

*Alia*



12-3-5-8







# MICHAELIS ET TMÜLLERI PHILOS. ET MED. D.

Hujusque in Illust. Lipsiensi Academia Profefs. Publ. & Practici,  
dum viveret, longè felicissimi & celeberrimi,

## OPERA OMNIA MEDICOPHYSICA, THEORETICA ET PRACTICA. EDITIO POSTREMA,

Accuratissimè ad mentem Auctoris recognita, mendis omnibus castigata, ac prioribus Editionibus  
duplo auctior, utpotè quæ omnes Auctoris Tractatus, Exercitationes, ac Collègia,  
ab eodem tam publicè, quàm privatim habita, congruis in locis harmonicè  
connexa complectitur, ut nihil ampliùs desiderari queat.

*Cum Indice locupletissimo ad calcem totius Operis.*

## TOMUS SECUNDUS.



## VENETIIS · M·DCC·

Apud Joannem Jacobum Hertz.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.









# S E R I E S M A T E R I A R U M E T T R A C T A T U U M

In Secundo hoc Tomo contentorum.

COLLEGIUM PRACTICUM  
DOCTRINALE.

L I B E R I.  
Praxeos.

<b>P</b> ROLOGUS GENERALIS.		SECT. I. D <small>E</small> Appetitu Animalis & Fame laesa. Pag. 30	
P <small>ag.</small> PROLEGOMENON.	1	C <small>AP.</small> I. D <small>E</small> Inappetentia, Anorexia, seu Fame imminuta.	31
C <small>AP.</small> I. D <small>E</small> Facultatibus Medicamentorum.	2	C <small>AP.</small> II. D <small>E</small> Appetitu depravato.	37
C <small>AP.</small> II. D <small>E</small> Constitutione Corporis Humani Vitali, ejusque Lezionibus in genere.	4	Art. I. D <small>E</small> Fastidio seu Aversione determinata.	Ibid.
C <small>AP.</small> III. Præctica generalia circa Facultatem Vitalem.	6	Art. II. D <small>E</small> Plea & Malacia.	Ibid.
Art. I. D <small>E</small> Motu Sanguinis Circulatorio.	Ibid.	Art. III. D <small>E</small> Fastidio Alimentorum.	41
Art. II. D <small>E</small> Motu Sanguinis Intestino & inde orta Cacoehymia.	7	C <small>AP.</small> III. D <small>E</small> Appetitu Nimio.	41
Membr. I. D <small>E</small> Cacoehymia Acida.	9	Art. unic. D <small>E</small> Appetentia Canina.	Ibid.
Membr. II. D <small>E</small> Cacoehymia Alcalina.	Ibid.	SECT. II. D <small>E</small> Siti laesa.	44
Membr. III. D <small>E</small> Cacoehymia Pituitosa & Serosa.	10	C <small>AP.</small> I. D <small>E</small> Siti Nimia.	Ibid.
Membr. IV. D <small>E</small> Succorum Cacoehymicorum Evacuantibus Universalibus.	11	C <small>AP.</small> II. D <small>E</small> Siti defectu.	47
Tit. I. D <small>E</small> Vomitoriis.	Ibid.	C <small>AP.</small> III. D <small>E</small> Siti depravata.	48
Tit. II. D <small>E</small> Purgantibus per alvum.	16	SECT. III. D <small>E</small> Alimentorum Masticatione.	48
Tit. III. D <small>E</small> Diureticis.	24	C <small>AP.</small> I. D <small>E</small> Musculorum Masticationi inservientium vitis, in specie de Spasmo Cynico & Tortura oris.	49
Tit. IV. D <small>E</small> Sudoriferis.	26	C <small>AP.</small> II. D <small>E</small> Maxillarum vitis.	50
C <small>AP.</small> IV. D <small>E</small> Feculente Animalis.	27	Art. unic. D <small>E</small> Dentium Stridore.	Ibid.
C <small>AP.</small> V. D <small>E</small> Auctoribus Practicis.	29	C <small>AP.</small> III. D <small>E</small> Dentium Vitis.	Ibid.
		Art. I. D <small>E</small> Dentium Defectu.	50
		Art. II. D <small>E</small> Dentium Carie, Factore & Vermibus.	51
		Art. III. D <small>E</small> Lapide Dentali seu Lithodonto.	52
		Art. IV. D <small>E</small> Dentium Vacillatione.	53
		Art. V. D <small>E</small> Dentium Stupore.	55
		Art. VI. D <small>E</small> Dentium Algore.	Ibid.
		SECT. IV. D <small>E</small> Deglutitione laesa.	Ibid.
		SECT. V. D <small>E</small> Chylificatione laesa.	57
		C <small>AP.</small> I. D <small>E</small> Chylis Imminuta & Abolita.	58
		C <small>AP.</small> II. D <small>E</small> Flatibus in Stomacho & Intestinis.	64
		SECT. VI. D <small>E</small> Assumtorum in Stomacho Retentionis, laesione.	68
		C <small>AP.</small> I. D <small>E</small> Vomitu & Nausea.	68
		C <small>AP.</small> II. D <small>E</small> Vomitu Cruento.	75
		SECT. VII. D <small>E</small> Doloris Symptomatum Stomachi.	77
		C <small>AP.</small> I. D <small>E</small> Angustia & Anxietate Præcordiorum.	Ibid.
		C <small>AP.</small> II. D <small>E</small> Cardialgia.	78
		C <small>AP.</small> III. D <small>E</small> Ardore Ventriculi.	85
		SECT. VIII. D <small>E</small> Fecum Avasculari à Chylo Separatione & Succorum Pancreatici & Fellei Effervescencia vitiosa.	86
		SECT. IX. D <small>E</small> Contentorum in Intestinis Expulsione laesa.	88
		C <small>AP.</small> I. D <small>E</small> Expulsione Alvi Contentorum diminuta.	Ibid.
		ART. I. D <small>E</small>	



Art. I. De <i>Atvi</i> Retentione.	Pag. 88	CAP. X. De Variolis & Morbillis.	Pag. 318
Art. II. De Passione Iliaca.	94	CAP. XI. De Febre Searlatina.	329
CAP. II. De Expulsione Contentorum aucta.	100	CAP. XII. De Peste & Febribus Pestilentialibus.	329
Art. I. De Diarrhoea.	Ibid.	De Pestis Symptomatibus.	339
Art. II. De Cholera.	109	SECT. XVI. De Sanguinis ex Corde in Partes Motu, adeoque Cordis, hinc & Arteriarum Pulsu lesio.	345
Art. III. De Lienteria.	113	CAP. I. De Cordis Palpitatione, & huius cognato Tremore.	346
Art. IV. De Celiaca.	115	CAP. II. De Palpitatione Arteriarum particulari.	351
CAP. III. De Expulsione Contentorum <i>Atvi</i> depravata.	117	CAP. III. De Lipothymia, Syncope & Virium prostratione.	352
Art. I. De Dysenteria.	117	SECT. XVII. De Nutritione.	358
Art. II. De Tenesmo.	130	CAP. I. De Nutritione Partium lesa.	359
Art. III. De Fluxu Hepatico.	131	Art. I. De Atrophia, Tabe & Macie.	Ibid.
Art. IV. De Haemorrhoidibus.	133	Art. II. De Phthisi.	361
Art. V. De Ani Pruritu.	140	Art. III. De Aridura Partium.	373
SECT. X. De Contentis Intestinorum Praeternaturalibus, in specie de Vermibus seu Lumbricis Intestinorum.	140	CAP. II. De Nutritione Aucta.	375
SECT. XI. De variis Intestinorum Doloribus, in specie de Colica.	142	Art. unic. De Corpulentia Nymia.	Ibid.
SECT. XII. De Situ intestinorum mutato.	158	CAP. III. De Nutritione Depravata.	378
CAP. I. De Herniis.	Ibid.	Art. I. De Cachexia in genere.	Ibid.
CAP. II. De Ani Procidencia.	162	Art. II. De Leucoplegmatia & Anasarca.	384
SECT. XIII. De Chyli ad reliquas partes Motu & Distributione lesa.	164	Art. III. De Hydrope Universalis.	385
SECT. XIV. De Pulmonum & Respirationis usu.	174	Art. IV. De Ictero Flavio, Nigro, & albo.	400
CAP. I. De Inspiratione lesa.	175	Art. V. De Lue Venerea.	410
Art. unic. De Suffocatione.	Ibid.	De eius Symptomatibus, Gonorrhoea Gallica &c.	419
Membr. I. De Suffocatione à viis interclusis, in specie de Strangulatis & Submersis, & in specie de deglutitis.	Ibid.	Art. VI. De Malo Hypochondriaco, & ejus flammato gradu, Scorbuto.	427
Membr. II. De Suffocatione ex Gas variorum rerum.	176	De Symptomatibus Scorbuti.	448
Membr. III. De Suffocatione Convulsiva.	178	Art. VII. De Affectibus Cutaneis.	461
CAP. II. De Respiratione depravata.	178	Membr. I. De Scabie.	Ibid.
Art. I. De Asthmate.	179	Membr. II. De Pruritu.	464
Art. II. De Singultu.	193	Membr. III. De Lepra.	465
Art. III. De Incubo seu Epialte.	196	Membr. IV. De Elephantiasi Ardens.	466
CAP. III. De vitiis Expirationis lesa.	198	Membr. V. De Serpigne & Lychee.	Ibid.
Art. I. De Sternutatione.	Ibid.	Membr. VI. De Phthoribus.	467
Art. II. De vitiis Vocis.	200	Membr. VII. De Sudaminibus.	468
Membr. I. De Aphonia.	Ibid.	Membr. VIII. De Sironibus.	Ibid.
Membr. II. De Raucedine.	201	Membr. IX. De Varicis.	Ibid.
Art. III. De Tussi.	204	Membr. X. De Lentiginibus.	469
Art. IV. De Catarrho Suffocativo.	215	Membr. XI. De Ephemidibus.	469
SECT. XV. De Chyli in Sanguinem Transmutatione, Sanguinisque Fermentatione lesa.	220	Membr. XII. De Maculis Hepaticis.	Ibid.
CAP. I. De Febribus in genere.	223	Membr. XIII. De Gutta Rosacea.	470
CAP. II. De Febribus Intermittentibus.	236	Membr. XIV. De Cutis nigredine.	470
CAP. III. De Febribus Continuis.	262	Membr. XV. De Porrigine.	471
Art. I. De Febribus Ephemeris.	Ibid.	Art. VIII. De Capillorum vitiis.	Ibid.
Art. II. De Febribus Acutis Primariis.	263	Membr. I. De Calvitie.	Ibid.
In specie		Membr. II. De Capillorum defluvie.	472
1 De Febribus Ardentibus.	264	Membr. III. De Alopecia.	472
2 De Febribus Continuis compositis.	Ibid.	Membr. IV. De Pilorum Tinea.	Ibid.
3 De Lipyria.	265	Membr. V. De Plicis Polonica.	Ibid.
4 De Febribus Continuis cum Prunella.	266	SECT. XVIII. De Sanguinis ex Partibus Refluxu vitiato, & exinde orta Inflammatione, tam in genere, quam in specie.	472
5 De Febribus Colliquativis.	Ibid.	CAP. I. De Sanguinis in Parte quadam Stagnatione.	472
6 De Febribus Ardentibus Deliris.	267	Art. I. De Inflammatione in genere.	Ibid.
7 De Febribus Typhode, Elode, Hydrede.	Ibid.	Art. II. De Inflammatione Faucium.	478
8 De Febre Affode seu Anxiosa.	267	Membr. I. De Aphthis.	486
9 De Febre Lyngode seu Singultosa.	Ibid.	Membr. II. De Uvula exulcerata.	487
10 De Febre Phricode seu horrida.	Ibid.	Membr. III. De Uvula Prolapsu.	Ibid.
11 De Febre Semitertiana seu Hemitritica.	Ibid.	Art. III. De Inflammatione Stomachi, ejusque Abscessu.	488
CAP. IV. De Febribus Acutis Symptomaticis.	281	Art. IV. De Inflammatione Intestinorum.	489
CAP. V. De Febribus Lentis.	281	Art. V. De Inflammatione Ani.	490
Art. I. De Febribus Lymphaticis Glandularum Conglobatarum, in specie de Febribus Catarrhalibus.	282	Art. VI. De Mesenterii Inflammatione, aliisque affectibus, & inde orto Abscessu.	491
Art. II. De Febribus Lymphaticis Glandularum Conglomeratarum.	285	Art. VII. De Inflammatione Pancreatis.	493
Membr. I. De Febribus Lentis Primariis.	285	Art. VIII. De Omenti Tumoribus.	494
Membr. II. De Febre Epiala.	287	Art. IX. De Inflammationibus Partium Thoracis internarum, in specie, de Inflammatione Pleurae, Pleuropneumonia, Peri-pneumonia, Pleuritide vera & notba.	494
Membr. III. De Febribus Syncopalibus.	Ibid.	Art. X. De Inflammatione Hepatis & inde orto Abscessu.	506
Membr. IV. De Febribus Lentis Secundariis & Symptomaticis.	288	Art. XI. De Inflammatione Lienis.	501
Membr. V. De Febribus Hefticis.	289	Art. XII. De Renū Inflammatione & Exulceratione.	511
CAP. VI. De Febribus Malignis.	294	Art. XIII. De Inflammatione Vesicae Urinae.	511
CAP. VII. De Morbo Castrensi.	312	Art. XIV. De Inflammatione Membrarum Cerebri, seu Phrenitide.	511
CAP. VIII. De Petechialibus.	312	Art. XV.	
CAP. IX. De Febre Purpurata.	317		



Art. XV. De Oculorum Inflammatione vera & notha.

Pag. 516

Art. XVI. De Inflammatione Aurium, earumque ulcere.

523

CAP. II. De Sanguinis Extravasatione in peculiarem corporis  
cavitatem. 524

Art. unic. De Empyemate. 524

CAP. III. Art. I. De Hemorrhagia in genere. 530

Art. II. De Hemorrhagia Narium. 537

Art. III. De Gingivarum Hemorrhagia. 540

Art. IV. De Sputo Sanguinis. 540

SECT. XIX. De Motu sanguinis ad Viscera. 545

CAP. I. De Lienis affectibus. Ibid.

Art. I. De Lienis Intemperie vitiosa. 546

Art. II. De Lienis Conformatione laesa, & indurata Tu-  
more & Scirrhus. 547

Art. III. De Fermenti Splenetici laesione. Ibid.

CAP. II. De Hepatis laesionibus. 547

SECT. XX. De Seri superflui Salibus recrementosis imprae-  
gnati per Renes excretionis. 548

CAP. I. De Laesa Urinae in Renibus Secretione. 549

Art. I. & II. De Urinae Secretione imminuta & abolita.

549

Membr. I. De Ischuria Renali seu Urinae Secretione  
laesa. 550

Membr. II. De Calculo Renum. 554

Art. III. De Urinae Secretione nimis aucta. 568

Membr. unic. De Diabete. Ibid.

Art. IV. De Urinae depravatae in renibus Secretione.

571

Membr. I. De Urina Pingui & Oleaginosa. 572

Membr. II. De Mitsu Cruento. Ibid.

CAP. II. De Urinae per vesicam Excretionis laesa. 575

Art. I. De Urinae Excretionis abolita. 575

Membr. I. De Ischuria Vesicali. Ibid.

Membr. II. De Calculo Vesicae. 579

Art. II. De Urinae Excretionis aucta. 581

Membr. unic. De Urinae Incontinentia. Ibid.

Art. III. De Urinae Excretionis depravata. 583

Membr. I. De Stranguria. Ibid.

Membr. II. De Dysuria. 587

SECT. XXI. De Glandularum usu & natura Lymphae, ejus-  
que in glandulis Separatione & Motu debito lae-  
si, indeque ortis Catarrhis in genere & in specie.

589.

CAP. I. De Lymphae vitiosa Generatione. 590

CAP. II. De Lymphae vitiosa Distributione. 590

Art. I. De Affectibus Catarrhalibus. Ibid.

Art. II. De Coryza. 600

Art. III. De Tussi, Raucedine, aliisque Affectibus catar-  
rhalibus. 603

Art. IV. De Epiphora. 603

CAP. III. De Lymphae motu impedito, indeque orto Hydrope  
in genere & in specie. 603

Art. I. De Hydropebus Particularibus in genere. 604

Art. II. De Ascite Particulari. 605

Art. III. De Hydrocephalo. 608

Art. IV. De Hydrope Pectoris. 610

SECT. XXII. De Sanguinis Motu ad Corporis circumferen-  
tiam, factaque ibidem Insensibili Transpiratione.

611

CAP. I. De Sudore Nimio. 612

CAP. II. De Sudore Depravato. 612

CAP. III. De Sudore Deficiente. Ibid.

# LIBER II.

## Praxeos.

SECT. I. DE Spirituum Animalium Generatione ac Di-  
stributione laesa in genere, indeque Sensus &  
Motus laesionibus. Pag. 613

CAP. I. De Facultatis Animalis Affectibus in genere. 613

CAP. II. De Facultatis Animalis Affectibus in specie, seu

Morbis Capitis. 616

Art. I. De Vigilis nimis. Ibid.

Art. II. De Somno nimio. 621

Membr. I. De Cavo. 621

Membr. II. De Comate Somnolento, & Vigili seu Ca-  
taphora. 622

Membr. III. De Lethargo. 622

Membr. IV. De Nyctambulis. 622

Membr. V. De Catalepsi. 622

SECT. II. De Sensibus Externis, eorumque laesionibus.

629

CAP. I. De Visus laesionibus. 630

Art. I. De Visu abolito. 631

Membr. I. De impedito Radiorum Visualium per Pupil-  
lam Ingressu. Ibid.

Punct. I. De Palpebrarum Paralyfi. Ibid.

Punct. II. De Vngue seu Panno Oculi. 631

Membr. II. De Tunicae Corneae vitiiis. 634

Punct. I. De Nubecula, Albugine, & Sugillatione.

Ibid.

Punct. II. De Hypopio. 636

Punct. III. De Phlyctenis seu Oculorum Pastulis.

Ibid.

Membr. III. De Humoris Aquei vitiiis. 636

Punct. unic. De Cataracta & Glaucomate. Ibid.

Membr. IV. De vitio Nervi Optici. 640

Punct. unic. De Gustu Serena. Ibid.

Art. II. De Visu imminuto, & in specie de Nyctalopia

642

CAP. II. De Auditus laesionibus. 643

Art. unic. De Auditui imminuto, & abolito. 643

Membr. I. De Surditate. Ibid.

Membr. II. De Sonitu & Tinnitu Aurium. 646

CAP. III. De laeso Tactu. 649

Art. I. De Stupore. 649

Art. II. De Dolo. Ibid.

Art. III. De Artuum Doloribus lancinantibus & laceran-  
tibus. 655

Art. IV. De Odontalgia. 656

Art. V. De Dolo Oculorum. 659

Art. VI. De Aurium Dolo. 660

Art. VII. De Cephalalgia. 662

Art. VIII. De Doloribus Articularum, seu Arthritide,  
Podagra, & mala Isthadico. 674

CAP. IV. De laesionibus Gustus. 682

Art. unic. De Gustu imminuto & depravato. Ibid.

Membr. I. De Aphonia. 683

Membr. II. De Loquela amissa. 684

CAP. V. De laesione Olfactus. 685

Art. I. De Olfactu imminuto, aut abolito. 685

Art. II. De Polypo Narium. 686

Art. III. De Odoratu depravato & Ozena. 687

SECT. III. De Sensuum Internorum & Functionum Anima-  
lium laesione. 688

CAP. I. De Spirituum in Cerebro, & hinc Sensuum Organis  
inordinata seu praeternaturali Agitatione, inde-  
que orta Vertigine. 689

CAP. II. De Spirituum Animalium nimio & inordinato subin-  
de ac vitioso Motu in partes externas, motui di-  
catis, indeque ortis Convulsionibus, Moribus  
Convulsivis seu spasmis, & Epilepsia. 696

Art. I. De Convulsione Clonica & Epilepsia. 697

Art. II. De Convulsione Tonica. 710

Art. III. De Tremore. 712

CAP. III. De Spirituum Animalium Motu & Influxu abo-  
lito. 714

Art. I. De Apoplexia. Ibid.

Art. II.



Art. II. De Paraplegia.	Pag. 719
Art. III. De Paralyfi.	731
CAP. IV. De Operationum Rationalium defectu.	740
Art. I. De Ratiocinatione imminuta & abolita, & inde nata Memoriae lesione & Stupiditate.	640
Art. II. De Delirio in genere.	744
Art. III. De Delirio a causis internis.	746
Membr. I. De Phrenitide.	746
Membr. II. De Delirio Melancholico.	751
Membr. III. De Mania.	762
Art. IV. De Delirio a causa externa.	768
Membr. I. De Rabie.	768
Membr. II. De Tarantismo.	773
Membr. III. De Amore infans.	Ibid.
Membr. IV. De Philtris.	773

## LIBER III.

### De Morbis Sexui Virili propriis.

SECT. I. De Seminis vel potius Geniturae Virilis lesa Generatione.	777
CAP. I. De Seminis defectu aut insufficientia.	778
Art. I. De Testium Inflammatione.	781
Art. II. De Pneumatocoele.	783
Art. III. De Hydrocele.	783
Art. IV. De Testium Scirrbo.	785
Art. V. De Sarcocoele.	785
Art. VI. De Hernia Varicosa.	787
CAP. II. De lesa Geniturae Virilis retentione & excretionem.	787
Art. I. De Geniturae citra coitum excretionem.	787
Membr. I. De Gonorrhoea vera.	Ibid.
Membr. II. De Gonorrhoea notha.	791
Art. II. De nimis citra Geniturae ejaculationem.	792
Art. III. De Geniturae excretionem nimis tarda.	792
Art. IV. De Seminis excretionem abolita, & quidem.	793
Membr. unic. De Caruncula Penis.	793
SECT. II. De lesa Penis erectione.	793
CAP. I. De Penis erectione deficiente, & hinc oriunda Impotentia Virili.	794
CAP. II. De Penis erectione aucta.	797
Art. I. De nimia Salacitate.	Ibid.
Art. II. De Priapismo.	798
CAP. III. De Penis erectione depravata.	799
Art. I. De Phimosis.	799
Art. II. De Paraphimosis.	800
Art. III. De Penis Inflammatione.	800
Art. IV. De Penis Dolo.	Ibid.

## LIBER IV.

### De Morbis Mulierum.

SECT. I. De Fluoris Menstrui vitio.	Pag. 801.
CAP. I. De Mensum Emensione.	803
CAP. II. De Mensum Fluxu nimio.	811
CAP. III. De Mensum Fluxu depravato.	816
Art. I. De Mensum difficultate.	816
Art. II. De Mensum paucitate.	818
Art. III. De Mensum stillicidio.	818
Art. IV. De Mensum decoloratione.	819
Art. V. De Mensum fetore.	Ibid.
Art. VI. De erratico & inordinato Mensum Fluxu.	819
Art. VII. De Mensum per loca aliena effluxu.	820
CAP. IV. De Fluore albo.	820
SECT. II. De Appetitus Venerei vitio.	825
CAP. I. De Virginitate lesa.	825
Art. I. De Genitalium Muliebrium sophisticationem.	826
Art. II. De Mammarum sophisticationem.	Ibid.
CAP. II. De Appetitu Venereo lesa.	826
Art. I. De Appetitu Venerei defectu.	Ibid.
Art. II. De Appetitu Venereo aucto.	827
Membr. I. De Vteri & Genitalium Muliebrium Pruritu.	827
Membr. II. De Genitalium Pusulis & Scabie.	828
Membr. III. De Furore Vterino.	828
SECT. III. De Affectionibus totius corporis, quae sequi Sexui ex vitio Uteri vulgo contingere dicuntur.	830
CAP. I. De Chlorosi.	831
CAP. II. De Cachexia Muliebri.	832
CAP. III. De Passione Hysterica.	834
SECT. IV. De Viri admisione lesa.	847
CAP. I. De Vaginae Vterinae Angustia.	Ibid.
CAP. II. De Procidencia Vteri.	847
CAP. III. De Inflammatione Vteri.	850
CAP. IV. De Vteri ejusque Vaginae Viceribus.	850
SECT. V. De Conceptione lesa.	851
CAP. I. De Conceptione falsa.	854
Art. I. De Vteri Inflatione.	Ibid.
Art. II. De Vteri Hydrope.	855
Art. III. De Hydrope Pudendorum.	857
CAP. II. De Conceptione imminuta & abolita.	857
Art. unic. De Sterilitate.	Ibid.
CAP. III. De Conceptione aucta.	859
CAP. IV. De Formatione Fetus lesa.	Ibid.
Art. I. De Partu Monstroso.	Ibid.
Art. II. De Mola.	860
SECT. VI. De Regimine Gravidarum.	864
CAP. I. De Dieta Gravidarum.	864
CAP. II. De Fetus debili roborando.	865
CAP. III. De Gravidarum Regimine in morbis.	866
Art. I. De Venae sectione in Gravidis.	Ibid.
Art. II. De Purgatione Gravidarum.	Ibid.
Art. III. De Opiatorum usu in Gravidis.	Ibid.
CAP. IV. De Gravidarum Symptomatibus.	867
Art. I. De Vomitu Gravidarum.	867
Art. II. De Pica.	868
Art. III. De Nausea & Fastidio ciborum.	Ibid.
Art. IV. De Torminibus Ventr: Gravidarum.	Ibid.
Art. V. De Diarrhoea Gravidarum.	869
Art. VI. De Dolo. lumborum, coxendicium & pubis.	869
Art. VII. De Odontalgia Gravidarum.	870
Art. VIII. De Cordis Palpitatione & Syncope Gravidarum.	Ibid.
Art. IX. De Tussi Gravidarum.	870
Art. X. De Hemorrhagiis Gravidarum.	871
Art. XI. De Suppressionis Urinae in Gravidis.	872
Art. XII. De Stranguria in Gravidis.	872
Art. XIII. De Spasmodis Gravidarum.	Ibid.
Art. XIV. De Dolo. sensu, fissuris & rimis Abdominis in Gravidis.	873
Art. XV.	



Art. XV. De Aquarum ex utero effluxu immaturo in Gra-	Pag. 873
vidis.	
Art. XVI. De Tumore & Inflatione Crurum in Gravida.	874
Art. XVII. De Hydropo Pudendorum in Gravida.	874
Art. XVIII. De Varicibus Gravidarum.	Ibid.
Art. XIX. De Haemorrhoidum tumore in Gravida.	Ibid.
SECT. VII. De Partu & Parturientium Regimine.	875
CAP. unic. De Partus lesionibus.	876
Art. I. De Partu immaturo.	877
Membr. unic. De Abortu.	Ibid.
Art. II. De Partu situ vitioso.	881
Art. III. De Symptomatis in & circa Partum.	881
Membr. I. De Doloribus Parturientium notis.	881
Membr. II. De Partu difficili.	882
Membr. III. De Partu mortuo.	889
SECT. VIII. De Regimine Puerperarum.	891
CAP. I. De Secundinae retentione.	893
CAP. II. De Lochiorum vitio.	895
Art. I. De Lochiis retentis.	895
Art. II. De Lochiorum Fluxu nimio.	899
Art. III. De Lochiorum per loca aliena excretionem.	902
CAP. III. De Doloribus post Partum.	Ibid.
CAP. IV. De Lipothymia Puerperarum & Uteri Suffoca-	904
tione.	
CAP. V. De Insultibus Epilepticis Puerperarum.	905
CAP. VI. De Gravidarum Cephalalgia, Vigilis, & Delirio.	Ibid.
CAP. VII. De Pudendorum excoriatione.	Ibid.
CAP. VIII. De Tumore Pudendorum.	Ibid.
CAP. IX. De Fissuris labiorum Pudendi.	906
CAP. X. De Ruptura Vulvae seu Perinaei.	Ibid.
CAP. XI. De Inflammatione Uteri cum Gangraena.	906
CAP. XII. De Haemorrhoidibus caecis.	907
CAP. XIII. De Aluo suppressa Puerperarum.	Ibid.
CAP. XIV. De Diarrhoea Puerperarum.	907
CAP. XV. De Incontinentia Urinae Puerperarum.	908
CAP. XVI. De Suppressione Urinae Puerperarum.	Ibid.
CAP. XVII. De Ventris Rugis.	908
CAP. XVIII. De Febris Puerperarum.	Ibid.
Art. I. De Febre Lactea.	909
Art. II. De Morbis Acutis Puerperarum.	910
Art. III. De Purpura seu Febre Miliari Puerperarum.	912
SECT. IX. De Lactis & Lactantium vitio.	914
CAP. I. De Lactis defectu.	915
CAP. II. De Lactis abundantia.	916
CAP. III. De Lacte in Mammis depravato, & variis indena-	918
tis Affectibus.	
Art. I. De Coagulatione Lactis.	Ibid.
Art. II. De Abscessu Lactantium.	919
Art. III. De Mammarum Fistulis.	920
Art. IV. De Inflammatione Mammarum.	Ibid.
Art. V. De Erysipellate Mammarum.	921
Art. VI. De Scirrbo Mammarum.	922
Art. VII. De Scrophulis seu Strumis Mammarum.	922
Art. VIII. De Cancro Mammarum.	923
CAP. IV. De Lactatione lesa.	924
Art. I. De Papillarum defectu.	Ibid.
Art. II. De Fissuris Papillarum.	Ibid.

# LIBER V.

## De Morbis Infantum.

CAP. I. De Infantum Regimine.	Pag. 925
CAP. II. De Morborum Infantum origine.	926
CAP. III. De Retentione excrementorum in Fetu.	927
Art. I. De Retentione Meconii.	Ibid.
Art. II. De Transpirationis occlusionem.	927
Art. III. De Vitio Lactis.	928
Art. IV. De Vitio Pulvis.	931
CAP. IV. De Morbis Infantum praecipuis.	932
CAP. V. Morbi Infantum speciales.	936
Art. I. De Torminibus Ventris.	Ibid.
Art. II. De Inflatione & Tensione Hypochondriorum.	939
Art. III. De Anorexia & Vomitu.	939
Art. IV. De Singultu.	940
Art. V. De Alvi adstrictione.	941
Art. VI. De Intertrigine.	942
Art. VII. De Umbilici Prominentia.	942
Art. VIII. De Umbilici Inflammatione.	Ibid.
Art. IX. De Anproidentia & Tensio.	943
Art. X. De Urina suppressione.	943
Art. XI. De Incontinentia Urinae.	944
Art. XII. De Hernia Infantum.	944
Art. XIII. De Scroto tumore aquoso.	945
Art. XIV. De Aphtho.	945
Art. XV. De Vigilis nimis.	946
Art. XVI. De Pavoribus in somno.	947
Art. XVII. De Epilepsia.	947
Art. XVIII. De Dentitione Infantum difficili.	950
Art. XIX. De Dentitione notis.	951
Art. XX. De Diarrhoea Infantum.	Ibid.
Art. XXI. De Lumbricis.	952
Art. XXII. De Verme Umbilicali.	954
Art. XXIII. De Tussi.	954
Art. XXIV. De Obstructione Narium in Infantibus.	956
Art. XXV. De Crusta lactea, seu Achoris, Favus, & Tinea.	956
Art. XXVI. De Affectu Pediculari, seu Phthiriasi.	959
Art. XXVII. De Variolis & Morbillis.	960
Art. XXVIII. De Subluxatione Infantum.	964
Art. XXIX. De Macie & Atrophia Infantum.	964
Caus. I. De Nutrimenti defectu.	964
Caus. II. De Lumbricis.	964
Caus. III. De Crinonibus seu Comedonibus.	964
Caus. IV. De Pusorum Lacteorum & Glandularum Mesenterii obstructione.	965
Caus. V. De Fascinatione Puerorum.	966
Art. XXX. De Febris Infantum.	966

# LIBER VI.

## Chirurgia Medica.

PROOEMIUM.	Pag. 969
CAP. I. De Tumoribus in genere.	970
Art. I. De Tumoribus Sanguineis.	975
Membr. I. De Inflammatione.	Ibid.
Membr. II. De Ecchymomate & Suffusionibus Sanguinis.	976
Membr. III. De Erysipellate seu Rosa.	978
Art. II. De Tumoribus & Abscessibus Cruribus.	979
Membr. I. De Bubonibus.	Ibid.
Membr. II. De Parotidibus.	980
Membr. III. De Carbunculis.	981
Membr. IV. De Furunculis.	982
Membr. V. De Phymatis.	Ibid.
Membr. VI. De Phygelidis.	Ibid.
Membr. VII. De Paronychia.	982
Membr. VIII. De Pernionibus.	983
Art. III. De	



<b>Art. III. De Tumoribus ex Lymphae vitio.</b>	<b>Pag. 983.</b>	<b>Art. VII. De Vulnerum Symptomatis.</b>	<b>Pag. 1009</b>
Membr. I. De Oedemate.	984.	Membr. I. De Vulnere, Inflammatione.	Ibid.
Membr. II. De Scrophulis.	985.	Membr. II. De Vulnere Erysipelate.	1009
Membr. III. De Scirrhus.	986.	Membr. III. De carne in Vulnere luxuriante.	Ibid.
Membr. IV. De Cancro.	987.	Membr. IV. De Vulnere Doloribus.	Ibid.
Membr. V. De Gummatis Gallicis.	988.	Membr. V. De Synovia.	Ibid.
Membr. VI. De Tumoribus recidivantibus.	989.	Membr. VI. De Partium vulneratarum Convulsione.	1010
Membr. VII. De Callis, Gangliis, & Sarcomatis.	989.	Membr. VII. De Partium vulneratarum Atrophia.	1010
Membr. VIII. De Excrecentiis.	990.	Membr. VIII. De Febris Vulnerariis.	Ibid.
Membr. IX. De Testudine, Talpa, seu Lupia.	991.	<b>CAP. III. De Ulceribus in genere.</b>	1011
Membr. X. De Verrucis, Clavis & Cornubus.	Ibid.	Art. I. De Carie Ossium.	1015
Membr. XI. De Fungo.	992.	Art. II. De Fistulis seu Ulceribus Stenosis.	1016
<b>Art. IV. De Tumoribus Vasorum sanguifluorum.</b>	992.	Art. III. De Fistula Lacrymali.	1017
Membr. I. De Aneurismate.	Ibid.	Art. IV. De Ulceribus sordidis & putridis.	Ibid.
Membr. II. De Varicibus.	993.	Art. V. De Ulceribus Dyssepulcricis seu Phagedenis.	1018
<b>CAP. II. De Vulneribus in genere.</b>	994.	Art. VI. De Ulceribus Cancrosis.	1019
Art. I. De Vulneribus cum Contusione.	1004.	Art. VII. De Ambustione.	1020
Membr. unic. De Sclopetorum Vulneribus.	1004.	<b>CAP. IV. De Luxationibus.</b>	1022
Art. II. De Vulneribus malignis & venenatis.	1005.	CAP. V. De Fracturis.	1023
Art. III. De Vulneribus Venarum & Arteriarum.	1006.	<b>CAP. VI. De Gangrena &amp; Sphacelo.</b>	1029
Art. IV. De Nervorum Vulneribus.	1007.	<b>APPENDIX. Praevis Extraordinariis.</b>	1032
Art. V. De Pectoris Vulneribus.	1008.		
Art. VI. De Capitis Vulneribus.	Ibid.		







I. N. 7.

# MICHAELIS ETTMÜLLERI

PHILOSOPH ET MEDICINÆ DOCTORIS,  
Facultatis Med. Adsefforis, & P. P.

## COLLEGIUM PRACTICUM DOCTRINALE.

### PROLOGUS GENERALIS.



Um placeat vobis mecum vosmet exercere in Praxi, non possum non facere, quin facilem me præbeam, atque exorato Divino Numine, ad eam me accingam. Quod hanc itaque attinet: dividitur vel in *Vulgarem* seu *Ordinariam*, vel *Extraordinariam*. *Vulgaris* seu *Ordinaria*, quam hoc loco pertractabimus, adhuc est manca, & in quamplurimis mutila, idque duabus ex causis:

I. Est defectus sufficientium experimentorum in Macro- & Micro-cosmo, super quæ solida Theoria, hoc est aliorum, minus sensibus obviatorum phenomenon, ex illis sensibus nobilioribus observatis, eorumque fiendi modis, applicatio & fiendi ratio fundari possit. Ob id tam studiosè hodie excolitur Chymia & Anatomia, ut ibidem ex observatis Microcosmis melior corporis humani operationum notitia, partim per Anatomiam, partim per Chymiam detecta, etiam obtineri queat. Ex his Pathologia constituitur.

II. Causa est defectus genuinorum & generosorum remedium in Praxi tam universalium, quam genuinorum specificorum, quæ nempe in se efficacitas sunt, & sine stomachi labore pharmaceutico, sponte suâ vim medicamentosam exerant. Unde qui supra vulgatam & ordinariam Praxin in Medicina excelluerunt Practici, hoc vel ope solidioris Theoriæ, vel ratione generosorum remedium, præstiterunt. In quibus ultimis sublimiores Chymiaci, ac horum antesignani BASILIUS VALENTINUS, PARACELSUS, HELMONTIUS, POTERIUS, &c. excelluerunt.

Hinc in Praxi vulgari ratione prioris, Theoriæ nempe, defectu vix circa radicem morbosam, sed potius circa ejus producta, versari datur: Ratione posterioris interdum anus aut Empiricus meliùs, maximè industrius & erudito Medico, curare observatur, & tam sæpè affectus in se curabiles incurabilium inscribuntur catalogo.

Dixi: Praxin vulgarem vix circa radicem morbosam, ut plurimum minus cognitam, à priori hæcenus imperiscurabilem, occupari, sed vel circa causam occasionalem, vel circa productum morbosum tantum, hoc vel corrigendo vel tollendo; unde sæpiùs

*Ettmüll. Oper. Tom. II.*

à posteriori, rariùs à priori, curare solemus. Rem exemplo declarabo: Spina digito infixâ externè, vel internè vitiosum fermentum, spinæ instar lædens, sensit, ut ibi externè Tumor, inflammatio, abscessus in chirurgia; hic verò internè affectus chronici frequentius ex digestionem partis cujusdam, vel publica vel privata, læsa, Acuti verò ex fermento peregrino, aut sanguinem aut spiritum inquinante, proficiantur. Hinc si spina maturè removeatur, omnia evanescent symptomata; qui verò vel anodynis, vel discutientibus, vel maturantibus, negotium tractant, naturæ quidem motum imitantur, & eam adjuvant; sed à posteriori saltim, quam à priori, spinæ nempe evulsione, commodiùs levare potuissent. Sic in maligna febre contagium insensibile est, quod morbum infert; hoc vel sublato, vel appropriato remedio destructo, cessat febris: Contagium est leve, quod in lue Venerea peccat, & fermenta digestiva hebetat; hoc sublato, faciliè omnia curantur, quæ difficillimè & tediosissimè per sudores aut salivationes aliàs mitigantur: Sic fermentum aut spina est exile, quod circa unum ac tantillum effluvium acrius, nares insigniter vellicans, impetuosum sternutationis spasium facit; his sublatis, vel per appropriata correctis, cessant effectus; qui per opium à posteriori saltim palliantur. Sanè frequentissimè in Praxi occurrit, ut non nisi à posteriori productis morbois ac symptomatis occurratur, à priori verò causa seu spina intacta relinquatur; idque vel ob causæ genuinæ ignorantiam, vel appropriati remedii defectum, Medicis ignorantibus optimè se agere opinantibus, scientibus verò tacite ingemiscantibus, & suos defectus adhuc deplorantibus.

Per *Extraordinariam* Praxin intelligo eam, quæ raro instituitur & observatur, eaque differt à vulgari seu ordinaria duobus modis:

I. Ratione remedium.

II. Ratione modi.

Illo, dum administrantur remedia, tam vulgaria quam sublimiora & generosa, *arcana* dicta, plus in recessu habentia, legitimè tamen methodo, quibus paucis citò, tuto, & jucundè curatur: Hoc, dum Praxis per Curas magneticas, transplantatorias & amuleta, instituitur. Hinc in talibus medicandis rationibus nec venæ sectionibus, nec fonticulis & vesicatoriis, nec purgantibus, tantoperè opus habemus, quia sola data vomitoria, & diuretica ac sudori-

A

dori-



dorifera, applicata cum appropriatis, utramque faciunt paginam.

Ut ergo reformetur Praxis Ordinaria, & Theoria magis perficienda per repetita experimenta & Observationes Anatomicas & Chymicas, & hinc remediis vel appropriatis particularibus, vel generosis universalibus, adeoque plurimis scopis satisfaciendis, sedulo opera danda erit. De utraque Praxi hic agemus, ad finem reservabimus, & appendicis loco in aliquibus Lectionibus prosequemur.

Ad Ordinariam pergo, in qua non levis varietas est, ratione methodi, quam ratione remedium; hanc igitur, quantum possibile, correctam jam dabo: in qua circa quemvis affectum præternaturalem ordine pertractandum, quinque capita observanda veniunt, quibus consideratis, totus morbus innotescit.

I. Caput *Historia morbi* est, ubi enarratur Invasio & Modus, affectusque Accidentia, ubi sic omnis diagnosi ejusdem, & omnia signa dignoscantur & eruantur.

II. Subjectum seu *Pars Affecta*: ubi distinguendum est inter *subjectum Inhaesionis* & *Radicationis*. *Subjectum Inhaesionis* est istud, quod maxime & primario afficitur: *Subjectum Radicationis* vocatur proprie focus somesque morbi, & quod maxime fuscitabulum est causæ morbificæ. Dabo exemplum: Multi laborant vertigine, idque ob stomachi vitium; ubi subjectum inhaesionis est caput, vel cerebrum, radicationis verò stomachus.

III. Caput erit *Cognitio & Evolutio causarum*, tam remotæ quam proximæ, tam materialis quam formalis, seu considerentur tam in se, quam respectu alterationis præternaturalis, quam corporis quibusvis partibus inducunt. Sub his causæ nonnaturales, naturales & præternaturales complectuntur, item characteres hæreditarii, & contagia extrinseca.

IV. *Prognosis*, quæ in unoquoque affectu determinanda, vel rite instituenda est.

V. Est *Methodus Medendi seu curatio affectus*, quæ complectitur tam methodum medendi generalem (nam generalia debent præcognita esse, antequam ad specialia fiat progressus) quam specialem cum cau-

telis Practicis, cum jam in specie pertractandi sint affectus; & remedia, simplicia & composita, nunc universalia, nunc specifica, interna & externa; unâ cum Casibus, Historiis & Observationibus Practicis.

Theoria autem & Praxis Medica in antecessum præsupponenda: Ubique observandum est, ut super fundamenta Chymica & Mechanica, adeoque experimenta, Theoria & Praxis Medica sulciatur, ac res difficilis & obscura in Tyroni gratiam dilucidetur, ita ut in functionibus naturalibus primatum obtineant experimenta Chymica, in animalibus verò Mechanica aut Mechanico-Mathematica. Nam corpus nostrum est machina hydraulico-pneumatica, cujus movens liquor spirituosus per Chymia explicandus: siquidem natura semper & ubique geometrizat. Jam verò, si rite & cum laude Praxin aggredi, inque ea feliciter progredi velitis, ante omnia quatuor præsuppono necessaria vobis præcognita:

I. Ut exacte calleatis seu cognitam ac perspectam habeatis naturam *subiecti Medicinæ naturaliter constituti*, ut bene sciatis, quomodo fiant naturales corporis humani operationes & functiones, uti & præternaturalem statum: *Natura enim seu rectum est norma, ad quam eam naturam emendatur præternaturale seu curvum*. Uno verbo: calleatis Physiologiam & Pathologiam, adeoque cognita sit vobis Theoria secundum varietatem Thesum & hypothesisum, tam veterum quam recentiorum.

II. Requiro, ut exacte *litis versati in materia Medica* secundum omnia tria regna.

III. Tertium est, ut cognita sit vobis *Pharmacia*, i. e. præparationes medicamentorum, & artificiosæ compositiones: Nisi enim cognitas habeatis simplicium vires, & componendi rationem seu methodum præscribendi formulas, certum est, quod in multis habebitis impedimenta in Praxin.

IV. Nec sine commodo præsupponitur cognitio methodi generalis, cui specialis hæc ed melius superstruetur.

Pergo ad rem, & quidem duabus aut tribus lectionibus tractabo Prolegomena, seu ea, quæ erunt fundamentalia in omni Praxi: appetent præcipiantur, quia continent fundamentum dicendorum.

## P R O L E G O M E N O N.

### C A P U T I.

#### DE FACULTATIBUS MEDICAMENTORUM.

Cum totius corporis œconomia, tam naturalis quam præternaturalis morbosa, à modernis per principia mechanica, secundum particularum minutissimarum, ex quibus omnes ejus partes, tam continentes quam contentæ, constant, figuram, magnitudinem, situm; & inde natam texturam, eorumque motum & quietem explicantur, hæcque hypothesis per experimenta Chymica optime illustratur; ob id etiam medicamentorum Facultates, secundum quas certam vim habent alterandi corpus, & inde natos eorundem effectus, optime ex iisdem principiis materialibus deducuntur.

Adeoque simplicium quorumcunque in tribus regnis vires & proprietates non ex suppositis potius, quam demonstratis, Elementorum manifestis quatuor Qualitatibus primis, multò minus ex ignoratis hæcenus occultis proprietatibus determinandæ sunt; sed ex specifica eorum virtute, ex singulari nempe particularum materialium textura in unoquoque subiecto definiendæ erunt, quæ ipsa ex semine primam suam nanciscitur originem, adeoque *textura talis materialis intrinseca quasi nucleus medicamentosus crasis seminalis* ob id vocari solet.

Ut rem exemplo declarem: Cochlearia scorbutum curat, non quatenus præsupponitur calida, sed ex specifica textura particularum ejus minutissimarum; dum nempe hæc constituunt concretum adeo acre, subtile, penetrans, quod acidum vitiosum in scorbuto peccans sui miscelæ corrigit, destruit, & in aliam quasi naturam transmutat,

cujus texturæ nucleus seu specifica crasis in istis volatilibus & acris particulis, seu, ut aliàs vocantur, sale volatili acri, præcisè consistit; reliquo corpore ceu effato nihil virtutis medicamentosæ antiscorbuticæ obtinente: Sicut etiam Creta Sodæ seu ardori ventriculi succurrit, non quatenus frigida, sed quatenus minutæ particule ita sunt conformatae & contextæ, ut quæcunque acida, quæ attingunt, mox imbibant, & ita cum acido in stomacho novum concretum invicem efficiant; quò fit, ut vitiosa ista effervescencia, quæ ab acido antea fiebat, remittebat, & consequenter Soda cesset.

Textura talis minutissimarum particularum in concretis, earumque seminalis crasis, cum certò à priori definiri adhuc nequeat, ob id secundum particularum quarundam in concreto magis prædominantium, in specie per particularum salinarum, *acidi nempe & alcali seu urinosi*, proprietates circumscribi solet; Quia

I. Distæ salinæ particule pro materialium textura primatum obtinent inter alias, nempe pingues seu sulphureas, aqueas, terreas particulas, ut hæc ipsæ omnes probabilissimè ex aqua fosa primam habeant originem.

II. Quia ex iis effectus quam plures materiales deduci possunt.

III. Quia aliàs in omnibus tã naturæ quã artis operibus mirabiles planè ac simul potentes se exhibent; Et

IV. Ipsa simplicia & particularia remedia saporum variorum



rum sensu, proximè ex salinis principiis derivandorum, ceu tot differentiis medicamentorum crasseos indicibus se nobis subinde exhibeant.

Habemus enim *Acida & Alcalina* in Vegetabilibus salina principia: Illa in acetosis fructibus, succis, lignis, &c. Hæc in antiscorbuticis, vulnerariis, &c. In animali regno præ cæteris sal alcali volatile, copioso oleo temperatum (sub quo occultatum est acidum) luxuriat: In mineralibus verò imprimis acidum dominatur, nunc crudum, nunc pinguedinis tegmine sulphureum, quod vel fixius, adeoque temperatius & nobilius, ut in metallicis, vel volatilius & acrius, ut in reliquis.

Cæterum sub generali isto acidi & alcali conceptu specialis horum in unaquaque specie, & ut dixi, seminalis differentia attendenda est, secundum quam specificas & sibi proprias qualitates seu dotes obtinent: hinc v. g. sal alcali in Armoracia specificum est antihypochondriacum: Sal volatile oleosum in chelidonio majori specificum anti-ictericum: acidum spiritus salis est speciale diureticum: acidum spiritus nitri est specificum Carminativum, &c.

Quoad speciales ac simplicium & inde paratorum remedium vires, ea quæ *Calida* dicuntur, ut piper, sinapi, aliaque: operantur, vel quatenus immediate sensus afficiunt, nempe linguam, & ita eam partium quarundam acrimoniâ feriunt, quæ dilatur fibras & nervulos ita subeunt, ac si essent ignis corpuscula, uti hoc per spiritum nitri illustrari potest: vel quatenus mediate tales particulæ massam sanguineam dissolvere, fermentationem ejus ratione salis volatilis oleosi intendere, & ita ejusdem incalescentiam, & consequenter caloris in partibus sensum augere valent; qualia sunt salia volatilia oleosa, imprimis olea destillata, aut spiritus inflammabiles, quia sulphur sanguinis insigniter dissolvunt, ejus resolutionem promovent, & ita sanguinis incalescentiam augent.

*Frigida* e contra sunt, quæ vel nullam talem impressionem motivam in partes sensiles faciunt, vel eam ab aliis particulis commotis exaltatam sistunt, quâ ratione saturnus frigidus, & inflammationes arcere dicitur: vel quatenus Massam sanguineam plus minus inspissando, aut fermentationem ejus intensiorem coercendo, conceptum ejus calorem ita infringunt; uti interno usu sunt acida, & imprimis nitrata.

*Sicca* sunt ea, quæ substantiam humidam corporis, vel roridam nutritivam, vel serosam distributivam velut imbibuntur; calcinata omnia, v. g. cornu cervi ustum, aut eandem dispergunt, & resolvunt, ut evacuantia omnia, imprimis sudorifera.

*Humida* e contra erunt, quæ vel substantiam talem suggerunt, ut probè nutritiva temperata, passulæ, amygdalæ dulces; item potulenta, cerevisia, &c. vel illorum absorptionem sistunt, ut blanda anodyna, & quascunque evacuationes inhibentia.

Invaluit hætenus falsa persuasio, quod quam plurima simplicia ceu *Aperitiva* ad viscerum, hepatis, lienis, mesenterii, &c. obstructions, utut serè semper imaginarias, cor mendentur: cum tamen talia, v. g. Absinthium, Centaurium minus, filix, salia fixa & volatilia, spiritus salis ammoniaci, Martialia, acidulæ, &c. proflint saltim, quatenus vitiosos & præternaturales in corpore succos acres, salios, & acriores, in specie acidos, & inde vitiatam sanguinis crasin, indeque derivata præternaturalia vitia bilis, lymphæ, succi pancreatici, digestionum errore subnata, corrigunt, emendant, & in statum naturalem reducant, nunc acidum nimium destruendo, nunc idem austerum corrigendo, nunc bilem inertem sale volatili acuendo, nunc acriorem oleoso temperando &c. siquidem ab horum succorum ametria, indeque natis vitiosis effervescentiis in primis viis, & inde læsa sanguinis fermentatione naturali, non autem à fictis obstructionibus, morbi in specie chronici oriuntur; unde talia aperientia putata propriè *Alterantia* appellanda erunt.

*Alterantia* autem ista in genere bino modo prodesse observantur:

I. Quatenus acidum vitiosum in corpore, in specie circa primas vias, destruunt; illud vel absorbendo, ut Martialia, terrea, calcinata; vel istud sui miscellâ in salum tertium transmutando, ut alcalia, tam fixa quàm volatilia; vel illud temperando, ut oleosa seu pingula, tam volatilia quàm fixa: quæ inter

Estmull. Oper. Tom. II.

primi generis etiam *Invertentia*, & respectu effectus vescentiæ ab acido inductæ *Præcipitantia*, appellari solent.

II. Quatenus alcali vitiosum in corpore, imprimis bilem & massam sanguineam corrigunt & emendant; istud vel acuendo simili alcali; vel temperando acidis, item oleosis seu pinguibus: Nam & hæc duo, acidum & alcali, ex quorum conjunctione compositum tertium emergit, ut in Macrocosmo, ita & in microcosmo, primariam merentur considerationem.

Præter alterantia hæc generalia, quæ universaliter vel acida vel amara, &c. corrigunt, ad alterantia specialia, quæ specialem causæ morbosæ peccantis nocendi rationem corrigunt, vel alterant, *specificæ* seu *appropriata* dicta, respiciendum: scilicet absinthium febribus tertianis in specie, China Chinæ Quartanis, Myrrha Mensium defectibus, &c. medentur, utut sub generali amarore generaliter sale volatili oleoso, acidi peccantis destructivo, polere dicantur.

Interim duo hæc acida, acidum & urinosum, corrigentia, sunt medicamenta temperata nullâ salium facultate excedentia, indeque sapore dulci aut planè nullo, aut blanda oleositate vel mucilaginositate se nobis exhibentia, ut sunt passulæ, Glycyrrhiza, amygdalæ dulces, semina frigida, mucilago seminis cydoniorum, sulphur commune, Gummi Arabicum, lac, pinguedines animalium, &c. Hæc ipsa interne acie quodcumque, in specie salium dum obtundunt, dicunturque *Temperantia*: dum quasi inviscant, dicuntur *Incrassantia*: dum fauces leniunt, & recrementis tussi eiciendis quasi vias lubricant, dicuntur *Expectorantia*: dum extrâ imposita acie dolorosum mitigant, & ita fibrarum ex dolore spasmodum seu crispaturam remitti faciunt, *Anodyna*: dum eodem modo moderate ab acido coagulatos succos blandè fundunt, *Emollientia*: dum acrimoniam temperant, & temperando utrumque acre, horum amicam unionem in salum tertium, adeoque pus promovent, *Maturantia* seu *Suppurantia* dicuntur.

Emollientibus contrariari videntur, *Adstringentia* dicta, quæ ratione texturæ stypticæ quodammodo austeræ, in specie ex terreo cum acido plus minus compositæ, operantur, & vel fluida quodammodo incrassando aut coagulando sistunt, vel fibras partium sui additione stringunt, & ita angustant, ut alumen, terræ metallicæ cum acidis, animalium partes calcinatæ, plantago, gallæ, acacia nostras, &c.

Ad ista alterantia pertinent etiam *Febrifuga* dicta, quæ febribus intermittentibus in specie medentur; & operari videntur, quatenus fermentum acidum febrile obtundunt, figunt, alterant, & destruunt: qualia sunt alcalia, & his cognata, tam volatilia, ut spiritus salis ammoniaci, absinthium, centaurium minus, carduus benedictus, quàm fixa, ut antimonium diaphoreticum, mater perlarum calcinata, sal fixum absinthii, &c. Quinimò pertinent etiam ad ista ea, quæ *Mense pellerè* dicuntur; & vel acidum simpliciter absorbendo, ut Martialia; vel substantiâ suâ volatili sanguini certam fermentativam turgentiam conciliando, ut volatilia, myrrha, crocus, rosmarinus, spiritus & sales volatiles, &c. operationes suas exercent.

Ad alterantia ista etiam *vulneraria* pertinent, quæ acidum præternaturale & vitiosum, mitius quidem in vulneribus, acrius in ulceribus, blando suo & temperato alcali delent, & ita consolidationem, remoto acido corruptivo fermento, promovent; sive externe applicentur locis affectis; sive interne propinentur, ut in stomacho nimio delecto acido, & chylo certo modo alterato, facillior fiat sanatio: ut cancri fluviatiles, eorumque lapilli, saturnus, plantago, &c.

Cæterum, dum *Aperientia* dicta ex vulgato sensu rejecerim, non removenda erunt *Incidentia* seu *Attenuantia*, & externo usu *Resolventia* dicta, quæ acrimoniâ sui salinâ, nunc falsâ temperatâ, ut tartarus vitriolatus, sal ammoniacum, &c. nunc acidâ, ut spiritus salis dulcis, spiritus viridis æris, oxymelque; nunc alcalinâ, ut Armoracia, aromatica, absinthium, spiritus salis armoniaci, &c. viscida incident, aculeis suis penetrant, & ita coagulata plus minus, aut indurata mollia & fluxilia faciunt, quæ inter externo & interno usu gummata imprimis eminent.

Experientiâ etiam compertum est, præter specificam vim



visum & crasin, quæ mediagere certis humorum & causarum morbosarum vitiis medentur remedia alterantia, eorundem quædam certis quibusdam visceribus aut partibus magis amica aut iniplica existere: quæ ratione aromatica omnia cerebro & nervis, amara hepatis, acida stomacho, terebinthinata renibus, &c. amica: e contra cantharides vesicæ, cepacea oculis, vitriolacea pulmonibus, Mercurialia nervis inimicissima esse solent: non quod talia proprio impetu ed ferantur, sed quod per corpus communi circulo cum sanguine aut sero & lymphâ circumrepta, vel certis in partibus & locis ratione determinata figuratiōis minimorum promptius se insinuant, & ita certas alterationes alibi insensiles dictis in locis inducant, vel certas morbosas causas quibusdam partibus in specie hostiles singulariter corrigant: quæ ratione cinabaris antimonii specificum cephalicum, item Antiepilepticum dicitur, quatenus speciale istud acidum, quod cerebrum afficit, & in nervis convulsiones inserit, præ aliis remediis optime tollit: fœniculum appropriatum ophthalmicum dicitur, quatenus vel causas morbosas oculis præsertim insensas tollit & mitigat, vel humores oculorum claros & perspicuos conservat specifico suo sale volatili blando.

Porro ad alterantia modò dicta vel maxime etiam pertinent aromatica, quæ odore plus minus forti, aut penetrante & sapore acri plus minus amaricante, crasin suam in sale volatili oleoso constitutam habent, quod in eorum oleo destillato, totius crasin integram possidente, patet, ratione cuius cum activa sint, penetrantia, adeoque sanguinis fermentativum motum stimulent, sal volatile oleosum sanguinis, & consequenter bilis augent, Calida vulgo & Sicca constituantur, ut galanga, caryophylli, mentha, rosmarinus, castoreum, terebinthina, &c. Ratione hujus salis volatilis oleosi temperant hæc ipsa aromatica omnem acrimoniam, cruditates visciditas resolvunt, adeoque cruditati acida, & inde congestis sordibus in intestinis & stomacho, indeque enatis flatibus, ex acido in materia viscida oriundis, optime conducunt: ob id etiam aromatica omnia stomachica; item Carnivora seu Flatuum I. iscussum esse solent.

Nervis porro & cerebro, & inde compositis membranis partibus, quibus acidum quodcumque inimicissimum esse solet, optime profunt, quas fovent & recreant, adeoque earum affectibus specificis succurrunt: ob id Nervina, ac Cephalica, ac Uterina, esse solent aromatica, Menstris quoque simul modò dicta.

Quin & cum ipsum sal volatile oleosum aptissimum sit, quod volatilizando & fermentando abeat in spiritus volatiles, eodem modo analogos spiritibus nostris vitalibus & animalibus, exinde vis eorum confortati a, ac, ut vulgò vocant, cordialis, proximè emanat; hinc spiritus & aquæ confortantes, aquæ vitæ, aquæ apoplecticæ, &c. ex talibus ordinariò componuntur.

Porro ultra alterantia sunt & generalia remedia evacuantia, quæ inter, præter purgantia, sunt Diuretica, & Sudorifera: Diuretica sunt varia ac multiplicia, quæ nunc ad renes delata eos abstergunt, & impedimenta urinæ excretionis removere, ut salia volatilia quæcumque, nunc urinarium serum acciunt, ut Raphanacea, & ex infectis petita remedia, ut cantharides; nunc fermentum renum specificè alcalinâ virtute acciunt, ut nitrosa volatilia; quæ inter primariò modò dicta infecta etiam eminent.

Sudorifera verò sunt, quæ acida absorbendo sanguiis suorem, & majorem dissolutionem conciliant, ac ita feri uberiorem & faciliorem secretionem, & cum eo sordium imbibitarum excretionem promovent, adeoque alcalinæ plus minus naturæ, tam volatilis, ut spiritus & sal volatile cornu cervi, sanguinis humani, succus & Extractum cardui benedicti, &c. quàm fixa; ut antimonium diaphoreticum, sal casdvi benedicti, cornu cervi sine igne, &c.

Aut, quæ suo modo huc pertinent Alexipharmaca, ut hæc sine duplici: partim sudorifera, & ita contagia maligna elicientia; partim alterantia, & venena in sua crasi invertentia & corrigentia; ut v. g. nitrum invertit virulentiam antimonii & arsenici, ipsum antimonium fixum, in specie cum nitro paratum, invertit virulentiam causæ malignæ in febribus malignis.

Acque hæc sere sunt generaliora remedium particularium in Praxi vulgaris capita. Quibus merito præferentia erunt Universaliora, & quæ pluribus Indicationibus

simul satisfaciunt, adeoque pluribus in casibus applicari possunt, Remedia; qualia non esse impossibilia, præter experientiam PARACELSI, HELMONTII, BUTTLERI: de quibus scripta HELMONTII, item RONDEN Tract. Elixir arboris vitæ, aliorumque, vel opium suo modo probabile reddit, quibusvis fere in morbis legitimo usu salutare, & quod quæcumque sere urgentia symptomata mitigat; ut ut palliative potius spirituum & humorum estranos motus sopiendo, quàm eradicaive affectus tollat.

Talia universalia, aut ad tallum naturam proximè accedentia, sunt ex regno vegetabili & animali, præter opium ritè paratum, in specie salia volatilia oleosa, quodcumque acre causæ peccantis in morbis mitigantia, & ita noxas inde inductas corrigentia; ob id à SYLVIO adeò decantata: hinc sulphura mineralium & metallorum fixata, simil ratione universaliter acidum & urinosum peccans temperantia, & vi singulari anodynâ quæcumque in morbis urgentia tollentia, quæ inter speciatim recensetur sulphur vitrioli fixum seu oleum gnis veneris HELMONTII, & cum eo paratus Mercurius diaphoreticus seu aurum Hori. orientale, item tincturæ solares legitime, item sulphura antimonialia tam sicca, quàm ex his paratæ tincturæ antimonii VALENTINI, & similia alia plus minus Universalia.

## CAPUT II.

### D E

#### CONSTITUTIONE CORPORIS HUMANI, VITALI, EJUSQUE LÆSIONIBUS IN GENERE.

**M**edicinæ Objectum est Corpus humanum vivens, quatenus sanabile: Illud quidem materiale: Hoc formale. Ut corpus hoc rectè consideretur, attendendum est tam ad ipsam structuram corporis materiale, quàm ad ejus actum vitalem formalem. Illa, nempe structura corporis humani, se habet instar artificiosissimæ machinæ hydraulico-pneumaticæ. Hic se habet instar principii moventis spirituosum, & dictam machinam dirigentis.

In structura hujus machinæ materiali duplex partium differentia imprimis consideranda est: nempe dum partes quædam sunt nervæ, seu, ut aliis vocantur, spermaticæ: alie verò sunt sanguinæ. Ille sunt nihil aliud, nisi mirabilis fibrarum textura, quæ prima partium stamina constituit, & primitus in ovo ex ejus colliquamento delineatur, & effingitur: His fibris postmodum per coaguli motum sanguis huc inde adherescit, unde parenchymata sanguinea nascuntur; quæ quæ partes certo situ & nexu invicem coherentes, materiale corporis structuram constituunt.

Constant autem materialiter dictæ partes non ex quatuor illis vulgaribus Elementis, ex quibus corpora naturalia quæcumque constare aut componi linguntur; tam talis quaternio à nemine adhuc evidenti ullâ ratione, nec ullâ certâ vel saltem probabili experientia, fuit confirmatus: sicut hoc eleganter docet BOYLE in Chym. sta sceptico.

Existentiâ quidem Aquæ, Terræ, & Aëris, nemo negabit, cum hæc sint maximæ portiones globum nostrum componentes, ac receptacula seu diversoria reliquorum variorum corporum: sed an materialiter unâ cum igne omnia componant missa? dubitatur merito: ut de aqua seorsum considerata res certissima sit, eam multorum reverà ingredi compositionem: ut taceam THALES sententiam, omnia ex sola aqua na. taliter constare, assertentis; quam hypothese jam optime confirmavit & illustravit HELMONTIUS in suis scriptis, speciatim Complexionum & Mixtionum Elementarium Figmentum: quæ ipsa magis illustravit DAVID von der Boecke Tractat. Medicor. & Experimenta circa rerum naturalium Principia.

Ignem quod attinet: modernorum persuadent experientia, ignem nostrum utraque (nam de testis in corpore solari concentrato & inde in universam mundi machinam, imprimis ipsos planetas, ut & tellurem, sub nomine radiorum & luminis vibrato, non sumus solliciti. v. ut multa persuadeant, eundem itidem ex sulphure resolut constare) nil aliud esse, quàm dissolutionem corporum dictorum sulphureorum, i. e. in re-



cessu pinguium acidorum , in sui particulas immediate minimas, factam imprimis mediante aere, cujus dissolutionis effectus duo inseparabiles sunt: Calor & Lumen; sicuti hoc sufficienter explicavit BECKIUS *Tract. supra citato pag. 61.*

Viget ignis imprimis in flamma, quæ est rarefactio & dissolutio fumi; fumus verdè est flamma inspissata, constans particulis ulterius rarefactibilibus, elevatis per motum aeris, à calore rarefacti: hinc flamma quæcunque extincta abit in fumum, fumus condensatur in fuliginem; & ita flamma, fumus, fuligo, fuliginis oleum, acidum pingue, sunt unum idemque corpus, pro vario resolutionis aut condensationis statu, diversimodè modificato.

Cum verdè videamus, omnia corpora fieri seu generari, nutrirì & corrumpi successive & insensibiliter, adeoque per minimas particulas; ita ut ex minimorum horum corpusculorum synerisi seu unionè certa, diacrisi seu separationè, metastasi seu transpositione, varia fiant, intereant, & alterentur diversimodè corpora, potius multivarias tales particulas, seu principia corporum materialia ac elementa assumamus: de quo videatur BOYLE *Tractatu de Origine Formarum & Qualitatum.*

Cum verdè omnes hæ particule sint materiæ, adeoque quantæ, necessariò proprietates suas quantitativas & mechanicas, adeoque determinatam figuram ac magnitudinem, certum ad se ordinem & situm habebunt, unde per variarum talium particularum mediante motu unionem & texturam diversa necessariò fiant corpora, multiplicèscque horum affectiones. Particulæ tales per mutuam texturam constituunt mediante motu corpora mista; qui tamen motus non vagus, sed determinatus est, tam in materiæ compositione, quàm ejus varia conformatione, adeo ut non nisi vi femininè determinata ex istis particulis motu fermentativo à seminibus alteratis varia efformentur corpora.

Particulæ tales, quæ immediate corpora constituunt, & in quæ etiam eadem immediate resolvuntur, numero quaternario pro explicandis corporum phenomenis commodèprehenduntur, nempe sunt:

1. Salinæ, nempe acidæ & alcalinæ, & ex his duobus enixæ seu salæ.
2. Pingues.
3. Aquosæ: &
4. Terres.

Quæ quidem sunt proxima corporum principia naturalia, non tamen ultima elementa, sed hujus respectu potius principiata sunt, ex aliis particulis simplicioribus prius contexta; unde & sub resolutione in alias successive facessunt particulas, ut plurimum aqueas: ita ut quamplurima, quæ maxime videntur composita, primò ex aqua per multiplicem particularum aquearum mutationem mechanicam in alias particulas modò dictas, vi femininè factam oriri, & tandem ultimò destructà seminum potestate tandem in aqueas redire soleant.

Sub generali enim acidi & alcali nomine innumerabilis salium, tanquam particularum magis activarum, diversitas comprehenditur, cum tam urinosa quàm acida mille modis pro varietate conerectorum, in quibus existunt, secundum proprietates mechanicas differant: unde & tam variis modis inter se & cum aliis combinari, ac diversi saporis diversissimè salia salsa exinde oriri possunt, pro quorum omnium varietate speciales quamplurimæ operationes naturales explicandæ sunt in corporibus.

Imprimis Fermentationes & Effervescentiæ dependent à salium activitate: est scilicet Fermentatio motus intestinus particularum minutarum, ortus à mutua salium, acidi & alcali, resolutarum in se invicem activitate, qua omnes reliquæ mistum componentes particulæ variè inter se permiscuntur & agitantur, usque dum sequitur aut ultimis talis misti resolutio, aut nova ejusdem alteratio, à salium istorum nova unionè, aut saltem contemperatione, dependens. Idem planè est Effervescencia, nisi quod in hac puriora, adeoque acriora exsistant salia, unde & fortiori invicem collidantur motu.

Ex talibus particulis, in specie salinis & sulphureis, etiam sanguis & chylus, succi corporis nostri primogeneci, constant; unde & consequenter totum corpus materialiter ex iisdem erit compositum; id quod confirmat resolutio ejus mechanico-chymica.

Quod si plures tales particulæ coeant in unam massam, constituunt partes similes, ex quarum coagmentatione dissimiles exsurgunt: Sicut hæ ipsæ fibræ & vasis appensæ &

Estimull. Oper. Tom. II.

connexæ, ac inde in debitam conformationem super basim fibrarum *Organical partes*, certis functionibus mechanicè exequendis destinatas, constituunt. Ita ut ratione materiæ ex Qua, partes vel similes vel dissimiles dicuntur; ratione verdè superinductæ conformationis mechanicæ, secundum quam cum instrumenta certis usibus inferviunt, Organicæ appellari solent, in quibus organis fibræ, harumque mechanica textura fundamentum constituunt: de quibus vid. GLYSSONI *Anatome Hepatis in Prolegomenis.*

Textura ista particularum minutarum, componens partes similes, constituit reverà earundem *Temperamentum elementale*; sicuti eadem particulæ texturam liquidam sanguinis compingentes, quasi crasin constituunt: unde *Temperamentum Vitale*, quod aliàs in Calido & Humido consistere dicitur, in totum corpus pro varia sanguinis materiali miscela varium derivatur.

Constituunt hæc ipsa simpliciter corporis machinam: Jam necesse est, consideremus ejus *admiratam vitalem*; nempe dum machina hæc in motu est diversimodè, dicitur *vivere*, ut ita, *vita* formaliter in hujus machine motu seu actione consistat: Quod si motus isti omnes penitus cessent, ita ut irrevocabiles sint, *Mortuus* esse dicitur: Quod si rectè & debitè omnes istos motus peragat, ad quos per se apta nata est, *Sana* dicitur; nam *Sanitas* est vitæ integritas: sin verdè perversè aut viciòsè, & quasi erroneè, moveatur, dicitur *agrotare*; nam *morbus* est vitæ labefactio.

Principium istud internum, quod actuat & movet hanc machinam animalem, vitale ab effectu appellatum, quod aliàs etiam speciali nomine anima dicitur, non est aliqua substantia immaterialis; quia

1. In quibusdam est divisibile,
2. Quia aliàs esset indestructibile; &
3. Quia in non-rationalibus est planè in intelligibile.

Sed est reverà ens materiale toti viventi coextensum, & propter actionum varietatem omnibus partibus ac organis intimè præsens, simulque ob earundem celeritatem, vehementiam & diuturnitatem summè activum & mobile.

Hæc & alia attributa non conveniunt præterquam subtilissimè cuidam & volatillissimæq; mobilissimæ materiæ, ob id in schola Medica, analogicè licet, *spiritus* appellare: nempe nil aliud hoc nomine intelligitur, quàm sanguis aut succus huic analogus in aliis brutis seu animalibus in subtilissimam substantiam resolutus, & exactissimè volatilifatus in præcordiis, tam per continuam ejus fermentationem, quàm non intermissam aeris inspirationem; unde ulterius pro totius machine actione unà cum sanguine distribuitur.

Resolutio talis sanguinis, & in substantiam spirituosam volatilifatio, propter crasin ejus salinam volatilem oleosam, & quasi nitro-sulphuream, fieri vix potest, quin cum insigni ejus incallescencia & estuatione contingat, & fiat quasi quedam ejus accensio: vid. WILLISTUS in *Responsione Epist. ad Highmo. um de effectibus hysterici & hypochondriaci*; videatur etiam HELMONTIUS *Tractatu in sole Tabernaculum, &c. Tractatu Blas Humanum, item Tractatu Spiritus vitæ.*

Sanguinis ita attenuati & resoluti, & quodammodo accensi, subtilissimè portiones, & quasi flammæ sunt isti Spiritus, qui & ob id à quibusdam luminosi seu lucidi dicuntur, cum in sua natura plures lucis proprietates possideant; quidum in sanguinea massa micant & gliscunt, Vitales dicuntur; dum verdè in cerebro & nervis liberiori lumine radjant, Animales appellantur: sicuti hi ipsi, dum ova sæcundant sub secundo congressu, Genitales dici solent. Et hoc est, quod alii animæ brutalis substantiam bipartitam faciant, nempe igneam seu flammicam, & lucidam: vid. WILLISTUS de anima brutorum, CORNELIUS non der Linden de anima hominis vitali, & KOLHANS de spiritus animali, BARTHOLINUS de luce animalium, HORSTIUS de Flammula cordis, SCHYL in *Præf. super Cartesium de Homine.*

Pro natura tamen sanguinis, seu materiæ ex qua, substantia hæc spirituosam reverà naturæ salinæ volatilis oleosæ seu salinæ sulphureæ esse videtur, quæ per fermentationem & aeris resolutionem in sanguinem volatilifata, & celerrima agitatione à præexistente jam in sinistro cordis ventriculo simili substantia accensa, instar occultæ flammulæ corruscet, totum corpus cale-



facit, & à putredinis corruptione conservat: Uno nomine, habet se instar subtilissimi & rectificatissimi spiritus vini calefacti insigniter & quodammodo accensi.

Spirituum horum subtilissima & quasi radiosa textura lucida necessario mutuam adhesionem requirit, quæ abrupta, aut in quodam loco intercepta, non sine periculo evanescit; hinc in suspensis discontinuitas hujus texture spirituosæ in causa est, quod in momento omnis facultas princeps cerebri pereat; hinc & syncopizantibus repente corpus frigidum, & quasi mortuum jacet.

Denique horum spirituum accensione quasi quadam genitorum calor per totam machinam se diffundit, pro operationum quarumcunque facilitatione. Non ergo *Vita animalium* præcisè consistit in calido seu calore, cum quamplurima sint frigida, & ipsa animalia calida suas habeant vicissitudines secundum magis & minus; Estque calor saltem consequens quoddam necessarium vitæ in animalibus calidis. Hujusmodi ergo spiritus volatiles reverà sunt idem cum eo, quod alii animam, alii spiritus insitos & influos, alii calidum innatum, alii ignem animale, alii *fundamentum vitalem*, alii alio nomine insigniverunt.

*Fundamentum* ergo vitæ consistit in sanguine (vel succo huic analogo in aliis animalibus non sanguineis) utpote ex cujus penu continua spirituum & concatenata est reparatio vel regeneratio: Hujus ergo legitima crasis & inde oriunda debita fermentatio ac spiritus ascentia & incandescencia, & spirituum independens hypostasis plus vel minus dissipabilis, radix est vitæ sanæ vel egræ, longæ vel brevæ, &c.

Hæc omnia homo cum brutis habet communia, ipsi soli propria est *Anima Rationalis*, substantia reverà spiritus, immortalis & inalterabilis, cum corpore hominis animali nihil habens commercii, & ab œconomia animali, ejusque functionibus planè exclusa, solas intellectus & voluntatis operationes immateriales seu inorganicas, sibi que proprias peragens. Ex unione tamen ejus cum corpore animali *sensuum* præsupponit *ministeria* & exercitia in intelligendo, ut occasione certarum spirituum animalium motionum sibi formet conceptus & phantasmata, unde in intelligendo pro harum exorbitantiis subinde & ipsa aberrat; sicut è contrà pro voluntatis imperio certum spiritibus istis animalibus motum pro voluntario motu interdum imperare valet.

### CAPUT III.

Concernens

### PRACTICA GENERALIA.

circa

### FACULTATEM VITALEM.

**I**N legitima methodo instituendi Praxin, ante omnia in corpore humano pro fundamento observanda imprimis differentia fundamentalis duarum facultatum, totum corpus gubernantium & conservantium, nempe vitalis seu naturalis, & animalis; harumque fundamenta. Genitalis autem ad animale refertur: Vitalis in sanguine & spiritu vitali, & inde derivatis reliquis succis, & visceribus sanguinis alterationi dicatis, consistit. In his fundata est Facultas vitalis, quæ conservat corpus in Esse vitali: Hæc verò animalis in spiritu animali, cerebro ac cerebello, & inde nato systemate nervoso & partibus nerveis, radicata est. Ratione prioris ad duo instrumenta nature mechanica, acidum & urinosum, tam in sanguine quam chyllo, ac inde derivatis succis, bile, succo pancreatico, lymphâ, &c. respiciendum, ut horum dyscrasia, anomalie, variis motus, &c. ritè cognoscantur, & maturè emendentur: ratione posterioris ad multiplices nervorum distributiones & varias partium cum his connexiones, indeque natos consensus varios, probe attendendum, & hinc natis malis dolorosis ac convulsivis maturè occurrendum.

Ut res pateat clariùs, in sanguine & inde derivatis succis, &c. duplex considerandus motus; nempe vel integræ massæ sanguineæ circulatorius, vel particularum ejus minutissimarum intestinus seu fermentativus. Ab his duobus dependet proximè vita hominis, ita ut uno intercepto pereat alter.

**Q**uod attinet motum sanguinis circulatorium seu *localem*: attendendum omnino Practico Medico est, ut conservetur in equali tenore, præcaveaturque omnis ejus stagnatio, vel quod impedimentum huic sanguinis circulo avertit. Prestamus id mediante Pharmacia & Chirurgia: Mediante Pharmaciâ per sudorifera sanguinem colliquefacientia, quasi attenuantia, & ita velociorem quidem, equalem tamen, motum per vasa conciliantia. Chirurgia sanguinis emissiones suadet, quibus imminuimus quantum, & facimus, ut in vasis nimis repletis liberior sanguinis fluxus fiat. Id autem quàm optimè fit per sectiones tam arteriarum quàm venarum, tam vasorum majorum quàm minorum, per scarificationes & cucurbitularum impositiones, ac perhirudines. *Effectus* sanguinis evacuationis *primarius* est imminuere sanguinis quantum, & ita indicatur imprimis à Plethora ad vasa (ad vires enim illa non datur) tam vera quàm apparente, quæ sui imminutionem postulat: *Secundarius* sanguinis missionis effectus est sanguinis liberiorum circuitum promoveri, quod veteribus *Venulatio* dicitur, sive sanguis stagnet in toto, sive in parte, ubi inflammationem parit, ac in toto corpore stagnans, affectum suffocatorium infert.

Hucetiam Revulsio, Aversio, Derivatio, &c. pertinent, quæ non videntur legibus circulationis ob stare, utut plures putent: modo rectè explicentur. Ex hypothese autem Veterum explicare Aversionem, Revulsionem, & Derivationem, est impossibile; Stante enim sanguinis circulo, impossibile est rationem dare revulsioni & aversionis, quia impossibile est, sanguinem in aliquam partem fluentem, ex corde per alium locum evacuari, revellere: v.g. impossibile est, ut sanguis, qui ascendit ad oculum inflammatum per partes circulandus, possit per venam scellam pedis aut brachii revelli, ut eo non fluat. Ut ergo pateat, quid de his hypothese habendum, dicendum: quod venæ sectio si fiat, fiat evacuando & sanguinem imminuendo: I. minuto ergo sanguine, in specie si sit plethora, tam simpliciter talis, quàm secundum quid, & secta venâ, movetur sanguis omnis faciliùs, largiùs & promptiùs, quoniam majus occupat spatium in depletis nonnihil vasis: Unde & ille, qui stagnans subsistit in vasis in loco inflammationis, sublata plethora non adeo vehementer ampliùs sistitur, quin potius ad motum imminutum redintegrandum nonnihil disponitur.

Nihilominus tamen queritur: *an delectus venarum in venæ sectione sit habendus?* Resp. quod respectu unius membri nullus respectus habendus; Si enim vena secanda in brachio, perinde est, sive basilica sive mediana secetur, quia omnes oriuntur ex uno trunco: Respectu autem diversorum membrorum maximè selectus habendus; Statuitur enim in œconomia microcosmi duplex regio, *inferior* & *superior*, respectu cordis tanquam centri, quod mittit sanguinem respectu arteriæ descendentes in inferiorem, & respectu arteriæ ascendentes in superiorem regionem. Cor est terminus, à quo movetur sanguis; & istæ regiones, superior & inferior, sunt terminus ad quem movetur sanguis: Si ergo malum quoddam est in regione superiori, & ratione hujus venæ sectio instituenda, ac ego seco venam in inferiore regione, verbi gratiâ pedis, tunc dicitur certo sensu *Revulsio Universalis*, nempe quando sanguis in parte superioris regionis corporis in inferiori evacuat, dum hic ipse in superiori regione in quodam loco stagnat: Nam exinde hoc habemus commodi, quod dum in regione inferiori evacuamus sanguinem, hic ipse propter minus obstatum promptiùs movebitur inferiora versus, quàm superiora, dum scilicet ex corde erumpit in arteriam magnam: dum enim facta inflammatione in parte superiore rami arteriæ magis ascendentes sunt infarcti, tunc in ramo arteriæ descendentes ob amplius spatium sanguis è corde erumpens potius inferiora quàm superiora versus propellitur, & ita revellitur, seu ad inferiora retrahitur.



Porro, quando sanguis in quadam regione stagnando dat inflammationem, si secatur vena in regione eadem, in loco vicino, ubi pars affecta seu morboſa eſt, dicitur *Averſio* seu *Revulſio particularis*; ſicut ſi ſanguis evacuetur in contrario, dicitur *Revulſio Univerſalis*: ſic v. g. in ophthalmia ſi ſanguis evacuetur in pede, eſt *Univerſalis*; dum evacuetur in brachio, eſt *particularis Revulſio* ſeu *Averſio*: dum nempe ſanguis ſuperiora verſus facto foramine in loco vicino inferiore evacuetur, eſtque nihil aliud, quàm ſanguinis ſtagnantis per locum proximum evacuatio. Et hæc *Averſio* ſeu *Revulſio particularis* non habet locum, niſi jam prægreſſa fuerit *Revulſio univerſalis*.

Tertium denique, quando ſecatur vena loco affecto proxima, dicitur *Derivatio*, in qua derivatione debent incidere venæ, per quas aliàs ſanguis ſtagnans naturaliter ſolebat fluere: v. g. pono *anginam*: In ea ſi vena non in collo, ubi ſanguis ſtagnat, ſed in pede ſecatur, dicitur *Revulſio Univerſalis*; in brachio quocunque, tanquam in loco ejuſdem regionis, ſi inſtituitur, *Revulſio particularis* ſeu *Averſio* audit, ſi ſub lingua rarinæ, tanquam loco affecto proximæ, dicitur *Derivatio*; quoniam per has ſanguis in faucibus ſtagnans naturaliter debet refluere, & hæc eſt *Derivatio*. Ponam ulterius *inflammationem uteri*: in hac *Revulſio* nis gratiâ inſtituitur venæ ſectio in brachio, ſed in regione reſoſita: *Averſionis* gratiâ in eodem, ſed remoto loco, nempe in pede; & *Derivationis* gratiâ in labiis vulvæ; ſcilicet apponuntur hirudines, qui modus *Italis* & *Hispanis* frequens eſſe ſolet, & **AMATO LUSITANO** in frequenti uſu fuit.

Quæritur: an hæc *Revulſio*, *Averſio* & *Derivatio* adhuc habeant locum ob circulationem ſanguinis? Affirmatur: verum non ſenſu veterum, ſed alio: de quibus venæ ſectionibus, prout circulationi ſanguinis applicari debent, vid. **HIGMORUS** in *Diſquiſ. anat. Corp. Hum.* pag. 150. Hoc negotium ſane plus habet in reſeſſu, quàm aſſumatur, quod demonſtrabo per exempla, & rationes: Quod attinet exempla *Revulſionis*, *Derivationis*, &c. ſeſſigo in **FORESTI** lib. 28. Obſ. 3. quod *revulſionis* efficaciam in muliere monſtrat. Mulieri enim cum actu fluerent menſes nimium, aperta ei vena in brachio fuit, unde ſubito menſtruum fuit reſtriſtum: ſed poſt ordinario tempore, quo ei vena ſecta fuit in brachio, ſenſationem cum aliquali dolore percepit, inſignem palpitationem in brachio paſſa fuit, quo tempore & menſium fluxus recurrit, & iſta palpitatione non ceſſavit, niſi vena aperta fuerit. Secundum exemplum habet **LINDANUS**, expertus *Præcticus*, in *Collegio ſuo Præctico Manuſcripto*. in *Hartmannum*, ubi reſert exemplum *Chirurgi Amſteldamensis*, qui laboravit ophthalmiâ oculi dextri, ad quam vocatus *Medicus ſenior*, tunc dicit venam in brachio dextro, unde magis magisque inflammatio fuit auſta: ratio, quia ſanguis in motu ſuſum jam erat impeditus; unde facta aperture in parte ſuperiori promptius adhuc ſuperiora verſus movetur ſanguis propter metum vacui, adeoque inflammatio augetur; ſunt enim duo rami, unus diſtribuitur in brachium, alter aſcendit in caput: Videns hoc *Medicus* ſequenti die, in brachio ſiniſtro venam ſecavit, & exinde ſiniſter oculus, antea illæſus, fuit etiam inflammatus: hoc videns ipſe tertio die repetit venæ ſectionem in brachio dextro, & tunc æger omnino in dextro oculo redditus fuit cæcus; unde denuo ſecavit venam in brachio ſiniſtro, exinde iſtius oculi auxit inflammationem: His ita factis **TULEPIUS** peritus vocatus ſtatim juſſit venæ ſectionem fieri in pede, unde ſenſum oculi ab inflammatione fuerunt liberati. Tertium dat **GABELCHOVERUS** in *Cent. 4. Obſ. 92.* qui reſert, quod mulier ſub fluxu menſium applicari paſſa fuerit cucurbitulas cum ſcarificatione in regione dorſi ſuperiori: reſtriſti menſes varia accidentia intulerunt, quæ, cum diu vexarunt agram, nec ceſſaſſent, niſi ægra quoad menſes in ſtatu naturali fuerit reſtituta. Reverà *Revulſio*, *Derivatio*, &c. adhuc certis circumſcribuntur regulis: Ratio, quia non eadem amplius cum Veteribus, qui putarunt, omnem ſanguinem in unum locum fluere; ſed omnes hæc ſanguinis detractio- nes vel *revulſiones* tantum operantur, quantum evacuetur ſanguis, & quatenus, imminuendo, ſanguini conciliatur liberior circulus, & ſubſpatio, quo extra corpus eſſit, dum in vaſis inanitis liberior ex corde aſſuit, loco affecto levantur. Verum vix juvat levamen tamdiu, quamdiu vena eſt aperta, & actu ſanguis eſſit; ſimul

*Etmull. Oper. Tom. II.*

enim atque eadem clauditur, etiam ſanguis denuo equaliter per ſua vaſa circulatur: tamen eo ipſo, quo loco inanitioni oppoſito liberius inſuit ſanguis, eo quod imminuta fuit ſanguinis quantitas, minus ſubſiſtit in loco inflammationis, quia etiam vaſis nonnihil inanitis per ramos vicinos facilius movebitur, quàm ut omnino in loco inflammationis ſtagnet: Unde quando revellimus, primario quidem evacuamus ſanguinem: (2.) dum fluit, adhuc ipſi promptiorem motum ad regionem contrariam conciliamus: & (3.) dum denuo clauſum eſt vaſ, propter inanita & imminuta vaſa, nimium incrementum inflammationis impedimus, & certum levamen ægro conciliamus. Res eſt facilis, modò diſtinguantur duæ regiones corporis. Ad hunc uſum ventilatorum reſerendi ſunt & alii uſus venæ ſectionis ſecundarii, dum nempe per acci- dens medetur partui difficili, urinæ ſuppreſſioni, caſu ab alto, &c.

Venæ ſectio ergo evacuatoria ubique inſtitui poteſt; in ventilatoria autem certus eligatur locus.

## ARTICULUS II.

### DE

## MOTU SANGUINIS INTESTINO, ET INDE ORTA CACOCYHMIA.

**M**otus ſanguinis & inde ſtatorum ſuccorum fermentativus, præſupponit duo ſalia, eaque volatilia, inſigniter activa, nempe acidum & urinoſum ſeu alcali. Hæc in maſſa ſanguinea inſtituunt motu inteſtinum ſeu fermentativum, dum internè temperantur & colliguantur mutuo per particulas ſulphureas pingues, diluuntur per aqueas, ſiguntur per interpoſitionem particularum terrearum. Hæc particulae ſalinae ſunt fundamentum iſtius motus, ita ut rationem principii activi obtineant, reliquæ verò paſſivi. Origo & fundamentum harum particularum, & inde dependentis motus fermentativi ſanguinis, eſt ex ſemine, unde oritur craſis ſanguinis materialis ſeminalis, quæ uti in quolibet homine varia, ita etiam varietas *Idioſyncraſiæ*, quæ maximas turbas dant in Praxi. Prout enim variat craſis ſeminalis, ſic variat motus fermentativus, qui in jugi tenore per legitimum uſum ſex rerum non naturalium conſervatur, ſicut per illegitimum uſum harum læditur ſanguinis craſis, & conſequenter vitiantur ſalia, indeque oriuntur *Cacochymia*, i. e. particularum dictarum ſalinarum amertia ſeu degeneraciones à craſi naturali, anomaliz, & variæ inde natæ efferveſcentiæ, quarum fundamentum conſiſtit in his duobus ſalibus, ſed à ſtatu naturali corruptis: ita ut in genere *cacochymia* ſit vel acida, in qua acidum vitioſum eſt; vel alcalina, in qua ſal urinoſum vitioſum: quæ maturæ à Medico cognoscantur & emendentur.

Inſtrumenta curationis deſumuntur ex triplici fonte:

1. Pharmaceutico.
2. Chirurgico.
3. Dietetico.

*Quoad remedia*, quæ ex fonte Pharmaceutico deſumuntur, non levis interea intercedit differentia; triplex enim ex eodem modo curationis exurgit, quod eundem quidem habet ſcopum præfixum, ſed non eadem incedit via.

Primus curationis modus ſit per generalia, nimirum in genere laxando & alterando. Talem methodum imprimis habuit **SYLVIVS** in ſua Praxi, quam vivis *ironi artis medicæ* ummopere commendo, quia ſa illina eſt ac perſpicua: ubi enim quis altius in Medicina progreſſus, ſtatim videbit, quid in reſeſſu habeat ejus Praxiſ?

Secundus curationis modus ſit per particularia & ſpecifica, dum nimirum præmiſſis præmittendis adhibentur appropriata, quorum uſu ceu ſalce quadam radix morbi demetitur: v. g. ſuppono aliquem laborare dyſenteria maligna; hic præmiſſo aliquo purgante & ha- barbarino, curatio vulgò inſtituitur (1.) per adſtringentia, (2.) per lac, &c. ceu temperantia, (3.) per conſolidantia; eſtque curatio univerſalis. Potius autem adhibentur ſpecifica, qualia ſunt priapus ceti, hæmatitis præparatus, cruor leporinus (imprimis leporis menſe Martio in ſuga capii) os ſepiæ præparatum,



ratum, & similia, sociatis imprimis etiam opiat. Qui modus curandi nusquam in Praxi observatus, hodie tamen colitur.

Tertius curationis modus fit per arcana seu panaceas, aut remedia polychresta dicta. Hæc sunt, quando Medicus nobili aliquo remedio instructus, eo præmissis præmittendis quovis serè morbos curare tentat: hinc dicit HELMONTIUS: Paucæ sunt, quæ Medicum nobilitant; paucissimis enim remediis tantum præstabit, quantum tota sæpè Pharmacopœia non præstat.

Dicam autem fundamentum triplicis hujus differentię: In genere præsuppono, causam morborum in genere esse duplicem:

1. *Efficientem seu formalem*, quæ est spiritus impetum faciens: Nam à quocunque sunt actiones, sane in statu sano, ab eodem & sunt actiones morbosæ in statu egro; Et à quo sunt actiones naturales in corpore nostro, ab eodem & sunt actiones præternaturales.

2. *Materiæ seu Occasionalem*, cujus scilicet occasione spiritus in huiusmodi actiones per versas trahuntur, uti sunt sapor & odor, seu fermentum peregrinum (voce quis ut lubet) à quo vel immediatè, ut in contagiis, vel mediatè, mediantibus scilicet humoribus, spiritus in actum educuntur: v. g. laborat quis febre quartana atroci propter causam aliquam irritantem (quæ est acidum sui generis fixum,) hinc si ex inspectione diutius superveniat (quale exemplum nupè mihi in Praxi obigit) cessat paroxysmus, non quidem planè (sic enim paulò post ut plurimum recidiva) sed ad quoddam tempus. Fuit hic causa materialis acidum aliquod in glandulis collectum, irritans spiritum. Jam qui per universalia curant, respiciunt saltem causam morbi materialem & occasionalem in genere, eamque ut removeant, contendunt, reliqua naturæ morborum curatrici relinquunt.

Constitit autem causa hæc occasionalis juxta HIPPOCRATEM in intemperantia, hoc est in eo, quod humoribus, vel spiritibus debite assimilari nequit; vis enim irritativa constitit in textura vitiosa partium minimarum, quæ spiritus irritati morbum producant. Textura hujus humorum materialis nucleum constituunt Acidum & Urinicum, in statu naturali volatile præsentem, à qua etiam qualitates dependent & variant: acidum temperatur ab oleo & destruitur ab alcali; alcali tamen passivè se habet, informatur enim ab acido; acidum autem activè se habet. Jam qui per universalia curant, nil magis opus habent, quam ut corrigant illud acidum, ac data portà quanto ocyus eliminant. Objiciat quis: At multi dicuntur de bile, de sale ejus volatili urinoso, à cuius turgescencia multi quoque oriuntur morbi, quæ per acida alterantur. Respondeo, concedo id quidem: Verum, bilis reverà est aliquod salsum volatile oleosum; quando enim bilis peccat, revera semper peccat salsum ejus volatile oleosum, quod figentibus acidis, antimonialibus aut vitriolicis, est corrigendum: sic dicunt in erysipellate bilem peccare, sed falsò; nam acidum volatile peccat.

Revera enim Cacochymia oritur proximè à vitio acidi vel alcali; quæ salia, si pro subiecto habent materiam aqueam vel serosam, oritur cacochymia serosa, vel Catarrhi; vel si materiam viscidam, tenacem & crassam, puriariā seu chylosā vocatur. Unde vulgata aliàs quadruplex cacochymia, biliosa, melancholica, pituitosa, & serosa, cum dictis facillè conciliari potest: Nam quod veteres vocant cacochymiam biliosam, hoc moderni per sal volatile oleosum à sanguine & bile, à statu naturali declinans, explicant: Veterum verò cacochymiam Melancholicam jam explicant per acidum vitiosum; quæ dum hærent in mucos viscido, exhibent veterum cacochymiam pituitosam: dum verò diluuntur à subiecto seroso seu aqueo, constituunt illorum Cacochymiam serosam.

Origo ergo domini Cacochymie est ex vitio salium, à seminali crasi successivè degenerantium. Remota autem origo cacochymie est simpliciter ex digestionibus læsis, speciatim ex errore digestionis primæ; his læsis, læditur crasis omnium succorum, unde cacochymia; sive statuuntur digestionem tres, sive quatuor, sive sex.

Tribus autem modis fit: vel ob digestionum Relicta,

Transmutata, & Transmissa, uti distinguuntur ab HELMONTIO. Ob Relicta, si recrementa vitiosa emittenda & expurganda retinentur in corpore, in partibus & partium culinis: Ob Transmutata, si ipsæ digestionem aberrant, vel vitio fermenti, vel obsectorum fermentationum, ut non ritè fiant, digerenda variè mutantur, & in multiplices sordes abeant: Ob Transmissa cacochymia oritur, si recrementa digestionum ex una transferantur in aliam, ex prima in secundam, &c. Unde hic habenda ratio primæ digestionis in stomacho.

Fundamentum omnis cacochymie est cacochymia, ut adeò verum illud vulgare sit: Cacochymia est mater cacochymie, & hæc consequenter cachexia. nempe digestio prima in stomacho est fundamentum omnium digestionum. Ex his causis oriuntur cacochymia acida & urinosa.

In specie peccant hæc salia; & (1.) quidem sal volatile urinosum (quod cum sulphure bilem constituit) nimia quantitate, nimia acrimonia, interdum nimia oleositate & pinguedine, interdum singulari & anomalo vitio, pro diverso usu rerum non-naturalium: v. g. per sapores rem explicabo: Inter plantas antiscorbuticas cochlearia, absinthium, fumaria, &c. omnia habent sal volatile in se, & tamen etiam in specifico sale volatili est differentia: simili ratione & nostri corporis sal volatile variis modis potest variari secundum sapores, & diversis ac variis modis variare fermentationem. Causæ, quæ vitio hujus salis dant occasionem, sunt imprimis alimenta aromatica, item alimenta acris & penetrantia, quæ partim augent, partim acris reddunt hoc ipsum sal volatile massæ sanguineæ. Accedunt vigiliæ, exercitia, iracundia, & similes affectus, qui nunc exasperant & acris reddunt, alio modo disponunt hoc ipsum sal volatile, & inde totam massam sanguineam. (2.) Contra acidit vitia sunt, quando hoc est nimis excessivum, i. e. copiosum, aut quando est nimis acidum, aut quando vitiosum, i. e. sapore rancido, aut vitiosè falso, aut aluminoso austero, aut alio simili inquinatum. Ubi est nimis copiosum aut inquinatum, massa sanguinea spissescit, & tardè circulatur: Ubi est vitiosum, variæ istæ in effervescencia sanguinis contingunt anomalie, quæ scorbuticis & hysteriis familiares. Causæ sunt variæ, assumpta imprimis acida, plus minus talia, item aer frigidus inspiratus, qui acido oculo videtur in præternaturis, tristitia, mœror, curæ, deficiens morus, & similia augent partim, partim acris reddunt acidum.

Hæc duo, & dum, & urinosum, rectè vocantur duo pugnes à SWALVE Tr. de sale alcali: & urinoso, qui continuè pugna fatigant massam sanguineam, ut sit in fermentatione; quamdiu æqualibus & proportionatis viribus concernunt, tamdiu consistit sanguis in aliquali motu & fermentatione naturali; simul ac verò alterum deficiat aut labascit, fit vitiosa fermentatio, & totus massæ sanguineæ status turbatus.

Quæritur: quomodo his occurramus? Resp. duobus modis: Nempe vitia hæc

1. Alterando.

2. Vitiatos succos evacuando.

Alterantia sunt vel generalia, vel specialia seu specifica: Evacuantia sunt etiam totuplicia, vel generalia, pluribus in casibus usualia, vel specialia, ad certam causam morbosam eliminandam determinata.

Alterantia generalia sunt, quæ acidum vitiosum & alcali vitiosum corrigunt, indeque natam præternaturalem effervescenciam sistunt, eorum amerciam in debitam harmoniam restitunt, &c. ex quibus interdum evadunt absorbentia, Præcipitantia aliàs dicta: alterantia specifica sunt, quæ hoc alcali, hoc acidum, certà ratione degenerans, transmutant.

Unde qui porrò per specifica curant, hi respiciunt quidem ad causam materialem, non tamen per generalem, v. g. acidi, dulcis, vel amari alicujus &c. conceptum, sed per specifica, quibus hoc vel illud acidum in specie corrigunt: Sic v. g. in pleuritide peccat acidum, in soda peccat acidum, in stranguria, exulceratione renum, podagra, nephritide, dysenteria, &c. etiam peccat aliud acidum. Hæc distincta non sunt unum acidum, sed distinctè curantur. Sub quolibet affectu acidum peccans specificum habet saporem, secundum quem nunc hunc nunc istum morbum producit; nunc



nunc coagulatur sanguis, ut in pleuritide, nunc urinam inquinat, & facit stranguriam: sic dens apri & lucii piscis specialiter destruunt acidum in pleuritide, licet generaliter per omnia alcalia fixa enervetur: lapilli cancerorum, acidum alias quodcunque corrigentes, destruunt acidum in stranguria, &c. Hinc illa, quæ maximè hanc vel istam causam corrigunt, dicuntur *specificæ*, vel *appropriata*. Acidum enim, sicut variat secundum saporibus diversos, ita specifici saporibus, aut specifica horum salium vitia, nobis à priori incognoscibilia, remedia alterantia specifica seu appropriata, per experientiam cognita, requirunt: Ita v. g. dum in scorbuto peccat acidum vitiosum, non quæcunque alcalia conveniunt, sed appropriata tantum, quæ scilicet præter hoc, quod acidum corrosivum corrigunt, etiam specificum acidum in scorbuto corruptum, emendant: Ita in ictero flavo non quæcunque amara conveniunt, sed specificum istud amarissimum, chelidonium majus (quod tamen superat absinthium) quod ipsum præter alcali naturam generalem, specificam vim habet, specificum in ictero peccantem saporibus corrigendi.

Et hinc est, quod HIPPOCRATES, quem omnes adhuc laudant, *Tr. de veteri Med.* (est Tractatus cedro dignus) in eo totus sit, ut reficiat qualitates elementares, tam ex Theoria Medicorum, quam ex Praxi, & omni conatu se monstret Chymicum, dum defendit toris viribus, quod peccet amarum, dulce, salsum, insipidum, & sexcenta alia, & quod etiam his saporibus morbosus per medicamenta, específicos quoque saporibus habentia, sit occurrendum. Igitur attendunt hic Authores saporibus istos, quos corrigere tentant.

Modus hic est optimus curandi, in Praxi Medica primario considerandus, & in quovis speciali casu evoluendus; in quo ipso fida experimenta chymicæ, cæcorum manuductricis, sunt consulenda. Hæc enim appropriata maximum habent usum, ubi Generalia non satis faciunt, & citò & tutò id præstant: sed expertum requirunt Medicum.

## MEMBRUM PRIMUM.

### De Cacoehymia Acida.

**Q**Uoad generalia verò, quæ acidum corrigunt, contraria alcalia nunc volatilia sunt, nunc fixa, tam in quanto quam in quali, sive reverà talia, quæ acidum destruunt, sive alcalibus similia terrea, absorbentia: v. g. ex regno vegetabili omnia salia urinosæ vel cineritia, ablinthii, tartari, cardui-benedicti, centaurei minoris, &c. destruunt acidum, & coëundo in salsum mutant; item omnia aromata, & aromatica, qualia absinthium, mentha, feniculum & cooleosa, & pingua, quæ obtundunt, & quasi aculeos acidi, sive sint expressa, sive, quod melius, destillata, ut omnes spiritus inflammabiles, spiritus vini, nasturtii, cochleariæ, &c. olea destillata, caryophyllorum, macis, &c. quod & camphorata pertinent. Ex regno animali acidum destruentia sunt: Spiritus & omnia volatilia, quæ abundantissime ex animalium partibus eliciuntur, ut cornu cervi, crani humani, viperarum, spiritus urinæ, vel salis ammoniaci, sanguinis humani, item partes animalium quævis duræ, ut cornua, ossa, ungulæ, lapilli cancerorum, maxilla lucii piscis, dens apri, ebur, os sepæ, unicornu, cornu cervi ustum, & sine igne, testæ cochlearum, reliquæque conchyliæ, & producta Marina, quæ potenter corrigunt acidum. Ita ut eorum attractu planè mutetur, & ex iis emergat sapor urinosus. Ex regno minerali destruunt acidum sulphura mineralium fixa, ut antimonium diaphoreticum, quæcunque terrea fixa & lapides, ut creta, terra sigillata, corallia, hamatites, osteocolla, silex calcinatus, & concreta metallica, istud absorbendo, & edulcorando: Mars primariò, & omnia Martialia, promptissime id absorbent, & dulcificant. Post Martem eminet Saturnus, saccharum Saturni, & omnia Saturnina, quæ attractu acidi saporem dulcem saccharinum acquirunt: Aurum & solaria remedia habent potentissimam vim, contumacissima absorbendi acida, præsertim acidum vinosum, quale est acidum podagricorum, & ita podagram compescunt; Specialiter quoque absorbent acida tartarea in corpore. Augent verò hæc acida, quæcunque assumpta talia, vel læsa digestio prima, in specie Panis, Vinum, &c. quæ habent acidum gratissimum nobis, maximè stomacho, unde acidum nativum per panem ritè paratum sustentatur, & per vinum in recta dosi conservatur, si non excedatur, alias aci-

dum præter naturale fit, & sic concurre vitium digestionis primæ: Acidum item augent positivè dulcia, v. g. saccharata, mellita, &c. quæ omnia, utut primò fronte dulcia, & acidis quasi contraria videantur, in recessu tamen habent acidum egregium, spiritum nempe insigniter acidum & corrosivum, qui per destillationem ex retorta, vel per fermentationem facillè excitatur. Excipiuntur tamen ab his passulata.

Pro corrigendo autem acido in genere, sufficiunt sequentes formulæ:

*R. Lapill. Cancr. præp.*

*Corall. rub. præp.*

*• C. C. usi præp. an. ℥j.*

*Sal. tart.*

*Absint. vel card. bened. an. gr. xv. vel xvj*

*Olei destillat. cumini,*

*Caryophyll. an. gutt. xij.*

*Laud. opiat. ferm. gr. v. vel vj. ad viii.*

*M. f. pulvis pro 4. vel 6. dosibus, S.*

*Pulvis præcipitans pro aliquot vicibus.*

*R. Lapill. Cancr. præp. ℥ss.*

*Unicorn. fossil.*

*Corall. rub. præp.*

*C. C. usi præp. an. ℥ss.*

*Salis absinth. ℥j.*

*Nuc. moschat. ℥ij.*

*M. f. pulv. S. ut antea.*

*R. Lapill. Cancr. præp. ℥j.*

*Off. sepia ℥ss.*

*Corall. rub. præp.*

*Crete præp. an. ℥j.*

*Salis absinth. ℥ij.*

*Nuc. moschat. ℥ss.*

*M. f. pulv. S.*

*Pulvis præcipitans.*

*R. C. C. usi præp. vel spod. præpar. ℥ss.*

*Corall. rub. præp.*

*Crystall. præpar.*

*Terra sigillat. vel salis absinth. an. ℥ss.*

*M. S.*

*Pulvis præcipitans.*

Usurpetur ante evacuationem, ubi peccat materia acida.

*R. Salis absinth.*

*Lapill. Cancr. præp. an. ℥ss.*

*M. f. pulv. pro duabus dosibus.*

*Potio destruens acidum:*

*R. Aquæ card. bened.*

*Fenicul. an. ℥ss.*

*Spiritus salis ammoniaci ℥ss.*

*Lapill. Cancr. præpar.*

*Corall. rub. præp. an. gr. xv.*

*Salis fumar. gr. xij.*

*Olei destillat. caryophyll. gutt. vi.*

*Syr. mentha ℥j.*

*M. S.*

*Potiuicula præcipitans bene agitanda.*

Hæc sunt ingredientia talia, quæ in genere acidum corrigunt. Præ cæteris tamen omnibus Mars in corrigendo acido, in primis viis peccante, primatum obtinet.

Ex volatilibus pro corrigendo, & destruendo acido austero hypochondriaco, & hysterico talis sit formula:

*R. Aquæ majoran.*

*Mentha vel rosmar. an. ℥ss ad ℥ij.*

*Vitæ matib. ℥ij. vel ℥vj. ad ℥j.*

*Ess. Castor. ℥ss.*

*Spiritus sal. ammoniaci vel hujus loco liq. C. C. succin. ℥ss ad ℥j.*

*Syr. fumar. ℥ss. vel ℥vj. ad ℥j.*

*M. f. Potio.*

De qua capiatur sæpe cochlear j.

Non nunquam adduntur *Corall. rub. præp. & lapill. Cancr. præp. an. gr. xv. ad xxiv. vel ℥ss;* item *Olei destill. caryophyll. gutt. iij. vel vj.*

## MEMBRUM II.

### De Cacoehymia Alcalina.

**Q**Uod attinet Cacoehymiam alcalinam, hanc, si alcali acrius fuerit, quæcunque acida, alcali destruentia, & in



& in tertium salum coeuntia, tam vegetabilium, ut acetum, succus citri, berberum, cydoniorum, &c. quam Mineralium, spiritus eorum acidi, simplices & compositi spiritus vitrioli, salis; Nitrosa imprimis, ut nitrum probe depuratum nitrum Vitriolatum seu arcanum duplicatum Mynsichtii, tartarus vitriolatus, hepaticum rubrum; item spiritus nitri cum spiritu vini dulcificatus, qui mirè convenit in Cacochymia billosa, duplici ex causa, partim quod destruat acrimoniam salinam, partim quod figat ejus mobilitatem volatilem, quò minus in effervescentias præternaturales erumpere possit; item sulphurea mineralia, & metallica cum nitro fixata, ut sunt, Sulphur commune, omnia antimonialia cum nitro aut spiritu nitri fixata, angimonium diaphoreticum, Bezoardicum minerale, &c. adeo sunt decantata; quæ optimè acrimoniam, & oleositatem volatilem temperant, indeque inflammabilitatem facilem figunt quasi & corrigunt, simulque anodyna sunt, & mediante sudore hæc fixata & correctæ per poros evacuant. Nitratæ quidem ratione amaroris, destruant sal alcali volatile, ratione sulphuris copiosi adjuncti in omnibus nitratis corrigitur oleositas, & nimia figitur, ne veniat effervescentia. Optata quoque non sunt negligenda, quæ obortas hinc nimias effervescentias, palliative quidem, potenter tamen, domant, & refrænant, simulque conjunctos sæpius feroces spiritus compescunt; vel si cacochymia urinosa oleosa, corrigitur per spiritum, & salia volatilium, ut salis ammoniaci, cornu cervi, &c.

*Acidum augmentant.* & acuum omnia acida assumpta, in specie acetum destillatum, spiritus vitrioli, & salis. Sal volatile oleosum, & inde natam bilem, augmentabunt in corpore similiter quæcunque salia volatilium, tam acria, quam oleosa, & hinc omnia aromatica, & spirituosa, ut aqua cinnamomi, spiritus cochleariæ, spiritus cornu cervi, &c. item remedia amara, qualia in ictero & febribus intermittentibus usitata, ut acius reddant sal volatile oleosum: v.g. ex absinthio, centauryo minori, chelidonio majori, mentha, olea destillata aromatum &c.

In specie pro corrigendo sale volatili acri seu bilioso, indeque nata phlogosi, alvi fluore bilioso, siti, &c. v.g. in febribus ardentibus.

*R. Nitri antimoniat. ʒi.*

*Arcan. dupl. ʒss vel ʒ ij.*

*Bezoard. miner. ʒj.*

*M. f. Pulvis.*

*Div. in 3. par. æq. S.*

*Pulvis refrigerans pro tribus vicibus.*

*R. Nitri antimoniat. vel arcan. dupl. ʒss.*

*Bezoard. miner. ʒj.*

*M. pro duabus dosibus.*

*R. Nitri antimoniat. ʒss.*

*Arcan. dupl. gr. xv. vel ʒ j.*

*M. f. Pulvis.*

*Item.*

*R. Ebor. sine igne,*

*Pulv. hepat. rub. an. ʒss.*

*M. f. Pulvis.*

*div. in 2. par. æqual.*

*R. Pulvis hepat. rub. ʒij.*

*Lapill. Cancr. præp. ʒj.*

*M. div. in 2. vel 3. part. S.*

*Pulvis digestivus: dosin unam mane, alteram vespere.*

Usurpetur ante evacuationem, ubi peccat sal volatile oleosum.

Item pro eodem scopo:

*R. Aquæ acetos.*

*Rubi idæi an. ʒss*

*Succ. citræ rec. vel cydon. rec. ʒj.*

*Antimonii diaph. ʒj. vel ʒ ij. ad ʒj.*

*Bezoard. miner. ʒss ad ʒj.*

*Syr. rubi Idæi vel acetos. citri ʒ vjad ʒj.*

*Spir. nitri dulc. q. f. ad gratiam.*

*M. f. Potio, D. S.*

*Potio refrigerans, & alterans pro aliquot vicibus.*

Usurpetur pro aliquot dosibus, pro dosi cochl. ij.

*R. Aquæ Rubi idæi ʒij.*

*Succ. ejusd. ʒij.*

*Antimonii diaph. ʒj.*

*Syr. rubi id. ʒss.*

*Spir. nitri dulc. q. f. pro grato sapore.*

*M. D. S.*

*Potio refrigerans pro aliquot vicibus.*

*Veraque verò, acida nempe, & alcalina vitata, temperant, & quasi obtundendo corrigunt remedia sulphurea, pingua, & oleosa, ex omnibus tribus regnis, quæ quasi catholica celebrantur, tam volatilia quam fixa. In regno vegetabili temperata sunt imprimis emulsiones ex seminibus oleosis, v.g. amygdalis dulcibus, pineis, pistaciis, seminibus quatuor frigidis majoribus, & minoribus, papaveris albi, &c. Hæc siquidem oleositate suâ temperant omne acre, acidum & urinosum, in corpore: quod etiam faciunt olea destillata vegetabilium, sed cautiùs usurpentur ob oleositatem, qua valde inviscant: Mucilagines, & gummi Arabicum, Tragacanthæ, saccharum, glycyrrhiza, althæa, Malva, & omnia ejusmodi emollientia, olera esculenta, rapæ, item opjata; sed palliando. Ex minerali regno lac, serum lactis, item gelatinæ animalium, &c. Præ cæteris sulphura Mineralium, & hinc metallica fixa, sunt adeo nobilia, cum non solum temperent omne acidum acre in corpore, & hinc Cacochymiam, sed etiam simul vi anodyna prædita sint, adeoque hæc sulphura fixa in tanto pretio apud practicos habeantur, quatenus ad universarium remedium classis propius accedunt: id quod sulphura antimonialia, exque his paratæ tincturæ, item tincturæ solis, &c. sufficienter confirmant. Pertinet huc quoque aqua calcis vivæ.*

## M E M B R V M I I I

### De Cacochymia Pituitosa, & Serosa.

**T**ertio quoque radicantur salia peccantia in subjecto, nunc viscido, nunc seroso; unde *Cacochymia pituitosa, & serosa*. Facile ex Cacochymia serosa oritur viscido, & nonnunquam in certis solis partibus, ubi frigus accedit, vel aliæ causæ; v.g. in arthritide vaga supervenit sæpè fixior morbus, v.g. lichiæ, podagra, chiragra, nephritis, &c. sine dubio ex pituitosa Cacochymia.

*Cacochymia serosa* Evacuationibus, & serum seu lympham alterantibus, saltem tollitur; si verò hæc salia hærent in subjecto viscido, & *Cacochymiam pituitosam* constituunt, corrigitur per Alterantia, Incidentia, Attenuantia, & Resolventia, imprimis per salia alcalia fixa, volatilium, & falsa, quæ aculeis suis penetrant, & ita coagulata plus minus indurata, mollia & fluxilia faciunt: quò pertinent omnia salia digestiva dicta, imprimis tartarus, qui est concretum salum, & corrigit mucos viscidos tenaces, qui dicuntur Cacochymia pituitosa; & tartarea, ut cremor tartari, seu crystalli salis tartari, tinctura tartari, spiritus tartari, salis ammoniaci, sal volatile tartari, spiritus carminativus, terra foliata tartari ejusque liquor, tartarus vitriolatus, nempe genuinus, qui paratur ad imitationem TACHENII in *clavo Medicinæ Hippocraticæ*; est nobile remedium: item arcanum duplicatum Mynsichtii, quod est sal polychrestum, multi usus in Praxi, item sal ammoniacum, sal digestivum hypochondriacum, &c. quibus subinde aut lapilli cancerorum, aut corallia præparata, aut simile quid, ad infringendum magis acida, admiscenda: imprimis gummata, sagapenum, mastix, myrrha, in specie ammoniacum & galbanum, quæ omnia mirabiliter conferunt in attenuando succo viscido; Spiritus æris viridis, gummi ammoniaci cum æruginæ, acetum destillatum, spiritus salis dulcis, oxymel, &c. hic sunt optima; nec non vegetabilia aromatica acriora, seu salina volatilium oleosa, vulgò aperientia, & febrifuga dicta, visciditates incidere, & ita magis absorbere solent; ut absinthium, carduus benedictus, centaurium minus, taraxacon, mentha, armora-cia, rosmarinus, sceniculum, angelica, galanga, & omnia intense amara; sicut de colocynthide notum est, quod itidem in muco viscido probe conducatur.

Sit ergo *Digestivum*, præmittendum purgationi pro includenda materia viscido pituitosa, ut subsequatur evacuatio minus dolorosa, & torminosa:

*R. Tartari vitriolat.*

*Salis hypocondr. an. gr. xv.*

*Ablini.*

*Card. bened. an. ʒss.*

*M. f. Pulvis.*

*div. in 2. part. æqual. S.*

*Pulvis digestivus pro duabus vicibus.*

*R. Tartari violat. ʒj.*

*Salis card. bened ʒss.*

*Flor. Salis armoniaci vel. gr. xv.*

*M. f. Pulvis.*

Div.



Div. in 3. partes. 3℔.  
℞. Tartari vitriolati. 3℔.  
Lapill. Cancr. præp. 3j.  
Salis Tart. 3℔.  
M. f. Pulvis.  
Div. in 2. part. æqu. S.

Pulvis digestivus pro duabus vicibus.  
℞. Tart. vitriolatus. 3℔.  
Salis abfynth. 3℔.  
Lapill. Cancr. præp. an. gr. xiv.  
M. f. Pulvis.  
Div. in duas vel tres partes æqu. S.

Pulvis digestivus pro aliquot vicibus.  
℞. Crem. Tart. 3j.  
Tartari vitriolati. 3℔.  
Salis abfynth. 3℔.  
Cichor. an. 3℔.  
M. f. Pulvis.  
Div. in tres partes æqual.

Capiantur una vel altera die ante evacuationem.

℞. Salis ammoniaci depur. 3℔.  
Maffich. 3℔.  
Cinnam. 3j.  
Salis abfynth. gr. vi.  
D. S.

Pulvis stomachicus pro 4. vicibus.  
Usurpetur bis in die, manè ante prandium, & à meridie aliquot horis, duabus præter propter ante coenam.  
In forma liquida.

℞. Aqua Mentha 3j.  
Arcan. dupl. 3j.  
Lapill. Cancr. præp. 3℔.  
Sal. tartari gr. v.  
Syr. de Hyssop. 3℔.  
M. S.

Potio digestiva pro duabus vicibus.  
℞. Liq. Terra sol. Tartari 3℔.  
D. S.

Digestiva Essentia.

De qua capiantur manè, & à meridie 30. vel 40. gutt.

℞. Aqua menth. 3j.  
Cinnam. 3v.  
Cum. ammoniaci aceto sol. 3j.  
Tartari vitriolati. 3j.  
Syr. rosar. 3j.

Misc. pro duabus vel tribus dosibus.  
Assumpto digestivo, propinetur purgans sequenti die, & sic felicius operabitur, & sine molestia.

Fundamentum tertii curationis modi per arcana, consistit in eo, quod una tantum detur causa materialis, & occasionalis morbi; hinc

1. Quædam arcana respiciunt causam formalem morborum, nimirum spiritum, cujus motum, & organum figere ac inhibere tentant. Ejusmodi panaceæ seu arcana imaginem habemus in opio. Sane nullam febrem scio (nisi excipiantur continue lente, & hectica) quæ non curare possit opium rite adhibitum, aliisque remediis sociatum.
2. Quædam arcana quodvis acre, præprimis in primis viis hærens, ac irritans spiritus, corrigere possunt, adeoque dato ejusmodi correctore aeris in primis viis orti, datur reverà panacea. Hujus panaceæ etiam vestigium suggerit nobis Syllii sal volatile oleosum, quo præmissis præmittendis plurimos morbos felicissimè, maximoque cum lucro, curavit.

#### MEMBRUM IV.

De Succorum Cacochymicorum evacuantibus universalibus.

E A, quæ cacochymia vitiatos succos evacuant, sunt varia, vel universalia, vel particularia: Universalia, si non totum evacuant corpus, operatio tamen ejus ad totam corporis machinam se extendit: Hæc in quintuplici sunt differentia: vel enim sunt Emetica seu Vomito-

ria; vel Cathartica seu purgantia, in specie sua, per inferiora; vel Diuretica seu urinam cientia; vel Diaphoretica seu sudorifera; vel Sallivancia, seu quæ ptyalinum concitant, nempe cum Mercurio facta remedia. Hi sunt quinque modi remedium evacuantium universalium: Particularia verò sunt Apoplegmatici, Erthina, Stenotatoria, item quæ interdum ex utero, ano, & velicæ excernunt: de quibus in Influentibus sufficienter est.

#### TITULUS PRIMUS.

DE

#### VOMITORIIIS.

Nunc igitur agam de Evacuantibus universalibus, & primò quidem de Vomitoriis, quorum sane ingens est copia in omnibus tribus regnis. Si tamen selectus vomitoriorum est instituendus ex regno ani, nullum, quod sciam, prostat vomitorium, excepta rassa a unguibus baccarum. Hæc enim per noctem vino generoso infusa, mane filtrata hausta, egregium est Vomitorium; quod etiam bilissimum CNOFFELII, Medici Regis Polonie, epporiston Castrense fuit. Ex regno vegetabili asarum, nicotiana, elleborus albus, oleum olivarum, succus raphani rusticani, Iuli sambuci & ebali cum aceto & oleo olivarum præparati, oleum ex arillis baccarum sambuci, & succo vermicularis.

Inter hæc excellit asarum, quod tanquam optimum Veteribus jam dudum innotuit: Nam in DIOSCORIDE (tanquam in Patriarcha, qui primò de Materia Medica scripsit) prostat, quod asarum purget, phlegma evacuet, &c. In hoc asaro singularia sanè reperiuntur: Nam radice & radice saporem habent ingenter acrem ac mordacitatem, qui in sua differentia exactissime æmulat saporem Zingiberis, vel Zedoariz. Ab hoc sale essentia acris dependet primò aus vomitoria; cum enim particule hæc acres, membranas ac fibras ventriculi, imprimis copiosiores circa pylorum, vellicant, fibra istæ contrahuntur, sicque vomitus excitatur. Præterea & attendendus sapor iste acris specifice Zedoaria æmulus, à quo vis alterativa dependet, item febrium chronicarum, & quartanarum curativa, item vi. quoque urinam ciendi, splenemque inflatum corrigendis. Hæc omnia ex ipsa asari textura desumenda. Præterea etiam notabile est, quod asarum planta sit hyeme latissime vivens, æstate vero marida, certo judicio, continere id singulare balsamum: conf. CARDILVCHII Tract. egregius de peste, in quo de hoc asaro non intellegentem habet discursum.

Dixi etiam, quod asarum curet Febres. Notum est, quod STROBELBERGERUS (optimus sui temporis Medicus) in Tract. de methodo curandi febres, contra quartanam maxime commendat, si nimirum terna uice in vino calido, imprimis ingruente paroxysmo frigido febrili, dosi à 3j ad 3j cum 3j piperis albi bauriacæ. Verum methodus hæc est vana. Concedo quidem, impossibile esse absque repetito Emeticorum usu curari posse quartanas: Concedo etiam, quod optimum sit antiquarium. Tentavi hoc, scilicet asarum cum pipere longo; & certè si hoc aliquoties repetatur, quartana cessat. Par ratio est in remittentibus Tertianis chronicis (quæ quò diuturniores, eò peiores) quæ repetito hujus asari usu curata fuerunt. Modus igitur curandi ac utendi asaro est triplex:

1. Pulveris.
2. In forma Infus.
3. Decocti.

I. Quoad pulverem, observandum: quod exactissimum asarum in alcohol redigitur, seu minutissimè pulverisetur, & melius vomitum, urinam, & sudores ciat; particule enim ejus eò melius se insinuare possunt ventriculi plicis: & contra grossomodo pulverisatum asarum non tam bene operatur, sed alium magis laxat. Datur adultis à 3℔ ad 3j; Rustico verò robusto ad 3iv: propinatur in vino calido generoso in febribus, & quidem hauritu paulò largiori.

II. Quoad Infusa: reperiuntur folia v. tridita.

Pro infuso remissiori.

℞. Fol. asari No. IX.

Quæ scindantur in segmenta minuta, infundanturque per noctem in Aqua card. bened. 3iv.

Hydromel. simpl. 3℔.

Manè Colatura detur, quæ mitius purgat.

Pro



*Pro infuso fieri:*

*Folia asari virid. etiam No. IX.*

Terantur in mortario, vel marmoreo vel lapideo alio; addendo hydromel simplex tamdiu, donec folia in succum solvantur: hoc deinde diluitur cum

*Aqua car. bened. 3 ij.*

*Estque præstantissimum Vomitorium.*

III. Quoad Decoctum, si decoquatur radix asari in aqua, exiit vim vomitorium, & tantum sit Diureticum: si autem in Vino decoquatur, manet vis emetica, fitque vinum emeticum. Primus observavit hoc HELMONTIUS; confirmavit vero ZWELFFERUS, & BOYLE in Principiis suis Philosophicis. Ratio in suspensio est: Dicam quod sentiam: Superius dixi, vim asari alterativam in sale essentiali fixo non adeo volatili consistere. Luniigitur in aqua decoquitur, partes salinae volatiles evolant, Decoctum amarecat, & fit tantum diureticum: Si autem in vino decoquatur, penetrat vinum texturam concreti, antequam scilicet particulae avolent salinae. Decoquitur etiam radix asari cum hydromelite, quod tamen non est emeticum, sed egregium, potius peccorale, mucum peccoris optine incident.

igitur solum tantum inter vomitoria vegetabilia excelsa asarum, reliqua sunt vitanda, imprimis ex nicotiana; nam subinde excruciant aegros misere.

Hinc rejicio in specie Tabacum, potentissimum vomitorium, & quidem ob summam, quam habet, violentiam. Sanè olei Tabaci guttula una, vel altera summe est venenosa; Videmus enim quantas in corpore nostro excitet turbas, unde metuendum, ne gravissima ac periculosissima exinde oriantur symptomata. Scio infantes, qui unguento ex pulvere Tabaci, in tinea capitis illito, in convulsiones, carialgias, lipothymias, choleras, sudorem totius corporis, &c. inciderint. Usurpatur autem nicotiana pro vomitorio triplici potissimum modo:

1. In fumo: si enim parum fumi deglutatur, mox fit vomitus, in non assuetis scilicet.
2. In infuso, si infundatur vino, ac filtratum mane bibatur; Vel

*Tabaci opt. Virgin. qu. pl.*

Infundatur cum Spiritus Vini q. s. per noctem:

Mane propinetur de Colatura cochlear unum, & sanè mirè præstat vomitum.

3. In Massificatione: si scilicet pisti magnitudine Tabacum massicatum cum saliva in ventriculum descendit, subito excitatur vomitus.

Caveamus igitur a Nicotiana. Potest autem corrigi ejus venenum per universalem Vegetabilium venenorum correctionem, nimirum per salem tartari, & per nitrum fixatum; hoc enim additum exhibet essentiam parum vel nihil emeticam, sed e contra quibusdam laudatur in empyemate, asthma humido, in specie verò syrupus nicotiana. Cum autem alia tutiora proferant, hoc facile carere possumus.

Rejicio Helleborum album; ut enim apud veteres fuerit usitatissimum Helleborismus, tamen quoad helleborum album in desuetudinem abiit. Dici nequit, quam stupenda symptomata inserat helleborus albus. Non datur in omnibus tribus regnis violentius emetico-catharticum remedium, quam helleborus albus, quod expertus loquor. Suasi mulieri cuidam Materialistæ nodulum ex helleboro nigro parare, ministri verò Officina infundunt helleborum album, hinc secuti vomitus, cardialgiae, sudores frigidi, &c. Ego stupefactus statim perspexi, helleborum fuisse album. Sanè, præter supra & infra factam hypercatharsin, adeo æconomiam animale afficit, ut suffocationis periculum imminet. Nihilominus tamen in sternutatoris apoplecticorum tantum locum obtinet, aliàs nulli autor essem, ut eo nec externe, nec interne uteretur.

Veteres quidem Elleboro albo frequenter usi fuerunt: Verum hi longè robustioris constitutionis fuerunt, vel illi in Græcia elleboro albo gavisi fuerunt mitiori, & climatis ratione minus truculento: Notum enim est, variare vires medicamentorum pro diversitate climatis. Accedit, quod ipsi non absque vino generoso dulci elleborum album adhibuerint; hinc nullum dubium, quoniam dulcedo vini temperare acrimoniam hellebori potuerit. Unum tamen monebo: Mania est affectus curatu difficillimus, qui sine vomitoriis curari nequit. Iam Maniaci post antimonialia, & assumpta vomitoria, parum levantur; hoc autem unicum est genus purgans, nimirum Elleborus albus, inque hoc casu tuto & necessario usurpari potest: Ut enim operentur antimonialia, tamen id nulla cum virescit sit: Solus

ergo helleborus albus est, qui vi speciei alterativa juvat Maniacos:

*R. Rad. elleb. albi 3 j.*

Infund. vino, coquatur, aut maceretur primò per noctem in loco calido: Vinum hoc, prius collum abiciatur; est enim nimis acre, radice residua aliud Vinum Rhenum superinfundatur, & hoc cum radiciis tantum in infusione stet per noctem: Mane colatura detur à 3 jss, ad summum 3 ij. hinc propinetur Maniaco, à quo cecurabitur Maniacus; horum enim est specificum.

Porrò rejicio etiam triviale illud Vomitorium, scilicet oleum olivarum, ejus 3 r. cum aqua tepida miscens: sed nocivum est vomitorium, mirè enim inde laxatur tonus fibrarum & membranarum ventriculi, unde post propter atoniam debilis redditur ventriculus.

Rejicio etiam Vomitorium Plateri ex succo Raphani rusticana, non vulgaris, ab 3 ij. ad 3 iij. cum hydromelite propinatum. Est vomitorium subinde potens, sed in ventriculo robustiori sæpe paulò diutius hic succus moratur, agitque in mucum ventriculi, ac eundem resolvit, unde gravis inflatio oritur.

Inter Vomitoria vegetabilia etiam numeravi Iulos sambuci & ebuli: Hic cum aceto & oleo olivarum in forma acetaris parantur, de quibus aliquot buccellæ sumptæ strenuè operantur, dosis tamen est incerta; nunc plus nunc minus sumitur, hinc etiam incerto modo operantur, ac denique conquerruntur aegri de debilitate ventriculi, atoniam enim ventriculi relinquunt. Equidem oleum ex arillis baccarum sambuci expressum, paucarum guttarum dosi exhibitum, potens est vomitorium, unde & à BLOCHWITIO contra icterum laudatur: sed cum asarum nostrum præstet, hoc sufficere poterit.

Denique Sedum minus seu Vermicularis, aut illecebra, acerrima planta antiscorbutica est, ejus succus um vino expressus potens est vomitorium. Novi quod in febribus tertianis certum hujus habent effectum, si scilicet hujus recentis cum vino tritæ ac subactæ Vermicularis succus expressus ante paroxysmum hauriatur. Quidam etiam decem septimanis febre tertiana conflictatus, succo hoc liberatus fuit.

Pergo ad Regnum minerale, quod suggerit Vomitoria antimonialia & vitriolata: omnium optima, potentissima, & tutissima sunt antimonialia; Vitriolata & Mercurialia vomitoria stomacho membranoso maxime sunt hominibus, summeque prosterunt ejus robur, in specie tal vitrioli vomitivum, quia ventriculo valde adhæret, quicquid de hoc ANGELUS SALA dicat; adeoque pauca antimonialia rite usurpata sunt instar omnium. Et quidem pro aliquot vomitoriis millenariis sufficit unicum vitrum antimonii, tam in forma liquida quam sicca; & in casu rigorosiori ad Turbith Minerale Crolli vel Mynsichtii confugiendum. Iam de vitro antimonii dicendum, & quare illud elegerim, etiam tradendum.

Antimonium est metallum suo modo imperfectum: id autem quod propriè vocari debet, est regulus, in quo ejus textura metallica potissimum consistit, hic propriè est antimonium, reliquum tantum est sulphur commune minerale copiosum; ut enim facie nigra appareat, tamen est purum sulphur commune. Iam ergo cum Regulus sit metallum imperfectum, simili modo de acido & urinoso, i. e. de sulphure & Mercurio participabit. Notandum: Quæ in Regno vegetabili vocantur acida, & urinosa, ea in Regno minerali sulphurea & Mercurialia dicuntur, ita ut in quovis metallo sulphureo lateat acidum, & in quovis metallo Mercuriali Urinosum etiam adsit. Igitur antimonium seu regulus etiam sulphur & Mercurium habebit. Sulphur hoc antimonii internum est de natura solari, seu ad perfectionem sulphuris solis proximè accedens, ita ut sit aurum imperfectum, aut in fieri adhuc: parte verò Mercuriali accedit ad naturam Saturni, quem etiam quidam ex antimonio parare conantur; saltem quod antimonium gaudeat sulphure solari, eoque non adeo fixo, nec non adeo volatili. Igitur regulum antimonii à sulphure externo purgatum alii cum subiectum lapidi Philosophorum elegerunt, vocarunt, quæ Saturnum Philosophorum: confer. SCHROEDERUS Pharm. l. 3. cap. 1. pag. 421. Vti enim Saturnus dicitur Pater Deorum, ita antimonium etiam sic vocarunt, cum ex ejus sulphure fixato à sulphure externo depurato & magis fixato Lapidem Philosophorum elaborare student: Videatur PHILELETHÆ (scriptor est Anonymus, Anglus tamen) Innotius ad apertum & occultum Regni Palatum, & M. A. N. C. append. anni (nescio ejus)



Ibi huius Lapidis Philosophorum fit mentio. conf. cum hi<sup>s</sup> PANTHALEONIS Tumulus Hermetis apertus, ubi Procellum PHILALETHÆ examinat. His jungatur BECHERI supplementum secundum, & quoad præparationem lapidis Philosophorum in via siccā, sufficit ejus demonstratio.

Igitur in antimonio duplex est sulphur: externum, & internum.

1. Externum est minerale istud, quod regulum adheret.
2. Internum est fixius, ad naturam solis accedens, quod cum Mercurio regulum antimonii constituit.

Quoad externum, istud minerale non differt à sulphure communi. Probat: tumatur aqua fortis, & incitatur frustula antimonii grasso modo confusa, sic operabitur aqua fortis in regulum; nimirum acidum minerale rodit regulum, contra acidum seu sulphur externum separatur; tunc cum coaleat in aqua calida accipitur perfectum sulphur, non differens à sulphure communi, nisi quod parum sit viscidius, quam commune sulphur. Alio autem modo elicitur sulphur antimonii:

*R. Antimonii qu. pl.*

Huic pulverisato affundatur

*Oleum vitrioli rectificatum.*

Destillentur per retortam, sic sublimabitur: sufficienter Sulphur.

Sulphur hoc minerale nudum se usurpat, vim cathartice, regulum autem junctum, nullam possidet.

Quoad alterum sulphur fixius metallicum: h. e. naturæ solaris. Differentia utriusque huius sulphuris patet in præparatione reguli antimonii; Antimonium enim cum alcalibus solum regulum amittit, accipitque tantum sulphur commune. In specie vitrum antimonii non fit, nisi quando sulphur externum penitus exhalauerit.

Dicendum igitur, quid sit vitrum antimonii? Vitrum in genere est concretum artificiale, ex acido sulphureo & alcali terreo, inuicem arte colligatis, & strictissime unitis, compositum nimirum ex arena & alcali cinerum. Probo hoc ex resolutione: acidum enim arene rodit alcali cinerum, hinc colligata ac juncta in vitrum abeunt. Par ratio est, si ex arena, vel latrone calcinato & mixto fiat vitrum Saturni, aut si cum lapide pyrite seu arena fiat vitrum Saturni. Probo id ulterius per resolutionem, si vitrum arte factum cum salis fixi ana colliguescant in crucibulo, post in aqua solvantur, sic precipitabitur per acetum arena, quæ forma pulveris in fundo remanebit. Vid. quoad Theoriam vitrorum, præter TACHENIUM in Hippocr. Chymico, BECHERUS in sua Minera arenaria perpetua.

Jam videatur, quale sit Vitrum antimonii? Constat igitur hoc ex acido sulphuris fixiori colligati, arteque cum parte alcalina Mercuriali juncto: Acidum enim sulphuris antimonii paulo fixius mediante sulphure arripit substantiam Saturninam, quæ duo coaluerunt in pellucidum vitrum, hinc pro facilitanda fluxibilitate vitri additur borax aut sal tartari, quæ sunt alcalia, ac motum intestinum augent, fluxumque vitri antimonii promouent. Jam differentia videtur inter vitrum commune, & antimonii: Videatur DAVISSONIUS in sua Pyrotecha. (scriptor rarus, sed elegans.) Nimirum in vitro commune præparatum longe sunt fixiora, firmius unita, & intimius colligata; quæ omnia in minori gradu sunt in vitro antimonii. Nam

1. Vitrum antimonii sub fluxu potest adhuc sublimari, quod non fit in vitro communi.
2. Vitro antimonii aliquod decedit, & infundatur; vitro autem communi infuso nullo modo potest aliquid absumi.

Iam igitur quaeritur: Quare in specie Vitrum antimonii seligatur pro iocrocis, & supis, &c. ex antimonio parandis: Resp. Ut in omni evacuant, juxta violentiam solutivam, attendenda vis alterativa specifica respectu morbi; ita & hoc in antimonio attendendum. Non sufficit vis evacuas seu Vomitoria, sed & anodyna temperativa analeptica, quæ in eis sulphure fixiori later, attendenda est. Dum præparatur vitrum antimonii, separatur sulphur externum, & tantum remanet fixius sulphur internum solare, cum paucis admodum sulphure externo minerali pertinacius adherente.

In hoc vitro antimonii habetur:

1. Ex acrimonia vitriolica particularum antimonialium remedium simulans.
2. Ratione sulphuris fixioris interni juncti & remedium

confortativum, temperativum, & ejusvis acidi correctivum.

Præparationem & correctionem vitri antimonii videbitis in Collegio nostro Chymico & Pharmaceutico.

Iam dicam, in quo consistat vis vitri antimonii emetica, alterativa, & anodyna &c.; est enim mitius venenum, sub quo elegans Medicina latet. Dixi supra, sulphur externum non purgare; sed tantum regulum. Igitur in particulis fixioribus antimonii vis emetica consistit. In quibusvis enim antimonialibus purgantibus ex acido sulphuris, cum substantia Saturnina coalescente, fit concretum Vitriolicum, à quo oritur molestia ventriculi, & consequenter vomitus, hoc est, quod alii dicunt, in sale fixo antimonii esse vim emeticam. Dabo exemplum. Gustetur parum Mercurii vitæ, & sapor vitriolicus nauseabundus se exeret; in hoc enim vis emetica Mercurii vitæ consistit; quod probat, si enim loco aquæ communis cum oleo tartari per deliquium præcipitetur, longè mitius operatur; acidum enim infringit alcali, ut magis salum evadat. Pari modo in vitro antimonii est textura vitriolica: hæc particule quasi vitriolice ventriculum vellicant, ut exinde vomitus sequatur. E.g. sola particula acida pinguis sunt, quæ acce quodvis volatile figunt, & imperium spirituum blandè & anodyna figunt.

Antequam igitur ad utendi modum accedamus, quædam dubia sunt eximenda: Dubium scilicet fuit in reguli particulis, junctis cum Mercurio & sulphure, consistere vim emetico-cathartice. Obicitur quis: quod omnis crocus metallorum consistat simpliciter ex sulphure antimonii externo, & nihilominus habeat vim & reguli emetico-cathartice. Respondeo: Verum est, esse sulphur externum, quod crocum constituit, sed non solum; infuse enim etiam partes regulinæ, utut paucæ, sufficientes tamen, à quarum particularum consortio, sulphuri externo adherentium, croci metallorum vis cathartice dependeat. Nam ut mediantibus salibus alcalicis fixis separatur ab antimonio sulphur externum, quod est acidum, salia alcalia fixa hoc imbibunt, & sic regulum dimittunt: Sulphur autem antimonii externum dum per alcalia dissolvitur, acidum rodit alcali, & sic semper huic aliquid de reguli antimonii habet, ut ita hujus ratione vim emeticam habeat; si quis enim ex croco metallorum exacte partes regulinas separare possit, certus sum, illum nullam vim emeticam habiturum. Alterum dubium est, quod dixerim, sub calcinatione antimonii fumum exhalantem, & in flores sublimatum esse sulphur externum antimonii, & tamen hi flores albi seu summi hic est summe emetico-cathartice, ita ut non in substantia, sed in infuso tantum utatur queat: Respondeo: ut sulphur externum sub igne quodvis metallicum secum rapit, sic etiam hic sulphur externum rapit secum ex regulo plures particulas regulinas, à quibus vis emetica dependet.

His rebus, consideremus usum seu potius utendi modum: Usurpatur tantum in infuso cum Vino Rhénano, & Syropo; nunquam verò, quoquomodo enim correctum, in substantia; cruda enim antimonialia assumpta loco infusorum, sæpe nociva sunt, aut ad minimum fallacia. Recipiuntur in specie vitri huius antimonii, vel croci metallorum, vel Mercurii vitæ, qui genuina est antimonii proles, gr. V. aut plura, infunduntur in Vinum Rhénanum, filtratum bibitur, ut sequatur vomitus; quia vinum Rhénanum est acidulum, & optime imprægnatur antimonialibus particulis: si ve multum sive parum de antimonio infundatur, nihil refert, modò determinetur quantitas vini hauriendi, non quantitas vitri aut substantiæ antimonialis infundendæ; quia liquor recipit, quantum recipere valet. Si enim gr. V. vitri antimonii Unciis tribus Vini infundantur, eundem effectum habebunt, ac si gr. xx. infunderentur; nam vis antimonii est in exhausta, ut docet WALÆVS in methodo medendi: Habeatur ergo ratio vini, non antimonii. Optime præparare docet KER. KRINGIUS in Comment. sup. r. curram Triumfal. antimonii Basilij Valentini pag. 144. & 169.

Præscribatur igitur ex tempore:

*R. Vitri antimonii vel croc. metall. simplic. aut absolutior. vel Mercurii vitæ gr. iv. v. vi. aut viij.*

Infundantur in

*Vini Rhénan. generosiss. vel absinth. q. s.*

Stent in loco tepido per noctem: mane filtrentur exacte per chartam emporeticam: Filtraturæ *R. 3j. vel 3jss. ad usum* D. S.

*Vinum emeticum.*

Hauriatur, & sic citò ac sicundè operabitur: Addi



Addi etiam possunt *Aqua cinnamomi* 3 ij.

Non ineptum est etiam quorundam inventum, quando ex vi-  
tro antimonij parvos calices vomitorios fundunt: his vini q. s.  
v. gr. 3 j. infundunt, relinquunt in satis tepido loco per diem,  
mane filtratum hauriatur, & sic egregium habebitur Vo-  
mitorium. Talis calix ad plures sane annos servari potest,  
nec quicquam ipsi sensibilibiter decessit.

Pertinet huc etiam MARTINI RULANDI calix  
ex ligno ordinario tornatus, quem interne pice obduxit, huic-  
que adhucliquida frustula viiri antimonij grosso modo contusi  
insperfit. post vini 3 j. vel sufficientem quantitatem infusam  
per noctem in loco calido relinquit, maneque filtratum,  
hauriendum praebeat.

Secundus modus est, ut loco horum Vinorum usurpetur in  
consistentia syruporum. Syrupum seu oxyfaccharum emeti-  
cum optimum parare docet LUDOVICI in sua Phar-  
macia pag. 212: nempe

R. Croci metallor. 3 ij. 3 ij.

Infundatur per triduum in loco calido in

Aceti Vini 3 x.

Saeptius agitata liquorem, dehinc filtra,  
& adde

Sacchari albi 3 x.

Vitro clauso in aqua calida detinendo, sponte saccha-  
rum solvitur, & si lubet tingitur cum

Essent. flor. papav. errat. 3 j.

Hic modus est certus & tutissimus, alias incertus sem-  
per.

Dosis 3 ss ad 3 vj.

Ad hujus fere, aut oxyfacchari emetici Angeli Sala-  
mationem:

R. Vitri antimonij 3 iij. vel v.

Infund. Aceto-Vini puro, stentque per aliquot dies in  
digestione, subinde agitando acetum: Post filtraretur, ipsi-  
que ana sacchari albiissimi addatur, sique habetur syru-  
pus elegans à 3 iij. ad 3 ss. in robustioribus ad 3 vj. propi-  
nandus.

Vel potest etiam fieri Syrupus emeticus citratus hoc  
modo:

R. Vitri antimonij pulver. q. s. v. g. 3 ss. vel 3 j.

Infundatur in

Succ. citri rec. per aliqualem residet. dep.

3 ss ad 3 j.

Stent in digestionem blandi caloris subinde agitando: fil-  
trato liquori addatur

Sacchari ana;

vel c. s. q. sacchari, coquatur ad syrupi consistentiam.

Habebitur sic syrupus elegans, cujus dosis 3 ss esto.

Præscribitur sequenti modo:

R. Aqua menth. 3 vj. vel 3 j.

Cinnam. c. Vin. 3 ij.

Syr. emet. 3 ss. (ubi varietur dosis pro varietate  
preparationis.)

Syr. Nicotianæ 3 ij.

M. S.

Mixtura emetica pro una vice.

Alium Syrupum vomitorium habet LOTICHIUS  
in Consil. pag. 52.

Tertius modus In infuso sit Sapa vomitoria, quâ olim Syl-  
vius frequenter in Belgio usus fuit, ut tamen ejus des-  
criptio proster in Appendice TILEMANNI de materia  
Med. quæ ita sit.

R. Vitri antimonij pulveris 3 j.

Infundatur in musti rec. vel loco hujus succi cydon.  
3 cc. 3 j. plus minus:

Stent in digestionem loco calido per aliquot dies & noctes,  
hinc filtraretur exacte, vel per linteum, vel per filtrum char-  
taceum: liquor filtratus leni igne evaporetur ad consisten-  
tiam mellis seu Rob liquidioris vel spissioris, ita tamen ut  
Rob liquefactum ad gutt. v. vel vj. seu, ubi spissius est, ad  
pisi unius vel duorum dari possit dosin, in quocunque ve-  
hiculo.

Sufficientes movet vomitus, & est remedium eupo-  
risoni.

Ad hujus imitationem prostat hic Lipsæ in Officina  
Linckiana ad insigne Leonis Syrupus rubi idæi emeticus,  
qui sine saccharo paratus à 3 j. 3 ij. ad 3 j. leniter vo-  
mitus ciet.

Vomitoria hæc tutissima ac perpetui sunt usus.

Post hæc in forma sicca eminet Tartarus emeticus Myn-  
sichtii, qui tutissimum est Vomitorium antimoniale: vid.  
MYNSICHT. in Armentis. Medic. Chymico pag. 13: cor-

rectus à LUDOVICI in Pharmacia.

Dixi supra: Vitrum antimonij non in forma sicca debere  
adhiberi, quia conflet, vim hujus emetico-cathartici, quam  
in minutissimis suis moleculis diffundit in liquorem infusum,  
esse inexhaustam. Metuendum igitur, ne, si aliquid de vi-  
tro antimonij in substantia recipiatur, hoc in rugis ac pli-  
cis ventriculi hærendo, ita hypercatharsin continuam, &  
cholerae periculum, excitet.

Dicis: cur igitur tartaro emetico, qui est pulvis antimo-  
nialis, utimur? Resp. Tartarus emeticus est infusum anti-  
moniale in forma sicca. Hoc quidem videtur paradoxon,  
sed tamen verum. Tartarus est filius seu privignus quasi  
vini: Scilicet est acidum vini cum alcali terreo saturatum:  
five ergo per infusionem, five solutionem, idem acidum vi-  
ni in forma sicca imprægnetur, quod post filtrationem coa-  
gulando ac crystallizando de substantia crassa antimoniali  
nil retinet: ergo idem est, ac si acidum vini infundendo in  
forma fluida rodatur vitrum antimonij, quàm sit solutio tar-  
tari in forma sicca: Optimus igitur Tartarus emeticus ex  
vitro antimonij fit, si

R. Vitri antimon. 3 ij.

Teratur cum ana cremoris tartari, ebulliant cum affu-  
sione aquæ communis q. s.; dum fervent omnia, tepide fil-  
trentur, & in frigido crystallisentur, & ita in forma sicca,  
humida, & media, habemus Tartarum emeticum. Dosis  
sunt gr. ij. vel iij. ad summum, in robustioribus gr. iv, rarif-  
simè gr. v: & quidem in Melancholicis affectibus contuma-  
cioribus, ubi & gr. vij. propinquantur. In Maniacis ordina-  
ria dosis nil operatur ob acidum figens, ideo augeatur do-  
sis. Præscribitur cum tantillo sacchari, ut sine nausea assu-  
matur, ita:

R. Tartari emet. gr. ij. iij. ad iv. vel v.

Sacch. albiss. gr. vj. vel 3 ss.

M. f. Pulvis, S.

Pulvis emeticus.

Addi possunt olei destillati menthe gutt. ij. Item, quan-  
do per inferiora volumus simul stimulare, additur scam-  
monium sulphuratum: e. g.

R. Tartari emet. gr. ij.

Scamm. Sulphurat. gr. ij. vel iij.

Sacch. albiss. gr. iv. vel v.

M. f. Pulvis.

Assumatur in cochleari uno vel altero jasculi gallina-  
cei, vel carnis: saccharum infervit pro corpore pulve vis  
nam duo vel tria grana sunt nimis tenuia, ne perentris,  
hujus medicamenti in cadendo, aut altera ratione.

In forma Bolii:

R. Conf. Menthe 3 j.

Mercurij vitæ gr. ij.

C. Syr. cinnam. parum, f. Bolus.

D. S.

Bolus emeticus pro una vice.

R. Rob. junip. 3 ss.

Tartari emet. gr. ij.

Scamm. Sulphurat. gr. j.

C. Syr. corr. aur. f. Bolus.

Dicis: non tamen protinus sulphurata aurata sunt rejicien-  
da. Resp. Verum est, si quis igitur tutum habere vellet  
sulphur antimonij auratum, huic sequentem commendo  
methodum:

R. Antimonij,

Tartari,

Nitri an. part. equal.

Antimonio fluenti in tigillo superiniiciantur tartarus, &  
nitrum, detonentur mutuo, & tunc peracta detonatione  
fluant, ut separetur regulus: Materia fusa in cono fusorio  
est bipartita, regulusque exacte separandus. Si autem sus-  
picio quadam adsit adhuc reguli quid admixtum esse, rur-  
sus detonetur tartarus cum nitro, & fluant, solvantur scoriæ  
in aqua communi, & recipiatur solutio tartari fervida  
per linteum transmissa; sic præcipitetur crocus seu sul-  
phur antimonij, continuando id tandem, donec nil amplius  
præcipitetur. Separetur hoc sulphur, ac edulcoratum ex-  
siccet, liquor filtrum transiens evaporetur, quo usque  
velit crystallifari, serveturque usui.

Ratio preparationis in eo consistit: nimirum sub de-  
tonatione prima abeunt in alcali fixum nitrum, & tartarus,  
quod promptè absorbetur à sulphure antimonij externa ra-  
tione acidi sui occulti, & sic regulus spontè cadit, qui ante  
ab acido detinebatur: scoriæ igitur istæ sunt turgidæ sul-  
phure externo & particulis regulinis. Præcipitatio fit cum  
tartaro: nimirum mitius hoc acidum est; nam etsi sulphur  
cen-



centes in aqua fervida ebulliat, non omnes enim acidum abluet. Hoc sulphur dosi gran. v. vel vj. propinatur: infanti à gr. ß ad gr. j. Si præcipitatio sit duplex, hæc posterior mitius operatur priori. Quod sæpius ex scorlis antimonii separantur sulphura, eò evadunt fixiora, minus cathartica, ac potius diaphoretica anodyna.

Præscribitur sequenti modo:

R. Crem. tartar. ʒß.  
Sulphuris antimonii virid par. gr. vj.  
Scamm. præp. gr. ij.  
M. f. Pulvis. D. S.  
Pulvis emeticus pro una vice.

Liquor filtratus est essentialis tartari, sulphure antimonii ex scorlis imprægnatus. Hic liquor est abstergens ac mucii primarum viarum resolutivus, diureticus, ac lithontripticus: uno nomine, egregium remedium.

Hæc vomitoria blanda & tuta sunt, sufficiuntque pro 1000 hominibus. Plura hæc de re, qui legere cupit, adeat sincerissimum Fratrem BASILIUM VALENTINUM, cum Commentario KERKRINGII (qui Commentarius omnium est optimus) in curru suo Triumphali antimonii: scripsit etiam in hunc curru Triumphalem antimonii Commentarium PETRVS JOHANNES FABER (cujus scripta tamen minus sunt bona; speciosus enim est in verbis, egenus in rebus) qui autem nihil habet in recessu. Post hunc scripsit etiam ALEXANDER HUCHENBON. de mysterijs antimonij libros duos egregios, in quos commematatus HEINRICUS THOLDENIUS. Verum quæ adduxit ihî THOLDENIUS, partim sunt dubia, partim falsa.

Dixi quidem, hæc sufficere remedia: tamen si duro nodo applicandus sit duruscuneus, ad Mercurium accedendum est: Ex hoc sufficit Turbith Minerale, vel Crollij, vel Mynsichtij.

Turbith minerale in genere notat omne remedium catharticum ex Mercurio paratum. Præmoneo hic: alio modo Mercurium vivum considerari, prout est in sua essentia; alio modo, prout est in sua existentia. Loquor igitur primò de Mercurij natura. Mercurius vivus in sua natura est liquor metallicus ex aqua & terra subtili æquabili proportionato specifico principio seminali (quod principium consistit in acido sui generis) progenitus. Hæc invicem contexta subministrant liquorem hunc, nimirum Mercurium. Representatur igitur Mercurius alcali metallicum, b. e. tale concretum, quod promptissime ab acido alteratur, & ab alcali liberatur per acida. Hinc etiam est, quod nihil magis queat agere in Mercurium, quam acida, & contra nil magis Mercurium ex spissa sua consistentia in liquorem fluxilem redigere possit, quam alcalia. Acida autem illa sunt vel occulta vel manifesta, quæ imprimis in spiritibus acidis mineralibus sunt conspicua.

Prout igitur sulphura acida variant, ita & variat Mercurius, ita à sulphure communi coagulatur in cinnabarin, & contra à sulphuribus metallicis, quæ sunt fixiora, coagulatur in metallum imperfectum. Quoad acida manifesta, notum est, quod à spiritu salis, nitri, sulphuris, vitrioli, &c. promptè coaguletur; tamen hic differentia observanda: Dum Mercurius coagulatur ab acido salis communis, hoc fit, ut maneat volatilis Mercurius; dum verò coagulatur à spiritu nitri, vitrioli, &c. ita coagulatur, ut magis maneat fixus: hinc est, quod facillimè Mercurius vivus cum sale communi paratus igne sublimetur, & contra Mercurium cum spiritu nitri paratus facillimè coaguletur. Axioma igitur est egregium: spiritus salis communis & spiritus nitri habent effectus duos oppositos: spiritus salis communis resolvit, sed nitri plus minus figit. Hoc ita probò: Mercurius vivus resolvitur in spiritu nitri; si autem abstrahatur spiritus nitri, hoc acidum agit in alcali, & Mercurius in fundo manet; si verò solutioni huic à spiritu nitri factæ injeceris sal commune, præcipitatur à sale communi, ex præcipitato hoc separato sublimato, ignique commisso, fit Mercurius corrosivus: sal commune hic volatilis, sal verò nitri figit Mercurium. Certum ergo fit, Mercurialem liquorem ab acidis tantum coagulari. Jam quod etiam resuscitetur Mercurius vivus à Salibus urinosis, exinde probò: quando scilicet ex cinnabari volo resuscitare Mercurium, addo sal tartari, urinae humanæ, Cineres clavellatos, &c. sic prodibit Mercurius vivus. Hoc est fundamentum controversiæ istius prolixæ, de præparandis Mercurij corporum metallicorum. Modò igitur quis novit vinculum Mercurij, & acidum saturandi, quod sa-

ciunt alcalia, sal tartari, urinae; Cineres clavellati, &c. sic spontè fuit Mercurius. Fuit hic Mercurius in essentia, quem alias etiam vocant Mercurium Virgineum, item Mercurium de Mercurio: iam consideremus Mercurium in sua existentia. Hic non est amplius Virgo, sed maxime adulteratus; cum enim sit liquor, cum quovis acido conubium agit, hinc etiam est, quod semper sulphur Mercurio adhæreat, ita ut nunquam Mercurius purus eruat. Sulphur igitur acidum subtilissimum, pertinacissime alcali puro adhæret.

Dixi: Mercurium non posse resolvi nisi ab acidis, quod probò: si recipiatur Mercurius vulgaris, & in diuturnam digestionem reponatur, sic successivè Mercurius vivus abit in rubrum pulverem, simillimum Mercurio in aqua forti præcipitato. Jam unde est principium hoc? Resp. est sulphur externum quasi adulteratum, quod ab igne actuatam ita præcipitatur: ab hoc sulphure externo, juncto cum Mercurio vivo, dependet emesis, salivatio, &c. à quibus dicitur siccat Mercurius. Hicce Mercurius in corpore nostro absorbet quævis acida, quæ à quibusvis alijs remedijs intacta manent, ita ut fixissima etiam acida in corpore humano à Mercurio absorbeantur. Dum verò ipsi adhæret contagium sulphureum, hinc est, quod attenuet, dissolvat, & colligefaciat humores, tam utiles, quam inutiles, tam naturaliter, quam præternaturaliter viscidos, ut sub forma spissioris salivæ possint excerni: & ita in lue v. g. Venerea per salivationem curanda, ratione substantiæ suæ alcalinæ, absorbet acidum Venerum; dum verò liquefacit viscidum, facit id ratione acidi istius sibi admixti. Certè Mercurius vivus ex se mitior est, seu ejus acrimonia minus sensibilis est, unde ex se facillè nec vomitum, nec secessum ciet: si verò diutius intra corpus retineatur, ptyalissimum & secessum facit, & ita potius partibus fluidis in corpore nostro; quam partibus solidis afficiendis, inservit. Sunt qui aliquot libras Mercurij vivi sine noxa hauriunt, nihilque incommodi inde sentiunt, præterquam quod caligas semper solvere cogantur. Curavi mulierem iliacam ex alvi obstructione laborantem gravissimam, cui Mercurium vivum cum potiunculis ad ʒ ij. propinavi, ac tamdiu continuavi, donec ʒ xxiv. Mercurij in corpore haberet: Hic ad quartum usque diem hærebat, dein salivare cepit, donec tandem Mercurius humores istos viscidos ac pertinaces solvit, alvumque strenuè laxavit.

Quod atinet Mercurium ita præparatum, ut fiat Vomitorium, dixi præparationem ejus per acida fieri, quæ cum figunt: acida autem ex vitriolo magis figunt. Jam ergo notetur: sicuti Mercurius vivus per se partibus solidis est innoxius, ita acidis sociatus nocet: quod enim copiosiora adhærent Mercurio sublimato acida, eò violentius purgat supra & infra; quod verò minus, eò mitius operari solet: v. g. Mercurius sublimatus est corrosivus propter copiosiora concretata acida; si autem addatur Mercurius vivus, ita ut sit minus acidus, est remedium tutum & suaviter laxans: Sic Mercurius præcipitatus cum spiritu vitrioli vel sulphuris, quod crebrius, & rigorosius abstrahuntur spiritus acidi, adeoque etiam, quod minus acidi est in Mercurio, eò fixior, & simul minus purgatorius, quod magis est acidi in Mercurio (si mitiori igne abstrahatur) magis purgatorius erit; verbi gratia, spiritus nitri, semel abstractus, dat Mercurium minimè tutum intra corpus assumendum; si autem abstrahatur summo igne spiritus nitri, ita ut acidum non maneat in ipso, Mercurius tunc est fixior, & minus purgatorius, propter acidi paucitatem. Rationem verò quod minus purget Mercurius sæpius abstrahatur, gustus suggerit; gustentur enim omnia cathartica, semper habebunt saporem vitriolicum. Ex hoc acido fit quasi concretum Vitriolicum, quod rodit ventriculum, & sic vomitum ciet. Fundamentalem Mercurij præparationum videb. in TACHENII Hipp. Chymico, & in FRANCISCI SYLVII Praxis lib. 4. Tr. 6. §. 20. & Tract. 3. §. 14. seqq. ubi multa habet de Mercurio egregia.

Pro nostro scopo Vomitorio selegimus Turbith minerale Crollij vel (quod tutius est) Mynsichtij. Modus Crollij in Basilic. Chym. pag. 122. 123. & 124. descriptus, sequens est:

R. Mercurij ʒß.  
Insundit

Spiritus Sulphur. per. camp. rectif. ʒj.

Abstrahit spiritum hunc sulphuris forti igne, idque tribus vicibus, quartà vice parum novi spiritus sulphuris addit, & abstrahit tamdiu, donec arena & fundus retortæ candeat: hoc facto caput mortuum album insundit in aquam



aquam phlogistam seu destillatam, digerendo edulcorat, donec nil acrimoniarum amplius in aqua percipiatur, & sic pulvis præcipitatus albus fit penitus flavus: Hoc præcipitatum flavum phiolæ longo collo immittit digestionem in cinerum igne per octidies, ut, si quid adhuc de substantia Mercurii non rite ab acido fixatum superfuerit, hoc sublimetur in summitate phiolæ, & pulvis in fundo resideat: pulverem hunc recipit, & ter spiritum vini affundit, terque deflagrare sinit.

Ratio hujus præparationis est: vult scilicet Crollius mediante acido ligare fluxum Mercurii, eligit acidum sulphuricum, quod medium est inter acidum salis & nitri, spiritum vero sulphuris eligit pro spiritu vitrioli rectificato, quia non semper hic purus habetur: nam semper aliquid de sua minera ipsi adhæret; hinc est, quod spiritus vitrioli limpidissimus, si parum stet, fiat obscurus, cum scilicet particula metallicæ præcipitentur; item quod successu temporis insignem æstum contrahat, quod consistit in motu acidi concitatione. Abstrahit ternâ vice spiritum sulphuris, ut sic mediante igne particula acidæ melius uniantur cum Mercurialibus: ne tamen nimis fiat corrosivus, adhuc semel abstrahit. Edulcoratio fit in aqua destillata, omnes enim edulcorationes debent fieri cum aquis destillatis, nam concreta Mercurialia serè sunt salia: jam aqua communis etiam est salia: ergo vix solvet Mercurialia. Spiritum vini deflagrare permittit, ut quicquid est corrosivum, ab oleo spiritus vini temperetur, & sic remedium tutum evadat.

Usus hujus Turbith mineralis Crollii est ad gr. iv vel v, pro scopo vomitorio. Non datur autem in forma pulveris, ne attractu suo gingivas rodât, faucesque lædat; sed potius in forma boli vel pilularum: v. g.

*R. Turbith miner. Croll. gr. v.*

*Theriac. opt. q. s. pro incorporatione:*

*Aut etiam*

*Turbith hoc minerale redigatur cum succo liquiritiæ Hispan. in formam pilularum.*

**MYNSICTII** autem Turpethum minerale ita paratur:

*R. Mercurium sublimatum corrosivum:*

Eumque solvit in Aqua communi, solutionem præcipitat cum oleo tartari per deliquium; præcipitatum hoc cum aqua destillata vel aqua communi calida crebrius edulcorat, ut quicquid adhuc copiosius salis, tum acidi, tum urinosi, adsit, hæc ablatur: tandem spiritum vini aliquoties desuper deflagrare sinit, ut penitus edulcoretur, & quicquid adhuc adsit, sub flamma ignis avolet. Ipsa verò edulcoratio cum aqua mellis non est necessaria, sed superflua.

Hujus dosis est à gr. v ad vj, ac eodem modo ac præcedens propinatur.

Usus hujus Turbith est, ut morbos fixos, & ab aliis remediis planè inalterabiles, quantum possibile, tollat ac corrigat, & partim viscidum, somitem morbosum, potentissimè incidendo, partim acidum quodvis vitiosum fixissimum absorbendo, partim ex vitriolica sua textura ventriculum ad purgationes stimulando: Lues Venerea, Gonorrhœa maligna inveterata, item scabies ferina, Lepra, gutta rosacea, quæ ab acido oriuntur specifico, sine hoc turpetho minerali vix corrigi possunt: hinc inveteratas quartanas subinde Turpethi usus ante paroxysmos eradicat, hinc, modò consent vires ægræ, tunc hoc turbith adhiberi potest, sic usum cosmeticum obtinet; nam acida ista, quæ vel Saturnus, vel oleum tartari corrigere nequeunt, hoc Turbith optime corrigit.

Operatur ratione suæ substantiæ, quæ absorbet quodvis acidum; ratione sulphuris externi operatur colliquescendo humores viscidos; ratione sulphuris & vitriolicæ suæ texturæ nauseam, sicque vomitum efficit.

Reliquitur autem hic sal vitrioli vomitorium: Nam necessitate coactus quædam de eo dicenda. Nimirum ANGELVS SALA, Vicentinus, Chymicus celebris, sincerus & industrius, in suis scriptis Chymicis, & speciatim in Tr. de Ternario Emericorum, mirè extollit sal Vitrioli vomitorium, ita ut etiam mannam vomitoriam vocitet. Juxta hunc B. D. JOANNES LANGIUS in Mifc. Curiosis, etiam hoc sal vitrioli vomitivum extollit. Videndum igitur, quomodo fiat? quidque in recessu habeat?

Paratur hoc sal vitrioli vomitorium sequenti modo: Vitriolum calcinatur usque ad colorem obscure prunneum, deinde caput mortuum pulverisatum cum aqua communi elixiviat, solutio hæc filtrata igne blando evaporatur, & concrevunt crystalli, quæ serè colorem florum persico-

rum æmulantur, & ipsum sal vitrioli Vomitorium constituunt.

Calcinatur ad colorem prunneum ideo; si enim tantum ad colorem rubrum calcinaretur, loco salis vitrioli acquireretur inter elixivandum genuinum Vitriolum, aliàs hoc non fit. Est itaque hoc sal non spiritus, non oleum, non caput mortuum vitrioli; nam hoc nihil suggerit; sed potius pars acida Vitrioli, quod prius in forma spiritus & olei fuit destillatum: Hæc pars cum particulis mineralibus colliquata per retortam non transit, sed in ea permanet. Constat autem acido vitriolico, cum substantia vitrioli arctius colliquato; omne verò Vitriolum constat ex acido sulphuris, & minera Martis vel Veneris invicem mixtis. Igitur sal vitrioli vomitorium nil aliud est, quam purius Vitriolum, seu in quo est plus acidi concentrati corrosivis, minus substantiæ mineralis metallicæ solutæ. Probo hoc: si enim aliquandiu aeri expositum fuerit hoc sal vitrioli, successivè ex mutatione texturæ motu insensibili candidissimum efflorescit in vitriolum viridescens, & ita regeneratur.

Quoad usum hujus salis vitrioli: scilicet, si quis unquam illud gustarit, nauseosissimum est remedium, quod tantos horrores excitat in ventriculo, ut non tantum ad nauseam & vomitus stimuletur, sed & per aliquot dies languores nauseosos patiat ventriculus: imò sub operatione hujus salis vitrioli tantoperè tonus ventriculi laxatur, ut vix dici queat. Vis ejus vomitoria non est à spiritu sulphuris, nec à minera Martis; nil enim in his emeticis est, & utimur quotidie hisdem absque vomitu; sed est potius à Venere, cujus tantillum vel mirum quantum integram massam sanguineam afficere queat. Nam si in his salis vitriolici saltem 3ss sit minera corrosiva Veneris, erit mirè vomitorium; mirè enim dilatativa est vis Venerea, ventriculoque Venerea sunt inimicissima.

Noceat autem Vomitoria:

1. Herniosis,
2. Gravidis; &
3. Mulieribus, quæ patiuntur prolapsum sinus pudoris & procidentiam uteri.

Vid. MYNSICHT in Armament. Chymico pag. 15. ubi de Tartaro emetico.

Si vomitus difficilis, sumitur haustus cerevisiæ calidæ, vel jusculum pingue; sic is promptius succedit: si vomitus sequatur nimis, sumitur haustus vini Rhenani tepidi; sic omnis vomitus statim sinitur, & in præcordijs cruciatus facile evanescunt, licet à fortioribus antimonialibus stomachus irritatus fuisset: & licet vice primæ rei jciatur, reiteratum tamen cum buccella panis, vomitus certè sistit; item opiata aromaticis sociata, hinc Theriaca in vino assumpta, vox vomitum cohibent, aut etiam eadem Theriaca cum spiritu vini crocato ventriculo calidè applicata.

## TITULUS II.

### DE

### PURGANTIBUS PER ALVUM.

Sequuntur nunc purgantia: si enim per artem variacrementosa per alvum rejiciantur, vocatur in specie Purgatio.

Locus purgationis sunt intestina, in quibus cum non præexistent ea, quæ eijciuntur, ventilanda erit, antequam ulterius, progrediar, quæstio: Per quam loca in Purgatione artificiali transferantur excrementa in intestina? quando v. g. assumuntur pulveres jalappæ, rhabarbari, hellebori, & similes, quomodo per intestina expurgentur ista excrementa? Resp. Loca ista, per quæ feruntur ex massa sanguinea, esse tantum duos ductus istos, choledochum, & pancreaticum, quibus natura tunc temporis quasi abutitur; unde & quæ excernuntur, frequentissimè flavedine tincta conspiciuntur: Hi enim ductus sunt naturaliter distincti, ut quicquid ex massa sanguinea in ijs fuit separatim, ad intestina amandant; quia nulli ali apparent ductus: simul tamen probabilis admodum PECHLINI videtur sententia, Tractatu elegantis de Purgant. cap. 36, simul etiam per glandulas miliares post intimam intestinorum membranam sitas mediantibus tubulis & parvis ductibus, ex dictis glandulis in intestina hiantibus, simul recrementa varia ex sanguine secreta in intestina deponi. in verò licet



licet multum PLEMPIO & aliis Autoribus statuant, quod per vasa etiam mescaraica in Purgatione artificiali separentur excrementa; respondeo tamen, quod sit contra legem naturae universalem, quae talis est, & per experientiam confirmatur, quod nempe nunquam fiat secretio cuiusdam materiae fecernendae ex massa sanguinea sine certo ac determinato cribro, per quod tanquam per filtrum separetur excernendum ab utili massa sanguinea: sin verò immediatè, & contra tale instrumentum separationis, ut sic dicam, aliquid separetur è massa sanguinea, tunc hoc fit promiscuè nunc cum ipso sanguine, uti hoc patet in fluxu haemorrhoidali, & in haemorrhagiis quibuscunque criticis, nec non in vomitu sanguineo splenicorum: interdum periodico & salutari &c., ita ut omnino existimem, per vasa mescaraica quaecunque nil in Purgatione deferri ad intestina, sed quicquid deferretur, deferri eò per ductum pancreaticum, & choledocum, & glandulas dictas intestinales miliares.

Equidem optandum esset, darentur vera purgantia, hoc est, quae sordes saltem excrementitiae ex corpore eliminarent, citra utilium nutritivorumque succorum depravationem simultaneam: Verùm vulgò dicta purgantia non sunt talia, sed sub blandiente nomine virulentiam nocivam gerunt absconditam; hinc sanos & aegros aequaliter vexant, & tot sordes evacuant, quas impossibile esset citrà vitae periculum in corpore existere. Hinc etiam tam insignis oritur virium debilitatio post purgantium usum, morbis sub antiqua contumacia persistentibus, dum interim varia & gravia inferunt symptomata, in specie convulsiones, propterea etiam tam studiosè corrigi iubentur.

Omnia sane purgantia nociva & virulenta sunt stomacho, solà aloë & rhabarbaro exceptis: operantur enim promiscuè suā virulentiam, & fermentativā colliquatione tam recremētosos quā alimentitios corporis succos resolvunt & colliquant, & quis non inveniebant sordes, corrumpendo nempe succos efficiunt, nisi eorum virulentiam robustior paulo stomachus ratione succi fermentativi acidi plus minus correxerit.

Operantur scilicet purgantia duplici ratione: vel irritando, & acrimoniam suā amarissimā pertinaciter vellicando intestina; unde non tantum horum spasmi & violentae contracturae (*lacerantes*) intestinorum, indeque propulsiones excrementorum sequuntur, sed simul etiam hiantia in ea orificia vasorum, choledochi & pancreatici, item glandularum miliarum, simul irritata & vellicata eructant uberius sua contenta. Unde etiam est, quod hi duo succi, si naturaliter sint constituti, ut plurimum tingant excrementa à purgantibus colore subpallido & subfavo; qui color saepius oritur ex bile tingente, copioso tamen succo pancreatico diluta: sin verò vitiosè hi succi constituti sint, aut si remedium assumptum habeat vim tingentem, qualia sunt Rhabarbarum, aloë, remedia Martialia, & similia, tunc varii coloris varia oriuntur excreta. Vel secundā ratione operantur, sanguinem & inde natos succos fundendo quodammodo, & simul colliquesfactione in corruptelam resolvendo; unde sordes tam variae ante remedium non praexistentes post purgans assumptum in corpore generantur. Sub hoc tamen motu, quicquid heterogeneum est in sanguine, & à vitalitate proscriptum, facilius alteratur, & consequenter elicitur, quā quod magis vitale ac utile erit.

Omnia scilicet purgantia habent acrimoniam volatilem insignem, utut non semper aequè faucibus perceptibilem; quae in vegetabilibus fundata est in sale volatili oleoso acri, ratione adjuncti olei insigniter amaricante, indeque visciditatem insignem adiunctam habent: in mineralibus verò vis laxativa in textura sulphurea vitriolica, aut sulphure volatili acri quali arsenicali, radicata est. Hinc etiam omnia acida destruant purgantia vegetabilia varia, quatenus destruant eorum sal volatile acre; item salia fixa, ver. gr. sal tartari corrigit purgantia, quatenus corrigit eorum oleum, & inde natam visciditatem, colliquesfaciendo texturam resinofam purgantis, tollit; sicuti etiam fermentatio purgantium eadem mitigat, ferociamque non nihil domat: In mineralibus verò ea, quae figunt sulphur volatile, quae inter eminent nitrum, tollit eorum, v. g. antimonii, malignitatem purgantem, eamque saluberrimè diaphoreticam reddit.

Promiscuè ergo agunt purgantia in succos corporis nostri, tam nutritivos, quā excrementitios; unde spontè sua ruit Divisio purgantium in cholagoga, phlegmagoga, &

Ermuller. Oper. Tom. II.

melanogoga; quin unum alterumve purgans loco omnium sufficiat: utut pro circumstantiarum ratione nunc debilius nunc fortius purgans eligendum sit. Nihilominus tamen pro morborum varietate solet interdum aliqualis selectus horum purgantium institui, quatenus sub generali virulentia laxativa in quibusdam vis specifica causae morbosae alterativa est recondita hujus vel illius morbi, obquam aliqualis selectus habendus: qua ratione helleborus niger praeter virulentiam laxativam etiam specialem habet vim contra affectus melancholicos; Rhabarbarum ad affectus renales: ubi per alvum evacuantur sordes tenaciores, in specie acidæ, praeter reliquis confert colocynthis ritè preparata, quae in hypochondriacis, morbis mulierum chronicis, in lue Venerea, gonorrhoea virulenta, &c. bona est, utut varia purgantia conveniant; in specie tamen Mercurius dulcis, si aliis permiscetur, uti evacuat, ita specialiter corrigit.

Laboramus abundantia purgantium: ex regno autem animali nil suppetit, cum in hoc nullum detur. Ex Vegetabilibus ergo ex omni purgantium caterua 4. vel 5. mitiora & tutiora pro scopo medico sufficiunt, v. g. jalappa, fenna, helleborus niger, qui nobilis, aloë, Rhabarbarum, &c. quibus, pro stimulis nunc de scammonio, nunc, ubi fortius agendum, de extracto trochiscorum alhandal, addi potest. Ex mineralibus sufficit Mercurius dulcis. omnibus praefertur antimonium per inferiora saltem purgans ritè paratum. Haec sufficiunt pro 1000 hominibus purgandis.

Modus usurpandi est varius, prout unum vel alterum remedium huic vel illi formae aptum est; usitatissime praescribuntur purgantia in forma pilularum, inter quas ex Extracto catholico, variis additis terminantibus, in specie Mercurio dulci, ubi mitius laxandum, massa pilularum de ammoniaco debito stimulo, sufficiunt. Verùm in compositionibus veterum officinalibus, qualis de hiera, &c. purgantia sunt crudi in substantia addita minus correctæ, ideo illa hodie non frequenter praescribuntur. Moderni sumunt Extracta purgantium horum, siue sint simplicia, siue composita, quae optime sunt per spiritum vini tartarizatum, vel beneficio tincturae tartari vulgaris, ut ratione salis tartari corrigatur aliquo modo vis laxativa excedens venenosa. Pro pilulis usualibus *alorice* ad imitationem LUDOVICI concinnatae, vel TILEMANNI, praestant. Inter pulveres pulvis jalappae compositus sufficit. Infusa inter, fennatum cum Rhabarbaro aut helleboro est optimum. In forma Eleqtuarii purgantia in parva dosi commodissime usurpantur, si per fermentationem parantur: (sic paratur colocynthis in minuta frustula concisa, elaterium, scammonium, in specie esula, thymalus, & tractatur sic, ut alias opium: de quo vid. Dn. LANGELOT *Epist. ad A. N. C.* ubi elegantem modum divulgavit.) Optime succedit cum succo cydoniorum vel pomorum Borsdorffianorum, addito sale tartari, fermentationi committitur, dehinc filtratur, & inspissatur ad consistentiam *Rob* vel *Electuarii*. Sic fermentatum ratione hac à ʒi. ad ʒss. ad summum ʒi, propinatur: bene sapit, valide operatur, licet correctum sit per fermentationem. Quibus placet, ex hoc Rob cum spiritu vini *Essentia* aut etiam *Extractum* preparari potest, & erit remedium magis tutum.

Quod attinet *Jalappam*: hujus vis solutiva juxta HELMONTIUM ex HIPPOCRATE, *deprædatur atiquid de vitali facultatibus nostris*. Hoc autem de aloë & Rhabarbaro vix dici potest. *Jalappa* igitur si p. ante hodierno seculo sanum ad nos allata, ac Veteribus penitus incognita. Nam ex Indis Occidentalibus, regione nempe Mexicana asserri solet. Dicitur aliàs *Mecboacanna nigra*: huic congeneralia *Metalita* dicta, viribus texturisque ferè eadem cum *Jalappa* conveniens. de qua vid. SCHROEDERUS *Pharmac. Append. pag. 29*. Quoniam verò ignoramus, quid sit? (utut quidam substituunt eam radici huic *Jalappae*) eam omittimus. Haec *Jalappa* nostris in hortis culta crescit, diciturque communiter *Flos mirabilis*, ab aliis *Mirabilis Peruvianus*, *Isseminum Peruvianum*, estque juxta MORISSONIUM planta heteroclitæ, nullique florum speciei respondens. Probo autem (utut contrarium statuatur WEDELIUS in *Diss. de Jalappa cap. 21.*) quod idem sit flos, qui in hortis nostris crescit, cum Mexicana *Jalappa*, hisce modis:

1. Quia radix nostra in taleolos discissa eadem facie apparet ac *Jalappa*, ita ut ovum ovo non possit esse similis.

B

2. Ex



2. Ex effectu; nostra enim æque purgat ac exotica: Nimirum ꝑss. vel ꝑ ij. nostræ tantum præstant, quam ꝑ j. exoticæ; hæc enim magis est resinosa; nostra verò minus; adeoque hujus ratione dosis nonnihil augenda, quod ipsum in climatis differentia consistit. Imò observatum fuit, quod succus foliorum floris Mirabilis inspissatus, cum saccharo in syrupi consistentiam redactus, ac infantibus propinatus, suaviter eos laxaverit. Confirmarunt hoc HORFERUS in *Hercule Medico*, item HORSTIUS (*Pater*) in *Observat.* Solus quem miror, GEORGIUS HEINRICUS VELSCHIUS (*Vir inexhaustæ lectionis*) in *Decad. Curat. & Histor.* in quodam loco negat Jalappam nostram esse eandem cum Mexicana; non tamen addit rationem: sed opinor, eum deceptum fuisse libro illo rarissimo, qui vocatur *Theaurus Mexicanus, Romæ impressus*, à FRANCISCO HERNANDEZ collectus, & post ab ANTONIO RECHO in ordinem redactus. In hoc fit ejus quidem mentio, nihil tamen de vi ejus laxativa dicitur. Hinc suspicor, VELSCHIUM exinde fuisse deceptum.

Usus radicis jalappæ Medicus est vel generalis, vel specialis:

1. Generalis est, quod ab ejus radicis assumptione alvus soleat provocari, & excrementa serosa plus minus flava egredi, citra tamen ventriculi subversionem & intestinorum extorsionem.
2. Usus speciale scilicet quod concernit: humidioribus subjectis tantum convenit; hinc etiam ad cachexiam pituitosam, hydropem, fluorem album, affectus catarrhales, &c. laudatur: in specie hydropicis, imprimis à BORELLO *Histor. & Obs. Medico-Phys. Cent. 2. Obs. 23. pag. 128.* tanquam appropriatum remedium commendatum. Vis operandi consistit in ejus particulis resinosis, id est oleosis, ab acido fortiter concentratis, adeoque in particulis acido-salis oleosis.

Probo hoc:

- (1.) Si enim mediante spiritu vini resina ex radice jalappæ extrahatur, caput mortuum nil quicquam valet.
- (2.) Quò pinguior & facilius inflammabilis est resina, eò melior & efficacior est Jalappa; hinc sequitur, quod extractio non in aquoso menstruo, sed oleoso aut spiritu vini fieri debeat.

Malè igitur facit Medicorum vulgus, qui in nodulis infundit radicem jalappæ vino, cerevisiæ, aut aquæ comuni: si enim hanc 100 amphoris aquæ infunderent, nihil tamen resinosa substantiæ, sed tantum mucilaginem quandam extraherent.

Modus operandi est duplex:

1. Particulis suis viscidis ventriculo & intestinis adherendo provocat eorum spasmos, & sic contentorum excretionem.
2. Operatur etiam, quatenus subacta in primis viis, humores attenuat, dissolvit, acrimoniam suam liquefacit, sicque in serosum liquamen vertit.

Probo hunc duplicem operandi modum binis exemplis:

- (1.) Si recipiatur resina jalappæ, eaque cum saccharo assumatur, hæc dosi gr. xv. sufficienter, cum insignibus tamen ventriculi torminibus, operabitur: Resinosa enim substantia ei & parietibus intestinorum adhuc adhæret, hinc spasmos, tormina, &c. ac tandem evacuatio, & in prædispositis hypercatharses.
- (2.) Si verò recipiatur hujus resinæ jalappæ ꝑss, & cum vitello oui subigamus, fit solutio blanda; nam vitellum oui oleosam resinam resoluit. Potio hæc grata cum aqua sceniculi vel menthæ, aut cum syrupo propinata, sine torminibus operatur. Ergò partim irritando, partim liquefaciendo, operatur resina jalappæ.

Utendi modus est duplex: usurpatur enim vel in forma solida, vel fluida. In forma solida, si recipiatur pulveris ꝑ j. (quæ est ordinaria dosi,) operabitur quinquies, sexies, si scilicet in substantia usurpetur: Vel, ut melius operetur, jungitur cum tartaro, vel tartaro vitriolato; quoniam detergendo viscidum loco stimuli additur: v. g.

℞. Crem. tart. gr. xv. ad ꝑ j.  
Pulv. jalapp. ꝑss. gr. xij. ad gr. xv.  
Olei destillat. anisi vel macis. gutt. j. vel ij.  
M. f. Pulvis, S.  
Pulvis purgans.

Propinetur in vehiculo serujdo, ut melius dissoluatur tartarus.

Si stimulum addere lubet:

℞. Pulv. jalapp. ꝑss. gr. xv. vel xvj.  
Crem. tart. vel tart. vitriol. vel arcu. duplic. gr. xii. ad xv.  
Scamm. præp. gr. j. vel ij.  
Olei destillat. anisi, vel macis, vel cinnam. gutt. ij.  
M. D. S. vt antea.

Vocatur vegetabile purgans polychrestum, ad plures usus sufficiens.

Vel alia ratione præscribitur:

℞. Pulv. jalapp. ꝑss. ad gr. xv.  
Nitri puriss. ꝑss. (vel nitri gr. iv. ad vj. & jalitart. gr. iv.)  
Scamm. præp. gr. j. vel ij.  
Olei destillat. anisi vel macis gutt. j. vel ij.  
M. f. Pulvis: S.  
Pulvis laxativus pro una vice.

Sine torminibus purgat. Vel

℞. Crem. tart. ꝑ j.  
Resin. jalapp. ꝑss.  
Sal. tart. gr. vij.  
Olei destillat. anisi gutt. ii.  
M. f. Pulvis.  
In forma Boli:  
℞. Conf. flor. tun. ꝑss.  
Crem. tart. gr. xv.  
Pulv. jalapp. ꝑss.  
Olei destillat. macis gutt. ij.  
Cum syr. ros. sol. f. Bolus, S.  
Bolus purgans.  
℞. Pulp. passul. ꝑ j.  
Pulv. jalapp. ꝑ j.  
Scamm. sulphurat. gr. j.  
Syr. fumar. q. s. f. Electuar. S.  
Electuarium purgans.

In Pilulis:

℞. Extr. cathol. gr. xii.  
Mag. jalapp. gr. iv.  
Extr. troch. alband. gr. ii.  
M. f. Pilule S.  
Pilule purgantes.

Quoad formam fluidam: usurpatur in Essentia, qualis sit, si ℞. Spiritus vini aut alius appropriatus, & affundatur radici jalappæ cum cortice citri: Vid. BARTHO-LINUS in *Epist. E. g.*

℞. Spiritus vini, vel alius Spiritus rectif. ꝑ j.  
Rad. jalapp. ꝑ j.  
Cort. citri ꝑ vi.  
Croci (qui coloris gratia additur) gr. v.

Stent hæc in infusione in loco tepido, filtretur liquor, ac usui aservetur, diciturque Essentia curata, cuius dosis ab ꝑss ad ꝑ vi. Estque hæc nil aliud, quam resina liquefacta, quæ ita propinatur; si enim abstrahatur spiritus vini, remanet resina liquefacta.

In forma Mixture:

℞. Aquæ hyssopi ꝑ j.  
Cinnam. ꝑss.  
Pulv. rad. jalapp. gr. xv.  
Extr. troch. alband. gr. ii.  
Syr. cicbor. cum Rhab. ꝑss.  
M. f. Potio: S.  
Potiuncula purgans.

Item si ipsa resina in forma mixtura desideretur: v. g.

℞. Resin. jalapp. ꝑss. ad gr. xii.  
Salis tart. gr. vi. ad vii.  
Cum l. q. syr. ros. simpl. vel solutiv. aut similis suavioris, fiat syrupus gratus.

Sal tartari huic potioni admiscetur, ut resinam corrigat, elusque in ventriculi plicis pertinacem adhesionem prohibeat.

In forma Emulsionis si desideretur:

℞. Sem. Melon. exc. ꝑss.  
Resin. jalapp. gr. vi, vii, viii, ix, ad xiv.

subigatur: deinde affundatur.



*Aqua tepida rosar. vel mentha vel alius appropri. ʒj.*  
& redigatur in liquorem lacteum; (oleum enim seminis solvit refinam, & sic coeunt in formam emulsionis:) add.

*Aqua cinnamomi ʒij.*

& edulcoretur cum syrupo rosato soluto, aut alio quodam grato, aut rotul. manus Christi,

M. D. S.

*Emulso laxativa pro una vice.*

Addi etiam possunt scammonii sulphurati gr.ij. aut extr. troch. alband. gr.j. cum gr.viii. Sal. tartari. Denique D. HARTWIGIVS cum vitello ovi seq. modo propinavit:

*Resina jalapp. sumit gr.vij. viij. vel ʒʒ. in robustioribus vero g. xij. & xv. subigit cum vitelli ovi dimidia parte, vel cū integro vitello: hinc affundit aqua fenicul. vel mentha ʒʒ. vel q. s. ut fiat emulsi formis Potio: addit deinde Aqua cinnam. ʒj. vel ʒij. & sacch. aut syr. cynam. parum pro edulcoratione;*

D. S.

*Emulso purgans.*

Suaviter & copiose operatur. Propinavi hanc misturam foeminae robustae, quam copiose supra & infra inde pugavit, citra tormina tamen & anxietates. Ubi igitur paulo exactius purgandum est, hæc mistura potest recipi.

Post Jalappam pergo ad Sennam, quæ unum ex optimis & mitissimis est Purgantibus. Hæc primatibus Medicinæ, Veteribus Græcis fuit incognita, nihilque de hac apud HIPPOCRATEM. Cum verò Ars Medica à Græcis ad Arabes, Saracenos & Mauros fuerit devoluta, Arabes in locupletanda ea fuerunt occupati, nobisque fruticem hanc notificarunt. Dicitur autem frutex Alexandrina, quod prope Alexandriam in Ægypto optimæ notæ invenitur. Simillima frutex hæc est colutea vesicaria, unde subinde hujus folia illius foliis adulterantur, nam colutea etiam vesicas, in quibus semen reconditum, habet, non tamen est planta eadem. Differunt in eo, quod flos sennæ genuinus sit Hellæus albus, flos autem coluteæ papilionaceus & luteus: Præterea vesicæ sennæ sunt compressæ, coluteæ verò vesicæ sunt turgidæ. Differentiam hanc habet JUNGIVS (Vir Eruditus) in Doxoscop. prope finem. Nihilominus tamen cognata videtur colutea sennæ ex eo, quod colutea in dupla dosi tantum præstet, quantum senna in simplici, quod primus docuit BARTHOLINUS Cent. 3. Hist. 60.

Hujus sennæ Alexandrinæ tantum in usu sunt folia, & quidem ordinariò sine stipitibus; hi enim sunt fibræ corticis, hinc longè fortiores quàm ipsa folia, torminaque excitant, quare etiam reiiciuntur. Sunt qui putant, idè non recipi stipites, quod adstringant, quod tamen est falsum; Nam idè potius reiiciuntur, ne nimis torminosum sint remedium.

Horum autem foliorum sennæ exsecratorum usus est vel generalis, vel specialis. Generalis est, dum ab eorum usu alvus aliquoties laxatur, plerumque tamen cum torminibus circa umbilicum: Quæ reiiciuntur, sub habitu seroso, viscoso, flavedine tincto, conspiciuntur: Interim tamen unum ex mitioribus est purgantibus. Specialis est, dum pro purgatione per vomitum in usu est, idèque potius in morbis chronicis, quàm acutis, (cum in his potius vomitus, quàm purgantia conducant) usurpatur.

In morbis igitur chronicis usurpatur, imprimis, dum producta morbofa eliminat, & viscosa evacuat: hinc v. g. in quartanis, febribus aliis chronicis, affectibus hypochondriacis, hysteriis, in scorbuto, ictero nigro, & in specie Melancholia hypochondriacæ, senna est inter usitatissimæ laxativa; unde à Veteribus relata inter Melanagoga, quæ succum melancholicum, i. e. acidum, vitiosum, à vitio primæ digestionis natum, per vomitum purgant, in specie in affectibus Melancholicis: non est adeo acris seu caustica, quàm alia purgantia, unde siccioribus tantum ac calidioribus conduct.

Vis ejus operandi refidet in substantia mucilaginosa, unde tantum per menstrua aquosa (scilicet per aquam, serum lactis, cerevisiam, aut vinum) extrahitur cum vel sine ebullitione mucilago, cujus nucleus est quasi refina subciliis ac acris, à qua vis laxativa dependet. Hæc autem mucilago est nunc volatilis, nunc spissior ac tenacior: Volatilis blandè operatur, sine insigni alteratione: Posterior autem crudè tormina excitare solet. Cavendum igitur, ne sub infusione in loco calido mucilago ista spissior unà extrahatur, sicque ægrum maximis torminibus vexet; hinc ordinariè, ut eò melius operetur, corrigentia vel stimulantia, nimirum tartarus, & zinziber, addi etiam solent. Zingiber additur, quoniam ejus acrimonia corrigitur vis stimulatix laxativæ sennæ; tartarus verò vel cremor, vel sal tartari

Emull. Oper. Tom. II.

additur, ut horum medio macilago ejus eò melius detergatur, & attenuetur, ne tanta tormina excitet: Nunquam igitur senna absque tartaro vel Zingibere præscribenda.

Modus utendi duplex est: vel in substantia seu forma pulveris, vel in infuso adhibetur. In forma pulveris datur ordinarie à ʒʒ ad ʒʒ. In infuso datur ordinariè ʒij. ad ʒʒ. Quoad pulverem: prostat in officinis pulvis sennæ Montagnana (Profess. Patavini) compositus ex tartaro & senna; qui feliciter usurpatur ad hunc usque diem: quoniam autem est nauseosus, raro hodie adhibetur. Qui ergo in forma pulveris sennam præscribere voluit, ita ut per vomitum tantum operetur, v. g. in morbis chronicis ubi alvus ficior & phlogosis adeit, item in scorbuticis, hypochondriacis, &c. sequentem in modum præscribat:

*R. Crem. Tartari,*

*Fol. senn. sine stip. an. ʒij.*

*Zingib.*

*Semin. anis,*

*Cinnam.*

*Galang. an. ʒʒ.*

*M. s. Pulvis.*

De hoc pulvere capiat æger pro liberanda alvo, vel in prandio cochleari uno jusculi, vel quantum cultelli cuspis capere potest, & suaviter laxabit.

Quoad infusum: male infunditur senna à ʒij ad ʒʒ: senna certe multum largitur & requiritur plus menstrui. tamen ergo senna cum tartaro aut infunditur, aut simpliciter ipsi coquitur: Quæ infunditur simpliciter, ipsi pro solutione additur Sal tartari; si verò coquitur, additur Cremor tartari; folia enim sennæ non nili ebulliendo solvuntur cum Cremore tartari. Interim rarior sit sennæ usus in forma Decocti cum tartaro, quo mucilaginosa substantia tenerior evaporat, & spissior tantum remanet; sed potius in infuso utimur. Raro tamen infunditur sola absque helleboro nigro, qui plerumque additur & blandè operatur: v. g. pro dosi una præscribatur talis potio laxativa, & quidem per blandam decoctionem cum Cremore Tartari:

*R. Fol. senn. sine stip.*

*Rad. polypod. an. ʒij.*

*Crem. tart. ʒj.*

*Coqu. in f. q. Aquæ simpl. vase clauso:*

*R. Colatur. ʒij.*

*adde*

*Aquæ Cinnam. ʒij.*

*Syr. borrag. ʒʒ.*

*M. S.*

*Potio laxativa pro una vice.*

Per solam verò infusionem cum sale tartari:

*R. Fol. senn. sine stip. ʒij. iij. vel ʒʒ. (non ultra ʒʒ)*

*Zingib. vel sem. anis ʒj.*

*Salis tart. gr. xv. ad ʒj.*

Infundantur in f. q. Aquæ simpl. vel fumar. vel cicbor. Stent in loco tepido per noctem: manè colaturæ recipiatur qu. pl. Si mitius operari debet, recipiantur infusi senn. ʒij. si vehementius, recipiantur ʒij. ad ʒʒ.

*Colaturæ addantur*

*Aquæ cinnam ʒij. vel ʒij. ad ʒʒ.*

*Syr. de succo cherem. vel rosar. solus. ʒij. vel ʒʒ.*

*M. D. S.*

*Potiuacula purgans pro una vice.*

Sunt Potiones gratæ palato, & elegantissimæ: Leviter operantur, non hypercatharsum inferunt. Color ruber est à sale tartari.

Vel, quod melius est, cum helleboro nigro aut Rhabarbaro sequenti modo:

*R. Fol. senn. sine stip. ʒʒ vel ʒij. ad ʒʒ.*

*Rad. helleb. nigr. ʒʒ. ad ʒj (vel Rhabarb. ʒj. ad ʒij.)*

*Sem. anis ʒj. ad ʒj. vel Zingib. ʒj. ad ʒʒ.*

*Sal. tart. gr. xv. ʒj. ad ʒʒ.*

Infund. in f. q. Aquæ simpl. vel beran. vel fumar. vel cicbor. Stent in loco tepido per noctem:

*Colaturæ R. ʒij. iij. vel iv. adde*

*Aquæ cinnam. ʒij. vel ʒʒ.*

*Syr. de pom. vel rosar. solus. vel alius pro edulcorat. ʒʒ.*

*M. D. S.*

*Potiuacula laxativa.*

Possunt etiam de colaturæ rectpi ʒij. pro duabus dosibus. Quod si pro pluribus dosibus infundatur, v. g. in Melancholia



*choliam hypochondriaca*; quoniam habitus sunt siccioris, iis minus acris, calefacientia, sed potius humectantia conducunt, & sequens infusum locum habet, quo etiam in aluo ad stricta ad plures dies, creberrimè etiam in doloribus colicis feliciter usus sum:

*R. Passul. min. ʒ ss.*

Contun. in mortar. marmor. affundendo

*Aquæ servidæ ʒ i ss.*

Vel ebulliant passula conquassata in Aqua communi:

*R. Decocti huius servidi ʒ i ss.*

Infunde

*Fol. senn. sine stip. ʒ iij.*

*Crem. Tart. ʒ i.*

*Flor. violar. p. iij.*

Stent in loco tepido, vitro bene clauso, donec frigescent, frigesfactus liquor detur pro lubitu, vel omni mane vel vespere, vel alternis diebus, in Melancholia hypochondriaca pro scopo evacuandi, primasque vias aperitas servandi, & sordes eliminandi, capiat æger ʒ iij. vel iv. Ultra octo dies autem hoc infusum vix asservari potest; mox enim acescit.

Quod si in morbis chronicis, febribus in v. g. quartana ad hecticas declinante, & febribus intermittentibus chronicis confirmatis, in quibus evacuatio ante paroxysmum fieri debet, *Infusum sennæ* expectatur, sequens esto:

*R. Fol. senn. sine stip. ʒ iij.*

*Rad. belleb. nigri ʒ i ss.*

*Zingib. ʒ ss.*

*Sal. Tart. ʒ iij.*

Potest etiam addi *radix acori*,

Incisa ac confusa includantur *nodulo*, infundanturque *aquæ*, vel *ce. ep. sic servida ʒ i ss.*

& in loco tepido successivè frigescent.

De hoc infuso æger quartanarius hecticus recipiat duas vel quatuor horas ante paroxysmum ʒ ii. vel iii. & exinde blandè evacuetur.

Ubi infantes immorigeri purgandi sunt:

*R. Fol. senn. sine stip. ʒ i ad ij.*

Hæc sola includantur *nodulo*, inicianturque *cerevisiæ*, quam potant, sic sufficienter evacuantur, præsertim si parum *salis tartari* addatur.

Pergo ad *Helleborum nigrum*, ita dictum à suis *radiculis nigris*; flore enim est candidissimo, aut inter æum etiam roseo: Contra *radix ellebori albi* est alba, flos verò nigricans. Dicitur & *Veratrum helleborus* à vertendo, quod mentem soleat vertere. Eligitur imprimis *Syriacus*, Germanis dicitur *Niers Wurts*. Ex hac radice *radicula tantum* recipiatur; in medio enim radix est lignosa, quæ non eligitur. Constant autem *radiculæ* hæc partim ex cortice radicis, partim ex ipsa radice lignosa: sem in omnibus lignis in cortice dupla, siquæ maior, vis est, quàm in ipso ligno, ita ut cortex ligni sancti in simplici dosi, tantum valeat, quantum ipsum lignum in dupla dosi, quod probe notandum. Planta est *plani singularis*; viret enim perpetuò, in specie sub intensissimæ *lætemæ*, mense nimirum Decembri & Febuario, sub ipsa etiam nive latissimè *florescens*. Radix saporis est per quam acris, pungentis: tamen sine singulari ardore: habet ergo in se acrimoniam similem isti, quæ in antiscorbuticis deprehenditur, adeoque acrimonia ista non adeo caustica ac acris est. Hinc notandum, quod ex radice calcinata nullum ferè aut paucissimum *sal fixum* acquiratur; totum enim concretum particulis volatilibus constat.

Usus ejus est vel generalis, vel specialis. In genere *Ellebori* internum usum sequitur *perturbatio ventris ac tormina*, binos *successus serosi*, aquosi & mucilaginosi, &c. A Veteribus inter *melanogoga* refertur. In specie PARACELSUS nimirum fecit banc plantam, quam ubique in scriptis suis laudat, eamque murato nomine *Daurum* vocavit, dicitque: *Elleborum quatuor morbos Cardinales curare*, nimirum *apoplexiam, epilepsiam, arthritidem, & nephritidem*. Certum equidem est, quod in morbis chronicis, præsertim qui nervosum genus afficiunt, epilepsia, item in mania, *Elleborus niger* singulare quid obtineat.

Quoad operandi modum, duas facultates in eo distinguenda: *Facultas laxativa*, & *alterativa*. *Facultas laxativa* consistit in mucilagine acrisiore, quæ primis viis adhærens easdem stimulat: *Facultas alterativa* consistit in particulis volatilibus & facillè evaporabilibus quasi scorbuticis, hinc vim corrigendi habet specificum istud acidum, quod *Melancholicos, scabiosos, quartanarios, &c.* vexat. Certè sunt, qui ex radice hanc parant *Essentiam*, quæ non laxat,

sed alterat. Vis igitur *alterativa præprimis usus ejus primarius est*. Vis ejus consistit tam in mucilagine quàm in *resina*; unde tam per *menstrua aquea*, quàm *oleosa*, v. g. per spiritum vini, quo *resina acris* elicitur, extrahi potest. Ista autem præcipitatio magis placet, quando per *menstrua aquosa* extrahitur. Imò frequentissimum est, ut uterque modus conjungatur pro *Essentia* tam laxativa, quàm alterativa obtinenda.

*R. Rad. res. minutim incis. qu. pl.*

Infund. in f. q. *aquæ communis*: ebulliat leniter vase clauso, stent in digestionem; continetur hæc, quousque tingatur; omnia hæc mixta evaporent ad consistentiam *Rob.* Capiti mortuo affundatur *spiritus vini*, sic elicitur *Essentia resinosa*; post abstrahitur spiritus vini, & utraque extrahita, tam extrahum mucilaginosum, quàm & aliud resinolum scilicet, misceantur, cui, si aliquid *salis tartari* pro correctio aliquali adderetur, vix erit improbandum.

*Adusus utendi j. m.* superest: Nemp in substantia *rad. aut nunquam adhibetur*; nimis enim acrimonia sua volatili turbat corpus, adeo, ut referat & ANGELUS SALA, quod *radicula hellebori fonticulis impositæ mirè corpus turbant*. Recipiatur ergo potius in Infuso, aut Extracto. De cætero in usu etiam est *radix Ellebori non præparata*. In officinis quidem usitatum est, ut *radix aceto* infundatur: verum sic mirè castratur. Error hic exinde natus: Observant enim, omnia purgantia esse medium quoddam inter venenosum & medicamentosum, in genere quod toti systemati nervoso sint inimica: Hanc contrarietatem corrigere conati sunt Veteres per aromatica, ut verbi gratia per *matichen, zingib. &c.* Verum, cum hæc correctio à posteriori tantum fiat, & malum tantum productum, non hostis ipse e-dem profligatur, illa parum valet. Ubi omnium purgantium vegetabilium vim tam acida quàm *alkalia* enervant: V. g. *acida*, ut *phlegma aceti, spiritus vitrioli, phlegma vitrioli acidulum, &c.* omnia purgantia vegetabilia corrigunt, quia texturam eorum resinosa concentrando penitus enervant, ita ut nec dissolv. commode, nec in partes solidas aut fluidas agere queant: sic igitur *radix Ellebori* potius castratur. Ex opposito *salia præparata* quævis corrigunt purgantia, alio tamen modo: sic *sal tartari* corrector est omnium vegetabilium purgantium; nam non dissolvunt *salia fixa* texturam resinosa, sed visciditatem purgantium maturè remouent commiscibilitatem eorum cum humoribus corporis nostri promouent: sic *resinæ purgantes* per *salia fixa* resolutæ, facillè in nobis subiguntur, & in corpore nostro alterantur. Ergo *radix Ellebori cum aceto præparata nil valet*: usus potius est radicis recentis selectæ in infuso, ubi *menstrua aquosa* eliciuntur. Infunditur autem *elleborus rad. solus*; sed ferè cum *senna*, ita ut modò *senna*, modò *Elleborus* in dosi prædominetur; semper tamen & *sal tartari* pro correctore resinositatis additur, ut sic suavius operetur. *Senna* autem aqua in infuso pro illis, qui modò *se habent*; serum lactis autem in *caribus*, *icis siccioribus*, in *hypochondriacis*, & qui unquam viscerum habent: Porro in *scabiosis & sanguine scorbutico* imbutis. Eligitur autem Vinum pro utcumque *sanis*. Sic igitur v. g. in scorbutico sequens formula:

*R. Rad. Elleb. nigri ʒ iij.*

*Fol. senn. sine stip. ʒ i.*

(addi etiam potest aliquid de *polypodio, nasturtio &c.*)

Infund. in f. q. *seri lactis* depurati per noctem: mane

*R. Colat. ʒ iij.*

adde

*Spiritus coeblear. ʒ j.*

*Aquæ cinnam. ʒ iij.*

M. f. *Haustus purgans* pro una dosi.

De cætero in nodulis frequentissimus est *Ellebori* usus; hic enim modus optimè convenit pro pluribus dosibus.

Quoad *Extractum*: vel recipi potest *Extractum* compositum superius dictum, vel quod alii compendiosius faciunt:

*R. Radiculas hellebori nigri incisas, infundunt vino Rhevano, digerunt tamdiu, donec inum sapore & colore ellebori imprægnetur, post infusant ad consistentiam Rob.*

Qui melius habere cupiunt, addunt sub infusione *sal tartari*, sicque habet *Extractum Ellebori nigri correctissimum*.

Quodvis igitur horum *extractorum* habueris, solum illud,



B 3 All





## Alii

*R. Succum cicchorii, rosarum, violarum, &c. cujus ope elicitur mucilago, quæ filtrata ac inspissata in Extractum nigrum abit.*

Ex hoc solo fiunt pilulæ parvæ ex uno grano ij. vel iij.  
Conf. LUDOVICI *Pharmac. pag. 134.*

Hic est optimus & simplicissimus aloës usus. Quod si quis usuales, magis compositas, desideret, is modò dicto Extracto gummoso aloës addat Extractum gummi ammoniaci: v. g.

*R. Extr. gummi aloës ℥ss.*

*Ammoniaci ℥ ij.*

*Viridi Martis ad albed. calc. ℥j.*

*Troch. alband. gr. xij.*

*Cum f. q. Ess. Martis f. pilul.*

*Dosis harum sint xv. vel xx.*

Hæ pilulæ erunt egregium præservativum, in morbis chronicis sub decremento luncæ ante novilunium assumendæ.

Post aloën, quæ cum Rhabarbaro sola habetur innoxia, ad hoc Rhabarbarum pergo, plantam polychrestam, & ægris egregiè proficuum. Nominatur *Rha*, à fluvio Asiæ & Europam circa regionem septentrionalem secernente, qui fluvius hodie in Muscovia *Volga* dicitur: vid. *OLEA RII Itinerar. Pers.* Nam frequentissimè ibi crescere prohibent, unde etiam *Rhea* vocatur.

Hic autem moneo, *Rhe* esse duplex: vel *Barbarum*, vel *Ponticum*: *Rhabarbarum* est vel verum, vel *Monachorum*: *Ponticum* est vel verum *Thracicum*, vel vulgare, dictum *centaurium majus*. Hæc probè sunt distinguenda, aliàs confusio oritur.

*Rhabarbarum verum*, quod hodie in officinis recipitur, est Sinense, nullumque aliud habemus verum *Rhabarbarum*, quàm quod ex Sina ad nos affertur.

*Rhabarbarum Monachorum* dicitur, quod in claustris Monachorum vestigia hujus *Rhabarbari* inveniantur: Nam Monachi commentati in Mæven & Arabes de materia Medica, ignorarunt *Rhabarbarum*, ejusque loco substituerunt *Hippolapathum majus*. Quia verò *Hippolapathum* hoc à Monachis nobis pro verò *Rhabarbaro* obtrusum, adhuc hodiè dicitur *Rhabarbarum Monachorum*.

Dixi *Rha Ponticum* duplex esse: vel verum *Thracicum*, aliàs verum *Alpinum* *Rha* dictum, qui primus hoc ex semine progermigare fecit. Dicitur *Rha Ponticum*, quod in regione juxta Pontum Euxinum imprimis repertum fuit. Et hoc ab *ALPINO* in peculiari *Traç. de Rhabarbaro* verè est descriptum. Opponitur huic *Rhabarbarum vulgare*, quod nihil aliud est, quàm *centaurium majus*, quod ab ignorantibus Pharmacopœis pro *Rhabarbaro* fuit habitum. Nostrum tamen *Rhabarbarum Sinense* tota differt cetero ab illo *Rhabarbaro Dioscoridis*. Nam *Rha Veterum* fuit *Rha Ponticum verum Alpinum*, unde veteres de vi laxativa *Rha* monuerunt, & de qua tamen nil *GALENUS*, nil *DIOSCORIDES* habent. Omnia verò hæc *Rha*, tam verum Sinense, quàm adulteratum, item *Ponticum* seu *Thracicum*, sunt de genere *Lapathorum*, ad quæ tanquam generis hæc *Rhabarbara* cœu species pertinent. Conf. *MUNTINGIUS de Britann. Peterum*, ubi egregia de hoc habet. In specie tamen horum *Lapathorum* quedam laxant magis, quedam minus: Nam Sinense *Rhabarbarum* & *Hippolapathum* quidem laxant; hoc tamen in docta, illud autem in simplici dosi. *Rhabarbarum* verum est lutea, parum rufescent, ponderosa, egregiè amara, os adstringens ac duplici substantia gaudens:

1. Volatili acriscula, quæ in subjecto aquoso mucilaginoso fundata est, quæque levissimo igne a volat, ut nihil de ea remaneat; in qua tamen vis laxativa residet.

2. Fixiori adstringente amaricante, absorbente, anodynâ.

Hæ sunt potiores posterioris substantiæ fixioris facultates: Hinc uti ratione prioris substantiæ blandè laxat. Ita posterioris respectu adstringit, & ad omnes fluxus, omnesque laxos & dissolutos morbos, confert; si enim in substantia assumatur, primò blandè laxat, post adstringit. *Hepati* necesse est præcavere V. verbis, ut antea hepatis fuerit dicta: Uti enim ipsi hæmatoseos negotium hepatis tribuerunt, ita hodierni hanc vim de tono hepatis explicare debent: Hinc ictero, hydropi, &c. conducit. *PARACELSUS* multum ei in nephritide tribuit, quod verum etiam est: Nam præterquam, quod urinam suo colore tingat, observatum

quoque fuit, *Rhabarbari* usum etiam in nephritide conducere, quatenus scilicet renum spiritum initium confortando, vel fermentum vitiosum corrigendo, juvat.

Utendi modum quod attinet, *Veteres* dosi ℥j in substantia exhibuerunt, quæ dosi nimis magna est; In infuso potius cum alio, aut in pulvere adhibetur. Quoad infusum, in usu est v. g. in febris tertianis sequens:

*R. Summ. cent. min. M. j.*

*Rhabarb. el. ℥ ij. vel ℥ iij.*

*Fol. sen. sine stip. ℥ j.*

*Salis tartari. ℥ss.*

Infund. in f. q. Vini absinth. per noctem: manè colaturæ  
*R. ℥ iij.*

## D. S.

*Vinum absinthiacum purgans.*

Præterea etiam usurpatur in infuso pro pluribus debilibus, nimirum cum passulis pro scopo hepatico, ut vocant, seu pro scopo temperandi & dyscrasia sanguinis, in ictero, cachexia, &c. corrigenda; v. g.

*R. Passul. min. conquss. ℥j ad ℥jss.*

*Rhabarb. el. ℥ss ad ℥vj.*

*Cinnam. ℥ ij.*

Infundantur in

*Aque comm. ℔ss*

Stent vase clauso per 24. horas in Balneo Mariæ: manè coletur.

Est potio grata, ægrisque admodum proficua. Rarum est, quod præcisè pro scopo purgandi assumatur, sed potius pro atonia viscerum corrigenda adhibetur. In hunc finem in hæmorrhagiis nimilibus, pro scopo præservativo & correctivo in fluxibus alvi, & in iis, qui ad hydropem inclinant, adhibetur: v. g. in dysenteria, ejusque principio, sæpius similis pulvis mihi fuit in usu:

*R. Rhabarb. electi.*

*Corn Cer. usian. ℥ss.*

*Extr. iheriacal. gr. iv. (aut hujus loco laud.*

*oparii gr. jss)*

*Olei de Siliac. cinnam. gutt. j. vel ij.*

*M. f. Pulvis.*

Communiter *Rhabarbarum* totum recipitur; sed nil valet: sumendum igitur potius integrum, non verò totum. Sic in fluxu hæmorrhoidum sequens præscripti remedium:

*R. Rhabarb. electi. non rossi gr. xv.*

*Hæmatii. præp. ℥ss*

*Corall. rub. præp. gr. v.*

*M. f. Pulvis.*

Laxat alvum, & simul hæmorrhoides sistit. Sic in Electuariis etiam contra hæmorrhagias nimias narium, uteri, &c. semper addendum est *Rhabarbarum*: in specie pro cachecticis & hypochondriacis sunt, qui parant *Electuarium alexans*, bilem inertem acuens, tonum hepatis restituens, simpliciter ex passulis & *Rhabarbaro*: sed in specie in ictero flavo expertum est sequens remedium:

*R. Passul. min. conquss. ℥iv.*

*Rhabarb. el. exalt. pulver. f. ℥ss*

*Cum f. q. Syrupi rosar. solut. M. pro Electuario.*

De quo caplat æger manè quantitatè nucis moschatæ. Isti etiam, qui reconvalescunt à morbis acutis, recipiant hoc *Electuarium*, & ingens solamen percipient.

Sunt etiam, qui *Electuarium* ex Extracto *Rhabarbari* parant cum spiritu vini; sed hoc nihil valet: Alii cum aqua parant solent, rectius & prudentius quidem, quamvis & hoc limam mereatur: In ossi inis proliat syrupus de cicchorio cum *Rhabarbaro*, qui infantibus statim post partum propinatur, ut meconium, & varias istas sordes, quas in utero contraxerunt, evacuet: Acui hic syrupus potest cum ℥j vel ℥ss syrupi emet. Angeli Salæ. Alii habent *Eliz. proprietatis* cum *Rhabarbaro*, quod laudo. Prostant etiam alia.

Restat *Scammonium* & *Colocyrbis*; quæ duo rarò simpliciter pro purgatione adhibentur propter vehementiam & violentiam: sed sæpe semper loco stimuli aliis purgantibus adduntur, nimirum, quando non sumitur integra aliquis purgantis dosi, sed abbreviatur, tunc additur de his aliquid pro stimulo: v. g. sint præscribendæ pilulæ purgantes, tunc recipitur massa pilularum tartaricarum Quercet. ℥ss ad minimum; si verò alia addantur, recipitur barum pilularum ℥j, & adduntur scammon. præpar. gr. ij. & trochiscor. alband. gr. j. pro stimulo.

*R. Massa*



**R. Mass. Pilular. de hier. cum agar.**  
*Ann. Querc. an. ℥ss.*

*Scamm. prepar. gr. ij.*  
*Trochif. alband. gr. j.*

*Cum Oleo destillat. macis f. pilula.*

**R. Mass. pilular. de hier. cum agar. gr. xij xv, ad ℥j**

*Gum. ammoniaci cum aceto solut. ℥ss.*

*Scamm. sulphurat. gr. ij.*

*Extr. troch. alband. gr. j.*

*Cum S. Q. Essent. absinth. vel lignor. vel ligni*  
*sassafr.*

*f. pilula pauciores, vel plures, prout placet.*

*Sunt polychrestæ. Addi etiam Extract. absinth. ℥ss. potest.*

**R. Extr. Cathol. Andern.**

*Panchym. Cr. an. ℥ss.*

*Gum. ammon. cum aceto liques. gr. xij.*

*Scamm. sulphurat.*

*Extr. troch. alband. an. gr. j.*

*Cum Tinctura Tartari f. pilula.*

**R. Extr. panchym. Croll. gr. xv.**

*Gum. ammoniac. cum aceto sol. ℥ss.*

*Scamm. sulphurat.*

*Extr. troch. alband. an. gr. j. vel ij.*

*Cum Elix. propr. vel Tincturatare. f. pilula.*

**R. Extr. panchym. Cr. vel alius gr. xv ad ℥j.**

*Absynth. gr. vj.*

*Scamm. sulphurat.*

*Extr. troch. alband. an. gr. j. vel ij.*

*Cum tinctura Tart. vel vitrioli Martis, vel*

*Elix. propr. f. pilula.*

*Item in pulveribus:*

**R. Tartari vitriolat. gr. xij. ad xv.**

*Scamm. sulphurat. gr. ij. vel lij.*

*Troch. alband. vel Extr. bor. gr. j. vel ij.*

*M. f. Pulvis pro dosi:*

*Chi etiam addi potest*

*Olei destillat. anisi gutt. ij.*

*Hic pulvis 5. 6. vel 7. purgat, uti aliàs bona purgatio comparata esse debet; quia digestivum tartarificatum promove omnium purgantium vim. Pulvis hic non fit molestus, mihi valde familiaris. Purgantia enim non nimis violenta sint, nec in magna dosi præferbantur; sed lenia, & quæ vel sexies vel septies tantum ad excretionem stimulant:*

*In Bolis:*

**R. Pulv. hyssopod. laxat. ℥j.**

*Scamm. prepar. gr. j. ad ij.*

*Cum conf. rosar. laxat. f. Bolus,*

*D. S.*

*Bolus purgans.*

*Jam ergo scammonium considerandum venit, quod nihil aliud est, quam succus inspissatus præstantissimus convolvulorum; quæ ita dicuntur, quod assurgendo palmitibus adhæreant: Græcè. *Ευδακ*, Germanicè *die Wunden*.*

*Hæc Smilax dividitur in levem & asperam: Ad asperam pertinet farsaparilla: Levis iterum est vel major, vel minor: Major dicitur convolvulus major sylvestris; & huic oppositur minor, cujus folia etiam lætescunt. Ad convolvulos hos læves pertinet scammonium, simillimumque est convolvulo nostro majori lævi, & radice tantum differunt. Reperitur in Syria, præfertur tamen scammonium Antiocheum, ita dictum, quod circa Antiochiam crescat. Ex hoc exprimitur succus, qui inspissatur dat scammonium. Hic autem succus duplici modo elicitur: vel radice ingens recipitur, & desuper abscinditur, hinc in medio sui perforatur, reponiturque in locum tepidum, sic in medio foraminis copiosum lac transudat, qui succus lacteus repositus optimum dat scammonium: vel radice & planta simul contunduntur: succusque exprimitur; est tamen scammonium hoc modo adulteratum. Priori modo Veteres suum scammonium præpararunt.*

*Adulterari etiam solet scammonium cum lacte esulino aut tithymalino; succus enim esulæ aut tithymalli mirè accedit ad formam scammonii. Adulterium autem hoc duplici modo cognosci potest:*

1. Scammonium genuinum non est adeo acre, quam lac esulinum.
2. Scammonium genuinum, cum aqua simplici trita, spirat odorem aromaticum non ingratum; quod ipsum vim ostendit alterantem, quod non facit adulteratum.

*E semull. Oper. Tom. II.*

*Jam scammonium hoc est succus compositus pro more vegetabilium ex gummosa & resinosa substantia. Resinosa autem est duplex: vel acrior, vel magis inertis, insipida, ac picea. Prior cum spiritu vini, posterior mediante aqua elicitur. Posterioris modus est v. g. si*

*R. Scammonium:*

*& teratur cum aqua simplici, fit mistura quasi lactea: Gummosa substantia, aut cum contenta resina picea decantatur cum aqua; spissa verò materia remanens nullius est pretii, nisi quod tormina excitet. Modus hic est BRENDÉLII, describiturque in *Chymia sua in artis formam redacta*, quam quibusvis aliis præfero.*

*Præparatur tamen etiam seorsim resina cum spiritu vini; laxat hæc, moderate tamen, præsertim cum aliis mixta. Prostat in officinis pulvis Cornacini Comit. de Warewick, de quo Autor peculiarem librum conscripsit, qui conducit ad quosvis morbos acutos. Basin ejus constituit resina scammonii; v. g.*

**R. Resin. scammon. ℥ss.**

*Antimonii perfectè cum nitro alcalis (vulgo sumitur antimonii diaph. sed male) gr. viij.*

*Crem. Tart. gr. ij.*

*M. f. Pulvis.*

*Hic pulvis diversimodè operatur; modò enim laxat, modò vomitum excitat. Ad hujus pulveris imitationem aliquoties felici cum successu interitans præscripsi sequens:*

**R. Resin. scammon. gr. xij.**

*Antimon. diaph. gr. ix.*

*Crem. Tart. gr. v.*

*M. f. Pulvis.*

*Prodest imprimis in sanguineis, pituitosis, &c. In subjectis macris, biliosis, melancholicis, &c. non æquè succedit. Resina scammonii autem in hoc pulvere non tam pro scopo laxandi, quam alterandi recipitur.*

*Ufus scammonii in genere est, ut sit stimulus in purgantibus. In specie subusu ejus excrementa excerni solent tenuia, fluida, paulò acria; vnde Veteribus inter cholera & relatum. Operandi modus est duplex: Nimirum substantia in resinosà adhaerendo & vellicando substantia terò in gummosa colliquefaciendo humores, & in serosum liquamen permutando, operatur: Tamen in se non adeo vehemens aut virulentum est remedium, quam illud est, quòd vulgo prostat; cum non nisi ex ipsa radice habemus scammonium: Unde etiam infantibus scammonium propinari potest, & si pulveribus salinis addatur, satis operatur: Sic in usu est, si præscribatur:*

**R. Crem. Tart. gr. xv.**

*Tart. vitriol. ℥ss.*

*Scamm. prepar. gr. ij.*

*Troch. alband. gr. j.*

*M. f. Pulvis.*

*Hic pulvis 16. vicibus, blandè tamen, operatus fuit.*

*Vel:*

**R. Pulp. Passul. ℥j ss.**

*Tart. vitriolat. vel Salis digest. hyp. vel Salis ammoniaci. gr. xij.*

*Resin. jalapp. gr. vj.*

*Scamm. sulphurat. gr. ij.*

*Cum syr. ros. sol. f. Bolus, S.*

*Electuarium purgans pro una vice.*

*Simili modo alii cathartici additur, v. g. si sit præscribenda Pociuncula ex Extr. Ellebori nigri & scammonio, pro stimulo non recipiatur resina, quam in odio habeo, quia tormina excitat. Recipiatur ergo potius scammonium pulverisatum, huic affundatur succi cydon. per se depurati q. s. probè agitentur, & in digestionem ponantur, sic extrahitur mucilago, quæ inspissata, vel in forma extracti, vel pulveris sumenda.*

*Veteres alium modum pro scammonio corrigendo habuerunt: loco enim succi cydon. receperunt pomum cydonium, cui excavato indiderunt scammonium, vocaruntque postea Diagrydium.*

*Correctio scammonii per sulphur nil valet. Fundamentum consistit in eo, ut spiritus acidus incensi sulphuris corrigat scammonium.*

*Jam verò*

1. Sulphuris fumus acidus penetrans inæqualiter afficit scammonium: quædam enim particule plus, quædam minus alterantur.
2. Spiritus ejus acidus castrat & enervat scammonium.

*B 4 Ergo*



Ex d. Brendeliana correſſio omnibus praest. Si ulterius corrigere placeat, Emulſioni addatur oleum tartari per deliquium, sed tum in majori doſi danda. Rarum aliis est, scammonium per se troſcopo purgandi adhiberi, interdum tamen fit, ut vel in ſubſtancia vel reſina adhibeatur: v. g. Potio ſequens in forma emulſionis grata praſcribi poteſt:

R. Reſin. ſcam. ℥ſſ. gr. xii. ad gr. xv.

Teratur cum

Sacchari ℥ij. vel ℥iij;  
affundendo lenſim

Succiciſtri vel cydonior. ℥ſſ. vel ℥vj. ad ℥j.

Miſc. exacte, fiat Potio lactea:

quæ blandè & eleganter operatur.

Vel

R. Scammon. crud. vel præpar. ℥ſſ. ad gr. xv.

Teratur c. f. q. Aquæ roſar. cum pauco oleo tartari per deliquium acuatæ, in mortario lapideo, ut fiat Emulſio: quæ decantetur à ſecibus, & addito pauco aqua cinnamomi edulcoretur cum ſaccharo vel ſyrupo quodam, & erit Potio grata.

Tandem ſeſe offert Colocynthis, cujus etiam unicus eſt uſus pro ſtimulo. Species eſt cucurbitæ ſylveſtris, vehemens purgans. Germanis vocatur Colocynthen. Arabes vocant Handal, ac cum præpoſito Articulo al, quod idem eſt ac Hic, Hæc, Hoc, vocatur alhandal. In uſu tantum eſt pulpa hujus cucurbitæ maturæ, quæ ex Ægypto exſiccata ad nos aſſertur: ſemina ejus minus ſunt in uſu, utut LOBELIUS eorum uſum deprædicet.

Uſus ejus eſt vel generalis vel ſpecialis: Generalis eſt, quod inter vehementiſſima vegetabilium emineat purgantia; nam cum graviſſimis torminibus purgat. Quoad uſum ſpecialem, proverbium eſt Practicum: Quæ alia non attingunt, ea attingit Colocynthis, adeoque ad pituitas vitreas Veteribus diſſas, ſeu mucilaginoſiſſimos humores, prodeſt; hinc inter phlegmagoga primatum ducit, ac in lue Venerea præ aliis laudatur.

Colocynthis hæc

1. Saporis eſt amariffimi,
2. Simul adheſivi; &
3. Sub minimomultum diſſuſibilis.

Ab his particulis eſt, quod uſum colocynthidis ſequitur æſtus inſignis, ſitis clamora inflammatio ventriculi, tormina ventris, hypercathariſis, imò periculum convulſionis: modò igitur ejus nimia acrimonia temperetur.

Cæteroquin ſanè latet in ea vis reſolutiva & laxativa humorum tartareorum, hinc in colocynthide eſt vis menſes ſtimulandi juxta HELMONTIUM; hinc ſœtum & ſecundinas pellit. In ſpecie cachecticis conducit, unde & quibuſvis Elixiriſ anticachecticis addi ſolet colocynthidis. In correptione colocynthis commendo, ut extrahatur cum menſtruo aquæ potius, quàm ſpirituſo; aqua enim temperat reſinam colocynthidis. Veteres per gummi tragacanthæ, oleum commune, laudanum, &c. correxerunt, in trochiſcos ſubegerunt, & vocarunt Trochiſcos alhandal: Alii cum urina humana correxerunt. Optima tamen correptione eſt, quæ ſit cum ſale tartari eſſentiali, & ſi diutius digeratur cum ſale tartari, acrimonia ejus perit, remanetque tantum ſapor amarus.

Viendi modum quod attinet: nunquam per ſe exhibetur colocynthidis, niſi in fortiori clymate. Recentiores colocynthidem petiæ includunt, uti hoc imprimis urget LOBELIUS; quod valde riſi, cùm petiæ vix correxerit virulentiam ejus: Igitur potiùs in infuſo, vel in forma Trochiſcorum, vel extracti adhibeatur. In infuſo nodulis laxativis additur doſi ℥ſſ. ad ℥j. in ſubjecto robuſto. Optimus modus eſt in forma Trochiſcorum ad gr. j. vel ij. pro ſtimulo; non enim utor aliâ ratione colocynthide, quàm ſub forma Trochiſcorum. Extractum nunquam, quia minus tutum, uſurpare licet: nam propter reſinoſitatem inſignia tormina excitat. Sunt qui dicunt: ſi poma colocynthisidea recipiantur, ac incifa deſtillantur per alembicum, ſic aſcendere oleum, quod ſatis purgat. Sed ſit fides penes experientiam.

Reſtat Mercurius dulcis, qui Extractis purgantibus commode additur, ut ſiant pilulæ polychreſtæ in morbis chronicis, quales lues Venerea, ſcabies ſerlina, epilepſia inveterata, & alii contumaciores affectus: v. g. ponam talem ſcabie ſerina laborantem:

R. Extr. panchym. Cr. vel ellebor. ñgr. gr. xv.

Mercurii dulc. ℥ſſ. ad gr. xv.

Scamm. ſulphur. gr. j. vel ij.

Extr. troch. alband. gr. j. vel iſſ.

Cum eſſ. mentha vel ligni ſiſſafr. f. pilulæ,  
quæ vocantur Mercuriales, S.

Blut-reinigende Pillen.

Vel

R. Conf. ſumar. ℥j.

Mercurii dulc. gr. xv. ad ℥j.

Scamm. præp. gr. v.

C. ſer. rubi idai f. Bolus.

## TITULUS III

### DE

### DIURETICIS.

**I**nter Purgantia generalia, convenientia ſunt Diuretica, per urinæ copioſum fluxum ſordes recrementoſas evacuantia, ſuntque ea vel volatilia vel fixa: E. g. Diureticum volatile ſit:

R. Aqua petroſel. ℥ij. vel iſſ.

Ononid. vel oſk cheng. ℥j.

Malvat. juniperin. ℥vj. ad ℥j. vel ℥iſſ.

Spiritus lumbr. per putref. ℥iſſ.

Tartari vol. vel carmin. ℥ſſ. ad ℥vj.

Syr. bed. terr. vel ſanjo. ℥iſſ. ad ℥vj.

M. f. Potio, cochlearim ſumenda.

R. Aqua bed. terr.

Ononidis,

Petroſel. an. ℥j.

Malv. jun. perin. ℥iſſ.

Spiritus lumbr. terreſtr. per putref. v. ℥iſſ.

Salis ammoniaci ℥iſſ.

Syr. bed. terr. ℥j.

Doſis 2. 3. vel 4. cochlearia.

M. f. Potio.

R. Aqua bed. terr.

Ononid.

Petroſel. an. ℥j.

Malv. juniper. ℥vj.

Spiritus lumbr. per putref. ℥iſſ.

Olei deſtillat. ſerebimb gutt. iij. vel juniper. gutt. vi.

Syr. bed. terr. ℥vj.

M. D. S.

Mixtura diuretica pro aliquot vicibus.

R. Aqua fragor. ℥ij.

Tinctura tartari ℥ij.

Syr. bed. terr. ℥ſſ.

M. f. Potio.

R. Aqua fragor. ℥iſſ.

Sal. eſſent. tartar. ℥iſſ.

Clyſt. urinoſi ℥j.

Syr. h. d. terr. ℥ſſ.

M. f. Potio.

R. Aqua fragor. ℥iſſ.

Lapill. cancr. præp.

Spiritus ſalis dulc. an. ℥j.

Syr. bed. terr. ℥ſſ.

Miſc. pro Potione:

Pertinent huc tartarea volatilia, ſpiritus tartari volatilis probè reſtificatus, tinctura nephritica Ammelungi, quæ paratur ex ſilicibus ſolaribus (ſunt certi ſilices, qui maculæ flavas habent, prope Saalfeldium reperiuntur) nitro, tartaro, & minerâ antimonii Ungarici, invicem miſtis, & per retortam tubulatoſam paratur, non reſtificatur. Modus obſervandus: Diſſolvitur nitrum in aqua ſimplici, & poſt miſcetur cum reliquis ſpeciebus, ſedonitur in cellam, ut probè ſubigatur, & poſtmodum deſtillatur. Eſt tinctura nephritica ſolaris multi uſus, non ſaltem pro diureſi, ſed & ſudore, in affectibus maximè ſcorbuticis non contemnenda.

Non cedit huic ſpiritus carminativus polychreſtus doſibus Doſi. MICHAELIS, deſtillatus ex tartari & nuri ana per retortam tubulatoſam in receptaculum, in quo aliquantulum ſpiritus vini tartariſati: liquor deſtillatus aliquoties à ſale tartari vel à capite mortuo proprio probè reſtificatur, & ita aſſervatur; & ſic eſt ſpiritus tartari-volatilis egregiè diureticus, & ob vim diſcutiendi ſtatus diſtus carminativus, uſus egregii in morbis multis.

R. Spiritus ſal. ammoniaci,

Lumbr. terreſtr. an. ℥j.

M. S.

Spir.



*Spiritus diureticus: 40. usque ad 50. guttas.*  
Bis in die assumatur in haustu vini, aliàs sit sudoriferum;  
in vino verò ratione alcali mutatur in salium:

*R. Tinctura tartari tartarific. 3℔.*

Dof. 50 gutt.

*R. Tinctura tartari 3℔.*

*Claf. uinos. 3℔.*

M. D. S.

*Tinctura diuretica.*

Dof. 40 gutt.

*R. Spiritus Camin. de tribus 3℔.*

*Lumbr. terr. 3℔.*

M. S.

*Spiritus diureticus.*

Dofis 40 guttul.

*R. Liqu. terra fol. tartari 3℔.*

*Spiritus sal. ammoniaci 3℔.*

M. S.

*Mixtura diuretica.*

Dofis 40 gutt.

Pertinent huc succinum, & sal volatile succini, diureti-  
corum apex, oleum destillatum succini, petroleum, omnia  
raphanacea, aromatica, alliata, cepa, &c. quibus præ  
aliis adnumero persicariajasm acrem, quæ mirabile est diu-  
reticum, & simul præservativum, nephriticum; Alke-  
kengi, Terebinthina, oleum destillatum terebinthinæ,  
Juniperus, oleum destillatum, & spiritus bacc. juniperi;  
in specie *Malvaricum juniperinum*, quod fit ex spiritu baccæ  
juniperi, rob juniperi affuso & digesto, canphora, uri-  
na humana, & inde natum sal ammoniacum, ejusque spi-  
ritus, lumbrici & eorum spiritus per putrefactionem para-  
tus, & sal volatile; spiritus & sal volatile bufonum, propter  
vim alimentij bufonum, quia vescuntur muscis de cantha-  
ridum genere, scarabæi Majales, & ubi fortiter agendum,  
infusum asellorum, & cantharidum ritè paratum: c. g.

*R. Canthar. p. lverif. 3℔.*

Insundantur in

*Vini Rhen. opt. 3℔. vel iv.*

Stent in loco tepido per aliquot dies & noctes, filtretur  
per chartam, S.

*Vinum diureticum.*

Dofis gutt. x, xv ad xx adscendendo, in haustu tepidi  
jusculi; vel hujus infusi cochleare permiscetur aliis septem  
cochlearibus vini vel cerevisiæ: de qua mistura una die  
cochl. j, altero die 2, & sic adscendendo, propinentur: vid.  
**BARTHOLINUS** *Veni. 1. Hist. Anat. 82. & c. 4.*  
*Epistol. pag. 93. 304. & 400.* Interdum excitat vesicæ exul-  
cerationem, & mistum cruentum, qui curatur statim per  
uberiorem haustum lactis, præcipue cum sale tartari.  
Omnibus præfertur succus betulæ, de quo vid. **HEL-**  
**MONTIUS** *de Libiis*. Fermentat instar vini, degener-  
rat tandem in acetum acre; & in nephritide planè est sin-  
gulare remedium. Vel fiat *Decoctum diureticum*:

*R. Herb. fragor.*

*Parietar. an. M. 1℔.*

*Rad. s. aperient. 3x.*

*Bacc. alkekeng.*

*Juniper. an. 3℔.*

*Sem. fraxini,*

*Cicer. rubr. an. 3℔.*

*Crem. tartari 3℔.*

Coqu. in *Aqua petrosel. & Alkekengi*: In colat. lib. 8℔.  
dissolve

*Rob. juniper. 3℔.*

*Syr. alib. Fern. 3℔.*

*Spiritus salis cum spiritu frag. dulc. q. s. pro gra-  
to sapore.*

Vel:

*R. Res. ligni juniperini 3℔.*

Coqu. in f. q. aqua simplic.

*R. Colatur. lib. 1℔.*

Cui ferventi infund.

*Bacc. jun per. roc. 3℔.*

*Rad. fenic. 3℔.*

*Terra sol. tartari 3℔.*

Stent in infuso per noctem: Colatura aduleoretur cum sy-  
rupus de s. radicibus.

Diuretica fixa in specie sunt omnia salia artificialia sal-  
sa composita, qualia tartarus vitriolatus, nitrum, sal di-  
gestivum hypochondriacum, quod fit, si destillatur spiritus sa-  
lis ammoniaci ex sale ammoniaco & sale tartari; remanet ca-

pus mortuum falsum, quod potense est Diureticum: item  
salia vegetabilium ritè calcinando parata; uti sunt sal sti-  
pitum fabarum, sal genistæ, & suo modo sal fimi colum-  
bini, &c: sunt salia falsa, & calcinatione diuturni sunt al-  
calisata: item mediæ & quasi temperatæ naturæ sunt Rob  
juniperi, semen violarum, milii lolis, & ex his paratæ  
Emulsiones concinnæ pro urina pellenda; Extr. alkekengi;  
item vinum, in quo filices candefacti aliquoties extin-  
cti fuerunt: v. g.

*R. Tartari vitriolat. gr. xv.*

*Salis genist. 3℔.*

M. D. S.

*Sal diureticum.*

*R. Tartari vitriolat. ritè par. 3℔.*

*Salis stip. fabar.*

*Genist.*

*Fim. columbini an. 3℔.*

M. f. pulvis pro aliquot dosibus.

Sumatur in vino: vid. **HOFFMANNUS** in *Metb.*  
*Medendi.*

Addi pro lubitu etiam possunt olei destillati terebinth. vel  
baccar. juniperi; gutt. iv, v. vel vj.

*R. Tartari vitriolat.*

*Salis fimi. columb. an. 3℔.*

*Salis stip. fabar.*

*Genist. an. gr. xv. ad 3℔.*

M. f. pulvis.

Hauriatur in vino:

*R. Tartari vitriolat. 3℔.*

*Salis stip. fabar. vel alius 3℔.*

*Olei destillat. bacc. juniper. gutt. iv.*

M. pro duabus partibus.

*R. Tartari vitriolat. 3℔.*

*Lapill. cancr. præp. 3℔.*

*Salis Here. columb. gr. xv.*

*Vol. succini 3℔.*

M. f. pulvis,

div. in 3. part. æqu. S.

*Pulvis salinus diureticus cum vino sumendus.*

*R. Arcan. dupl. 3℔.*

*Salis stip. fabar. vel Here. columb. vel genist. 3℔.*

*Olei destillat. bacc. juniper. vel terebinth. gutt. iv.*

M. f. pulvis pro duabus dosibus.

*R. Tartari puri, vel crem. tartari, vel nitr. puri, vel nitr.*  
*antimoniat. 3℔.*

*Sal. tartari 3℔.*

*Olei destillat. terebinth. vel juniper. gutt. iij.*

M. pro duabus part.

Vid. *Tartarus tartarificus*. **LUDOVICI** in *Pharm. pag. 191.*

*R. Salis genist.*

*Stip. fabar.*

*Lapill. cancr. præp. an. 3℔.*

*Salis vol. succin. gr. iij.*

M. f. pulvis.

*R. Crem. tartari 3℔.*

*Lapill. cancr. præp. 3℔.*

M. pro duabus dosibus, in vehiculo servido assumendis.

*R. Terra sol. tartari 3℔.*

*Lapill. cancr. præp. 3℔.*

Misc. pro tribus dosibus.

*R. Crem. tartari 3℔.*

*Vitrioli martis ritè par. 3℔.*

M. pro duabus dosibus.

*R. Salis essent. tartari 3℔.*

*Vitrioli martis 3℔.*

M. in mortario lapideo, hinc exsicca, pro quatuor  
dosibus.

Diuretica etiam sunt acidula naturales, item spiritus  
salis & nitri dulcis.

In forma Bals:

*R. Rob. juniper. 3℔.*

*Lapill. cancr. præp. gr. xv.*

*Tartari vitriolat. 3℔.*

Misc. pro Bals.

Pro *Electuario diuretico*:

*R. Conf. violar. 3℔.*

*Rob. juniper. 3℔.*

*Lapill. cancr. præp. 3℔.*

*Arcan. dupl. 3℔.*

c. f. q. syr. bed. terr. fiat *Electuarium*.

aspergendum cum spiritu salis parum.



## TITULUS IV.

D E

## SUDORIFERIS.

**S**equitur tandem Evacuatio per sudorem, ob id diaphoretis dicta. Fit sudor, quando sanguis quacunq; causa resolutus, & quasi liquefactus, crebriori circulo per universum corpus rapitur, sub quo motu simul attenuatur latex ejus aquosus seu vehiculum sanguinis, quod copiosius dissolvit & imbibit salia heterogenea aliasque particulas recrementosas, per sanguinis fermentativum motum separatas, simulque, dum per partes solidas circulatur, falsa ista acquisita lixiviali virtute mundificat eas, sordesque sub nutritione relictas abstergit. Quicquid interea sub circulari hujus sanguinis, ejusque serosi laticis motu, desertur in vasa capillaria peripheria corporis, penetrat in glandulas miliares intercutaneas, per quas tunc guttularum minutissimarum forma tandem extra corpus eicitur. Deglandulis miliaribus **STENO & MALPIGHII** videatur.

Quoad sudorifera remedia: sumimus nunc volatilia, nunc fixa: Priora sunt omnia salia volatilia, & eorum spiritus, tam ex regno animali, quam vegetabili. Ex animali eliciuntur per simplicem distillationem, ut sal volatile & spiritus cornu cervi, urinae humanae, salis ammoniaci, qui soboles est urinae, & polychrestus; spiritus cranii & sanguinis humani, viperarum, tam mactia, quam pingua, quae potentissima sunt. Illa, ubi sine caloris intensione artificiali provocare volumus sudorem; Haec ubi simul calorem intensiorem reddere animus est. Ex regno autem vegetabili sunt omnia salia volatilia, quae beneficio putrefactionis fiunt, & subsequente distillatione; qui spiritus volatiles hoc in passu egregii sunt. Pertinent huc etiam Theriaca & Mithridatium, Elecuarium diacordii Fracastorii, & compositiones theriacales cum aceto imprimis vel vino assumenda, quae copiose sudorem eliciunt; spiritus volatiles oleosi, v. g. spiritus theriacalis camphoratus, florum sambuci, roris marini, &c. Pertinet huc tinctura Bezoardica camphorata, Mixtura simplex, nec non olea destillata, ut oleum succini, caryophyllorum, camphorae pennisum; item olea destillata empyreumatica ex ossibus animalium aliisque, quae prius aliquoties à capite mortuo rectificantur; sic enim deponunt foetorem, & ad aliquot guttas assumpta, copiosissimos & foetidos sudores eliciunt, ut oleum destillatum tartari, ligal Guajaci, buxi, &c. quae cum nihil aliud sint, quam resinae vi ignis colliquantur, patet, quod hac ratione etiam ipsa resinosa concreta vim sudoriferam exinde obtinebunt, ut angelica, ess. lignorum, theriacales ex aromatibus resinosis; item vegetabilia intense amara, & quasi incidentia, qualia sunt: Absinthium, carduus benedictus, radix vincetoxici, flores, baccae, & succus sambuci, radix chinæ, cortex chinæ-chinæ, ligna exotica quacunq; sassafras, &c. domestica, ut lignum quercinum, &c.

Formulae Sudoriferorum volatiliū:

R. Salis ammoniaci vol. gr. xv.

Campb. gr. ij.

M. S.

Sal sudoriferum pro una vice.

R. Aqua fumar. ℥j.

Spiritus C. C. cum sal. vol. ℥j.

Syr. card. bened. ℥ij.

M. pro Portione S.

Potiuncula sudorifera pro una vice.

R. Aqua fl. samb. ℥j.

Spiritus bacc. samb. ℥j.

Sal. ammon. ℥ss. ad ℥j.

Campb. (quæ potens &amp; nobile est sudoriferum) gr. ij.

Syr. card. ben. ℥ss.

M. f. Potio pro una dosi, S. ut antea.

R. Aqua card. bened. ℥ss.

Spiritus sal. ammon. ℥j. vel sal. vol. sal. ammon. ℥j.

Olei destill. caryophyll. gutt. j. vel ij.

Syr. fœnic. vel corr. alyant. ℥ss.

M. pro haustu sudorifero.

R. Aqua scorzon. ℥j.

C. inann. ℥ss.

Spiritus theriac. campb. ℥ss.

Salis vol. C. C. gr. xij.

Succini gr. vj.

Syr. scorz. ℥ss.

M. f. Potio, S.

Haustulus sudoriferus.

Quoad sudorifera fixa: sunt omnia salia lixivialia fixa, rite alcalisata; nam si remaneant salia, diuretica potius proveniunt: item sulphurea metallica, & mineralia fixa; unde omnia antimonialia per nitrum fixata, ut antimonium diaphoreticum, Bezoardica mineralia, simplicia & composita, antimonium diaphoreticum Martiale, aurum diaphoreticum, cinnabaris antimonii, &c. Pertinent & huc suo modo animalium cornua & partes ossæ cum & sine igne preparata, ut ossa hominum sine igne, cornu cervi ustum & sine igne preparatum, cranium humanum preparatum, mineralia, terra sigillata, unicornu fossile, &c. Præ cæteris fixum polychreston est antimonium diaphoreticum Martiale, compositum ex antimonio & Marte, cum triplo nitri fixatum: cujus compositionem docet LUDOVICI in Pharmac. ag. 330: multi ususest in morbis chronicis, ut ictero, febribus, scorbuto, &c. Nobile conjugium est sulphur antimonii & Mars, quæ duo revera conferunt pro usu sudorifero interno. Lapis Bezoar nil valet, quia inter 1000 vix unus est genuinus, sed vel adulterinus, vel artefactus: huic præfertur calculus humanus, qui optimus sudoriferus est, in morbis pestilentialibus insigniter proficuum.

Formulae sudoriferorum fixorum:

R. Antimonii diaph.

Cornu Cervi sine igne,

Salis card. bened. an. gr. xij.

M. pro pulvere, hauriendo jejuno stomacho in vehiculo calido.

Vel

R. Antim. diaph. simpl. seu martial. ℥j.

Salis card. bened. ℥ss.

Laud. opiat. gr. j. vel ij.

Ol. destillat. caryophyll. gutt. ij.

M. f. pulvis pro una dosi: S.

Pulvis sudoriferus pro una vice.

R. C. C. sine igne gr. xv.

Cinn. antim. ℥ss.

Bezoard. solis. gr. lv.

M. S. ut supra.

R. Corn. cerv. sine igne,

Nitri antim. an. gr. xv.

M. f. p. l. i.

Sign. ut supra.

R. Rob. samb. aut juniper. ℥j. ad ℥ij.

Corn. cerv. sine igne ℥j. ad ℥ss.

Antim. diaphor. ℥ss.

Cum syr. rubidiar. f. Bolus, S.

Bolus seu elecuarium pro una vice.

R. Rob. samb. ℥j.

Antimonii diaph. ℥j.

Extr. card. ben. gr. vj.

Cum syr. fumar. f. Bolus.

R. Extr. card. ben. ℥ss.

Laud. op. gr. j. vel ij.

Cum ol. destillat. anis. vel tartari rectif. f. pilula,

D. S.

Pilula sudorifera &amp; somnifera.

R. Extr. card. bened. ℥ss. ad ℥j.

Theriacal. gr. v.

Cum ol. succin. f. pilula: S. ut ante.

R. Extr. lignorum gr. xv.

Croci gr. ij.

Cum ol. tartari sat. rectif. f. pilula.

Sudorifera mista ex fixis &amp; volatilibus:

R. Antimonii diaph. martial. ℥j.

Sal. vol. viper. gr. v.

&amp; quando æger est inquietus,

Laud. opiat. gr. j. vel ij.

M. f. pulvis.

R. Aqua scabios.

Flor. sambuc.

Ulmav. an. ℥j.

Cord. Herc. Sax. frig. ℥vj.

Spiritus theriac campb. ℥ij.

Antimonii diaphor. ℥ss.

Corn.



*Corn. Cerv. sine igne ℥j.*  
*Sal. vol. Corn. Cerv. ℥ss.*  
*Campb. gr. iij.*  
*Syr. scord. ℥j vel ℥jss.*

M. S.

*Potio sudorifera semper bene agitanda pro 4. vicibus.*

*℞. Aqua fl. sambuc. ℥j.*  
*Corn. cerv. sine igne ℥ss.*  
*Sal. vol. corn. cerv. gr. v.*  
*Syr. fl. tunic. ℥ij.*

M. f. Potio.

*℞. Aqua flor. samb. ℥j.*  
*Tberiac. Androm. vel Eleth. diascord. Frac. ℥j.*

*Salis vol. viper. gr. vj.*

*Campb. gr. j.*

*Syr. rubridi ℥jss.*

M. D. S.

*Hausulus sudoriferus pro una vice.*

*℞. Aqua card. bened. ℥j.*

*Chyl. urinos. ℥ij.*

*El. diascord. Frac. ℥j.*

*Syr. card. ben. ℥jss.*

M. D. S.

*Hausulus sudoriferus.*

*℞. Tinctura ben. card. ℥j.*

D. S.

*Tinctura sudorifera pro duabus vicibus.*

In robusto vero corpore & casu periculoso pro una dosi ℥j. sufficit.

Hæc sufficiant, quoad motum sanguinis fermentativum restituendum, & quoad alterationem ejus succorum.

## C A P U T IV.

### D E

## FACULTATE ANIMALI.

**A**bsoluta ita consideratione Facultatis vitalis generalis Practica, pergimus ad Facultatem animale, tanquam alteram Principissam vitæ, in spiritibus animalibus & systemate nervoso fundatam. Quoad spiritus animales: attendenda est eorum substantia, hinc torpor & volatilitas: sed de his commodius infra de somno & vigiliis agam. Quoad systema nervosum: in hoc attendendum primò ad nutrimentum, quod est chylus, qui immediate eas partes nerveas nutrit, ob id etiam labe suas, in specie suum acorem, facile illis affricat, nervosis partibus per se inimicissimum. Secundò attendendum ad eorum structuram, quæ quanta est, tota constat ex subtilissimis & delicatissimis fibrillis, nunc coacervatis in nervos, nunc hinc inde separatis & distributis. Nam & ipsum cerebrum, tanquam basis systematis hujus, fibrarum talium delicatissimarum tegmine glanduloso inclusarum, est systema; unde consequenter ex hac textura, omne reliquum systema musculorum, membrarum, nervorum, tendinum, oritur: de quo vid. MALPIGHIIUS *Tract. serv. nium viscerum*, item WILLISIIUS in *Anat. cerebri & nervorum*.

In hoc systemate nervoso maxime considerandus est debitus fibrillarum tonus, seu legitima earum tensio, quæ tensio fibrillarum nervosarum dependet partim à propria textura, quæ instar chordarum sunt tensæ, partim ab influxu & radio spirituum animalium, debitum tonum fibrillarum nervosarum conservantium. Hæ fibrillæ nerveæ, in debito tono constitutæ, organon sunt motus & sensus. Motus omnis fit ab his fibris, seu instrumentis, mediantibus spiritibus animalibus, dictarum fibrarum contracturam promoventibus; æstque omnis vel animalis vel naturalis. Ratione utriusque obnoxie sunt hæ ipsæ fibræ vel defectibus paralyticis, vel etiam motibus convulsivis & spasmodicis, qui, spasmodici scilicet, insequuntur proximè præcedentem irritationis sensum, indeque natum rapidiorem spirituum motum. Irritatio hæc in specie est vel à frigore externo, vel si à causa interna, ordinariò oritur à vitioso acido: Utraque nervis sunt inimicissima. Hinc acidum destruentia penetrantia, simul tamen temperata volatilia oleosa, adeoque aromatica nervis sunt amicissima: hinc quæcunque aromata & vegetabilia aromatica suaveolentia, salia volatilia, aliaque simplicia prædita salibus volatilibus, & olea destillata, nervis amicissima,

item sulphura metallica, quæ omnia acidum peccans corrigunt & destruunt, Nervina & Cephalica dicuntur, & in omnibus affectibus in motu viciato ortis, sive atonia aut paralytis sit, sive motus depravatus, sive motus convulsivus, conveniunt; v. g. rosmarinus, mentha, salvia, majorana, lavendula, spica, stochas Arabica, melissa, flores liliorum convallium, castoreum, omnia etiam propriè sic dicta aromata, ut Cardamomum, macis, cubebæ, galanga, &c. & omnia ex his parata, spiritus & olea destillata, cumque his parata salia volatilia oleosa: Acidum etiam temperat succinum & succinata, rectè ab HELMONTIO nervorum solamina dicta, sal volatile succini, ejusque oleum destillatum, quod præcellens est; spiritus salis ammoniaci anisatus, aliaque innumerabilia: quod etiam faciunt sulphura antimonialia, & metallica fixiora ad affectus paralyticos & convulsivos adeò usitata, in specie ad paralyticos aurum diaphoreticum Poterii, ad convulsivos cinnabaris antimonii, & alia sulphurata similia; vi singulari anodynè prædita, salia volatilia oleosa nervina artificialia, in specie succinata; item ex sanguine & cranio humano parata; imprimis si salia horum volatilia cum oleosis aromaticis fuerint reddita oleosa, in systemate nervoso affecto sunt optima, & in specie acidum lædens & irritans destruendo omnes turbas promptè amovent, v. g. sal volatile oleosum Sylvii, cujus tamen præparationem non sincerè detexit; speciatim sal volatile oleosum præstans fit ex fuligine. Non difficile est salia volatilia oleosa præparare. De modo Sylviano vid. BARNERI *Tract. spir. vini non acidus*. Eleganter procedit cum succino sequenti modo:

*℞. Calcis vivæ,*

*Salis ammoniaci an. part. æqual.*

Hisque addatur tertia pars succini.

Mistura irroretur modicè cum spiritu vini tartarificato, destilletur per retortam vitream in arena, & prodit spiritus salis ammoniaci succinatus, separandus ab oleo, & iteratà rectificatione egregius fit in affectibus nerveis.

Similiter cum aliis oleis destillatis possunt fieri salia volatilia: elegans est hoc:

*℞. Cinnamomum vel caryophyllos:*  
*affunde*

*Spiritum vini probè tartarificatum:*

Stent in digestionem aliquandiu: spiritus vini tinctus (nam intensè rubescit) affundatur mixturæ ex aliis ammoniaci & calcis vivæ ana: Destillantur per retortam more consueti forti igne; sic prodit spiritus urinosus, sapore & odore aromatico insigniter præditus, colore aureo vel sanguineo.

Pertinent & huc pro cura systematis nervosi alia salia volatilia composita, in specie liquor cornu cervi succinatus, nobilissimum remedium in motibus convulsivis partium internarum. Fit ex parte anatica salis volatilis cornu cervi probè depurati, & salis volatilis succini, crebrioribus cum spiritus vini extractionibus seu cum aqua simplicis solutionibus depurati: Hæc duo salia miscentur cum spiritu cornu cervi rectificato, & ad perfectam unionem aliquoties cohobentur. Hujus frequentius imposticum erit mentio.

Si ex tempore præscribenda sit mistura ad nervorum atoniam, & affectus à nimia sensibilitate nervorum convulsivos polychrestæ, sit v. g. sequens formula:

*℞. Aqua Mentb.*

*Fenic.*

*Meliq. an. ℥j.*

*Ess. castor. ℥ij.*

*Liqu. C. C. succin. ℥j.*

*Spiritus sal. ammoniaci simpl. vel dicto modo oleos. ℥j.*

*Laud. opiat. gr. ij. vel iij.*

*Syr. cort. aurant. vel de Canella ℥vj.*

M. f. Potio.

Capiat æger cochlear j: non quidam benè sapit, sed certa est mistura.

Basin hujus constituit laudanum opiatum cum sale volatili, quod tollit sensibilitatem nervorum, & irritationem sensuum. Acidum irritans destruunt salia volatilia oleosa, addita castoreo & adjunctis.

Fibræ legitimæ tensæ sunt instrumentum sensus: sensus autem, ut notum est, sunt vel externi vel interni: ratione illorum externorum in specie considerandum est

1. *Systema utroque, hujusque major vel minor sensibilitas.*

2. *Ratione sensus naturalis partium mutui consensus.*

Sen-



*Sensus* consistit in motione fibrillarum nervosarum, facta ab objecto externo. Variat autem systematis nervosi sensibilitas, prout fibrillae nervae magis vel minus sensibiles ac tenerrae, adeoque ab objecto externo nunc facilius, nunc difficilius mobiles, adeoque magis vel minus sensibiles sunt. Hinc mulieres semper sunt sensiliores viris, & infantes adultis; quippe infantes tam facile in dolore dentitionis patiuntur convulsiones & motus convulsivos, ob delicatum systema nervosum. Ideo sensibilitas haec attendenda est in Praxi valdoperè, tum propter spirituum in individuis varietatem, tum praecipuis propter selectum remedium adhibendorum, quae pro majori vel minori sensibilitate intenduntur & minuuntur.

Quoad symptomata: quorum systema nervosum est sensilissimum, obnoxii sunt moribus convulsivis, magis mutationes tempestatum, & majores vel minores alterationes in morbis percipiunt. Imprimis habenda est ratio orificii stomachi sinistri, prout enim hoc sensibile, vel non, varia infert symptomata. Sensibilitas specialissimè in stomacho & circa praecordia obvia est; unde levi occasione anxietates praecordiorum, digestionis, item lipothymiae, frequentia illa in morbis symptomata superveniunt iis, qui paulo sensibilibus habent nervorum systema. Quaesiti enim de dolore, monstrant scrobiculum cordis; & sic nunc anxietates, lipothymiae, nunc alia symptomata, circa stomachi orificium primum habent fomitem atque originem; idque propter nervos ibidem magis nudos quam in reliqua superficie interna, ubi tunica mucosa magis teguntur: vid. WEPFFERUS in *cicut. aquar. Hist. 19. Nova pag. 85.* Ex hoc dirigant se Medici in remedium selectu: Tales enim sensibiles à levioribus remediis magnam patiuntur alterationem; alii è contrà à fortioribus non alterantur. Mulieres egregie nos vexant in Praxi ob mollem structuram: si molliculæ & succulentæ, habent genus nervosum subtilissimum, & sensiliores sunt praeter alios, inde levi morbo facile alterantur, & proinde cogunt Medicos, ut in iis aciora & volatilia cum circumspectione usurpent, quae alias in viris sine defectu adhibentur.

*Consensus partium* deducendus quoque ex harum fibrillarum nervosarum ramificatione varia. Cum enim ille supponat sensum, & fiat, quando una parte laborante altera pars & sensu simul afficitur, necesse est, ut fundamentum omnis consensus, & morborum per consensum, in structura & textura nervorum in specie nervosarum membranarum, quaeratur; ratione quarum cum aliis connexae conueniunt, non connexae non consentiunt. Consistit ergo consensus partium in connexionibus cum altera: qui triplici imprimis solet fieri ratione, ita quidem, ut omnis propriè dictus consensus fiat ratione saltem nervorum: Consentiant nempe partes nervae triplici modo:

1. Quatenus fibrae nervae ut continuæ: qua ratione imminente vomitu tremit labium inferius; Vel
2. Quatenus sunt contiguae: quarum ratione calculus vesicae subinde stimulum infert alvi, & tenesimum excitat; quia collum vesicae & intestinum rectum invicem incumbunt: sic affecto orificio stomachali, sequitur singultus.
3. Consensus partium fit ratione connexionis mediantibus funiculis nerveis: qua ratione consentiunt renes, ureteres & intestina, stomachus & caput, &c. quatenus haec partes habent nervosos funiculos ex uno plexu ortos; unde in nephritide rene à calculo affecto, supervenire solet vomitus & colica: & sic una parte affecta & reliquae afficiuntur. Et notum est, foeminas nephriticæ hystericae passioni esse obnoxias, & ex affecto stomacho oriri vertiginem ob consensum cerebri cum stomacho.

Hii sunt tres modi consensus partium ratione structurae nervae, quatenus partes sunt continuæ, contiguae, & per funiculos nervosos connexae.

Nunc considerandum systema nervosum, quatenus in eo fit motus animalis. Motus enim dividitur aliis in animalem motum simpliciter seu spontaneum, & naturalem scilicet seu secundum quid: Ille peragitur in nervis, à spiritibus excitatis ratione praegressi sensus; quando e. g. moveo pro lubitu manum, est motus spontaneus: at qui sit sine nostro arbitrio aut praegressa sensatione, est v. g. motus intestinum peristalticus, diaphragmatis, motus cordis pulsativus, &c. qui omnes sunt per fibrillas nervas diversimodè contextas, ratione certi toni fibrarum nervosarum, per quem sunt aptae, ut contrahantur & crispentur;

tono enim fibrarum laeso, laeditur motus. Considerandus ergo tonus laesus in nervis, ita ut vel deficiat vel depravetur? Deficit in atonia, unde motus cessat, & oriuntur affectus paralytici seu resolutiones partium, in quibus omnis motus cessat. V. g. si quis laborat atonia brachii, fit paralyticus: stomachus laborat atonia, si ingesta cum sonitu, tanquam in lagenam vitream, ingeruntur, & spontè effluunt, unde cessat modus retentionis & restrictionis; qualis atonia ventriculi etiam in lienteria observatur, ubi per pylorum resolutum effluunt cruda alimenta.

Causa hujus atoniae:

1. Est defectus spirituum animalium, conservantium in debito tono fibras; Vel
2. Laesio ipsarum fibrarum, in specie earum quasi nimia distensio & laceratio, ita ut non amplius in tonum debitum redeant.
3. Vel ipsarum relaxatio à copiosiore lymphâ, vel acra vel acida. Si lymphâ est copiosior, tunc nervi flaccidi sunt, unde si resoluti, cessat motus; si sunt in nimia tensione, oriuntur motus convulsivi, familiares in corpore humano, ilque tam partium internarum, quam externarum: v. g. convulsiones internarum sunt vomitus in stomacho, tormina colica, palpitatio cordis, &c. è contrà convulsiones epilepticae sunt in partibus externis.

Oriuntur in genere ex corrugatione & crispatione partium fibrillarum nervosarum, unde partes commotae necessarîo corrugatae ac convulsae sunt. Ratio hujus crispatae praeternaturalis consistit in rapido spirituum animalium motu, excitato ob irritationem seu sensationem violentam in quadam parte nervae: Sic v. g. in vulneribus capitis, si stylo acuto pungatur cerebri membrana, sequitur convulsio epileptica totius corporis, quia irritata membrana, cum reliquis membranarum continuè invicem crispantur: sic quando in venae sectione vel vulneribus punguntur nervi, sequitur ejus partis, cujus nervus est irritatus, convulsio. Fiunt ergo depravationes tonorum partium fibrosarum vel nervosarum ex violenta sensatione, ratione cujus irruentibus spiritibus animalibus crispantur.

Nimiam sensilitatem nervosae systematis, cum spirituum impetuosiorum, & inde nata symptomata spasmodica, quin etiam faciles nimis partium consensus, optimè sistunt opiata, & omnia similia Narcotica ritè parata: Item antimonialia sulphura metallica fixa, vi singulari anodynâ praedita. Cum tamen opiata propter narcoticam virulentiam sint suspecta, non nisi probè correctæ, vel per fermentationem, quae correctiones omnes superat, vel per distillationem cum salibus aut alcalibus fixis, in specie cum sale tartari, adhibenda sunt. Suspecta autem sunt omnia virulenta Narcotica, ut hyoscyamus, nicotiana, & reliqua Narcotica, nec adhibenda, nisi probè correctæ sint.

Primus modus per fermentationem est HELMONTII, qui fermentavit cum succo cydoniorum, idque tribus vicibus, postmodum cum spiritu vini, aut in forma liquida, essentiae, aut sicca in Extracto, adhibuit, ut didici ab amico, qui hunc modum ab HELMONTIO juniore habuit communicatum. Fermentatio haec etiam cum succo pomorum, aut alio appropriato quodam stomachico, inilitui potest. Angli in frequenti usu habent, nec potuerunt mihi satis decantare singularissimae ejus virtutes. De fermentatione hac opii vid. etiam LANGELOTT, in *Epist. ad A. N. C. & BARTHOLINUS*, cui à LANGELOTT fuit communicatâ, in *Epist. Cent. 3. Epist. 45. pag. 188.*

Preparatio ex BARTHOLINO est sequens: Vidi id sane non sine infirmi voluptate, cum una cum appropriato succo corrigenre, scilicet succo cydoniorum, leni calore ad fermentandum exposuisset. Exspirabat primò volatile illud sulphur foetidum, cerebro cordique adeo infesum, si quis eo propior factus, idque copiosius cum aere hauserit. Ego sane cum meo ipsius damno expertus sum, cum primâ vice pararem: Cautione deinceps factus, elegi to uo aeris maxime peritum. Colligitur deinceps sensum reliquum, quod inest impuriore substantiae: atque ea, quae levis spumosaque est, superiorem; ea vero, quae crassa & terrestrius est, immo occupat locum, utraque in magna quantitate, ea tamen imprimis, quae inferiora petit. M. rum quid puri parum adsit. Est liquor pellucidus, rubiniflavus rutilans, medio consistentis loco, qui à dictis accuratè separatus, balneoque vaporis ad spissioris Extracti consistentiam redactus, circulat tandem per unum aut alterum mensem cum alcohol vini, ut quod crudi reliquum est, excoquat, adque debitam maturitatem deducatur, &c.



Usus ejus est amplissimus, atque extendit se ad omne fere morborum genus, exceptis soporosis, vel naturam moru inordinato peccantem sedando, viribus defectum reficiendo, doloribus & vigiliis consumptam placidissimè quiete refocillando, vel humores univium effervescentes compescendo, vel spiritus paulò concitiores ad temperiem reducendo.

Adjungo ut plurimum appropriata cuique membro remedia, inque magnis ardoribus flores niri, nistrum perlatum, sal Ducis Hoffstæ: sequenti tamen compositione familiarissimè utor:

*R. Pulv. diacberi A. S. ʒij.*

*Salis Ducis Hoffstæ. cum auro parat.*

*Flor. niri an. ʒij.*

*Ess. Opii nostr. gutt. Llv.*

*Misc. optime.*

Dosis est gr. xv, xviij, xx pro adulto, quam dimidium tantum granum Essentia opii ingreditur; raro enim ad gr. j. aut iij ascendit, & non nisi in magnis doloribus & vigiliis, &c.

Hæc sunt verba D. IOELIS LANGELOTTI, & desumpta ex BARTHOLINI Epist. loco citato. Labor tamen hic minùs succedit, aut si succedit, evadit opium à virulentia narcotica non tantoperè separatum & correctum, uti dicitur; vel videtur, LANGELOTTUM encheirises quasdam subtiluisse, vel remedium non adeò nobile acquisivisse, ac ipse prædicat.

Secunda correctio opii beneficio alcali fixi, primariò salis tartari, hinc niri per carbonem fixati, priori vix inferior est: Nam sal tartari, ut obiter moncam, corrigit & omnia purgantia, & præprimis etiam corrigit opium; sive addatur insimul vinum, sive, quod melius est, addatur spiritus terebinthinæ, & est Laudanum opiatum multarum virium, à quibusdam in secretis habitum. Instituitur aliàs correctio hæc cum sale tartari sequenti modo:

Opium solvitur in lixivio salis tartari, digeritur & inspissatur: Vel

*R. Opii,*

*Sal. tart. vel olei tartar. per deliq. an. ʒj.*

Ponantur simul in digestionem, ut fiat massa crassa: cui affundatur

*Spiritus vini opt. ʒij vel iij.*

& statim habetur tinctura optima, filtretur & usui asservetur.

His duobus modis correctum opium nobile remedium evadit, quod semel pro semper, ne prolixior videar, commendando, maxime ad affectus nerveos à nimia sensilitate, & affectus spasmodicos, semper cum appropriatis nervinis propinandum.

Huc pertinet & Laudanum hystericum Conserdingii, Archiatri Brunsvicensis.

*R. Laud. opiat. per form. par. ʒij.*

*Extr. Zedoar. ʒj.*

*Calam. arom. ʒj.*

*Castor. gr. xv.*

*Spec. diacalam. ʒj.*

*Croc. ʒj.*

*Bezoar. Orient.*

*Occident. an. ʒss.*

*Cum oleo destillat. succini q. s. f. pilula.*

Dosis gr. vj. cum s. q. sacchari pro lubitu. Loco hujus fieri potest extemporaneum:

*R. Extr. Zedoar. gr. xij.*

*Castor. gr. vj.*

*Laud. ferment. gr. iv.*

*Cum ol. destill. succini s. pil. no. 36. pro tribus dosibus.*

Multa sane præstant in Medicina opiatà, adeò ut SYLVIVS dicat: *Se male non esse Medicum, quàm carere laudano opiato.*

Imminutam sensilitatem verò & motus defectum, plus minùs paralyticum, adeòque spirituum animalium torporem, corrigunt optime omnia acris aromatica, ut castoreum, & supra dicta salia volatilia oleosa, succinata, vegetabilia aromatica, aqua vitæ, cordiales, apoplectice, &c.

## CAPUT V.

### D E

## AUCTORIBUS PRACTICIS.

Quoad methodum Practicam: respectu horum fundamentorum præ cæteris teram vestigia SYLVII, prout conscripsit *Ideam Praxeos*, & vestigia WILLISII secundum principia in *Pathologia cerebri & moribus convulsivis*. Ratio, quod jungam hos duos, est hæc, quod neuter solus sufficiat, juncti melius: *Ile infusa Praxi* quàm optime principiorum salinorum, acidi & alcali, effectus & varias inde natas effervescentias, correctiones, adeòque humorum dyscrasias, explicuit, & mederi iisdem docuit de motibus verò convulsivis tacet: WILLISIVS verò citato loco, (qui primus in hoc puncto oculos aperuit) uti, ante eum HO CHSTEDTERUS in *Observationibus* ut & PISO de *colluvie serosa*, quoad motus convulsivos antea occultatos, multa prodidit, & viam WILLISIO hoc in passu jam olim stravit. Imprimis WILLISIVS curiosissimus fuit, & huic scopo egregiè satis fecit, hinc & legi meretur ejus allegatus *Tractatus de morbis convulsivis*, & hinc cætera scripta Practica, præsertim utrumque volumen *Pharm. Rational.* ubi hinc inde etiam de nervosi generis pathematis tractat. Quod attinet Praxin SYLVII: in duobus locis cautè legendus, & quodammodò corrigendus:

1. Quod nimis multa effervescentiæ isti billis & succi pancreatici tribuat, & ubi prior subinde causa sufficeret, eam in adjumentum vocet, ut nihil dicam de effervescentia in dextro cordis ventriculo ex bile adscendente, & lymphæ descendente, nec demonstrata hæcenus, nec faciliè demonstrabili.
2. Quod multa nimis tribuat vaporibus, fumis & halitibus, ex effervescentibus succis in primis viis exhalantibus, &c. qui ut plurimum tamen nihil habent in recessu, eosque jam dum excessit HELMONTIVS. Inde quoque in affectibus per consensum nervosum SYLVIVS etiam hos fumos accusat: Ubi enim hi ipsi ab eo adducuntur, subsunt ut plurimum motus spasmodici & convulsivi nervorum, ex irritatione partium sensilium abdominis, quibus inferuntur, in spasmos contractorum; unde & aliæ partes, cum quibus connexi surculi conjunguntur, continuato tali spasmo per consensum simul affici solent: quod e.g. patet in nephritide, dum tormina intestinorum & vomitus superveniunt; item in asthma convulsivo mulierum hysteriarum.

WILLISIVM verò quod attinet: hujus copula elastica interea in medio est relinquenda, donec certior ejus ratio constet: quin in affectibus spasmodicis acidum, aliudve dolorosum, irritans, & mutus nervosarum partium consensus interea sufficiant.

Hi ex Modernis imprimis Tyroni sufficiunt. Veteres quod attinet Scriptores: horum omnium loco sit SENNERIVS, cujus libri Practici nobis instar locorum communium sint; maxime enim dictus hic vir in eo sedulus fuit, ut omnes affectus ordine declararet: Nam ex omnibus Scriptoribus antecessoribus collegit flosculos. Vel loco hujus sit FORESTUS, ejusdem nempe *Observationum libri*, in cujus *scholiis* tota fere Praxis secundum veterum sententiam conscripta apparebit, per curationes plus minus illustrata. HELMONTIVS sedulo omnibus legendus est; cum accuratorem post PARACELSUM non habeamus. Judiciosè autem legatur, ne decipiamini; quia ejus Theoria interdum nimis est subtilis, ac subinde vix intelligibilis; Lectori saltem veterum excusabit, & nolentem volentem ad ulteriorem indaginem excitat: Imitatio Practica est impossibilis, quamdiu ejusdem scilicet generosioribus destituimur remediis, sine quibus eum imitari non possumus. Imo ipse in pluribus locis habet figmenta, e.g. sit, ejus *Actio Ignota Regiminis*, ubi multa habet, quæ optime ad *sistema nervosum Willisianum* possunt applicari. Interim quantum possibile, eum imitari conemur; optimam enim suggerit methodum à priori curandi: Experimenta ejusdem, tam Chymica quàm Medica, optima sunt, & quantum hæcenus constat, certissima.

Qui ergo veliter Helmontium legere cupit, observet:

1. Ne totum mox perlegere tentet, ob prolixitatis & confusionis metum.
2. Ut Anatomicis & Chymicis fundamentis probe instructus sit; &
3. Ut, quæ legit, tanquam paradoxa existimet, ulteriori meditatione digna, & ratione & experientia aut confirmanda, aut reiicienda.

Adeòque legantur in principio sequentes *Tractatus*:

Pro.



*Promissa Austeris.*  
*Venatio scientiarum.*  
*Cause & Initia Naturalium.*  
*Archæus Faber.*  
*Physica Aristotelis & Galeni Ignara.*  
*Elementa.*  
*Terra.*  
*Aqua.*  
*Aer.*  
*Progenasus Meteoris.*  
*Complexionum ac Mixtionum elementarium Fig-  
 mentum.*  
*Imago fermenti impræguatæ massæ seminis.*  
*Formarum Oris.*  
*Natura Contrariorum Nescia.*  
*Spiritus Vita.*  
*Calor Efficienter non digerit, sed tantum Exci-  
 tat.*  
*Triplex Scholarum Digestio.*  
*Sextuplex Digestio alimenti humani.*  
*Pylorus Reflor.*  
*Tartari Historia.*  
*Inventio Tartari in morbis temeraria.*  
*Alimenta Tartari infantia.*  
*Tartarus non in Potu.*  
*Custos Errans.*  
*Demens Idea.*  
*Scabies & ulcera scholarum.*  
*Asthma & Tussis.*  
*Latex humor neglectus.*  
*Cauterium.*  
*Tria prima Chymicorum Principia, neque eorum Es-  
 sentias de morborum Exercitiis esse.*  
*De Flatibus.*  
*Vitiis Ratio.*  
*Pharmacopolium & Dispensatorium Modernorum.*  
*Potestas Medicamentorum.*  
*In Verbis, Herbis & Lapidibus magna est Virtus.*  
*Builer.*  
*De Fontibus Spadanis Paradoxa.*  
*Humidum Radicale.*

*Lunare Tributum.*  
*Magnetica vulnerum curatio.*  
*Infantis Nutritio ad vitam longam.*  
*Arcana Paracelsi.*  
*Arbor vite.*

Quoad observationum scriptores Practicos, quales BO-  
 RELLUS, SALMUTH, TULPIUS, RHODIUS,  
 BARTHOLINUS, &c. legendi sunt cum iudicio exa-  
 cto, attendendo in his ad duo:

1. Raritatem & varietatem casuum.
2. Effectum remediorum subinde consignatum.

Quoad prius: ad initium & finem seu terminationem  
 morbi attendatur, ponderentur omnes circumstantiæ cli-  
 matis, ægri, vitæ generis, &c. si allegantur, ut sic ad evo-  
 lutionem causæ possimus pervenire. Eligantur etiam Au-  
 tores, qui non de fide sunt suspecti. Si circumstantiæ non  
 sint notatæ, modò huc modo illuc cogitatio dirigenda ad  
 conceptus varios, ut ita versatile ingenium acquiramus,  
 & inquiramus quid sit magis vel minus probabile, ut in  
 casu simili de causâ & origine ejus eò melius possimus judi-  
 care. Ubi explicatio circumstantiarum & Theoria simul  
 notata est, consideranda eadem, ex quibus principiis pro-  
 cedat? an ex Galenicis? an Paracelsicis? an sit purus Hel-  
 montianus? an verò hodiernus? & si possibile, cum pro-  
 babilioribus concilietur. Instar omnium sit BURNETT  
 in Thef. Practico.

Quoad posterius: effectus probe considerandus est, tam  
 remedium ipsum, & hujus efficacia per se, quàm, qua-  
 ratione, quo tempore, & quibus circumstantiis adhiberetur  
 fuerit? æstimando: Conferantur similia exempla ejusdem  
 Autoris, & ad iuvantia & lædientia intendatur animus;  
 iterata enim exempla constituunt experientiam, quæ una  
 in causarum indagationem nos deducit. Hinc circum-  
 stantiæ probe penitendæ, quatenus vel promovere, vel  
 impedire, vel immutare talem remedii effectum potue-  
 rint; quid aliud, vel melius, vel succedaneum, adhiberi  
 potuisset; hoc enim modo Praxis habitualis faciliè acquiri-  
 tur: è contrà, nisi dicta probe considerentur, decipi-  
 mur, quæ causa est, quod euphorista & specifica sæpius non  
 succedant, quia non sunt eadem circumstantiæ.

# P R A X E O S

## L I B E R I.

### A D S P E C I A L I A:

**O** Prima methodus est, & faciliè applicabilis ad Praxin,  
 & intelligibilis, quam primò instituit Poterius, &  
 dein Sylvius, procedentes secundum ordinem functionum  
 in corpore, sic sine confusione tractantur. In corpore au-  
 tem nostro functiones eæ sunt primariæ, quæ nutritionem  
 spectant, quia corpus nostrum conservatur per nutrimen-  
 tum: tamdiu quippe vivimus, quamdiu nutrimur. Nu-

trimenti ergò assumptio & distributio est prima & functio-  
 nibus primariis totius corporis. Assumimus autem ali-  
 menta, stimulat per appetitum, qui, quando fertur in  
 sicca, vocatur *Fames*; in liquida verò, vocatur *Sitis*. Ordinem  
 ergò in morbis humani corporis observo, quem natura  
 in nutriendo corpore; & incipio de appetitu animali,  
 seu Fame & Siti.

## S E C T I O I.

### D E

## APPETITU ANIMALI, ET FAME LÆSA:

**P**ræter necessitates assumendi alimenta externa ad  
 conservandum esse vitale corporis nostri, ulterius  
 sensilem stimulum ventriculo implantavit natura in fame  
 & siti: quarum ille in molestia cujusdam sensu circa orifi-  
 cium ventriculi superius seu sinistrum, ab acido volatili  
 fermentativo excitato, oritur; unde ab ista sensili percep-  
 tione & vellicatione excitatur desiderium solidorum ali-  
 mentorum, quod *Fames* dicitur. Nam omnia, quæ dictum  
 acidum spirituosum conservant, & famem conservant;  
 quæ augent, famem augent; quæ destruant, etiam famem

destruunt. Pluribus de appetitus natura vid. MOEBIUS  
 in *Fundamentis Medicis* cap. 8. pag. 100. Proût autem variat  
 hoc acidum esurinum, tam in animalium speciebus, quàm  
 in hominum individuis, sive naturali à causa, sive præter-  
 naturali ex vitio alteratum, etiam determinata fames  
 oritur, secundum quam succo tali appropriata saltem ap-  
 peti solent: & cum acidum tale ab assumptorum alimen-  
 torum in stomacho reliquis subinde alterari soleat, exin-  
 de consuetudo, ejusque insignis potentia, originem ducit,  
 secundum quam consuetudo, licet deteriora, magis appe-



appetuntur, & felicius digeruntur, aliis insuetis licet melioribus.

Sicut e contra *determinata* quorundam alimentorum *aversio* oritur, vel à vi imaginationis, ut plurimum matris gravidæ, stomacho infantis certum quasi characterem imprimendis; hinc enim puer per totam vitam abhorret à pane ob matris tædium, ex denegato ipsi pane nimis desiderato abortum; teste SCOTTO in *Physica curiosa lib. 3. cap. 27. pag. 533*: Vel à quadam læsione, ab assumpto quodam indurata stomacho, & hujus læsionis quasi ibidem infixæ memoria; hinc verò virgo assumens fortiter laxativum cinnamomo larvatum, ex tædio & nausea hujus Purgantis postmodum per aliquot annos cinnamomum ferre non potuit.

Cæsum imprimis non pauci averfantur ex eo, quod matres vel nutrices, dum adhuc lactant, denuò reddantur gravidæ; unde lactis à graviditate iterata insignis alteratio, indeque ejus in stomacho infantis prompta coagulatio, & quasi cæsiatio, unde noxæ stomacho indurata causâ infans per totam vitam abhorret cæsum: vid. SCHOTTUS in *Tr. de Aversat. Cæsi*, item DIGBY *Tr. 1. de Natura corp. pag. 38*. GRAEFF de *Org. Viror. generat. inservient*. item KERKRINGIUS *Spicil. Anat. pag. 50*. Fames hæc animalis præternaturaliter tribus læditur modis:

1. Quando *imminuitur*, aut interdum penitus cessat, ut in anorexia.
2. Quando *depravatur* omnino, & fertur in vitiosa objecta, ut in Pica vel Malacia.
3. Quando *augetur & excedit*, ut in appetentia canina, & Bulimo.

## CAPUT I.

## DE

## INAPPETENTIA, ANOREXIA seu FAME IMMINUTA.

**Q**uod attinet *Inappetentiam* seu *anorexiam*: illa est, si ægri destituuntur desiderio ad alimenta, quod naturaliter habere debebant; & quidem nunc simpliciter, ita ut nullum planè stimulum habeant, nunc secundum quid, si in accessione ad mensam nullum habent appetitum, dum autem edere incipiunt, eundem renovant. Si cum hoc prostrato adeit simul horror ab alimentis, vocatur *Fasidium*.

## SUBJECTUM.

*Subjectum* hujus affectus est orificium stomachi superius seu sinistrum, in quo uti est sedes naturalis famis, ita etiam in præternaturali fame affectum est.

## CAUSÆ.

Quoad *Causas*: nota est rejecta Veterum hypothesis de suctione vasorum ventriculi in assignanda causa appetitus, & rectius introducta fermentorum doctrina: unde alimentorum digestionem & famem oriri dicimus à succo stomachi fermentativo, vellicante orificium ventriculi sinistrum; famem verò diminutam à defectu vellicationis istius in orificio ventriculi sinistro sensili: quæ vellicatio sanè, uti est causa famis seu appetitus alimentorum naturalis, ita certè defectus illius erit causa formalis proxima anorexiæ.

Vellicatio ista, uti naturaliter fit ex fermento salino sæpius acidiusculo seu acido spirituoso, quod, subtiliter rodendo aut morsicando tunicas interiores ventriculi & orificium stomachi sinistrum, spiritus animales movet, & famem excitat, nisi habeat in quod agat, scilicet cibos liquidos, qui diluunt fermentum atque saturant, ne ita vehementius agere possit in tunicas ventriculi; ita fames imminuitur, & per consequens aboletur vitio orificii stomachi, quando hujus nervi sunt affecti, ita ut non sentiant stimulum; aut vitio fermenti digestivi.

Defectus vellicationis seu subtilis rosionis est causa generalis, reliquæ sunt speciales.

Jam in specie quoad orificium sensile: deficit sensus vellicationis in stomacho ob nervos ejus, vel propter spiritus animales affectos, si nempe particulæ fermenti digestivi activæ salino-volatiles obtunduntur. Hi nervi sunt sex-

tum, vel secundum Neotericos, octavum par, per quos spiritus animales copiosius affluunt, qui, sive per essentiam, sive per consensum sint affecti, anorexiam inferunt: sic nephritis, propter convulsionem per consensum afficiens plexum orificii sinistri nerveum, ut non percipiat sensum à fermento molestum, appetitum deicit. Ratio est, quoniam renibus affectis & dolentibus, etiam reliqui nervi ex plexu Fallopiiano seu mesenterii, levi spasmo & convulsione simul afficiuntur. Unde non tantum dolorem stomachi & vomitus excitant, sed præterea sunt causa, quò minus percipi possit vellicatio in stomacho à fermento facta, & sic appetentiam deiciunt: quod etiam usu venit in colica & affectibus omnibus intestinorum, hernia itidem &c. in quibus ratione continuitatis stomachus simul plus minus afficitur. Hinc affectus omnis, afficiens stomachum, solet inferre prostratum appetitum; quod etiam pertinent tumores, vulnera & ulcera: de quibus vid. SCHENKIUS *Obf. pag. 335. to 346*.

Quoad spiritus animales: hi inappetentiæ causa sunt, quando narcoticis stupidiore redduntur, indeque nervi minus sensiles: vel quando motus eorum à fortiori objecto ut amore, curis, meditationibus ita immutatur, ut vel non ferantur sufficienter ad stomachum, vel facta ibidem impressio non sufficiat determinando spirituum motui à fortiori objecto perturbato: sic notum est, laudanum opiatum & quæcumque opiata aliave Narcotica immodeicè ingesta appetitum prostrare: vid. WILLISIUS de *Anat. Brutor. P. 2. cap. 2. & in Pharm. Rational. P. 1. Sed 7. cap. 2*. Ratio est, quia stupidum suo modo reddunt superius orificium ventriculi, ut quasi insensibile fiat, & non percipiat vellicationem. Hinc notum est, quod nicotiana ejusque fumus notoriè inhibere soleat appetitum, propterea quia partim est narcotica, & nervoso generi stuporem inducit, partim quia imprægnata est sale volatili oleoso admodum penetrante, quod obtundit & temperat salinam vim stomachici fermenti. Facit huc inventum Indorum, quod refert SENNERTUS *l. 2. Prax. P. 1. Sed. 2. cap. 2. pag. 97*. ex MONARDE, dum ipsi ad fallendum appetitum utuntur medicamento, facto ex foliis tabaci & conchyliis fluviatilibus calcinatis, quæ duo in Mass. Pilul. cogunt & assumunt. Quæ pilulæ duplici ratione appetitum prosterpunt; nunc quoniam ratione foliorum tabaci orificium stomachi insensibile reddunt; nunc ratione conchyllorum calcinatorum salino-acidam vim fermenti stomachici absorbent & præcipitant, & ita ad multos dies appetitum reprimunt: Hinc milites usurpant fumum tabaci pro fallendo & sufflaminando appetitu. Pertinet huc, quod deliria, tristitia, terror, triste ex inopinato allatum nuncium, &c. subito appetitum deiciant, non secus ac alia graviora animi pathemata quælibet, item magni dolores, quatenus hæc omnia conspirant, ut spirituum animalium motum ita immutent, ut partim non dirigantur ad stomachum pro supplemento fermenti digestivi, partim spiritus vehementius commoti in cerebro non recipiant impressiones in orificio stomachi factas, ut plurimum istis minus vehementes: sic parili ex causa ex subitanea pedis luxatione optimus etiam HELMONTIO prostratus fuit appetitus.

Quoad digestivum fermentum: imminuitur & cessat fames I. quando fermentum digestivum in stomacho est obrutum à copiosa materia viscida aut pituitosa, ita ut nequeat spicula sua exerere in nervos, & hinc non vellicet orificium stomachi; vel redditum hebes ac iners, i. e. minus acre à materia vel substantia pingui. Saliva itidem viscida & glutinosa, fermentum stomachale inquinans, ordinariò appetentiam dejectam solet inferre: frequens est hæc in febre lenta laborantibus, & hecticis, qui conquerruntur de saliva glutinosa, & habent simul appetitum prostratum, unà cum compressione stomachi: Idem etiam accidit in Hypochondriacis quibusdam, qui de imbecillitate corporis continua cum appetitu prostrato & glutinosa saliva conquerruntur; Saliva enim plurimum in recessu habet, & multum facit ad appetitum, vel prostratum vel auctum, maxime in morbis chronicis, præcipue si qualitativus salinis sit imbuta, sicut in catarrhis vel coryza quandoque accidit. *Symptoma hæc, ex vivo Libus* unice dependentia, curantur optimè per vinum medicatum infusionis radicis armoraciæ & cochleariæ, adjuncto helenio. Observavi siquidem, quod, eam aliquoties hauserint, curati fuerunt; viscidam enim salivam, obruentem & destruentem appetitum, correxit mihi sæpius. Item inordinata aut nimis copiosa alimentorum, imprimis non facile dige-



digestibilium, una vice ingestio: unde gulones, qui una vice plus ingurgitant, quam par est, per aliquot dies postmodum habent dejectum appetitum; alimenta enim copiosius assumpta loco chyli degenerant in mucum nimium, quem nisi aliqui prius diluant, sive abluant potu vini, sive subacido haustu, famem haud sentiunt. Cerevisia, seu potus non rite defaecati, praesertim recentiores, tartarum & faeces in stomacho praecipitantes, appetitum stomachi prosterunt; hujus enim fundo inhaerentes debilitant fermentum digestivum. Sic pingua quaecunque copiosius assumpta, superingesto potu frigido, viscidum & cruditatem nidorofam in stomacho primisque viis cumulant, & iners reddunt ventriculi fermentum: hinc SENNERTUS *Pr. l. 3. P. 1. S. 1. c. 1.* notabile habet exemplum ex *Arctena* de quodam, cui per 10. dies appetitus penitus fuit dejectus ex assumpta  $\frac{1}{2}$  lbj olei violacei, in quo cera & adeps in emplastri consistentiam dissoluta fuere: pinguedo ergo admodum frangit vires fermenti stomachici. Item acida vel austera cuncta, quatenus nempe difficiles digestionem cum puncturis stomachi faciunt, & vomitus acidus cient, saepe quoque appetitum summè prosterunt. Item spiritus vini crebrius & copiosius assumptus ex se & ordinariè prosternt appetitum, propterea, quoniam acrimoniam acido-salam fermenti stomachi temperat, & coarctat: Nam spiritus vegetabilium virtutem habent temperandi & corrigendi acrimoniam humorum in corpore nostro; hinc spiritus vini copiosè sumpto altero die oritur anorexia, ut in moderate sumptus excitet. Item fit non raro, ut aliquando bilis pinguior, & praeternaturali motu suo ex intestinis in stomachum regurgitet: vid. SYLVIVS *Pr. l. 1. pag. 15.* Unde & deicitur appetitus, quatenus fermentum digestivum alteratur, & percipitur in ore sapor amaricans, & tales affliguntur insimul sodi, quod nunquam nisi ex cruditate nidorosa, & ex olcositate bilis, est: Et certum est, bilem appetitum prostertere, sive in ventriculo reperiatur, sive in massa sanguinea abundet sal volatile oleosum; quoniam praecipitat acidum, quo minus possit augeri fermentum stomachi, à quo oritur vellicatio. Denique excernenda varia subito suppressa, alterantia, & inquinantia contenta corporis, etiam immutando plus minus succum stomachi eturinum, anorexiam inducunt, ut mensium suppressio; item intermissus coitus, &c. Sic SCHENCKIUS in *lib. 3. de Inappetentia Obs. 1. p. 320.* observat viduam ex defuetudine Veneris subitanea, & ex meroze contracto, in insignem anorexiam prolapsam.

II. Secundum fermenti digestivi vitium in anorexia est, quando deficit in stomacho, cujus defectus non potest non causari appetitum dejectum: id quod fit ob varias causas, in specie, quando vel in toto corpore imminuitur, vel ad stomachum non deferitur, partim propter conturbatorem spirituum, partim omnium humorum in corpore: hinc enim quibusvis in febribus, primariò continentibus, ardentibus scilicet ac malignis, secundariò intermittentibus, penitus cessare solet appetitus, defectu acidi vitalis in stomacho labefactati ob humorum, adeoque lympharum, plus minus factam alterationem, & imminutionem in universo corpore, nec non pinguedinem sanguinis, aut abundantiam bilis & salis volatilis oleosi, destruuntis acorem in nobis. Sanè, qui ob volatilitatem bilis patiuntur orgasmum, hi facile incidunt in appetitum deficientem: item ob id tempore aestivo, aëre calido & squalido, minus quam hyberno, esurimus. Rationem dant nonnulli, quod multa in aëre volitent insensibilia, maximè tamen operosa, maximè quidem salia volatilia, quae dent causam, ut deficiat acidum in massa sanguinea; unde ut plurimum aestivo tempore propter abundantiam salis volatilis ex aëre attracti debilitetur fermentum stomachi, & deiciatur appetitus; qui contra tempore hyberno augeatur propter acidum, quo tunc aer impraegnatus sit. Arbitror tamen potius: ibi rariores & subtiliores spiritus magis absumi; hic verò eosdem magis concentrari, unde varia fermenti actiuitas accedit: & crebrior quoque potus tunc temporis admissus, qui diluit ventriculi fermentum, lubricumque inducit ipsi statum, unde dictus affectus seu appetitus prostratus. Ceterum praeter aliis assumpta multum huc faciunt: sic potus nimis appetitum prosternt, diluendo nimis & abstergendum fermentum digestivum; item vinum, de quo HIPPOCRATES *l. 2. Aph. 21:* e.g. potus recens, vel cerevisia, vel feri lactis usus nimis, admodum solet prostertere appetitum: de quo Tym. in *Cas. l. 3. Cas. 2. pag. 111.* Ratio est facilis: in sero enim lactis est sal volatile

admodum temperatum, plus minus nitrosum (ratione cuius refrigerare & laxare dicitur) quod obtundit & temperat acrimoniam fermenti stomachici, & exinde cessat appetitus. Tandem calculi in stomacho geniti etiam appetitum prosterunt. de quo Hoferus in *Herc. Med. pag. 137.* ubi subministrat exemplum appetitus prostrati lethalis cum nausea, ex calculis duris & copiosis in stomacho reperiis: Non secus ac alcalia assumpta, item acidum absorbentia, ut creta, bolus, cornu cerui ustum, terra sigillata, & Martialia, appetitum enecare solent: de quibus notissimum est, quod notabiliter appetitum deiciant, obtundendo penitus actiuitatem ac acrimoniam fermenti digestivi. Sic acidum etiam ab urina obrunditur, e.g. in febribus famelicis, ubi propter acidum nimis volatile multum edunt, & corpora tamen non augentur, hinc urina propria commendatur.

Hinc patet, quid anorexia seu fames deiciens sit? scilicet defectus vellicationis in stomacho, & quidem orificio sinistro; unde deficit desiderium naturale alimentorum.

## DIAGNOSIS.

Quod attinet signa: In Diagnostice non opus est prolixitate, quoniam ex se patent.

## PROGNOSIS.

Nunquam bonum signum est appetitus prostratio, in specie ista, quae citra causam manifestam aut citra stomachi oppressionem, ex defectu acidi naturalis in stomacho, vel ejus omnimoda extinctione oritur, ut in principio malignorum affectuum evenire solet: in sanis morbum imminuentem, in morbo sis semper aliquid mali, denotat; siue morbus hic fuerit chronicus, (vid. HIPPOCRATES *sect. 7. aphor. 6.*) siue acutus, (vid. GALENUS in *Hipp. Sect. 2. Aph. 6.*) Multum enim situm est in stomacho ad totius microcosmi vigorem: unde semper suspecta Medico.

Qui obnoxii sunt affectibus chronicis convulsivis, podagricis, colicis, nephriticis, &c. hisque subito & sine causa appetitus deficit, est signum imminuentis paroxysmi: nec hi ipsi sunt securi de cessatione morbi, nisi prius redeat appetitus.

Speciatim post quaslibet febres, tam continuas quam intermittentes curatas, bonus redire debet appetitus: quamdiu hic non redit, aut qui rediit denuò prosteratur, semper pertimescimus recidivas febres. Verissimum enim est, in quacunque etiam statu versetur aeger, illud HIPPOCRATIS: *In omni morbo constare mente, & lenè se habere ad ea, quae offeruntur, bonum:* vid. *sect. 2. aphor. 33.* si scilicet aeger adhuc aliquantulum sine nausea, & sine gravamine stomachi, assumit.

Si aegri quidem appetunt, sed quae offeruntur fastidiunt, malum signum est; deprauatum enim etiam mox defecturum innuit appetitum.

Si in morbis, etiam apparenter leuibus, appetitus mox prosteratur, raro bonum signum est, & unum ex primariis signis morborum malignorum. Deinde appetitus in principio & statu morbi defectus non est adeò malum signum, modò in declinatione reuertatur: Sed si appetitus in fine aut declinatione morbi de nouo prosteratur, vel recidiat, vel alterius cujusdam novi morbi metum incutit. Si in principio morbi continuò duret, periculosum est signum, quia virtutis vitalis magnam defectionem & gravorem morbum denotat, praecipue in quatuordecim: item si à tumoribus similibusve ventriculi incurabilibus morbis anorexia dependeat.

Si pueri anorexià corripiantur, periculum subest, utpote qui naturà voraces sunt, & multo alimento opus habent.

Denique est fatale signum, quando aegri in acutis febribus vel summa virium debilitate & prostratione subito alimenta vel potum, quae antea fastidiverunt, avidè appetunt, & assunt: quod quidem exhilarat adstantes, sed terrere debet Medicum.

## CURA.

Methodum medendi quod spectat: in anorexia curanda imprimis habenda ratio causarum, tam proximarum quam remotarum, ut maturè remoueantur; his enim sublati tollitur effectus. Hinc si e.g. à causa externa spiritus turbentur,



tur, si per consensum nervi afficiantur, &c. ad hæc ipsa scopus dirigendus venit.

In specie, quod hic agendum superest Medico, est

1. Ut ante omnia expurgentur ea, quæ vitiosa hærent in stomacho; & hinc
2. Corrigendum aut restituendum fermentum stomachi digestivum.

Dico, quoad fieri potest: Nam fermentorum est magna vis, & non possunt facili hæc ad lubitum Medici tractari: Imò per artem restituere, impossibile est; acul tamen potest per ea, quæ causas remonent, & stomachum evacuant.

Inter omnes autem causas appetitus læsi, sunt vel mutus copiosior stomachum replens, & hinc inertia stomachalis fermenti, obruti à pinguedine vel bile. Quæ ergo hæc causas remonent, sunt stomachum evacuantia, & mukum copiosiorum atque pinguedinem, obruentem activitatem fermenti, abducentia; unde ut plurimum vomitoria, aut per inferiora purgantia, præmittenda veniunt.

Vomitoria sunt optima: hæc enim sunt, quæ commodissime & immediate molestum stomachum humorem vel lentorem expurgant, & unum vomitorium plus & melius evacuat in affectibus stomachi, quam decem purgantia alia per inferiora. Vomitoria conveniunt antimoniatæ, quæ ut ut operentur per vim stomachi inimicam & malignam, non tamen prohibet, quò minus legitime præparata & cautè exhibita, opratus sequatur effectus. Usurpantur vel in forma sicca, vel liquida, in infusis nempe antimonialibus. In forma sicca:

℞. *Tartari emet. Myns.* gr. iiij.

*Sacch.* gr. vj.

*M. f. pulvis, S.*

*Pulvis Emeticus.*

In infusis antimonialibus elegans est modus WALÆI in methodo medendi, qui rectè monet, non attendendam esse quantitatem antimonii infundendi, sed potiùs quantitatem liquoris, in quam fieri debet infusio. Nam sive infundantur iv. vel vj. grana Mercurii vitæ, sive ℞ss, perinde est; modò justa accipiat liquoris quantitas. Sic v. g. ℞j. Mercurii vitæ est salutaris, si infundatur in ℞j Vini Rhenani: sicut è contrà gr. vj. tantum sunt lethalia, si in ℞vj vini infundantur pro dosi una; antimonium enim non plus de se diffundit, quàm possunt recipere liquores. De vitro antimonii, croco Metallorum, tam vulgari quàm absinthiaci Mynsichtii, & aliis, idem verum est: v. g.

℞. *Croci metall. absinthiaci.* gr. v.

*Infund. in f. q. Vini Rhenani.*

Stent per noctem in digestionem in loco calido: mane filtratur per chartam bibulam.

℞. *Hujus ℞j.*

*D. S.*

*Vinum Emeticum.*

Tutiùs hæc infusa adhibentur, quàm si ejusmodi antimoniatæ in substantia porriguntur, ob metum remanentium particularum in stomacho, quæ hypercatharthes aliæque mala minantur. Sed hæc etiam præcaventur, si subinde haustus cerevisiæ calefactæ, aut alius liquoris superbibatur, quò diluitur materia emetica, si post vomitionem haustus vini vel potus cum cydoniorum miva vel succo, Martialis aut terreis vel præparatis mixtus, propinetur. Syrupus emeticus Angeli Salæ à ℞iij, ℞ss ad ℞vj, est egregius. His vomitorii, ut ventriculum à materia crassa & viscida oneratum adjuvemus, addatur & non nihil spiritus æruginis, tam simplicis quàm compositi, seu qui paratur ex viride æris & gum. ammoniaco, ut qui est singularis in incidendo ventriculi muco viscido. Quando ergò appetitus est prostratus propter præsentiam materiæ crassæ & viscidæ in stomacho, sequens paretur Vomitorium:

℞. *Aquæ hyssop. ℞j. vel ℞iij.*

*Cinnam. ℞il.*

*Acet. squillæ.*

*Syr. emet. an. ℞ss.*

*Spiritus viridis æris compos. seu æstomat. ℞iij. ad ℞j.*

*M. S.*

*Potiuscula Emetica.*

Quod Vomitorium egregiè operatur.

Iis verò, qui non apti ad vomendum, aut à vomitoriis abhorrent, præscribantur purgantia per inferiora, quæ ex generalibus suprà dictis peti possunt. Interea specialiter præpollent aloetica omnia, quæ amica sunt stomacho, forèes mucilaginosas detergunt, & easdem exhaustiunt,

*Item. Oper. Tom. II.*

licet amara sint: Verum enim est proverbium: amarum prodest stomacho. Variæ sunt pilulæ ex aloë, v. g. *pilula Francofurt.* seu *Angelica dictæ*: vid. HOFFMANNUS *Clav. Seb. & derian. pag. 150*: quæ stomacho gratæ sunt, & in anorexia blandè evacuando conveniunt. *Pilula aloetica* usuales LUDOVICI, quas videb. in *ejus Pharm. pag. 179.*, item pilulæ aloëphanginæ cum scammonio acuatæ. Assumenda est aloë non lota; quoniam ex aloë lavando exhauritur mucilago purgans, relicta parte adstringente: vid. HELMONTIUS: potiùs succoterina sumatur, quæ pellucida est, & præparetur, si lubet, per crebriorem insuccationem, e. g. succo rosarum, violarum, vel alio, pro *aloe rosata, violata*, &c. Quilibet hic potest abundare suo sensu. Hæc pro evacuatione leniori assumuntur manè cum custodia; pro scopo verò stomachum saltem successivè purificandi, capiuntur vespertino tempore unà alteràve horà ante coenam: pro quo scopo hæc purgantia etiam cum aliis commutari possunt, v. g. cum Decocto tamarindorum, si scilicet cruditas nidiorosa simul adsit: conf. RONDELETIUS *Pr. l. 3. c. 13*; item per Decoctum passularum cum fol. sennæ ad imitationem TIMÆI à *Guldenklees*. Ubi fortius agendum est, Veterum compositio, nempe Mass. Pilul. de hiera cum agarico, quæ in officinis prostat, meritò præfertur reliquis: in affectibus biliosis præscribo sæpiùs à gr. xv. ad ℞i. addendo simul pro mucii stomachum obsidentis incisione vel gummi ammoniacum; aut pro ejusdem correctione Extractum absinthii, &c. cum forti & acuto stimulo. Hic moneo de Purgantibus, illa debere tantum tribus aut quatuor, vel ad summum sex vicibus purgare, demonstrante hoc ipsum HELMONTIO, & CNOFFELIO *Tr. de Febre epidem. maligna*; non verò imitandam esse vulgi pravam consuetudinem. Dabo exemplum: In mucilagine viscida ex stomacho evacuanda præscribo talem formulam:

℞. *Mass. pilul. de hier. cum agar. g. xii. ad xv.*

*Extr. absinth.*

(vel loco hujus gum. ammoniaci acet. sol.) gr. viij vel ℞ss.

*Scamm. sulphurat. gr. j.*

*Extr. troch. alband. gr. ss vel gr. j. ad ij.*

*Cum Elix. Propr. Parac. aut Ess. absinth.*

*f. pilula, S.*

*Pilula stomachicæ laxativæ.*

Eadem pilulæ de hiera cum agarico conveniunt quoque egregiè hypochondriacis, qui leniter sunt purgandi; sed tunc temporis adduntur appropriata, ut Extractum seu Essentia Martialis liquida, aut gummi ammoniacum; nam hoc potens est in detergenda & resolvenda materia viscida stomachum incrustante. Dabo exemplum pro hypochondriaco leniter purgando:

℞. *Mass. Pil. angelic. vel de hier. cum agar. ℞ss. vel gr. xij.*

*Gum. ammoniaci aceto sol. ℞ss.*

*Scamm. rosat. gr. ij.*

*Extr. troch. alband. gr. j.*

*Cum Ess. Martis f. pilula, D. S.*

*Pilula laxativæ.*

Quæ mukum viscidum incidunt & blande evacuant.

Vel

℞. *Mass. pilul. mastichin. gr. xv.*

*Extr. absinth. gr. xij.*

*Troch. alband. gr. j.*

*M. f. pilula.*

Vel præscribatur pulvis catholicus, purgans sine ullo symptomate copiosè in Hypochondriacis: v. g. in subiecto sacculis solutionis

℞. *Tartari vitriolati. gr. xv.*

*Scamm. sulphur. gr. iv.*

*Troch. alband. gr. j.*

*Olei destillat. cumin. gutt. ij.*

*M. f. pulvis, S.*

*Pulvis laxativus.*

Ubi stomachus mucilaginosà materià sive infarctus, sequens profuit:

℞. *Aquæ hyssop.*

*Mentha an. ℞ss.*

*Tartari vitriolati,*

*Extr. agar. an. gr. vi.*

*Scamm. sulphurat. gr. ij.*

*M: Potio, S.*

*Potiuscula laxativa.*



Et hæc etiam de Purgantibus sufficiant. Postquam præmissa fuerint evacuantia, usurpentur ea, quæ corrigunt stomachi appetentiam dejectam: qualia sunt, quæ vi salina volatili, nunc acri, nunc oleosa aromatica, pollent, & sordes mucilaginosas stomachi resolvunt & abstergunt: nam his deterfis sponte appetitus revertitur. Eadem etiam conveniunt, quando pinguis assumpta, & bilis sunt causa appetitus dejecti: hinc conducunt acida blanda seu temperata, stomacho grata, & appetitum egregie restaurantia, quia præter vim stimulantem pro simili lentorem incidendi & attenuandi conveniunt usu, ac præterea blanda sua adstrictione tonum stomachi plus minus per opiatam, copiosa potulentam, spiritus vini abusum, aliisve modis resolutum, firmant. Sed observandum: quod per acida provocare quidem seu irritare non nihil possumus famem, sed genuinam pro stimulo digestionis præparare, Medico impossibile est, adeoque optimum est, remove potius impedimenta: quo facto ipsa natura appetitu debito se refocillat seu recolligit. Parciores ergo & cauti magis in acidorum usu esse debemus, cum appetitus talis per acida quasi arte factus, subinde plus noceat quam prosit. Nam occasione acidi stimuli plus ingerunt ægri, quam naturali fermenti virtute degerere valent; unde cruditates acidæ sic colliguntur, 1000. malorum matres. Sanè vix, præterquam à cremore tartari, usum proficuum in hoc casu observavi ab acidis, præsertim mineralibus, nisi forsitan spiritus salis, & vitrioli Philosophicus, ab HARTMANNO adeo commendati, præprimis cum spiritu vini aut aromatico dulcificati, in atonia ventriculi, hanc restituendo, aliquod opus contulerint; adeoque aromatica, præsertim acriora paulò, imprimis observavi proficua.

Quod attinet medicamenta, quæ his scopis satio faciunt: sunt primò stomachica salina volatilia, tam acria quam oleosa, item aromatica & nervina; hinc mentha, in specie crispata, absinthium vulgare & Romanum, pulegium, salvia, rosmarinus, & in genere omnia nervina, sapore subacti & odore aromatico prædita, quæ omnia conveniunt in appetitu dejecto. Unde etiam in genere omnia aromata, præprimis cinnamomum, Galanga, caryophylli, Zinziber crudum & conditum, Zedoaria, &c. optime conveniunt, & eliminando ex stomacho: imprimis Zedoaria satis est decantata & usitata, ubi flatus sunt molesti in stomacho: sic grana piperis integra deglutita cruditates acidæ egregie destruunt; sicut & de Zingibere PLATERUS observavit, quendam post quartanam diuturniorem, ex cruditate acida ortam, apertis gravatum, solo huius usui diuturniore se restituisse. His aromatibus sunt confinia semina calida, majora & minora; nam & hæc salii volatili oleoso sunt prædita: item etiam radix helenii recens singulare stomachicum est: non minoris virtutis est calamus aromaticus verus, cujus loco, cum hic sit rarissimus, commodè substituitur radix acori veri, quæ tam cruda quam condita, & mane comesta, elegans est in corrigendo stomacho, & recreando appetitu dejecto. Radix armoraciæ seu raphani rusticani, item radix ari, sive recens usurpetur minutim incisa cum cochleari spiritus baccharum juniperi, vel spiritus vini; vel eadem simpliciter in loco umbrato exsiccata, (sed non juxta Dispensatoria præparata,) & pulverisata, quæ acrior, ed melior, convenit insigniter in appetitu dejecto, & hinc dicitur vulgò *radix digestiva*, quæ non solum consumendo & absumendo materiam in ventriculo resistantem, & appetitum imminuentem, sed etiam fodiendo & irritando ventriculi parietes, & sic spiritus animales & concitatus commovendo, operatur. Plebejæ quidem hoc, sed optimum sanè est remedium: seligatur saltem substantia intermedia aeris, cum extrema superficies, propter sal volatile in auras evaporans, sit insipida, & cum dimidio extracti tormentillæ mixta, egregium suggerit pulverem stomachalem contra anorexiam.

Juxta hæc omnia amaricantia acriora appetitum provocant, pituitam mucilaginosam incidendo ac abstergendo, ut fermentum digestivum, impedimentis his sublatis, pristinam recuperet activitatem, simulque ventriculi tunicam nerveam vellicent. Hinc varia prostant ex his composita officinalia, ut species diatrion-pipereon, species aromatica, & similia; ex simplicibus hæc parata essentia & Elixiria, *Elixir menthe cum spiritu proprio* per infusionem paratum, addito paucis saccharo; *Elixir stomachale Quercetani*, febrile Mynsichti; *Essentia menthe*, Zedoariæ, absinthii simplex & composita, pulegii, calami

aromatici, & simil. admodum conveniunt in hoc affectu. TIMÆUS à *Guilkenlee* facit mentionem *Essentiæ panis* cum vino Malvatico destillatæ, quæ omnino non erit rejicienda; nam spiritus panis per retortam destillatus, acido-volatilis est, inter stomachica remedia singularissimus.

Ex hæcenus dictis paratur *Vinum medicatum stomachale*, imprimis in malo magis chronico:

℞. *Herb. absinth.*

*Menth. an. M. j.*

*Rad. acori veri ℥ij.*

*Gentian. ℥ss.*

*Sem. 4. calid. maj. an. ℥ij.*

*Incis. includ. Nodulo, S.*

*Nodulus pro vino stomachico.*

Capiat æger omni die bis haustum, addendo omni haustu gutt. 6. spiritus salis dulcis.

Vel

℞. *Herb. menth. crisp. M. iij.*

*Rad. acori veri rec. ℥ij.*

*Helen. vel armorac. rec. ℥j. ad ℥jss.*

*Zedoar. ℥vj.*

*Cinnam. ℥iij.*

Misce pro nodulo vino infundendo:

De quo æger mane & à meridie aliquot horis ante pastum, aut etiam in ipso pastu bonum haustum capiat, & egregie appetitus allicitur.

Item

℞. *Herb. Mentha M. ij.*

*Card. ben. M. j.*

*Absinth.*

*Summ. cent. min. an. M. ss.*

*Rad. enul.*

*Caryophyll. an. ℥ss.*

*Sem. sinapi vel crucæ ℥j.*

*Cinnam. ℥ij.*

*Caryophyll. ℥j.*

*Incis. & cont. includ. nodulo, qui infusus s. q. Vini, capiat*ur omni mane ad lubitum.

Quando simul laxandum:

℞. *Herb. mentha M. ij.*

*Summ. absinth. M. j.*

*Rad. ari*

*Helleb. nigri crud. an. ℥ss.*

*Enula,*

*Fol. fenn. sine stip. an. ℥j.*

*Sem. anisi*

*Fenic. an. ℥vj.*

*Galang.*

*Zedoar.*

*Zingib. an. ℥ij.*

*Sal. tartar. ℥iij.*

*Incis. & contus. D. S.*

*Nodulus purgans pro vino.*

Imo sola radix armoraciæ recens, cum ana rad. helenii rec. vino Rhenano vel absinthice aut cerevisiæ infusa, omni mane hausta, egregium est remedium; quod insigniter commendat GABELCHOVERUS C. 1. Cur. 14. in appetitu prostrato ex nimia visciditate & glutinositate salivæ cum nausea ac amarore in ore: pituitam mucilaginosam incidit ac abstergit, unde humor fermentalis, remotis his vitiis, activitatem pristinam recuperat, atque ventriculi tunicam nerveam simul stimulat. Idem præstat piperitis vino infusa & propinata, vel sufficiat haustus vini generosi, vel panis triticeus vino intinctus, sensum sensumque deglutitus.

Facit huc Ooservatio 1. THONERI l. 2. pag. 141., qui fastidium ciborum ingens cum insigni virium prostratione & amarore oris curavit.

℞. *Rad. cicbor.*

*Herb. absinth. Rom.*

*Roris mar.*

*Card. bened. an. M. j.*

*Cent. min. M. ss.*

Decoqu. in Vini vel Aquæ Mens. ss. ad consumptionem tertiae partis:

De quo mane & vespere capiatur ss.

\* Similem videb. observationem in FORESTO l. 18. Obs. 8. Conf. etiam RIVERIUS in Obs. 1. à PACHE. QUO communicata, & l. 9. Prax. pag. 547., qui habet exemplum appetitus dejecti, per agrimoniam, absinthium, & centaureum



taurium minus in forma Decocti ad aliquot dies ita aucti, ut etiam canina appetentia ferè secuta sit. Decoctum fuit tale:

*R. Fol. agrimon.  
Com. absin. b.  
Summ. cent. min. an. M. ss.  
Coqu. in aqua.*

De Colatura cepitæger bonum haustum cum pauco saccharo.

Præterea conveniunt etiam acida volatilia, non nimia, sed potius temperata, ad appetitum provocandum, quæ inter, præter tartarum primas vias simul blande abstergentem & relaxantem, excellunt cydonia, quocunque modo usurpata; in his enim absoluta quasi cura est appetitus prostrati, imprimis cum vomitu aut alvi fluxu plus minus conjuncti: hinc ZACUTUS LUSITANUS non satis commendare potest cum medicamentis ex cinnamomo. Facit huc quoque pulpa cydoniorum plus minus aromatizata, & syrupus cydoniorum simplex & aromatizatus, omniaque cydoniata; unde misturis ad stomachum roborandum cydoniorum succus aut syrupus permiscetur: c. g.

*R. Aqua mentha ʒij.  
Cinnam. ʒij. ad ʒvj.  
Succ. cydonior. ʒj. ad ʒiʒ.  
Syrup. cydon. simpl. vel aromat. ʒss. vel ʒvj.  
M. f. Potio. S.  
Potiuncula corroborans stomachum.*

Capiatur pro lubitu. Item

*R. Aqua mentha ʒj.  
Cinnam. ʒss.  
Spiritus iheriacal. ʒiʒ.  
Laud. opiat. ferm. gr. ij.  
Syr. cinnam. ʒss.  
M. S. ut supra.*

Item spiritus mastichis acidus & panis nobilis est in affectibus stomachi omnibus; sicut & corrigit omnia purgantia stomacho adversa: item spiritus minerales acidi, cum spiritu vini rite dulcificati, v. g. spiritus salis dulcis, vel spiritus nitri dulcis, & spiritus vitrioli dulcis à gutt. x, xij. vel xv. ad xx. vel xxx. pro una dosi, semper bihorio ante pastum in vehiculo, præferim calido, præter propter usurpati. Dulces sint ideo, quia non dulcificati, nimis sunt acres: cum autem in nobis omnes succi sunt temperati, unde in Praxi temperatis remediis inhaereamus; remedia enim, quod magis temperata, eod magis grata, quia sine alteratione corporis operantur. Excellunt hæc inter, spiritus vitrioli volatilis: non autem vulgaris sit, sed præparetur beneficio spiritus vini ex vitriolo regenerato. Item sal volatile succini acidum, ab adjuncta pinguedine liberatum, ad gr. xij. vel xv, subinde ante pastum usurpatum. Item spiritus viridis æris volatilis ad gutt. xx. vel xxx. assumi potest. Optimum consilium est, ut maritentur hi spiritus cum vegetabilibus stomachicis vel aromaticis: hinc videmus Elix. propr. proprietatis seu compositum aromaticum, quod optime convenit in anorexia, habere adjunctum spiritum acidum sulphuris vel salis, ut ita eod melius operetur: cujus dosis est ad gutt. 30. vel 40. jejuno stomacho usurpatum. Vel

*R. Elix. propr. ʒij.  
Essent. absinib.  
Mentha. vel cal. arom. an. ʒj.  
M. S.*

*Elix. stomac. h. b.*

*R. Conf. pulp. citri ʒiʒ.  
Mentha. vitriolat. ʒj.  
Pulv. hepat. rub. ʒij.  
Spiritus salis coagul. ʒij.  
Cum f. q. syr. cydonior. aromat. f. Elebuarium,  
D. S.*

*Elebuarium stomachale.*

Conveniunt etiam acetum pro condimentis in cibis, aut acetum volatilifatum & assuſum Zingiberi, semini crucæ vel sinapi, & Zedoariæ, & sic usurpatum; uti & acetum squilliticum. Huc quoque pertinet pulvis hepaticus rubeus, seu Pulvis ebriosorum Dresdensium. Nec negligenda sunt Elixiria stomachalia, quorum non vilissimum est Elix. stomac. h. b. compositum D. Michaelis, in quo conjungitur aromata salina & oleosa cum spiritu salis seu vitrioli Philosophico, sequenti modo:

*Erismüller. Oper. Tom. II.*

*R. Herb. mentha crisp. M. iv.  
Absinib. Rom.  
Roris mar. an. M. ij.  
Salv.  
Pulegii,  
Melissæ an. M. j. vel M. ij.  
Rad. acori veri rec. ʒiij. vel exsic. ʒj.  
Pimpin. vel enula ʒij.  
Cyperiorient. ʒj.  
Gran. mall. ʒvj. vel ʒiʒ. ad ʒij.  
Sem. 4. cal. mai. an. ʒss.  
Sinapi ʒvj.  
Raf. fassifr. ʒiij.  
Zedoar.  
Galang. an. ʒiʒ. ad ʒij. vel ʒiij.  
Cubebæ.  
Nuc. moschat.  
Macis,  
Cinnam.  
Zingiber.  
Caryophyll. an. ʒiij. vel ʒss.  
Sem. coriandri ʒj.*

Irrorentur cum spiritu salis vel Vitrioli Philosophici (qui revera est spiritus salis, è butyro antimonii aqua diluto & re-  
tificato) ad gratum saporem & subtilem acorem: extra-  
hatur cum spiritu menthae crispæ in loco calido: post filtra-  
tionem adde

*Extr. stomach. compos. vel acori veri, quantum potest  
in Ess. dissolvi.*

*Dosis ʒss. ad gutt. 30. 60. usque ʒj.*

Hoc Elix. stomac. h. b. in scorbuto & malo hypochondriaco conjungitur cum spiritu cochleariz hoc modo:

*R. Elix. stom. acb. ʒiij.  
Spiritus cochlear. ʒiʒ.  
M. S.*

*Elix. stomac. h. b.*

De hoc sumantur bis de die gutt. 30. ad 40. & insigniter appetitum renovat, & stomachum confortat: Vel

*R. Elix. vitriol. Mny. ʒss.  
D. S.*

*Elix. corroborans stomachum.*

Dosis 30. gutt. bis in die, manè in vehiculo calido, vespèri in frigido, semper bihorio ante pastum.

Interdum etiam Essentia ambræ aliquid addatur; ambræ enim singulare est stomachicum, & convenit in specie in affectibus senum.

De cætero alcalia eadem ratione ac aromatica operantur; v. g. sal cardui benedicti, item Tinctura tartari acrior, i. e. salæ alcali quasi caustico facta, ad 40. gutt. usurpata: impedimenta stomachi removet, & acri stimulo appetentiam stimulat.

*R. Tinctura tartari acerr.  
Elix. propr. sine acido an. ʒiij.  
M. D. S.*

*Mixtura stomachalis.*

Item convenit Essentia piperis cum spiritu vini tartarizato parata.

Pertinent huc etiam salia, v. g. sal ammoniacum crudum, quod est egregium stomachicum, incidens, quod antea dixi de gummi ammoniaco, & alterans viscida, eaque extra stomachum removet, adeoque multum facit ad renovandum appetitum. Est quasi sal falsum, ex sale communi & sale volatiliurine, quæ dant sal falsum tertium. Quibusdam solet præscribi sal ammoniacum cum salibus vegetabilium fixis: sed est error insignis. Ratio est: Quia salia fixa alcalia arripiunt acidum salis communis; unde avolat sal volatile salis ammoniaci, & sic fit falsum fixum: potius omittantur salia fixa, & præscribatur sal ammoniacum solum, vel lapilli cancerorum adjungantur. Idem sal ammoniacum convenientissime cum aromaticis jungitur: Sic pro stomacho detergendo & appetitu restaurando:

*R. Flor. salis ammoniaci, vel sal. ammoniaci depur.  
ʒj.  
Spec. diatrion piper. vel cubebæ. vel alius aromat.  
ʒj. vel ʒss.  
M. pro tribus vel 4. dos. S.  
Pulvis stomachalis.*

Qui capiat omni mane.

Vel

C 2

R. Sa-



**R.** Salis ammoniaci depur. ʒi.  
Zingib.  
Spec. diatrion piper. an. ʒss. ad g. xv.  
M. D. S.  
Pulvis stomachalis pro tribus dosibus.

Item:

**R.** Rad. ari exsec. ʒi.  
Lapill. cancr. præp.  
Salis abstin. b. an. ʒi. ad ʒss.  
Ol. destillat. caryoph. gutt. iij.  
M. pro tribus dosibus D. S.  
Pulvis stomachalis pro tribus vicibus.

**R.** Rad. ari crud. ʒss.  
Piperis ʒi. ʒss.  
Zingib. ʒss.  
Flor. sal. ammoniac. ʒij.  
Olei destillat. cal. arom. ʒi.  
M. f. pulvis, S.  
Pulvis stomachalis pro aliquot vicibus.

**R.** Lapill. cancr. præp. ʒss.  
Galang.  
Salis ammoniac. depur. an. ʒi.  
Piperis,  
Zingib. an. ʒss.  
M. f. pulvis.

**R.** Conf. summ. abstinb.  
Rad. enul. an. ʒij.  
Zingib. cond. ʒvj.  
Spec. diatrion piper ʒij.  
Salis ammoniaci ʒi.

Cum syr cydon. f. Elethuarium, S.  
Elethuarium stomachale.

Vel usurpetur vinum absinthit. cum sale ammoniaco: quod etiam faciunt tartarea remedia, ut cremor & crystalli tartari, tartarus vitriolatus, item Panacea Hollsteinensium, sal tartari essentiale & similia: Item

**R.** L. quor. terræ sol. tartari ʒss.  
D. S.

Essentia stomachalis: 40. guttæ pro dosi, bis in d. e.

Pertinent & huc pulveres stomachales salini, inter quos etiam est pulvis stomachalis D. Michaelis, quia in appetitu prostrato convenit:

**R.** Rad. ari exsec. crudè pulverif. ʒij.  
Arcan. dupl. seu Panac. Holfat. ʒij.  
Salis abstinb.  
Cossi Arab.  
Rad. acori veri an. ʒij.  
Cinnam.  
Caryophyll. an. ʒss.  
Macis,  
Piper. longi,  
Zingiber.  
Cubebar.  
Cardamom.  
Gran. parad.  
Zedoar.

Sem. coriandri an. ʒi.  
M. f. pulvis.

Dosis ʒi. ad ʒss.

Egregiè convenit in affectibus stomachi, ubi obrutum est fermentum stomachale à cruditatibus.

Vel

**R.** Pulv. rad. ari ʒi.  
Arcan. dupl. ʒij.  
Olei destillat. menth. an. gutt. vi.  
M. f. pulvis, S.

Pulvis stomachalis: dosi quantum mucro cultri capis.

Huc pertinet etiam pulvis stomachalis Birkmanni, qui in ZWELFFERI Animadvers. in Pharmac. August. pag. 163. describitur.

Si anorexia ex vitio spirituum animalium & nervorum, ambra ejusque Essentia aliis stomachicis juncta singulariter convenit: item vinum, spirituosum & aromaticum: potissimum verò Essentia melissæ & pulegii, præprimis si juxta HARTMANNUM cum olei destillati baccarum juniperi aliquot guttulis, aut calami aromatici acutur: item Balsamus Peruvianus, si vel aliquot guttæ in haustu vini, aut cum saccharo propinentur, vel cum vitelloovi sorbi. lis assumantur, quod RIVERIUS in Pr. l. 9. cap. 1. ceu

expertum commendat; unde tinctura seu Essentia Balsami Peruviani cum tinctura tartaro parata, in hoc passu foret usurpanda. Egregium quoque est Elethuarium stomachale Paracelsi, cujus descriptio datur in Tom. 1. Oper. Nempe

**R.** Rob. juniper. ʒvj.

Pulv. Zing. b. ʒss.

Acori veri,

Macis an. ʒij.

Cubebar. ʒi.

Cum f. q. sacch. f. Elethuarium.

Dosis ʒi. ad ʒij.

Vel præscribantur condita sequentia polychrestæ, i. e. multi usus, in quamplurimis stomachi affectibus chronicis, pro senibus:

**R.** Rad. cicb. cond.

Scorzon. cond. an. ʒi.

Conf. menth. crispæ,

Abstinb. Pont. an. ʒss.

Fl. cicbor.

Rosar. rubr.

Anthos,

Pulv. Zedoar. an. ʒi.

Acori veri,

Cinnam. acerr.

Zingib. an. ʒi.

Mitbridat. vel Theriac. ʒij.

Cum f. q. syr. menthæ crispæ f. Elethuarium.

D. S.

Elethuarium stomachale.

Item:

**R.** Conf. Menthæ crispæ.

Abstinb. Pont. an. ʒss.

Ros. rubr. vel anthos ʒi.

Rad. cicbor. cond. ʒss.

Acori veri cond. ʒij.

Pulv. Zedoar. ʒvj.

Mag. corall. cum succo citri

Cinnam. an. ʒij.

Zingib.

Caryophyll.

Tinctura corall. an. ʒi.

Cum f. q. syr. menthæ crispæ f. Elethuarium irrorandum cum

Spiritu salis dulci.

D. S. ut antea.

Vel

**R.** Conf. ros. rubr. ʒij.

Menthæ ʒi.

Zing. in Ind. condit. ʒvj.

Acori veri cond. ʒij.

Spec. diatrion piper. diamosch. dulc. ʒij. vel ʒss.

Cum syr. flor. tunica f. Elethuarium.

Si expectantur Morsuli stomachales:

**R.** Conf. fl. anthos vel menthæ ʒss.

Rad. ari cond. vel Zing. cond.

Spec. mors. Imperat. vel pulv. stomach. Birkm. an. ʒij.

Extr. Zedoar. ʒss.

Cum f. q. sacch. in aqua faniculi vel menthæ sol. ʒviij. f. Morselli,

irrorandi cum oleo de Billato menthæ.

D. S.

Morsuli stomachales.

His adjungi possunt Rotula bibitoria Dodonæ, quas dedi in Collegio Formular. Class. 1.

Sin pingua aut biliosa præsternant appetitum, commodè prædictum Elixir proprietatis, tam solum, quam cum amaris mixtum, & remedia ex absinthio, usurpari possunt; quæ pinguedinem quamcunque potenter domant. In febribus, præsertim intermittentibus, ad revocandum appetitum amara talia, v. g. præter dicta, Elixir febrile Myns. sunt optima, quod Elixir videbitis in ejus Armament. Chym. pag. 254.

Si à Narcoticis prostratus sit appetitus, acida cum revocant.

Quod si verò, ut non rarò, v. g. in hypochondriacis, fieri solet, acidum præternaturale ventriculi appetentiam turber, absorbentia, v. g. lapilli cancrorum, creta, ebur &c. locum habebunt: item Elixir proprietatis sine acido; item cum spiritu salis ammoniaci paratum; Essentia absinthii tartarificata, spiritus salis ammoniaci, simplex & aromatizatus.

Nec



Nec *Externa* seu *Topica* ad anorexiam negligenda, sed sub linimentorum, epithematum, emplastrorum, &c. forma applicanda: inter quæ convenit crusta panis vinogenoso, vel acidulo vel malvatico, aut aceto, probe ebria, pulvere nucis moschatæ, macis, caryophyllorum, aliorumque aromatum aspersa, & ita instar scuti stomacho tepide applicata: item Elixir menthæ calidè cum frustulo panis intincto ventriculo impositum, applicando desuper laterem calefactum, admodum convenit, præsertim in spirituum defectu. Balsamum Anglicum ventriculo illitum mirè etiam appetitum provocat. Convenit etiam oleum stomachale Cratonis, mastichis, nucis moschatæ, menthæ, absinthii, caryophyllorum, Balsamum Peruvianum, tacamahaca, ceratum ex ladano, emplastrum stomachale Cratonis, Hartmanni, &c. E. g.

*℞. Olei expr. nucis. ℥ij.*

*Destillat. caryophyll. ℥j.*

*Absinth.*

*Mentha,*

*Juniperi an. ℥ss.*

*M. D. S.*

*Balsamus confortans stomachum.*

*℞. Empl. stomach. Hartmanni, vel de tacamah. q. s. Malax. cum Bals. Peruv. & inducatur super alut. sub forma scuti stomachalis,*

*D. S.*

*Emplastrum stomachale.*

Pellis vulturis similiter in forma triangulari stomacho applicata, est expertum remedium: Vidi ego aliquot experientias felicissimas, utut videatur ridiculum. Egregia quoque est *cera catholica Burbi*, cuius descriptionem communicavi in *Collegio Sobiæderiano P. 2.*

*Pergoad*

## CAPUT II.

### D E

#### APPETITU DEPRAVATO.

**Q**UOD attinet appetitum depravatum, est hic vel in appetendo, vel averfando. In appetendo est, si aliquid intensius, vel suetum vel insuetum, cum maximo desiderio appetunt, ut in *Pica & Malacia*: vid. SYLVIUS *Pr. lib. 1. c. 2.* Contrarium vitium est in averfando, si certum edulii genus averiatur, qui affectus speciali nomine caret. Vocatur aliàs *aversionis ciborum fastidium*, quando scilicet determinatè fastidiuntur cibi, v. g. omnimodè averfantur caseum.

## ARTICULUS I.

### D E

#### FASTIDIO seu AVERSIONE DETERMINATA.

**F**astidium hoc seu *Aversio*, est vel *nativum*, vel *adventitium*: ita, ut *nativum* non tantum per dispositionem hereditariam à parentibus in prolem peragatur, sed frequentius à matris imaginatione dependeat, ob quamcunque causam gestationis tempore pro ingratum iudicata, alimenta averfantis: *Adventitia* verò post nativitatem excitatur:

1. Vel à mero quodam præiudicio, hæc vel illa alimentum pro ingratum habente.
  2. Vel à alimentis ipsius, in nimia copia vel ad nauseam oblatis, vel iisdem non satis mundè paratis vel oblatis.
  3. Aliquando verò ab humorum, e. g. vitiosorum, ventriculi fermentum corruptentium affluxu, ut in gravidis sæpe observatur, quorum indolem explicare difficile est, nisi ex aliis conjunctis symptomatibus eam forsan augurari liceat.
- Cum autem rariùs occurrat in Praxi, consideremus potius

## ARTICULUM II.

### D E

#### PICA ET MALACIA.

**P**ica in genere est appetitus ita depravatus, quando quocumque tempore inusitata penitus appetuntur; Malacia verò est appetitus quidem nimius, utualium tamen, ita ut usitata, sed cum nimis intenso appetitu seu desiderio appetantur, unde & interdum plus, quàm conducit, comedunt. Sic v. g. Pica est, quando gravida appetit insuetam, e. g. crudas animalium carnes, condimenta & medicamenta in majori quantitate, e. g. Zingiber & Theriacam: vid. PLATERUS *Obs. pag. 330*: imò planè absurda, v. g. carbonem, cespites, corium, atramentum, cretam, plumbum: vid. TULPIUS *lib. 4. Obs. 43.* SALMUTH *C. 2. Obs. 62*: imò stercorea: vid. BORELLUS *Cent. 4. Obs. 2*: vel noxia tandem, ut calx viua &c., quod refert FERNELIUS. Malacia verò est, quando certum edulii genus, v. g. haleces: vid. TULPIUS *lib. 2. Obs. 24*: & alios cibos & potus usitatos, sed utrumque appetitu nimio & inconveniente, appetunt: patiuntur sæpe anxietates præcordiorum, languorem universi corporis, & superuenit vomitus variorum humorum.

#### SUBJECTVM PATIENS seu PARS AFFECTA.

*Pars affecta* primaria ordinariò statuitur stomachus, imprimis orificium sinistrum seu superius, ejusque fermentum: Vbi enim fundamentum est, & quasi residet appetitus naturalis, ibi quoque residet præternaturalis & depravatus. Sed si rite rem consideremus, manifestum evadit, distinctum in hoc morbo complicato esse subjectum patiens: appetitum nempe læsum & Phantasia depravatam, gustum, odoratum, auditum, seu horum sensuum organa.

Phantasia affici, ex eo certum est, quod homines, dum stomachus appetitu sensili, ut sic dicam, afficitur, seu à fermento digestivo vellicatur, ferantur singulari affectu in tam varia, ut sunt creta, corallia, murorum calces, carbonem, atramentum, &c. Namque non stomachus seu fermentum præcisè, sed phantasia est, quæ determinat appetitum ad hoc vel illud, e. g. in Pica. Objectum quidem stomachum stimulat, sed hic non declarat: sicut enim in fame, præter vellicationem ventriculi, phantasia concurrere, ex Physiologicis suppono; Ita non vellicatio prava, sed phantasia prava, quæ appetitum animale regit, objecta determinat, & uti aliàs melancholici feruntur in certa objecta, fictiles ægroti incidunt in objectum cum edulitiis, in quod feruntur: Ergo & utique phantasia vitium habet. Si inter fermentum stomachi, ejusque in nervos operationem, & inter appetitum hinc consequentem animale, intercedit intermedium phantasie opus, necesse est, ut prius phantasia, quæ id, quod à reliquis sensibus externis & interno communi susceptum fuit, componendo & dividendo quasi actu perficit, pravè afficiatur, à quacunque causa occasionali fiat, quæ tamen frequentissimè in ventriculo fomitem seu nidum sibi eligit: Adeoque Pica & Malacie sordes primaria in facultate animali, i. e. subjectum inhaesionis in spiritibus animalibus erit locandum.

Quod gustus afficiatur, certum est ex eo, quod aliæ quæque res fætidæ & pessimi saporis, & à quibus in statu sano ægri maxime abhorrent, cum insigni voluptate deglutiantur; quin & interdum dicant, habere talia suavissimos sapores. Exemplum videbitis in SALMUTH *C. 3. Obs. 62* de virgine, quæ omnia candida, & inter alia etiam calces parietum abrasas, ac cerussam, singulari voluptate devoravit, & earum deprædicavit suavitatem ac dulcedinem. Hic certum est, fuisse depravatum gustum, calx enim est admodum acris, At BORELLUS *Cent. 4. Obs. 2* habet exemplum de Virgineicante, quæ stercorea humana comedit, quæ non sunt adeo stipida, & tamen cum insigni gustu appetita deglutivit: unde certum est, affici gustum sine dubio à lymphæ salivæ corruptæ, & gustum depravante, quia aliàs stulti ingerere non possent. Res illustrari potest ex eo, quod suppressio mensium in mulieribus creberrimè det Picam, quando scilicet sanguis sepa-



separatus, in vasis uteri, ab externa vel alia causa coagulatus, stagnans inquinatur, indeque ad corruptelam sui tendens, ob denegatam excretionem sensim sensimque regurgitat in totam massam sanguineam; unde consequenter & afficitur lympa, quæ, uti per internam tunicam stomachi glandulosam transudando, ad supplementum fermenti digestivi concurrat, ita eadem spirituum vehiculum salivæque materia existit. Dum igitur saliva infecta est, non potest non lingua simul affici, & gustus depravari, unde saliva non minus, quàm fermentum stomachi vitale, simul affectum est in Pica. FRACASSATUS equidem in *Epist. de Lingua* pag. 255. gustandi hanc in Pica depravatam voluptatem à papillis nerveis vitiatis in lingua deducere nititur: sed ego consultius puto, si fundamentum constituitur in saliva.

Afficitur etiam odoratus, quatenus res foetidæ cum singulari jucunditate naribus admoventur. Exemplum affecti odoratus habet SALMUTH C. 2. *Obs.* 62 & 63. de virgine picante, quæ insigniter delectabatur à fœtore veterum librorum, à tineis blattisque erosorum, situque prorsus corruptorum, ita ut pares per totos dies in tales libros immitteret, & odorem suavem, uti dicebat, hauriret. Item BORELLUS citato loco aliud exemplum habet de virgine picante, quæ intensissimè afficiebatur odore corii, tanquam balsamo; quare semper in ore detinuit & masticavit, ut perciperet odorem suavem, quæsitivæque calceos vetustissimos, quorum odorem foetidissimum moscho & ambra comparavit.

Hæc probant esse non simpliciter affectum stomachum, sed insimul phantasiam spiritusque animales, & hinc gustum & odorem, cæteraque sensoria. Id quod ulterius confirmatur ex eo, quod picantes non præcisè in alimenta ferantur, aut in talia, quæ alimentorum loco ab iis ingeri possunt; sed etiam in alia aliorum sensuum, non præcisè gustus aut tactus in stomacho, objecta: v. g. dum pica impellit mulierem ad exsuctionem venti ex follibus, vel dum alia per picam appetit fragorem carbonum fossilium pedibus contritorum. Qualia exempla cum præcisè ex stomacho, secundum certam famis vel sitis modificationem affecto, non oriuntur, (conf. *Actu Societ. Reg. Volum. 1. pag. 447.*) distinguendum ergo videtur inter subiectum Inflammationis, quod reverà stomachus, & objectum Denominationis, quod est facultas animalis, ratione spirituum animalium in phantasia alteratorum.

### CAUSÆ.

Quod attinet *causam appetitus talis depravari*, certum est, hæc esse in fermento digestivo stomachi: Nam sicut in genere appetitus oritur à fermento stomachi digestivo vitali naturaliter ritè constituto; ita in specie etiam ab eodem alterato appetitus vel auctus vel depravatus in Pica & Malacia originem ducit. Videmus enim quod omnia animalia habeant in suo genere determinatum stomachi fermentum digestivum, ratione cuius fermentum istud se habet, seu appropriatum agens mentium in objecta appetita, ac sub illo certo modo determinetur eorum appetitus; hinc unaquæque species fertur in cibum certum; sic canis appetit ossa, scyurus fructuum nucleos, felis murres, ciconia ranas, asinæ avem, bos gramem, carduelis carduum, homo panem, &c. nulla alia est ratio, nisi quod activitati suæ appropriatum objectum postulet specificum in illis stomachi fermentum. Unde simili ratione Pica & Malacia oriri videtur; nimirum dum certa ratione alteratum & determinatum est fermentum stomachi, ut in insueta & singularia, nunc hoc nunc illud, v. g. creatam, carbonem, arenam, atramentum, &c. ardentem feratur. Sed in quo consistat ista specificatio fermenti, ut in singulis speciebus certo modo determinetur, & ita in unoquoque speciei individuo appetitus determinetur ad hoc vel illud? à priori adhuc est imperscrutabile. Ideæ certæ spiritibus impressæ, quas hic habere volunt nonnulli, & intellectu & explicatu sunt difficillimæ, utut nativæ quorundam ciborum appetentia per certam spirituum in utero matris alterationem facili & accuratè explicari queat.

Queritur: in quo consistat alteratio & depravatio determinati fermenti stomachalis? Res est ardua. Probabile videtur, hoc ratione causæ occasionalis, ut plurimum in ventriculo existentis, acquirere singularem acrimoniam, eamque acrem salivam, plus minus corrosivam, cujus occasione

tam determinata & sensilis sit vellicatio, pro cuius varia impressione in orificium stomachi phantasia exinde decipit, tam varia edulia, aut quæ horum loco ingeruntur, imò & subinde ridicula, appetit. Depravationem istam fermenti quoad occasionales causas confirmant exempla eorum, qui ex scabie retropulsa Picam cretæ inciderunt: vid. M. A. N. C. *Ann. 1. Obs.* 83. pag. 299. item FEHR Tr. 40. *alibi* 1610 pag. 98. Sic cum scorbuto interdum Pica & Malacia complicari solet, de quo vid. HORSTIUS *Obs.* pag. 395. l. 7. *Obs.* 35. Illustrat etiam istud assertum HILDANUS *Ce. turia 1. Observatione* 37. dum refert: Picam obortam ex ulcere faucium, in quo pus generatum; unde appetebantur haleces, pisces, & carnes salitæ & infumatæ, & similia falsa, quæ optimè deglutiebantur; res non appetitas verò, iuscula, &c. fastidiebant, & nullo modo deglutire poterat, dum interim superiora, licet graviora & morbo nociva, sine ullo nocumento bene digerebat. Fundamentum consistit in hoc: nempe ex ulcere faucium exstillans pus in stomachum, alteravit ejus fermentum digestivum, istudque pro natura puris acrioris acido-salis singularem impressionem fecit in orificio stomachi, & ad commellionem halecum & similibus salitorum quasi stimulavit; ut exinde talis inordinatus, determinatus tamen, appetitus fuerit. Hinc & mensium suppressio in mulieribus, in quibus vitiosum abundat acidum, frequentissimè Picam infert, alterando sanguinem, lympham, & his mediantibus consequenter etiam salivam, & ipsum stomachale fermentum.

In specie malum hoc frequentius observatur in mulieribus gravidis, quanquam his non solum: RIVERIUS tamen curiosum exemplum habet C. 4. *Obs.* 93. de sele aliquando picante, non quidem gravida, sed etiam sterili, quæ devoravit calcem, carbonem, & similia: sed cum hæc fuit gravida, potius liquor genitalis, vel aliud simile excrendum corruptum & suppressum, occasionem malo suggestit: sic pica simile exemplum de cane venatica gravida videb. in *Actu Societ. Reg. Volum. 1. pag. 447.* Non tamen hoc universale esse, probare possunt & confirmare similiter puellæ adhuc impuberes picantes: v. g. pica in puella 8 annorum observata in M. A. N. C. *Ann. 4. Obs.* 143. pag. 150. Sic pueri, item infantes picantes, subinde observantur, imprimis ex matre chlorosi laborante, quod testatur RIVERIUS in *Præxi*, & PETRUS JOHANNES FABER, qui in *Cusat* 62. habet exemplum de proprio filio 3. annorum picæ laborante, qui arenam, cineres & terram efflagitare, & magno cum crepitu iis vesci solitus fuit, lac verò & alios cibos omnino respuit. Conf. etiam M. A. N. C. *Ann. 6. Obs.* 139. pag. 202. FORESTUS libro 18. *Obs.* 7. & FONSECA l. 7. *Obs.* 91. in *Schol.* habet exemplum de pueris, crustas & calces parietum avidè deglutientibus. Gravidæ ergo non solum, sed & steriles hoc vexantur malo; aliæ etiam mulieres, sæpe virgines, quibus mensstrua suppressa, quorum exempla specialia prostant in FONSECÆ *Observationibus*. Nec mulieres tantum, sed etiam viri non rarò picæ & malaciæ laborare deprehenduntur: Nam sicut certum est, laborare viros affectu suffocationi hysterica simili; ita etiam prostant exempla virorum similiter picæ laborantium: Exemplum multa videbitis in SCHENKII *Observat.* l. 3. *Obs.* 1. pag. 319. ubi de Pica: Ut nihil dicam de curiosa observatione, quam habet BARTHOLINUS *Cent. 5. Hist. Anat. Hist.* 79. de marito picante, nauseante & vomente, cujus conjux gravida nausearet & vomeret: simile exemplum vid. in M. A. N. C. *Ann. 2. Obs.* 215. pag. 216. & MARCELLO DONATO in *sua Hist. Med.* l. 5. c. 1. Quod si intensior sit picantis matris gravidæ appetitus, malum hoc non rarò est hæreditarium: quale exemplum habet FONSECA l. 2. *Consil.* 29. de puella 14. annorum, quæ à tenera ætate infantili calcem parietum, & laterum fragmenta sæpè appetit, & deterreri nullo modo potuit: Ratio, quia mater gravida quoque testas & calcem comedere solita fuit; unde caractere hæreditario affecta fuit. Quod etiam facit historia, quam habet TULPIUS l. 2. *Obs.* 24. Novi hic mulierem, quæ impensè delectata cuspidibus acutis cretæ, cujus mater gravida Melancholiâ hypochondriacâ correpta, his delectata fuit.

Ex his patet solutio binarum controversiarum: Nempe I. an in pica appetantur omnia? an verò contraria? id est, an appetantur ea, quæ oriuntur cum fermento stomachi? an verò, quæ non oriuntur? Resp. cum videamus tales egros appetita avidè sumere & digerere sine noxa, patet, quod



quod similia tanquam grata à stomacho appetantur, i. e. appetunt ea, quæ sunt similia, & quæ se habent ut objecta convenientia ad activitatem fermenti stomachici vitiati, seu in quæ possit agere & digerere; reliqua omnia, quæ non potest solvere, respuuntur. Uti enim acidum esurinum naturaliter constitutum fertur saltem in appropriata sibi, seu in quæ commodè agere potest; ita istud simili modo in præternaturali ejus alteratione, inconfusa & singularia ardentè appetit; & quidem talia saltem, quæ ipsi sunt quasi similia, aut quæ promptè potest digerere.

Hæc deinde manu nos ducunt ad resolutionem II. *Questionis: An in pica, quando subinde extraordinaria ingeruntur, hoc ne fiat sine aut cum nocimento ægri?* nam ex talibus assumptis, cretæ aliorumque usu, prostant exempla, quod devorata sint hæc insueta & inordinata, & tamen non nocuerint. Respondetur: sicuti in ordinario victu sobrietas est cardo diætæ, & alimenta etiam non optima moderate assumpta conducunt, immoderate verò nocent; ita pariter in pica rarò nocent talia assumpta, licet insolita, modò sobriè nec nimia quantitate ingerantur, à quibus non appetitis non levis aliàs contingeret læsio; hinc enim æger picans sæpè aliquot cochlearia Theriacæ, aliaque mulier & Zingiberis, devoravit sine ulla insequente alteratione & noxa, teste PLATERO *Obs. l. 1. pag. 223.* Quod facit Observatio TULPII *lib. 2. cap. 24.* de muliere gravida; quæ gestationis tempore 1400. haeceres, sed non unà vice, devoravit sine noxa: Item stupendum est exemplum, quod habet PLATERUS *l. a. pag. 240.* de puella, quæ cepam sub cineribus coctam Theriaca impletam (quæ antea buboni pestilentiali fuit imposita) sine noxa devoravit, cum tamen certum fuit, cepam veneno fuisse imprægnatam: sic Medicus quidam Gallus, de la FORGE, in *Comment. Super Cartes. de Homine pag. 285. & 286.* refert exemplum de puella picante, quæ comedit lapides, qui tamen fuerunt gratiores, quando prius ad tempus radiis lunæ expositi fuerunt. Ac sanè plurima talia prostant exempla absurdorum & noxiorum sine incommodo assumptorum: Sic LINDEMANNI uxor, Melancholiæ hypochondriacæ laborans, araneas majores, *Kreutz Spinnen*, ubique locorum anxie collegisse ac devorasse innoxie, dicitur. Fermentum enim fertur in similia, & determinat assumenda: quod sapit, non nocet, quia digeruntur, modò servetur dosis: si nimium devorant appetita, nocent. Si igitur assumuntur ordinatè, nec unà vice nimis copiose, non nocent. Aliàs optimi etiam cibi in statu sano inordinatius ac copiosius assumpti, etiam sunt venena.

Ex hæcenus dictis definiri potest Pica, quod sit appetitus variarum rerum absurdarum, ex phantasia corrupta, quacunque occasione vitiata, originem ducens. Adeoque sub hac latitudine subiectum Pica erunt spiritus animales, vel vitiati, vel vitiatè moti, quatenus exinde opus phantasie depravatur, ut crebrior occasio sit ex ventriculo & hujus fermento alterato, ubi subiectum Radicationis erit.

*Causa proxima* erit vitiatus spirituum motus, quatenus phantasie munia turbat.

*Causa remota occasionalis* est multiplex, mensium defectus, gravidatio, fermenti digestivi alienatio, & quæ sunt aliæ plures circumstantiæ, semper hic probè observandæ.

Uno nomine: videtur Pica & Malacia revera esse species Melancholiæ hypochondriacæ, quia ejusmodi homines alia ut plurimum melancholiæ signa præ se ferunt, in qua ad certum quoddam phantasma, occasione fermenti stomachalis præternaturaliter alterati, dirigitur imaginatio; unde & tam delirus appetitus, & desiderium ad certum quoddam edulium, vel hujus loco aliud quid inusitatum assumendi, supervenit. Uti enim melancholici tales feruntur in certum objectum, si putant v. g. se esse cucurbitam, uti exemplum novi: ita picantes habent phantasma depravatum, quod velint habere atramentum, edere coriû cum lana, &c. Hinc & cura eadem, phantasiam nempe saltem demulcendo, ac in melancholicis nonnunquam fieri solet, in hoc malo faciliè instituitur: vid. Panarollus *Pentec. 3. Obs. 38.*

Nempe tali casu

- (1.) Imprimis stomachus evacuandus.
- (2.) Fermentum vitiatum acrius acido-salsum factum, saturandum, imprimis per Martialia, vel per alia appropriata alterandum; Et
- (3.) Stomacho acidis moderatis & ipsi gratis succurrendum.

*Bermull. Oper. Tom. II.*

## SIGNA.

Quod attinet signa: res est clara, quoad diagnostica.

Quoad Prognosin: distinctè paululum & circumspicte pronuntiandum: Nam citra noxam possunt comedi res appetitæ, sed sobriè: melius tamen est consueta, quam plane inconfusa, imò noxia, appeti. Quamvis enim feminas talia præternaturalia sæpius sine damno assumplisse observatum fuerit; quatenus tamen ex copioso rerum absorptarum esu tractu temporis pravi tandem humores inde generantur, hincque sunt corporis languor, cacochymia, hydrops, &c. potissimum cum vix semper sine noxa talia assumant, sed ab illis vel ad vomitum urgeantur, vel alia mala patientur: quale quid, præter SALMUTH *C. 1. Obs. 41.*, BRASSAVOLUS in *Comment. Sect. 5. Aph. 24.* de muliere testatur, quæ mota desiderio assumendi glaciem, in gravia incidit symptomata.

In prægnantibus imprimis observandum: eas denegationem rei appetitæ non semper ferre posse, quia per hanc fœtus non saltem variâ ratione defœdentur; vid. PANAROLLUS *Pentec. 1. Obs. 12.*; sed interdum trucidantur: Cum notum sit de muliere, quæ duabus vicibus dentes in pectus cujusdam viri immittere, atque sic binis moribus petere gessit, qui vir autem primum quidem morsum per tulit, alterum verò recusavit: unde factum, ut duos filios in lucem ediderit, unum viventem, alterum mortuum. Jucundius exemplum habet SALMUTH *C. 1. Obs. 41.* de muliere gravida, quæ picâ laborans summam habuit libidinem vellicandi barbam lanionis, unde magnam partem illius evulsit; quod etiam alterâ vice fecit; tertiâ verò vice lanio denegavit: hinc peperit tres fœtus, unum mortuum, & duos vivos. Unde vel ipsis connivendum, vel quantum possibile persuasionibus ad saniores mentem deducendæ. Interim rectè PANAROLLUS *Pentec. 2. Observat. 50.* inquit: *Temperantia mulieribus picâ laborantibus optimum remedium.*

## CURA.

Quoad Curam: suprà jam formatæ fuerunt indicationes, & cum præsertim Pica & Malacia in stomacho fundata sit, remediis stomachicis curanda venit. Ante omnia evacuandus stomachus vomitorio. Obseruetur tamen status ægri: *An subiectum pa. iens sit gravida? an verò nor?* In gravidis cautius vomitus prouocetur; nempe iis saltem, quæ faciliè vomunt, & adhuc in primis versantur gestationis mensibus: in ultimis, quarto, quinto & sequentibus mensibus non sine periculo propinantur: Ergo tunc cautius discamus mercari. Vomitoria suprà in generalibus dedi. FABER pro vomitorio utitur sale vitrioli vomituo, ut & Infuso Mercurii vitæ: sed Mercurius vitæ tutius exhibetur, quàm sal vitrioli vomituum, ex eo, quoniam hoc tantum est vitriolum ad albedinem calcinatum, hinc inimicissimum stomacho, cujus robur atque vires delicit & prosternt: Mercurius vitæ per se est satis tutus. Nec inepti sunt, qui cum desideratis vomitoria miscent, aut hæc illis superbibere jubent; sic enim præsentia rei exhibite ejus desiderium tollit, & humor praus simul euacuatur: vid. SENNERTUS *Pr. lib. 3. S. 2. c. 5.*

In vomitione autem respicienda estabilitas subiecti, prout inclinant ad vomitum: si picantes ad vomitum non apti, aut circumstantiæ quædam vomitum prohibeant, Purgantia per inferiora administranda, & quidem mitiora ex pilulis, præprimis aloeticis; quibus admiscendum est aliquid Mercurii dulcis ritè parati: aut parentur pilule, quas superius dedi. AGRICOLA miscet cum Extracto hellebori nigri, purgando mulieres non gravidas, ex mensium suppressione Picâ laborantes, hoc modo:

*R. Mercurii dulc.  
Extract. helleb. nigr. an. ʒß.  
Colocyth. gr. j.  
Cum succo cydonior. f. pilula, S.  
Pilula laxativa.*

Vel

*R. Mercurii dulc. ritè par. ʒj.  
Extr. helleb. nigr. gr. xv.  
Troch. alband. gr. ij.  
Cum ess. mentha f. pilula, S.  
Pilula laxativa.*

C 4

Con-



Conueniens quoque est, ut Purgantia propinentur simul cum re appetita, imprimis ut fallantur ægri: v. g. in appetentibus cretam aut arenam, aut calcem vivam, optimum est, ut cuncta permisceantur mechoacanni albâ, vel pulvere jalappæ, aut similibus.

Quod si verò totam humorum massam malè se habere exsignis innotescat, juxta SYLVII *Praxin lib. 1. cap. 2. §. 51.* sudores quandoque blandos per antimonialia mouere conuenit.

Præmissa Evacuazione opera danda, ut alteretur vitium in ventriculo, ac corrigatur labe fermento stomachi digestivo inducta, quod fieri nequit, nisi causa istius remoueat. Hinc si v. g. menses suppressi sint, revocentur: si aliquid affectionis hypochondriacæ subsit, hæc tollatur. Hinc dentur stomacho grata & appropriata acida blanda, spiritibus volatilibus nonnihil temperata; sic enim fit, ut acor fermenti naturalis reducat, & appetitus depravatus corrigatur: quæ inter in regno vegetabili excellunt succus & syrupus cydoniorum, limonum seu citri, aurantiorum, granatorum acidorum, &c. quoniam sunt singularia stomachica. Specialiter etiam commendatur à quibusdam contra picas aqua pampinorum vitis, primo vere ex vitium surculis incisis exstillans, quæ est imprægnata subtili tartaro, seu aciditate volatili, ratione cujus corrigit ventriculi labem, & appetitum reducit Usurpetur solitarie, vel conuenienter etiam diluatur cum spiritu theriacali, vel aqua in Julebis. FORESTUS *l. 18. Ob. 17.* puellam picantem curavit per syrupum de absinthio sæpius usurpatum, propinando postmodum purgans ex foliis fennæ. Commendantur etiam cappares cum aceto conditi ceu experti, quibus nonnunquam etiam solent addi semina carminativa, anisi, sceniculi, carvi, &c. Essentiam corticum aurantium cum essentia croci paxillo, in pica à menstruorum suppressione adhibuit cum successu Quercetanus imitatus Fermisius: vid. VELSCHIUS *Mittom. Cent. 3. Obs. 12.* Radices petroselinii cum Decocto cicerum propter vim diureticam præmissis vomitu: Haustus vini generosi itidem conducit, quoniam in vino singularis vis est restaurativa stomachi, imprimis si sit insusum super folia menthæ vel portulacæ, & Herb. absinthii. LINDANUS in *Coll. super Hartmannum* specificè commendat conservam rosarum cum spiritu vitrioli acidulatam; cui addit pulverem Zedoariz in hac forma;

*R. Conf. rosar. ʒj.  
Pulv. Zedoar. ʒj.  
Spiritus vitrioli q. f. ad grat. aciditat.  
M. f. Electuarium, S.  
Electuarium stomachale.*

De hoc subinde aliquid assumitur ter de die, maneo meridie, & vespere: continuetur tamdiu, donec cesset affectus, nam dicit esse expertum.

Loco conservæ rosarum melius esset, si reciperetur *conservam menthæ crispæ vitriolata*; nam est singularis in hoc affectu: v. g.

*R. Conf. menthæ crispæ vitriolat ʒiv.  
Pulv. Zedoar. ʒj, ʒiv, ʒiss ad ʒij.  
Syr. cydon. simpl. vel aromatiz. q. f.  
f. Electuarium.*

De quo sæpè æger capiat pro lubitu.

Item conuenit aqua cinnamomi cydoniata, vel sola, vel cum Elixir menthæ imprægnata, & acidulata cum tantillo spiritus vitrioli Philosophici; v. g. præmissis præmittendis fiat *mixtura stomachalis* talis:

*R. Aquæ menth.  
Meliss. cum vino an. ʒiss.  
Succ. cydon. ʒj. vel bujus & succi citri an. ʒss.  
Elix. menthæ ʒss. ad ʒvj.  
Spiritus salis dulc. ʒss.  
Syr. de succo cydon. pro lubitu.*

(nam syrupi non bene præscribuntur in magna dosi propter admistum saccharum.)

*M. f. Potio. S.  
Mixtura stomachica.  
R. Aquæ menth.  
Meliss. cum vino an. ʒj.  
Cinnam. cydon. ʒij.  
Elix. menthæ ʒj.  
Succ. citri,  
Cydon. an. ʒss.  
Spiritus salis dulc. ʒj.*

*Syr. cydon. ʒj. ad ʒiss. vel q. f.*

*M. f. Potio.*

*R. Aquæ menthæ  
Meliss. an. ʒj.  
Succ. cydon. ʒvj.  
Elix. menthæ,  
Syr. cydon. an. ʒij.  
M. f. Potio.*

*R. Aquæ menthæ  
Meliss. an. ʒj.  
Cinnam. cum vino vel cydoniat. ʒvj.  
Succ. cydon. ʒj.  
Spiritus salis dulc. parum.  
M. f. Potio.*

De his misturis capiantur subinde cothl. aliquot.

Succi si beneficio sulphurationis à fermentatione præseruentur, 100 annos durant.

SYLVIIUS in *Praxi*, modernorum commendare solet salia volatilia, non communia, sed oleosa, seu oleis vegetabilium imprægnata: Sed cautè adhibenda, quoniam sunt generosa nimis, & metus est, ne aliquando causent abortum.

Imo Narcotica quoque, v. g. Theriaca & Mithridatium, magnarum observantur virium.

Interdum in grauiori malo, imprimis grauidarum, saturandum & absorbendum est fermentum acre in stomacho; unde ad pulveres cachecticos & Martialia confugiendum est: (vid. BRENDLIUS *Consil. 103.* Ideo RIVERIUS *Cent. 4. Obs. 93.* specificè commendat pulverem thomachalem Quercetani seu Birkmanni completum, qui vid. in SCHROED. *Pharmac. l. 2. pag. 266.* & ZWELFFERI *Animadv. in Pharmac. Augusta am.*) nec non crocum Martis aperitivum, & hunc expertum dicit in Pica mulierum, ex quacunque causa orta. Dantur & alii pulveres cachectici, quorum basis est Mars, loco cujus etiam corallia, terræ, perlæ, mater perlarum, ebur, & similia absorbentia, fermentum saturantia, adhibentur: quibus præmissis purgatio per pilulas Mercuriales instituenda venit.

Quæstio est: an venæ sectio conueniat i picantibus grauidis? In quibus ob mensem suppressionem hic affectus venit, etiam conueniat? Ratio dubitandi oritur, quia in talibus ex mensum suppressione talis supervenit. Equidem de iis, in quibus menses suppressi, dubium non est, quin saphæne sectione, suo tempore instituta, multum adferatur auxilii. Interim non opus est, ut præcisè venæ sectio semper in tali affectu administraretur, nec nisi plethora aliæ indicantia adsint, quæ venæ sectionem suadeant, cum natura per hæmorrhoidum fluxum quendam liberaverit; Nam venæ sectio per se opem non fert. Sic enim refert RHODIUS in *Cent. 1. Obs. 57.* de quodam, qui scabie sedatus, & malaciâ insigni laboravit, & curatus fuit solo hæmorrhoidum fluxu. Facillius autem is curari potuit: nam hic fluxus salutaris fuit, venæ sectio verò non ita. Unde si tentandum esset aliquid in tali affectu, ad naturam Melancholiæ hypochondriacæ accedente, hirudinum ad hæmorrhoides applicatio interdum utilis videtur.

Ulterius observetur in grauidis, ne inferatur noxa sætui, eas non semper denegationem rei appetitæ ferre possent; si enim denegatur ipsis res appetita, læduntur infantes. Ex tali casu observavit SCHOTTUS in *Phys. curiosa* puerum à pane abhorrentem, ex vitio matris, cui picanti denegatus fuit panis. Aliud MARCUS MARCI refert de ideis: Grauidam scilicet cum appetitu summo usam fuisse carpium capitibus, increpata ab hoc, aversata fuit, ediditque puerum, cujus dimidia pars capitis fuit instar capitis carpi: Vid. porro SALMUTH, qui jucundum habet exemplum C. 1. *Hist. 34.* Si res appetita à muliere non planè contra naturam est, e. g. arsenicum, & haberi potest, concedatur; non verò in nimia dosi. Interim imitemur artificium PANAROLLI, ut nempe persuasionibus & fraude defraudentur, i. e. modò ægri desiderii ad stipulando, modò vel directè vel indirectè eadem detestando. Erat autem tale: Habuit puellam 12 annorum, devorantem corium inauratum, persuasit ei, pessimum habere saporem, ilinuit Decocto colocynthidos cum particula aliæ fortidæ; percipiens saporem, spontè cessavit: vid. *Penec. 3. Obs. 38.* & 50. Si verò res non possit haberi, tunc maximè, juxta persuasiones rationales, dentur dicta saturantia, fermentum stomachale & acidum stomachi ritè restaurantia. Item huc spectant vomitoria, ejusmodi absurdis commixta, quatenus his etiam abo-



abominatio quædam rerum desideratarum, dum ventriculo ingrata censentur, excitatur.

## ARTICULUS III.

## D E

## FASTIDIO ALIMENTORUM.

**V**ld. SYLVIUS *Prax. libr. 1. cap. 3. pag. 33.* Contrarium verò vitium modò explicatis affectibus est *Fastidium alimentorum*, quod est nausea & horroris seu aversionis species.

## CAUSÆ.

Aversatur autem ventriculus, quæ ipsi sunt nociva, dum huius fermentum pinguedine viciatum est, sive sint assumpta pingua, sive cruditas nidorosa, sive saliva biliosa, stomachum lædens: sicut etiam ingentium, seu ex certa læsione superveniens fastidium, semper præsupponit præcedens nocumentum: v. g. fastidit & horret virgo cinnamomum, quia antea cum hoc larvatus fuerit pulvis purgans violentus, à quo stomachus admodum fuerat læsus. Præ cæteris frequentius horrent ægri febricitantes carnem, quia læduntur ab ejus assumptione, quatenus non digeritur, sed in cruditatem nidorosam, & in liquamen amarulentum, degenerat, à quo offenditur ventriculus. Horrent ægri tales cerevisiam lupulata, partim propter amarorem, cum tales ægri subinde de molesto amarore in ore, aut de fructibus nidorulentis conquerantur; partim quod non digeratur, sed & ipsa facile nidorem hostilem contrahat: Unde vel aquam vino temperatam, vel cerevisiam secundariam desiderant, cum talia facile transceant, & suavi subacido sapore amica sint stomacho. Observavi exinde, quibus ægris adhuc cerevisiam bene bibentibus, crebrius propter urgentia symptomata, & repetitè, exhibitum fuit opium, granulatim licet, quod exinde horrorem cerevisiæ contraxerint, propter nauseosum opii amarorem, ventriculum offendentem. Hinc quibus amara dantur purgantia, resinosa præsertim, ut siti subinde urgentur, ita cerevisiam ferè horrent, aquosa vel acidula ferè appetentes: Ob id Julepi aciduli tam grati sunt talibus. Ob id, quamdiu cerevisia bene sapit quibusvis in morbis, præsertim acutis, bonum signum esse solet. Abstemiam à vino videb. in *M. A. N. C. Ann. 4. Obs. 103: à pane Ann. 6. Obs. 158.*

## CURA.

Ad restaurandam autem suavitatem & facilem assumptionem cerevisiæ & carnis, nil melius observavi, quam Elixir proprietatis Paracelsi ritè paratum & propinatum; Ab hoc enim adhibito appetitus talium redit, eoque curatur fastidium. Absinthium, uti etiam remedia ex mentha, imprimis Elixir menthæ, cum spiritu acido quodam acidulatum: hinc cydoniata, succus seu vinum, & syrupus cydoniorum, cydonia condita, & similia, optimè conferunt.

Substituimus in affectibus, qui pertinent ad appetitum, quos inter restat

## CAPUT III.

## D E

## APPETITU NIMIO.

**A**ppetitus nimius est, quando augetur, ita ut plus quam naturæ legitimus cursus permittit, appetamus. Hæc duplici vocatur nomine: uno *Appetentia canina*; altero *Bulimus*.

## ARTICULUS UNICUS.

## D E

## APPETENTIA CANINA ET BULIMO.

**A**ppetentia canina, vulgò *Heishunger*, dicitur à similitudine canum: quoniam taliter affecti alimenta non

comminuunt, sed copiosè deglutunt, interdum etiam evomunt, instar canum. Bulimus verò, vulgò *Lupi stomachum habens*, vox Græca ratione compositionis, à *Simultum*, & *Simus*, i. est voracitas nimia, denotat ingentem famem. Dicitur *Bulimus* ideo, quia Græci consueti omnibus rebus insignioribus vocabulum *Sim* præposuerunt: vid. VOIGT *de albed. nivis pag. 100.* Vulgò quidem appetentia canina & Bulimus confunduntur, & pro eodem affectu habentur: sed male. Hæc inter autem talis est differentia: appetentia canina est continua, inordinata, & ferè inexplebilis fames, quando ægri instar canum avidè ingerunt alimenta intensè appetita, quæ aut promptè digerunt, aut, quod frequentius contingit, denuo indigesta evomunt. Bulimus verò est tam intensa fames, per intervalla saltem recurrens, ut ægri ob id etiam propter stomachi officium superius molestius affectum, per ejusdem consensum animi deliquium patiantur: vid. SENNERTUS & RIVERIUS. Non tamen semper cum canina appetentia conjunctus est vomitus, ut testatur observatio SENNERTI l. 3. Pr. P. 1, Sect. 2. c. 4. pag. 101. Bulimus verò est ingens fames cum lipothymia seu defectu animi conjuncta.

## SUBJECTUM.

*Subjectum morbi* sine dubio est officium stomachi sinistrum.

## CAUSÆ.

Causa autem appetitus aucti, tam in Bulimo, quam appetentia canina, est vel in vel extra ventriculum. In ventriculo causa proxima est succus acidus vel nimis corrosivus in stomacho residens, isque volatilis vel penetranter activus, adeoque non à materia viscida irretitus seu fixus, sed subtilis & quasi spirituosus in stomacho, officium sinistrum insigniter vellicans seu morficans: in quo ipso omnes omnino Medicorum sectæ conveniunt. Veteres enim, dum producunt succum Melancholicum, hoc ipso succum acidum in stomacho confirmant: nam Hippocrates ordinariè Melancholicum succum per acidum describit, dum subinde Melancholiam comparat cum aceto acerrimo. Dum ergò dicunt Veteres, imprimis AVICENNA, melancholiam esse causam Bulimi & appetentiæ caninæ, eo ipso dicunt esse acidum: PETRÆUS, & antiqui Galenici, adducunt bilem porraceam & æruginosam, seu mixturam illam, primariò ex acido insigni stomachi & bile resultantem: unde etiam infantes, quibus frequens est resectio talis bilis porraceæ & æruginosæ, tunc temporis patiuntur tormina ventris, & exulcerationes ani; propterea, quoniam acidum etiam has exulcerationes producit: quæ tamen curantur per illa, quæ acidum absorbent. Hinc idem est, ac si dicant, peccare acidum corrosivum in stomacho. Hermeticorum schola, uti microcosmi actiones & operationes per macrocosmum definit, confugit ad spiritum salinum esurinum & Vitriolicum famelicum, qui spiritus salinus acidus & acris cum sit acerrimus in stomacho, ut quicquid ingeritur, promptè celeriterque concoquat, & à quo omnia assumpta, tanquam à fortissimo menstruo, dissolvantur. In hoc omnes conveniunt, quod acidum sit nimium, vellicans stomachum. Nec deest experientia: siquidem acida assumpta, imprimis verò acetum, succus citri, spiritus vitrioli & similia, vel naturaliter appetitum stimulant; ita & à similitudine effectuum poterit argumentari, quod talia intensiora in stomacho famem caninam præternaturalem intendunt. Confirmat hoc etiam experientia eorum, qui laborant appetentiâ nimia; quæ enim eiiciuntur in appetentia canina per vomitum, acida plus minus viscida esse solent: teste FONSECA (fuit Medicus Papæ) l. 2. Consult. 86. ubi exemplum habet cuiusdam adolescentis, qui singulis mensibus per vomitum rejecit succum crassum insipidum nigrum, postmodum verò successit appetentia canina, quo tempore ea, quæ rejecit, omnino fuerunt acida: Sic HORSTIUS l. 4. obs. 4. observavit, quod juvenis appetitum canino laborans acida insignia evomuerit. Confirmant hoc etiam Hypochondriaci & Melancholici, qui ob acidum notorium laborant appetentiâ caninâ; & BLASIUS *Observ. Anat. pag. 122.* ventriculum inexplebili fame laborantis acidum spirasse nidorem testatur: Ob simile enim acidum excedens canes non tantum ingerunt dura ossa, sed eadem etiam feliciter digerunt.

Præter acidum, etiam acrimonia urinosa seu alcalica,



lica maxime volatilis & activa, Famem caninam causare probabile reddit, quod iis, quibus bilis per ductum peculiarem ad ventriculum defluit, & voraces quoque observentur: vid. VESALIUS *de Hum. Corp. Fibr. l. 3. c. 8.* & *Möbius Fund. Phys. ap. 10.* præprimis cum POTERIIUS *C. 2. obs. 96.* testetur, se acidis famem caninam curasse.

Huc etiam pertinet orificij & membranz nervæ ventriculi nimia sensibilitas qua spiritus copiosius affecti continuam famem excitant. Atque hæc quidem ordinariæ sunt appetentiæ caninæ causæ.

Extraordinariæ etiam eveniunt, ut appetentia canina interdum oriatur à vermibus latis, siue in ventriculo producantur, siue ex intestinis hunc conscendant; quatenus alimenta, & chylum absumendo, ventriculum verò rodendo, appetentiam caninam inducunt. Exempla sunt rara: quædam tamen hinc inde tam à Veteribus, quam etiam modernis Medicis, allegata: Exemplum à TRALLIANO *lib. 7. c. 14.* ZACUTO LUSITANO *Med. Princ. Hist. l. 2. Hist. 68.* & SCHENCKIO *l. 3. ubi de appetitu canino Obs. 2. pag. 318.*, de muliere, intensissimo appetitu affecta, curata tamen per usum Hieræ, i. e. medicamenti ex aloë parati, cuius usu vermem 12. cubitos longum excrevit, & ita à fame canina liberata fuit. ZACUTUS LUSITANUS, qui *l. 4.* refert hoc, elegantem habet discursum de hac materia. Vid. etiam MARCELLUS DONATUS *Hist. mirab. lib. 4. cap. 2.* BURNETTI *sepulchret. lib. 3. Sect. 2. Obs. 9.* & à modernis observatum, scorbuticos non raro à lumbricis latis cum appetitu canino vexari. Sic B. D. MICHAELIS aliquando retulit, curasse se forminam scorbuticam similiter appetentiâ caninâ laborantem, quæ post usum succi nasturtii aquatici rejecit lumbricum, latum insignis longitudinis, & exinde appetentia canina promptè cessavit.

Verum, an vermes soli possint inducere caninum appetitum? merito dubitatur, propterea, quoniam taliter appetentes, ut promptè appetunt, ita promptè digerunt, quod fieri nequit à vermibus. Putarim ergo, unâ cum vermibus in intestinis simul adesse acidum succum esurinum nimium, à quo & appetentia oriatur, & etiam digestio, quæ non solos præsupponit vermes: Hi autem dubio procul vellicando, & morficando, malum insigniter augebunt.

Extra ventriculum ansam ex rebus non naturalibus præbet inedia, & longior alimentorum denegatio; ex præternaturalibus omnes evacuationes chyli & sanguinis immoderate.

Cæterum, utut tales, caninâ appetentiâ laborantes, multa devorent, & citò digerant, raro tamen solent pingues fieri, sed potius emaciantur. Ratio est; quoniam in talibus ob acidos succos, & acriores etiam in corpore luxuriantes, massa sanguinea redditur aspera & minus nutritiva. Nutritio namque nostri corporis fit obiectivè seu materialiter à succo blando, pingui, chyloso & subdulci; unde eorum, qui probe nutriuntur, massa sanguinea est semilactea, quod videmus in infantibus. In his verò, cum deficit talis succus pinguis chylosus, & potius abundet acidum, fit, ut propter asperitatem massæ sanguineæ minus nutriantur, sed potius emacientur. Videmus hoc in scorbuticis, qui laborant atrophîa propter excessivum acidum rancidum, specifici tamen saporis, à quo massa sanguinea aspera reddita minus potest nutrire corpus. Unde rarum est exemplum, quod habet AMATUS LUSITANUS *C. 7. Curat. 37.* de muliere melancholica, ingenti fame correpta, quæ ob id multa & copiosa devorabat, & cum arida fuisset & emaciata, exinde tamen postmodum pinguis fuit reddita: Rarum, uti dico, hoc est: interim si consideremus statum mulieris ægræ, quæ fuit melancholica, patet solutio dubii.

Adedque rarior affectus est fames canina, utut SCHENCKIUS *lib. 3. ubi de fame canina, Obs. 6. pag. 319.* famem caninam periodicam observavit quotannis circa solstitium invadentem, & quidem tantummodò 20. dierum spatio persistentem, consequente ingenti ciborum fastidio; qui ipse itidem observationem habet famis caninæ epidemicæ grassantis, *c. l. Obs. 1. pag. 318.* Sicut etiam rarum est, quod observatus fuit appetitus caninus epidemicus, quo fuit quipam curatus beneficio boli Armenæ, cuius usu vermes copiosè eiectioni sunt: vid. FORESTUS *lib. 2. Obs. 28. in Schol.*

Quod attinet Bulimum cum animi deliquio: easdem habet causas; utut miores: attamen propter orificij stomachalis, & membranz nervæ nimiam sensibilitatem cum

aliquali spirituum animalium dispendio aut torpore, ad li-pothymiam tandem disponit. Distinguendum autem hic est inter appetitum verum & falsum: Falsus enim est, qui etiam interdum ægris ferè in ultimo mortis agone evenit, & est quasi imaginarius, & venit ex aliquali impetu delirioso, quia ægri nesciunt, quid agunt, & malum signum est, præprimis si per totum morbi cursum sine appetitu fuerint.

## S I G N A.

Quod attinet signa: *Diagnos* est facilis.

Quoad *Prognosis*: affectus hic ut plurimum est citra periculum; facile enim restituitur, nisi ob animi deliquium interdum immineat morbus, aut exinde deficiat æger, præprimis si ventriculo adhuc repleto illud contingat, aut magnas evacuationes & colliquationes corporis sequatur.

Post morbos, imprimis febres, in statu reconalescentiæ sæpius solet invadere appetentia, caninæ similis; quæ tamen est sine periculo, signum potius est naturæ se recoligentis. Cæterum nisi ægri sint moderati & temperati, aut si nimis comedant, solent pati recidivam: vid. RIVERIUS *Prax. l. 9. c. 2.*

Quæ canina appetentia cum vomitu aut frequentioribus dejectionibus perseverat, periculosa est, quatenus in cachexiam, hydropem, tabem, &c. degenerare solet.

Bulimus superveniens morbis chronicis, quartanæ, hydropi, &c. raro est citra suspicionem funeli eventus.

## C U R A.

Quod attinet *Curam*: in hac duæ primariæ attendendæ sunt *Indicationes*:

1. Est, ut temperetur acidum istud acre volatile, ut acrimoniam suam penitus amittat.
2. Ut temperatum ita, & corrosivitate suâ exutum, evacuetur.

Quoad prius: dixi, acidum temperandum esse; quia aliàs, si humorem velimus purgare, antequam temperetur à sua acrimonia, metus est, ne evacuantibus irritatum gravia inferat symptomata. Si enim sursum velimus evacuare per vomitum, metus est, ne cholera morbus concitetur; uti rectè putat HARTMANNUS: si velimus per inferiora purgare, metus est, ne exulceret intestina, & ita inferat affectum dysenterici similem.

Ea, quæ acre acidum istud temperant, ex superioribus sunt notissima, in specie triplicia: (1.) aut sunt salia alcalia dicta, tam volatilia quam fixa, præsertim posteriora, quæ acidum omne absorbent, & in falsum aut insipidum transmutant: Sic v. g. si spiritui vitrioli acido, imò acidissimo, addatur sal tartari fixum, exinde spiritus vitrioli omnem aciditatem amittit, & fit planè insipidus. (2.) Temperant acidum corpora terrea, & marina, absorbentia communiter dicta, quæ acidum in se absorbent, imbibunt, & ita ejusdem actiuitatem temperant: Sic v. g. si acetum acerrimo infundantur lapilli cancrorum, fit ut acetum corrodat eos, qui absorbent in se omne acidum, & exinde acetum fit insipidum. (3.) Corrigunt acidum omnia ea, quæ acrimoniam ejus obtundunt, qualia sunt pinguis, aut mucilaginosi, hisque similia, quæ obtundunt, & hebetant acidum: vid. BARBETTE *Prax. pag. 120.*

Quod attinet *materiam Medicam*: inter alcalia seu salia fixa & volatilia pertinet sal tartari, aut oleum tartari per deliquium, sal absinthii, in genere salia fixa vegetabilium omnia, sal cardui benedicti, centaurei minoris; item salia volatilia, quæ inter eminet sal urinæ, &c. Hæc si usurpentur, potenter coercent appetitum quemcumque nimium; Item spiritus urinæ, spiritus cornu cervi, & similia volatilia. Pertinent huc etiam cepæ, allium, & similia simplicia, sale volatili acri prædita. Inter terrea sunt lapilli cancrorum, corallia, margaritæ, creta, lapis hæmatites, cornu cerviustum, & similia, quæ absorbent acidum, & ita temperant, ut deponat acrimoniam. Bolus Armena huc pertinet, non minus quam terra sigillata; hæc namque acidissima acida temperant: item Mars & Martialia omnia, quæ, quoniam acidum quodcumque imbibunt, non tantum in appetentia canina, sed in specie in malo hypochondriaco sunt convenientissima; siue sit limatura Martis cruda, siue crocus Martis aperitivus quicumque, siue Tinctura Martis quæcumque. Hoc observe



cur in preparatione Martialis pro hoc usu, ne præparentur eadem nimis acidis; ubi enim Mars ab acido semel est saturatus extra corpus, tunc sanè nunquam intra corpus acidum amplius potest absorbere. Quibus nunc opiata commodè addi possunt: v. g. dabo exemplum pulveris præscribendi, temperantis acidum contra appetentiam caninam, ex modò citatis subjectis:

℞. Limatur. Martis minutiss. pulv.  
Corall. rub. præpar. an. ʒss.  
Lapill. concrorum præp. ʒi. vel ʒss.  
Matr. perlar. præpar.  
Lapid. carpium præp. an. ʒj.  
Croc. Orient. gr. v. ad ʒss.  
Laud. opiat. gr. ij.  
M. f. Pulvis. S.  
Pulvis Præcipians.

Sufficit pro duabus vel tribus dosibus, prout magis vel minus appetit æger, & manifestè appetitum minuit, in iusculo pingui assumptus.

Si volumus remedium ex salibus, potest sufficere hæc formula:

℞. Antimonii diaphor. ʒss.  
Salis absinth.  
Cint. min. an. ʒj.  
Vol. Cornu Cervi vel urina, aut alius ʒss.  
Elesacch. anisi aut alius (pro odore & sapore) ʒss. ad gr. xv.

Prout magis vel minus volumus medicamenti saporem.

M. f. Pulvis pro dosib. duab. aut tribus, S.  
Pulvis Temperans.

℞. Salis card. bened. ʒss.  
Matr. perlar. præp.  
Lapill. concrorum præp.  
Ossis sep. an. ʒj.

M. Pro tribus dosibus.

Item urinae potus famem nimiam sedat.

Denique quod attinet oleosa: sunt quælibet olea expressa, & in specie olea destillata. Expressa sunt olea amygdalarum dulcium, lini, quod egregium in pleuritide, butyrum, jus pingue: Destillata, ut oleum anisi, carvi, & præ cæteris caryophyllorum, quod potens est in absumendo acido quocunque; unde etiam rigores febriles ab acido ortos compescit. Pertinet huc etiam vitellum ovi ad duritiem cocti, quod teste HARTMANNO, valde convenit in appetentia canina propter copiosum oleum, acidum excedens egregiè obtundens, unde etiam inde paratum oleum ovorum, uti notum est, convenit, quia hoc oleum ex vitellis ovorum obtundit vim accidi in appetentia canina, ut cesset, & exinde appetitus ad naturalem statum redeat. VIL-LANOVANUS refert: quendam sibi hunc affectum pane calente, & amurcæ olei imbuto, sustulisse: mulierem verò bovis liquatum adipem cum pari calentis olei quantitate duabus vicibus bibisse, sicque caninam appetentiam cum quinque dierum fastidio commutasse.

Observandum autem, ne pinguius ejusmodi utamur, ubi vomitus simul urget, ac si melius se incipiat habere æger, ab ulteriore eorum usu absteineat.

Commendantur præter modò dicta etiam alia, v. g. cochlear, cancri fluviatiles, caro suilla, hæc enim est imprægnata suo copioso sale volatili, & propter pinguedinem difficillimè digestionis seu coctionis, unde enervat vim corrosivam acidi esurini. Commendantur in diæta cerebra animalium, imprimis butyro frixa; cerebra animalium enim in totum sunt oleosa & pingua, & obtundunt acrimoniam corrosivam succi acidi in appetentia canina: Item convenit amyllum & oryza cum multo butyro & lacte cocta; hæc namque sunt oleosa. Similiter pertinent huc pineæ, & pistaciæ, oleosæ non minus, quàm amygdalæ dulces.

Ratione olei destillati conveniunt spiritus omnes vegetabilium inflammabiles: hi namque nihil aliud sunt, quàm olea volatilifata per fermentationem, & constant ob id blando acido pingui, imprægnato sale volatili plantæ. Unde spiritus vini, aut solum vinum dulce, & generosum, appetentiam caninam sedat, ut HIPPOCRATES scd. 2. aph. 21., GALENUS in Comment. in hunc locum, & ZACUTUS LUSITANUS l. 2. de Med. Princip. Hist. 69. testantur. Loco spiritus vini simplicis convenit spiritus

menthae aut salviae; aut vinum generosum, cui infusa salvia & absinthium, usurpari possunt; horum enim sal volatile oleosum temperat omne acidum. Faciunt huc quoque Essentiæ absinthii, pulegii, melissæ, &c. quæ ab HARTMANNO commendatur, imprimis si cum his maritentur olea destillata, v. g. carvi, & similia; hæc enim citra noxam temperant acidum in stomacho. Hincque à SYLVIO commendatur Potio sequens:

℞. Aqua m. n. b. ʒij.  
Cochlear.

Tinctura cinnam. cum spiritu Vini. par. an. ʒss.  
ʒss. absinth. ʒj.

Miscuit pro Potione.

℞. Olei destillat. maris,  
Juniperi an. ʒj.  
Misceantur.

Dentur 2. vel 3. guttæ pro dosi.

Denique hic non ineptè vel lociantur, vel subiiciuntur opiata, aliaque Narcotica, adeoque sensum ventriculi stupefacientia, quo minus officium suum percipiat vellicationem. Hæc ipsa tamen cautissime sunt usurpanda, quoniam palliant tantum affectum, non verò reverà curant. Huc pertinet laudanum opiatum notum, cujus loco substituitur Theriaca, uti etiam mitchridatium, quæ duo enim opio ceu basi sunt superstructa, & cum sale absinthii assumpta, acidum destrunt, & per sudorem nonnihil immi nuunt. Pariter solanum furiosum seu maniacum cum vino infusum, si hauriatur, quamcunque appetentiam deiecit, uti expertus est GESNERUS in Epistolis, qui videatur, quoniam est admodum elegans Discursus.

Ubi ita temperatum fuerit acidum, expurgandum est: Nam hic succus facessit omnino in serum, ut possit evacuari citra noxam. Purgatio instituenda est per vomitum, vel per secesum. Quoad purgantia seu evacuantia: præter illa, quæ aliàs in malo hypochondriaco præscribuntur, convenit imprimis Extractum panchymagogum Celsii, item Extractum agarici, item senna, & medicamenta ex aloë parata: e. g. juxta Poterium C. 3. Obs. 96., pilulæ de hiera simplici Galeni. Imitandus venit hac in parte FORESTUS scd. 3. lib. 18. Obs. 5. pag. 138., qui habet exemplum appetentia canina in Monacha cum vomitu ciborum, simulque humorum acidorum, in fine vomitus sentiente aliquid amarulenti, quod fauces vellicavit, quæ solùm fuit curata per has pilulas:

℞. Mass. pilular. hier. simpl. Gal. ʒj.  
(meliores sunt Zveiffers.)  
Rhabarb. opt. ul. erit. ʒss.  
Cum l. q. infusi vel syrupi rosar.  
s. l. a. pilulæ.

Quæ cum aliquoties fuissent mane usurpata, vomitus morbusque cessavit: & hac ratione etiam alius juvenis fuit curatus.

Dixi antea: succum acidum temperatum sub forma feri posse evacuari: unde etiam ad purgantia refertur jalappa, quæ mirè serum expurgat; huc pro ejus evacuatione potest præscribi pulvis purgans ab amico quodam expertus:

℞. Pulv. rad. jal. pp. ʒ  
Resin scam. gr. v.  
Sal. Tart. vel Tart. vitriolat. gr. iij. ad v.  
Limat. mart. sine acido præp. (si adsit nimia acrimonia) gr. v. ad ʒss.  
M. f. Pulvis laxativ. us. S.  
Laxier Pulver.

℞. Extr. aloes cum aqua tartaris. par.  
Corall. rub. præp. at. an. ʒss.  
Gum. ammon. a. cum aceto sol. ʒj.  
Extr. martis ʒij.  
Trochis. alband. ʒss.

Cum ess. myr. h. f. pil. n. 130: pro dosi 10. vel 15.

Quæ supra dixi de Theriaca, etiam confirmantur à FONTANO in Comment. & Respons. pag. 74. ubi refert de ancilla, insatiabili appetentia tribus mensibus detenta, unâ cum crebro vomitu; quæ ipsa cum assumpsisset vomitorium ex antimonio, & tesc vino postmodum recrearet, assumpta ʒj. Theriaces omnino fuit curata. Solum Armenam superius recommendavi, quæ confirmat FORESTUS l. 21. O. f. 28. in scholio, ubi refert morbum quendam, famem epidemicam appellatam, ex eo quod ita fame epidemica correpti, fuerunt sanati solo usu Bolæ Armenæ, ita quidem, ut post ejus usum simul copiosissimi vermiculi fuerint rejecti. Non minus notatu digna est

Objer-



*Observatio* MEARÆ, qui in *Hist. Med.* pag. 159. refert Bulimum repentinum sponte naturā, succedente gravi diarrhœa, curatum.

*Bulimum* ergo quod attinet: cum sit defectus vi-  
rium propter nimiam famem, curatur optime per  
vinum generosum; quod quò generosius est, eò ma-  
gis satisfacit scopo Medici. Omnes enim Autores ab  
HIPPOCRATE ad hanc usque ætatem commendant  
Vinum, idque generosum, quod abundat sulphure & spiri-  
tibus volatilibus, quo potentius possit temperare acidum,  
imprimis Vinum Malvaticum, vel Hispanicum, vel Fron-  
tiniacum, aut loco Vini simplicis potest fieri Vinum Hip-  
pocraticum, cui Nux Moschata & cinnamomum similia-  
que ipsa fuerunt: Hoc sane Vinum multum conducet.

Præterea mica panis vino intincta naribus applicata præ-  
cæteris curat Bulimum: Item commendatur odor vini:  
item panis, ipsiusque odor speciatim commendatur ad Bu-  
limum à LANGIO l. 2. *Epist.* 28. Vinum, licet alias na-  
turaliter augeat famem, in Bulimo tamen ratione animi  
deliqui remedium est: magis tamen convenit, si frustu-  
lum panis vino intinctum comedatur: Nam certum est,  
quod vinum & panis Bulimi paroxysmum citò co-  
rceant.

Tandem Theriaca prodest: præcipue haustus vini ge-  
nerosi, imprimis Hispanici vel generosi alius, maxime  
valet, in quo Theriacæ parum solutum; Sic eò melius  
convenit, quatenus sensibilitatem orificii stomachi so-  
pat.

## S E C T I O II.

### D E

## S I T I L Æ S A.

*Sitim* quod attinet: est appetitus humidi præternatura-  
lis auctus, consistens in vellicatione aut insignioris  
molestiæ sensu circa fauces, h. e. in expansione pharyn-  
gis oriunda ab acrioribus salibus salis, aut acrioribus alca-  
linis, membranas faucium, lingue, palati, vicinarum-  
que partium vellicantibus & pungentibus, concurrente  
subinde saliva non rite diluentis dicta saliva acris, nec ab-  
stergentis, defectu, sitim ita exasperante: Conf. SCHW-  
ALBE *Tr. Querel. Venæ.* pag. 154. Cujus sitis molestia sti-  
mulemur ad assumenda liquida aquea, quod simpliciora, eò  
meliora, cum postulentur à natura eum saltem in finem, ut  
pro vehiculo, tam solidorum alimentorum intra corpus di-  
stribuendorum, quam excrementorum extra corpus elimi-  
nandorum, inserviant.

Ille liquidorum Appetitus, sitis, naturæ cursu ad solam  
aquam erit ex quo omnia animalia, solâ aqua purâ &  
simplici sunt contenta: sed non pro scopo nutritionis, sed  
pro vehiculo nutrimenti. Homines verò per artem nutri-  
mentum simul cum vehiculo isto conjungunt, ut videmus  
in cerevisiis, dum simplicis alicujus, v. g. hordei, grana  
incoquantur aquæ, & ita mucilaginem hordei nutriti-  
vam eliciunt, & sic pro potu aquam nutritivam acqui-  
runt.

Leditur sitis seu Appetitus humidorum, præter natura-  
liter imprimis, quando auzetur seu intenditur: raro enim  
morbose deficit sitis, nisi in delirantibus, quando sæpe in  
morbis acutis squalida lingua & aridissimis faucibus sunt,  
& tamen non sitiunt, vel propter sensus in faucibus tota-  
lem abolitionem, vel quod sub delirio sitim non percipiunt,  
& tunc ipsi etiam nolentibus potus propinandus est. Ra-  
rius depravatur in morbis, idque sine periculo, dum nem-  
pe ægri potum consuetum horrent, & alium simpliciorum  
inconsuetum, aut etiam absurdum, desiderant, ut febrici-  
tantibus evenit.

### C A P U T P R I M U M.

#### D E

### S I T I N I M I A.

*Q*uod attinet *Sitim Nimiram*, ante omnia distinguen-  
di sunt ejus gradus. Est enim vel *molerata*, vel *tu-  
re* seu *clausa*: Illa v. g. ab exercitio, loquela diutur-  
na, cum ariditate faucium: Hæc in febribus post assump-  
ta purgantia; assumpta venena acris.

### P A R S A F F E C T A.

*Illius subiectum* sunt saltem fauces, vel speciatim dicta  
pharynx seu expansio œsophagi in summitate ipsa: *Hujus  
subiectum* est simul orificium ventriculi sinistrum, seu vul-  
go dictus stomachus, seu radicalis sedes Famis & Sitis. Il-  
la facile & breviter, interdu uno haustu, vel repetiti sal-  
tem calida sanguinis elutione, est corrigibilis: hæc reperi-  
tis etiam pluribus haustibus vix est extinguibilis. Dictæ

partes vellicatæ à sale acris & salso inducere possunt istius-  
modi appetitum liquidorum vel humidorum, Sitis dictum.  
Uidemus enim quod post usum salitorum aut piperatorum  
habeamus magnam sitim, ubi nihil aliud percipere pos-  
sumus, nisi vellicantem & morlicantem sensum in fauci-  
bus & larynge: quod monstrat, Sitis esse in faucibus:  
unde sitis ab animumptis vel gargarisatione potest tolli,  
abluendo nimirum fauces.

### C A V S Æ.

Quoad Causas: *Causa proxima* est Vellicatio quædam  
& molestia singularis, fauces affligens, partim positive,  
partim privative: Positive, si revera sal aliquod volatile  
nimis acre & copiosum, fauces aut orificium stomachi fini-  
strum rodens, pungens & vellicans est; unde prout causa  
salis vellicans in vehiculo plus minus glutinosa seu viscido  
hæret, indeque facilis seu difficilis eluitur, magis vel  
minus contumax esse solet: Privative, quæ instar causæ  
occasionalis se habet, secundum quam intenditur. Huc  
concurrit simul saliva, fauces aliàs abluentis & diluentis,  
defectus, qui solus Sitim quoque inferre potest: v. g. post  
diuturnam loquelam, purgantium potentiorum usum. Sic  
qui noctu dormiunt ore aperto, exsurgentes sitiunt. Istud  
autem sal acre contrariam habet rationem cum causa vel-  
licante, quæ in Fame peccat, si hoc sal sit alcalino-sal-  
sum de genere bilis, uti sit in febribus, si sit purè salsum,  
ut in hydropicis & scorbuticis, item in catarrhis à lymphæ  
salis oriundis, obviū. Unde uti in Fame urget acrimo-  
nia acida; ita acrimonia salis, vel simpliciter vel alcalina,  
inquinat salivam, unde continua sitis. Hinc etiam est,  
quod esurientes nunquam pariantur Sitim, & Sitis non at-  
tendat Famem; acidum enim in Fame obundat acre. Hu-  
jusmodi saliva aut Lympham salivalem imprægnantia,  
linguam, fauces & gulam vellicant, & ita Sitim pro-  
ducunt.

Quoad causas remotas: Sunt hæc vel externæ vel inter-  
næ: Externæ varia assumpta acriora, v. g. Aromata, Sali-  
ta, Piperata, Purgantia, Arsenicum, Mercurius sublima-  
tus: Internæ, quæ vellicant, sunt serè triplices.

1. Est *acrimonia alcalina bilis* plus minus oleosa, indeque  
plus minus amarulenta, & glutinosa, ibi sitis magis esse  
solet molesta: Si oleositas bilis amaricans, sitis solet esse  
serè inextinguibilis: Nam hoc sal volatile oleosum facile  
inquinat lympham & salivam, quæ salis reddita necessa-  
riò sitis fit cum amarore oris; Sic enim Febribus continuis  
correcti in æstivum cum effervescencia salis oleosi, de intensio-  
ne Siti ut plurimum conqueri solent, eaque magis vel mi-  
nus intensi, prout in talibus orgasmus bilis ex intestinis in  
stomachum regurgitat, aut prout nidorulentum acris mag-  
is vel minus infecerit stomachum, ac prout parcius sali-  
væ tunc solet esse proventus.

II. Causa remota est *acrimonia salis*, uti lymphæ in ge-  
nere, ita lymphæ salivæ in specie, nempe in affectibus  
quibusdam catarrhalibus, febribus catarrhalibus, Cache-  
cticis, Hydropicis, &c. in quibus ordinariò admodum ur-  
gere



gere solet sitis, ob serum maximam partem extravasatum, & Massæ sanguineæ detractum, hinc defectu suo partim immediatè, partim reliquam lympham reddendo, falsam, tale quid præstat; non secus ac in quibusdam scorbuticis, in quibus lymphæ salivæ falsior, ac simul plus minus glutinosa existens, fomes est contumacis huiusmodi sitis, quia nimis intensa sunt saliva.

III. Causa Sitis, naturalis & præternaturalis est saliva pauca, non sufficiens ablundo os & fauces; hinc post purgantia sequitur Sitis, quia exhausta est & subducta lymphæ. Hinc qui diutius loquuntur, percipiunt sitim, quia deficit saliva ordinaria: hinc in febribus, præter saliva biliosa acris, nimisurgens est sitis propter defectum salivæ; quæ in febricitantibus est familiaris, adeo ut lingua arida & non raro fissæ deprehendatur. Facit huc saliva viscida & glutinosa, & plus minus acris falsa, ut in phthisicis, hecticis, tabidis; item febricitantibus ac similibus, item ex morbis convalescentibus. In talibus enim saliva glutinosa, viscida & falso-acris, uti famem non leviter imminuit, ita contra sitim pertinacem ex faucium ariditate, linguæ glutinositate, &c. soler inducere, cum pro abstergendis faucibus minus apta sit.

Ad modò enarrata Salivæ vitia multum tribuunt Spiritus influi, vel materialiter eam simul alterantes, vel ad secretionem ejus plus minus tribuentes. Hinc illorum defectus vel absolutus in imbecillioribus, defatigatis, &c. vel respectivus, dum inæqualis eorum in corpore sit motus, & si quædam saltem loca specialius diriguntur, ut in magnis coloribus, iracundiis, paroxysmis febrilibus imminentibus, aut jam inchoantibus, Sitis ordinariò ex saliva parciore, viscidiorè & glutinosiorè, indeque cum faucium ariditate seu siccitate, affligere solet.

Præter dicta probè etiam notandum: quod in siti simul sit habenda ratio stomachi & pulmonum, quæ duo in provocanda siti multum conferunt: Stomachus quò minus esurit, & magis æstuat, eò intensior est sitis: quò magis æstus sanguinis in pulmonibus, eò magis æstuat pulmo; id quod ex vomica pulmonum, item ex empyemate, patet.

Hæc scilicet omnia in eo conspirant, ut gravem molestiam & vellicationem circa fauces inferant, & ita sitim admodum intensam reddant. Verùm ad Sitem vel augendam vel imminuendam multum facit consuetudo; Hi enim, qui adfueri sunt magnis porationibus, crebrius solent sitire: Exemplum huc faciens elegans habet ALEXANDER DEODATUS in suo *Valerudinar* pag. 26. de puella septenni admodum siticulosa & bibacula, idque propter nutricem siticulosam, à qua fuerat lactata, quæ per consuetudinem ita fuit, & sic in infantem cum lacte hoc malum transtulit.

In genere differentia sitis observetur: quod nempe quædam astringat cum ardore febrili: buxam sine eo, quod posterius in catarrhosis, scorbuticis, hydropicis, &c. obvenit, & probè hæc differentia notanda in cura.

## S I G N A.

*Signa diagnostica æger scit.*

Quoad *Prognosin* verò: nil per se sitis in recessu habet, cum per accidens saltem, prout est intensa vel non, ratione causæ morbosæ.

Sitis nimia & inordinata absque causa externa semper statum decidentis denotat, adeoque morbum imminere portendit.

Quæ à causis externis excitatur, potu assumpto facillè sedatur; quæ verò à causis internis procedit, pro illarum diversitate variat.

Si æger sitiens, hoc est, in quo omnes causæ, circumstantiæ & indicia sitis, ut lingua arida, os glutinosum aut exsiccum, æstus insigni corporis, in febribus ardentibus & malignis, non conqueratur de siti, malum signum est: quia aut innuit adesse delirium, aut innuit deficientem sensum partium in lingua, & omnimodam omnium facultatum, corpus gubernantium, prostrationem, adeoque imminentem mortem. Vid. HIPPOCRATES *Scilicet 4. Aphor 48.*

Sitis in febribus aliisque affectibus brevioribus cum horum solutione spontè evanescit: In hydropè verò aliisque chronicis vix sedatur.

Sitis in febribus ardentibus parca, est admodum suspecta; Undè non adeo sit securus tunc Medicus.

Cum naturaliter cum Fame nulla sit sitis, & contra:

adeoque, quamdiu acidum esurinum in stomacho dominatur, deficit sitis; Sin verò falsum aut acre contrarium, urgeat sitis: Ob id in siti plus minus clamosa, illius nempe naturalis defectum semper concludamus; Sicut etiam sitis talis defectu illius aliqualem adhuc præsentiam, & plus minus dominium colligamus.

Quando ægris, dum bibunt, potus deglutitur cum sonitu delabatur, quando sonat: *Gluck, Gluck*, pessimum signum est; innuit enim stomachi tonum planè resolutum.

## C U R A.

In Cura ergo seu Methodo medendi tres Indicationes dominantur.

1. Tollatur causa fauces irritans, nempe temperetur acrimonia salina fauces vellicans.
2. Augeatur materia seri & lymphæ salivæ per aquosa diluta.
3. Ne nimis ingurgitetur potus, & gravetur ventriculus, fallatur Sitis, si sit nimia.

Quod attinet hos scopos, & quidem indicationem primam, hæc pro varietate variis, varia largitur remedia. Ea, quæ causam irritantem tollunt, partim sunt acida & magis austera, partim temperata, quæ acrimoniam vellicantem aut urinosam, plus minus oleosam, seu bilem, aut salinam, corrigunt & emendant. Acida nimirum sint ex vegetabilibus acetosa & similia, item pruna acida, fructus citri, aurantium, granatorum acidorum, rubi idæi, berberis, ribes, cydonia, cerata, & omnium horum succi: item primi omnium, tamarindi, qui in febribus præter hoc, quod sitim compefcant, etiam æstum impediunt, & blandissimè alvum subducunt. Ex his succis parati Sympi eundem habent usum; utut non adeo potentem, propter admixtum saccharum. Pertinent huc succi expressi ex sempervivo, & portulacæ. In sempervivo esse singularem vim contra æstum, probant anginosi: Item tam acetum simplex, quam rosaceum, violaceum & rubi idæi: sic aquæ destillatæ portulacæ, lactucæ, nymphæ, imprimis aqua fragorum. Tincturam rosarum & violarum prætereo: Imprimis convenit Tinctura florum bellidis, quæ est egregia in siti compefcenda. Pertinet huc *hepatium rubeum*, pulvis scilicet acidus, ex *cremore tartari*, *spiritu vitrioli* & *Tinctura santali* coactans. Ex Mineralibus phlegma vitrioli acidulum, modò legitime destilletur, ut participet aliquid de sulphure vitrioli, item phlegma sulphuris, spiritus mineralium acidi, tam simplices, quam compositi, Clyssi dicti, in specie sulphuris, vitrioli, vitrioli Philosophici seu spiritus salis: in febribus æstuosioribus spiritus vitrioli, cum julebis, & potulentis assumpti, quorum guttulæ paucae sitim melius compefcunt, quam alia potus genera, quæ destruant acrimoniam. Clyssus in specie paratur ex sulphuris antimonii, & vitrioli ana: destillantur per retortam, sic spiritus volatilis sulphureus prodit, qui optimus in febribus ardentibus & siti: de quo SCHROEDERUS in *Pharm. ubi de antimonio*. Clyssi tales commodè potui ordinario vel julebis possunt instillari ad sistendam sitim, vel guttulæ X. XX. ad XXX. (prout acris) dentur pro dosi.

Temperata sunt subdulcia aut sub-pingua, lac & serum lactis, *Germ. Molcken* imprimis nitro volatili turgidum, quod in febribus, imprimis scorbuticis, æstum compefcit, siue solium propinetur, siue solvatur in sero lactis nitrum antimoniatum, siue aqua destillata seri lactis, modò legitime destilletur. Modus utendi est, ut accipiatur seri lactis mensura j. Huic ipdatur pomum citrium in taleolos incisum, sic enim acidum citri ex sero lactis præcipitat, quicquid caseosi aut butyrosi in eo continetur: Coletur ut fiat clarum: usurpetur pro potu. Loco cibi etiam sumi potest. Loco lactis naturalis sunt artificialia seu emulsiones, quæ sitim temperant, ex seminibus frigidis majoribus, ut portulacæ, lactucæ, papaveris albi; aut etiam emulsio paratur ex hordeo. Conveniunt item passulæ, glycyrrhiza, imprimis cum radice Chinæ aut sassafras decocta, & propinata.

Ea, quæ pro secundo scopo serum & lympham salivalem augent, sunt quæcunque potulenta ventriculo grata majori dosi assumpta, quæ vino, vel cinnamomi alteriusve, aromatis gravioris tantillo, contemperata; itaut julebi utrique scopo satisfaciant. Verum est, aquam simplicem appetere naturam: sed in illa, præsertim frigida, aut nimis copiosa propinanda sumus cauti; prostant enim exempla



plurimum non pauca, qui ex nimio aquæ frigidae potu sunt demortui. Tria recenset AMATUS LUSITANUS c. 2. Curat. 62; item SCHENKIUS lib. 3. Observ. exemplum habet, quendam ex subito aquæ frigidae post pastum potu mortuum esse: Similia exempla extingtorum à frigido portu videbitis in MARCELLO DONATO in Hist. Med. Mirabil. 4. c. 6. Sin verò non immineat mors, metus est, ne periculosum althma inducat, idque propter coagulationem sanguinis in præcordiis, ab aqua frigida factam: Tale observavit GABELCHOVERUS in C. 2. Cur. 17. & 18. Alias noxas prætereo. Rarissimum est, quod habet BARTHOLINUS Cent. 3. Obs. 89. de mulieribus Gronlandicis, per aquam frigidam potam à variolis curatis: Sed, uti dixi, rarum hoc est, & potius ipsarum idiosyncrasia tribuendum, quam imitandum. Rarè ergò, aut nunquam aqua simplex vsurpanda: potius conveniunt hic appropriata, quæ salium acrimoniam blandi aciditate temperant.

Tertio scopo ordinariè satisfaciunt gargarismata, elutiones faucium, mucilagines linguæ & faucibus illitæ; quoniam sitis est faucium affectus.

Ex his variæ possunt fieri formulæ, imprimis ex acetosa vulgari: nam acetosæ radix, folia, & semen, decocta, liquorem seu aquam tingunt colore rubeo instar vini, & recens expressus succus Vinum rubellum colore & suavi acidulo sapore elegantissimè refert; unde ægri decipi possunt talibus. Platerus describit tale medicamentum: sc. radicem & folia acetosæ coquit in aqua, in quo decocto soluit postmodum syrupos aut succos appropriatos, hoc modo:

R. Decoct. rad. & fol. acetos. ℥j.

adde

Succ. acetos. rec. expr. ʒiij.

Syr. rubium vel berber.

Granato. an. ʒvj. ad ʒj.

M. pro Julebo, S.

Julebus refrigerans contra Sitim.

Gratus est gustui, sitim, in specie febrilem, simul compescit, & alvum apertam servat.

Usitatum aliàs est Decoctum hordei simplex; hoc enim subpingue est, unde egregiè temperat salia siticulosa, ut:

R. Decoct. hordei simpl. ℥j.

Succ. citri.

Cydon. aa. ʒj. vel ʒij. ad ʒij.

Tinctura flor. bellid. vel papaver. errat.

Rosar. an. ʒj. vel ʒij.

Syr. acetos. citri vel rubium ʒij.

Spiritus vitrioli aut Salis q. s. pro grato acore,

M. D. S.

Julebus refrigerans contra Sitim.

In febribus Malignis Decoctum hordei cum C. C. aut radice scorzonæ præscribitur; quia decoctum hordei simplex est nimis crudum & flatulentum, nec syrapi semper necessarii sunt: loco ergò Decocti præscribi potest:

R. Decoct. rad. scorzonæ.

Cicbor. aa. ℥ss.

Succ. rubi idæi ʒij.

Citri.

Tinctura Flor. Bellid.

Rosar. aa. ʒij.

Syrup. rub. idæi,

Acetos. citri an. ʒj.

Spiritus sulphuris q. s. pro grato sapore.

R. Decoct. alterant. vel Citri Myns. ℥j.

Tinctura Flor. bellid. ʒss.

Syr. rubi idæi

Scabiosæ an. ʒj.

M. pro Julebo.

Interdum Julebi instar Tincturarum per infusionem ex tempore parandi præscribuntur, qui sunt gratissimi. Modus est hic:

R. Flor. rosar. rub. vel bellid. ʒvj.

Irrorentur cum

Spiritu sulphuris q. s.

Infundantur in

Decoct. bord. ℥j. ss. ad ℥ij.

Stent in loco calido, donec suaviter rubescat liquor: Colaturæ, imprimis si leniter abstergere animus est, adde

Syr. Iujubin.

Acetos. citri

Rubium an. ʒj.

(vel harum loco Syr. rubi idæi ʒij.)

M. pro Julebo grato.

Vel

R. Decoct. bord. ℥ij.

Flor. rosar. rub. ʒss.

Succi citri ʒij.

Stent in calore moderato, per aliquot horas: post blandam ebullitionem Colaturæ adde

Syr. rubium ʒij.

M. f. Julebus.

Loco Decocti hordei interdum non sine fructu præscribitur etiam Decoctum Tamarindorum, in specie quando alvus nimis clausa, simul blandè laxanda est: cui accedit tinctura rosarum, violarum, & bellidis, paratæ cum phlegmate vitrioli: Modus sit talis:

R. Pulp. Tamarind. vel Tamar. contus. ʒij.

Coq. in f. q. aquæ simpl. vel ʒij. ss.

Colaturæ adde

Tinctura flor. bellid. cum phlegm. vitrioli par.

ʒj. vel ʒij.

Violar.

Rosar. aa. ʒj.

Syr. rubium,

Berber. an. ʒj.

M. D. S.

Julebus aperitivus contra Sitim.

Conueniens etiam est Decoctum Tamarindorum cum passulis, egregiè temperans ac simul alterans, præsertim istis in casibus, ubi aciditas Tamarindorum non nihil suspecta videtur.

R. Tamarind. ʒij.

Passul. min. conquis. ʒj. ss.

Coqu. in f. q. Aquæ.

Colaturæ seruenti infund.

Cort. citri rec. ʒj.

Colaturæ refrigeratæ adde

Tinctura rosar. ʒss.

M. pro Julebo.

Sunt nonnunquam subjecta, quæ nequeunt perferre acida. in tali casu optimum est nitrum simpliciter depuratum secundum methodum TACHENII Hipp. Chym. in fine, ad aliquot drachmas usque ad ʒss. vel ʒj. mensuræ potionis ordinariæ, vel decocti hordei, vel aquæ appropriatæ additum: & ita assumptum egregiè confert ad effervescentiam massæ sanguinis, & sitim febrientium temperandam: vel quod melius nitrum antimoniatum, sulphure antimoni in præparatione antimoni diaphoretici fixatum, cum hanc habeat vim contra malignitatem pestis, hinc egregiè temperat salia, & sitim coarctet, quin etiam somitem sitis plus minus glutinosum ac viscidum resoluit & abstergit: conuenit etiam hydropicis, quoniam urinam mouet: Ex grat.

R. Decoct. alicuius ℥j. ad ℥ij. ss.

Nitri præpar. ʒj. vel ʒij. usque ad ʒij.

& ʒss.

Misc. S.

Potio refrigerans contra Sitim.

Præscriptionis formula, quæ est grata, cum aliàs nitrum sit nauseabundum, est hæc:

R. Decoct. bord. ℥ij. ss.

Aqua cinnamom. ʒj.

Nitri depurat. vel antimoniatis. ʒj.

ad ʒij.

M. S.

Potus contra Sitim.

Vel

R. Aqua acetos.

Semperviv. an. ʒij.

Rosar.

Succ. semperviv. an. ʒij.

Nitri depur. ʒij. ss.

Syr. Violar. ʒij. ss.

M. F. Potio. S.

Potio refrigerans contra Sitim.

Si acrimonia salia, ut in hydropicis, scorbuticis, & phthiisicis, spiritus salis & nitri dulcis est optimus, quatenus est diureticus. Ratione nitri serum lactis, Germ. MolcKen, egregium etiam est remedium ad sistendam Sitim, in specie febrium scorbuticarum. Certum enim est, quod non rarò scorbutici vehementer conquerantur de acrimonia salivæ salia, & hinc oriunda siti, quæ non melius compesci potest, quam sero lactis, quod nitro volatili, sed & oleoso tempera-



et turgidum, alvum simul apertam servat, salia quævis acia corrigit, ac per urinas expurgat. Modus utendi est nunc solitarius, nunc cum succo citri acidulatum, si nempe succus citri vel acerum destillatum instilletur, vel cum toto aut dimidio pomo citrio in taleolos inciso Mens. j. fori aciduletur; Sic enim omne crassamentum butyrosus, & superfluum caseosum, fundum petit: postmodum colatur, & leniter exprimitur, & serum acidulum clarum, gustu suave, contra sitim superest. Aut quod melius est: Sero lactis infunditur succus cochleariæ & acetosæ, agitantur simul, & per pannum colantur, & sit serum lactis admodum appropriatum contra scorbuticorum sitim. In febribus ardentibus serum lactis leviter acidulatum cum syrupo aut succo quodam, aut cum nitro antimoniato, esse elegans. Inter quæ temperando sistunt sitim, præter serum lactis, est imprimis ipsum quoque lac: item passulæ, ex quæ his parata Decocta, quibus suo modo & radices Chinæ, item lignum sassafras, pro circumstantiarum ratione, addatur. Lac quidem, nisi febris aliæ circumstantia illius usum interdicit, utpote quod acrimoniam quamvis notabiliter temperat, præprimis scorbuticam, hincque excitatam sitim, compescit. Emulsionem etiam supra dixi convenire ad temperandam sitim, ab acrimonia falsa oriundam, ex seminibus frigidis majoribus, item grans hordei, amygdalis dulcibus, & similibus. Emulsionis huiusmodi crassæ dabo formulam ad imitationem Sylvi:

R. Hord. ad crepatur. coct. ʒij.  
(vel solius vel additæ amygdal.  
dulc. ʒj.)

Cum Decocto hord. s. Emulsio ad ℥j.  
vel ℥jss.  
cui adde

Iulebirosarum aut Syr. violar. q. s. pro gratosapore: Et erit Emulsio satis conveniens. S.

Emulsio refrigerans contra Sitim.

Faciunt huc etiam juxta eundem SYLVIIUM juscula carniū gelatinosa, cum aqua multa parata magisque nitrata.

Quod si in scorbuticorum, hecticorum aut phthysicorum siti temperatis contra acrimoniam falsam utendum sit, præter serum lactis convenit Decoctum radicis Chinæ cum radice liquiritiæ: de qua videb. TIMÆUM à GunlenKlee l. 3. Epist. 29. p. 687. ad cuius imitationem præscribi potest ita:

R. Rad. Chinæ in taleol. incis. ʒj. vel ʒjss.

Liquiritiæ ʒij. ʒss. ad ʒvj.

Rasur. ligni sassafr. ʒvj.

Sant. rubri ʒij. vel iij.

Incisa & contusa infund. in

Aquæ comm. ℥vi. vel iix.

Stent in Balneo Mariæ per noctem; manè adde

Passul. min. conuass. ʒjss. ad ʒiij.

Coq. igne lento, vase bene cooperto ad  
℥iv.

De quo æger quotidie subinde pro lubitu capiat bonum haustum in scorbuto, phthysi, lue venerea, & similibus; manè calidè, & à meridie frigidè.

D. S.

Potus contra Sitim.

Quod si hic quidam acidum aut citri aut acetosæ addere velit, pro me erit concessum.

Mentio facta est radicis liquiritiæ: hæc cum semine feniculi decocta temperat sitim, quando oritur præcisè ab acrimonia falsa, qualis affligit phthysicos, hecticos, empyematricos & catarrhicos: in quibus calibus non adeo conveniunt acida, aut hæc saltem parciissime; Sed potius propinanda sunt temperata, talia ex glycyrrhiza, passulis, & similibus: præscribitur vel sola, vel cum hordeo, aut aliis. Exemplum sit tale:

R. Hord. crudi M. j.

Passul. min. conuass. ʒj. vel ʒjss.

Semen anisi,

Feniculi an. ʒj. vel ʒjss.

Rad. liquirit. ras. & incis. ʒss. vel ʒvj.

Coqu. in Mens. ij. Aquæ font. ad consumptionem tertiz vel quartæ partis: circa finem addendo

Cinnam. opt. ʒjad ʒjss.

De Colatura bibat æger, quantum lubet.

Hoc aliquando in imminente tabe scorbutici, cum siti laeta, saliva glutinosa, & appetitū dejecto, salubriter præscripsi. Vel

R. Hordei mund. M. j.

Passul. min. ʒj.

Crem. Tartari ʒij.

Cum s. q. Aquæ simplicis coqu. invicem ad crepaturam hordei.

Colatura.

D. S.

Potus alterans & laxans.

Sed de his aliisque salivæ vitiiis corrigendis conf. SYLVIIUS l. 1. Præf. cap. 31. & 32. Ex omnibus, quæ salivam, viscidam ac glutinosam attenuant, & resolvunt, imprimis excellit sal ammoniacum, internè subinde usurpatum.

Denique in leviori malo pro fallenda siti conveniunt gargarismata quæcunque, quæ os abstergunt, & fauces eluunt, ac simili ratione licet non tollant, saltem minus torquere faciunt. Convenit itaque imprimis aqua communis, in qua nitrum depuratum vel antimoniatum dissoluitur: item cerevisia secundaria calidè gargarisata, ac diversæ oris collutiones, quæ aliàs in febribus continuis præscribuntur; præsertim quando lingua est arida, scabra, plus minus nigricans. In talibus calibus succus sempervivi majoris, item mucilagines linguæ & faucibus squalidis & aridis illinendæ, ex semine psyllii, cydoniorum, malvæ cum aqua rosacea & sempervivi majoris, aut cum phlegmate vitrioli extractæ: & horum mucilaginum ʒj, solet convenienter addi ana vel dimidium succi sempervivi expressi, aut cydoniorum, & immisceri tantillum nitri depurati bene, vel salis ammoniaci: v. g.

R. Aquæ sempervivi maj. ʒ iij.

Succi eiusdem ʒi ss.

Mucil. sem. cydon. cum aqua spermat. ranarum extr. ʒi.

Salis ammoniaci ʒi.

M. S.

Mucilago refrigerans contra Sitim.

Liquor detineatur in ore aliquamdiu, hinc denuò expuat.

Vel

R. Mucil. Sem. cydon. cum aqua sempervivi extr. ʒi ss.

Succ. sempervivi rec. supr. ʒi vel ʒi ss.

Nitri ʒi. ad ʒi ss.

M. S. ut antea.

R. Mucil. sem. cydon. cum phlegm. vitrioli extr. ʒi ss.

Syr. rubi idæi vel violar. ʒvi.

M. S. ut supra.

Hæc mixtura linguæ impositæ eandem denuò tractabilem reddunt, & fauces blandè humectando, sitim quidem sedant & fallunt, non autem radicitus tollunt. Citrus quoque in taleolos incisus, saccharo inspissatus, vel ribes conditi, aut etiam aliquid de syrupo rubidæ, acidulato cum paucis spiritus salis dulcis, in ore contineri potest. Quod etiam rotulæ aut morsuli ex saccharo cum succo citri aut berberum parati spectant: item silices parvulæ, aut crystallus ore volutata: vid. BORELLUS Cent. 2. Obser. 68. Quod spectat quoque mastix MINDERERUS in Medic. Militari, siccum panis frustum aut globulum plumbeum hinc inde in ore volvi iubet.

Sunt etiam quidam, qui omne manè tantum non continuè siti torqueri solent, & tantum sani sunt: talem sitim optime sistit Vinum absinthites jejuno stomacho haustum; temperat enim oleum vitiosum, Massam sanguineam inquinans.

Denique observandum, quod æstuantem, aut intensius laborantem, aut magis defatigatū, siticulosi existant, in quibus optimum levamen est spiritus vini Cochlear j, qui parte sua volatili oleosi temperat & tollit acrimoniam salium, ex defectu spirituum in laboribus disperforum ortam: Conf. hic in specie AR. Angliæ Vol. 1. pag. 405. & 578 Huius loco & Vinum vetus generosum non erit inconveniens.

## CAPUT II.

D. S.

## SITIS DEFECTIVA.

Secundum in Siti Vitium est Sitis deficiens. Sitis imminutam aut deficientem quod spectat: affectus est rarius,



rarus, imprimis in juvenibus: Nihilominus tamen prostant exempla, ubi non tam in morbo, quam citra illum, non raro ad longum tempus omnis potus fuit neglectus: quales historias videb. in **PLATERO** *Obferv.* 237. & **LOTICHIO** *lib. 4. Obferv.* 1. & 2., ubi exemplum singulare habet de puero ab omni vino & cerevisia, nec non aqua abhorrente, & qui ne aquam quidem unquam gustaverat, ut ut egregie & athleticè vivens, & quod magis mirandum, progenitus fuerit à patre insigni belluone. **BORELLUS** *Cent. 2. Obf.* 68. similem Observationem habet de abstinencia à potu per sex annos; item per annum integrum: & simile fere exemplum videre est in **RHODIO** *C. 2. Obferv.* 56., ubi juvenis nunquam potans introducit; qui tamen multum delectabatur fructibus succulentis, qui dederunt materiam copiosam lymphæ salivæ, & mucos, unde non facile potuit sitire: nam ubi adest copia mucos, non est sitis. **BORELLUS** *l. a.* habet observationem de Medico, qui nunquam sputum reiecit, nec mucum, ut ut optime sanus: Cæterum ista lymphæ, quæ per secretum excernitur, ipsi fuit conversæ ad fauces, unde raram habebat sitim, & propter humectationem insufficientem difficulter loquebatur. Notum præterea est, ex **HIPPOCRATE**, quod splenetici satis diu à potu abstineant: Exemplum habet **PANOROLLUS** in *Pentecost.* 2. *Obf.* 19. de Splenetico quodam, per trimestre spatium nil omnino bibente. Quod verò delirantes nonnulli potulenta haud appetant, oblata detrectent, non est huius loci, sed inter delirii effectus numerandum.

### PROGNOSIS.

De cætero, si ægri non conquerantur de siti, quæ tamen in febribus ardentibus vel ratione aliarum circumstantiarum, adesse debebat, pessimum est signum; innuit enim deficientem sensum partium in lingua & magnam mentis alienationem.

### CURA

Sitis deficiens, si non in delirantibus observari contingat, aut ab humiditatis aquæ minusque salis in ventriculo & faucibus abundantia, aut à ventriculi stupore vide-

tur dependere; adeoque illius imminutionem, & ventriculi per aciora stimulationem & excitationem postulat: quod præstant sal cardui benedicti, tinctura tartari probe acris, & tartarus vitriolatus, arcanum duplicatum, arcanum tartari, sal ammoniacum cum aromatibus mistum, Elixir stomachale Michaelis, Proprietatis, cum & sine acido.

## CAPUT III.

### D B

### SITI DEPRAVATA.

**S**itis depravata rarissima exempla sunt, quæque sine fame depravata raro existit, dum quædam subiecta aceto præ aliis delectari potibus interdum observamus, & fere ad historias de pica vel Malacia pertinet, cum quibus unam eandemque causam & curam exigit.

### CURA.

In febribus ardentibus convenit imprimis vel aqua simplex, vel cerevisia secundaria, cui addatur dimidium Vini Rhenani, addendo pomum Citri unum alterumve in taleolos incisum, quæ mista sufficiunt pro lulebo; quibus in malignis optimo consilio addi potest gelatinæ C. C. rec. 37. in Mensura istius Misturæ. Vel

*R. Crem. tartari. 3ss.*

*Sacchar. 3ii.*

*Aqua font. Mens. j.*

Coque paulisper ad dissolutionem tartari: remote ab igne, &

inlice

*Cinnamomi frustulatum concis. 3ij.*

tegatur probe, & in loco frigido frigeat: adde, si placet, flores papaveris erratici.

Vini saporem refert, & potus est gratissimus, & vere universalis.

Cætera ad Fastidia cerevisiæ recensenda sunt: de quibus *suprà* addum.

Absolvimus ea, quæ pertinent ad Famem & Sicim lesam: Excipiunt hæc Degluttonis & Masticationis lesiones.

## S E C T I O III.

### D E

### ALIMENTORUM MASTICATIONE.

**S**olida alimenta assumpta, antequam stomacho transmittuntur, prius in ore ad meliorem sui transmutationem per masticationem præparantur, beneficio comminutionis & contritionis à denticibus, imprimis maxillaribus, & beneficio eorum cum saliva permissionis & subactionis. De denticibus vide **MOEBII** *Fundamenta*. Sunt autem ossa sui generis, & primariò à musculis temporalibus moneantur.

Saliva est Lympha sui generis in glandulis conglomeratis maxillaribus & stomaticis copiosis, tam palatinis, quam sublingualibus, & sanguine arterioso emulsa, & in os propriis ductibus effusa; constans primariò copiosa parte aquea, quæ subtili & occulto acido volatili est impregnata, unde attentatiuam, incisivam & fermentatiuam obtinet vim: propter quos fines etiam alimentis sub masticatione permiscetur, ut huius medio ad meliorem fermentationem in stomacho, & faciliorem fermenti stomachici ingressum præparentur, cum saliva hæc cum fermento dicto magnam analogiam & convenientiam, adeoque homogeneam, quodammodo habere videatur Originem ex glandulis salivæ videbit. in **STENONIS** *Obfervat. anatomicis de variis Oris, oculorum, &c. vasis*, item **WARTHONIO** in *Adenographia* c. 24. Eiusdem verò usum vid. in **DEUSINGII** *Exercitationibus de Nutrimenti animal. Elaboratione* pag. 3. ; item in *Alpendice huius Exercitationis* p. 303.

Paris biscoctus Salivæ imprimis agnatus materiam farinæ fermentat.

*In Saliva est vis armoniacalis.*

Præter quem usum primarium Salivæ, dum nempe parte aquosa alimenta resolvendo, salinâ acidulâ eadem incidendo & penetrando, adeoque instar fermenti, farinaceæ massæ additi, fermentationem in stomacho faciliat; secundariò etiam confert salivæ:

1. Fermentum stomachale ex parte restituendo.

2. Fauces & gulam pro faciliore degluttonione lubrificando.

3. Linguam, & os pro promptiori illius motione & loquela humectando.

4. Sitim alias perpetuò molestanti restringendo.

Tanta autem ciborum præparationis in ore est necessitas, ut horum comminutionem non sufficientem quam plurima animalia ruminando resarciant; Sicuti Salivæ degluttonis, reliquias ciborum in fermentum mutantis, deficientem permissionem aves in ingluvie absolunt: vid. **MARCUS SEVERINUS** *Medic. Hippocratica* pag. 303. Observantur enim homines ruminantes, quorum ventriculus musculosus: vid. **BARTHOLINUS** in *Cent. 5. Historia* 16., item **RHODIUS** in *Cent. 2. Historia* 59., item **HORSTIUS** *lib. 4. Obferv.* 9. & seqq. Anatomicen ingluvie videbitis in **BARTHOLINO** *Cent. 4. Epist.* p. 235. & 342. Alimentorum assumptionem & Masticationem lesam quod attinet: accuratè & succinctè secundum Theoriam promore complexus est **SYLVIVS** *lib. 1. cap. 4. Prax. De salivæ secretionem & motu vitiatæ* l. a. cap. 51. & 52. Primaria, quæ hic occurrunt, vitia sunt, quando aut imminui-



minuitur aut deficit plus minus; vel quando deprauatur Masticatio. In imminuta aut deficiente masticatione primaria vitia sunt, vel musculorum moventium (ad quos etiam musculosa congeries, linguam constituens, pertinet; de cuius tamen malis *infra*, ubi de *Gustus vitii*;) unde Spasmus Cynicus & Tortura oris: vel Maxillarum, & cum his dentium molarium.

## CAPUT PRIMUM.

### D E

## MUSCULORUM MASTICATIONI INSERVIENTIVM VITIIS, IN SPECIE.

### D E

## SPASMO CYNICO ET TORTURA ORIS.

**Q**uoad musculos mouentes, primario muscoli temporales & hinc muscoli genis & labiis communes, sui considerationem merentur, cum in finem à natura Magistra fabricati, ut præter ornatum decentem, mouendæ maxillæ inferiori, & ad superiorem conuenienter, idque validè, adducendæ inferuiant.

Vitiatur horum musculorum motus, quando vel Spasmo laborant, adeoque convulsi, seu pertinaciter eorum fibræ contractæ & rigidæ persistunt, adeoque interior maxilla superiori constanter adducta persistit: vel quando iidem paralyti laborant, & fibræ eorum relaxatæ & flaccidæ inferiorem maxillam pondere proprio deorsum labi permittunt, absque reductione ad superiorem. Convulsio ac Paralysis temporalis muscoli rara est, quin cum convulsionibus universalibus epilepticis & resolutionibus universalibus apoplecticis concurrat, quibus curatis universaliter, & particulariter horum affectus cessat; ridentibus, vel potius canibus ringentibus nisi interdum speciale muscoli vulnerati, vel alio modo affecti, subit vitium, particularibus remediis externis, pro casuum varietate, & cum aliis similibus partium similibus affectibus conuenientia vel analogia, curandum.

Genis & labiis inservientium musculorum simultanea convulsio aut paralysis pariter non nisi aliis grauioribus huius generis aliarum partium internarum affectibus suerueniunt, & tunc speciatim utriusque faciei partis convulsio & oris hinc facta utrinque diductio, tanquam in videntibus, vel potius canibus ringentibus, *Spasmus Cynicus* dicitur. Sin verò alterutra saltem faciei Musculorum pars vel conuellatur, vel paralyti afficiatur, & exindè recta oris figura in alteram partem distorqueatur, in convulsione quidem pars sana ad ægram conuulsam, in paralyti pars ægra resoluta ad sanam, *Oris Tortura* speciatim dicitur: in qua modò dicta oris ad alterum latus distorsione oculus alter ritè claudi nequit, nec æger debite exsufflare, quando expuere iustus, ex altero tamen oris latere id præstare potest. Quod si æger jubeatur ridere vel litteram O pronunciare, facile apparebit, alteram faciei partem liberè movere non posse. Quod si pars faciei dura sit cum sensibili plus minus dolore, & hæc aliam rectè se habentem ad se trahat, à convulsione illius lateris malum esse, palam fit. Sin verò pars affecta mollis, laxa & minus sensilis (& ejus oculi inferior palpebra ferè decidit) ad sanam partem trahatur, à paralyti malum esse ostenditur.

## C A U S Æ.

*Cause* equidem, tam externæ quàm internæ, hujusmodi convulsionum & paralyti suo tempore, ubi de his in genere tractabimus, evoluntur. In specie nunc in radice ac principio nervorum, ad faciei alteram partem derivatorum, hæret malum; tumque dimidium faciei totius, quin etiam aliz illius lateris partes, plures vel pauciores, simul afficiuntur. Sin verò specialiter vel in musculo uno alterove faciei, vel in nervi cujusdam surculo speciali, ad hos derivato, Malum hæreat, illa saltem facies pars, quam

*Estmuller. Oper. Tom. II.*

iste musculus regit, occupata apparebit: sic verbi gratiâ, Torturam oris à paralyti tali particulari putat **EPIPHANIUS FERDINANDUS** in *Hist. Med.* 12. natam, ex sæpius repetita applicatione acetii acerrimi, cui fuerat immaceratum lithargyrium, ad foueas in variolis delendas: non secus ac **HENRICUS** ab **HEER** in *Observat.* 17. notat, quendam ebrietate sopitum & totà nocte niue verberatum, Torturam oris maximam exindè laborantem, dextrâ genâ fenestraz viciniore omninò resolutâ. Torturam verò oris ex Spasmo natam observauit **PLATERUS** lib. 1. *Observat.* 138. & 139.

## P R O G N O S I S.

Quoad *Prognosin*. Tortura Oris, si per se extiterit, malum est difficile, aut tardè curabile: si verò acutis morbis superueniat, eaque ex Spasmo, periculossima; quò etiam pertinet *Apborismus* **HIPPOCRATIS** 49. *Seç.* 4. In febre non intermittente, si labium aut supercilia, aut oculus, aut nasus perueratur, imbecilli iam corpore, in propinquo jam mors est.

In specie superueniens Spasmo vel paralyti reliqui corporis apoplexiam, vel epilepsiam universalem, inde mortem portendit: Conf. lib. 2. *Prognost.* T. 8. & **FONTANUS** in *Methodo dignoscendi Morbos* cap. 2. pag. 8. & 10.

## C U R A.

*Cura* præmissis universalibus, i. e. primas vias laxantibus, aut ulteriori efficacità fortius purgantibus, & sudoriferis ex aromaticis & volatilibus, quin & interdum Decocto sudorifero ex lignis, per aliquot dies continuato, siquidem ex paralyti fuerit malum, utpotè frequentius; postea Vesicatoria nuchæ vel ad aurem affectam applicentur; ubi etiam cucurbitæ scarificatæ admoveri possunt. Hinc Castoreum, tam interne quàm externe usurpatum, est optimum: Extractum ejus in ore detineatur: Essentia castorei extrinsecus loco affecto crebrius illinatur, præsertim cum Tincturas dulcis siue Benzoës commissa, quam commendat **TIMÆUS** à *Gulden Klee* in *casibus* pag. 73. Quin & essentia rosmarini, salviæ, &c. similiter admoveri possunt. Nucha item & vertebrae colli aqua viræ (i. e. spiritu vini) rectificatâ foueri, & illius oleo destillato, chamomillæ, succini & terebenthinæ debent. In ore detineantur Masticatoria: v. g. Rotulæ Plateri.

*R. Nuc. Moschat.* ʒij.

*Rad. pyrethri,*

*Angel.*

*Semin. flaph. agr. vel sem. coriandri,*

*Sinapi an.* ʒj.

*Angel. (vel cumini.)*

*Cubebæ. an.* ʒss.

*Piper.* ʒss.

*Masticib.* ʒijss.

*Cera q. l.*

*M. F. Rotule.*

Aut castoreum in Spiritu vini dissolutum; aut fiat gargarisatio, vel diuturna in ore retentio Decocti radicis pyrethri cum semine erucæ.

Ex Spasmo si fuerit malum, universalia ista similiter locum habent, uti & sudorifera, & hinc quælibet ex & cum castoreo parata remedia. Speciatim observanda & fructuose imitanda. Cura **PLATERI** i. e. per Narcotica aromatica, mediante sudore & somno, hujusmodi affectum cutantis, ver. gr. Mithridatium, syrupum papaveris, opiata & similiter. Euporiston optimum ex semine graminis, *Henssaamen*, instar foris usurpatum. Plura de hoc affectu videbit. in **SENNERTO** l. 2. *Prax. par.* 1. cap. 8. item in **TIMÆO** von *GuldenKlee* in *Cas.*, p. 73. *M. A. N. C. Anno 3. Observat.* 332.



## CAPUT II.

## DE

## MAXILLARUM VITIIS.

**M**axillarum & his mediantibus dentium molarium vitio læditur Masticatio, quando maxillæ immobiles vel in partem, vel in totum fuerint: idque vel ob luxationem, in qua os nimis hiat, à quavis violentia externa factam, interdum ex oscitatione vehementiori adeoque nimio oris hiatu inductam, facili tunc per inflatam alapam, vel per percussionem, sub mento, tunc curabilem: vel ob tumorem, aut faucium in tonsillis inflammationis, aliavè ratione nimis tamentibus, in quibus vix os aperiri potest; aut Parotidum, liberum in sua cavitate maxillæ processibus motum impredientium: vel quando nutritionis priuatæ errore, aut universalis ex Massa sanguinis quasi decubitus ratione, lentus tartareusvè humor junctionem illam maxillæ cum ossibus temporum repleverit, adeoque motum liberum illius impediverit, ut in Scorbuto interdum contingere affirmat SENNERTUS. Quæ tamen omnia mala facili patet, eorumque ex aliorum similium graviorum curatione medicatio manifesta est. Conferatur quoad maxillarum hos & similes affectus, SENNERTUS l. 2. c. 17. His ferè modis immittitur aut deficit maxillæ motus, ad assumptionem & masticationem requisitus.

## ARTICULUS UNICUS.

## DE

## DENTIUM STRIDORE.

**D**eprauatur, quando tremulè mouetur maxilla, unde sonus ex dentium crebriore collisione natus supervenit in affectu, ob id *stridor dentium* dicto. Oritur propriè à spasmico reciproco musculorum ingenis, abductioni & adductioni mutuâ operâ intervientium, qui aliquali convulsio motu affecti stridorem talem inferunt.

## CAUSÆ.

Specialiores hujus *Causæ* sunt vel frigus externum, vel vermes seu lumbrici intestinorum, ex qua causâ stridor dentium nocturnus infantibus familiaris existit: Sicut & ex causis aliis, convulsionibus communibus, oriri potest. Speciatim etiam per consensum fieri solet, in febrium nempe rigoribus, in quibus non raro est stridor dentium, ob consensum cum partibus circa præcordia membranis.

## PROGNOSIS.

Sine manifesta causa superveniens adulto dentium stridor, malum portendit, aut apoplexiæ aut epilepsiæ imminenti.

In febribus dentibus stridere malum, præsertim si deliranti id accidat.

## CURA.

In Cura causis sublati, & ipse affectus morbosus cessat; optimum tamen remedium est Balsamus Peruvianus, extrinsecus usurpatus.

## CAPUT III.

## DE

## DENTIUM VITIIS.

**D**entium vitio Masticatio læditur, quando vel deficiunt, vel, præsentibus licet, vacillant, aut carie, & suppuræ affecti, aut dolore afflicti fuerint.

## ARTICULUS I.

## DE DENTIUM DEFECTU.

## CAUSÆ.

**D**eficiunt dentes vel proprio, vel alieno, gingivarum nempe vitio, *infra, ubi de dentium vacillatione*, prolixius explicando. Proprio vitio, dum euelluntur, aut excutuntur, à quavis causâ externa, vel ita alterantur, ut tanquam minus viuentes non amplius cum gingivaviua coherere queant, sed spontè sua decidunt. Ut enim mortificatum, v.g. cariosum os, cum vicinis partibus, vitæ communi & propriæ pro ratione spiritus influi & insiti gaudentibus, uniri nequit, sed necesse est, ut excidatur & separetur, quocum viuo osse partes subjacentes molles, viuentes, consolidatione debitâ, nutrimento mediante, uniri denuò queant; ita dens minus vitalis non jungitur amplius gingivæ, sed ab hac separatus excidit. Idque (1.) si mortuus fuerit propriæ ætatis, adeoque senii sui ratione: de qua vid. HELMONTIUS *Alimenta Tartari infantia* §. 25. (2.) Si ab externis nimis lædatur & vitietur, ut sunt nimis frigida, copiosius assumpta, dentibus inimicissima, & quæ senium eorum accelerant; item nimis acida, dentes & gingivas quali amburendo alterantia; item nimis calida, eaque vel crebrius assumpta, vel dentibus admota, à quibus successivè ita penetrantur & arroduntur dentes, ut frustulatum tandem excidant. Quòd facit pueriæ plurium consuetudo, dolores dentium vel aceto simplici, vel per coctionem medicatam curantium, à quibus stupescunt non solum omninò dentes, & insensibiles sic sunt lubiliores illorum intimæ fibrillæ; sed & ipsi dentes simul mortificantur & corroduntur. Par ratio est opiatorum sæpius usurpatorum. (3.) Nimis viscida & glutinosa dentibus inimica sunt, ut sunt omnia dulcia, saccharum, Ficus, uti & caseus: Hæc ipsa enim, ut promptè & tenaciter dentibus adhærendo, transpirationem eorundem propter necessariam nutritionem impediunt, ita & successivè acorem attrahunt, qui continuatâ sui adhæensione, successivè eisdem alterat: hinc & lac & quilibet lacticia, ob hanc rationem inimica dentibus observantur, eosque ad sui corruptionem seu cariem & successivam deficientiam disponere. Hæc ipsa gingivas simul plus minus alterando, & laxiores ac flaccidiore reddendo, indeque nutrimentum, pro dente per gingivas transmittendum, corrumendo, ipsos dentes insigniter lædere valent. (4.) Carie denique plus minus exesi dentes à lapide dentali seu lithodonto obsessi, seu sordibus variis inquinati, nigrique ac foetidi redditi, minus firmiter cohererent, sed successivè decidunt: Quæ posteriora vitia non nisi ex vitiata dentium nutritione privata, undecunque primitus orta, originem ducunt. In quem finem noto, nutriri dentem non solum per propria sua vascula, arteriolas & venulas, circa suam radicem implantatas, sed lateraliter etiam ex adhærentibus ipsis gingivis; unde & tam firmiter eorum, quousque sani sunt, est nexus, ut dens ceu osseum concretum, ex se indolens, quousque gingivis inuestitur, acutissimi tamen sit sensus, adeo mutæ vitæ & nutritionis centes sunt participes. Ac sanè particularis, ac præ aliis partibus propria dentibus est nutriendi & augmentandi ratio, adeo ut, cum continui attritione necessario imminuantur, nisi novâ eaque continua augmentatione reparentur, brevi penitus absumerentur. Quod ulterius ex eo patet, quod uno evulsio vel elapso vicini utrinque se dilatare magis soleant, & ex opposito ipsi respondens oblongari non nihil, & in prioris spatium aliquantulum subintrare observetur.

## DIAGNOSIS.

Dentium defectus per se, partim *autopsi*, partim ex relatione, patet.

Causarum verò diversitas dignoscitur vel ab antecedente violentia externa, vel diuturna Mercurii tractatione, vel ab hoc producta salivatione, vel à scorbuto: utpotè quibus prægressis, vel præsentibus, de causis certi erimus.

## PROGNOSIS.

Dentium defectus si fuerit à causa externa, de vicinis nihil metuendum, modò adhuc sint firmiores. Si verò oriatur à causa interna, v.g. scorbuto &c., reliqui facili sequuntur, & successivè elabuntur.



## C U R A.

Quoad *Curam*: dentes excidentes aut deficientes reparare, solius naturæ est, quæ in junioribus per recentium dentium subnascantiam priores alveolis suis extrudit, & defectum ita restituit. Quamdiu itaque dentium novorum primordia & quasi semina intra gingivas resistant recondita, novi dentes post priorum defectum renasci facile possunt: id quod non tantum genuini seu *s. p. entis* dicti dentes comprobant, sed quod etiam interdum in senectute dentes renati observati fuerint. Arti quod relictum est, saltim defectus illos naturæ nonnihil supplere potest, artificiales dentes ex ebore, vel dente hippopotami fabricatos, in istorum locum substituendo, pro loquelæ saltem gratia, non autem pro melioris Masticationis beneficio. Equidem exempla quædam prostant dentium sanorum, ex homine recenter revulsum, in proprios vel alienos alveolos denud insertorum, firmiter cum gingiva coalitorum, tanquam si nunquam dens defuisset, ita ut etiam masticatio fortis hoc modo perfici potuerit: sed quoniam adeo incerta res nondum confirmata est, eam in medio relinquo: vid. *Observationes Schenkii* pag. 202. ex *PARÆO l. 1. cap. de dentibus*, item *RIUERII* in *Observ. Communic. p. 357. vel 685.* & *BORELLUS l. 1. Observ. 10. pag. 18.*

Quod si dentes elabantur aut ab incauta Mercurii tractatione, aut salivatione, conveniunt medicamenta Solaria, aut ipsa folia auri deglutita, &c. Ubi autem malum fuerit à scorbutico, acrimonia feri scorbutica temperanda, quod *infra suo loco patebit.*

## ARTICULUS II.

## D E

DENTIIUM CARIE, FOETORE,  
ET VERMIBUS.

**C**ariem igitur dentis quod attinet: est hæc arrosio dentis, nunc maior nunc minor, quæ insensibiliter substantia eius absumitur, & nunc successivè excavatur, nunc altero latere pedetentim consumitur, donec successivè magis corrosus frustulatum excidat. Inchoat Malum ut plurimum in parvo puncto extrinsecus, quod nigrescit primitus, hinc foraminulum aperitur, sicque ad interiora eius penetrat, quæ quod teneriora ac molliora, indeque facilius dissolubilia, ed promptius absumentur, & dentem cavum reddunt. Conjungitur tunc, ad interiora ubi penetraverit corrosio, dolor, nunc maior nunc minor, prout radicem dentis nervæam diversimodè simul arrosierit. Ex corrosio ita dente nata sanies, ubi per dentis foraminulum relictum, ceu per fistulam, liberum spatium effluendi haud nacta fuerit, sed interiora magis ac radicem dentis unam alteramve, speciatim in maxillariibus, vitiauerit, acrimoniâ suâ nunc gingivam, nunc ipsam maxillam arrodit, & præsertim per illa huius foramina, per quæ vasâ in dentes subeunt, sensim extra effluit, & tubercula nunc in gingivis, nunc sub maxillis, excitat, quæ tandem exesa saniosum acre liquamen fundunt. Et licet curetur tale tuberculum & excitatum ulcusculum, subinde tamen quoties ex carioso dente sub nutritione vitiata nova sanies generatur, reciduat, & interdum in fistulam vel gingivæ vel maxillæ degenerat, adeo ut talia curari nequeant, nisi dens læsus euulsus fuerit.

*Fœtores* etiam subinde dentes carioli inferunt, halitum oris infici entem, præsertim si maior fuerit eorum euacuatio, ut alimæta carnosâ retenta in eadem putredinem attrahere queant.

Imò ex nutrimenti dentis carioli proprii corruptione, aut alimentorum mallicorum in iisdem retentorum putredine, *Vermes* in eorum cavitatibus generantur, gravissimorum dolorum aliorumque Malorum Auctores.

## C A U S Æ.

*Causa Cariei* est læsa dentis quacunque occasione nutritio, sine gingivarum vitætarum, & à contiguo dente abscedentium, indeque eius lateralem nutritionem impediendum, (unde scorbuticæ gingivæ vitio omnium frequentissimi Cariem patiuntur,) eveniat culpâ, siue ipse

*Ermuller. Oper. Tom. 11*

dens sub nutrimenti assimilatione, aut huius successiva transpiratione frustratus, ex illius corruptela, & in acidum corrosivum degeneratione, Cariem pedetentim contrahat. Acidum itaque ex nutrimento dentis degenerato, dentem corrodens cariem inducit.

*Causæ remotæ* rationem habent tam omnia dentes alterantia suprà allegata, quàm infrà circa gingivas, quoad dentium vacillationem, alleganda.

## P R O G N O S I S.

Caries dentium maturè curanda, aliàs sæpius recurrentes odontalgias, tubercula & paruos abscessus gingivarum aut sub maxillis, interdum etiam fistulas, circa dicta loca inferre potest.

## C U R A.

Quoad *Curam* cariosorum dentium, præsentissimum equidem remedium est dentis carioli euulsio, interdum etiam necessarium, si longius processerit Caries; cum faciliè aliàs contiguus dens contagio carioso infici, & hinc idem Malum contrahere possit: Ut taceam confirmatam Cariem aliâ ratione, quàm euulsione, curari non posse. Quamdiu verò vel non dum ed usque processerit malum, vel propter pericula, sub dentium euulsione interdum observata, hæc nimis metuatur, remediis res tentanda est, Cariei scilicet progressum ulteriorem inhibendo.

Evulsio appropriato peragitur instrumento, ac succedit ed melius, quod minus firmiter dens hæserit, & quod magis idem vacillauerit. Quod autem disponatur ad facilem magis, & minus dolentem euulsionem, remedia quædam à nonnullis adhiberi solent; ver. gr. Tithymali succus denti inditus: aut si ex eo & sale ammoniaco formentur globuli, aut cum farina triticeâ pasta, & cavitati dentis indatur.

Præter Tithymali lac alia ex simili lacteorum genere pari virtute pollent: ut Lac ficulneum farinæ admixtum; vel ex lacte Tithymali cum farina triticeâ subacta fiat pasta, quæ frixa in pinguedine ranæ facit dentes sine dolore cadere: vel farina siliginis misceatur cum lacte cataputiae instar pulvis, indatur denti cauo, sicque aliquamdiu permittitur, brevis sic cadere affirmant. Succus pariter chelidonii maioris, cauis dentibus inditus, eos frangit & eiicit. *PETRUS ASSELINÆUS* certum prodidit, quod si cicada, æstate inter segetes cantando se oblectans, confusa imponatur denti corrupto, tunc integrum illum eximi posse: vid. *VELSCHIIUS Mitomim. Cent. 2. Obierv. 82. annex. Anno 4. M. A. N. C.* Pinguedo item ranarum viridium, dentibus affricata, aut iisdem indita, dentium casum promouet: nempe coquuntur ranæ in olla vitreata affusa aquâ communi, & pinguedo quædam innabit, quæ dentis euulsionem promouet. Vel

*R. Gummi. ammoniac.*

*Sem. hyoscyami.*

*Succ. euuls. an. 3j β.*

*Mixtis addatur*

*Pinguedo ranæ viridis, & cera parum, f. Unguentum* denti extrahendo applicandum vel indendum.

*D. S.*

*Unguentum Singulare pro dentibus.*

De urina & dente canino, huic usui proficuis, vid. *SENERTUS l. 2. Prax. § 1. c. 10. p. 27.*

Cariæ verò ulterior progressus per artem & medicamentum inhibetur, efficacissimè imprimis per inustionem dentis carioli in loco carioso cum Cauterio actuali, siue ex ferro, siue, ob subtilitatem commodiorem ex argento vel auro factum; quo facto, auro foliato dens cauus repleatur; præservatur enim sic à maiori putredine & corruptione: Vel ex cera, cum myrrha probè subacta, vel potius cera viridi propter admixtam æruginem, impleatur dentis carioli excavatio. Ipsa Myrrha denti indita egregia est in hoc casu. Conf. hic *RIVERIUS in Observ. Communicat. p. 283. 49. 663.* ubi refertur, quod dentes terebinthinâ impleantur, & cauterio actuali dens inuratur in carie. Loco actualis cauterii, ubi necessum visum fuerit, potètiæ adhiheatur: Sic aqua Fortis denti carioso admota, vel spiritus salis gutt. j. vel ij. bombaci indita, ac denti adhibita, mire corrosionem juvat, & cariem præservare dicitur: item Zingiber in oxymelite coctum & in cavernam dentis immisum, præservat corruptionem. Coralliorum pulvis denti cauo inditus, vel os

*D 2 sepiæ,*



sepia, item camphora Cariei ulteriorem progressum inhibent: vel ex pulvere coralliorum alborum, cum melle rosato linimentum crassius redactum, dentibus illitum, Cariem inhibet. Vel

R. Corall. rub. præp.

Offis sep. pulv.

Corn. Ger. ussi præp. an. ʒ ij.

Myrrb. el. ʒss.

Camph. gr. v. vel vj.

Cum f. q. Mucil. tragac. f. pilule, dentibus cariosis excavatis indendæ. S.

Pilule singulares pro dentibus.

Factorem dentium ablata Caries sponte curat; Sin minus, gallia Moschata cum cypero & mastiche mista, denti cado indatur. Tollitur & fœtor dentium, si abluntur aqua, in qua sal ammoniacum dissolutum, post prandium & cœnam.

Vermes ex dentibus elicere subinde necesse est. Præstat hoc optime sabina in vino decocta, & in ore retenta, quæ copiose vermes elicit. Mucum seu reliquias chyli interiori tunicae ventriculi suilli seu pyloro adherentes, calentes adhuc, denti dolenti impositas, vermes elicere, traditur in M. A. N. C. Ann. 9. Observ. 187. Fumus item feminis hyoscyami specificus est, per infundibulum, susceptus ore, mirabiliter vermes expellit. Conf. *Alba Med. Haffniens. Volum. 1. pag. 209.* Suffitus item seu fumus ex fructu haliacabi confusus, cum cera mixto, facta exinde pasta, in laminam ferream ignitam injecta, fumum suggerit, quo, ore excepto, catervatim vermes cum sputo copioso reiecti, & crudelissimi dolores sopiti, observati fuerunt. Spiritus sulphuris quoque dentibus cum bombace inditus vermes optime necat, & dolorem inde oriundum placat: vel ex pulvere gallarum, cum succo radice pyrethri imprægnato paratur remedium, quod denti inditum vermes expurgat. Serum cervinum, quantum contra Vermes dentium valeat, vid. BARTHOLINUS Cent. 3. Hist. 96.

### ARTICULUS III.

#### D E

#### LAPIDE DENTALI, SEV LITHODONTO, ET DENTII NIGREDINE.

Quoad lapidem dentalem seu Lithodonton (ut vulgo ex vana persuasione vocant Tartarum dentium) huiusortum & Genesin optime delineavit HELMONTIUS *Traët. alimentis Tartari insontia* §. 22.

#### C A U S A E.

Nempe nutrimentum dentium laterale ex gingivis depravatum, sub sui perfecta cum dente assimilatione frustratum, & vitiatum, sicque in excrementitiam plus minus naturam degenerans, adhære scilicet saltem superficie tenus denti, ibique, quia iam ad duritiem dentalem ex aliquo sui pro nutriendo dente alteratione, determinatum fuit, ad indurescentiam quasi lapideam dentalem coagulatur saltem, & talem, plus minus tamen friabilem, duritiem acquirit, simulque, quicquid mucilaginis ciborum ac potuum imbibitis, simul sese fortiter indurat. Nunquam igitur sanæ gingivæ, & quæ cuspidali figurâ ad dentis medium assurgunt, hancque firmo amplexu retinent, dentalem hunc lapidem generare solent; bene autem laxæ, flaccidæ, cruentæ, minusque apte dentibus adherentes, adeoque externis injuriis ad sensilem dentis partem aditum permittentes, nec commodum nutrimentum suppeditantes, sed potius etiam laudabile pervertentes, hoc malum inducunt.

Par omnino est ratio sordidorum, nigrorum, aliore modo male coloratorum dentium. Quidquid enim hic subest vitii, non nisi productum morbosum & frustratâ & depravatâ privatâ dentium nutritione enatum, seu externa illa supra circa dentium casum, speciatim viscida, & dulcia, primam occasionem suggererint, seu gingivarum morbosus status, alterando nutrimentum dentium, & vitiando lateralem eius nutritionem in causâ fuerit. Sanè ut scorbuticis nil æquè familiare est, ac gingivarum pervarias subire passiones, speciatim cruentam flacciditatem, ita & in talibus dentium nigrities, & sordities frequentissi-

ma est. Nigrities sanè dentibus adhærens, quid nisi extruati ex gingivis, plus minus corrupti, & acore infecti cruoris, dentibus adhærentis, vestigium est, à cuius hostili præsentia, ut irritantur gingivæ, & inuiscantur dentis pori, ita ex facili hinc aciescentia erosio & cariei successivus progressus. Iuxta læsionem gingivarum & dentium læsio, indeque sordium excrementitiarum pluralitas ac veritas æstimanda: Hinc & ab inunctione Mercuriali pro cura luis veneræ, similive concitata saluatione, uti notabiliter vitiantur gingivæ, ita nigrescere subito, & pluribus sordibus inquinari observantur dentes.

### DIAGNOSIS.

Quoad diagnofin: Dentium Tartarus & Nigredo sponte nobis innotescunt: nec causarum signa distinctiva necessaria sunt, cum inter internas unica tantum adsit, utut externarum variaz dari possint, ut ex supra dictis patet.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognofin: Lithodonton & dentium nigredo gingivis, uti & dentibus ipsis, maximè nocent; quia ad totalem erosionem, crebriorem dolorem, aut præmaturum casum, facile disponuntur.

### C U R A.

Tophi dentium seu Lithodonton, eorumque sordities & nigrities, curantur per ea, quæ sordes distas abstergere, vitiosum earum acidum, gingivis & dentibus hostile, absorbere, & hinc blanda adstrictoria vi gingivarum tonum roborare valeat. Quod si longius processerit malum, & tenacior mucus dentes vitiauerit, potenter incidentia & dissolventia, & quicquid heterogenei fuerit, absorbentia, & quasi exedentia, adhibenda erunt, habendo semper respectum ad scorbutum plus minus præsentem. Convenient igitur in leviori modo os sepiæ, Corn. Ceru. ussum, mandibulæ lucii piscis, testæ ovorum calcinatæ, cinis nicotianæ, rorismarini, urina calida, cum qua fricantur subinde dentes & gingivæ, Tartarus calcinatus, aut parum Salis Tartari, aut aluminis ussi, cineres vegetabilium, ut nicotianæ, &c.

Duriora subiecta lapidea ex felice, pumice, &c. vitanda sunt, quia crebriori usu gingivas atterere, & absumere valent, ut rectè monet Zwelferus in Pharm. R. eg. pag. 101. nisi ubi fortius agendum; tunc enim, paulò tamen rariùs, adhibita minus nocent. Exempli loco sit farina Virginea Mynsichtii, egregie dentes dealbans, & à tartaro corrosivo purgans.

Hiscæ modò dictis convenienter radix Iridis Florentinæ additur, partim quia & ipsa conveniat, partim propter odoris gratiam, propter quem ultimum finem non inepta. Paratis dentifriciis, aliquot guttæ olei destillati caryophyllorum, aut ligni Rhodii, possunt addi: Ex. gr.

R. Corn. Cer. ussi ʒ iij.

Corall. ʒjss.

Rad. Ireos Flor. ʒ ij.

Alum. ussi,

Sal. tart. an. ʒ j.

M. f. pulvis: qui irroretur cum

Spiritu cochleariæ,

addendo

Olei destillat. caryophyllor. guttas aliquot

D. S.

Pulvis dentifricus.

Quod si dictis pulveribus color purpurascens conciliandus, Coccinogeliam in aqua aluminis solcanus, & cum hac adspargamus pulverem, qui exinde rubescit: sed leni admotus igni idem purpurascit.

Quod si pertinacius fuerit Malum, sordestenaciores, obstinata nigrities, firmius dentibus impacta, ac firmius conglutinata lithodonton, optimum remedium est spiritus salis cum melle ad gratiam saporis, vel quantum placet, mistus, & ita gingivis illitus. Spiritus Vitrioli suspectus est, cuius loco oleum sulphuris in f. q. aquæ communis dilutum, vel cum melle rosato subactum, adhiberi potest. Pertinet



et huc Opiata BORELLI c. 2. *Obferu. 65.*, ad grauius malum præfertim conueniens. Non incommodum est, si recipiatur Vinum, cui permisceatur spiritus sulphuris, ut acescat: huic immittatur radícula polypodii per viginti quatuor horas: quæ siccata, & loco dentifricii adhibita dentes firmat, mundat, & candorem iisdem inducit. Et ea, quæ de spiritu vitrioli refert RUIERIUS *in lib. 6. Prax. v. 2.*, potius spiritui salis, quam spiritui Vitrioli applicanda veniunt: Quod etiam facio iisdem liquor ex alumine usito, hic egregie conueniens.

*Pulvis dentifricus Principis Alenburghensis.*

R. Off. sepia,

*Cor. Cer. ad.*

Pumic. p. ap. an. ʒij. oburo

Moschi ʒj.

M. f. Balsam. cui adspargatur

Spiritus Vitis. ʒss.

& siccetur: Interim

R. Gran. Chermes,

Santali rubri an. ʒss.

Spiritus Vitis q. s. pro extrahenda Tinctura.

Irrora aliquoties prædictam puluerem & sicca.

D. S.

*Pulvis dentifricus.*

Non incommodum est, huiusmodi pulueribus dentifricis talem armoniam subinde addere, dentibus, gingivæ, ac omnibus oris partibus imprimis conueniens. Vel

R. Aqua plantag.

Sedi min. an. ʒij.

Sal. ammon.

Sal. Tart. an. ʒss. ad ʒj.

M. filtra, D. S.

*Aqua pro dentibus.*

Quæ ipsa dentes ab omni pastu abluuntur, & gingivæ blandè fricentur.

Sanè sal ammoniaci in aqua solutum, pro dentium ab omni pastu ablutione, foetorem eorum imprimis tollit: Sicuti maritima mundificatio cum urina humana dentes & gingivas à quàm plurimis malis præservat.

#### MEMBRUM IV.

#### DE

#### DENTIUM VACILLATIONE.

**D**entes sæpè etiam vacillant, seu minus firmiter gingivis connectuntur.

#### CAUSÆ.

Quod attinet *Causas*, dentes hoc vitium contrahunt vel propriâ, vel alienâ, scilicet gingivarum, culpa: Propriâ eadem est, sed in minori saltem gradu, quæ & dentes decidere penitus & cadere facit: de quo sæpius sufficienter actum: Aliena gingivarum culpa consistit in eo, quod fibrosa illarum caro vel mollis, vel flaccida, vel similitudina, vel etiam non nihil exulcerata, adeoque in omnibus his casibus plus minus cruenta, simul evadat. Rarum est, quod in SCHENKII collectis *Obseru. l. 1. cap. de Dentibus pag. 200* refertur, ex defluxione in dentium alveolos, hos hypsèa pituita interdum impleri, ut dentes extrudantur: suspicor tamen, non tam ex defluxione, quàm Lapidis seu topi dentalis uberiori incremento, potius vitium hoc ortum traxisse. Ita verò mala gingivarum oriuntur frequentissimè saliva, vel in genere acrioris, vel in specie scorbuticæ sapore, seu vitrioli acri sale inquinatæ culpa, à qua totius fibrarum gingivarum resolvi & emolliiri, penetrari eadem, & plus minus successivè non raro sensili admodum cum pruritu erodi assolent, vasculis sanguineis, unà per diæ resin vitiatæ, sanguinem paulatim fundentibus.

Postea & Mercurii usus, tam pro salivatione excitanda, & hinc acrioris & præternaturalis ejusque copiosioris salivæ profluvio, quàm faciei pro usu cosmetico applicatus, ordinario gingivam valdè laxare, & omnes dentes hinc mobiles quasi reddere solet. Huc pertinet etiam opiatorum usus in Odontalgia.

#### DIAGNOSIS.

Dentium vacillatio ex relatione faciliè innotescit.

*Etiomull. Oper. Tom. II.*

Causarum verò signa distinctiva cognoscuntur, vel ex antecedentibus, e. g. Odontalgia prægressa, salivatione Mercuriali, vel conjunctis, v. g. scorbuto, &c.

#### PROGNOSIS.

Dentium vacillatio, quæ ab Odontalgia oritur, ut plurimum spontè remittit.

Quæ & à salivatione Mercuriali, hæc cessante, pariter cessat, modò non adsit gingivarum nigredo.

Vacillatio dentium à causa interna sæpè est diuturna, qua dentes tandem faciliè elabuntur. Quod si ulterius cedat negotium, vitari magis gingivæ, exulcerari, profundius absumi eadem, vel corrumpi etiam, & ad gangrænam disponsi assolent. Malum, quod in genere Scorbutus, appellatur.

Quod si firmior paulatim gingivarum fuerit textura, relaxata eadem nihilominus sanguinem uberius in se recipit, & spuria intumescit & exerceat carne laxi, flaccidi & sordidi, & faciliè ad tactum cruorem stillante, in gingivarum hinc dicta excrecentia seu dentium superincarnatione.

#### CURA.

Ut igitur removeantur hæc mala, præmissa debita radicis morbosæ internæ curatione, gingivæ flaccidæ, tumidæ, cruentæ &c. adstringendæ; exulceratæ absorbentibus & mundificantibus ac adstringentibus consolidandæ; corruptæ, & plus minus gangrænatæ, ab ulteriore Mali progressu præservandæ. Conveniunt igitur flores rosarum rubrarum, flores aquilegiæ, & ex his paratum Unguentum de aquilegia ad scorbutum oris præsertim proficuum: Descriptio prostat in TILMANNI *Mat. Med. Cornu Cervi, & Ebur vitulum, laccæ & Myrrha, aluæ, tam crudum quàm usitum, lapilli cancerorum, solia quercus, ligustici, radix Irenæ florentinæ, bistortæ, tormentillæ, flores malvæ arbutescentis, nasturtium aquaticum, ruta, salvia, rosmarinus. Ex his vel sunt pulveres dentifrici, cuius exemplum vid. in BARTHOLINO *Cem. 6. Hist. 54.* qui elegans est pro dentibus scorbuticis: imbuatur ulterius cum spiritu Cochleariæ, ut ita melius approprietur. Item*

R. Flor. Malvæ arb. rubr. ʒss.

Cor. Cer. usi præp. ʒij.

Alum. usit. ʒss.

Nuc. Mosch. an. ʒj.

M. f. Pulvis subtilissimus. S.

*Pulvis dentifricus.*

Quo post oris collutionem, & dentium purificationem, bene fricentur gingivæ. Vel ex iisdem fiat Decoctum: v. g. ruta in vino decoquatur, quo calidissime os eluatur, egregio cum successu contra hos affectus scorbuticos. Salvia, item rosmarinus, decocta in aqua cum pauco addito alumine, egregius est gargarismus ad dicta dentium vitia.

R. Herb. salv. opt. M. ʒss.

Flor. malvæ arb. rubr. Mj.

Rad. polypod. ʒss.

Fiat Decoctio in Aqua font. q. s.

Colat. ʒj. adde

Mel. rosar. ʒijss.

Nutri ammoniaci ʒij.

Alum. usit.

Terr. sigill. an. ʒj.

Misc. pro Dentulorio. S.

Aqua pro dentibus.

R. Herb. lacc.

Cochlear. an. M. iij.

Coque in f. q. lactis:

Colatur. R. ʒj. adde

Succ. Cochlear. rec. ʒij.

Syrup. aquileg ʒiv.

M. pro Gargarismate.

D. S. ut antea.

Aliquandiu in ore teneatur.

Pertinet hæc Gargarismus de Tormentilla *Myns. p. 403. Decoctum ad gingivas roborandas Peterii in Pharmac. p. 313.* Si quoque aliud quid, certè myrrha & laccæ in istis gingivarum vitiis sunt præstantissima: Hinc Tinctura laccæ, Myns. est nobilissimum remedium in scorbuto & putredine gingivarum & oris, cui commodè Myrrha associari solet. Nam sola myrrha crebrius masticata præservat



egregiè contra scorbutum oris. *Tinctura lacca* prostat p. 46. *armamentar.* MYNSICHTII, & confer. M. A. N. C. *Ann. 6. App. Tit. 10. pag. 76.* B. D. MICHAELIS *Tincturam lacca* parabat ita:

*R. Phlegm. virioli qu. v.*  
in quo dissolv.

*Alum. ussi q. f.*

Solutionem hanc digere cum

*Lacca pulverisata,*  
donec tingatur.

Non inconsumtum foret, si addatur Myrrha, vel promiscuè ejus Tinctura. Vel

*R. Lap. Medicament. 3j.*  
Solve in

*Aqua Plantagin. ʒj*

*Colatura D. S.*

*Aqua pro Dentibus.*

Huc immissa spongiola applicetur loco affecto.

Vel

*R. Aqua Sedi min.*

*Prunell. an. 3j.*

*Spiritus cochlear. 3ij.*

*Mellis rosati. 3vj.*

*Spiritus salis q. f. pro grato sapore.*

*M. S. ut antea.*

Humectetur linteam & fricentur dentes & gingivæ, à scorbuto male se habentes. Vel

*R. Aqua prunell.*

*Salv. an. 3j.*

*Spiritus Cochlear. 3j.*

*Alum. ussi. 3ss.*

*Mell. rosati 3vj.*

*M. S.*

*Mixtura pro dentibus, & gingivis.*

Porro ulterius mel rosaceum, cum spiritu salis tantillo usque ad gratum acorem imprægnatum, omnia ulcera & putredinem partium in ore sanat, si præsertim ex scorbuto originem ducant, in specie, si simul cum Decocto salviæ subinde abluantur gingivæ. Egregium quoque est *Linimentum Hartmanni* ad hos gingivarum affectus, quod describit in *Praxi Chymiatr. pag. 123.*, sed cui non incommode myrrha addenda venit, ad imitationem SENNERTI in *Prax. lib. 3. p. 3. sect. 2. cap. 7. pag. 633.* Cui simile est elegans *Linimentum contra oris & gingivarum scorbutum*, quod habet DECKERS in *Comm. in Prax. Barbette p. 156.*; cuius loco possit etiam recipi:

*R. Alum. crudi 3jss.*

*Flor. aquileg.*

*Fol. Salvie an. 3ij.*

*Rad. Ireos Flor. 3jss. vel 3ij.*

*Myrrh. el. 3ij.*

Cum f. q. Mellis rosati f. *Linimentum,*

Egregium ad vacillationem dentium scorbuticam.

Vel

*R. Rad. bistort. 3ij.*

*Flor. rosar. rub. 3j. vel 3jss.*

*Balaust. 3j.*

*Alum. ussi 3ij.*

Irroretur aliquot guttis olei destillati caryophyllorum, & imprægnetur largiter Spiritu cochleariæ, qui ad oris scorbutum est egregius. Vel

*R. Pulv. rad. bistort. vel tormentil.*

*Flores balaust.*

*Rosar. rubr. an. 3j.*

*Myrrh. el.*

*Alum. ussi an. 3j. ad 3ss.*

*Mell. rosat. q. f.*

Melli ad ignem liquefacto inspergantur sensim pulveres, f. *Vnguentum.*

*D. S.*

*Vnguentum pro dentibus contra Aphthas, & Scorbutum.*

Hoc illinantur gingivæ & partes malo scorbutico affectæ.

Quod etiam pertinet *Linimentum SCHROEDERI*, p. 300. l. 2. c. 87.

*R. Rad. Ireos Florent. 3j.*

*Pumic. 3jss.*

*Alum. ussi 3ss.*

*Lapill. Cancr. præp.*

*Corall. rub. præp. an. 3j.*

Excipe cum melle rosato,

*D. S. ut antea.*

*Linimenta hæc*, tam pro gratia odoris quam propter vim specificam, oleo destillato caryophyllorum imprægnari possunt.

Præter hæc in excrecentia gingivarum scorbutica succus quoque Cochleariæ, cum alumine usso mistus, perquam egregius est. Sicuti ad hæc ipsa gingivarum vitia ex scorbuto nulli cedit vermicularis, cuius decoctum cum alumine & melle nobile experimentum est, gargarizando usurpatum: vid. M. A. N. C. *Ann. 6. Observ. 22. p. 50. Is DIGBY Medic. Experimental. P. 2. p. 78.* Itidem egregia est mixtura pro his gingivarum malis ex aqua calcis viuz cum alumine crudo & usso, ac radice Ireos Florentinz; quod in mentem revocat aliam non inconvenientem *Misturam efficacissimam in scorbuto oris*, nempe cremorem aquæ calcis viuz supernatantem saliformem:

*R. Huius Cremor. 3ij.*

*Gummi lacca 3ij.*

*Vitriol. Cypr. gr. vj.*

*Aqua rosarum,*

*Salv. an. 3jss.*

Solve calore levi, ut probe imprægnetur à Lacca.

*D. S.*

*Mixtura pro dentibus contra scorbutum oris.*

*Mixtura hæc* laventur gingivæ, & egregii usus erit.

Ac meritò extollitur usus lacce; Nam B. D. MICHAELIS aliquando putredinem gingivarum scorbuticam tantam, ut gangrænam minaretur, & propter intensissimum foetorem nemo juxta ægrum commorari posset, per solam Tincturam lacce, præmissis internis universalibus, feliciter restituit. Vel

*R. Gum. lacce 3jss.*

*Alum. ussi 3j.*

Excipe cum

*Mellis rosati 3vj.*

adde

*Spiritus salis parum pro grato sapore.*

*D. S.*

*Linimentum contra putredinem gingivarum.*

Affricetur subinde gingivis. Juxta Laccam hanc nobilissima est Myrrha; v. g.

*R. Fol. Salv.*

*Alum. ussi.*

*Maxill. Lucii pist. calcin.*

*Myrrh. an. 3jss.*

*Mellis q. f. pro linimento ad fricandos dentes,*

*D. S. ut antea.*

Quod si efficacius postuletur, aliquot guttis *Spiritus salis* imprægnetur.

In graviore morbo ulterius procedendum est, atque sic, præter *Linimentum Hartmanni* supra laudatum, ad *Vnguentum Egyptiacum*, cum melle rosato probe permixtum, deveniendum, pro graviore exulceratione aut inde metuendis malis gingivarum curandis. Vel

*R. Alum. ussi,*

*Salis ammoniaci an. 3j.*

*Maffich.*

*Thuris. an. 3ss.*

*M. f. Pulvis, S.*

*Pulvis densificans contra putredinem gingivarum.*

Affricentur gingivæ, postea quam ante & post *Decocto salviæ*, tormentilla ac rosarum rubrarum os elotum fuerit.

Imò interdum aqua forti graviore gingivarum luxuries sedanda. Conf. item *Linimentum SENNERTI lib. 2. Prax. p. 1. cap. 16. p. 52.* Aut denique aquæ virides ex viridi æris, pauco auri pigmento, alumine, & quibusdam Vulnerariis, addito melle in aquam infusis & decoctis, hic commodè adhiberi possunt: quo affricte gingivæ à luxurie, flacciditate & putredine, defenduntur: e. g. sit vel *Decoctum viridis æris in Decocto quodam*, vel *aqua viridis Hartmanni Prax. pag. 110.*, vel *Aqua Viridis PLATERI* cuius descriptio prostat in *sine Observationum eius*. Harum basis est viride æris cum vino, aut melius aceto: associantur quoque Colcothar, cerussa, alumen, &c. Vid. SCHROEDERI *Pharmacop.*



## ARTICULUS V.

## C U R A.

## D E

## DENTIIUM STUPORE.

**S**tupe tandem seu Hemodia affici dicuntur dentes, sicque Masticationem impedire, quando speciali doloris genere afficiuntur.

## S U B J E C T U M.

*Parti affecta* in dentium stupore est horum periostrum tactu quasi semi-privatum.

## C A U S A E.

*Cause* sunt vel interna vel externa. Interna causa est lymphæ salivalis aciditas: Inter externas sunt acida, vel assumpta, vel vomitu rejecta.

## D I A G N O S I S.

*Diagnosis* ex agri relatione patet.

## P R O G N O S I S.

Dentium stupor à causa externa spontè remittit, nisi objectum fuerit magis contumax.

A causa interna dependens, ut plurimum est diuturna, & sæpe redit.

Curat stuporem dentium portulaca recens masticata; caseus tam recens, quam vetustus, adeoque alcali manifestiore dives; siliqua ceracea masticata; item calidum ovi vitellum ad duritiem coctum applicatum. Omnium optimum est calida urina applicata.

## M E M B R U M VI.

## D E

## DENTIIUM ALGORE.

**A** fine dentium stupori est Algor dentium, dum frigoris attractu notabiliter alterantur: Nempe acidum & frigus inimicissima existunt dentibus, unde illorum nimia impressione afficiuntur fibræ illorum interiores & quasi irritantur, ut à cuiusve objecti actione specialis quidam dolor in dentibus percipiatur, Masticationis negotium insigniter impediens.

## C U R A.

Algorem hunc spiritus vini dentibus affricatus, vel panis calens masticatus, vel vitellum ovi assatum, calidè masticatum: item Theriaca dentibus affricata, huic malo medetur.

## S E C T I O IV.

## D E

## DEGLUTITIONE LÆSA.

**C**ibus ita in ore præparatus ulterius protruditur inferiora versus, quæ actio deglutitio dicitur, fitque, dum linguæ beneficio ad gulæ partem superiorem, eiusque expansam cavitatem, Pharynx dictam, devolvitur: cibus protrusus imprimis à sphinctere, se angustante, promovetur, & oclusi laryngis rimulâ deorsum pellitur, quæ pulsio per fibras carneas musculosas, œsophagi tunicas cruciatim investientes, motuque peristaltico se successivè contrahentes, continuatur, donec cibus in ventriculum ingeratur: ita ut actio hæc fibrarum musculosarum, & spirituum animalium beneficio peracta, in principio voluntaria, in progressu verò involuntaria, dicenda sit. Fibrarum musculosarum ipsiusque œsophagi accuratam Anatomem videb. in WILLISII Pharm. Rat.

Deglutitio læditur, quando vel impeditur seu imminuitur, aut deficit, vel quando depravatur. Imminuitur

1. Oesophagi ex parte,

2. Stomachi, seu orificii ventriculi superioris culpa.

Oesophagi vitium est (I.) quando tam musculorum eius tria paria, fauces sui ampliatione efformantium, unâ cum sphinctere, paralyti resolvuntur, quàm ipsa musculosa eius tunica simili malo corripitur. De posteriori vid. WILLISIUS Pharm. Rat. Vol. 1. p. 11. de priori TULPIUS l. 1. obser. 42. (II.) Propter ejusdem convulsionem & spasmus: quando propter eius contracturam & angustiam nimiam alimenta non possunt deorsum protrudi. Sive hoc fiat (1) vel à tumoribus, tam propriis, quàm partium vicinarum: Illud quando inflammatur Symplicite, aut quando scirrhuso tumore obsidetur, quando à caruncula excrecente vitatur; exempla quorum vid. in RHODII obs. 46. & 47. C. 2. Hoc, quando tonsillæ, aspera arteria, aut uvula intumescunt, inflammantur. Sive hoc fiat (2) ab arcta nimis clausura & strictura fibrarum eius; idque nunc ex spasmu seu convulsione; quæ pertinent Hypochondriaci subinde, non secus ac mulieres hystericæ, gulæ adstrictionem, & contracturam per nervorum spasmos ob consensum patientes, quod alii ex vaporibus stypticis ex hypochondriis clatis, fauces stringentibus, malè derivant: Nempe pertinet huc gulæ strictura ab utero, cuius mentionem facit HELMONTIUS Tract. Asthma, & Tussis § 13. Hinc

Et d. allier. Oper. Tom. IV.

etiam in epileptico paroxysmo difficillima aut nulla solet esse deglutitio: Sicuti & stupenda convulsio & contractio faucium à vermibus videri potest in THONERO lib. 2. Observat. pag. 94. Nunc ex illarum nimia exsiccatione in febribus ardentibus continuis; Quod suo modo etiam pertinet defectus salivæ, deglutitionem plus minus impediens, quia non satis madet gula; post exercitium etiam nimium potest sequi. Nunc ex illarum ab assumptis constrictione & conglutinatione; quo HOCHSTEDTERI facit Obser. Decad. 3. C. 5. de adstrictione gulæ ex potu vini Malvatici, in quo radix consolidæ majoris infusa fuit; unde acetum solvit illud: hinc ancilla virginitatem minus presentem balneo eius adhibito palliavit. Sive hoc fiat (3) ab obstructione, propter deglutita varia, aut maiora in faucium isthmo sive principio œsophagi hærentia, uti boli Majores, nux Persica, ovum gallinaceum, &c. aut acuta gulæ infixæ, ibique tam sui insolitæ præsentia, quàm propter dolorem, & huius occasione inflammationem aut abscessum, deglutitionem impediens; v. g. osicula, spinæ piscium, aciculæ gulæ infixæ.

Orificium superius ventriculi seu stomachus in culpa est, quando ritè licet, per œsophagi iter demissa, nihilominus admittere debite recusat: id quod fit imprimis, quando quæcumque occasione irritatus seu laceratus, contumacis se stringit & claudit, adeoque assumpta ulterius progredi impedit. Id quod fit (1.) quando vel inflammatum, vel excoriatum, aut plus minus exulceratum, vel tumore quocumque, à priori nullo modo cognoscibili, obsessum fuerit: quod facit curiosa & notabilis Observatio WILLISII Pharm. Rational. Volum. 1. pag. 45. (2.) Quando copiosiores, plus minus aciores, flatus in eiusdem angustis inclusi fuerint, quorum inimici præsentia utrumque, speciatim superius, orificium ad pertinacem sui stricturam irritatur; unde assumpta non nisi difficulter admittit, aut admissa eadem copiosi flatus eructantes insequuntur, eaque plus minus simul unâ rejiciuntur: quod facit non inelegans Obser. RIUERII 2. de Morbis infrequentibus, item PLATERI Obser. lib. 1. pag. 223. (3.) Quando quacumque de causa nauseat, aut assumenda horret ventriculus; nam & sic orificium claudit, non assumpturus si bi hostilia. Hac ratione familiare est febricitantibus,

D 4 quæ-



quælibet liquida aut esculenta fluida deglutire, sed carnes, ova fixa vel similia pertinaciter respicere, & oblata nullo modo, aut non nisi difficulter, admittere. Pertinet huc Observatio AMATI LUSITANI *Cent. 6. Cur. 49.*, ubi post creatum sanguinis, & assumptorum corruptionem, deglutendi omnimoda difficultas etiam aquæ, solâ vini assumptione salva. Conferatur HILDANUS *Cent. 5. Observ. 34.*

Tandem depravatur deglutitio, & imprimis triplici modo:

1. Fit sæpius in morbis, ut liquida optimè possint deglutiri, non solida: vid. PLATERUS: Id quod fit ob vitium gulæ: in specie ob eius angustiam vel tumorem.
2. Accidit nonnunquam, ut solida faciliè deglutiri possint, non verò liquida; quæ hausta subito cum suffocationis metu per os & nares redeunt: quale exemplum habet SANCHEZ.

Vitium hoc fit propter laryngem, ob epiglottidem non perfecte claudentem laryngis rimulam, quæ à solidis quidem deprimitur, liquida verò dum in laryngem apertam penetrare inchoant, ex suffocationis aut doloris sensu cum impetu regurgitant, & quæ data portâ per os & nares prodeunt: Quo pertinet durities ossæ epiglottidis non rite claudentis laryngem: de qua vid. Barbette in Anat. Practica, & in Coll. nostro Institut.

3. Depravatur, quando in eodem assumptorum vel solidorum vel liquidorum genere quædam faciliè, quædam difficulter, quædam omnino non deglutiri possunt: de cujus ratione infra, speciatim ex nausea ventriculi, constabit.

### PROGNOSIS.

Quoad *Prognosin* igitur: Deglutitio quò magis vel minus tollitur, eò magis etiam vel minus periculum vitæ imminet.

A paralyti musculorum faucium nata difficilis deglutitio, periculosum & difficulter curabile malum est.

Quod si ob spirituum mouentium defectum, & adeò insignem virium resolutionem, prout in acutis interdum accidit, malum evenit, pessimum signum, & mortis futuræ indicium.

Si cum sonitu; quasi in lagenam vacuum, decidit potus, malum. In vulneribus si accidat ex convulsione Deglutitio laesa, periculosum: sicut aliàs convulsiones faucium in acutis periculosa, in Chronicis minus.

Si à tumoribus per se quidem, & ex interna causa naturali oritur malum, pro tumorum vel faciliè, vel difficulter, vel omnino non curabilium natura, prognosin faciliè est: sic v. g. ex ulcere œsophagi cancroso omnimoda, adeoque lethalis deglutendi impotentia: sic ob œsophagum cartilaginofum factum deglutitio penitus abolita: vid. *ann. 3. M. A. N. C. Observ. 170.*: adeoque lethalis.

Deglutitæ res alienæ in faucium isthmo vel hærent, vel extra hunc, vel ad ventriculum tandem descendunt. Dum in faucibus hærent, præter inimicam sui præsentiam interdum simul dolorem excitant, unde tumor, inflammatio, abscessus, iique vel lethales: de quo vid. HILDANUS *Cent. 1. Obs. 35.* Item *Cent. 5. Obs. 35.*, ex officulo œsophago infixio tumor, dolor, Febris, inflammatio, Mors: vel hoc rupto abscessu rei peregrinæ cum pure excretionem, aut descensum faciunt: Conferatur idem HILDANUS *Cent. 1. Obser. at. 3.*, ubi mulier officulum devoratum, quo penè suffocabatur, septimo tandem die, excitatâ suppuratione, egresserit: Vel per alia plus minus vicina loca exitum sibi quaerunt: Quod facit exemplum notabile PARÆI *l. 24. c. 29.* Chirurgia de graminis ramulo deglutito, qui postea integer per intercostale spatium erupit: Idem HILDANUS *Centur. 1. Observ. 33.*, ubi spina piscis putrui per biennium infixæ, post excitato abscessu in extrema colli parte extracta: sicuti etiam officula, ex læsione claviculæ sinistri lateris secedentia, tussî post semestre spatium excreta, legantur in *M. A. N. C. ann. 4. Observ. 175.*

Dum verò ad ventriculum quocunque modo descendunt, vel inferiùs per anum successivè denuò excluduntur; dum v. g. miles metu, ne in itinere spoliaretur, sex ducatos deglutivit, eosque post aliquot dies Clystere abstergente sine noxa rursus reddidit, teste MICHAELIS. vel dum fistula deglutita tertiâ die sine noxa per alvum fuit reddita, Autore Bartholino *C. 1. Hist. anat. 57.* Vel in sto-

macho pertinaciùs hærentes varia mala inferunt; dum v. g. pylorum obstruunt, quæ obstructio, si contumacior fuerit, mortem comitem trahit, Autore KERCKRINGIO in *Spicilegio Observat. 1.* Conferatur etiam HILDANUS *C. 9. Observ. 35.*

Quò etiam pertinent aciculæ, quarum quædam sine periculo, quædam cum summo periculo deglutitæ observantur: conf. *M. A. N. C. ann. 4. p. 77.* Vitri frustula ut annulus, cuius asperitate excitatam dysenteriam notat ZACUTUS LVSITANUS *l. 2. Med. Princ. Histor. 84.* Cæterorum huc facientium affectuum Prognosis, ex dictis facilis est.

### C U R A.

*Cura* horum affectuum pro eorum varietate, & mali inde nati diuersitate, etiam variat. Si paralytis, ex generali paralytismo & convulsionum cura patebit: in specie tamen si vitium paralyticum circa fauces, & principium œsophagi in culpa sit, convenit Decoctum salviæ & erucæ cum vino paratum, in ore aliquamdiu detentum: vid. PLATERUS *l. 1. p. 209. Observ.* Item Decoctum eiucæ & sinapi, pulegii, nasturtii: item nux Moschata masticata & deglutita est egregia: item aquæ vitæ infusionis thymi, simili ratione in ore detenta, vel & infusionis florum lavendulæ cum aliquot granis castorei simili modo in ore detenta: Item aqua apoplectica, epileptica, &c. in ore detenta: essentia castorei, spiritu theriacalis cum essentia castorei junctus, ceraforum nigrorum, anisi, liliorum convallium, aqua Anhaltina, item succus salviæ mistus cum synapi, item mistus cum nuce Moschata & castoreo, & instar linctus deglutitus: terebinthina cum aqua primulæ veris mediante vitelloovi mista, successivè deglutita valde convenit: item oleum succini destillatum, aut oleum destillatum anisi, salviæ, &c. guttatim inter fauces injecta, egregiè conducunt.

Externè collum regioque vicina inungenda oleo lumbricorum terrestrium, costino, spirituum umbricorum terrestrium cum oleo destillato succini, anisi, lavendulæ, caryophyllorum, & similibus. Quod si tumores harum partium œsophagum angustent, & ita deglutitionem impediant, pro generali tumorum Curatione, vel quædam difficultatibus Scutellæ, & ierui, vel suppurantibus, siquidem cogniti fuerint quales sint, removendi sunt.

*Clausura faucium & œsophagi* à Spasmo, aromaticis & nervinis, blandis opiatis, additis tam internis, quàm externis, curanda. Ad deglutitionem spasmo quasi impeditam, pertinet etiam suo modo, quando in febribus ardentibus aut malignis sine faucium tumore aut læsione sensibili, sed ex ariditate faucium & linguæ, & proprii œsophagi exsiccatione, deglutitio aboletur: id quod pessimum signum esse solet; fibræ enim musculosæ & laryngis quasi convulsæ & exsiccatae sunt, ut deglutire non possint: levari tamen potest non nihil per gargarisma CORNARI *Observ. 10.* ex aqua tepida cum pauco aceto, vel etiam per mucilagines seminum cydoniorum cum aqua spermatis ranarum vel prunellæ paratas, faucibus crebriùs illitas, & blandè deglutitas. Externè *Unguentum* ZACUTI LUSITANI *l. 1. c. 1.* admittit ad hunc affectum, compositum ex *unguento Filii Zachariæ*, unguento rosato, resumptivo, oleo amygdal. dulcium, violarum, & mucilaginis cum lacte muliebri.

Salivæ defectus potu præsertim vini vel cerevisiæ succundariæ refarcitur; item crystalli frustula in ore circumacta salivæ copiam non nihil provocant.

Assumpta externa pro sui varietate oppositis curandâ; ut in illo HOECHSTEDTERI exemplo, propinato acido stranguatio & faucium angustia sublata fuit.

Ad spasum œsophagi, deglutitionem impediens, pertinet etiam, quando Hypochondriaci aut hysterici fauces quasi constringi, & cum loquela plus minus impedita deglutitio inhiberi solet, propter spasum dictarum partium. Curatur imprimis absorbentibus acidum primarum viarum appropriatis, simulque vi aromaticæ nervis conducentibus: hinc Martialis, bolus Armena, terra sigillata, maxillæ lucii piscis, dens apri, corallia, Corn. Cerviustum, nux Moschata, opiata. D. MICHAELIS curavit spasum ex malo hypochondriaco cum pulvere absorbente ex creta. Lapilli cancerorum, item essentia castorei & castoreata, spiritus salis armoniaci & similia in talibus pathematibus sunt optima: vid. SENNERTUS in *Prax. l. 3. sect. 1. c. 1. p. 7*, SCHENCKIUS *l. 3.*, WILLIS *Pharmacop. l. 1. c. 10.*



*Rational. p. 45.* Res alienæ variz subinde deglutiuntur non levem molestiam inferentes : Inter quas sunt frusta vitri, pro quorum noxa avertenda, & ut sine damno per inferiora tandem excludantur, convenit in specie puls paulò spissior ex oryza vel milio, vel panico, debite copiâ assumpta, sine omni desuper ingesto potu: id quod etiam suo modo in aciculis à mulieribus deglutitis confert, item in spinis piscium aliisve acutioribus ad stomachum delatis obtinet: Sic per huiusmodi spissiora involute res deglutitæ acutiores sensum ex ventriculo per intestina ulterius promoven- tur. Aciculæ deglutitæ subinde gravia inferunt sympto- mata: Interim tamen, si ventriculo sint infixæ, adhibet HILDANUS *Centur. 6. Obs. 36.* olei amygdalarum dul- cium & saccharum, in forma Elevariis mista, ante pas- tum, ut ita dolor per olei leniri, per saccharum verò ul- cus fortè præsens abstergi possit. Nam quanta mala infer- re possint aciculæ, videatur in HILDANO *Obs. 32. Cent. 1.* THONERUS *pag. 136.* aciculam per vias urinarias observavit. De Cultrivoro Prussico DANIELIS BE- CHERII *Professoris Regiomont. Kerkvings in spicilegio Anatomico obs. 44.* Alias res deglutitæ in faucibus vel hæ- rentes, vel etiam in asperam arteriam, aut ejusdem ra- mos, ex improvise dilapsæ, aut intra œsophagi superio- rem tractum adhuc hærentes; ea iterum artificiosè exi- menda veniunt, vel ulterius promoveantur, deorsum tru- dendo, vel tussu vel artificiali sternutatione, vel in specie excitatò vomitu per vomitorium liquidum infusum denudò foras eiciuntur, propinando simul crebrius emollientia

oleosa pro viis magis lubricis reddendis: Aut denique, si his modis non succedat negotium, instrumentis res tentan- da; in quem finem vel forcipes rostris longis, vel Instru- mentum WILLISII *Pharmac. Rational. Vol. 1. pag. 48.* aut HILDANI *C. 1. Obs. 36.* aut huius succedanea *C. 6. obs. 34.* vel Candela cerea, vel spongiola cum filo, item pro aci- culis hamulus HILDANI *C. 1. Observat. 31.* adhibeatur, quo foras extrahantur; quia periculum aliàs est, ne diu- tius in œsophago hærendo, tandem ex dolore inflamma- tionem & abscessum suppuratum, si non mortem ipsam, inferant: Conf. HILDANUS *Cent. 5. obs. 35.* Denique observandum est, subinde res quædam duriores in isthmo sau- cium diutius hæere cum tussu, & variis symptomatis quasi phthisicis, quæ omnia re extraneâ interdum spontè excre- tæ evanescent: vid. HOCHSTEDTERUS *Decad. 6. obs. 10.* BORELLUS *Cent. 4. Obs. 63.* PANAROL- LUS *Pentecoti. obs. 7.* In stomacho si fuerit vitium, p. vii ex causa, vel mala ejus methodicè curanda, vel instrumento WILLISII *Pharmac. Rational. Voian. 1. p. 45.* utendum. Si ex secunda causa, Carminativa externa & interna propinanda, infra de inflammatione stomachi dicenda. Quoad tertiam causam, stomacho gratis & acceptis insitendum.

Depravata Deglutitio, cum quædam curabilis, quædam non curabilis, illa verò nervorum ex vitio speciatim oria- tur, partim ex jam supra tractatis, & prolixè satis al- latis ac dictis, partim suo loco dicendis, Curatio ma- nifesta erit.

## S E C T I O V.

D E

## CHYLIFICATIONE LÆSA.

DE Chylificatione seu Chylificatione notum est, quomodo fiat: Nempe promota à alimentis ad stomachum, trans- mutantur ibidem in liquorem pulvaceum secundum Vete- res cremori præparatæ similem, Chylus appellatum; idque non effectivè à calore, sed beneficio fermentationis planè singularis, quam calor stomachi & ambientium viscerum non leviter promovet: de qua Chylificatione videantur MOEBIUS in *Fundament. p. 168.* HELMONTIUS *hinc inde in suis scriptis, in specie Tractat. sextuplex Digestio,* item Sylvius in *Dissertationibus Medicis Dissert. 1.* item CHARLETON in *œconomia animalis Exerc. 2.* item THOMAS CORNELIUS CONSENTINUS *Pro- gymnasii. Medic. & quidem 6.* denique KERGERUS *Tr. de Fermentat. sect. 3.* GORRÆUS in *definitionib. Medic. de Epistola pag. 276.* DIEMERBROEK *p. 29. & seqq. Anatom.*

Fermentatio hæc, qua transmutantur alimenta in Chy- lum, dependet imprimis à succo subtili acido salino, seu fermento spirituofo in stomacho saltem reperibili, qui partim instar Menstrui dissolvit cibos, partim volatili aci- ditate cum alimentorum particulis dissolutis, in specie salinis alcalibus, fermentationem efficit, & ita utriusque actione successivè eadem in aliam essentiam, liquorem nempe plus minus spissum lacteum, salsum, volatilem, temperatum, Chylum dictum, quem non immerito liqui- diori cremori vel præparatæ assimilant, transformat: Et si tantillum adsit aciditatis, attractu bilis in perfectam false- dinem veniat: sub qua actione spiritus primarii Efficien- tis, mediante necessario vehiculo acido esurino, locum obtinent. Hinc ea omnia, quæ vel sunt duriora, adeoque difficulter solubilia, vel quæ sunt sale volatili multum de- pauperata, ut alimenta vel exsiccata, vel sale condita, vel fumo indurata, difficilis solent esse digestionis.

1. Quod alimenta acquirant certam determinationem ad istud subiectum alendum, unde in prima diges- tione fundamentum consistit totius nutritionis in toto corpore.
2. Quicquid non ita mutatur, non sit perfectè nutriti- vum, sed alterativum: Nam quæ nutriunt nos, perfectè subiguntur, & hæc sunt sine omni mole- stia: Si autem vitiatur digestio, & in primis viis depravatur, emergunt cruditates.

Simile fermentum acidum volatile, alimenta contrita le- vi calore in vitro paucarum horarum spatio in liquorem

falsum lacteum instar chylli artificialis convertens, Chy- mia, naturæ æmula, docuit curiosos, cum primis TA- CHENIUM in *Hippocrate Chymico c. 13. p. 88.* quale menstruum etiam ex vitriolo artificiosè parat *Eruditus BOYLE in Philosoph. Experimental. P. 2. p. 20.* mediante quo alimenta non in chylum tantum artificialem, sed hunc etiam postmodum in liquorem rubrum instar sangui- nis mutavit. Carnes salitæ sale volatili depauperatæ non benè digeruntur; Carnes verò insummatæ adhuc difficilids. Maximi momenti negotium est hæc alimentorum fermentativa digestio, cum hoc ipso eadem disponatur, & ad he- terogeneorum maturè in intestinis separationem, & ad promptiorem volatilisationem & spirituaſcentiam in præ- cordiis: id quod sine exacta fermentatione fieri nequit. Hinc in his, in quibus imminuta, aut cruditate acida depravata est hæc fermentatio, ut in Cachecticis, in his de- bita sanguini maturitas & spirituaſcentia, adeoque debi- tus corpori deficit vigor.

Præsentiam Acidi talis salini esurini & fermentativi te- stantur ructus acidi in sanis, & quorum optimus est stoma- chus, naturaliter subinde præsentis, qui etiam apespiis, lenteris, dysenteris &c. supervenientes, restituti fer- menti digestivi indices habentur: hinc & Acida volatilia, speciatim panis, tam grata & amica sunt stomacho, qua- tenus suo modo sunt homogenea: undè & à Martialium usu frequentes ructus nidorosi sulphurei erumpere solent, similes iis, qui sensibiliter odoratu percipiuntur, quando limatur Martis spiritus acidus, nempe salis, affunditur. Undè & pingua, quæ acrimoniam fermenti huius obtun- dunt, uti appetitum prosternunt, ita etiam digestionem in stomacho turbare & impedire solent.

Origo fermenti huius primariè est ex tunica stomachi glandulosa interna, ex qua talis lympa fermentativa quasi transudat, quæ in rugis ejus obvias habet reliquias quasdam alimentorum prius digestorum, morâ diuturniori non leviter acceſcentes, & à saliva continuò deglutita insigniter subactas, & ad fermenti aliqualis naturam exal- tatas, quæ omnia mutuâ unionem fermentum istud digesti- vum stomachale constituunt. De tunica ventriculi inter- na glandulosa videatur THOMAS CORNELIUS CONSENTINUS in *pro-gymnasmat. p. 232.* item WIL- LIS in *Pharmacutica Rationali p. 12.* quam in specie con- firmat ventriculus porcineus, de quo observ. *Anatom. Am- stelodamenses p. 25.* Et ita fermentantur alimenta, & ea, quæ



quæ prius in stomacho acescebant, successivâ fermentatione transmutantur ita, ut aut planè, aut maximam partem, deposito isto acore abeant in massam, nunc insipidam dulcem, nunc salsam, nunc acidulam, semper talem naturaliter volatilem, idque varia sub temporis mora, dum in uno citius, tardius in altero, ob varias circumstantias, negotium hoc absolvatur.

Chylificatio hæc & alimentorum fermentatio læditur tribus modis:

1. Quando plus minus imminuitur, & tandem planè aboletur, ut non sufficienter aut nullatenus digerantur alimenta.
2. Quando augetur.
3. Quando insigniter depravatur, unde innumere alimentorum emergunt corruptiones: ad quas refertur etiam suo modo, si sub digestionem copiosi Flatus nascuntur, stomachum distendentes, inflationemque stomachi inferentes.

## C A P U T I

### D E

#### CHYLOSI IMMINUTA, ET ABOLITA.

**C**hylosis imminuta & abolita aliàs dicitur *Cochio* & *Chylifis læsa*, ratione modi fermentativi dicitur *Pepsis læsa*, *Apepsia*, & *Dyspepsia*; quæ ultima nil aliud est, quàm assumptorum in liquamen vitiosum conversio, ita ut è cibo potius non Chylus laudabilis, sed vel puita, vel humor acris, alcalicus aut nidorosus, fiat. Hærent siquidem alimenta ultra ordinarium tempus in ventriculo, nullam planè vel exilem admodum mutationem in consistentiâ, colore & odore experiuntur, sed cruda aut semicruda, per quamcunque viam excernuntur; ita ut partes vel non, ut in *Apepsia*, vel non sufficienter, nutrantur. Male in abolita Chylificatione ingeruntur cibi, quia obsunt potius, quàm ut nutrant: unde HIPPOCRATES in morbis acutis à tenui alimento incipiendam suadet nutritionem. Aucta verò Chylificatio, ut ut paucissimi, præter Sylvium, eam inter ventriculi symptomata referant, dum omnem digestionem læsam imbecillitatis ventriculi nomine exprimunt, fit quando aut citius, quàm decet, absolvitur, adeoque hanc plethora habitusque corporis athleticus, quem HIPPOCRATES l. 1. aphor. 3. periculo sum admodum pronunciat, sequitur: aut quando intra consuetum, aut digestionem finitum tempus nimis immutantur alimenta, ut ne siquidem convenientem corpori alendo materiam præbeant: simili modo ac massa quævis, nimium diutius fermentata, corrumpitur & acescit: quæ tamen nimia digestio vix concipi potest. Quando enim cum Chyli acescentia contingit, cum HELMONTIO Tr. Pylor. Reflor, ad Chylificationem potius depravatam accensenda erit: quæ fit, quando alimenta talem nutritionem experiuntur, cuius intuitu ad nutriendum corpus ineptissima; ad infinita enim mala producenda aptissima redduntur. Quæ depravationes alimentorum alio nomine rectè *Cruditates* dicuntur; quare, licet sint innumeri modi, dum varias ob causas digestionem possunt vitari, in specie binæ istæ *Cruditates*, acida & *nidorosa*, maximè peccant. *Cruditates pituitosa*, quam SENNER-TUS & RIVIERIUS jungunt, ad Chylificationem imminutam potius referenda erit.

*Cruditates acida* est, quando alimenta abeunt in liquamen acidum fixum, plus minus viscidum, nec sufficienter attenuatum & volatilifatum, fundamentum & origo tantum non omnium morborum Chronicorum: Siquidem omnes isti affectus, quos Præctici quidam Veteres, ut ex eorum lectione notum, ex *Antipræxia viscerum* seu inæquali eorundem intemperie, stomachi nempe calore debili seu intemperie frigida, & hac nunc simplici, nunc verò composita, complicata cum intemperie hepatis calida, derivant, reuerà ex cruditate stomachi acida nascuntur. Sanè lectio frequens Præcticorum, etiam modernorum, & imprimis Italorum & Gallorum, vos docebit, quod hi omnes accensent inæqualem Intemperiem stomachi frigidam & hepatis calidam. Verùm hac in parte meritò laudandus HELMONTIUS, qui prius caliginem discussit, & calorem non effectivè, sed dispositivè tantum, digerere statuit, & sufficienter confirmavit, quando potius fermenta & fermentationes læsas eque causas proximâs introducit læsa-

rum digestionum. *Nidorosa Cruditates* est, quando eadem corrumpuntur ita, ut abeant in liquamen putrilaginosum horridi saporis & odoris, & omnino nutritioni ineptum, quod *nider* vocatur: qualis percipi solet ex esu pinguium, aut ovorum cum butyro frixorum, nec adeò benè postmodum in stomacho digestorum; tunc enim exhalant ructus graueolentes, nidorosi, qui solent comparari communiter cum cruditate nidorosa, à qua illi etiam dependent.

### C A U S Æ.

Chyloleos ergò læsæ causa proxima erit vel in fermenti stomachici seu subiecti vitio, vel erit in vitio assumptorum alimentorum, seu Objecti haud ritè proportionati. In fermento quidem, quando non sufficienter, nec legitime digerit, sed depravatam alimenta potius corrumpit. Imprimis fermentum stomachi deficiens, spirituum animalium vel defectu, vel ad alias partes impetu, hinc pariori ad ventriculum affluxu, frustratur Chylificationem, per causas de appetitu prostrato allegatas: hinc debilitati ut minus appetunt, ita minus etiam aut planè non digerunt; aut spirituum defectu, aut in loco quodam dolentes, v.g. Nephritici, aut gravioribus animi perturbationibus quasi præoccupati vel diuertuntur, vel arcentur; aut quod concepta nausea spontè abhorreant digestionem assumptorum: stomacho enim non nunquam per consensum affecto, ut in nephritide, languet appetitus, & tunc vitatur digestio prima; sicut etiam in vulneribus capitis in stomacho cruditates nascuntur. Animi etiam pathemata, Terror, Pavor, &c. etiam turbant digestionem primam, & cruditatibus acidis occasionem præbent: Quò etiam facit motus corporis, qui moderatus promouet digestionem: sic etiam somnus repentinus post pastum, dat occasionem Cruditatibus. Quæ omnia pathemata agnoscunt spiritus variè affectos: elegans exemplum videbitis, apud HELMONTIUM Tr. Pylor. Reflor. §. 20.

Deinde idem fermentum digestivum, vel non satis acre, vel non satis volatile non sufficienter digerere valet: contra nimis acidum fixum, aut à vitioso & peregrino acore, vel falso vel alio vitioso sapore, vel facile acescentibus, ut dulcibus, in stomacho corruptum, uti fit in hypochondriacis & Scorbüticis, Cachecticis & aliis morbis Chronicis, dissolvit quidem promptè alimenta, sed eadem non ritè fermentando, debite volatilifare nequit, nec in falsedinem debitam abit; quin potius nimio acore eadem in massam vitiosè acidam transmutat, ex quibus imprimis cruditas acida emergit. Quod si verò propter pingua copiosius assumpta, aut ova, butyro nimis frixa & condita, hebetetur fermenti actiuitas, aut etiam ex peruerso bilis motu per vascula fellea ex intestinis hæc ipsa in stomachum aliquantulum regurgitet, ab huius sale volatili oleoso debilitatur, alteratur etiam exinde fermenti actiuitas, adeò ut assumpta alimenta non possint convenienter geri, quin propter talem præsentiam bilis, vitiantis fermentum, successivè putrescant potius & cruditatem nidorosa constituant.

Quod si eueniat, ut quæcunque occasione vitiosæ reliquæ ex præviis digestionibus vel rugis stomachi firmitus affixæ sint, vel intra ejus cavum etiam copiosiores aut pariores ut plurimum pituitæ viscida: aut acidæ sub forma hæreant, & harum præsentia impeditur fermenti actiuitas, cessat appetitus, deficit digestio. Inertia talis fermenti digestivi sepe etiam inducitur in peruersa curatione morborum, si remedia sunt pulveres fixiores, quales antimonium fixum ac salia fixa, & copiose, in specie in acutis, præscribuntur. Observandum quoque, quod in reconvalescentia febrium intermittentium adsit labes stomachalis, ob inertiam fermenti stomachalis, nimis hebetati, aut nimis fixati à copiosis talibus Ingestis.

Equidem in unoquoque individuo, tam brutorum, quàm in specie hominum, peculiaris & à priori non perscrutabilis fermenti est varietas, ratione diuersi usus assumptorum: unde fit, ut non tantum appetitus variet, sed etiam, ut ipsa variet alimentorum digestio, ita ut ea quæ unus appetit avidè, ea facillimè digerat, alius è contra respuit, aut non sine molestia digerit. Appetitus sanè est index, qui loquitur & monstrat quasi, quæ sint assumenda: Nam quæ facile assumuntur, facile digeruntur; quia ea tantum appetuntur, quæ appropriata sunt fermento stomachi, & quæ ipsi sunt amica, consequenter facile dissolvit, & facile fermentat. Hinc inculcat nobis HIPPOCRA-



**CRATES** in aphorismis: *Quod appetita facilius longè digerantur, quàm non appetita.* Ex hoc fundamento etiam, consuetudinis magna adeò est habenda ratio: Idem **HIPPOCRATES** in omnibus morbis consueti, licet acriteriora, in iuvenis, licet melioribus, esse praeferenda dicit: Ratio est hæc, quia ab omnibus assumptis semper quædam reliquæ in plicis & rugis stomachi hæreant; quæ si non ingrediuntur materialem compositionem fermenti, uti multi volunt, certum tamen est, quod non nihil aut certo modo per consuetudinem, fermenti digestivi naturam quodammodo alterent, & ita modificent, ut ab ipsis saltem similia alimenta magis appropriata reddantur. Hinc ab assuetis minus alteramur, quia fermentum iisdem quodammodo est homogeneum, & nulla est dyscrasia inter assumpta & fermentum, sed hoc se habet ad illa, ut proportionatum agens: E contra infusa sunt molesta; quoniam non habent convenientiam cum illo partes alimenti. Hinc etiam ii, qui certa quædam nonnunquam abhorrent edulia, incipiendo à minima dosi, & successivè ascendendo, eadem sibi successivè familiarissima reddunt; qua ratione & venenorum victui quidam assueti dicuntur, quatenus iisdem successivè fermentum stomachi alteratum & mutatum, talia olim hostilia, tanquam amica, facile arripit. Si ergo ex his alteratur fermentum, à crasi terminali degenerat, & præternaturalem acquirit saporem: unde talis læsio & perversus sapor fermenti stomachalis in Morbis chronicis maximas turbas dat, eosque contumaces reddit.

Hæc fuerunt vitia fermenti stomachalis: superveniunt & vitia ipsius stomachi, si scilicet est laxus, quod malum in morbis malignis obvium, imò lethale est; vel exulceratus; vel excoriatus; vel patitur excrecentiam.

Quod attinet vitium Chylosæ alterum: alimenta assumpta sunt Causæ Chylosæ læsæ, quando eadem certâ satione digestionis sunt inepta; quod fit imprimis vel propter eorum quantitatem, dum sunt nimis copiosa, vel propter eorum qualitatem, dum sunt vitiosa, & digestionis aliis inepta, aut ipsi assumptionis ratione ventriculo molesta. Quando enim copiosè nimis ingeruntur, & varia nimis assumuntur, non possunt digeri, quoniam fermentum ventriculi digestivum se habet in solutionis actu instar menstrui, habet determinatam activitatem, ultra quam non pergere potest: sicut unumquodque menstruum fermentativum, quod solvit & fermentat, requirit proportionem objecti debitam, in quod agere debet.

Habeatur ergo ratio quanti, ne plus assumatur, quàm fermentum digestivum solvat & volatilifet: Nam à nimia alimentorum quantitate obruitur in tantum fermentum stomachale, ut nec iisdem solvendis, nec convenienter fermentando volatilifandis, sufficiat: hinc sæpius nimia quantitate alimentorum oritur eroditas acida, dum assumpta recipiunt quidem acorem fermentativum, sed propter nimiam copiam non sufficienter fermentationi insituentæ evolvuntur, sicque loco chyli in forma pastæ crudæ plus minus acidæ nunc in stomacho hærent, eum gravant, ructus movent, nunc hinc inde in intestinis colliguntur. Quantitas tamen hæc absolute determinari nequit, utpote quam idiosyncrasia, ætatis, vitæ generis, aliarumque circumstantiarum diversitas variat; & certitudo de his vix alia reperiri potest, nisi quam ex mente **HIPPOCRATIS** de Veteri Medic. Text. 16. corporis sensus determinat.

Præter quantitatem, in specie varietas nimia ciborum etiam turbat digestionem: ut ut enim magna, adeoque alcahestica ferè sit fermenti stomachalis potentia, undè & semel varios admodum cibos potest dissolvere & fermentare; certum tamen est, quod non sit universalis, quin magis determinatur ad hunc vel illum cibum: Si ergo pingua cum acribus, acida cum dulcibus, aromata cum vino aut spiritu vini, fructus horæi cum aliis dyspeptis, lac cum fructibus horæis & acidis, & quasi quadrata cum rotundis, tam promiscuè ingeruntur, etiam certum est, quod fermentum, dum promptius agit in unum quàm alterum, & sic citius unum vel alterum fermentescit, necessariò exindè digestio non leviter vitietur, & pessimæ oriuntur corruptiones & cruditates; quarum comes est mucus copiosus in ventriculo residuus: vid. **KERGE-RUS** de Ferm. Nam id, quod non rectè digeritur, vix nec absque difficultate per pylorum transmittitur, undè vel copiosus mucus obruit stomachum, vel retenta diutius in stomacho, tepore loci in putredinem & omnimodam corruptionem abeunt, & ulterius vitiat Chylosis. Od id

rectè **HELMONTIUS** sobrietatem seu moderatam assumptionem quantitatem cardinem totius diætæ esse dixit; ea varietate enim ciborum emergit cruditas nidorosa. Quantitas ergo alimentorum debita, quam præscribit appetitus, observetur.

Quoad alimentorum qualitatem, eam præscribit simpliciter appetitus, secundum quem delectus est habendus; nam verum proverbium est: *quod sapit, nutrit*: Et nil denegetur ægro, multò minus sanis, de alimentis, modò ea appetant. Nam quæ cum appetitu assumuntur, feliciter & sine labore digeruntur, modò non excedatur in quanto; quia semper reliquæ hærent in stomacho, à consuetis alimentis non recedentes.

Determinantur autem appetitus, & indè alimentorum assumptionum qualitates, tam per consuetudinem, quàm per Idiosyncrasiam. Quoad consuetudinem: alimenta ventriculo molesta sunt, quando non iusto & consueti tempore, vel eadem, prioribus nondum integrè digestis & excretis, de novo ingeruntur: Consuetudo siquidem in cibandi tempore multum valet, quantum **HIPPOCRATES** de V. & A. acutor. Text. 15. scribit: nam & his, qui bis in die alimenta capiunt, & his, qui semel, repentinæ mutationes noxas & morbos inducunt: Quod si autem quis intempestivè alimenta nova ingerat, statim is ventriculi gravitatem, oscitationes, anxietates, borborygmos, &c. percipiet; ita, ut **AVICENNA** hoc errore nullum alium deteriore prosteatur, si nempe nutriendus super nutriendum, quod non digestum, demittatur.

Observetur etiam idiosyncrasia in quibusdam, ubi res cuidam est inimica, alteri grata: unus cum desiderio avidè caseum devorat, alter verò non: idè attendendum, ne talia propinentur, quæ aversantur aliis, quia facillè corumpuntur, & præsertim varias turbas in præcordiis, Cruditates nidorosas, generant. Quantum valeat appetita res, panis tantum monstrat, quem non fastidimus. Ratio, quia fermento stomachi est amicissimus, idque propter spiritum acidum volatilem in pane copiosum, & quasi homogeneum, & symbolizantem cum fermento stomachali. Undè etiam panis, ratione acoris fermentativi in panificio concepti, vel ratione spiritus istius acidi volatilis adjuvat, ut reliqua assumpta promptius colliquescant, & consequenter chylicentur ac digerantur: unde panis quò meliùs est fermentatus, adeoque in eodem magis exaltatus spiritus ejus acidus volatilis, eò est nobis salubrior; quò minus verò fermentatus, & quò magis spissior & glutinosior, eò magis nocivus est, & eò promptius abit in mucum crassum seu pastam viscidam & crudam in stomacho. Ut ut autem panis ex omnibus alimentis sit nobis familiarissimus, tamen uti omnis repletio mala, ita panis pessima; quia nimis exindè acor assumpta omnia impregnat: & quia panis motus fermentativus est nimis, impeditur digestio, quatenus illius ratione non alteratur chylus in fæcibus; huius verò ratione non subigitur debite, & subjectum tale debitam vitalem crasim seu characterem à fermento digestivo recipere nequit, impeditur adeoque notabiliter digestio, cum pasta viscida & cruda relinquitur subinde in stomacho. Ex hoc etiam decidendum est; quare quidam Vinum copiosius ferre queant? alii minus? nempe quorum volatilius ac subtilius, adeoque minus potens est fermentum digestivum, ut v. g. in pluribus literatis, hi ut plurimum leduntur à vino, huius acido prævalente acori fermentatio spirituosior naturali, cum nec debite subigi nec corrigi, nec appropriari tali subjecto potest; unde in talibus estus facilis ab acido, ebrietas à sulphure: hinc plures hypochondriaci, item cordis palpitationibus laborantes, tardius inebriari solent: vid. **LANGIUS** Misc. Cur. p. 39.

Juxta hanc qualitatem alimentorum, præ ceteris observandæ sunt eorum durities & visciditas: Duriora difficulter solvuntur, & viscidiora difficulter fermentantur; hinc dura aut viscida alimenta ledunt digestionem primam & cruditatem acidam inducunt, faciuntque, ut in stomacho oriatur pasta cruda viscida ob talia ingesta. Non ergo permittenda nimia varietas alimentorum, cum in alimentis variis etiam variæ sint proprietates speciales: varia enim alimenta ad cruditatem nidorosam disponunt.

Pertinent huc pingua difficulter digestibilia, laboremque magnum fermento stomachali facientia, eò quod aqueis portionibus, quæ tamen ad coctionem requiruntur, non misceantur. Præter ciborum varietatem potus nimis, au. etiam nimis confertim ingessus, vel aquea



quævis sunt, quæ insigniter turbant digestionem: ratio, quia

1. Potus nimis nimis diluit fermentum stomachi spirituosum digestivum, illudque nimis diluendo quodammodo hebetat.
2. Quia facit alimentorum in stomacho fluctuationem, quæ ubi nimia fuerit, impedit nonnihil legitimam fermentationem.
3. Quia tonum stomachi lædit, eundem distendit, ejusque fibras laxat & flaccidas reddit, ut, digesta licet, non adeo commodè per pylorum emitti possint: hinc eadem præter tempus in stomacho deſecta corrumpuntur, & in vitia varia abeunt.

Huc etiam referendæ sèræ nimis potationes, quarum rationes **LOWERUS** de Cord. p. 140. reddit. Quod etiam spectant, quando absque ullo, vel non sufficiente potu, cibi solidiores assumuntur, cum maceratione necessaria hac ratione defraudentur. Digestio alimentorum tandem læditur, quando alimenta non sufficienter masticantur, ita ut Masticationem qui negligit, Arabibus animam suam odisse dicatur: vid. **HELMONTIUS** de Vit. Rat. §. 21. **GREMBS**. Arbor. vitæ l. 2. c. 1. §. 3. & **MOEBIUS** Fundam. Physiol. c. 9.

Ex his facile patet, quid habendum sit de Veterum Intemperie inæquali: nam eandem non habere fundamentum in re, patet ex eo: quod sanguis qui calorem, & sic dictam temperiem vitiat, omnibus partibus distribuitur æqualiter, & proportionaliter movetur ad hepar & ventriculum: Quamdiu ergo sanguis debito calore viget, & quamdiu æquali proportionem circulatur, tam ad hepar, quam ad ventriculum, tamdiu sanè his ipsis etiam debitam conciliabit temperiem, & eodem modo debite calebit hepar, atque calet ventriculus. In ista ergo, quam dixi, Veterum Intemperie, experientia vos docebit, quod reverà semper subsit vitium fermenti stomachici, quod sit nimis & vitiosè acidum, nec satis volatilissimum, quin simul obrutum copioso mucro crasso & viscido: Propterea instituitur in talibus cura non cum iis, quæ calefaciunt stomachum & refrigerant hepar, sed quæ vim habent attenuandi & dissolvendi, imò etiam volatilifandi & temperandi nimium fermenti acorem.

Præter has causas primarias Chyloſeos læsæ, secundariæ non nullæ adſunt, quæ, quatenus retentionem aut expulſionem turbant, etiam Chylosin vitiant: quale exemplum non incognitum est. Procidentiam cartilaginis enſiformis, quam sæpius causam fuisse chyloſeos læsæ, & similium stomachi symptomatum, testis est expertus **Zacutus Luſitanus** in l. Med. Princ. Hist. 56. quæst. 36; item verrucæ ventriculo adnatæ. Chylosin turbare valent: quale exemplum habet **FORESTUS** in c. 18. Obs. 18. §. 30. Notum etiam est, quod renes afflicti calculo propter consensum nervorum, qui intercedit ventriculum & renes, similiter soleant turbare digestionem. Curavi feminam nephriticam, cui, quando urgebat dolor, languebat appetitus, & bibebat Coventum; cum verò dolores cessarent, redibat appetitus cibi & potus, & bibebat amaram cerevisiam, quam in paroxysmo bibere non potuit.

Pressius jam paulò & accuratius Cruditas nidorosa & acida consideranda venit. *Acida cruditas* in acido plus minus viscido, digestionis defectu enata, consistit: *Nidorosa* verò *cruditas* nihil aliud est, quam putredinis inchoatæ species.

#### 1. Cruditas acida oritur

1. Ob acidorum humorum in toto corpore abundantiam.
2. Ob acidorum frequentiore usum, vel etiam eorum, quæ licet non actu aciditatem manifestam præ se ferunt; reconditam tamen, & superveniente fermentatione se magis exerentem possident: qualia sunt saccharum & mel; quæ non minus in ventriculo acere, quam extra hunc, spiritum acidissimum fundere, satis notum.
3. Ob usum aromatum acutum & magis oleosorum, v. g. piperis, caryophyllorum, Zinziberis, &c. utpotè quæ vel propter aciditatem reconditam, vel acidorum acrimoniam exaltandi energiam, sæpius sodam & cruditatem acidam producunt.

*Cruditas nidorosa* ut pateat, observetur:

1. Eam contingere in febribus, præsertim acutis, in quibus fermentum digestivum, ejusque debitus acor deficit; unde appetitus cessat, & alimentorum

nausea supervenit, & cerevisiæ consuetæ lupulata seu nimis amaricantis horror adeſt; acidis contra delectantur.

2. Oriri eandem à bile similibusque humoribus alcalinis, ad ventriculum copiosius delatis.
3. Oriri frequentius ab assumptis, quæ aut ejusmodi nidorosam dispositionem in se habent, qualia sunt pingua, oleosa, fixa, fermentum digestivum & ejus acidum plus minus obtundentia, quod faciunt in specie ova, lac & lacticina, oleosa: aut quæ, si cum ventriculi fermento coeunt, nidorem contrahunt; v. g. limatura martis, quæ deglutita non nunquam ructus æquè nidorosos movet, ac si menstruo acido immergatur, aut cum eodem conspergatur.
4. Quando assumpta quælibet in stomacho diutius morantur seu retinentur: rectè ob id monet **HELMONTIUS**: non putandum, quod chylus rivi instar in fornace subinde excellentius coquatur, quod diutius retineatur; nam morà nimia alienatur potius & corrumpitur.
5. Nidorosa Cruditas emergit ex horæis fructibus, facile putrescibilibus; unde postmodum Diarrhœæ, &c.
6. Dulcia, quæ sub diurno calore ad amaritiem profunt, v. g. passule, glycyrrhiza, &c. eadem in stomacho facile Cruditatem nidorosam contrahunt, sub qua amarescunt, seu, ut aliàs dici solet, bileſcunt.
7. Cruditatis nidorosæ præsentis sunt signa ructus, de quibus supra. Sic egri sentiunt nauseosum saporem, eructant saporis empyreumatici & pſcium putridorum, imò sentiunt amarorem & saporis nauseosum.

Ex his præsuppositis verè sequitur, fieri Cruditatem nidorosam, quando fermentum stomachi vel deficit, vel assumptis plus minus ad hanc tendentibus ac dispositis infringitur. Unde debito modo nec fermentalem acorem contrahunt, nec digeruntur assumpta, sed morà sui in loco calido humido ad corruptionem plus minus, pro natura assumptorum scilicet, vel animalium vel vegetabilium, ordinariò facile putrescibilium, disponuntur. Unde pro putredinis natura alcali emergens, agens in pingue, saporem tetrum, vix explicabilem, subinde amaricantem, representabit. Præceteris hoc illustrant ova, quibus vix citius quid aliud nidorem contrahere observatur; hinc etiam eadem ad duritiem coctæ, brevi post tamen nidorem eructant: Deinde facillimè ova cum butyro frigida nidorem concitant: alcali nempe ovorum copiosum agit non solum in proprium oleum, sed simul in abundantius adjectum butyrum, unde & hujus additi ratione & acidum stomachi magis obtunditur, adeoque ejus activitas sic parili ex ratione & nidoris vis intenditur: Hinc tetri ructus erumpunt, qui indicant quidem inchoatam fermentationem, sed depravatam, & in ipsa adſione ex inertia fermenti digestivi deficientem; unde ex putredine Contentorum ructus tales tetri oriuntur. Accedit pylorus in furorem actus, qui portas transitus claudendo, irritatus ab hostili Contento, dicta digerendo retinendoque, magis magisque eorum putredinali corruptioni occasionem præbet.

#### DIAGNOSIS.

Quoad signa diagnostica, ea sunt facilia: Nam in Chyloſi plus minus imminuta, præterea, quæ habet **SENERTUS** l. 3. Prax. p. 128, conqueruntur egri de dolore grauativo stomachi duabus horis post pastum: item conqueruntur egri de ructibus, etiam quinque vel sex horas ab alimentorum assumptione molestis, iisque non acidis, sed nunc insipidis, nunc putridis, nunc sulphureis, nunc genuinum assumptorum odorem & saporem adhuc representantibus: qui fiunt, si assumpta non digeruntur; unde diu à pastu assumpta planè non, seu leviter imminuta, rejiciuntur: percipiunt dolorem gravativum circa præcordia post pastum plus vel minus obtusum: item conqueruntur tales egri de appetitu maxime & ferè semper deſecto, de inflatione stomachi à pastu: item adeſt sæpè tensio & distensio præcordiorum. Præterea in talibus subiectis, imprimis hypochondriacis, mox post pastum adſunt phlogoses seu tumor faciei, quasi essent ebrii: in quibus semper observandum, quod semper fiant à stomacho, eo nempe copioso mucro nimis acido, ab alimentis non rite digestis reliquo, onerato: item conqueruntur etiam egri tales ut plurimum de difficili respiratione, ita quidem, ut respira-



tionis impedimentum percipiunt in præcordiis, in specie dum dorso incumbunt, ob tensionem insigniorem hypochondriorum: item matutino tempore solent habere os pituiti & muco viscido plenum, qui revera est ex stomacho, dum per recubationem nocturnam regurgitat & pedetentim ad oesophagum tendit, & ita matutino tempore excernitur: urinæ à statu naturali recedunt, dum modò tenues & aquosæ, modò crassæ & rubræ turbidæ apparent. Omnia hæc symptomata sunt in digestionem nimia imminuta & abolita, propter succum fermentativum crassum & obrutum, qui minus potest fermentare, quin potius alimenta sub forma liquaminis aut pastæ viscidæ acidæ & flatulentæ in stomacho subsistunt. Cæterum quando depravata est digestio, illam testantur imprimis ructus. Subindè vertigine corripiuntur, imprimis jejuni, qualis vertigo, imprimis in nondum senescentibus, semper radicem habet in stomacho. Hæc & similia signa ut plurimum etiam in malo hypochondriaco occurrunt, tam in principio quàm incremento, cum hujus mali radix revera hæreat in stomacho.

*Cruditatis acidæ* cognoscitur ex soda, ructibus acidis & copiosioribus; item in talibus ægris solent præcæteris copiosiores esse flatus, & quæ rejiciunt, aut natura aut arte, per vomitum sunt admodum crassæ, viscidæ, ac pituitosæ; interdum serosæ, plus minus acidæ: alvus subindè est conrumax, ob scæces ab acido vitioso coagulatas & induratas: alvus plerumque est adstricta.

*Cruditatis nidorosa* ructus habet foetidos aut saltem horridos instar ovorum frixorum, aut piscium putridorum; atque hinc non saltem, præprimis matutino tempore, percipiunt saporem peregrinum & abominabilem, quasi cinereum seu ligni putridi, quem sufficienter exprimere nequeunt: subindè amaror cum cardialgia & aliquali nausea percipitur ex ore & stomacho: quæ aut naturæ instinctu aut vomitu rejiciunt, sunt liquida, sunt flava, & aut omnino insipida, aut quodammodo amaricantia, aut insipido-dulcia, aut ex amarore dulcescentia. Præterea habent alvum sæpius plus solito apertam, & tales cruditatem nidorosa laborant.

*Cruditatem pituitasam* pondus frigidum in ventriculo habens, & hujus gravativus dolor indicat.

## PROGNOSIS.

Quod attinet *signa prognostica*: certum est, in Chyloseos læsione & cruditatibus consistere fundamentum quamplurimum morborum, in specie chronicorum, quatenus vitium digestionis primæ non in secunda, multò minus tertia corrigitur: nam cacoehylia est mater Cacoehymiz, adeò ut ex cruditatis acidæ & ejus variis differentiis omnes febres intermittentes, malum hypochondriacum, scorbutus, nisi hic oriatur per contagium massæ sanguineæ communicatum, cachexiæ, passionēs colicæ, pathemata arthetica, calculi renum, affectus melancholici, in massa sanguinea deficiens hæmatosis, revera originem ducant. item similis acor in stomacho, vitians alimenta, est origo morborum cutaneorum, scabiei, serpiginum, herpetum forsitan & erysipelatium.

In genere omne acidum seu acor vitiosus subindè in corpore oberrans, fundamentum habet in vitiosa digestionem ex corruptione acidæ. Arthritis ipsa, dum vinum acefcit in ventriculo, aut potulenta ex vitioso acore tincta, prouunt in corpus, ex hac acidæ stomachi cruditatis habet suum ortum: Imò omnes isti affectus Chronici, de quibus in posteris p. lura, qui aliàs ex obstructione viscerum & mesenterii, hepatis & lienis, eorumque antipraxia ex frigida intemperie oriri dicuntur, revera ex vitio Chyloseos, & in specie, quando fermentum stomachi est nimis acidum, nec ritè volatilifatum, dependent.

## CURA.

Quoad *Curam*: Digestionis vitia, quæ à causis externis dependent, facillè corriguntur, causis illis sublatis, & meliore victus ratione instituta. Impossibile est arte promovere vel instituere Chylosin. Est enim opus simpliciter naturæ, & dos vitalis fermentorum appropriata, juxta Helmontium, nullà arte imitabilis. Ob id adjuvenus saltem naturæ opus, & corrigamus fermentum ventriculi, quantum fieri potest, & reducamus in naturalem statum.

1. Impedimenta quæcunque, mucum nempe & succos

in stomacho hærentes, utpote crassos & viscidos & acidos, removendo: quod imprimis fiat per Vomitoria, & hinc purgantia, in specie aloëtica.

2. Stomachum extergendo aromaticis volatilibus, sale alcalino oleoso constantibus.
3. Stomacho sensilem quasi stimulum addendo blandioribus acidis ipsi gratis.

His tribus modis curatur Chylosis laesa.

Quoad *primum scopum*: Vomitoria primum obtinent locum, cruditates, omnesque sordes post digestionem restas, veluti crudiores succos, removementia: inter quæ superius dictum, Infusa antimonialia esse præferenda, in quibus non tam esse ponderandam substantiam, quàm liquorem, in quem fit infusio; verivèbium enim est. quod *hypochondriacis ebrietas usque ad vomitum salubris sit*. Imprimis pro materia viscida & tenaci in stomacho resolventa & removenda, commodè propinatur Vomitorium:

℞. *Aqua Hyssopi* ℥ij.

*Cinnam.* ℥ij.

*Spiritus gum. ammoniaci* ℥ss. ad ℥j.

*Oxym. squill.*

*Syr. emet. an.* ℥ss.

M. S.

*Haustus Emetici pro una vice.*

Post Vomitoria Purgantia impedimenta removement: inter quæ massa pilul. de hiera cum agarico in subjectis paulo robustioribus conducunt, ex qua superius dedi formulas. Præter hanc pilulæ mastichinæ sunt elegantes, & stomacho appropriatæ; nam mastix est singulare stomachicum, ratione spiritus acidæ volatilil. Inter leniora alvum evacuantia, est aloë, maximè pilulæ aloëphangine ex aromaticis factæ, æque ad imitationem ZWELFFERI *correllæ*; vid. ejus animadversion. in *Pharmacop. Augustianam*; stomacho enim conducunt, & vi aromatici tonum ejus restituunt. Si volumus eas laxativas reddere, uno alterove grano scammonii acuentur; sic magis conveniunt ad detergendas sordes muculaginofas, stomacho sæpè adhærentes. Dabo exemplum hoc modo egregium:

℞. *Mass. pilul. aloëphang. vel de ammon. gr.* xvj. ad ℥j.

*Tartari vitriolat. gr.* vj.

*Scammon. sulphurat. gr.* ij.

*Extract. troch. alband.* (quod egregium est ad pituitam viscidam incidendam) gr. jss.

*Cum tinctura tartari* (quæ stimulat, & est salina abstergens) f. pilulæ, S.

*Pilule stomachales laxativæ.*

℞. *Mass. pilul. de hier. cum agar. vel familiar. Zouchff.* vel

*Extr. Panchym. Crollii, vel Cathol. gr.* xv.

*Gum. ammoniaci in aceto squill. sol. vel Extr. aut succ. inspiss. absinth. ℥ss. vel gr.* xij.

*Extract. troch. alband. gr.* j. vel ij.

*Scammon. sulphurat. gr.* j.

*Cum elix. propr. vel Ess. menthæ, vel spiritu mastich. f. pilulæ.*

D. S. ut anted.

℞. *Mass. pilul. mastich. ℥j.*

*Extr. absinth. ℥ss.*

*Troch. alband.*

*Scammon. sulphurat. an. gr.* ij.

*Cum Ess. ligni sassa. vel arc. tartari, vel Elix. proprii. f. Pilulæ,*

D. S.

*Pilule stomachales purgantes.*

℞. *Mass. pilul. de ammoniaco Quere ℥j.*

*Extr. martis cum spir. propr. ℥ss.*

*Troch. alband. gr.* ij.

*Olei destillat. mac. gt. j. vel ij.*

*Gum tinctura tartari f. pilulæ deaurandæ.*

D. S. ut anted.

Potest etiam beneficio remedium salinorum, imprimis ex tartaro, fieri pulvis laxativus, & stomachum egregiè evacuant.

℞. *Tartari vitriolat.*

*Cremor. tartari an. ℥ss.*

*Scammon. sulphurat. gr. ij. vel jv.*

*Troch. alband. gr. j. vel ij.*

*Olei destillat. anis. gutt. ij.*

M. f. pulvis, D. S.

*Pulvis stomachalis laxativus.*



Nam ultra 2. vel 3. sedes vix operabitur, pro constitutione tamen subjecti.

In forma liquida pro subjectis facilis purgationis, præprimis mulieribus delicatis, fiat talis potio:

℞. *Aqua absinth. vel hyssopi,*  
*Mentha an. ʒss.*

*Tartari vitriolari,*

*Extr. agar. an. ʒss.*

*Trocb. alband. gr. j.*

*Scamm. sulphurat. gr. ij.*

*Syr. ros. solut. ʒss.*

M. D. S.

*Hausculus purgans.*

Descriptionem formulæ domesticæ seu universalis habet SYLVIVS c. 9. §. 52. item c. 14. §. 50. Exemplum talium pilularum, sordes in primis viis abstergentium, quæ Francosurtenfibus aut Glassianis substitui possunt, sit:

℞. *Gum. ammoniaci aceto sol. ʒss.*

*Masticb. el. gr. xv.*

*Aloe succolor. gum. præp. gr. ix. vel xij.*

*Extr. trocb. alband. gr. iij.*

*Cum ess. mentb. f. pilule no. 60. S.*

*Pilule stomachales laxativæ pro aliquot vicibus.*

De quibus sit dosi una vice x, xij, xv, præter propter, idque omnibus tribus vel quatuor septimanis pro lubitu.

Omnes sordes viscidas detergunt, resolvunt, & ita cruditates acidas, & mala inde nata præcavent: conveniunt in morbis Chronicis, Cachecticis, hypochondriacis.

Aliam adhuc compositionem loco pilularum Glassianarum communicavi in *Colleg. Pharm. in Ludov. Coll. Formulæ*. Pertinent huc pilule de ammoniaco Quercetani in SCHROEDERO, familiares Zuvelferi Pharm. Reg. p. 66. & pilule Talemanni famigeratissime, in *Idea Form. & Coll. Formulæ*, item pilule Bened. & Schæderi. Modum parandi aliâq; videbitis in LUDOVICI Pharm. ad mod. vnor. seculum accommod. p. 179. item Tr. de sale tartari vol. in fine. Alii non incommode cremorem tartari in hunc finem adhibent, à ʒss ad ʒj in juscule carnis vel pulli benè calido, horâ unâ alterâve ante prandium, quavis septimanâ semel usurpando.

Alterantia contra Chylosin læsam sunt ea, quæ constant sale volatili aromatico blando, quæ si maritentur cum subtilibus acidis, sunt egregia remedia. Ex his imprimis commendantur *fenina*, quæ vocantur *minora calida*, anisi, carvi, petroselinii, cumini, & post hæc præ cæteris galanga & Zingiber. PLATERUS in *Obs. l. 2. pag. 406.* egregia aliquot habet exempla Chyloleos & Cruditatis, vitio stomachi & primarum viarum, curatæ per usum Zingiberis, sive crudum sit sive conditum, ac potest omni maiore usurpari. Radix acori veri condita manè comesta quæcumque cruditate & apesias corrigit. Nux moschata quidem etiam est elegans, sed quia est nimis oleosa, & ob id obrundere solet fermentum stomachi, aliis subinde est temperanda, imprimis simplicibus stomachicis dictis, quæ sunt satis nota.

Præ cæteris palmam obtinebunt absinthium & mentha, quæ sunt duo singularia stomachica; hinc à quibusdam laudatur Vinum absinthites, quod mirabiliter sordes & vitia digestionis primæ eliminat. Post absinthium Myrrha, nec non Zedoaria, item acorus, rosmarinus, & lignum sassafras, & quàm plurima supra in appetitu imminuto seu anorexia allegata insigniter conducunt. Item acida spirituosâ præ cæteris conducunt, ut spiritus salis dulcis, qui est optimus, item spiritus nitri dulcis; spiritus masticis benè rectificatus est egregius, mistus cum spiritu menthæ. Magnam etiam meretur considerationem Elixir Proprietatis Paracelsi, quod tamen ob ingredientem liquorem Alcahest, præparare non possumus. HELMONTIVS aliâ ratione in substantia præparavit, qui videatur. Vulgò præparatur cum spiritu vini, acuat cum spiritu sulphuris aut vitrioli acido, lege communi: hinc duplex habetur, cum & sine acido. Elixir sine acido paratur cum alcali fixo: cum lixivio nempe salis tartari solvuntur species, hinc inspissatur: inspissato magmati affunditur spiritus vini tartarificatus; & admodum est hoc utile mulieribus & infantibus in cruditatibus acidis; in quibus etiam aliisque affectibus, cum alcali volatili paratū mixtū prodest, si spiritus salis ammoniaci cum spiritu vini paratur & speciebus affunditur. Dicitur esse sexui sequiori, cujus dosi gutt. xxx. Alias Elixir proprietatis cum acido per se in cruditatibus nidorosis ma-

xime conducit, mistum cum spiritu cochleariæ, qui egregiè convenit: e. g.

℞. *Elix. proprii. ʒij.*

*Spiritus cochlear. ʒj.*

M. S.

*Elixir stomachale.*

Dosis gutt. 60. mane.

Convenit etiam egregiè Elixir vitrioli Myns. ritè paratum à ʒss. ad ʒss. & Elixir stomachale D. Michaelis, cujus superius facta fuit mentio. Essentia melissæ, menthæ, pulegii, rosmarinii, ligni sassafras, myrrhæ, cum spiritu vini tartarificato paratæ, omnes conveniunt, si acidulentur cum parva quantitate spiritus salis, vel spiritus vitrioli; sic enim concipiunt subtilem volatilem acotem: v. g.

℞. *Ess. melissæ ʒj.*

*Spiritus vitrioli Philos. ʒj.*

M. S.

*Essentia stomachalis.*

Dosis gutt. 40. vel 50.

℞. *Elix. stomach. ʒij.*

*Spiritus masticb.*

*Cochl. an. ʒj.*

M. S.

*Elixir stomachicum.*

Dosis 30. vel 40. gutt. bis in die.

In nimia & contumacissima ventriculi mucilagine optimus est spiritus asthmaticus, vel solus vel mistus: ut

℞. *Elix. stomach. Doctor. Michael. ʒj.*

*Spiritus asthmatic. ʒss. vel ʒij.*

M. S. ut antea.

Dosi 25. vel 30. guttularum est egregium & optimum remedium. Cydonia, & omnia ex his parata, ut succus, syrupus, &c. mirè conducunt ad juvandam digestionem. Interdum etiam hunc Vinum medicata, ut Vinum absinthites, vel fiat Vinum tale medicamentosum juxta SYLVII Praxin ex absinthio, mentha, radice gentianæ, & acori veri, aliisque aromaticis, quibus de mace, vel Zinziberis aliquid, potest addi: e. g.

℞. *Herb. mentb. crisp.*

*Calam. montan.*

*Absinth. an. M. ʒ. vel M. j.*

*Rad. enul. camp (quam superius commendavi cum rad. armorac.)*

*Acori veri. rec. an. ʒj.*

*Galangæ ʒij.*

*Cinam. ac. ʒij.*

*Macis ʒj. (tantum; quia nimis oleosa)*

*Semin. anisi ʒij. ad ʒvj.*

Concis. & contus. includuntur Nodulo, S.

*Nodulus pro vino stomachico.*

Nodulus hic infundatur in Mens j. Vini Rhenani, stent per horas 12. in loco calido: De quo capiatur ante pastum bonus hautus, singulis hautibus addendo spiritus salis dulcis (qui acidum volatile) gutt. xv. vel loco hujus Elixir proprietatis, imprimis cum spiritu cochleariæ factum & paratum.

℞. *Herb. mentb. crispæ,*

*Absinth. an. M. j.*

*Rad. enul. ʒvj.*

*Zingib. vel Zedoar. ʒij.*

*Cinam. ac. ʒij.*

*Semin. anisi ʒss.*

Incis. & contus. includ. nodulo, vino infundendo, ac in eodem ceu vehiculo spiritus salis dulcis gutt. xv. ad xx, assumuntur,

D. S. ut antea.

Item:

℞. *Herb. absinth. rec. M. ij.*

*Mentha M. j.*

*Rad. acori veri. rec ʒj vel iij. (aut hujus loco Zingib. vel Zedoar. ʒij.)*

*Cinam. ʒij.*

*Includ. Nodulo. D. S.*

*Nodulus pro vino stomachico.*

Electuarii loco sufficiat rob baccarum juniperi, imprægnatum pulvere Zinziberis aut macis, addito paucò saccharo ad imitationem PARACELSI.

Conveniunt ulterius egregiè salina, mucum incidentia & abstergentia, inter quæ sal ammoniacū, vel vulgariter depuratum, vel ad imitationem HARTMANNI c. 25: nobile est stomachicum in Chylosi læsa, propinatum ʒss.



ad gr. xv. in Vino absinthie seu vino infusionis ligni assafras. Post hoc non minus etiam niterū vitriolatum seu *arcanum duplicatum Myns.* egregium est in affectibus stomachicis, aut etiam tartarus vitriolatus ad imitationem TACHENII paratus, imprimis si cum aromaticis speciebus diatrion pipereon, aut cum speciebus diagalangæ, aut stomachicis Mynsichtii, cubebis, similibusque pulveribus stomachicis mistum: item terra foliata tartari seu sal tartari essentialiale, hepaticum rubrum, aut cremor tartari, vel solus vel cum sale tartari, vel similibus pulveribus stomachicis mistus. De spiritibus dulcificatis res nota est: nec mixtura simplex est inelegans, cum ex acido volatili temperato constet; item spiritus carminativus de tribus, de quo infra mentionem faciam, egregie convenit. Noti alijs sunt *pulveres stomachici Birckmanni & Quercetani*, in quibus basis est radix ari sale volatili acri & penetrante imprægnata: cum verò in arida radice maxima pars salis volatilissimæ avolet, & ob id inanis non nihil evadat, melius est, ut infusio fiat cum radice helenii in vino. Præterea pertinet huc pulvis stomachalis D. MICHAELIS, cujus compositionem *suprà de anorexia* dedi. Vel

- R. Rad. aron. ʒj.  
Lapill. cancr. præp. ʒʒ.  
Salis absinth. ʒj.  
Olei destillat. caryoph. , Macis an. gutt. iij.  
M. f. pulvis pro tribus dosibus, S.  
Pulvis stomachalis.  
Vel  
R. Pulv. rad. aron. ʒʒ.  
Flor. sal. ammon. ʒij.  
Piper. nigri ʒij.  
Zingiber. ʒij.  
Olei destillat. calam. arom. ʒj.  
M. f. pulvis.

Convenit item *Tragea stomachalis*, quam dedi in *Colleg. Pharmacev. Schræder. P. 2. Class. 1.*, vel hujus loco sal volatile oleosum egregium est. POTERIUS in usu habuit *specificum stomachicum*, quo plura præstitit in suis ægris: descriptio nullibi prostat: nemo scit præter *filium POTERII*, Bononiæ degentem. Interim probabile est, quod fuerit remedium antimonialiale ex regulo antimonii martiali paratum, ad imitationem seræ antimonii diaphoretici. Ad specifica stomachica pertinent etiam Chocolata, quæ est succus inspissatus ab Indis ex fructibus cacaum, Germanicè *Koc Koff Nuss*, conditus cum cinamomo & pipere: Hæc in vino vel lacte cocta & pota, est egregium stomachicum, & simul antiscorbuticum: vid. ZACUTUS LUSITANUS l. 2. obs. 7. *Prax. admir.* In viribus roborandis etiam conducit. Angli ergo haustum de hac operariis propinant pro meliori operum promotione.

Hæc pro senibus annumeranda venit ambra grisea & medicamenta ambrata, quæ in Chylosi læsa senum sunt optima; vel in forma sicca cum saccharo, vel liquida usurpata, cum spiritu nempe *menthae*, vel *melissæ*, vel *salviae*, in *essentiam stomachicam* redacta.

Non minoris pretii est *herba Theæ*, planta apud Chineses & Japonenses singularis virtutis: ad nos tamen sicca adfertur, quæ herba Sinensis & Japonensis elegantissima est medicina, quæ non tantum stomachum roborat, sed & præprimis liberat & præservat à calculo & arthritide, morbis Chinesibus & Japonensibus propter hujus plantæ frequentiore usum incognitis; item in cephalalgia potenter convenit, præservat ab ebrietate, & somnium arcet, stomachum imprimis confortat & vigilias citra virium debilitatem etiam ad tres dies noctesque protrahit. Usus est, ut folia, quantum pugillus magnus capiat, aut infundantur, aut ebulliant in aqua simplici servida, adjecto pauxillo sacchari, & istud Infusum aut Decoctum postmodum subinde calidè hauriatur, ac talis unus pugillus pro tertia ad minimum vice sufficit. Essentia quoque eius paratur beneficio spiritus roris majalis, qui ammoniacalis salis vi est imprægnatus. Item Elixir Menthae convenit: Vel

- R. Aqua cinnam. spiritusf. ʒvj.  
Elix. menth. ʒij.  
M. S.

*Haustulus stomachalis.*

*Dosis* cochl. i. vel ij. in fine pastus.

Conducit etiam essentia piperis cum spiritu vini parata, & essentia composita ex *salvia*, *Zedoaria*, & *myrrha*, cum

*spiritu salis ammoniaci vino* parata, dosi 40. gutt; item aquæ stomachicæ mastichinæ: e. g.

- R. Mastich. el.  
Rad. acori vulg. an. ʒij.  
Galang.  
Caryophyll. an. ʒj.  
Cinnam. ʒij.  
Zingiber.  
Macis an. ʒij.

His solum affunditur *Vinum malvaticum*: digerantur in loco calido, hinc per Balneum Mariæ destillantur. *Dosis* est cochl. j. vel alterum per intervalla ante prandium vel cænam per horam unam; item linteum multiplicatum eodem adfectum commodè applicari potest regioni stomachi.

Hæc in genere de Chyloleos læsione.

In specie quoad *Cruditatem nido osam*, seu sæpius incorrigibilem, id quod corruptum, evacuandum est. Convenit autem vomitus, aut Evacuatio per Rhabarbarum & Tamarindum. Præterea curatur per præcipitantia terrea, inter quæ eminet crystallus præparata. Post horum exhibitionem mirè conducunt Julebi acidulati, & subacida volatilia, cydoniata, succus citri, succus & syrupus portulacæ, item conserva rosarum aut menthae vitriolata, spiritus salis dulcis, vitrioli dulcis, Elixir proprietatis, spiritus mastichis, pulvis hepaticus ruber, cum ebore sine igne, cremor & crystalli tartari cum coralliis rubris: e. g.

- R. Crem. tartari, vel pulv. hepat. rub. ʒj.  
Corall. rub. præp. ʒj. ad ʒij.  
M. f. pulvis pro 4. dosibus.  
D. S.  
Pulvis stomachicus.  
R. Pulv. hepat. rub.  
Ebor. sine igne an. ʒj.  
Olei destillat. macis vel nuc. mosch. gutt. ij. vel iij.  
M. f. pulvis pro aliquot dosibus.  
D. S. ut antea.

- R. Salis digest. hypochondr. ʒʒ.  
Lapill. cancr. præp. ʒj.  
M. f. pulvis pro duab. dosibus.  
D. S. ut *suprà*.

- R. Arcan. dupl. ʒij.  
Oss. sep. præp. ʒj.  
Pulv. nuc. mosch. gr. vj.  
M. pro duab. vel tribus dosibus.  
Sign. ut *suprà*.

- R. Arcan. dupl. ʒij.  
Spe. diatrion piper. ʒj.  
M. pro duab. dos.  
D. S. ut *suprà*.

- R. Liq. terræ fol. tartari ʒij.  
D. S.  
Essentia stomachica.

Dentur pro dosi 40. ad 50 guttulae.

- R. Spirit. salis dulc. ʒʒ.  
D. S.  
Spiritus stomachalis.

Dosis sunt gutt. 30.

- R. Aqua mentha ʒij.  
Cinnam. ʒij.  
Succ. cydonior. ʒvj.  
Syr. acetos. citri. ʒʒ.  
M. f. Potio. S.  
Haustulus stomachicus.  
R. Aqua mentha ʒij.  
Cinnam. cum vino ʒʒ.

- Syr. cydonior.  
Portul. an. ʒij.  
Spiritus neri dulcis parum.  
M. pro Potione. S.

*Haustulus confortans stomachum.*

*Cruditæ* verò acida corrigitur per absorbentia & acidum destruentia, ac aromatica volatilia, ut cochleariam, centaureum minus, Rhabarbarum in nodulis, absinthium, & omnia ex ipsis parata, ut radicem helenii & armoraciæ, acori veri, Vinum & cerevisiam absinthitem, essentias, &c. item caryophyllos, nucem Moschatam, Zingiber; de quo resert PLATERUS, Pontificios post jejuniū quadragesimalis tempus cruditates, ex piscium esu collectas, optimè pulveris Zingiberis usu corrigere, & mala inde nata



nata avertere: res essentiam & spiritus vegetabiles volatiles, menthae, salviae, cochleariae, & similiter: item aquam vitæ Mattheoli, spiritum antiscorbuticum, nasturtii, piperidis, quæ est planta acerrimi saporis, & potentissima in corrigenda stomachi cruditate acida: essentiam ligni sassafras, & similia, quæ acorem temperant. Cinnamomifata huc etiam conferunt, galanga, mentha, feniculum, rosmarinus, tinctura tartari acris, elixyr proprietatis sine acido & volatile, spiritus salis ammoniaci volatilis, tartari volatilis, cornu cervi & carminativus de tribus, & similia alcalia volatilia, imprimis cum spiritibus vegetabilibus commista, ut fiant salia volatilia oleosa: quale est spiritus salis ammoniaci anisatus, caryophyllatus. Sin acidum nimium, conveniunt salia omnia fixa, ut sal absinthii, cardui benedicti, tartari, artemisiae, item sal digestivum hypochondriacum, arcanum duplicatum, Pulvis Stomachalis Quercetani & Michaelis, lapilli cancrorum, creta, cornu cerviustum, ebur, &c. quæ acidum absorbent.

Destructo acido, purgantia demum adhibenda: nisi enim hæc methodus observetur, nihil per purgantia evacuabitur; sed tormina & motus convulsivi excitantur. Usus cancrorum fluviatiliū mirè proficiuus est, præprimis si cum testis assumantur, cum egregiè acidum absorbent: quod ne iterum augeatur, ab omnibus omnino acetariis, acidis aliis & acescentibus abstinendum est.

In Cruditate pituitosa salina omnia, sive alcalia, sive acida, sive salsa, vel sola, vel cum aromatibus mixta, conducunt. Vitentur, quæ mucum viscidum aut pituitam generare apta nata sunt, v. g. caput vitulinum, pedes bovini, pisces, alimenta crassa, ova forbilia, &c.

Externè ad Chylosin imminutam conferunt olea nonnulla destillata suaveolentia, plus minus aromatica, & itidem parata Balsama, quoniam hæc sunt stomacho grata. Hæc inter excellens est oleū angelicæ destillatum, menthae, caryophyllorum, macis, baccarum juniperi &c.; oleum stomachale compositum Cratonis itidem est egregium; speciatim oleū destillatum mastichis flavum rectificatum extrinsecus illitum. Vel

R. Olei stomachal. Crat. ℥ij.

Destillat. menthae ℥j. vel 3℥.

Caryophyllor. vel macis gutt. vj. 11x. ad 3℥.

Zedoar. 3℥.

M. S.

Oleum externum ad illinendum regionem stomachi.

Illinatur stomachi regioni, applicando desuper laterem calefactum.

Vel

R. Olei menthae per infus. & coll. par. ℥ij.

Expr. nuc. Mosch. ℥j.

Olei destillat. menthae 3℥.

Macis,

Caryophyll. an. 3℥.

M. S. ut antea.

Pro Balsamo sufficit oleū nucis Moschatæ expressum cum oleo destillato corticum aurantium & macis mistum; vel Balsamus Stomachalis Timæi, cujus descriptionem dedi in Collegio Institutionum. Item Balsamus Peruvianus regionis præcordiorum illitus, etiam est egregius.

R. Olei expr. nucis. ℥ij.

Destill. bacc. juniper. ℥j.

Calami arom. 3℥.

Macis 3℥.

M. pro Balsamo, S.

Balsamus stomachalis.

Præterea Tacamahaca, galbanum, Mastix, &c. in forma emplastri seu sicuti stomachalis regioni stomachi applicentur: e. g.

R. Tacamahac. p. ℥ij.

Bals. Peruvian. p. j.

Cum f. q. Theriac. seu oleo destillato quodam, bacc. juniperi, &c. fiat Emplastrum:

D. S.

Emplastrum stomachale.

Item

R. Tacamahac. p. ℥ij.

Gum. carannæ p. j.

Malax. cum Bals. Peruv. vel oleo destillat. menthae, postquam igne liquefacta fuerint:

D. S. ut antea.

Vel

R. Emplastr. stomachal. Crat.

Tacamab. an. q. s.

Liquefacta malax. cum Balsamo Peruviano.

D. S. ut suprad.

Pertinet huc scutum stomachale de Hyrace HARTMANNI in Praxi Chymiatr. pag. 167, item Empl. de Tacamahaca SCHROEDERI Pharm. l. 2. cap. 53. n. 18. pag. 201, item Emplastrum stomachale MYNS. in anatom. Chym. pag. 504. Tandem spongia vino generosissimo, cui simplicia stomachica fuerunt infusa, imprægnata, stomachi regioni imposita seu applicata, idque calidè, itidem in usu est. Omnia denique externa in Chylosi læsa conveniunt, quæ in Anorexia dicta, & suo loco de vomitu & diarrhoea dicentur.

## C A P U T II.

D E

### FLATIBUS IN STOMACHO ET INTESTINIS.

Quando sub Chylificatione vitata simul generantur copiosi flatus, iique insigniter stomachum distendunt, dicitur Inflatio stomachi: Quod si flatus cum sonitu non semper grato per os erumpant, dicitur Eructatio: Sin copiosi admodum supra & infra simul erumpant, ut in malo hypochondriaco, dicitur Colera sicca; qui tres affectus parum inter se differunt, & uno modo curari possunt. Flatu hi si in stomacho retineantur, satis sunt molesti, imò interdum tam atroces, ut pessima inducant symptomata. Sic BARTHOLINUS exemplum habet C. 2. Epist. 81. p. 687. sceminae, quæ ventriculū adeo habuit inflatum, ut gravida habita fuerit.

Flatu cum neque ad vapores neque ad exhalationes referri possint, (vid. Kergerus Tr. de Ferm. §. 3. c. 3. p. 223. & sequentibus), meritò ab HELMONTIO ad tertiam quandam classē huiusmodi entium, nempe ad Gas seu spiritus incoercibiles referuntur, quod gas ipsi est substantia subtilis at spirituosā, in corpus visibile incoercibilis, nec immediatè reducibilis, genita ex multis corporibus per motum fermentationis aut effervescentiæ.

Sunt autem variæ gas: Sylvestria, pinguis, aquea, sicca. Sylvestria sunt, quæ vocantur communi nomine flatu; nullo enim modo possunt in corpus aut visibile aut palpabile reduci aut coerceri, secus ac in vaporibus; inde frustra & incassum laborant, qui magno alembico volunt capere flatu seu spiritum fermentantis vini, quia impossibile est, ut coerceantur in aliquod corpus.

Reperiuntur etiam flatu in aliis locis, si materia & causa efficiens commoda adfuerit, non tantum in tumoribus flatulentis; sed & observandum est, quod in venæ sectione non levis flatu proruperit, quamvis à ventriculo & intestinis, aliisve partibus, sæpè communicentur; ita ut qui nunc in stomacho exagitant, mox ad Massam sanguineam delati flatu, præcordiorum anxietates, difficultates spirandi, &c. procreent, & sæpius ex vulneratis valis sanguineis prorumpant.

Natura eorum obscurissima est, & ordinariò solent confundi cum exhalationibus & vaporibus, qui tamen toto celo differunt.

Quoad attinet Vapores: ii sunt effluvia humida, beneficio caloris resoluta, à frigore tenui in guttas condensabilia, unde halitus condensati flores, fuligo, dicuntur, cum quibus nullum commercium habent flatu; siquidem vapores & halitus calore solvuntur, & frigore constringuntur; neutrum autem horum flatu patiuntur.

Ex his patet: flatu esse producta nova corporum cum aliis nullo modo conferenda; unde ab HELMONTIO tanquam nova entia, à novo nomine appellantur gas; generatio ergo eorum est de novo, cum non præexistant formaliter in assumptis, sed materialiter fiant demum in stomacho, idque nec à calore, nec à frigore per se, sed tantum ab acido præternaturali per vitiosam fermentationem, ex & in materia crassa, viscida & pituitosa: hinc est, quod Veteres dixerent, oriri flatu à Melancholia; hoc enim est nil aliud, quam acidus succus. Unde in mulieribus hysteriis, hypochondriacis, scorbuticis, cachecticis, similibusque, vitio fermenti ventriculi mucagine acidà obruti, vel succi pancreatici nimis acidi, copiosissimi generantur flatu, propter acidum fermentans materiam pituitosam & vi-



& viscidam etiam quibuscunque ex cibis, ita ut causa efficiens non ructuum solum, sed & flatuum sit acidum. Materia ergo ex qua, seu subjectum, sit viscidum seu mucilaginosum pingue.

Remotis his dubiis, pressius examinabimus flatuum horum naturam, & consideremus flatus artificiales, qui in notitiam eorum nos ducunt. Equidem, quod obiter insinuo, nonnulli dicunt: quod ventus est in macrocosmo, flatus est in Microcosmo: sicuti Paracelsus Part. 4. Cardines mundi distinguit per flatus. Sed hæc parum ad rem facere videntur; ventus enim est motus aeris vi elastici elati.

Modus generandi & elevandi fit nunc per vitiosam fermentationem, ut patet in panificio, cerevisia & mulo; nunc per effervescentiam: i.e. materialiter existunt ex mistis, non formaliter. E.g. Spiritus nitri metallico corpori dissolubili, imprimis Marti vel Veneri, affusus, corrodendo & dissolvendo excitat itrepirum, effervescentiam, copiosas bullas, imo & flatus emergunt copiosissimi, & quidem adeo fortes, ut possint etiam fortiora vasa distringere: vid. BECHERUS in *Phys. subterr. c. de liquefactione*: si destillatur tartarus, formalem effervescentiam sub destillatione concipiet, ita ut, nisi patula sint quædam rimulæ, flatus sub effervescentia tam violenti surgunt, ut minime coerceri valeant: sed omnia propter flatus copiosissimos distringantur. Item si acetum destillatum, aut succus citri superfundatur corallis, ostreis, lapillis cancerorum, &c. flatuum tantus strepitus & bullarum proventus oritur, ut nisi detur porta, distringatur: Sic etiam farina omnis quocunque modo tractata, sive colla, sive frisa, sive macerata, non parit flatum: si vero acetum contrahit, & fermentetur, sponte flatus insignes eructat: Similiter ac fructus horæ, eorumque succi, in specie mustum quocunque naturaliter modo coquendo, destillando, &c. tractatum, nullum gas, ut vocat HELMONTIUS, flatulentum eructat, si non fermentet; simul vero atque fermentare, & inde acidum ejus activum fieri incipit, flatus copiosissimi & impetuosissimi erumpere solent, qui etiam, nisi detur spatium, fortissima dolia distringunt: conf. HELMONTIUS *Tr. de Flatibus*, & KERGERUS *l. a*. Sic si accipiat quis butyrum antimonii & affundat spiritum nitri, intensa fit effervescentia, & tantus flatuum imperus, ut nisi vas sit apertum, coerceri nequeant. Unum adhuc urgebo: poma matura quæcunque ratione tractentur, nil flatuum emittunt; quando autem calore fermentationem accipiunt, & fortiter agitantur, distripitur cortex propter flatuum proventum, qui pomis antea non inexistebant, sed de novo per fermentationem generati sunt.

Equidem verum est, esse multa alimenta, ex quibus præ reliquis generantur flatus: uti sunt raphani quicunque, armoracia, allium, cepæ, uvæ recentes, poma cruda & infusæ, alique fructus horæ, cerevisia novella & infusata, mustum, caseus, & similia. Verum hi generantur non in omni stomacho; nam robustus hæc, ut ut maxime flatulenta, sine flatulentia digerit; sed tantum in debili, aut qui aliis simul cibis copiosis se nimis inpurget, in hoc, ex alimentis etiam optimis & non flatulentis, per vitiosam fermentationem copiosissimi effusciuntur flatus. Quod non insit assumptis, patet ex eo; quod duo homines, alter sanus, alter æger; v.g. hypochondriacus, eisdem alimentis utentes, prior nullos generet flatus, posterior copiosissimos non insunt ergo alimentis, aliis æqualiter generarentur. Ratio est diversitas fermentorum in stomacho, unde hypochondriaci & hysterici ferè ex omnibus alimentis eliciunt flatus, quod alia non faciunt subjecta, quia in illis abundat acidum vitiosum. Certum interim est, alimenta quedam in quibusdam magis esse apta, ut exinde facillime elaborentur flatus, quam in aliis: e.g. præter jam dicta, eadem alimenta, quæ constant sale volatili acri, interim in stomacho suo nihil obesse possunt. Nempe talia flatulenta, sale volatili acri abundante, incitant & attenuant mucilaginem stomachi, & postmodum cum acido stomachi concurrendo in subjectum ita viscido, ex iis generantur copiosissima bulla, in quibus bullis talia tandem coeunt, & pedetentim resolvuntur, & tandem flatus fiunt.

Nisi ergo occasione talium ingestorum nati sunt flatus, de subjecto materia viscida seu pituitosis humoribus confirmatur suspicio. Quod vero ad sit in talibus talis mucilaginosa viscida, experientia testatur; quia in vomitu eru-

ant copiosa crassa, viscida, renacia, plus minus acidula. Interim rarum est exemplum, quod habet RHODIUS *Centur. 2. Observ. 32. de tubitanea ventriculi & abdominis inflatione ex esu pinguium postusum Decocti Chinæ*.

Quæritur: quomodo ex acido fermentante in materia viscida generentur flatus? In farina res nota est, quod in ea sint duo talia, Acidum & Urinosum, ratione quorum talem vim habet germinativam: ex farina aqua subasta fit pasta renax insigniter viscosa, in qua, addito fermento, incipiunt resolvi talia, & emergit acor: acidum enim agit in alcali, unde fermentando talia impedita imperuosius tumultuantur, donec viscositas resolvatur & inhibatur: Patet etiam in musto, quod tractatum beneficio ignis, & inspissatum, relinquit copiosum tuorum viscidum, cuius acor, qui in omni musto est, singit in alcali, adiuncta visciditas resolvitur in substantiam volatilem: vid. HELMONTIUS.

Patet ergo, quod flatus non insit in rebus, sed fiant per motum fermentativum ab acido in materia viscida. Hæc etiam intelligenda sunt de Colica flatulenta.

## PARS AFFECTA.

Pars primario affecta est stomachus, tam cavum ejus ratione flatuum, quam necessarii officium superius, cujus clausura connivet vel non, distendit, intendit vel non.

### C A V S Æ.

Causa proximè distensionis stomachi sunt flatus in stomacho, geniti ab acido fermentante in materia viscida. Quod etiam pertinet compressio: quemadmodum enim aer naturalis vim quandam elasticam seu expansivam possidet, ratione cuius ille compressus in lar plumæ seu lanæ cujusdam semper se iterum explicare conatur, hincque vapores vel alia corpora leviora sibi contigua propellit, & ventum excitat; ita venti in microcosmi cavitatibus unilantes, si harum coarctatione comprimantur, aut per naturam suam expansivam, aut à calore viscerum magis agitati, vel novorum accessu superati, angustius hoc spatium evitare conando, unusquisque eorum alterum agitando, ventum microcosmi seu flatum producit: quod exinde evidens fit, quod circa colicam flexuram arduissimam (inque colli inflammatione, teneris rigidisque ejus fibris) cum cateroquinidem Colon amplissimum in hypochondri sinistro spaciū occupet, sufficit, flatuum copia, & impetus major inde observatur, atmospheræ scilicet illi intestinorum compressi.

Remota sunt materia, vel assumpta vel retenta. Assumpta sunt omnia talia, quæ viscidiores generant succos, quæ ad flatus disponunt. Quoad retenta; constat, quod cruditas acida inducat flatus, ut fit in hypochondriacis, scorbuticis, cachecticis, quorum mala omnia oriuntur ex cruditate acida, in quibus ordinariò generantur flatus.

Porro de flatu naturali & præternaturali, item de quadruplici ructuum differentia, dum aliis est acutus, ut in hypochondriacis & jejunis; alius didi, quæ non nihil, graveolens, ex cruditate nidorosa; alius fletus seu is, qui simplicium assumptorum odorem & saporem simul refert, v.g. post esum cepæcorum, armæ racie, raphani, piscium; alius in pinguis, quando adsunt flatus sine certo ac determinato sapore. Conf. Helmontius *Tr. de Flat. Interdum*. licet rarius, adeo etiam ructus flatus, pessime notæ, & admodum horrendus. Flatus naturales sunt, qui semper & in omnibus subjectis reperuntur, imprimis in jejuno (quod patet in dissectis animalibus, ubi jejunum reperitur totum flatibus repletum) hunc in finem ordinari, ut conservent parietes intestinorum distentos, ne invicem collabantur, & consequenter pori continuè in intestinis maneant patuli. Hi gignuntur in nobis ex mucos naturali intestinorum acido, concurrente simul sale volatili oleoso seu bile pingui, sunt flatus inde sulphurei fetidi: quod exinde patet, quia sunt inflammabiles. Quare autem forteant flatus? ratio petenda ex artificiali Chymicis, ubi deprehendimus, subjecta sulphurea & pingua si solvantur ab acidibus, & præcipitentur ab acidis, factorem dare insigniter nares ferientem: Sic si cum antimonio, tartaro, co-nitro, &c. us ne taliorum vel regium antimonii præter scoræ istæ antimonii nil aliud sunt, quam sulphur æstimenti dissolutum ab alcali: quæ si solvantur simplici aqua, nullum flatum erunt odor; si vero hæc solutio præcipitatur ab acidis in stillam solutæ in destillati, ibidem videntur neri, &c. immo ructus in ore rector. Sic flatulencia in nobis testent, quatenus usoriam ut nã



Cum concurrente bile, cuius sal volatile & proprium oleum resolutum præcipitatur ab acido, & dat flatus foetidos. Et notissimum est, quò magis pingua sunt salia, eò magis foetent flatus; quò minus pingua salia, eò minus foetent.

*Præternaturales Flatus sunt*, qui sub digestionem primam, secundam, & tertiam per materiam viscidam pinguem ab effectu acido generantur.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa diagnostica in inflatione stomachi, notandum: (1.) quando erumpunt ructus, satis se prodit malum; quando verò hi ipsi, propter orificium stomachi finistrum firmitus clausum coercentur in cavo ventriculi, ad sunt præcordiorum angustia: (2.) deinde eadem præcordia sunt admodum distenta: (3.) si eadem tangantur, renisus quidam ibidem percipitur: (4.) ægri conqueruntur de difficili respiratione, propter distentum stomachum, & hinc impeditum diaphragmatis motum, in primis dum supini incumbunt; & dolor interdum tantus est, ut æger nesciat, quò se vertat; interdum ita, ut animi deliquia immineant, quod in hypochondriacis est frequens: (5.) subinde quoque percipiunt flatulentias quasdam in stomacho, quando se jactitant ex uno latere in alterum, ut describitur à FORESTO l. 18. Obs. 39. in scbol.

Gravitas & distensio talis quandoque non solum circa ventrem ipsum percipitur, sed & totum pectus occupat; aliquando verò retrò & inter collum & dorsum, ac ipsas vertebrae irruit. sæpe autem utrumque latus subit; interdum aliquando verò tumorem circa os ventriculi efficit, & tunc ructus inanes sunt, parum alleviantes; & flatuum, qui per alvum excerni consueverunt, eruptio inhibetur: Augetur malum, si ante perfectam restitutionem cibum largius accipiant; sic enim magis membra inflantur, & cum dolore distenduntur.

In genere distensio stomachi interdum usque adeò est molesta ægro, ut nesciat, quorsum se convertere debeat? interrogatus de passione, dicit: *es seyhm alles zu enge forme*: Imò hæc anxietates interdum eo usque procedunt, ut respirationes valde difficiles reddantur: Si emittunt ructus, levantur; eructaturi, de insigni angustia præcordiorum conqueruntur.

Inflatio ergo est Intumescencia, orta à flatibus, genitis ab acido per fermentationem in subiecto viscido.

### PROGNOSIS.

Quod attinet signa prognostica: nulli flatus sunt boni, excipiantur jejuni, licet melius sit, si cessant; innuunt enim stomachum sub digestionem plus minus defectuosum; unde ordinarius sunt hypochondriacorum symptomata.

Inflatio ventriculi, quæ in convalescentibus fit, recidivam morbi prioris significat.

Ut ut autem per se parum in recessu habeant inflatio stomachi, & Ructus, diutius tamen durantes, nec facile corrigibiles, metum futuræ tympanitidis, seu hydropis sicci injiciunt.

Ructus, qui ejiciuntur foetidi, pessimæ sunt notæ, & à GABELCHOVERO in Cent. 2. l. 15. in annotationibus, admodum funesti declarantur: imò monet Medicos, ut sibi caveant à taliter eructantibus, ne foetore contagium malignum in pulmones inspirent.

Rarum est, quod BARTHOLINUS in Art. Med. Hassnienf. p. 199. & RHODIUS c. 2. Obs. 52. observarunt, externæ frictione corporis quocunque in loco ructus continuos.

### CURA.

Flatulæ cum fiant per fermentationem vitiosam, ab acido præternaturali in subiecto viscido excitatam, in Cura

1. Attenuanda & expurganda materia viscida, crassa, & pituitosa in stomacho & primis viis circa fauces hærens; hinc Purgantia optimè h.c. conveniunt, ut pilulæ laxativæ cum gummatibus.
2. Per Medicamenta aromatica salino-volatilia oleosa discutiendi flatulæ, ut facilius per guttur inferius erumpant: & simul acidum fermentativum temperandum vel corrigendum.

3. Flatuum imperus per nitrum & nitrata, flatulentias figentia, & fermentationis motum sistencia, penitus coercendus & figendus.

Quoad 1. Conveniunt medicamenta Vomitoria, citius & tutius evacuancia è stomacho somitem morbosum, maxime antimonialia: imprimis à Rulando usurpatur aqua benedicta. Vomitoria si non commoda, aloëtica imprimis conveniunt, & pilulæ ex iis paratæ; hinc & pilulæ mastichinæ, vel aloëphanginæ, ad ventriculum crebrius eructantem usurpantur; quibus semper addatur gummi ammoniacum, galbanum, succos viscidos resolventia & evacuantia: e.g. ad affectus stomachi chronicos & sæpe recidivantes, ex materia viscida acida oriundos, optimè conveniunt tales pilulæ usuales:

*R. Gum. ammoniaci in aceto sol. 3ß.*

*Mastich. el gr. xv.*

*Aloes succot. gr. ix.*

*Ex. r. troch. alband. gr. lv.*

*Cum essent. menthae f. pilulæ Num. 60.*

*D. S.*

*Pilulæ pro aliquot vicibus.*

*Dosis 12. vel 15. &c.*

Alia formula talium pilularum in affectibus hypochondriacis, hysteriis, scorbuticis:

*R. Gum. ammon. acet. solut.*

*Vitriol. maris solat. an. 3ß.*

*Aloes luc. gr. xv.*

*Mastich.*

*Myrrh. an. 3ß.*

*Extr. troch. alband. gr. viij.*

*Cum f. q. essent. vel oleis destillat. menthae f. pilulæ No. 105.*

*D. S. ut antea.*

*Vel*

*R. Mass. pilul. de ammon. Querc. vel Extr. cathol. 3j.*

*Mercurii dulc. gr. xv.*

*Extr. troch. alband. gr. ij.*

*Oleis destillat. cum. gutt. j. vel ij.*

*Cum ess. Zedoariae f. pilulæ.*

*D. S.*

*Pilulæ pro una vice.*

Quidam etiam commendant pulverem sennæ laxativam, qui non est inelegans. Vel

*R. Pulv. jalapp. gr. xij.*

*Scamm. sulphurat. gr. iij.*

*Nitri gr. vj.*

*Oleis destillat. carminat. cujusd. gutt. j. vel iij.*

*M. f. pulvis, S.*

*Pulvis purgans pro una vice.*

Subtracto fomite, in specie mire convenient simplicia aromatica, Carminativa dicta, i. e. salia volatiliora oleosa, acidum temperando & corrigendo, viscidumque incidendo, qualia sunt radices angelicæ, gentianæ, aristolochiæ rotundæ, acori veri, galangæ, cortices aurantiorum, nucæ Moschata, cardamomum, caryophylli, macis, Zingiber, Zedoaria, cinnamomum, & ex his destillata olea: è salinis volatilioribus oleosis simplicibus carminantibus paratæ misturæ, v.g.

*R. Aqu. fanicul.*

*Menthae an. 3ß.*

*Carmin. cum vino 3j.*

*Spiritus anisi,*

*Essent. cortic. aur. an. 3ij.*

*Oleis destillat. macis gutt. v.*

*Syr. cort. aurant. 3vj.*

*M. f. Potio cochlearum haurienda,*

*D. S.*

*Poriuncula contra inflationem.*

FORESTUS in suis Obs. l. 18. Obs. 39. in stomachi Inflatione cum dolore ejus intolerabili & distensione, idque ex esu ciborum flatulentorum nimio & multo, & potu musti, tale habet experimentum: decoxit flores chamomillæ, tam vulgaris, quàm, quæ est nobilior, Romanæ, minutim incis. an. M. j & adjecto pauco semin. anisi, feniculi & carvi, in cerevisia: Hoc Decoctum cum bibisset, & copiosos flatus per superiora & inferiora æger emisisset, & ita feliciter curatus fuit. Speciatim oleum Chamomillæ Sapphirinū mirabile carminans est, item ejus aqua, essentia, & omnia ex chamomilla. Multi asserunt, quod oleum chamomillæ destillatū, colore caeruleo tingatur, quādo destillatur per



per alembicum cupreum : sed non est : Nam si in balneo per alembicum destillatur, etiam fit coarctum.

Porro semina quatuor calida maiora, ut anisi, cumini, foeniculi, carvi, & minora, quæ reuera sunt solamen pauperum, uti Helmontius dicit, eorumque in vino paratum decoctum, optime profunt: item olea eorum destillata, vel cum his & spiritu salis ammoniaci vinoso, methado superius indicata, fiat sal oleosum, quod in flatibus omnibus egregium est. hinc spiritus anisi, salis ammoniaci anisatus peccoralis, item seminis dauci, baccæ lauri, juniperi, exque his parata quæcumque.

Post convenit castoreum, quod est singulare remedium ad omnes affectus flatulentos, maxime muliebres & hypochondriacos, vel in substantia, vel ejus extractum & essentia, imprimis cum spiritu salis ammoniaci vinoso facta, aliaque ex eo parata remedia; item ex Myrrha atque Theriaca: Cortices etiam aurantiorum sunt nobile aromaticum ad acidum stomachi corrigendum, & flatus discutiendos, item eorundem essentia, & oleum destillatum, spiritus salis ammoniaci cinnamomifatus, & in genere quæcûq; aromatica sale volatili oleoso largiter imprægnata. Ratione cinnamomi species omnes aromaticæ officinales hic expetuntur: Vel

R. Semin. coriandr. ʒss.

Anisi,

Fœnicul. an. ʒij.

Zedoar.

Zingib. r.

Galang.

Sal. ammoniaci an. ʒj.

Specier. diatrien. piper. ʒijss.

Ol. sacch. aromat. ʒij.

M. f. Tragea grossa. S.

Tragea Romachica.

Uterius ex compositis sunt aquæ stomachicæ usitate, tam simplices quàm compositæ, foeniculi & menthæ, aqua carminativa Dornereilli, aqua cinamomi cydoniata, syrupus corticum aurantiorum; item syrupus baccarum lauri vel juniperi: de quibus vid. HORSTIUS l. 4. Obs. 4. & l. 5. Obs. 2, quin etiam spiritus anisi: Essentia chamomillæ Romanæ, olea destillata seminum supra monitorum carvi, anisi, corticum aurantiorum, cinnamomi; item balsamus sulphuris terebinthinatus & anisatus in contumaciorebus ructibus est optimus: omnibus his merito præfertur spiritus carminativus de tribus, qui fit ex tartaro & nitro, pelliturque per retortam adaptato Recipiente magno, cui spiritus vini tartarifatus inest; postmodum rectificatus fit spiritus elegantissimus odoris urinosi, potentissimus in quibuslibet flatule utiis, distensione, aliisque stomachi affectibus, dolore & hypothyria, aut aliis symptomatibus, & in specie conducit hypochondriaci.

Ex his variaz concinnari possunt formulæ:

R. Aquæ menth. ʒij.

Carmin. Dornere. ʒj.

Spiritus iberiac. camphor. ʒij.

Carminativ. de trib. ʒijss.

Laud. opiat. gr. iij.

Syr. cortic. aurantior. ʒvj.

M. f. Potio. S.

Mixtura Romachica confortativa.

Detur in paroxysmo, ubi nullus ardor aut æstus: Vel

R. Aquæ menth. ʒij.

Chamomill. Rom. ʒj.

Zedoar. ʒijss.

Carmin. Dornere. an. ʒss.

Spiritus carminat. de trib. ʒijss.

Essent. opiat. ʒj.

Syr. cort. aur. ʒj.

M. f. ut anted.

Vel

R. Aquæ chamomill. ʒij.

Essent. castor. tartarif. ʒijss.

Spiritus sal. ammon. anis. ʒj.

Syr. cort. aur. ʒij.

M. S. ut supra.

R. Elix. propriet. sine acido ʒij.

Essent. castorei ʒij.

Opii ʒj.

M. D. S.

Elixir corroborans Romachum.

Dosis 40. guttulæ.

Errmuller. Oper. Tom. II.

Tandem etiam spiritus nitri nobilissimum est carminativum, imprimis dulcificatus & temperatus cum duplo spiritus vini, digestus & cohobatus aliquoties pro spiritu nitri dulci anticólico D. MICHAELIS, nulloque sic magis appropriatus redditus. Hic enim, ut ut sit acidus, præfertur tamen reliquis, figendo potenter erumpentes spiritus flatuosos, & impediendo fermentationis & effervescentiæ motu, adeoque quascunque flatulentias cohibet: speciatim confert, si cum flatibus conjunctus sit ardor, seu æstus, aut etiâ superveniant vagæ phlogosæ, quæ nunc citò iterum evanescent, nunc citò aduolant, & solent oriri ex bile, cum acido in intestinis concurrente & vitiose effervescente; quibus in casibus peculiaris est spiritus nitri. Experientiâ semper confirmatus sum in adultis & infantibus, quando cum flatibus simul adscendunt sudores anxiosi, incalcescit facies, & rubor venit, quod tunc conveniat maxime spiritus nitri, qui figit effervescentiâ in primis viis. Melioratur adhuc, si pro dulcificatione ejus loco spiritus vini simplicis sumitur spiritus appropriatus, v. g. spiritus anisi, menthæ, baccarum juniperi, aut etiam spiritus vini aliquis aromaticus, seu spiritus vini carminativus ex vegetabilibus compositus, i. e. spiritus vini vegetabilibus aromaticis carminativis affusus, digestus, & aliquoties cohobatus: cujus exemplum exhibet SYLVIVS l. 1. Præf. c. 9. §. 18. ubi de ructibus, qui propter delectum simplicium est elegans;

R. Rad. angel. ʒj.

Imperator.

Galang. an. ʒijss.

Fol. rorismar.

Majoran.

Rut. bore.

Basilic.

Summit. cent. min. an. M. ʒ.

Bacc. lauri ʒij.

Semin. angel.

Leviss.

Anis. an. ʒss.

Zingib.

Nuc. Moschat.

Macis an. ʒijss.

Cinnam. ʒvj.

Caryophyll.

Cortic. aurant. an. ʒj.

Concisis & contusis crasse affunde

Spiritus vini Malvat. vel Hispan. ʒxl.

Digerantur per biduum in Balneo Mariæ, hinc ad siccitatem destillentur: quicquid ascenderit, magnatim iterum affundatur, per biduum digerantur, mox tres quartæ partes denuo destillentur, & asservatur spiritus destillatus pro usu.

Convenit & ejus Mixtura polybrevis, temperata contra flatus & ructus, & omnes morbos flatulentos, sequens quæ sit instar omnium:

R. Aquæ scenic.

Menth. an. ʒij.

Spiritus vini rectif. vel Ag. vis. Ment. vel spiritus

carmin. Sylv. ʒj.

Spiritus nitri gutt. xx.

Olei destillat. macis gutt. vj.

Laud. opiat. gr. iij.

Syrup. menth. ʒijss.

M. S.

Mixtura stomachica confortativa cochlearim sumenda

Dosis cochlear. ij.

Ad hujus imitationem præscribere solent sequenti modo:

R. Aquæ menth. ʒij.

Carmin. ʒvj.

Elix. menth. ʒss.

Spiritus nitri dulc. gutt. xv.

M. S. ut anted. Vel

R. Aquæ menth. ʒij.

Carmin. Dornere. ʒj.

Spiritus nitri dulc. ʒj. ad ʒijss.

Antim. diaphor. ʒj.

Laud. opiat. gr. iij.

Syr. cinnamom. ʒvj.

M. S.

Mixtura contra inflationes.

Vel

R. Ag. chamomill. Roman. ʒij.

Fœnicul. ʒj.

E 2

Spi.



*Spiritus theriacal. campbor. ʒi.*  
*Vitrioli dulc. ʒij. ad ʒi.*

*Laud. opiat. gr. ij.*

*Syrup. hyssopi ʒʒs.*

*M. f. Potio, S.*

*Mixtura confortativa contra inflationes,*

*Mixtura hæ propinentur, ubi phlogoses & æstuationes urgent.*

*Item spiritus nitri theriacalis ad 20. vel 30. gutt. convenit.*  
*Porro ambra in rictu contumacitæ singulari specifi-*  
*cum commendatur à Zacuto Lusitano l. 2. Prax. admittit,*  
*Obf. 7. cum saccharo in forma pulveris usurpata.*

*In Rictibus siccis pilulæ matichinæ conveniunt imprimis.*

*Item ad Rictus acidos diuturnos præ cæteris conveniunt*  
*grana piperis, vel integra vel modice confecta, No. v. vel*  
*vi. manè jejune deglutita: vid. RIVERIUS Obf. 37.*  
*Morb. infrequent. Item convenit armoracia: Sicuti ad aci-*  
*dum destruendum in flatulentis affectibus alii laudare so-*  
*lent talos leporis pulverisatos, aut talos suillos, lapillos*  
*cancrorum, cornu cerui præparatum, imprimis ultum,*  
*ebur ustum, corallia rubra præparata, antimonium dia-*  
*phoreticum &c. ut hæc terra fixa eo promptius absor-*  
*beant acidum in flatibus peccans. Unde ex his aromati-*  
*cis & terreis possunt fieri pulveres egregii; e. g.*

*R. Corn. Cerv. usi præp. ʒʒss.*

*Cryll. præp.*

*Ebor. usi præp. an. ʒʒs.*

*Salis absinth.*

*Chamomill. an. ʒi.*

*M. f. pulvis. S.*

*Pulvis pro aliquot vicibus.*

*Dosis ʒi. ad ʒʒs. Vel*

*R. Aquæ Menibæ ʒij.*

*Cinnam. spirituos. ʒij.*

*Lapill. cancer. præp. ʒi.*

*Syr. fœniculi ʒij.*

*M. D. S.*

*Potionculæ pro aliquot vicibus.*

*Essentia absinthii omni pastu in cerevisia usurpetur, item*  
*succus expressus, Vinum absinthites, quatenus corrigit*  
*causam materialem flatuum: ab omni pastu vespertino*  
*usurpatur pulvis ex coralliis, osse cocolla, & osse sapiæ*  
*an. pulverisatis in spiritu vini juniperino. Vel*

*R. Ebor. usi;*

*Corall. rub. præp. an. ʒʒs.*

*Spec. diatrion piper. ʒi.*

*Extrac. Zedoar.*

*Carr. aur. an. ʒʒs.*

*cum f. q. sacchari in aqua fœniculi solus. f. Rotula,*  
*irrotanda cum*

*Olei destil. ac. rucis aut fœnic. gutt. iij.*

*M. D. S.*

*Rotula stomachales confortativa contra inflationes.*

*Ubi nimia & contumacissima mucilago flatuum & ru-*  
*atum causa, optimus elixir prius asthmaticus, vel solus,*  
*vel mistus cum duplo elixir stomachalis Michachis; dosis gutt.*  
*xx. vel xxx. Est egregium remedium.*

*Externæ olea, tam destillata quam decocta aut infusa,*  
*carminantia supra citata commodè possunt illiniri, so-*  
*vendo desuper locum, latere calefacto. Reliquis prefer-*  
*tur oleum destillatum sapphirinum chamomillæ, semi-*  
*num carminativorum: Vel*

*R. Ol. expr. nuc. Mosch. ʒʒss.*

*Destillat. bacc. juniper. ʒi.*

*Ment. ʒʒs.*

*M. S.*

*Balsamus stomachalis.*

*Vel*

*R. Ol. chamom. ʒʒs.*

*Expr. nucist. ʒij.*

*Destillat. cors. aur.*

*Fœnic.*

*Mentibæ,*

*Zedoar. an. ʒʒs. ad ʒi.*

*M. pro Linimento, S.*

*Linimentum stomachale.*

*Aut Forus humidus externè applicandus, qualem dedi in*  
*Collegio Formul. pro torminibus colicis: Vel*

*R. Spiritus anisi ʒij.*

*Vini. ampbor. crocat. ʒʒs.*

*Theriac. ʒʒss.*

*M. S.*

*Epibema contra inflationes.*

*Applicetur cum panno coccineo imponendo desuper la-*  
*terem calefactum.*

*Item applicetur emplastrum de baccis lauri, malaxatum*  
*cù oleo Chamomillæ, absinthii, menthæ, vel Juniperi. Vel*

*R. Tacanabac. p. iij.*

*Balsam. Peruv. p. j.*

*Liquefacta misc. cum Theriaca in Emplastrum.*

*Item spiritus vini infus. aromaticorum, extrinsecè applica-*  
*tus calidè convenit.*

*Clysmata carminantia etiam commodè simul injici*  
*possunt, qualia præscribi solent in cardialgia, colica statu-*  
*lenta, &c. Clysmata etiam ex urina humana, imprimis*  
*pueri, vel sola, vel cum carminantibus cocta: e. g.*

*R. Rad. angel. ʒi.*

*Sem. anis.*

*Fœnicul. an. ʒij.*

*Ferm. pistor. ʒʒs.*

*Coque in urina pueri:*

*R. Colatur. ʒij. adde*

*Mell. despum. ʒi.*

*Ol. destillat. carvi ʒi.*

*Misce pro Clystere in tympanitide. Vel*

*R. Spec. carmin. M. j.*

*Rad. levist. ʒvj.*

*Sem. anis ʒij.*

*Coque in f. q. urinae hum.*

*R. Colatur. ʒvj. ad ʒviij.*

*adde*

*Elect. de bacc. lauri ʒvj.*

*Mell. mercurial. ʒi.*

*Sal. ciner. elavell. vel vitri antimoniaci. ʒʒs.*

*M. f. Enema.*

## S E C T I O IV.

D E

### ASSUMPTORUM IN STOMACHO RETENTIONIS LÆSIONE.

#### C A P U T I

D E

#### VOMITU ET NAVSEA.

**N**otum est, quod omnia alimenta, quæ per os ingerun-  
tur, transmittantur ad stomachum, ut ibidem reti-  
neantur, digerantur, & in salis tertium transmutentur,  
tandem digesta naturaliter per pylorū seu inferius stoma-  
chi orificium transire debeant: Si autem fiat, ut hujusmodi  
ingesta reiciantur denuò per os sursū ex stomacho, est mo-

tus præternaturalis. In eum namque finem est constructum  
œsophagi iter, ut alimenta assumpta deriventur in ventri-  
culum: quando verò varia humida, sanguis, pus, acida, bi-  
liosa, &c. subinde per superius ejus orificium & connexum  
œsophagum eiciuntur, vocatur Vomitus, quem ordina-  
rio nausea præcedere solet. Jam quod attinet Vomitus:  
Vomitus repera nil aliud est, quàm convulsio pylori, qui ner-  
vosus & fibrosus est, & hinc systole totius ventriculi per ir-  
ritationem imprimis orificii superioris gravem & nimiam;  
Dum enim, ut omnium optimè HELMONTIVS  
expressit Tract. Pyl. Rict. §. 2. 6. 21, pylorus irritatus  
fortiter se contrahit, & constringit, fit, ut continuato s-  
brarum



brarum tractu, subito sequatur motus totius ventriculi peristalticus inuersus, quia à pyloro progreditur usque ad stomachum, & in orificio sinistro terminatur. Idque propter fibras nerveas, tam circulares quam transversas, stomachi tunicam mediam intertextentes, & in specie ab orificio sinistro ad dextrum protensas, similiter constrictas, hanc pylori & totius stomachi convulsionem ad orificium sinistrum usque sequitur similis gulæ convulsio, indeque omnium contentorum ex stomacho in gulam, & sic per consequens ex gula in os protusio. Est enim pylorus, uti rectè inquit HELMONTIUS, Rector & Præses retentionis & transmissionis alimentorum in stomacho, & omnium in stomacho reperibilium & excretorum; unde in Pyloro subest ista pars, quæ in vomitu affligitur, dum sui aperturâ naturali transmittit inferiora versus ventriculi contenta, & sui contracturâ præternaturali superiora versus regurgitare facit eadem ipsa contenta. Vera esse ea, quæ modo dixi, confirmat ocularis experientia: Conferatur, quoad vomendi modum, OLAUS RUDBECK, Professor Suecus, Anatomicus insignis, in suis *Observationibus anatomicis*, HEMSTERHUSII *Melli aureæ annexis in Octavo*: Hic in *Observat.* 20. p. 309. ita inquit: *canis vivus diffus vomitionis actum palam fecit: primò pylorus se contrabebat, mox systole totius ventriculi ab orificio inferiori ad superius sequebatur, ac tandem æsophagi materiam effundens.* Confer. simul de modo KERKRINGIVS *specil. anatomico observ.* 1. de vomitu lethali à nummo deglutito, & intra circulum pylori hærente, ac WILLIS in *Pharmac. Rationali* *Part. 1. sect. 2. c. 1. p. 83.* ubi, quo modo fiat vomitus? explicat; item quæ habet HELMONTIVS *allegatus*, quando ait: *Si aperto pyloro vomitus contingeret, in duodenum maxima evomendorum pars decideret: unde huius pylori primum est peccatum in iis, qui lienteria corripuntur.*

*Nausea* præcedit vomitum; quæ *nausea* vulgò dicitur laxatio nimia orificii superioris; quod tamen omnino falsum est: quin potius nihil aliud est, quam inane vomendi desiderium, & consistit in nimia orificii superioris vel sinistri ventriculi clausura, & firmiore constrictione, propter irritationem ejus loci à re molesta factam; quod innuere videtur RIVERIUS, quando in *Praxi.* 9. c. 7. orificii dicti robur accusat: sicut fortior constrictione pylori dat vomitum. Nam quod in nausea addit talis constrictione & angustatio orificii stomachi superioris, patet ex eo, quod nausea revera sit species fastidii, quo aliquid abhorremus, & differt à vomitu secundum magis & minus: quando enim vel integer stomachus, vel speciatim orificium ejus superius seu sinistrum à re molesta vellicatur, & hoc exinde nonnihil convellitur, fit nausea; unde in omni fastidio, & in specie in nausea, tam difficulter deglutimus, dum boli deglutiti in gula circa orificium superius ventriculi hære videntur, & ulterius propter nauseam & ventriculi constrictionem inferiora versus descendere non possunt. Deinde, quando comedimus nauseantes aliquid, tunc sanè post deglutitionem rei molestæ sequitur ructus, non verò antè; quia scilicet antè stomachus erat clausus, qui per intrusionem deglutiti aperitur, & sic sequitur ructus. Qui nauseant ex vino, post nauseam ructant cum molestia & difficultate: hinc est, quod, quando audimus res horridas, vel quando olfacimus res ingratas, hoc ipso nauseamus, dum totus stomachus ex contrarietate, & bina ejus orificia se quasi contrahunt. Claudat se orificium superius ex quadam horrore Objecti molesti, quod fastidit; unde si nauseantibus res ingrata detrudatur, hoc ipsum sæpius, antequam stomachum intrat, per superiora reicitur, ex pertinacl scilicet stomachi clausura. Est igitur nausea stomachi quædam constrictione respicientis rem ingratam: sicut si continetur irritatio à re molesta istius loci, ita ut fibræ exinde usque ad pylorum protensas exinde convellantur, adeoque fortior pylori, & consequenter totius stomachi, superveniat strictura, & convulsivus spasmus, nauseam sequitur vomitus: vid. HELMONTIVS in *T. Pylor. Rector.* Orificium enim inferius superiori magis est robustum, unde & fortius, superius verò magis sensibile; unde illud in vomitu necessariò vi convellitur, superius autem se aperire, & pressuræ pylori cedere debet.

Cum ergo constet, vomitum esse constrictionem convulsivam, patet, illum referendum esse inter actus non voluntarios, adeo ut rarus sit vomitus voluntarius: quale exemplum BARTHOLINVS C. 1. *Hist. anat.* 39. observavit. In his certe voluntariè vomentibus videtur ad-

esse similis stomachi structura, atque est in hominibus ruminantibus: qualia exempla etiam videre potestis in *AQVAPENDENTE*, & in *HORSTII Obs.* 1. 4. *Obs.* 9, & citato BARTOLINO C. 5. *Hist.* 26. in Monacho ruminante, cui duo cornua quasi procreverunt. Nempe in his ruminantibus observatus fuit stomachus solito fibrosior & carnosior, quasi vestimento musculofo esset indutus, ratione cujus, tanquam per musculos, voluntariè moveretur stomachus, & sit regurgitatio ciborum in os pro ruminatione; aut voluntariò reiciuntur penitus per vomitum. Musculi enim, uti notum, sunt instrumentum motus.

### PARS AFFECTA.

*Subjctum* nausæ & vomitus, seu *Pars affecta*, est ventriculus, & quidem ratione orificii sinistri in nausea; ratione pylori autem in vomitu.

### CAUSÆ.

Quod attinet Causas vomitus & Nausæ: *Causa proxima* est, quicquid vehementer irritare, h. e. difficili molestiæ sensu afficere potest orificium stomachi superius & inferius; hinc enim fit, ut, si ritatis fibris nerveis, copiosius eò deriventur spiritus animales, à quibus impetuosius irruentibus, convulsivus stomachi excitatur motus. Irritatio autem est præternaturalis molestia, ac violenta sensatio: sensatio est violenta impressio, ab objecto facta in parte sensibili; quæ impressio in partibus externis vocatur dolor, in internis vocatur irritatio. Si ergo adest irritatio superioris orificii, fit nausea; si inferioris, fit vomitus.

Queritur: Si in nausea orificium superius sit strictum, quomodo fiat vomitus? quomodo strictura? Resp. Testatur id structura anatomica ventriculi, quod pylorus longè robustior & nervosior sit, quàm superius orificium; inferius enim in motu, superius verò in sensu præpollet. Licet stringantur æqualiter & in nausea & in vomitu, validior tamen est clausura pylori, unde sequitur motus stomachi peristalticus inuersus, & superior strictura debilis cedere debet. N. B.

*Causa remota* est omne id, quod quacunque ratione molestiæ insignioris sensu stomachum afficere potest.

### DIFFERENTIÆ.

Ratione hujus observandæ sunt Differentiæ vomitus, quando vomitus est vel *naturalis*, vel *artificialis*. *Artificialis* elicitur arte, vel mechanicà, dum intruditur digitus in os; vel pharmaceuticè, scilicet per remedia vomitoria stomacho ingrata.

*Naturalis vomitus* est vel spontaneus, vel non spontaneus: Ille est, quam instituit natura, irritate à quadam materia vitiosa & stomacho molesta; estque iste, qui vulgò oriri dicitur ab errore externo, nempe ab assumptis, v. g. alimentis pinguioribus, vel ingurgitato nimio potu: Hic, seu non spontaneus verò est vel *morbicus*, seu etiam præternaturalis, quando ea vomuntur, quæ vomì non debebant, v. g. sanguis; & oritur vi morbi affligentis stomachum. Hic iterum est vel *symptomaticus*, qui occasione alterius morbi, certo modo per consensum stomachum afficientis, evenit, ut in paroxysmis febrium intermittentium; vel denique *essentius*, qui evenit in statu morbi, beneficio naturæ solventis & emittentis materiam morbosam coctam, & se ipsam cum salute ægri exonerantis. *Symptomaticus* est vel per essentiam primariò affecto stomacho, vel per consensum secundariò eodem laborante. Si per essentiam seu primariò stomachus laborat, causa irritans, i. e. humores seu excrementa acia, vel in eo generantur, vel aliunde eò deferuntur; in specie vel ex copiosis arteriis stomachum ubique cingentibus; vel ex intestinis, in specie duodeno, per vitiosam regurgitationem succi bilioli & pancreatici in ventriculum. Formale vomitus est in motu. *Vomitus per consensum* fit, si ob connexionem nerveam cum alia parte affectâ sequitur vomitus: e. g. ex plaga capitis: *Vomitus* ratione materiæ excretæ alius est *alimentorum*, alius *medicamentorum*, alius *purulentus*, aliusque *sanguineus*. *Ultimus vomitus* ratione efficientis remoti est, vel *voluntarius*, vel *coactus*: de voluntario supra dixi; coactus seu non voluntarius est ordinarius, scilicet si quis vomit coactâ voluntate.

Per essentiam fit vomitus propter causam irritantem in stomacho existentem, quæ sunt vel contenta liquida, vel ipse ventriculus affectus, v. g. inflammatus, vulneratus,



aut exulceratus, aut excoriatus, adeoque facile irritabilis. Prior causa infert vomitus leviores, facileque curabiles: Posterior vero contumacior, interdum lethales. Imprimis vomitus admodum diuturni & continui, aut qui nullis cedere volunt remediis, sæpius vitium vel pylori, vel partis solidæ adherentis præsupponunt, ita ut hic sit vel omnino oclusus, vel scirrhotus, vel tumore alio affectus, cujus non pauca hinc inde prosant exempla. Sic SALMUTH C. 1. *Hist.* 20. dicit: quod scirrhus pylori interdum eveniat Hypochondriacis, qui vomitus continuos ciborum inducat: item BARTHOLINUS C. 4. *Hist.* 47. ex pyloro, callo obducto, vomitus continuos observat: RHODIUS Cent. 2. *Observatione* 63. habet vomitum perpetuum à *Stomatite*, (quod est certa quedam excrecentia ventriculi) utriusque scilicet orificio adnato. Vomitus ex ulcere vidit HILDANUS C. 5. *Observ.* 36. ex fistula SCHNEIDERUS de *Cataractis*: speciatim 1. 439. & ex gangræna BALLONIUS Lib. 1. *Consil.* 43. Sicut in morbis malignis post vomitus continuos & contumaces, atque insequentem mortem, observatum fuit, quod eschara quasi & incipiens gangræna in eorum stomacho reperta fuerit. Pertinent huc Vomitus Scorbuticorum, sæpius contumacissimi propter sal acre scorbuticum, vel cum saliva, vel per arterias, vel quacunque ratione ad stomachum delatum, eundem pertinacius vellicans.

Hæc & similes causæ imprimis inducunt Vomitus per essentiam.

Quod attinet contenta liquida Vomitus inferentia: sunt vel assumpta, vel retenta, vel transmutata, vel transmissa errore quodam ex intestinis. Ad transmissa pertinet vomitus in principio paroxysmorum febrium intermittentium, dum nempe succi ex pancreate & felle in intestinum duodenum effusi, violenter effervescendo pylorum irritant vicinum, aut etiam in ipsum stomachum reurgitant, & ita vomitus inferunt: item si bilis per infectionem ductus cholodochi ritiosam, item sanguis conglobatus, pus, (aut extra vasa ventriculo propria effusa, aut cum aliis humoribus ex vicinis membris, imo toto corpore, huc derivata,) huc deferantur: quod etiam feces alvi spectant, in illa passione interdum vomitu rejectæ, & clysteres & suppositoria vomitu rejecta. Mirabilia interdum excreta ex stomacho per vomitus sunt rejecta, inter quæ est rete illud artificiosum quasi humano contextum, de quo vid. KERKRINGIUS in *Spec. anat.* *Observ.* 6. Observatus etiam fuit vomitus butyraceus, licet teger butyrum non comederit; sericeus, cochlearum, busonum, lacertarum: vid. BARTHOLINUS C. 5. *Hist.* 94. & SCHENKIUS *Obs.* & M. A. N. C. ann. 3. Notum est, quod assumpta, sive quantitate nimis ingesta, ut commestationibus & crapulis dediti experiuntur, sive qualitate quæcunque vitiosa, acris & rancida, pingula, laxantia gulam & pylorum, aut ventriculo aliàs inimica & molesta, & præprimis, quæ vel individuali fastidio abhorrentur, vel antimonialia, mercurialia, aut similia acris, irritando stomachi tunicam nerveam, scilicet vomitoria & venena, vel quæ in eodem facile corrumpuntur, quod gulonibus, item infantibus lactantibus frequens malum, vomitus, inferant, sicuti videmus tantillum odoris antimonialis (ita reddeum HELMONTIO vocatur) quod imprægnat Vinum infusionis antimonii, circa corporalem ejus motum, stupendos non raro inducere vomitus. Ita ab arietico vomitus lethalem SALMUTH C. 1. *Obs.* 10: ab helleboro albo BONETTUS *Vesic. hres.* 1. 3. 168. 8. *obs.* 6: ab assumpta Gilla Theophrasti HEINRICUS ab HEER *Obs. opp. dor.* *Obs.* 26: ex abusu infusi apiaris & foliorum sennæ LIBAVIUS in *Cissa Med.* HORNUNGII *Epist.* 76: & à croco metallorum HILDANUS Cent. 4. *Obs.* 51. atque 79. annotarunt. Furor enim Archæi stimulat contractis fibris conatur ventriculo ejicere contenta. Faciunt huc etiam pingula, aut crebrius aut etiam copiosius assumpta; idque duplici ex ratione: pingula enim ceu difficillimè digestibilia, reluctando fermento acidofalino, non leves inferunt molestias & gravant stomachum: præterea orificium superius laxant; unde, dum ex irritatione horum supervenit pylori contractio, ex laxitate stomachi facile supervenit vomitus post pingua. Huc pertinent decem vix ultra tres menses succi plena rejectæ, quarum mentionem facit KERKRINGIUS *loc. cit.* 1. 1. & pisse eadem ratione excretus, qualem BORELLUS *Obs.* 1. *Obs.* 9. vidit: item suo modo vomitus sebaeus in M. A. N. C. ann. 3. *Obs.* 253.

Retenta sunt v. g. recrementa post digestionem primam in stomacho: Transmutata sunt Cruditates variae, nidorose, & acidæ: Quod etiam pertinent vermes, nauseam & vomitum excitantes: de quibus RIVIERUS Cent. 1. *Obs.* 28, & BARTHOLINUS Cent. 1. *Hist.* 47, & C. 3. *Hist.* 14, M. A. N. C. ann. 3. *Obs.* 258, & MOEBIUS *Instit. Med.* lib. 2. P. 2. c. 5. p. 183.

Vomitum per consensum seu secundarius est ferè frequentissimus, & sit, si causa conjuncta sit extra ventriculum, motusque hi ab extraneo quodam ipsi imprimantur. Partes ventriculum in consensum trahentes duplicis generis sunt: ita ut vel ratione continuitatis, quæ partibus cum ventriculo intercedit, œsophago scilicet, diaphragmati & intestinis, vel ratione illarum partium, cum quibus stomacho, intervenientibus nervis, est connexus; nervorum enim affectio est sentire & consentire. Sic œsophagi pars superior, si digito tantum vel quocunque modo irritetur, si non statim vomitum, vomendi tamen conatum, excitat: diaphragmatis concussio tussim, illiusque validior concussio, vomitum pedisequum habens, confirmat: cujus phænomeni ratio, præter viscerum omnium abdominis, hinc ventriculi propter vehementiorem compressionem, partium est continuitas, quam cum ventriculi orificio superiore diaphragmatis fibræ celebrant; licet communionem nervorum, quæ partes has duas intercedit, aliquid huc conferre, non adeo improbabile sit. Intestinorum tandem affectus eo modo accusandi sunt, quatenus iidem illorum motus peristalticus vel in totum, vel ex parte inuertitur, eoque ad ventriculum continuato, hic exagitur, & concutitur: hinc notoriè sequitur vomitus in dysenteria, passione colica, iliaca, & vermibus, propter consensum tunicarum interiorum, ventriculo & intestinis continuarum. Sic interdum dolorem colicum excipit vomitus propter contiguitatem stomachi: nam etiam consensu superficialis cum stomacho talem vomitus facit. Curavi nuper Hypochondriacum gravi dolore colli superiori hyeme in hypochondrio sinistro affectum, qui continuos vel vomitus, vel inanes vomendi conatus patiebatur; cum enim dolor fuerit in sinistro latere, in quo ipse intons ut plurimum reperitur, facile patet, quod fuerit per consensum, quem etiam postmodum curavi. Quæ per communes sibi nervos movent vomitus, sunt præsertim caput, renes, hepar, atque lien: Sic in nephritide, seu renibus calculo affectis, ordinariò superuenit vomitus, quia renes ex eodem plexu mesenterii hauriunt nervos, ex quibus nonnulli ad stomachum derivant: pariter ac abdominis reliqua viscera vomitus sympatheticos excitant, qui à sibi illorum spasmis deduci debent, quoniam nervos à plexibus mesenterii communes cum ventriculo possident: item in passionibus mulierum hysterici crebrius oriuntur vomitus, & quidem interdum salubres; nam in his partes membranosa insigniter conuelluntur: item in contusionibus cranii, aliisve similibus vulneribus capitis sæpius superueniunt biliosi vomitus, propter membranas cerebri, stomacho & reliquis partibus, præsertim internis, plus minus communes; aut genus nervosum ad inordinatum motum concitatum, quod colligitur à tremore, convulsionibus & deliriis, eundem vomitus concitantibus. Hinc HIPPOCRATI tales vomitus Coacti: *Præf. sect.* 5. §. 384. periculosissimi, ob causam, scilicet genus nervosum admodum irritatum, veniunt. In specie mulieres patiuntur vomitus insignes, non tamen per essentiam, propter suppressionem menstruum, sed etiam per consensum, quando nempe virores sunt cupidae, ob spiritus animales affectos, & inde succum fermentativum stomachi alterati: vid. HILDANUS C. 4. *Obs.* 32, ubi rectè dicit, quod sæpè vomitus diuturnus & pertinax affligat viduas, moniales, & virgines adultas, defectu Veneris, & vitii liquoris genitalis in iisdem retenti: item THEODATVS in *Pædagog.* p. 172. recenset vomitus contumaces, eosque periodicos siue certo tempore affligentes, ex retento in muliere semine post remissionem coitus: ita HOFERVS in *Herc. Med.* pag. 137. *Edn.* in 12. habet exemplum vomitus post quamcunque cibationem, aborti ob mensium suppressionem, accedente simul quadam pectoris constrictione. Quod etiam referendi vomitus spontanei salubres, qui periodice infestant nonnullos, idque ferè ex viscerum abdominis, ventriculo plus minus vicinorum vel connexorum vitio: tale exemplum refert SCHENCKIUS lib. 3. *Obs.* 1, dum quidam singulis mensibus per bidduum bilem utramque & cum pituita conjunctam vomere solitus, vitam ad multos annos produxit. Hi omnes vomitus spiritus ani-



animales variè affectos pro causa agnoscunt, ut superius dixi: Imprimis si hoc malo vexantur, qui vitio nonnullo splenis sunt affecti, ut videre est apud Forestum in lib. 18. Obs. 17. de quodam, qui circa lienem subindè dolebat, idque per certa intervalla, unde certis ferè periodis humorem melancholicum (uti loqui amat FORESTUS) sæpè etiam omninò atrum, evomit: Sic BORELLUS in C. 3. Obs. 93. p. 270. & 279. insigniter commendat utilitatem vomitus mensurui: & apud PANAROLLUM in Pent. 1. Obs. 22. habetur vomitus matutinus ordinarius, multa admodum symptomata præservans; item vomitus septennis salutaris in puella ob mensium suppressionem. In gravidis primis & ultimis mensibus vomitus obvius est: Sicut LOTICHIVS Obs. pag. 442. refert, quod signum conceptionis in viragine extiterit: ZACUTUS LUSITANUS l. 2. Prax. Obs. 13. de quodam, qui singulis mensibus, duobus diebus, quatuordecim vel 15. libras per vomitum excernebat humoris nigerrimi & pici liquidæ similis, qui exinde omnino salvus ad annum 80. produxit vitam; & Obs. sequenti refert, quendam tribus quibusvis mensibus atrabilario vomitu periodico laborantem usu chalybis curatum, apertis hæmorrhoidibus, per quas evacuabatur sanguis; & lib. 3. Prax. admir. Obs. 115. recenset perniciosissimum vomitum mensurum seu singulis mensibus materiæ, massæ globiformis instar, concretæ. Facit hic vomitus studiò prolectus in hypochondriacis, si scilicet singulis mensibus, aut sex hebdomadibus, semel largius mero se ingurgitant, & hinc vomitum artificialem non citra sanitatis commodum instituunt. Elegans quoque & admodum ridiculum est exemplum PLATERI in Obs. p. 655. de frequenti vomitu, post amputatum caput secuto: Simile inter rarè referendum est exemplum BARTHOLINI C. 4. Hist. 44. de vomitu contagioso in familia quadam, qui malignitatis fuit suspectus, & similiter alios per contagium affecti. Pertinet hic vomitus continuus lethalis ex corruptione & sphacelo pancreatis, quod cum substratum sit ventriculo, sphacelofum factum, illum facile irritare potuit: vid. BARBETTE in sua Praxi. 4. c. 2. Item vomitus contumax lethalis ob pancreas lapidosum vel scirrhum factum, recensetur à PANAROLLO Pentec. 1. Obs. 44. Inter vomitus causas est & depressio cartilaginæ mucronatæ, quam BARBETTE Anat. Prax. l. 4. c. 4. & DECKERS in Praxi ejus p. 156. annotarunt.

Inter ea, quæ vomuntur, etiam est pus, & sanguis purulentus & cruentus.

Spleneticis valdè familiares sunt Vomitus quicunque continui, tam cruenti, quàm non-cruenti. Vomitus spleneticus non-cruentus subinde periodicè nonnullos affligunt, præcedente non rarò dolore tensivo circa regionem splenis, idque cum talium ægrotorum euphoria: vid. FORESTUS l. 18. Obs. 17. item BORELLUS Cent. 3. Obs. 93. & in Append. diæ Centur. pag. 279.

Vomitui puris sit ex variis locis, præ vel in ipso ventriculo ex hujus abscessu, ratione ductus continui, v. g. oesophagi & intestinorum, vel ex aliis partibus per metastasin translato ad stomachum: quod testantur observationes, abscessus hepatis, pancreatis, lienis, mesenterii, &c. fuisse evacuatos per vomitum, quatenus ratione arteriæ celiacæ & venæ portæ communicant: sicut ab abscessu hepatis vomitu rejectum pus BONETTUS in sepulchr. l. 4. Obs. 40. testatur: de quibus infra plura, ubi de Inflammationibus.

De Vomitu sanguinis tractabo infra peculiari capite.

## DIAGNOSIS.

Quod attinet signa diagnostica: de illis vix opus est, ut multa dicam, cum satis manifesta sint: Imminente enim vomitu patiuntur ægri aliquam molestiam circa præcordia, & monstrant regionem cordis: huic supervenit vertigo, cum qua salivæ copiosus fluxus evenit, tremor labii inferioris, tandem violentus conatus stomachi, quo reiiciuntur omnia in stomacho.

Causæ autem quia variant, determinantur hoc modo: Differentia nempe vomitus per essentiam & per consensum probe attendenda est, quia in hac versatur cardo totius curæ, & artificiali conjecturæ hic opus est.

Nempe vomitum esse per consensum haviolumur, si partes quædam suo modo consentiunt cum stomacho, vel ob vicinitatem texturæ cum nervis affectæ, ita ut vel doleat, vel passiva læsionem plus minus sensilem, subito superv-

Etmull. Oper. Tom. II.

niat vomitus, stomacho antea robusto.

Sæpè affectus hi per consensum, ratione originis sunt adeò occulti, ut non nisi artificiali signorum syndrome præcognoscantur, donec manifesti fiant: v. g. interdum calculus & colica faciunt vomitus, ubi calculus non statim sentitur: attentus ergò in hoc sit Medicus.

In specie vomitus per essentiam cognoscitur, si post repetitos vomitus, & stomacho exinanito sæpè supersit inanis vomendi conatus, illius gravitas, tensio & inflatio, cibi fastidium, ructus acidi vel nidrosi, similiaque signa observantur: Et quidem, si tumor vel ulcus sublit, nullis remediis mitigari potest excretio, imò pus in posteriore casu simul excernitur: Sin verò vulnus, ex loco aliisque illius circumstantiis hoc concludere licet.

Quod si verò per consensum laborat stomachus, patet. Si aliquando ante vomitum percipitur quædam molestia in regione stomachi, si primo vel secundo die percipitur nausea, vomitus ipse est contumax, nullaque arte corrigibilis, & omne assumptum denuò reiicitur; & quidem, si nulla sit suspicio partium contiguarum, talis vomitus oritur ob vitium singulare in stomacho vel partibus vicinis, ob scirrhum aut callum, aut simile vitium.

Utrum verò humor ad vomitum stimulus in cavitate ventriculi liberè fluctuet? vel rugis aut tunicis ipsius in hæreat? dignoscitur: quod ille leuissimo conatu & sine alimento reiiciatur, contingat à pastu quædam ventriculi tensio & anxietas; aut si post pastum vomitus contingat, ut plurimum soli tamen humores vitiosi excernuntur: hic verò ab ingestis præprimis demum cibis contingit, citra verò illos nausea admodum molestat, & reiiciuntur alimenta sine humoribus, aut cum illis maximo demum cum connatu viscerum & crassi valde.

## PROGNOSIS.

Prognostica quod spectat: In genere vomitus omnis, qui non est nimius, ut plurimum est salutaris.

In specie causæ remotæ ante omnia probè considerandæ sunt, cum ipsis vomendi conditionibus, cum pro earum ratione variet Prognosis. Hinc enim vomitus, qui est à causa externa, vel ex mensium suppressione, qualis in gravidis, vel vomitus in principio morborum spontaneus non nimius, vel vomitus in declinatione morborum Criticus, potius salutare sunt, quàm periculosi: Sin verò nimius, à pharmaco præsertim aut veneno, vitæ periculum portendit.

Si à tumore similique conformationis ventriculi morbo contingit, pro hujus faciliore aut difficiliore cura de vomitu sedando modò major modò minor spes est:

Vomitui ab humore viscido difficillimè curatur, dum HILDANUS Cent. 4. Obs. 32. de quadam Religiosa refert; eam per 31. annos singulis diebus pituitam viscidam, bile interdum intermixtam, evomuisse.

Vomitui chyli & alimentorum frequentior, malus est, potissimum si cum febre sit: vid. HIPPOCRATES Sed. 7. apbor. 37. Sæpè enim ratione excretorum observandus est apbor. 2. Sed. 1. in Vomitionibus, quæ spontè sunt, si qualia oportet, evacuentur.

Vomitui liquidus, præsertim plus minus graveolens, aut vomitus uermium, superveniens in morbis, præsertim malignis: item vomitus humoris fusci & obscurè nigricantis ut plurimum sunt lethales.

In morbis malignis vomitus continuus & protractus pessimum signum est.

Ordinarius quidem est, ut in morbis malignis ex contagio haustis in principio morbi adit nausea & vomendi conatus: Sed si in progressu morbi superveniat vomitus, isque pertinaciter perduret, pessimum est signum, & plerumque mors sequitur. In benignis morbis optimum signum est vomitus, siue in principio sit, siue in statu, ut sit in febribus intermittentibus, ardentibus benignis; innuit enim vim naturæ adhuc laudabilem.

Vomitui, qui superveniunt casui ab alto, percussioni, & aliis læsionibus capitis, funestum sunt signum: innuunt enim gravem læsionem cerebri, cranii & meningum, & nisi tempestivè instituatur trepanatio, mors supervenit.

Vomitui hypochondriacorum & scorbuticorum, item spleneticorum, aut qui lienis & aliorum viscerum scirrhi, aliisque chronicis laborant affectibus, periodicus, est saluberrimus: cui supervenientes hæmorrhoides leuamen morbi certum tutumque afferunt.



Vomitibus porraceis, ærugineis, nigricans, item ex multis humoribus constans, seu variegatus ac foetidus, valde periculosus est: vid. HIPPOCRATES *Prognost. loco allegato* §. 11. 12. &c. & RIVERIUS *l. a.*; nisi tales à certorum ciborum cruditate aut corruptione proveniant: niger verò, qui affectibus melancholicis obnoxius, aut quibus ab assumptis talis contingit, non semper est periculosus.

Vomitibus ex pituita & bile permixtus, uti commodissimus est; ita sincerior, seu pituitosus aut biliosus tantum, deterior observatur: vid. HIPPOCRATES *Prognostic. Text. 12. §. 9. & 10. & l. 1. Prædiction. Textu 881.* item RIVERIUS *Prax. l. 9. c. 7. p. 413. & 414.*

Pariter siccum alvi & anio injectorum vomitio semper lethalis existit: verum tamen verò aliorumque toto genere præter naturam rejectio, utut ratione causæ mala quidem sit, bona tamen ratione effectus dicitur.

Denique Vomitus Criticus est laudabilis, symptomatikus verò periculosus: vid. DECKERS in *Praxi Barbet.* pag. 128.

Modò attendamus Causas, faciles erimus in Prognosi.

### C U R A.

Quod attinet methodum incedendi: in hac

1. Causarum remotarum irritantium habenda est ratio, earque ante omnia removendæ, sive per essentiam sive per consensum vomitum inferant: quod etiam de nausea intelligendum.
2. Sensus ventriculi, speciatim pylori, acutus, & nimius spirituum impetus, seu causa efficiens formalis, opiatas aut similibus anodynis, quippe quæ non parum auxilii in his affectibus præstant, leniendus & suffragandus.
3. Medicamenta ventriculo grata aromatica volatilia suaveolentia, admixtis blandè acidis adstringentibus pro fibrarum debito tono firmando, & labefactato restituendo, usurpanda.

Pro his scopis obtinendis observandum:

I. Non quemlibet vomitum esse sistendum: non spontaneum, aut motum instinctu naturæ, sed saltem eum, qui aut nimius aut symptomatikus, adeoque ex vi causæ morboæ cum virium ægri dispendio accidit. Vomitus Criticus sistendus est, nisi sit nimius: vomitus mulierum gravidarum non est supprimendus, nisi excedat, quia tunc evacuatur corpus primis mensibus, & puerperium inde ipsis salubre evenit; non tamen excedat modum. Pluribus evenit in principio morbi vomitus, qui non sistendus; sed si maturè vult suppressi, illum promoveamus.

II. In vomitu scorbutico non conveniunt calida aut acra aromatica, quæ malum magis exasperant, sed potius absorbentia seu acrimonia salis scorbutici mitigantia & temperantia; qualia sunt lapilli cancrorum, ebur sine igne, corallia, antimonium diaphoreticum, item juxta EUGALENUM lac, præprimis caprillum, cum succo nasturtii aut cochleariæ mistum; ut sic cessante acrimonia cesset vomitus: vid. DORINGIUS *Centur. 2. Ed. vel. 30.*

III. Vomitus sanguinis citò compescere optimè est, aliàs ob copiosam perfusionem sanguinis ac spirituum sequuntur lipothymia ac syncopes lethales.

IV. In verminibus semper procurandus, nec alvus sit adstricta, sed alternis ad minimum diebus, vel arte, vel natura, alvi defectio promovenda.

V. In omni Vomitu unice observetur, ne alvus sit adstricta, sed quantum modò possibile est, aperta teneatur, vel arte vel natura: hinc lenes clysteres tantum non in omni vomitu, imprimis contumaci, commendantur, ut, quod irritat ventriculum, derivetur ad intestina, & eliminetur. Idem tamen in pauca quantitate iniciantur, ne ventriculi fundus colo incumbens exinde comprimatur & irritetur: conf. GABELCHOVERUS *Cent. 2. Cur. 43.* Purgans blandum interdum convenit, quod revellendo simul videtur operari, quale ex superioribus de appetitu lesione petere licet; cui tamen tantillum opii addendum.

VI. Somnus, quantum fieri potest, conciliandus: Nam & hic motum humorum quemcunque, tam progressivum quam interminum, sistit, irritationes lenit, & evacuationem quamcunque cohibet.

VII. Ab errore externo, imprimis à veneno ingesto, si sit vomitus, non est sistendus, sed tamdiu hic uti remedium continuandus, quamdiu est suspicio veneni aliquid adhuc superesse, & medicamenta in ventriculo remaneant. Promovetur in tali casu vomitus, assumendo potulenta, in specie pingua, acrimoniam excessivam venenorum corrigentia: Omne venenum vegetabile & mineraliale consistit in excessiva acrimonia nobis hostili; non verò ita restet habet cum animalibus, ubi alia ratio.

VIII. In nausea, inappetentia seu anorexia, & similibus stomachi humoralibus affectibus, maturè his occurrendum, nec diu cum vomitorii cunctandum, ne præternaturalibus humoribus aliorum raptis, frustra instituantur vomitio: Conf. M. A. N. C. *ann. 8 Obs. 42. p. 71.*

Quod ergo attinet remedia ad vomitum directa: quæcunque causa sit irritans, removenda, sive sit per essentiam vomitus, sive per consensum. Curato enim morbo, hoc ipso curatur vomitus, sive curato ileo, curatus etiam est Vomitus; Unde si fuerit per essentiam vomitus, evacuanda est causa irritans. Causam autem, quæ removetur, sunt varia, pro causarum varietate. Pro hoc scopo usurpant quidam Vomitorium, & quidem mediocre, præprimis si assumpta copiosiora prava & quocunque modo stimulantia, item humores excrementitii in ventriculo tale quid præstent: vid. VALLESIUS *2. Epidem. l. 8. §. 5.* HOFFMANNUS *M. M. l. 1. c. 9.* & RIVERIUS *l. a. p. 414. c. 2. In stomacho viscoso, qui omnia evomebat, & phlegma tamen elevare non poterat, proficuum erat sequens:*

R. Aqua Mentb. ℥ij.

Cinnam. ℥vj.

Spiritus Matico. ℥ij.

Theriacal. campbor.

Essent. Croci an. ℥ij.

Spiritus salis dulc. gutt. xv.

Syr. nicotianæ ℥j.

M. f. Potio, S.

Mixtura Bembæalis dissolvens, cochlearium firmenda.

Aut etiam blandum purgans supra jam recommendatum. Utraque interdum ad modernorum imitationem cum parva opii dosi usurpanda: sed rarius fit; nam vomitus sponte cessat, causâ irritante evacuata: Si opus est, salubre est consilium RIVERII, quod dabitur infanti dolantibus Colicis. Quod si verò per consensum vomitus fuerit, curato primario morbo, etiam curabitur vomitus: hinc v. g. qui à partium inflammatione, turgescencia sanguinis enormi, aut solenni quadam illius excretionis suppressa, optimè venæ sectione curatur, ventriculo ut talialias minus adæquato remedio: vid. RHODIUS *l. 2. Obs. 66. l. 67.* BARBETTE *Prax. l. a. c. 2.* & WILLISIUS *Pbarn. rat. P. 1. S. 2. cap. 3.* Interea saltem sistatur opiatas sensus consensus.

Quæ irritationem stomachi sensibilem, & nimium spirituum impetum compescunt, sunt opiata, & alia anodyna, quatenus spirituum in fibris ventriculi impetum reserant, sensum stomachi obtundunt, ejusque perceptionem hebetant. Omnes vomitus compescuntur laudano opiato, quod primarium vomitus sistens est, præprimis si à vomitori nimio impetu tale quid fuerit: vid. SYLVIIUS *Prax. l. 1. c. 15.* & WILLISIUS *loco allegato.* Potest etiam usurpari essentia opii, Theriaca, Mithridatium, Philonium Romanum, Electuarium de ovo, diascordii Fracastorii, quod nobilissimum est; essentia & extractum theriacale cum laudano opiato, syrupus papaveris, crocus, tam internè quam externè adhibitus: e. g. in vomitu simpliciter compescendo, demulcendo ventriculum nimis irritatum:

R. Aq. Mentb. ℥ij.

Moschidin. superius descripti. ℥ss.

El. diasc. d. Frac. ℥ij. vel ℥iij.

Succ. cydon. ℥vj.

M. f. Potio, S.

Potiuscula confortans.

R. Aq. Mentb. ℥ij.

Cinnam. cum vino ℥iij.

Essent. opii ℥j. ad ℥ss.

Syr. Mentbæ ℥ij.

M. f. Potio, S. ut supra.

Expertus etiam est sequens Bolus in vomitu, singultu & similibus:

R. The-



*R. Theriac. 3℔.*

*Liquor opiat. gr. j.*

*Olei destill. macis gutt. ij.*

*Cum succ. cydon. f. Bolus.*

*D. S.*

*Electuarium pro una vice.*

His pro tertio scopo adiungantur stomachica bene odorata & aromatica, ventriculo grata, quæ in omnibus remediis stomachicis, siue sit nausea siue vomitus, addenda sunt. Nam uti foetida nauseam interumpit, sic aromatica suauolentia solantur stomachum. Hæc inter primaria sunt cydonia, & quæcunque cydoniata, in specie Vinum cydoniatum per fermentationem, mentha, absinthium, melissa, radices Zedoariae & cyperii, cortices citri & aurantiorum, mastix, caryophylli, nux Moschata, macis, præcæteris cinnamomum, & hinc Aqua cinnamomi simplex & cydoniata, syrupus de canella, seu de Cassia Myns, essentia cinnamomi & Cassia lignea Myns, Elixyr menthæ, Aqua Masticina Mynsichti, Item Decodum Icelis ad quemvis vomitum præstantissimum ex caryophyllis & Mastiche; quod videb. apud SENNERTUM h. Prax. de Vomitu p. 155. Nempe

*R. Caryophyll. crassiusculi contus. 3j.*

*Mastiche 3℔.*

*Resin. rub. p. j.*

*Simul mixta coquantur cum*

*Vini rubri 3℔.*

In vase clauso ad medias, sit Potiuncula Icelis p. 124. Item essentia & spiritus Mastichis, qui est egregius, menthæ, theriacalis camphoratus, Elixyr proprietatis Paracelsi de quo vid. HORSTIUS h. Observ. 15., Elixyr Vitrioli Mynsichti, Balsam Peruviani aliquot guttulæ, & ejus Tinctura ad imitationem Willisi parata; hinc simplicium istorum extracta, & olea destillata. Camphora cum speciebus dia-Moschi assumpta commendatur a RIVERIO. Quoad adstringentia, excellunt cydonia, syrupus de rosis siccis, qui blandè adstringit, syrupus coralliorum Quercetani, hinc succus granatorum, acetum vini, rosaceum, præprimis acetum Zedoariae per Infusionem, optime convenit: Decodum & extractum radicis tormentillæ, bistortæ, quo vix præstantius remedium habet in casu datur, & extractum absinthii, ligni aloes. In specie confert spiritus vitrioli cum conferva menthæ, absinthii, rosarum, &c. præsertim spiritus vitrioli Martis, qui primarium specificum est ad sistendum vomitum: nam præter acorem stomacho gratum habet simul saporem adstringentem ob consortium substantiæ metallicæ, quam cum vitriolo secum vehit; ubi etiam spiritus vitrioli Philosophicus, item cum spiritu vitrioli vel spiritu nitri ex terra sigillata paratus liquor Symplicis: vid. PRÆVOTIUS p. 41. in seclis. Modus est hic: Terra sigillata Strigensis imbibitur antea pulverisata cum spiritu Vitrioli, vel spiritu nitri ad consistentiam pulvis, quæ pulvis concrescit in loco frigido in lapidem & sit concretum aluminis. lapis higitus & pulverisatus in loco frigido & humido fluit in liquorem, qui liquor blandè acidulus vel solus usurpatur, nomine liquoris Symplicis, ad gutt. XX. vel XXX. vel cum æquali parte spiritus ceræ, & nigrorum digeritur, donec perfectè uniantur: qui liquor admodum potens est, valide adstringit, & ratione terræ sigillatæ malignitati resistit. Hinc dicitur a PRÆVOTIO & BARTHOLETO, aurum Potabile ex terra sigillata; quia terræ sigillatæ inest aliquid de primo ente auri. Tinctura Martis adstringens similiter est conveniens, & omnes ex Marte paratæ Tincturæ hic conveniunt. Alumen milturis additum pro hoc scopo, & adstrictiva & absorbentia terrea primaria sunt, ut Bolus Armena, terra sigillata, Corallia, & omnia ex iis parata medicamenta: Conferua rosarum menthæ vitriolata. Ex his omnibus præcæteris palmam præripit succus cydoniorum: hinc spiritus vitrioli prodest; Nam spiritus seu oleum vitrioli ad aliquod gutt. v. vel vj. in haustu Vini Malvatici admodum commendatur a RULAND & HARTMANNO in vomitu diuturno, dosi coch. j. vel ij. donec sistatur vomitus. Alii Mixturem hanc præscribunt ita:

*R. Aquæ Menthæ 3ij. vel iij.*

*Cinnam. 3vj.*

*Succi cydon. 3j.*

*Spiritus vitrioli rectif. gutt. v. vel vj.*

*Olei destill. cinnam. gutt. iij.*

*M. S.*

*Adstringens potiuncula stomachalis.*

Capiatur cochleatim, v. g. cochl. j. per vias & festissime operabitur: cui interdum gr. j. vel ij. ad summum gr. iij. landam opiat possunt addi, & sic erit efficacior. Vel

*R. Aquæ cinnam. simpl. vel cydon. 3ij.*

*Spiritus vitrioli 3℔.*

*Olei destillat. cinnam. gutt. iij. vel iv.*

*Syrup. Menthæ. 3j.*

*M. f. Potio, S.*

*Adstringens Mixture stomachalis.*

Item

*R. Aqu. Menth.*

*Rubi Idæi. an. 3j℔.*

*Cinnam. 3vj.*

*Spir. theriacal. simpl. camphoratus. 3 iij.*

*Succi Cydoniorum 3j.*

*Essent. Ambra. 3℔. vel 3j.*

*M. S. ut antea.*

In specie convenit in vomitu nimio, qui in febribus accidit, cum animi deliquito, aut ubi extrema frigent, propter ambra, quæ stomacho pergrata; ambra enim est optimum analepticum.

Item ubi non sufficit acor adstrictorius, ad alumen confugiendum, quod in omnibus fluxibus sanguinis & aliorum succorum potentissimum est: & sanè insignis Practicus sequentem Mixturem in secretis habet contra vomitum, lienteriam, alvi fluxum & similes affectus, ubi moderatè aut paulo fortiori opus est adstrictione. Formula est hæc:

*R. Aqu. Menthæ.*

*Cinnam. an. 3j℔.*

*(Vel Aqu. Menth. 3ij.)*

*Cinnam. spirituos. 3j.)*

*adde*

*Spir. vitrioli 3℔.*

*Olei destill. mac. gr. iv. vel v.*

*Aluminis gr. iv. vel a.*

M. pro haustula cochleatim capiendò in vomitu, tam sanguineo quam communi, lienteria, & aliis diarrhæis.

*D. S. ut antea.*

*Vel*

*R. Aqu. Menth. 3ij.*

*Cinnam. cydon. 3j.*

*Spir. Nutridul. theriac. 3j.*

*Alum. gr. iv.*

*Syr. corall. Querc. 3vj.*

*M. f. Potio.*

*R. Aqu. Menthæ*

*Fenicul.*

*Cinnam. cydon. an. 3j℔.*

*Succi cydon. 3j℔.*

*Liq. Symp. f. præ dist. 3j. ad 3℔.*

*(potenter enim adstringit.)*

*Syr. corall. Querc. 3j.*

*M. D. S.*

*Adstringens potiuncula.*

Theriaca 3j. cum aceto assumpta etiam confert. Vel paratur Bolus ex theriaca, & spiritu vitrioli ad gutt. ij. vel iij. In vomitu febrium, præsertim malignarum, remedium elegans est salis absinth. 3j. cum cochleari succi limon. vel granatorum misti: vid. RIVERIUS Centur. 1 Observ. 15. & c. 2. Observ. 99. E. g.

*R. Aquæ Cinnam. 3j℔.*

*Succi Citri 3j.*

*Salis absinth. 3j.*

*Corall. rub. præp. 3ij.*

*Syr. de ros. sic. 3ij. vel iij.*

*M. S. ut supra.*

Si pituita crassa in causa sit, pro huius incisione conveniunt aromatica & incidentia salina, ut spiritus salis vel nitri theriacalis. Sin verò malum ab erosionè & inflammatione tunicarum ventriculi, conveniet linctus ex mucilage feminis psyllii, cydoniorum, cum Syrupo solutivò: vid. BARBETTE Prax. loco athenas 1. 124. & 136.

Inter Externa ad vomitum compescendum, præter illa de Anorexia relata, conveniunt crusta panis seu panis tostus, aceto vini vel vino adstringente, aut in quo cydonia ebullierint, vel vino malvatico ebrius, hinc pulveribus aromaticis, caryophyllis, cinnamomo, mace, &c. adpersus, & ita externe stomacho calidè applicatur: item spiritus Vini camphoratus, vel Balsamum Anglicum calidè cum linteis multiplicatis sæpius admotum, est egregius: item



Item fons humidus ex Decocto absinthii, menthæ, melissæ, pulegii, & similibus aromaticis in vino vel aceto decoctis, cum linteis multiplicatis vel spongiâ calidâ admittitur; E. g.

R. Comar. absinth.  
Herb. menth. an. M. ij.  
Rad. acori veri,  
Leuiss. an. ʒvj.  
Cyperi solaris-  
Galang. an. ʒij.  
Mastic. ʒss.  
Caryophyll.  
Macis an. ʒij.

Concis. & contus. includ. sacculo interpassato, in forma oblonga vel triangulari, qui ita paratus & probe calefactus imponitur stomacho; vel calefactus irroretur cum vino, & calidè imponatur parte humidâ stomacho; vel equatur in uino, spiritu vini, aceto, &c. & ita fervidus applicetur.

D. S.

Sacculus extra applicandus.

R. Herb. Menth. crispæ M. ij.  
Nuc. Mosch. ʒss.  
Caryophyll. ʒij.  
Macis,  
Cinnam. an. ʒj.

M. f. Pulvis grossus: excipiatur cotone, & includ. sacculo interpassato, irroretur cum spiritu vini theriacali, vel oleo destillato menthæ ac baccar. juniperi.

D. S.

Externa species stomachales.

Item Theriaca, vel sola, vel cum Balsamo Peruviano probe mista, illinitur externè copiosè regioni stomachali; vel alutæ inducitur emplastrum formi admovetur: vel ad imitationem HOECHSTEDTERI irroretur Theriaca cum aceto rubi idæi, & applicetur regioni stomachali: vid. in Decade 7. Cap. 6. Item fiant Linimenta suaveolentia ex Theriaca, additis oleis destillatis; vel fiat Linimentum ex oleo nucis Moschatæ expresso, tanquam corpore, cum oleo destillatæ macis, carvi, menthæ, Zedoariæ, &c., & aliquot guttis olei destillati caryophyllor. acuatum externè inungitur: E. g.

R. Olei expr. nuc. Moschatæ vel oleo destill. bacc. juniperi ʒj ad ʒij.

Destillat. Menthæ.  
Caryophyll.  
Macis an. ʒss.  
Cinnam. gutt. v.

M. D. S.

Balsamus stomachalis.

Item oleum Mastichinum, absinthii, cydoniorum, menthæ, oleum stomachale Cratonis & cum oleis subactum, emplastrum stomachale Cratonis, de Caranna, quod est singulare; Compositio ejus secundum BARBETTE in sua Praxi, ubi de vomitu, p. 158. est hæc:

R. spec. arom. ros.  
Mastichis el.  
Oleo expr. nuc. Moschat. an. ʒi.  
Destillat. corr. citri  
Macis. an. ʒss.

Gum. carannæ q. s.

M. f. Emplastrum:

Inducatur super alutam, obducatur cum sindone rubra in forma scuti stomachalis, D. S.

Emplastrum stomachale.

Vel

R. Emplastr. stomachal. Crat.

Tacamabac. an. q. s.

Malax. cum f. q. olei stomachal. Craton. vel Balsam. Peruvianus: induc super alutam, f. scutum stomachale absque sindone, irroretur cum oleo destillato menthæ,

D. S.

Emplastrum stomachale.

Plura Externa huc faciunt, quæ supra dedi, ubi de Chylis. laesa, & quæ suo loco de Diarrhæa laudantur.

Sacculus croci ventriculo admotus, egregiè Vomitum sistit, etiam cum, qui nauigantibus solet esse familiaris: de quo eleganter videbitis historiam in BACONIS Verulamii Histor. Vitæ & Mortis pag. 121. Egredia sunt Cataplasmata, facta ex fermento, additis pulueribus aromaticis, quale est Mynsichtii ad singultum, quod optimum est in qui-

buscunque stomachi affectibus, in specie in Vomitu; vel quod addit DECKERS in Barbetie Praxim, ex Colleg. Londoniano D. MICHAELIS desumptum:

R. Pulvis menth.

Rosar. rub. an. ʒi.

Mastic. ʒj.

Nuc. mosch. No. iij.

Caryophyll.

Cinnam.

Macis. an. ʒij.

Croci. ʒi.

Ferment. acerr. ʒvi.

Cum f. q. Acet. rosar. f. cataplasma planè singulare, D. S.

Emplastrum stomachale.

Ad imitationem horum in contumaciori vomitu, aut morbo nauigantium, tale stomacho applicandum venit:

R. Ferment. acerr. ʒiij. vel iv.

Pulv. menthæ ʒi.

Zedoar. ʒss vel ʒvi.

Nuc. Moschat. No. ii. vel iij.

Macis,

Caryophyllor.

Cinnam. an. ʒjss. vel ʒij.

Sem. anis,

Cumini,

Fenicul. an. ʒij.

Acet. rosar. parum.

Misc. ad consistentiam Cataplasmatæ, applicandi ventriculo in vomitu nimio.

D. S.

Emplastrum stomachale.

Loco nucis Moschatæ & reliquorum aromatum Cataplasma hoc guttis aliquot olei destillati macis & caryophyllorum irrorari potest.

Hæc quidem in genere de vomitu curando.

In specie tamen considerandum; quis & qualis vomitus curandus? In hunc finem

I. Artificialis Vomitus non est curandus, nisi per accidens sit nimius; tunc enim suppressendus.

II. Spontaneus non est curandus, quia sit cum euphoria ægri, quicquid etiam reiciatur, nisi sit nimius, adeoque debilitetur æger, vel nisi atonia stomachi ex crebriori vomitu metuenda sit: tunc enim curandus, causam irritantem remouendo, aut eius genesin præcauendo, aut genitam alibi reuellendo & auertendo per Venæ sectionem, aut hæmorrhoidum, hirudinum applicationem, apertionem.

III. Non-spontaneus Criticus non est curandus, nisi, quod ratum, sit nimius; tunc enim, ut vomitus artificialis, sistendus.

IV. Non-spontaneus symptomaticus curandus est, observando præprimis: an sit per consensum? an per essentiam? Si per consensum, primarius morbus, quantum possibile, curandus est: Interea, ne alia mala à vomitu excitentur, opiatæ irritatio stomachi sistenda, vel auctus stomachi sensus leniendus, & appropriatis roborandus: v.g. si ex nephritide à capitis vulnere æger sæpius vomat, unâ cum primarii morbi curatione, misturis aromaticis, cum opio aut papaverinis mistis, nimius vomitus nonnihil compescendus. Sin verò per essentiam sit vomitus, considerandum: an vitium sit in eisdem fibris aut nervis, supra mod. in undecunque irritatis? vel in ipso eius corpore, quando exculceratur, excoriatur? &c. an verò vitium consistat, in causa quadam materiali seu occasionali, cum plus minus irritante. Hujus ratione consideretur: an sit per Protopathiam? an verò per sympathiam? hoc est, an causa peccans materialis in eo generetur? an verò aliunde deferatur? Sin vitium est in ipso stomacho, hoc debitis modis curandum, & sensus auctior opiatæ sopiendus? Sin causa materialis occasionem suggererit, siue humor peccans fuerit, siue fermentum saltem peregrinum, adeoque vitium vel in stomacho generatum, vel in eo radicatum, adeoque per sympathiam, tale vitium materiale vel corrigendum vel eliminandum: hinc opiatæ & appropriatis, plus minus adstringentibus, ventriculo succurrendum, & ulterior generatio præcauenda. Sin verò per sympathiam sit malum, & aliunde transmissa materia peccans, hæc vel corrigenda, vel per alvum evacuada, vel alibi auertenda: qua ratione gravidis nimium vomentibus venæ sectione in brachio interdum succurrimus.



Non spontaneus morbidus, omnino quocunque modo curandus, v. g. sanguinis vomitus, causæ etiam eius sollicitam habendo rationem. Conf. hic pluribus WILLIS *Pharm. Ration. Vol. 1. pag. 76. & seqq.*

In specie Vomitus artificialis est sistendus: e. g. post assumptum Vomitorium vehementius aut diutius, ægrum vexans, convenit Fetus externè calidè applicatus, ex absinthio, mentha & aromatibus sacculo inclusis, & in vino decoctis: item haustus vini generosi non nimis frigidi super vomitiones seu hypercatharses ab antimonialibus sistit. Theriaca etiam, si vires ferant, aut pilula unica laudani opiatæ aut parum essentia opii, in elixyr mentha propinatæ. Præsentaneum etiam remedium dicitur potus lactis cum pane cocti, aut panis vinogenoso acido intinctus & comestus. Clyster itidem ex lacte, in quo Theriaca dissoluta, iniciatur: item crusta pannis tosta, Vinogenoso imbuta, cum pulveribus aromatum inspersa applicetur.

Si Nausea aut Vomitus imminet ab assumpto medicamento vel ingrato vel satido, convenit masticatio corticum citri recentium, cui subindè de pulpa aliquantulum adhaereat; vel panis tostus aceto intinctus, & pulvere caryophyllorum inspersus, ori ac naribus admoueatur.

Plura de Vomitionibus nimis per medicamenta factis, earumque medendi ratione, vid. WILLISIUS in *Pharmac. Ration. pag. 75.*

## CAPUT II.

## DE

## VOMITU CRVENTO.

## CAUSÆ.

**I**am sequitur Vomitus sanguinis seu Vomitus Cruentus, qui est, quando reicitur sanguis per os: Et fit vel ex aperta quacunque ratione arteriola aut venula stomachi, itaque vel vitio suppressarum consuetarum sanguinis aliorumve humorum Evacuationum, vel denique vitio splenis, adeoque ex dehiscente vase brevi in stomachum; vel denique vitio Pancreatis, in quo una alterave vena à lymphæ eius præter naturam acidior exesa, aut aperta, refundit sanguinem in duodenum, qui regurgitat in stomachum, & sic non raro Vomitus cruentos inducit.

Remota causa, ob quas fit interdum Vomitus cruentus, sunt primariò suppressæ consuetæ sanguinis in corpore excernendi evacuationes: hinc post hæmorrhoidum & mensium suppressionem ex robore naturæ superuenit Vomitus cruentus: idque tam in gravidis, quam non gravidis. Exemplum talia non sunt rara, & referuntur à RULANDO *Curat. Empiric. Cent. 3. Curat. 4.* CORTHUMMIUS *de Morb. acut. c. 70. §. 33.* & ab HOECHSTEDTERO *De ad. 2. Cas. 6.* refertur exemplum Vomitus sanguinei admodum periculosi propter suppressos menses in virgine: item SCHENCKIUS *l. 3. Observ. 1.* similem habet Observationem Vomitus sanguinei propter suppressos menses. Fit quidem non raro, ut prægnantes ipsæ ex mensibus retentis interdum assilantur Vomitu tali sanguineo, idque ferè sine periculo, est enim motus naturæ, quos non facillè licet æstetare: vid. M. A. N. C. *Annu. 19. 10. Observ. 6.* & SALMUTH *C. 2. Hist. 54.* qui refert de prægnante Vomitu sanguineo præternaturali afflicta eousque, donec scilicet ipso conceptu edito ab onere liberaretur: & simile ferè exemplum habet SCHENCKIUS *l. 4. Observ. 1.* de gravida, quæ sanguinis Vomitus per 7. menses perpessa fuit, & tandem feliciter peperit. Ad hanc consuetarum evacuationum suppressionem pertinet ulcus consolidatum antiquum tibiarum, vomitus cruentum inferens: vid. RHODIUS *Cent. 2. observ. 65.* Ratio duplex est: partim quod sanguis, ante sub forma puris euacuatus, suppressus: partim quod fermentum acre ulcerosum multiplicans erodit vascula arteriosa in pulmonibus. In mutilatis vomitus cruentus non raro contingere solet, pede manumque ablata, ubi natura sanguinem redundantem per Vomitus reiecit: vid. CORTHUMMIUS *l. de Morb. acut. c. 70. §. 35.*

Spleneticis tandem valde familiares sunt vomitus cruenti. Quoad modum: certum est, quod per splenem nil immediate veniat in stomachum; sed fiat beneficio vasorum brevium, arteriosi & venosi, quæ raro ferè & nunquam oriuntur ex splene, sed ex arteria coeliaca, splenica, & vena

splenica ante ingressum horum vasorum. Quando ergo spleniscirrhosis, vel alio modo intarctus, non potest admittere sufficienter sanguinem per arteriam splenicam affluentem, qui tamen stagnando in dicta arteria, ob denegatam spatium non potest remeare convenienter ad splenicam venam, lege circulationis. Impedito ergo sanguinis motu in arteria & vena splenica, stagnat quodammodo in arteria splenica, in specie circa vas eius brevis, ante nempe ingressum arteria in lienem, quod vas brevis ad ventriculi seu stomachi fundum subrepat. Sub tali occasione stagnatio sanguinis impediti facta, tandem per vas brevis apertum sanguis arteriosus in stomachum evacuat: hinc subindè ante vomitus sanguinis percipiuntur pulsationes circa dorsum in latere sinistro, ubi sunt costæ nothæ inferiores, & brevis post ruptionem vasis brevis arteriosi sequitur sanguinis vomitus, talibus subjectis ubinde salutaris. Zacutus Lusitanus in *l. 2. Med. Princ. Hist. 10.* aliquot recenset exempla spleneticorum & similium, quos sanguinis vomitus similiter subleavit: qualia etiam habentur in PLATERO *l. 3. observ. 1.* & SCHENCKIO *l. 3. observ. 1.*

Non tamen semper è splene sunt cruenti isti duxus, vel hoc communiter existimant, quin & ex hepate, citra lienis noxam, vomitus sanguinis fieri potest: de quo conf. HOECHSTEDTERUS *Dec. 1. Cas. 5. p. 145.* Miræ sane ut subindè sunt humorum metastases & translationes, ita & vasorum anastomoses, & apertiones. Conf. de vomitu sanguineo, an ex splene an ex hepate? SCHENCKIUS *l. 3. observ. 1.* THONERUS *in obs. p. 2. §. 140.* SENNERTVS *l. 3. p. 5. Sect. 2. cap. 2. pag. 507.* BARTHOLINUS *Cent. 3. Hist. 36. C. 4. Hist. 60.* HORSTIUS *l. 4. obs. 1. p. 5.* Observationem rariorem habet RIVERIUS *Cent. 4. observ. 6.* de rustico, qui cum aquam fluminis potasset, ac inscius hircinæ simul haurisset, hæc laxa vasa stomachi intixa, continuum sanguinis vomitum induxit.

Denique ex pancreate subindè fieri sanguinis Vomitus, ex eo ferè patet, quod interdum tales sanguinem vomentes conquerantur de dolore profundo sub hypochondrio dextro: locum scilicet monstrant infelici, ubi inferitur ductus pancreaticus in intestinum duodenum: & præterea talem Vomitus sanguinis sapius sequi solet & puris vomitus, quod fit non, nisi ex pancreate exulcerato, vel per abscessum nonnihil vitiatum. Et tales Vomitus pancreatici præ ceteris solet præcedere dolor grauius & obrutus in superiori lumborum regione, ubi situm est pancreas. Habeo hac in parte consentientem SYLVIIUM, qui in *l. 1. Prax. cap. 15.* dicit: quod ut plurimum sanguis, qui simul per ventriculum & per alium reiciatur, oriatur ex pancreate, quando scilicet vasculum eius quoddam à succo acriori corrodat: unde sanguis in intestina excidens, partim inferius deferatur, partim ex irritatione duodeni sursum in ventriculum propellatur; & etiam pus, quod reicitur per vomitus, huc pertinet, quod ex pancreate est.

## DIAGNOSIS.

Quod attinget Diagnosin Vomitus Cruentis: Non raro decipiuntur Medici, qui vomitus materiam nigricantis habent pro cruento: vid. HOECHSTEDTERUS *Dec. 2. cas. 4 & 5.* ubi grumosa & nigricantia rejecta refert, quæ putata sunt sanguinem grumorum fuisse: sed falsò; fuerunt enim succi arabilarii vulgò noti, nati partim vitio digestionis primæ, partim ob miscelam variorum humorum in intestinis, ex qua miscela oriuntur. Si ergo reiciuntur fluida rabicunda, innuitur reici sanguinem arteriosum. Si obscura fluida grumosa instar substantiæ hepatis, est semper sanguis venosus: Si verò non adeò obscurus: sed saltem nigricans cum sensu dolorifico morficante, vel cum sapore acerbo aut austero, reicitur, talis non est sanguis, vel saltem non solitarius, sed simul acidi succi, qui sui miscelâ atramenti instar humorem nothum cruentum emergere faciunt. Noui Medicum, deceptum ab alio, qui se ingurvit vno cerasino, illud supra iterum & infra reddens; iste Medicus putavit, esse sanguinem nigrum.

## PROGNOSIS.

Vomitus sanguinis diuturnus malus est.

Vomitus spleneticorum cruentus, aut qui aliorum viscerum chronicis affectibus laborant, periodicus, saluberrimus est.



In quocunque sanguinis vomitu' sæpius recurrentes superuenientes hæmorrhoides salutem afferunt morbi certam.

Excretiones sanguinis sursum aut deorsum in exanthematis, variolis, morbillis & similibus lethales sunt: vid. HOECHSTEDTERUS Dec. 1. Cap. 8.

Vomitum Cruentum vitio Evacuationis solennis suppressæ, v. g. obstructionis mensum, &c. non adeo est nocivus, nisi excedat; quia Observationes testantur, nonnullis ordinariò ferè menses vomitu fuisse rejectos: vid. PANAROLUS Penec. 1. observ. 6. BARTHOLINUS Centur. 5. Hist. 32. & TIMÆUS à GuldenKlee l. 4. Cap. 12.

LINDANUS in Vomitu sanguinis hoc instituit Prognosticon: sanguinem ægri reliciunt ex ventriculo duplici formâ; vel grumosum seu crassum & atrum; vel tenue fluidum, & nigrum instar atramenti, & acrem. Neutrum autem est atra bilis, per vitiosum succorum in intestino duodeno concursum facta: quibus enim atra bilis exit, ij postredie moriuntur quod ipse dicit, aliquoties vidi. Nam atra bilis longè differt à sanguine, quæ omnes partes exundando quasi cauterizat.

### C U R A.

Vomitum sanguinis, si criticus, non sopiendus: Morbidus verò consideratur vel absolute, pro ut est excretio sanguinis simpliciter præternaturalis; vel respectu, respectu causarum antecedentium, quæ sanguinem vel coaceruant, vel in specie ad ista loca diffundi faciunt. In vomitu igitur cruento curando, posterioris huius ratione Causæ antecedentes removendæ, idque extra paroxysmum, vel excretionem consuetas revocando, vel viscerum vitia corrigendo. Prioris ratione, idque in primo paroxysmo, sanguinis motus, ne nimis in ventrem effundatur, corrigendus, vel reuellendo vel avertendo; sanguis verò jam effusus, duplicia postulat remedia:

1. Vasa aperta adstringentibus sunt coercenda, ut sanguis sistatur.
2. Sanguis effusus plus minus congruatus reliquus resoluatur & ejiciatur.

Quibus subinde venæ sectio vel in brachio, vel in pede, aut etiam, per hirudines, hæmorrhoidum apertiones, in corpore vel simpliciter plethorico, vel in quo sanguinis euacuatio suppressa est, subinde præmittendæ sunt; hæmorrhoidum enim fluxus quasi vicaria est euacuatio.

Remedia inter quæ conveniunt, pro primo scopo, sunt adstringentia, quæ ex cydoniis, plantagine & portulaca parantur, imprimis succus & syrupus: item ablinthium, & præ omnibus aliis succus radicis urticæ majoris, quæ radix urticæ majoris vel decocta tantum vel infusa similiter est admodum experta. Præterea convenit syrupus de symphyto Fernelii, de quo vid. BARTHOLINUS Cent. 3. Obs. 61. Item expertissimus in Anglia contra vomitum est Syrupus sequens, paratus ex succis foliorum plantaginis & radicis symphyti majoris vel caltatrippæ, quem non solum valdoperè commendat BOYLE in Philosoph. Experimental. Vol. 1. p. 110, sed descriptionem eius videb. etiam in Digby Recept. Vol. 1. pag. 175.

R. Rad. Symphyt. maj. rec. collect. 3 vi.  
Fol. Plantagin. M. ij.

Concidantur, & contundantur omnia in mortario, & exprimat succus fortiter per prælum, de quo non depurato cum f. q. Sacchari (parte) vel dupla) f. f. a. Syrupus: de quo usurpetur sæpius quotidie cochleatim.

Catholicus est ferè in quacunque sanguinis rejectione compescenda. Aliàs ad suppressendum sanguinem oleum seu spiritus vitrioli eminet, qui simul styptica vi vasa firmat, hinc aqua urticæ majoris & foliorum plantaginis, acidulata cum spiritu vitrioli, sumitur cochleatim, egregiè vomitum sistit, & pro hoc scopo ab HARTMANNO & RULANDO maxime commendatur in Thesuro pag. 184; ubi habet exemplum horrendi vomitus sanguinis curati per hanc mixturam:

R. Aquæ Radic. urtic. 3 vi.  
Spiritus seu Olei vitrioli q. l.  
ut acescat modicè, M. S.  
Aqua Sanguinem sedans.

Verba Autoris sunt hæc: Bene diluta & frigida pota firmant ventriculum, sanguinisque profluvium instar miraculi represserunt, quæ etiam potionem plures alii Auctores admodum laudare solent.

Simile exemplum videbitis in Observ. RIVERII, ubi similis vomitus eodem modo fuit curatus.

Porro semen hyoscyami Heurnio usitatum: crocus Martis adstringens, imprimis ille, qui ex vitriolo Martis in aqua soluto iniectione olei tartari per deliquium præcipitatus & edulcoratus. Tinctura Martis adstringentes, item terra sigillata, catechu. aliaque terræ medicatæ, lapis hæmatites, præsertim cum blandè acidis propinata. Ex his BIERLINGIUS in adversar. Curat. p. 107. & 109. sequentia præscribit Elethuaria.

R. Conserv. rosar. 3 il.  
Hemat. præpar. 3 iß.  
Croc. Mart. adstringent. 3 l.  
Sem. hyosc. albi 3 il.  
Cum Syr. portulac. f. Elethuarium, S.  
Elethuarium Sanguinem sedans.

De quo dosis quantitas nucis, avellane. Item

R. Conserv. rosar. 3 iß.  
Spec. diatr. frig. 3 il.  
Bol. armen. 3 j.  
Semin. hyosc. 3 ii.  
Syr. myrtill. q. f.  
M. D. S.

Elethuarium Sanguinem sedans.

Item Tinctura vitrioli Martis est egregia in quacunque hæmorrhagia: Modus præparandi est hic:

R. Terræ vitrioli Martis probe calcin. & edulc.  
(aliàs enim Vomitus movet, quod vidi) qu. v.

Soluatur in Spiritu Salis:

Solutio abstrahatur per retortam in arena ad mellis consistentiam, cui affunde Spiritum vini bene rectificatum, ponatur in digestionem loci calidi ad aliquod tempus, & euadet Tinctura rubicundissima, per filtrum à remanentia separanda. Hæc Tinctura saporis subdulcis adstringentis datur à guttis 15. ad 20. & 25. in aqua appropriata, & egregiè confert. FORESTUS in suis obser. l. 18. obs. 18. habet mixturam ex trochiscis de carabe & terra sigillata, cum aquis convenientibus dilutis, quæ præmissa venæ sectione habet effectum singularem in sanguine fluente sistendo, & concreto simul dissolvendo; quæ mixtura descripta est in SENNERTO l. 3. Prax. de Vomitu p. 158, est prima formula in vomitu sanguinis; nempe:

R. Aqu. burs. pastor.  
Portulac.  
Plantag. an. 3 l.  
Troch. de carabe  
Terra sigillata. an. 3 iß.  
M. S.  
Potio adstringens.

Ad culus imitationem:

R. Aqu. burs. pastor.  
Plantagin.  
Portul. an. 3 i.  
Acet. rosar. 3 iiii. vel 3 iß. ad 3 vi.  
Troch. de carab.  
Terr. sigillat. an. 3 iß.  
Syr. myrtin. 3 vi. ad 3 j.  
M. D. S. ut antea.

SYLVIUS habet Mixturem ad quæcunque sanguinis excretionem, & in specie ad vomitum sanguinis, polychrestam, in Praxi l. 1. cap. 9. §. 20., quæ primà fronte quidem inanis apparet, sed quod ipse testari possum, admodum est proficua. Formula hæc est:

R. Aqu. plantag. 3 j.  
Cinnam. 3 vi.  
Aceti destill. 3 iß.  
Corall. rub. præp. 3 iß.  
Sanguin. dracon. 3 iß.  
Laud. opiat. gr. ii.  
Syr. myrtin. 3 i.  
M. D. S.  
Potiuncula adstringens.

Hæc Mixtura sæpius cochleatim sumpta curabit pleasque vasorum rupturas, & supra multorum expectationem sanguinis effluxum brevi tollit.

Quod si metus est à coagulatione sanguinis, addi potest prædictæ mixturæ lapill. 69. præp. 3 iß., ut & antimonii diaphor. 3 j. atque ita usurpari. Cum autem hæc Mixtura propter sanguinem draconis, quem non habemus ge nuinum, sit suspecta, ad huius imitationem sequenti modo corrigi potest:

R. Aqu.



*R. Aq. plantag.* ʒ ij. vel liij.  
*Cinnam.* ʒ iij. vel ʒ vi.  
*Aceti destillat. vel rosac.* ʒ iij. vel ʒ ss.  
 ad ʒ vi.  
*Corall. rub. præp.* ʒ ss.  
*Terr. sigillat. gr. xv.* ad ʒ j.  
*Laud. opiat. gr. ij.*  
*Syr. Myrsin. vel alius appropriat.* ʒ ss. vel ʒ j.  
 M. D. S.

*Potiuuncula sanguinem sedans.*

Loco aceti addi quoque possunt gutt. xii. *Spiritus vitrioli.*  
 Capiatur cochleatim.

Item

*R. Aqua plantag. cum spiritu vitrioli vel Nitri*  
*modò suprad. acidul. qu. v.*

Cui addatur

*Terra sigill. pro lubitu, e. g. ʒ j. vel ʒ ss.*

M. S. ut anted.

Detur subindè cochleatim.

Efferuescit quidem, sed non diù durat, & acquirit sapos-  
 sem adstringentem aluminosum.

*R. Aq. hyperici,*

*Plantag. an.* ʒ ij.

*Succi plantag. rec. expr. vel tydon. vel g. qua-*  
*ter.* ʒ vi. vel ʒ j.

*Hæmat. præp.* ʒ ss.

*Bell. ærmen. præp.* ʒ j.

*Lqd. opiat. gr. liij.*

*Syr. de symph. Fern.* ʒ vi.

M. D. S.

*Potiuuncula sanguinem sedans.*

*R. Aqu. vitæ. mai. cum spiritu vitrioli acidul.*

ʒ iv.

*Cinnamom. spirituos.* ʒ j.

*Terr. sigillat.* ʒ ij.

*Hæmat. præp.* ʒ j.

*Laud. opiat. gr. liij.*

*Syr. de symph. Fern.* ʒ vi.

M. S. ut anted.

Ad vomitum sanguinis in Phthisica, quæ inter alia im-  
 primis de dolore in latere dextro sub hypochondrio  
 querebatur, ubi, pancreas inseritur intestino, profuit se-  
 quens potio:

*R. Aqu. plantagin.*

*Tormentill. an.* ʒ j.

*Cinnam.*

*Aceti destillat. an.* ʒ vi.

*Corall. rub. præp.* ʒ ss.

*Troch. de carabe ʒ j.*

*Terr. sigill. ʒ ss.*

*Mum. gr. vi.*

*Laud. opiat. gr. i.*

*Syrup. de symph. Fern.* ʒ j.

N. F. Paris, S.

*Potiuuncula sanguinem sedans.*

Commodè & lapilli Cancr. possunt addi, quando nempe  
 metus est coagulati sanguinis adhuc in stomacho hærentis;  
 quod pater ex angustiis præcordiorum, ex imminente lipo-  
 thymia, ex difficili Respiratione, pulsu debili, ventriculi  
 inflatione, facieque citrina ac pallida; quibus interdum su-  
 perveniunt Phlogoses. In his enim usurpentur sanguinem  
 grumosum dissolventia, ut lapilli Cancr. cum aceto soluti,  
 vel corallia præparata in vino acido, antimonium diapho-  
 reticum, succinum, trochisci de carabe, & de terra sigillata,  
 camphora. In specie sperma ceti à ʒ ss. ad ʒ j. in jussculo ca-  
 lido, vel haustu cerevisiæ dissolutum & assumptum, mira-  
 bile est ad dissolvendos sanguinis grumos relictos verò opor-  
 tet per Rhabarbarum, simileve laxans educere, aut etiam  
 vomitorio leniore evacuare. Conf. BONETTI *sepul-*  
*chret. p. 733. ʒ. 9. & RIVERIUS Cent. 4. Oser. 26.*

In vomitu sanguinis vitio splenis; in quo copiosiore aut  
 æger interdum deficit, aut viribus licet resumptis, in incu-  
 rabilem ascitem delabitur, noto: ad præseruationem &  
 fundamentum curationis, & inde metuenda plurima ma-  
 la, nil melius convenire, quàm martialia aperientia dicta,  
 & hinc alinthium, omniaque ex eo parata. Conf. DODO-  
 NÆUS *n. Hist. stirp. p. 24. ʒ. in obseru. p. 47.*

EXTERNE ad Vomitum cruentum scutum ex thèria-  
 ca cum croco, aceto rubi idæi irroratum, convenit ex HO-  
 ECHSTEDTERO *Dec. 2. Casu 3;* vel panis tostus, cui in  
 vino maluitico vel aceto intincto sit ad peris caryophyl-  
 lorum pulvis, Autore HARTMANNO *Prax. Chymia*  
*ii. p. 177.* Puris interdum excretio non statim sistenda, sed  
 blandè potius promouenda; ulterior tamen simul eius pro-  
 uentus impediendus. Quorum illud præstant, præter anti-  
 monium diaphoreticum, vel antihæticum Poterii, & lapil-  
 li cancrorum in aceto assumpti, myrrinata, aloetica, sulphu-  
 rea, itè saccharum saturni, vitrioli martis, & ex his duobus  
 parata Tinctura antiphthisica, dosi gutt. XXX. vel XL.  
 usurpanda in Decocto quodam vulneratio, e. g. in Decocto  
 Cheresol. aut plantag. aut comar. hyperici. Ulteriorem  
 puris prouentum impediunt Balsamus sulphuris anisatus,  
 aut ex floribus antimonii paratus à gutt. iii. viij. ad x. vid.  
 SYLVIUS *Prax. i. l. c. 9. ʒ. 22. p. 48.* Absoluimus ea, quæ  
 quoad retentionem contentorum in stomacho peccant, per-  
 gimus ad

## SECTIONEM VII.

D E

### DOLORIS SYMPTOMATIBUS STOMACHI.

Notum est, & frequenter in Praxi experimur, quod  
 ægri conquerantur de grauissima anxietate & angus-  
 tia circa præcordia, & dolore cordis, & similibus, & simul  
 nesciunt, quid conqueruntur; de his & eorum symptoma-  
 tibus aniculentis, quibustam multum negotii nobis fa-  
 ciunt, agemus.

#### C A P U T I

D E

#### ANGUSTIA, ET ANXIETATE PRÆ- CORDIORVM.

Quod attinet anxietatem & angustiam præcordio-  
 rum, notum est, cor ex se nullo sensu, nullaque mole-  
 stia corpori esse molestum: Cæterum sæpius evenit, ut in  
 præcordiis, hoc est, ut explicat Fernelius l. 4. de Febr. c. 10.,  
 regione circa ventriculum, diaphragma, jecoris cauum,  
 lienem, pancreas, in specie ventriculo, eiusque superiore  
 orificio, adeoque in ea regione, quæ costis nothis, anteriora  
 & versus sternum se insistentibus circumscribitur, non raro  
 sint anxietates & insignes molestiæ, item frequentes dolo-  
 res ægris grauissimi: & quidem si ægri conquerantur de an-

gustiis præcordiorum, siue ventriculi regionis, siue non  
 explicabili molestia illius loci, quando propterea sunt in-  
 quieti, adeoque ex nimis anxietatibus hinc inde in lecto  
 se volvunt & jactitant, dicitur in specie *Anxietas*. Sin do-  
 lor sit, qui in ea regione frequenter affligit, & quando ægri  
 intento digito monstrant in fouea ista, quæ dicitur *trochi-*  
*culus cordis*, in specie vocatur *Dolor stomachi* seu *Car-*  
*dialgia*; præprimis si unà cum dictis anxietatibus & angus-  
 tiis præcordiorum jungatur insignis dolor compressivus  
 & restrictivus, ut dicant: *Animo æger, ʒ. cor mihi vade-*  
*tur rumpi; vix sum apud me;* quod innuunt cum contorsionis  
 sensu. Quando verò cum his anxietatibus, & angustiis con-  
 junctus sit sensus Morficationis & ʒionis, vocatur *Car-*  
*diogme*, *Membra occupat metus mortis*. Anxietates  
 illas optime illustrat vomitus imminens ab assumpto vo-  
 mitorio, qui uti maxime anxios reddit ægros: *Omnia ipsi*  
*sunt angusta: Cælo, terraque gravari videntur; mortis sen-*  
*tiant periculum.* Cardialgiam verò repræsentant dolores  
 illi, qui post deglutitos grandiores bolos, aut duriora as-  
 sumpta, nos sensibilissime & interdum atrocissime af-  
 figunt, quod vocant *compressionem stomachi*.



In utroque casu Malum semper oritur ab affecto plus minus orificio ventriculi sinistro: præsupponenda nempe hic sensibilitas huius orificii, & inde nata proclivitas ad sui contracturam, variosque spasmos: da qua *suprà in Prolegom. assum.* Conveniunt adeoque & differunt anxietates & Cardialgia: Illæ quasi vagæ; Hæ fixæ: Illæ simpliciter ab irritante, subinde non commodè explicabili, molestia; Hæ à convulsiva constrictione. Anxietates istas dico oriri omnes quibusve in morbis simpliciter ab affectu præcordiis, seu speciatim ventriculo; uti non solum ostendunt angustia istæ, quæ vomitum ab assumpto medicamento immediate præcedunt; sed & mulieres hysterice subinde de gravissimis anxietatibus vagis conqueruntur, in quibus simpliciter affectum esse orificium stomachi superius, testantur rursus subinde superuenientes, à quorum eruptione sensibile leuamen percipiunt: Item in febribus, v. g. intermittentibus, nunc præcedunt, nunc in ipso paroxysmo affligunt anxietates multiplices: quæ quod sint ex stomacho, confirmatur ex eo, quod à frigido potu assatim hausto ordinariò insigniter exasperantur, & non nisi vomitu superueniente solvantur: In febribus, tam benignis quàm malignis, gravissimæ anxietates, quæ frequenter affligunt ægros, iridem simpliciter sunt ex molesto orificio sinistro stomachi, & partibus membranosis affectis, nullo verò modo ex corde affecto. Etsi enim sudor v. deatur leuare in talibus malum, tamen revera in stomacho est, & cessante sudore redeunt: nempe suppressio sudore effluvia ista, quo insensibiliter aut sensibiliter aliàs distillantur, retenta, affligunt præcordia & membranas eorum partes; unde anxietates: parili serè ratione, atque in diarrhoeis, quò copiosior diaphoresi gaudet corpus, & minor erit diarrhoea, sed quò minor est diaphoresis, eò copiosior alvi fluxus. Porro esse anxietates ex præcordiis, ostendunt gravissimæ istæ præcordiorum angustia, & subinde lethales anxietates cum hypocondriorum extensione, præcurrentibus lipothymiis, sudore frigido, &c. quæ superueniunt interdum contorsioni vertebrarum: hinc est, quod ij, qui eorum largiore se replent, noctem insequentem inquietam patiuntur, dum hinc inde se iectigare ob anxietatem coguntur saltem propter stomachum, ex nimia repletione male affectum. Quotiescunque ergo ægi vel anxii sunt, vel de anxietatibus conqueruntur, cordis sentire anxietates, qui affectus est frequentissimus, certi esse possumus, semper & simpliciter fontem & radicem habere in stomacho, speciatim circa sensibillissimum eius sinistrum orificium. Unde etiam, quando ægi dicunt, *Cor & animam mihi suffocat*, falsò vocant cordis angustiam, putantes laborare cor. Profectò cor est musculus serè indolens, aut si tam illud irritatur, sequitur eius motus convulsivus, qui vocatur palpitatio cordis. Iam verò tales ægi nullam palpitationem talem patiuntur, hinc minimè cor esse affectum constat; potius, uno verbo, videtur ille affectus, quem PETRUS SALIUS DIVERSUS *adstrictionem ventriculi* vocat, quatenus nempe, utroque ventriculi orificio arctius constricto, flatus aut quævis materia rarefscens spatium sufficiens sese explicandi non reperit, hinc ventriculum distendendo diaphragma comprimit, & respirationem difficilem reddit. Malum simpliciter hæret in spasmò orificii stomachi sinistri, à quacunque causa graviter affecti. Excipio tamen saltim affectus suffocatorios, seu in spirationis negotium turbantes; Nam & hi anxios reddunt ægros. Quæcunque reliquæ anxietates oriuntur ex stomacho.

## C A U S Æ.

Causæ, quæ anxietates tales pariunt, sunt nunc manifestæ acriora, vel stomacho hostilia assumpta, ut Mercurius sublimatus, Arsenicum, lac coagulatum, linal &c.; nunc alimenta sub digestionem corrupta, ut tractus horæi, vitata; nunc contenta peregrina, ut flatus & humores aruginosi; nunc miasmata & fermenta aliunde suscepta, ut in peste morbisque contagiosis, ut *suoloco videbimus*. nunc ipsi ventriculo impressum vitium, inflammatio, eschara &c.; nunc; nervorum vitia convulsiva, orificium eius aut membranas partes vicinas inicientia, ut in vertebrarum contorsione.

Curantur anxietates huiusmodi nunc per alcalia aromatica & oleosa, seu carminativa & discutientia, & effervescentes succos, in specie acidum, corrigentia; uti sunt vitriolata & nitrata, in genere per ea, quæ succos vitiosos effervescentes corrigunt, & halitus inde elatos resoluunt & discutunt. Semper ergo est habenda ratio morbi adjuncti, humorum effervescentium & reliquarum causarum, pro quarum varietate etiam Cura varianda: e. g. anxietates in hystericis optimè per salia & Castorina curantur: id quod etiam obtinet in hypocondriacis: in aliis cum phlogosi & æstuatione junctis anxietatibus spiritus vitrioli aut nistri dulcis, aut Tinctura bezoardica vel mistura simplex, similiaque conveniunt: quibus opiata, si ferat ægri conditio, subinde addenda sunt.

## C A P V T II.

## D E

## C A R D I A L G I A .

**Q**uoad Cardialgiam seu Cardiogmum: est, quando à causa quadam, graviter & continuò ventriculi orificium sinistrum irritante, huiusmodi dolorifica constrictione & convulsiva crispatura, quæ cum insigni dolore semper juncta est, oboritur. Regio stomachi præsertim in scrobiculo cordis, Veteribus vocata fuit *cardia*, quæ vox, ut ut propriè significet cor, nihilominus tamen, quoniam talis dolor stomachi seu orificii superioris, sæpius in consensum trahit cor totumque corpus, ut exinde non rarò sic dicatur lipothymia, syncopes, sudores, & glutinosi frigidi, ut moribundorum, circa caput, virium omnimodæ prostrationes, & non rarò stupenda & horrenda symptomata oriuntur; propterea vocarunt dolorem hunc Cardialgiam, quasi dicere voluerint dolorem cordis; cum tamen non laboret cor, sed afficiatur orificium ventriculi sinistrum. Et quidem iste dolor orificii superioris est admodum molestus & intensissimus, ac subinde propter symptomatum frequentiam & vehementiam toti corpori periculosus: propter quam causam etiam HELMONTIUS *ibidem* statuit sedem animæ & Duum-Viratum, seu conspersionem lienis cum stomacho, seu sede animæ, cuius duum-viratus jus se extendat in omnes operationes animales homini proprias.

Observanda hic imprimis est differentia hominum: quidam habent orificium stomachi sensibilius; quidam minus: Illi, uti sæpius anxietate & cardialgiâ laborant, ita crebrius lipothymiam incurrunt, quæ famèd non terreat Medicum. Contrarium est in reliquis.

## P A R S A F F E C T A .

Nobilis pars est hic locus affectus: nam leve vulnus, si attigerit hoc orificium sinistrum, serè est lethale: Imò plaga cum manu fortiori inflata mortem inferre potest: quale exemplum recenset BARTHOLINUS in C. 5. *Hist. flor.* 34, ex pugno nempe stomacho violentius applicato subortam esse mortem. Non rarò epileptica superueniunt pathemata ob dolorem eius ventriculi, à bile præsina euenientem: de quo vid. AMATUS LUSITANUS C. 1. Cur. 20. Nec mirum est; quia orificium stomachi, maximè nervum & admodum sensibile, consensum facile cum toto systemate nervoso facit; unde illò affecto, totum nervosum genus compatitur, & in spasmum ac convulsionem pertrahitur.

Cardialgiæ autem hæ, sicut anxietates, interdum sunt vagæ, interdum fixæ. Vagæ nunc cessant, & iterum incipiunt; hærent unice in stomacho & intestino duodeno; oriuntur ex effervescentia succorum heterogeneorum, maxime bilis cum aliis succis præternaturaliter fermentantibus; unde simul percipiuntur phlogoses. Cardialgiæ verò & anxietates fixæ oriuntur ex simili causa, sed continuò agente.

Ex his patet, subiectum seu partem affectam esse orificium stomachi superius sinistrum, sensibile admodum, quod irritatum convulsivum quid patitur, & ita quò magis sensibile, adeò plus minus intensum dolorem, & graviora adhuc symptomata & accidentia, etiam aliarum partium, patitur. Observandum hic simul, quod Cardialgia non semper



per præcisè affligat in parte abdominis anteriore epigastrica, quin potius sæpè in dorso sentitur, non tantummodo in suprema lumborum regione, aut circa ultimas vertebra thoracis, sed sæpè dolor sequitur ductum œsophagi, ita ut sæpè intra scapulas fursum ascendere videatur, & sit à spasmodica contractione & motione œsophagi, stomacho continuari.

## CAUSÆ.

*Causa proxima* Cardialgiæ est insignis læsio & contractura convulsiva dicti orificii ventriculi, utpotè partis sensibillissimæ, ex molesta irritatione oriunda, qua læsione, ratione nervorum plurium & majorum, ac spirituum animalium insigniter affectorum, postmodum faciliè totius microcosmi œconomia turbatur, & gravia symptomata oriuntur, vel potius totum nervosum genus in consensum trahitur, & actionum animalium consequenter insignis læsio & prostratio supervenit. Si causa irritans sit acris & corrosiva, oritur sensus corrosionis insignis seu mortificationis, cum angustiiis junctæ.

*Causa remota* est omne id, quicquid lædere potest dictum orificium, & ad dolorificum ejusmodi spasimum concitare, sive hoc fiat immediatè & per essentiam, sive per consensum saltem, dat Cardialgiam.

*Per consensum* non adeo frequentes sunt Cardialgiæ, ut ut interdum in nephritide, in specie in contorsione vertebrarum dosi, cum quis sibi malè fecerit, gravis dolor observari soleat; levis quidem est hæc res, sed neglecta, paucis hebdomadibus crudelia infert symptomata, quod ipse vidit: item à depressione & induratione cartilaginis ensiformis: vid. Ballonius Epidem. l. 2. p. 242. & Sennertus Prax. lib. 2. P. 2. c. 26: aliarumque partium vitii, e. g. calculis in vesicula fellea contentis: vid. KENTMANNUS de Calculis; à lapide in intestino jeuno: vid. SCHNEIDERUS l. 3. de Catarrh. c. 7: item à scirrho pancreatis, & melenterii: vid. RIVERIUS Cent. 1. Obs. 90. Interdum hysterica passio gravior Cardialgiam per consensum infert, quod observavi in muliere hysterica, quæ semper dicebat: *ibi malum vesicæ*; patiebatur ardorem stomachi, qui ardor oriebatur à bile effervescente cum acido; excretæ materiæ dicebat: *malum evanuit*. Quod spectat mensium suppressio, Cardialgiæ, frequens causa.

*Per essentiam* verò vel ipsius stomachi aut partium vicinarum subest vitium, vel in stomacho contentorum, & horum vel intusgenitorum, vel extrinsecus assumptorum. In specie quoad contenta, ceu frequentiores Cardialgiæ autores, Cardialgiam frequenter inferunt status, imprimis in stomacho vacuo oberrantes, plus minusve distendentes: hi namque status ex potenti utriusque orificii strictura inclusi angustiiis, vago motu vagas & insignes anxietates, ac subinde Cardialgias inducunt, in specie acriores acidi acrosivi, aut simili vitioso acore inquinati; unde hypochondriacis & hystericis frequens est hoc malum: vid. RHODIUS Cent. 2. Obs. 70: in quibus ægri jacent ita, ut videatur ipsis cor ferè destrui, dum dicunt: *cor sibi id in suffocari*; ut etiam postulent interdum venæ sectionem: sed malè, in specie, si ipsi corripiantur quadam febre intermittente; tunc enim in principio paroxysmorum, in quibus sunt inquieti & se jectigant, graves anxietates, interdum Cardialgiæ, à flatibus oriri solent, qui, si cum impetu per os prorumpunt, sunt ructu. Fit hoc ex effervescencia succorum in primis viis, præsertim in stomacho, unde vellicantur ejus orificium, & Cardialgia infertur, quæ in febribus intermittentibus curatur optimè per Clysmata.

Porro sunt excrementa quæcunque in stomacho stabulantia, quæ inter ferè primatum obtinet materia viscida glutinosa & acida, pituita vitrea dicta, orificio stomachi sinistro impacta, quæ dicitur oriri à tartareis humoribus; hæc enim acore vitioso inquinata, rodunt & vellicant, & quasi perterebrant stomachum, unde isti dolores, qui post passum horam unam vel duas ægros vexant: Item excrementa talia, quæ vulgò bilis porracea, & æruginosa à colore viridiusculo vocari solet, in quibus acidum peccat corrosivum, gravissimas præcordiorum angustias & molestissimas Cardialgias inferunt: vid. PLATERUS l. 2. Obs. p. 436. & 498. AMATUS LUSITANUS l. 1. Cap. 20. ZACUTUS LUSITANUS Pr. adm. lib. 2. Obs. 1, & PANAROLLUS Pent. 1. Obs. 20. Excremen-

ta hæc oriuntur partim ex corruptione assumptorum sub digestionem primam, v. g. uvarum: vid. RHODIUS Cent. 2. Obs. 53: partim verò transmittuntur ex Intestinis, in specie ex duodeno in stomachum; quando enim bilis, vel naturaliter vel præternaturaliter constituta, occurrit acido paulò intensiori, vel pancreatico, vel stomachico, tunc ex horum tam solitaria quàm simultanea cum Chylo miscela abeunt in varios & distinctos humores diversarum proprietatum, nunc nigros, nunc virides, nunc sæculosos, nunc alio colore vitioso præditos. In specie in bile porracea & æruginosa peccat acidum pancreatis nimium, forsan simul vitiosè austerum; unde talia evomentes sæpius patiuntur stuporem dentium ex vitioso acido, ex quo cum bile amara concrevit liquor viridis acris & corrosivus deterrimi saporis, & qui in stomacho, si non vomitum aut Cholera morbum, certè gravissimas angustias & Cardialgias inferre solet: vid. BONETTUS l. 3. S. 7. Obs. 22, HOLLERIUS Obs. propr. 21, & BONELLUS C. 1. Obs. 53: live per se vitiosa extiterint talia contenta, sive occasione vitiosorum fermentorum ad motus & excretionem præternaturales concitata fuerint. Comprobat hoc ulterius *experimentum* GRAFFII de succo pancreatico, qui cum reciperet bilem flavam ex folliculo fellis canis aperti, eamque misceret cum spiritu vitrioli insigniter acido, accepit misturam ex nigro viridescentem, & ita id, quod vulgò dicitur bilis æruginosa seu isarodes, uti videre potestis in Tr. de succo pancreatico. Unde etiam infantibus familiaria sunt excreta porracea seu viridia, eaque semper cum torminibus alvi juncta, quæ ducunt originem ex vitio & corruptela lactis, quod acore vitioso imprægnatum, non ritè digeritur, sed præternaturaliter acescit, levique bilis permissione viridescit; unde etiam talia excreta tenellorum non rarò solent excoriare podicem, propter nimiam acrimoniam, & ordinariò inferre tormina, propter aciditatem intestina rodentem: hinc, quod obiter moneo, per lapillos cancrorum, semine anisi, &c. talia infantum excreta curantur; quoniam talia corrigunt acorem, & vitium lactis emendant. Et observatum fuit, quod in gravissimo statu Cardialgiæ ex talium succorum per vomitum reiectione levamen percipiant ægri, maximè in febribus ardentibus. Huc etiam pertinent lapides & calculi in cavitate ventriculi collecti aut tunicis adnati: vid. HOEFERUS Herc. Med. c. 1. 3. c. 1. & BONETTUS l. 3. S. 7. Obs. 31. Præterea assumpta vitiosa & extraordinaria nimis acria similiter inferre solent cardiacam passionem: Sic Valerola lib. 1. Obs. 7. & Salmuth C. 1. Obs. 9. intensissimam cardiacam passionem referunt, ortam ex improvviso haustu mercurii sublimati loco emulsionis amygdalarum, quam curavit VALERIOLA per crystallum propter acidum destruentem, per theriacam cum butyro recenti, obrundente & temperante acrimoniam corrosivam ventriculum erodentem. Sed præterea quoque PLATERUS in Obs. Cardialgiam lethalem ob arsenicum propinatum; BONETTUS Sepulchre. l. 3. S. 7. Obs. 2. & 3. BARTHO-LINUS Cent. 2. Hist. 18. à veneno; PETRUS JOHANNES FABER in Curat. exemplum habet Cardialgiæ intensæ cum pravis symptomatibus, ex usu nimio casei recentis & mollis, in ventriculo postmodum coagulati. cui simile fieri solet, si lac quodcunque intempestivè haustum, aut si acidum quodcunque, v. g. vinum (vid. AMATUS LUSITANUS Cent. 6. Obs. 56. item FORESTUS l. 18. Obs. 13.) superingeratur, indeque coaguletur & grumescat in stomacho; tunc enim deterrima symptomata, in specie syncope, præcordiorum anxietates, sudores frigidi & similia symptomata, oriri solent, ut ob id lac coagulatum inter venena à quibusdam fuerit relatum. De Cardialgia à potu frigida vid. RHODIUS Cent. 2. Obs. 71. Balsami Sulphuris abusu Aët. Hæffn. Volum. 1. c. 131. Dixi cap. a reced. de hirudine cum potu assumpta, vomitum sanguinis producente; hic verò, quod rarum est, ex RHODIO C. 2. Obs. 72. Cardialgiam crudelem induco ex hirudinibus productam, naribus, ut fieri solet in Gallia, pro hæmorrhagia artificiali excitanda applicatis, postmodum per nares in gulam, & orificium stomachi sinistrum irrepentibus: quæ Cardialgia curata fuit, quod obiter moneo, per aquam salitam propinatam, propterea, quoniam sal admodum contrariatur hirudinibus. Parili nempe ratione hirudines ano applicatæ, ut hæmorrhoides provocent, nonnunquam ingrediuntur intestinum rectum, & gravia inferunt symptomata: in tali casu solent



solent elici mediante clystere ex aqua salita; sic enim promptè egrediuntur: Non secus ac vermes subindè Cardialgiæ sunt autores. patet ex eo, quod his excretis soleat cessare, observante eodem RHODIO C.2. *observat.* 73; Vid. etiam M. A. N. C. *Ann.* 3. *observ.* 258, Cardialgiam quoque intulerunt lacertæ, ut habet GESNERUS lib. 2. *Hist. Animal. cap. de lacerto;* pediculi, vid. HEURNIUS *de morbis capitis cap. 7;* lumbrici, vid. HERCULES SAXONIA *Prælect. Præf. P. 2. c. 7. §. 4.* HEINRICUS ab HEER *Observ.* 16. & RHODIUS l. a. Elezens est, quod habet PLATERUS in *Observat.* de Cardialgia intensissima & cruciati maximo ob deglutitam anguillam viam, quam postmodum mortuam, & veluti excoctam, per alvum excrevit. Signum hæc excoctio est, quod iam fermentum stomachi incepit agere in anguillam; undè tantum exterius rosit. Hoc etiam videmus in piscibus voracibus, v. g. lucio, qui pisciculos minutos ita sensim sensimque digerit. Cardialgiam etiam PLATERUS habet ob deglutitum scarabæum: aliud exemplum habet intensæ cardialgiæ, abortivæ ob deglutitionem cochlearis, quod ipsum sequenti die per anum reddidit. Pertinet hæc vitium deglutitum. & acicula deglutita, per urethram iterum egressa. Cardialgiam, angustias præcordiorum, respirationem difficilem, & dolorem pectorum ventriculi, inferentes.

Quod ipsum attinet ventriculi aut partium vicinarum vitium, cardialgiam inferens, varium admodum esse potest: Sic HILDANUS C. 3. *Observ.* 20. observat dolorem ventriculi, primo leuem, hinc gravissimum cum dolore capitis, tandem vagè omnes corporis partes vicissitudine mira affligentem, lethalem: in aperto cadavere ulcus cavum magnum & frigidum circa orificium ventriculi fissuram fuit inuentum: quale etiam observavit DONÆUS *Observ. Med. cap. 25:* non secus ac RIUERIUS *cap. 1. Observ.* 90. notat ventriculi dolorem diuturnum lethalem; ubi, aperto cadavere, inventus scirrhus, pancreas, mesenterium, jejunum & pylorum occupans: Similes tumores, ventriculo dolorem inferentes, observavit HIPPOLITUS BOSEUS *de Facultat. anal. lect. 2. pag. 21* & ZACHINUS *P. 2. Observ.* 11.

Hi ipsi dolores stomachi seu cardialgiæ, utut vagum sint symptoma, non raro sunt periodici, statuto tempore ac periodo affligentes. Hinc inde huius rei prostant exempla, quale imprimis est singulare BARTHOLOMI C. 3. *Hist.* 50. ubi recenset tales ventriculi dolores periodicos alternis diebus statuto tempore affligentes: Sic GVARINONIUS in *Cons.* 170, habet intensum ventriculi dolorem, menstruo tempore affligentem in muliere.

### DIAGNOSIS.

Quoad signa diagnostica anxietatum & Cardialgiæ: recensentur ab ægris, qui conqueruntur, se insignes molestias in præcordiis sentire, monstrantque regionem sterni inferiorem & scorbiculum cordis; quæsti, non possunt verbis sufficienter exprimere molestiam: quibus sæpè accedunt jectigationes corporis, & inquietudines, vigilie, respirandi difficultas, item imminencia subindè animi deliqua; quæ ordinariò prægreditur vertigo aut scotomia: anxietates has insequuntur faciei liuor, extremorum refrigerationes, & subindè sudores frigidi: ægri interdum quasi exanimati jacent, interdum ex doloris acerbitate se mire jectigant, nescii ferè quid agant.

Præ cæteris autem observandum; quod hæc Cardialgia seu stomachi dolor non semper affligat in parte abdominis epigastrica anteriore, quin potiùs è regione ventriculi dorsi atrocius affligat sæpius, non tantummodò in suprema lumborum regione, aut circa ultimas vertebrae pectoris seu thoracis, ubi scilicet incumbit stomachus pancreati, sed, quod magis mirandum, sæpè cardialgia sequitur ductum œsophagi, ita ut dolor talis sæpè intra scapulas sursum adscendere videatur, utut inferius circa vertebrae dorsi seu thoracis sit gravior illi, quæ adscendit inter scapulas, & sit à spasmodica contractione & motione: quia imò non raro ægri conqueruntur solummodò de dolore compresso intra fauces, qui dolor reverè ex stomacho, per continuatum œsophagi ductum ad fauces deriuatur.

Porro observanda distinctio: ne forsàn Cardialgia paulò inferius protensa seu protracta habeatur pro dolore colico, & colicus dolor in ea parte coli, quæ immediate sub-

sternitur stomacho, habeatur pro cardialgia: qualia exempla SCHENKIUS in *observat.* recenset l. 3. de quibusdam Medicis deceptis, curantibus quendam in anteriore stomachi regione dolorem sentientem, tanquam cardialgiâ laboraret; quem tamen errorem detexit unicus clyster injectus, dum nimirum hoc ipsò fuit sedatus dolor colicus, aliàs enim nihil præstitisset clyster. Id quod in specie dignoscitur, considerando circumstantias loci dolentis, & hinc antecedentia & consequentia: Nam ut plus magis sursum versus protenditur dolor in cardialgia, qui in colica vera, quasi deorsum versus umbilicum & lumbos vel renes descendit; & raro etiam sola affligit cardialgia, quin si paulò atrocior fuerit, horrenda infert symptomata. *Causarum signa*, an sint humores? an flatulentiæ? an per consensum renum? an per consensum alius alterius partis? præter hoc, quod faciliè patient, recensentur à SENNERTO in *Praxi*.

### PROGNOSIS.

In *Prognosi*: Dolor ventriculi seu Cardialgia, licet adstantibus videatur terribilis, & ægris funesta, tamen ex se leve malum est, & nihil habet in recessu, modò mox curetur: si tamen sit acerbior, ut diutius protrahatur, propter syncopes metum, non contemnendum malum est, propter periculosa, quæ aliàs superveniunt, symptomata: unde magis periclitantur in cardiaco hoc affectu, qui os ventriculi admodum sensibile habent, aut obnoxii passionibus convulsivis; item qui rarè aut tenebræ sunt texturæ, in talibus nempe, vel etiam in aliis, si interdum est extremorum refrigeratio, ac sudor circa frontem ac tempora frigidus, lypothomia ac syncope, aut convulsiones superveniunt, res periculo non caret; metus enim est, ne dicta symptomata excedant, & sic majus periculum immineat: Sic in febribus, cuius symptoma existit, præsertim continuis & acutis, tam benignis quàm præsertim malignis; dum ægri simul de æstu & ardore insigni circa ventriculum, vel quæ aliàs dicitur Soda, aut etiam de vera Cardialgia conqueruntur, res meritò suspecta, ut plus admodum periculosa, est: vid. HIPPOCRATES S. 4. *Apbor.* 65: signum siquidem est, partim magnam adesse humorum saburram, partim ingentem ventriculi inflammationem cum subsequente sphacelo, partim nervorum orificii ventriculi stricturam spasmodicam.

Pessima anxietas & anxiosissima Cardialgia solet oriri ex acri & mordicante humore, in specie bile porracea, vel æruginosa; hinc est ista, quæ ex lacte oritur coagulato, quemadmodum *Astor. Hassinens. Volum. 2. Observ.* 87. constat.

Ista, quæ oritur ex pituita viscida, plus minus acida, contumacior quidem est cæteris, minus tamen molesta, ac minus gravibus symptomatibus stipata esse solet.

Cardialgia post alimenta vitiosa assumpta sæpè quidem est molestissima; rursus tamen remittit, modò non supervenerit febris.

Cardialgia in puerulis sæpè epilepsiam, in adultis verò morbos chronicos, eosque molestissimos, excitat.

Cardialgia denique à lumbricis & flatu ut plurimum minus periculosa; interdum tamen ex lumbricis ventriculum mordentibus gravissima symptomata oriuntur, ex quibus ægri repente deficiunt; ut etsi dispositio flatuosa habitualis facta fuerit: vid. RIVERIUS lib. 9. *cap. 10.*

### CURA.

Quod attinet Curam: in hac

1. Mature removenda imprimis causa stomachum irritans aut lædens qualicunque, sive sit interna, sive sit externa; item sive per essentiam, sive per consensum fuerit.
2. Placandus est stomachi dolor aut natæ inde angustia, tam per generalia oppiatà intermissa, quàm per specialia aromatica appropriata; unde Theriaca ad 3 ij. egregium est anti-cardialgicum; ita tamen, ut quævis causæ sublatio ordinariè primum locum obtinere debeat, interdum tamen



tamen anodyna & narcotica, si dolor nimis urgent, præmittenda veniant.

*Primum* quod attinet *Indicationem*: quæ causam irritantem remouent, in affectu per essentiam, nempe humorum contentorum, siue assumptorum, siue intus genitorum vitiorum, per se planum est, quod excellent vomitoria, quæ **AMATUS LUSITANUS, FABER**, & omnes Autores, ubi necessarium, commendant. Si verò est per consensum, curetur morbus primarius: ver. gr. nephritis, in qua dentur anodyna. Hinc in principio febris intermittentis & ardentis, si æger patitur Cardialgiam enormem, maturè propinetur Vomitorium, aliàs est metus, ne æger incredibilia pathemata incurrat. In febribus malignis ordinariò observatur Cardialgia, ubi vitium est in sinistro orificio stomachi; hinc in malignis, quæ oriuntur à contagio, præmittenda Vomitoria antimonialia, aliàs ob graviora symptomata vix speratus effectus sperandus. Observamus hoc quoque in petechiis, quæ sunt malignæ, contagiosæ, & acutæ, in quarum cura si detur vomitorium in principio morbi; morbi cursus absolvitur sine anxietatibus: si negligitur in principio, incredibilia symptomata æger assidue affligitur. Præ ceteris tamen vomitoria antimonialia præcellunt, quæ interdictum sunt v. g. aqua benedicta Hartmanni aut Rulandi; vel quidam solent commendare, si vinum absinthiæ in poculum Vomitorium Rulandi infundatur. Paratur hoc poculum de ligno juniperi cum pice & Vitro antimonij grosso modo imprægnatum, qualem modum habebitis in *Collegio Ionseniano* D. MICHAELIS; est admodum elegans hoc poculum.

Vel

R. Tartariemet. Myrs. gr. ij. ad iij.

Olei sacchar. anisi,

Chamomill. an. gr. v.

M. S.

Pulvis vomitorius pro una vice.

R. Aqua Chamomill. Rom.

Mentha an. ʒss.

Spir. carminat. Sylv. ʒss.

Syr.emet. Ang. Sac. ʒss.

vel ʒvj.

M. S.

Potiuscula vomitoria pro una vice.

Post Vomitoria, & quidem in malo minus acuto, usurpanda sunt purgantia: sed quoniam hæc per se ventriculo sunt inimica & molesta, irritando ejus orificium sinistram, facile possunt exasperare malum; propterea convenientissimum est, ut jisdem addantur opiatæ, simili modo ac de vomitu dictum fuit: qui modus usitatus est apud modernos, utut etiam opiatæ omnium humorum excretiones sistant, & etiam hypercatharses removeant; nihilominus tamen convenientibus purgantibus permixta, eadem blandè & suaviter, nec adeò vehementer, operari faciunt. Hujus rei aliàs horrenda Veterum Practicorum prostant vestigia: nam ut plurimum usurparunt Electuarium diaphœnicum cum Philonio Romano, sub hac formula:

R. Elect. diaphœn. (quod etiam purgat) ʒss.

Philon. Roman. (propter opium) ʒij.

Miscuerunt pro Electuario;

Quod purgat blandè, & simul dolorem sistit: de quo videre potestis RIVERIUM in sua Praxi, ubi de Vomitu, l. 9. cap. 7. pag. 415. item de Cardialgia cap. 10. pag. 433. ac SCHVLZIUM in Consilio 114. aliisque. Verum quoniam talia Electuaria ferè sunt inausciosa, commodiùs à modernis præscribitur talis formula; quæ etiam in Colica est proncua: v. g.

R. Tartari vitriol. vel arcan. duplic. Myrs. gr. xij. vel xv.

Scamm. sulphurat. gr. ij. vel iij.

Laud. opiat. gr. j. vel ij.

Extr. troch. alband. gr. j.

Olei destillat. carvi vel chamom. Rom. gutt. ij.

M. f. Pulvis, S.

Pulvis laxans, & sedans dolores.

Laxat per inferiora, & hoc facto sistet dolorem.

Vel

R. Mass. pilular. aloëbang. cum scam. gr. xv. ad ʒj.

Extr. troch. alband. gr. j.

Laud. opiat. gr. j. ad gr. ʒss. vel ij.

Et muller. Oper. Tom. II.

Olei destillat. succini gutt. iij.

Cum essent. Mentha vel absinth. f. pilula.

D. S.

Pilula laxantes & sedantes dolorem.

R. Mass. pilul. de hier. cum agar. ʒj.

Scamm. sulphurat. gr. j.

Laud. opiat. gr. ij.

Cum essent. absinth. f. pilula.

D. S.

Pilula stomachales laxativæ.

R. Mass. pill. de ammon. Querc. gr. xij.

Mag. jalapp. gr. v.

Scamm. sulphurat.

Laud. opiat. an. gr. j.

Cum essent. castor. f. pilula.

D. S.

Pilula stomachales laxativæ.

R. Mass. pill. de ammoniac. Querc. gr. xij.

Auri fulmin. gr. v.

Cum essent. castor. f. pilula.

D. S.

Pilula stomachales laxativæ.

Certum est, quoadmodum convenienter possint misceri opiatæ cum purgantibus; ubi tamen simul observandum, quod opium, quoniam omnes spirituum & humorum motus sistit, si addatur purgantibus, eius respectu purgantium dosis plus minus augmentanda sit, ne supprimatur omnino minor Purgantis dosis. Et convenienti talia purgantia opiatæ mista, in specie iis, qui obnoxii sunt hypercatharsis aut facile vexantur torminibus intestinorum, ut mulieribus, quæ ex levi purgatione suffocationem uterinam incurrun. Item convenit talis mixtura iis, qui facillimè sunt solutionis alvi, quemadmodum reperiuntur, ubi duo grana scammonii octo es purgant; in his enim remora inijcitur purganti. Item convenit hæc mixtura iisdem, qui acidis corrosivis succis abudant, ac lymphæ acriori qui falso acidæ turgent, in specie scorbutico-hypochondriacis, quibus per purgantia commotis ob succos crudos & acidos gravissima superueniunt abdominis tormina: hoc ne fiat, commodè permiscetur laudanum opiatum, aut saltem die uno aut altero cum Digestivo præmittitur. De hac mixtura vid. HOEFERUS in Herc. Med. pag. 124; sicut moderni Belgæ, SYLVIVS, & eius discipuli, utuntur tali mixtura laudani opiatæ cum purgantibus. POTERIVS, Scriptor nobilis, curavit aliquando Cardialgiam aliis omnibus relictantem, in suis Observ. Cent. 1. Cap. 24. mediantibus laudatissimis suis pilulis catholicis. Compositio prostat in eiusdem Pharmacia spagyrica, & habet exemplum de dolore ventriculi intensissimo periodico, quotannis certis temporibus, certisque diebus redeunte, qui aliis quam plurimis irritis tandem à POTERIO curatus fuit per pilulas Catholicas, quæ sunt hæc:

R. Aloes succotr. ʒss.

Myrrha ʒij.

Mastic. ʒj.

Croci Orient. ʒss.

Magnesi. Saturn. meteoris. ʒj.

Cum syr. ros. solut. f. Massa:

Cujus dosi à gr. xv. ad xxiv.

Valdè commendat has pilulas.

Præcipuum autem ingrediens, quod obscurè proponit, est Magnesia saturnina meteorisata, quæ videtur esse Flores antimonij correcti, per inferiora saltem purgantes; Magnesia saturnina enim aliàs est antimonium per meteorisationem nil aliud intelligit quàm in flores sublimationem.

Quod si Cardialgia oriatur à flatibus, aut exhalationibus ex effervescencia humorum in intestino duodeno obvia, nempe ex bile & succo pancreatico (nam succus pancreaticus & bilis commisti, dum effervescent, halitus acres in stomachum mittunt) uti contingit interdum in febribus intermittentibus, item in paroxysmis hypochondriacis & hysteriis; in talibus casibus optima sunt clymata carminativa seu aromatica, ex iis nempe, quæ flatus discutunt, & blandè intestina absterguunt, origano, pulegio, chamomilla, cum sale tartari parata, quæ in paroxysmis febrium intermittentium, paroxysmis hysteriis &c., sunt optima, nunc simplici, nunc partitis vicibus injecta: ver. gr.

R. Herb. mentha,

Flor. chamomill. an. M. j.

F

Red.



*Rad. angel.*  
*Bacc. lauri,*  
*Juniperi, an. ʒʒ.*  
*Sem. anisi,*  
*Feniculi,*  
*Salis tart. an. ʒ ij.*  
 Coqu. in f. q. *Aqu. simpl.*  
*R. Colatur. ʒ ix.*  
 adde  
*Electuar. de bacc. lauri ʒ ij.*  
*Olei destillas. anis.*  
*Feniculi an. ʒʒ.*  
*M. pro Clysmate, S.*  
*Clysm. contra flatus.*  
 Quod tepide applicetur. Vel  
*R. Herb. Chamom. M. ij.*  
*Flor. sambuci M. j.*  
*Rad. levisst. ʒ j.*  
*Semin. 4. cal. maj. an. ʒ ij.*  
*Sal. tart. ʒ ij.*  
 Coque in f. q. *Aqu. simpl.*  
*Colat. ʒ j.* adde  
*Elect. de bacc. lauri,*  
*Hier. cum agar. an. ʒ j.*  
*Olei destillas. bacc. juniper. ʒ ij.*  
*M. f. Clysm. pro duabus vicibus, S.*  
*Clyster contra flatus. Vel*  
*R. Herb. calaminth.*  
*Origan.*  
*Ruta an. M. j.*  
*Fol. lauri M. ʒ.*  
*Sem. anisi,*  
*Cumini,*  
*Dauci an. ʒ i.*  
*Sal. tart. ʒ ij.*  
 Coque in f. q. *agu.*  
*Colatura ʒ ix.* adde  
*Elect. levisst. ʒ i.*  
*Olei anethi,*  
*Ruta an. ʒʒ.*  
*M. f. Enema, S.*  
*Clyster contra flatus.*

Sal tartari additur propter duplicem scopum; (1) ut menstruum acuet: (2) ut vi salini incidat.

*R. Herb. mentha aut calami mont.*  
*Origan.*  
*Puleg. an. M. i.*  
*Flor. Chamomill. vulg. aut Rom. M. ʒ.*  
*Rad. angel. ʒ ii. vel ʒ ʒ.*  
*Bacc. lauri ʒ ij.*  
*Semin. anisi,*  
*Dauci,*  
*Fenicul. an. ʒ j.*  
 (semina hæc egrogia sunt Carminativa)  
 Coque in f. q. *Aqu. simpl. & Vrin. human.*  
*Colatur. ʒ viij. vel ʒ ix.* adde  
*Elect. levisst.*  
*De bacc. lauri an. ʒ ʒ vel ʒ vj.*  
*Olei destillas. anisi,*  
*Feniculi an. ʒʒ.*  
*Vitell. ovi No. j.*  
*M. f. Clysm. S.*  
*Clyster contra flatus.*

Inflicendum tepide, vel una vice, vel, si flatum obstiterit præsentia, duplici vice applicetur.

RIVERIUS in tali casu habet Clysmata ex solo vino albo aut Hippocratico cum oleis destillatis carminativis parata, quæ non sunt inelegantia.

Quæstio est: an venæ sectio conveniat? quod negatur; per se enim in Cardialgia tollenda nil emolumenti habet: unde, quando prostant exempla Cardialgiarum, per venæ sectionem curatarum, verè sunt casualia, quàm ex lege artis exhibita. Exemplum tale habet RIVERIUS c. 1. *Observat. 44.* de dolore vehemente, ventriculi & lienis regionem occupante, qui aliis omnibus irritis, (venæ sectione tandem fuit curatus; vel cardialgia propter alium asseritum ex sanguine nata fuit, & cum hoc suo modo conjuncta, ratione cuius venæ sectio indicata fuit, ut v. g. in mensibus suppressis, item si à sanguinis turgescencia nimia dependeat: vid. FORTIS c. 2. *Conf. 86.* Pertinent huc etiam exempla THONERI in *Obs. pag. 153.* de dolore ventri-

culi immani & ingenti in Plethorico, aliis irritis venæ sectione subito incantamenti instar curato; idque propterea, quia tantum adfuit suspicio inflammationis stomachi, quæ tamen non est sufficiens.

Sensum doloris tollunt imprimis Papaverina & opiata; vid. WEDELIUS *Opiol. pag. 116.*; quæ inter Veteribus in usu fuit Philonium Romanum ad ʒ j., item pilulæ de cynoglossa ad ʒʒ. Modernis in usu est laudanum opiatum, cum decocto flor. chamomill. usurpatum, & laud. hystericum: item usurpetur sequens mistura specifica contra dolorem stomachi & præcordiorum, aut ad Cardialgiæ omnes causas;

*R. Ag. chamomill. ʒ ij.*  
*Cinnam. ʒ j.*  
*Elix. menth. vel Citri vel aurant. ʒ ij.*  
*vel ʒʒ. vel ʒ vj.*  
*Olei destillas. chamomill. vulg. vel Rom gutt. vi.*  
*Laud. opiat. gr. ij. & ij. ad vj.*  
*Syrup. de hyssopi ʒ vj.*  
*De Canella ʒ j.*  
*M. D. S.*

Mixtura dolorem sedans pro una vice.

De qua capiantur pro dosi duo vel tria cochlearia, & in genere anxietates dispellit.

Mixtura hæc diversimodè specificari potest; hinc potest, huic etiam addi spiritus salis ammoniaci, aut sin ardoris sensus simul adsit, spiritus nitri dulcis: E. g.

*R. Ag. Chamomill. ʒ ij.*  
*Carminat. Dornet. ʒ j.*  
*Elix. mentha ʒʒ.*  
*Spiritus nitri dulc. ʒ ij.*  
*Laud. opiat. gr. ij.*  
*Syrup. cinnam.*  
*Menth. an. ʒʒ.*  
*M. S. ut antea.*

Xel etiam pro causarum varietate addi possunt pulveres quidam terre fixi absorbentes, & quidem omnia in debita dosi;

Vel

*R. Ess. flor. Chamomill. Rom. ʒ ij.*  
*Mentha,*  
*Opii. (Perinde enim est, si ve opium in forma sicca si ve liquida adhibeatur.)*  
*Spiritus anis an. ʒ j.*  
*M. D. S.*

Essentia dolorem sedans.

Dosis 30. ad 40. guttul. Vel

*R. Spiritus sal. ammon. anisati ʒ ij.*  
*Essent. opii ʒʒ.*  
*M. Pro tribus dos. S.*  
*Essentia dolorem sedans.*  
*R. Spiritus carmin. de trib. ʒ ij.*  
*Essent. opii ʒʒ ad ʒ j.*  
*M. S.*

Essentia dolorem sedans.

*R. Spiritus carminativ. de trib.*  
*Essent. castor. an. ʒ ij.*  
*Opii ʒʒ. ad ʒ j.*  
*M. S.*

Essentia dolorem sedans.

*R. Spir. Corn. Cerv. cum sale vol. ʒ j.*  
*Essentia opii ʒʒ.*  
*M. S.*

Mixtura dolorem sedans.

Dosis gutt. XLV.

Conuenit etiam Tinctura tartari acerrima, ter in die à 40. ad 50. guttas.

Aliàs quæ in Cardialgia in genere conueniunt pro causarum ratione; vel appropriata stomachico-aromatica blanda in casu, quando status aut similia adsunt; vel absorbentia, in bile præsertim seu recrementis porraceis: ut racemam propria ventriculi vitia debitis modis curanda. Aromatica talia ad Cardialgiam usitata præ cæteris sunt radix angelicæ & enulæ campanæ, feniculi; Herb. & semen feniculi, anisi, Herb. rorismarini: specificum est chamomilla, tam vulgaris quàm præstantiori cum effectu Romana, quæ nobile est aroma, unà cum vi anodyna, & omnia ex his parata remedia, quia sunt expertissima in Cardialgia, & non habent in hoc passu illi conferendum. Sanè RIVERIUS, AMATUS LVSTITANUS Cent. 4. Cur. 59. vix sufficienter possunt commendare aquam chamomillæ destil-



destillatam in Cardialgia flatulenta, si ad 3 iij. propinetur; hinc decoctum chamomillæ seu expertissimum mirificè à FORESTO ad Cardialgiā commendatur. Alii essentiā florum chamomillæ cum proprio spiritu paratam commendant. D. MICHAELIS paravit Essentiā hanc cum spiritu vegetabili carminativo, i. e. spiritu vini à specificis seu simplicibus carminativis abstracto; quæ essetia à 3ss. ad 3 j. propinata in affectibus stomachi & Cardialgia erit convenientissima & elegantissima. Alii oleum destillatum saphirium chamomillæ vulgaris, & Romanæ meritò extollunt in haustulo vini assumptum, aut oleo nucis Moschatæ mixtum & exterius illitum, admodum est conveniens ad tollendam cardialgiā: vid. *Art. Med. Hassniens. Vol. 1. pag. 213. & Vol. 2. observ. 87 p. 208.* PAVLI *Quadrip. Botan. p. 253.* in specie AMATUS LUSITANUS *Cent. 3. Cur. 30.* FORESTUS *l. 18. Observ. 20.* Post chamomillam ulterius conveniunt Decoctum ligni sassafras, hyssopus, summitates anethi, menthæ crispæ, ite flores anthos seu rorissarinii, & flores verbasci, qui sunt singulariter anodynii. In specie cortices citri & aurantiorum, & ex his parata Elixiria, Tinctura & oleum destillatum corticum aurantior. Ex dictis simplicibus destillate aquæ, aqua chamomillæ, florum sambuci, hyssopi & cinnamomi conveniunt. Vinum absinthites similiter est utile, uti etiam ad dolorem acrem vinum decoctionis nucis Moschatæ, qui laudatur insigniter à STOECKERO in *Praxi* ad dolorem acrem: item spiritus Vini anisatus seu spiritus & oleum destillatum anisi, spiritus salis ammoniaci simplex & anisatus, est egregius in Cardialgia. In urgente casu potest propinari elixyr menthæ, item olea destillata carminativa: e. g. oleum destillatum carvi experimentum est THONERI in *Observ. p. 236.* ad gutt. iv. vel v. usurpatum: duo enim *cit. loco* exempla habet curatorum à vehementissimo totius abdominis, itemque à sævo ventriculi dolore: item *eodem loco* habet exemplum ingentis doloris stomachi, qui per intervalia, præsertim à cibo assumpto, usque ad scapulam se extenderit ex sympathia cum ventriculo, cujus orificium superius alligatū septimæ dorsæ vertebrae; qui dolor insignis. guttis olei destillati succini subito fuit curatus. Huic simile est oleum anisi & cumini.

Et hæc conveniunt in specie in anxietatibus vagis.

Quod si percipiatur, simul ardor in regione stomachali, tunc modo dictis aromaticis commodè adduntur blanda acida, quæ ardorem refrænant, v. g. succus & syrupus granatorum acidorum, rob & syrupus cydoniorum, succus Citri, syrupus acetositis Citri, & speciatim spiritus nitri dulcis, imprimis ex spiritu nitri cum duplo spiritus anisi dulcificatus; & similia.

Si oriatur Cardialgia & stomachi anxietas à succis acrioribus, acidis, ex bile porracea & æruginosa, prassina dicta, in qua acidum cum alcali effervescebat dominatur, eadem propinantur acidum effervescebat destruentia: v. g. testæ cochlearum marinarum, mater perlarum, pulvis Marchionis, Corn. Cerv. ustum, ebur ustum, lapilli cancerorum, in specie Crystallus præparata: v. g.

*R. Crystall. mont. præp. 3j.*

*Corall. rub. præp. 3j. vel 3ss.*

*Corn. Cer. utriusque præp. 3ss vel 3 ij.*

*Laud. opiat. gr. ij. vel iij.*

*M. pro tribus dosibus, S.*

*Pulvis dolorem sedans.*

*R. Nutr. perl. præp. vel corall. rub. præp.*

*Cinnab. antimonii vel nativ.*

*Antim. diaphor. martial. an gr. viij.*

*Laud. opiat. gr. j.*

*Olei destillat. caryophyll. gutt. j.*

*M. f. Pulvis, S.*

*Pulvis dolorem sedans.*

Capiantur hi pulveres in aqua chamomillæ, imprægnata cum essentia castorei.

Nempè in tali bili æruginosa, teterrima symptomata ventriculo inferente, crystallus montana præparata specificum alexipharmacum bilis æruginosæ rectè dicitur LANGIO, qui adhuc loquitur more Veterum; licet difficulter solvatur per menstrua, tamen convenit, ut destruat acidum corrosivum in his prædominans.

Si mucilago viscidior Cardialgiā inferat, addenda erunt tartarea, & gummata, ut cremor tartari, & gummi ammoniacum.

Pertinet huc Cardialgia intensissima & periculosissima, nata ex hausto mercurio sublimato, in qua convenit oleum amygdalarum dulcium cum lacte mistum. Quidam solo la-

*Essent. Oper. Tom. II.*

te; quidam verò cum oleo tartari per deliquitum temperato, utuntur pro potione, cujus historiam & curam refert VALERIOLA *l. 1. Obser. 7.*, qui casus cum sit singularis, & non inelegans, ejusdem remedia paucis communicabo.

Primò præscripsit Fomentum exterius proficuum:

*R. Fol. hyosc. albi*

*Absinth. Rom. an. M. ss.*

*Mastic. 3 iij.*

*Crystall. puriss. 3 ij.*

*Coquatur in*

*Ol. rosar.*

*Violac.*

*Liliac.*

*Anerbi an. 3 iv.*

*Vini rubri ss.*

ad humiditatis consumptionem.

Coletur.

Et hoc remedio applicato mirum levamen percepit. Interim postmodum præscripsit hanc potionem:

*R. Crystall. præp. 3 j.*

(ratio quoniam acidum Mercurii sublimati arripit crystallum, & enervatur.

*Tberiac. 3 ij.*

*Butiri rec. 3 j.*

(ad demulcendam acrimoniam Mercurii sublimati)

In Decocto bordei q. s. misc. & pro aliquot vicibus propinat.

Talibus scilicet obtunditur acidum corrosivum Mercurii sublimati, ac sensilis dolor ventriculi mitigatur. Loco butyri in lacte solum propinasset.

NB. Hyoscyamus externè, & crystallus internè, perfecerunt totam curam: nam crystallus externè in fomento nihil præstat, nititurque ejus tutor hypothese vulgari. Per crystallum montanam etiam curata est à THONERO in jure gallinaceo usurpatam. SCVLTEVS in *Arman. Chir. P. 2. Observ. 59.* terram sigillatam cum syrupo consolidæ majoris in erosione ventriculi dolorifica ut singulare remedium commendat.

Pertinet huc suo modo elegans casus, quem habet THONERVS in *Observ. 2. pag. 136.* de dolore ventriculi punctorio, qui fuit curatus per 3 ij ss. Olei amygdalarum dulcium, in jure galli propinati; quo factò intra 3. horas acicula per vias urinarias fuit excreta, & exinde dolor omnis subito disparuit. Facit huc etiam, quando oritur similis dolor ex deglutitis vitri frustulis, aciculis, aut similibus, ubi conveniens est, ut usurpetur puls pinguis ex milio aut oryza facta, eaque non nimis fluxilis, sed aliquantisper spissa, quæ assumitur absque subsequente potu; sic enim fit, ut huic puli involuta frusta vitri vel aciculæ, aut similes res acutæ mistæ puli, citra noxam ex ventriculo per pylorum dilabantur.

Reliquæ causæ appropriata sua exigunt remedia; hinc v. g. aquæ salis potu cardialgiā ab hirudine curatam refert RHODIVS *Cent. 2. observ. 72.*

In Cardialgia à vermibus

*R. Elix. propriet. sine acido 3 ij.*

*Spir. sal. ammon. 3 j.*

*M. S.*

*Elixyr stomachale.*

*R. Essent. absinth. tartarif. 3 ij.*

*Spir. sal. ammon. 3 j ss.*

*M. S.*

*Essentia stomachalis.*

In doloribus ventriculi senum gravioribus, aut etiam in aliis Cardialgiis cum gravi virium dejectione & Lipothymia junctis, elegantes sunt pilule Poterii, quas describit C. 3. c. 30. ita:

*R. Ambra gris. gr. ij. vel iij.*

*Moschi*

*Croci Orient. an. gr. j. vel ij.*

*Opri Thebæ. (ritè præpar.) gr. iv.*

Misc. f. pilule. quæ in senibus & viribus dejectis sunt convenientissimæ.

Idem POTERIVS citato loco C. 31. habet exemplum diurni doloris ventriculi, aliis omnibus irritis tandem decocto ligni sassafras per 20. dies continuatos curati.

Item absinthium eiusque essentia senibus vigilantibus prodest: Sic ZACVTVS LVSITANVS *lib. 2. Med. Princ. Hist. 58. observatione 10.* exemplum habet de

F 2 impor-



importuno ventriculi dolore potu vini absinthitis curato. **WEDELIUS** Essentia suæ carminatiuæ addit essentiam castorei & anodynæ, cum oleo caryophyllorum gutt. j. vel altera: valet & in singultu & in inflammationibus ventriculi, dosi gutt. XXX: miscet cum elixyr proprietatis, quando cruditates ventriculi adsunt. Descrip-tionem Essentia huius Carminatiuæ videb. in eius Opiol. pag. 119.

Quod attinet Externa: interdum hic maximè conueniunt Linimenta suuolentia ex oleis imprimis destillatis concinnata, quorum compositio est facilis: vig. ex oleo chamomillæ destillato, item Mastichis destillato, macis, caryophyllorum, & guttulis quibusdam olei destillati cin-namomi: quæ si acria fuerint, excipiuntur cum oleo cha-momillæ infuso, mastichis, nardino, & oleo stomachali Cratonis, item cum oleo nucis Moschatæ expresso in mul-lieribus; item Balsamo Peruviano: addi etiam potest ole-um destillatum succini ob convulsiones stomachi, quibus resistit. Modus præscribendi est hic:

R. Olei destill. chamomill. 3j.  
Macis,  
Caryophyllor. an. ʒss. vel gutt. xv.  
Balsam. Peruviani 3ss.  
Cum olei expr. nuc. Mosch. q. s. f. Balsamus.

D. S.  
Balsamus stomachalis externè adhibendos.

Vel  
R. Olei stomach. Craton. 3ij.  
Destillat. succini 3j.  
Angelic.  
Caryophyll.  
Macis an. gutt. iv.  
Cinnam. gutt. ij.

M. D. S.  
Oleum dolorem sedans.  
R. Olei destill. bacc. iuniper. ʒj.  
Caryophyllor.  
Macis an. gutt. vi.  
Expr. Nuc. Mosch. q. s.  
M. S.

Balsamus dolorem sedans.  
Illinatur regio præcordiorum, imponendo desuper late-rem calefactum.

Item  
R. Olei expr. nuc. Mosch. ʒij.  
Destill. absinth.  
Mentha,  
Caryophyllor. an. gutt. v.  
Balsam. Peruvian. gutt. vj.  
M. D. S.  
Balsamus stomachalis.  
R. Olei expr. nuc. Mosch. ʒij.  
Destillat. caryophyll.  
Mentha, an. gutt. v.  
Balsam. Peruvian. ʒj.  
M. D. S.  
Balsamus stomachalis.

Post linimenta externa conueniunt ulterius Emplastra, regi-  
oni stomachi applicanda: quæ inter elegans est Empla-  
strum carminatiuum Mynsichtii; item, si suspicio sit fla-  
tuum, emplastrum de baccis lauri. Ex omnibus excellit  
Tacamahaca, per experientiam **POTERII** singulariter  
commendata in L. 3. c. 32. v. 240., quæ sola in forma Empla-  
stri regioni stomachi applicata, acerbissimos dolores cura-  
vit, & hactenus crebrâ experientiâ eius usus fuit confirma-  
tus; quod etiam fuit in frequenti usu **D. MICHAELIS**:  
Loco eius sumi potest gummi carannæ, non minoris effi-  
caciæ: Præscribitur vel simpliciter ita:

R. Tacamahac. vel gummi carann. p. ij.  
Theriac. part. j.

Liquefacta in mortario calido, misceantur pro emplastro;  
sic sistit dolorem; quod malaxetur cum Oleo destillato succini  
in convulsione stomachi; vel loco Theriacæ tacamahaca  
misceatur cum p. j. Balsami Peruviani pro confortatione  
stomachi. Inducatur super alutum in forma scuti stoma-  
chalis, S.

Emplastrum stomachale.

Applicetur ut adhæreat. Non autem prius sindone obdu-  
catur, potius nudè imponatur. Si illud auferre velimus,  
illinamus oleo calido. Est nobile remedium in huiusmodi  
affectibus stomachi, in specie in Cardialgiis; unde Empla-

strum stomachicum de Tacamahaca **Schræderi** commodissimè  
usurpari potest. Ipse **POTERIUS** circa finem Pharm.  
spagyrica excellens habet Emplastrum ex Tacamahaca  
compositum pro affectibus stomachi hac forma:

R. Olei destillat. mastich. 3ss.  
Mentha,  
Absinthii,  
Nuc. mosch.  
Caryophyll. an. 3j.  
Tacamahac. 3ijss.  
Cera Carr. 3iv.  
M. f. Cerorum.

de quo accipiat q. s. pro scuto stomachali.

Item conuenit Emplastrum ex ana tacamahaca & ceroti  
stomachalis Cratonis, quæ liquefacta in mortario calido  
malax. cum Balsamo Peruviano.

D. S.

Emplastrum stomachale.

Iam quoque omnia, quæ de tacamahaca dicuntur, Intelli-  
genda etiam sunt de gummi carannæ, nobilioris forsitan  
usus: vel ex ana gummi carannæ & tacamahacæ, in morta-  
rio calido liquefactorum, & cum Balsamo Peruviano mala-  
xatorum, sit Emplastrum induendum in alutam in forma  
scuti stomachalis, & imponendum regioni stomachi. Cæ-  
terum videatur, quod attinet naturam gummi carannæ &  
tacamahacæ, **MONARDES** de simplicib. Lomm. in  
Clus. p. 318.

Denique post huiusmodi Emplastra usurpantur externè  
etiam Fotus vel Fomentationes ex aromaticis, absinthio,  
mentha, hyssopo, floribus chamomillæ simplicis &  
Romanæ, origano, majorana, semine fœniculi, car-  
vi, baccis iuniperi, &c. regioni stomachi applicandi:  
lique duplici sub forma, aut ut species coquantur in aqua  
& aceto, aut in vino, & istud decoctum pannis linteis tri-  
plicatis aut quadruplicatis applicetur stomacho; vel ipsæ  
species insuntur sacculo, coquantur parumper aquâ vel  
vino, & ita sacculus applicatur regioni stomachi, subindè  
renouandus. Fotus potest esse talis, quem commendat in-  
ter alia **FORESTUS** in L. 18. observ. 22; ad cuius imita-  
tionem

R. Herb. absinth. nostrar.  
Pont.  
Flor. chamomill.  
Meli or.  
Rosar. rub.  
Herb. mentha an. M. j.  
Sem. anisi

Carvi an. 3ss.  
Coque in s. q. aqu. comm. Colat. ʒss. adde  
Theriac. 3ss.  
Aqu. rosar. 3ij.  
Aceti rosar. 3jss.

M. pro Fotu, ventriculi regioni applicando. S.  
Fotus externus.

Sacculi sunt meliores ita:

R. Com. absinth.  
Herb. majoran.  
Flor. Chamom. Rom. an. M. j.  
Bacc. juniperi cont. 3vj. ad 3j.  
Sem. anisi,  
Carvi,  
Cumini,  
Fœniculi an. 3ijss.

Incisis & contusis impleatur sacculus oblongus interpassan-  
dus, qui ebulliat in Vino aut Aqua, & ita; quàm cali-  
dè fieri potest, imponatur regioni stomachi, repetendo  
crebrius.

D. S.

Sacculus externè applicandus.

Vel

R. Comar. absinth.  
Herb. majoran.  
Mentha an. M. j.  
Flor. Chamomill. M. Rom. ij.  
Bacc. juniperi cont. 3ss. vel 3vj.  
ad j.  
Sem. anisi,  
Carvi,  
Dauci,  
Fœnic. an. 3ijss. vel 3ij.

Inc-



Lacina & contusa includ. sacculo interpassato. S.  
*Species ad forum.*

Coquantur in vino, & tepide cum spongia applicetur stomacho: vel sacculus probe calefactus irroretur cum Oleo destillato succini, menthae, vel Chamomilla, & applicetur.

R. Herb. origan.  
Rorismar. an. M ij.  
Rad. acor. veri,  
Galang. an. 3 ss.  
Caryophyll.  
Cinnam.  
Macis an. 3 j.  
Bacc. lauri,  
Sem. anisi,  
Carui,  
Fenicul. an. 3 ij.

Lacina & cont. includ. sacculo, qui Vino generoso ebulliat, & applicetur. S.

*Species ad forum.*

Omnibus in casibus satisfaciet hyoscyamus, quem in Cardialgia scorbutica praepimis commendat DRAWLZIUS una cum aliis anodynis: c. g.

R. Fol. hyosc. albi,  
Malva sub prunis cocta & debite pistat.  
an. 3 iij.

Farin. bord.  
Lent. ana, cum Decocto lent. ad debitam  
consistentiam reduct., 3 ij.  
Muc. tragac. 1  
Sem. psyll.  
Cydon. an. 3 ij.  
M. f. Cataplasma, S.  
Puls. dolorem sedans.

Quod si dolor stomachi & ventris sit occasione refrigerationis corporis externae, & inde natorum flatuum, tunc conveniens est, simplex quidem, sed admodum bonus, sacculus Montagnanæ. Formula est hæc:

R. Furfur. M. iij.  
Mili rosii M. ij.  
Salis comm. decrep. M. j.  
Misceantur.

Calefant in sacculo, & applicentur.

In Colica, quoque est elegans.

Mulieres interdum vitio, ut putant, matricis, & eius occasione impuritatibus congestis, contumaces dolores in orificio ventriculi superiori percipiunt, quos in casu tali tollit sequens:

R. Vnguent. pomat. 3 ss.  
Sevi hircin. 3 j.  
M. f. Linimentum, S.  
Vnguentum lenitivum.

Quibus inungatur serobiculus cordis manè, meridie, & vespere aliquot diebus.

Pertinet huc etiam doloris ventriculi peculiaris species, œsophagum simul molestant, Ardor stomachi, quem Germani vocant den Soods.

## CAPUT III

### D E

## ARDORE VENTRICULI.

Non raro enim ebullit præter naturam in stomacho materia excrementitia, unde insignis ardor & dolor stomachi percipitur, ut quasi copiosi fumi sulphurei per gulam ascenderent. Malum hoc à primaria passione vocatur *Ardor stomachi*, iis verò, qui Germanos sectantur, *Soda*.

### PARS AFFECTA.

Subiectum est stomachus ratione contentorum, & orificium sinistrum cum œsophago ratione æstus.

### CAUSÆ.

Causa ejusmodi proxima est effervescencia nimia in stomacho, orta ab acido vitioso nimio, effervescente cum quodam alcalino pingui seu oleoso, & cruditate nidorosa. Acidum enim & alcali, dum effervescent, inducunt ardorem

Ettmüller. Oper. Tom. II.

plus minus intensum, prout plus vel minus olei vel sulphuris ipsis adjunctum fuerit. Nam effervescencia sola non infert ardorem; si autem oleositas adest cum effervescencia, tunc talis calor intensus emergendo ascendit, siue bilis regurgitet in stomachum, siue sint assumpta biliosa, vel alcalina, vel nidorosa &c.; quod alcali simplex non facit, nisi addatur oleosum, quod patet per mechanicam.

Causæ remotæ sunt variae: quædam respiciunt nunc acidum, nunc alcali urinosum; unde alimenta vel nimis acida, v. g. Vinum, acetum &c., vel pingua assumpta, cruditati nidorosa ansam præbentia, ardorem ventriculi excitant. Hinc ii, qui sunt iracundi, aut quibus facile acrior bilis ex duodeno in stomachum regurgitat, obnoxii semper huic affectui propter effervescenciam bilis cum acido stomachi, tunc temporis vitiosi, obortam: item hypochondriaci plures in quibus similiter acidum in stomacho prædominatur, quando mellita, aut saccharata, & alia dulcia facile accenscentia assumunt, propter horum facilem effervescenciam cum acido facile sodam incutunt: imò etiam aromatica, aut acida, v. g. allium & cepæ, assumpta copiosius, effervescendo cum acido, non raro sodam inducunt. Plura, quoad causas, dixi supra de Cruditate acida.

### DIAGNOSIS.

Signa diagnostica ex ægrorum relatione patent; quando nempe circa præcordia conqueruntur de dolore granatiuo, sub forma aquæ ebullientis sensim sensimque adscendentis, & fauces interiora versus constringentis: quem dolorem etiam ructus nidorosi & amarescentes tandem, committantur.

### PROGNOSIS.

Nil habet in recessu, imprimis qui post alimenta assumpta observatur, cum facile cesset: quitamen sine causa manifesta affligit, morbum Chronicum ut plurimum constituit.

### CURA.

Occurrimus facile sodæ, modò temperemus maturæ acrimoniam humorum effervescencium, aut destruamus acidum vitiosum, subjungendo, si opus fuerit, vel Vomitorium, ad quod tamen raro recurrimus; vel laxativum.

Conveniunt igitur v. g. lapilli cancerorum, uti & ebullitum, bolus Armena, corallia præparata, lapilli carpio-nium vel percarum, crystallus præparata, lac luncæ, unicornu fossile & similia. Præ cæteris creta & terra marialis; hinc species diacretæ, & morsuli de creta Mynsichti sunt expertissimi; vel horum loco

R. Crete præp. 3 ij.  
Nuc. mosch.  
Ebor. viti præp. an. 3 j.  
Vinc. fossil.  
Corall. rub. præp.  
Lapill. Cancr. præp. an. 3 ij.

Cum 3 iv. vel vj. Sacch. in aqu. portul. solut. f. Morsuli.

Quibusdam usitatum est etiam lateres combustos intensius rubescences pulverizatos cum saccharo mistos, aut in morsulos redactos propinare; nam & hi, quoniam participant de terra Martiali, unde rubedo, potenter compefcunt quæcunque effervescenciam. Album græcum seu ster-cus canis ossa vorantis à multis est probatum. Quibusdam etiã in usu est siliqua ceracea comesta, quæ sodam solet brevi suffocare. Conferua fructuum cynosbati ad 3 j. dosi auellanae ejusdem magnitudinis insigniter convenit: sed hic observetur, quod fibrillæ istæ in interiore parte fructus, quibus adhærent semina, non sint separandæ. Syrupus & conferua ex summitatibus quercus commendatur ab HORSTIO l. 4. Observ. p. 194. Portulaca, ejusque succus, & syrupus, aut ipsa planta recens assumpta, sunt egregia; ut & succus sempervivi: nitrum etiam depuratum vel antimoniatum in aqua florum sambuci solutum, itè cremor tartari ad 3 ss. datus, quo ardor ventriculi iam desperatus fuit sublatu: v. M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 210. p. 386: vel specificum illud KERGERI de ferment. contra febres, corallia nempe cum cremore tart. v. g.

R. Crem. tart. 3 j.  
Corall. rub. præp. 3 j. vel 3 ss. ad 3 ij.  
M. Pro dosibus auarior, S.  
Pulvis vaporans.



His denique addatur nux Moschata, quia oleo temperata est. Ex his variae possunt fieri formulae, E. g.

*R. Creta prap. 3 lb.  
Corn. Cervi usti prap. 3 i  
Corall. rub. prap. gr. xv.  
M. pro dosibus duabus, S.  
Pulvis vaporans.*

*R. Creta prap.  
Farin. later. an. 3 lb.  
Nuc. Mosch. gr. v.  
M. f. Pulvis, S.  
Pulvis vaporans.*

*R. Arcan. dupl. 3 ij.  
Off. sep. pulv. 3 i  
Nuc. Mosch. gr. vj.  
M. Pro dos. duabus, S.  
Pulvis vaporans.*

*R. Arcan. dupl. 3 lb.  
Creta prap.  
Vnicorn. fossil.  
Nuc. Mosch. an. 3 lb.  
M. f. Pulvis, S.  
Pulvis vaporans pro aliquot vicibus.*

*R. Spec. diacreta Mnsf. 3 i lb.*

*Arcan. dupl.  
Nuc. Mosch. an. 3 lb.  
M. S. ut antea.*

Vel

*R. Creta albidissim. prap. 3 lb.  
Corall. rub. prap.  
Ebor. usti prap.  
Crystall. prap. an. 3 lb.  
Nuc. Mosch. 3 lb.  
M. f. Pulvis.  
D. S. ut antea.*

Vel cum f. q. Sacch. f. Mosch.

*R. Conf. Summ. querc. 3 i  
Creta prap. 3 lb.  
Nuc. Mosch. 3 lb.*

Cum f. q. Syr. portul. f. Eleusarium.

Inter Evacuancia, temperatis succis & sedato effervescentiae motu, optimi sunt Tamarindi in Decocto, aut Infuso usurpati; laxant nempe & refrigerant egregie, ac in biliosis hunc affectum sedare solent: vel usurpetur Rhabarbarum aliave similia: vel ubi purgatione validiore opus,

*R. Mass. Pilular. de ammoniaco Querc. gr. xij.  
Magistev. jalapp. gr. iij.  
Scamm. sulphurat.  
Extr. troch. alband. an. gr. ij.  
Cum Elix. propriis. f. pilule.*

Habuius symptomata ventriculi dolorosa: sit nunc

## S E C T I O VIII.

D E

### FÆCUM ALVINARVM A CHYLO SEPARATIONE, ET SVCCORVM PANCREATICI ET FELLEI EFFERVESCENTIA VITIOSA.

**D**E hac communiter altum apud Autores est silentium, nihilominus necessum est, ut de ea agatur. Praesuppono hic ex Physiologicis, quod Chylus tenuis in stomacho ex alimentis productus elaboratur successivè per pylorum in intestina, apparenter quidem homogeneus, cum tamen non paucae partes heterogeneae, & economiae animalis conservandae ineptae, subsint, in intestinis, antequam aliorum pergant, probè separandae. Nempe habet se Chylus ad instar lactis, in quo ad sensum, licet homogeneo, faeculentiae tamen caseosae subsunt, in intestinis precipitandae. Separatio hæc fit mediantibus duobus hisce succis, bilioso & pancreatico, in fine duodeni & principio jejuni in intestina effusis, ibidem chylum diluentibus, blandam in & cum eodem effervescentiam excitantibus, eundemque alterantibus, & ita simul crassiores, viscidiores, & quasi caseosas eius partes precipitando, per alvum evacuando separatibus: ita sicut chylificatio in stomacho fiat beneficio fermenti salini volatilissimi acidii, ita & faecum separatio fiat in duodeno à fermento bilis primario, licet & lymphæ pancreaticæ etiam aliquid conferat. Si sit, ut videtur hic alteratus chylus in intestinis & depravetur, non possunt non exinde emergere varii morbi: Aut enim nulla planè sit faecum separatio, & alteratio, ut in fluxu icterico, item cæliaco sufficienter patet; de quo negotio videatur SYLVIVS in Dissertat. Medica 2; in icteri specie enim ex obstructo folliculo fellis excrementa sunt candida, unde corporis tabescentia: Vel peruersa sit separatio, unde Massa sanguinea caecochymica. Bilis quidem excrementorum Catalogo male olim fuit adscripta, cum in se reverà balsamicus sit liquor, & condimentum quasi balsamicum, chylo pro ipsius & totius Massæ sanguineae conservatione ab omni corruptione putredinali additum, instar Myrrhæ cuiusdam alo. svè: unde & vermium facilem ex chylo generationem, quantum possibile prohibet: vid. H E L MONTIVS Tra. Sextplex Digest. Præterea quoque bilis sale suo volatili oleoso, seu essentiali eius constitutio, si quid manifesti & præternaturalis acoris adhuc in chylo deprehendatur, hoc, utpote toti corpori hostile, destruit, & in calsum terrium volatile transmutat. simulque chylum totum optime diluit, & fluxiliorem ac liquidorem reddit, & ita per accidens faecum excretionem simul nonnihil promouet.

Nec improbabile est, alii quod asserunt, bilem oleositate sui sulphurea occulta, ut in se appareat flava, quasi tingere chylum, adeoque primam pro faciliore in sanguinem transmutatione dispositionem addere, ut hujus sulphurem Tincturæ medio exaltari facilius, ac in rubrum sanguinem converti possit; cuius defectu Cachexiæ & leucophlegmatiae anasarcae, & quædam hydropes ex parte oriri videntur: sicut pictores, quando colores lucidiores volunt reddere, addunt sel seu bilem; cum omnis color ruber ex sale volatili cum oleo volatili digestis constet; non secus ac ex sale volatili cornu cervi & spiritu vini fit Tinctura rubicunda: Ergo in cachexiis, anasarca &c., sæpius bilis deficiens ex deficiente hæmatosi oritur.

Concurrunt cum bile eodem in loco succus pancreaticus, subinde acidus, plus minus tamen, in animalibus repletus, qui chyli dicto modo à bile alterat: crassiores & quasi caseosas partes leniter coagulando precipitat, & blandâ quadam cum bile fermentatione, quæ in statu præternaturali subinde in effervescentiam degenerat, dictarum faecum separationem insigniter adiuvat: De hoc succo, adeoque ipso pancreate, vid. GRAFFIVS Tra. de succo pancreatico, item SCHWALBE Tra. de Pancreas Pancrene. Hi duo succi, bilis nempe, constans sale volatili oleoso, & succus pancreaticus, constans acido temperato, subeunt chylum, hunc attenuant, incidunt, resolvunt, & facta blandâ fermentatione, crassiores ac faeculentiores partes à reliquis tenuioribus temperatis & nutritivis separant, & hæc posteriorestranscolantur in vasa lactea.

Chylus ita in intestinis tenuibus alteratus & perfectus, & à scybalis recrementosis separatus, motu intestinorum peristaltico successivè secundum eorum ductum promouetur, ita quidem, ut succus tenuior nutritivus intret vasa lactea, faeces verò precipitatae ulteriori motu per intestina crassa, in quibus debitam consequuntur consistentiam, usque ad intestinum rectum protruduntur, & ita foras emittuntur. Iam verò in interno intestinorum pariete imprimis considerabilis est mucus eadem intestina oblinens, qui nil aliud est, quam crassior Chyli pars (dum ejus tenuiores portiones per intestinorum foraminula ranscolantur) relicta, quæ oblinendo intestina ab illorum succorum acrimonia eadem defendit, simulque lubricando chyli faecumque motum faciliorem reddit.

Ana-



Anatomen tamen intestinorum exactam videbitis in WILLISII *Phasim. Rationali*. Motus peristaltici seu lumbricalis visibile exemplum videbit. In HELMONTIO *Tract. de Flaz. §. 48*. Ab hac chyli in intestinis perfectione, & chymi nutritivi à feculis sæculentis separatione, maximè vita, vel sana vel agra, dependet, post legitimam nempe stomachi digestionem: aliàs enim, si nihil separatur utilis ab inutili, frustratur corpus suo nutrimento; sin. verò vitiosè separentur, ita ut maneant excrementa Chylo permista, & ita subintrent massam sanguineam, nil aliud, quàm insignis huius caecochymia vel vitiosi limus sanguinis status, expectandus venit. Certe multum in recessu habet status vel naturalis vel præternaturalis succi fellei & pancreatici, & ab his vel legitima vel vitiosa chyli perfectio, & ab eorum invicem concursu naturalis vel præternaturalis facta fermentatio, ita ut dispositivè & excitativè ad morbos quoscunque ferè concurrant horum succorum vitia, vitiatam plus minus stomachi digestionem præsupponentes; vitæ enim fundamentum consistit in crasi sanguinis.

In hoc certè puncto, imprimis ex vitio horum duorum succorum in duodeno, & ibidem blandè obortæ effervescentiæ, chyli secretionem, & sic porro, maximam partem morborum, in specie chronicorum, & omnia in intestinis obvia symptomata, originem ducere, quam plurimi Moderni statuunt, quos inter præprimis est SYLVIUS, qui cum magno satis applausu suo tempore Triumviratum hunc statuit intestinale, nempe ex bile flava, & succo pancreatico, & denique ex pituita, composita partim ex saliva continuò deglutita, partim ex reliquiis chyli in stomacho digesti, & per intestina transcolati: adeò, ut ex stomacho, digestionem vitiatà, in specie cruditate acidà, & ex vitiosa constitutione horum duorum succorum tantum non omnes morbi chronici originem suam ordinariè habeant.

Nam hæc tria, si rectè se habeant, blandam ac temperatam in intestinis excitant effervescentiam; sin. verò vitiantur, tunc vitiosè separatur à fecibus alvinis chylus, qui ab eorum vitio, imprimis à bile, inquinatus & depravatus, similiter Massam sanguineam, & tandem totum corpus, inficiet & inquinabit, unde varia mala nunc abdomen affligunt, nunc successivè in totum corpus redundant: hoc enim in loco non tantummodò radicem paroxysmorum febrium intermittentium, sed præterea colicæ, diarrhææ, Mali hypochondriaci, suffocationis sic dictæ vterinæ, & similia quam plurimorum, statuit. Nam si succi permisti, per necessitatem naturæ iniolabilem effervescentiam inducunt, ex eo, quoniam impossibile est, ut sal volatile, quale est in bile, & acidum, quale est in succo pancreatico, concurrant sine effervescentia: quæ tamen, his succis legitimè constitutis, est blanda & temperata; his verò succis vitiosis, eadem est vehemens & impetuosà, aut inter se mutuo, aut etiam cum Chylo, imprimis si hic nimis acidus, nec ritè volatilatus fuerit, ut in hypochondriacis contingit: hinc scilicet est, quod tunc Hypochondriaci sæpè sub hypochondrio dextro, ubi nempe hi succi inferuntur in duodenum, patientur varia symptomata abdominis, nunc phlogoses & ardores, ex bile præprimis nimis copiosa & nimis oleosa, nunc verò per fermentationem talem vitiosam in pituita ab acido vitioso factam oriuntur status, rugitus, murmura, ructus, borborygmi, distensiones, & similia quamplurima abdominis symptomata, qualia, v.g. in Hypochondriacis sæpius observantur. Imò Cachexiæ, icteri cujuscunque species, si non ex stomacho, quod rarius fit, ut plurimum ex vitiosis his duobus succis, vitiosam cum chylo effervescentiam, & præternaturalem fæcum separationem constituentibus, radicaliter oriuntur: dum v.g. in iracundis, in terribis, &c. varia abdominis symptomata, dolores, æstuationes, diarrhææ & similia symptomata contingere solent, oriri hæc ipsa videntur ex vitiosa effervescentia horum duorum succorum, per animi motus, indeque natam sanguinis vitiatam fermentationem, præter naturaliter constitutorum, & vitiosè ex suis fluctibus dejectorum.

S A U S Æ.

Cause verò, quæ Chyli hanc perfectionem in intestinis, & debitam à sæculentis separationem depravant, est vel ipse chylus vitiosè in stomacho genitus, vel est vbi

etiam succi fellei, aut pancreatici, vel utrorumque, vel saltem alterius vitiatorum: quibus subinde accedit etiam suo modo mucus iste pituitosus, intestinorum parietes naturaliter aliàs oblinens.

In chylo ipso est, si hic depravate digestus, & quidem pro ratione vitæ gentis sedentariæ, scilicet ubi ut plurimum laboramus cruditate acidà; exinde enim & mucus viscidus in intestinis & toto corpore generatur, qui ineptus est pro suscipienda fermentatione.

Secundum vitium est in bile, ejusque sale volatili oleoso, quod non ritè se habens, non ritè transmutat chylum in salsum tertium, nec fæces separat.

Primaria autem bilis vitia sunt:

1. Quando abundat, chylus cum illa dilutus fit nimis oleosus; & tunc expurganda est.
2. Quando eadem nimis acris & salina est: tunc vel acidis blandis, v.g. spiritu vitrioli, nitri, & salis dulcibus, aut succis acidis vegetabilium, citri, ribium &c. præcipitanda & corrigenda; vel oleosis volatilibus obtundenda: Acidà enim dulcificata conjungunt se cum bile, & illam temperant.
3. Quando eadem est oleosa nimis & pinguis, ratione cujus obtunditur acrimonia salina maximè necessaria; & tunc salibus volatilibus, aut acrioribus aut aromaticis, acuenda.
4. Quando deficit, vel simpliciter in folliculo selleo, vel quando non deferretur ad intestina ob mucum orificii, cuiusque oppilationem à calculo, (deficiente bile deficit secretio fæcum,) aut iners est, spirituosus aromaticis volatilibus salinis oleosis, v.g. spiritu salis ammoniaci, Corn. Cerv., essentia absinthii, centaurei minoris &c. est similiter restauranda.

Lympha pancreatica peccat:

1. Quando abundat; & tunc evacuanda.
2. Quando, quod frequentius accidit, est nimis acidà, aut nimis austera (ratione cuius austeritatis pertinentes alvi obstructions, dolores intestinorum torquentes, & suffocationes uterinæ oriuntur) similivè vitioso sapore impregnata; tunc alcalia, tam fixa, ut sal centaurei minoris, absinthii, sal tartari, quàm volatilia, ut spiritus salis ammoniaci, sal volatile urinæ, Corn. Cerv. &c. acidum istud absorbendo; ita omnia terrea, ut creta, corallia, lapilli cancerorum, & metalla Martialia, Antimonium diaphoreticum, &c. absorbendo vel aromatica seu volatilia oleosa, ver. gr. castoreum, galanga, Zedoaria, olea aromatica destillata macis, caryophyllorum; spiritus vini, & similia, blandè obtundendo, eam corrigent.
3. Quando deficit: & tunc blandè acidà succilia, aut spirituosà, qualia acidà vegetabilia, spiritus minerales dulcificati, ut spiritus nitri dulcis, succus cydoniorum &c., speciatim alimentosa, Vinum & acetum, conducunt.

Verum cum sæpius tam complicata symptomatum sit syndrome, & etiam tam singularia horum succorum vitia & corruptiones, ut vix artificiosa conjectura Medicus cognoscere possit, quodnam primum vitium? Ob id talia, quæ omni genere hos succos vitiatos, eorumque vitiosas fermentationes corrigere valent, & quæ universaliter ferè horum vitia corrigunt, in promptu debent: qualia sunt falsa temperata, arcanum duplicatum Mynsichtii, spiritus carminativus, item acidà volatilibus permista, spiritus anticolicus seu spiritus nitri dulcis, duplo nempe aut triplo spiritus anisi junctus, & in specie opitata. Nam hæc opitata quascunque vitiosas effervescentias, ac præternaturalem succorum statum, feliciter sistunt ac tollunt, imprimis si appropriatis permista fuerint. Imprimis conducunt hic mixturæ ad imitationem Sylvii conscriptæ: e.g.

R. Aq. Cerefol.

Mentb.

Carminativ. an. 3 j.

Cinnam. 3 vj.

Acet. rusac. vel vini, vel acet. destillat. 3 j.

Lapill. Cancr. præp. 3 j.

Antimonii diaphor. 3 j.

Laud. opiar. gr. liij.

Syr. scoloib. For. 3 ss. vel 3 vj.

M. S.

Mixtura bene circumagitanda.

F 4

R. Aq.



*R. Aqu. Card. bened.*

*Endiv.*

*Membra. an. 3 l.*

*Aceti destill. 3 vi.*

*Spiritus nitri dulc. 3 j.*

*Lapill. Cancr. prap. 3 ss.*

*Antimonii diaphor. gr. xv.*

*Syr. cort. aurant. 3 ss. vel 3 vi.*

*M. D. S.*

*Mixtura bene circumagitanda.*

*Usurpetur coctileatim.*

*R. Aqu. sumar.*

*Hyssopt.*

*Membra an. 3 j.*

*Mixt. simpl. 3 j.*

*Laud. opiat. gr. ʒj.*

*Syr. fœtosyrb. For. 3 j.*

*M. pro aliquot dosib. S.*

*Mixtura bene circumagitanda.*

*R. Aquæ Menib.*

*Antiscorb. Dornier. an. 3 j ss.*

*Tinct. bezaard. 3 j.*

*Lapill. Cancr. prap. 3 ss.*

*Antimonii diaphor. gr. xv.*

*Laud. opiat. gr. iv.*

*Succi cydonior.*

*Syr. acetos. citri an. 3 ss.*

*M. S.*

*Mixtura bene circumagitanda.*

Hæc mixturæ conveniunt in dubio statu, quando nescimus, quinam succorum peccet.

*Mucos denique pituitosus peccat:*

1. Nimiâ copiâ; & tunc evacuandus per colocynthidem imprimis.
2. Nimiâ crassitie & visciditate; & tunc incidendus per salia, tam salia, tartarum vitriolatum, &c. quæ eundem abstergunt; quàm alcalia: item attenuandus & resolvendus per salina volatilia aro-

matica, in specie per gummata.

3. Quando deficit; & tunc augmentandus per alimenta viscida, aliquamdiu assumpta.

Hæc sunt primaria humorum in hoc loco peccata, quæ datâ operâ corrigenda, ne exinde mala drianas plurima; his enim causis actio bilis impeditur, chylus viriosè diluitur, & sæcum separatio impeditur sensibilibiter. Ex hisce duobus, nempe ex vitio chyli sub digestionē prima, & ex vitiata eiusdem perfectione sub digestionē secunda in intestino duodeno, emergit sors non tantum omnium morborum, & omnis cacochymia, exceptis nempe morbis à contagio, & iis, quæ dependent à parentum charactere hereditario. Alias ex his functionibus læsis primariò omnes morbi chronici, qui ordinariò obstructionibus hepatis, lienis aut mesenterii, originaliter adscribuntur; secundariò acuti, oriuntur: Sive enim peccent conjunctim, sive separatim, necessariò exinde vitiatur crasis sanguinis, unde oritur cacochymia totius corporis, adeoque efflorescunt varii morbi & symptomata: non secus ac plura mulierum circa menses vitia radicem primam circa hæc partes figunt. Unde, si quæ obstructiones, tumores, aut similia mala viscerum abdominis in chronicis morbis subindè observantur, producta potissimum morbosa asserenda sunt.

Hæc in genere præmonere volui secundum modernorum hypothesein, propterea, quia dabitur occasio, ut horum subindè mentionem injiciam: Sufficit hic, quod obiter insinuo, SYLVIVS, quoad Theoriam, in *Dissert. Medicis*, quæ bene applicabiles ad Praxin: quoad Praxin verò, idem SYLVIVS videatur l. 1. *Prax. cap. 10.* & 11. qui instar omnium. Nemo unquam hoc negotium tanto studio tractavit, præter SYLVIVM: eius hypotheseis facile sunt applicabiles, licet interdum impingat; tamen tyroni eum commendo. Occasionemumpsit ex HELMONTIO *Tr. Sextuplex. Digestis* qui Tractatus aliàs est elegans, modò corrigantur quidam errores in eo, iuxta hodierna experimenta.

Pergo ulterius ad

## SECTIONEM IX.

DE

### CONTENTORUM IN INTESTINIS EXPULSIONE LÆSA.

#### CAPUT PRIMUM.

DE

#### EXPULSIONE ALVI CONTENTORUM DIMINUTA.

#### ARTICULUS PRIMUS.

DE

#### ALVI RETENTIONE.

#### CAVSÆ.

**D**ictum est superius, quodd Chylus, seu Id, quod è stomacho dilabatur, in intestinis separetur in duas partes; quarum pars alimentitia ulterius promoveatur intra corpus per vasa lactea sic dicta; pars verò excrementitia, in intestinis relicta, post aliqualem moram extra corpus excrementorum nomine exteratur.

Expulsio hæc contentorum in intestinis læditur, tribus modis.

1. Quando diminuitur, ita ut aut rara sit, aut ad tempus omninò nulla: id quodd fit in alvi Retentione, item in tarda Ejectione.
2. Quando augetur in alvi fluxibus variis, diarrhœa, Cholera, Lienteria, Cæliaca.
3. Aut denique quando depravatur, ita ut cum dolore, cum torminibus, aliisvè similibus stipata contingit symptomatis: item quando retinenda externantur, dum loco sæcum rejicitur sanguis, vel alia, ut pus, uti fit in dysenteriis, fluxibus hæmorrhoidalibus, &c.

**Q**uod ergo attinet *Alvi Retentionem*, dum parum vel nihil aut admodum tardè fit contentorum intestinalium excretio: cujus causa est vel in ipsis contentis expellendis, vel in ipsis intestinis expellentibus.

Quod attinet expellenda contenta: hæc ipsa inferunt retentionem alvi, quando non perveniunt usque ad intestinum rectum propter deficientem peristalsin seu motum peristalticum, ut istud excretionem irritent; cessante enim stimulo, cessat alvi excretio. Nam in statu naturali fit necessariò sæcum exclusio, si sub debita consistentia molli ab intestinis per motum peristalticum protruduntur usque ad rectum intestinum, ubi stimulant alvum, quod solum sensibile nobis: in naturali statu sæces nos non urgent, nisi ed perveniant, & ab ijs irriteretur intestinum rectum.

Fit aut hoc (1.) propter eorum paucitatem ex alimentis paucis assumptis: (2.) Propter eorum ad motum peristal-



peristalticum ineptitudinem; quando enim inepta sunt in motu, fit ut stagnent in intestinis, eorumque imprimis coli, cellularis, jejuni maxime & ilei, ut non possint protrudi: vid. KERKRINGIUS *in specul. suo Anatom. Obs. 39.*

Inepta sunt ad motum contenta, tribus ex occasionibus: I. Propter eorundem exsiccationem & indurationem, v. g. ob paucitatem potus, in his qui parce vivunt, in febribus ardentibus post nimios sudores, post graviores corporis motum, &c. Assumpta etiam quadam duriora & austera similiter feces plus minus indurant, ut panis crustæ & spiræ, quæ ipsæ assumptæ nimiam copiam propter visciditatem & tenuitatem suam non raro solent duriores dare feces, indeque etiam alvi periculosissimam obstructionem: vid. MOEBIUS *Instit. pag. 453.* Sic res compertæ est, de Mespilis alvi adstrictionem causantibus, ita ut etiam epilepsia aliquando supervenerit; præprimis hoc faciunt eorum lapilli, sive ossa; hinc vulgo fructus hi dicuntur Germ. *Arsklammern.* Item ova ad duritiem cocta similiter insigniter solent alvum adstringere: Exemplum habet CORNARIUS *in suis Consil. Conf. 4.* de quodam, qui ex esu quatuor ovorum ad duritiem coctorum jejuno stomacho, insignem alvi adstrictionem passus fuit, ita ut post aliquot dies in fecibus alvi, per medicamenta laxativa eductis, adhuc integra eorum frustula vitelli & albuminis ovorum apparuerint: Item fructus nonnulli horti cum pellicula tenaci obducti & deglutiti, quales sunt uvæ crispæ, Germ. *die Stachelbeeren*: item uvæ vitis, Germ. *die Weinbeeren*, si scilicet comedantur unâ cum pelliculis: nam hæ pelliculæ admodum reluctantur stomacho in digestionem, quin crudæ & indigestæ dilabuntur ex stomacho insigniter acidæ; unde dum coacervantur cum reliquis contentis in intestino colo, fit ut exinde incrassentur, & inviscerentur contenta, ac hinc inde in globos quasi cogantur, & pertinacissima alvi obstructio ex talium pellicularum esu nimio sequitur: Sic ab esu immoderato nucum castanearum consipationem alvi obstinatam in matre lactante & infantulo lactato observavit TIMÆUS *von Galdenklee l. 5. Cap. 15. p. 215.* Item cerasa, & imprimis eorum nuclei integri devorati: vid. HELMONTIUS *Tr. sexual. Digestio*, KERKRINGIUS *Obs. 6.* SCHENKIVS *Obs. l. 3. sub Tit. de Excrementis*; ubi in elve Dreifden observavit JOHANN-FRANCISCUS HILDESIVS per tres septimanas adstrictionem alvi ob numerosa cerasa cum nucleis comesta, qui nuclei post id tempus rursus alvum subierunt: Item vita sedentaria ut plurimum duriores reddit feces propter deficientem in motu excretionem, cum intestina minus agitentur & commoveantur; hinc inde subsistunt & difficulter detrahuntur in intestinum rectum: Quies & somnus nimis multa etiam possunt: de quibus vid. HOECHSTEDTERVS *Decad. 4. Cap. 1. p. m. 336.* hinc ut plurimum Studiosi, scribæ, & virgines netrices, & sartorum famuli auctorumque (de ultimis tamen, nempe, de futurorum famulis, res non absolutæ semper veritatis est; plerumque enim largior potus vitium hoc impedit) hoc malo laborant: In quiete enim & somno languidior exercetur respiratio, ob quam tardior in intestinis motus, unde scybala sensim sensimque magis exsiccantur, imò ob excessum quietis & somni succi acidi austeri adaugentur: vid. etiam nonnulla huc facientia *sub Tit. Anorexia.*

Facit huc etiam II. Fæcum alvinarum nimia visciditas & glutinositas, pertinacius parietibus intestinorum adherens, ratione cujus subinde impedimento est, quod minus feces possint excerni: unde ii, qui copiose utuntur viscidis alimentis, sive qui eadem in pituitam excrementitiam, sive mucum viscosum, ex transmutata digestionem, transmutant, solent esse obnoxii alvi adstrictioni: aut qui mucu viscido vel acido vel austero abundant, in specie pituita, quam vocant, vitrea, alvi solent esse obstructiores; idque eo magis, quod parcius bibunt, aut quod parcius moventur; feces enim à mucu & p. vita simili involutæ & coagulata in intestinis hærent, ut hæc non sentiant stimulum fecum. Unde interdum hypochondriaci, de quibus postmodum, obstructionem alvi incurunt: In talibus enim deficiente motu, minus quasi concussis intestinis, feces retentæ pedetentim tenaciorem consistentiam acquirunt, indeque alvum clausam patiuntur.

Præterea III. Feces condensatæ & coagulata alvi obstructionem inducunt; idque ex vitio acidi, vel stomachici, vel pancreatici in intestinis prædominantis, imprimis si simul austerus plus minus fuerit iste acor. Notum enim est, quod bilis & succus pancreaticus, uti separant cremo-

rem nutritium ab excrementis, ita simul excrementis certam consistentiam tribuunt, secundum quam nunc magis nunc minus sunt fluida. Unde ubi abundans alcali oleosum bilis diluit fæces & fluxiles facit, ita acidum vel stomachi vel pancreatici vitiosum, aut nimium, aut austerum, feces istas nimis coagulat, hinc & indurat, quia impeditur activitas bilis oleosæ, facientis ad molliorem fecum. Hinc plures hypochondriaci, & quod idem est, mulieres hysterica, laborant ordinario alvo obstructa, & alvi excreta sunt ferme nigricantia propter austeritatem nimiam succi pancreatici, cujus austeritate indurata feces, diutius in intestinis subsistunt: hinc etiam in quadam Icteri specie solent aut omnino, aut maxima ex parte, indurata & condensata esse feces; hinc alvus segnis & tarda, propter bilis absentiam, (in isto scilicet ictero, ubi denegatur transitus bilis in intestina) & consequenter acidi in intestinis abundantiam.

Et hæc sunt causæ, propter quas alvus vitio secum plus minus supprimitur: supersunt causæ, quando ulterius vitio ipsorum intestinorum non sufficienter propellentium supprimuntur feces.

Vitio autem horum plus minus tardior est alvus & obstructa variis ex causis: (1.) Quando eadem non transmittunt feces, vel sunt inepta ad transmissionem, vel non sufficienter propellunt: Inepta ea sunt ad transmissionem, si ea obstructa, aut infarcta, aut nimis angustata, v. g. in inflammatione eorum; unde indurescunt & quasi nimis coalescunt: ac ordinario alvus supprimitur in tumoribus hærentibus intra vesicam urinariam & intestinum rectum, vel inter vulvam & anum in mulieribus: Exemplum vid. apud TVLPIVM *l. 3. c. 10.* Huc pertinet anus imperforatus: de quo vid. FABRICIVS HILDANVS *p. 1. Obs. 3.* BENIVENIVS & PARÆVS & JOB VAN MEEKERN *c. 22. p. 166.* Affectus autem hic parum attenditur; perforatur enim antequam cessat symptoma: Item in gangrena, in qua pellis eorum corrugatur, unde in alium est desperatum: Exemplum habet BARTHOLINVS *Cent. 6. H. 38.* de coalitu ilei ex inflammatione intestinorum, eumque subsequente gangrena, unde obstructissima alvus secuta; & BARBETTE *in sua Praxis l. 4. c. 7. p. 198.* *Obs. parva Deckers*, lethalem alvi obstructionem notat ex gangrena coli, ubi recto annectitur: Item, quando coalescunt post eorum exulcerationes, aut post dysenterias; nam post dysenteriam nonnunquam in fine coalescunt, & sub sanatione inuicem consolidantur intestina, ut exinde non raro postmodum lethalis alvi suppressio sequatur: Conf. Johannes Rhodius *Cent. 2. Obs. 77.* Marcellus Donatus *cap. 10. l. 4. pag. 361.* & M. A. N. C. *Ann. 2. pag. 149.* ubi alvus suppressa lethalis fuit ex ulcere intestini recti: Et in passione iliaca similis accedit alvi obstructio. Pariter ex crescentia carneâ in intestino quodam enata alvi obstructiones infert: conf. M. A. N. C. *Ann. 6. p. 137.* & RHODIVS *Cent. 2. Obs. 82.*

Præter hanc angustationem intestina (2.) non promouent feces, quando deficiunt in suo motu peristaltico, idque ob affectionem vel paralyticam, vel convulsivam: Quoad priorem quidem, dum resolutæ fibræ motui peristaltico sunt ineptæ & intestina sunt insensibilia, etiam cessat intestinum motus peristalticus, ut in stupore ani: nam sensu abolito intestinorum, etiam tunc temporis aut parum aut nihil excernitur & expellitur; hinc non raro frustra apoplecticis stimuletur alvus per clysmata, intestinis interdum paralyti affectis & insensibilibus redditis: Quoad posteriorem, oritur intestinum affectio convulsiva, quando ex irritatis intestinis sequitur pertinax fibrarum contractura, vel quando undecunque ipsæ fibræ intestinorum in uno alterove loco spasmus contractæ non promouent contenta, ob impedimentum peristalticum eorum motum: id quod fit v. g. in omni colica convulsiva, in colica scorbutica, & similibus intestinum doloribus, ubi fibris intestinum ratione doloris irritatis, & speciatim plus minus contractis, in loco spasmo correpto, feces hærent, unde alvus pertinacissime suppressa esse solet. Unde & serè tunc frustracriora propinantur purgantia, lenioribus magis proficiunt; cum illa, irritando suâ acrimoniam, malum exasperent; hæc autem emolliendo, intestinum sensum quasi demulcendo, magis proficiunt sunt: Sic etiam in nephritide pariter obstinata est alvus ordinario, propter consensum cum fibris intestinum spasmus convulsus, unde & tormina tunc non rara sunt. Frequens est gravidis, partui vicinis, alvi adstrictio, ob uterum & grandiolem foetum, qui intestinum rectum comprimit.



## DIAGNOSIS.

Quod attinet *signa diagnostica*, sunt hæc: si ægri raro & non quotidie, sed interdum ad aliquot dies, interdum etiam septimanas, non ejectiones feces: vid. *Obs. PANAROLLI* *Pent. 1. l. 5.*, ubi observat aliquem, qui interdum in 15. diebus, interdum ad 20, interdum post 3. menses demum solitus est exonerare alvum, sed rarum & infrequens hoc est.

Symptomata autem hujus obstructionis sunt varia: dolores abdominis gravativi, compressivi, nunc vagi, lancinantes, supervenit nausea, vomitus interdum, capitis symptomata, inquietudo, jectigatio corporis, vigilie, vertigo, & Cephalalgia.

Docent hæc, quid sit alvi obstructio!

## PROGNOSIS.

Alvi suppressio malum est frequens & quidem pro circumstantiarum conditione nunc plus nunc minus periculosa. Pertinacior si fuerit, subinde est lethale malum, nunc immediate & per se, nunc mediate, insequente nempe ileo: de quo postmodum.

Deinde si non semper insert lethum, nihilominus per experientiam quorundam patet, quod alvus pertinacius clausa subinde gravia inserat symptomata, nunc interdum animi deliquia: item quod nonnunquam in ipsa excretionem alvi superveniant ex conatu naturæ hæmorrhagiæ narium: Exemplum tale habet *SALMUTH c. 3. Obs. 26.* de alvum nimium obstructa, ita ut in excretionem scybalorum sanguis per nares profluat. Fæces in alvo nimis obstructa in intestino colo coarctatur & coagulatur interdum decipiunt medicos, ut tales ægros habeant pro splenicis: Nam vulgaris est consuetudo, ut omnia symptomata in latere sinistro seu hypochondrio sinistro adscribantur falso spleni; unde cum in latere sinistro colon sit angustius & propterea intorquetur deorsum versus renem, hinc sæpius fit, ut ibidem locorum hærentia scybala, talia inferant symptomata, quæ vulgò splenicis attribuantur, & non raro pro splenicis habentur: Exemplum talis pro splenico habiti habet *SALMUTH Cent. 1. Obs. 24. & c. 2. Obs. 98.* de quodam, in quo per annum unum & semis, scybala retenta dolorem tensivum & tumorem hypochondrii sinistri intulerunt, ut inde propter talia symptomata pro splenico fuit habitus, postmodum tamen paucis emollientibus adhibitis curatus fuit; & eventus detexit, quod tantum ab induratis scybalis ortum traxerit istiusmodi affectus: Conf. item *SYLVIUS l. 1. Prax. cap. 14. §. 57. p. 168.* *PANAROLLUS c. 1. Obs. 1.* de quodam refert qui non solum 10. 15. & 20. dies incolumis servatus est, sed contigit, inquit, *alvum ita exsiccatum fuisse, ut usque ad 3. menses sanus perfectè existeret, forsan terrestris ciborum naturæ vi conversus est in sanguinem.* Hæc ille. Imò in talibus etiam purgantia propinata, quia sunt sine effectu, ægros & Medicos fallunt; sæpius enim evenit, ut in talibus per purgantia evacuentur copiose liquida & tenuiora, ipsis crassioribus & viscidioribus fecibus ac mucos adhuc remanentibus, ut jam olim hoc observavit *SENNERTUS in Praxil. 3. ubi de Alvi Retentione pag. 202. & 285.* Hic ipse quoque *SENNERTUS de colica* observavit mucum viscidum rejectum ad instar intestini fuisse excavatum: sicut & *LIPSIUS* ex vita sedentaria, pertinacem alvi incurrit obstructionem, quam crebriori usu spiritus vitrioli sustulit; facta alvi solutione scybala aut potius mucus prodiit in longum protractus, adeo ut ipse *LIPSIUS* una cum excrementis intestina se redditurū putaret.

Tandem omnis alvi obstructio semper solet augere stomachi & capitis pathemata, & nisi in iis fluat alvus, in deterius labitur status: Unde, omnibus præmonentibus Practicis, in vulneribus capitis, in cephalalgia, in melancholicis, & quibuscunque capitis affectibus, semper opera danda est, ut sit libera alvus & aperta, non quidem propter vapores ascendentes, sed propter consensum, quem medianibus nervis copiosissimis omnia interna viscera, in specie intestina, habent cum suo principio, cerebro. Quælibet itidem mali hypochondriaci pathemata ab alvo obstructa exacerbantur.

Obstructio alvi contumaciior in hominibus tenerioris ætatis sæpius producit epilepsiam, in specie autem eam quæ dependet ex vitio excrementorum: per repletionem enim irritantur tandem intestina, & ob consensum totius nervosum convellitur.

Alvi obstructio cum passione illaca est lethalis, si non remittit.

Obstructio alvi cum passione colica morbum extremè exasperat.

Pregnantum obstructio contumaciior, reddit partum valde difficilem.

Obstructio alvi ex paralyti intestinorum ut plurimum est lethalis.

## CURA.

Quod attinet *Curam*: In ea ante omnia consideranda est causa morbosa proxima, quæ removenda; sic enim symptomata immediate solvitur: Unde

1. Fæcum contentarum ratione conveniunt ea, quæ emolliunt, earumque visciditatem & austeritatem corrigunt, adeoque fluida & mobilia excernenda reddunt.
2. Conveniunt ratione intestinorum, quæ vel eorum angustiam tollunt, vel eadem plus minus sensibilia vellicant, ac blandè stimulant; uti sunt acriscentia plus minus amaricantia & irritantia: vel denique irritationem in iis, & inde natum eorum spasmus tollunt, ut lenientia anodyna.

Ea, quæ emolliunt, sunt talia, quæ & fluxilia faciunt, & vias lubricant, ut aquosa, oleosa, mucilaginosa, dulcia, & hinc gummata. Quæ eadem stimulant & leniter irritant; sunt acris, tam salina quàm specifica purgantia, & horum instar, intense amara: fecibus enim fluxilibus & intestinis leviter irritatis, eorum motu peristaltico concitato, ejectione contenta. Quæ irritationem vel spasmus intestinorum sistunt, sunt anodyna seu lenientia, mucilaginosa & temperata, oleosa, hinc narcotica & opiata. Quæ intestinorum mala, vel curabilia, ut inflammationem, exulcerationem; vel incurabilia, ut coarctum &c. levant, ex affectus ratione patent. Quæ dictis Indicationibus satisfacit materia Medica, imprimis internæ sunt oleum Amygdalarum dulcium recens nempe expressum ad *℥ij. iij.* vel *℥v.* quod optimè & blandè alvum subducit, siue assumatur per se, siue in cerevisia calida, vel juscua pinguis: Vel

*R. Ol. amygdal. dulc. rec. expr. ℥ijss.*

*Syr. rosas. solus. ℥j.*

*M. pro Haustu.*

Sic medicamenta ex Jalappa, ex foliis sennæ, & ex scammonio prosunt: item aloetica; de quibus notetur, non esse adhibenda in frequenti alvi obstructione, uti & Rhabarbarum; quia talia medicamenta præter virtutem laxativam in se continent subsequam aliquam adstrictoriam, nisi hæc corrigantur per adjuncta Antimonialia ritè parata, & in casu externo in Clysteribus usurpanda. Sal fermentorum vitis saturatum cum spiritu salis (vocat aliàs *sal salatum*) blandè etiam alvum subducit irritando nervos. Item conveniunt insigniter ova sorbilia cum butyro assumpta, eaque, quod magis sorbilia, eò magis seu plus movent alvum, emolliendo æquè ac austeritatem corrigendo: de quo prostat *Obs. in HOEFERI Hecule Medico*, quod scilicet ova sorbilia assumpta alvum fluxilem & parvam quasi diarrhoeam in uno alterove subjecto prodixerint: vid. etiam *BARTHOLINUS c. 6. Hist. 65.* & *BRASSAVOLA de Purgantibus c. 2.* Item copiosus etiam potus promovendo contenta alvum fluidiorem reddit, quoniam aut induratas aut exsiccatas feces diluit: vid. *BARTHOLINUS Cent. 5. Hist. 40.* ubi refert pertinacem alvi obstructionem largo vini haustu curatam: id quod in specie aut hypochondriaci aut laboriosis necessarium est, item mulieribus, ut eò promptius exeant feces. Potus hic nunc est usitatus seu ordinarius alimentosus, nunc medicatus; quæ medicatio imprimis fit, quando potulenta alterantur resolutibus emollientibus & laxantibus, in specie cum passulis, quæ sunt egregium remedium ad blandè laxandum alvum, & nihil aliud, quàm mustum concentratum, temperate in se, & quæ blandam irritandam vim obtinent; unde vel passule nude assumptæ conveniunt, imprimis hypochondriaci & scorbutici, quibus alvum sustinent apertam; nam purgatio illis nocet: vel cum passulis, earumque pulpa, tantillum permiscetur cremoris tartari aut arcani duplicati; c. 3.

*R. Pulp. passul.*

*Tamarind. an. ℥jss.*

*Crysal. tartari ℥ij.*

*Trib. rad. jalapp. ℥j.*

*Scamm. sulphurati. ℥j.*

*Ant. & op. per infer. purg. ℥ss.*

Cum



Cum f. q. *syn. ros. solut. f. Elethuarium*, D. S.  
*Elethuarium laxans, sumendum mane & vespere, pro*  
*dosi quantum capiunt duo cuspides culiri.*

Vel

*R. Pulp. passul. ℥ss.*  
*Arcan. duplic. vel tartar. vitriol. ℥ss.*  
*Extr. troch. alband. gr. iij. v. vel vj.*

Cum f. q. *symp. pomor. f. Elethuarium*, S.  
*Elethuarium laxativum.*

Conveniunt ergo specificè *passula laxativa*, quarum varieg sunt descriptiones, uti videbitis in Dispensatoriis. Fiunt ex *passulis* cum *cremore tartari* & *Senna*: prescribo ℥ss. pro doli; e. g.

*R. Fol. Senna sine stip. ℥ij.*  
*Crem. tartari ℥ij.*

Decoque in aque *℥ij.* ad consumptionem tertię partis:

*R. Decoctum expressum, & infund.*

*Passul. min. ℥ss.*

Decoque ad mollitiem, & adde

*Syr. rosar. solut. ℥vj.*

M. D. S.

*Passula laxativa; 1. cochlear plenum ante cenam.*

Vel

*R. Fol. senn. sine stip. ℥ij.*

*Cinnam.*

*Gingiber. an. ℥ij.*

*Aqua endiv.*

*Vini opt. generos. an. ℥vj.*

Infunde per noctem mane bulliant ad consumptionem tertię partis: Colaturę adde

*Prun. enucl. Ungar. N. xx.*

Decoquantur cum

*Sacchari ℥ij.*

ad consistentiam syrupi: adde

*Aqua cinnam. ℥ss.*

*Syr. rosar. sol. ℥ss.*

D. S.

*Pruna laxativa.*

De prunis his laxativis ante cenam assumat patiens tres vel quatuor, juxta THONERUM *Obs. 2. l. 2.* Vinum passulatum similiter egregium est delicatulus, quod alvum adstrictam blandè educit; item *Vinum passulatum laxativum* *Timæi in Epist. 1. 3. Epist. 26. p. 624;* ad cujus imitationem MEIBOMIUS sequenti modo prescribit:

*R. Passul. min. ℥ij.*

*Fol. senn. sine stip. ℥ij.*

*Cinnam. ℥ij.*

Incisis & confus. affundit *℥ij.* vini per horas 24. de Colatura propinat ante cenam bonum haustum.

Ipsè sepe ad hujus imitationem prescribit *Decoctum passulatum cum senna*, quod ex *Diss. de dolore hypochondriaco* notum est; vidi egregios effectus; e. g.

*R. Pass. min. confus. ℥ss.*

Conquassentur in mortario, ut fiat pasta, coque in

*Ag. comm. ℥ij.*

Colaturę ferventi *℥ij.* ad *℥ij.* infunde

*Fol. sennæ sine stip. ℥ij.*

*Flor. violar. p. iij. vel sem. anis. ℥ij.*

Stent in loco calido per noctem: mane *R.* Colatur:

D. S.

*Potio laxativa.*

De quo capiatur haustus pro libitu mane, preprimis in hypochondriacis, hysteriis, affectibus melancholicis, & blandè stimulat.

Facit huc serum lactis probè depuratum, quod in febribus, tam ardentibus & malignis, quàm hypochondriacis & scorbuticis, si alvum habent obstructam, (id quod sit ex succo pancreatico nimis austero & acido coagulante feces) ac simul phlogosi ac estuatione laborant, aliisque in casibus ad alvum suaviter laxandam conducit. Ratione nitrositatis suę, in alcali volatili oleoso fundatę, temperat egregiè succi pancreatici vitiosum acidum, plus minus austerrum, ac demulcet acrimoniam salis scorbutici, simulque emollit feces, sive solitarie usurpetur, sive, si fuerit debilius, cum syrupo Rosarum solutivo adhibeatur, sive infusione & ebullitione aliquali tamarindorum magis gratum & laxativum reddatur; sicque potus erit appropriatus in obstructione alvi febrium ardentium & scorbuticarum.

Nota: alias quoque sunt Decocta vel juscula pullorum, imprimis in quibus herbę emollientes, v. g. folia malvę,

herb. parietarię, violarię, mercurialis & similia ebullierint: qualia Decocta successivè usurpata similiter blandè alvum subducunt: vid. Decoctum emolliens ex radice althęę HORSTII *Obs. p. 273.* M. A. N. C. *Ann. 3. p. 372.* BARBETTE, & HARTMANNUS: loco quorum etiam recipi potest:

*R. Rad. althęę ℥ij. ad ℥ij.*

*Herb. malvę vel brancę usq. M. j.*

*Pass. minor. ℥vj.*

Coqu. in f. q. aquę:

*Colaturę ℥ij. vel ℥ss. adde*

*Fol. senn. sine stip. ℥ij. ℥ij. vel ℥ss.*

*Cremor. tartari ℥ss.*

Stent per noctem, blandè ebulliant ad dissolut. tartari, mane iterum coletur: Colaturę adde

*Syrupi de spina cervin. ℥ij. pro lubitu, q. s.*

M. S.

*Potio laxativa.*

Est emolliens blandum, successivè alvum stimulat. Item Decoctum de Ficubus Massiliensibus seu quibuscunque aliis similiter alvum subducit, imprimis si decoquantur in potu ordinario seu Decocto hordel simplicis. Fiunt etiam conservę laxativę violarum & rosarum elegantes, quando loco sacchari his additur manna electa Calabrina, & flores recentes violarum & rosarum cum hac conjunguntur in conservam, quę mista cum pulpa passularum & tantillo cremoris tartari, blandissimè & suaviter alvum subducunt. Quod si duriores feces, aut copiosus mucus, aut viscidus, aut pituita vitrea intestina incrassarit, & alvi obstructionis fuerit fomes, nil melius est gummate ammoniaco & galbano, in vehiculo appropriato dissoluto, si ve solo, sive stimulo laxativo acuato. v. g.

*R. Ag. menth. ℥ij.*

*Gum. ammon. acet. sol. ℥ij.*

*Syr. rosar. sol. ℥ss.*

M. pro duob. dosibus, S.

*Potiuscula laxativa ad 2. vices.*

Hęc Potio in duas partes divisa sit: mirabiliter dissolvit mucum & evacuat; si verò contumacior sit alvus, acuetur hęc potio stimulantibus. Ubi ergò mucus tenax, in iis prescribo talem formulam:

*R. Ag. Menth. ℥ij. vel ℥ss.*

*Cinnam. ℥ss.*

*Gum. ammon. acet. sol. gr. xv. vel ℥ij. usque ℥ss.*

*Tartari vitriol. g. vj. viij. ℥ss. ad gr. xv.*

*Scamm. sulphurat. gr. ij. vel iij.*

vel bujus & extr. troch. alband. an. gr. j.

*Syr. de pomis, vel rosar. solut. ℥ss. vel ℥ij.*

M. S.

*Potiuscula laxativa.*

Insigniter mucum viscidum educit. In mollioribus subjectis gummi ammoniaci sufficit.

Tandem salina & tartarea remedia, ut crystalli & cremor tartari, vel solus ad ℥ij. in jusculo feruido, presertim in quo herba quędam emolliens prius decocta fuerit, propinatus; vel cum granis duobus scammonii sulphurati vel extracti trochiscorum alhandal acuatus: item horum loco etiam ipsum sal essentiale tartari an. ℥ss. ad ℥ij. usurpatum usque ad ℥ij. in vehiculo calido, vel solum vel dicto modo acuatum, aut etiam tinctura tartari legitime per spiritum vini parata pro senibus. Graviores & contumacioribus in malis ad Mercurium vivum potest fieri confugium, ad ℥ij. vel iij. pro una vice, vel in jusculo carnis pinguiore, vel in oleo amygdalarum dulcium propinatum: vid. M. A. N. C. *Ann. 3. Obs. 225. & 315.* Vel alii laudant Vinum, in quo mercurius vivus per mensem in loco tepido fuerit infusus, intercedente crebra agitatione, aut aliquamdiu ebullierit; quod Vinum, relicto mercurio, non tantum lumbricos enecat, sed insigniter alvum, etiam pertinacissimam, reserare dicitur, si ad cochleare unum vel alterum propinetur. In desperatissima alvi obstructione, irritis aliis, mirabile quidem obtinet aurū fulminans non aded exactè edulcoratū, a gr. vj. vij. vel viij. ad x. usq. cum extracto hel-lebori nigri in pilulas redactō: nam tales pilulę ex auro fulminante ceu extremum commendantur prælidium: Conf. ROLFINGIUS in *Chym. pag. 339.* Vel

*R. Syr. rosar. solut. ℥ss.*

*Aurif. fulmin. gr. xij.*

*Troch. alband. gr. j.*

M. S.

*Succus aperiens pro una vice.*

Sanè



Sanè in adulto quartanario ex gr. v. auri fulminantis, cum nitro antimoniatò ante paroxysmum propinati, effectus suavis laxationis observauit. Nitro antimoniatu torpida irritat Intestina, ut facilius fiat excretio, & respectu talis nitri adjuncti aurum fulminans mira præstat in hoc affectu. Quoties itaque animus est, hoc aurum fulminans loco laxatiui porrigere, non nimis edulcorandum, ut sapor salinus aliquantisper remaneat: nam quò magis est edulcoratum, eò magis est diaphoreticum; vel quò minus edulcoratum, eò magis catarcticum: Item hoc aurum fulminans in affectibus infantum intestinalibus, in specie flatulentis, cum torminibus conjunctis, est optimum remedium: Deinde & hoc singulare est, quod in adultis feces nigerrimo colore inficiat, tam aurum fulminans, quam auri cum spiritu salis solutio. Fortiora enim purgantia minus conveniunt in pertinaciori & fatali alui obstructione, ne irritando intestina, horum spasmos dolorosos & tormina excitando, malum exasperetur; unde cautissimè in talibus casibus tractetur purgantia, ne præpostero horum, præsertim aerlorum, alui intestina magis contrahantur & excrementa indurentur, ac ex continuata irritatione dolorosa ægri in morbum illatum adducantur.

Externæ quæ applicantur, sunt primariò quidem, uti notum est, Clysmata, eaque ex emollientibus & lubricantibus parata, quæ nota sunt omnibus: v. g.

R. *Herb. alibæ,*

*Chamomill.*

*Melil.*

*Malvæ an. Mj. vel Mj.*

*Rad. lil. albor. ʒij.*

*Sal. tartar. ʒi. ad ʒij.*

Coque in aqua simpl. vel sero lactis caprill.

*Colaturæ ʒix. adde*

*Salis gemm. ʒj.*

*Ol. lil. alb.*

*Mell. rosar. an. ʒi. vel ʒij.*

M. pro Clysmate emolliente in induratis scibus tepide injiciendo.

D. S.

*Clyster emolliens.*

Injecto Clysmate æger aliquamdiu lateri dextro incubat, ut feratur uique ad intestina.

Vel

R. *Herb. Malvæ,*

*Melil. an. M. ij.*

*Rad. alibæ*

*Lil. alb. an. ʒi.*

Coque in f. q. Aqua simpl.

*Colatur. ʒix. adde*

*Electuar. benedict. laxat. ʒj.*

*Ol. sem. lini,*

*Rapar. an. ʒij.*

*Vitell. ovin. j.*

M. pro Enemate, S.

*Clyster 2. emolliens.*

Virtutem irritandi intestina torpida obtinet quoque mel inter Clysteres assumptum, siue simplex siue compositum: v. g. Mel rutaceum, rofaceum, mercuriale, & ad imitationem mellis etiam manna Calabrina; sicut enim apes ex floribus optimis succum eliciunt, eumque transformant in mellis consistentiam, ita à calore Solis ex floribus & foliis præstantior succus in aërem elevatur sub forma roris cuiusdam, qui deinceps cum succo transudante incorporatus & à frigore coagulatus in foliis arborum reperitur sub forma Mannæ.

R. *Spec. emoll. M. ij.*

*Flor. samb. M. i.*

Coqu. in f. q. lactis bubuli:

*Colatur. ʒij. adde*

*Mell. Mercurial. ʒij.*

*Vitell. ovor. num. ij.*

Misc. pro Enemate pro duabus vicibus. S.

*Clyster emolliens.*

Vel sola Clysmata ex lacte bubulo cum melle & saccharo, pro scopo laxatiui injecta, sufficiunt.

Superius dixi, quod internè convenient passulæ in alui obstructione: ad eandem imitationem sunt, qui decoquunt passulas in jure vituli, & colaturam Decocti instar enematis injiciunt cum laudabili effectu. Item si ex nephritide vel simili affectu alui obstructa sit, Clysteres emollientes cerebinthinati perquam sunt proficui: item clysmata ex

solo oleo expresso seminis lini, item ex oleo seminis rapì, sunt admodum experta: v. g.

R. *Ol. express. sem. lini,*

*Rap. an. ʒiv. vel v.*

*Dia-coloc. Quercetan. ʒvj. vel ʒi. ad ʒij.*

M. pro Clysmate, in alpo contumaciori egregio, aliis irritis, S.

*Clyster emolliens.*

Sanè PRÆVOTIUS alui segnitie gravem solo oleo communi benè maturo, ad lib. j. per Clysterem injecto, levavit. Sic RULANDUS in *Theor. Pract. Cent. 4. Obs. 99. p. 233.* exemplum habet alui per tres hebdomadas obstructæ, ita ut nullis neque clysmatibus neque suppositoriis moveri posset, tandem injectis singulis horis ʒiv. olei olivarum, alvus emollita, & multa scybala rejecta fuerunt: Sic idem RULANDUS c. 9. *Curat. 13.* quendam rusticum, qui similiter ob scybala indurata alium habuit obstructam, curavit per clysmata ex oleo seminis lini ad ʒv., quod injectum nunc iolum, nunc cum ʒij. trochiscorum alhandal, egregie alium obstructam curavit: e. g.

R. *Ol. rapar. in quo ʒi. trochisc. alband. ebull. ʒviij. adde*

*Vitell. ovin. j.*

*Mell. rosar. ʒj.*

Misc. pro Enemate, S.

*Clyster emolliens.*

Ubi autem Emollientia hæc pro soluenda alpo non suffecerit, his præmissis, ad alia quædam paulo acriora accedendum erit; & quando jam metus est induratarum secum, egregium est sal gemmæ, quod à ʒss. ad ʒj. usque ad ʒijss. vel ʒij. clysteribus additum, quasquæ feces induratas potentissimè resolvit & fluxiles facit; nihil namque magis emollic feces duras, ac intestina ad eorum expulsionem irritat, quam sal gemmæ. FORESTUS l. 21. *Obs. 5.* optimè in scibus induratis à ʒj. ad ʒij. cum Decocto emolliente simplici usurpavit: Sic LINDANUS commendat in obstinatissima alui obstructione, si sit clyster vel enema solummodo ex juscula carnis cum melle, cui addatur sal gemmæ à ʒss. usque ad ʒij.

R. *Herb. Chamom. cum flor. M. iij.*

*Flor. samb.*

*Verbasc. an. M. j.*

Coqu. in f. q. aquæ simpl.

*Colaturæ ʒix. adde*

*Salis gemm. ʒj.*

*Mell. ros. ʒj.*

M. pro Enemate, S.

*Clyster emolliens.*

Vel

R. *Decoct. emoll. ʒix. ad ʒj.*

*El. benedict. lax. ʒj.*

*Salis gemm. ʒj.*

*Mell. rosar. ʒss.*

M. pro Enemate, S.

*Clyster emolliens.*

Vel

R. *Spec. emoll. M. ij.*

*Siccior. ovill. ʒj.*

Coque in f. q. aquæ.

*Colaturæ ʒviij. adde*

*Sal. gemm. ʒij.*

*Vitell. ovin. n. j.*

*Mell. mercurial. ʒij.*

M. f. Enema, S.

*Clyster emolliens.*

Ubi status simul adsunt, clysteribus addi potest

*Ol. de Bull. camini,*

*Caroi an. ʒss.*

Quod si sal gemmæ non sufficiat, commodissimè in Clysteribus incoquitur, vel pulpa Colocynthid. in nodulo ligata; vel etiam trochisci alhandal. v. g.

R. *Decocti parietar. vel emollient. ex Melil. chamom.*

*Et wiatr. ʒviij. vel ix. in quo ebulliant*

*Pulpæ colocynth. in nodul. ligat. ʒi.*

*troch. adde*

*Salis gemm. ʒi. ad ʒij.*

*El. benedict. laxat. ʒj.*

M. f. l. a. Clyster, S.

*Clyster stimulans.*

Vel

R. *Spec. emoll.*

*Carmin. an. M. j.*

*Pulp. coloc. in pec. lig. ʒij.*



Coque in aqua simplic.

Colaturæ ʒix. adde

Salis gemm. ʒj.

El. benedict. lax. ʒss.

M. f. Enema, S.

Clyster Stimulans.

R. Herb. mercurial.

Parietar. an. M. j.

Pulp. coloc. in per. lig. ʒj.

Coque in f. q. aque :

Colaturæ ʒix. adde

Mell. mercurial. ʒj.

M. pro Enemate, S.

Clyster Stimulans. Vel

R. Flor. chamomill.

Melilot.

Violar.

Verbasc. an. M. j.

Pulp. colocynth. in per. lig. ʒss. ad ʒj.

Sem. lini ʒvj.

Coque in aqua simplic.

Colaturæ ʒviiij. vel ix. adde

Salis gemm. ʒj.

El. benedict. laxat. ʒss. ad ʒj.

M. f. Enema, S.

Clyster Stimulans.

Addi etiam potest vitell. ovi N. j.

Sed obseruetur : quod in his, ubi acria stimulantia, ut sal gemmæ, colocynthis &c. ingrediuntur, oleosa & mucilaginosa omittenda sint ; olea enim obtundunt salinam acrimoniam, & sic non possunt incidere & stimulare. Vel ubi Colocynthis non est sufficiens, tanquam ad ultimū, ad antimonialia, est confugiendū, si scilicet loco colocynthidos ʒj. croci metallorum Decocto superius dicto emollienti incoquatur : nam hoc extremum est remedium ; cuius usum crebriorem factum videbitis in Obs. RIVERII, qui aliquot habet exempla Decocti in Clysteribus admodum feliciter ; Vel quod magis approbem, Infusum fiat croci metallorum, cuius ʒiiij. aut iij. Decocto emollienti jam facto admiscetur, & sic conjunctim injiciuntur, additis simul reliquis convenientibus. Formula sit hæc :

R. Decoct. emoll. usq. ʒv. vel vi.

Infusi croc. metallor. ʒii. vel iii. ad iv.

Salis gemm. ʒj.

El. benedict. laxat. ʒi. ad ʒiij.

M. f. l. a. Clyster, feliciter Stimulans, S.

Clyster Stimulans.

Loco infusi talis ex tempore potest Syrupi emetici ʒi. ad ʒiij. addi ; feliciter enim stimulat.

Vel : R. Spec. emoll. usq. M. ii.

Croci metall. in per. lig. ʒi. ad ʒiij.

Coque in f. q. aque ad ʒx.

Colaturæ adde

Salis gemm. ʒj.

El. benedict. lax. vel lenitiv. ʒi.

Misc. pro Enemate, S.

Clyster Stimulans.

R. Decoct. scor. reg. antimonii ʒix. ad lb. i.

Salis sarmeni. visis ʒi.

El. benedict. lax. ʒi.

Mell. rutac. ʒss.

Misc. pro Enemate, S.

Clyster Stimulans.

Cæterum in Clysmatum usu speciatim obseruandus est intestinorum status. ubi enim intestinorum motus deficit, & hæc minus sensilia stimulum indigent, acria saltem stimulantia usurpanda sunt modò dicta : Curam videbitis sub titulo Apoplexiæ & Paralyseos. Ubi verò irritatis intestinis, indeque dolorosis eorum spasminis, aut ubi aliàs suspicio est intestina quocunque loco affecta aut irritata, ibidem contrahi arctius, & spasmio affici, ibi stimulantibus & acrioribus malum exasperatur : emollientibus & lenientibus saltem tunc insitatur, etiam eadem subinde per os propinando.

Applicatis clysmatis, si ulterior necessarius sit stimulus, imprimis applicentur suppositoria, eaque multiplicia Communiter parantur ex sale & melle, & cum pulvere radicis hellebori nigri, sicut videre est in officinis Pharmaceuticis. SYLVIVS de atro obstructa c. 11. §. 38. seqq. subministrat, & omnibus præfert, suppositoria ex alumine, idque ad imitationem ANGELI SALÆ, qui in suis scri-

ptis, & quidem in Appendice pag. 840. factè mentionem suppositoriorum ex alumine factorum ; quæ suppositoria similiter admodum commendantur à SYLVIO, uti dixi : siue fiant ex aluminis rupei frustulo, in longum in formam suppositorii conciso, & oleo amygdalarum dulcium, vel liliorum alborum illito : vel si alumen pulverisatum uniat cum tragacantha, in aqua liliorum alborum soluta, compingatur in suppositorium aluminosum, in alvo adstricta stimulanda admodum conducit. LINDANUS ex cocto melle atque sale marino gemmeove parata commendat ; ita quidem, ut in talibus suppositoriis, pro adultis quidem possit sumi ʒj. ad ʒj. unā cum granis tribus vel iv. trochiscorum alhandal, & ita fieri suppositorium acre : in parvulis verò loco trochiscorum alhandal possunt sumi species hieræ pieræ Galeni, eæque cum pauca quantitate salis gemmæ permisceri cum melle in suppositorium satis acre.

Vel

R. Supposit. acut. N. ij.

illinantur oleo diacoloc. S.

Suppositorium sedis.

R. Pulp. jalapp. ʒj.

Salis gemm. ʒss.

cum f. q. Mellis ad debitam consistentiam cocti f. suppositorium, S.

Suppositorium sedis.

Cæterum obseruetur, quod, ut eò melius operentur Suppositoria & Clysmata, iis præmittenda sint medicamenta emollientia siue lubricantia & incidentia, per os, ne frustra iis irriteretur alvus, & sequatur, quod sæpè fit, inflammatio intestini recti. Sub horum usu sit infusus seu Balneum ex emollientibus confectum ; sub egressu verò balneo usurpentur etiam Unguenta externe abdomini illinenda, vel sacculi simpliciter lenientes & emollientes, plus minus Anodynini, in lacte cocti, ubi nempe spasmus &c. vel in scibus durioribus vel intestinorum spalmo ; BORELLUS. Q. 1. Obs. 12. seq. laudat :

R. Fol. Malvæ,

Alib.

Plantag.

Absinth. an. M. j.

Flor. chamomill.

Mell. an. M. ʒ.

Sem. sævæ.

Lini,

Cum. an. ʒj.

Coque in Vini Albic. f. usque ad consumptionem duarum partium, fiat Fotus, & post fotum sequens inungatur Linimentum :

R. Ol. amygd. dulc.

Violarum,

Lilior.

Rosar.

Chamomill.

Nardin. an. ʒss.

Adip. an. vin. ʒj.

Cera q. s.

M. f. Linimentum : in quod dissolvatur parum Emplastri de baccis lauri.

E contra applicantur interdum unguenta acriora stimulantia ad concitandam vim intestinorum motricem labentem, siue promovendum intestinorum motum peristalticum, cum felle tauri, sale gemmæ &c. acuata. Commendatur Zibethum umbilico inunctum. (obiter moneo, in colica hoc inunctum esse secretum.) præterea Emplastrum ex felle tauri & colocynthide umbilico applicatum est egregium : Exemplum habet SCHENCKIUS l. 3. Obs. de Excrementis, in puella, quæ per tres menses non deposuit alvum, curata tamen per tale Emplastrum, non omisit aliis. Item oleum colocynthidos per vesicam destillatum nobile & singulare quid est : Maceratur prius in aqua communi, & destillatur ; sic prodit oleum paucum, cuius una alterave gutta umbilico illita, alvum satis stimulat : quod etiam faciunt extracta purgantium non nimis inspissata, quæ cum oleo colocynthidos umbilico largiter illita alvum segniorem satis stimulant. In officinis prostat Unguentum de Arthanita, quod malaxatum cum f. q. olei diacolocynthidos Quercetani, & abdomini toti illitum, alvum optimè refertat : D. MOEBIUS ad hoc, tanquam ad sacram anchoram consuetam, confugit, applicando supra umbilicum, quod etiam commendat CLAUDINUS



de Ingressu ad Infirmitates, l. 10. c. 2. Alii commendant tale Linimentum in alvi obstructione:

*R. Olei amygd. dulc. rec. expr.  
Pingu. anserin.  
Butyr. Majal.  
Ung. Dialibæ an. 3 ij.  
Salis gemma 3 ss.  
Spec. hieræ simpl. 3 j. ad 3 ij.  
Colocynthid. gr. xvj. ad 3 j.  
Diagrd. gr. iv. vel v.  
M. s. Unguentum.*

Quod commendat, ut illinatur abdomini ad mouendum aluum, SOLENANDER Conf. 29. sect. 3. pag. m. 306.

Vel

*R. Unguent. de Arthanis.  
Marruat. an. 3 j ss.  
Pingu. anserin. 3 j.  
Sal. gemma 3 ss.  
Diagrd. 3 j. ad 3 ss.*

Cum s. q. Olei avillor. ebuli. s. linimentum.

Conueniunt etiam linimenta opomphalia, inter quæ est Emplastrum ex felle tauri supra dictum, si nempe fiat ex felle tauri cum aloë hepatica, sale gemmæ & modico scammonii; v. g.

*R. Aloes hepat. 3 ij.  
Fell. tauri 3 j.  
Scammon. 3 ss.*

M. inuicem, optime tere:

Cum s. q. Butyri non saliti, vel pinguedin. porcin. s. Linimentum molle: quo umbilicus inungendus, & si fortius agere vel imus, plantæ pedum, Vel

*R. Elater. 3 iij.  
Scamm. 3 j ss.  
Extraß. troch. alband. 3 j.*

Cum s. q. Olei diacolocynth. redige in Linimentum.

Quæ ratione nonnulli etiam in alvi obstructione commendant, ut plantis pedum applicetur Linimentum, factum ex oleo populeo, cum hiera picra usitata, quod aluum emollit & soluit. Sic

*R. Testam. iugulandis, imple cum pinguedine anserina, applica umbilico, simulque abdomen illine eâ. Item*

*R. Pomum assatum: subige cum pinguedine anserina, & abdomini illine.*

Item pulpa pomorum Borsdoffianorum cum paucis croco subacta & abdomini toti instrata conuenit quoque. De suppositoriis iam monui: Sunt qui dicunt, quod in desperata alvi obstructione nil melius sit, quam digitus intinctus oleo seminis rapi vel lini (quod oleo communi seu oleo olivarum melius in obstructionibus alvi) immittatur ano; hinc enim potentissime solvi asserunt.

Alii etiam sunt modi, quibus iuvantur alvo adstricta laborantes, inter quos observatu dignum est exemplum, quod recenset MEIBOMIUS *Tra de usu Flagrorum in Re Venerea* p. 7. de quodam Principe, qui non potuit alvum deponere, nisi prius à seruo flagellatus. Præterea tussis & sternutatio similiter adjuvant nonnihil excretionem alvi: sic Platerus in Obs. p. 210. habet exempla quorundam, qui ob duritiem excrementa ægrè poterant per podicem excernere: his crebriorem tussim imperant, ut beneficio istius tussis, diaphragmate moto, infra excrementa eliciantur. Fit nonnunquam, ut aut à podice nonnihil læso, aut excrementis crassioribus aut induratis, hæc hæreant, ut non nisi insigni dolore possint excerni, uti etiam fit in hæmorrhoidibus, ut animi sæpe deliquium patiantur ægri. In tali casu idem imitandus venit PLATERUS, qui iomentat cum oleo, & simul imperat sternutationem & tussim, & sic feliciter alvi suppressionem tollit, & fæces retentas elicit: Vid. l. c. p. 346.

Alvus nimis obstructa interdum causa est, ut per alias vias, & naturæ planè contrarias, ventriculum & gulam, sursum versus ejiciantur contenta; ad quam Expulsionis intestinalis læsionem primario refertur Iliaca Passio.

## ARTICULUS II.

### DE PASSIONE ILIACA.

**I**liaca passio est consequens contumacioris alvi. Definitur, quod sit motus peristalticus intestinorum inversus, ubi cum dolore circa umbilicum intensissimo excrementa alvina motu retrogrado per os ejiciuntur, à contumaciori alvi obstructione.

Distinguitur ab excretionem illa per alias vias de novo apertas facta, v. g.

1. Per umbilicum apud SCHENCKIUM l. 3. Obser. 4. & 5. sub titulo: *Illecora atropo loco excreta.*
2. Per fistulas ex intestinis perforatis, Obseru. 6. apud eundem; & penem cum urina Obs. 7. citati Autoris: simile apud BORCELLUM c. 3. obser. 16. & HILDA-NUM Cent. 1. obser. 74.
3. Ulterius mulieribus quibusdam per naturalia, v. g. Obser. 8. per ulcus vesicæ & intestini recti; Obser. 10. per partem pedis superiorem Obser. 11. SCHENCKIUS l. 3. p. 293. Editionis in folio.

Quando ergo alvus ita obstruitur, ut per superiora eliciantur excrementa, vocatur Ileus seu morbus Iliacus, Convulsus & Chordapson, quod tenue intestinum tactu deprehendatur convolutum instar chordæ, cuius causa recte dicitur motus intestinorum peristalticus inversus; ita ut reverà id, quod est vomitus in stomacho, hoc est iliacus morbus in intestinis. Nam quando incipit talis inversio motus peristaltici in pyloro, fit vomitus; quando verò incipit motus iste peristalticus inversus in quodam loco intestinorum, in specie in fine ilei circa principium coli, ubi propter valvulæ frequentior est sedes ilei morbi, tunc fit morbus iliacus.

Est enim unus continuus tractus eiusdem substantiæ similiter connexus, à summitate œsophagi usque ad extremum podicis hiatus: totus tractus est una substantia membranacea, fibris circularibus nerveis, oblique tamen incedentibus composita, quæ substantia nunc est amplior, nunc angustior: amplior est, dum constituit stomachum, angustior est, ubi œsophagum & intestina, in specie colon & tenuia, efficit. Unde sicut in statu naturali unus continuus est motus à summitate œsophagi usque ad podicem, quo ingesta successive motu peristaltico naturali protruduntur, ita si quodam in loco invertatur hic motus, ut fiat contrario modo sursum versus, tunc oritur excretio contentorum per superiora, non per podicem: quæ excretio interdum est vomitus, si incipiat motus peristalticus inverti à pyloro: hinc etiam, si iste motus peristalticus inverti incipiat circa insertionem ductus pancreatici & cholodochi, in specie oriri solet cholera; si verò motus hic inverti incipiat in ileo, seu alio quodam intestinorum loco, est ileus, siue locus inversionis motus peristaltici sint intestina tenuia, siue sint crassa. Nam & interdum podex siue extremum intestini recti, est locus, ubi incipit talis inversus motus; quæ ratione non tantummodò clysteres alvo injecti, sed etiam suppositoria per os denuò rejecta fuerunt, existente tunc simul valvulæ coli vel rupta, vel exesa, vel relaxata, vel alio modo irritata, quando scilicet hic motus, inversus incipit ab extremitate coli: frequentius tamen in ileo magis convoluto, & in quo magis viget motus peristalticus, sedes huius morbi esse solet spectatim eo in loco, ubi inseritur intestino colo.

Reverà igitur ileos complicatus affectus est: nempe ex pertinet alvi obstructione, & motu intestinorum peristaltico inverso, vel naturaliter impedito, adeò, ut quicquid motum naturalem peristalticum sistere, vel potius impedire, & e contra irritando ad motum præternaturalem inversum cogere potest, causa sit ilei; & vice verâ sequuntur etiam hæc duæ mutuo, & nunc ex alvo obstructa irritantur intestina. ut ex contractura fibrarum sequatur inversio motus; nunc ex irritatione contrahuntur fibræ, sique tollitur naturalis intestinorum progressivus motus, & e contra præternaturaliter sursum invertitur eorum actio.

### PARS AFFECTA.

*Subiectum seu Pars affecta* sunt intestina, nunc tenuia nunc crassa, nempe ileon, jejunum, Colon &c. Veteres quidem crediderunt tenuia hic saltem affici: attamen contrarium testatur experientia, dum coli reliquorumque intestinorum diversi loci passim inflammant in cadaverum sectionibus observantur, licet sæpe ileon, & pòst principium coli, sit sedes partis affectæ: primario tamen eo in loco est pars affecta, ubi motus peristaltici est inversio; nam intestinum rectum fœtui in utero profus occlusum, & quidem intus, passionem hanc intulisse diebus plus minus 8, observavit IOHANNES POSTHIVS: vid. Ob. er. Anatom. in anatomiam Realdi Columbi p. m. 52. Facile quoque fieri potest, ut per consensum afficiatur mesenterium & aliæ vicinæ partes. Sic itur & invertitur naturalis hic motus, & præternaturalis insertur, nunc vitio contentorum, nunc vitio intestinorum: Ulorum collectorum, vel retentorum induratum,



erum, ac intestina infarcientium; Horum vel inflammatorum, vel gangrenatorum, vel ingressorum mutuo, vel coarctatorum, vel ulceratorum, vel hernia translocatorum, vel convulsorum &c. : His nempe causis quibusvis irritantur intestina, plus minus sinitur motus contentorum deorsum, unde alvus obstructa, & prouocatus motus contentorum sursum inuersus, unde ileus morbus.

## C A U S Æ.

*Causa motus talis compressiui seu peristaltici inuersi est irritatio quæcunque intestinum, in certo quodam eorum tractu, ita tamen, ut intestinum irritatum non possit bene deorsum versus moueri: quando enim irritatur in quodam loco intestinum naturaliter, succo siue magis magisque deorsum versus deprimitur unde, si ex quacunque causa aliquod impedimentum adsit, quod motum intestini irritati inferiora versus cohibeat, molesta verò irritatio nihilominus continuet, necessario fibris contractis motus sursum versus excitatur: exemplū sit de farci minibus conficiendis.*

*Causa ergo proxima intestinum affectionum formans est spirituum animalium impetus, motum libum concitans: Materialis est contumacia eorum obstructio, quam insequitur distensio ab urgentibus & cumulatissimis facibus, qua facta spiritus animales concitantur, & fibrosæ intestinum portiones irritantur ad motum inuersum, uti ventriculus ob nimiam repletionem vomitiones instituit.*

In specie causa occasionales irritantes, excrementorum transitum per intestina plus minus impediunt, sunt variae. HILDANUS *Observ. Cent. 1. observ. 61.* asserit, quod præcipua causa seu radix Ilei consistat imprimis in fine intestini Ilei circa cæcum, & in principio coli, ubi est valvula, & quod coacervatio & induratio scybalorum in dicto loco, & consequenter angustatio & continua stimulatio intestini, sit causa frequentior iliaci morbi: quibus accedunt quæcunque angustationes præternaturales in dicto loco: hinc c. l. ex scirrho & ulcere cancroso in cæco, quod ileum oppleuerat ut nil ad colon penetrare fuerit, hunc affectum observauit: Sic etiam NICOLAUS FONTANUS in *Consiliis & Responsis p. 84.* post iliacam passionem lethalem obseruat materiam indurata & quasi lapideam sine ullo voluulo circa intestinum cæci pertinaciter adhærentem, illudque ita extendentem, ut extrahi non potuerit. Herniæ subsequitur iliaca passio, nisi hernia inueterata adsit, & exitus maior; in omnibus enim herniis est obstructio alui. Quando ergo diu morantur excrementa, acescunt, & acidum austerum intestina constringit, eorum membranas vellicat, unde motus inuersus peristalticus: per adhibita ligamenta autem intestina ad situm naturalem redeunt. Quoties in sequiori sexu morbum iliacam obseruare contingit, herniam vel umbilicalem vel inguinalem adesse, tuto ferè prædicere possumus, & nunquam fallit, quamvis ob exilitatem patientes ipsæ non obseruare soleant: vid. M. A. N. C. *ann. 8 observat. 93.* & quia non possunt expelli excrementa per intestina, in umbilico & icroto convoluta, hinc non sine horrore sursum versus excrementa eliciuntur. Assumpta austeræ & similia pertinaciter aluum occludentia etiam huc faciunt: hinc ileos ex usu nimio mepilorum aut aliorum duriorem & austeriorem obseruatus fuit. Ileon pertinacem ex usu malorum cydoniorum nimio obseruauit ZACUTUS LUSITANUS *lib. ult. Prax. N. 2. Obs. 2.* curatum, aliis irritis, stercore vaccino recti toti abdomini ter illito: *Idem l. c.* dolorem iliacam ex facibus induratis ob eum copiosum auellannarum, per balneum oleagineum & epoti omenti arietini liquefacti & j. curatum: Pariter *l. 2. Medic. Princ. Hist. 97. obs. 16.* ex pyrorum crudorum ingurgitatione nimia obstructis intestinis voluulum obseruauit. FORESTUS *l. 21. Obs. 23.* describit ileum ab arsenico sumptum propter huius corrosiuam irritationem, per olei amygdalarum dulcium, concitato vomitu, curatum. Observata quoque fuit inflammatio & ileos, si ægri post nimium motum, calorem, & sudorem, ingurgitarunt frigida, & est interdum lethalis. Ulcera pariter intestinum corrodentia, impediendo motum peristalticum, huc pertinent; hinc rectè KERKRINGIUS *specil. obs. 42.* iliacam passionem interdum ab ulceribus intestinum grauioribus cum inflammatione potius, quam eorum intorta conuolutione, oriri asserit. Ulteriori itidem considerationi relinquo, quod PEYERUS *de Intestinorum gland. pag. 79.* affirmat, interdum lympham in plexu quodam glandularum intestinalium austeriorem & stypticam factam,

pertinacem striduram efficere posse. PANAROLLUS in *Pent. 1. Observat. 50.* quatuor habet species ilei à diuersitate causarum differentes: primam causam dicit esse herniam: secundam vult esse conuolutionem intestinum: tertiam dicit esse adstrictionem intestinum (quæ tamen non procedit) præsertim ilei ad instar sarciminis luanicæ: & quartam vult esse descensum intestini unius in cavitatem alterius.

Examinemus has causas. Vulgaris est persuasio, conuolvi intestina; unde RIOLANUS dicit: Voluulum instar digiti complicari. Verum ista conuolutio intestinum est falsa; hypothesis enim nondum est pro vera agnita, quod intestina ita conuolvi queant: quomodo enim ea mesenterio adhærent, impossibilis est talis conuolutio, demonstrante hoc ipsum HELMONTIO in *Tr. de flatibus*, ubi acutè RIOLANUM refutat: unde & nata hinc appellatione voluuli, quando ileos dicitur voluulus à volutatione, est absurda. Nec quenquam offendat, quod hinc inde apud Autores, etiam Barbertum, fiat mentio intestinum conuulutorum, per anatomen in iliaceis obseruatorum. nam arbitror, fuisse etiam semper gangrenam intestinum, in qua corrugari inuicem ac complicari solent, & ita apparenter conuolvi videntur intestina; hinc RIVERIUS *Cent. 3. Observ. 26.* notat passionem iliacam lethalem, in qua ileum tribus complicationibus conuolutum & complicatum, & quasi compactum in unam massam circa finem illius, & tota hæc portio gangrenæ affecta fuit: vid. egregius Discursus in KERKRINGII *specil. anat. Observ. 42. pag. 95. & 96.* ubi iliacam passionem ex ulceribus intestinum & inflammatione refert.

Verum descensus intestini unius in alterum, siue superioris in cavitatem inferioris, siue ingressus inferioris in cavitatem superioris, est satis frequens, & in Praxi à SYLVIO aliquoties obseruatus: vid. *l. 1. Prax. c. 15. §. 18. & seqq.* Dux sunt causæ, secundum SYLVIVM, inflammatio, & ingressus intestini in aliud (descensus à superiori in inferioris intestinum incurabilis est: herinæ subinde etiam ingressum ejusmodi excitant in colica.) Causa huiusmodi ingressus sunt subinde flatibus, diuersimodè intestinum tenue distendentes, quo fit, ut in uno loco magis dilatetur Intestinum, quam in altero, cum nimio motu, & inordinata iestigatione corporis ægri in lecto: agras nempe, dicit SYLVIVS in torminibus solere se variè contorquere, & corpus suum variè mutare & agitare: hac corporis violentia contorsione & agitatione faciliè erit, ut intestini à flatibus distentum admittat partem istius intestini statu non distenti, & propter angustiam loci fieri, ut se inuicem incant, & ita se mutuo ingrediantur; unde necessario impeditur motus naturalis; & quia mutuos hic ingressus cum dolore est, infert motum peristalticum inuersum; in specie in morbis intestinum dolorosis, in conuulsivo spasmus intestinum, faciliè mutuo introeunt; uti non raro conuulsio infert obstructionem, ita non raro colica conuulsiva, maxime scorbutica, ileon infert, quæ colica est frequentissima, & oritur vitio intestinum conuulsivo & constrictivo, à quo clauditur aluus: vid. DRAWIZIUS *de Scorbut.*, qui urget has conuulsiones & spasmos conuulsivos Intestinum. Et sanè ingressus hic mutuos intestinum est frequentissima veri ilei causa, cuius fiendi modum oculariter obseruauit PEYERVS *de gland. intest. p. 83.* Præter exempla SYLVII etiam videbitis in SCHENCKIO *l. 3. Obser.* factam mentionem ingressus intestinum tenuium in ileo ad digiti longitudinem: item apud REALDVM COLVMBVM *l. 15. p. 487. de Reg. anat.*, BLASIVM, & PLEMPIVM in *Fund. Med. c. de mesenterio*, item HEINRICVM ab Heer *observ. 24. §. 4.* Ingressus hic intestini in intestinum semper habet subsequam alteram causam, inflammationem & gangrenam, attestantibus hoc exemplis quamplurimis *supr. cit.* Denique inflammatio intestinum, & hanc subiequens gangræna, quatenus corrugat intestina, subinde dant affectum huncce lethalem: conf. KERKRINGIVS in *specil. anat. obs. p. 42.* item BARTHOLINVS in *Ep. c. 4. Epist. 92. p. 529. & Epist. 93. p. 542.* ubi ingressum unius intestini in alterum habet. HELMONTIVS *Tract. de flatib. §. 31.* inflammationem à facibus induratis dependere asserit: dubium tamen est, utrum fæces producant inflammationem? an inflammatio fæcum indurationem: nam vero non videtur simile, in ileo contentam materiam ita posse indurari, ut protrudi ab in estinis continuo motu peristaltico agitatæ nequeat. Itaque oriri primò inflammationem credibile est. deinde verò fæcum indurationem ob viam de-



negatam; utut satis sit probabile, in crassioribus intestinis hoc facile posse evenire: Ansam autem inflammationi præbent succi intestinorum præternaturaliter acidi, qui fracedine sua sanguinem, intestinorum substantiam influentem, inquinant, inflammationesque causantur; quo pacto forsitan etiam subortum est contagium, inferens ileum, teste ALEXANDRO BENEDICTO lib. 29. c. 8. & OLAVO BORRICHIO in Epistolis Baribolini citatis.

De inflammatione videatur in BARBETTE Chirurgia p. 198., quæ si sequitur volvulum talem ex ingressu, fieri aliter nequit, quàm ut sese jungat febris aliqua; quam si vulnerariam quis vocitaverit, à vero non multum aberrabit. Nanciscitur autem febris malignæ indolem, degenerante inflammatione in gangrænam & Sphacelum. Gangrænam ilei observavit CASPAR BARTHOLINUS: vid. Cent. 6. Hist. 58. Hist. anat. THOMÆ BARTHOLINI; item RIVERIUS Cent. 3: Intestinum rectum nigrum, & gangrænâ corruptum vidit etiam GVIDO PANTINUS.

Dum hæc duæ causæ, nempe inflammatio & ingressus intestinorum mutuus, constituuntur cum SYLVIO, innuuntur saltem frequentiores causæ. Nam observavit etiam CASPAR BARTHOLINUS & POSTHIUS, uriam dictam, Ileon ob intestinorum coalitum; quare & hic cohabitatio obstructionem & insequentem inflammationem producere valet: vid. M. A. N. C. An. 9. Obs. 93, ubi exemplum adducitur, quod obstructio & inflammatio in uno eodemque subjecto quandoque concurrant. Hinc Sennertus aliud Ileum & motus inversi intestinorum genus observavit in hypochondriaco, qui ex hypochondriis crudos humores & crassos evomit, prætereaque integrum etiam Clysterem superveniente epilepsia & cæcitate: In hoc subjecto necesse fuit, ut erosa fuerit valvula dicta Baubini in colo; alias impossibilis fuisset transitus Chysteris: id quod ipsum forsitan factum est ab humoribus acris inibi hærentibus.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa diagnostica: eadem per se sunt clara; quando nempe nil aut parum descendit per inferiora, hinc successivè abdomen indurefcit & intumescit, superveniunt murmura varique motus in abdomine; successivè egri nauseant, sæpèque percipiunt vomendi conatum, supervenit vomitus, primò quidem omnium ingestorum, successivè recrementorum variorum flavescientium, & tandem per os contenta intestinorum excrementa, quæ aliàs per podicem essent excernenda, vomitu rejiciuntur; modò adest habitus foetidus, interdum lipothymia; tormina itidem subinde crudelissima ægros vexant, & anxietates vix explicabiles eosdem fatigant: tandem sudor admodum frigidus syncopticus advenit: dolor abdominis interdum est intensus, ut etiam clysmata injecta interdum per os prodierint: adest interdum pulsatorius & ardens dolor in certo abdominis loco, si scilicet adest inflammatio intestinorum; adestque simul ut plurimum febris typhica, ubi nempe frigit extrema, interiora verò utuntur; ubi scæces vel prodeunt per os, vel imminet prodire: urina supprimitur, quod vesica in consensum trahatur: vires omnes languescunt, singultus supervenit, qui prodromus convulsionum & epilepsia, quæ huic tragœdiæ tandem finem imponit.

Imprimis autem hic notanda sunt, quæ Ileum præsentem aut futurum esse, monstant. Et quidem imminentem Ileum produnt: (1) Alvus: pertinaciter suppressa, ita ut podex interdum intro retractus appareat, ut neque specillum neque fistula clysmatica intrudi possit, est prænunciatus: (2) Intestinorum tenuium crudelia tormina: (3) Incipiens nausea & vomitus: Quod si (4) superveniunt singultus, ferè mors est in olla.

In fiente nonnunquam sequitur aliqualis dejectio excrementorum tenuium & fluidorum; in facto verò nulla: Imminet aut jam adest in facto Ileus Vomitus frequens succi biliosi cum excrementitiis humoribus: Quando intestina crassa, primariò colon; affecta sunt, adest simul podex interiora versus restrictus, ita ut ne fovea appareat, & tanta sit angustia podicis, ut ne specillum quidem introire possit; si podex autem liber est, tunc intestina tenuia sunt affecta, magis tamen superiora, ut jejunum, quâdo magis nausea & vomitus urgeat: ubi majores dolores circa regionem epigastricam cruciant ægros, ileon est affectum. Si jam adest inflammatio, patiens nec febricit, nec horrore concutitur, adest dolor in certo abdominis loco vulvarilis & ardens,

item febris typhica, sitis & ardor quasi quidam ventriculi: si jam adest sphacelus, cessat dolor, sæpiusque adest sudor frigidus, difficilis respiratio ob consensum nervorum, tandemque supervenit lipothymia, in nonnullis etiam epilepsia. Equidem & in colica interdum analoga symptomata observantur; quanta tamen hæc inter sit differentia, videatur SENNERTUS l. 3. Prox. pag. 247. ubi de Ileis; item RIVERIUS in Pr. l. 10. c. 2. Nam sæpius gravior colica pro iliaco morbo à timidis Medicis habetur.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: rarè evadunt Iliaci; omnis enim ileus est periculosus & peracutus affectus, in quo plures intereunt, quàm convalescunt; unus tamen facilius curatur, quàm alter.

Qui tales sunt ex inflammatione intestinorum, ut plurimum, si non semper, moriuntur: qui ex gangræna, semper est lethalis.

Ileos, ubi etiam stercoris vomitus supervenit, ut plurimum est exitialis, & à quo pauci convalescunt. Si tamen ex hernia superveniat vomitus, non adeo desperatus est, quàm si ex aliis causis: vid. præter SENNERTUM in Pr. l. 3. ubi de Ileis pag. 248, M. A. N. C. Ann. 2 Obs. 25. p. 370. Ann. 6. Obs. 44. & Ann. 8 Obs. 93. utut etiam ileos ex hernia non sine periculo sit.

Qui ex scybalis est induratis, vel ex mutuo intestinorum ingressu, curari potest.

Si ingressus fiat per ascensum, curari potest; sin verò per descensum, est incurabilis, teste SYLVIO.

Si ex usu legitimo opiatorum succedat quies atque somnus & doloris remissio, salva res est; si verò non, desperata.

In ileo dolor iste acutissimus subitò sine causa manifesta deficiens, gangrænae intestinorum signum est.

Facit hunc Aphorismus 10. HIPPOCRATIS sect. 7. Ab Ileis vomitus, aut singultus, aut surditas, aut convulsio, aut desipientia, malum.

Si contingat cum stranguria, nisi febre superveniente copiosior urina fluxerit, iuxta HIPPOCRATEM sect. 6. aphor. 44. lethalis est; eum juxta allegatum HIPPOCRATEM sect. 7. §. 3. febris convulsionem solvat: item si febris acuta cum parotidibus adsit: item si alvus citra causam manifestam fiat aperta: vid. TVLPIVS l. 2. obs. 4 & RHODIUS c. 2. obs. 79.

Arabes quinque gradus Ileis constituerunt:

1. Periculosissimus is est, quando stercus vomunt.
2. Si sudor ex toto sit foetidus.
3. Cum spiritus, qui respiratione emittitur, est foetidus.
4. Cum ructus est foetidus.
5. Cum per alvum crepitus foetidus exit.

De hujusmodi Iliacorum foetore, cons. PANAROLVS Pent. 3. Obs. 16.

### CURA.

Quod attinet Curam, consistit in eo:

1. Ut irritatio intestinorum sistatur.
2. Ut excretio contentorum naturalis quacunque ratione promoveatur.

Unde prout causa irritans varia, & prout multipliciter alvus sisti potest, varianda subinde specialis Cura.

Ea, quæ usurpantur, sunt tam interna quàm externa. In genere, quoad multiplices istos scopos, adhuc observandum:

I. Ubi stercora dura adsunt, aut ubi saltem præsupponuntur talia, ibi nil agi potest, nisi hæc ipsa indurata clysteribus prius emolliantur: nam si diu nimis expectent ægri sine præsidio, & stercora postmodum per superiora ejiciantur, rarè, vel cum magna difficultate, evadunt. Testantur hoc non solum curæ Forelli l. 21. Obs. 22. & seqq. sed etiam rustica, quæ cum per quinque aut plures dies noctesque ex ileo omnia per superiora rejiceret, nec quicquam retinere posset, Clystere emolliente injecto servata est. Excretio igitur retentorum omni studio promovenda venit.

II. In Ileis morbo quacunque purgantia fortiora, aut etiam leviter stimulantia, per os exhibita, non conveniunt, nisi jam sedata sit omnis intestinorum irritatio, & hinc ortus motus eorum inversus: nam subsistente irritatione, & durante aut imminente vomitu intestinali, purgantia quacunque, tam lenia quàm fortiora, semper evadunt vomitoria,



ria, & ita malum non leviter exasperant. Per os igitur, quantum possibile est, fugienda sunt ceu venena; revera enim motus iste inversus augetur, & vomitui stercoreum, si non adsit, occasio suppeditatur. Conf. SYDENHAM *Tr. de Metb. curand. Febr. p. 67. 19. 68.* qui admodum est elegans, quando dicit: quod non applicanda sint purgantia, nisi prius restituto in integrum ventriculo, atque adeo ad motum naturalem deducto; quod verissimum est. Vid. JOEL *Prax. l. 4. Sect. 3. c. 6.* DRAWIZIUS *de Scorb. qui dolores causat. p. 8. p. 562. M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 238.* Atque hæc imprimis de stimulantibus per os intelligenda sunt; quæ enim clysmatum formâ injiciuntur, tutius usurpantur. Potius ergo laxantia adhibenda.

III. Observandum: licet periculum præsens vitæ sit, metuendum tamen, nisi sequatur multa excretio, & revocetur omnino motus humorum deorsum, qui sursum ferebatur, non extra periculum esse ægrum. Nam quia totus venter inferior commotus est, non prius securitas credenda erit, quam sequitur alvi profluvium, aut sponte, aut per artem provocatum. Unde mortui sunt nonnulli incuria istâ, de quibus Medicus jam securus erat, ut dicit BALLONIUS *l. 2. Conf. 24.* Semel ergo cessante morbo iliaco seu vomitu stercoreo, non mox à cura abstinendum: prospiciatur igitur ægro, ne in recidivam cadat, aliâs facili.

IV. Etiam observetur, quod in hoc affectu ægri subinde summâ virium dejectione laborent, & non raro animi deliquiis; propterea Medicus semper aquâ aut spiritû theriacalem camphoratâ, aut spirituum vini cum aqua Cinnamomi, præsertim propter ventriculi labem, aut spiritum rosarum ambratum, Confectionem Alkermes, quo viribus consulatur, aut similia reselectiva in promptu habere debet. Animi deliquium oritur ex fœtore, quo tales sunt affecti: Jam omni fœtida spiritibus nocentissima judicantur. De fœtore hoc consulas PANAROLLUM *Pent. 4. Obs. 16.* de juvene quodam, vulvulo tandem mortuo, qui fœtidissimum odorem non tantum in omni vomitu & ructu, sed etiam tandem ex toto corpore, exspiravit.

V. De opiâ queritur: an usurpandum sit? Resp. Opiata propter irritationem & præternaturalem motum & dolorem interdum usurpanda; sed cautè: sistunt quidem irritationem & motum peristalticum inversum, quod remordet, ileos non adest; sed simul impediunt alvi excretionem. Propterea considerandum est, quod magis urgeat? Nempe si (1) magis affectum inducat irritatio, præmittenda sunt opiata, & hinc subjungantur, quæ alvum stimulant, & fœces educunt: sin verò ex obstructione undecunque orta natum sit malum, hæcque adeo magis urgeat, danda sunt, sed non, nisi relaxatâ seu apertâ alvo, ad irritationis & motus peristaltici inversi memoriam quasi tollendam, aut recidivam præcavendam. (2) Quando aliis omnibus irritis, aut in specie propter continuum vomitum nihil introritti potest, perpenlis omnibus circumstantiis, ad compescendum stomachi furorem propinentur. Non tamen expectetur, donec vires deficiant penitus, sed his utcumque adhuc robustis Opiata usurpanda, appropriatis tamen stomachicis juncta; e. g. cum aqua menthæ spirituosâ, aqua Cinnamomi, &c. ut aliquandiu sufflaminato motu peristaltico inverso, alia remedia melius operentur. Porro (3) in spasmu intestinorum à sale acriscoroutico, nervos melfarai-cos aut fibras afficiente, ut in colica scorbutica, ad remissionem illius usurpari possunt, ut remittente spasmo, alia abstergentia aut Evacuantia ed melius operari possint. (4) In inflammatione intestinorum fugiantur, ne ad citam gâ-grenam hæc disponant; fugiantur opiata, si mors est in olla, ne prostituantur remedia aliâs salutaria: De quo opii usu in passione iliaca conf. WEDELIUS in *Opiol. p. 120.* item M. A. N. C. *Ann. 2. Obs. 238. p. 240.* & *Ann. 9. Obs. 114. pag. 279.*

VI. In ipso morbo, à quacunque causa fuerit, ægri vitent frigida quævis, tam alimentâ quàm medicamenta; quin calida intus & extra usurpentur. Omnis potus frigidus fugiendus, sed calidis ventriculus demulcendus: jam convalescentes tanquam puerperæ, tractandæ; nec sese aeri frigido exponant, nec in victu peccent; quin in & post affectum victus tenuis ordinetur, & non nisi cochlearia aliquot juscule gallinacei sorbeantur, ova sorbilia &c. assumantur, quemadmodum & ad motis externis studiosè se à frigore præservent ac defendant: hinc paradoxon satis videtur, quod HIPPOCRATES *l. 2. Epidem. Sect. 6.* in vulvulo tenui seu molli (idest flatuoso) frigidum vinum multum meracum comendet: vid. VALLESIUS *Commen-*

*tar. in hunc locum, & HORSTIUS Centur. Probl. Dec. 6. Qu. 2.*

Conveniunt ergo in hoc affectu quamplurima supra ad alvum adstrictam laudata; uti sunt, ratione quidem alvi clausæ, clysmata abstergentia & emollientia & ex vino, urinâ pueri, & seminibus carminantibus parata, à ZACUTOLUSITANO *l. 7. Medic. Princ. l. 1. p. 97. Obj. sequ. commendata.* Simplicia emollientia, & ex his parata clysmata, item oleum lini, raparum, sesaminum, &c. clysmatis instar usurpanda, satis sunt cognita: quod etiam pertinet clysmata emollientia WEDELIUS in M. A. N. C. *Ann. 2. Obs. 238.* Quod si hæc emollientia non satisfaciant, & opus sit stimulo, ipsis incoquitur colocynthis; item oleosa dicta applicantur, quibus incocti sunt trochisci alhandal, vel oleum diacolocynthidos mixtum: vid. RULANDUS *in lib. Præf. p. 232.* ubi habet observationem de ileo periculoso, curato per Clysterem ex olei feminis lini 3 vj. cum trochiscor. alhandal 3 j. parum bullitis: hoc bene inunxit umbilicum, reliquum injecit: excretis copiosis, hoc solo curavit. Quo pertinet Clyster Hartmanni ex iure pisorum, extracto ejusdem, oleo lini, in quo trochisci alhandal ebullierint. Vel

R. Herb. Mercurial.

Parietar.

Flor. lil. alb.

Samb. an. M. j.

Semin. napi 3 j.

Coq. in f. q. aquæ:

Colatura 3 x. adde

Infus. Antanomial. 3 i. ss.

Sal. Gemma 3 j.

Mell. Mercurial. 3 l.

M. f. Enema, S.

Clyster aperiens

Vel

R. Herb. malva,

Parietar. an. M. j.

Flor. meliss.

Sambuc. an. M. ss.

Coque in f. q. aquæ simpl.

Colatur. 3 viij. adde

Sal. gemma 3 j.

Syr. emer. Ang. Sale 3 j.

M. f. Enema in fecibus induratis viscidis, S.

Clyster aperiens

Facit huc POTERIUS *Obs. 19. Curat. l. 2. c. 83.* de iliaca passione, per oleum supra & infra infusum curata. RIVERIUS commendat pro Clysmate decoctum intestinorum & omenti vervecis, in quo butyrum & parum salis gemmæ dissoluta sint; sed in induratis fecibus: item LINJANUS laudat Clyisma ex Decocto hordei, vel alio, addito nitro ad 3 iij, idque in specie, si malum adsit, aut metuendum ex inflammatione intestinorum: vel ad imitationem ZACUTII *l. 2. Med. Princ. Obs. 97.* ex SCRIBONIO LARGO fiat Clyisma ex oleo cum ruta & nitro decoctum, quo iliacum morbum cum vomitu stercoreum curavit. Quod si verò vel motus peristalticus inverti incipiat in intestinis crassis, aut ab ipso podice, qui tunc est retractus, iniecta talia stimulantia raro, imò nunquam, scoposatisfaciunt, sed potius irritant: valent tantum in intestinis tenuibus, in crassis verò affectis per superiora curamus: vid. M. A. N. C. *Ann. 3. Obs. 209.* Propterea omnes bene observentur circumstantiæ, & usurpentur, quæ nullo modo stimulant, sed simpliciter emolliunt & relaxant. Emollientia & relaxantia sunt juscula, acrimoniam plus minus temperantia, & blandè abstergentia, ut juscula gallinaceas, vel sola, vel cum chamomilla aut plantis emollientibus decocta: v. g.

R. Herb. malva cum flor.

Flor. chamom. Rom. an. M. j.

Rad. alib.

Liquirit. an. 3 ss.

Coque in jusculo gallinaceo:

Colatura 3 j. vel 3 j. ss. adde

Liqu. terræ fol. rariar. 3 vj.

Olei amygd. dulc. 3 vj.

M. f. Potio, S.

Potio emolliens.

De qua in fecibus induratis ad 3 jv. pro dosi, probe agitando, haurienda.

Subinde etiam pinguiâ, intestina lubricantia, in usu sunt, qualia sunt olei commune aut olei amygdalarum dulcium, sed recens, ad 3 iij, in jusculo calido assumendum: item vinum malvaticum cum 3 ss. spermatis cert:

G

Vel



Vel

*R. Olei Amygdal. dulc.*  
*Vini malvat. an. ʒiij.*  
*ac. Tberi ʒj.*

*M. pro Potione, S.*  
*Potio emollientis.*

Vel

*R. Decoct. pass. min. cum tamarind. ʒss.*  
*Olei amygd. dulc. ʒij. vel iij.*  
*Syr. de pom. ʒj ʒss.*

M. S.

*Potio aperiens.*

Item

*R. Crem. tartari ʒj.*  
*Scamm. præpar. Brendel. gr. ix.*  
*Extr. troch. sc. alband. gr. iij.*  
*Olei destill. anfigutt. vj.*  
*M. f. pulvis.*

Div. in 3. partes æquales, S.

*Pulvis aperiens.*

**Raparum Decoctum**, tam crudarum quàm priùs afsatarum, copiosius haustum est laudatum; vel decoctum florum chamomillæ adjecto butyro non-salito tepide haustum: nec minus succus pomorum Borsdorffensium putridorum mirabilis est in tali Iliacorum casu: conf. M. A. N. C. Ann. 6. Observ. 114. p. 153. Et sanè observavi in quodam Iliaco, quod post injectum clystma ex olei rapar. ʒjv, lini ʒiij, diacolocynthidos Quercetani ʒvj. invicem miscendo, idque sæpius repetitum, cum simul bina poma Borsdorffiana vasa comedisset, copiosi secessus fortidi cum flatibus inde subssecuti: sic in muliere ex bubonocèle utriusque lateris cum gravissimis alvi torminibus, ac imminente ileo propter spasmus intestinoꝝ, me frustra plura tentante, nihilominus vetula accedens applicatione pulpæ pomorum Borsdorffianorum putridorum cum paucis croco, & super totum abdomen instratione mulierem levavit, & alvum referavit.

Quod si hæc, & quæ supra de alvo obstructa fuerunt commendata, non sufficiant, in pertinaci alvi clausura conveniunt bina remedia, quæ instar omnium sunt: nempe globuli plumbei Musquetarum & Mercurius vivus. Conveniunt Globuli bombardarum seu musquetarum, si sæcum induratarum retentio, sive conglutinatione intestinoꝝ aliquis adsit, sive ingressus intestini inferioris in superius ileum excitaverit: quo in casu inferius detruditur in suum locum; sed præmissis imprimis usu olei amygdalarum dulcium recens expressi, iuscui pinguioris, similisve fluidi, ut horum medio quasi lubricentur viæ. Globulos hos primùm credo introduxisse HELMONTIUM Tr. de Flat. §. 3. Ubi verò inflammatio, vel pangsæna, vel hernia, vel ingressus intestini superioris in inferius, excitaverint affectum, nihil possunt, quia potius exasperant malum: vid. de his globulis, præter HELMONTIUM, HEINRICUS ab HEER Obs. 2. & M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 96. p. 155. pluresque alii Autores. WELSCHIUS Hecateos. 2. p. 19. Obs. 33. cum Saturno Mercurium in amalgama redigere, hincque globulos parare docet. Rarum est, quod ileus ex omphalocèle per dictos globulos curatus fuerit, Autore WELSCHIO loco citato: sic ZACUTUS LUSITANUS l. 2. Præceos admiranda Obs. 27. dicit & observat, quod pilæ plumbeæ primò 12, post 18, parvæ tamen, (Germanicè Schrott) curent & curarint ileum desperatum ex nimia castanearum crudarum ingurgitatione seu ingluvie, ac facibus inde induratis natum; sicut etiam habet exemplum ilei, orti ex pyris crudis copiosè ingestis. Verùm hi globuli non semper adeò sunt tuti, quia interdum diutius in corpore morantur: tale exemplum de tali globulo observatum, qui 11. die tandem redditus fuerit per alvum: tacco, quod non semper iusticiant: vid. FONTANUS in Consil. pag. 85.

Globulis ergò plumbeis præferendus Mercurius vivus: sed probe sit depuratus & copiosè ingestus, in dictis casibus nempe, ubi utiles sunt globuli plumbei; sed dico; satis copiosè assumi debere. Communiter ad ʒj. præcipitur ut capiat in oleo lini, vel oleo amygdalarum dulcium, aut cum oleo communi & saccharo, movendo non nihil ægrum desuper; quod quidem non contemno, sed putotamen, Mercurium ad aliquot uncias assumendum esse, ad minimum ʒiij. vel jv, interdum etiam à ʒss. ad ʒj. ut eò melius penetrare possit, applicando simul externè fomenta blandè emollientia, & postmodum simul ac per alvum

ejectus est, (nam si minor est dosis, tardè & difficulter redditur,) propinetur ægro olei amygdalarum dulcium ʒss. cum olei destillato anisi ʒss. ut lubricentur denuò & emundentur intestina: commodum etiam est, ut præmittatur aliquamdiu oleum amygdalarum dulcium recens ab ʒss. ad ʒj. vel ʒiij, vel sperma ceti in vehiculo calido, ut eò melius lubricentur viæ. Aliquando ERBENIUS, Archiater Polonus, propinavit ad ʒss. iij. Mercurij vivi, præserte febri, in pertinaci obstructione alvi, & quæ variis antea adhibitis catharticis & fortissimis enematibus referat non potuit: Ut ergò promptius operaretur assumptus Mercurium, ægrum post deambulationes primùm, mox saltationes, curru demum impositum hinc inde cum violentia & impetu, super strata & rura culta, trahi iussit, qui postmodum domum reversus in somnum incidit, manè verò reperit stercora cum Mercurio vivo in lecto, ut per 3. dies noctesque illum detinuerit. Historiam videbitis in Dissert. mea de Doloꝝ Hypochondriaco c. 5. §. 5. Vel immitatur æger in Balneo Aquæ tepide vel Decocti emollientis tepidi, postquam Mercurium ita assumpsit, ut internus Mercurij usus promoveatur per externum istum solum. Prostant exempla, propinatum fuisse Mercurium ad ʒj. imò ad ʒss. iij. vid. HEINRICUS ab HEER Obs. 27. ZACUTUS LUSITANUS loco allegato Observat. 35. & PARÆUS l. 16. c. 58. Quia verò globuli & Mercurius frigore suo aliquantum intestina lædunt, post horam usum ZACUTUS loco allegato clysterem ex vino generoso; HEINRICUS ab HEER l. a. ex vino Cretico injicere jubet; quod aliis emollientibus & anodynis enematibus præstare licebit: imò quia interdum Mercurius aliquoties & in majore quantitate exhibitus retinetur, hinc dolorem colli, & intumesceniam gingivarum movet, & exin salivatio imminet, his etiam partibus succurrendum per mel rosarum, syrupum violarum, &c. & Mercurij exitus per Clysteres omni studio promovendus, & reliquæ ipsius per interna solaria, v.g. Bezoarticum solare, antimonium diaphoreticum, aliaque diaphoretica, consumantur: quæ vult videre plura de Mercurio in Iliacæ passionis, videat RIVERII Prax. p. 456. Item HENRICUM ab HEER in c. 1. RHODIUM in c. 2. Obs. 80. & in Obs. HEINRICI MOINICHEN, Cultus anatom. Lyseri annexis, pag. 244. Et quidem, quod Mercurius sit melior globulis plumbeis, patet ex FONTANO, qui in Consil. & Respons. p. 85. Iliacæ passionem tandem Mercurij ope curatam refert, postquam æger 3. bombardæ globulos sine successu devoravit. Propinavi ego alicui ʒss. sed irritò successu; & cum aliam dosin sumere vellet æger, epilepsia superveniente interibat. Curavi tamen mulierem quandam verberibus læsam in capite, cum febre superveniente, perniciosissimæ alvi obstructione laborantem, cum abdomine hinc indurato, tumido & doloroso, & præsertim in hypochondrio sinistro tumore duro, unde mali causa, ut tandem quoque singultire inciperet, quæ integras duas libras Mercurij vivi successivè deglutit cum salute. Cum enim metuerem jam imminentem ileum, die 14. Junii exhibui:

*R. Aqu. Mentb. ʒj.*  
*Mercurij vivi depur. ʒiij.*  
*Olei amygdal. dulc. ʒvj.*

Mista hausit pro una vice sine alteratione. Die 15. Junii:

*R. Aqu. mentb. ʒj.*  
*Cinnam. ʒiij.*  
*Mercurij vivi purg. ʒiij.*  
*Olei amygd. dulc. ʒvj.*  
*Misc.*

Sed iterum sine effectu. Vesperti sequens ordinavi Clystma:

*R. Decoct. flor. chamom. ʒiij.*  
*Aqu. benedict. ʒiij.*  
*Sal gemmæ ʒj.*  
*Misc. pro Clysmate.*

Sed omnia frustra. Die 16. Junii Potio eadem Mercurialis deuo hausta fuit: sed frustra; unde dolor hypochondrii sinistri intendebatur, abdomen durum evadebat, & singultus major. A meridie dedi:

*R. Aqu. Mentbæ ʒj.*  
*Cinnam. ʒss.*  
*Mercurij vivi purg. ʒv.*  
*Syr. rosar. solut. ʒvj. M.*

Hausit frustra.

Externè ad emolliendas sæces præscripsi:

*R. Pingu. asferin. ʒiij.*



Qua calide crebrius abdomen inungebat.

Die 17. Junii prescriberebam:

℞. *Lact. bubul.* ʒ viij.  
*Terebinth. cum vitell. ovifol.*  
*Sal tartari an.* ʒ iij.

M. pro Clystere, qui pro duabus vicibus, sed frustra, applicabatur.

Potio Mercurialis proxima denuo hausta fuit mane, & iterum de novo hausta vesperi, ita ut xger ʒ. ij. Mercurij in corpore haberet, unde & varios motus in abdomine percepit: sed alvus clausa manebat; ideo & eodem die Infessus pro semicupio ordinatus fuit:

℞. *Herb. ʒ. flor. Chamom.* M. vj.  
*Malva rec.* M. iij.

*Flor. sambuc.* M. ij.

*Bacc. lauri* ʒ iij.

Coquebantur in aqua.

Infidebat ægra, continuando interea semper litum abdominis cum axungia anserina.

Die 18. Junii Infessus idem & clyisma continuabatur. Mercurius pertinaciter in corpore subsistebat, uti & 19. & 20. die. Hòc tempore dolebat collum, tumescebant gingivæ, vacillabant dentes, & Mercurio retento salivatio superveniebat; unde pro faucibus & collo leniendis

℞. *Mell. rosati* ʒ j.  
*Syr. violar.* ʒ ʒ. ad ʒ j.

Miscebantur.

Pro abdomine verò illinendo:

℞. *Ungu. de arbanit.* ʒ j.  
*Olei diacolor. Quercet.* ʒ ij.

Miscebantur pro Linimento, quo inungebatur abdomen.

Die 21. eundem adhuc persisterent, & ultra ostiduum Mercurius vivus in corpore hæreret, pro facibus duris & tumore in colo sub hypochondrio sinistro emolliendo cum dicto unguento prescripti.

℞. *Emplast. de cicuta,*  
*Gum. Ammoniaci aceto sol.* an. q. s.

Miscebantur pro Emplastro, quod malaxatum cum oleo tartari fetido, inducebatur super alutam, & applicabatur integro hypochondrio.

Die 22. Junii:

℞. *Decocti spec. emoll.* ʒ viij.  
*Salis em. clavell.* ʒ vj.  
*Mell. despum.* ʒ iij.

Miscebantur pro Clysmate, sæpius iterando.

His & similibus factum est, ut pedetentim soluta alvus, Mercurio successive in pauca quantitate apparente. Continuantur clysmata, unguenta supra dicta, donec die 29. Junii nocte ex improvise lectu copioso Mercurio vivo repletum fuerit: hinc pro alvo aperta servanda, & Mercurio, fauces adhuc affligente, eliciendo, die 3. Julii prescripti:

℞. *Lact. vaccin.* ʒ j.  
*Salis ciner. clavell.* ʒ ʒ.  
*Mell. rosat.* ʒ jv.

Miscebantur pro Clystere, qui pro duabus vicibus applicabatur.

Sed cum die 23. Julij adhuc Mercurii vestigia superessent, ordinavi Decoctum Hochstedteri ex rad. enulæ & sceniculi pro sudore; item Bezoardicū solare sequenti modo:

℞. *Pulv. Bezoard. fenn.* ʒ j.  
*Bezoard. solar.* ʒ ʒ.

Miscendo pro pulvere.

Vomitibus copiosis materiz viscidæ creberrimus supervenit ab hoc medicamento, & ita continuatis internis jusculis, ext. ernæ clysmatibus, successivè convaluit.

Præter hæc dicta, ratione irritationis plus minus intensæ, internæ etiam præter anodyna & opiata supra laudata, juscula pinguia emollientia, quæ acrimoniam temperant, & indurata emolliunt, usurpari solent; quorum historiam videbitis in RIVERIO. Imprimis Jusculum Decoctiois malvæ, aut Decoctum florum meliloti & chamomillæ, item juscula Decoctiois raparum, quæ & leniunt, & simul blandè abstergunt; item Decoctum hordei cum melle & nitro assumendum. SYDENHAM ubi de eorum symptomatis, in principio morbi pro sistenda irritatione & compescendo vomitu laudat ʒ j. salis absinthii cum succo limonum assumpti, superingestâ subinde aquâ menthæ: ac sanè remedium hoc non est contemnendum. Observavi in iliaco, quod post hanc potiunculam, ad illius imitationem conscriptam, & vomitus cessaverit, & dolor abdominis multum remiserit.

*Estmuller. Oper. Tom. II.*

℞. *Aqu. Menthe* ʒ iij.  
*Spiritus theriac. simpl.* ʒ ʒ.  
*Salis absinth.* ʒ j. ad ʒ ʒ.  
*Syr. de spina cervi.* ʒ vj. ad ʒ j.  
M. S.

Potiuncula stomachalis contra vomitum.

Hæc potio mutatis mutandis sæpius repetita optimum effectum in Iliacis solet habere: Vel

℞. *Aqu. Menthe* ʒ ij.  
*Cinnam.*  
*Zedoar. cum vin.* an. ʒ ʒ.

*Salis absinth.* ʒ ʒ.

*Laud. opiat. gr. ii.* vel iij.

*Syrupi de spina cervina* ʒ vj.

Misc. pro Potione, S.

Potio stomachalis lenitiva.

℞. *Aqu. feniculi,*

*Menthe an.* ʒ j.

*Spiritus theriacal. campbor.* ʒ ij.

*Olei sacch. cinnam. gr. xij.*

*Laud. opiat. ferm. gr. ij.*

*Syr. fenicul.* ʒ ʒ.

M. D. S.

Viantea.

Capiatur cochleatim.

℞. *Aquæ fenicul.*

*Menthe an.* ʒ ʒ.

*Carmin. cum vin.* ʒ j.

*Spiritus sal. ammoniaci anisat.* ʒ ʒ.

*Essent. opii* ʒ j.

*Syr. menthe* ʒ vj.

Misc. & detur in principio, S.

Potio lenitiva, cochleatim sumenda.

Item spiritus terebinthinæ à P E T R Æ O ceu egregius commendatur ad sistendam irritationem. Commendatur etiam theriaca in haustu vini calidi generosi ad ʒ j. assumpta, quando scilicet malum non est ab inflammatione, multum præstat; item syrupus papaveris & similia. Vel

℞. *Succin. præpar.*

*Antimonii diaphor.*

*Cinn. antimonii an.* ʒ ʒ.

*Laud. opiat. gr. ij.*

*Campbor. gr. i.*

M. f. pulvis, S.

*Pulvis lenitivus.*

℞. *Cinn. Antimonii* ʒ ʒ.

*Dent. bippopot.*

*Bezoard. mineral. an. gr. viij.*

*Campbor.*

*Laud. opiat. an. gr. ij.*

M. f. pulvis, S.

*Pulvis lenitivus.*

℞. *Corn. Cerv. sine igne,*

*Dent. bippopot.*

*Cinn. Antimonii an.* ʒ j.

*Sal. vol. Corn. Cerv.*

*Succin. an. gr. v.*

*Campbor. gr. ij. M.*

Divide in 2. partes, S.

Viantea

Si ab inflammatione malum fuerit, post abstinentiam alimentorum à RIVERIO adeò commendatam, cæteris paribus, venæ sectio proficua erit, tam in brachio quam crure, repetita, cū Clysteribus emollientibus, anodynis, ex lacte cū pauco saccharo, mucilagine seminis psyllii, & nitro.

Vir juvenis corripiebatur colicâ, ad quam aliàs proclivis erat, eique Tauchæ concitata, occasione animi pathematum, perfert eam per noctes 2. & 1. diem, hinc rheda domum vehitur sub pessimæ viæ conditione acerbè dolens.

Die Mercurii vesperi cum rediisset, accedens, offendo illum de continuis copiosis, viscidæ & biliosæ materiz vomitibus conquerentem, unâ cum exquisitissimis abdominis iliacis torminibus, cum totius regionis infra umbilicum duritie, & ad tactum renitentia: contactum autem doloris causâ ferre non poterat: alvus utcunque fluida, pulsus celer, frequens admodum, magnitudine moderatus, durus, sicis intensâ, stupor manuum reciprocus. Suspicabar inflammationem intestinorum in quodam ilei loco, occasione dolorum & motionis in rheda excitatam: forsan ingressus quoque in quodam ilei loco partis superioris in inferiorem simul aderat. Ordino Clyisma, quo applicato spasmus



manuum & pedum supervenit, retentum tamen per di-  
midiam horam bene evacuavit. Interne essentiam the-  
riacalem camphorata cum medio essentis opii prescripti,  
bis assumendam.

Die Jovis eadem adhuc omnia, saltem dolor remissior;  
intendebatur verò ariditas faucium & lingue, sitis cla-  
mosa, calor mediocriter, &c. ex quibus cum superioribus  
signis collatis confirmabatur adesse quandam intestinorum  
tenuium in quodam loco inflammationem: potum, nisi pro-  
bè calidum, revomebat: quoties aliquid biberet, toties  
dolores recrudescabant. Interne eadem continuanda iussi  
unà simul cum portione analeptica cum essentia opii, quam  
tamen subinde revomuit, interdum tamen quies unius al-  
teriusve horæ somnolentæ; externe litum anodyno-carmi-  
nativum applicui; sed omnia symptomata eadem. Inter  
alia

R. Flor. sulphuris 3℥.  
Maxill. lucci p. 2. 3j.  
Laud. opiar. gr. i.

M. f. pulvis pro quibus dosibus vespertinis.

Ali quale levamen percepit; status & murmura infra um-  
bilicum augebantur, clysmatis usū die Veneris vesperti,  
& die Saturni mane, alvus laxata fuit; pulveres continua-  
ti, mador subfrigidus cum pulsu supra descripto affligebat.  
Tandem appetere die Solis aliquoties liquamina stercorea  
fœtidissima evomit cum insigni virium prostratione, ita  
ut perfectus ileos adesset:

R. Aqu. Ment. 3℥ij.  
Spiritus théracal. simpl. 3℥ij.  
Salis absinth. 3j. ad 3℥.  
Syr. de spina cerv. 3j.

M. pro Portione.

Cepit hanc, & vomitus cessavit, nec de dolore abdomi-  
nis unquam amplius conquestus fuit. A meridie potionem  
ad imitationem SYDENHAM' a prescriptam repetere  
iussi, & tandem nullo remedio in toto morbi cursu, quàm  
ab hac formula, melius & sensibilius levamen percipere  
potui; unde per plures noctes continuare iussi simul ordi-  
nando Clystina supra allegatum ex oleo raparum, lini &  
diacolocynthidis Quercetani, quod sæpius etiam repeti-  
tum non sine fructu fuit, & crebriores secessus spontanei  
hoc infecuti fuerunt; præsertim cum die Martis bina poma  
Borsdorffiana successivè deglutivisset, hinc enim nocte se-  
quenti copiosi secessus fœtidi cum flatibus depositi fuerunt.  
Interdum die Solis, Lungs & Martis æger de difficillima res-  
piratione, & anxietate summa conquirebatur, vix loquen-  
di habens potentiam, & pessimo pulsu ac madoribus supra  
allegatis colligativis subinde frigidis, quin & singultu sub-  
inde superveniente, quoties nempe respirationis difficul-  
tas & præcordiorum anxietas remitterent.

Externè sedulo usurpavit litum, latere calefacto super-  
imposito:

R. Ung. dialthæ. 3vj.  
Ole. Chamomill. 3℥.  
Destill. juniperi,  
Terebinthin. an. 3℥ss.

Miscendo pro Linimento.

Quoties later calidus non incumberet abdomini, toties  
pejus habebat æger.

Diebus ultimis de testiculi sinistri superiora versus re-  
tractione convulsi, item de penis intra corpus retroces-  
sione tali, ut parum emineret, conquirebatur, alvus sat  
commode fluida erat: undè ex inflammatione intestino-  
rum gangrenata mortem supervenisse arbitror.

Si ab hernia tractetur saltem hernia intestina reponendo,  
ut suo loco videbimus: imò in casibus desperatis cum se-  
datione quoque: vid. DURETUS in Hæleri Prax. cap. de  
hernia, PARÆUS l. 7. cap. 15. & BARBETTE Anat.  
Præf. l. 4. c. 2; testaturque RIVIERUS in Praxi, quoddam  
pedibus suspensos liberatos fuisse. Alias Clysteres actio-  
res non negligendi sunt, dum ROLFINGIUS l. 7. Con-  
st. 5. repetitis clysteribus antimoniatæ fœminam iliacam  
ab hernia restitutam fuisse refert.

Sin ab ulcere, res desperata satis est, & solis emollienti-  
bus acque laxantibus operandum.

Sin gangrenæ, est incurabilis.

Hæc internis, ad ilei curam usque, etiam simul ex-  
terna, partim alvi excretionem promoventia, partim  
emollientia & suaviter lenientia usurpantur.

Oleum igitur destillarum chamomillæ cæruleum cum  
pinguedinetaxi, anseris, anatis, &c. permixtum, uni-

verso abdomini crebrius illinendum: vel Galbanetum Pa-  
racelli, cum unguento de arthanita & dialthæa mixtum,  
& oleum chamomillæ vulgaris, vel anethinum, & dia-  
colocynthidis Quercetani, crebrius illinatur abdomini,  
lintea probè calefacta desuper applicando: e. g.

R. Ung. dialth.  
de arthan. an. 3j℥ss.

Pingu. taxi.  
Ole. dia. colocynth. an. 3j.

M. f. Linimentum.

Item ZACUTUS LUSITANUS l. ult. Præcos num.  
2. Obs. 2. curat ileon pertinacem ex esu malorum coto-  
neorum induratis fœcibus contractum, aliis omnibus ir-  
ritis, per stercus vaccinum recens crebrius repetitum toti  
abdomini instaurum.

Si dolor urgeat, quod est frequens symptoma, conve-  
nit omentum agni castrati recentissime & calidè abdomini  
impositum; mirè enim solet lenire dolorem & mitigare  
symptomata. Quidam etiam sanguinem vespertilionis,  
tanquam specificum, hypochondriis illunt; uti etiam  
si exuvia serpentum cum oleo rosaceo decoctæ ventri toti  
applicentur: vel sit etià infusio in Balneo Decoctionis plan-  
tarum emollientium, ut beneficio infussionis in balneo  
relaxatio fiat, & compescatur dolor: e. g.

R. Herb. chamomill. cum flor. M. iv.

Malvæ,

Melilot. cum flor.

Par. etar. an. M. iij.

Bacc. juniperi 3℥ss.

Incisa & cont. miscantur pro Balneo.

Applicantur etiam cataplasinata ex pomis Borsdorf-  
fianis putridis cum tantillo croci; vel ex stercore ovillo  
cum lacte cocto.

Veteres, & jam quoque moderni, in casu, quo intesti-  
na à copioso stercore fuerunt repleta, unà cum præsentia  
flatuum, applicarunt tollem, & status copiosus in intestina  
injecerunt, cum in finem, ut status intestina nimis disten-  
dentes scybala iisdem impacta à parietibus abscedere face-  
rent, & postmodum separata stercorea facilius per clyma-  
rent, vel aliis modis, possint elici. Videre potestis hunc ap-  
plicandi modum in HIPPOCRATE l. 3. de morb. Text. 15.  
9. 24 AMATOLUSITANO c. 1. Curat. 110. item in  
RIVIERI Prax. p. 456. uti etiam in EPIPHANIO FER-  
DINANDO Histo. 74. ZACUTUS LUSITANUS  
in l. 2. Prax. Admiranda Obs. 28. habet tale exemplum  
ilei, ex usu nimio oryzae fœmiculæ ob retentas fœces per  
applicationem follis curati; quæ cura tamen nullius est  
usus.

Denique, cum omnia alia videntur frustranea, delibe-  
randum est, an audiendum sit consilium BARBETTE,  
quod habet in sua arstone ad Praxim applicata p. 148 qui dicit:  
aliis nil juvantibus apertionem abdominis esse instituen-  
dam, & manuali operà intestinorum situm corrigend-  
um.

Subsistimus adhuc in læsa contentorum in intestinis Ex-  
pulsionem, & progredimur nunc ad

## CAPUT II.

### DE

## EXPULSIONE CONTENTORUM AUCTA.

Quando nempe aut citius, aut crebrius, aut frequen-  
tius, aut copiosius, ejiciuntur copiosa excrementa  
& contenta. In genere vocatur alvi fluxus, qui alvi fluxus  
pro excretorum varietate vario modo nocet, & varia forti-  
tur nomina, dum distinguitur in Diarrhæam, Lienteriam,  
Dysenteriam.

## ARTICULUS I.

### DE DIARRHŒA.

Communissimus alvi fluxus est, qui vocatur Diarrhæa,  
quæ est humorum variorum plus minus naturalium  
aut corruptorum diversimodè constitutorum per alvum  
copiosus effluxus, ut plurimum orcum habens ex massa  
sanguinea, per fermentationem excrementa segregante,  
& in intestina amandante: hinc enim pro varietate ex-  
crementorum, quæ solent effluere, variant Diarrhææ quæ  
sunt



sunt nunc conjunctæ cum torminibus, nunc cum flatuum proventu, interdum sine iis, interdum in intestino recto pulsatione, nunc pituitosæ, nunc serosæ, nunc biliosæ, nunc viridescentes, nunc cruentæ, sine torminibus tamen, nunc purulentæ, quando nempe pus per inferiora rejicitur, & qui sunt alii modi. Observata quoque fuit *Diarrhoea pinguis oleosa* instar butyri: vid. M. A. N. C. *Ann. 2. Obs. 20 p. 35.* Interdum *Diarrhoea lapidosa*, vel copiosi lapides per alvum excreti, ut refert SCHENKIUS in *Obs. 1.* ubi etiam habet exemplum *Diarrhæe* tandem lethalis, in qua sæpius ossa, & ossicula, & quidem copiose, fuerunt excreta: etiam observata fuit verminosa ex fructibus horreis corruptis; vid. HORSTIUS *l. 4. Obs. 16.* sed mittimus has *Diarrhæas* mirandas. *Purulenta Diarrhoea* speciatim oritur ex prægressa ruptura cujusdam aut abscessus aut ulceris mesenterii, pleuriticoꝝ, &c. Sic enim PARÆUS in  *suis Operib.*  ex ulcere artuū pus per alvum rejectum refert: sic habentur exempla *Diarrhæe* saniosæ ex rupto jecoris abscessu: vid. BENEDICTUS SYLVATICUS *Cent. 3. Conf. 15.*

Præ cæteris observandæ sunt differentię *Diarrhæarum* ratione causarum sciendique modorum: dum nempe *Diarrhoea* est vel artificialis, qualis est purgatio seu catharsis per medicamenta instituta ratione venenialcalini; vel est naturalis citra artem Medicam, sed ipso naturæ motu instituta: & hæc est vel spontanea, vel non spontanea, quæ fit naturæ coacta. Illa, spontanea, quæ faciliè in corpore cætera sano excitatur, & nullum morbum præcedendum habet, quæ excernuntur ea, quæ debent, vel ob cautiam & errorem externum, ut v. g. fructibus horreis assumptis, esu cucumerum: talia enim inferunt *Diarrhæam*, quatenus in stomacho fermentantur, & sic successivè pessundant fermentum stomachi, & massam sanguineam fermentando, orgasmum bilis excitant, qualis notissimus est. Huc etiam pertinet refrigeratio corporis nocturna. Vel ob internam materię morbificæ metastasin, quando propter aliquam evacuationem suppressam fit *Diarrhæa*; qualis v. g. pleuritidem in sene sexagenario solvit; de quo v. PANAROLUS *Pentec. 1. Obs. 36.* aut quando pleuritidi suppuratæ supervenit *Diarrhæa* purulenta: Hæcque *diarrhæe* cum euphoria relinquuntur, quia sunt ad salutem ægri. Faciunt huc *Diarrhæe*, quæ dicuntur oriri ab hepate, cerebro, liene, &c. V. g. ZACUTUS LUSITANUS *l. 2. Præcox. Admir. obs. 22.* refert fluxum diurnum cerebralem, cauterio ad bregma indito curatum: idem *l. 1. Med. Princ. Hist. 76.* refert alvi fluxum ex debilitate brachii unius subortum, eo corroborato sanatum: sic refert RHODIUS *l. 2. obs. 84.* insignem *Diarrhæam* ex urinæ suppressione natam, dum fuit rejecta per pancreas urina, per renes aliàs secernenda: sic lochia suppressa interdum excitant *diarrhæam*, puerperis non infalubrem, ob materię metastasin: similis *Diarrhæa* videtur esse ista, quam refert MEARA, *Hibernus*, contra Villisium in *Historia Medicis Varior. pag. 131.* de *diarrhæa* serosa, ut ipse inquit, oriunda ex capite, quæ remote ex massa sanguinea orta videtur, utpotè quæ quoties suppressa fuit, toties copiosi pediculi generati sunt, ipsa verò fluente, ipsi pediculi evanescerant: sic SCHENKIUS *l. 3. obs. 18.* *diarrhæam* ex disrupto lienis abscessu notat: & SYLVATICUS *c. 3. Conf. 18.* refert *Diarrhæam* saniosam cum febre & jecoris abscessu, ex bubone sub axilla.

Omnes hæ *diarrhæe* saltem spontaneæ naturæ motu, per metastasin nempe materię, & variam ex uno loco ad alterum translationem seu motum, originem duxerunt. Vel denique spontanea *diarrhæa* excitatur ob spontaneum humorum motum, ubi ex quacunque causa vitium bilis, ejusque sal volatile oleosum, ordinariò subesse aut simul jungi solet, quatenus regurgitat in stomachum, ejusque acidum destruit, unde anxietates, sitis, & tandem *diarrhæa* supervenit. Tales sunt *diarrhæe*, quæ ex mutata diæta in peregrinationibus, item quæ tempore verno aut autumnali quibusdam suâ spontè superveniunt *diarrhæe*.

*Non spontanea* est vel morbus vel morbi. *Diarrhæa*, quæ est morbus sunt istæ, quæ subinde ægros affligunt, sive externæ, sive internæ occasione ratione; item quæ alterationi corporis post fructus horreos superveniunt. Hujusmodi *diarrhæa* interdum est vel epidemica, quæ ut plurimum simul contagiosa: alia non epidemica seu communis. *Diarrhæa* contagiosa per halitum contagiosum multiplicatur, & simul est maligna, quæ interdum in acutis anxietates, symptomata graviora, & sudores frigidos sæpe habet comites. Denique *diarrhæa* morbofa alia est *accidentalis*, alia est *habitualis*: *Accidentalis* in morbis externis ex

Etzmüller. Oper. Tom. II.

improviso venit: *Habitualis* est, quando nempe quidam diu & subinde ad longum tempus habent alvum laxiorem, vel qui levi ex causa solutionem alvi crebram habent. Testantur observationes, talem alvum solutam quosdam ad annum unum, vel aliquot etiam, affligere.

*Diarrhæa morbi*, seu quæ contingit in morbis, est nunc *symptomatica*, nunc *critica*. *Critica diarrhæe* sunt, quando in acutorum morborum statu & declinatione materia cocta, seu scæces massæ sanguinæ, fermentando separatæ & præcipitatæ, sero involutæ per convenientia loca filtratæ & cribratæ separantur, & ita confertim per intestina amandantur. Quod & pertinent *Diarrhæe sanguinis*, utut raræ, & quidem per modum criseos affligentes: quales *diarrhæas* aliquot observavit RHODIUS in *C. 2. obs. 85.* ubi habet de *diarrhæis sanguinis criticis*, in febribus ægros ad salutem vindicantibus: quale exemplum nullus unquam Authorum annotavit.

*Symptomatica Diarrhæa* in morbis est, quæ in principio aut incremento morborum & febrium malignarum, ex turgescentia massæ sanguinæ fermentativa, similique orgasmo, & speciatim ex fermento maligno eam colliquantæ, quæ periculosa, aut in phthisicis vel in hecticis subinde oritur; quæ si non semper, saltem ut plurimum est maligna. *Symptomaticas* istas inter sunt primariæ *colliquædive* dictæ, seu *fluxus alvi colliquædive*, quando ægri cum paucis alimentis copiosissima varia excernunt. Oritur ex sale acerrimo volatili, unde morbus acutissimus oritur, talesque *diarrhæe* præter ardentes & malignas febres, ut & pestilenciales, imprimis phthisicos & hecticos vexant: siquidem phthisicis ordinariò aliquandiu ante mortem superveniunt; hinc & phthisici quamplurimi ab injecto clysmate saltem usuali copiosas patiuntur defectiones, & à levietiam propinato medicamento insigniter evacuantur, sed simul admodum læduntur: ob id simus cauti in laxandis phthisicis. *Colliquativa* dicitur, quia ros partium nutritivus, ac ipsa massa sanguinea, ex texturæ mutatione ita fatiscunt, ut instar liquaminis serosi copiosè per alvum evacuentur, cum junctâ notabili corporis emaciatione, viriumque sensili prostratione. Sanè quibuslibet tabidis, undecunque id mali contraxerint, de facili talis imminet *diarrhæa*. *Diarrhæe* etiam quædam observantur periodicæ, per certum tempus affligentes, & redeuntes, idque in habitu nonnihil cacochymico, & debiliore fermenti stomachi activitate. Exemplum habet FORESTUS in *lib. 27. Obs. 2.* de *diarrhæa* quadam spontanea, quæ serosi & alii humores excernebantur, singulis serè tribus mensibus recurrente, præprimis si olusculis humidis, præsertim peponibus, vesceretur: Sic *diarrhæam* etiam menstruam refert SCHENCKIUS *l. 3. Observationum*, quæ *diarrhæa* declinante lunâ cum variis torminibus afflixit, ita, ut tandem ægrum etiam interfecisset.

## PARS AFFECTA.

*Pars affecta* ut cognoscatur, duo suppono.

1. Quod excreta ista, quæ per *diarrhæam* rejiciuntur, non sint actu in intestinis; nam interdum in ægris excrementa ad 40 vices rejiciuntur. Certum ergo est, materiam hanc effluentem deferri ad intestina, partim ex ventriculo ratione assumptorum, partim ex massa sanguinea, per ductus tam pancreaticos, quam choledochos, ac vasa excretoria glandularum intestinalium. Unde si ita dicta excrementa per vasa coledocha magis transcolentur, & à bile simul concitata magis tingantur, fit *Diarrhæa* dicta *biliosa*: si verò per pancreatica vasa ubertius materia effunditur in intestina, aut per glandulas miliares, dicitur *serosa* &c.: sicut, si ipsa excreta paulò crassiora & viscidiora, ac minus tincta fuerint, & sic chylus nondum assimilatus sanguini esse videtur, dicitur *Diarrhæa pituitosa*; quæ tamen vel ex vitio chylicationis, vel ex vitio intestinorum, quibus incipiens imminet dysenteria, originem habet. Aliàs una est *Diarrhæa* in radice.
2. Excrementa ista, quæ sub cursu excernuntur, antè non præexistisse in massa sanguinea talia: siquidem tanta saburra sanguini permixta esse haud potuisset sine subitanea vitæ noxa, cum aliàs sani fuerint; sed fieri materialiter ex sanguine corrupto per degenerationem.



Pars ergo affecta, seu *subjectum radicationis* est imprimis massa sanguinea, interdum turbata, & sub forma talium fordium corrupta. Subjectum *Denominationis* sunt intestina, quatenus per ea talis fluxus fit; & stomachus, qua tenus in hoc hæret causa occasionalis, sine qua fit nunquam diarrhæa: Et sic intestina instrumentaliter tantum & purè passivè se habent, massâ sanguineâ primariò affectâ existente.

## C A U S Æ.

Quoad causas: scrutabimur in eas, quæ diarrhæam morbosam inferunt, utpotè cum exinde cæteræ species faciliè ja dicari, aut earum fiendi ratio explicari possit. Cum ergo omnis diarrhæa, à quacunque causa dependeat, sit purgatio quædam naturalis, sive à causa externa sive interna oriatur, sive contagiosa & maligna sit, sive non, eodem planè modo se habebit, atque hypercatharsis à medicamento vegetabili purganti oriunda. Jam verò inferunt purgantia hypercatharsin duobus modis: Vel

1. Irritando tantum simpliciter stomachum & intestina, unde uberior liquor, qui in iis locis vel naturaliter transcolantur, vel transcolari apti sunt, effluxus: quod faciunt subindè vomitoria antimonia, resine aciores purgantium vegetabilium; item Mercurius sublimatus; item vermes: vid. in RIVERO *Observat. Cent. 1. observ. 28.* Vel
2. Fermentando, & ratione salis volatilis acris, destruentis acidum sanguinis nativum ac vitale, colliquefaciendo Massam Sanguineam, speciatim chylum quasi mustum, nec adeò perfectè sanguini assimilatum; unde partes colliquatæ, sic excrementosæ & putrefactæ redditæ, sero involutæ, per convenientes vias ad intestina amandantur, idque per ductam, partim pancreaticum, partim biliosum, in quibus transcolatorio modo eæ à massa reliqua separatæ & præcipitatæ, ejiciuntur & expelluntur; uti fit à laxantibus, venis infusis, aut quando odoribus purgantium, aliisvè similibus modis, quidam purgantur, licet non levis copia per glandulas miliares in intestina etiam transeat: vid. PECHLINUS *de Purg.*

Ex utraque etiam causa Diarrhææ quoque, & excessivus earum gradus, Cholera, oriri solent.

1. Ab irritatione quidem: ut à Mercurio sublimato, aut aqua forti, POTERIUS observavit.
2. A fermentatione: ut à fructibus horæis, à contagio fermentativo aliundè suscepto.

Ibi simplex acrimonia rerum irritando hoc malum infert: pb id affectus suâ naturâ levior est. Hic simul fermentum præternaturale acre salinum adest, plus minus malignum, fermentando agitans, turbans, & colliquefaciens humores & Massam Sanguineam, & in fordes mutans; estque naturæ nunc acidæ, nunc volatilis: quod fermentum acre similiter prosternit fermentum stomachi. Undè nunquam observatur diarrhæa, in qua non stomachus semper simul sit labefactus; nisi cum fermentum stomachi prosternitur, etiam non fit diarrhæa: Undè ibi temperantia imprimis & opiata: hic juncta absorbentia sudorifera, plus minus acidum absorbentia, conveniunt.

Confirmatur porro causa diarrhææ per purgantia artificialia, quorum vis consistit in sale volatili acri alcalino oleoso, quasi bilioso, quod testatur eorum sapor acris, amaricus, nauseosus: unde omnia purgantia inimica sunt stomacho & fermento digestivo; hinc fit, quod sumpto purgante oris amaror, sitis, inedia, & alia pathemata, quæ in diarrhæa & Cholera adsunt, sint præsentia. Hinc purgantia corriguntur per acida, quatenus destruitur sal volatile oleosum: sic & diarrhæa. Quicquid ergo more remedium purgantium vel fermentando alterare & colliquefacere potest massam sanguineam, vel intestina acrius irritare & stimulare, est causa ut oriatur diarrhæa: Undè per præcipitantia sudorifera, fermentationem in sanguine præternaturalem compescuntia, & hinc per opiata, omnem humorum motum, simulque irritationis sensum in intestinis compescuntia, optimè curatur Diarrhæa: Hinc fructus horæi tam faciliè excitant diarrhæas.

Ex dictis manifestum evadit: causam diarrhææ proximam seu occasionalem (supposito nempe ubique spiritu impetum faciente, seu causâ efficiente, formali proximâ) esse humorem acrem, seu potius minimum ejus fermentum,

nempe acre, vel irritans intestina, vel inquinans ac plus minus colliquefaciens massam sanguineam. Fermentum istud acre volatile atque alcalinum, ac occultè acidum, specifiçi tamen saporis, esse videtur; quod cum bile, vel in intestinis vel in folliculo felleo, commissum talem texturam, saponem & naturam acquirat, quod purgantium naturam seu crasin imitatur, & ita similem iis effectum producit.

Fermentum hoc sæpius quoque acidum esse, usitatissima juvenia persuadent: qualia præter opiata sunt Corallia, terra sigillata, Corn. Cerv. ustum, hæmatites, & Martialia, tormentilla, ejusque extractum acre, Vinum absinthites, pastus oryza, item puls amygdalarum dulcium cum lacte &c.: talia nempe omnia temperando, ac in specie corrigendo acido inferviunt.

Juxta has causas proximas, causa interna remota seu occasio disponens corpus ad diarrhæam, nunc est fermentum stomachi digestivum, nunc est ipse internus naturæ per humores concitata motus: Fermentum stomachi, quando non debito modo se habet (nam in omni diarrhæa est appetitus prostratio; quando autem appetitus redit, cessat diarrhæa) sed labefactum, adeoque vel debile, vel vitiatum est, hincque quod cibos nec fermentet, nec bilem digerat, indè subito hujus culpam alvus luit, ejusque fluxus excitatur. Undè quæcunque acidum spirituosum stomachale quocunque modo destrui, è contrâ bilem augere, vel in organum præternaturalem concitare valent, ad alvi fluxum disponunt: sicuti quorum potens est stomachi acidum esurinum, à propinatis purgantibus difficulter laxari solent, & rariùs habent diarrhæam; quia acidum stomachi destruit fermentum acre alcalinum oleosum, quod agitando sanguinem, infert diarrhæam. Ab interno naturæ motu provenit diarrhæa, aut per motum criticum, aut symptomaticum: de quibus jam dictum. Accedit his simul habitus corporis, multum ad diarrhæam promovendam faciens: nam iis, qui densæ sunt texturæ, & cutim habent spissam, adeoque parum transpirant, uti sæpius quotidie egerunt, quàm qui poros habent apertos; ita & illi diarrhæis magis obnoxii, uti rectè annotat GABELCHOVERUS *Cent. 3. Cur. 73. in feboli*; quia transpiratio insensibilis impeditur, & turgescencia sanguinis promoveatur: propterea id, quod retinetur, per alvum solet deponi. Rationem in glandulis intestinorum querere nititur PEYERUS *Tr. de glandulis intestinorum pag. 86.* Hinc in qualibet diarrhæa tam sedulo opera danda, ut vel copiosiori insensibili transpiratione, aut sensibiliore sudatione, corpus perspirabile conservetur.

In specie ubique causæ antecedentes examinandæ, an ab errore externo? an verò ab interno fermento aut contagio? an ab humorum organismo oriatur malum? Ex his etiam differentiarum diarrhææ essentialium patet ratio: Et speciatim *epidemica* plus minus maligna aut contagiosa, ex fermento alcalino salino acri maligno, vel ex inquinamento aliis stomacho hostilibus, vel cum aere inspirato, vel cum assumptis ingesto, vel excretis agrorum suscepto, se consensum multiplicat, & primitus oritur. Diarrhææ *habitualis fundamentum* in vitio fermenti digestivi, ab assumptis alterati, & bilis à naturali crasi alteratæ, residet: Illud non ritè digerit & subigit, nec tali corpori appropriat assumpta: hæc, nempe bilis, non ritè perficit & separat eadem ab excrementis, quin hæc potius mutua miscelâ saponem acrem intestina irritantem, & ad celeriores expulsionem stimulantem, acquirunt: quibus occasionibus & ventriculus & intestina adeò irritabilia successivè evadunt, ut à levissimo objecto, v.g. ab ordinario potu, ad excretorium motum seu sui contracturam irritentur. Viscera etiam, ut hepar, pancreas &c. & in tono soluta, humorum transcolationi occasione suggerere possunt, unde talia effluunt, quæ aliàs retineri deberent. Diarrhæa *caliquatæ* fundamentum habet in deficiente plus minus acido stomachali, & acriori è contrâ redditâ bile, unde partim Chylus acris salsus evadit, intestina stimulans; partim illa acrimonia falsa massam sanguineam resolvit, colliquefacit, ut in lua textura fatiscens in serosum salium liquamen abeat, quod per glandulas intestinales & pancreas secretum sub tali diarrhææ specie excernatur. Diarrhæa omnis oleosa & pinguis, si non est ab assumptione nimia pinguium, oritur ex colliquefactione pinguedinis corporis, adeoque conjuncta est cum ejusmodi macie & tate lethali.

Quoad causas remotas externas, diarrhæam excitantes, sunt



sunt partim frigidi potus, partim ipsa assumpta, facile fermentabilia aut corruptibilia. Notum enim est, quod inter assumpta fructus horæi, item cucumeres, melones, pruna, uva, &c., utpotè facile fermentescibiles, diarrhœam inferant.

## DIAGNOSIS.

*Signa diagnostica*, quæ ex relatione ægri patent, antecedentia & consequentia optima dant signa: semper adest nausea insignis, & ut plurimum appetitus dejectus, sitis e contra aucta, & dejectio virium, interdum aliqua simula vexant tormina, aut murmura, vel horborægmi, immediate scilicet excretionem antecedentia: Mælo 10. gravescens tandem veniunt præcordiorum anxietates, lipothymia, & sudores frigidi, maxime circa frontem, tandem mors, nisi maturetur cura.

## PROGNOSIS.

Quoad *Prognosis*: in hac ante omnia exactè observanda sunt differentia Diarrhœarum: nam ex harum consideratione & cum viribus ac statu ægri collatione, manifesta se exerit prognos.

In specie omnis diarrhœa critica spontanea non nimia, si excernuntur ea, quæ debent, idque cum euphoria ægri, salutaria est; sin minus, contra: vid. HIPPOCRATES *Aphor.* 2. l. 1.

Nec rejicienda est ea, quæ ob materiæ metastasin, vel spontaneum humorum motum, accidit.

Symptomata verò diarrhœa in principio morborum, aut etiam morbis malignis cum excretionem cutanea junctis, superveniens, si non semper, certe ut plurimum, est mala: Sic ver. gr. Diarrhœa superveniens peripneumoniæ, est pessima; & omnis talis alvi fluxus in principio morborum superveniens, ut plurimum malus est: Quia

(1) impedit coctionem materiæ morbificæ, seu legitimam heterogenearum sacum separationem, per naturalem humorum fermentationem. (2) Quia vires prostermit. (3) Quia subsequens est febrilis colliquationis: id quod patet, quia rejecta tunc temporis ut plurimum sunt fetida. Erò talis diarrhœa symptomata semper sistenda, aut saltem ita cohibenda, ne fiat nimia. Unde semper errant Medici, qui tunc purgantia indicari exultant, quando scilicet supervenit talis diarrhœa. Sed rectè dicit LINDANUS, ipsos tunc nescire, quid sit superveniens morbo? nam cum talis diarrhœa superveniat talemmodò morbo propter summam materiæ cruditatem, eamque apius malignam, non debet sanè irritari aut exasperari urgentibus. Pertinet huc & *sect. 6 Aphorism. 15. HIPPOCRATIS, & l. 5. Epidem. Text. 4. & l. 1. de morb. Text.*

*Longa diarrhœa laborantis superveniens vomitus, morbum tenet*: Hinc ubi in diarrhœa habituali urgent stomachi symptomata, nausea, vertigo, anxietates præcordiorum omnis blandus instituat: Item *Aphorism. 17. sect. 6. Obthalmia laborans cum alvi profusio corripit, bonum est*: emper fit tunc diarrhœa ex metastasi: conf. GALEUS in l. contra liliu. cap. 1. Item *Aphorism. 29. sect. 7. Leucophlegmia deorsum diarrhœa supervenit, nilum solvit*; ex dicta nempe nunc ratione: conf. M. A. N. C. *Ann. pag. 215.*

In quacunque diarrhœa, quò magis valet stomachi appetitus, eò melius est; quò magis prostratus, eò pejus: & deventes ructus acidi, vel rediens appetitus, diarrhœam clinantem innuunt.

Omnis diarrhœa epidemica contagiosa, est maligna & periculosa.

Si spontanea venit diarrhœa, brevi intereunt.

Omnis quidem diarrhœa est periculosa: sed hoc non est universale. Interdum diarrhœa in habitioribus & succulentioribus mediocri est: interdum in prægnantibus alvi fluxus usque ad finem partus sine noxa est. HIPPOCRATES quidem *Aphorism. 34. sect. 5. dicit*: mulieri proterenti, si alvus multum fluat, periculum est, ne abortiat; quia spiritus debilitantur, fetus fit imbecillior, instar ponderis jacet in utero, uterus in suo tono relatur, neque sufficiens est ad retinendum fetum, unde irritus convellitur, & dolorem exhibet, fetumque excludit, unde abortus. Sed limitandus hic Paragaphis: Si dem rectè hic SCHULZIUS *Conf. 340. observat*: inquit, videris fluorem ad sistendum inobedientem, (nempe prægnatam) ne multum urgeas; ferunt enim nonnunquam

Exmuller. *Oper. Tom. II.*

prægnantes eiusmodi evacuationes usque ad partum circa noxam: uti contigit in uxore fratris mei, inquit, quæ prægnans per quatuor menses, sanguinolentas dejectiones etiam cum rasura intestinorum passa est, nec ullo medicamento sisti poterat, tandem excluso fetu sano & incolumi sponte sua intermisi. Vid. item Platerus, quoad hoc punctum, de Gravidâ in *Observat. pag. 802.* item de simili alvi fluore & dysenteria gravidarum Ballonius lib. 2. *Consil. 57.* Ubi ergo apparet, hanc diarrhœam esse sine insigni læsione, tunc faustus conatus naturæ, & tantummodò ratio stomachi habeatur. Ratione excretorum notetur; quò magis hæc à stato naturali recesserint, adeoque quò deterioris conditionis fuerint, eò ceteris paribus diarrhœa deterior habenda est: hinc si crassa admodum, aut alba, aut viridia, aut crocea, aut spumantia deiciuntur, hæc omnia mala sunt: item mala est dejectio pauca, glutinosa, alba, subpallida, lubrica: exitiosa verò est nigra, utut non semper, æruginosa, pinguis, livida, fetida &c.; innuunt enim hæc fermentum sanguinis colliquescentium magnum putridum. Versicolor quidem diuturnior est, sed nihilominus exitialis.

Omnium periculosissima est Diarrhœa colliquativa, & quidem semper in morbis acutis: & si talis tabidis aut hecticis superveniat, plerumque lethalis est: & quibus Phthysicis, vel confirmatis, vel quibus capilli desuunt, spontè superveniens diarrhœa, semper est colliquativa, & eosdem ad oreum deducit.

In Diarrhœis sudor & urina ordinariò suppressæ, frictum copiosius profuant, de alvi fluxu cessaturo spes quædam illucelcit.

## CURATIO.

Ante omnia considerandum: an & quæ sit curanda? est, an relinquendus sit naturæ motus? an verò festinetur cura? Sinenda est diarrhœa spontanea, quæ vitio assumptorum, vel ratione metastaseos materiæ morboscæ evenit, cum motus naturæ non corrigendus, nisi excedat, indeque vires deiciat: Item critica Diarrhœa etiam curanda non est, nec turbandus faustus conatus naturæ, sed prospiciendo saltem appropriatis stomacho, ut conservetur appetitus, ne superveniant ejus symptomata; observantur enim tales interdum spontè cessare: Imò interdum promoven- dæ sunt hæc ipsæ.

Curanda verò est, vel (1) Diarrhœa artificialis nimia sive hypercatharsis, si scilicet copiosa egeruntur; de quo videatur Willisius in *Pharmaceutic. rational. p. 110.*

Vel (2) Diarrhœa spontanea, si excessiva & ex errore externo: In tali excessu vix sæpè conjuncta sunt funesta stomachi symptomata, ut nausea, vomitus: ne prosterneat vires, aut superveniat cholera, maturè sistenda.

(3) Diarrhœa symptomata omnis, seu ea, quæ in principiis morborum, maxime acutorum, aut incremento supervenit, & conjuncta cum prostratione virium, anxietatibus ægrorum, interdum cum syncope, qualis primariò remedia postulat, sistenda & compescenda est.

(4) Diarrhœa epidemica aut maligna contagiosa curanda est ob periculum prostrationis virium; cum sæpè sine lethales.

(5) Habitualis Diarrhœa curanda est, quæ ob inveteratum stomachi malum, aut hepatis tumorem: hæc enim ad tabem deducit ægrum.

Quoad ergò methodum medendi: observanda causarum remotarum diversitate, diarrhœa quàm maxime curari debent, ut symptomata & epidemica, his indicationibus levantur:

1. Fermentatio præternaturalis Massæ sanguineæ compescenda, aliorumque contentorum colliquesfactio fermentativa inhibenda, & fermentum salinum acre, nunc acidum, nunc simul alcalinum, seu biliosum, adeoque æruginosum, destruendum, idque moderate acidis incrassantibus & adstringentibus.
2. Blandis sudoriferis junctis, massa sanæque repurganda, ac fermentativa substantia eliminanda; sic curatio erit magis fida seu tuta.
3. Acre irritans, quodcumque temperandum absorbentibus, vulgò præcipitantibus dictis.
4. Irritationis sensus auctus opiatibus theriacalibus vel similibus sopiendus, adeoque hinc natus spirituum impetus, & efferus humorum motus, localis, sistendus.



3. Blandè evacuanda sunt excrementa, occasionem subministrantia, si quæ sunt.

4. Stomachus, quantum possibile, & appetitus læsus, ejusque tonus plus minus resolutus, apprimè restituendus.

Pro his scopis meliùs consequendis sequentia probè observanda sunt axiomata:

I. In quovis alvi fluxu, qualiscunque etiam sit, ventriculi semper summam habendam esse curam, cum semper hic sit labefactatus: quò magis enigm functio stomachi appetitiva læsa, eò periculosior est diarrhoea, & appropriatis maturè succurrendum stomacho: imò certum est, diarrhoeam non posse curari, nisi stomacho appetitus redeat; hinc calidus potus & calidus foras apprimè conveniunt: ipsi scilicet ægri observant, subito atque potum saltem frigidiusculum ingerunt, quod mox alvi stimulum sentiant: item parvus potus in quavis diarrhoea convenit, cum **FORESTO** *anno: ante l. 22. observ. 4.* bibendi abstinencia omnem alvi fluxum maximè solvat. Pro resolutio autem ventriculi tono restituendo conveniunt Vinum & vinosa, cydoniata, mastix, & ex hac parata medicamenta, Vinum Absinthites, mentha, cinnamonum, &c. reliquis medicamentis admiscenda. Calidi foras sunt varii, tam sacculi, quales supra circa vomitum ordinati, quam emplastra, præsertim ex tacamahaca, cum balsamo Peruviano & aromaticis applicata.

II. In Diarrhoea symptomatice aut maligna nullo modo purgandum. Pessimus mos est, quod in morbis acutis, aut aliis in principio supervenientibus, purgantibus velint succurrere: potius diarrhoea symptomatice tractetur per blanda laxantia, scilicet ut materia morbofa removeatur, naturæque motus promoveatur. Diarrhoea omnis, illata ex turgescencia causæ morbofæ, vis naturæ est: nam in tali se habet passivè, non activè, ut promoveatur purgantibus. Non ergò symptomatice diarrhoea irritanda est per laxantia, sed sistenda aut moderanda est, ne fiat excessiva præternaturalis; quia

1. Impedit coctionem materiæ morbofæ, & separationem legitimam.
2. In principio acutorum morborum vires prostermit; &
3. Est consequens colliquescitivum; quod patet, quod rejecta sunt sæpe livida, foetida, ac horrida.

III. In diarrhoea epidemica contagiosa maligna, & quidem in principio, ubi vires integræ, alexipharmaca, tam acidum quàm alcalinum fermentum peccans defluentia, & per sudorem ejicientia, primum obtinent: hinc theriacalia, item spiritus & essentia theriacalis, Tinctura Bezoardica cum opio, antimonialia fixa, terræ sigillatæ primum ducunt, speciatim si à fermento præternaturali humores ipsi ad colliquationem disponantur: nam si à simplici irritatione intestinum est Diarrhoea, non æquè necessaria sunt; unde in epidemica pariter atque contagiosa magis, quàm aliis speciebus, conveniunt: æger simul quietus, & in loco calido se contineat.

IV. In nulla diarrhoea in principio evacuatio per alvum, ut quibusdam mos est, dum in principio dant rhabarbarum, vel syrupum rosarum solutivum, instituatur, sed sistendus est effervescentium humorum impetus, quo facto, cessat diarrhoea. Sufflaminato humorum impetu, ubi, quod notandum, necesse fuerit, vel clysmatis blandis alvus eluenda, vel blando laxativo, aut rhabarbarino aut tamarindis, intestina abstergenda, idque in casu, quando adhuc hærent reliquæ excrementorum, quæ intestina irritant: conf. hic **SEPTALIUS** *in animadu. 19. Caut. Med. l. 7. §. 89.* Potius ergò spectatores motus aliquamdiu naturæ erimus, quamdiu non excedit, & morbificæ causæ potissimum rationem habeamus.

V. Ut ut vomitus in diarrhoeis sit periculosus, tamen ubi ventriculus maximè laborat instituatur, cautè tamè, adeoque ubi in principio diarrhoeæ, aut in statu, maximè urgent stomachi symptomata, nausea, vertigo, anxietates præcordiorum, & exinde diuturnior evadit affectus: idque ex **HIPPOCRATE** *lib. 4. aphor. 17. item aphor. 15. sect. 6.* qui sunt aurei, & l. 2. de rat. victus.

Vir consistentis ætatis, habitusque cæteroquin sani, in itinere ante 3. menses diarrhoea ita infestatus est cum appetitu prostrato, sit & imbecillitate virium, qui curatus quidem quoad diarrhoeam per debita remedia, deficiebat nihilominus adhuc dum appetitus, & pauca comedens qualibet tamen nocte quinquies vel sexies per alvum reddebat liquida. Malum simpliciter videbatur esse ex crudi-

tate stomachi nidorosa: siquidem omni manè patiens hic ructus nidorosos, periecit, quod signum fermenti digestivi depravati. De cætero exhibui vomitorium, unde melius ad tempus habebat, sed non diu post recidivabant pathemata, non tamen atrociter; Ex quibus patet, in habitualibus Diarrhoeis, ex læso stomacho natis, Vomitoria esse optima.

VI. Adstringentia, quæ talia, non conveniunt in diarrhoeis; quid enim juvat stringere & arctare partes alvum irritantes, & excernenda retinere, dum omnia adhuc sunt in motu? Omnium Practicorum testimonis perhibent, quod, si in principio maturius adhibeantur, aggravent morbum, dum sæpius metastaseos in aliam partem nobilem, aut supervenientium convulsionem, febrium, & gravissimorum symptomatum abdominis supervenit merus: sic enim ex diarrhoea, cydoniatis intempestivè suppressa, ileum lethale observavit **BALLONIUS**: vid. **BONETTUS** *Pharos Medic. pag. 413.* Nec stomachus aut intestinalis laborant laxitate nimia, vel resolutio tono, non magis scilicet, quàm in hypercatharsi. Non igitur, nisi in diarrhoea diuturna iam curata, pro primarum viarum tono redintegrando, propriè dicta adstringentia, cydoniata v. g. aut ex inspis defumpta, conducunt. Cui autem lubet in principio hæc usurpare, adjungat semper sudorifera. Cætera, quæ sapore stypico plus minus imprægnata sunt, v. g. tormentilla, terra sigillata, Cor. C. ustum, saccharum Saturni, &c. non tam adstringendo, quàm specificè sui texturæ saporem fermenti vel humoris peccantis corrigendo, absorbendo, prodesse potius videntur.

VII. Ridiculè nimis à quibusdam Medicis Vinum prohibetur, quia peccet bilis, vel ad sit febris: ne ergò calidis irriteretur, interdixit volunt: sed falluntur. Vinum enim in diarrhoea est potus medicamentosus, quatenus est ventriculo amicum, tam simplex generosum, quàm medicatum, & viribus attritis tanquam resocillativum ægris est propinandum; hypercatharsin enim sæpe haustus calidi vini curavit. Sic diarrhoeam trimestrem desperatam vino rorismarini curatam refert **WELSCHIUS** *Hecatost. 2. pag. 29:* sic in diarrhoea post purgantia, post fructuum horarum abusum, Vinum absinthites egregiè confert.

Quoad remedia, quæ conveniunt in diarrhoeis, opera danda est, ut

(1) Sint stomacha grata.

(2) Motum fermentativum sanguini inductum sistant per contraria.

(3) Sudorifera adhibeantur.

Inter hæc ex regno vegetabili primum ducunt theriacalia, adeoque opium & omnia opiata: nam opium quoscunque motus & evacuationes corporis, præter sudorem, compescit, hæmorrhagias sistit, paroxysmos febriles inhibet, vomitus sedat &c., in genere omnes humorum motus, sive sint effervescentiæ, sive alii, potenter compescit, unde semper cum absorbentibus & diaphoreticis miscetur opiū correctum. Propter hoc opium Theriaca in aceto assumpta expectando sudorem est egregia, de qua, & speciatim de electuario diascordii, jam *supr. dixi*, & considerationem meretur estatim **FORESTI** *l. 22. obs. 17.* Tales jure meretur laudes contra quoscunque alvi fluxus, imprimis Cholericos, ita ut veteres non satis illam potuerint laudare, cum maximè ab opio vim suam habeat sudoriferam, assumitur à 3j. ad 3ij., egregiè confert: & quidem, quò magis est recens, eò potentiùs operabitur: compescit mordacitatem humoris & torporem inducit; quoniam minus infraçte sunt opii vires. Eadem theriaca commode etiam regioni umbilicali & stomachi illinitur, sive sola, sive cum Balsamo Peruviano mista, aut etiam aliquot guttis olei destillati macis imprægnata. Nobilior est electuarium diascordii Fracastorii, egregium planè. Ovi vitella bina, cum albumine quoque ad duritiem cocta, cum aceto rosaceo irrorata, & quasi acidulata, experimentum sunt præstantissimum **HELMONTII** *in Tr. Pylorus Rectior pag. 184. §. 22.* aliquoties à me expertum, etiam in diarrhoea, quæ iam per 4. dies pertinaciter theriacalibus resistit, & nunquam fessit: conf. **M. A. N. C. Ann. 8. pag. 67. Interdum addo pulverem nucis moschatae vel macis. Sunt qui recipiunt Boli Armenæ & nucis moschatae ana, miscunt cum uno alterove vitello ovi ad molliem cocti, & ita sine sale assunt contra diarrhoeas; quod experimentum est **STOECKERI** *in sua Praxi.* Malum cydonium cerâ impletum & assatum, comestumque egregiè convenit.**

Quibusdam etiam, ceu probatissimum commendatur serum hircinum (multa sanè latent in hirco) quod liquefactum



Quum cum tantillo farinae triticeae miscetur, ut fiat instar pulmenti, quod pulmentum subinde assumptum laudatur insigniter contra diarrhoeam. Tormentillae radix, ejusdem Decoctum, & in specie *Extradum eius* cum aqua quadam aut spiritus Vini factum, praemissa, si opus est, levi purgatione absterforia, v. g. rhabarbaro, myrobalanis, una alterave vice à 3 ss. ad 3 j. usurpatum in convenienti vehiculo, ut jusclo calido, aqua cinnamomi cum vino, cydoniata, aqua menthae, &c. egregium est in omni diarrhoea & dysenteria, tam benignis quam malignis epidemicis, & omnibus aliis medicamentis praecellit: addi potest, si opus est, laudanum hystericum, vel laudani opiatum gr. j. ad ij. Faciunt etiam huc plantago, ejus radix, & semen, item portulaca: quae duo quacunq; ratione usurpentur, egregia in diarrhoea sunt; uti etiam folia myrthi, flores balaustrorum, lysimachia flore luteo & purpureo. Diarrhoeam in specie compescunt fructus austeri, quatenus pontici: quales sunt fructus myrtillorum, cydonia, mespila condita, aut, quod praestat, cruda; horum enim succus cum succo persicarum maculatae mixtus, & leni igne ad tertiam partem inspissatus, maximum est remedium. FORESTUS l. 22. Obser. 1. aliquoties feliciter expertus est vsum mespilorum in quibusdam, diarrhoea continuè laborantibus, qui aliis irritis, his mespilis fuerunt curati. Item addi potest non ineleganter sorbus torminalis, quae est egregium specificum in diarrhoeis etiam epidemicis, item in diuturnis, quae abusu fructuum horarum superveniunt: folia habet instar vitis, Germ. *Ebes beer* vocantur: nota est mulierculis, quae colligunt fructus, dum incipiunt maturefcere, nondum tamen perfecte maturi sunt, & saporem austeriusculum habent, exprimunt succum, & inspissant in consistentiam rob, quod nobile remedium est in diarrhoea: superioribus annis, dum grassabatur diarrhoea, aliis irritis egregie profuit, dosi Cochli. j. in vehiculo quodam. In ejus locum etiam rob sorbi aucupariae potest substitui: sed hoc est inferioris conditionis, utut egregie etiam conveniat stomacho. Spongia salicis exsiccata, & ad 3 ss. data, in quibusdam singulariter commendatur ad diarrhoeas: haec ipsa spongia alias commendatur ab Hartmanno ad Cholerae paucorum granorum dosi, si in aqua quadam styptica propinatur: sicuti etià 3 j. seminis iophiae Chirurgorum quod praestantius est, atq; semen plantaginis supra laudatum. Residuum ab extracto rhabarbari, aut etiam Rhabarbarum tostum, scopis multis satisfacit, adstringit, acrimoniam humorum temperat, & tum temporis potenter sudorem movet. Nux moschata & macis communia sunt, & omnibus nota contra diarrhoeam remedia, eorumque olea destillata interne & externe conveniunt. Gelatina Corn. Cerv. 3 j. & ss. in potu ordinario dissoluta est admodum specifica in diarrhoeis, in specie epidemicè grassantibus.

Denique cinnamomum, ex quo aqua & oleum est destillatum, praestans est remedium ad diarrhoeam. Uterius malum cydonium, ejusdem succus recens, item miva cydoniorum aromatizata, & cydoniata quaelibet sunt egregia in diarrhoea quacunq; unde miva cydoniorum aromatizata cum theriaca milta, additis aliquot guttulis olei destillati cinnamomi, vel macis, experimentum est saepius probatum LOTICHII in *Observationibus*; quibus si addantur aliquot grana laudani opiatum, erit bolus eo magis efficax:

Vel

R. Mro. cydon. aromatiz. 3 ij.  
Aqua cinnamom. spirituos. 3 vj.  
Terra sigill. 3 ss. vel Bezoard. mineral. gr. xv.  
Laud. opiatum gr. ij.  
Olei destill. cinnam. vel macis gutt. ij.

M. D. S.

Potumcula cochlearum sumenda.

Capiatur subinde cochlearim.

Itali lignum lentiscinum, seu lignum, ex quo transudat Mastix, laudant, & ubi potest haberi minori pretio, est admodum elegans. Decoctum hujus ligni potum insigniter notum est, in cuius locum Decoctum mastichis, sive gummatum ex lentisco secret, seu stomachicum nobilissimum in quibuscunq; diarrhoeis usurpari potest. Fuit secretum D. OSWALDI contra diarrhoeam in aqua appropriata vel potu ordinario. Praefari potest ita, ad imitationem nempe TILEMANNI in *Materia Medica*:

R. Aqua plantagin.  
Fol. Querc.  
Tormentill.  
Reser. an. ss.

Vel harum loco

R. Aqu. simpl. vel plurial. 3 ss. vel 3 ij.  
Mastich. el. 3 ij. vel 3 iij. ad 3 ss.  
Macis 3 j.  
Coquantur: Colaturae addo  
Aqua cinnam. 3 j.  
Misc. pro Potu ordinario, S.  
Potus pro aliquot vicibus.

Vel edulcoretur cum rotul. manus Christi perlata vel syrupo mastichino vel cydoniorum pro Iulebo. S.

Iulep.

Qui crebro tepide hauriatur; a STOECERO enim & plurimis aliis egregie in diarrhoea commendatur.

Potest etiam de succo cydoniorum sulphurato addit parum.

Loco hujus Decocti Stoeckerus impraegnat aquam fumo Mastichis: scilicet adjiciunt Mastichen supra prunas candentes, fumum excipiunt ollâ novâ vitreâ, & mox ollam fumo bene repletam implent aquâ simplici vel appropriatâ; hoc subinde repetunt, donec subtilem Mastichis saporem acidulum aqua contraxerit, quae est potus stomachicus egregius conveniens in diarrhoea & dysenteria. Inter aquas appropriatas sunt imprimis aqua tormentillae, pimpinellae, plantaginis & portulae: ex succis sunt succus cydoniorum & granatorum, rob & muscus prunorum sylvestrium, quod rob commodissime loco succi hypocistidis potest substitui. Alias aqua chalybeata, item serum lactis chalybeatum, uti & acetum chalybeatum, convenit. Decoctum granorum juniperi stomacho gratum & dreticum, laudatur à Riverio; urinam enim promovendo necessario alvum exsiccât: item decoctum Corn. Cerv., priapi cervi, ceti, &c. pro potu ordinario assumptum, corrigendo & temperando egregie convenit in quibusdam diarrhoeis, speciatim epidemicè grassantibus, aut aliis contagiosis. ELLENBERGIUS, quondam Medicus Hallensis Saxo, pro potu ordinario Menst. j. cerevisiae, in qua decoxit sacchari albi 3 ij. & gummi Arabici 3 ss. propinat. Porro terrae istae minerales sigillatae, Bolus Armena, terra Solaris in aurifodinis, quae habet principium metallicum, sulphureum acidum, ratione cujus convenit figendo fermentum alcalinum & promovendo sudorem. Ut autem promoveatur, maritur cum spiritu Vitrioli Martis; sic naturam acido-austera acquirit, uti est in liquore styptico: de quo suo loco dictum; qui praemisso blando diaphoretico aptus est ad gutt. xx. Hinc martialia, crocus martis & terra Vitrioli dulcis (est caput mortuum elixivatum) quatenus temperant quodcumque aere, & in specie acida absorbent, simulque vi sudoriferâ pollent, sunt convenientissima in quacunq; diarrhoea, in specie, si cum vehiculis acidulis assumuntur, aut cum spiritu vitrioli irrorentur, sic enim magis adstrictoria evadunt.

Inter absorbentia etiam sunt corallia, cornu cervi, crystallus, smaragdus; sic nempe ZACUTUS LUSITANUS l. 1. Med. Princ. Hist. 22. & Obs. *venena* diarrhoeam diuturnam & ingentem refert, ex veneno ab amassa in cibo propinato, aliis irritis per smaragdum percurratam ad gr. xij. in conf. cydoniorum; sic in diarrhoeis biliosis, nempe in bile æruginosa & porracea dictis, crystallum laudare solet, quam pro hoc scopo sequenti modo praescribere soleo:

R. Crystall. præp. 3 ij.  
Bezoard. martial. 3 j.  
Laud. hysser. gr. ix.

M. f. Pulvis pro duabus dosibus, S.

Pulvis pro duabus dosibus.

Facit huc similiter lapis hematites, qui quoscunq; fluxus alvi insigniter refrinat, tam naturalis, quam ex saccharo saturni & vitriolo Martis praeparatus artificialis, à 3 ss. vel gr. xj. ad gr. xv. & 3 j. in aqua appropriata: nam & ipse hematites naturalis ex Marte & Saturno vim suam habet in sistendo sanguinis fluxu, & compescendis etiam diarrhoeis: de quo vid. M. A. N. C. Ann. 2. Observ. 43. p. 227. & GLAUBERUS pag. 6. Praeparatio est genuina: nam saccharum saturni per se egregium est in diarrhoea ab acrioribus humoribus nata, & à multis non incommode commendatur, in specie in maligna & pertinaci diarrhoea, & dysenteria, & ubi imprimis excrementa sunt nimis acra, mistum cum croco Martis adstringente, non tam præcisè adstringendo, quam vitiosos sapores absorbendo: Conf. POTERIUS Cent. 3. c. 77. Cent. 2. cap. 39. & 81, ubi gravia alvi profluvia croco Martis prostant curata.

Ex haecenus dictis plures concinari possunt formulae: ver. gr.

R. Aqu. plantagin. 3 iij.

Cin.



*Cinnam.* 3j.  
*El. diascord. Fracast.* 3ij.  
*Corall. rub. præp.* 3ij.  
*Terra figill.* 3j.  
*Syr. myrtin.* 3j.  
*M. f. Potio: S.*  
*Potio adstringens sudorifera.*

*Vel*  
*R. Aqu. tormentill.* 3ij.  
*vel huius locoplantag. & portul. an.* 3ij.  
*Acet. vini vel rosac.* 3ß. *vel* 3vj.  
*El. diascord. Fracast.* 3ij.  
*Terra figillat.* 3ij.  
*Antimonii diaphor.* 3j. *ad* 3ß.  
*Syr. cydonior. vel syr. de ros. sec.* 3ß. *vel* 3vj.  
*M. D. S.* *ad* 3j.  
*Ut antea.*

Cochleum nim capiat æger probetectus in lecto, pro duabus aut tribus dosibus, sudorem expectando: acida nempe cum ter rã figillata ac similibus propinata, texturam aluminosam quasi acquirunt.

*R. Ag. Mentb.* 3ij.  
*Cinnam. cum vino vel cydon.* 3j.  
*Acet. destill. vel simpl.* 3vj.  
*El. diascord. Frac.* 3j. *ad* 3ij.  
*Antimon. diaphor. vel terra figill.* 3j. *vel* 3ß.  
*Syr. cydonior. vel Mivæ cydon. aromat.* 3ß.  
*ad* 3ijß.

*M. pro duabus dosibus, vel per intervalla 1. vel 2. Cochlearia.*

*D. S.*  
*Ut antea.*  
*Vel*

*R. Aqu. Mentb.* 3ij.  
*Theriacal. Aug. vel Cinnam.* 3ß.  
*Spiritus theriacal. camph.* 3ij.  
*El. diascord. Fracastor.* 3ijß.  
*Terra figill.* 3ß.  
*Syr. Cydon.* 3vj.  
*M. D. S.*

*Mixtura adstringens sudorifera.*

Usurpetur pro tribus dosibus expectando sudorem, capiendos primam manẽ, alteram à meridie hora quarta vel quinta, tertiam post mediam noctem, vel expectando alterum manẽ.

*Vel*  
*R. Aqu. mentb.* 3ij.  
*Cinnam.* 3ij. *vel* 3vj.  
*Extr. tormentill. gr. viij.*  
*Croci Martis adstring.*  
*Laud. hysser. an. gr. vj.*  
*Syr. cydon.* 3ß.  
*M. pro una dosi, S.*

*Mixtura adstringens sudorifera, pro una dosi.*

*R. Aqu. mentb.* 3ij.  
*Spiritus nitri aulc.* 3ß.  
*Terra figill.* 3j.  
*Laud. opiaci gr. iij.*  
*Syr. cydonior.* 3j.  
*M. S.*

*Potiuicula adstringens bene circumagitando, pro aliquot dosibus.*

*Pro temperanda acrimonia humorum:*

*R. Amygdal. dulc.*

*Sem. pavov. alb. an.* 3ß.

*Cum f. q. Decocti Corn. Cerv. f. Emulso ad 3ßß.*

*adde*

*Aqu. cinnam.* 3vj.

*Terra figill. alba.*

*Corall. rub. præp.*

*Corn. Cer. utri præp. an.* 3ß.

*Edulcoretur cum lacte rosar. S.*

*hæc temperans bene circumagitandum, pro aliquot dosibus.*

*Vel*

*R. Conf. rosar. viriolat.* 3j.

*Terra figillat.* 3ß.

*Olei destill. mac. gutt. j.*

*Laud. opiaci. gr. ij.*

*Cum Syrupo Myrtino f. Bolus, D. S.*

*Electuarium adstringens, pro una dosi.*

*Vel*

*R. Conf. rosar. rub.* 3j.

*Bezoard. minor. gr. xv.*

*Laud. opiaci gr. iß.*

*Olei destill. cinnam. gutt. ij.*

*Cum Syrupo cydon. f. Bolus, S.*

*Bolus adstringens. Vel*

*R. Conf. Mentb. viriolat.* 3ijß.

*Electuar. diascord. Fracast.* 3ß.

*Terra figill.* 3ij. *ad* 3j.

*Antim. diaphor. Martial.*

*Extr. rad. tormentill. an.* 3ß.

*Cum syropo imperator. f. Electuarium, aliquoties de die sumendum dosi 3ij. S.*

*Electuarium adstringens.*

Mulier quædam corripiebatur diarrhæa simplici, sed tunc epidemica, cum varia & multiplici phlogosi: primò die 8. vel 10. vicibus; secundo 40. vicibus deiecit: undè virium insignis prostratio, anxietas præcordiorum, inquietudo, &c. Vocatus à meridie ordinabam:

*R. Terra figillat.* 3j.

*Antim. diaphor.*

*Extr. tormentill. cum Spiritu Vini per.*  
*an.* 3ß.

*Laud. ferment. gr. ij.*

*M. f. Pulvis.*

*Divid. in 2. part. equal.*

Capiebat unam vesperi, alteram post mediam noctem in vehiculo sequenti:

*R. Aqu. scord.*

*Tormentill. an.* 3j.

*Cinnam.* 3j.

*Spiritus theriacal. camph.* 3j. *ad* 3ij.

*M. f. Potio.*

Cessabant hinc dejectiones, sed tamen nox inquieta absque somno fuit. Manẽ

*R. Cor. Cerv. sine igne,*

*Bezoard. Martial.*

*Extr. tormentill. an.* 3ß.

*Theriac. gr. ij.*

*M. f. Pulvis.*

Capiebat in isto vehiculo: cessarunt ferè in totum dejectiones: Sed, utut se cogeret, sudorem tamen nullum extorquere potuit.

*Vesperi*

*R. Corall. rub. præp.*

*Corn. Cerv. sine igne an.* 3ß.

*Extr. tormentill. gr. v.*

*Theriacal. gr. iß.*

*M. pro pulvere.*

Dormivit benè, nonnihil sudavit. Manẽconquerebatur de insigni circa præcordia molestia, & dolore compressivo: signo contentorum adhuc recrementorum circa primas vias, sed per ista remedia ab excretionem cohibitorum. Hinc

*R. Spiritus carm. de trib.* 3ij.

*Dosis gutt. 40. bis in die.*

Passiones hysterice supervenerunt, ab istis nempe retentis occasionate, quæ tamen sequenti mane per ternas dejectiones alvinas spontaneas fuerunt levate: undè cont. quanto spiritu curata est.

In Diarrhæa torminosa cum copiosis secessibus nigricantibus, appetitu prostrato, siti intensa &c., primò ad abstergendas primas vias, & ad removendas, si quæ adsint, sordes, & temperandum simul nimium impetum humorum:

*R. Conserv. mentb.*

*El. diascord. Fracast.* an. 3ij.

*Rhabarb. el.* 3j.

*Corall. rub. præp.* 3ij.

*Cum f. q. Syrup. corall. Quercet. f. Electuarium.*

De quo capiebant sæpius pro lubitu: cuius usu cum immueretur quidem nonnihil alvi fluxus, non tamen penitus susteretur, ac tormina simul urgerent:

*R. Ess. tormentill.* 3ij.

*Opii 3ß. ad* 3j.

*Miscendo.*

*Dosis 40. gutt. bis vel ter. in die.*

Denique ovum ad duritiem coctum, cum aceto rosacea profuit.

Tandem in Diarrhæa epidemica maligna, cum modò dictis semper alexipharmaca sudorifera præp. mis usurpanda erunt, quæ etiam conducunt in quacunque diarrhæa, nunquam enim diarrhæa sine sudo-



sudore curatur. Sudorifera sunt antimonialia fixa, aliaque satis cognita: miscenda tamen semper appropriata; cum spiritu theriacali conjungatur spiritus Maltichis, cum terra sigillata, sal volatile viperarum & similia. Superiori anno, cum grassaretur hic Diarrhoea epidemica, non absque applausu medentium aliquoties usum vidi egregium hujus pulveris, etiam ubi jam adesset delirium:

*R. Terræ sigillat.*

*Antimon. diaphor. an. gr. xv.*

*Pulv. macis vel Nuc. Mosch. gr. iv.*

*Sal. vol. viperar. gr. vj.*

*M. f. Pulvis pro una dosi: S.*

*Pulvis adstringens.*

Cui interdum laudant opiat gr. j. vel ij. addi possunt.

Usurpatur in f. q. vini aciduli.

*R. Terræ sigill. vel Corn. Cerv. sine igne. gr. xxiv.*  
vel 3 ss.

*Extraß tormentill. gr. xv. vel 3 j.*

*Sal. vol. Corn. Cerv. gr. vj.*

*M. pro duabus dosibus, vel robustiori pro unica dosi, expectando sudorem: cui etiam laud. opiatum, vel extractum theriacale in debita dosi addi potest; S.*

*Pulvis adstringens.*

*R. Aqu. plantag. vel tormentill. 3 iij. vel iv.*

*Gelat. Corn. Cerv. 3 vj.*

*El. diascord. Præcassor. 3 ss. vel 3 ij. ad 3 iij.*

*Antimonii diaphor. 3 i. vel 3 ss. ad 3 ij.*

vel Bezoard. mineral. 3 j.

*Extr. tormentill. 3 ss. ad 3 j.*

*Syr. cydonior. 3 ss. vel 3 vj. ad 3 j.*

*M. pro duabus dosibus, expectando semper sudorem.*

*D. S.*

*Potio adstringens pro duabus dosibus.*

*R. Aqu. Menib. 3 iij.*

*Corn. Cerv. sine igne 3 ij.*

*Bezoard. miner. 3 j. ad 3 ss.*

*Extr. theriacal. gr. vj.*

*Syr. cort. aurant. 3 iij.*

*M. pro tribus dosibus, S.*

*Pro adstringens pro tribus dosibus.*

In eadem diarrhoea maligna gelatina Corn. Cerv. soluta & potui addita, semper egregium habuit effectum.

Vir quidam gravi diarrhoea maligna decumbebat, & junctis febrilibus symptomatis, cui inter alia optime profuit

*R. Aquæ menthe,*

*Scord. an. 3 ss.*

*Cinnam. 3 iij.*

*Acet. vini 3 vj.*

*Theriac. Androm. 3 ss.*

*Bezoard. miner. 3 ss.*

*Syr. cydonior. 3 iij.*

*M. f. Potio.*

Capiebat pro lubitu, & ad diaphoresin corpus disponebat; hinc vitellum ovi durum cum aceto assumpsit.

Externè interpolatis vicibus clystma ex lacte ordinatum fuit, propter tenesimum similiter graviter urgentem. In Diarrhoea a veneno, per insectiam potio, laudatur Smaragdus ad gr. xij. in conf. cydoniorum assumpta. Ut verò stomacho simul succurramus, optime ipsi conducunt cydoniata, speciatim vinum cydoniatum, pro lubitu subinde hauriendum. Vel sit Mistura cydoniata, urgente siti subinde cochlearim loco Iulepi haurienda, intermedio reliquorum remediorum tempore.

*R. Aq. rubi Idæi 3 ij.*

*Cinnam. cydon. 3 j.*

*Succi cydon. 3 ss.*

*Spiritus vitrioli Martis gutt. vj. vel Spiritus salis dulc. gutt. xv.*

*Syr. cydon. aromat. 3 vj.*

*M. D. S.*

*Potio confortativa sive mixtura stomachalis.*

Item pro scopo stomacho succurrendi conducit haustus vini generosi, item vitellum ovi cum aceto.

Externè contra diarrhoeam prævalet theriaca, imprimis recens, ventriculo vel umbilicali regioni imposita & illita, vel sola, vel cum ana Balsami Peruviani aut olei destillati mastichis mista, quæ irroretur aliquot guttis olei cujusdam destillati, in specie macis: sicuti & balsama stomachalia ordinario conducunt. Item somenta, parata ex aromaticis, absinthio, mentha, melissa, caryophyllis in vino de-

coctis, & ita regioni stomachali & umbilicali cum linteis applicatis: Item olea destillata aromatica macis, menthae, Carvi, &c. extrinsecus illita: v. g.

*R. Theriac. Andr. rec. 3 j. vel 3 ij. ad 3 iij.*

*Olei destill. bacc. lump. vel menib. 3 ss. & 3 j. ad 3 ss.*

*Caryophyllor.*

*Macis, vel nuc. moschat. an. gutt. iij. v. vel vj. ad 3 ss.*

*M. f. Linimentum, S.*

*Unguentum ad ungendum stomachum, & ventrem.*

Stomacho & umbilico illinatur, imponendo laterem calescentem. Convenit quoque crusta panis tosta cum vino austero vel aceto ebria & imprægnata, & pulvere nucis moschatæ, caryophyllor. aspersa, calidè admoveatur stomacho: Vel

*R. Ferm. acerr. 3 iij.*

*Pulv. fol. menthae 3 j.*

*Zedoar. 3 ss.*

*Caryophyll.*

*Galanga,*

*Zingiber, an. 3 ij.*

*Acet. rosar. q. f.*

*M. f. Cataplasma, illinendum linteis, S.*

*Emplastrum adstringens singulare.*

Item balsam. seu linimentum factum ex oleo macis destillato, & oleo menthae & carvi destillatis, & cum f. q. olei nucis moschatæ expressi fiat Balsamum, stomacho & umbilico illinendum: e. g.

*R. Olei destillat. menthae 3 j.*

*Zedoar. 3 ss.*

*Caryophyll.*

*Cinnam. an. gutt. iij.*

*Cum f. q. Olei nucist. expr. f. Balsamum, S.*

*Balsamum adstringens.*

Quando opus est leni intestinorum absterfione, tam in principio quam declinatione, tunc imprimis usitatum est rhabarbarum, idque nunc in substantia ad 3 j. cum conservâ rosarum usurpatum; vel rhabarbarum totum ad 3 ss. vel 3 ij. cum pulveris nuc. Mosch. gr. v. vel viij. usurpatum; vel in forma sicca; vel cum syrupo rosarum solutivo: vel syrupus rosarum solutivus propinatur in Decocto hordei; cui additur 3 j. præter propter terræ sigillatæ: e. g.

*R. Rhabarb. el. 3 j. vel 3 ss.*

*Nuc. Moschat. gr. viij.*

*Laud. hysser. gr. iij.*

*M. f. Pulvis, S.*

*Pulvis abstergens.*

*Vel*

*R. Rhabarb. rosi 3 ij.*

*Cortic. myrob. citr. 3 ss.*

*Cum conf. rosar. fiat Bolus, S.*

*Saccharum solutivum.*

Vel etiam detur blandum Decoctum tamarindorum, quod suaviter alvum laxat, & stomacho amicum est. Sed non conveniunt talia, nisi in declinatione pro reliquiis exterminandis; vel in principio, quando nempe excernenda varia, vel in primis viis congesta sunt; vel ad hæc loca aliunde moventur, vel quando ex fructibus horæis malum recens natum est, tunc, ut removeantur sordes istorum locorum, ne ab iis supprimatur, vel retardetur vis appropriatorum remediorum, in principio blanda talis absterfio locum habet.

Clysmata etiam anodyna ex lacte in tali intestinorum vellicatione, in specie, si in crassis fuerit malum, optime conveniunt: quorum tunc habetur indicatio, quando crebrius, & tamen parcius, deiciunt ægri, peccante magis acrimonia, quam copia excernendorum.

*R. Lact. Chalybeati 3 viij.*

*Vitelli ovi an. j.*

*Olei chamomill.*

*Mellis rosar. an. 3 j.*

*M. f. Enema: S.*

*Clyster leniens.*

*R. Flor. chamomill. M. ij.*

*Verbasci M. j.*

*Rad. altheæ 3 j.*

*Sem. cydonior. 3 ij.*

*Coqu. in f. q. lactis vaccini:*

*Colat. 3 viij. adde*

*Theriac. 3 j.*



*Tberiac. 3 j.**Terebinth. cum vitelloovi sol. 3 iij.**M. f. Emulsi, S.**Chirax leniens.*

Si ab acrimonia oriatur dolor in ano, & excoꝛiatio intestini recti & podicis, confert clyisma ex lacte, vel simplici vel chalybeato: item totus ex lacte calido, cum sponsia applicato: vel lactis decoctio cum floribus verbasci, chamomillæ, foliis hyoscyami &c., applicetur.

Nuperrimè sub cura habui Chirurgum, qui intra 24. horas ultra 100. vices sellare coactus est, cum appetitu stomachi nullo, pulsu crebriori, forti tamen & robusto: Huic tandem, postquam in causas antecedentes inquireram, & ægrum ultra septimanam in hypochondrio sinistro dolorem obtusum, qualis aliàs spleni tribuitur, percepisse audiveram, præscripsi Clyisma ex lacte calybeato cum terebinthina, eo quod parum quidem, sed sapius deiceret: quo præmissis, ordinavi hunc pulverem:

*R. Corn. Cerv. utri præp. 3ss.**Hæmatit. præp. gr. xv.**Terræ sigillat.**Nuc. Moschat. an. gr. viij.**Laud. opiat. gr. ij.**M. f. Pulvis:**Divide in duabus part. aqual.*

Hujus æger accepit dosin, unam hinc diarrhœa cessavit adeo, ut post hunc saltem bis dejecerit.

Si ergo præsumptio fuerit humorum acrimoniæ peccantis, clysmata lenientia locum habent.

Atque hæc in genere pro Diarrhœa Cura.

In specie jam considerandæ sint Diarrhœarum differentia, de quibus, an & quales sint curandæ vel relinquendæ? ex supra dictis patet. Nempè (1) artificialem, (2) spontaneam ab errore externo, (3) ex humorum metastasi, (4) ex humorum spontaneo motu, & (5) criticas non esse curandas, sed relinquendas, nec naturæ motum turbandum; quin spectatorem saltem agere; & si deficere videatur, moderatè stimulandum.

Sin verò tales Diarrhœæ futuræ sint nimia, adeo ut ob ventriculi vitium hinc læsa ejus fermentatio, vel bilis defectus, aut ejus corruptela, vel intestinorum atonia, aut facilis irritabilitas hinc metuenda sit, sistendæ veniunt moderatè.

Indicium, quando curandæ vel non curandæ sunt tales Diarrhœæ, præter dicta imprimis suggerit ventriculi appetitus, & coctio, quibus salvis, nil nocet Diarrhœa.

Sanandæ igitur sunt:

1. Diarrhœæ modò dictæ, si sint nimia.
2. Diarrhœa morbus, tam simplex quàm epidemicus.
3. Diarrhœa symptomatica, præsertim colliquativa.
4. Diarrhœa habitualis.

Quibus omnibus generalis ista cura applicanda venit.

In specie in Diarrhœa artificiali, si sit ex hyperbaturis, conveniunt (1) narcotica, quæ sensum irritationis tollunt, & inde natos quoscunque humorum motus sistunt, ut opiatæ: hinc theriaca & electuarius diascordii cum aqua cinnamomi usurpatur: (2) Diaphoretica terrea, quæ humorum turgescientiam compescunt, & acrimoniam temperant: v. g. terra sigillata, antimonium diaphoreticum, cornu cervi sine igne, item hæmatites vulgaris, vel artificialis, cum saccharo saturni & vitriolo Martis; hæmatites enim est filius Saturni & Martis: hinc Vinum Rhenanum generosum, speciatim Vinum absinthites, item spiritus & essentia theriacalis, sive per se sive cum aliis, e. g. essentia anodynâ, mista egregia est in Diarrhœa ex hypercatharsi.

*R. Antimonii diaphor. gr. xij.**Terræ sigill. 3ss.**Laud. opiat. gr. ij.**M. f. Pulvis:**D. S.**Pulvis adstringens.**Vel**R. Theriac. Androm. 3jss.**Corn. Cerv. sine igne gr. xv.**Cum spiritu Menthe. f. Bolus, S.**Electuarius adstringens, pro una dosi.**Vel**R. Aqua menth. 3 j.**Cinnam. cydon. 3ss.**Spiritus theriacal. camphor. 3jss.**Antimonii diaphoret. 3 j.**Laud. opiat. gr. ij.**Syrup. cydon. 3ss.**M. S.**Potio adstringens.**Vel**R. Aqu. tormentill. 3 jss.**Spiritus theriac. camp. 3jss.**El. diasc. Frac. 3 j.**Bezoard. Iovial. 3ss.**Syr. cydonior. 3vj.**M. f. Potio: S.**Ut anted.*

Æger in lecto calido detineatur.

Abdomini, imprimis regioni epigastricæ, emplastrum ex theriaca imponatur: vel Fodus ex Decocto absinthii, Mentha, cum aromatibus in vino decoctis.

Quod si tormina, aut alvum egerendi conatus adsint, Clyisma ex lacte tepido, in quo theriaca dissoluta sit, injiciatur, aut etiam Clyisma ex vulnerariis nonnihil adstringens & blandè abstergens. Confer. M. A. N. C. Anno. 3. Observ. 303. pag. 525.

Diarrhœa nimia ob errorem externum, v. g. fructus horæos, &c. per absorbentia & sigentia sistitur.

*R. Corall. rub. præp.**Corn. Cerv. utri an. 3j.**Nuc. moschat. gr. xij.**Essent. opii. gutt. xv.*

M. pro duabus dosibus, in haustu cerevisiæ calidæ, vel Vini absinthii calidi assumendis, S.

*Pulvis adstringens.**R. Terræ sigill. gr. xij.**Corall. rub. præp. gr. v.**Laud. opiat. gr. ij.**M. f. Pulvis: S.**Ut anted.**R. Ess. menthæ 3 j.**Opii 3 j.**Olei destillat. cinnam. gutt. xij.**M. S.**Essentia adstringens.**Dosis gutt. 45. ad 50.**Vel**R. Aqu. menth. 3 j.**Cinnam. Cydon. 3vj.**Spiritus theriacal. camphor. 3ss.**Corall. rub. præpar.**Corn. Cerv. utri præp. an. 3ss.**Laud. opiat. gr. iij.**Syr. Cydon. aromat. 3vj.**M. f. Potio: S.**Potio adstringens.*

Capiatur cochleatim, expectando sudorem.

*Vel**R. Theriac. 3 j.**Terræ sigill. 3ss.**Cum f. q. Syr. vel succi Cydonior. f. Bolus.**D. S.**Bolus adstringens, pro una dosi.**Vel**R. Consero. Menth. vitriolat. 3vj.**Cor. citri cond.**Diascydon. cum arom. an. 3ss.**Terræ sigillat. 3 j.**Confect. Alkerm. 3 j.**Cum Mirta cydon. f. Electuarius.**Electuarius adstringens.*

Si ex metastasi nimia futura sit Diarrhœa, radix melle est evellenda, & præsertim cum Catarrholi tali Diarrhœæ sint obnoxii, præsertim nocturnæ, ut rectè insinuat Ballonius: vid. BONETTI Pharos Medic. pag. 411. (undè & à cerebri Veteres talem diarrhœam deduxerunt, sed malè) Avertentibus, & aliorum Derivantibus, adeoque Vesicatoriis aut Fonticulis Diarrhœa talis erit lenienda. Egregiam Observationem talis Diarrhœæ Catarrhalis vocatæ, per Vesicatoria curatæ, videbitis apud ZACUTUM LUSITANUM.

Diarrhœa ex spontaneo humorum motu nimia, pariter ut ea, quæ ex errore externo oritur tractanda, ventriculo imprimis succurrendo: ubi amara, ut absinthium & theriaca, speciatim conducunt:

*Vel**R. Rad. ars 3 ij.**Torment. 3 j.*



Piperis 38.

M. f. Pulvis.

Dosis quantum capit cunctelli cuspis, in vino.

In *Diarrhæis* quasi *habitualibus*, ad aliquot annos durantibus, conveniunt internè imprimis *Martialia* quæcunque, & aromatica stomacho grata: imò *thermæ*. Sic *RI-VERIUS* l. 2. *Observ.* 47. mentionem facit alvi fluxus per octennium durantis, thermis curati: quibus ipsis thermis etiam curatus fuit alius alvi fluxus diuturnus, cum ulceribus conjunctus *resie eodem, citato loco, Observ.* 49.

*Colliquativa* *Diarrhæa* vix, nisi curato primario morbo, auferri poterit: interim temperantibus ac blandè adstringentibus ulterior ejusdem progressus, quantum possibile, cohibendus.

## ARTICULUS II.

## DE

## CHOLERA.

**S**ummus *Diarrhææ* gradus, & qui rarò absque malignitate existit, est *Cholera*, ista nempe affectio, quando cum summo impetu ex singulari violentia varis fordes recrementosæ, tam sursum per os quàm deorsum per anum, expurgantur, concurrente simul ventris ac intestinorum dolore, plus minus vehementer, inflatione & distensione hypochondriorum, cardialgia, siti, pulsu celeri & frequenti, interdum parvo, in signi præcordiorum angustia, nec rarè intervenientibus lipothymiis, supervenit inquietudo & jectigatio, partium extremarum frigus, sudor frigidus, imprimis circa frontem, & prostratio virium, tandem quoque adveniunt singultus & convulsiones, prodromi lethality.

Omnia hæc symptomata sunt atrociora, prout causa efficiens occasionalis acrior & malignior extiterit. Malum acutum hoc à *diarrhæa* differt secundum magis & minus, nulloque sui præcedente præfagio suboritur; ultra 2. vel 3. dies non durat, rarò ad quartum; sæpè funestum existit, & dicitur *cholera humida*, in qua varii succi, nunc acres, nunc insipidi, peccant. Nam præter hanc etiam *Cholera sicca* datur, *norba* nempe, in qua saltem flatus copiosi suprà & infrà, vel per utrumque guttur, eructantur, frequenter in lipothymiam cedens, ac in hypochondriacis subinde observabilis.

*Humida Cholera* est, quæ jam considerata venit, cujus causa est eadem cum causis *diarrhææ*, nisi quod gravior, & pro operandi ratione magis efficaci existat; hinc vel acre quoddam venenum, v. g. *Mercurius sublimatus*, *Arsenicum*, aut simile quoddam assumptum, continuo vellicans & rodens intestinum imprimis duodenum, & stomachum, choleram infert: vel fermentum malignum acre alcalinum, concitans *Massam sanguineam*, eamque fermentativo motu colliquefaciens, indeque simul succum felleum & pancreaticum turbans, choleram infert: Scilicet similis tunc est ratio, atque *helleborina*, *scammoniata*, *Colocynthica*, aliave graviora purgantia simul suprà & infrà purgare solent: siquidem purgantia talia acia & intense amaricantia, vel incautè usurpata, vel iis propinata, qui stomachum ac intestina habent sensibilibus, eadem symptomata, atque in *Cholericis* obvia sunt, concitare solent, nempe sitim, anxietatem, æstum præcordiorum, extremorum frigus, tandem convulsiones, ac mortem.

Acre hoc, sive irritans, sive colliquefaciens, sive (idque ut plurimum) utrumque fuerit, nunc humoris copiosi facie se exhibet, ex assumptis nempe vel in se vitiosis, vel saltem intus corruptis genitum; nunc verò, idque ut plurimum in vehementiori affectu, & qui spontè suâ ex interna oritur causa, sub mole minima existit, adeoque rectè fermentum malignum appellari potest.

## PARS AFFECTA.

*Subjectum* seu *Pars affecta* *Cholæræ* proximum est intestinum duodenum cum *Pyloro*, & principium jejuni, ibidem scilicet, ubi inseruntur isti ductus, *Pancreaticus*, & *Cholodochus*: Hæ enim partes à succis aeribus plus minus & contrariis eò effusis irritatæ ac vellicatæ, tunc convulsivum stimulantur motum, adeoque ex peristaltico motu sursum ac deorsum naturaliter simul succos hos aciores, aut insigniter corruptos emittunt.

## CAUSÆ.

*Causa proxima* sunt vel fortis ac insignis irritatio ab acri, tam assumpto venenoso, quàm in corpore præternaturaliter genito; vel colliquefactio & conturbatio *Massæ sanguineæ*, indeque natorum succorum, à fermento peregrino acri maligno de natura alcalina, cum ipsis confuso, quod fermentum vitiosum *Massam sanguineam* fermentando alterat, transmutat, & corrumpit ita, ut partes corruptæ ac vitiosæ sero involutæ, tandem per abusum (nam reverà abutitur natura his viis) ductus colodochi & pancreatici ad intestina ablegantur, & ibi concurrendo & effervescentia hanc tragœdiam cholæræ agunt; unde simillima infert symptomata, atque purgantia acia maligna assumpta. Prioris exemplum est *Cholera*, quam observavit *POTERIUS* *Centur.* 2. c. 59. à potu aquæ fortis nata: posterioris exemplum suggerunt v. g. purgantia maligniora inconsulto propinata. Nam quod tale vitiosum fermentum sit, quod *Massam sanguineam* inquinet, patet ex eo, quod, utut non rarò ab alimentis corruptis occasionaliter inchoetur *Cholera*, nihilominus tamen excrementorum quantitas est tanta, ut alimenta, aut quævis assumpta omnia, & quocunque modo corrupta, longè superet: quæ excrementa non oriuntur, nisi ex *Massa sanguinea*, quæ communis fœcus & promus condus est totius œconomiz animalis. Hinc etiam est, quod purgantia, si sint nimia, non rarò *Choleras* excitent, in istis scilicet, in quibus copiosa salia contraria, præsertim acida, per medicamentum purgans fermentante motu ad intestina detruduntur, & ibidem tam effervescentia, quàm mutuâ sui miscellâ vitiosum saporem acquirendo, tam violenter intestina stimulant, & *Choleram* excitant: uti interdum in hystericeis, scorbuticis & similibus, observari solet. Hinc etiam est, quod fructus horæi, aut ipsius aeris vitio in liquamen acre quasi vitriolatum corrupti, aut in stomacho imbecilliori sub digestionem vitiati, in talem *Chylum* vitiosum a: fermentativum abeant, ut & intestina irritando, & *Massa sanguineæ* crasin turbando & colliquefaciendo, *Choleram* excitent. Unde etiam ex ista commotione præternaturali *Massæ sanguineæ*, symptomata febrilia non rarò adsunt, tam ratione pulsus, quàm ratione caloris & Cephalalgiz. Imò facit huc imprimis historia *AMATI LUSITANI* *Cent.* 3. *Hist.* 88. de muliere cacoehymica cholera correpta cum febre, supervenientibus tandem mensibus, in qua, quando effluebant menses, alvus erat adstricta, simul verò atque menses supprimerentur, cum febris insigni augmento redibat *Cholera*, & sic vicissim; quod innuit effervescentiam febrilem in *Massa sanguinea*; quæ *Massa sanguinea* per menses fluentes, tum his suppressis per *Choleram* morbum, evacuabatur, idque cum effervescentia. Sic adjunctus dolor ventris & intestinorum, inflatio eorum ac distensio, effectus genuini contentorum acrium effervescentium, dicta confirmant.

Dum ergo conflunt per ductum felleum & pancreaticum succi varii, plus minus corrupti, ex eorum miscella, & concursu emergit humor tertius diversi coloris & proprietatum, adeoque nunc bilis æruginosa, nunc porracea, nunc alia similis, tam suprà quàm infrà rejici videtur, & in specie dum movetur, bilisque intensius imprimis à fermento maligno (quo nomine nihil aliud concipere possumus, quàm summam acrimoniam, etiam in minimo interdum efficacissimam, nervosis partibus sensibilibus, & summam præternaturalem impressionem, humoribus verò in singulari textura sua mutationem inferentem) concitata, tam graviora ac periculosa circa præcordia in regione stomachi, & præsertim in lumbari dextra, ubi intestini duodeni, situs, symptomata excitare solet. Peracutum enim est malum *Cholera*, quodque graves anxietates præcordiorum, extremorum refrigerationes, lipothymias, sitim, pulsus intermittentes, singultus, non rarò convulsiones cum pulsu parvo, celeri & frequenti, inducit: simili ratione atque eadem à malignioribus purgantibus quotidie observamus. Hinc etiam est, quod theriacalla, sudorifera, & malignitati resistentia, primariò in hac *Cholera* sunt attendenda: unde etiam *PANAROLLUS* *Pent.* 1. *Observ.* 28. *Choleram* à veneno quasi putredinali asserit, & *IOHANNES COLLE* l. 3. *Med. Pract.* ubi de morbis malignis, inter affectus ventriculi malignos reponit. Accedit & hoc, quod interdum aut critica hæc sit evacuatio, febres aliosque morbos universales solvens, aut quamvis symptomatice, qualis illa, quam *RIVERIUS* *Cent.* 3. *Observ.* 78. & *Observ.* à *Pacô* quo



quo *causa*. refert, alias tamen sanguinis commotiones ac impuritates pro causa agnoscat, v. g. humores nidorosos aut bilem fedictam atram, qualem à quodam, præcordio. rum angustia & obstruptione viscerum laborante, *am xai* *ndro* maximo cum impetu rejectam fuisse TULPIUS lib. 2. obs. 21. refert. In genere quæcunque & qualiacunque symptomata fortem ac deleteriam antimonialem purgationem, aut helleborum album sequuntur, aliudve violentius catharticum, ea similiter obvia sunt in Cholera. Iam verò notum est, quod dicta recte inter venena corpori inimica reponantur: Ergò &c.

Hæc in genere de Causis & fieri modo.

Quoad remotas occasionales causas, quæ fermentum corruptivum & Choleram producant, sunt vel internæ vel externæ. Hæc in specie sunt assumpta varia plus minus præternaturalia: Illæ verò internæ, aut ex assumptis intus genita, aut spontaneâ contentorum corruptelâ nata, ac putredine malignâ inquinata: frequentiores tamen causæ sunt, vel assumpta fermentando facili corruptibilia, & in nidorem biliosum transmutabilia, nisi debite à fermento ventriculi subigantur; vel medicamenta assumpta acriora plus minus maligna; vel denique certa venena, aut acrimoniâ corrosivâ, at propriâ suâ naturâ Choleram inducentia.

Quoad assumpta: notum est, quod ex usu persicorum aliorumque fructuum horarum facili effervescebiliū, & postmodum putrescendo in nidorem biliosum alcalinum degenerantur, oriantur Cholera: vid. TIMÆUS *von Gulden Klee* l. 3. Casu 8. pag. 119.; quin ex malorum pericorum esu Cholera contractam in se ipso observavit ZACUTUS LUSITANUS l. 2. *Præx. Admir. Obser.* 15.; sicut ex esu eorundem nimio, superbibitâ cerevisiâ, mulier septuagenaria Cholera correpta fuit, quæ 300. vicibus unâ die aquam inspidam per alvum, & 100. vicibus pituitam per os, rejecit cum febre & delirio: vid. FONTANUS *in Anal. c. 33. Exmpl. 12. pag. 162.* item ex esu melonum eandem Cholera observavit ZACUTUS LUSITANUS l. 1. *Præx. Admir. Obs.* 16.; itidem ex esu fructuum præcoctum cum ovis siccis, superbibitâ frigida, observavit Cholera ingentem idem ZACUTUS LUSITANUS lib. 4. *Præx. Admir. Hist. c. 1. n. 7.*, ita ut æger biduo 300. vicibus ejiceret copiosum humorem aquosum, & 60. vicibus evomeret. Hinc etiam mustum, cerevisia novella, Vinum non rite defæcatum &c., facillimè cholera inducunt, si eorum fermentativa vis ad massam sanguineam forsân digestionis errore deferatur: Sic SCHENKIUS observavit Cholera ex multo, esu fungorum, potu frigida, ambulatione cum pedibus nudis, & lotionem pedum in aqua frigida, quæ singula periculosam cholera induxerunt: vid. l. 3. *obs.* 3. Ex vino acido in nimia quantitate ingurgitato RIEDLINUS *Obs.* 51. Phaseolis, cepis, fungis BRASSAUOL. l. 9. in Hippoc. de *Vul. Aetorum* l. 4. Text. 103. ex nimio raphani esu cholera itidem observavit AMATUS LVSITANUS c. 2. *obs.* 32. ratione salis acris, quo corrupto, insigniter potest depravari etiam sanguis: Ex esu nimio lactis, uti subinde interdum est Cholera, ita ex ejus nimia corruptione (nam lac facillimè fermentatur & corrumpitur) Cholera observavit HEINRICVS ab HEER in *Obs. opp. rara* 15. Sic ex oryza cum lacte parata, sed frigida assumpta, itidem Cholera observavit ZACUTUS LVSITANUS *loc. cit. obs.* 16. speciatim ova barbi & lucci piscium insigniter cholera inferunt: de quibus SCHENKIUS l. 7. *obs.* 21., item TIMÆVS in *cas. l. 1. c. 7. p. 118.*, qui ipse per esum barbi contraxit Cholera.

Hæc omnia præternaturaliter fermentum in stomacho corrumpunt, & degenerant in liquamen acre, in quibus præponderat alcali oleosum, quæ partim irritant intestina, partim deferuntur ad sanguinem & cholera inferunt: prout plus vel minus maligna, eò etiam vis pronata fermentativa volatilis major vel minor.

Post assumpta imprimis sunt medicamenta purgantia nimis generosa, aut fortiora, aut inconcinna dosi, vel subiecto, cujus contenta quælibet sunt acriora, proinata, quæ non raro inducunt cholera: vid. RIVERIUS c. 2. *obs.* 19. item in RHODIO *Cen. 2. obs.* 69., quod est rarum exemplum, dum refert: quod ex assumpto antimonio non rite correcto singulis hebdomadibus per biennium colica periodica per aliquot horas exorta auit recurrens: Ita FORESTVS l. 18. *obs.* 44. Cholera periculosissimam observat ex taleolis radices hellebori albi, vino infusis, concitatam,

curatam per 3 li. pulveris florum nymphaeæ albæ, ceu proprii ejus antidoti: Sic acria ferè omnia, & venena quædam acria, uti sunt Aqua Fortis, Antimonialia, Arsenicalia, Mercurialia, in specie Mercurius sublimatus corrosivus, item præcipitatus, acrimoniâ suâ nunc pylorum, nunc duodenum, rodendo crebras inducunt Choleræ. Inter internas causas, febres malignæ in principio sui interdum adjunctas habent Choleræ, ut plurimum lethales: sic & Cholera epidemica, plus minus malignæ, subinde observata fuerunt, qualem refert SYDENHAM *Tr. Observat. de Morbis acutis sect. 4. c. 2. p. 239.* Sic WILLISIVS in *Phar. Ration. Vol. 1. S. 3. c. 3. pag. 119.* Cholera malignam refert etiam epidemicam, quam tamen sub nomine dysenteriae non cruentæ describit. Sæpius satis pestilentialia observantur, seu pestem in sinu gerunt, v. g. illa, cujus RIVERIUS *Observ. Morb. Infrequentium* 26. meminit. Rarum etiam est, quod ab oclusa fontanella Cholera à se observatam refert IOHANNES MICHAEL FEHR *Tr. de Abstin. p. 106.* Vt nihil dicam de singulari idiosyncrasia, cujus ratione ex audito tonitru cholera subinde enata: vid. *Acta societ. Reg. Volum. 1. pag. 446.* Ratio hujus est in HANNEMANNI *Methodo Cognosc. simpl. Veget. 6. 35. p. 71.* Sicuti notatu dignum est, quod habet FONSECA l. 1. *Cons. 84.* de Cholera, in qua evacuabantur sursum & deorsum nigra, idque vi io lienis obstructi ob mensis deficientes. Tandem PANAROLLVS *Pent. 1. Obser. 11.* observavit in viro cholera sanguineam; *oben und unten Blut*, cum maximis symptomatibus, occasione nimie Veneris contractam; cui cum aliquando ferocius incumberet, in tam copiosam sanguinis cholera incidit, ut etiam mortis periculum immineret, per 3 iv. lapidis hæmatitis, in vino seu succo granatorum acidorum assumpti, curatam, postquam ad 12. libras sanguinis rejecerat, cum omnium admiratione: quod planè singulare est, & non memini me apud ullum Autorem tale quid legisse.

Omnia quæ supra de Purgantibus dicta in diarrhœa & Cholera, hic conveniunt. Ergò, ut in hypercatharsi vehementiori & diarrhœis, ita etiam in Choleris, ad duo imprimis respiciendum est: Vel (1) ad acre irritans, istudque ut plurimum acidum, nunc solitarium, nunc bili permixtum, indeque cum hac effervescentia, & ita bilem æruginosam omnium pessimum constituens, à qua etiam gravissima Choleræ circa præcordia symptomata: Vel (2) ad fermentum malignum fermentativo motu colliquescentem massam sanguineam, & conturbans inde derivatos succos, estque materiæ alcalinæ acris simillimæ purgantibus gravioribus.

## DIAGNOSIS.

Quod attinet signa diagnostica: ex superius facta enarratione symptomatum clara sunt: ex quibus etiam

## PROGNOSIS

est facilis.

Cholera, quæ sponte suâ sine causa manifesta externa corripit ægros, ut plurimum est funesta ac ferè lethalis.

Cholera periculosissimum & peracutum est malum, intra biduum, vel triduum, imò 24. horas, ægrum jugulans: utut ex RHODIO *superius alleg.* constat in quodam ex Antimonio minus decenter præparato Cholera ad biennium, per intervalla tamen, & quidem per periodos, afflixisse. Periodum ferè observat tertianariam, ita nempe, ut de tertio in tertium diem moveatur, seu plus minus exasperetur.

Cholera, quæ supervenit in principio febrium, imprimis malignarum, ut plurimum est funesta, utut in declinatione quarundam febrium interdum possit esse salutaris, si nempe fiat per modum criseos, quod tamen rarissimum est.

Propter malignitatem cautissimè tractanda cholera; suspecta enim admodum est propter metum recidivæ; cum sæpius ægri jam reconvalescentes ex superventu inopinata recidivæ obeant: vid. HORSIUS l. 4. *Obs.* 8., ubi notat, cholericam passionem ferè curatam, ex potu vini non rite defæcati, lethaliter recidivantem.

Minus periculosa est cholera, ubi stomachus non affectus, ubi non lipothymia & anxietates præcordiorum sunt.

Quò perturbatio ventris major est, & quò magis patitur ventriculus, eò periculosior est cholera, & etiam periculosiora habet symptomata, eoque citius mortem inferit.

Quò



Quò magis à statu naturali recedunt excrementa, speciatim si fuerint livida, aut si fuerint foetida, aut si fuerint nimis corrosiva, qualia sunt ea, quæ dicuntur æruginosa, & porracea, utpotè interrancais quibusvis hostilia; item cum loturæ carnis simile quid excernitur, eò periculosior est cholera: & longè adhuc majus malum, si nigra aut livida rejiciantur, ut ex TULPII *Observ. l. 1. a.* innotescere potest. Sin tamen aliquando oriatur Cholera per Crisin, potest esse salutaris, uti monui.

Cholera colliquescitiva, mutans habitum corporis, semper serè lethalis est.

## C U R A.

In Cura eadem medendi ratio est cholerae, quæ vomitus atque diarrhoeæ, utut remedia magis efficacia, aut magis selecta subinde adhibenda sint. Maximè attendendæ sunt causæ: anoriatur ab assumptis? an à fermento maligno? propter quod summà circumspeditione opus est, quoniam Cholera suspecta est propter metum recidivæ; sæpius enim ægri jam convalescentes ex superventu inopinatæ recidivæ obierunt.

1. Temperandum est quodcumque acre, quod choleram infert, & blandè in principio morbi per leniter sudorifera evacuetur.
2. Destruendum est fermentum malignum alcalinum, quod choleram excitat.
3. Hinc utroque in casu opiatas humorum & partium motus sistendus; &
4. Appropriatis odoriferis stomachus roborandus. Dico odoriferis: nam in omnibus intestinorum & stomachi affectibus sunt egregia odorifera, sive interne sive externe usurpentur, quibus sæpè solis potest alvus sisti. Sanè multum hisce tribuit HELMONTIUS, qui solo emplastro odorifero sæpè desperatissimas curavit Choleræ.

Pro his scopis melius obtinendis, observetur:

I. Semper medicamentis anti-cholericis addenda esse alexipharmaca bezoardica, vel ipsa remedia propinata ex se vim habeant alexipharmacam; quia causæ ejus ut plurimum sunt malignæ, ut rectè monet LANGIUS *Commentario in Fabrum*; unde non satis sumus tuti in Cura.

II. In principio morbi benè considerandus naturæ motus, idque in specie, si ab externis assumptis facilè fermentescibilibus vel putrescibilibus oriatur matum; tunc enim benè considerandus naturæ motus. Si enim, moriente Hippocrate, et omuntur ea, quæ debent, confert, & faciliè ferunt, Undè ex tali causa, v. g. ab alimentis corruptis & similibus, nata cholera non subito nimis est supprimenda, & ab adstringentibus sortioribus in initio est abstinendum & cavendum; nec vomitus & alvi dejectio statim ab initio cohibeantur, quia suppressa excrementa commota adhuc aut fermentativa, siue à fermento maligno per colliquationem transmutata fuerint, siue ex assumptis genita detineantur, sub cinere gliscunt, & novum ac deterius incendium minantur: uti hoc rectè monet FORESTUS *lib. 18. Observ. 45.* item AMATUS LUSITANUS *Cent. 3. Cura 88.* Undè inimico visceribus incluso facilè multa ac gravia symptomata supervenire possunt: sicuti è contrà, si cathartici excretionem promovere velimus (quod SYLVIUS *Prax. l. 1. c. 15. §. 29.* & RIVERIUS *Præcox. l. 9. c. 9.* contendunt) juxta SYDENHAM *l. 1. a.* oleum igni addere mus. Igitur cum lenissimè Cathartici operatio novos insuper excitet tumultus, spectatorem potiùs naturæ agere debemus, aut saltem in principio juxta Riverium & SYDENHAM acre istud abstergendum blandè ac diluendum; hinc demùm opiatas morbi impetus frangendus.

III. Opiata nunquam satis laudanda sunt remedia in cholera & omni alui fluxu, quæ sanè nunquam emittenda, & in majori quàm consuetà dosi, e. g. ad gr. iv., præscribenda: sin tamen magna adsit virium dissolutio seu prostratio, magna laudani dosi juxta RIVERIUM non est exhibenda, sed melius est, partitis vicibus propinare, adeoque in minori dosi, in grano uno vel duobus subsistendum, semper cum appropriatis analepticis miscenda, & etiam bis in die exhibenda: quinimò si rariùs accesserit Medicus, ita ut æger vomitu ac dejectionibus ad plures horas fuerit exhaustus, jamque graviora symptomata, v. g. extremorum frigus, imminet, in tali casu, omisiss quibusvè aliis auxiliis, mox ad sacram laudani anchoram est accedendum; sicuti aliàs opiatas in cholera cura nunquam omittenda

sunt, cum Bezoardicis & antimonio diaphoretico mixta.

IV. A nimio potu, in specie frigido, quantum possibile, abstinendum: haustus tamen vini moderatus optimè convenit, nisi pro scopo abstergendi & temperandi vel serum lactis, vel decoctum hordei cum syrupo Rosarum, vel Decoctum pulli aquosius, aut simile; diluentia enim mltè profunt. Sed omnia, quantum possibile, tepidè exhibenda.

V. In declinatione morbi, ubi cessat impetus, adstringentia & stomachum roborantia usurpetis ubi conveniunt.

Medicamenta igitur, quæ dictis conveniunt scopis, sunt mentha, & omnia ex mentha parata; cum hæc, ceu singulare specificum, stomachum suo modo pacificans, commendatur à Tralliano, quoniam nempe singularissimè convenit; undè etiam ejus succus insigniter commendatur ad Choleram: Portulaca item & scordium ac plantago, siue in decocto cum syrupo cydoniorum & confectioe alchermes, aut electuario diascordii, siue eorum succus cum mentha, propinentur: Pariter semina 4. frigida majora, amygdalæ dulces, & similia, & ex his paratæ emulsionēs, propter vim temperandi acrimoniam humorum effervescentium à quibusdam commendantur; quas tamen minus probo, quia laxant stomachum: Aromata oleosa, nux moschata, caryophylli, & similia, commendantur similiter: Acida item, effervescentiam sanguinis nimiam compescunt, commendantur: Sal prunellæ à Riverio commendatur, ubi cum Cholera conjunctus est ardor & sitis. Alias internæ præterea conveniunt terra sigillata, & terra Solaris, & Martis Solaris; est terra, quæ reperitur in auri fodinis, coloris flavi, & quæ imprægnata est primo ente auri, & soluta cum spiritu salis, dat tincturam insigniter adstringentem, & quæ fluxibus malignis epidemicis, alvi præceteris, convenit. Reperitur itidem in Martialibus fodinis terra Martialis, quæ similiter imprægnata est primo ente & semine Martis. Similiterque hic commendatur Crystallus præparata ad 3ss. & ceu singulare laudatur specificum, bilem æruginosam temperans. Iuxta Crystallum & Smaragdum est, qui acerrimi istius succi corrosivi vim infringit, speciatim ubi iam convulsiones imminere videntur. Ulterius Martialis, imprimis antimonium diaphoreticum Martiale est egregium; hinc Corn. Cerv. ustum, Ebur sine igne, corallia rubra, in usu sunt.

Quoad differentias causarum: in cholera à causa nimis acris nata, adeoque à venenis corrosivis aut similibus excitata, v. g. Arsenico, Mercurio sublimato, aqua fortis, &c. conveniunt imprimis pingua & oleosa, acre tale obtundentia: ut Oleum amygdalarum dulcium, aut butyrum non salitum, quæ corrosivitatem demulcent: item lac, cui semper appropriata, ut terra sigillata, admisceri possunt; acidum enim & pingua & lactea potenter temperant. Conveniunt interea acre istud absorbentia, ut terræ minerales sigillatæ, crystallus præparata, quæ crystallus in bile æruginosa seu porracea, in qua activè acidum prævalet, ceu appropriatum laudatur à LANGIO in *Epist. l. 1. c. 4.* & *l. 3. c. 1.* item ZACUTO LUSITANO in *l. 2. Præcox. Admir. Observ. 15.*, qui hunc crystallorum usum insigniter similiter experitus est; Videri etiam potest HEINRICUS ab HEER in *Obs. 1.* ubi choleram, inepto usu fontium spadanorum ortam, usu crystalli montanæ cum succo cydoniorum, vel limonum, & berberum, unoque alterovè clystere curavit. Exempli loco sit POTERIUS, qui *l. 2. cap. 59.* ab Aqua Fortis, pro vino epota, nauseam, vomitus, dysenteriam, febrem cōtinuam refert. quæ tamen omnia curavit per lac & emulsionem amygdalarum dulcium cum gr. xv. terræ sigillatæ aut lemnis: hinc noctu per theriacæ ʒij cum aliquot granis dictæ terræ; tandem propinavit lac vaccinum chalybeatum cum ceræ flavæ ʒj pauxillo nucis moschatae & dictæ terræ Lemnis addito: Conf. SYLVIUS *c. 15. §. 46. in Praxi.* Extrinsecus solum ex absinthio, mentha, rosas siccis, mace, nuce Moschata & aliis ordinavit. Dictis addi potest salis tartari, quod absorbet, in specie Mercurii sublimati corrosivam vim sistit.

Si à perverso usu & effervescentia fructuum boræorum oriatur malum, præter blanda abstergentia, eorumque colliuviem evacuantia, conducunt. Præcipitanti dicta, salia alcalia, terrea: ut sal absinthii, sal tartari, terra sigillata, ac ebur ustum: quibus opiatas semper addenda: ad imitationem nempe cerevisiæ vel musti effervescentium impetuosius, dictis mediis cohibitorum. Vel

R. Aqu. tormen. ʒj.



Cinnam.

Menth. an. ʒss.

Spiritus vitrioli gutt. xv.

Elect. diascord. Fracast. ʒjss.

Terra sigillat. ʒjss.

Croci Martis adstr. ʒss.

Syr. cydonior. ʒjss.

M. f. Potio, quæ etiam in diarrhœa convenit.

D. S.

Potio confortans.

Si verò à fermento maligno per modum nimis purgationis excitata fuerit cholera, conveniunt blandè acida, itud destruentia ac præcipitantia, sudorifera blandis opiatibus mista expectato sudore; v. g. succus & Syrupus granatorum, ribium & berberum, Syrupus coralliorum, portulacæ, spiritu vitrioli, imprimis spiritus vitrioli Martis, & cum spiritus niri aut vitrioli paratus liquor stypticus, cujus supra feci mentionem: item solutiones coralliorum cum succo citri aut limonum; tinctura item sulphuris vitrioli insigniter convenit; uti etiam in principio morbi Tinctura Bezoardica, Mixtura simplex, quæ & effervescentiam Massæ sanguineæ compescit ratione spiritus vitrioli blandè adstringendo, & sudorem movendo malignitatē occurrit terræ minerales cum blandè acidis propinatæ, hinc terra sigillata cum spiritu vitrioli est egregia; item Antimonium diaphoreticum, antimonium diaphoreticum Martiale, Bezoardicum Solare, Ioviale, & Martiale, ebur sine igne vi absorbendi, & sudoriferà, itidem conveniunt.

Præ cæteris laudatur opium, & omnia ex opio parata remedia, quæ inter præcellit ad choleram electuarium diascordii Fracastorii, cujus dosi ad summum convenit in cholera à ʒij. ad ʒj. Compositio est ex adstringentibus alexipharmacis & sudoriferis: est quidem quodammodo rudis & theriacalis, nihilominus quoad ingredientia, est satis elegans, utut loco ejusdem vel sola conserva menthæ cum terra sigillata & aliquot granis laudani opiatum admodum conveniat. Theriaca & Mithridatium, & ex his facta extracta theriacalia, spiritus & essentia theriacalis & menthæ quibus in majori malignitate semper addenda est camphora.

Ex dictis facile est, varias formulas concinnare: Sic SYLVIVS in quacunque humorum attemperatione, & hinc orta cholera curanda, hanc Mistruram commendat:

R. Aqu. plantagin. ʒij.

Feniculi ʒj.

El. diascord. Fracast. ʒij.

Syr. papav. albi ʒj.

M. f. Potio: S.

Potio confortans.

Vel alio modo:

R. Aqu. menthæ,

Cinnam. cydon. an. ʒj.

Spiritus theriacal. ʒjss.

Liqu. fixæ. ʒss.

Laud. opiat. gr. iv.

Syr. corallor. ʒvj.

M. f. Potio: S.

Vt anted.

R. Aqua plantaginis,

Portulac. an. ʒjss.

Cinnam. cydon. ʒvj.

El. diascord. Fracast. ʒij.

Crystall. præp. ʒss.

Antimonii diaphor. ʒj.

Terra sigillat. gr. xv.

Syr. papav. albi ʒj.

M. f. Potio pro aliquot dosibus, S.

Potio confortans.

Vel

R. Aqu. Portulac. ʒij.

Cinnam. ʒvj.

Spiritus theriacal. campb. ʒij.

Niri dulc. ʒss.

Elect. diascord. Fracast. ʒij. vel ʒijj.

Antimonii diaphor. Martiale. ʒss. vel ʒij.

Syr. portulac. ʒj.

M. f. Potio pro aliquot dosibus: S.

Vt anted.

Caplatur cochleatim, expectando sudorem parvum.

R. Aqu. Menthæ ʒij.

Ebor. sine igne ʒij.

Crystall. præp. ʒss.

Terra sigillata ʒj.

Laud. opiat. gr. iij.

Essent. opii ʒss.

Syrupi portulac. ʒvj.

M. f. Potio: S.

Vt anted.

R. Aqu. portulac. ʒij.

Cinnam. ʒss.

Spiritus theriacal.

El. diascord. Frac. an. ʒij.

Conf. alkerm. ʒj.

Ebor. sine igne ʒss.

Syr. corall. Quercetan. ʒvj.

M. f. Potio: S.

Potiuncula confortativa adstringens.

Vel

R. Aqu. Mentb. ʒij.

Portulac. ʒj.

Terra sigill. ʒij.

Crystall. præp. ʒss.

Laud. opiat. gr. vj.

Syr. Mentha ʒss.

M. f. Potio: S.

Vt anted.

R. Aqu. Mentb.

Rubi idai an. ʒjss.

Spiritus theriacal. campb. ʒij. ad ʒvj.

Terra sigillat. ʒj.

Corall. rub. præp. ʒss.

Laud. opiat. gr. iij.

Syr. rubi idai ʒvj.

M. D. S.

Vt anted.

Item

R. Theriac. ʒj.

Terra sigillat. ʒij.

M. f. Bolus: S.

Bolus confortativus adstringens, pro una dosi.

Detur in cochleari aceti vini.

R. Theriac. ʒj.

Terra sigill. ʒj.

Crystall. præp. gr. xij.

Cum Syr. Mentha f. Bolus, S.

Vt anted.

R. Conserv. Mentb. ʒj.

Terra sigillat.

Corall. rub. præp.

Crystall. præp. an. ʒss.

Laud. opiat. gr. ij.

Cum Syrup. corall. Quercet. f. Bolus: S.

Vt anted.

R. Conserv. mentb. ʒij. ad ʒss.

Crystall. præp. ʒj.

Terra sigillat. ʒss.

Laud. opiat. gr. iij.

Cum Syrup. mentb. vel portulac. f. Electuarium pro duabus dosibus, S.

Electuarium confortativum adstringens pro duabus dosibus.

R. Conf. menthæ vitriol. vel rosar. rub. ʒj.

Theriac. ʒij.

Terra sigill. ʒij.

Cum Syr. cydon. aromas. f. Electuarium: S.

Electuarium confortativum adstringens.

R. Ebor. sine igne,

Crystall. præp. an. ʒss.

Laud. opiat. gr. iv.

M. f. Pulvis.

Divide in duas parti. equal.

D. S.

Pulvis confortativus adstringens.

R. Terra sigill. vel Antimonii diaphor. ʒj.

Bezoard. solar. vel Iovial. ʒss.

Laud. opiat. gr. jss.

M. f. Pulvis, qui nobilis est in cholera.

Dentur duæ doses: S.

Vt anted, pro duabus dosibus.

Vel

R. Aqu.



**R. Aqu. Mentha** 3ij.

Cinnam.

Aceti bezoard.

Spir. theriacal. campb. an. 3ss.

Syr. acetos. curi vel cydon. q. l.

**M. pro vehiculo florum pulverum: S.**

Potio confortans pro vehiculo pulveris.

Vel

**R. Crystall. prap.**

Ebor. sine igne, vel Vnic. veri prap. an. 3j.

Boli Arm. 3j. ad 3ss.

Laud. opiat. gr. vi.

**M. f. Pulvis pro aliquot dosibus: S.**

Pulvis confortans, & adstringens pro aliquot dosibus.

**R. Ag. Mentha** 3ij.

Cinnam.

Essent. theriacal. an. 3ij.

Syr. corallior. 3vj. ad 3j.

M. D. S.

Potio pro vehiculo pulveris.

In hoc capiatur pulvis, subinde hauriatur unum vel alterum cochleare ejusdem.

Ante aliquot annos mihi occurrit studiosus, qui ex nimia comperatione incurrit in cholera, cui propinavi hunc pulverem.

**R. Ebor. sine igne** 3j.

Bezoard. leuial. gr. v.

Pulu. anod. confort. 3ss.

**M. pro Pulvere:**

Quem assumebat, & cum theriaca illinebat ventriculum, & ita bene se habuit adjuncto sudore.

**TIMÆUS VonGuldenKlee** in cholera, & profluvio alvi vehementissimo, & similibus fluxibus, commendat suam *Opiniam Bezoardicam*; cujus compositio est hæc:

**R. Theriac. Androm.** 3ij.

Conf. de hyacinth. 3ss.

Pulu. Bezoard. Senn. 3ij.

Misceantur.

Vid. ejus Descriptio medicamentorum singularium p. m. 422.

Quod attinet *Externam* in cholera; conveniunt quæ imprimis stomachum respiciunt, quæ inter eminet theriaca, simili ratione atque supra in Diarrhoea laudata sunt, in specie spiritus Vini, aut aromaticus, aut camphoratus, seu largiter camphora imprægnatus, in specie à Vegetabilibus cordialibus & aromaticis abstractus, cui ex tempore singulis uncias 3j. camphoræ calidæ, cum linteo multiplicato ad 3ij. præcordiis celeri manu applicetur. Hoc ipso æger, qui per quatuor noctes diesque pertinaci cholera supra & infra, etiam generosissima remedia, rejecit, curatus fuit. Conf. **HEINRICUS ab HEER** in *Observationibus*: Vel

**R. Spiritus vini camphor.** 3ij.

Theriac. 3j. ad 3ij.

**M. pro Epistematē ventriculi: S.**

Externæ mixtura stomachalis.

Proficuum etiam est panis tostus vino generoso intinctus, & pulveribus aromaticis adpersus.

Rarò evenit, modo duntaxat interna, ut, siue in principio, siue progressu, opus sit absterfione intestinum laxativis vel clysmatis. Si tamen opus est, ut in cholera errore imprimis diætæ enata, vel reliquæ quædam in intestinis hærentes abstergendæ, vel continuè eadem alvum stimulantem & quasi tenesimum inferentes, removendæ sunt, imprimis si ex corruptione alimentorum in stomacho nata sit Cholera. In tali casu **SYLVIVS Præcios** l. 1. c. 15. §. 29. partim pro excretionē per superiora adjuvanda, partim inferiora versus promovenda, propinat vomitorium antimoniales, admisso laudano opiato: Formula hæc est:

**R. Oxyseeb. Vomitiv.** 3ij.

Laud. opiat. gr. ʒ. vel gr. j.

Aqua mentha q. l.

M. f. Haustus.

Quo equidem propter vomitorii vim haud facillè imitari jusserim, potius, ut temperarem, simulque abstergerem ferum lactis solum, vel cum 3j. alterave syrupi rosati aut violarum solutivi temperatum, vel blandum Tamarindorum Decoctum cum eo paratum, imprimis si adhuc nimia sitis, cum temperet effervescentiam sanguinis, exhiberem, vel infusum blandum ex Rhabarbaro, & bolum ex eodem cum conserva rosarum, exhibendi suaderem: item

*Estimul. Oper. Tour. II.*

pulpa tamarindorum ad 3j. infuso lactis dissoluta non est frustranea. Applicantur etiam clysmata lenientia, cum theriaca imprimis admixta, addendo 3ij. vel ʒij. Theriaces uni clysmati ad imitationem **RIVERII**, qui subinde suis clysteribus admiscet theriacam non absque fructu, nempè Clysteribus ex lacte addit theriacam ad 3ij. & 3ij. interdum ad 3ss: vid. **RIVERIUS** l. 3. *Observ.* 78. ubi casum cholerae periculosum habet. Loco theriacæ interdum permiscetur electuarium diascordii, quod similis fere est usus.

Si cholera sit à remedio purgante, ut exinde oriatur hypercatharsis, tunc vel solum sufficit laudanum opiatum, quod in quacunque hypercatharsi est præsentissimum remedium, si cum vino bibatur. In Diarrhoea post usum vini cunctæi pertinaci, cum successu præscripti:

**R. Essent. theriac. al.** 3ij.

Opii 3ss ad 3j.

Mista propinabatur ad gutt. 40. bis vel ter in die. Vti etiam notum est, quod theriaca à 3j. ad 3ij. ac theriacalia ratione opii præ cæteris in quacunque hypercatharsi conveniant, in haustu vini generosi calidi, aut absinthitis assumptam, sicut **RIVERIUS** Cent. 2. *obs.* 19. habet observari novæ de cholera ex superpurgatione admodum periculosa, propinatis gr. ʒij. laudani opiat. exoptatè curata. Similiter idem **RIVERIUS** curavit senem 70. annorum, propinando interdum Decoctum plantaginis & portulacæ, de quo superius, cum syrupo cydoniorum & electuario diascordii ac confectioe alchermes, singulis noctibus exhibendo granum j. vel ij. laudani opiat. Facit quoque *Cent. 3. obs.* 78. mentionem cholerae cum tertiana febre malignæ: casus fuit admodum periculosus, qui tamen fuit curatus præscripto clysmate ex jussulo cum confectioe Alche mes ad 3ij. & theriacæ rec. 3j., quo subito vomitus & alvæ suppressa fuit: deinde ad præcautionem semper duabus horis ante paroxysmum gr. ij. laudani opiat. propinavit, & sic præservavit, & curavit. Simile exemplum habebitis in *Obs.* 4. communicata à **PACHEQVO**.

Plura huc conferri possunt, quæ dixi *suprà artic. 1. de Diarrhoea*.

## ARTICULUS III.

### DE

### LIENTERIA.

**A**lvi fluxus auctos pertinet etiam Lienteria, l. intestinum lenitas seu Diarrhoea assumptorum, quæ est, quando assumpta omnia, prout fuere ingesta, per alvum egeruntur: aut est talis alvi fluxus, in quo parum aut leviter aut omnino non immutata, per alvum egeruntur assumpta, ita ut tunc referant exacte proprietates suas omnes.

### PARS AFFECTA.

Pars affecta primaria est ipse stomachus, maxime pylorus. Revoco in memoriam hic, quod rectè pylorus ab **HELMONTIO** dicatur *Rehor*; si enim pylori orificium non ritè clauditur, dilabuntur alimenta ex stomacho, & tunc supervenit Lienteria; quia non ad debitum tempus persistunt in stomacho. Cum verò in naturali statu ad legitimam digestionem requiratur, ut fermentum digestivum debite dissolvat & alteret alimenta, ut stomachus convenienter eadem retineat, sanè ex contraria causa necessariò oritur Lienteria.

### CAUSÆ.

Causæ ergò Lienteriæ sunt investigandæ vel in fermento stomachali non digerente, vel in pyloro non retinente. Nempè

1. Succus stomachi fermentativus, aut omnino deficiens, aut iners, aut ex retentis variis impeditus, Lienteriam efficit.
2. Quando pylori tanta est laxitas, & e contra reliquarum stomachi partium tanta irritatio, ita ut non debite retineat, quin potius assumpta per pylorum dilabuntur quàm reverà excernantur, etiam Lienteria oriri solet: idque, uti dixi, in specie, quando cum hac pylori laxitate vel levissi-



ma conjungatur stomachi irritatio aut molestia.

Prior Lienteria vulgo dicitur oriri à facultate concoctrice laesa: Posterior verò à retentrice labefacta & expultrice irritata. Causa ergo proxima est fermentum stomachi digestivum labefactum, aut iners, aut deficiens, cui accedit stomachus præternaturaliter irritatus, & pylorus laxatus, ita ut sic assumpta ad sufficientem usque dissolutionem retinere nequeat, sed per alvum promoveantur. Sola enim laxitas pylori vix videtur à debita causa, nisi accedat simul hujus & reliquarum partium ventriculi irritatio, quatenus pylorus non ex inferiore ventriculi parte, sed hujus eminentiore loco prodit.

Ad has causas proximas collimant ceteræ remotæ, ventriculum & pylorum ad irritationem & laxationem disponentes. Illustrant hoc observationes Auctorum. Sic FORESTUS lib. 20. Obs. 29. & 30. Lienteriam observat admodum contumacem, ortam ex ulcere ventriculi. In hoc enim ulcere non tantum fuit notabilis alteratio succi fermentativi stomachi à pure acri falso, & ob id immutata digestio, sed præterea etiam stomachus ab ulcere doloroso continuo irritatus, quælibet assumpta sui contractione mox deinde ejecit: curatum tamen fuit hoc ulcus & per consequens etiam Lienteria (1) abstergendo & mundificando per aquam multam; item per decoctum hordei cum melle rosaceo: postmodum (2) consolidando cum decocto radicis symphyti majoris cum terra Lemnia vel alia sigillata propinata, vel cum lacte vaccino, item pulvere equiseti. Sic Lienteriam ex irritatione stomachi ab acriore humore in eodem retento ortam, GABELCHOVERUS Cent. 2. Obs. 47. observavit, dum refert exemplum ejusdem, qui hystericis & debilitate stomachi non nihil affectus, omnia potulenta in ea forma, quæ assumpsit, per alvum deinde egessit: Curatus tamen fuit per abstergentia & temperantia, imprimis serum lactis.

Porro inter remotas Causas crebrior & nimius potus etiam subinde ad Lienteriam disponit, idque propter relaxationem nimiam stomachi, præsertim pylori, oriendam: laus enim fibra relaxata non possunt sufficienter contrahere, & propterea succedit Lienteria seu alimentorum crudorum egestio. A MATUS LUSITANUS Cent. 6. Cur. 7. lac, prout desumptum, egestum observavit, quam Lienteriam ex nimio mucositate in ventriculo putat, & per oxymel cum speciebus hietæ pieræ & rhabarbaro curavit. Sic THEODATUS in Valetud. p. 28. puellam nimis sicciosam & bibulam ex nutrice bibulam Lienteriam affectam ex relaxato pyloro in hoc malum incidisse refert. Denique Scorbutus non raro secum conjunctam habet Lienteriam, primum observante BARBETTE in Praxi, cum tamen continuò in Praxi occurrat, ut excrementa à talibus assumpta, sicut fuerunt ingesta excreantur. Malum est difficile & admodum contumax in scorbuticis, & originem ulcere videtur ex irritatione stomachi ex tale acri scorbutico, tam per membranam stomachi glandulosam, eò delato, quam cum saliva deglutito: cum enim gingivæ scorbuticorum, non raro laborent ulceribus, salivæ in stomachum descendens non potest non molestiam contrahere eidem; & cum alimentis, dum masticeantur, hæc ipsa salivæ imprægnentur, eunc stomachus ad præmaturam excretionem stimulat, ut non possint diutius retineri, sed vel levissima laxatione pylori denudela buntur. Sicut acris irritatus stomachus infert vomitum, aut vesica urinaria ab urina acrimonia, calculo, aut ulcere vellicata, frequentem mictionem seu stranguriam; sic certa humorum venena Lienteriam excitare solent; membrana enim ventriculi hujusque fibrarum transversarum contractione, alimenta expelluntur, quæ diutius morari conveniebat: vid. MOLINETTI Exercit. anatomico pathol. l. 2. c. 4. pag. 281. Tandem ab errore exoritur, & assumptis fructibus horæis, inter dum periculosa evenit Lienteria, in quò observatum est, quòd potus parum immutatus redditus fuerit, quæ sæpe est lethalis; ideo enim fermentum stomachi plane delectum ab ipsis assumptis, diarrhæam excitantibus.

## DIAGNOSIS.

Quod attinet signa diagnostica; res est aperta.

Ut autem causas ejus distinguamus, notandum, quod in illa, quæ ex digestionis stomachi debiliore oritur, semper sit halitus foetidus & acidus, appetitus dejectus, flatus stomachi, mufmura abdominis, & similia.

Quæ à laxitate pylori, ex causis antecedentibus,

& proximarum reliquarum denegatione colligitur.

Quæ verò ab irritatione, ex mordicatione, rossione & ardore ventriculi, & acrum per superiora ac inferiora reiectione dijudicatur: quibus accedunt acrimonia scorbuticæ, simili hæc in toto signa.

## PROGNOSIS.

Prognosis quod concernit:

Lienteria scorbutica est malum periculosum, difficilis curationis, & facile recidivans: imò si graviores morbos excipiat, ut plurimum lethalis evadit: vid. BARBETTE Prax. l. 4. r. 3. §. 6.

Lienteria periculosa est in prægnantibus.

Lienteria diu durans, uti tandem atrophiam & tabem, ita summam virium prostrationem necessario comitem habet; ut taceam, ad Cachexiam quoque successivè eandem disponere.

Lienteria, quæ gravioribus supervenit morbis, sive acutis, in specie in febribus ardentibus & malignis, sive chronicis, est periculosa, & similiter lentâ tabe ægrum interficit, quia difficulter curatur propter virium insignem dejectionem, quæ tamen deberent restaurari per assumpta.

## CURA.

In Cura observandum:

1. Stomachum esse roborandum, & tam aromaticis quam moderatè acidis blandè adstringendum, ut ita fermenti stomachalis vigor redire queat, & pylori fibrarum laxitas restituatur: adeoque pro hoc scopo conveniunt omnia illa, quæ tam in anorexia quam apoplexia fuerunt insinuada.
2. Irritationem in stomacho maturè esse sistendam, tollendo acrimoniam humorum quorumcunque, in specie salforum, & sopiendo ventriculi sensum: adeoque pro hoc scopo, quæ in vomitu, cholera, aut diarrhæa fuerunt laudata, locum inveniunt.

Pro quibus scopis feliciter obtinendis, notandum est:

I. Quod in præsentia excrementorum ventriculi pituitosorum vel similium, conveniant quidem vomitoria, eadem tamen admodum lenia. Fortiora enim vel quantitate vel qualitate, in specie oleositate nimis infesta, quæ, veteribus fuerunt in usu, conum ventriculi facillimè destruant, aut certe malum irritant. Quod si minus purgatio per superiora locum habeat, fiat levis evacuatio per inferiora; blandior nempe, & quæ præter vim abstergentivam suam nihil adstringit, & stomachum roborat: ut sunt aloetia, Rhabarbarum, panacea stomachi, Myrobalani, &c.

II. Si metus vel suspicio veneni adsit, ordinaria methodus relinquenda, & hoc per convenientem viam evacuandum, itaque per alexipharmaca, aut veneno per specifica, resistendum. Quod pariter observandum si Lienteria ex fungis vel aliis fructibus horæis copiosis assumptis, & facillè corruptibilibus, similibusq; occasionibus externis contracta fuerit, ut appropriatis alexipharmacis obviatur.

III. Cavendum est juxta FORESTUM l. 22. Obs. 22. in hoc fluxu à fortioribus purgantibus, uti etiam à magna eorum dosi, adeoque, quantum possibile, cum iis procedendum, quæ aliqualem adstrictionem alvi participant; ut in principio, præsentibus recementis fortius irritantibus, non statim ea procedere debeamus, quæ fluxum adstringunt. Convenit ergo inter laxativa Rhabarbarum cum Vino: Sic HELIDÆUS PADUANUS in Obs. p. 126. puerum rium annorum, gravi Lienteriâ affectum, curavit per Rhabarbari cum succo cydoniorum vel vino ante cenam exhibitum: Addunt etiam species hietæ pieræ pilulæ pariter mastichinæ conveniunt hoc in passu, quæ ex blandis Purgantibus, stomachicis ac aromaticis sunt compositæ, ad gr. xv. vel 3 j. tuto possunt ordinari; item pilulæ aloeticæ.

Medicamenta ergo, quæ ad Lienteriam conveniunt, quòd attinet, sèd sunt eadem, quæ suprà ad vomitum fuerunt laudata, siquidem simul observat is cautelis, suntque omnia stomachica blandè acidâ, & aromatica: qualia sunt v. g. Absinthium, Meneha, uti etiam salvia, cinnamomum, in specie cydonia & omnia cydoniata, mēspila condita, nux Moschata, & macis, galanga, Zingiber, item Corallia, solutiones & syrupus coralliorum Quercetani: unde



unde refert FABER in *Cur. 65. de Lienteria*, præmissa purgatione, curata aqua cinnamomi & syrupo coralliorum. Hinc corallia, & speciatim paulo elegantiores tinctura Coralliorum, maxime sassafrata, in aqua vel spiritu cinnamomi propinata, conveniunt insigniter in Lienteria, cum ratione participationis substantiarum coralliorum acie quodvè temperent, & ratione menstrui stomacho ut plurimum gratæ sint. Harum tamen preparatio admodum variat: non inutilis est modus pro hoc scopo, quando corallia solvuntur in succo citri: solutioni filtrata, & inspissata ad consistentiam rob. postmodum affunditur menstruum debitum, & extrahitur tinctura: quod menstruum est nunc spiritus antiscorbuticus compositus in tinctura coralliorum antiscorbutica, quæ erit conveniens in lienteria scorbutica, nunc extrahitur cum spiritu rosarum ambrato ad rescindendas vires imbecilles, tam ex senio quam ex Venere, nunc affunditur essentia aut spiritus ligni sassafras, sitque tinctura coralliorum sassafrata, in lienteria egregia, & qui sunt alii modi. In Lienteria scorbutica, uti dico, convenit tinctura coralliorum antiscorbutica, quia utrique scopo succurrit. Corallia possunt etiam in succo limonum solvi: de qua solutione capiatur cochlear, & est egregia. Præterea convenit Zingiber in India conditum, uti & nux moschata in India condita, item myrobalani condita; potenter enim adstringunt. Elixir proprietatis, tam commune legitime paratum, tam sine acido, non est inelegans. Alumen etiâ legitime applicatum aliis irritis valet in quacunque viscerum laxitate, & à PETRÆO in *diff. Harmonica* laudatur ceu singulare, & præsentissimum remedium in hoc affectu, pulvere tenus cum aliis in liquida aut sicca forma; Mistura supra in Vomitu commendata, & hic notanda. Optimum est Alumen dulcificatum: de quo videantur Scripta POTERII, & DARIOTTI in *guldenen Chymischem Schatzkiste*. Dicit etiam quod pudenda seu priapus cervi & tauri insigniter conveniant, si pulverisata à 3j. ad 3j. in vino medicato propinentur. Vinum quoque absinthites Chalybeatum convenit, aut Vinum infusionis absinthii, melissæ, pulegii, menthæ &c., legitimo usu erit proficuum. FORESTUS l. 22. Obs. 28. refert lienteriam desperatam, ex qua orta macies, curatam aliis irritis hoc remedio: exhibuit nempe vitellum ovi pulvere nucis moschatæ unius insperso, super tegulam ignitam seu calefactam assatum, quo ipso fluxus desinit, & æger probe convaleuit: unde loco hujus euphoriston HELMONTII ad Diarrhæam ex vitello ovi unico vel duobus ad duritiem coctis, cum pulvere nucis moschatæ & aceto rosaceo etiâ locum inveniet, cujus usum felicem & ego in diarrhæis observavi. Tandem succus citri, cydoniorum &c., cum aqua cinnamomi, miva etiam cydoniorum aromatica cum pauca terra sigillata mista, & hinc leviter aliquot guttis spiritus vitrioli irrorata, similiter laudatur: item conserva Rosarum vitriolata cum terra sigillata vel cum theriaca mixta, lienterias curant. Quæ Irritationis sensum tollunt, sunt theriaca & theriacalia, laudanum opiatum & omnia opia, item Eleætharium Diacordii Fracastorii. Ex his facile est plura componere. Facit huc imprimis Eleætharium Sennerti n. x. in sua Praxi, ubi de Lienteria pag. 295. quod est expertum. Vel

R. Conserva mentib. vel Rosar. probe vitriolat. 3ij.  
Theriac. opt. vel loco hujus Diacord. Fracastor.  
3j. 3j. vel 3ij.

Ol. de ill. mentha gutt. vi.  
Cinnam. gutt. iij. vel iv.

Cum Miva cydoniorum aromatizata aut succo cyd.  
f. Eleætharium:

Cui etiam potest addi terra sigillata vel alia similis à 3j. ad 3j. pro lubitu, S.

Eleætharium confortans stomachum.

De hoc detur crebro portio nucis juglandis vel castanæ ad instar, donec Lienteria cesserit: & simili formâ, ex AMATO LUSITANO desumpta RIVERIUS feliciter est usus: vid. *Pr. Med. l. 10 c. 4.* AMATUS autem LUSITANUS l. 2. c. 56. hoc solo senem lientericum curavit. Panis biscoctus in spiritu vini maceratus, & hinc theriaca illitus & comestus, etiam convenit in Lienteria. Aliquando cuidam in lienteria scorbutica præscripti sequens Eleætharium:

R. Corall. rub. præp. 3j.  
Terr. sigillat.  
Lapill. Cancr. præp. an. 3j. vel 3ss.  
Ammon. gr. xv. ad 3j.

Emuller. Oper. Tom. II.

Galang.

Zingiber.

Cubebæ. an. 3j.

Miva Cydonior. aromatiz.

Succi Cydon. ana q. f. f. Eleætharium molle:

D. S.

Eleætharium stomachale.

De quo pro temperanda acrimonia irritante scorbutica, & inde nata corrigenda lienteria, medietatem cochlearis sumebat æger, & convalescebat. Vel

R. Lapill. Cancr. præp. 3ij.

Corall. rub. præp.

Antimonu diaphor. an. 3ij.

Salis vol. Corn. Cerv. 3j.

Olei destill. macis,

Mentha an. gutt. vj.

M. f. Pulvis.

Dosis 3j. manè & vesperi.

His etiam laudanum opiatum addi potest.

Denique spiritus mastiches, decoctum mastichis cum aliis mixtum, eius spiritus acidulus, syrupus mastichinus TIMÆI Von Guldenkle, quem in *Epist. pag. 456.* describit, cum oleo destillato menthæ & cinnamomi, & omnia similia in vomitu usitata, optimè hic conducunt. Præter comunia adstringentia, ut sunt Mastix, terra sigillata, tunica interna stomachi gallinæ &c., commendatur præ cæteris coagulum leporis & hædi siccatum & ad 3j. propinatum. De aliis adstringentibus, spiritu salis, liquore styptico, ceu notis, non est ut multa dicam. Observandum saltem, an magis tonus stomachi roborandus appropriatis adstringentibus? an magis acre vellicans abstergendum & temperandum?

Externè in laxitate stomachi, ut debitus ejus tonus restituitur, convenit sacculus sequens pro Fotu:

R. Com. absinth.

Herb. mentha an. M. j.

Flor. Chamomill.

Rosar. rub. an. Mj.

Mastich. 3ij. vel 3ij.

Caryophyll.

Nuc. Moschat. an. 3j.

Zedoar.

Zingib. an. 3j. ad 3j.

Includantur sacculo interpassando, qui in vino coctus vel maceratus tepidè ventriculo admoveatur, & subindè repetatur.

R. Com. absinth.

Herb. major.

Mentha an. M. j.

Chamom. cum flor. M. iv.

Mastich. 3ij.

Caryophyll.

Nuc. Moschat. an. 3j. 3j.

Zedoar.

Zingib. an. 3j.

Sacculo interpassato inclusa S.

Sacculus pro stomacho.

Ebulliat in vino, & crebro applicetur stomacho. Qui si non suffecerit, plura externa applicanda, supra in appetitu prostrato, Chylificatione laesa, & vomitu laudata. Cataplasma ex fermento & pulveribus aromaticis supra in vomitu laudatum, hic & in quibuscunque affectibus stomachi maxime locum habet: Formulam quoque videre potestis in Catalog. Ionsioniano MICHAELIS: sicut & Emplastrum stomachale de laudano Cratonis, vel solum, vel mistum unà cum tacamahaca & balsamo Peruviano, de quo superius, egregium est contra lienteriam. RULANDUS recipit solum micam panis, eamque aceto imprægnatam regioni stomachi non absque successu applicat.

## ARTICULUS IV.

### DE

### COELIACA.

Lienteriam excipit *Celiacus fluxus* sive *Chylosa ab i excreto*, quando nempe alimenta assumpta quidem digeruntur in stomacho, sed digesta sub forma chylosa cum excrementis unà per alvum excernuntur; quam tamen RIVERIUS lienteria saltem gradū remissiorem credit.

H 2 Duplex



*Duplex* hujus Cœliacæ, annotante SYLVIO Pr. l. 1. c. 13. §. 3. & 4. fiendi est *modus*.

1. Quando Chylus non fecernitur à sœcibus alvinis in intestinis, sed simpliciter, prout ex stomacho solet dilabi, sine alteratione foras emittitur, cum debilitate ægri & insigni languore virium; unde excreta grisea, plus minus albicantia Chylola invicem permixta apparere solent.

2. Quando fit quidem secretio chyli ab excrementis, caterum propter defectum distributionis chyli hic quidem secretus, tandem cum excrementis confusus nihilominus excernitur.

*Prior* passionis cœliacæ species, quædò scil. nulla secretio chymi ab excrementis contingit, fit vitio bilis, quando nempe bilis ad intestina non deferretur, ut ibidem possit instituire secretionem istam, h. e. quando bilis in intestinis deficit, quod fit in icteri ista specie, in qua obstructus est porus cholodochus: nam solus succus pancreaticus non potest perficere chylum, aut debitam secretionem instituire sine bile, in qua maximum momentum situm est: aut deferatur licet bilis ad intestina, si tamen hæc est inertis, & in sua crasi vitiata, i. e. non sufficienter salina acris, sed potius tantummodò oleosa ac nimis pinguis, aut potius nimis serosa vel aquea, tunc similiter nulla excrementorum à chymo nutritivo potest fieri separatio, hujusvè debita perfectio; unde vel cœlici fluxus species emergit.

*Posterior* Cœliacæ species fit, quando patentibus ductibus, cholodochi & pancreatici, fit quidem secretio Chyli, sed nulla distributio, quia obstructa aut infarcta sunt orificia vasorum lacteorum in intestina hiantium, & myco obfusa, unde non potest eadem subintrare chymus nutritivus, adeoque propterea excrementa cum chymo nutritivo excernuntur.

### C A U S Æ.

*Causa proxima prioris* est obstructio vel infarctus ductuum, sive à calculo sive à muco, sive ab alia re: Ceterum notum, chylum perfectionem ultimam accipere in duodeno, accedente fermento felleo, quo obstructo, nulla fit separatio chyli à recrementis, unde chylus crudus.

*Causa proxima posterioris* est obstructio vel infarctio vasorum in intestina tenuia hiantium: nam licet fiat separatio recrementorum à chylo, per peristroma tamen istud intestinis incumbens, per quod tanquam per filtrum cribratur aut transeolatur chymus nutritivus, si incrassatum sit mucagine viscida ac tenaci, dicta orificiola simul infarciunt, non potest admittere succum chylosum nutritivum, atque propterea confusa excrementa cum chymo nutritio excernuntur.

In his autem cœliacis fluxibus ventriculus ne plurimum est salvus, quia chylus perfectus excernitur: uti hoc observant TRAMBESARIUS in *Cons. l. 5*. Interdum enim fit legitime digestio prima, licet secunda vitietur: sicut taliter affecti non raro insignem habent appetitum, quod observat FORESTUS l. 22. *Observ. 26*. in muliere, in qua appetitus adhuc fuit salvus. Interim tamen hoc non universaliter adeo asserendum, quin nunc magis nunc minus salvus videatur: id quod docet curiosa *observatio 76*. M. A. N. C. *Ann. 4. & 5. pag. 63.*, ubi quidam post cujuslibet generis carnis esum fluxum chylosum patiebatur: In hac nempe carnes, quia non bene in chylum perfectum digerendo transmutabantur, sed probabiliter nidoroso sapore corrumpebantur, etiam inde factus chylus separationi ac perfectioni ulteriori in intestinis ineptus, fluxum chylosum concitabat. A piscibus nihilominus etiam durioribus, tam recentioribus quam salitis & fumo induratis, non idem patiebatur, quia sine dubio ventriculi fermento magis appropriati, & hinc melius digesti fuerunt. Vitium ergo totum fluxus cœliaci est vel in ipso chylo male digesto, adeoque inepto subeunda alterationi bilis, vel in ipsa bile non fecernente, vel in poris intestinorum non admittentibus chylum.

*Causa remota* est omne id, quod folliculum felleum aut cholodochum obstructum, aut mucum copiosum in intestinis facit. Si orificia vasorum lacteorum aut à muco viscido obstruuntur, e. g. in infantibus aut senibus, quibus malum hoc satis frequens est; aut à coalitu & cicatrice intestinorum post diuturnos alvi fluxus, præsertim dyentericos, hinc membranae intestinorum interioris erosionem, constipantur: quale quid illi, qui per Indiam Orienta-

lem, iter faciunt, ob dysenterias locis illis familiares, sæpius experiuntur. Huc etiam pertinet glandularum mesenterii obstructions ac dispositio scirrhusa, à quibus fluxum cœliacum ortum esse, diversæ autorum Observationes testantur; ver. gr. DIEMERBROCCIIUS *Anat. l. 1. cap. 8.*, M. A. N. C. *Ann. 2. Obser. 152.*, & RIVIERUS *l. 10. cap. 4.*

### DIAGNOSIS.

*Signa distinctiva*, seu quibus distinguere possumus, à qua causa oriatur fluxus cœliacus, sunt facillima. Nam ubi deficit bilis, ejusvè actio, excreta per alvum omnino sunt albicantia vel grisea, aut saltem pallida; item omnia invicem sunt permixta, nec ullum cujusdam patet vestigium secretionis: Vbi verò obstructa sunt orificia vasorum lacteorum, tunc excreta sunt tincta bile, fla vescunt nonnihil, & sic porro; & præterea chymus talis cum excrementis hinc inde confusus tantum apparet, ita ut certa quædam differentia Chymi nutritivi & recrementorum in excretionis conspicua sit.

### PROGNOSIS.

Quoad *Prognosin*: malum est satis grave, si diutius duret, quo æger vel maciem vel atrophiam incurrit, & tandem ad lethalem tabem perducitur; quamvis fluxus cœliaci alia species citius, alia tardius ac difficilius curetur: ver. gr. quæ ab humorum visciditate difficilius sanatur, quam quæ à bilis affluxu denegato, nisi forsitan hujus causa fuerit malum difficulter mobile, v. g. calculus, meatum cholodochum obstruens.

Imò incurabilis est illa, quæ à cicatrice intestinorum, & coalitu osculorum vasorum lacteorum, glandulisvè mesenterii induratis oritur.

### C U R A.

In *Cura prima* speciei cœliaci fluxus folliculus felleus obstructus, aut causa ista obstruens removeatur illis, de quibus *infra de ictero* dicitur. Imprimis acuenda est bilis vis, quæ sale volatili acris & oleoso constant, adeoque plus minus amara sunt, seligendo imprimis stomacho simul grata vel accepta: nam bilis debita falsedine prædita non permittit obstrui suum ductum. Quando ergo obstruitur, est inertia bilis ejusque deficiens acrimonia salina. In *secunda specie* abstergendus est mucus adhærens parietibus intestinorum, aut removenda quæcunque impedimenta, chyli distributionem inhiibentia.

Utrique scopo satisfaciunt simplicia vel aromatica, vel blandiora, vel acriora, intense amaricantia, bilem & ejusdem acrimoniam augmentantia, ductusque cholodochi & vasorum lacteorum obstructions resolventia. Præmarium est absinthium, mentha, agrimonia, capillus veneris, cardus benedictus, radices quinque aperientes dictæ, radices Cichorii, cujus amaror nitrosus egregie in specie convenit, intestina abstergit; & in genere omnia amaricantia. Novi cœliacum, tantum cum solo vino absinthite fuisse curatum. Item convenit rhabarbarum, feniculum, radix rubiæ tinctorum, semen anisi, feniculi, imprimis ciceris rubri, quorum Decoctum à quibusdam insignitur commendatur: gummata sæpius laudata, mucum viscidum, vasa lactea obstruentem, resolventia, in specie gummi ammoniacum, & mixturæ ex his conflata, item pilulæ ex his gummatis conveniunt. Gummata hæc destillata suggerunt spiritum acidum volatilem, in hoc casu optimum, maxime si conjungatur cum æruginis, & destilletur spiritus viridis æris compositus, sive componatur viride æris cum parte dimidia folii gummi ammoniaci, seu addatur una sulphur: sic destillando per arenam ex retort. prodit spiritus acidus volatilis, qui ad mucum dissolvendum est optimus: de quo *postmodum*, ubi de *asthma*. Veteribus in usu fuit in tali casu, ubi resolvenda & abstergenda pituita, oxymel tam simplex quam scylliticum, cum aqua vitæ juniperina: loco horum utimur potius dicto *spiritu viridis æris composito*, dicto *asthmatico*.

Remoto muco, subministranda sunt salia alcalia mucum abstergentia, & orificia vasorum lacteorum infarcta optime



optimè referantia: ideo convenit Tinctura tartari, tam vulgaris, quam Tinctura scoriarum reguli antimonii ob alcali tartari & nitri, quod imbibit spiritus vini in tali Tinctura: item tinctura tartari composita locum inveniet; hæ enim tincturæ, sale alcali imprægnatæ, aperiunt, bilem acciunt, & pluribus intentionibus satisfaciunt. Convenit etiam tinctura martis pomata, liquor terræ foliatæ tartari, uti cum & ex eo parata tinctura vitrioli martis Zvelfferi, aliæque essentia martiales aperiunt cum mensuris temperatis non nimis acidis paratæ. Quibus tandem salia volatilia omnia ad meliorem penetrationem commodè possunt administrari; spiritus salis ammoniaci, vel simplex vel oleosus factus additis aromaticis, vel per se, vel cum spiritu cochleariæ mistus, spiritus urinæ, spiritus carminativus de tribus, cujus supra feci mentionem, ex tartaro, nitro, & spiritu vini, ad gutt. 20. vel 30. in aqua menthæ vel alia appropriata, aut haultu vini absinthitis usurpatus, spiritus tartari volatilis per fermentationem, sive cohobationem à sale fixo, de quo videatur TACHENIUS; & similia volatilia aromatica, bilem acriorem reddentia, & visciditates intestinorum abstergentia, cum spiritu cochleariæ, nasturtii, &c. mista. Quidam commendat adstringentia, sed non conveniunt, potius malum exasperant. FRAMBESARIUS loc. supr. cit. ceu specificum commendat pendendum sive priapum cervi.

Quod attinet externa in cosliaca: parum aut nihil operantur, nisi concurrat vitium ventriculi in Chylificatione læsa, in quo casu applicari possunt, quæ suo loco dicta.

## CAPUT III.

## DE

EXPULSIONE CONTENTORUM ALVI  
DEPRAVATA.

## ARTICULUS PRIMUS.

## DE

## DYSENTERIA.

**N**on raro depravatur alvi fluxus in excretionibus dolorosis, quando præter Chylum aut similia ex alvo ejicitur sanguis, æquæ ac pus seu sanies, cum ventris dolore ac torminibus, quas inter primatum ducit *Diarrhœa cruenta*, aut secundum legitimum veterum usum dicta *Dysenteria*.

In genere quicumque alvi cruentus fluxus secundum Veteres, Hippocratem, & coetaneos aut successores ejus, Dysenteria appellari solet, solis hæmorrhoidibus exceptis, quibus adhuc stat sua autoritas: unde in hoc generali sensu apud Veteres sunt gradus sive potius differentie Dysenteriarum.

I. *Prima differentia* est, quando sine intestinorum vitio, motu & impetu naturæ, ex quacunque causa sanguis bonus in toto corpore abundans ex venarum orificiis in intestinis apertis effunditur, & per alvum excernitur: differens saltem loco effluxus ab hæmorrhoidibus, in quibus saltem venæ ani aperiuntur; in hac verò dysenteria etiam reliquæ ad superiora intestina secundum totam eorum longitudinem, perque omnes eorum anfractus, distributæ. Talis dysenteria interdum evenire solet iis, quibus aut membrum aliquod amputatum fuit, e. g. pes, brachium &c., tunc enim non potest non abundare sanguis in toto corpore: quale exemplum refert HILDANUS in *Obs. Cent. 2.* de juvene, cui dux tibiæ amputatæ fuerunt, qui post curam dysenteria lethali fuit correptus: aut in quibus solennes evacuationes sanguinis suppressæ in quibusdam locis, sanguis per alvum sibi viam querit, v. g. mulieribus, quibus supprimuntur Menfes; tunc enim non raro fit *Diarrhœa cruenta*. Non raro talis diarrhœa cruenta supervenit hominibus spleneticis aut Melancholicis, item quibus vomitus cruentus, etiam interdum talis diarrhœa cruenta familiaris est: Pertinent huc dysenteria notæ scorbuticæ, de quibus vid. HORSTIUS in *suis Obs. 17. Obs. 31. p. 393.* dum scorbutici sæpius sanguinem excreverunt, qui neque hæmorrhoidalis, neque diarrhœa genuina fuit, sed diarrhœa nota ex anastomosi vasorum in intestinis orta. Sic pariter ex ulcere mesenterii interdum diarrhœa cruenta oriri solet: talis sanguinis excretio item est usitata iis, qui laborant, utut raro, ulcere pancreatico; quale Sylvius in *Pr. observ.*

Estmuller. Oper. Tom. II.

vit, quod ulcus apertum interdum pius, interdum autem non parum sanguinis effudit. Pertinet huc etiam Dysenteria critica singulares: de quibus vide Rhodius in *suis Observationibus*, quales nullus Aurorum unquam observavit.

II. *Secunda species dysenteria* seu fluxus alvi cruentus est iste fluxus, quo sanguis tenuis & aquosus, & loturæ carminum similis, uti appellant, sine dolore excernitur, quod propter hepatis imbecillitatem fieri dicitur, & aliàs *Fluxus Hepaticus* appellatur; quia falsò præsupponunt oriri vitio hepatis non rite sanguificantis; sicuti hoc nomen ipsi omnes Veteres tribuunt, utut hepar in se sit insons. Tacebo jam de hoc; est enim reverà nil aliud, quam apertio vasorum interiorum sive superiorum hæmorrhoidalium.

III. *Tertia species dysenteria* est, quando ob vitium intestinorum spasmodicum cum insignibus torminibus, & cum muco albescente, hinc cum purulenta materia, sanguis ejicitur, quæ tertia species *dysenteria* dicitur, pro ut hodie id nominis venit; estque nil aliud, quam *Diarrhœa cruenta torminosa*, sicuti reliquæ diarrhœæ cruentæ sæpe semper sunt absque torminibus.

## PARS AFFECTA.

Pars affecta in dysenteria sunt intestina, nunc crassa: vid. SPIGELIUS *anatom. p. 179.* PANAROLLUS *Pentec. 1. Obs. 9.* & BARTHOLINUS *Cent. 6. Hist. 2.*; nunc tenuia, quod præsertim sectiones cadaverum, quales BARBETTE *P. 1. 4. c. 5.* & M. A. N. C. *Ann. 3. Obs. 116.* testantur, disparitas quædam signorum, de qua in *Diagnosi* dicitur, credere jubet: nunc conjunctim, quod HORSTIUS *1. 4. Obs. 20.* docet; quatenus scilicet ab Objecto vellicantur, irritantur, & spiritus insitus incandescit. Læduntur autem intestina, si ab objecto sensili vellicantur & irritantur, & tandem fit, ut talia pathemata sequantur.

## CAUSÆ.

*Causa dysenteria* est vel efficiens proxima formalis, vel materialis, sive occasionalis: illa est spiritus insitus, sed occasione dolorosa ad præternaturalem impetum provocatus, & dolorum torminosorum & excrementorum, sanguinis ac muci, profusionis primus artifex.

Sed misso hoc, ceu causa universali, causa imprimis particularis seu occasionalis irritationis talis consideranda venit. Hoc est acre quodcumque internum, pertinaciter intestinis adhærens, eaque in tantum continuè vellicans, & stimulans, ut propter irritationem continuam tandem sanguis effluat, idque cum insigni dolore: ab acri objecto enim intestina membranosa vellicata & puncta se contrahunt, unde tormina, cum ad locum læsum fiat uberior sanguinis affluxus, & per læsionem vasa aperiuntur, & sanguis profundatur: e. g. qui acrioribus sternutatoribus utuntur, post crebram sternutationem sanguinem emungunt. Optimè fiendi modum dysenteria ostendit hypercatharsis, quod purgantibus acribus, v. g. antimonio, propinatis violenta fiat vellicatio, quæ intestina spasmò afficiuntur, & sic hypercatharsis cruenta supervenit.

Acre autem hoc in specie est acidum membranis intestinorum nervisque inimicissimum: unde v. g. mulieres hystericae, acrioribus, acidis & erodentibus succis turgidæ, & quæ aliàs vel systema nervorum sensibilius obtinent, aut affectibus intestinorum spasmodicis obnoxia sunt, mediocribus etiam purgantibus facile graves dysenterias incurrunt, quatenus intestina à purgantibus fortius vellicata, & ab acido acri excoriata & erosa, cum gravissimis torminibus sanguinem fundunt: unde quodcumque acre fortius intestina vellicans, simulque plus minus sanguinem & reliquos inde derivatos succos exagitans, facile Dysenteriam excitare potest. Novi bina exempla in hysterica, quæ habuerunt systema nervosum intestinorum sensibile, quod gravem dysenteriam incurrerint.

Porro, ratione hujus causæ materialis distinguenda est ante omnia dysenteria, dum alia est benigna, vel maligna: Benigna ut plurimum sine febre est, item sine contagio, & tantum sporadicè seu sparsim quosdam saltem homines in hoc vel isto loco affligit. Maligna verò Dysenteria ut plurimum conjuncta est cum febre maligna, interdum pestilentiali, simulque epidemicè grassatur, ac sæpe integram regionem devastat, & potenti contagio se multiplicat; de quo postmodum.



*Dysenteria benigna* est sporadica, seu levissima, ut dixi, oritur ex acri quocunque, frequentius tamen ex acri acidopius minus corrosivo, intestina potentius irritante, & plus minus exoriente; & ita tormina & sanguinis effluviū excitante; sive oriatur ex assumptis talibus, aut corruptis, aut in acorem peregrinum degenerantibus; aut denique oritur, ex succo pancreatico nimis corrosivo, vel per se tali, quando non temperatur sufficienter à bile, vel propter irrationem à purgantibus copiosius in intestina effuso. Nil enim magis est inimicum partibus nervis, & intestinis, quàm frigus & acidum; unde, si tale quocunque errore ad intestina pervenerit, membranas nervosas rodit, exoriat, & ad sanguinis profusionem disponit. Rara nempe est *Dysenteria benigna*, quæ sit vitio sanguineæ massæ, sed ferè tantum ex contentorum in intestinis corruptione & depravatione. Hinc notum est, quod imprimis fructus horrei sive autumnales, qui facillimè corrumpuntur, & corrupti, vel in corpore alterati, & non ritè digesti, intensum & fortem acorem contrahunt, dant dysenteriam: quos inter fructus pepones, melones imprimis & cucumeres eminent, uti etiam pruna cerea, Germ. *Diespillinge*, quæ ipsa non paucos *Dysentericos* reddidisse refert *FORESTUS l. 2. obs. 23.*, *SENNERTUS in Praxi*, & *MOEBIUS in Insistit*. Saccharum, item cibi dulces & melliti, in stomacho corrupti, imprimis in hypochondriacis aut hysteriis, in quibus subjectis vitiosa fermentatione vel nimis acescunt, vel sui miscellâ cum bile orgasmum excitant, & camari-nam nimis movent, dysenteriam interdum inferunt: Elus item uvarum nimius, uti etiam musti, plus minus fermentando & acescendo facillè ad dysenteriam disponit; nam multum corruptum similiter acescit: Purgantia etiam sortiora, uti antimonii, aut *Colocynthis*, aut similia, iritando acrius & vellicando intestina, & ita acrium succorum ad ea derivationem promoventia, dysenteriam benignam non rarò inferunt, ordinariò in subjectis systematis nervosi subtilioris: Mercurius etiam vivus pro Cura Luis Venereæ extrâ illitus dysenteriam interdum inferre observant Galli, sæpius per inunctionem Mercurialium Luis Veneream curantes: Sic ulcus pedum diuturnum curatum *Dysenteriam* intulit lethalem: vid. *M.A.N.C. Ann. 2. obs. 213. pag. 314.* Ex vermibus quoque *Dysenteriam* excitari, v. *RIVERIUS l. 3. obs. 3.* & *BARTHOLINVS Hafniens. T. 2. obs. 31.* Sic & usu aceti in plumbeo vase asservati observata fuit *Dysenteria* à *SENNERTO*; vel etiam aquis in canalibus plumbeis diutius asservatis: Adamas devoratus nec minutissimè tritus *Dysenteriam* infert, quod certum est; ratio, quia ejusdem ramenta propter angulorum acutiem incidendo & perforando non possunt non lædere intestina; cum notum sit, solum vitum non ritè comminutum tale quod præstare: vid. *ZACVTVS LVSITANVS in l. 1. Prax. Admir. obs. 18. item l. 2. obs. 10.* de *Dysenteria*, tabe & morte ex Adamante impolito devorato. Sed dico: Adamas non minutim tritus; alias enim minutissimè pulverisatus pro *dysentericæ* cura adhibitus fuit, uti refert *WORMIUS in Mus. p. 103. ubi de Adamante*: Item ex asperitate annuli deglutiti observavit *ZACVTVS LVSITANVS* *Dysenteriam*, quali *dysentericæ* puls crassa ex oryza mederi potest.

Hæc causæ, sive errore externo sive interno, inferunt *Dysenteriam benignam*, in quibus peccat acidum acre intestina erodens. Sed hæc fuit *Dysenteria benigna*, quæ non multum facessat negotii.

Quoad *endemiā Dysenteriam*, nullibi hujus mentionem factam observavi, præterquam in *SYNDENHAM observ. circa morbos acutos p. 247. §. 4. c. 3.* qui talis *endemicæ* *Hybernorum* *Dysentericæ* mentionem facit.

*Epidemicam* quod attinet: hæc omnium frequentissima est, & autumnali præsertim tempore aut hujus consimilis, solet affligere. Oritur ab acri acerrimo, intestinis specifico suo sapore insensissimo, eoque sub mole minimè efficacissimo, adeoque saltem fermento subeili tot mala inferente. Hoc nunc acrius est, animonialis aut helleborinæ, vel *colocynthidæ* quasi profapix; nunc mitius: undè nunc maligna, nunc benigna, utraque insigniter contagiosa.

*Maligna* plus habet in recessu, & imprimis observanda vis ejus contagiosa, quæ se per contagium malignum mirificè in corpore humano propagat: non enim solum per sedes communes promptissimè inficit, sed etiam, quod observatu dignum est, per instrumenta Clysterum potest alium inficere, teste *HELIDÆO PADVANO Ital. in Observ. pag. 104.* Dicit enim, sæpius *dysentericæ* corripit eos, quibus

clyster infunditur, instrumento non benè abluto, quo antea *dysentericus* fuit usus: sicut etiam *HORSTIVS in Observ.* dicit: *instrumenta scarificationi apta, non purgata, ejusmodi ulcera contagiosa excitare.*

Exempla talium *dysenteriarum epidemicarum* plus minus malignarum sunt frequentissima; imprimis scripsit de hac la Maniere de Fluxu *dysenterico epidemico*; item *WILLISIVS in Pharm. Rat. P. 1. p. 119. & 125. it.* *SCHENKIVS in Obs. lib. (ni fallor) 6. ubi de Morbis malignis*, *BARTHOLINVS Cent. 2. H. stor. anatom. 65.* non minus quàm *AMATVS LVSITANVS Cent. 3. Cur. 90.* Et quidem talis *dysenteria maligna* non promiscuè quæcunque animalia affligit: nam *dysenteria* interdum in homines solum, interdum in bruta tantum grassatur, dum *SALMVTH l. 3. Obs. 55.* canes saltem & feles *dysentericæ* contagiosæ malignæ laborantes observat, quod rarum est. Oriuntur hujusmodi *endemicæ dysentericæ* ex causa externa plures affligente, in quorum corporibus exaltatum contagium fermentativà vi se multiplicat, imprimis propter aerem plus minus præternaturaliter alteratum, & alimenta inquinantem, ex aquarum vitio, ac fructuum horarum corruptela & inquinamento. Sic *dysenteria lethalis* ex esu brassicæ capitata, noxio rore infecta, refertur in *M.A.N.C. Ann. 3. Obs. 88. p. 143.*, item post diuturnam siccitatem & ætatem squalidam, ubi rubedo corripuit fructus, aut miasma malignum exit ex terra, foliis arefactis instar arsenici adherens: quale fuit miasma anni hujus seculi 24. & 66. in quibus mirabiliter grassata fuit *dysenteria*, ubi post aerem squalidum fructus corrupti: Post aerem squalidum, & inde hinc inde efflorescentiam candidam instar vitrioli saturni in canalibus plumbeis testorum, superveniente pluvia & flore isto ita abluto, ac aquas inquinante, anno 1644. *dysenteriam* pertinacem in Belgio ortam observavit *LINDANUS in Coll. privæ. ad Hartmannum*. In consideratione hujus *dysentericæ* malignæ contagiosæ, cum omnia contagia consistant in miasmate fermentativo, massam sanguineam inquinante, & consequenter succos alterante, rectè arbitror sensisse *WILLISIUM de causa Dysent. Traß. de febribus c. 10. pag. 186.* quod scilicet talis *dysenteria* non oriatur ab humore aliquo vitioso in internis visceribus producto, qui acrimoniâ suâ corrodat (non ita; quoniam tantillus fermentativus odor potest etiam summe inficere); sed rectè dicit, causam ejus esse miasma quoddam sanguini impressum, adeoque intimè ipsi confusum, inde ad intestina latum, illi imprimis inimicum, acrimoniâ hostilem afferens, intestina irritans, vasorum oscula referans, & sanguinis excretionem faciens. Nempe miasmata talia videntur esse naturæ quasi antimonialis, de natura *colocynthidis* aut *scammoniacæ*, aut similis, quæ in specie intestina saltem acrimoniâ suâ vellicare aut afficere, simul tamen & Massæ sanguineæ crasin fermentativâ suâ vi pervertere valent, aut simili ratione, ut *Arsenicum*, quod gustu dulce est, & etiam extrâ non citò sentitur, intrâ autem cum symptomatibus multis multis cruentos facit; undè ratione prioris tormina, & hinc cruentæ dejectiones, ratione posterioris febris maligna adjuncta esse solet. Tale esse fermentum contagiosum, quod fermentando corrumpit sanguinem, & ipsi acrimoniæ aut naturæ intestinæ insigniter hostilem imprimit, nulum esse dubium: sicut enim butyrum antimonii partibus nervosis illitum ulcera excitat, ita in intestinis similis causa acida ejusmodi exulcerationes excitare potest.

Quod attinet progressum in *dysenteria*: est talis: in principio, dum dolores & tormina intestinorum urgent, excernuntur liquida albicantia, plus minus mucilaginosa, seu mucus albicans, hinc sanies & pus cum sanguine. Unde prout nunc plurimum de sanguine, nunc plus de muco excernitur, dividunt vulgò *dysenteriam in rubram, & albam*: Sanguis, qui excernitur, equidem ex vasis, vel anastomosi vel diaresei apertis profluit; mucus verò quid præcisè sit? controversitur. Sanguis, qui profunditur, non est præcisè ab excoriatione aut exulceratione intestinorum, ut vocant: nam utut hoc in benigna ab acrimonia succorum acido-corrosiva simpliciter oriunda locum habeat, in maligna tamen, & in qua tantillum saltem miasma acre, contagii medio propagatum, causæ proximæ vices obtinet, non opus est tali excoriatione: Sufficit ab istius contagii acerrima & intestinis inimicissima acrimonia continuè & tam sortiter stimulari intestina, ut hac ex irritatione & crebriori contractione tandem proprium cruorem fundant & exprimant, simili modo atque à pulvere sternutatorio for-



fortius vellicantur nares, ut mucus crebriorem, & tandem largam hæmorrhagiam fundant; ita ut cruoris profusio sit saltem consequens, & effectus alterationis in intestinis: nempe spina alicubi infixæ ex doloris occasione affluxum sanguinis uberiorem, indeque, ubi denegatur hæc excretio, tumorem facit. Similis spina & tantillum acre alicubi rodens in benigna, vel miasma virulentum intestinis hostile in epidemica & maligna; hinc vellicatis intestinis, & horum repetiti spasmi, & insignior sanguinis fluxus excitatur, unde tumetibus sanguine intestinis eadem rubent, & non raro inflammantur, & per aperta partim, partim erosa vasa, cruorem profundunt.

Nempe hoc est indignatio Arcei intestinalis, seu spiritus insiti, cruorem proprium furiosè profundentis, ex irritatione ab occasionali fermento, uti loquitur HELMONTIUS, acri, intestinis insigniter hostili, unde tormina, & sanguinis per anum profusio, aut muci extravasatio, copiosè superveniant: hinc etiam rectè dicit, quod dysenteria à pleuritide tantum differat in radice seu loco affecto, cum quoad causam conveniant.

Mucus hic sub cursu morbi interdum est valde copiosus. Multi admirantur, unde sit? non sanies est, aut pus; ut sint, qui dicunt, quod nihil aliud sit, quam pituita, quæ naturaliter oblinet parietes intestinorum; quod tamen non potest esse propter nimiam & excessivam, quæ subinde excernitur, ejus quantitatem, pro qua capienda intestina ipsa interdum non sufficerent. Probabilior videtur HELMONTII sententia, qui dicit: destillare mucum talem ex intestinis læsis, & esse nihil aliud, quam nutrimentum intestinorum irritatorum proximum, sed depravatum, aut frustra intestinis infusum: simili modo enim ac pars exulcerata plorat liquorem, qui nihil aliud est, quam nutrimentum istarum partium; ita nutrimentum hoc, cum intestinis læsis, excoariatis & exulceratis assimilari nequeat, ex parte læsa nunc sub forma muci, nunc saniei, nunc puris in cavum eorum destillat, prout diversi sunt gradus corruptionis hujus alimenti proximi: iam sæpe sanguinem unà effundunt lotura carniū similem.

Tres autem gradus in hac dysenteria imprimis observandi sunt:

1. Quando tantum adsunt atrocia tormina cum excretionē mucosa & cruenta.
2. Quando cum torminibus copiosus mucus plus minus præternaturalis & cruentus excernitur, quemque vulgò dicunt esse abrasionem aut aliqualem excoarationem intestinorum.
3. Quando in tantum suscepit malum augmentum, ut jam in intestinis læsis sequatur perfecta exulceratio.

Quod in graviore dysenteria pus generetur in intestinis, patet ex anatome: non enim tantum in intestinis, sed & in glandulis melaëicis pus copiosum colligitur & abradytur. Ista autem abrasio iterum est triplex, secundum ista nempe, quæ unà cum muco interdum excerni observantur:

1. Quando saltem interiora velamenta bombycina, seu crusta ista, quæ intestinorum carni obducitur, abraduntur.
2. Quando jam aliquid de intestinorum tunica crassa abradytur. HIPPOCRATES vocare soletamenta intestinorum in *sect. 7. apbor. 64.*
3. Quando jam ipsorum intestinorum substantia crassiuscula sive caro quasi frustulacim eroditur, & tunc exeunt carunculae, ut dicit HIPPOCRATES *sect. 4. apb. 26.* qui tertius gradus est acerbissimus, & mortiferum signum.

Carunculae tales, quarum passim apud Autores sit mentio, quid sint? explicatu obscurum est. Sanè substantiæ intestinorum membranosa non videntur esse: potius glandulae intestinales tumefactae, & morbi progressu à substantia intestinorum separatae, & ita excreta carniū, sive molecularum carnosarum speciem referentes.

Tandem, an sit exulceratio in intestinis dysenteria affectis? uti vulgò asseritur, meritò dubitatur; & rectè hoc negat Holdehoffius Tr. de Err. Medic. pag. 33. ex eo, quod aliàs dysenteriae cura per specifica tam citò fieri non posset: ut taceam, tantum non impossibile curatu videri talem exulcerationem, cum aliarum partium membranarum exulcerationes, ut laryngis, item fistulae ani, sint plurimum incurabiles. Ergò non nisi in diuturniori dysenteria, eaque graviore, tandem excoaratio, & forsan aliqualis

Estmuller: Oper. Tom. II.

exulceratio, locum habebit, quæ in ordinaria non statim statuenda erit.

Do orocerrimus, qui torquet dysentericos, non est promiscuè & simpliciter ex corrosione aut exulceratione intestinorum, utut hæc videatur totalis causa; sed serè maxima ex parte est ex convulsione & corrugatione spasmodica intestinorum, quæ intestina irritata spasio quodam correpta se convellunt & contrahunt, & motu quasi vermiculari se torquent, sub quo tam insignes sunt dolores. Præsuppono hic suprà dicta de systemate nervoso: subinde retrahitur umbilicus, quod signum est manifestum motus convulsivi; hinc successiva sunt tormina, non continua, sed remittunt, prout malum nunc mitius nunc gravius est. Tormina hæc ordinariò præcedunt excretionem, nisi intestina gangrenata sunt, quando sub ista spasmodica contractione intestina simul propellunt, & ulterius cogunt contenta, & ita ad excretionem stimulant.

## DIAGNOSIS.

Signa diagnostica ex dolore & excretionē imprimis desumuntur.

Dysenteria nempe præhendit ægros cum insignissimis intestinorum doloribus & torminibus: subsequuntur dejectiones, & quoties dejicitur alvus, ingens cruciatus, & intestinorum depressio cum dolore, & molestissimo viscerum omnium quasi descensu, adest: dejectiones non sunt itercofosæ, sed variarum rerum, nunc simpliciter mucosæ, nunc intermixtis sanguineæ, nunc simpliciter sanguineæ, quæ aggravescente morbo fiunt putrilaginosæ, & interdum membranarum speciem referunt.

Quando sanguis simul excernitur plus minus, *Dysenteria cruenta*, sive *rubra* appellatur: si verò mucosa superabundant, aut solitaria sint, in specie *Dysenteria palba* vocatur.

In maligna sæpius est conjuncta febris plus minus intensa, eaque interdum petechialis, lingua subalbida mucilagine dense obsita, & si vehementius æstuet corpus, nigra etiam & sicca observatur, unà cum summa virium prostratione; ægri sunt anxii, & inquieti, sitiunt insigniter: subinde præcedente ulterius morbo, sanguis sincerus copiosus confestim effluit; id quod corrosione majorum aliquot vatorum in intestinis & mesenterio argumentum est. Nunquam intestina inflammantur, indeque gangrenâ incurabili afficiuntur: aphthæ interdum fauces obsident, imprimis, quando adstringentibus intempestivè adhibitis suppressa fuit dysenteria: afficitur successivè simul intestinum rectum, unde ordinariò dolorosissimum tenesmus patiuntur ægri: supervenit non raro anxi proidentia, appetitus prostratus, interdum nausea & vomitus urgent ægros: non raro succedit singultus, anquam pessimum signum, & vigilæ, ut etiam interdum deliria, & tandem quoque lethales convulsiones superveniant. Grassetur communiter in Incolas insitæ Pestis, estque contagiosa, seque tunc temporis sub forma febris malignæ multiplicat.

Causarum signa partim ex excrementorum conditione, partim à signis humorum in corpore abundantium, partim à vitæ genere, v. g. militari, ac diæta, similibusque circumstantiis petuntur.

An maligna & pestilens sit? colligitur ex eo: si commune fuerit malum, pluresque cum symptomatis malignitati propriis, v. g. anxietate præcordiorum, petechiis &c., moriantur.

Ante omnia autem pro meliori cura sciendum est: an tenuia an crassa intestina afficiantur? Denunciant hoc locus, & modus doloris, tempus exitus excrementorum, & horum varia mistio. (1.) Locus doloris arguit tenuia intestina affecta, qui est circa & infra umbilicum, ubi situm ileon & jejunum; in crassis verò affectis est magis circa latera infra & juxta stomachum, secundum nempe coli ductum. (2.) Quoad modum doloris: hic longè vehementior est affectus intestinis tenuibus, ac si cultris hinc inde discinderentur, aut quasi aciculis pungerentur; qui contra dolor remissior & non nihil obrusor est in crassis. (3.) Celer excretio post dolorem crassa intestina affecta, tardior verò excretio tenuia intestina labefactata arguit; ed quod à loco affecto ad podicem longior via sit. (4.) Si tenuia afficiantur, permixta magis & confusa invicem sunt excrementa, stercus, sanguis, & mucus, propter longius iter, quod mutuo conficiunt: in crassis verò intestinis minus sunt confusa, sed potius sunt aperta



vestigia distinctionis à se invicem. ( 5 ) Tenuia affecta magis ad vomitum stimulant ægros, præsertim quò propius respectu ventriculi afficiantur; crassa minus: undè & anxiosi magis sunt, & pejor se habent ægri in tenuibus affectis, quàm in crassis. Consultatur quoad hoc punctum & prognosin in dysenteria SENNERTUS, qui satis est accuratus, & RIVERIUS.

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin:

Benigna minus est periculosa, maligna periculosa.

Quò magis tenuia afficiuntur intestina, eò periculosius laborat æger, & econtrà.

Considerandum etiam; an dysenteria habeat febrem? item an adsit vomitus? Sanè omnis dysenteria, præsertim epidemica, cum febre juncta periculosior esse solet, quàm quæ sine febre; & quò magis acuta & malignior hæc fuerit: siquidem & petechiæ in febribus talibus observatæ fuerunt.

In dysenteria quasi pestilentiali eò periculosius laborat æger.

Ita dysenteria, quæ cum vomitu affligit, & cui ferè se adjungere solet singultus, est deterim; cùm periculum subit, ne ipse stomachus plus minus affectus sit: Quò magis enim affligitur stomachus cum cibi fastidio, eò periculosior est: si non adest vomitus, & ægri alimenta assumunt cum appetitu, talis non est lethalis, nisi culpà Medici fiat.

Dysenteria, in quibus excreta sunt viridia, nigra, aut varia, aut admodum graveolentia, sunt pessima: item dysenteria, quæ ab atra & porracea bile, ut vocant, incipit, nullà præcedente febre, nec coctionis signis apparentibus, exitiosa est, teste HIPPOCRATE *Sect. 4. aphor. 22. & 24.* & FONTANO in *Methodo generali pag. 62. cap. 5, 6, 7.* & *pag. 77.* propter corrosivum acidissimum succum, valde erodentem intestina; item quæ à dejectione biliosa aut æruginosa, hinc magis erodente: vid. HIPPOCRATES *Sect. 7. aphor. 23.* Omnium tamen crudellissima videtur, quæ à pituita acida atque salsa, utpote qui humor ratione tenacitatis difficilè abstergitur.

Si dysenteria ructus superveniat, vel crepitus ventris, bonum signum est, scilicet redeuntis suo modo fermenti digestivi.

Econtrà convulsiones ac deliria, dysenteria supervenientia mortem ut plurimum significant.

Si à dysenteria laborantibus veluti carunculae dejectionum, lethale est, teste HIPPOCRATE *Sect. 4. aphor. 26.* ut plurimum quæ profundius ulcus denotant: vid. SENNERTUS *Prax. lib. 3. P. 2. Sect. 2. cap. 7. pag. 334.* & *337.*

Dysenteria indolens sæpè mali est ominis; ~~nam~~ enim seu gangrænam intestinorum, indeque inductam insensibilitatem ostendit: conf. de *Dysent. epidemica quorundam indolente* M. A. N. C. *Ann. 2. Obs. 43. p. 82.* item BARTHOLINUS *Acti. Med. Hafniens. Volum. 2. pag. 183.* RHODIUS *Cent. 2. Obs. 88.*

Quando adest tenesmus in dysenteria cum hiatu ani, ita ut clysteres injecti statim elabantur, aut cum tanta podicis adstrictione, ut nihil possit introritti; certum plerumque est mortis signum: vid. la MONIERE *Tr. supra cit. cap. 5. pag. 164.* & *191.* Nempe hic tumor, illic paralytica constitutio intestino recto inducta ex virtutis animalis prostratione adest.

Dysenteria, si est symptoma febris malignæ aut variorum, periculosa est, & ferè lethalis.

Dysenteria superveniens febris, aut quæ aderat, si intenditur, malum est; quoniam inflammationem aut insignem intestinorum corruptionem ostendit.

Lienteria superveniens dysenteria diuturnæ, est admodum mala.

Aphææ dysenteria superveniens, ut plurimum lethale sunt indicium.

Gravida cum dysenterico tenesmo correpta, frequentius abortum patitur; idque cum periculo, imprimis si grandior fuerit fœtus. Interdum tamen dysenteria gravidis ante partum salutari observata fuit, teste FORESTO *l. 22. Obs. 34.* item AMATO LUSITANO *Cent. 2. Obs. 51.* quia post partum plerumque hæc liberantur; testante HIPPOCRATE *Sect. 2. Prædict. Text. 30.* & *l. 5. Epidem. Text. 33.* & *l. 7. Epidem. Text. 49.* & SENNERTO

*Prax. l. 3. pag. 243.* per bina exempla hoc comprobante. Sic autem benigna, non maligna, non nimis gravis & non longè ante partum; aliàs est periculosa, & mors in olla: epidemica tamen gravidis non lethali observata fuit in M. A. N. C. *Ann. 3. Obs. 17. pag. 22.*

Dysenteria cum oris amaro vel vomitu bilioso in principio, malitiosissima esse solet, in specie in principio: vid. SAVONA in *suis Decis. Med. Decis. 31. p. 80.* & M. A. N. C. *Ann. 8. Obs. 63. p. 106.*

RIVERIUS *Cent. 2. Obs. 63.* ex maculis in facie erumpentibus in dysenteria; item ex singultu dysenteria in progressu morbi superveniente, signum prognosticum lethale ominatur: imminet enim convulsiones, & afficitur systema nervosum insigniter; cùm singultus sit signum convulsionis diaphragmatis, quæ superveniens, malum; in principio autem singultus non adeo funestus.

Si in dysenteria post aurem sinistram vel dextram nigra macula vel tubercula appareant, æger citò moritur; in quo equidem incertus est Sennertus; signum tamen certum esse vult HOEFERUS in *Herz Med. p. 192.*

Veneris exercitium dysenteriam curat: id quod RIVERIUS in *Pr.* notat ex AMATO LUSITANO *Cent. 2. Curat. 47.* qui refert, quendam dysenteria epidemica laborantem, celebrato cum uxore coitu, sanatum.

It, qui ex dysenteria intereunt, præcipuam mortis causam habent intestinorum gangrænam: vid. RIVERIUS *l. 3. Obs. 2.* Ac sanè quidam dysenterici ante mortem absque pulsu toti algidi, adhuc tamen de interiorum intensissimo aestu conqueruntur: Conf. M. A. N. C. *Ann. 8. Obs. 63. pag. 106.*

Dysenteria à causa externa, ut à fructibus horæis, non adeo periculosa est; quæ autem ab interna, sæpè periculosa: in qua, si sanguis sincerus excernatur, periculosior est, ob vasa majora erosa.

Quò magis vel minus intestina exulcerata sunt, eò gravior vel mitior aut melior dysenteria est.

Dysenteria, quæ intestina crassa affecta, utpote symptomata minus periculosa habens, ac à clysteribus multum levaminis admittens, non adeo periculosa est; ut & quæ à mania oritur: vid. HIPPOCRATES *Sect. 7. aphor. 5.* Conf. M. A. N. C. *Ann. 3. Obs. 116. p. 214.*

Spleneticis superveniens dysenteria, bonum signum est: vid. HIPPOCRATES *Sect. 6. aph. 48.* nisi hæc longior extiterit; tunc enim aut ex lienteria, aut hydrope pereunt, juxta *Sect. 6. aphor. 43.* & *Coac. Sect. 3. Prænot. 295.* & *296.*

Pariter & Podagricis salutaris observatur dysenteria, juxta *l. 2. Prædict. Text. 15.*

De cætero senes & pueri ex hoc morbo sæpè pereunt, quàm qui mediâ ætate constituti sunt: vid. HIPPOCRATES *Sect. 2. Text. 30.* & SENNERTUS *Prax. lib. 3. pag. 243.*

### C U R A.

Quoad Curam: in genere pro meliori medicationis ratione, atque scriptorum Practicorum utiliori lectione, observandum ante omnia: an benigna, an verò maligna fuerit dysenteria? item an à causa interna vel externa? & hæc vel assumptis acribus, vel contagio nata fuerit? Nempe epidemica non sunt præcisè maligna; id quod notatum in M. A. N. C. *Ann. 8. Obs. 163. p. 106.* Et ex his considerationibus variarum dysenteriarum, variat subindè apud Practicos medendi ratio, uti patet legenti ex la MONIERE, WILLISIO *Pharm. Rational.* SYDENHAM in *Obs. de Morb. acutis* &c.

Quoad Methodum medendi: in hac sequentes Indicationes observandæ:

1. Irritatio intestinorum sistenda, tam acre velliens corrigendo, quàm opiatis, aliisque anodynis & appropriatis sensum irritationis nonnihil sopiendo, indeque provocatum spirituum impetum compescendo. Ea verò, quæ acre velliens corrigunt, sunt; vel generalia, istud aut obtundentia aut absorbentia, vel specialia, specificum saporem dysentericum corrigentia.
2. Præcipitantibus sive absorbentibus & blandis sudoriferis, in specie in dysenteria maligna, Massa sanguinea ventilanda, & miasma contagiosum



sum eliminandum . Interdum in benigna blandè abstergentibus & laxantibus intestina eluenda .

3. Noxa intestinis illata debitis vulnerariis , item adstringentibus sive stypticis ac similibus restituenda .

Methodus hæc diuersa est à methodo vulgari , quia vulgò respicitur saltem ad productum morbosum , nempe ad intestinorum exulcerationem ; non verò respiciunt radicem morbi seu acre istud vellicans , undè tot mala oriuntur : Hinc iubent communiter ( 1 ) evacuare intestina purgando : ( 2 ) Clysteribus eadem abstergere : ( 3 ) Dolorem urgentem sedare ; & ( 4 ) Ulcera purificare & consolidare . Sed in hac methodo sæpè feliciter moriuntur ægri , & qui evadunt , naturæ , non artis beneficio obtinent .

Pro his scopis autem meliùs obtinendis , observentur sequentes regulæ :

I. Quod anodyna & narcotica à multis quidem ceu Necrotica in dysenteria proclamantur ; quod exemplo illustrat l. 3. *Obs.* 10. THONERUS & ZECHIUS *Conf.* 37 : sed falsò ; idque saltem vitiò præconceptæ hypotheseos : quin potiùs expertus ille Practicus LINDANUS in hac tota cura semper ab anodynis & narcoticis curam incipiendam suadet , in quo consentiunt ferè omnes moderni , qui omnes opiatas , cum appropriatis junctis , miram vim tribuunt in dysenteria curanda : vid. BARBETTE in *Pr. lib. 4. c. 5. de dysent.* pag. 180. HORSTIUS *lib. 10. Obs.* 3. HOEFERUS in *Herc. Med. p. 195.* THEODATUS in *valer. adin. p. 340.* WEDELIUS in *Opiol. pag. 121.* Undè etiam tot prostant exempla feliciter curatarum dysenteriarum per sola opiatas : Sic RIVERIUS in l. 1. *Obs.* 64. refert dysenteriam in fluxum hepaticū mutatam cum febre & summā virium prostratione , per laudanum opiatum curatam : vid. etiam l. 2. *Obs.* 37. 44. & 84. item l. 3. *Obs.* 4. l. 4. *Obs.* 87. in specie WILLISIUS in *Pharm. Ration. Vol. 1. Sect. 3. c. 3. p. 128.* & p. 300. nec non LUDOVICI in M. A. N. C. *Ann. 4. Obs.* 207. HELMONTIUS *Tr. Bustlerii* ; & MARCUS MARCI in *virriolo narcoticum* & *anodynum sulphur* , placans dolores , dicit esse : *Terra virrioli dulcis* pro hoc scopo sublimatur cum *sale ammoniaco* , & est *Arcanum Anglorum* .

II. Sed non dandum , uti dixi , opiatas in principio solū , sed potiùs aliis , præsertim appropriatis , mista , idque in specie specificis & absorbentibus sudoriferis in dysenteria maligna , e. g. theriaca cum ossè humano & hepate viperino : item si opus fuerit , blandè intestina abstergentibus , in specie Rhabarbaro , in benigna jungi debent ; sic meliùs & tutiùs operantur .

III. Laxativa in dysenteria maligna nihil valent , sed nocentissima sunt : potiùs irritatis intestinis crabrones excitamus , & vires dejicimus : in benigna verò suam merentur laudem , in principio usurpata ; sic enim eluunt alvum . Si autem in principio morbi Laxativum propinatum fuerit , mox ab hujus facta operatione opiatum subijciendum . Nempe quoad abstergentia primas vias ac blandè laxantia , habenda simul ratio tam subiecti patientis plus minus cacochymici , quàm causæ antecedentis , an sit *absumptis* ? an sit *contagio* ? idque tam propter impetum dysentericæ majorem vel minorem , quàm propter alia in subiecto cacochymico metuenda symptomata . Cacochymiam igitur in principio convenientibus laxare , non inconueniens est ; uti & , si à fructibus horæis malum ortum fuerit , præmisso tamen quoque sedativo , v. g. vesperice antecedente ; imò laxanti quoque opiatum addere convenit . Quando itaque primæ viæ abstergendæ , ac alvus blandè laxanda est , sit in principio vel rhabarbaro vel ferolactis ; de quibus infra : in progressu morbi penitus abstinemus . Adhæc ipsi qui in principio suadent purgationem , non sine cautela hoc faciunt : Volunt nempe , si dysenteria oriatur ab humore atrabilario , acerrimo & maximè corrosivo , quod tunc ferociam illius potiùs temperando purgandum sit . De modo purgandi optimè scripsit LUDOVICUS SEPTALIUS in *animado.* & *Caut. Medis.* l. 7. p. 224 .

IV. Vomitus in dysenteria planè sunt inane quid , in malignis planè nocivi , nisi dysenteria sit ab hypercatharsis , aut assumpto veneno . Pro majori illustratione rem exemplo & observatione confirmabo . Vir juvenis dysenteria gravi confectus , in principio quidem nonnihil cruenta , sed in progressu tota mucosa , excernebat : aderat simul febris continua : hunc sine evacuantibus rhabar-

barinis mox per opiatas & specifica aggressus sum curare ; successit quidem cura , sed magno labore & sub continuo calidæ cerevisiæ potu , laterumque calefactorum pedibus & abdomini applicatione : subindè sudores spontanei , præsertim vespertini , erumpebant cum euphoria . Cessante dysenteria durabat adhuc febris continua lenta cum gravamine ventriculi & appetitu penitus dejecto , copioso nempe muco ventriculum obsidente : ob id ordinavi Sal Ammoniacum cum paucis lapillis cancrinis , cuius repetito usu attenuatus quidem nonnihil fuit mucus , sed non rejectus : coactus ergò propinaui vomitorium ex syrapi emetici ʒʒ . idque eò magis , quod vesperi præcedente æger spontaneo vomitu varia mucilaginosa excrevisset : sed vomitorium nihil effecit , utut anxium reddiderit ægrum , muco nempe in ventriculo copioso obstante remedii vim , tamen copiosa mucosa screatu & tussi rejecta , febre lenta adhuc perdurante , quibus rejectis multum levatus fuit . Excrevit autem illa ex ventriculo : nam & stimulum tussis in regione scrobiculi cordis percipiebat , & quæ excreabat , illinc prodire asserbat : ob id misturam ex aqua hyssopi , syrupo nicotianæ & oxymelite squillitico ordinavi , cuius usu rejectis quidem copiosius , sed crebriores etiam denudè cessus passus fuit ; propterea intermisi , & præscripsi sequentem pulverem :

R. Rad. ari non præp. ʒij.

Lapill. Cancr. præp. ʒij.

Miscendo :

Omni manè largam dosin capere jussi ; quo assumpto , ut penitus ex ventriculo eradicentur mucosa , 40. guttas Tincturæ tartari benè acris omni manè capere jussi ; sicque convaluit .

Ex hoc casu didici :

1. Necessarium esse in dysentericis benignâ laborantibus , præmittere laxantia ; si enim hoc in principio fecissem , tantam mucis saburram in declinatione morbi circa ventriculum & primas vias non habuissem : Nam quoniam dysenteria erat benigna in corpore crudi succis infarcto , hi ipsi motu febrili correcti , & in mucum temperatum conversi , circa primas vias depositi ; sed antidysentericis & opiatas remediis detenti , postmodum istas turbas dederunt .

2. Didici in dysenteria , si malum sit vel ex ventriculo , vel declinante morbo , nihilominus adhuc foveatur à dyspepsia ventriculi , Vomitoria mitiora tutò posse propinari . Vomitoria equidem in dysenteria magis , quàm diarrhœa , sunt periculosa , propter metuendam ventriculi læsionem . Sin autem dysenteria sit à pharmaco maligno aut veneno , & materiæ relictæ quædam pars in ventriculo hæreat , conveniunt . Conf. SENNERTUS l. 3. *Prax.* p. 352 .

De cætero si conveniunt , magis in benigna , quàm maligna locum habere videntur ( la MONIERE tamen *Trat. de fluxu dysenterico maligno* observavit subindè in primo principio vomitoria fuisse proficua : Et arbitror hoc ita esse , in casu nempe , quo contagium malignum inspirando haustum , ventriculum saltem adhuc obsideat ) idque si superiora intestina laborent , si cacochylia adsit , aut malum foveat , nec non humorum in primis viis , intestinis & ventriculo , molesta saburra ; si denique natura eò vergat , ægrique eidem faciliùs auscultent , viribusque adhuc consent , &c. Vomitu namque diuturnas dysenterias curatas vidit MERCATUS .

V. Sudoris tam per se , quàm diaphoreticis provocati , in specie habenda est ratio in dysenteria epidemica plus minus maligna . Sanè cum hic ante aliquot annos in universa hac regione grassaretur dysenteria epidemica maligna , pastores pagani suos rusticos solis sudoriferis , præprimis tincturâ Bezoardicâ , curarunt . Eodem tempore quidam rusticus , & ipse dysenteria malignâ correptus , sumpsit balsami sulphuris gutt. xx. & ultra , cuius repetito usu per repetitos sudores ipse fuit curatus . Undè dicit PETRÆUS in suis *Dissertationibus* , quod rectè faciant Hermetici , qui dysenteriam non tam purgantibus , quàm diaphoreticis aggrediuntur , & statim correcto aere bacis juniperinis , alternis diebus potionem Paracelsi pestilentialem , aut Aquam theriacalem , aut simile diaphoreticum alexipharmacum propinent : post expulsionem veneni postmodum curativo appropriato utantur . Hinc etiam ipse la MONIERE refert , quod sudor pri-



nis morbi diebus vel sponte prodians, vel debito sudoriferorum usu prolicitus, dysenteriam frequenter supprimit, serosis humoribus foras propulsis. Quò magis ergò corpus transpirat, & magis sudoribus afficiuntur, mitior est dysenteria. Exinde apparet, eandem serè, quæ in febribus continuis & malignis, methodum medendi observandum esse.

VI. Adstringentia, ut talia, in principio & progressu morbi nil valent; potius graviter nocent. Certè nil pejus est, quàm uti in dysenteria adstringentibus: siquidem non relaxata, sed irritata sunt intestina: imprimis nocentissima sunt intempestivè, h. e. ante appropriata & alexipharmaca in maligna, & ante abstergentia laxativa in benigna, exhibita: interdum saltem in declinatione morbi commodè usurpari possunt. Nam validè adstringentibus, maximè in principio, dysenteria suppressa, subindè graves excitat affectus, nunc paresin contumacem, nunc abscessus mesenterii: vid. la MONIERE: Sic enim MARTINI in *Tr. de Morbis Mesenter.* p. 44. inflammationem, & abscessum mesenterii periculosum notat ob dysenteriam sinistrè adstringentibus curatam & suppressam: sic etiam paresin ex dysenteria intempestivè suppressa observavit VELSCHIIUS de *Agagrop. Diff.* 2. p. 16: sic in quos morbos dysenteriaz adstringentibus suppressè subindè desierint, vid. HILDANUS l. 3. *Obs.* 42. & 46.

VII. Venæ sectio frustranea est in quacunque dysenteria; in maligna enim nociva, nisi forsàn gravis evacuationis sanguinis suppressio aliud suaserit: in quo tamen casu cautè fiat, adeoque nemini Auctor sum, ut imitetur SYDENHAM in *Obj. de Morb. acutis* p. 252. *Secl.* 4. c. 3.

VIII. Clysmata rarò sunt usurpanda: Nam utut hæc vulgò sint usitatissima in dysenteria, tamen sæpius sunt pessima: scilicet enim usu malum exasperant potius, quàm leniunt. Usus laudem habet, vituperium meretur abusus. Locum non habent, nisi (1) ubi affecta sunt intestina crassa; ad tenuia enim eorum vis non pertingit. (2) In benigna, ubi eluendæ sordes quædam. (3) Ubi acrimonia insignior temperanda. (4) Quando nimis affliguntur tenuia intestina superiora & pylorus, ut quasi per accidens revulsorio stimulo liberentur. (5) Ubi consolidatio necessaria. Non tamen crebrius aut copiosius injiciantur; quia (a) omnes Clysteres, qualescunque fuerint, etiam ex lacte, intestina tanquam aliquid peregrinum, plus minus irritant & vellicant, & ita malum quodammodo exasperant, & reverà motus spasmodici fiunt: vid. HELMONTIUS, qui accuratus est, quoad usum clysmatum in Dysenteria. (b) Quia tenesmus sæpè graviter per clysmata exasperatur; & (c) quia ipsa intestina irritata mox denudè clysteres rejiciunt, & ita propter suas contracturas & spasmos dolores exasperant, parum juvare possunt: In declinatione ergò morbi usurpanda.

IX. Stomachi in tota cura dysenteriaz summa semper habenda est ratio, non secus ac in quibusvis alvi fluxibus. Quò magis enim furit, eò peior erit status morbi, & quò melius se habet, vel appetendo nonnihil, vel alimenta quædam perferendo, eò major spes salutis adeit: e contra appetitus penitus dejectus, aut vomitus superveniens, aut etiam singultus, pessima sunt signa. Ob id semper simul appropriatis, internè pariter & externè, stomacho succurrendum est; cujus ratione Vinum, præsertim in adjuncto vomitu, non nocet absolute consideratum; acoris verò ratione nonnihil suspectum videtur: Modicè autem propinatum, stomachum restaurat, & in dysenteria epidemica salubre est. Anno 1666. cùm dysenteria maligna epidemice grassaretur in Misnia, præsertim ruri, observatum fuit, quod ægri, dum laborarunt vomitu in dysenteria, cerevisiam, julepum & Laxativa omnia evomerunt, Potum vini autem calidi conducibiliorem fuisse ægris potu cerevisiæ; eumque citius retentum, nec adeò subito per vomitum fuisse rejectum.

X. Caveant sedulo ægri, ne corpus refrigerent, sed quantum possibile, calidum illud & blando madore irroratum conservent, præsertim pedes: nam quò calidiora conservantur extrema, eò melius habent ægri; si verò tantillum refrigerentur, præsertim pedes, acerbiores superveniunt dolores. Eadem ex ratione à frigidæ potu, quantum possibile, abstineant; simul enim atque potus non calidus ingeritur, subito tormina & alvi excretio, crudeliter superveniunt; hinc juscula decoctionis gallinarum sæpius sorpta, licet minus grata, sunt summe proficua.

XI. Denique quieti sint ægri, & quantum possibile, omnem corporis jectigationem remittant, nec ex lecto surgant, sed saltem per patinas substratas colligant rejicienda. Sanè, referente la MONIERE c. 6. p. 104, quies tantæ fuit utilitatis, ut, qui statim à morbi principiò decubuerunt, nec veriti sunt in lecto, vel in pulvinari, vel super linthea deicere, morbi violentiam facile superarunt: sic quò magis quiescunt, eò minùs fluxus exacerbatur.

Nec XII. negligenda venus, cùm eam tanquàm salubrem commendat RIVERIUS. Refert AMATO LUSITANUS in *sua C. 2. Cur.* 47. de quodà dysenteria epidemica laborante, qui celebravit cum uxore coitum, & manè sanus evasit.

Plures Cautiones, quæ ad Praxin faciunt, videbitis in WILLISII *Pbarmac. Rational.* Vol. 1. pag. 131. & 132, item SEPTALIO citato loco pag. 220, qui est elegans; item in HOLDERHOFF de *Erroribus Medicinæ ubi de dysenteria.*

Remedia alterantia in dysenteria, acre vitiosum peccans temperantia, & irritans sistentia, sunt vel communia, vel specifica; ita enim melioris cognitionis ergò distinguere lubet. Communia sunt & conveniunt, vel quatenus adstringunt, ut styptica, vel quatenus consolidant, ut vulneraria, quæ blando suo alcali, demonstrante HELMONTIO & TACHENIO, acidum in ex ulceratis intestinis temperant & absorbent, vel quatenus in genere omne acre corrosivum destruunt, istud vel obtundendo, ut pinguis, oleosa, lacticia; vel succos acidos & corrosivos imbibendo & absorbendo, ut terræ medicatæ, ossa animalium, corallia & reliqua alcalia. Specitalia verò seu medicamenta specifica sunt ista, quæ speciatim acre dysentericum, ut sic, emendare, & consequenter vim ac impetum spiritus infiti coercent, & singulari proprietate dysenteriam propriè curare valent, & quorum vim & energiam antidysentericam longa experientia confirmavit. De distinctis his distinctè.

Inter hæc eminent priapi, priapus cervi, ceti, & tauri, cranium humanum cum usnea, tragæa granorum actes, sanguis leporis, hepar serpentum, ungula equina, stercus caninum; sicut & generalia absorbentia commodè cum specificis misceri possunt. Priapus ceti est omnium optimus, quem laudat D. MICHAELIS: post hunc est cervi priapus; vilissimus est priapus tauri. Facit mentionem horum priaporum HELMONTIUS in *Plevra Furente*, eosque commendat non magis contra dysenteriam, quàm in specie contra pleuritidem, in qua ipsa hi priapi sunt experti. Usurpantur vel in forma sicca vel in forma humida: In forma sicca, quando nempe exsiccantur lentè in furno, hinc raduntur, & quantum fieri potest, comminuuntur, cujus rasura (non præscribuntur pulverisandi) præscribitur à ʒss. ad ʒi. in juleculo calido, sive in potulactis, sive in aqua foliorum quercus, aut etiam in potu cerevisiæ calidæ; idque subindè repetatur, & unum est ex optimis contra hunc morbum remediis, vel solum, vel cum laudano opiato usurpatum. Superiorem anno pauper, desperatà dysenteria correptus, remedium à me petebat, & præscripsi ei sequens:

℞. Rasur. priapi cervi ʒij.

Laud. hysser. gr. ix.

M. f. pulvis pro duabus dosibus.

Vel

℞. Conserv. rosar. antiq. ʒss.

Rasur. priapi cervi ʒij.

Laud. opiat. gr. iij.

c. f. q. syr. cydon. arom. f. Electuar. pro 2 dosibus.

D. S.

Electuarium adstringens pro 2. dosibus.

In forma liquida præscribuntur in Decocto, quod ad aliquot uncias crebrius hauritum similiter est expertum, à quibusdam in secretis habitum. Non tantum per se potando, sed etiam pro vehiculo aliis inservit remediis, v. g. cum eodem emulsionem parando ex seminibus appropriatis, semine papaveris albi, pineis, amygdalis dulcibus, &c. ubi Decoctum horum priaporum est liquor appropriatus, quo fiunt tales emulsionem: e. g.

℞. Sem. papav. albi

4. frig. mai. an. ʒij.

Amygd. dulc. ʒij.

c. f. q. Decocti priapi cervi vel ceti f. Emulho: adde Terræ sigillat. alba ʒi.

Vine.



*Vnic. fossil.*  
*Corall. rub. prap. an. 3 ss.*  
*Syr. papav. albi 3 ss.*  
*D. S.*

*Lacc confortativum adstringens.*

Sic fit Julepus in dysenteria conveniens:

*R. Decod. priap. ceti vel cervi 3 ss.*  
*Aqu. cinnam. 3 j. ad 3 j ss.*  
*Syr. corallor. Querc. 3 ij. vel 3 j.*  
*M. pro lulebo: S.*

*Julepus confortativus adstringens.*

Hauriatur crebrius imprimis nocte, quo dysenteria invalescit: est grati saporis, & optime convenit.

Superiori anno aliquoties præscripti non sine effectu:

*R. Fel. bed. terrestr.*

*Plantag.*

*Sanguis. an. M. j.*

*Flor. rosar. rub. p. 3 j.*

*Rad. tormentill. 3 j ss.*

*Raf. priapi ceti vel cervi 3 ij.*

Incisa & contusa coquantur in f. q. aque simpl.

*Colatura 3 ss. adde*

*Aqua Cinnam. 3 j.*

*Syr. Cydon. arom. 3 ij. vel 3 j.*

*M. D. S.*

*Potio confortativa adstringens.*

Plura qui cupit videre de efficacia horum priaporum, adeat Dorncrellium Tra& German. de Dys, item Sto-Kerum in sua Praxi p. 38. in quem commentatus est Tholdius.

His priapis multiplici experientia serè apud omnes confirmatis, subinde alia permiscuntur, & fiunt pulveres compositi *antis dysenterici*; v. g. multi commendant hunc pulverem:

*R. Priapi cervi 3 ss.*

*Rad. symph. major.*

*Tragacanth.*

*Nuc. Mosch. an. 3 ij.*

*Terra sigillat.*

*Bel. Arm. prap.*

*Corn. Cerv. ussi prap. (imbibit omne acidum*

*Zedoar. 3 ss.*

*potenter) an. 3 ij.*

*M. f. pulvis: D. S.*

*Pulvis adstringens.*

Hunc pulverem multum commendat EURERUS Tr. de Dysenteria p. 25. qui Tra& est admodum elegans. Vel ut alii componunt:

*R. Raf. priapi cervi 3 j ss.*

*Terra solar. Hung. vel sigill.*

*Corn. Cerv. sine igne an. 3 j.*

*Corall. rub. prap.*

*Pulv. tormentill. an. 3 ij.*

*M. f. pulvis:*

*Alio modo:*

*R. Terra sigill. 3 j. vel 3 j ss.*

*Raf. priapi cervi 3 j.*

*Corn. Cerv. ussi sine igne 3 vj. ad 3 j.*

*Corall. rub. prap.*

*Pulv. tormentill. an. 3 ij.*

*M. f. pulvis: S.*

*Pulvis adstringens.*

Cujus dosi 3 j. bis vel ter in die in vehiculo quocunque calido. Vel

*R. Raf. priapi cervi 3 j.*

*Corn. Cerv. sine igne*

*Antimonii diaphor. an. 3 j.*

*M. f. pulvis.*

Divid. in tres partes æquales, S.

*Viatica*

Addi his pulveribus possunt laudari opiat grana aliquot, & gutta olei cinnamomi.

Vehiculum pro dictis pulveribus esse potest:

*R. Aqu. card. bened.*

*Mentha an. 3 j ss.*

*Cinnam. 3 vj.*

*Ess. opii 3 ss.*

*Syr. card. bened. 3 vj.*

*M. D. S.*

*Potiuscula confortativa ad pulverem.*

Juxta priapum cervi, Corni Cervi est egregium remedium, quod mulcis scopis ad curam dysenteriae satisfacit,

quod facile patet, siueustum assumatur, siue sine igne præparatum propinetur, imprimis ejus & eboris gelatina: v. g. sit Julepus propinandus ad dysenteriam:

*R. Decod. bo. d. cum Corn. Ceru. 3 ss. ( loco hujus potest sumi Decodum priapi cervi pro lubitu )*

*Gelatin. Corn. Ceru. 3 ss. vel 3 vj. ad 3 j.*

*Aqua Cinnamom. 3 vj.*

*Syr. de symph. Fern. 3 j.*

*M. f. Julepus: S.*

*Julepus confortativus.*

Capiatur pro lubitu.

Aqua Cinnamomi additur propter stomachum, cui est convenientissima, cum in dysenteria ratio omnino sit habenda stomachi, imprimis quando affecta sunt intestina tenuia, & sequi solet vomitus.

Vel etiam Gelatina corni cervi & Gelatina priapor. diarr., maxime priapi cervi, dissolvuntur in potu ordinario hoc modo:

*R. Gel. corn. ceru.*

*Priapi cervi an. 3 j.*

*M. S.*

*Gelatina ad potum.*

Hæc Gelatina super igne liquefit, cujus dosi cochl. ij. vel 3 j. in Mens. j. cerevisiæ vel potus ordinarij, & crebrius usurpari potest. Non alterat saporem cerevisiæ, & tamen egregie confert; sunt enim hi priapi concretum quasi medium inter cartilagineas & ossa.

Quidam commendant pro potu Decoctum corni cervi cum radice pimpinellæ, uti est RIVERIUS, utpote qui pimpinellam, sanguisorbam scilicet ( altera enim nimis acris foret ) ceu expertam in dysenteria commendat: vid. RIVERIUS Cent. 3. Obs. 84.

Juxta corni cervi etiam aliorum animalium, imprimis violenter interemptorum, ossa & cornua in dysenteria sunt usitata & egregia, partim sine igne præparata, partim & usta. Usta quidem, qualiacunque sint, coincidunt vi absorptivæ, temperativæ & diaphoreticæ: sed & non usta conveniunt. De ossibus bovinis calcinatis, quæ multum commendantur, item ossibus humanis calcinatis aut sine igne præparatis, quæ similiter sunt admodum utilia, ex homine nempe violenter interempto desumpta, utpote in quibus de mumia vitali siue spiritu insito nonnihil adhuc superest, nihil dicam: saltem moneo, quod rasura cranii humani, vel cranium humanum sine igne ad 3 j. vel sola vel cum opiat, sunt egregium specificum in dysenteria, imprimis desumpta ex homine violenter interempto. Exempli prostant, quod dysenteria contumax beneficio rasuræ pulverisatæ cranii humani ad 3 j. propinata fuerit curata, quæ etiam experta est ab Illustri Dno BOYLE, Anglo, ut ipse mihi narravit: videatur etiam commendata hæc rasura apud Riverium in sua Praxi lib. 10. cap. 6: Hinc etiam usnea cranii humani, tam suspensi quam rotæ fracti, singulare specificum est in dysenteria à 3 ss. vel gr. xv. ad 3 j, siue solùm siue cum aliis propinata. Taceo polychrestum ejus usum in hæmorrhagiis omnibus de hac usnea & arcanis sub eadem sepultis contra quamcunque hæmorrhagiam, vid. HELMONTIUS de Magnæ. Vulner. Curat. Unum adhuc moneo de hac usnea: experimentum egregium factum est in Anglia, uti retulit mihi unus ex Collegio Experimentalis Regio: Curasse quendam secari venam: verum, utut sanguis floridus exsilierit, tamen arrepta usnea subito suppressum fuisse; cum verò deposuisset usneam, denuo contertim exiisset; simul ac verò denuo manu arripuerit, cessasse cum insigni præsentium admiratione. Narrat hoc ipsum etiam BOYLE in sua Philosophia Experimentalis, Anglico idiomate conscripta. Porro dens hippopotami, & hujus loco unicornu verum, est singulariter expertum in dysenteria, si præparatum à 3 j. ad 3 ss. vel 3 ij. ad 3 j. propinetur. De hoc dente: vid. WORMIUS & BARTHOLINUS. Confert imprimis hic dens hippopotami tunc temporis, ubi imminent convulsiones, utpote contra quas est singulare remedium. Certum est, quod obiter adjungo, experimentum contra hæmorrhoides nimium fluentes; item contra nimiam hæmorrhagiam uteri, seu nimium mensium fluxum, est experimentum HOECHSTEDTERI. Uva quercina singulare dicitur specificum, quod a non paucis commendatur, uti potestis videre in SENNERTO cap. de Dys. p. 359, item SCHENKIO l. 3. Obs. V. eadem cum non semper reperitur hujusmodi uva quercina, sub



sub radice quercus collecta, in defectu huius non incommodè potest substitui viscum quercinum, aut etiam fungus quercinus, vel fungus sorbi aucupatorum; hi ipsi enim similiter sunt egregii.

Post uvam quercinam est *Tragegranorum adēs*, seu panis infuccatus cum succo baccarum Sambuci, & est egregium specificum à plurimis expertum. Laudes videbitis in HARTMANNI *Praxi Chym.* p. 19. item BORELLO l. 2. *Obs.* 40. Optimus præparandi hunc pulverem modus est hic: (nam vario modo præparatur.)

*R. Succigranor. adēs rec. expr. qu. v.*

Ex quo per subsidentiā clarificato cum farina secalina conficitur massa, & qua ordinario modo panis formetur, qui bis in fornace ad debitam duritiem coquitur, ut redigi possit in pulverem: Ex pulvere isto cum succo baccarum sambuciterum formetur panis, & priori modo coquatur, id quod tertiā vice similiter repetatur: Deinde ubi tertiā vice similiter pulverisata ista pasta fuerit, addatur.

*Sang. lepor. crud. rec. (de quo postmodum) 3 jv.*

*Pulv. priapi cuiusvisque, uti notum est, vel ceti, vel cervi, vel tauri 3 j. vel 3 ij.*

*Succigran. sambuc. rec. q. s.*

*M. f. Massa*; quæ denuò in elibano blandè siccetur & pulverisetur.

Addatur, si lubet, *suecharum* ad pondus omnium.

Dosis est 3 ss. sine saccharo verò à 3 j. ad 3 ii. Inspergatur panitello, vino intincto, & ita assumatur.

Quidam coniungunt *succum granatorum maturorum* cum *succi sambuci ana.* & cum *farina frumenti q. s.* faciunt pastam, & superiori modo procedunt.

Facta est mentio sanguinis leporini, qui similiter singulare est specificum antidyntericum. Observandum autem est, quod non accipiendus sanguis ex lepore spontè mortuo, aut frigore enecato, sed potius, quantum fieri potest, in fuga capto, & dum ita à canibus fatigatur, & summo sub periculo & pavore mortis constitutus est, jugulato; tunc enim sanguis est optimus, qui duplici modo usurpandus: aut enim hic sanguis linteo mundo excipitur, quod linteum siccatum haustui cerevisiæ vel potui ordinario per noctem infusum dysenteriam curat: aut ipse sanguis leporis, superiori modo capti, exsiccatus & pulverisatus ad 3 ss. vel 3 j. propinetur; nobile & expertum est remedium: vid. HELMONTIUS *Tr. Potestas Medicam.* §. 28. Et usum huius lintei expertus est desideratissimus noster Præceptor, D. MICHAELIS, felicissimo sepius cum successu. Commendat & hunc sanguinem Schmuck in *Theaur. Secret.* 10. *Thes.* 2. RHUMELIUS p. 415. & MINDERERUS in *Medicina militari.*

Iuxta hunc sanguinem non minoris etiam est usus sanguis pavidi agni, qui etiam prius per terrefactus & in articulo mortis constitutus, juguletur, & sanguis dicto modo colligatur, & usurpetur: Maltum in recessu habet, & loco sanguinis leporini convenienter à quibusdam substituitur; sic enim pavor, ejusque idea sigillat sanguinem totum, ratione cujus remedium est ad dysenteriam. Usurpatur igitur pulvis talis sanguinis, tam leporini quam agni, à 3 ss. ad 3 j. imprimis in succo vel syrupo cydoniorum: cui si addere velimus vel mumiam, vel aliquid simul de lapide hæmatite, perinde est. De sanguine agni vid. etiam RHUMELIUS in *latro-Herm.* p. 415. item MINDERERUS in *eleganti sua Medicina militari.* Porro inter specifica dicta hepar serpentum & viperarum ritè exsiccatum & pulverisatum etiam nobile est specificum, & primum ferè locum meretur in omni dysenteria, seu communi seu benigna, seu epidemica maligna: vid. M. A. N. C. l. 2. *Obs.* 127. p. 209. Dosis à 3 ss. gr. xv ad 3 j. vel 3 iij. vel cum crystallo mixtum, quæ bilis porraceæ & dysentericæ Antidotus prædicatur à LANGIO in *Epist.* l. 1. & experimento comprobatur ab HEER in *eiusmodi Observatione de Cholera.* D. MICHAELIS in frequentissimo simul ac expertissimo & felicissimo fuit usu, cui communis catum fuit à D. ELLENBERGIO, Medico Hallensi, qui satelliti Principis fluxu desperato laboranti in haustu vini rubri propinavit, tam felici successu, ut intra horam fuerit suppressus fluxus: e. g.

*R. Pulv. hepat. viper. 3 ss.*

*Crystall. præp. vel corall. rub. præp. 3 j.*

*Laud. opiat. ferm. gr. ij.*

*M. pro duabus dosibus: S.*

*Pulvis adstringens.*

Vel

*R. Pulv. hepat. viper. 3 j. ad 3 j.*

*Extr. tormentill. 3 j. ad 3 ss.*

*Laud. opiat. gr. ij. vel laud. hysser. gr. j.*

*Olei destillas. mac. gutt. ij.*

*M. pro duabus dosibus: S.*

*Pulvis confortans.*

Vel

*R. Extr. tormentill. gr. xxiv.*

*Hepat. viperar. 3 j.*

*Lapill. Cancr. præp. 3 j.*

*Laud. hysser. gr. ix.*

*Olei destillas. cinnam. gutt. ij.*

*Misce divid. in duas partes æquales: S.*

*Pulvis.*

Vel

*R. Pulv. priapi ceti 3 j. ss.*

*Hepat. viper. 3 ss.*

*Corall. rub. præp. 3 j.*

*Laudan. opiat. gr. vi.*

*Olei destillas. cinnam. gutt. jv.*

*M. pro 6. dosibus: S.*

*Pulvis.*

Anno 1669. cum acerbissimè hic grassarentur dysentericæ epidemicæ, hoc pulvere felici cum successu gravissimam curavi dysenteriam:

*R. Pulv. hepat. viper. (vel serpent.) exsicc. gr. xv.*

*Crystall. præp. 3 ss.*

*M. fiat Pulvis:*

Detur in triplo.

Prima dosi assumebatur manè; secunda à meridie horæ tertiæ vel quintæ; tertiæ dosi post mediam noctem. Certe miratus sum efficaciam huius pulveris, quam nunquam credidissim. Vehiculum erat sequens:

*R. Aqu. tormentill. 3 ii. vel 3 j.*

*Cinnam. cum. vin. vel cydoniat. 3. vi. vel 3 j.*

*Spiritus theriacal. camphorat. 3 ii. vel 3 iii.*

*Syr. de symphyto Fernel. 3 ss. vel 3 j.*

*M. tam pro vehiculo dictorum pulverum, quam etiam cochleatim usurpando.*

Vel

*R. Aqu. plantagin. 3 ii.*

*Mentha 3 i.*

*Cinam. 3 iij.*

*Syr. diacod. 3 ss.*

*M. f. Pulvis.*

*Potuncula confortativa.*

Vel

*R. Troch. de carab. 3 j.*

*Hepat. viperar. 3 j.*

*M. f. pulvis.*

*Divide in 2. partes æquales: S.*

*Pulvis.*

Capiantur in dicto vehiculo.

WEDELIUS felleam vésiculam ante hepatis exsiccationem separari jubet: hæc enim stimulandi vim habet: unde & in partu difficili bilis viperarum adhibetur non sine fructu, ut cum HELMONTIO idem asserit. Interdum etiam addebam terram sigillatam & ossa bovina an. 3 j. felici cum successu. Præscribham crystallum præparatam, ut absorberet & imbiberet, sicque temperaret acidum; inserviunt enim spectatim bili porraceæ vel terugi nosæ corrigendis; unde specificum est crystallus in cholera, à bile porracea orta: hepata verò præscripsi ratione malignitatis, ob quem felicem usum ingreditur *Pulverem antidyntericum D. Michaelis*, qui est talis:

*R. Hamat. præp. 3 i.*

*Cornu cer. cum antimonio usti,*

*Croci Martis adstring.*

*Mag. corall. cum succo citri an. 3 ss.*

*Medull. saxor. 3 iv.*

*Pulv. hepat. serpent. vel viper. 3 ii.*

*M. f. Pulvis.*

Dosi à 3 ss. ad 3 j. usurpabatur feliciter. Conf. HOFMANNI *Clavis* p. 108.

Præter hepata viperarum sunt, qui insigniter etiam commendantur hepata ranarum viridum, qui pulvis similis dicitur fuisse *Secretum Paracelsi antidyntericum*, de quo sit fides penes autorem.

Non ignotum est etiam, quod à multis commendetur pomum excavatum, cum cera & gummi Arabico repletum,



tum, assatum, & comestum tanquam specificum antidy-  
sentericum. Laudatur admodum tale pomum ab HART-  
MANNO in *Pr. Chymiatr.* p. 196. uti etiam ab HORSTIO  
l. 4. *Observ.* 20. item in *Problem.* p. 70. *Dec.* 60. *Quæst.* 5. Sand  
AMATUS LUSITANUS in l. 6. *Curat.* 14. multiplici  
ceræ usu curatam dysenteriam observat. Loco pomi com-  
munis melius est, si usurpetur pomum cotoneum matu-  
rum, utpotè cum hoc non sit inelegans contra dysenteriam  
remedium: Auctor est VALERIOLA l. 8. *Obj.* 4. Præ-  
scripsi aliquando experimenti gratiâ:

℞. Gum. Arab. 3 j.

Mastic. 3 j.

Pulverisatis adde

Laud. opiat. gr. ij.

Hic Puleis pomo excavato indebatur ac assabatur, & totus  
comedeatur, erat est in sapore adstringentissimus: sed  
non vidi aded magnum effectum, utut non sit contemnen-  
dum remedium.

Quod etiam pertinet pulvis dysentericus Cratonis ex gum-  
mis Arabico, corallis & tragacantha.

Porro stercus canis seu Album Græcum vulgò commen-  
datur, & admodum expertum est remedium pro pauper-  
culis, speciatim si canis per sex dies noctesque probè ossi-  
bus fuerit nutritus: nam superius commendavi ossa. Do-  
sis est à 3 ss. ad 3 j. addito pauco saccharo in vehiculo lactis  
caprilli, vel simplicis vel chalybeati: Nam hoc stercus, vi-  
le licet, reverà tamen non ignobile & singulare est experi-  
mentum in dysenteria & omnibus hæmorrhagiis, etiam  
desperatis. Sanè FRANCISCUS *loel in sua Praxi de*  
*Dysenteria*, & FORESTUS, uti etiam MINDE-  
REUS in *Medic. Militari*, idem multis nominibus com-  
mendant, Sic rusticam mulierem quæ ultra 4. septimanas  
gravi uteri fluxu laboraverat, mediante hoc stercore seli-  
cissime curavi.

Ungula equina, seu istud cornu molliusculi, quod ex un-  
guis equinis excinditur, quando ferramenta applicantur,  
exsiccata, & pulverisata, ad 3 j. frequenter propinata, optimi  
est remedium ab EVRERO ad Dysenteriam cōmendatissi-  
mum; quam ungulam caballinam in butyro vel pinguedi-  
ne tostam, & quidè ex equa, itidem specificè laudat HEL-  
MONTIUS *Tract. Pylor. Rect.* §. 22. item *Tract. Ignota*  
*Atio Regim.* §. 41. Videri etiam potest LANGIUS  
*Comment. in Fabrum*, qui & ipse ad stipulatur HELMON-  
TIO, ejusque asserita approbat. Curat etiam epilep-  
siam; sed cautela hæc observetur, ut ungula collecta sit ex  
equa, quæ non lascivit; aliàs plurimum obest, quàm prodest.

Satyrioni multa attribuunt in hoc morbo, idque impri-  
mis, qui PARACELSI terunt vestigia, qui insigniter il-  
lam commendat in quamplurimis morbis. Duæ vel tres  
radices potui infusæ & ita potatæ singulariter comen-  
dantur contra dysenteriam, unde & radix satyriionis à  
multis admodum laudatur.

Aqua suberata, sive aqua, in qua suber bullierit, pro  
potu ordinario, item pulvis suberis combusti, arcanum di-  
citur contra dysenteriam, expertum à BORELLO *Cent.*  
1. *Obj.* 23. & 57. & à RIVERO in l. 4. *Observ.* 87. Quidam  
etiam commendant insigniter julos luglandis, tempore  
vernali in Majo arboribus adnascentes, qui sereno cælo  
collecti, siccari & pulverisati, & ad 3 j. in Aquis appropria-  
tis propinati, à multis commendantur. Huc pertinet  
Tormentilla, ejusque pulvis & extractum; rob. item sorbi  
torminalis, & hujus defectu sorbi aucupariæ, ceu ex Diar-  
rhœa cognita, præsuppono. Unicornu fossile, terra Vi-  
trioli dulcis ex vitriolo martiali saltem desumpta, quibus-  
vis martialibus longè præferenda: quæ martialia juvant  
quidem, ubi ab acido specialiter originem trahit dysente-  
ria, malumque est leuius, quia acidum saturant; in reliquis  
autem casibus, dysenteria nempe contagiosa, aut maligna,  
vel epidemica, minus proficua videntur. Sulphur, hujusque  
flores sunt præstantes. Lignum straxini iusto tempore col-  
lectum, ad 3 j. pulveretenus in vino calido adhibitum, sin-  
gulare est specificum in dysenteria.

Tandem alumen inter alia quàm plurima etiam lauda-  
tur ad dysenteriam: & quidam tantummodò recipiunt tria  
aluminis frustula magnitudinis pisi, propinant in vino ru-  
bro calido, & pretiosum dicunt esse arcanum. Alii, quod  
magis approbo.

℞. Alum. crud. 3 ss.

Cinnam. 3 j.

Redigunt in formam pulveris, & ita in vino rubro dosi  
3 j. propinant.

Sicut etiam aluminis aliquot grana aliis pulveribus mi-  
sta sunt optima.

Sicut etiam aluminis aliquot grana aliis pulveribus mi-  
sta sunt optima.

Hæc ferè sunt specifica.

Progredimur ad ea, quæ communiter & generaliter ad  
dysenteriam usurpari solent, & pleraque simplicia stypti-  
ca, adstringentia, & acidum absorbentia, & pinguis itud  
obundantia, ac aliàs in diarrhœa, cholera & vomitu usi-  
tata; item quælibet vulneraria magis usitata sunt, ver. gr.  
plantago, portulaca, tormentilla, pimpinella, sanguisor-  
ba, perfoliata, hederæ terrestris, centummodium, lysima-  
chia, potentilla, folia quercus, millefolium, bursa pasto-  
ris: radix tormentillæ, plantaginis, Nymphææ, filipen-  
dulæ, consolidæ majoris, pæoniæ, bitortæ, enulæ: flores  
rosarum rubrarum, balauftiorum, juli corylini, flores pa-  
paveris rhæados, bellidis, hyperici, cimæ quercus (NB. in  
quercu singularia latitant contra hunc morbum) semina  
plantaginis, acetosæ, portulacæ, nasturtii, aquilegiæ, per-  
foliatæ, papaveris albi, &c. STOEKERUS in *sua Pra-*  
*xi* tanquam expertum commendat semen papaveris con-  
tusum, cum vitello ovi, & frixum in cineribus. Mala cydo-  
nia, mespila, sorba, myrtilli, spongia cynosbati (cujus  
aliàs 3 j. commendatur ad quæcunque hæmorrhagias)  
nux moschata &c.: hinc omnes dictorum simplicium suc-  
ci, syrapi, extracta, succus plantaginis & hederæ terrestris  
ceu singulares laudantur. In fine dysenteria valdè confert  
succus absinthii, & mentha depuratus, ac saccharo in sy-  
rupum redactus; habet enim mentha cum absinthio multa  
miram vim corroborandi ventriculum. Aqua bursæ pasto-  
ris, cinnamomi, quercus &c., commendatur specificè ab  
HORSTIO; ab aliis aqua tormentillæ, plantaginis, cin-  
namomi cydoniata, syrupus de rosis siccis, myrtinus, plan-  
taginis, portulacæ, cydoniorum, coralliorum Quercetani,  
de symphyto Fernellii, papaveris: imò si dysenteria à mul-  
to fructuum usu contigerit, in ipso principio valdè laudat  
hic syrupum de absinthio cum aqua cinnamomi vel theria-  
cali RIVERIUS in *Praxi*, ubi de Dysenteria. Melius  
erit ejus Decoctum.

Præ cæteris convenit lac crebrius usurpatum, in princi-  
pio serosius, e.g. caprillum abstergendi fine, in progressu lac  
bubulum consolidandi & glutinandi fide: hinc & ex lacte  
parata remedia frequenter à quibusdam in dysenteria lau-  
dantur, quia temperant humores acres, irritationem inte-  
stinorum sic sistunt, & quibusdam additis, simul adstrin-  
gunt: lac amygdalarum dulcium & seminum, sive emulsio  
cum aqua chalybeata parata, ut oleositas omne obtundat  
acidum: item lac chalybeatum, tam medicamenti quàm  
alimenti vices sustinet. De jejuniis ejusque usu vid. HOL-  
TERHOFF *loc. cit.* p. 39; item quomodo in metu coagu-  
lationis corrigendum, & ne vitiosè concreascit, præcaven-  
dum? videatur *Pharos Medicor.* BONETTI ex BALLO-  
NIO pag. 426; nempe in specie chalybeandum.

Eò præstantius evadit lac, si appropriata in eo decoquan-  
tur: nempe lac chalybeatum, in quo radix symphyti majo-  
ris decoquatur, de quo bonus haustus calidè propinetur  
ægro ter in die, quod, ut suprà dixi, singulare est speci-  
ficum.

Vel

℞. Lact. rec. in quo 5. vel 6. deleatur ferrum igni-  
tum M. j.

Huic incoquantur

Rad. symph. major.

Tormentill. an. 3 j.

Ad tertiæ partis consumptionem.

D. S.

Lac sanans.

De Colatura ter in die propinetur bonus haustus.

Vel

℞. Ras. priapi cervi 3 j ss.

Rad. tormentill. 3 j.

Coqu. in lactis ss ij.

Colatura misc. cum pauco saccharo,

D. S.

Lac adstringens.

Sed NB. abste febris.

Si ipsum lac solitarium videatur incommodius, dimi-  
dio aquæ, vel communis vel cuiusdam appropriatæ, di-  
luatur, invicem ebulliant, & ita crebrius propinentur.  
Convenit itidem Decoctum Orizæ in lacte cum vitellis  
ovorum & succo hederæ terrestris.

Præterea Essentia & syrupus symphyti majoris, essentia  
vul-



vulnerariæ compositæ, Extractum theriacale, tormentill, &c. usurpantur, quæ extracta cum laudano opiato dant elegantes pilulas nocturnas: item spiritus theriacalis camphoratus, tinctura corallorum sassafrata, tinctura sulphuris vitrioli, liquor stypticus ex terra sigillata cum spiritu nitri, à *Barboletio liquor aureus dilutus*, tinctura hæmatis, & theriacalia quæcunque, item mixtura simplex in principio dysenteriae malignæ.

Præter dicta etiam terræ minerales conveniunt, ut terra sigillata, ossa humana calcinata, terra vitrioli dulcis, i. e. quæ per crebriorem lotionem dulcis reddita, & loco omnium crocorum Martis adstringentium esse potest, ex cuius 3℔. ter propinata FABER Cur. 28. p. 324. puerum curavit. Hinc AGRICOLA hunc commendat Bolam:

℞. Terra vitriol. dulc. 3℔.  
Off. microcosm. calc. gr. xij.  
Theriac. 3℔.  
M. pro Bolo. Vel  
℞. Theriac. 3℔. ad 3j.  
Terr. sigillat.  
Vitrioli dulc. an. gr. xv.  
Off. microcosm. præp. gr. xij.  
M. f. Bolus: S.  
Bolus adstringens pro uno dosi.

Vel  
℞. Theriac. Andr. 3j.  
Hemast. præp. 3j.  
Off. microcosm. præp. gr. xv.  
Sacchar. saturni gr. vj.  
M. f. Bolus: S.  
Vt antea.

Vel  
℞. Rob. ferbi termin. 3j℔.  
Bezoard. Martial. gr. xv.  
Terr. vitr. dulc. gr. vj.  
Laud. opiat. gr. i. vel ij.  
M. f. Bolus: S.  
Vt antea.

Item bolus armena, antimonium diaphoreticum, myrrha, (est balsamica, & elegans, imprimis ejus essentia) sulphur & flores sulphuris, succinum (hoc est singulare) sunt egregia, imprimis lapilli cancerorum præparati, umbilicus marinus præparatus, trochisci de terra sigillata & de carabe ad 3j. insigniter conferunt, non tantum in dysenteria, sed etiam in ipso sanguinis: E. g.

℞. Aqu. plantag. 3ij. vel 3iij.  
Cinnam. 3℔. vel 3vj.  
Acet. rosac. vel acet. dest. 3iij. vel 3℔. ad 3j.  
El. diascord. Fracast. 3j. ad 3ij.  
Trochisc. de carabe, vel de terr. sigill. an. 3℔.  
Lapill. Cancr. præp. 3ij.  
Antim. diaphor. 3j.  
Syrup. Myrtin. 3vj. vel 3j.  
M. f. Potio: S.  
Potio adstringens.

Modus hic per mixturam præscribendi est Sylvianus.

Vel ℞. Aqu. plantag.  
Portulac. an. 3j℔.  
Cinnam. 3vj.  
Acet. rosac. 3℔.  
Troch. de carab. 3j.  
Corn. Cerv. usli præp. 3ij.  
Sacchar. saturni 3℔.  
Syr. Myrtin. 3vj. vel 3j.  
M. D. S.

Mixtura adstringens confortativa.

℞. Aqu. plantag. 3iij.  
Cinnam.  
Acet. rosac. an. 3vj.  
El. diascord. Frac. 3j.  
Terra sigill. 3℔.  
Sacch. Saturni 3j.  
Laud. opiat. gr. ij.  
Syr. myrtin. 3℔.  
M. f. Potio: S.  
Potio adstringens.

℞. Aqu. plantag. 3iij.  
Spiritus theriacal. camphor. 3iij.  
Extract. tormentill. 3j℔.  
Corall. rub. præp. 3j. ad 3ij. } vel loco  
Terra vitr. dulc. gr. xv. ad 3j. } horum

Laud. opiat. gr. iij.

Syr. myrtin. 3j.

M. f. Potio: S.

Vt antea.

℞. Aqu. Menthae,

Plantag.

Tormentill. an. 3j.

Cinnam. 3vj.

Troch. de carab. 3j.

Cran. human. sine igne 3ij.

Laud. opiat. gr. vj.

Syr. de symph. Fern. 3j.

M. f. Potio: S.

Vt antea.

℞. Aqu. plantag. 3iij.

Cinnam. 3vj.

El. diascord. Frac. 3j℔.

Theriac. Andr. 3j.

Terra vitrioli dulc. 3℔.

Laudan. opiat. gr. iij.

Syr. myrtin. 3j.

M. f. Potio: S.

Vt antea.

℞. Aqu. plantagin. 3ij.

Tenell. Corn. Cerv. 3j.

Acet. destill. vel simpl. 3vj.

El. diascord. Frac. 3ij.

Antimonii diaphor. 3℔.

Syr. Cydonior. 3j.

M. f. Potio pro tribus dosibus: S.

Mixtura adstringens confortativa pro tribus dosibus.

Vel ℞. Aqu. plantag.

Scord. an. 3j℔.

Acet. vini vel rosar. 3iij. 3℔. ad 3j.

El. diascord. Frac. 3j. ad 3ij.

Corall. rub. præp. 3ij.

Extract. tormentill. 3℔.

Syr. cydon. aromat. 3℔.

M. f. Potio: S.

Potio adstringens.

℞. Aqu. plantaginis 3iv.

Cinnam. spirituos. 3ij.

Acet. vini 3℔.

El. diascord. Frac. 3ij.

Corn. Cerv. usli præp.

Extr. tormentill. an. 3j.

Laud. opiat. gr. ij.

Syr. cydon. 3ij.

M. S.

Vt antea.

℞. Aqu. plantagin. 3iij℔.

Mentha. 3j℔.

Cinnam.

Acet. vini an. 3℔.

El. diascord. Fracast. 3ij.

Corallor. rub. præp. 3ij. ad 3j.

Extract. tormentill. 3℔.

Syrup. plantag. 3℔.

M. D. S.

Potio confortans ad quietem.

℞. Aqua menthae 3ij.

Serpill. 3j.

El. diascord. Frac. 3j℔.

Terra sigillat.

Corn. Cerv. usli præp. an. gr. xv.

Pulv. hepat. viperar. 3℔.

Syr. cydonior. 3℔.

M. f. Potio pro tribus dosibus: S.

Vt antea.

Sic in dysenteria cum copiosa sanguinis rejectione per inferiora, ultra biennium durante, ab usu potionis purgantis blandæ ex gummi ammoniaco in aceto soluto, cum scammonio sulphurato, & extracto trochiscorum alhandal; quæ tamen in virgine delicata cachectica, cui non ritè fluebant Menses, cum tumore abdominis flatulento, nato ex muco acidoviscido, ultra 15. imò 18. secessus procuravit, profuit hæc Mistura, cum optima specifica in cassum adhibuerat:

℞. Aqu.



℞. *Aqu. plantagin.* 3 ij.  
*Cinnam.* 3 ℥. vel 3 vj.  
*El. diascord. Frac.* 3 j.  
*Troch. de carabe* 3 ℥. ad 3 ij.  
*Hemat. præp.* 3 ℥. ad 3 ij.  
*Antimonii diaphor. gr.* xij.  
*Syr. card. bened. vel plantag.* 3 ℥.

M. pro Potione:

Quæ mixtura cochleatim sumpta omnia pacata reddidit.

Habui quoque agnatam mulierem; 27. annorum natam, texturæ aliàs delicatæ, & fermenti digestivi stomachici adeo teneri, ut etiam blandiora quoque remedia, tam alterantia quam laxantia, eandem graviter afficerent: Præterea hæc scorbutico hæreditario affectu & hysterici passionibus obnoxia, tussim stomachalem patiebatur, ex acido viscido stomachi obortam: pro qua curanda præscripsi, præmissis præmittendis, has pilulas:

℞. *Gum. Ammoniaci in aceto sol.* 3 ℥.  
*Aloes luc. gr.* iij.  
*Extr. troch. alband. gr.* ℥.  
*Laud. hysser. gr.* v.  
*M. f. pilule.*

Cepit has vesperi ante cenam, mane aliquoties cacavit, semelque vomuit, & sana reddita fuit. Hinc interjectis aliquot mensibus tussis rediit, unde eisdem pilulas iterum præscripsi, quibus assumptis in copiosissimos vomitus, hypercathartes cruentas cum tenesmo, ex quibus hinc vires prosternebantur, passionemque hystericam includit: in quo casu inter alia remedia hunc pulverem præsecum experta est:

℞. *Corall. rub. præp.*  
*Corn. cerv. usli præp.*  
*Antimonii diaphor.*  
*Terra sigillat. an. gr.* viij.  
*Laud. hysser.* (cuius ordinaria dosi aliàs sunt gr. vi. in subjecto vero delicato dedi) gr. jv.  
*M. f. pulvis.*

Hunc pulverem aliquoties deglutivit non sine successu, Passionis verò hysterice satisfecit Elixir uterinum D. Michaelis; sicut tenesmo facculi ex floribus verbasci & chamomillæ in lacte bullitis, ut & clystma ex lacte simplici, addito tamen paucis sacchari: quibus adhibitis restituta est feliciter.

In forma pulveris aliàs sequentes etiam mihi familes sunt.

℞. *Troch. de carabe* 3 j.  
*Pulv. hepat. viperar.* 3j.  
*Laud. opiat. gr.* iij.  
*M. f. pulvis pro duabus dos. S.*  
*Pulvis adstringens.*

Quibus addi etiam possunt olei destill. cinnam. gutt. ij.

℞. *Troch. de carabe* 3j.  
*Flor. sulphuris* 3ij.  
*Laud. opiat. gr.* ij.  
*M. pro duabus dosibus: S.*  
*Vi antea.*

℞. *Flor. sulphuris* 3℥.  
*Bezoard. Martial. gr.* xv.  
*Terra sigill. gr.* iij.  
*M. f. pulvis pro dosi: S.*  
*Vi antea.*

℞. *Terra sigillat.*  
*Flor. sulphuris an.* 3℥.  
*Antimonii diaphor. Martial. gr.* xvj.  
*Vitrioli Martis ad albedin. calc. gr.* viij.  
*M. pro duabus dosibus: S.*  
*Vi antea.*

℞. *Corn. cerv. præp.* 3℥. ad 3ij.  
*Laud. hysser. gr.* v.  
*M. f. pulvis: S.*  
*Vi antea.*

℞. *Corn. cerv. usli præp. gr.* xv.  
*Bezoard. Martial. 3℥.*  
*Laud. hysser. gr.* v.

Olei destill. cinnam. vel macis gutt. j. vel ij.

M. f. pulvis: S.

Vi antea.

Propinetur in vehiculo calido; convenit in flatu.

℞. *Extr. tormentill.* 3 j.  
*Terra sigillat. gr.* xvi.  
*Corn. cerv. usli præp.* 3 ℥.  
*Laud. opiat. gr.* ij.  
*M. f. pulvis.*

Divide in 2. partes æquales: S.

*Pulveres adstringentes.*

℞. *Extr. tormentill.*  
*Corn. cerv. usli præp. an.* 3 ℥. ad gr. xij.  
*Vinc. fossil. gr.* v.  
*Laud. opiat. gr.* j.  
*Olei destillat. macis gutt. j.*  
*M. D. S.*  
*Pulvis confortativus adstringens.*

℞. *Extr. tormentill.* 3 ℥.  
*Corn. cerv. usli præp.*  
*Lapill. Cancr. præp.*  
*Laud. hysser. an. gr.* v.  
*Olei destillat. cinnam. gutt. j.*  
*M. S.*

Vi antea.

Sic etiam crocus martis adstringens 3 ℥. ad 3j. & hinc rubrica fabrilis, quæ multum de Marte participat, conveniunt: pulvis Bezoardicus SENNERTII cum aliis compositis in malignis: pulvis Saxonicus adstringens Bezoardicus, thus, myrrha, gummi Arabicum, putamina ovorum anserinorum, ossa bovina, ebur, maxilla lucii piscis, dens hippopotami, os sepis, talus porcum calcinatus, qui commendatur à BARTHOLINO Cent. 5. Hist. 97, & saccharum saturni, quod nobile est remedium, & vobis (NB.) sic commendatum, plus in recessu habet in gravissimis torminibus, temperando specificè & corrigendo saporem dysentericum, 3 ℥. ad gr. xv. cum allis mineralibus usurpatum, unde etiam, cum hoc saccharo saturni præparatur tinctura antiphthica, quæ est elegans in exulcerationibus internis quibuscunque. Pertinet etiam huc Michaelis liquor hypticus, & tinctura illa Martis adstringens ex terra sic dicta solari, cum spiritu salis paratus: Conf. HOFFMANNI Clav. Schrad. pag. 133.

His & additur Theriaca, Mithridatum, electuarium diascordii Fracastorii, laudanum opiatum, & similia notata. Qui præservacionis gratia aliquid postulat:

℞. *Theriaca. Anar.* 3 ij.  
*Raf. priapi cervi* 3 vj.  
*Pulv. rad. tormentill.* 3 ℥.  
*Extr. ejusd.*  
*Vinc. fossil. an.* 3 ij.  
*Antimonii diaphor.* 3 ℥.  
*Laud. opiat. formic.* gr. xv.  
*c. f. q. succi cydon. f. Electuarium:*  
*D. S.*

*Electuarium præservativum.*

℞. *El. diascord. Frac.* 3j.  
*Raf. priapi cervi vel vici* 3j.  
*Troch. de carabe* 3j.  
*Flor. sulphuris* 3j.  
*c. succo cydoniorum f. Electuarium: S.*  
*Vi antea.*

De quo capiat seger mane à meridie & sub interitu lecti, pro lubitu.

℞. *El. diascord. Frac.* 3j.  
*Raf. priapi cervi* 3j.  
*Antimonii diaphor.* 3j.  
*cum succo cydonior. f. Electuarium:*  
*D. S.*

Vi antea.

De quo mane quantitatem castaneæ perservativæ; curatæ, autem indie.

Quod si vel in principio vel in declinatione dysentericæ benignæ laxativa proprimis viis abstergendis usurpanda veniant, cautè hoc fiat; quandoquidem illi, qui in dysenteria



vulnerariae compositae, Extractum theriacale, tormentillæ, &c. usurpantur, quæ extracta cum laudano opiato dant elegantes pilulas nocturnas: item spiritus theriacalis camphoratus, tinctura corallorum assaiata, tinctura sulphuris vitrioli, liquor stypticus ex terra sigillata cum spiritu nitri, à *Bariboletio liquor aureus* dictus, tinctura hæmatis, & theriacalia quæcunque, item mixtura simplex in principio dysenteriae malignæ.

Præter dicta etiam terræ minerales conveniunt, ut terra sigillata, ossa humana calcinata, terra vitrioli dulcis, i. e. quæ per crebriorem lotionem dulcis reddita, & loco omnium crocorum Martis adstringentium esse potest, ex cuius ʒss. ter propinata FABER Cur. 28. p. 324. puerum curavit. Hunc AGRICOLA hunc commendat Bolam:

℞. Terræ vitriol. dulc. ʒss.  
Oss. microcosm. calc. gr. xij.  
Theriac. ʒss.  
M. pro Bolo. Vel  
℞. Theriac. ʒss. ad ʒj.  
Terr. sigillat.  
Vitrioli dulc. an. gr. xv.  
Oss. microcosm. præp. gr. xij.  
M. f. Bolus: S.  
Bolus adstringens pro uno dosi.

Vel  
℞. Theriac. Andr. ʒj.  
Hæmatis. præp. ʒl.  
Oss. microcosm. præp. gr. xv.  
Sacchar. saturni gr. vj.  
M. f. Bolus: S.  
Vt antea.

Vel  
℞. Rob. sorbi termin. ʒjss.  
Bezoard. Martial. gr. xv.  
Terr. vitr. dulc. gr. vj.  
Laud. opiat. gr. j. vel ij.  
M. f. Bolus: S.  
Vt antea.

Item bolus armena, antimonium diaphoreticum, myrrha, (est balsamica, & elegans, imprimis ejus essentia) sulphur & flores sulphuris, succinum (hoc est singulare) sunt egregia, imprimis lapilli cancerorum præparati, umbilicus marinus præparatus, trochisci de terra sigillata & de carabe ad ʒj. insigniter conferunt, non tantum in dysenteria, sed etiam in sputo sanguinis: E. g.

℞. Aqu. plantag. ʒij. vel ʒiij.  
Cinnam. ʒss. vel ʒvj.  
Acet. rosac. vel acet. dest. ʒij. vel ʒss. ad ʒj.  
El. diascord. Fracast. ʒj. ad ʒij.  
Trochisc. de carabe, vel de terr. sigill. an. ʒss.  
Lapill. Cancr. præp. ʒij.  
Antim. diaphor. ʒj.  
Syrup. Myrtin. ʒvj. vel ʒj.  
M. f. Potio: S.  
Potio adstringens.

Modus hic per mixturam præscribendi est Sylvianus.

Vel ℞. Aqu. plantag.  
Portulac. an. ʒjss.  
Cinnam. ʒvj.  
Acet. rosac. ʒss.  
Troch. de carab. ʒj.  
Corn. Cerv. usli præp. ʒij.  
Sacchar. saturni ʒss.  
Syr. Myrtin. ʒvj. vel ʒj.  
M. D. S.

Mixtura adstringens confortativa.

℞. Aqu. plantag. ʒij.  
Cinnam.  
Acet. rosac. an. ʒvj.  
El. diascord. Frac. ʒj.  
Terræ sigill. ʒss.  
Sacch. Saturni ʒj.  
Laud. opiat. gr. ij.  
Syr. myrtin. ʒss.  
M. f. Potio: S.  
Potio adstringens.  
℞. Aqu. plantag. ʒij.  
Spiritus theriacal. camphor. ʒij.  
Extract. tormentill. ʒjss.  
Corall. rub. præp. ʒj. ad ʒij. } vel loco  
Terræ vitr. dulc. gr. xv. ad ʒj. } horum

Laud. opiat. gr. iij.

Syr. myrtin. ʒj.

M. f. Potio: S.

Vt antea.

} troch. de  
carab. ʒjss.

Vel

℞. Ag. Mentha,  
Plantag.  
Tormentill. an. ʒj.

Cinnam. ʒvj.

Troch. de carab. ʒj.

Cran. human. sine igne ʒij.

Laud. opiat. gr. vj.

Syr. de sympb. Fern. ʒj.

M. f. Potio: S.

Vt antea.

Vel

℞. Aqu. plantag. ʒij.  
Cinnam. ʒvj.

El. diascord. Frac. ʒjss.

Theriac. Andr. ʒj.

Terræ vitrioli dulc. ʒss.

Laudan. opiat. gr. iij.

Syr. myrtin. ʒj.

M. f. Potio: S.

Vt antea.

Vel

℞. Ag. plantagin. ʒij.

Tenell. Corn. Cerv. ʒj.

Acet. destill. vel simpl. ʒvj.

El. diascord. Frac. ʒij.

Antimonii diaphor. ʒss.

Syr. Cydonior. ʒj.

M. f. Potio pro tribus dosibus: S.

Mixtura adstringens confortativa pro tribus dosibus.

Vel ℞. Aqu. plantag.

Scord. an. ʒjss.

Acet. vini vel rosar. ʒij. ʒss. ad ʒj.

El. diascord. Frac. ʒj. ad ʒij.

Corall. rub. præp. ʒij.

Extra. tormentill. ʒss.

Syr. cydon. aromat. ʒss.

M. f. Potio: S.

Potio adstringens.

Vel

℞. Ag. plantagin. ʒij.

Cinnam. spirituos. ʒij.

Acet. vini ʒss.

El. diascord. Frac. ʒij.

Corn. Cerv. usli præp.

Extra. tormentill. an. ʒj.

Laud. opiat. gr. ij.

Syr. cydon. ʒij.

M. S.

Vt antea.

Vel

℞. Ag. plantagin. ʒijss.

Mentha. ʒjss.

Cinnam.

Acet. vini an. ʒss.

El. diascord. Fracast. ʒij.

Corallor. rub. præp. ʒij. ad ʒj.

Extra. tormentill. ʒss.

Syrup. plantag. ʒss.

M. D. S.

Potio confortans ad quietem.

Vel

℞. Aqua mentha ʒij.

Serpill. ʒj.

El. diascord. Frac. ʒjss.

Terræ sigillat.

Corn. Cerv. usli præp. an. gr. xv.

Puly. hepatic. viperar. ʒss.

Syr. cydonior. ʒss.

M. f. Potio pro tribus dosibus: S.

Vt antea.

Sic in dysenteria cum copiosa sanguinis rejectione per inferiora, ultra biennium durante, ab usu potionis purgantis blandæ ex gummi ammoniaco in aceto soluto, cum scammonio sulphurato, & extracto trochiscorum alhandal, quæ tamen in virgine delicata cachectica, cui non ritè fluebant Menses, cum tumore abdominis flatulento, nato ex mucro acido-viscido, ultra 15. imò 18. secessus procuravit, profuit hæc Mistura, cum optima specifica in cassum adhibuerat:

℞. Aqu.



*R. Aqu. plantagin. 3 ij.*  
*Cinnam. 3 ss. vel 3 vj.*  
*El. diascord. Frac. 3 j.*  
*Troch. de carabe 3 ss. ad 3 ij.*  
*Hemat. præp. 3 j. ad 3 ij.*  
*Antimonii diaphor. gr. xij.*  
*Syr. card. bened. vel plantag. 3 ss.*  
*M. pro Potione:*

Quæ mixtura cochleatim sumpta omnia pacata reddidit.

Habui quoque agnatam mulierem; 27. annorum natam, texturæ aliàs delicatæ, & fermenti digestivi stomachici aded teneri, ut etiam blandiora quoque remedia, tam alterantia quàm laxantia, eandem graviter affecerint: Præterea hæc scorbutico hæreditario affectu & hysterici passionibus obnoxia, tussim stomachicalem patiebatur, ex acido viscido stomachi obortam: pro qua curanda præscripsi, præmissis præmittendis, has pilulas:

*R. Gum. Ammoniaci in aceto sol. 3 ss.*  
*Aloes luc. gr. iij.*  
*Extr. troch. alband. gr. ss.*  
*Laud. hysser. gr. v.*  
*M. f. pilule.*

Cepit has vesperi ante cenam, mane aliquoties cacavit, semelque vomuit, & sana reddita fuit. Hinc interjectis aliquot mensibus tussis rediit, unde eandem pilulas iterum præscripsi, quibus assumptis in copiosissimos vomitus, hypercathartes cruentas cum tenesmo, ex quibus hinc vires prosternebantur, passionemque hystericam includit: in quo casu inter alia remedia hunc pulverem proscuum experta est:

*R. Corall. rub. præp.*  
*Corn. cerv. usi præp.*  
*Antimonii diaphor.*  
*Terra figillat. an. gr. vij.*  
*Laud. hysser. (cujus ordinaria dosi aliàs sunt gr. vj. in subjecto vero delicato dedi) gr. jv.*  
*M. f. pulvis.*

Hunc pulverem aliquoties deglutivit non sine successu, Passionis verò hysterice satisfecit Elixir uterinum D. Michaelis; sicut tenesmo facculi ex floribus verbasci & chamomillæ in lacte bullitis, ut & clystma ex lacte simplici, addito tamen pauco sacchari: quibus adhibitis restituta est feliciter.

In forma pulveris aliàs sequentes etiam mihi fami-  
 Nares sunt.

*R. Troch. de carabe 3 j.*  
*Pulv. hepat. viperar. 3 j.*  
*Laud. opiat. gr. iij.*  
*M. f. pulvis produabus dos. S.*  
*Pulvis adstringens.*

Quibus addi etiam possunt olei de still. cinnam. gutt. ij.

*R. Troch. de carabe 3 j.*  
*Flor. sulphuris 3 ij.*  
*Laud. opiat. gr. ij.*  
*M. pro duabus dosibus: S.*  
*Vi antea.*

*R. Flor. sulphuris 3 ss.*  
*Bezoard. Martial. gr. xv.*  
*Terra figill. gr. iij.*  
*M. f. pulvis pro dosi: S.*  
*Vi antea.*

*R. Terra figillat.*  
*Flor. sulphuris an 3 ss.*  
*Antimonii diaphor. Martial. gr. xvj.*  
*Vitrioli Martii ad albedin. calc. gr. vij.*  
*M. pro duabus dosibus: S.*  
*Vi antea.*

*R. Corn. cerv. præp. 3 ss. ad 3 ij.*  
*Laud. hysser. gr. v.*  
*M. f. pulvis: S.*  
*Vi antea.*

*R. Corn. cerv. usi præp. gr. xv.*  
*Bezoard. Martial. 3 ss.*  
*Laud. hysser. gr. v.*

Olei de still. cinnam. vel macis gutt. j. vel ij.

M. f. pulvis: S.

Vi antea.

Propinquetur in vehiculo calido; convenit in flatu.

Vel

*R. Extr. tormentill. 3 j.*  
*Terra figillat. gr. xvj.*  
*Corn. cerv. usi præp. 3 ss.*  
*Laud. opiat. gr. ij.*  
*M. f. pulvis.*

Divide in 2. partes æquales: S.

Pulveres adstringentes.

Vel

*R. Extr. tormentill. 3 j.*  
*Corn. cerv. usi præp. an 3 ss. ad gr. xij.*  
*Vinc. fossil. gr. v.*  
*Laud. opiat. gr. j.*  
*Olei de stillat. macis gutt. j.*  
*M. D. S.*

Pulvis confortativus adstringens.

Vel

*R. Extr. tormentill. 3 ss.*  
*Corn. cerv. usi præp.*  
*Lapill. Cancr. præp.*  
*Laud. hysser. an. gr. v.*  
*Olei de stillat. cinnam. gutt. j.*  
*M. S.*

Vi antea.

Sic etiam crocus martis adstringens à 3 ss. ad 3 j. & hinc rubrica fabrilis, quæ multum de Marte participat, conveniunt: pulvis Bezoardicus SENNERTII cum aliis compositis in malignis: pulvis Saxonicus adstringens Bezoardicus, thus, myrrha, gummi Arabicum, putamina ovorum anserinorum, ossa bovina, ebur, maxilla lucii piscis, dens hippopotami, os sepis, talus porcinus calcinatus, qui commendatur à BARTHOLINO CEN. 5. Hist. 97, & saccharum saturni, quod nobile est remedium, & vobis (NB.) sic commendatum, plus in recessu habet in gravissimis torminibus, temperando specificè & corrigendo saporem dysentericum à 3 ss. ad gr. xv. cum aliis mineralibus usurpatum: unde etiam, cum hoc saccharo saturni præparatur cinctura antiphthysica, quæ est elegans in exulcerationibus internis quibuscunque. Pertinet etiam huc Michaelis liquor stypticus, & tinctura illa Martis adstringens ex terra sic dicta solari, cum spiritu salis paratus: Conf. HOFFMANNI Clav. Sebada. pag. 132.

Hic & additur Theriaca, Michridatum, electuarium diascordii Fragatorii, laudanum opiatum, & similia nota. Qui præservationis gratia aliquid postulat:

*R. Theriac. Mar. 3 ij.*  
*Raf. priapi ceti 3 vj.*  
*Pulv. rad. tormentill. 3 ss.*  
*Extr. ejusd.*  
*Vinc. fossil. an. 3 ij.*  
*Antimonii diaphor. 3 ss.*  
*Laud. opiat. ferment. gr. xv.*  
*c. f. q. succi cydon. f. Electuarium:*

D. S.

Electuarium præservativum.

Vel

*R. El. diascord. Frac. 3 ss.*  
*Raf. priapi ceti vel cervi 3 j.*  
*Troch. de carabe 3 j.*  
*Flor. sulphuris 3 j.*  
*c. succo cydoniorum f. Electuarium: S.*  
*Vi antea.*

De quo capiat æger mane à meridie & sub introitu lecti, pro lubitu.

Vel

*R. El. diascord. Frac. 3 ss.*  
*Raf. priapi cervi 3 ss.*  
*Antimonii diaphoret. 3 j.*  
*cum succo cydonior. f. Electuarium:*  
*D. S.*

Vi antea.

De quo mane quantitatem castaneæ perservativæ, curatè vè, autè m. indic.

Quod si vel in principio vel in declinatione dysentericæ benignæ laxativa propriis viis abstergendis usurpanda veniant, cautè hoc fiat; quandoquidem ii, qui in dysenteria



teria statim eunt ad purgantia, non curant, sed omnia deteriora faciunt; qui vero prius sistant spirituum impetum, ac tormina sufflaminant, optime curant, dicit LINDANUS. Quando igitur ad incipientem dysenteriam quis venit, dato anodyno, & hinc conciliato somno, eundem est ad purgationem, & blandè saltem eluenda intestina, vel in principio detur blandum laxans, mistum cum opiato, vel præmisso laxativo, mox subiungatur opiatum. Inter purgantia sufficit aloë, vel usurpetur imprimis Rhabarbarum, quod tutum est, nunc etiam, nunc leviter tostum, ut partibus volatilibus exhalatis reliqua substantia interea styptica minus laxet; & hinc myrobalani: nam præter vim laxativam simul vim anodynam Rhabarbaro tribuit HOLDERHOFF sc. nunc loam usurpatur, nunc cum laudano opiato; hinc v. g.

R. Conserv. rosar. vel el. discord. Frac. 3℔ ad 3j.

Rhabarb. opt. pulveris. 3j. ad 3ij.

Laud. opiat. gr. j. vel ij.

cum Syr. cydon. vel de rosis sic. M. f. Bolus.

Detur in duplo: S.

Bolus abstergius prouta vice.

Usurpetur vespere & si opus est repetatur mane; si enim primâ vice non sufficienter abstergit, reiteretur. Vel

R. Conf. rosar. antiq. 3j. vel 3℔ ad 3ij.

Pulv. rhabarb. 3℔ vel 3ij. ad 3j. vel tosti 3ij.

Laudan. opiat. gr. j.

Syr. de rosis q. s.

M. f. Bolus: S.

Præced.

Vel

R. Pulv. passul. 3 ij.

Pulv. rhabarb. el. 3℔ ad 3j.

Laudan. opiat. gr. j.

M. f. Bolus: S.

Præced.

Vel

R. Aqu. plantagin. 3 j.

Cinnam. 3j.

Pulv. rhabarb. el. 3℔ ad 3j.

Laud. opiat. gr. j.

Syr. myrob. 3℔.

M. S.

Potio laxativa bene circumspicienda.

Vel

R. Rhabarb. el. 3℔.

Flor. rosar. rub. p. s.

Infunde in liq. ferulac.

Colatura 3℔ vel 3j. adde

Syr. de rosis sic. 3 ij. ad 3℔

M. S.

Potiuscula laxativa.

Vel

R. Aquæ plantagin. 3 j.

Pulv. rhabarb. 3 j.

Laud. opiat. gr. j.

cum Syr. myrob. vel cydon. q. s.

M. D. S.

Præced.

Laxantia talia comodiùs mane propinantur: somnifera verò seu opiatia tutius & comodiùs sub noctem dantur, quia raro de die agunt, noctu verò feliciùs ægri dormiunt; adhuc circa noctem ordinari deasperatur dysenteria. Fit interdum, ut dysenteria correpti patiantur dolorem gravativum obtusum & compressivum sub umbilico, quasi materia ibidem incuneata haberet, unde facile oriri suspicio possit, quasi pathema hoc oriretur ex suppressis per opiatia secessibus, qui tamen non est; quin potiùs ex continuato spasmo intestinorum, in quodam loco pertiniaciùs vellicatorum, originem ducit: unde externe lenientia, item later calefactus abdomini applicatus molestissimum istum dolorem compressivum & gravativum in abdomine sistunt.

Si Dysenteria maligna, omittenda laxativa, & nunc in principio, nunc sub cursu morbi, sudorifera usurpanda veniunt, specificis juncta: e. g.

R. Corn. ceru. sine igne.

Antimonii diaphor. 3℔.

Sal. vol. viperar. gr. v.

Laudani opiat. rub. gr. j.

M. f. pulvis: S.

Pulvis adstringens.

Vel R. Corn. ceru. sine igne gr. xv. ad 3℔.

Terra sigill. 3 j.

Sal. vol. corn. ceru. vel extrah. iberic. gr. vj.

M. pro duabus dosib. S.

Præced.

Vel

R. Pulv. Bezoard. Lud. 3j.

Corall. rub. præp. vel Antimonii diaph. 3℔.

Laud. opiat. gr. j.

M. f. pulvis: S.

Pulvis adstringens singularis.

Vel acui potest sale volatili, aut viperinis, aut etiam extra-cto tormentilla.

Vel

R. Vfn. cran. hum.

Bezoard. miner. vel solar. an. 3℔.

M. f. pulvis: S.

Pulvis adstringens confortativus.

Qui olim etiam usitatus erat D. LANGIO.

Vel

R. Aqu. mentha 3 j.

Spiritus iberic. campb. 3 j. ad 3ij. (in om-  
bus alvi fluxibus prodest)

Antimonii diaphor. 3 j.

Off. hum. calc. 3℔.

Extr. ibericacal. gr. v.

Syr. card. bened. 3℔.

M. f. Potio pro una vice; S.

Potio adstringens confortativa.

Ubi nimia dissolutio sanguinis adest, liquor stypticus sive aurum potabile Bartholetti ex terra sigillata & spiritu nitri atrum convenit.

R. Quin. Essen. Cinnam. 3 j. (nobile remedium)

Mentha 3℔.

M. D. S.

Confortans tinctura: 20. usque ad 25. gutta.

Vir consistentis ætatis, dysenteria epidemica ex contagio occasione pavoris affectus, cum per 6. vel septem dies saltem diarrhoea simplici jam laborasset, quæ successive in dysenteriam mutabatur, magis tamen mucosam, minus cruentam, Albam communiter dictam. Die saturni vesperi vocatus præscripsi:

R. Aqu. scord.

Mentha an. 3j.

Aceti vini 3℔.

El. discord. 3 ij.

Terra sigill. 3℔.

M. pro duabus dosibus.

Sudavit, & melius habuit.

Die solis admodum debilis, siticulosus & anxius erat; & quoties cerevisiam biberet tantillum frigidiusculam, aut potiunculam, toties in comitenti urgebant secessus. Verum ad juscula calida vel haustum calidum non item; non secus atque dum probe testus stragulis, & munitus pedibus vel operculis abdomini aut pedi admotis probe caleret, & consequenter nonnihil sudaret, toties angustia & anxietates præcordiorum cessabant, & si sudaret, dicebat, bene se habere nihil timere; simul verò atque vel lecto surgeret, vel pedes nudaret, subito anxietatibus præcordialibus tum sensu molestia torminosa abdominis vel crebriori dejectione afficiebatur, unde & calidè custodiendum & calidum potum propinandum suasi per totum morbi cursum. Hinc die solis præscripsi:

R. Antimonii diaphor. Martial. 3℔.

Terra sigill. gr. xv.

Cornu cerui ussi præp. 3 j.

M. pro duabus dosibus:

Quasi in vehiculo calido jusculi gallinacei vel vini capiebat, & sic melius habebat; unde & prosequente nocte adhuc unam dosim capiendam monui. Sed ut ut opiatam tam supra quam sequentibus diebus simul propinarem, tamen parcissimus & minimè talibus proportionatus sequebatur somnus; id quod ferè obtinet in dysenteria, ut opiatam in crebra & magna dosi ferre queant cum parco vel nullo somno, & minori virium prostratione, quam ex torminibus & secessibus patiuntur, aut opiatam alias inferre solent. Ergo die lunæ præscripsi:

R. Raf. priapi cerui 3j.

Laud. opiat. gr. ij.

M. pro duabus dosibus.

Vespere præscripta Potio sequens:

R. Aqu.



R. Aqu. plantagin. ʒij.

Cinnam.

Spir. iheriac. tamber. an. ʒij.

Acet. vini ʒss.

El. diascord. ʒj.

Lapill. Cancr. præp.

Antimon. diaphor. an. gr. xv.

M. f. Porio:

Captebat pro lubitu.

Die Martis præscripti:

R. Corn. Cerv. usi præp. ʒss.

Mag. Corall. cum succo citri ʒj.

Terra vitrioli dulc. ʒss.

N. pro duabus dosibus.

Unam cepit manè, alteram circa mediam noctem in vehiculo cerevisiæ calidæ, cumino probè conditæ; vesperi verò tincturæ bezoard. gutt. l. cepit, quam postea omni manè repetitam semper cum successu bono propter sudorem assumpsit, sicque evasit. Nam & alii huic malo tunc temporis obnoxii in principio bis vel ter accepti hæc tinctura mediante sudore faciliè evaserunt; sicut aliis essentia theriacalis anodyna D. MICHAELIS ad 40. guttas optimè contulit:

Die ergo Mercuri, Iovis, & Veneris eadem tinctura Bezoardica manè captebatur; à meridie verò mixtura ex eleuario diascordii. Sed cum nihilominus quotidie ter vel quater, etiam noctu toridem vicibus, pateretur adhuc secessus mucosus cum paucò somno, sine torminibus tamen, nullo appetitu, siti iam tamen moderata, iudicavi hancce morbi protractionem tam saltem ex vicio stomachi non digerentis oriri: Unde die Saturni iussi manè capiat ovi vitellum induratum cum aceto rosaceo, cuius usu optimè habuit: propterea vesperi bihorio ante cœnam idem repetere iussi. Sub cursu morbi externè pro coercendo tenesmo graviter urgente iussi capere stercur columbinum, hoc cum aceto calido probè subigere, & tam abdomini insternere, quam podici applicare, & sæpius calidè renovare, cuius usu commodè habuit.

Quibus & similibus, tam generalibus, quam specificè legitimè methodo usurpatis, ubi mitigatum fuerit malum, pro restituenda intestinorum noxa ab ulceribus inducta, pro tertia Indicatione in declinatione morbi conveniunt Portiones vulnerariæ, quibus nempe abstergantur & consolidentur intestina, & purificetur sanguis. Conveniunt etiam tunc Balsama sulphuris tam commune cum oleo terebinthinæ, aut eo anisi, aut oleo haccarum juniperi, aut oleo succini præparatum, quàm Balsamum sulphuris nobilius, quod nobis descripsit POLEMANNUS Tr. de sulph. Phosphorum, qui videatur: Fit ex sulphure aurato antimoni. Portiones vulnerariæ possunt præscribi hoc modo ad imitationem SYLVII L.L.C. 53. §. 52.

R. Heder. terrestr. M. j. vel ij.

Alchymill. seu pyrol.

Plantag. an. M. j. vel M. ʒss.

Summit. hyperic. florent. M. j.

Rasur. Corn. Cerv. ʒss. vel ʒij.

Coque in f. q. Aqu. simplic.

Colatura ʒiix. ʒix. vel x. adde

Syrup. Corallor. Quercet.

De symph. Ferncl. Cydonior. an. ʒ

M. pro Potu.

De quo bis vel ter æger quotidie bonum haustum capiat, qualibet vice 8. vel x. xij. ad xv. guttas balsami sulphuris terebinthinati vel anisati simul assumendo.

Item balsamum Peruvianum præter hoc, quod vomitum in dysenteria molestum supprimat, etiam intestinis lēsis ad ʒss. mirè conducit. Propinatur in forma pulveris cum saccharo albo aut corallii præparatis mistum; vel in vitello ovi assumptum & dissolutum egregium est; sicuti etiam Clysteribus felici cum successu addi solet: Conf. M. A. N. C. Ann 3. Obj. 77. p. 127. & Ann. 8. Obj. 63. p. 106.

Item R. Herb. heder. terr.

Plantag.

Tormentill. an. M. j.

Fl. balauil. p. ij.

Ras. priapi ceti ʒij.

Coque in aqu. ferrarior.

Colatura ʒij. adde

Syr. corall. Querc.

De symph. Fern. an. ʒ iij.

M. S.

Ettmuller. Oper. Tom. II

Porio adstringens vulneraria pro aliquot vicibus.

Hæc sunt Interna, commendata in dysenteria.

iuxta hæc Interna, non negligenda Externa; quæ Inter Imprimis conveniunt interdum clysmata pro certis scopis injicienda: sed non adeò frequenter usurpentur, ne magis intestina irritentur, ac crebriora superveniant tormina.

Clysmata autem ista sunt aut temperantia acrimoniam humorum, adeoque simul anodyna, aut sunt consolidantia exulcerationem, seu intestinorum lesionem. Imprimis quando urget tenesmus, vomitus, tormina crasiorum intestinorum, tunc conveniunt anodyna clysmata, quæ & temperant, sicuti in fine morbi vulneraria usurpanda. Ea, quæ temperant, & vi anodynâ polleant, sunt clysmata ex lacte, vel solo, vel in quo saccharum injectum, injicienda tepidè: vel lac cui interdum ratione doloris incoquantur flores chamomille & aliquot capita papaveris, addito parum sacchari: vel clysmati ex lacte addantur theriacæ ʒij.; sic interdum lac chalybeatum, in quo dissoluta ʒss. plus minus sevi hircini, cum vitello ovi diluti, ne iterum concreascit, est elegans: e. g.

R. Lac. vaccin. vel simpl. vel chalyb. ʒj.

Sevi hirc. (quod est optimum; cuius loco etiam cervinum usurpari potest) ʒj.

Mixta injiciantur pro Clystere: S.

Clyster leniens.

R. Flor. melilot.

Sambuci,

Verbasc. an. M. j.

Cap. papav. cum sem. Nij. ad v.

Coque in f. q. lact. bubul. Chalybeas.

Colatura ʒj. adde

Theriac. ʒj.

Sevi cerv. vel hirc ʒss. ʒj.

Vitell. ovi q. f. pro solvendo sevo.

Misc. pro Enemate: S.

Ut antea.

Loco capitum papaveris addi potest Philonium Romanum ad ʒij. omisâ Theriacâ, vel laudani opiat. gr. ij.

Quibusdam expertum est clyisma, quod recipit lactis quantum sufficit, in quo decocta sint radix symphyti majoris & ciceres rubri: cui additur

Pingued. caprin. cum vitello ovi dissol. ʒj.

M pro Clysmate.

Porro etiam commendantur Clysmata vulneraria siue consolidantia, inter quæ imprimis commendo clysmata terebinthinata, quæ ad imitationem SYLVII L.L.C. 53. & BARBETTE, præscripta in affectibus intestinorum & uteri sunt singularissima: v. g.

R. Lact. rec. chalyb. ʒiv. vj. ad lxx. ix. & ʒj. (non in nimia copia: loco etiam lactis autumi potest Decoctum quoddam vulnerarium aut aliud appropriatum.)

Terebinth. in vitello ovi sol. (sic enim fatiscit in liquorem) ʒij. vel ʒiij. ad ʒss.

Mellis rosac. ʒss. vel ʒvj. ad ʒj.

M. f. Clyster: S.

Clyster sanans.

Cui etiam theriaca ad ʒj. vel ʒij. addi potest.

De hoc enemate dicit SYLVIVS: Tali enemate, & quidem unico, circa initium vel adeoque maturè injecto, curavi non semel dysenteriam cum puris dejectione conjunctam. Dabo aliud exemplum, quod habet BARBETTE in Praxi sua:

R. Terebinth. cum vitello ovi sol. ʒij.

El. diascord. Frac. ʒss.

Pulv. rosar. rub. ʒj.

Lact. vaccin. ʒviii.

M. pro Clysmate:

Quod idem ceu expertum commendat.

NB. Pulveres tamen Clysteribus admisti, dum quidam addunt terram sigillatam, trochiscos de carabe, rosas rubras, non adeò conveniunt; si enim remanent in intestinis, jisdem adherent, malum irritant & exasperant.

Hæc fuerunt clysmata anodyna temperata: sequuntur nunc vulneraria & consolidantia clysmata, qualia sunt abstergentia & mundificantia: v. g.

R. Herb. bursa pastor.

Plantag. an. M. j.

Rad. symph. maj. ʒj.

Coque in f. q. aqu. simpl.







## P A R S A F F E C T A.

*Pars affecta* est intestinum rectum, imprimis ubi anus cingitur sphinctere musculofo, ibi sensibile admodum est, & si leviter irricatur, Tenesmus adest.

## C A U S Æ.

*Causa tenesmi proxima efficiens formalis* est spirituum eo provocatorum impetus: Cujus *Causa occasionalis* est irritatio continua intestini recti, quod quacunque occasione ita stimulat & irritat spirituum vi se contrahit, & ita egestionem urget.

*Irritatur* autem intestinum rectum & stimulat vel per *consensum* ratione aliarum partium, vel per *essentiam*. Per *consensum* etiam observatur aliquid in nephritide seu dolore renum, quia tunc temporis sub motu calculi contingit tenesmus propter quosdam nervos ex plexibus mesentericis ad intestinum rectum derivatis, ex quibus etiam alii ad renes distribuuntur: Observavit id TIMÆUS Von Guldenklee, & ego etiam. Item calculus vesicæ, ubi lœmetur urethræ, in viris frequenter tenesmum inducit, pondere suo & irritatione colli vesicæ similiter irritans intestinum rectum: confer. HORSTIUS in suis Problem. pag. 70. Dec. 6. Quæst. 6 item TIMÆUS Von Guldenklee in Epist. p. 242. Adhæc mulieres propinquæ partui tenesmum interdum patiuntur, propter uterum incumbentem intestino recto.

Hi sunt Tenesmi per consensum.

Per *essentiam* frequenter oritur Tenesmus, si malum hæret in ipso intestino recto, primariò à muco tenaci acido seu pituita viscida acida, firmiter intestino recto agglutinata, & istud plus minus rodente, vellicante, hinc excoriant, & tandem planè exulcerante: quâ ratione ordinariò dysentericæ supervenire solet, propterea quod, quæ excernuntur, acida & acria corrosiva, & simul glutinosa, intestinis pertinaciter adherent. Item anus inflammatus similiter non rarò infert tenesmum; unde & hæmorrhoidibus cæcis, indeque plus minus tumentibus aut dolentibus, tenesmus, sæpe frequens comes, se associat. Pertinent huc etiam ascarides intestinum rectum mariscantes, & rodentes, qui ut plurimum etiam, si non semper, tenesmum inferre solent: vid. F. O. R. E. S. T. V. S. l. 21. Oðserv. 29. in schol. Tandem purgationibus violentioribus aut post aloen crudam sæpius usurpatam etiam supervenit Tenesmus, partim propter excrementa acriora excreta, & intestino recto nonnihil adhærentia, & illud plus minus stimulantia, partim verò propter particulas purgantes resinosas, visciditate suâ dicto intestino pertinaciùs adherentes & hoc continuo stimulant. Faciunt etiam hic omnes excoriationes, exulcerationes, aut fistulæ internæ intestini recti, pertinacem etiam Tenesmum junctum habentes.

## D I A G N O S I S.

*Diagnosis* est clara per se, imprimis ex relatione ægri.

## P R O G N O S I S.

Tenesmus ex se consideratus, leve est malum: si tamen habeatur causarum ratio, variat prognosis.

Nempè qui per consensum, est absque periculo; per *essentiam* verò subindè procidentiam ani inferre.

Interim si processerit, & non ritè curatur, inducitur excoriatio intestino recto, & non rarò in ulcus sordidum degenerat, quòd ulterius tandem facili in fistulam ani abit, difficulter sanabilem, sed per sectionem curandam: quales fistulæ hic locorum sunt raræ; in Anglia verò frequentes.

In gravidis gravior Tenesmus, si non semper, subindè tamen abortus est causa; vid. *Prognosis in Dysenteria*, & HIPPOCRATES *Sed. 7. §. 27.*; id quod confirmat la MONNIERE *de Dysenteria c. 5. pag. 169.*; nempè prægnans dysenterica Tenesmo correpta semper abortum patia est; & cum periculo, si grandior fuerit sætus.

## C U R A.

Cura varianda est pro causarum ratione: Ante omnia causa vellicans removeatur; unde & si per consensum fuerit Tenesmus, curato priori morbo & ipse evanescit. Interea opiat vellicatio intestini spasmodica maturè sistatur. Si per *essentiam* fuerit, imprimis causa materialis,

*Estmuller. Oper. Tom. II.*

humor acris, acidus & viscidus, corrigatur & abstergatur; Excoriatio verò inde nata aut exulceratio jam facta mundificetur, & denique consolidetur. Conveniunt ergo clysmata a mucum abstergentia, & vi anodynâ irritationem sistentia in pauca quantitate, nempè ad ℥ss. injecta, simul hæc vel ex simplici lacte, vel cū sevo hircino permisto. Nam & sctus lactis tepidi tenesmi molestiam lenit. Aliàs nudum Decoctum cicerum rubrorum cum floribus verbaschi instar Clysmatis cum sevo hircino, vel cum melle roseo injectum, cū & saltartaci additum, satis est conveniens: e. g.

℞. Flor. verbasch. Mj. vel ij.

Semin. cicer. rub. ℥ij.

Sal. Tart. ℥j.

Coque in f. q. Aqu. simpl.

Colatura ℥j. adde

Sevi hircini cum vitello ovi dilut. ℥vj. ad ℥ijss. vel ℥ij.

Mell. rosati ℥ss. vel ℥vj. ad ℥j.

M. pro Clysmate, pro duabus vicibus applicando: S.

*Clysmata lenitivum pro duabus vicibus.*

Formulam elegantem habebitis in SENNERTI *Praxi*, ubi de *Tenesmo*, quam etiam commendat D. MICHAELIS, in qua basis sunt lumbrici teretres, ex quibus parata Clysmata etiam in dysenteria sunt egregia: e. g.

℞. Flor. verbasch. Mj.

Rosar. rub. Mss.

Lumbric. concis. ℥j.

Sem. fœnugr.

Psylli an. ℥ij.

Coque in lacte recenti, ubi magis dolor leniendus; vel in sero lactis, ubi materia peccans abstergenda:

Colatura ℥j. adde

Mell. rosac. ℥vj. ad ℥j. vel ℥ijss.

M. f. Clyster pro duabus infundendus vicibus: S.

*Vt antea.*

Præ cæteris appropriatum remedium in Tenesmo est verbascum, seu, ut aliis vocatur, Tapsus barbatus, quocunque modo externè usurpatum, speciatim Decoctum ejus aut florum in lacte, cum spongia vel linteis multiplicatis instar fomenti ano admotum: nam dolorem lenit, acrimoniam temperat, fluxionem repellit, ac speciatim tenesmum quemcunque, etiam dysentericum, curat. Facit huc suffimigium ex verbasco & terebinthina Mynsichtii, quod egregiè convenit; vel sunt simul sacculi ex verbasco, foliis quercus & anserina, qui vel in lacte decocti, vel loco ejus in aceto fervido ebulliti, podici applicentur. Vel

℞. Herb. linar.

Verbaschi an. Mj.

Flor. chamom.

Verbasch. an. Mj. vel ij.

Include sacculo, in lacte chalybeato coquendo: D. S.

*Sacculus dolorem sedans.*

Æger in sella perforata Decocto ferventi insideat, & fumum exsurgentem excipiat; vel in lacte chalybeato cocta linteis multiplicatis calidè applicetur; vel includantur sacculo interpassato, & calidè parti dolenti admoveantur. Optimi clysteres sunt ex jure capitis aut carnis vervecinæ cum aliquot guttis olei destillati Philosophorum vel ceræ; hoc enim oleum ceræ mirabile est in exulceratione intestini recti, potenter abstergit & consolidat. Loco olei ceræ aut similium, etiam balsamum Peruvianum simili ratione applicatum, est efficax. Præter dicta & suffitus Tenesmum sistunt, in specie suffitus ex latere candefacto vel limatura Martis candente, aceto ferventi infuso, ano exceptus, à quibusdam etiam multum est commendatus. Aliàs sunt etiam suffitus ex thure, myrrha, galbano, nucæ moschata, rosæ & similibus: item fumus Decoctionis sabinæ ex aqua & aceto, lamine ferreæ aut lateri calefactis infusæ; pro sctu exceptus, est egregius. STOECKERUS in *Praxi* mirabiliter juvare dicit suffimigium de thure & pice, super carbonem vivos projectis. Quod si verò gravius urgeat Tenesmus, etiam possunt applicari glandes sive suppositoria, parata ex sevo hirci, vel melle inspissato, cui pilulæ de cynoglossa vel nonnihil de opio additum fuerit; quæ in gravi dolore Tenesmi ita applicanda: conf. AMAT. LUSIT. C. 3. Hist. 97. Sed vereor, ne sola applicatio suppositorii, irritando intestinum, malum exasperet.

Tandem, ubi nonnihil exulceratus fuerit anus, conveniunt Injectiones ex vulnerariis paratæ, illinendo postmodum cum oleo rosarum & lumbricorum terestrinum, probè



In mortario plumbeo agitatis; vel etiam cum solutione lithargyrii in aceto subactis & in linimenti consistentiam redactis; vel cum unguento populeo, de tutia, aut unguento diapompholygos, aut de cerussa camphorato; aut etiam dicta linimenta levi supposito ex sevo hircino cum pulvere thuris, tutia & similibus excepta ad mundificandum & consolidandum ulcus ita applicentur; vel *unguenti albi camphorati & diapompholygos ana*, cum pauca *terra vitrioli dulci rite parata*, subacta, & in consistentiam unguenti redacta, quocunque modo, vel linteis vel aliis applicatur, vel ano intruditur.

Denique ad consolidandum & mundificandum ulcus in Tenesmo enatum, oleū Mastiches optimè convenit ad aliquot guttas in aqua menthæ, plantaginis, aut pulegii exhibitum, quod valde laudatur, conferens etiam, si ex ipsa dysenteria fuerit malum. HILLERUS in C. I. Curat. 75. refert Tenesmum Chronicum & admodum contumacem, quem post multa alia frustranea curavit oleo vitrioli rubello in jussulo carnis exhibitio, à quo purulenta multa excreta fuerunt. Hæremus adhuc in Fluxibus alvi, & quidem in iis, in quibus excernitur sanguis. Ordine pergendum jam est ad

### ARTICULUM III.

#### DE

#### FLUXU HEPATICO.

**F**Luxus Hepaticus modernis rarissime visus, adeo ut ob id non pauci omnino dubitent dari reverà talem fluxum, utut hi, non quidem antiquissimi, sed majoris ævi, multa de eodem clamitent & scribillent, adeo ut etiam VARANDÆUS conscripserit specialem *Tract. de Hepatitide*, seu de hoc affectu, aut alvi fluxu vitio hepatis contingente.

Est veteribus hic fluxus hepaticus, quando nempe sanguis aquosus & imperfectus, tenuis, atque, ut vocant, loturæ carniū similis, absque dolore aut gravioribus symptomatibus per alvum copiose rejicitur.

Appellationis ratio desumpta fuit, prout à Veteribus describitur, ex præconcepta hypothese majorum, quod nempe hepar sanguificet; adeoque cum hunc fluxum oriri voluerunt ex deficiente sanguificatione in hepate, ob id eum fluxum Hepaticum vocarunt. Sed talis fluxus hepaticus Veterum est reverà non-ens; si enim exactè consideremus exempla eorum, qui referuntur hoc fluxu laborasse, ea longè aliud quid persuadent, scilicet. nil aliud, quàm fluxum hæmorrhoidalem, ex hæmorrhoidibus superioribus oriundum. Unde nunquam hepatis vitio hoc fieri dicendum est, cum hepar de sanguificandi munere jam sit depositum.

#### CAUSÆ.

Quod ergo attinet Diarrhæam cruentam, dysenteriam contra-distinctam, tres sunt tantum casus, in quibus Diarrhæa talis sanguinea indolens, Fluxus hepaticus Veteribus dicta, oriri solet: Nempe 1. quando uberius fluunt hæmorrhoides internæ & superiores, qualem sub nomine hepatici fluxus intelligit BARBETTE in sua *Praxi*.

2. Quando talis fluxus remanet post dysenteriam, jam curatam, in qua propter depauperatam massam sanguineam, & excoctam interiorem intestinorum membranâ, vasa sanguifera excoctata nondum perfecte consolidata; sic enim etiam subinde aliquid de sanguine tenuiore transudat, & sic indolens talis sanguinea Diarrhæa, & ut SYDENHAM vocat, Dysenteria habitualis, superesse solet; unde dysenteriam superveniens fluxus cruentus, nullo modo talis fluxus hepaticus statuendus.

3. Quando quacunque occasione vasa quædam sanguifera in intestinis, vel per anastomosin, vel per diarræsin, aperiuntur, & ita hæmorrhagiam intestinalem excitant.

Eadem etiam causæ internæ, quæ v. g. hæmorrhagiam nativam excitare valent, eæ etiam similem hæmorrhagiam intestinis inferre valent, in specie acrimonia sanguinis, perforans plus minus orificiola intestinalium vasorum; quæ causa est promptior, quò serosus magis sanguis simul exsere solet: qualis affectus exemplum suggerit DEODA-

TUS, qui fluxum hepaticum ac diarrhæam cum fluore uterino & profluvio Mensium immodico in vna femina simul observavit in *Viteudiu. pag. 231*. Conf. etiam BONTIVS de *Medicina Indorum p. 24*. Quà ratione etiam hæc pertinet Dysenteria notha scorbuticorum, cuius facta est mentio supra, nisi & hæc forsitan ad hæmorrhoides pertineat. Adhæc ex suppressione consuetæ cujusdam sanguinis evacuationis etiam fluxus cruentus talis oriri potest. Quò pertinet Observatio FORESTI l. 22. *Observat. 20*. de fluxu sanguinis puri ex vita otiosa, & sanguinis naturæ fluxu usitato suppresso, venæ sectione in brachio curata. Sic ZACVTVS LVSITANVS lib. 2. *Medicæ Princip. Histor. 84*. observat sanguineum fluxum hepaticum in iis, in quibus artuum aliquis præcisus; item ab omiſsa exercitatione solita, & similibus causis: quæ quidem coacervare possunt sanguinem utilem, & ita dare occasionem, ut quocunque in loco erumpat, non autem possint inducere verum hepaticum fluxum. Exemplum talis proponit DEODATVS l. a. *pag. 217*, non minus quàm BORELLVS Cent. 1. *Obs. 99*. Tandem occasione insignioris cujusdam & confirmatæ obſtructionis in quodam viscere abdominis, propter impedimentum circulationis sanguinis interdum arteriæ mesentericæ aperiuntur in intestina, & talem fluxum cruentum excitant. Quò pertinet BARTHOLINI *Histor. 41*, Centur. 6. ubi notat cruentas dejectiones, supervenientes Mesenterii obſtructionibus salutares. Sic sanguinis miros fluxus in lienosis videbitis recensitos in MARCELLO DONATO l. 4. *Histor. Med. Mirab. cap. 9*. Quò facit *Observat. 20*. FORESTI l. 22. in *f. bol. excretionis sanguinis viri*, in indurato splene facta salutaris. Adeo ut de fluxu Hepatico, & ipsi simili, meritò dubitent Moderni, cum rarissima, imò serè nulla, proſtent exempla. Ob id BARBETTE l. a. vult, quòd talis fluxus, dictus Hepaticus, sit tantummodò apertio superiorum venarum hæmorrhoidalium, per quas evacuetur sanguis, & subinde per anum defluit, & effluit: quæ sententia etiam mihi videtur verissima.

Quibus tamen placet defendere talem fluxum, qui à Veteribus vocatus fuit Hepaticus, ipsi nullam aliam possunt assignare Causam, quàm nimiam sanguinis aquositatem & tenuitatem, ob nimiam feri abundantiam, quod ipsum abundans serum in tantum tenuem, & fluxilem redat massam sanguineam, simulque vasa sanguifera, imprimis mesaraica copiosiora adeo laxet, ut exinde sanguis aquosus, per vasa laxata facile & copiose transudare possit.

Vnde remota causa erit partim Chylificatio laesa, partim feri excretio vitiosa seu impedita. Chylifica io laesa, quando aut copiosis assumptis potulentis aut alia quocunque ratione chylus non lacteus & legitime consistit, sed tantummodò tenuis, aquosus & admodum fluxilis generatur. Vnde si postmodum vel vitio renum vel vitio debetæ motionis corporis, vel alia quacunque ex causa supprimitur feri excretio, non potest non exinde subsequi sanguis aquosus & facile transudabilis. Sed, uti dixi, verissima est sententia eorum, qui statuunt, quòd non reverà sit talis fluxus, sed tantum oriatur ex apertione venarum hæmorrhoidalium superiorum: de quo paulò post plura.

#### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa diagnostica: per se patent.

#### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Eandem similiter statuunt, quæ solet statui in fluxu nimio hæmorrhoidum, aut aliis præternaturalibus sanguinis excretionibus: scilicet excretio nimis copiosa & frequens sanguinis tandem corpus ad cachexiam, hinc hydropem, tabem & similia symptomata necessarîo disponit, ut propterea fluxus hepaticus dictus, in juvenibus interdum difficulter, in senibus verò nunquam serè aut raro curetur. Præsupponit semper scilicet in corpore vitium, à quo ipso fluxus dependet, & cuius respectu magis vel minus curabilis evadit.

#### CURA.

Quod attinet curam: pro causarum antecedentium seu remotarum varietate variat; aliàs eadem est, quæ reliquarum hæmorrhagarum: Conveniunt etiam eadem remedia styptica, quæ vel in diarrhœa usurpantur, vel quæ



ad nimium hæmorrhoidum fluxum adhibentur, vel denique, quæ alias hæmorrhagias quæcunque in genere suppressimere solent: unde si sit hæmorrhoidum apertio, harum lege curetur, præsertim per martialia, in specie per tincturam sulphuris vitrioli. Si sequitur dysenteriam, eadem est Cura, quæ dysenteriz levioris.

In specie, quæ ad fluxum suppressendum commendantur, sunt imprimis ex tormentilla, plantagine, fânica, coralliis, agrimonial, & ex urtica majore petita remedia: succus plantaginis, portulacæ, & succus urticæ majoris, uti quemcunque sanguinis fluxum sistunt, ita in specie ad fluxum hepaticum commendantur: quibus si misceatur succus fâniculæ, eo est convenientior. Cum his succis mitti sy-cupi coralliorum, item papaveris albi, eorum vires intendunt. Conveniunt etiam Martialia, quæ omnia per se semper adstringunt, tam terra Martialis in mineris Martis frequens, quàm etiam crocus Martis adstringens, & lapis hæmatites cum succo granatorum; aut tinctura sulphuris vitrioli sive tinctura Martis adstringens: de quibus alibi; quia præparationes eorum sunt variz, adeoque habendus delectus. Agrimonia sive Eupatorium specificum est: Poteril, qui dicit, se Decocto Eupatorii desperatam Hepatitidem curasse. Cum hoc Decocto sive parata essentia ex succo Eupatorii (non ex herba sicca, uti procedunt Pharmacopœi) si misceatur tinctura sulphuris vitrioli, aut legitima lapidis hæmatitis tinctura (quæ parci manu administratur) erit Mistura maximè conveniens; v. g.

*R. Essent. agrim. dicto modo par. 3j.*

*Tinctura sulphuris vitrioli 3ij.*

*Essent. anod. cum succo cydon. (de quo suo loco) vel quæcunque modo parat. 3j.*

*M. S.*

*Tinctura adstringens.*

Dosis 30. guttulæ.

Non sine ratione addo essentiam opiatam, propterea quoniam Practicorum Observationibus constat, fluxum hepaticum post dysenteriam laudari opiatum usu curatum. Unde opiatum non negligenda. Id quod affirmat etiam BONTIUS in *Medic. Indorum* c. 4. qui dicit, optimum remedium ad fluxum hepaticum esse extractum opii vel croci.

Si acrimonia plus minus serosa dictum malum inducat, Rhabarbarina, item vulneraria & adstringentia cum opiatis conducunt: hinc terræ, de quibus res nota est, quod adstringunt ut terra sigillata, Corallia, Trochisci de Carabe, unicornu fossile, &c. conveniunt. Sed, ut obiter moneam, due sunt species, quæ unicornu fossile veniunt nomine. Prima species reverà sunt ossa animalium calcinata, calcinatione vaporosa à vapore humido & calido à terra elevato: Videbitis etiam in officinis materialium, quod talia ossa dentur perfecta pro unicornu fossili, quæ linguz adherent instar Corn. Cerv. utli, adeo ut non sint habenda pro vero unicornu fossili in hoc affectu proficuo. Altera potius species, quæ est verum unicornu fossile & species margæ, quæ interdum superveniente spiritu salino coagulatur, ut in veram abeant duritiem lapideam, ita tamen, ut quasi per cancellos sit divisa nunc marga nunc concretum ejus lapideum. In hac pars mollis, lingua admodum adherens seu marga, adhibenda in fluxu hepatico. Item non inconsultum est ad sudores & sudorifera decurrere ad imitationem VARANDÆI, qui l. c. pag. 173. dicit: *Quidam putant in progressu morbi non inutile esse sudores Decocto quodam, ut ferunt Mili; radicis china vel sursaparilla, provocare, quia sudores alvi fluxum imminuere solent, rapidius sum serosa materiam, hepatis calefaciunt, quod experiri non erit inutile: Si enim æger sudet, & leviter id ferat, magna erit salutis spes, minorisque in hepate noxæ signum. Nam quicunque magna hepatis imbecillitate, scirrhus aut obstructione tenentur, vix unum sudoris guttulam emittere possunt. Pro hoc scopo lignum lentiscinum, ex quo fluit Mastix, item lignum cotoneum, decoctum instar aliorum lignorum & propinatam singulariter commendatur in hoc morbo; Nam, ut rectè dicit VALLANDÆUS: *circulo loco*, ubi contumacior fuerit hic morbus, quod etiam tunc temporis necessum sit accedere ad Decocta lignorum, ut istorum beneficio provocatis sudoribus minus fluxilis evadat materia sanguinea, & ita minus possit transudare per intestina. Porro gelatina Corn. Cerv. parata vel in succa cum aqua cinnamomi, à LINDANO in tali casu tanquam experta commendatur.*

*Etmuller. Oper. Tom. II.*

Denique passulæ singulariter in hoc morbo conveniunt; hæ enim multum faciunt ad laudabilem sanguinis crasin, & æquabilem fermentationem conservandam: In passulis quippè multa latitant, quæ aut sanguinis dyscrasiam, aut ejus vulgò sic dictam temperiem corrigunt; sunt enim reverà mustum concentratum, quod blandè fermentando multum valet ad corrigendam vitiatam sanguinis fermentationem. Facit huc *Observat. 20. l. 22. FORRESTI*, ubi nil aliud ægrum vexavit, quàm talis diarrhœa cruenta, ex sanguine acriore nata. Casus est hic: Quidam sanguinem purum rejiciens, adeoque excoarctatione cum paucis ventris torminibus & tussi valida, cum expectoratione humoris crudi & urina suppressa, hac sola Portione curatus, quæ lubricat, mitigat dolorem, & urinam provocat:

*R. Fol. Malvæ,*

*Violæ. an. Mj.*

*Herb. hyssop. Mss.*

*Radii. liquirit. rose 3jss*

*Fânicul.*

*Petroselin.*

*Puar. pass. an. 3j.*

*Pruna Damasc. No. xv.*

Coque in *Cerevisia*, quæ continuò utens æger sanabatur.

Nec abludit cura PETRI IOHANNIS FARRI, qui notat fluxum hepaticum ex potu aquæ frigidæ & usu lactucarum cum aceto multo, curatum, præmissâ purgatione ex extracto Rhabarbari, syrupo coralliorum cum aqua cinnamomi sapidis sumpta.

Quod si suppressa quædam sanguinis excretio malum induxerit, hac in ordinem revocatâ, & interea Venæ sectione revulsoriâ institutâ, curetur.

Quod si tandem impedimentum sanguinis circulo ex infarctu aut tumore visceris injiciatur, hoc, quantum possibile, sublato, & venæ sectione revulsoriâ administratâ, fluxus cruentus sufflaminandus erit.

Sed pergo. Notum est, ut dixi, Modernorum sententiam esse, quod fluxus hepaticus sit reverà apertio venarum hæmorrhoidalium superiorum; quare me convertito ad

## ARTICULUM IV.

### DE

### HÆMORRHOIDIBUS.

IN quibus plura se offerunt agenda. Hæmorrhoides, quoad vim erymi, nihil aliud notant, quàm quemcunque sanguinis fluxum: propriè tamen usurpatur tantummodò de fluxu sanguinis ex externis venis ani seu intestini recti; vocatur Germ. *vena aenea*, quia solum ad usum ægrorum vasa hæc stillant sanguinem, quæ vasa sunt venæ & arteriæ; secundum leges circulationis sanguinis. Dantur quidem etiam Hæmorrhoides muliebres, si evacuatio sanguinis ex vasis externis vulvæ: de quibus tamen, eùm non sint hujus loci, inter morbos mulierum agendum.

Hæmorrhoidalia hæc vasa, ratione insertionis in intestinum rectum, sunt duplicia: nempe hæmorrhoides superiores seu internæ, & inferiores hæmorrhoides seu externæ. Externæ extrinsecè podicem lambunt: utraq; confluunt arteriam ac ejus sociam venam.

Quoad originem, arteria hæmorrhoidalis superior seu interna oritur ex arteria mesenterica inferiore; vena verò superiores sive internæ oriuntur ex ramo mesenterico sive vena splenica venæ portæ: unde dixerunt veteres, sed falsò, per hunc ramum mesentericum evacuari splenem per hæmorrhoides; cui tamen asserto repugnat lex inviolabilis sanguinis circulationis.

Quoad vasa hæmorrhoidalia externa sive inferiora, horum arteria quidem oritur ex trunco hypogastrico arteriæ iliacæ internæ, quæ arteria hypogastrica, præter venam hæmorrhoidalem, copiosos ramos ad uterum mittit: Venæ verò externæ oriuntur ex vena cava nempe ex ductu ejusdem hypogastrico, ex quo etiam vena pudenda, item vena, quæ ad musculum clunium, item vena, quæ ad intestinum rectum derivatur, & hæc sunt hæmorrhoides externæ. Iam verò eùm ex hoc ramo hypogastrico, arterioso pariter ac venoso, deriventur etiam in mulieribus vasa ad collum uterinum, per quæ vasa in iisdem sit excretio menstrua, adeo ut ista vasa hæmorrhoidalia ad anum, & vasa menstrualia uteri, oriuntur ex



uno tempore, exinde facillè patet, qui fiat nonnunquam, ut sæpius in mulieribus menstruationis defectus compensetur fluxu hæmorrhoidum; siquidem interdum in habitioribus post 48. annos ordinario menstruo fluxui succedunt hæmorrhoides, interdum mensium obstructorum loco fluunt hæmorrhoides. Exemplum vid. in HORSTII. *Observat. lib. 4. Observat. 12. & Probl. Decad. 6. quest. 8*: Conf. BARTHOLINUS in *Ass. Med. Hassniens. Vol. 1. pag. 165*. Subinde etiam cum mensibus, sed raro simul fluunt hæmorrhoides: Conf. M. A. N. C. *Ann. 2. Observ. 24. pag. 39*.

Antequam ulterius pergamus, melioris doctrinæ ergo ante omnia differentiz hæmorrhoidum sunt attendendæ: nempe hæmorrhoides in genere sunt vel *furentes*, vel *fluentes*: Illæ sunt dolentes, & alio nomine dicuntur *cæcæ*, ex eo, quoniam non sunt apertæ, sed oculis quasi clausis connivent; unde propter clausuram suribundè dolent & tument. *Fluentes*, sive alio nomine *apertæ* dictæ, sunt, quæ apertè sanguinem fundunt, & nunc confertim rivuli instar, nunc successivè guttatim effundunt: Prius si fiat, signum est affectæ arteriæ: si guttatim & pedetentim effluat, venæ sunt affectæ, sicque sit excretio, maxime si fæces alvi ejiciuntur, tunc enim ante excretionem conatus est pressorius. Hæmorrhoides hæc fluentes sunt vel spontaneæ, vel non spontaneæ: *Spontaneæ* sunt beneficium naturæ se ipsam exonerantis, in morbis chronicis oriuntur, vel apparent, & subinde in apparenter sanis cum euphoria solent emitti; idèd Germanis vocatur, *Vena aurea*. Hæmorrhoides non spontaneæ sunt vel criticæ vel morbidæ: *Criticæ* sunt, quæ morbum acutum in declinatione beneficium naturæ se ipsam exonerantis solvunt, adeoque salubres sunt: *Morbidæ* verò sunt, quæ maleficio sanguinis aut propter quæcunque causam in perniciem ægri in morbi principio oriuntur, irritatâ naturâ ab impetu causæ morbificæ, adeoque sunt nocivæ & præternaturales. Hæmorrhoidum fluxus subinde est frequens viris, raro quidem nostris, magis autem Italis; in his enim, viris nempe, hic fluxus hæmorrhoidalis quasi vicarius est menstruationis muliebris. Hinc enim prostant exempla virorum, per statas periodos hæmorrhoidum fluxum patientium, ita ut interdum singulis mensibus, interdum singulis septimanis, nonnullis in viris redeant: ob id etiam alio nomine hæmorrhoides fluentes dividuntur in *erraticas*, quæ in salubres, & *periodicas*. *Erraticæ* sunt, quæ nullum certum recursus tempus observant: *Periodicæ*, quando eadem, imprimis in viris, certâ & singulari periodo, recurrunt; qualis periodationis hæmatodes exempla in viris videb. in M. A. N. C. *Ann. 4. Obs. 44. & 69*, item in AMATO LUSITANO C. 5. *Cap. 3*. de viro, qui singulis mensibus per hæmorrhoides habuit evacuationem instar mulieris per uterum: imò, quod in quibusdam viris suppressus mensruus hæmorrhoidum fluxus periculofam hæmoptysin in iis induxerit. Mulieribus etiam interdum, utut raro, accidunt hæmorrhoides, sed tunc temporis ut plurimum ex conjunctæ sunt cum vitio mensium, quod vel supprimantur, vel naturali regula emanferint, quia tunc superveniunt hæmorrhoides loco menstrui. In his autem subjectis, ubi sunt, nunc certus ordo observatur, nunc sunt sine ordine. Aliquot scio exempla, quod in habitu corporis succulentiore & turgidiore partium post 40. annum, quando naturaliter fluere desinunt Menses, superveniat fluxus hæmorrhoidum periodicus, ita ut, cum in his certâ periodo fiat evacuatio per uterum, hanc naturaliter cessantem insequatur hæmorrhoidum fluxus. Imò interdum à junioribus ex mensium obstructione præternaturali oriuntur hæmorrhoidales fluxus, fluentes periodicè, qualia exempla subministrat HORSTIUS l. 3. *Observat. 45*. In gravidis pariter, quibus naturaliter connivent Menses, interdum superveniunt hæmorrhoides, mensium loco in gravidis fluentes: exemplum habet SCHNCKIUS l. 3. *Observat. de Hæmorrhoidibus*. Id quod fuit per apertas hæmorrhoides, ordinariè est sanguis, similis cætero in corpore sanguini, adeoque nunc floridus, nunc obscurus, nigricans: interdum tamen loco sanguinis etiam alii excrementi succi, v. g. humor, vel albidus & aquosus, nonnihil viscidus, aut etiam aliz variz aquositates, sub hæmorrhoidum forma per has venas emulgi solent; quæ ipsæ mucositates hæmorrhoidales sunt similes fluori albo in mulieribus, qualis hæmorrhoidum fluxus nothi, ut sic dicam, exempla videb. in SENNERTO, ubi de Hæmorrhoidibus p. 427. item SCHNEIDERO l. 3. de Catarrh. cap. 7. pag. 270. & seq. item

M. A. N. C. *Ann. 1. Observat. 75. pag. 180*. Interdum, etiam aqua citrina, & loturæ carniū similis, aut similis aquositas, effluit in istis hæmorrhoidibus, quas vesicales appellant: Vid. FORESTUS l. 23. *Observat. 5*. sic fluxum hæmorrhoidum ichorodes, ejusque curam, videbitis in VELSCHII *Hecatoest. 2. pag. 62*.

Effluunt autem interdum hæmorrhoides spontè citra arbitrium aut intentionem ægri: observavit tamen contrarium Panarollus Pentec. *Observatio. 47*. de quodam, qui, si voluit, ex intentione intensè potuerit promovere & sistere hunc fluxum hæmorrhoidalem.

Hæc sunt hæmorrhoides fluentes.

Quod attinet Hæmorrhoides *furentes* seu *cæcæ*: hæc sunt nihil aliud, quàm incipiens inflammatio ani; ordinariè enim ferè insequuntur se mutuo, ex impedito sanguinis fluxu & refluxu per venas hæmorrhoidales: sanguis enim evacuandus, dum propter clausuram osculorum in istis vasis, & fibrarum vellicatarum stricturam, non potest excerni, nec remeare, necessariò stagnat, stagnatione partium porulos arctat, & in iis subsistit, atque sic tumorem ac inflammationem inducit, sicut alias omnis inflammatio oritur ex impedito sanguinis motu, de quo alibi; unde hæmorrhoides interdum suppurantur, & in abscessus ani periculosos degenerant; hinc impedito in his sanguinis motu, tumores & dolores gravissimi superveniunt. Talis ergo cæcarum hæmorrhoidum status est admodum dolorosus, adeo ut in tali casu ægri dicant, esse ita dolentes, quasi perforetur pedes ferro candente: & quando volunt excrementa alvi excernere, propter ingentem dolorem sæpius animi patiantur deliquia: Imò dum internæ ita affectæ sunt hæmorrhoides, ex præterlabente stercore interdum tales oriuntur dolores, ut etiam convulsiones superveniant. Scio egò exemplum mulieris hoc in loco, quæ, quando volebat excernere alvi excrementa, in animi deliquium cum faciei tumore, rubore & incallescencia incidebat ex iisdem hæmorrhoidibus cæcis: simul ac verò excreta fuerunt stercorea, cessabant omnia talia symptomata: Conf. BARTHOLINUS C. 4. *Hist. Anat. 40. pag. 320*. Externæ taliter affectæ præter dicta symptomata, tam sessionem quàm ambulationem admodum molestam reddunt.

Hæc venæ ergo hæmorrhoidales cæcæ ex sanguine stagnante, & in hoc loco coæservato, sæpe insignem contrahunt tumorem, imprimis in externis, qui tumor subinde ad insignem magnitudinem foras prominet, adeoque referat LINDANUS in *Coll. manuscripto super Hæmorrhoidibus*, se observasse hæmorrhoides cæcæ in tantum tumorem auctas, ut pugni instar extra anum foras prominere. Sub isto tumore subinde variam magnitudinem atque figuram vasa hæmorrhoidalia repræsentant, unde à figuræ varietate etiam varia nomina sortiuntur, & pro ut vel verrucas, vel uvarum baccas, mora, ficus, &c. repræsentant, etiam hæmorrhoides nunc *verrucales*, nunc *uvæ*, nunc *ficæles*, aliàs *marjicæ*, appellari solent. Tumor ergo hic variformis cum sit, cauto opus Medico est, ne confundantur hæmorrhoides dolentes cum verrucis, cristis, aut condylomatibus ani; de quibus vid. RIVERRIUS in *Prax. cap. de Hæmorrhoidibus*. Tales hæmorrhoides cæcæ & tumentes nunc spontè disparent, nunc perseverant, nunc aperiuntur, nunc fluunt: Imò si sanguis stagnans non discutitur, aut dissolvitur, spontaneâ coagulatione indurantur & in perfectos scirrhus abeunt, qualia exempla non sunt pauca; vel suppuratè degenerant in abscessus, ex quibus oriuntur ulcera mali moris, & non raro fistulæ. Prostat exemplum intestini recti ex tumore hæmorrhoidum cæcarum scirrholi, imprimis à SANCHEZ in *Observat. pag. 377*. de muliere mortua ex hæmorrhoidibus cæcis diuturnis, quæ ipsa post mortem dissecta ostendit intestini recti terminum 6. digitorum longitudine ad anum usque scirrholum & induratum: simile exemplum vid. in RIVERRIO l. 3. *Observat. de Dolo. & Inflammatione hæmorrhoidum*. In tumore durum degenerantium. Item hæc hæmorrhoides cæcæ ex sanguinis inclusi constitutione nunc mites sunt & benignæ, nunc malignæ, cancröse, gangrenosæ, &c. Effluunt autem hæmorrhoides imprimis citra voluntatem aut intentionem ægri, & spontè naturæ: nihilominus consuetudo, ceu altera natura, est adeo potens, ut etiam hæmorrhoides voluntariò fluentes reddere queat: Exemplum habet PANAROLLUS *Pentec. 2. Observ. 47*.



de senē, qui cū iam juvenis laborasset fluxu hæmorrhoidum salutarī, in tantum sibi reddit familiarem eundem, ut, cū in senectute se aliquo modo malē haberet, pro voluntate intensē potuerit promovere & sistere hunc fluxum hæmorrhoidalem, prout ipsi libuerit.

## P A R S A F F E C T A.

*Subiectum* est podex seu inferius orificium intestini recti ratione vasorum sanguifluorum.

## C A U S Æ.

*Causæ* affectuum hæcenus recensitorum hæmorrhoidalium, ut sanguis vel fluat vel stagnet, sunt vel internæ, quæ promovent, ita ut quasi sua sponte superveniant; vel externæ, dum variè afficiuntur ista vasa ab externis occasionibus.

Quoad *causas internas*: quocunque modo accidunt hæmorrhoidalia pathemata, omnia sunt præter naturam, cum hæmorrhoidales affectus naturaliter nemini contingant, adeoque semper eorum affectus præsupponat itatum præternaturalem & morbidum. Hinc sicuti mulieribus vitio mensium supervenire solent; ita viris non nisi hypochondriacis, aut exinde scorbuticis vel splenicis; uno nomine: Melancholicis affectibus ab acido vitioso natis, accidunt. Hinc rectè notat FORESTUS lib. 23. *Observat. 7. in Schol.* quod ijs, qui laborant hæmorrhoidibus, color faciei ad viridem nonnihil colorem declinet, teste AVICENNA: id quod in multis aliquando advertentes, solo hoc signo inducti, eos hæmorrhoidibus laborare pronuciavimus. Nempe semper præsupponitur vasorum illorum stimulus, vel irritatio, vel spina ipsæ infixa, h. e. fermentum salinum in sanguine ejusque sero præternaturale, quod quacunque occasione vel hæreditario ex vitio, vel ex præcedentis causis morbofis contractum, nunc externæ occasionis, nunc solennis cujusdam sanguinis evacuationis suppressæ causæ, ad ista loca delatum, vellicando loca ista sensilia, imò & fibrarum nervearum stricturæ, sanguinis stagnationem seu coacervationem, hinc tumorem plus minus inflammatorium, tandem dolorem intensissimum ac fluxum infert: Uno nomine: quæ sunt causæ, quare subindè crebriores & chronicæ hæmorrhagiæ narium, sive habituales aliæ sanguinis evacuationes quosdam affligunt, ex etiam sunt causæ hæmorrhoidalium pathematum, cū non, nisi excretionis loco, differant. Conf. de tali fermento vitioso, quod acri suo stimulo hæmorrhoidales affectus concitet, elegans consilium CNOFFELLI in M. A. N. C. Ann. 5. §. 6. *Append. pag. 1.*

Quoad *causas externas*: sunt ex variz, motus nempe aut agitatio sub equitatione vel uestione paulò laboriosior, cursus diuturnus, saltatio, purgantia, & similia, quæ tam in non dispositis, quàm imprimis in dispositis, pathemata hæmorrhoidalia inferunt. Fœminæ etiam in ultimis gravidationis mensibus, aut etiam, ubi difficili laborant partu, cæcas incurrunt hæmorrhoides; in utroque enim casu motus sanguinis circa uterum & anum non nihil impeditur; partim vasa propter uterum angustata, in causa sunt, quod tumeant vasa hæmorrhoidalia, cū podex imprimis non parum patiat, & ita occasio subministratur, ut stagnet in venis hæmorrhoidalibus, quæ stagnatione tumefacta vasa, & inflammata pars, dant hæmorrhoides cæcas dolentes: utut non observari ex tali casu natas hæmorrhoides, nisi in istis, qui ad hypochondriaca seu Melancholica pathemata sunt proclives. Ac sanè, quod crebrius pariunt mulieres, eò magis hos affectus exasperant. Purgationes quoque vehementiores non raro inducunt hæmorrhoidalia pathemata, partim ac præcipue, quando particulæ medicamenti purgantis resinose acres intestino recto visciditate suâ pertinacius adherent, illudque stimulant, quæ occasione de facili dolor & inflammatio oriri solet; partim quando purgatione acres & salini evacuati humores circa intestinum rectum non raro dolores excitant, & ibidem vellicando occasionem subministrant apertionis venarum hæmorrhoidalium. In specie hic accusari solet aloc, quasi venarum ora aperiat, & hæmorrhoides cieat. Effatum hoc est ARABUM, à LEONHARDO tamen FUCHSIO, & IOHANNE IACOBO MANARDO, minus Arabibus faventibus, hoc rejicitur: sed reverà commune hoc est

*Etmuller. Oper. Tom. II.*

quibusvis purgantibus magis resinosis, ut in dispositis hæmorrhoides concitent: Sic MANARDUS in *Epist. Medicin. l. 12. Epist. 3. pag. 226.* ex potu rhabarbari id observavit in viro, quod etiam de sennatis & scammoniatis à se observatum refert SCULTETUS in *Artem. Chirurg. Observ. 76.* Nimia etiam sanguinis intestina commotio, v. g. nimia iracundia, uti quibusdam hæmorrhagiæ narium, ita prædispositis ex causa interna, vel ex vasorum & intestini recti relaxato tono, hæmorrhoidales affectus infert.

Ex quibus patet, quod causa hæmorrhoidalium affectuum omnium sit tantum sanguis evacuandus; idque vel propter quantitatem sponte naturâ evacuandus vel propter qualitatem, nempe sanguinis agitatione, iracundia, vel simili motu factus turgescens emittendus: maximis enim iracundiis supervenire solent hæmorrhagiæ narium: sicuti interdum externæ causa irritans ad hos ipsos affectus disponere potest, v. g. suppositoria acria, frictiones fortes, violentior digitorum in anum intrusio: Vid. HORSTIUS l. 5. *Observ. 16.*

## D I A G N O S I S.

Quoad signa: Lumborum dolor sine manifesta causa ex febre, hæmorrhoidum instantium est signum: Vid. GABELCHOVERUS *Cent. 1. Curat. 65. Annot. pag. 98.* Distinguendus ante omnia fluxus hæmorrhoidalis verus à *Diarrhæa cruenta scorbuticorum*, quæ aliàs vocatur *Dysenteria scorbutica mandosa*: de quo videndus in specie HORSTIUS l. 7. *Observ. 38. pag. 393. & 394.* ubi fit mentio fallacis hæmorrhoidum fluxus, scorbuticis familiaris: qui ipse in hoc differt à vero fluxu hæmorrhoidum, quod hæmorrhoides veræ attritu excrementorum imprimis aperiantur, & etiam cum excrementis unâ sanguis evacuetur; ob id etiam raro solet excerni sanguis, antequam excrementa prodant: sin verò fiat, ut promiscuè excernatur sanguis tam ante quàm post excrementa; vel etiam longè post excretionem sine dolore, torminibus, &c. copiosus sanguis effundatur, tunc suspicionem potius esse, numne sit scorbutica evacuatio, quàm fluxus hæmorrhoidalis? Aliàs color faciei ad viriditatem inclinans pathognomonicum signum est hæmorrhoidibus laborantium, teste FORESTO.

Deindè signa hæmorrhoidum tamentum distinguenda à condylomatibus, cruris, verrucis, & aliis ani affectibus: Vid. imprimis in RIVERII *Pr. pag. 417. de hæmorrhoidibus cæcis l. 10. cap. 11.* Nempe à Rhagadibus distinguuntur: quod hæc sunt fissuræ ulcerosæ, à condylomatibus, quatenus hæc rugarum podicis intumescens oblongæ ejusdem cum reliqua illius substantia sint, & extra venarum quoque loca compareant; cū hæmorrhoidum eminentiæ magis rotundæ, nigrae, & in venarum tantum extremitatibus existant: à thymis sive verrucis, quod hæc sint tubercula exilia & carnosæ, qualia etiam in genitalibus utriusque sexus ab impuro coitu exoriri solent, flores thymi figuræ æmulantia, coloris candidi aut subrubri, ac doloris expertia: à ficis, quatenus, quamvis hi tumores pariter lividi & dolorosi sint, carnosissimi tamen magis observantur, cū hæmorrhoides nihil, nisi venæ sanguine turgidæ sint.

## P R O G N O S I S.

Quoad Prognosin: certum est, hæmorrhoides tam fluentes quàm furentes esse præternaturales.

Observanda autem distinctio hæmorrhoidum suprà allegata: nempe criticæ aut spontaneæ, non nimis, sed parcæ, debite & periodice fluentes, sunt saluberrimæ: nam teste experientia & autoritate veterum, præservant & curant morbos, vulgò melancholicos dictos, aliosque graves chronicos, uti sunt affectus hypochondriacus, mania, melancholia hypochondriaca, scorbutus, scirrhi ac tumores viscerum, & similia mala; & quando sunt loco menstruationis muliebris, sunt similiter salutares. Sic exempla virorum longævorum ex hæmorrhoidum periodico fluxu videb. in M. A. N. C. *Ann. 2. Observat. 192. p. 294. Ann. 4. & 5. Observat. 44. pag. 39. & Observat. 69. pag. 57.*

E contra clausæ vel intempestive suppressæ dictos morbos exasperare solent: sicuti in scorbutico suppressæ hæmorrhoides mortis causa observatæ; vid. M. A. N. C. *Ann. 3. Observat. 331. pag. 543.* HIPPOCRATES



14. epid. 1.31. & 16. Aphor. 12. HORSTIUS 1.2. Observ. 26. & HIGMORUS Anat. p. 256.

Hinc suppressæ hæmorrhoides, quæ semel ac iterum fluxerunt, nunc sovent, nunc exacerbant chronicos morbos, præsertim arthritidem, quæ ab iisdem fluentibus non parum levatur.

Verum ubi fluxus hic fuerit nimius & copiosus admodum, eadem imminet pericula, atque quæ hæmorrhagiam nimiam quamvis solent insequi; nempe univetsum corpus debilitat, ad hydropem, tabem, similesque affectus disponit, in specie viros ad exercitium Venerem omnino impotentes reddit, cum magno feminarum tædio: conf. hic in *Prognosi* simul HIPPOCRATES *Secl. 6. Aphorif. 11. 12. 13. 21.*

Imprimis notandum est, quod diuturnas curanti hæmorrhoides incumbat, ut una harum servetur aperta, quia aliàs varii morbi imminerent corpori: conf. DEODATUS in *Valerud. p. 93.* item HORSTIUS in *Probl. Decad. 6. Quest. 8.*, quod illustrat *Obs. AMATI LUSITANI Cent. 5. Curat. 3.* ubi ex menstruo hæmorrhoidum fluxu suppresso copiosus sanguis per os effusus fuit, & aliud menstruum sanguinis sputum exinde contraxit. Atque hoc imprimis evenit, quando simpliciter stringuntur vasorum ora, sine fermenti interni, sanguinem agitantis & dicta pathemata inferentis, correctione.

Hæmorrhoides cæcæ malè curatæ, seu ubi jam adest inflammatio, non raro dant ulcera, quæ facillimè degenerant in abscessus, ulcera, & interdum fistulas incurabiles, in Anglia malum molestissimum, interdum lethale.

### C U R A.

In Cura primariò, uti in omni excretionem, attendendus est naturæ motus, & constitutio subjecti plus minus, vel sana, vel morbida, hoc est, chronicis affectibus plus minus obnoxia: natura enim sola in quibusdam subjectis statumque minus naturali hunc motum & evacuationem in salutem horum instituit, ut nempe majora mala avertat. Hinc

1. Hæmorrhoides fluentes seu fluere consuetæ, ut suo tempore fluant, conservandæ; quia mitigant majores morbos chronicos.
2. Hæmorrhoides consuetæ fluore suppressæ, sive in cæcas degenerantes, aperiendæ.
3. Hæmorrhoides nimium fluentes moderate sistendæ.
4. Nunquam fluere consuetæ, raro, aut in chronicis saltem affectibus, in quibus apparet motus naturæ ad hæc vasa, & in subjectis tantum tali evacuatione opus habentibus, aut eam facillè ferentibus, præsertim ubi suppressa solenni sanguinis evacuatione natura quasi spontè eò inclinatur, aperiendæ.
5. Hæmorrhoides cæcæ si non fluxerint, vel non ex usu sit, ut fluant, aut resolvendæ aut discutiendæ, aut, si aliàs fluxerint, aperiendæ.

Semper verò earum dolor inflammatorius sistendus. Ergò tria saltem remedium genera pro curandis hæmorrhoidalibus affectibus locum habent:

1. Quæ eas aperiunt.
2. Quæ eas claudunt.
3. Quæ appropriata & anodyna dolentes discutiunt:

Pro istis scopis ritè obtinendis notandum in genere, quod pro curandis hæmorrhoidibus nimis apertis omnia convenient illa remedia, quæ in diarrheis, dysenteris, vel ipsa cholera, aut etiam aliis quibusvis hæmorrhagiis, specificè conveniunt virtute. Cæcis verò omnia illa exactè conveniunt, quæ vulgò in morbis spleneticis, & referendis viscerum obstructionibus laudari solent.

Moneo autem, hæmorrhoidalia pathemata, sive fluant, sive non fluant, existerè non in exactè sanis, sed qui inclinant ad affectus hypochondriacos, ita ut hæmorrhoides sint consequens talium affectuum hypochondriacorum; hinc rectè dicunt Præctici: *Hæmorrhoides in sua radice magnam habere cognationem cum affectu hypochondriaco*: Conf. *Miscellanea curiosa medica, anno 3. Observ. 22. p. 40.* i.e. hæmorrhoides corpore sano constituto non apparentes, sunt signum deficientis plus minus sanitatis, & hypochondriacorum affectum um quasi confectarii: adeoque remedia huic appropriatis, in specie martialibus, & hinc vegetabilibus amaricantibus aromaticis, eorum radicalis cura tractanda est, eò serè modò, ac in genere morbi chronici & vulgò dicti spleneticis tractari solent. Martialia enim fluentes sistunt, & cæcas vel faciuntur dispereant vel aperiunt; quod

observatum est in liquore Martis solari. Cum his usurpentur simul appropriata, ut scrophularia, millefolium flore albo, crassula, pilulæ de bdellio. Conf. *Wedelius Op. p. 124.* & *M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 22.*

Quoad media cæcis aperiendis convenientia, consultum est, ut, antequam applicentur aperiencia, præmittantur emollientia hæmorrhoides cæcas, balneæ nempe aut semicupia emollientia, item somenta, imprimis parata ex lacte tepido, vel solo, vel cum emollientibus bullito; præstantissima enim sunt ad compefcendum dolorem hæmorrhoidum cæcarum, observant id ZACUTO LUSITANO in *sua Praxi*, quæ sic interdum spontè solent referari: emollientæ verò aperiuntur vel applicando hirudines, vel fricando foliis ficus recentibus modicè tritis, quæ forti frictione lac acre ac ferè causticum plorant, cujus acrimoniæ vasa tumentia successivè aperiuntur: vel si hoc non sufficiat, illinuntur commodè sacco cyclaminis, eoque vel solo, vel cum succo betæ misto, imprimis ubi iam adest inflammatio, vel dolor nimis urgeat: Vid. HEINRICVS ab HEER in *Obs. oppido vara 6.* Vel recipiatur alia acrius succus ceparum recens, vel solus, vel cum aloë sub forma linimenti mistus: item succus ari, bryoniæ, centaurii minoris, &c. externè illitus, easdem aperit, suppositoria etiam ex radice cyclaminis facta, hæmorrhoides insigniter stimulant, ut aperiuntur, vel ex hiera picra cum pulvere colocynthidis & melle parata: pulvis colocynthidis, aut solus, aut etiam adjecto felle bubulo, aut felle porcino, cum melle vel oleo amygdalarum amararum permixtus in consistentia linimenti, potenter etiam stimulat hæmorrhoides cæcas: Canceri itidem fluviatiles in oleo cocti ad mellis consistentiam etiam aperiunt hæmorrhoides, & imprimis in metu inflammationum conveniunt: imò lienis dolori ac nimio inflammationis incremento resistit: Omnia ista remedia externa urgente plus minus inflammatione, ardore ani, &c. tamdiu prius ducantur in mortario plumbeo, donec lividum colorem ex plumbi ramentis contrahant, sic & tutius applicari possunt; plumbum enim convenit ad arcendum inflammationem.

Tandem linimentum ex medulla colocynthidis, cum oleo amygdalarum amararum probè mixtum, illitum etiam easdem referat: item cataplasma factum ex stercore columbino, cum semine staphisagriæ & lupinorum, similiter applicari potest. Succus & magma seu pulpa galiopfidis, seu urticæ mortuæ, furentes hæmorrhoides aperit. Valde quoque commendatur ad obstruatas hæmorrhoides quod sequitur:

*R. Urine vetustæ, sane bonam partem:*

Quæ bulliant ad minimum per horam vnam; despumetur & purificetur, addendo in fine

*Urticæ parvas siue Galiopfides incisas:*

Subigantur & firmiter exprimantur.

Quod si calor adsit hæmorrhoidum, simul addenda est aqua Rosarum: si verò adsit simul pruritus hæmorrhoidum, addendum nonnihil de succo limonium, vel aceto destillato, vel aceto rosaceo.

His ita permixtis æger collocetur in sella, & foveatur linco multiplici, soti isto calidissime imprægnato; quæ linco tam diu novò soti calido imprægnata admoveantur subindè, donèc hæmorrhoides aperiuntur.

Denique inter aperiencia hæmorrhoidum ora, & quæ fluxum earum promovent, nil melius est applicatione hirudinum venis ani, pro promovendo fluxu hæmorrhoidum. Modus applicationis est: Illinatur locus cum aqua dulci saccharata, vel lacte tepido, vel sanguine animalium recenti, ut faciliùs hirudines allecantur: si sufficienter suxerint, adspargantur sale communi, cujus acrimoniam sentientes decidunt: vel illinatur locus aqua absinthii: si interdum introrepant in anum, tunc ne internè suctu malum inferant, injiciatur clystima ex aqua salita, tunc à tali clysmate hirudines decidunt, & unà cum clysmate ejiciuntur. Conf. SENNERTUS 1.3. *Prax. ubi de hæmorrhoidibus Quest. 3.* Quod si verò profundius delitescant vasa hæmorrhoidalia, ac præsertim superiora, ita ut commoda hirudinum applicatio fieri nequeat, imitetur ZACUTUS LVSITANUS 1.2. *Pr. Admir. Observat. 74.*, qui docet, quomodo per cucurbitulam applicatam commodè manifestanda sint? quæ aliàs suprà genua in parte externa applicatæ in hæmorrhoidibus suppressis conveniunt.

Quoad interna remedia, promovent hæmorrhoidum fluxum remedia aloetica quæcunque, quatenus nempe parte sui resinosa circa partes ani adhærescendo easdem stimulant,



lant, ut hinc facile sanguis effluat, hinc pilulæ aloephan-  
ginæ, & ratione aloes Elixir proprietatis, & similia, quæ  
ingreditur imprimis aloë, item myrrha, quoscunque san-  
guinis fluxus promovens; item quæcunque purgantia acio-  
ra & magis resinosa commodè usurpari assolent. *Fluentes*  
*Hæmorrhoides* siue *aperas* quod attinet, si non rite sanant,  
modò dicta easdem promovent, in specie fortis ex emol-  
lientibus; sin verò nimis fluant, in tali casu supprimantur.  
Supprimuntur tam *remediis internis*, quàm *externis*. *Internè*  
conveniunt Rhabarbarum tostum ac myrobalani: præ cæ-  
teris tamen Tamarindi, quos commendat R I V E R I U S  
ad hæmorrhoides fluentes: cimæ quercus, exque his parata  
cantierva & syrupus. Decoctum ligni lentiscini præservat  
à nimio fluxu hæmorrhoidum: syrupus de rosis siccis, utut  
vulgaris, est tamen efficax; BORELLUS namque l. 4. *Ob-*  
*servat*. 58. refert, quod hæmorrhoidum fluxus nimius ad  
3 x. fuerit sedatus per syrupum hunc aliquoties adhibiturum:  
Syrupus & succus portulacæ, myrtinus & cydoniorum  
sunt convenientes: succus urticæ majoris ad 3 ij. vel tres  
haustus, est experimentum R I V E R I I C. 4. *Observ.* 81: Item  
aliis irritis succus stercoreis asinini haustus, aut ex hoc para-  
tus syrupus, est optimum adstringens, quæ, uti quæcunque  
hæmorrhagiam mirabiliter sistunt, ita in specie fluxum hæ-  
morrhoidalem: Decoctum sanguisorbæ in potu ordinario  
est BARTHOLINI in *Art. Med. Hassniens.* Volum. 1. p.  
165. Dens equi marini siue hippopotami præparatus & as-  
sumptus fuit D. MICHAELIS secretum contra hæmorrhoi-  
des nimis fluentes; ex quo dente etiam curabat fieri annu-  
los pollicis pedum applicandos, quibus hæmorrhoides felici-  
cum successu compescere solebat. Ossa microcosmi præpa-  
rata, item trochisci de carabe, quæ à 3 ß ad 3 j. usurpari  
possunt, conveniunt; item de terra sigillata, & in genere  
omnia ea remedia, quæ *infra ad hæmorrhagias* nimias lau-  
dantur: item quæ *suprà de vomitu sanguineo* fuerunt com-  
mendata, ac ferè vi acidi absorpti vi simul instructa sunt, hic  
optimè conveniunt, speciatim Martialia omnia, quæ uti  
acidum hypocondriacum absorbent, ita hoc ipso in vitrioli  
quali naturam degenerant, & alvum suaviter apertam ser-  
vant, dum simul sanguinem coagulando, excretiones ejus  
quascunque, & speciatim per hæmorrhoidalibus vasa, si-  
sunt, ut tincturæ Martiales, tinctura sulphuris vitrioli,  
tincturæ vitrioli Martis Zuvelfferi, potius tinctura antiph-  
thifica, aut liquor Martis solaris, aut crocus Martis præ-  
cipitatus, lapis hæmatites & similia.

R. Aju. plantagin.

Portulac. an. 3 jß.

Tinctura sulphur. vitrioli 3 jß.

Laud. opiatu gr. iij. vel iv.

Syr. co. allior 3vj.

M. f. Potio: S.

Potio adstringens.

Speciatim etiam pilulæ de bdellio in *Pharm. August.* dosi  
3 j. subindè usurpatæ, mirabiliter nimium hæmorrhoidum  
fluxum sistunt: id quod imprimis videri potest apud SO-  
LENANDRUM in *Praxi* S. 4. *Conf.* 20., quod consilium  
multa in se continet, quæ ad hæmorrhoidum Praxin perti-  
nent: item FORESTUS l. 23. *Obs.* 25. unde quidam non sine  
successu adhibent suffitum de bdellio, qui suffitus similiter  
egregiè confert.

De opiatis, quo pertinet theriaca, etiam internè contra  
hæmorrhoides fluentes usitatis, taceo, cum per se nota  
sint.

*Externè*, quæ hæmorrhoidum nimium fluxum sistunt,  
sunt suffitus nidorosi & olidi, qualis suffitus picis, carboni-  
bus ardentibus injectus, exceptus in sella perforata; vel  
sufficit suffitus ex thure & Mastiche ano exceptus: vid. R I-  
V E R I U S. Spongia ista terrestris, crepitus lupi dictus,  
quem vocant Germ. *Buben-oder Pöhl*, meritò commen-  
datur à SOLENANDRO, qui siccatus & valis hæmor-  
rhoidalibus nimis apertis admotus non tantummodò san-  
guinem fluentem sistit, sed etiam partes jam exulceratas  
optimè sanat. *Credere experio*, dicit SCHOLZIUS *Conf.*  
202. Probatum sunt *sacculi Rulandi*, quos ipse expertus est:  
fiunt ex *glandibus contusis & foliis quercus*, formentur duo  
sacculi interpassati, injiciantur in acetum servidum,  
quorum unus post alterum calidè podici applicetur conti-  
nuato usu. Item pulvis ex subere ulso & mumia applicatus  
fluxum hæmorrhoidalem nimium etiam sistit: pulvis buso-  
nis combusti, vel pulvis ranæ terrestris applicatus hæmor-  
rhoidibus, easdem stringit: item fuligo furni splendens,

conquassata cum albumine ovi & mista, ac postmo-  
dum cum telis araneorum in forma linimenti hæmor-  
rhoidibus nimium fluentibus applicata, fluxum hunc simi-  
liter cohibet: Est experimentum HELIDÆI PADVA-  
NI. De pulvere sympathetico res nota est. Polygonum  
sub axillis positum laudatur à WEDELIO in M. A. N. C.  
*Ann.* 3. *Obs.* 22. Sunt, qui recipiunt sanguinem recentem ex-  
cretum, quem in lamina ferrea benè calefacta exsiccant &  
pulverisatum inspergunt hæmorrhoidibus fluentibus & sic  
subito sistunt, quod observavit RHUMELIUS. Pingue-  
do etiam anguillæ, quæ, dum assatur, exstillat, non saltem  
egregium est contra dolores hæmorrhoidum remedium,  
sed & nimium fluorem optimè sistit. HARTMANNUS  
commendat cingulum ex helleboro nigro. Verùm eo ma-  
gis commendarem Elleborum album, cujus folia sunt in-  
star plantaginis nervea: ex his linteo insutis factum cin-  
gulum lumbis applicatum, est singulare experimentum  
LINDANI contra fluxum hæmorrhoidum (gmenfium), cujus  
felicem successum aliquoties observatum in Collegio suo  
confirmat; imprimis si adhuc pulvis subtilissimus de corti-  
cibus quercus adspargatur, qui instar pollinis adheret, &  
aliàs in dysenteria est magnum remedium. Tandem ter-  
ra vitrioli dulcis rite edulcorata, vel sola cum bombace  
applicata, vel cum albumine ovi subacta, aut cum succo  
plantaginis in linimenti consistentiam redacta, & ita ap-  
plicata, egregiè confert: Item

R. Unguent. de rutia,

Ol. hyperic. q. l.

Misc. pro Linimento: S.

Unguentum lenitivum.

Vel Unguentum de lithargyrio vel rutia, cum cinere  
ostrearum subactum, compescit nimium hæmorrhoidum  
fluxum; item suffumigium rasuræ vulgæ equinæ.

Venæ sectio in brachio, quam quidam usurpant, non  
adeò necessaria videtur, nisi forsitan occasione solennis sup-  
pressæ sanguinis evacuationis hæmorrhoidum nimium me-  
tuatur fluxus. Quod si verò hæmorrhoides eçcæ non ap-  
tende, nihilominus tamen admodum dolentes & tormen-  
tantes discutiende sint, pro sistendo dolore anodyna, ut lac,  
opiata, Decoctum foliorum hyoscyami in lacte chalybea-  
to, ac similia sub focus forma, vel cum spongia, vel cum lin-  
teolis multiplicatis, calidè applicata egregiè conferunt.  
Imprimis tamen quedam specifica crebriori experientia  
hic conveniunt: Probata hic conveniunt Momordica  
planta insigniter vulneraria, & imprimis ulceribus mam-  
marum dicata, cujus fructus siue poma spinosa & rubi-  
cunda in oleo communi, vel lini, vel, quod melius est, in  
oleo amygdalarum dulcium infusa, dant nobile oleum non sal-  
tem vulnerarium, & ad quævis ambuita, sed in specie ad  
hæmorrhoides cæcas optimum: In muliere quadam, quæ  
ex mensibus imminutis dolore hæmorrhoidum afficieba-  
tur, feliciter hujus tentavi experimentum. Post momor-  
dicam eminet hic etiam præ cæteris verbascum & ex flori-  
bus ejus infusum paratum oleum Verbascum certè appro-  
priatissima est planta ad cæcas & fluentes hæmorrhoides  
compescendas. Applicatur variis modis; præprimis in la-  
cte velin aqua ferrariorum, vel vino adstringente cocta so-  
lia vel flores verbasci instar suffitus, vel somenti spirituosi  
in sella perforata, optimè curant hæmorrhoides. Experi-  
mentum hoc est Mynsichtii ad condylomata & hæmor-  
rhoides cæcas. Aut flores verbasci & sambuci simul sacculo  
inclusi pro somento in aqua simplici vel lacte bulliant, &  
ita applicentur: aut in graviore dolore, ubi verbasci soti  
solus non sufficit, imitetur FORESTUS l. 23. *Obs.* 6.  
in *sebolis*, qui aliis remediis irritis dolorem hæmorrhoi-  
dum intensum, & qui nullis aliis sedari poterat remediis,  
feliciter curavit soti foliorum & florum verbasci siue tha-  
psi barbatii in aqua cum semine hyoscyami cocti, quo ipso  
omnis dolor evanuit. Quidam recipiunt lanam verbasci,  
hanc cum terebinthina miscent in formam pilularum, qui-  
bus suffitu utuntur ad hæmorrhoides compescendas, id  
quod experientia comprobavit. De floribus sambuci dixi  
jam. Quidam etiam pro eodem scopo faciunt cataplasma-  
ta ex foliis & floribus dictorum simplicium in lacte deco-  
ctis, & applicant cum fructu: est sanè egregium. Quod si in-  
flammati præsens, aut hæc multum progressa sit, conve-  
nienter adduntur folia portulacæ, quæ addita, in ista sci-  
licet, valdè operè commendantur.

Post verbascum & sambucum nota sunt folia mandra-  
goræ, utur rarè: nam mandragora ex solanorum genere  
non parum conjunctam habet narcosin: item folia solani  
furiosi,



14. *epid. l. 31. & l. 6. Aphor. 12.* HORSTIUS *l. 2. Observ.*  
26. & HIGMORUS *Ann. p. 256.*

Hinc suppressæ hæmorrhoides, quæ semel ac iterum fluxerunt, nunc sovent, nunc exacerbant chronicos morbos præsertim arthritidem, quæ ab iisdem fluentibus non parum levatur.

Verùm ubi fluxus hic fuerit nimius & copiosus admodum, eadem imminet pericula, atque quæ hæmorrhagiam nimiam quamvis solent insequi; nempe universum corpus debilitat, ad hydropem, tabem, similesque affectus disponit, in specie viros ad exercitium Venereum omnino impotentes reddit, cum magno feminarum tædio: conf. hic in *Pregness* simul HIPPOCRATES *Secl. 6. Aphorif. 11. 12. & 21.*

Imprimis notandum est, quod diuturnas curanti hæmorrhoides incumbat, ut una harum servetur aperta, quia aliàs varii morbi imminerent corpori: conf. DEODATUS in *Vuln. p. 93.* Item HORSTIUS in *Probl. Decad. 6. Quest. 8.*, quod illustrat *Obs. AMATI LUSITANI Cont. 5. Curat. 3.* ubi ex menstruo hæmorrhoidum fluxu suppresso copiosus sanguis per os effusus fuit, & aliud menstruum sanguinis sputum exinde contraxit. Atque hoc imprimis evenit, quando simplicitur stringuntur vasorum ora, sine fermenti interni, sanguinem agitantis & dicta pathemata inferentis, correctione.

Hæmorrhoides cæcæ male curantur, seu ubi jam adest inflammatio, non raro dant ulcera, quæ facillime degenerant in abscessus, ulcera, & interdum fistulas incurabiles, in Anglia malum molestissimum, interdum lethale.

### C U R A.

In Cura primariò, uti in omni excretionem, attendendus est naturæ motus, & constitutio subjecti plus minus, vel sana, vel morbida, hoc est, chronicis affectibus plus minus obnoxia: natura enim sola in quibusdam subjectis statumque minus naturali hunc motum & evacuationem in salutem horum instituit, ut nempe majora mala avertat. Hinc

1. Hæmorrhoides fluentes seu fluere consuetæ, ut suo tempore fluant, & conservandæ; quia mitigant majores morbos chronicos.
2. Hæmorrhoides consueto fluore suppressæ, sive in cæcis degenerantes, aperiendæ.
3. Hæmorrhoides nimium fluentes moderatè sistendæ.
4. Nunquam fluere consuetæ, raro, aut in chronicis saltem affectibus, in quibus apparet motus naturæ ad hæc vasa, & in subjectis tantum tali evacuatione opus habentibus, aut eam facile ferentibus, præsertim ubi suppressa solenni sanguinis evacuatione natura quasi spontè ed inclinatur, aperiendæ.
5. Hæmorrhoides cæcæ si non fluxerint, vel non ex usu sit, ut fluant, aut resolvendæ aut discutiendæ, aut, si aliàs fluxerint, aperiendæ.

Semper verò earum dolor inflammatorius sistendus.

Ergò tria saltem remediorum genera pro curandis hæmorrhoidalibus affectibus locum habent:

1. Quæ eas aperiunt.
2. Quæ eas claudunt.
3. Quæ appropriata & anodyna dolentes discutiunt:

Pro istis scopis ritè obtinendis notandum in genere, quod pro curandis hæmorrhoidibus nimis apertis omnia convenient illa remedia, quæ in diarrhæis, dysenteris, vel ipsa cholera, aut etiam aliis quibusvis hæmorrhagiis, specificè conveniunt virtute. Cæcis verò omnia illa exactè conveniunt, quæ vulgò in morbis spleneticiis, & referendis viscerum obstructionibus laudari solent.

Moneo autem, hæmorrhoidalibus pathemata, sive fluant, sive non fluant, existerè non in exactè sanis, sed qui inclinant ad affectus hypochondriacos, ita ut hæmorrhoides sint consequens talium affectuum hypochondriacorum; hinc rectè dicunt Præctici: *Hæmorrhoides in sua radice magnum habere cognationem cum affectu hypochondriaco*: Conf. *Miscellanea curiosa medica, anno 3. Observ. 22. p. 40.* i.e. hæmorrhoides corpore sano constituto non apparentes, sunt signum deficientis plus minus sanitatis, & hypochondriacorum affectu um quasi cœlestarii: adeoque remediis huic appropriatis, in specie martialibus, & hinc vegetabilibus amaricantibus aromaticis, eorum radicalis cura tractanda est, ed serè modò, ac in genere morbi chronici & vulgò dicti splenetici tractari solent. Martialia enim fluentes sistunt, & cæcas vel faciuntur dispareant vel aperiunt; quod

observatum est in liquore Martis solari. Cum his usantur simul appropriata, ut scrophularia, millefolium flore albo, crassula, pilulæ de bdellio. Conf. *Wedelius Op. p. 124. & M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 12.*

Quoad media cæcis aperiendis convenientia, consultum est, ut, antequam applicentur aperiencia, præmittantur emollientia hæmorrhoides cæcas, balneæ nempe aut semicupia emollientia, item somenta, imprimis parata ex lacte tepido, vel solo, vel cum emollientibus bullito; præstantissima enim sunt ad compescendum dolorem hæmorrhoidum cæcarum, observante id ZACUTO LUSITANO in *sua Praxi*, quæ sic interdum spontè solent referari: emolliatæ verò aperiuntur vel applicando hirudines, vel fricando foliis ficus recentibus modicè tritis, quæ forti impressione lac acre ac serè causticum plorant, cujus acrimoniâ vasa tumentia successivè aperiuntur: vel si hoc non sufficiat, illinuntur commodè cum succo cyclaminis, eoque vel solo, vel cum succo betæ misto, imprimis ubi iam adest inflammatio, vel dolor nimis urgeat: Vid. HEINRICVS ab HEER in *Obs. oppido rara 6.* Vel recipiantur alia acrius: succus ceparum recens, vel solus, vel cum aloë sub forma linimenti mistus: item succus ari, bryoniæ, centaurii minoris, &c. externè illitus, easdem aperit, suppositoria etiam ex radice cyclaminis facta, hæmorrhoides insigniter stimulant, ut aperiuntur, vel ex hiera picra cum pulvere colocynthidos & melle parata: pulvis colocynthidos, aut solus, aut etiam adjecto selle bubulo, aut selle porcino, cum melle vel oleo amygdalarum amararum permixtus in consistentia linimenti, potenter etiam stimulat hæmorrhoides cæcas: Cancritidem fluviatiles in oleo cocti ad mellis consistentiam etiam aperiunt hæmorrhoides, & imprimis in metu inflammationum conveniunt: imò lienis dolori ac nimio inflammationis incremento resistit: Omnia ista remedia externa urgente plus minus inflammatione, ardore ani, &c. tamdiu prius ducantur in mortario plumbeo, donec lividum colorem ex plumbi ramentis contrahant, sic & tutius applicari possunt; plumbum enim convenit ad arcendam inflammationem.

Tandem linimentum ex medulla colocynthidos, cum oleo amygdalarum amararum probè mixtum, illitum etiam easdem referat: item cataplasma factum ex hercore columbino, cum semine staphisagriæ & lupinorum, similiter applicari potest. Succus & magma seu pulpa galiopsidis, seu urticæ mortuæ, furentes hæmorrhoides aperit. Valde quoque commendatur ad obliuiscas hæmorrhoides quod sequitur:

*R. Urinæ vetustæ & sana bonam partem:*

Quæ bulliant ad minimum per horam unam; despumetur & purificetur, addendo in fine

*Urticæ parvas siue Galiopsides iucifas:*

Subigantur & firmiter exprimantur.

Quod si calor adsit hæmorrhoidum, simul addenda est aqua Rosarum: sin verò adsit simul pruritus hæmorrhoidum, addendum nonnihil de succo limonium, vel aceto destillato, vel aceto rosaceo.

His ita permixtis æger collocetur in sella, & soveatur linteo multiplici, fotu isto calidissime imprægnato; quæ lintea tam diu novo fotu calido imprægnata admoveantur subindè, donec hæmorrhoides aperiuntur.

Denique inter aperiencia hæmorrhoidum dra, & quæ fluxum earum promovent, nil melius est applicatione hirudinum venis ani, pro promovendo fluxu hæmorrhoidum. Modus applicationis est: Illinatur locus cum aqua dulci saccharata, vel lacte tepido, vel sanguine animalium recenti, ut facilius hirudines allecantur: si sufficienter suxerint, adspargantur sale communi, cujus acrimoniam sentientes decidunt: vel illinatur locus aqua absinthii: si interdum introrepant in anum, tunc ne internè suctu malum inferant, injiciatur clysmata ex aqua salita, tunc à tali clysmate hirudines decidunt, & unà cum clysmate ejiciuntur. Conf. SENNERTUS *l. 3. Prax. ubi de hæmorrhoidibus Q. est. 3.* Quod si verò profundius delitescant vasa hæmorrhoidalibus, ac præsertim superiora, ita ut commoda hirudinum applicatio fieri nequeat, imitetur ZACUTUS LVSITANUS *l. 2. Pr. & Admir. Observat. 74.*, qui docet, quomodo per cucurbitulam applicatam commodè manifestanda sint? quæ aliàs suprà genua in parte externa applicatæ in hæmorrhoidibus suppressis conveniunt.

Quoad interna remedia, promovent hæmorrhoidum fluxum remedia aloetica quæcunque, quatenus nempe parte sui resinosa circa partes ani adhærescendo easdem stimulant,



lant, ut hinc facile sanguis effluat, hinc pilulæ aloephantinæ, & ratione aloes Elixir proprietatis, & similia, quæ ingreditur imprimis aloë, item myrrha, quoscunque sanguinis fluxus promovens; item quæcunque purgantia acriora & magis resinosa commodè usurpari assolent. *Fluentes Hæmorrhoides sine apertis* quod attinet, *si non rite fluant*, modò dicta easdem promonent, in specie totus ex emollientibus: sin verò nimis fluant, in tali casu supprimantur. Supprimuntur tam *remediis internis*, quàm *externis*. Internè conveniunt Rhabarbarum tostum ac myrobalani: præcæteris tamen Tamarindi, quos commendat RIVERIUS ad hæmorrhoides fluentes: cinnæ quercus, exque his parata coactiva & syrupus. Decoctum ligni lentiscini præservat à nimio fluxu hæmorrhoidum: syrupus de rosis siccis, utut vulgaris, est tamen efficax, BORELLUS namque *l. 4. Observat.* 58. refert, quod hæmorrhoidum fluxus nimius ad 3 x fuerit sedatus per syrupum hunc aliquoties adhibitum: Syrupus & succus portulacæ, myrtinus & cydoniorum sunt convenientes: succus urticæ majoris ad 3 ij. vel tres haustus, est experimentum RIVERII *C. 4. Observat.* 81: Item aliis irritis succus stercoreis asinini haustus, aut ex hoc paratus syrupus, est optimum adstringens, quæ, uti quamcunque hæmorrhagiam mirabiliter sistunt, ita in specie fluxum hæmorrhoidalem: Decoctum sanguisorbæ in potu ordinario aliquamdiu continuatum egregium etiam experimentum est BARTHOLINI in *Art. Med. Hassniens. Volum. 1. p. 165.* Dens equi marini sive hippopotami præparatus & assumptus fuit D. MICHAELIS *secretum contra hæmorrhoides nimis fluentes*; ex quo dente etiam curabat fieri annulos pollicis pedum applicandos, quibus hæmorrhoides felici cum successu compescere solebat. Ossa microcosmi præparata, item trochisci de carabe, quæ à 3 β ad 3 j. usurpari possunt, conveniunt; item de terra sigillata, & in genere omnia ea remedia, quæ *infra ad hæmorrhagias* nimias laudantur: item quæ *suprà de vomitu sanguineo* fuerunt commendata, ac ferè vi acidi absorpti vā simul instructa sunt, hic optime conveniunt, speciatim Martialia omnia, quæ uti acidum hypocondriacum abiorbent, ita hoc ipso in vitrioli quasi naturam degenerant, & alvum suaviter apertam servant, dum simul sanguinem coagulando, excretionem ejus quascunque, & speciatim per hæmorrhoidalitā vasa, sistunt, ut tincturæ Martiales, tinctura sulphuris vitrioli, tincturæ vitrioli Martis *Zurckfferi*, potius tinctura antiphthisica, aut liquor Martis solaris, aut crocus Martis præcipitatus, lapis hæmatites & similia.

*R. Aju. plantagin.*

*Portulac. an. 3 j β.*

*Tinctura sulphur. vitrioli 3 j β.*

*Laud. opiat. gr. iij. vel iv.*

*Syr. co. allior 3 vj.*

*M. f. Potio: S.*

*Potio adstringent.*

Speciatim etiam pilulæ de bdellio in *Pharm. August.* dosi 3 j. subinde usurpatæ, mirabiliter nimium hæmorrhoidum fluxum sistunt: id quod imprimis videri potest apud SOLENANDRUM in *Praxi S. 4. Conf. 20.*, quod consilium multa in se continet, quæ ad hæmorrhoidum Praxin pertinent: item FORESTUS *l. 23. Obs. 25.* unde quidam non sine successu adhibent suffitum de bdellio, qui suffitus similiter egregiè confert.

De opiat, quo pertinet theriaca, etiam internè contra hæmorrhoides fluentes usitatis, taceo, cum per se nota sint.

*Externè*, quæ hæmorrhoidum nimium fluxum sistunt, sunt suffitus nidorosi & olidi, qualis suffitus picis, carbonibus ardentibus injectus, exceptus in sella perforata; vel sufficit suffitus ex thure & Mastiche ano exceptus: vid. RIVERIUS. Spongia ista terrestris, crepitus lupi dictus, quem vocant Germ. *Buben-oder Poffil*, meritò commendatur à SOLENANDRO, qui siccatu & valis hæmorrhoidalibus nimis apertis admotus non tantummodò sanguinem fluentem sistit, sed etiam partes jam exulceratas optime sanat. *Credite experito*, dicit SCHOLZIUS *Conf. 202.* Probati sunt *sacculi Rulandi*, quos ipse expertus est: sunt ex *glandibus contusis & foliis quercus*, tormentur duo sacculi interpassati, iniiciantur in acetum servidum, quorum unus post alterum calidè podici applicetur continuato usu. Item pulvis ex subere usto & mumia applicatus fluxum hæmorrhoidalem nimium etiam sistit: pulvis bufonis combusti, vel pulvis ranæ terrestris applicatus hæmorrhoidibus, easdem stringit: item fuligo furni splendens,

conquassata cum albumine ovi & mista, ac postmodum cum tellis araneorum in forma linimenti hæmorrhoidibus nimium fluentibus applicata, fluxum hunc similiter cohibet: Est *experimentum HELIDÆI PADVANI*. De pulvere sympathetico res nota est. Polygonum sub axillis positum laudatur à WEDELIO in *M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 22.* Sunt, qui recipiunt sanguinem recentem excretum, quem in lamina ferrea benè calefacta exsiccant & pulverisatum inspergunt hæmorrhoidibus fluentibus & sic subito sistunt, quod observavit RHUMELIUS. Pinguedo etiam anguillæ, quæ, dum assatur, exstillat, non solum egregium est contra dolores hæmorrhoidum remedium, sed & nimium fluorem optime sistit. HARTMANNUS commendat cingulum ex helleboro nigro. Verùm eo magis commendarem Elleborum album, cuius folia sunt instar plantaginis nervea: ex his linteo infutis factum cingulum lumbis applicatum, est singulare *experimentum LINDANI contra fluxum hæmorrhoidum lymphicum*, cuius felicem successum aliquoties observatum in *Collegio suo* confirmat; imprimis si adhuc pulvis subtilissimus de corticibus quercus adspargatur, qui instar pollinis adhæret, & aliàs in dysenteria est magnum remedium. Tandem terra vitrioli dulcis rite edulcorata, vel sola cum bombace applicata, vel cum albumine ovi subacta, aut cum succo plantaginis in linimenti consistentiam redacta, & ita applicata, egregiè confert: Item

*R. Unguent. de rutia,*

*Ol. hyperic. q. f.*

*Misc. pro Linimento: S.*

*Unguentum lenitivum.*

Vel Unguentum de lithargyrio vel rutia, cum cinere ostrearum subactum, compescit nimium hæmorrhoidum fluxum; item suffumigium rasuræ vngulæ equinæ.

Venz sectio in brachio, quam quidam usurpant, non adeò necessaria videtur, nisi forsan occasione solennis suppressæ sanguinis evacuationis hæmorrhoidum nimium metuatur fluxus. Quod si verò hæmorrhoides cæcæ non apertæ, nihilominus tamen admodum dolentes & tormentantes discutiendæ sint, pro sistendo dolore anodyna, ut lac, opiata, Decoctum foliorum hyoscyami in lacte chalybeato, ac similia sub foris forma, vel cum spongia, vel cum linteolis multiplicatis, calidè applicata egregiè conferunt. Imprimis tamen quædam specifica crebriori experientia hic conveniunt: Probata hic conveniunt Momordica planta insigniter vulneraria, & imprimis ulceribus mammarum dicata, cuius fructus sive poma spinosa & rubicunda in oleo communi, vel lini, vel, quod melius est, in oleo amygdalarum dulcium insusa, dant nobile oleum non solum vulnerarium, & ad quævis ambuita, sed in specie ad hæmorrhoides cæcas optimum: In muliere quadam, quæ ex mensibus imminutis dolore hæmorrhoidum afficiebatur, feliciter hujus tentavi experimentum. Post momordicam eminet hic etiam præcæteris verbascum & ex floribus ejus insusum paratum oleum Verbascum certè appropriatissima est planta ad cæcas & fluentes hæmorrhoides compescendas. Applicatur variis modis; præprimis in lacte vel in aqua ferrariorum, vel vino adstringente cocta folia vel flores verbasci instar suffitus, vel fomenti spirituosi in sella perforata, optime curant hæmorrhoides. Experimentum hoc est Mynsichtii ad condylomata & hæmorrhoides cæcas. Aut flores verbasci & sambuci simul sacculo inclusi pro fomento in aqua simplici vel lacte bulliant, & ita applicentur: aut in graviore dolore, ubi verbasci soli solus non sufficit, imitetur FORESTUS *l. 23. Obs. v. 6. in scabellis*, qui aliis remediis irritis dolorem hæmorrhoidum intensum, & qui nullis aliis sedari poterat remediis, feliciter curavit fotu foliorum & florum verbasci sive thapsi barbati in aqua cum semine hyoscyami cocti, quo ipso omnis dolor evanuit. Quidam recipiunt lanam verbasci, hanc cum terebinthina miscent in formam pilularum, quibus suffitu utuntur ad hæmorrhoides compescendas, id quod experientia comprobavit. De floribus sambuci dixi jam. Quidam etiam pro eodem scopo faciunt cataplasmata ex foliis & floribus dictorum simplicium in lacte decoctis, & applicant cum fructu: est sanè egregium. Quod si inflammatio præsens, aut hæc multum progressa sit, convenienter adduntur folia portulacæ, quæ addita, in ista scilicet, valdè operè commendantur.

Post verbascum & sambucum nota sunt folia mandragoræ, utur rarò: nam mandragora ex solanorum genere non parum conjunctam habet narcotin: item folia solani furiosi,



furiosi, portulacæ, hyoscyami, flores chamomillæ, & similia. Post verbas cum eminet linaria, de qua res notissima est, quod sit unum ex primariis specificis contra furorē hæmorrhoidum, quocunque modo usurpetur, cuius olei aut etiam ex linaria, vel sola vel cum floribus chamomillæ, parati fotus, in lacte cocti & applicati, item linimenta, unguenta, &c. cum sevo hircino, sunt singularissima specifica **HARTMANNI** pag. 160. §. 3. in *Pr. Chym.* **HORSTII** L. 4. Obs. 50. & **HOEFERI** in *Herq. Med.* p. 95. Nam certum est, quod ex linaria quæcunque parata sint expertissima in cæcis hæmorrhoidibus.

*R. Herb. linar. M. ij.*  
*Flor. verbasci M. j.*  
*Sambuci M. ss.*  
*Sem. fenugr.*  
*Lini an. 3j.*  
*Incis. & contus. D. S.*  
*Species ad fotum.*

Linimentum sequens in dolore & tumore venarum hæmorrhoidalium plerumque cæcarum inter topica varia palmam sibi præripit, quod paratur ex herbis & floribus linariæ coquendo cum adipe porcino: cui expresso parumper refrigerato vitellum ovi permiscetur, & cum lana aut gossipio parti dolenti applicatur. Hoc linimentum confestim ad miraculum sistit dolores, referente Iohanne Wolfio Medico Hassiaco celeberrimo, qui hoc Secretum Principi suo Hassiæ Landgraviorevelare noluit, donec ipsi annuatim bovem benè saginatum promitteret: Vid. **SCHONFELDERS** *Hist. p. m. 50.* **VOLTERUS** in *Schola oblietricum* p. 132. laudat seqq.

*R. Herb. Linar. cum flor. lus. M. ij.*  
*Hyosc. M. ss.*  
*Ol. rosar.*  
*Verbas. an. 3 iij.*  
*Butyr. rec. 3 v.*

Coqu. & exprim. per pannum: fluant denuo adijciendo

*Fol. linar. M. j.*  
*Exprime & adde*  
*Vitell. ovor. no. ij.*  
*Misc.*  
*R. HB. Linar. M. ij.*  
*Flor. verbasci M. j.*  
*Samb. M. ss.*  
*Sem. fenugr.*  
*Lini an. 3j.*

*Incisa & contusa D. S.*  
*Species ad fotum.*

Coquantur in aqua vel lacte.

Decoctum fundatur super lateres calefactos, in sella perforata excipiat suffusus, post huc Decocto immittuntur linteamina, & sub forma focus humidi applicantur.

Focus urticatæ urinæ hæmorrhoides tumentes curat: Vid. **VELSCHIIUS** *Micromim. Cent. 1. Obser. 33. connexa anno 4. & 5. M. A. N. C.* Modum parandi linimenti habet, uti dictum, **HARTMANNUS**, & in *Zuvelsseri Pharm. Reg.* etiam ejus est descriptio: v. g.

*R. Unguent. de linar. 3vj. vel 3j.*  
*Ol. express. sem. hyosc. 3j. vel 3ij.*  
*Sacchari saturni (in ardore & inflammationis metu) 3ij. vel 3ij.*  
*M. pro linimento.*

Cautelam audietis in fine.

Liquor quoque simpliciter ex floribus linariæ putrefactis egregie anodynus in hoc casu colligi potest, atque ex floribus sambuci & verbasci.

De oleo momordicæ supra locutus sum. Quidam etiam commendant oleum, in quo baccæ herbæ paridis cum modico vino coctæ sunt, quod dat linimentum reverà elegans, uti hoc in hæmorrhoidibus cæcis ac furentibus in puerpera observavit **GESNERUS**, ac commodè cancerosis hæmorrhoidibus quælibet ex baccis his remedia applicari possunt. Pertinet huc oleum septem florum *Mynscheitii*, item oleum seminis papaveris & hyoscyami, in specie olei, asellorum, aut etiam scarabæorum stercorariarum, *Germ. der Mist-käfer*, quæ sunt singularissimum specificum in dolore cæcarum hæmorrhoidum: ex quibus, cum oleo carvi vel lini infusus, pluribus permistis, sunt olea expertissima contra hæmorrhoides dolentes & tumentes. Oleum & cineres scarabæorum sæpius expertus est in cæcis hæmor-

rhoidibus **BIERLINGIUS** in *Adversar. Curios. Censur.* 1. pag. 49. **URSULÆ CARTESIÆ**, *Principissa Italæ Patavina* in secretis fuit oleum asellorum: Nempe aselli contusi coquantur in oleo violaceo, aut lini, aut quod optimum cum oleo nucum expresso: In tali quodam oleo coquuntur etiam sine coctione in cucurbita probe clausa, aliquamdiu digeruntur, hinc oleum ex his exprimitur nobilissimi & singularissimi usus ad hæmorrhoides. Eodem modò cum scarabæis stercorariis oleum & linimentum anodynum ad hæmorrhoides expertissimum parari potest, quod valde commendat **SOLENANDER** S. 4. *Conf. 20.* Quidam parant unguentum ex modò dictis oleis, quod externis hæmorrhoidibus commodè potest illiniri; in hæmorrhoidibus verò intus latentibus sub forma suppositoriorum immitti, ut pertingat ad partem affectam, hoc modo:

*R. Asell. contus. 3j.*  
*Ol. violac. 3ij.*  
*Coqu. & colentur, add.*

*Cera 3 ss.*, plus minus, prout magis vel minus consideramus *Unguentum* fluidum vel crassum.

Misc.

Certum est, quod aselli in Chirurgia in compescendis doloribus nimis hæmorrhoidum, in ulceribus & fistulis, in ulceribus mammarum, non habeant par remedium: conf. **FONSECA** L. 1. *Conf. 27.* & **BORELLUS** C. 1. *Ob. 63.* de usu millepedum in hoc casu. Oleum Buxi insigne est anodynum, propter quam causam etiam applicatur hæmorrhoidibus dolentibus, non minùs quàm dentibus in odontalgia, in qua est singulare. Sunt qui putant, hoc oleum esse oleum *Heraclinum Rulandi*: sed falsum est; paratur enim istud ex corylo.

Tandem in usu etiam sunt contra dolorem & tumorem hæmorrhoidum cæcarum mucilagines seminis psyllii, lini, cydoniorum, nunc solæ, nunc cum saccharo saturni & camphora pauca mistæ: quibus etiam parum opii addi potest in graviore dolore, & ita applicari, ac speciatim in hæmorrhoidalibus: siquidem in his, etiam in externis remediis, ea præpollent, quæ acidum istud, unde hæmorrhoidalia pathemata oriuntur, vel absorbent, ut saturnina, vel vi opposita alcalina corrigunt & temperant. Dictis mucilagibus in ardore ac inflammatione commodè adduntur succus portulacæ, succus medii corticis sambuci:

Vel

*R. Mucil. sem. psyll.*  
*Cydonior.*  
*Lini cum aqu. rosar. an. par. 3j.*  
*Butyri rec. non saluti 3j.*  
*Vitell. ovor. no. ij.*  
*Ol. rosac. complet. parum.*

Agitentur in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo, ad colorem lividum usque, s. l. a. linimentum, perquam egregium in inflammatione, ac dolore hæmorrhoidum: S.

*Unguentum lenitivum.*

Vel

*R. Mucil. rad. alib.*  
*Sem. cydon.*  
*Lini cum aqu. rosar. parat. an. 3 iij.*  
*Ol. ovor. 3ij.*  
*Expressi sem. hyosc. 3ij. ss.*  
*M. f. linimentum in mortario plumbeo.*  
*D. S.*  
*Vi antea.*

Oleum enim ovorum in mortario plumbeo agitatam, dolorem maximè lenit.

Hinc aliquoties ad hujus imitationem cum fructu præscripsi:

*R. Mucil. sem. cydonior. cum sem. ran. ext. 3j.*  
*Spiritus vini camphorat. 3ij.*  
*Sacch. saturni 3j.*  
*M. f. Linimentum: S.*  
*Vi antea.*

Quo linteum humectatum applicetur crebrius.

Balsamum sulphuris ad extra, i. e. cum oleo hyperici, aut nucum, aut seminis papaveris expresso paratum, appropriatissimum est, & nobile experimentum Rulandi contra hæmorrhoidalia pathemata: cui assentitur **FONSECA**, qui mirè laudat in tali casu; imò in secretis esse habendum scribit. Interim tamen in hujus defectu & Balsamum sulphuris terebinthinatum non incongruum est ad hæc ipsa dolentia pathemata, quod sistit & discutit dolorem. Posterior hæc compositio paulò acrior est: adda-



addatur ergo saccharum saturni vel camphora. In hæmorrhoidibus cum inflammatione, gangrænâ incipiente, ac tumentibus pugni instar, sequenti linimento uxor *Monieur NAVARRET* septimanæ decursu restituta est:

*R. Ol. ovor. ʒj.*

*Balsam. sulphuris*

*Ol. Philos. an. ʒʒ.*

*Misc. pro Linimento.*

Videatur *BLEGNY Tom 1. Obs. pag. 26.* Ubi deficit verum Balsamum sulphuris *Rulandi*, tunc

*R. Flor. sulphuris :*

Misceantur nudi cum *terebinthina*, aut oleo *terebinthinae*, & applicentur.

Vel ad imitationem hujus *RULANDI in Curat. Empir. Centur. 1. Curat. 7.* contra dolorem & tumorem hæmorrhoidalem applicetur sacculus ex foliis quercus & glandibus confusus paratus, qui in aceto coctus & applicatus, ut ipse loquitur, miraculi instar dolores sistit hæmorrhoidales: Unde ad imitationem *RULANDI* hunc sacculum in utrum quoque vocavit *LOTICHIVS in Observat. pag. 1729* & similiter se esse expertum scribit. Loco horum sunt etiam sacculi ex fursuribus triticeis & floribus verbasci, quæ invicem cocta applicantur.

Denique scrophularia summum est remedium, quod singulariter & super alia convenit in quibuscunque hæmorrhoidalibus affectibus, in quocunque statu fuerint; multiplici adhibetur usu, interno pariter ac externo: nunc enim hæc radix scrophulariæ autumnò collecta, amuleti instar secum gestata, aut coxæ alligata in regione dorsi, ut femora attingat aut cutim, singulare experimentum est ad hæmorrhoidalia pathemata, fluentes nimirum sistendo, atque dolentes, & cæcas dissolvendo: Vid. *HORSTIUS & SCULTETUS in Arman. Chirurg. Tab. 42. pag. 174.* Theriaca etiam cum saccharo saturni linteolo molli suscepta podici intrudi potest: c. f.

*R. Theriac. ʒʒ.*

*Sac. bar. saturni ʒj.*

Cum f. q. *Oleumomord. misc. in formam liniment.*

Interne usurpata radix scrophulariæ, vel etiam foliorum pulvis usurpatus, cum cibo vel potu capiendò, dolorem omnem statim sistere, sæpius expertum esse asserit *HEINRICUS ab HEER Observ. 20.*, sive ipsa substantia sicca, aut viridis, sive decoctum assumatur: Conf. etiam *SCHULZIVS Consil. Med. p. 107.* Sicuti eadem radix in tessulas dissecta, filo annexa, & vino infusa, nimium fluxum hæmorrhoidalem compescere solet. Patientem nempe de hoc novem diebus in nimio fluxu bibat: post radices exprimantur, & siccantur, ac eo modo, quo siccantur radices, etiam hæmorrhoides imminui, & quasi siccati, ac nimium dolorem cessare, asserunt. Si verò rursus aperire velimus, vino vel aquæ simplicet rursus imponendæ sunt, atque tunc iterum nonnihil hauriendum. Curavi mulierem juvenculam, quæ occasione primi partus difficilis hæmorrhoidum cæcarum dolorosissima pathemata contraxit: duravit hoc malum integro anno: Post partum denuò gravida facta, longè pejus habuit, non secus ac in subsequente puerperio, ita ut interdum ad plures dies alvum suppressere cogeretur, metu insani hæmorrhoidalis doloris: suppurabantur interdum, & gravi cum dolore pus fundebant. Hinc tentandi gratiâ tempore autumnali totam scrophulariæ plantam transivisi, ut radices quasdam femoribus alligaret, & quasdam una cum foliis incisas, nodulo inclusas, cerevisiæ infunderet, & inde ordinariò biberet: folia quædam minutim concisa omni matutino tempore cum pane butyrato assumat. Horum usu per unam alteramve septimanam continuatò egregiè convaluit. Item sola recens hæc radix fricta cum butyro dat Unguentum singulare ad hæmorrhoides dolentes: vel radice recens collecta autumnò benè mundata & confusa in mortario lapideo cum butyro recenti, fiat Unguentum, quod in olla nova clausa per dies 15. in cella, aut fimo equino aut alio loco humido, reponitur: dein liquefacto sensim leni igne butyro exprimitur, & cum pinguedine humana servetur pro linimento egregio & singulari contra hæmorrhoides dolentes. *SOLENANDER 5.4. Consil. 20.* mentionem facit cujusdam Chirugi, qui omnes hæmorrhoidales affectus certò curavit, sive sint dolentes, sive tumentes, sive fluentes, scilicet per herbas integras scrophulariæ & crassulæ majoris cum suis radicibus: macerat eas seu infundit in cerevisiam, & ita infusi hujus manè & vesperi bonum haustum offert:

Nam quantum sola hæc crassula majoris radix verno tempore, dum primò folia protrudit, & aliquot sejus nempe nodi, saltem externè suspensa, ut circa lumbos cutim attingant, conferat in hæmorrhoidum cæcarum doloribus, ex quacunque causa natis, videbitis in *Miscellaneis Curiacis Med. Anno 2. Observat. 195. p. 298.* & *BARTHOLOMIÆ in Hist. Hassniens. Vol. 1. cap. 51.* Id quod probavi aliquandò in studio, Hæmorrhoidibus cæcis admodum afflicto, qui hoc usus amuleto egregiè convaluit. Crassula hæc major vocatur sedum telephium, Ger. *die ferse Henne*, & singulariter commendatur ad hæmorrhoides dolentes, etiam in dolorosis affectibus alvi, interno & externo usu; imprimis si ejus radix cum primò turgentibus primo verè foliis contundatur, & teratur cum oleo rosarum, hinc coquatur blandè ad humiditatis superflue evaporationem & consistentiam linimenti, & ita applicetur in forma unguenti: Convenit egregiè in dolore & ardore hæmorrhoidali. *Solenander c. l.* nescit ferè, quibus verbis sufficienter commendare debeat ad quæcunque hæmorrhoidum vitia. Chelidonium minus, idque usu tam interno quàm externo, fluentes sistit, dolentes verò aut tumentes perfectè sanat. Herba siccata infunditur cerevisiæ; herba verò recens confusa aut succus expressus, si extrinsecus admoveatur, certà experientiâ idem præstat: hoc modo empiricus quidam omne hæmorrhoidum vitium curabat. Aqua destillata adhibita eos curavit, qui ferè hydropici facti fuerunt nimio profluvio: planta confusa oleo incocta dat Unguentum contra quæcunque hæmorrhoidum vitia, in specie contra hæmorrhoides dolentes & tumentes: flores etiam & folia manè comeduntur: in specie si radix hæc appendatur, tanquam singulare secretum ad hæmorrhoides commendatur. Quidam

*R. Pulv. rad. scrophular.*

*Chelid. min. an. ʒʒ.*

Cum *Ol. verbasci f. linimentum magne laudis ad hæmorrhoides.*

*D. S.*

*Unguentum lenitivum.*

*Vel*

*R. Herb. Chelidon. min.*

*Linar.*

*Flor. verbasci an. M. j.*

*Rad. hyosc.*

*Scrophular. an. ʒʒ.*

Ex incis. & confus. f. sacculus, lacti incoquendi.

*D. S.*

*Sacculi lenitivi.*

Vapor Decocti in sella perforata excipitur ano, postmodum species Decocti in sacculo incluse applicentur calidè loco dolenti, vel ex sicca forma, vel immersi priùs in lac decoctionis:

*Vel*

*R. Herba linar. M. ij.*

*Flor. Chamomill.*

*Verbasci an. M. j.*

*Rad. scrophular. ʒvj.*

*Sem. fenigr.*

*Lin. an. ʒij.*

*Incis. & confusa D. S.*

*Species lenitiva.*

Decoctum millesolii interne crebriùs usurpatum ad sedandas hæmorrhoides furentes, & absumendas fluentes, est nobile: Vires hujus Decocti videb. in *Obs. 5. Riveriana*, communicata ipsi à Pachequo: Pulvis item millesolii & tormentillæ. His addenda est theriaca recens, quæ linteò illita, hæmorrhoidibus recentibus cæcis imposita, brevi dolorem compescit.

Tandem sit hoc Unguentum compositum:

*R. Balsami sulphur. imprimis cum oleo hyperici par. ʒij.*

*Ol. momord ʒj.*

*Sem. papav. expr. ʒʒ.*

*Sacchar. saturn. ʒj.*

*Camphor. gr. vij.*

*M. f. Linimentum: S.*

*Unguentum.*

Camphoram non immeritò addo: nam mirabile est remedium ad hæmorrhoides dolentes; si ejus ʒʒ ad ʒj. subigatur (nam non dissolvitur) in aquæ malvæ vel rosar. ʒj. & ita applicetur cum linteis ad dolentes & ardentes hæmorrhoides: v. g.

*R. Aqu.*



*R. Ag. verbasci vel faniculi ʒij.  
Campboræ cum oleo amygd. sol. ʒi.  
M. D. S.*

*Mixtura refrigerans.  
Et cum linteis duplicatis applicetur rimæ ani.  
Vel*

*R. Ag. rosar.  
Flor. verbasc. aa. ʒvj.  
Spiritus vini camphorat. ʒij.  
Sacchari saturni ʒi.  
M. S.*

*Mixtura refrigerans.*

In immenso ardore, & dolore egregie quoque convenit Linimentum ex cerussæ part. ij. & camphor. p. j. cum paucis Spiritus vini camphor. illinendum.

Quod si chronici facti sint, & quasi habituales, affectus dolorosi hæmorrhoidales, speciatim post mensium emanationem, convenit egregie fonticulus in tibia: Vid. VELSCHIIUS Hecatost. 2. p. 50. & ZACUTUS LUSITANUS l. 2. Præcedi admiranda Observ. 71.

Hæmorrhoidum excrecentium curationem facilem & tutam videb. apud RHODIUM Cent. 2. Observat. 94.

Circum adhibitionem Unguentorum in hæmorrhoidibus cæcis dolorificis notanda & observanda verba WEDELII Tractat. de Comp. Medicamentorum p. 185. Licet, inquit, apud omnes adeo Præfatos deprædicentur Unguenta, & in specie de linaria, in eo casu, nescio tamen, quibus observationibus id confirmari scripserint; siquidem aliquoties observavimus, hæmorrhoidibus cæcis dolorificis minus hac profuisse, quin potius dolorem fervoremque intendisse. Dilatant enim magis folliculo venarum sorditiem ibi collectam, vel sanguinem etiam floridum feruidioremque exasperant, transpirationem prohibent, &c.

Melitem symptoma est, quando puerperæ hæmorrhoidibus cæcis affliguntur; melius enim est, ut promoveatur lochiorum fluxus, ne his suppressis exciteur hæmorrhoidum inflammatio. Cum enim fluant lochia ex venis hypogastricis, ex quibus oriuntur venæ hæmorrhoidales, facile fit, ut sanguis etiam illic influat, stagnet, & inflammationem ani inducat: In tali casu prodest illud Linimentum ex Decocto baccarum paridis in oleo cum modico vini, quod antea laudavi, cujus olei illinigo statim dolores cessare facit, ut expertus loquitur Geinerus in Epistol. l. 1. pag. 21. Item experimentum Foresteri est: Nempè.

*R. Ciner. superis Germ. Pantoffel baliz. qu. v.  
& cum ana vitelli oui & oleo rosar. aut ol. sem.  
lini l. Linimentum nobile.*

Quod frequenter feliciter usurpauit FORESTUS in dolore hæmorrhoidum cæcarum: Vid. lib. 23. Obs. 25. ubi nobilis mulier, quæ in puerperio semper dolore hæmorrhoidum valde affligebatur, aliis multis frustra tentatis hoc Linimento præsentaneum semper levamen percepit. Locus hic probe notandus est, quia multa in se continet, quæ huc spectant: Conf. HARTMANNUS in Pr. Chymiatr. p. 160. Cum oleo myrino, quod similiter

commendat Lindannus in Comm. ad hunc locum: Ideo huius infundi potest coryledon adjectis guttis libanotidis coronariæ: vid. VELSCHIIUS Midamim. Cent. 1. Obs. 38. annex. M. A. N. C. anno 4.

Similius adfit ardor sub dolore, commode suber cum oleo rapistri, quod LINDANUS loco olei myrini sumit, aut in defectu huius cum oleo lini probè misceatur (præ eo enim dicit, quod valdopere convenient in dolore hæmorrhoidum cæcarum) in mortario plumbeo in Unguentum, & aliquantum succi sempervivi seu sedi maioris addatur, cum tantillo cerussæ & ceræ; sic enim fieri, inquit, ut statim cesset dolor & ardor hæmorrhoidum cæcarum. Potest etiam camphora addi. Aliis in simili dolore applicatum saccharum saturni cum aqua rosarum est elegans, quod similiter etiam ardorem sistit.

Et hæc fuerunt Hæmorrhoides cæcæ dolorosæ.

Denique non raro exulceratæ sunt extrinsecus hæmorrhoides dolentes, & in abscessus degenerant, ad quos experimentum est singulare Domini BOYLE Phil. Experim. T. 2. Sect. 1. p. 213. factum ex oleo amygdalarum dulcium cum auro tulminante, ulceribus & apostematibus, ex hæmorrhoidibus natis, applicandum. Facit etiam mentionem huius Bartholinus l. 4. Epistol. p. 323. ex communicatione ex Anglia facta. Præ cæteris vid. AGRICOLA in Chir. Par. 2a pagin. 594. Conf. & VELSCHIIUS Hecatost. 2. p. 61.

## ARTICULUS V.

### DE

### ANI PRURITU.

Propter cognationem affectuum observo, subinde quosdam graviter affligi pruritu ani satis molesto, in quo alius, utitis, optima est aqua plantaginis, in qua medicum aluminis coctum fuerit, qua ipsa abluitur & foveatur locus pruriginosus, sicuti ad similem ani affectum cum exulceratione junctum præstans est Linimentum hocce:

*R. Lithargyr.*

*Sulphuris citr.*

*Tragar. aa. ʒi.*

*cum aceto, adjecto paucis oleo rosæ, l. Linimentum.*

*D. S.*

*Unguentum.*

Quo locus in podice inungendus.

In casu, quando oritur dolor ani, qui accidit ob chartam, vel vitriolo vel pipere vel simili inspersam; in tali casu optimè convenit postmodum foveat ani cum lacte tepido, addita paucis aqua rosacea, uti vult BORELLUS Cent. 4. Obs. 2. in dolore ani, cui vitriolum suis affricatum. Plura, ubi de inflammatione ani.

Absolvimus ea, quæ in contentorum in intestinis expulsione & distributione sunt obvia, pergimus ergo ad

## SECTIONEM X.

### DE

### CONTENTIS INTESTINORVM PRÆTERNATURALIBVS.

### IN SPECIE

### DE VERMIBVS seu LUMBRICIS INTESTINORVM.

Vermes intestinorum adultos pariter ac ipsantes crebro vexant, & symptomata adeo plura cum aliis morbis communia inferunt, ut etiam doctos Medicos aliquando fallant, referente FORESTO. Triplex horum differentia communiter statuitur: (1.) Teretium seu vermium longorum, lumbricorum in specie sic dictorum; (2.) latorum, qui velicæ instar aut membranæ tenuis aliquot ulnatum longi subinde excreantur; & (3.) ascarides seu parvi isti vermes, t. m. tibus similes, qui in intestinum rectum incolunt, inter quos lati rariissimi sunt. Præter hos tamen etiam alia vermium differentia subinde observabiles sunt, uti sunt

vermes cucurbitini dicti; item observati fuerunt vermes cornuti: Vid. M. A. N. C. ann. 3. Obs. 63. pag. 109: item bisepures l. c. Obs. 84. pag. 141.

### CAUSÆ.

Generantur lumbrici quivis ex proprio suo semine, ut consueque nobis communicato, quod imprimis ex ascaridibus patet, qui licet copiosissime per medicamentum purgans rejiciant, brevi post tamen repullulant, de novo ægros vexant, denud



denotè eliciendi. In specie lumbrici vivipari observati fuerunt, teste PANAROLLO *Pentec. Observat.* 15. SCHENCKIO *lib. 3. Observationum*, FORESTO *lib. 21. Observat.* 26. &c. BORELLO *lib. 1. Observat.* 98. Cauti tamen hic sumus, ne intestinula lumbricorum cum eorum scutura confundamus; de quo vid. BARTHOLINI *Alia Med. Hassnien. Vol. 4. pag. 157*. In specie lumbrici palmaris longitudinis observari solent, ut plurimum convoluti invicem, pluresque innati. Ergo rarum est, quod lumbricus teres longitudinis trium ulnarum observatus fuerit in M. A. N. C. *Ann. 3. Observat.* 254. pag. 457. Nam latus aliàs lumbricus ad plures alias exercere solet, qualem trium ulnarum, item sex ulnarum longitudinis excretu vidit IOEL in *Praxi*; sex & novè ulnarum in M. A. N. C. *Ann. 6. Obs.* 194; sicut AMATUS LUSITANUS *Cent. 6. Cur.* 74. Vermem latus quatuor cubitos longum per vomitum excretu observavit. Plures & notabiles de lumbricis Observationes videbuntur BINNINGERO.

Causæ remotæ hujus mali sunt præprimis crudities ventriculi ac intestinorum putrilaginosæ; unde in pueris, addiphagiz litantibus, præsertim pullitibus ejusmodi verminosa observatur, non illis saltem, qui dentitionis ætatem superarunt juxta HIPPOCRATEM *Secl. 4. Aphor. 26*, sed & minoribus & lactantibus etiam adhuc: unde debilis minus amara, sed liebes & iners, generatur; hinc, ubi deficit bilis, lumbricorum partem esse rectè HELMONTIUS dicit.

### DIAGNOSIS.

Dignoscitur lumbricorum præsentia ut plurimum ex fœtore oris peculiari & ad acorem vergente, saliva copiosiore ex ore profuente, imò sœtante & cum nausea rejecta; item stercoribus bubulis similibus corruptis & griseis; tunc se, ubi oculi album flavedinem simul contrahit, seu icterus adjunctus est.

Accedunt his alia signa minus frequentia, dolor sc. & morbus ventris, præprimis horis matutinis, ita, ut abdomen quoque interdum inflari videatur; pavores nocturni, dentium stridores, tremores atque convulsiones, febres modò erraticæ, modò continuæ, corporis contabescencia, item gingivarum erosio: Vid. RIVERII *Praxis lib. 10. cap. 9*: Facies modò rubra suffunditur, modò pallescit, appetitus ad voracitatem usque intenditur, nares frequentius scalpunt, ventriculo jejuno sistunt, tussi sicca laborant, ab alimentis tamen assumptis, imprimis dulcibus & lacte, potissima symptomata remittunt, ab acidis verò & amaris secus.

Qui lumbrico lato laborant, eos varia & multiplicata atque diuturna symptomata vexant; quæ inter etiam hoc peculiare observatur, quod cum excrementis alvi corpuscula cucurbitæ seminibus analoga prodeant: Vid. BARTHOLINUS *Alia Med. Hassnien. Volum. 4. pag. 150*.

Quoad *ascarides*: notum est, quod hi ipsi phases lunæ observare soleant: vid. BARTHOLINUS *l. a*. Unde etiam in specie noctu à nona vel decima hora nocturna usque ad auroram moveri & excitari solent, hoc est fodicare & vexare ægros; cætero tempore, manè tota die & vespere, ut plurimum quieti sunt, saltim de nocte in podice tumultuantur: adeo novi quosdam totà nocte ab istis torqueri, ut dormire nullo modo queant, interdum de istis ne tantillum animadvertendo.

Præter hanc molestiam & hoc mali junctum habent, quod invalescentes quibusdam anum & intestinum rectum, imò nates & femora erodere soleant; quin & ulcus ani & intestini recti in quibusdam excitem, quod refert SCHENCKIUS *lib. 3. Observ.*

### PROGNOSIS.

Quòd plura sibi habent combinata symptomata, & quòd illorum plures atque majores existunt, eo pejores etiam observantur.

Sunt verò, si speciem consideremus, minus noxii ascarides, nisi majores existant: lati verò, utut hæc gravia excitem symptomata, difficilioris curationis observantur.

Aliàs graves, præprimis lumbrici, morbos non rarò accersunt, sc. febris latus intensas, animi deliquia, aphontiam, deliria, epilepsiam, pulsum intermittenstem, colicam, & apertentiam caninam.

In morbis aliis spontè prodeuntes vel per alvum, vel per os, & quidem in statu cruditis & principio morbi, rarò sunt sine periculo: Nam vix mortis imminemtem ac summam malignitatem denotant, unde fugà se volunt redimere. Sin verò excernantur in statu coctionis & declinatione, bonum est.

### CURA.

Pro Cura ergò vermium imprimis observandum, ut

1. Enecentur.

2. Per Purgantia, imprimis jalappam & mercurium dulcem aliave media eueantur, ne putrescant in intestinis, & sic ex istis, novo suscitato semine, novi lumbrici generentur: Vid. RIVERIUS *C. 1. Observ.* 28. *C. 2. Obs.* 5. *Obs. Comm.* 7. pag. 280. 318. 398.

R. Pulv. jalapp. ʒj.

Mercurij dulc. ʒij.

Cum saccharum l. quæquæ hyperisolut. f. Rotula, pro 3. vel 4. dosibus: S.

Rotulæ pro vermibus pro aliquot vicibus.

Vel

R. Conserv. flor. persic. ʒij vel ʒj.

Mercurij dulc. gr. xv ad ʒi.

Mag. jalapp. vel spec. dia. Turb. cum

Rhabarb. gr. v. vel. viij.

Scamm. gr. ij ad vj.

C. l. q. syrupi flor. persic. f. Bolus: S.

Saccharum purgans pro una vice.

Imprimis autem lunâ decrecente sub ultima ejus quadræ quivis vermes aggrediendi, & qui vermibus obnoxii sunt, semel in menie decrecente lunâ debitis subsidis sunt præservandi. In specie in morbis puerorum semper vermes debent esse suspecti, cum præ cæteris istis soleant esse familiares, autore SALMUTH *Cent. 1. Observ.* 264; quod pariter de Adultis ait BORELLUS *C. 1. Observ.* 89.

Remedia ergò magis appropriata, vermes enecantia, sunt in specie raphanus rusticanus, ejusque succus & aqua destillata, cum aliis mista, nasturtium, absinthium, carduus benedictus, centaureum minus, flores persic, tanacetum, flores hyperici, de quibus vid. BARTHOLINUS *Alia Med. Hassnien. Vol. 1. Observ.* 40, herba tabinæ, scordii, coralina, radix dictamni albi, filicis, gentianæ, graminis, Zedoariæ, uti & allium, cepæ, porrum, in lacte cocta, &c. semen cinæ, portulacæ, &c. myrrha & aloë, quolibet remedia ex cornu cervi, spiritus cornu cervi essentificatus, de quo vid. HARTMANNUS *pag. 179*, quolibet mercurialia, unde Bolus *Hartmanni* cum conserva rosarum & floribus benzoes; item infusum ac decoctum Mercurii cum aqua graminis, ceparum aut alii paratum; idem pulvis contra vermes officinaram ex mercurio cum saccharo subacto, &c.

R. Mercurius vivus:

Teratur in mortario vitreo cum saccharo, donec pulvis griseus emerget.

De quo ʒj ad ʒjss in cochleari ligneo.

Pulvis TIMÆL von GuldenKlee, quem *l. 5. Cas.* 16, & Arcanum ejusdem, quod *l. 6. Epist.* 2. describit, oleum lignorum, v. g. coryli, item juniperi, quæ RIVERIUS *l. a*. commendat, egregia sunt. Spectant hæc etiam acida, v. g. succus citri, spiritus vitrioli vel sulphuris, sanè aqua communis spiritu sulphuris acidulata subinde hausta mirabiliter vermes expellit: alii spiritum vitrioli cum f. q. sacchari in pulveris formâ redactū contra vermes propinant: Sic Wedelius puerum verminotum tincturâ violarum vitriolatâ curavit: Vid. *Tr. de Med. Facultat. l. 2. Secl. 2. c. 5. pag. 179*. Quod etiam præstat conserva rosarum vitriolata cum aliis mista.

Extra clysteres frequenter injecti, & primò quidem ex lacte, decocto ficuum, passularum, liquitriæ, melle &c. pro alliciendis vermibus, ubi per os anthelmintica exhibita sunt, imprimis conveniunt. Quod si verò ad crassam intestina descendisse videantur lumbrici, ex enecantibus & specificis illa parari debent, v. g. ex radice graminis, gentianæ, absinthio, scordio, centaureo minori, portulaca,



aca, corallina, semine cinæ, &c. in lacte coquendis & cum melle applicandis.

Ab domini denique applicantur fel tauri cum pulvere colocynthidos subactum, quod umbilico impositum, fortiter eos pellit; Item cataplasma ex myrrha, aloë, aceto rosaceo, & felle tauri paratum; oleum absinthii, amygdalarum amararum, hyperici, diacolocynthidos Quercetani, & quod CRATO l. 3. Consil. 25. commendat, petroleum; item oleum destillatum ligni coryli, aut cataplasma ex farina lupinorum, myrrha, aloë, &c. quale RULANDUS Cent. 2. Observ. 21. præscribit; item ex hiera picra cataplasma, oleum contra vermes, cujus BARTHOLINUS Cent. 2. Hist. 67. meminit, unguentum contra vermes Offic., item TIMÆI lib. 5. Casu 16., aut ex unguento de arthanisa; & mercurio vivo, quod RIVERIUS commendat: vid.

PLATERUS Praxi Tom. 3. pagin. 881. & 882.

In specie ad *latores vermes*, qui scorbuticos imprimis affligunt, succus nasturtii recens expressus exhibitus est optimus, item pulvis jalappæ cum semine Santonici à ʒi ad ʒss propinatus, est eorum purgans, teste DRAWIZIO vom *Escarbochel* pag. 127. Item species dia. Turbith cum Rhabarbato, hinc mercurialia.

*Ascarides* verò in specie curant suppositoria ex caeseo Hollandico aut lardo, nunc simpliciter ita applicata, nunc melle illita; item Enemata abstergentia cum colocynthide, item Enemata vel Balnea ex absinthio: Vid. BARTHOLINUS *AB. Med. Hassniens. Volum. 4. pag. 150.* Hinc pulvis ex tartaro vitriolato, corn. Cervi, & Extracto trochiscorum alhandal eos elicit, uti & Mercurialia.

## SECTIO XI.

DE

### VARIIS INTESTINORUM DOLORIBUS.

**H**I cum frequenter in Praxi occurrant, & multa propria habeant, eorum naturam declarabo: nam dum distribuuntur contenta in intestinis, & excernuntur excrementa, non parvi & pauci intestina torquent dolores: de quibus utut in capite generali quodam de doloribus sit agendum, nihilominus tamen consultum duxi, & hic quædam de iis præmonere.

In naturali quidem statu indolens planè & consequenter insentilis intestinorum est actio, & contentorum distributio, nisi quod tantum intestinum rectum sentiat stimulum, quando feces sunt excernendæ. Deinde tantummodò interdum levia adsunt murmura & borborygmi, quando status naturalis intestinorum tenuium, speciatim ilei, peristaltico intestinorum motu hinc inde agitatus, illa murmur & borborygmus infert: nihilominus tamen præternaturali in statu subinde hæc ipsa variis & gravissimis cruciantur doloribus, *Tormina* aliàs appellatis à torquendo, quod in his intestina quasi contorqueri aut convolvi, & omnino constringi videantur: ac reverà formaliter omnes ferè dolores intestinorum, paucissimis exceptis, à convulsivo spasmō intestinorum, in quem à spiritu impetu cidentur, immediate oriuntur, quo torqueri & convolvi videntur.

Ut autem causaliter sint vari, vix tamen quæcunque causæ dolores inferunt, nisi ad motus convulsivos per irritationem intestina disponantur. Causæ ergò, dolores intestinorum facientes, sunt irritatio intestinorum, quibus motus convulsivus inductus fuit, in quo ægri affliguntur. HELMONTIUS non solum convulsiones spasmodicas illustrat eleganti exemplo *Tr. de Flatibus* §. 38., ubi refert in puero herniam umbilicalem à flatibus, ut intestina prolapsa potuerint per tunicam tenuem conspici, qui ingentes pulsus dolores, quotiescunque intestina lumbricali spasmō convelli conspiciuntur; sed & ordinariò ferè alvus suppressa esse solet sub talibus intestinorum doloribus, dum spasmus istis impeditur, ut nimis retardetur naturalis motus peristalticus, & huius medio contentorum profluxio. Rectè hi dolores *tormina* dicuntur. In specie tamen, cum in his multa lateant, observandum: nullum Autorum hanc materiam rectè pertractasse, exceptis duobus, WILLISIO sc. & SYLVIO, licet variè: Sylvius sc. virtutes activas secundum salia explicat, WILLISIUS verò convulsiones, spasmos, horumque naturam rimatur. Horum vestigiis insistamus, & hos duos simul conjungamus pro meliore intellectu.

#### COLICA.

Ex præfatis dolorum speciebus tractabimus colicam, cum aliàs nullus scriptorum symptomata occasionalia melius suggerat. Evolvemus ergo naturam dolorum intestinalium.

#### DIFFERENTIÆ.

In scrutinio autem causarum ante omnia observandæ sunt horum dolorum *Differentiæ*, desumptæ vel à *parte affecta*, vel à *causa efficiente*. Ratione quidem *partis affectæ*

distribuantur intestinorum dolores vel ratione intestini dolentis, vel ratione situs partis dolentis. Intestina, quæ afficiuntur, nunc sunt tenuia, nunc crassa, unde diversi dolores intestinorum, dum iliaci & colici sunt. Tenuia si afficiantur, ut jejunum & ileon, vocari solet imprimis *Dolor iliacus*; quando vero in intestino crasso, in specie in colo, & parte superiore intestini recti urget dolor, *Colicus* dici solet: utut non raro hi duo dolores confundantur à vulgo, adedque in genere quæcunque intestinorum tormina generali *Colica* nomine veniunt, nec multum refert. Facile tamen distingui possunt observando saltem *doloris atrocitatem*, & *intestinorum tenuitatem* & crassiorum *situm*.

Quoad *doloris atrocitatem*: dolores intestinorum tenuium, imprimis iliaci, acerbissimi sunt & crudeliore colicis. Quoad *situm*: Iliaci dolores regionem umbilicalem, & intra eam regionem hypogastricam occupant; Colici verò magis lateralia & superiora petunt. Nam colon intestinum à dextro inguine incipiens, supra & circa dextrum renem sursum assurgit versus hepatis, & inde sub costis nothis transversim fertur ad hypochondrium sinistrum, ejus magnam quidem partem occupat; nihilominus tamen mox angustatum contorquetur ad renem sinistrum in hypochondrio sinistro, indeque porro ad inguen sinistrum, ubi tandem ad os sacrum in intestinum rectum devolvitur. Hinc isti dolores, qui in abdominis ambitu modò delcripto percipiuntur, omnes sunt colici, utut nonnulli eum tantum hoc appellent nomine, quod partem abdominis superiorem & anteriorem instat cinguli ambiat; cum tamen sæpe dolor usque ad umbilicum, imò interdum usque ad vesicam insigni ambitu devolvatur, qui reverà etiam sunt colici. Tenuis verò intestinum, ubi emergit ab intestino duodeno, versus hypochondrium sinistrum torquetur, & hinc recedens medullarium ventris imprimis occupat; Unde in, & circa, & infra umbilicum percepti dolores sunt imprimis iliaci.

Uti obtinuit, ut hi dolores confundantur. Et in genere omnes dolores, qui abdomen occupant, colica vocantur: Idè & huic consuetudini & nos accommodabimus, & nomen Iliaci & Colici insinuemus, cum ratione modi fieri naturaliter conveniant.

Ratione situs doloris hæc iterum est differentia: dum nempe quidam dolor dicitur *hypochondriacus*, alius dolor *lumbaris*, & alius *umbilicalis*. *Hypochondriacus* dolor est iste, qui imprimis & frequentissimè percipitur in hypochondrio sinistro, interdum, sed rarius, in hypochondrio dextro, idque sub costis nothis, dolor acerbus est admodum pertinax, qui communiter adscribitur lienis affectu. Unde vulgo quicunque dolores in ista parte percepti mox habentur pro augurio affecti splenis; tamen, cum iste dolor sit ut plurimum punctorius, rodens, & mordicans, lien verò ejusque parenchyma per se ferè insensibile sit, adedque vix, præterquam gravativum & obtusum dolorem, imprimis ex infarctu ejus nimis enatum, à vitiosis succis seu sanguine productum, vel saltem dolorem obscurissimè tensivum, seu quasi distendentem, ex distenta ejusdem substantia membranea, perpeti queat, facile patet, quod dictus



dictus dolor punctorius & terebrans non spleni, cum in-  
primitissimus sit lien pro tali dolore, sed saltem colo, sub hypo-  
chondrio sinistro non nihil angustato, & deorsum versus  
contorto, proprie conveniat: Unde etiam his doloribus  
hypochondriacis tumor nunc durus & tactui renitens in  
hypochondrio sinistro, nunc vero insignis istius hypochon-  
drii intumescencia, tumor mollis, & facile cedens, nullo  
modo spleni, sed simpliciter intestinis sub hypochondriis  
incurvatis, in specie colo, hinc & ileo, proprius erit; cum  
lien in profundo situs nullo modo contingi queat: conser-  
atur SYLVIVS *Prax. cap. 14. §. 5. & 57.* Vid. & SAL-  
MUTH *Cent. 1. Observ. 24.*, item HILDANUS *Cent. 1.*  
*Observ. 58.* Est fallacia causa non causa.

Dolor ergo hic punctorius & terebrans acerbissimus  
in hypochondrio sinistro observabilis, frequentissimè situs  
est in intestinis, partim quidem in intestino jejunum, partim  
verò, & quidem ut plurimum, in intestino colo, qui in utro-  
que hypochondrio curvatur facit angulum satis acutum:  
Gravissimè ergo errant, dum dicunt. Germani scilicet:  
*Hepar pungit*; si in sinistro, iterum falsum est, si dicunt:  
*Lien pungit*. Hi dolores aliàs percipiuntur, si quis equitan-  
do se exercet, si nona siuectus, percipit in hypochondrio do-  
lorem, maximè, si post passum equitat; jejunum enim  
mox, aut duodenum, jungitur versus hypochondrium sini-  
strum, & facit angulum; unde dolor punctorius sub hypo-  
chondrio sinistro, sub intestino jejunum incurvato; frequen-  
ter tamen in colo, nunc in dextro angulo, nunc in sinis-  
tro.

Quod attinet jejunum intestinum: duodenum, ubi deor-  
sum à pyloro pergit ad principium jejuni, contorquetur  
hoc ipsum jejunum mox ad hypochondrium sinistram, ibi-  
que à lumbis à mesenterio liberius assurgens contorquetur  
postmodum denuò in abdominis medietullum. In illo, ut  
hic dicam, angulo, seu contorsione ista, sæpius latent nunc  
status, nunc verò ut plurimum mucilago acida, quæ ibidem  
pertinaciter affixa dolores istos acerbos hypochondrii sini-  
stri in profundo sitos inducit. Verùm hi dolores sunt fre-  
quentius in colo: id quod rectissimè observat WILHELMUS  
FABRICIVS HILDANVS *C. 1. Obs. 18.*, pro-  
pterea, quoniam colon amplum in sinistro hypochondrio  
angustatur, & in ista angustia contorquetur inferius, ita,  
ut ratione situs & conformationis facillimè status ibidem  
allidere, stercus aut excrementa ibidem hæreere, & non  
tantummodò intensum dolorem, sed etiam renitentiam  
tactui, ut etiam perceptibilem intumescenciam, inferre  
potuerit.

Hic ergo est dolor iste frequens admodum hypochon-  
driacis; partim, quoniam horum intestina semper obsidet  
copiosa mucilago viscida acida; partim, quia his nunquam  
deficiunt status. Falsum ergo est, hunc dolorem esse in  
splene, utpote qui per se ineptus est istiusmodi dolori. Et  
ut dicant, medicamenta splenetica, tam interna, quam  
etiam externa, emplastra & unguenta, spleni admodum con-  
venire in sopiendo hoc dolore, respondeo: quòd ista medi-  
camenta interna splenetica habeant vim aut carminati-  
vam, aut temperandi acidum in intestinis, & ita remo-  
veant causam antecedentem: item emplastra & unguenta  
ordinariò ingreditur gummi ammoniacum, quod habet  
vim egregiam dissolvendi & liquefaciendi mucilaginem  
viscidam ibi stagnantem; & ita evenit, ut, quæ spleni con-  
ducere putantur, reverà conducant intestino colo, à tali  
causa affecto. Curantur terreis absorbentibus, cinnabari-  
nis, carminativis, & Martialibus.

Post dolorem hypochondriacum est *lumbaris dolor*, etiam  
frequentissimus, & qui sæpius confunditur cum dolore ne-  
phritico: siquidem pylorus, dum in intestina se dimittit,  
ibi intestinum duodenum, ventriculo proximum, super-  
stratum reperitur dextræ lumborum regioni, unde, si in in-  
testino duodeno circa principium jejuni subinde oriuntur  
dolores, tùm isti dolores percipiuntur circa dextram lum-  
borum regionem, seu in dorso; *disaceror in spina dorso*, di-  
cunt ægri, & rectè *Dolor lumbaris* vocatur: cujus pars affe-  
cta est hinc rodens, & principium jejuni.

*Dolor hic lumbaris* est multiplex: nunc *nephriticus*,  
nunc *mesentericus*, nunc *pancreaticus*, nunc *intestinalis*.

*Nephriticus* est, qui ex renibus, vel calculo, vel alio af-  
fectu laborantibus oritur, & ut plurimum obtusus, grava-  
tivus & contundens esse solet, & vitia in excretionem urinæ  
varia adjuncta habet: *Ægri dicunt: premor, non pungor*:  
est enim instar ponderis prementis & contundentis mallei  
in regione lumbari.

*Mesentericus* (ita dictus, quod plexus mesentericus, &  
nervi ex spinali medulla ad hos plexus derivati, imprimis  
afficiantur) est, qui fit circa lumbos, propter mesenterium  
superioribus lumborum vertebri annexum, cujus nervi  
vellicati propter spasmos & convulsiones, quas subeunt in  
dicta regione, graves lancinantes dolores, & quasi divel-  
lentes lumbos à spina dorso, excitant; unde dolores partu-  
rentium, hysterici, &c. subinde oriuntur. Frequens hic  
dolor est scorbuticis, & vulgò confunditur cum nephritico,  
licet reverà non ita, & inchoando in dicta lumborum re-  
gione, tandem universum abdomen & intestina occu-  
pet.

*Lumbaris pancreaticus* fit ex pancreate, transversim  
lumbis incumbente, affecto, vel tumente, vel scirrhuso,  
vel exulcerato, vel simili morbo affecto, etique in superio-  
ri regione lumbari juxta costas æsthas obscurior seu obtu-  
sus, & in profundo delitescens, quasi contundens, & levi-  
ter interdum pulsans, minusque gravis, minusque mo-  
lestus.

*Lumbaris intestinalis* dolor est, qui circa regionem lum-  
barem affligit, frequenter ad hypochondrium dextrum in-  
clinat: fit ex dolente intestino duodeno cum principio je-  
juni, vel propter chylum vitiosum, vel propter confuen-  
tes ibidem binos succos, felleum & pancreaticum, ibidem  
acrimoniam suam & effervescentiam præternaturali variis do-  
loribus lancinantes excitantes.

Hæ sunt differentie dolorum intestinalium, quoad par-  
tem affectam.

*Altera differentia* doloris intestinalium fundatur in va-  
rietate cause efficiens, & fiendi modo; indeque tormina  
abdominis, adeoque pathemata colica, sive vel humorosa,  
vel convulsiva. Nam ut quæ semper ferè tormina à spasmo  
intestinalium, vel in toto tractu, vel in quadam parte origi-  
natur, tamen ratione cause antecedentis ita dirigitur: nunc  
quatenus tales dolores symptomati, vel à contentis hu-  
morosis, in intestinis hærentibus, occasionaliter percipiun-  
tur; vel quatenus sine his, ipsorum nervorum ad intestina  
distributorum vitio & spasmò, excitantur: Ideò distingui-  
mus, & per humorosam eam intelligimus, quæ forsetur à  
causa materiali in intestinis hærente: per convulsivam  
eam intelligo, quæ oritur ex vitio nervorum, ad intestina  
ex plexibus mesenterii distributorum, ratione quorum in-  
testinis in fontibus oritur colica convulsiva, quæ doloribus  
varis, & pro causarum proximorum varietate efficiendi  
modo distinctis, affligit: hinc dolor in colica humorosa est  
nunc *fixus* seu *pererebrans*, nunc *purgens*, nunc *disrumpens*,  
nunc *rodens*, nunc *contundens*, nunc *gracilis*,  
nunc *pulsans*: de quibus colicæ humorosæ differentiis &  
causis præceteris SYLVIVS in *cap. 14. v. p.* quando ori-  
tur colica ex contentis stercoribus, ex flatibus, ex mucagi-  
ne viscida, hinc inde intestina obsidente.

Sic enim *dolor pererebrans* & *fixus* est, quando scilicet  
intestina in uno eodemque loco perterebrantur aut quasi per-  
forantur videntur: Oritur hic ipse vel à scybathis induratis,  
in cellulis intestinalium firmiter impaëis, & tunc est perti-  
nax; vel oritur à mucilagine viscida glutinosa & acida, in  
determinato loco quodam hærente, & pertinaciter agglu-  
tinata, in specie in angulis intestinalium sub hypochondrio  
sinistro, in quibus aptum invenit diversorium, ubi nempe  
angustatur & deorsum contorquetur colon. Hujusmodi  
mucilago viscida & acida pertinaciter intestinis aggluti-  
nata, ratione viscositatis dolorem continuum & fixum,  
ratione aciditatis dolorem pectebantem & quasi perforan-  
tem insert. Vel oritur à pituita vitrea veterum, quæ insert  
dolorem fixum quasi perterebrantem. Et hic est dolor iste,  
qui hypochondriacos non raro vexat, & est dolor colicus à  
materia viscida acida & pituita vitrea. Ut dico, est im-  
primis ordinaria, & usitatissima colica.

*Dolor purgens* in colica humorosa oritur ab acido acio-  
ri pertinacique intestina vellicante & pungente, quasi acu  
vellicentur.

*Dolor disrumpens* & quasi disrumpens est, quando intesti-  
na distendi & disrumpi videntur. Hic oritur frequentius à  
flatibus nativis ex materia viscida per vitiosam fermenta-  
tionem ab acido inductam. Aliàs, quoad generationem  
flatuum, sufficiunt ea, quæ habet HELMONTIVS *Tr.*  
*de Flatibus*, qui legatur attentè, maximam enim lucem as-  
fudit doctrinæ de dolore intestinalium à flatibus. Hi in  
intestinis coerciti, & inordinatè moti, hinc inde dolores  
tensivos & divulsivos inducunt: & hic dolor colicus à fla-  
tibus vitio assumptorum est frequens, semper tamen ne-  
cessæ



esse est, concurrat intestinorum spasmus, nunc in uno quodam loco fixus, nunc hinc inde vapus, cuius occasione flatibus exitus interceptur, qui aliàs de facili, quâ datâ portâ, exitum invenirent.

*Dolor gravis* oritur ex materia copiosa plus minus viscida, absque acrimonia cuidam parti, maximè intestinis tenuibus, infixa; ac præsertim pituita vitrea simplex dolorem talem infert. In intestinis crassis talis dolor gravativus sæpe cum sensu tumoris remittentis est. Interdum tumores & abscessus in mesenterio latentes talem dolorem gravativum in abdomine inferunt: Ne ergo confundantur.

Quod si prævium acidum sit peccans hæc materia, sive ex vitio stomachi, sive succi pancreatici, præter gravativum, *Dolor quasi contundens* oriri solet, qui etiam sensu molestus est; dicunt: *Corpus sibi haberi, ac si suffigatur esset.*

*Dolor contorsionis, lacerationis, & vagæ lincinationis*, ac si in corpore omnia se circumvolvunt, acerbissimus dolor est, quo intestina contorqueri, & invicem quasi convolvi videntur, & frequens intestino colo. Tales lincinationes vagæ oriuntur ex convulsione & spasmodica intestinorum contractione, de qua postmodum. Lacerationis hic sensus adest in colica nephritica. Novi mulieres multiparas, dicentes, dolorem nephriticum esse acerbiorum ipsi partus doloribus. Si ergo adsunt tales lincinationes & contorsiones, tunc est *colica convulsiva*, sive habitus sive accidentalis sit.

Tandem dolor varius, nunc rodens, nunc alius symptomatibus variis conjunctus, est ex acido acri non nihil falso, quasi-muriatico, vellicante, arrodente, sodicante, & quasi excoriante intestina: ut plurimum etiam in intestinis agnoscit vermes, qui sæpe satis copiose stabulantur.

Denique dolor adest *pulsans*, qui ex arteriarum, in motu pleno impeditarum, est spasmus, & frequenter inflammationem intestinorum comitatur, vel quando hæc ad inflammationem disponuntur: tunc enim arteria tenditur, ex qua tensione fit pulsus durus sensibilis, ut patet ex inflammato digito propter infixam spinam, in quo mox pulsans arteriarum dolor percipitur. Præterea tamen & aliud quovis inimicum objectum, gravius intestinum quoddam quodam in loco vellicans, facili ex superveniente spasmio arteriolarum dolorem pulsantem inferre potest.

*Tormina abdominis convulsiva* sunt, quæ cum dolore contorquente, lacerante, lancinante, & abdomen subinde contrahente, nunc in duritiem tendente, nunc vago, nunc quodam in loco crebrius fixo, aut convulsionibus & contorsionibus intestinorum simpliciter oriuntur, adeoque crebrioribus lincinationibus & contorsionibus ac lacerationis sensus in intestinis vel abdomine molestus percipitur; omnisque originem habet ex spasmis & convulsivis contractionibus intestinorum.

Colica hæc convulsiva sine causa materiali in intestinis hærente, ad manu ductionem WILLISII iterum est vel *accidentalis* vel *habitualis*. Illa *accidentalis* est ista, quæ a causa evidenti solitaria, nunc externa, nunc interna, sine præcedente certa in corpore prædispositione ad colicam, sæpe a causa quadam occasionali oritur, & iis, qui genus nervosum sensilius, adeoque facilius irritabilius obtinent, imprimis molesta est, adeoque frequenter a causa externa vel aliena, à morbo quodam interno, in alia quadam parte radicato, excitatur; & sic per consensum frequenter ius intestina affligit. Talis colica convulsiva accidentalis, ut à notioribus incipiam, est, quæ ver. gr. observatur in nephritide, in aut post partum, item in purgationibus. Notum est, quod nephritidi superveniant ordinariò tormina abdominis convulsiva, vomitus, singultus, alvus adstricta, aliaque similia symptomata. Non oriuntur hæc propter contenta in intestinis, sed oriuntur à convulsione intestinorum, ex plexibus mesenterii nerveis, à ramo intercostali & pari vago oriundis, qui diffundunt ramos partim ad renes, partim ad intestina, partim ad stomachum.

Ubi ergo per dolorem renalem mediante nervo ad rene istum derivato communicatur huius dolorosus spasmus seu motus convulsivus isti plexui radicali, ex quo oritur nervus, tunc in graviore malo omnes nervi ex plexu oriundi reliqui similiter convelluntur, adeoque intestina convulsa colica pathemata contumacissima inferunt, ubi miserè torquentur agri, nullis nec purgantibus, nec

evacuantibus cedentia: stomachus convulsus vomitum aliaque symptomata habet, & rectè huius sedem statuere puto WILLISIIUM Tr. de Anima Brutorum P. 2. cap. 25. in mesenterio, ita quidem ut pertingat ad plexum mesenterii maximum, qui quacunque ex causa irritatus & contractus dolorem intestinorum & ventriculi infert. Sic dolores abdominis, qui affligunt parturientes, & dolores post partum, &c. sunt tales spasmii, quibus uterus & mesenterium, ipsaque intestina ac genus nervosum, sensilius convelluntur, & convulsionem abdominis inferunt: quibus in partu accedit convulsiva uteri contractura; unde non rarum est, quod mulieres communiter post partum dolore colico laborent; ratio est convulsio spasmodica partium abdominis. Nec rarum est, quod mulieres sub difficili mensium fluxu patiantur tormina gravia abdominis, ex similibus intestinorum spasmis.

*Tormina abdominis habitualia* sunt illa, quæ habitum quasi contrahunt, i. e. quæ certam in corpore & firmiter radicatam dispositionem seu causam antecedentem & tedium somitem in corpore latentem agnoscunt, quo leviter à causa procacitica vel occasionali quacunque in corpore latente commoto atrocità, nunc levia, tormina abdomen occupant, & aliquandiu ægrum excruciant, utut intestina, quoad contenta, rectè se habeant. Tormina hæc nunc successivè denuò remittunt, sed sæpius reverti solent, in quibus sæpe embilicus introversum retrahitur, interdum insigniter distenditur, & duritiem notabilem contrahit: subinde etiam in epilepticos motus, interdum in paralytica pathemata transeunt; cuius rei nuper bina exempla vidi: Mulier cum in tertium annum crebrò epilepsia esset affecta, gravissimo corripiebatur paroxysmo, quo cessante, de horribili colica, quæ intestina lacerari videbantur, conquerebatur. Talis dolor est v. g. dolor abdominis scorbuticus, item in suffocationibus hypochondriacis vel hysteriacis vulgò dictis, virorum & mulierum, est obvijs, estque nihil aliud, quam convulsiones mesenterii, & plexuum nervosorum & conjunctorum intestinorum, quarum partium vehementiore contractionum ulterius insequitur faucium restrictio, & quasi suffocatio. In hac præter tormina abdominis adsunt difficiles respirationes; *suffocatur cor meum*, inquirunt.

Pertinent huc etiam isti gravissimi abdominis dolores, qui non raro morbis diuturnis, & in specie febribus intermittentibus malè curatis, in quibusdam superveniunt, quod cum tædio experimur, qui nullis cedunt remedijs evacuantibus, quæ frustra propinantur, & potius malum irritant; sicut etiam mihi semel evenit, qui curare volui febrem intermittentem solo oleo baccarum juniperi: sed post evenerunt dolores atrocissimi, quæ ullis purgantibus levigari non potuerunt: ad aliquot dies continuabantur tormina convulsiva, orta ex febre illa suppressa. Originem videntur habere ex metastasi fermenti morbo ad glandulas mesenterii, nervos imprimis circa plexos mesaraicos vellicantis, unde postmodum spasmii dolorosi pertinacissimi partium abdominis membranosarum superveniunt; sicut etiam non rara sunt similia tormina in mesenterii abscessibus, morbisque cognatis: vid. BARTHOLINUS Cent. 1. Epist. pag. 253. Propter communicationem spasmodicam Colica etiam periodica, certisque temporibus affligens, observata fuit.

Omnes hi dolores, tam humorosi quam convulsivi, hoc commune habent, ut ratione adjunctorum nunc cum ardore aut phlogosi plus minus intensa, nunc verò cum algore seu frigoris aut rigoris sensu affligant, nunc vomitus adest, nunc abest, nunc, idque sæpius, contumax alvi obstructio, nunc alvus fluida, interdum nimis aperta: ardor & aestus nunc universum corpus occupat, atque plus minus febrilis est, & verè ex impetu spirituum, & concitatore sanguinis cæterorumque humorum motu, occasione dolorum concitatus, oritur: interdum saltem in profundo sub hypochondrio dextro propè regionem lumbarem, ubi inseruntur ductus pancreaticus & Choledochus in intestinum duodenum, percipitur. Hic autem ardor & phlogoses ibidem perceptibiles sunt ex effervescencia acidum bile acriore; exinde enim caloris ac ardoris sensus oritur, qui ægris insigniter est molestus, isque frequentius in dolore lumbari, intestinali, seu circa regionem intestini duodeni: de hoc nuperrimè habui observationem in subiecto, maximè bile oleosa prædito. Algor verò, aut colicæ superveniens rigor, qui in abdomine percipitur, qualis e. g. etiam interdum in principio febrium intermit-



entium obvlus est, est ex contraria causa. Oritur nempe ab acido nimis acris simplici aut austero, aut alio modo excessivo, quod occurrens bili paucæ vel minus oleosæ, aut etiam oblitæ à materia viscida in intestino duodeno, ibidem cum eadem concurrens effervesceit quidem, dolorem tamen cum frigoris sensu junctum infert: sicut videmus spiritum vitrioli salis volatili non oleoso affusum effervescentiam quidem, sed satis frigidam, inferre. Hoc frigus læpius quidem in regione lumbari, & interdum etiam in aliis intestinorum locis, persentiscitur, propterea plus vel minus acidi, aut copiosus iste pancreaticus existit succus. Reverà autem vix videtur esse positivum frigus, quin potius oritur ab acido peccante, membranas mesaricas & vicinas vellicante, & in spasmos cogente, qui frigoris sensum solent repræsentare; parili ferè ratione, atque rigor & frigus febrile non nisi à tali membranarum circa præcordia, & hinc panniculi carnosii, spasmo tremulo oriuntur. Vomitus interdum abdomine dolentes affligit, præsertim in colica convulsiva crebriores observantur, ut in nephritica, hysterica & scorbutica notum est: minus in colica humerosa, nisi vel intestina superiora tenuia magis afflicta sint, vel occasione assumptorum in ventriculo corruptorum, malum ortum fuerit; interdum tamen à colo malè affecto, quatenus ventriculo proximè subternitur, vomitus concitari solet. Alvus adstricta, ut plurimum oritur ex intestinorum convulsiva, cæque pertinaci in quodam loco contracturâ; unde in convulsiva frequens est, & hinc etiam in humerosa, magis tamen in illa; & etiam si aperitur alvus in convulsiva, parum commodi exinde percipiunt ægri, secus in humerosa; in hac enim, si evacuetur, qui evacuari debet, melius ordinariò habere solent ægri. Ardoris istius originem optimè explicat, v.g. spiritus vitrioli acidus oleo terebinthinæ affusus, ex quibus oritur effervescentia cum intensissimo ardore, ita ut per vitrum manus insigniter incalascit, & sæpius vitrum rumpatur; vel si confundatur spiritus salis rectificatus cum spiritu vini rectificato, ex quibus duobus, celeri manu permixtis, tam intensus excitatur calor, ut interdum erumpat flammula, & vitrum, nisi sit admodum capax, in mille frusta diffiliat: simili ferè ratione acidum vitiosum nunc ex pancreate, nunc aliis locis ad intestinum delatum, occurrens bili, talem inferre solet.

Cæterum præter hunc ardorem, etiam non rarò sunt ardores in abdomine, ut in aliis locis; sed hi sunt conjuncti cum sensu pulsacili, & sunt dolores ardentes pullatorii, qui oriuntur ex inflammatione cuiusdam intestini, quando sc. sanguis in vasis capillaribus intestinorum effunditur, ibique inflammationem inducit, in qua inflammatione inseparabilis comes est sensus pullatorii.

### PARS AFFECTA.

*Pars affecta* in talibus torminibus semper sunt intestina primariò, nempe à morbo, i.e. à dolore; pars verò affecta à causa in colica humerosa sunt eadem intestina, uti etiam in colica convulsiva, quando malum est per essentiam sed in colica convulsiva per consensum, aut etiam in Colica habituali, vitium est in nervis, & plexibus mesenterii nerveis, vel per consensum affectis, vel ab acido acris eo deposito & congesto irruatis.

### CAUSÆ.

Ex his patet, quæ sint causæ omnium in intestinis dolorum? In genere sunt duæ causæ, quæ dolorem in intestinis inferunt.

*Prima causa* sunt contenta in intestinis varia, plus minus naturalia, quæ iidem dolorem inferunt, & multiplex eorum nocendi artificium.

*Secunda causa* est spasmodica intestinorum convulsio, quæ intestina in vias dolorificas crispationes & contorsiones coguntur.

Ut plurimum concurrunt in graviore dolore hæc duo, ut sc. adsit aliquid ægri, imprimis ex pancreate, quod intestina irritat aut vellicat, & hinc supervenit ex irritatione spasmodica & dolorifica intestinorum contractio.

Ad eoque in omnibus intestinorum torminibus, tam humerosis quam convulsivis habitualibus, quoad causam antecedentem, respiciendum est imprimis ad acre acidum plus minus austerrum, plus minus viscidum; vel ex stomacho ad intestina delatum, ad eoque ab assumptis vel vitiosis, vel vitiosè digestis, eo distributum; vel in plexibus nerveis mesenterii,

*Etmull. Oper. Tom. I.*

vicinisque locis membranosis, pertinaciter hærens, & à quacunque causa externa excitatum.

Quoad intestinorum contenta, quæ Colicam humerosam continent, imprimis dixi esse attendendum ad acidum: vix enim datur Colica vera, quæ non habeat ortum seu doloris sensum ex acre vitioso, & intestinis molesto; qui si adest, dat tormina, vel flatus, distendentes intestina; hinc *Colica stercoraria* à stercoribus induratis; hinc *Colica puritosa* à succis glutinosis, imprimis acidis, item ab assumptis, præsertim fructibus horæis, fermentescibilibus, itè à cerevisia novella, item à pinguibus cum superingesto potu frigido, vel acidulo crebriores oriuntur Colicæ. Bilis enim per se inepta est ad inducendum dolorem Colicum, cum per se diluat potius contenta, & ita ratione salis volatilis oleosi, quod est saponaria naturæ, intestina quasi abstergat, temperet acorem, & ad hærentes lordes instar Clysteris naturalis per abusum naturæ quasi abluat: Colica è contrà lethalis est, ubi abest bilis; aut si biliosa observetur Colica, à bile portacea seu æruginosa originem eadem habebit: acor potius biliosus in subiecto plus minus viscido hærens, indeque elevati flatus, humerosas Colicas inferunt. In specie sub Purgationibus generosioribus Hypochondriaci & Icorbutici sæpius tormina patiuntur, partim à stimulis remedia purgantia, partim ab actionibus ad intestina communis humoribus: item post elum alimentorum difficulter digestibilibus, aut qui copiosam mucilaginem viscidam loco Chyli subministrant, Colicæ subindè oriuntur, præsertim si abdominis superveniat nimia refrigeratio: in specie pinguis assumpta, quibus potus facillè accescens superbibitur, abest in mucaginem viscidam, & accescentem, quæ in intestinis postmodum dat Colicam. Sic post cibos acidos, fructus horæos, poma cruda immatura, pyra, vinum, & mustum infectum, post potus non ritè defecatos (*Keuterling*) nec depuratos, item post abusum cerevisiæ albæ, (*Breyhan*) ex utroque facillè fermentescibilibus, & similium potuum, una cum melle aliisque dulcibus, præsertim in digestionis debiliore stomacho, fermentando & accescendo subindè Colicæ superveniunt. Item ex ostrearum nimio usu frequenter oriuntur atrocissima tormina, quod aliquando observavit *FORESTUS l. 21. Obs. 7.* Præ cæteris flatus, hinc stercora diutius retenta, & tandem cruditates viscidæ acidæ in intestinis frequentissimè tormina abdominis inferunt: hinc hypochondriaci, in quibus notissimus est excessus acidi, & in quibus reperitur materia viscida in abdomine & intestinis, & copiosi flatus, admodum proclives sunt ad tormina Colica: Hinc rectè mulieres prohibent nutrites ab omni acido, exinde enim infantes in tormina ventris incidunt. Acidum enim, uti lac coagulat in stomacho, ita viscidam mucilaginem in intestinis exinde producit, unde exoriuntur exinde tormina infantum. Hac ratione intelligenda venit doctrina Paracelsica, quæ pro causa Colicæ adducit spiritus salium resolutos, aut etiam tartarum nimis resolutum, aut etiam coagulatum nimis, qui tartarus stypticus alluminosusque acris spiritibus intestina & vicinas partes irritet & exerceat: nempe acidum peccans hoc ipso insinuat. Stercora quod attinet nimis indurata, in intestinis tenuibus viscida & crassa, & ab acido plus minus austero coagulata, *Colicam stercorariam* dictam, subindè perquam contumacem, inferunt subsistentibus firmitus in intestinorum cellulis dictis stercoribus, & ita ad dolorem eadem irritantibus: Hinc in ictero interdum supervenit Colica pertinacissima ex defectu bilis & abundantia succi pancreatici in intestinis, unde contenta ab acido coagulata & constipata intestina vellicant: hinc acida maximè nocent colicæ laborantibus.

Facit hæc dolor colicus in *lue Gallia* interdum affligens, ex acido specifico natus viscido, qualem observavit *ZACUTUS LUSITANUS lib. 2. Præseos Admir. Obser. 21.* nullis nisi Mercurialibus Unguentis, succumbens.

Pertinent hæc varia præternaturalia deglutita: utri, quando v.g. ex nummis aureis deglutitis, indeque eorum substantia, in cellulis coli stercori transitum impediendo, contumacissima Colica oritur: vid. *BARTHOLINUS Cent. 3. Epist. 69.* item *BORELLVS Cent. 4. Obser. 25.* Item ex potu aquarum arsenico infectarum Colica observata est. Colicam atrocissimam cuip rufsi, præcordiorum angustia & respirandi difficultate à vapore Saturni hausto, videb. in *M. A.N.C. Ann. 3. Obser. 131.* Idem observatum est ab aquis haustis ex vase plumbeo intus incrustato. *ibid.*

Pertinent hæc calculi, qui subindè à colicis fuerunt excreti cum levamine, ita, ut reverà detur *Colica calculosa* à calculis an intestinis coagulatis: qualia exempla vide *l. 4. Obs. 44. 19b seqq. HORSTI.*



Ex vermibus quoque & lumbricis in intestinis habitantibus gravissimus Colicus dolor obortus est: vid. AMATVS LVSITANVS *Cent. 1. Cur. 5. l. 33. p. 232. 236. l. 237.* de gravissimo in idem dolore colico, perceptio ex calculo magnitudine ovi gallinæ excreto: item à BENEVENTO *cap. 9. pag. 132.* ubi habet colicum dolorem intensissimum, qui curatus fuit excreto lapide ex intestinis per Fomenta emollientia admota: Consecutus SCHENCKIVS, & M. A. N. C. *Ann. 8. Obs. 70.* cum cura, HILDANVS *Cent. 1. Obs. 57.* THONERVS *l. 2. Obs. 4.* RHODIVS & SALMVTH: Et dolorem inferentem, sanè Colicum dolorem lethalem ex intestinis à dysenteria conglutinatâ, observat RHODIVS *Cent. 2. Obs. 77.* Sic pariter Colicam lethalem notavit SCVLTVS in *Artem. Chirurg. Obs. v. 61.* natam ob cancerum occultum, ex obstrukione occulta meatus choledochi.

Pertinet huc denique, quod observat HORSTIVS *l. 4. Obs. 47.* tormina continua sub hypochondrio dextro à calculo, vesicam biliariam repente, & intestinum atterente. Pariter colicum dolorem à purita, in externa intestinorum superficie hærente, notat RIVERIVS in *Obs. communicatis.*

Nil magis solet excitare Colicam vitio intestinorum, quàm acidum intestinis inimicissimum; item frigida, uti alias partibus nervosis infecta, ita in intestinis faciunt Colicam, siue acidum hospitet in subiecto seroso, siue vitio digestionis primæ, siue per pylorum & ex pancreate ad intestina veniat.

Secundam causam Colicæ dixi esse non contenta in intestinis, sed potius spasmodicam convulsionem & contorsionem, quæ constituit Colicam convulsivam. In hac considerandum etiam venit acidum nervis eorumque fibris inimicissimum, in plexibus nerveis mesenterii vicinisque locis pertinacius hærens, à quacunque causa externa excitatum, idque vel cum nutrimento proprio ad dictas partes delatum, vel cum vehiculo lymphæ ed depositum: id quod in scorbuticis, hysteriis, &c. post febres malè curatas certissimum est. Item tormina abdominis contumaciore, utut non semper æquè atrocia, sæpè ab abscessibus in glandulis mesenterii & pancreate fiunt, teste BARTHOLINO *l. a.*

Sunt autem hæc tormina convulsiva vel hypochondriaca & hysterica, vel febrilia. *Passionem hystericam* quidem quod attinet: reverè hæc nihil est aliud, quàm species Colicæ convulsivæ, cuius fundamentum hæret in plexibus nerveis mesentericis irritatis, & in spasmodicis convulsionibus concitatis, unde etiam partium superiorum superveniunt spasmi, indeque præcordiorum angustia, difficiles respiraciones &c.; nam sensus globi in abdomine moti, quem mulierum & ignorantis Medici pro uteri habent motu, est plexus centralis maxime convulsus, adeo, ut etiam observetur talis globus in viris, qui tamen utero carent: vid. WILLISIVS de *Passione Hyster.* Scorbutici dolores omnium sunt vehementissimi, & misere torquent, ut iuxta illum ceteræ species sint saltem rufus joculique, quos ex convulsionibus intestinorum reget, & omnium optime demonstrat IOHANNES DRABITIVS in *institutione de scorbutico dolorifico* S. 8. qui eleganter hoc negotium declaravit per motus convulsivos & spasmos nervorum in & extra mesenterium oriorum, & ad intestina derivatorum.

Inchoat in specie & jussimodi dolor in dorso ac regione lumbæ

ri, hinc & pergit ad interiora, & intestina graviter affligit: inchoat sc. ubi annequitur mesenterium, & pertingit anteriora versus usque ad umbilicum: interdum est admodum vagus & oberrans, interdum fixus, & in quo umbilicus interiora versus retractus apparet; interdum in intestinis & abdomine convulsiones & contracturas inferi dolorosas: Subinde hæc cessant, & superveniunt nunc convulsiones artuum, nunc verò pareses, quibus cessantibus, repetit abdominis dolor: Interdum pertinaciter abdomen afficit. Quæ omnia certè non possunt concipi, nisi per talem convulsionem. Accedit quoque, quod in tali Colica podex sæpè sit pertinacissime clausus, & interiora versus contractus, quando nempe & ipse est convulsus, ita, ut nullum Clyster poterit applicari propter spasmodum, simul intestinum rectum occupantem. Fit non raro, ut ipsum abdomen excavatum appareat, & umbilicus interiorum versus retractus videatur propter istas convulsiones, quibus umbilicus, & forsitan etiam ipsum peritonæum simul afficitur. Certum est, quod hi dolores abdominis convulsivi sunt gravissimi & contumacissimi, & nisi rectè tractentur, facile degenerant in pareses, ut in locis vinosis, Austria, Moravia, Franconia, &c. sævis experiantur incolæ, vel contracturas artuum. Hæc virum icorbuticum, qui alias optime valet, leviter autem occasione, vel in alicuius terrore, vel ex assumptis alimentis tantulum scime accitibus, ex haustu vini rubidi, ex potu cerevisiæ non inædescentia &c. subito corripitur Colicâ convulsivâ: horridus patoryismus est, post horas 6. convalescit, percipit dolorem iuxta spinam dorsæ, quatenus ab acido membranae nervæ vellantur, & ipsam concipiunt: vibratur ad umbilicum, variis torminibus & torturâ totum abdomen excruciat, donec ad spinam dorsæ quietus resistat. Subindè prodit alicuiusmodi dolorum convulsivorum apud TVLPIUM *l. 3. Obs. 22.* & THIERNÉYERVM *Pr. T. 2. c. 4.* antiquæ Scriptores Practicos & Theoreticos; sed quos hi ipsi talem ex humoribus, speciatim ex bile derivatè nituntur. Non autem commodè ex his extricare se possunt: tunc dicunt, oriri ab humoribus intra membranas intestinorum, seu ipsam eorum substantiam, nunc in concavo, nunc in parte convexa intestinorum contentis; nunc dicunt oriri ab humoribus biliosis vel acerbis in duplicatâ peritonæi afflatis: alii alias assignant causas: vid. FORESTUS *l. 25. Obs. 3.* item RIOLANUS in *Enciclos. Anatom. de Peritonæo cap. 13. pag. 96.* Sed facilis est error, si cum horum symptomata explicatio, modò superius dicta ponderentur. Solus WILLISIVS primò oculos aperuit, tamen in *Anat. Cerebri*, quàm in *Tr. de Morbis Convulsivis*, ut & de *An. Brutorum* P. 2. cap. 15.

Febrilia tormina iuncta, quæ tribus intermittentibus diuturnis non adeo benè curatis supervenire solent, ante etiam critico modo superveniunt: alvus pertinaciter est clausa, purgantibus etiam fortioribus si laxantur æri, sit tamen ferè sine dolorum levamine. Videntur autem oriri ex metastasi materię morbosæ, delatæ ad glandulas mesenterii, vesicantis partes nerveas; unde etiam non raro sunt similia tormina in mesenterio abscessibus.

Dolores abdominis considerantur secundum suas differentias, vel ratione partis affectæ, vel ratione causæ efficientis.

In parte affecta  
consideratur

intestinum dolens

situs doloris;  
unde dolor, vel

1. tenue: dolor Iliacus.

2. crassum: dolor Colicus.

hypochondriacus  
utriusque lateris.  
lumbæ: qui iterum vel  
umbilicalis.]

nephriticus  
mesentericus.  
pancreaticus.  
intestinalis.



In causa efficiente  
consideratur dolor, vel

{ humorosus.  
convulsivus.

In dolore humoroso  
consideratur vel

Modus

{ fixus, seu cerebrana.  
pungens.  
distendens.  
rodens.  
contundens.  
gravans.  
pulsans.

Causa

{ flatus.  
stercora indurata.  
ictericia.  
mucus renax.  
assumpta varia: Horrea  
facile fermentescibilia.  
cerevisia novella.  
pinguia cum potu acido  
nummi auxci.  
calculi.  
ipsi intestinorum affe-  
ctus: sc. hernia, in-  
flammatio, &c.

{ ab acido  
in subje-  
cto plus  
minus  
viscido.

In convulsivo  
consideratur

Modus doloris

{ lacerans.  
lancinans.  
contorquens.  
pulsans.  
His addatur abdomen tendens, ut  
in subluxatione vertebrarum.

Causa

accidentalis

{ nephritica.  
parturientis.  
purgantis.  
menstrua.  
item abscessus partium vicinarum, ut  
glândularum mesenterii, pancreatis  
&c. vid. Bartholin, C. 1. Ep. p. 353.

habitualis  
ab acido  
nervos vel  
licante

{ hypochondriaca.  
hysterica.  
scorbutica.  
febrilis.

Ratione adjuncti in genere est

{ frigida.  
calida.

Multa essent dicenda de Colicis malignis: sed temporis angusta impedit hoc. Moneo saltem, quod vomitus & singultus talis Colicæ ex vicinitate stomachi & diaphragmatis omnes sunt ex similibus spasmis ex mesenterio vibratis.

## D I A G N O S I S.

Pergo ad signa diagnostica:

Diagnostica signa doloris habentur ab ægro & symptomatum syndrome: In hac sinus cauti, ut dignoscamus bene in Colica affectu eam, quæ est conjuncta cum nephritide, à solitaria.

Ut autem ritè cognoscantur hi dolores intestinales; & ritè à se invicem discernantur, tria summa capita observanda sunt:

1. *Antecedentia*, ut constitutio ægri, vitæ ratio, motus conueniens, an scorbuticus, calculosus, &c.
2. *Adjuncta* seu *incidentia* in ægro: nempe ipse doloris modus, & adjuncta reliqua partium symptomata.
3. *Consequentia*: mutationes nempe in urina, in alvi excrementis, iuvantia & Nocentia, si alvus non responderet, fæces induratae, vel intestina contracta; si purgantia nil evacuant, vel parum sine levamine, est Colica convulsiva.

Ex his invicem collatis, sed probè ponderatis, facile est, dolores dictos à se invicem discernere, & sciendi eorum rationem cognoscere. In specie attendendum, an sit Colica humorosa? an verò convulsiva? & si hæc, an sit accidentalis? an verò habitualis? & si habitualis; an sit scorbutica, hysterica, an alia?

Est muller. Oper. Tom. II.

Speciatim sæpius confunditur Colica simplex cum illa, quæ superuenit nephritidi. Ut ita melius cognoscatur radix morbi, omnes circumstantiæ probè pensandæ, & speciatim urina, in qua, si sit Colica nephritica, notabiles mutationes observari solent: si enim sunt Aquæ, Colica est nephritica; intensius tinctæ in medio, coloratae in superficie, signum Colicæ scorbuticæ.

Solitaria facillè distinguitur ab ea, quæ incipit in affectibus uteri: Nā ubi cum convulsione intestinorum concurrit convulsio partium ad uterum pertinentium, percipitur dolor, qui à lumbis deorsum trahitur versus sinum pudoris; item si adest simul affectus uterinus, dolor ille etiam ad os femoris seu coxendicis pertingit: item, si adest junctus dolor ille cum difficultate morus, percipitur gravamen in dorso & lumbis propè renes, & hinc sequitur postmodum dolor Colicus.

Denique si acerbatur dolor Colicus, ut fiat passio hysterica, tunc percipiunt simul angustiam in præcordiis, item percipiunt impedimentum in respiratione, propter similem convulsionem diaphragmatis deorsum versus.

Ut à dolore nephritico distinguatur Colica, observetur quod in dolore colico post passum sit remissio, imprimis post assumptam aromaticam, quæ sunt Colicæ remedia; dolor verò renalis post passum sit acerbior. Deinde, si adest dolor renalis, mutatio semper est in urina, quod non est in Colica; aut, quod obiter moneo, quod in dolore colico scorbutico adest stranguria insignis, & urina coloris admodum fulgidi & salini excernitur, sed non semper. Tandem, ubi dolor est colicus, Clysteres aut Evacuationes alvi esse leuant; renalē aut parum, aut nihil solent levare. Denique in renali Colica adest semper dolor plus minus

K 3 obtu-



obtusius ac gravatius in dorso circa lumbos, qui non est in Colica vera.

Plura de signis distinctivis Colicæ veræ à Colicæ nephriticæ, videb. in SENNERTI *Praxi*.

In Colica convulsiva est dolor lacerans, sed non ita gravatius & obtusus, ut in renibus: Urinæ excernuntur pallidæ & lacteæ, copioso sedimento imprægnatæ, quod non fit in reliquis speciebus Colicæ.

### P R O G N O S I S.

Quod attinet signa prognostica: Colica ex se leve malum est, raro periculosa; quæ tamen interdum ex adjunctorum aut supervenientium symptomatum, aut plurium circumstantiarum ratione, & ubi est nimis continuax, potest esse periculosa, imò lethalis.

Humorosa, & quæ sit à materia in intestinis contenta, quam veteres Prædici sæpius Colicam biliosam vocare solent, mitior est, & facilius curatur convulsiva.

Porro omnis Colica convulsiva, quò magis complicata habet symptomata ventriculi, eò est periculosior, & difficilius curatu.

In specie vomitus Colicæ superveniens raro bonum signum est.

Colica humorosa flatulenta gravia symptomata facit, & ad tympanitidem disponit.

Colica convulsiva habitualis omnis periculosa est; partim ob diuturnum paroxysmum; partim, quod sæpius recurrat, & sic periculosior fiat: firmiter radicata facit mala multa; nam huic non raro superveniunt aut pareses, aut epilepsiz: Sic HOEFERUS in *Hercule Med.* p. 185. exemplum habet Colicæ, quæ gravem cephalalgiam & maniam induxit, cum cæcitate & impedita deglutitione. Item THONERUS in *Obs.* pag. 93. observat colicam in geminatam visionem & epilepsiam terminatam; nec ratum est, quod intulerit tetanum totius corporis & contracturas partium externarum.

In humorosa colica saltem attendendum est, ne sub ejus exacerbatione & alvi obstructione superveniat alios morbus.

Eventit interdum, ut Colica humorosa degeneret in abscessum: vid. HILDANUS, qui C. 2. *Obs.* 74. refert dolorem neglectum, qui superveniente febre & abscessu in colo, mortem post se traxit: conf. etiam C. 1. *Obs.* 54., ubi prostant exempla doloris colici in abscessum intestinum degenerati. Aliud videbitis exemplum in PANAROLLO *Poetec.* 4. *Obs.* 50., qui habet dolorem colicum intra 10. horas lethalem: quæ tamen rara.

Colica scorbutica convulsiva interdum est lethalis, ita, ut observata fuerit instar morbi peracuti intra dies 3. & noctes 3. aut 4. jugulasse ægrum.

Rapcedo in Colica ut plurimum lethale signum est. Denique in omni Colica, quò magis aperta alvus, & stimula respondet, bonum est; quò contumacior, imprimis si podex retractus, periculosa est, & metus passionis illiæ: vid. RIVERIUS in *Praxi de dolore Colico*.

Petgo ad

### C U R A M.

Cura Colicæ est duplex: nempe instituat vel in paroxysmo, vel extra paroxysmum.

In Paroxysmo

1. Cautela irritans intestina maturè sopiendâ, & ipse intestinorum sensus dolorosus, indeque natus motus convulsivus opiatu sistendus.
2. Si est Colica humorosa, causa peccans materialis, ejusdem nempe acrimonia acida, aut visciditas, aut alius nocendi modus, corrigenda, & maturè per alvum educenda. Patet quid, cum Colica humorosa ut plurimum oriatur ex mucos acido viscido, in hac Cura convenient aromatica acidum corrigentia, viscidum incidentia & evacuantia, imprimis gummata mucum expurgantia.
3. Si Colica est convulsiva, appropriata nervina, in specie salia volatilia oleosa opiatu mista, propinanda sunt.

Extra paroxysmum, hoc sedato, morbus primarius, fomes morbosus, unde dolores pendunt, isque in specie in Colica convulsiva habituali, variis appropriatis est tollendus, & crebrior aut consuetudo recidiva præcavenda.

Pro dictis tribus leopis in paroxysmi Cura obtinendis, imprimis in toto paroxysmo, repetitus clysterum legitime ap-

plicatorum usus sedulo est observandus, ut his ipse, pro varietate intentionum variis, continuo alvus, quantum possibile, evacuetur & fervetur aperta: magis autem conveniunt Clysmata talia, si in humorosa malum hæret in intestinis crassis; mitius verò, quando in tenuibus: Et quidem ubi non sumus certi, in humorosa materiam peccantem hædere præcisè in intestinis tenuibus, minus conveniunt purgantia Clysteribus admitta, propter metum volvuli: Ubi verò certum est, malum hædere in intestinis crassis, imprimis colo, uti communiter fit in dolore hypochondriaco, tunc etiam fortiora purgantia seu stimulantia Clysmatis addi possunt.

Deinde conveniunt, ubi ventriculus gravius simul affligitur, ut tanquam revulsorio stimulo tam causa irritans, quam motus spirituum, ad intestina deriveretur: Item, quando post propinata Purgantia non sufficienter respondet alvus, optimum est in talibus casibus clysteribus acerbis plus minus purgantibus naturæ motum promovere. Quando verò malum hæret in intestinis tenuibus, potius blandissima laxantia & abstergentia per os conducunt: quod confirmat experientia D. MOEBII in infante Colicâ laborante, cui Medicus quidam aliquot Clysteres applicandos curavit, sed sine fructu; tandem MOEBIUS advocatus laxans blandissimum per os adhibuit, quod ex voto cessit, & infans brevi convalescit: Videatur Colleg. MOEBII in *Synopsi cap. de Colica*. Quod si videmus, Clysteribus acrioribus alvum non respondere, & malum non mitigari, ut ulterius insistendum non est, sed præsumendum, vitium hædere vel in Intestinis superioribus, vel esse Colicam simpliciter convulsivam. In convulsiva Colica Clysteres anodynæ & leniter demulcentes sunt optimi: item accedendum est ad Clysmata ter binitinata, quæ in quavis convulsione sunt optima. Si in Colica imminet metus Ilei, vel podex sit pertinaciter retractus, non adeò copiose injicienda sunt, ne promoveamus iliacum morbum.

Clysmata, quæ in omni Colica conveniunt, sunt in principio morbi vel mitiora emollientia, si scilicet in intestinis abstergentia; aut carminantia; vel si non suffecerint, fortiora purgantia, aut acrius stimulantia ex colocynthide, aut timo, & similibus: Præsertim in humorosa, quando alvus præternaturaliter & pertinaciter obstructa, Clysmata insigniter emollientia profunt, quæ sunt ex lacte simpliciter, addito saccharo aut melle, oleo communis aut lini; vel quando coquantur in lacte quædam emollientia, quæ blandè alvum lubricant, talia sunt optima, imprimis in doloribus abdominalis scorbutici, item in hypochondriaciis, in quibus cum melle mixtæ conveniunt.

Si magis anodyna desiderantur;

R. Fol. hyoscyam. M. j.

Coqu. in f. q. lactis:

Colaturæ 3 iij. vel 3 x. adde

Mellis rosati 3 j.

M. pro Clysmate anodyno: S.

Clyster lenitivus.

In graviore Colica, ubi materia hæret in crassis intestinis, injici possunt ex oleo expresso sem. lini, raparum, &c.

R. Ol. expr. sem. lini,

Rapar. an. 3 v.

M. pro Enemate: S.

Clyster lenitivus.

V. l. aqua muc.

Ol. diacolocynth. 3 vj.

Et mixt. pro Clysmate: S.

Vi. ansea.

Vel communis modo Clysmata emollientia injicienda:

R. Herb. brancæ urpæ,

Maltæ,

Meliloti an. M. j.

Rad. li. arb. 3 j.

Sal. Tart. 3 j.

Coqu. in f. q. Aquæ simpl.

Colaturæ 3 iij. vel 3 j. adde

Ol. lil. alb. 3 iv. vel vj.

Visc. ovi No. j.

Mell. de pum. 3 j.

M. pro Clysmate duobus vicibus injiciendo: S.

Clyster emolliens.

Vel ubi aut mucus viscidior, aut si scilicet in intestinis hærent, omisso oleo, Clysteribus talibus geminæ a 3 j. ad 3 ij. addendū est, quod omnes leces attenuandi & dissipandi vim habet, hinc pro laxanda alvo obstructa optime valet: v. g. cly-



clysteri supra dicto ex oleo seminis lini & raparum ʒj. salis gemmae addi potest: Vel

℞. Herb. Malva M.ij.  
Flor. sambuc.  
Verbasc. (qui sunt anodyni) an. M.ʒ.  
Rad. lil. alb. ʒʒ. ad ʒj.  
Coqu. in aqu. simpl.  
Colatura ʒviii. vel ʒix. adde  
Elect. biera picta (stimulat, & est aloëticum)  
ʒʒ. vel ʒvj. ad ʒj.  
(vel pro scopo emolliendi El. Lenis. ʒiʒ.)  
Sal. gemm. ʒij. ad ʒj.  
M. pro Clysmate una vice applicando. S.  
Clyster emolliens.

Ubi verò sunt flatus, convenit Clysmata carminans & emol-  
lens, imprimis cum sale gemmae injectum: e. g.

℞. Spec. emoll. M.ij.  
Rad. angel.  
Levifl.  
Sem. carvi an. ʒʒ.  
Bacc. junip. ʒj.  
Coqu. in f. q. Aqua:  
Colatura ʒviii. adde  
Elect. de baccis lauri ʒvj.  
Mell. rutac. ʒʒ.  
Salis gemma vel nitri depur. ʒij.  
M. f. Enema: S.  
Clyster carminans.  
℞. Spec. emoll. M.ij.  
Carmin. M.ʒ.  
Sem. carvi ʒj.  
Baccar. junip. ʒj.  
Coqu. in f. q. Aqua:  
Colatura ʒviii. adde  
Elect. bier. cum opar. ʒj.  
Mell. Mercurial. ʒʒ.  
Salis gemma vel nitri ʒj.  
M. f. Enema: S.  
Vt antea.

℞. Herb. veron.  
Flor. chamom. an. M.ij.  
Rad. Levifl. ʒʒ.  
Sem. anis ʒiiij.  
Coqu. in f. q. Aqua:  
Colatura ʒviii. adde  
Sal. gemma ʒj.  
Mell. Mercur. ʒj.  
M. pro Clysmate: S.  
Vt supra.

℞. Herb. calaminib.  
Ruta an. M.ʒ.  
Flor. alib.  
Anethi,  
Chamom. an. M.ʒ.  
Bacc. lauri,  
Sem. carvi,  
Cumini. an. ʒʒ.  
Fenugr.  
Lini an. ʒiiij.  
Coqu. in f. q. Aqua:  
Colatura ʒx. adde  
Salis gemm. ʒj.  
Ol. anethi,  
Ruta,  
El. bier. picr. an. ʒʒ.  
M. f. Enema: S.  
Clyster contra flatus.

**RULANDUS** seu maximè expertum Clysmata laudat in  
desperata alvi obstructione, in dolore colico & iliaco se-  
quens, utut incondita sit Compositio:

℞. Decoct. flor. chamom. vel verbasci ʒviii.  
Ol. cham. per infusionem & decoctionem ʒv.  
Elect. bened. laxat. ʒj.  
Sacch. rubr. ʒʒ.  
Diagryd. gr. viij.  
Sal. comm. vel salis gemma ʒj.

M. pro Clysmate.

Cujus usum commendat, tanquam sibi sæpius expertum.

Loco salis gemmae in Colica flatulenta potius olea de-  
stillata simul addenda, quæ potenter penetrant, & flatus di-  
fructiunt: e. g. sit Clysmata carminativa anodyna, quale  
Ettmüller. Oper. Tom. II.

etiam hypochondriacis, item hysteriacis commodè præscri-  
bi potest hoc modo:

℞. Fol. lauri p. iij. vel M.ʒ.  
Flor. Chamom. Rom. aut Vulgar. M.ʒ.  
Rad. angel. vel Levifl. ʒvj.  
Sem. calid. minor. an. ʒij.  
Coqu. in aqu. comm.  
Colatura ʒx. adde  
Elect. de bacc. lauri ʒvj.  
Syrup. papav. f. ʒʒ. vel loco hujus Ther.  
ʒj. ad ʒij.

Ol. destill. angel.  
Carvi,  
Cumini.  
Bacc. lauri an. gutt. iij. vel iv.  
Vitell. oui No. j.

M. pro Clysmate pro 2. dosibus injiciendo, propter flatus,  
qui impediunt, quo minus totum una vice possit injici.

S. Clyster lenitivus contra flatus.

℞. Fol. lauri M.ʒ.  
Flor. chamom. M.ʒ.  
Rad. angel.  
Levifl. an. ʒiiij.  
Coqu. in f. q. aqu. comm.  
Colatura ʒix. adde  
Elect. de bacc. lauri ʒvj.  
Theriaca ʒj.  
Ol. destill. carvi,  
Cumini,  
Bacc. junip.

Lauri an. gutt. v.

M. pro Clysmate duabus vel partitis vicibus injiciendo: S.  
Vt antea.

℞. Summitat. anethi,  
Herb. chamom. an. M.ʒ.  
Rad. Levifl. ʒj.  
Baccar. lauri ʒvj.  
Sem. fenic. ʒiiij.  
Coqu. in f. q. Aqua:  
Colatura ʒix. adde  
El. de bacc. lauri ʒijʒ.  
Theriaca. ʒj. ad ʒij.  
Ol. destillat. angel.  
Cumini.

Ruta an. gutt. v.

M. f. Clyster pro duabus dosibus: S.

Vt supra.

Vel

℞. Herb. chamom. Rom.  
Menthe an. M.ʒ.  
Bacc. lauri ʒʒ. ad ʒj.  
Juniperi ʒʒ.  
Sem. anis,  
Cumini  
Fenic. an. ʒij.

Sal. Tart. ʒii. ad ʒiiij.

Incis. & contus. coqu. in f. q. aqu. simpl. vel ubi saltar-  
tari additum non fuit, in urina humana:

Colatura ʒix adde  
Elect. de baccis lauri ʒvi. ad ʒj.  
Mell. rutac. ʒʒ.  
Ol. destill. anis vel bacc. lauri ʒʒ. ad ʒj.  
Vitelli oui No. j.

F. Enema: S.

Clyster contra flatus.

℞. Flor. chamom. M.ii.  
Fol. lauri M.ʒ.  
Rad. Levifl. ʒiiij.  
Sal. tart. ʒi.  
Coqu. in f. q. Aqua:  
Colatura ʒviii. adde  
Elect. de bacc. lauri ʒi.  
Ol. destill. bacc. junip. ʒi.  
Cumini. ʒʒ.  
Syrup. papav. simpl. ʒi.

M. pro Clysmate, duabus vicibus injiciendo: S.

Clyster contra flatus.

Uterius, ubi sunt nimii flatus in intestinis præ cæteris  
conveniunt Clysmata ex urina pueri, quæ mira faciunt in  
affectionibus intestinorum flatulentis; si scilicet.

℞. Urin. pueri impub. ris:  
& ipsi addatur



*Permentum parum*  
 ipſique poſtmodum incoquatur ſemen aniſi & anethi,  
 & Colatura ꝑ viij. vel ix addatur  
 Mellis deſpum. ꝑj.  
 ſicque iniiciantur: inſigniter confert in aſſectibus  
 flatulentis. Vel

R. Decoſt. Carn. ꝑ vj.

Vrin. human. ꝑ iij.

Fermenti ꝑj.

Salis comm. ꝑj.

Mell. roſat. ꝑj.

M. pro Clyſmate ad imitationem VALERIOLE præſcripto in gravioribus doloribus flatulentis. Vel

R. Spec. carminat. M. ij.

Coqu. in ſ. q. Vrina humana:

Colatura ꝑ viij. adde

Ol. deſtill. terebinth. ꝑj.

M. ſ. Enema: S.

Clyſter contra ſtutus.

R. Vrina pueri caleſc. ꝑ ix.

Sperm. ceti ꝑ iij.

Vitell. ovi No. j.

Syrup. papav. alb. ꝑj.

M. ſ. Enema: S.

Præſcripta.

Confer. THEODATUS Valitudinario p. 197.

Faciunt hoc etiam Clyſmata terebinthinata cum Urina, quæ ſuperius in dyſſenteria dedi; & imprimis in doloribus convulſivis, nephriticis, hyſtericis, ſcorbuticis, &c. ſunt optima, & multum commendantur à THEODATO in Valet. pag. 147., qui etiam in Colica flatulenta hoc Clyſma præſcribit:

R. Fol. Mercurial.

Chamom.

Betæ an. M ꝑ.

Abſinth.

Ruta

Lauri an. Mj.

Sem. cumini,

Bacc. lauri an. ꝑ iij.

Incifa & contuſa coquantur in aqu. comm. & Vini Malvat. an. ꝑ iij.

(Ingredientia ſunt nimis copioſa propter ꝑ iij; poteſt facile emendari:) adde

Ol. nuc. expreſſ. ꝑ iij.

Coffor. ꝑj.

Terebinth. ꝑj.

M. pro Clyſmate in aſſectibus renalibus & uterinis.

Vel

R. Vrin. human. aut Decoſt. emoll. ad imitationem Willisii ꝑj.

Terebinth. cum vitello ovi diſſol. ꝑ iij. vel ꝑ iij. ad ꝑ iij.

Mell. colat. vel Mercurial. ꝑ vj. vel ꝑj.

M. ſ. Clyſma: S.

Clyſter lenitivus.

Conferatur hic WILLISIUS de Anima Brutorum, ubi in Colicâ pag. 394. P. 2. c. 15., & in ſpecie in Colicâ nephritica proficui ſunt terebinthinati Clyſteres.

Sunt, qui ceu ſingulare Clyſma laudant & commendant Decoſtum veronicæ cum myrrha, & vino, quibus B. D. LANGIVS. addit Salis Tartari ꝑj. ad ꝑj. aut tincturam Tartari. Senſibus Clyſmata ex vino Malvarico cum oleo Chamomillæ, & quæ vim anodynâ habent, faciendâ; hinc ſyrupus papaveris, ſed cautè, addendus.

Fortiora Clyſmata, eaque in Colicâ humorofa ſaltem conducentia, minus in convulſiva, ſunt ea, quæ ingreditur colocynthidis in petia ligata, vel aqua benediſta, aut Inſuſum croci metallorum ab ꝑ iij. ad ꝑ iij. vel iij. de quibus Clyſmatis antimonialibus, aliis irritis, in Colicâ proficuis, vid. RIVS C. 1. Obſ. 57. & 67. item C. 2. Obſ. 12., & C. 3. Obſ. 22. & ſupr. de alio obſtructa: v. p.

R. Luris piſorum ꝑ viij. vel viij.

Aqu. bened. ꝑ iij. vel iij.

Elab. lenitiv. ꝑ vj. vel Ol. comm. ꝑj.

M. ſ. Enema: S.

Clyſter lenitivus.

R. Decoſt. piſor. ꝑ iij.

Scor. reg. Antimonii ꝑ vj. ad ꝑj.

Mellus Mercurial. ꝑj.

M. pro Clyſmate: S.

Clyſter abſterſivus.

Imitatur hac in parte RVLANDVM, qui ipſe hic

eſt antecellor, & valè utitur Enemate cum aqua benediſta Cent. 6. Curat. 22.

R. Decoſt. piſor. (egregiè abſtergit) ꝑ viij.

Aqu. bened. ꝑ iij. vel iij.

Sacch. ꝑj.

Ol. olivar. ꝑj. vel ꝑj.

M. pro Enemate.

Iniiciatur quavis hora doloris recrudescētis pro duabus, vel 3. doſibus: Inſigniter hunc commendat Clyſterem, & quidè in cœcumaciſſima alvi obſtructione, in dolore iliaco & colico.

Simile exemplum habet idem in pertinaciſſima alvi obſtructione in puerpera, quæ per 20. dies & noctes nihil excreverat, & jam ſtercora per os exhibat, curatâ hoc Clyſmate, in quo loco aquæ benediſtæ addidit Extractum eſulæ:

R. Luris piſor. ꝑj.

Extracti eſulæ ꝑj.

Ol. ſem. lini ꝑ iij.

M. pro Clyſtere:

quo injecto, alvique excrementis copioſè rejectis, curata fuit iſta puerpera. Item

R. Decoſt. cent. min. ꝑ iij.

Aqu. bened. Rulandi ꝑ iij.

Mell. Mercurial. ꝑ vj.

M. pro Clyſtere.

Præter fortiores pertinent hæc Clyſteres ex fumo tabaci, maxime proficui in Colicâ humorofa, & in omnibus doloribus abdominis: vid. Hiſtor. Anat. 66. BARTHOLINI Cent. 6. & C. 4. Epiſt. pag. 253

Inſtrumentum verò, quo commodè poteſt Anglorum more applicare ſibi unusquiſque tale Clyſma, & fumum tabaci ſub hac forma inteſtiniſ immittere, habet BARTHOLINUS in Cent. 6. Hiſt. iam allegatâ, & SIMON PAVLI Quadripart. B. 1. c. 7. Claſſ. 3. p. 462. & 463: non tantum dolores ſolunt, ſed & alvum laxant.

II. Præter Clyſmata in omni Colicâ, in ſpecie humorofa, minus in convulſiva, attendendum eſt, an conveniat Purgatio per alvum; an verò non? Nempe tutius poſſumus purgare remediis per os propinatis, ubi contenta in inteſtiniſ urgent, quàm ubi malum ſimpliciter à ſpasmis fuerit, ut pote in quo non niſi leniter abſtergentia conveniunt. Deinde, ſi inteſtina ex ſtrictura convulſiva, propter contenta etiâ irritantia, ſint nimis firmiter clauſa, cavendum à purgantibus, magis magisque irritantibus; ſed potiùs leniſſima, emollientia, elucentia inteſtina, aut ſimpliciter lubricantia oleoſa & paſſulata conducunt. In ſpecie in principio Colicæ, dum adhuc dolor urget, propriè dicta purgantia miſui conveniunt, ſed omninò nocent; irritando enim inteſtina malum fortius exaſperant, & ex auctâ hac inteſtinorum contractura minus laxant. Imò cum in Colicâ ſæpiùs adſit periculofus vomitus, metus eſt, ne ita purgantibus irritentur erabrones: quo ſæpiùs iterantur, in deterius labitur aper & magis diſponitur ad aſſectus paralyticos: ſin verò mox in principio uſurpari debent, ſint non nimis violenta, ſed lenia, & ſimul opiatif miſta, ut ſolvent dolorem, & cauſam morboſâ eliminent ex inteſtiniſ: ſemper nempe conſiderandum eſt, ne acriori laxativo irritatis inteſtiniſ omninò impediatur excretio ſæcum, & ad contrarium ſequi diſponatur ager. Adhuc ſæpiùs evenit, ut purgantia, licet fortia, nihil operentur, ſed ſubſiſtant, unde ſubſequitur inde dolorum augmentum Ergo purgantia talia vitanda. In progreſſu verò morbi, attenuatâ viſcidâ materiâ, & temperatâ eiùſdè acrimoniâ, blandè ſubducentia conveniunt. Deinde, ſi ex inflammatione eſt colica, Medicus caveat, ne ullo, quantum viſleni medicamento ſuoducente, utatur; ex irritatione enim inteſtinorum inflammatio augetur, & hinc volvuli ſeu ilei metus ſupervenit. In Colicâ humorofa, in ſpecie, ubi inteſtinorum peregrini, ac vicioſi hoſpites ſunt exturbandi, purgantia locum habent, vario tamen, pro circumſtantiarum ratione, regimine, &c. Nempe ſi dolor non adeo urget, & morbus ſit ex errore viſtus, aut ſimili cauſa externa, aut malum ſit à viſcidâ tenaci & acida pituita, cum dolore terebratè, & gravativo, in principio purgari poteſt; ſecus differendum hoc ipſum, donec non niſi miſceſcat dolor. In pituita enim vitrea vel acida, ſi quis Lenientibus ſolis contentus à purgantibus veris abſtineat, nil ager; potiùs, quamprimùm viſcidâ materiâ attenuanda, & per Purgantia attenuantibus miſta, eadè evacuanda: conf. SEPTALIVS in Animadv. l. 7. §. 72. Si verò dolor ſit nimis acerbus, priùs eſt mitigandus, antequâ Purgantibus proritetur alvus. Purgantia autem in Colicâ humorofa conveniunt nunc fortiora, nunc minorâ: Fortiora hæc & propriè dicta purgantia, in ſpecie, ubi



ubi ex spasmo fortius contracta sunt intestina, aut motus eorum peristalticus minus fieri solet, non conveniunt quin levissima plus præstent, quam acriora & fortissima. Sic HENRICUS à MOINICHEN *Obs. 5. at* BARTHOLINUM *missu* habet, quod DONADONUS alvi stypcitatē ad 3. septimanas durantem solo feri caprini copiose sumpti usu curaverit: Sic, referente SENNERTO, observatum est, cum æger quidam 30. Clysteres sine effectu accepisset, alium Medicum mannam ab 3 j. ad 3 jss. cum 3 jss. olei amygdalarum dulcium propinasse in jusculo gallinæ pingui, & ægrum à dolore liberasse. Commendat hanc misuram RIVERIUS *Prax. 1. 10. c. 1.* Vel oleum amygdalarum dulcium loco butyri jusculis admisceatur, quibus etiam spermatis ceti 3 jss. commodè addi potest. Singulare experimentum CRATONIS ad solvendam alvum, & sedandos dolores Colicos est oleum amygdalarum dulcium 3 ij. ad liij. cum vino Malvas. & spermato ceti: vid. *Dissertat. med. de sperm. ceti c. 2. §. 4. p. 11*

Ut ergo blandè laxetur alvus in Intestinorum doloribus, blandissimè emollientia & abstergentia locum habent, præprimis in Colica convulsiva, ubi acria parum vel nihil operantur; lubricantia verò, ut oleum amygdalarum dulcium & pingua optimè laxant. Inter Emollientia & Abstergentia sunt imprimis potio passulata, & hinc pulveres salini cum stimulo scamoneato. Inter lubricantia & pingua convenit Potio PLATERI in principio doloris colici propinanda, quæ ex lente & emolliente procedit. Præscriptio est hæc:

R. Ol. amygdal. dulc. 3 jss.

Vini Malv.

Syrup. papav. an. 3 jss.

M. f. Potio.

quæ detur pro haustu. Vid. *Observationes PLATERI*: Nam & oleum amygdalarum dulcium in jusculo calido propinatum, subito sedat tormina infantum. Loco syrupi papaveris etiam spermatis ceti 3 jss. addi, & ita alvus laxari potest: Vel ubi tutius uti licet purgantibus, cremor tartari cum resinis Purgantium propinetur ad imitationem WILLISII *c. 1. pag. 396. c. 8.*

R. Crem. tart. 3 j.

Scamm. sulphurat. gr. ij.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis aperiens.

R. Crem. tart. 3 j.

Mag. jalapp.

Scamm. an. gr. v.

M. pro alvolaxanda. S.

Pulvis aperiens.

R. Corall. rubr. præp.

Maxill. lucii piscis an. 3 jss.

Auri fulm. gr. v.

M. f. Pulvis: S.

Ut antea.

Vel Infusum sennæ cum sale tartari & zingibere paratum, vel Infusum rhabarbari cum senna, adhibeatur. Vel ubi viscida ac tenax pituita primariò peccat, Potiones cum gummate Ammoniaco in Colica humorosa sunt admodum convenientes: Propterea ubi pertinax est Colica ex pituita vitrea & acida.

R. Aqu. Mentha 3 j. vel 3 jss.

Cinam. 3 j. 3 jss. vel 3 jss.

Gumm. amm. cum aceto solut. 3 jss. vel 3 j. ad 3 jss.

Tart. vitriolat. 3 jss. ad gr. xv.

Scamm. sulphurat.

Trochisc. alb. an. gr. j. vel ij.

Syrup. rosat. solut. vel de pom. 3 jss.

M. pro una vice: S.

Potio purgans pro una vice.

Potio hæc mirè saburram educit. Vel

R. Aqu. mentha seu succ. pomor. Borsdorff. depur. 3 j.

Gumm. amm. cum aceto sol. gr. xv. ad 3 j.

Salis hypochondr. 3 jss.

Scamm. sulphurat. gr. ij.

Ext. troch. alb. gr. 3 vel j.

Syrup. rosat. solut. 3 jss.

M. S.

Ut antea.

R. Aqu. Chamomill. 3 j.

Gumm. ammon. cum aceto sol. 3 jss.

Tart. vitriolat. gr. xij.

Scamm. sulphurat. gr. ij. vel liij.

Laud. hysser. gr. vj.

Estmuller. Oper. Tom. II.

Syr. de spina cervin. 3 liij.

M. f. Potio: S.

Ut supra.

R. Lapill. Cancr. præp. g. xij.

Tart. vitriolat. 3 jss.

Trochisc. alb. gr. ij.

M. f. Pulvis.

D. S.

Pulvis emolliens.

Curavi juvenem, natione Westphalum, malo hypochondriaco, ut vocant, aliàs obnoxium, qui post insignem corporis, in specie pedum, in ludoscenio spectando refrigerationem, altero die incipiebat dolere latere sinistro sub costis: dolor erat acutus, admodum punctorius, cum frequenti vomitu admodum moesto, ipsique ægro doloroso, ingenti siti, & virium prostratione; hinc dolores lancinantes, sed raro, ex illo loco in totum abdomen progredi, ad lumbos reflexi, & in sinistro hypochondrio tandem terminari solebant, ubi terebrantes punctiones primariò vexabant, alvus erat obstructa, respiratio erat parva seu difficilis, contactum in latere dolente & fortius prementem bene perferre poterat, punctionesque sæpè fursum ad præcordia ascendere videbantur. Clysmata quidem bene operabantur, sed dolores persistebant, unde usurpabam alterantia, antiscorbutica, antihypochondriaca, quæ etiam nil juvabant. Tandem gummi ammoniacum sequenti modo præscribebam:

R. Aqu. mentha 3 j.

Gumm. ammoniaci in aceto sol. 3 jss.

Tart. vitriolat. gr. xv.

Scamm. rosat. gr. iv.

Ext. troch. alb. gr. j.

Syr. de pomis 3 jss.

M. f. Potio.

Ab hac potione 15. sedes sine torminibus venerunt cum euphoria, & symptomata dolorosa evanuerunt.

Mercator quidam Annæbergensis simili dolore cruciatur, copiose erat purgatus, sed dolor persistebat: Præscripsi hanc potionem, unde copiosis evacuatis viscidis, sanus evadit. Semel tamen in virgine cachectica hæc Potio dysenteriam excitavit.

In declinatione verò morbi, ubi viscida adhuc, vitrea & acida pituita in intestinis hæserit, commodè usurpentur eadem gummata cum Mercurio dulci, qui eam potenter dissolvit & abstergit Imitandus hac in parte DEODATVS, qui declinante morbo ex hac causa nato, præscribere solet has pilulas.

R. Mass. Pilul. coeb. min. 3 j.

Aquile alb. dulc. seu Merc. dul. gr. xv. ad 3 j.

Ol. de still. anisi gutt. ij.

M. f. Pilula manè deplutiendæ.

Inepta autem est hæc Compositio: possunt assumi alia, v. g.

R. Mass. Pil. de hier. cum æger.

Mercur. dulc. an. gr. xv.

Troch. alb. gr. j.

Ol. de still. anisi gutt. ij.

Cura essent. mentha f. Pilula: S.

Pilula purgantes.

Mercurius enim dulcis est egregium medicamentum, & in frequentiori usu est RIVERIO, in cujus *Observ.* sæpius fit mentio Purgantis, quod vocant Calomelanos Turquesi, quod nihil est aliud quam Mercurii dulcis, additus tantum aliquot granis scamonii sulphurati, in hac proportionē: v. g.

R. Mercur. dulc. 3 j.

Scamm. sulphur. at. vel res. jalapp. 3 jss.

M. f. Pulvis:

& cum mucil. tragacanthæ f. Pilula pro una dosi in fine paroxyimi.

R. Mass. Pil. de ammoniaco Querc.

Extract. absinth. 3 jss.

Troch. alb. gr. ij.

Cum Ol. de stillat. anisi f. Pilula: S.

Pilula purgantes pro una dosi.

Item

R. Tart. vitriolat. gr. xv. ad 3 j.

Scamm. præp. gr. liij.

Troch. alb. gr. ij.

Ol. de still. Zedoar. gutt. j.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis purgans.

Loco digestivi sit:

R. Tart. vitriolat. vel sal. ammon. depur. 3 j.

Ol. de still. anisi gutt. iv.

M. pro duabus dosibus. S.

Pulvis emolliens.

K 4 Quod



Quod si verò in Colica humorosa mox in principio Purgantia conveniant, commodè eadem cum opiatīs miscantur, ut *supra de Cardialgia* dictum fuit, quò sine majore intestinorum irritatione sublato dolore alvus laxetur. Modus hic est recens usitatus: Veteribus nonnullis, in specie **HELIDÆO PADVANO**, hoc fuit usitatum, qui propinavit in Colicis doloribus recipiendo *Elest. diaphan.* 3 v. ad 3 vj. & *Philon. Rom.* 3 j. quod laxat, doloremque sedat.

Ceterùm nostra delicatula rostra non perferunt hos Roslos seu Elestuaria: propterea conveniunt potius Pilulæ stoeticæ cum laudano opiato ad imitationem **RIVERII** præscribendæ, qui *C. 1. Obs. 63.* & *C. 2. Obseru. 1.* has imprimis commendat Pilulas:

*R. Aloes optime* 3 j. (Satis forte est, ego  
*Diagryd. gr.* viij. non ita præscriberem)  
*Laud. opiat. gr.* liij. vel v.  
*M. f. l. a. 6. Pilula.*

Similes pilulas cum Laudano opiato permittas videbitis apud **POTERIUM** *Cent. 3. c. 27.* Pertinent huc **Pilula STOECKERI**, quibus, ut ipse scribit, cum summo suo honore *Ducem Tartarorum* curavit in Colica.

*R. Aloes succotæ vel pilul.*

*Aloephang.* 3 j.

*Opii,*

*Croc. an. gr.* j. vel ij.

(pro croco potest sumi & castoreum)

*M. f. Pilula:*

Quarum vel dimidia pars, vel omnes, exhibentur jejuno stomacho; dolore enim post horam sedant, & postmodum solvunt, & faciunt, ut dicit, operationem.

Si volumus, ut in meliore dosi melius & potentiùs operentur, acuamus has ipsas cum gran. ij. vel iij. *scamm. sulphurati*, & ita commodè usurpari poterunt.

*R. Aloes rosat.* 3 j.

*Extracti Zedoar. gr.* viij.

*Scamm. sulphurati. gr.* j.

*Laud. opiat. gr.* j.

*Ol. destill. carr. gutt.* ij.

*Cum essent. Zedoar. f. Pilula.*

Item

*R. Gum. ammon. cum aceto sol.* 3 j.

*Diagryd. gr.* vj.

*Laud. opiat. gr.* lv. vel v.

*M. f. Pilula pro 4. dosibus.*

Clysteribus quoque Laudanum opiatum à quibusdam injici solet à gr. iij. ad 3 ss., nec dubium est, quin cessaturus sit dolor: sed cautè agendum est: Conf. **BORELLUS** *Ce. 1. 4. Ob. 94* Loco hujus tutius Theriaca ad 3 ij. Clysteribus additur.

Sedato autem paroxysmo in Colica convulsiva, conveniunt appropriata Purgantia, commodè cum sudorifero usurpanda.

III. In usu Vomitoriorum remedium, quæ interdum necessaria sunt, cauti sumus maximè: si enim ventriculus & supernæ partes intestinorum repletæ nimium fuerint, ex usu maximè erit, ut medicamentis ad dejectionem ingessis locus detur pertranscundi. Quod si totus dolor, ejusque causa, infernas partes obsideat, non solum frustra tentatur vomitus, sed aliquando sit cum certa ægrorum perniciè, cum Volvulosi facildè inde fiant. Illustrat Vomitoriorum usum observatio **PLATERI** *l. 2. Observationum pag. 451. seqq.* Adolescens quidam nobilis ex inordinata victus ratione, & nimio potu vini Mulcati Narbonensis, cardialgiâ primùm, mox Colico dolore laborans, postquam semel curatus, maturus, quàm par erat, se aeri frigido concedidisset, & quadrigis celeriter per urbem veheretur, recidivam passus, 7. septimanarum spatio, durante morbo, licet sæpiùs Clysteribus & narcoticis usus fuisset, non tamen integrè sanari potuit, donec Vomitorio antimoniali usus fuisset, à cujus usu mox magnam copiam æruginosæ bilis aliquoties vomuit, uti & pituitæ; atque inde urinæ, quæ ex atro croceâ diù permanserunt, in naturalem colorem permutatæ, ipseque sensum ad se redire cepit.

IV. Opiata in dolore Colico semper sunt optima, in principio & progressu morbi adhibita, primariâ in Colica convulsiva, hinc etiam in humorosa; in qua ipsa saltem, ubi necessitas urget, locum habent. Et quidem tutius est, ut alysi évacuatio præmissa fuerit, nisi summa doloris atrocitas nimis urgeat: frequentius tamen in utrumque duci possunt, ubi materia morbosa sperit tenuior & acrior;

minùs verò, ubi eadem fuerit viscidior. Nam Opiata acere quodcumque temperant, viscidæ verò materiæ motum ulteriùs impediunt, & ita eandem magis figunt, quatenus motum intestinorum inibent. His ipsis Opiatis, tam in principio, quàm in progressu morbi, semper appropriata & resolventia acia, pro causæ morbosæ dispositione varia addenda erunt, ut eò meliùs succedat operatio. Præ cæteris Opiatis Laudanum hystericum est egregium remedium, tam in Colica convulsiva, quàm etiam in reliquis. Denique, si quando Opiatis utendum, non sunt differenda eò usque, donec vires vitales jam collabascant, ægerque non longè sit ab interitu; talis enim in casu non raro solet vita dormiendo finire: potius in principio aut incremento morbi viribus validis usurpantur. Adeoque in Colica humorosa usurpantur Opiata post Purgantia, & hinc etiam Purgantibus mista, & non, nisi in casu necessitatis, ante Purgantia. Nempe, ubi tanta est, siue ventriculi debilitas, siue vomituritio, ut nec pilulæ possint detineri, ibi (1) remedium anodynum ordinetur; (2) paucis horis elapsis catharticum, eo temporis spatio interjecto, ut Narcoticum à Cathartico tanto distet intervallo, ut ab eo non vincatur & pereat, eas tamen in ventriculo moras trahat, quæ ad virtutem purgativam communicandam eidem sufficiant, ut suam demùm exerat operationem, cessante altero; licet catharticum, modò id possit fieri, diù post anodynum rectissimè propinetur, cum etiam ad horas 12. ab hoc assumpto alvus, isti ægriùs respondeat, atque non, nisi operosius, solvatur. Cum autem hic, uti in aliis plerisque morbis, in quibus indicantur Narcotica, Catharticum semper dolorem intendat (saltem finitâ jam operatione, quâ quidem vigente, mitius nonnunquam cum ægro agitur;) idcirco solenne est, Anodynum ingerere, ubi primum exspiravit Cathartici visus, ut rectè loquitur **SYDENHAM** in *Observ. cir. a morbos acutos p. 297.*

V. In omni Colica fugiendum frigus, præsertim ventriculi & pedum; hinc calidus potus est optimus. Et observavi in Colica convulsiva cum copioso vomitu conjuncta, & aliquot secessibus, ex abdominis ab aura frigida refrigeratione nata, optimum fuisse remedium bonum haustum aquæ vitæ juniperinæ, unde omnia mala cessarunt. Hinc rara est & vix imitanda Observatio, quam habet **AMATUS LUSITANUS** *Cent. 1. Curat. 2. & C. 7. Curat. 21.* **ZACUTUS LUSITANUS** *l. 2. Præf. Admiv. Obserp. 25.* **FORESTUS** *l. 21. Obseru. 12.* **TULLIUS** *l. 2. Obseru. 37.* & imprimis **SEPTALIUS** loco *suprà citat. §. 82.* Colicæ desperatæ, copiosæ aquæ multâ nive refrigeratæ potu curatæ. Sed arbitror, accidentarium fuisse affectum, quasi occasione refrigerationis intestinorum convulsorum spasmi relaxati fuerunt; unde mirabilis flavæ bilis copla évacuata fuit: Ergo non, nisi cautissimè, imitandum venit.

VI. Si alvo relaxatâ dolores persistant, id quod in specie in Colica convulsiva convenit, & quidem, ubi materia est in intestinis, usurpanda sunt adhuc remedia appropriata & aromatica, quæ nempe ratione salis volatilis temperant acidum, incidunt viscosum, discutunt flatum, ac ventriculo & intestinis grata sunt, & hinc etiam remedia, quæ mulieribus in passione hystérica propinantur, imprimis volatilia salina. Unde ex his Castoreum & Castoreata cum Opiatis mista: ex istis Chamomilla, semina calida majora, & similia, imprimis conducunt. Vinum simplex vix semper æquetum videtur, medicatum meliùs convenire arbitror.

Quod si ergò alvus relaxata, & ista universalia plus minùs præmissa fuerint, & nihilominus tamen dolor persistat, aut si urgeat adhuc Colica convulsiva, ad appropriata accedendum est, eaque in specie aromatica; nam hæc acidum temperant, flatum resolvunt, viscidum incidunt, simulque nervis amica sunt, eorumque spasmos sistunt, adeoque in genere in quibuscunque abdominis doloribus conducunt. Talia sunt herba veronicæ, quæ ceu singulare specificum laudatur; cui tamen non cedit chamomilla, imprimis chamomilla Romana, sclarea seu hordinum, cortex aurantiorum, zedoaria, gentiana, helenium, absinthium, semina calida majora: Ex quibus modò dictis destillata olea, decocta & alia multiplicia præparata valent, ut aqua florum chamomillæ, veronicæ, cinnamomi, menthæ, aquæ spirituosæ compositæ, spiritus & aqua carminativa *Dornacellii & anticolica: V. g.*

*R. Flor. chamom. Rom.*

*Sambuci,*

*Pol. menth.*

*R. an. frr. an. M. liij.*



Baccar. Junip. rec. ʒiʒ.  
Lauri excort. ʒvj.

Sem. cumin. ʒi.

Anis.

Fenic. an. ʒʒ.

Calam arom. ʒʒ.

Flau. cort. aurant. ʒiij.

Cinnam acuti ʒvj.

Zedoar. ʒij.

Pulveriscentur omnia tenuissime, & adspargantur cum spiritus nitri rectif. ʒʒ ad ʒvj.

Infundantur cum f. q. Spiritus vini, non adeo exacte rectificati:

Sient per 12. horas in Balneo Mariæ, digerantur lento igne, vase bene munito. Tandem destillentur per alembicum ex arena vel cineribus lentè, ut caveatur empyrena.

Dosis est cochlear i. vel ij.

Huc pertinet etiam *essentia carminativa WEDELII* in Opilog. descripta, cum anodynis & castoreatis mista. Item Syrupus corticis aurantiorum, de papavere, ubi dolor adest; Syrupus de Althæa Fernelii, ubi emolliendum, & acrimonia temperanda; Castoreum, sulphur, omnia salia volatilia, adeoque liquor Cor. Cer. spiritus salis armoniaci, spiritus tartari, spiritus carminativus de uribus, stercus equinum, stercus lupinum, testes equini, &c. Promiscuè hæc in quibusque abdominis doloribus conveniunt; in specie tamen, ubi status urgent in hypochondriaciis, spiritus carminativus de uribus, &c. est optimus. Ubi verò sunt tormina convulsiva hysterica, liquor cornu cervi succinatus, salia volatilia oleosa, item camphora, & aqua theriacalis camphorata, item stercus equinum, & similia conducunt; v.g. in genere contra dolores abdominis;

R. *Aqua chamom.* ʒij. vel iij.

Spiritus theriacal. simpl. vel campb. ʒij.

Laud. opiat. gr. ij. vel iij.

Syrup. cortic. aurant. ʒʒ.

M. F. Potio, cochlearim usurpanda: S.

Potio leniens pro aliquot vicibus.

In Colica humorosa flatulenta:

R. *Aqua mentb.* ʒij. vel iij.

(vel *aqua mentb. & chamom.* an. ʒʒ.)

*Elixir mentb.* (nisi urgeat status) ʒiij ad ʒʒ.

*Essent. carm.* ʒi. vel ʒʒ.

Spiritus nitri dulc. vel *Anti-Colic.* ʒʒ. vel ʒij.

(vel spiritus nitri rectif. gutt. x. vel xv.)

M. f. Potio: S.

Potio leniens contra flatum.

Capiatur cochlearim, subinde, si possibile, aliqualem sudorem expectando. Et convenit etiam in specie talis mixtura cum spiritu nitri in Colica cum ardore corporis quasi febrili juncta, seu in Colica putata biliosa.

Sit adhuc alia Formula:

R. *Aqua sem. anis.*

*Flor. cham.* an. ʒij.

Cinnam. ʒi.

Spiritus Zedoar. ʒʒ.

Nitri dulc. ʒij.

Olei destillat. anis gutt. vj.

Laud. opiat. gr. ij.

Syrup. rad. enul. ʒi.

M. F. Potio haurienda cochlearim: S.

Potio contra colicam.

Vel:

R. *Aqua cortic. aurant.* cum vino ʒij.

*Phylogon.* (quæ rezeans est carminativa) ʒi.

Spiritus nitri dulc. anticol. ʒi.

Syrup. cortic. aurant. ʒvj.

M. f. Potio: S.

Potio contra flatum.

Sumatur cochlearim, expectando sudorem.

R. *Aqua mentb.* ʒʒ.

*Chamom.*

Zedoar.

Carminat. an. ʒʒ.

Spiritus nitri dulc.

Theriac. campb. an. ʒi.

Syrup. papav. albi. ʒi.

M. S.

Potio dolores sedans cochlearim sumenda.

In colica conyuliva, qualis est scorbutica, hypochondria-

ca, hysterica, &c. cum ascendit ad cor, ut loquuntur, cum difficili respiratione:

R. *Aqua fl. chamom.*

*Mentb.*

*Puleg.* vel *veron.* an. ʒi.

*Ess. castorei* (sit turbida Potio) ʒij. vel iij.

*Liq. Cor. Cer. succ.* vel huius loco *spiritus salis armoniaci* ʒi. vel ʒʒ.

*Laud. opiat.* gr. ij. (vel *ess. opii* ʒi ad ʒʒ.)

*Syrup. artemis.* vel *cort. aurant.* ʒvj. vel ʒi.

M. f. Potio: S.

Potio dolores sedans pro aliquot vicibus.

Capiatur cochlearim pro 2. vel 3. dolibus; expectetur, si possibile, blandus sudor.

R. *Aqua matricar.*

*Mentb.* an. ʒi.

*Carminat.* ʒʒ.

*Ess. castor.* ʒij.

*Spiritus salis amm.* ʒi.

*Laud. opiat.* gr. iij.

*Syrup. artemis.* ʒ. vj.

M. S. Potio dolores sedans.

R. *Aqua mentb.* ʒij. (vel huius & *aqua fenic.* ʒʒ.)

*Spiritus salis amm.* ʒi.

*Ess. opii* ʒʒ.

*Syrup. cortic. aurant.* vel *chamom.* ʒʒ ad ʒvj.

(Vel loco syrupi *elaeosaccharum aurantiorum* :)

M. D. S.

ut antea.

R. *Aqua mentb.*

*Fenicul.* an. ʒʒ.

*Spiritus salis amm. anis.* ʒʒ.

*Laudani opiat.* gr. ij.

*Syrup. fenic.* ʒʒ.

M. D. S.

ut antea.

Vel quando salia non conveniunt:

R. *Aqua chamomill.*

*fl. sambuc.* an. ʒʒ.

*Ess. castor.* ʒʒ.

*Vnic. veri præp.* ʒi.

*Maxil. lucii piscis* ʒʒ.

*Saluolat. Cor. Cer.* gr. vj.

*Syrup. artemis.* ʒij.

M. D. S.

ut supra.

R. *Aqua chamom.* ʒij.

*Mentb.* ʒi.

*Essent. opii* ʒʒ.

*Maxil. lucii piscis.* ʒi.

*Saluolat. Cor. Cer.* gr. xv.

*Syrup. fenicul.* ʒij.

M. D. S.

ut antea.

Capiatur subinde cochlearim.

R. *Aqua mentb.* ʒij.

*Carminat.* ʒi.

*Ess. castor.* ʒ. ij.

*Olei destillat. cortic. aurant.* vel *citri gutt.* vi.

*Laud. opiat.* gr. ij.

*Syrup. cort. aurant.* vel *citri q. s.*

M. D. S.

ut supra.

Capiatur cochlearim.

R. *Aqua mentb.* ʒij.

*Melissæ cum vino.* ʒi.

*Ess. castor.* ʒʒ. ad ʒ. ij.

*Spiritus sal. ammoniaci* vel *simpl. velanifat.* ve

*Laud. opiat.* gr. ij. (*liq. Cor. Cer. succin.* ʒ

*Syrup. melissæ* ʒvj.

M. S.

ut supra.

R. *Lapill. Cancr. præp.* ʒʒ.

*Sal. uolat. Cor. Cerui* gr. xij.

*Laud. hysser.* gr. jx.

M. pro 2. Dosis: S.

Pulvis dolores sedans.

R. *Pulcor. veri præp.*

*Cinnab. antimonii.*

*Fl. sulphuris* an. gr. viij. ad ʒʒ.

*Laud. opiat.* gr. ij.

M. F.



## M. F. Pulvis S.

ut antea,

contra: Colicahumorosas:

℞. Olei destillas. carvi,  
Cumini,  
Angelica vel anis,  
Aurant.  
Chamom., vel fœnic. an. gutt. vi.  
M. D. S.

Oleum contra colicam,  
Vel

℞. Olea jam prescripta;  
adde

Sacchari albiss.  
Flor. sulphuris an. ℞ij.  
Maxill. lucii pisc. ℞j.  
Laud. opiat. gr. vi. ad ℞℞.  
M. f. pulvis S.

Pulvis contra colicam pro aliquot vicibus.  
Vel

℞. Flor. sulphuris ℞j.  
Mandibul. lucii pisc. ℞j.  
Olei destillati carvi,  
Cumin.

Fœnicul. an. gutt. jv.

Laud. opiat. gr. jv.

M. f. pulvis pro 3,4, vel 5 dosibus: S.  
ut antea.

Quod si cum ardore, aut caloris vel æstuationis sensu, affligunt tormina, nil melius est, quam nitrata, inprimis spiritus nitri dulcificatus effervescentem bilem optimè compescens. Si verò cum rigore vel dolore affligant dolores, talia, quæ absorbere & corrigere valeant acidum, ut sunt salia alcalica fixa, item animalium ossa & partes duræ, speciatim maxillæ lucii piscis, lapilli Cancrorum, vel unicornu præparatum, vel tali leporis, aliaque similia acidum absorbentia, & hinc dolorem compescencia supradictis addi possunt.

Dolor lumbaris nephriticus optimè per terebinthinata, per pilulas ex terebinthina, &c. compescitur, quæ ipsa etiam in dolore lumbari mesenterico convenienter usurpantur.

Ut in specie considerentur remedia interna: chamomilla, tam vulgaris, quam Romana, corrigendo acidum austerum ventriculi & intestinorum, egregia & instar omnium in torminibus alvi quibuscunque est, aliis irritis sine nunquam deseruit, cuiuscunque sint conditionis colicæ, ita, ut in colica nephritica, in doloribus post partum, in doloribus gravidarum, & omnibus aliis Decoctum florum chamomillæ vulgaris in aqua communi vel cerevisia paratum, calidè haustum, sæpius reiteratum, & quæcunque ex eadem parata, mirabile sint remedium; hinc & aqua & decoctum ejus cum aqua communi specificè commendatur a GABELCHOVERO C. 1. Cur. 10., si vel solitariè, si vel additis corticibus citri & aurantiorum propinetur. In muliere, Colicâ convulsivâ per diem & noctem pertinacissimè laborante, Opiatis & appropriatis frustratis solo huius in cerevisia Decocti usu reperto eandem curatam observavi. In specie oleum ejus saphirinum ad aliquot guttas haustum, est præsentissimum carminativum & anodynum, unde fibrarum contracturis blando suo contactu medetur. Porro huiusmodi istud odoratum, quod vocatur Sclarea, qua solent adulterare vinum nostrates, ut fiat moschatelinum, est odoris penetrantis & terti, & si quid aliud Vegetabile, miraculosum quid facit in Colica Viro- rum, tam convulsiva quam humorosa & flatulenta, uti in suffocatione mulierum hysterica, si vel Decoctum ejus, si vel exinde parata essentia, aut spiritus per fermentationem paratus & aliquoties abstractus, in conveniente vehiculo usurpatur, & nunc præstat, inprimis in suffocatione uterina mulierum in arcanis habenda. Radix allii jam à Galeni temporibus laudatur; notum enim est exemplum de rustico, esu allii se curante, quod ex GALENO habet SCHENCKIUS in Observ. & ZACVTUS LUSITANUS de Med. princ. Hist. 1. 2. Hist. 95. Hinc ad huius imitationem commendatur iusculum ex allio & oleo olivarum (nec sine ratione; hoc oleum enim laxat intestina, allium acrimoniam humorum temperat) quæ calidè hauriantur cum parte dimidia vini optimi; hæc Mixturam cœu sæpius expertam commendat BORRELLUS C. 4. Obs. 93. Post hæc eminent cortices aurantiorum, in quibus non est vis vulgaris antiscorica, maxime in humorosa & flatulenta ex acido austero, & certè Essentia seu Tinctura corticum aurantiorum cum eorum spiritu, vel im-

primis cum spiritu Chamomillæ Romanæ parata, aut Extractum, aut saltem eorum pulvis uterpatus, & inprimis oleum destillatum, aut elæosaccharum ex hoc paratum, sunt egregia remedia in affectibus colicis: Acidum enim quodcunque potenter corrigit, flatulentias cohibent, nervisque ab acido vellicatis per quàm grati existunt. Hinc etiam, quod obiter moneo, in stranguria ex acido primarum viarum ad vias urinarias delato, olea destillata corticum aurantiorum & citri sunt elegantissima remedia. Pertinet huc Pulvis SCHALLERI ad Colicam, quem quidam commendant. Compositio est hæc:

℞. Cortic. aurant. ℞℞.

Maxill. lucii pisc. præpar.

Infer. aurat. (Dentes trux auratæ)

Lapill. cancr. præp.

Tal. leporis,

Succin. præpar.

Zedoar. an. ℞j.

M. F. Pulvis pro aliquot dosibus.

Dosis à ℞℞ ad ℞ij vel ℞j, si fieri potest, in vehiculo tepido. Meliorari potest hic pulvis additione florum sulphuris, & irrotatione cum oleis carminantibus, v. g. oleo destillato corticum aurantiorum, item essentia opii.

Vel

℞. Rasur. eboris ℞ij.

Corall. rubr. præp.

Lapill. cancr. præp. ar. ℞j.

Terra figill. gr. xij.

Olei destillat. cort. aur. gutt. ij.

Anis,

Carvi,

Fœnicul.

Zedoaria an. gutt. j.

M. F. Pulvis pro 2. dosibus: S.

Pulvis dolores sedans.

Helenium ejusque radix in vino decocta, item absinthium, radix imperatoris, & similia acria aromatica, experta etiam sunt in Colica, & postmodum absinthium convenit, inprimis iis, qui in peregrinationibus Colicâ laborant, si vel decoquatur, si vel minutim dissectum cum saccharo misceatur & capiatur, & in Colica & in febrium reliquiis oborta nil melius esse usu absinthii, refert FEHR de absinthio pag. 173: ob id MINDERERUS in Medicina Militari contra Colicam tanquam optimum euporiston commendat Vinum decoctionis absinthii, vel radicis helenii cum corticibus aurantiorum calidissimè potum, addito theriacæ vel mithridatis pauco; quæ duo ob opium dolorem sistunt: item Theriacæ cum Cor. Ceru. assumpta, expectando sudorem; vel decoctum radicis enulæ cum essentia absinthii & spiritu theriacali egregium est experimentum, tollens intestinorum tormina ex virtute contentorum nata: quod etiam præstat Extractum acori veri: semina 4. calida majora, aut elæosaccharum ex his paratum sunt egregia remedia in affectibus colicis in vino decocta, & rectè dicuntur ab HELMONTIO solamen pauperum, appropriata intestinis, & affectibus flatulentis. Virtus & usus consistit in eo, quod nempe contractionem inhibendo, & aciditatem, nunc lymphaticam, nunc viscidam, intestinis hostilem, corrigendo afferunt: egregium solamen & levamen intestinis male affectis, indeque eorum spasmos, & inde ad tactum sensilem duritiem, remitti faciunt, & sic quodvis acidum intestinorum irritatorum temperant & corrigunt: Conf. HELMONTIUS in Traët. de Flatibus §. 75. Semina hæc decocta in vino generoso & hausta à STOECKERO commendantur; unde & eorum destillata olea, non secus ac oleum destillatum zedoariz, corticum aurantiorum, vel angelicæ, vel menthæ, vel macis, ad aliquot guttas propinata, sunt laudata in flatibus, torminibus & doloribus intestinorum: Spiritus salis ammoniaci anisatus, castoreum, & omnia medicamenta ex eo, egregiè conferunt; non tantum in Colica, ubi adsunt status, quos potenter discutit, aut ubi adsit pituita viscida acida, quam temperat, sed etiam in Colica convulsiva; non secus ac in suffocatione uterina, quæ reverà est Colica convulsiva; item in doloribus scorbuticis convulsivis, egregium quoque est castoreum; si vel per se, si vel mixtum cum aliis: in specie in Colica convulsiva cum salibus volatilibus propinatur, in specie cum sale volatili succini, cui si addatur unum vel alterum granum opii, sit egregium Medicamentum. Dabo exemplum in Colica convulsiva:

℞. Castor. ℞℞.

Salis volat. succin. vitæ parati gr. v.

[nam



(nam in succino multa latent arcana  
contra convulsiones & epilepsiam.)

Laud. opiat. gr. jss vel ij.

M. F. Pulvis: S.

*Pulvis dolores sedans pro una vice:*

Veteres Castorei ʒj. ad ʒij. in haustu vini calidi propina-  
runt in pertinaciori Colica, uti constat ex JOELIS *Praxi*,  
& SOLENANDRI *Consiliis*, si Colica sit orta, uti dicit  
JOEL, à causa frigida; in alius tamen etiam convenit: &  
SOLENANDER commendat Castoreum Clysteribus addi-  
tum; scilicet aliquot grana ejusdem in vino dissoluta, infun-  
dantur cum clystere in Colica vid. *ejus sect. 3. Consil. 28*. Nos  
utimur castoreo cum melle tartari aciore, vel etiam cum spi-  
ritu salis amm. vino in essentiam extracto, quæ sola ʒss. ad ʒj.  
dosi, vel cum essentia opii solata, optime conducunt.

Vel

R. Tinctura Tartari acerr. ʒij.

Ess. castor. ʒij.

M. S.

*Tinctura resolvens: 40. gutta.*

Ipsa enim Tinctura Tartari, ceu præsentissimum remedium  
ante extollitur ab HAUPTMANNO & LANGIO.

Vel

R. Elixir. propr. sine acido,  
Tinctura tartari acerr. an. ʒj.

M. S.

*Elixir resolvens.*

R. Tinctura tartari acerr. ʒss.

Ess. gum. amm. ʒij.

Myrrh. tartarif. ʒss.

M. D. S.

*Essentia resolvens: 50. gutta.*

R. Spiritus carminat. de tribus ʒij.

Ess. castor. tartarif. ʒss.

Opis ʒss. ad ʒj.

M. D. S.

*Mixtura resolvens.*

*Dosis gutt. 50.*

Pertinet huc Decoctum B. D. D. LANGII, & essen-  
tia anonyma ex Castoreo & asa fetida cum spiritu vini tar-  
tari parata; quæ essentia Anonyma & in Colica & in pas-  
sionibus hysteriis, i. e. colicis convulsivis, & in præca-  
vendis variolis & morbillis, est egregia; item Extractum  
Castorei, vel cum Laudano opiato, vel cum extracto the-  
riacali, quod habet vim opiatam, mixtum, & cum oleo  
quodam destillato in pilulas anticolicas redactum, dicta tor-  
mina sedat.

Ex his ferè paratur Extractum specificum anticolicum  
Mynsichtii, quod dosi ʒj. vel ʒss. ad ʒj. in omni vehiculo  
commode usurpari potest. Elegans est Compositio, ut  
quædam adsint Ingredientia non multi pretii. Flores sulphu-  
ris ʒss. ad ʒj. cum tantillo myrrhæ, præmissis præmittendis,  
in Colica valde profunt, propinanda commodè in vino vel  
alio vehiculo calido, probè corpus contendo, & sanè ex-  
pertissimum sunt remedium. Vidi Romæ egregium esse-  
ctum in Comite, Colicâ pertinace laborante, qui aliis ir-  
ritis per ʒss. florum sulphuris fuit curatus. Vel permiscetur  
sulphur & ejus flores convenienter cum elaseacebis carmi-  
nativis, factis ex oleo destillato corticum aurantiorum, anisi,  
zedoariae & similibus, quibus imprægnatur saccharum: v. g.

R. Flor. sulphuris ʒj. ad ʒss.

Olei destillati anisi,

Zedoar. an. gutt. ij.

Laudan. opiat. gr. i.

Sacch. q. l.

M. F. Pulvis: S.

Flores sulphuris ergo vobis sint commendati. Aromaticum  
sale volatili oleoso imprægnatorum vis anticolica per se nota  
est, v. g. zedoaria; quæ est carminativum egregium, statu-  
um resolutivum, & quæ, præmissis præmittendis, tam in  
substantia, quàm in tinctura, & inde parato Extracto, est  
nobilis; galangæ, quæ alias egregium est uterinum; cinna-  
momi, gentianæ, caryophyllorum, nucis moschatæ, &  
hinc ex his paratæ species sic dictæ aromaticæ composi-  
tæ in Dispensatoriis; nempe species diacumini, dia-calamintæ,  
diamti, dia-galangæ, diatrion pipereon, & tandem species  
diaphosphuris Mynsichtii: item olea earum destillata ad aliquot  
guttas propinata, similiter egregiè commendantur, qualia  
sunt carvi, cumjoli, anisi, fœniculi, caryophyllorum, lau-  
ri, corticum aurantiorum, angelicæ, succini, macis, ze-  
doariæ, menthæ; quod insigniter commendat THONE-

RUS: cumque iis possunt fieri compo-  
sita. Hinc PANAROLLUS *Pentef. 2. Observ. 8.* ceu sæpius ex-  
pertum remedium ad Colicam ex causa frigida commendat  
oleum baccarum lauri, aut oleum ex corticibus autaniorum  
per expressionem paratum, cum vino (potius est succus oleo-  
sus expressus) quo bibito ægri per breve tempus sedato dolo-  
re somnum capientes convalescunt. Vino guajacino cura-  
tam Colicam cum convulsionibus videbitis in AMATO  
LUSITANO *Cur. 32, & M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 274*.  
Hic non ultimo loco addendus spiritus nitri dulcis, quibul-  
dam *Anticolicus*, est summum HARTMAN-  
NI arcanum & ultimum refugium, quem ipse describit in  
*Praxi Chymiatrica*, imprimis si spiritus nitri benè re-  
tificatus, cum duplo vel triplo spiritus vini à simplicibus aromatibus ab-  
stracti seu cohobati, miscatur. Hic spiritus anticolicus dosi  
ʒss. ad ʒj. in vehiculo appropriato calido propinatus nobilissi-  
mum est remedium in colica flatulenta biliola, aded ut etiam  
in tympanitide suum faciat egregiè officium, præsertim, ubi  
vagæ phlogoses aut æstuationes corpus affligunt, si expec-  
tetur blandus sudor; sic enim ed melius operatur. Vehiculum  
appropriatum est imprimis Decoctum radicis helenii vel De-  
coctum priapitauri.

Modus præparandi est, si spiritus dicti re-  
tificati benè in  
quantitate pedetentim misceantur, misti in Balneo Mariæ  
probè digerantur, digesti duabus vel 3. vicibus cohobentur,  
donec perfectissimè uniantur, & sic sit egregius spiritus com-  
positus nitri dulcis anticolicus. Loco spiritus vini vulg. atis me-  
lius sumitur spiritus appropriatus, v. g. spiritus chamomilla  
per fermentationem paratus, aut idem spiritus infusus specie-  
bus carminantibus digestus, & tandem in balneo aliquoties  
cohobatus; sic enim rapit secum particulas carminantium  
aromaticas, i. e. salinas volatiles oleosas per alembicum,  
& ita cum ipiritu nitri iunctus sit efficacior & melior.

Hicce annumeratur & ab HARTMANNO commenda-  
tur spiritus terebinthinæ, & oleum ejus, quod absterge egre-  
giè intestina, ut nihil remaneat; hinc cum eo paratus bal-  
samus sulphuris terebinthinatus præprimis est egregius in  
Colica contumaci, etiam convulsivâ; unde quidam com-  
mendant sequens oleum compositum ad colicam:

R. Olei seu spiritus terebinth.

Bacc. jun. p. an. part. equal.

Infundantur flores hyperici; digerantur per diem & noctem, ex-  
primantur, & ita cum floribus novis pergatur, donec oleum  
rubicundissimum fiat.

Hujus Dosis gutt. xii. xv. ad ʒj. in brodio sumptum est in  
Colica humorosa expertissimum.

Unum adhuc observetur de Perforata, i. e. hyperico,  
si sc. digeratur in spiritu vini per mensem, superabitur ejus  
oleum in usu Chirurgico externo, & Medico interno, preuo-  
lissimum. Sapientia sat.

Spiritus carminativus ex nitro, tartaro & spiritu vini, de quo  
superius locutus sum, ubi de Cardialgia, est nobilissimus pla-  
ne in torminibus abdominis. Datur probe re-  
tificatus à ʒss. in quocunque vehiculo calido pro præstantissimo auxilio; in  
Colica similiter commendatur.

Præterea testes equini exsiccati, pulverisati, & propinati  
ad ʒj. cum pulvere seminis anisi ʒss. laudatissimum est expe-  
rimentum FONSECÆ anticolicum in l. 1. *Consil. 57.* (sunt  
Archibater Papæ) qui pulvis testiculorum equinorum in aqua  
liliorum convallium, addito parum croci, exhibitus excel-  
lens est experimentum contra Colicam, polychrestum ZW-  
ELFERO.

Pudendum seu priapus tauri, sive ejus rasura, sive Deco-  
ctum experimento egregiè comprobatum est à ZACUTO  
LUSITANO l. 2. *Præceps admiranda Observ. 24.* in Colica  
convulsivâ, quam, ut & dyenteriam, curat & præservat,  
Dosis ad ʒj. in vino Malvatico vel Decocto Helenii. Similiter  
commendat pudendum cervi BARTHOLINUS *Cen. 6. Hist. 50.* Fuligo pulverisata & cum aceto destillato mista &  
bibita calidè, statim dolorem pellere dicitur. Similiter etiam  
spiritus urinosus fuliginis aliquando felici cum successu fuit  
propinatus: quæ remedia & in casu ab alto & passionibus  
hysteriis & pleuritide &c. egregiè conveniunt, dum acidum  
in hisce malis potenter corrigunt. Saccharum Saturni in  
Colica à nimio acido remedium est singulare, si ad gr. ij. vel  
jv. cum alius propinetur; in saccharo enim Saturni magna vis  
Medica latet.

Denique stercorea animalium sunt remedia aliis omnibus,  
si non anteferenda, saltem tamen æquiparanda. Hicce præ  
cæteris parabilibus remedium, licet sordidum, addatur ster-  
cus equinum recens, ab equo avenâ pasto, cujus succus cum  
liquore quocunque appropriato, in specie cerevisiâ calidâ  
expres-



expressus & imbibitus, Imperando, quantum possibile, quietem, & expectando sudorem, singularem & praesentaneum est experimentum contra Colicas, imprimis convulsivam, non secus ac contra suffocationes hystericas (vid. RIVERIUS l. 10) habet statum, si fieri potest, ratione sexus, ita ut succus ex equo propinetur masculo, ex equa verò foemina, Loco hujus stercus cati exsiccatum in aëre, in vino resolutum & edulcoratum, hinc percolatum, aliquando Magnam alicui restituit. Non cedit huic stercus lupinum expectantia confirmatum contra Colicam ex quacunque causa natam, Dosi ℥ss ad 3j: Vid. PANAROLLUS, qui totus est, *Pensee. 3. Observat. 36.* HARTMANNUS in *Praxi Chym. pag. 184.* item FORESTUS l. 1. *Obs. 35.* in Scholio, AMATUS LUSITANUS *Cent. 3. Curat. 12.* item RIVERIUS *Cent. 1. Observ. 59. & 86.* & tantum non apud omnes Autores in magnis laudibus versatur stercus lupi, praemisso Clystere. Hinc etiam aqua destillata ex stercore bovis junioris ad 3j. propinata laudatur. Sic succum stercoris columbini cum lacte expressum laudatum videbitis in VELSCHIO, *Heparos. 2. pag. 32.*

Si metus sit, quod in pariesin transeant tormina abdominis, Clysmatis blandis alvus stimulanda est; internè vero salia volatilia, ut salia volatile urinæ, spiritus salis ammoniaci simplex & anisatus, liquor cornu cervi succinatus, in specie ex tartaro & spiritu tartari volatili, propinata; expectato sudore sunt convenientissima, quia non tantum acidum nervos vellicos corrigunt, sed pariesin praecavent & curant; expectetur post usum eorum sudor, quo apparente, paroxysmus, si non planè, sensibilibus tamen tollitur. Spiritus tartari volatilis legitime paratus (quod volatilior, eò melior; variae enim sunt ejus preparationes; felix est, qui optimum habet) est excellens remedium pro curanda pariesi per sudorem. Obiter moneo; expectibus vini sit volatilior spiritus, quam ex ipso tartaro, modo rectè destilletur, & super caput priortum rectificetur. Vel

℞. Spiritus salis ammoniaci anis. 3j.

Ess. laudan. opiat. Langelotti 3j.

S. Mixture dolores sedans,

Pro doli propinetur anti. 24.

℞. Spiritus salis ammoniaci anis.

succinati an. 3ij.

M. D. S.

Spiritus dolores sedans.

Ut Cura Colicæ convulsivæ magis illustretur, exemplo declarabo. Juvenis 16. vel 17. annorum corripitur torminibus abdominis gravissimis circa & infra regionem umbilicalem, simul ubinè praecordia occupantibus, dicebat: venire ipsi aliquando ad cor, & velle ipsi cor suffocare: alvus pertinaciter erat clausa, ut bilicus interiora versus retractus, abdomen contractum; corpus erat durum, & sensum non poterat erectus stare, quia malum viscera contracta: hoc etiam urinæ emissio difficilis; nec quicquam animi audebat promovere, quoniam totum abdomen dolebat.

Die Solis propinqua alvo, simulque sistendo nonnihil urgente dolori:

℞. Lapill. cancr. præp. 3℥.

Laudan. byst. gr. v.

Scamm. sulphurat. gr. iij.

Miscendo pro pulvere.

Exhibui: sed frustra. Propterea eadem die propino, quæ alias juvant.

℞. Arcan. dupl. gr. xv.

Scamm. sulphurat.

Trochic. alb. an. gr. j.

Muc. in pulverem.

Hinc sub nocte habebat aliquot sedes, sed sine levamine.

Die Lunæ injectum Clystma emolliens, & carminans aliquantulum; sed parum profuit; unde pro sistendis torminibus & leniendis spasmodis partium abdominis:

℞. Aqua fanicul.

Memb. an. 3℥.

Spiritus salis ammoniaci 3j.

Ess. opii 3℥.

Syrup. cortic. aurant. 3vi.

Misc. in Potionem.

De hac vesperti & nocte pro lubitu capiebat, simulq; abdomen induratum inungebat sequenti Linimento:

℞. Oleibamom.

Cumin. an. 3ij.

Destillat. anisi 3j.

Miscendo in Linimentum.

Nox paulo erat quietior: sed manè omnia recrudescebant symptomata; unde die Martis ad compescendos spasmos:

℞. Emplastr. de galbano q. l.

Malaxetur cum l. q. olei succini, F.

Emplastrum insternendum abdomini.

Die Mercurii omnia erant in eodem statu, & cum æger possideret, ut saltem bene aperiretur alvus, quoniam praesens versus græmum:

℞. Passul. min. laxat. 3℥.

Aurif. fulm. gr. jv.

Miscendo,

Unde post aliquot horas xi. ferè secessus habuit; hinc vesperti

℞. Savi bircini,

Vnguenti potab. rub. an. 3j.

Miscendo in Linimentum.

Hoc inungebat largiter abdomen, quod emollitum nonnihil fuit cum euphoria.

Die ergo Jovis, cum corpus videretur sufficienter evacuatum, ad convulsivum dolorem sistendum,

℞. Cinnab. antimonii 3j.

Laudan. byst. gr. iij.

M. f. Pulvis.

qui preparabatur in duplo, & usurpabatur egregio cum levamine.

Die Veneris pro ahstergendis residuis in intestinis, & leniendis usdem, quod remittat eorum contractura;

℞. Olei lini,

Rapar. an. 3v.

M. pro Clysmate.

Qui egregiè contulit, multa viscida evacuavit cum levamine; unde vesperti modò dictus pulvis repetitus noctem quietam reddidit.

Die Saturni tandem, cum partim contumacia dolorum, partim clystma me certiore reddiderint, quod mucago acida seu pontica in recessu peccaret, ordinavi sequentem portionem laxativam appropriatam; licet enim bis, ter & saepius quotidie excerneret liquida sponte sua, tamen sine debita euphoria erat, quia non evacuabatur, quod evacuandum erat, sed hæc excretiones erant saltem effectus praemissorum Laxativorum, quorum occasione propter irritationem fluida serosa ejiciebantur, somite morbofo, mucos pontico summatim herente. Propterea

℞. Aqua mentha 3j.

Gumm. ammon. in aceto sol. 3j.

Tartari vitriolat. 3℥.

Scamm. præp.

Trochisc. alb. an. gr. 8.

Syrup. ros. sol. 3ij.

Misc. pro Potione.

Hinc 4. vel 5. vicibus excrevit, plenario cum levamine.

Æger alias levi de causa huic affectui erat obnoxius: Peccabat in eo forte acidum austerum, unde & laxantia parum operabantur, & hujus acidi austri occasione in subjecto viscido Colica hæc convulsiva excitata fuit.

Cum post dierum aliquot intervallum subinde aliquot vestigia recurrerent, ob id manè liquoris martis solaris gutt. xij. ad xv. a meridie spiritus salis ammon. gutt. xxx. ad XL. aliquandiu accepit cum levamine.

Novi Studiosum juvenem, Colicam convulsivam verno tempore cujusvis anni patientem, quæ typum febris intermittens tertianæ servat; Dicit enim æger, pati deliquium; & interrogatus, quid patiatur? respondet: circa cor sentire angustias, ac si vomiturus esset; cui fini & integram palmam faucibus intrudit, summoque conatu vomitum, utur subinde frustra, provocat: hinc oculos torquet, sudorem frigidum syncopit cum tremoreque membrorum experitur, & quidem semper alternis diebus motum repetit. Tale parthema ex qua causa prodierit, initio nesciebam; Interim ex inspectione urinae, caudam pavonis representantis, confirmabar de latente scorbuto, adeoque præscripti ante & in paroxysmo hunc pulverem:

℞. Cinnab. antimonii gr. xv.

Salis vol. succin. 3℥.

Laudan. opiat. gr. j.

M. f. Pulvis: cujus vehiculum erat:

℞. Aqua Epileps. Langii 3j.

Ceras. nigr.

Lil. convall. cum vino an. 3vj.

Spiritus coctlear. 3ij.

Spir.



Spir. Cern. Cerv. cum sale vol. 3j.

Misc.

Syrupum nullum addebam, quia dulcia ferre non poterat, sed capiebat in hac Mixtura pulverem ante paroxysmum, sub paroxysmo aliquot cochlearia vehiculi solius ingurgitando. Hinc præmixto Clysmate liquorem Cern. Cervi succinatum continuavit, & ita repetitio ejus uti malum in prima ejus herba truncatum fuit, ægerque restitutus est. Similiter quoque Mixturam ei præscripsi:

R. Aqua antiscorbut.

Fl. sambuc. an 3ß.

Spiritus coctlear. 3j.

Lumb. ter. est. volat.

Arcan. dupl. Myrsichii an. 3j.

Syrupi scelergrb. Foresti 3ß.

M. pro Portione.

De opio & opiatis est res clara; unde etiam secundum Veteres merend' Theriaca & Muhiudatium propter opium usurpata s'c'e contra dolores abdominis: & sunt egregia remedia ad 3j. in vino propinata, ubi aperta prius fuerit alvus: loco quorum sufficiat nobis Laudanum opiatum & Laudanum hystericum; Nam Laudanum opiatum est generale & universale remedium & anodynum. Loco laudani hysteric

R. Extraß. Zedoar. gr. xij.

Cassior. gr. vj.

Laud. opiat. gr. jv.

M. f. Pilule No. 36, pro 3. dosibus: S.

Pilule dolores sedantes pro 3. vicibus.

Cæterum notum est varias esse opi præparationes, è quibus omnibus vobis commendo eam, de qua supra in Prolegomenis dixi.

Si ab errore externo fortè dolor colicus ortus fuerit, possunt internè præscribi absorbentia, Laxativa & Opiatis mista: e.g. nullis erit sequens pulvis:

R. Lap. Cancr. præp. 3j.

Scamm. sulphurat. gr. i. j.

Zinn. in hofes or. v. ad vi (vel laudani opiat. gr. j. vel ij.)

Olei destillat. cortic. auratis. gutt. ij.

M. f. pulvis pro una vice.

Dentur 3. doses:

Capiantur in vehiculo calido.

Grana integra piperis cum spiritu vini propinata in Colicâ post crapulam, vel cerevisiæ vitio, præcedente frigore contractam, commendat HOFFMANNUS de Medicamentis officinalibus; Cruditates enim acidas Piper optimè destruit.

Porrò quadruplex est differentia doloris lumbaris: inter quos dolorem lumbarem nephriticum optimè curat terebinthina, & omnia Medicamenta ex ea parata, ut balsamus sulphuris terebinthinatus, quæ etiam sunt optima in dolore melenterico.

Etiam ipse dolor Colicus nunc cum algore, nunc cum ardore affligit: Dolor, qui cum frigore affligit, optimè curatur additis appropriatis oleis destillatis aromaticis, ut aurantiorum, &c. In assu addantur Nitrata, maxime spiritus natri dulcis anticolicus.

Hicce Internus, quantum possibile, succurrimus doloribus abdominis.

Inter Externa, quæ applicantur abdomini, ad compescendos dolores colicos & iliacos, eorumque spasmos & convulsivos motus, eminent ex supra laudatis simplicibus detumpta olea cocta & destillata, ut oleum anethi, chamomillæ, rutæ, amygdalarum dulcium, laurinum, oleum destillatum baccarum lauri, juniperi, corticum aurantiorum, maciæ, & omnia, quæ intus sumuntur: e.g.

R. Olei anethi per coll.

Chamom. an. 3j.

Destillat. chamom. 3j.

Anisi,

Carvi,

Cumini,

Fenic. vel Zedoar. an. gutt. vj.

ad. latur

Corporis pro Balsamo q. l. pro libitu:

M. S.

Balsamus externum.

R. Olei anethi,

Chamom. an. 3j. vel ij.

Destillat. cham. vel anethi

Angel.

Cumini.

Ol. destill. Rutæ an 3ß.

M. S.

Oleum dissolvens.

Vel cum oleo nucisæ expresso i. Balsamus; vel cum Tacamahaca

Emplastrum. Vel

R. Olei anethi,

Chamom. an. 3j.

Destillat. anethi,

Chamom. an. gutt. jx.

Carvi,

Cumini an. gutt. vj.

M. S.

Singulare oleum contra colicam.

Item in Colica convulsiva:

R. Olei destillat. succini 3j.

Spica 3ß. vel an. p. æqu.

M. S. Oleum externum contra colicam.

Illinantur largiter regioni abdominis, in specie umbilicali, & fovendo desuper latere calefacto, effectus expectatur.

Oleum quoque corticum aurantiorum cum oleo destillato angelicæ vel anisi fociatum, & umbilico illi in Colica convenit:

Vel

R. Olei laurini 3ß.

Cassior. pulv. is. vel ejusd. olei 3j.

M. f. Linimentum: S.

Vnguentum contra colicam.

Quod umbilico inunctum non est inconveniens, imponendo latere calefactum.

R. Olei laurini,

Anethi,

Chamom. an. 3ß.

Galbani Paracelsi 3j.

Destillat. succini 3ß.

Carvi,

Cumini,

Feniculi an. 3ß.

M. f. Linimentum: S.

ut antea.

PARACELSUS feliciter usus fuit zibetho; vel zibethum umbilico inunctum cum oleo nucis moschatæ, addendo parum olei destillati maciæ, egregiè convenit. Loco hujus Balsami zibethi MYNSICHTII in Armament. pag. 79. egregiè commendatur; vel Ballatum apoplecticum, quod zibethum ingreditur, umbilico illinatur, & desuper locus foveatur. Pinguendo cati sylvestris, uti in epilepsia interna est notabile, ita in doloribus convulsivis abdominis est egregium: sumitur asservata & depurata, & illinitur probè regioni umbilicali. Jubent quidam differentiam sexus observare, sed tamen non adeò necessarium est: non vulgare est medicamentum, plurimum in recessu habet. Quibus placet zibethum addere, remedium magis efficax habent.

Horum loco excellit contra omnia tormina abdominis Galbanum, in specie in convulsiva Colicâ atrociorè; unde etiam egregium est hystericum, umbilico applicatum, siue Galbanum in forma Emplastri sit malaxatum cum oleo succini vel spiciæ, vel alio appropriato, vel Balsamus Peruvianus externè abdomini instilletur, vel Emplastrum matricarie de galbano malaxatum cum oleo destillato succini, quod optimum est ad spasmus convulsivum, regioni umbilicali applicetur: Vel

R. Galb. in spiritu vini non rectif. soluti 3j.

Olei chamom.

Rutæ an. 3ß.

Croc. gr. vj.

M. F. Linimentum: S.

ut supra.

Vel Galbanum simpliciter lento igne liquefactum, cum part. ij. olei succini, & part. i. olei spiciæ malaxatum, inducatur alutæ & applicetur, quod optimum est. Oleum destillatum galbani compositum, seu Galbanetum Paracelsi, de quo vid. SCHROEDERUS, ubi de Galbano, SENNERTUS de Colica, & HARTMANNUS in Praxi Chymiatr., umbilico illi nobilissimum est & expertissimum in Colica, quacunque, speciatim in convulsivis abdominis doloribus.

Vel

R. Galbaneti Paracelsi 3j.

Olei destillat. succini 3j.

Spica 3j.

M. pro Lin.

Variant



Variant autem descriptiones hujus olei nobilissimi.

Interim *bujus defectu & oleum destillatum succini vel solitarium, vel partes ij. cum olei spicae parte j.* mistæ, commodè contrà affectos dolores umbilico illiniri possunt.

Horum loco *oleum saponis* commodè adhiberi potest, quod egregium in his affectibus est ob penetrantiam alcalinam, quâ destruitur acidum: nempe destillatur *sapo cum calce viva*, vel cū cineribus ossium calcinatorum, ut destruaturs ejus acidum, per retortam: cujus oleum ita destillari gult. ij. vel jv. umbilico illinuntur, pro cura colicæ torminosæ: Vel dissolvatur *sapo* in spiritu vini ad mellaginem: massacum ana *calcis vivæ* destilletur, & cohobetur aliquoties. Hac ratione acquiritur oleum externum ad affectus dolorosos & alias partes nervosas, quod in arthritide frigida etiam laudatur. His addatur oleum petrae albam, quod multum in recessu habet; quod non tantum abdomini illitum, sed & regioni lumbari, in specie in doloribus lumbaribus, nephriticis & mesentericis, est egregium sistens & compescens dolorem.

Emplastro denique ex gummate *tacamahacæ*, vel solo vel cum emplastro de meliloto mixto, & cum oleo chamomillæ vel aliis carminantibus malaxato; vel *Tacamahacæ* cum Balsamo Peruviano malaxata & imposita, est bona:

*R. Galban.*  
*Tacamab. an. part. jss.*  
*Bals. Peru. part. j.*  
*F. l. a. Emplastrum, S.*  
*Emplastrum dissolvens.*

Alias usitatum etiam est Emplastrum ex baccis lauri, uti & Emplastrum carminativum Sylvii cum emplastro Nicotianæ mixtum. Stercus suillum Cataplasmaris instar calidè applicatum, laudatur à RULANDO; Cataplasma verò ex stercore equino cum oleo rutaceo, experimentum est JOELIS & AMATI LUSITANI.

Tandem sacculi & Fomenta in aqua & vino aut lacte cocta in dolore abdominis scorbutico, calidè applicata abdomini conveniunt: v. g.

*R. Summ. hyoscyami,*  
*Flor. sambucian. M. ij.*  
*Chamom. M. ij. ad jv.*  
*Bacc. junip. rec. 3ss. ad 3ij.*

Includantur *sacculo*, probe interpassato, qui vino calido, aut lacti vaccino vel caprillo immersus aut ebullitus, cum lintheis multiplicatis calidè abdomini applicatur, & sæpius reitatur; maxime enim egregium est in Colicâ scorbutica.

*R. Fol. lauri,*  
*Rutæ an. M. ij.*  
*Summit. anetbi,*  
*Cent. min.*  
*Flor. cham. Rom.*  
*Sambuc. an. M. ss.*  
*Rad. angel.*  
*Levisi i an. 3ij.*  
*Bacc. lauri 3j.*  
*Juniperi 3ss.*  
*Sem. 4. calid. maj. an. 3ij.*  
*Concis. & contul. coqu. in vino, in vase clauso: D. S.*

*Fomentum externum.*

*R. Summit. anetbi,*  
*Herb. mentha,*  
*Rutæ,*  
*Flor. cham. an. M. ij.*  
*Bacc. junip.*  
*Sem. fœnic. an. 3j.*  
*Incis. & contul. includantur sacculo: S.*  
*Sacculus pro fomento.*

*R. Summit. anetbi,*  
*Flor. cham. an. M. j.*  
*Ror. mar.*  
*Sals. an. pug. ij.*  
*Sem. 4. calid. an. 3j.*  
*Incisa & contula dentur: S.*

*Species ad fomentum.*

Huc pertinet *sacculus avenaceus* calidè applicatus:

*R. Avena part. ij.*  
*Bacc. junip.*  
*Sem. coriandri an. part. j.*  
*Contula milc. includantur sacculo.*

Item sacculus ex milio calidè abdomini applicatus, egregie conducit. Catellus Melitensis colicâ affectis appositus, anodynus est. Lapis nephriticus amuleti instar appensus mirificè contra Colicam laudatur.

Extra Paroxysmum Martialis profunt: Manè nempe datur solutio martis cum succo pomorum, vel in robustioribus Liqueur martis solaris, & vesperti spiritus salis ammoniaci saturatus. Profunt etiam Diuretica cum Carminativis mixta: vid. WILLISIUS de Anima Brut. pag. 397.

Hæc sufficiant de Colicâ, & passionibus Colicis: Pergo ad alia. Sic ergo jam

## SECTIO XII.

DE

### SITU · INTESTINORUM MUTATO.

UTriusque contentorum in Intestinis distributio, & conveniens excrementorum egestio, necesse est, ut hæc debitum obstruentur; qui est ut naturaliter internus colligantur à mesenterio, utpote cui connexa sunt, simulque vertebri lumborum, imprimis superioribus, suspendantur & annectantur; exterius verò eadem ritè à peritonæo, tanquam in bursa, contingantur. Quod si verò mutetur hic intestinorum situs ex loco tali naturali in alium, fieri nequit hoc sine insigni tumore, qui tumore ab intestinis, ex loco proprio prolapsus, communiter Hernia dicitur.

#### CAPUT I.

De

#### HERNIIS.

**H**ernia Germanis *ein Bruch*; Græcis *κῆλη* vocatur.

Fit hoc, quando bursa peritonæi in quodam loco aut rumpitur aut relaxatur, tunc per laxatum aut ruptum peritonæi locum intestina elabuntur, & ita herniam inferunt: quamdiu verò hæc bursa peritonæi est integra, tamdiu intestina in naturali loco permagent. Intestinis,

his, uti notum est, tanquam linteum vel indusium superstratum est omentum, similiter uti intestina à peritonæo collecta: hoc ipsum simili ratione, aut cum intestinis, aut absque us rupto aut laxato peritonæo, decidere potest; unde vel *πρωτοκῆλη*, vel *εὐρυπρωτοκῆλη* oritur.

Definitur, quod sit prolapsus aut intestinorum tenuium, aut omenti, ex limitibus peritonæi, dependens aut à vulnere, aut à laxatione.

Genus est prolapsus, qui ipse pertinet, tanquam ad genus superius, ad morbos situs mutati.

#### PARS AFFECTA.

Pars affecta partim est Peritonæum, quod variis in locis læditur, partim sunt intestina & omentum, quando situm suum mutant; unde peritonæum aut planè rumpitur, aut dilatur: Intestina ergo saltem tenuia, jejunum, ileon, unâ cum suprâ intrato omento in hernia ita prolabi possunt; crassa enim, quia nimis firmiter connectuntur, immobilia sunt.

Loca, in quibus ordinariè laxatur, aut peritonæum rumpitur, sunt varia: frequentissimè hoc fit in ejusdem processibus circa inguina, per quos in scrotum descendunt vasa spermatica, ibique convolvuntur in testes: & postea



postea è uno illeus. Nam in his duobus locis facillimè aut laxatur, aut omnino rumpitur peritonæi membrana fibrosa, seu bursa; unde etiam ratione partis affectæ hæc duæ sunt primariæ herniarum species: nempe *Enterocoele* seu *Hernia scrotalis* aut *inguinalis*, dum omentum vel intestina per processum peritonæi ad inguina & scrotum descendunt; & *Omphalocoele* seu *Hernia umbilicalis*, quando intestina vel omentum per partem peritonæi, cingentem vasa umbilicalia post partum præcisa, laxant & dilatant, ita, ut hæc peritonæi pars extendatur circa cicatricem dictam umbilicumque, ad quem modum accidit *Hernia umbilicalis* & *Omphalocoele*.

*Hernia scrotalis* est vel *perfecta* seu *completa*, vel *imperfecta* seu *incompleta*: *Imperfecta* est *Hernia inguinalis* seu *Bubonocoele*, quando saltem in inguinibus seu regione bubonum est tantum tumor ab intestinis prolapsis, & super osse pubis hærentibus: quæ si successivè ulterius descendant in scrotum, est *Hernia scrotalis perfecta*. Illud verò, quod per peritonæum læsum prorumpit, est vel omentum, vel intestinum, vel intestina nunc conjunctim, nunc separatim. Quod si descendat solum omentum in scrotum, est *Epiplocoele*: si verò non tam intestina sola, quod raro fit, quam omentum, per peritonæum ruptum, dicitur *Enterocoele*.

Hæc duo loca, umbilicus & processus peritonæi, sunt serè, per quæ ordinariò & frequenter fiunt Herniæ; non autem sunt sola; nam etiam in aliis locis abdominis Peritonæum læsum ruptum aut laxatum dat Hernias, observante hoc primùm *BARBETTE in sua Chirurgia P. 1. cap. 71*, quod etiam aliis in locis, nunc supra & infra umbilicum, nunc in lateribus longè supra inguina, item à parte posteriori circa regionem lumbarem ruptum aut laxatum Peritonæum interat Hernias; quæ, quia rariores, ab imperitis Chirurgis tanquam abscessus tractari solent, non erant periculum ægri. Refert etiam *citato loco* exemplum herniæ, ubi per processus peritonæi laxatos & ruptos facta sit hernia, ubi intestina non in scrotum delapsa, sed juxta scrotum parti musculosæ femoris infederint, & ita juxta scrotum ingentem tumorem ex laxata cute induxerint: Idem *BARBETTE* observat rupturam peritonæi juxta spinam dorsæ, & ibidem ex intestinis prolapsis factam herniam: Sic etiam *BARTHOLINUS Cent. 2. Hist. 95*, observat talem herniam supra regionem umbilicalem, mox infra cartilagine m ensiformem ex ruptura peritonæi, quæ est similiter singularis, ut vulgari, non tamen contemnenda, quia potest occurrere in Praxi: Sic ex utero rupto intestina prolapsa observat *SCHENCKIUS l. 4. Observ. pag. 650*, de intestinis ex utero prolapsis: Simile exemplum *NANZELIUS* habet in *Anal. Microcosmi & Macrocosmi pag. 705*, de descensu intestinorum in capacitatem uteri, ex rupta uteri cervice, quæ intestina etiam in uterum prolapsa loco secundariò ab imperito Chirurgo fuerunt extracta. Observandum tamen hic est, ne præternaturalis testiculi situs falsò habeatur pro hernia: Nam interdum testiculorum alter non semper in scroto hæret, sed ossi pubis incumbit; sicut interdum planè intra abdomen retrahitur, & tumorem infert. Non ergo iste tumor ex testiculo confundatur cum *Bubonocoele* vel abscessu illius loci, de quo *SCHENCKIUS in Obs. pag. 341*.

## CAUSA.

*Cause Herniarum proxima* latet in ruptura aut laxatione peritonæi; hinc omnia, quæ quocunque modo aut rumpe-re, aut successivè laxare aut dilatare possunt quodam in loco peritonæum, induunt naturam *causarum remotarum*. Ruptura in *Omphalocoele* aut aliis speciebus est frequentior, in scrotali verò est rarior, quoniam rupto processu peritonæi intra musculorum confinia intestina subsistunt, & ita saltem inguinalem herniam faciunt, cum eadem successivè per dilatatum peritonæum, tanquam per demonstrata vestigia facillè in scrotum descendant. Hinc tales causæ internæ sunt paucæ & raræ. Interdum subest character hæreditarius, ita, ut herniosi parentes herniosos generent fœtus. Aliquot exempla videbitis in *HILDANO Cent. 3. Obs. 73*. Fiunt etiam interdum Herniæ intestinales ex nimia & violenta purgatione, teste *PLATERO in Observ.* ubi subministrat exemplum herniæ talis ex usu & nimia operatione purgantis ab empirico propinati. *Ætas* quoque *infantis & puerilis* ob peritonæi teneritudinem hic confert aliquid: Herniam etiam à primo ortu refert *HILDANUS*: & *SCUETETUS Obs. 60. P. 2. Armament. Chirurgicæ*: *Congenita umbilici hernia* ex magis repentina imaginationis impressione meminit. Utriu-

rum *Causa externa* hernias inserunt, ut sunt *motus & saltus nimius*: sic v. g. *diffensio* quædam *femoris* causa fuit herniæ, vel inguinalis, & consequenter scrotalis, apud *Joh. von Meck Kern cap. 66, pag. 297*; quia olim surgens è sedili suo, (: ultra vires corporis :) *sinistrum crus* ex improviso è loco moverat, ex quo *Bubonocoele*, & brevi post *Enterocoele* non sine dolore in scroto habuit. Similiter idem observavit herniæ insignne augmentum ex vomitu p. 282. Hernias etiam infert *clamor nimius*, unde ratione continui clamoris infantes facillimè fiunt herniosi: item fortior *sternutatio*, *tussis nimia*, &c. inserunt hernias: vid. *SCHENCKIUS*: item nimium ponderosa *bajulatio*, & *iratio*, *altatio*, &c. *PLATERUS* refert ex impetu tauri cornibus factam herniam l. 3. pag. 712. *Difficilis partus* subinde hernias, imprimis *omphalocoelem*, seu herniam umbilicalem, inducunt.

## DIAGNOSIS.

Quoad *signa diagnostica*: In omni hernia adest tumor præternaturalis: intertum tamen tumori soli non est fidentum. Itaque cauti simus in cognoscendis herniis, nè decipiamur, & tumorem ex præternaturali situ, similemque hernias putemus; si enim tumor præternaturalis adest, & in scroto nullus testiculus, tumor non dependet ab hernia: Sic *Observat. 55*, refert *MARCHETTE pag. 104*, villicum quendam, *bubonocoele* laborantem, accessisse *barbitonforem*, qui *bubonocoelem* ratus est *bubonem venereum*; quapropter sectionem administravit, quæ facta, *stercus* loco puris emanavit. Itaque præter tumorem notetur in diagnosi: tumorem herniosum nunc incrementum, nunc decrementum pati, nonnunquam etiam planè aboleri.

Aliàs hernia incipiens facillè cognosci potest: nempe tumor, ubi unquæ locum sit, mollis, serè indolens apparet: dum æger in dorso jacet, intestina & omentum prolapsa spontè in cavitatem abdominis recedunt, & tumor totus ut plurimum disparet: Imò resupinato ægro, ac elevatis nonnihil cruribus & natibus, interdum cum murmure intra abdomen relabuntur; erecto verò ægro tumor talis redit, accrescit & protuberat, estque ut plurimum sine dolore, nisi aut intestina inflammata, aut flatibus aut stercore indurato repleta, aut in angustiore foramine inclusa intestina, irritationis & doloris occasione in subministrant.

Jubendus etiam æger, ut tussiat; hoc etenim factò, quando aliquid in scrotum descendit, crepitum observamus.

Præterea omentum & intestina semper digitis possunt repelli, nisi aut flatus, aut excrementa indurata id impediunt.

Hernia confirmata iisdem cognoscitur signis, in specie, si successivè magis magisque incrementum capiat: item, si causæ præcedentes potuerint eandem inferre: Vid. *SENNERTUS*.

Factam Herniam quod attinet: est malum sine periculo, si reponitur; si verò non, sed in loco rupto vel laxato hærent intestina, tunc periculum est non leve, licet observatum sit sæpius contrarium.

## PROGNOSIS.

In Prognosi, quò diuturnior, & quò major vel minor, etiam periculiosior aut levior est Hernia.

Confirmata est curatu difficilis, præsertim in adultis, in quibus rarissimè absque Chirurgica operatione curari possunt: in tenella infantum ætate facilius succedit negotium.

Si ex hernia superveniat vomitus, non adeò desperatus, quam si ex aliis causis: vid. *M. A. N. C. Anno 6. & 7. Observ. 44*, *SENNERTUS in Praxi, ubi de oleo p. 248*. Bina sunt pericula, quæ ex herniis ingruunt: nempe *Colica* & *morbus iliacus*, occasione intestinorum irritatorum in loco prolapsis; sive irritentur à causa externa, frigore, contusione, &c.; sive à causa interna, retentis fecibus, flatibus, &c. Deinde fit interdum, ut intestina prolapsa inflammantur, & inflammata gangrenam concipiant, & sic æger moriatur: quale exemplum habet *HILDANUS* ex *epi-plocoele* demor-tui, *Obs. 72. Cent. 1*. Si Herniis subito factis, & exaggeratis gravi dolore, singultus superveniat, aut ileos, paucissimi evadunt: *Tulpis* saltem l. 3. *Obs. 13*, contrarium habet exemplum de hernioso vomitu stercoreo seu ileo, qui evasit: Nam



Nam si intereunt ægri, aut ileo, aut intestinorum inflammationum gangræna moriuntur.

Rarum est, quod intestina prolapsa & inflammata suppurantur, & suppurata extrorsum versus aperiantur, ita ut ster-  
cus, & interdum ipsa assumpta alimenta per aperturam pro-  
deant: de quo HILDANUS in *Observationib.*, item JACOB  
van MEECKERN.

### C U R A.

In Cura omnis Herniæ tres scopi sunt attendendi:

1. Ut reponantur Intestina & omentum prolapsum in si-  
tum naturalem.
2. Ut reposita Intestina in situ naturali firmentur, ne  
denuo excidant.
3. Peritonæum ruptum aut laxatum consolidando, quod  
in senibus aut actuosius difficile, in junioribus &  
sedentariis facile debitis subligaculis partem affe-  
ctam comprimendo.

Pro scopis melius obrinendis observandum:

I. Clysterum usus non negligendus, quando flatus vel  
murmura intestina crassa occupant, vel alvus contumacior  
est, & symptomata gravia ægrum torquent: Conferatur  
HILDANUS l. 6. *Obs.* 73: sic enim intestina crassa abster-  
guuntur & facilius ex intestinis tenuibus in eadem derivantur  
excrementa, & sic remonentur impedimenta. Purgantia  
autem exulent.

II. In Hernia intestinali cordatus Medicus semper statum  
rationem habeat, & proinde nobiliorum carminan-  
tium & præcipitantium usum quam sedulo observet, cum ta-  
lium causa & inde producti flatus murè exasperant her-  
nias.

III. Herniæ à frigore, præsertim subitaneo, solent fieri le-  
thales: irritata nempe intestina dolorem, hinc spasmus &  
duritiem concipiunt, quos insequitur ileos: vid. VEL.  
SCHIUS in *Hæcat.* 2. pag. 6. item M. A. N. C. *Ann.* 8. *Obs.*  
93. pag. 154.

IV. Cautiones in Repositione manuali observandæ sunt,  
quas imprimis suggerit PANAROLLUS in *Reposit.* & Cura  
Herniarum *Pentec.* 5. *Observat.* 49., quæ omnes perquam sunt  
laudabiles, exceptâ secundâ, ubi frigida intrâ & extrâ com-  
mendat.

Cautela sunt sequentes:

I. In Enterocæle non debet Chirurgus sapius manum admo-  
vere, sed cautiſſimè & tenerimè tractet intestina, ne impetu-  
so contactu intestina, dum dolent, irriterentur & sic spasmus, do-  
lor ejus & cum dolore inflammatio, intendatur, unde difficilis  
repositio.

II. Abstinere jubet à rebus omnibus calidis tam intra quam ex-  
tra, quoniam inflammationem accelerant, ex qua corruptio &  
mors. Frigida verò probate non possum, quia sunt pericu-  
losissima; quin tepida aut subcalida internè & externè usur-  
panda remedia.

III. Ita debemus ægrum collocare, ut pedes altiores sint  
quam caput.

IV. Cibi omnes solidi fugiendi & tantum rebus liquidis uten-  
dum est.

V. Parti dolenti applicare possumus omentum agni castrati te-  
pidum, & ungere manus cum oleo amygdalarum dulcium, vel  
imponendum simul unguentum; idque saltem tepidè, non fri-  
gidè, applicetur.

VI. Advertat Chirurgus facili aut spontè intestinum regredi  
iſce remediis absque ullâ manuum vi: nam si sapius admoveantur  
manus, irritatur natura, & res est desperata, cautiſſimèque  
primitus ea tractet, successivè ea intrudendo: si dolor impedit,  
tunc illinatur blandè locus herniosus volâ manus cum oleo appro-  
priato, ut oleo hyperici cum oleo amygdalarum dulcium, oleo cha-  
momilla, oleo violaceo & similibus blandis, cum aliquot guttis  
olei deſtillati cujusdam carminativi acutis.

VII. Abstineat tandem egrotans à vino, etiamsi decrepitis  
ſit (loquitur de vino Italici tanulari, de nostrate aliter pro-  
nunciandum.) Id tamen animadvertendum est; quod si in  
stomachi incidat dolorem, concedendum est, ut manè capiat vini  
potentis 3j.

Conf. quoad Herniarum Curas HILDAN. loco superius ci-  
tato, SCULTET. in *Arm. Chirurg.* Tab. 39., & HARAM  
de Herniis.

Ut ergo reponantur intestina prolapsa, hæc ipsa con-  
veniente corporis situ reſupinato (quod primario intel-  
ligendum est de hernia umbilicali & inguinali; secunda  
lo etiam de reliquis cruribus, & natibus nonnihil eleva-

tis, ut intestina naturali quodam impetu per locum natura-  
lem retrocedant) adjuvanda est; aut si spontè retrocedere  
nolunt intestina prolapsa, comprehendantur lincolo calido  
manu sinistra, dextrâ verò, & quidem digito indice & polli-  
ce inuncto oleo sulphuris Rulandi, per rupturam intrudan-  
tur. Notetur tamen, non proficuum esse, sæpius intesti-  
na prolapsa manibus palpare; siquidem hoc modo & dolor  
& hernia augetur. Simul autem impedimenta, flatus impris-  
mis, stercora, & hinc intestinorum ad tactum induratio re-  
movenda. Induratio hæc intestinorum non præcisè est à fæ-  
cibus induratis, quales vix reperiuntur in intestinis tenuibus,  
quæ solummodò procidere solent, sed potiùs ex membrana-  
rum tensione & spasmotico intestinorum affectu talis duri-  
ties oriri videtur: crassa enim ob firmam compactionem non  
possunt prolabi, nisi impetu suo. Ergo irritatio ista, duri-  
tici occasio, blandis fomentis externis resolvenda, internis  
aromaticis carminantibus, intestinis amicis, & tensionem  
renisumque eorum & flatuum genesin impediuntibus, sisten-  
da: de quibus in *Colica*.

Pro dictis igitur impedimentis removendis internè con-  
veniunt 4. femina calida majora, quocunque modo sumpta,  
speciatim probè contusa in vino vase clauso ebullita, & cali-  
dè pota, addendo interdum parum lapillorum cancrorum  
præpar., de quibus vid. HELMONTIUS *Tract. de Flatibus*;  
externè verò fomenta, unguenta, cataplasmata anodyna,  
carminantia & blandè emollientia. Usurpanda sunt emol-  
lientia in induratis fæcibus & intestinis, discutiencia in fla-  
tuum præsentia; anodyna in irritationis molestiæ plus minus  
dolorosæ, & hinc duritiæ urgentia. Ingredientia per se pa-  
rent: Vegetabilia carminantia cum lacte coquuntur, & vel  
in forma cataplasmati, vel lac decoctionis cum lincolis mul-  
tiplicatis tepidè hernioso loco imponendum:

R. Flor. chamom.

Meliss.

Sambuc.

Verbasc. an. M. ʒ.

Rad. angel. ʒʒ.

Sem. fenugrec. ʒvj.

f. l. a. Decoctum c. l. q. lactis:

D. S.

Epithema externè leniens.

Intestina si sint refrigerata, foveantur lincolis calidis. RIVE-  
RIUS applicatm spiritum vini instar fomenti calidè, & sic resti-  
tuit herniosos: vid. *Cent.* 3. *Observat.* 82. Aliàs imponuntur  
intestina & omenta calida animalium, v. g. canis, vervecis,  
vituli; in specie omentum agni castrati tepidè admotum com-  
mendatur:

Vel

R. Olei insol. chamom.

Sulphuris Ruland. an. a ʒʒ.

Deſtill. anethi,

Chamom. an. gutt. viij.

M. D. S.

Oleum externum leniens & dissolvens.

Item litus blandus cum oleo amygdalarum dulcium, hyper-  
ici, chamomillæ, lilliorum alborum tepido: interdum fo-  
tus ex laxivo acri, lemine cumini & pauco vino Malvatico,  
silo crudo exceptis, admoveatur. SOLENANDER S. 4. *Con-  
ſil.* 13. ceu expertissimum commendat contra intestina pro-  
lapsa stercus ovillum dulci lacti bubulo vel caprillo incoctum:  
Colatura in forma fotus; remanentia verò blandi cataplas-  
mati seroto calidè & crebrius post sufficientem fomentatio-  
nem, imponenda, donec intestina tractabilia fiant: hoc  
enim remedium SOLENANDER, uti loquitur, sæpius uti-  
le reperit, ubi non potuerunt reponi intestina propter fla-  
tuum copiam & fæcum duritiem, aliquoties se, ubi res viſa  
desperata, intestina laxata reposuisse, & ubi frustra alia adhi-  
bita fuerint: vid. citato loco, ubi fere omnia habet, quæ sunt  
necessaria ad Curam herniæ. Fidem facio, me aliquoties  
iſto fotu, cum res videretur in præcipiti esse, prolapsa inte-  
stina reposuisse, antea frustra tentatis aliis, addendo semper  
spiritus vini aliquam portionem; partim enim emollic, par-  
tim dolorem sedat, partim discutit: cōf. HILDANUS c. 6. *Obs.*  
2. & 70. Simulclysina emollientia & carminantia iniciantur,  
ut evacuatis intestinis crassis, recto & colo, facilius intestino-  
rum tenuium, quippe quæ in herniis prolabantur, contenta, vel  
flatulenta vel humorosa, eò pergere possint, insimulque inte-  
stina leviter irriterentur, & liberent se à fæcibus: deinceps  
exinanito recto & colo, paratur quoque spatium vacuum in-  
testinis reponendis.

Exemplum Clysteris emollientis esto hoc:

R. Herb.



*R. Herb. atriplex.*

*Malva,*

*Parietar.*

*Flor. samb. an. M. j.*

*Rad. alb.*

*Lil. alb. an. 3vj.*

*Sem. anisi,*

*Lini an. 3ss.*

*Coq. in f. q. lavis carnis vital.*

*Colatura 3x. adde*

*Terebinth. cum vinell. ovis solut.*

*Mell. mercurial 3ij.*

*M. f. Clyma: S.*

*Clyster emolliens.*

Si vero nimium diu prolapsa fuerint intestina, ita ut jamjam inflammationem susceperint, instituantur curatio modo prescripto in illo.

Præter dicta quæ applicantur intestinis prolapsis, siue in serotum, siue umbilicum, conveniens est, ut regioni lumbari, ubi nempe mediante mesenterio appenduntur intestina, quædam applicentur, quæ nervos ad mesenterium delatos firmant & restaurant, & sic mediantibus his intestina prolapsa quasi retrahantur; quæ Inter cæminet Emplastrum, cuiusdam Medici secretissimum, HOFFMANNI in M. M., cujus descriptionem vobis communicabo:

*R. Gum. ammoniaci,*

*Galban.*

*Sagapen. an. 3ij.*

*Terebinth.*

*Cera Virg. an. 3ij. seu 3vj.*

*Magnet. arsenical. 3ij. gr. xv.*

*Rad. ari 3j.*

Gummata solvantur in f. q. aceti stillati & coqu. in formam Emplastri, intermissis postea reliquis speciebus.

Extendatur emplastrum super alutam, quod dorso & lumbis applicatum, intestina valido tractu in locum naturalem redire facit: ejus effectum vidi mirabilem.

Alias etiam hujus loco pinguedo ursina, quæ quibusdam tamquam secretum, & lumbis illita ad retrahenda intestina, item, quæ adhuc mollior est, pinguedo erinacea commode applicari potest: loco hujus pinguedo leporis dorso vel lumbis illita, & hinc exuvie serpentum superimpositæ, admodum retrahunt, & intestina retenta firmant: Aut talia si non sufficiant, subinde ad Chirurgiam accedendum est, & apertione loci herniosi intestina reponenda, ipseque locus consolidandus, quæ facillime interdum sine remedio curari possunt herniæ.

Ut verò reposita intestina in loco firmentur, idque per peritonæi, vel laxari vel rupti, quantum possibile, consolidacionem, præter corporis quietem summè necessariam, internè conveniunt omnia remedia vulneraria, & ex his parati pulvres, potiones aut essentia traumaticæ seu vulnerariæ, eaque semper carminantibus temperata: sicuti senior quidam herniosus, qui etiâ pedis fractu passus, per aliquot septimanas quiete & vulnerariis usus, hernia curatus fuit: adeo ut continuus in dorso decubitus sit vera herniarum panacea, etiam in senibus: vid. etiam HILDANUS *Cent. 5. Obs. 54.*, ubi refert monachum senem herniosum, laborantem per longum tempus arthritide, hac remittente, liberatum esse ab hernia. Similiter vulneraria inter cæminet persoliata; refert enim SOLENDER loco supra citato de quodam, persoliatæ uti ab hernia curato. Deinde lymphitum majus & omnes reliquæ consolidarum species, herniarum, quæ est laudatissima HOLLERII planta, ab eo quocunque modo ad herniarum curam commendatur, si videri decoquatur, si videri pulveris affumatur, aut quocunque modo usurpetur. Hernia igitur & persoliata præ cæteris commendantur: sicuti herniæ quamplurimæ curatæ referuntur in VELSCHII *Miscom. Cent. 3. Obs. 76.* pulvere cochlearum, quarum loco cancerorum lapilli subitui possunt, & seminis persoliatæ 3j. rad. ireos 3ss., mistis cum trag. aromat. 3ij.; loco hernioso pinguedine anserina muncto, & linteis, matricæ & thure suffutis, suppositis. De utro quoque persoliatæ & consolidæ Saracenica cum azungia gallinæ, melle, & butyro Majali egregio, vid. in M. A. N. C. *Ann. 3. Obs. 306. 341.* ubi hic laudatur:

*R. Sem. persol.*

*Pol. consol. Sarac.*

*Persol. an. 3ij.*

*Pileosella,*

*Rad. consol. maj. an. 3ss.*

*Sacch. Penid. 3v.*

*Estmull. Oper. Tom. 11.*

*M. f. pulvis.*

Detur manè in jusculo. Vel

*R. Herb. berniar.*

*Persoliat.*

*Flor. hyperic. an. M. j.*

*Rad. symph. 3ij.*

*Coq. in l. q. aq. comm.*

*Colatura 3x. adde*

*Syrup. de symph. Fern. 3ij.*

*M. D. S.*

*Potio sanans. Vel*

*R. Herb. berniar.*

*Bistort.*

*Persoliat. an. M. ss.*

*Rad. figill. Salom.*

*Symph. maj. an. 3ss.*

*Sem. Nasturt.*

*Hyperic. an. 3ij.*

*Incisi & contuli affunde*

*Vini rubri Mentl. j.*

Stent per noctem in loco temperato, ne vinum acefeat.

*D. S.*

*Potio vulneraria.*

Mane & vespere deinceps hauriat æger ad 3ij. cum una vel

alt. era cusp. cultelli *lap. cancr. preparator.*

Vel coqu. spec. es prædictæ in f. q. *Cerousia secundaria.*

*R. Herb. alchimill.*

*Herniar. an. M. j.*

*Rad. consol. maj. 3j.*

*Sem. nasturt. 3ss.*

*Coqu. in f. q. vini.*

*Colatura 3vij. D. S.*

*Potio pro aliquot vicibus.*

Quæ hauriatur una cum *lap. cancr. preparatis.*

Si ex vulnerariis istis, quorum notitiam præsuppono ex materia Medica, sunt cataplasmata lesionis loco imponenda.

Vel

*R. Aqua cherosol.*

*Herniar. 3ss.*

*Aceti vini,*

*Lap. cancr. prepar. 3j.*

*Antimonii diaph. 3j.*

*Syr. de symph. Fern. 3vj.*

*M. D. S.*

*Potio sanans pro aliquot vicibus.*

Deinde hic imprimis etiam vulnerariæ plantæ sunt in usu, quæ inter præstantissima sunt millefolium, plantago & geranium Rupertianum, bistorta, &c. Sic semen nasturtii nulli eedit in hoc puncto, externè pariter & internè usui paratum: idque hoc ex fundamento, quod acrimonia sua caustica uberior rem alimentorum affluxum excutit, quo ipso Peritonæum eo facilius consolidatur. Est adhuc Medicus Polonus, qui pueros herniosos quamplurimos restituit propinando internè semen nasturtii, in vino, siue sub forma decocti vel potus, aut etiam cerevisiæ medicatæ; externè verò applicando siultum pelis vel cutis anguillæ, obitum cum albumine oui. Item semen nasturtii commendat etiam insigniter FORESTUS *lib. 23. Observ. 15.* ut etiam FONSECA *lib. 2. Conf. 36.* qui tanquam expertam hanc describit herniarum curam hoc modo:

*R. Pulv. sem. nasturtii:*

Subigit probè cum albumine oui, extendit super alutam, & apponit ad herniam, neque remover, donec ex se decidat. Felicem vidi successum. Vel

*R. Herb. berniar.*

*Sem. anisi an. 3ij.*

*Nasturt. 3ss.*

*M. f. pulvis grossus, perotandus cum balsamo sulphuris.*

Pertinet etiam huc *Ceratum Scirpi* ad hernias intestinales expertum, similiter ex semine nasturtii. Descriptio sequens est optima:

*R. Gum. carann. p. ij*

*Sem. nasturt. p. j*

Subigantur cum l. q. *terebinthina codæ*, & f. l. a. *Ceratum*, quod impostum, & diutius continuatum herniam intestinalem brevi terè sanat.

Sub utro tamen hujus Emplastri alvus semper sit fluida, ne sub nimio conatu egrediendi hernia aggravetur: maxime autè juvat, si sumatur singulis diebus manè, & vespere seminis nasturtii pulverisati cum vino rubio 3j. per aliquot septimanas, & hanc curam tanquam expertam commendat FONSECA.

L

Post



Post semen nasturtii est & radix sigilli Salomonis, cuius Decoctum in vino aliquandiu continuatum singulariter etiam à FORESTO l. 27. Obs. 15. ad herniarum curationem commendatur, ubi refert de quodam, huius Decocti potu, per tres septimanas continuato, à rupta curato. PARACELsus folia betonicæ & saniculæ albæ decoxit in vino, & propinavit pro hernia curanda. Aqua vulneraria dictæ, Vinum medicata vulneraria, item ex plantis dictis paratæ Conservæ & Essentiæ, imprimis essentia heroliarum, symphyti sive sanguis symphyti, flores hyperici, &c. crebrius usurpata conducunt. Item pulvis lumbricorum terrestrium, & ex his parata essentia, similiter convenit in hernia.

Quod attinet Externa, sunt eadem astringentia vulneraria, loco rupturæ aut lacerationis imponenda, eaque pro intentionis varietate multiplicia. v. g.

R. Poll. pugill. sulis. vel serpent. q. l.

Lixiv. f. r. t. f. q. l.

Cagu. ad consistentiam emplastricalem superinducendi.

D. S.

Emplastrum pro hernia.

Sic Decoctum pellis arcturæ ob viscositatem & lentorem cum aliis resinosis redactum in emplastrum, multa præstat: etiam succus herniarum cum farina fabarum rupturæ applicatur, & à FABRO ad hernias præ ceteris commendatur: item exuvie serpentum commixtæ, & ex his paratum Emplastrum prodest: quidam suadent rupturæ applicandum, nec aliud dicant, quod regioni dorsi admodum firmiter inest. Singulare quid obinet & omnibus præfertur oleum lacertorum ad curandas hernias suo usu, cuius insignis encomia & usus videbitis in FONSECA l. 2. Conf. 36., & hinc ZWELFFERO in Pharm. Reg. p. 266.

De cetero subtile in usu sunt Cera multiplicita, composita ex pice navali, cui tanquam corpori & basi additur massæ, resbus, balastrum, gummi ammoniacum, carumna, cerebinthina & linaria: quibus etiam addi solent sanguis Draconis, bolus Armenus, etocus Martis poltragens, hæmatites, viscum queruinum, terra sigillata, vitrioli dulcis, &c. Magna quidem promissione, sed sæpius expectatione fallaci, præstant. Magnetem etiam quidam addunt: nemo autem credat magnetem ob virtutem ita dictam attractivam ferri hic aliquid præstare; siquidem nulla sit attractio in tota natura, nec magnes vim suam exerit, nisi directus sit versus lumen polum: jam verò notum est, magnetem misceri emplastris non nisi pulverisatum. Itaque profectio non video, quomodo virtute sua possit aliquid præstare in repositione intestinorum & consolidatione rupturæ: Si ergo magnes in similibus aliquid præstaret, hoc ratione particularum martialium fieret. Emplastra talia videbis apud HOFFMANNUM in Thef. Pharm. pag. 69. & apud ZWELFFERUM.

Mulier quædam in mediacra plures herniosas egregie curavit emplastro facto ex resina, pice, & lateribus coctis pulverisatis. Hæc diu probè permixta ac subacta crasse inducuntur super alutam, & ita applicantur. Illinatur quoque locus crebro balsamo sulphuris Rulandi, aut bals. sulph. hyperici, cuius præparatio talis est:

R. Olei commun. p. liij. vel jv.

destillat. cerebinth. p. j.

Infund. flores hyperici, & exprimantur, novis infundendo, donec oleum rubicundissimum fiat: Hinc infund. flores sulphuris, ebulliat blando igne: quo illinatur locus herniosus; aut misceratur cum emplastro ad rupturam.

Pertinet hæc & Emplastrum disulphuris Rulandi: vel

R. Emplastr. contra ruptur. usit.

Disulphuris Rul.

Picis navalis. liquef. an. q. l.

Malax. c. f. q. olei ovor. aut hyperici, aut bals. sulphuris: inducatur super alutam, hernia applicanda.

Emplastrum pro hernia.

Applicetur quam calidissime æger perferre potest, nec removeatur prius quam spontè decidat: ubi deciderit, balsamo sulphuris, eodemque calido, pars probè inungatur, & iterum Empl. recens imponatur, quamdiu necessarium fuerit. Vel

R. Emplastr. contra rupt.

de tocamach. an. q. l.

Malax. c. oleo destill. succini, vel hyperici, inducatur super alutam.

Non inconvenientens videtur mucilago radices symphyti majoris, quæ instar Cataplasmati imposita merito à ZWELFFERO extollitur: uti & ejus Decoctum impositum herniis multum in recessu habet: quod etiam facit Cataplasma mucilaginosum in Pharm. Reg. pag. 312.

Præterea oleum mastichinum, myrtinum, hyperici, cerebinthina & spica conveniunt; imprimis oleum vitellorum ovorum à quibusdam singulariter commendatur. Sunt quibus suspecta sunt huiusmodi externa pingua, & oleosa, quia nimis laxent & ad majorem peritonæi dilationem occasionem suggerant: hinc non adeo incepto consilio jubent recipere acetum destillatum acerrimum, in quo lithæ gyrium solutum, cui ipsa linrea intincta repositis intestinis superimponantur, ac probè firmetur usque ad consolidationem: vel etiam quidam insigniter commendant Emplastrum, quod fit ex Gummi Ceraforum nigrorum in oleo hyperici dissoluto, adjecto pulvere thuris & Mastichis, hocque diu, donec fiat emplastrum seu Ceratum loco affecto calidè applicandum pro consolidatione. Balsamus commendatus est insigniter ab HARTMANNO in Praxi Chymicæ c. de Hern. p. 210. Ejus descriptio est manca; primaria & genuina est hæc: Dum tal gemmæ ita præparatum, & ad fluorem redactum est, prout vult HARTMANNVS, affundatur ipsi spiritus aut oleum cerebinth. ad emumentiam usque digitorum: digerantur aliquandiu, hinc abstrahantur, cohobentur postmodum aliquoties, donec oleum cerebinthina evadat rubicundissimum, quod oleum rubrum abstrahatur ad consistentiam aliqualem, donec scil. Balsamus elegans in fundo remaneat, qui est verus Balsamus salis gemmæ ad hernias decantatus.

Cæterum cum his ipsis externis, necesse est, ut simul uspentur, debita subligacula, quibus subiaci possunt Emplastra.

Observeetur hic sedulo: ut quotiescunque emplastra firmiter adhærere desinunt, novo opus sit, subligaculum non removeatur, nisi prius corpore posito ad lūm superius laudatum. Nam ubi per hinc streptum emplastro usus sit pariens, tamen de novo instituenda erit curatio, si semel probabatur iterum stanti ægro intestina. Subligaculorum taxillum Ideam & descriptionem apud PARÆVM in Script. Chirurgicis, in HILDANI Observ. & IOB VAN MEECKEN videbitis.

Curam hernia magnetis videbitis in M. A. N. C. Ann. 4. & 5. Observ. 102.

Locutus sum de situ intestinorum mutato, eoque imprimis, quando omentum vel intestina tenuta decidunt in scrotum vel umbilicum, & dant hernias: Dictum etiam fuit, quod crassa non possint prolabi, ut dent hernias. Nihilominus singularis & molesta mutatio est, quando intestinum, rectum eminet per anum, & vocatur Ani Procidentia.

## CAPUT II

### DE

#### ANI PROCIDENTIA.

**A**ni Procidentia fit, quando sub sæcum excretionem Intestinum rectum ita prominet & protrudatur, ut non possit rursum spontè retrahi intra corpus, aut licet retrahatur, mox incipiat denuò prolabi. Fit autem hoc nunc cum, nunc sine dolore, vel cum vel sine inflammatione, nunc cum vel sine humore, nunc cum hæmorrhoidibus affectis vel non.

#### PARS AFFECTA.

Iam autem naturale est, quod in omni alij excretionem intestinum rectum aliquantisper protrudatur, sed facta excretionem idem intestinum à muculis levatoribus denuò sursum retrahatur, ita, ut excretionis actus sit compositus, & ex podicis extrusione & podicis retractione constet. Quando itaque ista protrusio naturalis excedit, retractio verò naturalis deficit, tunc contingit necessario affectus, quem vocant Ani Procidentiam.

#### CAUSÆ.

Duplex ergo hujus Ani procidentia est Causa.

1. Est quidem nimia aut frequentissima aut violenta ani extrusio, & ita fibrarum musculorum levatorum aliqualis læsio & laceratio.
2. Est musculorum levatorum plus minus resolutorum deficiens retractio. Quæ nunc seorsim, nunc junctim accidunt: v. g. à calculo vena, & irritati continuo per consensum intestinum rectum, ac ad continuam protrusionem stimulari potest. Quam etiam tali occasione à crebriori excre-



excretionis conatu in tantum extendi ac relaxari possunt musculorum levatoriorum fibræ, ut pertinax alvi hinc sequatur protrusio, qualis procidentia in calculo vesicæ diutius affligente ordinaria esse solet.

Nimium & frequentius aut violentius extruditur anus propter quæcunque acris & morficantia in intestino recto hærentia, quæ omnia istud intestinum continuè vellicant & stimulant, à quo stimulo continuè irritatum intestinum se contrahit indefinenter, & foras protruditur; unde hoc ipsum sæpius protrusum in tantum tandem elabitur, ut retrahi deinde nequeat: hinc imprimis tenesmus & dysenteria interdum ani procidentia inferunt, ut in diarrhœis supervenit ani procidentia; item clysteres aciores, aut etiam suppositoria nimis stimulantia, inducunt non rarè hunc affectum, uti hæc refert PANAROLLUS *Pent. 1. Obseru. 23.* Stercora dura aut excrementa viscida in intestino recto hærentia, ac difficulter excernibilia, ut sic dicam, continuo stimulo & continuè protrusione etiam procidere faciunt anum; conatus enim ille expellendi est tantus, ut per hunc protrudatur intestinum rectum, quod etiam facit subinde difficilis partus, dum parturientes omni conatu & retenti respiratione motum excretorium inferiora versus: molliuntur, qua occasione cum fetu per anteriora, simul anus per posteriora, non rarè egreditur: quale exemplum habet AMATUS LUSITANUS *C. 1. Curat. 93.* & GABELGHOVERUS *Cent. 1. Curat. 71.* Hæmorrhoides dolentes anum continuè stimulant, item nimium fluentes, pariter ad hoc malum disponunt: Item calculus vesicæ vicium, per consensum continuè irritans podicem, ita ut crebriori egerendi conatu anus subinde graviter procidat, de quo jam dixi.

Quando ita protrusus est anus, secunda causa, nempe musculorum levatoriorum impedita retractio, accedit propter constitutionem eorum paralyticam; siue hoc fiat vitio ipsarum fibrarum & musculis inotricium; siue fiat vitio nervorum ad musculos dictos derivatorum, de quo *supra loco, ubi de paralyti.* Facit huc suo modo percussio fortior seu casus ab alto super os sacrum aut vertebrae lumborum, ubi nervuli derivantur, quæ paralyti horum musculorum, nervorum ratione, inducit: item si nimio conatu anus semel protrusus diutius extra hæreat, ita ut fibræ musculorum levatoriorum retrahentes nimis laxentur aut flaccidæ fiant, similiter procidentiam ani subinde Chronicam inferunt; fibræ enim in toto solutæ & quasi paralyticæ impediunt retractionem ani: sicuti intestina prolapsa, dum nimium refrigerantur ab ambiente aëre, musculi fibrarum resolvuntur; quin etiam excrementa serosiora aut aquosiora copiosius vel crebrius per anum excreta, intestinum rectum & musculorum fibras laxantia, ut nequeant intra corpus retrahere anum, etiam subinde hoc malum inferunt.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet *signa diagnostica*: sunt facilia, & per se sensum patent: Causas ex antecedentibus faciliè possumus haberioliari.

### PROGNOSIS.

Quoad *Prognosis*: Ani procidentia per se ordinariè non multum habet in recessu, & pro causarum varietate vel facilius vel difficilius Curam admittit: nunc etiam periculosior, nunc minus periculosa esse solet; nisi enim subito aut repente curretur, interdum in periculosum ani tumorem terminatur.

In specie duplici in statu periculosa sit, vel cum inflammatione, vel paralyti musculorum. Si Ani procidentiam cum inflammatione non rarè tandem gangræna subsequitur: si conjuncta cum hæmorrhagia vel tenesmo, sic difficulter curatur; chronica enim sit interdum: Ani procidentia, quæ orta est à paralyti vel nimia resolutione musculorum levatoriorum, difficulter curatur, quia repositio licet semel ano, tamen quando denud excreta cum excrementis, malum faciliè recidivat.

### CURA.

Quoad *Curam*: duo sunt notanda:

1. Anus prolapsus est reponendus; &
2. Repositus probe firmandus, ne tam faciliè prolabatur.

Repositio est facilis sique imprimis manuum ope, quando indicæ digito blandè intruditur anus, vel quando lintheum cum Decocto adstringente vel vino calido, prout necessitas postulat, ebrium circumvolvitur indicæ digito, & hujus medio anus intruditur. Quando ita repositum est intestinum,

*Etzmull. Oper. Tom. 1.*

patiens extendere debet coxas & crura, & ita extensio, quoniam potest, corpore, vel supra ventrem, vel etiam supra alterum latus, quamdiu potest, quietus jacere debet, ut ita repositus melius firmetur anus.

Ut vero repositio melius faciliteretur, considerandum prius: an quædam adsint impedimenta, repositionem vel impediencia, uti sunt stercora dura, aut sordes in ano, aut tant prolapso inflammatio; vel recidivam minitancia, uti sunt ani nimis diuturna refrigeratio, vel musculorum levatoriorum paralytica constitutio: quæ ipsa prius ante repositionem remouenda sunt, adeoque *Lac decoctionis herbe meliloti vel florum verbasci, vel florum sambuci*, in formâ clysternis applicetur & foveatur anus, ut emollantur stercora indurata, & removeantur, aliàs recidivat malum. Si verò causæ sint sordes aut mucus acrior intestinum stimulans, hoc prius abluendum & eluendum est fomento abstergente & blandè adstringente: pro quo, sedpo conveniunt, quæ modò insinuatæ fuerunt; vel horum decoctum foliorum quæretis, florum verbasci, cicerum rubrorum, parietariæ, &c. cum aqua ferrariorum paratum usurpetur, quo abstergantur blandè sordes adherentes. Si verò adsit inflammatio vel etiam tumor intestini prolapsi aut similibus, quibus præsentibus impossibile est, intestina debite reponere; inflammatio prius arcenda applicatione foris emollientis & discutientis: ad quod foris usurpantur imprimis folia & flores verbasci, meliloti, chamomillæ, sambuci, malvæ, violariæ, &c. quæ coquantur nunc in lacte, nunc in aqua ferrariorum, nunc in vino rubro adstringente; v. g.

*R. Flor. sambuci.*

*chamomill.*

*Hyperic. an. M. ʒ.*

*Rosar. rubr. D. ʒ. ʒ. vel ʒj.*

*Summit. absinth.*

*Melilot. an. M. ʒ.*

Coquantur in lacte vel vino rubro:

In lacte, ubi dolor; in vino, ubi tumor durus & renitens; ubi verò tumor inflammatorius, in sero lactis: & hoc Decocto anus tumefactus & inflammatus subinde fomentetur ac foveatur, donec omnia ista phætëmata cessaverint.

His omnibus remotis impedimentis, reponendus est anus, illinendo prius cum oleo rosarum vel myrrillorum superaffuso pulvere gallarum contusarum, C. C. usto & mastice pulvere ana; sic enim adstringitur anus, meliusque si maturus, quod minus recedere & excidere possit. Præterea ad firmandum anum prolapsum in suo loco, conveniunt etiam remotis impedimentis suffitus ex seminibus & floribus verbasci, floribus chamomillæ & resina abietis: vel quod adhuc melius est, instituantur suffitus KESLERI, quem describit in suis *Centuriis Processuum C. 4. num. 15.*

*R. Asphalti,*

*Succini,*

*Masticæ,*

*Tburis,*

*Myrrhe an. ʒj.*

*M. pro suffitu: S.*

*Pulvis singularis ad suffitum.*

Excipiatur ano in tella perforata:

Hoc factò foveatur aut illinatur vel cum pinguedine cervinæ liquefacta, vel cum oleo ovorum, & ita intrulo ano æget probe extensis pedibus lateri incumbat.

Ut verò firmetur anus plus minus repositus, faciliusque etiam reponatur, multum confet tale emplastrum calidissimè regioni ossis sacri superiori aut etiam lumbis applicatum, quod ita paratur:

*R. Gum. opoponac.*

*Sagapen. an. q. ʒ.*

Liquefacta calidè inducantur super alutam, f. *Emplastrum*, & applicetur, quantum fieri potest, calidè.

Aliàs contra ani procidentiam & firmandum intestinum rectum HARTMANNI experimentum in *Prax. Chymicar.* est asser querinus bene calefactus & mistiche illitus; cui, quam calidè ferre possit æget, per horæ quadrantem insideat; quin etià loco masticis sola medulla cervinæ aut hircinæ liquefacta, & ita intestino prolapsò, unà hoc blandè reponèdo, & hinc illita, simili ratione applicata confert: siquidem solum sebum cervinum, aut etiam hircinum, liquefactum & ita intestino recto prolapsò illitum, unà hoc blandè reponèdo, & hinc simili modo insidendo, procidentiam ani recentem curare solet.

Loco pinguedinum hircinæ etiam frizentur flores verbasci in butyro non salito, strixa benè transcolantur, quo ipso simili modo anus intingatur. Cui aliis præferendū



dum remedium habetur cinis scarabaeorum pulularum, qui intestino subinde prolapsi inspersus, & hinc istud intestinum denuo repositum mirè firmare dicitur.

Quod si fiat, ut haemorrhoidibus juncta sit veletia sequatur eas proidentia ani, optimum est oleum mastichis, in quo bullierint scarabaei: quod oleum illud intestino prolapsio est convenientissimum & specificum: Sicuti, si in eodem oleo mastichis bulliant flores verbasci, egregium est specificum ad proidentiam ani ex teneismo, Iritus aliis, insigniter conveniunt sacculi sequentes:

*R. Furfur. M. ij.*

*Fol. mil. esol.*

*Flos. verbasc. an. M. j.*

Insinuantur sacculo interpassato, coqu. in an. vini & aceti, & applicentur sepe pedibus, ut perfecte anus stringatur.

Convenient imprimis, si post partum difficile in malum natum fuerit: Vid. GABELCHOVERUS *Centur. 1. Obs. 71.* Loco aceti vel vini, aut similis liquoris convenientis, etiam decoquantur in aqua ferratorum, quae potenter adstringit & anum firmat.

Repositus ita anus si non remaneat, ut firmiter loco suo retineatur, praeter convenientem corporis situm, ad corrigendam musculi levatoris resolutionem simul appropriata nonnulla aromata convenient: v. g.

*R. Flos. chamom.*

*Balaustior.*

*Antibos.*

*Fol. Salvia,*

*Lauri an. p. ij.*

*Nuc. cupress.*

*Galliar. contus. an. par. jv. vel vj.*

*Cors. granator. 3 l.*

Coquantur in aqua vel vino chalybeato; applicentur & usurpentur pro fotu.

Quod si post repositionem firmato etiam ano remaneat calor aut etiam rubedo in ano, ne ulterius superveniat inflammatio aut etiam aliud, gravius symptomata, recipiatur aqua plantaginis, in qua solutum est saccharum Saturni, & ita anus hoc ipso blande fovendus est: aut loco hujus supradicti fontis astringentibus utendum.

Hic de sim. intestinorum prius: Pergo ulterius secundum ordinem naturae ad

## CAPUT XIII.

### DE

## CHYLI AD RELIQUAS PARTES MOTU ET DISTRIBUTIONE L. E. S. A.

**S**eparatus ita in duas partes chylus, beneficio bilis & succi pancreatici, i. ejus subtilior & tenuior ac fluidior pars ulterius per crustam intestinorum horum byemam, & porulos intestinorum ita configuratos, ut cremor hunc lacteum saltem admittant, crassiores vero partes huius potius non proportionatas, imò etiam flatus & aequi excludant (de quo videatur LOWERUS *Tract. de Cordis pag. 212.*) in vasa lactea transiunt, & tenuiter ab aliis in abluuntur, restitante ejus parte viscida sub specie muci; pars vero crassa excrementa sensim sensimque ad intestina crassa moruorum peristaltico ablegatur, ubi sub forma stercorum excluduntur, dum in recto intestino constituta molesta & pondere idem ad sui excretionem stimulant; quae tantò est major, quòd feces sunt fluidiores; tantò minor, quòd excrementa crassiores.

Motus autem chyli ex intestinis ad reliquas partes quomodo & per quae hae vasa? semper admodum controversum fuit, unde etiam tanta dubia de organo sanguificationis & nutrimento partium oborta fuerint. Veteres Galeni sectatores ex intestinis attrahi a venis mesaraicis chylum statuerunt, & ad hepar transvehiri in cœvrem & spiritum naturale elaborandum; inde & facultatem naturalem in hepate collocant, & simul contrarium chyli & sanguinis motum in mesaraicis fecerunt. Inventis vero postea anno 1626. d. 23. Julii à GASPARO ASELLIO *Ticinesi* xenis lacteis, a colore & proprietate contenti liquoris sic dictis, per has ad hepar morum chyli promoveri creditum fuit, de quo ASELLIUS *Tract. de venis lacteis*, item WALLÆUS in *Epist. de Chyli & Sanguinis Motu*.

Cum autem JOANNES PECQUETUS *Diepensis* Anno 1651. tritum annorum observatione confirmatum suum novit, licet casu, inventum receptaculum commune in

brutis una cum ductu thoracico, ex eo usque ad venas axillares protenso, divulgasset, & BARTHOLINUS loco illius receptaculi lumborum glandulas suas lombares in homine demonstrasset, creditum omnino fuit; partem chyli crassioris ad hepar per lacteas circa venam portæ sursum tendere, partem vero tenuiorem ad chyli receptaculum per reliquas lacteas deferri, ex quo per ductum thoracicum in ramum venosum axillarem sinistram infundatur, ut cum sanguine redeunte per venas ad Cor mixtatur, imò in mulieribus lacteas quasdam mesenterii ad uterum deferre chyli partem pro nutrimento foetus, & ramulos quosdam, licet nondum viros, à lacteo thoracico ad mammam lactis materiam chylosam deferre probabiliter statutum fuit, ut & serosam materiam ad renes deferri, ex his sub vrinae forma post partum excernendam: videatur PECHLINUS *Tract. de Receptac. lumb.* item BARTHOLINUS *Tract. de lacteis thoracis*.

Sedulitas Anatomicorum tandem usque eò processit, ut à BARTHOLINO *Dano*, RUDBECKIO *Sveco*, & OLIVIO *Anglo*, ferè eodem tempore, licet diversis in locis, circa annos 1651. & 1652. vasa lymphatica inventa fuerint, quae occasione simul observatum fuit, vasa ex mesenterio ad hepar protensa non esse lactea, sed esse lymphatica, serosam materiam ex hepate educunt (sicut omnia reliqua lymphatica per viscera & artus dispersa ex circumferentia corporis ad truncum thoracicum, & tandem ad cor, seu commune centrum, liquorem contentum revolvunt) unde nihil chyli ad hepar convelli, & omne receptaculo communi & tandem cordis infundi, indeque cor sanguificationis organum vnicè proclamatum fuit, hepatis exequis in sanguificationis negotio à BARTHOLINO celebratis: quae opinio communi Medicorum applausu, paucissimis, imò ferè nullis, aperiè reventibus fuit recepta: vid. BARTHOLINUS *de vasis lymphaticis*, item RUDBECKIUS *de vasis glandulosis & serosis*.

Lugebat hepar suam cladem, dum nox ex imperato ipsi feruntur supplicia à LUDOVICO BILSIO, *Nobili Flandro*, qui à tenera adolescentia 10. annorum etate, usque ad senectutem ingruentem Anatomiae operam dando, praeter artificiosam cadaverum condituram, & incrementum eorum sectionem, anno 1660. se invenisse divulgat, alimenta in chylo transmutata praeter separationem inutili ab utili in institutis, ratione vasorum lacteorum & mesaraicorum dividi, ita, ut in communiter sic dicta lactea pars subtilis tenuiorque in has roris per angustos, meatus transluet, & ad receptaculum commune transferatur, unde per vasa (communiter sic dicta lymphatica, ab ipso vero, ob rorem contentum, vasa rorisera appellantur) sursum partim in cor & reliquas partes, partim vero deorsum, uno verbo, in omnia membra, deferatur; crassior vero ejus succi ex intestinis pars propriè Chylus dicta, in vasa mesaraica sanguifera ingreditur, ad hepar amandanda pro suscipiendo ibidem sanguinis rudimento, quod absolvatur tandem in corde: ita ut BILSIUS non tantummodò hepar a reà seipsum denovo resuscitavit, sed & venarum mesaraicarum munus devehendo chylo dicatur denuò renover, sed etiam rorem suum, ab aliis lympham appellatum, in vasis thoracis ex centro, hae. receptaculo ad circumferentiam corporis quaquaversus moveri asserat, quod omnibus, qui vasorum lymphaticorum mentionem fecerant, omnino contrariatur. Ejus Commentatores pro materia saliva, urinae, sinoviae, lactis, pro nutrimento foetus, & alibi etiam pro nutrimento partium spermaticarum rorem hunc assumunt, ut videri potest apud DEVISINGIUM *Epistol. ad Bartholinum de Hepatis Resurrectione*, item in *Appendice Excerpt. de Nutrimenti Corporis Elaboratione*: CASSIVS item videatur, qui hae BILSII *Afferia sententia Helmontii Digestioni* accommodat. Sed hanc BILSII opinionem refutatam videri praeter omnes, alios Anatomicos: apud IACOBUM HENRICUM PAVLI in *Anatome Anatomia Bilsiana*, item à RVSCH in *Tr. de Valvulis Vasorum lymphaticorum*.

Ex his quid verum sit? huiusmodi potius, quam statuere concessum est; probabilius interim videtur, chylum ex intestinis in vasa lactea exprimi, à lacteis per mesenterii glandulas successivè ad receptaculum commune (quod in homine non constituit glandulae lombares Bartholinianae; hae enim saltem sunt vicariae glandulae magnae mesenterii brutorum: sed in homine itidem membranosum, sicut in brutis, repetitur: vid. WARTHONUS in *Adenographia*, item RUDBECK in *Tabulis Anatomicis*, quae in *Hemphesbuffi Mel. de Antea Anatom.* reperiuntur; item DIEMERBROCK *Anatom. pag. 87.*) deuchi, ibique cum lymphae ex infe-



floribus ramis ascendente permisceri, dilui, & sic ulterius continuato pulsionis motu per ductum thoracicum in venam axillarem sinistram infundit, ibique cum lymphâ ex superioribus ramis descendente demum permisceri, tandemque in cordis dextro ventriculo influere.

Cæterum aquosiores assumtorum partes in primis quoque viis ex Chylo secerant, & antequam cum sanguine permiscantur, separari, cita potulentorum in bibonibus, ferè ut assumpta sunt, sub urinæ specie excretio persuadet; Uti & Diabetes, acidularum potatio, assumtorum cum urinis cuncta excretio, odor urinæ violaceus ex terebinthina, odor croceus ex comestito croco, color sanguineus ex succo Opuntio, sicut Indica nempe: sed per quas vias cita hæc derivatio ad vias urinarias pertingat? obicorum est. Probabile videtur, chylum copiosum per vasa lactea in mesenterio ad glandulas delatum, ibi pauca quondam secretionem utilis ab inutili aquosa materia, & quod hæc postea, cæterum chyli, per vasa sui generis ad partes urinarias amandetur. Hinc rectè clamare videtur Helmontius: Diserte urinam potus ab urinæ croris secerneat, quasi nempe illa in mesenterio a chylo, hæc in renibus à sanguine seceratur: de qua urina prius vid. etiam DEUSINGIUS in *Dissert. de Depuratione Alimentorum* pag. 146. & in *Appendice* p. 331; & 334. item *Miscell. A. N. C.* Ann. 2. *Obs. 2. p. 4. & Annotat. ad hanc Obs. v. p. 92. Obs. 74. in schol. p. 234. Obs. 157. pag. 248. de nova via feri ad renes; & Obs. 168 p. 266. item BAR THOLINUS Cent. 1. *Hist. Anat.* 68.*

Hæc non generari ex sanguine, sed ex chylo vel materia chylota, probatum videb. in DEUSINGIO *Diff. de Lacte*, item in CHARLETONI in *Oeconom. Exercit. 3. item in CORNELIO CONSENTINO *Progr. 6. de SCHNEIDERO 1. 3. de Catarrh. 3. Fœtum quoque per os & per placenta materiam nutriti succo hujusmodi chyloto, ex quo primitus similiter ovum uterinum concrevit, videb. in Exercit. Harveyi de Generat. Animalium, item in DEUSINGIO de Genesi Microscopi, item in CLAUDIO de la Courve Tr. de Nutritione factus in utero, in hæc portiones chyli pro hujusmodi liquoribus per vasa lactea, vel his vel alia his similia, nondum tamen cognita, ad has partes deferantur? an verò ex chylo cum sanguine permixto nondum subactio, sed adhuc crudo, & copioso sive diluto, ad has partes delato, in eis separatur à reliqua massa? dubium est. Posterius tamen verius videtur: id quod similiter de materia seminis proxima intelligendum venit. Quæ ratione lædatur subinde Chyli in intestinis separari ulterius per vasa lactea in corpus distributio? & qui inde sequuntur affectus? videb. in SYLVII *Praxi 1. cap. 16. pag. 192. & c. 17. pag. 200.* Nempe impeditur hæc chyli distributio**

I. Quando nulla fit in intestinis transcolatio: idque duplici ex causa.

1. Quando obducta & oblinita sunt intestina à copioso mucosæ crasso & viscido, simulque obducta orificia vasorum lacteorum: quam obstructionem sequitur

a. Fluxus cæliaci Species; sic enim excrementa chylota excernuntur: de quo superius, ubi de Cæliaci Affectione.

II. Fit læsa aut omnino abolita transcolatio, quando per diarrhæam aut dysenteriam abrasa intestinorum interna tunica, sequuntur hincinde cicatriculæ, quibus simul occluduntur pori seu orificia vasorum lacteorum in intestina hiantia: idque fit imprimis, uti dixi, in dysenteria, quæ tenuia affligit intestina; tunc pariter fluxus illius cæliaci species est, quod à SYLVIO aliquoties in sectionibus cadaverum fuit observatum.

Dengarari hanc chyli transcolationem necessum est ut sequatur corporis Atrophia ac Tabes; quæ tamen minoris est momenti, quando ex prima causa oritur, uti infra patebit ex methodo medendi: sed posterior ex occlusionis pororum seu orificiorum vasorum lacteorum, ac cicatricibus post dysenteriam vel diarrhæam è crassa tunica intestinorum, imprimis tenuium, relictis, nullo modo est curabilis, sed tabidum ægrum interimit.

Quod si fiat, ut jam transcoleatur chylus, & deriverit in vasa lactea, tamen si in ipsis vasis lacteis, circa glandulas mesenterij in specie, obiciatur impedimentum, ulteriorem chyli progressum impediens, etiam lædatur & impeditur debita distributio.

Hæc obstructio fit imprimis à chylo ipso nonnihil viscido, aut, quod frequenter est, à pituita seu mucosæ intestinali resoluta, in vasa lactea pulso, ac ibidem demum coagulato: id quod fit v.g. post exercitium nimium, dum corpore bene calefacto subito ingurgitur potus frigidus; à calore enim exercitii & motu primo liquefactus mucus ac attenuatus in vasa lactea

Etymull. Oper. Tom. II.

propulsus, superventu haustus frigidi demum congelasce & spissescit, & ita vasa lactea ac glandulas mesenterij infarciit.

Quando ergo chylus in venis lacteis tale invenit impedimentum, & nihilominus tamen novus continuè succedit, vasa lactea insigniter distenduntur, & cum instructa sint suis valvulis, fit, ut tunc in mesenterio copiosè ubique appareant vesiculæ: qualia exempla non pauca observata sunt. Quod si verò venæ lacteæ rumpantur, quod facile fieri potest, tenuissima enim est illarum tunica; tunc chylus effunditur in cavum abdominis, unde oritur certa quædam Ascitis particularis species, vid. SYLVIIUS *l. c.* ubi notabilia imprimis sunt ea, quæ de Ascite scribit; ita, ut Ascitis propriè dicta, seu particularis abdominis hydropis, & in quo pedes non simul intumescunt, adeoque confirmatæ universalis cachexiæ proles non est, speciatim quod subito interdum generatur ex causis occasionalibus, us prædictum, quæ à SYLVIO memorantur, frequentissimam occasionem exultimam talem chyli per lacteas effusi stagnationem; sicut non negarim, & alia ex causis in aliis abdominis visceribus vel locis, lymphaticis ruptis, & lymphæ extravasationem, & hinc Asciticam intumescitiam supervenire posse, simili ferè ratione curandam, atque de illa ex chylo effuso differit SYLVIIUS, de quo suo loco plura, ubi de lymphæ Motu impedito.

Tandem tertio, si malum in ductu thoracico, vel ab obstructione vel laceratione, hæreat, fit cum morte animalis, licet lenta, & est ferè maium incurabile. Hoc saltem in loco occasione obstructionis vasorum lacteorum considerandæ sunt obstructiones viscerum abdominis, & in specie mesenterij, item hepatis, lienis, pancreatis &c: nempe apud Veteres Practicos duo ferè sunt fontes morborum chronicorum, nempe Anispraxia viscerum, & eorundem Obstructiones.

Quod attinet anispraxiam viscerum: de hac superius dixi sub chylicatione læsa, eamque rejeci in Institutionibus. Dicunt: somitem morborum esse inæqualem temperiem, stomachi nempe frigidam, & hepatis calidam. Rationem sumunt ex eo, quod observant in Praxi deficientem chylolam; unde argumentantur ad intemperiem stomachi: item quod patientes conquerantur de phlogosi sive rubore faciei; ergo derivant, ex æstuatione hepatis. Hæc anispraxia viscerum, stomachi & hepatis, statuitur primarius fons morborum chronicorum. Porro dicunt: patere, quod ex in fine difficultis curationis, si scilicet volumus prospicere stomacho calidius, nocemus hepati, & si volumus hepati prospicere frigidius, nocemus stomacho: idè in specie eos ad incurabili catalogum referunt. Sed hoc effatum aperte falsum est; stante enim sanguinis circulo, impossibilis est talis viscerum contrarietas; nempe omnis incalescentia partium dependet à sanguinis & spirituum calore, ita ut etiam cor ipsum per se frigear, nisi à spiritibus & sanguine calido citò incalescat. Si ergo spiritus & sanguis proportionabiliter distribuuntur ad viscera, proportionali calore etiam viscera fomentantur. Interim hæc Anispraxia non confundenda cum robore inæquali partium, & deinde cum accidentario quodam visceris cuiusdam fervore. Scilicet debilitas subinde ratione balsami sui seu spiritus insiti observatur viscus præ altero; id quod & in partibus externis non rarum est, à quacumque occasione læsum & hunc debilitatum fuerit viscus aut pars: v.g. brachium, in quo diu gestatus fuit fonticulus, aut quod aliquando gravius lauciatum fuit, restitutum demum, debilius ac minus robustum, flaccidius, frigidius, sub tempestatum mutationibus irritabilius, præ altero observatur; hoc verò robur inæquale nulla partis anispraxia est: Sic ubi adest Rosa, in parte affecta robur partis ita debilitatur, ut facile ob debilitatem partis rosa recurrat in eodem loco. Robur hoc partis læsæ inæquale oritur ex vitio fibrarum, quæ tonum partis naturalem ejusque robur constituunt; His enim labetactis, pars ob earum laxitatem & toni resolutionem, flaccida, mollior & debilior fit. Quoad accidentariam visceris incalescentiam; accidit interdum, ut viscus quoddam fervidius reddatur, quam naturaliter esse debet: sic v.g. renes interdum æstuant, aut hepar intensius fervere observatur; id quod fit propter præternaturalem quasi spinam acidam infixam, cujus hostili præsentia visceris incalescentia supervenit: hinc impedimentum actionis propriæ, non autem cum alia visceris anispraxia aut contrarietate, unde & non refrigerantibus, sed spinam infixam evellentibus, hoc est, acidum corrigentibus, curandum: de quo vid. HELMONTIUS *Tract. Reienta*.

Quoad alteram originem morborum chronicorum, obstructiones nempe vasorum melaracorum & viscerum in hypochondriis: aut nihil vitiatius in morbis chronicis quibuscunque, quam anispraxia viscerum, & dein ob-



struções & infarctus vasorum melaenicorum, hepatis, & lienis &c. Hinc nullus est rusticus, nec vetula qui non sciant loqui de oppilatione venarum melaenicarum. Unde ordinario origo febrium intermittentium, continuarum, cachexiarum, mali hypochondriaci, scorbuti, icteri, pathematum abdominis, & similitum affectuum chronicorum, qui sunt ægrorum torturæ & Medicorum scandala, aut à pituita viscida, aut à succo terreftri melancholico, derivantur; idque tam in schola Galenicorum, quam Paracelsitarum, & aliquorum modernorum, in specie eorum Consultationibus, à quibus passim etiam oppilationes & infarctus, à tartaro hinc inde coagulato siccæ, inculantur.

Cæterum sicuti qualitates occultæ Physicorum sunt asyla ignorantia eorum; ita simili ratione dicere audeo, quod etiam tales in abdomine viscerum obstructions & antipraxia viscerum sæpius sunt velamen, quo ignorantiam suam palliant Medici. Ob id nonnulli Præctici, adhuc insistentes Veterum vestigiis, dubitare incipiunt, an dentur revera tales viscerum obstructions, quales accusantur: vid. HOEFERUS in *Here. Medic. pag. 139.* item HORSTIUS l. 4. *Observ. 44. pag. 239. & 240.*, ubi rectè dicit HORSTIUS, postquam dubitaret de obstructionibus, quod plurima symptomata vulgariter adscribantur mesenterii obstructionibus, quæ tamen sæpius habeant aliam originem. Equidem duo imprimis sunt, quæ fulcire videntur hanc hypothesin: quorum alterum hanc opinionem reddit probabilem; alterum eandem reddit inculpabilem. Probabilem hanc de obstructionibus vasorum melaenicorum hypothesin reddit, quod in dictis morbis chronicis quàm plurima abdominis symptomata, tormina ventris, phlogoses, alvi fluxus, &c. in quibus videtur esse impeditus humorum motus, ægris molesta sint, præsertim cum circa hypochondria affligant: etsi alia quædam pars sit affecta, semper tamen præcedant, conjungantur aut subsequantur abdominis passiones: quin etiam, quod subindè in morbis chronicis confirmatis scirrhi & steatomata in mesenterii glandulis, item in alius abdominis visceribus sint inventa: Unde facile possunt persuaderi, simpliciter esse in mesenterio talem obstructionem & infarctum. Alterum, quod inculpabilem reddit hanc hypothesin, est, quod fons per anatonien non adeo possit detegi: Cum enim præsupponant infarctum vasorum capillarum, quæ ordinariò post mortem collabescunt & reperiuntur clausa, hinc post mortem nulla falsæ curationis inquisitio institui potest: sed potius hos, ut & alios Medentium errores, tegit terra. Sed in istis vasis aut visceribus, quæ continuus liquorum transitus abluir, v. g. in venis aut arteriis, vasis item lymphaticis & lacteis, hepate & liene, &c. obstructio talis fieri nequit sine liquoris transcurrentis refectione & collectione, hinc partis tumore, aut ruptis vasis liquoris contenti extravasatione; quæ mala, tumor aut extravasatio, necessariò & semper comitari debent quævis obstructiones. Et reverà, si totum perpendimus negotium, impossibiles sunt tales obstructions in corpore humano; si autem quædam reperiantur, aliter explicentur necessum est. Res ut pateat accuratius, tres imprimis consideremus canales & meatus, in quibus obstructio fieri supponitur.

I. Sunt vasa sanguifera, arteriæ & venæ, quæ invehunt & revehunt.

II. Vasa lymphatica & lactea, quæ ex uno loco invehunt in alterum.

III. Sunt pori & meatus partium continentium, eorumque particulares ductus, per quos nunc continua nunc interrupta est liquorum tractio, primariò quidem viscerum, hepatis, lienis, pancreatis, pulmonum, renum &c., secundariò glandularum, ac terriò partium carnosarum.

Quod si in his locis debeat fieri obstructio, tunc sanè necesse est, ut humor in motu impeditus stagnet, hinc pars intumescat, & oriatur vel liquoris stagnantis coactio, aut ruptis vasis liquoris in motu impediti in vicina loca extravasatio. Et

I. Quidem in vasis sanguiferis, ubi est in aliquo vasculo obstructio, necessariò impeditur sanguinis motus. Unde sanguine hoc in illa parte impedito primo fit ejus stagnatio, ex stagnatione tumor partis, hinc capillarum vasorum ruptio: his ruptis sanguinis vel extra corpus, vel in quadam corporis cavitate, extravasatio, & hinc necessariò inflammatio, stante continuo sanguinis circuitu; siue sit impeditus motus in arteriis, & tunc adest continua pullatio; siue in venis, & tunc est tenitencia & distensio.

2. Ubi in vasis lacteis aut lymphaticis sit obstructio,

similiter fit lymphæ transcurus in motu impedito, ita ut per vasa lymphatica non aliorum commoveatur, nec ab his resorbeatur lymphæ ex parte; unde hæc in parte coacta dabit tumores serosos: si verò jam absorpta sit, adeò & in motu per vasa ex horum obstructione impediatur, crescere solet lymphæ in his venis, à qua tumor seu obstructio; unde à lymphæ stagnante fit vasorum distensio, tandem ruptio, & ita lymphæ necessaria effusio. Lymphæ ista effusa in peculiarrem cavitatem dat hydropem particularem, v. g. hydrocephalum, hydropem pectoris, palpitacionem cordis ex aqua pericardii abundante, ascitem parvum abdominis, & similes alios hydropes particulares; effusa verò lymphæ in poros partis solidæ non tantum partem istam instat spongiæ tumefaciet, adeòque tumores œdematosi & serosi exinde pro varietate lymphæ variam originem ducunt.

Obstructions, quæ dicuntur fieri in ipsis visceribus, aut partibus continentibus, etiam suos dant tumores, indeque vel inflammationes, vel abscessus, vel scirrhi, nec sine his contingere possunt. Cum enim meatus & pori earum in hunc finem sint constructi, ut aliquid transeat, necessariò ex istis obstructis non potest non fieri interdum liquoris transcurrentis stagnatio: unde pars necessariò intumescit, & tumefacta per suppurationem degenerat in abscessum; aut ubi materia stagnans inspissatur aut indurefcit, sunt tumores duri, plus minus indolentes, & ad tactum renitentes; qui ex sanguine in partibus sanguineis dicuntur scirrhi; ex lymphæ verò in partibus glandulosis dicuntur strumæ seu scrophulæ. Talis coagulatio & induratio materiæ obstruentis ordinariò fieri solet ab acido, subsistente aut in sanguine plus minus vitioso, in specie crudiore, atque crassiore, aut in lymphæ viscidore, in quocunque loco obstructo: hinc sensim sensimque partes subtiles avolant & evanescent, quæ ipsæ aliàs temperabant acidum: his discussis materia, siue sanguis siue lymphæ, sensim inspissatur, & à resistente acido ita firmitus coagulatur & induratur. Quod autem addit tale acidum in abscessibus, per se patet ex suppuratione: quod insit tale acidum in scirrhis & scrophulis, ex eo est manifestum, quod hi tumores, si inconvenienter tractentur, ita, ut acidum eorum vitiosam contrahat effervescenciam, facillimè in caneros ulceratos & depascentes tam scirrhi quàm scrophulæ degenerent: hinc enim adeò est necessarium, ut simus accurati v. g. in Cura tumoris mammarum, quarum glandulæ scrophulosæ, ut ita dicam, facillè dant cancerum.

Patet ex dictis, quid habendum sit de Obstructionibus; nempe nullo modo universaliter esse negandas obstructions; hoc enim absurdum esset: abusus tantum tollendus, & imaginariis istis obstructionibus superstructis morbis aliud fundamentum querendum: Nam & ductus cholochochus, non minus quàm ipse ductus pancreaticus, in cœliaca passione oscula vasorum lacteorum, ubi hiant in intestina, tubuli renum, ureteres in nephritide, &c. subindè reperiuntur obstructi, subsequenter exinde variis symptomatibus: mesenterii item obstructions esse repertas, unà cum glandulis ejus induratis, cum subsequente corporis inacile, similiter hinc inde prostant exempla, & plurima Præctitorum experimenta loquuntur: abscessus quoque omnes & scirrhi necessariò obstructions præsupponunt. Verum in febribus intermittentibus, etiam cachexiis, hypochondriacis, & similibus morbis chronicis, sæpius omnino nihil adest, quod obstructions arguat; maximus enim est error in Præctici, ut istud, quod est productum morbosum, habeatur pro causa morbi. Quod si verò in his morbis chronicis jam inveteratis tandem superveniant tumores viscerum scirrhi aut inflammationes, v. g. quando quartanis inveteratis, malo hypochondriaco confirmato, &c. comitem se sistit scirrhus lienis, aut ictero scirrhus hepatis, hypopis prodromus, aut in cachexia confirmata deprehenduntur glandulæ tumentes & scirrhi mesenterii; quæstio adhuc est de tali tumore & præsupposita vera obstructione, an sit causa & radix talis morbi? an verò potius sit productum morbosum? Vulgò quidem putant, ex tumoribus istis morbos oriri: falsum est; tales enim obstructions & inde nati tumores non sunt causæ radicales talium morborum chronicorum, sed sunt producta morbofa, seu talia, quæ morbo jam facto tandem superveniunt. Hinc enim in talibus morbis chronicis, eorumque principio, aut nunquam aut rarissimè obstructions & tumores tales adeste solent; sed hi ipsi affectus morbi istius confirmatis superveniunt, adeòque ceu effectus tales morbos inveteratos sequuntur; adeòque ex morbo sunt, non verò ex his morbi. Et quidem scirrhi aut similes tumores quod attinet; in his integer quidam ramus, aut huic anne-



xx visceris partes, omnino oppilantur, & in talem tophum coguntur; unde per eam cessat penitus contentorum trajectio, adeoque successivè vicini rami pedetentim dilatati eisdem münere fungi videntur: sic si totus quidam ramus ex vena portæ in hepate, aut si quidā ramus ex splene, aut si glandulæ mesenterii & colli scirrhescent, tunc totus iste ramus aut glandula inepta fit suo usui; unde dum nulla amplius fit trajectio, scirrhus generatur, quem nullus tumor, nulla inflammatio sublequitur. Sed quid de talibus obstructionibus partium abdominis pro fundamento morborum chronicorum habendum sit? eruditè explicat LINDANUS in Colleg. manuscripto super Praxin Hartmanni cap. 164. de Mesenterii inflammatione §. 233. ubi de hoc affectu ita inquit: *Creatur hoc mihi, nam facit hoc Praxius videre: illi morbi & vitia, quæ passim attribuantur obstructionibus mesenterii aliorumque viscerum, sunt reverà affectus ventriculi imbecillis & non bene habentis, laborantis scilicet cruditate vel corruptione, imprimis sæpius in hoc casu acidà. Revocate hoc ad animum, qui Praxin aggredimini. Vinam hoc Medici disceant, ut postquam tot purgationibus nihil profecerint, cognarent non esse obstructiones mesenterii. Deinde potest nunc aliquid magis insipuum esse, quàm velle tollere obstructiones purgantibus? Præterea in eis aperibus nunquam reperietis mesenterii obstructiones, nisi simul scirrhum & corpus morbi longitudine emaciatur, ubi totus sanguis nigrè corruptus scirrhum mesenterii & obstructionem generat. Quid is purgantia proderunt? Corrigite igitur ac corroborate ventriculum, corrigetis sic omnem obstructionem, & tolleris omne malum. Natura causæ satis providet, ne vasa mesaraica possint obstrui, scilicet accuratissime filerando Chylum per filamenta bombicina: unde videmus chylum per venas lacteas limpidissimè insisteri aque transire, adeo ut potius spiritus lacteus, si ita loqui liceat, transeat, quàm aliquod corpus: ac verò quomodo ibi fieri poterit obstructio, præsertim cum pateat, minores ramos desinere in ampliores? atqui obstructio est metuenda, ubi ex majori in minus vas deferatur. Ego, inquit, tales obstructiones, affectus melancholicos, hypochondriacos, &c. curo, curato ventriculo. Hæc LINDANUS. Et sanè rem ita se habere, confirmat quotidiana experientia: ergo hujusmodi obstructiones & antipraxia viscerum sunt asyla ignorantie. Certi sunt, quod nullum reperietis morbum chronicum ex viscerum infarctu derivatum, in quo non primaria morbi radix & origo semper hæreat in stomacho & primis viis, atque vitata digestionem. Nempe digestio prima in ventriculo & ejus perfectio in intestinis plus minus læsa, sunt fons omnium morborum chronicorum, tam ex antipraxia, quàm obstructionibus viscerum vulgò derivatorum; nam si dicunt adesse antipraxiam viscerum, tota causa est in stomacho & cruditate acidà: item quod supponunt adesse obstructiones, vitium est post cruditatem stomachi acidam in vitio digestionis secundæ. Nam si committitur error in digestionem primam, non corrigitur in secundam; si committitur in secundam, vitatur tertia, scilicet hæmatosis, & sic fit sanguis cacochymicus. LæSIONES hæc sunt vel vitio objecti seu errore externo, vel vitio fermenti digestivi in stomacho, aut vitio succorum, bilioli aut pancreatici, vitiatorum, quorum multiplex alteratio secunda mater morborum talium esse solet. Speciatim bilis vel parciol vel interior fovere & contumaces quasi reddere solet hos ipsos affectus; unde ametria chyli, dyscrasie sanguinis, partium nervosarum multiplices dolorosi effectus, originaliter ex vitioso acido primarum viarum propullulare solent, dominante semper acido, seu vehiculo plus minus seroso aut viscido, eoque semper vario, ipso etiam magis vel minus volatili aut fixo; unde vitiosum imprimis acidum tantum non in omnibus chronicis reperietis morbis. Unde etiam basis curandorum talium morborum consistit in vomitoriis, quibus & febres intermittentes, & malum hypochondriacum, & omnes affectus melancholici, cachexie iidem: necessariò sunt primitus aggrediendæ. Conveniunt ergo remedia tam generalia alterantia, nempe acidum corrigentia & absorbentia, viscidum alterantia, eaque evacuantia, & hinc stomachum & bilem balsamicam aromaticè vi restaurantia, quàm specifica, speciales saporos acidos enervantia, & specialem vitia humorum emendantia, quæ impregnata sunt sale alcali, aut fixo aut volatili acro, aut volatili oleoso: qualia sunt v.g. aromata, antiscorbutica, aperientia dicta: hinc etiam est, quod v. g. martialia & saturnina in dictis morbis sunt adeo utilia, ut tales ægros ad acidulas, seu sacram anchoram, soleamus ablegare, quæ turgida sunt primo ente martis. Jam verò martis concretum terretum, habens pro subjecto tetram quandam volatili, quæ beneficio sulphuris acidi coagulatur*

Etmull. Oper. Tom. I.

in corpus Martiale, per se simpliciter adstringit, & omnia ex eo parata saporem habent adstringentem. Gustate omnia ex Marte parata, sive sint sicca sive liquida, semper reperietis, quod apertam habeant adstrictionem in lingua; unde Mars. lac chalybeatum, potus chalybeati, & omnia martialia, in diarrhoea, dysenteria, & in alvi quibuscumque fluxibus, hæmorrhagiis, viscerum atonias, &c. conveniunt, quæ ipsa tamen etiam in malo hypochondriaco propinantur. Dum ergo per se semper Mars adstringit, quomodo in talibus malis ex obstructionibus suppositis conveniant, & quomodo aperire queant? dubiū remansit. Primus nobis aperuit oculos HELMONTIUS in Parad. de Fontibus Spadanis, cujus vestigia laudabiliter intulit TACHENIUS in Hipp. Chym. cap. 28., ubi agunt de Marte, qui duo toti sunt in eo, ut ostendunt Martem per se semper adstringere, per accidens verò in dictis morbis chronicis aperire (vid. LUDOVICI in Pharm.) quatenus rationis suæ texturæ terrestris pronipissimè absorbet in se saporos vitiosos acidos, austeros, ponticos, aluminosos, aliisque similia salia corrosiva, sive, uti vocat HELMONTIUS, sylvestria, in stomacho & intestinis oberrantia, quibus absorptis, dum agunt in Martis corpus fixum terrefcere, omne suum vitiosum saporem & omnem excessivam qualitatem omnino exuunt & deponunt, & vitriolicam & abstersivam acquirunt naturam: id quod fit propter mutationem texturæ particularum; indeque laxando alvum, dictos saporos morborum vitiosos sub forma nigrarum sæcum ex corpore evacuat, & morbum tollunt, & sic convenit in omnibus morbis chronicis.

Dum autem ab his Martialibus, ut & Saturninis, remediis absorpta sunt salia vitiosa in his morbis, conveniunt salia tam animalium quàm vegetabilium volatilia, quæ hæc salia alterant, & simul vitiosam mucaginem vitio stomachi enatam attenuant, deinde resolvunt, ac fluxilem faciunt, ut facilius corrigi aut evacuari, aut tandem sanguini assimilari possit: unde etiam purgantia præter hæc assumpta conveniunt, imprimis ad detergendum, ut, quantum fieri potest, crassos ac pituitosos succos evacuemus, in quibus usurpantur talia, quæ eisdem incidunt, ac visciditatem corrigunt.

Præter vitia ista, & præternaturales acido acres saporos, in istis morbis chronicis vitia stomachi pronata, simul videre est, quod non raro ex dicta vitiosa stomachi digestionem ipsa quoque massa sanguinea cruda reddatur, & mucos acido crasso ac viscido impregnetur, unde ex tali cacochymia necessariò superveniat cacochymia. Hinc in talibus subjectis, ubi gravius fuerit ventriculi sub digestionem erratum, aut notabilior cruditas acidà, si venam secundo mittatur sanguis (quod an rectum sit, non dicam, præsuppono talem) observatur ut plurimum eidem extravasato & jam coagulato (supernatante mucum quandam albidum, plus minus sublividum, spissum, & multis modis variegatum, quod in sero natans reverà nihil aliud est, quàm chylus crudus vitiosè digestus, qui cum non possit debite fermentando assimilari sanguini & spiritui ascerre, sub forma talis succi ac mucos vitiosè ipsi confusus inest, fermentationis negotium impedit, hincque cachexias, talesque morbos chronicos, antè ac corrigatur ac evacuetur, sed contumaces reddit, speciatim mulieres ad chloroses disponit; hinc etiam tales vel levi motu de difficillima respiratione conqueruntur: sicuti mulieribus, talibus morbis correptis, ordinariò mensium fermentativa turgescencia & effluxus supprimitur.

Revera ergo prima radix seu origo plurium morborum chronicorum, qui derivantur ex antipraxia viscerum & obstructionibus, est ex digestionem primam in stomacho vitiatam, (ubi assumpta loco chyli laudabilis salis volatilis degenerant & transmutantur in liquamen viscidum, aut fixum aut alio sapore vitioso inquinatum) & læsa perfectione chyli in intestinis, & separatione sæcum; quæ omnia oriuntur ex stomachi cruditate acidà ac corrupta, & succo pancreatico vitioso, unde ad saporos & salia respiciendum est.

Quæ jam dixi, hæc omnia confirmant symptomata, & remedia juvenilia & nocentia. Symptomata si probè examinentur, omnia possunt deduci ex cruditate acidà; hinc enim ructus acidi, flatuum ortus, & deficiens appetitus; hinc effervescencia & phlogoses ex vitio succorum, in intestinis murmur, alvi fluxus, tormina, & ex bilis vitio æstuationes oriuntur: In specie hæc confirmant juvenilia & nocentia, i. remedia enim in genere quæ conveniunt in hujusmodi morbis chronicis, aut, ut tantum communi sensu loquar, quæ conveniunt in obstructionibus ab acido natis sunt vulgò, sed malè, sic dicta aperientia, propriè verò



acidum aliisq; vtriosos & præternaturales in corpore succos acres, falsa, & inde vitiatam sanguinis crasim, indeque derivata præternaturalia vitia bilis, lymphæ, succi pancreatici, digestionum erroribus, corrigentia, emendantia, & in statum naturalem reducentia, viscidum attenuantia, stomachum restaurantia, &c.

Quæ ex regno vegetabili hic usurpantur, sunt triplici in ordine: vel acris volatilia, *Artis scorbutica* dicta, vel aromata oleosa vel amaricantia *Hepatica* dicta, vulneraria blandè diuretica & similia, conveniunt. Conducunt autem talia in talibus morbis chronicis, non quatenus penetrent diastas obstructions, sed quatenus partim amaritie suæ, acrimoniæ volatili &c. quæ in recessu habent tal volatile plus minus acris vel oleosum, contraria sunt vitiosis salibus aut saporibus acidis, in stomacho & primis viis & ipsa massa sanguinea hinc inde obstruantibus, quos dicta alterantia præcipitat, (nam alcalia omnia præcipitant acida in genere,) aut eadem alterant, aut in salum transformant, & ut plurimum per urinam evacuant; partim bilem inertem acuum, & acriorem oleoso sale volatili temperant. Talia vegetabilia, quæ obstructions respiciunt & stomachum restaurant, sunt verbi gratia *radices, quinquæ aperientes*: ut sunt radix apii, a sparagi, petroselinæ, ruscæ; item radix robæ tinctorum, quæ est egregia diuretica, eryngii, enilæ, cichorii, taraxacum, tale volatile egregie constans, arum, chelidonium majus, levisticum, endivia, fumaria, radix graminis, finis, polypodi, fragariæ, butyræ, alari, pimpinellæ: alar radix in substancia assumpta, aut in vino decocta, est egregium vomitorium; in aqua verò bullita dat potum diureticum, & cura reum febrilem, & morborum chronicorum, teste HELMONTIO & ZWILLFERO. Præterea conveniunt ma. rabium, quod in scirrhus hepatis & lienis commendatur, hyssopus, artemisia, absinthium, centaureum minus, carduus benedictus, agurmonia, chamedrys, scelopendria &c. His jungitur etiam, quam vocant Itali *Milzkatellam*, quæ est nihil aliud, quam species galiopsidis minoris. Constant hæc sale temperato quasi nitroio, quod temperat blandè acidum, & illud ad vias urinarias delet. De floribus genitæ res est nota. Cotinus item fixini, tamarisci, radicem capparis, & similes: semina calida minora, uti vocant, nigellæ, dauci, & similia: item cicutæ. Nam radice cicutæ quidam curant obstructionem hepatis, pulvere ejus a ʒss ad ʒij. propinac: coquunt etiam, & decoctum adhibent. Sabina non in uteribus solum est dicata, sed etiam in infarctibus, quos vocant, viscerum. Inter aromatica oleosa, acidum temperantia, in usu sunt galanga, rosamarinus, salvia, feniculum, mentha, semina calida majora, levisticum, absinthium, & similia amara, plus minus odorifera.

Omnia hæc revera operantur virtute salinæ volatili oleoso-urinosa, quatenus acidum destruunt, & bilem inertem acuum. Item tolluntur tales affectus per temperata, v.g. per vinum lactis, per pilulas & similia, quæ vitiatos sapores obtundunt, & ita morbos corrigunt.

Quoad acris, attenuantia viscidum, conveniunt hic omnia antiscorbutica & anti hypochondriaca, qualia sunt imprimis nasturtium & omnes nasturtiorum species, cochlearia, persicaria, quæ apud modernos inagnæ est altitudo; pipertus &c. Operantur ratione salis volatilis oleosis, quod destruit acidum, eliminat sordes primarum viarum, & sal scorbuticum temperat & corrigit: Item semen sinapi egregium est in scirrhis, uti & eruca. Jam hæc simplicia vegetabilia duplici modo usurpantur; vel cruda, vel præparantur: Cruda sumuntur, nunc recentia, quorum vis consistit in tale volatili, sed facile dissipabili, ad imitationem HORSTII cum tero lactis probè depurato; nunc sicca, quæ sunt quasi oleosa, & quorum vis medicamentosa in concreto quasi concentrata est.

Quoad præparata: etiam succi, decocta, spiritus per fermentationem, essentia, & extracta, parari solent: v.g. essentia fumaricæ composita, essentia absinthii, *essentia mirræ* cum spiritu vini tartarizato seu cum unctura tartari, *essentia absinthii scorbuticæ* cum spiritu cochleariæ parata: ut. moduli ex dictis simplicibus vino infusi,

Adduntur his gummata quæcumque, præsertim ammoniacum, sagapenum, maffix, & hinc galbanum & myrrha; quatenus hæc pituitam viscidam aut vitream, seu mucaginem acidam, hinc inde intestinis & stomacho adnatam, resolvunt & abstergunt: & certum est, quod gummæ ammoniacum in scirrhis viscerum & similibus, ab infarctu verò ortis affectibus nullis aliis cedat remediis: potest sumi in forma pilularum, vel saltem potest purgantibus addi: vel ex Viridi æris & gummæ ammoniacæ distilletur spiritus acidus volatilis & pe-

neirantissimus: vel quidam recipiunt spiritum viridis æris, & in eodem dissolvunt vel extrahunt gummæ ammoniacum, quæ est essentia egregia.

Ex dictis in specie in usu esse solent *essentia & extracta*, si nempe spiritus per fermentationem proprius affunditur ipsi vegetabili, aut ad imitationem Angeli Salæ ejus succo inspissato: sic enim fit v.g. *essentia absinthii*; ex succo menthæ inspissato cum spiritu menthæ per fermentationem factio, ex succo *baccarum sambuci* inspissato, affuso spiritu florum sambuci vel baccarum sambuci, fit egregia *essentia contra erysipelatæ*; ex succo *fumariæ* inspissato cum spiritu fumaricæ paratur *essentia antiscorbutica*. Idem potest fieri ex *antiscorbuticis, nasturtio, & cochlearia*.

Præparantamen essentia quæcumque ratione parentur, non exhaustiunt totam crasim medicamentosam simplicium; post extractionem enim talismodi essentia multum virtutis in eis adhuc residet. Nam utur videatur, cochleariæ vim consistere in sale volatili, quod in superficie hæret; notum tamen est, quod multum insit salis fixioris, ut ita dicam, quod affusus spiritus cochleariæ ex succo inspissato non elicit. Præferuntur ergo his *Quintæ Essentia* dictæ, paratæ ex eorum spiritu inflammabili per fermentationem parato, & spiritu eorum urinoso volatili per putrefactionem parato; qui duo junguntur in debita proportione cum oleo simplici destillato, & sic mediante digestionem diurnâ & repetitâ cohobatione coeunt invicem in *Quintas Essentias* dictas, ex sale volatili, oleo & spiritu constantes, & crasim totius mixti optumè referentes. Salia volatilia in forma camphoræ ascendunt cum sapore simplicium.

Quoad spiritus vegetabilium antiscorbuticorum, queritur; quomodo sint præparandi, cum vis maximam partem consistat in sale volatili. Respondetur: Ut tota crasim medicamentum fervetur, sicut prius per fermentationem; qui reasfundantur antiscorbuticis recentibus, ut ita per fermentationem pars fixior volatilis fiat, & per repetitâ cohobationem simul nanciscatur vis volatilis: quin etiam salia fixa admodum sunt convenientia, nempe ex dictis vegetabilibus parata; v.g. sal genitæ, fraxini, absinthii, centauri minoris, cardui benedicti, rosis marini, & similia, quæ omnia virtute suâ saponaria, & absteriva, uti quilibet alcalia, acidi destructivâ & diureticâ, dictis morbis, ab obstructionsibus vulgò natis, medentur.

Præ cæteris inter talia ciminet imprimis tartarus, qui egregium est simplex & vegetabile concretum, ad quod Medici, tanquam ad sacram anchoram, confugunt in morbis chronicis, imprimis ubi laborat stomachus, non ut aperiat obstructions, sed ut sordes varias primarum viarum eliminet, & vitiosos sapores succi pancreatici & fermenti digestivi corrigat; unde usurpatur nunc cremor, ut & crystalli tartari, in vehiculo fervido. Quod verò hujus aciditas quibuldam sit suspecta, utur in se insignem vim habeat incidendi, attenuandi & resolvendi, prætereaque urinam citiendâ, tunc conveniens est, ut cremori tartari addatur sal tartari, vel recipiatur cremor tartari, aut tartarus crudus, & pro suspecta ista aciditate temperanda misceatur cum dimidio salis tartari (quod privilegium dicitur ad resuscitationem metallorum) dissolvatur blandè in aqua feruida, post fermentationem filtretur, & ita in loco calido evaporent; sic evadit sal tertium egregie diureticum, & nobile digestivum salum egregium: vel addi possunt lapilli cancerorum aut similia subjecta, quæ vim salinam acuum, aciditatem verò nonnihil temperant.

Pertinet huc terra foliata tartari & liquor terræ foliatæ tartari, qui egregius est in omnibus morbis chronicis: quod etiam facit tartarus vitriolatus *Tacryni*, egregium & universale digestivum: similis naturæ ferè est tartarus vitriolatus BARTHOLETI in *Tr. de Respiratione*, quem vocat *expertum alexipyretum*: item sal digestivum hypochondriacum ex additione salis tartari ad sal ammoniaci in præparatione hujus spiritus. Non cedit his arcanum *Monfiebri* seu *panacea Holstæica*, lacta ex alcali nitri, saturato nonnihil à spiritu vitrioli, in hypochondriacis, scorbuticis, febribus intermittentibus, remedium sanè singulare, blandum somnum concilians. Ratio hujus rei videtur hæc: quod nempe sal alcali nitri imbibit nonnihil de sulphure vitrioli fixo anodyno, utur parum sit, à quo derivanda videtur vis ejus blanda hypnotica. Sed juxta hæc ex tartaro paulò fixiori, imprimis conveniunt volatilia ex tartaro, spiritus nempe ejus & sal volatile; non autem spiritus communis & phlegmaticus, sed per se crebrius rectificatus, & à capite mortuo ritè volatilizatus: nobilissimus est ip morbis chronicis quibuscumque & similibus affectibus, Obstructionibus vulgò tributis, quateus vitia digestionis primæ & secundæ propter vitiatos



Ex Regno animalium pro ulu Medico in morbis chronicis conveniunt partes animalium duræ, falibus volatilibus turgidæ, ossa & cornua præparata, lapilli Cancr., marina, & in specie testæ cochlearum, quæ marina præ aliis singularem habent vim alcalinam, quâ omne acidum mutant in falsum: imò calcinata dant calcem vivam, quod alix partes non faciunt, exceptis testis ovorum. Hæc ergo convenientissima sunt in morbis chronicis pro destruyendo acido, cum primariò ex acido viscido dependant: imprimis talia eorum volatilia aut spiritus urinosi. Omnes enim animantium partes suggerunt copiosum sal volatile urinosum, quod elegans est in morbis chronicis, sapores viscosos destrueredo: Talia sunt v. g. spiritus & sal volatile Cornu Cervi, spiritus & sal volatile sanguinis humani, spiritus & sal volatile viperarum, succini, urinæ humanæ, ratione salis volatilis, quod est in spiritu salis ammoniaci. Nam urina humana ad chronicos hos affectus, utit sordida, est tamen expertissima: vid. SOLENANDER *Constra. Sect. 1.*, qui dicit, quod *russicis*, *agrestibus hominibus in obstructione hepatis & lienis*, barumque partium tumoribus, sæpe putandam dedere urinam propriam, idque magno ac felici cum successu. Melius autem est, si etiam præparatur ex urina immediate spiritus, aut mediante tale ammoniacum. Loco horum omnium in specie esse potest spiritus salis ammoniaci adjectione cujusdam alcali fixi, sive sit sal tartari, sive cineres clavellati, sive calx viva, paratus: natales hic habet suas ex urina humana, & nihil est aliud, quàm sal & spiritus urinae humane depuratus, minus olidus: Euenim sal ammoniacum, quando ebullit sal commune cum urina humana; nam sic sal commune imbibit sal urinæ, & sic fit sal ammoniacum. Iam verò omnia acida lubentius sese jungunt & untunt cum salibus fixis, quàm volatilibus: quando ergo additur alcali fixum, acidum salis communis illud sibi unit, & dimittit ex se sal volatile seu spiritum salis ammoniaci, qui est spiritus urinæ. Duplex autem est spiritus salis ammoniaci: nam si paratur adjectione alcali fixi, habetur spiritus talis ammoniaci urinosus, sed participans adhuc nonnihil de acido; ideo etiam in

Ex Regno Minerali cæteris frequentius usurpantur Mars ac Martialis, ac horum ratione acidulæ, item & Saturpina: utraque, quatenus delitunt salia vitiosa in primis viis, & aciditates peregrinas absorbendo edulcorant, ea cum fecibus nigris eliminant, conveniunt. Verum cum operentur talia, quatenus acida vitiosa destruant, ob id attendendum est, ne extra corpus sub eorum præparatione nimis saturentur acidis, alias nullus sunt virtutis & efficacæ, & sic frustraneus erit eorum usus; Mars enim semel Acidofaturatus extra corpus, instar pulveris tantum jacebit in corpore, & quomodo assumptus fuit, prodibit. Hinc *Crocus Martis saccharinus*, qui fit, quando lamina ferrea illicitor acido spiritu vitrioli, vel oleo vitrioli, seu spiritu sulphuris, qui illam corrodit in crocum, (vid. SCHROEDERUS Pharm.) pessimus est & nullus usus, utut sit *basis pulveris cæcheædici Quercetani*; nam ab acido spiritu sulphuris penitus corrosus & natratatus, ut ne aqua fortis quidem attingat eundem; unde nec in corpore potest dissolvi, sed in stomacho residet tanquam terra mortua, & potius nocebit, quam proderit. Ideo ed collimandum, ut medicamenta Martialis sub præparatione cum minimo, quantum possibile, tractentur acido, & quidem talibus, quæ stomacho nostro sunt amica & convenientia, & quæ superari possunt à fermento ejus, ita ut solutus Mars tantum à salibus vitiosis corporis saturetur; spiritus autem minerales sunt nimis acidi, utpote Martem adeo imprægnant & corrodunt, ut instar terræ mortuæ hæreat in corpore, nec superari possit à fermento stomachico. Unde in stomacho robustiore potius convenit limatura ipsa Martis cruda, simpliciter pulverisata, & aliquotâ olei imbibitione à rubigine præservata; vel in iis, quibus paulò tenerior & sensibilibior est stomachus, usurpatur imprimis in forma liquida;



quæ præparationes eò collimant, ut redigatur in corpus vitriolaceum; tunc enim fit, ut Mars præcipitetur in corpore, sic præcipitatus absorbet acidus copiosiores succos in primis viis. Unde limatura Martis recens infundatur in succos acidulos vegetabilium, e. g. succum radicis cichorii, succum pomorum Borsdorfianorum, cydoniorum, musum, vel succum acerolæ & acetosellæ, vel Decoctum tamarindorum: Infusum hoc Marte probè imprægnatum, inspissetur in Extractum, quod vel ita usurpandum, vel cum spiritu Vini vel cochleariæ tinctura Martis liquida extrahenda: quæ nullo modo reluctatur digestionì, & optima est in morbis chronicis.

*Tinctura Martis cum spiritu panis* parata, est egregia. Hoc idem observetur de *Crocis Martis aperitivis*, cum paucò saturatis acido. Optimus modus est, si Mars irroretur cum succo cichorii depurato, exponatur soli, donec abeat in crocum subtilem: vid. PANAROLLUS: qui crocus, cum ab acido corrosivo non sit saturatus, magnam obrinet vim salia sylvestria in corpore absorbendi.

Quid dicendum de *Croco Martis aperitivo cum salibus*? Fit nempe lixivium ex salibus vegetabilium fixis, quod lixivium affunditur Marti, unde Mars corroditur in Crocum Martis aperitivum cum salibus. Vix laudem meretur, propterea, quoniam salia ista fixa in lixivio aggrediuntur Martem, & tunc aqua solvit proprium Martis acidum, salia fixa se uniunt cum acido, & ita abeunt in tertium sal falsum: Nam hoc tertium falsum, cum in se sit saturatum, neque acidum neque alcali corrigit, & ita crocus Martis aperitivus cum salibus vix laudabilem habebit in corpore usum.

Sed hæc tantum mea est coniectura; an vera sit? consulenda experientia.

Substituimus hæcenus in remediis ad obstructions viscerum directis, aut ijs, quæ in Obstructionibus vitio stomachi ortis laudantur, Recensui ea, quæ ex regno vegetabili desumuntur, & progressus factus ad regnum minerale, & de Marte dictum, quod semper adstringat per se, aperiat per acidens; hinc opus esse ut cautè & paucissimis acidis præparetur: vid. PANAROLLUS *Pentec. 5. Observ. 32.*

Præ alijs præparatis nota est tinctura vitrioli Martis ZWELFFERI, aut hæc illa in forma sicca seu *sal Martis compositum*, ex ana vitrioli Martis & terræ foliatæ tartari (*humectatur, & denud fecatur*) in morbis chronicis nobilissima. Dosis 20. 30. vel 40. gutt. bis in die, mane jejuno stomacho in vehiculo calido, vespere in vehiculo frigido ante cœnam, pro subjectis tenerioribus, quia est debilis, & plus operatur ratione terræ foliatæ tartari, quàm ratione vitrioli Martis; Unde huic vel simplicissimam, satis tamen efficacem, tincturam Martis præferre vellem. Modus has simplices, sed non inellegantas tincturas Martis parandas, describit DRAWIZIUS in *Tr. de Scorbuto dolorifico Sect. 8. de Dolori Ventris scorbuto*. Et si hæc extracta & tincturæ martis legitime parata certè mirabiliter præstant. Melior in usu est liquor Martis solaris, qui fit ex minera quadam in locis argillosis, composita ex Marte & sulphure, reperitur in Hassia juxta pagum Almenrodt, & prope Salsfeldiam, ut & Naumburgum circa pagum Sbohen: Exposita aëri, verno & autumnali tempore efflorescit in vitriolum martis dulce, quod beneficio roris majalis per ollam non vitreatam elixiviatum, filtratum, & depuratum, constituit liquorem Martis solarem, qui elegans est in affectibus chronicis, in quibus utimur Martialibus. Nulla alijs de hoc prostant vestigia, quàm in GLAUBERO in *Tr. Oleum vitrioli dulce*; Licet autem scopum is non feriat, tamen medicamentum est nobilissimum: si minera cruda destillatur nondum aere resoluta, copiosum dat sulphur, caput mortuum trahitur à magne, quod signum sufficiens Martis: sunt etiam, qui ex eo tantillum auri eliciunt. Ex capite mortuo destillando nullum elicitur sulphur, & si aëri exponitur, nil vitrioli dat: minera cruda autem efflorescit in vitriolo, quod destillatum nullum dat sulphur, sed phlegma & spiritum vitrioli. Liqueorem tamen hunc appellare possumus acidulas concentratas, quia, quod acidulæ præstant sub haustu, idem præstat hic liquor sub guttularum usu.

Hoc ipso liquore possumus pervenire ad inquisitionem Acidularum: nempe minera hæc si immittitur aquæ & coquatur, nunquam quid evanescit; libero verdè aëri exposita, sal universale aeris omne sulphur minere solvit, sulphur dissolutum mediante spiritu acido rodit adjunctam mineram Martis, unde coeunt in Vitriolum. Iam ergo, quod attinet acidulas cogitemus aquas dicto sale universali imprægnatas, quæ præterfluunt mineram Martialem, solvere dictum sulphur, quod solum sulphur rodat mineram Martis, unde li-

quor talis Martialis. Talis minera ab aere eluitur in terra. Acidulæ nativæ & hic liquor sunt unum Ens, constans præstanti virtute diuretica & virtute acidum destructiva: Mars, qui ex acidulis præcipitatus aliàs cadit, dissolvitur ab acido corporis, & solum sub forma fecum eliminatur. Si Martialis non satisfaciunt, ægros ablegemus ad acidulas non artificiales, sed naturales, in dicta anti-praxia viscerum. Vina etiam Martialis, seu Mars in vino extinguatur, seu limatura Martis recens, vel sola vel cum cinnamomo, vino Rhodano aut Malvatico infusa, continuato usu sunt egregia; volatilis enim & subtilis vini acor nunquam intermittit, quin rodendo Martem, ejusdem subtilem crocum in se absorbeat. Hinc si addantur nonnulla Vegetabilia appropriata, v. g. cochlearia, sumaria, absinthium, chelidonium majus & minus, fœniculum, &c. cum cinnamomo & zingibere, exinde evadet Vinum Medicatum anticaceticum. Nam & aqua ferri-rorum pro pauperculis est egregium.

Verum quoad legitimum martialium usum, observetur:

1. Sub Martialium usu semper operam esse dandam, ut alvus servetur aperta.
2. Si excreta alvi exinde evadant nigricantia aut atramentosa, signum esse legitimæ operationis martialium.
3. Blando motu corporis promovendam esse operationem martialium: si non sunt nigra, quæ excernuntur, signum est, quod minus operentur.
4. Inter ipsa Martialis habendum esse delectum: ut nempe observetur acidum humorosum peccans, an sit acris & volatilis? an verdè mitius? item consideranda constitutio ægrorum, an vel nimis delicata? Nam quorum orificia stomachi sunt sensibilia, illi minus ferunt Martialis cruda: sed talibus saltem tinctura Martis liquida, tinctura vitrioli Martis ZWELFFERI aut Infusa Martialis cum vino usurpanda sunt: Quorum verdè robustius ac minus sensibile orificium stomachi finistram, his Mars crudus præparatus, liquor Martis solaris, similiaque, commodè propinari possunt.

Pergo: post Martem nobilis est Saturnus, cujus saccharum, & ex hoc cum vitriolo Martis, & spiritu Vini parata tinctura *Antiphthisica*, reverà, uti notum, egregia sunt remedia in malo hypochondriaco, melancholicis hypochondriacis, scorbuto, & similibus chronicis affectibus, imprimis cum vitio splenis junctis, qui vulgò Obstructionibus attribuntur. Ex hoc saccharo Saturni methodo confectus fit spiritus, quem vocant *spiritum Saturni*, & multi insigniter in splenis commendant affectibus: sed sub hoc spiritu insignis latet impostura; est enim nihil aliud, quàm vini spiritus regeneratus ex aceto, cum quo paratum fuit saccharum Saturni; quod certum est. Quibusdam etiam crystalli ex minera Saturni cum spiritu nitri paratæ, sacchari Saturni loco in usu esse solent, quæ crystalli præter hoc, quod in febribus ardentibus, item peste, egregium præbeant refrigerium, ut cum vulgò ita loquar, etiam in affectibus chronicis, hypochondriacis, & hinc ortis Melancholicis, præ cæteris conveniunt, & etiam hos in stomacho radicales affectus, & obstructionibus falso tributos, insigniter curant & sanant.

Quæritur: *quaratione Saturnina operentur?*

Respondetur: pari ferè ratione, cum Marte. Per se Mars semper adstringit: gustate saccharum Saturni, & aperte aluminositatem & adstringentem dulcedinem percipietis: Corrigit ergo & dulcificant præternaturales aciditates; si enim assumantur crystalli Saturni, acidum saturatur ab alcali, Saturnus præcipitatus attripit ad se potenter acida, quæ dulcificantur & eliminantur cum fecibus: non autem prodest quatenus æstum hepatis corrigit, sed quatenus dulcificat, & vitiosos sapores invertit. Iupiter etiam & Antihæcicum Poterii, item Diaphoreticum Ioviale Schræderi, similiaque in dictis morbis chronicis conducunt.

Hæc est Materia Medica, quæ in genere in morbis chronicis, ex obstructione vulgò derivatis, reverà ex acido vitioso natis, convenit, hoc est, cachexiis omnibus, icteri speciebus, Leucophlegmatia & anasarca, malo hypochondriaco, scorbuto, menstruorum defectibus, febribus intermittentibus, & similibus, in quibus ista vulgò aperire dicuntur, reliqua vitiosa salia morbosa, ordinariò ferè ex cruditate stomachi ortunda, corrigere & emendare solent. Verum artificium chronicos hujusmodi affectus ritè curandi consistit in eo ut tempori inseruiamus, nec nimis præcipitando curâ, et abrones irremus; h. e. temperatis remediis successivè insilamus, ac acrioribus commoti aciores p. n. succi effervescendo, & par-



& partes nerveas irritando, varia symptomata inducant: quibus imprimis moderatus corporis motus simul accedat.

Legitima ergo utendi methodus his ipsis est, ut usurpentur

1. Digestiva; hinc  
2. Vomitoria vel blanda laxantia pro removendis impedimentis.

3. Preparato sic corpore Martialia, ut promptius absorbere & imbibere queant vitiosa acida: Quibus

4. Interponantur, non purgantia propriè dicta, quæ insigniter tales ægros & tandem frustra vexant, & subinde periculosa symptomata inferunt, ex acriorum & effervescentium succorum ad intestina provocato influxu; sed blanda potius & per epictasin laxantia, & quæ leni stimulo intestina mediocriter proritant: Et

5. Subjungantur Alterantia aromatica, in specie volatilia, plus minus amaricantia.

Inter Digestiva, reliquis ferè præmittenda, in specie laxativa, eminent imprimis salia salia, aut nonnihil utriusque, succos acidos attenuantia, & acere omne blandè temperantia; qualia sunt, tartarus vitriolatus Tacenii, sal ammoniacum, sal hypochondriacum, arcanum duplicatum, liquor terræ foliatæ tartari, unctura tartari, unctura scoriarum reguli antimonii, unctura vitrioli Martis Zavelseri: v. g.

R. Tartari vitriolat.

Sal. absinth. ʒi.

Lap. Cancr. præp. ʒss.

M. f. Pulvis digestivus pro duabus vel tribus dosibus. S.

Pulvis digestivus.

Vel

R. Tart. vitriolat. ʒij.

Salis absinth.

Lap. Cancr. præp. an. ʒi.

M. f. Pulvis.

Div. in 4. vel 6. part. æquales. S.

Pulvis digestivus.

Capiatur semel vel bis in die.

R. Liq. terræ sol. Tart. ʒj.

D. S.

Essentia digestiva.

De hoc capiat æger bis vel ter in die 30. vel 40. guttas, manè nempe in vehiculo calido, meridiè biberio ante prandium, & à meridiè in frigido vehiculo. Vel

R. Tinctura antimonii ex scor. par. ʒj.

D. S.

Tinctura digestiva.

Capiantur de tali bis gutt. xx. manè jejuno stomacho in vehiculo calido, meridiè & circa vespertinam in frigido.

Paratur autem sic Tinctura Antimonii ex scoris: si sumantur scoriz reguli antimonii cum nitro & tartaro parati, adhuc calidæ, & infundantur in spiritum Vini rectificatum, sic fit unctura tartari, quam æstimo ob alcalia fixa imbibita. Vel

R. Liq. Terra sol. Tartari ʒss.

Tinctura tart. antimonii ʒij.

M. S.

Essentia digestiva.

Dosis 40. vel 50. guttæ, bis vel ter in die.

Quod II. attinet Vomitoria: hæc sunt nota ex antimonio, quæ sunt optima: præstant autem liquida succis; & si opus est, reterentur.

3. Martialia ex suprâdictis sunt cognita; sive usurpantur artificialia, nempe unctura, croci, infusa Martialia; sive naturalia, ut sunt acidulæ. In horum tamen usu aliquandiu persistendum est, ut radicibus corrigatur causa morbilica: in specie liquor Martis solaris continuetur ad 3. 4. usque ad 6. vel 7. septimanas, ascendendo à gutt. 10. 12. ad 20. vel 25., & descendendo, bis in die, manè in vehiculo calido, à meridiè in frigido. Si non sufficiant, hauriantur acidulæ naturales in loco natali.

Hæc Martialibus interponantur subinde blanda laxantia, successivè, & ut vocant, per epictasin evacuantia, quæ scilicet alteratas & præcipitatas surdes beneficio istorum medicamentorum subinde leniter educunt: Nam in morbis chronicis violenter purgando nil præstamus, sed morbos deteriores reddimus. Si alvus ordinariò fluit, bonum signum est; si vero interdum tantum fluat, interponantur dicta remedia per epictasin purgantia: vid. WEDELIUS de Med. facult. pag. 45.

Hæc inter eminet Rhabarbarum, quod aliàs *Anima br-* *patis* dicitur, blandum est laxativum, & aromaticum simul corrigit & acuit bilem, additis stimulis salinis; v. g.

R. Rhabarb. el. ʒj.

Arcan. dupl. ʒss.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis laxativus pro una vice.

Vel fiat Electuarium ex pulpa passularum cum rhabarbato pulverisato, recipiendo ad quamvis unciam pulveris rhabarbari ʒj., & ea sub forma electuarii aliquandiu continuando.

Dosis nucum juglandium quotidie bis, est remedium ad cachexiam & quasvis icteri species commendatissimum: unde HELIDÆUS PADVANUS facit pilulas ex rhabarbato pulverisato, & ex gummi ammoniaco in aceto dissoluto; & hæc fuerunt ejusdem pilulæ, optimæ in morbis cachecticis.

IV. Si quid aliud ex purgantibus mediocribus convenit, imprimis sunt gummata, in specie gummæ ammoniacum, cum laxativis acuta: Talia sunt pilulæ de ammoniaco Quercetani, item pilulæ de ammoniaco Bontii, de quibus videatur SCHROEDERUS: vel Riverii, vel Hartmanni, quæ satis sunt commendatæ & utiles; item pilulæ aperientes Tilemanni:

R. Aloes succot. ʒj.

Gum. ammoniaci aceto solut. ʒss. vel ʒj.

Tart. vitriolat. ʒij.

Cum Tinctura Martis f. Pilulæ.

De quibus num. ix. x. vel xj. xv. ad xx. capiantur horâ vna vel alterâ ante cenam.

Nempe pertinent hæc omnes pilulæ usuales seu domesticæ dictæ, quæ sub cursu curationis morborum chronicorum omni septimanâ simul capiantur, in specie sub usu Martialis: v. g.

R. Gum. ammon. in aceto solut. ʒij.

Vitrioli Martis vice parat. ʒj.

Aloes luc. gr. xv.

Masticb.

Myrrhæ an. ʒss.

Extr. troch. alband. gr. viij.

Cam Essentia menth. fiant Pilulæ: S.

Pilulæ emollientes & aperientes pro aliquot vicibus.

R. Gum. ammon. cum aceto sol. ʒss.

Aloes luc. ʒij.

Masticb. elæb.

Myrrh. elæb. an. ʒij.

Extr. troch. alband. gr. xv.

Cam essent. absinth. f. pilulæ minores. S.

Pilulæ aperitivæ pro aliquot vicibus.

Dosis gran. xv. ad summum ʒj., singulis 24. diebus, vel singulis mensibus usurpentur sub decremento lunæ.

R. Mass. pil. de ammon. Querc. gr. xv. ad ʒj.

Extr. absinth. gr. xv.

Aloes lucid. gr. xv. ad ʒj.

Scamm. sulphurat.

Extr. troch. alband. an. gr. iij.

Cam unctura Tart. fiant pilulæ.

D. S.

Pilulæ stomachales laxativæ, semel in septimana usurpanda. Præscripti aliquando, ubi perfecta influenda est purgatio, imprimis Extr. elleb. nigri: e. g.

R. Extr. elleb. nigri gr. xv. ad ʒj.

Troch. alband. gr. j.

Gumm. ammon. cum aceto solut. ʒss.

Scamm. sulphurat. gr. iij. vel iv.

Cam Tinctura Martis fiant Pilulæ: S.

Pilulæ stomachales pro una vice.

R. Gummi ammon. in aceto solut. ʒj.

Scamm. sulphurat. gr. iv.

Extr. troch. alband. gr. j.

Cam Ess. carbol. purg. f. pilulæ.

D. S.

Pilulæ stomachales pro una vice.

Præscripti aliquando hypochondriaco, colicâ hypochondriacâ laboranti, sequentem formulam, à qua absque ulla lassitudine cum insigni levamine purgatus fuit:

R. Aqua Menth. ʒj.

Gum. ammon. cum aceto sol. ʒss.

Tart. vitriolat. gr. xij.

Scamm. rosat. gr. iv.

Syrup. de pom. Reg. Sab. ʒss.



M. I. Poria: S.

Poria laxativa.

Faciunt huc *pilula ex gummatibus SYLVII ex Praxi Med.*  
*L. 1. cap. 2. §. 14. cap. 7. §. 52. & cap. 14. §. 53. cap. 34. §. 110. &*  
*cap. 35. §. 16.*, quæ multum contribuunt ad evacuandum in  
 his morbis. Distarum pilularum aliquot capiat æger manè  
 jejuno stomacho. Item Mercurius dulcis in his chronicis affe-  
 ctibus, in specie spleneticiis, cum extracto hellebori nigri est  
 egregius, qui cum sit tenuissimus, uno vel altero grano ex-  
 tracti troch. albandi est acuendus, hac forma:

R. Mercurii dulc. gr. xij. vel xv.

Extr. helleb. nigr. vel Mass. Pilul. de

Ammon. Quercet. gr. xv.

Troch. alband. gr. j. vel ij.

Cum ess. absinth. f. pilula.

Quibus etiam gutta i. vel altera Olei destillati cumini addi  
 potest: S.

Pilula stomachales pro una vice.

Item pilulis convenienter permiscetur chalybeata, vi-  
 triolum Martis, ut ex pilulis Sylvianis patet, vel extractum  
 Martis sequenti forma:

R. Extraß. helleb. nigri,

Mart. an. gr. xv.

Troch. alband. gr. ij.

Scamm. sulphurat. vel rosat. gr. iv.

Cum Essent. live tinctura Mart. liquida. f  
 pilula: S.

Pilula chalybeata purgantes.

Sin in forma pulverum debent dari Laxativa, (dico laxati-  
 va; nam 3. aut 4. sedes sufficiunt; possunt tamen subinde re-  
 peti:) dantur imprimis cum salibus digestivis, v. g.

R. Tartari vitriol. ℥ss. vel gr. xv.

Scamm. sulphurat. vel rosat. gr. iv.

Troch. alband. gr. iv.

Ol. destillat. anis (ratione odoris & saporis)  
 gutt. ij.

M. f. pulvis.

D. S.

Pilula laxativa.

Hic pulvis interdum sepius, interdum duodecies laxat.

Faciunt huc etiam pastulata, in specie eorundem Deco-  
 cta, imprimis cum Martialibus usurpanda, in subjectis  
 paulò siccioris constitutionis. Convenienter etiam usur-  
 pantur Infusa ex fol. sennæ cum sale tartari, quæ sunt ru-  
 bicunda, & omni teter sapor est correctus, cum & sine  
 rhabarbaro; vel mista cum gummi ammoniaco, & pur-  
 gantia alia.

Obiter moneo, quod nunquam senna propinanda in qua-  
 cunque forma, nisi addatur stimulus salinus, in specie ex  
 Tartaro: Ratio est, quia aliàs non purgat, sed tantum adhæ-  
 rescendo parietibus intestinorum dat tormina: si tamen ad-  
 datur stimulus, blandè & benignè, sufficienter tamen, eva-  
 cuat. Infusum sennæ sit tale:

R. Fol. sennæ sine stip. ℥ss.

Sem. anis (ceu corrigens) ℥ss. vel 3j.

Sal. Tart. 3j. ad 3℥ss.

Infund. in f. q. Aqu. simpl. stent in loco tepido per no-  
 ctem;

Colat. 3ij. vel iv. adde

Aqua cinnam. 3ij. vel 3℥ss.

Syrup. de cicbor. cum rhabarb. 3℥ss. vel q. v.

M. D. S.

Poria laxativa.

In genere tandem dictis aliquandò continuatis sit acces-  
 sus ad alterantia aromatica: eaque vel simpliciter talia; vel  
 simul pius minus laxantia. Faciunt huc imprimis noduli vi-  
 no infundendi, qui ipsi parantur ex simplicibus; nunc ari-  
 dis, quæ sunt quasi oleosa, & quorum vis medicamento-  
 sa in concreto quasi concentrata est; nunc verò ex recentibus,  
 in iis nempe, quorum vis in sale volatiliori, sed fa-  
 cile dissipabili, consistit. Alterantibus his Purgantia infu-  
 sioni apta permiscuntur: Non enim omnia purgantia con-  
 veniunt, ut infundantur, qualia sunt, quorum vis pur-  
 gans consistit in parte resinosa, quoniam resinam non at-  
 tingit aqua: Quorum verò vis purgans consistit in parte mu-  
 cilaginosa, ea possunt infundi & subministrant suam vim  
 liquori aquoso seu vino. Sic dabo exempla: radix jalappæ  
 non purgat, etiam si totum cantharum ejus infusi haurias:  
 gummi guttæ, mechoacanna, & similes plantæ resinose  
 nihil valent in nodulis. Contra radix eluæ, hellebori ni-

gri, folia sennæ, radix ireos nostratis, rhabarbarum & si-  
 milia, commodissime infunduntur; hæc vim purgantem  
 communicant Aquæ, & Vino, quæ consistit in parte mu-  
 cilaginosa & sale volatili. Si assumantur herbe sicce, in-  
 fundendæ, de quibus sub exsiccatione non multum perit vi-  
 rium seu salis volatilis; Unde plantæ aromaticæ, quarum  
 sal volatile oleosum cum sit fixius, ut plurimum quod coer-  
 cetur ab oleo, commodè possunt infundi. Possunt autem  
 infundi radix angelicæ, sceniculi, levistici, helenii; item  
 herba filicis, aut scolopendriæ, aut potius ex Aromaticis  
 herba majoranæ, rorismarini, menthæ, absinthii, asari,  
 tataraci, centaurii minoris, cardui benedicti, & cum his  
 passulæ, imprimis Corinthiæ: item omnia, quorum sal  
 volatile concentratur in proprio concreto; semen crucæ,  
 sinapi, dauci, caryi, baccæ itidem juniperi & lauri, &  
 similia: v. g. sit Nodulus alterans ex siccis:

R. Herb. absinth.

Mentha.

Rorismar. an. M. j.

Rad. fenic.

Levis. an. 3℥ss.

Galang. 3℥ss. vel 3vj.

Zedoar.

Zingib. an. 3ij. vel liij.

Cort. aurant. 3℥ss.

(vel borum &amp; cort. citri an. 3ij.)

Cinnam. 3ij. vel liij.

M. pro Nodulo Vino infundendo: S.

Nodulus ad vinum stomachale.

Quod vel simpliciter ita bibitur, capiendo quotidie bis sem-  
 per antepastum unâ vel alterâ horâ bonum hauritum.

Alius nodulus aut Vinum medicatum ex recentibus vegeta-  
 bilibus in quibuscunque hypochondriacis:

R. Herb. rec. chelid. maj.

rec. cochlear.

Nasturt. aquat. an. M. j.

Rad. acori utr. rec.

Armorac. rec. incif. an. 3j℥ss.

Caryoph.

Cinnamom.

Zedoar. an. 3j℥ss.

Sem. anis.

Fenic.

Sal. Tart. an. 3ij.

Incif. &amp; confusa includ. nodulo: S.

Nodulus ad vinum.

Quibus tamen subinde adhuc spiritus, & sola volatilia in-  
 stillari solent, v. g. spiritus salis ammoniaci, spiritus tartari  
 volatilis, spiritus carminativus de tribus, liquor Corn. Cer.  
 succinatus, Essentia infusa aromatum, maxime volatilia  
 oleosa, aliaque similia, addendo de talibus omni hauritulo  
 gutt. 30. 40. &c.

Item Nodulus alterativus, laxativus ex herbis recentibus:

R. Herb. rec. cochlear. M. ij.

rec. absinth.

Chelid.

Fumar.

Nasturt. an. M. ss. vel j.

Fol. sennæ sine stip. 3vj. ad 3j.

Rad. rec. acori veri, vel emule,

Armorac. an. 3℥ss. ulque ad 3

Helleb. nigri crud. 3vj.

Esul. præp. 3ij. vel 3ij.

(violenta enim est, propterea etiam in hac dosi datur:)

Zedoar.

Zingib.

Cinnam. an. 3j.

Sem. anis.

Fenicul. an. 3ij.

Sal. Tart. 3ij. ad 3℥ss.

M. pro Nodulo vino infundendo:

D. S.

Nodulus laxativus.

Sal Tartari stimulans est, & menstruum reddit idoneum  
 pro purgantibus extrahendis: posset loco ejus addi cremor  
 tartari, sed sal tartari est melius.

Capiatur subinde unus alterve haustus, & laxabitur blan-  
 dè corpus. Dabo aliud exemplum ex alterantibus siccis &  
 laxantibus:

R. Herb.



R. Herb. absinth.

Enul.

Membra an. M. j.

Fol. fern. sine stip. 3vj.

Rad. rad.

Fenicul.

Leviss. an. 3vj.

Helleb. nig. crud. 3℔.

Isula prop.

Galang.

Zedoar.

Zingib. an. 3ij.

Passul. min. 3℔.

Sal. tart. 3℔.

Includ. Nodulo. S.

Nodulus ad vinum.

Ad Alterantia dicta aromata pertinent etiam Elixir Proprietatis sine acido, tinctura lactaria composita, & Elixir anticephalicum alterativum.

R. Aloes succor. 3j.

Gumm. ammon. 3vj.

Morb. 3℔.

Croci 3ii.

Infundantur cum s. q. tinctura tartari acerrima, mediante digestionem diurnam extrahatur Essentia composita.

Dosis ad 30. vel 40. gutt. bis in die propinanda. Vel Elixir anticephalicum laxativum.

R. Aloes.

Myrrha.

Gumm. Ammon. an. 3℔.

Croci 3j.

Caryophyll. an. 3℔.

Rad. belleb. nig. crud. 3℔.

Pulp. colocynth. Num. i.

Pulverisatis grol. m. 10 adde

Sal. tartari 3℔. ad 3ij.

Affunde vini spiritum non deplegmat. q. l., digerantur per diem & amplius. Nunc

R. Sal. ammon. depur. an. cum sal. tart.

Addatur illis, & parum spiritus Vini non deplegmati, saltem q. l. ad solvenda salia, digerantur, filtrantur.

Dosis 40. gutt.

Tinctura tartari composita paratur sequenti modo:

R. Aloes succor. part. ij.

Myrrh. elect. part. ij.

Croci part. j.

Extrahantur cum Tinctura tart. acerrima, probe digerantur, & filtrantur.

Quod etiam pertinet Essentia myrrhe, & Essentia absinthii, vinetoxici, prelestim ex succis inspissatis cum spiritu chilear. paratæ.

Sic generaliter morbi chronici ex vitio digestionis primæ & secundæ curantur.

Quod si hujusmodi chronicis affectibus subinde obstructiones revera tales, tam mesenterii, quam hepatis & hodiatis, ac inde supervenientes tumores duri ac scirrholi, tamque renitentes & indolentes vel in glandulis mesenterii, vel in hepate, vel liene, aliave parte simili deprehendantur, nascuntur pariter hujusmodi ex acido viscido, cuius hostili pressura stringuntur fibre, clauduntur pori, ac ordinarius fluidorum transitus plus minus impeditur, unde HIPPOCRATIS Magni lienes & tumores viscerum superveniunt. Revera ex talibus præteritum mesenterii obstructionibus ac tum oribus, subinde oriuntur aut saltem pernaciter foventur chronici morbi, mirabilibus ac subinde difficulter explicabilibus sympto matibus, utque quotidie variantibus, stupati. Et quidem mesenterium, si quadam in parte affectum sit, difficulter cognosci potest, cum in profundo ferè situm est; supervenire tamen solet aliqualis, molli tamen, & sine fluidi contenti indicis, abdominis tumor, excreta alvi liquida, subinde varia, dolor obsecutus, interdum plus minus gravatius in profundo abdominis percipitur, & ægi successivè emaciatu videntur, nec nisi, ubi longius processerit malum, tactu timor renitens tandem cognoscitur, imò interdum vix ante cadaveris apertionem observabilis est.

Lienem verò aut hepatis si affligant obstructiones & tumores, dolor gravatius simulque obsecutus, plus minus tensivus, in eorum regione percipitur, interdum quoque, si majores sint, tactu patent. Dolores punctorii, nem va-

gi, nunc distentes, nunc denuò evanescentes, nullo modo his visceribus conveniunt, sed intestinorum sequuntur affectiones. Egorum talium floridus faciei color perit; ac splenetici, obscuri lividi, & quasi plumbei apparent, Hepatici verò ad vitiosam flavedinem ferè declinant; urinz crudæ subinde varijantes excernuntur, eæque ferè pauciores; tandem tumor hydropicus æplasmæ vitæ finem imponit. Deteriora hæc sunt mala, si lieni affectus hepatis sui consortium traxerit; cum omnis ex splene refluxus sanguinis immediatè potat hepatis. Recentia hæc mala, ac inde successivè succurrentes chronici morbi, nunc hypochondriaci, nunc scorbutici affectus symptomata, imitantes, adhuc curabiles sunt: magis verò confirmati, ac præsertim, ubi jam in scirrhum abierint tumores, incurabiles existunt.

Curandi ratio ex suprâ dictis spontè patet; nempe per interna acidum corrigentia, humorem stagnantem plus minus viscidum incidentia & solventia, & per epicrasin evacuantia, primum ducunt: quibus & externa emollientia ac attenuantia socianda. Martialia ergo ante perfectum scirrhum sunt optima; hinc enim aquæ Martiæ tumentes lienes absorbere dicuntur: sed ubi ad scirrhum degenerant, nocent plurimum Martialia. Rationem, eamque satis exactam suggerit TACHENIUS in Hippocr. Chymico Clav. pag. 181. & 188. Hinc gummata, præteritum gummam ammoniacum & galbanum, & plura alia, ex his concinnata remedia sunt optima: nec tinctura tartari, spiritus tartari, ac alia quævis talia volatilia, sed pauciter & crebrius usurpata. Hinc quælibet virgò aperientia dicta, v. g. cortices ligni fraxini, scopolendriæ, ceterach, filix, ablinthium, rhabarbarum, macrubarum, quælibet antiscorbutica & similia, alias Aperientia, item Hæpatica, vel Splenetica dicta, locum inveniunt; cum quoad rem facti seu experientiam omnes conveniant, saltem quoad theoriam seu experimentorum per causas scrutinium, differamus.

Externè conveniunt, tales partium abdominis tumores, plus minus scirrhum imitantes, emollientia gummata, in specie ammoniacum, galbanum, sagapenum, bdellium, & similia; hæc enim intere incident, & emolliunt viscida crassa atque tenacia. Iungantur his Vegetabilia ad narcoticorum naturam propius accedentia, v. g. nicotiana, cicuta, hyoscyamus &c. exque his parata emplastrum varia, v. g. emplastrum splenetica dicta, quæ ut plurimum fiunt ex gummam ammoniaco, galbano, sagapeno, &c. cum succis plantarum appropriatarum, nempe cum succis nicotianæ, mandragoræ, cicutæ, pryonis, radicis cumicis agrestis & similibus: nam, quod obiter moneo, singulare quid obtinent succi plantarum narcoticarum &c., imò ipsum opium pro talibus emolliendis tumoribus duri scirrholi partium abdominis, quibus & alia istis tumorebus appropriata socianda sunt, videtur DOERING Tract. de Opio cap. 5. Hinc emplastrum de Nicotiana est egregium: e. g.

R. Extract. nicot. per decoct. par. p. ij.

Opii in extract. redact. part. j.

Cum oleo balaustiarum solloquor. & pauca Cera.

f. Emplastrum.

ZWELFFERUS egregium Cataplasma ad scirrhus lienis ex nicotiana, describit in Pharm. Reg. Vir. Editionis p. 322. Hinc etiam in officinis prostant unguenta & emplastrum splenetica. Convenienter etiam usurpatur Emplastrum spleneticum Aquapenientis ex part. ij. gummam ammoniaci in aceto soluti, part. j. succi nicotianæ, part. ss. resinz & resbenthinæ & succi ebuli, cum oleo de capparis & sufficiente quantitate ceræ mistis paratum: item emplastrum de cicuta cum ana gummam ammoniaci in aceto destillato soluti mistum, quod super alutam inductum, & applicatum parti dolenti, non est inconveniens, malaxatum cum oleo succini.

Prostant præterea emplastrum alia de ammoniaco parata: item Emplastrum HEURNII, ex cicuta & gummam ammoniaco, quod describit SENNERTUS in Praxi lib. 3. P. 4. cap. 6. de Scirrbo lienis pag. 492., malaxatum cum oleo Philosophorum, succini, &c. Pertinet hoc Emplastrum Sennerti de cicuta, quod in omnibus tumoribus abdominis est egregium. Descriptio autem hæc est:

R. Herb. cicuta M. ij.

Flor. genit. M. j.

Gummam ammon. (quod est basis) 8℔.

Cuquantur in s. q. aceti destill. ad gummam ammon. dissoluitionem: Colaturæ adde

Succ.



*Succ. nicot. vera* lbss.

*Esula* 3iv.

Iterum leniter coqu. ad humiditatis consumptionem: tandem adde

*Resin. pini,*

*Terebinth. an.* 3ij.

*Syrac. calam.* 3vj.

*Myrrhe* 3j.

*Olei cappar.*

*Cera an. q. l. pro consistentia Emplastri.*

Facit hoc etiam *Emplastrum carminativum SYLVII* in *Praxilib. 1. cap. 14. §. 58.* quod in se etiam egregium est in hujusmodi affectibus, ubi externa opus est applicatione *Compositio* est hæc:

*R. Gum. galbani,*

*Edell.*

*Ammon. an.* 3ss.

*Opii Thebaic.* 3j.

Dissolv. in aceto destill. iterumque inspissa: adde

*Cera citr.*

*Colophon. an.* 3ij.

*Thuris,*

*Myrrhe rub. an.* 3ij.

*Bals. Peruv.*

*Ol. Philosoph. an.* 3j.

*Terra* 3ss.

*Destill. carui* 3ss.

*Terebinth. Venet. q. l.*

*M. pro Emplastri.*

Quod insignis habet vires in duris tumoribus partium abdominalis emolliendis & resolvendis.

Item *Emplastrum de ranis cum Mercurio Vigonis* dictis in casibus, in quibus sæpe altis, est egregium, qualia etiam variis scirrhis hinc inde abdominis tumoribus commodè applicari valent: Vel ad liquefendam & emolliendam pituitam viscidam:

*R. Gum. ammon. in aceto squill. solut.* 3j.

*Tacamabac.*

*Emplastr. de mucilag. an.* 3ss.

*Ammoniaci* 3ijss. vel 3ij.

*M. Lento igne coque in consistentiam Emplastri: S.*

*Emplastrum resolvens & emolliens.*

Extra in forma debita applicetur scirrhis vel hepatis vel splenis calidè, & præstat effectum speratum.

*R. Empl. de melior.* 3ij.

*Galban.*

*Gumm. ammon. in aceto sol.*

*Sagapen. in aceto sol. an.* 3ij.

*Tacamabac.* 3ss.

*Ol. destillat. chamomill.* 3ss.

*Cera gutt. v.*

*M. f. Emplastrum: S.*

*Emplastrum discutient.*

*R. Emplast. de ran. cum Merc. dupli.*

*Splenet. an. q. l.*

*Malaxentur cum oleo destill. succini aut alio.*

*Induc super alutam in forma debita.*

*Detur absque sindone: S.*

*Ut antea.*

*R. Empl. de ran. cum Merc. 3j.*

*Gum. ammoniac. in aceto sol. & insp.* 3ss.

*Opii in aceto sol. & inspiss.* 3ss.

*M. f. Emplastrum.*

*Malaxetur cum Oleo destillato juniperi vel Philosoph. S.*

*Ut antea.*

*R. Empl. de troscyam.* 3ss.

*Gum. ammon. vel galban.* 3ij.

*M. f. Emplastrum: S.*

*Ut antea.*

*Malaxari possunt talia emplastra usus tempore cum oleo destillat. succini, vel, quod melius, utur ingrati factoris, oleo destillato gummi ammoniaci, aut oleo tartari: nam quando destillatur gummi ammoniacum cum viridi æris, post spiritum volatilem prodire solet oleum empyreumaticum foetidum, sed penetrantissimum, quo etiam emplastra & vnguenta fiant admodum penetrantia. Loco hujus tamen in tumoribus duris, & ad scirrhum inclinantibus etiam oleum Philosophorum, saponis, vel cera potest recipi.*

Ante verò horum applicationem non incommodum fuerit, præmittereunctionem partis a pituita viscida infarctæ cum oleo laurino, nicotianæ &c., cum oleo destillato Philosophorum vel gummi ammoniaci sciendo permissis: item Unguentum Martiatum purgans commodè adhiberi poterit, dictis oleis dilutum.

*BARTHOLETUS* *Traët. de Respiratione* commendat *sinapismum humidum*, quo utitur in Lienis infarctu & ejusmodi induratione: Fit enim ex sinapi cum urina confusus & applicato instat *cataplasmatum*: Non est inelegans; nam sal volatile urinae potenter penetrat, unitum cum sale volatili sinapi seminis.

Hæc de Morbis ex Obstructionibus, aut veris, aut falsis & putatis ita dictis: Pergo ad

## SECTIONEM XIV.

D E

### PULMONUM, ET RESPIRATIONIS USU.

**C** Hylus sanguini permixtus in vena axillari sinistra, pergit in truncum venæ cavæ descendens, & ita in dextrum cordis ventriculum, ex quo per arteriam pulmonalem seu venam arteriosam in pulmones derivatur, & in suo transitu alteratur, ex pulmonibus verò per venam pulmonalem seu arteriam venolam transfertur in sinistram cordis ventriculum. Antequam autem sanguis ex dextro cordis ventriculo perveniat ad sinistram pro acquitenda debita sui perfectione, ac nova debite fermentationis fuscitabulo, ut abire queat in spiritus, prius alteratur per aerem respiratione attractum: ad id ut hæc respiratio sit tanti momenti, ut citra hanc perfectus, & pro corpore gubernando sufficiens sanguis minimè generari possit. Hoc ut fieri possit, dilatari debent pulmones, ut arteria pulmonalis sanguine infarcta mediante illorum dilatatione possit transmittere sanguinem in venam pulmonalem. Quæ pulmonum dilatatio cum non fiat in seculo, dilatati pulmones non possunt recipere eundem: propterea tota sanguinis massa transit partim ex venâ cavâ per ovale foramen in venam pulmonalem, & ita in sinistram cordis ventriculum; partim verò ex dextro cordis ventriculo ex arteria pulmonali per canaliculum arteriosum in arteriam magnam, ita ut sanguis non ambo cordis ventriculos per meæ simul in seculo circulatione, sed alterutrum: vid. *HIGHMORUS* in *Disquis. Anatom. &*

*SCHWAMMERDAM* *de Respirat.* Facit hoc experimentum anatomicum, v.g. si in pulmones ex corpore extractos flaccidos per venam arteriosam inspirator liquor, tunc nihil traiecitur; simul ac verò pulmones inflati continuatur, promptè per eandem venam injectus fertur liquor. Ut ergo traiecitur sanguis, dilatandi sunt pulmones. Verùm dilatatio ista fit ita, quod scilicet repleantur pulmōnes, quia dilatentur; non verò dilatentur, quia repleantur: i. e. aer irruens pulmones dilatat ac distendit, non verò pulmones distendi aerem hauriunt: ita ut dilatatione pulmonum & amplientur vasa, quæ recipiunt sanguinem, & amplientur vesiculae simul, donec aer irruens easdem distendat.

Dilatatio pulmonum immediatè sequitur motum Thoracis; de quo *MOEBIUS* in *Fundament. pag. 101.* item *HIGHMORUS c. l.* ubi & pulmonum motus aut thoracis est animalis, dependens à musculis, primariò à diaphragmate, secundariò à reliquis musculis thoracis, nempe triangulati subclavio & intercostalibus. Hunc thoracis motum ejusque dilatationem sequitur aeris ambientis propulsio, propulsi per os & nares in pulmones irruptio, & ita horum dilatatio: nam cum nullibi sit vacuum, sed omnia plena, necessariò ubique datur motus circularis. Conferatur hæc *SCHWAMMERDAM c. l. CHARLETON* in *Exerc. 8.*



## INSPIRATIONE LESA.

**A**eris illa in pulmones dilatatos susceptio seu Inspiratio larditur tribus modis:

- I. Quando omnino cessat & aboletur, seu plus minus deficit, seu suffocatur, ut fit in *Suffocatione dicta*.
- II. Quando non est sufficiens ordinaria hæc Inspiratio, ac propterea fit solito ac debito frequentior & celerior, & ita quasi *austa* in *frequentiore Respiratione*: de quo vid. SYLVIVS *Prax. l. 1. c. 81. §. 2.*
- III. Quando depravatur seu cum labore ac difficultate fit, ut in *Dyspnæa*.

## ARTICVLVS I.

## SUFFOCATIONE.

**A**bolitæ Respirationis seu suffocationis plus minus imminuentis causæ sunt multiplices, ex triplici tamen hauriendæ fonte, quatenus Respiratio seu aeris admissio & reciprocatio tollitur: vel

- I. Vitiū viarum, aerem non transmittentium, ut palati, gulæ, laryngis: vel
- II. Fit vitiū pulmonum vitiosè constitutorum, & aerem extrinsecus irumpentem, non admittentium: vel
- III. Fit vitiū musculorum & nervorum ad Respirationis negotium requisitorum, thoracem & consequenter pulmones & alias partes non legitime dilatantium ac moventium, & ita aerem non sufficienter impellentium; unde ob varietatem hujus motus varii defectus fiunt.

## MEMBRUM I.

## SUFFOCATIONE A VIIS INTERCLUSIS.

In specie de

## STRANGVLATIS, ET SVBMERSIS, ET INEPTI DEGLVTITIS.

**Q**uod attinet primam causam, nempe vias clausas, non admittunt hæc aerem, quando eas vel extrinsecus aliqua angustat, vel intrinsecus iisdem adhæret.

Extrinsecus sese offert in specie *Strangulatio*, quæ à laqueo injecto angustantur fauces & bronchia, & contracta larynge intercluditur omnino aeris transitus; quod fit in suspensis: in quibus notandum, quod subito si stringitur larynx, & angustantur vasa sanguifera, in momento omnis sensus & motus pereat, in specie sensus.

Ratione causæ extrinsecæ fit etiam *suffocatio* sæpe ob *submersionem in aquam*, partim quatenus aqua replet fauces & laryngem, partim quatenus impeditur aeris admissio: Nam in qui intereunt in aquis, partim intereunt propterea, quia non possunt attrahere aerem, partim quoniam aqua frigida pulmones vel replet, vel sanguinem præsentem coagulat, ut suffocati intereant.

Porro ad angustationes viarum pertinent *inmores in larynge collum*, struma internæ, inflammationes interoarum partium ad fauces pertinentium: siue sit inflammatio, siue tumor faucium, tonsillarum &c., siue sit inflammatio ac tumor musculorum laryngis & gulæ in angina, siue sint alii abscessus & tumores, in vicinia laryngis geniti, qui omnes laryngis dilatationem impediunt, & angustationes depetatas atque suffocationem inferre possunt.

Pertinent huc varia & multa ingesta, quæ vel quæcunque ratione in faucibus, siue in capite oesophagi ratione nimie molis, siue in larynge, hærentia occasionem præbere possunt, quò minus aperti queat laryngis simulæ siue epiglottidis, unde necessario sequitur suffocatio. Tales sunt boli grandiores, qui occupant fauces, & obstruunt bronchia, sic necessario inferunt suffocationem, si non occurrant salubres dum v.g. BARTHOLINVS *Centur. 1. Hist.*

& in specie in LAMSWERDE contra *Schvammendam* *Exspirat*.

Substantia pulmonum à Maipighio deprehensa fuit vesiculosa, quòd scilicet ea sit contexta ex copiosissimis parvis vesiculis angularibus, simplici membrana constantibus, & sibi invicem connexis, hinc inde etiam fibris morricibus procarum vel dilatationem meliori, vel contractione dotatis; quod necessarium; alias non fieret sanguinis circulus; quæ vesiculæ ab aere per asperam arteriam intrante inflantur & dilatantur, à contracto verò thorace denuò compressæ aerem receptum iterum remittunt: vid. BARTHOLINVS *Tractatu de Pulmonum Substantia* l. 1. *Motu*. Non enim sufficit, ut dilatetur semel, sed novus inspiretur aer necesse est: Hujus verò aeris portionem ipsam sinistram cordis ventriculum vnâ cum sanguine ingredi in viventibus, credit SCHWAMMERDAM citato *Tract.* item BARTHOLINVS *Centur. 4. Epist. p. 488. contra Highmorum Tract. sept. citato*. Aeris illa in pulmones dilatatos utruptio vocatur Inspiratio.

Necessaria admodum est Respiratio, cum hac deficiente omnia intereant animalia. Non tamen refrigerium cordis & sanguinis, aut hujus à nitroso aeris sale condensatio, aut similis alia circumstantia primarius ejus est finis, cum talia in calore viventium naturaliter constituta, aut in senibus vel cachecticis resercente, nullum locum inveniant: vid. MARCUS AURELIUS SEVERINUS *de Respiratione Pifcium*, & MALPIGHIVS *de Bonyce*.

Sed potius usum viæ nostræ simpliciter necessarium ær. Inspiratus sanguini præstat: id quod confirmat (1) pulmonis parenchyma vesiculolum, quasi officina aut sanguificationis, aut sanguinis renovationis. (2) Sanguis dum in pulmone est, ut de novo quasi vtitur intermedio temporis, dum ex dextro ventriculo cordis ad sinistram pergit, per intermedios pulmones pæus circulator; & (3) ut terrestria animalia pulmones habent, ita possident aquatilia bronchias, eorundem vicarias: Quæ omnia necessarium planè circa sanguinem per viæ cursam, Respirationis usum annunt.

Veniens ergo Respirationis usus esse videtur, quod nempe aer inspiratus & sanguini permixtus necessarius sit ad eam, sanguinis vitalem restorationem, & aliam ejus perfectionem, quam in præcordiis acquirit, & cujus gratia continuato motu per pulmones, tanquam instrumentum, fertur: nempe hinc Inspirationis Vtus est, ut attenuet, resolvat, h. e. volatilifet sanguinem, ut ita hic & promptius spirare possit, simulque aptius reddatur pro omnimoda sui, sine ulla capitis morbi residentia, per poros diffusionem: conf. ROCHAS *de Aquis Mineralibus cap. 1. de Aquis sulphureis*, & BOYLE *de vi æris elastica*. Facit hoc aer ratione salis sui universalis, dissolvens texturam sanguinis telum sulphuream, eamque dissolutam ita rarefaciens, ut hinc promptè in spiritus volatiles vitales aereosalinos abeat: simul etiam ratione dissoluti & cum salibus volatilibus agitati sulphuris insignem istam in sanguine exalescentiam excitat: vid. HOCK. in *Micrographia*, ubi de Carbonibus: adeo ut rectè afferat WILLISVS, aerem inspiratum sanguinem primario incendere. Conferatur hic quod *suprà de spiritibus dictum*: vid. WILLISVS *de Incensione in Respiratione ad Highmorum in Dissert. de Accensione Sanguinis*, Et EDHAM *de formato senu in cap. de Bysichu. contra Willisum*. Aer enim mentiri vicem obtinet ad corpora sulphurea comburenda, resolvenda: vid. HELMONTIVS *Tr. Blas humanum*. Hinc primario Respirationis fini & aliis secundariis accedunt, ut:

- I. Promotâ sanguinis circulatione per pulmones, hinc omnia ea, quæ rapidiorem sanguinis reddunt circulum, etiam crebriorem & altiore procurant Respirationem.
- II. Fuliginum ex præcordiis sub expiratione exclusio.
- III. Fæcum alvinarum, ut & fæcus ex utero excretio.
- IV. Excrementorum ex pulmonibus per tussim rejectio expirando.
- V. Vocum prolatio beneficio laryngis, quæ instar fistulæ Musicæ seu pnedatæ per expirationem vocem format.

Duplici autem actu constat Respiratio: Inspiratione & Expiratione. Si pulmo ab aere intrante dilatatur ferè, & aer comprimit substantiam pulmonalem, fit Inspiratio; Expiratio verò, quando iterum aerem elidunt.



*Hist. Anom.* 11. ex subito deglutitæ linguæ bubulæ frusto suffocationem subitam notavit: sic FORESTUS *lib. 15. Observat.* 28. refert non nulla talia exempla ex comestione bolorum majorum suffocatorum; ut quidam ex frusto carnis fumo indurata in gula hærentis; quidam ex frustis pomorum non rite masticatis, suffocatus ferè fuerit; alius ex frusto tabaci &c. Quæ internè hærentia, ratione irritationis sensibilissimæ difficilem Respirationem, aut pertinacem ab epiglottide clausuram efficiunt, & ita suffocationem inferre possunt. Pertinet huc inepta Deglutitio rerum majuscularum, vel epiglottide nimis elevata in asperam arteriam irrumpentium, quale quid inter ridendum & loquendum deglutientibus interdum contingit, indeque unum vel alterum arteriæ asperæ ramum obstruentium, & suffocationem inferentium: hinc suffocatio à deglutito phaeolo in asperam arteriam illabente refertur in M. A. N. C. *Anno 2. Observat.* 153. pag. 240. Sic SCHENKIUS *lib. 2. Observat.* refert de matrona nobili, sumptura piulas, quarum unam in asperam arteriam atraxit, & inde ferè suffocata fuit. Plura videb. l. c. & MARCELLI DONATI *Hist. Medic. mirabil.* In genere quicquid laryngis & Epiglottidis motum debitum ac dilatationem impedire potest, suffocationem minatur; unde etiam pilli Epiglottidiculi involuti strangulationem inferre possunt. Confer. FORESTUS *lib. 15. Observat.* 28. vid. BARTHOLINUS *Cist. Med.* pag. 524. Sic ex uvæ acinis alii suffocati fuerunt: suffocationis ex pyro crudo improvidè deglutito mentionem facit RHODIVS *Observat.* pag. 92. Facit huc etiam polypus narium, ubi caro fungosa excrevit in intimis narium, qui interdum nimis excrefcens non tantum nares obstruit, sed interdum quædam crura in fauces protendit; unde non leve suffocationis periculum imminet: de quo *de ejus Cura suo loco* plura habebimus. Sic à struma, internè circa jugulum abscondita, suffocationem observat PLATERUS *lib. 1. Observat.* 172. Pertinet huc rarus casus, dum ex prolapsu palati repentinam & periculofam suffocationem imminere notat TVLPIVS *l. 1. Observ.* 38.

Hæc est prima causa, quando vitio vjarum sic suffocatio.

### DIAGNOSIS.

Quoad signa: suffocatio si oriatæ à viis interclusis, res est facilis, & per se patet.

### PROGNOSIS.

Prognosis sub aquis suffocatorum omnium optimè explicat ALBINVS in *Tr. peculiar.* Nempè spes restitutionis deficit:

1. Si sanguinem ex ore vel naso emittunt.
2. Si os habent apertum instar moribundorum.

### C V R A.

Quoad Caram: variat hæc pro Causarum antecedentium ratione.

Quando vix sunt affectæ, quæ non transmittunt, tunc impedimentum ex viis est auferendum: sic v. g. suspensio laqueus solvendus, vena secanda, Frictiones artuum instituentæ, spirituosæ liquida infundenda, in loco calido reponendi: Conf. Methodus Revivificandi ludræd vel terid suspensos in W. PFFERO, *Tract. Observationum de loco affecto in apoplexia* pag. 182, ubi elegans refert exemplum de ancilla, quæ per unum diem suspensa fuit Oxoniæ: item BARTHOLINVS *Cent. 2. Epist.* 96. p. 717., HORSTIVS *lib. 2. Observat.* 9.

Sub aquis suffocati, ut ex orci faucibus revocentur & restituantur, docet HELMONTIVS *Tract. De mens. Idea* §. 50. item BARTHOLINVS *Cent. 6. Hist.* 68. Nempè elatis pedibus, inclinato corpore, conuulsiendi sunt, ut hausta aqua citius maturè; vel reponantur supini inclinato capite percutiendo pedes, & ita revocando quantum possibile vitam. Hinc encheiresibus addatur *methodus* BORELLI, qui suffocatis talibus panis assæti micæ pititu vini calide imbutas admovent, easque læpius repetit; & hinc, ubi reviviscere incipiunt æger, pro alteratione corporis interna corrigenda, propinentur sudorifera spirituosæ: vel imitemur FORESTVM *lib. 15. Observ.* 26, propinando calidè decoctum florum chamomillæ in cerevitha factum, evocando in lecto sudorem; qui ipse etiam *cit. loc.* puellam duorum annorum in aquam saponatorum delapsam ferè moturam

leni vomitu curavit. Plura de Submersis conf. M. A. N. C. *Anno 6. l. 7. Observat.* 20. pag. 30. *Observ.* 75. pag. 104. *Observat.* 76. pag. 108. *Observat.* 89. p. 129. *Observ.* 125. pag. 162. & *Observ.* 130. pag. 173.

Quando in faucibus hærent boli, istorum descensus promouetur concussione in dorso, ubi est via œsophagi, ac propinentur & lubricantia, ut oleum amygdalarum dulcium, quod assumatur in aqua appropriata, & mucilago seminis cydoniorum. FORESTVS *loco supra citato* frustum carnis fumo indurata in gula hærens lentè deglutitione Cassiæ, cujus beneficio lubricatum fuit œsophagi iter, ad ventrem promovit: sic suffocationem imminuentem ex frustis pomorum non rite comminutis per lambitionem oxynelis squillitici, incisis sic frustulis, & spontè ad stomachum delabentibus.

Præ cæteris observatum est à FORESTO, quod ex potu Aquæ fortis fauces ferè occlusæ, exhibitâ mucilagine seminis cydoniorum lambendo deglutitæ, curatæ sint: Vel in grandiori malo imitemur PLATERVM *Observ.* pag. 386., qui ex officulo gulæ infixo, unde dolor & ardor & per consensum laryngis spiritus angustia, per Cataplasma maturans & suppurans applicatum, factâ suppuratione & cum pure officuli excretionem procuravit. Si hoc non potest fieri, maturè res est extrahenda instrumento chirurgico, vel promovendus est vomitus artificialis, successivè medicamentum lambendo, vel vomitus naturalis digitis. Si res deglutita hæreat in larynge, aut bronchiis aspera arteria, maturè excitanda est tussis, vel promovenda violenta sternutatio, ut sic ista res ejiciatur ab irritatione, & provocetur vomitus, ut hujus conatu ejiciatur res per fauces.

### M E M B R U M I I.

#### D E

### SUFFOCATIONE EX GAS VARIARVM RERVM.

**S**ecunda suffocationis plus minus imminenti Causa est in pulmonibus infarctis, aut aerem irrumpentem suffocantem non admittentibus: quod pertinet non tantum variis mucus viscidus pulmonum bronchia obstitens, ut in Asthmate confirmato; item excrefcens in pulmonibus natæ aeris introitum impediens. In specie tamen subitanea suffocatio interdum unminet vitio pulmonum, quando sanguis quacunquæ ex ratione vitiosè stagnat, & serum impeditur in pulmonibus, eosque nimis replet, & ita Respirationis negotium insigniter impedit, ut angustia tales suffocantes consequantur: sic PANAROLLVS *Pens. 1. Observat.* 13. exemplum habet suffocationis oriatæ ex nimia sanguinis abundantia, & ita nimia venarum turgescencia à sanguine copioso ac turgido, à quo sanguis per pulmones motus fuit impeditus. Ad suffocationem propter pulmones eventientem etiam refertur solent illæ frequentissimæ, quæ ex exhalationibus seu Gas Sylvestri, ut rectius vocat HELMONTIVS, Musti ac cæteris, aliorumque liquorum fermentantium & effervescentium, ac pariterum recentium à calce viva recentier incrustatorum, animalibus imminet: Item quæ ex inspirato fumo carbonum accensorum, item ex Gas metallicis in metalli fodinis originem ducunt: Item quæ ex puteis & cryptis subterraneis, latrini diutius oclusis, ex fornibus lutanatrum diutius oclusis &c. tubandè exhalant: quò etiam faciunt haustrodores, fumi minerales acidi volatiles, ut antimonii, sulphuris incensii, spiritus vitrioli, aquæ fortis, & uniles fumi aut vapores, ut potè quæ omnia subitanè plus minus suffocationem, vel ejus saltem periculum inferunt. Exempla quamplurima obvia sunt: De Gas ex fermentante musto & fermentante cerevisia suffocante res nota est; In cellis enim vinariis, quando fermentat cerevisia recens, & efferveicit mustum, si quis ingrediatur cum faculis ardentissimis, ut illas extinguat, ut ne scintilla remaneat.

Quæstio jam est: quæ ratione talia Gas vegetabilia vel mineralia, seu sumi exhalantes, tam subito animalia quacunquæ jugulent ac ardentissimas facies extinguant? an sanguinem in præcordiis afficiendo, & ad sui coagulationem & consequentes stagnationem in pulmonibus disponendo, ut ut agri catarrho suffocativo sanguineo intereant? an verò hi ipsi fumi & Gas saltem spiritus vitales & animalis efficiant? quos vel instar candela extinguendo, Narcotiis stu-



pore afficiendo ad regimen corporis ineptos reddant, unde aegri quasi apoplectici in creantur. *Præparatus & factus pulvis* dicitur. *Sc. H. NEIDERUS l. 2. de Catarrhis c. 1. l. 2. Sect. 2.*, ubi confirmat suam hypothesin, quod nos ipsi percipimus, hauriendo tales fumos styphes, angustiam in thorace, & præcordiis, & subitâ diffinitionem Respirationis, quibus perceptis non turbetur statim caput, sed prius pectus: ubi nonnihil ad se redeunt, plerumque vomitu exercentur, & mucosa multa sponte vel arte ex naribus & ventriculo rejiciuntur: & in specie, quod ægros ita affectos post curationem nunc pleuritis, nunc peripneumonia, nunc tacecines, nunc febres, nunc tabes, atque similia symptomata, ut plurimum cum spuma circa os, & sanguinis & pulmonum notata, infecta sint: ut etiam simul lethargus vel apoplexia invadat, aut ad se redeuntes delirent interdum, non tamen esse signum prius affecti cerebri, quin potius spiritibus vitalibus, his fumis imprægnatis, ad cerebrum promoris supervenire tale symptoma, non verò proprium morbum constituere: cum quo conf. *SCHENCKIUS in Obser.* quas habet ex *PARÆO*. Posteriùs vero *HELMONTIUS*, alique defendunt. Multi, quos inter & *MARCELLVS DONATVS*, volunt imprimis affectum esse cerebrum. Fundamentum erroris est in eo, quod putarunt veteres, Respiratione attrahi aërem in cerebrum per os cribri forme, dicunt ergo, hos fumos per nares attrahi & promoveri per cerebrum, atque ita spiritibus animalibus lethargicos inferri affectus. Helmontii hypothesin confirmant adjuncta symptomata, nempe à tali Gas inspirato affecti caroticorum vel apoplecticorum instar se habent, & primò vertigine caducâ seu tenebrosâ correpti concidunt; hinc instar demoriturorum absque pulso, aut saltem vix sensibili, totî frigidi, quasi syncope correpti, jacent; hinc & vomitus subinde in principio adest; excitatis verò nunc lethargus, nunc delirium restat, modò ex somno provocantur, evigilant quasi somniantes.

Ex his duabus hypothesibus posterior magis probabilis videtur, ut utro modo cum priori conciliari debeat, cum non improbabili videatur sententia, reverà suffocari ægros tales, & ex alteratione subitanea sanguinis per pulmones circulandi, hinc spirituum vitalium inchoata extinctione, & continuati radii cum spiritibus animalibus interceptione, omnia ista mala oriri videantur. Reverà ex una parte suffocationis subitanæ, ex impedito sanguinis tam fermentativo quam circulatorio motu, videtur species; ex altera tamen parte affecti sunt spiritus animales, & consequenter systema nervosum. Et reverà apoplexiam, & quidem positivam, prout *HELMONTIUS* eam in *Tr. de Leth.* distinguit, refert symptomatum concursus, cum apoplecticorum instar & jaceant, atque in vitam revocandi sint ægri: Nempe, sicut Gas tale in momento mirabiliter extinguit ignem quemcumque candela aut facis, ut ne scintilla supermaneat, destruendo activitatem spiritus seu salis nitro-aerei, à quo conservatur ignis & flamma: (Gas metallicum extinguit lampades metalli fustorum, ut ne vestigia maneant: si fossiles hoc vident, avolant, ne pereant; dicendo: *Vapor insurgit*;) ita simili ratione tale Gas inhibet alterationem sanguinis ab aere inspirato, beneficio illius salis inducendam, unde subitaneæ fermentationis sanguinis defectu universum spirituum tam vitalium, quam animalium, systema turbatur, & in fonte quasi eclipsi patitur; simul tamen certo stupore afficitur, & narcosi quasi papaverinâ inquinatur. Spiritus generantur in nobis per fermentationem mediante aere cum accensione, ut enascatur Gas latum volatile luminosum, quod vocant spiritus, qui à Gas extincti aut inquinati inferunt partim suffocationem, partim apoplexiam sanguineam positivam: vid. *SCHENCKIUS*. Confirmat hoc & carus; tales enim planè carotici jacent vel apoplexiâ infecti. In specie tale Gas inspiratum gignit ventriculum affligit, & ejus occasione vertiginis, & similia capitis symptomata inducit. Illustrant hæc ea, quæ in specie habet *MAYOW Tr. de Nitro, & spiritus nitri aëreo cap 7 & 8* & *BOYLE in sua machina*; partim nempe aeris ad ignem & vitam animi munus esse necessitatem; & ut aeris alteratio aut defectus subitò ignem extinguit, ita etiam vitam tollit: quòd cum sit ob æris vitium, reverà ob respirationem plus minus vitiatam tales ægros simul lædi apparet. Percipiunt tales ægri angustiam præcordiorum quasi suffocationem mox in principio, non quasi aër crassus pulmones nimis repleat, aut ex crassitie respirationi ineptus sit; sed mox videantur extingui spiritus animales, & suffocari taliter affecti; quoniam ex hostili præsentia aeris

*Etmüller. Opt. Tom. II.*

vitiatu inspirati pulmones & thorax se stringunt, ac minus pro admittendo aëre se dilatare volunt: hinc mox sub primo talis aeris inspiratu pectoris angustia; vitiatu postmodum sanguinis fermentativo motu, ac superveniente hinc spirituum vitalium subitâ eclipsi, adeoque syncope, etiam spirituum animalium deficientia in motu, indeque vertigo, sensus & motus abolitio oritur, propter interruptum summè necessarium radiosum spirituum nexum, pari ratione atque suspensis eo ipso, quo contriunguntur carotides, mox eadem symptomata superveniunt, propter interceptam spirituum continuitatem. Interim tamen adhuc dubium restat: *quomodo hoc Gas inspiratum sanguinem in pulmonibus atque spiritus animales auferat?* Sane Gas hunc motum fermentativum sanguinis, instar motus ignei, mox extinguere, spiritus animales figere, manifestum est: sed quâ vi hoc præstet? quaeritur; nam sanguinis coagulatio, quam alii hic inculant, minus satisfacit. Sane Gas ista omnia sunt naturæ volatilis sulphuræ, unde obtundunt & bebent vim salis nitro-aerei, à quo ut conservantur flammæ, ita conservatur fermentatio & spiritus ascensiva vitalis in præcordiis. Quod Gas tale sit quodammodò de naturâ sulphuræ, patet ex carbonibus, quorum incensorum sulphur, minerali simillimum, beneficio lixivii & alcali fixi eliciendum, dissolutum exhalans Gas hoc constituit. Ita Gas metallicum aut minerale, fossiores inquinans, præter odorem sulphureum, quem spirat, arsenicalis ab omnibus dicitur esse naturæ, quod arsenicum crudum & Volatile metallorum sulphur est.

Quod denique Gas ex cerevisia vel musto, aliisque liquoribus fermentantibus, exhalans, etiam sit sulphuræ volatilis naturæ, patet ex affectu inebriativo, soporoso & carotico, quem infert ægris, quasi spiritus vini uberius se ingurgitasset, qui spiritus Vini sulphuræ naturæ est cura contrarietatem. Ab hoc sulphure volatili etiam vis narcotica Gas horum inspiratorum deducenda videtur, siquidem & narcosis opii in ejusdem sulphure volatili fundata est; sicut tales per Gas exhalans affecti, non secus ac affectus per opia nimita inducitur, per castoreum curantur. Hæc demonstrent, quod ejusmodi Gas polleat vi sulphuræ illoperactivâ, unde partim apoplectici, partim suffocati intereunt tales ægri, & magis sunt affecti spiritus animales.

## C U R A .

Contra hæc mala, vel imminencia, vel etiam jam affligentia, nempe contra Gas aut tales fumos inspiratos, fumum nempe carbonum, aërem cellarum aut putcorum, duo primatum oblinent: nempe acetum & castoreum. Notum enim est, quod acetum quibuscunque narcoticis, ipso etiam opio, sit contrarium, eorumque correctivum, non se us atque castoreum, adeò, ut referat *NARDIUS in Notis Genial. Not. l. pag 76*, quod à fumo carbonum tumolentia solo calido vapore aceti naribus suscepto, fuerit curata. Hinc acida admoveantur naribus, acetum sc. rosaceum, rutaceum, aut simplex cum castoreo, aut aqua hircinum cum castoreo: vel fiant Noduli ex nigella & semine majorana, quæ infunduntur aceto, & applicentur naribus; illic fricantur teporâ; aut infunditur in os unum alterumve cochlear acetum; item imponatur emulsioma ex aceto icoto & testibus. *Acetum Vitrioli benedictum* secretum fuit *D. LANGLI* ex vitriolo artificiosè calcinato, & cum aceto destillato extracto, quod expertum est in morbis soporosis, lethargico, caro, cataphora, & similibus catarrhosis affectibus: interdum in affectibus ex fumo carbonum & Gas Sylvestri suffocatis extulcandis.

Talibus ergo ægris, præmissis in specie vomito, idque ed potentiori, quò magis caroticorum aut apoplecticorum instar jacent, infundatur acetum, & cum aceto quocunque parata remedia; idque cochlearim; vel etiam acetum castoreo mistum, vel acetum infusionis castorei dicto modo usurpatur, quod in talibus suffocationibus à fumo carbonum & cerevisia effervescente est egregium. Non autem convenit in suffocatione à Gas minerali, sed tantum vegetabili: Scilicet, ubi haustum Gas sylvestre, & malum gravius, infunduntur Vomitoria liquida commodè cum spirituosius, cum spiritus theriacali, simplici aut camphorato, aut Aqua apoplectica, aut essentia castorei, aut similibus mista; ut simul extinguatur Gas malignum & ejiciatur: nam mirum est, quantum exerceant ægri per vomitoria: Si nul etiam sternutatoria insufflenda naribus. Item in aërem exportandi sunt ægri, os diducendum, con-

M unud



nud ventus faciendus, facies crebro aqua frigida adpergatur, hinc acida & Castoreina conducunt. Castoreum enim conveniens est in corrigenda cruditate & virulentia opii, in quo est tale sulphure natronicum, ut in sulphure carbonum, & in effervecentium vegetabilium fumis & vaporibus: similiter incidit sanguinem congruatum; copioso enim tale volatili est imprægnatum: v. g.

*R. Aqua Hyssopi 3ij.*

*Acess. Theriac. 3ss. vel 3vj. ad 3j.*

*Castor. 3ss. ad 3l.*

*M. D. S.*

*Potio ad caput sublevandum.*

Cochleatim assumatur, præmisso vel sublequente vomitu.

An largi Venæ sectio conducatur ad imitationem Panarollæ ferè dubito; nisi forsitan in plethoricis aut obessoribus, in quibus natura tardior est sanguinis motus, pro quo melius promovendo conducit seu locum invenit vid. Panarollus citato loco. Plura de his videb. in SENNERTO l. 1. *Prætex.*, ubi de caro. p. 636., item SCHENCKIO ex Parac. p. 217. l. 2. *Observat.*

## MEMBRUM III.

### DE

## SUFFOCATIONE CONVULSIVA.

**T**ertia denique causa suffocationis hæret in nervis & motu spirituum animalium, non moventibus musculis, thoracis aut laryngis motu dicatos: Hinc etiam fortè apoplexiæ tacti non tantum instar strangulorum suffocati intereunt propter deficientem thoracis & pulmonum motum; sed præterea quoque in syncope & similibus pathematis, deficiente sanguinis & spirituum in pulmonibus motu. Tandem propter nervorum cessantem motum ex spirituum animalium defectu lethalis suffocatio supervenit, quando ex resolutione nervorum paralytica cessat partium respirationi inservientium motus; è contra suffocatio imminet ex spasmus aut convulsione musculorum & nervorum, respirationi inservientium: ver. gr. dum mulieres hysterice, aut viri hypochondriaci (perinde namque hoc est, uti *babebimus suo loco*) interdum suffocari videntur, in quibus nervi parvi vagi ac intercostales spasmus affecti, qui, uti omnia viscera interna abdominis, ita in specie musculos thoracis ac laryngis constringunt; percipiunt etiam tales ægri angustias faucium, quasi laqueo strangularentur, idque ex convulsione seu spasmus musculorum, laryngem imprimis, & hinc diaphragma moventium, quibus convulsis larynx stringitur, & epiglottis clauditur, unde tales ægri plus minus suffocantur; quæ structura nihil aliud est, quam convulsio musculorum & partium nervosarum.

Quod talis suffocatio imminens sit ex nervis, rectè hoc derivat exinde WILLISIUS in suis scriptis, imprimis in *Anat. Corpor. cap. 10. & in Description. Nervor. cap. 26.* ubi rectè quamplurima (non omnia) mulierum hystericearum symptomata à tali nervi intercostalis spasmus & contractura deducit.

Nec solus WILLISIUS statuit hanc convulsione, sed reperitur etiam in SOLENANDRO *Conf. 24.* de difficili & periculosissimo affectu in musculis laryngis & aspera arteria, ubi sæpius imminet suffocatio, idque, uti rectè decedit & differt, ex convulsione laryngis; uti similiter singularem laryngis convulsione, & inde natam suffocationem, habet BARTHOLINUS *Cent. 4. Epist. 77. p. 414.* In paroxysmis epilepticis, item virorum hypochondriacis sæpius imminet periculum suffocationis, quod subito perit & redit: suntque hæc mala cognata admodum Asthmati convulsivo, (de quo inferius:) subito ut dico accedit, & recedit, sine omni materiz sensibilibus accessione & recessione; nempe in talibus casibus semper affecti sunt nervi, ique vel laryngem vel diaphragma moventes. Pertinet hæc, quando ex Venenis nonnullis assumptis, in specie ex fungis, ob id dictis strangulatoris, que nemodum præstant exempla, subito oritur suffocatio: Nam & hæc similiter ex affectis Nervis, indeque laryngis & diaphragmatis convulsione oriri probabile est. Facit hæc etiam singularis *Observatio PLATERI in libr. 2. Observ. pag. 171.* de imminente suffocatione ex coitu, de rustico alias robusto & sano, qui, quoties cum muliere rem habuit, semper in suffocationem quasi lethalem incidit: imò

ipse aliquando fuit in re hæc domestica adeo sedulos, ut in ipso actu animi un exspiravit. Notum nunc est, quod *Coitus* rectè appelletur *Epilepsia parva*, propter quali convulsionem quandam in tali actu, quo afficiuntur nervi; unde ex simili convulsivo affectu nervorum, thoracem moventium, talem suffocationem in coitu natam fuisse, probabile est.

Hæc sunt suffocationes convulsivæ.

## SIGNA.

Quoad signa sunt petenda ex eo, quod simul alia coincidunt symptomata, quæ mulierem vel hystericam vel marem hypochondriacum ostendunt: item, quod huiusmodi suffocationes paroxysmatim repetant, nec continuè affligant, ex levissima causa redeant, & sine materiz cuiusdam tenuis excretionem denud cessent.

## CURA.

Pro Cura talis suffocationis convulsivæ in Paroxysmo eadem in genere convergentia remedia, quæ in passionibus hystericis, aut affectibus epilepticis in usu sunt: quæ inter eminet Castoreum, essentia castorei, castoreina & salia volatilia, in specie liquor Corn. Cerv. succinatus, spiritus salis ammoniaci simplex & amicus, sal Volatile succini, & etiam Oleum destillatum succini, item salia volatilia cum camphora, & ipsis sociata opiata: uti *imposuerim audietis cap. de Asthmate Convulsivo*, & videbitis in WILLISIO de Morb. Convuls. p. 214.

*R. Aqu. Mentib. vel pulegii vel alius appropri. 3ij.*

*Ess. castor. 3ij.*

*Opii 3ss.*

*Spiritus sal. ammoniaci 3j.*

*M. D. S.*

*Potio ad respirationem.*

*Vel*

*R. Aqua Mentib.*

*Flor. sambuc. an. 3jss.*

*Spiritus sal. ammoniaci 3jss.*

*Essent. opii cum alcal. par. 3ss.*

*Syr. cort. c. aurant. 3ij.*

*M. S.*

*Potio ad respirationem.*

*Detur cochleatum.*

*R. Aqua Mentib. 3ij.*

*Spiritus carminat. de trib. 3ij.*

*Lapill. Cancr. præp. 3ss. vel 3ij.*

*Laudan. hysser. 3ss.*

*Syr. cort. aur. 3vj.*

*M. D. S.*

*Potio ad respirationem.*

Sin ex fungis sit malum, horum Alexipharmacum est oxymel quilliticum, vel solum vel cum theriaca propinandum, præmisso pro circumstantiarum ratione vomitorio. Conf. defungorum medela TIMÆUS Von Gulden Klee in *Cas. p. 311.* item PANAROLLUS *Pentec. 3. Observ. 45.* aliisque Conveniunt etiam spiritus camphorati, spiritus theriacalis camphoratus, &c.

## CAPUT II.

### DE

## RESPIRATIONE DEPRAVATA.

**L**æditur II. Respiratio, quando eadem depravatur, ita ut nimis crebra, difficilis, laboriosa, ac non tardè cum angustia conatu & anxietate, ac in qua subinde imminere videtur suffocatio, perficitur, nempe in *Dyspnœa*, cujus prius gradus dicitur aliàs *Anbelatio* simpliciter, & sit. si ægri frequentius & crebrius respirant, qualis Respiratio eorum, qui diuturno cursu defatigati sunt. Secundus gradus dicitur *Anbelius asthmaticus*, si frequentè ac tum mo cum labore respiratio ducitur, ut nisi fiat, suffocatio imminet: qui ubi adeo ingravescit, ut ægri non possunt amplius supini jacere; sed coguntur *sedens* ten erecti respirare, sublati alis & admodum expanso pectore, oritur tertius & deterius gradus, qui *Orthopnœa* vocatur: de quorum Orthopnœicorum erecta respiratio HELMONTIUS



**TIUS** *Tract. Tussis & Asthma*, item *Catarrh. Delirium* §. 45. *Lir. P.* Nam simul ac tales Orthopnoici incumbunt in dorso, imminet suffocatio: simul ac vertere recti respirant, levamen percipiunt. Omnia autem hæc in genere Asthmatis nomine vocabo.

## ARTICULVS I.

## DE

## ASTHMA TE.

**H**istoria Asthmatis hæc est: scilicet adest in omni asthma respiratio frequens, eaque laboriosa & difficilis, cum anxietate circa præcordia, ut anxiosi nesciant, ubi levamen possint percipere: adest sæpe tussis, interdum crebra & molesta; interdum non, interdum adest stertor, interdum sine omni stertore Orthopnoici laborant.

## PARS AFFECTA.

*Subiectum & Pars affecta sunt pulmones.*

## CAUSÆ.

Cum autem asthma sit multiplex, ideo *Causa proxima* omnis *Dyspnœia*, & *Orthopnoia* est deficiens admissio & receptio aeris, propter expansionem & constrictionem vesicularum plus minus de scientem, quæ insigniter impedita respirationem tollit, & hinc anxietatem & angustias, ut & suffocationis periculum infert; sive pulmonum, sive thoracis, sive aliarum partium impedimento hoc ipsum eveniat. Notum namque est, quando expanduntur & constringuntur debite pulmones, tamdiu esse respirationem liberam; simul ac verò aliud impedimentum se offert, adest difficultatem respirandi, anxietatem & similia, nec legitime sanguinem circulari.

Veteres, multique ex modernis, unam saltem asthmatis speciem sibi concipiunt, ab obstructione & compressione bronchiorum dependentem; & si sine manifesto pulmonum infarctu Asthma contingat, vaporibus & flatibus, ab aliis visceribus ascendentibus, hoc tribuunt, sicut SYLVIVM quoque egisse, ex *Scriptis* ejus constat. Pro diversa tamen caute morbozæ natura, ejusque diverso situ, HELMONTIVS *Tr. Tussis & Asthma* §. 18. Asthma dividit in *humidum* & *siccum*, WILLISIVS in *Parob. Cerebri* in *pneumonicum* & *convulsivum*; imò ex his duobus *mixtum* addit: vid. *Pharm. Rat. P. 2. b. 1. c. 12.* Melioris ergo doctrinæ gratiâ in genere secundum citatos hos Autores, qui primi nobis in hoc puncto oculos aperierunt, dividam in *humidum* & *siccum*, seu, ut aliis vocantur, in *Asthma manifestum* & *occultum*. *Asthma humidum* seu *manifestum* est illud, quodâ materia quadam viscosa fovetur, ut ab ejus præsentia, motu ac occasione oriatur, ab ejus verò excretionem, aut vomitum, aut quocunque modo facta remotione & promotione, idem cessat. Inde etiam tale asthma humidum frequentius conjunctam habet tussim, simul stertorem, expectorationem conjunctam & scretum, sed tamen non semper. Dantur enim asthmata humida, ubi nec tussis nec scretus adest, sed conqueruntur de difficili anhelitu interno, interdum ceris quibusdam paroxysmis exasperatur: Interim tamen, si imminet paroxysmus, fit successivè, & ægri percipiunt longè ante paroxysmum ex coarctata materia peccante; dum cessat paroxysmus, fit cum sensibilibus materiæ peccantis remotione & excretionem. *Asthma* verò *occultum* seu *siccum* est, quod citra præsentiam talis materiæ, frequentissimè ex sola convulsione partium thoracis & pulmonum motui inservientium, in specie diaphragmatis, oritur, unde & sine sensibilibus materiæ excretionem cessat.

Primum *Asthma*, *manifestum* seu *humidum*, ratione loci & loci morbozæ, est duplex: nempe oritur interdum ex *pulmonibus*, hinc *Asthma pulmonale*; interdum, aut quidem ferè lapsus, oritur ex *stomacho* & *primis viis*, estque *Stomachale*. *Asthma humidum*, quod fit ex *vizio pulmonum*, est multiplex: frequentior causa est muco crassus vitidus, tenax & mucilaginosus, quem alii vocant *pituitam viscidam*, nunc salus, nunc acidus, nunc insipidus, ex deficienti naturali, & depravata præternaturali pulmonum nutritione natus, qui ipse successivè in proprio pulmonum parenchymate, maxime in bronchiis eorum, coarctatus, & hæ-

*Etmuller. Oper. Tom. II.*

rens, non raro impedit aeris ingressum & egressum, & ita vitiat pulmonum dilatationem & constrictionem; vel pus in vomica, abscessibus pulmonum, empyemate, phibis; vel serum copiosius inundans pulmones; vel sanguis in motu per pulmones plus minus impeditus, vel ob abundantiam, vel ab acido coagulationem, vel ob nimiam turgescenciam & quasi ebullitionem, vel ob vitium Cachecticum. In stomacho & in primis viis est vitium, si muco crudo & inde natis flatibus obsideantur; item si ab hydropse abdomen nimis occupetur.

*Siccum* seu *Occultum*. *Asthma* fit vel ratione conformationis in gibbosis; item ob cruda tubercula, grandines, calculos, &c. bronchia obidentes; ob deglutita pulmones obstruentia; item propter deficientem pulmonum nutritionem, indeque horum corrugationem & exsiccationem, seu ratione convulsionis nervorum & musculorum respirationi inservientium, diaphragmatis, laryngis, aliorumque, vel denique ratione fibrarum propriarum pulmonum nimis strictarum ac contractarum, vesicularum dilatationem impediendum; idque coincidit cum *Caduco pulmonum* HELMONTII. Specialius paulò hæc explicanda veniunt: *Asthma*, quod fit ex *vizio pulmonum*, & ut plurimum intelligitur sub Asthmatis mentione, est vel *perepigenesin*, vel *per metastasin*; per *vitiata* vitio nutritionis propriæ depravata; per *peritum* vitio materiæ ex sanguine, vel immediate vel ex alio loco mediante sanguine aut lymphâ ad pulmones depositæ.

Per *vitiata* igitur fit Asthma, quando vel vitio aeris aut vitio aliorum inspiratorum, v.g. in metallifodinis fossoribus, vel alia quacunque ratione, irritatur larynx & aspera arteria, ita ut exinde harum partium lædatur digestio, & nutrimentum proximum degeneret in liquamen serosum mucosum, aliâque ratione corruptum. Præter inspirata etiam lymphæ consideranda est, quæ uti continuè humitæ etiam asperam arteriam, ita, si ab aëre inspirato aut quocunque ratione lædatur, excorietur, aut aliâ viâ vitietur, in specie, si aeris, falsa, aut plus minus acida reddatur, acrimonia sua erodendo pulmonum teneram substantiam, nutrimentum ejus depravationem, & ita succorum crudorum ac mucilaginosorum coarctationem infert. Nempe hoc est, quod PETRUS IOHANNES FABER in *Parob.* tradit; scilicet excrementa in pulmone ab ejus alimentis lequestrata & abundantia, effeculam grandinis, vel lapidis, tartarique coagulati, si indurescant. Quod si verò adhuc sint liquida, oriuntur asthmata, tussis & catarrhos suffocativos, si scilicet liquidum hoc excrementum in lentam, glyceam & vitream muretur visciditatem, verum produci Asthma: hinc frequens imprimis hoc est vis, qui in mineris metallicis sunt occupati, aut qui mineralia, aquas fortes, antimonialia, & si specie mercurialia, tractant, & in laboribus Chymicis versantur; inspiratum enim tale Gas seu fumus acrior & malignus cum aëre, ita inquinat digestionem pulmonum, ut loco assimilationis alimenti proprii hoc ipsum degeneret in varii generis excrementa: uti de hoc eleganter disserit HELMONTIVS *Tract. Tussis & Asthma* §. 44. Pertinet hoc etiam quæcunque materia in aut prope pulmones hærens, & liberum eorundem motum impediens, ut sunt imprimis abscessus & Apostematâ, vomica pulmonum, quæ ob pus genitum, vel pulmones corruptos, inferunt affectus asthmaticos. In omni pulmone vomica difficilis est anhelitus: Vid. POTERUS *L. 3. c. 27.* & RIVIERIUS *C. 1. Obser. 22.* Sic namque DODONÆUS, ex quo etiam SCHENCKIVS & alii habent Autores, refert in *Obser. 19.* exemplum Asthmatici mortui, cujus in pulmonum inferiori sede & basi, qua septo transverso incumbit, reperti sunt abscessus duo insignes, in utraque parte unus, à quibus inundati pulmones materiâ purulentâ Asthma lethale induxerunt: Vid. HILDANVS *C. 3. Hist. 39.* Hinc etiam Phibici, item Empyematici, ut plurimum sunt Asthmatici & frequenter Orthopnoici intereunt propter pus, quod vel in empyemate in Cavo thoracis fluctuat, vel propter pus, quod unum alterumve laterum pulmonum inundat.

Per *peritum* sunt *humida asthmata* pnevmonica variis ex causis: v.g. dum febres continuæ interdum solvantur per decubitus in pulmones materiæ in sanguine coctæ, cujus copiosâ rejectione, præsertim mediante tussi, omnia postmodum levantur mala. Quin & serum in corpore copiosius quacunque causâ occasionaliter retentum, ut fluxilloræ facit sanguinem, ita etiam asthmata talia inferre solet: unde hinc inde Observationes prostant, ex solitis feri evacuationibus suppressis abortorum Asthmaticum: vid.



**RHODIUS** *Centur. 2. Observ. 17.* de Orthopnoëia ingenti, oborta ex sero sanguinis, quo pulmones & ejus circumjacentia loca repleta fuerunt: id quod patuit per solutionem, quoniam intra 24. horas fuit levata per excretionem 36. librarum urinae. Nec serum tantum, sed etiam sanguis ipse, non saltem quacunque occasione in cavum pectoris effusus, sed quacunque ratione in suo motu impeditus, ac in vasculis pulmonum stagnans, aut tardius per eos circulatus, aut etiam impensius subinde ebulliens aut turgescens, Asthma ac Orthopnoëiam infert; sicut gravior talis affectus dat Catarrhum suffocativum ex sanguine: de quo infra. Confer. **WILLISIUS** *Pharm. Rational. P. 2. pag. 239.* Hinc est, quod post cursum seu motum vehementiorem sinus quodammodo quasi naturaliter Asthmatici, quoniam sanguis per motum rapidum ac velocem per vasa motus, vix tam promptè circulari potest per pulmones ex dextro cordis ventriculo in sinistram, quin nonnihil subsistat, ac in pulmonibus hæreat; unde tale Asthma seu distensio pulmonum nonnihil impedita, quia non sufficienter & debite potest circulari sanguis. Unde videmus etiam, quod mulieribus, quibus suppressi sunt menses; item viris, quibus suppressus hæmorrhoidum fluxus, Asthmata supervenire soleant; quia in talibus sanguis copiosius retentus abundans hæret, & quodammodo circa pulmones stagnat, & non facile potest circulari. Quod verò in sanguinis menstrui & hæmorrhoidalis suppressione sæpius sit impedita circulatio in pulmonibus, patet, quod talibus tam frequens symptoma est spiritus cruentum seu sanguinis. Cachectici porro ad unum omnes ex levissimo corporis motu sunt Asthmatici plus minus, quatenus in his sanguis crudus, ex cruditate ventriculi acida, & quasi semichylosus ex defectu digestionis primæ, diutius hæret in pulmonibus, tardiusque in istis movetur, propter tardiores ab aëre rarefactionem & alterationem propter gluciosiores paulò consistentiam, ratione quorum nonnisi lento motu per pulmones circulari potest. Unde celerius motu sanguine sub corporis motu, facilius circa pulmones subsistit, ac Asthma tale inducit.

Facit hoc, quod ex terrore, in quo sanguis admodum in similem sui in præcordiis stagnationem disponitur, Orthopnoëia læthalis oborta fuerit: teste **FORESTO** *C. 16. Observat. 10.* In genere quicquid sanguinis circumum circa præcordia vel per pulmones quocunque modo sufflaminat, Asthma infert; hinc quacunque materia, aut in pulmonibus, aut in sinistra cordis auricula coagulata, stagnans, dyspnoëiam læthalem infert: ita **RIVERIUS** *Centur. 1. Observat. 82.* tale exemplum habet ex dyspnoëia mortui, in quo post mortem reperta fuit materia viscida coagulata in sinistra cordis auricula, à qua impeditus sanguinis motus dedit dyspnoëiam læthalem. Facit hoc, quod potus subitanei frigidi post labores, aut corporis nimiam incalcescentiam, aut etiam lotio corporis in aqua frigida sub nimio æstu, Asthmata inferant; quia in talibus post nimium æstum aut motum massa sanguinea insigniter attenuatur, dissolvitur, & fluxilis redditur; ex subito verò rei imprimis frigida, vel potu, vel intempestiva applicatione rei frigida sanguis gravior factus in pulmonibus stagnare, & ita necessario Asthma inferre solet: de quo **RVLANDVS** in *Tocf. pag. 112.* ubi refert dyspnoëiam jamjam suffocantem & iterè læthalem ex haustu copiosæ aquæ frigidissimæ, ob ingentem sitim in interfo canicularium æstu excitatam, per vomitum aquæ benedictæ subito restitutam. Simile exemplum Asthmatis, excitati ex potu frigida, & balneo frigido, habet etiam **GABELCHOVERVS** *C. 2. Cur. 17. & 18.*

Tandem & hydrops pectoris Asthmata gravia inferre solet.

In genere quicquid in pulmonibus vel sanguinis motum, vel respirationem graviter impedit, Asthma infert, quæ inter primatum obtinet mucus ex depravata pulmonum nutritione oriundus.

Ex modo dictis obiter duo observanda sunt:

- I. Sanguinem, lympham, serum, & materiam vitiosam quamvis in pulmonibus, quæ Asthma tale inferunt, non destillare ex capite, uti falsò putarunt majores nostri; sed omnem istam solummodo ex vasculis, vel sanguinis vel lymphaticis, eò inferri, sive fiat immediate, sive mediate, mediante nempe alimenti degeneratione, aut lymphæ alteratione.
- II. Asthmata hæc humida eò esse vel graviora, vel pertinaciora, quò magis materia peccans acrimoniâ suâ, autâve pulmonibus inimicâ impressione, hos

aut asperæ arteriæ ramos irriverit, ac ita eorum fibras ad pernaciores sui constrictiones stimulat.

Ceterum Asthma tale humidum seu manifestum sæpius hæret in stomacho & primis viis, quàm ipsis pulmonibus; ut plurimum enim talium stomachus, nisi manifestum sit in pectore vitium, ex cruditate acida & viscida, reperitur infarctus materia crassa, plus minus viscida ac mucilaginosa, &c. statibus generandis apta: (confer. **LINDANNVS**, & **GABELCHOVERVS** *lib. 4. Observat. 4.*) quæ ubi quacunque ratione fuerit agitata, turgescere & quasi inflari incipit, sicque gravia & periculosa admodum dat Asthmata, per paroxysmos subinde assilientia; unde etiam in tali Asthmate ægri conqueruntur de angustia præcordiorum sub collis noctis; dicunt: *Non posse se expedire*: partim quia nimia distensione ventriculi a talibus copiosis succis & flatibus onerati, impedit liberum diaphragmatis motum deorsum versus, quod tamen ad pulmonum dilatationem maximè est necessarium; unde etiam tales sunt Asthmatici imprimis post pastum, dum etiam alimenta vitiosa fermentatione turgescendo distensionem Astmæ præcordiorum, indeque diaphragmatis motum impediunt; partim verò, quia diaphragma ipsum quodammodo simul in consensu trahitur ex irritatione stomachi, ut ejus convulsio tandem, & hinc pervehit sub respiratione motus sequatur; ita ut arbitretur plura esse Asthmata humida, quæ radicanter in stomacho, quàm in pulmonibus. Id quod apprimè confirmat **GABELCHOVERVS** *Centur. 4. Cur. 20. & Annotatione*; quod scilicet 11, quæ Asthmata sunt obnoxia, serè habeant ventriculum frigidum, imbecillum & flatulentum; quoniam in talibus ex vitiosa digestionis coacervantur mucilagines, & cruditates acida. Hoc sanè verissimum est de omni Asthmate humido pituitoso, tam pulmonali quàm stomachali: in talibus Asthmaticis ex vitio primarum viarum sæpius etiam adfuit status, qui insigniter dyspnoëiam intendunt. Sic qui laborant cruditate acida stomachi, &c. qui exinde originem ducunt, scorbutici & hypochondriaci, sæpius post pastum, præsertim vespertinum, difficillimam patiuntur respirationem, idque saltem vitio digestionis primæ cruditatis acida, indeque naturæ copiosissimi motus flatuum, &c. relictæ solent tales ægri multa viscida per os, quæ ipsa non tam ex pectore, quàm ex stomacho, oriri solent. Confirmat hoc, quod vomitu præsentis ejusmodi Asthmate laborantes levamen habeant. Refert **RVLANDVS** in *Tocf. Pract. pag. 109. 112. & 120.* se curasse Asthma per vomitum, dum rejeçta pituita lenæ cum bile permixta sunt aliquot libræ: Item **SYLVATICVS** in *Centur. 2. Conf. 39.* observat Asthma singulis noctibus recurrens cum suffocationis periculo, à quo non prius æger fuit immunis, quàm succederet spontè vomitus assumptorum & materiarum pituitosarum. Sic **TIMÆVS** in *Epistol. pag. 122.* refert Asthma contumacissimum & nullis cedens remediis, vehementi tandem provocato vomitu curatum: imò, solo aliquot Scorbuticos, qui, quando post pastum vel haustulum vini hauriunt, brevi sunt Asthmatici. Tale Asthma ex flatibus & hypochondriacum dicitur à **RIVERIO** *Asthma notum*: estque mihi unum ex certissimis signis mali hypochondriaci, quando ægri à pastu, aut interdum manè, dum resupinati in lecto jacuerunt, conqueruntur de difficili respiratione propter impedimenta circa hypochondria; est enim ex stomacho & hypochondriis, partim flatibus, partim à materia viscida in stomacho & vicinis regionibus hærentibus, distentis & oneratis. Hydropici denique confirmari tandem etiam sunt Asthmatici; partim propter liberum diaphragmatis motum impeditum; partim propter distentos musculos abdominis, thoracis dilatationem & sursum versus elevationem seu sublationem impediens; partim propter copiosius retentum serum, crassum sanguinis vitians, & acrimoniâ suâ pulmones nonnihil vellicans; hinc enim & tussiculosi tandem redduntur Hydropici.

Asthmatici interdum patiuntur stertorem in faucibus & tussim, & hujus medio materiarum viscidarum excretionem, qui stertor vulgò signum habetur infarctuum pulmonum: sed observavi, quod etiam in stomacho infarcto à tali muco talis stertor & tussis adfuerit, ut vulgò adscribatur pulmonibus. Distinctio autem facienda est stertoris: Quidam est ex pectore, si vitium hæret in bronchiis pulmonum, vel ramo asperæ arteriæ; tunc enim aër reciprocè materiam quatit & concutit, unde stertor ex profundo auditur: quidam est



ex faucibus, si scilicet circa membranam pituitariam posteriorem mucus copiosus est in confinitate laryngis & epiglottidis, & quasi oblinitur. Reverà ergo stertor iste omnis oritur ex lymphæ viscidioris, ex membrana pituitaria posteriore copiosius eructata, quæ in isthmo faucium hærens, seu reciproco aeris motu circa caput laryngis agitata & commota, talem stertorem seu dyspnoeam superficialiorem infert, similem illi, qui in nocte à nobis dorso incumbentibus auditur, *etque in gutturo*, ubi percipitur sonus.

Hæc est prima differentia Asthmatis, scilicet manifesti & humidi, cujus dixi materiam vitiosam imprimis, & ut plurimum hærete in stomacho, raro in pulmonibus, nisi sit ex vitio sanguinis non rectè circulati.

Alterum *Asthma*, *siccum* nempe, seu *occultum* ab HELMONTIO dictum, est istud, quando citra ullum somitem materialem, vel materię sensibilis ejusdem accessio-nem aut recessionem aut excretionem, paroxysmus & subitò incipit, & etiam subitò cessat, non verò successivè tale Asthma mirabile, neque per expectorantia, neque per Vomitoria, neque per purgantia, solet levari, sed licet videatur corpus purificatum, pertinaciter tamen persistit. Invadit nunc periodicè, nunc vagè, vel propter motum animi, ut terrorem; vel propter morum corporis, ascen-dendo in altum; aliquamdiu durat, & cessat sine manifesta causa, iterumque advēnit levissima ex causa ægrī corripiun-tur Asthmate momentaneo, sunt aliàs sani, donec paroxys-mus veniat. Varia hujus Asthmatis exempla admodum Cu-riosa vld. in HELMONTIO, *Tractat. Asthma*, & *Tussis* §. 41.

### C A U S E.

Differentia causalis horum Asthmatum est varia. Nempe (1) vitio conformationis partium ad respirationem pertinentium; hinc enim omnes gibbosi ferè evadunt tan-dem Asthmatici; aut etiam, qui aliàs malè conformatam spinam dorſi, quæ impedit expirationem pulmonum legiti-mam, obtinent: Quò etiam facit sterni ac Costarum notharum vitiosa conformatio, orta ex sterne cum costis ad inferiora reflexione; quale exemplum refert SCHEN-KIUS in *Observat. ubi de Respiratione seu difficultate Respirandi*: Item cruda tubercula aut grandines similesque variz excreſcentiæ in bronchiis pulmonum: Tumores scirrhosti in pulmonibus: calculi iidem; vel intra bron-chia pulmonum successivè geniti hos ipsos obstruentes, & ita liberum aeris commeatum impediētes, quale asthma rarioris Observationis HELMONTIUS l. 1. c. 5. 43. vocat, & inter humidum & siccum ambigens pronunciat; vel etiam extra bronchia incumbentes eadem angustantes: aut alia concreta præternaturalia, sive in parenchymate pulmonum, sive in bronchiis pulmonum hæreant; talia enim Asthmata, ferè continua & incurabilia inferre solent: vid. FORESTUS lib. 17. *Observat.* 10. item HELMON-TIUS *Tract. suprà citato* p. 93, ubi exemplum habet asthma lethalis ex calculis punicosis in pulmone & bronchiis repertis: sic à scirrho pulmonum asthma in M. A. N. C. *Ann. 3. Observat.* 262. pag. 474. SCHULZIUS: à calculis asperam arteriam externe comprimentibus asthma lethale notat KERKRINGIUS *Spicileg. Observat.* 72.: singulare etiam est exemplum TULPII lib. 2. *Observat.* c. 7. de Dysp-nœia admodum diuturna cum tussi, orta ex putamine nucis avellanæ, capiti asperæ arteriæ inhaerente. Hinc (2) idque primariò, Asthmata sicca inferunt convulsiones ner-vorum aut musculorum thoracis, motui & respirationi in-servientium, diaphragmatis in specie, & laryngis aliorum-que, vel per se, vel per consensum, ut cœlet aut deficiat motus thoracis dilatatorius & constrictorius, quo cessante asthma adest; Nervus enim irritati convulsivum motum in musculis excitant, unde hi ipsi convulsi nunc expirationem ruit perficere nequeant, in specie diaphragma, ubi tali con-vulsivo motu affectum fuerit. Asthmata talia vocat HEL-MONTIUS *sicca*, & *Caducum pulmonum*: WILLISIO in *Pasbol. Cerebri de Morbis Convuls.* cap. 12. item *Pharm. Rat.* P. 2. pag. 240. vocat *Asthmata convulsiva*; quia à con-vulsionibus partium respirationi inservientium, à quacun-que causa contingentibus, oriuntur: LINDANUS verò in *Coll. Manuscr. super Hartmannum* Asthma tale siccum omnium optimè appellat *Crampam seu Convulsionem dia-phragmatis*. Nulli tamen horum motuum latitudinem affectus debite exhauriunt: in genere, antequam ad specialiora tran-sciam, dico, talia asthma esse asthma convulsiva. Ac

Estmüller. Oper. Tom. II.

apud Veteres altum est de his silentium quoad theoriam, ntur, qui attentè Practicos legit, plurima hinc inde talium asthmatum, tam occultorum quàm manifestorum, repe-riantur exempla apud eos. Attamen omnes ferè Veteres Practici, excepto HELMONTIO, & WILLISIO, suis præconcep-tis hypothesebus occurrunt unam saltem speciem asthmatis sibi concipiunt, & asthma talia convulsiva ex muco pulmonum & infarctu asperæ arteriæ, & si sine mani-festo pulmonum infarctu contingat, ex vaporibus & flatribus pulmonum, vel alia ratione derivare volunt, utur ipsi, interdum videntes difficultates, ultrò fateantur, quod suffi-cienter se extricare non possint: legatur HELMONTIUS, qui plura habet exempla. Præterea asthma talia sunt in PISONE *Tract. de Morbis à Colluvie serosa ortis* pag. 192. & 222, ubi talium asthmatum originem ex hypothesi per-terum, frustraneo tamen conatu, explicare nititur: item PLATERVS in l. 1. *Observat.* pag. 161. & 172. cum vi-deret, quòd non posset conciliare tam stupenda exempla cum infarctu pulmonum, dicit oriri ex catarrho, quòd su-bitò ex capite in pulmones & thoracis musculos derivetur: item IOHANNES COLLE, *Medicus Italicus*, in *Tr. Cœmior Medicus* pag. 159. idem & simillimum Helmon-tianis refert exemplum, in quo tandem nolens volens fa-teri cogitur, oriri tale asthma à pravo motu pulmonum & constrictione, seu à flazuum & fuliginum copia. Ipse SYL-VIUS talia asthma ex vaporibus, & halitibus, ex intesti-ni soriundis & pulmones replentibus derivat. Multa exem-pla talia recenset SCHENKIUS pag. 234. & 237. in *Ob-servat.* item MARCELLVS DONATIVS in l. 4. *Histor. Med. Mirab. lib. 2. cap. 12.* RIVERIUS Cent. 3. *Observat.* 85. FONSECA l. 1. *Conf.* 11. item BENEDICTVS SYL-VATICVS Centur. 2. *Conf.* 60. Hic SYLVATICVS c. l. simile Helmontianis habet exemplum, ubi casus est syncope epileptica, cui conjunctum est asthma non sine suf-focationis periculo, aucta imprimis, ubi supinus jacebat æger, assilgens propter vaporem quandam, quem sentit ex ventre inferiore ad superiora deorsum, & ad fauces: Vid. quoque *Conf.* 6. SYLVATICI jam citati de Palpitatione cordiscum syncope, simulque angustia & difficultate spi-randi, ex vitio hypochondrii spulstri.

Sanè sæpius miror, cum Veteres viderint, moveri tho-racem per tot & tam insignes musculos, quare tantoperè & frustra se macerant in asthma hoc persequendo, nul-lumque respectum ad hos musculos habuerint: Reverà enim frequens asthmatis occulti causa hæret in musculis convulsis, primario quidem in diaphragmate, secundariò in musculis reliquis; unde pro varietate musculorum est varium. Creberrima hæc sunt asthma, eorumque exem-pla imprimis in HELMONTIO, & hinc in WILLISIO citato loco possunt videri. In diaphragmate quidem con-vulso rectè urget hæc LINDANVS, quòd tales asthmatici conquerantur omnes, se sentire ingentes dolores & an-gustias circa costas nothas, & difficilem constrictionem in-stitari zonæ circumligatæ in ista regione, ubi diaphragma annexum est: id quòd fit ex violenta diaphragmatis de-orsum versus concussionem & convulsione, quòd ita con-vulsam dat talem sensum constrictorium; unde postmo-dum & reliqui intercostales muscoli, sive inspirationi sive expirationi inserviunt, simili spasmò correpti, gravius malum reddunt; ut plurimum tamen convelluntur, qui inspirationi videntur inservire. Exemplum talis Asthma-tis convulsivi manifestum habet HOBOKEN *Tractatulo de Anat. secundina in Epistol.* pag. 214., vbi æger rectus sanus fuit; si verò supinus, totus thorax cum impetu con-vulsus fuit sursum, ut respiratio insigniter læderetur: con-vulsi fuerunt omnes muscoli, qui dederunt asthma pericu-losissimum.

Facit hæc difficilis Respiratio in iis, qui patiuntur verte-brarum dorſi contorsionem, & quasi cingulo circa costas nothas constricti, difficulter admodum respirant, propter nervos ex vertebra subluxatis prodeuntes, nonnihil com-pressos, & hinc sensiliùs irritatos. Item pertinet hæc Asthma convulsivum & occultum muliebri seu hysterico, quòd in viris vocatur Asthma hypochondriacum: nam in hystericiis paroxysmis præter varia symptomata alia, sæpiùs insignis est respirandi difficultas, ita ut ægræ omni momento suffocari videantur, quòd tribuit HELMONTIVS actioni regiminis uteri, in viris splenis vitis; cum tamen simpliciter oriantur à convulsionibus, vel diaphragmatis, vel musculorum thoracè moventium, vel musculorum laryngis ob cōsensum nervi eò tendentis, unde loqui non possunt. Partes hic affectæ reverà



sunt musculi respirationi, ac præsertim inspirationi, inservientes; siue sint diaphragma; siue thoracis musculi externi, aut intercostales; siue musculi laryngis & faucium. Exemplum tale, quod insigniter huc facit, habet HORSTIUS lib. 5. *Observat. 32.* de muliere hysterica, gravi asthma affecta: Curavi Studiosum, Francum, tali asthma affectum, qui simul erat perfectus hypochondriacus; omni nocte sub medio nocte recurrebat, percipiebat in abdomine murmur: evigilando referebat, *contorqueri os ipsi in ascensu*: durabat per horas duas, donec successivè evigilaret, tunc discubiebat: conquerebatur quasi torculari cruciaretur. Per Vomitoria Maritima & vplatilia, in specie per spiritum catinativum continuatum curabatur.

Facillimè rara & notatu digna THONERI *Observat. lib. 2. Observat. 1. pag. 93.* nempe obstinata illa contractio laryngis & faucium (dum quasi laqueo angustari illas partes sentiunt) & Orthopnoea cum suffocationis periculo ob fauces summè contractas, una cum aliarum partium vagis convulsionibus, excitatis ex vermibus intestinorum, quibus excretis Orthopnoea & partium convulsionibus cessabant. Quando ergo jam inferunt hi convulsionem aliarum partium, certum est, quod convulsio thoracis similiter det Asthma & Orthopnoeam. Vitium hic querendum est in nervis, illique imprimis paris vagi & intercostalis. Afficiuntur autem hi nervi, vel in exortu in cerebro & cerebello circa radicem; vel in progressu circa varios eorum plexus, nunc superiores circa pectus, nunc, idque frequentius, inferiores, nempe mesentericos; vel denique in ipsis musculis, quibus inferuntur: Confer. WILLISIUS *Pharm. Rational. P. 2. p. 241.* Utriusque prostant exempla: Ubi afficiuntur plexus in abdomine, aut mesenterii, aut lienaris, aut similes nervi, cum quibus conspirant sæpe rami paris vagi & nervi intercostalis, ibi antecedunt vel adfunt simul mesenterii & intestinorum convulsionem, quam umbilici interiora versus violenta contractio & totius abdominis contractio, aliaque ejus symptomata sequuntur, in specie murmurationes, borborygmi, subinde quidam vermiculationis sensus uno alterove in abdominis loco: vel percipiuntur tensiones hypochondriorum, & similia pathemata alia, qualia mulieribus in passionibus hystericis & viris hypochondriacis solent esse frequentia: Exempla curiosa videb. in HELMONTIO. Ubi verò radix mali hæret in capite circa radicem nervorum, ibi sine tali sensu in abdomine ferè gravior vertigo, alteratio in capite ante paroxysmum, aut alia capitis pathemata, quæ motum inordinatum spirituum in cerebro annunt, solent esse adjuncta. Quæ denique ex ipsis musculis affectis fiunt, pro musculorum varietate diversa sunt: puerum observavi 13. annorum, qui quavis vespere, præsertim à pastu, tam crebra ac violenta respirationis inordinatione afficiebatur, in quo malum saltem oriebatur ex diaphragmate affecto; idque, ut videbatur, per consensum ventriculi: nam vomitorio propinato ferè in totum cessavit malum.

In specie, cum hujusmodi asthma convulsiva, quæ maximè ex nervis & musculis affectis oriuntur, incognita sint apud Præcticos, notetur, quod multiplex admodum varietas in his observabilis sit, idque tribus imprimis ex causis:

1. Propter texturam & tractum seu distributionem planè singularem nervi intercostalis & paris vagi, qui duo nervi, cum subministrant suos nervulos in thoracem & abdomen, præfunt movendis membris, ac partibus etiam colli, thoracis & abdominis, & ultra mirabilem sui structuram & distributionem, & pluribus plexibus hinc inde diversimodè sociantur, & hinc per consensum mutuum varios ac insignes spasmos ac motiones, etiam remotionibus in locis, excitare valent: vid. WILLISIUS in *Anat. Cerebri*: qua ratione nephriticos quosdam diffie hore respiratione laborantes, hinc non raro asthma convulsiva incurrere, quorum fomes latet in abdomine, ibidem afficiens nervos, ex quorum consensu thoracis pathemata, ut in hypochondriacis notum est. A nervo intercostali etiam lunculi nervi derivantur ad pulmones, ideo ut formentur dictæ vesiculæ membranæ, ita ut, prout dicti funiculi magis vel minus constringuntur vel laxantur, vesiculæ illæ fiant pro aere patentiores vel minus recipientes.
2. Causa secunda est varietas & multiplicatas musculorum mirabilium duplici motui, dilatationis & constrictionis, tam laryngis quam thoracis, inservientium, & tam in anteriori quam posteriori thoracis parte situatorum, una cum diaphragmate: qui omnes cum variam structuram & distinctum motum, & hunc vel dilatationi vel constrictioni thoracis inservientem, obtineant, hinc suas peculiare habent functiones, & suas raras alterationes; mirum non est, quin musculis affectis diversimodè, etiam functionum sequantur læsiones, & tam insignis varietas circa asthma convulsiva observetur.

3. Tertia causa est duplicitas motus, universalis nempe & motus uniuscujusque musculi in specie. Duplex est motus thoracis; dilatatorius in inspiratione, & constrictorius in expiratione, qui se habent nunc activè nunc passivè: His modibus dum variis musculi diversimodè inserviunt, sequitur, quod hi duo motus variè lædi, & variis modis tam in expiratione quam inspiratione vitari possint. Facit huc periculosum exemplum HOBOKEN. *suprà allegatum.*

Istud verò, quod in asthma convulsivo afficit nervos, tam in eorum radice, quam progressu, ut plurimum est Acidum vitiosum plus vel minus austerum, nervis, uti notum est, inimicissimum: In specie sub forma lymphæ cujusdam acidæ nervos; siue in plexibus abdominis, siue plexu lienari, siue in alio foco, in abdomine coacervato, siue in cerebro aut cerebri confiniis propè plexus Choroides, nervos vellicat & irritat, eosque in spasmos deducit (spasmo correptus musculus in similem spasmum & alium redigit.) Hinc scorbutici, hypochondriaci, mulieres hystericæ &c., non raro tali affliguntur asthma: non secus ac ii, qui Inunctionibus Mercurialibus pro Cura luis Venereæ malè sunt tractati, aut sub ipsa cura aeri incautiùs se exposuerunt, his subindè nervorum impressionibus vitiosis Asthmata convulsiva sunt familiaria: Conf. HILDANUS.

Pertinent pariter huc arthritici confirmati: & in quibus vel rariùs vel difficiliùs Paroxysmi podagrici superveniunt, in talibus hujusmodi Asthmata solent supervenire. Exemplum referam: Victor senex, sapiùs aliàs arthritide affictus, cum paroxysmi hujus requiem concessissent, sensim difficilis supervenire respiratione, quæ interdum erat tolerabilis: Edebat moderatè, satis interdum erat vegetus, sed postquam cum cubitum ivisset, nunc imminente somno, nunc cum unam alteramve horam dormivisset, ex improvviso anxietates præcordiorum suffocatorie superveniebant, unde nisi suffocari vellet, mox cogebatur è lecto assurgere, mensæque assidere erectus, ubi altam, anhelam & densam agebat respirationem, idque per tres, quatuor pluresque horas, donec malo successivè remittente, cum tantilla saltem materiz viscidæ rejectione, iple lectum repetere, & securè postmodum dormire posset. Interrogabatur interdum exactè, ubi percipiat impedimentum respirationis? Monstrabat regionem, quæ circumscribitur costis nothis, in specie hypogastricam, quasi ibidem fortissimè constringeretur: In ipso paroxysmo dicebat, se percipere *susurrum* in abdomine, tandem subito accidere sonitum quemdam singularem in regione epigastrica; quo facto, malum breviter remittit, & lectum repetere potest. Tragedia hæc omni nocte recurrebat, varia incassum fuerunt adhibita: optimum erat, ut post coenam parcam, ingruente paroxysmo, Theriacæ vel Mithridatæ, quantum caput culcilli culpis, caperet, quod paroxysmum vel sufflamabat, vel insigniter levabat. Interim pro varietate tempestatis vel gravior vel lenior erat. Tandem cum post aliquot septimanas Chiragra brachii & manus superveniret, quod dicti paroxysmi cessarunt.

Asthmata hæc convulsiva seu sicca sæpiùs solent esse hæreditaria, non secus ac convulsionem epilepticam graves etiam subindè sunt hæreditariæ; redeunt etiam quodammodo, sequuntur tempestatum mutationes, & ejusmodi loco ægris interveniunt, atque nunc vagos, nunc ut plurimum periodicos inferunt paroxysmos, certum tempus recurrentes observantes: imprimis tempore vespertino infestant, ut intermedio tempore ægri sint maximè sani, & etiam cessant sine sensibili remotione materiz. Verum interdum in fine aliquid, licet parum, mucicunt, quæ non causa peccans est, sed ex conatu respirationis circa laryngem & fauces aliquid colligitur, quod evacuatur. Ubi cessaverint aliquamdiu, facillè per multiplices occasiones externas, v.g. per iracundiam, mutationes tempestatum &c., recidivam incurrunt.



Tertio loco asthma occiduum oritur vitio pulmonis, aridi & flaccidi redditur instar membranae corrugatae & exsiccatae, idque propter deficientem eorundem nutritionem, unde in talibus subjectis ex tali exsiccatione, ariditate, & concidentia pulmonum, necessario oritur asthma. Exempla talia non sunt rara: praeter cetera vid. RHODIUS *Centur. 2. Observat. 21.*, ubi habet aliquot exempla asthmaticorum, ex tali ariditate & flacciditate pulmonum mortuorum; Sic SYLVIVS l. 1. *Prax. Med. cap. 24.* exemplum habet simile de quodam empyemate, in quo post mortem aperto in dextro latere repertum fuit empyema aquosum, ex sero & pure permixtum, cuius lateris dextri pulmo totus arefactus, flaccidus, & tabe confectus repertus fuit, quod ipsum recte adscribit impedire nutritioni pulmonum: Vid. quoque c. 22. p. 302. Quod etiam disponit crebrior nicotianae fumus, immediate afficiens pulmones, eosque plus minus ad atrophiam disponens, non vero caput immediate alterans.

Huc etiam facit affectus, quem vocant Germ. *die Berg-K-Sucht*, qui est asthma, oriundum ex inspiratis fumis mineralium, laedentibus graviter pulmonum nutritionem: Metallarii enim, & qui aquas fortes, cinnabarin, & zruginem consuevit, uno verbo: qui continuo exhalationes arsenicales, vitriolicas, Mercuriales, alioque metallicos vapores, & carbonum fumos per nares atque os attrahunt, raro de integritate pulmonis atque respirationis sibi gratulari queunt; si quidem observatum est in sectionibus cadaverum ejusmodi artificum pulmones adeo fuisse exsiccatos atque flaccidos, non secus ac si fumo indurati essent: vid. BARTHOLINUS *Cent. 4. Epistol. 72.* Et quidem primario asthma oritur ex vitio fibrarum ipsarum pulmonum contractarum, & pertinaciter convulsarum, atque ita debent vesicularum expansionem impediendum. Structura ista pulmonum ferè est sensibilis, quando nempe quis odores acido-sulphureos, v.g. spiritum nitri aut sulphuris accensum, vel burytum antimonii, aquam forte recentem, spiritum salis ammoniaci generosum ac similia odoretenus haurit; mox enim halitus suspenditur, fauces & thorax constringuntur, ac spiritus recipitur, angustia percipitur intra pectus, & denegata respiratio, in qua thorax per se salvis ob internum autem impedimentum se expandere nequit, sed propter pulmonum fibras admodum sensibiles, occasione inspirati objecti & odoris exotici quasi contractas, & inde difficilem redditam inspirationem, à motu cessat. Pulmonum enim fibræ nervæ, & quæ propter obiectum Pulmonum motum, non tam sensibiles, quam mores, & speciatim constrictoræ sunt, propter quem finem & pulmo suis nervis instructus est. Fibræ videlicet, prout stringuntur nimis aut contrahuntur diversimodè, præsertim sinistrae convelluntur, vesiculas pulmonum membranaceas stringendo angustiores & pro aëre suscipiendo ineptiores reddunt, adeoque sui structura asthmaticum pathema inferunt; quo sensu ferè consilari potest HELMONTIUS *frigidura pororum membranae pulmonis*, aut saltem doctrina, quam hinc superstruit, hoc modo intelligibilis explicari potest. Hujus exemplum vidi nuper in Italicis, qui conquirebatur de cingulo circa pulmones obstruato, unde aërem non introiit. Sed totum hoc dogma falsum est: hoc verum est, fieri, si fibræ nervæ, quæ cogunt vesiculas pulmonales, convelluntur, quibus strictis non fit receptio aëris, & tunc cessat respiratio. Stanspius alias optimè sanus erat, noctu circa horam 12. percipiebat difficile anhelum, fenestras aperiebat, assidebat mensæ; si volebat ampliare thoracem, non poterat; durabat usque ad horam quattordecimam vel quintam. Nempe hoc est asthma siccum, quod HELMONTIUS explicat seu insinuat sub nomine *Caduci pulmonum*, id est, in tali obstrui & occudi poros pulmonum, per quos transire debebat, aër; unde his oclusis, sequitur Asthma tale: ut ut ejus primaria hypothesis, quod nempe pulmones sint immobiles, & saltem cribri instar per quod transiatur aër, se habeant, falsissima sit; hanc enim destruit & Anatomie, & sufficienter infringit BARTHOLINUS *Tract. de Struct. & Usu Pulmonum*. Sicut & contra WILLISII hypothesis non omnimodè amplectenda, qua pulmonibus proprios nervos, propriumque iidem motum attribuit; unde his convulsis, inquit, & rursum ad fauces quasi protrahitis, sequitur tale asthma: vid. *ejus Pathol. Cerebri de morbi convulsivis*. Verum & hæc sententia contrariatur anatomie, cum parenchyma pulmonum sit ineptissimum pro motu proprio. Dum ergo vult WILLISIVS quod asthma convulsivum à convulsione pulmonum, falsum sit, ut HELMONTIUS; cum ex falsis hypothesebus non possit non sequi falsa conclusio; nisi hoc de fibræ vesicu-

las pulmonales colligentibus intelligere velimus: Videtur tamen se ipsum postmodum correxisse, dum in *Oper. Posthum.* nempe P. 2. *Pharmac. Rational.* ubi de asthma, de tali pulmonum motu non memorat, sed saltem in nervis & musculis convulsis acquiescit.

Vnde cumque igitur irritentur, aut malè afficiantur dictæ fibræ pulmonum; sive sit acidum internum; sive externum, eas irritans, corrugans & constingens; sive sint spiritus metallici; sive aëris externus, inclementior aut impurius inspiratus, tale asthma exinde oriri potest.

Res ut pateat, consideremus tria, quæ ad legitimum pulmonum motum, & hinc aëris reciprocationem faciunt:

1. Legitima partium mechanica conformatio.
2. Musculorum instrumentaliter moventium, & nervorum, musculorum motum mediante spirituum animalium influxu dirigentium constitutio.
3. Observandæ sunt fibræ ipsæ nervæ pulmonum, tam membranae undique pulmones cingentes, quam alia ad ipsas vesiculas pulmonales, pro istis ritè colligendis, hinc inde dispersæ, quæ fibræ pro fibrarum natura motu saltem contractivo erunt instructæ, adeoque constringere saltè & coarctare vesiculas pulmonales, sed nulla alia ratione movere poterunt. Nempe de his fibris in Epistol. ad Amicum refert MALPIGHIUS: in pulmonibus unum observari non indignum consideratione: In raris enim & lacertis exterius reticularis adest plexus ex carneis fibris, ita ut sit mirus musculus, comprimens singulas cellulas pulmonis; & in testudine, præcipue interiori, etiam hujusmodi reticularis musculus mirus observatur: Idem etiam plexus carneus circa pulmones in reliquis perfectis animalibus patet, si extremitates lobulorum turgidæ adhuc & molles perlustrantur; tunc enim caro aliquantulum rubet & turget. Conferatur etiam, quoad has fibras, LAMBERGII *Tr. de Respiratione Schvæmmerdam. Exspirat pag. 35.* Acland ab his fibris Caducus ille Pulmonum Helmontii, vel eorum spasmus rectius, derivari videatur.

Secundo tria hæc considerata etiam triplex jam explicata asthmatis sicci differentia oritur.

Tandem hoc suo modo videtur pertinere Asthma non rarum, quod insequitur suppressam aut malè curatam scabiem: Vid. HILDANVS *Cent. 3. Histor. 39.*, ubi observat asthma lethale ex repulsa scabie, aut etiam, quando post ulcera intempestivè clausa sequitur asthma: siquidem ex scabie retropulsa ordinario difficultas respirationis, interdum perfecta suffocatio supervenire solet; sic LINDANVS in *Colleg. super Hartm.* ex Scorpigine retropulsa asthma periculorum natum observavit; & ipse etiam asthma convulsivum ex podice scabioso vidi. Malum videtur tunc esse complicatum; natum partim a fermento scabiei acris, pulmonum fibras vellente, & ita ad fortiores contracturas stimulant; partim ex sanguinis crasi hinc vitata, in debito fermentationis motu ac textura depravata, ac quasi cachectica reddita: v.g. sanguine à sero nimis fuso & liquato à Mercurialibus, sive in unguento sive alio modo adhibitis, & tunc pulmones, tum copia tum acrimonia, gravante, unde & asthma pituitosum simul supervenire solet. Hinc observandum: materiam rejectam per os in Asthmaticis interdum esse causam mali, nempe in asthma humoroso; interdum verò est effectus, nempe in asthma sicco eorum, qui constitutionis sunt succulentioris & humidioris, & quorum sanguis & lymphæ, mollioris quasi ac minus firmæ texture, alterari facilius, & in variam formam mutari possunt. In talibus enim ex crebriori pulmonum agitatione, & aëris per asperam arteriam reciprocatione, subinde copiosior paulò lymphæ, per glandulas in asperam arteriam effusa, in mucum coit, in paroxysmo convulsivi declinatione eiciendum. Hinc ulterius in omni asthma, etiam humoroso, ad motum thoracis, plus minus liberum vel impeditum, semper respiciendum: nam ratione spirituum ex irritationis cujusdam circa pulmones sensu ut plurimum in paroxysmo aliquid convulsivi concutitur, unde & pro hujus ratione plus minus malum intenditur, ac tali ex causa oporata interdum sequuntur tales paroxysmi.

Notandum ulterius: quod difficilis ista respiratio, quæ tam in rasis humida in statu, quam etiam in rasis sicce principio adest, non sit semper, aut saltem non solum, à pulmonum infarctu aut catarrho, aut simili quodam vitio, sed frequenter oritur ex irritatione pulmonum, & hinc



fibrarum earum contractura, indeque impedita plus minus earum expansione. Signum mihi erat, adesse talem irritationem, quoties aeger vel loquens, vel validius inspirans, tussire cogebatur: Nam in talibus casibus, propter crebriorem aeris reciprocationem, irritati magis pulmones tussim concitabant magis, unde difficultatem respirationis magis ex simplici pulmonum irritatione, quam materiae peccantis coactione, ortam judicavi: Hinc tali in casu ex opiatīs, v. g. ex spiritalis ammoniaci anilato cum essentia opii misto, semper levamen observavi; non saltem minorem tussis violentiam, sed etiam liberiores mox respirationem, vellicationis nempe sufflaminato sensu. Hinc etiam sensus doloris compressivi, sive gravativi in pectore, sive profundo pulmonum, non semper à copia materiae, sed saepius à fibrarum pulmonalium in particulari

quodam loco irritatarum constrictione, quam compressivus ac gravativus talis dolor subinde insequi solet.

Observandum denique est hoc: quando jam tales convulsiones, vel musculorum vel fibrarum pulmonalium, dant, asthmata, quod tunc ut plurimum simul & tardior sanguinis circuitus per pulmones esse soleat, adeo ut ex impedito plus minus ejus motu non tantum insignis in praecordiis anxietas, & majus imminens suffocationis periculum adsit; ac praeterea tali in casu rubor malarum ac faciei, vasorum in collo major intumescencia, aut sensilis etiam artierarum pulsatio, adesse solet.

*Asthma* est ratione causarum vel *humidum*, vel *siccum*; *Humidum* ratione partis ab humore irritatae vel *Stomachale* vel *pectorale*: Hoc vel *vitio pulmonum*, vel *vitio nervorum*, vel utroque simul.

*Asthma* est vel *humidum*  
seu *manifestum*:  
cujus *causa materialis* est

in *pulmonibus*

*Mucus viscidus*, ex deficiente & depravata pulmonum nutritione natus.  
*Pus* in vomica, abscessibus, empyemate, phthisi.  
*Serum*, pulmones copiosius inundans.  
*Sanguis* in motu impeditus per pulmones; vel ob abundantiam; vel ab Acido coagulationem; vel cachecticum vitium; vel ob nimiam turgescencia, & quasi ebullitionem.

In *Stomacho* & *primis viis*, mucus crudo & inde natis flatibus oblectis; item hydropicis.

*Asthma siccum* seu *Occultum*,  
fit vel ratione

*Vitiosa conformationis*: in gibbosis, ob cruda tubercula, calculos grandinesque bronchia obidentes, res deglutitae illa obstruentes.

*Convulsio musculorum respiratorum* intercurrentium, diaphragmatis, laryngis, aliorumque: ut in hypochondriacis & scorbuticis.

*Pulmonis* vel exsiccati vel corrugati, vel, ob fibras proprias nimis strictas, contracti & angustati: Caducus Pulmonum.

## DIAGNOSIS.

Quod attinet signa: Asthma ipsum se manifestat sponte. De causis tamen est inquirendum, quomodo dignoscenda sint: neoriatur error in Praxi. Necessse ergo est, ut attentus sit Medicus ad cognoscendas asthmatum siccorum & humidorum differentias, quas ex plurium circumstantiarum collectione saltem delumere potest. In specie Asthmata, quae sunt ex vitio conformationis, item quae oriuntur ex mucus, aut materia pulmones inundante, ferè solent esse continua; aut licet videantur interdum remittere, tamen levissimà occasione data graviter recrudescunt: Id quod etiam verum est, si vitium sit ex pulmonum corrugatione & laesa nutritione. Reliqua asthmata periodicè, nunc statim nunc vagis periodis recurrere solent. Et quidem *Asthma humidum* esse vel *vitio Stomachi* vel *vitio pulmonum*, cognosci potest ex causis antecedentibus, ex hypochondriacis symptomatibus, & pectoralibus magis urgentibus: item si paroxysmus adsit cum stertore, aut cum tussi, aut etiam cum copiosa materiae in aut post paroxysmum rejectione; ita quidem, ut hoc ipsum fiat cum levamine aegri.

In asthma autem humido seu manifesto, si motus continetur crassus in bronchiis pulmonum, respiratio est difficilis cum sonitu ex profundo, coque sterrente, & inssi, ac pituita plus minus copiose excretionem, quae quò magis excernitur, eo magis affectus immittitur: si verò materia peccans sit in substantia pulmonum, vix talis adsit sonitus, nec tussis successiva, idque non adeo copiose, per tussim aliquid rejicitur. Sin tamen est vitium humorale in pulmonibus, aut in ventriculo, Asthma solet esse continuum, quod semel iterum curatum, antequam denudò repetat, successivi incrementi signa producit.

Ut autem sit continuum, subinde tamen exasperatur, idque praeterea vespertinae nocte, quo tempore omnes aegri asthma humido affecti pejus habere solent; quod tamen omni asthma ferè commune est, ut vespertinae nocturno tempore acerbius affligat: item quod motu corporis temper exasperetur; item quod pro aeris mutationibus melius vel pejus habere soleant aegri. Signa Asthmatis manifesti quilibet potest facile cognoscere.

Quoad *Asthma* verò *siccum*, convulsivum, & spectatum *Caducum pulmonis*: ex eo ferè se producit, quod sine continua, sed interdum plane intermittant, paroxysmorum repetitione, ita quidem, ut subito meliores, hinc etiam subito cessent, sine ulla somitis materialis, vel praesentis vel antecedentis, vestigio, aut manifesta rejectione: ex improviso enim tussu in aegros, alias opacius respirantes, atque evanescentia

sensibile respirationis nocumentum, utut debiles admodum, plus minus tamen, aegri esse soleant: saltem difficile est haurioli, ubi lateat fomes & fermentum seu spina, nervos hostili sua praesentia irritans, & ad spasmos provocans.

Porro nullus humor, nullus stertor, aut nulla tussis, item nulla humoris excretio adsit in talibus asthmaticis, utut subinde sonus coactus (*es pfeiffi*) exaudiat: quod si aliquid excernitur, aut ferèatur rejicitur, hoc fit in sine, & parum est, duo vel tria spura, & non amplius; natum talismodi potius sputum circa fauces ob summam aegri anxietatem, non autem quod sit causa morbosa. Multum ut plurimum inspirant; sed parum expirant, si sint convulsi musculi expirationi inservientes: contrarium fit in asthma humido, in quo non sufficienter possunt respirare.

Quoad *signa distinctiva*: si malum originem à capite ducat, adsit vel antecedit vertigo, dolor capitis, sensus fluctuationis in capite & similia capitis pathemata: si verò est in abdomine, adsunt rugus, murmura, ubi ligatura circa costas prodest.

Quod si diaphragmatis musculi, aut loca vicina sint affecta primario, semper accedit ingens dolor instar zonae in ista regione, ubi annectitur diaphragma costis nothis: Sin musculi thoracem moventes afficiantur, conqueruntur aegri in paroxysmo de sensu, quasi universus thorax firmiter constringeretur ac comprimeretur: Si laryngis & faucium musculi affecti sint, suffocationis, quasi laqueo injecto, sensum habent aegri. Si pulmo contractus primario sit, inexplicabile quoddam impedimentum respirationis experiantur aegri.

Ultimo affliguntur frequentius & atrocius in asthma convulsivo aegri tempore vespertino aut nocturno circa primas noctis horas, donec recedat, seu in somnum incidunt, quo obrepente reliquam noctem & sequentem diem sine ulla difficili respiratione pertransigunt, donec tandem, si malum aliquandiu latuerit, aut periodicè, aut erraticè, subito, vel ex levissimo in sex rebus non naturalibus errato, reperit paroxysmus. Imprimis à causis quibuscunque procatartice, v. g. à levi motu corporis, aut à levi exandescencia, aut similibus, in momento ferè concitantur; & siccitè subito fiunt, subito etiam desinunt: quod tamen contrarium fit in asthma humido, quod successivè fit, & etiam successivè, removendo causam seu materiam, curatur.

Fomes asthmatis convulsivi, ubi praecise haereat, symptomata, vel antecedentia vel adjuncta aliarum partium, ferè commonstrant. Plura videb. in SENNERTO & RIVERO.



## P R O G N O S I S.

Quod attinet Prognosin: Asthma omne tam per se, quam in progressu morbi superveniens, semper est periculosum & grave, maxime in morbis acutis, in specie in malignis, in quibus unum ex funestissimis signis est.

Periculosiora sunt tamen occulta quam manifesta: Item inveterata, sive sint humorosa; nam hæc ferè insignem pulmonum læsionem arguunt, sive convulsiva; nam talia epilepticum in quodam nervorum plexu radicatum fomitem præsupponunt. Et quidem asthma occulta, in specie convulsiva, & Caducus pulmonum, frequenter occurrunt in Praxi, quam humida.

Asthma inveteratum quodcumque raro perfecte curatur, quoniam vel leuissimo dicitur errore, vel alio peccato, subinde recidivat.

In febre acuta superveniens asthma, sive in cursu, sive post morbum acutum sequatur, semper est valde periculosum: unde etiam à RIVERO *Prax. Med. l. 7. c. 1.* lethale dicitur, si asthma superveniat Pleuritidis seu Peripneumonia.

Asthmaticis omnibus aliquandiu jam tum hoc morbo laborantibus ut plurimum cachexia, insignes tumores pedum edematosi, & tandem inferioris corporis tumor quasi hydropicus, supervenit, & sic moriuntur.

Hæc de signis: Pergo ad

## C U R A M.

Imprimis autem considerandum est: an asthma sit morbus primarius & solitarius? vel secundarius & complicatus? hoc est, an superveniat phthisicis, empyicis, hypochondriacis, hysteriis, scorbuticis, aut similibus? Ille primariè in specie curandus venit: si verò sit affectus secundarius, præcisè non curatur, nisi in primario sublato morbo, adeoque tunc ad morbum primarium respiciendum est, nisi interdum paroxysmi gravius urgeant; nam sanato vel sublato morbo primario, & hoc symptoma cessat.

Asthmata ergo, quæ primariè constituunt morbos, curanda sunt, & quidem in genere, quantum possibile, libera & sufficiens Respiratio procuranda.

I. Impedimenta, æt i libero accessum & recessum per pulmones denegantia removendo.

II. Respirationis organorum inordinati motus plus minus convulsivi compescendi.

Ratione prioris: aeris ambiens ventilatio, erecta sessio, alvi subductio, venæ sectio, portiones sanguinem attenuantes, ejus motum circularem promoventes, viscida, pulmones infarciunt, incidentes, spirituosæ, blandè dulces, pulmones demulcentes, conveniunt: interdum etiam Vomitoria vtiliter administrantur. Ratione posterioris: antispasmodica, anodyna volatilia, &c. sunt optima.

In specie Asthma humidum, aut ex ætate a viscido muco genitum curatur:

I. Materiam peccantem viscidam attenuando & dissolvendo.

II. Tandem ita præparatam per convenientes vias, vel sereatu & tussis, vel vomitu, vel secessu ejicientdo: &

III. Id quod restat in specie extra paroxysmum, removendo, & novum proventum maturè impediendo: adeoque vel pulmonibus læsis & vulneratis, appropriatis pectoralibus, si asthma humidum vitio pulmonum fuerit; vel stomachi digestio prima sedulo rectificanda, si hujus errore nata fuerit.

Asthma siccum similiter curatur in paroxysmo & extra paroxysmum.

In paroxysmo quidem (1) *Conformationis vitia* difficillimè curantur; excrecentiæ tamen, tubercula, aut grandines beneficio spiritus sulphuris per campanam successivè absumi posse, sunt qui asserunt.

(2) *Asthma convulsivum* in nervorum & muscularum vitio curabitur, radicatus fomitem ejus corrigendo, respiciendo præsertim vitium, in quo lateat. In specie

I. Paroxysmus imminens suspendendus per opiatas: vel

II. Idem præsens sistendus per volatilia & castoreata, item mineralia antepileptica & similia, acidum, nervis inimicum corrigentia, nunc solitaria, nunc opiatas temperata.

III. Recursus paroxysmorum præcavendus velicatoriis, vel brachiis, vel nuchæ, vel femoribus applicatis, pro nervorum vel nidi varietate: etiam fonticuli interdum inurendi.

Ex propria *fibrarum pulmonalium fibrilura natum asthma* curatur:

I. Causam irritationis, quantum possibile est, corrigendo & removendo.

II. Opiatis sensum vellicationis sistendo.

III. Appropriatis simul vulnerariis & balsamicis, pulmonibus succurrendo.

Extra paroxysmum verò curatur, primarium morbum curando, & paroxysmi recidivam prævertendo.

Pro his scopis ritè obrinendis notandum:

I. In paroxysmo asthmatis humidi Vomitoria omnium esse optima, ita ut hæc vel mox in principio, paroxysmo gravius affligente, adhibenda sint, etiam quando maxime videatur urgere suffocationis metus, quem interdum mirè sedant; nihil enim equè paroxysmos asthmaticos humidos curat, quam vomitus: Hinc omnes cordati Practici semper in asthma Vomitoria usurpant & subinde gravissimorum paroxysmorum, Vomitoriorum propinatorum usu levatorum, observationes prostant. Nec est, quod exinde metuatur suffocatio: inanis hic est metus; nunquam tale quid observatum; in humido nempe æqualiter evacuat materiam Vomitus, sive in pectore sive in stomacho hæreat. Notum namque est, quod in omni Vomitu simul fit insignis contractio pectoris, & quod per motum gulæ sursum simul moveatur aspera arteria, & ita simul ex ventriculo & ex pectore fit evacuatio; unde pus phthisicorum, quod in pulmonibus fluctuat, læpius optimè & feliciter per vomitoria evacuat; & talia etiam id, quod bronchiis pulmonum fortiter impactum est, certò & feliciter deturbant: quin etiam expectorantibus remediis commodè remedia vomitoria, sed in imminuta dosi, possunt permisceri, ut saltem stimulent expectorationem, non autem vomitum insetant: vel præmissis solventibus & attenuantibus sunt propinanda, & ita stomacho & primis viis occurrendum; id enim, quod in his hæret, vix melius ac per vomitoria evacuat. Exemplar per vomitoria, in paroxysmo propinata, feliciter curatorum prostant hinc inde in Authoribus: Imprimis RULANDUS quamplurima habet in *Thef. Med. pag. 103. 109. 111. 116. 118. 120.* & sic porro: In *Cent. 3. Curat. 96.* refert de Orthopneæ periculossima, curata subtili solo vomitu librarum viij. pituitæ lentæ & crassæ cum bile permixtæ: Et hæc etiam est Methodus POTERII, qui viribus adhuc stantibus in asthma propinat vomitorium, ut videbitis in *Cent. 2. Cur. 16. & 46.* item *Cent. 3. Cur. 22.*, ubi etiam curavit asthma periculossimum ex vitio mensium deficientium beneficio vomitus, in paroxysmo propinati: Sic TIMÆUS in *Epist. p. 122.* asthma refert periculossimum & contumacissimum, nullis cedens remediis, tandem provocato vehementi vomitu curatum: vid. etiam HOEFERUS in *Herc. Med. p. 118.* & HORSTIUS in *Problem. Decad. 4. qu. 3. pag. 90.*, HARTMANNUS *Pr. Chymiar. pag. 134.*, RIVERO *l. 7. Prax. c. 1. & PETRÆUS Nosol. l. 1. Diff. 18.* Imò natura ipsa monstrat interdum proficuum usum vomitoriorum: sic SILVATICUS *Cent. 3. Consil. 49.* refert asthma singulis noctibus recurrens cum suffocationis periculo, à quo non prius arger fuit immunis, nisi spontè succederet vomitus tam assumptorum quam materię pituitosæ. In specie in Asthma sicco, ubi radix mali est in hypochondriis vel abdomine, aliis irritis vomitus convenit extra paroxysmum, rarius in paroxysmo, præsertim si forsan metuenda pathemata hysterica obstituerint; tutius tamen extra quam in paroxysmo. Et ita quidem in paroxysmo asthmatico vomitoria sunt optima, ut pote quæ subinde à præsentaneo vitæ discrimine liberant: purgantia verò per inferiora in paroxysmo non conveniunt, quin eum potius insigniter exasperant. Inter Vomitoria ad hunc scopum usalia sunt parum antimonialia, partim quæ ex nicotiana parantur: nam hæc sunt appropriatissimum ad tale asthma remedium, atque materiam viscidam ex stomacho & ex pulmonibus evacuant: aqua nicotianæ ad ℥j. data, vel syrupus nicotianæ sumptus ad cochlearia duo egregiè promover Vomitus: nam duo sunt syrupi ex nicotiana, vomitivus, & alterans: Imò solus sumus nicotianæ per tabulum attractus, & gutture habitus, potentem vomitum pro asthma curando mover. Deinde succus expressus radicis ireos nostratis ab ℥ss. vel ℥j. ad ℥ij. prout est validus vel minus validus, in hydromelle vinoto propinatus, tam ex ventriculo quam pulmonibus ortam Orthopneæ jam desperatam curavit, teste PLATERO *Observat. l. 1. pag. 175.* mover vomitus vicio-



violentos & secessus; qui ipse ab eodem commendatur in Dyspnœia, ab hydropo pectoris enata. Facit huc Vomitorium secretum FREITAGII ad Asthma & Empyema ex HEURNIO, quod habet in *Aurora Medicorum* c. 20. descriptum: & Vinum emeticum HEURNII ex Elleboro albo, quod proficit in SCHROEDERO l. 4. p. 239.

*R. Hellebor. albi crass. cont. ʒʒ.*

cur affundit

*Vini Petrosim. vel Hispan. ℥j.*

Digeri exponendo Soli:

Hujus infusi cochlear unum.

Valde dissolvit & movet vomitus, idque sine insigni difficultate; si verò semicochlear cum aliis laxantibus exhibeatur, præclarè alvum sine vomitu educit: Mistris, vel Linctibus aliquot guttæ hujus infusi additæ, empyematis expectorationem copiosè movent: Hinc præstantissimum remedium ad Asthma & empyema est hoc:

*R. Passul. mundat. ʒiv.*

*Rad. liquirit. ras. ʒj.*

*Mell. despumat. ʒij.*

*Sacchari Candi ʒv.*

*Vini Hispan. ʒvj.*

Bulliant, ut fiant instar Conditi: cui tantum admisceatur Acidum seu spiritus sulphuris per campanam, ut gratum acquirat saporem, hinc aliquot guttæ Vini illius helleborati instillantur.

Teneantur in ore masticandæ passulæ, vel quoties easdem in os recepturus est, guttæ duæ tresve instillantur de dicto infuso, idque speciatim in Asthmate humido, ubi materiz resolutione & expectoratione opus est. Remedium hoc ceu secretum habendum vult FREITAGIUS.

His tamen vel commodè præmittenda vel adjungenda sunt Expectorantia remedia, quæ Acidum corrigere & visciditates istas attenuare & resolvere valent: quæ primaria sunt ea, quæ ex gummi ammoniaco præparantur, ut Potiuncula Bruneri, item syrupus nicotianæ & similia: c. g.

*R. Salis ammoniaci ʒj.*

*Spec. diatr. piper. ʒʒ.*

*M. f. pulvis:*

*div. in 3. partes æquales: S.*

*Pulvis digestivus,*

Vel si materia sit nimis viscida;

*R. Aqua pulmon. vitul. cum succo nicot. ʒʒʒ.*

*Syrup. de jujub. ʒʒ.*

*Nicot. per iterat. Infus. per. ʒij.*

*Spiritus sulphuris gutt. xv.*

*M. S.*

*Potio confortativa ad pectus pro 2. vicibus.*

*Notandum II.*

I. Pus, si asthmatis causa, evacuandum vel per expectorantia, vel per paracentesin thoracis.

II. Abscessus vel ulcus consolidandum: de quo infra, ubi de Phthisi.

*Notandum III.* In paroxysmo asthmatis cujuscumque, speciatim humidi, in quo sanguis in motu suo simul per pulmones vel præcordia plus minus sistitur.

I. Ad venæ sectionem properandum, ut sanguinis copia imminuatur, & ejus liberior motus nonnihil juvetur, adeoque sic in specie in asthmate, vitio sanguinis enato, locum obtinebit, minus in reliquis: Vc)

II. Sanguis coagulatus dissolvendus, de quo ubi de Casu ab Alto: Vel

III. Vitium cachecticum emendandum, de quo, ubi de Cachexia: Vel

IV. Solitæ evacuationes revocandæ, v. g. menses proritandi, aut si fieri nequeat, fonticuli in regione loci, consuetæ excretionis vicini, induendi.

V. Tuigescentiæ qualibet, acidum effervescentis absorbentibus, aut blandis diaphoreticis, aut copiam sanguinis imminuentibus, corrigenda.

*Notandum IV.* In nullo paroxysmo cujuscumque asthmatis purgantia conveniunt, imprimis propriè sic dicta seu fortiora, quia eum potius exasperant: quod observant unanimiter omnes Practici, quia agitant corpus & succos contentos, & symptomata morbi pejora faciunt; nisi forsitan ad imitationem POTERII purgantibus oplata in paroxysmo addere velimus; de quo vid. *Cent. 3. c. 22.* Nam opiata sedant paroxysmum & symptomata, quæ aliàs purgatione inducuntur, dum interea pilulæ laudabiliter operantur: vid. *Cap. citatum*, ubi egregia & notari digna habet. Facit huc notitiam SCHOLZII in *Conf. 92. In asthmaticis*, dicit, diligenter ca-

ventur, ne dentur spiritus evacuantes, à quibus commoveatur & aguetur materia, ipsæque fluxiones augeantur: videmus enim homines aliquin sanos post purgationem multum expuere, & emungere nares sæpè ob motam materiam: quare magis hoc illis accidere possit, quibus sponde, & quidem continuè, fluxiones ad pectus moventur. Alias post sedatum paroxysmum ad præcavendam recidivam, & si quæ sunt reliquæ morbosæ, ad eas exhauriendas conveniunt evacuantia quæcumque moderata, in specie pilulæ, quibus semper gummi ammoniacum addendum venit: v. g. massa pilular. de ammoniaco Quercetani; item massa pilul. de herera cum agarico, mista cum gummi ammoniaco: c. g. FREITAGIUS habet pilulas:

*R. Massa pilul. de agar. ʒj.*

*Gum. ammon. ʒʒ.*

*Troch. alband. gr. ij.*

*Extr. cinnam. (nil valet) gr. iij.*

Cum essentia croci vel enulæ fiant pilulæ: quibus etiam guttæ una vel altera olei destillati anisi addi potest: Vc)

*R. Galban. cum croco sol. ʒʒ.*

*Extr. troch. alband. gr. ix.*

*Diagryd. gr. iij.*

cum oleo destillato curvi f. pilulæ pro tribus dosibus.

*D. S.*

*Pilulæ resolventes pro 3. vicibus.*

Ubi Asthma ex vitio stomachi, conveniunt hæc pilulæ:

*R. Massa pilul. de agar. aut ber. cum agar. gr. viij. ad ʒj.*

*Gum. ammon. aceto squill. sol. gr. viij. ad ʒʒ.*

*Extr. troch. alband. gr. ij. vel iij.*

Cum spiritu anisi vel aqua asthmatica f. pilulæ.

*D. S.*

*Pilulæ purgantes pro una vice.*

*Pilulæ catholica* Poterii similiter sunt expetæ contra Asthma: Nec negligendus est in tali casu Mercurius dulcis, cum scammonio sulphurato acutus, quem RIVERIUS interdum sub nomine Calomelanos usurpat: vid. *Cent. 3. Observ. 28. 29. 31.* Vel

*R. Massa pilul. de ammon. Quercetani gr. xv.*

*Mercur. i dulc. ʒj.*

*Extr. troch. alband. gr. ij.*

*Olei destillat. anisi gutt. ij.*

Cum f. q. spiritus anisi f. pilulæ,

*D. S.*

*Pilulæ pectus resolventes.*

Vel

*R. Pass. min. purg. ʒj.*

*Tartari vitriolat. Troch. ʒj.*

*M. S.*

*Passula laxativa pro duabus vicibus.*

Item prodest aliàs Oxyinel de nicotiana Quercetani purgans: vel possunt fieri Vina Medica squillitica aromatica successivè evacuantia; c. g.

*R. Herb. Anthos,*

*Mentha,*

*Salvia an. M. j.*

*Fol. fen. sine stip. ʒvj. vel ʒj.*

*Rad. armorac. rec. ʒij.*

*Her. nostr. recens. ʒʒʒ. ad ʒij.*

*Florem.*

*Acori veri,*

*Angelis. an. ʒj.*

*Rad. zedoer. vel. galang. ʒij.*

*Cinnam. ʒj.*

*Passul. min. ʒvj. vel ʒj.*

Infund. in vini Mens. ij.

Hauriatur cochlearim qu. v. semel & bis, ut laxet.

*Notandum V.* Si Asthmatis causa est serum, hoc evacuandum per urinam vel sudorem, vel veficatorium confectum, vel per fonticulum pedetentim.

*Not. VI.* Sudorifera in Asthmate convulsivo & sicco, tam in quàm etiam extra paroxysmum, non negligenda sunt: nam illis rectè adhibitis, interdum asthmata præcaveniunt, aut horum paroxysmi sæpè sedari possunt, maxime si ex volatilibus sint præparata. In Asthmate humido etiam suum locum habent quodammodo: id quod confirmat SCHOLZIUS sup. à citato loco inquit: Multum prodest sudor, qui & fuligines & aquositates collectas discutit. Provocari potest Decocto guajaci callidè assumpto: facit quoque ad expectorationem & puitæ in pectore incisionem. Scio quosdam decocto ligni lassifras ulos pro potu quotidiano in vigore hujus morbi, & alias id talem loco vini in principio pectus assumpsisse, & exinde eximiam opem tenuisse.

*Not.*



**Not. VII.** Si vitium sit in Stomacho, Vomitoria & carminantia aromatica, ac digestionis vitia, præsertim cruditatem acidam, corrigentia, conveniunt, utpote cura methodica circa tenturum & malum hypochondriacum instituenda.

**Not. VIII.** Opiata multum conferunt, præsertim respectu paroxysmi. Quando enim nimius spirituum impetus, & hinc inordinatæ pectoris motiones, item quorumcumque in corpore contentorum fluidorum nimius motus ad pectus urgent, optime his omnibus Opiata ritè administrata, præsertim appropriatis permixta, multum conferunt. In asthma quidem humido, quatenus materiz peccantis motum & excretionem sufflaminant, suspecta videntur, cum magis incrassentur, & quasi inspissetur materia peccans: Ad omniam verò paroxysmi ferociam mitigandam, quæ concitatori spirituum impetu per accidens quasi exacerbatur, optima sunt. Tutiora autem sunt in asthma sicco, tam ante paroxysmum, eundem præcavendo, quam in paroxysmo, eundem minuendo. Conferatur **WILLISIVS in Pharm. Rational. Part. 1. pag. 299. Part. 2. pag. 247.** Talia sunt essentia opii, Theriaca ac Murtidatum, Symplicium diacodion Montani. Nempe in quovis paroxysmo asthmatis tam humidi quam sicci, spirituum impetus, & hinc concitator sanguinis ac lymphæ motus ad partem probè attendendus; & si nimius, Opiatis nonnihil sufflaminandus. Docuit hoc Veterum experientia Practica: hinc **FONSECA lib. 1. Conf. 85.** Inquit: *Articularius in paroxysmo asthmatico & difficultate respirandi suffocativa damna communem curationem, quæ fit avertendo materiam, quæ fluit; quia hic modus curandi agit magis illam: esse potius inhibendam fluxionem, quam iis, quæ incrassant, præsertim si fuerit tenuis. Quare exhibet syrupum de papavere, dia. Codium, & devenit ad opiatum, quod est philonium Romanum ad 3i: quam etiam Galeus videtur laudare curationem Catarrhi suffocantis: Deinde adhibet cucurbitas ad vertebrae dorso & super scapulam: hac ratione (inquit) omnes evaserunt. Illi verò, in quibus processit evacuantibus, divertentibus, & materiam agitantibus, perierunt: quæ cerè verò prorsus præferuntur, ut mihi etiam experientia compertum est. Quoad Philonium majus seu Romanum vid. **ZWELFFERUS Animadv. in Pharm. Aug. pag. 61.***

**Notand. IX.** Quod Asthmata à causa particulari orta, ut à scabiæ retropulsa, ex ulceribus occulis, ex fumis metallicis & Mercurialibus, particularem requirant medendi methodum. Asthmata si oriuntur ex scabiæ retropulsa, tunc orantis movendus est lapis, ut iterum appareat scabies in extima cute mediantibus sudoriferis, in specie volatilibus, & hinc appropriatis, nempe remediis ex helenio, ejus Extracto & essentia, fumaris, ejusque essentia simplici vel & composita, extracto theriacali, Decocto helenii & fœniculi & similiter: Item antimonio diaphoretico, cum salibus fixis & volatilibus misto, Massam sanguineam purgando, scabiem denuò expellentibus, nisi enim fomes scabiæ denuò sub cure defigatur, omnis cura erit frustranea; in quem finem etiam velicatoria, femoribus & brachiis applicata, optima sunt. Quod si nullomodo possit reproduci scabies, in tali casu imitandum est **ZACUTI IUSITANI** egregium inventum, qui talem ægum cum alio scabioso in eodem lecto collocat, ut ab hoc fermentum scabiæ malignum & ulcerosum hauriat, & ita denuò scabies introducatur.

**Notand. X.** Si à fumis metallicis, in specie Mercurialibus, oriuntur asthmata, tunc nil in horum cura perficitur cum ordinatis ad hunc effectum remediis, nec expugnatur, sed potius appropriatis ex mineralibus & metallicis remediis sistenda: hinc Mercurius dulcis, item Mercurialia fixa (quod fixiora eò meliora) Bezoardicum solare, turpethum Minerale, item cinnabaris antimonii, antimonium diaphoreticum ac similia in usu sunt. Exempla talium asthmatum ex fumis metallicis, imprimis Mercurialibus, curatorum, vid. in **HORSTIO l. 7. Obs. 25.**

**Notand. XI.** Si Dyspnœia oriatur à subito frigida potu vel frigore admissio, præsertim post æstum, imprimis conducunt, quæ sanguinem grumofum solvere valent: in quod puncto succum bellidis in vino propinavit **D. MICHAELIS**: vid. **MINDERERUS in sua Medicina militari.** Acetaria ex bellide in ætate laudat **DEODATUS in Pauli. Hygiali. l. 3. cap. 22.**

Remedia ergo alia appropriata, quæ conveniunt in Asthma humido, eoque ex pulmonum aut stomachi vitio; aut mucilagine crassa viscida & sterculenta, utpote quæ ordinariò ferè nomine asthmatis intelliguntur, sunt imprimis incidentia, attenuantia, expectorationem promoventia, &c. plus minus aromatica, stomacho & pulmonibus amica, v. g. helen-

nium, quod est insigne pectorale, marrubium album, & nigrum seu prassium, hyssopus & capilli Veneris, ros Solis, tusilago, scabiosa, pulegium, calamintia, acorus verus, carduus benedictus, satureja, crocus imprimis, item folia & flores rotundifolii, de quibus vid. experimentum **BORELLI in Cent. 4. obs. 46.** qui flores vel ejus folia coquere jubet cum vino optimo & melle ad dimidiæ partis consumptionem, & capere ante somnum, dicitque mirè conferre. Porro conveniunt veronica, radix raphani, ari, zingiberis, zedoaria, quæ sola mirè levat dyspnœiam comesta, sicut & aqua seu spiritus zedoariæ multum confert ad liberandum pectus à saburra, & liberiores spirituum procurandum: item prodest radix vitis alba seu bryonia, cujus succus artificiosè prolectus, præter vim laxativam, singulares hic habet vires contra asthmata; dissolvit enim, quicquid grumofum & coagulatum est in corpore, & pectus liberat, quem videb. præparatum in **HARTMANNI Pr. Chymiatr. pag. 95.** His addatur helenium, optimum antiasthmaticum, quocumque modo usurpetur, imprimis pulverisatum, & cum melle in Electuarii forma redactum, in asthma stomachali multum confert. Radix ari acris, vel vino infusa, & pota, vel lentè in umbra siccata, ut retineatur sal acerrimum, & pulverisata pro expectoratione etiam egregia est, cum vino assumpta. In genere quò recentior est radix, & ex ea parata remedia, eò sunt meliora propter sal acerrimum, quod aliàs, si vetustior radix, avolat: e. g.

**R. Pulv. radic. ari 3iv.**

**Ireos Flor.**

**Cinnab. antimonii an. 3ij.**

**Flor. sulphuris,**

**Benz. pulveris. an. 3i.**

**M. f. pulvis. S.**

**Pulvis pro expectoratione.**

**Dosis 3ss.**

Commendatur etiam à multis tizcula ari, sed est sex nullius ponderis: Si radix hæc præparatur cum aceto, caltratur. Omnes faculæ, ireos, ari, bryonia, quæ aliàs vulgò in affectibus pectoris, in specie in asthma, commendantur, seu facultatè omnino rejiciendæ, quoniam omni usui, omniq; facultate omnino sunt destitutæ: vid. **ZWELFFERUS in Animadv. ad Pharm. Augustanam.**

Ex his fiat Vinum medicatum pectorale tale:

**R. Herb. hyssopi,**

**Rorismar.**

**Flor. rapar. an. M. j.**

**Rad. ireos Flor. 3ss.**

**Aristol. rotun.**

**Liquirit. an. 3i.**

**Zedoar. 3ss.**

**Coricar. pingv. n. viij.**

**Semin. urtica 3vj.**

**Anis.**

**Fœnicul. an. 3ij.**

Ex incis. & contris. fit Nodus pro Vini Mens. ij.

**D. S.**

**Nodus ad vinum pectorale.**

**V. l.**

**R. Herb. Marrub. M. ij.**

**Com. absinth. vel hyssopi,**

**Rorismar. vel Veron. an. M. j.**

**Rad. enui. 3ij.**

**Ireos Flor. 3i.**

**Imperator. 3ij. vel 3ss. ad 3vj.**

**Zedoar. 3ij. vel 3ss.**

**Passul. min. 3i. vel 3ss.**

**Sem. anis.**

**Fœnicul. 3ss. vel 3vj.**

Hæc ipsa incisa includantur nodulo, infundendo vino:

**D. S.**

**Nodus ad vinum pectorale.**

De quo æget bis vel ter quotidie hauriat bonum haustum.

Vel coquantur in aqua addito melle, & ita fiat post colaturam Hydromel pectorale. S.

**Hydromel pectorale.**

Vel decoquantur in aqua vel vino, & cum f. q.

**Sacchari fiat syrupus pectoralis. S.**

**Syrupus pectoralis.**

Vel cum aqua, aceto, & melle pro oxymelite pectorali.

**D. S.**

**Oxymel pectorale.**

Aut additur decoctioni oxymeli. Iquillit. q. l. pro gratia laporis. S.



Potio pectoralis ad respirationem.

Vel

R. Herb. hyssopi,  
Marrub. an. M. ij.  
Rad. enul. ʒij.  
Sem. fennicul. ʒij.  
Anis. ʒij.  
Terra fol. tartari ʒij.  
Aqua simpl. ℞ij.  
Mellis despum. ℞ss.

Coqu. in vase clauso : in fine desputnetur, & addatur

Cinnam. ʒij.

Croci Orient. ʒj.

Coletur pro Hydromelite pectorali resolvente & incidente,  
D. S.

Hydromel pectorale.

Convenit imprimis senibus, asthmate humido laborantibus addi potest pro lubitu syrupus nicotianæ. Junioribus propter metum febris, scorbuticis aut hypochondriacis propter fermentationem, cautè præscribitur.

Vel

R. Herb. scabios. M. ij.  
Heder. terrestr. M. j.  
Rad. enul. ʒij.  
Ireos Flor. ʒvj.  
Sem. anis,  
Fennicul. an. ʒij.

Coqu. in f. q. aquæ simplic.

Calatura ℞ss. addo

Oxymel. squillit. q. s. pro gratia saporis.

M. D. S.

Potio pectoralis resolvens.

TABERNÆMONTANUS in Herbar. Decoctum botryos commendat, quod cum oxymelite dari potest. Oleum seu liquor sacchari, tam simplex, quam compositus, qualem habet RIVERIUS Prax. l. 7. c. 1., similiter tanquam expertum commendatur in paroxysmo: vid. etiam PETRÆUS l. 1. Dissert. Harmon. 18. §. 44. Sed in genere moneo, fugiendum esse abusum sacchari & saccharatorum meliorumve in omnibus morbis, speciatim in affectibus pectoris: saccharum enim, propter facilitatem effervescentiam ac hinc flatulentiam, multos exasperat morbos, quorum radices in primis viis latent; imprimis febres, post hinc scorbutum & malum hypochondriacum deterius reddit. Tandem urit phthisicis, tussiculosis & asthmaticis familiarissimè præscribantur saccharata, in nimia tamen copia malum potius aggravant, quam leniunt, viscidiora reddendo excrementa, & putrilaginem & corruptionem pulmonum magis intendendo. Imprimis de nocu- mentis sacchari in affectibus pectoris vid. GARENZIER in Tract. de Tab. Anglicæ, ubi dat exemplum tale: si quis frusta duo carnis recipiat, & unum ex his saccharo adspersat, altero non consperso, & per noctem relinquat manè, inveniet unum putredine correptum, altero non saccharato adhuc sine noxa existente.

Porro essentia croci in asthmate multum commendatur, item essentia helenii & ligni sassafras, item essentia radices Ireos Florentinæ cum spiritu anisi parata. Convenit etiam aqua seu succus raphani recens expressus, qui cum saccharo est egregium incidens, resolvens & expectorans. Modus est quando raphanus recens in taleolas incisus, & saccharo adspersus, inter duas patinas exprimitur, vel quando comminuitur Raphanus, & cum saccharo mistus exprimitur. In omni tussi & asthmate, respirationem lædentibus, hic succus potentissimum est expectorans, omnem mucum ubique resolvens, tam in pulmonibus quam in stomacho. Convenit itidem acetum & oxymel, nunc simplex, nunc compositum & squilliticum, quod Veteres in frequenti usu habuerunt: imprimis aqua cinnamomi cum oxymele scillitico mista, est egregia in senibus; & hanc ipsam in paroxysmo commendat RIVERIUS Cent. 3. Observ. 8. & Obs. 21. ut & Prax. Med. l. 7. c. 1.

R. Aqua cinnam. ʒij.

Oxymel squillit. ʒj.

M. D. S.

Potuluncula respiratoria.

Propinetur cochleatim, præsertim in senibus ac sanè Oxymella talia præstant ferè syrupis de hyssopo, de helenio, de erysimo Lobelli, de Marrubio, tussilagine, &c. D. SCHOENFELDER Hist. & Cur. 44. pag. 174. inquit: Vidi, & præfens fui non infimæ notæ mulieri, paroxysmo asthmatico conficta, de repente suavis sumere acetum, quod statim suprajacentem

cubiculi in promptu erat, cochl. ij., & ita quasi miraculo quodam paroxysmus sedatus est. Notæ sunt aliæ Aquæ pectorales & asthmaticæ spirituosæ, quas inter frequentior est Aqua Asthmatica Imperatoris Rudolphi, quæ est spiritus Vini aromaticus, syrupus de marrubio, de absinthio Mynsichii: & speciatim aqua rectè destillata & syrupus nicotianæ ex multiplici infusione paratus, aque sic magis à vi vomitoria liberatus, est per quàm utilis: imprimis EPIPHANIUS FERDINANDUS in Hist. Med. Mirab. Hist. 48. & 32. hunc syrupum ceu divinum commendat remedium, ad mucum in asthmate, & pus in Empyemate evacuandum: sed necesse est, ut vis ejus emetica mediante diuturna digestionem infringatur. Propterea FERDINANDUS ita præscribit:

R. Fol. tabac. ʒj.

Bulliant in aquæ dulc. lib. ij. ad consumptionem medietatis, addendo in fine

Malva,

Branca Vrf.

Violar. an. M. j.

Coletur, & cum sapa misc. & calidiusculè detur pluries. Idem FERDINANDUS in Ep. Conf. 48. sequentem syrupum ceu singularem in asthmate laudat:

R. Tabaci,

Tussil. an. M. j.

Cum aqua coque ad tertias, & adde sacchari q. s. pro syrupo, quem non satis potest laudare.

Et quidem ratione salis volatilis acerrimi oleum ejus est vomitorium, sed ejus sal volatile est egregium in affectu pectoris. Viraque ratione convenit nicotiana: nam dum adhuc instructa est virtute vomitoria, convenit in paroxysmo pro vomitorio; postmodum ubi hæc est infracta, ejusmodi tamen sal volatile aere insigniter expectorant; unde Petrus Johannes Faber insigniter commendat aquam nicotianæ ad asthma, præmissio purgante, ad ʒiv. cum aqua cinnamomi, & gutt. iv. vel vj. aut x. spiritus niri instillatis Essentia peti cum spiritu vini extracta, & nielle excepta, egregium est expectorans.

Præ ceteris asthma humidum vix melius habet remedium, tam in quàm extra paroxysmum, quàm gummi ammoniacum in vino vel aceto vel alio liquore appropriato acidulo dissolutum: nil namq; æquè resolvit, & expectorant mucilagines viscosas ac tartarum, uti vocant, pulmonum atque stomachi & primarum viarum, quàm gummi ammoniacum, quod ipse felici usu præscribo. In asthmate certè vix habetur par remedium: datur à ʒj. ad ʒij. vel ʒj. in aceto vel liquore appropriato acidulo dissolutum; hinc basis est commendatissima potiunculæ Brunneri ad Asthma in ejus Consiliis, Conf. 34., cujus descriptio est hæc:

R. Gum. ammoniaci ʒj. vel ʒij. ad ʒij.

Vini Rhen. ʒij.

Aqua hyssopi ʒiv.

Misc.

Detur pro vna doss, ubi necessitas urget; vel pro duabus dossibus.

Hanc potiunculam multi Authores commendant, quos inter est etiam TIMÆUS in Cast. pag. 97. & MICHAELIS, qui feliciter eà usus est. Ingrata quidem est, sed admodum in paroxysmo asthmatis humidi convenit; addi potest oxymel squilliticum; c. g.

R. Aqua hyssopi ʒij.

Gum. ammoniaci cum aceto sol. ʒj.

Spiritus cochlear. ʒij.

Oxym. squillit. ʒvj.

Syr. de erys. Lobel. ʒij.

M. S.

Potio ad respirationem.

Detur in Asthmate scorbutico. Vel

R. Aqua hyssopi,

Veron. an. ʒij.

Cinnam. ʒj.

Ess. zedoar. ʒij.

Gum. ammoniaci cum aceto sol. ʒj. vel ʒij.

Oxymel. squillit. ʒj.

M. D. S.

ut suprâ.

Hujus occasione paratur etiam spiritus asthmaticus B. Domini D. MICHAELIS in Asthmate humido expertissimus: Vocatur etiam alias spiritus viridis aris compositus, vel spiritus gummi ammoniaci compositus; v. g.

R. Viridis aris aut Cryst. viridis aris c. aceto par. ʒiv.

Gum. ammoniaci ʒj.

Sulphuris



*Sulphuris eler. ʒij.*

Mixta destillentur cautè ex retorta in arena; alias enim rupta vitra, aut tota massa in receptaculum proruit: prodit spiritus acidus admodum volatilis, & simul oleum frigidissimum & penetrantissimum: spiritus separatur ab oleo scetido, & rectificetur per alembicum, cui *nodulus ex croco* impositus sit.

Spiritus hic ritè paratus mirabilis est ad incidendam, attenuandam, & dissolvendam quamcumque massam viscidam, in quocunque loco stabulantem, & tollendum asthma; sive per se in aqua asthmatica Rudolphi, vel alio vehiculo oleoso inflammabili conveniente, sive etiam additis aliis, e.g. Elixir proprietatis &c. usurpetur. Oleum rectificatum inservit pro malaxatione emplastrorum pro tumoribus duris scirrhoris, ac scrophulis viscerum aut partium externarum.

Dosis spiritus est a guttul. xxx. ad xxx. in vehiculo quodam vel aqua destillata; aut diluatur cum spiritu hyssopi, essentia belenii, & fiat Mixtura cochlearum usurpanda; e.g.

R. *Aqua hyssopi,*  
Flor. papav. err.  
Asthmat. an. ʒij.  
Spiritus asthmatic. ʒij.  
Oxymell. squillit. ʒi.  
M. D. S.

ut ante.

De hoc in paroxysmo, q. pl. capiatur; sic enim convenit in dissolvendo & attenuando mucos.

Vel  
R. *Aqua Flor. papav. ʒij.*  
Asthmat. ʒvj.  
Spiritus asthmatic. ʒi.  
Syr. de nicot. ʒij.  
M. S.

Succus respirativus pro aliquot vicibus.

Vel  
R. *Aq. hyssopi ʒij.*  
Mentha ʒi.  
Asthmat. Rud. ʒvj.  
Spiritus viridis aris ʒi. vel ʒij. ad ʒij.  
Syr. nicot. ʒvj. vel Oxymell. squillit. ʒi.  
M. S.

ut ante.

Vel  
R. *Aq. asthmatic. Rud. ʒij.*  
Spiritus asthmatic. Mich. ʒij. vel ʒij.  
M. D. S.

*Aqua asthmatica cochlearum sumenda.*

Vel  
R. *Aqua hyssopi,*  
Mentha,  
Cinnam. an. ʒi.  
Spiritus gum. ammon. cum viridis aris. ʒi.  
Syr. nicotian. ʒvj.  
M. S.  
Potio asthmatica.

Vel  
R. *Aq. hyssopi ʒij.*  
Asthmat. Rud. ʒi.  
Gum. ammoniaci cum aceto squillit. sol. ʒi.  
Spiritus asthmatic. Mich. ʒij.  
Syr. de hyss. ʒvj. vel ʒi.

M. pro duabus vel tribus dolibus. S.

ut ante.

Vel  
R. *Aq. Flor. papav.*  
Asthmat. Rud. an. ʒij.  
Spiritus gum. ammon. cum viridis aris ʒi.  
Oxymell. squillit. vel Syr. nicot. ʒi.  
M. S.

ut ante.

Vel  
R. *Aq. Flor. papav.*  
Hyssopi an. ʒij.  
Asthmat. Rud. ad ʒij.  
Spiritus asthmatic. ʒi.  
Oxymell. squillit. ʒi.  
M. D. S.

ut ante.

Hauriatur cochlearum.

Vel  
R. *Aq. Flor. papav. ʒij.*

*Aq. Antise. Dom. ʒi.*  
Spiritus asthmatic. Mich. ʒij.  
Cochlear. ʒi.  
Essent. croci.  
Rad. oculan. ʒij.  
Brod. rad. emul. ʒvj.  
M. S.

ut ante.

Vel R. *Aq. hyssopi ʒij.*  
Veron. cum Vino ʒij.  
Spir. virid. aris vel Asthmatic. ʒi. ad ʒij.  
Syr. nicot. ʒij.  
M. S.

ut supra.

Usurpetur cochlearum.

Hic spiritus mixtus cum elixir pectorali D. D. MICHAELIS admodum commendatur ab eodem contra asthma & similes pectoris affectus. Descriptio istius Elixiris est hæc:

R. *Herb. pulmon. Ital.*  
Gnaphal. mont.  
Marrub.  
Hyssopi  
Brassica,  
Rorella,  
Veronica,  
Scabiosa,  
Tussilag. an. M. j.  
Flor. Enula,  
Scabios. an. p. ij.  
Rad. Enula,  
Tussilag.  
Aristol. rotunda,  
Ireas Flor. an. ʒi.  
Myrrha,  
Mastic. el.  
Croc. Orient.  
Succi Liquirit. an. ʒi.  
Cinnam.  
Cardam. el. an. ʒij.  
Benzoes ops. (egregium in affectibus pectoris.) ʒij.  
Syrac. ʒij.  
Alupi. Moschar. ʒij.  
Sem. Nigellæ.  
Vitica an. ʒij.

Inella & confusa lixorentur cum spiritu sulphuris: infundantur in spir. hyssopi, belenii & rorella; digerantur & extrahantur: In liquore filtrato dissolvatur Extractum pectorale, & servetur pro usu.

(Extractum pectorale Michaelis est succus tussilaginis vel plantaginis inspissatus.)

Hoc Elixir cum dimidia parte spiritus asthmatici permixtum, & ad guttas 20. 30. vel 40. propinatum, est excellens remedium; e.g.

R. *Elix. pectoral. ʒij. vel ʒij.*  
Spiritus asthmatic. ʒij.  
M. S.

Elixir pectorale, & asthmaticum.

Alii solummodo spirituum gummi ammoniaci cum ærugine destillatum miscent cum spiritu anisi vel zedoariæ, & ita similiter egregium remedium habent contra asthma. Quidam loco spiritus asthmatici laudant etiam spiritum niri dulcem; e.g.

R. *Aq. Asthmatic. Rud. ʒij.*  
Spiritus niri dulc. ʒij.  
M. S.

Aqua asthmatica cochlearum sumenda.

Nonnulli recipiunt gummi ammoniacum, & miscent cum aliis, aut faciunt exinde Loch, vel Electuarium, quale videb. in RIVIERO Cent. 3. Obs. 21. e.g.

R. *Gum. ammon. in vino sol. ʒi. vel ʒij.*  
Oxymell. squillit.  
Syr. rad. emula,  
Marrub. an. ʒi.  
M. S.

Succus asthmaticus pro aliquot vicibus.

Cui etiam pro lubitu addi potest aqua hyssopi ad ʒij. vel ʒv. ad imitationem Brannemanni Mixture: item spiritus ceti ʒij. vel ultra.

SCHOENFELDER Curat. lib. 1. pag. 130. sequenti modo laudat:

R. Gum.



R. Gum. ammoniac. decoct. sol. ʒij.

Extr. croci ʒj.

Syr. de praffo,

Hyssopi,

Oxymel. squillit. an. ʒss.

Vini Rhenani ʒijss.

Aqua asthmatic.

Aur. Longii an. ʒij.

Spir. Veron. ʒss.

Misceantur.

Observeor vanden hie, ne nimis sit usus vel abusus dulcium & saccharatorum, utut ordinariē usurpentur vulgariter; admodum enim nocent pulmonibus & stomacho, & quodammodo ad Phthisin disponunt.

Dictum Elixir pectorale etiam cum spiritu salis ammoniaci anisato misceti, & ad guttas 40. vel 50. propinari potest.

R. Ag. hyssopi ʒij.

Veron. ʒj.

Spir. salis ammon. anis. ʒij. vel ʒj.

Syr. de byssopo ʒij.

M. D. S.

Potio pectoralis.

Vel

R. Spiritus salis ammon. anis. ʒss.

D. S.

Spiritus spiritus ad respirationem.

De quo capiat æger 30. vel 40. guttas ter in die: mane in vehiculo calido; à meridie bihorio ante pastum in frigido; vesperti, post moderatam coenam, sub introitu lecti, iterum.

Vel

R. Spir. carmin. de trib. ʒij.

D. S.

Spiritus resoluens.

Eodem modo usurpatqr. Vel

R. Tinctura tartari ʒss.

Spiritus salis ammon. ʒij.

M. D. S.

Tinctura resoluens.

Usurpetur eodem modo.

Elixir proprietatis Paracelsi & ipsum insignis est efficacie in asthma, pro varietate preparationis à guttis xv. xx. ad xxx. propinatum. De oleis seminum pectoralium, ut oleo destillato anisi, salvia, corismarini, in haustu vini propinantes, nihil dico, quoniam sunt alias satis nota. Facit huc suo modo Decoctum istud ad asthma expertum & utilissimum FRANCISCI JOELIS l. 3. Prax. Sect. I. cap. 5. pag. 151. cuius basis est radix zedoaria, quo ipso in Asthma & Orthopnea facilitatem respirationis sapienter restituisse se asserit. Prescriptio est hæc:

R. Rad. zedoar. ʒss.

Gum. ammon. ʒij.

Fl. sulphuris ʒij.

Croci ʒj.

Contusa coq. in Hydromel. ʒij. (nam mediocrius mellis usus præferendus est usu sacchari) ad medias.

D. S.

Potio asthmatica bene circumaganda.

De quo patienti sæpe in die cochlear j. & ij. propinetur. Nam sola radix zedoaria mirè levat dyspnœjam, si comedatur, eodem docente JOELE. Loco radicis zedoariae alii laudant radicem zingiberis, si scilicet hujus ʒj. in ʒvj. aquæ communis coquitur ad consumptionem ʒij., & hinc aliquantulum sacchari ac mellis addatur pro potu ordinario. Ab ista Potione Joëlis non abluat Potio Brunneri, qui eam tãquam Panacream in paroxysmo commendat, ubi aliàs sedari nequeat. Compositio est hæc:

R. Rad. Fœnic.

Asari,

Ireos Flor. an. ʒij.

Glycyrrh. rasa ʒij.

Coque in aqua font. ad consumptionis tertie partis:

Colatura R. ʒvij. in qua dissolve

Gum. ammon. ʒj.

Oxymel. squillit. ʒj.

Syr. de praffo ʒj. vel ʒij.

Misceantur.

Juxta dicta sulphur, & in specie spiritus sulphuris acidus per campanam paratus, in aqua appropriata ad gratam aciditatem propinatus, admodum commendatur à Practicis ad alle-

vlandum paroxysmum asthmatis humidi: Miscetur cum aqua florum raparum, cum aqua scabiola, hyssopi, syrupo heleni ad gratum saporem, & propinatur tam in quàm extra paroxysmum: addatur, si placet, syrupsus de nicotiana: cujus mixtura cochlearia aliquot subinde hausta insigniter arnuant, abstergent, & tussim expulsiōe promouent. Vid. de hoc THONERUS, nec non HORATIUS AUGENIUS, item BRUNNERUS in Conf. 34. ubi hic nectere, quomodo insufficienter commendare debeat hoc stigma acidum sulphuris in aqua appropriata: se vidisse, inquit, ad decem horas paroxysmo asthmatico periculossimè affectum, cui propinatus est. sulph. in aqu. hyssopi, miraculè instar consulens opem. Imò ab omnibus Authoribus commendatur, tam ad malum præcavendum à recidiva, quàm paroxysmum imminuendum: sicut aliàs extra paroxysmum crebrior florum sulphuris usus, uti & potus sulphuratus pulmonibus optimè confert. Variæ possunt fieri mixturæ huius olei sulphuris, imprimis ad mutationem mixturæ Brunneri:

R. Ag. Rad. croci,

Flor. rapar.

Scabiol. an. ʒj.

Spir. rad. angel.

zedoar. an. drachm. ij.

Syrup. nicot. drachm. vj.

Spiritus sulphuris q. l.

M. D. S.

Potio pectoralis.

Vel

R. Ag. Flor. rapar. ʒiv.

Cinnam. cum vino ʒss.

Syr. nicot. ʒj.

Spir. sulph. q. l. pro subtili acore.

D. S.

Potio asthmatica.

Vel

R. Ag. sanicul.

Hyssop.

Flor. rapar. an. ʒj.

Spir. zedoar. drachm. vj.

Sulphuris q. l.

M. ad gratum saporem: S.

ut supra.

Commendo aquam florum raparum: nam de hac BRUNNERUS c. l. dicit: quod hæc aqua cum croco & paucis moscho mixta miraculose asthmaticis restituit respirationem.

Vel

R. Ag. Hyssopi,

Nicot.

Veron. an. ʒj.

Spir. zedoar. drachm. vij.

Syr. rad. belen.

de Hyssop. an. ʒss.

Spiritus sulph. per camp. q. s. pro grato

D. S.

ut antea.

sapore.

Nec inelegans est Mixtura Lindæ:

R. Rad. Ireos Fi.

Liquirit.

Tussilag.

Flor. Violar. an. ʒj.

Rad. Imperator. ʒss.

Helen. ʒij.

Sem. Fœnic.

Anisi an. unc. ʒss.

Omnibus crassiusculè concisis affunde

Aceti acerr. ʒij.

Macera & digere per triduum: Colat. adde

Sacch. ʒj.

Spir. sulphuris rectif. unc. ij.

Vini Malvatic. ʒijss.

M. & serva diligenter.

Dosis manè & vesperti cochl. ij.

Facit etiam huc potus vitriolarum Helmontii, sulphure accenso & suffitu probe imprægnatus, qui optimus est pro potu ordinario asthmaticorum, & tussientium & similitum: vid. Tumulus Pellis, & Tr. Tussis & Asthma in fine; & conf. CNOELFELII elegantissimus liber de Cura Febr. epidem. malign. pag. 96., qui cum spiritu sulphuris etiam gummi ammon. miscet, quod addi potest, nisi sapor molestus fuerit: c. g.

R. Ag. Flor. rapar. unc. ʒss.

Hyssop.

Ag. Veron.



*Aqz. Veron. an. ʒvj. vel ʒj.*

*Spi. zedoar. ʒʒ. vel ʒvj.*

*Gum. ammon. cum aceto sol. ʒj.*

*Spi. sulphuris acid. legit. parat.*

(sic dissolvetur melius gum. ammon.) ʒj. vel q. l. ad acorem gratum.

Misceantur.

His languidis tandem accedamus ad vomitoria. Denique crocus, uti & sperma ceti in paroxysmo propter vim resolvendi egregie conducit, imprimis in asthma senum, & ceu mirabile laudatur à TIMÆO Von GuldenKlee ad levandum subito paroxysmum asthmaticum, etiam atrocissimum, si scilicet à ʒʒ. ad ʒj., vel solitarie vel cum ana lapillorum cancrorum in aqua hyssopi cum ejusmodi syrapi parum, aut in haustu cerevisiæ calidæ propinetur; dissolvitur enim sic sperma ceti instar buyeri, & facile ac sine nausea assumitur: c. 8.

*R. Sperm ceti ʒij.*

*Croc. Or. ʒj.*

*M. pro duob. dof. S.*

*Pulvis asthmaticus.*

Aliàs etiam potest propinari in aqua hyssopi, cui saporis gratiâ additur syrup. de nicotiana.

Vel

*R. Aq. Cinnam. ʒij.*

*Sperm. ceti ʒij.*

*Oxymel. squillit. ʒj.*

*M. D. S.*

*Potio asthmatica resolvens.*

Singulare enim & expertum est remedium: Experimenta videb. in TIMÆI Von GuldenKlee *Caf. 1. 2. Conf. 10. p. 97.* item in L. 1. *Epist. 11. pag. 92.* & 116. ubi tribuit: illum nunquam fessellisse spermatem ceti usum in asthma, etiam in paroxysmo; adeo ut felicem successum ex spermate ceti propinato, quàm ex Potium. ula Brunneri, observaverit. BIERLINGIUS *Advers. Curios. C. 1. pag. 14.* sequenti modo præscribit:

*R. Syr. de hyssop.*

*Capill. Veneris an. ʒʒ.*

*Sperm. ceti ʒj*

*M. D. S.*

*Succus sæpius coctileatim sumendus.*

Tandem terebinthina cruda per se à multis commendatum est remedium in asthma. Usurpandi modus est varius. Optimus est, si dissolvatur in vitello ovi, & assumatur; aut affusa aqua appropriata fiat liquor lacteus seu emulsio, quæ in paroxysmo asthmatico, item in alius pectoris affectibus, est egregia. Nam sic potest optime assumi terebinthina, quæ aliàs est admodum nauseosa. Dosis est à ʒʒ. ad ʒj. quocunque modo usurpata. Balsamum etiam sulphuris quodcumque etiam solum commune terebinthinatum, & in specie cum oleo anisi præparatum, quod magis appropriatum est, uti quibusvis fere pectoris affectibus, ita in specie asthma extra paroxysmum quocunque modo usurpatum, ad reliquias removendas, & in primis pulmones relaxandos, egregie confert, de quo gutt. 6. vel 8. ad gutt. 20. in vitello ovi vel haustu cerevisiæ calidæ, tanquam experimentum commendat LINDANUS in *Colleg. super Hartmanni Praxin.* Quod si nimis calor intus, ob id luadet SCHOLZIUS, ut ex Balsamo sulphuris cum gummi ammoniaco fiant pilulæ, quibus assumptis haustus appropriatus desuper ingurgitandus, ut eo promptius operetur. Flores etiam extra paroxysmum pro pulmonum conservatione, atque, si ipsi fuerint, restitutione usurpantur. Neque

*R. Flor. sulphuris,*

*Sacchar. an. q. v.*

*M. pro pulvere: S.*

*Pulvis pectoralis.*

Hisce addantur denique millepedes seu aselli. Vix scio, an melius magisque conducens remedium sit contra Asthma; hi ipsi namque à Veteribus practice mirabiliter laudantur in asthma humido, quin tamen etiam juxta WILLIUM convenienter in asthma sicco seu convulsivo adhiberi possint, nulum dubium est. Certe multa mirabilia latent in his animalculis, quæ paucis notæ: ex cognitione tamen materię Medicæ præsuppono, vni singularem habere anodyniam, & potenter diureticam, penetrativam, absterisivam: contra suffusiones internæ maximè commendantur, contra ulcera ac fistulas materiaram & contra arthritidem vagam icorbuticam; & quidem sale volatili nitroio admodum penetrante, eoque egregie incisivo, & insigniter diuretico, adeo, ut somni quorumvè asthma eradicando videantur convenientissimi.

LINDANUS sanè in *Colleg. Manufer. super Hartmannum* in solis his animalculis perfectam asthma curam consistere asserit. Usurpantur vel in substantia ad ʒj., vel exsiccati aut præparati vel pulverati miscentur cum melle addendo parum gummi ammoniaci, ex quibus cum syrupo nicotianæ fit linctus seu potius Electuarium spissum, in quo assumentum. Optimus præparandi modus videtur, ut hi ipsi aselli conquisiti & panno lineo inclusi macerentur seu infundantur in vino aut Decocto pectorali, quod Vinum aut Decoctum infusionis expressum & filtratum singularissimè ad quæcumque asthma, etiam in calculo vesicæ, & affectibus fistulosis Chronicis, est remedium, de quo bibitur quotidie bus haustus unus.

Vel

*R. Vini infus. Millep. ʒviij.*

*Ext. rad. belen. ʒj.*

*Croc. ʒʒ.*

*Syrup. de hyssop.*

*Marrub. an. ʒj.*

*M. D. S.*

*Potio asthmatica pro aliquo vicibit.*

Conferatur BARTHOLINUS *Altor. Hag. niens. Volum. 1. c. 92.* Alii in asthma, tam adustorum, quàm pectorum, millepedes cum croco & cinamomo infundunt vino, quod expressum, & cum paucis sacchari, vel syrupo de hyssopo, aut marrubii edulcoratum, propinant ægis, certissimo, ut dicunt, experimento: vid. PETRÆUS, & SCHLUNKIUS in *Observat.*

Quidam tale vinum macerationis millepedum in dicta loco vini consueti asthma uticis propinant.

Quod item et modum colligendi asellos: in cella cerevisiaria ponatur patella cum jusculo carnis calido, tunc aselli copiose, allecti odore & sapore jusculi, capi possunt.

Sin statum nostræ stomachi malum exasperent, quod sic in hystericiis & hypochondriacis, spiritus carminativus est egregius. Tentandum etiam aliquando, quid salivatio Mercurialis in asthma humido contumaciore præstet sit? Occasionem suggerit THEK MAYER *Conf. 51. pag. 146.*, qui refert asthma per pyæsimum seu salivationem ex oculis cum Mercurio dulceturatum: Sicut idem *c. l. 2. pag. 55.* refert, quendam asthmaticum ex pediluvio cerevisiæ calidæ illic factum arthriticum, & ab asthma liberatum: quod ipsum confirmat pediluvium usum in asthma, quem quidam commendant: videatur HOEFERUS *Herc. Med. pag. 119.* Hæc in genere de asthma humido, seu eo, quod imprimis ex mucilagine viscida pulmonum & stomachi oritur.

Denique quod Asthmata occulta, tam ex convulsione musculorum & nervorum, quam ex strictura ipsorum pulmonum, in his cura nonnihil est varianda, cujus medendi rationem jam supra habuimus.

Quod statueram Medicam: In his asthmaibus oculis & convulsivis instar cynosuræ probe obtinendum est effatum Helmholtzii: quod nempe id, quod epilepticum adultum sanat, sanet etiam tale asthmaticum: unde remedia antiepileptica, item anihysterica, tam fixa, quàm in specie volatilia, salina oleosa, castoreum, hic sunt convenientissima, ut rectè observavit WILLISIUS in *Pharm. Ration. P. 3. pag. 246.* observando simul, quod tales asthma tunc plerumque sunt hypochondriaci, ubi dictis lubinde etiam de laudano oporatio aliquid addendum, utpote quoad in talibus convulsivis affectibus præcavendis & refræmandis nulli adeo cedat remedio. Et quantum opiata prosint in Asthma, videb. in WILLISIO loco allegato pag. 299. Observavi in asthma talis oculi, ex podagra tetropulsi oriundo, omni vespere remper, quod theriaca imminente paroxysmo assumptæ, eundem præcaverit, ita ut post eas ulum illa nocte non reveritus fuerit.

Conveniunt ergo præmissio vomitorio ad paroxysmum mitigandum aut præcavendum salia volatilia, in specie sal succini, cornu cervi, crani & sanguinis humani, achorum & rattari spiritus convenit, & liquor cornu cervi succinatus, spiritus carminativus de tribus, tinctura sulphoris, essentia catarrhalis, castoreum, essentia ejus cum spiritu salis ammoniaci parata, & omnia ex eo parata remedia, (obiter moneo: dicitur communiter castoreum conveyere, ubi peccant flatūs, quoniam illos dissipat: sed aliud quid subest: Castorei talis oleosum abluum quodcumque acidum nervis inimicum: nec est castoris testiculus, sed liquor intra testiculos & penem collectus.) Ex asellis etiam & lumbricis, in quibus est talis polychrestum, parata medicamenta, spiritus lumbricorum per putrefactionem paratus, cinnabarina, & similia sulphura metallica



Ita merito à WILLISIO in hoc casu commendari videntur. Cum his, ut dixi, miscenda subinde opiata: Hinc D. BOYLE in *Virilitate Philosophiæ Experimental. P. 2. pag. 92. 93. pag. 121. item pag. 177.* refert exemplum talis asthmatis convulsivi, & Orthopnoæ inveteratæ & terè disperatæ, per usum sanguinis humani, cum laudano opiato Helmontii cum succo cydoniorum facto, curatæ: item pag. 270. asthma convulsivum refert per salia volatilia curatum.

Ex dictis sequentibus concinnari possunt formulæ: e.g.

R. Pulv. opil. manb. ʒj. vel antimonial. gr. iij.

Circab. antimonii gr. ij.

Sal. volat. succin. gr. iij.

Laudan. opiat. gr. j.

M. f. pulvis: S.

Pulvis pectoralis sedans.

Vel

R. Tinctura tartari compos.

Spir. carmin. an. ʒij.

Ess. opii ʒj.

M. D. S.

Mixtura asthmatica coëctatim sumenda,  
Dosis 40. guttulæ. Vel

R. Tinctura sulph. vel ess. catarrhal.

Liq. cor. cer. succin. vel spir. sal. ammon. an. ʒij.

Ess. opii ʒj.

M. D. S.

Essentia pectoralis.

Vel

R. Aqu. Hyssopi vel scabios. ʒij.

Asthmar. ʒss. vel ʒj.

Spir. sal. ammon. ʒj.

Syr. de hyssopo ʒij. vel ʒijj.

M. D. S.

Potio asthmatica.

Vel

R. Aqu. Hyssopi ʒij.

Veron. spirituos. ʒj.

Spir. sal. ammon. simpl. vel anis. ʒj.

Syrup. de hyssop. ʒij.

M. D. S.

Potio asthmatica.

Vel

R. Olei amygd. dulc. rec. expr. ʒss. ad drachm. vj.

Sperm. ceti drachm. ʒ.

Croci gr. vj.

M. D. S.

Oleum asthmaticum & pectorale.

His remediis utiliter interdum interponitur, interdum præmittitur vomitus, præsertim ubi fomes mali hæret in abdomine, ut supra monitum fuit; nisi hysterica pathemata obstaculo sint, in quibus cautè provocetur. Interdum dico: nō semper: vid. D. BOYLE l. a. pag. 270. ubi refert exemplum talis asthmatis convulsivi per vomitum curati; ut ut ipse non desinatur, quod tale fuerit, tamen circumstantiæ satis aperte monstrant. Huc pertinent olea destillata Pectoralia & nervina, ut olea destillata anisi, salviæ, torismarini, succini, terebinthinæ, &c. quæ asthma convulsivum tollunt. Curavi aliquando tale asthma siccum vitio pulmonum eorumque contracturâ enatum, aliis quàm pluribus irritis, recipiendo:

Olei destillat. succini gutt. viij.

Anis.

Terebinth. an. gutt. iv.

Sacchar. albiss. ʒss.

Miscebantur pro duabus dosibus.

Hæc una capiebatur manè, altera à meridie, vnde mirabile levamen sequenti nocte percepit. Hinc postmodum:

R. Olei destillat. succin. ʒij. ad ʒj.

Anis.

Terebinth. an. ʒss.

Misc.

Dosis erant viij. vel x. ad xij. guttas, manè in vehiculo calido, & interdum etiam à meridie in haustu quocunque frigido, capiendas, laxando intermedio tempore subinde alvum per pillulas minores laxativas, unde paroxysmus nocturnus fuit mitissimus: alterà die emanavit, & patiens sine expectoratione convalevit, ac postmodum satis commodè se habuit. Cum his parata salia volatilia oleosa erunt optima.

Externè huc faciunt etiam linimenta externa anodyna & emollientia, pectoralia aliàs dicta, loco quorum sufficit solum oleum amygdalarum dulcium; vel ad imitationem WEDE-

R. Vngv. potab. v. drachm. iij.

Croci pulveris. ʒss.

Ol. destillat. anis.

Fenicul. an. gutt. xv.

M. f. linimentum. S.

Vnguentum pectorale leniens.

Vid. WEDELIUS de Med. Compositione pag. 180.

Vesicatoria quoque scapulis aut brachiis applicata subinde multum opis præstant, tam irritatione molestâ spirituum influentium morbum divertendo, quàm feri actiois, præsertim scorbutici, talis asthmatis crebriorem fomitem detrahendo aut avertendo.

Mulier scilicet 50. annorum, cui tamen adhuc fluebant menses, laborabat tertianâ intermittente ordinariâ, sed die vacuo semper torquebatur asthmate convulsivo gravissimo, vesperi post horam 7. ex improvise superveniente, & ad 4. usque matutinam per se verante; dies verò paroxysmi febrilis erat vacuus absque tali asthmate, quod saltem die à febre vacuo vesperi affligebat. Et quidem primò nulla tussis adera, aut saltem levis & inanis præcedebat: secundò secretus seu materiz excretio nulla; aliquando quidem ante paroxysmum die illo, quo vesperi rediturus erat, viscida quædam mucosa excreta-  
bat, sed maximè nec ante nec post eum: tertio sinebatur paroxysmus successivè sine sensibili materiz evacuatione, inchoabat subitò sine ulla causa antecedente: symptomata erant, respiratio difficilis, imò ingruens hinc cordis palpitatio, anxietates præcordiorum gravissimæ, motus convulsivi in brachiis & scapulis, extremorum frigus, sudor varius, præsertim frigidus, in paroxysmo affligebat; finito paroxysmo lassitudo omnium membrorum, calor corporis, pulsus celer & frequens aliquamdiu supererant. Ex quibus facillè erat concludere, paroxysmos hos revera esse de asthmate sicco seu convulsivo. Finita & curata febre, periodum suam tentianam observabat paroxysmus asthmaticus. Tentata varia, imprimis volatilia, liquor cornu cervi succinatus, spiritus carminativus, essentia castorei, spiritus lumbricorum terrestrium, sperma ceti cum croco, emplastrum ex racamahaca & galbano pro præcordiis: sed incassum omnia. Malum non erat hytericum, aut ex abdomine vel hypochondriis: in his locis quæta omnia, caput sine labe, saltem pectus universum constringi, faucesque ocludi videbantur, ut non nisi cum tonitu spiritum docere possit. Præcesserat gravis cephalalgia, hanc exceperat febris, quæ cum per octiduum durasset, associavit se hoc asthma. Sulpicabar acce miafma, cephalalgia quod induxerat, utcumque sub motu febrili resolutum ad nervos intercostales derivatum, unumque vel alterum hujus nervulorum aut saltem plexum occupasse, unde istæ lachrymæ: urinæ crassæ cum copioso sedimento quasi farinaceo & salibus scorbuticis admodum copiosis, unde & scorbutus delitecebat. Supervenit dolor & tumor hæmorrhoidum fausto omine, propterea applicationem hirudinum urgebam, à quibus certum levamen sperabam: sed obstinatè renuit; unde pro horum levamine

R. Mucil. sem. cydon. cum sperm. ranar. extr. ʒj.

Spiritus Vini probè camphor. ʒij.

Sacchar. saturat. ʒj.

Misc.

Quo linteam benè humectatum applicabatur crebrius.

Aliis ergo irritis, ordinata sunt duo vesicatoria ampla, utrinque propè carpos applicata die vacuo; die verò paroxysmi biborio ante hunc

R. Far. leopod. drachm. ʒ.

Pulv. opil. antimonial. gr. ʒss. ad gr. ij.

Misc.

Quorum usu per triduum omni vesperi continuato evanuit paroxysmus penitus, ita ut exactè convalesceret.

Scopus erat vesicatorius doloris ratione divertere motum spirituum, an forsan de acri scorbutico simul evacuari quid possit: non aded attendebatur, dum iste pulvis internè præternaturalem spirituum impetum sopiendo paroxysmos levaret, ipsâ naturâ sub statu ira pacato quod supererat corrigente, & ita etiam factum fuit.

Habuiamus jam Asthmata humida & asthmata convulsiva, seu talia, quæ impediunt motum pulmonum, sive convellatur thorax expirando, sive convellatur inspirando: Pergo ad alia Inspirationis scilicet vitia, quæ inter non ultimum est Singultus.



## ARTICULUS II

## DE

## SINGULTU.

**S**ingultus est Respiratio seu potius Inspiratio violenta & interrupta cum impetu ac cum sono ingrato, & dependet à subitanea ac vehemēti diaphragmatis deorsum versus contractione, & revera convulsione. Percipimus enim omnes, quod singultiendo cum impetu inspiremus, & quod tunc simul regio ventriculi antrosum versus moveatur, sicuti hoc aliàs fieri solet in omni ordinaria Inspiratione. Dum ergo diaphragma violenter & cum impetu deorsum versus contrahitur, ventriculus & abdomen necessarid antrosum versus propelluntur; & ita cum subitanea inspiratione singultus efficitur. Veteribus aliàs singultus statuitur affectus stomachi irritati: sed parum consideratē: Nam & ipse HIPPOCRATES, & GALENUS in *Comment. super Aphorism. 3. sect. 7.* aperte statuit, talem stomacho esse singultum, qualem nervis convulsionem. Imò hinc inde Authores Practici aperte comparant singultum convulsioni: sed cujus partis? nempe istius partis, quæ inspirationi primariò inservit, & talis pars est imprimis diaphragma, quod scilicet convulsus violentus & cum impetu deorsum tractum, singultum infert: adeoque primus, qui hanc sententiam quod singultus sit affectus diaphragmatis, defendit, est PLATERUS: à partibus etiam stat SYLVIVS: Conf. idem defendens MAYOWJUS de *Respirat. pag. 292.* Nec desunt argumenta, quæ hoc ipsum persuadent, quod singultus primariò oriatur à convulsione seu contractione fibrarum diaphragmatis versus inferiora, modò consideremus, quænam circa singultum sint observabilia?

I. Quod confirmat, est, quod nos omni tempore voluntariò possumus singultire. Hoc aperte innuit, non stomachi esse actionem, in quo nullus est motus voluntarius, sed necessariò affici partem, quæ voluntatis nonnihil subiect imperio. Et quidem cum faciamus singultum inspirando, innuit talem affici muscolum, qui pro voluntatis imperio respirationem seu actionem missam potest nonnihil mutare. Jam nullus talis est musculus in toto respirationis negotio, quàm diaphragma, quod respirationi primariò inservit, & nervis ex cerebro & cerebello constat: unde, si diaphragma convulsus, sit singultus; pro hujus, enim varia alteratione pro voluntatis imperio possumus etiam respirationem variis modis mutare. Primariò ergo in singultu est diaphragma.

II. In omni singultu percipitur motus vehemens abdominis circa regionem epigastricam extrosum versus; quod non potest concepiti alio modo fieri, nisi quod diaphragma ex convulsione nimia aliquantisper (non in totum) planius redditum omnia abdominis contenta deorsum aut extrosum premat, & in specie ventriculum ipsi proximè annexum. Nam cum hoc fiat saltem inspirando, & in omni Inspiratione diaphragma moveatur deorsum, patet, diaphragma saltem in singultu esse affectum.

III. Nullus potest singultus fieri, nisi inspirando, id est, ærem attrahendo, & ita diaphragma deorsum versus movendo.

IV. Sæpius entur singultus solà inspiratione continuata, & quàm longissimè inhibita Expiratione. Jam ergo si esset motus expulsiorius stomachi in singultu, Inspiratione potius aggravaretur malum, quàm curaretur: Ratio, quia in inspirando diaphragma comprimit stomachum, unde potius irritaretur ad singultum, quàm quod exinde malum levaretur: imò ex constrictione fibrarum sequeretur vomitus.

V. Notum est, joco interdum, imò sæpiissimè, curari singultum: Id quod innuit, non aliquid naturalis, sed potius voluntari, & secundum rationis ductum alterabilis partis, primariò in singultu affectæ; quæ in inspiratione non est alia, quàm diaphragma.

VI. Ad hæc sternutatio superveniens singultui hunc solvit, i. e. curat, teste HIPPOCRATE *Sectione 6. Aphorism. 12. Miscellan. Academ. Nar. Curios. Ann. 3. Observat. 138 pag. 216.* & WEDELIO de *Medicamentorum Facultatibus pag. 212.* Ratio, quia fori sternutatione, adeoque sub forti ista expiratione, concussus diaphragma ex se dispellit, non minus quàm ex stomachi orificio, quod istud antea irritabat. Sternutatio enim revera est motus diaphragmatis, & oppositus motui diaphragmatis in singultu; dum enim singultum in-

spirando, sternutamus expirando, hinc diaphragma convellitur, & sic singultus contrario motu per sternutationem tollitur.

VII. Nimis animi motus, v. g. Risus, Terror, Ira, & similia pathemata, curant singultum: idque ratione spirituum animalium, qui à fortiori objecto commoti & alterati minus vacant singultui; variato enim motu eorum, qui influunt in partes mobiles, variat etiam partium motus. Exempla talium ab animi moribus, e. g. terrore felis, muris, &c. curatorum habet *Valerius Observ. 4. lib. 2. pag. 123.*, utut aliàs etiam non sint rara: Sic si quis attentius personæ, quam amavit, & à qua redamatus fuerit, recorderetur, singultum tolli, experimentum in vulgus notum est, ob eandem spirituum animalium revocationem, à diaphragmate nimirum ad cerebrum: Alii immisso cerevisiæ cultro, ejusque haustum uno Inspirationis actu deglutiunt: Nonnulli filo constringunt arctissime minimum digitum &c.

VIII. Ad hæc absque stomacho affecto hepatis inflammatio sæpe dat singultum exitiosum: quia hepar inflammatum parte suâ convexâ immediatè contingit diaphragma; parte vero concava stomachum. Unde tunc continuus hujus diaphragmatis motus molestiam creat, ratione cujus irritatur continuò ac stimulator, ut convellendo singultiat. Hinc

IX. Observatur etiam non raro singultus in morbis convulsivis, v. g. in passionibus hysteris.

Singultus formale, ut dixi, consistit in contractione violenta & convulsiva diaphragmatis inspiratoria.

## CAUSÆ.

**Causa** hujus violentæ diaphragmatis convulsionis est omne id, quicquid ad violentam, non tamen durantem, sed interruptam subinde & reciprocam contractionem, diaphragma irritare & vellicando stimulare valet. Hoc ipsum, quod ita irritare valet diaphragma, ut fibris contractis fiat convulsio, interdum, & quidem sæpius, hæret in stomacho, orificio nempe ejus superiore, quod diaphragma perforat, ipsique in transitu firmiter satis connectitur; unde vulgò falso putatur singultum stomachi esse affectum. Pertinent ergo huc imprimis alimenta, aut medicamenta nimis acria assumpta, vel alia quæcunque: Sic quidam loco balsami sulphuris assumens oleum vitrioli, exinde in gravem & periculosum incidit singultum, quatenus orificium ventriculi & diaphragma fuerunt læta, de quo refert *BARBETTE in sua Praxi lib. 4. cap. 2. pag. 136.*: Sic soluspanis quantitate nimis comestus & illico devoratus, singultum concitare dicit *FERDINANDUS in Histor. Medic. Conf. 43.*: Item in febribus continuis ardentibus post intemperatum & intemperativum Juleporum acidorum & emulsionum refrigerantium usum, non raro singultus sequitur, saltem vinipotus curandus; uti hoc habet *SCHENCKJUS l. 3. Obser.* Alia itidem ventriculum intensius alterantia, in specie refrigerantia, singultum inferunt: sic enim *TIMÆUS Von GoldenKlee in Cas. lib. 3. Cas. 5. pag. 125.* refert singultum gravem & contumacem ex potu copioso aquæ frigidæ & nitri, quatenus stomachum affectit: sic singultum obstinatum per bimestre ex nimio aquæ frigidæ haultu post æstum observavit *RIVERIUS Morbor. Infrequent. Obs. 1.* I hæc enim & similes causæ, stomachi orificiū superius cum impetu vellicando & stimulando, simul etiam diaphragma facillimè irritant, quod irritatum nititur excutere rem molestam, adeoque convellitur sub inspiratione, & ita singultum inferunt.

Sed præter occasiones tales externas & ex internis singultus supervenit stomacho affecto, siue per essentiam afficitur, siue per consensum: Per consensum v. g. in vulneribus capitis, in nephritide, in imminente ileo, in hernia graviore, quibus sæpius, utut inaususto omine, singultus supervenit. Per essentiam afficitur stomachus, dum ab acriori quodam plus minus viscido succo, intra rugas propè orificium superius hærente, originem ducit, cujus expellendi nixum singultus insequitur. In specie in febribus ardentibus aut malignis interdum singultus supervenire solet, idque sæpe utplurimum ex stomacho, ex causa maligna graviter affecto.

Ratio, quod ex affecto orificio superiori superveniat singultus seu diaphragmatis convulsio, est consensus stomachi cum diaphragmate, quia stomachi os superius facit transit, non per circulum nerveum diaphragmatis, ut fert communis opinio, sed per hujus muscolum posteriorem, ibique idem firmiter satis annectitur. Conferatur nova & accurata *diaphragmatis Anatome* CASPARIS BARTHOLINI, cujus epitomen videb. in BARTHOLINI



*Art. Medic. Hoffm. vol. 4. pag. 14.* Unde si aliquid pertinacius vellicat orificium stomachi, facillime simul vellicatur diaphragma, ejusque fibræ musculares nervæ, & exinde sequitur singultus.

Præterea plures aliæ etiam causæ, quocunque modo diaphragma afficientes, siue in hoc ipso siue in pectore hæreant, ad singultum disponere possunt: ut v. g. hepatis inflammatio in parte gibbosa, ubi immediate contingit diaphragma, singultum infert, uti jam superius dixi. Quò etiam pertinent conformationis vitia, luxatio nempe collarum inferior, dum collarum interiora ad ventriculum versus detorsio, ut iis adhæreat diaphragma, causa fuit singultus trimestris, quarum reposuio ejusdem curatio existit, teste SCHENCKIO in lib. 3. *Observationum*: nem continuu singultum ex compressione undecimæ thoracis vertebrae observavit RHODIUS *Centur. 2. Observat. 61.* Infantibus & junioribus magis voracibus frequentes singultus contumaces, idque imprimis ex pituita viscida acida, pertinacius stomachi orificium obducendo, unde etiam non raro chronicus & admodum diuturnus talis esse solet singultus. Ex arthritide non amplius artus afficiente singultum desperatum observavit VELSCHIUS *Hecatest. 2. pag. 20.* Purgationes effrenæ subinde singultus malo omne sequuntur, ut notat HIPPOCRATES *S. 7. Aphor. 41.*, siquidem non rarum est, convulsiones aciores interqui Purgationes. Tandem febribus sæpe continuus, aut in statu periculoso, aut in quibus jam convulsiones imminet, supervenit; partim ex pessimè affecto stomacho; partim ex spasmus jam imminetibus seu ultimo naturæ conatu. Denique ipsis morbis convulsivis, vel universalibus vel particularibus, per consensum diaphragmatis simul afficientibus subinde supervenit singultus: hinc etiam passionibus hystericis subinde singultum supervenire observavi.

Hæc de natura singultus.

Rara item singultus qui vult exempla, qualia non pauca prostant, adeat MARCELLUM DONATUM in lib. 4. *Hist. Med. Mirabilis c. 5.* item SCHENCKIUM lib. 3. *Obs. Bartholin. Cent. 2. Hist. Anatom. 4.* de singultu quatuor annorum continuo; item *Cent. 3. Epist. 61.* de muliere ad eodè graviter singultuente, ut per biennium à Dæmone obsessa crederetur; quibus addantur BARTHOLINI *Alia Medica Hoffm. vol. 2. Obs. 28. & vol. 1. Obs. 73.*, in quibus refertur singultus periodicus annuatim in vertigine recurrens, & toto die assidens, somno cessans, nec nisi largâ venæ sectione in brachio curabilis.

## DIAGNOSIS.

Quod attinet signa diagnostica: singultus per se pater & cogniri facillimus est; verum tantibus quoque notus: saltem curiosus sit Medicus in perferutandis causis remotis seu fonte morbo, an hæreat causa irritans in stomacho? an in alio quodam loco, ut ejus diversitate curam tum temporis variare queat.

## PROGNOSIS.

In Prognosi observandum, quod Singultus ex causa externa, vel manifesta, vel vitio assumptorum, vel vitio exercitorum, sit affectus levis, minus periculosus.

Singultus autem quicumque superveniens Vomitus, aut Purgationi nimis, diarrhææ aut dysentericæ, sæpius & ut plurimum periculosus est; quia imminentes convulsiones epilepticas, in talibus morbis ut plurimum lethales, innuit.

Superveniens etiam singultus inflammationi hepatis vel alius visceris malum pronunciat, ut hoc habet noster HIPPOCRATES *sect. 5. Aphor. 38. & sect. 7. Aph. 18.* Exemplum hujus, quod singultum ex inflammatione hepatis lethalem esse confirmat, refert AMATUS LUSITANUS, *Centur. 5. Curat. 30.* Vid. *Disput. D. REINESII de Inflammat.*

Pertinaci alui suppressioni aut etiam morbo Iliaco, aut etiam repentinæ & contumaciori herniæ, aut etiam in aliis intestinorum periculosis doloribus, superveniens singultus admodum periculosus esse solet; innuit enim imminet vomitum stercoreis lethalem.

Singultus in omni continua febre & morbo acuto periculosus est, nisi fiat instante crisi per vomitum: hinc PLATERUS *l. 1. Obs. pag. 203.* rectè asserit, singultum febribus ardentibus mox in principio aut circa statum supervenientem & perseverantem, plerumque esse mortis prænuntium;

quod tamen non æquè universaliter verum est, contrario apparente in HORSTIO *l. 1. Obs. 25.*

Distinguat ergo singultus: nam qui in principio morborum acutorum supervenit, minus est periculosus; qui autem in statu cum a iis gravioribus symptomatibus sit, periculosus & sæpe lethalis est. Singultus enim in principio morborum acutorum oritur ex turgescencia in primis viis, unde vomitum superveniente cessat singultus.

Singultus sæpe diuturnum malum est, ægrotumque subinde per plures dies, menses, annos &c. affligit, interdum penitus incurabilis observatur, in quo casu occultum quoddam conformationis vitium; os ventriculi, aut diaphragma, aut nervos afficiens, sæpe lubesse solet.

## CURA.

Quoad Curam: in hac duo sint consideranda:

I. Causa proxima & occasionalis, quæ irritat diaphragma ad convulsionem, est removenda; &

II. Materia remota ipsæ irritationis sensus diaphragmaticus est tollendus, ut consequenter ejusmodi contractura convulsiva remittat.

Ea, quæ vulgaria aniculatorum sunt remedia, compressionem thoracis respiratione omittâ, &c. omitto. Dico potius ad singultum compescendū ratione indicationis posterioris insigniter commēdātū opium, & quælibet opiata ac theriacalia, lenium irritationis tollendo, atque hinc natum impetuosum spirituum, ad diaphragma motum, similiter impediendo, & sic diaphragmatis spasmus supprimendo. Nam opii & opiatorum usum felicem omnes omnino deprædicant, inter quæ euphorison frequens est Theriaca, Mithridatum, Philonium Veterum, & laudanum opiatum, vel simplex vel hystericum, quod adjuncto castoreo compositum est: Sic HORSTIUS *supra cit. loc. l. 1. Obs. 25.* Singultum pertinacem admodum, febri continuæ circa finem supervenientem, curavit recipiendo

*Conserva rosar. 3j.*

*Theriac. & Androm. 3ss.*

*Laud. opiat. gr. ij. vel iij.*  
& miscendo.

Hinc GALENUS similiter commendat opiata: sed eadem miscere jubet cum appropriatis, & quidem rectè, nempe cum castoreo, galanga, zingibere, caryophyllis, mastiche & similibus: Hinc etiam ad singultum, item vomitum & similia, talem sæpe Bolum expertum commendat TIMÆUS *Von GuldenKlee.*

*R. Theriac. Androm. ʒij.*

*Ligni aloës ʒss.*

*Ol. destillat. mac. gutt. ij. ;*

*Laud. opiat. gr. j.*

*Misc.*

Loco ligni aloës alia appropriata possunt addi, in specie castoreum, semen anisi, &c. Hinc aliquando ad imitationem Tunzi felici cum successu talem præscripsi:

*R. Theriac. Androm. ʒss.*

*Laud. opiat. gr. j. ad ij.*

*Ol. destill. anis. gutt. ij. vel iij. vel sem. anis. ʒss.*

*macis gutt. j. vel ij.*

*Cum succo cydoniorum fiat Bolus. S.*

*Electuarium contra singultus pro una vice.*

Talibus enim piatis, uti rectè dicit GALENUS, semper admiscenda simul erunt appropriata singultui dicata remedia: qualia sunt in specie cinamomum, aqua galangæ & mastichina, castoreum, quod uti in morbis convulsivis est optimum, ita & hic à Galeno & Veteribus insigniter commendatur; siue interius assumatur; siue solummodò naribus admoveatur. Semen anisi, ex eoque parata essentia, spiritus & oleū; item spiritus salis ammoniaci anisatus, & similia quocunque modo assumpta ad singultum sunt commendatissima, quæ etiam externè scrobiculo cordis applicari & illini possunt. Zingiber similiter ad singultum commendatur, si tenuiter pulvereretur, vel in India conditum assumatur: sic enim tanquam Euphorison non ultimum, insigniter singultum sistere dicitur.

JOEL in omni singultu seu præsentissimum commendat cornu cervi ʒj. quocunque modo usurpat. FORESTVS alias habet Julapum, quo ipso aliquoties feliciter usus est contra singultum. Compositio ejus est hæc:

*R. Hord. mund. M. j.*

*Sem. anis.*

*Anisi,*

*Sem. Carvi,*



*Sem. Carui,*  
*Feniculi,*  
*Quatuor frigid. maj.*  
*Papav. albi. an. ʒj.*  
*Portulaca,*  
*Laſuca an. ʒʒ.*  
*Flor. cordial. p. j.*  
*Liquiris. rafa ʒiij.*

Coque in ſufficiente quantu. aquæ comm. (meliùs in cerev. ſa aut vino) pro ʒj.

Decoctum coletur, & aromatizetur cum

*Spec. diatr. frig.*  
*Dia. rhod. Abb.*  
*Diatr. ſantal. an. ʒj.*  
 Addendo  
*Syrup. Violar.*  
*Acetof. citri,*  
*Rofar. an. ʒj.*  
 M. D. S.  
*Jalapium.*

Ubi verò pertinacius fuerit malum in corpore robuſto, ut quando ad aliquot ſeptimanas, interdum menſes, perſiſtit hæere in ſtomacho, & quidem imprimis, ubi non ſufficiunt & conferunt opiata, ante omnia præmitatur purgatio, & quidem vomitus ex antimoniis, ut huius medio eradice- tur fomes morboſus ex ventriculo, præſertim quando talis contumacior ſingultus ex pituita, ut vocant, vitrea, ſuperiori ſtomachi oriſicio firmiter impacta, oriatur: hæc enim vo- mitorio ſublata ſponte ceſſat malum: quibus verò infeſta ſunt vomitoria, & opus eſt, ut fiat per inferiora pur- gatio, danda ſunt imprimis aloëtica, ut pilulæ ex aloë, ſucceſ- ſivè mucum tollentes, vel ſolæ, vel cum grano laudani opiatæ miſtæ: aut ſi malum fortiùs hæret, purgantibus miſceatur Mercurius dulcis, idque ad imitationem RIVERII Cent. 3. Obſerv. 42, ubi curavit ſingultum moleſtum, ſæpiùs quotidie per annum recurrentem, per calomelanos Turqueti, i. e. Mercurii dulcis gr. xvj. & diagr. gr. viij. miſta invicem; ſicut RHODIUS Cent. 2. Obſerv. 60. ſingultum ſeptem dierum cum hiera, cum oxymelle data, excretis ʒiij. pituitæ ſanarum reſert.

Peracta purgatione vel vomitu, dum languet ſtomachus, ad conſuetudinem ſingultus penitus tollendam propinentur remedia ex zedoaria, corticibus aurantium, Chamomilla Romana, &c. B. D. LANGIUS coravi ſingultum decem dierum ex humoribus craſſis, tunicis ventriculi impactis, be- neficio ſalis vitrioli ad ʒj. in Vino malvatico dati, quo maxi- ma pituitæ vitreæ copia excluſa, ſingultu planè ceſſante. Pro corroboratione dedit hiſ:

℞. Ebor. uſi ʒʒ. vel ʒj. aut ebor. ſine igne ʒʒ.  
 Olæ deſillati cinnam., mac., vel auiſi, vel carjoph.  
 gutt. v.

M. pro pulvere.

Propinetur in aqua menthæ ſpirituola, & ita denud roborabi- tur ſtomachus.

Vel ad imitationem Sylvii danda eſt talis miſtura:

℞. Aqu. Menibæ ʒj. vel ʒiſſ.  
 Viti Maſſichol. ʒʒ. vel ſpir. ſberiac. ſimpl.  
 aut Camphorat. ʒiij.  
 Conf. alKerm. ʒj.  
 Laudani opiat. gr. ij.  
 Syr. Menibæ ʒvi. vel ʒj.  
 M. D. S.

Potio confortativa.

Pertinet huc etiam miſtura ſæpiùs ad ſingultum experta cydoniata cum extracto zedoariæ & laudano opiato in M. A. N. C. anno 6. Obſ. 149. pag. 210. Nempe

℞. Vini, cidon.  
 Tinctura roſar. an. ʒj.  
 Extract. zedoar. gr. xv.  
 Laud. opiat. gr. ij.  
 Ol. deſill. cort. aurant. gutt. iv.  
 Syr. Cydonior. ʒʒ.  
 D. M. S.

Potio ſtomachum confortans.  
 Detur co. hleatum.

Vel

℞. Aqu. Menibæ ʒj.  
 Spir. ſberiac. campb. ʒiij.  
 Auiſi ʒj.  
 Laud. opiat. gr. ij.  
 Syr. cinnam. ʒj.

Estmuller. Oper. Tom. II.

M. D. S.

Potio confortativa contra ſingultus.

Quibus miſturis, ubi ſemel ſtutus & eructationes ſtoma- chi adſunt, qui interdum in ſingultu reperiuntur, & ſtoma- chum inſigniter diſtendunt, commodè ſpiritus nitri, vel ſim- plicis gutt. vj. vel viij. vel potius ſpiritus nitri dulcis, aut etiam ſpiritus nitri theriacalis à ʒʒ. ad ʒj. addi poteſt: aut ſi adun- da ſint pathemata hysterica, loco confectionis AlKermes, ex- tractum caſtorei admisceri poteſt.

Externè in quocunque ſingultu in ſpecie expertum eſt Cataplaſma Minſichtii ad ſingultum, compoſitum ex ſer- mento acri, pulvere menthæ & aliis aromaticis, malaxatum cum oleo caſtorei, impoſitum regioni ſtomachali; vix enim datur efficacius inter externa contra ſingultum remedium, quo multi feliciter & cum ſummo ſucceſſu utuntur: vid. De- ſcriptio in MYNSICHTII Armament. Sect. 38. Simile eſt Cataplaſma Schmuckii, quod tanquam certum & probatum ad ſingultum commendat: Compositionem habet in Theſ. Med. 2. Secret. 18. & eſt hæc:

℞. Bacc. lauri,  
 Roſ. rub. ʒlvi.  
 Mentibæ an. M. j.

Pulverifata ſubige cū ſermenti acerrimi quantitate ovi, im- pone patinæ, aſfunde acetum ſerveus, & calidiſſimè cum linteo triangulari impone regioni ſtomachi & præcordiorum: ſi ex- ſicceetur, denud cum aceto irroretur & applicetur.

Deinde convenit etiam externè contra ſingultum empla- ſtrum de galbano crocatum Minſichtii, cujus deſcriptionem videbitis in Armam. Chym. f. 8. 37. pag. 311; item ol. deſillat. aniſi gutt. aliquot umbilico aut ſterobiculo cordis illitæ, in uſu eſſe ſolent. Panis etiam calidus linteo obvolutus, ventriculo applicatus, efficax eſt remedium ad ſingultum compeſcen- dum: efficacius ſi vino malvatico vel alio generoſo irroratus fuerit, & ita applicetur regioni ſtomachali. Quidam cum ſpongia aut pane calido applicant ventriculo ſorum humi- dum, factum ex aceto calido valde acri, cocto cum caſtoreo, pipere, & ſinapi.

Hæc in genere.

Pro varietate autem cauſarum ad ſingultum diſponentium etiam modò dictis generalibus ſpecialia quædam admiscenda ſunt, v. g. ſi ſingultus oriatur a cruditate ſtomachi, aut à vitia- ta digeſtione, tunc, præter vomitum, pilulæ aloëticæ cum lauda- no opiato miſtæ conveniunt, ut ſunt pilulæ roſacæ; item pilulæ maro-coſtine, Maſſichinæ, item zingiberina, eſſentia zedoariæ, elixyr proprietatis cum ſpiritu aniſi miſtum, elixyr proprietatis cum ſpiritu ſalis ammoniaci; item eſſentia abſin- thii, eſſentia & ſpiritus maſſichis, eſſentia meliſæ & pulegii, &c. nobiles quoque ſunt.

Singultus & irritatio ſi fiat ab humoribus acris corroſivis ac ærugineſis, plus minus eſſerveſcentibus, tunc ſupra dictis appropriatis in ſpecie addantur abſorbentia: qualia crystal- lus præparata, ebur uſtum, vel cornu cervi uſtum; item lapil- li cancerorum, qui abſorbent omnes corroſivos humores: item terra ſolaris, ſigillata, Bolus Armena: item lapilli per- carum & carphonum, pulvis abſorbens Wedellii, cum opiatum miſta: in ſpecie pelliculæ internæ ſtomachi gallinacel exſiccata & pulverifata, & in aqua, ſucco & ſyrupo portulacæ uſurpatæ. Singultum ſupradictum ex aſſumpto acriori, e. g. ol. vitrioli hauſto excitatum, BARBETTE curavit hac Mixtura in Praxi præſcripta:

℞. Succ. ſemper. vivi major. depur. ʒj.  
 Aqu. roſarum,  
 Plantagin. an. ʒj.  
 Vitelli ovi Num. i.  
 Syr. de portul. ʒj.  
 Laud. opiat. gr. ij.

Miscendo, & cochleatim uſurpando.

Huius miſturæ putreſcè ſimul debuiſſe addi, aut lapillos cancro- rum, aut cornu cervi uſtum, aut terram ſigillatam, aut ſimilia, acidum promptè abſorbentia. Ad huius ergo imitationem

℞. Aqu. endiv.  
 Plantag. an. ʒj.  
 Succ. ſemper vivi maj. depur. ʒj.  
 Cornu cervi uſi præpar. ʒj.  
 Lapill. cancer. præpar. ʒj.  
 Terra ſigill. ʒʒ.  
 Laud. opiat. gr. ij. vel iij.  
 Syr. portulac. ʒj.  
 M. D. S.

Potio contra ſingultum.



Si suspicio adsit veneni assumpti, vel malignitatis in singulis, v.g. in febre maligna, modò dictis appropriatis & alexipharmacis ex terra sigillata addatur aqua cordis cervi, cordialis *Herculis Saxonia*, aqua cinnamomi cum vino, & cydoniata, syrupus corticum curi, pulvis analepticus *Mindereri*, laudanum opiatum vel extractum theriacale, & similia malignitati appropriata; ad imitationem *RIVERII Centuria 4. Observ. 78.* qui continuum singultum in febre maligna compescuit per emulsionem ex seminibus quatuor frigidis majoribus cum lapidis prunellæ ꝑj. laudani opiatigr. ij. Sanè nitrum antimoniatum ad ꝑj. est convenientissimum.

Vbi singultus est conjunctus morbis convulsivis aut hysteriis, his ipsis per salia volatilia, castoreum, & opium curatur, simul singultus evanescere solet.

Si singultus est symptoma affectus cujusdam gravioris, ut inflammationis hepatis, febris acutæ, &c. spontè equidem, morbo primario curato, singultus spontè cessat; quia tamen partum molestum, partum mali ominis est symptoma, propterea simul sudorifera, & blanda opiatum cum affectui primario appropriatis, ut iidem & singultus & affectus primarius simul curentur, jungenda erunt.

Si singultus sit à nimia refrigeratione stomachi, in specie, si post nimium æstus ex haustu copioso frigido oritur singultus, qualem singultum mirè obstinatum per bimestre duranti observavit *RIVERIUS in Observ. Morborum Infrequentium*, uti vocat, *Observ. 1.*, optimum consilium est, ut ad imitationem ejus instituatur Balneum aquæ dulcis, in quo plantæ nervinæ incoctæ sunt, cui insideat æger; quo consilio *RIVERIUS* ægrum ex nimio frigida haustu singultientem, aliis omnibus fere irritis, curavit.

Hæc de Convulsione diaphragmatis inspiratoria seu singultu sufficiant; sequitur

### ARTICULUS III.

#### DE

#### INCUBO seu EPHIALTE.

**I**nter affectus præternaturales inspirationem lædentes pertinet etiam Incubus seu Ephialtes, qui & ipse reverà est nihil aliud, quàm pectoris affectus, impedita nempe ac difficilis respiratio, in specie lussaminata Inspiratio, dormientibus imprimis ac dorso incumbens, cum insomnio quodam ponderis præcordia prementis ac suffocationis imminuentis obveniens, cujus occasione vigiles, quia talia delirant somniantes, varia subinde sibi de persona aut re certa, aut etiam de persona invisa, superincumbente narrare solent Ephialte affecti.

Est nempe complicatus affectus abdominis Incubus, quem ipsi ægri rite explicare nequeunt; propterea constituitur à quibuldam sedes in stomacho, ab aliis in pectore, ab aliis in capite: symptomata fere tali ordine se mutuo insequuntur:

- I. Læditur respiratio, maximè inspiratio; Hanc
- II. Insequitur sensus, aut saltim metus imminentis strangulationis.
- III. Est depravata loquela, dum loqui nesciunt incubo affecti, sed gementes, queruli &c. fiunt, aut sonum saltem inconditum, rectiusboatum, aut saltem sonum gravem proferunt; undè & vocati parum aut nihil respondent, & fere immobiles jacent,
- IV. Adeest insignis anxietas præcordiorum: &
- V. Denique insomnium supervenit rei aut Objecti aliquis, nunc certum nunc incerti, thoracem prementis, & quasi constringentis: Quibus
- VI. Accidunt maculæ rubæ, lividæ, cærulescentes, artus imprimis pingentes, & manè postmodum apparentes.
- VII. Expergefactus, dum omnia cætera evanescunt symptomata, corporis tremor, & non raro diaphragmatis vibratio celerrima & violenta superest, unà cum totius corporis lassitudine, *als Wenn sie geprügelt Waren,*

#### CAUSÆ.

Quoad Causam & fiendi modum incubi: quæ vulgò proferunt, omnibus nota sunt; scilicet incusant obstructionem

meatuum cerebri ac principii spinalis medullæ, à vaporibus crassis ex abdomine eò exhalantibus; unde impedito spirituum animalium influxu ista symptomata superveniunt, obque hanc rationem Incubus ad affectus capitis ordinariò refertur: vid. *SENNERTUS 1. Præf. P. 2. cap. 29 ubi de Incubo.* Hic tamen in *Paralipom. pag. 113.* hanc sententiam mutavit, & Incubum esse affectum respirationis læsæ cum insomnio gravi asseruit; sicut jam suo tempore *FERNELIUS* & *PLATERUS* insulsiſsimam hanc Veterum opinionem rejecerunt, dicendo, morbum hunc primariò ad affectus thoracis & respirationis læsæ, secundariò ad affectus capitis pertinere. Nempe hi ipsi causam proximam statuerunt humorem crassum melancholicum, vel pituitosum circa præcordia hærentem, quo humore, quacunque ex causa commoto aut turgescente diaphragma & pulmones comprimantur, unde exhalantibus vaporibus vox opprimatur, & deniq; iidem cerebrum petentibus spiritus animales conturbentur & misceantur, unde somnium tale sequatur: cum quibus etiam coincidit *PETRI JOANNIS FABRI* sententia in *Parabol. cap. 7.* Sed adicensus iste vaporum ex primis viis ad caput vsque, & quicquid illis superfluitur, rursus utitur fundamentum, & facilis est solutionis.

Audiantur moderatiorum quidam, in specie *SCHNEIDERUS in libro specialissimo de Catarrh. cap. de Catarrh. nar. pag. 246.* item in *Diff. de Epilepsia*, & per consequens etiam de Incubo, ubi rectè Incubum ad convulsionis species refert, in specie talem, in quo thoracis musculi hominis, somnium capientis, ita afficiantur, ut respirez exinde laboriosus.

Res ut pateat paulò clariùs, ordine procedendum: scilicet Causa Incubi proxima est quæne id, quod liberum thoracis, & in specie reciproci diaphragmatis motum inferiora versus in somno impedire potest; hoc namque ita primariò quoad respirationis negotium impedito, secundariò etiam reliqui musculi inspirationi intervinientes in motu impediuntur; eòdem notum sit, quod diaphragma sit primarium instrumentum respirationis. Quicquid ergo primariò libero diaphragmatis motu, secundariò reliquorum musculorum, inferre potest impedimentum, est causa Incubi.

Istud, quo thoracis, ac speciatim reciproci diaphragmatis motus impeditur, hoc facit; vel quatenus est Causa externa & objectum quoddam, diaphragma opprimens, & ejusmodi motui dentium versus reluctans, & oritur exinde Incubus accidentalis & quali levior; vel læditur diaphragmatis motus vitio nervorum ejusmodi, & musculorum thoracis motui inferventium, id quod sit in Incubo habituali, utpote graviore, & qui firmiores egit radices, & ex quadam dispositione interna radicata plus minus, vel sæpius vel difficilius ægrum afficit.

Incubus accidentalis fit, quando liber diaphragmatis motus saltem impeditur, propter impedimenta in primis viis ac abdomine, motui ejus deorsum resistentia. Hæc inter imprimis est stomachus: qui vel copiosioribus alimentis infarctus; vel materia viscidâ aut mucilaginosâ inquinatus; aut flatuum copia, de quibus superius, ubi de Inflatione stomachi; aut potu nimio & cruditatibus distentus, dorso incumbens diaphragma magis sursum repellit, & ejusdem inferiora versus motum impedit, ut non inspiratio fieri possit, unde etiam reliqui musculi cessant. Propterea *HILDESHEIM in Specul. de Affect. capitis specieg. 4. pag. 434.* inquit: *Qui seire cupit quid sit Incubus? is ante somnum comedat castaneas, & superbibat vinum saculentum.* Hinc raro Incubo afficiuntur, qui laudabili utuntur diætâ, aut qui sobriam amant cœnam: e contra pueris ob *indignationem*, seu nimiam & immoderatam ciborum ingurgitationem familiaris esse solet; unde etiam sæpius ex crapula, ebrietate, & nimia voracitate in cœna Incubus affligit: sed talia saltem inducunt Incubum accidentalem, leviozem, & facile dissolubilem. Nam si dormiatur in latere, & elevetur caput, possumus præcavere talem Incubum: quod magis enim supini jacentes, eò minus comprimit ventriculus diaphragma, & contra.

In habituali verò ac continuo Incubo, quatenus habet causam quandam in corpore latentem, ad nervos imprimis respiciendum venit, eos nempe, qui respirationi intervinunt, & imprimis diaphragmatis motui, ob quorum vitium actus respiratorius prohibetur: adeoque ad nervos par. octavi, unde & intercostales progrediuntur, & qui ex cerebello primas radices habent, hic imprimis respiciendum, ut rectè asserit *WILLISIUS in Anat. Brutorum P. 2. ubi de Incubo*; & notabili Observatione fundamentum habituales Incubi in parte capitis



capitis postica circa cerebellum confirmat LOWERUS *Tract. de corde pag. 157.* de quodam nobili: Adeo, ut respectu causæ revera nervorum affectus sit Incubus habitualis, isque vel paralyticus, vel convulsivus, i. e. qui vel ex denegato plus minus spirituum animalium influxu, propter impedimentum quasi obstructionis, & inde hinc musculorum resolutione, vel ex impetuoso nimis spirituum per dictos nervos propter irritationem quandam influxu, & hinc musculorum spasmus, oriatur. Prius Veteres, & adhuc suo modo WILLISIUS loco allegato, ubi cerebellum affectum esse putat, ut Ephialtes quasi lethargus sit cerebelli; item LOWERUS loco allegato asserunt: Posterius verò affirmant moderni: vid. SCHNEIDERUS loco allegato: Et ob id à quibusdam, in specie Arabibus, Incubus Epilepsia nocturna; item Epilepsia parva propter convulsiones musculorum thoracis, quæ similiter fiunt in omni insultu epileptico, vocari solet; unde in epilepticis respirationis est difficultas, & spuma apparet circa os: quo nomine vocatur à RODERICO à CASTRO *Tract. de Epilep. cap. ult.*, quia Incubus confirmatus in epilepsiam degenerare tandem solet. TIMÆUS *Von GuldenKlee* sanè in *Casibus lib. 1. Cap. 17.* refert Incubum, cuius Historia, prout describitur, ferè persuadet, ad mala quasi paralytica eundem esse referendum; nihilominus in epilepsiam tandem lethalem desit. E contra RHODIUS *Cent. 1. Observat. 54.* refert exempla Incubi Vigilantibus obvenientis, qui in apoplexiam terminari observatus fuit: sicut ex historia infra narranda parebit exemplum Incubi ad epilepticos morbos referendi. Forsan utrumque, ut in variis casibus, nempe tam paralyticum, quam convulsivum, in Incubo locum habet: sicut non rarum est, Paralyticum cum spasmis, & contra, subinè permutari; ita quidem ut causa Incubi, acidum nempe peccans, lymphæ medio ad cerebellum delatum, nunc irritando nervos respirationi inservientes, ac cordis motui dicatos, affectus spasmodicos; nunc spirituum motum nonnihil sufflaminando leviores affectus paralyticos inducat: hinc etiam cura ejus specialis ferè remediis antiepilepticis perficitur. Revertè ergo Incubo insistente laborant nervi diaphragmatis, & hinc reliqui musculi thoracis motui inservientes, qui convulsi impediunt motum diaphragmatis dilatatorium, unde necessarii respirationis difficultas supervenit.

Verum cum idem nervus ex intercostali profectus, musculos thoracis movens, etiam ex eodem trunco furculus procedens laryngem movere soleat, hinc est, quod consequenter à nervi intercostalis irritatione musculis convulsis simul etiam convellatur larynx, qui exinde sentum strangulationis, & postmodum etiam loquelæ impedimentum, aut saltem sonum inconditum, qualem epileptici alias etiam edere solent, subinè gemebundum, efficit; & cum etiam simul sub respirationis defectu inminuta plus minus evadat languinis circulatio, ob id ab eodem anfractu pulmones anxietatem insignem præcordiorum inducunt: sicut dum evigilant tales ægri, cor insigniter palpitat, quod testatur morum convulsivum: & cum hæc omnia fiant imprimis in somno, facillè ejus occasione anima rationalis, talium rerum nescia, concipit somnium quasi ponderis, nescio cuius, incumbens. Notum enim est, quod ii, in quorum vesiculis seminalibus genitura turget, indeque genitalia nonnihil titillat & vellicat, ordinariò accidunt somnia Venerea, quasi rem habeant cum hac vel illa pulchra femina cum voluptuosa genituræ excretionem. Uti ergo turgescencia & eruptio genituræ dat somnia Venerea; simili ratione motus diaphragmatis & hinc thoracis impeditus dat somnia, & imaginationes compressionis & constrictionis thoracis a se superimposita. Somnium tale vagum applicatur interdum certo cuidam subjecto, unde tali affectu laborantes certum sibi objectum imaginantur: quando enim conquiescunt; jacere super prælorem; tunc est determinatum, & fit imprimis occasione sanguinis stagnantis in præcordiis: sic nimis premi imaginantur à vetula ingrata, quale exemplum habet SCHENCKIUS *pag. 129. de se 39. lib. 1. Observ.* de laetifico, qui putavit, se comprimi à vetula, quam vidit & contrectavit. Hac ratione FORESTUS Incubo affectus putabat, pectus suum comprimi à cane nigro, unde respirare non potuit, utrum formica videret esse somnium fallax; uti de se refert *lib. 10. Observ. 52.* Simile ferè exemplum habet ZACUTUS LUSITANUS *lib. 1. Prax. Admir. pag. 42.* quod m. diante Antimonio per luperiora & inferiora curatum fuit. Hinc rectè dicit VINCENTIUS ALSARJUS à GRUCE, idque ex auctoritate GALENI, quod Ephialtes sit quædam quasi in somnio epilepsia, cum ca-

Estimul. Oper. Tom. II.

dem, utut leviora, perperiantur in incubo, dum quiescunt, quæ patiuntur comitiali morbo correpti, cum vigilant: utrobique scilicet ægre respirant, & vox incondita profertur. Vitium imprimis est in nervis, in specie in nervo intercostali, sive in ejusdem radice aut exortu in cerebro & cerebello, sive in uno alterove ejus plexu, antequam scilicet furculos thoracem moventes hinc inde distribuit, laccessito in specie à lymphâ plus minus acri acida, subtili tamen, unde respirationis symptomatica, hic cætera consequentia. Exemplum Incubi ex nervo in exortu affecto allegavi *suprà ex Lovvero de Corde.*

Affligit Incubus in specie dormientes: nihilominus non mirandum, si in ipsis etiam vigilantibus oriatur; nil enim impedit, quod minus & in his diaphragma & reliqui musculi, etiam interdum convellantur: referi enim RHODIUS *l. c.* item SMETIUS in *Misc. Med. de Incubo pag. 547.* Observations Incuborum vigilantibus obvenientium. Adeoque formaliter ad affectus nervinos partium respirationi inservientium, nunc paralyticos, nunc convulsivos, referendus Incubus; Materialiter seu subjectivè magis subjectum constitutionis Melancholicæ, ut vocant, affligere solet. Hypochondriacis & Scorbuticis imprimis familiaris est Incubus, & quidem speciatim inclinantibus ad Melancholiam hypochondriacam, sicuti alias affectus varii convulsivi frequentes sunt hypochondriacis; unde etiam iisdem facillè talis pectoris potest obvenire convulsiva constructio. Imò ex hypochondriacis talibus ad scorbutum declinantibus derivandæ videntur maculæ, quæ eorum cutim pingunt; hæ ipsæ enim ut scorbuticis familiares sunt, ita etiam exinde, dum declinante Incubi paroxysmo aliquis mador interdum prorumpit, illæ maculæ, Germ. *das Alp. Kneipen*, originem habebunt.

Præterea vermes abdominis in pueris inferunt Incubum, sicut hi ipsi hostes ad horrendas etiam epilepsias, aut convulsiones, eisdem admodum disponunt: vid. SENNERTUS *l. 1. Prax. P. 2. cap. 29. pag. 579.* Rarum est, Romæ observatum fuisse Incubum epidemicum, quod ex Cælio Aureliano refert SENNERTUS *l. c.* Sicuti mirabilis est affectus, quem recenset FORESTUS *l. 10. Obs. 52.*, medius inter incubum & epilepsiam, tertio quoque die rediens, & ita periodum tertianam observans, nodulo ex semine nigro pæoniæ cerevisiæ immisso curatus.

## DIAGNOSIS.

Quod attinet signa diagnostica: patent ex relatione ægri. Possunt etiam hauriri ex concumbente cum ægro. Taliter enim affecti, imprimis noctu profundo somno oppressi, solent fieri anxii & queruli, gementes, raucum & inconditum sonum aut boatum proferentes, jacent immobiles, ita ut neque manum neque pedes moveant, parum aut nihil vocati respondent, & cum impetu & exasperati de nimia anxietate cordis & lassitudine conqueruntur, & varia de rebus præcordia prementibus referunt.

## PROGNOSIS.

Quod attinet Prognosin: Incubus Accidentaliter ex se & causa externa nil habet in recessu: Habitualis verò subinè prodromus est epilepsie, imprimis in junioribus; sicuti in senioribus minatur apoplexiam & melancholiam.

Quod si Incubo nocturno jungatur subinè vertigo diurna, prognosin est ceterior, & malum periculosum.

Si Incubus, dicit SENNERTUS, accidit partim dormienti, partim vigili, deterior est; quia epilepsia propinquior: & rursum deterior, si post excitationem sudor frigidus, tremor cordis, spasmus, aut syncope sequatur.

## CURA.

Quoad Curam in ephialte: si est accidentaliter,

- I. Evacuandus est stomachus & primæ viæ.
- II. Ordinetur benè digesta; & speciatim lautior cæna & subitaneus post partum decubitus vitetur.
- III. Propinanda medicamenta volatilia oleosa plus minus antiepileptica seu convulsionibus appropriata.

Habitualis seu confirmatus Incubus ad modum mali hypochondriaci, Melancholici hypochondriaci, aliorumvè morborum Chronicorum, curari debet: nempe per digestiva, præsertim martialia, hinc per Evacuantia, quibus subjungantur volatilia ac antiepileptica.

Inter Evacuantia primatum obtinent Vomitoria antimonialia.



nialia. Modus adhibendi omnibus est notus. Si inferius laxare volumus, ut ut vomitus sit optimus, fiat hoc mediante extracto Hellebori nigri, & Mercurio dulcificato in forma pilulari, quæ in epileptico insultu sunt expertæ: c. g.

R. Extr. helleb. nigri,  
Mercur. dulc. an. gr. xv.  
Scamm. sulphurati gr. ij. vel iij.  
Extr. trochisc. alband. gr. j.

Cum oleo destillato succini s. pilulæ.

Adspers. succino præparato:

D. S.

*Pilula Ispbacica & Stomachica.*

Alias insula etiam tenuata sunt in usu; item mals. pilul. Officinalem de Lapide Lixuli commendatur à quibusdam: ZACUTUS LUSITANUS lib. 7. Med. Princ. Hist. in Observ. cap. 8. commendat Ali. en, ut optimum in ephialte confirmata remedium; quæ passulis majoribus, quibus exempti sunt acini, indatur cicoris parvi magnitudine: quarum passulorum nonnullæ cum ʒj. dictæ aloes semper duabus horis ante passum assumptæ, certe dicuntur curare Incubum ac Vertiginem, modò aliquandiu continuetur, donec Ephialtes planè eradicetur. Loco hu us remedium etiam pilulæ aloëphanginæ iuxta ZACUTUM LUSITANUM simili ratione ad 5, vel 6. usurpari possunt: præservant non tantum ebrietatem, sed etiam assumptæ ante cenam digestionem juvant sine metu insignioris laxationis: Quod si fortius laxare debeant, grano uno akerovè magisterii scammonii acuari possunt. Loco harum pilularum substitui possunt pilulæ sine Cura Cyriaci Weberi, quarum descriptionem videbitis in Pharmacop. Augustana Class. 6.

Præmissâ Purgatione Sudorifera volatilia pro universo corpore abstergendo & sanguine ventilando sunt maximè proficua. Inter appropriata hic convenientia præ cæteris palmam refert Pæonia mas, ejus radix, folia, semen, & flores sunt frequentè in usu; si radix debito tempore collecta infundatur potui; si ejus pulvis siue grana seminis Num. 15. usurpentur; siue ex his paretur emulsiõ; siue ex floribus fiat tinctura, & aliquandiu continuatur ului pentur. Huic adjunguntur nonnulla alia in Epilepsia usitata, ut flores stoechas, lavendulæ, anthos, &c. à quibusdam Smaragdus præparata tanquam singulare specifiçum contra somnia turbulenta, Pavores nocturnos, & contra Incubum & in infantibus & adultis insigniter commendatur. Alii cubitum ituri præservationis gratiâ ab Incubo Theriacam cum aqua Pæoniæ assumunt; vienim opiatâ convulsivos spasmos sistit: loco cujus etiam Eleosaccharum torismarini, succini, salviæ, lavendulæ, cinamomi, anisi & similia sub introitu lecti, præcedente cenâ parçâ, assumpta commendari solent.

Anisum enim appropriatum in Incubo remedium est; semen scilicet ejus paulò largius sub introitu lecti prægressâ parçâ cenâ assumptum, cum etiam oleum ejus præstet egregiè in curandis somniis truculentis & turbulentis sub introitu lecti ad aliquos guttas cum aliis permistum & assumptum, unde etiam insomnia turbulenta & pavores nocturnos puerorum idem oleum potenter sistere solet: item spiritus catminativus de tribus, vel spiritus ammoniaci anisatus, agut. xxx. vel xxx. velperi poss moderatam cenam sub introitu lecti: Vel

R. Tinctura tartari ʒss.  
Spiritus salis ammoniaci ʒij.  
M. S.

*Tinctura resolvens.*

Usurpetur eodem modo. Vel olei destillati anisi, aut Balsami sulphuris anisati, gutt. 6. vel 8. sub introitu lecti capiantur, & æger jubetur minus dorso incumbere: unde pavidis anisata sunt convenientissima.

Quod si forsan in paroxysmo Medicus vocaretur, ita ut medio noctis quasi orthopneicus spiraret æger, Vomitorium præscribatur. Sed si hoc jam aliquot dies noctesque ante præscriptum, sit aut suspicio sit magis stultenta, quàm præcisè humorosa peccare, præscribatur Clyma, simulque Mixtura volatilis aromatica: c. g.

R. Herb. Absint.  
Hyssopi an. M. j.  
Flor. chamomill. M. ij.  
Bacc. laur. ʒj.  
Salis tartari ʒij.  
Coqu. in f. q. aqu. simpl.  
Colatura ʒ x. adde  
EleB. de hiera cum agar. ʒj.  
Olei destillati terebinth. ʒj.  
M. pro Clymate. S.

*Clyster abstergens.* Vel

R. Aqu. Hyssopi ʒij.  
Mentha ʒj.  
Cinam. ʒss.  
Spiritus salis ammoniaci ʒij. vel ʒij.  
Syr. nicot. ʒj.  
M. D. S.

*Potio pro capite & Stomacho.*  
Capiatur cochlearium. Vel

R. Aqu. Hyssopi ʒij.  
Mentha ʒj.  
Cinam. ʒvi.  
Spir. anisati. ʒj.  
Oxymel. squillit. ʒss.  
M. S.

*Potio resolvens pro capite & pectore.*

Quomodo infantes tractandi, videb. in WILLISIO de Anima Brutor. pag. 248.

Coronidis loco Historiam Incubi magis ad epilepticos, quàm ad paralyticos affectus referendi, subjungam. Puella 18. annorum cachectica, & cui nondum Menies fluxerunt, indeque nonnihil athmatica ex narrationibus crebrioribus servæ seu famulæ, primùm imaginationem Incubi concipit, cum ab illa sæpius audivisset se quavis nocte Incubo corripit, & istud mali ab alio concitari. Jam ut ut hæc ipsa dimissa fuerit, illa tamen mox ab huius discessu Incubo corripit, nempe omni nocte præcisè horâ 2. incipit quilratre, hinc mox sensu & motu privata jacet, donec successivè ad se redeat, quo tempore sudore madet, & hinc inde in corpore maculas magnas rubeas, præsertim in femoris parte carnosa observat. Hæc quavis nocte eodem præcisè tempore redeunt. Ergo suspicabar Incubum esse revera convulsivum in subiecto hypochondriaco cachectico: Dedi tartari emetic. gr. iij. qui parum operabatur, & hinc quovis manè de pulvere cachectico seu croco martis aperitivo largam dosin, prohibendo acida. Successus fuit, ut post aliquos dies noctesque Incubus tardius assigeret, horâ tertiâ, hinc quartâ, tandem quintâ maturinâ, tandem per biduum penitus desiceret, quo transacto horâ quintâ maturinâ malum redit, sed absque maculis. Propino vomitorium liquidum, cujus usu cum copiosa mucosâ rejecisset, non redit Incubus. Suasi ut Elixir Proprietatis impostum continuaret, certus, modò primæ viæ a cruditatibus acido-pituitosis essent liberæ, & hinc mentes comparerent, cam pancreatice valitutam.

Hæc de Incubo. Cumque hæc sufficiant de Vitiis Inspirationis læsæ, pergo ad

### CAPUT III.

#### DE

### VITIIS EXPIRATIONIS LÆSÆ.

Vitia interdum, quæ expirationem lædunt, sunt imprimis

- I. Sternutatio, quando exspiratio fit cum impetu & insigni labore.
- II. Tussis, quando Exspiratio fit interruptum & cum sonitu.

Quod etiam faciunt

- III. Vocis vitia, quando aer erumpens non legitimam, sed vitiatam vocem proferit: nam solummodo exspirando, dum aer transit la yngem, fit vox, nullo modo inspirando.

Pergo igitur ad

### ARTICULUM I

#### DE

### STERNUTATIONE.

**S**ternutatio est vitium singulare in aeris expiratione contingens, & quidem nihil aliud, quàm motus convulsivus musculorum pectoris expirationi intervenientium, & ita reverà est affectus pectoris, in quo motu convulsivo, post aliquam Inspirationis inchoatæ suspensionem, subito & magnâ, sed mox iterum cessante vi per nares & os aer una vice expulsetur, unde sonus rancus excutitur. Omnium consensu duo conjuncta sunt in sternutatione, nempe sensus quidam cereæ cujusdam



cujusdam molestie in naribus, conjunctus cum violenta thoracis compressione.

### PARS AFFECTA.

*Parti proxime affecta*, seu id, quod sternutationem dat, sunt muscoli thoracis, cujus constrictioni & expirationi dicati speciatim diaphragma, & muscoli intercostales interni, & abdominis. Diaphragma duplici constat motu, dicatum expirationi & inspirationi, quod convulsivi quid patitur.

*Forma* sternutationis consistit in motu convulsivo musculorum expirationi dicatorum, & diaphragmatis: id quod patet in specie, dum voluntariò artificiosam ciemus sternutationem, quod necessum est fieri à musculis voluntatis imperio subjectis.

Jam verò cum & inspiratio & exspiratio sint morus misti, uti præsuppono ex Physiologicis, ubi id eundem motum dormientes citra voluntatem obimus, & vigilantes variè determinamus; Et ipso contactu percipimus semper simul in sternutatione non solum cum impetu constringi thoracem; sed etiam diaphragma moveri sursum, simulque subito abdomen comprimi ab ejus musculis, & hinc à contentorum sursum motu diaphragma intra thoracem cogi, indeque postmodum regionem illius infra cinguli, ubi connectitur costis notis diaphragma, dolere. Unde & in partu difficili, aut secundinarum retentione, profusa est sternutatio, dum à musculorum abdominis sobita & constrictione exploduntur contenta; sicut à contrario in herniis intestina libus eadem nocet.

Parti affectæ etiam adnumerandæ nares, quatenus ex, & specialiter earum membranz interioris, sunt sensiles, & facilius irritatæ sternutationem faciunt.

*Causa occasionalis* hujus convulsionis est in specie quicquid valet irritare membranam narium internam superiorem: Nulla enim unquam sit sternutatio coacta, in qua non membrana ita sensilis, nares internas succingens, vellicetur, & quasi in crispationes eleatur: quo facto, deum pectus consequenter per consensum irritatur, & ita convellitur. Quam sensilis sit hæc membrana, sentimus, quando e. g. tenues pili, qui subtiles & acuti, naribus intruduntur, unde acuta titillatio in naribus percipitur; quæ membrana narium insigniter movet varios nervos, & totum systema. Experimur in his affectibus mirabilia, qui per odorem excitantur; siquidem ex odore interdum syncope patiuntur; vellicatur enim ab objecto acri connexus, quæ ratione irritationem hanc nervorum sequuntur convulsivi spasmus thoracis.

Fundamentum hujus consensus est quedam perplexus connectio furculorum quorundam nervorum parvi tertii, & quarti ad nares productorum, cum pari nervorum vago & intercostali, thoracem moventium: nervulis ergo istis ad nares dimissis, occasione membranz vellicatæ spasmus fortiori, adeoque secundum eorum ductum irritatis, & ita spasmus correptis, simili spasmus convelluntur nervi thoracem moventes, & exinde diaphragma aliquandiu propter inspirationem protrahentem deprimitur, sed mox cum impetu & forti motu sursum propellitur: vid. SYLVIVS in *Anat. Cerebri*: sicut & cæteri muscoli inspirationi inservientes magis tenduntur, sed mox superveniente contratio spasmus nervorum & musculorum expirationi inservientium, sternutatio supervenit, adeò ut rectè BARTHOLINUS *sternutationem, levem Epilepsiam* nuncupet in *At. Med. Hassnienf. Vol. 2. pag. 49*. Certè quo sensibilibior est ista narium membrana superior, eò propter facilitatem irritationem promptius sternutamus: hinc Itali ex crebriori pulveris sternutatorii abusu, & hinc membranz crebrius irritatæ, sed à copiosiori lymphæ affluente minus sensilis factæ culpæ, minus sternutare solent, cum nos Germani ex tantillo eorum pulveris odore crebrius sternutare soleamus. Quatenus ergo nervi narium membranz sensorii in cujusdam plexibus junguntur cum plexu intercostali, eatenus sit consensus. Mirabilis consensus est faucium, oris, & narium cum nervis intercostalibus: similis ferè est ratio, ubi videmus, quod ex titillatione circa diaphragma oritur motus in facie, qui vocatur Risus, hincque titillari involuntariè ridemus. Interim ultra præviam talem irritationem interdum & convulsivi quid esse, & etiam per consensum aliarum partium per consensum vellicando thoracem excitari posse sternutationem; vid. curiosa historia illustrata in *M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 138. pag. 247.*, ubi referuntur in ancilla sternutationes 300. in uno paroxysmo, eoque singulis 24. horis periodi.

*Estmuller. Oper. Tom. II.*

cè repetente. In his, ubi sunt crebriores & vehementiores sternutationes invitat, ad nervos convulsos respiciendum. Plura de sternutatione ejusque natura conf. MARTINUS SCHOCKIUS; item SCHNEIDERUS *Tr. de Offe Cribiformi*, & in *specie de catarrhis*, ubi de Catarrho narium, quem vocat sternutationem; item WILLISTUS in *Parabol. Cerebri*. Certum ergo est, nullam fieri sternutationem, nisi irritetur membrana narium.

Irritatio ista membranz narium intimè variis fit modis: internè & externè. *Externè*, nunc sunt odores fortes: sic post odorem majoranz, rosarum, Basilici, nonnulli sternutant: acidum in fumo etiam sternutationem excitat; nunc pulveres in aëre volutantes inspirati; nunc sunt medicamenta paulò acriora naribus insufflata, ut nassurtum. Facienda autem est differentia pro ratione membranz narium plus minus sensilis, vel non, & ejus texturæ plus minus delicatæ, vel non, vel ab objecto externo aliàs movetur: hinc odor rosarum huic sternutationem excitat, alius non. Quod pertinent omnia sternutatoria artificialia, à quibus, vellicatâ membranz narium & irritatâ, sternutatio promovetur: quæ sunt, quæ sunt ex majorana, lillis convallium, radice ellibori albi, euphorbio, foliis nicotianæ, castoreo, esula præparata, & præ cæteris omnibus, quæ sunt ex vitriolo ad albedinem calcinato. *Internè* lymphæ membranas narium aliàs naturaliter humectans paulò acrior imprægnata fuerit: hinc coryzam frequentes sternutationes præcedunt quia lymphæ falso-acidior vellicat membranam narium. Præcedens hæc sternutatio signum est læsionis & excoitationis membranz internæ narium à tali vitiosa lymphæ.

Patet ex his, in omni sternutatione cerebrum esse insens, non verò concuti, ut vulgò dicunt. Concuitur sanè caput, sed sine cerebri concussionem. Patet etiam, quod ea, quæ sternutatione eliciuntur foras, primariò sint ex faucibus, & naribus, secundariò ex pectore, aspera arteria, & pulmonum bronchiis, ex naribus & faucibus quidem, quando ibidem sit membranz pituitariæ à SCHNEIDERO de *Catarrhis* primus descriptæ, continuo talem plorant lympham, quæ oritur ex glandulis post dictas membranas constitutis: vid. STENO de *Glandulis secundariis*, & alii. Quæ lymphæ, ubi fuerit copiosior, aut etiam ipsius, quod sit ab aëre inspirato, cum impetu per laryngem etumpens obstruere ista molesta & humores ibidem hærentes removere & ejicit. Quod si quid hæret in bronchiis asperæ arteriæ, aut larynge, illud simul sternutatione expellitur. Hinc in morbis pulmonum, Pleuritide, peripneumonia, sternutatio mala est, Authore HIPPOCRATE: ad pituitam verò in bronchiis pulmonum contentam potenter expellendam, quæ tussis rejici non poterat, sternutamentum conferre, docet GALENUS: videatur RIVERIUS, ubi de *Sternutatione*. Unde etiam remedia sternutatoria, quæ ex narium confiniis hos humores serosos, plus minus viscidos propriè emulgent, nihil ex capite emungunt, nec cerebrum purgant, sed tantum ex membranis narium, præsertim pituitariâ superiore, substratisque glandulis hauriunt: sicut ratione atque Apophlegmatismi nihil omnino ex capite, sed immediate ex glandulis palatinis sublingualibus & maxillaribus; mediatè verò ex massa sanguinea, emulgent & hauriunt. Interdum mucus firmiter impactus in stomacho, etiam sternutationem excitavit.

Fit interdum, ut coitus etiam sternutationem promoveat: vid. BARTHOLINUS *Centuria 5. Historia 19.*, ubi refert, se observasse in quibusdam copiolam sternutationem post coitum celebratum. Quod etiam pertinet AMATUS LUSITANUS, qui dicit, quod quidam, qui à Venere aliquandiu, abstineret adipectâ pulchra muliere, fortiter sternutavit; cujus sternutationis optimum medicamentum sit coitus: Vid. *Cent. 5. Obs. Cur. 4. in Scholio*: Item inspectio Solis sternutationem curare, vid. MAYOW *Tr. de sale nitro* &c.

Patet ex dictis etiam sternutationem esse motum quandam singulit contrarium: nam in singultu cum impetu inspiramus, seu diaphragma convellitur deorsum; sicut in sternutatione cum impetu expiramus, & diaphragma convellitur sursum. Porro in singultu fit sonus clarus & ingratu propter apertum laryngem; in sternutatione fit sonus rucus & stridulus propter oclusum nonnihil laryngem, & propter impedimentum narium.



## DIAGNOSIS.

Signa diagnostica per se patent.

## PROGNOSIS.

Quod attinet signa prognostica : sternutatio à causa externa, nisi crebrior sit, non mala est.

Copiosior, frequentior, violentior, sine causa manifesta crebrius repetens, est mala, & interdum lethalis, utut leve videatur malum; graves enim nervosi systematis affectus epilepticos, aut convulsivos, aut in ætate grandæva apoplecticos & paralyticos, portendit: Conf. HORSTIUS in *Observat.* pag. 290. ubi habet sternutationem admodum dubiam in puella, & dicit, quod sternutatio nimis frequens & vehemens semper ferè innuit subsequenter mortem: quod confirmat HILDANUS *Cent. 4. Obs. 12.* de sternutatione lethali in puerpera observata, quæ cum aliquoties sternutasset, expiravit.

Interdum ex suppressa sternutatione per artem oborta est epilepsia.

Uterius sternutatio nociva est oculis: sic enim ex sternutatione nimia cecitatem nonnunquam obortam refert HILDANUS *Centuria 1. Observat. 14.* uti etiam ROLFINGIUS in *Dissert. Anatom.* pag. 1254. Ob id cauti sumus in oculorum affectibus cum sternutatoriis, ne cæcos reddamus eos, quibus debemus vltum conservare. Potius ergo Erithina in oculorum affectibus & epilepsia conveniunt, in quibus etiam sunt optima; minus sternutatoria: Conf. BARTHOLINI *Ab. Medic. Hassniens. Vol. 2. pag. 243. 251. & 303.*

Postmodum per accidens sternutatio in mulieribus per accidens aliquid habet in recessu: nempe promovet menses, partum difficilem, molam, fortiter totum abdomen commovendo, & fortiter universum ferè nervorum systema concutiendo; quando enim ira concutitur abdomen, insigniter sanguis circa uterum stagnans promovetur & commovetur. Vel facta tali concussione motus & vibratus uterus, spontè ejaculatur særum. De mensibus vid. HILDANUS *Cent. 3. Obs. 51.* De partu verò, uti etiam de strangulatu uteri, audiendus est HIPPOCRATES *Secl. 5. Aphor. 35.* Vid. M. A. N. C. *Ann. 3. Observat. 138.*

In nimium autem fluentibus mensibus & in gravidis periculosa est fortis sternutatio.

Denique sternutatio post usurpata sternutatoria fortia non fortè cedens, malum signum est, speciatim si hoc fiat in apoplexia aut epilepsia, & similibus affectibus; signum enim est, totam vim animalem esse prostratam.

## CURA.

Quod attinet *Curam*: hæc consistit in eo, ut narium vellicatio, & hinc ortus impetuosis spirituum motus, & si nata thoracis convulsio, tollantur. Removenda ergo in Sternutatione est

I. Causa membranarum narium vellicans; & hinc

II. Sensus irritationis obviandus.

Unde odor opialiorumque narcoticorum, vel laudanum opiatum ipsum assumptum, est optimum ad sternutationes nimias. Exemplum habet ZACUTUS LUSITANUS de sternutatione continua, per usum laudani opiatum curata. Primum frequens odor sufficit opii; ubi verò hoc nihil proficitur, interius adhibetur laudanum opiatum: item oleum rosaceum cum opio impægnatum interioribus naribus illinendum. Ocymum commendat AMATUS LUSITANUS, ut & eius succum. Caterum notum est, quod sit planta luavis & optimi odoris, ut probabilius sit illam provocare sternutationem, & ob id potius abstinendum est ab ozymo in sternutatione. Tandem semen fœniculi & anisi aceto insusa naribus pro odorato admoveantur. Lac reptidum, vel cum aqua suaveolente temperatū, etiā pro naribus abluendis seu elvendis injectum, est optimum; præsertim si stimulatio ab occasione externa, inspirato scilicet acriori sternutatorio, fuerit excitata: vid. HORSTIUS *l. 3. Observ. 51.* item FORESTUS, item BARTHOLINI *Ab. Med. Hassniens. Vol. 2. pag. 166.* Loco lacis tepidi cremoris lactis & mucilago seminis cydoniorum vel ptylli cum aqua nymphæ extracta, naribus injecta conducit.

Plura de Sternutatione nimia videb. in AMATO LUSITANO *Cent. 4. Cur. 4.* HORSTIO in *Obs. loc. cit.*, & in specie M. A. N. C. *supra allegata.*

## ARTICULUS II.

## DE

## VITIIS VOCIS.

**A**D Expirationis vitia & vocum præternaturalia pertinent errata, cum vox propriè formetur sub aëre expiratione. Vocum vitia dico: non loquelæ; aliud enim est vox, aliud loquela. Vox nempe nihil aliud est, nisi sonus, qui fit ab aëre, asperam arteriam transeunte; huic postmodum accedit in lingua & faucibus articulatio, & est sermo vel loquela. Hæc vice de Vitiis Vocis.

Vocum vitia sunt, quando vel deficit vox in Aphonia; vel vitatur in specie in Raucedine.

## MEMBRUM I.

## DE

## APHONIA.

**D**eficit Vox vel vitio thoracis, vel vitio laryngis: Thoracis vitio deficit, quando aër non convenienter expiratur, uti fit in Apoplexia graviori, ubi musculi thoracis soluti, aut tali thoraci convulsione, ubi inspiratio & exspiratio impeditur, ut subinde fit e. g. in affectibus hysteriis & aliis convulsionibus, dum musculi non movent thoracem, nec aërem emittunt: Vitio laryngis, non modificans aërem sub elisione, vel propter ejus stimulam, vel propter musculorum ac nervorum moventium causam. Rimulæ adest vitium, quando à tumoribus vicinis impeditur plus minus ejusdem apertio: item quando epiglottis facta est ossæ: vel quando ab assumptis adstringentibus angustatur penitus & constringitur rimula laryngis, unde vox deficit aut planè non editur; de quo vid. BARBETTE *Anatom. Pract. lib. 1. c. 4.* ubi de Cartilaginibus. Vox deficiens musculorum & nervorum vitio in specie dicitur *Aphonia*, quæ nil aliud est, quàm obmutescencia ex vitio laryngis: si enim vitio lingue fiat, dicitur *loquelæ lapsa*, & lingue tunc motus deficit, aut alia ejus vitia suis signis se exhibent, quæ in aphonia locos se habent, in qua nullum lingue vitium, præsertim quoad motum, observari solet. Aphonia dicitur aliis *Anapnoia*, quæ HIPPOCRATI sunt distincta, à modernis verò confunduntur: *Aphonia* enim HIPPOCRATI idem ac *apoplectici*, cum *Aphonia* nomine intelligantur, qui ne motum quidem ullum præteritum seu voluntarium retinent; *Anapnoia* verò eos, quibus vitio laryngis vox cessat aut deficit: vid. GORRÆUS in *Definit. Medic. pag. 51. & pag. 57.*

## CAUSA.

Aphonia ista, prout communiter accipitur, fit ex vitio nervorum & musculorum, quando hi nunc paralyti sep reclusionem, nunc ipsismo laborant. Quoad vitium paralyticum: Aphonia fit frequentissimè à paralyti musculorum laryngis, ita ut totus larynx sit apertus, & ita deficiente aëris in larynge strictura, nullus possit formari sonus; live larynx vitio proprio, live vitio nervorum recurrentium ad eum distributorum accidat. Nam in canibus dissectis, vellicatis illis nervis, Aphonia in promptu est: sic videmus non rarò aphonos fieri, qui magis raucedine laborant; id quod fit probabiliter à nimia humiditate & consequenter resolutione musculorum laryngis, ut flaccidi & impotentes fiant ad motum. Manifestum hujus rei exemplum est, quod refert TULPIUS *l. 1. Observ. cap. 39. pag. 78.* Hinc etiam tardior loquela ob abundantis phlegma, qui anno 12. demum loqui cœpit, teste AMATO LUSITANO *Centur. 6. Cur. 5.* Pertinet hæc etiam erapula, subinde aphonia inferens paralyticam: Vid. HOECHSTETTERUS *Decad. 3. Cas. 9.* Quod etiam facit Aphonia ex casu ab alto, & inde contracto vitio nervorum paralytico: POTERIUS *C. 2. cap. 11.* & jam olim notata observatio GALENI, quæ vid. in SENNERTO *lib. 2. Præf. pag. 254.* Sic ex restore nervorum vitio facta aphonia, pro apoplectica restituta, vid. in BARTHOLINI *Ab. Medic. Hassniens. Vol. 1. Observ. 101. pag. 193.* Curiosa etiam est Aphonia paralytica, ex globulo plumbeo per vomitum moto, inde quo recurrentes nervos premente, de quo vid. DEODATUS in *Valerind. pag. 97.* Ut taceam nervos recurren-



ter quovis infortunio obfiffo, vel reſectos: conferatur SENNERTVS lib. 2. *Prax. Par. 3. cap. 14. pag. 355.* Tempore hyemali obſervavi aliam aphoniā in virgine, quæ cubans noctu in hypocausto, ac ſuaviter dormiens, ob extinctam lampadem ex oleo non adeo puro conſtructam, & huius fumo terro ſucceſſivè inſpirato, altero manè ſurgens, cætera ſaniſſima, Aphona erat. Videbatur ſubefſe vitium quaſi paralyticum laryngis ejusque muſculorum, ex iſto fumo inſpirato laſorum, quo hianſe, non potuit formare vocem. Curabatur per Eleſtuarium ex ſcordio pulveriſato, cum melle excepto, crebrius aſſumpto & deglutito. Atque hæc aphoniæ ad conſtitutionem nervorum & muſculorum paralyticam pertinent, ſi in paroxyſmo apoplectico accedant, & hoc ceſſante, etiam aliquamdiu aſſigant, ſive ſine eo, aliis functionibus omnibus ſalvis, ægros ſubinde prehendant.

Quoad alterum aphoniæ fiendi modum: hunc ex contrario vitio, v. g. convulſione muſculorum & nervorum laryngis, fieri inſinuavi; tunc enim conſtricta rimula ſimiliter nullam poteſt edere Vocem.

Obſervatur crebrè talis in graviſſimo paroxyſmo hyſterico, in quo aphoniæ jacent ægræ, pariter ac Epileptici; convulſionibus enim ſæpius aphoniæ ſuperveniunt. Speciatim videatur hic Epileptica aphonia per venæ ſectiōem curata, in HOECHSTEDTERO *Decad. 4. Caſ. 1.* & conſ. Caſus parallelus, nempe *Caſ. 2. & 4.* Item ex vermibus in ventriculo & inteſtiniſubindè Obmutelcentia obſervatur, teſte FORESTO *121. Obſervat. 28. in Scholio, & L. 14. Obſervat. 33. in Schol.* Notè nempe varii ſpalmiſmodici affectus ſunt, occasione vermium obvenientes. Pertinere etiam huc videtur curioſa obſervatio in BARTHOLINI *Abſ. Med. Hoffmænſ. Volum. 1. Obſervat. 86. pag. 170.* Nam ex conſtrictionis lenis in loco affecto ſpasmus nervi recurrentis adfuſſe probabiliter concludi poteſt. Forſan & huc pertinet Aphonia iſta mirabilis M. A. N. C. *Ann. 3. Obſervat. 121. pag. 193.* Spontè ſua ex improviſo aſſigens, ſpontè ſua denuo cetans ac recidivans: nempe vix paralyticum, ſed potius convulſivum quid ſubefſe videtur. Forſan etiam huc pertinet aphonia, ſuborta ex reſecta gonorrhœa virulenta. Fonticulis in ingvine aperti curata, apud ZACUTUM LUSITANVM lib. 1. *Prax. Admir. Obſervat. 97.* nempe acce virus Venereum faciliè nervos recurrentes vel muſculos laryngis irritando, ex ſpſmo aphoniā inferre potuit. Reſidua quidem eſt: an aphonia in febribus interdum ſuperveniens paralyticum potius an convulſivum vitium ſit? Interim tamen, quantum colligere valeo, ad convulſiva vitia potius referrem: Nam & quæ in variolis non rarè obſervantur aphoniæ, (vid. HILDANVS *Cenſur. 6. Obſervat. 14.*) ex convulſione potius eſſe videntur, cum convulſiva pathemata non raro in illis obſerventur; dum ſcilicet acce Vaccinæ venenum nervos recurrentes irritando, ad ſpſmos illos cogit: ſicut tuſſim, raucedinem, ac his affinia aſpera arteriæ ac laryngis mala eadem inferunt. Sed præter Paralyſin ac convulſionem etiam ſubitanea ſpiritus perturbatio ad aphoniā diſponere valet: ſicuti videmus, quosdam nimio terrore percuſſos planè quaſi obmutelcere. Pertinet huc mirabile exemplum *deſcribitur ex viſcancris in M. A. N. C. Ann. 2. Obſervat. 145. pag. 129. & Anno 3. Obſervat. 187. pag. 348.* Præ quo longè curioſior eſt ſubitanea iſta aphonia cum perfecta in toto corpore *anæſthæſia*, omnibus cæteris, tam vitalibus quam animalibus functionibus ſalvis, in M. A. N. C. *Ann. 3. Obſervat. 231. pag. 454.* quæ omnia tamen beneficio venarum ſectiōis breviter evanuerunt.

### PROGNOSIS.

Quoad *Prognœſin*: apoplexiæ juncta aphonia, difficilius curatur, ac interdum diuturna eſſe ſolet.

Quæ cum ſingultu ſunt Aphoniæ, peſſimæ ſunt, *Autore HIPPOCRATE.*

Balbi profluſio alvi maximè corripuntur, teſte HIPPOCRATE *Sed. 6. Aph. 32.* & hoc ipſo ſerè ſanantur.

Aphoniæ perſe & ſolitarie, modò ræ tractentur ægri, ſucceſſivè curabiles ſunt; quæ verò ſunt ſub curſu febrium malignarum, peſſimæ notæ ſignum ſolent eſſe.

### CUR A.

In *Cura* ad primarium morbum, cuius ſymptoma eſt Aphonia, aut ſaltem ad ejus cauſam antecedentem, reſpi-

ciendum, ut hiſtemotis faciliſſor prædicti ſymptomatis ſit Curatio. Pro quo curando, ad laryngem & ejus muſculos ac nervos recurrentes imprimis reſpiciendum, tam eorundem paralyſin undecunque natam, ſæpius ex nimia humectatione, quàm ſpſmum ex nimia irritatione linguæ removendo: internè per volatilia aromatica & nervina, aliàs Cephalica dicta, e. g. ſpiritum ſalis ammoniaci cum eſſentia calthæ & oleo ſuccini miſtum & deſtillatum, liquorem Corn. Cerv. ſuccinatum &c., ſubindè ſudorem ſimul provocando, & etiam pyaliſmum maſticatoriis promovendo. Imò in contumaciori malo, præſertim paralytico, dicta ſudorifera ex lignorum Decoctis inſtituenda veniunt. Hinc externè ſacculi ex Nervinis aromaticis, ſpiritu vini irroratis, exterius collo applicandi; vel ſpiritus apoplectici cum ſpiritu limbricorum vel formicarum eodem in loco calidè cum linteis multiplicatis applicandi, aut olea decocta nervina ſpinæ, ſuccini, lavendulæ, rutæ, juniperi, cum Theriaca permixta, aut cum baſamo Peruviano ſubacta, ibidem frequentius illinenda, aut etiam eſſentia caſſioræ, vel ſolitaria, vel iſtis ſociata, ſedulo admovenda; oleum imprimis ſpicæ linguæ illitum in loquela amiſſa egregiè convenit; internè etiam cum ſpiritu Vini. Vel

*R. Herb. ſabo.*

*Amboſ an. M. j.*

*Sem. erucæ,*

*Sinapi an. 3 j.*

*Coq. in ſ. q. Aqu. ſimpl. in vaſe clauſo:*

*Colatura ꝑ j. adde*

*Spir. Ceraſor. nigr. 3 vj.*

*Sal ammoniaci 3 j.*

*Mellis amboſ. 3 j.*

Miſc. pro Gargarismo in aphonia, laryngis affectu poſt paroxyſmum apoplecticum: S.

*Gargarisma.*

Internè ſpiritus Vini, cui flores lavendulæ infuſi, cochlearim propinandus. Pro quorum omnium meliori ſucceſſu, ubi circumſtantiæ aliz permiferint, & venæ ſectio ſub lingua interdum inſtitui poteſt. Vid. M. A. N. C. *Anno 3. Obſerv. 231. & WEDELIVS Diſput. de Venæ ſectiōe cap. 1. pag. 7.*

## M E M B R U M II.

### D E

## R A V C E D I N E.

EIX minoribus cauſis ſit vox non nihil imminuta ſeu depravata, quando nempe diverſimodè & non naturali modo ſonat vox, quod ſit variis modis. Præſuppono nempe hic noſſiam ac conſtitutionem ſiſtulæ pneumaticæ, ejusque capitis laryngis, ut & muſculorum laryngis ceu vocem formantis, h. e. Vocales, qui ſunt ſonus ex larynge ſimpliciter emiſſus, & oris certa amplitudine, majore vel minore, abſque nova allifione variatus; ſicut, dum partes oris, ſpeciatim lingua, vocem variâ allifione & inflexione modificant, Conſonantes ſunt, & conſequenter propriè ſic dicta loquela ſeu Vox articulata efformatur. Imò ergo uti notum eſt, quod per ſiſtulam pneumaticam in longitudine & latitudine, humiditate & ſiccitate, &c. aliis qualitatibus & circumſtantis prout variat, variis formetur etiam ſonus, nunc gravis, nunc ſuavis, nunc clarus, nunc ſtridulus, nunc raucus; ita ſimilitudine cum noſtra ſiſtula pneumatica ſeu aſpera arteria & larynge comparatum eſt, ſimilibus ex cauſis vocem variantem; dum nunc eſt ampla, nunc anguſta, nunc eſt ſicca, nunc humida, nunc alio modo vitata, varias etiam ac varias voces per exſpirationem proferit: Speciatim quando eſt ſicca & acida, proferit vocem claram, ac ſonum, quem ſpeciatim in febribus acutis ardentibus vocamus clangolum: ubi verò larynx & aſpera arteria eſt nimis humida, tunc ſit vox rauca: ſit eadem ſimul obſcura & quaſi interrupta, quando non tantum humida, ſed etiam mucilagine craſſa inviſcata eſt aſpera arteria. Cum ergo aliz Vocis depravationes vix cadant ſub Medici curam, imprimis agam de Raucedine.

Redditur Vox rauca, quando aer exſpiratur per aſperam arteriam & laryngem nimis humidam ac nimis madefactam, unde ſæpè in diuturna loquela vox raueſcit: quia quò plus loquimur, uti copioſior lymphæ emulgetur ſaliva in os; ita propter morum laryngis copioſior lymphæ emulgetur iſta occasione in laryngem, unde hæc uberior effuſa tandem



Raucedinem infert. An aliquid inter potandum in asperam arteriam ingrediat? negatur. Vid. SCHNEIDERUS.

### PARS AFFECTA.

*Pars affecta* in Raucedine est aspera arteria, ejusque larynx; larynx enim primario format vocem.

### CAUSÆ.

*Causa Raucedinis proxima interna* est in specie nimia effusio lymphæ tenuis & moderate glutinosa, quæ per asperam arteriam transudat, eamque cum larynge aliis naturaliter humectat & imbuit, ac parit ut ab aëre inspirato, vel inelementiore, vel variis effluviis permixto, defendat, partim ut, ubique eandem planam reddendo, voci formandæ aptiorem reddat, & oritur hæc ipsa ex glandulis juxta annulos laryngis sitis: de quibus præter BARTHOLINUM in *Epistol.* vid. SCHRADEUS in *Observat.* pag. 199. Quibus addatur membrana glandulosa interius cingens asperam arteriam: de quo WILLISIUS in *Pharmac. Rational.* Part. 1. pag. 11. Quod si lymphæ hæc majori copia effundatur, & nimis humectet asperam arteriam, & laryngem, hoc modo omnis rauco oritur, uti in aliis instrumentis pneumaticis fistulæ humectatæ dant raucum sonum.

Observanda est *Differentia Raucedinis*, vel recentis vel inveteratæ: Illa à lymphæ simpliciter tenui, nunc mitiori, nunc acriori, nimis saltem humectante: Hæc à crassiore, mucosa, regimine aquoso obducente interius bronchum nascitur.

*Causa remota* excitans, habet convenientiam cum tussi: nempe est irritatio laryngis, cujus occasione copiosior lymphæ contingit effusio; siue fiat irroratio à causa externa, siue interna.

Quoad externam: rauco subinde solet oriri occasione aëris inelementioris inspirati, fumi sulphuris accensi, & spirituum acidorum inspiratorum, aut effluviis acrimiarum aëris permixtorum; unde etiam subinde tussim nunc præcedere, nunc comitari solet Rauco. His & suo modo diuturnior sermo aut loquela, vel vociferatio intensior, aut cachinnus diuturnior & vehementior addiposunt: quia quod plus loquimur, eò copiosior emulgetur saliva per vasa salivalia & per glandulas, ratione motus linguæ: pariter ratione per motum laryngis asperæ arteriæ copiosior lymphæ provocatur, quæ dat raucedinem: Item facit hoc potus nimis maximè acidulatus. Potus vini raucos quosdam facit, quatenus successivè fauces irritat, etiam consequenter ad laryngem effunditur lymphæ, unde rauco.

Internè ad raucedinem disponit seu irritat laryngem affectus catarrhalis, lymphæ acrior, salior, aut acidior, quæcunque occasione vel variata, vel ad asperam arteriam delata, quæ utillando & irritando uberiorem lymphæ effusionem, & ita raucedinem concitat. Talis autem rauco vulgò catarrho tribuitur, & propriè *Bronchus* dicitur, qui nullatenus à capite desillare putandus est, quoad vulgatam opinionem, sed ex propriis laryngis & asperæ arteriæ glandulis effunditur, & frequentissimè à causis externis provocatur. Interdum tamen etiam ex vitio externo oritur. Facit huc excoarctatio partium asperæ arteriæ internarum ex lymphæ simili acris: id quod in lue Venerea obtinet, quæ sæpius gravem & diuturnam raucedinem infert. Multum confert constitutio narum & faucium ad raucedinem: coryzantes etiam emittunt vocem raucedine præditam nonnihil: sicut scorbutici ob acris serum faciliè raucescunt. Tussis crebrior, præsertim in qua acrior plus minus materia ejicitur, irritando laryngem, & hinc copiosioris lymphæ instillationem provocando, ad raucedinem disponit; hinc phthisici, item empyematici, non raro raucescere solent. Omnes hæc causæ moderatæ, aut quæ faciliè corrigibiles sunt, levem inferunt raucedinem.

Quod si verò gravior & contumacior Rauco fuerit, ita, ut vel copiosior lymphæ continuè effusa tandem spissescat, uti fieri potest tempore hyberno, vel alio modo vitietur, & in mucum degeneret; vel occasione irritationis laryngis & uberioris lymphæ effusionis tandem successivè læsa aspera arteria & larynx simul suum nutrimentum proprium, sub assimilatione alienatum, profundant, istudque in cavum asperæ arteriæ deponant, malum gravius longè & periculosius redditur, & hinc subinde mucosa spissa oris expectoratione ægri reddere solent: hinc apud Practicos prior rauco à sero tenui & acris, posterior verò à materia pituitosa, oriri

dicitur. Unde & imprimis in inveterata tali raucedine, aut in diuturniori malo, ad pulmones vel maximè respiciendum erit, cum talis occultam vomicam pulmonum hinc insequitur, ut rectè observatum fuit in BARTHOLINI *Med. Hassniens.* Vol. 2. pag. 395.

Reliqua Vocis vitia, ut sunt vox tremula, intercepta &c., videntur in SENNERTO *lib. 2. Prax. cap. de Vitiis Vocum.*

### PROGNOSIS.

In *Prognosi*: Rauco à causis externis nihil mali inuit; inveterata verò, aut quæ à causis internis læsionem insignem asperæ arteriæ conjunctam habet, in specie inferioribus, aut quæ per annum & diutius continuatur, vix sanatur; recidivat enim levi, & tussim chronicam aut periculum phthiseos infert; sicut & bronchi & coryzæ in valde senibus coctionem non admittunt: vid. HIPPOCRATES *Sec. 2. aph. 40.*

Phthisi autem rauco conjuncta eandem exasperare solet; quæ enim ob suppurationem phthiseos & peripneumoniam fit, serè sub mortem futuram fieri solet.

### CURA.

In *Cura* attendendum ante omnia, ut causa remota, irritans asperam arteriam & hinc propinqua, removeatur; sic spontè cessat: unde, quoad proximam, observandum imprimis, an rauco ab externa vellicante fauce vel interna causa inducatur: deinde, an lymphæ humectans mitior? an verò acrior fuerit? id quod junctæ tussis ostendit: Item an recens vel inveterata sit? hoc est, an simpliciter à lymphæ tenui acris & copiosiore nimis, humectante asperam arteriam? an verò simul à mucosa crassiore & viscidior, ex degeneratio- ne alimenti oriundo, & laryngem incrustante oriatur: id quod partim ex sensu majoris vel minoris titillationis, partim ex excretis per os, quæ creatu vel tussi rejiciuntur, manifestum est.

*Recens* igitur Rauco à causa externa enata, hæremora per opiata, lenientia, temperantia, irritationem & hinc lymphæ effusionem sistendo: à causa verò interna, à lymphæ copiosa, per sudorifera catarrhalia ex tale volatili succini, quælibet corporis contenta atque etiam lympham mundificantia, & ordinatum motum ejus promoventia; & hinc per temperantia & opiata, acrimoniam lymphæ irritantem demulcentia tollitur, quæ maturè maritentur sudoriferis; sic enim magistum est; præmissis, si opus fuerit, purgantibus talibus, quæ sub feri forma evacuare solent, qualia in specie sunt gummæ guttæ, radix jalappæ, cortex radicis cilix, elaterium, Ebulus & sambucus; de quibus *infra*, ubi de vitis glandularum: Nec multum hic refert, licet inter purgantia nullus habeatur delectus, quia promiscuè omnia evacuant. Inveterata verò rauco per Incidentia, & hinc Expectorantia, optimè levatur. Rauco sit sit à lymphæ tenui & à causa externa, fauces vellicante, parum vel nihil per os excernitur: si verò sit inveterata, ubi mucus copiosus incrustat laryngem, materia crassa viscida plus minus copiosè per creatum & tussim expectoratur: pro quo scopo interdum vomitus etiam necessarius est. Quod si altiores in corpore radices habeat malum, v. g. luen Veneream, scorbutum, vomicam pulmonum &c., ad hæc primaria cura dirigenda, simul tamen symptomati, scil. raucedini, succurrendum.

In Raucedine ergo recenti à lymphæ nimis acris, tenui & copiosa, conveniunt temperantia, incrassantia aliis dicta, quæ acrimoniam lymphæ leniunt, & fauces plus minus lubricant: item opiata & similia, præsertim papaverina: unde syrupus de papavere, diacodion Montani cum baculo liquiritiæ usurpatus, essentia opii, theriaca, &c. conveniunt. Inter temperantia convenit admodum glycyrrhiza ejusque syrupus, & alia medicamenta ex ea, syrupus violarum, de jujubis, quem Rulandus & Dodonæus valde commendant; oleum sacchari, tam simplex quam cõpositum; mucilago radialis althææ cū saccharo, juscula avenacea cum passulis: sic diacodii Montani, item scabiosæ syrupus, vel misti, vel cum rob passularum subacti, cum baculo liquiritiæ assumpti, omnibus Loch incrassantibus & expectorantibus præstant: Vel

R. Syr. papav. alb. 3vj.

Violar.

Glycyrrhiz.

De jujub. (qui est optimus in tenui lymphæ) an. 3ss.

Rob. moror. 3iij.

M. D. S.



*Succus contra raucedinem.*

Capiatur successivè lambendo cum *glycyrrhiza*; egregium enim est.

Vel

*R. Syr. diacod. Mont. 3vj.*  
*Mell. vel rob passul. 3ij.*  
*Extr. liquirit. 3j.*

Diluantur cum paucò *Aqua scabiosa*.  
*M. D. S.*

*Succus ad collum.*

Balsamum sulphuris anisatum aut terebinthinatum, vel solum vel cum saccharo in formam pulveris subactum, est quoque expertum in lymphâ copiosiore, etiam viscidiorè; cumque hoc raucedinem, quæ ad aliquot annos duraverat, curavit RIVERIUS: item flores sulphuris in ovo forbilli assumpti sunt egregii, temperando lympham catarrhalem & præservando partes pneumonicas ab erosionem vel excoriationem. BORÉLLUS *Cent. 4. Observ. 27.* conclamatum hultusum: florum sulphuris, cum salviæ foliis per os excepti, restituit: parem experientiam sequenti *Observas. 29.* habet. Si quid aliud, sperma ceti expertum est ad raucedinem, à 3j. ad 3ss. vel 3j. aliquot vicibus assumptum. Quidam raucedine contumacissimâ aliquando afflicti salis irritis per 3ij. spermatis ceti, unâ vice assumpti in vehiculo calido, tandem sunt liberati: vid. *Dissert. de sperm. ceti Cap. 2. §. 12.* Item rapæ earumque Decocta cum saccharo simplici vel candisato meritis commendantur à TIMÆO in *Consil. lib. 2. Conf. 12. p. 100.*, per quam egregium est temperativum, ac quolibet ex rapis dulcibus, sive recentibus sive siccis, parata remedia. Passulæ itidem elegantes sunt ad raucedinem, tam majores quam in specie minores; unde rob passularum est egregium: item decoctum passularum cum aniso non contemnendum est in raucedine incipiente remedium; cum quibus passulis erysimum decoctum erit medicamentum præferendum syrupo de erysimo Lobeli: quod etiam spectat decoctum SIMONIS PAULI in *Quadrup. Botan. pag. 44.* IOEL confirmat, myrrham in ore utentem raucedinem tollere: Vel

*R. Succ. liquirit. 3ij.*

*Myrrha 3j.*

*Tragac. 3j.*

*Sacch. penid. vel Canar. 3ij.*

Cum *Aqu. rosar. f. Morfuli* in ore tenendi, & successivè deglutienti: S.

*Morfuli ad os & collum.*

Vel fiant Rotule:

*R. Spec. dia. iros simpl. 3jss.*

*Tragac. 3j.*

*Flor. sulphur. 3ij.*

*Extr. Croci xi. vi.*

Cum f. q. *sacch. in Emuls. papav. sol. F. Rotula*, successivè deglutienti: S.

*Rotula ad os & collum.*

In Raucedine verò inveterata, aut ubi jam mucus viscidus vel lymphâ crassa peccat, tunc incidentia, resolventia & expectorantia primatum obtinent. Præ cæteris convenit Syrupus de erysimo Lobeli expertus in raucedine, aliàs *not. 6. v. syrupus contra raucedinem* appellatus, mediante quo raucedinem desperatam se curasse asserit LINDANUS & SCHWELZIVS in *M. A. N. C. Ann. 3. Observ. 153. pag. 275.* ubi simul Descriptionem ejus, ubique alias obviam, adjungit: vid. in specie SENNERTVS l. 2. *Prax. P. 3. cap. 3. pag. 300.* Compositio hæc est incondita sarrago ingredientium variorum: basis est erysimon cum semine, quod gustu prodit suum sal volatile: tota planta imprægnata est sale volatili acri: penetrans antiscorbutico, seu simili illi, quod reperimus in plantis antiscorbuticis, ratione cujus egregiè incidit & dissolvit mucum in raucedine inveterata. Syrupi hujus loco conveniunt passulæ minores, aut earundem pulpa, cum semine erysimi: confuso probè subacta, quæ dabunt remedium sufficiens ad raucedinem curandam, & reliqua ingredientia sine periculo possunt omitti: cui placet multa congerere, is abundet suo sensu. *Electuarium* quoque ex melle, scordio & foliis salviæ; item radice belenii, pulverisatæ & ad consistentiam *Electuarii* spissioris subactis, itidem sit commendatum, quod subdosi castanæ magnitudinis aliquoties in die assumptum mucum dissolvit, & expectorationem promovet. Syrupus de prassio seu de marrubio, uti & oxymel squilliticum, etiam est egregium: Vel

*R. Aqu. Hyssopi,*

*Scabios. an. 3j.*

*Asthmat. 3vj.*

*Oxym. squillit. 3ss.*

*Syr. de erys. Lobel. 3j.*

*Ol. de still. anisi gutt. vi.*

*M. f. Potio. S.*

*Succus resoluens contra raucedinem.*

Egregium etiam est Balsamum sulphuris, vel terebinthinatum, vel anisatum, vel juniperinum, ad aliquot guttas in vehiculo calido, vel suprà dicto modo usurpatum, nisi Raucedo ad aliquot annos duraverit: curat simul excoriationem, aut incipientem plus minus exulcerationem partium pneumonicarum. Item radix ari acris imprimis commendatur ab HORSTIO, propinando nempe pulverem radicis ejus cum ana sacchari simplici vel candisati cum vitello ovi permixtum; vel cum syrupo violarum aut papaverino aut alio in *Electuario* redactum; virtute enim incisivâ optimè confert ad Raucedinem inveteratam, uti etiam pulvis pectoralis *Ludovici*, & spiritus salis ammoniaci anisatus, &c. Brassica denique seu Caulis (unde & loch de caulibus) & in specie ejus succus, admodum ad raucedinem diuturnam laudatur; vel solus succus nonnihil inspissatus, & cum melle mistus, admodum ad raucedinem extollitur: de cujus virtutibus contra raucedinem vid. in specie CODRONCHIUS *Tr. de Vitis Vocis & Respirationis*: Nam si quis alius, hic sanè pertractavit virtutem horum naturam, & commendat succum brassicæ cum melle mistum ad raucedinem & vocem interceptam. RIOLANVS commendat cubebas, quæ sensim sunt deglutendæ, aut cum aqua vel decocto mellis propinandæ: & credo, quod propter acrimoniam aromaticam non sint inconvenientes in raucedine curanda.

Contra Raucedinem subitò ex fumo tabaci inspirato enatam, præmisso nonnihil violarum syrupo, ipse serè aphonus curatus fuit:

*R. Aqua scabiosa 3ij.*

*Asthmat. 3vj.*

*Spir. sal. ammoniaci anis. 3jss.*

*Syr. de byssopo.*

*Erys. Lobel. an. 3vj.*

*M. f. Potio. S.*

*Potio contra raucedinem.*

Capiebat cochlearim.

Præ cæteris CODRONCHIUS loco allegato duo habet remedia ipsi frequenti usu in Raucedine experta, & quæ etiam D. MICHAELIS tanquam probata sæpius commendavit: recentiorum à SENNERTO l. 2. *pag. 359. & 361.* & GABELCHOVERO c. 1. *cur. 74.* Primum est Decoctum, quod imprimis in usu sit Concionatoribus, tam ad præcavendam quam curandam raucedinem: item commendat illis, qui multum clamant, ita, ut congeratur quasi tensiva & phlegmatosa dispositio, & exinde fiant rauti; capiendò 3vj. ante somnum, & totidem in diluculo, vel etiam necessitate cogente interdiu noctuque paulatim sorbendo, & ubi peccat lymphâ copiosior, tenuior, aut salior effusa; adeoque in Raucedine recenti imprimis conveniens est. Hujus descriptio est sequens:

*R. Hord. ops. non excors.*

*Passul. min. an. 3j.*

*Liquirit. mundat. & incis. 3ij. (in fine decocti addatur)*

*Caricar. pingv. No. vj.*

*Herb. capill. Vener.*

*Hyssopi an. M. ss.*

*Sem. brassic. 3ij.*

*Pingar. recent. 3ss.*

*F. omnium Decoctio in aqua fontana:*  
*Colaturam R. & pro ejus qualibet ss adde*

*Mell. despumat. 3j.*

*Sacch. cand. 3ss.*

*Misc. & misceatur.*

Hujus usu vox serè amissa unâ nocte restituta fuit. Uno nomine: potio hæc temperat murem & demulcet acrimoniam lymphæ, ac irritationem asperæ arteriæ. Loco verò sacchari candi potest addi Syrupus de erysimo Lobeli vel jujub. vel de hispidula, quoniam aliàs ad raucedinem commendantur.

Posterior remedium est *Electuarium* seu Lambile, & convenit in Raucedine inveterata, in qua conjuncta est pituita crassa ac tenax, pertinaciter partibus vocalibus adherens, & in quo casu fortius extergentia adhibenda erunt: vcr. gr.

*R. Succ. brassic. depur. 3ij.*



*Sacchar. penid.* ℥j.

*Oxymel. simpl. vel /quill. parum.*

*M. f. Electuarium molle seu Lambile; S.*

*Succus spissus contra raucedinem.*

Loco sacchari penid. potius addi potest Syrupus de Erythimo, aut alii supra dicti, vel etiam ℥j. ad ℥ss. radices arapulverifatae, vel recentis, quocunque modo haberi potest; in quibus casibus hanc etiam Mixturem saepius experientia confirmavit:

*R. Aqu. Hysopi* ℥ijss.

*Asthmat. Rud.* ℥j.

*Syr. de Eryf. Lob.* ℥ijj.

*M. D. S.*

*Succus contra raucedinem.*

Venæ sectio vitanda; diuturnam enim & incurabilem ferè Raucedinem reddit: vid. *M. A. N. C. Ann. 9. Obs. 57.*

### ARTICULUS III.

#### DE

#### TUSSIS.

**I**uxta Raucedinem etiam sub expiratione contingit affectus frequens admodum & satis communis, qui vocatur *Tussis*. Opus quidem naturæ, h. e. insolentia actionis, excitata propter materiam morbificam, i. e. actio extraordinaria, quæ non fit, nisi adsit materia naturam irritans, adeoque est bonum signum malæ causæ. Est autem Tussis motus convulsivus expiratorius thoracis, in quo non una, sed pluribus simul ac interruptis vicibus, fit æris interdum & contentorum in aspera arteria vicinisque locis per os expulsio, cum violenta admodum corporis concussionem. Omnis nempe tussis fit, dum muscoli thoracem stringentes & ærem sic expellentes non blando ac naturali modo subsident, sed potius violenter simul & confestim, utut interruptis vicibus, contrahuntur, & quodammodo convelluntur, ita ut rectè à quibusdam tussis referatur ad motus convulsivos expiratorios thoracis, non autem ad veras convulsiones. Adest aliàs complicata actio in tussi, ex strictura nempe aliquali laryngis ob irritationem, & ex forti & vehementi æris ex thorace elisione propter vehementem hujus contractionem. Utrumque occurrit in tussi, exinde enim exurgit ille sonitus, qui in tussi percipitur: si larynx non stringitur, utut thorax sit exhaustus & vehementer expiremus, non tussimus; sed si stringitur, sonitus ac vera tussis adest. Notum est aliàs, quod tussis nunc sit voluntaria, nunc verò coacta. Cum enim tussis fiat per musculos, imprimis diaphragma, qui musculi thoracis certo modo obediunt voluntati, hinc fit ut pro voluntatis imperio variè expirationem alterare, & sic etiam tussim provocare queamus; quatenus scilicet inspiratio & exspiratio est actio media seu mista, partim animalis, partim naturalis, & eatenus certo modo à nobis determinari solet. Non rarè tamen nolentibus admodum contumaces fiunt tusses, quæ sunt præternaturales & considerationi Medice subsunt.

#### CAUSÆ.

*Causa proxima* est irritatio asperæ arteriæ, ejusque ramorum, sive fiat per essentiam sive per consensum, à spirituum impetu in motum convulsivum actio. Afficiuntur igitur hi à quavis irritatione, quæ liberam respirationem impedit, in quocunque etiam sit respirationis organo, in pulmonibus, faucibus, diaphragmate, ventriculo, hepate inflammato, &c. frequentissimè tamen occasione irritationis asperæ arteriæ, vel sine tali occasione prævia ex solis spasmi & motibus convulsivis, tam ex primario affectu, quam ex consensu cum aliis partibus nervis, in tussi nempe convulsiva: sic enim quaerunt Anatomici, unde sit, quod auriculæ membranâ interiore stylo vexatâ oriatur tussis inanitis? ac rectè dicunt: fieri per consensum propter irritationem, & hinc aliqualem spasimum plexus nervi auditorii cum nervis intercostalibus, præsertim istis ad asperam arteriam derivatis, & sic fit tussis inanitis, vellicatâ auriculâ internâ. Sed hæc est Tussis convulsivæ præternaturales, seu quæ interdum, sine vitio partium pnevmonicarum post epilepsiam aliasque convulsiones, per simplicem nervorum & musculorum thoracem moventium & contrahentium spas-

mus sunt observabiles. Exemplum talis tussis convulsivæ de virgine epilepsâ afflicta, ex tali nervorum circa principium in cerebro irritatione, videbitis in *WILLISII Patholog. Cerebri, seu de Morbis Convulsivis*, ubi de Tussi Convulsiva: quamvis & hi spasmi modò ex partibus respirationi intercurrentibus primariò affectis, modò per consensum cum aliis partibus nervis contingant, ratione cujus tales tusses convulsivæ cum aliarum partium convulsionibus conjunctæ, hypochondriacis & hystericis frequentes sunt, in genere iis, qui vitii nervosi generis ex acido præternaturali, imprimis lymphæ acidæ, obnoxii sunt: potissimum infantes nimis tussiendo interdum quoad partes respirationi intercurrentes ita convelluntur, ut respiratio quasi interrumpatur, suspendatur, aut pervertatur, quod vulgò apud nos vocant: *Sie bleiben aufen*: vid. *WILLISIIUS Pharmac. Rational. P. 2. Sect. 1. cap. 6. p. 61.*: sicut & *HILDA-NUS C. 2. Obs. 66.* mentionem facit tussis ægrum interficientis, quæ fortè fuit convulsio vehemens diaphragmatis. Tales tusses convulsivæ non secus atque alii morbi convulsivi, epileptici affines, non solum sunt chronice, sed etiam periodice.

Sed missis merè convulsivis, illam in specie consideremus tussim, quæ causam materiale, respirationis organa afficientem, agnoscit, præsertim eam, quæ ex prævia irritatione asperæ arteriæ originem ducit, adeoque tam laryngis quam bronchiorum cum appendicibus vesicalibus seu lobularibus, ut vocat *WILLISIIUS loco allegato p. 8.*, affectionem sequitur, seu, ut *Helmontius* loquitur, tussis oritur sensu noxiæ, infestantis laryngem à sui principio usque ad pulmonum profunditatem, sive mediâtè sive immediâtè eadem afficiatur; ad quem posteriorem modum & ventriculus acri lymphâ vellicatus, & diaphragma malè affectum, spectant vel concurrunt. Facit huc exemplum *BARTHO-LINI C. 6. Hister. Anat. 97.* de tussi per annum inveterata in vacca, in qua post mortem salvis pulmonibus inventum fuit jaculum diaphragmati infixum, à quo continuò irritatum diaphragma non potuit non talem tussim inveteratam & continuam inferre; sicut & *hepar inflammatum siccum* tussim comitem habet. Huc faciunt & tusses à vermicibus in aspera arteria, quarum exempla habet *ZACUTVS LVSITANVS l. 2. Prax. Admir. Observat. 36.* & *BENIVENIVS Observat. cap. 67.* Infantes interdum gravi tussi laborant, ubi accusatur stomachus: sed non videtur; potius vermes stomachum vellicant, ut rectè dicit *SENNERTVS l. 2. Prax. cap. de Tussi*, & *FORESTVS l. 16. Observat. 2. in Schol.* quo vellicato sequitur talis tussis inanitis cum motibus convulsivis & epilepsia, & sic potius videtur ex genere tussis, per consensum & motum convulsivum ex nervis excitatæ.

*Parti verò affectæ à causa occasionali materiali est*

- I. Larynx & aspera arteria admodum sensibilis, vellicata & laceßita, in specie quoad tunicam internam, eandem invellentem; pulmo enim est insensibilis: Vel
- II. Est œsophagus & stomachus: quorum, ille nempe œsophagus, asperæ arteriæ; hic verò, stomachus, diaphragmati est continuus & connexus: Vel
- III. Denique sunt ipsi musculi moti, aut nervi eos moventes.

*Causa remota* irritans & tussim provocans, est quicquid musculos aut nervos expirationi dicatos irritare aut vellicare potest, sive hoc fiat mediâtè sive immediâtè: illa enim vellicatione fibræ tam musculorum quam nervorum crispantur velocem ac rapidum spirituum motum ac influxum excitant, de quo *plura, ubi de Convulsionibus*: unde necessarîo contracti musculi thoracem contrahunt, & prout irritatio est interrupta, etiam interruptus seu suffultorius thoracis est motus.

Fit ista irritatio, ut dixi, nunc per essentiam, nunc per consensum: Per essentiam, quando vitium, quod tussim concitat, aut est in ipsis nervis, aut est in musculis: Per consensum verò, quando alia quædam pars, cui nervi intercostales, thoracem stringentes, consentiunt, afficitur; & sic mediante altero vellicantur nervi, unde tussis: e. g. si calipatur auris & tussitalis per consensum fit ratione nervorum, estque semper tussis sicca.

#### DIFFERENTIÆ.

Jam verò considerandæ imprimis *Differentiæ*, dum tussis ratione modi est vel sicca vel humida. Tussis humida est,



est, quando concussione istius ope, & aëris elisi violentiâ, humores, ut sanguis, pus, mucus seu pituita, lymphâ, & similes liquores per os excernuntur, ex quocunque loco proveniant talia: *Sicca* verò *tussis* est, quoties magno ac diuturno conatu parum aut nihil excernitur, sed irritò tussiendo conatu corpus univèrsim fatigatur, quâ tussi inani seu sicca continuatâ non ratò graviore, tam corporis, quàm speciatim hypochondriorum aliarumque partium dolores contundentes & plus minus lacerantes oriuntur. Imò hac ipsâ tussi inani herniæ, tam intestinales, quàm etiam scroti seu testium tumores, excitantur: sicut non ratò conatu isto aliquando urina, aut etiam alvi fæces, involuntariò protruduntur: qualem tussim graviozem ac vehementiorem, *Tussim ferinam* secundum HIPPOCRATEM appellare solent.

II. Causæ irritantis ratione oritur Tussis vel à causa externa, vel à causa interna: Utraque tussim, tam siccam, quàm humidam, & quidem pro foci materiæ occasionalis ratione vel pectoralem vel stomachalem excitare possunt.

Causa externa sunt vel inspirata vel assumpta. *Inspirata* sunt aer inclementior, præsertim hybernus, sumi minerales acriteres, fumus v. g. niri vel sulphuris iugenti, & eorum effluvia. Hæc & similia pertinacem & intensissimam tussim inferunt; quatenus particule acidæ ac corrosivæ insigniter aculeatæ nunc simpliciter asperam arteriam, nunc simul membranam pituitariam inferiorem propè fauces sitam, afficiunt & irritant, quibus irritatus oritur tussis, quam aliquandiu continuatam & pectoris angustia & quasi compressivus ac gravativus circa pulmones sensus cum aliqua respirationis difficultate intequi solent: quæ omnia symptomata non materiæ collectionem, sed irritationem bronchiorum & pulmonum, insequuntur; ex horum enim aliqua contractura & gravativus ille sensus, & hinc respiratio nis aliqua impedimentum sequuntur, de qua supra, ubi de *asthma*. Ratio: quoniam nervi ad caput laryngis & ipsa aspera arteriæ bronchia delati, oriuntur ex eo nervi intercostalis tureulo, à quo ipse thorax stringitur & contrahitur: Surculo ergo isto ad asperam arteriam protracto, & irritatione in spasmoticas protractiones acto, hæc continuantur ad muscolum istum, qui thoracem stringit, & sic thoracis contractio & tussis.

Pertinet hæc *Tussis metallifera*, quæ ex Gas acido inspirato in tales tussis incidunt. Pertinet hæc tussis epidemica communiter grassans in plurimos, sive benigna fuerit, ut sit communiter tempore hyberno inclementiori, sive maligna, quæ nempe conjuncta est cum febre, catarrhali maligna, Germ. *Mit Fluss Fiebern*, ex singulari aeris inquinamento à pluribus contracta. Non desunt exempla: Imprimis apud Solenandrum, ex quo etiam allegat SCHENCKIUS l. 2. *Observat. de Tussi*, habetur exemplum tussis admodum letalis, Romæ epidemicè grassantis.

*Assumpta* sunt quæcunque vel per errorem in asperam arteriam delata; hinc vel minutissima gutta potus, vel mica panis, aut simile quid, ex irritatione concitat tussim pertinacem ex modo dicta ratione: vel mediante œsophago & stomachi officio superiori asperam arteriam afficiunt: Notum nempe est, quod aspera arteria, ubi desciunt annuli tracheæ, & contingit œsophagum, fiat membranosa, unde reverà & facillimè cum œsophago contigua irritatur, & ita per consensum dat tussim. Nec desunt exempla: sic e. g. quando inluet bibimus vini spiritum acriorem ac aliud spirituosum acrius, vel quando alimur admodum acia, maximè acida, tunc eo tempore, quo transeunt hæc œsophagum, utut clausa sit larynx, nihilominus tamen vellicando asperam arteriam, œsophagi canalibus tenuam, tussim, nunc leniorem nunc asperiozem, efficiunt.

Inspirata vel assumpta hæc, quatenus inferunt tussim, primò dant tussim siccam simpliciter ex irritatione laryngis enatam, in specie si hyeme ac inclementiori, irritantur simul nares, iterutamus aliquandiu: Tussis verò hæc aliquandiu continuata consequenter ex læsione partis ita irritatæ tandem fit humida, ac materiæ primò serosæ, tandem mucosæ, expectoratio sequitur, quæ interdum est copiosa, ut tussis chronica oritur. Communis hic fert fabula, destillare talem materiam ex capite in laryngem, quod falsum est; non enim saltem in larynge & bronchis pulmonum, sed in iplo etiam pulmone successivè colligitur, hinc evacuat. Nempe primò uberior lymphâ ex irritatione transudat in dicta loca, quæ pedetentim condensatur in mucum plus minus crassum & viscidum. Quod si gravior ex irritatione dictorum

sit læsio, & phlegmonodes plus minus sit dispositio vel etiam aliqualis excoarctatio, ipsum nutrimentum dictarum proximum, maximè asperæ arteriæ & partium circa fauces constitutarum, in debita assimilatione impeditum unâ transfundat, & successivè alteratum sub mucis pituitosis forma evacuat; quod in naribus dat coryzam, in faucibus tussim humidam. Hinc ordinariò duo tempora in tali tussi distinguere solent: Quamdiu enim est sicca, tussim à catarrho tenui esse asserunt, materiam adhuc crudam evacuationi ineptam, hinc remedia concoquentia seu incrassantia dicta, reverà anodyna & temperantia usurpant: Deinde dum est humida, & mucus excerni incipit, materiam coctam asserunt, adeoque Incidentia pro facilitanda expectoratione usurpant; hinc semper tales tussis ab inspiratis superveniunt. Mucus ergo iste varius, nunc insipidus, nunc acris salis, nunc subacidus, non est causa morbifica, ut vulgò putatur, sed potius est productus effectus, qui oritur ex vitiosa assimilatione alimenti asperæ arteriæ, quâ ipsâ assimilatio nutrimenti vitiat, quando aspera arteria à vitio externo plus minus læditur. Mucus hic si hæret in bronchiis pulmonum, seremus mucosa viscida copiosa, genita ob læsionem hujus partis, inducitur ab aère inclementiore, unde talis successivè de novo gignitur, & interdum tussim chronicam admodum gravem infert; dicunt: *Catarrhum ipsis cecidisse super pectus*: sed omnis ex pulmonibus generatur & nascitur. Sic ex acidis fumis metallicis inspiratis talis tussis oritur; saltem enim est in tali tussi à causa externa recremèta talia mucosa ex sanguine deponi à natura in pulmones seu excrementa præternaturalia non sūt tanè ex Massa sanguinea, sed sunt in aspera arteria; quod proprio exèplo didici. Aliquândo etiam sanissimus, & parabam clysum ex antimonio, nitro, & sulphure per retortam, sed ex intensiori igne rumpebatur retorta, unde ingredientia sulphurea copiosum fumum acidum eructabant, ex cujus inspiratione incidi æstivo tempore suavissimo in coryzam & tussim per quatuor septimanas pertinaciter durantem, in qua copiosè admodum mucilaginosâ per nares emungebam, & tussi per os rejiciebam; quæ non destillabant ex capite, cum nulla pateat via; nec erant in massa sanguinea, nec in corpore; sed fiebant in luminitate narium & in aspera arteria, ex acido illo inspirato hæc partes lædente: unde primò copiosior lymphâ alluebat, postmodum superveniente dispositione phlegmonode & aliquali excoarctatione dictarum partium, earum alimentum proximum in talem mucum copiosum degenerabat, donec irritatio nec cessante, indeque lymphæ copiosior affluxu desinente, & per vulneraria restituta partibus læsis, alimento non amplius degenerante, omnia illa symptomata cessarent. Hoc nempe est, quod suis custodibus tribuit HELMONTIUS T. *Custodias Errans*: qui dictis partibus præsidens, eas ab externorum inspiratorum iniuriis defendunt, quibus læsis & hinc errantibus, privata illorum locorum digestio vitatur, & non nutritivus in talem lympham seu liquamen, ac mucum crassum & viscidum, pervertitur, quod ipsum incrassans ac vellicans asperam arteriam tempore hyberno, dat istas contumaces tussis. Quæ omnia facillè ex dictis concitari possunt, per Custodem dictarum partium spiritum insitum & hinc influentem intelligendo. Ex talia causa externa genitæ tussis nunc sunt propriæ, nunc verò sparæ seu epidemicæ, pro quocunque grave aeris vitium inspiratione plures læserit.

*Causa interna*, quæ tussim inferunt, etiam nunc humidam nunc siccam excitant. Et quidem tussim humidam quod attinet: illa dependet à causa interna semper à materiâ nonnihil viscida, plus minus acris & falsa, quæ subsistit vel in aspera arteria & pectore, vel in œsophago & stomacho. Illam vocabimus tussim pectoralem; Hanc stomachalem.

Humida Tussis pectoralis oritur variis ex causis.

1. Est mucus viscidus ex degeneratione alimenti proximi, vel pulmonum vel laryngis, natus, sive lædatur alimentum harum partium assimilatione occasione causæ externæ, sive internæ. Quod pertinet ab æssu & ulcera pulmonum, plithisis, vel quando à sanguine, ejusque sero acriori eroso pulmonum parenchymate, aut quando à lymphâ acriori excitatur larynx aut aspera arteria, adeoque dictis in locis postmodum nutrimenti proximi assimilatio impeditur; quia nutrimentum tale pro læsionis varia ratione etiam in variis mucum, lodes, purulentias, &c. degenerat, & ita irritando pulmones & asperam arteriam Tussim humidam infert, in qua copiosè talia præternaturalia excrementa eliciuntur. Pertinet hæc Tussis humida, (quæ morbos acutos & se-







natura. Quod si sonitus non adeo superficialis, sed est quasi ex loco profundo, & ex imo pectore; ut quando acri percipiunt gravamen in precordiis, tussis ut plurimum est in stomacho, & tunc simul conqueruntur acri de dolore antrorsum, imò percipiunt ante tussim ibidem vellicationem quandam, & ita tussis ex profundiori loco hausta etiam indicat affectum stomachum. Ubi verò sonus est quasi superficialis, monstrat affectum asperam arteriam: item interdum quicunque ex cavo thoracis procedit, & quem brevi post sequitur excretio, tunc sæpius malum hæret in ipsis pulmonibus & bronchiis.

Sonus ex profundo quasi rancus, *es rebels*, pulmones affectos dicit, qualis in empyematicis cadit: est symptomatice, quatenus vel exsiccet pulmones, vel quatenus simul empyema in pulmonibus movere.

4. Tussis stomachalis pertinaciter affligit, ut subindè, præsertim in infantibus, vomitus, nunc materię pituitosæ, nunc alimenterum ingestorum superveniant, secus ac in tussi pectorali fieri solet.

5. Ostendunt hoc antecedentia: si nempe præcesserint causæ lædentes pulmones aut asperam arteriam; vel si præcesserint causæ, quæ stomachum lædere possunt, ex illis de loco affecto concludi potest.

6. Adjuncta quoque symptomata consideranda sunt. Nam ubi adæst apësia, appetitus prostratus, sensus stomachi gravatius, intensior tussis, vitium est in stomacho: Acri ipsi digito intento monstrant locum affectum suo serbiculo cordis, in regione stomachi propè ejus orificium sinistrum, se sentire inquietos coaceratam & sensibilibus molestantem secreta rejectam materiam ex stomacho per gulam sensim sensimque attolli; non est improbabile, imprimis cum ex succo raphani hausto paulo post copiosissime rejiciantur mucosa.

Ubi verò exacerbetur, utut continuo affligere soleat noctu; aut ubi simul conjuncta est febricula quasi nocturna; aut alia pathemata catarrhalia, ratione lymphæ nimis asperæ per illam membranam pituitariam excreta; aut ubi adjuncta signa phthisica, ostendunt tussim pectoralem.

D. Tussis ex stomacho orta nullus Practicorum aliquid habet, præter LINDANUM in *Meletematibus Med. pag. 351.* ac præter *super Hartmanni Praxin Chymiatricam* expreisè dicit: *Mibi est conperitum pluribus Observationibus, plerumque tussim esse ex ventriculo: ubi autem materia laetior, & unde procedat, ex sono dicere possum, qui variatur pro materię & loci conditionibus. Si materia est tenuis, acutus est sonus: si salsa & tenuis, & in ventriculo delitescit, suribunda tussis est, in qua vix aliquid egerit, licet cum summo conatu tussiant. Certum est, quod dixi, pleræque tussis perstiterit fieri ex ventriculo, dum materia vellicans est in vagis ejusdem circa orificium superius.* Hanc LINDANI sententiam illustri ac notabili exemplo confirmatam videb. in *M. A. N. C. Ann. 6. Obs. 6. p. 16.*

Causæ internæ etiam interdum tussim siccam inferunt; idque ibidem, quatenus afficiunt vel asperam arteriam & bronchia pulmonum; vel quatenus afficiunt stomachum & oesophagum: utut talis tussis sicca interna inveniat subindè degeneret in humidam, sicut *suprà*, ubi de causa externa, monitum fuit: Et illas tussis siccas communiter Practici deducunt a materia nimis tenui, acris, terosa, &c. Tussim verò *suprà tractatam humilam* originem dicunt à crassa.

Tussis pectoralis sicca ex affectu asperæ arteriæ & laryngis oritur, imprimis à vitio lymphæ, naturaliter obliuentis dicta loca: Hæc enim ex vitio catarrhali si fuerit præternaturaliter acrior, salso-acidior, siue præviâ externâ occasione siue proprio naturæ motu lymphæ ut alterata, insignem tussim inferre solet, quatenus per glandulas circa fauces, item circa laryngem & cartilagineas asperæ arteriæ sitas, ad interiorum hujus tunicam effusa, continuo vellicat laryngem, asperam arteriam in se admodum lentilem, & pulmones nimis vellicat, & ad tussim talem, sæpius contumacem, successivè humidam, provocat; glandulæ enim hæc, ut superius monui, pro humectatione membranz continuò transudant lympham pro faciliiori formatione vocis.

Tussis talis, quæ in specie *Catarrhalis* dicitur, potissimum attingit tempore vespertino & nocturno utque ad mediam noctem, i. e. solet vexare ægros tempore nocturno 7. & 8. usque ad 12. horas, tempore diurno quasi silet: imò concurrunt tæpè febricula quædam lenta plus minus intensæ, in qua ægri interdum satis comode se habent; à meridie autem & apparente vespere vagis horripilationibus vexantur, quas ingruente nocte insequitur æstus totius

corporis, non tamen adeo intensus, sed plus minus moderatus, præsertim capitis, & hinc reliqui corporis, donec revertente aurorâ febricula denuò cesser. Hinc etiam non tardè accidit, ut etiam sub æstu illo febrili artuum lancinationes & dolores vagi unâ affligant, ex lymphæ acido sapore, partes nerveas vellicante, ortundi. Hinc indicis præsentibus certum est, subesse vitium lymphæ, vel acidæ vel salis, uti suo loco habebimus: Nam febris adjuncta, vespertino tempore moderatè & epidemice affligens, interdum ad febres catarrhales lymphaticas lentas vitio lymphæ natas, pertinet.

Tussis talis catarrhalis originem ducit ex lymphæ vel falsidior, quæ uti in Massa sanguinea febrem talem plus minus lentam excitat, & sub cute pustulas; ita laryngem & asperam arteriam irritando, tussim siccam inferit. Non ratum tamen est, tussim talem siccam nocturnam etiam sine febre affligere, pariter ex catarrhali vitio lymphæ oriundam. Iidem catarrhis depluentibus à capite tribuunt Auctores eam; sed post HELMONTIUM *Tract. Catarrhor. deliramenta*, imprimis SCHNEIDERUS de *Catarrhis* caliginem excussit: Hic enim in eo est totus, ut dicat, excrementa tussiendo rejecta in tussi tali catarrhis tributa, tam sicca, quam, quæ successivè supervenit, humida, transudare ex sanguine per *tunicas*, quas vocat *pituitarias*, seu colaporia. Verum rectius STENO observavit, quod post has *tunicas*, communiter *pituitarias* *Schneideri* ac alias similes, per quas terosæ materię fit transcolatio, sitæ sint copiosæ glandulæ, quarum orificia hient in illas tunicas pituitarias, & ita lympham in istas cavitates effundant: adeoque, dum dicit SCHNEIDERUS, in cotyza transudare mucum per tunicam seu membranam pituitariam superiorem, interne nares succingentem; in tussi verò transudare mucosa rejectanea per membranam seu tunicam, asperam arteriam investientem &c., potius cum STENONE dicendum: sub his tunicis latitare glandulas, suam lympham per illas exonerantes. Hæc obiter.

Quando ergo ista lymphæ est præternaturaliter acrior, salisior, acidior, aliove simili plus minus corrosivo sapore impregnata, non potest non fieri tussis, quia vellicatur aspera arteria. Salsa sit lymphæ ex concutitu acidi & urinosi, uti ex *Pathologicis* patet.

Ad has Tussis ex lymphæ vitio genitas pertinet etiam Tussis, quæ præcedit variolas & morbillos, itidem sicca & admodum molesta; nec non ea, si variolæ pulmonem & asperam arteriam obident, cujus exemplum habet LOTICHIUS in *Observat. pag. 143*; item quæ infantibus ex malè curata scabie, aut ex unca capitis, aut achoribus quovis modo repulsi, nascitur. Hæc tractata curari possunt, ut non fiant humida; si minus, tussis etiam humida supervenit, ex supradictis rationibus: imò & phthisis variolis successivè secuta observata fuit. Facit etiam hæc phthisicorum incipientium & scorbuticorum tussis sicca, eaque admodum laboriosa; & quæ vulgè à destillatione capitis oritur dicitur, etiam ab hac originem ducit; quando nempe ex lymphæ acriori, maxime acidæ, sudante per glandulas, confusas circa laryngem & annulos asperæ arteriæ, inundantur pulmones: procedente tempore ex dictis causis tussis sic humida diu & noctu cum difficili anhelitu; & dum pulmones excoriantur, ac procedente ulterius malo exulceratur aspera arteria aut pulmo, phthisis perfecta pulmonalis eam insequitur, dum primo ex nutrimento vitiatu mucus, ulterius ex procedente corrosione materia purulenta, tandem in perfecta exulceratione pus genuum, tussiendo expectoratur.

Radix mali, unde talis lymphæ vitiosa generatur, tussim talem catarrhalem, præsertim nocturnam inferens, est in ventriculo; errata nempe digestionis ejus, & hinc deficiens in intestinis ejusdem perfectio; quibus in locis chylus variolus salis aut acido-salis genitus sui tabem mediante lymphæ variis partibus, ac speciatim, quavis occasione ad derivetur, pulmonibus afficit. Ratio, quare tussis tales vespertino ac nocturno tempore magis exasperentur, adhuc intricata est. Universale aliàs est, quod morbi à feri à lymphæ vitio ortundi his temporibus magis exacerbari soleant, ad quod ipsum non parum videtur ferre prohibita plus minus transpiratio insensibilis, vespere ex remittente tepore diurno minus copiosè procedens. Observata etiam fuit tussis sicca vitio pulmonum, quando nunc calculi, nunc excrementa aliaque in bronchiis pulmonum tussim inferunt. Refert SCHENCKIUS in *l. 2. Observat.* tussim siccam admodum diurnam ex irritatione continua capi-



ris laryngis, propter calculos in tonsillis genitos, qui irritando dederunt tussim.

Quod si verò causa stomachi & oesophagi internæ inferant tussim siccam, vocari ut plurimum solet *tussis serina*, in qua gravissimè, etiam continuè & interruptis vicibus, tussunt: si incipiunt tussire, vix remittere sciunt. Oritur ex materia falsa acri, præsertim tenui & subtili, raro crassa, pertinacius stomachi orificium superius vellicante istudque rodente: nihil hic excernitur: interdum etiam tantopere urget, ut pertinaci tussi & concussione stomachi vomitus sequatur: & faciliè partem affectam præter dicta sonus profundus, locum irritationis in tussi, & suprà allegata declarant. In specie infantum tussis quæcunque, si non à causa externa, semper fundamentum in stomacho habet, sive humida sive sicca; post vomitum cessat, respiratio est libera, nihil ejicitur materiz: ergo est causa in stomacho. Accedit & hoc, quod sentiant circa præcordia & circa stomachum gravativum quid, & sic tussis non potest esse in pulmonibus. Imò habeo jam tale exemplum: Est hic juvenis, qui aliquando bene inebriatus domum rediens noctu non bene tectus dormivit, & in tantam ventriculi incidit læsionem, ut percipiat compressionem stomachi, cum tussi acerbæ, in qua tussi præsentiscit vellicationem in scrobiculo cordis: unde quando ejicit alia mucosa, sunt ex stomacho ex vitia digestione: manè, inquit, gulam esse quasi infarctam mucus; nam dum ita concutitur stomachus, irritatur diaphragma, & materia mucosa sensim sensimque sursum versus vergit, ut gula quasi infarcta videatur. Quid etiam pertinet in SCHENCKII *Observat. pag. 237. Tussis nova infantum* Lutetis grassans, *Quinta dicta*, in qua etiam ventriculus affectus fuit.

Pertinent huc istæ tussis, quæ non raro in principio paroxysmorum febrium intermittentium unâ alterâve horû paroxysmum antecedunt, & sunt simpliciter ex irritatione orificii stomachi superioris, nata ex motu inchoato fermenti febrilis & motu humorum, succi pancreatici & bilioli, circa intestinum duodenum à dicto fermento febrili agitatorum; unde tussis per ventriculi consensum cum diaphragmate circa paroxysmorum principium contingere solet: & quidem tales ordinariò ferè sunt hypochondriaci, seu in quibus abundat acidum in stomacho. Tales enim tussis sunt, quas quidam contrahunt, dum in lectis acri liberiori se exponunt circa regionem stomachalem, exinde faciliè fit, ut pertinax tussis stomachalis superveniat.

Senes sæpiùs quoque tussi laborant, eaque pectorali, si vitium est ex aère externo inspissato; si verò citra talem externam læsionem senes tussiendo excernant copiosa viscida, & simul conquerantur de dolore plus minus compressivo in scrobiculo cordis, ordinariò vitium stomachi subesse solet, natum ac sustentatum ex defectu digestionis, præcipuè in senibus.

De *arthriticorum tussi* res etiam intricata videtur: observavi aliquoties arthritidi obnoxios, si hæc aliquandiu inducias dederit, quod tales facili occasione tussim, eamque humidam, incurant cum sensu molesto circa scrobiculum cordis, ac difficili plus minus inspiratione, quæ symptomata superveniente podagria leviter & quasi spontè evanescunt. Recte stomachalis videtur tussis, cum faber podagræ reverà in stomacho cudatur.

Interdum variz tussium differentiz subinde complicantur, ita, ut in dispositis tussi humidæ faciliè superveniat tussis convulsiva. Sic in scemina gravida, aliàs epilepticis pathematis obnoxia, gravem tussim stomachalem patiente, observavi, quod aliquando per plures dies tussi huc humidæ, propter visciditatem materiz laboriozæ, validissima convulsio pectoris supervenerit, ceu genuinum asthma convulsivum, ita ut ægra subinde suffocanda videretur, quod adstantes non stolidè non Catarrho suffocativo habebant. Sic pariter tussis humida, tam stomachalis quàm pectoralis, ferè complicari ac simul affligere possunt.

## PROGNOSIS.

*Prognosis* facilis est. Fundamentum ejus ex varietate causarum efficientium, subjectorum patientium, & utriusque adjunctarum circumstantiarum desumi solet.

Tussis frequens nimis & diuturna non raro ad hæmoptysin disponit.

Tussis serina, tam in infantibus, quàm etiam adultis, maribus herniam, in prægnantibus abortum causat.

Tussis sicca nocturna in subjecto, quod debiles habet

pulmones, minatur phthisin, quatenus ex continuo pulmonum concussione, & lymphæ acrioris in eorum parenchyma translatione, tandem erosionem, & ita ulcus pulmonum & hinc phthisin, quam ex catarrhis oriri putant, inferit.

Capiti debilitato admodum nociva est tussis; uti etiam illis, quibus affecti sunt oculi.

Tussis senum diuturna non maturatur, dicit HIPPOCRATES *Sect. 2. Aphor. 40.* adeoque difficillimè curantur.

Tussis hydropi superveniens, malum est: vid. HIPPOCRATES *Sect. 6. Aphor. 35.*

Tussis à causa externa nihil habet in recessu, & sine periculo est; quæ verò à causa interna, sive sit pectoralis sive stomachalis, phthisin minatur, aut eandem incipientem ostendit.

Scorbuticis frequentiores tussis sunt suspectæ, ne ex partibus serosis phthisin contrahant.

Interdum febribus ardentibus, imprimis curatis & in declinatione non ruz purgatis aut judicatis, supervenit tussis humida ex metastasi materiz morbosæ concoctæ: inque tali casu, si rectè procedat expectoratio, bona est; sin minus, & non in tempore succurrimus ægro, periculum imminet phthiseos aut periculosi asthmatis.

Tussis omnis humida inferens læsionem pulmonum, periculosa est ob phthiseos metum.

Tussis graviter affligens phthisicos, ubi subito cessat, signum periculosum est.

Tussis stomachalis humida cruditates, atrophiam, tabem, &c. minatur ex vitio chyli, corruptentis plus minus lympham; tandem etiam pectoralem inferit: quo etiam suo modo de Tussi sicca stomachali verum deprehenditur.

## CURA.

In *Cura* attendendum ante omnia, an Tussis morbus sit primarius? an verò secundarius, qualis v. g. Phthisicorum, pleuriticorum, &c. Nam hæc primariò morbo sublato vel spontè cessat aut sedatur. Interim attendatur naturæ motus in tali casu, ut promoveatur, si sit parvus, in phthisicis v. g. & purulentis; vel inhibeatur, si sint nimii, ut in tussi serina crebrius inani, & ita saltem temperetur.

In hac verò Cura tussis cujuscunque

1. Ante omnia removenda est *Causa irritans* seu ad tussim stimulans; &

2. Sittenda est vellicatio aut irritatio.

Qui duo scopi utur pro varietate causarum valent, ut plurimum tamen ad removendam causam melius remedium non est, quàm vomitus, qui in quavis tussi est proficiuus, in contumaciore verò, præsertim stomachali, est necessarius, sine quo tussis chronica tutò non potest curari; qui uti convenit in tussi recente, ita sine eo tussim inveteratam curare admodum difficile est. Quæ verò pro secundo scopo vellicationem sistant, sunt imprimis, uti notum est, opiata, in specie appropriatis mista.

Aliàs materia Medica in tussi tribus ferè generalibus capitibus absolvitur: nempe *Incrassantibus*, *Incidentibus*, & *Balsamico Vulnerariis*.

*Incrassantia* sunt opiata ac temperata dulcia, quæ tussim à materia tenui & serosa, & inde ortum irritationis sentum, sistunt, ac vellicans mitigant, & ita materiam vellicantem ad consistentiam moderatam pro meliore expectoratione disponunt; unde ab effectu *Incrassantia* dicuntur.

*Incidentia* sunt, quæ in tussi humida mucum glutinosum pro meliori expectoratione disponunt, & attenuant, ac mobiliores reddunt.

*Balsamico-Vulneraria*, quæ noxiam excoarctationem bronchiorum aut pulmonum aut stomachi emendant, ut ultiores progressus maturè inhibeantur. Sed cum hæc methodus sit confusa, & non æquè accommodabilis, meliorem & distinctiorem tradam.

Opiata in omni tussi convenire, certum est. In horum tamen usu observetur:

1. Quod non conveniant, ubi peccat materia viscida quia opiata figunt peccantem materiam, hujusque resolutionem & excretionem sistunt, & consequenter eandem quali tenacem, tussimque quasi contumacem reddunt: neque etiam semper conveniunt in tussi humida, sive in stomacho sive in pulmonibus fomes sit: sistunt quidem hæc opiata tussis, sed tantum palliativè, & recidivant, quamdiù fomes superest, nisi præmissis probè universalibus; tunc cum



enim commodè usurpari possunt cum aliis ad removendam uberioris materię generationem. Unde speciatim in tussi recenti, in tussi sicca, eaque imprimis nocturna, item in tussi à lymphā acrisā salsā vel acidā conducunt, adeoque tunc imprimis conveniunt, quando Practici dicunt, tussim oriri ex materia tenui serosa, quę incrassanda, & ita ejus excretio facilitanda sit: pro quo scopo semper usurparunt pilulas de cynoglossa; quas ingreditur opium & hyoscyamus, sed ingredienti hęc sunt nimis cruda.

His itaque pręmissis, *Tussis pectoralis sicca à causa externa* inducta, qualis tussis tempore hyemino ex aere inclementiore, vel sub laboribus Chymicis accedit, optimè tollitur per opiata maturè adhibita, si vè sit laudanum opiatum, si vè sit theriaca, si vè syrupus papaveris: c. g.

R. Conf. tussilag. ʒʒ.

Laud. opiat. gr. ij.

M. pro Brolo: S.

*Saccharum vesperinum pro una vice.*

Capiatur biborio ante cœnam.

Imprimis si quis letus à frigore hyberno, ut imminet coryza, maturè potest curari sic:

R. Theriac. ʒj.

Ol. destillat. anis.

Succin. an. gutt. ij.

M. D. S.

*Theriac catarrhalis pro una vice.*

Capiatur sub forma boli cum sudore:

omnia ista pathemata unà salce dimittuntur.

Conveniunt etiam pilulę de styrace Sylvii. Item in tussi orta à viro aeris externi hyberni usurpetur Decoctum radicis zedoarię in vino, vel Decoctum radicis helenii cum passulis in vino Malvatico calidè haustum, & sudor expectetur; sic tussis evanescet & faciliè curatur. Alii non ineptè faciunt, dum juniperi baccarum M. ij. coquunt in cerevisia ad consumptionem tertię partis, & Decoctum calidè hauriunt, expectato sudore: sic talis tussis cessat; vid. RIVERIUS. in Praxi: Item tinctura baccarum juniperi MYSICH-TI, in Armarum. Chym. Sect. 2. descripta, convenit. Pręferunt autem optimè vel removere vim causę externę, in specie aeris inclementioris vel hyemalis insultum, balsama odorifera ex oleis destillatis, v. g. apoplectica, vel anisatum vel succinatam, largiter naribus illita: item olea destillata anisi, macis, suffusus succini, gummi animę, &c. Nam talis larga illitio alterat aerem introeuntem, ut non fauces vel asperam arteriam lædat. Certissima hęc est pręservatio: hoc modo me pręservo ab omni tussi & coryza; sed maturè hoc fiat. Ubi metienda coryza, immititur HELMONTIUM Tract. de Asthmate & Tussi, patemus Sternutatorium ex saccharo & pulvere bellebori nigri ana, addendo aliquot guttas olei destillati caropbyllorum. Talis loco sternutatorii tempore vespertino sufficitur in nares; sic tollitur omnis noxa. Juiubas in Vini spiritu maceratas commendat HARTMANNUS ad pręservandam tussim in Praxi Chymiatr.

Quod si à mineralibus eorumque fumis sub laboribus Chymicis inspiratis oriatur noxa tussim inferens, optimum est panis largiter butyro illitus, ante laborem assumptus; sic aerimonia inspirata obtunditur, & tussis ac similia pręvenitur; sicut etiam post alterationem jam nonnihil inductam theriaca, & ejus medio provocatus sudor, promptè eam tollunt: si inducta læsio ab his, non curatur melius, quàm per vulneraria & quidam pectoralia, si decoquantur in cerevisia.

Not. II. Quod si eadem tussis à causa externa nata, dum jam fuerit inveterata, ut jam eiciantur copiosa mucosa, adeoque reddita humida, curatur ut reliquę tussis humida, pręmissio nempe laxativo, in specie vomitorio, conveniunt opiata eam sistentia; hinc subjungenda, si sit tussis pectoralis, vulneraria & appropriata pectoralia, noxam inductam demum corrigentia, & inde nutrimenti aut sanguinis in ea factam degenerationem sistentia. Vel si tussis fuerit stomachalis, noxa curatur aromaticis stomachicis: v. g. si quis hyeme contraxit tussim, eamque neglexit, sit humida & rejiciuntur viscida in magna copia; dicunt, aerem catarrhum ipsi super cor cecidisse: sed falsum est; non est causa morbi, sed productum morbosum: falsum idem est, quod expectemus expectorationem; sed si in veterata humida sit, quatenus læsio occasionem præbet, ut nutrimentum vitetur, vomitus optimus est, si vè sit sicca si vè humida, sicut tussis chronica tutò non potest sine vomitu curari. Vesperti propinanda sunt opiata, ut caveatur generatio: si sistitur, tunc

Etzmüller. Oper. Tom. II.

denud læsio à tussi antecedente inducta appropriatis curanda. Si in pulmonibus pars est affecta, ad eluendam noxam, ne malum recidiver, vulneraria pectoralia sunt usurpanda; ubi excellit in specie hederæ terrestris, cherefolium, veronica, scabiosa, helenium, & jusque radix, tussilago, lignum sassafras & similia. Hęc decoquantur in aqua, vel cerevisia, in qua melius, & Decoctum calidè bibatur bis vel ter quotidie; sic læsio sistitur, consolidatur, & alia mala supervenientia pręvenitur. Si tussis est inveterata asthma: balis, ubi ob læsionem membranę pituitarię posterioris in stomacho mucus copiosus collectus, post vomitoria appropriata stomachica usurpanda, ut mentha, Elixer menthę, proprietatis, pectorale, compositum zedoarię, &c.

Not. III. *Tussis humida pectoralis*, quatenus constituit morbum, curatur materię crassę vel causę irritantis evacuatione, adeoque per incidentia, attenuantia, resolventia, atque expectorantia dicta, interpositis pręsertim vomitorio, vel moderatò purgante, (nam rariùs profunt hic purgantia,) & tandem per pectoralia & vulneraria, læsionem in bronchiis & pulmonibus obortam sollicitia, & ulteriorem progressum aut recidivam faciliorem pręvenientia.

Conducunt ergo hęc pro scopo incidendi & expectorandi succus raphani recens cum saccharo candi, arum ejusque radix: item spiritus asthmaticus, gummata, in specie ammoniacum, & ex comparata remedia liquida, & in genere omnia ea, quę suprà in Asthmate humido, item Rucedine inveterata, fuerunt laudata: item matrubium album, ejusque decoctum, helenium, hederæ terrestris in tussi à putrilagine pulmonum, hyssopus, zingiber, &c. SCHROEDERUS laudat egregiè Decoctum calami aromatici. Porro crocus, radix ireos Florentinę, tussilaginis, zedoarię, veronica, scabiosa, mentha, rosmarinus, & modò dictorum flores, nicotiana ejusque syrupus, & oxymel nicotianę in tussi ex lymphā crassā, atque ex melle, scurdii & helenii pulvere paratum Electuarium: it. acetum scylliticum, oxymel simplex, & oxymel squilliticum compositum, cui incoctum matrubium, botrys, ejusque succus & syrupus, syrupus de crysmo Lobellii, aliis dictus syrupus ad rucedinem, eluxer pectorale Michaelis vel Wedellii cum spiritu gummi ammoniaci, vel salis ammoniaci anisato, qui poterit incidunt: nam anisum est singulare pectorale, ubi est incidenda materia crassa. Conveniunt etiam vegetabilium dictorum conservę, & sic porro. Vulgò commendatur aqua pulmonum vituli cum plantis pectoralibus destillata: sed quo jure nescio, quia vituli pulmones parvi facio.

Pro expectorandò ergo mucò, quocunque in loco ille hæreat:

R. Aqu. hyssopi ʒij.

Asthmat. Rud. ʒvi.

Gum. ammon. cum aceto sol. ʒj.

Syr. nicot. ʒvj. vel ʒj.

M. S.

Potio pectoralis contra tussim.

Est Mixture egregiè expectorans. Vel

R. Aqu. hyssopi,

Tussilag. an. ʒij.

Asthmat. ʒʒ.

Gum. ammon. cum aceto sol. ʒj.

Oxymel. squillit. ʒj.

Syr. nicot.

de crysm. Lobel. an. ʒij.

Hyssopo

Tussilag. an. ʒvj.

Spir. mirri dulc. q. s.

M. D. S.

Potio contra tussim.

Vel

R. Aqu. hyssopi,

Scabios.

Oxymel. squillit. an. ʒj.

Syr. enul.

Nicot. an. ʒʒ.

M. S.

Succus expectorans pro aliquot vicibus.

Vel

R. Aqu. Fœnic.

Hyssop. an. ʒij.

Asthmat. ʒvj. vel ʒj.

Oxymel. squillit. ʒj.

Syr. nicot. ʒvj.

O

M. D. S.



M. D. S.

Potio contra tussim.

R. Aqu. hyssopi ℥ij.

Veron. ℥j.

Asthmat. ℥ss.

Oxymel. squill. ℥j. ad ℥ij.

Spir. nicot. ℥vj.

M. D. S.

Potio resolvens contra tussim.

R. Aqu. hyssopi ℥ij.

Veron. ℥j.

Asthmat. ℥ss.

Spir. sal. ammon. ℥j.

Syr. nicot. ℥j.

M. D. S.

ut supra.

R. Aqu. hyssopi ℥ij.

Veron. cum vino ℥j.

Spir. viridis aris, vel asthmat. ℥j. ad ℥ij.

Syr. nicot. ℥ij. ad ℥vj.

M. D. S.

ut antea.

Usurpentur cochlearum.

Pro scopo vulnerario pectorali convenit sulphur, ejusque flores: item balsama sulphuris, quæ sunt nobilissima, siue sit terebinthinatum, siue, quod melius, anisatum, aut juniperatū, aut succinatū. Talis aliquot guttæ, vj. viij. x. ad xij. & xv. semel vel bis in die in vehiculo calido vel ovi vitello, optime conveniunt ad eluendam noxam pulmonum: aut cum balsamo sulphuris fiat eleosaccharum: item Benzoe, antihæsticum Poterii, antimonium diaphoreticum, & Vulneraria pectoralia supra laudata. Prostant etiam hinc inde pulveres pectorales, & pulvis contra phthisin, qui conveniunt in tussi ex vitio lymphæ: v. g. Pulvis pectoralis D. Michaelis;

R. Rad. ari. præp. ℥iv.

Ireos Flor. ℥j.

Mag. benzoës ℥ij.

Flor. sulph. ℥j.

Antihæst. Pot. ℥j.

Sacchar. ℥ss.

M. f. Pulvis:

De quo desis à ℥ss. ad ℥ij.

Vel

R. Rad. Ireos Flor.

Flor. sulph. an. ℥j.

Antimonii diaph. ℥ss.

Laud. opiat. gr. ix.

Oleos sacchar. fanic. q. l.

M. pro pulvere. S.

Pulvis pectoralis.

Vel

R. Pulveris pectoral. Mich. vel Ludov. ℥j.

Antihæst. Pot. vel Antimonii diaphor. ℥ss.

Laud. opiat. gr. j.

Oleos sacchar. anisat. q. l.

M. f. pulvis: S.

ut antea.

R. Lap. cancr. præpar.

Flor. sulph. an. ℥j.

Laud. opiat. gr. j.

Ol. destillat. anis. gutt. j.

M. f. pulvis S.

Pulvis pectoralis contra tussim.

R. Res. ligni sassafr. ℥j.

Maceretur in

Aqu. fontan. Mens. j.

Adde

Herb. beder. terr. vel Veron.

Pulmonar.

Scabios. an. M. j. vel ij.

Passul. min. conquass. ℥ss. vel ℥j.

Sem. anis.

Feniculi an. ℥ss.

Coq. invicem ad tertias, in fine decocti addendo

Rad. liquirit. ras. ℥j. vel ℥ij.

Colatura D. S.

Decoctum pectorale.

Vel

R. Herb. beder. terr.

Veron. an. M. j.

Hyssopi,

Herb. Marrub.

Pulmonar.

Tussilag. an. M. ℥.

Flor. enula.

Scabios. an. P. ij.

Rad. enul.

Ireos Flor.

Sem. caribam. cont. an. ℥vj.

Rad. mechoacan. albiss.

Passul. min. an. ℥j.

Incisa &amp; contus. D. S.

Species pectorales.

Ex his in aqua decoctis potest fieri Decoctum pectorale: vel possunt coqui cum hydromele, & per manicam Hippocratis aliquoties colari, & usurpari bis vel ter in die, pro urgentia affectus, mane haustus calidus, & à meridie bihorio ante coenam, & sub introitu lecti: S.

Decoctum pectorale.

R. Herb. rec. veron.

Heder. terr.

Scabios. an. M. j.

Cheremesol. M. ℥ss.

Res. lign. sassafr. ℥j.

Coqu. in f. q. aqu. simpl., addendo in fine decoctionis

Passul. min. conquass. ℥ij.

Res. rad. liquirit. ℥j.

Ebulliant iterum leniter; hinc, dum fervent adhuc, suspende in nodulo cinam. elect. ℥ij.

Colatura lib. iij. D. S.

Decoctum pectorale.

Vir juvenis tussi humida pectorali gravissima laborabat, ipso ægro alias scorbutico existente, contra quæ ex inclementia aeris externa, morbus jam aliquandiu duraverat cum tussi crebra, materiz viscidæ copiosæ rejectione, ita, ut jam in statu esset, æger penitus decumbere, aderat simul pulsus febrilis, sudor continuus, respiratio nonnihil difficilis, dolores spinæ dorsu ingentes, urina paucissima, recurrentes interdum lipothymiz, præsertim si excretio nonnihil cessaret, phlogoses vagæ, & subinde recurrentes anxietates, dolores lancinantes in artibus post tussim, &c. Mala hæc omnia ex lymphæ constitutione præternaturali oriebantur, quæ vitioso sapore scorbutico acido infecta omnia ista symptomata, præsertim irritando asperam arteriam & pulmones, tussim; ex pancreate verò effusa & effecta vascendo in primis viscum cæteris contentis phlogoses, anxietates &c. inducebat. Vocatus die Solis pro tussi, ceu maximo urgente, præscribo expectorationis gratiæ:

R. Aqu. Fenicul.

Hyssop. an. ℥ss.

Asthmat.

Syr. nicot. an. ℥vj.

Oxymel. squill. ℥j.

Muc.

Capiebat cochlearum.

Pro cæteris symptomatis vagis, ex radice scorbuti natis, tollendus præscripti:

R. Spir. carm. de tribus ℥ss.

Dosis 40. gutt. quotiescunque libuerit, aut symptomata urgeant. Usus hujus spiritus multum laudavit; potione verò ista multa expectoravit.

Die Lunæ pro expectoratione continuanda succum raphani recenter expressum, cum saccharo temperatum, crebrius hauriendum iussi, & sumptum istum continuare.

Die Martis, cum mucus ceu productum morbosum maximam partem esset evacuatus, & non nisi difficillima pauci muci fieret rejectio, tussis verò continuaret, eaque obinam conatum dolorosa præcordis, ad lationem irritantem tollendam præscripti:

R. Aqu. Fenicul. ℥ij.

Asthmat. ℥vj.

Syr. diacod. Mont. ℥ss.

Muc.

Crebrius acceperit, præsertim quando tussis laboriosior urgebat, hinc bene dormivit, multumque laudavit remedium hocce.

Die Mercurii interdiu spiritum carminativum; vesperti verò & noctu, quantum supererat de Potiuncula, capere iussi.

Die Jovis, cum multum tussiret, parum rejiceret, nox gravis fuisset, pro lymphæ correctela, & irritationis partium spiritualium lenitione;

R. Spir.



R. *Spir. sal. ammon. anis.* ℥ij.  
*Essent. opii* ℥j.  
 Misc.

Assumebat ter de die dosi 40. guttas, mane, circa vesperam, & tempore ingruentis somni: primum quidem acrior spiritus fauces lacerare visus fuit, postmodum vero usu continuato admodum profuit, tussim instantem inanem niox reprimendo, humidam vero in expectorando promovendo, & hanc minime laboriosam reddendo; unde aliquandiu continuato hoc spiritu convaluit. Sed cum premature frigori externo denuo se exposuisset, adeoque recidivam periculosa pateretur, optime contulit sequens Potio:

R. *Aqu. scabios.* ℥ij.  
*Asthmat.* ℥vj.  
*Lap. cancr. prapar.* ℥ij.  
*Extr. sulph.* ℥j.  
*Syr. diacod. Mont.* ℥ij.  
 Misc.

Quæ potio mutatis mutandis egregie, præsertim vesperi & noctu, profuit, eumque restituit.

Tussis humida stomachalis, ex humida viscida materia orta, curatur, præmissis attenuante & vomitorio, aromaticis nonnihil temperatis stomachicis, reliquias materię peccantis incidentibus, attenuantibus & solventibus, & stomachi tonum restaurantibus. Pro purgationis scopo Vomitoria antimonialia equidem nota sunt, quæ nunc per se evacuationis scopo usurpantur, nunc supra dictis potionibus in minuta dosi adduntur, pro promovenda expectoratione. Sanctè testor, quod ex usu vomitoriorum ne minimum nox observaverim. Pro scopo purgandi per inferiora convenit mass. pilul. de hiera cum agarico, vel extractum ejus, addito gummi ammoniaco in aceto soluto, quod resolvit mucum, ut eò melius possit evacuari, actuatum cum extracto trochiscorum Alhandal: e.g.

R. *Mass. pilul. de hiera cum agar.* gr. xij. ℥xv.  
*Gum. ammon. aceto sol.* ℥ss.  
*Extr. troch. Alband.* gr. j. vel ij.  
*Ol. destillas. anis.* gutt. ij.

Cum *Essent. gum. ammon. f. pilula*: S.  
*Pilula purgantes pro pectore & stomacho.*

Similibus pilulis feriam tussim a pinguibus vaporibus, in muliere aliquando curavi. Vel

R. *Mass. pilul. de ammoniaco Querc.* gr. xv.  
*Hier. cum agar.* gr. viij.  
*Extr. agar.* gr. v.  
*Bals. sulph. anis.* gutt. ij.

Cum *Essent. gum. ammon. f. pilula*, usurpandæ imprimis in tussi ex materia crassa & viscida, post febres acutas non raro obvenientes: S.

*Pilula pectorales & stomachales.*

Quin etiam his ipsi Mercurius dulcis commodè potest addi, quem usurpat RIVERIUS cum diagrydio: vid. *Cent. 3. Observat. 31.*

Vulgò pro scopo purgationis usurpant agaricum in infuso ad ℥ss. cum oxymelite, sed ignavum est simplex. Potius extrahit ejus cum aliis. Quidam semen carthami ab ℥ss. ad ℥vj. infundunt; ut ut etiam ex hoc semine à ℥ss. ad ℥ij. elegans Emulsio purgans fieri possit.

Optata ac limba in tussi humida, ubi expectoratione opus, non conveniunt; excretionem enim impediunt & hinc materiam evacuandam crassiorem ac viscidiorē reddunt. In fine tamen, ubi maximam partem evacuata est mucilago, & crebrior tussis inanis sæpius repetens, antequam aliquid ejiciatur, superest, in talibus ad vestigia læsionis irritantis delenda commodè cum aliis papaverina usurpari possunt, ut nempe his nimia irritatio ac crebrior frustranea tussis suspendatur; interea verò materia expectoranda præparetur, ut minori labore excernatur: v.g.

R. *Aqu. scabios.* ℥ij.  
*Asthmat.* ℥vj.  
*Flor. sulph.* ℥j. ad ℥ss.  
*Syr. diacod. Mont.* ℥j.  
 M. S.

*Potio contra tussim.*

Pro incidenda materia viscida & crassa, præter ea, quæ suprà de Asthmate ex stomacho oriundo dicta sunt, imprimis conducit hæc Potio admodum experta:

R. *Aqu. hyssop.*  
*Tussilag. an.* ℥ij.  
*Asthmat. spirituos.* ℥ss.  
*Oxymel. squillit.* ℥ss. vel ℥vj.  
*Estmuller. Oper. Tom. II.*

*Syr. de hyssop.*  
*Nicos. an.* ℥vj.  
 M. D. S.

*Mixtura contra tussim pro aliquot vicibus.*

Addi etiam potest pro meliori incisione & faciliori rejectione spiritus nitri dulc. aut salis dulcis q. pl. pro grata aciditate. Hæc mixtura subinde cochlearim sumpta expectorat egregie.

Vel

R. *Aq. Hyssop.*  
*Tussilag. an.* ℥ij.  
*Asthmatic.* ℥ss.  
*Gum. ammon. cum aceto squillit. sol.* ℥ij.  
*Oxymel. squillit.* ℥j.  
*Syr. nicotian.*  
*Tussilag.*  
*De Hyssop.*  
*Eryf. Lobel. an.* ℥ij.  
*Spir. nitri vel sal. dulc. q. l.*  
 M. S.

*Succus contra tussim pro aliquot vicibus.*

R. *Aqu. hyssopi.*  
*Mentha an.* ℥j. vel ℥ss.  
*Asthmat.* ℥ij. vel ℥vj.  
*Cinamm.*  
*Oxymel. squillit. an.* ℥ss. vel ℥j.  
*Gum. ammon. cum aceto squillit. sol.* ℥ij.  
*Spir. asthmat. vel salis dulc. q. l. pro grato sapore.*  
 M. S. ut ante.

Elixir pectorale D. Michaelis cum spiritu asthmatico mixtum, uti in asthma, ita in tussi à stomacho, notum est, quod sit egregium: e.g.

R. *Elix. pector. Mich.* vel *Propr.* ℥ss.  
*Spir. gum. ammon.* ℥ij. M. S.

*Elixir pectorale contra tussim: 40. guttas.*  
 Item

R. *Rad. ari acerr. non prap.* ℥ij.  
*Spec. dia. Ireos* ℥j.  
*Extr. rad. helenii vel zedoar.* ℥ss. ad ℥ss.

Cum sacch. in aqu. fœnic. vel menth. vel scabios. sol. q. l. fiant Rotule, adpergendæ cum ol. destillas. fœnic. S.

*Rotule contra tussim.*  
 Vel

R. *Rad. ari non prapar.* ℥ss.  
*Gum. ammon. in aceto sol.*  
*Masticb. elect. an.* ℥j.  
*Tartari vitriol.* ℥ss.  
 Cum f. q. sacch. in aqu. menth. sol. F. Rotule.  
 D. S.

*Rotule pectorales contra tussim.*

Adnumerandum hic mulierum euphorion, quod est;

R. *Succirapax. express.* qu. pl.  
 adde  
*Sacchari Candi parum.*

Mirabiliter resolvit in pectore & stomacho, atque expectorat.

Pro altero scopo, stomacho nempe appropriata sunt Elixir stomachale, Elixir proprietatis, quod cum & sine acido in vino enulato usurpatum, egregie commendatur. Elixir quidem cum acido in principio videtur exasperare tussim: verum, modò continetur ad tempus, neminem spe sua frustrabit. Egregie etiam à STOECHERO commendatur decoctum zedoariæ cum vino paratū, elixir menthæ acidulatum cum spir. sulphuris, tinctura tartari acris, vel sola vel cum spir. salis ammon. simplici aut anilato, Malvat. juniperinum, essentia & extractum helenii, quod est pectorale & stomachale; item essentia croci, & chocolata, compositū istud exoticū ex fructibus Cacao, musta cum saccharo, aut etiam cocta cum vino saccharato & assumpta, optime convenit in tussi quacunque, siue mucilago hæreat in stomacho, siue hæreat in pectore; nam egregium est stomachicū & pectorale. Quod etiam pertinet balsamus Peruvianus, guttatim ad 6. vel 8. guttas usurpatas: quin etiam præmissis præmittendis in tali tussi aliquando liquorē terræ sol. tartari, item tincturā vitrioli martis Zwelferi pro debita rugarum ejus expansione proficua observavi. Convenit etiam præmissis præmittendis, tam in tussi pectorali quàm stomachali humida, uti etiam suo modo sicca, Electuarium, quod fit ex

*Herb. scord.* M. ij.  
*Satu.* M. j.  
*Flor. sulph.* ℥ij.



Hæc omnia subtilissimè pulverisata, vel sola, vel addito laudano opiato, cum syrup. diacod. excepta, subinde deglutuntur ad sistendas tales tussis.

D. S.

*Electuarium pectorale.*

Not. IV. Quod si sit *tussis sicca nocturna pectoralis*, adeoque *catharralis*, sive à lymphæ vitio orta, quæ vel falsa, nunc per glandulas ad asperam arteriam in larynge & bronchiis exsudat, vel acida, quæ sæpè, si inveterata, conjuncta cum febre catharrali: Talis curatur & præservatur, nunc præmissis nunc omisso vomitorio, per volatilia sudorifera, opiatissima, vespèri imprimis assumenda, interdum sudorem imperando, quæ lymphæ vitium catharrhale corrigunt, blandè discurrunt, & vellicantis irritationem sistunt: v. g. spiritus salis ammon. simplex vel anisatus, liquor cornu cervi succinatus, à gutt. 40. ad 30., & alia, quæ lymphæ vitium corrigunt & tale sistunt: quibus adjungenda essentia opii vel alia opiata & papaverina, quæ mirè talem tussim sedant, & præsertim conducunt, si febris catharrhalis juncta fuerit; Unde & Veteres Philonisi contra talem tussim, item syrupis diacodim, usi fuerunt. Nobis verò opiata imprimis sunt in usu, eaque permixta imprimis talibus, quæ acrimoniam lymphæ falsam aut acidam temperare, corrigere, ac mitigare possunt: v. g.

R. Spir. salis ammon. anis. ʒiʒ. ad ʒij.

Essent. opii ʒʒ.

M. S.

*Spiritus pectoralis: 40. vel 30. guttæ pro una vice.*

Sumatur bihorio ante cenam, & si opus, ante introitum lecti.

Vel istis præmissis appropriata pectoralia, imprimis balsamica oleosa sulphurea, lympham corrigentia & noxam partis eluentia, usurpentur, quæ etiam interdum sola sufficiunt; v. g. flores sulphuris, qui jam à Celio contra tussim pectoralem à lymphæ acri sunt commendatum remedium, ut eorum ʒj. quovis mane in ovo forbili accipiatur: conf. THESAURUS RULANDI p. 109: flores liquidus, benzoë, & flores benzoës in ovo forbili, sperma ceti, oleum destillatum anisi, semine cum saccharo, balsamum sulphuris anisatum, troctura sulphuris, quam habet WILLISIIUS in Pharm. Ration. P. 2. p. 113. E. g.

R. Tinctur. sulph. ʒij.

Essent. opii ʒʒ.

M. D. S.

*Essentia pectoralis.*

Dentur pro dosi 40. vel 30. guttæ, bihorio ante cenam, & si opus, ante introitum lecti usurpandæ.

R. Spir. sal. ammon. succin.

Tinctur. sulph. an. ʒj.

Essent. opii ʒʒ.

M. D. S.

*Essentia pectoralis contra tussim.*

Dentur 30. vel 40. guttæ pro dosi.

R. Aqu. scabios. ʒij.

Flor. papav. errat. ʒʒ.

Tinctur. sulph. Willis ʒʒ.

Syr. diacod. Mont. ʒʒ.

M. D. S.

*Succus contra tussim.*

R. Aqu. scabios. ʒij.

Mentib. ʒj.

Spir. salis ammon. anis. ʒij.

Syr. nicot. ʒj.

M. S.

*Mixtura pectoralis.*

Conveniunt item succinata omnia, myrrhata, & reliqua, quæ vulgò incrassantia seu propriè tenuem & acrem lympham temperantia appellantur, v. g. lac, violæ, glycyrrhiza, jujubæ, passulæ, radix Ireos Florentinæ, heleonii, horumque Decoctum, herba veronica, scabiosæ, item vulneraria pectoralia, ut veronica, hederæ terrestris, &c. syrupus de jujubis, rosarum, scabiosæ, loch passularum, Decoctum raparum, quod est egregium, & ex hoc Decocto paratus syrupus, qui egregius est in tussi inveterata. Hordeata etiam sunt in usu, ubi est lymphæ acida & falsa, quam temperant: hinc BORELLUS Centur. 4. Observ. 89. refert de Tussi, maciæ & agrypnia, hordeatorum ulu curatis: item caricæ cum spiritu vini compastæ, species diatreos usitata, pulveres pectorales varii, semen papaveris, syrupus papaveris, amygdalæ dulces, & pilulæ de cynoglossa: loco quarum moderni usurpant laudanum opiatum, mixturam imprimis cum spermate ceti, item cum succino; vel, quæ meliores, pilulæ de styrace & ad

tussim Schrøderi, quarum Descriptiones videbitis in ejus Pharm. lib. 2. cap. 73. Num. 6. & 7. pag. 252. Admodum elegantes sunt pilulæ de storace Sylvi in tussi sicca nocturna citra febrim, ad temperandam lympham falsam & acidam optimè, quas rectè dicit, posse substitui pilulis de cynoglossa. Compositio est succincta & descripta in Praxi lib. 1. cap. 20. pag. 284.

R. Syr. calam.

Succ. liquirit. solut. & inspiss. seu extracti liquor.

Olibani,

Myrrhæ,

Opii Thebænic. corr. seu laud. opiat. an. ʒʒ.

Croc. orient. ʒj.

Cum l. q. Syr. papav. alb. P. mass. pilul.

Observeur hæc de succo de glycyrrhizæ, quod scipius solem adulterari, idque variis quilibet ac pulveribus pro ponderis augmento: unde dum propinandus succus glycyrrhizæ pro temperanda lymphæ acida vel falsa, inultum aggravat malum: nam reperitur in ʒʒ. succi glycyrrhizæ una alterave drachma quilibetiarum. Ubi ergo volumus esse cauti, præscribimus succum glycyrrhizæ Hispanicæ; cujus defectu

R. Succ. glycyrrh. in aqua hyssopi solutus, qui filtratur & inspissatur: Dum enim solum filtratur, quilibet remanent, & sic habemus succum purum & gratum. Verum in inspissatione exactus observeur ignis gradus; ubi enim vel leviter excedit sit succus amaricans & empyreuma contrahit, quod etiam est nocivum.

Vel

R. Extr. sulph. pulveris gr. xij.

Croc. gr. ij.

Myrrh. elect. gr. iv.

Laud. opiat. gr. j.

Cum essent. succin. F. pilulæ: S.

Pilula vespertina contra tussim.

Vel

R. Succin. præpar. ʒʒ.

Myrrh. elect.

Sal. vol. succin. an. gr. v.

Extr. croci gr. ij. vel iv.

Laud. opiat. gr. j. vel ij.

Ol. destillat. succin. gutt. ij.

Cum essent. opii vel lign. sassafr. vel succin. f. Pilulæ, bihorio ante cenam sumendæ:

D. S. ut supra.

Quod si pilulæ sint molestæ, loco earum habet Rotulas hæc SYLVIIUS loco citato; nam & ipsum saccharum in tali tussi convenit:

R. Sem. hyoscyami alb.

Papav. alb. an. ʒʒ.

Thuris,

Myrrh. rub. an. ʒj.

Croc. opt. ʒʒ.

Succ. liquirit. inspiss. ʒj.

Sacch. alb. facti cum mucilag. Alib. ʒʒ.

Gum. tragac. in aqua ros. dissol. ʒj.

M. f. Rotula exigua.

Harum unam subinde in ore detineant ægræ, ac sensim deglutiant: quod si aliquid de laudano opiato admisceatur, esset eo melius.

Vel

R. Spec. diatr. simpl.

Trag. fr. ʒj.

Flor. sulph. ʒij.

Extr. croci gr. vj.

Cum l. q. Sacch. in Emuls. semin. papav. albi solut. f. Rotula,

adspargendæ aliquot guttulis olei destillat. anisi.

D. S.

Rotula pectorales contra tussim.

R. Spec. diatr. usit. ʒʒ.

Flor. sulph. ʒij.

Laud. opiat. gr. iv. vel v.

Cum sacch. in aqua scabios. solut. f. Rotula.

D. S.

Rotula contra tussim.

Quæ crebrius sumendæ.

R. Flor. sulph. ʒj.

Benzoes,

Succin. præpar. an. ʒʒ.

Thuris,

Gum. Arab. an. ʒj.

Extr. croci ʒʒ.

Laud.



*Laud. opiat. gr. lii.*  
 Cum sacch. in aqu. fœnic. sol. ℥ij. F. *Rotula*,  
 Adpersendæ cum ol. destil. ar. anis. S.  
*Rotula catarrhales.*  
 R. Flor. sulph. p. iij. vel iv.  
 Spec. diatr. p. l.  
 Cum l. q. sacchar. f. *Rotula*.  
 D. S.  
*Rotula pectorales contra tussim.*  
 R. Spec. diatr. simpl. ℥ij.  
 Bel Armen. præp. ℥i.  
 Succ. liquirit. depur. ℥ss.  
 Cum ℥ij. vel ℥iv. sacchar. in aqu. flor. papav. errat.  
 solut. F. *Rotula*.  
 D. S.  
*Ut antea.*  
 R. Spec. diatr. f.  
 Tragac. an. ℥ij.  
 Flor. sulph. ℥ss.  
 Extrat. liquirit. ℥j.  
 Laud. opiat. gr. v.  
 Cum f. q. sacch. in aqu. scabios. solut. F. *Rotula*: vel  
 cum mucilag. trag. F. *Trochisci*: D. S.  
*Trochisci contra Tussim.*  
 R. Extrat. liquirit. ℥j.  
 Pulv. rad. Irees Flor. ℥ss.  
 Sacch. albiss. ℥ss.  
 Cum f. q. mucilag. tragac. in aq. veron. sol. formentur  
*Trochisci*: S.  
*ut antea.*  
 R. Conf. flor. enul.  
 Hyssop. an. ℥ij.  
 Spec. diatreos simpl. ℥ss.  
 Antihet. Poter.  
 Flor. sulph. an. ℥j.  
 Benzoes ℥ij.  
 Cum f. q. sacch. in aqu. hyssop. sol. F. *Morsuli*: S.  
*Morsuli pectorales.*  
 R. Conserv. flor. anthos,  
 Beton.  
 Calend. an. ℥ij.  
 Succini præpar. ℥j.  
 Myrrb. elect. ℥ij.  
 Benzoes,  
 Tburis an. ℥j.  
 Cum sacch. in aqu. serpill. sol. F. *Morsuli*, ittorandi  
 cum ol. destill. succini: S.  
*ut antea.*  
 Vel fiat pulvis temperans seu incrassans:  
 R. Rad. Irees Flor. ℥ij.  
 Flor. sulph. ℥j.  
 Ol. destill. anis. ℥j. ad ℥ss.  
 Fœnicul. gutt. xij. ad xv.  
 Sacch. opt. ℥ij.  
 M. D. S.  
*Pulvis pectoralis*  
 Dosis ℥j., detur bis in die, & convenit, si læsio est in  
 pectore.  
 R. Spec. diatreos ass. ℥j.  
 Flor. sulph. ℥ss.  
 Laud. opiat. gr. iij.  
 M. f. pul. pro tribus dosibus: D. S.  
*Pulvis pectoralis pro tribus dosibus.*  
 R. Flor. sulph. ℥j.  
 Pulv. anod. Lud. gr. iv.  
 M. D. S.  
*Pulvis vespere fumendus pro catarrhis.*  
 Vel  
 R. Pulv. pectoral. Lud. gr. xxv. ad ℥ss.  
 Laud. opiat. gr. j.  
 M. f. pul. pro una dosi.  
 D. S.  
*ut antea.*  
 Ad tussim difficilē nocturantem per quatuor vel quinque  
 horas assilgentem, cum febre catarrhali & coryza, præmissis  
 uniuersalibus ad temperandum serum acre  
 R. Sperm. ceti gr. xxiv. vel ℥ss.  
 La. d. opiat. gr. iij.  
 M. & divid. in 2. part. equal.  
 Una pars hora pomeridiana quinta, altera pars hora de-  
 cima vespertina fumebatur, & optimē profuit.  
 R. Sperm. ceti ℥j.  
 Estueller. Opt. Tom. II.

*Succin. præpar. ℥j. vel ℥ss.*  
*Myrrb. elect. gr. viij. ad ℥ss.*  
*Laud. opiat. gr. iv.*  
 M. F. pulvis.  
 Dividatur in 3. vel 4. part. equal.  
 D. S.  
*Pulvis pectoralis.*  
 Capiantur mane & vespere bihorio ante vel post co-  
 nam.  
 R. Sperm. ceti ℥ij.  
 Flor. benz. ℥j.  
 Myrrb.  
 Sal. volat. succin. (est egregium in  
 omnibus vitis lymphæ, quoniam  
 blandē temperat & eam movet)  
 an ℥ss.  
*Laud. opiat. gr. iv.*  
 Misc. f. pulvis.  
 Divide in 3. vel 4. part. equal. D. S.  
*Pulvis vespertinus.*  
 Capiat æger vnam partem iturus cubitum.  
 Vel  
 R. Sperm. cet. ℥j.  
 Flor. benz. ℥ss.  
 Laud. opiat. Lang. gr. liij.  
 Ol. destill. succin. gutt. ij.  
 Misc. pro tribus dosibus:  
 D. S.  
*Pulvis catarrhalis.*  
 Assumantur vespere ante coenam.  
 R. Flor. sulph. ℥j.  
 Benz. ℥ss.  
 Laud. opiat. gr. ij.  
 M. f. pul. capiendus bihorio ante coenam:  
 D. S.  
*Pulvis vespertinus.*  
 R. Lapill. can. r. præpar. ℥j.  
 Succin. præpar. ℥ij.  
 Antihet. Pot. ℥ss.  
 Cinnab. antimonii ℥j.  
 Laud. ferment. gr. iv.  
 M. f. pulvis.  
 Dividatur in 4. part. equal.  
 D. S.  
*Pulvis contra tussim & catarrhum.*  
 R. Spec. diatreos simpl.  
 Flor. sulph. ar. ℥j.  
 Antihet. Pot. ℥ij.  
 M. f. pulv. ubi materia tenuis salsa uturpandus. D. S.  
*Pulvis pectoralis & catarrhalis pro aliquot vicibus.*  
 R. Conserv. rosar. rub. ℥ij.  
 Antihet. Pot. ℥ss.  
 Flor. sulph.  
 Spec. diatreos an. ℥ij.  
 Cum syr. diacod. f. *Electuarium*:  
 D. S.  
*Electuarium pectorale catarrhum temperans.*  
 Faciunt huc oleotacchara, maxime ex oleo succini,  
 quæ in talibus sunt nobilissima. Syrupus diacodon,  
 Montani, & syrupus icabiotæ, vel misti, vel cum rob  
 passularum subacti, cum baculo liquiritæ assumpti, &  
 ita pedetentim deglutiti, etiam hîc egregium sunt reme-  
 dium, omnibus loch incrassantibus & expectorantibus  
 præferendi.  
 Hæc conveniunt ad temperandam lympham salisam.  
 Verum cum adjuncta imprimis soleat esse febris catar-  
 rhalis, ab eadem lymphæ acrimonia nata, ad hanc si-  
 mul respiciendum est. In Tussi ergo sicca cum febre  
 catharrhali:  
 R. Aqu. scabios. ℥ij. vel iv.  
 Asthmat. ℥ss.  
 Liq. corn. cerv. succin. vel spir. sal. ammoniaci anis. ℥j.  
 au ℥ss.  
 Syr. diacod. Mont. vel papav. alb. ℥j. ad ℥ss.  
 M. D. S.  
*Potio contra tussim & Catarrhum.*  
 Capiantur imminente paroxysmo, & post mediam no-  
 ctē expectando blandum sudorem.  
 Vel  
 R. Aqu. scabios.  
 Serpill. an. ℥ss.  
 Spir.



*Spir. salis ammon. anis. ʒiſſ.*

*Liqu. cornu cervi succin. ʒi.*

*Syr. papav. simpl. ʒi.*

**M. pro tribus doſibus in tuſſi ſicca catarrhali.**

**D. S.**

*Potio peſtoralis pro duabus vicibus.*

Aliàs ad temperandam lympham ſaſam & acidam præpri-  
mis opiata ac papaverina & diſta ex ſpermate ceri & ſuccino  
conveniunt, imprimis gummata mucilaginoſa, qualia ſunt  
tragacanthum, item gummæ Arabicum: radices etiam ſub-  
dulces, imprimis glycyrrhiza, altheæ, helenii, & ſimiles: e.g.

**R. Spec. diatr. ʒiſſ.**

*Pulv. rad. alib.*

*Succ. Liquirit. an. ʒi.*

*Laud. opiat. gr. xvj.*

*M. F. pulvis. S.*

*Temperans pulvis peſtoralis.*

*Vel*

**R. Aqu. lochſani & experti ʒiſſ.**

*Lochſani & experti ʒiſſ.*

*Spec. diatr. simpl. ʒiſſ.*

*Succin. præpar. ʒi.*

*Syr. diacod. Mont.*

*De jujub. an. ʒi.*

**M. D. S.**

*Leniens ſuccus peſtoralis.*

*Item*

**R. Aqu. ſenic. vel ſcabioſ. ʒiſſ.**

*Aſthma ʒvj.*

*Syr. diacod. ʒiſſ.*

**M. D. S.**

*Leniens potio peſtoralis.*

*Vel*

**R. Aqu. ſor. papav. err. ʒiſſ.**

*Syr. papav. simpl.*

*De jujub. an. ʒiſſ.*

**M. pro duabus doſibus: S.**

*Leniens ſuccus peſtoralis pro duabus doſibus.*

Veſperi unam biſorio ante coenam, & alteram ſub introitum  
lecti ſumendo.

*In ſine*

**R. Maſſ. pilul. de ſucc. Crat. gr. xvj.**

*Extr. agar. gr. viij.*

*Troch. alb. nã.*

*Scamm. ſ. ſphur. an. gr. ij.*

*Cum eſſent. ligni ſaſafr. F. pilula.*

**D. S.**

*Pilula catarrhales & peſtorales.*

**Not. V.** Quod in Tuſſi ſicca chronica, aſth. gente peſtus, &  
à lymphæ vitio oriunda, adeoque phibitum plus minus mini-  
tante, diſta ſulphurea balſamica, noxam eluentia, non ſuffi-  
cient, & tuſſis fiat continua, & poſtea incipiat eſſe mucola  
materia ex ulcere pulmonum. In tali caſu pro lymphæ corre-  
ctela optima ſunt decocta lignorum ſudoriſera, matutino  
tempore uſurpanda. Talia præſervativa matutina ſunt De-  
coctum guajaci, imprimis ligni ſaſafras; egregium enim eſt  
in affecta lymphæ catarrhali; vel Decoctum huius aut radices  
chinæ cum paſſulæ mediantibus quibus & corrigitur lymphæ  
& per ſudores evacuato latice morboſo, eoſque ſubinde repe-  
titos & aliquandiu continuatos, optime curantur hæc ipſæ:  
vid. quæ ſuperius dixi de ſiſt. Hæc quantum valeant, vid.  
LOTICHIUS Ob. l. 3. c. 10. Obſ. 1. p. 233. & PISO de Collu-  
ſis. p. 184. Veſperi beneficio opiatorum ſutatur violentia tuſſis.

*Externæ R. Capit. allii Num. 3.*

*Cum l. q. pingued. porcin. contendantur in formam unguenti.*

**D. S.**

*Unguentum peſtorale.*

Hoc veſperi ante lecti ingreſſum prope ignem plantæ pe-  
dum illinantur, quod per tres dies continuandum.

*Vel ſumatur ſaltem pinguedo lucci piſcis.*

**Not. VI.** Si ſit Tuſſis ſicca ſerina ſtomachalis, eaque invete-  
rata, curatur præmiſſo vomitorio, maturè tamen inſtituto,  
partim per opiata, partim per temperata, acce, oriſcium  
ejuſ vellicans, corrigentia: qualia ſunt flores ſulphuris,  
paſſulæ, & omnia ex paſſulis, Decoctum raparum, liquiritiæ  
& ejuſ ſuccus, Decoctum helenii una cum paſſulis Corinthia-  
ciſcum Vino Hupanico vel Malvatico paratum: & poſtimo-  
dum ſaccharum album addatur pro lubitu, & coquatur ad  
conſiſtentiam aliqualem ſyrupi.

*Dofis mane & veſperit detur coch. ij.*

Hoc remedium adultorum tuſſim præmiſſo vomitorio mi-

reſedat: in infantibus abſque vomitu à Lindano laudatur.  
Interdum etiam de ſyrupo diacodii vel pro ratione circum-  
ſtantiarum eſſentiâ opii cuilibet doſi aliquantulum addi po-  
teſt. Egregium eſt remedium ad talem tuſſim ſerinam, vicio  
ſtomachi ortam.

**Vel**

**R. Tinctura tartari compoſ. ʒiſſ.**

*Spir. ſal. ammon. anis. vel alius volatiliſ arom. ʒiſſ.*

*Eſſent. opii ʒiſſ.*

**M. D. S.**

*Elixir peſtorale contra tuſſim.*

**Dofis** 40. gutt. mane, à meridie, & ſub introitum lecti, in  
quocunque vehiculo, expectando ſudorem.

Addatur hiſ Decoctum raparum, quod certe eſt egregium  
remedium, ſit rapum ſit recens vel exſiccatum, & in tuſſi ſic-  
ca omni, vel catarrhali vel peſtorali vel ſtomachali, nobile,  
quod ego aliis irritis vidi optimum.

Perinet huc euporiſton: ſcilicet paſſulæ aut ſicus cum ſpi-  
ritu vini combuſti veſperi in tuſſi ſerina ſicca ex ſtomachi vi-  
tio cum tuſſi, ſuperveniente aſperitate faucium, phlogoſi, vel  
raucedine cum tuſſi catarrhali & chronica.

Porro convenit glycyrrhiza, ejuſque ſuccus, imprimis Hi-  
ſpanicæ; necnon Eleſtuarium helenii cum melle, ac cætera  
ſuprà in tuſſi ſicca laudata. Sic facit huc euporiſton AMA-  
TI LUSITANI Cem. 6. Curat. 90., recipiendo.

*Sulphuris crudi, aut ſor. ſulph. (perinde enim eſt) ʒiſſ.*

*Flor. benz. ʒi.*

Quæ in tenuiſſimum pulverem redacta propinantur doſi  
ʒiſſ. in ovo forbili mane, & veſperi, & ſub introitum lecti,  
aliquandiuque continuatur. Videatur etiam RULAN-  
dus loco citato, qui viro annorum 40. tuſſi vehementiſſimâ &  
aſthmate aſſicto pulverem hunc præſcripſit. Benzoë tan-  
rectè vocatur balſamus peſtoris, & in morbis aliis peſtus ab-  
ſigentibus reverà eſt egregium remedium; unde eſſentia  
benzoëſ cum eſſentia croci atque eſſentia ſuccini miſta, in  
tuſſi ex peſtore affecto orta erit egregia.

*Vel*

**R. Pulvæ paſſul. min. ʒiſſ.**

*Flor. ſulph. ʒiſſ.*

*Cum l. q. ſyr. papav. simpl. F. Eleſtuarium.*

**D. S.**

*Eleſtuarium peſtorale.*

Capiatur pro lubitu ad compeſcendam tuſſim ſerinam.

Loco ſorum ſulphuris comunium quidam commen-  
dant flores ſulphuris ſaccharatos. Modus præparandi eſt, ut  
ſumantur

*Flor. ſulphuris comm. part. ij.*

*Sacchari part. j.*

*Caput martis vitrioli ad pondus omnium.*

Sublimantur hæc invicem in flores ſulphuris ſaccharatos:  
ſed communibus multò deteriores & nullius uſus ſunt.

Quidam omnes tuſſes curavit per pomum excavatum  
melle rotaceo impletum, ſuprà prunas poſitum, & ita ſub no-  
ctem devoratum. Sed tuſſis hæc ſerina, modò præmiſſus fue-  
rit vomitus, ut plurimum ſpontè evaneſcere ſolet, tantillis  
temperatis poſtea aſſumtis.

In genere Tuſſis humida ſerè ut aſthma humidum curatur:  
Tuſſis autem ſicca ſimiliter ratione atque affectus catarrha-  
les levatur.

Superèſt Tuſſis nervorum ſeu convulſiva, quæ curatur ut  
aliæ convulſiones epilepticæ, & imprimis præmiſſis univer-  
ſalibus per ſalia volatilia & ſuccinata, quæ inter liquor cornu  
cervi ſuccinatus eſt egregius: unde etiam Dn. Boyle in Phi-  
loſ. Experimentali in tuſſi quacunque, etiam inveterata, ſola  
ſolet commendare ſalia volatilia, v.g. ſpiritum & ſal urinæ,  
item ſpiritum cornu cervi, aut ſal cornu cervi, tanquam ſin-  
gulariſſima & expertiſſima.

**Not. VII.** Cum fauces ſint ſubinde læſæ, & lymphæ acio-  
ri plus minus excoſtatæ, rubentes & quodammodo inflam-  
matæ, ob id acrimoniam blandè temperantia & increaſtan-  
tia diſta, item dulcia plus minus fauces lubricantia & le-  
nientia, conveniunt. Hoc occaſionem dedit errori, quali  
talìa in aſperam arteriam penetrarent, & ita expectoratio-  
nem promoverent, quod falſum; ne guttula enim tranſit in  
ſtatu naturali. Sunt autem talia, paſſulata, ſuccus gly-  
cyrrhizæ, ſyrupus violarum, roſarum, de jujubis, tuſſilaginis,  
ſcabioſæ, liquiritiæ: Item ſyr. diacodii Montani cum ſy-  
rupo ſcabioſæ miſtus, & cum baculo liquiritiæ guſtatus, ſub-  
inde lambendo deglutitur: Olea ſacchari, Linctus, Rotule  
ſuprà dictæ, & ſimilia ex remediis ſuprà recensitis parata:

**R. Syr. diacod. Mont. ʒvj.**

*Mell. paſſul. ʒiſſ.*

*Extr. liquirit. ʒi.*

*Diluo.*



Diluantur cum paucâ aqua scabios. in consistentiam Loeb.

D. S.

*Succus pectoralis contra tussim.*

Vel interdum glycyrrhiza recens continuè maceratur; sic enim oblinuntur fauces & lubricantur.

Pertinet huc liquor seu oleum sacchari, ex saccharo & spiritu Vini, uti habet HARTMANNUS.

℞. Spir. bacc. juniper. vel hujus loco Vini spiritus vulgaris,

Olei destillat. bacc. juniper. an. ℥iv.

Sacch. alb. ℥ij.

Misceantur.

Incendatur spiritus, & remanet saccharum, quod vocatur oleum sacchari: cui adde parum extracti croci & usurpetur successivè lambendo.

Convenit maximè si tussis affligit ex squalore aeris sicci vel squalidi, & inde orta raucedine. Quidam laudant, si modò cohobetur spiritus vini, sed non magna est differentia. RIVERIUS facit oleum sacchari compositum, dum spiritum vini imprægnat appropriatis pectoralibus. Hoc oleum sacchari, ut obiter moneo, est quoque egregium vulnerarium, si extrinsecus instilletur & applicetur. Loco hujus olei sacchari sunt, qui recipiunt ovum ad duritiem coctum, & exempto vitello albumen induratum saccharo replent, ita non nihil perforant & in cellam suspendunt, & ita fit oleum sacchari, quod arbitror non esse inconveniens. RHUMELIUS in *Herm. pag. 137.* Saccharum Canarium laudat.

Potest etiam exteriùs aliquid plantis pedum addi, scilicet ante lectum luti piscis pinguedo, vini spiritus, spiritus menthae, & similes.

Fit interdum, ut cum tussi conjuncta sit hæmoptysis seu sputum sanguinis: in tali casu FORESTUS commendat Syrupum myrtillosum l. 16. Obs. 20. in *Scholio*, imprimis si cum Decocto passularum, cum spica aromatisato, assumatur.

#### ARTICULUS IV.

DE

#### CATARRHO SUFFOCATIVO.

**A**ffectus ex hæcenus dictis, nempe ex Asthmate, præsertim sicco, Tussi, & Raucedine complicatus, diversimodè tamen, ita ut nunc hoc, nunc illud symptoma observari videatur, isque vel subito irruens, vel ex improviso exasperatus, nunc continuus, nunc remittens, & vel periodicè, vel incertis intervallis repetens, & quidem suffocationis periculum plus minus inferens, cum stertore, materiz vel paucæ vel nullius refectione, Catarrhus Suffocativus Germ. *ein StocK-fluss*, vulgò dicitur, adeò ut vulgus in genere quancumq; respirationem subito difficiliorem redditam & suffocationem minitantem, in specie si cum tussi conjuncta fuerit, nomine Catarrhi suffocativi appellare soleat; dicunt: *cecidi ipsi Catarrhus Suffocativus*. Hinc fit, ut Asthmata occulta interdum recurrentia, item Asthmata humorosa, imprimis vesperi graviter affligentia, sub hunc censum veniant & confundantur; item Tussis serena, in specie nocturnæ, graviter affligentes, imprimis cum excretionem copiosiore facta conjunctæ, huc à quibusdam trahantur. Catarrhus tunc dicitur à præconcepta opinione, quasi subito ex cerebro præsertim fluat humor serosus plus minus pituitosus, qui bronchia & pulmones replens suffocationis periculum intendat. Sed paucis rem explicat LINDANUS in *Colleg. manuscr. super Hartmann. Prax. Chymiatr.* dicendo: *Maxima de nihilo nascitur historia, nil obscurius hæc de Catarrho suffocativo doctrinâ: Nam ipsa Anatomia tam ostendit falsissimam, quomodo materia vel pituitosa vel serosa, à capite potius in pulmonem, per rimam asperæ arteriæ, & epiglottidem obstantem, transibit, quam per œsophagum, &c.* Alii igitur verè cautiore per venas à capite deferri tales humores, hinc deponi in pulmones, replere hos & asperam arteriam, & suffocationem ita inferre putant. Sed ridiculas has de Catarrhis suffocativis hypothesen non solum discutit & refutat HELMONTIUS *Tract. Catarrhi Deliramenta*, sed in specie hanc paradoxam de Catarrho suffocativo doctrinam exactè quoque rejicit VINCENTIUS BARONIUS *Tr. de Pleuropneumonia*; & videri potest SCHNEIDERUS *de Catarrh. l. 3. cap. 4. pag. 276. & 296.*, qui primus exactius paulò de Catarrho suffocativo agere annus est.

Est muller. Oper. Tom. II.

Ut suprà ergo monui, complicatus affectus est, qui vulgò suffocativi catarrhi nomine venit; circa quem moneo, varios Authores & Scriptores esse, & ingentem illorum confusionem. Aliqui enim sunt, qui confundunt triplices affectus, distinctos tamen toto cœlo, qui catarrhi suffocativi nomine veniunt apud Authores. Unde in vulgi judicio & præconceptis hypothesibus, per ignorantes Medicos confirmatis, hæc non inhærendum; Propterea triplicem catarrhi suffocativi putatilli, asthmatis convulsivo contradiſtincti, differentiam facio, prout in Praxi observare eam mihi contigit.

I. Differentia prima est Catarrhus suffocativus ex pulmonibus affectis, ex hostili acido inspirato, vel intus genito, illis profundius se insinuante, irritatis, hinc proprias fibras fortius se stringentibus; unde Suffocationis imminet necessitas, non prius cessans, donec lymphæ uberior irrigatio irritans illud præternaturale, & ex eorum mutuo coalitu concretum mucosum factum, ablutum & abstersum fuerit, cujus expectoratione morbus solvitur. Remanet tamen subinde vestigium in illis fibris, ita ut levi occasione renovatum spasmodum & spirituum occlusionem minentur.

Mulier quædã hoc Catarrho suffocativo laborabat: principium mali erat frequens alaudarum assatio, quarum sub assatione, & cum butyro irrotatione, & undique pinguedinis in carbones destillatione, & hinc fumorum elevatione factum fuit, ut ipsa primò tussim aliqualem, sed siccam & profundam seu ex imo pectoris experta fuerit, quam aliquando ex improviso atrox pectoris & faucium angustatio, & post aliquos dies perfecta Orthopnoea secuta fuit, in quo statu continuè ultra octiduum videbatur suffocanda, ita ut leni aures commotione aut januæ apertione mox suffocatio imminere videretur, donec successivè expectoratione materiam glutinosam ac perquam viscidam ejicere, tali refectione successivè liberius respirare, & sic tandem ad sanitatem redire cepit. Mansit tamen vestigium in pulmonibus impressum, ita, ut faciliè à quavis causa angustiam pectoris sentiret.

Circa hujus affectus ætiologiam observandum:

- I. Causam remorâ esse acidum viscidum ex butyro, & alaudarum pinguedine incensa, exhalans, cum aëre inspiratum, asperæ arteriæ canalis & hinc pulmonibus undique inhærens.
- II. Hoc irritavit inimicâ suâ præsentia, idque tam acrimoniâ, quam adhæsiōne glutinosâ, tanquam fuligo camini, undique in pulmonum ductibus adhærens ad bronchia & pulmones, unde primò tussis, eaque sicca, hinc ex irritatione illa lymphæ uberior affluxus, ab utriusque gravior irritatio, unde superveniens continua fibrarum nervearum in pulmonibus strictura & coarctatio convulsiva.
- III. Duravit hoc tamdiu, donec tam lymphæ, quam nutrimenti proprii affluxu fuligo illa abstergeretur, & ex utriusque successivè concretum novum, ob moram & exactam nutritionem seu subactionem, spissum, candidum, glutinosum, &c. genitum fuerit.
- IV. Hujus medio fuligo sublata, irritatio sedata, contractura pulmonum hinc remissior reddita fuit; unde liberaliori paulò aeris accessu & recessu materia ista sub paroxysmo genita, cum fuligine involuta, commota, protrusa, & sic per bronchia sursum ejectione fuit.
- V. Mansit tamen vestigium ex pulmonum nutritione propria seu priuata, plus minus læsa, adeoque contractâ, hinc pulmonum debilitate & fibrarum tali constitutione, quæ faciliè in spasmos agi possit; unde vel leviori occasione externa pulmo irritari, fibræ contrahi, & hinc affectus pristini memoria revocari solet.

Pertinere huc videtur Infantum quorundam plus minus robustorum Catarrhus suffocativus, cum epileptiz metu junctus; dum v. g. simpliciter creberrimâ thoracis systole & diastole cum levi vel nulla tussi, continuè suffocari videntur; idque ipsum etiam eveni subinde ita, ut tali spasmodicâ affectione pulmones stringi & thorax coarctari ita videatur, ut & respiratio libera impediatur, & sanguinis per pulmones circulus impediatur: hinc facies eorum rubicunda esse solet, & præcedere talem affectum per aliquot dies vel raucedo levis vel tussicula: Conf. de tali Infantum suffocatorio affectu HILDANUS *Centuriâ 3.*



Observat. 10. item SCHENCKIUS in Observat. pag. 149.

## C U R A.

Ut itaque talem affectum in adultis Opiata & Attemperantia, vulgò *lacrassantia* dicta, optimè levant, etiam paroxysmos; ita & talibus infantibus thoracica, item spermaceti, &c. in vehiculo calido propinata, observantur proficiunt; cum è contrà asthma humida, item tussis humorales, præsertim ex stomacho in infantibus non rare, imprimis per nicotianam, item per blanda emetica, curari debeant.

II. & III. *Differentia Catarrhi suffocativi reverè est Catarrhus suffocativus vitio laryngis:*

Laryngis nempe affectus ad bronchum pertinet, quando subito respiratio difficilis redditur cum adjuncta sensibili laryngis irritatione, *titillus mordet*, indeque superveniente tussi, eaque satis violenta, cum excreatu in principio paucò, in progressu & in fine copioso, semper tamen cum levamine. Quæ in principio paroxysmi ciliatur, ferè sunt tenues, paucæ, & terosæ, quæ in progressu paroxysmi fiunt crassæ, viscidæ & copiosæ, quæ dicuntur coctæ; auditur interdum stertor & sonitus, interdum raucedo adest, aut præcedit, aut sequitur, vesperi & noctu plerumque affligit, dum enim dorso incumbunt patientes, exasperatur: præcedit interdum dolor capitis & partium colli vicinarum, semper juncta est titillatio laryngis, &c.

Ex dictis elicitur: Catarrhum hunc suffocativum, propriè loquendo, esse affectionem laryngis, in quo hæc & caput asperæ arteriæ, in specie epiglottis, afficitur primariò; hujus enim & Epiglottidis & laryngis irritatio, & hanc semper insequens pertinacior strictura seu clausura, omne id præstat, quod alias Catarrhus suffocativus dicitur; ita, ut catarrhus suffocativus Formale in acta & stricta clausura laryngis, ob irritationem hujus, consistat. Jam verò, si in ipsa larynge hæreat malum, & sic erit affectus similis broncho cum raucedine, sive suprà aut extrà laryngem, saltem in ambitu aut si per faciem epiglottidis incumbat causa peccans, eritque tunc Catarrhus suffocativus, qui pertinet ad catarrhum membranae pituitariae posterioris *Schneideri*. Declarabo ulterius: nempe notum est, si tantum aquæ aut ceræ viscosa guttula aut mica saltem panis sub inspiratione laryngem ingreditur, quod hanc admodum sensilem irritando mox faciat ejus convulsionem seu pertinacem ab epiglottide occlusionem & suffocationem. Quanta enim respiratiois difficultas, tussis, secretusque violentia, nisi impetuosior tussis mox insequens illata denudè eliminet? & quò diutius sit ista irritatio, eò plus pituitæ, postmodum excreatur. Hæc symptomata, quæ superveniunt, exactissimè delineant catarrhum suffocativum vitio laryngis. Nam tunc talis mica panis laryngem irritat cum sensibilitate, irritata convellitur, unde ex strictura difficilis respiratio & suffocatio, tandem supervenit secretus, qui non est exactè in larynge, nec est causa itarum angustiarum in larynge, sed mica: interim tamen est productum quasi morbosum; sit nempe de novo ex irritata larynge, ex lymphâ ulterius affluente ad locum affectum; Unde ex quacunque causa interna, si similis fiat in faucibus irritatio, tunc similis subito imminet tussis, strictura vel suffocatio, & similia pathemata.

## C A U S A.

Causa ergo irritans, quæ infert huiusmodi subitaneum pathema, est respectu laryngis vel interna vel externa. Interna ut plurimum est affectus feri vel lymphæ acrioris, nunc salioris, nunc in specie acidioris, ad bronchum delata, & tunc titillatio adest ob acrimoniam lymphæ acidioris ad laryngis intensionem; quæ deservit obliationem a causa externa, ab inclementia aëris introducta, tuncq; pars læsa plorat copiosâ lympham, nunc falsâ, nunc acidâ; itaq; sic Catarrhus suffocativus nihil aliud, quam quasi Raucedo subitanea; hinc irritatur larynx, stringitur epiglottis, unde metus suffocationis subitaneus Promde autè talis raucedo fit interdù, singulis noctibus repetens: quale exemplum apposuè hoc facit, quod habet RIVERIUS *Cens. 3. Observat. 15.* Hæc nempe causa respectu laryngis externa, tale Catarrhum suffocativum inferens, est imprimis lymphâ viscidior, glutinosior & copiosior cujuscunque saporis, ex membrana pituitaria posteriore & inferiore ad fauces copiosius delata, & subito inviscens quasi laryngem, & epiglottidis liberum motum impediens; unde mox suffocatio imminens, tussis, & copiosus materiarum viscidæ secretus cum sensu lectionis in faucibus: estque affectus reve-

rà catarrhalis, nempe vitio membranae pituitariae posterioris, quem describit SCHNEIDERUS *lib. 5. de Catarrh. cap. 2. Sect. 2.*, & ejusdem est naturæ cum asthma humido, cum tussi chronica, imprimis stomachali. Exasperatur hic affectus subinde vesperi & noctu, & frequenter per se subito ex pregressa causa externa, imprimis ab aëre inclementiore aut maligno, aut variis effluviis spirituum acidorum mineralium imprægnato, factâ alteratione, vel ex tussi diuturna & chronica oritur, ut patet in exemplo HILDANI *Cens. 6. Obs. 8.* ubi habetur talis Catarrhus suffocativus. Subolevit hoc PLATERUS, unde Catarrhum suffocativum angustiam intra fauces ait, & catarrhum non ad pulmones, sed ad fauces delabi animadvertit, *L. 1. Obs. 185.*

Est ergo Catarrhus hic suffocativus propriè dictus affectus, cognatus tussis ferinæ & raucedini graviori, indeque complicatus ex pluribus symptomatibus.

## C U R A.

Catarrhus suffocativus à causa externa curatur eodem modo ac raucedo recens seu tussis nocturna sicca, v.g. per vomitoria, & post per opiatâ ac similia alia temperata, *Incrassantia* dicta, i. e. lympham acrem, in specie acidam, temperantia; vel si minus in principio conveniunt Vomitoria, præmissio clysmate, per sudorifera blanda, lymphæ motu & materiam corrigenia, hinc per opiatâ irritationem faucium tolerantia & silentia. *Incrassantia* sunt passulæ, glycyrrhiza, tragacantha, gummi Arabicum, thus, jujubæ, syrupus de jujubis, violarum, papaveris, scabiosæ, liquiritiæ, &c.

R. *Aqu. scabios. ʒiij.* (vel *Aqu. scabios. mensb. an. ʒiij.*)  
*Asthmat. Rudolph. (est vini spiritus coar-*  
*posit. aromat.) ʒiij.* vel *ʒiv.*

*Syr. papav. simp. ʒiij.*

*Violar. ʒss. ad ʒvj.*

M. & cochleatum capiatur.

D. S.

*Potio ad respirationem cochleatim sumenda.*

R. *Aqu. scabios. ʒiij.*

*Asthmat. ʒvj.*

*Spir. salis ammoniaci anisat. ʒj.*

*Syr. papav. alb. ʒj.* vel hujus loco *diacod.*

*Ment. ʒss.*

D. S.

*Vi. anis.*

R. *Aqu. Mentb.*

*Scabios.*

*Serpill. an. ʒj.*

*Asthmat. ʒvj.*

*Spir. salis ammoniaci anisat. ʒj.*

*Flor. sulphuris ʒss.*

*Syr. diacod. Ment. ʒj.*

M. D. S.

*Potio Catarrhalis ad respirationem.*

R. *Essent. catarrhal. ʒvj.* vel *ʒss.*

*Spir. salis ammoniaci anisat. ʒj.*

M. S.

*Essentia catarrhalis ad respirationem.*

Si asperior fuerit Mixture propter spiritum salis ammoniaci, omitti potest.

Exempli loco sit puer 10. annorum, constitutione ferè asthmatica, facies naturaliter tunudior, dormiebat aperto ore & cum stertore, obnoxius subinde erat aliquali tonsillarum tumori. Hic vel ex simplici aëris frigidi nudo capite susceptione, vel ex refrigeratione extremorum post corporis motum & exercitium, proximè insequente aut certe alterâ in Catarrhum suffocativum dictum incidebat, ita, ut suffocandus omnino videretur, facies intumescerebat, ex rubro ceruleo sciebat, tussis crebra, sed inanis, & sub qua nihil præterquâ tenuis & paucæ lymphæ evacuetur. Interrogabatur: *quomodo ipse esset in paroxysmo?* dicebat semper: *titillare ipsum in falsa gula;* nempe erat affectus laryngis, ex lymphâ acri vellicante natus, occasione caularum in motu debito impedita. Cum evanisset paroxysmus, febris aliquot dierum levis supererat, tussis frequens & pedetentim copiosius mucæ, crassæ & viscidæ, per aliquot immediatè insequentes dies excreta, & sic morbi solutio. Redibat tamen sæpius paroxysmus, idque speciatim hyberno vel verno tempore, rarius æstate. In paroxysmo adstantes inungebant verticem balneo succini, bronchia fortioribus ligaturis constrangebant. Præscribebam Mixturem sequentem, ut irritationis sensum & hinc laryngis contracturam sic lenirem: nempe

R. *Aqu.*



**R.** *Aqu. scabios.* ℥ij.  
*Asthmat.* ℥ss.  
*Syr. diacod. Mont.* ℥vj. ad ℥j.  
*M. D. S.*  
*Potio pro respirations.*  
*Item*

**R.** *Aqu. scabios.* ℥ij.  
*Spiritus salis ammoniaci anis.* ℥ss.  
*Syr. papav. alb.* ℥vj.  
*M. f. Potio cochlearum lumenda.*

*Externè* in regione laryngis, ubi patiens titillationis & constrictionis sensum percipiebat, cum linctis calidis applicati & sæpius reiterari iussi:

**R.** *Aqu. Articuli ademura* ℥ij.  
*Spir. cerasor. nig.*  
*Lil. convall. an.* ℥j.  
*Essent. opii* ℥ss. ad ℥ij.  
*Milla applicabuntur.*

Hæc brevior reddebatur paroxysmus. Finito verò paroxysmo præscripti:

**R.** *Aqu. scabios.*  
*Serpill. an.* ℥ss.  
*Asthmat.* ℥vj.  
*Flor. sulph.* ℥ij. vel ℥ss.  
*Syr. Asthmatis.*  
*Scabios.*  
*Violar.*  
*Papav. vel de jujub. an.* ℥vj. ad ℥j.  
*Miscendo.*

Potio, probè agitando, crebrius hausta crebriorem tussim & materię copiosioris rejectionem prævenit, quatenus irritationis in larynge sensum & fluxionis causam removet, & acrimoniam lymphę temperando, lesionem laryngis & hinc mucı excretionem inhibuit.

Tandem ob crebriorem nimis recidivam in subiecto phlegmatico, seroso chylo abundante, inurebatur brachio sinistro fonticulus, unde nec crebri adeò nec adeò graves postmodum redierant paroxysmi. Circa annum decimum quartum denud claudere coepit fonticulus, cum spes esset, ex alteratione corporis, & notabili habitus ejus immutatione, eum hunc affectum immutatum iri.

Si malum est à *causa externa*, curatur ut Asthma humorosum, vel Tussis chronica, imprimis stomachalis, nempe per vomitum, & deinde per attenuantia, & mucum viscidum incidentia, & consequenter insignem siccitatem & rejectionem causantia, vulgò *Expectorantia* dicta, v.g. succum raphani recentem, syrupum & aquam nicotianę, quę nobilissima, spiritum asthmaticum, oxymel squilliticum, radicem arı, gummi ammoniacum in aceto solutum & cum aqua erysimi propinatum, aquam asthmaticam Rudolphi, spiritum asthmaticum Domini D. Michaelis ex vitide arı & gummi ammoniaco, & similia.

**R.** *Aqu. Hyssopi.*  
*Mentha,*  
*Nig. arıana an.* ℥j.  
*Asthmat.* ℥vj.  
*Oxymel. squillit.* ℥ss.  
*Spir. Nicotianę* ℥vj. ad ℥j.  
*M. f. Potio. S.*

*Potio resoluens pro respirations.*

Capiatur cochlearum.

**R.** *Aqu. hyssopi.*  
*Scabios. an.* ℥ss.  
*Asthmat.* ℥j.  
*Gumm. ammon. in acq. sol.* ℥j.  
*Syr. scabios.* ℥j.  
*M. D. S.*

*Potio resoluens pro respirations.*

Ex dictis patet: Opiata & his cognata anodyna, & hinc Attemperantia, aliis *Increascentia*, in paroxysmo & sistendo & præcavendo primum obtinere, etiam ex vulgata aliqua hypothese: Cum enim non, nisi ex humoribus, motu & hinc loco peccantibus, oriri soleant pathemata talia, humores verò locali motu nullo ferantur in corpore, nisi beneficio spirituum animalium, mediantribus fibris illos moventium; à spiritibus autem præternaturaliter moveri non soleant, nisi hi promoveantur ab obiecto molesto vel præternaturali, hoc est, nisi pars quædam sensilis irritetur; manifestum evadit, quod ea, quę irritationis sensum tollunt, & spirituum impetum ôiunt, etiam præternaturales humorum motus retardant,

& partium inchoatos spasmos curare valent: in quo puncto primum ducunt anodyna, ut clarum est. Quid ergo cysteres prolunt, in talibus Catarrhis suffocativis suppositus usitatissimi, tique aciores? Res clara est, quod nil valeant, per accidentialem, primas vias evacuando, & sanguinis & abdominis viscera in motum concitando, & utroque modo pectoris angustiam nonnihil sublevando, saltem ex indirecto prodesse. Quid venæ sectio? ad quam, tanquam ad sacram anchoram mox confugiunt! Per se nihil prodest, nisi in graviore paroxysmo, & pulmonum reciproco motu plus minus impedito: metus sit, ne graviore circa pulmones sanguinis stagnatio superveniat, pro liberiori sanguinis circulo conciliando hæc interdum instituenda veniat.

Uterius capiti, nuchę & vertici ballama, emplastra, cataplasmata, sulphurea dicta, ex mastiche, succino, tacamahaca, caranna, elemi & similibus aliis imponuntur: item ex fermento, ex oviz ad duritiem coctis, ac similibus, pro suspendendo catarrho deserviente: Sed conatu sanè inani & ridiculo vexantur ægri sine fructu, cum in capite non sit mali radix. Item Vesicatoria cervici, scapulę & similibus locis pro scopo diversorio applicantur malè iridem, nisi interdum per accidens, ubi asthmatis convulsivi quidpiam adest, in quo casu vesicatoria brachiis applicari possunt.

Hic IV. loco affectus peculiaris annumerandus venit, & qui modernis, antiquatam istam de feri catarrhalis ex capite de fluxu sententiam recipientibus, Catarrhi suffocativi nomine venit: estque ille Catarrhus suffocativus vitio linguis, de quo eruditè tractat VINCENTIUS BARONIUS loco allegato, & SCHNEIDERUS lib. 5. de Catarrhis c. 4. ubi de Catarrho suffocativo, qui omnes, & cum iis LINDANUS, rectè dicunt: Catarrhum subito suffocantem, aut suffocationem minuantem, nil aliud esse, quàm sanguinis quacunq; ex ratione in pulmonibus stagnationem, seu quod oriatur ex impedito sanguinis in pulmonibus circulo; dum nempe sanguis copiosius ex dextro cordis ventriculo in pulmones effusus non promoveatur ulterius, sed in pulmonibus stagnet; quę sanguinis stagnatio non tantum est origo hujus affectus, sed peripneumonię pariter ac pleuritidis; unde etiam quidam *sanguinis cœm* appellant.

Sanguinis hæc cœm accidit ita in Syncope Cardiaca, Veteribus dicto affectu, quàm in Syncope ordinaria graviore, in qua tamen deficit movens spiritus. Plerumque ergo qui hanc syncope cardiacam ignorant, ad Catarrhum imaginarium suffocativum delabuntur. De hac syncope cardiaca, Veteribus sic dicta, optime in lectione illorum v. r. CASPARUS HOFFMANNUS nonnulla refert in *Instit. Medic. lib. 3. cap. 50.* esse eam, cum, cerebro nihilo passo, sanguis ad cor tam vehementer affluit, ut omni spiritus via ad cerebrum intercludatur. Hinc, infert, non omnes, qui subito moriuntur, apoplexiâ mori, & sæpè causam sinistra ab anatomicis quærit in capite, cum sit in thorace! ita, ut hic Catarrhus suffocativus & syncope cardiaca sint unum idemque, oriatur ex sanguinis impedito in circa cor in pulmones. Hinc ex his fundamentis SCHNEIDERUS l. c. pag. 297. definit Catarrhum suffocativum, quod sit ille Catarrhus, in quo sanguis plerumque copiosus, cum de venę cavę truncos ascendente, tum maxime de ejusdem venę cavę truncos descendente in cor, & hinc in pulmones contractum & celeriter fluit, nec non & interdum in musculos thoracis. Quemadmodum enim in apoplexia imminente sanguis arteriarum, nempe carotidum, in cerebro; ita in imminente Catarrho suffocativo sanguis venarum in pulmonibus, tam superne, quam inferne, cum impetu ac violentia movetur, ac ibidem subsistit. Conf. WEPFERUS *Tract. de loco affectu in Apoplexia* pag. 163. & 202. item SCHENCKIUS in *Observ. pag. 278.* ubi prolixius differtur de Syncope cardiaca, in qua concreto in venis sanguine ægri subito moriuntur. Similes nempe, quoad externam faciem, affectus sunt Apoplexia & Catarrhus suffocativus, ita ut hi affectus subito confundantur, aut etiam simul in ægris adsint. Nam ut in Catarrho suffocativo sit sanguinis stagnatio in pulmonibus; ita in his similiter, qui Apoplexiâ moriuntur, tandem similis sanguinis in pulmonibus supervenit stagnatio. Hinc in Apoplexia mortuus vasa pulmonum distenta & rupta interdum, ex sanguinis impedito motu, in præcordiis reperiuntur, referente hoc non tantummodo FRACASSATO in *Epist. de Cerebro ad Malpighium*; sed etiam CORNELIUS CONSENTINUS in *Prognosis*. inquit: quod ii, qui moriuntur Apoplexiâ, eodem modo intereant atque strangulati; quod admodum appositè dicitur. Nam in strangulatis quoque injecto collo subito perit sensus & motus, ex impedito sangui-



sanguinis in carotide motu, & succedente respirationis abolitione. Ne autem in confundamur, merito adhuc urgeo ingentem hanc confusionem, quando quidam Catarrhum suffocativum à sanguinis stagnatione in v. in quibus, & Catarrhum suffocativum vitio laryngis, distinctos inter se affectus, confundunt, quod facit SCHNEIDERUS &c., ubi promissuè allegat Authores, & promittunt facit Chaos.

Est itaque Catarrhus talis affectus ad Peripneumonias suo modo accedens. Hujus exemplum videtur repræsentare mulier illa Catarrho suffocante interempta, quam refert PLATERUS l. 1. pag. 87. Caterum sit interdum, ut etiam in paroxysmo Catarrhi suffocativi cum tussi, copiose materia viscida, imò non raro spumosa, per os excretio contingat: Nam huc trahendus ille inter Authores maximè hinc inde ventilatus Apborismus HIPPOCRATIS 43. sect. 2. Dicit enim hic: *Ex iis, qui strangulantur & submerguntur, nec tamen sunt mortui, non redeunt ad vitam, quibus spuma circa os apparet.* Hic valè digladiantur Authores, quid intelligatur per strangulationem? Optima est sententia eorum, quos inter est LINDANUS, qui dicunt: intelligi per hanc Catarrhum suffocativum; nam, ut dixi, in eodem apparet spuma, & non raro ejicitur mucus & materia viscida.

*Anginæ species, Cyranche dicta ab ulcere in interioribus laryngis, fauces occludente;* unde *Anginosis spuma circa os apparet malum de peratum est:* sicut & CHRISTOPHORUS à VEGA l. 3. de Art. Med. cap. 8. refert, duos viros lentinas & puteos cœnoso expurgantes, præ fortiori strangulatos spumam ex ore emisisse.

Mucus hic & materia viscida rejecta primum dedit occasionem imposturæ scholarum, quod nempe talis mucus ac materia spumescens, per laryngem in pulmonem decidens, sit causa morbi, quod tamen falsissimum; cum potius sit productum morbotum, quàm causa affectus. Verùm ostendam originem illius ex duplici fonte: spuma illa copiosa, quæ taliter affectorum aut mortuorum ore effluit, omnis est ex pulmonibus, facta per agitationem ab aere inspirato; si enim acidus liquor in canis venam injiciatur, ejusmodi spumæ vel eadem symptomata sequuntur, atq; in ejusmodi suffocativis Catarrhis. Quod testatur exemplum canis, cui olim per chirurgiam intolantiam 3i. olei seu spiritus sulphuris per campanam in aquam diluti sunt in venam cruralem infusa, unde canis post hujus injectionem per semihorulam & successivè admodum anxie respirabat, sensimque difficilior, ita, ut tali Catarrho suffocativo tandem moreretur: antequam suffocaretur, & etiam post mortem copiosissima spuma ex ore & naribus effluxit; imò factâ apertione thoracis torum pulmonum perenchyma, omnia vasa asperæ arteriæ, totiusque truncus, fauces, nares & guttur erant infusa hac spumâ quasi viscidâ: bullæ extractæ & asservatæ in tabula tandem abierunt in liquorem rubicundum, ferolum, lotioræ catium similem. Factâ ulteriori inquisitione, pulmones erant repleti sanguine nigricante & crassifaculo, ita, ut hic canis exactissimè manifestaret Tragœdiam Catarrhi suffocativi, ejus rei habeo testes: Nam ab acido sulphuris coagulatus sanguis subiecit, unde ab aere violentius inspirato crebriori sui respiratione & sanguis hic factâ concussionem, mutatus fuit in spumam, quæ replevit has partes: vid. *D. sp. med. de Chirurg. l. 1. fu. or.*

Spuma ergo in iis, qui laborant Catarrho suffocativo, & quæ tandem supervenit Apoplexiâ graviore affectus, etiam ex pulmonibus esse videtur; Mucus verò & materia viscida non sub forma Catarrhi à capite refluit, sed est ex larynge. Fit nempe spuma ex sanguine in pulmonum vasis stagnante, ab aere reciproco motu impetuosius haulto, crebriori respiratione non nihil rarefacto & attenuato, & ita in spumam resoluta; sicut cerevisia agitata in spumam abit: quâ ipsâ spumâ repleta aspera arteria malum potius exasperat, quàm levat. Ubi tale signum apparet, rectè signum lethale censetur, & raro, si spuma illa adsit in Malis peracutis, evadunt; hinc rectè dicit HIPPOCRATES in Apbor. allegato: *Quibus strangulatis spuma circa os apparet, ii intereunt.*

Quod attine mucum, qui in tali casu ejicitur, illum dixi ex larynge, & reverà nil aliud est, quàm lympa paulo viscidior, ex larynge tunc ubertius emulsa, & in tantis angustis mediante crebriori respiratione cum aere elevata. Nam larynx & aspera arteria interiori membrana bullata, interdum humectantur à glandulis, posterius curâ cartilagine copiosè hærentibus, quæ ordinatò transudant lympam tenuem, plus minùs acrem, plus

minùs viscidam, in asperam arteriam, pro ejus & laryngis humectatione ad meliorem vocis formationem. Hinc quando in febribus ardentibus abrupta est ista lympa, vox fit rauca.

Stagnante ergo sanguine in pulmonibus & impedito nonnihil circa asperam arteriam, ex anxietate acri copiosior lympa crassa & viscida eructatur in arteriam asperam, ejusque loca vicina, etiam per membranam pituitariam inferioriorem emittitur, quæ est materia ipsius muci sub hoc affectu rejecti, & vulgò habetur pro pituita ex capite depluente.

Inter causas remotas, quæ tali stagnationi & coagulationi, aut ubertiori influxui in præcordiis seu pulmonibus, hinc Catarrho suffocativo, occasionem suggerunt, à SCHNEIDERO &c. allegantur varæ; præsertim aëris obervandum vitium, ratione cujus & epidemicum ac malignum hunc Catarrhum interdum esse, pluribus deducit: Nec ultima est, quod post nimium exercitium aut motum concalescit insigniter corpore, adeoque sanguine attenuato, subito ingurgitur haultus aquæ frigidæ, à qua repentinam incidunt suffocationem: propterea quoniam in exercitio & motu sanguis attenuatus & rarefactus rapidè ac celeriter circulatur & æstuat; à subito verò aquæ frigidæ potu ingurgitato sanguis subito ad sui coagulationem disponitur, hincque stagnando in pulmonibus & præcordiis facilè suffocationis periculum inferat: Id quod patet, quia à tali causa non raro fiunt pleuritides, unde suffocationis periculum. Exemplum tale curiosum habuit aliquando Dn. D. MICHAELIS in Coquo, qui cum diutius ac vehementius circa focum & ignem incaluisse coquendo, à foco abscedens subito copiosam & frigidissimam cerevisiam hausit, unde tantam spirituum angustiam, & in præsentaneum suffocationis periculum incidit ex coagulo sanguinis: Curavit tamen hunc coquum beneficio succi florum bellidis rubræ recenter expressi. Notum enim est, quod succus iste singularem vim habeat vulnerariam, ac imprimis sanguinem grumosum & ab acido coagulatum dissolvendi; unde etiam hic succus sanguinem ex potu frigidæ semicoagulatum, congruatum, denudò resolvendo, suffocationis periculum removet: Conf. *Medicina Militaris* MINDERERI, in qua videbitis acetarium ex bellide, & ad hujus imitationem instituit Curam hanc D. MICHAELIS; sicut flores bellidis aliàs nobiles sunt in pleuritide.

Faciunt huc varæ exempla suffocationum talium similiter ortam ab obstructione valvularum in pulmonibus, & impedito sanguinis motu per eoque imprimis est illud, quod habet MAUROCORDATUS *Tract. de Motu & Usu pulmonum cap. 40. pag. 88.* ob calculum in arteria venosa enatum: sic polypus cordis seu excrescentia carnea in sinistro ventriculo cordis nata, quatenus sanguinis motum per pulmones inhibet, suffocationem infert, de qua BARTHOLINUS *Centur. 2. Epist. 86. pag. 683.* RIVIERIUS *Centur. 1. Observat. 82.* WILLISIUS *contra Highmoreum pag. 15.* & MALPIGHIUS *de polypo Cordis.* Quo etiam facit cartilago venæ pulmonalis truncum occludens, qualem MAYOWIUS *de Pulsu Cordis* vidit.

Sed propinquiores causæ talis Catarrhi suffocativi sunt quadruplices:

I. Sanguis nimis abundans & turgescens, qui propter rarefactionem & ubertorem in pulmonibus majus spatium occupat, adeoque tardiùs circulator, tandem verè stagnat.

II. Est sanguis paulo viscidior seu pituitosus, hoc est, chylo crudiori imprægnatus, ad motum tardior, adeoque stagnationi aptior: quod pertinet observatio RIVIERII *Centur. 1. Observat. 81.* de suffocatione ex materia viscida pituitosa, in dextra cordis auricula reperta. Conferatur observatio parallela in MAYOWII *Tract. de Motu musculorum pag. 99.*

III. Obstructio valvularum in pulmonibus à calculis, &c.

IV. Est interdum sanguis ab acido vitioso aut aere nimis frigido post æstum subito inspirato, aut denique quacunque alia ratione coagulatus & inspissatus, qui uti peripneumoniam & pleuritidem infert, ita, si quoque sanguis coagulatur, talem suffocationem infert.

Rectè namque dicit Lindanus in *Coll. in Pr. Chymias. Martmanni*: *Nihil quicquam potest esse absurdius, quàm fin-*



gere tam repentinam deductionem viscida ac pituitosa materia ex capite in asperam arteriam citra tussim, ac exinde suffocationem imminuentem; quin potius per patulas vias in gulam ejus contingat excretio. Ergo vult, dictam suffocationem non esse à Catarrho, sed esse à stagnatione sanguinis. Quod pertinet Terror subitaneus, ex tali sanguinis stasi subitamam suffocationem inferens. Pulsus hinc est deficiens, interdum parvus, celer & frequens.

## DIAGNOSIS.

Catarrhus hic suffocativus in specie cognoscitur ex dolore pectoris gravativo, difficultate respirationis, voce ferè intercepta, periculo suffocationis, anxietate ægri, interdum tussi, non semper, & saltem, quando simul vasa laryngis lympham uberius effundunt; pulsus tardiore & rariore ex tarda circulatione sanguinis, & quodammodo formicante seu vermiculante; hinc qui catarrho tali suffocativo oppressus est, ægerimè spirat, & anima cum spiritu fertur. Nonnunquam membrana pituitaria Schneidero dicta, quæ obducit subjecta corpora glandulosa, plures humores rejicit, quos creatu & sternutatione rejicere solemus.

Coincidunt ferè hæc ipsa cum apoplexiæ signis, nisi quod in hac suffocatione ægri ægerimè spirent; in apoplexiâ verò debiliore, abolitis tantum actionibus animalibus cæteris, nihilominus plus minus respirant, arteriæ pulsant, utut pulsus sit durus, nec ea spirandi difficultate vexantur: in Apoplexiâ forti verò vix vitæ ullum manifestum adeest indicium, neque deficientis aut exinde matè habentis respirationis adhuc signa; sicut & pulsus subindè frequens & vegetus percipi solet: in syncope verò communi pulsus est ferè nullus.

## PROGNOSIS.

Quod *Prognosis*: res est clara, periculo esse plenissimum hunc affectum; strangulatio enim cum spuma maximè est infesta, uti dicit HIPPOCRATES. In morbis autem acutis omnino jugulat: propterea maturanda est Cura.

## CURA.

Totus scopus in curando Catarrho suffocativo seu syncope cardiaca est, ut promoveatur sanguis stagnans per pulmones: id quod sit vel imminuendo ejus quantitatem, vel resolvendo remediis internis ejusdem coagulationem, & denique blandendo sudore eundem attenuando, & fluidiorem perficiendo, sicque liberiores ipsi motum promovendo. Adeoque ex remediis primò se offert venæ sectio, in Catarrho suffocativo ut plurimum necessaria, in brachio quanto citius instituta, & pro conditione subjecti satis larga: Nam occasio est præceps, & nil citius ac potentiùs sanguinis circulem motum immutare, eundemque accelerare, & stagnationem impedire potest, quàm hæc ipsa. Hinc etiam Coccurbitulæ cum scarificatione hinc inde affigendæ. Obiter moneo hic, quod vulgò Clysteres instandi, sternutatoria & Gargarismata, item Bechica, Linctus adhiberi, Frictiones brachiorum & pedum, ligaturæ fortes &c. institui, atque Emplastræ & Cataplasmata capiti, quoniam à pituita ex capite descendente ortum duxisse credunt, applicari solent; sed hæc cerè, ut rectè dicit LINDANUS, sunt lusus scolarum mulierum, anilia inventa ac inania omnia, à Medico rationali non imitanda; quia sæpè feliciter tunc moriuntur ægri: subindè tamè ante aut post venæ sectionem Clystma acrius profluenda alvo injectum, non est inconveniens. Vomitoria, quæ hic à quibusdam insigniter laudantur, pariter sunt inepta; ipseque dubitans RIVERIUS inquit: *In vehementi Catarrho vix confert Vomitorium*: Et FREITAGIUS in *Auxora Medicorum* dicit: *In Catarrho graviore esse periculosa vomitoria*. Adjunt quidè exempla feliciter propinatorum Vomitoriorum; verùm hic subesse dicam imposturam: Nam copiosa materia viscida infert imposturam, ut habeantur talibus angustis afflicti pro Catarrho suffocativo laborantibus; quin potius conveniunt saltem in Catarrho suffocativo ex vitio lymphæ, de quo supra, aut in Asthma te fortiori, facta ex stomacho, aut ubi suspicio simul est, mucilaginem viscidam subesse in stomacho, aut etiam hæret in pulmonibus, idque fouere malum, aut causæ remotæ instar esse; quali in casu propinatum vomitorium in forma liquida optimum & divinum est remedium. Jam verò cum Asthma stomachale pro tali suffocatione habeatur, hinc factum est, quod dicuntur conferte vomitoria in Catarrho

suffocativo. In sanguinis verò extrato nihil juvat, quin potius administratâ venæ sectione sanguis stagnans vel citò dissolvendus & attenuandus, vel blandâ diaphoresi in rapidiorem circulum cogendus. Interna remedia sunt aquæ Asthmaticæ ac pectorales dictæ spirituosæ, imprimis temperatis & anodynis mistæ initionibus. Præ cæteris optimè hic convenit sperma Ceti, ʒss. ad ʒj. in aqua hyssopi cum pauca aqua Asthmatica Rudolphi, vel cerevisia calida aut alio vehiculo calidè propinatum, quod in deplorato Catarrho suffocativo pro sanguine coagulato denuò resolvendo fluxilemque reddendo est inobile, & ab omnibus Medicis laudatum remediū, ad quod tanquam ad sacram anchoram confugiunt: vid. SCHENCKIUS, RANCHINUS, & SCHMUCK Th. 1. *secreta Med.* 15. Mirabilia enim facit, cum probè reclus sit æger: Etiam in Catarrho suffocativo infantum exquisitissimum remedium D. PETRI à CASTRO dicitur, ad pili magnitudinem, vel anniculo ad ʒss. in lacte materno dissolutum, propinatum; unde etiam est singulare Vulnerarium, ubi est sanguis coagulatus. Paucis nota est origo hujus spermatis ceti. Revera autem est ex capite balænarum, non verò ipsum cerebrum, sed materia pinguis in capite balenæ contenta, quæ exinde desumpta per saccum seraceum trajicitur ob nimiam pinguedinem: materia restitans, per lixivium forte, ex calce viva cineribusque clavellatis paratum, depuratur. Formula potest præscribi talis:

℞. Aqu. hyssop. ʒj.  
Sperm. ceti ʒss. ad ʒj.  
Syr. de hyssop. ʒss. ad ʒvj.  
M. D. S.

*Dissolvens potio pro respiratione pro una vice.*

Potio hæc propinetur pro una dosi, quæ admodum dissolvit sanguinem coagulatum.

Probè etiam convenit Mixture ex lapillis cancrorum cum aceto destillato parata, expectando sudorem, quæ promovet liberum sanguinis circulum; item talia volatilia sanguinem resolvablem & per sudorem blandum ventilantia, v. g. antimonium diaphoreticum cum sale volatili cornu cerui, sale volatili succini; vel spiritus cornu cervi essentiatum, item liquor cornu cervi succinatus à gutt. xx. ad xxx., qui est egregium sudoriferum, & in hoc casu admodum proficuum; Unde conducunt etiam remedia & Mixture à SYLVIO præscriptæ l. 1. *Idea Prax.* cap. 20. §. 24. pag. 280. seqq. ubi de motu sanguinis per pulmones impedito: Quibus addantur cherefolium, scabiosa, bellis minor, veronica & similia: item omnia ferè vulneraria sunt egregia in hoc Catarrho suffocativo, propterea, quoniam instat alcalicorum solent absorbere acidum coagulans sanguinem: ac omnia remedia, quæ aliàs in casu ab alto usurpari solent, promovendo simul, quantum possibile, sudorem; quin & ubi mucilago viscida hæret in stomacho, aut tussis & materiæ per laryngem transudantis superveniat rejectio declinare paroxysmo. Commode etiam Expectantia usurpari possunt, inter quæ Raphanus, & ex hoc expressus succus cum pauco saccharo, vel alia inde medicamenta parata, egregiè conveniunt in hoc casu. Multa sanè latent arcana sub hac plantula, utpotè cujus sal volatile est vulnerarium omnibus aliis præferendum. In ipsa quoque suffocatione est commendata.

Datur Syrupus ab ʒss. ad ʒj: sed legitimè sit præparatus, alias vomitus movet. In MELICHII *Dispensatorio* pag. 168. laudatur semen nasturtii. Radix ari, & succus ejus, sale volatili acri prægnans, insigniter convenit: Vel acetum, in quo macerata fuit, commendat Helmontius contra casum ab alto in congruato sanguine resolvendo. Hinc similis ratione convenit in Catarrho suffocativo, quoniam stagnantem sanguinem in præcordiis dissolvit. In vulgari usu sunt oxymel squilliticum, ut acetum squilliticum, quæ tamen minus sunt potentia: gummi ammoniacum itidem valde convenit, si dissolvatur in pauco aceto, & propinetur in aqua hyssopi: Unde spiritus gummi ammoniaci cum ærugine paratus etiam cæteris paribus est egregius. Mixture hæc in ulum potest fieri talis:

℞. Aqu. hyssop.  
Scabios. an. ʒj.  
Succi ari ʒss. vel acet. infus. rad. ari ʒvj.  
Spir. gummi. ammon. cum viride ari ʒj.  
Syr. pin. cor. ʒj.

M. F. Potio, subindè cochlearim usurpanda.

D. S.

*Potio resolvens.*



**ZECHIVS** etiam in suis *Consul.* & **MERCURIALIS** commendat in Catarrho suffocativo gummi ammoniacum, si propinetur cum oxymelle simplici, idque felici, uti dicunt, cum successu. Nota est etiam Potio Brunneri ex gummi ammon. ad 3j. in aqua hyssopi & vino Rhenano. His etiam aqua asthmatica Rudolphi, quæ est spirituosæ, & in officinis prostat, percutere potest. Hicce remedia commodè etiam

adduntur ex Croco parata medicamenta: Nam crocus est egregius in Catarrho suffocativo, & **FREITAGIVS** in *Aurora Medic.* inquit, quod Orthopneis infallibile remedium sit. Exceret, uti crocus est anima pulmonum, ita sanguinem fluxilem ac tenuem facit: ut taceam vires insigniter refectivas in Croco, &c.

## S E C T I O X V.

### D E

## CHYLI IN SANGUINEM TRANSMUTATIONE, SANGUINISQUE FERMENTATIONE LÆSA.

**Q**uod attinet chyli cum sanguine confusi decentem assimilationem: ex suprâdictis notum est, quod deferatur chylus in receptaculum commune, ut ex hoc in ductum thoracicum confusus cum sanguine in venis axillaribus sensumque subigatur, & tandem successivè alteretur, ac virali spiritu imprægnatus in sanguinem mutetur; quæ actio, speciatim sanguificatio, in pulmonibus inchoatur, & tandem per continuum motum, tam progressivum, quam localem, & agitationem cum massa sanguinea absolvitur. In hoc enim sanguificationis negotio cor, ipsique annexa vasa, se habent purè passivè, & locum solum his liquoribus pro motu & transitu meliori concedunt; aded, ut cor saltem antequam munere in machina hac hydraulica fungatur. Sanguificatio siquidem non est actio organica, sed saltem similis purè; adedque, propriè loquendo, nullum corporis visceris organorum sanguificationis nomen merebitur; sed cor saltem vas erit aut officina, in qua talis insignior mutatio successivè peragi solet: uti **CHARLETON** in *Oeconomia Animalis* pag. 51. & speciatim **GLYSSONIUS** in *Anatome Hepatis* habet.

Est enim reverà Cor nil aliud, quàm musculus compositus, ita quidem, ut sinister ventriculus propriè cor appellandus sit, cujus appendix est saltem dexter ventriculus, propter pulmones solummodò fabricatus, & instar mensuræ, quæ in certa quantitate sanguinè vehit, ut per pulmones fiat melior & commodior sanguinis propulsio, pro subeunda maximè necessaria ad vitam ab aere alteratione, antequam finitimum cordis subeat ventriculum. De Structura & Fabrica cordis vid. elegans **LOWRI** *Tractatus de Corde*, **Schneiderus** de *Catarrhis*, & **ECCLESIASTES** cap. ult. vers. 6. *Antequam rumpatur fasciculus aëre natus, & recurvat vasa aurea & contrahatur hyaria super fontem, & confringatur vasa super cisternam* &c. **SAHS** a **LOEWENHEIM** vocavit circulum sanguinis *Oceanum Microcosmicum*, quia teste **ECCLESIASTE** p. 1. v. 11. 7. *ut omnes torrentes eunt ad mare, & mare non est repletum, ac locum, unde torrentes proficiuntur, illuc ipsi revertuntur*: Ita etiam sanguis in corpore nostro.

Chyli in sanguinè transmutatio, & sanguinis spiritusascensio, vix aliter præterquam per fermentationis motum, mediantè quo Chylus perfectè subigitur, & in naturam sanguinis mutatur, huius videtur, ut dixi in *Institutionibus*, de quo confici. **KERGERUS** *Tract. de Fermentatione*, item **DELSINGIUS** *Tract. de Nutrimenti animalium Generatione* Cap. de *Sanguificatione*. Saltem dubium est, a quo fermentatio hæc sanguinis fermentativa chyli primariò dependat: an nempe oriatur à fermento quodam spirituoso salino-volatilè, in sinistro cordis ventriculo radicaliter stabulante, chylium sanguinè assimilante, & sanguinem in spiritum volatilante? id quod asserit **BACKIUS** *Tract. de Corde*, **HILMONTIUS** hinc inde in suis *Scriptis*, in specie *Spiritus vitalis, Blas humanum, Sextuplex digestio*: quod etiam facit sentire **CHARLETONIS**, item **GLYSSONII** *locis supra citatis*: An verò sanguis ipse, prout in se principis fermentativis, in specie salinis & viscosis volatilibus turget, & chylium permixtum transmutare, & successivè sibi assimilare valeat? sicut hoc asserunt **NEEDHAM** de *Formato Facto* cap. de *Biolychnio*, **LOWERUS** de *Corde*, item sive modo **SYLVIVS** in *Dissertat. de Sanguificatione*, ubi ex hinc ascendente ex hepate, & lymphæ actua descendente cum sanguine ex vena axillari, talem ex utriusque concursu effervesceniam oriri vult, à qua chyli in sanguinem trans-

mutatio, & sanguinis vitalis calefactio primariò dependat.

Pro decitione consideranda prima sanguinis generatio, quæ absolvitur à spiritu genitrali maris cum spiritu genitrali scemini in uno junctis: qui uti totum ovum fecundat, & in eodem generationem, & fermentationem partium quarumcunque absolvit per motum; ita ab hoc ipso spiritu, calore incubantis gallinæ adjuto, etiam sanguinè primò produci impossibile nō est: ita, ut hic spiritus, dum movet particulas minimas liquoris in puncto saliente, eisdem successivo motu ita alterat, ut ex propriæ texturæ materialis aptitudine, spontè quasi in talem liquorem rubicundum abeant, qui postmodum novæ materiæ dispositæ impulsu, & repetitio per cor aut ejus rudimentum transitu, ab isto spiritu vitali, ex dicta materia continuò se multiplicante, ulterius augmentetur; aded, ut sanguis ipse, virali spiritu & principis fermentativis salinis imprægnatus, chylium in sanguinem mutet, qui in pulmonibus ab aere inspirato attenuatur & volatilatur, unde insigniter spiritusascit, & propter salino-sulphuream mixturam incalecit sanguis, & virali quasi calore incenditur. Ob id enim toties per cor transit omnis sanguis, ut

1. Languidus & effertus, spiritibusque depauperatus, in pulmonibus beneficio aeris inspirati denudè exsuscitetur.
2. Ob id chylium tam longo tramite ex intestinis per ductum thoracicum ad claviculas usq; ascēdit, sanguini permiscendus, ut eò propiorè viâ ad cor & pulmones deferatur.

Promovetur insigniter hæc sanguinis fermentatio, & consequenter chyli assimilatio ab aere in pulmones inspirato, cujus medio & attenuatur & volatilatur, & propter sulphureo-salinam mixturam incalecit, ac quasi virali calore accenditur. Chylus autem sanguini permixtus confusus in subclavis attenuatur, solvitur & subigitur, cumque eo ad cordis dextrum ventriculum deferatur, ex quo in pulmones erumpit; ubi tota massa sanguinea, tam ex sanguine, quam chylo permixta constans, per hos tracta, ex inspirato aere penetralla ejus subeunte, & mixta texturam salino-sulphuream dissolvente, insignè & maximè subitanè alterationem subit, dum insigniter rarefcit, indeq; intensiorem acquirit calorem, & ad volatilisationem ulteriorem insignem aptitudinem, simulque propter salia ipsius dissoluta & rarefacta in impetuosam abit fermentationem, sub qua particule massæ sanguinæ componentes, imprimis acidæ & urinosæ, in se invicem agere, mutuique concursibus se subigere, & exinde cum particulis sulphureis una permixtis incalescere, & propter salium volatilium cum sulphureis texturam rubescere incipiunt; spiritus enim & salia volatilia alcalia, si cum spiritibus sulphureis digerantur, tincturam suppeditant rubicundissimam: vid. **DAVIDIS** *Von der Beike Medus. & experimenta circa Rerum Naturalium Principia*. Quæ ipse sanguinis in pulmonibus inchoatæ alterationes continuantur, donec ad finitimum cordis ventriculum deferatur, exque eo per arteriam magnam in universum corpus, quamvis nempe ab aere suscepta alteratio persistit in eodem: Chylosæ verò portiones una permixtæ sub illo fermentationis motu & simili motu una subactæ & permixtæ, pedetentim ita alterantur, ut eandem sanguinè exactè assimilantur, promovente non leviter faciliorem assimilationem chyli cum sanguine, bile chyli in intestinis permixta, ratione cujus sulphuris & faciliorem cum sanguine unionem, & faciliorem in tincturam rubeam exaltationem



rationem acquirat; pari modo, ac salia volatilia cum oleis distillatis dant colorem rubrum. Dum hæc ita fiunt in sanguine, partes ejus tenuiores ac subtiliores salino-volatiles oleosæ, seu Quinta quidam Essentia, à crassioribus liberatur compedibus se extricant, magisque adjumento aeris volatilifantur & attenuantur, ac ita in veros spiritus animales & vitales perficiuntur; adeò, ut illa inspiratio aeris sit causa, sine qua non potest fieri sanguificatio, ejusque spiritus ascensio.

Cæterum chylus unico per pulmones & contrasitu in sanguinem abire nequit, ob brevem, quam ibi necesse est, moram: hinc evenit, quod si canis saginato post 4. vel 5. à pastu horis sanguis detrahatur, hic refrigeratus chyli lactescens ingentem copiam coagulo cruoris supernatantem exhibeat; si verò jejunum animal, aut plures horas impastum simili modo tractetur, nihil chyli in cruore apparebit, sed serum nudum aquosum, quod tamen coagulatum, dare solet gelatinam lacteam, nunc copiosam, nunc nimis copiosam, prout plus vel minus chyli in partium nutritione & sanguinis assimilatione fuerit absumptum: vid. *LOWERUS Traët. de Corde pag. 121. & 229. item in Vindictis Willisianis pag. 44.* id quod etiam facit spiritus natri dicto sero instillatus. Pertinet hæc gelatina illa albicans, quæ venæsectione emissio sanguini humano non rarè supernatat, & vulgò *pituita* vocari solet, reverà tamè chylus est nondum perfecte assimilatus; Unde etiam prostant tot Observationes sanguinis albi instar lactis ex venâ secta emissi etiam in sanis hominibus, ob chylum scilicet nondum ritè assimilatum: vid. *RHODIUS Cent. 1. Obs. 36. item Cent. 3. Obs. 33. BORRELIUS Cent. 1. Obs. 75. SCHNEIDERUS lib. 3. de Catarrhis pag. 101. &c.* Observavit etiam Dn. D. FRISIUS, sanguinem venæsectione emissum per 3. 4. vel 5. vel 6. dies nonnunquam coagulatum, in homine perquam sano, nempe muliere. Pro vario ergo usu & habitudine sex rerum nonnaturalium, prout hæc ipsæ sanguinis fermentationem vel intensiorem vel remissiorem reddunt, ita etiam chyli sanguini assimilatio nunc celerior, nunc tardior erit. Lympha evaporata relinquit gelatinam chylosam. Massa ergo sanguinea per vasa rapta tam chylo constat, quam sanguine propriè sic dicto, adeoque ex chylo in se homogeneo & univoco univocæ fermentationis actione nil aliud, quam univocus etiam sanguificationis generabitur liquor. Falsum ergo est, ex quatuor humoribus omnino inter se differentibus, quatuor Elementis, & quatuor Qualitatibus primis, quatuorq; temperamentis analogicis constare sanguinem: Nam & differentes istæ partes, in quas separatur massa sanguinea venæsectione emissæ, post sui coagulationem, non actu insunt sanguini, sed partim ab alteratione per aerem inducta fiunt, (tal nitrosum æreum sulphur sanguinis per san præcipitatur), partim à sanguinis emissi corruptione & incipiente putredine: conf. *LOWERUS Traët. de Corde pag. 155. item HELMONTIUS Tractatu Scholæ Humoralium Decap. Cap. 1. §. 46. & 47. item FRACASSATUS in Epistolis de Cerebro pag. 377. & 378.* Vanz ergo sunt omnes speciales ex sanguine emissio, prædictiones & judicia; Optimam autem utilitatem Tonforibus & Medicis afferunt: vid. *BRUNONIS Nota super Jessenii judicium de sanguine venæsectione emissio.* Sanguis enim in se licet homogeneus, & per totum similis, in unoquoque tamen homine peculiaritatem & singularem suam habet crasin, ex radicali ejus constitutione, & sub generationis primordius mixture oriundam, à qua omnis temperamentorum, ut vocant, diversitas & idiosyncrasia quamplurimè dependent; quæ sanguinis constitutio, & inde orta attributa in colore & consistentiâ unicuique propria, cum à nemine cognosci possit, sanè nec de sanguine venæsectione emissio, an multum, vel parum à statu naturali declinet, iudicari potest; imprimis, cum brevi post ob corruptionem & putredinis notam extravasatus ei, qui in vasis adhuc fluctuat, omnino fiat dissimilis.

Chylus legitime ac naturaliter constitutus totus abire in sanguinem aptus natus est in sanis: quod si verò hoc non contingat, sed vel proprio vel sanguinis vitio depravetur, partes ejus excrementitiæ per fermentationem separantur a partibus reliquis, & quasi præcipitantur, seroque imbibitæ & ab eo absorptæ partim per poros cutis, partim verò per urinarias vias seceruntur, quæ in sanorum urinis clari & optime aliàs coloratis circa fundum subsidere solent. Præsupposito, fermentari continuè massam sanguineam, illaque fermentatione chylum successivè & repetitus multis circuitibus sanguificari, sanguificatio hæc, & ipsa etiam massæ sangui-

nez fermentatio, duobus imprimis lèditur modis: nempe vel vitio chyli, vel denique vitio ipsius sanguinis. Vitio chyli lèditur, quando ineptus est, ut exinde fiat sanguis per assimilationem fermentativam: vitio verò sanguinis inepti, quatenus sibi laudabiliter non assimilatur chylum.

Primaria, & ferè ordinaria causa querenda est in chylo: hinc enim cacochylia est cacochymia mater. Chylus enim, ut ex eo fermentando fiat laudabilis sanguis, debet esse salino-volatilis subdoleis, & consistentiæ tenuioris lactis, seu potius feri lactis tenuioris, simulq; sulphure bilis rubineo sufficiens, licet insensibiliter propter admissum acidum, quod omnia reddit pallida, tinctus, ut hoc ipso sulphure factilius uniatur sanguini, & promptius calefcat: debet etiam chylus legitimus à scoris feculentis in intestinis esse separatus: conf. *SYLVII Praxis P. 1. cap. 18. & 19.*

Histibus ergo in specie fontibus chylus peccat, & ab istis Cacochylia dependet: nempe

1. Dum non sufficienter digeritur & attenuatur, nec debite volatilifatur in stomacho.
2. Quando non ritè dngitur à bile, ejusque sulphure oleoso.
3. Quando non ritè seceruntur à scoris beneficio succorum, fellei & pancreatici. Hinc præter alia peccata in stomacho frequenissimum simulque gravissimum vitium chyli est, quando non ritè digerendo volatilifatur, sed est nimis fixus & viscidus, & quod eo pejus, ab in eruditatem acidam; unde prigo quamplurimorum morborum chronicorum ex stomacho: Nam tali chylo vitatur massa sanguinea insigniter, immittitur ejus fermentatio, & spiritus ascensio; deinde tali succo infarciuntur partes solidæ potius, quam reverà nutriuntur.

Potè cum insigniter varient & bilis & succus pancreaticus in sua crasi, facile patet, variam etiam chyli in intestinis à scoris esse secretionem, nunc laudabiliorem, nunc pejorem; unde nunc vitiosus, nunc laudabilis massæ sanguineæ chylus transmutatur: de quibus supra.

Hæc sunt causæ, quæ lædunt massam sanguineam vitio chyli.

Massæ sanguineæ vitio lèditur sanguificatio, quando ipsa massa sanguinea deficit à naturali ac debita crasi feminalli, unicuique individuo propria ac peculiari. Nam certum est, unumquemque hominem singularem ac sibi peculiarem obtinere massam sanguineam; quæ proprietates & singularis crasis ex particularum seu principiorum naturalium componentium varietate & crasi resultat: Unde tam multa syncrasia, idiosyncrasia & proprietates emanant. Dependet hæc crasis massæ sanguineæ formaliter, ut dixi, à particularum seu principiorum naturalium massam sanguineam componentium ad se in vicem habitudine: radicaliter verò & effectivè dependet à parentibus, à quibus sub conceptione & prima corporis fermentatione, ratione spiritus generallis, in fœtum transplantatur. Uti enim dispositio morbofa & crasis vitiosa communicatur à parentibus, ita simili ratione craseos naturalis fundamentum etiam ex semine ejusq; spiritu vitali petendum.

Hæc inter principia materialia, quæ component sanguinem, & ejus constituent crasin, eminent particule salinæ, urinosæ, & acidum volatile, intercedente sulphure seu oleo temperato invicem mixtæ, à quibus continuo & nunquam interrupto, simul tamen blando fermentationis motu, sanguificationis fermentum, indeque ejus in spiritus transmutatio & chyli assimilatio dependet. Denique hoc pacto, beneficio fermentationis nempe, siquid est, heterogeneum in tota massa sanguinea, excluditur & separatur, ut per convenientia cribra transcolatum ex corpore evacuetur. Vitia ergo sanguinis crasi, & salium debita alterata à proportione, vitatur etiam & depravatur naturalis ac vitalis sanguinis fermentatio &c., vitatur chyli assimilatio, ac denique vitiosi succi massam sanguineam inquinant. Fermentatio hæc lèditur ac vitatur multis modis, in genere nunc

1. Cum quodam excessu, vel periculosa quadam effervescentiâ: id quod deprehenditur in pulsu magno, celerè & frequente, cum insigni ut plurimum corporis incallescenciâ & ardore, ut imprimis in morbis acutis aut febribus ardentibus, pleuritide & similibus obvium est: nunc
2. Vitatur fermentatio massæ sanguineæ, cum quodam defectu, unde pulsus parvi, rari & tardi percipiuntur, corpori debitus deficit calor, totum corpus est torpidum & segne, & insignis spirituum percipitur defectus; id quod in chronicis morbis, cachexiis, & similibus apparet: nunc



3. Variis modis depravatur fermentatio, quare pulsus tantum non in his mutatur, ut fit in scorbuto, malo hypochondriaco in veterato, paroxylis febrium intermittentium, passionum hysteriarum & similium; in quibus multiplices pulsuum inaequalitates percipiuntur.

Pro varietate ergo istarum in fermentatione massae sanguineae differentiarum quamplurimarum sentiles corporis mutationes oriri solent: unde corpus nunc calet, nunc friget, nunc patet, nunc rubet; alvus nunc est clausa, nunc laxa; & similia symptomata, quae hypochondriacos & scorbuticos in horas fatigant.

### DIAGNOSIS.

*Signa*, quibus sub modo proxime cognoscitur fermentatio sanguinis laesa, sunt pulsus & urina: Ille statum sanguinis fermentantis, & exinde intra arterias ebullientis ostendit; de quo vid. SYLVIVS lib. 1. *Praxeos* cap. 26. Hic vero statum sanguinis ex dicta fermentatione resultantis declarat. Fallit tamen utrumque interdum. Nam, ut taceam de febribus malignis, pulsus subinde mutatur ratione spirituum animalium cor mouentium; hinc enim in animi affectibus insignis est pulsus mutatio, quatenus immediatè haerent in spiritibus animalibus: Simus ergo cauti, ne neglectis talibus fallamur. Urina verò fallit, quia duplex est: nempe urinæ potus, & sanguinis. Jam urinæ sanguinis licet monstret signa clara sanguinis, tamen ob admixtam urinam potus minus alteratur; item propter admixta varia, ex laxatione partium urinaryarum enata.

### CAUSAE.

*Causae* itaque, à quibus vitatur hæc sanguinis fermentatio, sunt omnia ea, quae efficiunt, ut salia ista, acidum & vitiosum, debitam non observent armoniam vel proportionem, nec cum reliquis particulis texturam. Quomodo vero, & quibus modis sal volatile urinosum seu biliosum, acidum seu melancholicum, in corporis animalis succis, & hinc in sanguine alterentur & vitentur, supra dictum est, ubi fundamenta generalia tradidi; item patent hinc inde in lib. 1. *Praxeos* SYLVII.

Inter causas verò, quae salia afficiendo sanguinis crasin laedunt, eminent varia contagia, quae ceu tor præternaturalia fermenta massae sanguineae inquinant, & imprimis omnia extrinsecus haerent, sive immediatè cum aere inspersione, sive mediante certo fomite corpori admoveantur. Miasmata enim fermentando massam sanguineam turbant, in eaque hoc modo se multiplicant; unde postmodum malorum contagia corpus affligunt, & se ulterius propagant. Si quid aliud, sanè contagia ex corpore morbofo aut aëre hausta, massae sanguineae statum insigniter turbant: Quibus & viscerum, sanguinis depurationi aut perfectioni inservientium, labes ac neglecta officia accedunt. Ab omnibus his massae sanguineae textura ac crasis plus minus præternaturalis redditur, quia atteruntur salia, quae exinde novos quasi sapores adsciscunt, & ita fermentationem turbant.

Quoad *Causas remotas*: Fermentatio sanguinis vitatur, si præcellerint hæmorrhagiae: unde non ritè peragi potest. Ex laefactis etiam visceribus potest vitari sanguis, quando illa de legitimè non habent, obstructions ibi & schirchi, aliaque mala adsunt; unde consequenter defectus fermentationis oriuntur.

Sanguine ergo his modis ita vitiato, aut vitiosis fermentis inquinato, adeoque salium debitam proportionem corruptam, non tantum chylus perversè assimilatur; sed propterea quoque totum corpus ac quælibet ejus partes exinde plus minus inquinantur: qualis namque sanguis, talis etiam est totius corporis habitus vel status; qui sanguis tunc modò est calidior, modò frigidior. Exinde enim omnia ea fiunt, quae de temperamento partium vitali earumque intemperie vulgò dici solent, ut illorum ratione hic ad hunc vel istum morbum inclinet: v. g. dum quidam ratione temperamenti ad morbos melancholicos, chronicos; alius ratione temperamenti cholerici ad affectus acutos febriles dispositus dicitur. De his temperamentis, quae originem ex elementis deducunt, nihil dico: Nam temperatura & intemperie fundamenta sufficienter sunt destructa; Quaternio nempe elementorum & calor nativi monarchia. Quaternionem explosit BOYLE in *Tract. de Qualitatum Origine*; & Calidi nativi Monarchiam HELMONTIVS, qui evincit, quod scilicet calor non effectivè,

sed dispositivè tantum cooperetur. Nam, quod propriè Temperamentum sit vitale, optimè explicat MARCUS MARCI P. 2. *Philos. vet. Rest. Sect. 4. pag. 138.*, dum inquit *Per Temperamentum non intelligi primas Qualitates, non bonum symmetriam: Verum constitutionem cujusque radicalem, ex qua velus effectus procedunt dicta Qualitates, cujus radicalis constitutionis potissima vis est in sanguine, qui est proximum subiectum animæ, ac primum vivens, cujus gratia corpus univèrsum videtur factum, vitæque ex eo participare: Humidum verò radicale aut sanguis est, ut vult HARVÆUS, aut certè in eo radicatur, & corpus sanguine destitutum confestim friget, nihilque in eo manet de Temperamento.* Hactenus MARCUS MARCI.

Hæc ita se habere patet ex legibus circulationis sanguinis, & æquali etiam sanguinis distributione in partes proportionaliter facta, quae omnia ex sanguinis crasi, & hinc dependente motu fermentativo, & inde oriundis proprietatibus variis, tam sanguinis, quam corporis, proximè deducenda sunt: quàm diu enim debita manet sanguinis crasis, & hic debita fermentatione incalcescit, non potest non totum corpus, ejusque partes omnes æqualem & proportionatam habere temperaturam. Unde patet falsam esse istam *in æqualem temperiem calidam hepatis & stomachi frigidam*, quæ ut nihil potuisset fingi insulsius, ita tamen in Practicorum & Consultationum libris nihil occurrit frequentius; quin tamen in tali ut plurimum, si non semper, vitium est in stomacho. Sanè, dum sanguis nimium incalcescit, v. g. ex motu, vel febre, &c. omnes partes intensius calent; dum is naturæ, vel senio, vel morbo, tepidior existit, similem temperiem vitalem, nempe influam, quælibet partes experiuntur. Tanquam paradoxon caliditatem sanguinis nimiam, acutis præsertim in morbis notabilem, consideremus, quæ quidem ex aucto motu fermentativo omnino derivanda venit, sed primariò ob acidum volatile, intensius cum alcali oleoso ebulliens, adeoque à bile naturaliter seu subiectivè, ab acido formaliter seu effectivè: dum verò minus fermentescit & est intemperica frigida, id fit ex abundantia acidi; idque eo magis, ubi chylus viscidus massam sanguineam imprægnat. Propterea & aromata, & similia calefacientia, salia volatilia oleosa, spiritus, vin., olea destillata, &c. calorem corporis accendunt non, nisi ratione volatilium acidi, communicabilis contentis corporis nostri, illique assimilabilis; è contrà Acida mineralia, calorem temperant & imminuunt, ac per consequens refrigerant; id quod figendo acido suo intensiore, nobis non, communicabili, motum humorum & acidum volatile subjugando, præstant, unde cessante debito fermentativo motu, caloris remissio observatur. Sed eo ipso, quo nobis non assimilabilia, aut contentis communicabilia existunt, remedium, imò sub inconcinna dosi veneni, naturam assumunt, & hinc alterata in corpore nostro plus minus, per vias urinaryas eliminantur. Hinc in quibus acidum fixius quasi, adeoque constitutivis nostris præternaturale, exsuperat, ut in Hypochondriacis, melancholicis, mensibus deficientibus, præsertim cum concursu pituitæ viscidæ, & defectu bilis acrioris, frigidiores observantur; adeoque volatile acidum spirituosum, contentis nostris commiscibile, & quod horum fermentativum motum promovere potest, quò plus activum existit, eò intensius calere corpus observatur: è contrà acidum fixius, quod subigit & figit illud sal volatile acidum, & ita contentorum fermentativum motum plus minus inibet, frigoris & imminuti in sanguine caloris Author existit. Certè omnis rerum calor spontaneus ubique sequitur motum intestinum particularum minimarum formaliter, acidi verò agentis in terream plus minus alcalinum effectivè: in ipso igne adurendi vis ab acido reverà oritur: Caloris vivæ incalcescentia ab acidi activitate dependet.

Hinc in omnibus morbis intemperiei calidæ mirè commendantur Acida volatilia, qualia sunt: succus citri, ribium & berberum, acetosæ, acetosellæ, & rubi ladi; spiritus salis, nitri, vitrioli; hepaticum tubeum, & similia acida; propterea, quoniam acida præceteris corrigendo sal volatile oleosum, simulque massam sanguineam blandè condensando, effervescentiam nimiam inibent; è contrà in intemperie frigida, ubi sanguis minus fermentatur, commendantur aromata salia volatilia oleosa, uti sunt omnia aromata, spiritus ardentes volatiles, extracta vegetabilium amarificantium, & quæ sunt similia alia.

### CURA.

Quoad curam, quæ massa sanguinea, ejusque crasis laesa, & consequenter ejus fermentatio mutata, propter salia à naturali



naturali constitutione degenerantia, corrigatur aut emendetur, ea sit per remedia virtute saluta operantia; in quo negotio imprimis observetur sapor specificus crasin sanguinis plus minus vitians, ut proximè per specificum remedium curari queat. His de remediis *suprà in generalibus*, ubi de dyscrasia sanguinis corrigenda egi, dictum est; & in specie conferri potest SYLVIVS lib. 1. *Praxios* cap. 18. 19. 25. & 26., qui metetur de hac materia ut legatur, modò corrigatur fundamentalis ejusdem hypothesis dubia, aut verius manifestè falsa, de motu bilis in sanguine sursum ad cor, & hujus alcalinæ cum occurrente lymphæ acidulæ effervescencia deleatur, & saltem illorum mutatorum aut alteratorum operationes chylo & sanguini plus minus immutatis applicentur, tunc egregium usum pro facilitanda Praxi habere possunt.

## CAPUT I.

## D E

## FEBRIBUS IN GENERE.

**A**D vitia sanguificationis læsa, seu effectus ejusdem, pertinent suo modo febres quæcunque, quarum doctrina maximè necessaria, & tantum non fundamentalis; cum nullo detur morbus ferè, qui non sit conjunctus cum febre, adeo, ut in proverbium abierit: *Vix sine febre mori*? Dicitur autem Febris à Februo, quod à Ferreo deducitur, vid. SENNERTUS de febribus c. 1. German. dicitur *das Fieber*. Quod communior autem morbus, frequentiorque est febris, eò intricatiorem esse ejus Theoriam, & consequenter empiricam in plurimis esse Praxin, confirmat scriptorum Medicorum dissensus; ita, ut ne binos quidem exactè sibi consentientes in hoc puncto inveniat, ut propterea ab alio in jisdem etudiri potius, quàm sententiam meam proferre, aut alios informare vellem. In qua tamen doctrina pertractanda me ita geram, ut propter amplitudinem materiæ non ceram tempus refutationis illorum, quæ Authores hinc inde dicunt; sed ea, quæ fieri poterit, brevitate, seposito omnium partium studio, quæ nostra sunt, h. e. Practica, imprimis considerabimus, pro Theoria hypothesin eligendo talem, quæ mihi videtur probabilis, & Praxi facilius accommodari potest, adeoque præ cæteris Medico utilis existit. Quod si tamen quis alius memet ipso accuratius rem tetigit quoad Theoriam & Praxin, ut SYLVIVS vestigiis insistat, horror. Ego reliquis ferè omnibus antepono vobis quo commendo eum, qui certè solus & facile & accuratè tractat Februm doctrinam, & quæ dicit in Theoria, sunt talia, quibus Praxi facillima & quasi manualis & ocularis potest superstrui, ut ut in omnibus mihi non sufficiat: Videatur *ejus Praxi*, legique potest GRAFFIUS de *succo pancreatico*, ubi quædam habet ex hypothesibus Sylvianis de Febribus; item *privatum Collegium SYLVIVII excusum cum Tract. Hoffmanni de usu lenis* &c., quod quidem non vult pro suo cognoscere. Et verum est, nimis confusè tractantur omnia in illo; inter unum tamen plurima continet SYLVIVIO digna.

Definitur autem febris, quod sit actio fermentationis massæ sanguinæ depravata, in qua totius massæ sanguinæ crasis depravatur; unde toti corpori multa eveniunt incommoda. Dependet autem à fermento quodam naturalibus plane incongruo: Vid. KERGERUS de *Fermentatione* S. 3. cap. 3. pag. 332.

Loco Generis posita est actio depravata fermentationis massæ sanguinæ, quo sensu febris non referenda inter symptomata; cui verò hoc genus displicuerit, ille definat Febrim per morbum intemperiei. Nam quatenus fermenta à naturalibus aliena subintrant in sanguinem, necessum est, ut hæc ipsa massa sanguinea etiam degeneret in alienam à naturali temperiem. Hoc pro diversitate fermenti febrilis varia etiam est massæ sanguinæ dyscrasia; Quare in immensum prolapsi sunt errorem Veteres, indifferenter definientes febrem per intemperiem calidam. Nam, ut ut verum sit, in multis febribus deprehendi calorem quandam excessivum, attamen experientia constat, sæpius contingere & febrem absque notabili calore, ut *infra patet*.

Inter omnia concomitantia symptomata immediatè, nullum magis universale existit, quàm *pulsus notabilis mutatio*. Et speciatim februm presentia ex nullo melius potest cognosci, quàm ex pulsu nimis frequenti præternaturali; febrium enim exactè monstrat, Dico autem, pulsum debere esse

præternaturalè frequentem, nunc magis, nunc minus, magis scilicet in paroxysmis intermittentis: habemus siquidem & pulsum nonnunquam frequentem in junioribus; sicut & præter hunc, nonnunquam frequentem post usum vini generosioris, itemque post motum corporis & nimia exercitia observamus. Ubi verò citrà manifestam causam pulsus est nimis frequens, à causa interna præternaturali ortus, rectè signum februm pathognomonicum quæcumque statuitur, cui postmodum adjuncta symptomata varia certam Februm speciem determinant. Hæc est sententia SYLVIVII, quam, licet frustra, reicere conatur DEUSINGIUS, juratus Sylvii hostis, in *Tract. Disquisitio Anti-Sylviana de Signo februm pathognomonicis*, ubi manibus pedibusque vult refellere doctrinam SYLVIVII, sed frustra laborat. Conferantur hoc præter Praxin SYLVIVII binæ *ejus Dissertationes de Febribus*. Attamen in febribus malignis non video, quomodo negantem hanc sententiam Sylvianam SYLVIVIVS possit nominare hospitem in praxi; siquidem id ipsum quotidie experimur, signum pathognomonicum esse, quod uni soli convenit morbo, quò possidè, ponitur morbus. Accedit ut plurimum *celeritas*, unde celerem pulsum seu inseparabile cujusvis febris signum, & quod nunquam abesse potest, statuit PIENS de *Febribus* P. 1. C. 2. pag. 12. Communiter statuunt Authores, calorem præternaturaliter augmentum esse *essentiam februm*, eatumque *signum proprium*, definitientes eandem per calorem in corde accensum, & hinc in totum corpus per arterias diffusum. Verum rectè hoc negat SYLVIVS, cum dicit: Calorem nimium nullo modo esse de formali ratione febris, quia nec soli, nec omni, nec semper febrim conveniat.

Quatuor primaria in omnibus febribus observabilia sunt symptomata:

1. Muratus pulsus.
2. Frigus, horror & rigor.
3. Calor seu æstus plus minus intensus.
4. Urina mutata, tam secundum liquorem, quàm secundum contenta.

Quod attinet frigus & æstum: hæc non constituunt essentiali febris, sed ejus saltem seu producta, seu consequentia symptomata; ita, ut nunc conjunctum, nunc separatim, unum solitariè dominetur. Originem ducunt à duplici sale activo, acido nempe & urinoso, quæ fermentando & effervescendo intensius æstum inducunt, majorem vel minorem, prout oleola magis seu pinguis & volatilis massa sanguinea extiterit: e. g. spiritus vitrioli, si cum oleo terebinthinæ destillato miscetur, effervescencia fit intensissima cum ardore summo, propter sal volatile in oleo terebinthinæ concurrentem cum acido vitrioli, uti exposui supra, ubi de Soda.

Æstus ergo omnis occasionaliter fit ab acido, sanguinis crasin immutante, & inde fermentativum: jus motum, hinc spirituum alterationem, & majorem incalescenciam & fervorem inducente; Cum ipsi spiritus, forsan certi volatilis ac subtilis acoris ratione, caloris sensum in animalibus undiq; diffundant, quod tamen ulteriori considerationi relinquo. Et quidem eæ febres, in quibus sanguis simul alteratur, & ad motum insigniorem fermentativum præternaturalem disponitur, intensiore æstu comitatur esse solent; remissione, quæ primariè ex spirituum alteratione accidit.

Peccare autem in intensiore corporis æstu, adeoque in febribus, primariè acidum, probatur partim, partim illustratur sequentibus.

1. In vulneribus & ulceribus, & hinc dependentibus febribus symptomaticis, vinum & quælibet acida nocent; quia inflammationem in vulnere & æstum febrilem in corpore intendunt. Quæ omnia præservantur & curantur internè per lapillos cancrorum & similia, & per externa Saturnina, acidum imbibentia. Est enim Saturnus Chirurgorum Patronus, vulnere & ulcerum pathemata ab acido enata curans; non secus ac caput mortuum vitrioli vulnere corruptionem tollit, ut loquitur HELMONTIUS, acidum imbibendo & corrigendo.
2. Pleuritides, Anginæ, & quælibet inflammationes internæ, tam in principio, quàm in progressu, ad suppurationem tendunt, febri continuam acutam junctam habent, h. e. æstum continuum intensum. Jam verò morbi hi extra controversiam ab acido originem ducunt; hinc per acidum absorbentia remedia promptissimè curantur, v. g. dentem apri, maxillam luctu pulvis, salia volatilia quælibet, stercore equinum, &c.
3. Erysipelaceæ alæque spontè sua, & à causa interna enatæ



- enatae inflammationes cum aestu & ardoris manifesto sensu, & non raro gravi juncta febre cum externo ardoris & ruboris perquam sensibili indicio, ab acido originem ducunt; hinc praeter interna modò dicta, similia externe conducunt, acidum illud absorbentia, v.g. creta, cerussa, antimonium, & epithemata Saturnina, lac virginis &c.: ablato per hæc in erysipellate acido, juncta febris pariter evanescit.
4. Intermittentes febres ex acida viscida stomachi cruditate originem obtinent: hinc alcalia etiam, tam fixa, quam volatilia, ut sal absinthii & spiritus salis ammoniaci, quam Testacea, ut ostracoderma, & specificum febrile Crollii & Strobelbergeri, quæ illas curant, & paroxysmi ferientium acidum tollunt: in Quartanis speciatim Murtalia & Saturnina, intensius acidum absorbendo, conveniunt.
5. Febres catarrhales dictæ à lymphæ acrimonia originem ducunt, quæ quò acidior fuerit, eò intensiorem cephalalgiam, ferinam magis tussim, lancinationes artuum graviores, & speciatim intensiores aestuationes vespertinas & nocturnas & febres infert: Unde & volatilibus, spiritu salis ammoniaci, imprimis anisato, liquore cornu cervi succinato, optimè curantur, acidam lympham corrigendo, item Opiatis vitiatum lymphæ motum suspendendo.
6. Variolæ, non lecus ac morbilli, intensissimum æstum junctum habere solent, qui erumpentibus istis cessare consuevit. Acidum autem in variolis peccare, praeter symptomata ab acidi acrimonia & erosione nata, v.g. suppuratio cutis, in foveas erosio, interdum ossium caries, pulmonum exulceratio; cum per absorbentia, per invertecia, salia volatilia, Tincturam Antimonii, &c. abunde confirmat.
7. Arthritis quælibet, praesertim vaga, & hinc etiam fixa, nisi hæc nimis inveterata fuerit, cum febrilibus symptomatibus minus ingruit, & praeter æstum, in vaga subinde admodum intentum, pulsum celerem & frequentem excitat; scilicet Acidum, uti in Arthritide dolores excitat, ita & æstum & ardorem infert febrilem; unde & acido devicto, dolores evanescent, & ardores extinguuntur. Confer. TACHENIUS *Hippocrate Chym. Edit. 2. pag. 417.*
8. Febres istæ, quæ ex retropulsa vel scabie adultorum, vel achoribus infantum oriuntur continuæ, & subinde admodum periculose sunt, in infantibus etiam usque plurimum cum diarrhœa junctæ, ab acido salto plus minus viscido originem habent, adeoque superiora confirmant.
9. Febris lenta quasi hectica, ex ulcere partis cujusdam internæ, speciatim pulmonis, nata, & à sanie putulenta originem habens, id confirmat. In sanie autem putulenta acie imprimis considerandum, & hoc urinosum, sed acido-salsum; hinc læta sanguinis crasi vitatur ejus fermentatio & aestuatio.
10. Infantes ferè tormina patiuntur ex acido lactis vitiatro, cujus testes sunt excreta viridia, item semigrumosa: hæc si diutius durent, sequitur æstus febrilis totius corporis; interdum satis contumaces quoque iidem occasione acidi excitatæ superveniunt convulsiones: sed destructo acido in primis viis per absorbentia & volatilia, omnia ista cessant.
11. Urinæ videntur id illustrare. Hæc in febribus intensius tinctæ & perquam rubræ observantur, & quò intensior vexat æstus ægros, eò magis flammeum & rutilantem contrahunt colorem, nisi turbentur. Declinante febre, ac deservescente æstu, naturali citrino colore denudè apparent. Intensiorem hunc colorem ab acido esse, mechanica Chymica docet, cum ab acidis instillatis, spiritu vitrioli, nitri, sulphuris, salis, etiam aceto, urinæ intensius rubescant, quæ ab alcali, oleo tartari per deliquium, lixivio cinerum clavellatorum, &c. aut nonnihil pallescunt, aut saltem nullam in calore mutationem patiuntur. Scorbuticorum urinæ subinde intensissime tinctæ sunt absque febrili æstu, ab acido saltem luxuriante, urinam ita alterante.
12. Symptomata, quæ à vini abusu, v.g. Rhenani, accidunt, ex acido tartaro volatili imprimis originem ducunt: v.g. orexis, æstus corporis, cephalalgia, pulsus febrilis, &c. similia ferè symptomata febrium: hinc spiritus salis ammoniaci, vel pulveres præcipitantes, os lepro, vel lac ipsum ista compescit.
13. Aestuationes vagæ & phlogosæ, quæ hypochondriacos sæpius affligunt, ex effervescencia in primis viis, ab acido primario excitata, originem ducunt: Hinc Præcipitantibus dictis, coralliis, ebore, alcalibus fixis, &c. ferè curantur, & correcto acido emendantur.
14. Similia observare possumus in soda seu ardore stomachi; æstus ille ardorque unde, nisi ab acido? hinc acido hoc Præcipitantibus correcto, soda etiam evanescit.
15. Considerationem etiam meretur, quod TACHENIUS in *Hippocrate Chym. cap. 18.* remedia Vegetabilia calida, acido prædominante; frigida verò alcali superante dari asserit. Sanè calida omnia, resinolam substantiam obtinent, eamque acrem, in qua vis calefactoria residet, adeoque oleosa substantia ab acido concentrato gaudet. Hinc resinola vel liquefacta in oleo, vel destillatione resoluta in spiritum ardentem, intensè calefaciunt. Porro oleum destillatum cornu cervi auterebinthinæ, in forma propria assumpta, calidissima sunt; per digestionem verò cum alcali fixo in sal volatile mutantur, quod macrum (scurum) nec oleolum, nulla caloris vestigia exhibet, calido i. e. pingui acido in sale fixo remanente. Sanè sæpius observavi in febribus intermittens æstum & ardorem ex usu spiritus salis ammoniaci simplicis, ante paroxysmum exhibiti, multum remississe.
16. Illustrat negotium nonnihil, quod ardoris iste sensus, qui post combustionem ab ignitis subjectis remanet, sit ab acidi spiculis, in parte læta relictis. Unde per Saturnina, per alcali animalium, (permanantia), utinam humanam, spiritum salis ammoniaci, &c. proximum levamen & refrigerium.
17. Videtur ergo æstus oriri occasionaliter ex acido præternaturali, volatili tamen, seu tali, quod sanguini commiscibile nonnihil naturalem ejus fermentationem turbare, & cum particulis alcalinis & oleosis præternaturalem quasi effervescenciam constituere possit. Sub qua & ipsi spiritus geniti aciores quasi, hincque calidiores & fervidiores existunt, à quibus cum sanguine per universum corpus ex præcordiis calor diffunditur.
18. Equidem plures ex bile ardoris rationem, tam naturalis, quam præternaturalis febrilis, derivare amant. Sed (1) an bile oriatur ardor iste? dubium est. (2) Posito, ex bile cum oritur, quantur, quæ ratione fiat? an magis ab ejus oleo, in recessu acido volatili imprægnato, an verò ab alcali (liquidum id extra artis opem bilis formaliter possidet) ejus origo sit? Unde (3) in febribus intermittens, quæ quasi tot continuæ sunt, quot paroxysmos habent, amara, resinosa, bili magis analoga, & hinc alcalia volatilia tam proficua sunt.
- Observetur autem hic calor duplex in febribus differentia:
1. Est vel humidus vel siccus.
  2. Est vel mitis vel acris.
- Humidus* seu *vaporeus* aliàs dictus semper melior est siccus. Oritur à juncta copiosa transpiratione, quæ ferè præsupponit cutem mollem, & cujus fibræ minus sunt tensæ, & obsequit talem febrilem in sanguine commotionem, quæ copiosè secedant, & mediante sero emittantur particule heterogenee separatæ seu coactæ.
- Contrarium fit in *siccò calore*, quo cutis arida & quasi squalida deprehenditur, ac inordinatam particularum in sanguine fermentationem, & insignem confusionem spirituum, præsertim animalium, præternaturali impetu fibras plus minus stringente, innuit. *Mitis calor*, vel acris sem mordax, crasin sanguinis & spirituum sequitur, qui minus actioribus particulis salinis, præsertim acidis effervescens turbidus, mitiorem; sed copiosioribus aut acrioribus jisdem sit imprægnatus, acrem, ad tactum mordacem, tanquam si igneæ particule tactus se insinuant, calorem repræsentat.
- Frigus, horror & rigor, non nisi gradualiter differunt. Frigus quod attinet: non rarum est, quod febricitantes conquerantur de frigore, & multò magis de horrore, utur ab alio calidi obfer ventur; aut licet extremæ manus partes, pedes & nalis, frigus actuale contrahant, item pallescant, ac ungues livescant, corpus tamen ipsum calidum plus minus observatur: nempe membranosarum saltem partium pathemata hæc ita sunt, quæ ab acido febrili vellicata motus convulsivos patiuntur. Unde proborum gradualis differentia, si leviores sunt, & vix tali appellatione digni, quibus saltem



saltem sic cutis asperitas, frigoris sensu interdum imponunt ægro; si graviores sint, ita, ut sensibili convulsione quatantur membra, & per consensum simul nonnihil afficiantur rhintuli, Rigor existit; medio modo si se habeat, horror dicitur. Sanè interdum tam gravis est rigoris insultus, & tanta convulsiva membrorum extremorum & totius corporis convulsatio, ut epileptici similes concutiantur. Frigus hoc oritur ab acido, dum acidum, quamdiu suo modo præponderat, coagulando sanguinem, & ejus motum quodammodo sistendo, & quidem primariò vellicando partes nerveas membranolas corporis nostri, in specie circa præcordia, horum spasmos & convulsivam vibrationem inducit, quæ sub forma frigoris, item horrores percipitur, ut in Quartanis.

Afficiuntur autem sub hoc rigore qualescunque sensiles membranæ, non panniculus saltem carnosus, quæ plurimum est opinio, sed etiam aliæ quævis membranæ, tam abdominis quàm viscerum interiorum, ventriculi nempe, intestinorum, mesenterii &c., & aliæ quævis. Cum enim sentiendi vi polleant exquisita, si ab acro, in specie ab acido, irritentur, rigores fiunt. Nam, quod obiter insinuo, omnes membranæ conspirant & consensum fovent, quatenus oriuntur ex membranis cerebri, unde & omnes cum cerebri membranæ consentiunt; si nempe una illarum convulsivè qual patitur, totum nervosum genus in consensum trahitur: de quo membranarum consensu vid. *Anonymus in Tractatu Anatomie Cerebri Willisiana annexo*. Hinc in colicis doloribus rigores frequenter accidunt. Abscessus item quilibet interni, dum rumpuntur, & ita membranas, quæ eas ambiunt, perfodiunt, Rigores superveniunt. De hoc vid. pluribus tractans PIENS *Tractat. de Febribus Part. 1. cap. 7. pag. 254. tr. sequen.* Sanè rigores & horrores, qui interm. nientium inchoant paroxysmos, non nisi ex præcordiis seu partibus membranosis in primis viis affectis excitantur, ut rectè docet FERNELIUS *Pathol. lib. 4. cap. 10. pag. 248.*; quod etiam de his asserendum, qui in principio febrium continuatarum contingunt. Illi verò, qui in continuatarum febrium cursu, tam benignarum, quàm malignarum, accidunt, & præsertim circa statum morbi affligunt, ex irritatis & hinc quassatis partibus membranosis externis, interdum & subcutaneis, serè contingunt, & in febribus benignis sudoris, præsertim critici, prænuntii sunt; in malignis verò excretionis intercutaneæ, purpuræ, pustularum & similium sunt indices.

Ex dictis pater: attendendam esse naturam, & efficaciam salium, eorumque mutuam consensum fermentativum, & effervescentiam, cum ex hac salium activitate & mutua actione, utur instrumentaliter, tota febrium Theoria & Praxis deducenda sit: Conf. nobilem POTERRII *Encheiresin lib. 1. de Febr. cap. 23. pag. 29.*, ubi salia allegat in massa sanguinea reperibilia, quæ confusa insignem effervescentiam concipiunt.

Non ergo est de essentia Febrium Calor, sed tantummodo symptoma consequens ut plurimum febrium: sicut hoc vrgit HELMONTIUS *S. 4. cap. 1. Tractat. de Febribus*; Ubi producit castrenses Febres, quæ citra solum, & manifestum calorem accidere, i. e. quæ ab initio, ad finem vitæ quoque, absque calore suam peragere tragediam: sicut & in principio continuatarum febrium & paroxysmorum interm. nientium horror & frigus invadat ægros, nullo præterente calore. (2) Nec convenit soli febr. calor, cum alias etiam multis in affectibus intendatur calor, ut ut non semper adsit febris: quin & dantur febres malignæ, in quibus nil minus quam calor est molestus, cum pulsu ut plurimum frequenti & debili, parvo & tardo; quæ tamen sunt omnium pessimæ & lethales: contra notum est in febribus interm. nientibus, calorem & frigus promiscuè apparere solere. (3) Nec omni convenit febr. calor, quia dantur etiam febres planè frigidae, quæ frigore & rigore plius minus molestæ sunt absque æstuatione superveniente. Paradoxon hoc videbitur multis; exempla tamen aliquot videb. in Sylvii *Disquisit. 9. de Febribus S. 13. pag. 167.*, quod nempe observari sint ægri, & suo & adstantium consensu febricitantes, utur ipsis nihil unquam caloris, neque ante neque post paroxysmum, accesserit, frustra se opponente DEUSINGIO in *Disquisit. Anti-Syfoiam: S. 52.* Conf. de tali febre frigida BARTHOLINUS *Centur. 3. Epist. 293. 296. 302.* KERGERUS de *Fermentatione Scit. 3. pag. 229.* & HELMONTIUS loco jam citato. Nec ratum est, febres intermit-

Estmuller. Oper. Tom. II

ientes diuturnas solo frigore, & aliquali rigore statim temporibus invadere, sine eo, ut nullum vel levissimum vestigium æstus superveniat. Quinimò in lectione veterum subindè etiam exempla prostant observatarum febrium frigidarum, non tantum in HIPPOCRATE, sed etiam AVICENNA, qui AVICENNAS affirmat, dari febres frigidas absque calore; loca AVICENNAE & HIPPOCRATIS allegata prostant in ROLFINCIO de *Methodo curandi & recognoscendi Febres in genere cap. 13. pag. 636. 737.* Erupit etiam GALENUS jam suo tempore observavit horrores & rigores febriles absque ullo subsequente calore, ut videbitis allegatum in *Observationibus SCHENCKII lib. 6. Observ. de Febribus pag. 636. & 757.* in specie, aliisque Practicis; quinimò similia exempla in Praxi quotidie occurrunt. Exemplum febris talis frigidae & mihi aliquando contigit observare mense Aprili hujus Anni in viro scorbuto, quales sunt ut plurimum nostri febricitantes, quod exemplum pro meliore fide huc lubet adducere.

Erat hic Artifex, qui laborabat perfectà tertianâ, seu recurrebat febris tertianâ quoque die, anticipando semper duabus horis cum nullo subsequente calore. Quoad constitutionem subjecti, patiens erat insignis scorbuticus: paroxysmus ingruerat maximo cum rigore, & gravissimo horrore, ultra horam integram durabat, postmodum, cum deberet succedere calor, nullus omnino apparebat, quin loco caloris atrocissimi dolores totum corpus omnesque artus cruciabant, in specie regionem dorsii lumbarem, in & circa centrum mesenterii, & femora. Cum his doloribus sensim solvebatur paroxysmus circa omnem calorem & ardorem; circa cujus finem subindè materia viridissima, terribiliter tamen & amaricans saporis vomitu ejiciebatur. Urina erat insigniter turbida, pallida & crassa, cum copioso sedimento, simulque arenulis, seu potius salibus scorbuticis, matulæ affixis: Paroxysmi observabant ordinarium typum. Vocatus ego, cum jam ab uxore purgatus esset, curavi eundem attemperando acidum (de rationibus plura, ubi de intermittente Tertiana:) v. g.

R. Tartari vitriolati gr. xv.

Lapill. can. gr. xij.

M. f. pulvis:

Propinabatur ante paroxysmum, qui tunc erat quartus.

Post hoc remedium & frigus & dolores insigniter remiserunt, & quidem blando sudore subsequente, absque tamen insigni locale scintilla corporis, potius erat sudor subfrigidus: Post paroxysmum & sudorem vomitus ordinarius sequebatur. Die intermissionis propter radicem scorbuticam præscriptum est:

R. Spir. sal. ammon. Zij.

Cochlear. ʒj.

Muc.

Hujus mixturæ recipiebatur 30. 40. vel 50. guttas bis in die intermissionis, manè & vespèr, semper bihorium ante passum, & die sequenti paroxysmi tantundem bihorium ante paroxysmum, in liquore tepido. Paroxysmus subsequens idem habebat frigus ingens absque calore: sed dolores insigniter remittebant. Die ergo intermissionis continuavit dictum spiritum; tertio paroxysmo, ad quem vocatus, præscripti:

R. Salis absinth. ʒj.

Lap. can. præp. ʒss.

M. S.

Mixtum sal febrile.

Assumebat per bihorium ante paroxysmum, & sic paroxysmus non amplius rediit.

Die intermissionis continuavit denud mixturam spiritus salis ammoniaci, & cum adhuc semel pro meliore sanitatis confirmatione salis absinthii cum lapillis caperorum tempore paroxysmi sumpsisset, ulterius non apparuit febris, sicque æger convaleuit. Certum ergo est dari febres frigidas; utur hoc multis videatur paradoxon. Et vrgè etiam similes febres absque calore infestas videbitis in ZACUTO LUSITANO *Nb. 4. Medicor. Princ. Histor. 1. & etiam lib. 3. Prax. Histor. Observat. 121.* Pulsus autem mutatus sequitur naturaliter, quando vel spiritum animale cor moventem, vel auctam sanguinis in præcordiis turgescientiam & fermentationem, occasione cujus cor nonnihil irritatum spirituum provocat motum, hinc sæpius vel frequentius se contrahit,

P

trahit,



trahit, & ipsa pulsus frequentior facit; hinc etiam ex fermentatione præternaturali sanguinis irritatum cor dat pulsus frequentior, qui innuit febrem. Ex irritatione igitur frequentia & celeritas; ex impetu spirituum vehementia, ex sanguine irritante plus minus turgescere magnitudo: de quibus infra suo loco. Vehemens pulsus semper bonus æstimandus, quia robur spirituum moventium ostendit, licet etiam nonnunquam ex irritatione sanguinis & spirituum fiat, connantium expellere, quod noxium est, ut initio dolorum, & in conflictu critico, ut loquitur POTERIUS lib. 1. cap. 47. de Febribus.

Oritur ergo, seu potius consistit febris formaliter in fermentatione sanguinis præternaturali, eaque insigniter depravata, seu, ut alii loquuntur, disproportionata, subinde simul insigniter aucta, adeoque interdum ejus quasi effectus, cujus occasione & alterantur spiritus, & rarefacti magis impetuosiores & intensius incalescentes redduntur; inducta à fermento peregrino, nunc sanguinem, nunc spiritus, nunc utrumque immediatè afficiente, quò depuretur massa sanguinea, aut separetur, quod ipse hostile & præternaturalis existit. Id quod confirmant omnia circa febres observabilia, in specie pulsus, æstus, diarrhoeæ in his frequentes, non nisi per auctum massæ sanguineæ motum explicabilia. Ut enim sanguis naturali fermentatione volatilisatur in spiritus, & restauratur assimilando chylam, & depuratur per fermentationem, scorias excrementitias per urinam ablegando; ita, ubi vitiosè fermentatur, ibi præternaturalis ebullit, ac effervescent, ut inde motus insignis arteriarum observetur, & crebro pulsu præsens est febris.

Omnis igitur febris est motus naturæ, seu, ut alii dicunt, quædam ejus lucta, quæ spirituum plus minus alteratorum opem, quod hostile seu inimicum æconomix animalis existit, eliminare satigit.

Pro hujus fermentationis præternaturalis varia ratione varix febrium differentia, varique us adjuncta symptomata reverà oriuntur. Quod consistat febris in tali sanguinis præternaturali fermentatione, conferatur præter SYLVIIUM WILLISII de Febribus, item KERGERUS Tractat. de Fermentatione sect. 2. cap. 3. pag. 238., item CÆSAR MAGATUS in considerationibus Medicis Questione 1. pag. 27., item ZIEGLERUS Tractatu de Fermentatione, & SCHÖCKIUS in suo Tractatu de Fermentatione cap. 25., qui negat quidem febrem esse fermentationem, sed effervescentiam: Verum vos non terreat SCHÖCKIUS, potius criticum agens quàm Medicum, adeoque contendit magis satisfacere Philosophis, quàm Medicis. Sed hæc obiter.

Quod autem febris essentia reverà consistat in tali præternaturali sanguinis fermentatione, multæ confirmant quotidie circa Febres observabilia. Et quidem

1. Ex abusu fructuum recentium horzorum facile oriuntur febres propter insignem horum fermentescibilitatem, & intermittentes simplices sunt duplicatæ; hinc etiam nonnunquam diarrhoeas & dysenterias inducunt: imò liberatus aliquis à febribus, si fructibus horæis, aut eorum embaminatis eorum succis paratis, aut potulentis facile fermentescibilibus, nimis delectetur, facile pati solet recidivas; unde & scorbutici ex esu prunorum, vel succis crudis expressis simplicium antiscorbuticorum nasturtii, aut cochleariz utentes, propter horum fermentationem febres intermittentes incidunt.
2. Hinc est, quod prohibita transpiratio introducat febres, quia poris clausis vitiosa saliva coëscunt, ut nequeant exhalare. Nam id, quod alias transpirat, ubi supprimitur, necessarîo regurgitat in massam sanguineam, quæ exinde turgescit, utique infarctatalem fermentationem & effervescentiam concipit, tandem in febrem ardentem erumpit. Nam hoc certum est ex SANCTORIO, quod uno die naturali seu 24. horarum spatio plus expiremus insensibiliter, quàm 15. dierum spatio per alvum deponamus, aut per urinam reddamus.
3. Plures febres oriuntur ex contagiis extrinsecus inspiratis. Nemo verò naturam contagiorum melius poterit explicare, quàm is, qui naturam fermenti & fermentationis in contagiis concipit. Dum enim istæ febres, quæ sovent contagium multiplicativum, suam vim obinent beneficio fermentationis, facile apparet, quod febres productæ in simili fermentatione consistant. Vid. KERGERUS, qui satis est elegans,

ut Theoria adhuc sit manca. Nam in fermentatione respiciendum ad salia, urinolum seu acidum & alcali, sine quibus non satis potest explicari.

4. Veterum putredō, quam tanquàm causam febrilem in febribus hinc putridis dictis adducunt (vid. SENNERTUS cap. 2. de Febribus) non potest concipi, nisi cum WILLISIO, SYLVIO, cæterisque innumenis recentioribus per fermentationem massæ sanguineæ explicetur.

Facile nobiscum potest conciliari POTERIUS, qui præ reliquis Veteribus lib. 1. de Febribus cap. 23. febrium essentiam satis concinnè exposuit, ubi asserit: *esse in massa sanguinea subacidam speciem salis cujusdam cum dulcedine quadam; & aliam tandem amarā: quæ subsistit: & ambæ actu sunt frigidae, & tactu nihil quicquam caloris percipiunt.* At ubi inter se vase permiscetur, tantus calor & fervoris excitatur gradus, ut vas nullo modo manibus contineri possit. Sed, quod majus adhuc est, ex utroque rorem & fragorem exoritur tantum, ut nihil magis, quàm bellum, cogitari possit. In hoc conflictu vapor quidam seorsim ab utroque spirat, non hæc graveolentia quadam &c. Quatenus igitur per putredinem subintelligitur motus quidam intellectus fermentativus, dependens à reactione salium daveisurum seu contrariorum, facile poterimus conciliare cum Veteribus: quatenus verò per putredinem subintelligitur motus quasi planè destructivus, in quo partes contrariæ in tantum concitantur, ut corporis pristina structura penitus immetatur, uti loco exempli in senam HELMONTIUS producit gangrenam, eatenus secedimus à Veteribus. Rectè de ea asserit HELMONTIUS §. 32. cap. 22. de Febribus: omne putridum esse mortuum; cruentum autem atrum, lividum, viridem, non testari sui corruptionem seu putredinem, sed solum effervescentiæ aut turbulentiæ fermentalis signa præbere: quando enim corporis partes viventes sunt, putredo propriè dicta locum nulli habere potest. Hinc v.g. SENNERTUS l. 4. non itatim & explicet adhuc febres putidas per putredinem; tamen in eam explicatione hinc inde Fermentationis, Ebullitionis, & Effervescentiæ vocabulo utitur, quæ cum putredine confundit: imò, ubi graviores controversiæ dirimendæ sunt, semper ad effervescentiam, turgescitiam & ebullitionem confugit, ut hic quasi per transennam viderit, quod jam dictum est. Conf. etiam PIENS de Febribus pag. 236. Par. 1. Rem exponit simili maxime accommodato, seu adæquato prælaudatus HELMONTIUS, desumpta de vino turbato, dum vix floret, non enim consumpmitur idco, quippe sublato turbine, reclearetur spontè: vid. §. 28. cap. 21.

Ultimas quod attinet: tinctura harum intensior ab acido prædominante, & hinc cæteræ particulas magis concentrante, originem ducere supra insinuatum fuit, ubi de Ardoribus: & ab hoc acido plus minus exaltato aut enervato & saturato etiam coctionis & cruditatis materiæ morbificæ in sanguine ratio, ac in urina signa dependent; de quibus infra, ubi de signis.

## PARS AFFECTA.

Subjctum febris primarium, seu Pars affecta omnis febris, non sunt vasa majora & minora, non cor, non aliud quoddam viscus, sed omnes febres sunt in massa sanguinea & spiritibus insitis, qui vitiosæ massæ sanguineæ tam fermentatione, & nunc majori vel minori ebullitione, quàm circulatione alterati, omnia illa pathemata inferunt, quibus Fermentantes corripiuntur: vid. HELMONTIUS §. 19. cap. 1. de Febribus, qui etiam §. 18. hoc illustrat exemplo suo, desumpto a spina quæta digito infixa. Sanguinem affectum, præter alterationem pulvis supra notatam, & ludor, sine quo nulla febris perfectè iudicata seu curata dici potest, & coctio ac cruditas materiæ in sanguine contentæ, perque urinam manifestatæ, & icterus febribus facile superveniens, & alteratio insignis sanguinis, quæ post absolutas febres observatur, eò major, quò diuturnior febris extiterit, dum indolem acidam exinde acquirere rectè dicitur à MAJOW Tract. de corde pag. 159., confirmat: unde etiam ex urina & pulibus tam elegantia in febribus benignis habemus signa, diagnostica & prognostica, quatenus scilicet hæc immediatè sanguinis fermentationem, & inde peculiarem ejus statum ostendunt, quod licet non potest, nisi



nisi in febribus simul massa sanguinea affecta fuerit. Spiritus verò influus simul laborare, confirmat opii usus, qui spirituum sedando impetum, intermittentium paroxysmos nunc penitus sistit, nunc saltem postponere notabiliter, & minus hinc affligere facit. Tandem, quod pariter in continuis obtinet, quorum ferociam & mitigare, interdum penitus extinguere notatum: vid. BARTHOLINUS *Cens. 1. Hist. 84.* Ubi autem palliativum saltem sit remedium subindè, eò ipso tamen, quo insigniter febres mitigari ac mutari ejusdem usu, spiritus saltem alterando & effervescendo observatur, & spiritus simul affici in febribus manifestum evadit. Ad hæc, qui gravibus, etiam sanissimi, corpiuntur undecunque natis doloribus, aut diutius perseverantibus, febrilia exactè pariuntur symptomata, qualia in continuis mitioribus contingere solent doloris occasione, in motum nimium adactis & inde alteratis in suis proprietatibus spiritibus insuis, à quibus solis tunc febris dependet. Nec obstat, ephemeram aut synocham sine putredine vocari tales febres; eò ipsæ enim, quo ephemeræ tales unius seu plurium dierum à spiritibus affectis, & undecunque alteratis, unice dependere concedimus, spiritus in febribus aliis quoque multo magis affici, negari non potest. Id quod magis confirmant maligniores, spiritus magis quam sanguinem alterantes, quæ tunc etiam, ubi urinæ sanorum similes existunt, nec adeò insignis, pro ratione scilicet pessimè habentis ægri, à statu naturali in pulsu mutatio observatur, adeoque sanguis minus alteratus notatur, tamen ægros facillimè trucidare solent, spirituum magis affectorum causâ. Imaginatio tandem, quantum in concilianda febre valeat, cum meticolositate aut horrore ægri, sanus sibi facillè similem febrem contrahit, aut dum ludicris & ridiculis amuletis intermittentes subindè sugantur, ex sola imaginatione spiritus saltem afficiente, per se fortissimum est.

Ex dictis hæcenus patet, nec calorem nec frigus esse de essentia febrium, aut rationem earundem formalem constituere; sed saltem esse symptomata febri supervenientia, non secus ac sitis ac cephalalgia easdem comitari solet. Idem autem est calor in statu sanitatis temperatus, qui in febribus nimis corpus calefacit; idem efficiens; idem fiendi modus; idem subiectum recipiens, saltem in gradu majore omnia. Patet etiam: non cor, altamve partem quandam solidam esse subiectum febrium primarium, nec vasa, aut majora aut minora, sed sanguis & spiritus. Non ego nego uterim, dum massam sanguineam & spiritus pro subiecto habeo, quin alia quædam pars seu quoddam viscus possit esse focus febrilis, in quo hæreat ac latet causa febrilis; sic enim certum est, focus febrium omnium intermittentium, imprimis quartanæ, ubi nascitur fermentum febrile, esse stomachum: sic viscera exulcerata fomitem continent febrium hecticarum: sic quoque in febribus symptomaticis ulcerum & vulnorum, ut ut immediate afficiant sanguinem, focus tamen habent in parte ulcerata vel vulnerata.

Non confundantur tamen focus morbosus cum receptaculo producti morbofi; sic enim chronicis febribus subindè superveniunt tumores, v.g. Quartanis diuturnis lienis tumor supervenire solet. Interim universalis est morbus febris, cum sanguinis & spirituum ratione totum corpus affligat necessariò, adeoque ratione partium solidarum ita denominatur, quas tamen nunc æqualiter nunc inæqualiter affligit. Hoc sit ratione circumstantiarum accidentalium, prout fermentum febrile, aut corporis humores sub febrili motu plus minus alterati, aut etiam producta humorum morbofi, &c. aptiora sunt, ut unam, vel alteram partem magis vel minus afficiant. Ipsæ etiam partes solidæ, vel connatæ vel acquisitæ ex vitio, quò imprimis partium robur inæquale pertinet, magis vel minus dispositæ sunt ad suscipiendam ex causis prædictis alterationem seu immutationem; pro talium enim circumstantiarum ratione accidentales istæ febrium differentie, continuarum quidem in Pemphigodem, Efferoden, Eloden, intermittentium verò in tussiculofam, deliram, asthmaticam, &c. oriuntur. Forsan etiam & huc referenda venit & febris illa

continua, in qua lateris sinister totius æstus, & dextri frigus; vid. BARTHOLINI *Alia Med. Hassniens. Vol. 2. pag. 137.* Item febris ista brachii dextri particularis quotidiana in M. A. N. C. *Ann. 3. Obf. 205. pag. 381.*

## DIFFERENTIA.

Quoad Differentias febrium reales:

- I. Febris, ratione considerationis causæ, & inde acquisitæ moris, est vel benigna vel maligna: Maligna febris est, quæ patientem invadit cum summa virium prostratione, neque adeò est diuturna, ut plurimum etiam desinit cum excretionem aliqua notabili: Benigna contrario se habet modo. Febris est vel contagiosa, vel non contagiosa; quæ per se patent.
  - II. Febris ratione temporis vel durationis, & modi afflictionis, est vel continua, quæ sine intermissione & continuo cursu pergere solet; vel intermittens, quæ certa habet intervalla, in quibus patientibus quies conceditur.
- \* Febris continua ratione generationis est vel primaria, vel secundaria: Hæc vel comitata, vel symptomatica. Primaria est vel continens, synocha dicta, quæ, nullo stato excandescentiæ ordine, ab initio ad finem sine ulla remissione perseverat; vel continua plus minus periodica, Synochus dicta, quæ nunquam quidem intermitit, attamen certo tempore excandescentiæ habet sensibilem: Eadem continua, ratione cursus seu motus febrilis, est vel Acuta vel Lenta.

Febris Intermittens subdividitur in

1. Quotidianam.
2. Tertianam.
3. Quartanam, tanquam species frequentissimas.

Quotidiana est, cujus accessio qualibet die redditæ solet. Tertiana est, quæ tertio die redit; de qua notetur cautela WILLISII *cap. 4. de Febribus*, quod aliquando huius paroxysmi sunt diuturniores, ad 24. serè foras protracti, simulque accessiones suas præoccupantes, unde apyrexia spatium sæpè nycthemeri unus est. Quartana est, quæ extenditur in quartum diem, seu in qua apyrexia est bidua.


Præterea etiam observatæ sunt aliz species febrium intermittentium rariores: sic v. g. observavit Quintanas TULPIUS *l. 3. cap. 52.*, sic HIPPOCRATES *l. 1. Sect. 3. Text. 11.* meminit Quintanæ, Septanæ, Novanæ, &c. Octanam in quodam senè observavit FRANCISCUS VALESIUS *cap. Controvers. Medicor. & Philol. Plures videbitis raras & vix credendas febrium species in SCHENCKIO lib. 6.*

Deinceps ulterius febris intermittens juxta BARBETUM & alios est vel simplex vel duplex: Tertianæ simplex est, quæ singulis diebus ternis saltem redit: Tertianæ duplex est, quarum una primo die incipit & tertio redit; altera verò secundo incipit, & quarto redit. Tanta tamen varietas in unaquaque febrium classe subindè observabilis est, ut certis eam classibus includere impossibile sit.

Quæstio est: quid sit censendum de febrium Divisionibus Veterum, qui eas diviserunt in Synochum simplicem & putridam: quarum illa credita est saltem inhabitare spiritibus; hæc verò ipsis humoribus. Idè brevibus ex præmissis Synochum simplicem seu febrem hærentem in solis spiritibus, planè non dari, facillè probari & evinci potest. Nam motum aliquem in sanguine puro (excipio febres malignas & contagiosas, in quibus sanguine existente puro spiritus animales à mixtate maligno afficiuntur & alterantur) excitatum à motu aliquo nimio, non dico dignum nomine morbi, uti præmonitum. Jam verò si per synochum simplicem Veteres non intellexerunt motus tales, profectò non video, quid habuerint, quod febrem vocitarent non-putridam. Nam, uti superius demonstratum est de causis, reliquæ febres omnes dependent à certo aliquo fermento: ubi itaque fermentum fermentans, ibi etiam necessariò fermentatio, quæ concurrit cum Veterum putredine.



Febris omnis in motu spirituum influorum præternaturali, & hinc contentorum pariter commotione nimia (tàm locali, quàm intestino seu fermeptivo) consistens distinguitur.





## III.

Ratione motus seu cursus morbi, & hunc insequentis durationis Febres sunt vel

Acute: v.g. Malignæ; Continuae sanguineæ omnes tam ardentes seu follicitæ, quam comitate cum inflammatione partis sensibiliore: item Symptomaticæ tales; Tertianæ intermittentes legitime; Lymphaticæ quædam: sed rarius sunt hæc adeo acute.

Lente: Hæctica quælibet, tam primaria seu per se incipiens, quam secundaria seu Symptomatica: item quælibet aliæ (præter supra insinuatæ) Symptomaticæ, Lymphaticæ catarrhales, Tertianæ nothæ, Quotidianæ continuæ, quæ ferè sunt Lymphaticæ; Quartanæ quælibet, Intermittentes erraticæ. Plures hæc pertinent, quæ à quibuidam malè ad Hæcticas referuntur, si in strictiori sensu hoc nomen accipere velimus. Quod pertinent istæ, quæ in cachecticis, item virginibus chlorosis laborantibus observantur: vid. Sennertus de Febribus pag. 149. & 207.

## IV.

Ratione permutationis, Febres

1. Maligna tandem fit Benigna: & contrà Benignæ faciliè degenerant in Malignas; primariò quidem Continuae, rarius Intermittentes.
2. Continua fit Intermittens & contrà: ut Causus, Tertiana; & contrà.
3. Continua follicitaria fit comitata, & contrà: si Ardenti syncho supervenit inflammatio hepatis; aut si pleuritis evanescat, superfluit solâ febre.
4. Continua fit Symptomatica, tam benigna, quam maligna: v.g. si per metastasin materiæ superveniant tumores, & hinc abscessus & ulcera.
5. Comitata fit Symptomatica: v.g. essentialis cum pleuritide, hæc non bene curatæ, ex relicta spina sæpè fit recidivans Symptomatica: item eadem febris ob inflammationem suppurantem, item ob insequens empyema, fit Symptomatica.
6. Intermittens unius speciei in aliam degenerat: v.g. Tertianæ in Quartanas, & contrà.
7. Simplex fit composita, & contrà; Tertiana Intermittens simplex fit multiplex; Continua ardens fit periodica Tertiana continua; quælibet humoralis malè tractata fit Symptomatica in phthisi.
8. Acuta fit lenta; v.g. Continua fixioribus malè curata fit Lenta.

## V.

Ratione idæ morbi Febres est vel

Analoga seu conveniens, ratione mutationis, motus, symptomatum & proprietatum, sibi ipsi: v.g. Tertiana Intermittens rigore, ardore, sudore, &c. paroxysmum absolvit &c. Tales ferè sunt omnes legitime: item simplices, item compositæ ejusdem speciei, sed separatæ: item compositæ plurium specierum per se consideratæ, nisi aliud quid adveniat.

Anomala: v.g. dum sudor paroxysmum Intermittentis præcedit, vel dum affligunt Intermittentes sine rigore, aut quædam sine æstu, &c., tales verò sunt nothæ; item compositæ diversarum specierum; item ejusdem speciei, sed implicitæ.

## VI.

Ratione modi affligendi Febres est morbus vel

Proprius seu singularis, seu sporadicus, dum hunc vel istum febres quædam affligit, eaque plùs modis diversa.

Communis seu universalis, seu Epidemicus: v.g. Tertianæ æstivæ seu vernaes, Quartanæ Autumnales, Catarrhales hybernæ, Variolæ, Petechiales.

## VII.

Ratione effectus vel

Immediati, qui est vel

Massæ sanguineæ depuratio per heterogenet secretionem; v.g. Variolæ, Petechiæ: vid. Sydenham Method. Med. pag. 15. & 17.

Massæ sanguineæ alteratio in aliam & quasi novam texturam, seu in novam diathesin immutatio; v.g. in venantibus, peregrinantibus.

Mors, hinc Febres lethalis ex depravata massæ sanguineæ & spirituum crasi.

Mediati, qui est vel

Salus in febre salubri; & quidem vel

Perfecta: coctâ & excretâ materiâ, & sub hujus tegmine fermento febrili, si que restituta massæ sanguineæ & spirituum crasi naturali.

Imperfecta: vel fixato præposterè fermento febrili, unde recidiva; vel crisi imperfectâ soluto morbo; vel febri in alium morbum abeunte: v.g. in Intermittentibus & Continuis fixa morbum palliant, unde recidiva, vel Acutam in Lentam plùs minùs Hæcticam abire faciunt; item Variolæ non ritè excretæ Phthisin interdum post se relinquant; item Febres in læterum transiunt, nunc symptomaticum, nunc criticum.



## C A U S A E.

Cum ergo Febris consistat in lesa sanguinis fermentatione, & omnis fermentatio dependeat à motu spirituum ordinato, & duplici sale, acido & urinoso, facile patet, quod causæ februm in genere erunt omnia ea, quæ dictam salum harmoniam & proportionem lædere, crasin massæ sanguineæ naturalem pervertere, & talem dytcrasiam seu talem heterogeneitatem & disproportionatam texturam particularum componentium plurimum aut pauciorum inducere possunt, ut exindè salum activitate vitiatâ fermentatio præternaturalis excutetur: Unde & mediante ipsi effervescentiâ massa sanguinea coquitur, & particulae salinæ vitiosæ tanquam seculentæ excernuntur. Hæc ipsa in genere, qualiacunque fuerint, *Fermentum febrile*, naturalibus planè incongruum, in definitione appellare placuit; cuius occasione nempe sanguis præternaturalem fermentationem concipit, & spiritus simul insigniter alterantur. Immediatè talem fermentum sanguinem, & hoc mediante spiritus afficit; seu è contrâ immediatè spiritus, & his mediantibus sanguinem inquinat.

Tale fermentum est, v.g. quod ex insensibili transpiratione prohibita & resecta febrem subindè accendit: Tale fermentum est, quod ex ulcere quodam interno, v.g. phibisi pulmonum, febrem inducit: Tale fermentum est, quod in erysipelate aut pleuritide febrem acutam inserit: Tale fermentum est, quo scabies retropulsa febrem periculosam subindè excitat: Tale est lymphæ acidior, febrem catarrhalem inducens: Tale fermentum est, quod ex fructuum horæorum abusu subindè febre nos mulctat: Tale fermentum est, quod contagii sub tegmine nos inquinat: Tale fermentum est, quod ex usu rei horridæ ac faciliè alterabilis in primis viis, læpius febrem intermittentem excitat.

*Fermentum tale nunc extrinsecus nobis communicatur per Assumptorum aut Inspiratorum varietatem*; quod & contagia perueniunt: nunc inrus generatur. Vix tamen febrilem alterationem inducent talia, nisi volatilis plus minus naturæ & spiritibus & sanguini commiscibilia fuerint; sine hac enim conditione variam quidem immutationem, & tamen fermentativam turgescientiam febrilem in sanguine concitare non valebunt. Nam axioma infallibile Philosophorum est: *Nihil movetur à se ipsa*. Hinc quidam Veterum accusarunt, præter putredinem, causam aliquam februm, *motum, contactum rei calidæ, peroriorum cutis constrictionem*, &c. *Admissionem rei calidæ* nihil aliud acculaverunt, nisi fermentum aliquod. Nam posito, motu quodam concitari febrem, profectò hoc nunquam observabitur, nisi in corpore, cuius fermenta jamjam sunt inquinata particulis naturali fermento incongruis, quæ à motu nimio ad agendum excitantur; sicut flagello excitatur scintilla sub cineribus latitans: aliàs namque omnes operarii, v.g. Melliores, Trituratores, Pugiles, &c. ob motum nimium prolaberentur in febrem, cum tamen constet experientiâ, horum fermentationem nimiam in massa sanguinea mox remittere, corpore ad quietem composito. Deinceps rerum calidarum contactus itidem non excitabit abique fermento febrem. Nam uti constat ex Physiologia, calor non est nudum aliquod Kerollaceum, sed omnindè constat ex effluviis calidis. Quatenus itaque effluvia ista fermentis nostris sunt incongrua, quis non animadvertit, adesse hinc fermentum aliquod? si verò sunt congrua, isti motus non concitabunt febrem aliquam, sed saltem nimiam aliquam sanguinis fermentationem, quæ in corpore puro cessat, cessante effluviis calidorum influxu. Ad hæc itaque concludo: febrem nunquam oriri abique certo quodam fermento, fermentis nostris incongruo.

*Constrictionem pororum corporis* quod attinet: nunquam hæc observatur, uti corpore jamjam præternaturaliter constituto. Nam corpore itè disposito, semper ejus pori sunt patuli, ut per hos continuò evacuentur partes certæ, non extremæ tantum, sed reverà massæ sanguineæ effluvia laudabilia: Itaque si talia effluvia ex corpore discedere nequeunt, necessum est, adesse jamjam aliquem massæ sanguineæ præternaturalem statum.

*In specie, quoad intus genitum fomitem febrilem*: spectatim ad primas vias respectus habendus, quarum errata fermento quidem digestivo acido volatili ex ventriculo imprægnata, & interius sanguini commiscibilia, defectu tamen debita digestionis & perfectionis in primis viis, qua in talium volatile abire debebant, non adeo homogeneè assimi-

labilia exitunt, quin inordinatam fermentationem citius vel tardius inducant. Imprimis esca duriores & digestu difficiliiores in stomacho diutius retentæ primum hic locum obviunt, quippe degenerant in liquamen aliquod viscidum, nunc aperte acidum, nunc aciditatem aliquam visciditate suâ celant.

Notum hoc imprimis est ex febris intermittentibus tertianis &c., fomitem simpliciter in primis viis habentibus; continuarum verò, præsertim benignarum plurimum, par omnindè est ratio, si erratum primarum viarum sanguinem seu lympham inquinet, & eatenus fermenti instar continuam fermentationem in sanguine efficiat. Siquidem intermittens febris paroxysmus quilibet integram quandam benignam, per crisi sudoris finientem, febrem continuam repræsentat. Unde non rarum est, ex intermittente tertiana continuam fieri; & contrâ, ardentem continuam in intermittente terminari; & complicari hæc duo denuò, ut in continuis periodicis obviunt. De humoribus certis in corpore extravasatis, & hinc fermentantibus, res est comperta penes eum, cui perspectum, febres traumaticas originem suam tanquam à fermento febrili nasci ex humoribus extravasatis & putrescentibus in ulceribus & vulneribus, & quocunque sanguine extravasato.

*Fermentum hoc in benignis videtur esse acidè plus minus naturæ* (ut ex iis, quæ supra de æstu corporis, rigore, &c. dicta sunt, & infra de urina dicentur, probabiliter concludi potest); Imò etiam in malignis, sed in his acutius, volatilius & penetrabilius, ratione quarum proprietatum & spiritibus tam promptè communicabile existit, adeoque ad veneni naturam, quæ in intemperatura insigni simpliciter consistere videtur, propius accedit. Non autem semper humorum peccantium copia aut moles, seu, ut vocant, saburra hanc fermentationis læsionem inferunt, sed sufficiunt interdum miasmata quædam fermentativa, vel inspirata, vel aliàs in corpore relictæ.

Imprimis aer verius fermenti febrilis inducit naturam, quippe qui turget effluviis valde potèrè fermentativis plagarum tenellatum receptum. Porro æstivus aer itidem fermenti febrilis schema suscipit, quatenus effluvia copiosa alcalica eum replent. Autumnalis demum, & hybernus non raro quoque febrilis fermenti personam agit, quatenus effluvia in se se continent salia-acida.

Ceterum effluvia animalium putrescentium, v.g. cadaverum humanorum pisciumque, adeò sunt efficacia fermenta febrilia, ut sepe patefiant sæpius in sinistro nitorum mortuorum exemplo.

Ejusmodi effluvia, si ex corpore febrili discedunt, & in corpus sanum suscipiuntur, veniunt nomine contagii, Græcis *μολυσμα*: neq; etiam videtur improbabile, posse ex astris continuò descendere effluvia, quæ pro diversitate aspectuum, astrologum, &c. planè sunt incongrua fermentis humanis; quod factò, ut plurimum præsignant febres pestilenciales: Quæ effluvia forsitan intelligit HIPPOCRATES per suum *μολυσμα*.

Fermenta hæc cum sint activa, & undique per contenta corporis diffusiva, odorum ad instar facile admodum totam massam sanguineam, motum salum æquale pervertendo, in fermentationem præternaturalem excitare valent, vel spiritus influos, eorum texturam vitando insicere possunt; quod non tantum in contagiis susceptis, sed etiam intermittens diuturnioribus, manifestum est. Talia enim fermenta, v.g. contagia, sunt spirituosissima in malignis, quæ vel spiritibus, vel sanguini, se insinuantia, nunc citius nunc tardius potentiam suam alterativam exercendo, febrilem occasionem suggerunt: Adeoque minimum subindè est, quod peccat in febris seu materialis causa, quod tamen fermentationis medio multiplicabile existit; unde intermittens insignis diuturnitas, continuarum verò malignarum copia contagiorum spirituosorum. Rem exemplo quasi simili nonnihil declarabo: In febre continua aut paroxysmis intermittens massa sanguinea est similis vino, aut generoso musto fermentescibili, quod fermentando se ipsum deputat & perficit. Nam vinum, utut variis constet particulis salinis, imprimis tamen ex sale ejus alcalino seu urinoso & acido fit fermentatio, in qua fermentatione insignis turgescencia percipitur, quæ mediante separantur & ad fundum successivè præcipitantur partes disproportionatæ non bene miscibiles sub secum nomine, vel per superius vasis orificium eructantur, quo factò ex recuperata debita particularum textura vinum quietum, laudabile ac perfectum existit.



existit. In turgescencia febrili simile quid observamus occurrere. Nam & ibi particulae heterogeneae in massa sanguinea coacervatae mediante tali effervescencia seu fermentatione separantur, & quasi praecipitatae sero involvuntur, cujus medio nunc per urinas sub forma sedimenti evacuantur, nunc sub forma sudoris emittuntur, nunc saepius certo tempore mediate naturae motu critico per alium locum evacuantur: adeo, ut vinum harum naturam exacte exprimat: hinc v.g. fit, quod non raro febrim superveniat icterus, quando nempe fermentum febrile & vitiosa salia per modum efflorescentiae desiguntur intra cutem. Interim tamen observandum, quod haec ipsae feculentiae, fermentatione critica separatae, non solum sint recrementa corporis morbola, sed etiam partes ipsius massae sanguineae nutritivae sub tumultu isto fermentativo alteratae, mutatae, simul praecipitatae, & à reliquis separatae, quae ita vel per sudorem, vel per urinam & alias vias foras emittuntur: non secus enim ac sudore artificiali per motum, exercitiorum &c. non serum purum aut recrementosis saltem particulis commistum, est, quod emittitur, sed etiam ex ipsa massa sanguinea copiosae particulae utiles, fermentationis auctae motu attritae, hinc in salsum mutatae, & ita reliquis minus sociabiles factae, una excluduntur; ita etiam in sudore intermittenti massa sanguinea sub paroxysmo in tantum seu plus minus colligata propriae substantiae una jacturam facit. In intermittentibus quot sunt paroxysmi, tot sunt febres quasi particulares, in quibus post frigus vel horrorem turgescencia fermentativa & effervescencia massae sanguineae, in qua materiae coctio peragitur, accidit, quibus peractis sequitur in fine eorum quasi quadam crisi facile copiosus sudor & urinae fluxus.

Quamdiu ergo sanguinis crasis unicuique homini propria, dependens fundamentaliter ab acido & alkali, formaliter & proxime in spiritu vitali, proportionata est, tamdiu fermentatur blandè & spiritaliter massa sanguinea; simul ac verò laeditur eadem, imprimis si congerantur particulae salinae facile fermentescibiles, & non rite cum integra massa miscibiles, seu tot fermenta particularia sunt omnes pro febre, & fortius, ubi fermentate incipiunt, febrem inducunt.

*Causa remota* in febribus variae ac multiplices ex rerum non naturalium vario usu & abusu sunt derivandae. Proclives in febrem vulgò dicuntur calidi & humidi, quod rectè rejicit POTERIUS lib. 2. de febribus cap. 15., quin potius dicit, omnia corpora aequaliter ferè disposita ad febres esse, imprimis ea, quorum pori sunt obstructi, & qui crapulae sunt dediti: per hanc enim laeditur sanguis & spirituum crasis, & oritur dyscrasia, per poros obstructos coacervantur alia excrementa, ad turgescenciam febrilem suscitandam in massa sanguinea jam ante disposita.

Multum autem hic praestant, imprimis in malignis contagiosis, animi pathemata, ex quorum censu imprimis metus & pavor hic magni sunt ponderis. Interim tamen nunquam ego credo, ex hisce solis posse oriri febrem, nisi jamjam quaedam fermenta ignava circumstent corpus, quae à talibus commotionibus animi, spiritus animales alterando, ad operandum irritantur: E.g. Esto febris maligna contagiosa, quae ortum ducit ex fermento ex aëre, & in aëre oberrante, ita, ut varias personas hoc fermentum afficiat, frustra tamen, ob legitimam spirituum animalium, massae sanguineae & fermentorum crasin: Si itaque ex personis his quaedam pavorè percellatur, notum est, spiritus animales alterari & posterni, totamque massam sanguineam immutari ob motum cordis immutatum: in hoc ipso fermentum contagiosum certò certius vires suas exeret. Quapropter hic facio secessum ab HELMONTIO. Pestis causam proximè accusante Archei pavore. Constat tamen ex pavore posse oriri variolas, morbillos, petechias, morbum Hungaricum, sudorem Anglicum, pestem ipsam &c. Quæro itaque: quidnam hic determinet Archeum pavore percellum, nisi accedat fracedo quaedam determinata, seu fermentum quoddam contagiosum per aërem volitans, certaque subjecta, & in his spiritus animales & massam sanguineam ob materiam praedispositam inventam ac suscitata afficiens & alterans.

## DIAGNOSIS.

Quoad signa in genere diagnostica: superius dixi, quod sit pulsus frequens; calor verò, qui in febribus interdum Estmuller. Oper. Tom. II.

adeft, tantummodò symptoma superveniens, non verò necessariò ipsis, semper conjunctus, ut ut plurimum non minùs quàm sitis affligat ordinariò febricitantes: Adeft cephalalgia; item interdum adeft adjuncta syncope, & alia symptomata varia: Appetitus nunquam est naturalis; aut enim est nimius, ut hoc saepius observari licet in principio quartanarum; aut planè est depravatus, ut hoc experiri licet in mulieribus; aut etiam est planè prostratus, v.g. in ardentibus & malignis nonnullis.

## PROGNOSIS.

*Pronostis febrium in genere ex pulsu & urina desumitur.*

Pulsus quidem in omni febre est frequens, nunc magis, nunc minus: minus scilicet frequens in paroxysmo febris intermittens innuit ceteris paribus vires adhuc validas, & cor insigniter irritatum: Oritur autem à cordis vehementiore irritatione, propter sanguinis nimiam & depravatam turgescenciam, unde cor crebrò distrahitur, arteriaeque distenduntur: Sin simul est parvus, pessimum signum est, & formicans dicitur.

Vehemens prout spirituum influentium vigorem infrequens nunquàm rejici debet, adeo ut magnus & vehemens pulsus semper animosum reddat Medicum, in quocumque febricitans statu fuerit, ut ut varia urgeant symptomata, sive benignae, sive malignae sint febres: & quò vehementior, major & aequalior est pulsus, eò melior, & signum laudabile & aquabile sanguinis fermentativae turgescenciae & spiritalitatis; quò minor, eò periculosior, in specie in intermittentibus & malignis, ubi est pessimum signum: magnus enim pulsus aquabilem sanguinis turgescenciam, & qui optimè occupatus sit in excernendis seculentis, denotat; & viceversa pulsus parvus deficientem sanguinis turgescenciam & omnia insausa portendit, quia insignem virium labefactionem junctam habere solet.

Durus interdum observatur in febribus, sed nunquàm fausto omine, quin semper tensionem spasmodicam membranarum in quodam loco plus minus laesam aut inflatam, & hinc in dilatatione arteriarum sententiam aut fibrarum aliqualem spasmus sequitur; unde in febribus cum inflammatione partium membranarum junctis, e.g. in pleuritide, &c. ordinariò observatur.

Deinde etiam in febribus quibusdam, praesertim malignis, in quibus spiritus animales & genus nervosum magis afficiuntur, in quibus etiam citra sensibilem, de qua conquæti possent ægri, molestiam, pulsus durus plus minus observatur, pessimo ut plurimum omine, cum deliria, convulsionem, & mortem insequi observaverim.

Semper bonus est pulsus mollis, generis nervosi minùs mutatum habitum ac spirituum animalium debitum motum ostendens, & ferè cum madore aut levi sudore junctus esse solet, & tali ex pulsu saepius fausta expectari possunt in febre; Unde & pulsus undosus dictus, ex magno, vehementi & molli compositus, ordinarius factoris imminens prodromus solet esse in febribus, cum in pulsu duro vel nullo, vel qui absque euphoria quasi per vim naturae prodit, sudorem observaverim; scilicet & fibras cutaneas in tali casu tendi, porosque contra contractiores hinc esse atbitror, nisi pulsus talis insigniorem partis cujusdam inflammationem sequatur; tunc sudores enim proficiunt, & ut plurimum pulsum mutationes inferentes, eliciuntur.

Quoad Urinam: hanc ideo sub cursu febrium inspicere debemus, ut habeamus signa coctionis & cruditatis: ubi enim exhibuerint suo tempore signa coctionis laudabiliora, imprimis in febribus continuis, faustum est signum; si verò, non, periculosum.

Signa coctionis sunt, quando urinae clarae redduntur turbidae, crassae, & continent vel encorema, vel sedimentum: quae ipsa quò sunt copiosiora, eò sunt meliora.

Urina, quamdiu est cruda, tamdiu morbus est suspectus, quoniam adhuc in aequilibrio ad mortem vel salutem haeret æger.

Per cruditatem verò intelligitur talis massa sanguinea, ejusque humorum status, quo sanguini permixti & uniti naturalem ejus fermentationem vitalem turbant, & in effervescencias febriles eam concitant: id quod imprimis particularum salinarum à debita crasi deficientium existit culpa. Coctio verò est eorumdem separatio, & à reliquis



partialis per fermentativum motum quasi præcipitatio, ut secreta & heterogenea salta, seu effusa, instar cuiusdam capitis mortui à sero imbuta & diluta per certa viscera cribra & quasi filtra secerni, & hinc per naturæ consuetas vias evacuari possint: adeoque particulae tales fermentando à reliqua materia instar fecum separate, & cum urinâ excreta in fundo subsident, coctionis signa perfecta suppeditare dicuntur. Hinc scilicet in febrium acutarum principio urinæ sunt claræ, pellucidæ, tenues, plüs minus tinctæ, & absque sedimento excernuntur, quæ procedente morbo in incremento fiunt turbidæ, crassæ, & in statu omnino copioso sedimento, seu fecibus fundum matulæ perentibus, saturatæ; unde hæc coctæ, illæ verò crudæ, appellantur. Crudæ sunt, quando nil secernitur, & in sanguine adhuc omnia permixta: Coctæ, quando iam facta separatio. Quod si enim mediante fermentativo motu fiat successivè extrusio & separatio istarum quasi feculentiarum, urinæ crassiores magis contentis saturatæ, & quæ spontè turbatæ prodeunt, adeoque inchoatam coctionem ostendunt. Quod si turbidæ maneat, adhuc ingentem motum & inordinatam fermentationem & confusionem in massa sanguinea innuunt: sin verò turbidæ clarescere, & ad fundum contenta dimittere incipiant, signum progressus ulterioris in coctione ostendunt, ut in multo fermentante: Vid. KERGERUS de Fermentatione. Exemplum cruditatis quasi simile sit, multi filtratio per chartam emporeticam; Nam, quamdiu in fermentante liquore omnia sunt confusa, si transcoleatur per filtrum quodcunque, massa turbida transit; fermentatione verò absoluta feces separantur ad fundum, & liquor clarus transit, feces resistunt. Idem fit in cruditate & coctione sanguinis: Quamdiu in cruditatis statu omnia sunt confusa, urinæ excernuntur tenues, rubæ, claræ ac perspicuæ; quando verò in statu coctionis secreta præternaturalia à succis præternaturalibus sunt separata & præcipitata, vocatur Coctio, seu quod materia morbifica sit cocta, ac urinæ appareat turbidæ, crassæ, frequentes cum copioso sedimento. Consentit SENNERTUS lib. de Febribus pag. 215. ubi de Coctione & Cruditate: cum quo conf. SYLVIVS lib. 1. Prax. cap. 55. §. 16. Hinc applicandi hæc sunt Aphorismi HIPPOCRATIS, nempe Aphorismus 21. 22. 23. & 25. Sect. 1., ubi legitimam evacuandi per quascunque vias rationem docet, & in specie cocta, non verò cruda evacuanda monet. Nam dum omnia sunt confusa & cruda, nihil potest evacuari cum euphoria, sed potius totum corpus saltem turbatur: id quod fit v.g. in principio & incremento febrium: Unde purgantia, sudorifera & Diuretica nunquam in principio aut incremento, antequam coctionis signa in urina appareant, sunt adhibenda; quod observetur in omnibus febribus continuis & intermittentibus benignis. Quando verò omnia sunt cocta, & à se invicem separata, commodè tunc educi possunt: id quod fit in fine incrementi & statu morborum, cum natura hoc agit, quæ nunquam instituit evacuationem criticam, nisi omnis cocta sit materia; sicut & in febribus intermittentibus nunquam spontè erumpit sudor atque urina, nisi in fine paroxysmi, dum prius materia morbifica in paroxysmo est cocta, & ejicitur per sudorem vel urinam.

Probe ergo coctionis & cruditatis ratio in cura febrium benignarum observanda est, pro legitima instituenda evacuatione. In malignis febribus alia est ratio; in his enim coctio & cruditas locum non obtinet, quia mox præcipitantibus & appropriatis alexipharmacis sudorifera in principio adjungenda sunt: sicut natura mox in principio malignarum secundâ vel tertiâ die petechias, pustulas, bubones, carbunculos &c. expellere solet.

Ab illo negotio cruditatis & coctionis universa crismus in continuis dependet ratio, quæ in præcipitatione quarumcumque fecum, subitanè ex massa sanguinea exclusione, & vel extra corpus, nunc cum sudore, nunc cum urina, nunc cum sanguinis ipsius excretionem, vel in quandam corporis locum congestionem, in tumorem ac abscessum, consistit, ipsis separatis feculentis prius circa exclusionis locum, ex facta, ibidem aut in vicinia irritatione, varia symptomata occasionaliter concitantibus: dum v.g. sudores criticos rigores repetiti; hæmorrhagias criticas agrypnæ; deliria narium pruritus, oculorum splendores, cephalalgia, obauditiones, &c. præcedere solent: Nam secundum HIPPOCRATEM nox, quæ antecedit crisin, gravis. Hinc temper observavi, quamdiu in febribus, præsertim continuis, urinæ sunt crudæ, tamdiu res ægri in statu existunt ambiguo: Quando verò adfunt signa coctionis, semper quælibet fau-

sta possumus ominari; ita, ut non meminerim, vel legisse me, vel observasse, cum coctionis signis quenquam interisse. E contra, quæ coctæ jam plüs minüs apparebant urinæ, si recrudescant denud, semper periculum portendunt; si nempe sedimentum, quod primis diebus subsiderat, deficit, ut si urinæ crassæ intensius tinctæ pallescere, & tenuiores excrementi incipiant: id quod nunc per causas externas, vini generosi potum, iracundiam, passum paulò copiosiores, præsertim carniū vel similiū; nunc per causas internas ex deficiente naturæ motu & dominio causæ morbificæ evenit. Curabam puerperam purpurâ affectam, procedebant omnia mediocriter, die nonâ urina crassa intensè tincta turbata, & sedimentum deponere incipiebat; Interea etiam purpura incunquæ erumpebat, coctionis signa augmentabantur, ipsâ ægrâ commodè se habentem: Sed die 15. cum nox prægressa fuisset inquietata, mane urina excernebatur pallida, tenuis, vix citrina, ex improviso delirium, convulsiones, & circa meridiem mors. Quod hic subitò factum, hoc interdum successivè, & terè aliquot dierum spatio evenire solet. Propterea rectè POTERIUS de Febribus cap. 42. coctionem veram continuam & universalem esse debere, asserit; vera quidem, quia non rard falluntur Medici, opinantes, veram esse coctionem in urinis ex crudo humore in fundo earum subsidente, quæ verum sit sedimentum; continua etiam debet esse coctio, ut fida sit. Fit enim aliquando, cum non ex toto humor à natura superatur, ut manè appareat cocta, vespere autem delitescat coctio. Debet etiam esse universalis & totius massæ morbificæ coctio. Frustra namque in parte quadam coctio suscipitur, morbo in reliquo corpore crudo existente. Hæc POTERIUS.

Opus hoc coctionis solius est naturæ, & hanc Insequens crisis, quam arte adjuvare non possumus, saltem impedimenta naturam gravantia remove valemus. Motus hic naturæ circa coctionis negotium in eo consistit, ut acidum fermentativum morbosum, unde febris oritur, corrigatur & temperetur, adeoque in salum, aliarum particularum additione mutatum, ex massa sanguinea extrudatur: id quod mediante fermentationis motu accidit. Cruditas enim, & ætior omnium particularum in sanguine unio, & hinc procedens ætior effervescencia febrilis, ab acido dependet, quo dominante intensior fermentatio, nulla secretio fit. Dum verò per mutam collisionem quasi acidam febrile fermentum successivè ab alcalibus arripitur saturari, in salum mutari, & sic ex compedibus sanguinis solvi, i. e. liberari, incipit; etiam alix particule heterogeneæ, nec salisguini debnè assimilabiles, ab acido tamen vitioso una colligatæ & quasi concentratæ simul ex sanguine extrudi, & hinc ex ejus liquore fermentationis medio (quæ partes unibiles ritè coeunt, non unibiles secernuntur) præcipitari solent, coctio & copiosiorum cum urina contentorum excretio accidit. Conferatur SYLVIVS l. 1. §. 14. sequen. Hinc etiam in febribus malignis, si urinæ sanorum similitudine excernuntur, signum periculosum est: sc. spiritus infusos imprimis esse affectos, & ipsam massam sanguineam à fermento maligno citrà insigniorem fermentationis ejus turbationem corrupti, & in textura sua viciatè significans; unde & cum minore ardore tales febres conjunctæ esse solent, summa visum potius prostratio & nervoli generis symptomata magis urgent: sin tamen in his etiam malignioribus coctionis veræ signa se exhibere inchoant, bene sperare Medicum jubent, & si salubres sunt tales, in fine coctione naturæ morbificæ, ejusque signis in urina, terminari assolent.

Febribus sæpius supervenit icterus, qui vulgò iuxta Hippocratem Sect. 1. Appor. 62. ante septimum diem itatur periculosus; quod tamen non est universale: sicut hoc non solum SENNERTUS annotat Insu. lib. 3. Part. 3. c. 7. pag. 740., sed etiam ex HORSTIO lib. 1. Obs. 23. patet, ubi icterus salutaris quartâ die in continuo obvenit; & BARTHOLINUS Cent. 3. Hist. 4. icterum salutarem in quarta ante septimum supervenientem notat.

Ex se icterus est motus naturæ, per despumationem nempe massæ sanguinæ genitus; fermentando enim massa sanguinea despumatas lordes figit intra cutem, & colorem dat icteritum.

Hic superveniens tertiâ, quartâ vel septimâ die est faustus; primâ verò aut secundâ, vel sextâ aut octavâ die superveniens, sicut ex se non sic pravus, minus est tutus; quia est icterus symptomaticus, quo frequenter moriuntur ægri, cum prior sit criticus. Ergo præter signa coctionis plüs nullius jam prægressa optimè negotium hoc decedit CASTRO

suprà



*supra citatus lib. 3. cap. 10. pag. 210. & figur.* Nempe etiam die quarta icteritiam cum rigore esse bonum signum, quia critica sit: item icteritiam sine rigore ante septimum accedentem, utut symptomaticam, si sequatur evacuatio aliqua, per alvum v. g. urinam, ægrum liberare: quæ pluribus c. l. videantur.

Inter lethalia signa, quæ certò mortem prænunciant, nullum observavit IOHANNES STEPHANUS in *Oper. Medic. Miscel. pag. 449.* quod pluri sit momenti, & plus polleat, frequenti & insolenti manuum admotione ad nares sine ulla materie effusione: ubi enim ægri febricitantes identidem manus moritant ad nares, quasi sordes exempturi, aut nares conuncturi, si nihil talis fiat, perniciosissimum est signum.

## C U R A.

*Methodum medendi* quod spectat, in cura generali attendendum, an febris sit benigna? an verò maligna?

1. In febribus benignis vel semper usurpanda præcipitantia dicta, vel specifica, quæ fermentum febrile acidum volatile, specifici tamen saporis, corrigere, alterare, & enervare seu quasi figere, & hinc in saporem & texturam minus activam mutare, indeque fermentationem febrilem compescere, & sordes effervescentes, ac crasin massæ sanguineæ vitiantes separare, & quasi ad fundum præcipitare valent.
2. Materia vitiosa peccans, fermenti talis vel vehiculum aut fomes (mediante quo v. g. ex primis viis, fluidis corporis contentis, speciatim sanguini, permiscetur, ut in intermittentibus aut continuis benignis) ab ijs, præsertim à sanguine, separatur.
3. Utrumque, quæ datà potèst, imprimis per peripheriam cutis, eliminetur.

*Opus hoc est vel solius naturæ, vel solius artis, vel utriusque simul.* Solius naturæ opus est hæc cura, dum coctione materie morbificæ, & hinc facta crisi, expedit. Unde in Veterum methodo medendi Medici agebant Spectatores naturæ, observando coctionis signa & tempora, & hinc expectando crisin, quibus ritè se habentibus, morbus judicabatur, & salvabatur æger. Solius artis opus est, quando remedijs specificis antifebrilibus fermentum febrile enervatur & corrigitur; id, quod superest, spontè suâ & absque morbofo conatu curante naturâ. Talia sunt v. g. Specifica febrilia intermittentium, ut *Febrisfugum Riverii*, aut *Specificum febrile Kergeri*, in quartana Specificum Febrile seu China Chinæ (nempe recipiendo *China China 3℔. salis ammoniaci 3j.*) aut *Helmontii Diaphoreticum Paracelsi*, quarumvis febrium rheumatos.

*Artis & naturæ opere simul curantur* in methodo hæcenus communiter recepta, quæ naturæ, fermentationis sanguinis febrilis medio, laudabiliter agenti & coquenti, auxiliatrices opes ferimus, impedimenta illius, sordes & fomites primarum viarum removendo. Hinc aut Temperantia, aut Absorbentia, aut Diaphoretica, vulgò Præcipitantia dicta, aut appropriata alia, utramque faciunt paginam in febribus: sunt enim talia, quæ in genere fermentationis, aut vitiosè effervescentes humores sui miscellâ compescunt, mitigant, & plûs minûs enervant, dyscrasiam sanguinis corrigunt; adeoque nunc acidum destruendo, nunc alcali corrigendo, motum omnem fermentativum supprimunt; sicque vitiosarum & heterogenearum partium exclusionem, & à reliquis separationem promoveni, utcumque ejus effectus explicentur, & hinc nata gravia symptomata, motum & impetum naturæ plûs minûs frangentia, mitigant. In quem finem in genere venæsectionis, Purgantium, Opiatorum, & dietæ usus observandus venit. Præcipitationis vox ex Chymicis est desumpta: Nam sicut præcipitando separantur contenta in liquore quodam, ita propter analogiam Præcipitationis vocabulo utuntur Medici, quando præcipitantibus, aut rectius absorbentibus, effervescentiam massæ sanguineæ compescunt, & heterogeneas partes separant & præcipitant; quod aliàs etiam vocant coquere. Hæc sunt, quæ in febribus intermittens, simul atque continuis, præmittuntur, instar digestivorum cum alijs anteparoxysmum. Digerunt enim seu corrigunt & temperant saliva in primis viis, & in salum mutant, habentem vim alterandi massam sanguineam, corrigendi ejus crasin, & præcipitandi excrementi quæcumque massam sanguineam turbantia in febribus. Præcipitantia hæc sunt vel salia urinosæ, vel metallica fixa, antimonialis, nunc secretæ, nunc vul-

garia. Antequam aliquid inchoamus in febribus, ralla præmittenda:

*Digestivum febrile ad imitationem specifici febrilis Kergeri:*

*R. Crem. tartari 3ij.  
Corall. rub. præp. 3j.  
M. F. Pulvis  
Div. in 2 partes. S.  
Pulvis febrilis alterans.*

*R. Arcani dupl. 3℔.  
Antimon. diaphor. 3j.  
Salis absinthii ʒi. vj.*

*M. f. Pulvis pro 2. dosibus: S.  
Pulvis febrilis resolvens.*

Auxiliatrices has opes ferimus naturæ rectè agenti, h. e. quæ fermentationis medio coctionem ritè molitur pro futura excretionem. Sed quid agendum Medico, cum vitiosè agit natura? h. e. cum crudâ adhuc materiâ excretionem symptomaticam in principio aut incremento instituit eadem irritata, sive turgat plûs minûs materia peccans, ut aliàs dicitur, sive non? Coacta sanè agit natura, unde & subindè debilitant ægrum tales excretionem, & absque euphoria fiunt; quas tamen, ubi supprimerentur arte, periculum est, ne imperi contentorum intra corpus coëscito, fiat irruptio in partem aliquam nobilem, adeoque exitalem vitæ calamitatem inferat: v. g. ponu febrim continuam insignem, sed benigniorem (utut malignarum reverà eadem sit ratio, in quibus tamen magis ad malignitatem, præsertim, si spiritus potissimum occupet recipiatur) cui, crudis adhuc existentibus urinis, die tertîa, quartâ & quintâ supervenit diarrhœa, aut hæmorrhagia narium crebrius repetens. Excretio hæc reverà est symptomatica, debilitatur æger, franguntur vires, periculum est, ægrum vix superaturum morbum, aut ad statum cum ista excretionem perduraturum. Quod si supprimatur hæc ipsa, ex diarrhœa impedita febris intensior, sitis, cephalalgia, deliria &c. metuenda erunt: Si hæmorrhagia narium succidatur, eadem, ac præsertim deliria & convulsionem. Quid igitur agendum in talibus casibus? Variè decernant hîc Practici, an promovendus, an sistendus sit talis naturæ motus? Omnium optimè mihi videtur negotium decidisse STEPHANUS RODERICUS CASTRENSIS *Tract. Quæ ex Quibus lib. 3. cap. 10. pag. 119.* Decisionis nucleum paucis c. comprehendam. Inquit: Omnis evacuatio symptomatica ratione facta, in tempore peccat. Si enim debito fieret tempore, b. e. in die decretoria, non amplius symptomatica, sed critica diceretur. Nihilominus peccat vel in solo tempore, vel simul cum temporis vitio habet vitium qualitatis, aut quantitatis, aut utriusque. Si qualitate & quantitate simul sit vitiosa, omnino damnaunda est. Si quantitate tantum, quantitas vel excedit, & tunc est inhibenda, vel deficit, & tunc an supplenda? certant artis proceres, & adhuc sub iudice lis est. Si qualitate peccaverit, decreto HIPPOCRATIS *Secl. 2. Aphor. 2. damnabitur.* Nam cum non purgantur talia, qualia purgari oportet (quod idem est, ac si diceret, quæ peccant in qualitate) nec conferro, nec leviter solvari. Profectò si non conferunt, non sunt proficua; si non tolerantur, non sunt cum virium tolerantia. Si tandem solius temporis peccatum sit, non autem omnino qualitatis, neque valdè magni quantitatis, tunc posse aliquid judicare, tam certum est, quàm quid certissimum. De deficiente ergo ex quo excretionem, sub iudice lis est, HIPPOCRATIS *Conjilio Secl. 2. Aphor. 29. cum morbi inchoant, si quid movendum videtur, move.* Ubi GALENUS esse melius ait, in prin. ipus evacuare, quod minorem jam factam materiam facilius natura possit concoquere. Si igitur evacuatio confert in principio ad futuram coctionem, sanè isthæc evacuatio ante coctionem fit. Si autem fieri potest cum utilitate ab arte, aut quod majorem agitationem patitur corpus, multo melius fiet à natura, à cujus operibus minor contingit agitatio. Hæcenus CASTRENSIS.

Hinc & excretionem symptomaticam interdum morbum solvere, observatum refertur in BARTHOLOMÆO *Secl. 1. Med. Hassni. Vol. 4. pag. 104.* Interea Medicus, sive sistendas, sive promovendas observaverit hujusmodi evacuationes, semper acce peccans Temperantibus & Invenientibus enervare, sedulus insistat. Siquidem tam materie morbificæ turgescientia, quàm excretionem symptomaticam, semper sequuntur nimia in materia occasionalis, seu fermenti ejusque ventriculi, acrimoniam, tam benignam, quàm malignam. Sive enim ex aucta effervescencia, sive ex irritatione partium sensuum, & hinc nato motu contentorum vitioso, sive ex utroque oriri dicamus turgescientiam, aut excretionem sympto-



Symptomaticam, sanè utique principale peccans erit acrimonia nimia.

In specie superius insinuata *auxilia generalia* quod attinet: ex fonte chirurgico imprimis se offert venæsectio, de cuius usu queritur. Ex supra iactis fundamentis per se patet, insignem circa venæsectionem intercedere abusum, in omni febre eam instituere; cum per se ferè nil in febre curanda conferat venæsectio, utcumque ejus effectus explicentur. In intermittentibus nullius usus est; Præcipitantibus enim solis & Evacuantibus curantur: imò si in his secetur vena, procuratur, ut fiant magis chronice: & si mille mihi curandæ essent, nunquam venæsectionem instituerem. In continuis verò cautè & cum distinctione procedendum, quia in ardentibus sæpius lubet malignitas. Jam verò in malignis *secare venam subindè est ægrum jugulare*. In ardentibus verò propriè dictis, jisque benignis, non incongruum est venæsectionem administrare, utut non semper necessariam esse observaverim; si enim in febre benigna maturè instituitur vomitus, negligi potest venæsectio: Verùm cum in continuis ardentibus subindè lateat malignitas, propterea in administranda venæsectione cautissimus sit Medicus, adeò, ut, ubi secanda vena, in primo principio administret; tertiâ enim vel quartâ demùm die eam instituere non rarò periculosum est; & quò malignior febris, eò minus locum habet. Convenit ergò per accensum saltem venæsectio interdum in febribus ardentibus continuis benignis, in subjecto juvenili, & qui laudabili chymo ac generoso victu, præsertim in potu, utuntur, aut subjecto alias vomitum abhorrente, aut in quo consuetæ quædam sanguinis evacuationes artificiales sunt suppressæ, tempore verno & æstivo, in subjecto plethorico, tam vero, quam apparente, aut in quibus nimia effervescencia aut ebullitio sanguinis, indeque orta spirituum exandescencia intensius observatur, vel si fortè aliæ circumstantiæ eam tuaverint, in primo tantùm, ut dixi, principio. In quibus verò subjectis effervescencia & ebullitio massæ sanguineæ mitior est, in his venæsectionis nunquam suavis ero. Nam rectè dicit ZACUTUS LUSITANUS, venæsectionem intempestivam, causam, mortis esse in febribus ardentibus, lib. 3. *Prax. admir. Observat.* 57. Et nescio sanè, cui usus sit venæsectio? Dicunt quidem, ut ventiletur massa sanguinea, & supprimatur calor: sed parum refrigerationis sperandum, & merum est effugium, cui contrariatur Praxis. Nam, ubi est insigniter calidus sanguis & in vasis coarctatur, vix ebullitio potest habere spatium sufficiens, tunc sanè, quando aperimus venam, potius ebullitionem augemus, quia majus acquirit spatium pro ebullitione. Cauti ergò sumus in venæsectione in febribus continuis. Conf. hic HELMONTIUS de febribus, ubi de venæsectione, hinc CNOEFFELIUS in *Metb. Meden. Febr. epidem.*

Ex fonte Pharmaceutico in genere se offerunt Evacuantia, sive sint vomitoria, sive Purgantia in specie sic dicta, sive sudorifera, sive diuretica, & hinc symptomatum urgentium sedativa opiata. Equidem & horum omnium usus spontè patet.

Evacuantia quidem purgantia nulla sanè per se febribus conducunt, nisi in declinatione, adeòque correcto fermento febrili & coctâ materiâ, ac sedatâ ebullitione. Frustra enim aliàs propinantur, turbabunt magis massam sanguineam, irritabunt partes solidas, & quicquid evacuant, abique euphoria erit, cum non evacuetur tunc temporis, quod evacuandum esset, nullâ factâ utilis ab inutili segregatione. Confirmat hoc experientia, quæ ostendit, post repetitas etiam Purgationes eodem tenore pergere, interdum gravius affligere intermittentes. Continuat verò magis exasperantur ipsæ: id quod manifestò ostendit, non attingere Purgantia radicem morbosam, sed Medicos, & ægros deludere. Quod si aliquando à purgante remedio cesset febris, hoc uti rarum, ita summè accidentarium erit, sub liquaminibus istis, quæ faciunt & evacuant Purgantia, unâ forsan exhausto fermento febrili, aut ab acrioribus amaricantibus solutivis, v.g. scammonio aut colocynthide vi alterante correcto eodem, vi solutivâ propriè nil opere conferente. Sanè in omni evacuatione in febribus instat cynosura *apborismus* observandus HIPPOCRATIS: *Coctâ medicari oportet, non crudâ*. Per hoc medicari intelligit quancumque evacuationem, sive sit per urinam, sive sit per sudorem, sive per alvum. Hinc si in principio præscribenda propriè Purgantia, vomitus saltem tunc convenit. Natura hoc

monstrat, quæ nunquam; ubi sui juris est; Instituit evacuationem, adeòque nec crisin, nisi coctâ sit materia. Imitemur ergò naturam tanquam ministri, & nunquam evacuationem instituamus, antequam perfectè coctâ sit materia morbifica. Interim blanda primas vias abstergentia, & hinc præsertim diaphoretica, quovis ferè febris statu & tempore, nisi forsan crisis quædam instans aliud moneat, optimè adhibentur; vera tamen & propriè dicta purgatio non convenit, præterquam in statu aut declinatione.

Primas vias evacuantes, in quibus ferè stabulatur formes morbosus, sunt vel Vomitoria, vel per inferiora laxantia. Illa ex omnibus evacuandi generibus tantùm non in omni febre locum inveniunt, imprimis in principio sanè ipsæ vomitorii interdum etiam mox in principio radix morbosa quasi unâ falce demeritur: id quod restitit febrile, facilius dehinc curatur. Intermittentes febres sine eo difficulter curantur. In continuis acutis, & lentis, ibi in principio hic etiam in progressu, sunt optima: imò non rarum est, quod malignæ exindè, sed primo insulto adhibitis, multum levantur: vid. SYDENHAM in *Traçt. de febribus*. Ergo, qui apti sunt ad vomendum, nec in quibus aliquid obstat: item, quibus vel hypochondria suspensa, aut rugitus in jisdem est, aut nausea, vel tuctibus tectis amaricantibus; item cephalalgia vel aliquali vertigine vexantur, in febrium principio optimè, imò sæpius necessariò, vomitu evacuantur.

Quæ verò per inferiora laxant alvum in febribus, sunt vel injecta Clysmata, vel assumpta Pharmaca. Clysmata familiarissima in febribus locum habent, & imprimis pro levando æstu, & aliarum, præsertim capitis, per consensum ut plurimum partium symptomatis, & hinc abdominis pathematis propriis mitigandis conducunt. Bina saltem conditiones observentur eorum usum prohibentes.

1. Quando natura aliorum vergere, & evacuationem, præsertim criticam, vel huic saltem analogam, per alias vias instituere tentat: unde v.g. in paroxysmo in intermittentibus, naturâ criticam quasi sudorem tunc moliente, præposterè injeiuntur.

2. Quando exercitio cutanea in febribus malignis, vel expectanda est, vel imminet, vel jam adest, & facta fuit. Hinc in variolis, morbillis, purpura, petechiis, &c. minus conducunt, nec, nisi summi necessitate urgente ad eadem, eademque saltem lenissima, & tamen cautè, fiat accessus: potius quantum possibile, dictis in affectibus vitentur.

Per os assumenda sunt blanda laxantia, præsertim salibus digestivis sociata & acuata, & ultra primas vias baud penetrantia, ex Tamarindis, Rhabarbaro, Infuso sennato &c., & hæc speciatim in principio locum inveniunt.

Sudoriferorum ulum ipsa nobis natura monstrat, Cum enim in febrium sine natura suâ sponte copiosos sudores moveat soleat, ita, ut nulla febris perfectè cura recidivæ metum curari, aut judicata dici possit, nisi sudor in declinatione provocatus fuerit; ob id, apparentibus coctionis signis, sudorifera sunt optima: sicuti in toto earum decursu præcipitantia sunt utilissima, quæcum liberam & copiosam transpirationem promoveant, æqualia non solum effectui sunt sudoriferis, sed propter operandi modum illis etiam præferenda: dum sine insigni vitium jactura successivè & cura vel contentorum graviorem agitationem, vel contentuum partium molestant irritationem operantur, ac heterogeneas fermentativas particulas in massa sanguinea hærentes discutunt & excludunt. Nempe, ut supra insinuatum, minus periculose illi decumbunt, quibus in febribus cutis humida aut madida percipitur, quam quibus arida aut sicca est. Cæterùm in sudoriferis observetur, quod non semel, sed quovis opus est, propinantur: Nam primâ sudatione tantummodò movetur massa sanguinea potius, quam ut integrè evacuetur. Iteratis ergò subindè sudoriferis, instituenda est denud massæ sanguineæ perfectâ purificatio. Certè vulgus indoctum non raro imminentes, aut jam incrementis febres, etiam continuas, repetito sudoriferorum, eoque promiscuo usu non rarò curat. Semper tamen observandus criticus naturæ motus, ne impediatur; peractâ crisi sudor iteratus tutissimus est, quo omnis metus recidivæ tollitur. Eligenda autem temperata, non acuta, nec aromatica, aut resinosa, sed vel fixa abstergentia, commun-



communiter *Præcipitantia* dicta, vel volatilia non oleosa, aut non calida. In malignis verò in principio, & toto morbi cursu utramque faciunt paginam alexipharmaca & sudorifera, malignitati in specie resistentia, sequendo nempe naturæ ductum, quæ ferè quartâ quintavè die erumpere facit petechias seu pustulas, nunc bubones, nunc abscessus, &c. Hæc ipsa tamen, prout plùs vel minùs simul effervescentia febrilis urget, etiam absorbentibus appropriatis, in specie sulphuribus mineralium fixis, socianda sunt; in principio quidem temperatioribus, in incremento, & statu fortioribus: siquidem in malignia nullæ cruditatis aut coctionis haberi potest ratio, upote quæ in talibus locum non obtinet, utut in declinatione earundem subindè aliquid materiæ coctæ simile, in urinis ægrotum occurrere solet. Quod si minùs ad sudandum corpus dispositum fuerit, tutissimum est sudoriferis addere *Opia*: quæ, uti alias quascunque excretiones sistunt, ita promptissimè sudorem promovebunt, & naturam ad faciliorem per sudorem evacuationem disponunt. Sed de hæcenus dictis remediis vid. *HOLLTERHOFF Tract. de Error. Medicor. cap. 11.*

*Opia* quod attinet: per se non conveniunt, per accedens interdum ad mitiganda atrociora symptomata, imprimis subindè urgentia, usurpantur; aliàs naturæ motum impediendo febres quidem interdum sistunt, sed aut graviori cum recidiva, aut chronici alicujus morbi supervenientis metu. Unde, quando adhibentur, *saltim in incremento fiat, non in statu, ne* motus critici plùs minùs impediantur: non in principio, *ne* naturæ conatus inchoatus sufflaminetur; & hoc in continuis. In intermittentibus verò, præmissis præmutendis, vel ante paroxysmum ad inhibendam febrem, vel in paroxysmo ad sopiendam graviora symptomata: utrinque non, nisi appropriatis vel absorbentibus, vel diaphoreticis permixta.

Denique ex *fonte dietetico* petita præsidia quod attinet: *frictio* intensior ordinarium symptomata febrium est, & oriri dicitur à calore; quod tamen irridet *HELMONTIUS*, idque jure apertio; quin potius à defectu salivæ, & à sale alcalico lixiviali faucibus in paroxysmo adhærente; hinc in febribus scorbuticis, tam intermittentibus, quàm continuis, sitis est intensa, aut tali sitis admodum torquentur ægri. Ratio, quia sal falsum scorbuticum vellicando fauces illam exchat. Hinc etiam, uti rectè dicit *HELMONTIUS*, *aliquot gustus spiritus seu flagmatis sulphuris acidis* plus levanturum, quàm integra mensura aquæ frigidæ simpliciter hausta, aut potus cujusdam. Non ergo ad calorem, sed ad falsissimum vel lixiviosum erit respiciendum.

Saccharata quæcunque in omnibus febribus insigniter nocent, cum saccharum & mel, condita, syrupifata, aliæque dulcia, sint admodum fermentativa, adeoque fermentationem præternaturalem inducant, & ita malum exacerbent. Conf. imprimis de sacchari & dulcium noxa in febribus *HEINRICUS* ab *HEER Obs. oppido rar. 5.* item *PANAROLLUS Penitente 1. Observat. 12.* ubi similiter dulcium & syrupifatorum usum in febribus perstringit.

Vinum vulgò pessimo consilio interdicitur febricitantibus, quod tamen optimum est; Nam in intermittentibus haustus vini aciduli, speciatim Rhenani vel Necarlai, non nocet; siue die intermissionis assumatur; siue etiam in rigore paroxysmi, dum vires nimis prostratæ apparent, propinetur; quia hoc reficitur ægor: sicut & in febribus continuis malignis, & in ipsa peste, generosi vini haustus remedium locum obtinet, quippe quod malignitatem coarctet, stomachum languentem mire recreat, & pro conservandis & restaurandis viribus summe laudabile est egregium: id quod etiam suo modo in febribus continuis verum est, sed moderatè. Quoad febres verò continuas benigniores: in causo tertiana continua, hæmiplegia, &c. vino abstinere tutius est, nisi adsit vomitus, summa virium prostratio, ut & syncope. *HIPPOCRATES* in omni febre vinum porrigit: naturæ enim nostræ vinum est amicissimum, & vires insigniter restaurat, prætereaque acidum ejus stomacho in omni febre laboranti perquam gratum, non rarò etiam urinæ fluxum promoveret salubriter, habito tamen delectu: conveniunt enim imprimis vina acidula, defæcata tamen, alba, debilia & aquosa, ut loquitur *POTERIUS de Febribus P. 2. cap. 26.* non pro potu ordinario, sed pro appetitu ægri, & ratione virium. Nil magis situm in febribus tollit, quàm acida. Vina autem dulcia & pinguis, qualia Hispanicum & Malvaricum, minus locum obtinent: nempe viæ fermentativa vini, ejusque acidum ardentibus in fe-

bribus nonnihil suspecta sunt, nisi in casu, quo medicamenti vires subit. Unicus vini debilis haustus plus sitini sistere solet, quàm dimidia *cerevisiæ* mensura. Equidem vulgò dicunt, vinum calorem inferre, & sic febrem augere, ratione spiritus sulphurei volatilis: Verùm absurdam hanc esse sententiam, ex superioribus patet, cum potius tam spiritus volatilis, cujus in haustu integro vini vix 3j. vel 3ss. continetur, quàm ejus acidum, stomacho & viribus dejectis sit amicissimum. Sanè, quibus nocet vinum in febribus, mox ab ejus usu noverunt percipiant; nempe mox phlogosin & æstuationis incrementum, non ob spiritum ejus inflammabilem, sed ob acidum. Talibus igitur interdiciendum vinum, vel mox superingessis absorbentibus vis ejus restringenda.

Quoad potus alios: *cerevisia*, aut potus aliàs consuetus alius, non rejiciendi sunt, nisi amarior sit molestus, aut æger eos horreat. Omnes ut plurimum febricitantes, in specie in continuis, reculant *cerevisiam*; quia tunc deficit appetitus, & in stomacho digestio prima plùs minùs: Ob id *cerevisia* talis assumpta in stomacho mox corrumpitur & cadaverisatur, ac nidorem stomacho molestum contrahit, indeque molestiam ipsi excitat, unde mox nausea ejus & abhorrentia sequitur; hinc simplex, tenuis & aquosus potus, facile transiens, ventriculo amicus, nec cum lædendus, est optimus. Appetunt præterea subindè febricitantes coentum, vel aliq. simplices aquosos potus, item ejus fratrem Germanum, *Kauterling*, qui ipsi non denegandi sunt: saltim, quoniam facile flatu in stomacho hypochondriacorum generant, & stomachi tonum laxant, præterea, ut corrigantur nonnihil, & stomacho reddantur magis grata, blandè acidà instillanda erunt, siccus citri nempe, cydoniorum, aut alius similis: item Tinctura florum bellidis, cyani, rosarum, violarum, cum acido phlegmate virioli paratæ; spiritus minerales, cum simplicibus & dulcificati, tum compositi, clysti; quatenus hi talia acris lixivialia & nidorosa acris, quasi alcalisata, in stomacho coarctant, præcipitant, & in aliud esse mutant, nec non sub copioso potu stomachum ejusque robur conservant: c. g.:

*R. Flor. rosar. rubr. M.ij.*

Infunde in aquam spiritus sulphuris blandè acidulatam, sicut in loco calido, donec tinctura emergat: Hæc percolata sumatur, addendo

*Syrupum acetos. citri vel berberum,*

vel rubi Idæi,

& F. quasi Juleps.

S.

*Juleps confortativus.*

Vid. *Monhebbii Decodum citri.*

Vel

*R. Pomor. citror. no. iij.*

In taleolas dissecta contergantur sacch. alba;

Coq. in l. q. aqu. simpl.

*Colatura B. S. adde*

*Succi citri rec. ʒiij.*

*Flor. rosar.*

*Papav. errat. an. M.ij.*

*Spiritus salis dulcis parum.*

Sicut in loco tepido in infusione ad extractionem uncturæ.

*Colatura*

D. S.

*Juleps citius confortativus.*

Sic quoque aqua in formam Julepi aciduli preparari potest. Item nitrum antimoniatarum dissolvatur in potu, nisi ventriculi tonus debilis, nausea, &c. inhibeat.

In intermittentibus potus tales aciduli non prius, quàm post frigus aut horrorem, affligente æstu, non tamen undè vice, possunt admitti: potius tunc primum potum calidum plùs minùs medicatum assumant, cætera moderatè fugida largiùs superbibant, ut largior promoveatur sudor. *PANAROLLUS & LANGIUS in suis Epistolis* perstringunt eos Medicos, qui siccantibus ægris omnem subtrahunt potum in continuis febribus; cum tamen in his largiùs sit præbendus, modò fiat cum regimine: nempe dum in continuis continuo sitiunt, crebriùs quidem, sed quacunque vice parcius, nec nimis frigidus porrigendus potus, isque suprà dicto modo acidulatus, ne noceat, & minùs laxet stomachum. Imq. in febribus

conti-



continuis malignis optime interviit pro potu ordinario mistura ex aqua fontana seu coveuti seu Kauterlingii part. ij. vini part. j. vel saltem dimidia, quarta, quinta, & sexta: quibus ad mens. iij. commistis addatur pomum citrium in taleolas dissectum, & est potus suavissimus & convenientissimus. Cui pro lubitu addatur Celatimæ cornu cervi ʒj. ad ʒij; sic appropriatum magis redditur. Alias quoque serum lactis bene depuratum & succo citri vel aceto nonnihil acidulatum, in febribus continuis benignis, item in intermittentibus scorbuticis & hypochondriacis, potus est optimus, illi largior alvus inhibeat. Sed depuratum esse debet serum, ne pars caseosa remanens exasperet malum. Cum pomum citrio in taleolas inciso purificatur, & convenit etiam in morbis malignis continuis, laxat alvum, & temperat sal scorbuticum, & hypochondriacum peccans. Vel in forma Julepi:

℞. Seri lactis ℥ij.

Succicetri rec. ʒij.

Flor. bellid.

Papav. errat. an. ʒij.

Ebulliant vase clauso, donec tingantur:

Colaturæ adde parum sacchari:

M. D. S.

Julepus operitivus.

In specie spiritus sulphuris cum s. q. aquæ communis propinetur, qui præter alia commodè, & copiosum sudorem movere solet: Vid. RIVERIUS Centur. 1. Observat. 19. PIENS de Febribus Par. 2. pag. 21.

Quoad viſum: ordinariò parum in febribus continuis apperunt ægri, ob id febricitantes nunquã ad alimenta nimis cogendi sunt, ac nil, quod ipsi nausent, porrigendam, sed tenuis dicta est optima: Semper tuniandum illud HIPPOCRATIS: Corpora impura (qualia primariò sunt febricitantium) quod plus nutrit, eò magis læſerit: quia alimenta quæcunque in febribus, quæ citra appetitum & cum nausea assumuntur, non digeruntur; sed in stomacho calido & languido putrescunt, & lodes febriles augent. Laudatissimus est HIPPOCRATIS Aphorismus 69. Sect. 7: Si quis cibum febricitanti dederit, ut sanè robur, sic laboranti morbus sit: Unde in febribus præsertim continuis, tenuis victus est optimus; & quod magis acuta est febris, eò tenuior ac strictior convenit diæta. Unde, licet ad plures dies ægri jejuni jaceant, perinde erit, nec utquam videri febricitantem fame pereuntem, sed potius, siquid ingeritur febris exasperatur; superveniunt enim cardialgiæ & alia symptomata. Nam in alimentis appetitus præſcribit rationem, quantum, & quale, & tempus: Unde consultius est ad cibum non cogere, vel persuadere ægros; nec voluit HELMONTIUS suos ægros à morbis obesos assurgere. In specie carnis usus ut averſatur in febricitantibus, ita nocet jis: item pisces viscidiores, imprimis in febribus intermittens, studiosè vitandi. Fruſtus quoque horæi, exque jis parata fermentescibilia, noxia sunt: nam omnia, quæ augere aut inducere possunt fermentationem præternaturalem in febribus, nocent. Summatim: Diæta febricitantium sit tenuis, parca, neque plus ægris obtrudatur, quàm ipsi appetunt: frustulum panis vino intinctum, juscula, leves pulcullæ, & ad summum ova forbilia in febre quacunque, tam continua benigna, quàm maligna, abundè sufficiunt: Juscula interdum avenacea, & pulces ex pane & cerevisia, magis conducunt. In intermittens verò ingruentè paroxysmo stomachus sit vacuus; quicquid enim in stomacho deprehenditur sub paroxysmo, corrumpitur: ac proin attendamus, ut ægri diu ante paroxysmum cibentur, si fortè appetant cibum.

Quies corporis, tam externa in vigilantibus, quàm interna in dormientibus, est optima: sanè, quod quietiores sunt ægri (nisi hoc ex omnimoda virium prostratione fiat) & minus anxii, eò melius est signum, & eò mitior est febris, ac benignior ejus conditio: e contra si anxii sunt ægri, jactabundi, membra inordinatè agitant, suspiciosi, &c. eò pejus.

Somnus semper bonum signum est, nempe naturalis; præternaturalis autem comatosus, qui malignis interdum supervenit, malus & curandus. Aliàs nunquam arcendus somnus ab ægris est; sibi enim in somno relicta natura, nec perturbat spiritus, optimè suo funguntur munere, & coctionem materiæ eò citius absolunt; unde & arte in incremento morbi, moderatè tamen, provocari potest: Ut taceam, ubertorem ferè esse insensibilem transpirationem, ac in-

terdum sensibilis sudatio sub quiete somni esse solet. Et hæc de Febribus in genere sufficiant.

## C A P U T I I

### D E

## FEBRIBUS INTERMITTENTIBUS.

Hactenus in genere locutus sum de Febribus, dictumque fuit febres consistere in tugescentia ac fermentatione sanguinis præternaturali vitiosè aucta & depravata. Jam observandum: quod hæc fermentatio febrilis aut continua sit, & sine intermissione fatiget ægros, donec depurata massa sanguinea aut per crisi naturæ beneficio præcipitata & segregata heterogenea excludat; aut adjumento, debita evacuatione artificiali instituta, imprimis per sudorem eadem expellat; aut ista effervescentia febrilis est interrupta, suis interstitiis distincta, quibus elapsus novus insultus, & quasi nova quædam fermentatio redit: ita, ut in genere febris omnis aut sit continua, aut intermittens. Hæc vice de Febribus intermittentibus. In specie, quod attinet Febres intermittentes: sunt, quæ per intervalla nunc breviora, nunc longiora, diversis redeunt paroxysmis, tempore intercalari ab omni febre penitus vacuo. Unde, dum febris in genere est motus spirituum præternaturalis, & sanguinis fermentatio nimia & depravata, seu agitatio ejusdem inordinata, ut plurimum cum calore & siti, aliisque præterea variis symptomatis molesta, quibus œconomia animalis variè perturbatur; hinc febres intermittens erit interpolata, ac quasi interrupta talis febrilis fermentatio. Referenda itaque erit febris inter symptomata actionis depravata spirituum & massæ sanguinæ; qui verò malum morbum desinit per morbum intemperiei, hi possunt respectu qualitatum nostrarum secundarum nunc intemperiem calidam, nunc frigidam; vel secundum qualitates nostras primas, intemperiem acrem, vel fœsam, vel amaram, accusare: Unde pro singulorum paroxysmorum accessione ac interſſio diversæ febres hæc diversæ quoque fortuntur nomina, ut Quotidiana, Tertiaria, Quartana, &c. Nam si quotidie novus redit paroxysmus præcedenti in proportionem respondens, (hæc enim est cautela in cura quotidianarum,) dicitur quotidiana; si verò hoc contingat tantum alternis diebus, & una dies sit vacua, dicitur Tertiaria; si post duos demum interſſionis dies revertantur paroxysmi, vocatur Quartana &c.; sicut præter Quotidianas, Tertianas & Quartanas etiam dantur Quintanæ, Octanæ, Nonanæ. Mihi sanè contigit videre febrem octanam singulis diebus Veneris circa vespertam redeuntem, quam, præmissio vomitorio, spiritu salis ammoniaci breviter proſigavi. Exempla talium febrium quintanarum, octanarum & plurium aliarum, videb. in SCHENCKIO lib. 6. Observ. de Febribus. Quinimò dantur etiam Febres mensuales singulis mensibus tantummodò redeuntes; quale exemplum in juvene observatum annoravit SCHENCKIUS citato loco: Idem exemplum observavit LINDANUS in muliere, quæ toties, quoties mensuram patiebatur purgationem, ordinariò per tridum febricitabat. Imò dantur etiam febres anniversariæ, seu singulis annis certo tempore redeuntes: Imò Febris, quæ die natalis quorannis affligebat, & tandem etiam exstinguebat; fuit observanda: vid. SCHENCKIUS c. l.

Febres hæc nunc sunt simplices, nunc ex pluribus intermittentibus sunt compositæ, quando nempe non uno & simplici paroxysmo, sed duplici aut triplici vice periodus febrilis absoluitur: Tales sunt, v. g. quotidianæ duplices, triplices, quoties eodem die duo tresve proportionem variâ successivè sibi respondentes producuntur paroxysmi: Dantur Tertianæ duplices, triplices, item quadruplices ex tot Tertianis compositæ; sive in tertiana duplici eodem die bini, sive alternis diebus singuli revertantur paroxysmi; sicut in tertiana triplici una die bini, altera unus tantum observatur paroxysmus. Id quod etiam de Quartanis similiter obtinet: Contingit enim, ut æger uno die sit immunis à febre, & diebus sequentibus patiat paroxysmos singulos, atque tunc est Quartana duplex:



**duplex** : Quin & contingit, ut quotidie novus recurrat paroxysmus, hoc tamen ordine, ut primus in proportionem durationis, afflictionis, symptomatum, &c. respondeat quarto, quartus septimo, secundus quinto, quintus octavo, tertius respondeat sexto, sextus nono; & sic consequenter; & tales sunt Quarta triplex, De his vid. SYLVIVS l. 1. *Prax. cap. 27. §. 13. & sequ. & SENNERTUS Paralipomen. pag. 175.*

Ex his omnibus de febribus intermittensibus quotidianis dubium est, imprimis, an dentur: hoc est, an detur talis febris intermittens, quæ quotidie simili typo recurrat, ita ut secundus paroxysmus primo, tertius secundo, quartus tertio, &c. exactè sit similis; siue in incremento accrescant; siue in statu similiter consistant; in declinatione similiter decrescant. Paroxysmi horum plurimum sunt horarum octo, intermissio 16, imò sunt, qui affirmant, subindè ad horas 24. extendi paroxysmum, ita ut continuè similis appareat. Multi affirmant, multi negant: Qui affirmant, GALENUM producant: Qui negant, producant experientiam. Cum enim in schola Galenicorum præter sanguinem tres statuatur humores à bile derivatur Tertianam, à melancholia Quartanam; hinc necessariò à quarto humore, pituita, voluerunt febrem quotidianam produci. Qui negant, uti dictum, producant experientiam, quod rarissimè observatæ sunt tales febres; Quare etiam à BARBETTE omnis Quotidianæ creditur Tertiana duplicata. Sed verior est sententia affirmativa, ut ut certum sit, rarè observari Quotidianas intermittentes: vid. tamen RHODIUS *Censur. 1. Observat. 1. & 3.*, ubi exemplum habet de febre quotidiana intermittente 4. annorum: Sic GABELCHOVERUS *Cens. 6. pag. 137.* observavit febrem diuturnam singulis diebus horà certâ invadentem. Verùm decipiuntur interdum Medici, (sicut fateor, quod ipse ita fuerim deceptus,) ut, quando febris quotidie recurrit, putent esse Quotidianam; quæ tamen sæpius est tertiana duplex, ut ut in principio singulis diebus eodem tempore & eadem proportionem recurrant paroxysmi: eventus docuit, fuisse tertianas duplices; cum vel tertiana prius simplex fuerit; vel interdum tales finiuntur ita, ut uno die paroxysmi cessent, alternis postmodum diebus redeunt, quod clarum exemplum, fuisse tertianam duplicem; vel sit tandem, ut unus paroxysmus subindè soleat postponere, altero statum tempus observante, quæ similiter testantur, fuisse perfectam tertianam duplicatam; aut denique, quando sit, ut paroxysmi se mutuo insequentes non habeant eandem ad se invicem proportionem, ratione nempe temporis invasionis, aut ratione durationis, aut ratione comitum symptomatum: in talibus casibus ubi non respondet secundus primo, tertius secundo, & sic porro; sed paroxysmus in tali casu tertius responder primo, quartus secundo, quintus tertio, & sic porro, similiter est febris duplicata tertiana, ut ut quotidie invadens. Interim cauti sumus in determinandis quotidianis; non enim arbitror, simpliciter negandas esse, cum nulla appareat contrarietatis ratio; quin potius, sicut tertianæ in quartanas, ita & hæc in tertianas faciliè mutari possunt. Sed negotium totum pendet à controversiâ, unde ordinata ista febrium sit periodus: quæ quamdiu latet in obscuro, etiam præsens de quotidianis controversiâ ferè in suspensio manet.

Sed præter has febres certâ periodo affligentes, observantur etiam febres intermittentes, quæ nullam periodum observant, sed planè incerto tempore redeunt & affligunt; quæ ob id *inordinatæ* vel vagæ, item *erraticæ* communiter, HIPPOCRATI *Placita*, dicuntur, & verè ex scorbutico originem ducunt.

*Erraticæ* sunt, quæ quidem aliquam periodum habent, sed ita, ut videantur non habere: sic v. g. hodie invadit horà duodecimâ, perendie sexâ matutinâ, rursus perendie vespere octavâ, rursus perendie horâ decimâ, &c. *Vagæ* sunt, quæ planè nullam periodum observant, neque tempus accedendi vel recedendi habent, quin aliquando per noctes diesque aliquot in septimana remittit, & tunc redit, tum sit mox tertiana, mox quartana &c., ut ut communiter hæc due promiscuè usurpentur.

Historia febrium intermittentium, quomodo affligant, & successivo symptomatum ordine paroxysmos absolvant, optimè enarrat SYLVIVS l. 1. cap. 30. §. 13. ad 26. In genere tamen triplici primario symptomate, eoque insigni, ordinatò, præcedente scilicet frigore ac horrore vel rigore, unde Germani dicunt, *das Kalte*, & subsequente calore plüs minus intenso totius corporis, indeque emanante ludo-

re largo, molestia sunt hæc febres.

Hæc tria verè primaria constituunt symptomata paroxysmorum, quæ ferè semper aut ut plurimum in intermittentiis paroxysmo percipi solent, ut ut circumstantiarum varietate nunc unum, nunc alterum symptoma, vel abundare vel deficere soleat, & secundaria quasi symptomata superveniant. Percipiunt nempe ægri ante paroxysmos febrium intermittentium (ut totum earum describam periodum) *Oscillationem & pandiculationem*, quin & *lassitudinem artuum* universalis subindè est molestia; hinc non rarè insequi solet in lecto *inquietudo corporis*: Hinc molestius subvenit plerumque corporis quædam lenis refrigeratio; quæ refrigeratio, quod benè notandum, lævior aut saltem perceptibilior est in regione lumbari, ita, ut in dorso sursum & deorsum repere videatur: unguetque ingruente paroxysmo sunt lividi aut cærulei: frigus in abdomine sentitur, hinc magis, magisque totum corpus, & in specie extrema digitorum, manuum, nasus, mentum refrigerantur; coque runtur ægri circa regionem lumbarem de sensu lacerationis: Frigori junctus est nunc levis horror, nunc gravis rigor concurrens & quætiens membra, ut Patientes epilepsia affligi videantur: durante frigore dolores subindè nunc rodentes, nunc lancinantes, nunc dolores vagi artus affligunt, nunc alia tormina & murmura inflant abdomen, donec tandem remittant, nunc immediate, quod bonum, nunc, quod sejus est, successivè & certo intervallo & incipiente frigore. *Pulsus*, uti est frequentior, ita fit insigniter minor, fit etiam debilior, interdum tam debilis & exiguus propter fermentationem sanguinis imminutam, ut vix digitis percipi queat. In hoc frigore, aut remittente jam frigore, subindè *anxietates circa præcordia* solent affligere ægros, unde tunc sentim sentimque frigus mutatur in calorem, cum quo calore intenditur *hæsus*, quæ rariùs, aut saltem non adeò vehementer, urget in frigore. Cum calore *pulsus* fit continuè frequentior, sensim fit major aut robustior: *Vbi enim in corporis incaluit, cæntia pulsus est parvus, signum ferè esse solet febris malignæ, summeque virium prostratæ*; ideoque non parvum imminet periculum. Calori aucto accedit *linguæ ariditas, respiratio aucta*, nonnumquam *capitis dolor*, ac ætus temporum & collis pulsantis, *vigilia*, non rarè quoque in paroxysmo graviore *delirium*. Hinc remittente iterum nonnihil calore sudor emanare solet nunc copiosior, nunc parcius, cum quo paroxysmus evanescit, ita, ut hoc cessante nihil amplius morboſi in ægro restare videatur, aut saltem urinæ sequitur copiosa excretio, insequente tunc ferè somno vario, nunc magis, nunc minus quieto, somnus variis moleſto, ac turbato. Notandum tamen in tertianis magis affligere ætatem, in quartanis frigus & rigorem, in tertianis maiorem sium, in quartanis maiorem artuum lassitudinem, quæ in & post paroxysmum solet affligere. Hic est quidem modus ordinatus, quo solet invadere febris: nihilominus tamen observatur subindè anomalia seu degeneratio in paroxysmis à consueto hoc ordine: sic enim ratione symptomatum dantur febres *simpliciter algidæ* vel frigidæ, seu tales, quæ affligunt cum frigore aut horrore, quem autem nullus aut omninò levis insequitur calor, uti in febribus frigidis *æstus* apparet solet, de quibus supra: E contra etiam dantur febres intermittentes *simpliciter calentes* seu ardentes; idque in specie Tertianæ, vix quartanæ, quæ citrà frigus aut horrorem ullum, mox à calore & ardore gravi inchoant, qui calor etiam interdum post paroxysmum subindè durat, aut saltem lenè admodum ac pedetentim remittit. Rarum interim est, inversum horum in paroxysmo ordinem, ita, ut calor præcedat, sequatur frigus, &c. vid. PRJMEROſIUS de Febribus l. 2. cap. 4. pag. 98. Unde pro huiusmodi symptomatum variationis ratione in paroxysmo plures accidentales intermittentiis differentie emergunt, dum dicuntur febres *vomitivæ*, quæ ferè semper, imprimis in tertianarum principio, corripunt vomitus, rariùs dejectiones ordinatæ: *Siticulosæ*, quando sitis nimis ac extraordinariè urget, idque tam in frigore, quam calore, quod in scorbuticis subindè solet evenire: *Famelicæ*, quibus conjuncta fames gravior, & tantum non inexplebilis, idque sæpius inchoat in paroxysmo, aut saltem eodem continuato; Febres *Cardiacæ*, quæ cum molestia cardialgia conjunctæ sunt: *Terminæ* seu colicæ, quando in principio paroxysmorum, aut saltem in statu, subindè tormina ac dolores abdominis sunt molestia: *Anxiosæ*, quæ imprimis cum insigni anxietate, præcordiorum angustia, & hypochondriorum tensione sunt molestæ, quæ symptomata emulsi status vel ructus alle-



alleviant nonnihil, quales febres anxiosas, illi, qui malo hypochondriaco sunt obnoxii, solent ut plurimum contingere: *Tussiculosa* (qualem ipse vidi) quæ inchoante paroxysmo cum gravi tussi solent esse molestæ; inanis hic est tussis, & in qua parum, aut omnino nihil, etiam rejicitur: Item *Deliræ*, quando nempe in paroxysmo, imprimis in declinatione subinde delirium adest & recurrit: In declinatione dico: rarum enim est, ut in principio morbi adsit delirium: Vid. MARCELLUS DONATUS *Hist. Med. Mirabil. lib. 3. cap. 14.*, qui observat delirium melancholicum in muliere quarantâ laborante, quod delirium melancholicum singulis paroxysmis mox in principio rediit, remittente verò paroxysmo, & ipsum remisit, & intermisit: & hinc inde etiam plures tales, aut etiam aliæ in Practicis occurrunt, in specie prolixius in SYLVII *Praxi c. l. §. 7. & sequen.* Quibus addantur febres hysterica, i. e. quæ in paroxysmo conjunctæ sunt cum pathematis hystericis, imprimis cum suffocatione hypochondriaca; quale exemplum videbitis in M. A. N. C. *Anno 2. Observat. 193. pag. 295.*: & *Tertiana soporosa* in M. A. N. C. *Anno 4. & 5. Append. pag. 45.*

Observandum hic est, diversimodè febres degenerari, & in se invicem quasi transmutari: V. g. frequenter observavi febres intermittentes ordinario modo affligentes, quæ post aliquot paroxysmos absque frigore & rigore prævio, solo calore ægris fuerunt molestæ: e contra occurrerunt tertianæ intermittentes, quæ in principio fuerunt simpliciter ardentes seu calidæ, sed post aliquot paroxysmos reverà in typum suum ordinarium frigoris & caloris transmutatæ sunt: sicut frequenter occurrit, ut intermittentes chronicæ mutant formam, & declinantes solo horrore aut rigore crucient ægros, absque æstuationis supervenitu.

Ut autem febres intermittentes continuæ benignæ frequentissimæ sint, observantur tamen intermittentes malignæ seu periculosæ ita distæ, quod instar febrium malignarum continuarum cum pulsu parvo ac debili, insigni virium prostratione, summa cordis anxietate, inquietudine, in principio paroxysmi affligunt, interdum exanthematum vel petechiarum eruptione & similibus sanctis symptomatibus, sæpius sunt lethales. Dubium quidem hic quibudam occurrit: *An dentur febres intermittentes malignæ?* Siquidem has ipsas vix ac ne vix quidem natura sustinere posse videtur, quin turbas excitet continuas, vimque inferat corpori, non nisi ægrè, ferendam. Sanè, si grassantibus febribus malignis etiam in intermittentibus omnia eadem symptomata observantur, quæ in aliis tunc temporis frequentioribus continuis & continenter occurrunt, ac præterea in cujuscunque intermittens paroxysmo crescente calore pulsus non est magnus, sed est parvus & debilis, celer & frequens, signum ferè solet esse intermittens malignæ, imprimis si reliquæ modò allegatæ unâ conspirent. Reverà non negandum videtur, cum observationes malignitatis in intermittentibus febribus indices non raro in Practicis occurrant, utur ab his mutato nomine *Perniciosa* vocetur: Conf. JULIUS CÆSAR CLAUDINUS *Resp. 2. SENNERTUS de Febribus lib. 2. cap. 16. pag. 488.* ubi de *Tertianis*, MENGATIUS *de Febribus malignis pag. 20.* Sic exempla talium tertianarum & aliarum intermittentium malignarum, præter GALENI testimonium, *Epist. 7. Tom. 81.* videbitis in EPIPHANIO FERDINANDO *Hist. 85.* de febre tertiana primò miti, quæ postmodum omnino maligna & pestilentialis facta fuit: quin & tales tertianæ malignæ videndæ sunt in RHODIO *Centur. 1. Observ. 9. & 10.*, in qua convalescenti macula livida proruperunt: sic maculas petechiales in febre tertiana observavit MARCELLUS DONATUS *lib. 3. Hist. Med. Mirab. cap. 14.* Quin & Tertianas duplices primò & contagiosas epidemicas, deinde etiam simplices, sudoriferis imprimis curatas, videbitis in SALMUTH *Cent. 3. Observ. 31.* Item Tertianam duplicatam malignam curatam in RIVERO *Cent. 3. Observ. 78. Cent. 4. Observ. 2. & 15.* Item aliam similem malignam Bezoartibus mineralibus curatam idem habet RIVERIUS *Cent. 4. Observ. 36. & Observ. à Pacheco comm. 4. pag. 260.* Nec solum Tertianæ, sed & Quartanæ malignæ observatæ fuerunt: vid. in MARCELLO DONATO *cit. loc.* Item *lib. 7. cap. 6.* item Quartanam malignam habet HORSTIUS *lib. 1. Observ. 12. & 15.* Addatur his FEHERIUS *Tractat. de Scorz. Cur. pag. 72.*, ubi intermittentem petechialem malignam recenset: imò de Peste Londinensi testatur HODGES, ejus febrem nonnunquam per paroxysmos, quamvis ut plurimum vagos, afflixisse.

Hæc in genere de Febribus intermittentibus, earumque variis symptomatibus.

## CAUSÆ

Hæc Febres omnes intermittentes cujuscunque sint typi, & quibuscunque stipatæ sint symptomatibus, ejusdem tamen omnes sunt natura, & essentia in radice; cognoscunt enim eandem omnino causam, focum, & fiendi modum, sive sint octanæ, sive sint simplices, sive duplices; diversificantur solum pro subjectorum, & hinc certarum quarundam circumstantiarum ratione, secundum rerum naturalium, non-naturalium, & præternaturalium varietatem, à quibus etiam causis postmodum tanta diversitas symptomatum in his emergit febribus: Unde etiam earundem medendi ratio in omnibus est una eademque in methodo medendi generali; saltem accidentalibus symptomatum differentia nonnihil observetur.

Patet hoc ex eo, quia sunt invicem permutabiles, qualis permutatio non deprehenditur, nisi inter habentia symbolum, seu quæ invicem symbolizantur, h. e. quæ essentia conveniunt: Sic non rarum est, febrem primò simplicem fieri duplicem, febrem quotidianam fieri tertianam: Quartanæ quoque in tertianam subita mutatio, & vicissim tertianæ in quartanam, jisdem utrobique permanentibus symptomatibus, urgere videtur, utramque ab eodem humore generari, ut loquitur PIENS *Par. 2. de Febribus pag. 96. & 234.* Nempe præsupposito spirituum motu & impetu, seu universali efficiente motuum, tam animalium, quam præternaturalium morbosorum, adeoque febrium causa proxima materialis seu occasionalis investiganda, quæ ratione radicalis originis & foci ventriculum & primas vias, ratione verò alterationis primariæ & invasionis massam sanguineam speciatim afficit.

Arbitror ergo Causam hanc proximam esse fermentum præternaturale in ventriculo genitum, quod subinde massam sanguineam alterando ratione motus fermentativi immutati, & partes nerveas primarum viarum vellicando, ratione acrimonie hostilis, occasionem & præternaturali spirituum motui, & hinc cæteris omnibus symptomatibus, quorum complexus paroxysmum constituit, suggerit. Fermentum hoc, seu admodum actuum, salina erit proflapia, ejusque acida, Conspirant enim in hoc & supervenientia symptomata, & una eademque intermittentium cura. Originem ejus, tanquam causam omnium febrium intermittentium remotam, fabricari puto in stomacho & primis viis, ex viciata nempe ventriculi digestionem immutata, vel depravata; sive in fermento digestivo, sive in alimento assumpto, hæreat vitium. Occasione enim digestionis læsæ ex acido fermentativo naturali facili præternaturale fermentum emergere, seque in alimentorum reliquiis, stomachi rugis invicatis, inserere, & ita fomitem febrium intermittentium pro plurius paroxysmis recurrentibus suggerere potest: ut hoc patet ex appetitu præternaturali, qui in his Tertianis nonnunquam etiam abolicus, imprimis verò circa paroxysmum imminens. Notum namque est, nonnullos antea sanos ex usu rei avertatæ, vel ipsi aliàs horridæ, incidisse brevi post in febrem; sicuti è contra ex usu rei appetitæ intensius, ac summè, utur apparetur etiam noxiæ, diuturnis correpti febribus optimè nonnulli sanentur. Confirmat hoc, quod vel levis error in dieta & curatione commissus, aut febres recidivare faciat, aut easdem adhuc durantes insigniter exacerbare aut etiam duplicare soleat. Nec rarum etiam est, quosdam secutare in his febribus solâ pertinaci ac statutâ inedia, è contra alii curantur excessivo potu, sive sequente vomitu, sive sequente largiore & profusiore sudore, quod Germani expriment: *Sie haben das Fieber aufgebungert oder versoffen.* Exempli passim sunt obvia; Quædam saltem enarrabo. Novi hic mulierem, quæ ultra tres menses constituta fuerat cum tertiana, sub longo medicamentorum abusu: Ipsa denique correpta appetitu halectis, ulum, Medico licet non connivente avidè devoravit, & exinde præter spem & opinionem febre curata fuit. Novi hic aliam mulierem, quæ naturaliter avertabatur caecum: huic cum clam, & ipsi nescienti tantillum casei cum aliis cibis fuisset oblatum, ipsa brevi post nauseâ correpta, & vomitu mox subsequente, febre tertianâ 17. hebdomades afflicta, à qua nec ipsa potuit curari, nisi quod aliquando intensè similiter appeteret halecem, quod commestis ipsa similiter sana evasit. Facit hoc exemplum WIERI in *Observat. de quodam*, qui, 21. halebibus & mulis editis, liberatus à quartana evasit. Sic



novi hinc vitum, qui esu anguille, quam naturaliter abhorret, & nonnihil invitum comederat, in febrem tertianam, ultra quadrantem anni durantiem, incidit. Ut plurimum in mutatione victus peccatum febres producit.

Remanet ergo: causam omnium febrium intermittentium oriri in stomacho ex vitio digestionis primæ, ejusque certa cruditate acida: hinc rarum est, quod tales febres sint epidemicæ vitio aëris, vel vitio alimentorum contractæ, qualia exempla videbitis in SALMUTHI l. 6. RIEDLINO *Observat.* 23. & 24. WILLISIO *Tractatu de Febribus cap. 3. pag. 127. cap. 14. pag. 244. cap. 17. & de quartana epidemica cap. 6.,* item in BARTHOLINO *Causa Hist. Anat.* 56.

Non ergo putandum est, ex distinctis visceribus affectis, ut falsò quidam dicunt, distinctas etiam exurgere febres, dum tertianas ex vitio hepatis & bile, quartanas ex vitio lienis ac succo melancholico, quotidianas solum ex stomachi vitio oriri volunt. Dicis: ac observatur labes talium viscerum, ita, ut in quartanis scirrhi, in Tertianis icterus flavus concipiantur? Respondet: In principio harum febrium hæc viscera ut plurimum esse salva & sana, utut diuturnis redditus his febribus, aut pertinaciter resistentibus ipsæ, subinde viscerum talium tumores aut scirrhi, præsertim in quartana, nempe per sigentia nimis seu paroxysmum cohibentia, superveniant; adeoque non ex causa radicali, sed potius hos tumores & viscerum labefactiones sub diuturno febris cursu, tanquam producta morbosa ex læsa massæ sanguineæ crassi supervenisse certum est. Interim concedo faciliè, infarctus tales quorumcumque viscerum, item alia corporis vitia, v.g. suppressa menstrua, & aggravare aliundè natas febres, & obstitiores reddere, aut crebriori ac faciliori recidivæ occasionem subministrare, propter cachexiam ferè habituatam & dyscrasiam in massa sanguinea regnantem, & etiam sanos ad eandem disponere posse, uti sunt quamplurima exempla quartanarum, post suppressionem mensium oritarum; ita tamen, ut ipse fomes febrilis, & talium morborum Author, fabricetur in stomacho, nempe in hujus digestionis primæ, seu totius corporis fundamentali, insigniter turbata, uti notum est in mensibus suppressis infestare nauseam, vomitum, picam & similia stomachi vitia. Quod si ergo in stomacho vitiosè digeritur chylus, aut licet non digeratur vitiosè, si tamen vitio succorum, pancreatici & biliosi, non rectè separetur à fecibus alvinis, & sic postmodum infundatur sanguini, non poterit tunc nec convenienter eidem assimilari.

Ex hoc fonte ergo ut plurimi alii exurgunt morbi, ita, ubi massa sanguinea per se existit faciliè fermentativa aut promptius effervescentibus, v.g. in juvenibus biliosis, ebriosis, &c. aut à quacunque data occasione, aut crapulæ, aut iræ, aut suppressæ insensibilis transpirationis, ad fermentationem præternaturalem disponatur, aut denique si ipse chylus non rectè subactus per se fuerit nonnihil fermentativus, v.g. ex fructibus horæis, ex potu non rectè defæcto, ex dulcibus &c., tum faciliè massa sanguinea his heterogeneis nec rectè assimilatis particulis, in quibus ad primarias facultates salinas semper respiciendum, turgida, datà tali occasione in fermentationem vitiosam etumpit, sicque febrilem paroxysmum concipit.

Quod ut pateat, observandum: vitium istud concoctionis consistere imprimis in chylo non rectè salto volatili ac temperato, sed potius acido ac viscido nonnihil, plius minus, prope diversimodè variatur digestio. Unde diversimodè postmodum variatur febris, accedente alià atque alià in omnibus subjectis sanguinis crassi. Saturata jam, & interdum ad turgescientiam usque impleta, massa sanguinea tali materia vitiosa male assimilata, tunc pars illius materie vitiosæ in sanguine congelatur naturalem ejus fermentationem datà occasione turbat. Unde cum sit acida ac viscida, particulas massæ sanguineæ salinas volatiles ac oleosas quodammodo obruit, sanguinem ad aliqualem coagulationem disponit aut inspissat, & ita notabiliter sanguinis fermentationem immittit. Unde ingruente paroxysmo pulsus fix minor, sit etiam debilis præter debilem fermentationem sanguinis, interdum vix observatur, utut cor depravata sanguinis fermentatione irritatum, frequenter se contrahat, sicque pulsus frequentiore edat. Turbatà ita sanguinis fermentatione, tunc salta ejus fermentativa non rectè invicem agunt, nec partes ejus oleosæ ex motu fermentativo debitum calorem concipiunt, calor sensim deficit corpori, & frigus succedit, quia & turgescente sanguine, & hinc confusus ac perturbatis spiritibus animalibus & vitalibus, lassitudo in-

signisprehenditur. Dum verò materia peccans seu fermentum febrile delitescens, ex errore primæ digestionis genitum, exserere se incipit, plius minus vellicat partes nervas & membranaceas ratione aciditatis hostilis, hinc eorum spasmus, frigus, horror, & rigor, modò major, modò minor, succedunt: In rigore enim primariò vellicatur panniculus carnosus, & ferè universum membranarum corporis, in specie abdominis, systema, unde & frigus intensum, imprimis in abdomine & lumbis percipitur. Sunt nempe membranz quæcumque totius corporis continuatz & conjunctæ membranæ cerebrum involventibus, adeoque faciliè pars una alteram per consensum, & spasmis afficere potest: vid. D. KROHN in *parvo Tractatu de Motu Musculorum in fine Tractatus Willisii de Nervis, & infia, ubi de Cephalalgia*: Unde oritur musculorum motus, v.g. musculorum labia moventium, & sic stridor dentium, musculorum dorsum elevantium, unde ista elevatio in lectis Germanis: *Siefriebrén, dasi ibnen die Zäbne Klappern, und dasi sie immer in oder unter dem Bette in die Höhe springen.* Hinc & in horrore & rigore, qui revera nihil aliud sunt, nisi membranarum convulsivi motus, (nam quod in musculis est motus convulsivus, id in membranis est rigor,) dum ita spasmis concutuntur partes membranæ, unde lancinationes ac alii dolores lumbares mesenterici, sicut & in extremis partibus lancinationes artuum vagæ oriuntur, etiam stomachus & intestina, & his connexa vasa cholodocha & pancreatica vellicantur, ut ob id contenta sua quocunque modo constituta convulsivo motu copiosius egerant, ex quorum plius minus naturaliter constitutorum concursu oriundæ effervescentiæ non tantum varia abdominis symptomata coniungunt, sed hæc ipsa effervescentia & regurgitando in stomachum, eundem in principio & incremento stimulant ad crebras & violentas illas vomitiones.

Ubi tamen non est putandum, materiam rejectam, nunc albicantem, nunc viridescentem, latuisse in stomacho & fomitem esse morbosum; Nequaquam: sunt potius hæc ipsa succus pancreaticus & biliosus invicem commisti.

Fermentum interim hoc febrile sanguini permistum simul actumate sua naturalem ejus motum fermentativum pervertit, hinc spirituum vitalium debitam emersionem & volatilisationem aliquantisper suffraginare, nec non debitam incalcescentiam ejusdem primitus impedire potest: (instat vini denuò ebullitionem molientis, turbati tunc videtur massa sanguinea; hinc enim in statu *pulsus parvi* minusque vehementes esse solent:) donec ipso fermento cum sale volatili oleolo sanguinis ad præternaturalem eff. & turgentiam concitato oriatur per totum corpus incalcescentia ista insignis, cum sanguinis turgescencia, æstu & ardore, pulsu magno, frequentiore, vehementiore & celeriore, donec materia fermentativa vitiosa omnino subacta, & instat sequum in vino præcipitata quasi, & à reliquarum partium consortio liberata, leiore copioso per calorem attenuato imbibita, copioso urinz fluxu, aut, quod frequentius, effuso sudore quasi critico excernatur, & ita massa sanguinea æqualiter ac naturaliter denuò fermentant. Febris omnino remittat ac intermittat, idque tandiu, donec similibus incrementis fermentescibilibus in massa sanguinea adhuc hærentibus denuò ex parte maturatis, & turgescientiam concipientibus, novus redeat paroxysmus. Hinc etiam in *paroxysmo collectæ urinz* sanorum est similis, vigente adhuc fermentationis motu, quæ post paroxysmum collecta crassa, turbida, ac copiosa sedimento onusta, solet excerni. Qualis tragœdia tandiu durat, donec massa sanguinea omnino deputata ac quasi desecata existat.

Ex dictis noro: ex acido & sale volatili urinolo, in sanguine quasi effervescente, totam paroxysmorum histoniam esse explicandam; ita quidem, ut *frigus, horror, & rigor*, ipsaque febris, primariò dependeat ab acido vellicante membranaceas abdominis particulas, speciatim stomachum & intestina tenuta, quæ convulsivo impetu quæcumque, & incon-sensum raptim ceteras membranaceas partes. Simile quod observamus in assumptione regum ventriculo imitatur, v.g. medicamentorum amaricanorum &c., quibus haptus afflicto Archæum & hinc genus nervosum, rigorem experitur simillimum horrore febrili; unde Germani: *Er erschutert sich darvon.* Acutum autem in intermissionibus vellicans testatur talem febrem curari: (1) per *alcali vel absorbentia*, fixa aut volatilia, ut sunt talia absinthii alcalisatum, tal cartari, nunc solum, nunc cum oleo baccharum juniperi destillato assumptum. (2) Quod rigor & frigus potentissimè sedentur per *olea destillata*, in specie caryophyllorum,



lotum, iam intus assumpta; quàm extrâ præcordiis illis; penetrando enim suo sale volatili oleoso destruant acidum, vellicans partes membranosas ventriculi & intestinorum, & mirabiliter rigores sopiunt: sicuti & alius in usu est hoc oleum penetrantissimum, ut spinam dorsi febricitantium eomer inungendam jubeant, quod etiam non culpandum erit. (3.) *Opium*, sensibilitatem partium, & inde dependentes convulsivos motus sopientiâ, eisdem rigores placant.

*Calor* paroxysmorum verò & *æstus* in febribus ordinatissime surgens, quod sint ab acido fermento in massa sanguinea; per vitiosam & inordinatam fermentationem cum ejus sale volatili oleoso, ita quidem, ut acidum minus prædominetur, testantur: quod acida, imprimis *nitrata*, ut *nitrum artemisiatum*, *nitrum viridiatum*, i. e. *arcanum duplicatum*, *spiritus nitri aule*, &c. optimè æstuationes compescant, figendo & coercendo tam acidum volatile, quàm sal volatile oleosum acre, indeque natam effervescentiam intensiorem, & ita nimios tumultus compescendo.

Observandum ulterius: quod vitiosa sanguinea massa ex vitio digestionis primæ necessarîo etiam videntur primariis post massam sanguineam succi, biliosus & pancreaticus, quibus in paroxysmo uberius in intestina effusis, adeoque plus minus in intestinis effervescentibus, & ex mutua miscela texturam ac saporem phis minus præternaturalem acquiruntibus, quàm plurima abdominis oriuntur symptomata; v. g. *anxietates præcordiorum*, *vomitus*, *tussis æsthmatica*, *fitis clamoia*, *scorbutica*, *hypochondriaca* & *hysterica symptomata*, *termina*; *vagitus* & *borborygmi intestinorum*, itemque *insolationes*. Et propterea in cura paroxysmorum, horum succorum simul maxima habenda est ratio; cum ab ipsâ insigniter paroxysmi circa eorum principia exalpetari & aggravari soleant; quæ, qualia sint? & qua ratione partim à tacto pancreatico, partim à bile, horumque vitiosa miscela, briantur? optimè explicasse videtur SYLVIVS in *Praxi ratiô loco cap. 30.*, cui effervescentia vix sufficiat, cum plurima sint problemata maximè necessaria, quæ ex illa non possunt resolvi.

Certum interim est, ab his vitiatis, ac in principio paroxysmi in intestina effusis, atque vehementem invicem turgentiam inducentibus, non tantummodo aggravari paroxysmum, sed multa etiam abdominis symptomata induci; qualia jam ordine recensebo: Nempe ab utrisque acrioribus vomitus crebrius repetentes originem ducunt: à succo pancreatico acidior, & bile minus oleosa, intenditur *frigus abdominis* & *circa lumbos* in latere dextro, ubi intestini nodum insignuntur ductus: ab utroqueque acriorum intensiori effervescentia *æstus ac ardor in abdomine* molestus nascitur; ut ægri tales subinde dicant, & monstrant locum sub hypochondrio dextro: *et hinc sic im Seib:* Ex istidem fontibus non raro *status hypochondriorum*; item ex flatibus subsistentibus intumescencia, inquietudines; & præcordiorum anxietates, & imprimis, si simul afficiatur stomachus & inficitur; distentis plus minus hypochondriis difficiles respiraciones ac insignes angustia; item dolores sub costis notis, &c. nascuntur: quibus symptomata medetur Clyster aut ante paroxysmum, aut in principio paroxysmi applicatum. Quod febribus intermittentibus malè curatis soleant supervenire tormina abdominis, audietis proximè, ubi genus ac varis abdominis doloribus. Acidum in corpore abundans Fumelicas inducit febres. Cætera symptomata, ut *cephalalgia*, *agrypnia*, *deliria*, *respiratio difficilis*; *fitis*, &c. ex sanguine ælluante, spiritibusque animantis intensius causatis, indeque fortius agitaris & perturbatis originem docunt. Ariditas lingue ob consumptionem lymphæ salivæ linguam humectantis. Quod si adsit saliva; eaque simul salia nimis, insigniter intenditur fitis.

Observanda etiam hic est *differentia febrium intermittentium*, v. g. *Tertianarum in notbas & legitimas*. *Legitima* si *exquisita* ex pura & sincera bile fieri vulgò dicitur, in qua ratio est insignis, corpus veluti pungens, litis & æstus magnus, vomitus biliosus &c., accessio longissima est 12. horarum, septem circitibus ad summum judicatur: primus est debilis, secundus fortior, &c. quartus fortissimus; postea paulatim remittit. *Tertiana* verò *notba* dicitur, quæ ex bile cum pituita; seu, ut ego interpretor, ex materia acida viscida permixta oritur; accessiones ad 16. vel 18. horas extenduntur, raro 14. circitibus solvitur, sepius ad aliquot septimanas excurrit, calor in ea minus pungens est: Vid. POTERIUS de *Febribus lib. 1. cap. 27.* Uno nomine:

*tota ratio differentia consistit simpliciter partim in constitutione massæ sanguineæ, partim fermento febrili phis minus liberò aut impedito*: Libèrum enim nec impeditum, adeoque acrius, potentius quidem agit, & graviora infert symptomata, sed citius saturatum & enervatum febrî finem imponit: Impeditum verò vel propter fomitem, aut vehiculum, cui inhæret, viscidius atque tenacius, adeoque, ut vulgò vocant, pituitosum, vel in subiecto, cujus massa sanguinea aliiq; ejus humores temperatior, chylosiores, adeoque viscidiores existunt, minus se exercere potest, adeoque mitiora quidem symptomata, sed diuturniores paroxysmos, febresq; etiam magis chronicas solet inducere.

Quicquid sit de *differentia febrium in notbas & legitimis*; silem ex diversitate paroxysmorum modò enarratâ colligere possumus, quod, quò acrius est, & volatilius, adeoque æctivius fermentum febrile, eò acutius, h. e. brevior, sive gravioribus symptomatis stipatam, inducere febrem; & contra quò inertius est & minus æctivum fermentum tale; id quod in specie evenit, quando pro fomite, in quo nidulatur, habet humorem viscidum & glutinosum; eò minus acutam, sed diuturniorem, & mitioribus comitaram symptomatibus fore febrem: Ex quo etiam quotidianarum prætertianarum & quartanarum præsertim diuturnitas æstimanda; itaque, quò diuturnior sit febris, eò viscidum magis ac glutinosum fomitem fermenti in primis viis existere, putandum est: *indeque in acutioribus magis absorbentia, vulgò præcipitantia dicta; in diuturnis verò seu chronicis incidentia & Absorgentia magis conveniunt.*

Quæritur autem ulterius: quare febris intermittens assoluto uno paroxysmo non cesset? Hanc Quæstionem ut solvamus, attendendum est

1. Ad ipsum recursum,
2. Ad ipsum statutum recursus tempus.

*Recursum* quod attinet, præsuppono fomitem morbosum primario vitio digestionis primæ radicali in stomacho, secundariò in massa sanguinea; ita, ut primo paroxysmo notus totus ejiciatur & subigatur; quin potius reliquas habere instar fermenti se multiplicantis. Fermentum dùm dicit, hoc ipso non magnam materiam molem insinuo, sed interdum minimum quoddam miasma, æctivum tamen & penetrans, indeque efficaciter alterans; Unde etiam SENNERTUS de *Febribus* non ineptè asserit, quoddam miasma fermentativum hæere in massa sanguinea, quod revocet paroxysmos febriles, & quod à POTERIO dicitur seminatum febrile; ut non sit talis focus, nempe materia viscida, in corpore seu massa sanguinea. Nempe fomes in stomacho fermentativus dehiscit; in massa sanguinea verò post paroxysmum inquinamenta quædam, licet minima, superesse videntur; unde fermento isto in fomite tantillum saltem odorem spirante, reliquis his commotis paroxysmi recurrunt. Verum quare tam statutis horis, & tam præciso tempore, recurrat paroxysmus, adeò, ut in certitudine ipsa horologia superet, nec interdum dumidum boreæ quadrantem anticipet, hoc est quod à nemine huc usque convincenter explicatum fuit; sicut & aliarum omnium periodorum rationes sunt obscurissimæ. Nam nullus morbus fuit, qui non observatus fuerit periodicè affligens: sic v. g. cephalalgia periodicè observata sunt.

Interim tamen causa hujus periodi adhuc sub tenebris inscrite est sepulta; & licet ego ultra 30. diversas Authorum opiniones collegerim; nulla tamen est sufficiens; quorquor enim evolvi, tot quoque video refutandos: quædam sunt ridiculæ, nonnullæ ex toto absurdæ; ac proin hoc dubium pos etiam in medio relinquimus. Interim puto, causam hujus periodi febrili adeò certæ & statutæ in interno Artheo, per certam ideam modificatâ, consistere. Hinc præsertim in febribus diuturnis, non semper videtur adesse talis materia morbosica peccans, ut in principio interdum accidentariò simul adfuerit, ut jam etiam CELSUS monuit, cui natura tunc ex consuetudine videtur febrium continuare: videturque hoc confirmari experientia ex eo, quod tales febres diuturnæ sint subindè levissimæ, imprimis Quartanæ; ita, ut paroxysmus admodum tolerabilis ultra horam unam alteramve non duret, & sit maximè tolerabilis, ægro interea optimè habente, cum interim tales febres non ad annum, non ad biennium, sed ad quinquennium & decennium, imò ad 30. annos duraverint. Exemplum tertianæ per 30. annos durantis recentet SPIGELIVS de *Febre semitertiana lib. 2. cap. 13.* & BALDUINUS *Reflexus Epist. 13. pag. m. 30.* item WIERUS in  *suis Observationibus* aliquot exempla Quartanarum ultra 30. annos durantium & similiter



similiter mentionem facit febris 3. mensium RIVERIUS *Cenur.* 3. *Obser.* 49. & sic porro. Quis ergo ex fomite adeo copioso tantam febrium diuturnitatem velit derivare? quin potius credendum, aut consuetudinem aut miasma residuum diuturniorum febrium inducere paroxysmos. Unde etiam subinde tales febres citra notabilem materiam peccantis excretionem, v. g. per terrorem, aut similem substantiam alterationem, & motus corporis vel animi curari solent: Sic ex terrore subitaneo quartana aliquot annorum & ferè incurabilis fuit curata, ut refert BOYLE in *Philos. Exper.* pag. 219. Vid. etiam VALERIOLA *lib.* 2. *Obser.* pag. 123., ubi refert Quartanam contumacissimam, multique remediis etiam non curabilem, quæ subitè iræ & ex-candescentiâ ægri fuit curata; item SCHENCKIUS in *Obser.* de sene quartana afflicto, qui sub aqua demersus fuit curatus. Hinc est, quod opiata tales febres turdè & cerè curant, cum consuetudinem talem naturalem turbent: & quomodo quædò subinde curarentur tales febres per amuletum ridicula, aut acrimia rubificantia, extrinsecus admota? Sic refert SALMUTH *Part.* 3. *Obser.* 81. pag. 364. de Tertianis diuturnis curatis per amuletum, factum ex charta linteo inclusa, cui fuit inscriptum:

*Ein Fuchspelz und ein Marder-Hut*

*Sind beyde vor das Kalte gut.*

Id est:

*Pellicium Vulpinum & pilus ex Martis pelibus, contra frigore optima sunt remedia.*

Item TIMÆUS von GuldenKlee in *Cas.* 20. *lib.* 8. de Quartana cum scheda curata: *Fest Fleisch giebt gute suppen:* id est: *Caro crassa dat bona iuscula.* In his solum alteratâ imaginatione cura fuit peracta, & nulla fuit materiam morbi- ficæ seu fomitis facta excretio sensilis.

Imprimis tamen observetur in regione nostra, ut habeatur ratio semper mali hypochondriaci vel scorbuti, quippe his ut plurimum se jungunt febres: Ex uti scorbutus est Prothicus, ac omnibus ferè se associat morbis; ita etiam non raro febribus intermittens, sicuti interdum continuis se jungit, easque insigniter exasperat. Periodi Paroxysmorum in talibus interdum sunt vagæ, modò anticipantes, modò postponentes: Nam, ubi adest febris erratica intermittens, ibi semper debet esse suspicio latentis scorbuti; adeo, ut dubitem, an febris sit erratica, quæ non sit à scorbuto, & fomitem habeat in stomacho. Interim sit interdum, ut etiam in abscessibus partium occultis, v. g. mesenterii, subinde rigores quidam cum subeunte phlogosi plus minus intensi accendant, & schema tertianæ, & quidem erraticæ, exhibeant: id quod evenit, dum membranosa substantia ab acri acido vellicantur, unde & in ruptura abscessuum partium internarum talis rigor vel horror subinde supervenit: hoc ipsum tamen raro fit, cum contra scorbuticæ & hypochondriacæ intermittens scilicet occurrere soleant. Scorbuti etiam præsentiam in febribus intermittens, ut & continuis, arguunt anxietates præcordiorum, dolores lancinantes artuum, aut etiam dolores vagi abdominis aut convulsivi, ante aut in paroxysmo, aut in frigore aut in calore assigentes; quibus tamen ut plurimum in principio aut in incremento paroxysmi vomitus materiam nunc flavæ, nunc viridis superveniunt; uti etiam maculae quædam in paroxysmi statu & sine se exhibere solent; quæ quidem rarissimè petechiales sunt; frequenter tamen maculae istæ, nunc lividæ, nunc rubidæ, nunc majores nunc minores, nunc cum sudore efflorescentes, post sudorem verò de- nuò evanescentes. Arenulae etiam quasi rubræ, facili- tamen friabiles, in fundo matulae hærentes, & undique parietibus ejusdem se affigentes, infallibile quoque complica- ti scorbuti sunt signum: Nam sunt salia concreta vitiosa acido-salia, crystallifera; sunt friabiles, non duræ, ut cal- culosorum. Quod si verò desint hæc arenulae, sæpius in su- perficie urinæ talium febres scorbuticæ affectorum crusta pin- guis adest, aut hæret in eis sedimentum crassum copiosum, & quasi fursuraceum, subrubicundo sanguineo quasi atque incarnato colore non nihil tinctum: in tali casu sæpius etiam, imò ferè semper, subest scorbutus, ut alia signa taceam. Contumacissimæ sunt autem præceteris tales fe- bres scorbuticæ, & quæ vix curari possunt, nisi sublatò fo- mite scorbutico; alias enim vel septies recidunt.

Febres chronicae, si modò cum frigore affligunt, modò cum horrore, abscessus mesenterii, &c. later.

Febres periodicae nunc statim redeunt horâ, interdum etiam nunc citius, nunc tardius redeunt: & dicuntur anticipare, ita, ut si hodie paroxysmus febrilis tertianæ intermittens patientem invadit horâ pomeridianâ ter-

Estmüller. Oper. Tom. II.

tiâ, tertio die invadit circa meridiem horâ duodecimâ præterpropter; quod autem ut plurimum accidit in prin- cipio febrium: Vel dicuntur postponere, ita, ut ho- diernus paroxysmus eveniens circa horam tertiam po- meridianam, redeat circa septimam pomeridianam diei tertii, idque ut plurimum in morbi declinatione.

*Anticipatio talis vel Postpositio tres ferè habet causas.*

1. Robur spirituum validius vel debilius.
2. Fermentum febrile magis vel minus activum in- volatilitate & acrimonia.
3. Fomitem seu vehiculum materiale magis vel minus viscidum, magis vel minus copiosum, &c.

Ex his recurrit varietas deducenda, atque pro causarum modò ratione dictarum etiam prognosis anticipationis aut postpositionis instituitur.

Præceteris typum mirabilem habet MARCELLUS DONATUS *lib.* 3. *Histor. Medic. Mirab. cap.* 14. de qua- dam febre, quæ primâ vice diei horâ primâ secundâ vice horâ secundâ, tertîâ vice horâ tertîâ, & sic successivè usque ad primam horam noctis: deinde ordine retrogrado à prima hora noctis ad vigesimam quartam diei, hinc à 24. ad vi- gesimam tertiam, vigesimam secundam & usque ad pri- mam horam diei (nam MARCELLUS DONATUS fuit Italus, unde ad horologium Italorum hos paroxys- mos observavit) usque dum penitus extincta fuit.

Unum adhuc quaeritur; unde fiat, ut febres inter se invicem transmutentur, jam simplices, jam compositæ? Fit enim, ut tertiana in quartanam, quartana in quotidianam, Tertianæ duplex in quartanam, & sic porro, degenerare observetur. Cæterum hoc confirmatur, quod febres in- termittentes non differant essentialiter & modo fieri; sed saltem quibusdam circumstantiis, & nunc impediens, nunc promoventibus activitatem fomitis morbos; quæ om- nes probè considerandæ sunt Medico.

Quod autem attinet febrium multiplicationem, quando simplex fit duplicata, triplicata, quadruplicata, &c. (nam RHODIUS *Cenur.* 1. *Obser.* 15. habet Quartanam du- plicatam, quotidie iter invadentem) oriuntur hæc ipsa ex du- plici fonte:

1. Ex errore curæ.
2. Ex errore dietæ.

1. Ex errore Curæ:

1. Quando Medicus vel adstantes propinant præposterâ, & nimis intempestivè, aut nondum præmissis vomitu, specifica febrisfuga, imprimis sigentia; tunc enim opti- mè multiplicantur febres: Sic ex specifico febrili Sero- belbergeri, & Crollii, quæ aliàs suas merentur laudes, intempestivè adhibitis multiplicantur febres cerè, ita, ut simplex fiat duplex.

2. Inconsideratus Opiatorum usus (de legitimo *infra*) ante paroxysmum, non raro etiam febres multiplicat: ut ut enim hæc tantum non omnes febres intermit- tentes curent, tamen, si non præmittantur præmitten- da, simplices redduntur duplicatæ, vel ad minimum diuturniores.

3. Acriorum, præsertim aromaticorum resolvendum item purgantium acriorum ac vehementiorum, præ- sertim vegetabilium, usus ante coctionis signa, quæ ipsa movent quidem causam materialem, sed non promovent resolvendo, exsuscitant, sed non enervant fermentum febrile: Talia facillimè, præsertim in quartanis, multiplicant febres. *Verissimum enim est; Quartanam in principio blandè esse tractandam, ne sim- plex in duplicem, aut triplicem, aut etiam continuum len- tam mutetur.*

Ac tandem.

4. Quando ægri volunt, ut subito quæcunque ratione abigantur febres, tunc loco simplicis sæpè duplex aut triplex emergit. Modi sunt varii: in hoc tamen om- nes conveniunt, quod certo modo figant & sistant acti- vitatem fermenti febrilis; unde concludendum erit, fermentum febrile quasi dividi & successivè inferre e- nunc duplicem, nunc triplicem paroxysmum.

II. *Errore dieta exasperantur vel multiplicantur febres,* quando ægri, v. g. imminente paroxysmo, non habent sto- machum vacuum, vel antè absolutum perfectè paroxys- mum præmaturè aut nimis avidè, imprimis carnes, co- medunt; vel quando intermissionis die copiosiora alimen- ta assumunt, cum per victus intemperantiam morbo sem- per nova materia suppedietur, uti eruditissimè disse- rit RONSSETUS *l. a. lapsa enim corpora*, iuxta HIP-

POCRA.



POCRATEM, quod magis nutritivis, et magis laetis: vel sudorem fluentem supprimunt; vel in aut ante paroxysmum lacticia bibunt; vel fructus horæos, aut alia similia facile fermentescibilia quocunque morbi tempore assumunt: hæc enim sunt pessimæ noxæ, & corruptione sui facile foveant febres, easdemque magis chronicas reddunt: item ex usu nimio piscium interdum multiplicantur febres, & quæ sunt huiusmodi causæ alie.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa diagnostica; primariò haurenda sunt ex paroxysmò. Si enim paroxysmus primus invadit cum horrore & algore aliquomodo, cui succedit sitis, & æstus ingens totius corporis, hic verò paroxysmus tertio die repetitur, certissimum adesse tertianam.

Si cessante paroxysmo patiens iterum surgit, consuetaque peragit munera, tertiana est exquisita; sin verò cessante paroxysmo patiens nihilominus conqueratur de appetitu prostrato, cephalalgia, lassitudine, agrypnia, vel somno saltem turbulento, adest tertiana notha, vel quotidiana cum remissione.

Paroxysmi si singulis diebus redeant certis horis, attamen iidem, v. g. die primo horâ 10. & tertio iterum decimâ; secundo verò die hora quartâ & quarto itidem quartâ horâ, certissimum tertianam duplicatam esse.

Signa paroxysmi imminenti sunt: subitanea lassitudo, oscitatio, totius faciei & labiorum pallor, unguium pallor cum subsequente livore, nonnunquam etiam abdominis dolores, ructus nonnunquam.

Pulsus paroxysmi tempore est frequens, in juvenibus magnus, creber, fortis, urina est crassa aut viscida, in tertiana exquisita ad rubedinem inclinans.

Reliqua ex iis, quæ dicta sunt, per se parent, imprimis quoad scorbutum.

### PROGNOSIS.

In Prognosi primariò attendenda est natura febris, secundariò ratio urinæ.

Quoad naturam febris: quæcunque intermittens maligna & pestilens est pessimæ noxæ & periculosa; quamvis enim evidentes habeant intermissiones, ægrotautes tamen non tardè medio tollunt, ut dicit RIVERIUS in *Praxi de Febris*.

Benigna sunt absque periculo, minisque periculose quartanæ, quàm tertianæ, utut contumaciores & diuturniores existant; cum è contra tertiana intermittens sit gravior & brevior: Quæ, ut rectè dicit HIPPOCRATES *sect. 4. aphor. 39. si legitima fuerit, septem ad summum circuitibus finitur*, modò æger fuerit obsequens, nec hic, nec Medicus, errorem committant.

Tertiana, quod magis est notha, quod magis mitis & lenta, eò est diuturnior, curatu difficilior ac periculosior. *Legitima 7. circuitibus finitur. Notha verò ut sunt frequentiores, sic magis periculosiores, & curatu difficiliores*, quæ subindè ultra 14. periodos extenduntur; quando verò nec illo tempore curantur, concludendum est, errorem vel ab ægro, vel à Medico commissum fuisse.

Utut autem benignæ periculose non sint, si tamen vel ab ægro vel à Medico error committatur, in lethales morbos degenerare possunt, ut rectè dicit WILLISIVS de *Febris cap. 4. pag. 139.* Facile enim sunt curabiles, quæcunque eæ fuerint, etiam quartanæ, modò tempestivè aggrediantur, & viscera interna sint salva.

His præsuppositis: si febris in principio non occurratur, ut plurimum evadit chronica; quò verò diuturnior est, eò magis ad cachexiam disponit.

Speciatim tamen tempus durationis ex urinis aliquo modo cognosci potest; in quibus crudæ ac coctionis observatio utut non adeò necessaria sit, ac in continuis acutis, tamen propter evacuationem, & hinc specificorum legitimum usum imprimis observanda.

Omnis enim urina in principio solet esse tenuis: quod magis successivè crassescit, eò tuior aut etiam brevior innuitur morbus.

Imò dicunt: si in principio urina sit cruda, paulò verò post nubeculam albam habeat seu encorema, bonum esse; quarto enim paroxysmo terminari febrem: sin verò urina sit pauca, rubicunda, sine nebula seu encorema, vel non perfecta coctionis signa se offerant, quod tunc ad septimum

usque paroxysmum extendatur febris, aut præter febris longitudinem invita solutio, cum meru nempe recidivæ, vel febris in alium morbum diuturnum degeneratio metuentur.

Observantur hæc in urinis aliquandiu post paroxysmos collectis: nam omnes, quæ in paroxysmo excernuntur, crudæ esse solent; in paroxysmo enim mediante fermentatione fit coctio, quæ eo finito ceu facta in urinis se exhibet.

Si in tertianæ secunda accessione omnia fuerint fortiora, in tertia verò remittant, quartâ accessione febris penitus cessabit: sin verò in quarto paroxysmo omnia sint graviora, adeoque morbus sit in statu, & in quinto symptomata remittant, septimo morbus finietur.

Febris tertiana, quamdiu anticipat, tamdiu est in incremento; postquam verò postponit, adest ejus declinatio.

Quando copiosi sudores manant post paroxysmos, interdum in urina vix sedimentum apparet, & res est ubique sine suspitione: contrâ, si contrâ.

Convulsiones in paroxysmo febrili non sunt ita metuentæ, uti in continuis & malignis.

Febris intermittens quibusconque supervenientes viscerum quorumvis scirrhi, vel tumores his cognati (quod fit in febris diuturnis malè curatis) malum innunt, & ferè hydropem, aut icterum lethalem tandem superventurum innunt, aut chronico quasi cachectico vitio successivè evolvuntur.

Intermittentes in genere quod magis in typo sunt constantes & minùs variant, eò diuturniores solent esse; contrâ, si variant & anticipant, celerioris existunt solutionis.

Vomitibus in intermittibus benignis, si in principio sit, siue in statu, optimum signum est; innunt enim valorem naturæ.

Quoad *Quotidianas*: cum longè sint, & à fomite pertinaci foveantur, interdum non vacant periculo. Nam, cum ventriculus ferè insigniter afficiatur in hac febre, & ipsi sanguis crudus, ac ferè aquosus constitutus sit, facili, quæ de-tinentur, in cachexiam, hydropem, ac alios periculosos affectus, item in carum ac lethargum, dilabuntur.

Quotidiana diurna nocturna est periculosior, cum tempus medium deficiat.

Diuturna est febris quotidiana, & durat dies noctesque 40., nonnunquam ad aliquot menses; quò citius tamen signa coctionis se exhibent, & paroxysmi breviores sunt, ac in principio eorum vomitus adit, brevior ac salubris promittitur eventus.

Si vires & appetitus in Quotidianis valdè deficiunt, accessiones sunt longæ cum nullo sudore, parva salutis spes superest.

Solvuntur Quotidianæ frequenter Vomitus & dejectionibus viscidis seu pituitosis, tum per dolores articulorum, metastasi ad articulos factâ.

Si æger in quotidiana quotidie somnolentior evadat, æ gravitatem quandam circa caput sentiat, earum seu lethargum affuturum notat: Vid. FORESTUS *lib. 3. Observ. 22.* ubi plura de hoc argumento.

Quartana quidem omnium est tutissima propter longa intervalla; ex accidente tamen, quando multiplicatur, vel quando ob errorem ægri, aut irritationem medicamenti exasperatur, degenerando in alios morbos periculosa esse solet.

Quartana *Senibus* plerumque est lethalis, jux præsertim, qui sexagesimum annum transgressi sunt.

Quartana longissima est omnium febrium, & sæpè ad aliquot annos extenditur. MASSARIAS vidit Romæ maiorem, quæ 22. annos eam laboravit. Ut plurimum tamen ultra annum non exporrigitur.

Quartana si est constans in typo, vel ad interitum, vel ad graviora tendit symptomata; sin verò fuerit inconstans, ad salutem vergit, & subindè motu veluti critico evacuat.

Quartanæ si fuerint inveteratæ, Medicorum scandala sunt, & rarò, nisi circa anni mutationes, nempe circa solstitia & æquinoctia, solvantur; his enim anni temporibus subindè curantur, tam sponè, quàm etiam arte. Primus terminus est proximum solstitium seu initium quarti mensis; quò si non solvatur, extenditur ad proximum æquinoctium seu septimum mensem: imprimis Quartana autumnalis extendi solet usque ad æquinoctium vernum, quò præsentè, ut plurimum cessat sponè.

Quartanæ æstivæ sunt breviores autumnalibus: hæc verò sunt admodum longæ, imprimis si ad hyemem vergant.

Mulieres



Mulieres etiam Quartana diuturna correptæ, dum gravidæ sunt, sponte ferè liberantur.

Diuturnior talis quartana, si ægri non exactum observent regimen, præsertim quoad potum, aut si conjunctus sit, aut superveniat pertinacior cujusdam visceris affectus, ægrotos in *hydropem*, aut *contumacem scorbuto* conjicit: sicca corpora ad hæticam & tabem deducit.

In omni intermittente, si intermissionis die constet appetitus, bonum est: si prostratus, malum: sicut & *dejectus* in Quartana appetitus malum est signum, & raro tales evadere asserit HOFFERUS in *Hercule Med.* pag. 293.

De Urinis Quartanariorum refert JOEL, quod extra paroxysmum sint aqueæ, ac renes & pallidæ: sed die paroxysmi magis ad obscuram flavedinem vergant, & ante solutionem febris ut plurimum turbidæ & nigra excernantur.

Nigra ergo urina in Quartanis cum euphoria ægri salutare sunt signum, imprimis sub cursu morbi; innunt enim coctionem vitiosorum humorum, utur in aliis morbis sit periculosum: sin verò huic adluncta sit virium prostratio, lethale est; labescit enim jam natura.

Modus eventus intermittentium est, quod vel transmutentur in febrem continuam, vel malè curatæ abeant in febrem continuam acutam vel hæticam: interdum, sed rarissimè, ad mortem deducunt; vel perfectè successivè curantur, nunc per inediam, nunc per sudores, quæ solutio omnium tutissima, aut urinas copiosas: Quò etiam suo modo pertinent pustulæ & ulcuscula, subindè in malignis in labiis & naribus, & aliò erumpentia; de quibus vid. WILLISIIUS: utur non solvant febrem, fausto tamen ut plurimum omne erumpunt; innunt enim fermentum eliminari in paroxysmo febrili per recolligentem se naturam. Nam & SALMUTH refert lib. 2. *Observat.* 2., tertianas intermittentes per inflammationem labiorum criticam aliquoties finitas, seu artificialiter, dum legitimis evacuationibus, aut sudoris eductione curantur. Sicut etiam icteri die critico, paroxysmo quarto vel septimo, & cum euphoria ægri supervenientes varii, vel nigri, vel flavi, interdum tertianam & quartanam solvunt. *Aphorismus* HIPPOCRATIS 64. *Secl.* 4. est verus; vid. BARTHOLINUS *Cent.* 3. *Hist.* 4., qui observat icterum in quartana salutem ante 7. supervenientem. Sin verò mox in principio appareat, coniunctaque graviora symptomata habeat, malum prognosticat, scilicet naturæ subvectionem.

### C U R A.

Supereft nobis *Methodus medendi cum Materia Medica* & similibus, quæ pertinent ad curam febrium intermittentium. In hac ergo cò imprimis respiciendum est:

1. Ut fomes materiæ morbosæ in stomacho & primis visceribus resolvatur & removeatur Incidentibus, Abstergentibus, Evacuantibus &c.
2. Ut fermentum febrile, & inde nati paroxysmi febriles, debitis appropriatis, aliis dictis specificis, enerventur & tollantur, fermentationem inordinatam febrilem corrigendo, & præcipitando, hinc per convenientes vias, quò ipsa vergit natura, in specie tamen per sudorem, evacuetur. Et
3. Ut symptomata varia, sæpè in cursu urgentia, mature removeantur aut mitigentur, in specie rigor, calor, & sitis. Et
4. Denique dyscrasia sanguinis reliquorumque corporis fluidorum, ac atoniæ viscerum sub cursu morbi supervenientes, alterantibus debitis corrigendæ & restituendæ.

Dictis scopis satisfaciendis conducunt optimè medicamenta salina; tam artificialia lixivialia, nunc acris seu pura, nunc temperata seu composita falsa, ex acido & alcali constantia; quàm salia naturalia, in medicamentis febri-fugis insigniter amaris ac acerbis, sale volatili nunc acriori, nunc oleoso turgentibus, latentia. Uno nomine: sufficiunt febribus intermittentibus curandis alcalia, & quæ ad horum naturam propius accedunt: talia nempe, quæ acidum destruere & viticidum incidere valent, sive volatilia, sive fixa. Nempe præmissis quibusdam digestivis salinis, v. g. tartaro vitriolato, aut sale hypochondriaco, instituat-ur ante paroxysmum vomitus, isque interdum repetendus, quippe sine quo Quartanam curare impossibile est; Aut si hoc minùs consultum fuerit, die paroxysmum insequentem proximo antecedente fiat Purgatio. Præmissis talibus universalibus vel p. r. superiora, vel, ubi opus fuerit, per inferiora purgantibus, usurpentur diaphoretica, tam

vulgaria, quàm appropriata specifica febrilia, ante paroxysmum; diebus intermissionis eadem digestiva & prima vias abstergentia, & postmodum appropriata alterantia aromatica, vulgò *Apertiva* dicta, v. g. Essentia absinthii, Elix-yr febrile, Elix-yr proprietatis, spiritus carminativus de tribus, &c.

Pro talibus ergo scopis legitimè obtinendis observentur quædam cautelæ, quæ instar cynosuræ sint. Ante omnia I. observetur, ut *maturetur Cura*. Intermittentes enim omnes incipientes facillè curantur, ut ultra 3. vel 4. paroxysmos non durent; si invalescunt, sunt contumaces. Quò autem diutius duraverint, eò contumaciores ordinatè fieri solent, & eò magis ægrotum, ejusque humores ac viscera lædunt, & cachexiam aliæque mala post se relinquunt. Maturetur autem cura secundum dictam methodum, motum naturæ promovendo, non autem eundem impediendo.

Obsev. II. *Vena-sectio* est inutilis apud nos ad curandas febres intermittentes: Nam febres tales ferè diuturnæ magis sunt, ac certè paroxysmus venæsectionem insequens ut plurimum gravior esse solet, & diuturnior reliquis antecedentibus: Et cui usui institueretur eadem? Sanè quò plus urget æstus, eò celèrior promoveretur naturæ opus in sudore, remittit sic æstus, ægerque percipiet levamen. Interim prout cursus variant, contingere potest, ut aliquando per accidens necessaria videatur venæsectio: siquidem *Ballonius lib. 2. Epidem. & Ephemer. Consil.* æstiv. anno 1579. pag. 269. & ex illo HONETTUS in *Pbaro Medicorum* pag. 196. Tertianam ob intermissam venæsectionem lethalem superveniente spontè nimia excretionè observavit. Salvatellæ sectio à quibusdam ad quartanam commendatur, incertà tamen ex ratione: interim tamen BALLONIUS *cit. l. p. 194.* Quartanas diuturnas per salvatellæ sectionem curatas observavit.

Obsev. III. Vomitus ac vomitoria in omnibus febribus intermittentibus insigniter sunt proficua, speciatim in Quartana, in qua præ cæteris auxiliantur; Unde etiam in gravioribus repeti possunt. Certum namque est, quod radix curandarum intermittentium, imprimis quartanæ, consistat in vomitu, ut dicit FREITAGIUS in *Aurora Medicorum*. Propinanda sunt hæc ipsa, vel unà alterâve, aut tribus horis ante paroxysmum, ut cum natura oppugnent febrem, quò sic ante paroxysmum negotio suo fungantur. Quod si verò vires ægri, hinc febris & vomitus labori non videantur sufficientes, die paroxysmum proximè antecedente propinentur. Monet enim hoc natura ipsa, quæ sæpissimè ingruente paroxysmo per vomitum se exonerat. In primo febrium principio præprimis conveniunt, nec nocent interdum in progressu, vel ipsa etiam declinatione; sic enim chronicas ac contumaces febres repetita exhaustiunt. Inducantur in specie, quando ægri conqueruntur de saporibus, aut amaris aut nauseabundis in ore, præsertim dum manè evigilant; Nam tales sapores oriuntur ex stomacho, & sæpè contumaces reddunt febres: Aut quando inquirunt, se per-sonificare quædam angustias aut molestias in præcordiis, & monstrant regionem epigastrico-hypochondriacam, jectigationes, cardialgias, ructus, &c.; aut quando nausæ vel vertigines, tam in-quàm extra paroxysmum ægros vexant, &c. Interdum in principio paroxysmi moventur humores vitiosi in primis visceribus ad os ventriculi; & refert PRIMEROSIUS de *Febribus lib. 2. cap. 2. pag. 195.* *Vidimus convulsiones & cardialgias singulis paroxysmis enatas ex bile æruginosa, quæ ejusmodi bilis vomitu sedabantur.* In his & similibus causis vomitoria in specie sunt necessaria. Quod si febris contumacior quodammodo affligat, repetitum vomitorium propinatum in statu est valdè proficuum: Hinc rectè Rulandus aquam suam terræ sanctæ, quæ maximè est antimonialis, tanquam catholicum commendat febrifugum, quo febres nullis pharmacis cedentes eradicatæ fuerunt. Nec quenquam deterreat, quod ægri spontè sua in tertianis subindè vomant: Nam talis vomitus subindè est symptomaticus, acrimoniam succorum in primis visceribus commotorum & effervescentium insequens, adeoque verè est symptomaticus, ac raro sufficiens: in quo casu, si cætera respondeant, etiam vomitorio, sed blando, sufficiens vomitus promovendus. Imprimis utilis est vomitus in quotidiana, ita, ut vix sit febris, in qua sit utilis; & quidem necessarium videatur, per intervalla instituendus. Cautione tamen opus est, ne ventriculus aliàs debilitatus adhuc plus debilitetur. Peracta vomitione, confortant aliquo vino generoso, aqua cinnamomum cum vino aut cydoniata, aut simili extra vel intra usurpato, stomachus roborandus,



aut tumultus ab Emético excitatus sedandus per opiata blanda, electuarius diazcordii, Theriacum : v. g.

*R. Aqu. rubi Idai ʒi.*  
Cinnam. spiritus. ʒi.  
Conf. alchem. ʒss.  
Laud. opiat. gr. i.  
Syrup. papav. simpl. ʒij. vel ʒijj.  
M. D. S.

*Potio confortativa.*

Vomitoria defumantur ex triplici Regno : Vegetabili, Animal, & Minerali.

Inter vomitoria Vegetabilia primò excellit *asarum*, quod nulli cedit, & ceu singulare Febrifugum antiquarium commendatur à STROBELBERGERO *Tractat. de Februm Cura*. Usus ejus est, ut propinetur radix pulverisata mediocriter (minutissimè enim sudorem tantum movet) à ʒss. ad ʒj., aut ʒiv. : præferebatur cum paucopipere, aut gr. viij. vel x. talis ammoniaci, in haustu vini calidi, aut aqua vel decocto centaurei min. aut cardui benedicti hora unâ aut alterâ ante paroxysmum : benè se tegat æger in lecto ; sic enim & vomitus, & post hunc largus sudor simul sequitur. Et certum est, omnes Auctores commendare asarina vomitoria contra Quartanam.

Alio modo præparatur asarum, & quidem, ut fiat vomitorium admodum blandum ex folijs asari assumunt *folia ejus viridia & succulenta* benè crassa, aut madore nocturno & diurno purgata, No. viij. x. ad xij. ad summum : hæc folia convoluta scindunt ad modum tabaci in longa segmenta (non minimè ; quia tunc vehementius dant vomitorium) : infundunt per noctem in aqua cardui benedicti ʒiv., ponendo in locum tepidum. Mane colatur infusum per linteam rarum, & datur vel per se, vel cum ʒss. *Oxymellis simplicis*, si sine ulla molestia vomitum movet.

Si vomitorium hoc debet esse potentius, tunc

*R. Asari folia recentia* No. ix.

Conteruntur cum pistillo ligneo in mortatio marmoreo, affunditur stillatim

*Oxymel simplex* ab ʒss. ad ʒj.

Itaque terendo tandiu, donec folia in liquidum & potabilem succum fuerint contrita : tunc addatur

*Aqu. card. bened.* ab ʒj. ad ʒiv.

Misceatur, & fiat haustus latus potens ad vomendum, in quibuscunque intermittentibus, in specie in quartanis.

D. S.

*Potio vomitoria pro una vice.*

Vel folia recentia tria cum vino exprimantur, & succus propinetur, qui validè vomitum ciet.

De asaro obiter noto : quod hac ratione præparatum sit vomitorium ; Decoctum verò in aqua simplici omnem amittit vim vomitoriam, & potius fiat appropriatum remedium diureticum, febres quartanas solvens.

Post asarum est aqua nicotianæ, quæ ab ʒss. ad ʒj. propinata ciet vomitus, ut videri potest in HARTMANNI *Praxi Chym. cap. 238. de Febre Tertiaria*.

Denique radix vincetoxici & ipsa commendatur tanquam vomitorium in principio intermittentium : ut

*R. Rad. vincetox. ʒi.*

Coq. in f. q. aquæ & vini :

*Colatura* ʒiss. vel ʒiij. detur uti : excitat vomitum blandum, & postmodum etiam diaphoretin :

D. S.

ut supra.

Verùm omnibus quibuscunque vomitoriis præferuntur meritò vomitoria antimonialia ritè parata. In infuso calix vomitorius Rulandi ; vel infundatur *crocus metallorum* ad gr. viij. in *Vinum Rhenanum* aut *absinthio* ab ʒss. ad ʒj. vel ʒij. prout tamen mitior vel etiam fortior est *crocus metallorum* plus minus, (nam variant præparationes) Vinum probè filtratum potest sumi : c. g.

*R. Mercurii vici gr. v. ad vj.*

Infund. in *Vino Rhenano* vel *absinthio* q. l.

Stent in loco tepido per noctem, mane

*R. Filtraturæ ʒi. ad ʒx. vel ʒij.*

D. S.

*Vinum emeticum.*

Item Tartarus emeticus *Mynsichi* & *Ludovici* potest dari in substantia ; & quidem *Mynsichi* à gr. ij. ad gr. iij. ; *Ludovici* verò à gr. iv. v. ad vj. : c. g.

*R. Tart. emer. Myns. gr. ij. vel iij.*

*Salis ammon. simpl. aut depurati* gr. xij. ad xv.

vel *lap. cancr. præp. vel sacchar. gr. vj. ad ʒss.*

M. S.

*Pulvis emeticus.*

Detur in vehiculo calido.

Vel in forma pillularum :

*R. Mass. pilul. de tribus Ruffi* gr. xv.

*Tartari emer. Myns. gr. ij. vel iij.*

*Scammon. sulphurat. gr. j.*

Cum essent. cent. min. f. pilulæ : S.

*Pilula vomitoria pro una vice.*

*Oxyæcecharum vomitorium*, seu syrupus vomitivus à ʒij. ad ʒvj. potest propinari in aqua appropriata, vel vehiculo appropriato ante paroxysmum : c. g.

*R. Aqu. card. bened. vel cent. min. vel mentha vel sumar.*

ʒij. vel ʒss.

*Syr. emer. Angeli Salsæ ʒij.*

aut *Syr. rubi idæi emer. ʒij.*

*Nicotianæ ʒi. ad ʒij.*

M. D. S.

*Succus emeticus.*

Capiatur pro dosi.

Multi commendant sal vitrioli vomitivum à ʒi. ad ʒss. : sed ego horreo ; quia remanet aliquid subinde, quod in totum destruit ventriculum. Optima ergo sunt vomitoria antimonialia.

Fortissima vomitoria sunt ramenta unguium humanorum, quæ infunduntur vino : Colatura sumitur, & violentissimos vomitus movet, adeo, ut non nisi militibus & rusticis propinari queat propter nimiam violentiam. Fuit *secretum calrense* KNOEFFELII.

Observat. III. *Purgantia paulò efficaciora seu fortiora*, præter *vegetabilia*, in principio intermittentium febrium esse nociva : turbant enim massam sanguineam, & dum cruda adhuc est urina, nil noxii expurgant, sed vires debilitant, & febrem effertatorem reddunt. In progressu quidem nonnihil eliciunt, sed simul colliquesfaciunt corpus ; ideo sunt nociva : Imò febris intermittens in continuam per ineptam purgationem degenerare potest ; Adeo in genere potenter Purgantia, præsertim acriora vegetabilia, in febribus intermittentibus sunt vitanda : Confer. SEPTALIUS in *Animadversion. lib. 5. pag. 104*. Imò in statu etiam, ubi copiosa sedimenta onerant urinas, si violentior purgatio fuerit instituta, insigniter debilitant ægros, & paroxysmos insequentes aut graviores, aut certe febres diuturniores reddunt. Possunt hæc febres curari sine ulla purgatione per inferiora (certis conditionibus), cum quidem vomitus in principio ex primis viis, aut sudor post paroxysmos, aut in declinatione universali erumpens sufficiens, quicquid heterogenum est, ex sanguine expurgant. Quod si in principio aut in progressu morbi, ubi contumacior videtur febris, instituenda videtur purgatio, idque vel, si vomitoria locum non habeant, vel ob vomitionem impediam, vel ob suspicionem excrementorum in stomacho aut intestinis stabulantium, sit ea lenis, ultra ʒ. vel 4. aut 6. sedes non proritans : id quod in omnibus, præsertim in quartanis, observandum est.

*Genuina Purgantia ex Antimonialibus aut Mercurialibus desumenda sunt*. Nam hæc dum evacuant, simul corrigunt fomitem & fermentum febrile, adeoque appropriatissima sunt, quorum defectu mitiora vegetabilia, in specie *sennæ* & *Rhabarbarina* substitui possunt. Imprimis ab initio leviter tractandæ sunt *Quartanæ*, nullumque forte medicamentum in earum principio adhibendum ; quia hæc ex simplici non rarò duplicem & triplicem faciunt quartanam. Imò observatæ fuerunt *Quartanæ*, quæ ab adhibitis remediis diuturniores & contumaciores redditæ fuerunt, iis, qui absque medicamentis relictæ fuerunt, citius reconvalecentibus. Vid. BALLONIUS in *Pharo Med. Bonetti pag. 198*.

Optimè usum purgantium in *Quartanis* determinat BALLONIUS citato loco pag. 196. Nempe levioribus in initio utendum : Cocta quando est materia, ac jam aliqua ex parte mitigari cæpit, locus valentioribus esto ; quoniam humores tenaces, crassi, viscosique leniorem vim effugiunt &c. ; qui prolixius hoc negotium explicat. Propinquantur convenientissimè tertio vel quarto paroxysmo absoluto, idque intermissionis die in tertianis, in quartanis verò die ante paroxysmum ; vel etiam purgans propinquitur ipso paroxysmi die, sed ita, ut effectum suum ante paroxysmi invasionem compleat : de quo vid. notabilis locus in DECKERS *Comment. in Barbesse Praxin p. 106*. Imò in contuma-



contumaciore febre etiam appropriatis salinis incidentibus & abstergentibus remediis permissa Purgantia ante paroxysmum propinari possunt, in specie scammonium, quod tunc ferè alterantibus simul vicem obtinet, speciatim in quartanis ante paroxysmum simul cum alius propinanda Purgantia: vid. BALLONIUS citato loco pag. 149. HOEFERUS in Her. Med. pag. 291. Hic enim in recidivis, appropriatis abstergentibus & abstergentibus scammonium additum felici cum successu usurpavit. Purgantia talia sint, ut dixi, mediocria: Fortia aut æriosa nocent; sufficiunt blanda mitiora primas vias a sordibus inde latitantibus evacuantia. Conventunt igitur quæcunque purgantium formulæ, speciatim tamen digestivi salini pulveres, aut infusa stimulo cathartico acuata.

Sufficit vel solus tartarus vitriolatus, grano uno vel altero Purgantis cujusdam acuatus. Dabo exempla: sit pulvis purgans mihi aliis in frequenti usu:

R. Tartari vitriolati gr. xij. ad xv.  
Scammon. sulph. gr. iij.  
Troch. alb. gr. ij.  
Ol. de still. anis. gr. iij. vel ol. caryoph. gr. ii.  
M. F. pulvis, qui 5. vel 6. Sedes.  
blandè moveri: S.  
Pulvis purgans pro una vice.

Vel  
R. Crem. tartari, vel tartari vitriol.  
Pulv. jalapp. an. ʒss.  
Mag. scammon. gr. vj.  
M. F. pulvis. S.  
ut ante.

Vel  
R. Crem. tart. ʒj. vel gr. xxiv.  
Pulv. jalapp. gr. vij. ad ʒss.  
Ol. de stillar. caryophyll. gutt. j. M. S.  
Pulvis aperitivus.

R. Pulv. hepatis rubr.  
Tart. vitriolati. an. gr. viij.  
Scammon. Sulphurati. gr. v.  
M. f. Pulvis: S.  
ut ante.

R. Crem. tart. ʒss.  
Pulv. jalapp. ʒss.  
Extract. troch. alband. gr. j.  
Ol. de stillati anis. gutt. ij.  
M. F. Pulvis: S.  
ut ante.

R. Crem. tart. ʒss.  
Arcan. dupl. gr. xv.  
Pulv. jalapp. gutt. vj.  
M. F. Pulvis: S.  
ut ante.

R. Rad. jalapp. ʒss. ad gr. xv.  
Nutri puriss. gr. vj.  
M. F. Pulvis. S.  
Pulvis purgans.

R. Pulvis jalapp. gr. xv.  
Scammon. sulphurati. gr. iij.  
Nutri puriss. gr. iv.  
Sal. tartari gr. ij.  
M. F. Pulvis. S.  
ut ante.

Quoad infusa: ex omnibus optimum est blandum infusum lenne cum sale tartari, acidum vitiosum corrigente, quod non tantum RIVIERIUS lib. 1. Observ. 39. 40. lib. 2. Observ. 66. lib. 3. Observ. 32. & Cent. 4. Observ. 84. sed & alii quamplurimi Authores, in specie in Quartana, commendant; vel solitarium, vel cum helleboro nigro, aut ejusdem Extracto in Quartanis, aut cum rhabarbato in tertianis sciato: c. gr.

R. Fol. senn. sine stip. ʒij. vel ʒss.  
Sem. anis. consus. ʒj.  
Sal. tartari ʒr ad ʒss.

Infund. in f. q. aqu. card. bened.  
Stent in loco tepido per noctem: manè

R. Colatura ʒij. adde  
Aqu. cinnam.  
Syrup. de pom. Reg. Sabor. ʒss.  
M. S.

Potio laxativa.

Quæ potio 4. vel 5. vicibus purgat, est coloris elegantissimi, & saporis immundè nauseabundi.

Estmüller. Oper. Tom. II.

In Tertianis additur Rhabarbati ʒj. & immineatur dosis lenne.

Vel

R. Fol. Senn. sine stip. ʒj.  
Rad. helleb. nig. crud. ʒij.  
Polypod. ʒij.  
Sal. tartari ʒss.

Ebulliant leniter in sero lactis per subsidem. depur.

Colatura ʒiv. adde  
Tinctura tartari ʒj.  
Syrup. fumar. compos. ʒss.  
M. S.

ut ante.

R. Fol. senn. sine stip. ʒij.  
Crem. tartari ʒss.

Infund. per noctem in f. q. aqu. card. bened.

Stentur in loco calido: manè facta blandè ebullitione, coletur. Colatura ʒij. adde

Syrup. de cybor. cum rhabarb. ʒss.  
M. D. S.

Potio purgans pro una vice.

R. Fol. senn. sine stip. ʒss.  
Sal. tartari ʒss.

Infund. in f. q. aqu. comm.

Stent in loco calido per noctem: manè

R. Colatur. ʒss.

D. S.

Potio aperitiva.

R. Fol. senn. sine stip. ʒj.  
Helleb. nigri crud.

Zingib. an. ʒj.

Sal. tartari acerv. ʒss.

Incis. & contus. indantur nodulo, infundantur in

Aque ferventis mens. j.

Et vase clauso reponantur, ut blandè frigeant: postmodum infusum in cella asservetur.

De hoc semper duobus horis ante paroxysmum, nec non diebus intercalariis, bonus haustus calidè assumatur, imprimis in Quartana.

R. Com. absinth. M. ʒss.  
Flor. cent. min. p. ij.

Rhabarb. el. ʒij.

Rad. elleb. nigr. ʒj.

Cinnamom.

Sal. tartari an. ʒj.

Infundantur in aqu. fumarie:

Stent in loco calido per noctem:

manè R. Colatur. ʒij.

adde

Syrup. rosar. solut. ʒij.

M. pro una d. si: S.

Potio purgans pro una vice.

Vel extractum hellebori junctum cum Extr. Martiali, in forma Potionis præscribi potest:

R. Aqu. card. bened. ʒj. vel ʒij.

Extract. helleb. nigr. ʒj.

Extr. Mart. aper. ʒss.

Troch. alb. gr. ij. vel iij.

Syr. de pomis ʒvj.

M. f. Potio. S.

Potio purgans in Quartana.

R. Aqu. card. bened. vel menib. ʒvj. vel ʒj.

Cinnam. ʒss.

Gumm. ammon. cum acet. solut. gr. xvj. ad ʒj.

Tart. vitriol. gr. ij. vel ʒss.

Scammon. sulph. gr. iij.

Extract. troch. alb. gr. ʒss. vel gr. j.

Syrup. rosar. vel de pom. solut. ʒij.

M. S.

Potio emolliens laxativa.

Quod si pilulæ placeant, usurpetur extractum Catholicum Andernaci a gr. xv. ad ʒj.; item in eadem dosi Extractum panchymagogum Crollii; item Extractum helleb. nigri, & acutum cum aliquot granis scammonii sulphurati. Alias etiam pilulæ tartareæ Quercetani, item pilulæ de ammoniaco Quercetani, & similia alia nota conveniunt: c. g.

R. Mass. pilul. de Amm. Quercetani vel tartarear.  
infusæ gr. xv. ad ʒj.

Extract. absinth. gr. vj.



*Scamm. sulphurat. vel extrah. troch. alb. gr. ij.*

M. F. Pilula. S.

*Pilula febrilis purgativa.*

*R. Mass. pilul. de ammon. Quercetani gr. xv.*

*Extrah. card. bened.*

*Absterg. an. gr. iv.*

*Nitri antimoniati gr. vj.*

*Scamm. rosati gr. j.*

*Cum f. q. essentia martis f. Pilula. S.*

*ut ante.*

*R. Extrah. pauchym. Cralli gr. xv.*

*Martis cum succ. pom. gr. xij.*

*Tartari vitriolati gr. vj.*

*Scamm. sulphurat. gr. iij.*

*Cum f. q. essentia martis f. Pilula. S.*

*ut ante.*

*Omniun opimum purgans, præsertim in febribus chymicis, est mercurius dulcis: c. 2.*

*R. Mass. pilul. de tribus Roff.*

*Merc. dulc. an. gr. xv.*

*Scamm. sulphurat. gr. iij.*

*Extrah. troch. alb. gr. j.*

*M. f. Pilula. S.*

*ut ante.*

*Vel in forma Boli:*

*R. Conserv. rosar. ℥ss.*

*Merc. dulc. ℥j.*

*Scamm. sulphurat. gr. v.*

*M. f. Bolus. S.*

*Saccharum purgans.*

*R. Merc. dulc. gr. xv.*

*Tartari vitriolat. ℥ss.*

*Scamm. sulphurat. gr. iij.*

*Cum conserv. rosar. f. Bolus: S.*

*ut ante.*

Egregius hic est Mercurius dulcis, quia viscidus, pituitosa, cruditates chyloles, & inde lymphæ vitia imprimit, evacuat; scammonium verò acrioribus, & uti vocant, biliosis, expurgando in primis vis conduct. Pertinet hoc præsertim contra quartanas contumaces Merc. dulcis cum Merc. vitæ mistus ad imitationem HARTMANNI *Præxi Chym. lib. 1. cap. 4. §. 1. Vid. CARDILUCCIUS Officin. Sanit. pag. 23.* Sicut & Buryrum Antimonii in substantia sumptum etiam est conveniens purgans in febribus: (adeit enim aliquid de Mercurio vitæ.) Nam quidam propinavit gutt. ij. buryri antimonii in haustu vini, & quidem Quartanario, & citra ullam incommodum alvum solvit: rursus sumplit gutt. v. in vino, & purgatus est, & sudavit, febrisque soluta fuit.

Pertinet hoc *specificum empiricum* pro febribus intermittentibus, præsertim in Tertianis, vel simplicibus vel compositis.

*R. Meibomian. alb. ℥ij.*

*Grana piper. albi no. xxi.*

*Lap. cancr. præp. ℥j.*

*M. f. Pulvis.*

*Div. in 3. part. aqu. D. S.*

*Pulvis febrilis aperitivus.*

Propinandus in basi vini calidi, imminente paroxysmo, expectando semper sudorem largum; plures febres diuturnæ hoc ipso curatæ fuerunt.

Pertinet huic *Pulvis Camitæ de Warwich*, præsertim additione Martis correctus, ante paroxysmum usurpatus, optime conferens: ad cuius imitationem

*R. Crem. tartari gr. xv. ad ℥j.*

*Scamm. sulphurat. gr. iij. ad ℥ss.*

*Antimon. diaphor. gr. vj.*

*M. f. Pulvis. S.*

*Pulvis pro una vice.*

*R. Antimon. diaphor. ℥ss.*

*Mag. fram. gr. xxiv.*

*Crem. tartari gr. ix.*

*M. f. Pulvis.*

*Div. in 4. part. aqu. S.*

*Pulvis febrilis laxativus.*

*R. Crem. tartari ℥j.*

*Antimon. diaphor. ℥j.*

*Scamm. præp. gr. vj.*

*M. f. Pulvis.*

*Div. in 2. part. S.*

*Pulvis febrilis.*

*R. Pulv. Carnach. ℥j.*

*Troch. alband. gr. j.*

*Ol. destillat. maris gutt. ij.*

*M. f. Pulvis. S.*

*Pulvis laxativus.*

*R. Pulv. jalapp. gr. xij. ad xv.*

*Antim. diaph. non edulcor. gr. vj. xij. ad viij.*

*M. f. Pulvis. S.*

*Pulvis febrilis aperitivus.*

*R. Corall. rub. præp. vel lapill. cancr. præp.*

*Salis absterg. vel Arcan. dupl. Mnsf.*

*an. ℥ss. gr. xij. xij. ad xv.*

*Scamm. sulphur. vel præp. Ascend.*

*gr. ij. vel iij. ad iv.*

*M. f. Pulvis. S.*

*Pulvis febrilis laxativus.*

*II. Detur ante paroxysmum.*

*R. Salis ammon. gr. xv. ad ℥j.*

*Pulv. jalapp. ℥ss. ad gr. xv.*

*M. f. Pulvis. S.*

*Pulvis aperitivus.*

*R. Arcan. dupl. ℥ss.*

*Antimon. diaph. gr. v.*

*Corall. rub. præp. gr. iij.*

*Pulv. jalapp. gr. vj.*

*Scamm. sulph. gr. ij.*

*M. S.*

*Pulvis laxativus.*

*R. Arcan. dupl. gr. xv.*

*Antim. diaph. ℥ss.*

*Scamm. sulph. gr. iv.*

*M. S.*

*Pulvis aperitivus.*

Egregie conferunt, præsertim si mox in reclinata, capiuntur. Item

*R. Passul. min. laxat. ℥v.*

*Tartar. vitriolat. gr. vj.*

*M. S.*

*Passula laxativa.*

Observ. IV. *Clysteres*, ad alleviandam paroxysmorum atrociam, ubi copiosi status aut borborygmi, aut atiores abdominis, aut dolores in centro mesenterii circa vetebras lumbares, aut angustie in præcordiis, quæ sudorem sæpe impediunt, sunt insigniter proficui; item in ventriculi symptomatibus ante vel in paroxysmo, v. g. vomitu nimio, anxietatibus, item gravibus aliis symptomatibus, ex acrioribus & mordacibus æruginosissimis succis ad ventriculum delatis, difficulter vomentibus, h. e. orificio stomachi superiori robusto instructis, id quod eo magis observetur, ubi alvus aliàs est obstructa, aut excreta indurata sunt, uti istud subinde evenit in hypochondriacis & similibus. Fiant saltem ex leniter abstergentibus aut emollientibus, cum sale tartari acuat. In scorbuto vel febre scorbutica, ubi dolores abdominis convulsivi aut lumborum graviores adsunt, ex lacte idem salubriter fiunt, vel solo, vel solvatur in eo saccharum aut mel, adjecto vitello oui, misce symptomata tollunt: sicut & in hypochondriacis & hysteriis, ubi urgent varia symptomata, clysmata talia ex & cum terribilissima maturè injecta multum conferunt. Dabo exemplum clysteris emollientis ac blandè abstergentis:

*R. Spec. carmin.*

*Emollient. an. M. j.*

*Salis cin. clavellat. ℥ij. ad ℥ij.*

*Scor. rog. antimon. ℥j.*

*Coq. in f. q. aqu. simpl.*

*Colatura ℥viij.*

*aduc*

*Elect. bacc. laur. ℥j.*

*Ol. destillat. cereb. ℥j.*

*M. pro Clystere: S.*

*Clyster.*

*R. Spec. carmin. vel emollient. M. ij.*

*Muri tartar. ℥j. vel ℥ij.*

*Coq. in f. q. aqu. simpl.*

*Colatura ℥ix. aduc*

*Elect. de bacc. laur. ℥j.*

*Ol. destillat. succin. ℥ss.*

*Vitelli oui no. j.*

*M. f. Emul.*

*D. S.*

*ut supra.*

*R. Flor.*



- R. Flor. chamom. M. ij.  
Baccar. junip. ʒj.  
Sem. anis. ʒss.  
Coqu. in an. aqu. & urina humana.  
Colatura ʒvii.  
Adde  
Elett. lenitivi ʒj.  
Ol. de still. baccar. junip. vel terredinib. ʒj.  
M. F. Enema: S.  
Clyster contra flatus.
- R. Herb. chamom. Rem. M. ʒ.  
Fol. lauri,  
Flor. sambuci an. M. ʒ.  
Rad. angel.  
Levisi.  
Sem. anis an. ʒvj.  
Coqu. in s. q. aqu. simpl.  
Colatura ʒix. adde  
Elett. de bacc. lauri,  
Lenitivi an. ʒvj.  
Nuri ammon. ʒj.  
Ol. de still. angel.  
Bacc. lauri,  
Ruta (multa namque factum in Ratibus  
hac) an. gutt. iv.  
Virell. ov. No. j.  
M. pro Clymate.  
D. S. ut supra.
- R. Fol. lauri,  
Flor. sambuci an. M. ʒ.  
Flor. cham. M. j.  
Rad. levisi. ʒvj.  
Sem. fenu graci vel lini ʒss.  
Coqu. in s. q. urina humana & aqu. simpl. an. p. æq.  
Colatura ʒix. adde  
Elett. bier. cum agar. ʒvj.  
de bacc. lauri ʒij.  
Ol. de still. angelica,  
Carvi,  
Ruta an. gutt. iv.  
M. pro Clymate: S.  
Clyster contra flatus.
- R. Herb. absinth.  
Card. bened. vel cent. min. vel veron. vel  
ruta ʒc. an. M. j.  
Rad. enula ʒj.  
Levisi. ʒvj.  
Bacc. junip. ʒj.  
Sal. tartari ʒj.  
Coqu. in s. q. Aqu. simpl. aut feri lactis.  
Colatura ʒvii. adde  
Elett. bier. cum agar. ʒj.  
Mell. rosat. ʒvj.  
Nuri, vel salis ammon. vel salis gemm. ʒiss.  
M. pro Ememate: S.  
Clyster febrilis abstergens.
- R. Flor. cham. M. ij.  
Herb. mentha M. j.  
Baccar. junip. ʒj.  
Coqu. in s. q. aqu. simpl. & urina humana an. part. æq.  
Colatura calidè applicetur.  
In scorbuto fiat Clyster ex lacte:  
R. Lact. caprill. vel vaccini ʒix. ad ʒij.  
Adde  
Mell. rosat.  
Rutac. an. ʒj. ad ʒiss.  
Virell. ov. No. ij.  
M. F. Clyster, &  
applicetur pro duabus vicibus: S.  
Clyster pro 2. vicibus.

Semper hora vna vel altera ante paroxysmum Clysteres Injiciendi sunt, & sic operantur cum euphoria ægri.

Observ. V. Rarissimè aut ferè nunquam, nisi interdum per accidens, febres intermittentes solis universalibus, ut purgantibus, vomitoriis, venesectioni, aut similibus cedunt; quin his administratis, alia insuper alterantia appropriata seu specifica, alias Febrifugadicta, requirantur, quæ fermentum febrile corrigunt, malam crasin massæ sanguineæ emendant, & inquinamenta à paroxysmo relicta resolvunt, eaque per diaphoresin blandè excludunt, alias in pejus ruit malum. Experientia testatur, Diaphoretica in intermit-

tentibus plus præstare, quàm purgantia, vel quæcunque alia monstrante hoc naturæ in fine paroxysmi beneficio sudoris fidentis tragediam: eaque sunt partim communia, præsertim salina, tam fixa, quàm volatilia, nempe quorum vis in destructione fermenti febrilis acidæ, ejusque per sudorem exclusionem ferè consistit; uti est v. g. China China contra tertianas, item Mistura Crollii contra tertianas, &c. quæ vulgò dicuntur præcipitare, figere, effervescentiam sistere, &c.

Eligenda autem sunt Diaphoretica pro varietate symptomatum in paroxysmis distincta: in specie aromatica nimis acris, etiam theriacalia, vitanda sunt, ubi intensior æstus affligit ægros, utpote in quo casu fixa magis conducunt: vid. BECHERUS Phys. subterr. lib. 1. pag. 393.

Ac sanè febris intermittens tuto curata potest dici nulla, nisi per sudorem successivè finierit.

Observ. VI. Quicumque autem febres intermittentes rectè curare velit, cum cavere oportet, ne corpore non prius purgato, per quæcunque loca id fiat, à diaphoreticis & specificis initium faciat, maxime in principio; quin potius præmissis universalibus tantummodò hæc exhibeantur; quia alias specifica intempestivè adhibita, qualia sunt Strobelbergeri, Timæi, Mansuetii, aliaque Terrea, febres reddunt compositas. Vomitorio semel præmissio tuto possunt ea dein dari.

Observ. VII. In omnibus intermittibus febribus, aliisque periodicis morbis, æger ante paroxysmum & in eo neque cibum neque potum assumat; sed necesse est, ut stomachus sit vacuus. Quicquid enim paroxysmus in stomacho invenit, hoc omne digestionis primæ in paroxysmo penitus deficientis errato in scorias febriles, novo somitu intervenientes corrumpit. Alvus tamen utilissimè exoneratur ante paroxysmum, vel per se, vel speciatim injecto, si opus est, Ememate, ut ante monui.

Observ. VIII. Medicamenta febrifuga semper, non præsenke, sed instante febre & ita ante paroxysmum exhibeantur, una vel duabus vel tribus horis ante eum; vel in vehiculo calido; vel, si non placet, in haustu vini absinthitis; vel alio medicato, promovendus dein sudor (si enim is non sequitur in fine paroxysmi, accedunt cephalalgie;) idque repetatur sæpius in duobus, tribus vel quatuor paroxysmis, licet non amplius redierit paroxysmus suo tempore, ut sic junctus viribus cum natura operentur. Ingruente autem sudore in fine paroxysmi, non nimis singulis contegatur æger, ne animi deliquia incurrat, aut vires nimium exhauriantur.

Observ. IX. In Tertianis perniosis seu malignis misceantur semper alexipharmaca: qualia sunt antimoniaia fixa, item Bezoardicum Minerale, maxime Martiale & Joviale; quia magnum periculum subest. Interim tamen, cum febris maligna simulare possit tertianam, cautus sit Medicus, præsertim cum lingua sit aspera & nigra, omniumque virium nimia & subitanea prostratio: (ex lingua multa petuntur signa, imprimis in continuis & malignis.) Forlan hac respexit JOHANNES TOLL in Praxi Schenckiana pag. 290. dicens: Cum paroxysmus tertiana est cum malis accidentibus & debilitate cordis, ita, ut putetur à materia venenata esse, dentur infirmo in paroxysmo seminis citri aliquot grana, & videbitis effectum mirabilem &c. Nempe Emulsa seminis citri additis appropriatis alexipharmacis & absorbentibus, non foret inutilis.

Observ. X. Spiritus salis ammoniaci volatiliss (modus paranda est omnibus notus) universale est febrifugum, & repetito usu præprimis raro fallit in Quartanis, aliisque intermittibus, sive æstus adsit, sive frigus; unde spiritus hic in genere spiritus antiquatiss vocatur. Loco ejus enim ipsum sal ammoniacum depuratum, seu ejus flores, vel loco ejus sal catholicum, convenienter præmissis universalibus, seu uno alterove paroxysmo jam delapso, ʒj. vel ʒss. ad summum (est enim acerrimum) propinantur. Verum obiter noto: non facilè, nisi pro subitaneo usu esse præscribendum sal ammoniacum conjunctum cum salibus luxivialibus fixis: Ratio, quia aliàs ex sale ammoniaco avolat omne sal volatile, relicto sale fixo acido, quod se jungit cum luxiviali, & fit sal tertium salsum. Ipsas febres scorbuticas etiam spiritus salis ammoniaci mitigat, in quibus cum ana vel dimidio spiritus cochlearis optime permisceatur. Usurpari potest tam ante paroxysmum, si sit paratus fuerit, à ʒss. ad ʒj., prout acrior vel debiliior fuerit, quàm etiam die intermissionis ad gutt. xx. xxx. vel xxxx. bis in die in aqua quadam appropriata. Loco hujus Galenici in simplici febre intermittente & scorbutica succos aut decocta



absinthii, cardui bened., centaurei minoris, & similitum plantarum febrifugarum amarificantium, sale volatili oleoso aceti præditarum, ad imitationem RULANDI usurpari solent: loco quorum spiritus salis ammoniaci longè melior est. Pro hoc scopo

**R.** Spir. salis ammon. ʒij.  
D. S.

*Spiritus febrilis resolvens.*

Dentur 30. vel 40. guttæ, vel pro 2. dosibus.

**R.** Spir. salis ammon. ʒj.

*Ess. opii gutt. xv.*

**M.** pro una dosi ante paroxysmum.

D. S.

*Essentia febrilis pro una vice.*

**R.** Spir. salis ammon. simpl. ʒiij.

*Liqu. cornu cervi succin. ʒj.*

M. S.

*Spiritus resolvens.*

Repetatur aliquoties.

Vel

**R.** Aqua card. bened. vel fumar. ʒj. ad ʒiij.

*Spir. salis ammon. ʒss. ad ʒj.*

*Laudani opiat. gr. iij. vel ij. vel ess. opii gutt.*

*Syrupi card. bened. ʒij. vel ʒss.*

*M. pro dosi. S.*

*Potio febrilis pro una dosi.*

Vel

**R.** Aqua card. bened. ʒj.

*Cormin. ʒss.*

*Spir. salis ammon. ʒss. ad ʒj.*

*Ol. destillat. caryophyll. gutt. ij.*

*Syr. card. bened. ʒss.*

**M. F.** Potio assumenda ante paroxysmum.

D. S. ut antea.

Mirè convenit, in specie si cum affectibus abdominis hypochondriacis gravior sit paroxysmus.

Vel

**R.** Aqua card. bened. vel mentha ʒj.

*Spir. salis ammon. ʒss.*

*Lapill. canc. præp. vel corall. rubr. præp. vel antimon. diaphor. ʒss. ad ʒj. ʒj.*

*Ol. destillat. caryophyll. vel succ. gutt. ij.*

*Syrup. card. bened. vel cortic. aurant. ʒij.*

M. S.

*Potio febrilis pro una vice.*

Addi etiam potest Laudani opiat. gr. j., si frigus urget.

Pro varietate circumstantiarum in febre scorbutica permisceatur cum spiritu cochleariæ, repetatur, si opus; feliciter enim operatur.

Vel

**R.** Aqua card. bened. vel cent. min. vel menth. ʒj. vel ʒij.

*Cinam. ʒij.*

*Spir. salis ammon. ʒj.*

*Antimon. diaphor. gr. xvj.*

*Syrup. card. bened. vel de beton. ʒij.*

M. D. S.

ut supra.

**R.** Salis ammon. simpl. vel depur. gr. xv. ad ʒj.

*Corall. rubr. præp. vel lapill. canc. præp. vel,*

*quod melius, antimon. diaphoret. vel antihell.*

*Poterii ʒss. gr. xij. ad gr. xv.*

M. D. S.

*Pulvis febrilis.*

Detur ante paroxysmum, addendo unam vel alteram guttam olei cuiusdam destillati, v.g. caryophyllorum, &c.

**R.** Salis ammon. ʒj.

*Antim. diaphor. ʒss.*

M. f. Pulvis.

Dentur 3. doses. S.

ut ante.

**R.** Aqua antiscorbut.

*Cardui bened. an. ʒss.*

*Spir. cochlear. vel sal. ammon. an. ʒj.*

*Lapill. canc. præp.*

*Specif. Febril. Scrobelbergeri an. ʒj.*

*Laud. opiat. gr. ij.*

*Syrupi scelerisrb. Foresti ʒj.*

M. S.

Mixtura pro aliquot vicibus in febre scorbutica.

In forma pulveris:

**R.** Salis ammon. Div. vel ʒij. ad ʒij.

Div. in 4. part. æq. S.

*Sal febrile pro 4. vicibus.*

Vel

**R.** Salis ammon. gr. xv.

*Lapill. canc. præp. ʒss.*

*Laud. opiat. gr. j.*

M. S.

*Sal Febrile.*

Detur ante paroxysmum.

Vel præscribatur sal ammoniacum cum sale absinthii vel aliis fixis, cum absorbentibus acidum; illudque in hypochondriacis temperant.

Obf. X. Præter spiritum salis ammoniaci salia fixa seu cineritia vegetabilium, cardui bened., fumariz, centaurei minoris, absinthii, artemisiz, imperatoriz, adedque quælibet alcalia omnes febres intermittentes, imprimis Quartanas & febres scorbuticas tollunt vi sudorificæ, si solitarie à ʒss. ad ʒj. imò ad ʒss. ante paroxysmum dentur; imò horum ʒj. adjunctum vel antimonium diaphoreticum, antihæcticum Poterii, aut flores antimonii diaphoretici, aut flores sulphuris, quos HOFFMANNUS pro Tertianâ, perfectè curanda in clavo pag. 370. commendat, bis vel ter ante paroxysmum in aqua cent. min. vel vino cum sudoris eruptione propinando: item lapilli cancr. præparati, qui & ipsi turgent sale volatili temperato, aut corallia, mater perlarum, aliaque concreta terrea, & quidem dimidiatâ ad illa dosi, pro circumstantiarum tamen varietate variandâ, rarè fallunt. Nempe sit interdum, ut nimis citò propinatus spiritus salis ammoniaci, aut ubi adhuc nimium adest frigus, minis prosit, & tunc in subsidium vocanda salia fixa, & ante paroxysmum propinanda, continuato spiritu isto intermissionis tempore. Nam ubi magis urget frigus & rigor, quàm æstus, salia hæc fixa lixivialia sunt convenientiora, simulque fortiter sudores movent, nec facillè febrium duplicaturam admittunt: sed ubi excedit æstus, spiritus salis ammoniaci convenientior, quod per subitaneum sudorem æstum mitigat; item tartarus vitriolatus, Potio Croliana, & similia. Hinc in febribus frigidis fixa utramque absoluunt paginam, & BARBETTE in sua Praxi salia fixa incinerata incurat tertianæ & aliarum febrium intermittantium longè præfert ului chinæ chinæ, tanquam tutiora & promptiora sine recidivæ metu: Item volatilia salia animalium, spiritus urinz, aut hujus loco spiritus salis ammoniaci, sal volatile cornu cervi aut viperarum, quæ in Quartana à ʒss. ad gr. xij. propinati, vel commodè aliis permisceri possunt. Præscribendi modus est hic:

**R.** Corall. rub. præp.

*Salis absinth. ʒss. vel gr. xv.*

*Laud. opiat. ʒss. ad gr. j.*

*Ol. destillat. caryoph. vel bacc. junip. gutt. ij.*

M. f. Pulvis. S.

*Pulvis febrilis.*

Detur ante paroxysmum.

**R.** Salis absinth. vel card. bened. ʒj.

*Corall. rub. præp. vel lap. canc. præp. vel anti-*

*monii diaphor. ʒss. gr. xij. ad gr. xv.*

*Laud. opiat. gr. j. vel ij.*

M. f. Pulvis. S.

ut ante.

Horâ unâ vel alterâ ante paroxysmum in vehiculo calido assumantur, expectando post paroxysmum sudorem.

Vel

**R.** Salis absinth. ʒj.

*Volat. cornu cervi gr. v.*

*Laud. opiat. gr. ij.*

M. S.

*Sal febrile pro una vice.*

**R.** Salis absinth. gr. xv.

*Volat. cornu cervi gr. iij.*

*Corall. rubr. præp. ʒss.*

*Ol. destillat. caryoph. gutt. ij.*

M. f. Pulvis ante paroxysmum assumendus. S.

*Pulvis febrilis pro una vice.*

Item contra Quartanam:

**R.** Salis absinthii ʒij.

*Lapill. cancr. præp. ʒss.*

*Antimonii diaphor. ʒss.*

M. pro 3. dosibus.

D. S.

Pulvis



*Pulvis febrilis pro 3. vicibus.*

Vel

- R. Salis absinth. ℥j.*  
*Lapill. cancer. prap. 3℥.*  
*M. pro 4. dosibus. D. S.*  
*Pulvis febrilis.*  
*R. Corall. rub. prap.*  
*Salis absinth. an. gr. xv. ad 3j.*  
*Sol. fulmin. gr. vj.*  
*M. f. Pulvis. S.*  
*ut ante.*

Detur ante paroxysmum.

De euro fulminante vid. HOEFERUS in *Herz. Med.* pag. 391.

- R. Cornu cervi sine igne 3j.*  
*Salis card. bened.*  
*Cent. min. an. gr. viij.*  
*M. f. Pulvis.*

Div. in 2. partes. S.

*Pulvis sudoriferus pro 2. vicibus.*

- R. Sals absinth. gr. xv.*  
*Antimonii diaph. 3℥.*  
*Corall. rub. prap. gr. xij.*  
*Ol. destillati sassafras gutt. ij.*  
*M. f. Pulvis. S.*  
*Pulvis febrilis.*  
*R. Antimonii diaphor.*  
*Salis absinth.*

- Card. bened. an. 3j.*  
*Ol. destill. macis gutt. ij.*  
*M. f. Pulvis pro 2. dosibus. S.*  
*Pulvis febrilis pro 2. vicibus.*

- R. Lapill. cancer. prap. 3j. ad 3℥.*  
*Antimon. diaphor.*  
*salis absinth. an. 3℥.*  
*M. D. S.*

- Pulvis febrilis.*  
*R. Salis absinth. 3j.*  
*Volat. cornu cervi gr. v.*  
*Lapill. cancer. prap. 3℥.*  
*Laud. opiat. gr. ij.*  
*M. f. Pulvis. S.*  
*ut ante.*

Detur ante paroxysmum.

HELMONTIUS commendat ad vim febrilem salia ex plantis cephalicis, majorana, salvia, rosmarini, &c. sed non fixa, verum volatilia, in *Tractat. de Febris* §. 4: sed non omnibus licet adire Coenithum, ut possint habere salia vegetabilium volatilia in forma sicca: intermixta sub forma olei possunt adhiberi.

In forma Potionis:

- R. Aqua card. bened. 3j.*  
*Salis absinth. 3j.*  
*Cent. min. 3℥.*  
*Julepi rosar. 3ij.*  
*M. pro dosi. S.*

*Potio febrilis pro una vice.*

- R. Aqua cent. min. 3j. vel 3jss. ad 3ij.*  
*Salis absinth. vel card. bened. gr. xv. vel 3j.*  
*Lapill. cancer. prap. 3℥. vel gr. xv.*  
*Syrupi card. bened. 3℥.*

M. F. Potio ante paroxysmum assumenda. S. ut ante.

Quod si urgeat rigor, gutt. ij. olei destillati caryophyllorum vel baccarum juniperi addantur.

Item ante Paroxysmum convenit hac Potio Sylyi cochleatim assumenda:

- R. Aqua petrosel. 3ij.*  
*Paniculi 3j.*  
*Spir. iheriac. 3jss.*  
*Sal. volat. succin. 3j.*  
*Syrup. card. bened. 3j.*  
*M. S.*

*Potio febrilis cochleatim sumenda.*

- R. Aqua card. bened. 3ij.*  
*iheriac. f. 3j.*  
*Salis absinth. 3℥.*  
*Spir. salis ammon. 3j.*  
*Syrup. papav. erras. 3ij.*  
*M. D. S.*

*Potio febrilis pro aliquot vicibus.*

Obs. XI. Quod attinet salia falsa seu duplicata, quae constant ex alcali & acido, ut tartarus vitriolatus, arcanum duplicatum Mynsichtii, sal hypochondriacum digestivum, nitrum antimoniatum, item tartarus nitr. Barbolesi, quem vocat suum alexiprotum universale, seu sal tartari imbibitum cum spiritu nitri: nam & haec salia fixa lixivialia vegetabilium cum spiritu salis aut nitri coagulata in salia falsa crystallisata, mirè in omnibus intermittentibus conveniunt, imprimis in principio morbi tanquam digestiva & absorbentia ante universalia valde utiliter usurpantur: Imò his continuatis felicissime saepe febres profligantur. Diebus enim intermissionis pro abstergendis primis viis, & removendo paulatim, si quis subit, fomite febrili, multum valent bisquotidie à gr. xv. ad 3j. & 3℥. in appropriato vehiculo usurpata: idè die intermissionis ante vomitoria danda sunt, maxime sal hypochondriacum digestivum, quod Digestivum Quartanarium vocat SYLVIVS:

- R. Salis hypochondr. 3℥.*  
*Absinth. gr. v.*  
*M. S.*

*Sal sine pulvis emolliens.*

- R. Salis ammon. depur. 3j.*  
*Nitri antimoniat 3j.*  
*M. div. in 2. part. aqu. S.*  
*Sal digestivum pro 2. vicibus.*

Mandè in vehiculo calido & vespere in frigido capiendò; ut ante paroxysmum commodè etiam propinari possunt:

- R. Arcan. dupl. 3℥. gr. xv. ad 3j.*  
*Lapill. cancer. prap. vel antim. diaph. 3℥.*  
*M. F. Pulvis. S.*  
*Pulvis pro una dosi.*

Detur ante paroxysmum, & etiam repetatur die intermissionis bis: egregiè prodest, copiosam praecipitat materiam.

- R. Arcan. dupl. 3j.*  
*Antim. diaphor.*  
*Lapill. cancer. prap. an. gr. xiv.*  
*M. f. Pulvis.*  
*Div. in 2. part. aqu. S.*  
*Pulvis alterativus.*  
*R. Arcan. dupl. gr. xv.*  
*Lapill. cancer. prap. gr. xij.*  
*Ol. destill. bacc. junip. gutt. ij.*  
*M. D. S.*

*Pulvis febrilis alterativus.*

- R. Arcan. dupl. gr. xv.*  
*Salis absinth.*  
*Corall. rub. prap. an. 3℥.*  
*Laud. opiat. 2. j.*  
*M. f. Pulvis. S.*  
*Pulvis febrilis.*  
*R. Arc. dupl. Myns. 3℥. vel 3ij.*  
*Salis absinth.*  
*Lapill. cancer. prap. an. 3j. vel 3℥.*  
*M. f. Pulvis:*  
*Div. in 2. vel 3. part. aqu. S.*

*Sal febrile per 2. vel 3. vicibus.*

Detur dosis ante paroxysmum & die intermissionis loco digestivi. Conveniens est in febribus intermittentibus scorbuticis, item, ubi nimis urget febris.

- R. Lapill. cancer. prap.*  
*Arcan. dupl.*  
*Salis absinth. an. 3℥.*  
*Salis volat. succin. gr. xij.*  
*Laud. opiat. gr. ij.*  
*M. f. Pulvis.*  
*Div. in 3. part. aqu. pro tot dosibus; S.*  
*Pulvis febrilis pro 3. vicibus.*

Semper dosin unam horam ante paroxysmum assumendo.

- R. Eboris sine igne,*  
*Arcani dupl. an. gr. xij.*  
*Anri fulm. gr. vj.*  
*M. S.*  
*Pulvis febrilis.*  
*R. Crem. tartari 3j.*  
*Tartari vitriolati 3℥.*  
*Spiritus sulph. gutt. ij. vel iv.*  
*M. f. Pulvis.*  
*Div. in 2. part. aqu. S.*  
*Pulvis alterativus.*

Pertinet



absinthii, cardui bened., centaurii minoris, &c. similibus plantarum febrifugarum amarificantium, sale volatili oleolo acris præditarum, ad imitationem RULANDI usurpari solent: loco quorum spiritus salis ammoniaci longè melior est. Pro hoc scopo

*R. Spir. salis ammon. ʒij.*  
*D. S.*

*Spiritus febrilis resolvens.*

*Dentur 30. vel 40. guttz, vel pro 2. dosibus.*

*R. Spir. salis ammon. ʒj.*

*Eff. opii gutt. xv.*

*M. pro una dosi ante paroxysmum.*

*D. S.*

*Essentia febrilis pro una vice.*

*R. Spir. salis ammon. simpl. ʒij.*

*Loqu. cornu cervi succia. ʒj.*

*M. S.*

*Spiritus resolvens.*

*Repetatur aliquoties.*

*Vel*

*R. Aqua card. bened. vel sumer. ʒj. ad ʒij.*

*Spir. salis ammon. ʒss. ad ʒj.*

*Laudani opiat. gr. iʒ. vel ij. vel eff. opii gutt.*

*Syrupi card. bened. ʒij. vel ʒss.* (viij.)

*M. pro dosi. S.*

*Potio febrilis pro una dosi.*

*Vel*

*R. Aqu. card. bened. ʒj.*

*Carmin. ʒss.*

*Spir. salis ammon. ʒss. ad ʒj.*

*Ol. destillat. caryophyll. gutt. ij.*

*Syr. card. bened. ʒss.*

*M. F. Potio assumenda ante paroxysmum.*

*D. S. ut antea.*

*Mirè convenit, in specie si cum affectibus abdominis hypochondriacis gravior sit paroxysmus.*

*Vel*

*R. Aqua card. bened. vel mentha ʒj.*

*Spir. salis ammon. ʒss.*

*Lapill. cancr. præp. vel corall. rubr. præp. vel*

*antimon. diaphor. ʒss. ad ʒj. ʒj.*

*Ol. destillat. caryophyll. vel succ. gutt. ij.*

*Syrup. card. bened. vel cortic. aurant. ʒij.*

*M. S.*

*Potio febrilis pro una vice.*

*Addi etiam potest Laudani opiat. gr. j., si frigus urget.*

*Pro varietate circumstantiarum in febre scorbutica permisceatur cum spiritu cochlearæ, repetatur, si opus; feliciter enim operatur.*

*Vel*

*R. Aqua card. bened. vel cent. min. vel mentha ʒj. vel ʒij.*

*Cinam. ʒij.*

*Spir. salis ammon. ʒj.*

*Antimon. diaphor. gr. xvj.*

*Syrup. card. bened. vel de beton. ʒij.*

*M. D. S.*

*ut suprâ.*

*R. Salis ammon. simpl. vel depur. gr. xv. ad ʒj.*

*Corall. rubr. præp. vel lapill. cancr. præp. vel,*

*quod melius, antimon. diaphores. vel antisept.*

*Poterii ʒss. gr. xij. ad gr. xv.*

*M. D. S.*

*Pulvis febrilis.*

*Detur ante paroxysmum, addendo unam vel alteram guttam olei cuiusdam destillati, v.g. caryophyllorum, &c.*

*R. Salis ammon. ʒj.*

*Antim. diaphor. ʒss.*

*M. f. Pulvis.*

*Dentur 3. doses. S.*

*ut ante.*

*R. Aqua antiscorbut.*

*Cardui bened. an. ʒss.*

*Spir. cochlear. vel sal. ammon. an. ʒj.*

*Lapill. cancr. præp.*

*Specif. Febril. Strobelbergeri an. ʒj.*

*Laud. opiat. gr. ij.*

*Syrupi scelotzrb. Forsti ʒj.*

*M. S.*

*Mistura pro aliquot vicibus in febre scorbutica.*

*In forma pulveris:*

*R. Salis ammon. ʒiv. vel ʒij. ad ʒij.*

*Div. in 4. part. æq. S.*

*Sal febrile pro 4. vicibus.*

*Vel*

*R. Salis ammon. gr. xv.*

*Lapill. cancr. præp. ʒss.*

*Laud. opiat. gr. j.*

*M. S.*

*Sal Febrile.*

*Detur ante paroxysmum.*

*Vel præscribatur sal ammoniacum cum sale absinthii vel aliis fixis, cum absorbentibus acidum; illudque in hypochondriacis temperant.*

*Obs. X. Præter spiritum salis ammoniaci salia fixa seu cineritia vegetabilium, cardui bened., fumariz, centaurii minoris, absinthii, artemisiz, imperatoriz, adeoque quælibet alcalia omnes febres intermittentes, imprimis Quartanas & febres scorbuticas tollunt vi sudoriferâ, si solitarie à ʒss. ad ʒj. imò ad ʒss. ante paroxysmum dentur; imò horum ʒj. adjunctum vel antimonium diaphoreticum, antihæcticum Poterii, aut flores antimonii diaphoretici, aut flores sulphuris, quos HOFFMANNUS pro Tertiana, perfecte curanda in clave pag. 370. commendat, bis vel ter ante paroxysmum in aqua cent. min. vel vino cum sudoris eruptione propinando: item lapilli cancr. præparati, qui & ipsi turgent sale volatili temperato, aut corallia, mater petlarum, aliaque concreta terrea, & quidem dimidiatâ ad illa dosi, pro circumstantiarum tamen varietate variandâ, raro fallunt. Nempe sit interdum, ut nimis citò propinatus spiritus salis ammoniaci, aut ubi adhuc nimium adest frigus, minus prosit, & tunc in subsidium vocanda salia fixa, & ante paroxysmum propinanda, continuato spiritu isto intermissionis tempore. Nam ubi magis urget frigus & rigor, quam æstus, salia hæc fixa illuvialia sunt convenientiora, simulque fortiter sudores movent, nec facillè febrium duplicaturam admittunt: sed ubi excedit æstus, spiritus salis ammoniaci convenientior, quod per subitaneum sudorem æstum mitigat; item tartarus vitriolatus, Potio Crostiana, & similia. Hinc in febribus frigidis fixa utramque absolunt paginam, & BARBETTE in sua Praxi salia fixa incinerata incurta tertianæ & aliarum febrium intermittentium longè præfert usui chinæ chinæ, tanquam tutiora & promptiora sine recidivæ metu: Item volatilia salia animalium, spiritus urinæ, aut hujus loco spiritus salis ammoniaci, sal volatile cornu cervi aut viperarum, quæ in Quartana à ʒss. ad gr. xij. propinari, vel commodè aliis permulceri possunt. Præscribendi modus est hic:*

*R. Corall. rub. præp.*

*Salis absinth. ʒss. vel gr. xv.*

*Laud. opiat. ʒss. ad gr. j.*

*Ol. destillat. caryoph. vel bacc. junip. gutt. ij.*

*M. f. Pulvis. S.*

*Pulvis febrilis.*

*Detur ante paroxysmum.*

*R. Salis absinth. vel card. bened. ʒj.*

*Corall. rub. præp. vel lap. cancr. præp. vel anti-*

*monii diaphor. ʒss. gr. xij. ad gr. xv.*

*Laud. opiat. gr. j. vel ij.*

*M. f. Pulvis. S.*

*ut ante.*

*Horâ unâ vel alterâ ante paroxysmum in vehiculo calido assumantur, expectando post paroxysmum sudorem.*

*Vel*

*R. Salis absinth. ʒj.*

*Volat. cornu cervi gr. v.*

*Laud. opiat. gr. ij.*

*M. S.*

*Sal febrile pro una vice.*

*R. Salis absinth. gr. xv.*

*Volat. cornu cervi gr. iij.*

*Corall. rubr. præp. ʒss.*

*Ol. destillat. caryoph. gutt. ij.*

*M. f. Pulvis ante paroxysmum assumendus. S.*

*Pulvis febrilis pro una vice.*

*Item contra Quartanam:*

*R. Salis absinthii ʒij.*

*Lapill. cancr. præp. ʒss.*

*Antimonii diaphor. ʒss.*

*M. pro 3. dosibus.*

*D. S.*

*Pulvis*



*Pulvis febrilis pro 3. vicibus.*

Vel

- R. Salis absinth. ʒj.
- Lapill. cancr. præp. ʒʒ.
- M. pro 4. dosibus. D. S.
- Pulvis febrilis.*
- R. Corall. rub. præp.
- Salis absinth. an. gr. xv. ad ʒj.
- Sol. fulmin. gr. vj.
- M. f. Pulvis. S.
- ut ante.

Detur ante paroxysmum.

De auro fulminante vid. HOEFERUS in Libr. Med. pag. 293.

- R. Cornu cervi sine igne ʒij.
- Salis card. bened.
- Cent. min. an. gr. viij.
- M. f. Pulvis.

Div. in 2. partes. S.

*Pulvis sudoriferus pro 2. vicibus.*

- R. Salis absinth. gr. xv.
- Antimoni diaph. ʒʒ.
- Corall. rubr. præp. gr. xij.
- Ol. destillati sassafras gutt. ij.
- M. f. Pulvis. S.
- Pulvis febrilis.*
- R. Antimoni diaphor.
- Salis absinth.

Card. bened. an. ʒj.

Ol. destill. macia gutt. ij.

M. f. Pulvis pro 2. dosibus. S.

*Pulvis febrilis pro 2. vicibus.*

- R. Lapill. cancr. præp. ʒj. ad ʒʒ.
- Antimon. diaphor.
- Salis absinth. an. ʒʒ.
- M. D. S.

*Pulvis febrilis.*

- R. Salis absinth. ʒj.

*Volat. cornu cervi gr. v.*

Lapill. cancr. præp. ʒʒ.

Laud. opiat. gr. ij.

M. f. Pulvis. S.

ut ante.

Detur ante paroxysmum.

HELMONTIUS commendat ad vim febrilem salia ex plantis cephalicis, majoranæ, salvie, rosmarini, &c. sed non fixa, verum volatilia, in Tractat. de Febris ʒ. 4: sed non omnibus licet adire Corinthus, ut possint habere salia vegetabilium volatilia in forma sicca; intermissa sub forma olei possunt adhiberi.

In forma Potionis:

- R. Aqua card. bened. ʒj.
- Salis absinth. ʒj.
- Cent. min. ʒʒ.
- Islepi rosar. ʒij.
- M. pro dosi. S.

*Potio febrilis pro una vice.*

- R. Aqua cent. min. ʒj. vel ʒʒ. ad ʒij.
- Salis absinth. vel card. bened. gr. xv. vel ʒj.
- Lapill. cancr. præp. ʒʒ. vel gr. xv.
- Syrup. card. bened. ʒʒ.

M. F. Potio ante paroxysmum assumenda. S.

ut ante.

Quod si urgeat rigor, gutt. ij. olei destillati caryophyllorum vel baccarum juniperi addantur.

Item ante Paroxysmum convenit hæc Potio Syllii cochleatim assumenda:

- R. Aqua petrosel. ʒij.
- Fanicul. ʒj.
- Spir. iberiac. ʒʒ.
- Sal. volat. succin. ʒj.
- Syrup. card. bened. ʒj.
- M. S.

*Potio febrilis cochleatim sumenda.*

- R. Aqua card. bened. ʒij.
- iberiac. f. ʒj.
- Salis absinth. ʒʒ.
- Spir. salis ammon. ʒj.
- Syrup. papav. erras. ʒij.
- M. D. S.

*Potio febrilis pro aliquot vicibus.*

Obs. XI. Quod attinet salia falsa seu seu duplicata, quæ constant ex alcali & acido, ut tartarus vitriolatus, arcannum duplicatum Mynsichtii, sal hypochondriacum digestivum, nitrum antimoniatum, item tartarus nitr. Bartheolæ, quem vocat suum alexipheton universale, seu sal tartari imbibitum cum spiritu nitri: nam & hæc salia fixa lixivialia vegetabilium cum spiritu salis aut nitri coagulata in salia salia crystallifera, mixtæ in omnibus intermittentibus conveniunt, imprimis in principio morbi tanquam digestiva & absorbentia ante universalia valde utiliter usurpantur: Imò ils continuatis felicissime sæpe febrez profligantur. Diebus enim intermissionis pro abstergendis primis viis, & removendo paulatim, si quis subit, fomitem febrilem, multum valent bisquotidie à gr. xv. ad ʒj. & ʒʒ. in appropriato vehiculo usurpata; idcirco die intermissionis ante vomitoria danda sunt, maxime sal hypochondriacum digestivum, quod Digestivum Quartanarium vocat SYLVIVS:

- R. Salis hypochondr. ʒʒ.

Absinth. gr. v.

M. S.

Sal fræ pulvis emolliens.

- R. Salis ammon. depur. ʒj.

Nitri antimoniat. ʒj.

M. div. in 2. part. aqu. S.

Sal digestivum pro 2. vicibus.

Mane in vehiculo calido & vespere in frigido capiendum; uti ante paroxysmum commodè etiam propinari possunt:

- R. Arcan. dupl. ʒʒ. gr. xv. ad ʒj.

Lapill. cancr. præp. vel antim. diaph. ʒʒ.

M. F. Pulvis. S.

*Pulvis pro una dosi.*

Detur ante paroxysmum, & etiam repetatur die intermissionis bis: egregie prodest, copiosam præcipitat materiam.

- R. Arcan. dupl. ʒij.

Antim. diaphor.

Lapill. cancr. præp. an. gr. xiv.

M. f. Pulvis.

Div. in 2. part. aqu. S.

*Pulvis alterativus.*

- R. Arcan. dupl. gr. xv.

Lapill. cancr. præp. gr. xij.

Ol. destill. bacc. junip. gutt. ij.

M. D. S.

*Pulvis febrilis alterativus.*

- R. Arcan. dupl. gr. xv.

Salis absinth.

Corall. rubr. præp. an. ʒʒ.

Laud. opiat. g. j.

M. f. Pulvis. S.

*Pulvis febrilis.*

- R. Arc. dupl. Myns. ʒʒ. vel ʒij.

Salis absinth.

Lapill. cancr. præp. an. ʒj. vel ʒʒ.

M. f. Pulvis:

Div. in 2. vel 3. part. aqu. S.

*Sal febrile per 2. vel 3. vicibus.*

Detur dosi ante paroxysmum & die intermissionis loco digestivi. Conveniens est in febris intermitentibus scorbuticis, item, ubi nimis urget febris.

- R. Lapill. cancr. præp.

Arcan. dupl.

Salis absinth. an. ʒʒ.

Salis volat. succin. gr. xij.

Laud. opiat. gr. ij.

M. f. Pulvis.

Div. in 3. part. aqu. pro rot dosibus; S.

*Pulvis febrilis pro 3. vicibus.*

Semper dosin unam horam ante paroxysmum assumendo.

- R. Eboris sine igne,

Arcani dupl. an. gr. xij.

Auri fulm. gr. vj.

M. S.

*Pulvis febrilis.*

- R. Crem. tartari ʒj.

Tartari vitriolati ʒʒ.

Spiritus sulph. gutt. ij. vel iv.

M. f. Pulvis.

Div. in 2. part. aqu. S.

*Pulvis alterativus.*

Pertinet



Pertinet hac *potio specifica febrifuga Crollii*, quam RIVERIUS toties ante paroxysmum usurpavit cum felici successu: Formula est hæc:

*R. Aqu. cicbor. ʒi. ij. vel liij.  
Spir. sulph. vel vitrioli gutt. xv. ad ʒi.  
Salis absinth. ʒss.  
M. S.  
Potiuncula.*

Propinetur duabus horis ante paroxysmum: hac ipsa sæpius curavit quamplurimas febres, imprimis tertianas, felici cum successu. In imbecillibus subiectis imminui potest dosis ingredientium. RIVERIUS creberrimam ejus fecit experientiam, ut videre est in *Observ. ejus Cent. 1. Observ. 20. 19. 26. item Cent. 4. Observ. 2. 12. 15. 25. & Praxi lib. 17. cap. 3.* LUDOVICI in *Pharmacia* Mixturam hanc extemporaneam loco nitri vitriolati commendat; & sanè non contemnenda est. Commodè etiam lapilli cancerorum, antimonium diaphoreticum & similia addi possunt.

Observ. XII. Salia nitrosa, & cum nitro parata omnia medicamenta, optimè sistere ardores nimios cum paucis vel nullo rigore, in paroxysmo, aut etiam ante cum administratione; imò spirit. nitri dulcis in declinatione paroxysmi, aut finito jam paroxysmo, sensibiliter febres mitigat. Præter hunc, nitrum antimoniatum, nitrum vitriolatum seu arcanum duplicatum aut Panacæa Holsteinensium, perinde est, præ cæteris in scorbuto conveniunt, adeoque febres scorbuticas optimè tollit; hinc in febribus intermittens cum nimio æstu:

*R. Nitri antimoniat. gr. xv.  
Salis ammon. gr. vj.  
M. f. Pulvis ante paroxysmum propinandus.  
D. S.  
Sal febrile pro una vice.  
R. Nitri antimoniat. ʒi.  
Arcan. dupl. Myns. ʒss. vel an. gutt. xv.  
M. D. S.  
ut ante.*

: Detur ante paroxysmum.  
Item

*R. Nitri antimoniat. ʒss.  
Arcan. dupl. ʒi. vel ʒss.  
Antibell. Poterii gr. ix. vel xij.  
M. pro 3. dolibus. S.  
Pulvis febrilis refrigerans.  
Dentur ante paroxysmum.  
R. Nitri antimoniat. ʒi.  
Cornu cervi sine igne ʒi.  
Antimonii diaphor. gr. viij. M.  
Div. in 2. par. æqu. S.  
Pulvis febrilis pro 2. dosibus.  
R. Arcan. duplicat. gr. ij. ad xv.  
Ebor. sine igne ʒss.  
M. f. Pulvis. S.  
Pulvis febrilis refrigerans.*

Propinetur duabus horis ante paroxysmum, aliquot diebus repetendus, præsertim, si urgent diebus intercalariis phlogosis.

*R. Arcan. dupl. ʒi.  
Salis volat. succin. gr. iv. ad ʒss.  
M. pro dosi ante paroxysmum. S.  
Sal febrile refrigerans.  
R. Nitri antimon. ʒss.  
Antimon. diaph. ʒss.  
M. f. Pulvis. S.  
Pulvis febrilis refrigerans.  
Caplendus ante paroxysmum.  
R. Arcan. dupl. ʒss. ad ʒij.  
Corall. rub. præp. vel autim. diaph. ʒi. ad ʒss.  
M. f. Pulvis. S.  
Pulvis resolutivus.*

Observ. XIII. Acida, an qua talia febribus intermittens convenient? dubito. Sanè ex iis commodum adeò singulare haurire vix potui; nec nisi interdum, dum nimis urget æstus, pro hoc nonnihil compescendo, mediante fixatione humorum effervescens convenire solent: v. g. si in febre intermittente rigori intensior superveniat æstus, vel cum clamorosa siti junctus, vel cum difficili sudoris eruptione, vel quando ipsa febris intermittens tota est ardens, vel quando febris intermittens plus minus ardens in continuas degenerare velix, optima sunt, declinante non nihil paroxysmo, aut saltem non ante ejus statum,

tunc sub ardore paroxysmi, & inde nata gravi anxietate, sequens mixtura confert:

*R. Aqu. card. bened. ʒij.  
Menth. ʒi.  
Antimon. diaph. ʒss.  
Laud. opiat. gr. j. vel ij.  
Syr. card. bened. ʒvj.  
Spir. nitri dulcis q. l. pro grato sapore.  
M. D. S.*

*Potio refrigerans & confortans.*

Usurpetur cochlearim in ipso paroxysmo.

*Vel  
R. Aqu. rubi Idæi ʒij. vel hujus & aqu. card.  
(bened. ʒss.  
Sacci rubi Idæi ʒij. ad ʒvj.  
Antimon. diaph. ʒss. ad ʒi.  
Syr. acetos. citri vel rub. idæi ʒss. vel ʒi.  
Spir. nitri dulc. q. l. pro grato sapore.  
M. D. S.  
ut ante.*

Hauriatur subinde cochlearim: mirabiliter ardorem compescit, sitim minuit, sudorem provocat, &c.

*Vel  
R. Aqu. flor. papav. err. ʒiv.  
Antimon. diaph. ʒij. vel ʒi.  
Syr. flor. papav. erras. ʒss.  
Spir. nitri dulc. q. l. pro grato sapore.  
M. S.  
ut ante.  
R. Aqu. card. bened. ʒij.  
Fumar. ʒi.  
Succin. præp. vel antimon. diaph. ʒi.  
Syr. card. bened. ʒi.  
Spir. nitri dulc. q. l.  
M. D. S.  
ut ante.*

Detur in paroxysmo & ante eundem, si æstus minus urgeat successum felicem in eo observavi.

Præter Acida itidem conveniunt in paroxysmo Mixture ex lapillis cancer. cum aceto: e.g.

*R. Aqu. card. bened.  
Cicbor. an. ʒss.  
Aceti vini ʒvj.  
Spir. theriacal. simpl. ʒij. ad lv.  
Lapill. cancer. pulveris. ʒss.  
Syrup. de 5. radic. ʒi.  
M. S.  
Potiuncula.  
Caplant cochlearim.  
R. Aqu. acetos.  
Fumar.  
Menth. an. ʒi.  
Acetirubi Idæi vel sambuc. ʒvj.  
Spir. theriacal. simpl. ʒss. ad ʒij.  
Lapill. cancer. præp. ʒij. ad ʒi.  
Syr. cort. aurant. ʒij.  
M. f. Potio cochlearim usurpanda.  
D. S.*

*Potio refrigerans & confortans.*

Est quoque proficua, quando angustia & anxietates præcordiorum, item flatulentia & hypochondriaca abdominis symptomata nimis urgent.

Item

*R. Aqu. acetos.  
Rub. Idæi an. ʒss.  
Cinnam. ʒij.  
Acetirubi Idæi ʒvj.  
Lapill. cancer. præp. ʒss.  
Antimon. diaph. ʒi.  
Syr. violar. ʒss.  
M. D. S.  
Resolvens potio febrilis.  
R. Aqu. card. bened.  
Eudiv.  
Semperoviv. an. ʒi.  
Aceti destill. ʒvj.  
Spir. nitri dulc. ʒi.  
Lapill. cancer. præp. ʒss.  
Antimon. diaph. gr. xv.  
Syrup. acetos. citri ʒvj.  
M. D. S.*



*ut antep.*  
**R.** *Aqu. cherefol.* ℥iv.  
*Aceti vini* ℥vj.  
*Corall. rub. præp.*  
*Lapill. cancr. præp. an.* ℥j.  
*Laud. opiat.* gr. ij.  
*Syrup. beder. terrestr.* ℥ss.  
*M. S.*

*Resolvens mixtura febrilis.*  
**R.** *A. beder. terrestr.* ℥iv.  
*Aceti vini* ℥ss.  
*Lapill. cancr. præp.* ℥j.  
*Antimon. diaph.* ℥j.  
*Syrup. diacod.* ℥j.  
*M. S.*

*Mixtura resolvens.*  
**R.** *Aqu. cherefol.* ℥ij.  
*Mentib.* ℥j.  
*Cinnam.*  
*Aceti vini an.* ℥ij.  
*Lapill. cancr. præp.* ℥j.  
*Syrup. fennicul.* ℥ij.  
*M. D. S.*

*Resolvens Potio febrilis.*  
**Observ.** XIV. Opium, & ex hoc legitimâ fermentatione paratum laudanum, aique omnia opiata, illegitimo usu omnes febres intermittentes pertinaces reddit, & e contra legitimo usu citò tollit, mitigatque continuas: (in opio enim multa latent.) Certissime est proficuum; sistit enim sensum vellicationes & motum tremulum. Sed in rigore necesse est, utrisque præmissis universalibus, digestivis & evacuativis, ut licet primò via à sordibus liberentur, idque imprimis duobus in casibus:

1. Quando paroxysmi ex consuetudine potius, quam ex fomite morbofo pertinacius redeunt.
2. Quando graviora quædam, aut etiam molestiora symptomata, durante paroxysmo affligunt ægros: frigus insigniter mitigat & rigores.

Nunquam autem opiata solum, sed semper cum febrifugis usitatis quacunq; forma admisceantur, quorum formulas passim dedi. Alias merus est, ne citò nimis & solitariè usurpata simplices febres reddant duplicatas aut triplicatas, aut sopiendo febrem, graviolem recidivam postmodum inferant: Id quod etiam faciunt fixa terrea, v. g. specifica ex cochleis marinis, aut matre perlarum calcinatis, quæ etiam nimis aut intempestivè propinata febres duplicant. E. g.

**R.** *Arcan. dupl. Mynschiei* ℥j.  
*Salis absinth.* ℥ss.  
*Laud. opiat.* gr. ij.  
*M. F. pulvis. S.*  
*Pulvis febrilis.*

Detur ante paroxysmum in vino absinthite.

**R.** *Elixir febril.* ℥ij.  
*Essent. opii* ℥ss.  
*M. S.*

*Elixir febrile* 40. usque ad 50. guttas.

**R.** *Tinct. tartari. Compos.* ℥ss.  
*Essent. opii* ℥ss.  
*M. S.*

*Tinctura*: 40. usque ad 50. guttas.

**Observ.** XV. Cephalalgia rard post paroxysmum aut intermissionis die sunt molestæ, nisi suppressus in paroxysmo sudor easdem inducat: sit tamen in febribus nonnullis, imprimis scorbuticis, ut in primis paroxysmis nullus omnino sudor promanet, sed declinante jam febre hic vel sponiè postmodum erumpat; ita, ut nocte die que tales ægri interdum cum salute sudoribus quasi diffuant. Ergo pro cephalalgia tali vel sudor patienter expectandus, vel blando epithemate camphorato calido dictus dolor mitigandus.

**Observ.** XVI. Vesicatoria vel nuchis, vel carpis manuum applicata, febres diurnas optime exhauriunt, spectatim rigor ex eorum usu cessare solet; interdum penitus cessat febris. Applicantur die intermissionis, ut ita eorum operatio præveniat paroxysmo: Nam & Strobelbergeri *Emplastrum febrifugum* vim nonnihil causticam, certe intense rubrificantem, obtinet. Sic quoque POTERIUS lib. 2. de Febribus cap. 23. pag. 109. refert, quod in *Quartana diurna* Vesicatoria capto admodum interdum sunt proficua. Quod etiam facit suo modo salivaria *Mercurialis*.

*Quartanarios* subinde radicini cutant, ut hoc severà videatur remedium ipso morbo gravius? Confer. BALLONIUS in Bonetti *Pbaro Med.* pag. 626. & 653. item PIENS de Febribus Part. 2. pag. 273. Notabile est, alias eos, qui aliquandiu intermittentibus laborarunt, promptissime salivare, etiam ex aliquot granis mercurii dulcis propinatis. Hinc ad præcavendam talem salivationem purgatio promovenda, vel fortis sudor repetitus imperandus.

**Observ.** XVII. *Intermittentes diurnæ*, præsertim Tertianæ duplicatæ, item continuæ paulò diuturniores, ita videntur alterare sanguinem & inde derivatam lympham, ut crassior, viscidior, & glutinosior eorum evadat textura; unde convalescentes tales adhuc *febriculas* lentas subinde experiantur, aut saltem appetitus aliquandiu infausso omine non debite redit. Febricula tali optime (præmisso interdum Vomitorio, mucum primarum viarum eliminante) per sal ammon. occurrere possumus: e. g. dedi ejusmodi pulverem ante paroxysmum in diurnis febribus, ubi metus adest hæticæ, summè proficuum inveni, & hæticam avertit.

Vel.

**R.** *Arcan. dupl.* gr. xij. ad gr. xv.  
*Ebor. fin. igne* ℥ss.  
*M. S. T. uis febrilis.*

Detur duabus horis ante paroxysmum.

*Anorexia* verò per absinthii vel centaurii minoris conuatum qualemunque aliquandiu usum tollitur.

**Observ.** XVIII. *Diurnæ febres*, item quæ per copiosam Absorbentia, aut calcinata terrea diutius usurpata, curata fuerunt, vix sine insigni viscerum labe, aut multiplicibus hinc resultantibus symptomatibus, solent evanescere; unde & colicæ & hydropes, aut pedum saltem tumores, aut cachexiæ subinde hos insequuntur. Talibus malis & præcavendis & curandis optime intersit absinthium in Decocto, essentia, succo, extracto, &c. frequentius usurpatum, aliaque congrua amara. Sanè crurum tumor œdematosus ordinariò chronicis intermittentibus super venit, præteritum, si copiosius biberint ægri, & parum sudaverint, vel si copiosius post curam febris citò se ingurgent: sed parum in recessu habet hic tumor; interne etiam multiplici absinthii usu, externe verò *chelidonii* majoris recentis plantæ pedum ad motionem faciliè abigitur.

**Observ.** XIX. Dum jam febris remittit universaliter, aut etiam alio tempore intermissionis die, vel etiam post febres chronicas, maxime profunt alterantia ex febrifugis Vegetabilibus, ut præcaveatur vel curetur cachexia sub curia morbi enata: ut essentia absinthii tartarifata, vel ex absinthio, centauro minori, radice enulæ, aut cum spiritu tartarizato composita, cardui benedicti, centaurii minoris, liquor terre foliæ tartari, Tinctura tartari, Tinctura antimoni, spiritus coëlearia, Elixir stomachale, Elixir febrile Mynschiei, vel D. D. Michaelis, Elixir proprietatis cum sine acido, item paratum cum spiritu salis ammoniaci, Elixir cachecticum, Tinctura tartari composita, Spiritus salis ammoniaci, Carminativus, similiaque alterantia, quæ acidum infringunt & bilem acuum, massæ sanguineæ crassem emendant & stomachum corrigunt, propinentur: idque bis in die, mane jejuno stomacho, & vesperti, ad 20. 30. vel 40. & 50. & 60. guttulas in liquore appropriato: v. g.

**R.** *Essentia absinth.* vel *cent. min.* vel *card. bened.* vel *gentiana*, vel *myrrha*, vel *Tartari simpl.* aut *compos.* vel *Elixir febril.* vel *propr. sine acido* ℥ss.

*Spiritus salis ammoniaci* ℥ss. vel ℥ij.  
*M. S.*

*Mixtura febrilis.*

**R.** *Essent. absinth.*  
*Card. bened.*  
*Centaur. min. an.* ℥j.  
*Sptr. vitriol.* ℥ij.  
*M. S.*

*Mixtura febrilis.*

Dosis 30. vel 40. gutt. Detur bis die intermissionis.

**R.** *Elixir febrilis D. Mich.*  
*Propr. an.* ℥ss.  
*M. S.*

*Mixtura febrilis & stomachica*: 40. guttas.

**R.** *Tinctura tartari ac.* ℥ij. vel ℥ij.  
*Elixir propr. sine acido* ℥j.  
*M. S.*

*Resolvens Tinctura febrilis*: 40. ad 50. guttas.

**R.** *Elix.*



- R. *Elim. febrilis* Mich. ʒij.  
*Essent. fumar. comp.* ʒi.  
 M. S.  
*Essentia febrilis* 40. gutt.

- R. *Tinctur. tartar. acerr.* ʒij.  
*Quint. essent. absinth.* ʒi.  
 M. S. *Essentia febrilis.*  
 Vel

- R. *Tinctura tartari acerr.* ʒij.  
*Spir. Carm.* ʒi.  
 M. S.

*Resolvans Tinctura febrilis.*

Observat. XX. Uti in intermittentibus febribus ante paroxysmum & in eo stomachus sit vacuus, ita tempore accessione abstinendum est ab omni cibo & potu; si enim aeger bibat potum frigidum, magis urgebit horror & rigor. In ipso tamen aestu, calore urgente, aut paroxysmo jam nonnihil declinante, & maxime, quando sudoris erupio instat, potus paulo largior, non tamen nimis frigidus, sed calidus, concedendus venit, isque quod calidior, ed liberalior; promover enim sic egregie sudorem, & promptius cedit febris. Interim pro potu singulariter convenit *vinum & cerevisia absinthiaca in omni febre intermittente*. Quod si merus, scorbuti, vinum cochlearia, vel etiam vinum quoddam ex akerantibus Aromaticis medicatum cum essentia absinthii, spiritu cochlearia & similibus die intermissione, vel declinante paroxysmo usurpandum. In Quartanis tamen *pareissime bibendum est*; nihil magis enim febres has contumaces reddit, quam nimius potus in paroxysmo, idque ratione lienis facile noxam contrahentis. CRATO planè in paroxysmo quartanario potum interdixit, quod maxime curationi conferre asserit. Certè crebrior, præsertim cerevisia, potus diuturniores reddit has febres, in paroxysmo febris ingurgitatus, mucum in primis viis, & hinc fermentum febrile in fomite augens; adeoque consultum est, à potu ut abstinere, quamdiu possibile est, aut saltem non prius bibant, quam aestus invaluerit: & quidem bibant potum calidum, & si melius rebus suis consulerent, huic primo potui, aut saltem sequenti, unum alterive minus calido instillant spiritum salis ammoniaci simplicem ad gutt. 40., ut huius usu magis corrigatur noxa à potu illata, ac simul largior promoveatur sudor; in fine tamen paroxysmorum non interdicens est potus.

Potus ordinarius sit vel aqua, vel cerevisia tenuis, vel secundaaria cum vino absinthie medicata, aut saltem cum simplici vino ita correcta, vel, quod his præferendum, serum lactis probe depuratum, præsertim in scorbuticis, cui etiam commodè de succo citri aliquantulum instillari potest; aut loco horum Decoctum tamarindorum cum passulis egregie convenit. Julapia refrigerantia locum non habent, ubi calor proportionatus est constitutioni ægri, vel qualitati materiae coquendæ &c., multo minus, ubi minor est. In tali ergo casu satius est, si sitis adsit, concedere potum alias consuetum: sic qui vino adsuetus, nec in totum interdicens, quia consuetudini aliquid dandum, & magnum peccatum foret, ab uno extremo ad aliud prolabi. Quod si sitis nimis urgeat, simulque aestus gravior oriatur, commodè potui nigrum vel simplex depuratum vel autimoniatum addi potest, supra quod nil melius desiderari potest, ita, ut aliquot drachmas quotidie ebibere sit licitum. Si accedat, ut, dato nitro urina cum tanto ardore non mittatur, vel aeger liberalius mingat, bono sit animo. In intermittentibus purè ardentibus monendi sunt ægri, ne nimium potum ingurgitent, aut quoties lubet. Præstat quidem potum libentem concedere, modo dein expectent, usque dum sentiant, omnem ex ventriculo abijisse: si verò ægri sint inobedientes in hoc passu, optimum est, ut potum calidum bibant: si enim calidum biberent cum nitro dissoluto, calor magis refrænetur & temperatur; à potu autem frigido magis incalcescimus, quod videmus, cum ex ambulatione aestuamus & frigidum bibimus: verba sunt LINDANI super Hartmannum; Et imprimis convenit tunc potus imprægnatus cum spiritu nitri dulci, aut instilla Julepi propinetur tunc mulsum ex floribus cum spiritu sulphuris acidulatum, e.g.

- R. *Flor. papav. errat.*  
*Resar. an.* M. ʒs.

Infund. in f. q. vel ʒss. aqu. comm. aut *for. papad. errat.* aut *seri lactis depurati*: acidulatur leniter cum spiritu sulph. per campanam: stent in loco calido ad Extract. Tinctura: Colat. adde

- Syrup. de Jussab.* ʒij.  
*Violar.* ʒi.  
 M. pro Julepo: S.  
 In epus confortans.  
 Vel

- R. *Conserv. acetosell.*  
*Flor. ʒos.*

*Tunica an.* ʒi.

Affund. f. q. decoct. rad. scorzonæ. cum cornu cerbi, vel aqu. appropri., dissolv. in mortario cum pistillo, vel indantur cucurbitæ clausæ ad unam vel alteram ebullitionem: Colatur vel filtratur tepide.

D. S.

ut ante.

Vel

- R. *Conserv. for. ros.*

*Tunica,*

*Viol. an.* ʒss. ad ʒi.

*Succi ribium* ʒiv. ad ʒi.

Affund. f. q. aquæ simplicis vel destillatæ cujusvis, dissolvantur in mortario lapideo cum pistillo, clausoque vase leniter ebulliant.

*Colatura* ʒss. adde

*Tinct. flor. bellid.* q. f. pro grato sapore.

M. D. S.

*Julepus refrigerans.*

Vel

Ad imitationem HOFFMANNI in Clave pag. 400.

- R. *Radic. acetos.*

*Tamarind. an.* ʒi.

Coqu. in f. q. aqu. fontanæ:

*Colatura* ʒiv. infundantur (rat. M. ʒss.)

*Flor. ros. rubr. cum spiritu nitri dulci utro*  
 Stent in loco tepido: *Tinctura colata* adde

*Syr. ribium,*

*Rubi idæi an.* ʒij.

D. S.

*Julepus confortans.*

- R. *Aqu. acetos.*

*Cicbor.*

*Endiv. an.*

*Succ. cydon.* ʒss. ad ʒij.

*Tinctur. flor. bellid.* ʒij.

*Syr. violar. q. f.*

M. S.

ut ante.

- R. *Aque fontanæ* ʒi.

*Tinctur. flor. bellid.* ʒij.

*Syrup. ribium,*

*Rubi idæi an.* ʒij.

*Spir. nitri q. f.*

M. D. S.

ut ante.

- R. *Aque fontanæ* ʒss.

*Cinnam.* ʒss.

*Succ. citr. rec.* ʒss.

*Spir. nitri parum q. f. pro grato sapore.*

Observat. XXI. In declinatione paroxysmorum, si spontè sudet æger, cooperietur leniter: alioquin, nisi beneficio naturæ non erumpat sudor, ante paroxysmum quartanum non provocetur, idque in tertianis: postmodum apparentibus coctionis signis in fine paroxysmi cieatur, & calidis lintheis fricando abstergetur, ut ed melius fiat. In Quartanis ante coctionis signa nec possunt, nec arte prociendi sunt. Quod si ante talia signa sudent Quartanarii, equidem non suppressendus est, aliàs graves dolores ostocopi inferre solet; de quo vid. BALLONIUS in Boneti Pharo Medico pag. 199. Et sanè quolibet specifica mediante sudore febrem profligare solent.

Observat. XXII. Frigora febrium quæcunque, earumque rigores, horrores & tremores, omnium optimè compescunt aromatica, præsertim sub olei vel extracti forma usurpata: v.g. mirabiliter frigus & rigorem curant oleum destillatum caryophyllorum, cinnam., macis, baccarum juniperi, mentha, &c. externè regioni præcordii vel stomachi applicata: Specialissimè autem oleum destillatum caryophyllorum & cinnamomi ad guttas 5. vel 6. acutissimè penetrant, & sunt ferè nonnihil caustica; undè addita reliquis speciebus internè mita faciunt: imò intus assumpta cum appropriatis, quàm etiam externè ingruente paroxysmo regioni stomachali, spiritæ dorsi, & plantis pedum probè inuncta, applicato præcordiis latere probè calefacto: vid. SYLVII Praxis lib. 1. cap. 30. §. 143. Oleum petrae quoque



quoque prodest contra rigorem febrem, cuius gutta aliquot ante paroxysmum propinanda. Qui usum ejus internum nascant, exteme regioni stomachi illinant. Dista olea sequenti modo præferri possunt:

R. Balsam. Peruv. vel olei destillat. bacc. junip. ʒj.

Ol. destillat. caryoph.

Mac.

Succin. an. ʒss.

M. D. S.

Balsamum febrile calefaciens stomachum.

Inungatur dicto modo.

R. Olei expressi nuc. mosch. ʒj.

Destillat. bacc. junip. ʒj.

Caryoph.

Macis an. ʒss.

M. pro balsamo, præcordia d. m. inungendo.

S. ut ante.

R. Olei expr. nuc. mosch. ʒj.

Destillat. caryoph.

Macis vel cinnamon. an. gr. xv.

M. D. S.

ut ante.

R. Olei expressi nuc. mosch. ʒjss.

Destillat. bacc. junip. ʒj.

Succin. ʒj.

M. S.

ut ante.

R. Olei destillat. bacc. junip.

Ror. mar. an. ʒj.

Caryoph. ʒss.

M. D. S.

Oleum febrile calefaciens.

Inungatur dicto modo: quæ inunctio etiam interdum regioni lumborum, aut plantis pedum applicari potest: imò solus later calefactus plantis pedum applicatus rigores etiam solet imminuere.

Interne hæc ipsa symptomata optimè corrigunt salia fixa, extracta aromatica amara, extractum centaurei minoris, gentianæ cum aliquot guttis olei piperis, olea destillata acrida, & quælibet opiata: hinc mixtura ex theriacæ cum specifico Strobelbergeri egregia, præsertim in casibus, quando intermittentes omnem calorem deponunt, & solo frigore molestantur, seu cum algore sunt.

Item

R. Salis absinthii ʒj.

Matr. perlar. præp. vel test. ostr. præp. ʒss.

Piperis albi pulveris. gr. vi. vel gr. viij.

M. pro una dosi, hora una aut duabus ante paroxysmum assumenda.

D. S.

Pulvis febrilis calefaciens.

Sic etiam in febribus intermittens chronicis, in quibus ordinariè magis rigor urgete solet, vulgus granorum piperis. viij. xij. xv. ad xx. in grossa frustula concisa in haustu cochlearis aquæ vitæ simplicis vel anisatæ assumit aliquot horis ante paroxysmum, fausto cum successu, imò continuato eodem usu, Quartanam quoque curant: si autem tardius, aut paroxysmo iam instante assumantur, æstus gravissimè intenditur. Non igitur adhibenda sunt, ubi solus vel major æstus urget; potius verò si algore adest. Juvenem novi 17. annorum, qui 70. grana leviter confusa, pro una dosi ante paroxysmum assumpsit, & febris emanavit; ut post aliquot noctes dielque ex haustu cerevisiæ secundariæ frigida redierit, piperis tamen usu continuato se iterum curavit: 6. 8.

R. Salis ammon. ʒj.

Piper. albi gr. viij.

M. F. Pulvis: S.

Pulvis febrilis calefaciens.

R. Salis ammon. ʒj.

Piperis albi grossè pulv. gr. xxvj.

M. pro pulvere.

Diu. in 2. part. S.

Pulvis febrilis resolvens.

R. Salis ammon. gr. xv.

Caryoph.

Piper. albi an. gr. v.

M. f. Pulvis. S.

Pulvis febrilis calefaciens.

R. Matr. perlar. præp. vel test. ostr. præp. ʒss.

Salis absinth. gr. xv. ad ʒj.

Ol. destillat. caryoph. gr. ʒj.

M. f. Pulvis. S.

ut ante.

R. Salis absinth. ʒss.

Corall. rub. præp.

Test. conchar. præp. an. ʒss.

Ol. destill. bacc. junip. gr. iij.

M. f. Pulvis pro 2. dosibus.

D. S.

ut ante.

R. Salis absinth. gr. xv. vel ʒj.

Lapill. cancr. præp. vel animon. diaph. ʒss.

Laud. opiar. gr. j.

Ol. destillat. caryoph. gr. iij.

M. f. Pulvis. S.

ut ante.

Capiatur ante paroxysmum, inungendo simul dicta olea præcordia.

R. Arcan. dupl. ʒiv.

Ebor. sine igne, vel lap. cancr. præp. ʒij.

Pip. longi gr. xxiv.

M. f. Pulvis.

Div. in 4. part. equal. S.

Pulvis febrilis.

Usurpentur duabus vel tribus horis ante paroxysmum.

R. Tartari vitriolat. crystall. ʒj.

Lapill. cancr. præp. ʒss.

Piper. longi gr. xvij.

M. f. Pulvis pro 3. dosibus.

S. Pulvis febrilis calefaciens & resolvens.

R. Specif. febril. Crokii ʒj.

Salis absinth.

Cent. min. an. ʒss.

Ol. destillat. caryoph. gr. iij.

M. pro 2. dosibus: S.

Pulvis febrilis.

R. Aqua card. bened. ʒj.

Extract. gent. cum spir. vini facti ʒj.

Salis absinth. ʒj. vel spir. salis ammon. ʒss.

M. f. potio. S.

Potio febrilis pro una vice.

R. Aqua card. benedicti ʒj. ad ʒss.

Cinnam. ʒj. ad ʒss.

Extract. gent. ʒss. vel ʒj.

Sal. vol. ammon. gr. xv. vel spir. sal. ammon. ʒss.

Syr. card. bened. ʒss. ad ʒij.

M. F. Potio.

D. S.

ut ante.

Propinentur bihorio ante paroxysmum, moderatè terendo corpus: frigore magis urgente, ut in Quartanis, Extracti dosis augeri, item cum extracto theriacali acui potest; magis verò urgente æstu, ut in tertianis ordinariis, spiritu salis ammoniaci aucti dosi permisceatur.

R. Extract. absinth. gr. xv. ad ʒj.

Salis absinth. gr. vi. vel ʒss.

Ol. destill. caryoph. gr. iij.

M. f. Pilula. S.

Pilula febriles pro una vice.

Capiatur ante paroxysmum in rigore, ubi paucus æstus sequitur: egregiè calefaciunt.

R. Extract. absinth.

Card. bened. vel gentiana.

Cent. min.

Rad. imperat.

Theriac. an. gr. v.

Ol. destill. caryoph. gr. iij.

M. f. Pilula. S.

Pilula febriles.

Capienda imminente paroxysmo, una alterare horæ ante eundem.

Vel

R. Extract. absinth.

Card. bened.

Cent. min.

Theriac. (ratione opii)

an. gr. v. ad gr. vj.

Ol. destillat. caryoph. (ubi adest horror, alias omittitur) gutt. iij.

F. Pilula.

S. ut ante.

Assuman.



Assumantur in aqua appropriata ante paroxysmum: nil enim magis rigorem febrilem imminuit, quam oleum destillatum caryophyllorum.

℞. *Extract.* seu succi inspiss. cent. min. gr. xv.  
*Sal. card. bened.* vel alius salis ℞.  
*F. Pilula: S.*  
*ut ante.*

℞. *Extract.* cent. min.  
*Gentian.*  
*Zedoar.* an. gr. vj. vel viij.  
*M. f. Pilula.*

Quibus etiam addi potest *laud. opiat.* gr. j.  
*D. S.*  
*ut ante.*

℞. *Extract.* absinth.  
*Gentian.* an. gr. viij.  
*Theriacal.* gr. v.  
*Salis cent. min.* ℞.  
*Olei destill. bacc. junip. vel ror. mar.* gr. ij.  
*M. f. Pilula: S.*  
*ut ante.*

℞. *Extract.* absinth.  
*Card. bened.*  
*Cent. min.* an. gr. vj.  
*Myrrh. elect.* gr. ij.  
*Laud. opiat.* gr. j.  
*M. f. Pilula: S.*  
*ut ante.*

Commodè etiam hæc febrilibus *Extractis trochiscorum albondal* gr. ij. ad gr. iij., tam pro alterandi, quam pro laxandiscopo addi possunt; utut sub debita diaphoresi levior laxatio accidere soleat.

Observat. XXIII. *Ad febres intermittentes ardentes præmissis præmittendis nil melius est, quam sal ammon. cum &c., vel solitarium dest.* ℞. ad ℞. ante paroxysmum usurpatum: Vel

℞. *Salis ammon.* ℞. ad ℞.  
*Antib. Poterii* ℞. ad gr. xij.  
*M. f. Pulvis* usurpandus ante paroxysmum: S.  
*Pulvis refrigerans.*  
 ℞. *Salis ammon.* ℞.  
*Corall. rub. præp.*  
*Antib. Poterii* an. gr. viij.  
*M. S.*  
*Pulvis mitigans.*

Certè nil magis æstum febrilium intermittentium mitigat, quam sal ammoniacum, aut eius spiritus urinosus, & hinc etiam arcanum duplicatum. Alias aliquot febres ordinatio modo assigentes profigavi:

℞. *Salis ammon.* ℞. ad ℞.  
*Corall. rub. præp. vel lap. cancr. præp.* ℞.  
*Olei destillat. bacc. junip.* (ad gr. xv.  
*Mac. an. gr. j.)*  
*M. f. Pulvis* ante paroxysmum propinandus: S.  
*Pulvis febrilis.*

Observat. XXIV. Post rigorem subindè superveniente jam æstu, æget conquiescentur de insigni virium prostratione, cum *respiratione anhela, celeri, frequenti & parva, & gravissimo æstu interno*, utut quoad contactum externum minus æstare soleant. Talibus in æstu paroxysmi vel spiritus salis ammon. quocunque modo propinatus, vel mistura cum aceto & lapillis cancrorum *suprà insinuata*, bono cum successu propinatur.

Observat. XXV. In paroxysmis febrilium intermittentium subindè graves *cardialgie, stomachi rotones, præcordiorum angustie, suffocatio imminens, famet nimia*, similiaque nimis molesta symptomata, *inquietudinem, anxietatem, & insignem corporis æstigationem inferentia*, adsunt; idque imprimis in hypochondriacis, hysteriis & scorbuticis. Curantur beneficio spiritus salis ammoniaci vel simplicis vel oleosi facti: vel externè per Linimenta, vel emplastra ex racamahaca, vel sola, vel cum ladano *Cratonis* mista, cum oleo quodam destillato subacta, nempe anisi, vel succini, vel menthae, vel Balsamo Peruviano, regionis stomachi applicata: feliciter enim compescunt, præmittendo simul vel vomitorium pro circumstantiarum ratione, vel applicando clysmata.

Observat. XXVI. Notatu dignus est BALLONII locus in *Bonetti Phoro Medicorum* pag. 213. Puella febre Ter-

sianna jam mensem laboranti, ante paroxysmos dexteri hypochondrii & cruris dolores, calore extenso quiescebant: quid hoc rei? nisi purgationibus anteveras, hoc minatur abscessum.

Observat. XXVII. In cura Quartanarum, uti & quorumcunque morborum chronicorum, Medicus tangat hypochondria, an adsit tumor aut durities, scirrhus cujusdam abdominis visceris, hepatis, lienis, aut etiam mesenterij? in specie inveterata situerit. In tali casu ordinariò scabies supervenit. *Quærat etiam*, an adsit scorbutus? an multi adsint status? ut certus fiat de malo hypochondriaco: & in remissionis die his tumoribus maturè occurratur; nisi enim curantur, vix solent febres curari, vel recidivant. Item an viscera reliqua, imprimis pulmones, sint salva? Facto hoc, tunc demum instituat prognosin & curam.

Observat. XXVIII. In Quartana contumaci locum habent acidulæ, sed ventriculus & viscera sint robusta, seu in legitimo tono constituta; aliàs enim nimis debilitantur ægri, quod in omnibus acidulis observandum. Quod si nimis debiles sint patientes, conveniunt potiùs remedia Martialia arte præparata, aut etiam acidulæ artificiales; de quibus videb. GABELCHOVERUM *Centur. 6. Curat. 8.*: sicuti etiam in hypochondriacis, scorbuticis, spleneticis, hysteriis &c. febre intermittente laborantibus, Martialia ante paroxysmum sunt usitatissima: c. g.

℞. *Essent. absinth.* ℞.  
*Solut. martis cum succ. pom.* ℞.  
*M. S.*

*Tinctura aperiens: 50. gutta.*

Observavi ego quartanam chronicam limaturâ martis crudâ præparatâ ante paroxysmum sumptâ solâ fuisse curatam. Mulier juvenula stertilis, hypochondriaca, & splenetica, ratione hæreditatis maternæ quartanaria, cum insigni dolore splenis in hypochondrio sinistro, quoties frigus urgeret, etiam urgebat dolor, & quò intensius frigus, eò intensior dolor, & contrâ. Præmissio vomitu jussi capere die intermissionis *Tincturam tartari simplicem* cum elixyr propriet. sine acido à gutt. 50. bis in die; Nam alia amara febrisfuga quælibet fugiebat: Interdum etiam intermissionis die, quæ paroxysmi diem præcedebat, capiebat pulverem, ex salis ammon. gr. xv. pulv. jalappæ ℞. Misc. Sed hæcenus omnia sine levamine. Præcedente morbo necesse erat, ut toto die paroxysmi, circa quartam saltem pomeridianam repetentis, jejuna maneret; aliàs vomitus, præcordiorum anxietates, graviores dolores & rigores patiebatur. Hinc ad imitationem *Observationum* quarundam RIVERII, ipsâ hypochondriacâ & duriore alvi exten-

℞. *Fol. sem. sine Hip.* ℞vj.  
*Salis tartari* ℞ij.

Infunde in l. q. aqu. comm.

Stent in loco tepido per noctem: Mane

℞. *Colatura* ℞j.

adde.

*Quint. essent. cinnam.* ℞j.

*M. D. S.*

*Potio laxativa pro una vice.*

Capiebat omni mane hauftulum, unde aliquoties viscosa evacuabat, idque saltem intermissionis diebus; etenim die paroxysmi propter supra enarrata symptomata nihil tentare poteram: Sed cum splenis vitia, scirrhum, similiaque mala metuerem, ob id ordinabam:

℞. *Solut. martis cum succ. pom.* ℞.

Capiebat omni mane gutt. 30.: quod cum etiam die paroxysmi faceret, commodè admodum cum paucis splenis dolore habuit; sed continuato licet remedii usu idem levamen continuare noluit, propterea

℞. *Liqu. martis solar.* ℞.

Dabantur 20. guttæ omni mane: benè contulit, alvum apertam servavit; interposuit subindè hauftum superioris Infusi sennati: sed febris constans permansit, quinimò ex causis aliis supervenientibus simplex Quartana facta fuit triplex. Undè cum leniter tractanda esset, ipsa à medicamentis abhorrente, deditic, quo primarius urgebat paroxysmus:

℞. *Salis ammon.* ℞.  
*Pulv. epilept. antimonial.* gr. ij.  
*Misc. pro pulvere.*

Cepit manè, vomuit aliquoties, & per alvum egressit.

℞. *Corall. rubr. præp.* ℞j.  
*Pulv. epilept. antimonial.* gr. ij.  
*M. pro pulvere.*

Cepit



Cepit vesperti bithorio ante paroxysmum, quem vix per-  
sensit. Sequenti die hunc pulverem iterum bis cepit, &  
nunquam vomitus secutus fuit, potius somnolenta admo-  
dum evasit. Tercio die pro tertio paroxysmo eisdem pulve-  
res, sed dimidiata tantum dosi, accepit; unde paroxysmi  
omnes tres evanuerunt, qui etiam per sex successive dies pe-  
nitur non redierunt, ipsa integrè omni nocte profundè dor-  
miente, sed simul lassitudinem insignem membrorum om-  
nium percipiente: propterea res mihi suspecta visa fuit vi  
anodynæ antimoniali non extirpante, sed palliante febrim;  
quod etiam eventus docuit. Nam ex improvito statè die  
statèque horà primarius paroxysmus cum vomitu, tussi &  
asthmate convulsivo, ac repetentibus subindè epileptici  
convulsionibus rediit, quem etiam ordine ceteri insecuti fue-  
runt: Hinc

R. Ol. tartari per deliquium ℥j.

Capiebat 40. guttas mane & vesperti, trithorio ante paro-  
xysmum.

Item.

R. Pol. senn. sue ssp. ℥ss.

Rad. bellad. nigr. non prop. ℥ss.

Esula non prop. ℥ss.

Salis tartari ℥ij.

Infund. in aqua comm. stent in loco tepido per noctem,  
mane

R. Colaturæ ℥ss.

De hac hibeat manè bonum haustum, vesperti verò  
oleum tartari, & ita alternis vicibus continuando paroxysmi  
brevi post evanuerunt, saltem primario illo adhuc nonnihil  
affligente: pro quo profligando

R. Extrahent. ℥j.

Corall. rubr. ℥ss.

Cum s. q. Ol. destillat. caryoph. s. Pilulæ:

Quas cepit in vehiculo rob sambuci tribus horis ante paro-  
xysmum, qui non rediit; continuavit sic adhuc 2. vicibus, die  
intermissionis ol. tartari per deliquium bis aliquandiu assu-  
mendo, & ita convaleuit.

In hoc casu observandum:

1. Consensus splenis cum febre, dolore isto sub frigore  
urgente, reverà splenetico existente, simpliciter con-  
vulsivo.
2. Martialia non solum splenis vitia conducere, sed etiam  
impetum paroxysmorum febrilium notabiliter retun-  
dere.
3. Anodyna quælibet pro radicali februm cura nihil con-  
ferre, saltem spirituum impetum & motum naturæ  
cohibendo, morbum palliare, qui postmodum eò in-  
tensiori impetu resurgunt; unde etiam cum epileptici  
convulsionibus redibant paroxysmi.
4. Lassitudinem post cessantes febres intermittentes super-  
stitem vel recidivam, vel cachexiam, interdum etiam  
anasarcam, minari.
5. Chinachinam non propinavi; in splenetica enim hac  
maximoperè nocuisset, figendo acidum febrile, con-  
centrando etiam pariter acidum in splene peccans, adeo-  
que visceris hujus scirrhum, & hinc continuam ægritu-  
dinem, induxisset.

Observar. XXIX. In febribus chronicis ac diuturnis in-  
termittentibus, ac in specie in Quartanis, discussio licet  
morbo, diu paroxysmi typum ægri probè observent, & præ-  
sertim ordinariâ dixit & abstinentiâ recidivam declinent;  
vid. BARTHOLINI *Adæ Med. Hassiens. Vol. 1. pag. 191.*  
Nam interdum etiam post aliquot septimanas recidivant &  
quidem graviore paroxysmo. Non mox ergo desistamus à  
febrifugis, quæ optima sunt præmissis universalibus, ut spir.  
salis ammoniaci, sal volat. cornu cervi, sal volatile vipera-  
rum, & succini.

Hæ & similes cautelæ, si benè observentur, nunquam er-  
rorem aliquem observabitis in cura, sed satis eam reddent  
facilem atque securam. Quod si verò illegitimè & vitiosè  
curantur, atque paroxysmi impediuntur, seu febris suppri-  
mitur, id quod fit, quando fixis ac similibus obtun-  
ditur fermentum febrile, & in suo fomite quasi concentra-  
tur, sanguinis fermentatio febrilis impeditur, & debita  
eiusdem turgescencia sufflaminatur; unde quidem paroxysmi  
cessant, & multa prava insequi solent symptomata. Sanè  
nil est, quod nocentius possit contingere ægro, quam ista  
paroxysmorum inhibitiò, quatenus materia ista vitiosa cum  
fermento concentrato mediante sanguine cumalata, circu-  
lata & in turgescencia fermentativa impedita, hinc inde  
tandem affixa hæret & gravia infert symptomata, viscera

reddit languida, imprimis infarectilenem & hepar, colicæ  
passiones infert atroces, tumores pedum œdematosos, asth-  
mata & tusses, cachexiam, & subindè hydropem, lassitu-  
dines artuum, icteros difficultè curabiles, cephalalgias diu-  
tornas, febres continuas lentas, tanquam hecéticas, & simi-  
lia symptomata. Exempla nonnulla imprimis videb. in  
GABELCHOVERO *Centur. 1. Curat. 43.*, item *Centur. 6.*  
*Curat. 109. 210. 211. 212.* & sequenti, item M. A. N. C.  
*Ann. 3. Obs. 89. pag. 149.* ubi Tertianæ per amuletum curata  
in gravem passionem colicam & hinc Iliacam degen-  
ravir.

Facta est sæpius mentio *Febrium scorbuticarum* intermit-  
tentium, quæ vix ullis cedunt remediis, & sunt contuma-  
cissimæ, nec aliquid in illis præstari potest, unde sæpius  
subindè recidivant febres. Retulit D. MICHAELIS,  
quendam quinquies recidivam passum fuisse ob lcorbutum  
febris junctum, quo curato febris planè cessavit. Talibus  
in febribus necesse est, ut Medicus aliis cum remediis febrili-  
bus crebrius specifica *antiscorbutica* propinet, tam die inter-  
missionis, quam ante paroxysmum permista cum specificis;  
si enim hoc non fiet, incassum laborabit. Eminet in his  
casibus imprimis spir. cochleariz cum spiritu salis ammoniaci,  
vel similia. Inter hæc præstantissimum remedium est  
arcanum duplicatum Mynsichtii ad ℥j. vel solum, vel cum  
lapillis præparat. cancerorum ℥ss., ante paroxysmum; vel  
repetitum subindè die intermissionis, & egregiè confecti  
& similia aliis sociata: item spiritus cochleariz cum  
spiritu salis ammoniaci ante paroxysmum propinetur hoc  
modo:

R. Aqu. antiscorbut. Dornereilii vel Querceta-  
ni ℥j. ad ℥ss.

Spir. salis ammon. ℥ss. (pius minus, prout  
fortis vel debilis est)

Spir. cochleariz ℥j. (in officinis admodum  
debilis; alias ritè præparati vix græx  
possunt propinari.)

Laud. opiat. gr. j. vel ij.

Syrup. scolorib. Foresti ℥ij.

M. D. S.

Potio febrilis scorbutica pro una vice.

Præmissis universalibus ante Paroxysmum propinetur;  
valdè prodest.

Vel cum spiritu salis ammoniaci eleganter permisco-  
tur arcanum duplicatum Mynsichtii in forma liquidæ  
v. g.

R. Aqu. card. bened.

Flor. sambuci an. ℥ij.

Spir. cochlear. ℥ij.

Salis ammon. ℥j.

Arcan. dupl. Mynsichtii ℥j.

Corall. rub. præp. gr. xv.

Syrup. scolorib. Foresti ℥j.

M. S.

Mixtura febrilis scorbutica, benè  
circumagitanda.

R. Aqu. menthae,  
Scorbut. Dornereilii an. ℥j.

Spir. cochlear. ℥j.

Arcan. dupl. ℥ss. vel ℥ij.

Mag. corall. cum succo citri ℥j.

Syrup. scolorib. ℥ss. vel ℥j.

M. pro 2. dosibus ante paroxysmum.

D. S.

ut ante.

Convenit item Mistura hæc, quam in Tertianæ scorbuticæ  
continua probatam habeo:

R. Aqu. febrifug.

Antiscorbut. an. ℥j. vel ℥ss.

Spir. cochlear.

Salis ammon. an. ℥j.

Njeri vitriolati Mynsichtii,

Lapill. cancr. præp. vel antim. diaph. martial.  
(an. ℥j. ad ℥ss.)

Laud. opiat. gr. iij.

Syrup. scolorib. Foresti ℥vj. vel ℥j.

M. s. Potio, pro aliquot dosibus: S.

Mixtura febrilis.

Capiatur in febre intermittente scorbutica continua, ut  
infringatur malicia scorbuti & febris.

Vel

R. Aqu. febris.

Antiscorbut. an. ℥ss.

Spir.



*Spir. cochlear.*

*Salis ammon. an. ʒi.*

*Ocul. cancr. præp.*

*Specif. febril. Strobelbergeri an. ʒi.*

*Laud. opiat. gr. ij.*

*Syrup. scolaryb. Foresti ʒi. M. S.*

*Mixtura pro aliquot vicibus.*

Item in febribus Scorbuticis absque frigore invadente, cum summo ardore, extremorum lancinatione, cum angustis præcordiorum & anxietatibus cum flatibus conjunctis, cum fructu præscripti hanc potiunculam subindè haurientiam, ubi ad omnia respicitur symptomata:

*R. Aqu. mentha,*

*Fœniculi,*

*Fumar.*

*Carminat. an. ʒi.*

*Spir. Cochlear.*

*Theriac. s. an. ʒi.*

*Njeri dulc. gr. xij.*

*Lapill. cancr. præp. ʒss.*

*Laud. opiat. gr. iʒs.*

*Syrup. cortic. aurant. ʒvj.*

*M. D. S.*

*Potio febrilis scorbutica.*

Detur cochleatim in ipso paroxysmo: valdè prodest.

In Tertiana scorbutica gravidæ nono mense, cujus paroxysmi cum graviore vitium prostratione invadebant sine ullo frigore, cum calore, & etiam sine sudore terminabantur:

*R. Aqu. febrifug. ʒij.*

*Aceti sambucini,*

*Mixt. simpl. an. ʒij.*

*Spir. cochlear. ʒi.*

*Lap. cancr. præp. ʒss.*

*Antimonii diaph. gr. xv.*

*Succ. cydon.*

*Syrup. acetos. citri an. ʒiij.*

*M. pro aliquot diebus.*

Superiore hyeme in Quartana scorbutica atrocissima, cum tussi, & hinc metu phthiseos hæc Potio admodum profuit in paroxysmo assumpta, præmissa semper ante paroxysmum clystere ex lacte:

*R. Aqu. mentha,*

*Card. bened.*

*Cherifol. an. ʒi.*

*Spir. cochlear. ʒij.*

*Salis ammon. ʒi.*

*Lapill. cancr. præp.*

*Arcan. dupl. an. ʒss.*

*Antibell. Poterii ʒi.*

*Sacchar. Saturni gr. vj.*

*Syrup. de succo gran. acid. ʒi.*

*M. l. Potio. D. S.*

*Mixtura singularis.*

Quæ subindè hauriebatur pro aliquot dosibus: continuabatur simul spiritus antiquarij: Tandem sequentia profuerunt:

*R. Salis absinth. ʒi.*

*Ocul. cancr. præp. ʒss.*

*M.*

*Div. in 4. partes.*

Capiebatur singulis diebus binas doses.

*R. Aqu. borrag.*

*Meliss.*

*Antiscorb. an. ʒi.*

*Mixt. simpl. ʒiij.*

*Syrup. rub. Idæi ʒi.*

*M. D. S.*

*Mixtura febrilis scorbutica.*

Cochleatim assumatur die intermissionis.

*Vel*

*R. Elixir febril. Mynsichti,*

*Spir. cochlear. an. ʒij.*

*M. D. S.*

*Elixir febrile scorbuticum.*

Capiantur gutt. xxx. bis in die intermissionis.

*Vel*

*R. Elixir febril. vel propit.*

*Spir. cochlear. an. ʒi.*

*M. D. S.*

*Mixtura febrilis scorbutica guttatim in sumenda.*

Dosis à guttis 20. ad 30. valdè prodest diebus intermissionis.

*R. Liq. terra fol. tartari ʒij.*

*Spir. cochlear. ʒss.*

*M. S.*

*Essentia febrilis scorbutica, ad 20. guttas.*

*R. Spir. Salis ammon. ʒij. vel ʒiij.*

*Cochlear. ʒi.*

*M. S.*

*Spiritus febrilis resolvers: 30. gutt.*

*pro una dosi.*

Alia etiam antihæcica Poterii (de quo plura, ubi de Hæcica) cum magisterio coralliorum cum succo citri (reliqua magisteria sunt nullius pretii) an. ʒss. & arcani duplic. Mynsichti ʒss. ad ʒss. & pro una vel duabus dosibus ante paroxysmum usurpata, in febribus scorbuticis sunt egregia.

*Vel*

*R. Arcan. dupl. ʒi.*

*Salis absinth.*

*Lap. cancr. præp. an. ʒss.*

*M. f. pulvis: S.*

*Pulvis febrilis scorbuticus.*

Propinquetur in Tertiana scorbutica, ubi æstus intensior: aliquoties repetatur, donec febris cesset.

*Vel*

*R. Arcan. dupl. Mynsichti,*

*Mag. corall. cum succ. citri an. ʒi.*

*Sal. volat. cornu cervi vel viperar. gr. vj.*

*M. f. Pulvis. D. S.*

*Pulvis febrilis scorbuticus.*

Capiatur in vehiculo sequenti:

*R. Aqu. febrif. usit.*

*Antiscorb. Dornicelli an. ʒiʒs.*

*Spir. cochlear.*

*Salis ammon. an. ʒi.*

*Laud. opiat. gr. i.*

*Syr. Scolaryb. Foresti ʒss.*

*M. S.*

*Aqua ad pulverem.*

In hoc ipso tanquam in vehiculo, capiatur iste Pulvis, atque durante paroxysmo, aut saltem post rigorem subindè de eodem capiatur.

Serum lactis, in specie caprilli, est potus imprimis conveniens, dum talium febrium admodum urget æstus & sitis, vel solum, vel imprimis cum citro acidulatum; nam & hic in scorbuto est egregius: Vel & affundatur Herba cochlearia & nascitur cum pomo citrio in, taleolas inciso, & exprimat pro potu in paroxysmo:

*Vel*

*R. Herb. fumar. M. ij.*

Maccera per noctem in sero lactis caprilli q. l.

Colaturæ addatur

*Succ. pomor. Borisd. ʒiv.*

*Sacch. parum.*

*M. S.*

*Potio alterativa.*

Hauriatur extra paroxysmum.

Decoctum etiam Tamarindorum ad dictas febres sub forma julapil usurpatum est egregium, simul alvum obstruendam, quæ sæpissimè in scorbuto solet observari, blandè laxat, prætereaque erasin massæ sanguineæ vitiosam temperat: v. g.

*R. Tamarind. ʒiʒs.*

Coqu. in l. q. feri lactis:

Colatura adde

*Tinctura flor. bellid. ʒij.*

*Syrupi rosar. soluti vel violar. q. l. pro gratia saporis.*

*M. D. pro Julapio febrili laxativo, durante æstu.*

*D. S. Iulepus aperiens.*

Vid. MORELLUS de Mater. Medic. pag. 33.

*R. Decocti passul. min. in sero lact. depur. ʒiʒs.*

*adde*

*Succ. cochlear. per resid. depur. ʒiij.*

*Citr. rec. ʒi.*

*M. f. Iulepus: S.*

*Iulepus febrilis scorbuticus.*

*Vel*

*R. Sero lactis depur. ʒi.*

*Decocti*



*Decocti tamarind. ℞.*

*Succ. citr. rec. ʒ. j. c. ʒi. ad ʒi. ℞.*

*ʒʒ. ex 1010 citr. ʒiij. vel q. l.*

*M. f. Julepus S.*

*Julepus. v. refrigerans & laxativus.*

*R. Decocti scordii cum Cornu Cei. vi. ℞.*

*Tama ind. ʒiij.*

*Tinctura flor. de lid. ʒ. j.*

*Spiritus Mentis Pullos. q. l.*

*M. D. S.*

*ut ante.*

NB. Potus lactis in febribus scorbuticis valde convenit, si aliquantulum sacchari vel spiritus salis ammoniaci addatur: quotidie assumitur, manens in mensura *sic Nessel;* v. z. si patos ymus est à meridio; si cedat ante cenam, in cena comedere debet *Friskbe Mich.*

Æ voti referentia PROSPERO ALPINO lib. 10 de Medicina *Egypti cap. 15.* potum quendam ex fermento & Aquâ totâ un parant, pro februm, in specie Tertianæ, Cura.

Alii, ut Sakhi, Rohani, & quidam populi vicini, ex Bianca ursina & ferri & potum conficiunt, & *Bariſeb* appellant: Quod si de potus generis non incommodum in febribus ferventioribus datur: Decoctum faciunt ex herba Sina, ut decoctum colorem Aquæ retineat, non puniceum: Decocto fermentum addunt, & in locore idè aliquot dies fermentatque committunt: Vid. KERGERUS de Fermentatione *Secl. 3. Cap. 1. p. 81.*

Ex f. a. uctis patet: quod in Cura febrium intermittens, mox aprin i. no, præmissis uno vel altero digestivo, Vomitus ante paroxysmum, aut die intermissionis blanda laxativa propinanda: postea intermissionis diebus alterantia volatila, vel Martiâ, pro ratione urgentium symptomatum; paroxysmi vero tempore remedia fermentativi acidi destructiva &, ut vocant, laxantia, primatum obtineant. Unde remedia alcalina propinax, tam v. a. uia quam fixa, & his cognata Acida quocunque modo destructiva, ex omnibus tribus regnis ad Curam febrium intermittens adhiberi possunt. Hinc ratione Al. ali. volatilis plus minus, aut oleosi, conveniunt V. etum simplicia Febrifuga Vegetabilia, v. gr. *quævis Americania*, plus minus Aromaticâ, qualia in specie sunt *Aust. th. uni*, Cardui benedicti, centaurium minus, chamomilla, tertianari. (huj. sentim Decocto. am. intermissionis die; q. a. n. ante paroxysmum propinatio, Tertiana fit curata: Vid. TADERNÆMONTANUS) Ulmaria, cupus decoctum, item aqua demill. insigniter commendantur intermissionis diebus; taraxacon seu deus leonis, qui est egregium; sumaria, quæ etiam conveniunt in febribus scorbuticis, & hinc Quartanari; nasturtium, cuius succus cum vinis al. ʒ. i. adh. bitus Quartanam certo curat, modo in lecto paroxysmum instantem expectet æger, sudorem moveat, & purget. Conveniunt etiam radix plantaginis, taraxaci, cnicidoni majoris, gentianæ, zedoariæ, quæ revera præmissis præmittendis optima sunt.

Uſus horum est nunc in substantia sub forma pulveris, nunc in decocto amarissimo, nunc in succo recentis expresso, nunc in extracto, nunc, sique optimus, in sale fixo. In substantia flores centaurii min. ad ʒi. pulverisati adhibent insigniter & commendantur ad curandam febres, quæ ratione THONERUS curavit tertianam duplicem admodum refractariam, præmissis universaliibus, per pulverem herbæ centaurii minoris ad ʒi. in haustu vini per 3. dies propinando; sudorem enim movet. Pertinet huc & pulvis cardui benedicti. Sec. Decoquendi modum dicta Vegetabilia febrifuga ostendit imprimis RULANDUS *Theſaur. Præp.* quæ decocta mediante venientia calore quævis febres intermittentes tollunt, modo, ut sæpius monui, præmissa fuerint universalia: v. gr.

*R. Flor. cent. min. M. ℞.*

*Rad. asari M. i.*

(nam atque in Aquâ coctum omnem vim vomitionis amittit)

*Coqu. m. l. q. Aqu. simpl.*

Hujus decocti calentis vii. q. quotidie in lecto bene recta haustu ℞. & diu multumque suscitavit, quo ad certum tempus continuato, a duratâ chronicaque febre curata fuit.

Postea

*R. Herb. card. bened. M. j. vel ij.*

*Rad. asari. M. j. vel ʒi.*

*Estmüller. Oper. Tom. II.*

Inſun. per noctem in lib. jv. Aquâ, post decoqu. lento igne ad tert. s.

Hujus Decocti æger omni mane ieiunus in lecto arctè cooperitus bibat unc. ij. vel iv. calidè: accipiat semper 6. horis ante paroxysmum, & multum sudet, donec febris repetitio hujus uli omnino evanuerit.

Et certè hujusmodi Decocta ex paucissimis Ingredientibus præferenda longè Decoctis magistralibus, quæ ex mille speciebus combinatis sunt composita: hinc vel sola herba centaurii min. optimè est ad intermittentes remedium, si ante paroxysmum adhibeatur. Helmontius tartarum februm medicamentum opimum vocat: alatum in Aquâ decoctum: movet urinam.

Altas etiam Chamæmelon, ejus Decoctum, item aqua decocta ex ejusdem succo ad aliquot uncias adhibita, à multis insigniter commendatur ante paroxysmum.

In succo usurpantur v. gr.

*R. S. cc. express. abs. th. rec. ʒi. ad ʒi. vel ʒiij.*

Accipitur in haustu vini absinthii aliquot ho. is ante paroxysmum: si hoc aliquoties, & evanescit febris.

In Extractis usurpantur dicta Vegetabilia febrifuga sub forma pilularum, cum enim sint insigniter amara, ut vel aut amarities, cum sp. r. u. u. paratur Extractum. Talia Extracta sunt cardui benedicti, centaurii minoris, theriacale, & quæ sunt alia, ex quibus formantur pilule, quorum formulæ ex suprâ dictis patent. Capiantur imminente paroxysmo ur. a. altera v. hora ante eundem. Usurpentur etiam hæc Extracta in forma liquida: nam essentia & extracta differunt tantum ratione consistentiæ, recipiendo nempe essentiam absinthii, centaurii minoris, cardui benedicti, myrrhæ, & similes, trebrius, tam die intermissionis, quam ad ʒi. usque ad ʒj. ante paroxysmum, in vehiculo appropriato. Modum parandi præsuppono ex ANGELO SALA. Ad istas Essentias ex Vegetabilium febrifugis paratas pertinet etiam *Elaxir febrile Dn. Doctoris Michaelis*, cujus hæc est descriptio:

*R. Summit. cent. min.*

*Absinth. ana M. iii.*

*Herb. auric. muris,*

*Fol. asari ana M. ii.*

*Herb. pentaphyll.*

*Marrubii,*

*Rutæ,*

*Cardui bened.*

*Scordiana M. i.*

*Summit. hyperic. ʒss.*

*Rad. cbelidon. maj.*

*Tarax.*

*Angelica,*

*Zedoar.*

*Gentiana,*

*Imperatoria,*

*Distammi albi,*

*Morus diaboli,*

*Filicis,*

*Aristoloch. b. rec. ana ʒi.*

*Caryoph. ʒi.*

*Pip. longi ʒvi.*

*Zingib. ʒss.*

Extractantur enim Sp. r. u. absinthii card. bened. & cent. min.

& addatur Ext. alium febrile.

Dosis est à guttis 40. ad 50. die intermissionis ad alterandam viam in m. hæc sanguine ex crasi.

Loco talium Vegetabilium longè utilior est spiritus salis Aram., ut non cedunt salia fixa ex istis febrifugis parata. Pertinet etiam ad hæc Vegetabilia China China seu Cortex Peruvianus Antiquarius, seu Jesuitarum: Vid. Dn. D. AMMANI *Dispar.* Est cortex aromaticus, saporis acerrimi ferè instar cinnaqi. & defertur ex Provincia Peruviana: Vocatur à quibusdam *Gentiana I. dicia*. Genium usurpandi modum vid. in BARTHOLINI *Cent. v. Histor. A. arom. 50.* item in SYDENHAM de morbis acutis Epidem. p. 95. *Secl. 1. cap. 5.* D. MONGINO Tr. de Cura febrium per Chinam China. Datur à ʒi. ad ʒi. probè pulverisata in haustu vini calidi, v. g.

*R. China China ʒi. ad ʒi.*

Pulverisetur minutissime in

Vini Rhenan. vel Hipp. ʒi. vel vi.

Seint in infusione per noctem mane probè mista hauriantur ante paroxysmum. Curat frequenter Quartanas, & hinc etiam Tertianas Chronicas aut duplicatas etiam notat.

R Vel



Vel

℞. Pulv. China China 3vj. ad 3j.

Rad. gentian. 3ij.

Flor. cent. min. pug. iv.

Piper. long. 3j.

Alis tartari 3ss.

M. f. Pulvis: S.

Species in vino.

℞. Cor. chin-china 3vj.

Guajaci 3 ii ad 3ij.

Cora. cent. min. m. j.

Cinnam. 3ij.

Caryoph.

Lap. cancr. an. 3j.

Sal. tartari 3ij.

M. f. pulvis, includendus nodulo.

S. Nodulus ad vit. um febrile:

Infund. in vino Rhenano, vel absinthio Ment.iss. Dosis bonus haustus una cum pulvere. Ratio fallunt, signa co-  
 -tionis ubi preceßunt. Vel

℞. China China subtiliss. 3vj.

Rad. gentian.

Limat. Martis puriss. an. 3ij.

Caryoph. 3ss.

M. f. pulvis: S.

Pulvis alterativus pro una mensura vini.

Bilatur post paroxysmum, & diebus intermittentibus bis, mane calidè & a meridie frigidè.

Alii, inprimis Medici Angli, famosum suum Febrifugum hoc modo componunt.

℞. Vin. rubr. ops. ℞ j.

China China in pollin. redact. 3ij.

Stent in loco tepido per tres dies & noctes, deinde liquoris decan. atque datur 3iv. prater propiet ante paroxysmum horis 4 vel in declinatione ejus. Hæc dosis continuatur per 4. 5. vel 6. dies quotidie, usque dum febris remiserit.

Quo scopo obtento Lenitium exhibeatur.

Vel

℞. Pulvis china china subtiliss. 3j.

Lap. cancr. præp. 3j.

Cardam.

Cubeb. an. gr. iij.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis febrilis.

Infidum tamen est remedium, ut reliqua omnia sæpius esse solent; unde necesse est, ut rite prædicta sint universalis, & aliquoties usurpandum veniat hoc remedium; itemque fugata febre ejus usu, corpus adhuc semel vel bis leniter purgandum sit, aliàs post unam alteramve septimanam censeo recidivari febres. Loco hujus, cum sit exoticum, arbitror, non ineptè substitui posse gentianam recentem amarissimam nostratam; & ejus succum condensatum, cum vino ad 3j. horâ unâ ante paroxysmum assumptum, febres intermittentes quascunque feliciter curare. Unde etiam ejus pulvis ad 3ij. vel tres eandem cum chin. china et sic etiam habere arbitror; ut ut certum sit china chinam esse egregium medicamentum, tam in Quartanis, quam in Tertianis diuturnis.

Vel

℞. Pulv. gentian. subtiliss.

Card. bened. an. 3j.

M. S.

Pulvis febrilis.

Ad hæc Vegetabilia Febrifuga pertinet merito etiam myrrha, quæ ipsa ante paroxysmum propinatur in specie in febre quartana à multis & solet insigniter commendari: Et credo quod etiam in febris scorbucis futurum sit non contemnendum simplex. Propinatur ante paroxysmum a 3j. ad 3ss. vel solum, vel etiam secundum veterum methodum cum castoreo, idque non ineleganter. Utrumque, Castoreum & Myrrha, permisceatur ad 3j. & propinatur in haustu vini ante paroxysmum.

Alii

℞. Myrrha.

Castor.

Opoponac.

Extract. gent.

Absorb. an. 3j.

Com. misbrida. & succo absinthii q. s. f. pilula num. xxvij. de quibus horum duabus ante paroxysmum æger

septem vel decem degluriat, & hinc sudorem expectet.

Aliàs etiam notum est, in quibuscunque febribus intermittentibus ante paroxysmum commodè posse propinari Misturam simplicem vel Tincturam Bezoardicam ad gr. 20. 40. ad 50. pro ratione circumstantiarum in aqua cardui bened. vel vine absinthie, præmissis universalibus; curat enim istas per sudorem.

Pertinet huc ulterius antimonium diaphoreticum, in specie antimonium diaphoreticum martiale; quæ etiam ante paroxysmum usurpata febres fugant. Pertinet etiam hæc Pulvis febrilis perlatus T. mai. Descriptio, quæ prostat in ejus Medicamentis, est hæc:

℞. Antimon. diaph. 3ss.

Margar. præp. 3iv.

Ocul. cancr. præp.

Cornu cervi ust. præp. an. 3j.

M. f. Pulvis.

Propinetur in aqua appropriata cum aliquot gutta misturæ simplicis.

Item pertinent huc quoque nonnulla fixa terrea & imprimis calcinata, vi præcipitativa insigni prædita, Febrifuga specificæ ut ex dictis, qualia sunt v.g. specificum febrile Crolli ex testis oblongis concanum calcinatis, quale etiam est specificum febrile Mynsichtii. Has testas præparandi modum habet ROLFINGIUS in Chym. Item specificum febrile Strobelbergeri, paratum ex mure perlarum calcinata. Dosis harum est a 3ss. ad 3j. vel 3iv. horâ unâ vel alterâ ante paroxysmum in haustu vini vel aqua destillata, bis ac ter reiteranda, donec cesset Febris. Usurpandi modus est:

℞. Aqu. cent. min. vel tarax. 3j. vel 3ij.

Cinnam. 3ij. vel 3ij.

Specif. febril. Strobelberg. 3j.

Antimonii diaph. gr. xv.

Syrup. de card. bened. 3ij. vel sacch. parum.

D. S.

Potio febrilis bene circumaganda pro una dosi.

Loco talium etiam cornu cervi ustum & similia terrea ac alia marina calcinata commodè substitui possunt.

Pertinet huc spiritus salis coagulatus, spiritus vitrioli coagulatus, compositum etiam sal antifebrile Mynsichtii, & alumen, à non paucis tanquam singulare febrifugum febrium intermittentium laudatum, in specie Magisterium aluminis SCHROEDERI in Pharm. pag. 324. de quo conf. etiam HOFFMANNUS in Clave p. 349. Dosis 3ss. ad 3j. bis vel ter ante paroxysmum propinatum eas prouocat. Novi hoc remedium empirico diuturnas in Medici opprobrium febris fuisse curatas:

℞. Nuc. mosch.

Nuri depur.

Alum. an. 3j.

Mile. i. pulvis.

Divid. in tres par. æqu.

Tribus successive paroxysmis, dum ingruunt, assumatur, expectando sudorem & febris solvitur.

Sic tartarum aluminosum tinctum videbitis in ROLFINGII Chymia. Alii aluminis bene decurati, vel aluminis tincti Mynsichtii, quod videb. in MYSICHTII Armat. pag. 39, aliquot grana miscet cum aliis febrifugis, & ita propinant. Alii ad usum febrilem ita præparant:

℞. Alum. crud. ℞ j.

& probe calcinant in vase, ut moris est: frustula calcinata & adhuc cadentia immittunt in acetum destillatū, quod filtrant per chartam bibulam, & hinc humiditatem maxima ex parte, si non omnem, per alembicum abstrahunt: Residuum in loco frigido in cyllas concretescit, quæ a 3j. ad 3ij. in aqua cardui bened. horis 2. ante paroxysmum propinat, sunt satis proficua. Hæ ipsæ cyllas dum concretescunt, possunt tingi, si addatur succus baccharum sambuci, qui eat tingit colore rubineo.

Facit huc & sal. antimonii & sacchar. Saturni, in Tertianis & Quartanis non inelegans eposition:

℞. Corall. rub. præp. vel lapill. cancr. præp. 3ss. ad 3j.

Sacch. Saturni 3ss. gr. xij. ad xv.

Laud. opis. gr. j.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis febrilis.

Propinandus ante paroxysmum in Quartana contrumaci in Decocto cardui bened. Sicuti continuo pulveris lapillo-  
 -tum cancrorum usu, ad 14. dies in Decocto cardui bened. propina-



propinatorum, contumax aliquot mensium Quartana aliquando curata fuit.

*Sal antimonii* commendatur in Antidoto Antipyretico non solutivo à POTERIO in append. pag. 596., quod sal definit l. 2. *Pharm. spagyr. cap. 12. de antimonio*: abscondit inibi genuinum modum Autor, ego verò suspicor hunc:

*R. Antimonii diaphor.* (verba Autoris sunt *sibi in sudorem resolvere*) affundatur acetū destillatū cum spiritu nitri in tantum acuarum juxta mentem ZWELFERI pag. 380. *Mans. spagyr.* (solum in pulverem dulcem reducere:) factā diutinā digestionē in loco calido temperato antimonium diaphoreticum filtretur, filtratumque evaporet, quo facto reperies sal aliquod, vel saccharum, vel vitriolum, sicut alia vitriola parantur ex saturno cum aceto destillato, & Marte cum sulphuris spiritu.

Si lubet parare salē subtiliorem & præstantiorem, solvatur saccharum illud in spiritu vini, iterumque fiat evaporation.

Hoc sal antimonii, si cum flor. antimonii diaph. conjungitur, nullum mihi est dubium, quin ex eo sit sperandum medicamentum insigne anopyreticum; siquidem constat ex alcali nitri, antimonii floribus diaphoreticis, & alcali etiam falso antimonii; quare etiam omnino laudandus est præsertim *Antidoto Poterii*. Simile quid sperandum etiam est de Auro fulminante, quippe quod in se continet calcem solatē alcalinā & Tartarum nitratum; nam urit reverā oleum tartari cum spir. nitri vel Aqu. regia concresecit in verum nitrum, attamen mihi videntur in hoc nitro Salia contraria non ita penitus concreta, quare talis tartarus nitratus adhuc pollet virtute aliquā acidum absorbendi.

Verū observandum est, quod hujusmodi fixa optimè quidem curent, sed revera potius supprimant febres intermittentes; adeoque periculosa sint, nisi cautè, præmissis universalibus ac primas vias probè abstergentibus, administrentur, quia alias febres duplicant & triplicant, & subinde eas nonnihil contumaces reddunt: Et si hoc non faciunt; tamen figendo fermentum febrile, & hinc impediendū turgescētiā febrilem, vel palliativè curant, vel stypticā vi condensando nonnihil massam sanguineam, sæpius in vesiculis scirrhus ac tumores relinquunt. Adhuc non semper curata sunt, quia his specificis seu terreis semel curatæ febres subinde solent recidivare. Certè aliquoties observavi, ab horum usu si febres curatæ fuerint, vel diu languidos fuisse ægros, vel tumoribus abdominis hinc facillè fuisse obnoxios: appetitum insigniter prosterunt, & hærent in stomacho pertinaciter, digestionemque ejus labefaciunt, ut ex febribus intermittētibz ægrifiant hectici. Unde rarissimè, & non nisi cautè, usurpanda sunt Specifica febrilia; & si usurpanda sunt, pro dictis incommodis præcavendis præpinentur non calcinata, sed saltem vel simplici tritura, vel prævia cum aceto secundum MYSICHTIUM in *Armat. pag. 97.*, aut cum lixivio forti secundum ROEFINCIIUM l. 1. a. Extractione: prius necesse est, ut limba quā optimè sint mundata; nec sola, sed cum aliis sudoretis, hoc modo:

*R. Aqu. card. bened. 3j.*  
*Specif. febril. Strobelberg. 3ss.*  
*Sal. volat. Corn. Cerv. gr. vj.*  
*Laud. opiat. gr. j.*  
*M. S.*

*Potuncula antifebrilis.*

*R. Aqu. card. bened. 3jss.*  
*Specif. febril. Strobelbergeri scrup. j.*  
(vel bujur, & lapill. cancr. præp. an. gr. xv.)  
*Spiris. salis ammoniac. 3ss.*  
*Essent. op. gutt. x.*  
*Syrup. card. bened. 3ij.*  
*M. S.*

*Potuncula antifebrilis.*

*R. Specif. febril. 3ss.*  
*Salis absinth. scrup. j.*  
*M. f. Pulvis pro 1. dosi.*  
*D. S.*

*Pulvis febrifugus.*

Quibus vel tribus horis ante paroxysmum assumatur.

Addi possunt olei destill. caryoph. gutt. iij.

In Tertianā hysterica præmissis præmittendis cum successu præscripti:

*Estmuller. Oper. Tom. II.*

*R. Corn. Cerv. usi præp. 3ss.*

*Salis absinth. scrup. j.*

*Corall. rub. præp. gr. xij.*

*Extrakt. callos. gr. v.*

*Laud. opiat. gr. ij.*

*M. f. Pulvis.*

*Div. in 2. part. æqu.*

Capiebantur ante paroxysmum aliquoties repetendo: item

*R. Testar. caneb. præp. 3ss.*

*Antimonii diaph.*

*Salis absinth. an. scrup. 3. vel gr. xv.*

*Laud. opiat. gr. ij.*

*M. pro 2. dosibus.*

*D. S.*

*Pulveres præcipitantes antifebriles Quercetani.*

Capiantur ante paroxysmum.

*R. Cor. Cerv. usi præp. gr. xv. ad scrup. j.*

*Lapill. cancr. præp. gr. iv. ad vij.*

*Salis absinth. gr. iv.*

*M. S.*

*Pulvis præcipitans.*

Post febrim profligatam dandum est blandum laxans die illo, quo alias paroxysmus redire solet: v. g. ex massa pil. de Ammoniaco; addito Extracto absinthii cum debito stimulo: Nempe.

*R. Massa pilul. de Amm. Quercetani gr. xij.*

*Extrakt. absinth. gr. vj. vel xv.*

*Troch. alb. gr. ij.*

*F. Pilula: S.*

*Pilula laxativa.*

Vel si recidiva forsā supervenerit, hanc præmissis præmittendis levat Salamm. vel solum vel cum coralliis præparatis, aut Antihæctico Poterii mistum, ante paroxysmum usurpatum.

Potius ergo salia vegetabilium fixa calcinata, quæ sunt res solubilia, & ex ipsis preparata remedia, quæ etiam, uti antea monui, à BARBETTE præferuntur China Chinæ, ceu tutiora loco horum aut calcinatorum commendo. Interim inter fixa calcinata ex marinis parata singularia sunt; sunt enim instar calcis vivæ, affusā aquā effervescent, & sic consequenter alcali fixum occultum gerunt. Calcinate partes animalium terreæ, ut Cornu Cervi usum, pulvis busonum calcinatorum &c. omni sale sunt spoliata, unde præ his calcinata marina tutiora sunt. Denique sulphur minerale etiam inter febrifuga insigniter laudatur; & certum est, quod sulphur in febribus intermittētibz non sit contemnendum remedium, dosis 3ss. ad 3j., idque aliquoties ante paroxysmum reiteretur; quascunque enim intermittentes contumaces feliciter curare dicitur; Et credo, quod verum sit. Hinc etiam pluvius pyrius febrifugus est mistum, quo utuntur in castris ad fugandas febres intermittentes non inepto consilio à dosi 3ss. vel 3j. in aceto vel vino acidulo ante paroxysmum; ratione enim sulphuris, nitri, & alcali carbonum, est egregius. Facit hoc Pulvis febrifugus egregius D. Salzmanni, cujus basis est in Sulphure. Descriptio sequitur:

*R. Nitri fixi 3ss.*  
*Flor. sulphuris 3ij.*  
*Salis amm. 3j.*  
*Santal. rub. pulv. 3vj.*  
*Sacch. albiss. 3ij.*  
*M. f. Pulvis.*

Propinetur à 3j. ad 3jss. ante paroxysmum.

Santalum & saccharum possunt sine noxa omitti, & tunc dosis diminuatur.

In peste & febribus intermittētibz vitriolum Cyprium à RODERICO FONSECA in *Consul. Medicis Tom. I.* commendatur, & PETRUS BORELLUS *Cens. 4. Obs. 77.* in Febribus præscribit: *Vitrioli Cyprii frustum in 3ss. iv. Aqua* infundere docet per horæ quadrantem, & propinandas suadet hujus Aquæ 3vj. manè per 6. dies, duobus horis ante cibum.

Observ. denique XXX. Cum febres diuturnæ, imprimis Quartanæ, uti etiam febres aliz intermittentes, raro soleant esse tales, i. e. diuturnæ, quin tandem accedat istis vel tumor, vel scirrhus viscerum, in specie scirrhus lienis, vel etiam mesenterii, tanquam productum morbosum, vel dispositio quasi mali hypochondriaci; ideo tunc in omnibus medicamentis simul ad splenem respiciendum



erit, ut feliciter eradiceatur morbus. In tali casu non omittenda *Martialis*, vel etiam alia plantæ splenetica cum *Febrifugis mista*, pro curandis talibus, diuturnis intermittentibus; idque imprimis die intermissionis, aut ante paroxysmum. Conveniunt ergo extractum Martis cum succo pomorum, vel ex eo parata essentia Martis liquida, mista cum spiritu cochlearia, item Tinctura vitrioli Martis Zivelferi, item *Sal Martis compositum Conserdingii*.

*R. Vitrioli Martis,*

*Terra fol. tartari an. part. equ.*

Sub mixtura & tritura liquefit, exsicceatur blando igne; & nobile est.

Vel usurpatur *Mars tartarificatus*, qui sic paratur:

*R. Crem. Tartari part. ij.*

*Limat. Martis part. j.*

Minutissime tere in mortario marmoreo, hinc adde aquam ferventem, blandè exsicceatur, aqua fervida irrota tam diu, donec fiat, Marte absumpto à cremore Tartari, pulvis subtilissimus.

Item crocus Jovis aperitivus cum salibus, vel Limatura Martis crudè preparata ante paroxysmum sumpta, antimonium diaphoreticum Martiale, & præsertim, ubi *iberus* supervenire velit. Nam Quartana in specie vix sine Martis opè debellari possunt.

De opio supra monitum fuit, quod etiam ad Febrifuga remedia suo modo pertineat; unde & Theriaca, maximas sanè virtutes continens ab opio, ad Febrifuga refertur solet. Facit huc antiquissima GALENI Febres curandi methodus, qui suos Quartanarios curavit, primum propinando vomitorium, deinde die sequenti dedit succum absinthii bibendum, denique duabus horis ante paroxysmum dedit Theriacam, & sic Quartanarios omnes curavit GALENUS. Plura de hac methodo vid. apud ZACUTUM LUSITANUM *L. 4. Medic. Princ. Hist. 33.* Verum cum cautela hac faciendum esse rectè monent Practici, ne intempestivè ante coctionem data febrim multiplicet. Conf. BALLONIUS *Phar. Med. pag. 200.* HORSTUS *Probl. pag. 15. Decad. 1. Qu. 9.* Nam modò rectè procedatur, succus absinthii ad  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . cum theriaca  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . in haustu vini tribus horis ante paroxysmum, certò liberat à quibusvis febribus intermittētib. Theriaca ad  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . aut  $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ . in febribus tertianis intermittētib. chronicis, ante paroxysmum in haustu vini absinthitis, expectando sudorem, expecta est: vid. RIVERTUS in *Obs.* Ego subinde in febribus chronicis cum successu præscripsi cum Febrifugo Strobelbergi ita:

*R. Theriac. Andromach.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ . ad  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .*

*Specif. Febril. Strobelbergi  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . ad  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .*

*Salis card. bened.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .*

*Olei destill. caryoph. (aderat enim horror) gutt. ij. vel iij.*

*Cum l. q. syrupi sceleribici Foresti, de arseni-  
sa, vel de absinth.*

*E. Bolus.*

Propinabatur hora una vel altera ante paroxysmum, præmissis præmittendis, & egregiè contulit.

Sic & Theriacæ  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . ante paroxysmum hausta cum moderato haustu aceti multum prodest, quando nimis ætus ejusdem videtur respuere, & mediane ludore febrem profligabit.

Sed hæc fuerunt Febrifuga partialia.

Dicenda hic quædam sunt de *Febrifugis Catholicis*; quæ illa reverà legitimè sub medendi methodo plura dantur; aded ut salia fixa & sal ammoniacum non immeritò huc revocari queant: sicuti sub perverso usu & inconcinna methodo etiam optima specifica tallunt. KERGERUS *Tract. de Fermentat. Sect. 3. de Febril. pag. 250.* commendat suum *Febrifugum præcipitans*, quo felicissimè utitur in quibusvis febribus intermittētib. præparationem autem tericet. Relatum est ab Annico, esse nihil aliud, quam *Cremoris tartari* partes iv. & *corallorum rubrorum præparatorum* partes iij.; quæ exactissime miscentur, & pulvis dosi  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . usque ad  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . aut  $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ . tam diè intermissionis, quam ante paroxysmum, usurpatur: Pertinet huc *Mercurius fixus diaphoreticus Helmontii*, sed ejus præparationem in Aicani sibi reservavit. Est autem reverà mercurius præcipitatus fixatus, tinctus cum sulphure Veneris fixo, parato beneficio liquoris alcahesti, quod extrahit sulphur Veneris, ut Mercur. ejusdem decurrat: Vid. de hoc STARCKEY in *Microscop. Anglica*. Item D. MOEBII *Sal Anici-  
febrile* hæc pertinet: Nempe

*R. Nitri el. part. iij.*

*Vitrioli el. part. j.*

Fundantur in cucubulo: solum solvatur, flaretur, & iterum coaguletur.

Stantem Vitrioli Hungarici recipiantur partes iij. & nitri pars j: expulso prius per retortam Gas sylvestri nocivo, residuum solvatur, filtretur, iterum crystallifetur, evadet sal ejus emetico-diaphoreticum: Vid. HOFMANNI *Clav. Pharm. Schroderi pag. 356. sub Viuvolo*.

Item pertinet huc *Antiquarium febrifugum Riverii*, etiam quasvis alias febres curans, cujus plures hinc inde circumferuntur descriptiones: Plures parare istud volunt ex auro, vitro antimonii, & Mercurio vivo; quæ invicem viâ succi præcipitantur in Aurum quoddam vitæ seu Mercurium præcipitatum solarem: Sed dubito ferè de hac descriptione; nam Mercuriale quidem, sed benignius, remedium esse existimo. Et si rectè operandi ratio in ejusdem operationibus observatur, facile quis suspicari potest, ex basi Mercurii dulcis procedere, cui sulphur antimonii & aurum fulminans, interdum de *semmonio* nonnihil, tanquam quartus athleta, additur; hinc etiam vomitum simul, secessum etiam, atque sudorem movere solet. Sed ista supra dicta particularia etiam sufficiunt.

Hæc sunt interna, quæ subindè usurpantur in febribus intermittētib.

Juxta hæc subindè etiam non incongruè quædam Externa, tam pro febribus curandis, quam pro æstu nimio, aliisque symptomatis in paroxysmo mitigandis, adhibentur. Inter Medicamenta externa, quæ æstum nimium plantis pedum applicata compescunt, excellit Epithema ex aceto rosaceo, cum succo sedis majoris & nitro, ana q. s. mistis, & ita applicatis, quale æstus febrilem insigniter restinguit, & imprimis convenit, quando urgent pathetura capitis. Convenit etiam fermentum cum aceto & sale plantis pedum adlubitum. Item potentilla seu argemina, & flammula recentè contusa, carpis manuum & plantis pedum applicata, ad leniendum calorem & æstum febrilem intermittētib. laudatur. Epithema quoque sit ex aceto & succo sedis majoris, ana q. s., addito nitri tantillo; quod plantis pedum applicatum admodum laudatur ad temperandum æstum. Illa autem, quæ febres curant, sunt varia: Emplastra, Cataplasmata, unguenta, &c. Vel pulsui applicanda, vel amuletorum formâ suspendenda. Priora vim habent causticam, rodentem, & cutim rubefaciētem, atque pustulas excitantem, ut ibi beneficio irritationis & vesiculationum fermentum febrile foras eliminetur, ad imitationem naturæ per pustulas labiorum & alibi se levantis.

Aliæ ex alio, cepa, ruta, ranunculo ardente, planta æne vulgaris & aquatica, sabina, croco, mastiche, cerebintina, camphora, pulvere pyro, ataneis & earum telis, & oleo harum & scorpionum, & similibus formantur cataplasmata, carpis manuum pro febribus curandis applicata. In specie:

*R. Allium contusum: adde*

*Cepas contusas.*

*Croci parum.*

Mixta cum aceto, & in formam cataplasmatum subacta instar magni thaleri, ingruente paroxysmo, carpis manuum applicentur, ubi vasa venosa & arteriosa magna; & ita per paroxysmum relinquatur, tepetendo, donec febris cesset.

His alitè etiam piper longum addunt, & non contemnendum remedium est.

Quidam recipiunt sonchum ritum, sambucum & plantaginem, hæcque cum aceto subacta carpis assigant. Iberis planta pedum plantis supposita febres tollit, juxta BORRELLUM *Cent. 1. Obs. 13.* Aliud febrifugum amuletum videb. ibid. *Obs. 32.* Radix plantaginis appensa commendatur etiam contra febres; hinc LOTICHIVS in *Obs.* hanc radicem commendat, ut applicetur à suis ægris. Præteris in fuligine futni non inelegans est remedium; sicilicet hæc & salia contusa recens ana miscentur invicem cum albumine ovi, & applicantur carpis manuum vel plantis pedum, & egregè æstum compescunt. Alii fuliginem splendentem, ut WILLISIUS de *Febribus*, cum alio, cepis, & albumine ovi miscent, aceti nonnihil affundunt, & ita carpis manuum applicant; vel cum Theriaca subigitur & cerebintina, & applicatur pulvis.

Angli habent Cataplasma febrile ex sale, lupulo recenti, & pulvis majoribus. Hoc carpis manuum applicatum in febribus intermittētib. insigniter prodest. Facit huc Empla-



*Emplastrum ad Tertianas imprimis usurpandum, quod fit ex*

*Mell. ʒij.*

*Masticb.*

*Terebinth. an. ʒʒ.*

(Terebithina egregia est externè)

Cognatur mel ad debitam consistentiam, & cum reliquis f. l. a. *Emplastrum*: extenditur super alutam, & adspargitur nonnihil tursurum, ne nimis adhærescat, & imponitur regioni ventriculi, quando febricitans iturus est cubitum, ac, quamdiu placet, relinquatur.

Pertinet huc *Emplastrum febrile D. Michaelis* externè applicandum, quod est egregium:

*R. Fulig. furni splend. Spiegel-Rus* (egregia habet salia) *ʒʒ.*  
*Terebinth. ʒvj.*  
*Tel. araneæ. ʒi. vel har. & araneæ. maj.* (an. ʒʒ.)

*Campbor. ʒij.*

*Ole. araneæ. vel scorpion. q. l.*

*M. f. Emplastrum.*

Carpls manuum utrinque magnitudine thaleri applicatur, gestaturque aliquandiu, donec febris evanescat: Hoc ipso notatum ab Authore, quod hoc ipso quendam senem ferè octogenarium quartanâ laborantem sine alio remedio curaverit.

Rectè additur camphora: nam hæc ad ʒj. vel ʒij. sacculo lineo inclusa, & in scrobiculo cordis appenta, continuè gestata, donec exhalaverit tota, felicissimè Febricitantes tertianâ restituit. D. Schroeckius frequenter in usu habuit in Tertianis & Quartanis.

Præ aliis usitatum est oleum araneatum, & omnia alia ex araneis parata; nam & viuz araneæ majores cellulariæ instar amuletorum suspensæ commendantur; mirabile enim in se habent sal nitrosum insigniter diureticum; quæ araneæ, & etiam ex his paratum oleum, basia sunt decantati *Emplastri Strobelbergeri contra Quartanas*, quod describitur in *SCHROEDERI Pharm. lib. 2. cap. 72. ubi de Emplastris*: sed descriptio est manca. Genuinam admodum prolixam, nisi habenda esset ratio temporis, communicarem, Carpls istud applicatum nonnihil vesicat, quod est signum legitimæ operationis, utur successivè evanescant. Loco hujus succedaneum non inconveniens est sequens, ad Quartanas etiam malignas, expertum *Emplastrum*:

*R. Terebinth. Veneta ʒj.*

Cui liquefactæ in aëneo cupreo injiciantur

*Araneæ. uiv. magnæ. (Araneæ Cellariæ magnæ) No. xj. xx. vel xxx.*

Agitentur probè cum spatula lignea, donec araneæ ferè non amplius appareant: add. postea

*Pulv. carn. bufon. exsic.*

*Rubetæ. exsic. an. ʒʒ. ad ʒʒ.*

*Tartari crudi ʒj.*

*Sabine ʒi. vel ʒvj.*

*Olei scorpion. vel simpl. vel Matthioli q. l. ad justam consistentiam Emplastri.*

Agitentur probè omnia cum spatula lignea, donec f. *Emplastrum.*

Vid. *Tb. saur. Pharm. HOFFMANNI pag. 63. No. 2.* Hoc, ut dixi, egregium est maxime in Febre Quartanâ & malignis propter bufonæ & rubetæ.

Præterea in Quartanis aliisque febris diuturnis subinde consultum est, si suspicio sit de tumoribus viscerum aut splenis affecto, emplastra quædam splenis regioni applicare. In talibus casibus convenit emplastrum de cicuta, mistum cum gummi ammoniaco; imprimis emplastrum ex Nicotiana; nam Nicotiana aliis per se ad splenis icribus & tumores externè est egregia. In hunc finem Extractum ejus vel succus inspissatus, & similia, cum gummi ammoniaci in aceto soluti ana. permiscetur, & fiat *Emplastrum*:

*R. Emplastri de Nicot. usit. part. ij.*

*Gummi ammon. in acct. sol.*

*Tacamab. an. part. j.*

Mixta malaxentur cum l. q. *Olei Philisophorum*: extendatur super alutam, & dentur abique undone: S.

*Emplastrum resolvers.*

Item *Emplastrum carminativum Sylvii* sic optimè cum successu applicatur, uti etiam *Emplastrum de canis cum Mercurio*, quod ubi egregium est. Helmontius mentionem facit *Emplastri*, quo ad splenis regionem applicato, plurimos Quartanarios se curasse asserti: Compositio &

*Erruher. Oper. Tom. II.*

preparatio non adeò constat: Quidam volunt, hanc esse; Ego verò non credo:

*R. Tabaci q. v.*

Minutissimè inciso affunde vini q. l.

Coqu. per mediam horam in vase clauso, postmodum coletur & fortiter exprimatur: Colaturæ expressæ add.

*Succi inspiss. vel Extract. Nicot.*

*Mell. commun.*

*Cera,*

*Olei nicot. vel oliuæ. q. l. ad consistentiam Emplastri.*

Applicetur tepidè regioni lienis cum oleo capparum contra Quartanam. Vid. *HOFFMANNI Thesaur. Pharmac. pag. 66. No. 12.*

Ubi simul adest dolor:

*R. Extract. Nicot. per decoct. dicto modo par. ʒij.*

*Opii per dissolut. cum vino in Extract. consst. redacti ʒj.*

*Cera ʒʒ.*

Cum terebinthina & olei Nicotianæ an. q. l.

*f. Emplastrum.*

Facit huc etiam *Cataplasma Myrsicini febrile* non ineligans, quod vid. in *Arman. Chym. ʒ. 38.*

Superest nunc cura perversa.

Curaciones perversæ vocantur, quando febres malè curantur, & præteritum intempestivè supprimuntur, vel arte, vel remedio, illi. o eorum impetum silentibus. Hæc curæ sunt infidæ: licet enim febris cesserit, tamen iterum recidunt, & graviora mala, graves sc. *abdominis dolores convulsivi*, contumaces admodum, quales etiam pargin inducere valent, inferunt, quæ nullis cedunt remediis, & ad ileon inclinant; superveniunt lassitudines corporis, cephalalgia horrenda, & interdum asthmata periculosa: idque evenit, si nimis maturè febris supprimitur, si mox in principio dantur specifica fixa, quæ aut multiplicanti, aut supprimunt febres, sed postea post suppressionem dicta mala atrocissima excitant.

In tali statu Laxantia & Emollientia evacuantia, hinc anodyna saltem conveniunt. Laborabat mulier quædam tertianâ maxime frigida, cui tandem suasi, ut continuatæ olei destillati juniperi usu internè & externè, febrium tolleretur, quod etiam evenit: sed supervenit tandem gravis dolor abdominis convulsivus, simulque præteritum hypogastrium lancinans, & insigniter gravativus, una cum retractione umbilici interiora versus, & pertinacissima alvi adstrictione. Purgantia parum operabantur, idque frustra. Mirabile etiam est, quod ex cura magnetica præpollerè adhibita, non præmissis præmittendis, dicta mala supervenire soleant: vid. *M. A. N. C. ann. 3. Observ. 89. pag. 131.* spiritus salis ammoniaci maxima ex parte ea abigit, sed repetito usu. Cum autem frequentissime obveniant colicæ convulsivæ, ut dicant: *jacet mihi aliquid in ventre & me comprim, ne me flectere valeam*; alius pertinaciter clausa est, quæ nec clysmatibus, nec fortioribus Purgantibus moveatur, tormina interea crudènter perdurant, & morbus iliacus periculosus exinde fit. Ipse observavi non reterari alvum, nisi per Decoctum pallularum blandissimè alvum laxantium. Hinc præmissio vel onusso Decocto pallularum ad mitiganda symptomata mulieri præscripti:

*R. Aq. myrtib. ʒʒ.*

*Spir. salis ammon. ʒʒ.*

*Laud. hysser. gr. v. opiat. gr. ij. vel iij.*

*Syrup. cori. aurant. ʒij. vel j.*

*M. pro una vice.*

Cujus usu sedato nonnihil dolore, ordinata fuit Porio laxativa pallularum. Cum superesset adhuc dolor in abdominis regione hypogastrica dextra, & tumor durus instat parvi fere minimus ibidem tactu. Iste offertur. Mixturam antea præscriptam tenerandam, & sequens *Emplastrum* applicandum jussi: *R. Gummi ammon. in acct. solut.*

*Emplastri. mastic. de ʒʒ. usit. an. q. l.*

*Malax. cum u. q. uenit de aliis comp. f. l. a. Emplastrum* inqueendum super alutam, iterum cum oleo *Philisophorum*.

Applicabatur externè dictæ regioni, ut fortiter adhærescat, & accurata fuit.

Ubi jam omnia fuerint sedata, ut tuta in agis persistat cura, in usu abstinuit & remediis abundantiæ. Cum adhuc aliquandiu pergendum esset, apparuit quæ assiduis, febribus supervenientibus, imprimis nocte curatis, optimè conducunt.



Nobilis quartana duplicata affectus alio in loco ab alio Medico aliquoties acceperat pulverem china-china: cujus usu semper quidem evanuit febris, sed etiam rediit, idque aliquoties. In hoc pro cura præmissi:

*R. Mercur. dulc. ʒi.*  
*Scaev. sulphur. gr. iv. Misc.*

Benè profuit. Hinc pulveris istius Mercurialis (quem describit HOFFMANNUS in *Clave Schraderiana* sub nomine *Antiquarii Rveriani* pag. 275.) ʒi. ad ʒi. ordinavi. Sed hic parum evacuavit, mitigata tamen fuit febris. At, quia pulvis non evacuaverat, post quadriduum salivatio supervegit, ferè per octiduum durans, sub qua nihilominus febris contumaciter persistit. Hinc post repetita vomitoria.

*R. Elix. febril. D. Michaelis,*  
*Essent. absinth.*

*Op. an. ʒss.*

Miscebantur pro doli una, ante paroxysmum assumenda.

Aliquoties hoc accepit, unde remittentes successivè paroxysmi evanuerunt. Sed ipse admodum debilis reddi cœpit, & manifestò quasi tabescere, tandem etiam paroxysmi febriles redierunt: Hinc intermissionis die creberrimè & copiosè essentiam absinthii, centaurii minoris & Elix. febrile mista usurpavit, ut tonum viscerum & eversionem bilis conservarem: Hypochondrio sinistro applicavi emplastrum de Nicotiana cum gummi ammoniaco; quia ibidem & prope sphinam maxime frigus cæteraque urgebant symptomata: Diebus verò paroxysmorum

*R. L. p. cancr. præp. ʒi.*

*Sacch. Saturni gr. xviii.*

*M. pro 2. dosibus.*

Accipiendo unam mane, alteram verò à meridie, duabus vel tribus ante paroxysmum horis; quorum usu per aliquod dies & noctes continuato febris evanuit.

Sed alvi contumacia & excreta admodum dura supervenerunt, & subindè dolores compressiui sub umbilico afflixerunt, unde colicam humoroso-convulsivam ex acido viscido per saccharum Saturni, ejusque texturam aluminosam fixato & condensato, contraxit: passulis quidem laxativis ad ʒv. propinatis alvi beneficium conservavi, nihilominus colica cum cardilagia complicata, utraque lancinans, constriciva & graviter compressiva supervenit; hinc urgente graviter malo ordinavi:

*R. Essent. castor. ʒi.*  
*pro duabus dosibus.*

Item *R. Plur. chamom. m. iij.*  
*Sem. anis. ʒvj.*

*Pulp. colocynth. ʒi.*

*Coqu. in l. q. fer. lactis:*

*R. Colatur. ʒij.*

*adde*

*Terebinth. in visello ovi soluta ʒvj.*

*Mel. rosat. ʒss.*

*M. pro 2. dosibus pro duabus vicibus applicando.*

Sequenti die passulas laxativas assumpsit: Extra

*R. Empl. matricar. de Galb. part. ij.*

*Tacamab.*

*Bals. Peru. an. part. j.*

*M. f. Emplastrum abdomini inster-*

*nendum, quo etiam symptomata levata fuerunt.*

Sensit nihilominus adhuc colicam periodicam, per aliquod dies paroxysmi consueto tempore recurrentem, sed levem, dicto emplastro & usu essentiae castorei ac absinthii tandem evanescentem.

Ex hoc casu observandum:

1. Salivationem Mercurialem, nisi fuerit insignis, & quæ diu accopiosè evacuando universum corpus evacuet, non curare Quartanas, quod tamen observaverunt PIENS de *Febrib. lib. 2. pag. 273.* item ex BEL-LONII *Phars. Med. cor. pag. 200. 618. & 653.*
2. Si immaturè concentretur & figatur fermentum febrile, præter alia multiplicia symptomata, spectatim colicas convulsivas graves inducit, acido fixato partes sensibiles saltem fortiter irritante, dum ex texturæ mutatione fluida fermentare nequit.
3. Idem ferè esse peccans materialis in colicis indè natis cum fermento febrili, prout ex eo patet, quod periodicam febriem observent colicæ aliquandiu, utut leviter affligentes.

Vir ætatis consistentis laborabat febre intermittente tertiana scorbutica, cujus paroxysmos cum binâ vice sustinisset, die intermissionis, scilicet die 2. Junii, ordino pulverem laxativum ex nitro vitriolato, quod crebrius quidem, sed sine levamine purgavit; nam insequentie die 3. Junii eadem paroxysmi vehementia, & dum paroxysmus urgeret, gravissimi dolores crurum, eum corripiebant à genu usque ad popitem, spectatim in regione tibiarum, ut ex illis miserè lamentaretur: sed evanescente paroxysmo & dolores hi penitus intermittebant, ita, ut intermissionis die nihil de his perciperet: id quod manifestum est signum delitescens aerimonie scorbuticæ, quæ sub paroxysmo commota istas turbas excitare solet. Post aliquot paroxysmos die 7. Junii ordino spiritum salis ammon. die intermissionis capiendum: Cum verò semper ante paroxysmum per tres vel quatuor horas, gravissimas anxietates præcordiorum sentiret, die 8. Junii ante paroxysmum ordino vomitorium blandum, cujus usu & omnes anxietates remiserunt, & paroxysmus non rediit illâ nocte: sed die sequenti 9. oculus sinister inflammatus cum intenso dolore conspicitur.

Die 10. Junii nocte hora 2. redit paroxysmus cum frigore & aestu insigni stipatus, dolor crurum mediocris vel nullus, oculus dexter verò etiam altero mane admodum inflammatus & acerbè dolens deprehenditur. Vocato ergo chirurgo, vesicæ prope nucham utrinque excitandas iubeo, quibus copiosè plorantibus die 12. Junii nocte, cum expectaretur paroxysmus, nullus rediit, saltem appetente mane æstus per aliquot horas mediocris, hinc & sudor: sed nullus rigor vel horror, nullus crurum dolor, mediastibus scilicet vesicantibus his ita evanescentibus. Die 14. à meridie hora quamvis gravissimi dolores oculorum redeunt, sed post mediam noctem cessant, superveniente mane levi paroxysmo, superiori simili. Die 16. hora 5. vespertina denuò oculi acerbè dolent usque post mediam noctem, sed post hanc appetente mane levis, ut supra, redit paroxysmus. Die 18. Junii, ut præcaverentur dolores oculorum ante paroxysmum urgentes, jussu, acciperent semen sinapi, hocque contunderent, & cum ipsi vini istorando in forma puliculæ carpis utrisque pro revulsionem applicarent: hujus uso factum, ut nulli dolores percepti fuerint, & nocte sequente circa auroram paroxysmus ex illis denuò rediret. Sed cum sinapismo isto oculorum affectus ante paroxysmum cessarens, factum fuit, ut hinc post paroxysmum idem rediret: ob id semper mane & vesperti sinapismos applicandos jussi, quorum usu non amplius redierunt oculorum pathemata; internis verò fixis pedetentim febris evanuit.

In hoc caso notabile est:

1. Doloris tibiarum scorbutici extinctio superveniente oculorum inflammatione.
2. Huic ipsi præter constitutionem internam spiritus salis ammon. præbuit, oculis debillioribus noxiis, non secus ac volatilia antiscorbutica oculos heberant.
3. Vesicatoriorum usus reverà efficax pro rigore febrium intermittendum compescendo.
4. Naturæ motus & impetus in oculos, seu partem aliâ debilliorem, tam ante, quam post paroxysmos, sed per sinapi usum in carpo, avertendo delusus.
5. Quam salubre remedium sit vomitorium, si præcordiorum anxietates pluribus horis ante paroxysmum urgeant, pro his sedandis.

Hæc de Febribus Intermittebantibus.

## CAPUT III.

### DE

## FEBRIBUS CONTINUIS.

### ARTICULUS I.

### DE

## FEBRIBUS EPHEMERIS.

POST Febres Intermittebant tractandæ veniunt Febres continuæ, i. e. quæ à primo suo invasionis momento usque ad ultimum durationis finem continuò perdurant. Febres hujusmodi continuæ quoties blanda fuerit, & usque tantum durat, secundum durationis suæ rationem dicitur *Ephemera*, seu *unius diei naturalis Febris*, Latini *Febris diurna*: Quenadmodum si eadem per duas, tres, quatuor, quinque



quâque vel sex dies ita dura verit, & aliquo critico nature motu finitur, *Diaria* seu *Ephemera plurimum dierum*; item usitato vocabulo *synochus* non parvis, dici solet.

## CAUSÆ.

Causa in genere harum Februm Ephemerarum est per-versus usus 6. rerum non-naturalium, quarum occasione excitatur sanguinis fermentatio naturalis intensius aucta, & plus minus turbata, adeoque non-naturalis, ut corpus ed usque incalasciat. Unde præter functiones leviter læsas Pulsus frequentior solito ac major excitatur. Omnes ergo res non-naturales, quæ sanguinis fermentationem augere, & effervescentiam excitare possunt, sunt febris diariæ Causæ. Spontè tandem evanescit, & blando sudore ac madore prorumpente finire solet: pro quo scopo etiam blandum sudoriferum propinatum, Mixture simplex, vel Tinctura bo-zoardica, semel vel bis usurpata, interdum curationem absolvit. Interim est febris nullius momenti, & vel raro aut nunquam sub Praxin Medicam cadit; pro uberiore tamen ejus Explicatione consulatur SYLVIVS lib. 1. *Præcos* cap. 28. propter res sex non-naturales benè explicatas, PIENS de Febris P. 2. cap. 2. pag. 15., WILLISIUS de Febris.

Facile tamen in corpore impuro, sed cujus sanguis à debita crassi plus minus declinat, & heterogenearum pat-ticularum miscelâ ad fermentationem præternaturalem dispositus, in putridam vulgo sic dictam, seu fermentativam præternaturalem, degenerare possunt. Quando ergo est motus degenerationis febris ephemeræ in aliam, sequentia adhiberi possunt:

R. Decoct. cornu cornu rad. scorz. ℥j.

Succ. citri,

Cydon. an. ℥ss.

Tinct. flor. aquileg.

Bellid. an. ℥ss.

Syr. rubi Idæi ℥j.

Spir. vitriol. q. l. pro sapore.

M. D. S.

Julepus alterans.

R. Decoct. cornu cornu ℥j.

Succ. citri rec. ℥ss.

Cydon,

Syrup. acetos. citri,

Rubi Idæi an. ℥ss.

Spir. salis dulc. q. l. pro Julepo.

D. S.

Julepus alterans.

Vel loco Julepi fiat Decoctum alterans & laxans:

R. Flor. bellid.

Papav. errat.

Rosar. an. M. ℥.

Tamarind. rec. ℥ss.

Coqu. in ℥. ij. vel ℥iv. aqua comm. vel feri lactis depur.

cum spiritu vini acidulati:

Decocto ferventi addo

Conserv. Papav. errat.

Rosar. rub. rec.

Violar. an. ℥vj. vel ℥j.

Stent in loco tepido per horas aliquot; Colatura

S.

Potio aperitiva & alterans pro aliquot vicibus.

De quo bibat æger pro lubitu, vel quotidie bis manè, & bilorio ante cenam.

Item

R. Rad. scorz. ℥ss.

Ros. cornu cervi ℥j.

Ligni saffr. ℥ss.

Coqu. in f. q. aqua, citra finem addendo

Cortic. aurant. ℥ss.

Colatura edulcoretur cum saccharo,

D. S.

Hæmflux alterans.

In ardore corporis cum inflatione abdominis præscripti eundam:

R. Aqu. fœniculi ℥ss.

Corminas. ℥vj.

Spir. nitri dulc. ℥ss.

Syrup. cort. aurant. ℥ss.

M. S.

Esmuller. Oper. Tom. II.

Potentiola alterans contra inflationem.

Item

R. Aqu. acetos.

Scorzonera an. ℥ss.

Succ. citri ℥j.

Spir. nitri dulc. ℥ss.

Tinct. flor. bellid. ℥ss.

Syrup. rub. Idæi ℥ss.

M. S.

Potentiola alterans, cohibens sumenda.

## ARTICULUS II

## DE

FEBRIBUS ACUTIS  
PRIMARIIS.

Quoad supra factam divisionem, considerabo primò fe-bres continuas acutas, postmodum lentas. Quod attinet Febres continuas, quæ suum cursum cum impetu con-tinuant à principio usque ad finem, sunt vel primariæ, vel secundariæ seu symptomatice dictæ. Primariæ sunt, quæ per se morbum constituunt. Secundariæ superveniunt aliâ morbo, à quo complicantur; quales v.g. febres sunt, quæ continuæ sunt in Pleuriticis, Peripneumonia, Erysipela-te, & similibus partium inflammationibus; item quales superveniunt vulneribus aut ulceribus gravissimis partium, imprimis internarum, quæ ratione phthisis ex ulceratio-ne cujusdam visceris nata ordinariò secum febrem comi-tem habere solet.

Primariæ continuæ melioris doctrinæ ergò dividuntur secundum SYLVII doctrinam & manuductionem in acutas vel non-acutas seu lentas. Acute sunt, quæ cum gravissimis symptomatibus brevi & admodum periculose invadunt: Lentæ sunt, quæ lentè & successivè modera-tis symptomatibus ægros affligunt. Illius exemplum est v.g. Causus; Hujus exemplum sit v.g. Hæctica. Utræque in specie sunt vel simplices, aliàs Continentes seu Continuas ut *Febris* sic dictæ, ut hoc vocabulum Medicinæ parenti-bus, in specie HIPPOCRATI, fuerit incognitum; vel Compositæ, aliàs Continuas Periodicæ seu synocha. Illæ sunt, quæ eodem tenore, eodem impetu, sine variatio-ne, sine ulla exacerbatione aut remissione à suo principio usque ad ultimam & integram sui cessationem perdurant. Continuas verò in specie seu periodicæ sunt, quæ continuò quidem in suo cursu ad finem usque perseverant, nihilo-minus tamen certo tempore, nunc tertio die, nunc, quod rarius, quotidie, aut quarto die, subindè exacerbationes quasdam & paroxysmos exacerbatos patiuntur, post quas remissio quidem, non autem totalis intermissio febris obser-vatur. Talis continua periodica est inter Febres acutas continua Tertiana; inter Lentas verò Febris Catarrhalis omni vespere ferè suas exacerbationes habens. Reverà hæc nihil aliud sunt, nisi febres composi-tæ, ex febre nempe intermittente suas periodos observante, & febre continen-te, equali cursu continuò promota.

Durant hæc febres vel ascendendo, ita ut æger primâ die lenem calorem præternaturalem sentiat, postmodum de die in diem augetur, vel secundò descendendo, ita ut pri-mo die maxima caloris & febris symptomata ægrum inva-dant, quæ postea sensim sensimque remittunt, donec in naturalem statum perveniat, & sic continentes sunt, quæ eodem modo durant.

Acute febres sunt vel solitariae vel comitæ: Illæ, quæ solæ & simpliciter ægrum affligunt; Comitæ verò sunt, quæ cum alio affectu, in specie cum inflammatione ejus-dam partis, conjunctæ sunt: quales v.g. sunt Febres Pleuri-ticorum, Febres in angina correptis; sive Febres tales va-rient ratione inflammationis, sive inflammatio veniat ra-tione Febris.

Utræque etiam hæc ipse sunt vel benignæ, vel sæpius etiam malignæ, exque admodum periculose: Benignæ sunt, quæ ultra sui naturam nulla graviora conjuncta habent symptomata; Malignæ verò sunt, quando vires ægri subitò & præter talis febris naturam prosternuntur, & sympto-mata occurrunt, quàm in tali affectu fieri solet, graviora & insolentiora. Malignæ dicuntur ratione hominum mali moris, qui externè se præbent amicè, internè verò semper de mala cogitant. Inducant hæc febres prostratio



Vitam sine causa manifestam, rarissimè sunt intercurrentes: sepiùs complicantur continuæ cum malignis, ita, ut propterea etiam non rarò confundantur: imò sepiùs accidit, ut febris reverà maligna primis diebus formam causæ aut febris benignæ præseferat, ac sub malignitate lateat. Proinde cauti sumus in earundem diagnosi, & prognosi. De his jam non dico; quia suo loco dabitur occasio: Hæc vice considerandæ sunt febres *continuae acutæ primariæ folliculæ, benignæ* uno nomine: considerabimus in specie;

## FEBRES ARDENTES,

*Die hitzigen Fieber.*

Uti in omnibus febribus, ita in specie in continuis acutis, ratio habenda est duorum salium, utinosi & acidi, in massa sanguinea & succis reliquis, motu mutuo concurrentium, & plus minus fermentantium aut effervescentium. Hujus effervescentiæ occasionem nunc suggerit acidum, ut in febribus comitatis seu cum inflammatione conjunctis, e.g. pleuritide, item in febribus catarrhalibus; quid occasionem suggerit sal volatile oleosum & alcali peccans, quod cum acido effervescente calorem per corpus distribuit, ut sit in continuis primariis, atque dictis.

## CAUSÆ.

Scilicet *Causa proxima* Febrim constitutam non perlocutorem est nihil aliud, quam talis massa sanguinea dyscrasica, quæ hæc sale volatile acris, sepius oleoso simul, (scilicet præternaturaliter vitio seu corrupto, & consequenter sanguinis naturam etiam turbantem,) quod ab aliis vocatur bilis præternaturalis, adeo est turgida, ut vel levi accedente occasione calorem ebullitionem febrilem præternaturalem, instar vini generosi immanè ebullientis, tandem concipiat, dum sal volatile acris aut oleosus uberius luxuriat vitiosè cum acido concorrit, & plus minus intensè fermentat; unde insigniter incallescunt partes oleosæ (nam calor consistit in motu) tam effertur ardorem & æstum in totum corpus distribuitur. Unde ex sale volatili abundante calor actus & insigniter auctus observatur, idque eo magis quod magis oleosum fuerit sal volatile massæ sanguineæ. Pulsus est admodum celer, frequens, & quod magis oleosa, adeoque occidit acida est massa sanguinea, edent major, quatenus acrior propterea excitatur effervescentia. Urinæ simul sunt crassiusculæ & plus minus turbidæ, prout longius vel propius absint à statu tales febres. Et quod magis oleosum fuerit sal peccans, eo simul magis tinctæ: quando verò æqualiter effervescent acidum naturale cum sale volatili oleoso peccante, tandiu urinæ crudæ seu tenues & intense tinctæ existunt: quando verò successivè præcipitatur sal volatile oleosum peccans seu bilis ab acido, urinæ crassiores turbidæ, & quæ pederentur sedimentum deponunt, excerni solent; unde coctionis signa talia rectè dici solent.

Quando massa sanguinea à fermento planè dissolvitur, ita, ut nulla coctionis appareant signa, mors præsto est. Kergerus urinas fermentatas rectè dicit turbidas febricitantium. Nam, quæ fermentescunt, acrius ex conturbatione & exagitatione perspicuitatem amittunt: vid. KERGERUS pag. 277. de Fermentat.

*Causa remota* crasin massæ sanguineæ ita alterans, ut occasione levi datæ hujus orgasmus febrilis, & spirituum in duorum fervor & impetus oriatur, adeoque fermenti præternaturalis vires occupans, hæret imprimis secundum fundamenta supra in genere posita, & quantum hæcenus ex Juxamibus & Nocentibus judicare potui, in stomacho & primis viis. Nempe est vitium chyli; vel sub digestionem plus minus corrupti, vel in duodeno à bile effusa minus perfecti, sed vitiosè alterari, ut sub liquaminis fermentativi odorosi plus minus amaricanus acris, & plus minus oleosi forma successivè massæ sanguineæ infundatur, easque vires fermentationis, & circulationis leges subit, donec ibidem uberius & copiosius congestum, vel quacunque occasione externâ excitatum, tandem ordinariam sanguinis fermentationem & spiritalitatem naturalem turbat, indeque quasi congestum effervescentiæ febrili præternaturali occasio existat, mediante qua heterogenea ista materia sanguini suffusa, ipsique inimica secernatur, & hinc excernatur, ut in morbo nempe salubri; vel massa sanguinea ita corrupta & inquinata deficiat in effectu secretorio, ut tandem penitus immutata ejus textura & fermenta-

tio vitalis & spiritalitatis, & ipsa vita, seu illorum effectus, deficiat. Adedque deputatur massa sanguinea in febre continente salubri; penitusque vertitur eadem in ichali, quasi scilicet generosum mustum fermentando se depurat, & secum secretionem, tanquam quadam coctione, in vinum generosum abit: quod undecunque læsâ fermentatione istâ in vappam aut srum aut potum ingratum, aliusve modis vitiatum transit. Quod simile intelligibilis saltem reddendæ, non aurem explicandæ harum febrium naturæ, inserviat; nempe hoc ipsum chyli vitium est quasi (mutatis nempe mutandis) stercus liquidum seu scorria, ex tenuibus intestinis præternaturaliter transmissa in massam sanguineam, ibidem intrando archæum febrim inferens, ut vult HELMONTIUS *Tract. de Febribus* cap. 2. Sed hoc stercus, licet dicat HELMONTIUS non esse naturale, sed præternaturale, ex chylo corrupto & nidoso, a bile corrupta in intestinis vitiosè factum. Confirmat hæc dicta analogia ista, quæ inter febrim intermittentem & continuam salem intercedit, dum non saltem de facili complicantur, aut invicem permittantur, ut infra patebit; sed quod unus est in intermittente paroxysmus, hoc in continua est integri morbi cursus. Nempe acidum primarium vitium fermentativum, sed sub digestionem abstrahit, chyli non rectè transmutati & consequenter nec debite perfecti medio in massam sanguineam delatum, præternaturalis fermentationis est occasio; quod aliis naturalis modo chylum perficiens, hunc sanguinem perficibilem, & continuatæ fermentationis adjumento potest esse assimilabilem reddit aded nempe secundum VALERIUM in *Hist. Vita & Mortis* pag. 136. stomachi robur fundamentum est ad reliquas coctiones, & omnes succorum in corpore fermentationes sunt saltem continuationes fermentationis in stomacho inchoatæ, ut loquitur SYMSON *Zymologia* pag. 30. &c.

Ex quibus hæcenus vis & operandi ratio causarum remotarum promptè elicitur, cum ea res febres continuas arduas imprimis toleant occupare corpora juvenilia, in quibus notum, quod bilis sit copiosa in seu massa sanguinea imprægnata copiosa sale volatili oleoso, adque magis tempore vernali & ætivo, acieque squalido, quod incallescens corpus agitat massam sanguineam, quæque fermentationem intendit; item corpora evasca & enchysia, & quorum massa sanguinea ob particularum fermentescibilium copiam & volatili acrimoniam intensius fermentari solet; eos item, qui utuntur victu laevo, & potu generoso, spiritu vini, & vino generoso; item qui vitam agunt sedentariam aut otiosam, aut homines nimis sunt dediti & similes: sæpe etenim multum huc facit corporis habitus plethoricus, sanguine existente plus minus oleoso. Quibus subinde accedunt causas externæ, quæ talem dispositionem movent, ut res procaciter in actum secundum protumpant: quas inter est primariæ transpirationis intensibilis prohibitio; influxus enim illis transpirabilibus suppressis massa sanguinea turgescit: iracundiæ fervor, actum & volatiliū abusus: hinc immeritò subitanea in aquam frigidam post æstum corpora disposita in febres arduas comitit, quatenus scilicet obstruuntur pori, quod observavit HILANDUS *Centur. 1. Observat. 95.* (nisi tynochus pluvium dierum seu non putrida hinc oriatur) & VALERIOLA *lib. 2. Observat. 6.* qui habet exemplum febris tynochæ periculosissimæ ex pororum cutis obstrukione: item ex nimio usu aquæ theriacalis in animi deliquis infum; febris ardens observata fuit à Salmuth *Centur. 1. Observat. 31.*, sicuti idem Salmuth *Centur. 1. Hist. 32.* observat Febrim ardentem ex theriacæ nimia quantitate exhibitæ, &c. Sed res est clara; quod magis enim dispositum est subiectum, eo facilius oriuntur febres arduas.

Hæc *Continentibus*, plus minus acutis & simplicibus, complicari solent Febres intermittentes, adeoque

## FEBRES CONTINUÆ COMPOSITÆ.

Rectè SYLVIO dicuntur, compositæ ex continua acuta & intermittente periodica; ita quidem, ut sub febris continuæ cursu subinde affigens, & periodicè recurrens febris intermittens, exacerbationem periodicam plus minus intensam febris continuæ inferre soleat. *Continuæ hæc periodice ut plurimum sunt Tertianæ*, earque frequentiores, in quibus nempe sine intermissione febris pergit, ut subinde excerceatur, & quæ ista exacerbatione denuo remittat. *Continuæ verò quotidianæ* rarius sunt acutæ, quin ferè sub certum



centum continuatum, sed reverà febrium lentarum aut lymphaticarum veniunt. Febri huic in exacerbatione nonnunquam animi deliquium vel syncope solet imminere, ob quam causam tales febres alias *synopales* nuncupantur. Omnium autem rarissima est continua quartana, de qua, an oblecta fuerit, multi adhuc dubitant, sicut & JOEL in *Praxi*, (cui Veterano Practico iam septuagenario, & tamen in Pomerania, ubi ex acido fixo viscido, seu Veterum melancholia nata inorbi, indeque hypochondriacum malum ac scorbutus frequentiores sunt, & ex quo humore Quartanam derivant, viventium nunquam apparuit) eam aut nullam aut rarissimam esse judicat. Quin & si aliquando occurrant, ad lentarum naturam eas proximè accedere, asserit PIENS de *Febribus* Part. 2. pag. 98., aut cum continuas lentas complicatas erunt. Negabile talis complicationis exemplum suggerit LINDANUS super *Hartmannum*, dum dicit: *Vidi ego in hac urbe (nempe Amstelodami) tres Quartanas cum bellica ex animi errore contrahat: Præmus paroxysmus erat vehemens, secundus lentior, tertius lenissimus, quartus, qui respondebat primo, iterum vehemens. Ite. His Quartanis remittebantur remanebat febris continua seu bellica ex errore orta. Principio non putavi dari quartanam continuam, sed postmodum depravandi: effecti, ut omnes Quartanæ cessarent, sed remanebat bellica. Ego sanè continuas periodicas (quæ tertiianas & quartanas) paucissimas, nisi Tertianas, quæ sunt frequentiores.*

Continua in his febribus continuis periodicis est febrilis fermentatio, ejusque effectus pulsus mutatus, & caloris intensio, & certâ suâ periodo saltem exacerbationem, cujus indicium symptomata præbent, patitur; ita tamen, ut in his exacerbationibus ferè nunquam, aut rarissimè horrores sensus percipiatur ob intensiorem caloris sensum, & motum, totum corpus occupantem, quin saltem ex caloris & ardoris augmento exacerbatio funesta solet observari. Confer. SYLVIVS lib. 3. cap. 31. *Ex intermittente igitur & continue componuntur continua periodica, speciatim Tertiana acuta.*

Causa complicationis hujus febrium intermittantium & continuarum est, quod in massa sanguinea ad febrem continentem disposita ex sale volatili oleoso copioso ob errorem dietæ & stomachi erratum, ubi vitiosi succi congeruntur, qui intermittentes periodicas inferunt; cum & antea, massa sanguinea ex sale volatili oleoso uberius effervescente, jam febrem continuam patitur.

Huc pertinent febres scorbuticæ periodicæ vagæ, curæ difficilioris.

Complicantur autem tribus modis:

1. Dum febris intermittens in continuam ardentem degenerat, & ita postmodum invicem perdurant, dum, præter totam febris intermittens ejusque fermentum acidum,crementa nidorosa massam sanguineam errore digestionis primæ inquinant, unde hujus occasione continua simul excitatur, sed periodica.
2. Continens in intermittentem abit, correctâ plus minus massâ sanguineâ, & successivè succedente fomite præternaturali intermittens in primis viis, in specie si minus dietæ sub cura febriæ continuæ operam dent ægeri.
3. Dum simul tales binæ febres inchoant & pergant, idque modo supra dicto, siue simplices fuerint, siue compositæ seu multiplicatæ. Notabilis est explicatio, quam refert PARACELSUS Pent. 2. Observ. 33. pag. 99., nempe Tertianam continuam duplicem cum Quartana lethalem.

Jam verò nobiliora quædam his acutis in febribus, tam continens, quam continuis periodicis, occurrunt symptomata, pro quorum varietate subinde variant, unde varias fortuntur nomina seu appellationes. Sic quædam habent febrium, ubi fuerit gravior error, aut error seu

## FEBRIS ARDENS

Appellatur, cujus duo sunt quasi pathognomonica symptomata: *Æstus nempe & ardor intensus, & suis ferè inolevabilis*; Hinc frequentissimè continua tertiana periodicæ causi nomen obtinere solet: vid. SYLVIVS lib. 1. *Præcos* cap. 29. §. 24. & cap. 31. §. 5. Quibus primariis symptomatibus subinde accedit & linguæ ariditas, labiorum fissuræ, capitis dolores, delirium, & similia alia symptomata: HORSTIVS verò in *Problem. Dec. 1. Quæst. 4. pag. 5.* Veretum Causum hodiernam febrem Hungaricam esse asserit. Uti

na in talibus febribus est intensissimè elasta, rubicundissima, in incremento crassa, turbida, opaca, cum enzoremate, in statu copiosissima sedimenta sunt in fundo matule, quæ ardorem significant: si urina pravis densa, crassa, aut opaca, & subito intensè tenuis, portendit deliria, jecturatioes, anxietates &c.

## C A U S A.

Easdem penitus causas agnoscit Causus, sed intensiores, & concitatiores fermentationem excitantes, ac febres continuæ acutæ alia: Unde ex volatili acris acido, cum sale volatili oleoso intensiorem sanguinis effervescentiam excitante, intensissimus Æstus oritur; cum notum sit, nil magis effervescente & fermentando incallescere, quam talia volatilia oleosa: sic spiritus vitrioli mixtus cum oleo seu spiritu terebinthina, salino-volatili oleoso, insigniter effervescente incallescere solet. Hinc, dum sub ista effervescencia insigniter turgescit, & ut sic dicam, ebullit massa sanguinea, non potest non pulvis fieri maximus, & necessarîa frequentior, & prout spiritus animales sunt constituti, imprimis in principio, simul robustus. Ardor talis, dum alcalisatur quasi causa febrilis, ut loquitur HELMONTIVS *Treat. Pylorus Reflor* §. 26., fitum adeo inter se & cruciantem excitat: h. e. depravatum in febris fermentum stomachale, dum non aptum est ad consuetam digestionem, in excrementum nidorosum faciescit: sinit, quicquid in stomacho fuerit, quod a calore partis, & speciatim ab intenso æstu febrili magis alteratum, & quasi colliquatum in texturam alcalisatam oleosa, ut quasi empyreum coprahatur, tunicis ventriculi tenuis impactum, febrilem situm inferit, non solum irritando & vellicando certo modo membranam stomachi & oesophagi, & per contentum ipsius quoque linguæ; sed præterea massæ sanguineæ infusum simul alterat lympham salivalem, fauces humectantem, eamque subinde sale volatili oleoso impregnat, ratione cujus taliter ægotantibus subinde gustus amarus in linguâ obvenire solet: unde intolerabilis ferè sitis, & quæ amaricantibus, v. g. cetervisâ lupulâ, ex dictis causis intenditur, nec nisi acidis, præterea minerialibus, corrigibilis est.

Alia differentia est in Febre,

## LIPYRIA

Dicta, in qua interiora uruntur, exteriora verò frigent: de qua disceptantes admodum quoad ortum & secundum modum Authorum sunt sententiæ. Quamplurimi ad secundarias, adeoque vel Comitatas vel symptomáticas febres ærunt. Inter omnium sit LINDANUS, qui super *Hartmannum* inquit: *Febris propria est febris ardens, oritur ex inflammatione visceris interioris valde sensilis, de qua loquitur Aphor. 46. Sect. 4. HIPPOCRATES, & Aphor. 72. Sect. 7. de quibus notandum, (1) Febres has non esse intermittentes, (2) in talibus algorem esse externorum, & ariditatem internorum. Ubi per partes externas non vulgò dicta, manus, pedes, nasus, lobus aurium, &c. intelligenda sunt, sed universi corporis habitus. Algor autem non est tactu Medici aut adstantium judicandus, sed ægri judicio, quæ iste algere dicit, & regi jubet. Tepent enim membra, nec est ea vis, quæ in aliis febribus ardentibus adesse solet. Hæc Febris brevi terminum attingit, plerumque intra triduum, quatuor diu, & vix unius evadit, nisi statim ab initio huic malo præveniamus: len, hepatis, viscerum alia &c. si quæ accenduntur, non tantum periculi importas, quàm per partibus membranosis inflammationes accidunt, ut ventriculo, ileo, utero, & sic &c. Solent enim conqueri de summa alia partes affectæ: linguæ crassa nigra, magna corporis aestus agitatio, sitis inexstinguibilis, delirium, pervigilia &c. Hæc LINDANUS.*

Notanter dicit LINDANUS, partem sensibilibus valde sequi Lipyriam. Pars enim non valde tenuis, v. g. velentium inflammatum, febrem quidem etiam continuam, sed lentam ferè plus minus inferre solet. Confer. SENNERTIVS lib. 2. de *Febribus* cap. 26. pag. 206. Sanè Practicæ experientia cum primis contentiens est hæc lententia. Sunt & nonnulli, qui etiam primariam febrem subinde Lipyriam esse contendunt, quæ inter non tantum est SYLVIVS lib. 1. *Prax. cap. 29. §. 31. & 32.* & PRIMERO-SIVS lib. 3. de *Febribus* c. 8. p. 264.; sed etiam ex nimis libertati usu tractu saginorû (Ger. der Bybachker) eandem enatam, adeoque apparenter primariam observatam à BORRICHIO in *BARHOLINI AB. Med. Hassniens. Vol. 2. pag. 160.*



**Pag. 166:** Primaria talis, eam rarissima sit, adeoque adhuc nonnihil dubia, & quoad sciendi rationem adhuc intricata, saltem frigoris ratione ad genus nervosum membranosum undecunque irritatum, & astuationis vero respectu ad sanguinem in præternaturalem fermentationem concitatum; hincque alteratos insigniter spiritus, idque ex suprâ dictis probabilissimè à sui generis acido, respiciendum erit.

Potèrunt

### FEBRIS CONTINUÆ cum PRUNELLA.

Dum in febribus continuis, imprimis in Causo, sitiunt ægri, sæpè lingua & faucës ardescunt, earumque concurrent ardor ac rubor obscurus. Unde tunc temporis simul lingua quoque non tam arida existit, sed præterea etiam crusta nunc albicante, nunc nigricante obducta, colore nigrescente puniceo apparet tincta, *Eurhydrum* uti vocant, qui faucium ac linguae affectus vulgò vocatur prunella, Germanis *die Braune*, & omninò distinguenda ab angina, ut ut vulgò confundantur. Hæc febris cum prunella vocatur *Febris Hungarica*, & non raro solet esse epidemica: De quibus *Sylvius lib. 1. Prax. c. 29. §. 26. & 33.* Imò dubitant nonnulli, an detur Causo, cui non ut plurimum conjuncta sit malignitas? Ipsa saliva infecta causa maxima videtur febrium istarum, quas vocant vulgò *die Braune*; seu febrium vitiolo faucium calore conjunctarum: dum scilicet ista alterata, & imprimis mox glutinosa reddita in febribus, mucilaginis instar agglutinatur faucibus & linguae, quæ mucilago pedetentim ab æstu febrili calcinata quasi aut exsiccata, indeque istis partibus teneris perquam molesta & hostilis, has irritat & ardescere facit, ita ut mox phlogosin seu inflammatoriam quasi dispositionem acquirant, unde rubedo, ardor, dolor, nunc plus minus spissi proveniunt; tandemque fissuræ faucium & linguae:

### FEBRIS COLLIQUATIVÆ

*Dicitur* etiam huc pertinere, dum scilicet febribus his continuis accedit subindè colliquatio corporis, quæ nostris in provinciis sunt frequentissimæ, præterea colliquativæ seu colliquefactivæ dicuntur: scilicet tales, in quibus corpus brevi tempore insigniter consumitur & emaciatur; *nam se bald versallen*, dum ros nutritivus chylosus, tam in massa sanguinea, quam in solidis partibus, dissolvitur, & ipsa pinguedo quasi obundat & colliquecit. Accedit hoc, idque crebrius, per alvum, & tunc vocatur *Diarrhoea colliquefactiva*, quam certo respectu possumus referre ad *SYLVII Febris Cacatorias*; in qua copiosa, ut plurimum admodum fetida (qui *fecerit oleosa* subtilitate, adeoque & pinguedinis pessimam colliquationem notat, cum nihil æquè fœtere solet, ac oleosa seu pinguis corrupta, & ad putredinem vergentia) excernuntur: sæpius per sudores; qui vocatur *sudor Colligativus*, qui copiosus minus calidus, interdum plus minus glutinosus excernitur: item per urinam in *urina fluxu colligativo*, in quo urina copiosa cum supernatante propter aucta pinguedine effunditur: nunc etiam sæpius in certis corporis cavitates humores colligativi effluunt, quo sensu semper oritur Hydrops quidam; qui frequentissimus est in abdomine & pedibus, cum superiorum partium marasmo: nunc verò solo ardore febrili, sine ulla excretionem se ostendere solet; idque tardius, dum nempe absumitur ros nutritivus, necessario corpus emaciatur. De hac videatur sequens Febris Hæctica.

Febris hæc colligativa sunt omnium pessima & malignis proximæ; quibus tandem in periculoso statu convulsiones superveniunt vel deliria, & sic intereunt ægri.

Definiri autem potest hæc febris, quod sit symptoma fermentationis massæ sanguineæ auctæ, dependens à nimia acrimonia fermenti febrilis, unde oritur notabilis humorum laudabilium profluvius, omniumque partium pinguium resolutio.

De genere non opus est, ut multa differam.

### PARS AFFECTA.

*Partes affectæ* sunt partes totius corporis chylosæ ac pingues: nam reverà impossibile est, ut os, vel cartilago, vel membrana, vel fibræ in corpore corrumpantur, nisi hoc fiat per putrefactionem aliquam, v.g. in carne & pectore;

hinc etiam omnes fibras in singulis angulorum ferreus resperire licet in cadavere ad extremum maciato: imò, si fibræ quædam annihilarentur, quæro quomodo possibile sit, ut patientes tales tabidi sceletiformes possint exercere omnes musculos? cum constet, puncta vel compressa una alterare fibræ musculi, aliàs vegeti satui, aboleri etiam actionem musculi. Interim tamen faciliè largior, quatenus succi pingues aptas reddunt fibras quascunque movent expeditioni, eatenus destructo succo pingui percipere corpora varia incommoda:

### CAUSÆ.

*Causa* colliquationis talis *primò* in subiecto patiente sed succo nutritio chyloso torido, & inde nata pinguedine, *partim* in efficiente etiam, consistit: In patiente quidem, si succus iste texturæ rarioris, subtilioris, minusque ab acido concentratæ existit, hinc facilius resolvable & attenuabilis denuò esse solet: v.g. carni aprugne sub assatione nil omninò, aut planè minimum est, quod desinit; suis verò domesticæ catni plurimum, eò magis, quod plus adipe vel carne abundat, ut loquitur GORRÆUS in *definit. Medicinæ* pag. 319.

Texturam autem istam plus minus resolvablem à certo contextente acido dependere, illustrat experimentum istud, quo olea per spiritum nitri acidum in pinguedinis consistentiam coagulare possumus, dum alcalia è contrà & saccharum butyri coactionem debitam penitus inhibeant.

*Causa efficiens* attentans, & mensuri instat dissolvens, & hinc serolo vehiculo dubile reddens, non est tantummodò caloris motus, utut hic pro liquefenda denuò pinguedine multum valeat, sed *acrimonia septica seu quasi causifica fermenti febrilis* peccantis, penetrans, dissolvens, & nutritivum succum ac pinguedinem partium solidarum, cuius coagulatio ab acido occulto fieri assolere, liquefaciens, simili ferè ratione atque acres quasi causificæ particule purgantium, aut sudoriferorum resiniferorum acrum &c. dissolvere & liquefacere assolent chylas & roridas nutritivas particulas; quæ *acrimonia*, ad quam acrum classis, an acidorum volatillissimorum, an alcalium, an saliorum, referenda sit, in medio hoc loco relinquo.

Huc etiam facit nimia succi bilioli acrimonia; quæ longiore tramite in intestinorum cavitatem influens, chylum acrem redit; quare in massam sanguineam transiata, eandem cum nutritivo succo resolvit & colliquefacit, quæ nimium fermentando, & in sua textura satiscendo, per glandulas intestinales, pancreas, & vasa biliaria excernuntur: unde frequentissimum Febris colligativæ symptomus, *diarrhoea* oritur; sicut & ipse bis in talibus cadaveribus fœtus vesiculam planè exinanitam, & ad instar folii florum papaveris tenuem observavi.

Si verò nulla oritur humorum extravasatio, oritur demum sudor, qui tamen ut plurimum concomitatur & diarrhoeam & hydropem; quæ propter, ubi sudor diarrhoeam & hydropem non levat, res est maximè desperata.

*Causa remotiores* Febris colligativæ possunt esse variae. Imprimis autem ex rebus non-naturalibus, multum hic valet aeris constitutio epidemica. Quoad potum: nimium in modum promoveri febrem colligativam largior & frequentior porus spiritus vini, qui depravando fermentum ventriculi, adauget per oleositatem suam, tale volatili copioso turgidam, tal volatile oleolum bilis, eamque reddit acrem: quare ut plurimum ejus potatores strenui tandem mortem oppetunt ex febre colligativa. Idem centendum est de fumo tabaci nimium frequenti & copioso. Ex haustu nimio aquæ frigide, corpore prius nimium commoto, febrem colligativam sibi aliquando contraxit Juvenis 18. annorum. Quoad alimenta: faciliè possunt ad febrem colligativam disponi, nimium quantum, appetentes aromata.

Ex rebus præternaturalibus est scorbutus, qui raro patientem occidit absque colliquatione, imprimis si patientis erit ætate profectior. Febris aliquando colligativa est cancro mammarum cum diarrhoea observata est.

Colligativa enim hæc Febris, ubi eam sensibili excretionem est conjuncta, faciliè se manifestat, & suam causam producit. Verum, ubi sine tali sensibili excretionem subito corpus quasi fatalitè & colliquecit, signum est massæ sanguineæ admodum acris, ineptæ ad nutriendum; unde pinguedo & ros nutritivus partium solidarum colliquefactus, nunc



nunc sensibilibiter mediante sero, nunc insensibiliter halituum formâ foras successivè excernitur.

*Distinguenda autem sunt hic, lenta emaciatione in febribus ab eo, quod nos dicimus, collapsus, in specie facili. Illud autem à colliquatione, & hinc subsequente emaciatione oritur: Hoc verò à spirituum infusorum defectu aut saltem deficiente vi elastica, & fibræ & stamina parvum in debito tono, & hinc interstitia porosa in debita dilatatione pro fluidorum quorumvis facilitate transmissione, detinente oritur. Hac igitur vice cessante, vel ob spirituum absolutam paucitatem, vel eorundem vitia, tam consustionem vel denegatum plus minus eorum influxum, partes molles, præsertim faciei, colicæ, nâs acuminari, tempora excavari, oculorum orbitæ profundiores apparere incipiunt, ut in subitanea syncope correptis, aut facie Hippocratitæ deformibus, manifestum est.*

Ut itaque colliquatio subitanea neque bonum signum esse solet, pessimum tamen semper indicium est ista subsidientia partium mollium subitanea, quæ nunc mox in principio morborum, nunc in eorum progressu, interdum horulæ spatio contingere observatur, spirituum infusorum affectum gravem omnino annuens. Gutinosus sudor est pessimus, in specie in febribus malignis: ab acido enim sit assimilatio alimenti, hoc si destruitur ab acri volatili, veniunt inde sudores colliquativi, quatenus non potest assimilari alimentum, hinc & in talibus febribus decidunt pili ob illorum denegatum nutrimentum; vid. GARMANNUS de *Miraculis Mortuorum*, ubi habet de pilis, quod sunt quasi Vegetabiles.

Porro febribus continuus & continetibus hæc sæpius supervenit *delirium*, idque non leve, quale in intermittentibus scorbuticis interdum observabile est; sed grave, & ad furorem subindè egros disponens; idque nunc citius, nunc tardius superveniens, & adstantes insigniter turbans. Hæc

### FEBRES ARDENTES DELIRÆ,

Uti vocant, vulgò *Morbus capitis*, non raro sunt epileptice; antecedere solent vigilie perminaces, subindè cephalalgie crudeles; sequuntur verò continuata hæc symptomata, tandem convulsiones epileptice.

Fu hoc, quando partim ex fermento febrili, ut plurimum tamen maligno, speciatim ipsi spiritibus animalibus, & hinc generi nervoso, circa interiores capitis partes inimico; partim istorum textura vitatur, adeoque motus debitus pervertitur, & genus nervosum continuè vellicatur (undè intensior circa frontem, quam alias corporis partes, æstus percipitur) partim ex calefacto per sanguinem fortiter effervescentem cerebro, spiritibusque animalibus fervidioribus redditus, hi ipsi in cerebro & cerebello inordinatè moventur & agitantur; hinc enim occasione tam perverſi, quam continuati & inordinati motus, inquietudo, insignes capitis dolores, vigilie perminaces, hinc gravia deliria, & tandem convulsiones superveniunt, quæ intermunt egros.

Apud Veteres scriptores Practicos & eorum Interpretes, plures adhuc febrium acutarum differentie annuuntur; v.g.

### FEBRIS PEMPHYGODES.

Latine *Ampullosa* dicta, in qua tam facies & os, quam caput & aliæ partes corporis, bullis & bullulis hinc inde protuberantibus intectisq; observantur; cuius notabile exemplum videb. in M. A. N. C. ann. 8. *Observat.* 56. pag. 93. & ZACUTO LUSITANO *Prax. Admir.* *Observat.* 15. Qualis tamen bullularum elevatio & intumescencia potius fermenti maligni cujusdam critico quasi naturæ motu, cum suo vehiculo ad istas vaſa solatarum exclusi, effectus esse videtur.

### FEBRIS TYPHODES, item ELODES, item HYDRODES.

Latinis *Sudorifica* dicta est, in quibus statim primo die ægri copiosè sudant; tudore ipso parum aut nihil allevante (quæ an eadem fuerint cum sudore Anglicò, ut

asserit LANGIUS *Epist.* 19. lib. 1. dubitare licet) sive colliquativus, sive non fuerit talis sudor: illius nempe colliquativi Theoria ex supra dictis; hujus verò aliquo modo mutuanda ex SYLUIO lib. 1. *Præf.* cap. 30. §. 40. & 114. item cap. 38. intelligi potest.

### FEBRIS ASSODES dicta, seu ANXIOSA.

Quando ægri anxietates cordis patiuntur, in qua ob anxietates ægri, decubitus eundem non ferentes, figuram jacendi sæpius variant, adeoque in lecto se jactitant.

### C A U S A.

Inter omnes anxietatis *Causas* frequentissima est *ovis ventriculi affectus*, quando nempe vel ob malignum quoddam fermentum, vel à pravis, utut paucis, humoribus, ejus tunicis immersis, mordetur seu irritatur, vel ipsdem in intestinis, in specie in tenuibus, stagnantibus, qui ad stomachum delati, sub nomine bilis porraceæ terra symptomata faciunt: Hinc vomitoria in principio harum febrium instituta sunt optima. Præter hanc tamen vel *unum* intensius, vel *orgasmus* materiæ ejusdem, vel malignitas insignior, vel imbecillitas in causa esse solet: de quibus in specie vid. STEPHANUS RODERICUS CASTRENSIS lib. 1. cap. 21. *Tractat. Quæst. Quibus.*

### FEBRIS LINGODES, *vulgaris, quædam* seu SINGULTUOSA.

Talis est febris, in qua singultus cum febre permanet, vel cum febre per totum morbum simul exacerbatur. Exemplum vid. in M. A. N. C. ann. 4. *Observat.* 48. pag. 43. Ut plurimum est ex ventriculo, live per essentialiam, live per consensum affecto.

Curatur carminativis, castoreis, cinnabarinis, & opiat. Sic HORSTIUS lib. 1. de *Febrib.* *Observ.* 25. Laud. opiat gr. iij. cum pauxillo Theriacæ & conservæ solarum cum successu exhibuit: item applicavit cucurbitam scâtificatam super os ventriculi.

### FEBRIS PHRICODES, *vulgaris, quædam* HORRIFICA.

Cui in toto morbi cursu crebri horrores & rigores superveniunt, quales non solum in suppurationibus partium internarum, sed etiam febribus compositis interdum supervenire solent: de quibus omnibus, ne actum agam, vid. STEPHANUS RODERICUS à CASTRO *citato loco*, nempe *Quæ ex Quibus* lib. 1. cap. 18. 19. 20. &c. Consecratur etiam ZACUTUS LUSITANUS, qui & earum Historiam & Observationes pertractat in *Medicorum Principum Histor.* & *Præxi Admiranda*. Plura symptomata, eorumque diductionem, hislo iam etiam harum febrium exactiorem; videb. in SYLUIO lib. 1. *Præf.* cap. 29. item cap. 31., ubi prolixè historiam morbi indicat. Hoc notandum in SYLUII lectione: quod simul unâ vice tractet Febres biliosas & lymphaticas; nos verò seorsim illa tractamus. Inter febres compositas plus minus acutas primariam sui considerationem meretur

### FEBRIS SEMITERTIANA, seu HEMITRITÆUS.

De qua tamen variantes sunt Authorum sententiæ, cujus discrepantiæ, præter generalem febrium theoriam admodum intricatam, hæc ferè est origo, vel nimia Verorum veneratio, & in ipsdem defendendi studium, vel non ritè observata multiplex tam compositionis febrium mutuz, quam complicationis earum cum alijs affectibus varietas. *Vulgarissima de semitertiana ferè sententia*: esse eam compositam ex duabus febribus, Tertiana & Quotidianâ, quarum una sit continua periodica, altera verò intermittens, in qua ipsa, quoniam sub quovis paroxysmi insultu horrores plus minus perceptibiles sit, ob id & *horrificam* seu *phricodem* hanc febrem vocasse Veteres asserunt. Talis semitertianæ typum ex intermittente quotidiana cum tertiana exhibet REGIUS in  *suis Dissertationibus*. Vir quidam



dam robustus incidit matutino tempore in h. rorem totius corporis, quem insecutus est calor mulsus, pulsus celer & citius perpetuus durans: sub vespere ipsum eadem die invadit refrigeratio totius corporis, postquam sequebatur pulsus iusto sequentior & celerior: Sequenti die calore illo perpetuo & pulsus celer ac crebro durante, leve frigus sensui, calor quodammodo increvit, & pulsus induruit: Tertio die rursus manè exhorruit, & dein incaluit, & vespere, remittente frigore, rursus increvit calor: quart. verò die leviter sub vespere rursus perpetuo frigore incaluit, & pulsus induruit.

Semiteriana verò composita ex Tertianâ intermittente & quotidianâ continua vid. in TIMÆO lib. 8. Cap. 21. & 22. pag. 367. & sequen. Conferatur etiam HORSTIUS lib. 1. Observ. 14. item RIVIERIUS in Obs. de Morbis infrequenter Observ. 23. Sic Hemitritæus ex continua quotidiana & quâ triplici Tertianâ vid. in RIVIERIO Centur. 4. Observ. 23. Sic Hemitritæum ex continua minus acuta & in p. u. Tertianâ cum singulis vehementi & tumore in sinistro hypochondrio, observavit PLATERIUS lib. 2. Observ. 1. p. 312. SENNERTUS hinc duobus modis & anim. Semiteriana typum adit, in nipe illam, quæ ex intermittente, præteritâ Tertianâ, vel simplici vel multiplici, conjuncta cum Febre symptomatice continua, inflammationem patris ejusdem in inter. insequente, oritur, petiunt ad hoc ipsum, speciatim per Observationes SPIGELII in Tract. de Semiteriana: v. g. refert SPIGELIUS se in juvene quodam h. lga. x dysenteria ipse febrem tertianam lapio & morbo, per Anatomiam ejus usque inspectione factâ, intestina tenuia inflammata, ileum verò ipso celo corruptum, ubi adheret colo & cæco, invenisse. Confer. de hoc pluribus SENNERTUS lib. 2. de Febribus cap. 21. pag. 123.

Observandum ulter. us hic occurrit: non raro febrem malignam esse, quæ Semiterianæ typum referat; vel quia intermittenti Tertianâ quocunque modo complicatur; vel quia ipsa maligna vago nonnihil exacerbationis morbi Semiterianæ talis typum repræsentat: Ob id FORESTUS lib. 5. Observ. 14. & 16. Semiterianas has suboriri astringit, grassantibus febribus malignis & pestilentibus. Nec refragatur SPIGELIUS citato loco, qui tempore pestis hanc febrem frequentissimam esse sinit: unde & SCHENCKIUS lib. 5. Observationum Hemitritæum pestilentem pluribus describit. Quod ac. & Hemitritæus malignus Bezoniæ curatus: vid. RIVIERIUS Centur. 4. Observ. 16.

PLENS de Febribus lib. 2. pag. 283. complicationem istam minus a. mut. sed semiterianam nihil aliud esse asserit, quam febrem continuam h. rificam seu phricodem cum multis rigoribus ingruentem, vel plures intermitteutes sibi invicem succedentes, & quasi subintrantes: id quod subinde evenire nonnunquam possit, probabiliter arbitror.

Observandum & hoc: uti male curatæ quæcunque ex causa febres intermitteutes in continuas lentas facile degenerant, ita & taliter ipsa intermittens complicata Hemitritæ faciem referre potuit: Sic enim Tertianam intermittentem exquinam mutatam in Semiterianam refert FORESTUS lib. 5. Observ. 3. & 6., & febrem lentam tandem mutatam in Hemitritæum, iterum FORESTUS Obs. 14. lib. 5. refert.

Sane omnes modis enumeratæ & observatæ complicationes & alia plures, ut facile fieri possunt, ita & Hemitritæ in genere sic dicti typum omnino plus minus variare, necesse est. Nempe signum pathognomicum Hemitritæi ferè esse solet, quando feb. is continuo quidam affligit, sed cum succedentibus rigoribus crebrioribus aut horroribus; ubi rigores cum insequente intensiore astu Tertianæ, horrores vero, aut saltem refrigeratio, cum minore incalescentia, Quotidianæ febres intermitteutes typum constituere dicitur. Jam ex superioribus patet: fermentum acidum, aliudve quodvis ac. re, membranolum genus vellicans, horrores & rigores, item massam sanguineam inquinans, æstuationis occasionem suggerere. Quibus perpenis, de facili multiplicitas typi, & complicationes lentarum acutarum intermitteutes primariarum, secundariorum, malignarum &c. in subje. patiente ratione criticos partium contentarum, & constitutus partium solidarum plus minus variantium, & modis & hinc & ill. reman. patescunt; adeo, ut uni eundem etiam complicationis generi minus nos percipere applicare debeamus. V. g. Semiterianam cum variis observavit SPIGELIUS de Semiterian. lib. 2. cap. 16. Nullus

dubito, recurrentes apparenter enim horroribus aut rig. tibus paroxysmos ab ac. variolatum fermento, partes membranaceas vellicante, & in sanguine æstuant, accidisse, & ita in subje. patiente ratione specialis contentorum idiosyncrasie quasi typum quendam repræsentante. Pariter FORESTUS lib. 5. Observ. 22. feb. is hor. te mentionem facit, cui accessit erysipelas. Horrores hi non à speciali feb. is typo, sed ab acido erysipelatis, vellicante subinde membranaceas partes, ortum habuerunt.

Pro meliore disceptata compositionis saltum febrium, imprimis notabilis est locus SENNERTI de Febribus lib. 2. cap. 21. pag. 320; dum dicit: Imprimis compositas arguit redit. s. rig. is, horrores aut frigoris potius quæ quietem. Quod si plane continua & simplices videntur febres, attendendum, an post rig. em sudor su. sequatur? Nam si in febre, quæ continua videt. r., rig. is fiat, & sudor non subsequatur, aut fortè post plures rigores u. us sudor, signum est febrem illam non esse simplicem, sed compositam: Nam in p. u. feb. is rigor non apparet, nisi crisi tempore, quando sudor sequitur. Deinde etiam Pulsus feb. is compositæ ind. am exhibet: Nam quamvis feb. is quædam continua videatur, si tamén sæpius fiat pulsus contractio, illa non paroxysmi, motusque materis novi indicium est.

### DIAGNOSIS FEBRIUM ACUTARUM:

Signa febrium continuarum acutarum diagnostica sunt facilia: Nam in genere calor intensus admodum; & sitis insigniter aucta seu ferè intolerabilis, sunt signum quasi pathognomicum feb. is ardentis seu Causi; siue sit feb. is ardens ex genere continentium, siue ex genere Tertianarum continuarum periodicarum, period. est. Inchoant hæc febres primis post præcedentem, aliquot dierum lassitudinem, & aliqualem capitis perturbationem, cum frigore & rigore plus minus intenso, quod frigus in principio harum febrium dependere videtur ex eo, quod ingruente feb. is effervescentiâ, dum turgescere incipit sal ejus volatile oleosum, hoc adhuc ab acido concurrente nonnihil impeditur, (nam in omni fermentatione acidum & alcali præsuppono,) quin & quodammodo adhuc subigitur, aut saltem in æquali proportionem detinetur, antequam effervescentiâ febrilem concipere possit: sub qua lucta dum turbatur massa sanguinea, calor ordinarius nonnihil deficit, & ab acido in partibus nervis horrores aut rigoris sensus inferitur: qui tamen non diu durat, quin superato tandem acido à sale volatili oleoso, hora una vel altera immediate insequitur incalescentia ac æstus ingens totius corporis, isque continuus, eodem die persistens, vel similiter accrescens, vel similiter decrescens usque ad finem status, sitis, cephalalgia, & reliqua ex ordine symptomata.

Pulsus præterea semper deprehenditur frequens, celer, & in benignis magnus, qui semper bonus; innuit enim æqualem concursionem saltum in corpore, & consequenter laudabilem sanguinis statum. Si verò malignitas subest, est celer & frequens, interdum inæqualis; in omni febre continua pessimus est celer & frequens pulsus. Nam paradoxum est, statuere pulsum magnum in febre maligna; & paradoxon etiam, statuere in febre benigna parvum. Similis ferè celer & frequens est pulsus, quem omnes in nobis ipsis percipimus, dum ab insigni exercitio, aut vehemente motu nris, concurrente intractabili animi pathemate, v. g. ex fuga, ex imminente malo &c., corpus incaluit. V. hemens est plus minus, pro virum cordis, a quibus dependet motus, vario robore & calor quod est intensior, magnamque sequitur ebullitionem, eo celerius & frequentius vibratur arteria.

Calor est intensus admodum in his febribus, & vocatur, vaporis, i. e. quando manu tangimus ægrum sub intenso æstu, quasi subtilis inador percipi videtur. Et quidem, ubi massa sanguinea videtur magis temperata, & minus acris salina, calor est blandior, ubi verò eadem est magis salina, solet percipi simul acrior nonnihil, & quodammodo simul morficans. Ut patet incrementis feb. is intensæ est crassa, rubra, & successively turbida, opaca, cum enervatione in principio sine leuamento, cruda, aut saltem leviter cocta: in statu verò copiosa admodum, & varia sedimenta in fundum macule secedunt, quæ coctionis signa exhibent, & ardorem significant; unde etiam de coctione & cruditate materis morificæ, & consequenter de salute & morte



morte, prognosis instituitur. Probè igitur attendendæ sunt urinae mutationes pro meliore prognosi.

Oblervandum tamen, quod, quò magis sudant ægri, eò minor sedimenti copia exindè soleat in urina provenire; sicut etiam eorum urina, qui sunt constitutionis biliosioris, ut vocant, aut qui laborant scorbuto, aut qui inclinant ad phthisim, etiam levi febricula intensè rubescunt, ob ætiora & acidiora plus minus salia massam sanguineam talium ingredientia: contra verò, quorum massa sanguinea est magis temperata seu diluta, aut copiosa lymphâ, aut succo dulci nutritio chyloso, eorum urina minus intensè, cæteris paribus, tingi solent, & crassiores, illorum verò tenuiores, observantur: hinc & pariter in illis naturaliter celeriores & frequentiores, in his rariores & tardiores pulsus observari solent. Semper igitur idiosyncrastia subiecti simul consideranda.

Si urina in statu est tenuis, pessimum signum est.

Si urina plùs densa, crassa, aut opaca, & subitò intensè tenuis, portendit deliria, jestigationes, anxiaes, & ut plurimum mortem.

Sitis affligit intensa, saliva paucæ, eaque glutinosa observatur, tussis & insignes cephalalgia, quas comitantur agrypnia, ut plurimum iuncta esse solent.

Si verò febris continua periodica fuerit, secundum typum exacerbationis eadem se ipsam prodir, an sit Tertianæ, Quotidianæ, an Quartanæ? imò observatæ etiam fuerunt Tertianæ continuæ duplicatæ: Vid. POTERIUS C. 1. Cur. 43. de duplici nempe Tertianæ, concitata, à fulgure palatium incendente, &c.; quin & PANAROLLUS l. a. observat Tertianam duplicatam continuam cum Quintana lethali complicatam.

Pergit talis cursum hæc febris, donec solvantur: id quod fit vel subitaneâ crisi, vel successivâ. Illa non, nisi in his febris, accidere solet, idque frequentius in calidioribus climatibus, & generosiore victu potuque utentibus, & quidem vel die 7. vel 14. vel 21. &c. Rarius apud nos, in specie cum Aletantibus, Absorbentibus & Diaphoreticis crisi subindè præventianus: semper tamen & necessariò motus naturæ probè attendatur, ne eundem impediamus.

Alia verò pedetentim solvitur, dum cocta materia, v. g. per successivam urinæ excretionem, vel per sudores nocturnos crebrius repetentes, successivè excluditur. Quid etiam facit, quod eadem, præsertim plus minus acutæ, solvantur per copiosam expectorationem, excretionem & excretionem cum mediocri tussi; sicut præsertim in petechialibus copiosè ex faucibus excretio, & quasi pyralismus morbum solvit; interdum successivè abscessus qui dam in loco supervenit, &c. Nempe & hæc his in febris successivam coctionem materię morbificæ insequens, crises cum sit vicaria, tamen excretionem vel translationem materię coctæ fiat, necesse est, nisi in lentam, aut hecicæ similem acuta hæc febris degeneret, aut ex materię coctæ, scilicet non deburè, h. e. non sufficienter in falsum mutatur, nec fixa renovato fermentationis imperiæ recidiva sequatur.

In Febre colligativa totum corpus languet, notabiles ad sunt evacuationes, sive per sudorem, sive per urinam, sive per alvum, sive in certa cavitate collectio.

Urina est ruffa & gravis; præcipitata verò monstrat copiosissimum sedimentum, in superficie autem ut plurimum pinguedinem aliquam habens.

### PROGNOSIS.

Febris vel continens, vel continua Tertianæ periodica, ceteræ acutæ, sunt ambigui exitus: per se quidem minus periculose sunt, sed potius per se salutares, de facili tamen periculum supervenit.

Ea sunt periculose, quæ mox in principio, uti dicunt, extremos habent labores (est formula loquendi HIPPOCRATI usitata) hoc est, quæ nimis sunt acutæ, & ubi symptomata atrociora confertim, maxime circa regionem stomachi, confertim ac mox in principio ingruunt, & ad finem pergunt, quod universale est in omnibus febribus ardentibus.

Subita etiam alleviatio in morbis acutioribus est pessima ac lethalis: sic Medici non raro decipiuntur, nescientes, quid sit extremæ naturæ conatus? Vid. LANGIUS in M. C. pag. 143.

Quò mitoria pathemata sunt circaprimas vias & regionem stomachalem, eò mitor & salubrior est febris; ubi autem urget nausea, adest anxietas præcordiorum, cardialgia,

& diarrhœa, imprimis ubi adest colliquatio factio corporis, affectum plùs minus periculosum innunt; nam illæ proximè accedunt ad febres malignas: Unde quævis malignæ acutæ periculose censendæ sunt.

Probè autem attendendum, an in principio talis febris adsit diarrhœa colligativa? an verò symptomatice?

Deinde cum febribus continuis ardentibus quibuscumque sæpius complicatur malignitas, reddens tales febres admodum periculosas.

In febribus ardentibus benignis vomitus est optimum signum, sive in principio sit, sive in statu; innuit enim valorem naturæ.

Uterius fluxus alvi in principio magnus, virens dissolvens, aut ex materia insigniter corrupta, indeque admodum foetens, periculosus est, & interdum mortem minatur; est enim colligativus & simpliciter symptomatice: si verò sine insigni vitium labe contingit, & æget aliquod levamen percipit, non adeò est periculosus.

Sudor autem colligativus, licet in habitu corporis ægri post sudorem reperitur sabulum, vel nonnunquam etiam in lecto sabulum ruffum, aliquoties observata est curatio talium febrium.

Urina, quatenus subministrat signa coctionis & cruditatis, quò citius exhibet signa coctionis, tutus est affectus.

Urina alba, aut pallida, & admodum cruda, in omnibus febribus ardentibus admodum periculosa est, & plerumque mortem portendit.

Urina alba, tenuis & clara, in febre continua ardente cum delirio, lethale est signum, propter imminentes convulsiones.

Quantò urina rubicundior est in initio, tantò citius terminatur, cum signis bonis ad bonum, cum malis ad malum.

Illæ febres continuæ ardentes, quæ nullius evidentis causæ vi, sed in corporis & animi quiete præter expectationem excitantur, graviores multò sunt & periculosiores, quam quæ prægressam habent causam evidentem, v. g. motum corporis, æstum solis, &c.

Quæ lethales futuræ sunt, vires in dies magis prosterunt citra ullam criticam evacuationem; aut si quidem excerpitur die minime decretorio, naturæ satiscitis signum exhibet.

In omni febre ardente semper adspicienda est lingua, ad sit humida? an verò aspera & arida, aut nigra, aut fissa, livida & mucosa, vel alio modo vitiosè constituta? adeoque Prunella imminet: quò magis enim lingua à statu naturali ad dictas qualitates præternaturales declinat, eò gravius æstus internus, eoque periculosior innuitur febris; quò autem humidior & rubicundior naturaliter est lingua, eò melior spes affulget in omni febre ardente.

Quoad tempus eventus: Febris ardens acuta circa septimum interdum, interdum circa decimum quartum finitur apud nos, quin & ad 20. extendi solet: sæpè, ubi sunt magis acutæ, intra diem quartum solvitur: quæ in aliis regionibus ordinariò septimo terminantur, rarius ad decimum quartum extenduntur. Unde in effatis HIPPOCRATIS & Practicorum observatis, regionum ac aliarum circumstantiarum probè habenda est ratio. Quando urina in principio morbi rubicundior, crassior, & magis vel minus turbida se exhibet, tantò citius terminantur hæc febres: unde si quartâ die signa coctionis evidenter apparent, terminantur ferè die septimo; si verò conspiciantur talia signa septimo die, terminantur undecimo vel decimo quarto: Nam in acutis imprimis observanda est crisis. Facies turgida & subtumida morbi longitudinem pronunciat, & secundum signa coctionis subindè citius vel tardius finitur.

Hæc Febres acutæ continuæ vel à natura curantur, vel arte, & terminantur perfecte vel ad sanitatem, aut mortem, vel imperfectè. Prior curatio, & quidem perfecta, fit, quando aut per crisi subitam, aut successivam convalescunt ægri, de quo supra: sin minus, in invalescente quotidie febre, agrypnia, deliria, convulsiones, &c. superveniunt, hinc mors ultimam ducit lineam. Fit autem crisis, quando natura secernit ab inutilibus inutilia, & præparat ad excretionem. Versatur enim crisis in terminis cruditatis & coctionis; siquidem nulla crisis salutaria, nisi peracta coctione, speranda est. Natura noxia illa inquam mentia, sive separata, sive separanda, fermenti rationem habentia, per varia loca expellit: Hinc ulcusculis circa labia & nates erumpentibus febres desinunt; quia ad nasum plures venæ & arteriæ visum effugientes abeunt: & quia



Et quia labia pœciliati sui gēheris raro & spongioso parenchymate constant, & vel sola epidetmide, vel haud densa cute investita, per quæ fermentum febrile facillè expelli potest. KERGERUS de Fermentatione pag. 239. plura habet, unde omnia remittunt Accidentia, & nihil restat præter aliqualem virium debilitatem. Interdum per crisi fermentum febrile ad ambitum corporis protruditur, & febre desinente scabies excitatur, quæ propterea etiam, si ad interiora recurrat, recidivam parit.

Si verò imperfecta fuerit, observatum est, ut docet FERNELIUS libro de Febris cap. 10., Tertianam diuturnam atque Quartanam in atrocem cruciatum colico immaniore desinere, qui nonnunquam & in articulo dolorum, & in paralyin facessat. Atque hic dolor tamen consueti accessus temporis ferè exacuatur, pristinumque circuitum retinet.

Observavit & BARTHOLINUS Cens. 3. Hist. Anat. 50. pag. 100. dolores ventriculi & nauseam post febrem per vices solitis paroxysmi diebus, solitæque febris horæ, multo amplius febrili calore infestare, quos abstergentibus Medicinis, iusculis citatis & acetosis præparavit. Fit hoc, quando abusu nimio Præcipitantium seu Absorbentium fixorum suppressitur impetus fermentativus humorum & spirituum febrilis, unde natura fermentum febrile non ex toto corpore evacuato valet, sed fixato in tantum acido morbofo, imperfecta crisi ad intestina vel ventriculum transponit, vid. supra pag. 146. & recidiva ut plurimum periculosior denuò insurgit, & febris acuta in lentam, hecticæ similem, mutatur.

Dum per crisi finitur, in nostro climate quidem rariùs, in locis autem calidioribus, Gallia & Italia, ordinariò per hæmorrhagiam narium criticam, rariùs per sanguinis evacuationem per alia loca, solvitur: interdum etiam sudore critico, interdum alvi fluxu critico, interdum urina excretionem, terminari solent. Exemplum sudoris critici post febrem talem ardentem notatu dignum habet HILDANUS C. 6 Observat. 77. de quodam viro robusto curâ ardentissima & continua febre confectante, qui septimo die in sudorem aded flavum incidit, ac si croco tinctus esset, & quidem copiosissimum, ut contorta subueula aqua ubertim extillaret, & lintamina omnia croceo colore inficeret. Exemplum verò critique per hæmorrhagiam singulare habet ZACUTUS LUSITANUS Lib. 1. Prax. Admir. Observat. 86. de Febre ardente ingenti per sanguinis copiosum fluxum ex venula gingivæ inferioris cutatam, & criticè solutam.

Hæmorrhagia ut plurimum fit per nares; hic autem facta fuit per radices dentium: non fecus atque Lib. 3. Prax. Admir. Observ. 110. observat hæmorrhagiam criticam per porum iuxta radicem pollicis pedis dexteri, in interna parte spontè apertum. Quin & idem ZACUTUS LUSITANUS crisi Febris ardentis per sputum sanguinis observat. l. 8. Prax. Hist. cap. 6. Observ. 4.

Curiosum est, quod refert PLATERUS l. 1. cap. 86., dum delirans in febre ardente uxorem per vim comprimit, moxque extinguitur; Uxor verò mox quoque eodem modo correpta à febre quidem sanata est, mens tamen nunquam ferè constitit.

Aphorismus HIPPOCRATIS 62. Sect. 4. non semper est verus: Vid. HORSTIUS lib. 1. Observ. 20., ubi lèterus salutaris quartâ die in continua febre obvenit.

Hæmorrhagiam narium subindè præcedere solet tinnitus aurium: in sanguinis nempe turgescencia febrili ex motu vehementiore arterioforum, & sanguine in locis vicinis stagnante, & aurem interiorem movente.

Signa locorum, per quæ contingit crisis, videbitis in Institutionibus: interim verum est Effatum HELMONTII de Tempore No. 53. pag. 309., Medicum debere negligere crisi, quia prævenire sc. melius sit. Verissimum hoc est, qui potest prævenire universalioribus & subtilioribus remediis, faciat, mox in principio vim causæ occasionalis seu fermenti morbofi evacuando, & naturæ turbatæ impetum sistendo. Verum cum hoc non in omnibus licitum sit, & generolum remedium negotium hoc præsupponat, potius Medicus sit naturæ minister, & expectet crisi, quam ut naturam præpositerè turbet, legitimis remediis illi succurrendo.

## CURA.

In Cura harum Februm acutarum & continuarum periodicarum, si unquam alias, Medicus si naturæ minister: cum enim depuretur massa sanguinea in iisdem, adeoque fiat sanguinis febrilis turgescencia, ob materiz ejusdem heterogeneæ, ipsiusque naturæ averantis secretionem, ut ejus coctio & hinc crises testantur, manifestum evadit, Indicationes genuinas & veras in eo versari, ut sanguinis præternaturalis fermentatio intra modum naturæ propositum conservetur, et nimirum ratione, ut nec hinc plus æquo gliscat seu intendatur, unde periculosa symptomata inequi solent, nec illinc nimium torpeat seu deficiat, quâ ratione materiz coctio & excretio impediretur, ac facillè lenta chronica febris dubii eventus superveniret, ut rectè loquitur SYDENHAM Tract. Methodus curandi Febres Sect. 1. cap. 4. p. 18.

Cura igitur Februm talium cum à sola fiat natura, hoc saltem Medici est officium, ut illius conatum debet moderetur & adjuvet. Ante omnia ergo

1. Naturæ removendus fomes ex primis viis, qui consistit in scoriis, & chylo viciato & à bile præternaturali corrupto genitis.
2. Corrigena est dyscrasia massæ sanguineæ, unde oritur febrilis orgasmus, temperando & alterando sal volatile acris urinoium plus minus oleosum, vulgò bilem, h. e. fermentum febrile, ejusque acrimoniam plus minus, indeque natam effervescentiam compescendo.
3. Cicutatâ causâ peccante, hæc ipsa simul per convenientes vias, quò vergit natura, evacuanda, inter quas excellit blandus sudor. Nam in omni febre, blanda diaphoretica primariò obinent locum, nisi crisi hoc negotium prævertat, seu nisi naturalis excretio præveniat artificialem.
4. Symptomata in cursu morbi magis magisque urgentia mitiganda.

Primum præstat Venæsectio, & Evacuatio: Secundum verò Natura: Tertium Antimonialia fixa, animalium partes duræ, &c.: Quartum in genere Anodyna, in specie moderatè acida, aliavè appropriata. Hic noceat probè LUDOVICI accuratissima Methodus medendi, nempe in principio, præmisso vel omisso Vomitu, mox volatile aliquod, v. g. Tincturam Bezoardicam, Mixturam simplicem, spiritum cornu cervi, &c. pro circumstantiarum ratione cum Opiatis exhibendo: in statu fixiora Terrea alcalina: in declinatione Cancrina, Corallina, &c. Hac nempe methodo nec crisi negligit Medicus, nec otiose eam expectat. Hanc verò otiose expectant non solum Veteres, quod præmissâ venæsectione aquæ frigida largiore hauustu saltem curare solebant ægros, motum naturæ criticum observando; sed etiam Moderni plures Itali, & Galli præsertim, qui post venæsectionem & clymata solâ tenuissimâ dietâ & largiore pulsanæ exhibitione sanare suos in acuis latagunt sub spe critique: Vid. LANGII Miscell. Curios. pag. 6.

Pro his scopis ritè obtinendis observetur:

I. Cautissimum esse debere Medicum, ne pro Causa, aut alia febre continua simplici, curet præsentem malignam. Fit enim, ut sæpiùs febris maligna in primis diebus formam cauli tantum præ se ferat, & suâ malignitate latitet. Præter vires autem prostratas: pulvis debilis malignam indicat, & frequentissimè sunt complicata. Unde tutius est, adhibere mox in principio simul appropriata alexipharmaca malignitati resistentia. Nam dubitant nonnulli, an deus causus verus sine adjuncta malignitate? Si itaque cerò conter, malignitatis metum adesse nullum, tunc denuò ad ordinariam ac consuetam methodum turò accessus fieri potest. Quamdiu verò, levis licet, superbi malignitatis suspicio, Alexipharmacis aut Bezoardicis dictis simul insistendum erit, quæ uti sunt necessaria in omnibus febris, ita in continuis laudanda.

II. Dum simul propinquantur Alexipharmaca aut Bezoardica, sub horum usu minime æger in principio ad sudorem cogendus erit, nisi facillè & quasi sponte sequatur. Adenda simul sunt Præcipitantia, & dyscrasiam sanguinis pedetentim emendantia seu corrigentia, talia tamen, quæ corpus ad blandam diaphoretin successivè disponant, antequam perfectus & copiosus proficiatur sudor. Diaphoretis enim, ut in omni febre, ita in specie



in continuis conservanda; sic enim calor & ætus multos, & cephalalgia, vigilia, aliæque symptomata minus defatigare solent ægros; quia sudor tunc temporis sine successu est, & potius vires prosteruntur, dum nempe omnia adhuc sunt cruda, nec quicquam separatim, nisi manifesta ad sine signa malignitatis aut contagii. Insuper ergo sudor elicitur. Ideoque potius tinctura Bezoardica, aut mixtura simplex seu specificum Paracelli in peracutis harum febrium caputistion ordinatum est, quatenus disponit corpus ad aliqualem madorem. Compositum est ex sudoriferis blandis, simul precipitantibus nullis.

Observ. III. In febribus ardentibus, seu continuis imprimis potus concedendus est liberalior; imprimis, quod maior est sitis, & intensior ardor, eo magis indulgendum genti; Recte enim culpant PANAROLLUS, LINDANUS & LANGIUS in *Epistolis Medicis* eos, qui ægris febrilibus omni serè potu interdicerent. Observetur hoc saltem: melius esse, ut frequentius & parcius bibant, quam ut una vice multum ingurgitent. Prius enim successivè alterat, simulque madorem continuè conservat: posterus verò totum stomachum nimis labefactat. Prostant sane exempla non pauca pulmonum & reliquorum viscerum omnino aridorum & exsiccatorum ex ardore febris ardentis, ob denegatum potum; Vid. PANAROLLUS in *Observ. Pentec. 4. Observat. 8.* Idem alio loco habet *Observationem* febre ardentem mortui, in quo cor tanquam semivivum apparuit. Ergo si urget sitis, liberalior potus concedendus est ægris, talique quem apperunt, & quidem simplex unusque, non modò hic, modò iste; modò non nimia quantitate, nec frigidus ob stomachum ingurgitetur, sed potius tepidus; frigida enim nimis nociva. Interdum enim post nimium potum timor pedum supervenire solet.

In *selektu potus* habenda est ratio effervescentiæ febrilis plus minus temperanda & sedanda, & hinc symptomatum, speciatim circa primas vias urgentium, præsertim alvi plus minus clausæ vel apertæ. Hinc serum lactis bene depuratum, & lacte coctum ad aliqualem gratiam acidularum, potus reverà medicamentosus existit, modò diarrhœa absit, sed potius intensior sitis urgeat: Conferatur PIENS de *Febribus Part. 2. pag. 166.* item SEPTALIUS in *Animadvers. §. 11. pag. 98.* Tandem & consuetudinis ratio simul habenda est. Alias *Aqua fontana* vel *cerevisia secundaria bene pura* cum dimidia *vini tenuioris*, aut quinta vel sexta parte *vini Rhenani* mista, addendo mensuræ unæ succi citri Noj. succi cydoniorum vel ribium q. l. ad gratiam saporis, & *Gelatina cornu cervi* super igne dissol. 3j. & autè febricitantibus gratissimum potum suggerit. *Idem* enim, imprimis his in febribus, in Potu conveniunt, tam *mineralia*, in ætu nempe nimio ac cum *Causo*, quam *vegetabilia*, n. ætu nempe moderatiori: Unde RIVERTIUS *Centur. Observat. 19. Aquæ simplicis 3j. addit. pir. sulphuris 3j. xx.* pro potu ordinatio. *Decoctio bordei* sub nomine *psiana* plures utuntur; quod minus approb. cum cruditates stomachi flatulentis, ejulque atoniam inferat.

Observ. IV. In principio & cursu febrium ardentium, ubi alvus obstructa est, vel non satis libera, conveniunt imprimis *Chysmata*, aut, loco horum, tamarindorum decocta aut infusa: Verum illa saltem lenientia ac blanda, & quæ alvum tantummodò laxant, scortis recrepentes ex interstitionis naturæ eliminant, eamque continuè fluidam servant; idque præsertim in duobus in casibus:

1. Si urgent symptomata præcordiorum & abdominis: item si orgasmus humorum ad caput ferri quodammodò videtur.

2. Si nimia æstus & ebullitio sit sanguinis, tunc commotissime applicatur *Enemata*. Confer. SYDENHAM *Secl. 1. cap. 4. p. 27. & 29.* Quibus & addatur principium morbi præcept, in quo antè ventriculionem clymate alvus eluenda venit: c. g.

R. Flor. cham. m. j.

Herb. card. bened.

Viola. an. m. j.

Rad. gentian.

Enula an. 3vj.

Coqu. in f. q. aquæ.

Calatur. 3viii. add.

Elect. lenitiv. 3j.

Nutri ammoniaci 3j.

M. f. *Enema alterans & emolliens*:

D. S.

*Enema laxativum.*

Vel

R. Herb. chamom. cum for.

Card. bened.

Salv.

Ruta an. m. j.

Rad. enula.

Levis. an. 3vj.

Bacc. junip. 3j.

Sal tartari 3ss.

Coqu. in f. q. aquæ: colat. 3viii. add.

Elect. biera cum agar. 3j.

Mell. rosat. 3j.

Liqu. corn. cerpi succin. 3ss.

M. f. *Chysma revellens*:

D. S.

*Enema revellens.*

Alvus verò, ubi succederet quotidie officio suo, nullo modo irriganda venit.

Observ. V. Vomitoria non adeò necessaria sunt, atque in febribus intermittens: nihilominus tamen ubi in principio & in incremento morbi nausea urget, aut inanis vomendi conatus adest, saporè amaricans aut similes ru- Aus adfuit, ut vel ex bilis regurgitatione in stomachum, aut recementorum nidolorum in eodem collectione, lithothymia aut cardilagia immincant, vel anxietates præcordiorum, ipsi ignes exinde accedant, conveniens sanè est, vomitorio in principio aut incremento, hæc impedimenta remove, nisi vel diarrhœam, vel gravissima symptomata in cursu morbi experiri velimus: exempligratiâ, in febris initio, propinato vomitorio, mitigantur horrenda illa symptomata, quæ ex humorum in ventriculo locisque vicinis illuvie ortum ducunt; imò verò & fortassis in ipsis quoque incunabulis opprimuntur morbus, qui alias cum ægri periculo incretceat & chronicus fiet, & sic simul remedia postmodum usurpanda eo melius operari possunt. Observa- vi ipse sæpius, quod ex usu vomitoriorum ægri non adeò gravibus symptomatibus consticti fuerunt. Quod si serò accessit jam incrementum morbi, adit, nihilominus cætera ubi responderint, ac speciatim si vires a morbo nondum attrita fuerint, etiam in incremento vomitorium propriari potest: Confer. hic accuratus & elegans SYDENHAM in *Methodo curandi febres pag. 3. & 23. sequen.* Idque eo magis, si certè constet, febrem esse vel benignam; tunc sanè, si illa indicantia supra indicata adfuerint, vel eam esse malignam, sed ex contagio extrinsecus hausto stomachum infestante, non tumidus, nec humidus hic sit Ad- diendus; in talibus enim vomitu præmisso, sanè omnia symptomata toto morbi decursu sunt mitiora. Observanda tamen sunt vires plus minus robustæ; item vomitoria non sunt nimis valida, sed blandiora & in dosi minori, id est corpus nimium commoveamus: in talibus enim ægris facile multum & vehementer solent evacuare, flui horibus & motibilibus corporis existentibus contentis, secus ac in intermittens, in quibus, præsertim contumacioribus, validiora subinde usurpanda veniunt Vomitoria. Observatum tamen etiam fuit, quod in ægris, quos aliæ Vomitoria non moverunt, illi in febribus talibus impetuosissime sunt purgati. E. g.

R. Croc. metall. absinth. gr. viij.

Infund. per noctem in *Vini Rhenani* q. l. mane filtratur, & pro dosi 3j. audentur

Syr. p. cin. am. 3j.

M. D. S.

*Vinum emeticum pro una vice.*

R. Oxyacch. emic. Angel. Sale 3ij. vel 3ss.

Aqu. mentha 3ss.

M. S.

*Poriungula emetica pro una vice.*

R. Taria i emet. Myrsibay gum. ij.

Scamm. sulphur. gr. j.

Sacch. alb. m. vi.

M. f. Pulvis: S.

*Pulvis emeticus pro una vice.*

Vir vegetus & sanus, *Barbutor*, tenerioris licet constitutionis, in convivio vel periculo genio plus debui indulgerat, Baccho in specie litans; unde post noctem inquietam manè voluit copioso & aliquot secessibus se exonerabat. Die abhinc terribis iracundiæ gravissimæ affligebatur, unde aliquot diebus interfectis languorem & lassitudinem artuum ipsam percipiebat cum aliqua siti, donec aliquando sub medio noctis post mediocrem horrorem gravi ætillu



est cum cephalalgia intensâ corripere, jungantur vires prostratae, latis clamorâ, inquietudines cum pulsu frequenti, celeri, magno, molli & vehementi. Urina intense tincta emissâ successivè per totum turbida, crassa, & copiosis contentis ubique saturata conspiciebatur. Circa meridiem vocatus febrim continuam adentem benignam judicabam, idèd præscripsi:

℞. Aqu. rub. laei,  
Alofa an. ℥ss.  
Antimon. diaph. ℥j.  
Syrup. papav. ℥j.  
Spir. nitri an. c. q. l.  
Muc.

De qua Mixtura capiebat cochlearim pto lubitu.

Si in principio primo vocatus fuisset, sine deliberatione max vomitorium dedissem. Verum, quia æger hic vehementior constitit, quâ sub diebus ante invasionem morbi vomitum non naturalem passus fuerat, hærebam, nè ex vomitorio propinato aut hypercathartes sequeretur, cum sine violentia non operentur, aut ægrum, si cum vomitorio tentare vellem, viribus jamdum satis attritis lipothy-mia corripere, imprimis, cum urina jam turbida appa-ruerit, adeoque morbus non in principio, sed in incremen-to sit, quæ sane distulant Vomitorium usum. Post-quam autem ita ægro die solis propinandam jussuram Mi-sturam jam dictam, vespere ejusdem diei rediens ægrum in pristino statu offendebar, sed magis anxium, cum flu-ctuationis sensu circa præcordia, conquerentem simul, quoties de Mistura sumebat, se sentire æstuationem inli-gnem totius corporis, præsertim capitis. Deliberabam ergo, an vomitorium conveniret? cum hujus vsum urge-rent instituendum:

1. Aeri anxietas & inquietudo, quæ præcordia affecta indicabant, adeoque, si vomitus omitteretur, metus sit, ne symptomata dicta exasperentur.
2. Fluctuationis sensus, quem æger percipiebat in præ-cordiis; quod signum est, ut præter loqui amant, anoriplam humorum instare.
3. Exæstuatione circa præcordia, quam eger, quoties de Mistura præscripta caperet, pati dicebat, quæ indi-cium est, spiritum nitri dulcem cum contentis pelina-tum viatum effervescente.

Hæc ergo Permittentia & dissuadentia vomitum dum oc-currebant, mecum deliberabam, an vomitorium conve-niret? Tandem neglectis dissuadentibus lene Vomito-rium præscripsi ex tartari emetici gr. ij., unde æger vom-itiones crebras incidebat cum copiosissimis alvi dejectioni-bus, revera cholericis pathematis, superveniente tumida virium prostratione, extremitatum refrigeratione, & sudore circa frontem syncopico. His ita perseverantibus, cum æger non posset surgere præ languore, tantillum vini exhi-bere, quietumque simul in lecto manere eundem, ut ex-trema incalescerent, imò naribus admoveere vinum jussi, in hujus odore recideretur. Dehinc præscripsi:

℞. Aquæ menthae,  
Rubi Idæi an. ℥ss.  
Cinnam. 3vj.  
Spir. thiatric. campbor. 3iij.  
Succ. cydon. 3j.  
Essent. ambre. 3ss.  
Muc.

Hæc mixtura successivè ab ægro assumptâ vomitus & se-cessus sedavit, eumque quietum reddidit.

Externè simul stomachum inungi curabam Theriacâ, vel rosâ, vel in vino dissolutâ. Post mediam verò no-ctem præscripsi:

℞. Ebor. sine igne,  
Antimonii diaph. an. 3j.  
Benzoin. solar. gr. xv.  
Laud. opiat. gr. iij.  
M. f. Pulvis pro 3. dosibus.

Primam dosim post mediam noctem cepit, secundâ manè, & tertiam vespere. Ita atrociora symptomata ex voto eva-nuerunt.

Observat. VI. Purgantia, quæ talia, imprimis propriè dicta, seu quæ abusive Eradicativa vocant, plurimum nociva sunt in febribus continuis ardentibus, nec nisi in declinatione morbi conveniunt, coctâ scilicet prout mate-ria, & sedari maximâ ex parte ebullitione febrili.

Sed tunc serè est superflua & inanis, cum materia cocta per urinas & sudores eliminari soleat. Quod si non fiat,

aliqualis & repetita blandior purgatio, & quæ stimulando falsam motum naturæ provocat, locum habet. In princi-pio harum febrium est si ultranea; movent quidem seu tur-bant nimium corporis contenta, sed non tunc promovere nociva, crudis a. huc omnibus existentibus, ac vires nimium protellunt: In progressu verò morbi est serè nociva, aut saltem inutilis dielise ex causis: Siquid tamen movendum vi-deatur, in principio secundum HIPPOCRATEM moven-dum.

Observanda tamen hic est Animadversio SEPTALII lib. 5. §. 4. pag. 98. Uti in continua tertiana respectu sui, aut materiae illam facientis, nunquam ab initio ante coctionem me-dicamento purgante evacuandum est; ita, cum quandoque bilis acris ad ventriculum transfundatur & mordens, gravissima inferens pericula, & sagè mortem, potissimum, si æger ad vomendum naturâ ineptus fuerit: Illa ut præveniamus re-spectu symptomatis, cum syrupo rosato solutio & sero lactis, vel solo, vel cui tamarindi incocti, purgare licebit, &c. Ut enim in cursu morbi purgantia omnia sunt omittenda, toto tamen morbi decursu eo lubidè simul respiciendum est, ut alvus blandè servetur aperta, & quidem imprimis, ubi æstus & cephalalgia urgent, quæ sub alvo clausa magis intendi solent: idque eo tutius fieri solet, quando nulla adeit sus-picio malignitatis. Nam in febribus malignis, imprimis cum excretionem cutanea, variolis, morbillis &c. junctis, cautissimi sumus in alvo aperienda. Intempestiva enim purgatio ante materiae coctionem instituta, magna incon-moda vehit: vel enim finem supini non assequuntur Pur-gantia, nihilque aut parum viscosorum humorum educunt, atque ita saltem eos agitant, turbant, confundunt (reverà fermentant,) unde ex materia mora & non evacuata in pri-mis vjis hærente, tormina, animi deliquia, vertigines, & alia symptomata oriri solent; vel si medicamentum fortius fuerit, corpus liquefact, vires debilitat, ut natura postea facillius succumbat, & morbum vel planè non, vel non nisi longiore tempore vincat. Neque Purgantia neque vomito-ria febrilem fermentationem tollunt.

Pro scopo igitur alvum apertam servandi convenit impru-mis serum lactis, aut simplex, aut cui juxta SEPTA-LIUM l. a. Tamarindorum 3j. vel 3ss. infusa fuerit. Quod si verò in principio harum febrium blandè purgare aut primas vias abstergere animus sit, tunc vel solutior, vel cum passulis, v. g.

℞. Crem. tartari,  
Pulv. Rhabarb. an. 3j.  
Scamm. præp. gr. j.  
M. f. Pulvis: S.  
Pulvis laxativus:

Capiatur in vehiculo manè.

Vel

℞. Pulp. tamarind. 3ij.  
Pulv. rhabarb. 3j.  
Scamm. præp. gr. ij. vel iij.  
M. f. Bolus: S.  
Electuarium laxativum pro  
una vice.

Vel

℞. Tartari vitriolati gr. viij. ad xv.  
Scamm. sulphurati vel rosati gr. ij. vel iij.  
(ad vj.)

M. S.

Pulvis aperiens.

Item Infusum blandum ex solis fennæ cum rhabarbato in principio harum febrium, ubi non nimis celeriter moven-tur, tunc concedi potest: c. g.

℞. Rhabarb. opt. 3ss.  
Fol. fenn. sine stip. 3j.  
Infund. in sero lactis per noctem;  
manè blande ebulliat: Colatura adde  
Syrup. rosat. solut. 3ij.  
M. D. S.  
Potio laxativa pro una vice.

Observat. VII. Injecto vel omisso clistere, conve-nit interdum in primo principio Venæsectio: dico in principio, eoque primo, quando nempe ea necessaria videtur (non enim semper necessarium est) idque saltem, ubi urget aut movendum est æstus in robustis, nimia-que turgescencia contentorum corporis, ut in corpore juvenili,



juvenili; plethorici; generosiori victu utentibus, aut in affuetis, aut quibus suppressa est solennis quædam evacuationio: in talibus commodè vena incidì potest: Conf. SYDENHAM *Section. 1. cap. 4. pag. 19.* Nam si est febris, quæ venæsectionem postulat, ea sanè est febris acuta continua: propterea quando in his observatur pulsus major, aut potius maximus, unde periculum est, ne ex nimia sanguinis rarefactione vasa distenta ac repleta libentorem sanguinis impendant motum, venæsectio mox in principio primo instituenda erit, præmissio vel neglecto, uti dixi, clystere, quocunque diei tempore. Nempe rectè hic loquitur LINDANUS: *Venæsectio eam ob causam instituitur, ne calor immodicè exardescat. Vi igitur frangitur illo æstus, & circuitus sanguinis liberior fiat, opus est Venæsectione, mane, sive vespere. Adultis equidem religio est, alio tempore mittere sanguinem, quam matutino: Verum occasio est præcepti, & quandoque graviter peccant, qui hoc observant: accidit enim sæpe, ut sanguis mittatur, cum in furore maximo est febris, cum tamen venæsectio fieri non debeat, nisi in meliore tempore morbi, & remissione calore febrili. Nam, ut rectè CELSUS monet lib. 2. cap. 10. In ipso furore sanguis non est mittendus, & qui hoc mittit, idem facit, ac si iugulari hominem. Qui itaque matutinum præcisè observant tempus, sæpe in hunc errorem incidunt. Ergo dies non oportet numerare, sed in principio primo aut tempore huic proximo, sanguis mittendus, modo hoc observetur, ut in remissione fiat febris tempore. Si vero jam tertia aut quarta dies fuerit, ex qua æger decubuit, aut ægrotaverit, periculosum est, secare venam, idque eo magis, si suspicio malignitatis subsit, utpote in quibus etiam in primo principio venæsectio administrari non potest, nisi summa urgente necessitate.*

Præmissa venæsectione Vomitoria instituuntur. Quæritur: qualis prior sit? an venæsectio? an purgatio per superiora? Præmittitur venæsectio, ut exinanitis vasis sub conatu vomendi præcaveatur hæmorrhagia; si hoc non potest fieri, sufficiunt vomitoria. Quantitas sanguinis mittendi secundum conditionem subjecti ac impetum febris determinanda venit. Interdum in incremento, aut etiam in statu februm continuarum benignarum, urgente prunellâ & linguz ac faucium affectibus, subindè consultum est, ut vomæ raninæ sub lingua secentur, quæ si largiter fluant, & sanguis exsiliat quasi, faustum solet esse signum; sin verò saltim stillet, aut pedetentim effluat, ominosum. Aliàs ubi hæc & suprà dictæ circumstantiæ non adsunt, tunc intermitte potest, cum febres ardentes continuæ etiam sine venæsectione optime curari possint. Ipse GALENUS monet, cavendum, ne dum febrem jugulare conamur, ægrum simul jugulemus, quod tribus Medicis evenisse scribit libro de Curandi ratione per venæsectionem cap. 12., quibus non opinantibus, pro animi deliquio, mors obrepit. Et cur laticem illum pretiosissimum studio exantlemus, qui à febre heu nimium! depascitur, ut planè per febrem absumptum fuisse in venis per observationem constat. Refert IOHANNES ARGENTERIUS in Galenum lib. de Febribus ad Glaucon. cap. 2., in cuiusdam febre extincti cadavere ne guttam quidem sanguinis in venis fuisse repertam: ANDREAS SPIGELIUS de Semiterstiana lib. 1. cap. 13. in quodam febre extincto venas majores circa hepar sanguine vacuas repertas fuisse; & ibidem cap. 16. venam cavam & arteriam magnam sic vacuum fuisse sanguine, ut non opus fuerit filo venam cavam & portæ truncum, dum extenteretur, intercipere. Præterea ex Observationibus constat, quod crebra sanguinis missiones homines febribus aptiores reddant: Vid. WILLISIVS de Febribus cap. 9. pag. 175. Item cap. 11. pag. 197. Id ipsum autem observare debuisset WILLISIVS, ut ipse in febribus venæsectionem non adhibuisset. Testantur liquidem ipsius Observationes & Curationes febrium, parum congruè fermentationi superstructæ, post venæsectionem semper ægros deterius habuisse, etsi in initio aliquid contulisse videretur. Itaque ego cum ejusmodi sanionibus & sanguifugis non facio, qui vitæ thesaurum tam inutiliter abligantur, cum præsertim in his septentrionalibus oris homines tam frequentem atque largam venæsectionem non ferant, & alia præsentiora jucundiora atque tutiora remedia in promptu sint. In principio saltem vel venam secare, aut etiam Laxativo primas vias stimulare, concessum esse dixi; minus vero in progressu morbi; id quod erudito discipulo pluribus deducit BALLONIUS in Bonetti Phar. Medicorum pag. 172., ubi ostendit: ob vehementiam morbi, & symptomata in ejus

Estmüller. Oper. Tom. II.

progressu ad remedia, venæsectionem & purgationem, non statim propeandum esse. Rectè: Alterantia enim & blanda Diaphoretica saltem conducunt, & quæ symptomata urgentia mitigant.

Observat. VIII. *Diaphoresis* uti in omni febre, ita in specie in continuis conservanda libera; sic enim calor & æstus mitior, cephalalgia aliaque symptomata nimis gravia esse solent. Minus tamen ad sudorem cogendi sunt ægri, præsertim in principio aut in incremento; quia tunc temporis, cum adhuc omnia sunt cruda, sine successu & euphoria debilitantur. Conveniunt autem imprimis Diaphoretica salina, sal cardui benedicti, absinthii &c., item terra, terra sigillata, corallia præparata, antimonium diaphoreticum, Bezoardicum Minerale, Coram Cervi sine igne, pulvis diaphoreticus Ludovici: Sic KERGERUS de Fermentatione Sect. 3. cap. 3. pag. 351. temper Diaphoreticis solet neccere Præcipitantia, quæ fermentum febrile corrigunt. Minus conveniunt volatilia subtilia sulphurea & aromatica vel resinosa, quia hæc nimis incendere solent.

Quod de Venæsectionis præsidio dictum, idem etiam de cucurbitulis & hæmorrhoidibus intelligendum: vid. KERGERUS l. 4. pag. 241.

Observat. IX. *Vitus* in febribus ardentibus sit tennis, interdum paucus aut nullus: & cum appetitus iterè semper sit prostratus, minus ad victum cogendi sunt ægri, licet tribus vel 4. diebus nihil comederint. Inter alias rationes, ob quas febres continuæ fiunt chronice, vel ob quas hæc recidivant, aut quod curatæ tandem in intermittentes tertianas degenerant, est etiam hæc causa, quando ægri nimis cibantur, vel in cursu, vel in declinatione: nam alimenta assumpta defectu fermenti digestivi à calore febrili in stomacho putrescunt potius, nec debite digeruntur, & ita malum exasperant: imprimis alimenta magis nutritiva aggravant, ac lædunt stomachum. Melius ergo est, ut per aliquot dies jejunent ægri; facile enim hoc ipsum ferunt: hinc etiam rectè notat WILLISIVS *Traçtatu de Febribus*, quod sæpius ex liberiore victu in reconvalescentibus à talibus febribus recidiva inducatur; scilicet ex carniū & alimenterum evchymorum ubertiore ingestione ægri in febrem relabuntur. Cum enim viscera sint debilia, & alimenta nisi tenuia, non facile digerantur; cumque sanguinis crasis sit imbecillior, ut succum nutritivum assimiles, si alterutri quid disproportionatum offatur, iterum naturæ œconomia pervertitur, & omnia pessum eunt; quicquid enim non rectè digeritur, in scorias facessit febres. Quare à carnibus convalescentes diu abstineant, easque demum comedant, quando urina fuerit sanorum similissima. Optimus est ergo hac in parte HELMONTIUS, qui in *Traçtatu de Vitis Ratione* egregie decidit hanc controversiam, & inquit: *Mala agros meos sanos, quam obesos reddere.*

Observat. X. *Opium*, *Opiata* & *Papaverina*, uti polychrestia in multis morbis sunt; ita in febribus ardentibus continuis sunt optima, & nunquam omittenda: sed urgentibus symptomatibus sedulo & quidem cautèdanda. Observetur tamen in eorum exhibitione tempus legitimum, & usus legitimus. Tempus est, ut propinentur Opiata non in principio, quando tantummodo incipit morbus; multo minus in statu, quando imminet quædam crisis aut morbi solutio; utrobique enim naturæ sic impediretur motus: sed propinentur Opiata in incremento morbi; quia non tantummodo calor febrilis ipse insigniter demulcetur, quolibet symptomata redduntur mitiora, sed etiam calorem febrilem ipsum insigniter demulcent somnum inducendo, deliria & convulsionem præcavent, & hinc diaphoresin promovendo optima sunt. Nam turgescentes humores placant & sopiunt, & hinc, ut coctio causæ morbosæ melius promoveatur, per accidens juvant, & spiritus blandè figendo absorptionem & dissipationem eorum nonnihil præcavent. Hinc rectè dicit LINDANUS: *Si organismus adsit humorem, ac humor peccans surgeat seu immaniùs effervescat, tunc syrupus papaverinus optime convenit ad 3j. cum aliis exhibitus; mobilissimus enim & blandus est, convenitque in specie in febre, imprimis ardente, si cum cantillo nitri mixtus fuerit. In febribus sanè ardentibus motus furibundus optime sedatur laudano opiato cum cantillo nitri; sed non debemus eo abuti, sed recto tempore adhibere, nempe si spiritus animalis furibundus sit. Deinde in exhibendis opiatibus non debemus expectare, donec spiritus planè*

S

absu-



absumpti sint, & vires consequenter nimis profusae; sed in tempore usurpanda, dum vires adhuc constant. Conf. WILLISIIUS de Febribus cap. 10. pag. 127. In rebus nempe desperatis ad Opiata non est refugiendum: v. g. imitari possumus POTERIUM & LINDANUM, qui aliquot caulis laborantes cum dolore ventriculi curantur hac mixtura:

R. Aqu. acetos. vel scabiosa 3vj.

Succi limon. 3ss.

Spec. dia-Morx. fr. 3j.

Syrup. papav. nigr. unc. j.

M. f. Potio.

Quae ipsis elegantissimos praestitit effectus: Vid. POTERIUS Cent. 2. cap. 50.

Vel imitemur SYDENHAM, ad tumultum ab Emetico concitatum sopiendum sub noctem vel horâ totius blandum anodynum propinantem: e. g.

R. Aqu. Papav. nigr. unc. ij.

Adiab.

Syrup. de mecon. an. 3ij.

Papav. alb. unc. ss.

M. f. Haustus:

ut habet cit. loc. pag. 25.

Propinanda autem semper opiata cum debitis appropriatis mista, tam in benignis quam malignis, aut appropriatis alterantibus, aut appropriatis alexipharmacis, prout necessitas requisiverit, sic feliciter operantur; nunquam verò solitaria.

Observat. XI. Vesicatoria, quando & quomodo in febribus his acutis applicanda, dum caput & genus nervosum nimis affliguntur? infra, ubi de febribus malignis, exponetur.

Remedia ergo, quae in his febribus continuis Ardentibus conveniunt, praeter Vomitoria & Laxativa jam dicta, praecipue sunt alterantia, eaque vel ipsum affectum ejusque causam occasionalem materialem respiciunt, vel symptomata primaria. Illa sunt nitrum & quaecunque nitrata remedia, imprimis nitrum antimoniatum, & nitrum vitriolatum seu arcanum duplicatum Mynsichtii: item cum nitro fixato mineralium sulphura, in specie antimonialia, v. g. antimonium diaphoreticum, tam simplex quam compositum, aut Martiale Ludovici, aut Joviale Poterii, seu hujus Antihelicticum, Bezoardicum minerale simplex, hinc Joviale, Martiale, & cinnabaris antimonii. Sulphura mineralium per se sunt egregia in talibus febribus, multo magis metallica per nitrum fixata; nitrata enim, & cum eo parata remedia fixa, figunt talismodi volatile aere peccans, indeque natum organum, & similiter temperant omnem acrimoniam lixiviam; & ubi talis hoc oleosus fuerit, oleositatem ejus coërent, simulque blandè per urinam, & hinc per sudorem evacuant. Hinc absorbentia Animalia, hisque cognata Terrea, v. g. cornu cervi sine igne, hujusque gelatina cujusvis aeris temperativa, ebur sine igne, maxilla lucii piscis, unicornu verum crudum & sine igne, lapilli cancrorum, corallia preparata, aut horum cum succo citri magisteria, unicornu fossile, terra sigillata, &c. Hæc temper cum diaphoreticis & alexipharmacis necesse suadet pro fermenti febrilis præcipitatione KERGERUS Tract. de fermentatione pag. 251. sect. 3. cap. 3. Quia & salia volatilia animalium illis ipsis committeri & moderatâ dosi subinde addi possunt; hinc enim sal volatile cornu cervi, & liquor cornu cervi succinatus, subinde cum aliis fructuosè usurpantur. Hisce ex Vegetabilibus Refrigerantia, & Hepatica vulgò dicta itidem accensenda, v. g. cichorium, taraxacum, lactuca, & omnia umbellacea, plantago, acetosa, acetosella, portulaca fumaria, flores colarum, acaciz, borraginis, buglossæ, &c. Ex quibus & similibus parata Decocta repetuntur promiscue in Practicorum Veterum & recentiorum scriptis, e. g. PLATERO, & SYLVII Praxi. 1. cap. 29. item PIENS de Febribus par. 2. c. 2. & 3. &c. Quod etiam pertinent remedia blandè pingua, seu temperata oleosa, vegetabilia, ut semina frigida majora dicta, exque his parata Emulsiones, quæ oleosa sua vi talismodi nimis acce blandè temperant, & corrigunt, adeoque effervescentiam acriorem plus minus siliunt.

Remedia, quæ symptomata magis respiciunt, sunt imprimis omnia blanda acida, æstus, sitis, oris squalorem, virium diminutionem &c. mitigantia. Talia vel ex vegetabili regno sumuntur, adeoque mistiora; vel ex minerali, adeoque acriora existunt: Illa in æstu minus urgere; Hæc ubi intensior æstus, nec subiecto patientis aliusque circumstantis proportionatus adest, magis locum habent. Illa enim facilius in salum temperatum diureticum in nobis al-

teramus; hæc & contra fixioris naturæ, & quasi firmioris texturæ, minus alterabilia sunt, quæ cum acida potentiora bilem & ejus acidum volatile acere præcipitant & corrigunt, adeoque humores nimis effervescentes figunt, & inde natas æstuationes aliaque pathemata mitigant.

Inter acida mineralia præferuntur spectatim spiritus mineralium acidi, tam simplices, primariò sulphuris, hinc vitrioli, salis, nitri, præ cæteris & cum dictis spiritibus, aut spiritu vitrioli volatili parata mixtura simplex seu Tinctura Bezoardica: quam compositi, chysii alias appellati, per retortam ex sulphure, nitro & antimonio & similibus parati; sic sunt spiritus acidi volatiles admodum egregii; & Tinctura vegetabilium cum phlegmate vitrioli, spiritu proprio acidulato, Tinctura bellidis, rosar., violar., cyani, aquilegiæ &c. Viuipentur talia acida mineralium in Julepis, ut & Misturis alterantibus. Tinctura instillantur potui ordinario ad 50. vel 60. guttas pro dimidia mensura.

Cæterum spiritibus istis acidis puris præferuntur meritis spiritus hi ipsi mediante spiritu Vini dulcificati, quia magis sunt temperati, & ita œconomiz nostræ animali magis affines. Nam hæc suprema lex sit Praxeos, quam etiam SYLVIIUS urget, ut semper temperatis instilamus, duplici ex ratione:

1. Quia omnes corporis nostri succi naturaliter sunt temperati.
2. Quia remedia intemperata, & nimis graduata nimiam ac subitanam inferunt naturæ mutationem, quæ nunquam est bona.

Propterea ego præfero spiritus dulcificatos seu temperatos ipsi spiritibus crudis acidis; sic enim minus alterant corpus, & minores dant turbas; & certum est, quod potentius æstum febrilem temperent, quam si crudi propinentur. Hinc spiritus salis dulcis, item spiritus nitri dulcis, præstant usu interno, cum aliis misti, his ipsis spiritibus crudis.

Ex omnibus illis spirituum sulphuris, hinc spiritum nitri dulcem, eligerem; Spiritus vitrioli propter ramenta metallica non semper est tutus. Ex vegetabili regno conveniunt fructus, imprimis succulenti, sapore acido & austero se manifestantes, v. g. citrus, qui præmatum obtinet & malignitati resistit, ejusque succus expressus; item succus ribium, berberum & cydoniorum, imprimis in fluxibus alvi nimis, robur idæi, granatorum & similes alii. Addatur etiam acetosa & acetosella, quarum succum expressum suavissimum præfero syrupis cum saccharo paratis, quia sunt fermentescibiles. Præ cæteris commendabiles sunt hi ipsi per spontaneam residentiam, post sulphurationem secundum HELMONTIUM depurati, & in loco frigido asservati. Tamarindi quoque hic optimè conveniunt, quia sapore acidulo simul alterant, & æstum leniunt, quatenus sal volatile oleosum destrunt, & præterea alvum obstrictam blandissimè laxant: hinc etiam ZACVTVS LVSITANVS in febribus syncopalibus seu cum hypothyms conjunctis insigniter commendat tamarindos in aqua simplici decoctos, cum tales febres syncopales egregiè leniant. Præter hæc etiam succus temperavi majoris, item ex portulaca & plantagine parata remedia commendantur.

Ex his variæ sunt formulæ; præter usum enim Tinctura Bezoardica seu Mixtura simplicis in principio morbi, ubi subest metus malignitatis, à guttis 30. vel 40. vel etiam 50. ad 3j. propinata pro constitutione ægri, ubi adhuc subest metus malignitatis, conveniunt Juleps aut Mistura acidulæ: v. g.

R. Decoct. corn. Cervi simpl. vel cum rad. scorz.

(habitu ratione circumstantiarum) ℞ ℥j.

Succ. citri rec. unc. ij.

Syrup. flor. nymph.

Papav. alb. (est egregius in his febribus) an. 3vj.

Spiritus nitri dulc. vel spiritus salis dulcis q. l. pro grato sapore.

M. f. Juleps. D. S.

Juleps refrigerans & alterans.

Hauriatur de hoc pro libitu.

R. Decoct. corn. cervi ℞j. vel ℞jss.

Succi cydon. unc. ij.

Syrup. papav. alb. unc. j.

Rub. idæi unc. ss.

Spiritus nitri dulc. patum.

M. D. S.

Juleps refrigerans & confortans.

R. Dr-



**R. Decoct. Corn. Cervi cum rad. scorz. ℞i.**  
*Tinct. flor. rosar.*  
*Violar. an. 3j.*  
*Syr. acetos.*  
*Flor. nymph. an. 3j. ad 3ij.*  
*Spir. sulphuris parum.*  
*M. D. S.*  
*Iulepus refrigerans.*

**R. Decoct. Corn. Cervi cum rad. scorz. ℞i.**  
*Succi berb.*  
*Ribium an. 3ij.*  
*Tinct. flor. rosar.*  
*Violar. an. 3j.*  
*Syrup. acetos. citri 3ij.*  
*Spir. sulph. vel vitrioli q. l. pro gratia aciditate.*  
*M. D. S.*  
*Iulepus refrigerans & corroborans.*

**R. Decoct. corn. cervi ℞i.**  
*Alteram. us. 3iv.*  
*(vel huius loco gelatinæ Cor. Cervi. 3j. ad 3ij.)*  
*Syrup. Ceras. nigror.*  
*Ribium an. 3ij.*  
*Spir. Vitrioli q. l. pro gratia sapore.*  
*M. D. S.*  
*Iulepus alterans & confortans.*

**R. Decoct. cornu cervi cum rad. scorz. ℞i.**  
*Citri Myrsichtii. 3iv.*  
*Syrup. cerasor. nigror.*  
*Rubi Idæi an. 3j.*  
*Spir. nitri dulc. q. l.*  
*M. D. S.*  
*Iulepus refrigerans & corroborans.*

**R. Decocti Cornu Cervi. ℞i.**  
*Tinctura flor. bellid. 3ij.*  
*Syrup. rubi Idæi 3j.*  
*M. D. S.*  
*Iulepus confortans.*

Decoctum hordei alii præscribunt: sed minus probor  
 quia est potius crudus, qui ut plurimum subinde excitat in-  
 flationes stomachi: idcirco præfero huic vel aquam simplicem,  
 vel Decoctum radices scorzonæ; Talia enim minus sunt  
 cruda, & convenientiora.

**R. Aqua font. q. pl.**  
*Vini parum*  
*Succi cydonior. q. l. pro gratia acore:*  
*M. D. S.*  
*Hauftus corroborans.*  
*Vel*

**R. Aqua font. ℞i.**  
*Syrup. papav. alb. 3vj. ad 3j.*  
*Rubi Idæi 3ij.*  
*Spir. nitri dulc. vel Tinctura violar. 3j. ad 3ij.*  
*M. D. S.*  
*Iulepus refrigerans & corroborans.*  
*Vel*

**R. Aqua Font. ℞i.**  
*Succi cerasor. compos. Ladovici vel alius succi*  
*appropr. 3ij. ad 3iv.*  
*Syrup. rubi Idæi q. l.*  
*M. S.*  
*Iulepus refrigerans & confortans.*

**R. Aqu. font. ℞i.**  
*Syrup. flor. papav. errat. vel Violar. vel*  
*scach. albi q. l.*  
*Spir. vitrioli 3j. ad 3ij.*  
*M. D. S.*  
*Iulepus refrigerans.*

**R. Aqu. acetos.**  
*Scabios. vel taraxaci,*  
*Flor. papav. errat.*  
*Succi berb.*  
*Cydon. an. 3j.*  
*Tinctura flor. bellid. 3ij.*  
*Syrup. acet. citr. 3j.*  
*M. S.*

*Mixtura refrigerans & corroborans pro aliquot*  
*vicibus.*

**R. Aqu. borrag.**  
*Bugloss.*  
*Rubi Idæi an. unc. j.*  
*Cinnam. 3ij.*  
*Estmüller. Oper. Tom. II.*

*Succi citri ros. 3vj. ad 3ij.*  
*Confect. alcherm. 3ij.*  
*Syrup. rub. Idæi 3j.*  
*M. S.*

*Mixtura confortativa pro aliquot vicibus post*  
*sudorem.*

*Vel in forma Electuarii:*

**R. Conf. acetosell.**  
*Pulpa citri an. 3ij.*  
*Flor. tunc. 3j.*  
*Rob ribium 3vj.*  
*Conf. alchermes 3ij.*  
*Cum f. q. Syr. acetos. citri vel*  
*Rubida i. Electuarium.*  
*D. S.*

*Electuarium confortativum.*

Convenit etiam Decoctum herba & radicis acetosa elo-  
 rantis coloris & saporis grati, cui additur vel succus aceto-  
 sa expressus & asservatus, vel succus ribium sulphuratus, &  
 syrupus rubi idæi vel violar. q. l. pro gratia & sapore ægri.  
 exempla dedi supra, ubi de suis.

Extemporanea etiam Tinctura fieri possunt instar Iule-  
 porum saporis elegantissimi, quæ egregie profunt, ut  
 plurimum sudore blando, sine molestia tamen, ægro con-  
 venientes.

**R. Flor. bellid.**  
*Rosar.*

*Tunic. an. m. ℞.*

Infund. in aqu. commun. acidulata spiritum sulphuris per camp.  
 stent in loco tepido ad extractionem tincturæ:

*Colatura mens. 3j. adde*  
*Syrup. rosar. vel rubi idæi, vel viol. q. l.*  
*M. pro Iulepo egregia. S.*  
*Iulepus refrigerans.*

**R. Flor. aquilegia, vel cyani, vel papav. errat. vel**  
*rosar. vel violar. (quocunque volueris: nam omnes flo-*  
*res carulei assuto spiritu acido dant Tincturam rubi-*  
*scandam) 3j.*

*Spiritus sulphur. per campan. vel vitrioli q. l. pro grato*  
*acore.*

Infund. in 3j. ℞. ad 3ij. *Decocti corn. cervi, vel radices*  
*scorzonæ, vel Kariovitrioli sulphurei acidi in vase vitreo*  
*benè clauso:*

Siet ad aliquot horas, donec eliciatur Tinctura elegana,  
 cui transcolata adde

*Aqua rosar. 3ij.*  
*Cinnam. 3j.*  
*Syrup. rubi Idæi vel violar. vel*  
*jusubim. 3ij. vel 1ij.*  
*M. S.*  
*Iulepus refrigerans.*

*Virperur pro potu ordinatio.*  
*Vel*

**R. Flor. bellid.**  
*Papav. errat.*

*Rosar. an. p. ij.*

Irrorati cum f. q. spiritus sulphuris vel vitrioli Infund. in  
*Decocti cornu cervi, vel loco huius in aqua flor. papav. er-*  
*rat. scabiosa, taraxaci, &c. ℞i.*

Sient in loco calido, donec extracta Tinctura, cui filtra-  
 ta adde

*Syrup. rubi Idæi*  
*De jusub. an. 3ij.*  
*M. S. Iulepus refrigerans.*

**R. Flor. papav. errat. m. j.**  
*Violar. m. ℞.*

Irrorati cum f. q. spiritus sulphuris vel vitrioli, inf. in  
*aqua flor. papav. ℞i.*

Sient in loco calido per horas aliquot:  
*Colatura adde*

*Syrup. flor. papav. errat.*  
*Rubi idæi an. 3ij.*  
*M. D. S.*  
*Iulepus refrigerans.*

Loco spiritus sulphuris & vitrioli succi vegetabiles aci-  
 di asservati possunt.

*Vel*

**R. Pom. citri in talem. incis. No. ij. vel 1ij.**  
*Macerentur in aqua feruida ℞i.*  
*adde*

*Flor. papav. errat. m. j.*



Ebulliant leniter: *Colat. adde*

*Pleofacch. citri 3j.*

*Syrupi extotocitro 3j. ad 3jss.*

*M. pro Iulebo.*

Veletiam ipse tinctura, v.g. flor. bellidis, rosar., papav. errat., aut etiam spiritus acidi dulcificati, instillantur potui ordinario, sive sit cerevisia, quam tamen propter amarorem respuunt, sive sit cerevisia tenuis, *Kovens* vel *Kauerling*, quæ ipsi sunt gratiores: v.g.

*R. Tinctura flor. bellid. 3ij.*

*Aquileg.*

*Violar. an. 3j.*

*M. S.*

*Tinctura refrigerans: 30. vel 60 guttas in libram unam potus ordinariis.*

Et ipsi spiritus dulcificati præscribuntur hoc modo:

*R. Spirit. nitri vel Salis dulc. 3ss.*

*S. Spiritus pro potu ordinario 30. vel 60 guttas in libram unam.*

*Vel*

*R. Spirit. Sal. dulc. 3jss.*

*Tinctura flor. aquileg.*

*Bellid.*

*Violar. an. 3j.*

*M. D. S.*

*Tinctura refrigerans pro potu ordinario: 60. usque 80. guttas in libram unam.*

Interdum loco Iuleporum propinatur Decoctum tamarindorum, vel solum in aqua communi, vel, quod blandius abstergit, in sero lactis: v.g.

*R. Tamarind. vel pulpa eorundem 3j. ij. ad lij.*

*Coqu. in f. q. Aqua comm. vel seri lactis depur.*

*Colatura 3 viij. ss. ad 3j. ss. vel 3j. adde*

*Succ. citri 3vj. vel 3j.*

*Tinctura flor. bellid. 3ij. vel 3ijj.*

*Syrupi acetos. citri vel rubi Idai 3jss. vel q. l.*

*M. S.*

*Iulepus alterans, & laxans.*

*Capiatur pro lubitu.*

*Vel*

*R. Decoct. tamarind. cum pass. 3jss. vel 3ix. ad 3j.*

*Syrupi acetos. citri vel rubi Idai 3j.*

*Spir. nitri dulc. parum.*

*M. S.*

*Iulepus aperiens & alterans.*

*R. Decoct. tamarindorum cum pass. 3j.*

*Syrupi granat. acid.*

*Ribium an. 3jss.*

*Spir. nitri dulc. q. l.*

*M. D. S.*

*Iulepus alterans & laxans.*

Facit hæc elegans Tinctura rosarum Zuelferi, quam parat cum sero lactis acidulato cum pulpa tamarindorum, quæ blandè laxat: vel Insulum florum cum tamarindis supra in febre ephemera præscriptum.

Ipsam certè serum lactis est potus admodum conveniens in Febribus, imprimis, si melioris depurationis gratiā aciduletur cum succo citri vel Tinctura similiter appropriata; insigniter enim compescit æstum, & alvum blandè servat aperiam, ratione salis nitrosi volatilil, quod in se continet.

*Vel*

*R. Seri lactis 3ij.*

*Succ. citric. 3ij.*

*Fl. bellid.*

*Papav. errat. an. M. jss.*

*Ebulliant vase clauso, donec serum lactis tingatur.*

*Colatura adde*

*Sacchari parum, aut loco florum tingentium aliquot unelas syruporum florum papaveris erratici & rubi Idai.*

*D. S.*

*Iulepus alterans & aperiens.*

*R. Flor. papav. errat.*

*Rosar. an. M. ss.*

*Infund. in seri lactis depur. cum spiritu sulphuris leniter acidul. 3jss.*

*Stent in loco calido ad Tincturæ extractionem:*

*Colatura adde*

*Syrupi de jujubis 3ij.*

*Violar. 3j.*

*M. pro Iulebo.*

*S. Iulepus alterans.*

Iuxta dicta in his febribus optimè conveniunt ulterius fixata nitrata, vel cum nitro fixata mineralia, & metallica, effervescentiam massæ sanguineæ optimè compescuntia, & sal volatile biliosum peccans corrigentia, & fignentia, impetando plus minus sudorem, prout minor vel major urget malignitas, aut etiam prout intensior vel remissior erit effervescentia febrilis. Vltimissimum est v.g. nitrum præparatum, seu beneficio lixivii acris de puratum, quæ præparatio optima est; vel nitrum antimoniatum. Prodest ergo arcanum duplicatum Mynsichtii vel nitrum vitriolarum, & spiritus nitri dulcis. Nil magis æstum febrilem compescere potest, quam nitrum ipsum solum de puratum: *superat hanc laudem*, inquit *POTERIVS*, & *nihil magis desiderat*. Sumitur in Decocto scorzonere, & ita sub forma potus ordinarii propinatur. Loco nitri solummodo de purati usitatum aliàs est nitrum cum sulphore communi fixatum, seu sal prunellæ dictum, quod nihil valet: optimum est antimoniatum, i. e. nitrum compositum fixatum cum sulphure antimonii, id quod fit in præparatione antimonii diaphoretici vel antihæctici Poterii. Nam in tali nitro præparato adest adhuc subtilissima pars sulphuris antimonii, aded ut ratione hujus simul corpus ad blandam diaphoresin disponat, & simul sal corrigat vitiosum. Propinatur ad 3j. in aqua quadam destillata, vel decocto quodam, vel potu ordinario, & assumitur ejus 3ss. spatio 24. horarum. Verum sub forma pulveris propinatur cum Antihæctico Poterii, & multi ulus est, cum quo ego aliquoties felicissimo cum successu præscripsi, modo ablit laxior alvi constitutio. Pertinet hæc Antimonium diaphoreticum, Bezoardicum minerale, tam simplicia, quam composita, cum nitro fixata, maxime antimonium diaphoreticum Martiale, antihæcticum Poterii tunc præparatum, coloris albi (cæruleum enim nil valet) & Bezoardicum Ioviale, si per se destilletur cum Mercurio sublimato butyrum Ioviale, quod figuratur cum spiritu nitri (vid. *SCHROEDERUS*, & *ZWELFERVS*) est egregium, & loco antihæctici potest substitui; Bezoardicum Saturninum, Cornu Cervi sine igne, & omnia supra laudata absorbentia animalia terrea, quæ absorbendo nonnihil, & ad diaphoresin disponendo corpus, auctam effervescentiam corrigunt: e.g.

*R. Aqu. rubi Idai 3ij.*

*Rad. scorzon.*

*Succ. cydon. rec. an. 3j.*

*Bezoard. Iovial. 3j.*

*Syrupi papav. albi, vel rubi Idai 3j.*

*Spiritus nitri dulc. q. l.*

*M. D. S.*

*Mixtura alterans, cochleatim sumenda.*

*Capiatur cochleatim pro lubitu, ut & febrem temperet, & simul corpus ad blandum sudorem disponat.*

*R. Aqu. rubi Idai 3jss.*

*Taraxac. 3j.*

*Antimonii diaphor. 3ss ad 3j.*

*Syrupi ribium vel rubi Idai 3vj.*

*ad 3j.*

*Spiritus Nitri dulc. 3j. ad 3jss.*

*vel q. l.*

*Misce. S.*

*Mixtura alterans.*

*Vel ad imitationem POTERII Cent. 2. c. 49.*

*R. Aqu. acetos. 3jss.*

*Antimonii diaphor. 3ss.*

*Succi citri,*

*Syrupi papav. nigri an. 3j.*

*M. pro potuuncula, aliquot vicibus assumenda: S.*

*Potiuuncula præcipitans, cochleatim sumenda.*

*R. Aqu. Taraxaci 3iv.*

*Tinctura flor. bellid. 3jss. 3ijj.*

*Corn. Cervi sine igne 3ss.*

*Antihæct. Poterii 3j.*

*Syrupi flor. papav. errat. vel simpl. 3j.*

*M. D. S.*

*Mixtura alterans.*

*R. Aqu. rubi Idai 3ij.*

*Spir. theriac. camphor. 3ijj.*

*Antimonii diaphor. 3ss.*

*Bezoard. Iovial. 3ss.*

*Syrupi papav. simpl. vel rubi Idai 3j.*

*Spir. nitri dulc. q. l.*

*M. l. Po*



M. f. *Potis pro una vel duabus dosibus haurienda, & repetitis vicibus, pro lubitu tamen.*

D. S.

*Mixtura alterans.*

*Æger se disponat ad aliqualem madorem, ut compescatur ætus, & faciliè sistentur febres.*

℞. *Aqu. flor. acac.*

*Sambuci,*

*Taraxac. an. ʒi.*

*Gelatina cornu Cervi ʒi. M ʒiʒ.*

*Cornu Cervi sine igne ʒi.*

*Antibell. Poterii.*

*Antimonii diaphoret. an. gr. xij.*

*Syrupi papav. simpl. ʒvi.*

M. D. S.

*Mixtura alterans, & corroborans.*

℞. *Aqu. scorzonera,*

*Taraxac. an. ʒiʒ.*

*Mixt. simpl. ʒi.*

*Elect. diascord. Fracastorii ʒiʒ.*

*Corn. Cerv. sine igne ʒʒ.*

*Antibell. Poterii ʒi.*

*Syrupi ex toto citro ʒiij. vel ʒʒ.*

M. D. S.

*Mixtura alterans, coctilem sumenda.*

℞. *Aqu. scorzonera,*

*Flor. sambuci an. ʒij.*

*Antimon. diaphor. ʒij.*

*Bezoard. mineral. ʒi.*

*Syrupi papav. alb. ʒi.*

*Spir. nitri dulc. q. s.*

M. pro 3. dosibus vel coctilem. S.

*Mixtura sudorifera pro aliquot vicibus.*

℞. *Aqu. fumar. vel Flor. sambuci ʒiij.*

*Corn. Cerv. sine igne ʒij.*

*Bezoard. min. ʒi. ad ʒʒ.*

*Extracti theriacal. gr. vi.*

*Syrupi cort. aurant. ʒiij.*

M. pro 3. dosibus.

M. D. S.

*Mixtura sudorifera pro aliquot vicibus.*

In forma sicca nitrata præscribi possunt:

℞. *Nitri antimon. vel Nitri depur. ʒi. ʒʒ. ad ʒij.*

*Antibell. Poterii, vel Antimonii diaph. simpl.*

*vel Martial. ʒi. ad ʒʒ.*

*Laudani opiat. gr. i. vel ij.*

M. S.

*Pulvis corroborans & refrigerans vespertinus.*

Detur pro 2. dosibus in vehiculo, convenienter, imprimis tempore vespertino. Vel

℞. *Nitri antimoniat. ʒi.*

*Cornu Cervi sine igne,*

*Antibell. Poterii vel Antimonii diaph. an. ʒʒ.*

M. f. Pulvis. S.

*Pulvis refrigerans, & confortans.*

Cui in suspitione malignitatis, aut imminente delirio camphora gr. ij. addi possunt. Vel

℞. *Corn. Cervi sine igne ʒʒ.*

*Nitri antimoniat. ʒi.*

*Antimonii diaphor. ʒʒ. vel gr. xij.*

*Camphor. gr. ij. vel gr. iv.*

M. f. Pulvis.

Div. in 2. partes æqu.

D. S.

*Pulvis refrigerans, & corroborans.*

Tempore vespertino loco camphoræ præscribo *Laudani opiat. gr. ij. vel ij. ad iv.* Detur in vehiculo conveniente, aut quocunque. Blandè movet sudorem, & egregiè compescit æstum.

℞. *Nitri depur. gr. xv.*

*Antibell. Poterii ʒʒ.*

*Sacch. Saturni gr. v.*

M. f. Pulvis: S.

*Pulvis refrigerans.*

℞. *Nitri depur. gr. xv.*

*Antibell. Poterii,*

*Antimonii diaphor. an. gr. v.*

*Camph.*

*Laud. opiat. an. gr. j.*

M. f. Pulvis: S.

*Pulvis refrigerans, & corroborans vespertinus.*

*Eschmüller. Oper. Tom. II.*

℞. *Arcani dupl. gr. xv.*

*Antimonii diaphor. ʒʒ.*

M. pro dosi. S.

*Pulvis refrigerans, & confortans.*

*Pulvis hic ita compolitus interdum nonnihil laxare solet.* Vel

℞. *Arcani dupl. gr. xij.*

*Lapill. Cancr. præp.*

*Ebor. sine igne an. ʒʒ.*

M. f. Pulvis: S.

*Pulvis refrigerans & confortans.*

℞. *C. C. sine igne, vel pulv. Bezoard. Lador. (gr. xv.)*

*Bezoard. loy. vel mineral. ʒʒ.*

*Camph. gr. j. vel ij.*

M. f. Pulvis: S.

*Pulvis diaphoreticus alterans.*

℞. *Ebor. sine igne,*

*Antibell. Poterii an. ʒʒ. ad gr. xv.*

M. D. S.

*Pulvis præcipitans,*

℞. *Terra sigillata,*

*Bezoard. mineral. an. gr. xv.*

*Camphor. gr. ij.*

M. f. Pulvis. S.

*Pulvis Bezoardicus sudoriferus.*

℞. *Vnicorn. fossil.*

*Ebor. sine igne,*

*Cinnab. antimon. an. gr. viij.*

M. D. S.

*Pulvis alterans.*

℞. *Vnicorn. foss.*

*Corn. Cerv. sine igne an. gr. xij.*

*Bezoard. mineral. scrup. ʒ.*

M. D. S.

*Pulvis sudoriferus alterans.*

℞. *Pulv. Bezoard. ʒi.*

*Antimonii diaph. vel Bezoard. min. vel cinn. antimonii ʒʒ. vel gr. xij.*

*Camphor. gr. ij. vel iij.*

M. f. Pulvis. S.

*Pulvis Bezoardicus diaphoreticus.*

℞. *Corn. Cerv. sine igne gr. xij. xv. ad scrup. ʒ.*

*Antimonii diaphor. scrup. ʒ. ad gr. xij.*

*Sal. volat. Corn. Cerv. gr. iv. vel v. vel vj.*

M. D. S.

*Pulvis Bezoardicus sudoriferus.*

℞. *Cornu Cerv. sine igne gr. xv. vel scrup. ʒ.*

*Antimonii diaphor. vel Bezoard. min. scrup. ʒ.*

*Sal. volat. Corn. Cerv. gr. iv. vel v. vel vj.*

*Camphor. gr. ij. vel laud. opiat. gr. j.*

M. f. Pulvis. S.

*Pulvis diaphoreticus.*

℞. *Antimonii diaphor. Martial. scrup. ij.*

*Bezoard. mincr. gr. xv.*

*Laud. opiat. ferm. gr. ij.*

M. f. Pulvis.

Div. in 2. parti. æqu. S.

*Pulvis sudoriferus.*

Quorum unus capiat tempore vespertino, alter post

mediam noctem.

Nitrum etiam depuratum, aut nitrum antimoniatum pulverisatum dissolvatur in potu ordinatio, na, ut iuxta LIN-DANUM ejus ʒʒ. hoc modo intra diem naturalem commotè propinari possit. Pertinet huc sudoriferum maximum *Fabri*, quod nobile est remedium, item *Jupiter diaphoreticus Beguini*, cinnabaris antimonii, & dulcedo aluminis saccharata, scilicet alumen fixum, à quo nempe phlegma toties cohobatur, donec non amplius exurgat, sed omnia fixa manent: ut habetur arcanum ad omnes febres, etiam hecticas, ita similiter egregium est figens in febribus continuè ardentibus: Vid. POTERIUS in l. 2. Pharmacop. Spagy. cap. 2. Clartorem verò & meliorem descriptionem habet antiquus Chymicus DARIOTII in *Thesaur. suo Chymico* cap. 24. pag. 245.

Juxta dicta, ubi ipsum sal biliohum peccaverit simul nimis acrimoniam, conveniunt subinde Emulsiones, paratæ ex levinibus temperatis oleosis cum remediis fixis, quæ blandè temperant & obtrundunt acrimoniam illius salis peccantis: sunt ordinariæ ex seminibus fragilibus, aut majoribus, aut minoribus; item ex hordeo ad crepaturam cocto, ex amygdalis dulcibus: v. g.



R. Sem. q. frigid. mai. 3℥.

Papav. alb.

Amygd. dulc. ana 3ij.

Cum l. q. Aquæ rosar. f. Emulsio:

cui adde

Ess. opii 3℥.

M. S.

Emulsio temperans.

R. Sem. papav. alb. 3j.

q. frigid. mai. ana 3j.

Cum l. q. Aquæ galæg. vel nymphææ, vel rubi Idæi & Aquæ sempervivi mai. (pro qualibet 3j. seminum unc. j. liquoris assumitur, uti notum est) fiat Emulsio: cui pro circumstantiarum ratione adde

Nitr. antimoniat. scrup. j. vel 3℥.

Antib. Petrii vel Antimonii diaph. vel Bezoard. min. 3℥. vel 3ij.

(vel Antimonii diaph. & Aneib. Petrii ana gr. xv. 3j. ad 3℥.) edulcoretur parum cum rosul. Manus Christi perlat.

D. S.

Emulsio refrigerans & confortans pro aliquot vitiis.

Vel

R. Sem. papav. alb. 3. ij.

q. Frig. mai. ana 3j℥.

Cum l. q. Aquæ flor. papav. errat. f. Emulsio:

adde

Ebor. sine igne scrup. ij.

Antimonii diaphor. scrup. j.

Sacchari parum.

M. D. S.

Emulsio refrigerans & confortans.

Capiatur subindè cochlearim pro i. a. vel 3. dosibus.

R. Amygd. dulc. 3j.

Sem. papav. alb. 3j. vel 3j.

q. frigid. mai. ana 3j.

Cum Aquæ acetos. vel endiv. f. Emulsio:

adde

Antimonii diaphor.

Bezoard. minor. ana 3j. ad 3℥.

M. D. S.

Vi antea.

Edulcoretur parum.

Cochlearim usurpetur.

Non tamen crebrius aut copiosius prescribantur hæc Emulsiones, quia stomachum nonnihil pessundant, ejusdem tonum laedunt, appetitum destruant, & ita crebriore usu nocivæ evadunt.

Hæc quoad Interna sufficiant.

Externè pro symptomatum aliquali mitigatione, imprimis pro compescendo æstu febrili, & ad præcavenda deliria, ac vigilias, dolores, coma vigil, plantis pedum, & volis manuum applicandum est cataplasma ex fermento pistorio, cum aceto & sale imprægnato; vel, quod melius est, Cataplasma D. MICHAELIS:

R. Fol. rutæ rec. m. vel liij.

Radic. raph. incis. No. ij. vel liij.

Salis m. j.

Fermenti acerrim. m. vel unc. ij.

Aceti vini vel rutæ. q. l.

M. pro Cataplasmate vel Pulmento, plantis pedum nudis, vel volis manuum ita applicando, & si exsiccatum fuerit, repetendo.

Imò solæ radices raphani in taleolas incisæ stomacho pedibusque, sale & aceto probè prius mundatis, applicatæ, insigniter conveniunt: quidam etiam occipiti, applicant: Raphanus enim irritando successivè quasi attrahendo derivare videtur. Pauperiores saltem recipiunt limbum recentem: hunc aceto probè permixtum, nudis pedum plantis applicant. Succus cancerorum fluviatiliū ex canceris vivis contusis recens fortiter expressus, instar cataplasmatum plantis pedum, & volis manuum applicatur, subindè renovando, egregiè conduct. ad temperandum æstum: Imò instar epithematis fronti circumligatus seu applicatus egregiè convenit ad cephalalgiam tollendam, & inde imminentes vigilias contumaces, item ad præcavendum delirium. In canceris enim fluviatilibus multa latent, tam in febribus ardentibus, quam etiam in usu chirurgico.

Sæpius dictum fuit, quod etiam dentur Febres deliræ, propter delirium præsens ita dictæ: in tali delirio, ut & agrypnia & cephalalgia, præter blanda anodyna aut opiata, cum aliis appropriatis cautè & circumspiciè usurpata, ve-

narum raninarum apertio subindè proficua existit: ac sanè in morbo dicto Hungarico seu febre calironsi, earum sectio, & ratione junctæ prunellæ, & ratione capitis pathematum, summè proficua existit. Quarum loco & tali in symptomate imminente, aut gravius urgente, cætera si respondeant, vena frontis sectio à quibusdam institui solet. Forsan, ubi sub agrypniis aut cephalalgis, item frontis astuacionibus, periculum delirii imminet, hirudinum pone aures applicatio non inutilis foret. Alti in febribus ardentibus etiam periculosissimis obandito, sed non in principio, super veniens bonum signum esse solet: propterea, quia ex decubitu aliquot fermenti febrilis, seu, ut aliis loquuntur, materię peccantis ad glandulas parotides cæteræ partes alleviantur. Præter dicta istis in capitis pathematis epithemata non raro fructuose, sed calidè, aut saltem tepidè fronti applicantur. Observandum autem, quod ejusmodi epithemata tempora simul tegere debeant, na, ut ultra arterias ibidem pulsantes pergant. V. g.

R. Aqua anethi vel rosar. vel flor. sambuc. vel verben. 3ij.

Apoplect. 3℥.

Philonis Rom. vel Requ. Nicolai vel

Theriac. 3j.

M. D. S.

Epithema externum.

R. Aqua flor. sambuci

Verbena ana 3j℥.

Spir. theriacal. camphor. 3j℥.

Philon. Roman. 3ij.

M. D. S.

Epithema resolvers circa caput.

R. Aqua chamom.

Flor. sambuciana 3j.

Apoplect. vel cephal. ad extrâ 3ij.

M. D. S.

Epithema externum.

Applicetur cum lineis multiplicibus tepidè fronti & temporibus.

Sed à nimio camphoræ usu in agrypnia abstinendum, quæ aliàs singulare est in deliriis. Vel hujus loco sequens Emulsio, quam aliquoties felicè cum successu præscriptâ, applicari potest:

R. Sem. papav. albi 3ij. vel liij.

Hyosc. 3℥.

Aquæ sperm. ranar. 3ij.

Sempervivi,

Solani,

Hypnotica usq. ana 3j.

F. l. a. Emulsio:

adde

Camphor. gr. vi. vel viij.

M. D. S.

Emulsio externa circa caput.

R. Nucl. persic. 3j. vel liij.

Sem. papav. alb. 3ij.

Aquæ sperm. ran. 3ij.

Semperviv.

Solani ana 3j℥.

F. l. a. Emulsio:

adde

Camphor. gr. viij. vel 3℥.

M. pro Epithemate. S.

Epithema circa caput.

R. Sem. papav. albi 3j.

Aqua menthe,

Verbena ana 3j℥.

F. l. a. Emulsio:

adde

Camphoræ gr. ix. vel xij.

M. S.

Epithema refrigerans.

R. Sem. papav. albi 3ij.

Aquæ sperm. ranar. unc. liij.

F. Emulsio:

adde

Croci scrup. 3℥.

Camph. gr. viij.

M. pro Epithemate.

Cui subindè etiam succus cancer. fluvi. addi potest. D. S.

ut antea.

Dictæ Emulsiones aut Mixturæ solè in forma epithematis



ei applicantur fronti: vel miscetur his ipsis ana succi cancerum fluxuatum recentis expressi, & ita subindè fronti applicentur, sepeque renoventur, & egregiè delirium sistunt: c. g.

R. Aqu. beton.

Fl. papav. errat.

Sambuci an. unc. j.

Succicancer. fluxuat. rec. express. ʒij.

Spir. vin. campb. ʒij.

M. D. S.

Epirobema circa caput.

Vesicametiam aquam rosarum tanquam eximiam commendat PIENS Tract. de Febribus. Item

R. Unguenti alab. str. vel popul.

Somif usitat. ʒ ss.

Ol. express. nuc. mosch. ʒ ss.

Campb. gr. vi.

M. D. S.

Unguentum ad quietem.

R. Unguenti alab. str. ʒij.

Ol. express. nuc. mosch. ʒj.

Pbilon. Romani vel Iberiac. ʒ ss.

M. S.

Unguentum refrigerans cephalicum.

Quin & si impetuosior tactus quasi ad caput meruerit, in specie ubi excretio quæcunque, imprimis cutanea, suppressa, dicta capitis symptomata inferunt, Vesicatoria femoribus vel brachijs applicata, & Enemata actiora, conducere arbitror.

### PRUNELLÆ CURA.

Prunellam quod attinet, quæ non raro adest in his febribus in nimio corporis ardore, seu cum linguae rubedine, ardore & scabritie, hanc optime præcavent & mitigant mucilago seminis psyllii vel cydoniorum, cum Aqua sempervivi majoris extracta, subindè linguae applicata, aut in faucibus deserta: Conf. suprà ea, quæ de his nimia dixi, & M. A. N. C. Ann. 2. Observat. 76. pag. 123.

Vel

R. Sem. cydon.

Malva.

Psylli an. ʒij.

Cumf. q. Aqua sperm. ranar. t. Mucilogo ad ʒ ss. cui adde

Salis ammoniaci ʒj.

Aqu. semperviv. compos. ʒij.

Succicancer. fluxuat. unc. j.

M. D. S.

Mucilogo refrigerans.

De quâ quantum sufficit, in ore subindè detineatur.

R. Mucilag. sem. cydon. cum Aqu. rub. Idæi extr. ʒ ss.

Syrupi portulac. ʒj.

Nitri parum.

M. D. S.

Ut ante.

Detineatur in ore.

R. Aqu. semperviv. mai. unc. ij. vel unc. iij.

Mucilag. sem. cydon. cum sperm. ran. extr. ʒj.

Nitri depur. ʒ.

M. D. S.

Ut ante.

Conveniet etiam inspectum, nisi aliquid obster, matura venarum raninarum sublingua sectio, idque tunc imprimis, quando tumores observantur, & metus est supervenientis & instantis angina: sicut etiam in nimia fluctum inflammatione oris lotiones cum nitro, tantum quam sine gargarisatone, convenienter usurpari possunt, factæ ex plantagine, lactuca, solano, ligustro, portulaca, prunella & similibus, additis post decoctionem succis mororum, berberum, citri, &c. aut similibus: quorum formula sequens præscripta est à SYLVIO l. 1. Prax. cap. 29. §. 86.

R. Fol. prunell.

Sal eis.

Fragor. an. m. j.

Herb. integr. part. j.

Coqu. in l. q. aqua pura:

Colatura ʒij. adde

Syrupi ana-mori unc. j.

Lap. prunell. (vel potius nitri antim.) ʒ ss.

M. l. Gargarisma.

Estmuller. Oper. Tom. II.

Vel

R. Herb. prunell.

Salvia,

Scabios. an. m. j.

Flor. ros. rubr. m. ss.

Cort. nuc. jugland. ʒj.

Coqu. in aqua simpl.

Colatura ʒviij. adde

Succi semper-vivi mai. ʒij.

Rob moror. ʒ ss.

M. D. S.

Gargarisma refrigerans.

R. Herb. prunell. m. j.

Salv. m. j.

Albi Gra. i ʒ ss.

Coqu. in l. q. Aqua:

Colatura ʒij. adde

Spir. vin.

Rob moror. an. unc. ss.

M. ll. ro-ar. ʒj.

M. pro Gargarismo: S.

Gargarisma resolutiv.

Item

R. Herb. prunell. m. ij.

Salv. m. ss.

Flor. malv. arbor. rub. m. j.

Coqu. in l. q. aqua simpl. vel cerovif. secundaria.

Colatura adde

Mellis parum,

Nitri qu. pl.

M. pro Gargarismo: S.

Gargarisma.

Alis palmam præcipere dicunt, si

R. Sem. eruv. mai. confus. q. l.

Succi eiusdem ʒij.

Salis ammoniaci ʒ ss.

Dissolvantur, & ita invicem destillentur.

Qua ipsa aqua fauces eluantur, & humectentur.

Cujus indetector.

R. Aqua sempervivi mai. unc. viij.

Succi eiusd. unc. iv.

Salis ammoniaci ʒj.

M. D. S.

Gargarisma.

Et dicto modo adhibeatur.

Item succus cancerum fluxuatum contusorum expressus perquam egregius in huiusmodi faucium affectibus est nempe

R. Canc. flux. No. vi.

In mortario cum paucis acetorubi Idæi confusi leniter exprimantur:

adde

Succi sedi mai. unc. iij.

Rob nucum unc. j.

Nitri ammoniaci ʒj.

M. D. S.

Gargarisma refrigerans.

Et hoc ipso liquore sicanda lingua.

Vel

R. Aqua semperviv. mai. ʒ ss.

Succi cancer. flux. rec. ʒ v.

Salis ammoniaci depur. ʒ ss.

M. D. S.

Ut ante.

Colligitur hoc crebrius os, aut gargarisatur, aut tepidè in ore detinetur. Vel

R. Aqua cancer. flux. ʒij.

Sperm. ran. ʒj.

Semperviv. mai. ʒj.

Pbologm. vitriol. roidi ʒ ss. vel ʒij.

Syrupi viol. ʒj.

Rosar. rubr. ʒ ss.

Nitri cum alcali depur. ʒ ss. ad ʒj.

M. D. S.

Ut ante.

Notetur: nitri vel salis aurum. simplicis loco esse quoque potest sal ammoniacale, quod vid. in Collegio Chym. & Ludoviciano.

Alioquin observavi in morbis malignis, dum fauces sunt sicæ & aridæ, sine crustæ pituitosæ præsentia, optimum fuisse remedium ʒ ss aquæ communis mell c mm. cochl. j. vel ij. Spiritus vini Rhenani rectificati ʒj. vel ʒ ss. Multa usurpentur pro oris collutione.



Si post tales oris collutiones in graviore malo mox lingua denuo arefcit, tūc nil melius est:

*R. Frustum lardi non saliti, vel si salitum fuerit, in aqua spermatis ranarum macerati: hujus frustulum unum imponatur linguae, & ita aliquandiu detineatur, emollitur exinde lingua, & interdum crusta quasi coriacea separatur.*

Loco frustuli lardi contra talem linguam febriem alia pinguis, v. g. *butyrum non salitum*, itidem commodè usurpari possunt. Vel

*R. Rapas: concinde; inde vasi ligneo, impone grave pondus: liquorem expressum instar syrupi coque.*

### FEBRIUM CONTINUARUM PERIODICARUM CURA.

Hæc ipsa remedia & methodus promiscuè tam in febribus continuis, quam continuis periodicis, usurpari possunt, nisi quod in his ad exacerbationum vicissitudinem magis respiciendum sit, adeoque tempore ingruentis paroxysmi modò dictis, imprimis antimonialibus fixis, simul ratione complicatae febri intermittentis præmissis præmittendis libidine adjungenda sunt absorbentia illa & alterantia, supra laudata, in specie *Corallia, lapilli cancerorum, antisepticum Poterii*, sal cardui benedicti: item nitrum variolatum Myrsichum, quod solum ante paroxysmum in periodicis est egregium. Imprimis conducunt Mixture ex subcontrariis paratae, i. e. ex acidis & terreis, quorum formulæ extant supra, conservando corpus in diaphoresi blanda, alvumque liberam retinendo, aliæque pro symptomatum valietate debite præstando.

### SEMITERTIANARUM CURA.

Eadem ferè de Semitertianis aliisque similibus compositis & complicatis variè febribus dicenda veniunt. Sunt autem omnes periculose semitertianæ, & nunc magis nunc minus acutæ, pro varietate nempe complicationis & compositionis variz: unde & cura specialis pro harum varietate varianda; attendendo: an benigna magis, an maligna fuerit eadem? an simpliciter febris composita sit? an verò cum inflammatione partis cujusdam vel nobilioris vel ignobilioris, lentioris vel minus lentis juncta? quò nobilior aut lentior pars inflammata fuerit, eò gravis magis & periculosus erit affectus, & cui altiore ope succurrendum. Lenta itidem, si intermittenti juncta fuerit, pro ratione originis lenta & Prognosis & Cura non nihil modificanda; adeoque ea, quæ de febribus intermittensibus & continuis jam dicta, ea & semitertianis, prout ad unam vel alteram talium prius accedant, accommodanda erunt.

In genere rigorem & horrorem tollunt absorbentia, alcalia, &c. Atque verò eadem diaphoresi & alvi libertate juncta. Si statâ period. recurrant paroxysmi, aut exacerbationem possunt remedia propinari.

Vomitoria in plerisque sunt optima; sicut, si cum inflammatione juncta, diaphoretica & sudorifera; cum lentis verò salia adstringentia, & incidentia, ut sal ammoniacum, arcanum duplicatum, &c.

Vir iuvenis febre intermittente lenta typo Tertianæ duplicata affligebatur, quæ tamen revera hemitertianæ quædam videbatur species: ex iusta dicta, ipso hypochondriaco existente. Paroxysmi omnes affligebant saltem cum æstu, sine ullo horrore vestigio, lentè & pederentem incipiebant cum cephalalgia, hypochondriorum tensione, & dolore abdominis gravativo; æstus erat quoad externum tactum moderatus, pulsus non adeò insigniter frequens, sed interiora eò magis urebantur, cerebrum horebat, lingua in paroxysmo arida & squalida. Biduo ferè jam ægrotaverat; Die ergo Martis:

*R. Corall. rub. præp.*

*Arcan. dupl. an. ℥j.*

*M. pro 2. dosibus.*

Vesperis appetente nocte erat paroxysmus. Die Mercurii ordinabatur pulvis blandè laxativus ex Tartaro vitriolato: vespere denud capiebat unum ex istis pulveribus: hoc die paroxysmus quasi erat duplex, ante & à meridie. Die Jovis:

*R. Arcan. dupl.*

*Nitri antimoniaci,*

*Antisept. Poterii an. ℥j.*

*M. pro 2. dosibus.*

Vesperis erat paroxysmus unus. Die Veneris:

*R. Spirit. nitri dulc. ℥ij.*

Apparebant paroxysmi bini, mane unus, alter vespere; lique factis intensè terminabantur omnes sine sudore. Die Saturni:

*R. Lap. canc. præp. ℥ss.*

*Salis absinth. ℥j.*

*Antimonii diaphor. ℥ss.*

*M. pro 2. dosibus.*

Paroxysmus erat duplex, à meridie, & hinc vespere. Die solis vomitorium propinabatur, quod copiosa & mucilaginosa evacuavit: hac die nullum paroxysmi vestigium apparebat, noctu levis quidam insultus, cum vespere prius accedentes sequentem pulverem:

*R. Salis ammoniaci ℥j.*

*Antisept. Poterii ℥ss.*

*Misc.*

Die Lunæ, cum metuerem hæc die paroxysmum:

*R. Aqua card. bened. ℥ij.*

*Salis ammoniaci ℥j.*

*Salis cent. min. ℥ss.*

*Antisept. Poterii gr. xv.*

*Syrup. cort. aurant. ℥ss.*

*Misc.*

Capiebat subindè cochleatim; quia & lentus, & ferè vagus erat morbi motus.

Redibat paroxysmus circa meridiem ingens, ægro admodum anxio existente, & de gravissimo æstu conquerente.

Post aliquot horas vocatus reperio æstum in partibus externis admodum moderatum, neque etiam possunt respondentem febri adeò anxiosæ, ac de ea conquerebatur æger, ipse nunquam adhuc gravius, & cum tanto ardore, ac tanta cephalalgia laborasse affirmante propterea

*R. Spirit. sal. ammoniac. ℥ij.*

*Dosis gutt. 40. mox, & appetente nocte.*

Primo huiusmodi intra mediam horam internus æstus tepescere, anxietates cessare, quin ad exteriora verso æstu, & sudore facile erumpente, paroxysmi cessatio, nocte in seculum quietis. Continuavit integrè septimanà hunc spiritum, & levis saltem vestigia paroxysmorum circa horam secundam pomeridianam patiebatur, quæ usque spiritus salis ammoniaci insequente sudore intra horam evanescerent. Sed cum hæc quodidie evenirent, utina verò copiosum sedimentum haberet, alvus verò clausa; ob id die totis

*R. Passul. laxat. ℥ss.*

*Tart. vitriolat. ℥ss.*

*Pulv. sacchar. Morismanni gr. v.*

*Misc.*

Capiebat, & hoc die nullus paroxysmus apparebat.

Quoad differentias febrium continuarum supra recensitas:

### CURA CAUSÆ

Nisi singulare requirere, saltem, quod nitro tam sitis quam æstus ratione imprimis conveniat, si in forma sicca in potum dissoluta usurpentur, sive spiritus nitri simplex, aut potius dulcificatus ad guttas 50. in mensura tenuis potionis assurmatur: v. g.

*R. Nitri antimoniaci ℥ij.*

Dissolvatur in mensura vel cerevisiæ vel potus ordinarii, ita ut ℥ss. liceat dare die naturalis, nisi liberior alvus obtineat.

Quod si accidat, ut dato nitro non cum tanto ardore mittatur urina, & liberantius accidat menses, bono animo esto, dicit LINDANUS. Spiritus nitri usurpatur in hæmipis, item in Potionibus, quarum formulas supra dedit.

Vel præterbatur Decoctum quorundam alterans:

*R. Rad. scorzon. ℥j.*

*Liquor. ℥ss.*

*Fol. acerol. m. p.*

*Flor. violar.*

*Rosar. rubr.*

*Borrag. an. p. ij.*

*Modet. m. p. vel ij.*

*Raf. Cor. Cerv. ℥j. ad ℥ss.*

*Passul. min. ℥j.*

*Coqu. in l. q. Aquæ simpl.*

*Colatura ℥ss. aude*

*Spirit. nitr. vel vitrioli q. s. ad*

*aliqualem saporis gratiam.*

*M. D. S.*

*Potio refrigerans, & alterans.*

De hoc æstu subindè capiat incensum, imprimis cum phrenitide juncta.



In hoc passio bonum est remedium laudanum opiarum, si tempestivè & prudenter exhibeatur, omnem caloris vim refrænabit.

## CURA FEBRIS LIPYRIÆ

*Es plurimum periculosa* admodum propter inflammationes erysipeaceas, partes internas occupantes, instituitur per diaphoretica, tam absorbentia quam volatilia alcalia penetrantia & discalientia; quàm medendi rationem infra, ubi de inflammationibus, in specie ubi de Pleuritide, habebimus.

Malignarum febrium curam infra tractabimus.

Quoad

## CURAM FEBRIUM COLLIQUATIVARUM.

In his ad *acre colliquescens* imprimis respiciendum, ut hoc corrigatur: Si enim hoc neglecto excretiones saltem, quæ tantum sunt producta morbosa, respicere, hæcque suppressæ velimus, retentis iisdem mille malis multabitur æger. Ad *acre* autem illud temperandum, viz aliquid convenientius esse videtur, quàm absorbentia, v. g. antimonium diaphoreticum Martiale, terra sigillata, sulphoreum fossile, &c. Quæ eò videbuntur efficaciora, si locutione blandorum acidorum, ut succi ribiani, berberum, ceraforum, citri, cydoniorum, &c. aliqualem quasi austeritatem contraxerint: Hinc enim SYLVIVS spiritum salis dulcem 29. §. 92. laudat. Unde & in excretionem nimia adstringentia, v. g. Tinctura hæræmatis, &c. manè & vesperti ad gutt. 16., vel liquor stypticus ad gutt. 20. adhiberi possunt. Foras & camphora, quodvis *acre temperans*, hic locum habebit. Inter Composita Elixuarium discordii Fracastorii, juncto succo citro propinatum, præ aliis conducibile videtur.

## CAPUT IV.

De

## FEBRIBUS ACUTIS SYMPTOMATICIS.

Sufficiant hæc de Febribus Ardentibus, seu continuis acutis, utque benignis. Pergo ad Febres acutas secundarias, hoc est, quæ non propriam substantiam habent, sed à graviore alicujus partis affectu originem trahunt. Dicuntur alias etiam Symptomaticæ, per quandam similitudinem; quia

1. Ut symptoma morbum sequitur, ita & febres tales alium morbum.
2. Sicut remoto morbo removetur symptoma, ita & hæc febris.

Sunt equidem, qui febres has in comitatas, & symptomaticas strictius dictas, dividunt, ut SENNERTUS de Febribus: illo nomine eas indigitans, quæ inflammationibus partium junguntur; hoc cæteras.

Sed non opus est scrupulum in talibus facere. Sunt autem hæc ipsæ secundarie nunc acutæ, idque crebrius, nunc lentæ, pro affectum quos sequuntur, & partium affectuum conditionibus: dum illi vel graviores vel leviores sunt; hæc verò, nempe partes affectæ, vel sensibiles, vel minus sensibiles; item vel nobiliores, seu quæ magis cum sanguine & spiritibus commercium habent, vel ignobiliores.

Hæc ergo inter symptomaticas se offerunt illæ, quæ vulnera quædam insigniora sequuntur, (Febres vulneraria,) ab acido in vulnere orto, doloris, inflammationis, & hinc etiam febris autore.

Præterea, quæ ex infœcia vulnere conducibilia sunt, interne egregia Mithridatis in Casibus Chirurgicis præchens: v. 8.

R. Aqua hyssopi ℥ij.

Ronic. ℥j.

Spir. iheriac. ℥ij.

Acet. vim. vel simpl. vel destill. ℥ij. ad ℥ss.

Lap. calc. fluo ℥j.

Syrup. card. bened. ℥ij.

M. D. S.

Potio vulneraria dissolvens.

Vel in forma licca:

R. Lap. calc. præp. ℥j.

Extirac. iheriac. gr. ij.

M. D. S.

Pulvis dissolvens.

Quibus etiam pro partium affectuum ratione, vel sym-

ptomatum variorum syndrome, simul alia appropriata addi possunt.

II. Febres, quæ ad sunt inflammationibus gravioribus, occasione acidi vitiosi sanguinem coagulantis, & ad stagnationem, indeque ortam inflammationem disponentis, ex vitiosa cum sale volatili effervescencia in sanguine ut plurimum causantur. Febres hæc nunc sunt acutæ, v. g. in pleuritide, inflammatione hepatis, angina, erysipelate; nunc Lentæ, ut in inflammatione prope fundum mesenterii, &c. Curantur hæc febres simul & eadem ratione, quâ Inflammationes ipsæ, per Attenuantia, Acidum absorbentia, volatilia, alcalia, Diaphoretica &c. de quibus infra suo loco, nempe, ubi de inflammationibus. Hæc ratio hæc etiam laetitia, endivia, serdum lactis, tempervivum, & alia refrigerantia dicta, alcali volatili blandò constantia, quæ phlogoses & incalescentias, ab effervescencia acidi ortas, corrigunt, & ita per accidentem refrigerant.

III. Quæ sanguinem intra corporis cavitates, aut in ipsis solidis partibus, effusum & coagulatum insequi solent, & ex acore, putredinem corruptelam antecedente, oriuntur. Conducunt sanguinem congruatum resolventia, & putredini resistantia, quæ præter misturam supra laudatam sunt Bellis minor, scabiosa, flores hyperici, chæresolium, papaver rhæas, antimonium diaphoreticum, non negligendo simul portiones vulnerarias.

IV. Pertinent hæc Febres istæ, quæ in principio paroxysmorum Arthriticorum usque ad statum ferè observantur: de quibus vid. SYLVIVS l. 1. Præx. cap. 30. §. 36. 110. & 161.

Sed de Febribus Symptomaticis videbitis in specie pluribus agentem SENNERTUM l. 2. de Febribus cap. 16. p. 202. seqq.

## CAPUT V.

DE

## FEBRIBUS LENTIS.

Uxta febres continuas acutas biliosas observantur etiam febres continuæ minus acutæ, plus minus lentæ, ita dictæ, quod continuè quidem affligant ægros, sed tardiore motu sua absolvant tempora, hinc magis diuturnæ, minusque urgentibus stipatæ sint symptomatis, nec ardore adèd intenso seu vehementi molestant, plus tamen minus acri mordaci: idque nunc magis, nunc minus tales, prout variat ægri constitutio. Illæ magis propriè ita dictæ, Germanis sine schmeckende Hitze, & à comite frequentiore, nempe contabescencia corporis, Germ. Febris contabescens, ein schwindend, suchrig Darr-feber, vocantur: Hæc verò minus lentæ, & nonnihil ad acutarum naturam accedentes, graviora ferè symptomata juncta habent, adèdque brevius tempora sua, absque tamen critico motu, successivâ saltem solutione percurrunt, quales continuæ quotidianæ in specie dictæ. Sunt enim lentæ omnes benigne; malignæ autem acutæ esse solent, utur petechiales præ cæteris lentæ esse videantur. De febribus his apud Practicos pauca prostant. Interim à lymphâ imprimis continuè sanguinis intusa orti cum SYLVIO arbitror, quæ vitiosa effervescencia massæ sanguineæ præternaturalem infert, unde & à SYLVIO cap. 29. Lymphaticæ dicuntur: quas inter eminet imprimis Hæctica febris, ex multis causis producta, de qua inferius.

Jam ex Physiologicis præsuppono: lympham, unde communissimè derivantur hæc febres, omnem esse duplicis nature; vel glandularum conglobatarum, quæ continuè massæ sanguineæ per venam axillarem iterum infunditur; vel glandularum conglomeratarum, quæ ductui thoracico, & consequenter & sanguini additur.



## ARTICULUS I.

D E

FEBRIBUS LYMPHATICIS GLANDULARUM  
CONGLOBATARUM.

In specie

D E

## FEBRIBUS CATARRHALIBUS.

**P**Ræteris considerabiles sunt *Febres Catarrhales*, Germ. *Fluss-Fieber*, quæ in principio & incremento catarrhorum, v. g. *coryzae*, *tussis*, *raucedinis*, &c. subinde moleste sunt, dum *lymphæ glandularum*, primariè quidem conglomeratarum, secundariè etiam conglomeratarum, circa caput & pectus constitutum, quacunque ex causa (de qua, ubi de *Catarrhis*) *acrior* & *acidior* ac *salsior*, ac quasi *mucoïtica*, aliove modo vitiosa reddita, copiosius circa dicta loca effunditur, occasionem crebrius suggerente *ambientis aeris inclementia*, aut alio obiecto externo dictas partes irritante.

Talem catarrhalem lymphæ motum comitatur *febris ex alteratione sanguinis à lymphæ irritatione spirituum insuorum*, cum ardore, rodente magis quam magno, molesta, accedentibus simul hinc inde lassitudine, & lacerationibus corporis variis. Lassitudo itidem conturdens & plus minus lassans ex lymphæ derivanda venit, cum lacerationes hæ in artibus non rarè sint, & sequantur ferè semper lymphæ vitiatæ in artibus activitate, & hinc inde stagnationem: ac sanè *lymphæ constitutio ac motus plus minus naturalis*, præsertim glandularum plus minus conglomeratarum, probè observandus venit pluribus in febribus, tam in *intermittentibus*, quam in *continuis*, cum diversis symptomata, lacerationes in specie artuum à paroxysmis subinde urgentes, haud aliunde quam à *lymphæ vitio* oriri videantur, & tunc simul subinde lubesse observatur scorbutus, & inde lymphæ præternaturalis alteratio.

Hæc ipsa lymphæ glandularum conglomeratarum, ubi in glandulis colli ac cerebri acrior, id est, tam salsior, quam in specie acidior, facta fuerit, ibidemque effundatur, tunc subinde capitis dolorem gravativum cum subsequente coryza, raucedine, tussi (quæ omnes sunt vitia lymphæ à tali causa) simileque affectus interit, simulque impræparatè febres Catarrhales dictas, calore non tam vehementi & inuenio, quam mordicante & acri comitatas.

Videbitis de *Febre scorbutica*, ubi de scorbutico agitur.

## C A U S A.

Certum enim est, quod omnes febres catarrhales, tam cum quam sine coryza aut tussi, semper sint ex lymphæ pimis acida. Febres hæ Catarrhales interdum sunt mutissimæ, circa vespertinam autem ordinariè exacerbantur solent; unde etiam tales febres sunt *Febris continua periodica quotidiana Veterum*, quam ipsam etiam FERNELIUS jam suo tempore sub lenit febribus nomine descripsit.

In his febribus lymphaticis lentis ac catarrhalibus, cum capitis perturbatione & dolore gravativo seu gravedine, subinde levis horror & faciliè transiens, sed crebrius repetens, molestus est, (salubris est, ac si frigida perfundantur,) isque imprimis interitum subinde repetit. Pulsus est continuè frequens & celer, vehementià & magnitudine moderatus, sub exacerbatione in dictis conditionibus acutus. Urina excernuntur interitus tinctæ ac rubentes, sed quæ uno alterove die elapso mox crassescunt, hinc conturbantur & flavescunt, videnturque copiosum admodum deponere sedimentum. Lassitudo gravis ac lacerans subinde occupat artus. His subinde conjunctus est calor, sive ardor rodens sive acris, circa vespertinam ingravescentis, ad mediam usque noctem ferè durans, interdum satis intensus, interdum paulò remissior. Post mediam noctem autem successivè denuò remittitur, manèque ægri sunt debiles; durat tamen continuè lentus sed obscurus calor, qui omni vespertina intendi, & insigniter subinde exacerbari solet. Lymphæ enim acidior vitiosè in massa sanguinea effervescit, unde caloris intensio, non tamen semper adeò insignis, & quidem circa vespertinam, quoniam tunc convenientibus nonnihil poris corporis, uberior lymphæ laticisque ferosi impeditur transpiratio, hæc nempe circa ves-

peram ex aeris ob solem occidentem alteratione inducitur, & copia ejus & acrimonia augetur, aut textura seu constitutio ejus plus minus vitatur, unde etiam febris tunc exacerbatio levis usque ad mediam noctem lentitur. Durant ista symptomata sub coryza & tussi gravioribus usque ad statum morbi, dum nempe lymphæ temperari & crassescere incipit, seu, ut vocant, *matéria catarrhalis cocta fieri*, & spissior mucos emungi, & glutinosioris pituitæ expectoratio incipit; acrimonia enim lymphæ si correctæ est, cessat etiam febris.

Quoad causas remotas febrium lentarum, in specie catarrhalium: Illæ sunt, quæ ad affectus catarrhales disponunt. Interdum, sed rariùs, febres hæ catarrhales, ac ipsi catarrhi, interdum sunt lentæ epidemicæ seu communes, & in vulgus grassantes, ab aeris communi impressione natæ; nunc, idque frequentius, benignæ; nunc, & quidem rariùs, malignæ, & tunc subinde acutæ: quæ malignæ, uti per contagium suum lympham & corporis humores in specie afficiunt, ita hoc consequenter faciliè ansam dat fermentationi sanguinis præternaturali, & sic se propagare, & insigniter exacerbari videntur, sc. pertinere huc videtur morbus ille epidemicus, cujus mentionem facit RIVERIUS de Morbis Infequentibus. 9.

## D I A G N O S I S.

Diagnosis febrium dictarum ex hæcenus dictis symptomatibus patet: cum quibus conf. SYLVIVS.

## P R O G N O S I S.

Quoad PROGNOSIN: Febres hæ non multum in recessu habent, uti febres continuæ acutæ seu biliosæ dictæ: faciliè curantur aut evanescent, utut insigniter moleste, interdum & vehementes sint.

Febres tamen catarrhales epidemicæ, & in specie malignæ, subinde non sunt sine periculo. Equidem extenduntur nonnunquam ad 14. dies noctesque; raro tamen salutariter, sed convulsionibus supervenientibus ægri moriuntur: contra si non fuerint malignæ nec epidemicæ, leves sunt & faciliè curantur.

## C U R A.

Quod attinet methodum medendi: Febris ista, quæ à lymphæ glandularum conglomeratarum vitiatæ acri & acida oritur, adeoque febres lentæ catarrhales, hæ in multis cum cura catarrhorum vulgariū conveniunt. In specie eò dirigenda est, ut lymphæ hujus corrigatur vitium, eaque per blanda sudorifica ac diaphoretica imminuitur; idque eò magis, si epidemicæ ac contagiosæ: nam febres catarrhales epidemicæ non carent malignitate, uti ex debilitate virium, ex facili contagio, ex vigiliis, interdum levibus deliriis supervenientibus apparet: Ut ordine procedamus, curantur per ea, quæ

1. Irritationem partium solidarum affectarum, indeque natum spirituum impetum ac copiosorem lymphæ effusionem sistunt.
2. Lymphæ præternaturalem acrimoniam temperant. Ee
3. Quæ lympham temperatam per convenientes vias evacuant.

Pro priori scopo conveniunt imprimis Opiata; pro secundo autem *salia volatilia alcalia* aut *Marina absorbentia* & *temperantia*, & quæ vulgò *increffantia* dicta, ut etiam appropriata contra catarrhos remedia, v. g. lignum *sassafras*, ejus *Decoctum*, & ex eodem parata remedia, essentia catarrhalis cum spiritu *serpilli*, succinum præparatum, oleum *destillatum*, & omnia succinata, flores *sulphuris*, *antihæcticum Poterii*, aliaque *antimonialia fixa*. Myrrha similiter est elegans remedium; ejus enim aliquot granula sapore suo balsamico acorem lymphæ nimium temperant. Camphora quoque hic imprimis est usitata, quæ & blanda diaphoresi vitia lymphæ immittit; & similia. Præterea tamen sal volat. cornu corvi, sal volat. succini, & ex his paratus liquor cornu cervi succinatus, item spiritus & sal volat. sanguinis humani, salis amm. anisatus, nifi ælius sit nimius, & similia Opiatis mista: v. g.

R. Aqua satv. vel scabios.

Serpilli an. ʒj.

Spiritus salis amm. unsf. vel succu. ʒi.

Syrupi diacod. Montani vel pap. albi ʒj. (vel loca hujus laud. opii ʒi.)

M. D. S.

Potio catarrhalis pro aliquot vitibus.



Capiatur cochlearim ante exacerbationem vespertinam, & in hac ipsa, & excutitur blandus sudor.

*R. Aqua sanie.*

*℞. papav. errat. ana ʒss.*

*Liqu. cornu Cervi succin. ʒss.*

*℞. opii.*

*Maxill. lacil. pife. ana ʒss.*

*Syrup. fl. papav. errat. ʒss. vel ʒvj. M.D.S.*

*Potio catarrhalis cochlearim sumenda.*

Capiatur singulis horis cochl. j. expectando sudorem vesperti & noctu, imminente tñm ingruente paroxysmo.

*R. Aqua serpilli ʒj.*

*Liqu. Cornu Cervi succin. ʒj. vel loco hujus,*

*Spir. Corn. Cervi essent. ʒss.*

*Laud. opior. gr. ij.*

*Syrup. papav. albi ʒij. vel ʒiij.*

*M. pro una vice. S.*

*Potio sudorifera pro una vice.*

*Loco hujus Mixture:*

*R. Liqu. Cornu Cervi succin. vel spir. salis*

*amm. anis. vel ess. succin. ʒij.*

*Essent. opii ʒss.*

*M. S.*

*Essentia catarrhalis.*

Dosis gutt. 30. 40. ad 50. aliquot horis ante exacerbationem, & iterum ingruente nocte.

*Vel*

*R. Theriac. Andromachi ʒj.*

*Sal. volat. Cornu Cervi gr. vj.*

*Succin. gr. iij. vel iv.*

*M. f. Bolus. S.*

*Electuarium sudoriferum pro una vice.*

*R. Succin. prap. ʒss.*

*Myrrh. elect. gr. v.*

*Sal. volat. succini gr. iv.*

*Extracti croci gr. ij.*

*Laud. opiat. gr. j.*

*Olei destillat. succini gr. j.*

*M. i. Pulvis. S.*

*Pulvis catarrhalis pro una vice.*

Si fuerit lymphæ nimis salsa, ea, quæ edulcorant, sunt usurpanda: v. g. ex glycyrrhiza, ficibus, jujubis, hordeo, &c. item Emulsiones papaverinæ, opiatæ, & cum opio paratæ pilulæ de styace, aliæque, quæ in tussi catarrhali allegata sunt.

*Sillogula difficultas transcedere deat:*

*R. Aqu. mentha ʒj.*

*Cinnam. ʒss.*

*Spir. sal. Ammoniaci anis. ʒj.*

*Laud. opiat. gr. iij.*

*Syrup. de passul. vel de liquirit. ʒvj.*

*M. D. S.*

*Potio catarrhalis ad collum.*

*Capiatur cochlearim.*

Urgente tussi sic adhuc in principio, pro lymphæ acrimonia temperanda, faucium & asperæ arteriæ dolorosa irritatione sistenda, & materia incassanda:

*R. Aqu. scabios. ʒij.*

*Asthmat. ʒvj.*

*Syrup. diacod. vel papav. alb. ʒj.*

*M. D. S.*

*Potio catarrhalis.*

Capiatur cochlear j. tempore vespertino, cum Opiatis.

*Vel R. Aqu. scabiosa ʒiij.*

*Asthmat. ʒvj.*

*Spir. salis amm. anis. ʒj.*

*Syrup. papav. alb.*

*Violar. ana ʒss. vel ʒvj.*

*M. D. S.*

*Vi ante.*

*R. Aqu. serpilli.*

*Card. ben. ana ʒj.*

*Spir. theriacal. camphor.*

*Ess. lign. sassafr. ana ʒj.*

*Liqu. Cornu Cervi succin. ʒj.*

*Syrup. papav. albi ʒss.*

*M. D. S.*

*Vi ante.*

Pro faucium, pharyngis & laryngis levi exoriatione conveniunt Loch pastularum, sympus discordion Montani, violarum &c. cum baculo liquiritiæ.

Hæc Cura cum Decocto ligni sassafras tandem continetur, donec perfecte sistatur febris.

Suffraganea sic febre, & impetu spirituum ac lymphæ sedato, si opus fuerit, blanda laxatio institui potest, v. g. ex Mass. Pulv. de ammon. Quercetant, aut Mass. Pulv. de succino Cratonis, acuatæ cum Mercurio dalei.

*Vel*

*R. Mass. Pilul. de succino Cratonis ʒj.*

*Sal. volat. succini gr. vj.*

*Ref. iudop. gr. iij.*

*Extracti trochisc. alband. gr. j.*

*Olei destillat. succini gutt. ij.*

*Cum essent. ligni sassafras. i. pilule.*

*D. S.*

*Pilula catarrhales & cephalicæ.*

Quibus factis, reliquæ jam incassatæ expectantibus, incidentibus ac similibus sunt evacuandæ: c. g.

*R. Aqua hyssopi ʒij.*

*Asthmat. ʒss.*

*Spir. Vatrioli, vel asthma, vel quod melius,*

*Gummi Ammoniaci depur. ʒj.*

*Syrup. Nicot. ʒss. vel ʒvj.*

*Emet. Angeli Salæ (ut fauces & præcordia melius stimulentur) ʒj.*

*M. D. S.*

*Potio pectus & catarrhos resolvens.*

Loco hujus mixture succus raphani expressus, cum poco saccharo temperatus, egregie incidit mucum.

Lymphæ correctæ evacuatur, aut universaliter per Diaphoretica & Diuretica; aut particulariter per vases & os, atque hoc saltem in statu, cessante febre, & coacta materia. Ubi ergo diuresis magis intenditur:

*R. Liqu. Terra fol. Tartari ʒss.*

*Dosis 40. vel 50. guttulis bis in die.*

Hactenus dicta ut pateant, exemplis declarabo.

Ante aliquot annos grassabatur hæc Catarrhus epidemica tempore vernali circa Festum Pentecostes, isque malignus & insigniter contagiosus, ita, ut vix esset domus, in qua non aliquot ægrotarent: symptomata erant tussis admodum gravis cum copioso sputo, coryza contumacissima, cephalalgia, dolores dorsi & artuum, mox ingens vitium prostratio intra manifestam causam: quibusdam superveniebat hæmorrhagia narium; quibusdam diarrhœa terrosa. Cura, quæ tunc temporis instituebatur, optimè fiebat per sudorifera, E. g. mox in principio vocatus præscripti:

*R. Aqu. fl. sambuci.*

*Card. bened. ana ʒvi. ad ʒj.*

*Spir. Cornu Cervi electif. & sale volat. probè acuat. ʒss.*

*Salis volat. succini gr. xij.*

*Laud. opiat. gr. j. vel ij.*

*Syrup. fl. papav. errat. ʒss.*

*Mista pro Potione sudorifera pro 1. dosi.*

Capiebat æger, & expectabat sudorem, qui semper cum levamine fiebat.

*Item*

*R. Aqu. mentha ʒj.*

*Spir. salis amm. anis. (quibusdam liqua Cornu Cervi succin.) ʒj.*

*Laud. opiat. formant. gr. iij.*

*Syrup. card. bened. unc. ss.*

*Miscebantur pro bausu.*

Hæ ipsæ potiones repetebantur, expectando desuper sudorem.

Interdum conveniebat sequens pulvis:

*R. Succini catarrhalis gr. xv.*

*Specif. cephal. ʒss.*

*Bez. solaris gr. iv.*

*Miscebantur pro dosi.*

Pro compellenda tussi, incidenda materia crassa, & adjuvanda excretionem, præscribebam potum ex gummi ammoniaco cum aceto scyllitico soluto, oxymelle scyllitico, & syrups appropriatis incidentibus & expectorantibus, cum aquis pectoralibus, & spiritu salis du'ei: quales suprà, ubi de Tussi, dedi. Pro coryza & capitis affectibus optime cōveniebat Inunctio verticis cum oleo succini, aut applicabatur emplastrum cephalicum ex emplastri de heronica & emplastri de bregmato ana partibus æqualibus, cum oleo succini mixtatum.

Quibusdam affectus catarrhalis, in specie artus, cum dolo-



dolore lancinante; vago aut quem patiebatur in artubus. affligebat: id quod præsertim senibus erat familiare: tunc sufficiebant sudorifera opiatissima. Pro reliquis ergo morbi expellendis, pro artuum debilitate & eorundem dolore, conveniebat hæc Mixtura, quæ ut plurimum morbum curabat, præmissis modò dictis. Mixtura erat hæc:

*R. Aqu. lã. convall.*

*Serpilliana ʒiʒ.*

*Essent. ligni sassafr. ʒiij.*

*Spir. cornu cervi rectif. ʒi.*

*Cornu Cervi sigillat. ʒi.*

*Sal. volat. Cornu Cervi ʒi.*

*Succini ʒss.*

*Land. opiat. gr. iij.*

*Syrup. beton. ʒvj. ad ʒi.*

Miscebatur pro Portione.

Capiebat æger duo cochlearia pro lubitu omni horâ, blandum expectando sudorem. Vel

*R. Aqu. menthe*

*Card. Cervi,*

*Antiscorbut. ana ʒij.*

*Asthmat. Rudolphi (est spirit. comp.) ʒi.*

*Ess. ligni sassafr.*

*Spir. lumbric. terrestr. per putref. (propter dolores vagos) ana ʒij.*

*Specif. cephal. ʒi.*

*Sal. volat. succini ʒss.*

*Syrup. fl. tunice ʒss.*

Miscebantur pro aliquot dosibus in formam Portionis: de qua capiebat quater in die 3. vel 4. cochlearia.

Anno 1669. & 1675. cum grassaretur hic mediâ æstate febris catarrhalis epidemica, non tamen maligna, ex lymphæ vitio oborta, cum vagis artuum & dorsi doloribus, tussi gravi, cephalalgia, diarrhœis, hæmorrhagia narium, coryza imprunis, & similibus lymphaticis affectibus, cum calore lento circa vespèram exacerbato, utile fuit ante omnia præmittere hæc Mixturem, expectando sudorem blandum:

*R. Aqu. card. bened. vel serpilli,*

*Fl. sambuci ana ʒvi. vel ʒi.*

*Spir. Cornu Cervi essentif. i. e. cum sale volat. propr. æquat. ʒss.*

*Salis volat. succini ʒss. vel gr. xii. ad xv. (vel liq. Cornu Cervi succinati loco spirit. Cornu Cervi & salis succini, ʒss.)*

*Land. opiat. gr. j. ad ij.*

*Syrup. fl. papav. errat. ʒss.*

*M. l. Portio pro una dosi.*

*D. S.*

*Portio sudorifera pro una vice.*

Hæc subindè repetita profligavit malum, corrigendo lympham, & correctam per sudorem evacuando. Vel hujus loco:

*R. Agr. fl. acacie ʒi.*

*Liqu. Cornu Cervi succin. ʒss. ad ʒi.*

*Syrup. diacod. Montani ʒvj. ad ʒi.*

*M. D. S.*

Capiatur pro dosi sudorifera.

Item profuit hic Pulvis:

*R. Succini præp. gr. ij.*

*Specif. cephal. gr. viij.*

*Bezoard. solar. gr. iv.*

*Land. opiat. gr. ij.*

*M. D. S.*

*Pulvis ad quietem.*

Vel *R. Succini præp. ʒss.*

*Specif. cephal. ʒss. vel ʒi.*

*Land. op. gr. ij. vel iij.*

*M. pro 2. dosibus, manè & vespèri assumendis. S.*

*Pulvis vespertinus.*

Pro Tussi duo tempora consideranda erant:

1. Scilicet dum eg adhuc sicca erat.

2. Quando humida evaserat.

Ubi ratione prioris, seu in principio & incremento morbi talia adhibebantur, quæ lymphæ acrimoniam temperant, & ut vocant vulgò, materiam tenuem incrassant, irritationemque sistunt: in progressu verò & statu, tussi nempe humida, in qua copiosa viscida reiciebantur, conducebat Potio, in eadem, viscidum mucum attenuans, illumque expellens, ex aqua asthmatica, oxymelle squillitico; &c. qualia jam & superius de tussi pectorali dixi.

Ubi verò morbo aucto spissior mucus nates obfesserat, tunc fuit optimum olei destillatum anisi varibus illitum: quod quidem mordicat, egregiâ tamen cum euphorâ mucum resolvit. Loco cuius etiam crebrior salum & spirituum urinosorum odoratus, e.g. spiritus salis ammoniaci simplicis & anisati, salis volat. uring., Cornu Cervi, tempore præprimis vespertino repetitus, mucum resolvendo à Coryza liberavit. Quibus non sufficientibus ultimum præsidium existit:

*R. Pulv. bellib. nigri,*

*Sacch. alb. ana part. æqu.*

Cum aliquot guttulis olei destillati caryophyllorum, misc., quem pulverem naribus inticiebant.

Cum autem sub coryza dolor capitis invalesceret, optimum fuit oleum destillatum succini vertici illitum, vel quibus id nimis acre videbatur, ejus loco itidem Balsamum Peruvianum illitum satisfaciebatur: item emplastrum ex ceratiprogmatice usitatis, & emplastri de betonica ana, malaxatis cum oleo succini, vertici imponebatur.

Cum etiam suspicio esset, ex tussi ferina præcordiis successivè læsionem fuisse inductam, tunc pro auferenda noxa illata, in declinatione morbi præscripti Balsamum sulphuris terebinthinatum vel anisatum, vel utrumque simul, de quo quotidie manè in vehiculo calido guttas x. vel xii. recipiendas jussi; sic enim ejusdem balsami vi læsio partium curata est.

Pro artuum affectibus, eorumque debilitate curandis, imprimis ubi dolores seu lancinationes artuum aderant.

*R. Aqu. farniculi,*

*Mentha,*

*Papav. errat. ana ʒi.*

*Asthmat. Rudolphi ʒiij. ad ʒvj.*

*Spir. lumbric. terrestr. per putref. ʒss.*

*Specif. cephal. ʒss.*

*Syrup. fl. tunice ʒss. vel ʒvj.*

*M. pro aliquot dosibus, aliquoties in die capiendis.*

Externa simul adhibenda habebitis infra, ubi de cura dolo-

lorum. Nobilis quidam juvenis laborabat difficili respiratione cum tussi gravissima & frequentissima, reiciebat copiosissima viscidissima, flavescens &c., subindè cruore permixta; accedebat febris intensa, cum summo æstu, omni vespèrâ circa horam quintam vel sextam recurrens, usque post 10. noctis durans, quo tempore successivè remittebat: inchohobant hæc exacerbationes successivè sine ullo frigoris aut horrois vestigio, & quamdiu affligebant, continuis sudoribus diffuebat. Symptomata hæc omnia intra bidui spatium contraxerat, erat scorbuticus, indeque copiosa salia scorbutica matulæ parietibus adhærebant: tussis erat reverà pectoralis ex pulmonibus oriunda; quando tantillum non exactè calidum biberet, mox tussiebat, si pectus parum denudaret, tussis itidem urgebat, quò largius sudabat, eò minus sordidum expectorabat: Febris erat catarrhalis essentialis occasione acidi scorbutici nata, cujus beneficiò depumata quasi massa sanguinea sordes heterogeneas intra pulmones deponebat. Nempe quadrat hæc affectum Plateri lib. 2. Observationum pag. 273. Catarrhus & tussis vehementissima in declinatione febrium evanire solet, præsertim versus hyemem in corporibus cacochymicis, in quibus non licuit propter febrem acutam sufficienter purgare. Occasio externa erant exercitia varia corporis, quotidie cum summo conatu peracta, sudore, qui tali occasione largissimus stillabat, nunc repressio nunc retropulso. Metuebâ phthisin pulmonalem in subjecto nonnihil macilentio, aliàs cholericò scorbutico, propter acidum volatile acerrimum pulmonibus inimicissimum.

Pro Cura

*R. Arcan. dupl. ʒss.*

*Maxill. lucii pisc.*

*Antimonii diaphor. ana gr. vj.*

*M. l. Pulvis.*

Item

*R. Spirit. salis amm. anis. ʒij.*

*Tinctura Tartari compos. ʒss.*

*Misc.*

Capiebat 40. gutt. bis in die.

Item pro æstu vespertino:

*R. Maxill. lucii pisc.*

*Arcan. dupl. ana gr. xv.*

*Misc.*



# Febres Lymphaticæ Glandular. Conglobatar. & Catarrhales. 285

Sed cum nihilominus omnia exasperarentur :

*R. Aqu. flor. papav. rhæad. ʒij.  
Spir. falis amm. an. ʒi.  
Maxill. lucii pisc. ʒss.  
Fl. sulphuris gr. xv.  
Syrup. violar. ʒvj.  
Misc. pro Potione.*

Capiebat cochlearim : sed cum paucio successu , febre vespertina cum dictis symptomatibus quotidie exacerbata. Hunc

*R. Aqu. papav. errat.  
Hyssopiana ʒss.  
Maxill. lucii pisc. ʒij.  
Antibell. Poterii ʒj.  
Sal. vol. maxill. luc. pisc. gr. iij.  
Essent. opii ʒss.  
Syrup. violar. ʒss.  
Misc.*

Potiones hæc à meridie appetente vespere , adedque ante paroxysmum , ut & una in paroxysmo , successivè capiebat , manè Elixir proprietatis sine acido ferè recipiendo . Assumpsit etiam hanc posteriorem mixturam , sed nimis confertim : undè cum debilis esset , & aliquot noctes propter tussis violentiam penitus non dormivisset , in talem somnolentiam delapsus est , cum tanta virium enervatione , ut vix loqui posset : propterea hujus loco antecedens ista Mixtura repetita & usurpata fuit , utut morbo in eadem ferè atrocita pergente . Quod ergo febris vespertinum impetum infringere :

*R. Aqu. flor. papav. errat. ʒij.  
Acac. ʒj.  
Maxill. lucii pisc.  
Corall. rub. præp.  
Antibell. Poterii ana gr. xv.  
Syrup. violar. ʒss.  
Misc.*

Sed eodem modo nihilominus ferociebat febris , tussis tamen & creatu paulatim remittentibus :

Undè

*R. Amygd. dulc. ambr. ʒij.  
Sem. melon. ʒss.  
Cum s. q. aqu. flor. papav. errat. f. Emulsio  
adde  
Maxill. lucii pisc. ʒss.  
Antibell. Poterii ʒj.  
Misc.*

Educorabatur paucis saccharo .

Egregiè profuit , unde & eadem vespere repetita , & sequentibus diebus continuata fuit , vi temperaturæ & acris acido-salis mitigativæ , hujus remediis ope omni æstu febrili penitus evanescente : nempe , uti in febribus acutis , ardentibus , ac similibus male ejusmodi Emulsionem usurpantur , cum vel nihil prosint , vel oleositate sua temperant , & particulas volatiles acriores efferverescentes quasi inviscante , ex acutis lentas facere queant ; ita , ubi acrimonia falsa , acido-falsa , muriatica , præsertim lymphatico in subiecto peccat , & hinc partem solidam rodendo plus minus afficiat , optimè profunt tales Emulsiones . Subjugato sic maxime partem morbo pro purificando sanguine , alteranda lymphæ acriori , & in specie restituendis pulmonibus plus minus læsis , adedque pro præcavenda phthisi , ad imitationem WILLISII

*R. Rasur. santal. rub. ʒj.  
Lign. ass. ʒss.  
Macera per 12. horas in Aqua comm. ʒ. viij.  
Coqu. ad consumpt. ʒss. hunc adde  
Herb. heder. terrestr.  
Com. hyperic. flor.  
Herb. veron. ana M. ij. ʒ.  
Rad. liquorii. ʒss.  
Sem. fenic. ʒj.  
Passul. min. conquass. ʒij.  
Coqu. ad remanent. ʒ. iv.  
Colatura D. S.*

Potio sanguinem mundificans .

De hoc omni mane plenum haurium calidè bibit ; item sub introitu lecti pariter ; dum interea vespere , hora quartâ vel quintâ ob febrilia vestigia caperet :

*R. Aqu. fl. papav. errat. ʒij.  
Asthma. ʒss.*

*Maxill. lucii pisc. ʒj.  
Antibell. Poterii ʒss.  
Syrup. papav. alb. ʒij.  
Misc.*

Item

*R. Maxillar. lucii pisc. gr. xv.  
Antibell. Poterii ʒss.  
Misc.*

Quibus & similibus pulveribus à meridie , adhuc per aliquot septimanas continuatis , simul cum isto decocto eadem ratione crebrius repetito , perfectè denud convaluit .

Et hæc sunt Febres lentæ catarrhales ex lymphæ acida conglobatarum glandularum , affectum catarrhalem conjugatum habentes .

## ARTICULUS II

### DE

## FEBRIBUS LYMPHATICIS GLANDULARUM CONGLOMERATARUM.

**P**Ræter hæc tenus dictas observantur quoque Febres lymphaticæ viis lymphæ glandularum conglomeratarum , quæ in certam cavitatem suam effundunt succum : inter quas eminent parotides & pancreas , quæ similem ferè lympham in os & intestina , consequenter quoque in massam sanguineam evomunt . Peccat hæc ipsa lymphæ , imprimis quando est plus minus viscida , ac sæpius salior & acrior , aliòvè simili modo vitata ; tunc enim saliva viscida ac salior blandam quidem continuam febrem , lentam tamen , calore non ita forti molestant , inferunt .

Febres hæc lentæ nunc sunt primariæ , nunc secundariæ : Illæ , quæ per se incipiunt , & nullum alium morbum sequuntur : Hæc vero , quæ ex alio sunt morbo , sive ab alio , tanquam à sua causa , immediatè dependent ; v. g. vulgè corruptionem partium ejusdem internæ sequuntur , sive ab alio morbo malè tractato per illius degenerationem fiant , adedque tunc tanquam primariæ per se subsistant ; quales sunt , quæ continuas acutæ , non intermittentes male curatas sequuntur , suntque omnes febres lentæ ferè periodice , h. e. quæ suis plus minus periodis certis exacerbant solent : idque vel ( frequentius quidem ) vespertino tempore , sicque quotidiana typum repræsentant ; vel ab omni pallo , tuncque ad hostiles febres revocantur . De his singulatim .

## MEMBRUM I

### DE

## FEBRIBUS LENTIS PRIMARIIS .

**Q**Uoad Febres lentas primarias . Horum levissimæ , sed diuturno ferè , ægros apprehendunt , insequente quidem calore continuo , sed non aded intenso seu vehementi , prout in acutis ; utut subinde in extremis mordaci plus minus acris , interdum tolerabili seu mediocri , sed qui vespere intenditur , & usque post medium noctis graviter urit , & absque sensibili quasi excretionem solvitur . Appetitus est prostratus , alimentorum assumptorum insequitur dolor gravativus stomachi , hujus & intestinorum inflatio ac distensio , adest simul interdum quidam torpor ac somnolentia . Febres hæc circa vespere , interdum post cenam demum , exasperantur cum pulso frequentiore , non tamen aded magno , propter lympham sanguinis fermentationem depravantem , per noctem ferè durant ad meridiem sequentis diei , & tunc solent cessare ; interdum tamen citius assilunt . Saliva huic hoc modo vitata si junctus fuerit succus pancreaticus viscidus aut salus , aut alio modo vitiosus factus , simul adesse solet anxietas circa præcordia , interdum tormina obicuta , & laniationes ventris . Pulsus est continuus celer , frequens , magnitudine & vehementia moderatus , ad paritatem tamen & debilitatem declinans . Sitis in his febribus interdum satis urget , & in specie ubi saliva peccat , est glutinosa ; quia fauces & lingua tenè materiâ subinde sunt obducta . Urina sunt crassa , intensius tinctæ , quæ faciliè turbantur , & subinde multum crassamentum seponunt . Adest simul lassitudo totius quasi contundens , cum laniationibus artuum subinde juncta ; interdum etiam cephalalgia tensiva & gravativa molesta est .



se solet. Omnia hæc symptomata sunt intensiora, ubi acrimonia salina, aut vitioso sapore simpliciter saliva & succus pancreaticus peccant; sin verò visciditas simul præternaturalis adfuerit, mitiora quidem, sed diuturna magis, erunt eadem.

Pluribus ad *acutum* naturam accedere hujusmodi febres *lentas*, non solum ex hæcenus facta relatione patet; sed in specie, quod *acuta continua*, & etiam *intermittentes*, in *lentas*, tam has quam alias, facillimè degenerent; quin & in *hecticam* transeant. Nempe *acuta illa* ex concitatore fermentationis febrilis impetu occasione acrioris & volatilioris aciditatis in sanguine acrioris (ceteris hinc inde derivatis humoribus, & ipsius acrioribus existentibus) originem ducit: *lenta* è contrà ex remissione illo impetu ab acido minus acri, aut in subiecto seu vehiculo viscidior ac glutinosiore hærente, ipsius corporis humoribus ceteris temperatioribus plus minus ac glutinosioribus, vel naturaliter vel præternaturaliter, existentibus.

Observandum enim est probè axiomata: *chronicos contrumaces, diuturnos, ac lentos morbos ex viscida, glutinosa, tenaci materia*, vel tanquam proxima occasionali causâ, vel tanquam fomite dependere; *acutos* verò, & cum corporis perturbatione junctos, ab *acriore causa occasionali* mate: tali originem ducere.

### CAUSÆ.

Origo ergo *lentarum harum febrium primariarum* est imprimis in *stomacho*, vel ex *vicio & defectu digestionis primæ*, dum ex hebetato aut alterato plus minus fermento stomachali (undecunque id vitiū ortum fuerit) & bile quoque mitiori minusque acri chylus minus volatilis, sed viscidus, vitioso tamen, aut acido aut falso acri sapore inquinatus, massæ sanguineæ instillatur: quo ipso successivè fomes febrilis talis congeritur, cujus occasione tandem fermentatio & commotio sanguinis febrilis supervenit, (unde à sanguine pituitoso, seu à pituita acida, orti continuas quotidianas afferere Veteres,) salubriter cessans, dum illo fermentationis motu depurat se massa sanguinea, & quicquid heterogenei permixtum fuerit, coexistit & præcipitaverit, ut cum urina vel successivis sudoribus eliminari queat. Cum verò chylus talis juxta sanguinem etiam lympham totius corporis vitare & insigniter alterare soleat, utpote in quâ lymphâ naturaliter gelatina lactea seu chylola deprehendi solet &c., sanè talis plus minus alteratio, ac debitis ulibus exsequendis hinc necessaria ineptitudo lymphæ, fovere tales febres, & ita caloris nonnihil auctioris, pulsus ex irritatione cordis frequentioris, propter sanguinem verò pituitosum, hinc imminutam & depravatam ejus fermentationem parvi & debilis, ac reliquorum in eadem symptomatum originem esse, probabile admodum videtur, live per se & primariò oriatur, live alios demum affectus consequantur: adeoque revocanda huc veniunt ea, quæ de *Febribus lymphaticis* disserit et videt SYLVIVS lib. 1. cap. 29. Sanè *exacerbatio vespertina*, & calor circa id tempus ibidem gravior, ex lymphæ alteratione illa primariò oriri videtur, cum quilibet à lymphâ orti affectus circa vespertam & appetente nocte ferè magis intendi soleant, ut in febribus catarrhalibus, simpliciter ex lymphæ vitio natis, manifestum est, cujus exacerbationis ratio intricata huc revocanda, quam *supra de Febribus catarrhalibus* dedi.

### PROGNOSIS.

Quoad *Prognosin*: Febres hæ lymphaticæ ex vicio glandularum conglomeratarum, in specie salivæ & succi pancreatici pendentes, seu febres continua quotidiana, quod magis vel minus lente fuerint, eò diuturniores vel minus diuturniores esse solent difficiles tamen ferè curatu, nec temper omni periculo vacant.

Quod pejora etiam habent symptomata, eò periculosiores esse solent.

*Paroxysmi vespertini* si sint longi, cum interdum ad 16. horas extendantur, vires sint debiles & appetitus prostratus, ingens periculum subest.

Salubris hæc febris, nisi cautè & probè tractetur, nunc in *cachexiam*, si nempe *acuta* magis nonnihil fuerit; nunc in *hecticam*, cum qua magnam affi-

nitatem habet, si *lentius* magis exierit; terminari solet.

### CURÆ.

In *Cura Febrium lentarum vitiis lymphæ glandularum conglomeratarum*, in specie salivæ & succi pancreatici, quando hi nimis salii aut viscidit existunt:

1. Rectificetur quasi *stomachus*, ejusque digestio restitatur.
2. *Visciditas*, ac *acrimonia falsa* lymphæ corrigenda.
3. *Lymphæ correctæ*, ac *cruditas pituitosa* blandè evacuada.
4. *Symptomata* mitiganda.

*Pro his scopis consequendis*:

I. Tam in principio, quam in incremento hujus febris minus Vomitorium optimè locum invenit, imprimis si anxietates præcordiorum adsint, & vires simul consent; aut Evacuantiæ per alvum mitiora: E. g.

R. Tartari emet. Mynl. gr. ij. vel iij.

Salis ammoniaci depur. gr. viij.

M. f. Pulvis S.

Pulvis emeticus pro una vice.

Per inferiora:

R. Mass. Pilul. de tribus Russi gr. xv.

Aur. fulm. gr. iij.

Scammon. præp.

Troch. alband. ana gr. j.

Cum Tinct. Tartari compos. f. Pilulæ S.

Pilulæ purgantes.

II. *Diuretica*, quæ simul sunt *Alterantia*, optimo cum successu applicari possunt. Nempe, ut loquuntur *Practici*, præmissis præmittendis, fundunt atque attenuant sanguinem, & ita restaurant plus minus naturalem ejus fermentationem, simulque crassa crudaque excrementa, si quæ circa primas vias aut aliis in locis retiterint, dissolvendo abstergunt, & remotioni aptiora reddunt.

Remedia itaque quæ corrigunt, resolvendo & attenuando viscida, & temperant falsa, sunt imprimis spir. salis dulcis, valde egregius in tali casu, etiam in *hectica*; spir. nitridulcis; item talis amm. nitrum antimoniatum, salis Tartari essentialis, arcanum duplicatum Myosichtii, tartarus vitriolatus Tachenii, terra foliata tartari, ejusque liquor ad 40. vel 50. guttas bis in die semper bihorio antepastum assumptus, tinctura tartari acerrima & composita, essentia myrrhæ tartarificata, spir. carminativus de tribus, & ipirit. salis ammoniaci; cum quibus antihæcticum Poterii commodè misceri potest. Hinc præmissis vel blando vomitorio vel laxativo;

R. Sal. amm. puri vel depur. ʒj. ad ʒʒ.

Antihæct. Poterii ʒʒ. vel gr. xv. aut xvi. ad ʒj.

M. f. Pulvis pro una aut duplici dosi. S.

Resolvens pulvis stomachalis.

Quarum una manè, altera vespertini propinetur, præsertim ante exacerbationem.

R. Salis amm. depur. ʒj.

Galang.

Zingib. ana gr. viii.

M. f. pulvis.

Div. in 2. partes æqualis: S.

Vi ante.

R. Arcan. dupl. ʒʒ. ad ʒij.

Antimonii diaph. ʒj.

M. f. pulvis.

Div. in 2. part. æqu. S.

Resolvens pulvis febrilis.

Una dosis sumatur ante prandium, altera à meridie hora 4.

Sic quoque nieri antimoniaci & salis amm. ana conducunt etiam insigniter.

Item hæc Mixture egregiè profuit:

R. Aqua menth. vel card. bened.

Fenic. vel hyssopi ana ʒʒ.

Spir. theriacal. simpl. vel compos. ʒʒ. ad ʒiij.

Salis dulc. ʒj. ʒʒ. vel ʒj.

Antihæct. Poterii ʒj.

Syrupi de hyssopo ʒʒ. ʒvj. ad ʒj.

M. pro 2. dosibus,

aut subinde cochleatim hauritur pro lubitu.

D. S.

Potio febris & stomachalis resolvens.

Pro



Pro mucro viscido, fauces & linguam incrustante, retolvendo & excernendo convenit cerevisia secundaria cum tantillo mellis rosati; vel aqua, acetum & nitrum depuratum; vel infusum florum malva arboræ in aqua communis, acidulato cum paucis spir. sulphuris vel salis, addito modico syrupi appropriati, &c.

Urresclarior fiat, exemplum Quotidianæ continuæ minus lentæ, sed ad acutis nonnihil accedentis, narrabo.

Virgo annorum 18. & cui difficulter fluere solebant menses, negotiis domesticis adnecta, nec ad ordinatam vitam dictatâ, conqueritur de artuum lassitudine spontanea quasi consudente, cum cephalalgia intensa, & sicut pedetentim aucta. His ita aliquot dies consistentibus, corripitur aliquando à meridie horrore mediocriter per aliquot horas, quem insequitur nox gravis cum æstu mediocriter intenso, cephalalgia gravissima, angustia præcordiorum gravatissima, sine semina: manè melius habet, cephalalgia tolerabilis, calor præternaturalis quidem, sed moderatus, ut & reliqua symptomata: sed à meridie, appetente vespere omnia sensim exacerbantur. Nox insequitur iisdem symptomatis, ac antecedens gravis contingit; sequenti tamen manè omnia demum remissa & mediocriter, continuè tamen eadem urgent symptomata, quæ saltem vespertino & nocturno tempore exacerbantur. A meridie vocatus præter hactenus enumerata offendi ægram viribus adhuc constantem, de cephalalgia & lassitudine, præsertim artuum, conquerentem: calor deprehendebatur mediocriter, naturalitamen longè intensior, isque continuus, non admodum actis vel mordax, qui vespere saltem intendebatur, & per noctis medium gravius urgebat: Pulsus erat celer, frequens, magnitudine & vehementia moderatus, ad parvitatem declinans; appetitus nullus, sitis intensa; potum cerevisiæ consuevit horrebant, aquam appetebat: urina erat turbida, crassa, intensius nonnihil tincta, fauces & lingua salivâ viscidâ mollestata. Præmissâ venesectione, partim, ut adstantium postulatis satis fieret, partim, quia menses non bene fluxerant, per aliquot dies noctesque varia tentabam: dedi ei mixturas alexipharmacas ex antimonio diaphoretico & spiritu nitri dulcis, imperando sudorem: sed frustra omnia. Tandem interim cum morbus in eodem statu maneret, & tutus essem à latente malignitate, crudissimum pituitosarum in primis viis delitescens suspitione commotus, præscripsi vomitorium sequens:

℞. Aqu. mentha 3℞.

Syrup. emet. Salis 3℞.

Misc.

Cepit manè, sed sine vomitu: aliquot secessus admodum torminosos habuit, sed cum tanto levamine, ut paroxysmus mitis fuerit, ac cephalalgia & æstus penitus evanuerint, nec redierint. Hinc præbui lympham corrigentia, abstergendo primò primas vias, & resolvendo earum cruditates acidas:

℞. Salis ammoniaci ʒj. vel ʒj.

Dedi pro 2. dosibus manè & vespere.

Potè

℞. Salis amm. ʒj.

Arcan. dupl. 3℞.

Miscebantur pro una dosi, ante consuetum exacerbationis tempus assumenda.

Item

℞. Salis amm. depur.

Arcan. dupl. ana ʒi. ad 3℞.

M. pro 2. dosibus.

Quibus ipsis cum esset motus febrilis sedatus, in fine morbi pro lymphâ adhuc melius corrigenda:

℞. Spirit. salis amm. 3℞.

Dosis 20. gutt. bis in die, qui continuato usu curam absolvit.

## MEMBRUM II

### DE

## FEBRE EPIALA.

A Dhas lentas febres pertinet & ista, quam veteres GALENI sectatores Epialam vocant, in qua agri simul ca-

lent & frigens, vel, ut alii, in qua intermitten algeni, & exteriora frigens. Hanc cum Quotidianis coincidere, & ex cruditate pituitosa primarum viarum oriri putat BALLONIUS in Bonetis Phar. Med. pag. 103. Sed meritiò fictitiam his modis definitam Epialam Galenicorum asserit LINDANUS, qui hoc nomine nihil aliud, quam febrem mollem seu continuam, homotonomam, cum calore leni humido ac molli, intelligit: Id quod & appellationis ratio insinuat, de quo vid. PIENS de Febris Part. 1. pag. 91. Quod si unquam talis observetur febris, in qua calor & febris coincidunt, placet præ alius PLATERII assertio: Epialam non constituere febres peculiarem speciem, sed esse symptoma vel intermittentium copulatum, cum horrore alterius febris supervenit calori alterius, antequam dissolvatur, quod per subintrantiam vocant; vel intermittentium cum continuis junctum, cum calori continuo miscetur horrore intermittens: vid. PIENS c. l. Simile quid interdum apud puerperas, aliove ægros purpurâ affectos, videre est apud nos, in quibus ante purpuræ eruptionem urgente licet æstu, tamen sit tantillam partem quandam extra lectum proferant, mox horrore sensum in corporis peripheria, interdum in ipsis quoque lecti integumentis percipiunt, dum scilicet aciores particule salinæ sub corporis communibus involucris delitescentes, & jam excernendæ, vellicatione suâ talem horrore sensum circa panniculum carnosum inferunt.

## PROGNOSIS.

Epiala lenis est absque periculo, sed diuturna aut periculosa; quia facili in hecticam transire potest.

## CURA.

Epiala specialis cura ex ejusdem origine aut generatione facili haberi potest.

## MEMBRUM III.

### DE

## FEBRIBUS SYNCOPALIBUS.

A D Febres lentas referuntur etiam à quibusdam Febres syncopales, in quibus ægri animi deliquio frequenter corripuntur. Symptoma tamen hoc non continuus plus minus lenis admodum proprium est, quin & malignis non raro superveniat; Imò in intermittentiis paroxysmis subindè observetur; Unde etiam ad intermittentiis differentiam hanc referre visum fuit SYLVIO l. 1. Prax. cap. 30. §. 104. De cætero quibuscunque etiam febribus syncopes tales supervenientes videntur hæc esse stomachica, atque vel occasione mucis vitiosi, superius ventriculi orificium obsidentis, & vitioso sapore illud crebrius irritantis; vel ex aliquali humore plus minus æruginoso in ventriculo contento originem ducere: de quibus inferius plura, ubi de Lipothymia.

## PROGNOSIS.

Febris syncopalis, qua talis, non est absque periculo: consideranda tamen & cætera circumstantia.

## CURA.

In febre syncopali curanda adhibenda est ratio causæ: Hinc unicornum verum maxime à FORESTO lib. 3. Observ. 19. Schol. prodelle dicitur, cum vino in paroxysmi principio tempore syncopes propinatum: Nempe, ubi acres, aut æruginosi succi ventriculum lancinant. Sic ZACUTUS LUSITANUS lib. 3. Praxeos Observat. 23. Febrem refert syncopalem minutam seu mollem, obstinatam, cum nulla proficerent medicamenta, per aquam cum tamarindis decoctam, aliquandiu continuatam, refert curatam; nempe, ubi in dorso acres succi similiaque contenta in ventriculo hæterint. Alias nota sunt spirituosas volatilia, vel alcalia, vel sulphurea, seu inflammabilia, ad syncopes curam, ubi nempe viscidum plus minus flatulentum in causa fuerit. Non inconcinnum tamen est hic monitum BALLONIUS in Phar. Med. pa. 211. §. 85. Lipothymia interdum præcedit febrem; Medici territi istis symptomate ad cardiacam pro-



perant, cum potius ad purgans medicamentum statim sit deveniendum.

## MEMBRUM IV.

## D E

## FEBRIBUS LENTIS SECUNDARIIS &amp; SYMPTOMATICIS.

Suprà dictum fuit: juxta lentas primarias etiam secundarias dari, ex aliis morbis quocunque errato non rite tractatis enatas, & tunc tanquam primarias solitarie existentes. Non raro tales in Praxi occurrunt, & frequentius febres vel continuas acutas, vel intermittentes insequuntur, quando nempe *Præcipitantium*, ut vocant, seu *absorbentium* abusu nimio oder *Wann* sic bald *vertrieben* erudens acidum morbosum fermentum præmaturè figitur & quasi retunditur, & hinc cessante sanguinis ebullitione febrili heterogeneæ copiosæ particulae, alias præcipitandæ seu concoquendæ, retinentur in ejus massa: quibus ipsis & obtunduntur particulae ejus salinæ activæ fermentativæ, & inertes quodammodo evadunt, & lymphæ simul, specierum glandularum conglomeratarum, v.g. salivarium & pancreatici, vitiafunt, & glutinosior, subindeque salior evadit. Quibus occasionibus febres continuæ lentæ oriuntur cum calore mediocri, ægro interdum vix adeo sensibili nisi, ubi suas exacerbationes habent; exque ut plurimum vespertine, in quibus subindè intensior & mordax satis percipitur: Pulsus est continuè celer, frequens, mollis, magnitudine ac vehementiâ moderatus, ad parvitatem declinans, vires prostrata, appetitus nullus, os glutinosum, ex quo copiosa viscida subindè reuiciuntur; molestia præcordiorum gravativa, fluxus alvi subindè materia liquida quasi pituitosa, nunc cum nunc sine lancinationibus intestinorum molestis: Urina crasse copiosum crassum albidum seponentes sedimentum, excernuntur, &c. & sanè plura in his oblectantur symptomata, quæ etudè SYLVIVS sub febre lymphatica salivali & pancreaticæ explicat lib. 1. Prax. cap. 29. §. 13. & 14. Superveniunt quoque tales febres lentæ supra dictis febribus, si post has curatas ægravius alimenta ingerant; quo medio ut non raro recidivam sibi conciliant, ita, ubi depauperata magis fuerit massa sanguinea, ex copiosiore, & crudiore chylis non rite assimilabili, lentatalem febrem gignitur. Nec solis febribus, sed etiam aliis affectibus, ex acido viscidopliis minus natis in quibus vel intempestivè movetur camarina, & hinc in matiam sanguineam & lympham derivatur, vel non debite evacuat, de facili lentæ tales, quasi hecicæ, plus minus superveniunt febres: pro quarum tamen omnium cura acidofalsi peccantis correctio temperando, viscidis attenuatio incidendo, & ejusdem excretio per vomitum, alvum, urinam, vel sudorem ciendo indicatur, prout hoc ipsum exemplis clariùs patebit.

I. Juvenis 16. annorum præter propter laboravit febre tertianâ intermittente ordinariâ, quæ ferè sublatâ, cum jam largiter comederet, subito concidit appetitus, omnia assumpta, etiam potulenta, alieno sapore videbantur inquinata, & ipse gravamen quoddam, angustias & pressiones circa præcordia sentiebat. Propinato ergo vomitorio, rejectaque copiosissima materia saburra, omnia ista symptomata cum ipsa febre evanescerant. Sed brevi post cum strenuè edere, denuò eadem in præcordiis patiebatur symptomata, repetito vomitu eadem rejiciebat excreta, eaque in magna copia; sed insequeretur calor insignis vesperti & noctu, usque ad meridiem alterius diei graviter affligens, cum virium imbecillitate, capitis dolore gravativo, propensione in somnum, appetitui jectio, saliva crassa & viscida, os & fauces subindè agglutinante & infarciante, circa meridiem calor remittebat, sed post coenam recurrebat, dicto modo affligebat, donec à meridie remitteret. His benè pensatis, febrem quotidianam lentam & quasi lymphaticam à SYLVIO appellatam, esse suspicatus sum, eamque non tam ex lymphæ pancreaticæ, cum nulla abdominis adessent symptomata, & æger quotidie naturaliter alvum exoneraret, quam ex lymphæ reliquarum glandularum, in specie salivarium, quæ crassa & viscida, & acida præternaturaliter cum sit, unde & saliva simili vitio affecta, talia symptomata tam oris, quam stomachi inducat.

Propterea

R. Antihell. Poterii ℥ss.  
Nuri ammoniaci gr. viij.  
Mile.

Præparabatur in duplo, sumendo manè & vesperti dosin unam.

R. Aqu. mentha;  
Portulacæ ana ℥ss.  
Aceti destillati ℥vj.  
Lap. Cancr. præp. ℥ss.  
Antihell. Poter. ℥ss.  
Spir. salis dulc. gr. xv.  
Syrupi hyssopi ℥ss.  
Mile.

Hauriatur cochlearim, aliquantulum profuit. Hinc

R. Aqu. mentha,  
Fenic. ana ℥ss.  
Spir. theriac. simp. ℥ss. ad ℥ij.  
Oxymell. scyllit. ℥vi.  
Spir. salis dulc. gr. xv.  
Syrupi de hyssopo ℥ij. vel ℥ss.  
Mile.

Capiatur cochlearim.

Post aliquot cochlearia hausta æger portionem dulcem nauseans de novo copiosa, crassa, viscida & mucilaginosa vomit. Ut ergo cruditates viscidæ melius attenuarentur, saliva ac lymphæ reliqua leniebatur, & stomachus corrigebatur:

R. Salis amm. depur. gr. xv. ad ℥j.  
Dabatur in duplo;  
& optimè profuit.

R. Salis amm. depur. ℥j. vel ℥ss.  
Antihell. Poter. gr. xij. ad xvi.  
Mile.

Divisi in 2. part. æquales.

Continuato etiâ sic sale amm., æger tandem convaleuit.

II. Similis lentæ erat febris, quæ sequebatur post Tertianam legitimam, per pulveres fixos seu præcipitantes obrutam vel quasi curatam: sed superveniens successivè calor mediocris, lentus tamen, continuus pulsus celer, frequens, mollis, magnitudine moderatus, appetitus ferè nullus, cerevisiam vix tolerabat, leviter saltem sorbebat, viscidæ copiosa ore rejiciebat, urina copioso sedimento imprægnata, subindè admodum debilis erat: uno nomine, omnia disposita erant ad hecicam. Usurpabatur sal ammoniacum cum ana lapillorum Cancrorum, vel Antihellici Poterii: item Arcanum duplicatum. Sed etiam his irritis, ob viscidam per oscopiosè rejecta Vomitorium in dimidiata lactem dosi datum; hinc copiosa & viscido-serosa rejecta malum ferè totum levatur: quod superfluum, matutinus usus Eliægris proprietatis, & vespertinus spiritus salis ammoniaci sustulerunt.

III. Similis erat febris lentæ ex acido viscido, sanguinem & lympham inquinante, quæ affligebat Nobilem quendam. Hic post curatos morbillos curationem negligit; unde post aliquot septimanas corripitur insigni lassitudine, & omnium membrorum torpore: accedit semper à meridie mox calor præternaturalis, ita ut circa vespertam non mediocriter alluatet, usque post noctem mediam: manè commodè satis habebat, febre tamen lentâ continuâ superfluit dormis nonnihil inquietè, os ferè siccum semper & glutinosum est, copiosus mucus à meridie fauces opplet, sponde subindè vesperti ad vomitum inclinât, quo tempore etiam admodum anxius est, alvus obstructa, pulsus celer, frequens, parvus, vehemens, caput dolet & perturbatum est: urina turbida cum copiosis sedimentis. Aliis frustra tentatis ordino Vomitorium, quod cum euphoria operabatur: postmodum spiritum salis ammoniaci, & tandem post hujus continuatum usum elixir proprietatis curæ finem imposuit. Nempe acidum morbillorum sub cura temperatum & vehiculo seroso absorptum, non excretum, sanguinem, chylum, lympham, &c. inquinavit, à quorum acidofalsa visciditate talis febris supervenerat.

IV. Par ferè ratio videbatur esse cum alio, contagio Venereo inquinato, ac in utroque inguine bubonibus & excoriationibus parvis circa Glandem corpeo. Hic præmissis Purgationibus Mercurialibus potare cepit Decocta lignorum cum antimonio & Mercurio depurato: sed cum aliquot dies hæc continuasset, incidit in febrem lymphaticam,



cum totius corporis lassitudine, æstu præternaturali, sed certis temporibus, præsertim vespere, (ultim exacerbatante gravissimè, & post mediam noctem usque grassante, ante meridiem redibat, & à meridie sinebatur vespere recurrent, &c. ut adeoque intra 24. horas binos quoque paroxysmos sustineret æger. Pulsus contiuu erat, frequens, celer, ferè parvus, os glutinosum, rejiciebat copiosa viscida, anxius nonnihil erat, & febris hæc lenta ex contagio Venereo acido specifico in materia viscida sanguinem & lympham inquinante, per ista Decocta commoto, non sufficienter prius evacuato corpore, originem ducere videbatur. Paucis præmissis propino vomitorum, à cuius usu rejcebantur copiosa viscida cum insigni euphoria: Hinc

R. Salis ammoniaci scrup. ij.

Propinabatur pro duabus dosibus, semper horà unà ante paroxysmum.

Item

R. Salis amm. 3℔.

Arcan. dupl. scrup. j.

Misc. pro 2. dosibus.

Respectu verò æstus ordinabam:

R. Salis ammoniaci 3℔.

Nigri antimoniaci scrup. ij.

M. pro 2. dosibus.

Hiscæ aliquoties repetitis æstus & symptomata cætera remiserunt.

Tandem, cum adhuc conquerebatur de ore glutinoso & anxietatibus præcordiorum, iteravi vomitorium, & hinc præscripsi:

R. Sp. salis ammoniaci 3 iij.

Propinabatur dosi gutt. 40. bis in die; copiosam, turbidam ac crassam Urinam cum euphoria movit.

Sed omnibus symptomatis evanescentibus, cum appetitus adhuc esset prostratus, & noctes inquietæ resisterent, præscripsi Decoctum sequens:

R. Rad. China in taleol. incis. 3 i℔.

Rasur. ligni sassafr. 3j.

Rad. liquirit. 3vj.

Sant. rubri 3 iij.

Infund. in Aqu. comm. ℔. jv.

Stent in Balneo Mariæ per noctem: manè addatur

Passul. min. unc. iij.

Coquantur lento igne ad remanent. ℔. iv.

De qua colatura data manè & à meridie bonum haustum cepit, semper guttas 40. sinthure antimonii addendo, & ita quoad affectum hunc convaluit, redeunte appetitu & viribus integris.

V. Similis febris lenta est ista, quæ affligit quosdam post scabiem malè curatam, ut observavi in quodam Studiofo. Symptomata erant: prostratio virium, fauces & os siccum, saliva glutinosa, liquidæ alvi dejectiones, calor continuus præternaturalis vel moderatus, pulsus celer, frequens, vehement, parvus; urina cum copioso lætissimo sedimento, appetitus prostratus, sitis intensa, affectus quasi hecticus. Varia & multa frustra tentabam; tandem optimè contulerunt pilulæ ex extracto hellebori nigri cum Mercurio dulci, & hinc crebrior usus essentia viperarum, & tandem spiritus carminativus de tribus.

VI. Pertinet etiam ad hujusmodi lentas etiam Febris Virginea, chlorosi seu Catbexia Virginea juncta, Hectica interdum quodammodo similis, ex creditatibus ut plurimum primarum viarum viscidis, hinc bilis inertia, cum mensium suppressione enata.

VII. Dum pus sit, major calor & dolor, quàm factus pure, adeo, ut dicit HIPPOCRATES: Adeoque in quovis Apoplemate dum suppuratur, febris lenta juncta esse solet; interdum etiam Acuta: v. g. ex lacte coagulato, dum Apoplema sit; vel dum Apoplema sit in auribus &c. febris juncta esse solet, tam diu durans, donec facta sit perfecta suppuratio. Unde hujus promovenda maturatio, & remediis sanguinem congruatim resolvantibus, Acidum absorbentibus, & diaphoreticis & diureticis sanguinem depurantibus, insistendum: v. g.

R. Aqua cberosol.

Scabios. ana 3 i℔.

Ess. myrrhe tartaris. 3 iij.

Aceti vini vel simpl. vel destill. 3 iij. vel 3 ℔.

Lapill. cancr. præp. 3j.

Flor. sulphuris 3 ℔.

Syr. scabios. 3 iij.

Etzmull. Oper. Tom. II.

M. D. S.

Posio febrim maturans: capiatur cochleatum.

VIII. Ulcera insigniora externarum, aut quælibet internarum partium insequi solent Febris symptomatica lenta, ferè hectica, adeoque diuturnæ, & ad tabem ac mortem tandem deducentes, à sanguinis infectione, à pure falsocris viscidis, ut notissimum est, in ulcera pulmonum phibifico. Nec curari hæc possunt, nisi removeatur partis corruptela, & mundificetur & consolidetur ulcus: id quod, Absorbentia supra laudata, poriones vulnerariae alcali divites ex lapillis cancrorum, hederæ terrestri, cheresolio, bujula, pulmonaria, veronica, scabiosa, ut & lignorum decoctum sulphurea balsamica, flores sulphuris, antimonium diaphoreticum, Antihæcticum Poterii, myrrha, balsamus sulphuris, saccharum Saturni, tinctura antiphthifica, Balsamus Peruvianus, terebinthina, præstabunt: de quibus infra, ubi de Phibico. Ac sanè quamplures lentæ, diuturnæ, ac tabifica febres, ex oculis, nec à priori benè cognoscibili corruptione aut putredine, ac lente utrexe seu abscessu partis cujusdam internæ, mesenterii, pancreatis, renis, hepatis, vesicæ, uteri, &c. originem habere solent, & difficilè curabiles, ac sepius lethales ægris existunt: Vid. SCHENCKI. USI. 3. Obs. BARTHOLINUS C. 2. Hist. 19. & C. 4. Hist. 18. Hinc in M. A. N. C. Ann. 4. Append. p. 50. febris lentæ perpetuæ abscessuum latentium comites esse dicuntur.

Pertinent & hæc fistula diuturna, quæ etiam hectica similem febrim inducunt.

IX. Quod etiam facit factus mortuus; aut secundino, vel integra, vel parte sui resecta, hinc putrescens, & in sanem plus minus purulentam abiens, tam sanguinem inficiens, quàm per contactum simul uterum inquinans: haud curabiles, nisi illis remotis, ac putredine, ne latius serpat, supra dictis remediis maturè prohibita, ac parte læsa consolidata.

X. Rari sunt insigniores aut diuturniores dolores quæcumvis partium, quin febrim symptomaticam comitem tandem adificiant, continuo pulsu, celeri, frequenti, in principio vehementi, in progressu debili ac parva, interdum, dum membranosæ partes magis afficiuntur, duro, calore lento seu miti, non adeo magno; siue Acidum vel acre dolorificum massam sanguineam simul alteret, & præternaturalè fermentativum motum inducat; siue simpliciter ex spirituum animalium concitatione impetu, hinc vigiliis, inedia, &c. commoto sanguine intensius, febris quasi synocha simplex plurium dierum concitetur: sic v. g. colicas contumaces, aurium dolorem, odontalgiam graviolem, &c. tandem febricula talis sequitur; quæ tamen consumpto saltem dolore etiam evanescit, & ferè blanda sudatiuncula terminatur.

## MEMBRUM. V.

DE

## FEBRIBUS HECTICIS.

AD Febres lentas etiam suo modo pertinet Febris Hectica, quæ cum his magnam habet convenientiam, & frequentissimè esse solet symptomatica, aut saltem, aliarum febrium respectu, quæ in illam terminantur; secundaria adeo ut negent quidam dari Hecticam primariam, ac per se incipientem: Vid. RIENS P. 2. de Febr. p. 49. Quod tamen ita universaliter vix concedendum videtur; quin & ex perverso usu rerum non-naturalium, v. g. tristitia aut calore diutius protrahitis, excernendis præternaturaliter retentis, vitiosis assumptis, aut saltem malè digestis, Hecticam oboriri possit, Prædici observant.

Est aliàs Hectica lenta admodum febris, & interdum ægro vix sensibilis. Nam calor ejus est admodum lenis, & quasi occultus, qui etiam primo attacku vix est perceptibilis, unde etiam rarò de calore conqueruntur ægri, utut, si diutius continueatur manus, calor morficans & rodens se manifestet, post assumpta tamen alimenta duabus vel tribus demum horis se prodit calor, isque nonnihil acrior, & vehementior. Deinde corpus successivè & insensibiliter emaciatur, & tunc, si ulterius progreditur, consumptio seu Hectica Mara, modes vocari solet, à Græco nomine τῆς vel habitus; partim, quia Veteres crediderunt, utut falsò, hanc febrim inherere ipsi corporis habitui; partim, quia hæc febris ad habitum, seu summum gradum pervenerunt, ut aut planè nunquam, aut rarissimè, curam Medici admittant. Denique pulsus equidem est vehementior solito, ac

T

frequen-



*frequentior, parvus tamen & debilis, simul & celer, & inæqualis, cum successiva & clandestina virium prostratione.* Et hæc sunt tria quasi signa pathognomonica, & primaria symptomata, quibus præsentibus *Hæctica* primaria conicitur & ponitur: Nempe

1. Calor ipsi ægro occultus, vix sensibilis, ab omni passu post aliquot horas audus.
2. Adesse absumptio & extenuatio corporis successiva seu marasmus: &
3. Pulsus celer, parvus, frequens, debilis, & subinde durus.

Hæc tria ubi observantur, audacter pronociandum est, aut adesse, aut imminere *hæcticam*.

De *Febre colliquativa* supra dixi, quæ summus gradus est *Febris hæcticæ*.

*Symptoma*, quod maximè vexat ægros, præter virium debilitatem, est *marasmus* seu consumptio, & marcor succi nutritii partium solidarum, cujus ratione *Hæctica* perfecta in tres gradus vulgò solet subdividi.

*Primus* *hæcticæ* febris gradus est, dum ipsa saltem rorida, mucilaginosa & nutritiva partium substantia, quæ in nutrimentum partium proximum abire debet, successivè absumitur, & quasi dispergitur.

*Secundus* gradus est, quando hæc ipsa substantia rorida jam in pinguedinem, aut etiam in succum nutritivum partium solidarum mutata, & reliquis partibus non nihil assimilata, pedetentim liquefacta, quasi denuò consumitur.

*Tertius* gradus est, cum absumpto omnino isto rorescido, ipsi nonnihil assimilato, ipsa stamina partium fibrosa seu ipsæ fibræ ardescunt tandem & exsiccantur, & hinc siccitatem ac ariditatem sensibus manifestam contrahunt, ægrique tandem sceleta repræsentant pelle induta.

De his videantur *Practici*, in specie *SENNERTUS* & *RIVERIUS*.

Modus generationis hujus febris est duplex: nunc enim est *primaria*, & *per se* incipit; nunc est *secundaria*, & *instar symptomatis* supervenientis alius morbus tandem insequitur, & ita *Hæctica* *symptomatica* seu *complicata* dicitur. Ista *Febris hæctica*, quæ *per se* incipit, est, quæ successivè oritur vitio rerum 6. *nonnaturalium*, ver. gr. à nimio corporis exercitio, labore continuato; quandoque, & quidem primariò ferè, ex tristitia & merore animi immoderatis; quandoque à vigiliis & curis multum protrahis; subindè ab inedia diuturniore; interdum ab evacuationibus corporis insignioribus; non rarò ab illegitimo ac perverso thermarum ac balnearum usu; sæpius ab alimentis pravi & parvi succi non rite in stomacho digestis, & corruptis.

Hæc est causa primaria, & vix sine alimentorum corruptione oritur *Hæctica*: quæ verò aliis supervenit morbis *instar symptomatis*, ac cum iis complicatur, est, quando observatur supervenire febribus continuis, aut intermissis; contumacioribus ac vehementioribus, in specie perverso modo curatis. Sic namque inter alia *HORSTIUS*

l. 1. *Observ.* 34. observat *Hæcticam lethalem*, abortam ex febre intermittente, per Specifica ineptè & empiricè curata. Supervenit etiam *Hæctica* sæpius viscerum plerorumq; specialissimè pulmonum, inflammationi, uti his inflammationibus in abcessus & ulcera degenerantibus, cum quibus partium internarum ulceribus, sicut interdum etiam cum partium externarum abcessibus gravioribus ordinariò jungitur *Hæctica*: quæ ratione Phthisici semper sunt *Hæctici*: Sic *LINDANUS* super *Hartmannum* observavit. *Hæcticam contumacissimam ex abcessu mesenterii* pronatam; item *ex utero*, qui in carcinoma incidere; item *Hæcticam ex ulcere renum*: item observavit *hæcticam* in femina, ortam ex multitudine fonticulorum corpori inuistorum, qui omnem humiditatem ac rorem nutritium absumpserant, quæ tamen curata fuit clausis & sanatis istis fonticulis; quod observetur contra fonticulos. Quin & *huiusmodi* subindè febris lenta, *hæctica* plùs minùs similis, sociari solet, aut sub febre, quæ *hæcticam* simulat, latet morbus *Gallicus*: vid. *ZACUTUS LUSITANUS* lib. 2. *Prax. admir. Observ.* 119. item *FONSECA* lib. 1. *Consult.* 40. pag. 264.

#### PARS AFFECTA.

Vulgò dicitur: *Hæcticam in habitu corporis* fundatam esse & radicaliter consistere; undè definitur calor præternaturalis in partibus solidis ac continentibus incensus & residens, qui tamen non est: quin potiùs instar febrium

aliarum radicatur in massa sanguinea ejusque fermentatione, una cum lymphæ vitiatæ. Prout enim se habent hi duo liquores, in specie sanguis, ita se habet universum corpus: unde etiam particularia ulcera insigniora tibiarum, renum, & quatenus inquinant massam sanguineam circa loca ulcerosa circulatam, inferunt *hæcticam*: Vid. *PIENS de Febris Part.* 2. pag. 46. & 51. Unde etiam calor *Hæcticorum*, lentus imprimis, circa loca arteriarum manifestior ac magis perceptibilis sentitur.

Has inter causas, quas modò numeravi, remotas ista *Hæctica* quæ *per se* incipit, adeoque perversum usum rerum nonnaturalium sequitur, semper est proximè & originaliter ex vitio stomachi ac alimentorum; nempe quando stomachi fermentum loco nativi saporis acquirit saporem falsum acremvè, & ad digestionem plus minus ineptum; hinc enim itidem alimenta in succum viscidum, salium, acrem fatiscunt.

#### CAUSÆ.

Causa proxima hujus febris in massa sanguinea est dyscrasia sanguinis nimis acido-falsa & acris, cum nimia ejus viscositate seu glutinositate conjuncta; quatenus nempe in hoc lymphæ glandularum conglobatarum redditur acris & falsa: unde simul & lymphæ facilis viscositas & glutinositas, idque sensibilibus in glandulis conglomeratis, adesse solet. Hinc in *Hæctici* omnibus saliva non tantum pauca cum ariditate linguæ & faucium, sed & viscida nonnihil, simulque plùs minùs glutinosa percipitur (qualis saliva, talis ut plurimum est succus pancreaticus) simulque sentiunt stomachi pathemata propter lympham vitiosam deglutitam. Ab ista ergo acrimonia salina non blanda & æquabilis fit fermentatio sanguinis, sed potiùs depravata insigniter, simulque quodammodò imminuta, ac consequenter calor acris, lentus, ac quasi obscurus excitatur: Confer. *WILLISIUS de Febris*: Unde & spiritum in corpore defectus, nec non languor totius corporis, & successiva virium debilitas superveniunt, cum particule saline urinose & acide (instrumenta naturæ generalia) non debite invicem intestino motu concurrant, sed potiùs paucae & inertes factæ in tertium falsum coaluerint partim, partim adhuc liberæ ab ista falsedine impediuntur, quò minùs debite fermentent, quin potiùs ex vitiosa fermentatione massæ sanguineæ calorem nonnihil auctum quidem, non tamen intensum adeò, sed tantum acrem & quasi asperum inducant. Hæc ipsa omnia augentur adhuc insigniter à visciditate falsa lymphæ, sæpius à nimia laticis absumptione orta (de qua postmodum) undè magis vitiosa & plùs minùs oppressa sanguinis fermentatio pulsus parvum, celerem, frequentem, & ex virium defectu debilem efficit. Sanguinis hinc falsus simulque viscidus ineptus est, ut nutriat partes, quin potiùs asperitate suâ rorem nutritivum vitiat, eumque acris ac lento calore successivè colliquat; inde corpus necessariò tandem absumitur.

Post passum ergo dum novus Chylus & fluidior, facileque digestibilis alimentorum pars per ordinarias vias sanguini infunditur, dilutus nonnihil sanguinis fluxus redditur, & ob resoluta magis falsa (canon enim est Chymicorum: falsa non agunt, nisi resoluta) etiam attenuata ipsius massæ, simulque alterata supplementa, fermentationem nonnihil acriorem inducit; unde aliquot horas post passum calor auctus cum pulsu frequentiore, & nonnihil majore percipitur, efflorescente simul nonnunquam colore faciei plùs minùs rubicundo. At non diu durat, quin successivè iterum deficiat, & postea præternaturalis quidam supermanet. Sed cum hoc ipsum chylosum excrementitium supplementum minus commode assimiletur sanguini, multò minus aptum est ut assimiletur partibus solidis; propterea subindè tempore nocturno sub specie sudoris copiosi denuò per poros cutis confertim emanat, unde sudores nocturni in *hæctica* confirmata sunt satis frequentes. Propter istam verò lymphæ salivæ visciditatem, simul imminuitur & omnino prosternitur appetitus, superveniente nonnunquam alimentorum istorum fastidio. In vitio enim stomachi semper habenda est ratio salivæ, ut pote quæ multum valet: Nam ex hujus ratione non rarò impeditur & labefactatur plus minus assumptorū fermentatio, ac tandè ipsa sâguificatio, unde necessariò massæ sâguineæ falsæ fermentativa magis magisque obtunditur, ac fiunt inertiora, ac *Hæctica* sic lentè ac successivè fit gravior, & tandem incu-



rabilis: aut quando ex nimia acrimonia lymphæ & massæ sanguineæ idem Chylus novus pervertitur, hinc non potest nutrire corpus, sed ineptus fit assimilationi, ut ita indè exarescant & marcescant partes corporeæ.

Hæc, quæ dicta sunt de *Causa proxima*, confirmantur per omnia ea, quæ tanquam *causa remotissima febrim hecticam* inducunt: hæc enim omnes huc collimant, ut aut *visciditatem* sanguini, & in specie lymphæ inducant, aut in sanguine & lymphæ acrimoniam acido-salsam generent. In specie, quando animo corporis motu ac defatigatione oritur hectica, tunc non tantummodo absumuntur spiritus animales, sed quoque pars sanguinis aquosa vehiculum reliquarum partium subinde dispergitur, ac ros nutritivus simul attenuatus exhalat. Unde necessarii lymphæ & massæ sanguineæ viscidiores & unitis salibus aciores seu saliores fiunt. Quoties ira infert hecticam, toties sale volatili massa sanguineæ oleoso seu bile, ut vocant, acrimoniam excedentem nascitur, fortius afficit acidum, & uniendo cum eodem acrimoniam salinam insignem generat: Quoties tristitia aut morores diuturni Hecticam inferunt, toties acidum immoderatum cum urinoso conjunctum in salsum iners degenerat: Quoties à vigiliis & curis protractis oritur, toties spiritibus animalibus insigniter absumptis, ac tenuibus massæ sanguineæ partibus exhaustis, reliqua massa spissior ac necessarii acrior evadit: Denique in diuturniore inferquitur Hectica, quoties defectu alimentorum temperaturarum acidum & urinosum intimiore unione concurrente tertium salsum acre generant: id quod fit eò magis, quoties alimenta pravi succi aut minus nutritiva Hecticam inferunt; unde subinde fit, ut picæ superveniat hectica vitio malæ dietæ: Conf.

SYLVIUS lib. 1. Præx. c. 32. §. 8. sequ. C. ritum interim est, quod asserit LINDANUS, hecticam propriè sic dictam, & quæ non aliis supervenit morbis, ut plurimum vitio alimentorum, horumque in stomacho vitiosa digestionem oriri: asserit enim se vidisse plures Hecticos ex stomachi vitio, tum ex vitio aliarum partium; & omnes istas Hecticas, quæ oriuntur cum dolore ventriculi, aut quibus talis dolor superveniat, oriri ex stomachi cruditate vitiosa, quæ sit talis, ut neque sit acida neque nidorosa, sed potius sit talis alimentorum corruptela, quæ alimenta in crassiores cibum ac viscidiores salsum acrem degenerant: Unde tales Hectici conquiescunt subinde de sapore cinereo seu sapore singulari, & non explicabili more, imprimis tempore matutino. Unde ut plurimum in hectica sit respiciendum ad stomachum, quod corrigatur ejus cruditas: Imò reliquæ etiam causæ non naturales vix sufficiunt inferre hecticam, nisi simul stomachus ita afficiatur, ut hujus vitio alimentorum deficiat digestio.

Porro continuus febris superveniens hectica fit, quando per cursum morbi, aut copioso sudore exhaustus & omnis latex aquosus, & cum eo ros nutritivus partium: aut, quando in deflagratione, ut sic dicam, febrili massa sanguinea fuit perversa in dyscrasiam acrem nimisque salsam: quod etiam pertinet perversus curandi modus per medicamenta nimis acria. Id quod eò magis fit in febribus intermittens propter nimios sudores, qui ordinariò in fine paroxysmi sequuntur: si tales febres cum talibus sudoribus sint contumaciores ac chronice, & propinentur subinde ante paroxysmum medicamenta salina aciora fixa, aut torrea calcinata, tunc facile fieri potest, ut tandem intermittentes degenerent in periculosas & difficilliores hecticas: hæc enim partim augendo massæ sanguineæ acrimoniam, & absumendo laticem aquosum eam diluentem, unde fit viscidior, partim destruendo fermentum stomachi, adeoque inhibendo omnem digestionem, ansam hecticæ dant. Ipse observavi Febricitantes, si in cursum morbi crebrius usurparunt terrea, sæpius evasisse Hecticos. Quoties denique viscerum primariorum, v.g. renum, imprimis pulmonum inflammationi, in apostema aut ulcus aut empyema degeneranti, supervenit hectica, tunc à pure lymphæ & massæ sanguineæ inficiente tunc acri (cum omne pus sit salsum per effervescentiam ex acido & urinoso) & glutinoso massa sanguinea fit acrior, salsior & viscidior, unde consequenter fermentatio ejus naturalis impeditur: quæ vitia reliquis humoribus communicata hecticam magis confirmatam reddunt. Uno verbo: in quibusvis exulcerationibus internis & externis profundis, v.g. in cancro mammarum exulcerato, oriuntur tales febres.

## DIAGNOSIS.

Quod ergo attinet *signa diagnostica*: tria pathognomonica signa fuerunt suprà enarrata, omnia, soli, & semper hecticæ convenientia: nempe calor lentus post partum exacerbatus; pulsus frequentior, celerior, minor & debiliior; ac denique consumptio corporis; cui tandem sudor nocturnus cum capillorum defluvio supervenit: quibus si accedant circumstantiæ præcedentes ad eam disponentes, e.g. ructus cinerosi, quando scilicet ventriculi fermentum ita est depravatum, ut ructus ejusmodi odorem spirantes persentiscantur, confirmatur eò magis conjectura artificialis Medici: In toto corpore adest lassitudo, si sequens etiam lipothymia: patientes conquiescunt de æstu interno, sequitur atrophia, somnus horis matutinis est rarus.

Hectica incipiens difficillimè cognoscitur, facillimè curatur: Confirmata autem hectica facillimè cognoscitur, difficillimè curatur.

*Urina Hecticorum* in principio sanorum sunt similes; quod etiam observatur in febribus lymphaticis, à saliva & succo pancreatico nimis viscidis, & hinc urinæ sanis limillimè observantur. Sin verò, quod sæpius fit, insignè concurrat stomachi vitium, tunc *urina alba, pallida, crassa & turbida* subinde excernitur; cessante postmodum appetitu & deficiente digestionem urinæ tenuis, perspicua, intensè tincta, &c. excerni solent; hectica postmodum ad *marasimum* progrediente, *urina* progredi solet copiosa intensè tincta, sed in superficie cum crassa seu pelle quasi oleaginosa, id est, pinguedo araneorum telis similis, ipsi supernatat: qualis urinæ facies tamen etiam in duobus casibus observare licet, quam agyrtæ stolidi ac Pharmacopolæ inspicientes, arbitrantur pinguedinem internam resolutam. Crusta enim hæc non confundenda est cum *urina oleaginosa*, reverà tali, quæ in febribus acutis ardentibus, item in febribus intermittens, nimio calore conjunctis, interdum excernitur; quoniam liquefacta corporis pinguedine parum ejus cum urina excernitur; unde tales ægri subito emaciantur; neque cum urina oleaginosa apparenter tali, qualis in *hypochondriacis & scorbuticis* confirmatis subinde apparere solet, quæ tamen non pinguedo, sed sunt potius salia vitiosè concreta, pelliculæ instar urinæ supernatantia.

Ut distinguantur hæc, observetur: quod, ubi est vera pinguedo, quæ urinæ supernatat, semper sit *uniformis*, & ad latum aspectu nullum colorem, nullum splendorem, &c. acquirit: in scorbuticis verò & hypochondriacis hujusmodi pinguedinis quasi crusta innatis, ad latum matulæ adspicua, varios colores, instar *caudæ pavonis* mentitur, vel instar *iridis* elegantissimè coloratæ apparet. Prius, ubi nulla est alteratio, est vera pinguedo: posterius sunt salia vitiosè concreta. Non raro, imprimis autem ubi in corpore internæ exulcerationes, urinæ est additum fabulum copiosissimum.

*Excrementa alvi* in hecticis sunt diversa: Fæces quandoque sunt duræ, imò sæpius in principio & incrementa hecticæ interdum difficulter egeruntur; postmodum verò sunt ad modum liquidæ, & redduntur copiosæ, dum nempe stomachus omnino labefactus nec ritè continet, nec debite concoquit assumpta: In ultimo hectica gradu fluxus alvi terè est continuus, quæ omnium pessima est, & sudores colligativi singulis noctibus ubertim prorumpunt, capilli etiam pedetentim defluunt, unde magis magisque corpus emaciatur, ut isto alvi fluxu ut plurimum hectici intereant.

## PROGNOSIS.

Quod attinet *signa prognostica*: in principio hectica facile curatur; quæ verò magis est chronica, quod propius accedit tibi, eò difficilius curatur; i. e. quod propinquior est primo gradui, eò facilius: quod propinquior tertio, eò difficilius curatur: tertius gradus planè incurabilis est.

Deinde Hectica per se morbum constituens, & ex perverso sex rerum connaturalium usugenerata, facilius curatur, quàm quæ à labe visceris interni orta est; sin verò super venerint exulcerationes internæ, periculo est plenissima.

Hectica febri putride, uti vocant seu, intermittenti, aut continua, vel alii morbo chronico conjuncta, aut



illas curatas immediate insequens, curatu est difficilima, & plerumque lethalis, ægris contabescantibus.

Hectica in junioribus, visceribus validis, cæteris paribus, facilius, in adultis tardius & difficilius in senibus, quotumque se habeant modo, serè nunquam curatur.

Si adsit facies Hippocratica, quam vocant, res serè est desperata: Vid. GARMANNUS de Miraculis Mortuorum, ut & Disputatio D. LANGII de Facie Hippocratica: Ad hæc si accedat hæmorrhæa ac alvi fluxus, aut pili decidant, aut pedes insentur, mors est præ foribus.

Quoad tempus eventus: notum est, quod morbus per se admodum chronicus ac contumax sit hectica, tardus ac difficilis, lentus, & qui subinde diutius solet cruciare ægros, cujus longitudo ac difficultas ætate & corporis constitutione est metienda.

### C U R A.

In cura quod primum respiciendum est: num hectica dependeat à partis alicujus morbo, adeoque sit symptomatice? tum enim cura ad istum morbum, à quo lubindè dependet hectica, est dirigenda: Deinde considerandum: an hectica sit simplex seu morbus primarius? an verò secundarius, seu complicata cum quadam febre putrida? & in hoc casu tollenda prius putrida, & hinc removenda hectica.

Sin verò in se sit morbus primarius, attendendum est, ut

1. Acrimonia sanguinis & lymphæ acido-salina temperetur ac corrigatur.
2. Ut humorum reliquorum, in specie lymphæ, aciditas & visciditas emendetur.
3. Stomachi digestio restituetur.

Hæc ut commodius fiant:

Observ. I. In hectica simplici seu sine febre putrida, quam vocant, seu fermentativa, complicata, nec evacuationes, nec venæsectiones, nec purgationes sunt instituendæ; hæc enim semper vires debilitant, & nutrimentum corporis plùs minus deprædantur. Sed potiùs mediis diæteticis ac pharmaceuticis corpus reficiendum.

Observ. II. Si tamen prima regio corporis, nempe stomachus & intestina, excrementis referta sit, propter cruditates à debili ventriculo productas, tutò Purgatio una alterave lenis absterforia in principio institui potest. In Hecticis copiosissimè Purgantia evacuant, sed plerumque in perniciem ægrorum; deficit enim fermentum acidum stomachi.

Observ. III. Imò si vitio stomachi, ( id quod sæpiùs, ut dixi, fit, ) oritur Hectica, convenit ante omnia vomitorium blandum instituere, si vires adhuc sunt validæ. Audiendum hic est LINDANI consilium, dum inquit: In curatione hecticæ statim ad partis affectu cognitionem incumbere oportet, quæ cognita, ego facilius hecticam quam quartanæ curo; oriuntur enim plerumque ex vitio stomachi: Sic, inquit, curavi uno vomitorio, & hinc cum Elixir proprietatis hecticæ intra 4. dies: Sicuti elixir proprietatis in hectica ex stomacho singulariter commendat idem LINDANUS.

Observ. IV. Inter symptoma, quæ huic superveniunt morbo, præcipuum est & quasi funestum alvi fluxus, ægros faciliè ad interitum produciens; colliquationis enim est. Refrænandus ergo erit, utpote periculofus, maturè & debite remediis ex cydoniis, rosis rubris siccis, lacte chalybeato, unicornu fossili & similibus: uti etiam sudoris uberior effluxus; quos sudores optimè compescunt opiata in parva & probe subducta dosi, vespertino tempore usurpata.

Observ. V. Dulcia, uti saccharata, & maximè mellita, vitanda sunt: Talia enim sunt viscida & glutinosa, obtundunt succos corporis, stomacho nocent, & illos viscidiores & glutinosiores, hinc inæqualem fermentationem, & ita hecticam deterioremm reddere solent.

Si ergo hectica fuerit symptomatice, ad primarium morbum respiciendum esse dixi, considerando ante omnia simul stomachum. Quod si superveniat febris intermittens, vel continua acuta, malè curatis, hectica, ibi præmissio aut omisso vomitu blando utilissimum est sal ammoniacum cum antihectico Poterii mistum, secundum formulas, quas suprà dedi sub Febre lymphatica ex vitio lymphæ glandularum conglomeratarum, succi nempe pancreatici & salivæ, propinatum, quod est egregium

remedium, curans hecticam præsentem, & præservans ab ulteriore progressu: Vel

R. Salis armoniaci depur.

Antib. Poterii gr. xv.

M. D. S.

Pulvis resolvens.

Si abscessum, aut ulcus, aut simile vitium partium internarum inloquitur hectica, illo rectè curato per vulneraria, per remedia sulphurea & antimonialia fixa, item per balsamum sulphuris & similia, faciliè hectica curari potest, utpote spontè interdum evanescens, ut suprà de Febribus symptomatice insinuatum fuit.

Balsamus tamen sulphuris præparandus est non cum oleis destillatis, v.g. oleo terebinthinæ, baccarum juniperi, &c.; hæc namque olea nimis sunt æria, & febrem &c. quæ adaugent; sed potiùs elaboratur cù oleis expressis v.g. oleo amygdalarum dulcis recens expresso, spinæarum, insigniter sunt nutritiva. Huic balsamo jungi poterunt aliquot partes oleorum destillatorum temperaturarum, ex quibus laudo oleum destillatum anisi, & hoc modo forsitan paratur etiam Balsamus Viræ Archiatri Hallensis KEL-LINGII. Notetur saltem, ut pro majore tinctura balsamica extrahenda ignis digestionis adaugeatur. Porro conveniunt etiam pinguedines animalium, quo sensu axungia canina multum præstat; cui tamen præferenda est humana: item butyrum Majale, &c. Ex resinis multum hic præstat ipsa terebinthina, si solvatur in vitello ovi; uti & Decocta plantarum temperaturarum, quæ vulgò vocantur herbæ pulmonariæ, v.g. tussilago, plantago, pulmonaria, galiopsis, aliàs scrophularia, &c. vid. SCHROEDERUS Pharmat. Medico-Chym. lib. 4. pag. 154.

Curato ergo primario morbo, unde hectica dependet, & rectificato stomacho, ipsa Hectica curanda venit. Id quod etiam tentandum est, si ipsa per se morbum constituerit, idque imprimis per remedia Pharmaceutica, & præcipuè Diætetica. Fens. Cbi arguit nihil hic suggerit, nec venæsectione, neque fonticuli, neque scarificationes, nec aliud quid conducunt. Ex Pharmacia conveniunt temperata, quæ salsum temperant, viscidum attenuant, & blandè corporis partes solidas humectant. Hæc inter eminet ros Majalis quocunque modo propinatus. Sunt qui ex eodem spiritum & sal essentielle parare volunt, idque in hectica valde prodesse asserunt: commodè in spiritu rosis Majalis aut ipso rore infundi possunt flores violarum, borraginis, buglossæ, & exinde parata tinctura sub forma Juleporum largiter usurpari. Hujus vicarius est ros vitrioli volatilis, istud nempe phlegma volatile roridum, occultè sulphureum, quod in destillatione spiritus vitrioli priùs erumpit, uti & sine aciditate sensibili progreditur: Hoc insipidum licet serè, sulphurè tamen volatili vitrioli singularum virium est imprægnatum. Hoc phlegma vitrioli roridum subinde rectificatum, aliquoties à capite mortuo cohobatum, intercedentibus quibusdam digestionibus fit remedium ad hecticam egregium, in specie si oriatur ab exulcerationibus partium internarum: Confer MARCUS MARCI à GROENLAND in Philos. Peter. Reg. Ritua Part. 3. sub Sect. 9. ubi de Lapillo Butleri & Driff. Helmontii. Commendant alii & istam aquam, quæ rorellæ seu herbæ rosis solis innatare solet, utpote quam quidam spiritum mundi concentratum appellant, & phthisicis commendant. Res est mira: sub ardentissimo solis æstu guttula continua inhæret huic rorellæ; unde etiam hæc & ejus aqua in phthisi commendatur, quam putò non esse nocivam.

Vulgò commendatur aqua ex carne porcellorum, ostreis, caneris fluviatilibus, & similibus: laudet eadem qui vult, ego sanè minime facio. Subindè conveniunt herbæ, quæ succo pingui sunt plenæ, v.g. althea, symphytum majus, plantago, cichorium, endivia, lactuca, portulaca, nymphæa, borrago & buglossa, radices althææ, symphyti, cichorii, &c. ex quæ his parata remedia, nuclei pinearum, pistaciæ, sebesten, amygdalæ dulces, semina pinguia 4. frigida majora, semen papaveris albi & similia mucilaginosæ, & Electuariorum forma, non tamen nimis copiose usurpata: unde & cerevisia primariò triticeæ, hinc & hordeæ, sunt nutritivæ: In specie passulæ Corinthiæ sunt perquam egregiæ: nempe ut aliàs dicunt, non datur melius hepaticum ac melius nutriendum, quàm rob seu palpa passularum, blanda & perquam temperata, cujus respectu vulgò calidæ & humidæ dicuntur.



dicuntur. Et putarem ego in his perfectam curam heclicam consistere; singulariter enim nutriunt, & temperant omnia acria, maxime salsa; unde etiam à RIVERO tam in Praxi, quam in Observat. Cent. 4. Observ. 43., non secus atque aliis Autoribus multum extolluntur ad curam phthiseos & heclicæ. Sic etiam JOEL in Praxi mirè commendat passulas ad corpus pinguescendum & incrassandum; sicut etiam aliàs in dyscrasia sanguinis temperanda ac corrigenda, & sanguine quasi renovando, perquam sunt egregie: humidæ dicuntur; hinc Decoctum passularum cum rasura ligni sassafras, & radice chinæ, helenii, &c. Heclicis perquam est proficuum. Fit etiam ex passulis vinum per fermentationem admodum elegans, instar vini Malvatci seu Petri Simonis, addendo parum sacchari: quod si præparatum fuerit cum succo pomorum Borisdorffianorum, quod obiter moneo, in malo hypochondriaco est egregium, fortan etiam in hectica. De lapillis cancerorum, & de perlis res nota est, quod reverà in se contingant Heclicorum solamina: sed observetur, hoc verum esse eo sensu, quo notanter dicit HELMONTIUS, quod perlæ & lapilli cancerorum (nam de his idem sentio) si resolvantur in primum suum rorem lacteum, unde concreverunt, tunc sufficiant pro cura heclicæ & phthiseos absoluta. Verùm talem liquorem primogenium obtinere, non omnibus æquè concessum est: nam prout communiter perlæ & lapilli cancerorum tractari solent cum menstruis corrosivis in Magisteria, seu corpora salina seu saliformia, & hinc in liquores, & ita magis magisque destruuntur, nihil conducunt ad curam heclicæ, utur liquor perlatus per deliquium, item corallorum per deliquium, conveniant ad temperandum istum æstum; non tamen sunt perfecta cura Veterum. Interim, qui habere possunt liquorem primogenium horum, eos concedo habere perfectam heclicæ & phthiseos curam. Aliàs Mixtura ex aceto destillato cum lapidibus cancerorum velcum perlis, utiles observantur in Heclicis. Juxta hæc terra foliata Tartari, ejusque liquor ritè præparatus, nobilis est pro Heclicis; item Antihecticum Poterii, ita nominatum ab usu contra hecticam, à ʒss. ad ʒi. Præparandi modus est facilis, sed encheirisis, quæ sulphur Joviale aufertur, non omnibus nota. Communiter prolat colore cœruleo, qui tamen olet impostura: Nam color cœruleus est adhuc de Sulphure Jovis inflammabili, ratione cujus interdum movet vomitus. In præparatione ergo ejus detis operam, ut separatim hoc Sulphur sequenti modo:

℞. Jovis optimè purif. part. v.  
Reguli Antimonii part. jv.

Fundantur in regulum compositum, quicum eriplo niteri fundatur & figatur, ita, ut dum stant liquefacta, agitetur cum ligno, ut per eruptionem flammæ superfluum Jovis Sulphur exhalet: quo facto, solvatur mixtura, & hinc pulvis candidus fundum petens est genuinum antihecticum Poterii, & nobile remedium. Hoc etiam intelligendum est de Sudorifero magno Fabri, item Bezoardico Joviali, quæ debent esse alba, & tamen in officinis sunt cœrulea. Sanè Antihecticum Poterii ab Autore à ʒss. à ʒi. cum conserva rosarum ad heclicæ curam feliciter usurpatum fuit. In horum defectu vel antimonii diaphoreticum ritè fixatum, vel Bezoardicum minerale, aliaque sulphura fixa; item lapilli cancerorum, lapides percarum, ebur sine igne, corallia præparata, mater perlarum, similiaque acrimoniam temperantia cum appropriatis mista optimè conducunt, continuando usum in heclicis, imprimis quos æstus paulò intensior affligere solet quibus subinde aut sal ammoniacū depuratum, aut arcanum duplicatum, Magisterium saturni Mynsichtii, item species dia-Saturni Mynsichtii, cōmodè addi & unà distribui possunt. Post hæc etiam est saccharum saturni, quod est egregium in hectica remedium, in specie si ex ulcere interno oriatur, vel per se, vel quando ex hoc cum vitriolo Martis paratur tinctura antiphthisica, quæ convenit in Heclicis. Dosis gutt. xx. xvj. ad xxx. De alumine & ejus dulcedine saccharata locutus fuissupra, ubi de Febris intermissentibus, quæ ab omnibus Practicis commendatur ad Hecticam: Allegavi POTERIUM & DARIOTTI: consuli etiam potest FABER l. 4. Panth. c. 38. Sunt qui spiritui vini adiungunt spiritum aluminis, unde sic spiritus aluminis dulcis, quo ipso Chymicus quidā in Polonia familiarissimè in hectica utebatur. FABER commendat arcanum sanguinis humani vel cervini ad ʒss. Hoc revocat in mentem, quod habeat BOYLE in Poitof.

Etzmüller. Oper. Tom. II.

Experim. p. 331., qui spiritum sanguinis humani (ex sale vitæ tili dissoluto) & oleum sanguinis humani diversis in locis insigniter ad hecticam commendat. In hectica incipiente ex mœrore animi & animi pathematis tinctura coralliorum cum spiritu cordiscervi egregie contulit, bis in die 30. ad 40. guttulas.

Formulæ sint tales:

℞. Amygd. dulc. vel nuc. pinear. rec. ʒss.  
Sem. 4. frig. maj. ana ʒj.

Cum f. q. Aquæ borrag. vel nymph. f. l. a. Emulso:  
cui adde

Lapill. cancer. præp. ʒss.

Antibest. Poter.

Magist. corall. cum succo citri an. ʒj.

Edulcoretur parum cum Julepo rosar. vel manus Christi perlatae:  
M. D. S.

Emulso confortativa sepius per diem sumenda.

℞. Conf. ros. rub. antiqu.

Flor. borrag.

Tunica ana ʒj.

Rad. cicborii condit.

Amygd. dulc. excors. ana ʒss.

Nucleor. pinear.

Coreic. citri condit. ana ʒij.

Antibest. Poterii ʒj.

Matr. perlar. præp.

Corall. rub. præp. ana ʒss.

Cum f. q. syr. flor. tunice. ʒss. rad. symph. ana f. Electuarium:  
D. S.

Electuarium singulare contra Hecticam, de quo sumantur tres cullæli cuspides per diem.

℞. Antibest. Poterii,

Specif. cephal.

Mag. corall. cum succo citri ana ʒss.

Sacch. Saturni gr. vj.

M. f. Pulvis:

Div. in 2. partes. S.

Pulvis confortans contra hecticam.

Prodest ubi Hectica imminet post febrem ardentem.

℞. Balsam. sulphuris amygdal. ʒij.

D. S.

Singularis Balsamus, de quo sumantur 40. guttæ per diem in calido jusculo.

℞. Cancr. fluviat. viv. N. jv.

Aquæ rosar.

Borrag.

Flor. papav. err.

Cinnam. borrag. ana ʒij.

Contund. in mortario marmoreo, exprime, & adde Syrupi flor. pap. err.

Tunica ana ʒvj.

M. S.

Singularis potio, singulis duabus horis sumenda.

Extrema:

℞. Ungu. refrig. Gal. ʒj.

Axung. hum. ʒvj.

Sacch. saturni ʒj.

M. f. Unguentum. D. S.

Unguentum externum ad spinam dorso.

℞. Unguenti resumpt. usit. ʒj.

Carn. caner. fluviat. viv. optimè contus. ʒvj.

Axung. human. ʒss.

M. S. ut supra.

Sed ultra Pharmaciam, uti dixi, maximam partem pro cura Hecticæ constituit dieta, præmissis necessariò præmittendis, primas vias sc. abstergentibus & mundificantibus, alimenta succulenta & probe nutrientia subministrans, quæ inter excellenti lac & quavis lacticia atque Emulsionones. Convenientissimum est lac muliebri, imprimis si ex ipsis uberibus nutritis sanæ sugetur, ne ab aëre alteretur. Exemplum habet FORESTUS l. 5. Obs. 10. de juvene phthisi desperatâ laborante, qui sibi conduxit nutricem, & lac ex illius uberibus suxit; ex quo non tantum restitutus fuit, sed etiam gravidam fecit eandem (nam lac muliebri stimulat ad venerem) ne novum illi lac deficeret. Aliàs lac asini præ cæteris in heclicæ cura salubre est, cum sit ex animali longævo: in nostro est mare lac bubulum ex bestia sana, & sanis pascuis gaudente, cōmodè Heclicis ordinatur & præscribitur; siue ipsum lac usurpetur, quæ cōmunis est sententia; siue in specie sumatur lac chutyra, à PIENS de Febris P. 2. p. 61. laudatum. Interdum etiam serum lactis substitui potest: vid.

T 3 BAR.



**BARBATUS** de sanguine & serop. 119. Uturpetur autem maturè, nec nimis tardè, sed necesse est vires adhuc nonnihil consent, & etiam stomachus adhuc digerendo nonnihil valeat; his enim deficientibus non multum proderit. Lac caprillum etiam est egregium, quod à quibusdam non sine fructu usurpatur.

In usu vero lactis inferiorum observetur:

1. Ne hæctica adjuncta sit alia febris putrida dicta: item, ne adsit capitis dolor: uem, ne ventriculus scateat excrementis & sordibus acris, ex digestionis vitio natis: item ablit hypochondrium tensio.
2. Ut nihil ferè aut bibatur, aut comedatur aliud.
3. Ut pauco addito saccharo lactis coagulatio impediat: ob id etiam sub usu lactis acidia quævis fugienda sunt.
4. Ut assumatur lac jejune & calidum, adeoque vel immediatè ex ipsis mammis sugatur, vel recentissimè multum adhuc calidum hauriatur, ne alteretur ab aëre lac; facillimè enim est alterationis.

Primum etiam lac alimentum sub tali lactea cura constituat, cæteris non, nisi levioribus & facile digestibilibus, iisque paucis, assumptis. Ante omnia verò exploret Medicus, an æger lactis usum ferre queat? Medicum docet **JOEL** in Praxi, ubi de Hæctica: Nempe ventriculus prius leni purgatione evacuato, exhibeantur ægro initio, 3ij. vel jv. lactis, videlicet si probè concoquat, & nil molestarum ex eo sentiat, nec post assumptum lac gravitatem ventriculo sentiat, aut singultus excutitur, aut nausea vomitusque sequatur, nec calor in corpore, nec pulsus intendatur, tunc potest integrè libra mandari vespere propinari; post assumptum autem lac nec violentius se commovebit, nec dormiet æger. Usus legitimus dicitur lactis communicari in Colleg. Schræderiano Part. 2. Confer. **SENERTUS** de Febribus N. 3. c. 3. p. 351. **JOEL** in Praxi Tom. 5. pag. 37. & **M. A. N. C. Ann. 1. Observeat. 141.** Alimenta reliqua sunt omnia temperata & boni succi, unde pulles, v. g. ex oryza, item juscula avenacea temperata, & hordeacea in statu hæctico conducunt: de quibus **BORELLUS** Cent. 4. Observe. 89. qui multos hæcticos tantum non desperatos usu hordeatorum frequentè restitutos esse affirmat. Item Choccolata, Amygdalata, nuclei pinearum, pistaciarum, semina frigida majora, &c. carnes pullorum porcorum, vitulorum juniorum, caponum, gallinarum & anatum, imprimis ranis & cochleis nutritorum: sunt enim, qui insigniter commendant ranas, earumque coxas, quæ ranarum coxæ frequentè eliduntur in Italia. Etiam testudines laudantur ad curam hæctica, imprimis quidem, quando prius nutritæ fuerint saccharo & farinâ, & post modum coquantur in brodio gallinarum non admodum salito: sc. volunt, ut testudines seu limaces montani per aliquot dies noctesque in jejuniis serventur, postea saccharo & farinâ fiat nutritio duabus vel tribus diebus; postmodum cum aqua & pauco sale coquantur, postremò verò jure optimo galli aut anatis præparentur; hæc enim ratione præparatæ optimè in hæctica conducere dicuntur. Confirmat hoc **AMATVS LUSITANVS** Cent. 2. Curat. 53, qui curavit quendam per pullorum gallinaceorum testudinibus nemoralibus lagnatorum esum, & potum lactis asinini.

Canceri recentes fluviales solent esse admodum usitati, imprimis quorum caro est insignis: certè canceri fluviales, rore alcalino nutritivo turgidi, modò à stomacho digerantur, quocunque modo usurpari, imprimis si ex contulis succis eliciantur, conveniunt: subactus cum Decocto aut succo amygdalarum nobile sunt alimentum medicamento sum: vel cancerorum succus expressus cum butyro recenti Majali non salito missus dat Butyrum antibæcticum quod cõpositum matres famillias vocant die Krebs-Butter, id est: Butyrum cancerorum, egregium restaurativum consumptorum: Conf. **SACHSIUS** in Gammarol. Sunt, qui commendant etiam ostreas in hæctica, quæ simili ratione bene conducunt, si eas feret stomachus: Sic **LINDANUS** super *Harimannum* notabile habet exemplum hæctica, ostrearum usu curatæ: dicit namque fuisse Amstelodami virginem 20. annorum, quæ ex ulcere pulmonum in hæctica incidit, & jam desperatâ salute per aliquot annos decubuerat: huic egræ obvenerat voluptas comedendi ostreas; unde cum ipsi gratificatum fuerit 12. præparatis ostreis,

his avidius consumptis totidem iterum concessæ fuerint: postero die cum ægra senserit, quod ex harum usu se habeat melius, plures fuerint oblatæ, & intra breve tempus magnam eorum quantitate comederit, ac ita brevi in totum ab hæctica liberata fuerit, nupserit, & 8. liberos pepererit. Nempe in talibus habeatur ratio stomachi, ejusque quod appetitum dictamen, & quoad digestionem operatio.

**LANGIUS** in suis *Miscellaneis* commendat anguillam, ut comedatur ab Hæctici, nec hoc videtur absonum: Vid. ejus *Miscellan.* pag. 41. ubi videbitis ejusdem opinionem. Sed præstat tub lactis usu carniū esum intermittere, ne lacti ad corruptionem detur occasio, quia Lactinia sola pro cura usurpentur.

Quod si fluxus alvi adsit, imprimis crassa alimenta conducunt, ut de oryza, pultes farinacci, lac chalybeatum propinetur.

Hæc sufficiant de Febribus continuis, ad quas pertinent etiam primariò Febres malignæ.

## CAPUT VI.

### DE

### FEBRIBUS MALIGNIS.

**F**ebrium in benignas & malignas communis est divisio, cujus supra, ubi de Febribus in genere actum fuit, mentionem fecimus ( hæc enim non, nisi gradualiter differunt. )

Quod ergò attinet Febres malignas, seu viros malignum, & hujus summum gradum, sc. pestilentialē, ita dicuntur propter similitudinem ab hominibus malignis, qui sub specie recti decipiunt. Nam apparenter sunt tales morbi ordinarii, quoad externa signa aut externam formam apparent boni, in se autem reverà sunt pessimi, & gravissima symptomata inferunt. Sunt autem hæc ipsa materialiter nihil aliud, quàm nomina, quæ fortuntur hi morbi per metaphoram, & in sensu Medico significant certam causam morbosam occasionalem seu materialis, & inde ortorum affectionum statum & conditionem, secundum quam febris ab ordinaria sui natura & nocendi consuetudine, respectu nempe corporis universi patientis, violentius agunt & peiores fiunt, ut quasi veneni naturam acquirant, & consequenter summum periculum & mortis metum inferunt, quæ pejor conditio causæ morbosæ per vocabulum malignum solet exprimi. Hæc ergò ratione non tantum febres, tam intermittentes quàm continuas acutæ, sunt malignæ & benignæ, sed etiam malignitas & benignitas communis est affectio omnium morborum, ut interdum sint benigni, interdum maligni: sic dantur angina maligna, pleuritides, dysenteria, cholera, diarrhæa, benigna & maligna, & sic consequenter etiam in aliis morbis quidam sunt maligni, quidam benigni: In specie tamen in febribus attendenda venit malignitas.

Interim morbi maligni non iidem sunt cum contagiosis; dantur enim febres contagiosæ, quæ non sunt malignæ, ut scabies contagiosa sine malignitate, item coryza, & vice versa malignæ sine contagio.

Ex his prædictis describitur Febris maligna. Jam ergò uti alius affectus quivis, ita in specie illa febris nomen malignæ acquirit, quoties subito ac inexpectatè vires ægri prosteruntur, aut symptomata occurrunt majora seu longè graviora ac insolentiora, ac aliàs in affectu simili, aut ex causa ordinario modo constituta oriri possunt. Ex quibus sequitur fundamentum diagnosticum febrium malignarum, tales scilicet morbos maximè esse periculosos, aut speciatim febres acutas malignas, adeoque subinde brevi ad mortem terminari, vel repentinâ symptomatum truculentia, vel subitaneâ virium sine causa manifestâ prostratione, quâ ratione idem ferè cum veneno socerunt. Sic verbi gratiâ febris talis ex vitio digestionis primæ sub nato fermento febrili est tertiana intermittens, si more aliàs solito omnia procedant, est benigna; si autem in hac tanquam in ardente subinde immolant vel crebra animi deliquia, convulsiones, deliria, vel ægros anxios admodum cum pulsu parvo in vigore paroxysmi existere videmus, aliaque symptomata in tertianis gravius longè, quàm conditio morbi requirit, & planè insolentia affligunt, tunc latet anguis in herba; significat enim fermentum febrile ejusque seminem depravatum & corruptum.



*corruptum, subest malignitas, diciturque Tertianæ maligna:* Item in Tertianæ ardente, si nulla addit sitis, utut naturaliter esse debeat, suspecta est res, & malignitas subesse dicitur: Si in continuis adeit sitis clamorosa cum erudis fecibus, rubra & squalida lingua, præsumptio est febris malignæ: Item si homo aduc in neutralitatis statu esse constitutus, seu apparenter sanus, aut quoque febre apparenter miti correptos, secundâ aut tertiâ die conqueritur de maxima & subitanea virium prostratione citra causam manifestam, hoc subinde solet innuere & prædicere morbum malignum.

Vires autem primariò prosternei solitæ sunt imprimis vitales, successivè etiam animales dictæ, utut pro affectuum varia ratione nunc hæ, nunc istæ magis, nunc utraq; simul affligi soleant. Differentia tamen, ut in principio malignas cognoscamus, non adeò est cognita: latent subinde febres malignæ in principio, & levioris morbi speciem repræsentant, exercitioresque interdum fallunt, unde etiam malignæ & mali moris dicuntur; quantum tamen viribus & vitæ insidientur: Si enim tertiâ vel quartâ die se prodit malignitas, hoc nimium sit tardè, & occasio medicinam parandi præterlapsa est. Unde sumus cauti in febre maligna maturè cognoscenda, ne in perniciem abeant symptomata, quæ in febribus malignis affligunt.

Cognoscuntur imprimis ex pulsu, vel mox in principio nimis debili, vel subito nimis debilitato & parvo, qui vires animales & vitales prostratas denotat: Quando acidum est forte, pulsus magnus; quando verò acidum depressum est, & regnare incipit, sit pulsus parvus. Pulsus magnus fit à sanguine omnes arterias dilatante, & hoc est à nimia turgescencia & fermentatione, quæ fermentatio ex majori concursu salium.

Inter symptomata illa, vel majora vel insolentiora, quæ ordinariè in malignis affligunt, sunt multiplicia, adeò, ut nullum ferè sit symptoma extraordinarium, quod non subinde in una alteravè maligna febre observatum fuerit: v.g. *hydropobias* in febribus malignis observavit SALMUTH Centur. 2. *Histor. 52.* Item SANCHEZ in *Obs. Medicis.* Interdum malignitas est tanta, ut partes nunc internas nunc externas *sphacelo ac gangrenâ* correptas observare liceat: Confer. HILDANUS *el. 3. Obs. 93. & 95.* item SALMUTH Cent. 1. *Histor. 7.*

Sed quæ frequentius ac ordinariè magis in febribus malignis observavi symptomata, sunt: 1. *Subitanea virium sine causa manifesta, eaque ferè omnimoda prostratio*, quæ suspecta est Medico; ita ut etiam longè major in his febribus esse soleat, quàm in aliis, & nunc in principio febris, nunc subinde tribus ac 4 diebus ante decubitus, ac imprimis in brachiis ac curibus, percipiatur talis virium successivè defectus: appetitus mox in totum prosteruitur, cui interdum nausea & fastidium ciborum succedit; & quamdiu aliquid iusculi, vel tantillum alimenti sine nausea, aut insigni adstantium persuasione ægri assumunt, semper bonum est signum, imprimis, si adhuc saporem percipiunt genuinum, & non dicunt: *sapit instar ligni fracidi*: quod etiam, valet si potum ordinarium, v.g. cerevisiam lupulatam, ferè valeant, nec illam avertentur. Calor non eam habet acrimoniam, quam aliæ febres benignæ fermentatione seu putride, si nempe ejusdem generis benignas & malignas conferamus. Symptomata tamen sunt graviora: rarò foris adeò intensus, atque in febribus continuis ulcratis seu benignis, sentitur calor, potius interiora uruntur, exterioribus moderatè calidis: Interdum ægri dicunt: *urit in corpore*, & monstrant regionem stomachi seu præcordialem. Certè quando ægri conqueruntur de nimio calore interno, & tanto causo partium internarum, utut externè parum aut mediocriter saltem caleant, prævum malignitatis, & ut plurimum viscerum inflammatorum, tandemque sphacellatorum signum esse solet, ut è cadaverum sectionibus notum est. Undè facillè patet: quare febres malignæ sine exanthematibus nonnunquam pejores sint, ac eæ, in quibus talia copiosissimè erumpunt?

Sitis citra æstus rationem intensissima est, cum ardore faucium, lingua arida, scabra, &c. tandem nempe urget in febribus malignis sitis, ut communium febrium conditionem longè superet; & cum æstus in malignis non soleat effectantur, quantus in ardentibus, imò interdum adeò mitis, ut ægri de eo non conquerantur, nihilominus tamen gravissimè urgeat sitis cum viribus prostratis, signum est, subesse malignitatem. Ægri qui insigniter

Estmull. Oper. Tom. II.

calent, & tamen de nulla siti conqueruntur, simi liti, malignitatem adesse monstrant. Hoc an sit periculo sumum, vid. in LANGII *Miscell. Cur. p. 38. item in Epistolis.* Quod si potus retinguenda sitis gratiâ porrectus non solum nihil profit, verùm etiam simul fluctuationem & anxietatem pariat. & lingua vix abluta, scabra & arida denuò reddatur, suspiciendum est de latente malignitate.

Somnus brevi post deficit, & graves agrypnæ ægrum affligunt, eaque nunc sunt anxiosæ, nunc absque anxietate. Hæc ex affectu nervoso genere & spiritibus animalibus: Ille ex stomacho & præcordio malè habentibus originem ducunt: quibus deliria & convulsionès infallibiliter supervenire solent: interdum etiam citius, quàm febris fert conditio, deliria adesse solent, quæ semper innuunt malignitatem, & sic adrept tandem mors. Rarum est, quod somnolenti observentur ægri: quod si corripiantur somnolenti, est coma vigil. Pulsus in talibus febribus, imprimis initio, sæpius naturali pulsui est simillimus, aut non multum ab eo discrepare videtur: postmodum tamen subito debilitatur, fitque parvus, celer, debilis & frequens; subinde, imprimis in statu talium febrium, pulsus est inæqualis: interdum mox ab initio pulsus formicanti est similis, i.e. minimus & frequentissimus: durus etiam subinde in febribus malignis est pulsus. In genere, uti in febribus continuis, quæ plùs minùs simulant ardentem benignam, pulsus est parvus, celer & debilis, certè colligendum est, malignitatem subesse, adeò ut, quandiu non nihil magnus existit, vel quantocumque parvus nonnihil major evadit, semper bonum esse soleat. Præterea ægri sunt inquieti sine manifesta causa & anxii, & interdum investigatio insignis & major longè, quàm ratio febris inferre, adesse solet. Inquietudo illa anxiosa non semper toto sit corpore, sed nunc brachium unum vel alterum movent, nunc pedem agitant, aut extra lectum exserunt, nunc integumenta hinc inde trahunt, nesciit, quare hoc faciant. In febribus benignis frequentissimè etiam sunt anxii & inquieti ægri, ut plurimum mox in principio morbi citra causam legitimam, frequentius in incremento & statu: Sedem habent in stomacho, & ibidem angunt ægros, atque tunc conqueri solent, se sentire tantam cordis angustiam: Interrogati, ubinam esset ipsis illa angustia? monstrant scrobiculum cordis, respiratione liberà tamen, & non impediri existente: sed tunc virium hæret in recrementis variis, nunc pituitosis, nunc, idque frequentius, nidorosis aut biliosis, stomachi officium superius afficientibus: & si simul à contagio fuit malum, nauseant ægri, & sæpius vomitum ratiuntur.

Interdum quicquid medicamentorum porrectum fuerit, denudè vomunt, & cæteroquin contentorum nihil. Subinde conqueruntur in istis anxietatibus: modò vomere possent, dicunt. Hinc sæpius observavi, quibuscumque vomitorium in primo malignarum insultu dedi, hi omnes morbi cursum, siue salutaris siue lethalis fuerit, quieti & tranquillæ, summâ etiam prostratione virium existente, transegerunt, in specie si contagium basium fuerit, adeò, ut hoc in casu unum ex primariis videatur auxillis vomitu, maturè provocatus. Anxietates istæ cessant per sudores leventur, tamen sudoribus cessantibus redeunt. Nempe hoc in casu non semper copiosa materia peccans aut sordium saburra adeit, quæ stomachum afficiat; sed effluvia illa termenti febrilis maligna, quæ dum sudoris medio distillantur, primæ viæ ac præcordia liberiora sunt: sed illo suppresso, eadem interiora versus ruunt, & anxietates inferunt; non secus scilicet ac diarrhœa ex suppressa diaphoresi interdum oritur, & contra hæc aucta illa cessare solet. Urus ut plurimum pertinaciter consistatur: Id quod ferè melius est, præsertim quando excretio cotanea expectanda, quàm si frequentius sit fluida, quod interdum fieri solet, & tunc excreta liquida instar fecum sunt conspicua, ut plurimum pessimè olentia; estque uno nomine super fluxus talis colligativus. Urine ut plurimum sanorum urinis simillimæ, ita, ut hæc in febre maligna, quæ tali, nullas patiatur alterationes, quin ægri interdum intereunt febre malignâ correpti cum urinis optimis, & sanorum simillimis: vid. SCHENCKIUS l. 2. *Obs. p. 278:* idque tùm temporis, imprimis quando primaria febris ardentis concurrant symptomata. Unde tales urinae præsentibus aliis pravis signis, certum malignitatis indicium præbent. Quod si verò mutatae appareant, id non tam ratione febris ut malignæ, quàm ex medicamentis aut alimentis, aut ipso statu massæ sanguineæ aut morbum, id evenit. Interdum urinae in



*Statu turbida sunt, sed sunt tennes & crudæ, indeque vel paucæ vel nullo sedimento; simul etiam color talium dilu-  
tior est, qui tamen nil boni denotat. Unde malignis in  
febris coctionis & cruditatis ratio ex urinarum inspe-  
ctione habetur tanta, quanta in benignis: Interdum,  
R I V E R I O teste, urina in statu concocta apparet, licet  
ad incrementum ruant ægri. Interim tamen, etiam si pesti-  
lentiæ habuerint ægri, modò tamen in summa virium pro-  
stratione urina excernuntur crassæ, ac sunt turbida, & sedi-  
mentum plus minus copiosum, vel candidum, vel lateri-  
tium simileve, sed æquale, deposuerint, tamen semper  
bonum signum est, & nemini cum tali urina intereun-  
tem observavi: Quin & sudores antea impossibiles, aut  
similes huic excretionibus cutaneæ, sponte prodire solent.  
E contra in febre maligna, etiam melioribus signis præ-  
sentibus, urina tamen crudæ & perspicua, licet crassâ & in-  
sensu mixta existente, & ita perdurante, tamen nihilomi-  
nus intereunt ægri, utut etiam in tali clara urina aliquid  
quasi sedimenti flavescentis seorsim natate videatur; hoc  
enim chyli portiuncula est, ex assumptis cum urina se-  
creta. Excreta hæc vesicæ & alvi insigniter fortentia,  
aut gravi fœtore imprægnata, malignitatem pestilentia-  
lem interdum denotant. Facies taliter ægrotantium so-  
let interdum esse terrea, & à statu naturali multum muta-  
ta, livida interdum aut plumbea. Cerebri & partium  
nervosarum morbidæ seu malæ affectiones subito indu-  
cunt, neque legitimam inter se proportionem obtinentes,  
malignitatem denotant.*

*Capitis dolor intensus, in specie in capitis summitate,  
affligit. Dum sudant ægri, sutoris odor, imprimis in  
progressu, est quasi dulcis, qualem odorem spirant cada-  
vera vel carnes animalium, dum putrescere incipiunt,  
ut frequenter observavi. Sanè notum est, naturalem su-  
dorem habere saporem salum plus minus urinolum. Ego  
observavi in muliere tertianâ duplicatâ cū arthritide vagâ  
laborante, quod acidissimum sudorem sudavit. Dubito au-  
tem, an unquam apud ægrum febre malignâ periculosè cor-  
reptum acidus sudor observatus sit? Ulterius non raro  
adest difficilis Respiratio, idque speciatim in iis malignis,  
in quibus excretio cutanea vel imminet, vel conjuncta  
est; hæc enim vel impedita, vel suppressa, respiratio-  
nis supervenit difficultas, cum inquirunt, restitute ipsi  
in collo, neque velle descendere. Quæ sere ad mortem ap-  
propinquantibus supervenire solent; unde ab adjunctis  
symptomatibus variis variis tunc tortiuntur appellatio-  
nes febres malignæ, ut nunc febres petechiales, à pete-  
chiis seu maculis hinc inde manifestantibus & corpo-  
ris cutem tingentibus; ac, ubi hinc inde erumpunt tu-  
berculi minora rubicunda, morbilli; nunc à pustulis seu  
tuberculis majoribus suppurantibus, ac crustam teridam  
relinquentibus variolæ; nunc ab excretionibus cutis miliari,  
quando, prout grana sunt vel rubra vel alba, Purgura ru-  
bra & alba, Germ. der. orthe und Weiße Triel appellari  
solent; quæ alba puerperis solet esse molesta & lethalis.  
Maculæ variz superficiales in toto corpore, ac præter-  
tim in lumbis, dorso ac pectore apparentes; vel etiam bu-  
bones aut tubercula, simul ac carbunculi erumpentes,  
malignitatem maximè denotant ad naturam febrium  
pestilentialium accedentem. Et hæc est differentia in pete-  
chis & aliis malignis, quod prius afficiatur pectus, lumbi,  
ac dorsum: contrarium fit in variolis, quæ prius caput  
occupant. Variant subinde hæc symptomata in febribus  
malignis, ut nunc plura, nunc pauciora adsint: sed sæpe  
latent tales febres, ut non, nisi tardè, Medicus eas valeat  
internoscere. Sed suspicio earum oritur, si in specie hæc  
septem adsint: nempe*

1. Subitanea virium prostratio, citra manifestam cau-  
sam.
2. Appetitus penitus dejectus citra causam ordinariam  
& manifestam, licet omnes functiones sint natu-  
rales.
3. Vigiliæ pertinaces mox à principio morbi, etiam  
citra quancumque causam ægrum vexant.
4. Quod urine tales sanorum similes sint.
5. Pulsus plus minus debilis.
6. Cum queruntur, restitute ipsis in collo, neque velle de-  
scendere.
7. Quod citra calorem frigus admodum sit aut intensa,  
cum auidra lingua & faucium, aut interdum pla-  
nè nulla.

Talia ut plurimum febrem malignam gravem innuunt,

idque eò magis, quò anxii magis & inquieti sine causa  
manifesta ægri existerint.

Quia etiam critica symptomata nonnunquam malignita-  
tis signa mentiuntur, ead in distinguere docet POTER-  
US l. 1. de Febris cap. 18, nempe omnia symptomata gra-  
via, quæ apparent antesigna coctionis, morbi maligni ratio-  
ne sunt; quæ autem post coctionem, dependent à conflictu  
naturæ & morbi, utque maligni habent, præter speciem  
& apparentiam.

Quoad afficiendi modum: febres hæc malignæ nunc,  
ut ut rariùs, privatæ sunt, unum alterumve hominem ob  
causam singularem internam sicut invadentes, nunc,  
idque crebriùs, epidemicè grassantur in plures, causam-  
que communem habent aerem, vel alimenta vitia.

Porro febres malignæ sunt vel nò contagiosæ, quæ adflan-  
tibus aliis nullam noxam inferunt. Frequentissimè autem  
simul sunt contagiosæ, alioque inquinare solent. Ra-  
rum est, febrem propriè dictam malignam, si gradus sit  
excellentior, non esse contagiosam. Hinc observanda ve-  
nit febrium malignarum differentia à LINDAN O super  
Hartmannum innuata:

1. Febris maligna simpliciter, v.g. quando morbus, aut  
Tertianæ continua, vel intermittens, suâ naturâ  
benigna, ex degeneratione causæ occasio nalis seu  
fermenti febrilis, ex parte acrioris & subtilio-  
ris, pessima interentis symptomata, facta est  
maligna.
2. Maligna contagiosa, v.g. petechialis, febris castrensis,  
vel Morbus Hungaricus: quò ut plurimum etiam  
pertinent jam dictæ epidemicæ malignæ.
3. Febres pestilentes: quarum summus gradus est
4. Pestis ipsa, Rex morborum.

Quoad malignas contagiosas: Fundamentum harum con-  
sistit in tali fermento maligno spirituosum, (h. e. quod ob  
acrimoniam malignam summe actuum, adeoque sui me-  
diante intestino quasi fermentativo motu apta in materia,  
multiplicabile existit; ob volatilem verò & spirituosam natu-  
ram spiritibus nostris imprimis communicabile, & hinc ab-  
sque activitatis impedimento in distans quoque diffusi-  
bile & summe penetrabile est;) quod aura, seu odoris instar,  
adeoque in minima mole consentis nostris, præsertim  
spiritibus nostris, sociatum assimilationis modo se multi-  
plicans, effluviarum spirituosorum medio disseminatum,  
spiritibus sibi symbolizantibus se sociat, licet etiam sanum  
infect; hujus massam sanguineam fermentando, aut potius  
ad putredinem disponendo. Ut enim tantillus fermenti  
odor sæpe integram cellam cerevisiæ & vini potest turbare;  
ita simili ratione vel tantillum contagioli in asmatice fer-  
mentativa potestate sæpiùs afficere potest multos homines.  
Nempe contagium hoc ex ægri corpore exspiratum non soli-  
tariè, sed cum substantia spiritus insui unâ exhalantis  
sociatum, videtur se imprimis associare munia nostræ spi-  
rituali vitali, unde hoc appropriatum est ad corpora hu-  
mana; & hinc v.g. in peste humana saltem homines, non  
verò alia animalia, inficiuntur. Propter hanc munitiam  
contagiosam fit morbus contagiosus in consanguineos, qua-  
tenus igitur eos est convenientia spiritus vitalis, seu radi-  
cis munitatis; unde faciliùs ab ægris consanguinei, quàm  
alii homines, affici solent.

Contagium duplici modo afficit, nunc per contactum corpo-  
rale, nunc in distans. Per contactum corporalem fit vel im-  
mediatè per ipsum contactum corporis sani vel ægri, vel me-  
diatè, mediante certo fomite, v.g. mediocribus vestibus, ali-  
mentis & similibus. In distans, seu virtualiter, mediante aere  
per inspirationem se multiplicare solet. Contagium hoc virtua-  
le, quod cū aere hauritur, & se nobis insinuat, sæpiùs feb-  
res malignas ac pestilenciales constituit; hoc, præter sangui-  
nem aut ipsos spiritus per pulmones circulator, in specie  
orificium stomachi superius graviùs affligere solet. Quod  
immediatè afficiatur stomachus, etiam patet ex eo, quod  
tales infecti, ubi alias nullam alterationem senserint,  
conquerantur tamen mox de quadam molestia in orificio ve-  
triculi superiore, quàm molestiam sæpiùs sequitur nausea, quæ  
nausea si superveniat, bonum est signum, inquit enim stoma-  
chus insurgente nò, cōtra malignitatē, nec statim fuisse nimis  
alteratū si modò massa sanguinea a nullo miasmate altera-  
ta sit: Et rectè dicit LINDANUS, in constitutione epide-  
mica hoc observandum esse, neminem spontè & sine  
causa manifesta nauseare (nisi forsitan hoc sit ex ingluvie)  
nisi qui maxima contagiosum suscepit, à quo ventriculus  
irritatus nauscat; unde etiam subito præsentē tali nausæ  
pro-



profectus est vomitus, ut succurratur naturæ nauseanti. Multi statuunt partem affectam in febribus malignis esse stomachum: quod facit H E L M O N T I U S qui dicit, febres malignas consistere in convexo stomacho, alii: dum observarunt escharam & gangrenam in stomacho, statuunt, solitariæ stomachum esse affectum. Modus, quod contagia stomachum afficiant, non adeo est clarus: Probabile est, afficere contagium *stomachum*, quatenus aer haustus contagio plus minus inquinatus & impregnatus salivam inquinat, quæ ita imprægnata subinde per gulam descendens, stomachum afficit, & contagium ibi deponit: hinc optimum præservativum habetur saliva exspuitio, quamdiu nō cum personis infectis vel loco suspecto reselt: Vid. M. A. N. C. Ann. 9. Obs. 170. Non enim possum consentire Helmontio, qui dicit, cribrari aerem per pulmones, & ex iis transire per diaphragma, & hinc ad stomachi ambitum pertingere: sunt liquidem viæ nimis dubiæ: id quod videtur confirmari per opinionem BARTHOLINI, qui asserit, quod in febribus malignis affectus locus primarius semper sit stomachus, ex eo, quod in quibusdam, febribus malignis ardentibus demortuis, in ventriculo vel inflammatio, vel eschara, vel sphacelus, vel similes affectus observati fuerunt; utat præter ventriculum intestina aliæque viscera interna reperiantur interdum similiter sphacelata, postquam ægri in cursu morbi de nulla molestia conquesti fuerunt, quàm de causa interno: vid. BARTHOLINUS Cent. 3. Hist. 68. & 80. uti etiam in Cent. 3. Epist. 42. item HELMONTIUS Tumulo Pestis pag. 843. & PANAROLLUS Pent. 4. Obs. 3. Sicut enim alias ventriculi orificium valde sensibile est, ita etiam à contagio, systema nervosum afficiente, illa ventriculi molestia oriri potest, quatenus miasma malignum intra corpus inspiratum spiritus & systema nervosum semper aggreditur; adeoque nil obstat, quin allegatæ ventriculi erosiones interdum etiam productæ morbo habebantur, simili modo, ac carbonculi & bubones in partibus externis conspicui.

Quoad febres epidemicas, malignis privatis, & quæ ex particulari contentorum corporis, præsertim in primis viis, dyscrasia, & hinc maligna volatili acrimonia oriuntur, opopolitas: hæc vel visio atmospheræ, vel visio vidus generari, & his mediantibus in plures grassari solent. Quod si contagii simul accedat violentia, collatiùs diffundere se solent. Atmospheram quidem multiplicia effluvia inquinant, vel ipsa hœbit in se hostilia & maligna, vel mixto balitu in associatione nobis contraria facta, vel (quod inclinât HODGES Tract. de Peste Londinensi p. 39.) spiritus nigro-aëreus alterativus, & quasi corruptivus, quod minus ului vitali nobis ampliùs inservire queat.

## C A U S Æ.

Ceterùm quæstio hic est in specie: quæ sit causa proxima febrium malignarum? seu in quonam consistat ratio formalis venenositatis, malignitatis aut virulentiae? (nam hæc tria sunt synonyma) tam morborum malignarum in genere, quàm in specie malignarum febrium?

De hac controversia in specie 4. primariè prostant opiniones.

I. Opinio docet: consistere malignitatem in febribus malignis in singulari quadam putredine ac corruptione humorum, quæ humores in sensiore putredine quasi afficiantur, & ita totum corpus putridum quasi reddatur. Verùm eo ipso, dum non explicatur, in quo consistat talis putredo seu corruptio? aut quid per eandem intelligant? sententia hæc neminem sapientiorē reddit.

II. Opinio est WILLISII Tr. de Febrib. cap. 13. & aliorum quorundam modernorum, qui volunt: In febribus malignis sanguinem disponi in coagulationem præternaturalem, ita, ut hinc inde semi-grumosus hæreat, sicque circulum naturalem turbet; undè etiam tam cetera superveniant symptomata: quam WILLISII sententiam apprehendit D. JOHANNES DANIEL MAJOR in Tract. de Chirurg. infusoria, & huic chirurgiam suam iofusoriam supertruit. Confer. etiam RIOLA-

NUS Eucheir. Anat. l. 2. ca. 27., qui in febribus ardentibus malignis aliquoties vidit sanguinem concretum intra venas instar medullæ sambucinis; quod etiam observatum à FERNELIO l. 6. Physiol. cap. 7. & SIMON PAULI in Parechasi de Febribus Malignis §. 8. Verùm, quod raro aut non semper addit talis sanguinis coagulatio, non solum per experientiam refutari asserit SYLVIVS, qui se observasse affirmat, sanguinem venæ sectione aut per nares evacuatam vix concrelescere aut coagulari, quin potius nimis fluidum, liquidum ac tenuem, apparere, à qua sanguinis fluiditate potius, quàm coagulatione, febres malignas deducendas esse asserit; sed etiam non ineptè rejecit CAROLUS LE FONT, Medic. Doctor in Academ. Avenionensi in Gallia, Tr. de veneni Pestilentialis natura in cura Diss. 1. cap. 13., qui potius venenum corrosivum de natura arsenici causam pestis, hinc & mutatis mutandis, febrium malignarum statuit.

III. Propterea ipse SYLVIVS in Praxi, ubi de febribus malignis, item de Peste, malignitatis cujuscunque naturam & causam materialem in acrimonia nimia, nunc luxurians urinsosa, nunc acida, consistere asserit: vid. Tr. de Lue Venerea §. 130. in specie autem in febribus malignis peccare acrimoniam salis volatilis alcali nimis acris, acidum nostri corporis destruentis, atque sanguinem & lympham dissolventis, & nimis fluidum reddentis, atque ejus consistentiam naturalem destruentis; adeo, ut ex deperdita consistentia, ejus eurgescencia & rarefactio in corde impediatur, quin & spirituum animalium generatio imminuatur; undè stillicidia sanguinis, hæmorrhagiæ, esse signa sanguinis nimis fluidi à sale volatili acris dissolvente: Confer. etiam SIMON PAULI l. 1. c. qui salacrem in sanguine radicatum & fundatum statuit febrium malignarum proximam causam: Confirmant ex eo, quod acida curent & præservent à malignis, & quod sulphurea in febribus malignis proficiunt.

IV. Opinio est eorum modernorum, qui malignitatem febrium consistere volunt in verminatione, seu, uti vocant, putredine & corruptione animalata, cujus sententia Patronus est imprimis KIRCHERUS Tract. Scrutinium Pestis, aliàs elegantissimo. Consentit eidem LANGIUS in Præfatione hujus scripti, & Dissertatione de Morbillis, uti & AUGUSTUS HAUPTMANNUS Tract. de viva mortis imagine, item in Epistola de hac materia ad Petrum Johannem Fabrum scripta, & Tract. de Theriis Wolkenkleinernibus. Volunt nempe hi, in omnibus febribus malignis & ulceribus gangrænosos talem adesse putredinem sanguinis, ut exinde copiosissimi & minutissimi generentur vermiculi, qui ubique scatentes & corpus lancinantes tam varia inducant symptomata, necesse est. Nec deerit experientia: in variolis sanè minutissimos vermiculos refert BORELLUS in suis Observationibus per microscopium factis: Sic PETRUS à CASTRO in Peste Neapolitana bubones vermiculis scatentes, & Emplatra bubonibus applicata vermiculis innumerabilibus referta fuisse observavit. Sand KIRCHERUS non solum in Scrutin. Pestis, sed etiam in Arte Magna Lucis 9. Umbra l. 130. Part. 2. Pragmat. 2. innumeros vermiculos minutissimos in quavis febre putrescente, in plantis putridis, aceto, lacte, cadaveribus, lignis, fructibus, nec non in sanguine Febricitium, in cerebro hominis, aliisque ejus partibus ex putredine ortos per microscopium observavit: vid. etiam Munus subterr. KIRCHERI lib. de veneno pag. 107. Quinimò & HAUPTMANNUS per microscopium in sphacelo ex lue Venerea oborto observavit quæmplurimos vermes ad instar limacum, Germ. Wie Schnecken, sed minutissimos, qui carnem non secus ac vermes castum, morficantes erodissent ac consumpsissent, & unicus ejusmodi vermiculus chartæ impositus brevi spatio 50. alios extra corpus rejecerit. In peste savissima, quæ totam Lusitaniam depopulatam reddidit, principio morbi omnibus vermium nigrorum rotundorum copiam per nares manasse, observavit ZACUTUS LUSITANUS lib. 4. Medic. Princ. Hist. 46. Quæst. 42. ZAPFEIUS in Dissertat. de Morbo Hung. inquit: Ipse in nupera dysenteria laborantibus per microscopium aliquoties observavit innumeros vermiculos, albos & rubros, acaros magnitudine æquantes, cum rostris, his bamatis. Item in puerpera hujus loci fixissimæ manæ, quæ laborabat ulcere, multa remedia, sed in cassum fue-



in fuerunt adhibita: tandem in suspicionem vermiculorum ex laete putrescente incidit, cremorem crassiusculum effluentem per microscopium examinans, tunc aderant innumeri vermiculi minimi, quales in casto apparent, postea adhibito busonum pulvere cum paucillo oleo arsenici, vermiculus enecatis ulcus brevifusus consolidatum. Sic habitum corporis verminosum cum variolis & pustulis vidit RHODIUS Cent. 3. Obs. 64. Confer. etiam M. A. N. C. Ann. 1. O'f. 50. pag. 147. & append. ad hunc annum, ann. 2. annex. pag. 23. ann. 6. & 7. Obs. 188. & ann. 9. & 10. Obs. 130. pag. 305. Probabile ergo admodum videtur, sanguinem, præsertim malignæ febricitantium, admodum vermiculosum existere. Sed hanc opinionem, & hinc malignitatem derivaram, optimè ventilat MARCUS MARCI in suo Tr. Philof. Veterum Restit. Part. 4. Sect. 8, dum dicit: *Aut torres oriri putant ex vermibus, cum igitur corruptio non adsit, unde putredo & vermes? qui non nisi putredine præcedente generari possunt? Idem est, ac si dicat: vermes non nisi præcedente putredine seu corruptione sanguinis & humorum posse generari, adeoque potius effectus esse corruptionis malignæ, quàm ejusdem formalem rationem, ut reverà æger possit corripitur febre malignâ & etiam mori, antequam tales variant.*

Ex his hypothesebus certi quid determinare in tanta rerum obscuritate, difficile est. Ut tamen id, quod magis mihi probabile videtur, dicam, arbitror: febres malignas consistere in acrimonia intensissima & simul volatili; sive acerrimum fermentum & spirituosum, adeoque intus penetrans, & tam fluidorum corporis texturam insigniter immutans, quàm solidarum sensibilitatem singulariter irritans, esse causam formalem malignitatis; vel, ut SYDENHAM loquitur Observat. de morbis acutis Sect. 3. cap. 3, malignitatem in epidemicis morbis in particulis calidissimis & spirituosissimis consistere, ita, ut malignitas ad venenorum naturam, quarum vis in acrimonia summa, sub minima mole insigniter activa consistit, accedere videatur. SYLVIVS equidem cum modernis quibusdam in febribus malignis putredinem sanguinis inchoatam, induitam ab acrimonia lixiviosa seu alcalina, destruentem sulphur sanguinis vitale, intelligit, unde & eius consistentia & fermentatio vitalis & spiritalis debita deficiat, atqueque ejus putredo, & hanc mors necessariò insequatur.

Atque hæc, quibus hanc sententiam probabilem reddere conatur, sunt varia.

(1) Quod vita sit radicata & fundamentaliter consistat in solo sanguine, adeoque febres malignæ afficiant primariò sanguinem.

(2) Quod radix hæc vitalis, in solo sanguine supposita, consistat in crasi ejus seminari, in qua vita vel sana vel ægra, vel longa vel brevis, fundamentaliter deducitur; unde crasis hæc seminalis in malignis plus minus destruat & pervertatur.

(3) Quod craseos hujus formalis ratio in acido pingui, seu sulphure & alcali volatili, certâ proportionem in massa sanguinea unitis, consistat, à quibus & textura seu mistio, & fermentatio, & spiritalis ejus dependeat; unde in malignis vel acidum sulphureum, vel alcali, vel utrumque afficiatur, & depravetur à malignitate.

(4) Sulphur sanguinis, quod acidum occultum gerit, agentis; alcali verò patientis rationem habeat: unde magis in substantia sanguinis sulphurea affecta malignitatem consistere. Sulphur enim in sanguine aliàs vocatur id, quod veteres calidum ionatum vocant.

(5) Afficiatur & alteretur proximè sulphur tale sanguinis vitale ab acris & volatili quodam alcali, quod & substantiam ejus dissolvat, & acidum enervet, & pingue imbibat; unde in malignis acris volatile alcali peccare verosimillimum esse.

(6) Rationem vero istam, quâ alcali dissolvat sulphur acidum concretorum, & quam ordinariò sequatur misti solutio, esse putredinem: Consistit nempe hæc in tali minimorum actione mutua, secundum quam alcali prædominatur acido, & dissolvit intimius pingue, unde misti destructio, & fætor, aliæque subsequantur effecta. Putredo enim est ab alcali, fermentatio verò ab acido.

Adeoque (7) concludunt, malignitatem febrium consistere in putredine sanguinis, inchoata ab alcali acris volatili, destruentem ejus sulphur acidum vitale, indeque

delente ejus texturam fermentativam & spiritaliscentiam.

Cum vero (8) naturaliter aer inspiratus sale universaliter vitali turgeat, quo conservetur istud acidum in sanguine, ob id hoc sale universaliter enervato, aut alterato, aut inquinato, disponantur tam facile corpora ad morbos malignos, vel immediate inspiratione hi ipsi propagentur.

Sed cum alcalia potius passivè sese habeant, quàm activè, & ubique acidorum ductum sequi soleant, nervosorum etiam partium symptomata, v.g. deliria, vigiliae, &c. in plurimis perquam frequentia, potius ab acido acris, quàm a vino, videantur oriri; & constitutio partium vitalis quarumvis, tam solidarum quàm fluidarum, seu Veterum calidum nativum, quæ in malignis in specie oppugnantur; in acido volatili (quatenus TACKENII hæcenus probabilissimis, dum meliora monstrata nondum sunt, hypochresibus intillere placet) potissimum fundata sit, quæ non, nisi à symbolizante, sed viciosa, & illud quasi subjungente, vitiari potest acido: remedia quoque in febribus malignis, imò ipsa peste usitata, ut salia volatilia, camphora, summum alexipharmacum, myrrha, & alia resinosa, quatenus acidum acre pinguedine balsamica temperant & corrigunt; animalium partes duræ, ut cornu cervi, ebur, unicornus; item terra medicata pinguis, sulphure metallico plus minus impregnata, hinc plus minus temperando absorbentes, ut terræ sigillata, bolus Armena; quæ habent sulphura metallica fixa, ut cinabaris, Ammonium diaphoreticum, Bezoardicum minerale, Joviale, & omnia Bezoardica, remedia solaria, diaphoretica, &c. quæ speciatim acidum volatile temperant & corrigunt, ac plus minus figunt, destrunt & absorbent, istudque fixatum & quasi cicuratum, mediante sudore, unà cum parte cruoris alterata, foras amandant: probabile reddunt, Acidum acerrimum volatile seu spirituosum potius malignum istud in febribus constituere, quàm urinosum seu lixiviosum: Nam, uti rectè dicit SYLVIVS, in testimonio sulphur esse quoddam singulare ac mirabile, à quo mirè temperetur quodcumque acre, & imprimitis figuratur quodcumque salius vel acris. Unde etiam in causis, aliæque fixiores continue febres, tam vicinæ sunt malignis, ut hæc tubindè subillarum regimine lateant, & illæ quoque promptissimè in has degenerent, quatenus facile fermentum febrium harum benignum seu mitius, acris & volatili reddi, indeque malignitatem veram contrahere potest. Ut taceam variolas, Pleuritides ac similes manifeste ex acido natas febres, sæpe malignas simul existere. Sed si ritè hæc consideremus, malignitas hæcenus explicata non nisi istas febres attingit, quæ ex contentis corporis humoribus, maligno tali fermento inquinatis, oriuntur, quæ minores saltem esse videntur, cum graviores ex infectis, & maligno afflatu quasi vitiatis spiritibus, primariò oriri videantur, qui infecti exinde notabiliter immutati, & plus minus syderati, seu ex parte mortificati, contra corporis, in specie sanguinem, pessimè vitiantes malignarum febrium, & in specie petechialium, ipsiusque pestis, fundamentum existunt.

Nempe afficiuntur in febribus malignis primariò quidem spiritus & contenta corporis, utut secundariò etiam acres malignæ particule generis nervosi partes quædam, v.g. ventriculum, plus minus affligere soleant.

Prout autem particularum fermentativarum non est differentia in proprietatibus & activitate, ita etiam malignitas quibusdam in febribus magis humores, præsertim sanguinem, inquinat, in aliis verò spiritibus maximè infecta est, quorum prævio inquinamento & massam sanguinem plus minus afficit. Ut hoc pateat, observandum, quod symptomata illa inter graviora & insolentiora primum ducat nimia & subitanea virium prostratio, tam ex ægri narratione, quàm ex ægri pulsu cognoscenda. Cum verò omnis vis corporis, viriumque robur in spiritibus situm sit, non poterit in malignioribus febribus tantus virium collapsus tam repentinus esse, nisi malignitas seu venenum primò spiritus occupet, holque immediate destruat, & his mediis contenta cætera fluida, speciatim sanguinem, inquinet, ejusque fermentationem, & spiritaliscentiam lædat: id quod ulterius cætera concurrentia symptomata febrium malignarum confirmant: Pulsus nempe frequens, celer, parvus, uri in febribus petechialibus observari solet, corpore adhuc ad sudorem disposito, qui deficientem turgescientiam & fermentationem sanguinis



seu spirituum moventium, qui non sufficienter vibrantur in corde, & nimiam ejus confusionem, & in fermentatione inordinationem ostendit, unde potius per cor fluat, quam ex eodem turgescendo ebullit. Urinæ in malignioribus, aut pessimo ægri statu naturalibus similes subinde; item agrypnia ac delirium, convulsiones, cum omnimodo fere sudoris defectu, in talibus febribus citò ac frequenter assilientia, contagium efficacissimè & latissimè in distans non raro se diffundens, quod saltem subtilissimis ac spirituosissimis particulis competere potest, adesse testantur. Confer. hic in specie VELTHUSIUS de Usu Lienis p. 134. & seq. Ac sanè plures contagiosiores, & speciatim pestilentes, ipsaque pestis in specie, spiritibus inimicæ sunt.

Sunt autem spiritus, virium fundamentum, duplexes: vel vitales, vel animales; qui tamen mutuo nexu & functionum circulo mutuas opes sibi conferunt, & ad conservationem sui ac totius corporis intimè conspirant. Probè itaque attendendum: utrum in maligniore febre magis spiritus vitales cum massa sanguinea à malignitate inficiantur? an verò spiritus animales & genus nervosum magis afficiantur?

Spiritus vitales, & hinc massam sanguineam, primariò affectam esse, persuadent:

1. *Actus* intensus cum pulsu celeri, frequenti, & parvo.
2. *Suis* clamorosa, fauces aridæ, lingua scabra, nigra & fissa.
3. *Calor* moderatus cum pulsu celeri, frequenti, & inquali, mox sub ingressu morbi apparentes.
4. *Anxietates* & inquietudines, propter bilem portacream vel æruginosam, quæ in stomacho delitescens maximas molestias infert.
5. *Colliquatio*, speciatim fluxus alvi colliquatilis, ad instar Purgantium malignorum ex simili acido volatili acerrimo originem ducit. Hoc opprimit spiritus vitales, & cum bile commistum massam sanguineam attenuat, & plùs minùs colliquefacere solet.
6. *Sapor* subdulcis & nauseosus odoris, qui putredinis inchoatæ est comes, similis odori cadaverum ex inchoata sanguinis corruptione, ab acido volatili acri orta.
7. *Sanguis* nimis fluidus, tenuis & admodum dilutus, difficiliùs aut planè non congrumescens, qualem SYLVIUS observavit: sicuti & SIMON PAULLI, qui etiam ex acrimonia volatili derivat Febres malignas, in *Paræcusi de Febribus malignis*, libro elegantissimo, pag. 14. & 21. sanguinem florentissimi coloris venà sectà emissum, pessimum morbi maligni signum asserit: Simile etiam fatetur BRUNO in *lessen*. pag. 89. Veteres dixerunt: si sanguis venà sectà non concreverit, malum est; innuit enim defectum fibrarum ex putredine. Sufficit, veteres statuisse talem defectum esse signum inchoatæ putredinis in sanguine. Observatum sapientiùs in febribus malignis, quod partes solidæ dispositæ fuerint ad putrefactionem, teste HILDANO C. 3. Obs. 97. & 95: PANAROLUS *Pentec.* 8. Obs. 48. HORSTIUS *Ocur.* 5.

Huc etiam & pertinet *fulgidium sanguinis* per nares, per uterum, &c. in febribus malignis interdum observatum: vid. HOECHSTEDTERUS *Decad.* 1. Cas. 3.

Spiritus verò animales ac genus nervosum primariò magis affectum ostendunt:

1. *Ardor capitis* circa frontem continuus, & longè intensior, quam in reliquo corpore.
2. *Pulsus durus* citra partis ejusdem membranosa in quadam corporis regione notabilem affectum, simul frequens, celer, &c. Tales pulsus cum duritie semper suspecti esse solent.
3. Si cum pulsu laudabili, h. e. magno, vehementi, æquali, frequenti, æstu plùs minùs inteso, tamen summa virium prostratio, aut stupor, aut facultatum animalium defectus se exerat.
4. Si urina parum à statu naturali recesserit, aut tenuior, quam morbi ægrique conditio requirat, fuerit, adeoque pertinaciter cruda extiterit.
5. *Agrypnia* pertinaces sine causa manifesta.
6. *Appetitus* prostratus, nausea & vomitus; hinc &

ventriculus subindè eschara, tanquam vesicato, rio aut caustico affectus, deprehenditur: vid. BARTHOLINUS l. 4.

Foras & 7. huc pertinet, si arida, scabra, vel plùs minùs squalida cutis ægri fuerit absque vaporoso calore, vel blandi madoris vestigio.

Talium, adeoque malignarum febrium malignitatis, quæ spiritus afflando quasi adedò pessundant, ratio à priori hæcenus imperseverabilis extitit, ipsi spirituum naturæ & existendi ratione nondum exactè exploratà. Sanè contagia magis activa seu spirituosiora & potentiora in spiritus imprimis agere, præter modò dictas rationes perituet imaginatio, quæ non, nisi spirituum ministerio, peragitur, & tamen efficacissimè contagiorum receptionem promovet.

Ex hæcenus dictis lucem sceneratur: unde æstus & febrius sanguinis ebullitio ut plurimum remissior in febre maligna observari, & vix unquam ad gradum ardentium assurgere soleat, pessimo licet ægri status. Unde notat dignissimum est assertum SYDENHAMI de *Merbozo Med.* p. 43., quamvis malignitatem, quæ sanguinem adoretur, sine insigniore febrili ebullitione periculosiorem longè esse: aut enim spirituum magis affectorum & quasi syderatorum, quam turbatorum humorum, est indicium: aut saltem in humoribus, præsertim sanguine, à fermentativis malignis miasmatis confusionem, & in textura & motu intestina eorum inordinationem indicat, & ita locale sententia quidem, sed internè saltem gliscens, non verò ad exteriora pergens, accidit; unde natura quasi oppressa non potens est symptomata illa magis regularia exercere, quæ morbo competunt: Confer. etiam ejus (SYDENHAMI) *Observ. de morbis acutis Sect. 5. cap. 5. pag. 361.* Sanè in istis malignis, quæ cum excretionibus cutanea contingunt, v. g. petechialibus, variois, purpura, &c. tantum abest, ut æstus & sanguinis ebullitio gravioris morbi sit indicium, ut potius, modo non nimius fuerit, promoveat insigniter & separationem & excretionem producti illius morbofi sub cute defixi; cum hi è contra periculosius se habere soleant, in quibus deficit magis calor & æstus corporis febrilis; unde & parcius & tardius excretio talis cutanea procedere solet. Equidem in malignis febribus, quæ ex interna contentorum degeneratione oriuntur, item in variolis, morbillis, &c. massa sanguinea magis affici, & hinc etiam febrili acutè sanguinis effervescentià agitari solet: sed in acutioribus pestilentialibus, peste ipsa, spiritus imprimis affici & quasi mortificari, aut necrosi affici videntur.

Causa ergò proxima febrium malignarum videtur esse acidum volatile acre seu spirituosum aut malignum, spiritus corporis nostri vitales & animales enervans, & plùs minùs destruens.

Causæ malignitatis remotæ, præter contagium corporale, sunt admodum variae: nunc externæ, nunc internæ, prout nunc epidemice, nunc non epidemice grassantur. Externæ sunt, quæ forinsecus accedunt, vel inspirata, vel assumpta: Hæc sunt corrupta putrida inquinata, tam vegetabilia, quam animalia agrotantia: inspirata sunt aer, isque vel contagio putrefactivo ab alio ægro inquinatus; vel effluviis aliis malignis undecumque exhalantibus est infectus, uti fit in constitutione epidemica plùs minùs pestilentiali; vel aer ab anni diversæ tempestate, imprimis austrina, i. e. calida & humida, ita alteratus, aut sale ejus universali balsamico omnium rerum conservativo plùs minùs hebetato aut enervato corpora nostra ita disponantur, ut facillè & quasi spontè in putredines inclinent, & tales semper sunt epidemice; vel denique aer nimis quietus, aut in loco minùs apto conclusus, qui subindè insigne vitium contrahit, ut talem aërem inspirantes postmodum quasi veneno assulentur. Singulare exemplum aeris maligni habet RULANDUS *Tract. de Febre Hungar.* c. 8. p. 231. de febre maligna ex attractione aurae, ex ventilatione frumenti, per aliquot annos quieti, obortà: Sic ex factore paludum ignerum injectarum putrescentium febrem malignam pestilentialem paucos ante annos Lugdunè Batavorum notat HELVETIUS in *Diribitorij* p. 65. Et sanè frequentissimam febrium pestilentialium originem rerum talium corruptarum fracedines esse, jam diu observatum est: confer. du HAMIEL de *affection. corporum* pag. 432. ubi, quomodo tales fracedines febres pestilenciales inducant, tractat. Undè & post magnas hominum strages, & corporum putrescentium



alium aut minus debite sepulcorum putredinales exhalationes, & in diuturnis obfessionibus aut castris non mutatis, ex varia colluvie putrescente exhalantes frigidiores, febres epidemicas malignas, quasi pestilenciales suscitant febres. Ut nihil hic dicam de *aëris subterraneis*, antea diu clausis, apertis, de *terre motibus*, &c. crebrius febres malignas comites trahentibus. Quoad vidus errata: nil notius est, quam famem sequi pestem: Item esus alimenterum non nihil putridorum, praesertim carniū absque salis condimento, subinde etiam solet esse causa, ut oriantur febres malignae: Sic BORELLUS Cent. 2. Observat. 32. febrem malignam epidemicam ex esu carniū bestiārum egrotantium obortam notat. Item potus aquarum putidarum, aut usus fructuum herarum corruptorum, aut malignā aurā afflatorum, forundae matres morborum, speciatim febrium malignarum epidemicarum, esse solent: Sic EPIPHANIUS FERDINANDUS Hist. Med. 11. notat febrem malignam lethalem ex esu fungorum: vid. SCHENCKIUS in Obs. Item febrem malignam petechialem ex esu, cicuta cum oleribus recentibus subortam notat SIMON PAULI in sua elegantissima *Taxidrom seu Digressione de Febribus malignis* pagin. 3. Et quae sunt similes aliae causae remotae, quae malignae consentur: de quibus vid. KIRCHERUS in *Scrutinio Pestis*.

Interna causa remota multis videtur dubia, an & quomodo stante humanā vitā possit aliquid putridi & mali & quasi veneni in corpore gigni? quod tamen non, nisi ex natura veneni non rite intellecta, originem duxit. Sed qui considerat varias & subinde inconcepibiles alterationes humorum in corpore nostro secundum res non naturales, praesertim varia assumpta; & praeternaturales, in specie in primis viis, ubi naturaliter species segregantur putredinem, & inde certum foetorem contrahunt, & multiplices misceles, & per medicamenta quoque factas eorum mutationes, & exinde mirabiles texturas ac hinc proprietates novas, ac planē singulares sapes ortos; itemque qui perpendit, quod in vivente corpore gangraenae, sphacelique fiant, is non dubitabit etiam, quin tam in sanguine, quam in solidis partibus putredo, adeoque ut ardentiores, ita & malignae mitiores, in corpore, in specie ex primis viis, suscitari possint: Nam & irati hominis morsus venenosus non absque ratione quibusdam putatur. Sic v.g. succus pancreaticus & felleus naturaliter constituti tertium temperatum succum constituunt, quorum alteratio, praesertim pancreatico acriori aut acidiori existente, bilis eruginosa dicta, plus minus hostilis, prout acrior seu mitior eadem fuerit, & ob pessima symptomata, quae interdum inferre solet, plus minus maligna oritur. Probat hoc ipsum quoque convenientia febris ardentis acutioris cum febre maligna: Nam intensior ardens, item quae ab iracundia excitantur febres acutae, & eaeque ex bile vel nimis oleosa naturae, acido volatili constante, proximē subinde accedunt ad malignas; aut saltem huiusmodi ac similibus sublevantur remediis. Unde qui vitae tenacioris, qui abundant acido, ut melancholici, scabiosi, &c. aut non adeo periculose corripi solent malignis febribus, propter acidum potentius, acidum volatile acre figens. Sed tales saltem sunt privatae. Nam quae ab extra communicatur malignitas, aut à contagio, aut epidemica quadam aëris & alimentorum alteratione, nobis insinuat, adeoque in plures simul & epidemicae observatur grassari, plus in recessu habere videtur.

Cavenda autem in genere sedulo contagii seu fermenti maligni, seu causae febris malignae, confusio cum alterationibus sanguinis aliorumque humorum notabilioribus, in malignis febribus obviis, seu productis morbois, ut plurimum spirituum influorum, praevia alteratione & affectione à contagio seu fermento maligno inductis: hinc enim nec sanguinis coagulatio à WILLISIO asserta, nec ejusdem nimia dissolutio, quam SYLVIUS urget, ad rationem malignitatis formalem explicandam inserviunt; dum haec alterationes producta morbois mediata, non secus ac bubones & carbunculi, putandae sunt: v.g. in aegro variolis aut morbillis correpto, & per totum corpus huiusmodi in crustato, non putandum est, extitisse in corpore tales sordes, quae febrem induxerint, & postmodum sub cute depositae variolarum pustulas & saniem constituent; siquidem sanissimus subinde ex improvviso huiusmodi copiosissimis obducitur; sed à fermento seu miasmate maligno, interdum sub forma odoris contagiosi hausto, spiritus inquinante, & horum medio humores efficiens, geocantur illa in corpore, donec una

cum multiplicato fermento contagioso, sed horum humorum, licet alteratorum, medio temperato & correcto, secernantur, & circa glandulas intercutaneas defigantur. Qui igitur novit leve fermentum moderare, subigere citò, & dum adhuc in herba delitescit, is etiam feliciter uberiorem exanthematum proventum potest praecavere. Par ratio petechiarum, purpurae, bubonum & anthracum esse videtur: sunt horum colores rubri, lividi, nigri, non quidem à maligno fermento plus minus caustico seu urinoso praecise, sed à maiore vel minore mortificatione & necrosi humorum vel partium solidarum, ob spirituum extinctionem, cuiuscunque etiam naturae miasmata malignum fuerit.

## DIAGNOSIS.

Quando aliquis incipit laborare febre maligna horror levis ac tardus praecedit, quem calor mox subsequitur, qui in maligna, quā tali, saepius est parvus vel nullus, adeo, ut de eo vix conqueri soleant aegri: subito verò virium ingruit prostratio inopinata: interdum oriuntur deliria, jestigationes ac inquietudines corporis, maculae subinde ac vesiculae coloris & magnitudinis variae in corpore efflorescunt: Imò nulla sunt symptomata febribus solennia, quae non in hac vel in illa febre maligna observentur; adeo, ut etiam hydrophobia in febre maligna observata fuerit: Exemplum refert SALMUTH Cent. 2. Hist. 52., quin & SANQUEZ in Obs. Med. similiter referret exemplum hydrophobiae in febre maligna observatae. Subinde malignitas est tanta, ut partes nunc internas nunc externas sphacelo ac gangraena correptas observare liceat: id quod interdum in variolis malignis contingere solet (dico in malignis; non enim semper & omnes variolae sunt malignae;) SALMUTH post variolas non recte expulsas observavit gangrenam Pentec. 1. Obs. 70.

Non autem una eademque malignitatis in quibusvis morbis malignis vel venenosis est ratio ac conditio, tam subiecti patientis, quam symptomatum hinc enatorum varietate; sed specialis ratio in singulis morborum malignorum causis distincta est. Alia enim est dysenteriae malignae, alia febrium petechialium, alia febrium malignarum sine petechiis, alia morbillorum aut variolarum, alia pestis, alia purpurae puerperarum, alia in catarrhis epidemicis, alia morsus canis rabidi, alia luis Venereae, alia scabiei ferinae, alia in scorbuto ad gradum malignitatis devector; adeo, ut de febre maligna ferri vix possit iudicium, quin singulare quid subesse videatur. Sane etiam non levis inter ipsam malignitatem est differentia, dum febres malignae quaedam sunt acutiores, ob id pestilenciales dicuntur, quartā vel septimā die ad summum interimentes; quaedam contra minus acutae, ut quae ad decimum quartum, interdum etiam vigesimum, extenduntur: cuius differentiae ratio partim est in causae agentis maiore vel minore activitate, vel in subiecti patientis apta vel inepta susceptibilitate; prout enim utrumque magis vel minus dispositum, eo acutior quoque & malignior existit febris. Hinc ob eorum rationem sit, ut febres malignae tales nunc mulieres, nunc viros, nunc pauperes, nunc divites, nunc juvenes, nunc adultos, nunc infantes, &c. solum affligant.

Ratione symptomatum adiutorum, in specie in excretis, magna est febrium malignarum varietas, dum quaedam cum certis & insignibus cutis efflorescentiis, quaedam sine his, vel paucis admodum, quaedam aliis symptomatibus stipata est.

## PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: audita febre maligna pavescit Medicus, contremiscunt aegri; siquidem omnes febres malignae per se sunt molestae, & saepius pessimi ominis & periculosae: & quod periculosiora cum virium imbecillitate concurrunt symptomata, eo majus portendunt periculum. In genere tamen unanimis Practicorum est consensus, prognosin malignarum esse incertam, & cautam atque prudentem in prognosi requirere Medicum; cum mox & inopinatò nunc ad vitam, nunc ad mortem terminentur: Nempe verissimum est, quod dicit HIPPOCRATES: In acutis sunt incertae praedictiones vitae & mortis: Unde & GALENUS malignas febres statuta ad iudicandum non habere tempora, asserit; plurimi enim subito cum periculosis signis evadunt signis; alii subito cum salutaribus à medio auferuntur.

Pulsus, quod magis magnus & aequalis est, & consuetum eundemque tenorem servat, eo est melior.



*Inordinatus* vero, *inæqualis*, debilis, seu quasi *retractus*, periculofus est, in specie in principio morbi; quò major etiam est *pulsus*, eò melius; quò minor, eò deterius.

Si celer & parvus *mul*, aut formicans contigerit, admodum prævum omen est, ex quo vix emergunt ægri. Nihilominus tamen *Pulsus parvi* non sunt tam mali omnis in febribus malignis, quàm in benignis.

Sic etiam *pulsus intermittens* aut *deficiens* in febre ardente benigna ordinariò est periculofissimus: Interdum tamen in malignis, cæteris paribus, non adeò malum, sicut dicit RIVERIUS, qui observavit in juvene *pultium* intermittentem quidem per multos dies, morbo tamen tandem desinente. Nec *pulsus parvus*, rarus, ac debilis, sed etiam *similis sano* cum aliis pravis signis portendit malignum morbum.

Uterius malignæ febres habent ut plurimum *agrypnias* & *deliria* comites.

*Delirium* si à somno, vel spontaneo, vel per medicamentum excitato, compescatur, non est metuendum, imprimis conjunctum simul copioso sudore: post somnum autem perseverans *delirium*, admodum periculofum est; innuit enim convulsiones, aut mortem ægri.

Varii colores ante oculos apparentes, ac obiecta peregrino colore vestita, convulsiones, deliria, &c. innuunt. Visitationem ægrum maligna febre correptum, licet aliàs benè se haberet; dicebat: me indurum esse pallio & veste cærulea; imò omnis niger color coruleus illi videbatur: Signum hoc aderat manè, à meridie subsequiebantur delirium & convulsiones, & tandem interibat.

*Surditas* seu potius *obauditus* in morborum acutorum principio periculofissima; in statu autem apprensus salutem perendit, præcipue in malignis: Et multos observavimus, dicit RIVERIUS, quibus in his febribus in statu supervenit *surditas*, aliis licet periculofis cum symptomatibus, omnes tamen evaserunt: Nam interdum delirium solvitur, interdum criseos per hæmorrhagiam naturæ futuræ est indicium. Quare autem *surditas* in statu salutaris sit? nondum determinatum est; forsitan ad parotides glandulas decubitus quasi quendam *criticum*, & successivam hinc *discussionem* materiae peccantis inquit: siquidem & *parotidum tumores* in febribus malignis & purpuratis *lethales* in augmento & statu morbi; si verò tantillum declinante morbo appareant, *salutares*.

*Urina* in febribus malignis sanorum sunt *simillima*, vel etiam *perturbata* & *crasse*, tales permanentes malæ. Multi, *coctionis signis* in urina apparentibus, sed denuò recrudescuntibus, sublatis sunt e medio. *Urina* tamen *cocta*, laudabile habens *enaeorema*, per aliquot dies continuans, & in *sedimento* sensim abiens, salutem certam perpetuò pollicetur.

Rarum est, quod *cruda urina* metastasin materia peccantis seu *producti morbofi* in morbis malignis felici eventu insinuet: Vid. BARTHOLINI *Alia Medica Hassniens.* Volum. 4. p. 156.

Quò magis à statu naturali declinat, in specie si fuerit, eò majus periculum subest: item *urina pinguis* & *oleaginosa*, nigra aut livescens, cum sedimento vel livescente vel nigro, nisi hoc sit ex medicamentorum usu, exitum portendit.

*Narium stillicidium* semper malum signum est, præsertim si cum *agrypnia* sine manifesta causa, ardore capitis, aut continuo magis aut intenso nimis, sit conjuncta; præsertim si præ reliquis corporis partibus facies excessivo rubore tingatur, vix tales evadunt: nempe *spina peculiaris* (fermentum malignum) capiti quodam in loco aut ejus membranis partibus infixæ est, cujus occasione hæc symptomata excitantur. Hinc *Vesicatoria* brachio aut cruribus admodum, item *aninarum* testio, aut *hirudinum* pone aures applicatio, subindè necessaria est.

Alvi fluxus quoque tempore febribus malignis supervenientes pessimi sunt; & quò magis fuerint excrementa, & fluxus sit colliquativus, eò major malignitas, & gravior periculum attest: in specie, si in febre maligna post excretionem cutaneam obveniat diarrhœa, summum periculum est, cum retrocedat malignitas, & massæ sanguineæ fermentatio penitus conturbetur; hinc eadem semper ferè *lethalis* existit. Hinc quoque sanguinis dejectiones quæcunque in febribus malignis, si ægri mingant siue deiciant cruenta, semper sunt admodum periculose; imò omnes *lethales* eas esse, pronunciat HOECHSTEDTERUS Dec. 1. Cas. 2.

Graveolentiam feri ac crudelis, hæc raræ, certam mortem denotare, observavit SCHENCKIUS in *Observ. pag. 418. ex FORESTO*; utriusque aliquomodo contrarium exemplum habeat PAULI l. a. cap. 2. p. 13.

Si in *vola manus* ægri percipiunt *confiones*, *titillationes*, & *subfultus tendinum*; item *ficica carpum*, dum *pulsus* tentat Medicus, *tendines*, etiam *quietis digitis*, moveri aut *subfultare* videntur, signum sunt, certò imminere convulsiones.

*Muscarum venatio*, aut *stercorum collectio* in malignis ferè semper *lethalis*. Rarissimè tales evadunt, ut ut non semper desperandum: quale exemplum vid. in M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 269. p. 484.

Tempus eventus quod attinet: acuti sunt morbi febres malignæ, quæ tamen in nostro climate à septimo usque ad decimum quartum ferè suos terminos habent. Quoad modum eventus: ferè modo quasi *cris* eo judicantur, nempe per sudores: Quò pertinent *excretiones cutaneæ* *pustularum* *petechialium*, &c. nunc per *metastasin* *producti* nempe *morbosi*, à fermento quidem maligno geniti, ipsum tamen fermentum cicuratum & correctum in se continentis, ad *lora glandulosa* transmissi, unde *bubones*, *anthraxes*, &c. originem habent.

Interdum *bubones* circa genitalia apparent, quibus die undecimæ erumpentibus omnia symptomata levantur, & febris evanescit; sit enim hæc tumoris eruptio per *metastasin* seu translationem.

Hæc de Prognosi febrium malignarum: Pergo ad

## C U R A M.

Quæ est duplex: *præservatoria* & *curatoria*.

*Præservatio* in febribus malignis & epidemicis optimè præstant acida blanda, ut acetum, in specie acetum destillatum, B. zoardica & alexipharmaca infusione simplicium alexipharmacorum, radicis angelicæ, &c. parata: quibus si addatur *camphora*, melius succedit: item citrus ejusque succus; item haustus largi vini: de quibus quotidie manè ante egressum e domo haustus sumptus egregiè præservat, in specie si cum tantillo *camphoræ* fuerit junctus; item *essentia citri*, *zedoarii*, &c. hinc, quando Medici ægros in febribus malignis visitant, in ore *zedoariam* gessent.

Præmissis ergo interdum vomitorio, detur *Tinctura bezoardica*, & hinc:

R. Conserv. pulpe citri ʒj.  
Elect. discord. Fracast. ʒʒ.  
Theriaca Androm. ʒj.  
Flor Sulphuris ʒʒ.  
Antimonij diaphor. ʒj.  
Costi Arab. veri ʒʒ.  
Spiritus rosar. ʒj.  
Syrupi rubi idæi q. s.  
M. f. Electuarium: S.  
Electuarium præservans.

R. Conserv. Flor. anthor,  
Pulpe citri,  
Scordii ana ʒj.  
Theriaca ʒʒ.  
Antimonij diaphoret. ʒij.  
Terra sigillat.  
Cornu Cervi sine igne ana ʒj.  
Bezoard. mineral. ʒʒ.  
Camphor. ʒʒ.

Ca l. q. Syrupi rubi idæi f. Electuarium, irritandum cum oleo pestilentiali Herisi.

D. S.

Electuarium pestilential præservans.

Vel:

R. Aqua cardui bened.  
Flor. sambucianæ ʒʒ.  
Cinnam. ʒʒ.  
Acet. vini ʒvj.  
Elect. discord. Fracast. vel Theriaca Andr. ʒj.  
Antimonij diaphor. ʒj.  
Bezoard. mineral. ʒʒ.  
Syrupi card. bened.  
Rubi idæi an. ʒʒ.  
M. D. S.

Mintura præservans, coelestium summis.

Item

R. Con.



*R. Conserva pulp. citri ꝑj.  
Tberiac. ꝑij.  
Terra sigillat.  
Cornu Cervi sine igne,  
Antimonii diaphor. ana. ꝑij.*

Cum s. q. sacchari in aqua scordii solut. s. Morfili, intro-  
randi tempore usus aliquot guttulis olei pestilentia-  
lis Heinisli. S.

*Morfili preservantes.*

In metu febris ardentis malignæ ex nimia ira, hinc  
forti motione & potu :

*R. Ebor. sine igne gr. xv.  
Specif. cephal. ꝑss.  
Camph. gr. ij.*

*M. s. Pulvis : S.*

*Pulvis preservans.*

Vesperj sumatur.

*Cura februm continuarum malignarum, quæ talis*

1. Per medicamenta talia instituenda est, quæ per con-  
venientes vias, speciatim sudorem, quem natura  
monstrat, nunc blandum, nunc copiosum, fe-  
bris malignæ causam & fomitem morbi, seu ma-  
lignitatem aut venenositatem, sive sit sal acre  
putrefactivum, sive miasma aliud, maturè &  
quartocidus expellant & corrigant, Bezoardica  
aut alexipharmaca aliàs vocata, circa quæ consu-  
lenda imprimis experientia; pro diverſitate enim  
februm malignarum diversa etiam remedia ale-  
xipharmaca plus minus utilia observata fuerunt.
2. Sunt talia, quæ spiritus & humores corroborent, ne  
tam facile à fermento maligno alterari, sed hoc  
potius subigere queant.
3. Symptomata, tam ratione violentiæ malignæ, quàm  
ratione febris continuæ plus minus ardentis, ur-  
gentia mitiganda.

Nam quoad Primam Indicationem: modò vel acre aci-  
dum volatile malignum in humoribus correctum, vel odor aut  
fracedo venenosa in spiritalibus suscepta, alterata & extin-  
cta fuerit, quod superest, facile ab hoste liberata natura  
supplet, dum spontaneo ductu in malignis per excretiones  
cutaneas, bubonum, antracum, pustularum, macularum,  
&c. venenum, correctum prius, & vehicula serosi hu-  
moris involutum, optimè excludit.

Quoad Secundam Indicationem: modò spiritus & humo-  
res in sua naturali crassi constitutione conserventur, sive  
præterea per remedia ipsis sociabilia, fermento autem ma-  
ligno hostilia, tanquam quodam balsamo condiantur, quo  
symbolizatio aut convenientia eorum cum aliorum homi-  
num sanguine & spiritibus hoc modo plus minus immu-  
tetur, & ita tam facilis fermenti maligni, præsertim epi-  
demici aut contagiosi, susceptio impediatur, aut suscepti-  
licitas, confermentio cum iisdem, mutuaque eorum alte-  
ratio ita præcaveatur ( in quo optima con. ite preservatio )  
quin potius ita dispositi spiritus & humores vincere illud  
queant, h. e. corrigere & temperare, & hinc excludere, in  
quo curationis vertitur cardo; res omnis de facili impe-  
diatur. Nempe, ut rectè PARACELSUS Tom. 3.  
Operum Fragmento de Peste hoc verum regimen præserva-  
tium asserit: die virtutem attractivam stillen, dass nicht  
ein laßt geben; hoc est, ut interpretor, ita alterare corpus  
ejusque contenta, ut inepta fiant ad veneni aut contagii  
susceptionem. Conferatur idem PARACELSUS de  
Peste lib. 2. cap. 3.

Hæc modis nempe vel fermentum malignum corrigendo,  
vel balsamicâ vi muniam nostram spiritualem condiendo ope-  
rari videntur remedia alexipharmaca, eaque pro sui varie-  
tate nunc saltim alterutro, nunc simul utroque modo. Rem  
exemplis quibusdam illustrabo. Præcæteris decantata sunt  
sulphurea, v. g. ex minerali Regno sulphur commune, cujus  
usu HIPPOCRATES ipse pellem istam famosam  
Græciæ abegit, & suffusus ejus pro geris emendatione &  
propotus medicatione perquam laudatum existit, non se-  
cus ac ejusdem in substantia usus. Sane suffusus seu odor sul-  
phuris uti quasvis corruptiones & alterationes, ipsamque  
HELMONTIO teste, sanguinis putredinalium alteratio-  
nem præcaveat; ita simul odore & fracedine malignas, con-  
tagiosas, pestilentes, ignis instar tollit & extinguit. Con-  
creta antimonialia sulphurea, debito & appropriato veneno-  
so seu maligno halitu per ignis & niri vim exhausta, in  
febris malignis saturantur quasi denuò, dum absorbent  
simplicem malignum & venenosum halitum seu fermentum

febris malignæ Autorem. Terra pinguis temperando &  
absorbendo fermentum malignum acre, & illud ita corri-  
gendo se exerunt. Camphoræ penetrantissima substantia  
& odor efficacissimus, uti balsami instar condit corpus no-  
strum, etiam mortuum, & acre spirituosum quod vis tem-  
perat; ita simul odorem malignum & pestilentem sui miscelâ  
alterat & enervat. Aceta quælibet, aut horum loco succi  
vegetabilium acidi, præsertim citri; item chylis minerales  
sulphurei, penetrando & permiscendo se undique, certo  
modo alterant contenta corporis, & firmiorem suo modo  
texturam eis conciliant, quo modo tam præservationi inter-  
viunt, idque eò magis, si alexipharmacis aromaticis infusis  
balsamicam vim majorem acquisiverint, quàm pro vehi-  
culo plurium remedium, præsertim aromaticorum calido-  
rum, optimè conducunt: quò etiam vina generosa acidula  
pertinent. Animalium partes duræ, cornu cervi usum,  
ungula alcis, lapis bezoar, calculus humanus, &c. ab-  
sorbent non solum acidum, partibus animalium hostile  
malignum & acre, sed simul & potissimum salia eorum-  
dem volatilia & spiritus, crassi sanguinis conservandæ, &  
per diaphoresin ac diuresin depurandæ, & ita suscepto ma-  
ligno evacuando, simul conducunt: unde KERGERUS  
Tract. de Ferment. Sect. 3. c. 3. pag. 250. Præcipitantia alexi-  
pharmacis necesse conſuevit. Alexipharmaca cætera aro-  
matica, amaricantia, &c. v. g. Zedoaria, baccæ hederæ,  
juniperi, lauri, radix angelicæ, gentianæ, myrrha,  
crocus, &c. exque his & similibus concinnatas compeſi-  
tiones iæriacales, per opium imprimis animatas, &c. quod  
attinet: præter usum sudoriferum modò laudatum, dum  
æ tum corporis sui usu, mediante sui constitutione resioſa  
& oleosa intendunt, hoc ipso sanguinis balsamicam vim, &  
spirituum vigorem ac robur conservare, imperum verò eorum  
undecunque intensiorem factum societate opii debere refræ-  
nare, ac contra malignum virus illa defendere, ostendunt,  
acido præsertim cum vehiculo usurpata. Sed hæc in genere  
de alexipharmacis delibasse sufficiat.

Alexipharmaca hæc, ut supra dictis Indicationibus ri-  
tè applicentur, observentur iequentes cautelæ.

I. Vomitoria in primo principio februm malignarum, id-  
que eò magis, quò magis sunt malignæ, & quidem tunc  
temporis, quando à causa epidemica externa, adeoque à  
contagio extrinsecis haussa, stomachum imprimis inqui-  
nante & inficiente, oriuntur, præcæteris omnibus ma-  
ximè conducunt, ut peccante laburra evacuata, & con-  
tagio sublato, stomachus non affligatur à morbo, & mul-  
ta symptomata maturè præcaveantur; sicut eadem etiam  
in pestilentiali constitutione ordinari solent. Urgent enim  
anxietas præcordiorum insignis, dolor stomachi, nausea,  
conatus vomendi, & similia circa præcordia moleſta sym-  
ptomata, quæ stomachum & primas vias à suscepto conta-  
gio affecta innuunt. Pariter conveniunt eadem vomito-  
ria, si ex privato contentorum vitio febris maligna orta  
fuerit. Imprimis in febre maligna, de morbo Hungari-  
co seu de morbo castrenſi participante, in principio pro-  
vocatus Vomitus sapissimè est salutaris: vid. Rulandus  
Tract. de Morbo Hungarico. Sed tempus observetur, ut  
maturè fiat, nempe in principio, antequam quancunque  
excretionem aliam, imprimis per cutim, molliatur natu-  
ra; elapso enim primo principio simul occasio est elapsa.

Ex vomitoriis præ reliquis præferuntur antimonialia, in  
minori tamen dosi propinanda, ne corpus nimium mo-  
veamus: v. g.

*R. Vuri antimonii hyacinth. gr. vi.*

Infund. per noctem in loca calidq in

Vini Rhen. q. l.

Manè filtretur: R. ꝑss. addo

Aque cinnam. ꝑss.

M. S. Potio emetica pro una vice.

II. Sudorifera primatum obtinent in cura malignarum,  
utpote quæ optimè malignitatem expellunt: interdum  
tamen & hic debitis determinantur regulis, ne quid ni-  
mis. Quò major est malignitas, eò frequentius & copio-  
sius provocandus est sudor, adeò, ut in febris malignis  
pestilentialibus, i. e. in summo malignitatis gradu, aut etiam  
in aliis malignariis, ad minimum ter in 24. horis sint pro-  
pinanda medicamēta sudorifera alexipharmaca, teste experi-  
tiæ Prædicorum; semper tamen habito virium reſpectu, ne  
hæc ipsæ nimis exsolvantur: Neque etiam linteis vel aliis  
superimpositis æger nimium est contegendus; quoniam  
experientia docuit, ægros interdum nimio sudore expi-  
râsse; nimia enim & profusa sudoris effusio subinde minus



tata, serum aquosum nimis exhauriendo sanguinem in-  
crassat, & ejus motum debitum inhibet. Unde, ubi cum  
mitiore malignitate conjuncta est febris ardens, potentiori-  
bus sudoriferis locus non est, sed potius in principio ab-  
sorbentibus ac mitioribus sudoriferis, in progressu tortio-  
ribus, insistendum. Considerandum autem simul in su-  
doriferorum usu: an corpus sit perspirabile; & an ad sudo-  
rem dispositum? an verò non? Si illud, tutius & poten-  
tiora propinari possunt sudorifera: sibi, cautiùs & mi-  
tiora, ite turbetur magis massa sanguinea, interpositis  
ubique blandis acidis.

Sed sudorifera inter non levis delectus est habendus. Tu-  
tissima omnium sunt *salia volatilia*, hinc *volatilia aroma-  
tica*. Sed hæc ipsa solum in principio morbi & incremento  
conveniunt, in statu fixiora tutius usurpantur: id quod  
præsertim in volatilibus sulphureis ac remediis theriacalibus  
observandum, ubi non, nisi in principio & incremento mor-  
bi adhibeantur, ac ubi minùs urget ætus; periculum aliàs  
est, ne in statu novæ turbæ, in massa sanguinea intensio-  
rem ætum & ebullitionem, indeque varia capitis sym-  
ptomata inferant. Videatur hic elegans locus LUDO-  
VICI in *Pharmacop.* 237; cum quibus conferantur loca  
parallela p. 243. 261. 280. 284. 328, &c. Nempe volatilia  
inter sudorifera, ubi febris paulò intensior fuerit, macra con-  
venientius locum habent; ubi verò hæc febris remissior  
fuerit, oleosa seu aromatica adhiberi possunt. Et sicuti hæc  
aromatica propter æstuationes nimias & phlogoses circum-  
spectè usurpanda; ita *salia volatilia* propter nimiam san-  
guinis fusionem, & nimiam faciliè supervenientem hæ-  
morrhagiam moderatè usurpanda: Videantur BARTHO-  
LINI *Acta Med. Hassniens.* Vol. 4. p. 166. Nocumtis om-  
nibus medentur interposita subinde analeptica blandè aci-  
da, nempe *ex succis Vegetabilium*, in specie citro ac cydo-  
niis; item *ex ossis mineralibus sulphureis*; aut denique Mi-  
stura cum paucis spiritibus nitri dulcis, & in specie compositio-  
nes theriacales cum vehiculo acido propinatæ & melius ac  
tutius operantur. De theriacis genuino usu vid. SEP-  
TALIUS in *Animadvers.* lib. 3. §. 53. p. 130. Post sudori-  
fera talia volatilia in principio & augmento aliquoties repe-  
tita, fixiora ex animalibus aut antimonialia usurpanda & con-  
tinuanda erunt.

III. Post omnem sudorem provocatum, ut & in ipso  
fluente jam sudore, ne ægri nimis debilitentur, blandis  
acidis viribus deperditis prospiciatur, cum massa sangui-  
nea nimis sic, uti & à miasmate maligno acris, dissolvatur,  
sub *zuleporum* & *Misturarum* moderatè acidularum,  
imprimis cum & ex citro aliisque paratarum formæ usur-  
patis, quæ malignitati resistunt, ac corpus blandè ad dia-  
phoresin disponunt: qualia sunt succus citri, cydonio-  
rum, acetum, ac spiritus nitri dulcis, qui præ reliquis aci-  
dis in malignis convenientius palmam aufert: hæc enim  
in declinatione sudoris & post sudorem porrecta & conti-  
nuata, sanguini debitam consistentiam restituunt, ac  
ægros debilitatos egregiè refocillant. Quin & in ipsa su-  
doris tortura acida spirituosissima mista, naribus subinde appli-  
canda, quæ ægros debiles nonnihil animant: sic vinum  
generosum, acetum theriacale cum aqua carbunculi tempera-  
tum, aqua apoplectica acida vel spirituosissima, cum succo citri  
aut aceto diluta, & similia naribus subinde ab adstanti-  
bus admovenda sunt, quæ etiam sub ipso sudore cochlea-  
ris dosi possunt propinari: hinc aceti theriacalis ac similis  
parum propinetur: unde & veteres acida, ceu putredi-  
ni aut malignitati resistentia, frequenter his in febribus  
laudantur, & idè acetum & spiritum vitrioli allegant,  
ut ut spiritui huic meritò præferendus sit spiritus nitri dul-  
cis: E. g.

R. Decoct. citri *Myshebtii* ℞j.  
Syrup. rubi Idæi q. s. pro grato sapore.  
Spiritus nitri dulc. parum.

M. D. S.

*Jalapum confortativum bezoardicum.* Vel

R. Decoct. Cornu Cervi vel citri *Mys.* ℞j.  
Succi citri, vel ribium,  
Granator. acid. ana ℞j. ℥jss.  
Elect. diascord. Fracast. ℞j.  
Syrup. rubi Idæi ℞j.  
Spiritus nitri dulc. parum.  
M. D. S. Ut antè.

R. Aqua galeg.

Scorzonæ.

Cordial. Hercul. Saxon. ana. ℞j.

Succi citri.

Cydonior. ana ℞j.

Spiritus theriacal. campb. ℥jss.

Tinctura flor. aquileg.

Paon. ana ℞jss.

Syrup. acetos. citri ℞jss.

Spiritus nitri dulc. q. s.

M. D. S.

Mistura confortativa bezoardica.

Et ejusmodi Mistura acidulata cum electuario diascordii  
præsertim locum invenit, quando per *salia volatilia* pau-  
lò profusior sudor fuerit proleclus.

Vel:

R. Aqua borrag.

Buzloff.

Rub. Idæi, ana ℞j.

Cinnam. ℞jss.

Succi citri ℞vj. ad ℞j.

Confect. alchem. ℞jss.

Corall. rub. præp.

Lapill. cancr. præp. ana ℞jss.

Syrup. cinnam. vel alius ℞vj.

M. S.

Mistura confortans post sudorem.

Item Mixtura SYLVII in *Praxi.* l. 1. c. 9. §. 20. cap.  
23. §. 53. & cap. 17. §. 13. cap. 30. §. 135.

In forma Electuarii:

R. Conserv. acetosell. vel rad. scorzon.

Pulpa citri ana ℞j.

Rub. ribium ℞vj.

Confect. alchem. ℞jss.

Cum Syrup. acetos. cit. vel rubi Idæi q. s. Electuarium.

D. S.

Electuarium refrigerans & confortans.

IV. De opio & opiatis expertum est HORSTII judi-  
cium in *Judicio de Cbirur. infusoria*, p. 83. Ea nempe,  
si revera sunt remedia polychresta, ita etiam in malignis  
febris quibuscumque utramque faciunt paginam: rectè si-  
quidem administrata, & alexipharmacis mista, sudorem  
promovent, imprimis ubi propter nimiam inquietudinem  
aut anxietatem ægri prohibentur à sudore. Ut ergo ta-  
lia præcaveamus, exhibemus opiata cum sudoriferis; ut  
sic melius proliciatur sudor, & magis quieti reddantur  
ægri: & quidem in incremento solum, dum ad statum pro-  
perant, non in statu ipso, vel ubi deficiunt vires, con-  
veniunt. Unde & opium tam insigniter extollit, & qui-  
buslibet compositionibus alexipharmacis addendum suad-  
et LUDOVICI in *Pharmac. sua Modern.* pag. 276; sicut  
etiam VERULAMIUS in *Hist. Vita & Moris* p. 96. §. 21.  
Opiorum exitium usum in febribus malignis prædicat.  
Nempe excretionem egregiè promovet opium: spiritus  
quonque, ne tam citò resolvantur, quasi coërcet, & gra-  
viora in malignis symptomata mitigat: vigilias ac deliria  
præcaver; ac impetuosos humorum interdum effervescenti-  
um motus impedit & compescit, in specie horrendum  
ac metuendum sæpiùs sanguinis per nares profluvium si-  
stæ. Præter alia exempla huc facientia videndus T I-  
MÆUS à *GuldenKlee* in *Conf. lib. 8. Cap. 25. p. 377.* ubi ma-  
ligna febris ardens cum sanguinis ex naribus profluvio,  
tandem aliis irritis laudano opiato curata; quod notabile  
est: Tale exemplum etiam habetur in HORSTIO in  
*Obs. l. 1. pag. 18.* de milite, febre ardente maligna & morbo  
Hungarico pertinaci afflicto, aliis irritis laudano opiato  
curato. Post sudores etiam cum *Julepis* vel *Misturis* opiata  
propinata conducunt, ut quasi roboretur magis & quietior  
fiat æger; & magnum est commodum, si inducatur som-  
nus, modò recto tempore opiata adhibeantur: hinc &  
theriaca, mithridatum, &c. quod in febribus malignis  
his præsertur, Electuarium diascordii Fracastorii, ab Au-  
toribus, tam veteribus quam Modernis, adhuc suam me-  
retur laudem. Theriaca sola quidem absque acido ad-  
juncto propinata in principio febrium malignarum, in  
specie cum fervore excessivo, seu effervescentia nimia jun-  
ctarum, nonnihil est suspecta, quoniam theriaca per se  
sola nimiam sanguinis turgescientiam, & per consequens  
nimium ætum, excitare solet. Optimum ergo est, ut ta-  
les compositiones opiata & theriacales aromaticæ, e. g.  
theriaca, mithridatum, &c. à ℞j. ad ℞j propinentur cum  
vehiculo acido, v. g. cum aceto vini, vel cum aceti ruta-  
cei, vel cum aceti bezoardici altiusve similis cochleari  
uno vel altero; sic enim longè melius ac poten-  
tius



ius sudorem movebunt, & minùs debilitantur ægri: propter quam causam, nempe æstum, theriacales & mithridatii loco elect. diafcozidi, seu temperatum magis, adhibetur, in specie in alvi aliisque excretionibus præternaturalibus. Moderni vel laudanum opiatum, vel essentiam opii, aut hujus loco essentiam theriacalem usurpant. Observandum tamen, ne opiata adhibeantur tempore criticos; nam criticas motiones impediunt.

V. Camphorata sunt alexipharmaca & sudorifera optima, quæ præter vim veneni correctivam simul aliqualem vim spirituum fixativam obtinent; unde imprimis in inquietudinibus, vigiliis & metu delirii conveniunt; hinc & vigilias & deliria ipsa compescunt. Sed cautè ob volatilitatem nimiam usurpentur, cum non omnia subjecta ejus usum ferre possint; præsertim quorum caput debile est, literati v. g.; ac imprimis mulieres delicatæ, quæ fortiora odorifera olfacere nequeunt, mirè adhorrent camphoram, & in passionem hystericam ex ejus usu incidunt, utut hæc in aliis sistat paroxysmum hystericum. In mulieribus ergo his, systema nervosum sensilius habentibus, cautè procedendum: sicut & in iis, qui literati sunt, & quorum spiritus animales sunt faciliè mobiles & dissipabiles, his enim camphora generosum nimis remedium videtur, nimis ferit cerebrum, & nimis spiritus animales exagitat. Alias in propriè dictis febribus malignis, præsertim contagiosis, ubi subjecta eandem ferre queunt, inter alexipharmaca nunquam intermittenda camphora.

VI. Observetur, quod febrium malignarum non semper nec in omnibus sit una eademque ratio; attendendum igitur semper ad appropriata malignæ febris specialia remedia: prout enim hæc diversis se produnt symptomatis, & nunc continuæ, nunc intermittentes videntur, atque peculiari malignitatis gradu differunt; ita etiam earum causas in ipsa radice nonnihil diversas esse probabile est: adeoque easdem curandi non planè eadem est methodus, sed pro varietate dictarum circumstantiarum subindè alexipharmaca varianda & specificanda sunt. Sic illa maligna febris, quæ à contagio oritur, magis requirit alexipharmaca & potentiora sudorifera; quæ verò à causa interna, humorum pempe initus genita maligna constitutione, magis temperantia, absorbendo alterantia, & successivè diaphoresi resolvantia. Sic attendendum quoque, an massa sanguinea, an verò spirituum animalium ac nervorum systema magis affligantur? posterius enim in calu volatiliora, subtiliora ac penetrantiora opiatas mista magis conducunt; priori verò non, nisi volatiliora aut fixa, acidis blandis subindè temperata, conducunt. Item propter specialem febrium malignarum differentiam semper observandum, ut in specie huic malignitati simul appropriata per experientiam cognita opponantur remedia: v. g. in variolis, morbillis & purpura myrrha aut castoreum; in periculis semina expulsiua; in dysenteria epidemica hepata viperarum & similia.

VII. Observetur: nunc massam sanguineam magis, nunc spirituum animalium & nervorum systema magis affligi: ibi excretionibus cutaneas ut plurimum, item per alia loca expulsiões, contingunt; hic verò vigiliarum, deliriorum, convulsionum & similium symptomatum, cum pulsu ut plurimum apparenter bono, est impetus.

VIII. Observetur: ad illud præsertim quod magis urget, esse respiciendum. Nempe interdum febris est purè aut simpliciter maligna; interdum verò est complicata plùs minùs cum febre continua ardente: utut verum sit, raram esse febrem ardentem, cui non sublit modò major, modò minor malignitas. In tali ergo casu complicati quasi sunt morbi. Propterea attendendum simul sedulo est ad sanguinis motum fermentativum, ejusque ebullitionem febrilem, & indè dependentem æstum, cephalalgiam pulsatoriam, ac alia symptomata febribus ardentibus communia, ut pro varietate circumstantiarum possimus variare medicamenta: Quò magis enim æstus urget, eò minus sudoriferis alexipharmacis volatilibus oleosis utendum est, ne deliria concitentur; quò minùs verò, eò tutius ista, præsertim in principio & augmento usurpanda, id est, ut vulgò Practici dicunt: attendendum esse, an major putredo febrilis seu ebullitio in sanguine, an verò major malignitas urgeat? ad illud enim, quod magis urget, dirigenda præsertim est curatio, adeoque interdum magis ad malignitatem respiciendum. In genere tamen semper, quantum fieri potest, utrique prospiciendum: Sanè semper in turgescencia febrili intensiore magis usurpantur absorbentia & ebullitionem corrigentia, aut salia volatilia alexipharmaca juncta, interponendo simul blanda acida; malignitati per generosiora remedia volatilia, & æstuationem corporis nonnihil intendentia theriacalia, & similia alexipharmaca; utrique per moderata acida, aut sulphurea metallica fixa, v. g. antimonialia, est succurrendum: nam hæc & in febribus ardentibus & in malignis sobriè usurpata conveniunt, quatenus ebullitionem & organum febrilem sistunt, & vi sudoriferà malignitati resistunt: id quod in genere in omnibus febribus malignis observandum est.

IX. In cura febrium malignarum diligenter Medicus inspicat oculos, linguam, & consideret manus ægrorum. Oculos quidem, ut de futuro delirio & convulsionibus sequentibus possit judicare; quando enim oculi sunt fulgidi, rutilantes & quasi ignei, aut quando ad speciem ægrorum est ferox, delirium plùs minùs furiosum certò imminet. Linguam verò consideret ac fauces, ut internum causum seu ardorem in præcordiis, indeque ortam prunellam, vel linguæ & faucium excoriationem & exulcerationem, & alia similia symptomata in morbo Hungarico frequentia, cognoscat; lingua enim si fuerit mollis, humida, rubra, & fauces non affligat sitis, tunc Medicus sit securus; secus, si lingua nigra, faucesque cum lingua arida & fissa cum adjuncta siti appareant, tunc periculum adest, & imminet prunella. Manus denique seu carpos consideret, an sint metuendæ convulsionibus: ubi enim percipit Medicus, tangendo pulsum, quasi tractionem quandam, aut subsultationes tendinum in carpis, licet manus quiesca sit, certus sit Medicus imminere convulsionibus. Infallibile est hoc signum.

Observ. X. nihil esse exitiale, & hominem febre maligna correptum, præsertim si intensior fuerit malignitas, certius accitius ad interitum trahit, quàm quicumque, in specie ingens & superflua, purgatio per alvum, uti crebra experientia sufficienter comprobatur. Uti enim non, nisi funesto omine, laxa in talibus observatur alvus, & diarrhoea symptomatice aut colliquative perniciosè admodum sunt in febribus; ita quælibet etiam artificialiter instituta Purgatio, idque in specie, ubi à contagio natum est malum; item, ubi suspicio est, cutaneam affuturam excretionem; item ubi minus urget effervescencia febris ac æstus, quàm malignitas. Caveant ergo Medici, ne omnibus in his casibus morbi tempore propinquet Purgantia in morbi cursu.

Quod si in primis viis obstructis aperiendis aliquid molliendum necessarium sit, blanda clysmata, eaque temperata, adhibeantur. Et hæc ipsa etiam, ubi excretio cutanea se offert, non nisi cautissimè applicanda. Declinante autem morbo, aut devicta pernicie, post 14. dies, &c. blanda Laxantia non incommode conveniunt. Siquidem externe, pro primis viis abstergendis, in febribus malignis necessarium videatur, hoc vel serum lactis, præsertim cum succo citri nonnihil acidulatum, vel decoctum tamarindorum Julepis in debita quantitate additum, vel nitrû antimoniatum in potu dissolutum optimè complebit: Rectè hæc dicit BALLONIUS Pharo Med. p. 175. In malignis potius alterandum per alexipharmaca, quàm per Purgantia evacuantum. Id quod observandum contra Gallorum & Italianorum Praxin.

XI. Venæsectio in febribus malignis, quæ talibus, nullum omnino locum invenit, adeò, ut quò magis febris sit maligna, eò magis noceat venæsectio, idque eò magis, quò tardius instituitur. Quid enim prodest, sanguinem & spiritum detrahendo fores apertiores maligno fermento pandere? Cum enim in malignis natura sæpè per sudorem se soleat exonerare, certè venam secando impedimus hunc naturæ motum, & ad perniciem detruemus ægros. In specie in febribus cù excretionem cutanea, macularum vel pustularum, conjunctis, venæsectio instituta est lethalis, quia impedit motû naturæ quasi criticû per cutim factum, qui minimè turbandus est. Equidem Practici vulgares aliud suadent: dico tamè eam in quacumque febre maligna administratam plus nocere quàm prodesse, præsertim nisi in primo morbi insultu instituat; eum si ista illa refrigeratio ex sanguinis detractione noceat: de contræstuatione talis ægrorum, modò non sit excessivè nimia, excretionibus tales promoveat. Cauti proinde hæc in parte sumus, & caveamus à missione sanguinis, præsertim si à contagio febris maligna fuerit nata; ubi pessima est hac ratione enim porta contagio aperitur, ut integrâ massâ sanguineam afficiat, & vires magis labefactet. Sanè multorum annorum Practicis, B. D. MICHAELIS, nemini in febr-



febris malignis venam secuit, plurimis funestorum experimentis cautior factus.

Sunt equidem, qui in plethoricis petechiarum, morbillorum & variolarum eruptionem venæsectione maturè promoveri asserunt: sed hoc non, nisi rarò evenit. Vbi tamen minor est malignitas, adjuncta verò febris ardens intensior in subiecto plethorico ac juvenili, & in primo ætatis flore constituto, vel aliàs sanguinis missioni adueto, in talibus casibus interdum, sed *mox à primo principio*, venæsectio, cautè tamen & in parca quantitate, institui potest. Conferantur hic simul istæ circumstantiæ, quas insinuat *WILLISUS Pharmac. Rat. p. 389.*

Obijciat quis: largas nonnunquam in principio petechiarum & variolarum malignarum accidere narium hæmorrhagias, quæ vel morbum postmodum leviores reddunt, & impetum variolarum sistunt. Verum interdum est: consideretur tamen, an hæmorrhagia talis sit critica? an verò Symptomatica? si hoc, quod restantur symptomata capitis concomitantia, & nullum levamen morbi percipiat æger, hac in parte naturam sequi non licet: sin verò critica fuerit, & cum euphoria ægri fiat, probabile quidem videtur, ut in sanguinis organo imitemur naturam, & sic venæsectionem administrandam jubere possumus. Verum nec dum hoc licet facere, cum naturam non assequi possimus; ubi enim natura instituit hæmorrhagiam, se ipsam levat; & si adest stillicidium narium sanguinolentum in febribus malignis, pessimum habetur signum & funestissimum: unde neque tunc motum naturæ perversè agentis affectare conceditur. Ego nulli Autor ero, ut venam leget: & quidem in specie contra venæsectionem & purgationem in febribus malignis acriter dimicantes videbitis *TIMÆUM von GuldenKlee in Resp. p. 104. & p. 126.* item *BRUNNERUM in Consiliis de Febre Hungarica*, & *RULANDUM de Morbo Hungarico seu Castrensi*, & similes alios Autores, qui perunaciter rejciunt & venæsectionem & Purgationem: vid. in specie in *HORSTIO Juniore l. 1. Observ. in Append.* qui tamen non, nisi à cautissimo, imitandi sunt.

XII. Cantharidum & vesicantium usus in statu febrium malignarum est etiam usitatus & commendatus, carpiis & femoribus applicata: vid. *HOEFERUS in Herc. Med. p. 282.*, qui horum utilitatem insigniter commendat; & imprimis in Italia & Gallia usurpantur. Usus verò legitimus & applicandi ratio cõsistit in eo, quod vesicatoria imprimis conveniant in incremento vel principio status, dum, vel graviora, imprimis capitis & animalis facultatis, imminuent aut urgent symptomata, ut capitis dolores excessivi, convulsionones, gravius & ferox delirium, quod vel præcavent, vel cerò levant; vel naturam aliquam excretionem inoliiri ex erumpentibus hinc inde, sed imperfectè, maculis, à doloris sensu in quadam parte suspicio erupturæ abscessus est; vel quando facta jam excretio quæcunque ex causa denudè retrocesserit, tum imitemur Italos, subito vesicatoria applicantes, & ita opus naturæ, nempe excretionem, promoventes. Locum etiam habent us in febribus malignis tunc, quando extrema frigent, interiora verò urgetur: item quando veteris aut alii soporosi urgent affectus, adeoque, ubi suspicio est, ne vel fermentum malignum magis spiritus animales, & genus nervorum afficiat, vel quæcunque ex causa raptus sanguinis aliorumque contentorum ad caput, uti loquuntur Practici, fiat: vid. *M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 214.* In talibus casibus optimè *cruribus* supra vel infra genua, vel *brachiis* propè carpos, aut prope axillas, tandem etiam circa *nucham* applicantur: sed hoc vix, nisi in affectibus soporosis, aut ubi jam aliis in partibus applicata fuerint. Sanè talibus casibus, tam in benignis quàm in malignis febribus, conducunt, idque cò magis in his, quorum parcius sudor aut diaphoresis in iisdem non rarò observatur. Arbitror, quod in *miasmate maligno evocando*, mediante spiritu ad locum dolentem concitato impetu, singulare quid obtineant: sic enim & *bubonibus* aliisve tumoribus, ut melius erumpant, optimo consilio applicantur: Quin & vesicatoria talia, aut his parata fontanellæ, expertum esse pestis præservativum, habebimus suo loco: Hinc & febres intermittentes sui applicatione tollunt. Apud nos non sunt in frequenti usu Vesicatoria: in regionibus tamen calidioribus multum applicantur.

Remedia inter vesicantia optima sunt vel Emplastrum vesicatorium in Pharm. Augustana, vel Emplastrum istud vesicatorium Schröderi. Interim noceat, si per vesicato-

ria pustulæ excitari nequeant, desperatum malum esse. Ceterum audiat STEPHANI correctio, qui malè putat agere Medicos statim ad vesicatoria properantes, cum ea tunc adhibenda demùm sint, quando quidem excretio sit critica, sed impedita, ita, ut his ipsis juvetur natura.

XIII. Quoad dietam in febribus malignis observandam: tenuis hæc sit necesse est; & cum sæpius summè fastidiant alimentorum odorem, nullo modo ad eundem cogendi sunt, quin iuscula aut similia abundè, licet in parva quoque dosi, sufficiant. Potus sit vel cerevisia secundaria, vel etiam aqua simpliciter, quæ leviter ebullierit, cum parte tertia vel dimidia vini temperata, & infuso pomocitri cum cortice, in taleolas inciso, vel succo expresso medicata, quin etiam gelatina Cornu Cervi recens parata, & super carbonem liquefacta, largiter cum potu isto, aut cerevisiæ, aut alii ordinario, partim scopo analeptico, partim scopo alexipharmaco sudorifero, admisceri potest: e.g.

*R. Aquæ font. Biss. vel Brij.*

*Vini Rhenan. ℥j.*

Mistis his addatur

*Pomum citrium nonnihil dissect. &*

*nonnihil express. N. j.*

*Gelas. Cornu Cervi super ignem diffus. ℥ij. M. D. S.*

*Julepus citrius confortans singularis.*

Hinc etiam decoctum citri *Mynschiei*, additæ ℥j. vel ℥ij. gelatina Cornu Cervi, ad ℥j. convenientissimum in malignis est potus loco julepi. Vinu generosum acidu non nocet in malignis, quin moderato usu remedi confortantis vices subeat: Conf. RIVERII Praxis, & BARTHOLINUS Cent. 6. Hist. 7. Convenit etiam pro potu serum lactis acidulatum cum succo citri. Nec inconueniens est fumo sulphuris medicari potum quemvis ordinariu, cum tale sulphuris gas ad extinguendam malignitatem, & condiendos balsamicos vi humores, mirè conducatur; cujus loco etiam clyssi anti-monalis sulphurei, vel spiritus nitri dulcis, vel toris marialis 50. ad 60. guttas in mensura dimidia cerevisiæ, vel cujus ordinarii potus utilissimè instillari possunt: qualem potum sulphuratum, & clyssos hos proficuos præparandi modum, videbitis in CNOEFFELII M. M. febres malignas epidemicas seu pestilenciales pag. 96. Aliàs & nitrum antimoniatum à ℥j. ad ℥ij. in mens. j. potus ordinarii dissolutionem egregiè convenit, nisi vel alvi liberior fluxus, vel stomachi nauseabundi imbecillitas obstitit.

Quoad alexipharmaca & sudorifera, quæ in malignis febribus imprimis conveniunt, eadem sunt in triplici differentia: nunc enim conveniunt simpliciter alexipharmaca nunc alterantia, qualia acida; nunc in specie simul sudorifera, eaque nunc volatilia, nunc fixa: quorum illa magis in principio, hæc magis in incremento & statu conducunt.

Inter Sudorifera autem habeamus rationem & selectum, ut scilicet in principio volatilia, ubi magis malignitas urget, & fixa in progressu, aut ubi febris ardens jungitur, adhibeamus. De horum, imprimis volatiliu Bezoardicorum, legitimo usu vid. imprimis LUDOVICI in Pharm. p. 237. item 242. 261. 284. item in Tr. de Sale volatili tartari Prefat. Editionis secundæ. De acidorum usu noceat, quod ea in toto cursu febrium malignarum, partim cum julapiis, partim cum sudoriferis, conveniant.

Volatilia sunt vel macra seu salina, særè frigida, vel aromatica seu oleosa, særè amara calida. Macra illa sunt spiritus & salia volatilia urinosa ex animalibus desumpta, spiritus salis ammon., spiritus & sal volatile Cornu Cervi, viperarum, rattari, urinæ, liquor cornu cervi succinatus, spiritus & sal volatile succini, &c. item aceturum, succus citri, clyssi sulphurei; qui tamen magis in potu usitati, &c. Oleosa volatilia sunt camphora, quæ omnium optima. omnia aromatica, sudorifera, ut zedoaria, centaureum minus, &c. rob baccarum juniperi & sambuci; item olea destillata, ut succin., citri, camphoræ, exque his concinnatæ oleum pestilentielle Heinisii, oleu destillatū Cor. Cer., tartari &c. Essentia, Infusio, & Spiritus theriacales caphorati vel crocati: vid. ZWELFERI Mantissa Herm. p. 430. Essentia theriacalis anodyna, Elixir alliatu, pestilentielle Crollii, proprietatis, essentia zedoariæ, scordii, absinthii, cardui bened., croci, baccarum juniperi, cinnamomi, myrrhæ, succini, viperarum, castorei, tormentillæ, gentianæ, rutæ, vincetoxici, melissæ, &c. Aceta bezoardica, zedoariæ, tinctura bezoardica, tanquam optima alexipharmaca. Fixa sunt vel mineralia, vel animalia: Mineralia, ut sulphura metallica cum nitro fixata, in specie antimon., diaphoret., aurū diaphoreticū, cinnabaris nativa, antimon.,



quæ nobilissima, & à **POTERIO** *Sudoriferi pestilentialis* nomine venit; & Bezoardica mineralia quælibet, tam simplicia, quam cum aliis composita; in specie Bezoardicum Ioviale **RIVERIUS** in febribus malignis commendat; & hinc Bezoardicum solare: terræ minerales sigillatæ, unicornu fossile, terra solaris, corallia, flores sulphuris, item nitrum & nitrata: animalia suggerunt partes duras osseas, tam temperatas quam ustas, ut Corn. Cerv. vel ebur cum vel sine igne, Cornu Cervi solare, unicornu verum præparatum, lapides animalium bezoardici, pulveres viperini, & Bezoardica animalia.

Temperata, & medix quasi naturæ, sunt gelatina Cornu Cervi, & *femina ista expulsiua* dicta, quæ in omni casu, speciatim in febribus malignis, in quibus natura expulsio-nem ad cutim moliri incipit, polychrestæ sunt in forma Emulsionis, ad promovendam dictam excretionem cutaneam, qualia cardui benedicti, napi, aquilegiæ, nasturtii, citri &c., quibus addi potest myrrha. Hinc in petechiis, variolis & morbillis, purpura, & similibus excretionibus promovendis, mirabilis est Emulsio ex seminibus expulsiuis: vid. **ZWELFFERUS** in *Pharm. Regia* pag. 209, ubi egregium habet liquorem alexipharmacum; ad cuius imitationem soleo præscribere:

*R. Flavæd. cort. citri* drachm. ij.

*Sem. aquileg.*

*Card. bened.*

*Napian. ß. 3 ij. ad 3 j. vel 3 ß.*

*Citri.*

*Amygdal. dulc. an. 3 j.*

*Myrrh. elect. (quæ nobilis ob vim balsamicam)*  
à 3 j. ad drach. ß.

*Cum l. q. Aqu. scord. & scorzon. vel scabiosa & flor. sambuci f. Emulsio* ad 3 iv. vel v. parum edulcoranda, & subindè haurienda.

Hinc etiam interdum Corn. Cerv. sine igne drachm. j. & de Antimonio diaph. vel de Bezoardico minerali scrup. j. vel drachm. ß. & nonnulla alia addenda veniunt. Servat corpus in blando madore, ut ita promoveatur excretio. Sæpè hic maior loco sudoris sufficit, si scil. aliàs debilitatur æger, vel non adeo urget malignitas, nec debent ad copiosiores sudores cogi. Myrrha cum seminibus & amygdalis in emulsionis formam redacta lactescit; saporis tamen ratione ad strictè dictas Emulsionem non pertinet.

Ex modò dictis sexcenta alia concinnantur *composita*: ver. gr. pulvis Bezoardicus **SENNERTI** vel **D. MICHÆLIS**, rubens Pannonicus, imprimis conveniens, ubi *fluxus alvi* simul adest; pulvis Saxonicus, species de hyacintho &c., quorum largissimam legetem videbitis apud omnes *Scriptores*. Pertinent huc compositiones theriacales aromaticæ, ut theriaca, & muhradatum, Electuarium de ovo, Orvietanum, *Keßlers* camphoratum, confectio de hyacintho &c., & præ his temperatum magis Electuarium dialcordii *Fracastorii* ad drachm. j. vel drach. ij. propinatum; & quod magis laudandum, à **SYLVIO** correctum: quæ ipsa propter æstuationis incrementum, quod inferunt, convenientissimè cum *vehiculo acido*, in specie aceto, vel simplicis vel theriacali, aut succo citri miscentur, & ita in aqua scabiosæ, calendulæ, cardui benedicti, & similibus propinantur. Est enim theriaca mixtura salina oleosa volatilis anodyna & sudorifera, quæ & spirituum influentium imperium sopit, & sudorem potenter movet. Jam verò, si loco theriacæ reciperetur spiritus Corn. Cerv. essentificatus à drachm. ß. ad scrup. ii. vel drachm. i. & imprægnaretur gr. j. vel altero laudanti opiat, vel essentia opii guttis x. remedium habebitur eiusdem valoris, ac compositio illa theriacalis. Subindè consultum est, ut fixa volatilibus nonnihil acueatur ad promovendam sudoris excretionem.

Ex Regno ergò vegetabili conveniunt radix galangæ, scorzonæ, zedoariæ, gentianæ, alii, aristolochiæ rotundæ, angelicæ, succisæ, chelidonii maioris, Valerianæ, enulæ (huius radices decoctum cum floribus calendulæ commendatur mirè ad expellendas petechias) vincetoxicæ, bistortæ, olishi, levistii, ulmaris, petasitidis, pimpinellæ, pentaphylli, contrayervæ, antheræ, folia dictamni Cretici, galegæ, cardui benedicti, acetosæ, scabiosæ, scordii nostratis & Cretici (quod ferè omnibus præfertur in curatione malignarum) uvæ inversæ seu herbæ Paridis, rutæ, galegæ; summitates abutibii, centaurei minoris, cardui benedicti, scabiosæ, acetosæ, & similia; flores quatuor cordia-es, quibus merito additur flos calendulæ, hyperici, salvis,

betonicæ, aquilegiæ, crocus &c.; semen acetosæ, cochleariæ, angelicæ, melissæ, aquilegiæ, napi, citri; cortices citri & aurantiorum; bacce juniperi, uvæ inversæ &c. Omnibus palmam præripit in regno Vegetabili camphora cautè usurpata, mirabile concretum, quod & alcalicis subjectis & acidis se sociat; alexipharmacum omnibus superius, & verum balsamum, tam in præservatione quam curatione febrium malignarum. Propterea omnibus sudoriferis & alexipharmacis ad resistendum malignitati, quoties fieri potest, semper addenda, totam massam sanguineam suo balsamo tingit, potenter sudorem movet, ac vel in præcavendis vel mitigandis delirüs, agrypnüs, & convulsionibus, somnoque introducendo, vix par habet remedium.

Ex his ergò varia sunt remedia, præter aquas destillatas istorum simplicium, v. g. melissæ &c., imprimis infusione horum simplicium aceta sunt bezoardica, de quibus postmodum, ubi de peste: v. g. radix angelicæ, scordium &c. aceto infunduntur. Exemplum *aceti bezoardici* sit **TIMÆI Von Guldenkleee in Consil. l. 8. cas. ult.**

*Citrus* totus est alexipharmacus, unde cortices, succus, & ex eo parata remedia quæcunque, imò acidulæ ex citro paratæ, nunquam omittendæ. Pertinet huc syrupus acetosus citri, item syrupus de citro compositus, Decoctum citri Myrsinæ &c., quæ in morbis malignis convenientissima sunt: ob id cum quibusvis ferè remediis, tam absorbentibus quam alexipharmacis, in febribus malignis subindè aliquid de citro propinandum, aut etiam post illa exhibendum est.

De sambucos res nota est, quod ejusdem flores, spiritus florum sambuci, item rob ex bacis & rob juniperinum, sint egregia sudorifera pro pauperibus, imprimis si cum Corn. Cerv. sine igne propinentur; sic enim potenter sudores movent. Lignum sassafras, Decoctum ejus ut & Decoctum florum sambuci, pro corpore Juleporum etiam egregii usus est in febribus malignis; uti etiam Decoctum Corn. Cervi cum radice scorzonæ, & quæ sunt similia.

Ex Regno Animalii offert se imprimis Cervus, qui similiter totus est alexipharmacus & antipestiferus, imprimis cornu ejus, & ex hoc parata gelatina, hinc sanguis ac cor primatum obtinent, & ex his præparata in frequenti sunt usu; unde aut Corn. Cerv. sine igne, aut, quod melius est, spiritus Corn. Cerv., sal volatile Cornu Cervi, sal volatile & spiritus sanguinis atque cordis cervi, &c. præ cæteris sunt in usu: hinc etiam liquor Cornu Cervi succinatus potentissimum est alexipharmacum & sudoriferum in febribus malignis, speciatim ubi mox in principio aut incrementu affectus nervini, convulsionem aut epilepsiam imminet: Sal volatile Cornu Cervi rectè sublimatum à gr. v. ad xij. vel xv. usque ad 3 j. propinatur: spiritus Cornu Cervi à drachm. ß. ad drachm. j.: liquor Cornu Cervi succinatus ad gutt. 20. vel 30. est enim satis potens. Post Cervum est vipera, cuius sal volatile, item pulveres viperini ritè parati, sub nomine Bezoardici animalis sunt optimi. De lapide Bezoar ex damnarum genere desumpto, tam Orientali quam Occidentali, res nota est, quàm decantatus sit in peste & febribus malignis ob insignem vim sudoriferam; de quo observetur, quod habet **ZACUTUS LUSTANUS** & **HILDANUS**, quod non aded in parva dosi ad aliquot grana tantum, sed ad minimum ad scrup. j. vel drachm. ß. sit propinandus; utut in virtute alexipharmacæ & sudoriferæ ipsi nihil cedat calculus humanus, bezoardicus & sudoriferus, qui eadem dosi exhibitus longè melior est. Decætero propter familiarissimam lapidis Bezoar dici sophisticationem, ejus usus unicuique suspectus esse debet, adeò, ut in unc. i. vix drachm. j. genuini lateat. Quid? quod hic apud nos copiosior, quàm apud Indos invenitur, quibus tamen genuinus rarus est; vid. **BAUHINUS de Lapide Bezoar**: **ZWELFFERUS** in *Animadv. ad Pharmas. Augustanas* p. 65. etiam de ejus sophisticatione scribit. Bezoar factum. videb. in *append. ad Ann. 6. & 7. M. A. N. C.* p. 28.

Ex Regno Minerali in febribus malignis reliquis palmam præcipiunt antimonialia sulphurea, eaque reddita fixa; quoniam antimonii sulphur, de natura solari nonnihil participans, malignitatem salis volatilis peccantis figit, & fixatam mediante sudore educit: hinc antimonium diaphoreticum, alias notum, est singulare & usitatum remedium; omnia quoque, quæ basin antimonii agnoscunt. Unde etiam antimonio diaphoret. nobiliora, Bezoardica mineralia, tam simplex à gr. vi. ad xij. quàm solata & lunata, aliæque composita, in eadem dosi sunt optima. Bezoardicum Ioviale est usita-



ustitiam **POTERIO** cum camphora, si propinetur in aqua appropriata in febribus malignis. Sed nescio, an non huius cum nitro fixatis præferendum sit potius sulphur antimonii fixum: hinc cinnabaris antimonii, utraque non planè fixa sit, tamen ob sulphur suum, in specie ubi convulsi impetus simul urgent vel imminet, à gr. vj. ad ℥ss. vel xv. vel aliud genuinum antimonii sulphur, rursè cum sale ammoniaco sublimando paratum, sub nomine Tincturæ antimonii sic- cæ; vel sulphur antimonii fixum ex scorpiis reguli antimo- nii occulto artificio præcipitatum, in sistenda malignitate & epilepsia utramque faciunt paginam; ac reliqua antimo- nialia sulphura fixa, utpote ad panaceas maximè accedentia: vid. **BASILIVS VALENTINVS** in *Cyru Triumph. an- timoni*. Facit etiam hoc sulphur commune seu minerale, quod pro pauperibus in locum antimonialis sulphuris suo modo substitui potest, cum magnam inter se habeant cogna- tionem, idque vel crudè, vel cum camphora assumptum: unde etiam conclavia ægrotantium sulphure ac pulvere py- rio suffumiganda sunt: indusum etiam & vestimenta in gra- viore malignitate hoc ipso fumo imprægnanda. Possum etiam sulphurare iuber in cura febrium malignarum **CNO- EFELIVS** l.c. Pertinent huc etiam terræ alexipharmacæ mi- nerales, Bokus Armena, terra sigillata & similia, quatenus hæ ipsæ de sulphure minerali plus minus participant. Succinum & ejus, sal volatile est singularissimum, ubi genus ner- vosum à malignitate est affectum. Spiritus mineralium aci- duli commodissimè propinantur cum lulepis: eminet præ cæteris spiritus nistri, nunc solus, nunc, quod melius est, cum spiritu vini dulcificatus; & hinc spiritus salis, & spiritus sulphuris, qui est egregius. De Tinctura bezoardica seu mi- xtura simplici, cujus basin tum salo volatili constituit cam- phora, & de spiritu theriacali camphorato, res nota est, quod egi egè proficit, à ℥ss. ad ℥j. propinaxa. Spiritus fuliginis urinosus à ℥ss. ad ℥j. quibusdam in secreto habetur in morbis malignis.

Ex his variæ & mille Formulæ, in febribus malignis ma- gis utilitate, præscribi possunt: v. g. in principio & incremen- to præmissis præmittendis

℞. Tinctur. bezoard. rursè parata ℥j.  
D. S.

Tinctura bezoardica pro una vice.

Sumatur in quocunque vehiculo, stomacho vacuo, ex- pectando sudorem.

℞. Mixt. simpl. ℥j.

Liq. Corn. Cer. succin. ℥ss.

M. pro 2. dosibus: S.

Mixtura bezoardica per duabus vicibus.

Item in forma Potionis:

℞. Aqua ruta,

Rad. scorzon. an. ℥j.

Mixtur. simpl. rursè parata ℥j.

Spiritus fulg. relict. ℥ss.

Syrup. scordii ℥ss.

M. pro 2. dosibus: S.

Potio sudorifera pro duabus vicibus.

℞. Aqu. card. bened.

Fl. sambuci an. ℥ss.

Liqu. Cor. Ceru. succin. ℥j. vel loco huius salis  
volat. viper. ℥j.

Syrupi card. bened. ℥ss.

M. pro dosi, expectando blandum sudorem: S.

Potio sudorifera pro una vice.

℞. Aqu. card. bened.

Scordii an. ℥j.

Liqu. Cor. Cer. succin. ℥j.

Pulv. diaphoret. Ludovic.

Antimonii diaph. an. ℥j.

Syrupi scabios. ℥ss.

M. D. S.

Potio sudorifera Bezoardica, pro 2. vicibus, bene circummagi-  
tanda.

℞. Aqu. rubi idæi,

Scordii an. ℥j. ss.

Antimonii diaph. ℥ss.

Cinnab. Antimonii gr. xv.

Sal. volat. Cor. Cer. gr. xij.

Camph. gr. ij. vel iij. aut laud. op. gr. j. vel ij.

Syrupi card. ben. ℥j.

M. pro 2. dosibus.

D. S. ut antea.

℞. Aqu. flor. sambuci ℥j. vel ℥ij.

Estmuller. Oper. Tom. II.

Cor. Cer. sine igne ℥ss.

Cinnab. Antimonii gr. xv.

Sal. volat. Cor. Cer. gr. ix. vel ℥ss.

Syrupi scabios. ℥ij.

M. pro 2. dosibus: S.

Potio sudorifera bezoardica pro tribus  
dosibus.

℞. Aqu. scorz. ℥j.

Cinnam. ℥j.

Cinnab. Antimonii gr. xij.

Antimonii diaphor.

Sal. volat. Cor. Cer.

succini an. gr. v.

Laud. opiat. gr. i. ss.

Camphor. gr. i.

M. S.

Potio sudorifera bezoardica pro una dosi.

℞. Aqu. flor. sambuci,

Scordii an. ℥j. ss.

Cor. Cer. sine igne,

Antimonii diaphor. an. ℥i. ad ℥ss.

Sal. volat. Cor. Cer. gr. xv.

succini gr. vi.

Syrup. card. ben. ℥j.

M. D. S.

Potio sudorifera bezoardica pro tribus  
vicibus.

Capiatur pro 3. dosibus expectando sudorem: cui, ubi gra-  
uius urgoni symptomata, commodè laud. opiat. gr. i. ss.  
vel essent. anodyne ℥ss. potest addi.

Ubi delirium imminet:

℞. Aqu. cord. Herc. Sax. ℥l.

Cinnam. ℥ss.

Spiritus theriac. camphor. ℥ii.

Cor. Cer. essentif. vel loco huius potius sal. vol.  
Cor. Cer. ℥j.

Sal. volat. succini ℥ss.

Syr. st. tunic. ℥ss.

M. S.

Potio bezoardica.

Hauriatur cochleatim.

℞. Aqu. scord. ℥ij.

Spir. theriac. vel simpl. vel moderatè camph. ℥ij.

Cor. Cer. sine igne ℥ii.

Sal. volat. Cor. Cer. vel viperarum gr. xv.

Confect. alchermes ℥i. ss.

M. f. Potio:

D. S.

Potio confortativa.

Cochleatim capiatur.

Item:

℞. Aqu. Card. bened.

Galeg.

Fl. samb. an. ℥vi.

Spir. theriac. camph. ℥i. ss.

Sal. volat. viper. ℥j.

Elect. diascord. Fracass. drachm. ij.

Syrupi card. ben. drachm. vj.

M. pro 2. dosibus: S.

Mixtura bezoardica pro 2. dosibus, bene circummagi-  
tanda.

℞. Aqu. Galeg.

Scord.

Cord. Herc. Sax. frig. an. ℥j.

Spir. Theriac. camph. drachm. ij.

Tinctur. flor. aquil.

Pæon.

El. diascord. Frac. an. drachm. i. ss.

Syr. acetos. citri ℥ss.

M. D. S.

Potio sudorifera pro aliquot dosibus.  
Item

℞. Aqu. Fl. acac.

Samb. an. ℥ij.

Gelat. Cor. Cer. rec. ℥i.

Spir. Theriac. camph. ℥ij.

Cor. Cer. sine igne drachm. j.

Bezoard. solar. ℥j. ad drachm. ss.

Extracti theriac. gr. vi.

Laud. ferm. gr. ii.

Syrup. sanic. vel scord. drachm. vi.

V 2 M. D. S.



M. D. S.

Potio Bezoardica, cochlearim sumenda.  
Quando praescribimus Theriacam, acetum dixi esse ad-  
dendum:

R. Aqu. scord.  
Rad. storzon.  
Aceti vini an. ʒij.  
Theriac. Androm. ʒij. (ubi aestus urget, el. diascord. Frac.)

Antimonii diaphor. ʒij.

Camphor. gr. vj.

Syr. rubi Idai ʒij.

M. pro 2. aut 3. dosibus: S.

Potio Bezoardica pro aliquot dosibus.

R. Aqu. card. bened.

Fl. samb. an. ʒi ʒss.

Aceti vini ʒij.

Theriac. Androm. (vel ubi aestus nimis urget, el. diasc. Frac.) ʒij.

Antimonii diaphor. ʒij.

Syr. acetos. citri ʒvj.

M. D. S. Ut antea.

R. Aqu. fumar. vel Flor. samb. ʒij. vel ʒiij.

Acetirritac. vel scord. vel theriac. vel vini ʒvj.

Theriac. Androm. ʒij. ad ʒij.

Antimonii diaphor. ʒss. ad ʒij.

Camph. gr. lv.

M. pro 2. dosibus: S.

Potio Bezoardica sudorifera pro 2. dosibus.

R. Aqu. card. ben.

Scordis an. ʒi ʒss.

Succ. citrirc. ʒvj.

Theriac. Androm. ʒi ʒss.

Bezoard. min. ʒss.

Land. op. gr. i ʒss.

Syrup. mentha ʒij.

Spiritus nitri dulc. q. l.

M. pro 2. dosibus.

D. S. ut antea.

Repetenda sunt talia aliquoties.

R. Aqu. Fl. sambuc.

Scabios. an. ʒi ʒss.

Aceti ritac. ʒvj.

Theriac. Andr. ʒij.

Antimonii diaphor. ʒij. ad ʒss.

Bezoard. min. gr. xv.

Syr. rubi Idai ʒvj.

M. pro 3. dosibus: S.

Potio Bezoardica sudorifera pro tribus dosibus.

R. Aqu. card. bened.

Flor. sambuci an. ʒi ʒss.

Liq. Cor. Cer. succin. ʒij.

Antimonii diaph. Martial. ʒij.

Cinnab. antim. ʒij.

Syr. papav. simpl. ʒij.

M. D. S.

Mixture sudorifera bezoardica, cochlearim sumenda.

R. Aqu. flor. samb. ʒij.

Aceti fl. samb. ʒss. ad ʒvj.

Theriac. Andr. ʒij.

Antimonii diaphor. ʒss. ad ʒij.

Syr. card. ben. ʒij.

M. pro 2. dosibus, pro eliciendo sudore.

D. S.

Mixture bezoardica pro duabus dosibus.

R. Aqu. card. bened.

Scabios. an. ʒij. vel ʒi ʒss.

Cinnam. ʒvj.

Acetibezoard. vel ritac. aut sambuc. vel vini

acerr. ʒvj. ad ʒij.

Theriac. Andr. drach. ʒss. ad ʒij.

Antimonii diaphor. drach. ʒss. ad drach. j.

M. D. S.

Mixture bezoardica pro aliquot dosibus.

Addi possunt etiam gr. iij. praeterpropter camphora: capiatur aeger hauriendo cochlearim subinde, ita, ut corpus in blando maneat madore, vel ubi major urget malignitas, capiatur pro tribus vicibus, expectando semper sudorem.

Vel

R. Theriac. Androm. drach. j.

Antimonii diaphor. gr. xv.

Salis absinthii ʒss.

M. pro una vel duabus dosibus:

D. S.

Electuarium bezoardicum.

Capiatur in duobus cochlearibus aceti vini.

Effervescit quidem, sed optimè sudorem promovet, maxime in principio februm malignarum, ubi observavi egregium usum, ac praecipue in petechialibus.

Vel si Theriaca minus conveniat:

R. Conf. ex toto citro,

Ros. rub. vitriolar. an. ʒi ʒss.

Rob junperi ʒss.

Elect. diascord. Frac. ʒij.

Camph. ʒj.

Cum l. q. Syr. ex toto citro &amp; Electuarium pro aliquot dosibus: S.

Electuarium bezoardicum.

R. Aqu. rad. scorz. unc. ij.

Tenell. Cor. Cer. unc. j.

Aceti destill. vel simpl. drachm. vj.

Succi citri rec. drach. ʒss.

El. diascord. Frac. drachm. ij.

Syr. rubi Idai unc. j.

M. f. Potio pro tribus dosibus: S.

Potio sudorifera.

R. Aqu. card. ben.

Rad. scorz. an. unc. ij.

Cinnam. borrag. drachm. vj.

Succicitrirc. unc. j.

Elect. diascord. Frac. drachm. ij.

Syr. rubi Idai unc. ʒss.

M. D. S.

Potio bezoardica sudorifera, cochlearim capienda.

R. Aqu. scabiosa ʒij ʒss.

Succi citri rec. ʒvj.

Elect. diascord. Frac. ʒij.

Antimonii diaphor. ʒss.

Camph. gr. lv.

Syr. card. bened. ʒss.

M. pro 2. dosibus: S.

Mixture bezoardica pro duabus dosibus.

R. Aqu. rubi Idai,

Scord.

Cardial. Hore. Saxon.

Acetirubi Idai an. ʒij.

El. diascord. Frac. ʒij.

Antimonii diaphor. ʒij.

Bezoard. min. gr. xij.

Syr. rubi Idai ʒij.

M. pro tribus dosibus: S.

Mixture bezoardica pro tribus dosibus.

R. Aqu. Flor. samb. ʒij.

Aceti Flor. samb. an. ʒss.

El. diascord. Frac. ʒij.

Antimonii diaphor. ʒij.

Camph. gr. j. vel ij. vel iij.

Syr. acetos. citri ʒss.

M. D. S.

Mixture bezoardica.

Capiatur pro una dosi, expectando probe sudorem.

In progressu morbi, & ubi volatilia, in specie sulphurea, cautiùs usurpanda veniunt:

R. Aqu. fumar. ʒij.

Corn. Cerv. sine igne ʒij.

Bez. min. ʒij. ad ʒss.

Extr. theriac. gr. vj.

Syr. cort. aurant. ʒij.

M. pro 3. dosibus: S.

Potio bezoardica.

R. Aqu. scord.

Rad. scorz. an. ʒi ʒss.



*Cornu Cervi sine igne* ℥ij.

*Antimonii diaph.* ℥ij.

*Bezoard. min.* ℥ss.

*Syr. acosf. citri* ℥j.

M. pro 2. aut 3. dosibus, prout magis vel minus urgeat malignitas.

℞. *Aqu. rubi idai*,

*Ex succ. ceras. nigr. ana* ℥ss.

*Cornu alcis sine igne* ℥ij.

*Antimonii diaph.* ℥j.

*Syr. rubi idai* ℥vi.

*Spir. niri dulc. q. l.*

M. S.

*Potio alterans sudorifera.*

Usutpatur pro 2. dosibus, expectando sub moderata tegumentis sudorem blandum.

Commodè huiusmodi Mixture etiam myrrha potest addi.

In statu cum delirio:

℞. *Aqu. ulmar.*

*Cordial. Herc. Sax. frig.*

*Carbunc. ana* ℥j.

*Cinnam. (ratione vitium)* ℥vl.

*Bezoard. min.*

*Cinnab. antimonii ana* gr. xv.

*Nitri antimoniat* ℥j.

*Camph. gr. iij.*

M. f. Potio pro aliquot dosibus: S.

*Potio refrigerans & confortans.*

In suprà citato loco, & Tract. Cnœselii insigniter commendatur *Mixtura de tribus ex tribus*. Compositio est hæc:

℞. *Mixt. de trib. l. e. Mixt. simpl.* ℥vl.

*Spir. de trib.* ℥ij.

*Fl. sulphuris* ℥j.

*Aqu. fumar. vel alius alexiter.* ℥ij.

*Syr. acosf. citri* ℥j.

M. f. Potiuncula pro una dosi.

(Satis est potens; ita tamén præscribit CNOEFELIUS: subiecta forsitan habuit fortiora.)

*Mixtura de tribus*, uti notum est, est *Mixt. simplex*.

*Spiritus de tribus* sic componitur:

℞. *Antimonii quintuplâ nitri parte in pulverem album fixati, & edulcorati: vel huius loco rez. antimonii pulveris.*

*Sulphuris crudi pulverisat. ana* ℥ij.

*Nitri purif.* ℥iv.

Destilletur per retortam more solito, & f. *Spir. de tribus*, scilicet *Clyffus*.

℞. *Corn. cerv. sine igne* ℥ss.

*Antimonii diaphor.* ℥j.

*Cinnab. antimonii* gr. xv.

*Bezoard. solar.* ℥ss.

M. pro 2. dosibus.

D. S.

*Pulvis bezoardicus pro 2. dosibus.*

Capiantur in sequenti vehiculo:

℞. *Aqu. card. Herc. Saxon. frig.* ℥ss.

*Spir. ther. camph.* ℥ij.

*Syr. rubi idai* ℥vi.

M. D. S.

*Potio ad pulverem.*

℞. *Antimonii diaphor.* scrup. j.

*Cinnab. antimonii* scrup. ss.

*Camph. gr. v.*

M. f. Pulvis in graviore malignitate: S.

*Pulvis sudoriferus bezoardicus.*

℞. *Pulv. diaphor. Ladov.* scrup. j.

*Antimonii diaph. vel bezoard. min. vel cinnab. antimonii* scrup. ss. vel gr. xii.

*Laud. opiat. gr. i. vel camph. gr. ii. vel iij.*

M. f. Pulvis: S.

*Ue antea.*

℞. *Ebor. sine igne* scrup. j.

*Amibell. Poterii* scrup. ss.

*Bezoard. lunar. gr. iv.*

*Camph. gr. iij.*

M. f. Pulvis:

D. S. *Ue antea.*

℞. *Pulv. Bez. Sennerti* scrup. j.

*Myrrh. elect. grovi.*

*Etmuller. Oper. Tom. II.*

*Camph. gr. ij.*

M. f. Pulvis.

D. S. *Ue antea.*

℞. *Corn. Cerv. sine igne* scrup. j.

*Saliscard. bened. gr. xii.*

*Antimonii diaph. vel cinn. antimonii ana* ℥ss.

M. div. in 2. part. æqu.

D. S.

*Ue antea.*

℞. *Nitri antimoniat* ℥ss.

*Bezoard. min. scrup. j.*

*Camph. gr. iij.*

M. f. Pulvis ad imitat. Riverii.

D. S.

*Ue antea.*

℞. *Pulv. rub. Pannon. gr. xv.*

*Nitri antimoniat* gr. xij.

*Auri diaph. Poterii* gr. v.

M. f. Pulvis.

D. S. *Ue antea.*

℞. *Corn. Cerv. sine igne*; aut, quod melius:

*Corn. Cerv. solar.* ( *Cor. Cerv. inciditur in taleolas, & sic stratum super stratum cum foliis auri* ) scrup. j.

*Antimonii diaph.*

*Cinnab. antimonii ana* scrup. ss.

*Sal. volat. Corn. Cerv.*

*Succin. ana* gr. ij.

M. f. pulvis.

Div. in 2. part. æquales: D. S.

*Ue antea.*

Quod si convulsiones imminere velint:

℞. *Pulv. bez. Mich. vel epilept. diaph. Schrad.* scrup. j.

*Cinnab. antimonii* gr. xv.

*Sal. volat. Corn. Cerv. scrup. ss.*

M. pro 2. dosibus pro eliciendo sudore:

D. S. *Ue antea.*

Mihi in febribus malignis cum delirio aut imminentibus convulsionibus familiaris est sequens pulvis, qui admodum conducit. Præscriptio est hæc:

℞. *Antimonii diaphor.*

*Cinnab. antimonii ana* scrup. ss.

*Sal. volat. Corn. Cerv. gr. iv. vel v.*

*Succinigr. ij. ad v.*

*Camph. gr. ij.*

M. D. S.

*Ue supra.*

Potentissimè sudorem movet, ac simul malignitati potenter resistit. Hauriatur in sequenti vehiculo:

℞. *Aqu. flor. sambuci.*

*Scabios. ana* ℥j.

*Spir. theriac. camph.*

*Syr. card. bened.*

*Fl. papav. errat. ana* ℥ss.

M. D. S.

*Potio ad pulverem.*

Quando ægri sunt inquieti, & anxietates habent nimias, cuilibet dosi laudani opiat gr. j. vel ij. addi possunt, & operationem potenter promoveri: vitandum tamen tempore criticos. Vel

℞. *Pulv. bezoard. Mich. scrup. j.*

*Cinnab. antimonii* gr. vi.

*Camph. gr. j.*

M. D. S.

*Pulvis sudoriferus bezoardicus.*

Propinetur in dicto vehiculo.

℞. *Antimonii diaphor.* scrup. j.

*Cinnab. antimonii* gr. xv.

*Sal. volat. Corn. Cerv.*

*Viperar. ana* gr. iij.

*Succini* gr. ij.

*Camph. gr. iij.*

M. f. Pulvis, ter in 24. horis repetendus.

D. S. *Ue antea.*

℞. *Antimonii diaph.*

*Cinnab. antimonii ana* scrup. ss.

*Sal. volat. Corn. Cerv.*

*Viperar. ana* gr. iv.

*Camph. gr. iij.*

M. f. Pulvis.

D. S. *Ue antea.*

℞. *Cinnab. antimonii* gr. xv.



*Salis volat. cranii hum. gr. iv.*

*Succini gr. iij.*

*Camph. gr. ij. vel iij.*

*M. f. Pulvis.*

*D. S. ut antea.*

*R. Cinnab. antimon. ʒss.*

*Antimonii diaphor.*

*Sal. volat. Cornu Cervi ana gr. v.*

*Camph. gr. ij.*

*M. f. Pulvis.*

*D. S. ut antea.*

*R. Cinnab. antimon. gr. xv.*

*Sal. volat. Cornu Cervi,*

*Viperar. ana gr. iv.*

*Camph. gr. iij. vel iv.*

*M. D. S. ut antea.*

*R. Cornu Cervi sine igne ʒj.*

*Sal. volat. Cornu Cervi gr. vj.*

*M. S. ut antea.*

Vel præscribatur Pulvis ex tribus salibus Rosæ cruci-  
vi ex omnibus tribus regnis, quem commendat in sua  
Astronomia:

*R. Bezoard. mineral. gr. vj.*

*Sal. volat. Cornu Cervi gr. iv.*

*Card. bened. ʒss.*

*M. pro dosi: S.*

*R. Cornu Cervi sine igne, vel unicorn. veri præp.*

*Antimonii diaph.*

*Cinnab. antimonii ana gr. vj. vel viij.*

*Myrrh. gr. iij.*

*Sal. volat. Cornu Cervi vel Viperar. gr. viij.*

*M. f. Pulvis pro 1. dosi: S.*

*Bezoardicus pulvis sudoriferus.*

*R. Ebor. sine igne seu Pulv. diaph. Lud. gr. xv.*

*Antimonii diaphor. ʒss.*

*Sal. volat. Cornu Cervi gr. v.*

*M. f. Pulvis.*

*D. S. ut antea.*

Capiatur in sequenti vehiculo:

*R. Aqu. fl. samb.*

*Scabios. ana ʒj.*

*Syrupi papav. simpl. ʒvj.*

*Card. bened. ʒij.*

*M. D. S.*

*Potio ad pulverem.*

*R. Cornu cervi sine igne ʒj.*

*Bez. Orient. vel Bezoard. min. ʒss.*

*Sal. volat. Cornu Cervi gr. iv. vel v.*

*Camph. gr. j. vel ij. vel laud. opiat. gr. j.*

*M. D. S.*

*Bezoardicus pulvis confortativus.*

*R. Antimonii diaphor. gr. xv.*

*Sal. volat. viper. gr. vj.*

*Camph. gr. iij.*

*M. f. Pulvis.*

*D. S. ut antea.*

*R. Pulv. diaph. Lud. ʒj. ad ʒss.*

*Sal. volat. Cornu Cervi gr. vi. ad ʒss.*

*Camph. gr. j.*

*M. f. Pulvis.*

*D. S. ut antea.*

Compatiens sentit calorem internum, neque ob capitis  
dolorem dormire potest.

*R. Ebor. sine igne,*

*Cinnab. antimonii ana ʒss.*

*Sal. volat. Cornu Cervi gr. v.*

*Camph. gr. j.*

*M. f. Pulvis.*

*D. S. ut antea.*

*R. Corn. cerv. sine igne ʒj.*

*Bezoard. min. ʒij.*

*Terre sigillat.*

*Vnic. fossil. ana gr. xv.*

*Laud. opiat. ferm. gr. iv.*

*M. f. Pulvis pro 4. dosibus: S.*

*Bezoardicus pulvis confortans.*

*R. Pulv. bezoard. Mich. gr. xv.*

*Bezoard. min. ʒss.*

*Laud. opiat. gr. j.*

*M. f. Pulvis: S.*

*Ut antea.*

*R. Corn. cerv. sine igne ʒj.*

*Antimonii diaphor. ʒss.*

*Bezoard. min. gr. vj.*

*M. pro dosi, præsentis periculo.*

*D. S. ut antea.*

*R. Bezoard. animal. ʒj.*

*Solar. ʒss.*

*Laud. opiat. gr. j.*

*M. f. Pulvis.*

*D. S. ut antea.*

*R. Conserv. pulp. citri ʒss.*

*Elect. diascord. Fracast. ʒij.*

*Antimonii diaphor. ʒj.*

*Cum f. q. succi citri f. Electuarium: S.*

*Electuarium Bezoardicum confortativum pro aliquot  
dosibus.*

De hoc crebrius æger capiat pro lubitu in vel extra sudo-  
rem, ut in continuo corpus servetur madore.

Chirurgus quidam ex prægressa ita, & contagio in no-  
socomio contracto, febre malignissima afficiebatur: mox  
extremi labores, h. e. ætus intensus, cephalalgia gravis-  
sima, inquietudo anxiosa, pulsus inæqualis, vires pro-  
stræ, &c. intra paucas horas ægrum prehendebant.  
Ipse sponte sua post mediam noctem venam secat, manè  
vocatus propter spirituum urgentiam in morbo peracuto  
præscripti:

*R. Aqu. scord.*

*Cordial. Herc. Sax.*

*Rubi Idæi ana ʒj.*

*Corn. cerv. sine igne ʒss.*

*Cinn. antimonii ʒj.*

*Sal. volat. Corn. Cerv. gr. xv.*

*Succin. gr. viij.*

*Laud. opiat. per ferm. gr. ij.*

*Syr. flor. tunic. ʒvj.*

*M. pro 2. dosibus.*

Acceptit, benè sudavit, & longè melius habuit. Nempe  
in morbo adeò acuto cum tam subitanea symptomatum in-  
vasione blandè anodynis nimis impetus spirituum nonni-  
hil refræmandus, ne dissipati haud sufficientes pro statu mor-  
bi, quin & quietior æger nonnihil redditus facilius sudare-  
queat. In incremento ergo morbi tunc, circumspicere ta-  
men, usurpari debent. Vespert præscripti:

*R. Pulv. bezoard. Senn.*

*Vnic. veri præp. ana ʒj.*

*Bezoard. solar.*

*Levial. ana gr. vj.*

*M. pro 2. dosibus.*

Quarum unam appetente nocte, alteram circa auroram  
capiebat, hauriendo simul subinde pro lubitu de sequenti  
Mixture:

*R. Aqu. scord.*

*Fl. samb.*

*Rubi Idæi ʒvj.*

*Aceto rubi Idæi ana ʒj.*

*Elect. diasc. Frac. ʒj.*

*Syrupi acetos. citri ʒss.*

*Misc. pro Portione.*

Sudavit, dormivit, commodè habuit, & ita brevi ta-  
libus continuatis convaleuit.

Juxta cum dictis remediis alexipharmacis propter sitim,  
etiam interdum propter æstus, nem propter debilitatem  
ægrorum in & post sudorem, subinde scilicet pro scopo  
alexipharmaco & alterativo, Julepi blandè aciduli con-  
fortativi commodè propinquantur, inter quæ eminet citius,  
succus citri, & omnia cum citro parata, & si levis nigra dul-  
cis. Ordinetur ergo Decoctum citri Myrsichini supra infi-  
nuatum pro Julepo, aut Julebus ex decocto citri cum radice  
scorzonera, quem habet FEHR de scorzonera pag. 61.

*R. Pom. citri rec. N. ij.*

*Incid. cum corticibus in taleolas tenues:*

*adde*

*Sacch. albiss. ʒij.*

*Rad. scorzon. ʒj. vel ʒij.*

*Aqu. font. ʒvj.*

*Coqui ad tertias, & colentur.*

Vel Julepus ex Decocto citri, cum quo Tinctura rosarum  
elicienda, ad imutationem TILMANNI de Mat. Med.

pag. 9.

*R. Pom. citria N. ij.*

In



In taleolas dissecta conspergantur cum

Saccharo albo:

Coqu. in f. q. aquæ ad Ment. ℞.

Colatura frigida detur sola.

Veletiam cum ea, & succo citri Tinctura rosarum extra-  
batur, & cum syrupo de toto citro, omisso saccharo,  
edulcoretur.

℞. Decoſt. Corn. Cerv. cum rad. scorz. ℞j.

Tinct. fl. aquileg.

Pæon. ana ℞j.

Syr. acetos. citri ℞j.

Rubi Idai (qui admodum commendatur  
a GESNERO) ℞vj.

Spir. nitri q. f. ad gratum saporem,

& propinetur propotu: S.

Julepus refrigerans & confortans.

℞. Decoſt. Corn. Cerv. cum rad. scorz. ℞viii.

Succicitri

Cydon.

Tinctura fl. papav. erras.

Pæon. ana ℞j.

Syr. papav. simpl. ℞j.

Fl. tunic. ℞vj.

Spir. nitri dulc. parum.

M. f. Julepus in malignis cum agrypnis & deliriis:

D. S. ut supra.

℞. Decoſt. citri Myrs. ℞i.

Succigranat. acid. ℞j.

Ribium ℞j. ad ℞ij.

Syr. rubi Idai q. f. pro grato sapore.

M. f. Julepus: S.

Julepus citrius refrigerans & confortans.

Vel

℞. Decoſt. Corn. Cerv. cum rad. scorz.

Citri Myrs. ana ℞i.

Aqu. cinnam. ℞j.

Tinctura flor. rosar.

Tunic. ana ℞j.

Syr. ribium ℞j.

Chyssi antimonii sulphurati q. f.

M. S. ut supra.

℞. Decoſt. citri ℞j.

Syr. rub. Idai q. f. pro grato sapore.

M. S. ut supra.

℞. Decoſt. citri Myrs. ℞i.

Gelat. Corn. Cerv. rec. ℞j.

Syr. cerafor.

Rubi Idai ana ℞j.

Succi citri q. f. pro grato sapore:

M. f. Julepus.

D. S. ut supra.

Propinatur in specie, ubi volatilibus sudor fuerit provo-  
catus.

℞. Decoſt. rad. scorz. cum Corn. Cerv. ℞j.

Gelat. Corn. Cerv. rec. ℞j. ad ℞j.

Succi rubi Idai ℞j.

Citri ℞j.

Syr. acetos. citri q. f.

M. D. S.

Julepus refrigerans & confortans.

℞. Decoſt. rad. scorz. cum ligno assafr. ℞j.

Gelat. Corn. Cerv.

Syr. papav. albi (optime præscribitur in æstu.)

Rubi Idai ana ℞j.

Spir. nitri dulc. q. f.

M. pro Julepo.

D. S. ut supra.

Usurpatur subinde intermedio inter sudandum tempore,  
etiam in sudore.

℞. Raf. ligni assafr. ℞j. ad ℞vj.

Coqu. in f. q. aquæ, ℞j.

adde

Succi citri rec. ℞j. ad unc. ij.

Syr. ex toto citro unc. i.

Spir. nitri dulc. q. f.

M. S. ut supra.

Vel

℞. Decoſt. rad. scorz. cum Corn. Cerv. ℞j.

Gelat. Corn. Cerv. unc. j. ad ℞j.

Succi rubi Idai unc. ij.

Citri unc. i.

Etiam ill. Oper. Tom. II.

Syr. acetos. citri q. f. pro grato sapore.

M. S. ut supra.

℞. Decoſt. Corn. Cerv. ℞j.

Succigranat. unc. j. vel ℞j.

Ribium ℞vj. vel unc. j.

Elect. diascord. Frac. ℞j. vel ℞ij.

Syr. rubi Idai ℞j. ad unc. ij.

Spir. nitri dulc. parum.

M. D. S.

Julepus bezoardicus bene circumagitandus.

℞. Aqu. fontan. ℞ij.

in qua dissolv.

Gelat. Corn. Cerv. rec. ℞j. ad ℞ij.

Syr. rubi Idai unc. j. vel unc. ij.

Pap. alb. unc. j.

Spir. nitri dulc. ℞j. vel q. f. pro gratia saporis.

M. D. S.

Julepus refrigerans.

Egregie etiam convenit Intusum ex floribus, cum spiritu  
sulphuris sub forma Julepi propinatum.

Quibus placet, etiam Decoſtum samarindorum usurpare  
possunt, quando nempe alvus nonnihil liberanda venit:  
v. g.

℞. Decoſt. samarind. cum passul. ℞j.

Syr. acetos. citri,

Rubi Idai ana unc. j.

Spir. nitri dulc. parum.

M. D. S.

Julepus aperitivus.

Item

℞. Aqu. mentha,

Rubi Idai ana unc. i.

Succ. cydon. vel rub. Idai unc. j.

Tinctura fl. bellid. unc. j.

Cornu Cerv. sine igne ℞j.

Antimonii diaphor. ℞j.

Syr. rubi Idai unc. j.

M. D. S.

Mixtura refrigerans & confortans, bene circumagitanda.

℞. Aqu. acetos.

Rubi Idai ana unc. ij.

Gelat. Corn. Cerv.

Succ. rubi Idai ana unc. j.

Citri unc. j.

Syr. ex toto citro unc. i.

M. S. ut antea.

℞. Aqu. acetos. ℞j.

Succ. berber.

Ribium ana unc. j.

Gelat. Corn. Cerv.

Syr. acetos. citri ana unc. i.

M. S. ut supra.

Pro viribus refocillandis:

℞. Aqu. rubi Idai unc. ij.

Cordial. Herc. Sax. frigid. unc. j.

Succi citri rec. ℞j.

Conf. alchem. ℞j.

Syrupi acetos. citri vel rubi Idai unc. j.

M. S. ut supra.

Inter externa ad promovendum sudorem non inconsul-  
tum est, ut eo tempore, quo in febribus malignis & pesti-  
lentialibus internè propinantur remedia sudorifera alexi-  
pharmaca, simul imponatur panis parvus recens & calens  
ex furno extractus, qui ablata crusta inferiore paululum  
excavetur (eine Grube einer vvelche Nuss groſs) & in ca-  
vitatem theriaca imponatur, hinc vinum generosum in-  
fundatur, & ita calidè umbilico imponatur; fit enim exin-  
dè, ut panis, dum æger fudat, venenum malignum se in-  
sinuet: adeoque interdum, ubi umbilico adhæserit, co-  
lore cæruleo imprægnatus repertus fuit, utpote quod dicunt  
certum malignitatis signum. Panis remotus sepellendus,  
ne aliàs homini vel bruto nocere possit.

Quod si funestum illud symptoma, Hemorrhagia,  
nempe narium, urgeat in febribus malignis, quod inter-  
dum evenit, Epithemata fronti applicata conveniunt. Sed  
inter alia remedia confert bufo exsiccatus in umbra, con-  
tusus, & sub axillis applicatus: quod ipsum remedium  
imprimis in variolis prodest.

Diarrhæa si urgeat, pulvis Pannonicus ruber à ℞j.  
ad ℞ij. item Theriacalia & oplata cum sudoriferis fixioribus  
usurpata sunt convenientia.



*R. Corn. Cerv. usque pro. ʒi.*  
*Bols Arm. vel unuc. foss. ʒss.*  
*M. f. Pulvis: ʒ.*

*Pulvis asstringens & confortans.*  
*R. Terra sigillata,*  
*Corn. Cerv. sine igne an. gr. xij. ad xv.*  
*Sal. volat. Corn. Cerv. gr. vj.*  
*M. f. Pulvis.*  
*D. S. ut antea.*

*R. Aqu. fl. samb. ʒij.*  
*Spir. theriac. simpl. vel camph. ʒij.*  
*Corn. Cerv. sine igne ʒi. vel usque pro. ʒss.*  
*Terra sigillat. vel unuc. fossil. ʒi.*  
*Syr. acetos. curi ʒss.*  
*M. D. S.*

*Potio becardica adstringens: capiasur coctileatim.*

*R. Aqu. scordii ʒij.*  
*Spir. theriac. camph. ʒij.*  
*Corn. Cerv. sine igne ʒss.*  
*Bezoard. min. scrup. j.*  
*Syrup. papav. albi ʒss. vel ʒvj.*  
*M. pro 2. dosibus: S.*

*Mixtura adstringens pro 2. dosibus.*

Quando stomachi symptomata, vomitus, cardialgia &c. urgent:

*R. Tacamah. part. iij.*  
*Bals. Pernu. part. j.*

Blando igne liquefacta malax. cum f. q. Theriaca, extendatur super alutam in forma scuti stomachalis:

*D. S.*  
*Emplastrum stomachale.*

Ad præcavendas cephalalgias & deliria, Epithemata capiunt applicari possunt:

*R. Aqu. verben. ʒij.*  
*Spir. vini campher. ʒi.*  
*Opii gr. v.*  
*M. f. Epithema.*  
*D. S.*

*Epithema circa caput.*

Cum lintels multiplicatis tepide applicetur.

Quando fauces sunt sicæ & aridæ, sine crustæ pinuitolæ præsentia, optimum conservari remedium:

*R. Aqu. com. ʒss.*  
*Spir. vini rectif. ʒi. vel ʒiss.*  
*Mell. cochl. j. vel ij.*

Mixta usurpentur pro oris collutione.

*D. S.*

*Gargarisma refrigerans.*

Hæc de Febribus malignis in genere.

## CAPUT VII.

### DE

### MORBO CASTRENSI.

**V**ariare febres malignas, in specie pro adjunctorum symptomatum imprimis varietate, supra dictum fuit. Sic ubi in febre maligna observatur intensissimus capitis dolor, una cum affectibus ventriculi anxiosis, in specie cardialgia horrida, vocatur *Morbus Hungaricus seu Febris Castrensis*, cum imprimis in castris inter milites ex squalore castrorum oriri soleat. Est maligna admodum & contagiosa præ cæteris malignis febribus, trigâ symptomatum acerbis assilgentium stipata; nempe

1. Gravis cardialgia & anxietate; hinc
2. Intolerabilis cephalalgia, agrypnia, indeque gravissimus delirius; ac denique
3. Gravis oris prunella;

Quibus & dolor sive lassitudo artuum & oculos, & subinde alvus fluxor se solent sociare. Ger. die Haupt-Krächheit, die Ungarische Kranckheit, die Hirntohende Sucht, appellari solet, in specie & secundum experientiam dicta. De hoc morbo tractavit MARTIN. RULANDUS, aliique plures.

### CURA.

Si ergo febris maligna fuerit morbus Hungaricus, præmitto vomitu supra dictis remediis curari debet, sudorem subinde imperando. In specie Vomitoria in morbi princ-

pio sunt admodum necessaria: hinc etiam venarum sectionum sectio, respectu nempe prunellæ; loco quarum venarum frontis quidam loca amant, respectu habito ad cephalalgiam & deliria.

Komedia nunc pro Julepo commodè intervi. Decoctum Corn. Cerv. cum succo citri; pro Diaphoreticis spirit. theriacalis camphoratus, liquor cornu cervi succinatus, electuarium discordu Fracastorii, cinnabaris nativa & antimoni, pulvis Pannonicus rubeus a ʒss. ad ʒij. imprimis hic Pulvis Wittichii laudari solet, sudorem fortidum pellens

*R. Fl. sulphuris ʒi.*  
*Succini albi*  
*Cornu Cervi sine igne ana scrup. ʒ.*  
*Terra sigillat. ʒss. vel scrup. ij.*  
*M. f. Pulvis.*

Propinetur cum aqua card. bened. vel cum vino absinthie, præprimis, si cum rigore invalerit affectus.

Quibus & nitrum antimoniatum, præsertim in foto, subinde addi potest.

Ungari sequenti utuntur Euporisto:

*R. Allii bulbum*, quem spiritu vini imbibunt & contundunt, & hac pulcritudine corpora ægrotum fortiter fricando inungunt, ac deinde linteaminiibus benè cooperiendo ad sudorem componuntur: quò peracto statim levamen acquirunt.

Contra Prunellam, quæ imprimis urget morbo Hungarico affectos:

*R. Semperviv. mai. qu. v.*  
*Contund. ac pro singula ʒj. adde*  
*Salis Ammoniaci ʒss.*

Reponantur loco humido subterraneo, donec sal liquefactus sit, hinc liquor expressus & filtratus, vel idem prius per alembicum destillatus pro eluendis faucibus & collo adhibetur:

Vel *R. Aqu. semperviv. mai. ʒij.*  
*Succi ejusdem ʒij.*  
*Salis ammoniaci ʒi.*  
*M. pro gargarumate.*

## CAPUT VIII.

### D.

### FEBRIBUS PETECHIALIBUS.

**Q**uando in Febre maligna hinc inde se manifestant maculæ corporis cum tingentes, propriè Petechia & Febris Petechialis dicta, Germanis das Fleckfeber, præ aliis frequens; alias etiam Febris pulicaris, Febris lenticularis, pedicularis, nempe punctularis, vocatur.

Observetur tamen primariò, quod sæpius quidem in morbis malignis erumpant maculæ, quæ constituunt febrem petechialem; ô tamen præcisè sunt signa pathognomonica febris malignæ; Multum enim sunt morbi, in quibus apparent maculæ symptomatice, utut non præcisè sint morbi maligni. Sic interdum in febribus tertianis sub fine paroxysmorum subindè maculis coloratur corpus ante sudorem, quæ post sudorem evanescent, utut non adsit febris maligna. Ita etiam in scorbutico, leviori licet, subindè rubicundis maculis tingitur cutis, utut ægri nihil de malignitate conquerantur. Habent hoc singulare imprimis febres scorbutice, ut maculæ pulicum morsibus similes, interdum etiam graviores, in partibus erumpant, absque tamen malignitatis nota. præterea tamen maculæ illæ maxime apparent in febribus malignis, petechialibus idè dictis, quales interim febres cum maculis comitatæ copiosissimis, præ aliis malignis, cæteris partibus, magis videntur lentæ, minusque acutæ, periculose tamen esse solent, ægrique ad tertiam usque crisin seu ad 20. diem jacent, & nesciunt, utrum convalescant? an verò pereant?

Symptomata harum febrium, præter reliqua cæteris malignis communia, sunt insignis lassitudo totius corporis, dolor ejus contundens & lancinans universalis. Dicunt ægri: languere ipsis omnia membra, & esse ipsis, ac si suffigati essent. Vires simul mox insigniter prostrata, febre nihilominus miri adhuc existente: Nam calor non adeo vehemens est in toto corpore, minusque mordax, quam in ardente etiam mitiore: serè tamen vespertino tempore intendi observatur; tunc interdum in principio tam miris est, ut æger vix se ægrotare sentiat. Hinc supervenit intensissimus & con-



& continuus dorſi ac capitis dolor gravatius, ut neſciant, ubi ſint: agrypnia, anxietates, & *preſignationes* ægrotum; in principio facile, in progreſſu difficilius, in ſtatu planè non ſudant, vel ſpontè vel medicamentorum ope: interdum interdiſſi quietiores, noctu anxioſi magis redduntur, & gravius affligi ſolent. Inde, præter ea, quæ ſuprà de cauſa Febrium malignarum dixi, lymphæ ſimul ab acido volatili acri peccate inſignius inquinari, colligo & exiſtimo: hinc enim eſt exacerbatio vespertina & nocturna, ſicut & difficultas ſudoris inde derivanda veniunt. Subindè alvi fluxus variorum ſpumoforum, nſpore ſætidiffimorum, excrementorum ſupervenit, quæ omnia & aliis malignis ſunt communia: ſaltem quod macula rarò quarto, ſæpius circa ſeptimum, erumpere ſoleant, præſertim circa pectus & ſcapulas; hinc & abdomen, & crura; tandem etiam brachia ſimiliter tinguuntur: facies ordinariò libera eſſe ſolet. Macula hæ non ſolùm externas, ſed etiam internas partes affligere ſolent, teſte CASTRO de PESTE p. 76. Interdum non macula ſolùm, ſed etiam vubices in his febribus apparent: vid. MAJOR. *Diſſert. de chirurg. Inſuſ.* p. 260. Deliria quoque & Convulſiones frequentiffimè in ſtatu ſuperveniunt, quo tempore etiam in morbo ſalubri, & multò magis in declinatione, quaſi *ptyalismus* quidam, h. e. copioſæ ſalivæ, mucoſæ, eaque continua ex ore & faucibus, cum euphoria ægri exſecratio. Continua ſerè eſſe ſolet hæc febris; hinc rarum eſt, intermittentem eandem fuiſſe obſervatam à FEHR de Scorzon. pag. 73.

Conſundi interdum ſolent pulicum morſus cum petechiis. Ut ergò iſti commode diſtinguantur in petechiis, notandum: quod pulicum morſus ſeu macula in centro ſuo habeant punctum ruberrimum, morſus veſtigium, quod deſicit in petechiis: Præterea pulicum morſus appoſiti farinâ lupinorum, cum aceto aut oxymelice ſubactâ ſubitò evaneſcunt; maculis verò malignis ſeu petechiis applicata, nequaquam! Autore ZACUTO LUSITANO lib. 3. *Prax. Admir. Obſ.* 14. Macula hæ in morbo ſalubri eſſoreſcentes intèſe rubent inſtar pulicum morſuum, hinc pedetentim pallescunt, flaveſcunt, ſicque evaneſcunt; & quò magis rubicundæ ſunt, eò melioris ſunt nota; è contrà, quæ ex rubore liveſcunt, ſeu, ut aliàs loquuntur, plumbei coloris ſunt, vel quæ nigreſcunt, à Belgis *Peper Korns* dictæ, hæ i. ſæ omnium peſſimæ ſunt; & quò magiſtales, eò deteriores ſunt conditionis, quæ hæ extinctiõis ſeu deſtructionis, ſpiritus inſiti notitiam ingerunt. Nempe ſicut acida corroſiva partes mortificando, vegeto adhuc ſpiritu, colorem primò rubrum, hinc ſpiritu deficienter album efficiunt, penitus verò extincto ſpiritu & putreſcente parte nigrum colorem inferunt; ita quò major eſt, virulentia malignitatis, indeque ſuperficiẽ cutis maior vel minor mortificatio, eò etiam color magis vel minus lividus aut nigricans eſſe ſolet. Mortificatio enim hæc in extinctiõne ſeu deſtructione ſpiritus inſiti conſiſtit, quo vegeto rubent partes cutaneæ affectæ, deficiente eodem, ad nigredinem vergunt, ut in gangrænâ ac ſphacelo notum eſt: Unde & petechia veluti *inſiſteſccharum* ſimul inducentes obſervatæ fuerunt: vid. M. A. N. C. Ann. 6. *Obſerv.* III. pag. 148.

## C A U S Æ.

Petechiales hæ febres ſerè primò ex corruptela interna contentorum oriuntur, adeoque, tam maſſam ſanguineam aliòque humores, quàm ſpiritus, virulentia ſua afficiunt: ſanguis nempe corruptus, & à fermento acido volatili acri putredine inquinatus, & ob id à reliquo ſanguine ſeparatus, ſeroque imbibitus huius vehiculo (dum exſpirationi omnimodè ineptus eſt) ſub cuticula circa glandulas miliares deſignitur, & ibidem hærendo maculas inſert. Contagioſæ tamen admodum ſunt, ipſo tamen contagio minùs ſpirituolo, minùsque activo exiſtente, ut latere aliquandiu queat, antequam ſe exſerat. Interdum epidemicè graſſari obſervantur: Vid. FEHR l. c.

## P R O G N O S I S.

Quoad Prognofin: Febris petechialis, quò magis blanditur, eò magis nocet: ſæpè cum omnia pacata apparent, mors imminet; ſæpè mortui vicini præter expectationem evadunt. Aliàs periculofus valdè eſt morbus, quo plures moriuntur, quam evadunt, annotante HORATIO AUGENIO T. 1. l. 5. & SENNERTO de Febribus pag. 537.

Maculæ purpureæ quò plures, quò majores, & quò benigniores, item ſic criticè erumpant, naturæ victoriam

præſagunt; contrà verò, ſi contrariò ſe habent modo.

Quod ſi fiat, ut retrocedant, ingens periculum imminet: loſq.

Quò magis laze, copioſæ, & benè coloratæ, nempe rubicundæ ſeu ſanguineæ ſunt maculæ, eò eſt melius ſignum: virides enim & flavæ maculæ ſunt deteriores; cæruleæ, livide, & nigre ſunt omnium peſſimæ, cum virum debilitate magnum periculum portendunt, malignitatis moriſcantis indices; colore autem cicerum minus ſunt periculofæ.

Maculæ paucæ, febre magis ingraveſcente, & utinà crudâ exiſtente, ſerè ſunt lethales. Maculæ, quæ lubitò diſparent, aut recurrunt, periculofiffimæ.

Criticè dixi erumpere debere maculas & puſtulas: Nam, quæ ante ſigna aliqualis coctionis erumpunt, aut quæ inordinatè paucæ, neque benè coloratæ prodeunt, ex periculoſæ ſunt; morum enim naturæ coactum innuunt, ſæpiù que recurrunt. Quò magis cum macularum eruptione coctionis ſigna apparent, eò melius. Erumpere ergò debent copioſè & benè coloratæ, die 4. vel 7. vel 10, 11, 12, &c. præcedenti aliquolibet coctionis ſignis.

Hæmorrhagia parca ſuſpecta: larga in incremento, die critico, aut indicatorio, erumpens, bona; poſt maculas verò jam efflorefcentes ſuſpecta.

Excrementa alvi nigra & fœtida, ſunt periculofa.

Quoad tempus eventus: minus quàm aliæ malignæ acutæ eſſe ſolent, ſed lente quali ſua tempora percurrunt, ita, ut in ſtatu 6. 8. & plures dies eodem tenore perſiſtant ægri, antequam vel in melius, vel in deterius fiat mutatio: Vid. D. BURSER, Phyſicus olim Annæbergenſis, de Febre petechiali.

Quoad modum eventus: Qui morbum non negligunt, & ſtatim ſub initium utuntur remediis commodis, facile interdum liberantur, nonnunquam 11. 12. aut 14. die; qui verò curationem differunt, & aërem liberiores non devitant, diutius decumbunt, ſæpiù ſuccumbunt. Interim tamen, ſi omnia rite procedant, nec vires adeò ſunt proſtratae, ſerè intra 14. dies acutorum more ceſſant.

Solvitur equidem interdum per criticam hæmorrhagiam narium, vel ſudationem, vel urinam, quod tamen rarò apud nos contingit, quin lucenteſſimè apud nos per diaphoreſin autem evaneſcere ſoleat. Interdum etiam metaſtaſi produci morboſi ſeu materię coctæ in quendam locum finitur: ſic per apoſtoma in teſtibus febrem petechialem terminari aliquoties obſervavit ROLFICIUS.

Recurſus ſeu retroceſſio macularum & puſtularum ſic ita: Maſſa malignum volatile curi morbi ſigitur & quaſi præcipitatur, & intra cutim ac cuticulam deponitur: ſed ex ſanguinis efferveſcentia ſeroctiore, dum nondum ſic perfectè fixum, ſit, ut retrocedat, & præſentaneam mortem interdum inſinuat, ad quod multum ſimul contribuit aquibentis acris frigus.

## C U R A.

Quoad curam febrium petechialium: nihil ſingulare obtinet, ſed eadem Indicationes atque ſuprà circa febres malignas in genere inſinuatæ fuerunt, etiam hic ſpecialim obſervari aut applicari debent vel poſſunt: Saltem obſerventur hæ cautelæ:

I. Vomitoria in petechialibus præ aliis malignis maximè proſpiciendæ ſunt cum mox à priori principio graves anxietates ſoleant prehendere ægros, quas curare, earum incrementum præcavere, & ita longè quietiores reddere poſſumus ægros, propinato maturè vomitorio. Purgatio, niſi in primo ſerè principio, nocet, experientiâ teſte, quò aliàs ad diarrhæam de facili proclives ſunt petechii laborantes, quæ maximè eſt lethalis. Quin & apparentibus jam petechiis, aut maculis, a quocunque ſtimulo abſtinendum, & ne quidem ad clyſmata aut ſuppoſitoria facile eſt accedendum, ne impediatur naturæ motus.

II. Venæſectio nullius uſus eſt, cum febris ipſa minoris ſit conditionis, magisque urgeat malignitas, utur MENIATIUS de Febr. Mal. eam tanquam remedium, naturam oneris aliquâ parte levans, commendat: Et lethalem etiam docet eſſe FORESTUS in Schol. *Obſervat.* 36. l. 6. Nocivam verò oſtendunt BARTHOLINI *Alta Med. Haffniens.* Volum. 2. pag. 290.

III. Sudoriſera ergò primatum ducunt, ſpecialim in principio & incremento, dum adhuc ſudare poſſunt ac ſolent.



solent ægri; unde sub isto tempore *volatilia*, in specie *Theriacalia*, tutissimè adhibentur: in *progressu* verò morbi ac *statu fixioribus* saltem indulgendum, devictà jam prioribus malignitatis atrocità, jamque, quod reliquum est, naturà operante. Quod si gravior sit malignitas, ad minimum tamen in 24. horis porrigenda sunt remedia. Observanda tamen hæc *Cautela* 8. quàm *suprà* in cura febrium malignarum in genere insinuavi, ut pro varietate circumstantiarum possimus variare medicamenta, propinando nunc absorbentia, nunc sudorifera volatilia; nunc sola, nunc mista invicem cum acidis. Sudor autem non excutetur nimis, quin virium semper habeatur ratio, propter quem respectum nec linteis nimis vel stragulis opprimendus est æger, sed tolerabiliter saltem contegendus.

IV. Observandum: an petechiarum eruptio sit morbus? an productum morbosum? an excretio symptomatice? an verò critica? quod petechiis intempestivè, h. e. symptomatice potius quàm criticè erumpentibus, non insistendum sit nimio perè sudoriferis, sed potius effervescentiam nimiam sistentibus, adjunctis simul alexipharmacis, utendum. Hinc enim rectè JOHANNES STEPHANI in *Operibus Medicis Decad. 9. Conf. 6.* inquit: Minus sunt tolerandi ii, qui quamcunque cutis efflorescentiam petechiarum nomine dignantur, etiamsi aut febris sit intermittens, aut in semitissima. Petechiæ enim genuinæ sunt symptomatice febris pestilentialis, conjunctæ cum fervore sanguinis. Hæ ergò, dum criticæ sunt, nempe, quando die 4. vel septimâ largiter erumpunt, id quod fit cum ægri aliquo levamine, promoveri debent blandis sudoriferis, quæ inter nihil melius est Emulsione istâ ex seminibus *suprà* nominatis expellentibus propinata. Ubi verò petechiæ in principio vel in incremento quidem erumpunt, sed sparsim, & spontè evanescent, itemque debilitetur æger, tunc excretio erit symptomatice; ubi neglectis sudoriferis validis potius cum temperatis acidis alexipharmacis fervor sanguinis refrænari debet, neque prius excretionem promoveamus, nisi factâ sufficiente præcipitatione sanguinis, sudoriferis debitis earum proventus promovendus.

V. Apparentibus jam petechiis, abstinendum non solum est à fortiter Laxantibus, sed etiam Clysmata cautè, nec nisi blanda, atque non, nisi necessitate urgente inicienda. Maculis autem jam apparentibus superveniens fortè alvi fluxus, hic cautè est tractandus, & non adeo subito, nec simpliciter suppressendus, nisi aut copiâ excesserit, aut maculas retrocedere faciat, aut sensibilibus ægrum debilitet: Est enim interdum quodammodò naturæ motus evacuationem materiæ sensibilis molientis, & ob id non incautè suppressendus; idque præsertim, si affectus non tam ex contagio, quàm interno spontaneo vitio contentorum ac corruptela originem duxerit, ita tamen regatur, ut macularum expulsio, quantum possibile, promoveatur, non verò ab isto alvi fluore cohibeatur. Verùm, licet non sistatur talis alvi fluxus, sedulo tamen insistendum & sudoriferis & alexipharmacis, quo ita magis derivemus naturæ morum ad exteriora, ac ita spontè cesserit fluxus iste. Contrà cum tales alvi fluxus alio tempore venientes sine symptomatice, & subindè lethales, propterea cum alexipharmacis miscenda simul interdum adstringentia blanda, ut ita successivè fluxus in hoc casu periculosus sufflaminetur, ac omne malum præcaveatur.

VI. Si nulla est febris, in qua Vesicatoria conveniunt, est imprimis petechialis, spectatim quando retrocesserint macule: rardemum aut nunquam denuò apparere solent, sed vel superveniuntibus nervosi generis symptomatibus, nempe deliriis & convulsionibus, ægri intereunt, vel successivè per auctam diaphoresin saltem morbus solvitur. Ut ergò anceps sit talis in casu ægrum levemus; item, si aliàs graviora nervosi generis symptomata immincant, ut ordinariè in statuharum febrium assolet fieri, consultius est, maturè applicate Vesicatoria in pedibus ac brachiis, prout plius nimis urgent symptomata: Vid. SANCATORIUS in *Method. vitandorum errorum* p. 841. M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 214. p. 315.

VII. Quoad diaram: in æquali calore naturali conservandi sunt ægri, vinum imprimis moderato usu conducibile est his ægris: Sic enim HENRICUS ab HEER Obs. 5. refert, mulierem in febre petechiali pro desperata habitam, vini usu restitutam. Confer. etiam BARTHOLINUS Cent. 6. Hist. 7. FEHR de scorzon. p. 173. Potus ordinario infundatur tinctura florum aquilegiæ, quæ præ cæteris convenit ad expellendas petechias.

Quoad remedia ipsa: nulli singulare, quod non *suprà* de Febribus malignis in genere dictum fuerit, monendum occurrit. Saltem in principio magis sudoriferis, præsertim volatilibus, in statu verò fixioribus, blandè temperantibus & absorbentibus, magis utendum. Hinc in principio, ut Cornu Cervi solare, Bezoardicum Joviale, cinnab. antimonii vel nativa, utendum. Hinc in principio:

R. Corn. Cerv. sine igne,  
Antimonii diaph. ana ℥j.  
Sal. volat. Cornu Cervi gr. xij.  
M. f. Pulvis pro 2. dosibus.

D. S.

Pulvis sudoriferus.

R. Antimonii diaph.  
Cinnab. antimonii ana scrup. ℥.  
Salis vol. viper.  
Corn. Cerv. ana gr. iv.

Camph. gr. iij.

M. D. S.

Ut ante.

R. Pulv. diaphor. Ludov. vel Corn. Cerv. sine igne,

Antimonii diaph. vel bezoard. solar. ana ℥℥

Sal. volat. Corn. Cerv. gr. v. vel vj.

M. S. ut antea.

R. Aqu. cord. Herc. Sax. unc. j.

Mixt. simpl. ℥j.

Spir. Corn. Cerv. essent. ℥j.

Syr. ex toto citro ℥j.

M. D. S.

Potio sudorifera pro una vice.

Item aliquoties in principio & incremento proficuum expertus sum hanc Potionem:

R. Aqu. fl. samb. vel menthe ℥j. vel iij.

Aceti acerr. vel simpl. vel destill. aut flor.

samb. ℥℥. 3vi. ad unc. j.

Theriac. seu mithridat. ℥i. vel ℥i. ad ℥iij.

Antimonii diaphor. ℥℥ vel ℥iij. ad ℥j.

Myrrh. gr. vj.

Syr. card. bened. vel rubi Idæi, vel acasos. citri

℥j. ad 3vi. vel ℥j.

M. pro 2. vel 3. dosibus cum iudore.

Vel R. Aqu. fl. samb.

Ceras. nigr. unc. i℥.

Theriac. ℥j. ad ℥iij.

Corn. Cerv. sine igne ℥℥.

Specif. cephal.

Antimonii diaphor. ana ℥j.

Sal. volat. Corn. Cerv. gr. xij.

Syr. ex toto citro 3vi.

M. f. Potio. S.

Mixtura sudorifera pro aliquot vicibus.

Detur cochlearim.

R. Aqu. menth.

Galeg. ana unc. i℥.

Antimonii diaphor. ℥j.

Bezoard. min. ℥℥.

Sal. volat. Corn. Cerv. gr. xv.

Succini gr. viii.

Camph. gr. iij.

Syr. cortic. aurant. ℥℥.

M. S. ut antea.

R. Aqu. scorzon.

Scord. ana unc. i℥.

Aqu. cord. Herc. Sax. frig.

Cinnam. ana ℥℥.

Specif. cephal. ℥j.

Bezoard. min. gr. v.

Sal. volat. Corn. Cerv. ℥j.

Succini ℥℥.

Camph. gr. ij.

Syrupi rubi Idæi 3vi.

M. S. ut *suprà*.

R. Aqu. menth.

Scorzon.

Hirund. cum cassor. ana ℥j.

Spir. cochlear. ℥℥.

Antimonii diaphor. gr. xxv.

Specif. cephal. scrup. j.

Sal. volat. Corn. Cerv.

Succini ana gr. viii.



Laud. op. gr. i.

Syrup. cortic. aurant. parum.

Aliquando septem in una domo petechialibus febribus corripiebantur, in specie duæ ancillæ, his præscripti præmissio vomitoria:

℞. Theriac. ℥ij.

Antimonii diaphor. ℥ss.

Salis absinth. ℥j.

Cum s. q. syrupi acetos. citri. Bolus pro 2. dosibus.

Quarum unaquæque capiebatur in cochleari vini, unde copiosus emanavit sudor. Una illarum actu patiebatur mentes, quæ sine nocuimento hunc bolum accepit. Hoc præmissio postmodum creberrimo usu sequentis Electuarii, die nocteque illud capiendo, ac sæpius repetendo, ac sudorem subindè expectando, convaluerunt:

℞. Conf. pulpa citri ℥j. ad ℥ss.

Elect. diascord. Frac. ℥ss.

Antimonii diaphor. ℥ss.

Cum s. q. succi citri. Electuarium, addendo interdum camphoram.

Postmodum verò in & prope statum convenienter usurpari potest Emulso, supra de Febribus malignis in genere, ex lemanibus expellentibus præscripta:

Item

℞. Aqu. fl. samb. ℥ij.

Ceraf. nigr. ℥j.

Spiris. vini camphor. ℥ij.

Corn. cerv. sine igne ℥ij.

Bezoard. min. ℥j.

Sal. volat. succini gr. ix.

Syr. fl. tunica ℥ss. ad ℥vj.

M. D. S.

Mistura sudorifera.

Capiebatur vel pro 3. dosibus, vel cochleatim.

Item

℞. Aqu. scabios.

Mentha ana ℥ss.

Gelut. Corn. Cerv. rec. ℥j.

Antimonii diaphor. gr. xv.

Syr. card. bened. ℥ss.

M. pro 3. dosibus: S.

Mistura sudorifera pro 3. dosibus.

Item loco Inlepi nocturni usurpetur, quæ supra de Febribus malignis in genere cum electuario diascordii ordinata: vi

℞. Decoct. rad. scorz. cum Corn. Cerv. ℥j.

Succi citri rec. ℥j.

Elect. diasc. Frac. ℥ij.

Antimonii diaphor. ℥j.

Bezoard. min. ℥ss.

Syr. card. bened. ℥ss.

M. D. S.

Mistura confortans, cochleatim sumenda.

Capiatur pro lubitu.

Item cum plures simul ægrotent, pro remedio sæpius capiendo:

℞. Decocti ligni assafr. ℥ss.

Succi citri ℥ij.

Antimonii diaphor. ℥ss.

Bezoard. min. ℥ss.

Syr. fl. tunica. ℥ss.

M. S.

Potio confortans, circumagita.

Capiatur sæpius pro lubitu.

℞. Raf. ligni assafr. ℥ss.

Rad. scorz. ℥vj.

Coqu. in l. q. aqu. simpl. vase clauso: Colat. ℥ss.

adde

Vini Rhenani ℥vj.

Gelut. Corn. Cerv. ℥ij.

Syr. rubi Idæi ℥ss.

M. pro Potione. D. S.

Potio expellens.

In statu, dum summa urget virium prostratio, usurpari possunt Potiones analeptice, supra de Febribus malignis in genere præscriptæ, vel sequens:

℞. Aqu. scabios. ℥ss.

Corâ. Herc. Sax. ℥vi.

Cinnam. ℥ij.

Conf. alchem. ℥j.

Bezoard. solar. ℥j.

Syr. rubi Idæi ℥ss.

M. D. S.

Potio confortans, cochleatim sumenda.

Capiatur pro lubitu.

Juvenis 18. annorum, aliâ sanæ ac robustæ constitutionis, corripitur die Mercurii vespere levi horrore, post quem incalcescit mediocriter, nox insequens mediocris, mandie Jovis caput intensè circa frontem dolet, sitit graviter, fauces & lingua sicca, dolor gravativus præcordia occupat, calor totius præternaturalis mediocris, lassitudo omnium artuum: capitulo nutu pilulascephalicas, sedà meridiè præterea Medicum adit, qui ordinat pro sequenti manè ℥ss. syrupi emeuci in vehiculo appropriato; & licet pilulæ à meridiè semel vomitæ, ter secessu evacuasent, subet nihilominus die Veneris capere Vomitorium, quod lepties supra copiosa mucola, & octies infra evacuat; unde pro nocte sequente:

℞. Aqu. scord. ℥j.

Aceti sambuc. ℥ss.

Theriac. ℥j.

Antimonii diaph. ℥j.

Mista sumebatur pro 2. dosibus.

Sequitur nox gravis, manè symptomata eadem, appetitus nullus, sitis clamosa, cephalalgia intensa, fauces aridæ, lingua aspera & nonnihil nigricans, calor totius acris seu mordax, non tamen adeo intensus, cutis arida & squallida, lassitudo omnium artuum, vires prostratæ, pulsus celer, frequens, debilis, serè inæqualis, horretce-revisiam; hinc præscripti:

℞. Corn. cerv. sine igne ℥ss.

Bezoard. miner. ℥j.

Olei campb. gutt. v.

Succini,

Citri ana gutt. j.

Miscebantur pro duabus dosibus, manè & vespere assumendis.

Nox insequens erat inquietæ cum insequente delirio: die solis symptomata eadem, robur faciei insignis, pulsus celer, frequens, parvus, inæqualis. Ordinavi ergo

℞. Liqu. Corn. Cerv. succin. ℥ss. ad ij.

Pro 2. dosibus.

A prima dosi oriebatur æstus intensior, hæmorrhagia larga, quam rubor faciei præmonstraverat, petechiæ in manibus erumpébant, symptomata cætera erant eadem. Potus erat cerevisia secundaria cum vino.

Pro faucibus, unâ cum illis, quæ Chirurgus usurpabat, præscripti:

℞. Mucilag. sem. cydon. cum aqu. sperm. ran. extr. ℥j.

Nitri antimoniat. ℥j.

Rob. dianuc. ℥ss.

Mile.

Subindè fauces hoc ipso illinebat, & blandè gargasando expuebat.

A meridiè alteram spiritus dosin sumpsit, copiosioribus hinc erumpentibus petechiis, symptomata eadem continuabant.

Vespere ordinabam:

℞. Aqu. fl. papav. errat. ℥ij.

Samb. ℥j.

Ebor. sine igne,

Bezoard. miner.

Sal. volat. Corn. Cerv. ana gr. xv.

Syr. diascord. ℥ij.

Mile.

Assumebat istâ nocte successivè.

Die Lunæ:

℞. Pulv. bezoard. D. Mich. gr. xvi.

Sal. volat. Corn. Cerv. gr. viij.

Olei pestilent. Heinis gutt. vi.

Miscebantur: dabatur tres doses; quarum unam manè, à meridiè, & circa mediam noctem assumebat. Hac ipsâ die hæmorrhagia recurrebat, nox erat inquieta, delirata, & symptomata cætera eadem.

Die Martis:

℞. Liqu. Corn. Cerv. ℥ss. pro 2. dosibus.

Vespere verò ingruente nocte:

℞. Pulv. bezoard. D. Mich. gr. xv.

Cinnab. antimonii ℥ss.

Sal. volat. Corn. Cerv. gr. vj.

Mile.

Nox



Nox fuit pessima, summa delirij, inquieta, incipientibus manē convulsionibus.

Die Mercurij, morbi septimā:

℞. Cornu Cervi sine igne ℥j.

Bezoard. min. ℥ss.

Pulv. epilept. antimonial. gr. i.

Misc.

Capiebat manē: à meridie hora iij. capiebat gutt. 50. de liquore cornu cervi succinato: hac die secessus 4. copiosi; de cætero urina hæcens semper cruda sanorum simillima. Appetente nocte

℞. Pulv. bezoard. gr. xij.

Cinnab. antimonij ℥ss.

Sal. volat. Cornu Cervi gr. v. Misc.

Post mediam noctem iterum sumpsit guttas 50. liquoris cornu cervi succinati: nox erat tolerabilis ratione delirij, sed convulsionibus ingravescebant.

Die Iovis pulveres & spiritus iidem: vesperi ob nimias faciei & manuum convulsionibus graves Vesicatorium utriusque brachio prope carpum in parte extrema applicari jussi. Internē

℞. Aqua pæon. ℥ij.

Spiritus vini camph. ℥j. ad ℥ij.

Matr. perlar. præp. ℥ij.

Bezoard. solar. ℥j.

Syr. flor. tunis. ℥ij.

Miscebantur pro 2. dosibus.

Una ante, altera post mediam noctem usurpabatur. Nox erat quietior cum somno, licet interrupto, convulsionibus manē longè mitiores, qui effectus vesicatorius debebatur.

Die Veneris propter virium debilitatem ordinavi:

℞. Aqua pæon. ℥ij.

Spiritus vini camphorat. ℥jss.

Cornu Cervi sine igne,

Matr. perlar. præp.

Antimon. diaphor. ana ℥j.

Cons. alchem. ℥jss.

Misc. pro Potione.

Reiterabatur etiam vesperi pro nocte, æger melius habebat, convulsionibus erant mitiores vesicatorius largè fluentibus; nox tamen erat inquietior.

Die Saturni:

℞. Spiritus Cornu Cervi succin.

Tinctura corall. cum spiritu Cornu Cervi an. ℥j.

Misc.

Bis hac die guttæ 50. capiebatur; vesperi porio antecedens repetebatur: nox erat bona, convulsionibus & cætera symptomata cessabant, urina turbida reddebatur, & sedimentum seponebat: hinc die solis liquor Cornu Cervi succinatus à 40. ad 50. guttas ter intra 24. horas continuabatur; quo porro itidem continuato sic convaleuit.

Ubi petechiæ cum hæmorrhagia, dysenteria, aut diarrhœa conjunctæ, D. Michaelis usus est solutione terræ solaris. Convenit quoque terra sigillata. Diarrhœa quidem ob metum graviorum symptomatum non statim sistenda, sed Theriacalibus fomiti morbofo obviā eundem, sic sponē cessavit: v. g.

℞. Antimonij diaphor. scrup. ij.

Terra sigillat. scrup. j.

Extract. theriacal. ℥vj.

Misc. pro pulvere:

Div. in 2. part. S.

Pulvis adstringens confortativus.

Capiantur cum vehiculo calido, expectando blandum sudorem: Vel

℞. Aqua menth. ℥ij.

Aceti destillat. ℥j.

Elect. diascord. Frac. ℥jss.

Syr. cydon. ℥j.

Spiritus nitri dulc. gutt. xv.

Misc. pro Potione: S.

Mixtura adstringens sudorifera & confortans, cohibeat sumenda.

Externè pro hæmorrhagia narium sistenda, optimè appenduntur, aut sub axillis alligantur bufones. Virgo adulta febre petechiali graviter correpta, cum jam efflorescerent copiosæ petechiæ, gravi & pestinaci corripitur hæmorrhagiā: pro qua sistenda jussi capere duos bufones vivos, eosque contulos & conquassatos sub axillis utrumque alligat cum linteolo; quo factō, su-

būd omnis hæmorrhagia sedata fuit; & virgo post continuatum Electuarium ex conserva citri cum theriacæ usum convaleuit. Sed brevi post, cum nimis strenuè edisset, gravissimæ anxietates præcordiorum, & æstus intensissimus recurrunt; jubeo, ut vomeret cum syrupo emetico, & dictum Electuarium continuaret: quo factō perfectè convaleuit.

In adjuncta dysenteria, aut alia diarrhœa theriaca cum vino generoso fervidè stomacho & hypochondriis sæpius applicari potest.

Sæpè in febribus petechialibus stomachi urgent symptomata, ad quæ conveniens remedium est, laterem leviter coctum ignire, & aceto vini optimo ac aqua menthæ eundem extinguere, & hinc linteo involutum ad dorsum, aut etiam antè & regione ventriculi applicare; sin exaruerint, secundā vice igitur, & solo aceto vini adpersus applicetur.

Commodè etiam scitum stomachale potest præscribi:

℞. Cerat. de Lad. stomach.

Theriac. Androm. q. s.

Malaxata inducantur super alutam. Vel

℞. Tacamach. part. ij.

Cerat. stomach. p. j.

Liquefacta etiam subigantur largiter cum Theriaca Andromachi q. s. & applicetur. D. S.

Emplastrum stomachale.

Sunt, qui Epithemata fronti, præcordiis, &c. applicare solent: sed malè. Quia enim de facili refrigerantur, clausuræ pororum occasionem suggerunt, & ita petechiarum eruptionem impediunt, aut eas facilius retrocedere faciunt. Tutius balsama oleosa usurpantur, verb. grat. oleum arancarum compositum Mundereri, scorpionum, &c.

℞. Olei scorp. compos. Matth. ℥j.

Destill. melisse,

Ruta,

Citri an. ℥ss.

M. pro linimento scrobiculo cordis & pulsui applicando.

Vel idem cum oleo nucis moschatæ expresso misc. in formam Balsami: S.

Balsamus externus.

Veteres in usu habuerunt litum externum, quando petechiales maculæ, aut similes excretionescutaneæ, nolunt convenienter prodire: Instituerunt frictions seu inunctionem externam cum nitro, quæ à multis Autoribus insigniter commendatur. Unguentum sit tale:

℞. Olei amygd. amar. ℥ij.

Vini Rhenan. ℥vj.

Aqua cham. ℥ss.

Nitri ℥ij.

Bulliant ad consumptionem aquæ, & f. Colatura.

D. S.

Unguentum externum.

Linimentum hoc totico corpori affricetur. in specie dorso ad evaporandam materiam malignam è corpore, in febribus malignis & petechialibus, præsertim, quando non bene procedere vult sudor: facta enim corporis inunctione, & propinatis hinc sudoriferis, sufficienter admodum sudorem promovere solet.

Paulò aliter præscribit hanc inunctionem BAUNERUS in Consil. 42. sequenti modo:

℞. Olei Chamom.

Amygd. amar. ana ℥ss.

Nitri pulveris. ℥ij.

Aqua chamom. ℥j.

M. & coquantur.

Hinc inde videbitis apud Practicos hujus Linimenti ad evaporandas petechias in morbis malignis vestigia, cui substitui potest oleum scorpionum simplex: Vel

℞. Olei chamom.

Ruta,

Scorp. ana ℥ss.

Nitri ℥ij.

Misc. f. Linimentum.

D. S. ut supra.



CAPUT IX.

DE

FEBRE PURPURATA.

**A**D malignas huiusmodi febres pertinet etiam *nostra febris Purpurata*, Germ. *der Friesel*, dicta, qui alias morbus & febris miliaris dicitur in M. A. N. C. Ann. 3. *Obser.* 281. pag. 207. à pustularum exilisignatudi, nihilum magnitudinem quantum efflorescentia; uem *Morbilli ignei* quibusdam vocatur: Vid. M. A. N. C. Ann. 6. *Obser.* 42., quo loco etiam *Obser.* 145. pag. 209. *Purpura epidemica maligna* infantum fit mentio.

Febris hæc est vel benigna, seu scorbutica, vel maligna, febris continuz malignæ juncta: Quovis quidem adoritur, mores, & feminas, infantes & adultos, frequentius tamen apud nos puerperas, quibus & malignior magis & frequentior in specie existit, forsan mensium retentorum occasione; & infantes recens natos. Estque vel *rubra*, quæ forsan illud morbi genus est, quod *Rubeolam*, Germ. *Roseln*, dicunt; vel *alba*, instar hydatidum splendescens, unde vocatur Germania *der rosbe mawese Friesel*: Interdum etiam extra puerperium febris maligna purpurata accidit. Propter symptomatum vehementiam, morbi brevitate & periculum, commodè inter febres acutas referatur; ut ut purpura rubra in Plethoricis & scorbuticis, nec non aliis morbis cum multo sudore, & quovis alio tempore sine omni febre & symptomatu, excepto pruritu inoleto, frequentius observetur.

Incipit autem febris hæc sub specie synochæ; ut plurimum cum rigore, quem mox insequitur incallescens totius corporis, anxietas præcordiorum, inquietudo summa, oculorum rubor, interdum cum dolore capitis, semper cum agrypnia, & levissimo circa caput, pectus atque dorsum, sudore. Urina ut plurimum in principio saniorum est similis, aut parum admodum à statu naturali recedit: in puerperis verò lochia notabiliter satis immutantur, aut planè cessant. Temporis progressu & sub morbi incremento ad sextum usque diem ægri circa præcordia, scapulas, cervicem, denique totum corporis habitum, de ardore cum lancinationibus, acuum puncturis similibus, interdum pruriginosis, conquirit solent, cutisque simul asperior redditur cum aliquali rubore. In statu verò morbi omnia symptomata cum febre exacerbantur, urina est cruda, & quidem vel tincta & pellucida manet, vel cum sedimento multo turbatur, & asperitas illa in efflorescentias militares attollitur, nunc copiosiores, nunc pauciores, quæ levi accedente aurâ & levi denudatione in lecto evanescent, cum anxietatibus, difficili respiratione, summa virium prostratione, frequentius cum delirio, convulsionibus epilepticis, & catarrho suffocativo. Solvitur tandem morbus hic rarè per diarrhœam, interdum insensibiliter serè & per madorem, in puerperis sæpè per lochia, ubi exanthemata hæc sensim sensimque evanescent, & cuticula cum pruritu quodam in squamas seu futiles abit.

CAUSÆ

Originem debet hæc febris salii volatili acri, massam sanguineam turbanti, quod tamen subactum, & acido sui generis maligno saturatum, in forma salis tertii sero involuti infra cuticulam sub poris apponitur: hoc enim, ubi secretum & devictum fuerit, atque ad loca intercutanea propulsum, horum ardor, pruritus insignis, hinc cuticulæ excoriatio & desquamatio, &c. excitatur. Nasci videtur purpura simul ex radice scorbutica: nam scorbutus, uti ralem affectum purpuræ benignum sine febre interdum infert, ita si tales plus minus scorbutici maligni corripiantur febre, tandem in purpuræ efflorescentiam abeunt: Undè & antiscorbutica quædam, & remediis volatilibus & myrrhatibus, aliisque alexipharmacis mista, præ cæteris conveniunt.

PROGNOSIS.

Subindè acutus, non rarè præceps, est affectus, qui dum maximè videtur blandiri, etiam ex levissimo horrore subito jugulat: eandem enim cum febribus malignis

circumstantias observat; ita tamen, ut exterius hæc cutanea non sit critica, sed symptomatice, & pro morbo seu febre solvenda sola vix sufficiat, dum nunc sub purpura copiosiore, nunc pauciore, ægri intereunt. In specie periculosior est purpura alba, & quæ in puerperis cum lochiorum suppressione & diarrhœa symptomatice coniungit.

CURA.

In Cura purpuræ ac febrium purpuratarum, præter generalia ista, quæ *suprà de febribus malignis in genere* dicta fuerunt, observandum in specie:

I. Quod, licet alvus ad aliquot dies noctesque pertinaciter adstricta sit, non solum fortiter laxantia, sed & clysmata lenissima sint periculosissima, nec nisi blanda, atque non, nisi necessitate urgente, inicienda. Irritata enim alvo transpiratione cessat, efflorescentiæ cutis evanescent, & dein mors sequitur: Quod si alvi fluxus symptomatice & subindè lethalis superveniat, cum alexipharmacis simul miscenda adstringentia blanda, ut ita successivè fluor in hoc casu periculosus sufflaminetur, & omnino malum præcavetur.

II. Si purpura est alba, cautè est tractanda, neque extra lectum, dum ægri fortè debet, promovenda est ægra; si enim se extra lectum conferat, vel à levissima saltem aura frigida afficitur, retrocedit purpura. Undè jubeo, ut ægræ continuè contentæ maneat, ut lectus intra 3. vel 4. dies noctesque sterni nequeat, cum si retrocesserit purpura, ut plurimum moriantur. In purpura verò rubra, cum ea sit mitior, magis possumus connivere.

In principio ergo morbi conveniunt absorbentia, seri ebullitionem compefcentia, imprimis pulveres bezoardici; quibus myrrha cum aliis fixis animonialibus addenda: in specie convenit rob sambuci cum Cornu Cervi sine igne. In statu verò, ubi jam apparere incipit purpura, conveniunt emulsio ista seminum expulsiuorum, quam dedi *suprà ubi de febribus malignis in genere*; item liquor Cornu Cervi succinatus, castoreata, Tinctura corallorum cum spiritu cordis Cervi, & antiscorbutica, essentia myrrhæ &c., quæ sunt egregia; v. g. in principio morbi:

*R. Corn. Cervi sine igne,*  
*Antimoni diaphor. an. gr. xv.*  
*Salis card. bened. ʒss.*  
*Myrrha gr. vj.*  
*M. s. pulvis.*  
*Div. in 3. part. æqu. S.*  
*Pulvis expellens.*

*R. Specif. cephal. ʒss.*  
*Bezoard. min. ʒj.*  
*M. D. S.*  
*ʒi anted.*

*R. Aqu. Galeg.*  
*Flor. samb. an. ʒjss.*  
*Pulv. diaph. Ludov. ʒij.*  
*Antimoni diaphor. seu antib. Poterii ʒss.*  
*Syr. card. bened. ʒss.*  
*M. D. S.*  
*Mixtura expellens, cochlearum sumenda.*

*R. Aqu. card. bened.*  
*Fumar. an. ʒjss.*  
*Corn. Cervi sine igne ʒij.*  
*Antim. diaph. drachm. ss.*  
*Cinnab. antimon. gr. xv.*  
*Syr. ex toto citro drachm. vj.*  
*M. S. ut anted.*  
*R. Aqu. fumar.*  
*Scabios. an. ʒjss.*  
*Ess. castor. ʒj.*  
*Phic. veri præp.*  
*Antihel. Pot. vel Antimoni diaph. an. drach. ss.*  
*Sal. vol. Co. n. Cerv. gr. xv.*  
*Syr. artemis. drachm. vj.*  
*M. S. ut suprà.*

Item, quando diarrhœa conjuncta, addatur terra sigillata.

*R. Aqu. card. bened.*  
*Fl. samb. an. ʒjss.*

Spiritus



*Spiritus theriac. simpl. ℥ij.*  
*Cornu Cervi usli præp.*  
*Antimonij diaphor. an. ℥i.*  
*Terra sigill. vel Boli Arm. præp. gr. xij.*  
*Syr. flor. tanij. ℥ij.*  
 M. D. S.

*Expellens & adstringens potio confortativa.*  
 Reflexio quoque sæpe ad scorbutum facienda est, unde in tali purpura sequentem Mistruram præscribo:

*R. Aqua scabios.*  
*Scordian. ℥ss.*  
*Spiritus cochl. ℥i.*  
*Antimonij. diaph.*  
*Mag. corall. cum succo citri à 3℥ ad 3℔.*  
*Syr. card. bened. 3vj.*  
 M. D. S.

*Potio scorbutica expellens.*

Tempore excretionis:

*R. Mixt. simpl. vel Tinctura bezoard. camphoras.*  
*vel essent. myrrhas tartarif. ℥ij.*  
*Spiritus cochlear. 3℔.*  
 M. D. S.

*Mixtura sudorifera: 50. vel 60. guttae.*

Liquor cornu cervi succinatus egregius pariter est in hoc affectu: ex. gr.

*R. Liq. Cornu Cervi succin. 3ij.*  
*Spiritus cochlear. 3ij.*  
 M. D. S.  
*Mixtura expellens.*  
 Dol. 30. ad 50. guttas.

## C A P U T X.

### D. E

## VARIOLIS ET MORBILLIS.

**V**ariola & morbilli singulare quid obtinent præ febribus malignis: nam ex se sunt saltem *symptomata febris continua*, seu *synochi* sui generis, nunc *benigne*, nunc, & quidem sæpius, *maligne*. Observata scilicet sunt abique nulla malignitate, aut etiam quæ adfuerunt, sine insigni effervescencia febrili in infantibus; dum hi potissimas functiones rite exercent, per domum ac plateas decurrunt, &c.: qualia exempla observat SCHENCKIUS l. 5. *Observ. de febribus malign. & de variolis*. Interdum quoque adeo mites sunt variolæ, ut licet cum febre ardente junctæ fuerint, paucos tamen interficiant, ut potius quasi sponiæ naturâ convalescant. In hoc puncto SYDENHAM de *variolis benignis* est prolixus, ut ostendat, variolas & morbillos esse febres benignas. Opinio equidem vulgaris fert, omnes homines necessarîo variolis corripî, sed ita, ut qui iisdem semel affectus fuerit, vix easdem denuo patiat: ex qua præconcepta opinione hypothesis Arabum, in specie AVICENNÆ & RHASIS, nata est, scilicet variolas nobis in utero materno ingenerari, ex relicto inquinamento sanguinis menstruî, à foetu in utero attracti; quæ hypothesis multos hæcenus habuit Patronos: Sed antecessus est falsum, consequens irrationale. Nam quoad prius: multi homines moriuntur, qui nunquam variolis & morbillis laborarunt; sicut è contrâ sunt exempla, ut ut rara, qui scilicet aliquoties iisdem afflicti fuerunt: Vid. BORELLUS *Cent. 3. Obs. 10.* de muliere, quæ septies variolas passa fuit, & tandem anno suæ ætatis seu vitæ 128 his ipsis variolis tandem mortua fuit. Quod autem posterius sit contra rationem, patet ex eo, quod factus in utero non sanguine menstruato, sed potius nutrimento lacteo vel chylolo sustentur: deinde (2.) quod non omnes mulieres sint adeo morbosæ, ut necessarîo exindè pro variolis fomitem contrahant infantes: (3.) si sanguis maternus corruptus esset causa certa variolarum, fieret, quod aut lochius suppressis, aut etiam mensibus, & sic necessarîo corruptis, semper generentur in puerperis variolæ. Labillis ergo est hæc opinio, ut ut non sit negandum, multos esse factus morbillis & variolis affectos in utero

materno, qualia observat exempla SCHENCKIUS l. 6. *Observ. & BARTHOLINUS Cent. 3. Epist. pag. 682.* HILDANUS *Cent. 4. Obs. 55. & 56.* & PLATERUS *Pr. Tem. 3. pag. 250.* de muliere gravida variolis affecta, quæ factum similiter affectum variolis in lucem edidit. Hoc tamen certum est, plurimos homines, in specie infantes, iis corripî. Sed radicem obtineat reverà in sanguine fundatam, suæque nihil aliud, quam *sanguinis depuratio* & quasi *despumatio*, mediante *fermentatione febrili*, quo sanguis se depurat à remanentibus lacteis matris aut uterici vicariis, & plus minus ab acido coagulatis, sanguinem inquinantibus: Vnde talia inquinamenta fermentando separata unâ cum sanguine tunc simul infecto præcipitantur per fermentationis modum, & intra cutem ac cuticulam cum sanguine hinc inde deposita, acrimonia sua parvulas inflammationes inferunt, & tandem suppurantur.

Observandum autem, (1.) quod non differant *variola & morbilli*, quam secundum magis & minus: (2.) peccent imprimis particula *fermentativa*, lactis acore corrupta: à qua acrimonia acida (3.) dolores lancinantes doli, ubi nempe partes membranaceæ & nervæ locum habent, quæ in principio vellicantur; convulsiones partium nervosarum, & patoxyismi epileptici, urinae cruentæ excretionis viscerum, aut etiam, quod sæpius contingit, ulcera, phthises seu exulceratio pulmonum, ossium caries & spina ventosa, notante id HILDANO & aliis, de acido acri peccante, varias dante turbas hæc, testantur: sicut hepar & alia viscera etiam interdum pustulis corripuntur, etiam variolis, unde phthisis. Conf. de acido acri primario in variolis peccante SYLVIVS de *Morb. Infant. cap. 9. (4.)* Acidum illud ex lactis inquinamento ortum, ut effervesceat imprimis cum sanguine, unde febris acuta continua ardenti similis oritur, donec præcipitetur, ut ambo abeant in saltum tertium; ita excitata simul lympham inquinat singulariter, cujus ratione in principio variolatum ut plurimum tussis sicca, dñâ enim faucium asperitate, & earum plus minus raucedine adsont, & oculi lachrymantes, &c. vexant: de quo lympham imprimis affectam esse, videb. in M. A. N. C. *Ann. 4. pag. 302.* Acidum illud ita ex sanguine secretum, ac in pustulas congestum intercutaneas, sanguinem in parvis, quas acrimonia sua excitat, inflammationibus in pus acido-saltum mutat per *precipitationem sulphuris sanguinis ab acido*. Idem illud acre excoctat cutem, pruritus inferit, carnem exedit, & inde ex fibris ejus profundè erosis cicatriculas efficit, donec tandem cuticula erosa à dicta acrimonia squamarum forma decidat. Confirmantur ex his, quæ curant variolas, nempe caloreo, myrrha, asa fetida, sale cornu cervi, &c. acidum enim hæc destrunt, & lac corruptum corrigunt. Hinc (5.) in variolis & morbillis, ut melius cursus & motus illarum observetur, observanda sunt duo tempora: nempe tempus *ebullitionis* seu *effervescencie febrilis*, aut *massæ sanguineæ despumationis*; & tempus *deurationis* seu *expulsionis*. Tempus *ebullitionis* febris est, dum febris urget, & hoc tempus absolvitur primo quaternario, i. e. primis quatuor diebus, quod raro extenditur ad septimum diem: depurationis verò, dum pustulæ erumpunt, & successivè ad maturitatem pergunt, absolvitur sequenti septenario, nempe à die tertio vel quarto ad undecimum, raro à septimo ad 14. diem terminatur, ita ut circa diem decimum tertium curatio absoluta sit. Nempe hæc ut plurimum sunt ita, ut ut suppuratio non fiat sine æstus recrudescencia nova, seu febre secundaria ac suppuratoria, cum dolore atque ardore per totum habitum molestissimo, symptomatibusque aliis, pro diversitate partium, quas ulcusculcula hæc plus minus obliedent. Interim pro circumstantiarum varietate subindè variolæ non præcisè tertiâ aut quartâ die, sed etiam septimâ vel octavâ, vel etiam vigesimâ sic erumpentes observantur. Hinc variolæ etiam desperatæ post diem decimum septimum demum suppuratæ notantur in M. A. N. C. *Ann. 3. pag. 380.*

(6.) Acre illud acidum, nunc *volatilius & acrimius* existens, malignitatem interdum adjunctam habet, ita, ut dum acre malignum massæ sanguineæ consistentiam destruit, & spiritus inquinat, tali occasione & fermentum lacteum latitans præternaturaliter simul exciteretur, quod suo impetu fermentativo variolas inferit, sed sæpius impeditur propter spiritus nimis inquinatos, ut heterogeneum à massa sanguinea



vel turbata separari & erumpere nequeat subinde expulsum: Et sic conjunguntur febribus malignis variolæ, quæ sunt *variola maligna*. Malignitas hæc patet ex eo, quod interdum sint admodum lethales, & dum grassantur, communiter interimunt infantes; item, quod observatum fuit, sæpius pestem præcessisse variolas, aut variolas secutas pestem, quæ tunc temporis non fuerunt sine malignitate.

Cauti ergo sumus in variolis diiudicandis, an benignæ, an malignæ sint? ne has invicem confundamus.

*Multiplices autem solent esse variola & morbilli*, prout videre est in SENNERTO de febribus, ubi de variolis: hinc & SCHENCKIUS lib. 6. *Observ.* præter variolas & morbillos tertium pustularum genus crystallinum refert. In pueris etiam observantur variolæ exilliores, seu tubercula parva, pellucida, plûs minus alba, variolis æmula, (partim tamen, & serè sine febre, aut tantùm cum ephamera erumpentia, quæ ut plurimum sine multa sanie citissimè ex sicantur & sanantur: Ger. vocant *Spizbocken*, *Windbocken*, *Schafsblistern*, und *Steinbocken*. Patùm, nisi mole majore, à veris differunt, & intra triduum ad summum excitantur; ut uterum unum vel alteram aliquando suppurare, cutim erodere, & cicatrices inducere, experientia testetur. Affligunt nunc solitariè, nunc sociata periculis prodeunt, aut hæc post variolas sequuntur: Vid. M. A. N. C. Ann. 3. *Obs.* 203. pag. 378.

Afficiuntur autem in variolis & morbillis non solum partes externæ, sed & internis eadem copiosius insidere solent: vid. PARÆUS l. de variolis ca. 2. item SCHENCKIUS alique: ac in specie pulmonibus non leve periculum ab his imminet, ut rectè observavit BARTHOLINUS Cent. 3. *Epist.* 38; ac KERKRINGIUS *Spicil. Obs.* 62. refert puerum, pulmonibus variolis repletis subito suffocatum. Unde qui variolis aut morbillis intereunt ægri, vel suffocati intereunt, vel ex convulsionibus epilepticis moriuntur, vel fluxu dysenterico interimuntur.

### CAUSÆ.

Quoad causam occasionalem: probabilissimum videtur, firmius & altius radicatum principium querendum esse, præsertim cum non videatur eorum sententia probabilis, quid dicunt, quod oriuntur ex repetito contu post factam jam conceptionem, cum post conceptionem uterus firmissime claudatur, nec quicquam ampliùs embryoni ab extra communicari queat. Ac proinde suspicor, fundamentum variolarum & morbillorum consistere in lacte, quod haurit fœtus nunc in utero, nunc extra uterum; ita, ut lactis vitiosi inquinati, aut vitiose coagulati recrementa acido-viscida sint quasi radix, ut per mutuam effervescentiam febrilem urantur variolæ & morbilli. Occasionem in hanc descendendi sententiam dedit analogia achorum & favorum, Germ. *des Ansprungs*, & tinea capitis, Germ. *des aufgeschlagenen Kopfs*, & ipsarum ex lactis vitio serè nascentium, cum excretionem cutanea variolarum: scilicet utraque notoriè primariò infantum faciem affligunt, deinde & caput & reliquum corpus, quando nempe iidem vitioso lacte nutriuntur, eoque vel in ipso infantis ventriculo inquinato, vel in nutritis corpore in acidum vitiosum transmutato; ex hoc enim postmodum oriuntur achores, pustulae scilicet in facie, imò rubicundæ, cumque puritu conjunctæ, quæ consequenter abeunt in desquamationem cutaneam, ac disparentes ut plurimum relinquunt tinea capitis & oculorum affectus. Ut proinde tam achores seu favi, quàm tinea ex acido lactis peccante originem ducant: ac ipsas quoque variolas & morbillos ab acido lactis, quod talem effervescentiam febrilem excitat, dependere testentur symptomata adjuncta. Summatim, arbitror, radicem, propter quam infantes tam faciliè variolis sunt obnoxii, querendam esse in inquinamento lactis materni vel nutritis, quod successivè congestum in infantis sanguine, ac aliquando per sinule contagium excitatum, effervescentiam in massa sanguinea concitet, quæ consequenter se putificans inquinamenta ista sub forma efflorescentiarum deponit, quod probatur per symptomata sæpiùs allegata. Propter hanc in sanguine fundatam originem *consanguinei* in specie mutuo afficiuntur, uti D. Doct. MICHAELIS plura retulit exempla, quod fratres duo longè diffusi, quorum unus erat in Italia, alter in Germania, uno eodemque tempore variolis laborarint, quorum nemo alterius novit conditionem seu morbum; adeò, ut per longa etiam intervalla de-

prehendatur hæc inter consanguineos conspiratio. Sic scio exemplum hic Lipsiæ gemellorum adulatorum, fratris & sororis: frater cum degeret Wittebergæ studiorum gratiâ, soror autem gemella cum hic ex improvviso incurreret variolas, ecce frater hujus Germanus eodem tempore isdem Wittebergæ, ut nemo ibidem locorum aliquid de morbillis sciverit, etiam corripiebatur. Similiter novi tres Nobiles, quorum duo adulti ante paucos annos Giesse studiorum gratiâ morabantur, tertius cum sororculis domi degebat. Sed cum hic tertius cum sororculis hic domi apud matrem laboraret variolis, isti duo Giesse simul isdem, & quidem eodem tempore correpti moriebantur, ut tunc temporis nil aliàs ibidem de variolis innotuisset. Imò gravida sana enititur pueram variolis correptam, cum antea filio ex variolis ægrotanti sedulo assedisset, referente hoc MORISONIO de morbis mulierum pag. 66. Aliàs non rarum est, mulieres gravidas variolis correptas, & fœtum similiter isdem afflictum fuisse: Vid. BARTHOLINUS Cent. 2. *Epist.* pag. 681.

Seminarium autem illud fermentativum in sanguine detelens non, nisi accedente causâ externâ, (speciatim certâ aeris alteratione, in actum ducitur; unde sæpè epidemica exsistunt. Ad causas externas spectat etiam terror ex conspectu ejusmodi morbidorum, & contagium, ita quidem, ut ne cadavera variolosorum ejusmodi effluvis activis destricti PANAROLLUS Pentec. 1. *Obs.* 18. perhibeat. Non tamen putandum, præstitisse in corpore sanctorum & tantas fordes, quæ postmodum in ambitum corporis copiosissimè sæpè protruduntur; sed fermentum acidum, fermentando se multiplicans, ex naturalibus nutritivis corporis contentis eas generat: Unde quò magis quis est *cachymicus*, seu cujus sanguis alterabilis magis existit, eò copiosioribus isdem afficitur: Undè nec scabiosi ab isdem sunt immunes, uti observavi FEHR de Scorzonera pag. 73. item HENRICUS ab Heer *Observ.* 6.

Inutiliter dubitatur: an Veteribus Græcis eadem etiam fuerint cognita? Nam sunt, qui per Græcorum *Echymata* variolas, per *exanthemata* morbillos intelligunt: Vid. PARÆUS de variolis cap. 1. Sed res præcisè determinari nequit, cum *ἑκθύματα*, & *ἐξανθήματα* Græcis vox generalis & universalis sit, quamvis in cute efflorescentiam denotans: Vid. CASTRO *Quæ ex quibus*, lib. 3. cap. 14. 15. 16. pag. 187. 197. & 201. Sanè, ut essentia variolæ aut morbilli convenire videantur, differunt tamen hæc ipsæ pro *ætate*, *nationum*, aliarumque rerum *non naturalium* varietate diversimodè. Sic enim morbilli in Italia & Hispania periculosiores, quàm variolæ, quæ in Germania: Vid. THIERMAYER *Consil.* lib. 1. pag. 88. Sic morbillos in Gallia semper cum febre, variolas verò sine febre esse observatur: cum è contrâ in Germania semper febres acutas committentur, exque serè graviore variolas. Sic variolas in Indis primitus Hispanos intulisse refert SCHOOCKIUS de Ferm. pag. 463. & sequ. item RIVERII *Praxis*, ubi de variolis. In Islandia vigesimo quovis anno periodicè observantur variolæ, teste BARTHOLINO Cent. 3. *Epist.* pag. 390. Frequentes variolæ solent esse in Japonia: Vid. *Acta Societatis Regiæ Volum.* 1. pag. 825. Eadem variolæ in Æthiopicis distinctæ sunt à variolis Europæis: Vid. BARTHOLINI *Acta Med. Hassn. Volum.* 2. pag. 235. Undè & mirabilis earum ab Æthiopicis cura vid. in M. A. N. C. Ann. 8. *Observ.* 68. pag. 116. Sic morbilli Amboinenses planè peculiare observati à SAAR in *servitiis militaribus India Orientalis* pag. 30. Nec minùs curiosum est, quod D. Michaelis aliquando curavit mulierem in una corporis medietate variolis, in altera verò morbillis affectam, quam natura ita mirabiliter in duas quasi partes diviserat: Cura tamen fuit eadem. Adulor graviùs laborare, & difficiliùs ferre variolas ac morbillos, quàm pueros, per experientiam innotuit. Densior nempe adulatorum cutis, & firmior ejus textura, neque despumationi materiæ adeò apta est, & sub suppuratione sensibiliùs longè dolere solet. Maligniores etiam variolæ frequenter *verminosæ* observatz fuerunt: Conf. M. A. N. C. Ann. 3. *Observ.* 20. p. 44., ubi etiam vermiculi post variolas cum urina rejecti allegantur: sicut & sudorem *verminosum* in variolis videbitis in M. A. N. C. Ann. 6. *Obs.* 3. pag. 8: Item *vermes* in variolis observantur RHODIUS Cent. 3. *Observ.* 64. & BARTHOLINUS Cent. 5. *Hist.* 20.



## DIAGNOSIS.

Variolarum imminentium historia ita se habet: *Prægresso* horrore plius minus *insensibilis* insequitur æstus intensus, grauitas totius corporis, dorsus, præsertim *lumborum dolor* lancinans, & quasi pulsatio in spina, cum qua subinde conjungitur insignis dolor capitis grauius, oculi tumidi & subrubentes, dolor eorum sensibilis, aut quasi involuntaria lachrymatio, ex aciditate scilicet lymphæ occulta oculos vellicante: Quod si addit tussis sicca simul, seu potius nimias tussendi conatus, cum pulsu celeri, frequenti, vehementi, duro, plius minus magno, vel paruo, prout mos febris est, atque reliquis signis, res eò magis confirmatur. *Respiratio* nonnihil impedita, aut plius minus læsa, cum voce interdum rauca, & faucium asperitate, similiter adesse solet. *Urina* sanctorum non est dissimilis; natura nempe ad ambitum corporis serum imprimis propellente. Ubi ergo adfuit symptomata febris ardentis, cum urina parum aut nihil à statu naturali immutata, variolas portendunt, uti HORSTIUS rectè obseruauit in *Observat. pag. 346.* præprimis in iuniori statu seu ætate. Interdum tamen *turbida* est, quod magnam contentorum ebullitionem & agitationem significat: interdum *alba cum sedimento furfuraceo* apparere solet. Agri sunt inquieti & agrypni; terrores, insomniæ parua, deliria, aut leuiculi epileptici insultus antecedente solent eruptionem variolarum: Interdum etiam in primo morbi insultu vomitus, nunc verò saltem *inanis vomendi conatus*, hæmorrhagia *narium* subindè admodum copiosa, occasione nempe sanguinis nimium ebullientis & feruentis adesse solet, quæ in principio morbi leuioris spem reddit, *in statu* verò morbum longiorem, uel funestum exitus innuit. *Diarrhæa* subindè ægros corripit, interdum *diabete*, & *mißus cruentus* ægros fatigant.

Hæc ipsa omnia eò magis confirmant, quando epidemicè grauantur variolæ, quod benè etiam debet obseruare Medicus. Præceteris tamen tria primaria signa variolarum sunt: Dolor in dorso & lumbis, oculorum involuntaria illachrymatio, & dolor sensus in oculis.

Hæc & similia *symptomata* ægros uexant plius minus, donec tertia & quarta die *macula rubra* apparere incipiant: quibus rite & copiose prodeuntibus, ferè mitigati solent omnia prædicta symptomata. Ipsæ variolæ per se patent ex pustulis & maculis, nempe foras prorumpentibus. *Macula* istæ nunc simpliciter tales sunt, ita manent, ac sensum post aliquot dies euanescent, ac *morbilli* appellantur; nunc successiuè in *pustulas rubras* eleuantur, quæ albescunt pedetentim in centro, cum circulo *ambiente purpureo, livido*, &c. ibique in medio sui in *pus* abeunt, hinc in *crustas* & *squamas*, tandem decidunt, atque hæc *variola* dicuntur.

*Macula* tales potissimum ac primitus *in facie ac manibus* apparent, hinc & reliquis in partibus, quæ *tumide* omninò fiunt, ac quasi tumore inflammatorio & cedematoso misto affliguntur, præsertim caput sub suppuratione ista non rarum est, quod *ulcera graua* variis in locis relinquunt, ipsaque omnia carie afficiantur: in specie *malè* aut non rite *expulse variolæ*, indeque per *metastasin* ad internam quandam partem delatæ, successiuè mille mala, pro partium affectuum uarietate, inferunt; aded, ut non arbitrer, esse uel reperiri morbum, qui tot mala post se queat trahere, atque *variola* & *morbilli* non benè iudicati: quorum Catalogum uid. in FEHR de *Scorzonera*, item SCHENCKIO in *Obs. l. 6.*

## PROGNOSIS.

*Signa* variolarum & morbillorum *prognostica* quod attinet: Si sint benignæ variolæ, nihil refert.

Meliùs est variolas & morbillos cito quam tardè, *conferri* quam successiuè erumpere; *materia* enim obedientiam, & *natura* robur ostendit.

Post eruptas variolas & morbillos febres & symptomata remittere debent: sin minus, res periculosa est; aut enim *insufficientem expulsionem*, aut *defectum virium* ostendit.

Porrò in variolis obseruatum est, quod ii, quorum patentes morbo Gallico laborarunt, antequam eodem genuerunt, variolis tandem correpti grauius fuerint afflicti, uti obseruat HORSTIUS in *Observat. pag. 303.*

*Macula purpurea*, an in variolis mortis prænuucia? obseruat SYDENHAM de morbis acutis pag. 180. & de Variol. Confluent. p. 12. LIPSIUS pag. 9. HOCHSTEDTERUS Dec. 1. Cas. 9. & RIVERIUS Prax. l. 17. Sect. 3. cap. 2.

*Stillicidium sanguinis* ex naribus est *ominosum*, præsertim in principio: sed si in principio variolarum sanguis largiùs naribus effluerit, & spontè cessauerit, variolæ & morbilli pauciores erumpere solent, ægerque faciliùs liberatur; si non, peius signum est. Novi exemplum familiæ cuiusdam, cujus individua grauantibus variolis omnia patiebantur symptomata ebullitionis; superueniente verò hæmorrhagiâ ab eruptione, omnibus temporibus post hæc liberabantur.

Variolæ *meliores* sunt rubræ, & cito *albescentes* cum circulo rubro, magnæ, plures, molles & eminentes, acuminatæ, rotundæ, disjunctæ, & sine continuitate propinquæ; quæque loca externa & ignobiliora occupant, faciliè maturantur, & decidunt: Nam in SCHENCKII *Observ.* refertur, variolas etiam omnia viscera interna obledisse.

Porrò variolæ acuminatæ sunt salutares; *dura* verò, *depressa* (utur in facie & in variolis confluentibus sine noxa contingat), sunt lethales; & in specie foveam in medio monstrantes, & nonnihil sunt nigricantes: Si rubræ, & tamen in medio habent foramina, pessimum est, & signum, quod intereat.

*Variola* vel ipsæ *discolores*, vel ad livorem declinantes, aut saltem quæ habent circulum lividum aut violaceum, aut nigricantem, & quæ sunt *dura*, & *verruis* similes, *depressa*, &c. admodum sunt periculose, præsertim si in earum medio maculæ nigrescentes appareant.

Si variolis maculæ petechiales inspergantur, admodum periculolum est.

Variolæ cum petechiis nigris lethales: Vid. M. A. N. C. Ann. 6. Obs. 53.

Lividæ, cæruleæ, & nigricantes maculæ post variolas periculosæ, imò ferè lethales sunt: Vid. M. A. N. C. Ann. 3. Observ. 203.

Variolæ *duplices*, aut tardius erumpentes, & *maturantes*, admodum periculosæ sunt.

Non terrere debet Medicum, epilepticas adesse *convulsiones* ante horum exanthematum eruptionem; expulsi enim his pustulis subindè & spontè evanescent, nec amplius redeunt: sed si continuènt symptomata, in specie motus convulsivi post expulsiorem, aut redeant, admodum periculolum est, sæpiùs lethale; deficientem enim expulsiorem hoc innuit: Nam semper post eruptionem alleviari æger, ac ejus symptomata remittere debent; sin minus, periculolum est.

Si ante eruptionem fuerit febris acuta, intensa, & variolæ erumpunt copiosiores, bonum; sin verò febris intensa, & tamen parèe erumpunt, pessimum est, quia viscera interna variolis inquinantur, obervantibus SCHENCKIO & HORSTIO Filio in *Observat. Anatomicis*; qui ipse pulmones & omnia viscera ferè interna post mortem variolis repleta reperit. Habeatur ergo proportio variolarum excretarum, & febris adjunctæ.

Post eruptionem jam factam *alvi fluxus*, aut hæmorrhagia superveniens, malum est indicium: Aut enim retrocedere pustulas faciunt; aut inquinamenti humorum insignis ab istis pustulis inducti indicium sunt. Rarum igitur est, quod hunc cum ægroti levamine observavit WILLISIS de febribus pag. 261.

Hæmorrhagia ergo *salutaris* si debet esse, contingat

1. In principio aut incremento.
2. Sit sufficiens, aut moderatè copiosa.
3. Continua, unâ vel alterâ vice non interrupta; &c.
4. Per anastomosis fiat.

*Urina sanguinea* seu *mißus cruentus* in variolis & morbillis signum ferè est lethalißimum; uti etiam si sanguis purus & sincerus suprà & infrà excernatur, nunquam evadunt mortì, notantibus FORESTO lib. 6. Obs. 45. SCHENCKIO lib. 2. *Observat. pag. 761.* SYDENHAM de variol. confluent. pag. 13. & *Observationibus morb. acutorum* pag. 182. & 212. Item RIVERIUS Prax. lib. 17. Sect. 3. cap. 2. & Centur. 1. *Observatione* 71. SALMUTH Cent. 2. *Observ.* 70. M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 76. Unde etiam HOCHSTEDTERUS Dec. 1. Cas. 7. 8. & 9. non tantum urinas cruentas seu sanguinem per



per utinam, sed omnes omnino sanguinis tam per superiora quam per inferiora dejectiones, lethales asserit. Frequenter observavi, quod semper fuerit lethale signum. Rarum igitur est, *missionem cruentam salutarem in variolis observatam esse*, cum sanguinis per gingivas excretio suppressa esset: Vid. SCHENCKIUS lib. 6. Observationum.

Interim hæmorrhagia ex naribus & gingivis simul lethalis vid. in HILDANO Cent. 6. Observ. 77. Sicuti etiam rarum est, quod variolæ cum dysenteria fuerint curatæ à RIVERO Cent. 1. Observ. 71.

Res desperata, si manuum cutim assiduus mador, siccis tamen brachus, occupet; nisi fortè tales madidas manus naturaliter soleat habere æger.

Si in variolis & morbillis adest tensio & rugitus ventris, cum anxietate & agitatione ægrotum huc atque illuc, intra paucos dies obvenit, præsertim si adjuncta sit dolor, qui innuit inflammationem intestinorum: Videatur RIVERIUS in Observ. communicatis, & HOCHSTEDTERUS Observationum Anatomicarum pag. 22.

Variolæ salutares ut plurimum die quarto erumpunt.

Si variolæ appareant, comitante solummodo levi febre, ex pulsu aut urina, aut etiam calore externo vix notabilis, tum vel materia expellenda parca est, benigna, & natura robore pollet; vel suspecta res est, præsertim si magnus sit dorsi dolor, & insolita virium oppressio advertatur, latitante febre admodum maligna, & quarto subinde die lethali.

Quoad tempus eventus: pertinent hi morbi ad febres acutas; nam ut plurimum intra decimum quartum diem torus curius absolvitur.

Qui ex variolis pereunt, vel ex angina moriuntur, vel suffocantur propter faucium vel pulmonum oppletionem, vel alvi profluvio, præsertim dysenteria, vel denique convulsionibus intereunt: Hinc JOHANNES STEPHANUS

Commentario in Avicennam: Nil observatione dignius est, quàm anhelus & vox in patientibus variolas: Vbi enim promptè reliquæ agitur respiratio, vox faciliè sequitur, neque rancefcit, admodum salutare signum est: Atque, ubi difficultas trahitur spiritus, alterutrum significari; nempe aut vires concidisse, aut certo in septo transverso adesse phlegmonem. Similiter quando variolis impliciti, vehementer sitiunt, in eisque continenter angustur, promptèque refrigerant bulla, detumescuntque, & morbilli variolæque glaucolivore pallescunt, sunt ægi capulo propinquanti; hoc enim caloris nativi extincti argumentum est.

Maximè infectæ sunt oculis variolæ, in quibus lippitudinem, ophthalmiam, suffusionem subindè & cæcitatem inducunt.

Tandem hæ variolæ licet non statim jugulent ægros, interdum tamen, quia vel malè curatæ, vel quia partem quandam nobiliorem gravius læsant, diuturna & lethalia inducunt mala, in internis præsertim corporis partibus, maximè exulcerationes earum, speciatim pulmonum phthisin, interdum dysenteriam, mictum cruentum, item hydropem: Vid. LIPSIUS pag. 11. & FEHR de Scorzonera pag. 83. Interdum ulcera mala partium externarum, cariem ossis, &c. Nec paralytes, tremores, ac similes artuum imbecillitates, post variolas ac morbillos non aded infrequentes sunt: vid. LIPSIUS l. a. & BARTHOLINI Acta Med. Hassniens. Vol. 1. Obs. 88. Unde post curam attenti finus, ne aliquid materię morbose remaneat.

## CURA.

Quoad variolarum & morbillorum curationem: in hoc

1. Fermentum acre acidum temperandum.
2. Correctum per diaphoresin, naturà monstrante viam, ciendum.
3. Symptomata urgentia mitiganda.

Pro his scopis ritè obtinendis observetur:

I. Tempus ebullitionis & tempus excretionis seu expulsiōis probè discernendum esse, de quo supra; His enim temporibus ritè distinctis magna pars curæ tonitur. Nam nec ebullitio nimis evehenda, nec nimis suppressenda: Conferatur SYDENHAM M. M. febres contin. pag. 97. Nec expulsio variolarum & morbillorum nimis provocanda, teste eodem in Observ. de morbis acutis pag. 177. & 193. nem de variolis confinent. pag. 24. 25. & 27. Sed in principio, ubi variolarum & morbillorum elementa, i. e. pustulæ & maculæ nondum apparent, haud procius ad expellentia dilabendū, sed naturæ conatus ita expectandus. Quamdiu ergo effervescent

Estmüller. Oper. Tom. II.

massa sanguinea, & tempus ebullitionis adest, absorbentibus debitis & sistentibus est insistentum, quæ non tantummodo primordia morbis fieri fermentis, indeque ortum nimium sanguinis orgasmum compescere ac mitigare, sed etiam, quæ corruptioni sanguinis, à malignis miasmatis perficiendæ, obstaculum ponere possunt. Quod si subjectum pituitosum, aut prægressa quadam evacuatione debilitatum fuerit, alexipharmacis generosioribus ebullitio desumptoria intendatur: vid. SYDENHAM de febribus contin. p. 104. Ubi verò jam erumpunt seu jam erumpere incipiunt variolæ & morbilli, tunc Medicus convenientibus alexipharmacis & sudoriferis subindè repetitis, & in specie emulsione seminum præfacta, earum proventus promoveatur, continuando eadem, donec bonà fide morbilli & variolæ exarescant & decidant; symptomatisque urgentibus pro re nata prospiciat, imprimis faucibus, oculis, & naribus, ne lædantur. Magna tamen hic cautio opus est, ne, dum exiguis consulimus, magnum naturæ opus turbemus: Etenim toto hoc tempore una & continuata est crisis, quare nihil temerè tunc audendum erit.

II. Semper post sanatas variolas & morbillos corpus purgandum est, sanguisque purificandus (quod tunc etiam in ipso variolarum vigore fieri potest, cum sanguinem purificantia putredini resistant) ne eorum hinc indè hærentes reliquia acido-salse aut febres intermittentes, aut alia mala inferant: plerumque enim malum post se odorem relinquere solent. Prominere ergo morbi mortificata, ne reviviscat, aufertur, post duas vel tres septimanas à primo morbi insultu purgetur patiens sedulo: pro quo scopo Mercurius dulcis præ cæteris excellit. Sed an in principio purgandum? quaeritur. Equidem variolis & morbillis, quæ talibus, nihil conferunt purgationes; quatenus tamen corpus cacochymicum est, & prima via sordibus obfusa, ne supervenientia exinde varia symptomata naturæ motum turbent, blandissimum primas vias abstergens, cautè tamen, & saltem in primo variolatum principio, ubi minus urget malignitas, ingens verò sanguinis effervescencia est conjuncta, propinetur, ne occasio detur periculo isti, quod ex alvi fluxu in variolis imminet: adeoque tamarindorum decoctum, aut blandum laxans passulatum, subindè usurpandum conducit ad imitationem HORSTII Observat. Anatom. 27; vel Mercurius dulcis parca dosi propinetur, tanquam appropriatum contra variolas remedium, qui aut impedit omnimodam earum invasionem, aut facit ut facillimè & citò erumpant, parvisque proveniant: Vid. hac de re M. A. N. C. Ann. 3. Observ. 9. & 56. pag. 13. & 56. Ac promidè vel ante vel post variolas purgandi sunt ægri cum Mercurio dulci; cui pro stimulo addi potest gr. j. scammonii sulphurati: nunc in forma pulveris & cochleari ligneo, nunc cum conserva rosarum in forma boli, nunc in forma pilularum cum Massa Pil: de tribus.

Sed in progressu morbi, præprimis in variolis & morbillis malignis, item ubi pustulæ plus minus eruperint, licet alvus ad 6. vel 8. imo 10. vel 12. dies adstricta fuerit, à quolibet tanillum alvi stimulante, etiam levissimo clysmate aut suppositorio, studiosè abstinendum, nec, nisi summà urgente necessitate, alterutrum eorum usurpandum: Vid. RIVERI Praxi l. 17. pag. 187. & Miscell. Langii App. de Morbillis §. 97. & seqq. pag. 139. Si irritatur alvus, situm periculum vitæ, licet jam omnia fuerint in salvo, quod etiam à D. MICHAELIS & LANGIO observatum fuit; utpote, quod antea erat expulsus, faciliè retrocedit, ac consequenter anxietates lethales superveniunt. Nam subindè in variolis in apparente jam morbi declinatione supervenit alvi fluxus non absque periculo, quod etiam interdum dysenteriam inferit. Non ergo, nisi in morbi principio, Mercurius dulcis adhibendus, aut, si opus sit, clysmate alvus eluenda venit.

III. Pustulis jam apparentibus superveniens fortè alvi fluxus hic cautè tractandus, & non aded subito, nec simpliciter suppressendus est: idque præsertim, si affectus non tam ex adjuncta febre maligna, quam interno contentorum spontaneo vitio ac corruptela originem duxerit; ita tamen regatur, ut variolarum & morbillorum expulsio, quantum possibile, promoveatur, non verò ab isto alvi fluore cohibeatur. Verum licet non sistatur talis alvus fluens, sedulo tamen insistentum erit sudoriferis & alexipharmacis, quod ita derivemus magis naturæ motum ad exteriora, ac ita spontè cesset fluor iste. Contrà vero, cum tales alvi fluxus alio tempore venientes sint symptoma-



promota, & subindè lethales, propterea cum alexipharmacis expellentibus miscenda simul interdum adstringentia, blanda, ut ita successivè fluor in hoc casu periculosius sustinueretur, & omne malum præcaveatur.

IV. In variolis & morbillis *sanguis mistendus* haud venit in nostro climate; nil enim prodest, sed naturæ motum turbando multum nocere valet. Interim tamen in principio in adultis plethoricis aut habitioribus, ac phrenitide superveniente, vena aperta haud adeò nocere solet, præsertim cum subindè instituenda veniat in casu, quo de variolis nondum est suspicio, sed in primo fiat principio. Dum enim jam apparere incipiunt pustulae, periculosissimum, modò non lethale, existimo venam aperire; hinc vix imitandus GRASSIUS in *M. A. N. C. Ann.* 3. *Obs.* 55., qui sparsim jam tum erumpentibus variolis venæ sectionem cum levamine ægri administravit: Vid. RIVERII *Praxi.* 17. pag. 696. & SYDENHAM *de febribus Sect.* 4. pag. 101. *de morbis acutis* pag. 187. 196. 199. & 207. Hoc tamen non obstat, quin in aliis regionibus, aliis in casibus, subindè ante aut etiam post pustularum eruptionem vena salubriter secta fuerit; exemplo tamen apud nos non imitando: Videatur BALLONII *Pharos Medicorum* p. 179. & 185. HORSTIUS in *operibus Medicis in Observat.* pag. 39. l. 1. *Observationum*, item FILIUS HORSTII in *Observationibus Anat.* pag. 23. & 24. & SEPTALIUS in *Anatom. advers.* pag. 111.

V. Opiata in variolis & morbillis perquam proficua sunt, debitis cum cautelis adhibita, quæ vid. in *M. A. N. C. Ann.* 8. *Observ.* 68. pag. 115., cum pro mitigandis urgentioribus symptomatibus, & promovenda excretionem cutanea, pro sistendo alvi fluxu, & præcavendis nervosi generis symptomatibus, multum conferant, in specie vesperti exhibitæ. Adhæc ab eorum usu in faciei & manuum intumescencia, quam insignem in hoc morbo natura habet, evacuatio rectius procedit, dictusque tumor eorum ope ad debitum naturæ terminum protrahitur, ut loquitur SYDENHAM *Observ.* pag. 203. Hinc puer in variolis per 5. dies ex abusu syrapi papaveris innocuè dormit: Vid. *M. A. N. C. l. a. pag.* 114. Unde infantibus granum, vel alterum theriacæ, adultis laudant opiatæ concessam dolin, commodè propinare possumus.

VI. Sanati curâ pericula interrogandi sunt ægri postmodum: an sint rauci, difficulter respirantes, aut ulcerosi? aut an in quibuldam partibus internis, vel certis locis, in pectore, aut abdomine, aut cavitatibus harum visceribus, præsertim in pulmonibus, synptomata quædam sentiant adhuc? & tunc maturè dentur parti afflicte appropriata remedia, ne aeris fermentatione reliquæ variolarum in uno altove loco graves turbæ excitent. Sæpius enim post variolas non sufficienter expulsi vel excretæ faciliè ægri in phthisin incidunt, aut pleuritidem, aut diuturnum periculosissimumque alvi fluxum.

VII. Externa in variolis ad tollendas maculas & delendas cicatrices sint nulla, aut cautissime applicanda; ante maturationem enim nihil juvant, imò potius pessundant ægrum, & terra interdum inferunt symptomata: Vid. FORESTUS *lib.* 6. *Observ.* 45., ubi refert, quod ex variolis in facie buryio, in sartagine ad nigredinem fixo, illita, facta sit crusta admodum horrida, quæ totam exulceravit faciem, ita, ut æger unum perderet oculum, & nisi in tempore occurrissent, etiam alterum amisset: item BORELLUS *l. 1. Obs.* 64. observat mortem ex cataplasmate repellente faciei admoto, ad tollendas notas variolarum. Cui ergò maxime sinus in talibus applicandis. Potius si volumus extrinsecus aliqui facere, armillæ ex succino manibus & pedibus applicentur; ab his enim egregiè promovetur in dictis locis ignobilioribus variolarum excretio: Vid. BECKERUS *de Cultivato Prussiac* pag. 48. Cum ante biennium variolæ hic essent epidemiales, virgunculae cuidam in principio morbi ante earundem eruptionem brachialia ex succino parata carpo imposita fuerunt; cumque à sinistra manu deciderent læpè, dextræ verò semper admota manerent, variolarum immensa copia ibidem loci prorupit, ita, ut non sine molestia ardorem illarum ferre coacta fuerit. Cum his conferantur ea, quæ quoad succinum habet HELMONTIUS in *Tumulo Pestis* pag. 881.

VIII. In variolis & morbillis aer studiosissimè cavendus, quin potius in loco tepido seu moderatè calido ægri asservandi, & debitis stragulis custodiendi sunt. Ne tamen quid nimis in hoc puncto? Passim in hoc erratur, dum ægri in locis nimis calidis custodiuntur, atque copiosis stragulis tantum non suffocantur, id quod subindè admodum fit no-

civum. Ut hoc regimen fiat riè, tempore ebullitionis observetur ætus in ægro febrilis; qui si excedat, nullo modo per integumenta, aliisve modis est intendendus; è contra si est debilior, aut saltem videatur minor, quam qui sufficiat secernendæ & expellendæ materię variolarum & morbillorum, in mediocri calore sustentandi sunt ægri. Quæ regulæ in quibusvis febrilibus, excretionem cutaneam junctis, probe observandæ. Conf. FORESTUS *lib.* 6. *Observ.* 44. JOHANN DANIEL HORSTIUS *Observat. Anat.* 9. pag. 25. SYDENHAM *passim in ejusdem methode curandi febres, itemque in Observat. circa morbos acutos, & de Variolis Confluent.* pag. 19. 20. &c.

IX. Diata tenuis convenit imprimis his ægris, præsertim ebullitionis tempore, ne impediatur naturæ motus. Lenticulum Decoctum earumque elus à SENNERTO, RIVERO, aliisque Practicis in his affectibus laudatur: sed sine fundamento, cum legitima ejusmodi statulenta diata tenuiori variolarum non sint congrua; nec Decoctum, alvum laxando secretionem turbans. Vinum nocet his ægris; ebullitionem enim intendit, cephalalgiam ac delirium excitat, hæmorrhagiasque periculosas movet: Vid. FORESTUS *lib.* 6. *Observ.* 46. & FEHR *de Sierzonera* pag. 87. & SYDENHAM *l. a. pag.* 192. & 198. Gelatina cornu cervi dissolvitur in cerevisia tenui cum Tinctura aquilegiæ, quæ præ cæteris convenit ad expellendas variolas; vel Nodulus ex semine aquilegiæ & napi centulo infundatur cerevisiæ tenui, instillaturque de super liquor cotalliorum pro infantibus. De potu in variolis ordinariè observetur, cum ægri ut plurimum sint siticulosi, quod pro infantibus in specie semper infundendum sit pomum stercoris equini adhuc calidum, quod sordidum quidem, sed verè egregium est remedium: Nam per utrum huius infusi calidi promoveatur sudor, & præservatur collum, ne variolæ inquinent fauces, & concilietur angina.

Quoad Remedia duobus scopis prioribus satisfaciendæ: eadem sunt vel generalia, absorbentia & volatilia; vel specifica magis, variolis & morbillis imprimis convenientia. Absorbentia & volatilia simul & acie acidum temperant, & per diaphoresin auctam illud eici faciunt. Sed illa fixiora magis temperant, volatilia magis sudorem & urinam movent. Illa potius conducant, ubi circa primas vias urgent symptomata; hæc, ubi acutius & volatilius peccaverit acidum, adeoque graviora, præsertim nervosi generis symptomata inferat, ut inquietudines, convulsiones, &c. Illa magis tempore ebullitionis; hæc excretionis conducunt, dum difficilem aut tardam eruptionem admodum promovent: Illa magis conveniunt, ubi primarum viarum urgent symptomata; hæc, ubi pectoris, aut pulmonum metuuntur à variolis mala. Remedia fixiora sunt unicorini fossile, antimonium diaphoreticum, cinnabaris antimonii & nativa, corallia; item cornu cervi cum & sine igne, unicornu verum, quod tempore ebullitionis in variolis ante eruptionem insignem efficaciam obtinet; item semina expulsi vaista, speciatim variolis & morbillis dicata: sic namque non tantummodò ex semine napi, cardui benedicti, nasturtii, & aquilegiæ fit emulsiò egregia ad curandas variolas; sed etiam ipsa semina pulverisata sufficiunt. Pertinet huc pulvis contra variolas Timæi, cujus hæc est descriptio:

R. Sem. aquileg.  
Nasturt. an. Zij.  
Card. ben.  
Napi an. Zij.  
Rad. scorzon.  
Dictamni albi an. Zijß.  
Terra sigillata,  
Corn. Cerv. sine igne an. Zij.  
M. t. Pulvis.

Ex his seminibus CRATO, trium Imperatorum archiater, facit emulsionem, quam insigniter commendat in cura variolarum. Et certum est, quod in variolis & morbillis magnum usum habeant hæc emulsiones: Vid. ZWELFERUS in *Pharm. Reg.* pag. 209., ubi egregium habet liquorem alexipharmacum, cujus præscribendi modum supra de febribus malignis in genere innui.

Volatilia autem sunt quælibet salia volatilia, speciatim spiritus, & sal volatile Cornu Cervi viperarum, sanguinis humani, & in infantum variolis ob epilepsiam duo-



X 2 11-



*Antimonii diaph. an. ℥j.*  
*Myrrh. gr. v. vel vj.*  
*Syr. card. bened. q. l.*  
 M. D. S.

*Potio adstringens & expellens.*

*R. Aqu. scord. ℥ij.*  
*Spiritus theriac. ℥ij.*  
*Corn. Cer. sine igne ℥ss.*  
*Bezoard. min. ℥j.*  
*Camp. gr. iv.*  
*Syr. papav. albi ℥ss.*  
 M. pro 2. dosibus: S.

*Potio expellens & confortans.*

In specie emulsionem ex seminibus expulsiuis confectam, quas antea commendavi, & quas Crato addè laudat, proderunt. Cratonis emulsiò ad petechiales febres, variolas & morbillos est hæc:

*R. Sem. card. bened. ℥ss.*  
*Napi. ℥j.*  
*Citri ℥ss.*

*Aqu. card. ben. ℥ijss.*  
 M. f. l. a. emulsiò,  
 cui adde

*Syr. acetos. citri q. l.*  
 Egredia est hæc emulsiò. Item

*R. Sem. aquileg. ℥ss.*  
*Nasturt. ℥ij.*  
*Card. bened. ℥j.*

Cum aqua quadam appropriata f. emulsiò:  
 D. S.

*Emulsiò expellens.*

Vel secundum methodum modernorum præscribitur hoc modo:

*R. Sem. aquileg.*  
*Napi an. ℥ij.*  
*Aqu. ulmar. ℥vj.*  
 F. emulsiò: adde  
*Corn. Cer. sine igne.*  
*Antimonii diaph. an. ℥ss.*

Educoretur cum rotul. manus Christi per latis.  
 M. D. S.

*Emulsiò expellens confortativa.*

His, quando ægri sunt inquieti & jectigant, commodè semen papaveris albi cum essentia castorei addi potest; illud enim sudorem etiam simul proleat, quem papaver non cohibet, in tali ergo casu:

*R. Sem. card. bened. ℥ij.*  
*Napi.*  
*Aquileg. an. ℥j.*  
*Papav. albi ℥j. vel ℥ij.*

Cum f. q. aqu. card. bened. f. emulsiò:  
 cui adde.

*Essent. castor. ℥j.* ) sunt lactez.  
*Myrrh. ℥ss.* )  
*Antimonii diaphor. ℥j.*  
*Unic. foss. gr. xv.*

Educoretur parum, f. emulsiò sudorifera.  
 D. S.

*Emulsiò sudorifera:*

In specie excretionem variolarum & morbillorum promovens. Vel

*R. Sem. napi.*  
*Aquileg. an. ℥j.*  
*Papav. albi ℥ss. vel ℥ij.*

Cum f. q. Aqu. fane. & scabios. f. emulsiò:  
 adde

*Corn. Cer. sine igne.*  
*Ebor. sine igne.*  
*Pulv. Marshion. an. ℥ss. ad gr. xv.*  
*Bez. min. gr. vj.*

M. & edulcoracum Rot. manus Christi per l.

D. S.

*Emulsiò expellens.*

*R. Sem. aquileg. ℥ij.*  
*Napi.*  
*Card. bened.*  
*Papav. albi an. ℥j.*

Cum Aqu. fl. aquileg.  
*Card. bened.*  
*Napi an. q. l.*

F. emulsiò ad ℥vj.

adde

*Aqu. cinnam. cum vino ℥ss.*  
*Corn. Cer. sine igne ℥j.*  
*Bez. min. ℥ij.*  
*Unic. foss. ℥j.*  
*M. edulc. cum q. l. sacchari.*  
 D. S. ut antea.

Vel ad imitationem ZWELFERI cum myrrha:

*R. Flavod. cort. citri ℥ij.*  
*Sem. citri ℥j.*  
*Card. benedict.*  
*Aquileg.*

*Myrrh. elect. an. drachm. ss.*  
*Amygd. dulc. drachm. j.*

Contunde in mortario cum l. q. Aqu. scorzonera in emulsiõnem leniter edulcorandam.

D. S.

*Emulsiò expellens & confortans.*

Circa statum, & dum remittunt symptomata, & copiosam pustulæ efflorescunt:

*R. Tinctura antimonii tartaris.*  
*Essent. myrrh. an. q. v.*  
 D. S.

*Essentia sanguinem purificans guttatim capienda.*

Detur bis vel ter in die pro circumstantia ægri.

*R. Tinctura tartari acerr.*  
*Essent. myrrh. an. drachm. ij.*  
 M. S. ut antea.

Dentur adulto 50. vel 60. guttæ ter in die, infanti 20. vel 30.

*R. Tinctura tartari acerr. drachm. ij.*  
*Essent. myrrh. cum spiris. sal. ammon. par. ℥j.*  
 M. S. ut supra.

Dosis adulto 40. vel 50. guttæ, infanti 3. 4. & 5. annorum gutt. 20. vel 25. quater in die, pro ratione circumstantiarum.

Imprimis ad expellendas variolas nobile est sterco equinum in nodulo potui ordinario infusum, expressum, & ita propinatum; aut etiam in cerevisia calida succus expressus exhibitus scopis omnibus in cura variolarum & morbillorum satisfaci, & in specie ab angina ac pleuritis, ac cognatis in variolis periculosis nialis præservat. Alias etiam ad variolas sterco ovillum, tanquam infallibile Anglorum deprædicatur remedium, quod sterco equino quoad efficaciam non cedit: (vid. DIGBY Recept. P. 1. pag. 69.) dum recipiunt stercois ovilli q. plac. pro lubitu, quod tubigunt cum haustu vini, terendo mutuo, & hinc per linteum transcolanda ita propinant ægro ad curam variolarum; sicut ad morbillos singulare experimentum est sterco caprinum ita præparatum, aut in potu datum, mirabiliter simul expellit. Decoctum ficuum, mili, feniculi & similia sunt admodum appropriata in variolis, ubi jam incipiunt nonnihil erumpere, imprimis decoctum ficuum ad expellendas has pustulas multum laudatur, & rectè quidem: ficus enim temperant quaecunque acrimoniam, de quibus notato digna est observatio FORESTI, quilib. 6. refert, quod in variolis & morbillis epidemicè grassantibus, ut vix puer aliquis in urbe ab illis immunis esset, omnes insigniter, qui decocto ficuum in cerevisia utebantur, facile fuerint curati, quoniam facillimè prodierunt variola. Hinc etiam decoctum ficuum Mynsichtii contra variolas in usu est, quod etiam laudat MICHAELIS in Collegio Iossoniano. Videtur etiam faucibus & pulmonibus conducere, qui læpius unâ laborant. Verum in hoc decocto observetur, ne nimis fiat dulce & crassum, quoniam ficus laxant alvum, id quod fieri non debet: Commodè ergo ficus milium additur ad imitationem SALÆ in append. microtechn. pag. 825. cum decoctum milii per se vulgate quidem, sed admodum egregium remedium sit in his affectibus, & aliquantisper alvum constipet.

Quod si ergo partim ebullitio sanguinis sedata, partim excretio procurata fuerit, optimum erit, ut suppuratio promoveatur, externè autem nihil adhibeatur, quicquid etiam anicula contra suadeant. Pro suppuratione hac promovenda, ac ne lædantur præsertim partes internæ, optime conveniunt lapilli cancerorum cum myrrha crebrius ulurpati: v. g.

*R. Lapill. cancr. præp. drachm. j.*  
*Myrrh. gr. xv.*  
 M. f. Pulvis pro 3 dosibus.  
 D. S.

*Pulvis temperans.*

R. La



*R. Lapill. Canir. præp. 3℔.*  
*Corn. Cerv. sine igne 3j.*  
*Myrrh. gr. xv.*  
*Salis cardui bened. gr. v.*  
*M. pro tribus dosibus:*  
*D. S. ut antea.*

Sic egregiè suppurationis promovetur, sine insigni fovearum vestigio.

Studioſus quidam juvenis robustus, *juvencus*, sanguineus, &c. à meridie insigni calore corporis corripitur, quem excipit æstus, nox inquieta, manè insignis ardor totius, facies rubet, oculi fulgent, sitis intenditur, est anxius, vomit subinde.

Die Jovis ergo à meridie vocatus mox venæsectionem instituo, hinc pro 2. dosibus potionem theriacalem ex aceto sambucino præscribo; primam vomitu mox reiecit, alteram retinet: sed manè infrequente æstus, anxietates, materię vicidæ vomitus, sitis clamorosa, &c. intenduntur.

Die Veneris

*R. Nitri antimoniati 3j.*  
*Bezoard. min. scrup. j.*  
*Camph. gr. iv.*

Mista assumptis pro 2. dosibus.

Primam vomitu reiecit comite muco; alteram à meridie retinuit: sed symptomata intendebantur; bibit cerevisiam secundariam: Vesperi

*R. Corn. Cerv. sine igne 3j.*  
*Bezoard. min. scrup. j.*  
*Sal. volat. Corn. Cerv. scrup. ℥.*  
*Laud. opiat. ferm. gr. i℥.*

Miscebatur pro 2. dosibus.

Ordinabatur simul Julepus ex Infusione rosarum ad imitationem SYLVII, ubi de Sito: largiter sudavit, nox erat bona, mane melius habuit.

Die Saturni

*R. Corn. Cerv. sine igne 3℔.*  
*Bezoard. min. gr. xvj.*  
*Sal. volat. Corn. Cerv. scrup. ℥.*

Miscebatur pro 2. dosibus.

Mucus copiosus obſidebat fauces, pro quo eluendo & Chirurgus gargarizando, & æger cerevisiâ secundariâ calidâ fauces eluendo, operam adhibebant: Vesperi

*R. Corn. Cerv. sine igne scrup. j.*  
*Bezoard. min. scrup. ℥.*  
*Laud. opiat. gr. j.*

Miscebatur.

Sudabat largiter, nox erat bona.

Die Solis, adeoque morbi quartâ die, apparentibus subminxis pustulis hinc inde,

*R. Corn. Cerv. sine igne scrup. ℥.*  
*Bezoard. min.*  
*Terra sigill.*  
*Myrrh. el. an. gr. vj.*  
*Misc.*

Vesperi

*R. Corn. Cerv. sine igne gr. xv.*  
*Bezoard. solar. gr. ix.*  
*Sal. volat. Corn. Cerv. gr. v.*  
*Laud. op. gr. ℥.*  
*Misc.*

Ægro continuo sudante copiosius, ubi erumpebant variolæ.

Die Lunę essentia myrrhæ guttas 40. bis cepit; subintrol-  
 tu lecti vero

*R. Corn. Cerv. sine igne scrup. ℥.*  
*Antimonii diaphor.*  
*Myrrh. an. gr. viij.*  
*Sal. volat. Corn. Cerv. gr. v.*  
*Laud. ferm. gr. ℥.*  
*Misc.*

Quos pulveres semper ob noctes quietas & copiosas sudationes cum euphoria capiebat.

Die Martis essentia myrrhæ continuabatur tempore somni:

*R. Aqua scabios. 3j.*  
*Essent. myrrh. 3℔.*  
*Corn. Cerv. sine igne scrup. j.*  
*Bezoard. min. scrup. ℥.*  
*Laud. opiat. ferm. gr. ℥.*  
*Syr. card. bened. drach. ij.*  
*M. pro dosi.*

Estmüller. Oper. Tom. II.

Die Mercuri eadem propinabatur.

Die Jovis, morbi nempe octavo, pro suppuratione promovenda, & levando ejus dolore:

*R. Lap. cancr. præp. 3℔.*  
*Corn. Cerv. sine igne 3j.*  
*Myrrh. gr. xv.*  
*Salis card. bened. gr. ix.*  
*M. pro 3. dosibus.*

Vesperi

*R. Aqu. scabios. 3vj.*  
*Lapill. cancr. præp. 3j.*  
*Myrrh. gr. vj.*  
*Salis card. ben. gr. iij.*  
*Laud. opiat. gr. ℥.*  
*Syr. scabios. 3℔. vel 3 ij.*  
*Misc.*

Quibus ita continuatis convaleuit, in fine pilulis ex Extracto panchymagogo cum Mercurio dulci adhuc propinatis.

Jam ad sistenda symptomata, quæ affligant vel ante eruptionem, vel post eruptionem. Antecruptionem sunt:

I. Anxietates præcordiorum & ictigationes, ad quas, quando vel vomitus spontaneus præcessit, vel per medicamenta nauseosa provocatus fuit, omnium optimè confert liquor cornu cervi succinatus, infantibus præsertim singulariter conveniens; quin etiam Extractum theriacale aut laudanum opiatum in parva dosi conveniunt.

II. Vomitus in principio urgens non statim suppressendus: at si nimius fuerit, theriaca, Extractum theriacale, theriaca coelestis, syrupus papaveris, gr. j. vel gr. i℥. laudani opiat, unâ cum absorbentibus optimè curant. His non sufficientibus, accedendum ad liquorem Cornu Cervi succinatum, qui præsertim infantibus optimus est, & eisdem quietos reddit, in potu ordinario assumptus.

III. Diarrhœa in incremento & statu superveniens neplurimum funesta est, nisi in infantibus succulentis, præsertim si in statu occasione vel potus nimis vel frigidiusculi oriatur, & imprimis, si murmuraciones abdominis conjunctæ fuerint, & excrementa spumosa. Hæc Diarrhœa aut alius alvi fluxus per terram sigillatam curatur, si nempe hujus pulvis largiter cerevisiâ iniciatur, & sub quolibet haustu probè invicem agitentur, & ita assumantur; sic brevi sedatur diarrhœa, & variolæ progerminant: item Electuarium diascordii Fracastorii, cornu cervi ustum, unicornu fossile, Theriacalia, &c. conveniunt. Vid. SYDENHAM de morbis acutis pag. 195. 203. & 205. nec non BONETTUS Mercur. Compital. pag. 682. §. 69.

Aliquando puellæ decenni variolis insigniter afflicte, & in qua sine suppuratione incipiebant periculose evanescere, cum succedente alvi fluore, simulque pedes ejus usque ad genua cum dolore liveſcebant: hinc in adeo periculoso articulo constitutæ præscribebam sequentes pulveres:

*R. Antimonii diaphor. 3℔.*  
*Castor.*  
*Myrrh. an. gr. viij.*  
*Camph. gr. ij.*  
*M. f. Pulvis pro 2. dosibus.*

Quo pulvere cum aliquoties fuisset usa, & alvus suppressa, & variolæ etiam expulſæ fuerunt. Item

*R. Antimonii diaph.*  
*Corn. Cerv. sine igne an. gr. xv.*  
*Castor.*  
*Myrrh. an. gr. v.*  
*M. f. Pulvis pro 2. dosibus.*

Puero 13. annorum tribus diebus gravi corporis æstu, vomitu continuo, & incipiente diarrhœa afflicto, in suspitione variolarum, cum in vicinis locis obſervarentur, præscripsi:

*R. Extracti ther. gr. v.*  
*Laud. opiat. ferm. gr. i℥.*  
*M. f. Pilulæ. no. xii. pro 2. dosibus.*

A prima dosi omnis vomitus & angustia cessavit: Hinc

*R. Pulv. bezoard. compos.*  
*Specif. cephal. an. 3j.*  
*M. pro 2. dosibus.*

Hinc copiosissime eruperunt variolæ. Potui infundebatur Stercus equinum, ejusque succus permiscebatur.



Puero aliquot annorum ex variolis gravi difficultate respirationis laboranti, & simul diarrhœa correpto in statu morbi:

*R. Aqua scabios. ℥ij.  
Terra sigill. ℥ss.  
Syr. è succo scabios. ℥vj.  
Misceb. pro Portione.*

Capiebatur pro lubitu.

Sin autem diarrhœa, quod interdum fit, à lumbricis oriatur, lethalis observatur: Vid. RIVERIUS in *Praxi* l. 17. pag. 502: quamvis nec hoc forsan perpetuè veritatis esse, ex prognosi colligi queat. In morbillis interdum alvi fluxus ad aliquot septimanas excurret, non sine ægriorum discrimine, pro quo compescendo dicta theriacalia & absorbentia conveniunt. SYDENHAM quidem in hoc casu venæsectionem commendat, quæ tamen vix locum habet, neque in incremento, neque in statu, propter rationes suprà dictas, neque in declinatione, propter sanguinem jam depauperatum.

IV. *Vigilia, deliria*, imprimis *convulsiones epileptica*, quæ infantes mox primo in morbi principio aut incremento cum abdominis duritie affligunt, optimè curantur vel pulvere epileptico antimoniali, vel liquore cornu cervi succinato, cinnabari antimonii; & si necessarium videatur, in morbi principio *clysmata* levia iniciantur; simul externè, si dolor abdominis sensitivus adfuerit, Linimentum ex olei destillati succini ℥j, spicæ gutt. v. excipiendum cum corpore pro Balsamo, regioni umbilici & icrobiculo cordis inungatur, ædque aliquoties; sic enim epilepsia evanescere solet.

V. *Hæmorrhagiarum moderata* aliquando in finenda: præstat ut plus fluat sanguis, quam minus. Videatur HORSTIUS *Observ. Anatom.* pag. 95.

Quod si non sufficienter procedat, potius promovenda venit, vellicando nates, aut cum seta porcina, aut per radicem crocodili: (vid. LIPSIUS pag. 41.) aut crebrius & fortius easdem emungendo, aut aliis modis hæmorrhagiæ narium provocando: quod cum fecissem, sanguis bene fluxit, & febris desit, & brevi sanata est, dicit FORESTUS lib. 6. *Observat.* 48. Quod si excesserit modum, optimè hæmorrhagiæ narium curant *busones* appensû, aut sub axillis alligati: vid. WILLISIUS de *febris* pag. 266. Id quod & in aliis malignis obtinet. Aliàs cum in variolis nimia hæmorrhagiæ ex ebullitionis sanguinis nimio impetu oriantur, eandem etiam opiata cum absorbentibus seu præcipitantibus dictis compellunt: cont. WILLISIUS *Pharm. Rat.* P. 2. *Secl.* 3. cap. 2. & 217: vitando tunc volatilia.

VI. *Tussis*. Tussim siccam subindè molestim & pectoris affectus in principio optimè siliunt Temperantia acrimoniam lymphæ, & Lenientia, vulgò Incrassantia; in statu vero Incidentia & Expectantia. Ibi tyropus de jujubis, violarum, papaveris, diacodium *Montani*, pulpa passularum in aquæ scabiolæ, tussilaginis, &c.; hic verò tyropus Nicotianæ, de erylmo, cum aqua menthæ, hyssopi, &c. In omni tempore remedia ex scabiola præsertim, vel iola, vel cum spiritu salis ammoniaci anisato, qui in affectibus pectoris optimus est, mista, speciosè præservant & curant partes respirationis dicatas. Curavi superiore anno adolescentem 16. vel 18. annorum, qui sub primo morbi insultu laborabat catarrho epidemico cum pleuritide notha, per misturam ex spiritu salis ammoniaci anisato & laudano opiato constantem; sic quarto die erupere variolæ. Vel

*R. Aqua hyssopi,  
Tussilag. an. ℥ss.  
Syrup. de jujub.  
Violar.  
Nicotiana an. ℥vj.  
M. D. S.  
Potio contra tussim.*

Variolantes si moriuntur, suffocati ut plurimum intereunt, quare semper respirationis modum consideremus; quod celerior & minor, eò pejor: quod magis stertunt, eò pejor.

VII. *Virium prostratio*. Si in statu ob symptomatum syndromen vires fuerint prostratæ, optimè convenit tinctura coralliorum cum spiritu cordis cervi sæpius propinata; item vini Rhenani haustulus, vel panis similagineus, vino intinctus & ita propinatus, optimum est analepticum, speciatim, quando vires prosteruntur a nimio sudore, & ægri inde imbecilliores fiunt.

VIII. Supervenit interdum *Aphonia*, quæ duplex: vel non possunt formare sonum, quod fit vitio laryngis & ner-

vorum ejusdem: vel licet edant sonum, tamen loquelam formare nequeunt, quod fit vitio linguæ & ejusdem nervorum. Primus casus reperitur in HILDANO *Cent.* 6. *Observat.* 14., sed est rarus. Secundus casus curatur per interna volatilia antipalytica; imprimis essentia castorei linguæ in parte prima circa frænum crebrò affricetur: Vid. HORSTIUS *Observ. lib. 1. Observ.* 29.

Post eruptionem symptomata sunt:

I. *Retrocessus*, quibus deliria ac convulsiones superveniunt, & vocatur communiter raptus materiæ excernendæ ad caput; rectius autem diceretur Raptus materiæ ad systema nervosum. In hoc casu nil melius est, quam vesicatoria pedibus applicata: Vid. BARTHOLINI *Alta Med. Hassniens.* Vol. 2. pag. 200. Sicut alias, ubi in variolis graviora erumpunt symptomata, necritè eedem erumpunt, non absque fructu vesicatoria applicantur. Vid. FEHR de *Scorænera* pag. 88. nem BARTHOLINUS l. 2. Vol. 3. pag. 72. Epilepsias & deliria ex earum retrogressionem oriunda præcavent, interdum & curant. Internè optimè convenire dicitur hoc remedium, quando particula fanni rubri Anglici, Germ. *rothscharlachtschuch*, in cinerem seu crassamentum nigrum comburitur, & aliquoties in vino ægro propinatur. Experimentum hoc ab amico fide digno habeo. Aliquando cum recessissent morbilli, & varia exarsissent symptomata:

*R. Antimonii diaphor. ℥j.  
Cinnab. antimonii ℥ss.  
Sal. vol. Corn. Cerv. gr. xij.  
Caph. gr. ij.  
M. f. Pulvis pro 2. dosibus: S.  
Pulvis expellens.*

II. *Cicatrices & foveæ*, quæ oriuntur ab erosione, ab acido acri salso. Ergo temperandum illud, ut pus mixtescat, cum lapillis canerorum, & myrrha: quo facto, fovearum & cicatricum nullus metus. Unde

1. Maturantia & temperantia conveniunt.
2. Nervi & maculas tollentia.
3. Cicatrices & foveas, si quæ sunt, implentia.

Pro primo scopo, ut temperetur & mitigetur pus, oleum amygdalarum dulcium, vel oleum nucum recens & sine igne expressum cum penna calidè illinatur, quando jam maturaverint, & in medio oculi quasi albicantes apparuerint, hoc læpiusculè fiat in die. Vel, cum morbilli incipiunt se ostendere, sumitur crassities de renibus porci, in qua liquefacta intinguntur panniculi, quibus facies tergenda est 6. 7. vel 8. vicibus in die, usque dum morbilli siccantur, & nulla macula remanebit. Frustulum item lardi impositum, ac sæpius renovatum, est egregium. Præstantior est pinguedo lardi incensi super flores lactis destillans: Vid. CNOFFELIUS in *M. A. N. C. Ann.* 6. *Append.* pag. 192., ut ait SYDENHAM de *morbis acutis* pag. 706. pinguis ideo relictæ, quod furfures cumulent, ac cicatrices potius augeant. Pulvis ad Variolas MYNSICHTII vid. in *Armam.* pag. 134. Decoctum malvæ aut ficuum cum gossypio aut linteolo repidè sæpius applicandum commendat MERCURIALIS de *morbis puerorum lib. 1. cap. 3.* Unum ex optimis est spiritus vini aromaticus cum salibus volatilibus leviter acuat, & subindè calidè variolis applicatus: Vid. SYLVIVS de *morbis infantum cap. 9.* Vel observetur elegans illa methodus *M. A. N. C. Ann.* 4. pag. 30., ut tub eruptione variolarum spiritus vini myrrhatas calidè per 2. dies repetitis vicibus illinatur. Hinc saccharum Saturni aquâ rosatarum mixtum, calidè pennâ faciei applicetur: hujus loco etiam emplastrum de lpermate ranarum cum saccharo Saturni imponi potest: Vid. HOFFMANNI *Clavis* pag. 249. Sed cautè talia fiant, ne repulsioni variolarum, superveniat mors; qualia exempla suprà ex BORELLO & FORESTO allegavi. Sunt, qui acu aureâ vel argenteâ pullulas ad maturitatem perductas seu dealbatas perforant, nè materia purulenta cutim subjacentem erodat: sed super hoc legi meretur Consilium MERCURIALIS l. 2., qui molestiam æquè ac supervacaneam hanc operationem credit; potissimum cum nonnulli sub sanæ laudabilem carnem succrescere ajant.

Ne autem facies tot variolis obfideatur, Viennæ dorso seu scapul. imponunt vesicatoria: Vid. THIERMAYERUS lib. 1. *Consiliorum* pag. 106. Alii pro hoc vaporem ex decocto herbarum emollientium pedibus suscipiunt: vid. *M. A. N. C. Ann.* 6. *Observat.* 186. pag. 247.: aut lacti calido pedes immergunt, variolas ad extre-



mirantes has derivando & revellendo, Autore Sylvio loco su-  
præcit. §. 76. Facit huc, quod refert FORESTUS lib.  
6. observat. 42. In pruritu manuum & plantarum pedum, dum  
erumpunt pustula, ponantur dicta membra assidue in aqua ca-  
lida, & multum confert: priusque punctiões cessant, me-  
linque morbilli erumpunt. Quæ remedia quidem tuta satis  
videntur: sed habeatur tunc pedum ratio, nè à copia vario-  
larum dolores diuturni aliave gravia mala iidem concilien-  
tur: Conferatur HILDANUS Cent. 3. Observ. 99.

Secundo nevos tollunt imprimis sperma ranarum, hinc  
aqua florum fabarum cum paucò oleo tartari per deliquium  
temperata; item aqua omnium florum, cui miscetur Col-  
mericum Clavii cum paucà toria, &c.

Vel

R. Aqu. calcis viv. ℞ij.  
Pulv. sulph. citrini ℞j.  
Coqu. invicem: Colatura addo  
Aqu. rosar. ℞j.  
M. D. S.

Aqua mundificans.

Facit huc etiam cataplasma sequens:

R. Farin. fabar.  
Lupinor. an. ℞ij.

M. cum urina bovina ad consistentiam cataplasmatiss, quo  
ipso vespert tota inungatur facies.

D. S.

Epithema mundificans.

Relinquatur ita per noctem, manè tunc cum aqua florum  
fabarum abluitur, & videbitis egregium effectum.

Tertio cicatrices denique, si nihilominus quædam super-  
sint, pro his mediante nutritione debite implendis inservit  
auxilia alicuius piscis cum oleo ligni Rhodii mixta & illita  
(vid. WEDELIUS de Medicam. Compos. pag. 186.) &  
pinguedo anguillæ, unguentum de cerussa camphoratum,  
oleum ovorum, &c. An verò cicatrices relictæ adeò facile  
deleri possint, meritò dubitatur.

III. Pityalismus, rarum equidem hoc post variolas apud  
nos est symptoma; observarum tamen sæpius à SYDEN-  
HAM. Hic igitur variolis malè tractatis, interdum auspi-  
catò superveniens, ut sit tractandus, videb. in citato Autore  
de methodo medendi febris pag. 108. item in ejus Observat.  
pag. 174. & 201. Cessans pityalismus promovetur per cere-  
visiam tenuem, decoctum hordei, aut alium liquorem fer-  
mentescens, nec ad sudorem cogentem. Ubi propter sa-  
livæ visciditatem suffocatio metuenda, conveniunt garga-  
rismata ex cerevisia secundaria, aut decoctum hordei cum  
melle rosarum.

Quoad IV. indicationem: lationis partium adhuc habenda  
est ratio, quas inter sæpius ac periculosius affligi solent im-  
primis oculi, & quidem duplici modo:

1. Quando variolæ oculi bulbum occupant, non tantum  
cæcitas, sed & interdum albugo, ulcera oculorum,  
& pannus relinquuntur.
2. Palpebras obsident, quibus suppurantibus oculus non  
possit aperiri.

Ad præservandos oculos in variolis commendatur Sap-  
phirus & Smaragdus, ut & succinum, si nimirum circulus  
circa oculos ducatur. Optimum est collyrium ex Inhilo vi-  
tri antimonii in aqua plantaginis, rosarum, cyani, & calca-  
trippæ; vel dictis aquis addatur parum turiz, & nonnihil  
sacchari Saturni: nam & si hæc instillantur oculis, præser-  
vantur à variolis.

Si jam incipiunt prominere vel in oculo, vel eos affligunt,  
quod ex rubore & pruritu patet, frustum crudum carnis re-  
centis, sive bovinæ sive visulina, si magnitudine & crassitie  
thaleri tepidè applicetur, ut hoc ipsum salis infestantem  
oculos humiditatem absorbeat; hinc, ubi ferè ad quadran-  
tem horæ adhæserit, removeatur, novumque denuò appli-  
cetur, & sic consequenter aliquandiu continuando, valde  
convenit in præservandis & curandis oculis à variolis.

Aut mulier quædam sana allium masticer, & halitum oris  
oculis inflet, manè jejuno stomacho crebrius repetat; vel  
accipiat crocus, infundatur aquæ sceniculi, & infusum  
hoc (non tamen sit acre) instilletur:

Vel

R. Herb. ruta rec.

Ex qua contusa exprimat succus, fletur, & cum  
aqua quadam ophthalmica mistus instilletur.

D. S.

Aqua ophthalmica.

Ettemull. Oper. Tom. II.

Succus cheresolii cum aqua sceniculi instillatus varias ocu-  
lorum curat: Videatur Sylvius l. a. §. 83. Item

R. Aqu. plantag.

Solan.

Rosar. an. ℞j.

In quibus ebulliant

Sem. sumach ℞j.

Plantag. ℞ss.

Ex colatura fiat collyrium, sæpe oculis instillandum, id-  
que in principio, ut defendantur oculi à pustulis, in quo  
obtinendo tale me nunquam fecellit, dicit RENEALMUS  
in Observat.

Aliquando cum jamjam humor ad partem appulerat, ad-  
miscui, detractis aquâ solani & semine sumach, mucilag.  
sem. althææ in aqua sceniculi extractæ ℞ss. Quibusdam mi-  
nori in copia, pro ratione morbi: Conter. HORSTIUS  
lib. 6. Observat. Append. pag. 301. Loco seminis sumachi ma-  
licorium recipi potest: v. g.

R. Cort. granat. ℞ij.

Infund. in l. q. aqua rosar. & plantag.

Stent in Infuso in loca calido, postea fletur, &  
adde

Margarit. præp. gr. ix.

Croc. orient. gr. iij.

M. S.

Mixtura ad oculos.

Egregium quoque est hoc:

R. Vitrioli de Cypro:

Dissolve tantillum in

Aqua euphras. q. l.

adde

Tutia quantum serunt oculi sine dolore.

D. S.

Collyrium.

Instillatur guttatim oculis, & præservat egregiè à va-  
riolis.

R. Aqu. euphras.

Plantag. an. ℞j.

Tutia præp. ℞ss.

Camph. gr. v.

Croc. gr. iij.

Mista aut instillentur, aut applicentur oculo, ne variolæ  
possint oculo nocere.

Item

R. Aqu. plantag. ℞j.

Euphras.

Rosar. an. ℞ss.

Smaragdi præp. gr. xij.

Margar. præp. gr. vj.

Camph. gr. iij.

Croc. gr. iv.

M. D. S.

Collyrium externum.

Vid. TIMÆUS Von Guldenklees in Epist. pag. 318. Aut  
pro collyrio extemporaneo

R. Aqu. plantag.

Sperm. ran. an. q. s.

In quibus parum sacchari Saturni miscetur, & ita oculis  
instilletur pro præservatione.

Loco hujus sacchari Saturni etiam tutia preparata cum pau-  
co vitriolo albo adhiberi potest.

Quod si nihilominus palpebræ progressu morbi sint obesse  
& intumescant, ita, ut nequeant aperiri, vel etiam glutino-  
sis sordibus inviscantur, blando decocto semini lini, sceni  
græci, cydoniorum, malvæ, aut foci, vel ex floribus melilo-  
ti, vel ex malva & semine cydoniorum in aqua comm. deco-  
ctis, aperiantur, cum linteo calidè oculis applicando, idque  
tamdiu, donec inviscatio & tumor cessent. Malè à quibusdam  
usurpatur lac, utpote quod faciliè acorem contrahit.

Nebula postmodum in oculis apparentes pulvere sacchari  
Candi in oculis inflato curantur: Hoc enim saccharum non  
solum præservat oculos, sed & nebulas detergit, si cum aqua  
rosacea adhibeatur. Sin his omnibus non obstantibus vario-  
læ tamen oculos occupant, ita ut istis curatis vel lippitudo,  
vel ophthalmia, vel nebulæ aut suffusiones, vel visus hebetu-  
do, aut similes visus obscuraciones, post variolas supersint,  
proficua est aqua ophthalmica Rulandi, vel aqua ophthal-  
mica ex croco metallorum: sed simul nuchæ applicetur vesica-  
torium. His non sufficientibus, hoc clausio bina vesicato-  
ria pone aures applicentur, quæ impedimenta remonent, ut  
melius oculi curari possint per reliqua remedia: c. g.



R. Empl. vesicat. part. j.

Cirr. ana vel partem dimid.

M. D. S.

Emplastrum vesicatorium.

Hoc inductum super lineum nuchæ applicetur.

Quò verò diutius servetur apertum:

R. Empl. de sperm. ranar. part. v. vel vj.

Vesicator. part. j.

M. D. S.

Emplastrum aperiens.

Pertinet huc, quod refert LIPSIUS de Variolis: In antiquo libro reperi hoc experimentum: Puer quidam post variolas per totum annum nihil videbat, oculi ipsi quidem erant illi, sed spurcitie obducti. Sumebat tandem unius radicem Gentianam, secabat illam in partes minutas, coquebat postea eandem in vino, & aqua equaliter mixto, & idem inspergebat post in oculus per tres vel quatuor dies tempore matutino, quod quidem mordebat, oculus autem curabatur. Item Oleum hepaticum mustelarum: (aaltraupen) cujus si una vel dua gutta oculis insperguntur, usque dum pelles abeunt, est egregium remedium. Pinguedinis viperarum gutta una vel altera oculis instillata, vel si minus recens aut mucida, palpebris saltem illita, oculorum vitia curat. Conferatur quoad pterygion post variolas curatas FORESTUS lib. 6. Observ. 55.

Nares defendendæ sunt, ne intercipiatur respiratio, nec fiant ulcera & ozæna, quæ difficilis curationis. Optimum est odor aceti rosacei, vel solitarii, vel camphoræ imprægnati; sic præservantur nares à variolis: Vel

R. Flor. rosar. rubr. p. iij.

Camph. gr. viij.

F. Nodus crebrius naribus admovendus, vel solitariè vel aceto rosaceo intinctus:

D. S.

Nodus ad nasum.

Quod si in variolis crustæ subindè circa nares concrecant, ita ut per eas spiritus trahi nequeat, butyrum recens non salitum, vel cum aqua rosarum sapius lotum, blandè inungendum est, quousque crustæ decidant.

Aures. Ubi in variolis auditus lesus fuerit, imprimis vesicatoria pone aures applicanda; hinc essentia cardui benedicti, aut castorei, cum bombace crebrius auri immittatur: Vel fiat suffitus ex castoreo, myrrha, colocynthide, semine fœniculi, & paucis croci in vino coctis, ac per tritorium auribus immittatur.

Funestæ imprimis sunt variolæ faucibus, in quibus suffocatoria pathemata, atque ad eò agrypniam quasi inducunt. Ad præservandas hac fauces ab angina optimum est pro colutione oris & faucium stercore equinum, cerevisiæ secundariæ vel porus ordinario infunditur, & sæpius usurpatur; item gargarisma ex succo cancerorum fluvialium, cum aqua sempervivi majoris, omittendo vel addendo sal prunellæ; sic fauces & lingua præservantur: item gargarisma ex aquis appropriatis cum rob nucum & nitro depurato vel antimoniato: c. g.

R. Aqu. prunell. ʒiij.

Rob diamor.

Nuc. an. ʒij.

Syrup. granat.

De succ. scabios. an. ʒʒ.

M. S.

Succus ad fauces.

Vel

R. Aqu. prunell.

Scabios. an. ʒij.

Mucilag. sem. cydor.

Fœnugr. an. ʒj.

M. S.

Gargarisma ad fauces.

Convenit quoque decoctum vel Tinctura florum papaveris erratici cum succo cancerorum fluviat: Vid. SACHSII Gammarol.

Quod si nihilominus fauces & lingua obsideantur, idque cum magno dolore & calore, inieciuntur FORESTUM lib. 7. Observ. 17, qui jubet, ut continuò cum lacte caprino, & aqua plantaginis simul mistis, tepidè se gargarizent ægri; aut si gargarisatio inolestra sit, saltem aliquandiu in ore detineantur, hinc expuuntur, quod miraculi instar prodesse ait, & oris & gutturis præstantissimum remedium, cum signa exanthematum se produnt. Item Gargarisma ex Decocto hordei, passulus minoribus, & similibus temperantibus adhibeatur, idque ad facilitorem maturationem: pusillus ve-

ro se jam aperientibus, huic Decocto mel rosaceum cum paulillo aluminis admisceatur ad meliorem purificationem, ne ulcera sordida remaneant. Quod si nihilominus fauces & nares exulceratae fuerint:

R. Herb. veron. vel salu.

Hord. an. Mʒ. vel Mj.

Passul. min. Mʒ.

Coqu. in s. q. Aquæ plantag. ad ʒviij. vel ʒvj.

Colaturæ adde

Mell. rosac. ʒj. ad ʒiʒ.

Alum. ʒʒ. ad ʒj.

M. S.

Gargarisma.

Quod si lingua exulcerata fuerit, siquidem hæc non raro tota putrescit, eroditur, & expulsiur (vid. SCHENCKIUS lib. 1. Observat. BARTHOLINUS Cent. 2. Hist. 22. M. A. N. C. Ann. 1. Obs. 35. in schol. p. 119. & ROLANDUS Aglossostomograph. annex. ann. 3. M. A. N. C. pag. 448.) hæc est difficilis curatio. Contra talem tamen linguæ exulcerationem egregium est & expertum Linimentum HORSTII, quod habet in Observat. suis lib. 6. Append. de Morbillis & Variol. pag. 310. cujus descriptio est hæc:

R. Fl. malv. arbor. ʒʒ.

Balaust. ʒij.

Myrrh. el. ʒj.

Alum. ʒʒ.

Excipiantur hæc omnia cum s. q. mellis despum. f. Electuarium molle.

Quo sæpius illinantur partes vel locus exulceratus.

Si hoc non sufficit, accipe mel rosatum, tantillo spiritu salis acidulatum; sic sæpè eluantur ulcera oris, quæ egregiè mundificantur & consolidantur.

Quod si variolæ labia obducant, ad eòque ingentem dolorem inducant, mucilage seminis cydoniorum eadem inungantur & curentur.

Quod si dysenteria vel corripit vel subsequatur variolas, internè electuarium dialcordii Fracastorii, Cornu Cervi ultum, terra sigillata, tormentilla, &c., conveniunt. Externè, si ferat morbi conditio, clyster ex lacte cum radice lymphii usurpatur potest. Adhiberi etiam possunt remedia Riveriana, quæ in C. 1. Obs. 71. & Cent. 2. Obs. 2. legi possunt.

In miltu cruento remedia ex plantagine sunt optima. Sanguinem post variolas per digitos pedum transudasse, videbitis in M. A. N. C. ann. 3. Observ. 27: & vermiculos per urinam excretos ibid. Observ. 28. leni purgatione ablatis: Pollutionem nocturnam ann. 9. Obs. 15.

Paralytes, nunc particulae nunc universales, non raro insequuntur variolas: Vid. VELSCHIUS Miltomim. no. 30. Cent. 1. annex. ann. 4. & 5. M. A. N. C.: quam curandi rationem videbitis in jam dicto anno Obs. 9. pag. 13. Item quoad loquelam post variolas amissam, vid. HILDANUS C. 6. obs. 14. & M. A. N. C. ann. 2. obs. 201. Ulcera variolarum partium subindè pessimi moris, tuncas capitis, &c. post se relinquant variolæ, ad eò ut SALMUTH Cent. 2. Obs. 50. ulcera mammarum maligna admodum orta noceat ex paucis latensibus variolis corruptis. Ulcera talia cautè, & non ad eò vulgari modo tractanda sunt: Conf. FEHR de Scorzonera pag. 88. In gravioribus autem malis in subiecto robustiore, si alio modo curari nequeat, per salivationem cura erit optima, cum non secus atque in lue Venerea in variolis pathemata partium nervosarum soleant esse communia, quibus Mercurius dulcis egregiè prodest.

GANGRÆNA non raro variolas uno altero vel loco insequitur: quæ pars quomodo tractanda? & ægra à corpore separanda sit? exemplo gangræna genarum à variolis orta docetur in M. A. N. C. ann. 4. obs. 60. p. 50. & ann. 2. obs. 2. pag. 2. Facit huc curiosa observatio THIERMAIERI Conf. l. 1. pag. 106., scrotum nempe in variolis sphacellatum per Mercurium præcipitatum rubrum, cum unguento rosato digestivo mixtum, separatim, & resarcitum.

Denique articularum tumores & ulcera post variolas ut curanda sint? videb. in M. A. N. C. ann. 6. & 7. observ. 100. pag. 139.

Variolæ nothæ curantur ut veræ, nisi quod blanda diaphoretica usurpentur; sicut & ægri post peractam sanationem blandis laxativis evacuandi sunt.



CAPUT XI.

DE

FEBRE SCARLATINA.

**F**ebri scarlatina à SYDENHAM *Observat. de morbis acutis* §.2. cap.2. ita dicta, quam INGRASSIAS de tumoribus à Neapolitana Rossaniam, seu Rossaliam vocat, ad morbillos vulgò refertur; sicut & cum variolis nostris hoc commune habet, quod ferè infantes tantum invadat, & quidem cum febre plus minus acuta: post duos vel tres dies noctesque primò circa collum, scapulas, & petus, hinc faciem atque totum corpus rubori quidam, cum aliquali, sed vix notabili, intumescencia, nunc sub macularum dispersarum, nunc expansi continui formà, erysipelati similis observatur, qui tumor post 2. vel 3. dies sensim subsidet, & in maculas saltem latiores abit, donec & hæc circa diem septimum planè evanescant, & cuticula in squamas secedat.

CAUSÆ.

Febris hæc juxta SYDENHAM non tantum æstatis, sed & quovis alio tempore se exerit, cujus causa peculiaris lymphæ ebullitio videtur, unde cum symptomatis catarrhalibus, ver. gr. tussi, & aeris catarrhalis epidemica constitutione, frequentius oritur. Levem hanc SYDENHAM l. a., SENNERTUS, verò *Tract. de variolis & morbillis* gravem, & sæpius lethalem pronunciat; sicut etiam experientia docet, eam gravibus ut plurimum, utut raro lethali- bus, conjunctam esse symptomatis. Sub declinatione hoc singulare habet, quod facies & crura ut plurimum tumores oedematosos contrahant: imò crura simul obscure satis rubescunt, qui tumor interdum ad os fiduum, interdum diutius perseverat: interdum abdomen & hypochondria simili modo affliguntur, cum præcordiorum angustia, tussi & respiratione difficili, ægrique tandem, ut SENNERTUS annotavit, moriuntur.

CURÆ.

Quoad curam: febris hæc tractatur, ut febres purpuræ, variolæ, & morbilli, blandistamen diaphoreticis: in fine morbi lymphæ viscidior blandè evacuetur, & simul primis viis, & massæ sanguineæ dyscrasie occurramus per abstinthia & antiscorbutica.

CAPUT XII.

DE

PESTE ET FEBRIBUS PESTILENTIALIBUS.

**S**upereft adhuc summus febrium malignarum gradus, pestis & febres pestilenciales. Pestis consideratio & æneologica & Medica esse potest. Theologi eandem flagellum DEI dicunt: Medici ejus naturam, quantum possibile est, & indagant, & per medicamenta malignitati ejus succurrere satagunt. Est autem & vocatur pestis, quando in morbis suprema adest malignitas, quæ, quoniam quibuslibet ferè morbis conjungi, adeoque varia symptomata inferre potest, quibusdam non peculiarem morbum constituere, sed tantum conditionem morbi pessimam designare creditur. Unde pestilens febris dicitur maligna vebementior, proinde ac alii quoque morbi pestilentes vocantur, qui, præterquam quòd valde acuti sint, malignitate etiam suâ adjunctâ terribiles sunt. Conjungitur enim pestis cum omnibus aliis morbis particularibus quidem, populariter tamen grassantibus, quibus multi interficiuntur; unde etiam diverso tempore diversæ pestes observatæ sunt. Sic enim ab ÆGINETA prodita est *colica pestilens*; *Paripneumonia pestilentialis* meminit FRACASSATUS; *Pestis pleuritica* est descripta à JOHANNES WIERO in *Observationibus*; sic *angina pestilentialis*, *Phrenitides pestilenciales*, *dysenteria pestilenciales*, *hepatitides pestilenciales*, &c. non sunt raræ; MERCURIALIS meminit cujusdam pestis, quæ pedes, tibias, & ossa ita infestabat, ut intra triduum pestecorepti plerumque interi-

rent; *Georgia Agricola* nota fuit pestis, quæ homines velut stupefacti ac siderati, omnibus membris tamen non mutilabantur: sic ab eodem observata alia, quæ totum ferè corpus in putredinem vermiculosam resolvebat: nec ignota fuit olim pestis illa superioris seculi, & quod excurrit, *febris Anglici* nomine appellata. Sed, utur febres pestilenciales variis se associare aliis affectibus possint, pestis tamen bubonaria propriè sic dicta peculiare morbi genus constituere videtur, h. e. ista, in quibus nunc bubones, nunc parotides, nunc carbunculi, subindè etiam petechiæ, erumpere solent. Omnes ergo hi affectus distincti, præter suam ordinariam, ut sic dicam, naturam seu constitutionem, summam habuerunt conjunctam malignitatem. Unde si eos appellare velimus morbos cum malignitate summa conjunctos, si videretur velimus eos esse pestes, tales morbos imitantes, perindè est: cum in peste & sit causa, quæ tales morbos producere, & præterea singulari malignitate præsentaneum vitæ periculum inferre potest: In posteriori consistit pestilentialitas; Unde morbus, cui hæc conjungitur, pestis postmodum vocatur.

De peste verò multi scripserunt, præceteris tamen meretur legi, quoad Theoriam quidem KIRCHERUS de *scrutinio pestis*, & HELMONTIUS in *tumulo pestis*, qui sunt optimi, quoad scrutinium Theoreticum, & evolvunt naturam pestis, quantum possibile. Quoad Praxin verò ordinariam feliciter imitandam, aridet BARBETTE de *Peste*; parvusequidem est libellus, sed elegans; item DIEMERBROECIUS *Tract. de peste*; quibus & locietur SYLVIUS de *peste*: utpote qui præsentis pestis interfuerunt. BARBETTE interfuit duabus pestibus Amstelodami, & DIEMERBROECIUS etiam.

Pestis ergo nomine nihil aliud intelligitur, quam morbus maximè contagiosus & epidemicus, qui ortum ducit ex miasmate venenato, ab aère primùm suscepto, & ita per contagium ulterius propagato, quod occultè & latenter homines plures aggressum, eos in summum vitæ periculum conjicit, & ferè bubones, carbunculos, nonnunquam & petechias, comites secum trahit.

*Miasma* istud contagiosum summè est subtile, admodum activum, & quaquavertim diffusum, virulentiam suam exerit, adeoque quasi multiplicabile est; unde ob summam sui subtilitatem à quibusdam dicitur *spiritus pestilentialis*, ab aliis *aura venenata*, HELMONTIO vocatur *Gas fracidum* in aère, quo innuit & ejus subtilitatem, substantiam & naturam. GAS vocans, innuit materiam subtilissimam, spiritum incoercibilem, adeoque spiritum vitali facillè lociabilem: Fracidum vocans, originem designare vult, quod ex putrilagine, & odore spiritali fracidum oritur. GAS hoc tanquam spiritus subtilis quasi incorporalis, adeoque nullo sensu, quomodo serpit, propriè cognoscibilis, similis ferè est cæco isti odori, quo mediante canes heros suos agnoscunt. Illustrat verè hoc curiosum *observatum* BORELLI *Cent. 1. Obser. 74.* de quodam Eremita, qui miasma pestilentiale latitans solo odore, uti retulit, cognoscere potuit, percepit odorem fetidum calceorum visorum, similem *Summè contagiosum* est miasma, quod miris modis inficere ac se multiplicare potest, cum non tantum immediatum contagium corporalem, sed per intermedia quæcunque, per vestes, per nummos, per literas hinc inde transmissas, &c. propagatum, & in alias regiones translatum fuerit, adeoque juxta DIEMERBROECIUM l. a. cap. 7. *Annotat. 1.* & annotante SENNERTO, pestis primò, & antequam epidemica evadat, adeò furtim & clandestinè irruit, ut sensu interno sciri nequeat.

CAUSÆ.

*Natura* hujus *miasmatis pestilentialis* contagiosi, cum hecenus à nemine cognita, aut exactè & scientificè explicata sit, propterea etiam controversiam hanc in medio relinquo. Illustrarunt negotium hoc, qui naturæ arsenicalis esse asserunt, imprimis KIRCHERUS l. a., qui egregiè ventilat hanc controversiam, eam tamen suæ putredinis animatæ applicat: Hinc imprimis legendus HELMONTIUS, SYLVIUS, & PAULI de *febris malignis*, qui præcipuè de peste statuunt, quod ex contagio salinæ volatilis substantiæ oriatur; unde cochleari aceti atraque acida, quotidie manè potesta in peste Lugdunensi mirè profuisse, SYLVIUS expertus testatur. HELMONTIUS in eo præceteris est sollicitus: quomodò subindè animi affectus, ima-



Imaginatio, terror ac pavor, ad pestis propagationem conferant, ut iidem afficiant corpora antea sana? Nam inter causas, quæ corpus disponunt ad pestis fomitem promptius suscipiendum, vix unâ est potentior imaginatione, & hinc natis animi affectibus, terrore, metu, pavor, & similibus. Exempla miranda animi affectuum prostant hinc inde, in specie viâ. DEUSINGIUS *Dissert. de Peste*, item GABELCHOVERUS *Centur. 5. Observat. 67.* speciatim HOCHSTEDTERUS *Decad. 7. Cap. 21.* ubi curiola exempla habet.

Post istos tamen animi affectus imprimis etiam aer inquinatus multum in propaganda populariter peste confert; saltem ejus vitale heberatum aut inquinatum à veneno pestilentiali videtur, unde aeris medio venenum tale pestilens, quod ceu fumus instat gas exfulscenti ex fermentescibilibus subjectis, aut gas ex puteis profundis inspiratum, mox partim spiritus vitales afficit, partim etiam cruorem plus minus inquinat; hinc illius ratione virium omnimoda prostratio & vitæ periculum; hujus verò bubones & carbunculi: unde spiritus animales & vitales ab animi pathematis, maximè à terrore vel metu ac pavor, percussi & plus minus suppressi, ed facilius contagium suscipiunt.

Causæ remotæ, seu quæ misalima istud venenosum possunt producere, sunt variz ac distinctissimæ. Præ cæteris *terra motus* considerandi sunt, utpotè quos passim gravissimæ pestes infecerunt, quorum causa non ineptè rejici videtur in effluvia mineralia arsenicalia, sulphurea cruda & immatura, & Mercurialia ex cryptis exhalantia, ac similia quorû halitu tories jugulantur metalli fossiores, quæ ærem inquinando promptissimè pestem induxerunt: item cadavera animalium sine sepultura jacentia, putrescendo misalima maligna expirantia, ad pestem disponunt. Perinet huc *fames*, quam sæpius sequitur pestis; item *hominum strages in bellis*, quorum cadavera non sepulta, & putredine resoluta ærem corrumpunt, & pestem interunt. In specie mumialis conspiratio & confermentatio hic observanda est, ratione cujus inter consanguineos seu eos, qui habent symbolum seu convenientiam, cæteris paribus facilius & potentius propagatur; unde sæpè integras familias devastat pestis, ut ut alios homines cum his frequenter conversantes non attingat; sicuti & quidam magis homines, quidam magis bruta afficit: Vid. DIEMERBROECIUS *l. a. Annotat. 6.*, ubi annotavit filios in Hollandiæ civitate, in qua tunc nulla pestis, transmissos, patre ac fratre pereuntibus, at matre leihaliter decumbente, quamvis eluctante, ibi pariter ex eodem morbo decubuisse.

Fundamentum consistere videtur in archæo seu spiritu vitali infuso, cui cum misalima pestilentiali inspiratum ætius se junxerit, eatenus disseminatur & determinatur, ut facile alium hanc symbolizantem, i. e. sibi similem archæum inficere & inquinare possit: Contingit enim, ut pestis saltem determinata affligat bruta, boves, &c.; nam bruta diversa diversos habent spiritus. Karissimum est, quod pestis humana bruta affligat: quod observandum sedulo; quia in hoc ratio præteruotionis consistit.

Plures aliz *aëris alterationes* undecunque natæ ad pestes quoque plus minus disponunt: hinc enim morbi maligni populariter grassantes nunc acerbius affligunt, nunc denuò remittunt; pro aeris scilicet alteratione varia: unde & tales morbi maligni gravius grassantes, imprimis variolæ, febres petechiales, dysenteriz epidemicæ, &c. interdum prodromi solent esse admodum frequentes infecutione pestis. De veneficiis pestem inducentibus non opus est, ut multa dicam, cum exempla passim prostant apud Autores: Confer. GARMANNUS *de Mirac. Mortuor. pag. 40.* & HERCULES SAXONIA *Tract. de Plica Polon. c. 11.*

Quoad *affligendi modum*: pestis, uti superius monui, est admodum varia; non semper enim una pestis, sed diversæ sunt: In genere nunc est cum febre complicata, nunc, ut ut rarius, sine febre affligit. Sunt equidem multi, qui existimant, pestem non esse absque febre: Verum contrariatur experientia: Vid. DIEMERBROECIUS *lib. 1. cap. 12. Annotat. 2.* HODGES *de Peste Londin. pagin. 57.* SORBAIT *de Peste Viennensi Quæst. 12.* & imprimis BARBETTE *l. a.*, qui, cum duabus pestibus interfuisset Amstelodami, refert, se multos observasse, quibus citra febrem sub axillis aut propè inguina bubones eruperint, quod satis testatur, illos peste correptos & affectos fuisse: quos apso etiam tumores absque febre in peste longè difficiliore esse curatu, quam reliquos, observavit. Imò in genere pe-

*stis absque febre periculosior est ista, quæ sit cum febre*; febris enim est motus naturæ irritatæ. Dum ergò mox prosternitur spirituum exercitus, ut siderati quasi intereant, & hinc primum naturæ robur deficiat, absque febre, periculosissimè tamen decumbent ægri. Sæpè licet adsit febris, tamen est lenta, ut ut de interno causo conquerantur.

Pro varietate ergò pestis etiam symptomata, quæ ægros affligunt, sunt varia, & in qualibet peste ferè variant. Frequentius levis horror corripit peste infectos; hunc insequitur æstus seu ardor intensus: Hic æstus interdum est admodum insignis, cum sibi tamen parva vel nulla conjunctus; è contrà sitis interdum est admodum ingens, & uti vocant, clamosa, ut ut ardor quoad externa sit exilis: Ut plurimum, sive parvus sive magnus sit ardor corporis, lingua percipitur arida seu sicca, urinâ existente sanorum simillimâ: Interdum inclinant ad somnum: sæpius tamen caput insigniter dolet, & tunc oculi insigniter rubent, fulgidi sunt & ignei, atque taliter ægri nullo modo somnum capere possunt: Adsunt interdum anxietates cordis, cum pulsu parvo ac debili; à primo attractu pulsus magnus apparet, nihilominus tamen, ubi vehementius paulò applicantur digiti, mox suam parvitatem prodit. Vires imprimis in principio subitò ex toto prosternuntur. Supervenit interdum alvi fluxus, qui nullo ferè remedio sisti potest; quidam sæpius vomunt, quidam verò tantummodò ad vomitum inclinant: Multi habent tumores propè axillas, propè aures, & propè inguina, aut in locis, ubi adsunt glandulæ, aut majores, aut frequentiores: quibusdam erumpunt pustulæ rubæ seu albæ: quibusdam anthracæ seu carbunculi, maximè in digitis, naribus, oculis, labiis: quibusdam petechiæ, exque nigæ, quæ sunt omnium pessimæ, & frequentissimè necant. Plura videantur in BARBETTO, SYLVIO, & DIEMERBROECIO.

#### DIAGNOSIS.

Signa, quæ futurum pestem innunt, hæc inter vel maximè consideranda sunt infecta, ubi scilicet varia ac multa infecta alijs infusa, aut admodum copiosa, observamus in aere. Nam ex his infectis aut portendi, aut etiam interri pestem, multi existimant Autores. Exempla sunt nota ex KIRCHERO præ cæteris, præter hunc ex RIVERII *Observat. 10. morborum infrequentium*, item HILDANO *Centur. 4. Observat. 23.* Item observatum fuit sæpissimè, vel bubones crebriores, aut etiam infecta inconsumpta aut insolita, aut admodum frequentia, ita prædixisse pestem, ut sæpius infecuta fuerit: an ut causa? an verò ut signum? non disputo. Hæc & reliqua signa prognostica *pestis imminenti* à KIRCHERO *l. a.* assignata, ex gr. quæ dicuntur de capra, de pane mundo, de aqua Virioli crustam contrahente, &c. omnia sunt vana, & saltem simpliciter conjecturæ superficiales; propterea non amplius attingo.

Signa verò *presentis pestis* etiam non æquè sunt facilia: Nam antequam pestis grassatur, vix ejus signum pathognomicum haberi potest. Plerumque tamen in omnibus pestium generibus cum signis quibusdam febrium ardentium seu continuatum acutiorum ac periculosiorum concurrere solent bubones, carbunculi, & macularum varietates, uti etiam interdum ulcera maligna.

Quod si verò jam in loco quodam familiariter grassari incipiat pestis, non difficulter cognosci potest ex eo:

1. Quod multos invadat, ac plerisque subitò jugulet, in specie cum bubonibus & anthracibus. Vel
2. Quod virium subitanea adsit prostratio, & symptomata faculratis vitalis insigniter læsæ sine manifesta causa: Pulsus subindè in principio appareant magni ac celeres; sed mox sint parvi, languidi, frequentes, intermittentes, inæquales; in progressu conjungatur febris, calor extrinsecus appareat moderatus, intus verò sit insigniter ardor. Iplum ægrum peste correptum innuit *nausea sine manifesta causa*, id quod contagii suscepti indicium est: punctiões in locis bubonum, vel in fonticulis: item prægreisus terror: item capitis dolor sine manifesta causa, vel similis corporis præternaturalis alteratio subitanea: ægri interdum halitum foetidum expirant, vel sudant, aut etiam totum corpus malè olet; vel etiam dicunt, in cibo & potu putridum esse odorem, quasi fracidum: dicunt: *Putes*: ægris varii colores subindè ante oculos vertari videntur, qui vel deliria, vel certè epilepsiam innunt; tunica enim retina convellitur, qui spasmus mox continuatur ad reliquum



reliquum systema . Ego observavi in aliis febribus malignis , si ægri non possunt discernere colores , imminere convulsiones . Observavi quendam febrem malignam petechiali laborantem , qui dicebat : me indutum esse cæruleâ veste ; prædicebam de epilepsia lethali , quæ subsequuta est in meridie . Et denique si grassante peste æger sentiat in locis bubonum , ver. gr. sub axillis , circa parotides , aut circa inguina , *puncticulam* seu puncturam , *plures vel pauciores* , vel etiam unicam , instar aciculæ candentis , tunc solet esse infallibile pestis signum , tum temporis , ubi alias eadem grassatur : & LINDANUS dicit : nunquam eum feselesse , si nempe alia conspiraverint , qui tamen tribus pestibus interfuit . Quando igitur tale quid in bubonibus sit , statim oportet evocare , quia punctio illa est conatus naturæ , volentis huc deponere venenum . Quæ ipsa confirmantur ulterius , si præcesserit metus vel terror , & conjungitur capitis dolor insignior , vel similis præternaturalis subitanea corporis alteratio .

*Chronologiam pestium* insignium à diluvio ad nostra usque tempora videbitis in PIENS *de Febribus* Par. 2. pagin. 189.

### PROGNOSIS.

Quoad signa prognostica : in prognosicatus sit Medicus , ut minus possit in peste errare , quam in febribus malignis , ex eo , quoniam sæpissimè peste infecti moriuntur . Pestis enim omnis acutissima , & periculosissima est : interim sua est inter illas differentia . Quædam enim magis , quædam minus acuta est : est pestis , quæ intra 24. horas , quædam intra 2. vel 3. aut 7. dies noctesque jugulat : intra quartum summum est periculum .

Sanè si ullius morbi , certè pestis incerta est prognosicatio , ita , ut JOHANNES MORELLUS *de Febrib. pestil. cap. 5.* in hæc verba erumpat : *Fit , ut in peste nas fallat sensus , fallat ratio , fallant Hippocratis Aphorismi ; & , ut nipse puto , in his falleret Hippocrates ; quatenus nec mutationes criticæ , diebus criticis incidentes , nec urina & pulsus laudabilis aliquid certi promittunt , sed potius fallaces sunt.* Vid. DIEMERBROCIUS l. 1. cap. 15. §. 1. & Annotat. 1. SENNERTUS *de Febribus* pagin. 419. HODGES *de Peste Londinensi* pag. 163. & THOMSONIUS *Experim. Admir.* pag. 20. Sakim observandum , quod scabies tempore pestis sit salutaris ; item lue Venereæ correpti , aut qui laborant affectibus melancholicis , minus solent affligi , vel affligi minus solent periclitari , vel planè non pesti affligi , uti rectè hoc observat FORESTUS lib. 6. *Observat.* 24. In talibus enim peccat acidum . Pestem tamen libenter seclui Venereæ associare asserit HODGES *de Peste Londinensi* .

Porro ii , qui ob pestis horrendum metum , vel post excitationem nimis vehementem , peste corripuntur , in vitæ periculum adducuntur , licet maximè sedulo curentur , uti observavit GABELCHOVERUS *Centur.* 5. *Curat.* 71.

Tumores , bubones , & carbunculi , si citò & confertim erumpant cum symptomatum levamine , salutarem promittunt eventum .

*Bubonaria* pestis quocunque in loco erumpat , est omnium mitissima & securissima , & tutior illâ , quæ cum *anthracibus* conjuncta .

Pessimæ omnium ac lethales dicuntur pestes petechiales , quæ petechiis corpus inquinant , cujus maculæ in stigmata facile abeunt , ac ferè semper symptomaticæ existunt : Vid. HODGES pagin. 143. DIEMERBROCIUS lib. 1. cap. 15. Annot. 33. & THOMSONIUS *Experim. Admir.* pag. 21.

Pustulæ seu vesiculæ pestilenciales pisum majus , aut fabam minorem ad summum æquantes extinguunt cum dolore lancinante & exquisito , humore intus seroso ut plurimum citrino , imò livido , & ad suppurationem inepto , modò plures , modò pauciores : alias prodeunt sine ulla ferè symptomatica , aut certè levioribus , omniumque mitissimam fovant pestem , vel quæ venenum mox secedere patitur , vel quæ cras in firmiorem offendat ; quibus scemellam totam scitatem vidit HODGES pag. 120. , quamvis idem pag. 121. & BARBETTE pag. 33. eadem aliquando in carbunculos degenerare annotaverit .

*Stigmata* Germ. *Die Pfefferkörner* , id est , *granapiperina* , certissima mortis signa observantur , suntque nihil aliud , jam minutissimæ ac discretæ ulcerationes , quarum radi-

ces intrinsecè latiores quasi in pyramides affurgunt , & habitum mortificant ; imò etsi non rarò sine ulla ac graviore symptomatis compareant , nihilominus eæcant , prout exempla ab HODGES pag. 144. & 145. allegata docent , nisi superficiata admodum , & quibus aliquid sensibilitatis remansit .

*Vibices* diversicoloris nunc solitarii apparent , nunc carbunculis adjuncti sunt ; utriusque tamen pessimi moris observantur , imprimis , si sine febris incremento albescant .

*Carbunculi* , quamvis indigatis vibicibus minoris periculi sint , bubonibus tamen ut plurimum peiores observantur ; quatenus non tam gangræna videatur in fieri , quam in sphacelum degenerans .

Præterea sicut bubones plures & boni coloris paucioribus sunt magis salubres ; ita carbunculi , quò plures , eò res est periculosior .

Si per *sudores* largiores materia discutitur , bonum signum ; si vetò frigidus sit sudor , aut etiam extrema frigida , in specie nates , est malum .

*Tumores delitescens* & imperfectè erumpentes , seu , uti vocantur , ad interiora recedentes , summum vitæ periculum portendunt .

Eminentibus bubonibus seu exanthematibus superveniens *singultus* , malum est periculosum .

*Anthraces* qui erumpunt in digitis , utur videantur tutiores ; propter nervos tamen ac multos concurrentes tendines periculosiores sunt , quam in aliis partibus carnosæ .

Si super *bubonem* erumpat *anthrax* seu *carbunculus* , lethale est signum , præsertim in locis tendinosæ .

Si bubones & anthraces ante febrem erumpant , minus est periculum , quam si post febrem denuò appareant .

*Tumores* aliquantisper *inflammati* , unà cum circulo rubicundo inflammatorio , cæteris paribus non sunt adeò insigniter periculosi ; ubi verò eos circumdat *circulus plumbeus* seu *lividus* , gangræna pessima imminet , & sæpè ægri ante biduum intereunt .

*Cantharides* vel vesicatoria applicata super bubones , si excitant anaplasm vesicam , bonum est ; sin verò non excitant vesicas , laudacter pronunciandum , ægrum difficulter convalesciturum . Infallibile hoc est in omnibus morbis .

Si post applicatum vesicatorium & apertum , vel etiam post cauterium actuale , intra 12. vel etiam ad summum 24. horas anthracis augmentum seu ejus progressus ad vicinam non potest cohiberi , æger interit . Id quod etiam fit , quando post *cauterium* , sive potentiale sive actuale , applicatum *locus aridus* & siccus permanet ; sicut in moribundis fontanellæ non effluunt .

Si eschara excitata sit candida , infallibile signum mortis est ; sicut & quibus fontanellæ in prima morbi invasione exarescunt : Vid. DIEMERBROCIUS l. 1. §. 27. & lib. 4. *Hist.* 51. Sin verò applicato cauterio erumpant pustulæ vel vesiculæ , quò majores , eò melius ; & si postmodum conveniens & laudabilis materia in illis generatur , æger erit extra periculum .

*Anthrax* aut *carbunculus cum vibice* , communiter flavo vel rubeo , est admodum periculosus : quod si verò vibex albescat , cæruleascat , aut livescat , citra febris decrementum , pauca spes salutis superest .

Si bubones in collo aut propè aures inducant *dolores gutturis* , & deglutitio citra insignem internam inflammationem impediatur , tunc patiens vix ultra 12. vel 15. horas supervivet .

*Febris* insignis citra anxietatem cordis minus periculosa est , quam cordis anxietates citra insignem febrem .

Quò arida magis & sicca est lingua , eò magis imminet periculum : Vid. BARBETTE *de Peste* pag. 9.

Mox insignis in principio virium prostratio , crebra animi deliquia , cordis palpitationes , & præcordiorum anxietates compressivæ , lethalia ut plurimum sunt symptomata .

*Delirium* in peste cum oculis igneis & lingua arida , squallida , prævum est signum .

Pulsus in principio inæqualis valde & intermittens , semper ferè letalis est .

Sopores in principio ac statu semper lethales sunt : Vid. DODONÆI *Prax. lib. 1. cap. 18.* DIEMERBROCIUS l. 1. a. Annotat. 6. & HODG. S pagin. 163. Et rarissimum est , ut tunc cum surditate parotides saluatae prodeant .



*Singulus*, utpote qui ut plurimum à carbunculo ventriculi ac diaphragmatis videtur ortus, lethalis: Vid. DIEMERBROCIUS cap. 13. §. 5. & 6. cap. 15. Annot. 15.

*Vomitus pertinax*, seu qui per tempestivum & legitimum alexipharmacorum usum sedari non potest, utpote qui similiter carbunculum ventriculi pro causa agnoscit, lethalis est.

*Suppressio alvi* raro sine omni saloris spe solet esse; & contra diarrhæa, præprimis in principio, summum minatur periculum: vid. DIEMERBROCIUS libr. 1. cap. 15. Annot. 16. & 17. & HODGES pag. 157: imprimis, si excrementa varia, nigra, viridia, & insigniter fœtida rejiciuntur.

*Urina crassa*, turbulenta, ac enormiter fetida; item pinguis, nigricans, aut hypostasim lividam deponens, non sine periculo est: Vid. SENNERTUS pagin. 419. DIEMERBROCIUS l. 1. §. 21. & 23: ac HODGES pagin. 162.

*Sternutationes crebriores* mortis sunt prodromi, secus ac RIVERIUS de Febris Pestilent. asserit. Vid. DIEMERBROCIUS l. 1. Annot. 7.

*Motus artuum ac linguæ tremuli ac convulsivi*, nec non *vigilia*; item *raucedo* & dolor gutturis sine tumore, aphthis, similivè causa evidente, certissimi mortis imminuentis signum observantur: Vid. DIEMERBROCIUS l. 1. Annot. 10. Nec non *anhelitus fœtor* enormior: Vid. Præceptorius de morbis Contag. lib. 2. & DIEMERBROCIUS l. 1. Annot. 12. Similiter, si æger omnia sibi fœtere cœxerit: Vid. SENNERTUS de Febris pag. 420.

Si propinatis sudoriferis ægri parùm vel nihil sudant; si sudores mox in principio morbi sine euphoria promaneant; si jullo fervidiores, aut frigidiores, aut fœtoris cadaverosi sint, facillimè interire possunt; utut sudores aliquantum graveolentes, interdum salutes sint: Vid. HODGES pagin. 158.

*Hæmorrhagia* semper ab omnibus Medicis tempore pestis statuntur periculosa, imprimis per vesicam & sputum: Vid. DIEMERBROCIUS §. 24. & 25. & BARBETTE l. 1., utut hic narium hæmorrhagiam ac mensium fluxum, ut plurimum etiam mictum cruentum, salutes annotarit.

*Gravidis, puerperis, vel abortientibus*, si peste corripiuntur, multum periculi imminet, & plerumque pereunt. Sed, qui per nares habent legitimam hæmorrhagiam, aut quibus supervenit mensium fluxus, ita subindè convalescunt: quibus verò supervenit mictus vel alvi fluxus cruentus, subito intereunt.

Interdum fit, ut *anthraces* oriantur in oculis, in naribus, stomacho & intestinis, ilque circa spem vel minimè convalescentiæ.

*Anthraces* etiam oriuntur in vesica urinaria, & tunc ægri cum summis torminibus intereunt.

Quidam tanquam certum hoc habent experimentum prognosticum in peste: sc. *proiciunt lac mulieris*, lactantis mactulum, *in urina pestis infecti*; unde, si cadat in fundum, ante sextum vel septimum diem ægros interire; si verò non cadit, dicunt, eundem supervivere. Sit fides penes experientiam.

## C U R A.

Quoad curam in peste, duo sunt observanda:

1. Ut curetur corpus ab insultu.
2. Ut curetur jam peste infectus homo.

*Præservativum* propriè dictum & optimum est fuga, eaque cauta, cita, longa, & tarda: Fuge, citò, Recede longè, tardè Redi. Sed hæc præservatio non semper est licita, interdum contra conscientiam & rationem, & sic proditur propria incertitia. Unde inter Medicos & Politicos disputari solet, an domus infectæ occludendæ, an homines infecti sequestrandæ? Multi negant ex sequentibus rationibus:

1. Quod ægri à societate liberiori præscripti maximè consternantur.
2. Sani cum infectis orci faucibus exponantur: Et
3. Quod vicini arceantur, a quibus tamen nihilominus infecti consilium & solatium expectare possunt.

Verùm, sicut pars corrupta amputari solet ac debet, ne pars sincera trahatur; ita non melior est præservatio, quàm

tempestiva sanorum ab infectis seclusio; cum aliàs infectorum malitia & fraudulentia vix coerceri possit.

Tempestivè ergò, & maximè principio, ædum infectatum separatio hæc & exclusio prudentium regimine instituenda erit; aliàs, si contagium hoc propter moras se jamdum latius explicuerit, oclusio hæc respectu tanti periculi impar esset remedium, nec ærarium publicum sufficeret pro tanta segregatorum & oclusorum multitudine sustentanda. Simul tamen contagio infectis & inclusis de alimentis, medicamentis, aliisque necessariis prospiciendum est, ne fame potius quàm peste pereant: nec sani cum ægris secludendi, sed firmiores & sani extra urbem ædificio, ab omni contagio libero, ad certum tempus excipiantur, antequam ipsis in publicum prodire concedatur; semovendo interim pariter illic eos, qui contagio forsitan afficiuntur.

Præterea cum pestis afflictio in duobus consistat, nempe in causa agente, i. e. in malignitate ubique grassante, & secundo in subiecto patiente seu corpore humano, malignitatis insultus sustinente; propterea genuina præservatio consistit in duobus:

1. In causæ malignæ averruncatione & vitiatione.
2. In subiecti patientis ad resistendum malignitati roboratione, seu impeditione, ne contagium malignum suscipiat, h. e. ut loquitur HELMONTIUS de Xenechtho, h. e. amuleto; quod debet tollere appropriationem & adaptationem mumialem, extra quam nulla sit contagii susceptio; vel spiritum nostrum vitalem roborant, ne per metum aut terrorem afficiatur, & in contagio mumialem dispositionem delent, hinc massam sanguineam alterant, & certo quasi balsamo condunt, sic symbolizatio mumialis hoc ipso imminuitur.

Scilicet non aded promiscuè in quovis grassatur peste, quin certas familias, certum sexum, certam ætatem, certos homines, & c. saltem affligat gravius: Conf. BOYLE suspic. de aeris qualitat. pag. 34. item VELTHUSIUS de Læne pag. 171.

Pro quibus scopis notandum est: quod jejuni facilius à peste, uti etiam à morbis malignis, afficiantur; quod etiam in metalli fossoribus observatur; item qui in Antimonio, vel Mercurio occupati sunt. Ideoque jejuni non sumus; sed semper, antequam exeamus domo, sumamus aliquot buccellas panis cum butyro & ruta, & assumamus haustum vini absinthitis bonum, vel alium medicatum, vel, quod melius est, præcipiunt quidam haustum vini Rhenani aut alius generosi camphorâ imprægnati, i. e. sumatur camphoræ quantitas pisi, eaque leviter accensa immittatur haustui vini, ut supernatando successivè comburatur; sin extinguatur, denud accendatur, pergendo, donec tota consumpta sit; hoc enim modo vinum redditur camphoratum, quod, antequam exeamus, hauriamus. Est enim vinum veneno pestisfeto contrarium, adeoque singulare pestis præservativum, partim ratione acidit generosi, nostro corpori amicissimi, partim quod animos & minùs pavidos & meticulosos reddat, adeoque graves animi affectus & curas ad pestem disponentes pellat, si nempe ingurgitetur ad aliquam mentis hilaritatem: Vid. WILLISIUS de Febris, ubi de Peste. Semper autem addatur camphora, quia hæc in peste est optima. Vinum Hispanicum magnis encomiis extollit HODGES de Peste Londin. pagin. 228. 233. 243. & DIEMERBROCIUS l. 2. cap. 6. Annot. 14. Potest etiam fieri vinum medicatum infusione vegetabilium aromaticorum alexipharmacorum, nunquam omitendo myrrham & camphoram, & tale vinum medicatum hauritur singulis mane, antequam exeamus. Sic pestis & febrium malignarum præservativum optimum est salivæ exspitio, quamdiu nimirum nobis in loco affecto, vel cum personis ac rebus aliis suspectis, res est: Vid. M. A. N. C. Ann. 9. & 10. Observ. 170.

*Purgantia* ad præservacionem nil valent; sed si adhibenda, sint rara, parca & cauta, ne sæpius vires debilitentur, & massa sanguinea ab ipsis exinde vitietur. Ergo illa propriè sic dicta fugiamus, & mitissima demus. Ubi opus est laxatione, præscribendus est haustus BARBETTE Tract. de Peste pag. 203., cujus hæc est formula:

R. Rhabarb. elect. ʒjss.  
Fol. senn. sine stip. ʒij.  
Crem. Tartari ʒss. vel ʒj.

Rad.



Rad. scorz. 3ß.

Sem. anis. drach. ʒ.

Infunde per noctem in Aqu. card. ben. manē coqu. ad dissolut. Tartari:

Colaturæ ʒ iij. adde

Syrup. de cicbor. cum rhob. 3vj.

Spiritus salis parum.

Confect. alcherm. ʒi.

M. f. Haustulus.

Potus spirituosus simpliciter tales, ut Brandwein, ut & in specie Aquæ vitæ theriacales, Aquæ theriacalis aromatica, Aquæ apoplecticæ, & ipsæ compositiones theriacales solæ, ut Theriaca, vel Mithridatium, non aded sunt convenientes in pestis præservazione, quia ad phlogosin disponunt; Unde si talibus subiectis supervenerit pestis, ardentibus admodum corripuntur febribus, & in his pertinacia admodum inducunt deliria: Aut ergo parum sunt usurpanda talia, aut intermissis adis temperanda, monent SYLVIO.

Fonticuli corpori inusti sunt unum ex optimis præservativis, quos omnes Autores, pariter & experientia, comprobant: Vid. præ cæteris PRIMEROSIUS lib. 4. de febribus cap. 10. HILDANUS Centur. 4. Observat. 23. RIVERRIUS in Observat. communicatis, HORSTIUS in Observat. pagin. 359. & 360. BARTHOLINUS in Actis Acad. Hassien. Volum. 4. pagin. 153. alique. Confirmat hoc ipsum etiam LINDANUS, qui optimo consilio dicit: Nil melius esse ad præcavendam pestem, quam fonticulos: Avunculus meus, dicit, vixit in Maro & Africa, ubi suo tempore, spatio 5. septimanarum, 85000. hominum fuerunt à peste interempti: ipse se præservavit, & suavit suad Medico, ut inaret fonticulos, unde omnes ii, quibus excitati fuerunt fonticuli, manserunt liberi ac immunes. Ipse expertus sum, pergit LINDANUS, fonticulorum insignem usum, & is, qui infici ad infectos, aut locum inficere accedant, statim puncturas, & quasi morsificationes in fonticulis persequuntur, quo ipso percipiunt, locum esse peste affectum. Idque etiam confirmat HODGES de Peste pag. 241. Unde ratum est, quod interdum fallat, sicut contrarium habet HOCSTEDTERUS Dec. 7. Cas. 1. pagin. 2. & Cas. 31., qui observavit nonnullos, quibus fonticuli inusti, & tamen in peste demortui sunt: de quo vid. etiam HORATIUS AVGENIUS lib. 3. Præservat. pestilent. cap. 33. FRIDERICUS Von der Meye de Peste Bredana, & THOMSONIUS in Epilogismo.

Præservatio ipsa in specie instituitur vel per medicationem aeris, vel per medicationem corporis. Aerem medicare solemus per suffitus, ut nempe fracedo ista aeris inquinata corrigatur & tollatur, ubi suaveolentia, ut Moschus, Zibethum, &c. minus conveniunt: Vid. DIEMERBROGIUS lib. 2. cap. 2. Annotat. 9. Quin potius sulphurea, nitro, & omnia acida pro aere medicando sunt aptissima, quæ illi putredini resistunt; unde etiam talia miasmata exhalantia solent destruere. Sic sulphur accensum insigniter aerem corrigit; si adjungatur nitrum, est cò melius: hinc pulvis pyrus, qui constat ex nitro & sulphure, accensus est unum ex optimis remediis pro corrigendo aere, in ædificium infusus. Unde etiam optimo consilio commendantur crebriores tormentorum bellicorum, pulvere pyro probè infarcitorum, explosiones super civitates, absque globulis. His tamen, nempe sulphuri & nitro, & alia subiecta sulphurea addi possunt, succinum, benzoe, baccæ juniperi, thus, pyx, myrrha, camphora, ac galbanum, & similia sulphurea. Pix, ut notum est, fuit secretum HIPPOCRATIS pro aere corrigendo. Confer. hic KIRCHERUS in Scrutinio de Peste pag. 362. & HELMONTIUS in Tumulo pestis: exempl. gr.

R. Antimonii pulveris. ʒij.

Nitri ʒij.

M. f. Pulvis grossus. S.

Pulvis fumigatorius ad suffitum in domibus faciendum.

R. Nitri ʒiij.

Sulphuris ʒij.

Myrrh.

Succini an. ʒi.

M. f. Pulvis grossus.

D. S. ut antea.

R. Sulphuris ʒij.

Oribani ʒij.

Myrrh. ʒij.

M. f. Pulvis grossus:

Cujus R. p. j.

Bacc. junip. part. ij.

Succini part. ʒ.

M. D. S. ut supra.

Præterea etiam vitriolum, alumen, nitrum, sulphur, & in specie horum spiritus superflui lateribus ignitis, insigniter aerem corrigunt: item acetum tam simplex, quam rosaceum, & rutaceum, vel acetum vitriolaceum Angeli Sala affundatur lateri ignito, ut fumus exinde exurgens corrigit aerem, purificet vestimenta, & domus peste infectas: Vid. VALLESIIUS de Epid. c. 19. Vel aceto rutaceo addatur vitrioli q. l. & hoc ipso dicto modo suffitus instituantur: Vel vitride & maceratur in aceto, quo lateribus candefactis manet, meridie & vespere affuso, aer corrigitur: In quibus omnibus tamen camphora lubinde addenda venit. Trochisci efficaces, sed paulò suavioris, pro fumo possunt parari ita:

R. Nuri ʒij.

Sulphuris ʒij.

Benzoes.

Syracis simul liquati an. q. l.

Ut formentur trochisci, tubulu carbonibus ardentibus injiciendi: S.

Trochisci.

Fætores & odores graviores atque ingrati, nempe hircorum, quos GRULINGIUS de Peste p. 24. commendat, cloacatum, stercorum, jumentorum, & porcorum exhalationes seu fædora GARDILVIO de Peste pag. 65. & Append. cap. 5. magnè attulunt; cornu quoque, imprimis hircini & ungularum equinarum, suffitus, hincque suffitum de cornu hircino Mynsibii moderate, & non nisi sub personarum selecta admittantur, cum præter vim miasmata pestilentialia enervandi, spiritus animales simul figant & obfuscant: Vid. DIEMERBROCIUS de Peste lib. 2. cap. 5. Non inepti sunt, qui lac calefactum in conclavi suspecto reponi jubent; hinc enim fieri, ut infectio omnis lacti se infuset, ita, ut crusta viridiuscula lacti supernatante appareat: Vid. KIRCHERUS.

Medicatio corporis in præservando fit per remedia vel externa, vel interna. Interna sunt imprimis acida, & hinc sulphurea: Unde SYLVIVS à posteriore concludit, causam pestis & reliquorum morborum acutorum esse sal acre, quod obiter moneo.

Acida volatilia ab omnibus Autoribus commendantur in præservando corpore à peste: unde præter vinum acidum, commendantur inter fructus, aciduli imprimis, citrus, berbetes, ribes, & similes; item cydonia, & aurantia, ex quibus parata varia. Reliquis verò præfertur acetum, in specie acethieriacalia ex simplicibus alexipharmacis, præsertim diaphoreticis, e. g. Zedoaria, radice contrayervæ, cinnamomo, Zingibere, radice petasidis, scorzonæ, terpentaria, floribus calendulæ, rolarum, &c. infusa, quæ, si cum sine theriaca parata fuerint, egregium sunt præservativum. De talibus manet cochlear unum vel alterum, jejuno stomacho vel post jeculorum assumatur, præservationis gratia. Talia sunt acetum bezoardicum KIRCHERI de Peste pagin. 176. TIMÆI in Cas. 31. lib. 8. p. 393. & aqua prophylactica Belgarum, quam SYLVIVS & BARBETTE in Peste Amstelodamensi felicissimè usurparunt.

Sanè acetum solum, in quo soluta camphora, vel rob juniperi, vel infusa myrrha, vel sola, vel baccis juniperi, myrrha, Zedoaria, carduo benedicto, & paucis aliis selectis adhibitis, instar mille aliorum compositionum sufficit pro præservatione, quibus semper tempore usus f. q. camphoræ vel spiritus Vini camphorati addenda est. Vel

R. Acer. infus. Theriaca; huicque post filtrationem addatur camphora.

Vel

R. Baccar. junip. vel hedar. arbor. part. iv.

Myrrh. part. j.

Infund. in aceto: hinc filtretur & impregnetur cum camphora.

Hoc est præservativum & alexipharmacum nobile, omnibus compositis Theriacalibus præferendum.

Vel Theriaca q. v. assumatur in vehiculo aceti, addita myrrhæ & camphoræ, pro præservatione.

Ex tanè compositiones theriacales nunquam usurpandæ sunt, nisi in vehiculo acido, aut aceto. De virtute aceti alexipharmaca & præservatoria, præter SYLVIVM Tract. de Peste, vid. BARTHOLINVS Centur. 4. Hist. Anat. 13.

Post acida sunt sulphurea, tam mineralia quam vegetabilia,



lia, balsamica, vel corpus defendentia. Hæc inter eminet sulphur commune, quod est *in Olio*, quod curavit HIPPOCRATES pestem: vid. HELMONTIVS: sulphuris flores legitime sublimate. Cum pulvere sulphuris si miscere quis myrrham & camphoram velit, erit pulvis eo convenientior in peste: vid. in KIRCHERO *sulphur bezoardicum* egregium, præscriptum in peste: hinc sulphur, & omnia ex eo parata ab HIPPOCRATE, HELMONTIO & KIRCHERO & aliis omnibus laudantur in præservatione. Quibus etiam annumerandum venit succinum pulverisatum, vel solum, vel cum aliis in vehiculo acido mistis, & assumptum; singulare enim pestis est præservativum, interno & externo usu: nam quanta succini septem planetarum pulvis, nimirum utrisque temporibus, carpi, malleolis, & sinistrae mammae affixi, & ejus olei sit vis amuletica contra pestem, docet HELMONTIVS in *Tract. Magnetica Vulner. Curat.* §. 37. & in *Tumulo Pestis*. Certe sulphur, succinum, myrrha, & camphora reliquis fere præcellunt: Conf. SORBAIT de *Peste Quest.* 24. Nam camphora omnibus alexipharmacis in peste palmam præcipit: de quo plura inferius: undè & Elixir propr. cum spiritu sulphuris plus solito acidulatum egregie convenire solet; vel fiant composita præservativa:

R. Flor. Sulphuris ℥iij.

Myrrh. cl. ℥ii.

Aloes ℥i.

Croc. ʒss vel ʒii.

Camph. ʒi. ad ʒss.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis præservans.

De quo omni manè assumatur ʒss. in aceto simplici, vel rutaceo, pro præservatione.

Ex hoc varia fieri possunt remedia. Cum addito saccharo q. s. f. *Bolus præservativus*: Cum succo & conserva pulpæ citri largiter f. *Electuarium præservativum*, cuius dos ʒj., vel quantum cultelli cuspidis caput, vel quantitas castaneæ: Cum addito aceto usus tempore semper agitando potest fieri acetum præservativum.

Tinctura bezoardica seu Mistura simplex, ratione spiritus vitrioli in debita dosi assumpta, etiam præservationis loco usurpari potest. Hisce etiam opium addendum venit, quod spiritus figendo, & animi pathemata nonnihil coercedo, inter præservantia non ultimum meretur locum; hinc & theriaca, mithridatum, electuarium de ovo, vel, quod his præfertur in præservatione, electuarium discordii Fracastorii, & similes opio divites compositiones in vehiculo acido, in specie aceto medicato, vel aceto vini simplici assumantur.

Parantur quoque morsuli præservativi: e. g.

R. Conserv. pulpæ citri ʒj. vel ʒjss.

Theriac. Androm. ʒij. vel ʒiij.

Terra sigill.

Corn. Cerv. sine igne,

Antimonis diaphor. an. ʒij.

Cum f. q. sacchari in aqu. scord. solut. f. Morsuli, irrorandi tempore usus cum aliquot guttis Oleo destil. persilens. Heinssii.

D. S.

Morsuli præservativi.

R. Corn. Cerv. sine igne,

Terra sigill. an. ʒi ss;

Bezoard. anim. ʒj.

Sacch. Saturni ʒii.

Fl. sulphuris ʒiij.

Elect. discord. Fracast. ʒvj.

Camph. ʒss.

Cum f. q. sacchari in aqu. angel. sol. f. Morsuli, irrorandi cum oleo pestil. Heinssii.

D. S. ut antea.

Quod etiam pertinent Electuaria & Morsuli præservativi *suprà*, ubi de febribus malignis, præscripti.

Denique saccharum Saturni à gr. iv. v. vel vj. vel viij. ad ʒss. etiam singulare à morbo Saturnino seu peste & febribus malignis habetur præservativum & curativum, crebro usurpatum, quo aliquot mille personæ Augustæ Vindelicorum in peste præservatæ dicuntur. Si additur camphora, magis tutum erit. Cautè tamen usurpanda, ne nimio ejus usu, propter volatilitatem (malum) acceleremus.

Pauca hæc sufficiant ad præservationem internæ.

Quod attinet externam corporis medicationem: sit per litoreum aut spongiam, aceto vel simplici, vel theriacali, aut

spiritu Vini camphorato imprægnatam, naribus subinde admoveendam, omnibus pomambris, balsamis, oleis, linimentis, reliquisque suaveolentibus præferendam; vel ad imitationem ZWELFFERI *Pharm. Reg. pag.* 137. fiat pyxis tornatilis perforata, cui indatur spongia, aceto bezoardico madida, & admoveatur naribus, quibus camphora & myrrha addi possunt pro lubitu. In ore masticetur radix Zingiberis vel Zedoariæ, quæ præfertur reliquis in præservatione à peste, aceto nonnihil imprægnata; item metalla tractantibus & esodientibus multum commendatur. RULANDUS *Tr. de morbo Ungarico* experimentum fecit in febre Hungarica præservanda. Quod facit, quod SCHENKIUS in *Observ. l. 6. pag.* 793. ex FALLOPIO refert: nebulones, qui inservierunt peste cori eptis, non præservasse corpora sua, nisi Zingiberis & Zedoariæ elu, ea ore masticando: Masticarunt manè Zingiberem, postea ebiberunt haultulum vini generosi, & totâ die habuerunt Zedoariam manducando. Commendantur præ cæteris etiam radices angelicæ, heleni, imperatoris, cortices citri in aceto macerati, cujus aut radice alius macerata semper frustulum in ore detineatur, & subinde masticetur. Acetum camphoratum sæpè in ore, detineatur, & subinde masticetur continuè myrrha & mastix; uti etiam trochisci sublinguales cum tragacantha in aceto soluta, ex myrrha & camphora fieri possunt, qui in ore continuè volvantur; vel myrrha in aceto soluta incrustetur cum saccharo, & cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci; vel saccharum teratur cum corticibus citri vel aurantium tenuissimè incisus, sic illud sub tritura imbibit oleum:

R. Cujus *jacch.* ʒj. ad ʒij.

adde

Myrrh. ʒj.

Camph. ʒj.

Cum mucilag. tragac. f. Pastilli: irrorandi cum

Ol. destill. sacc. gutt. x.

Cort. citri gutt. vij.

Angel.

Zedoar. an. gutt. vj.

D. S.

Pastilli præservativi.

Quod ipsum omnibus Electuariis oleosis saccharatis præfero, radici Zedoariæ, corticibus citri, ac quoque costo aromatico vero, licet hæc aliis insignem usum habeant, quod scil. masticata debeant præservare ab infectione.

Quod si quis præterea tempora, carpos, & præter alia, præcordia oleo aut balsamo illinire velit, is balsamum apocasticum paulò copiosius cum camphora imprægnat; vel oleum destillatum baccharum juniperi societur probè cum camphora.

Vel

R. Ol. destill. bacc. junip. ʒij.

Angel.

Cort. citri,

Rosa,

Succum an. ʒj.

Camph. ʒj. ad gr. xxiv.

M. D. S.

Balsamus præservans contra pestem.

Et dicto modo usurpetur.

Sunt qui appensile seu amuletis, quæ Idiotismo Paracelsico Xenecitha vocantur, multum tribuunt, imprimis globulis ex arsenico metallico cum albumine ovi & gummi tragacanthi confectis, & similibus. Sed cauti sumus in his, ne periculosa adhibeantur; arsenicalia enim cruda non tantum escharatam in ente, sed & internè gravissima inducunt symptomata. Præ cæteris egregius est magnes arsenicalis Angel. Sala, egregium amuletum, in quo arsenicum fixum & potenter correctum est. Faciendum ergo tale amuletum:

R. Magnet. arsenic ʒj. vel ʒij ad ʒiij.

Benz. cum spiritu Vini solut. & ad debitam consist. evaporat. q. s.

F. Rotulæ maiusculæ, quæ sindone rubrâ inclusæ circa regionem cordis appendantur.

Item Mercurius vivus probè depuratus, & cum fumo Saturni calcinatus, qui in placentulas seu trochiscos formatus ʒii. pondere in staculo amuleti instar appendatur: Conter. HOEFERUS *Herc. Med. pagin.* 104. Fumus Jovis hoc etiam præstat: vid. POTERIUS in *Pharmac.* Nota etiam est vis bosonum, & quantum hi valeant in curanda & præservanda peste; sive ad HELMONTII metholum de *Tum. Pest.* pagin. 76. formentur trochisci ex ipsius uonibus, pedibus posterioribus suspensis, eorumque

vetini-



vermiculis rejeclis, cum cera & tragacantha, pro amuleto appendendi. Cum HELMONTIO conf. ZWELFERUS in *Pharmac. Regia*, ubi hoc confirmat, quod ille habet. Alii ex ossibus bufonum vel etiam bufonibus integris, ichthyocollâ exceptis, ad collum gestandum amuletum parant, veneni attractivum & preservativum. Alii bufones integros contusos coquunt in aceto rosaceo & rutaceo, materiam cum mucilagine tragacanthi redigunt in trochiscos, qui collo appenduntur: vel ipsi semet bubo simpliciter tempore Junii & Julii per caput transfossus vel suspensus, & ita arefactus, pro amuleto cordis regioni appendatur.

Cæterum notandum hic: raro bufones cantarellos vomere, nisi illi fuerint vel grandiores vel seniores: interim verum est, quod HELMONTIUS refert. Si enim per anatomem bufonem examinamus, reperimus in stomacho, & imprimis in intestino colo, revera tales muscas seu cantarellos, quales ipse describit, & hi in ventriculo sunt integri, in colo verò attriti, & ab his derivanda est vis diuretica in sale bufonum: siue autem evomant cantarellos, siue non, contusi vel solitarii, vel cum cera & tragacantha formati in trochiscos, & ita de collo suspensi, erunt amuletum optimum.

Verum à quodam experto Medico mihi narratum fuit, quoad bufonum applicationem faciendam distinctionem pestis: Si sit pestis, quæ oritur ex gas terrestri seu sylvestri, ex terræ mineris exhalantibus, in tali peste convenire amuleta ex bufonibus; quoniam bufo tanquam alimentum attrahat tale gas sylvestre: ubi verò sit pestis ex vitroso sidere in fluxu, aut ex perverso aëre circa gas sylvestre aut terrestre, optimum remedium esse in araneis, utpote quæ vitia aeris attrahant: In peste ergo terrea amuleta bufonum, in aërea amuleta araneorum, convenire.

Hæc de præservatione pestis pauca, sed sufficientia. Pergo ad

## C U R A M.

Ipsiæ pestis curationis cardo in eo consistit, ut miasma venenolum ab extra in massam sanguineam & spirituum confortium recepium, potius sudorifero foras excludatur. Methodum hanc medendi suggerit ipsa natura, quæ curatione pestem deponit venenum, & per hoc corruptam materiam, ob veneni tamen atrociam simul corruptentem, in bubones & carbunculos, necnon maculas, idque quasi criticæ, & ita pestem curat, quia venenum extra corpus eliminat. Totius ergo curæ cardo consistit in legitimo sudoriferorum usu & applicatione; adeoque si peste afflicti curandi, invocato Divino Numine, mox in principio ad sudorifera alexipharmaca est confugiendum, quibus ob summam penetrantiam semper & ubique addenda est camphora.

Cæterum in omni cura pestis legitimè instituenda observentur cautelæ sequentes.

I. Alexipharmaca repetenda esse singulis 8. horis, ita ut 24. horarum spatio æger ad minimum bis vel ter sudet: Vid. BARBETTE pagin. 18. ROLFINGIUS *Metb.* §. 485. & SYDENHAM *de morbis acutis* pag. 153. Neque enim putandum, quod ubi lemel vel bis sudet æger, periculum jam sit evitatum; nam vel minima veneni particula instar fermenti mirandas & stupendas extertit vires. Totum ergo, quantum quantum est, eliminandum: nec metuenda nimia virium prostratio, cum verè melius habeant, dum sudant æger. Et quavis bubo & anthrax egregie eruperint cum ægrilevamine, aut petechiæ copiosæ effluerint, sudorifera tamen sedulo sunt continuanda, ut eò tutius malignitas profligetur, ne fiat recidiva. Cæterum in sudore proliciendo texturæ ægritaræ vel densæ, virium infirmarum vel validatarum, malignitatis vel majoris vel minoris, semper habenda est ratio, ne, dum venenum eliminatur, vires penitus deliciantur; nec nimis contegatur æger, ne suffocetur: ad unam ultimamve horam sudor prolicitus sufficit: pro constitutione sc. ægri: dein concedatur ei quies, donec horæ 8. circiter effluxerint: quo facto iterum propinetur sudoriferum, & peracto sudore dentur analeptica cum acidis spirituosissimis mista, quæ & malignitati resistunt, & sanguini nimis diluto debitam consistentiam conciliant; nam acida condensant sanguinem. Si bubo jam dum compareat, aut maturecat, non ad adeo frequentes, nec adeo copiosos sudores æger urgeatur, ne materia maligna exterminata resorbeat, vireque frustra dissipentur;

cum illi, quibus bubones sine notabili symptomate prorumpant, sine ullo quoque non raro Medici regimine reconvalescant. In carbunculis autem & reliquis metastasibus sudor potentius urgeatur, utpote in quibus lectetio minus perfecta videtur, hinc per sudorifera magis juvetur. Sudorifera tandem, si vomitu recusantur, toties eadem vel alia reassumantur, donec retineantur.

II. Observandum: æger sudans à somno debet arceri, quia somnus impedit convenientem veneni maligni per sudorem expulsionem. Quod si somno nimis infestetur æger, subinde spongiola vel linteam acetum vini, vel acetum rosaceo seu rutaceo imbutum naribus admovendum, aut acetum ejusmodi camphoratum, ut & castoreum cum aceto; talium enim odore arceatur somnus.

III. Dum sudat æger, sudor verò nolit sufficienter prodire, promovebitur hac encheireti:

*R. Panis parvus* è furno calens.

Detrahatur huic crusta inferior, excavetur circa medietatem aliquantulum, cavitas theriaca in spiritu Vini camphorato dissoluta 3 ii. repleatur, ac ita panis fervidus stomacho vel umbilico imponatur.

Venenum enim à pane, ut vocant, attrahitur; quod alii faciunt, si æger peste correptus abhorreat à remediis: Vid. PASCHALIUS & MORELLUS.

Vel ad imutationem Keglert:

*R. Panis secalinus* adhuc recens calidus, in crusta inferiori fiat foramen magnitudine imperialis, infundatur spiritus Vini camphoratus, & ita dictus panis imponatur abdomini, ut foramen respondeat umbilico.

Sic æger incipiet intensè sudare, & per eum malignitatis extractio optime procurabitur: venenum verò pani se insinuabit, qui propterea defodiendus est. Aliàs de pane calido, quod is ex aere attrahat venenum, vid. KIRCHERUS *Traité de Peste*.

IV. Quod si in peste agrypnia, vel etiam delirium ex hac imminet, aut etiam si adit nimia inquietudo, & similia symptomata sudorem impediencia, in talibus casibus subinde necessarium videtur, ut sudoriferis de laudano opiato aliquid addatur, præsertim in principio, ut symptomata assidentia coerceantur, & simul post absterium sudorem blandus ac requisitus somnus sequatur. Quando æger sufficienter sudaverit, abstergendus est linteis ticcis bene mundatis & calefactis, quæ si prius sint probè suffusa cum pulvere pyritico, vel sulphure, succino, thure, & myrrha, eò magis proficua est abstergio, & convenientior. Absterfo sudore mutanda etiam stragula, ne, dum sudore expulsa malignitas, denuò versus corpus properet. DIEMERBROECIUS quidem *Traité de Peste* cap. 4. §. 5. & 6. BARBETTE pag. 18. hoc prohibent, præcipue sudoriferorum permutationem. Verum per se non nocent, sed quatenus frigida poros ocludendo insensibilem transpirationem impediunt. Unde etiam SYDENHAM pag. 155. absterisionem dissuadet, & in ausum spontè exsiccati permittere jubet, sine dubio, ut æger aërem frigidiores, & miasmata pestifera exhalantia, evitet.

V. Pestis, ut & febres pestilenciales, subinde conjunctæ esse solent cum ardore intenso vel febre ardente. Hæc ergo si adsit, & insignis ebullitio totam massam sanguineam conturbet, in tali casu minus commode Theriaca aut Mithridatium, & similia Theriacalia, quæ & ipsa fermentare solent, concedi possunt, quæ nisi cum aceto vel acidis temperentur, acrimoniâ aromaticâ febrem intendunt: vid. HILDANUS *Centur. 6. Observat. 29.* & SYDENHAM *de Morbis acutis* pagin. 132. Loco horum ergo potius fixa antimonialia & talina lixivialia & similia usurpentur, licet & electuaria diacordia Fracassorii tunc usurpentur; quas enim periculum est, ne, dum veneno resistimus, febrem nimis intendamus, adeoque tandem ægrum interimamus. Sin verò cum peste vel febris mitior aut omnino nulla adsit, convenientius illa theriacalia aromatica denuò usurpari possunt, ut sopita quasi fermentatio denuò restauretur, & debita sanguini & corpori æstivatio restituatur, hujusque medio expulsio promoveatur.

VI. Acida in peste non secus ac in malignis nunquam omittenda, quin eadem temperata & sudoriferis addenda, & in sudoris declinatione & post sudorem tempore quietis propinanda, cum hæc ipsa ægrum post sudorem debilitatum reficiant, & præterea, experientiâ teste, simul malignitati aliquomodo resistent. His ipsis tamen acidis, ad ædum compescendum propinatis, semper simul aliquid de ludo



sudoriferis permiscendum, ut corpus, si non in perpetuo sudore, saltem in perpetua blanda conservetur diaphoresi.

VII. Quibusdam insolis, ægris peste affectis, non secus ac in febribus malignis, interdum fausto cum successu applicantur *vesicatoria* ex cantharidibus præparanda; quæ velicæ tali casu ad evacuationem malignitatis præferuntur fonticulis, cum hi potius in præservatione, ista etiam curativè magis conducant, & potentiùs eliciant ipsi fonticulis. Conveniunt etiam, ubi natura bubonem aut anthracem, imperfectè licet, extrudere molitur, ad promovendum naturæ motum. Admoveri possunt partibus variis, vertebri collæ, versus humerum & carpum, cruribus & suris internis; quinimò & bubonibus subindè applicantur cum fructu. Talia enim vesicatoria, sicut cuiuscunque generis calefacientia, liquores reddunt magis fluxiles, naturæ legnitiem extingunt, & unâ cum serosa colluvie & noxiis humoribus, per ulcera miasmata pestilentialia educunt; ut à partibus nobilioribus revulsionem, & à vicinis derivationem taceam. Sed ut celeriter operentur, acerrima sint hæc ipsa. Sequens massa in ultima peste Londinensi fuit experta:

*R. Pic. naval. 3v.*

*Galban. 3j.*

*Cera 3lss.*

Quibus simul liquatis, & ab igne semotis, adde

*Pulv. cantharid. præp. 3j.*

*Ferm. acerr.*

*Sem. ammeos an. 3iij.*

*Euphorb. 3j.*

Cum *Aceti scyllitici* q.s. incorporentur, assiduè agitando, quousque cogatur in emplastri massam.

*Pars autem ad ruborem prius fovenda*, quod vis emplastri se potentiùs exerat. *Excitata ulcera aperta diu relinquuntur*, emplastro de meliloto, pulvere cantharidum insperso, locum iterum atque iterum sauciando. Inflammationibus dolorificis opportunè succurrendum foliis brassicæ, ulceribus superimpositis. Existimo tamen in peste morbisque malignis huiusmodi epispasticis semper de magnete arsenicali aliquantulum addendum esse. Vesicatoria, hæc, si imposita escharam vel in loco sano vel in bubone excitent, bonum erit signum; si non, pessimum. Ut autem multum profint hæc ipsa, non iam indiscriminatim omnibus admoveantur. Propterea, ubi in peste urget urinæ ardor ejusque incontinentia, sphincteris vesicæ inflammatio vel ulceratio, si mulier sit gravida, vel si insint menses, aut motus naturæ ad vias urinarias inclinet, abstinendum est à cantharidibus, ne iisdem micus eruentus, alias in peste lethalis, excutetur; nec applicanda in nimia virium prostratione.

VIII. Satiùs est in peste planè omittere venæsectionem, quam eandem vires labefactare, quarum conservandarum maxima est necessitas: cujus exempla videbitis apud *VERZASCHAM Observat. Med. pag. 58*. Præterea nullum indicans venæsectionis adest; è contrâ quod plus eruptionem impedit, eò plura incommoda venæsectionem sequuntur: quæ omnia prohibent, eamque interdunt; idque eò magis, ubi pestis cum alui fluore prorumpit, aut etiam, ubi bubones vel carbunculi, vel exanthemata petechialia se manifestent: Vid. *HODGES de Peste pag. 157. & 168. PIENS de Febribus pag. 179*. Undè cautè legendus, nec facillè apud nos imitandus *SEPTALIUS in Animadvers. pag. 112*, dum quibusdam casibus, apparentibus iam bubonibus & anthracibus, venæsectionem instituit: ut taceam, paradoxum videri venæsectionis necessitatem, quam in peste persuadere conatur *SYDENHAM Observ. pag. 39*.

IX. Observandum: In principio morbi, ubi natura maligna seu miasma venenosum adhuc est in primis viis, vel sub primo pestis intuitu, quæ noscuntur per nauseam, vomitum, vel conatum vomendi, tunc in principio primo dommodissimè adhibentur vomitoria, appropriatis alexipharmacis simul mista: talia enim sub primo pestis contagio, dum contagium per aerem fuerit haultum, mirè conveniunt: & consentiunt hac in parte Practici in unum omnes, vomitorium administratum leuare pestem. Certe *Purgatio nulli, vomitio pluribus salutaris*, dicit *LINDANUS*: & ubi iam mox in principio incipiunt apparere bubones vel anthraces, necessitas verò vomitorium suadeat, tunc, ne naturæ conatus per tales tumores expellens venenum impediat, & tamen utrique scopo satis fiat, consultius est buboni & anthraci maturativum, attractivum dictum, remedium applicare, dum propinatur vomitorium, ut horum medio venenum foras deriuetur, & vomitorium præstet suum officium. Alias enim, si immutatur tumor, subindè

scirrhii instar indurefcit, ita ut ad aliquot menses postmodum doritiles ista remaneat. Vomitoria ergo in principio pestis conveniunt cum regimine. Purgatio verò nullo tempore salutaris est, sed semper nociva in peste, imò nec clysmata semper præscribitur potuerunt.

X. Si vomitus adeo vexet ægros, ut remedia retinere nequeant, mox sub primo insultu imitandus venit *HODGES de Peste p. 196. & SYDENHAM Observ. p. 152*. Nempe tunc solo tegumentorum pondere & custodia (nisi quod lintheaminis pars subindè ad colligendos halitus vultui superinducatur) item applicato pane calefacto, aliisque similibus modis, sudor provocandus: nam, ut dicit *SYDENHAM*, cum materia morifica radiis versus ambitum corporis se exportant, illico alvi profluvium & vomitiones ab iisdem introsum reflexis, ac in ventriculum & intestina decumbentibus, provenientes ultro sedantur, adeo, ut quantumcunque stomachi subversio præcesserit, assumpta deinceps medicamenta probe retineantur, ac ad sudores ex voto proliciendos conducant.

Quoad remedia pro scopo sudorifero & alexipharmaco usurpanda: observandum est universale alexipharmacum pro quacunque peste vix dari, nisi quis camphoram & bufones hic substituere velit, quæ tamen non videntur sufficere. Deprehensum enim fuit diversis temporibus, pro diversitate nempe constitutionis pestilentialis, diversa etiam remedia peculiare obtinuisse vires. Quod si ergo specialia in peste tali ac appropriata remedia non sint inventa, generalibus istis in febribus malignis usitatis, & alio tempore probatis, utendum erit; quibus in symptomatum cura subindè symptomati appropriata sunt addenda; hoc saltem observando, quod illorum generosiora præprimis, eaque in majori dosi, propinari debeant.

Vehicula talium remediorum plurimum sunt Aquæ destillatæ, aceto tam simpliciter, quam rubidæ, sambucino, rutaceo, florum tunicæ, scordii, aut compositis theriacalibus imprægnatæ.

Præter ea ergo, quæ de febribus malignis recensentur, item quæ ad præservationem supra laudabantur, ex regno vegetabili supereminet supra laudata camphora, quæ & cum ea parata remedia, certè in peste curanda ab omnibus Practicis extolluntur, sive in substantia assumatur, sive in oleum redacta propinetur. Unde nobile & experitissimum est in peste oleum pestilentielle *Henisii*, Medici Veronensis in Italia, qui mira præstitit cum hoc in peste Veronensi, ut & ipsi post mortem Veronæ statua fuerit erecta. Compositum est ex ana olei destillati succini, olei corticum citri, & olei camphoræ: quæ olea invicem benè innecta constituunt hoc mirabile remedium, idque pro præservatione à guttis 3. ad 6., pro curatione à guttis 6. 12. ad 15., pro circumstantiarum varietate, expectando de super sudorem exhibeatur. Equidem oleum camphoræ genuinum plurimos laet; præparatio tamen facilis est, modò addatur certa quædam terra mineralis. Hinc *MINDERERUS de Peste* inquit: *Meo iudicio camphora plus virium in peste obtinet, quam vel pretiosa qualibet medicamenta bezoardica*: Vid. *Anatom. camphora D. MOEBII c. 13. pag. 30*. Interim, ubi complicati sunt morbi maligni cum febre intensiore, aut symptomatis capitis, delirium, agrypnus, &c. oleola ista minus sunt tuta. Sunt, qui

*R. Camph. 3j.*

*Alum. ov. 3vj.*

Lento igne per retortiam liquorem destillant in oleo, quod cum spiritu Vini aliquandiu circulant & cohobant pro alexipharmaco pestilentiali.

Imò vel solus spiritus Vini camphoratus, seu in quo soluta fuit campora, aut spiritus theriacalis camphoratus, egregii sunt usus in curanda peste; hinc etiam mixtura simplex & Tinctura bezoardica rite parata, propter additam camphoram in spiritu theriacali solutam, non contemnenda venit. A nonnullis hæc duo remedia, ab *UNZERO de Peste* descripta, insigniter extolluntur, quorum basis est camphora: Primum est potio, alterum Electuarium. Portionis descriptio est hæc:

*R. Aqua vita seu Spiritus theriac. 3vj. ad 3j.*

*Croc. ad quantit. cicris,*

*Camphor. 3ss. (dosis excessiva)*

*Misc.*

Detur totum infecto adulto, juniori dimidium, superbibendo parum Aquæ cardui benedicti, ac proliciatur sudor. Electuarium, quod etiam à *DEUSINGIO* commendatur, sit hoc modo:

*R. Theriac. An. rom. 3ij. ad 3j.*

*Flor.*



*Flor. sulphuris* ℥j.  
*Campb. gr. xv.* (dosis excessiva)  
 Misc.

Detur totum infecto, expectando sudorem; i squ  
 crebrius reiteretur.

Facit hoc elegans Electuarium, quod ipsum B. D. MI-  
 CHAELIS tam præservativè, quàm curativè, in febri-  
 bus malignis & pestilentialibus cum successu frequenter  
 usurpavit, cujus compositio est sequens:

℞. *Spec. alex. ter* ℥ss.  
*Pulv. Saxon.* ℥ss.  
*Theriac. opt.*  
*Michridat.*  
*Eucb. diascord. Frac. vel de ovo an.* ℥j.  
*Flor. sulphuris* ℥ss. ad drach. vj.  
*Campbor. drach.* iijss.  
*Olei pestilent. Crolli drach.* ℥ss.  
*Succini,*  
*Citr. an.* ℥j ad ℥ij.  
*Syr. de succo scord. q. s.*  
 M. D. S.

*Singulare electuarium contra pestem.*

Dosis ad præservationem est ad drach. ℥ss., ad curationem  
 drach. ℥ss. vel drach. ij. Hoc ipso multo milites à D. MI-  
 CHAELIS conservati fuerunt.

Deinde semen seu baccæ nigrae hederæ arboreæ, jam ab  
 antiquissimis Autoribus commendatæ, ab HELMON-  
 TIO etiam & multis aliis tanquam proficuum in peste re-  
 medium expertæ sunt, ad drach. ij. in aqua cardui bene-  
 dicti vel vino, expectando sudorem, & repetendo eandem:  
 Vid. KIRCHERUS in *Scrutinio Pestis*, & PALMA-  
 RIUS in *Tract. de Morbis contagiosis* pag. 453. Imprimis in  
 peste Hybernæ Medicus quidam frequentissimo in usu  
 habuit has baccas, quibus sæpius in die repetitis quam-  
 plurimos liberavit. HODGES cum aceti part. ij. & vini  
 part. j. propinat. Baccæ juniperi etiam in peste sunt com-  
 mendatissimæ, unde & earum rob seu succus inspissatus  
 ab Italis, baccis his carentibus, *Theriacæ Germanorum*  
 optimo jure vocari solet, quod, sicuti & ex sambucino  
 elicited rob, cum aceto assumptum est nobile; tam in  
 portionibus solet dissolvi, quàm etiam in forma Electua-  
 rii propinari. Unde quidam commendant sequens Ele-  
 ctuarium ROSENCREUZERI in *Astrologia Inferio-  
 rum* ex hoc rob, seu basi. paratum, tamquam in peste  
 præservativum & curativum remedium:

℞. *Rob. iunip.* ℥ij.  
*Elect. diascord. Frac. vel elect. de ovo.*  
*Michridat. an.* ℥ss.  
*Theriac. ℥ij. ℥ss. vel ℥vj.*  
*Flor. sulphur. opt. ℥ss. vel ℥iij.*  
*Myrrbæ* ℥ij.  
*Thuris albiss.* ℥vj.  
*Campb. ℥ij.*  
*Croci* ℥ss.  
*Succi citri* ℥ss. vel f. q.  
 pro miscendo Electuario.

In præservatione drach. ℥ss. seu quantum capit cultelli  
 cuspis; in cura verò ℥ij. vel ℥ss. propinentur in  
*Aqua card. bened.*

*Acetof. an.* ℥j.  
*Theriacal. unc.* ℥ss.

Invicem mistarum. Hauriantur unâ vice.

Rob juniperi dicto vix cedit Rob baccarum sambuci  
 rectè paratum & usurpatum. Huc facit theriaca seu Ele-  
 ctuarium tam curativum quàm præservativum LUDO-  
 VICI, quod dedit in *Colleg. Pharmacut. in Ludovici* à  
 drach. j. ad ij. propinandum, ut & Electuarium camphora-  
 rum Kegleri. Alium similiter & suam meretur laudem,  
 dum communiter *Theriacæ Russicorum* appellatur, cum  
 certum sit, confusa capita alii cum aceto vel vino assump-  
 ta sudorem potenter movere, & malignitatem per sudo-  
 rem expellere. Remedium ergò nauseabundum, sed, uti  
 dixi, insigniter proficuum.

Inter animalia imprimis eminet cervus & ciconia, ut-  
 pote quæ tota sunt alexipharmaca. Unde antidotus Pa-  
 racelli ex anguib, cujus basis est sanguis ciconiæ, adeo  
 est commendata in peste, utpote quæ vescitur ranis & si-  
 milibus animalibus, pesti curandæ dicatis. Non minus  
 ergò ciconia inter volatilia, quàm cervus inter quadru-  
 pedia, est alexipharmaca. Ex his parata omnia, in specie  
 volatilia salia, pro scopo sudorifero sunt nobilissima.

*Estmull. Oper. Tom. II.*

Spiritus corn. cerv. ritè paratus, ac sale volatili propriò  
 probè acuat, ad drach. j. exhibitus, egregius est in curan-  
 da peste. Crebrâ experientiâ in peste Londinensi confir-  
 matus refert HODGES de *Pestè* pag. 184. Juvenem  
 summa spiranda difficultas tenebat, arteriæ vibratio ces-  
 sare videbatur, omnia demum ultimum spiritum languentis  
 in labiis supremis enunciabant: Exhibus spiritus corn. cerv.  
 drach. j. cum unc. ij. aquæ scordii compositæ, morbo pericula-  
 riter hærente: Post triduum iteravi Portion. m, & admodum  
 etiam vespicatoria: semihorâ vix elapsâ calor viguit,  
 æger ab orco revocatus f. it. Tandem cum exans in facili  
 erat ulcerum, in furis à vesicantibus excitatosum, & colora-  
 tione, nec non sensus abolitione, sphacelationem immen-  
 tem minitante, partibus affectis profundè incisis & scarifica-  
 tis, hausto etiam bis de die rem. diomemorato, res iterum in  
 integro. Verùm omnibus præfertur vipera, & remedia ex  
 vipera, quæ inter eminet tal volatile à gr. x j ad ℥j. spinæ  
 viperinæ præparatæ exsiccata, oleo succini irrorata, ac  
 denique camphoræ q. s. permixta, sunt egregiæ à ℥j. ad ℥ij.  
 in peste: spiritus tamen & sal volatile à gr. x j ad ℥j. spinæ  
 viperinæ præparatæ exsiccata, oleo succini irrorata, ac  
 denique camphoræ q. s. permixta, sunt egregiæ à ℥j. ad ℥ij.  
 in peste: spiritus tamen & sal volatile, in quibus tota con-  
 sistit energia, reliquis præfertur: Hinc alex. pharmacum  
 Crollii ex anguib, paratum egregium est. Post vipers  
 egregii sunt b. fones, qui externè seu Xenechthon appen-  
 si, à peste præservant. An verò pulverisati internè as-  
 sumi queant, quæritur. Hoc quidem verum est, tal eorum  
 volatile & spiritum egregium esse remedium, insigne dia-  
 phoreticum, & probatissimum diureticum; quod etiam  
 confirmat PETRUS JOHANNES FABER. An  
 verò si specificam vim antipestilentialem habeant? dubi-  
 to. Interim exemplis potest confirmari, multos eosdem  
 internè sine periculo, exceptis intestinis, sumpsisse, alios-  
 que sal volatile & spiritum uti passè ut adeò cons. len-  
 da sit experientia. Alii recipiunt bufones vivos, quos  
 in spiritu vini submergunt, & ita s. flocant, & tunc ac-  
 quirunt spiritum vini alexipharmacum. bufones ita mace-  
 ratos per retortam destillant pro spiritu, sale volatili, &  
 oleo, qui spiritus cum sale volatili rectificatus mire lau-  
 datur ad pestem. Quibus tædiosi sunt hi labores, reci-  
 piunt bufones ab interioribus purgatos, exsiccant eos, &  
 cum hepate proprio similiter exsiccatos mistos pulveri-  
 sant, & ita à ℥ss. ad ℥j. propinat pro remedio antiloi-  
 mico; qui pulvis in peste penultima Londinensi propina-  
 tus multum profuisse refertur.

Huc facit quoque lapis microcosmicus, qui à ℥j. ad  
 ℥j. in aqua card. bened. in peste Londinensi, ubi in die  
 10000. mortui sunt, expertus fuit. Stercus humanum etiam  
 est egregium alexipharmacum. Refert POPPIUS, &  
 confirmatur à LANG O in *Comment. manuscripto*, quod  
 stercus proprium cum urina propria dissolutum & hau-  
 stum, per alvum, per vomitum, & sudorem pestem curet:  
 de quo conf. etiam RIVERIUS in *Observ. 38 communicat.*  
 à SAMUELE FOMIO. Hinc inde etiam in ZACU-  
 TO LUSITANO non pauca prostant exempla virtu-  
 tis alexipharmacæ stercoris humani contra morsum vipe-  
 rarum, & similia vulnera à bestiis venenatis infligta. In  
 India Orientali in insula Celebes, ubi admodum intoxi-  
 cantur sagittæ, quæ tam venenatæ, ut vel levissimum  
 vulnusculum sit lethale, Batavi bellum ibi perentes non  
 habent promptius remedium alexipharmacum, quàm  
 stercus proprium vulnere applicatum, quod extinguit  
 veneni vim. Mercator Norimbergensis, nomine SAAR,  
 qui per 7 annos castra lectus, in lib. *Offi. Idif. ben. Kriegs-  
 Diensten* refert, quod in India sit animalculum adeò vene-  
 nosum, ut ejus minutissima læsio præsentissimum esset  
 venenum, nisi applicaretur stercus proprium. Et cer-  
 tum est, quod stercus humanum buboni pestilentiali appli-  
 catum omne venenum eliciat, idque potentius quam  
 quodlibet cataplasma aut emplastrum a Chirurgo applica-  
 tum. Non mirum ergò est, si & stercus humanum in-  
 trinsecus assumptum, sit adeò potens in curanda peste.

Ex regno denique minerali vix potius remedium ha-  
 beretur sulphure, tam minerali, quàm, quod excellentius  
 est, antimoniali, si nempe hoc sit legitime fixatum; si-  
 ve communi modo per nitrum figatur in antimonio diapho-  
 retico, & omnibus Bezoardicis mineralibus, tam simpli-  
 cibus, quàm cum Marte & Saturno compositis, seu, quod  
 melius est, ipsum sulphur genuinum fixum tubi minori  
 ratione ex antimonio eliciatur in cinnabari antimonii,  
 aut in tinctura antimonii sicca, beneficio aquilæ albæ  
 seu salis ammoniaci elevanda; unde cinnabarim nativam  
 POTERIUS *specificum antipestilentiale* vocat.



Omnia hæc antimonialia & sulphura antimonii totam absolvunt paginam in cura pestis : & certè in sulphure perfecta cura pestis videtur latere . Sulphur nempe aut ejus flores à ℥ss. ad ℥j. in vehiculo acido propinati, sunt expectatissimum in peste remedium, & ab accuratioribus Autoribus, HIPPOCRATE & PARACELSO, extolluntur hic: Conferatur KIRCHERUS & HELMONTIUS, ubi demonstratur, & HIPPOCRATIS remedium antipestilentiale sulphur fuisse. Cæterum, quantum sulphur in recessu habeat ratione pinguedinis & spiritus embryonati acidi, ex materia Medica constat; unde non mirum est, quod tam præstans sit. In sulphure nempe est pinguedo quædam mineralis, quæ nupit arctè spiritui acido primigenio, seu, uti alij vocant, salii Hermetico. Id quod non tantum probat resolutio spagyrica, quæ in stagna acidum & singularem pinguedinem resolvitur; sed etiam ex compositione sulphuris artificialis, dum ex spiritu vitrioli & oleo terebinthinæ sublimari potest sulphur elegantissimum. Ratione pinguedinis balsamicæ corrigi sal acre pestilentiale; ratione verò aciditatis massam sanguineam nimis dissolutam temperat, & quodammodo coagulat: ut raceam, quæ habet HELMONTIUS *Tract. de arbore vitæ circa finem*. Hinc etiam vinum Hippocratis ad pestem curandam nihil aliud fuit, quam vinum commune, mistum cum sulph. depurato & sale decrepitato, in vase pice obturato aservatum; unde etiam potus quicumque in peste sunt sulphureandi ad arcendum venenum pestilentiale, sicut dixi in morbis malignis: vid. POLEMANNUS, & CNÖFELIUS de Epidem. febribus, ubi potum habet sulphure imprægnatum, quem in ultima peste Londinensis probatum repererunt. Modus hic est: Recipiebat fila sulphurea: hæc incendebat, fumum capiebat in lagenam, & huic infundeat potum, & agitando probe propinabat ægris. Aer etiam sulphure est medicandus.

Sulphuri quoque quodammodo cognatum succinum est, unde aut hoc aut præparatum, aut oleum, aut sal aliis mistum, in peste sunt egregia remedia.

De Theriacalibus compositionibus aliisque similibus Pharmaceuticis nihil dico, quoniam hinc inde circa febres malignas fuerunt monita, & omnibus sunt nota. Præferendum tamen reliquis omnibus electuarium diascordii Fracastorii, vel correctum à SYLVIO, propinatum à ℥j. ad ℥ss. vel ℥ij. in aqua appropriata, cum aceto bezoardico mista. Notè etiam sunt pulveres in officina prostantes bezoardici compositi: pulvis Saxonicus ad ℥ss. propinandus; pulvis Pannonicus rubeus ad ℥j. Imprimis ubi sunt alvi fluxus; constat enim ex adstringentibus: pulvis Cæsareus, & similiter alii.

Formulae & compositiones ex his possunt fieri variae: verb. grat.

℞. Flor. sulphuris ℥ss.

Cinnab. antimon. gr. xv.

Campb. gr. vj.

M. f. Pulvis:

D. S.

Bezoardicus Pulvis sudoriferus.

Sumatur pro dosi ad eliciendum sudorem.

℞. Unic. veri vel antim. diaphor.

Flor. sulphuris an. ℥ss.

Salis volat. viperar. ℥j.

Campb. gr. viij. ad ℥ss. gr. xij. vel xv.

M. f. Pulvis:

Div. in 2. vel 3. partes æqu.

D. S.

Pulvis sudoriferus.

℞. Flor. sulphur. ℥j.

Salis absinth. ℥ss.

(vel Salis volat. corn. cerv. gr. xij.)

Olei pestilent. Heinis. gutt. vj.

M. f. Pulvis, S. ut antè.

Item

℞. Cinnab. antimon. gr. xv.

Succini præp. ℥ss.

Sal. volat. corn. cerv. gr. v.

Succini,

Campbor. 20. gr. iij.

M. f. Pulvis.

D. S. ut suprad.

℞. Aquæ card. bened. ℥ss.

Aceti vini acerr. ℥j.

El. B. diascord. Frac. ℥ss.

Campb. gr. vj.

Syrup. acetos. citri ℥ss.

M. D. S.

Potio sudorifera pro una dosi, bene circumagitanda.

Vel

℞. Aquæ card. bened. ℥j.

EleB. diascord. Frac. ℥j. vel ℥ij.

Salis absinth. vel card. bened. gr. xv.

Campb. gr. viij.

Aceti vini ℥ss.

Syrupi de citro q. s.

M. D. S. ut antè.

℞. Aquæ card. bened. ℥ss. vel ℥ij.

Aceti theriacal. vel vini, vel succi citri, aut

acetosæ ℥vj. vel ℥j.

EleB. diascord. Fracast. ℥ss. vel ℥ij.

Campb. gr. v. ad ℥ss.

Syr. acetos. citri ℥ij. ℥ss. ℥vj. vel ℥j.

M. pro una vel 2. dosibus: S.

Potio sudorifera, bene circumagitanda.

Pertinet hæc Potio BARBETTE pag. 23. quæ in peste severissima Amstelodami sæpius usus fuit:

℞. Aquæ card. bened.

Propylac. an. ℥j.

EleB. diasc. Frac. ℥ij.

Salis prunell. ℥j.

Absinth. ℥ss.

Syr. berber. ℥j.

M. pro Hauſtu: S.

Potio sudorifera.

Item hæc Potio:

℞. Aquæ fumar. q. s.

Propylac. noſtrat. ℥j.

Antimon. diaphor. ℥j.

Salis scordii,

Rutæ an. ℥ss.

Iulepi rosac. ℥j.

M. pro dosi,

D. S. ut antè.

Item

℞. Aquæ card. bened. vel rutæ, angel. vel onulæ, vel

bacc. junip. vel tenell. corn. cerv. ℥j. ad unc. iſs.

Liqu. corn. cerv. succin. ℥ss. vel ℥j. ad ℥ss.

Campb. gr. v.

Syr. de scordio vel rubo Idæo unc. iſs.

M. pro Hauſtu: S.

Ut antè.

℞. Theriac. Androm. ℥j.

Salis absinth. ℥ss.

M. in Hauſtulo vini aciduli:

D. S. Electuarium sudoriferum pro una vice.

℞. EleB. diascord. Frac. ℥ss.

Antimon. diaph. ℥j.

Cum saccharo f. Bolus:

D. S. Ut antè.

Conferatur BARBETTE de Peste pag. 16 Item Bolus alexiterius WILLISII in Pharm. p. 329. Item

℞. Theriac. Androm. ℥j.

Bezoard. min. ℥ss.

Campb. gr. vj.

Aceti bezoard. q. s.

M. f. Bolus pro una vice, expectando sudorem.

D. S.

ut antè.

In genere moneo: in defectu medicamentorum antimonialium sulphur commune, aut ejus flores, commodè posse substitui.

℞. Tinctura bezoard. vel Mixt. simpl. drach. j.

Spiritus corn. cerv. ℥j.

M. pro una dosi:

D. S.

Mixtura sudorifera pro una dosi.

Loco Tincturæ bezoardicæ quibusdam secretus habetur spiritus pestilentialis seu antilimonius:

℞. Viridis grise bene calefacti ℥ss.

Itrota cum,

Aceti destillati ℥ij.

Destilla per retortam in arena igne intensiore:

Jam

℞. Spiritus tartari redif. part. iij.

Viri-



*Viridis aris modò prop. part. iß.*

Mistis his adde singulis uncis camphoræ 3ß. ponantur vitro bene obturato in digestionem, donec camphora uniatur liquori.

Sic cum aliqua particula opii digeratur, & filtretur, dat *Elixir antiloimicum* egregium.

Pertinet huc etiam *Elixir pestilentialia* Crollii.

## SYMPTOMATA.

**C**eterum frequentissima symptomata pestis sunt

### BUBO ET ANTHRAX.

Horum ergò medula convenientissimè hic tractatur.

In *Bubone* curando tria præ cæteris attendenda sunt scilicet: Nempe externè sunt applicanda:

1. Attractiva, seu quæ venenum eliciunt.
2. Maturativa, quæ tumorem ad suppurationem perducunt; Et tandem
3. Mundificativa & consolidativa, quæ ulcus uniant.

Ut enim sunt, qui discussioni bubonum operam dare volunt, minùs tamen consultum hoc arbitror, nisi simul copiosus sudor provocetur: siquidem & bubones iponte recurrentes, vesicatoriis extrinsecus admotis, sudoriferis verò internè propinatis, erunt denuò proliciendi. Equidem sunt, qui suadent etiam bubones crudos mox scalpello esse incidendos & aperiendos, quod tamen minùs commodum videtur; quin potius aliqualis saltem materię coctio & maturatio expectanda, plùs minùs perfecta, pro circumstantiarum ratione: quamdiu sc. apparent rubicundi, non aperiendi: quod si verò bubo sit vel lividus, vel niger, ita ut gangrænam minetur, tunc nullà expectatà maturatione protinùs etiam crudus scalpello est aperiendus.

Ea verò, quæ applicantur pro attrahendo veneno, & maturando simul plùs minus tumore, sunt varia. Quidam recipiunt *cepas* sub cineribus *coltas*, easque contusas, & cum *sinapi albo* pulverisato mistas, applicant bubonibus, ceu potens attractivum. Loco *sinapi* etiam, ubi præsertim dolor intensius urget, *Theriaca* & *fuligo furni* dicto modo cum *cepis* vel succo *ceparum* insit attractivi remedi per aliquot dies applicetur bubonibus pro eductione veneni, & maturatione abscessus. FORESTUS lib. 6. Obs. 19. refert, fuisse experimentum cujusdam Chirurgi:

*R. Cepam cavam*, immitte *Theriacam*, & applica. *Bubones* certo tempore capti & exsiccati, in vino aut aqua tepida macerati, usque dum probè mollescant, buboni calidè impositi dolorem sistunt, & ardori resistunt, & potenter malignitatem temperant; vel pulvis *bubonis* cum emplastro permisceatur, & ita applicetur buboni pestilentiali. Faciunt huc omnia Emplastra cum & ex bubone parata, quæ in principio, cum bubo apparere incipit, optimè conducunt. Tale Emplastrum expertum vid. in *Hildani Cens. 6. Obs. 30.* Vel solus pulvis *bubonis exsiccati* cum aqua *scorpionum*, ac cum aqua rutæ *caprarie* in forma cataplasmati imponitur, & insigniter conducit. Egregium remedium est *Stercus proprium* adhibitum. Pertinet huc Emplastrum attractivum magneticum *Cnæfeli*, bubonibus aut tumoribus malignis in peste applicandum:

*R. Succini opt. pulveris. 3ß.*

*Bubon. sicc. 1ß. pulveris. 3ß.*

Mistis in cucurbita tantum spiritus vini supersundatur, ut supereminet digitum transversum, in leni balnei calore sensim exhalet spiritus ad consistentiam magmaticis, ter affuso semper novo spiritu: tandem magna reliqua cum emplastro de meliloto in debitam consistentiam redigatur & applicetur.

Quod vid. in *Methodo medendi febres epidemicas malignas* pag. 60. 61. &c. item pag. 104: elegans est emplastrum, & quod plus in recessu habet, quod scilicet nimiam hæmorrhagiam in morbis malignis interdum evententem, sub alis applicatum, sistit; nam bubo exsiccat sub axillis gestatus quancunque hæmorrhagiam sistit. Methodus CNOEFFELII curandi bubones est hæc: mox applicat buboni emplastrum attractivum magneticum, & propinat *Bezoardica*. Sin loco euphorias speratæ, vigilæ, deliria, vomitus, &c. successerint, tunc eligit centrum aliquod in extracto abscessu, & in illo cutim specifico ruptorio, facta

*Estmull. Oper. Tom. II.*

prùs eschara, aperit. Ubi, inquit, sedulà observatione hoc impetrari, quotiescunque ruptorium eschara non infecuta, toties morbum fuisse desperatum: ubi verò produxit escharam, vigilias, deliria, aphonias, & similia symptomata, subitò cessasse.

Ceterum reliquis ferè emplastris magneticum arsenicale *Angeli Salæ* præfertur, ex magnete arsenicali paratum, in quo magnete arsenicali plurima singularia latent arcana abscondita. Legitimus usus hujus emplastri in eo consistit, ut, quod rarius, nudum per se applicetur. Dum ergò erumpere incipit bubo, applicandum vesicatorium, & promovenda eruptio: post septimam vel octavam horam facta vesica seu eschara aut pustula est aperienda: Hinc admovendum est Emplastrum magneticum istud arsenicale, quod omnibus palmam præfert. Compositio est hæc:

*R. Antimonii crudi,*

*Sulphuris flavi,*

*Arsen. alb. an. 3ij.*

Subtilissimè pulverisata sepiantur in phiola in arena, & subministratur ignis, donec bene invicem colliquescant, & colorem rubeum seu obscurum inducant (sic enim egregiè corrigitur arsenicum): vase refrigerato exime massam, quæ magnes arsenicalis vocatur. Jam

*R. Gum. serapim.*

*Ammon.*

*Galbani,*

*Magnet. arsen. an. 3ij.*

*Terebinth. Laric.*

*Cera an. 3ß.*

*Olei destill. succin. 3ij.*

*Terra vitriol. aulc. 3j.*

Misceantur ita: Gummata dissolvantur in aceto, & per pannum lineum trajecta iterum inspissentur: deinde seorsim colliquata cera & terebinthina extra ignem misceatur ad consistentiam debitam unguenti: hinc superadantur gummata & magnes arsenicalis, cum terra vitriol dulci, & oleo succini, & sic paratum est emplastrum ad extrahenda omnis generis venena efficacissimum: Vid. *Scripta Chymica ANGELI SALÆ, Praxis Chymicæ HARTMANNI, & in specie BARBETTE descriptione Pestis, ubi de Bubonibus.*

Loco hujus Emplastri Magnetici arsenicalis, B. D. MICHAELIS noster in Peste pro curandis Bubonibus & Carbunculis pestilentialibus ante annos 50. sequens Emplastrum magneticum usurpavit: Nempe

*R. Empl. diachyl. cu. r. gum. 3jv.*

*Pulv. fol. uvæ invers. seu Parid. 3j.*

*Magnet. arsenic. 3ß.*

Cum Oleo *scorpionum* & *aran. Mindereri* f. Emplastrum, quod, uti dicit, est expertissimum in hoc casu.

Hæc ipsa Emplastra magnetica, bubonibus admota in pueris, item in cute tenuiore & textura rariore, optime sufficiunt, & malignitatem extrahunt, ut eadem sub forma crutæ & escharæ, in qua residet malignitas, super bubonem hæreat: hac apparente, auferatur vel sponte, vel blando emolliente, ac si subsederit, Maturativis ac consolidantibus ei succurratur: si non, de novo adaptetur. De Emplastro magnetico *Angeli Salæ* refert BARBETTE, quod, si applicetur cuti duriori ac spissæ, aut buboni duriori, & profundius latenti, aut non satis prominenti, adeoque difficulter tractabili, nullam faciat crustam, & nihilominus tamen malignitatem potenter extrahat; ita ut intra 4. vel quinque dies tumor dispareat. Sed quoniam hoc non semper fiat adeò citò, propterea tutius illi agunt, qui suasu HODGES & DIEMERBROCH priùs vesicatorium parti bubonis inferiori, vel ipsi buboni juxta KEGLERUM & BARBETTE applicant, quòd promoveat & aditum faciat, ita, ut facta eschara & scissa, postmodum emplastrum magneticum eò melius queat operari: qualia vesicatoria pro bubonibus aperiendis videb. in *Append. pag. 32. & HORSTII Observationibus pagina 356.* Convenit quoque sequens:

*R. Ferm. acerr. 3ß.*

*Cantharid. 3ß.*

*Sem. sinapi,*

*Staphisagr.*

*Rad. pyrethri,*

*Euphorb. an. 3ß.*

*Aceto vini fortiss. q. l.*



M. f. Pasta vesicatoria: S.

*Emplastrum vesicatorium.*

Vesica post 7.8. vel 10. horas facta aperienda, eisque vel primis horis folium brassicæ rubræ aut betæ, butyro veteri aut oleo raparum inunctum, postmodum emplastrum & cataplasma attrahens atque emolliens applicandum: c. g.

℞. *Empl. diachyl. cum gummo.*

*Compof. an. ℥ss.*

*Unguenti basil. ℥iv.*

*Sym. sinap. cond. ℥iij.*

Mista sub forma Emplastri imponantur vesicæ apertæ; hoc enim maturat promptè, & suppurat tumorem.

Longè autem melius est dictum emplastrum magneticum, super quod cataplasma emolliens applicandum, donec malignitas sufficienter extracta, & crusta remota fuerit.

In hac crusta, quam emplastrum excitar, hæret imprimis venenum, & ob id insigniter densa ac pissa est; unde etiam longè facilius removeretur prægressa necessaria scarificatione. Ungitur locus unguento basiliconis cum theiaca misto, quod super crustam admovetur: nam hoc eam decidere facit. Quod si crusta primâ factâ tumor non sufficienter imminutus appareat, denuò est applicandum emplastrum magneticum, & nova crusta est elicienda, donec sufficienter disparuerit bubo. Quod si fiat, ut bubo aut nimis altè promineat, aut rectè super tendine consistat, tunc vesicatorium est nimis debile; cauterium verò actuale est periculosum propter tendinem. In tali casu admovendum est ruptorium seu cauterium potentiale, quod fit ex calcis vivæ drach. j. & saponis Hispanici q. s. quæ mista dant emplastrum, quod applicatum, foraminulum exedit.

Alii præmissio vel omisso vesicatorio:

℞. *Herb. Parid. Mij. vel iij.*

*Rad. lil. alb.*

*Alib. an. ℥ij.*

*Ficuum pingu. vo. ij. vel iij.*

Coqu. cum f. q. *Aquæ & olei lil. alb.* ad consistent. cataplasmatiss: Pulpæ trajectæ adde

*Theriac. Androm. ℥li.*

*Bufo. pulveris. ℥iij.*

*Ful g. splendent. ℥j.*

*Sapon. Venet. ℥iij. ad 3vj.*

*Olei raur. ℥ij.*

M. f. Cataplasma.

D. S.

*Cataplasma extrahens.*

℞. *Herb. Parid.*

*Flor. chamom.*

*Malva.*

*Meliloti an. Mj.*

*Rad. alib.*

*Lil. alb.*

*Sem. fenugr.*

*Lini an ℥j.*

*AlkeKengi ℥iij.*

Coqu. in f. q. *Aquæ simpl.* ad putrilaginem ad consistentiam cataplasmatiss: cui adde

*Olei bufo.*

*Scorpiu. an. ℥iij.*

M. D. S.

*Epithema externè applicandum.*

℞. *Fol. Nicot. M. j.*

*Herb. Parid. M. ij.*

*Rad. a. gel. ℥j.*

Coqu. in f. q. *Aquæ simpl.* Pulpæ trajectæ addo

*Cepar. sub. ciner. coct. ℥ij.*

*Fulig. splend. ℥j.*

*Theriac. ℥iij.*

M. f. Cataplasma:

D. S. ut antè.

Herbæ Paridis folia vel sola, vel cum fuligine in formam cataplasmatiss impastata, suppurare & maturare bubones dicuntur: vid. SCHROEDERUS lib. 4. pag. 119. Item Decoctum herbæ Paridis. Alii fermentum recipiunt, ex quo cum *scrophularia*, additis & bacis herbæ Paridis, Cataplasma faciunt, & ita imponunt ad maturandos bubones & extrahendum venenum. Item radix symphyti majoris sub prunis cocta, & cum Mithridatio ac butyro in modum cataplasmatiss imposita, bubonem

coquit, maturat, & aperit. Aliàs etiam cataplasma ex scabiosa confusa cum fermento acri & sanone Veneto applicatum, tumorem maturat: Vel fiat Emplastrum, seu Cataplasma ex foliis sambuci confusis, cum pulvere sinapi confuso subactis, quod applicatum maturat & promptè rupit abscessum seu bubonem. Emplastrum diachylon cum gummis, cum æquali parte Theriacæ Venetæ videb. in HORSTIO pag. 354. *Observ. 356.* Emplastrum de busonibus Hildani, quod Diemerbrocius lib. 3. c. 12. §. 17. describit. Quibus, si dolor valde urgeat, cataplasma, quale BARBETTE pag. 32. describit, substitui potest:

℞. *Folior. scord.*

*Ruta.*

*Cicutar. an. Mj.*

*Flor. chamom.*

*Anethi, an. p. j.*

*Summit. absinth. p. ij.*

*Micæ panis simil. ℥ij.*

Coqu. ex lacte vaccino ad consistent. cataplasma.

adde

*Croci opt. ℥ss.*

*Vitell. ovi no. ij.*

*Theriac. ℥iij.*

M. f. Cataplasma.

Hæc remediis nonnihil mitigatus bubo aperiendus venit; quia periculum est, si perfecta suppuratio expectetur, & spontè tumor rumpat, ne propter dolorem ac ardorem, subinde atroces, spiritus dissipentur, vires prostrantur, ac sanies pestilens retrorsum regurgitet; unde vel scalpello aperiendus est, vel cauterio potenciali applicato exitus materiæ patefaciendus. Vitanda autem sunt vesicatoria, quando bubones ad suppurationem vergunt, & talium loco sequens emplastrum ab HODGES expectum applicari potest:

℞. *Empl. oxycroc. ℥iij.*

*Gulbani colat.*

*Gum. carann. an. ℥j.*

*Picis naval. ℥ij.*

Liquatis simul cum oleo chamom. vel lil. alb. f. Massa pro Emplastro, quod plus millies Chirurgicæ manus vicem supplevit.

Apertio tamen bubonum artificialis auspiciatior ipsi habetur. Aperto bubone, vel sponte vel scalpello, usurantur mundificantia, & hinc consolidantia. In mundificatione maxime eminet infusum ex radice aristæ, lochie rotundæ, scordio, myrrha, aloë & croco, cum spiritu vini tartarizato factum; vel Balsamus Peruvianus, Balsamus sulphuris anisatus vel terebinthinatus mistus cum unguento basilico & Theriaca, & cum lana carpta immittantur in ulcus apertum, imponendo desuper emplastrum de minio, emplastrum album coctum, emplastrum diapompholygos cum oleo Nicotianæ, donec ita mundificetur, & successivè consolidetur ulcus, observando, ne consolidatio adeò citò promoveatur. Sed ulcus, quamdiu possibile, apertum servetur, ut ita omnis fomes & gas pestiferum commodè eliciatur, ac removeatur: postmodum cum emplastro diasulphuris Rulandi consolidetur.

De cetero probè attendendum, ne acetum buboni applicetur, teste HILDANO in suis *Observ.* Sic pariter nec Opiata propter dolorem, nec Saturnina propter ardorem, applicanda veniunt, ne venenum pestilentialiale interiora repetere cogatur, vel talium abusu sphacelus parti introducatur. Quod si bubones *edematosi* aut *rebelles* fuerint, quomodo tractari debeant, vid. in HORSTIO *Observ. pag. 350. & 351.* Nec Mercurius unguentis aut emplastris contra bubones addendus est, ut rectè monet BARBETTE. Exinde enim mortem observavit SCHENCKIUS in suis *Observ.*

Quoad curationem bubonum, imitari licet Barbette: caveamus nobis saltem, ne mox, uti ipse, ad vesicatoria properemus, cum hæc non adhibenda sint, nisi bubo vel fuerit profundus, vel cutis dura, vel tumor durus. Interim post vesicatoria, Theriacalia in usum vocanda jubet HELMONTIUS.

Internè danda sunt diaphoretica, imprimis sulphura antimonialia, ut in cura *pestis generalis* jam monui. Post sudorem Julepi moderatè aciduli, propinandi cum in finem, ut malignum fermentum acro his ipsis corrigatur, & emendetur, simul tamen corpus, quantum fieri potest, in diaphoretu blandà conservetur & retineatur.



## II. PAROTIDES.

*Parotides eodem modo tractanda sunt ac bubones.*

## III. CARBUNCULI.

Quoad carbunculos & anthraces: cognoscuntur facile, si cum colore purpureo & puniceo emergant, & circum circa circulus rubicundus, quasi inflammationis, qui melior; aut lividus & ater, qui deterior, se representat. Carbunculus talis facile serpit, & gangræna instar vicinas partes inficit, donec eandem pars mortificata excidat. Interdum saltem pustula quædam plûs minûs alba apparet, nam riam quasi costam continens, quæ aperta aut compressa non tantummodò, sed etiam dura & sicca, ac profunda in partibus subcutaneis carnosis radiata apparet. Interdum pustula plures quasi hydatides emergunt, sub quibus durities inflammatoria apparet. Bubonis & carbunculi seu anthracis differentia vid. in SENNER-TO de peste.

Carbunculus talis quicumque nihil aliud est, quàm incipiens partis mortificatio. Unde in Cura

1. Mortificationis vicinas partes insipientis progressus inhibendus.
2. Substantia mortificata separanda.
3. Ulcus relictum mundificandum & consolidandum.

Notandum autem in genere: quod, dum in carbunculo ardor summus est, abstinendum sit in Topicis ab oleis & pinguibus, quia quandoque sphacelismi periculum inducunt, ac proinde anthracibus non secus ac bubonibus applicandus est bufo exsiccat, aut in vino maceratus. Quidam expiscantur, utrum lethalis vel curabilis sit carbunculus? emplastrum ex molli galbano imponunt: Quod si tenacissime anthraci adhæreat, ita, ut non, nisi cum crusta avelli queat, salutis spem esse asserunt; sin verò non adhæreat, incurabilem plerumque atque lethalem esse. Item Emplastrum ex Theriaca Andromachi imponi suadent carbunculis: Quod si theriaca citò arefcat & aduratur, ipsa verò carbunculi constitutio nihil immutetur à theriaca, lethale esse signum portendunt. Verùm hoc in posteriori simus cauti (quoad galbanum res est sine periculo;) quoniam observatum fuit in peste Mantuana, quæ anno 1549. superiori seculo grassata fuit, quod Theriaca carbunculo imposita attulerit mortem; salutem verò, ubi bubonibus fuit applicata: uti refert RHODIUS in *Analeptis* p. 119.

Pro primo igitur scopo sapphiro in cute ducatur tam diu circulus circa carbunculum, donec locus fiat lividus. Præcaveat enim non tantummodò, ut ulterius non serpet carbunculus, sed paulò post aperitur & excidit, & præterea etiam vis veneni tota extinguitur: uti hoc non tantum affirmat HARTMANNUS in *Praxi Chymiatr.* ubi de Peste, & HELMONTIUS *Tractatu de Magnet. Vulnerum Curatione*; sed vid. etiam MARCUS MARCI in *Philos. Veter. Restituta Scd. 5. cap. de Magnetismo Sapphiri*. (Obiter noto, quod Sapphirus si pultus sub terra novus & fortiores acquirat vires.) Hinc apex carbunculi illinatur seu tingatur butyro antimonii quantitate nummi: tunc, ubi eschara apparuerit, applicetur raptorium ex oleo lini & chamomilla cum croco HARTMANNI, ubi de Peste §. 15, vel loco talium butyro antimonii extremitates anthracum attingantur, si circumducatur circulus: hoc enim ob acidum, concentratum non solum progressum ulterioris mortificationis inhibet, & in gangræna partem mortuam à viva secernit; sed etiam totum carbunculum excidere facit. Talibus factis, vel mitiori in malo sine his, applicandum est emplastrum magneticum arsenicale Angel Salæ, utpote quo non datur melius, & facit, ut subito exeat carbunculus; vel ad suppurandum & aperiendum carbunculum emplastrum de fuligine, cujus descriptionem videb. in HORSTIO *Observ.* pag. 349. & 356. Alii non ineptè mox applicant cauterium actuale, utpote in parte plûs minûs mortificata minûs dolorosum, quod tanquam omnium efficacissimum à BARBETTE & HODGES prædicatur, ubi simul applicandi rationem posterior pa. 215. tradidit. Hoc facto, escharam raptorio, vel in corpore tenello, solo emplastro magnetico arsenicali, successivè separant. Pinguia & oleosa, antequam escharæ secretionem moliat, natura, maxime vitanda. His factis, ubi promptè exciderit carbunculus, &

*Estmull. Oper. Tom. II.*

factum sit foramen, pergatur cum emplastro magnetico arsenicali.

Ut suppuretur eò melius crusta, SENNERTUS, DIEMERBROCIUS, BARBETTE & HODGES cataplasma atrahentia atque emollientia describunt ex allio, scordio, uva inversa, althæa, farina lentium, simo columbino, sapone nigro, melle, &c. si dolor valde urgeat, emplastrum de cynoglossa, aut de pomis granatorum laudatur. Postmodum etiam herbæ Paridis bacce vel uvæ ad maturandum carbunculum, & ad mitigandum dolorem laudantur. Sunt, qui insigniter commendant cataplasma Barbette suprâ descriptum. Ubi substantia suppurata probèeducta fuerit, unguentum b. filicum cum emplastro tetrapharmaco & iberiaca ulurpandum (vitanda vesicatoria); balsamo verò sulphuris terebinthinato aut anisato, item oleo tartari sordido, ulcus probè est mundificandum & abstergendum, atque convenienter emplastro consolidandum. Ad abiolvendam consolidationem, ne remaneat ulcus sordidum, insigniter laudatur cataplasma ex radice lymphiti majoris, confusa intra duos lapides, & repetitum applicetur; hoc enim intra paucos dies carbunculum consolidare & curare perhibent. De ulteriori carbunculi curatione vid. DIEMERBROCIUS & BARBETTE.

## IV. ÆSTUS.

Ea, quæ æstum in genere mitigant, sunt in specie nitrata, v. g. pro usu interno nitrum antimoniatum in potu ordinario dissolutum, drach. j. ad mens. ss.; aut etiam

R. Nitri antimonati ℥j.

Antimon. diaph. ℥j.

M. pro 2. dosibus.

D. S.

Pulvis refrigerans & confortans.

Item evcanum duplicatum, Spiritus nitri dulcis, &c. convenient.

Externè dissolvatur nitram in succo sempervivi majoris, & aceto rosæ, quibus intingantur lintea, & applicentur pulsibus, item fronti & temporibus. Sed observandum: non semper opus esse refrænare calorem, nisi ubi modum nimis exceßerit: Deinde in febribus cum excretionem cutanea conjunctis calor haud faciliè sufflaminandus venit, ne motus excretorius impediatur.

## V. CEPHALALGIE, VIGILIE, ET DELIRIA.

In cephalalgia notandum: sæpiùs dolorem capitis febrium continuarum, imprimis benignarum, esse saltim per consensum stomachi, vel primarum viarum, saltem in principio. Cujus ratio exinde desumitur, quod vomitorio in principio morbi dato, ut præcaveantur omnia serè præcordiorum symptomata, ita speciatim cephalalgia, quàm intensa etiam antè fuerit, remittat: Quin & quod clysmata injecta in febrium cephalalgis subindè eandem notabiliter levant. Sunt tamen & febres, præsertim malignæ, quæ genus nervosum, adeoque & caput, primariò affligunt: hinc æstu corporis utique moderato caput, præsertim circa frontem, intense ardet, agrypnia adiunt plus minus, interdum planè non dolet. Febres hæc sunt pessimæ nocte, quibus correpti rarè evadunt; nempe spina maligna capiti & nervoso generi infixæ est, unde illa symptomata. Quoad vigilias: hæc pertinaces in febribus, vel hypochondria ac præcordia malè affecta sequuntur; & tunc inquieti & plûs minus jactabundi solent esse ægri: vel capitis seu cerebri malè habentis sunt pedissequæ; & tunc intensior incalescentia circa frontem, oculi fulgidi, capitis plus minus perturbatio; item subindè dolor per essentiam adesse solet, ægri minûs inquieti sunt. Hæc ipsa symptomata diutius si durent, & gravis affligant, delirium post se trahunt, cujus comes sunt convulsiones.

Dolor igitur capitis si in principio est, adeoque non portendit judicationem vel crisin, curandus venit. Sin verò febris sit admodum intensa, adfuitque salutis signa, superverit verò capitis dolor, cum ipsa prope judicationem venerit, nil oportet tentare, quia interdum talis cephalalgia solet esse signum decretorium, vomitum vel hæmorrhagiam præsagens. Par ratio est quoad vigilias, in quibus criseos tempore, vel præsentis, vel instantis, anodyna aut plûs minûs somnifera minûs tutè appli-



carposiunt. Internè verò mala hæc in genere curat papaver, & quælibet ex eo parata opiata. Externè verò in febribus in usu est unguentum alabastrinum, cum oleo papaveris expresso, temporibus subindè illitum; item emulsio ex nucleis perficorum, v.g. drach. iij. & sem. papav. albi drach. j. cum aqua florum sambuci aut verbenæ aut solani parata, ac fronti tepidè applicata; nunc cum, nunc sine camphora: Camphorata enim semper non conveniunt.

Pariter & cataplasmata ex foliis ruta, radice raphani & sale communi, cum fermento susceptis, & plantis pedum applicata. Denique nitrum in aqua appropriata quavis dissolutum, cum linteis multiplicatis fronti ac temporibus applicatum convenit. *Observandum tamen hic:* dolorem in parte capitis anteriore à febre oriri; in parte verò posteriori à proprio capitis affectu: Confer. PRIMEROSIUS de Febribus pag. 321. Deinde quoad Epithemata humida: hæc minùs conveniunt, quando nempe corpus est in continuo madore. Talia enim dum frigida applicantur, striduram pororum capitis, adeoque & per consensum universæ cutis diaphoreses impedimentum, inferunt.

Hæc ipsa verò & vigiliis medentur. Præterea tamen & medulla crurum vituli recens, temporibus crebriùs illita, vespertino tempore, somni beneficium adfert. Emulsionem ex seminibus 4. frigidis majoribus, papav. errat. &c. ut interno usu, temperando sanguinis æstum, & acrimoniam fermenti febrilis, vigilias subindè compefcunt, ita & externè epithematis formâ applicatæ non inutiles sunt. Internè

R. Essent. castor. drach. ij.

Opi drach. ss.

M. S.

Essentia ad quietem inducens.

R. Aquæ fior. papav. errat. ʒij.

Corn. cerv. sine igne,

Antimon. diaph. an. ʒj.

Laud. op. gr. j. vel ij. vel ess. opii gutt. xij. ad xv.

Syr. corall. drach. vj.

M. pro 1. vel 2. dosibus:

D. S.

Potio ad quietem.

**BARBETTE** de Pesse scribit: Opi, licet sudoriferum sit, isto pestis tempore se valdè parum fuisse usum, quod somnus primis duabus vel tribus diebus non adeo confertur. Quando verò patientes 6. vel 7. diebus continuò insequenibus nullum somnum capere possunt, & virium defectus inde sequitur, hæc ratione, quod sequitur, præscriptum & assumptum egregiè contulit:

R. Aquæ prophylact. Barb. ʒijss.

Borrag. ʒj.

Cinnam. drach. iij.

Conf. de hyacintho drach. j.

Sacch. perlat. dra. h. iij.

Laud. op. gr. iij.

Misc.

Exhibuit cochleatim singulo horæ quadrante, donec somnus redeat, hinc æger somnum benè naturalem, & in somno ipso dolorem sat tolerabilem, capiet. Idem tamè Autor temerariè opi usum dissuadet, nec impuro vètriculo ægri quæ nimis debilibus dandum esse monet; quod plus nocuum quàm emolumentum in his ab eo sit expectandum. E contra neminem meticulosum nimis esse jubet; neque usum se ignorare prodeat. Præterea quàm ad laudanum opiatum deueniat, capitis dolorem sequenti more sedare studet **BARBETTE**: Hederam terrestrem contusam capiti, plantis pedum, ut & volis manuum hoc vel simile admoveat jubet:

R. Fol. ruta M. jss.

Ferment. acris ʒij.

Fini columb. ʒj.

Sal. s. comm. ʒss.

Acet. sambuc. q. s.

M. f. Cataplasma, plantis pedum & volis manuum applicandum.

R. Bol. Arm.

Terra sigill.

Creta albæ an. ʒss.

Aceti calendul. q. s.

Misc.

Usurpavit eod. modo.

## VI. SOMNUS NIMIUS.

Interdum profundior somnus ægros febricitantes quasi stupidos reddit, quo in casu vitanda Theriaca, mithridatium, & electuarium diascordii, ac similia, cum hæc ipsa opium contineant; potius somno nimio resistunt acetum rutaceum, sambucinum, &c. mixtura simplex, castoreum & castoreata: e.g.

R. Essent. card. bened.

Castor. an. drach. jss.

M. S.

Essentia sudorifera. 40. ad 30. gutt. in aceto rutaceo.

R. Ligu. corn. cerv. succin. drach. jss.

Essent. card. bened.

Castor. an. drach. j.

M. S.

Mixtura sudorifera: 30 gutt. in vino Rhenano ter in die.

R. Decoct. corn. cerv. cum rad. scorz. ʒss.

Aquæ prophylact. Sylv. drach. x.

Mixt. simpl. drach. iij.

Essent. castor. drach. ij.

Corn. cerv. sine igne drach. jss.

Antimon. diaphor.

Flor. sulphuris an. drach. ss.

Bezoard. Iovial ʒj.

M. S.

Bezoardica Potio confortativa: singulis horis

2. ad 3. cochlearia.

Externè vesicatoria cervici, item carp. aut malleolis applicata, sunt optima. Conf. HORSTIUS in Observ. pag. 383. in Praxi p. 26. Naribus applicatur acetum rutaceum, sambucinum, vel etiam succus rutæ aceto mistus; item castoreum aceto intinctum, &c.

Vel

R. Thuris,

Bacc. lauri,

Piper. nigr. an. ʒss.

Subigantur probè cum albumine ovor. imponatur fronti q. s. & somnolentiam arcebit.

D. S.

Externum epithema.

## VII. NARIUM HÆMORRHAGIA.

Hæmorrhagiarum varietas est, pro varietate febrium. Circa hanc notandum est: an hæmorrhagia sit critica? an verò symptomatica? Critica interpestivè suppressa quæ mala intulerit? & quomodo ipsa correctæ sit? videb. apud HEINRICUM ab HEER in Obs. pag. 70. Hæmorrhagia talis febrium sistitur, vel sanguinis fluxum prohibendo, vel locum apertum ocludendo: illud priùs, hoc posterius: Illud imprimis revellentia aut derivantia, aut internè Refrigerantia præstant. Quod si sedata fuerit hæmorrhagia, placet consilium SYDENHAMII in Methodo medendi febres pag. 61., laxationem alvi esse instituendam, si nempe alia non impediant. Inter interna excellit laudanum opiat. & omnia papaverina etiam, & præsertim in malignis, præmissis præmittendis: vid. TIMÆUS in Cas. pag. 378. HORSTIUS Observ. lib. 1. Obs. 27. Hinc & aqua papaveris erratici cum syrupo de portulaca & papavere; hinc & succi aciduli, cydoniorum, ribium, syrupus portulacæ, aut plantag. ac deniq; teriæ sigillatæ, lapis hæmatites, corallia, Bezoardicum Martiale, aut antimonium diaphoreticum Martiale, &c. Inter externa autem imprimis confert acetum, si hoc ipso abluantur manus ac pedes: vel epithemata ex aceto collo applicantur; vel creta cum aceto in forma cataplasmatum temporibus ac fronti; aut ex argilla & bolo communi cum aceto subactis, in forma cataplasmatum fronti ac nuchæ applicantur. Bubo vel vivus sub alis applicatus, vel excisus simili ratione sub axillis detentus, vel pugno compressus, ut probè incalcescat, potenter hæmorrhagias sistit. Denique nitrum ad drach. jss. in aqua frigida dissolutum ac propinatum hæmorrhagias sistit: Conf. RIVERRIUS Cent. 1. Obs. 48. Quod facit Iulius Primerosii, quo sæpe usus fuit ad compescendam hæmorrhagiam, aliis irritis:

R. Aquæ symphyt.

Plantag. an. ʒiv.

Syr. de ros. hcc.

Plantag.

Cydon. an. ʒss.



*Aceti vini albi ℥ij.*  
*Nitri antimoniaci aut depurati ℥j.*  
*Spiritus vitrioli gutt. x.*  
Misc.

**BARBETTE** *Obs. Hist. 2. in quadam peste, & in super hæmorrhagiâ dies 7 vel 8 laborante, ad sanguinem incrassandum, & sic cohibendum, ordinavit sequens, de quo sæpius cochlearia duo haurire iussit:*

*R. Aqua rosar.*  
*Plantag. an. ℥iv.*  
*Cinnam. ℥vj.*  
*Sangu. dracon.*  
*Corall. rub. præp. an. ℥j.*  
*Conf. de hyacinth. ℥j.*  
*Spiritus salis gutt. viij.*  
*Syr. berber. ℥ij.*  
Misc.

Ex huius usu hæmorrhagia fuit sedata, sanitas & mens redierunt.

### VIII. SITIS.

*Sitis, molestum perquam symptoma, sedatur convenientissimè per nitrata, & per acidula. Nitrata inter excellit nitrum antimoniatum in quovis potu dissolutum: quod etiam facit serum lactis depuratum, imprimis succo citri acidulatum. Acidula inter, tam vegetabilia quàm mineralia, excellit julepus ex Aqua communi, acidulata cum spiritu salis & syrupo citri, additur gelatina cornu cervi sudorem simul movens: Vid. RIVIERIUS Cent. 1. Obs. 29. Cent. 4. Obs. 83. PIENS de febribus Part. 2. cap. 29. Ex vegetabilibus acilibus vulgò notis, tamarindorum pulpa aut Decoctum conveniens est, ubi alvus simul aperienda venit; item Julepi citrati blandè acidi, &c.*

*R. Decocti citri cum corn. cerv. & rad. scorpi. ℥ij.*  
*Syr. ribium,*  
*Berb. an. ℥ij.*  
*Succi citri q. s.*  
M. f. Julepus: S.  
*Julepus refrigerans confortativus pro siti.*  
*Hule & similibus Gelatina corn. cerv. add. potest.*

### IX. CARDIALGIA ET VOMITUS.

Sal absinthii valdè prodest in vomitu & nausea febrili: Confer. RIVIERIUS Cent. 1. Obs. 47. Item conserva menthae, Extractum tormentillæ, &c. sunt egregium.

Vel  
*R. Conf. menth. vitriolat.*  
*Pulp. citri an. ℥ij.*  
*Cond. cort. citri,*  
*Elect. diascord. Frac. an. ℥vj.*  
*Conf. alchem. ℥ij.*  
*Salis absinth. ℥j.*

Cum succo cydon. vel citri f. Electuarium:  
D. S.

Electuarium Stomachicum ad quantitatem castaneæ pro una dosi.

Præscribi potest in nausea, fastidio cibi, & singultu. Item

*R. Mixt. simpl. ℥ij.*  
*Spiritus nitri dulc. camph. ℥ij.*  
M. S.

*Spiritus Stomachalis.*

De quo sæpius gutta 20. 30. ad 40. in vino sunt exhibendæ.

Conferantur etiam remedia **BARBETTE** usitata in Descript. Pestis in vomitu febrium pestilentialium: Nempe

*R. Aqua menth.*  
*Propyl. Barb. an. ℥ij.*  
*Cinnam. ℥ij.*  
*Conf. de hyacinth. ℥j.*  
*Salis corall. ℥j.*  
*Syr. martin. ℥ij.*  
M. f. Potio.

De quâ omni dimidiâ horâ cochleari, recipere jubet pro ordinario potu: ex cujus usu vomitus plerumq; sedatur, si non ex carbunculis stomachi & intestinorum oriatur: simulque regio ventriculi ter vel quater quotidie oleo sequenti inungatur:

*Estimul. Oper. Tom. II.*

*R. Olei nucis. express. ℥ij.*  
*Muc. de fillar. ℥ij.*  
*Absinth. ℥j.*  
Misc.

Interdum parvus potus conceditur; sedato verò vomitu mox sudoriferum exhibeatur. Egregium quoque est Emplastrum de caranna, aut quod **BARBETTE** in *Prax. lib. 4. c. p. 2.* commendat; item extacamahaca & Balsamo Peruviano cum theriaca malaxata; vel iacculus Stomachalis interpassatus ex mentha crispa, absinthio, rore marino, & rosis rubris; vel ex fermento cum bacis juniperi, caryophyllis, nuce moschata, mace, & aceto rosaceo cataplasma paratum calidè applicandum.

Præsentanei serè effectus est Epithema illud ex Spiritu vini rectificato, Aqua apocyni, leſtica, theriaca & camphora, quod vid. in *Colleg. Formul. Class. 3. §. 7.*

### DIARRHOEA, ET TORMINA ABDOMINIS.

*Alvi fluxus, uti & Tormina abdominis, curat in specie electuarium diascordii Fracastorii à ℥j. ad ℥ij. propinatum: veb. grat.*

*R. Aqua plantag. ℥j.*  
*Acetisum. uc drach. ij.*  
*Elect. diascord. Frac. drach. j.*  
*Extr. torment. gr. ij.*  
*Syr. plantag. drach. ij.*  
M. pro 1. dosi: S.  
*Potio adstringens pro una dosi.*  
Vel

*R. Aqua plantag. ℥ij. vel ℥ij.*  
*Cinnam. drach. ℥ij.*  
*Elect. diasc. Frac. drach. ij.*  
*Cornu cervi sine igne ℥ij.*  
*Antimon. diaphor. gr. xv.*  
*Spiritus salis dulc. drach. j.*  
*Syr. portulac. ℥ij.* M. D. S.  
*Adstringens Potio confortativa cochlearim.*  
*Capiatur pro lubitu.*  
*R. Essent. menth. drach. ij.*  
*Quinta essentia cinn. drach. j.*  
*Essent. opii drach. ss.*  
M. D. S.  
*Essentia adstringens.*

Propinatur in vino dosi guttular. 50.

*R. Corn. cerv. usi præp.*  
*Extr. tormentill. ana ℥j.*  
*Antimon. diaph. gr. xv.*  
*Camph. gr. vj.*  
Misc. pro pulvere:  
Div. in 2. part. æqu.  
D. S.

*Adstringens pulvis sudoriferus:*

Item Essentia theriacalis ad gutt. 30. vel 40.; Item Extractum theriacale ad gr. ij. vel jv., aliaque similia: Anodyna autem & opiata sunt optima, quibus adduntur & absorbentia, nempe cornu cerviustum, bolus Armena, terra sigillata, crystallus præparata, cum conserva rosarum antiqua propinata. Cydoniata denique quælibet sunt usitatissima.

### XI. SUDORES NIMI.

Rariùs equidem sudores nimis vexant sub febrium motu, quia moderati sunt exoptati: interdum tamen post febres continuas, aut graviore, aut paulò diuturniores, crebri sudores nocturni ægros vexare solent: arrophiam minantes, ex deficiente nutrimenti chylosi assimilatione, obſa guinem depauperatum nati. Hos ipsos & emulſiones temperantes, vel absorbentia coralliatæ, interdum Martialia, cum aromaticis subiunctis amaris, v.g. absinthio, curant: Confer etiam SYDENHAM in *Obs. p. 335.* De cetero corpore adhuc pleno in febribus non eliciendi vi, quia facilè translatio fieri potest ad caput, ut rectè monet BALLONIUS *Pbaros Med. p. 215.*

### XII. URINÆ SUPPRESSIO.

Quoad urinariorum affectus: suppressio huius interdum supervenit, quæ interdum crisco per sudores imminenti indicium



est, præsertim si prægresso sudore superveniat. Consecratu Henricus ab Heer *Observat. p. 62.* Interdum in statu sine criseos indicibus supprimitur, vel in delirantibus, vel alio modo affectis. In talibus regio pubis illinenda venit sequent. Linimento:

℞. Vngu. de alb. ʒss.  
Olei scorpion. simpl. ʒj.  
M. D. S.  
Vnguentum aperiens.

Applicetur crebrius.  
Vesicatoria vitentur.

### XIII. SYNCOPE, CORDIS PALPITATIO, ET ANXIETATES.

Ad syncopen, palpitationem cordis, & anxietatem, à sanguinis nimia ebullitione, aut symptomatis spasmodicis, aut etiam sanguine coagulato oriundam, præter externa, spiritus animalis torpidos excitantia, convenit aliquid confectiois alchermes, qui terre possunt, castoreum & castoreata, spiritus carminativus de tribus, liquor cornu cervi succinatus, spiritus salis ammoniaci succinatus, &c. Quando verò ex ventriculi cruditatibus originem trahunt, ante omnia conveniunt absorbentia, vel sola, vel cum volatilibus sociata: e.g.

℞. Aquæ theriac. ʒij.  
Tinctura bezoard. ʒss.  
Spiritus salis ammoniaci theriac. ʒj.  
Pulv. viperin. seu bezoard. anim. ʒj.  
Syr. cors citri ʒij.  
M. D. S.

Potio confortans, coelestium capienda.

℞. Corall. rub. præp. vel ebor. sine igne ʒj.  
Cinnab. anismon. ʒss.  
Sal. volat. cornu cervi gr. xvj.  
Succin. gr. viij.  
Campb. gr. ix.

M. pro pulvere:

Div. in 3. part. sequ. S.

Pulvis confortans.

Inter externa pro temporibus & facie irrorandis:

℞. Aquæ hircund. cum castor. ʒj.  
Carbunc.  
Spiritus meliss. vel citri vel rosar.  
Viridis aris ana ʒij.  
M. D. S.

Aquæ externa ad illinendum.

℞. Herb. serpill.

Maior.

Flor. lavend.

Castor. ʒj.

F. Nodus vel sacculi pro pulsibus, aceto rosaceo vel aquâ hirund. cum castoreo, vel Mixtura præscriptâ irrorandi.

### XIV. PRUNELLA.

Ad Prunellam seu Arginam, & incipientem oris nigredinem Gargarismus ex prunella, salvia, scordio cum rolis rubris mistis, &c. aquæ hordei decoctis paratus, addito nitro, sale ammoniac. o., unâ cum syrupo papaveris rhodos, & diamoron confert: e.g.

℞. Herb. scord.  
Prunell. ana Mj.  
Veron.  
Flor. scabios.  
Malva arbor.  
Rosar. rub. ana Mss.

Incil. dentur ad chartam: S.

Species mixta ad gargarisma.

Simul quoque externè collo sacculus integro croco, floribus sambuci, & spiritu salis ammoniaci irroratus, & interpassatus ita siccus calidè applicetur.

### XV. TREMOR MEMBRORUM ET TENSIONES.

Ad Tremorem & membrorum tensionem vesicatoria supra allegata pulsibus manuum & supra vena in parte interiore, imò contra nimias anxietates præcordiorum, etiam sub axillis, & supra umbilicum cautè applicari, vesicæ inde oritur maturè aperiri queunt.

### XVI. MACULÆ.

Ad maculas non raro diebus criticis, quarto, septimo, vel nono, in corpore hinc inde, præsertim dorso, brachiis & cruribus, seu morfus pulicum, quandoque ut vibices longiores provenientes, judorifera supra nominata continuentur: inter quæ myrrhata & castoreata excellent cum salibus volatilibus; hinc Eleſtuarium sequens:

℞. Eleſt. diaſcord. F. ac. ʒss.

Corn. ceru. sine igne.

Salis card. bened. an. ʒj.

Myrrh. eleſt. ʒss.

Cum f. q. Syr. rubi idæi. Eleſtuarium: D. S.

Eleſtuarium ad venenum expellendum pro 6. vicibus.

Capiatur in vino calido.

Item pulvis sequens:

℞. Corn. ceru. sine igne ʒij.

Antimonij d. arbor.

Salis card. bened. ana. drachm. ʒ.

M. f. Pulvis:

Div. in 6. part. æqu.

D. S.

Pulvis venenum expellens.

℞. Pulv. diaph. Ludov. drachm. ʒss.

Antimonij diaph. drachj.

Campb. drachm. ʒ.

M. pro pulvere:

Div. in 6. part. æqu.

D. S. ut antè.

℞. Corn. ceru. sine igne drachm. ʒss.

Salis card. bened. drachm. ʒ.

Campb. gr. xv.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis expellens.

Caveatur sedulo frigus, & fricetur quotidie corpus sacculo, sale calido vel tale petreæ repleto, & præterea de Decocto sequenti sæpe bibendum:

℞. Raf. corn. cerv.

Rad. scorz. an. ʒss.

Flaved. cort. citri atach. ʒj.

Sem. acetos.

Anis. an. drach. j.

Misc. & contus. coqu. in f. q. Aquæ:

Colatura edule retur instar Julepi.

D. S.

Potio confortativa & expellens.

Vel mediante hac f. Emulſio ex seminibus expellentibus cum myrrha ad imitationem ZWELFERI in Phar. Reg. p. 209.

Vel

℞. Flav. cort. citri drach. ii.

Sem. galeg. rec.

Aquileg.

Card. bened. an. drach. ʒss.

Myrrh. eleſt. dr. ch. ʒ.

Cum Decocto jam præscripto f. Emulſio: adde

Corn. ceru. sine igne ʒj.

Antimonij di. ph. ʒj.

Educorum parum:

D. S.

Expellens emulſio confortativa.

Sed etiam cucurbita sicca passim in dorso, brachiis & cruribus calidè affigendæ, & sæpius detrahendæ, vel diſtis sacculis, sale vel nitro reſectis, & lixivio calido humectatis, corpus calidè benè fricandum, ut eò melius cutis aperiatur, & maculæ excernantur, nec retrocedant.



# SECTIO XVI:

DE

## SANGUINIS EX CORDE IN PARTES MOTU, ADEOQUE CORDIS, HINC ET ARTERIARUM, PULSU LÆSO.

**U**T pateat connexio cum prioribus, superius habuimus in genere de sanguificatione læsa, & inde natis febribus, & sic, quando sanguis non rectè fermentatur, & in præcordiis ab aere inspirato non rectè resolvitur, unde tunc simul fit vitiosa chyli assimilatio: Quæ vitia sanguificationis ex læsa particularum, massam ejus componentium, crassi oriri diximus; five hæc crassitas vitietur vitio chyli, five vitio massæ sanguinæ, aut hæreditario aut adfectu. Verùm inter utroque intercedit alteratio ab aere inspirato & expirato: hujus ergo vitia inferenda fuere.

Jam ergo in præcordiis sanguis ab aere alteratus & perfectior factus, non ibidem hæret & subsistit, aliàs præsentissimum immineret mortis periculum; sed ulterius ex corde movetur per arterias in uniuersum corpus, & hinc per venas undique revehitur ad cor: qui motus cum fiat per circulum, propterea dicitur circularis, cujus centrum est cor; peripheriam constituunt externæ corporis partes; lineas ex centro ad peripheriam constituunt venæ & arteriæ, hinc etiam ubique arteriis venæ, & venis arteriæ respondere solent, excepto cerebri cortice & hepate. Ratione modi consistit hic motus sanguinis in pulsu, dum ex corde in arterias, & hinc in venas, impellitur. Duplici constat motu hic pulsus cordis & arteriarum:

1. Est verus & propriè dictus motus, qui est contractio seu systole.

2. Est impropiè dictus motus, qui est dilatatio seu diastole.

Illo agunt hæc partes, dum se contrahunt, & ita contentum sanguinem ulterius propellant: in hoc verò reverà patiuntur, dum à turgescencia sanguinis dilatantur ac distenduntur. Conf. de hac sanguinis circulatione **WALÆUS** in *Epistolis de Chyli & Sanguinis motu*, item *Charlestoniæ Oeconomia animalis Exerc. 6.* item **HARVÆUS** de motu sanguinis; item **CONRINGIUS** de Generatione & Motu sanguinis **PAULUS SARPA**, Religiosus Venetus, **BARTHOLINUS** in *Epist. C. 1. Epist. 26.* Vid. etiam **HIGHMORUS** *Disquis. Anatom. de arteriis cerebri.*

Cor à sanguine ex auriculis ad ejus ventriculos, imprimis dextrum, illapso & turgescente, expanditur, quâ expansione fibræ, cordis parenchyma constituentes, extensæ irritantur, h. e. nimio distensionis & lésionis sensu efficiuntur, inde copiose per nervos irruunt spiritus animales, qui has fibras movent & contrahunt, quâ contractione conus cordis ad ejus basin movetur, motu quasi turbiniis contorto, unde parenchymate crassescente angustantur ventriculi, & ita exinde sanguis impetuosè in arterias evibratur, donec expulsiōne istâ factâ spirituum impetus cessat, unde cor ceu flaccidum denuò subsidet, & illabentem sanguinem ex auriculis recipit. Est enim cor reverà musculus, & musculorum ibi modum movetur, ut jam olim statuit **HIPPOCRATES**, & noviter confirmavit **STENO** in *Observ. de Glandulis & Musculis*, item **HIGHMORUS** in *Disquis. Corp. Anatomicæ*, item **LOWERUS** *Tract. de Corde.*

Pulsus iste continuatur in arteriis, quæ etiam habent systolem & diastolen, cordi tamen contrariam. Cor enim, dum instar musculi se secundum fibras suas contrahit, cum impetu sanguinem rarefactum exprimit in arterias, quarum tunica crassa & nervea ab impellente isto sanguine violenter dilatatur, simulque, qui in ea est, sanguis ulterius pellitur. Ubi verò cor denuò repletur & distenditur, dilatatae arteriæ fibræ suis nerveis circularibus denuò se contrahunt, & sanguinem eos dilatantem in venas propellant, donec novo sanguinis impulsu denuò per uniuersum corpus dilatentur. Dependet ergo arteriarum motus dilatatorius à solo cordis impulsu, & hinc fieti sanguinis eruptione; id quod modernorum sanguinis transfusio

ulterius confirmat: Motus verò constrictorius dependet ab ipsis arteriarum fibræ nerveis. Descriptionem Anatomicam arteriarum videbitis in **WILLISII Pharmaceutica Rationali** pag. 282. Conferatur etiam quoad arteriarum motum **PLEMPIUS** in *Fundamentis Med.* pag. 130. & 173.

Non pulsant autem venæ:

1. Quia sanguis non tanto impetu irrult.
2. Quia tunicae molles, & facile cedunt.
3. Quia movetur à vasis minoribus ad majora.
4. Quia sanguis non est adeò tenuis, subtilis, & æstuans, ut in arteriis.

Vena cava tamen circa insertionem suam prope cor ut plurimum etiam pulsare solet, observante hoc **WALÆO** in *Epist. l. c.*, idque ob fibras nervosas, quas obtinet.

Motus hic, qui vocatur, ut dixi, pulsus, imprimis consideratur à Medico cum in finem, ut cognoscatur, qualis sit sanguinis fermentatio in corde? sicut secundò exploratur à Medico, ut cognoscatur sanguinis status ex turgescencia illa resulans, & pro fermentationis varietate subindè varians.

In hoc pulsu tria sunt consideranda:

1. Sanguis, qui movetur.
2. Efficiens, quod movet: Et
3. Instrumenta seu Canales, per quos movetur.

Pro ratione horum trium emergunt simplices & generales pulsum differentie: Et quidem

1. Ratione mobilitatis, seu sanguinis motus pulsus est vel magnus, vel parvus: Magnus, quando arteria sanguine turgescente distenditur: Parvus, quando minus eadem distenditur. Ad hunc pulsum refertur etiam plenus, & vacuus.
2. Ratione partis moventis, pulsus est vel vehemens vel debilis: A corde enim vehementer se contrahente, & sanguinem ita vibrante, pulsus fit validus vel robustus; si contri, fit parvus.
3. Ratione ejusdem instrumenti, nempe arteriæ, pulsus est vel mollis, vel durus. Mollis ab arteria cedentè tactui. Durus ab eadem arida, & tactui quasi resistente.
4. Ratione temporis inter plures pulsationes observabilis, est pulsus frequens, & rarus: Frequens est, quando sanguis celeriter movetur, & ebullit in corde, sicque totum cor distendit: Rarus est si immutata sanguinis fermentatione ac rarefcentia.
5. Ratione temporis inter plures pulsationes observabilis, pulsus est vel celer, vel tardior: Celerior à fortiori irritatione; irritatum enim cor cum impetu ac violentia evibrat sanguinem, unde subito acceleriter irritantur arteriæ: Contra minus irritato corde etiam minus irritantur arteriæ, & sic fit pulsus tardior.

De his vid. præter **MOEBIUM**, **SYLVIIUS** *Dissertat. Med. 3. de sanguificatione & sanguinis motu*, item in *Praxi* lib. 1. cap. 26. Non enim alius est, qui magis perspicue, simulque accuratè negotium hoc tractavit. Ex his simplicibus pulsum differentis omnes reliquæ, quæcunque pulsum differentie composiæ, æqualitates & inæqualitates, dependent, & facillimè cognoscuntur.

Locus, ubi percontatur pulsus Medicus, est (1.) carpus manus, (2.) est interstitium inter pollicem & indicem in parte molli, (3.) sunt tempora, quando v. g. in prægnantibus corpus non debet detegi, (4.) locus circa talos pedum, *bey denen Knochen*.

Unus idemque sanguis est, qui per arterias & venas circulatur, accidentales tantummodò habet quasdam differentias. (1.) Arteriosus sanguis est seriosior venoso, propter urinam, lympham, & insensibilem transpirationem,



nem, quæ serum sanguinis arteriosi immixtuunt. (2.) Ex uberiori sero, & propter spiritus copiosos, arteriotus sanguinis longè est tenuior, subtilior & calidior; venosus verò est crassior & torpidior. (3.) Arteriotus est rubicundior & fluidior, venosus est obcurior & nigrior, cujus causa est in aëre inspirato, quo in pulmonibus attenuatus sanguis arteriosus fluidior apparet venoso: Conf. LOVVERUS in *Vindicat. Pyrotol. Willisiana* pag. 39. & *Tract. de Cordis* pag. 174.

*Fini circulationis*, seu continuati sanguinis per pulmones & cor motus, est ut sanguis novo vitali vigore in pulmonibus & corde imprægnetur, qui antea longo per corpus motu erat infractus. Constat autem hic ipse novus vigor in renouata sanguinis fermentatione, indeque nova caloris exsuscitatione, & spirituum vitalium regeneratione.

Ufus sanguinis est, ut sit materia, unde nutriatur & augeatur nostrum corpus. Sed cum sanguis liquor sit in se, homogeneus, qui solus corpus nostrum nutrire non posse, propter diversitatem partium nutriendarum, conclusum fuit; unde Angli succum quendam albicantem torridum ex nervis allatum pro nutriendis partibus spermaticis commementi sunt, v.g. GLYSSONIUS in *Anat. Hepatis* cap. 43. CHARLETON in *Oecon. Anim. Exerc. de Sang. usu & succo nervorum nutritio*, & ENTIUS in *Apologia pro circulatione sanguinis contra Parisanum*: sed hanc opinionem refutarunt & sufficienter rejecerunt BARTHOLINUS *Spicileg.* 1. c. 3. item STENO de *Glandulis oris* §. 32. nec non DEUSINGIUS in *Exerc. de Sanguinis usu*, & commento succi nutritii per nervos influentis. BARBATUS verò præter sanguinem etiam sero partes nutrire ait in *Dissert. de sanguine & ejus sero*; cui BILSIUS rorem suum substituit, eumque nervosas partes nutrire, vel saltem ad nutritionem disponere statuit.

Ut, quod probabilis videtur, differamus, considerandos venit sanguinis status, quem ex chylo infuso continuo refarciri notum est; non autem chylum, sanguini in vena axillari sinistra permixtum, unico per cor transitu in sanguinem abire, sed sensim sensimque, supra ostensum fuit. Probabile ergo videtur: sanguinem (dum consideratur pro massa illa, quæ per arterias & venas circulator) ad omnes corporis partes distribui, ut eas per spiritum vitalem vitali in vigore conservet, simul tamen etiam eas nutriat & augeat, sed pro diversitate partium diversimodè: partes nempe spermaticas dictas parte sui chylosa nondum in sanguinem transmutata; parte verò sanguineâ perfectâ partes sanguineas: cui sententiæ ad stipulam vident. BARTHOLINUS *Cens. 2. Epist. 65. item Cent. 3. Epist. 38.* SCHNEIDERUM de *Catarribus lib. 2. pag. 85. item lib. 3. p. 95.* & BOYLEUM *Dissert. de usu lactis. Quod spectat etiam gelatina feri lactea, de qua BARTHOLINUS Cent. 2. Epist. 33. item BARBATUS de sanguine & ejus sero.* Facit etiam huc coagulatio feri à spiritu nitri in crassamentum quasi caseum, quod nihil aliud, quam chylus, sub feri tegmine occultatus, tam pro nutrimento partium nervearum & his cognatarum, quam pro aliis usibus per universum corpus distributus. Imò quicquid contra sanguinis asperitatem pro succi nervei benignitate in puncto nutritionis Angli tantopere urgent, quamdiu intra materiæ nutritivæ limites subsistunt, optimè chylo, sanguini non dum assimilato, diuturno tamen cum eodem circulo certo modo alterato, applicari potest. Quæ ipsa non parùm illustrat experimentum, quo anserum probè siginatorum sanguinem, ubi refrixerit, albissimo lacte supernatante cooperiri constat; secus ac in iisdem non æquè siginatis fieri observatur: Vid. BORRICHII *Herm. Ægypt. & Sapiens* pag. 262.

Rationes, quæ hoc nutrimento duplex persuadere videntur, præter experimenta, quæ chyli in sero copiosam præsentiam innuunt, & supra allegata fuerunt, sunt:

I. Statuta est sententia ab omnibus: Quibus constamus, iis etiam nutrimur & augemur. Jam verò partes nutriendæ & augendæ sunt duplices: spermaticæ, & sanguinæ: Illæ ex torrido, albumini ovorū simili, liquore in ovo uterino immediatè generantur, quibus ceu itaminibus postmodum per sanguinis a. hæzionem sanguinea parenchymata agglutinantur: Vid. HARVÆUS de *Generatione animalium*, item CLAUDIUS de *la Courroue Tract. de Nutritione Fetus in utero Part. 2. cap. 6. & 8.*

Duplex ergo alimentum requiritur illis assimilandum: chylosum nempe, pro spermaticis seu nerveis; sanguis verò pro sanguineis.

II. Quod crassiores sunt homines & pinguiore, item quod magis nutriuntur & augentur, eò videtur sanguinis fermentatio debiliior, eoque chyli in sanguinem transmutatio tardior, indeque alimenti chylosi major abundantia. Hinc phlegmatici, h. e. quorum sanguis chylosior existit, & sanguinei, h. e. quorum sanguis magis temperatus & dulcis est, uti ut plurimum sunt proceri, ita etiam crassi: Illi tamen magis, quam hi. Cholericis verò, h. e. quorum sanguis acrior & salisior existit; melancholicis item, h. e. quorum sanguis macrior, & respectivè acidior est, sunt macri, & interdum parvi: in illis enim lenta & blanda est sanguinis fermentatio; in his verò eadem est citata: Unde ibi uberior chyli abundantia propter tardam assimilationem; hæc verò nutrimenti chylosi paucitas, ob citam ejus in sanguinem conversionem. Ex eodem etiam fundamento infantes & juniores citius augentur, quam seniores; quia in recens natis pluribus in locis lacteus liquor reperiri solet.

III. In vulneribus partium nervosarum destillat aqua quædam limpida, sinovia dicta, post cujus nimium fluxum exarescunt membræ illa ergo aqua videtur esse nutrimentum proximum illarum partium, licet ob alterationem in vulnere corruptum. Sic in ossium fracturis adnascitur callus, similis ossium substantiæ, qui oritur ex nutrimento ossis, in motu suo impedito, hinc coacervato & coagulato; qui callus tamen nullo modo sanguini, aut partibus sanguineis similis existere solet.

IV. Impossibilis est explicatio, quomodo sanguis iste rubicundus, ex chylo candido genitus, possit denud in liquorem lacteum seu albicantem pro nutriendis partibus spermaticis converti.

V. Per diuretica, hinc per sudorifera, non secus ac per exercitia crassi valde emaciantur. De diureticis vid. HELMONTIUS *Tract. Latex Humor neglectus* §. 44. & *Tr. Jus divum virat.* §. 59. item SCHENCKIUS l. 3. *Observ. de Diabete* pag. 456. Item masticatione foliorum Tabaci per copiosam salivationem ingens corporis crassities curata refertur à BORELLO *Cent. 2. Obs. 11.*, quod vix aliâ ratione, quam per crebriorem pyalissimum contigisse videtur; quod & BORELLUS l. c. inclinât, cum foliis lauri, quod multas aquas educant: Tartari usus crebrior cor ora emaciat, nam urinam provocat: ratio hujus effectus alia dari nequit, quam quod separatum serum per urinam, & cum eo pars nutrimenti chylosi liquefacta & resoluta evacuetur.

Vitiatur cordis motus seu pulsus, & hinc consequenter sanguinis distributio, variis modis:

1. Quando eadem augetur, simulque depræatur in palpitatione & tremore cordis.
2. Quando eadem plus minus imminuitur aut deficit serè in syncope, & virium prostratione, in quibus pulsus aut est mollis vel tardus, debilis & parvus.
3. Quando eadem est nimis frequens & celer, nempe in febribus.

## CAPUT I.

### DE

#### CORDIS PALPITATIONE, & HUIUS COGNATO TREMORE.

**P**alpitationis cordis est, quando cor impetuosè admodum & vehementer subsultat & pulsat. Est enim revera cordis palpitationis motus ejusdem nimis inordinatus & convulsivus, coactus & vehemens, quod forti systole se contrahit, ut ut nunc vehementior, nunc mitior, nunc major, nunc minor, nunc verò mediocris. Palpitationis hæc cordis seu motus nimis vix sufficienter ex arteriarum pulsu cognosci potest: sæpius enim necesse est, regioni sterni circa, latus sinistrum, ubi cordis pulsus optimus, admoveere manum pro ritè percipiendâ cordis palpitatione, pulsus ipso in arteriis subindè vix aut leviter mutato, ut ut leviori in malo celerior aut frequentior soleat observari. Non verò opus est semper, eum interdum sit adeò vehemens, ut solo auditu possit percipi, vel visu cognosci, adeò ut præsentent exempla cordis palpitationum, in quibus sonitus ad



ad distantiam percipi potuerit; qualia videbitis exempla in TULPIO, qui convulsivam cordis palpirationem in platea dilata audivit; & BARTHOLOMEO Hist. Anom. 18. Cent. 1. sicut EPIPHANIUS FERDINANDUS Hist. 79. culcitras superitratas amovisse observavit: vel etiam costæ diffractæ, & ferè diffractæ fuerunt: Vid. SCHENCKIUS lib. 2. Observat. HORSTIUS lib. 2. Obs. 17. HOEHNSTEDTERUS Decad. 9. pag. 61. MAYOW de Motu muscularum pag. 96. Ex PISO de colluvie jerosol. p. 66. notat palpirationem cordis, in qua indumenta quasi flabello mora inæqualem cordis motum æmulabantur, & thorax & sternum ab illo motu à sede naturali dejecta mediocriter extuberabant. Ex quo affectu patet, esse convulsionem musculi cordis in tali palpitatione.

Contrarium quodammodò cordis palpitationi est vitium.

### TREMOR CORDIS.

Motus scilicet ejus quodammodò deficiens, vibrans & tremulus, imminutam ac vitiosam cordis constrictionem insequens, in qua fibræ musculorum cordis celerrimè & quasi semicontractæ systoles & diastoles vices obeunt. Confunduntur communiter hic cordis tremor & palpitatio, & vix reperietis quendam Præcticum, qui hæc non confusè tractet, cum tamen toto cœlo differant: Palpitatio enim est immoderata & vehemens cordis concussio, impetuosissima, systole ac diastole molesta, in qua cor violenter concutitur & quatitur, & dicitur hic motus testè ab HIPPOCRATE, à quo jam suo tempore cor habitum fuit pro musculo, cordis convulsio: id quod uberius confirmat LOWERUS Tract. de Cord. pag. 132., sicut modum, quo fit cordis palpitatio, optimè descripsit MAYOW de Motu muscularum pag. 95. Tremor cordis verò dicitur, cum minores sunt pulsus & crebriores, & quasi tremuli, pulsui languido & crebro similes. Oritur equidem à musculi cordis irritatione. Verùm in hoc est differentia, quod cor agitur palpitet, quando vires adhuc sunt robustæ & constantes; dum verò sunt imbecilles ac prostratæ, cor irritatum tremulo motu vibratur, adeo ut tremor cordis pertineat suo modo ad lymphomatata virium imbecillium, & etiam quodammodò ad lipothymias. In palpitatione cordis fibrarum vehementia; in tremore, verò crebritas earum imprimis observatur, ut rectissime hæc distinguit WILLISIUS Pharm. Rat. P. 1. pag. 260.

Illustrari potest per experimentum Anatomicum, si nempe ex cane vivo cor extrahatur, quod aciculâ punctum convellatur aliquoties; si verò ejus pulsus penitus languescat, tunc, si denud attingatur, tremorem exhibebit, & motum vibratorium. Quidni ergo palpitatio & tremor simills in corpore vegeto adhuc excitari poterit?

### PARS AFFECTA.

Pars affecta in Palpitatione & Tremore primariò est cor, quippe ejus substantia musculoſa præternaturali motu in convulsionibus & motibus convulsivis movetur. Cor enim esse musculum, & ex musculis compositum, videb. in LOWERO l. c. & STENONE de Glandulis 19. musculi. Item in pecunine musculorum Geometrico. Jam verò, cum omnis motus convulsivus in machina corporis nostri præsupponat sensationem nimiam, cujus occasione sequatur spirituum influentium impetus, proinde facile patet, proximam causam palpirationis consistere in tali sensatione molesta, uno nomine: irritatione. Sicut verò sensationem nimiam limitat vis cordis movens in spiritibus consistens: ita si cordis vis motiva sit nimis valida, oritur ejus palpitatio; si debilior, fit tremor, aut cordis motus vibratorius, inæqualis & varius.

### CAUSÆ.

Causa convulsionis cordis in ejus palpitatione, & motu ejus convulsivè tremuli in ejus tremore, est omne id, quod quacunque ratione aut musculos cordis, aut nervos ad cor derivatos, irritare & vellicare, adeoque ex impetu spirituum ad convulsionem stimulare potest.

Causæ tales irritantes investigandæ sunt vel in ipso organo motu, nempe in corde ipso, vel in motu med. i. e. in nervis cordis motui inservientibus. Ratione cordis causa irritans est respectu ejus parenchymatis, vel extra cor in ejus ambitu, eaque frequentior, vel intra cor & ventriculos ejus.

Inter causas extra cor subindè observata fuit aqua pericardii nimis abundans, quæ aqua nil aliud est, quàm lymphæ ed per certa vasa lymphatica derivata, ex glandulis thoracis se ed effundens; sicut etiam MARCHETTE observavit, ductum ex inferiore corpore ad pericardium lympham deducere; quæ lymphæ abundante fit hydrops pericardii, cujus occasione pericardium distenditur, cor irritatur, & palpitatio molesta ac diuturna cordis oritur: vid. AMATUS LUSITANUS Cent. 3. Cur. 43. item PISO Tr. citato pag. 186., qui etiam refert, quod in his, qui palpitatione cordis laborant, post mortem inventum fuit pericardium copioso sero distentum quod GALENUS jam observavit lib. 5. de locis affectis, ubi dicit, quod aqua abundans in involucro cordis sit causa palpirationis cordis, quæ sit una ex gravissimis, contumax, & rarè ferè curabilis, propterea, quod neque dissolvi neque discuti possit. Quod enim attinet RIOLANI consilium in Anat. sua lib. 3. cap. 4. ubi suadet: tali in casu esse perforandum sternum eo in loco, ubi capsula pericardii ei adnascitur, & sic aquam contentam extrahendam; magis theoreticum, quam Præcticum est. Sed dubium videtur quoad hanc causam, annon acrior lymphæ copia potius impediatur motum cordis? imò lymphæ hujus copia non tam causa, quàm affectus palpirationem cordis insequens, seu productum morbosum sit? Vid. LOWERUS Tract. de Cord. pag. 104., ubi à glandulis basi cordis adnatis eam derivat; siquidem in homine vivente paucior, quàm in mortuo, hujus reperitur quantitas, de quo vid. SCHNEIDERUS lib. 2. de Cataractis pag. 93.: sicut in his, qui morte violenta, & imprimis cum sanguinis profusione perierunt, vix guttula ejus; è contrà in hecticis & phthisicis, nec non suffocatis, major ejus quantitas reperitur.

Tubercula itidem & excreſcentiæ verrucalæ, cordi vel pericardio adnatæ, etiam sunt causa palpirationis cordis admodum vehementis. Exempla horum post mortem in dissectis reperiuntur, videbitis in SCHENCKIO lib. 2. Observat. de Sacerdote, circa cujus cordis basin ex rescentia carnea reperta fuit; item in alio, de quo vid. BONETUS Sepulchreto pag. 631. nec non ZACUTUS LUSITANUS lib. 8. Medic. Princip. Hist. cap. 8. Obs. 3. ubi ex excreſcentia carnea inter arteriam magnam palpitatio cordis insignis orta fuit. Sic ex trunco arteriæ magnæ prope cor ossea palpitatio cordis gravem observavit VVILLISIU Sin Pharm. Rat. pag. 264. Ob venæ pul monalis cartilaginem adnatam & ferè obstruictam, palpirationem cordis notat MAYOVV de Muscularum Motu pag. 97.

Præter Tubercula vermes etiam, & quidem in specie diſtus vermis cordis, der Derſuurn tam in pericardio ipso, quàm in pericardio contenti, aut eidem adherentes, inter alia symptomata periculosa subindè dant palpirationes. Affectus rarus habetur vermis pericardii, & paucis, & ferè nulli, cognitus. Ego tamen puto, quod non sit rarus talis vermis, sed admodum frequens. Symptomata taliter agrotantium, & Medicamenta contra eum videbitis in GABELCHOVERO Cent. 3. Curat. 1. Præceteris ægri patiuntur palpirationem cordis subindè recurrentem lineam manifesta causa, insignes rosiones & vellicationes, puncturas & dolores, præsertim rosiones & vellicationes in interiore pectoris loco, ubi situm est cor, ex improvise interdum lipothymie imminet, interdum etiam epilepticæ convulsionem supervenire observantur, facies pallet, ægri inquieti sunt, pulsus intermittens & intercurrentes est, & similia adfunt sympt. mata: Vid. FORESTUS lib. 11. Obs. 26. in Schol. PARÆUS lib. 1. Cent. 3. SCHENCKIUS lib. 2. Observ. 174. Medicamenta, quibus hic vermis interimitur, sunt imprimis Mercurialia, & hinc succus alii, raphani rutiliani, & nasturtii, aut quoque eorum infusa: de quibus vid. Praxi Chymiatr. HARTMANNI, qui eum curat per sal dictamnii & tanacetii; item per Mercurium vivum, hujus infusum: nec non GABELCHOVERUS l. c., ubi habet exempla vermis pericardii per hæc medicamenta necati. Curiosa est historia, quam habet PETRUS CASTRO, Medicus Veronensis, in suis Manuscriptis Præcticis: Mihi, inquit, contigit, dirum morbi genus in Cantabria observasse, sub epidemica constitutione, in qua post ingentem agrotantium stragem, qui omnes convulsi cum frequentissima & ferè continua cordis palpiratione moriebantur, dissectis quibusdam cadaveribus invenimus in singulis vermẽ, magnitudinis ferè minimum digitum æquantem, capsula cor-



dis affixum. Non valuerunt, inquit, præstantissima alexipharmaca vermem occidere, non Bezoar Orientalis, nec Theviaca, nec confectio alhermes, nec scorzonera aut alia, itemque nec allium, à quo tamen magis, quam ab aliis omnibus agebatur, scabiæ videbatur. Solus succus scabiosæ mox vermem occidit; unde hæc experientia observata scabiosæ impostum uti iussimus languentes, tam in iusculis ex cocta, quam in decoctis & prupis & ex ea fabricatis. Tandem nulla auxilia egrotantibus apponebantur absque hoc specifico alexipharmaco, & cerè mirum fuit, ob eo tempore nec ullum egrotantem perisse. Itaque non cordialibus hic affectus curari potuit, sed succo allii, scabiosæ, & aqua scabiosæ, in qua agnatus fuit per aliquot horas Mercurius crudus: item mercurius dulcis ad gr. ix. exhibitus cum bolo ex conserva florum scabiosæ magnopere profuit.

Hæc CASTRO propriâ experientia nobis reliquit. Vid. etiam hujus PETRI CASTRO Tract. de Peste Neapolit. Rom. pag. 137. & 138. ubi etiam veteris ejusdem mentionem facit.

Cataplasma externum contra vermem pericardii expertum vid. in LOWERO Tract. de Corde pag. 107. ex foliis cinara, tanacetii, & absinthii vulgaris, aceto vini incollis, & cum pauco m. tridatio mixtis, regioni cordis admotum.

Causæ internæ respectu cordis palpitacionem inferentes sunt variae. Rariores sunt ipsi affectus cordis, ut abscessus in corde, aut simile quid; sed potius omnia ea, quæ sanguinis localem motum quacunque ratione per cor impedire valent, unde circa radices vasorum & cordis basin aggestus, ad crebriores & validiores contractiones, adeoque palpitacionem concitat, internæ causæ rationem obtinent: Cujus sanguinis in circulo suo plûs minus impediti non leve argumentum est, quod pulsus in carpo minus cordis motui respondeat, sed languidus & diminutus subindè percipiatur, quasi sanguine non sufficienter distendente arterias. Hæc inter causas sunt tam ipse sanguis non ritè se habens, quam etiam alia sanguinis ritè constituti motum impediencia. Sanguinem quod attinet: ipse vitiosus minus turgescibilis & fermentescibilis, indeque ad stagnationem pronus, ad palpitacionem disponit. Uti enim à sanguine rarefcente naturaliter expansum cor irritatur ad suam contractionem, ita ubi præternaturalis est fermentatio, etiam per consequens præternaturalis irritatio, ibi etiam præternaturalis & violenta erit contractio. Hinc in iis, qui sanguinis mensuram patiuntur suppressionem, frequentes sunt palpitaciones cordis, quas ex levi motu tunc contrahunt; non secus ac cachecticis confirmatis, Idericis, spleneticis confirmatis, aliisque affectibus chronicis non rarè sunt: quod ex GLYSSONIO Tractatu de Cordis Palpitatione, & FORESTO lib. 17. Observ. 1. est notum. Præcæteris tamen, Hypochondriacis, Hystericis, & Scorbuticis familiare est malum hoc, ita ut in Palpitatione cordis semper suspicio sit de affectu scorbutico: idq; duplici modo; vel ob sanguinis intrinsicam constitutionem; vel propter nervos cor moventes convulsos. Ratione sanguinis frequens est palpitatio cordis, triplici ex causa: vel ob anormalem sanguinis in præcordiis turgescenciam; vel ob acidum vitiosum tunc in sanguine peccans & cor vellicans; vel ob grumulos sanguinis ex acido condensatos in corde relictos, qui inter cordis valvulas hærentes illic deniq; impacti palpitacionem inferunt non rarè. Dico tamen grumulos: si enim majores grumi & polypose concrecentiæ adessent, syncopes ac suffocationis metus instaret, ejus rei examen observatum est in M. A. N. C. Ann. 2. Observat. 197. pag. 298. Nec mirum est, quod tales grumuli in Hypochondriacis palpitacionem cordis inferant, cum & calculosæ concrectiones in corde existerent, item polypi cordis, idem subindè inferant malum: de quibus vid. HORSTIUS in Obs. & HOEFERUS in Hirc. Med. pag. 89. GREMBS A. bor. l. 2. c. 1. §. 8. Quod etiam bilis illa retortida in topi nigri speciem redacta facit, ejus FERNELIUS Pathol. l. 5. Obs. 17. meminit. In scorbuticis autem communiter gravissimâ cordis palpitacione affligis hoc mirabile est, quod si ipsi quieti in lecto jaceant, nihil mali sentiant; contra verò ex levissimo motu gravissimas incurrunt palpitaciones cordis, liporhythmis sæpè supervenientibus. Imò, quando hypochondriaci & scorbutici obnoxii sunt spasmodis nervorum, imprimis rami intercostalis & paris vagi, sit exindè, ut in talibus confirmatis, quando v. g. lien incumbit, subindè contingat cordis palpitatio, propter rami splenicum nervum satis insignem tunc spasmò correptum; qui spasmus plexui

mesenterico nervorum communicatos, nervum paris vagi afficit: quod uti ad quæcunque viscera interna, ita & copiosè ad splenem derivatur, à cujus furculis movetur cor, & ita affecto hoc nervo cor palpitat. Patet hoc serè ex eo, quod in talibus Hypochondriacis & spleneticis ingruente cordis palpitacione percipiuntur murmura & rugitus in abdomine, ex spasmò mesenterii, & intestinorum inordinata contractione & agitatione.

Quid de flatibus? Communiter quidem putant: flatus aut exhalationes ex liene ad cor ascendentes, aut metastasin materiæ in tali casu subesse, à quibus cordis palpitatio excitetur; quod tamen minùs verisimile, aut rarissimum videtur: & posito, quod sint, vix tamen continuâ cordis palpitacionem inferre possunt. Dubitant equidem nonnulli: an dentur flatus in vasis majoribus sanguiferis, & per consequens arteriis? Verùm vix possunt negari in vasis flatu sub eertis casibus; prostant namque exempla horum: sic SYLVIVS in Belgio in quodam cadavere in Nosocomio reperit flatu, vix divisâ summâ abdominis cute erumpentes: quin & arteriam aortam, præcipuè verò sinistram cordis ventriculorum ita distendentes, ut sinister ventriculus dextro longè capaciore apparuerit, propter distensionem à flatibus, cum tamen aliàs sit minor. An autem hi flatu semper aut ut plurimum sint causa palpitacionis cordis? vix credo: sed semper dubito, cum stante eorum formâ nativâ cum impetu ad cor deferri non possint.

Si sanguis in suo motu locali nonnihil impeditur, adeoque minùs commodè per cordis ventriculos circulatur, etiam cordis palpitacionem dare potest. Hanc frequentissimam causam palpitacionis cordis asserit Willisus in Pharm. Rat. P. 1. pag. 263., sanguinis nempe in cordis basi remoram & aggestionem: conf. M. A. N. C. Ann. 2. Observ. 197. pag. 299. Id quod confirmat etiam FORESTUS l. 17. Obs. 1. ubi palpitatio cordis observata in quodam, qui somnum meridianum capiendo tibias habebat nimis restrictas; laxatis verò tibis sine ulla palpitacione propter debitum sanguinis motum dormiebat. SCHULZIUS in Consil. 103. & 104. de iisdem tibis restrictis simile quid refert: In his enim propter impeditum sanguinis motum non potuit non fieri impeditus circulus in præcordiis, & hinc palpitatio cordis. Quod etiam exerescentia carnea in cordis basi inter arteriam magnam & aortam, 3vj. pendens, & alterum corculi representans, pertinet: vid. SCHENKIVS l. 2. Observat. pag. 214.: item polypi graviores in corde, tubercula in cordis ventriculis: vid. BONETTI Sepulchretum pag. 639. & 640: aut etiam calculi seu lapilli in corde reperi, de quibus supra. Sic SCHOLZUS in Consil. 103. refert inventum lapillum quendam nigricantem in eo, qui tali morbo sæpiùs fuit correptus; sic HORSTIUS habet exempla calculorum in corde reperorum, ex quibus vehemens ac diuturna oborta fuit palpitatio: & ex HORSTIO HOEFERUS Hirc. Med. pag. 89. refert Palpitacionem cordis lethalem, ex tribus lapillis in corde reperiis.

Quod nervos affectos: si isti, qui ad cor derivantur, ejusque aut viscerum vicinorum motui inserviunt, irritentur, similem cordis convulsivum motum inferunt, ubicunque etiam causa occasionalis latuerit. Unde præter ea, quæ supra de Hypochondriaco spleneticò dixi, contingit, quod animi pathemata, præsertim ira & terror, odores fortes in non assuetis, & similia, quæ spiritus animales in motu perturbatos & irregulares sciunt, ac nervos irritare atque concitare possunt, cordis palpitacionem inferunt: imprimis mulieres hystericæ, ubi cessante paroxysmo odore tantum quodam ex improvviso afficiantur, mox in palpitacionem exindè inclinant, ex solo odore: id quod fit, affecto nervo & spiritibus cor moventibus. Itè spiritus animales in motu inordinatos & convulsivos redacti palpitacionem cordis excitant, dum Palpitatio alios affectus spasmodicos sæpiùs comitari solet: e. g. in subiecto illo simul epileptico, quod PLATERUS Obs. 226. adducit; & à Venere juxta eundem PLATERUM Pr. T. 1. p. 486. In specie ad hujusmodi palpitacionem ex nervorum spasmodico affectu contractam pertinet hoc malum, dum in hypochondriacis & scorbuticis præsertim frequenter observatum, de quo supra dixi. Non putandum est, vel flatu ex hypochondriis ad cor deferri, aut vapores ex splene ad cor ascendere, & ita palpitacionem inferre, ut agri dicant, se sentire præcedentem alterationem, dolorem pulsantem, aut similia pathemata, sub hypochond-



pochondrio sinistro in lienis regione, unde concitetur cordis istud symptoma: nempe similiter in *hujusmodi subjectis est spasmodica affectio*, simpliciter ex affinitate ac intima communicatione, quam nervi splenici cum cardiacis habent: de quo & aliis huc pertinentibus vid. *Anat. Nerv. WILLISII*. Sicut enim hujusmodi subjectis spasmodica pathemata aliarum partium per consensum viscerum in hypochondriis non sunt rara, ita etiam cordis superveniens palpitatio simpliciter per consensum nervorum explicanda. Siquidem tales Hypochondriaci & Splenetici ante insultum vel cum eo percipiunt murmura & rugitus in abdomine, præsertim circa sinistram hypochondrium, præter symptomata splenis modo allegata, quæ non præcisè oriuntur à flatibus, spontaneo impetu hasturbas clientibus, sed potius aut à partibus status continetibus, spasmo vario affectis, adeoque palpitationes hæc nunc periodicæ, nunc aliter in affectu scorbutico & hypochondriaco affligentes; vel in sanguine, vel in nervisuum habent fomitem. Præterea dum afficiuntur paroxysmo tales, videtur cor quasi constringi, aut ambabus manibus comprimi. Concurrit etiam interdum sensus quasi ascendente sumi ex hypochondrio sinistro, quod ipsius membranarum istius loci indicium, (vel comes) existit: ut taceam vertigines subinde complicatas, anomalum & perturbatum spirituum animalium motum ostendentes. Acido nempe vitio hypochondriacorum utique commoto, & nervos vel stomachi, vel lienis potissimum irritante, & hinc spasmos eorum ac partium appensarum concitante, facile & nervi cardiaci similiter per consensum affici, & ita ad palpitationem cordis adigi poterunt: Ut etiam nervuli, arterias cordi vicinas moventes, spasmo affecti, & ita sanguinis circulum turbantes, & mediante vasorum arctiore strictione impediētes, consequenter ex sanguine circa cordis basin congesto, hujus palpitationem inferre possunt. Sed de his omnibus omnium optimè & prolixius agentem vid. *WILLISIIUM Pharm. Rat. P. 1. pag. 168.* cui sanè multum debemus, quod in nervorum eorumque affectuum theoria tantam lucem nobis accenderit. Ex metallicis fumis palpitationes convulsivæ oriri observatur, quia ut plurimum sunt arsenicales.

*Tremoris cordis*, in quo pulsus inæqualis & languidus, interdum quasi vermicularis, percipitur, *Causa, vel in musculo cordis, vel in nervis* investiganda, cum pariter convulsivi quid sapiat. *Quod ipsos cordis musculos attingit*: equidem in his aliquid vitiosum seu præternaturale contineri videtur, quod fibras motrices parenchymatis eorum continuo vellicare, & hinc ad contracturas irritare valet. Cum verò necessariò diastole cordis à sanguine influente superveniat, hæc vix sufficiens conceditur, quin ex dicta causa subito contractio repetita superveniat, & ita continuus, sed interruptus, adeoque tremulus, fit et motus. *Quoad nervos*: Scorbutici etiam ac Hypochondriaci, ex his ipsis affectis, & ab aliorum viscerum nervis, per consensum in spasmos coactis, leviores licet, tremores in corde pati observantur. Pauca aliàs de hoc cordis tremore prostant apud Autores & Scriptores Medicos, cum ordinariò cum palpitatione ejus confundatur, aut circa pulsuum vitia, vel lipothymias, subinde tremoribus supervenientes, tractari soleat, &c.

Absolvimus theoriam palpitationis cordis; jam ad ea, quæ Praxin spectant, pergendum.

#### DIAGNOSIS.

*Signa diagnostica* ex observatione differentiarum & aliorum symptomatum syndrome seu contingentia ferè colligenda sunt: Non ex pulsu in carpis manuum, vel aliis locis, ex quo parum certi, imprimis quoad causarum differentiam, imò planè nihil, cognoscere potest, quin potius requiritur imprimis applicatio manus ad ipsum cor. Facit huc *TIMÆUS in suis Epistolis Epist. 23. pag. 140.* ubi observat palpitationem cordis mirabilem, insignem & validam, in qua nullus in carpis pulsus observari potuit: ob id sc. vel ægri relationi fidentum, vel ipsi cordis regioni manus admovenda, pro percipienda cordis varia palpitatione.

Quo attinet *signa causarum*: in his totius rei cardo vertitur pro meliori Praxi.

Signa aquæ pericardii abundantis, calculorum, polyphi, vasorum pulmonarium obstructionis &c. sunt pauca & admodum fallacia, interdum ferè nulla. Pulsus non est adeò magnus, nec adeò vehemens aut concitatus, cum cor

in impedita capsula liberè moveri nequeat: affectus e contumax & pertinax; conjuncta simul est febricula, referens hecticæ speciem; accedit & tabes corporis, & tandem quoque spirandi difficultas. Signa vermium in pericardio habuimus. Si verò malum, quod frequentissimè fit, oriatur ex affectione hypochondriaci, tunc non solet esse continuum: ante paroxysmos verò vel cum his percipiuntur murmura subinde & rugitus abdominis, in specie juxta regionem sinistri hypochondrii. Præterea, cum tales paroxysmi afficiuntur, cor quasi constringi, & cum ambabus manibus comprimi videtur: concurrunt simul, & quidem nonnunquam, vertigines, aliæque abdominis capitique mala, ex anomalo motu spirituum animalium dependentia. Scorbuticis etiam malum hoc est admodum familiarè, & ferè hoc habet peculiare, quod sæpè ad levissimū corporis motum, si vel brachium vel manus tantummodo moveatur, paroxysmus palpitationis invadat, & subinde pravas lipothymias conjunctas habeat. Exemplum Palpitationis cordis talis scorbuticæ mirandum vid. in *HORSTII Observ. l. 17. Obs. 35. p. 380. & 389.* quod est sanè rarissimum exemplum.

*Tremor cordis* verò, quod vitium ferè contrarium Palpitationi, utut confundatur communiter, cognoscitur ex pulsu inæquali, debili ac languido: subinde etiam virium ingens prostratio & imbecillitas juncta esse solet. Talem cordis tremorem, quem Autores perversè vocant Palpitationem Cordis, lethalem, cum insigni inæqualitate pulsus, ex terrore gravi ortum, vid. in *RIVERIO C. 4. Observat. 211.*

#### PROGNOSIS.

Quoad *Prognosin*: Palpitatio cordis per se non est malum contemnendum; ut plurimum enim difficulter curatur.

Si palpitationi cordis superveniat pulsus sensim remittens, aut etiam nonnunquam in ermittens, cauti sint adstantes; imminet enim syncope.

Uterius qui in juvenili aut declinante ætate sanè, sine ulla manifesta causa corripuntur gravi cordis palpitatione, raro ad senectutem perveniunt, sed citius moriuntur. *Approbismus est GALENI*, & per experientiam Practicorum comprobatus.

Palpitatio cordis ex malo hypochondriaco frequentior quidem est, ac sæpius recidiva, s. levior autem & curatior est facilior reliquis speciebus, præsertim per idcirco quod cordis aut partium vicinarum accidentalibus. Ea verò, quæ ex scorbutico ferè gravior, & propter lipothymias junctas periculosior, nec curatur, nisi affectu ipso sublato.

Si palpitatione cordis continua vitio pericardii, aut vermium, aut arteriarum cordis ossæarum, aut polyphi ejus, aut calculorum aut aliarum causarum non cognitarum contingat, incurabilis est, atque instar Hæticorum lentè ac succellivè ad mortem deducit homines.

Si tandem malignitatis & veneni suspicio adest in palpitatione cordis, res est periculo plenissima, & rariùs ægri evadunt.

#### CURA.

Quod ergo attinet *Curam*: in genere ea ante omnia edirigenda, ut saltem causa peccata, seu id, quod musculum irritat, aut ejus nervum moventem vellicat, maturè removeatur, quo ipso spontè cessabit dicta convulsio. Nam irritatione ipsam sistere oporiet, non æquè nec semper tutum est; si enim sistitur sensus irritationis, periculum est, ne totaliter cesset cordis motus ac pulsus: itemque, cum palpitatione cordis laborantes soleant i. lig. em viriū imbecillitatem comitem habere, caveamus nobis ab opio, ne sc. hujus usu eas penitus prosterneamus, utut interdum, ubi gravior affligit paroxysmus ejus in hypochondriacis & scorbuticis, opium appropriatis additum ad coercendum impetum non sit inconvénient. Aspicienda ergò h. est origo mali, & ubi est à scorbutico, vel cachexia, vel malo hypochondriaco, vel affectu splenetico, aut hytterico, vel venenis, verme pericardii, &c. semper appropriatis his ipsis varianda est cura. U de mox patet, ut suprà dixi, palpitationem cordis ex aqua pericardii, & crescenti s. & conformatione læsa esse incurabilem; & solam eam, quæ à cachexia, scorbutico, & malo hypochondriaco, similibusque affectibus provenit, venire sub Praxi Medicam.

Quoad *punctum venæ sectionis* in palpitatione cordis, res est dubia: Nam expertissimi Practici eam cum cautela administrandam monent, ne vires prosterneamus, & ni addit summa plethora, planè omittendam: Habeatur ram-



men ratio causarum antecedentium cum usu venæsectionis. In graviore enim cordis palpitatione à subitaneo & nimio terrore aut timore, aut suspitione grumorum sanguinis, aut à suppressione sanguinis aliàs solenniter fluentis, contracta, aut si ex prægressa insigniore corporis commotione supervenerit, aut in junioribus sanguine fervido prædictis eveniat palpitatione, aut aliæ circumstantiæ occurrant, in quibus suspicio adest sanguinis circa cor aggregari, vel impetuosiùs circa vasa moti, tunc subinde necessitate coactus Medicus venam aperire necesse habet, ut sanguinis stagnationi ejusque impedito motui, aut præsentia aut imminenti, afferatur aliqualis medela, ut depleto sanguinis quanto facilior ejus circulus fiat, ne tam insigniter aut copiose, item in uno loco subsistere queat. Eò magis hæc convenit, sive subjectum sit plethoricum, sive reverà tale sive adparens; aliàs minùs tutam eam existimo. Prostant etiam exempla Practica quædam palpitationis cordis per venæsectionem in paroxysmo levata in HORSTIO lib. 3. Obs. 16. item in FONTANI Confil. 69. Responsis pag. 66. Ad miraculum eam cessasse observavit HOECHSTEDTERUS in Observat. Quin & hirudines applicatæ posterioribus ani venis, vel etiam applicatæ supra cor, interdum sedarunt paroxysmum palpitationis cordis. Exemplum habet ZACUTUS LUSITANUS lib. 2. Medic. Princip. Hist. 39. Obs. 2. de palpitatione cordis per hirudines supra cor admotas curatâ. Imò, quod mihi magis adhuc videtur paradoxon, ZACUTUS LUSITANUS observat palpitationem cordis validam, curatam per scarificatam cucubitulam supra cor admotam, lib. 4. Prax. Admir. pag. 136. Proinde in puncto venæsectionis experientia, & hinc circumstantiarum varietas ubique probè est attendenda.

Cùm verò inter Palpitationes cordis curabiles frequentissima sit ista, quæ ex affectibus hypochondriacis, scorbuticis, & hinc oriundis pathematis convulsivis oritur, propterea semper in palpitatione cordis hic reflexus est faciendus: & in talibus cordis palpitationibus, ratione peccantis acidi, tam in primis viis quàm in massa sanguinea fermentationem turbantis, in paroxysmo trium remedium genera, Martialia, hinc *Terræ* (quod in specie pertinent margaritæ, corallia præparata, magisterium coralliorum cum succo citri paratum, item tincturæ eorum, & omnia corallia, cinnabarina) ac tandem *salia volatilia*, utramque faciunt paginam in quacunque palpitatione. Equidem genuinæ tincturæ coralliorum rarissimæ sunt: inter mille modos parandi optimus modus hic est, qui sit beneficio menstrui ex rore Majali vel nive, sale universaliter turgescitibus. His simul analeptica, & virium ac spirituum refocillativa jungenda sunt, de quibus vid. WILLISIUS *Pharm. Rationalis*; quod quæ inter tamen Analeptica & spirituum confortativa, quæ semper sunt volatilia & penetrantia, observandum est, quod quoad salia volatilia sulphurea seu fortiter olentia non æquè omnibus subjectis talia convenire, sed interdum, uti in mulieribus hysteriis, ita in quibusdam hypochondriacis & doctioribus viris, qui ordinariò systema nervosum delicatum & sensibile obtinent, hoc fortius afficiendo paroxysmum exasperare; quod pariter in aliis affectibus convulsivis attendendum est. Talibus ergò loco salium volatiliū oleosorum & spirituum aromaticorum potius salia volatilia macra, ut spiritus salis ammoniaci, non oleosa, sed temperata, & simpliciter penetrantia, sine eo, ut fortiter nares afficiant, conducunt: v. g. essentia ambrae egregia est in lipothymiis & cordis palpitationibus, quæ tamen mulieri affectum hystericum exasperabit, loco cuius simplex quoddam sal volatile potius adhibendum erit: Cinnamomum & omnia ex eo parata egregia sunt in paroxysmo palpitationis cordis, non secus ac in lipothymiis; sicut & oleum cinnamomi destillatum omnibus in palpitatione cordis præferendum monet, & mirè laudat LINDANUS. Nihilominus tamen ab eius usu in quodam viro palpitationem cordis excitatam fuisse refertur in M. A. N. C. Ann. 3. Observat. 134. pag. 244, quod dudum etiam notarat MOEBIUS in Institut. Quod si verò à volatiliū sulphureorum & fortiter oleosorum ac odoriferorum, aut à Martialium usu ex improvise ductus & exasperatus jam fuerit paroxysmus, acidula penetrantiora, ac speciatim spiritus natri dulcis, figendo & sistendo humores commotos optimè eum compefcit: vid. loc. jam alleg. Cùm ergò cordis palpitatione sit saltem symptoma aliis superveniens affectibus, pro horum va-

ria differentia etiam hujus symptomatis nonnihil varianda cura; quod autem in specie attinet *Analeptica* in Palpitatione cordis, semper reliquis remediis addenda sunt *Melissa*, planra, si quæ alia, balsamica, ejusque essentia & spiritus per fermentationem paratus, quæ insigniter reficit aut lipothymia, aut cordis palpitatione affectos: idq; imprimis si hoc spiritu paretur essentia ambrae, de qua postmodum plura. Hujus primum Ens, ut vocat PARACELSUS Part. 2., mirè laudat FEBURE in *Chymia* §. 2. Vim habet aliqualem corpori inducendi rejuvenescèntiam; experientiâ factâ in Angliâ, ubi post primum ens mellissæ, propinatum vetulæ, ipsi capilli cani deciderunt, mentes antea naturaliter suppressi deinde fluxerunt, dentes & ungues regenerati, & rugæ seniles repletæ: Idem factum est in gallinis, quibus propinatum hoc primum Ens. Experimenta fecit, & mirè laudat in sua *Chymia* Part. 2., qui descripsit ibi processum & experimenta de primo ente mellissæ. Obiter hæc quoad rejuvenescèntiam. Item hæc ipsa melissa etiam vino irrorata, & externè regioni cordis vel sola, vel cum foliis borraginis in sacculo calido applicata, admodum conducere solet in ejus *radix*. Experimentum hoc primus fecit HELIDÆUS PADUANUS felici successu: Conf. FORESTUS lib. 17. Observ. 1., qui LÆLIUM à FONTE in Conf. 47. l. 2. imitatus est, & in thoracis vulneribus ex sanguine concreto excitatis palpitationes cordis ingentes hoc modo curavit: sedâ venâ applicavit melissam viridem & borraginem, aquâ rosaceâ & tantillo aceti rosacei irroratas, quas ipsas eundem calidè cordi admovisset, subito omnis palpitatione cessavit. Post melissam sunt caryophylli & citrus, item ros marinus, quæ cordis palpitationibus laborantes egregiè reficiunt. Imò terè omnia aromatica & nervina conveniunt, quæ inter est etiam radix zedoariæ in passione hysterica: item radix enulæ campanæ est insignis in hoc casu, uti & semen anethi atque dauci. Crocus etiam & ejus essentia, quæ dicitur cordis lætitia, tam externè, quàm internè commendat. solet. Internè ejus essentia seu tinctura; externè, si fiat *Nodus ex croco & camphora*, & in regione scrobiculi cordis suspendatur; qui nodulus est etiam singularis, quod obiter moneo, in melancholia hypochondriaca. De ambra & moscho res nota est, quod insigniter reficiant cor, ut dicunt, id est, quod spiritus vitales & animales roborent: de qua tamen ambra notandum est, quod habeat vim inebriativam instar spiritus vini, adeoque tandem nonnihil stupefactivam: hinc nimio ejus usu pro juvanda memoria quidam, imprimis senes, redditi sunt inspidi. In hac tamen cordis palpitatione vis hæc ambrae inebriativa minimè metuenda; nam, qui palpitatione cordis laborant, difficillimè inebriantur: res mira, interim tamen vera; unde eò tutius ambrae usus conceditur. Facit ergò huc essentia ambrae & croci cum spiritu rosarum vel melissæ parata, spiritus rosarum ambratus, in quo per fermentationem vis inebriativa ambrae insigniter corrigitur: Nam tanta vis est fermentationis, ut omnem stupefactivam vim, etiam ex opio, tollat. Paratur spiritus rosarum ambratus hoc modo: Quando rosæ fermentantur, additur ambra, ut eò melius dissolvatur: Huic spiritui rosarum ambrato, unum alterumque gramum vel guttula olei cinnamomi addita insigniter conducit. De cinnamomo, ejusdemq; oleo, vid. ZWELFERUS, & LINDANUS. De tinctura solis cum oleo cinnamomi Mynsichtii, vel aliâ, res nota est. Quæ vulgò communiter de tinctura solari, itè hujus extinctione in aqua Rosarum BURRHUS de Oculis ad *Barrholinum* refert, menstruo potius quàm auro in acceptis referenda erunt. Conducunt etiam cortices aurantiorum, item citri; horum enim sal volatile aromaticum in multis affectibus, in specie in palpitatione cordis, multum est utilis. Notum est, quod multi insigniter commendent aquas destillatas & alia medicamenta ex Corde, pulmonibus, hepate, & aliis animalium partibus; quæ tamen, meo quidem judicio, sunt nullius pretii: si enim destillatur aqua ex corde, vel exprimitur succus, vereor sanè, ne potius natura horreat talia remedia, quàm iisdem suaviter afficiatur. Aqua verò composita ritè destillata, spiritus etiam & sal volatile cordis cervi, & imprimis tinctura coralliorum cum spiritu cordis cervi parata, egregia est, in specie in palpitatione cordis hypochondriaca, & palpitatione cordis senili. Beato Dn. D. MICHAELIS multi usus fuit: nempe solutio coralliorum cum succo citri facta ad mellaginem blandè inspisatur, & cum spiritu cordis cervi extrahitur. Præter spi-



ritus & salia volatilia ex animalium partibus parata magni æstimantur, non quod hæc singulare quid obtineant præ spiritu & sale volatili sanguinis, sed quod à Præcticis soleat observari prærogativa; hinc spiritus & sal volatile cor. Cerv. in specie, item sal volatile viperinum, erunt egregia. In baccis juniperi uti alia multa latitant, & succedaneus est juniperus arbori cedro ad vitam longam, de quo vid. TACKIUS in *Chrysog.* ita ex his parata tinctura seu essentia cum spiritu proprio, vel Malvaticum juniperinum ROLFINGII in *sua Chymia*, & similia ex baccis juniperi parata, multum laudantur a FONSECA l. 1. Conf. 11. Quinta Essentia seu Elixir vitæ Matthioli notum est, imprimis sale volatili viperarum acuat: Nam ubi alia adhibentur in cassum, salia volatilia non fallunt, imprimis si cum spiritu sulphureo combinentur in corpus oleiforme. Camphora etiam non solum internè ad aliquot grana remediis appropriatis permixta, sed etiam externè, nunc cum nunc sine croco, in sacculo appensa, si cuti in melancholia hypochondriaca egregia est, ita & in cordis palpitatione. Hinc spiritus theriacalis camphoratus, non minus quam castoreum, utpote quod in omnibus morbis convulsivis est egregium, & à FERDINANDO Hist. 79. aliisq; quàm plurimis in palpitatione cordis commendatur. Unde essentia castorei cum camphora ad palpitacionem cordis insigniter, uti & essentia castorei cum essentia croci & ambræ mixta, in paulò largiori dosi usurpata conferunt. Nam castoreum jam a GALENI tempore in quavis palpitacione cordis in usu fuit, & confirmatur ab EPIPHANIO FERDINANDO, ubi castoreum omnibus aliis præfert remediis in palpitacione cordis: undè castoreum, uti & camphora & crocus cum spiritu salis ammoniaci vinoso vel cum spiritu carminativo soluta, & in essentia formam redacta, per consensum hypochondriorum palpitantibus conveniunt, in quibus corallia, salia volatilia, & Martialia ritè præparata, in paroxysmo sunt optima. Insigniter etiam in palpitacione cordis hypochondriaca commendatur *syrupus de limatura chalybis Mercati*, cujus descriptionem vid. in HORSTIO l. 3. Obs. 6., & credo. Aliàs serum lactis in palpitacione cordis melancholica commendatur à RHODIO l. 2. Obs. 40. Succinum etiam huc facit, quod in palpitacionibus cordis non minus, quàm lipothymia & syncope, affectibusq; hystericis, magnarum est virium, imprimis sal ejus volatile, & cū hoc paratus spiritus Cor. Cerv. succinatus nobilissimus: imò oleum destillatum succini ad gutt. lii. jv. vel. v. in aqua florum nymphææ seu florum aurantiorum, vel alia aqua appropriata expertum fuit remedium FONSECÆ Conf. 24. Huc etiam oleum pessilentiale Heinssii pertinet ex oleo succini, citri, & camphora.

Ex hisce formulæ sunt variæ in palpitat. cordis:

R. *Aque meliss.*

*Cinnam. cydon. an. ʒij.*

*Quin. Essen. Matthioli. ʒvj.*

*Spiritus theriac. campb. ʒʒ.*

*Corall. rub. præp.*

*Spiritus cord. cerv. an. ʒi.*

*Syr. flor. tunic. ʒvj. ad ʒj.*

M. D. S.

*Potio confortans contra palpitacionem cordis.*

R. *Aque meliss. cum. vino.*

*Fenicul. an. ʒij.*

*Spiritus theriac. campb. ʒʒ.*

*Corall. rub. præp. ʒi.*

*Syr. flor. tunic. ʒvj.*

M. D. S. ut ante.

R. *Aque meliss.*

*Cinnam. cydoniat. an. ʒliij.*

*Spiritus theriac. campb. ʒʒ. ʒvj. ad ʒj.*

*Cornu Cervi. cum sale volat. ʒj.*

*Corall. rub. præp. ʒij. ad ʒj.*

*Laud. opiat. gr. li. vel. liij.*

*Syr. flor. tunic. ʒʒ. ad ʒvj.*

M. D. S. ut ante.

Capiatur cochleatim. Vel

R. *Aque cinnamom. cydon.*

*Cordial. H. S. an. ʒi.*

*Fl. samb. ʒij.*

*Spiritus Cornu Cervi cum. sale volat. acuat. vel carminat. de tribus (qui spectatim in hypochondriacis palpitacionem cordis patientibus est egregius) ʒj. ad ʒij.*

*Syr. fenic. ʒʒ.*

M. S. ut ante.

R. *Aque cinnam. cydoniat. ʒj.*

*Cordial. H. S. ʒʒ. vel. ʒj.*

*Essent. vel rob. bacc. junip. ʒʒ. ʒij.*

*Croci ʒʒ.*

*Spiritus theriacal. campb. ʒj.*

*Olei destillat. cinnam. vel. succini pro mulieribus, gutt. jv.*

(Perindè est; oleum tamen cinnamomi viris, succini mulieribus convenit; non enim hæc semper possunt ferre cinnamomum.)

Agitentur & misceantur.

D. S.

*Potio contra cordis palpitacionem.*

Dosis cochlea j. vel. ij. pro renata. Syrupam studio omitto. Vel

R. *Aque meliss. cum vino ʒij.*

*Cordis cervi,*

*Cordial. H. S. an. ʒi.*

*Tinctura corall. cum spiritu Cornu Cervi ʒliij.*

*Salis volat. succin ʒj.*

*Syr. de canella ʒj.*

M. D. S. ut ante.

R. *Tinctura corall. cum spiritu Cord. Cerv. ʒij.*

*Essent. ambr. cum spiritu meliss. aut ros. vel spirit. rosar. ambrat. ʒj.*

M. S.

*Essent. a cordialis.*

Dentur pro dosi gutt. XXX ad XL. in haustulo vini vel aque cinnam. temperatæ, vel simili haustu appropriato.

Vel Pulvis hic:

R. *Tessar. concar. præp. vel corall. rub præp.*

*Cinnab. nat.*

*Antim. diaphor. simpl. vel martial. à gr. viij. ad ʒʒ.*

*Olei destillas. caryoph. gutt. j.*

M. f. Pulvis:

Cui etiam salis volat. Cornu Cervi gr. liij. pro labitu addi possunt:

D. S.

*Pulvis contra palpitacionem cordis.*

A conformatione læsa si sit vitium, ferè incurabile malum erit, ac saltem per exactam dietam, & minimum animi & corporis motum, quantum possibile sustentandi tales ægri.

Quod attinet externa, aquam carbunculi, spiritus, balsama & olea regioni cordis illinenda: Interdum aliquid præstant, sed parum; saltem spiritus reficiendo graviora symptomata inhibent; unde quilibet potest abundare suo sensu: illinenda parvi æstimo. Si tamen vitium sit ex hypochondriis cum rugitibus & borborygmis intestinorum, speciatim ex affecto splene, aut ex passione hystERICA natum, tunc in his casibus ad spasmos coercendos ea remedia, quæ aliàs in hystERICA passione, ex asâ foetida v.g. & ex galbano usitata sunt, nempe emplastrum matricale de galbano cum oleo succini vel oleo spicæ malaxatum, vel abdomini, vel splenis regioni, & in specie huic emplastrum de Nicotiana, pro varietate symptomatum commodè applicari possunt.

## C A P U T II.

### D E PALPITATIONE ARTERIARUM PARTICULARI.

V ERùm præter cordis palpitacionem subindè etiam particulares arteriarum palpitaciones molestæ sunt ægris, ita ut modò in hac, modò in illa parte, cum impetuosa vehementia arteriæ pulsant. Splenica interdum, interdum temporum arteria pulsant: quod facit exemplum BARTHOLINI Cent. 1. Hist. 18. de Pulsu arteriarum carotidum, ut etiam strepitus & sonitus possit audiri: sicut & alia vasa pulsant particulariter.

C A U S A E.

Tres imprimis causæ sunt particularis talis pulsationis seu palpitacionis sensus:

1. Inflammatio ejusdem loci; exinde enim arteriæ tenduntur, & ex fibrarum aliquali contractura, dilatationi renituntur, undè semper dolor pulsatorius supervenit.



Est impedimentum quoddam in sanguinis circulo; huius enim nonnihil in quadam parte sufflaminato transitu, distenta nimis arteria manifestum pulsationis sensum exhibent.

3. In specie Hypochondriacæ ex dicta causa pulsationem arteriarum percipiunt, nunc in toto corpore, nunc & in regione hypochondriorum aut lumborum infra costas pothas proximè, ubi nempe arteria coeliaca, & in specie insignior ejus ramus splenicus situs est. In his arteriæ tunica per consensum splenis aut partium vicinarum ad spasmus seu convulsivum motum disponitur, unde rigidiores propter fibras sensibiliter pulsant, cujus occasione sanguinis motus in particulari quadam arteria impeditur, utut non penitus tollatur; hinc enim est, quod paroxysmum eundem hypochondriacum, aut melancholicum, aut vomitum cruentum splenicorum subinde palpitantes tales in illis locis præcedere soleant. Præter hæc taliter affecti sanguinem spissum ac crassum, & ob id difficulter mobilem habere solent: unde & varices in venis talium ægrorum observavit Bartholinus Cent. 6. Obs. 24. de Pulsatione per universum corpus cum varicibus copiosis.

### C U R A.

Verùm taliter affecti optimè per Martialia curantur, cum ut plurimum ad malum hypochondriacum inclinare soleant, sicut priores duo modi imprimis per sudorifera.

### C A P. III.

#### D E

### LIPOTHYMIA, SYNCOPÉ ET VIRIUM PROSTRATIONE.

**P**ulsui cordis & hinc arteriarum nimio aucto oppositum est vitium pulsus parvus, rarus, debilis, myurus vel vermiculans, idq; frequenter in Imbecillitate ac Languore virium plus minus intensio, hinc animi deliquiis: de quibus optimè tractat SYLVIVS l. 1. Prax. c. 34. Languor hic aut imbecillitas partium, functionum, & viriis, nō solum à nativitate quibudam contingit, sed etiam variis ex causis supervenit: Atque est vel successivus, qui ipsis morbis supervenit, vel eos antecedit, vel etiam post eos curatos subinde superest; Non rarè enim sunt virium imbecillitates, quæ post morbos diuturnos observantur accedere: Vel languor virium hic est subitaneus, cum ex improviso penitus prostratis viribus lipothymia seu lipopsychia, syncopé aut asphyxia, ægrum corripit. Cum hac virium Imbecillitate semper conjunctus est pulsus tardus & minor; item pulsus debilis ac justo languidior, tunc præterea plerumque rarior quandoque, imò sæpius per intervalla certa aut incerta intermittens, interdum secundum arteriæ ductum magis magisque deficiens, qui tunc vocatur Pulsus myurus; qui ubi fit minor, dicitur Pulsus formicans seu vermicularis. Concurrunt simul sensuum tam in quam externorum torpor, & deficiens plus minus corporis motus observari solet, quod in Languore successivo saltem lassitudinis spontaneæ nomine, Germanis *die mattigkeit*, appellari solet: in qua ægri conquiescunt de vigore corporis debito deficiente, sunt tardi admodum, membra ponderosiora videntur, & ad quaslibet actiones torpent. Vires enim seu robur corporis propriè loquendo nihil aliud est, quam intensior sanitatis gradus, quo actiones vitales potenter satis exercere possumus.

Differunt saltem gradualiter, non essentialiter, lipothymia, syncopé & asphyxia. In omni animi deliquio seu LIPOTHYMIA, præter pulsum minorem & debiliorem plus minus, prout lipothymia est magis minusve periculosa seu gra vis, simul sensus, in- & externi omnino obfuscantur, & motus animalis, tam voluntarius, quam etiam quodammodo naturalis, non nihil deficit, adeo ut respiratio etiam aut nonnihil obscura aut ferè nulla reddatur; quæ symptomata tamè omnia denuò evanescent, & eger in antiquum statum restituitur, nempe sanum. Quoad SYNCOPEN: ita vocatur à *σύνκοπη*, concido, quod ægri concidunt; est gravior ac singularis animi deliqui species, & ab Apoplexia parum differt. In hac enim atro-

ciora hæc adsunt symptomata: subito ac inopinatò ferè concidunt ægri, pulsus vix vel nullus observatur, sensus externi & interni abolentur, motus corporis est nullus, ut etiam nulla ferè respiratio: Interim adsunt anxietates præcordiorum, sudor frigidus & glutinosus per poros erumpit, partelque corporis omnes frigent ac pallent: & in hoc differt Syncopé à Lipothymia, in qua nequidem corporis universi frigus semper observatur, quamvis perpetuus sit Syncopi: vid. SYLVIVS l. 1. Prax. c. 34. §. 65. Imò urinæ & alvi excrementa interdum spontè effluunt, ita ut mortuistales syncopizantes, quam vivis, existant similiore.

Syncopizantes vitam agunt mediam resurgentem, non descendente. Ejusmodi vitam mediam resurgentem vivunt etiam insecta omnia per hyemem abscondita, cochleæ, ranæ, hirundines, forsàn & Leucomoriæ populi, de quibus Liber Baro de HERBERSTEIN *Rerum Moscov. Comm. p. 82.*, quod sint homines syncopé detenti, & quasi mortui: vid. KERGERUS de *Ferm. Sect. 1. c. 6 p. 59.* Quomodo verò insecta ad vitam iterum perveniant? vid p. 56. l. a.

Observatæ etiam interdum fuerunt syncopæ in morbis malignis, quæ sine anxietate fuerunt, quando neglexerunt vomitoria, imprimis qui iis obnoxii fuerunt.

Omnia hæc sunt adhuc graviora in ASPHYXIA, ita ut cum pulsu planè abolito & aliquandiu ad sensum cessante ægri tales instar mortuorum jaceant.

In omnibus his affectibus, tam imbecillitate virium quam etiam lipothymia speciebus, observetur, mutationem insignem, tam imminente quam præsentem, cognosci ex pulsu & respiratione, ita ut pulsus plus minus deficiat in robore & magnitudine, nunc sit parvus, debilis, nunc magnus, interdumque planè nullus; quo cessante, cessant motus thoracis & respiratio. Cæterum sudor frigidus & glutinosus, in omnibus lipothymia speciebus plus minus observabilis, non est ordinarius & ferrosus sudor ex sanguine per poros cutis evaporans, sed est nihil aliud, quam ipsum nutrimentum partis roridum, & spermaticum, quod sub syncopé resolutum ac dissolutum ex partibus subcutaneis sub forma glutinosi ac frigidi sudoris erumpere & effluere solet. Unde & hic sudor singulares habet vires delendi verrucas excrecentiasque; item inflammationes hæmorrhoidum: de quibus videb. HELMONTIVS.

### C A U S A E.

Ut causas Pulsus minoris ac rarioris, adeoque virium Imbecillitatis scrutemur, suppono: corporis nostri vim vitalem radicam fundamentaliter esse in sanguine; exlerere verò se formaliter per subtilissimam sanguinis substantiam, seu partem ejus summè activam ac mobilem quam spiritus appellamus; qui in præcordiis aeris inspirat adjumento volatilitali instar radiosæ & luminosæ texturæ per totum corpus distribuuntur; nunc junctum in sanguine per vasa arteriosa, qui vitalis dicitur; nunc scorsim, traiciendo per cerebrum & nervos, qui Animalis appellatur, unde partium solidarum firma structura & tonus dependet.

Veteres robur corporis aut vires à Calido innato, & cordis firmiore textura, dependere dixerunt. Sed cum Calidum innatum, præter sanguinem & hujus motum intestinum, nullum detur, adeoque hujus respectu HOFMANNUS Vires corporis in temperamento, tanquam anima, consistere non ineptè dixerit, fons virium primarius potius in ipsa vita seu hujus principio & motu sanguinis intestino querendus est, à quibus corporis temperamentum & esse calidum, hinc vires ejus oriuntur; ita quidem, si fermentatio sanguinis naturalis potentior fuerit, calor & vires simul intenduntur, eadem verò sufflaminata tepor & imbecillitas simul obrepunt, virumque dissipatio, mortis prodromus seu principium est. Quod cordis constitutionem firmiorem attinet: nec hæc ad virium robur aliquid confert, quia in eo, tanquam officina, spiritus & vires corporis juxta veterum hypotheseon non generantur, sed ipsum potius cor activitatem suam à spiritibus animalibus & sanguine recipit.

In sanguine ergo remotè & fundamentaliter, in spiritibus proximè & quali formaliter & effectivè debilitas virium, tam successiva quam repentina, investiganda erit. In sanguine quidem, quatenus hic minus aptus est, ut debeat



debita fermentatione volatillari, ac in debitos spiritus exaltari possit: id quod fit, vel quatenus sanguis absumptus vel exhaustus est, vel quatenus idem deficit in sua acrimonia (salina fermentativa, i.e. dum in sanguine deficit acrimonia salina); in specie inertia salis volatilis urinosis & oleosis, scilicet, disponit sanguinem, quod minus aptus sit ad spiritus ascensionem suscipiendam; & contra non raro vitiose peccat acidum: idque in subiecto subinde plus minus viscido radicum: quorum causae antecedentes ex primis viis chylosi vitatae, & ejus perfectione in duodeno & debili fermento bilis, unde cacochylia & cacochymia, de quibus *supra Sect. 13.* actum est, investigandae erunt.

Spiritus verò repentinam inferunt virium prostrationem vel lipothymiam, quatenus vel deficiunt in cordis motione vel constrictione, & regendae corporis machinae non sufficient, vel quatenus sunt minus mobiles, volatiles ac activi, sicque quasi obruti & compressi, vel quatenus sunt nimis mobiles, adeoque facile dissipabiles, ita ut texturam eorum luminosam interruptam intereant operationes vitales, adeoque omnis repentinam virium debilitatis causa vel vitio spirituum vitalium in sanguine, vel vitio spirituum animalium in systemate nervoso coniungat: Unde in omni Virium imbecillitate pulsus notabiliter alteratur, in magnitudine quidem & parvitate virium sanguinis & spiritus vitalis innuit; alteratur verò in robore maiore vel minore, virium spirituum animalium ostendit.

Dependent tanquam quodam circulo hi spiritus eorumque functiones à se invicem, ita ut spiritibus vitalibus persum, euntibus seu radice inde diffusi evanescent, & eclipsentur spiritus animales; sicut è contrà his spiritibus evanescentibus, & cordis ac sanguinis & spirituum vitalium motus itidem cessat: Prius v. g. in suspensis manifestum est; si enim constringantur arteriae carotides, subito quoque cessat sanguinis motus: *Posterior* in apoplexia fortis tactis, in quibus cessante radio spirituum animalium simul quoque vitales operationes evanescent.

Successivus ergò virium languor ex sanguinis deficiente in praecordiis turgescencia oritur, unde etiam hujus respectu pulsus minores, rariores & tardiores; sicut hinc dependentes spirituum animalium defectus, debiliores existunt: atque frequentissime ex praeternaturali sanguinis glutinositate aut visciditate, unde partes ejusdem salinae activae obrutae minus concurrere inter se ac fermentare possunt: vid. SYLVIUS *c. l.* Quod si in hac sanguinis glutinositate, uti non raro fit, peccet simul praeternaturale Acidum, tam in sanguine quam lymphae, malum hoc euadit ed deterius, cum sic magis magisque inspissetur, ac tantum non coaguletur massa sanguinea, exindeque vitalis ejus fermentatio tantum non omnino aboleatur: hinc est, quod post morbos acutos curatos, si tantillum a dieta peccaverint aegri, speciatim in alimentorum assumptione excedant, Languores adhuc superveniant: hinc post morbos chronicos non rite curatos, in quibus spiritibus exhausta massa sanguinea spissior quasi ac crassa reddita fuit, Virium Languores saepius sunt diuturni, quod nondum restitutus sit completè sanguinis motus vitalis: hinc & cachectici, hypochondriaci & scorbutici subinde sunt adeò imbecilles ex vitata & anomala sanguinis fermentatione, propter vitiosum & rancidum acidum in massa sanguinea tunc abundans, & massam sanguineam inspissans. Unde, quando horum sanguis nimium spissescit, minus expanduntur ventriculi cordis, pulsusque sic sunt rariores, tardiores ac minores: quibus his positus necessariò etiam deficiunt spiritus vitales & animales, ex quorum defectu maiore vel minore etiam reliquae functiones, tam vitales quam animales, plus minus solent imminui. Quare in virium imbecillitate sensus sunt hebetes, imò vix sufficientes aut motui voluntario, vel motui naturali, speciatim legitimo cordis motui, unde pulsus est tenuis & simul tremulus ac languidus; aut ubi sufficit quoddam modo spiritus movendo cordi, ubi tamen à gravioribus objectis in motu distrahantur, vel perturbantur, vel figuntur, uti fit ab opiatibus & narcoticis, tunc necesse sequitur talis virium prostratio & languor.

Hæc de virium imbecillitate satis clara. Subitanei verò Languores seu Lipothymiae, aut syncopae, aut asphyxiae, radicatae sunt in spiritibus vitalibus, aut animalibus, nunc conjunctim, nunc separatim, ita ut in suo circulo uno deficiente, alter labefactetur quoque. In vitalibus quidem, quando subito deficiunt, ob cessantem in praecordiis quacunque de causa sanguinis fermentationem vitalem. Hinc enim Evacuationes quævis nimiae per quæ-

conque loca, v. g. sanguinis, item geniturae, & humilium humorum abundantes effusiones, cum absumantur spiritus vitales, sequitur lipothymia & syncopa; sive sanguis reddatur per nates, sive per uterum, sive hæmorrhoides, venæsectionem, aut alio modo: item nimia *aquarum hydropicarum evacuatio*, puris contentum facta ex thorace emissio, nimius sudor &c. syncopen inducunt: uti etiam crebriores purgationes, balnea nimia aut diuturnior in his mora, ob dissipationem spirituum animalium subinde syncopes inferunt: mutatio item subitanea ex aere fervido in nimis frigidum, aut etiam *ingurgitatio potus intempe frigidæ post insignem corporis incalcescentiam*, nunc lipothymias inducunt: Exempla habet SCHENCKIUS *lib. 2. Observ. 219.* ex BENIVENIO *c. 17.* ubi observat animi deliquium seu lipothymiam ex frigidissimo vino hausto sub longum lufum sub ardentissimo sole: & talia exempla syncopae correptorum ex nimio calore & frigore non sunt rara.

De venenis res nota est, quod eadem, sive extrinsecus applicata per morsum ac puncturam animalium venenatorum, sive intrinsecus assumpta quacunque, graves ac periculosas dent lipothymias.

Pertinent huc vitia ipsius cordis, praesertim abscessus, & partium ei vicinarum, qui subito rupti dant periculosas syncopes: sic praeter TULPIUM *lib. 2. Observat. cap. 16.* qui habet lipothymiam ex abscessu in sinistra cordis auricula, SANGEZ, Medicus Hispanus, in *Observat. pag. 273.* refert notabilem observationem de Bibliopola longo tempore lipothymiam sepe correpto, quo mortuo, maximum in corde apostema, mediam ejus partem occupans, inventum fuit: *Alius Venetus*, refert *idem*, in *sinu cordis apostema dimidii ovi magnitudinis habuit, unde & hic ipse quoque subinde syncopae correptus fuit. Sanguinis quoque habenda est ratio*, qui aut nimis parcus post copiosas excretiones, aut pure victatus, aut subito coagulatus, v. g. ex haustu frigidæ post æstum, aut aliâ quavis ratione inspissatus ac incrassatus, & ob id fermentationi ac spiritus ascensionis debita ineptus, aut in debito circulo impeditus, v. g. in syncopae cardiaca, funestam & periculosam lipothymiam & syncopen comitem ducit: vid. *infra suo loco*, ubi de Apoplexia, ubi agitur de syncopae cardiaca, quid sit? Quod verò sanguine spissescente & coagulato in corde subito totum corpus corruat, sit, quod non tam sanguinis circuitus necessarius sit ad sustinendum totum corpus, sed imprimis, quod requiratur continuus radius spiritus vitalis ex corde cum sanguine in totum corpus: hinc sanguine in syncopae ita in corde stagnante & non fermentante, adeoque deficiente plus minus ejus motu, tam locali quam intestino, intercipitur simul necessariò spirituum animalium & vitalium commercium, hinc necessariò omnes facultates, & aegri mortuorum instar corruunt. A veribus syncopen notant ZACUTUS LUSITANUS *lib. 2. Prax. Admir. Observ. 40.* BONETTUS *lib. 1. Med. Septent. S. 16. cap. 4.* SCHENCKIUS *lib. 3. Observ. 218.* PANAROLLUS *Pent. 4. Observat. 29.* Spiritus verò animales lipothymias inferunt, quando subito deficiunt ex eorum ataxia & confusione, ab objectis externis inducunt: unde omnes causae remotae ad syncopen disponunt, afficiendo vel spiritus vitales, vel fermentationem sanguinis impediendo, vel spiritus animales in ipsis sensoribus: ita quidem, ut in genere vel iidem oppressi & quasi concentrati in sua activitate impediuntur, seu fit in syncopae ab externis orta, v. g. in subitaneo terrore; vel iidem dissipati & subito resoluti evanescent quasi, ac ita in operando deficiant, verb. grat. in nimio gaudio. Pertinet ergò huc, quod ab odoribus fortibus, gravibus, ingratis & similibus, aegri in lipothymiam & syncopen incidunt: Sic refert AMATUS LUSITANUS *Centur. 2. Observat. Curat. 36.* de Monacho, qui ab odore, imò vel solo adspectu rosae in gravem lipothymiam incidit. Funestius exemplum est, quod habet HOFFERUS in *Herc. Med. pag. 311.* de Puerpera, quæ noviter pepererat, & ex odore strophili, in quo inuoluitæ fuerunt rosae, subito lipothymia lethali fuit correpta. Hinc est, quod feminæ hystericae ex odore zibethi, moschi, cinnamomi, &c. cum passione hysterica seu hypochondriaca simul in syncopen corruant. Nec solus odor, sed saepius etiam praesentia rei horridæ, infert lipothymiam ac syncopen.



Pertinet huc idiosyncrasia nativæ, secundum quam quidam certa animalia horrent, eorumque præsentiam ferre nequeunt: sic qui non possunt perferre præsentiam felis aut canerorum (quale ego novi exemplum) aut murium, aut canum, si, licet iis insectis, in loco quodam talia animalia abscondantur, subito tamen illis defectiones animi cum sudore frigido & anxietatibus ingruunt, ob intensius affectos spiritus animales.

De animi affectibus, vel fortioribus vel magis subitaneis, in terrore subitaneo & gravi tristitia, nuncio insperato, iracundia nimia, &c. res nota est, utpote quæ immediate systema nervosum ac spiritus animales afficiendo, & insigniter perturbando, inferunt syncopes & lipothymias: Ita de *gaudio subitaneo*, quod evanuerint quasi spiritus animales, syncopem lethalem obortam, præter LIVIUM, LOTICHIIUS in *Observ. Medicis*, & MARCELLUS DONATUS in *Histor. Mirab.* habent: Extrema obortem syncopen periculosam, per venæsectionem curatam, refert FONTANUS in *Conf. & Resp.* p. 63. Imò sola fortior ac intensior rei cuiusdam horrendæ imaginatio *syncope* quosdam syncopicos reddidit: Exemplum, quod imprimis huc facit, habet HILDANUS *Cent. 1. Epist. 34.*, ubi refert de suo fervo equo insidente, cui cum narrasset calamitosas strages bellicas, ex sola narratione in syncopen incidisse. *Nimius corporis motus, ac extrema defatigatio*, similiter interdum in lipothymias inducit ægros; uti etiam *graviores dolores*, in iis præsertim, qui sunt rarioris texturæ, adeoque spiritus rariiores & facilius dissipabiles habent.

Denique epilepticiis paroxysmis subinde superveniens symptoma est syncope, uti etiam aliis *affectibus convulsivis* gravioribus: sive convellantur saltem partes internæ, quæ dicitur à mulierculis *Epilepsiam in corpore*; uti v. g. fit in passionibus hystericis, aut in doloribus nephriticis subinde gravioribus: sive simul etiam externæ partes afficiantur, quæ spirituum animalium perturbatissimum innuunt motum. Plura de causis proximis & remotis languoris virium & syncopes videb. in SYLVII *Præcap. 34.*

Imprimis sui considerationem meretur syncope, quæ ex causa interna oritur, & sponte quasi subinde ægros frequentissime invadere viderur, de qua vid. GORRÆUS in *Defin. Med.* pag. 157. Hæc ordinariò solet habere causam affectionem orificii ventriculi superioris, quo male affecto, ab objecto ipsi inimico, ex consensu ejus cum universo systemate nervoso lipothymia & syncopes supervenire solent. Manifestum hoc est non solum in mulieribus hystericis, sed & in viris, qui aliquid hypochondriaci patiuntur; his enim levi occasione lipothymia supervenit, sub quorum intuitu ordinariò dicunt: *Malum sensum appropinquare cordis*; Hinc vertigo tales corripit, & ita sub forma suavis omni lipothymia corripuntur; excusitati dicunt: *Satis bene se fuisse*. Patheniata hæc originem habere solent simpliciter ex stomacho & primis viis, imprimisque ex sensibili orificio stomachi superiore affecto, per cuius sensum omnia reliqua superveniunt symptomata, & spiritus vitales deficiunt, ita ut frequentissimæ syncopes à causa interna oriundæ ex orificio hoc affecto contingere soleant, & tales ægri ferè ordinariò mutationem circa hypochondria præcedere, observare solent.

Ex lacte coagulato lipothymiam observavit HEINRICUS ab HEER *Obs. 15.* Ex *effluviis fungorum* syncopen notat ZACUTUS LUSITANUS libro 5. *Med. Print. Hist.* 23. AMATUS LUSITANUS *Centur. 1. cur. 29.* *Acres succi, præsertim æruginosi*, orificium dictum gravius infestantes, præter anxietates, crebras lipothymias, præsertim in subjectis tenerioris & rarioris texturæ, inferunt.

Tales syncopici, jacentes in lecto admodum debiles, dolores, mortificationes ac utillationes, aliaque pathemata, circa stomachi regionem percipiunt; item præter inexplicabiles istius loci mutationes seu molestias sub imminente syncope sentiunt vertiginem, caliginem oculorum, & tenebrositatem, unde sic animo delinquant; paroxysmus tandem iterum evanescit, utur levi occasione recurat, & ægri vel leviter saltem in lecto se moventes, aut extra lectum promoti, incidant eandem. Uti frequens est hæc syncope stomachica, ita etiam *nunc* per essentiam ex contentis stomachi, *nunc* per contentum affectis partibus, aut nervis abdominis, stomachum simul plus minus affi-

cienibus, accidere solet. Imò vix lipothymia quæquam corripit, quin sub eadem imminente alterationem quandam notabilem, vix etiam explicabilem, circa stomachi regionem percipiat, in quo stomachus vel mucosa humore, vel aliis vitiosis succis, per pylorum ad orificium superius regurgitantibus, eidemque impactis laboret: acque tali in casu lipothymia optimè vomitu curabitur, ita enim remotis causis malum hoc mox cessabit; vel absorbentibus terreis: quibus tamen adjungantur aromatica: vid. SYLVIIUS l.a.

His omnibus ita consideratis, facile est observare: *Causas syncopes proximas* esse aut spiritus vitales, subito deficientes ob cessantem sanguinis fermentationem ac circulum, aut spiritus animales subito in motu naturali deficientes; unde quasi abrupti, vel ad alias ataxias & convulsiones acti, movendo seu constringendo cordi minùs infervere possunt, adeoque spirituum consortio abrupto syncope supervenit. Hinc *causa* modò dictæ *remota* omnes vel sanguinem, vel spiritus vitales afficiunt, vel ceu objecta sensibilia spiritus animales in motu suo alterabunt: Ita ut hi ipsi spiritus

1. In motu debito, speciatim cordis, aut deficiant, dum oppressi & quasi concentrati in sua activitate impediuntur, v. g. in subitaneo terrore; vel dissipati vel resoluti evanescant, ac in operando decedant, & sic cor quasi paralyti laboret: Vel

2. In suo motu quasi exorbitent, & ex irritatione quâdam, & inde natis spasmi undecunque contractis, *cor in continua systole* seu constrictione detineant, ita ut sit continuus quasi cordis spasmus & convulsio, à spiritibus animalibus inducta.

Sanè in morbis convulsivis, præsertim partium internarum, non rarò hæc ipsa est; unde in tali casu ægri ad te redeuntes conqueruntur: *fuisse ipsis, ac si quis cor ipsis compressisset, vel pedibus calcasset*: Id quod innuit validam muiculi cordis contractionem. Sic sanguinem & spiritus vitales afficiunt quælibet evacuationes, mutationes subitanæ aeris, sanguinis quæcunque insignes aut in crassi, aut in motu locali alterationes. *Vitio verò spirituum animalium in motu deficientium* orietur syncope post odores graves, & objectis ex idiosyncrasia hostilibus; item quæ stomachi orificium afficiunt, ex cujus cum universo nervorum systemate consensu facilius spirituum animalium in motu abruptio fit. Dolores etiam spirituum animalium ratione syncopen inferunt. Neque etiam hinc negligendum, quod asserit PISO *Tract. de Colluvio serena* pag. 166. dicens: Quod syncopes funestissima & momentanea causa sit motus cordis repenti abolitus ab interceptione seu obstructione nervi cordis motorii, undecunque nervus iste afficiatur, aut (verba sunt PISONIS) *ex subtili aquula, quam nos vocamus lympham, ex cerebro eo derepente defluente, spirituum motus interceptatur*. Declaraturus hanc suam sententiam observationes aliquot raras & curiosas subnectit, & dicit: esse *quandam cordis apoplexiam*. Gaudium nimium spiritus dissipando, item dolores diurni, pariter ex dicto fonte syncopen inferunt. Et ex his spiritibus animalibus, aut deficientibus, aut perturbatissimis fit syncope; sive causa externè hæreat circa cor, aut in corpore constrictione musculorum; siue sit in valis. Unde est quod spiritus animales dicuntur luminosi, qui continuato lumine omnes corporis partes continuò illustrant, & ita ad suas functiones aptas reddunt: Vid. BARTHOLINUS de *Luce Animalium*, & HELMONTIUS. Hoc lumine intercepto fit syncope: & à Paracelsis vocatur Syncope Ecclipsis Microcosmi, quia nempe deficit lumen vitale, corpus irradians.

Certum est, semper observari in syncope virium sanguinis circa præcordia, & spirituum in motu & nervis: Vid. STENO de *Corda*.

## DIAGNOSIS.

Quod attinet *Signa* syncopes & debilitatis virium: per se manifesta sunt satis. Cautè tantummodò probè distinguendæ. Melius autem has non potest quis percipere, nisi ex adiutis relatione.



PROGNOSIS.

**Quoad Prognosin:** Distinctio facienda subitanei & successivi virium languoris, ac quidem in iis, qui siue causa manifesta sunt languidi, ac decrementum virium patiuntur, in morbos inclinant, in specie ad scorbutica mala.

Reconvalescentes, præsertim à morbis gravibus acutis, diu adhuc languidi, vel recidivam, vel cachexiam, & tandem hydropem vel febres intermittentes, in specie tertianam intermittentem incurrunt.

In morbi cujuscunque principio præter manifestas causas mox summa virium proveniens prostratio maligni morbi signum est, adeoque morbus talis Febbris maligna appellari solet.

Syncope & Lipothymia quæcunque est periculosa, plus minus tamen, prout magis vel minus aut est durabilis, aut deficit cordis motus: item prout causæ antecedentes graviores vel leviores fuerint. Unde quando syncozizantes post exhibitionem spirituosarum aut aliarum rerum volatilium; item post irrorationem faucium cum liquoribus spirituosis & fortiter odoratis & stimulantibus, aut faciei cum aqua frigida, non resuscitantur, nec post prætunica etiam ad se redeunt, in talibus signum est gravissimæ, & ob id periculosissimæ syncope.

Syncope ex affectu stomachi officio sinistro minus funesta est.

Si adfunt anxietates præcordiorum & inquietudines, omnes sunt ex stomacho.

Syncope, quæ est ex effusione sanguinis, genituræ, aut aliorum humorum quorumcumque, minus periculosa est eâ, quæ oritur à causa interna, & non raro abdita.

Quod magis affligitur massa sanguinea, eò periculosior est syncope: hinc post Purgationes, venæsectiones nimias, ut & hæmorrhoides, solet esse funesta.

Tandem sudor frigidus syncozizantibus superveniens, quod magis glutinosus & copiosior, eò gravior & periculosior syncope est.

CURA.

**Quoad CURAM:** In languore virium successivo seu paulatino omnia ea conveniunt, quæ vitalem sanguinis fermentationem & spiritusascensionem promovere, bilem plus minus peccantem acuerè, & ita sanguinis glutinositatem attenuare, simulque vim stomachi digestivam suo modo restaurare valent. id quod uno nomine faciunt volatilia & aromatica, diutius continuanda. Aromatica enim sunt stomacho amica, acuum bilem, & sanguinem ad volatilem naturam & spiritusascensionem promovere. Pertinet ergo huc spiritus vini & vina generosa, imprimis Claretæ seu Vina Hippocratica dicta, vel ex vegetabilibus aromatibus ordinentur talia vina medicamentosa, quæ subinde hausta vires ac sensus reparant, & similia alia analeptica recentia. Dabo exemplum Noduli talis infundendi in vinum in languore virium pro iisdem restaurandis:

*R. Herb. rorismar.*

*Menth. crisp. ana M. j.*

*Salvia,*

*Melissa ana M. ss.*

*Rad. acori veri,*

*Enule,*

*Feniculi ana ʒj.*

*Sem. 4. calid. min. ana ʒj.*

*Cinnam.*

*Cubeb.*

*Caryoph.*

*Macis ana ʒij.*

**Incisa & contusa includantur sacculo: D. S.**

*Nodulus ad vinum medicamentosum.*

Affundatur Vinum, de quo subinde hauriat æger jejunos, item omni passu, poculum unum. Quoniam vinum imbibit successivè vires simplicium aromaticas, & vires ex morbo veletiam senio prostratas restaurat: Nam vinum tanquam lac senum vires successivè restaurare valet. Vel

*R. Herb. rec. menth. vel meliss. M. iij.*

*Rorismar. M. i.*

*Rad. rec. acori veri ʒj.*

*Essmuller. Oper. Tom. II.*

*Angelica drach. vj.*

*Rad. Galang. drach. iij.*

*Sem. anisi,*

*Feniculi ana unc. ss.*

*Passul. min. unc. iv.*

**Incisa & contusa includantur Nodulo, qui infundatur in aliquot mensuris vini Rhenani:**

*D. S. ut supra.*

*Vel*

*R. Fel. rorismar.*

*Majoran.*

*Salvia,*

*Calamintha mont.*

*Menth. crispæ ana M. ss.*

*Rad. angel.*

*Galang.*

*Acori veri,*

*Enul. camp.*

*Fenic. ana unc. ss.*

*Sem. 4. calid. maj. ana drach. ii.*

*Cinnam.*

*Cubeb. ana drach. j.*

**Concis. & contus. infuantur sacculo, ac affundantur vini s. q.**

*D. S. ut supra.*

**Vid. SYLVIVS l. i. Prax. cap. 34. pag. 613. & sequ.**

Quod si adsit malum scorbuticum vel hypochondriacum, volatilia actia, ut cochlearia, nasturtium, armoracia, piperitis, &c. commodè possunt addi; ac ut melius operentur, singulo haustu certa dosis spiritus cujusdam volatilis, verb. grat. *Spiritus salis ammoniaci anisati gutta aliquot instillari poterunt.*

Item *Essentia & Elixiria stomachica, aque vite, apoplectica, epileptica, &c. salia volatilia oleosa*, Elixyr proprietatis sine acido, & sexcenta talia, locum inveniunt, ter quotidie usurpando, manè, à meridie, & sub introitu læsti: quin imò non inconsultum videtur, etiam sub ipso passu talibus uti.

Quod verò attinet syncopen & lipothymiam subitam: in hujus paroxysmo opera danda est, ut ægri quasi revocentur in vitam. Extra paroxysmum autem recidiva præcavenda.

In paroxysmo ad revocandum ægrum ordinariò generosiora paulò & spirituosiora remedia, quod magis talia, eò meliora, quæ nempe penetrant, & volatili spirituositate spiritibus deficientibus faciliè applicabilia sunt, simulque sensuum organa fortius vellicando, spiritus animales aliquatiter resuscitant activosque reddunt, & eorum in motu ataxias restitunt. Et quidem penetrantia salina volatilia, alcalina vel acida, primatum obtinent, habità tamen semper ratione causarum præcedentium: Illa, ubi spiritus quasi obruti concentrantur, & à debitis expansionibus impediuntur, ut spiritus salis ammoniaci, liquor Cornu Cervi succinatus, &c.: Hæc, ubi iidem faciliè dissipantur & exsolvuntur: hinc exen. gr. in lipothymia ex purgatione nimia, syncope ex in venæ sectione, ex vomitu, balneo, æstu nimio, corporis motu, &c. contracta, acida volatilia, ut haustus vini Rhenani, & acetum forte, liliorum convallium, calendulatum, &c. ori infusa, aut naribus admota, sunt admodum convenientia. Accedunt etiam his spirituosæ volatilia oleosa, & salia volatilia oleosa: quæ tamen cautè usurpentur, quia non omnia subiecta promiscuè talia ferre possunt. Non ergò indistinctim aquam carbunculi & balsama omnibus externè admoveamus, sed histantium subiectis, quæ hæc & similia non abhorrent: Sic novi mulierem, quæ non rosam; virum, qui non basilicon ferre potuit; ac proinde hæc subiecta horum usu magis prostrata, quàm refocillata fuissent: sic alium novi virum, qui post assumptam ambaram incidit in syncopen; sicut in genere systema nervosum sensilius habentia subiecta non possunt suaveolentia perferre. Tutiora his longè salina penetrantia, siue illa urinosa siue acida fuerint, præscribuntur. Attendendum tamen est, an syncope oriatur à spirituum animalium dissipatione ob objectum fortius eos commovens, adeoque à radii luminosi interceptione: an verò à spirituum animalium & vitalium oppensione & quasi concentratione: Adeoque in genere tres classes remediorum in lipothymia analepticorum in Praxi vulgò sunt.

**1. Spirituosa sulphurea seu oleosa**, quod pertinent omnes

**2. & spirit.**



*Spiritus inflammabiles aromatici per fermentationem parati, olea aromatica destillata, tam simplicia, quam aquae apoplecticae compositae, plus minus suaviter olentia. Quoad hoc punctum tamen: canē, ut jam dictum, nonnihil usurpentur; cum non solum mulieres omnes talia spirituosae oleosa, fumosa inepre vulgò dicta, quod caput replere putentur, commodè perferre nequeant, sed etiam mares plures, praesertim literati, aut lucubrationibus dediti, propter rariorem ac subtiliorem spirituum texturam fortius odorifera, siue suaviter siue malè illa oleant, non commodè ferant; cum talia nimis spiritus vel sanguinem afficiant, unde vel cephalalgiam vel capitis gravitatem quasi ebriosam inde contrahunt. Aliàs tan internè quàm externè sensuum organa admodum conducunt.*

*II. Spirituosa alcalina, spiritus volatiles acres urinosi, & omnia salia volatilis, eò præstantiora, quò magis oleosa priùs reddita fuerint.*

*III. Acida volatilia acida, in specie acetum, quæ partium sensuum organa potenter afficiunt, partim spiritus dissolubiles, ne nimis exsolvantur, præcavent.*

In horum tamen omnium usu sedulò, ratio causarum antecedentium habenda est. Sic enim, ubi syncope erit v. gr. ex veneno, appropriata alexipharmaca addenda erunt, in quo casu itidem convenit vomitus, ubi venenum in primis viis adhuc latuerit. Vbi est ex passione hysterica aut uterina, appropriata hysterica, v. gr. Zedoaria, castoreata, omnia salia volatilia, spiritus cornu cervi succinatus, spiritus melissæ, carminativi de ribus, salis ammoniaci Ꝟss. Quinta Essentia Matthioli, præteritum cum Castoreis, si ferre queat æger, cum aqua appropriata, ex. gr. artemisæ Ꝟi, propinentur; aut etiam opiatas additis malum præcaveatur: ut etiam tunc naribus admoventur appropriata; plurimum quidem naribus in syncope hysterica foetida ex castoreo & asa fetida, fumus sulphuris, pennarum accensarum, &c. Verùm in hoc sumus cauti propterea, quia non omnes mulieres æquè perferre possunt graveolentia; ut plurimum quidem sed non semper: de quo fuo loco, ubi de morbis mulierum; sunt enim quædam, quæ à graveolentibus læduntur. Unde optimum est in hysterica passione, ubi non scimus genium mulieris, an suaveolentia? an verò foetida perferat? spiritum salis ammoniaci volatilem admove-re naribus; Hic enim suaveolentia & foetida ferentibus conducit. Semper habenda causæ antecedentis ratio, atque in syncope non frigidiora & calidiora remedia aniculatum more attendenda, sed ea, quæ sunt plus minus resectiva, adhibenda.

Imò in syncope vitio stomachi & vitio orificii sinistri, aut etiam abdominis orta, vomitus interdum tutò potest provocari, si nempe adsint indicationes excrementorum evacuandorum; cum & hunc motu spontaneo ortum conduxisse observaverim: Sic FORESTUS lib. 17. obs. 7. refert syncopen ex utero ex defectu mensium afflicto simul stomacho, per vomitum curatam: FALLOP. Chrat. 86. refert syncopen desperatam, per vomitum, cum aqua cinnamomi copiosâ, curatâ. Confert ergò vomitus maturè adhibitus in syncope stomachica, ac ubi somes mali circa primas vias hæret, praesertim ubi nausea & similia symptomata urgent. In casu, quo non tam resoluti quàm oppressi aut inordinatè agitati spiritus videntur, excitat quoque tales ægros vomendi conatus, ac quasi in vitam revocat: & licet adstantibus terribilis videatur, Medicus tamen hoc in casu se nec timidum nec tumidum exhibeat: non illud, ne morâ inconsideratâ ægrum pessundet; non hoc, ne ægrum spiritus evomere cogat, Ubi ergò signum certum est, vitium à stomacho, & vires non attritas, sed validas adhuc esse, optimum erit, ut blandus & mediocriter instituat vomitus.

Hoc ipso vomitionis actu, ne animo delinquant, odores penetrantes, imprimis vini generosi, naribus admoventi. Quod si vomitus non æquè tutus videatur, clystima paulò actius injicere non vetabit; & propinentur Precipitantia ita dicta, quæ figendo effervescentiam humorum sistunt: quibus tamen adjungantur aromatica. Hinc corallia, Magisterium coralliorum cum succo citri paratum, lapis bezoar in dosi generali ad Ꝟss, ebur præparatum cum vel sine igne, additis aliquot guttis olei cujusdam destillati, vel succini, vel anisi, vel cinnamomi. His enim syncope imminens præcavetur, donec opportunè saburra viscosa ex primis viis evacuari possit.

IV. Adduntur his Opiata mediocri dosi, in scopo nem-

pe ultimo supra memorato, spirituum nempe aut dissipabilium, aut in imperus convulsivos promotorum, impetum sistentia: subinde enim fit, ut ex itrequieto nimis spirituum animalium motu, indeque ortis delictis, aut agrypnis, aut etiam motibus convulsivis, ingens virium imminuat prostratio. In tali casu ex opio rite parata remedia sunt divina auxilia, si appropriatis aliis remediis miscantur.

Quæ ergò conveniunt in syncope, resectiva & analeptica dicta præ cæteris sunt primario vinum generosum, cinnamomum, aqua & oleum destillatum ejus, ac omnia ex eo parata, in specie ejus oleum (vid. HELMONTIUS de Potest. Medic.) aquæ spirituosæ, v. gr. aquæ apoplecticae quælibet, spiritus liliorum convallium per fermentationem paratus, spiritus theriacalis, tam simplex quàm compositus, oleum destillatum caryophyllorum, item Balsama apoplectica & cordialia, item salia volatilia quæcunque, spiritus cordis cervi; liquor cornu cervi, succinatus, id est, spiritus Cornu Cervi essentificatus, & sale volatili succini debitâ proportionè unitus, qui est elegantissimus: Nam succinum, sal volatile & oleum destillatum succini, aliquot guttularum vel granorum pondere exhibitum, admodum potenter roborat syncopicos, imprimis simul concurrentibus insultibus epilepticis, aut insultibus hystericis. Spiritus rosarum per se est egregium resectivum. Quod si verò fiat spiritus rosarum ambratus, id est, si fermentetur ambra cum rosis, fit exinde spiritus rosarum ambratus potentissimus & elegantissimus: nam fermentatione ambra cum rosis ejus compages recluditur, ut postmodum cum spiritu rosarum sursum raptâ det spiritum elegantissimum. Ambra enim, & omnia ex eadem parata remedia, summum sunt restaurativum spirituum animalium: unde non tantummodò usurpantes in Venerem armat, sed præterea quoque senibus decrepitis moderato usu mirè conducit: unde confectio alchermes, quam ingreditur ambra, potenter reficit, imprimis si aliquot guttæ olei destillati cinnamomi addantur: item Essentia ambrae cum spiritu rosarum, aut, quod melius, cum spiritu melissæ parata, ad guttas viij. vel x. in aqua melissæ exhibita; cui tamen præfero spiritum rosarum ambratum. Quod si his sal viperarum aut succini probè deputatum addatur, vix relinquet Medicum & ægrum. In specie RUDOLPHI II. Imperatoris constantissimum medicamentum cephalico-cardiacum, ipsi ab ELISABETHA, Angliæ Regina, communicatum fuit ex ambra, molcho, & zibetho: affudit spiritum rosarum, virum sigillavit hermeticè, quod æstivo tempore in terra foditur.

Præterea quoque citrus, elixyr citri, vel spiritus citri acuat sal volatile Cornu Cervi, (quod senel-pto temper noto) in aqua appropriata exhibita similiter conveniunt: in specie Quinta Essentia dictæ vegetabilium aromaticorum, Quinta Essentia melissæ; angelicæ. Quibus notæ sunt encheireses Chymicæ parandi ex vino oleum seu Quintam essentiam vini, cujus minutissima gutta linguae admota totum corpus quasi fulmine penetrat; & est sal volatile subtilissimum vini in oleiforme corpus concentratum, si habebunt melius levamen in syncope. Essentia cordialis D. MICHAELIS ex vegetabilibus spiritualibus cum spiritu cordis cervi est egregia. Essentia croci, resectivæ PARACELSO dicta summa cordis læticia, insigniter laudatur. Paratur hæc essentia croci per aquam vitis, mense Martio ex pampinis incisiss destillantem, vel etiam cum spiritu appropriato melissæ, aut rosarum parata est efficacior: Huc essentia, si gr. j. vel alterum salis volatilis addatur, fit medicina præstantissima. Tinctura seu essentia castorei, speciatim in syncope hysterica & hypochondriaca, convenit. Tinctura coralliorum cum spiritu cordis cervi parata est elegans, imprimis post sanguinis, aut alius utilis succi excretionem, unde etiam puerperis post partum exhibetur pro reparandis viribus. Tinctura etiam solares, e. g. tinctura solis cum oleo cinnamomi, tam MYSICHTII in Armentario, quàm etiam D. GANZLANDI, egregiæ sunt. Verùm vires potius oleo cinnamomi tribuendæ, quàm auro: ut enim per salia insigniter dissolvatur aurum, non tamen totalis est ejus reclusio, ut sulphur absconditum fiat manifestum; facilius enim est aurum construere, quàm destruere: Aded ut mensura quidem in his sint egregia, admixta tamen atomi auri partim operentur: qui verò potest parare veram aurum tincturam, isti concedam summa



gāudium. Aliquoties factū fuit mentio saltum volatiliū, nec immerito: Hæc ipsa sunt magis appropriata, si fiant oleosa, & suaviaromate imprægnata, i. e. si artificiosè conjungantur cum oleis aromaticis destillatis, quod per se non potest fieri; beneficio tamen spiritus vini, quod de utroque, nempe sale volatili & oleo, participat. Imprimis spiritus salis ammoniaci benè rectificatus, conjunctus cum spiritu vini rectificatissimo aromatico, & sic oleosus factus, dat talem misturam, sal volatile oleosum admodum elegans in syncope, aut virium subita prostratione. Fuit Medicus, qui frigidus, & calore nativo jam quodammodò destitutos, haustulo Elixiris vitæ Matthioli, in quo grana aliquot salis volatilis viperarum dissoluta fuerint, se recreaturum confidat: Vid. SACHSIUS in *Anapolographia* pag. 311.

In genere vehicula horum remedium sunt aqua melissæ cum vino, aqua pulegiæ, cinnamomi, simplicis vel cydoniarum, aqua vitæ sive quinta essentia aut, ut alii vocant, Elixir vitæ Matthioli, item aqua cordialis *Herc. Saxon.*, aqua carbunculi, aqua cordis cerviæ, aqua vitæ alba *Dresdensium*, quæ est optima, aqua cordialis calida *Mynschiæ*, in mulieribus aqua hirundinum cum castoreo, &c. quibus etiam camphora, spiritus theriacalis camphoratus, & similia, pro meliori stimulo commodè addi possunt.

Quoad acida: spirituosum ac generosum vinum, succus citri, succus aut syrupus rubi Idæi, conserva pulpe citri cum electuario diascordii, acetum simplex vel acetum bezoardicum, florum calendulæ, liliorum convallium, florum tunicæ, sambuci, caryophyllatum, rutaceum, &c., in aceto infusum castoreum, &c. usurpari possunt. HOEFERUS externè commendat olfactum panis recentis, cujus odorem omnibus aquis perlatis longè præfert BECHERUS. Regioni cordis admoveat HARTMANNUS sacculos ex melissa, irroratos cum spiritu vini.

Quoad opiata denique: præter laudanum opiatum *Helmontii*, ex opio cum succo cydoniorum fermentando paratum, in parva dosi theriaca, Mithridatium, Extractum theriacale, aut his cognatæ compositiones, administrari possunt: v. g.

R. Quint. Ess. cinnam. ʒj.  
D. S.

Tinctura Cordialis: ʒo. guttæ pro 2. dosi.

R. Tinct. corall. cum spirit. Corn. Cero. ʒij.  
D. S.

Tinctura cordialis pro 3. vicibus.

R. Aqu. meliss. cum vino ʒij.

Apopl. ʒvj.

Cinnam. cum vino ʒij.

Essent. ambr. vel confect. al-chem. ʒj.

M. D. S.

Potio cordialis cochlearim capiendæ.

R. Aqu. fragor.

Rubi Idæi ana ʒij.

Tinctura solis ʒj.

Marr. perlar. præp. ʒij.

Confect. al-chem. ʒij.

M. S.

Mixtura confortans pro aliquot vicibus.

R. Aqu. rubi Idæi ʒiv.

Tinct. solis ʒij. vel ʒij.

M. S.

Mixtura cephalico Cardiaca.

R. Aqu. meliss. cum vin. ʒij.

Quint. essent. Matthioli drachm. iij.

Confect. al-chem. drachm. j.

Syr. fl. tunice ʒvj.

Potio cordialis pro aliquot vicibus.

M. S.

Vel

R. Aqu. cordial. Herc. Sax.

Cinnam. borrag.

Meliss. cum vino ana unc. j.

Spirit. theriac. simpl. ʒij.

Elixir. vel succ. citri ʒvj.

Essent. ambræ ʒj.

Syr. de cors. citri ʒij.

M. D. S. ut supra.

Vel

R. Aqu. rubi Idæi unc. ij.

Essent. Oper. Tom. II.

Aqu. Cordial. Herc. Saxon. ʒj.

Spirit. lib. convall. ʒij.

Salis ammoniaci ʒj.

Syr. borrag. unc. ʒj.

M. D. S. ut supra.

Vel

R. Aqu. meliss. vel rosar.

Fenic. ana ʒij.

Liqu. Cornu Cervi succin. ʒj. ad ʒij.

Syr. fenic. drachm. iij.

M. D. S. ut supra.

Vel

R. Aqu. rubi Idæi ʒij.

Aceti theriac. drachm. iij. ad ʒij.

Spirit. citri drachm. j.

Syr. rubi Idæi ʒij.

M. S. ut supra.

Vel

R. Aqu. fl. samb.

Borrag. ana unc. ij.

Succ. citri rec. unc. j.

Spirit. rosar. drachm. ij.

Syr. rubi Idæi unc. ʒj.

M. D. S. ut supra.

Vel

R. Aqu. borrag.

Bugloss.

Rubi Idæi ana unc. j.

Aqu. cinnam. drachm. iij. vel ʒij.

Succ. citri rec. drachm. iij. vel ʒj.

Conf. al-chem. drachm. iij. vel loco

hujus Tinct. corall. ʒi. vel drachm. ʒj.

Corall. rubr. præp. vel margarit. præp.

drachm. ʒj. ad ʒj.

Syrupi cinnam. vel allus unc. ʒj.

M. D. S. ut supra.

Quoad externa, naribus, temporibus, pulsibus, labiis, & ierobiculo cordis affricanda: sunt ferè similia, vel spirituosæ, aqua carbunculi, liliorum convallium, balsamus apoplecticus, &c. oleum carbunculi, cinnamomi, citri, &c. Præ cæteris utile est oleum succini, caryophyllorum & similia. Item admoventur naribus spiritus salis ammoniaci, aut similis acrior, acetum vini, acetum florum tunicæ, ac similia naribus adhibentur. Succinum solum sub forma suffitus, naribus excipiendi, adhibetur à RULANDO, qui dicit: se longâ experientiâ in omni ætate & affectu reperisse lipothymicos refocillatos ex accenso carabe, aut ex oleo carabino naribus illito, aut una alterave gutta cum aqua appropriata ori infusa: Vid. *Thesaurus* pag. 177. de muliere mortua ferè & frigida, quam oleum succini restituit: N. B. in succino multa latent.

In specie etiam syncope & lipothymia ex Evacuationibus quibuscumque, speciatim nimis Purgationibus, quæ sunt frequentes, imprimis conveniunt. Acida quæcunque, in specie succus cydoniorum, theriaca in aqua cinnamomi usurpata, item Extractum theriacale in aqua cinnamomi, & Mixtura ex aqua menthæ, spiritu theriacali simplici vel camphorato, & confectione al-chermes, aut aqua cinnamomi, in qua theriaca & confectio al-chermes sunt soluta, conveniunt: nam hæc sunt præsentanea. Spiritus vini rectificatus cum ambræ & moscho aromatizatus commendatur imprimis à FABRO in ejus *Pathologia*: sicut & hæc dicta optima erunt in post nimium vomitum contracta lipothymia.

In syncope ex nimio sudore, æstu, labore, exercitationibus, iracundia, gaudio nimio, aut odoribus ingratis, conducunt acida, acetum, succus citri, vinum, succi vegetabilium, aut julepi aciduli, Elixir citri acidulatum.

Vel

R. Conf. acetosell.

Pulp. citri ana unc. j.

Fl. tunice unc. ʒj.

Roburium drachm. vj.

Confect. al-chem. drachm. iij.

Syr. acetos. citri, vel rubi Idæi q. s.

M. D. S.

Saccharum cordiale.

Imprimis contra alterationem ab ira, præmissa, si opus sit, vomitorio, in specie si post iracundiam alimentorum facta sit assumptio, convenit Mixtura SYL-VII *Prax. I. l. cap. 28. §. 22.*, item Mixtura *supra c. 3. Prolegom.*



*Spiritus inflammabiles* aromatici per fermentationem parati, olea aromatica destillata, tam simplicia, quam aquae apoplecticae compositae, plus minus suaviter olentia. Quoad hoc punctum tamen: *cantè*, ut jam dictum, non nihil usurpentur; cum non solum mulieres omnes talia spiritus oleosa, fumosa inepre vulgò dicta, quod caput replere putentur, commodè perferre nequeant, sed etiam mares plures, praesertim literati, aut lucubrationibus dediti, propter ratiorem ac subtiliorem spirituum texturam fortius odorifera, siue suaviter siue male illa oleant, non commodè ferant; cum talia nimis spiritus vel sanguinem afficiant, unde vel cephalalgiam vel capitis gravitatem quasi ebriosam inde contrahunt. Aliàs tamen internè quàm externè sensuum organa admodum conducunt.

II. *Spiritus aëcalina*, spiritus volatiles acres urinosi, & omnia salia volatilis, eò praestantiora, quò magis oleosa prius reddita fuerint.

III. *Acida volatilia acida*, in specie acetum, quæ parum sensuum organa potenter afficiunt, partim spiritus dissipabiles, ne nimis exsolvantur, praecavent.

In horum tamen omnium usu sedulò, ratio causarum antecedentium habenda est. Sic enim, ubi syncope erit v. gr. ex veneno, appropriata alexipharmaca addenda erunt, in quo casu item convenit vomitus; ubi venenum in primis viis adhuc latuerit. Vbi est ex passione hysterica aut uterina, appropriata hysterica, v. gr. Zedoaria, castoreata, omnia salia volatilia, spiritus cornu cervi succinatus, spiritus melissæ, carminativi de tribus, salis ammoniaci ꝑ, Quinta Essentia Matthioli, praeteritum cum Castoreis, si ferre queat æger, cum aqua appropriata, ex. gr. artemissæ ꝑ, propinentur; aut etiam opiatiss additis malum praecaveatur: uti etiam tunc naribus admoventur appropriata; plurimum quidem naribus in syncope hysterica foetida ex castoreo & asa foetida, sumus sulphuris, pennarum accensarum, &c. Verum in hoc sumus cauti propterea, quia non omnes mulieres æquè perferre possunt graveolentia; ut plurimum quidem sed non semper: de quo suo loco, ubi de morbis mulierum; sunt enim quædam, quæ à graveolentibus læduntur. Unde optimum est in hysterica passione, ubi non scimus genium mulieris, an suaveolentia? an verò foetida perferat? spiritum salis ammoniaci volatilem admove re naribus; Hic enim suaveolentia & foetida ferentibus conducit. Semper habenda causæ antecedentis ratio, atque in syncope non frigidiora & calidiora remedia aniculorum more attendenda, sed ea, quæ sunt plus minus resectiva, adhibenda.

Imò in syncope vitio stomachi & vitio orificii sinistræ, aut etiam abdominis orta, vomitus interdum turè potest provocari, si nempe adsint indicationes excrementorum evacuandorum; cum & hunc motu spontaneo ortum conduxisse observaverim: Sic FORESTUS lib. 17. obs. 7. refert syncopen ex utero ex defectu mensium afflicto simul stomacho, per vomitum curatam: FABER Curat. 86. refert syncopen desperatam, per vomitum, cum aqua cinnamomi copiosâ, curatâ. Confert ergo vomitus maturè adhibitus in syncope stomachica, ac ubi fomes mali circa primas vias hæret, praesertim ubi nausea & similia symptomata urgent. In casu, quo non tam resoluti quàm oppressi aut inordinatè agitati spiritus videntur, excitat quoque tales ægros vomendi conatus, ac quasi in vitam revocat: & licet adstantibus terribilis videatur, Medicus tamen hoc in casu se nec timidum nec tumidum exhibeat: non illud, ne morâ inconsideratâ ægrum pessundet; non hoc, ne ægrum spiritus evomere cogat. Ubi ergo signum certum est, vitium à stomacho, & vires non attritas, sed validas adhuc esse, optimum erit, ut blandus & mediocris instituat vomitus.

Hoc ipso vomitionis actu, ne animo desinquant, odores penetrantes, imprimis vini generosi, naribus admoventi. Quod si vomitus non æquè totus videatur, clysmâ paulò acrius inficere non vetabit; & propinentur Præcipitantia ita dicta, quæ figendo effervescentiam humorum sistunt: quibus tamen adjungantur aromatica. Hinc corallia, Magisterium coralliorum cum succo citri paratum, lapis bezoar in dosi generali ad ꝑ, ebur præparatum cum vel sine igne, additis aliquot guttis olei cujusdam destillati, vel succini, vel anisi, vel cinnamomi. His enim syncope imminens præcaveatur, donec opportunè saburra vitiosa ex primis viis evacuari possit.

IV. Adduntur his *Opia* mediocri dosi, in scopo nem-

pe ultimo supra memorato, spirituum nempe aut dissipabiliorum, aut in impetus convulsivos proniorum, impetum sistentia: subinde enim fit, ut ex itrequeto nimis spirituum animalium motu, indeque ortis deliriis, aut agrypniiis, aut etiam motibus convulsivis, ingens virium imminuat prostratio. In tali casu ex opio ritè parata remedia sunt divina auxilia, si appropriata aliis remediis miscantur.

Quæ ergo conveniunt in syncope, resectiva & analeptica dicta præ cæteris sunt primario vinum generosum, cinnamomum, aqua & oleum destillatum ejus, ac omnia ex eo parata, in specie ejus oleum (vid. HELMONTIUS de Potest. Medic.) aquæ spirituosæ, v. gr. aquæ apoplecticae quælibet, spiritus liliorum convallium per fermentationem paratus, spiritus theriacalis, tam simplex quàm compositus, oleum destillatum caryophyllorum, item Balsama apoplectica & cordialia, item salia volatilia quæcunque, spiritus cordis cervi; liquor cornu cervi, succinatus, id est, spiritus Cornu Cervi essentificatus, & sale volatili succini debnâ proportionè unitus, qui est elegantissimus: Nam succinum, sal volatile & oleum destillatum succini, aliquot guttularum vel granorum pondere exhibitum, admodum potenter roborat syncopicos, imprimis simul concurrentibus insultibus epilepticis, aut insultibus hystericis. Spiritus rosarum per se est egregium resectivum. Quod si verò fiat spiritus rosarum ambratus, id est, si fermentetur ambra cum rosis, fit exinde spiritus rosarum ambratus potentissimus & elegantissimus: nam fermentatione ambra cum rosis se compages recluditur, ut postmodum cum spiritu rosarum sursum raptâ det spiritum elegantissimum. Ambra enim, & omnia ex eadem parata remedia, summum sunt restaurativum spirituum animalium: unde non tantummodò usurpantes in Venerem armat, sed præterea quoque senibus decrepitis moderato usu mirè conducit: unde confectio alchermes, quam ingreditur ambra, potenter reficit, imprimis si aliquot guttæ olei destillati cinnamomi addantur: item Essentia ambrae cum spiritu rosarum, aut, quod melius, cum spiritu melissæ parata, ad guttas viij. vel x. in aqua melissæ exhibita; cui tamen præfero spiritum rosarum ambratum. Quod si his sal viperarum aut succini probè deputatum addatur, vix relinquet Medicum & ægrum. In specie RUDOLPHI II. Imperatoris constantissimum medicamentum cephalico-cardiacum, ipsi ab ELISABETHA, Angliæ Regina, communicatum fuit ex ambra, molcho, & zibetho: assidue spiritum rosarum, vitrum sigillavit hermeticè, quod æstivo tempore in terra foditur.

Præterea quoque citrus, elixyr citri, vel spiritus citri acuat sale volatili Cornu Cervi, (quod semel pto tempore noto) in aqua appropriata exhibitâ similiter conveniunt: in specie Quinta Essentia dictæ vegetabilium aromaticorum, Quinta Essentia melissæ; angelicæ. Quibus notæ sunt encheireses Chymicæ parandi ex vino oleum seu Quintam essentiam vini, cujus minutissima gutta linguae admota totum corpus quasi fulmine penetrat; & est sal volatile subtilissimum vini in oleiforme corpus concentratum, si habebunt melius levamen in syncope. Essentia cordialis D. MICHAELIS ex vegetabilibus spiritualibus cum spiritu cordis cervi est egregia. Essentia croci, rectè PARACELSO dicta summa cordis lætitia, insigniter laudatur. Paratur hæc essentia croci per aquam vitis, mente Martio ex pampinis incisiss destillantem, vel etiam cum spiritu appropriato melissæ, aut rosarum parata est efficacior: Hunc essentia, si gr. j. vel alterum salis volatilis addatur, firmissima præstantissima. Tinctura seu essentia castorei, speciatim in syncope hysterica & hypochondriaca, convenit. Tinctura coralliorum cum spiritu cordis cervi parata est elegans, imprimis post sanguinis, aut alius utilis succi excretionem, unde etiam puerperis post partum exhibetur pro reparandis viribus. Tinctura etiam solares, e. g. tinctura solis cum oleo cinnamomi, tam MYNSICHTII in *Armentario*, quàm etiam D. GANZLANDI, egregiæ sunt. Verum vires potius oleo cinnamomi tribuenda, quàm auro: ut enim per salia insigniter dissolvatur aurum, non tamen rotalis est ejus reclusio, ut sulphur absconditum fiat manifestum; facilius enim est aurum construere, quàm destruere: Adeo ut menstrua quidem in his sint egregia, admixta tamen atomi auri parum operentur: qui verò potest parare veram aurum tincturam, isti concedam summi



gaudium. Aliquoties facta funt mentio talium volatiliū, nec immerito: Hæc ipsa sunt magis appropriata, si fiant oleosa, & suavi aromate imprægnata, i. e. si artificiosè conjungantur cum oleis aromaticis destillatis, quod per se non potest fieri; beneficio tamen spiritus vini, quod de utroque, nempe sale volatili & oleo, participat. Imprimis spiritus salis ammoniaci benè rectificatus, conjunctus cum spiritu vini rectificatissimo aromatico, & sic oleosus factus, dat talem misturam, sal volatile oleosum, admodum elegans in syncope, aut virium subita prostratione. Fuit Medicus, qui frigidus, & calorenativo jam quodammodò destitutos, haustulo Elixiris vitæ Matthioli, in quo grana aliquot salis volatilis viperarum dissoluta fuerint, se recreaturum confidat: Vid. SACHSIUS in *Anagelographia* pag. 511.

In genere vehicula horum remedium sunt aqua melissæ cum vino, aqua pulegiæ, cinnamomi, simplicis vel cydoniarum, aqua vitæ sive quinta essentia aut, ut alii vocant, Elixir vitæ Matthioli, item aqua cordialis *Herc. Saxon.*, aqua carbunculi, aqua cordis cervi, aqua vitæ alba *Dresdensium*, quæ est optima, aqua cordialis calida *Mynschiæ*, in mulieribus aqua hirundinum cum castoreo, &c. quibus etiam camphora, spiritus theriacalis camphoratus, & similia, pro meliori stimulo commodè addi possunt.

Quoad acida: spirituosum ac generosum vinum, succus citri, succus aut syrupus rubi Idæi, conferva pulpæ citri cum electuario diascordii, acetum simplex vel acetum bezoardicum, florum calendulæ, liliorum convallium, florum tunicæ, sambuci, caryophyllatorum, rutaceum, &c., in aceto infusum castoreum, &c. usurpari possunt. HOEFERUS externè commendat olfactum panis recentis, cujus odorem omnibus aquis perlatis longè præfert BECHERUS. Regioni cordis admoveat HARTMANNUS sacculos ex melissa, irroratos cum spiritu vini.

Quoad opiata denique: præter laudanum opiatum *Helmontii*, ex opio cum succo cydoniorum fermentando paratum, in parva dosi theriaca, Mithridatium, Extractum theriacale, aut his cognatæ compositiones, administrari possunt: v. g.

R. Quins. Ess. cinnam. ℥j.  
D. S.

Tinctura Cordialis: 50. guttæ pro 2. dosi.

R. Tinct. corall. cum spirit. Cern. Cerv. ℥ij.  
D. S.

Tinctura cordialis pro 3. vicibus.

R. Aqu. meliss. cum vino ℥ij.

Apopl. ℥vj.

Cinnam. cum vino ℥ij.

Essent. ambr. vel confect. alcherm. ℥j.

M. D. S.

Potio cordialis cochlearum capienda.

R. Aqu. fragor.

Rubi Idæi ana ℥ij.

Tinctura solis ℥j.

Maur. perlar. præp. ℥ss.

Confect. alcherm. ℥ij.

M. S.

Mixtura consorsans pro aliquot vicibus.

R. Aqu. rubi Idæi ℥iv.

Tinct. solis ℥ij. vel ℥ss.

M. S.

Mixtura cephalico Cardiaca.

R. Aqu. meliss. cum vin. ℥ij.

Quins. essent. Matthioli drachm. iij.

Confect. alcherm. drachm. j.

Syr. fl. tunica ℥vj.

Potio cordialis pro aliquot vicibus.

M. S.

Vel

R. Aqu. cordial. Herc. Sax.

Cinnam. borrag.

Meliss. cum vino ana unc. j.

Spir. theriac. simpl. ℥ss.

Elixir. vel succ. citri ℥vj.

Essent. ambr. ℥j.

Syr. de cort. citri ℥ss.

M. D. S. ut supra.

Vel

R. Aqu. rubi Idæi unc. ij.

Essent. Oper. Tom. II.

Aqu. Cordial. Herc. Saxon. ℥j.

Spir. lib. convall. ℥ij.

Salis ammoniaci ℥j.

Syr. borrag. unc. ss.

M. D. S. ut supra.

Vel

R. Aqu. meliss. vel rosar.

Fenic. ana ℥ij.

Liqu. Cornu Cervi succin. ℥j. ad ℥ss.

Syr. fenic. drachm. iij.

M. D. S. ut supra.

Vel

R. Aqu. rubi Idæi ℥ij.

Aceti theriac. drachm. iij. ad ℥ss.

Spir. citri drachm. j.

Syr. rubi Idæi ℥ss.

M. S. ut supra.

Vel

R. Aqu. fl. samb.

Borrag. ana unc. ij.

Succ. citri rec. unc. j.

Spir. rosar. drachm. ij.

Syr. rubi Idæi unc. ss.

M. D. S. ut supra.

Vel

R. Aqu. borrag.

Bugloss.

Rubi Idæi ana unc. j.

Aqu. cinnam. drachm. iij. vel ℥ss.

Succ. citri rec. drachm. iij. vel ℥j.

Conf. alcherm. drachm. iij. vel loco

hujus Tinct. corall. ℥i. vel drachm. ss.

Corall. rubr. præp. vel margarit. præp.

drachm. ss. ad ℥j.

Syrupi cinnam. vel allus unc. ss.

M. D. S. ut supra.

Quoad externa, naribus, temporibus, pulsibus, labiis, & scrobiculo cordis affricanda: sunt ferè similia, vel spirituosæ, aqua carbunculi, liliorum convallium, balsamus apoplecticus, &c. oleum carbunculi, cinnamomi, citri, &c. Præ cæteris utile est oleum succini, caryophyllorum & similia. Item admoventur naribus spiritus salis ammoniaci, aut similis acrior, acetum vini, acetum florum tunicæ, ac similia naribus adhibentur. Succinum solum sub forma suffitus, naribus excipiendi, adhibetur à RULANDO, qui dicit: se longâ experientiâ in omni ætate & affectu reperisse lipothymicos refocillatos ex accenso carabe, aut ex oleo carabino naribus illito, aut una alterave gutta cum aqua appropriata ori infusa: Vid. *Thesaurus* pag. 177. de muliere mortua ferè & frigida, quam oleum succini restituit: N. B. in succino multa latent.

In specie etiam syncope & lipothymia ex Evacuationibus quibusvis, speciatim nimis Purgationibus, quæ sunt frequentes, imprimis conveniunt. Acida quæcunque, in specie succus cydoniorum, theriaca in aqua cinnamomi usurpata, item Extractum theriacale in aqua cinnamomi, & Mixtura ex aqua menthæ, spiritu theriacali simplici vel camphorato, & confectio alchermes; aut aqua cinnamomi, in qua theriaca & confectio alchermes sunt soluta, conveniunt: nam hæc sunt præsentanea. Spiritus vini rectificatus cum ambræ & moscho aromatizatus commendatur imprimis à FABRO in ejus *Pathologia*: sicut & hæc dicta optima erunt in post nimium vomitum contracta lipothymia.

In syncope ex nimio sudore, æstu, labore, exercitationibus, iracundia, gaudio nimio, aut odoribus ingratis, conducunt acida, acetum, succus citri, vinum, succi vegetabilium, aut julepi aciduli, Elixir citri acidulatum.

Vel

R. Conf. acetosell.

Pulp. citri ana unc. j.

Fl. tunica unc. ss.

Rob ribium drachm. vj.

Confect. alcherm. drachm. iij.

Syr. acetos. citri, vel rubi Idæi q. l.

M. D. S.

Saccharum cordiale.

Imprimis contra alterationem ab ira, præmissa, si opus sit, vomitorio, in specie si post iracundiam alimentorum facta sit assumptio, convenit Mixtura SYL-VII Prax. l. 1. cap. 28. §. 22., item Mixtura supra c. 3. Prolegom.



gom. Artic. 3. Memb. 3. pro acido temperando. In metu febris ardentis malignæ ex nimia ira, hinc fortis motione, & potu, aliquando præscripti:

R. Ebor. sine igne gr. xv.

Specif. cephal. ℞.

Camph. gr. ij.

M. D. S.

Pulvis cephalico-cardiacus.

Vesperis accipiebat.

In *syncope febrium malignarum*, ex irrequieto nimis spirituum animalium motu, indeque ortis delirio, aut agryniis, aut etiam motibus convulsivis, camphora in pauca quantitate cum laudano opiato conjuncta, & aliis appropriatis addita, spiritus animales nonnihil figit, & ad debitum motum redigit; quod pertinet & syncope ex *sumogis narcoticis*, e.g. opii, liquorum effervescentium, carbonum, &c. orta, quo calu acetum castoreo imprægnatum præprimis pollebit.

In *syncope ex terrore*, nimis hæmorrhagiis, tristitia nimia, &c. cinnamomum, spirituosa oleosa, spiritus vini, aqua vitæ, aqua carbunculi cum salibus volatilibus, ut spiritus Cornu Cerv. &c. acuta, in specie salia volatilia oleosa, conducunt. Etiam graviore in syncope *venam aperire*, & aliquali sanguinis detractione liberum motum huic conciliare, non inconsultum est: Nam non semper syncopis nocet sanguinis detrahitio: id quod confirmat ZACUTUS LUSITANUS lib. 1. Prax. Admir. Observ. 135, ex mensium nempe suppressione syncope gravis *vena saphena* sectione curata: Conf. SYLVIVS lib. 3. Prax. cap. 3. §. 288. & cap. 10. §. 69. Contra *mæorem, subitanum terrorem*, &c. confert Mixtura SYLVII Prax. lib. 1. cap. 28. §. 24. Item

R. Aqu. fl. samb.

Cera. nigr. an. ʒiʒ.

Lil. convall. cum vino ʒj.

Ebor. sine igne ʒʒ.

Sal. volat. Corn. Cerv. ℞.

Syr. card. bened. ʒij. M. D. S.

Potio cordialis pro aliquot vicibus.

Quod si ex nimia sanguinis excretionem, v. g. nimio mensium fluxu, syncope imminet, Opiata v. g. acidis sociata sunt optima, additis corallis preparatis.

In syncope cum Epilepsia, passione hysterica, &c. juncta, conveniunt imprimis salia volatilia, vijam dictum.

In syncope ab apoplexia prodest spiritus cornu cervi.

In syncope sit ex vena sectione, ut in hæmo phobis, &c. acida proderunt; imponatur æger supinus pavimento, ac sale communis attriteatur ejus labia & lingua; vel granula quedam ori imponantur; & pro præcavenda eadem ante venæ sectionem capiatur ovum sorbile, vel haustus vini aromatici, vel juleculum, & hinc in dorso cubantibus vena aperiatur. Loco salis communis aut aliorum

remediorum, suadente HILDANO, urina humana vel bovina utiliter usurpatur; ita enim restitui hoc in passu ægros expertus fuit; vel acetum applicetur naribus, & affricetur linguæ.

Ista & similia, interna pariter & externa, usurpari possunt.

Ad *syncopen senum*, imprimis ad lipothymiam & viriorem Imbecillitatem ex defectu spirituum senibus obviam, Tl-MÆUS habet egregiam misturam sub forma Opiatæ:

R. Rotul. manus Christi perlas. (corpus) ʒij.

Terantur in mortario marmoreo, affunde

Oleum cinnam. gutt. xj.

Macis gutt. ix.

Caryoph. gutt. vi.

Nuch. mosch. gutt. x.

Essent. ambr. crocat. gutt. xxvii.

Pell. aur. Weidneri ʒij.

Spir. rosar. gutt. xx.

Meliss.

Citri ana gutt. xj.

Conf. alchem. ʒij.

M. exactè.

Dosis quantitas avellanz seu juglandis.

Vel

R. Ambragris. vel mosch. gr. vii. vel viii.

solve in

Olei destillat. cinnam. gutt. xi.

Cardam. gutt. viii. ix. ad ℞.

Margar. pray. ℞.

Sacch. candi albiss. ʒj. ad ʒij.

M. f. pulvis.

Vid. HOFFMANNI Clavis.

R. Conserv. flor. anthos,

Tunica,

Salvia, an. ʒʒ.

Confect. alchem. ʒj.

Ambr. gryf. gr. v.

Mosch. gr. iij.

Land. opiat. gr. ij.

Cum syr. flor. tunica. Electuarium.

Irroretur cum aliquot guttis olei destillati cinnamomi, &c.

D. S.

Electuarium confortativum.

In lassitudine pedum:

R. Fol. vitis,

Salicis,

Nymph. an. Mij.

Cap. papav. cum sem. no. viij.

Incis. D. S.

Species ad balneum pedum.

Decoqu. in aqu. simplici.

## SECTIO XVII.

### DE

### NUTRITIONE.

JAm ut pateat connexio cum superioribus, præsuppono: quod sanguis in præcordiis perfectus & turgescens, ex sinistro cordis ventriculo transferatur tandem per arteriæ aortæ ramos infinitos in totum corpus ad singulas partes, quo ipso tum illæ nutriuntur, nempe sanguine in genere sic dicto, tum etiam ex eodem liquore humanæ æconomiz conservandæ aut utiles aut inutiles portiones separantur, utpote sunt urina, lymphæ, bilis, &c.

In genere ergo sanguis distribuitur ad partes, ut eas nutriat, id est, ad particularum sensum ab ipsis secedentium aut petentium reparationem, ut & in juventute earundem ad majorem molem & magnitudinem excretionem.

Operationes autem machinæ corporeæ respiciunt conservationem ejus vel in individuo, vel in specie: Illæ vel respiciunt Esse vitale simpliciter, vel Esse animale: unde ad tria generalia capita omnes corporis operationes seu functiones rediguntur, nempe ad vitales, animales, & generales. Vitales actiones eò sunt directæ, ut corpus & conservetur, & in suo vigore vitali corroboretur, omnesque

partes solidæ pro obcundis promptius & melius actionibus organicis debitam magnitudinem assequantur.

Cum enim principia corporis activa sint in perpetuo motu, adeoque continuam patiantur partim alterationem, partim jacturam, necesse est, ut horum redintegratione vigor vitalis & restauretur, & quantum possibile exaltetur. Nam spiritus continuò sub actionum exercitio subtilitate suâ evanescunt & dissipantur, in quorum supplementum impenditur sanguis; cujus massa præterea quoque in partibus solidis nunc in earum substantiam perfectè convertitur, nunc alterata nonnihil saltem tam naturaliter post accretionis annos, quam præternaturaliter per exercitia, aut vehementiores corporis motus, totus insensibiliter per poros transmittitur: ut taceam partes hujus massæ effetas, & per crebriores circulationes, ac in præcordiis susceptas fermentationes, resolutas, copiosè itidem exhalantes; ita ut pluribus unciâ die naturali per insensibilem transpirationem tantum evacuetur, quantum per alvum 15. dierum cursu; de quo Transpirationis quan-



quanto vid. SANCTORIUS SANCTORII de *Statica Medicina*.

Perditio hæc nullo modo fit à solo calore, cum huius actio præfertim si viva flammâ non fuerit accensus, universim omnia humida mista siccet in tophum aut carbonem, ut copiosam remanentiam relinquant; secus atque in corpore nostro evenire solet, cum nullibi tale caput mortuum sanguinis naturaliter obvium sit, quin potius fermentoribus in corpore & aeris inspirati adjumento in tantum resolvitur & volatilatur massa sanguinea, & exinde separandus nutritivus succus, ut vel sponte, vel leni accedente calore, totus successivè exhalet.

Ut ergo insignes hi defectus resarciantur, alimentorum assumendorum, & hinc elaborandi nutrimenti, imminet necessitas; quibus restaurentur partim partes absumptæ nutrimenti appositione & assimilatione, in quo consistit nutritio; partim augeantur membra omnia pro aptitudine ad functiones faciliore, perfectiore ejus agglutinatione, in quo consistit augmentatio, seu accretio: ita ut nutritio & accretio saltem majoris & minoris ratione differant, quod nempe nutritio sit inchoata actio, & auctio perfecta nutritio: quarum illa per totum vitæ cursum; hæc saltim ad certos annos, tam ob partium augendarum pro majori extensione ineptitudinem, quam ob nutrimenti pro perfecta agglutinatione inhabilitatem, perdurare naturaliter solent.

Tribus verò actionibus, Appositione, Assimilatione, & Agglutinatione, absolvitur Nutritio & Accretio: Appositio simpliciter mechanica, per poros partium transcolatione & quali filtratione, peragitur: Assimilatio autem, & per coagulationis modum firmior Agglutinatio, non sine motu transmutationis fermentativo, ab occulto partium volatili acido, fieri videtur: quod spirituosum sub-acidum fermentum partium solidarum à spiritu animali dependere videtur; quia ad partes distribuitur, præter lensum & motum, simul earum nutrimentum toridum & salinum volatile oleosum spirituosum & volatili sua aciditate blandè coagulando & condensando rursus assimilatur & agglutinat.

Fiunt nempe succorum alterationes istæ, quæ dicuntur concoctiones, in corpore nostro omnino per fermenta & fermentationes; sicut separationes unius ab altero per transcolationes & filtrationes mechanicas; eorum verò retentiones & variaz motiones per solas pulsiones, beneficio totius partium, in earum structura & textura fibrosa fundati, sine ulla attractione: videatur CHARLETON in *Oeconomia Animalis Exercitatione* 7. §. 7. & seq. De Platonica circum pulsione CORNELIUS CONSENTINUS videatur: Omnis enim motus in pulsu consistit. In rerum natura non datur attractio, sed omnia fiunt per pulsum.

Naturale hoc est nutritionis schema, dum massa sanguinea existens temperata, & plena partibus mucilaginis & roscidis, i. e. chylosis, corpus turgidulum, molle & succi plenum repræsentatur: quæ nutritio læditur & præternaturalis redditur tribus imprimis modis: & quidem

1. *Alimenti nutritivus*, vel partis nutriendæ vitio. Nutrimenti vitio læditur, quando alimentum vel DEFICIT ob sui asperitatem, tam naturalem quam præternaturalem, uti in scorbuto, ubi assimilari nequit; tunc enim atrophia & tabes in promptu est.
2. Quando illud *Augetur*, adeoque partes solidæ nimis nutriuntur, ut in *Corpulentia nimia*, & in obesitate.
3. Læditur Nutritio, quando DEPRAVATUR; vel vitio alimenti, partium nutritioni legitimæ inepti, quo nutritio non tantum inæqualis, sed & perverso modo fit, unde habitus exterioris universi varia mala, v. g. cachexia, leucophlegmasia, anasarca, ascites, icteri, lues venerea, malum hypochondriacum, scorbutus, & similes alii affectus superveniunt; vel vitio partis nutriendæ, quando nutritio ipsa vitiosè est inquinata, ut inde scabies, pruritus, maculæ faciei, gutta rosacea, vari, aliæque vitia cutanea dicta oriuntur.

Consideramus jam

## CAP. I.

## DE

## NUTRITIONE PARTIUM LÆSA:

## ARTICULUS I.

## DE.

## ATROPHIA, TABES, &amp; MACIES.

**A**trophia, Tabes, & Macies, sunt deficientes Nutritiones non tantum quando corpus non nutritur amplius, seu præterea plus minus hæc ipsa etiam deficit. Et quidem immutatur nutritio manifestè ratione carniæ musculosæ, & ratione pinguedinis, non item ratione cartilagineæ, ossium aut parenchymatum membranarum ac fibrosarum partium. Hæc enim non absumuntur, utut subinde plus minus exsiccantur & atrescant; adeoque habitus carnosus & pinguedinis absumptio in genere *Atrophiam*, Germ. *das Abnehmen*, constituit. Et quidem pinguedo sola deficiens vocatur *Macies*; quando verò caro simul, ipsæ nempe partes toridæ musculosæ absumuntur, nec restituntur, *Tabes*, Ger. *die Schwindsucht*, appellari solet.

*Atrophia* ista in genere nunc est *universalis*, eaque frequentior, quando totum corpus non nutritur, sed successivè contabescit; nunc est *particularis*, eaque rarior, quæ unum alterumve tantum membrum ac viscus internum plus minus occupat; sicut enim nunc pulmones flaccidi, nunc lien corrugatus & tabidus observatus est, pariter sicut nunc manus altera, nunc pes in atrophiâ incidit; quod ipsum vitium in specie *Arida*, German. *die Gliedverwindung* dicitur.

## CAUSÆ.

In genere *Causa Atrophie Universalis est in Efficienti; vel in Obiecto. Efficiens sunt spiritus animales influi*, qui cum ipsius influi confermentati nutritionem efficiunt; undecunque verò deficientes atrophiâ inferunt. *Obiectum*, seu id, quod nutrit, sunt alimenta, quorum vel defectus in massa sanguinea, vel vitium, imprimis viscositas seu corruptio, nutritioni inepta existit.

Quoad spirituum animalium defectum: sunt, quando vel non generantur in abundantia, vel geniti absumuntur in motionibus corporis aut animi. *Non generantur*, ex sanguinis variis vitis, quæ ex vitis cerebri aut in textura, seu, ut alias vocant, temperatura, aut conformatione læsa scaturiunt. *Absumuntur* in iis, qui fortius aut crebrius laborant; hinc raro crassi aut obesi sunt rustici; item qui crebrius Veneri indulgent, unde ex parte Tabes dorsalis; item qui indulgent intensioribus meditationibus, hinc literati frequentius macilent, non secus ac qui mortore aut tristitia diuturnâ sunt affecti, ut quando virgo ob amari discessum tabe perit, ex observ. PANAROLLI *Pent.* 6. *Observ.* 18.

Quoad nutrimenti vitium: deficit nutritio, & oritur atrophia:

1. Quando non generatur alimentum in stomacho, v. g. in inedia, vel coacta vel voluntaria; aut etiam, quando alimenta parum nutritientia aut vitiosa assumuntur, uti fit in picantibus, carbonibus, cæram, &c. comedentibus.

2. Deficit nutritio, quando chylus genitus quidem non tamen distribuitur usque ad sanguinem; idque vel vitio vasorum lactearum in intestina hiantium obstructorum, v. g. in passione cœliaca, quam supra habuimus; vel vitio pylori à tumore scirrholo obstructi, ut annotatur *Samuth.* *Cens.* 1. *obs.* 20. & HOCHSTEDTUS *Dec.* 5. *obs.* 3. 26. & 28.; vel vitio glandularum mesenterii obstructarum, hinc insigniter tumefactarum, ac tandem scirrholarum, & plus minus strumolarum (hæc enim se invicem ita insequuntur) chylo transitum non concedentium; unde necessariò corpus emaciatur. Exempli huius non sunt pauca: Sic HILDANUS *Censur.* 1. *Obs.* 7. curavit puellam tabescentem appetitu minime privatam, idque ex mesenterii vitio, tumoribus scirrholis & strumosis multum repleto: & HORSTIUS libro 2. *Observ.* 3. similiter exemplum habet atrophiæ ex obstructione glandularum me-



lenterii Facit huc etiam, quod refert BONTIUS de *Medic. Indorum* cap. 12., quod nempe atrophiam seu extabescen-  
tia Indis regionibus quoque familiaris & epidemica sit qua-  
si, idque ex vitio mesenterii, nempe ejus abscessibus cor-  
ruptis: Nec tabes adeo decantata in Anglia aliunde habet  
originem, quam ex mesenterii glandulis scirrhis & stru-  
mosis: id quod anatome taliter affectorum confirmat,  
utur GARENZIER in *Traictu de Tab. Anglica* aliam  
suggerat originem. Infantulis imprimis & junioribus sa-  
tis frequens est atrophiam ex hac causa, nempe vitio me-  
senterii: Vid. SYLVIUS lib. 1. *Prax. cap. 14. §. 56.*  
HORSTIUS lib. 4. *Observ. 24.* HILDANUS *Cent. 1. Obs.*  
70. & *Cent. 2. Observ. 44.* SENNERTUS lib. 3. *Prax.*  
*Part. 3. Sect. 1. c. 3.* PANAROLLUS *Pentec. 5. Observ.*  
19. & BARBETTE in *Prax. Part. 3. cap. 3.* ubi de intesti-  
norum doloribus, item in *Anat. Pract. Part. 1. cap. 14.*  
pag. 87., in qua refert, frequenter infantes, raro adultos,  
atrophiam corripit cum ventriculo tumido & inflato, & do-  
loribus compressivis, vitio mesenterii, denegantis chy-  
lo transitum ac debitam distributionem: sicut etiam ma-  
ciem à receptaculi lumbaris, & ductus thoracici angustia  
& compressione, testantur FERNELIUS lib. 5. *Pathol. c.*  
11. & BARTHOLINUS de *Lacteis thorac. cap. 14.* Quod  
etiam pertinent lumbrici chylum in intestinis consumentes;  
item quando cum vel sine sanguine chylus extravasatur aut  
consumitur, uti verb. gr. in vulneribus ac ulceribus ma-  
joribus, lactatione nimia & diuturna, nec non mictio-  
ne chylosa, qualem DRAWIZIUS *Traict. de Scorbu-*  
*to Sect. 9.* & TIMÆUS Von *GuldenKlee lib. 3. Consil.*  
43. annotant.

3. Deficit Nutritio, quando chylus, licet sanguini por-  
mixtus, & plus minus assimilatus, nimis tamen cum eo  
evacuatur. Quod pertinet nimia quæcunque sanguinis effu-  
sio, sive fiat per nares, sive fiat per uterum, sive, quod  
sæpius fit, hæmorrhoides, sive per nimias venæ sectiones:  
Nam tales sanguinis evacuationes & excretiones mul-  
tum depauperant de rore nutritio, ut non possit non  
sequi atrophiam. Nec excludenda sunt medicamenta pur-  
gantia & Sudorifera fortiora, cum massam sanguineam  
nimis solvant, evacuent, & sic corpus emacient. Facit  
huc motus corporis nimius, per glandulas cutaneas sub  
forma sudoris rorem nutritium etiam exhauriens: item ob  
eamdem causam æstus nimius, qui liquefaciendo succum  
nutritium, eundem successivè deprædatur: item fluxus al-  
vinis copiosi huc pertinent; vid. BORELLUS *Cent. 2.*  
*Obs. 64.* ubi refert de atrophiam & maciem post sumptum phar-  
macum, indeque orta hypercatharsis, abortu, &c.: item  
fluxus febrilium colliquativi: item gonorrhœa virorum,  
tam vera quam notha: item fluor uterinus albus mulie-  
rum, aut copiosior aut diuturnior, mulieres tandem ad  
atrophiam ac maciem disponit, uti exemplum habet  
GVARINUS *Consil. 105.* Ulcera cariosa & fistulosa in  
artubus, verb. gr. in genu, atrophiam inferunt, absces-  
sione partis curandam: Vid. HORSTIUS lib. 9. *Obs. 20.*  
Nimia denique venus tabidos reddit matres, quia cum  
spiritibus mediante genitura succum nutritium exhaurit:  
quale exemplum habet ZACUTUS LUSITANUS lib. 3.  
*Prax. admir. obs. 120.* quod etiam pertinet affectus novo-  
rum maritorum, qui vocatur TABES DORSALIS, vel  
alio modo *Hælica* novorum maritorum, quando hi ipsi  
nempe ad rem venerem nimis sunt intenti, tandem suc-  
cum seu rorem nutritium nimis exhauriendo successivè ad  
talem dorsæ atrophiam deducuntur. In Tabæ tali dorsali,  
quæ frequentiore insequitur Venerem, successivè ma-  
rius dorso extenuantur, processus spinales prominent, &  
sensus vermiculationis cum aliquali titillatione subitò per  
dorsum medium decurrente percipitur. Exemplum non sunt  
rara, videbitis apud SOLENANDRUM *consil. 5.* item  
apud TULPIUM lib. 3. *observ. cap. 24.* item, ZACU-  
TUM LUSITANUM l. 1. *Prax. admir. obs. 122.*; sed  
in specie de hac *Lumbagine* & Tabæ dorsali vid. SEN-  
NERTUS lib. 2. *Prax. cap. 15.* ubi de *Tabæ dorsali*,  
& hinc WILLISIUS *Pharm. Rat. Part. 2. Sect. 1. cap.*  
*2. pag. 82.* De hac tabæ dorsali ex Veneris abusu orta sin-  
gulare est, quod habet LEMNIUS *observ. pag. 100.*,  
quod hæc nempe tabes dorsalis, licet semel curata, so-  
leat tamen subinde per periodos septenniorum recurrere,  
& maritos insigniter affligere. Duplex HIPPO-  
CRATI ejus species est: vel à distillatione in spi-  
nam, vel ægentia, aut huic analogi quædam exoptio-  
re excretionis; unde & gonorrhœa quævis ferè insequi solet.

Hæc fuit Atrophia, orta ex defectu nutritio-  
nis.

Altera causa erat atrophiam orta ex vitio nutrimenti.  
Vitium nutrimenti atrophiam inferens est, quando hoc vit-  
tium est, minus temperatum, sed nimis asperum, au-  
acre, aut salum acidum & quasi muriaticum, aut alio vi-  
tio peregrino inquinatum, hinc ineptum est, ut nutriat  
corpus: Id quod fit dupliciter:

1. Propter vitiosam nutrimentum in stomacho & primis  
viis digestionem.
2. Propter vitiosam nutrimenti geniti, vel per se bo-  
ni in massa sanguinea, tamen antea plus minus vi-  
tiata, corruptionem.

Conspiciant hæc duæ causæ non raro, ita, ut in tabe con-  
firmata per circulum quendam se mutuo intendant, & ita  
malum eò gravius reddant: v. g. animi affectus diuturni  
corpus similiter emaciantes, ut sunt iracundia, terror,  
& in specie tristitia, potus frigidus post nimiam incal-  
escientiam, etiam post iram, &c. Nam hæc pathemata par-  
tim sanguinem turbant, partim ex improvise obvenien-  
tia & digestionem primam alterant & vitiant: sicut enim  
prostant exempla hominum, his ex causis tabe corro-  
porum. Stomachum quod attinet: in hoc, uti fonde-  
mentum legitimæ digestionis, ita & sæpissimè causa ta-  
bis & atrophiam hæret, quando scilicet alimenta sub di-  
gestionem corrumpuntur, eaque non in chylum subdul-  
cem nutritium, sed in vitiosè salum acrem ac muriati-  
cum, ac plus minus viscidum aut terosum immutantur:  
quod vitium sæpissimè aut ipsa vitiosa assumpta, verb.  
gr. in pica, insequitur, aut sæpissimè vitio lymphæ sali-  
valis, stomachi digestionem turbantis, & fermentum ejus  
vitians, oboritur tabes: aut denique accidit ex ipsius  
fermenti, vel etiam succorum in primis viis tabe successi-  
vè contracta, & tandem vix amplius emendabili; quate-  
nùs ea, quæ naturaliter fluida, istud constituere debent,  
imprimis spiritus, sanguis & lymphæ, in crassi suâ vitata  
exsiliunt. Quod frequentissimè fiat tabes, etiam phthisis,  
ex vitio stomachi malè digerentis, fidelissimè inculcat  
LINDANUS in *Comment. ad Praxin Chymicar. Hart-*  
*manni*, qui dicit: quod ista tabes, quæ vulgò à catarrho  
oriri dicitur, aut à distillationibus capitis producta, sit sim-  
plicitèr ab acrimonia & visciditate sanguinis & lymphæ  
nata, propter errata digestionis primæ in stomacho, vel  
etiam succorum in primis viis; quod vitium vocat crudi-  
tatem putridam, ad differentiam crudæ acidæ & ni-  
dorosæ: vid. BARBETTE: quando nempe per hanc ali-  
menta corrumpuntur, & in chylum acido-salum seu  
muriaticum, simulque viscidiorum, degenerant. Qualis  
phthiseos radix ut maturè satis prænoscat, sciendum:  
quod ægriales, frequentius, etiam sine omni causa ex-  
terna, aut saltem cum levissima, de lunina lassitudine  
conquerantur, cum appetitu maxime dejecto, possi-  
mum carnium flaccescant muscoli, ad rissim subindè sti-  
mulentur, conquerantur se habere salum, aut muriati-  
cum saporem in ore, & muriam non esse salisorem: qua  
omnia à ventriculo oriri credo, dicit LINDANUS, ab  
ejus cruditate putrida, & ibi primam malæ radicem esse:  
Hæc putrida miscentur cum chylo, & deferuntur in sangui-  
nem, quem inquinant & vitiant, hinc hærent in pulmo-  
nibus, quos acrimonia suâ salina stimulat ad crebriorem  
tussim: unde & in principio, cum velicetur à saliva sal-  
larynx, tussicula tenuis est, ex qua concussis pulmones sen-  
sim intumescent, & phlogoses contrahunt, donec vascu-  
lum aliquod erodatur, & fiat ulcusculum sensim sensimque  
crescens, ac perfecta tandem superveniat phthisis. Vitio  
ergò tali stomachi inquinata massa sanguinea sit nimis  
salsa, item lymphæ similiter salsa progneratur, unde tam  
pravi sapes percipiuntur in ore; postmodum interrogati  
ægri, annon saporem alienum habeant? præter hanc acri-  
moniam salam conqueri solent de sapore cinereo, quod  
est signum jam incipientis corruptionis seu ulcers in  
pulmonibus: deinde conqueruntur de sapore carniū &  
piscium putridorum retia vel quartà post pastum horā,  
volæ manuum intensè calent, percipiunt circa præcor-  
dia cum grauius sensu calor quidam, ac pulsus sem-  
per celer & frequentior sit, tussis exasperatur, & respi-  
ratio sit difficilis, ac alba atque viscida exspuntur. Ta-  
les si perseverent, necessariò tabem & phthisin pulmona-  
lem contrahunt. Hæc ipsa decedunt vulgò à distilla-  
tione capitis, seu catarrho; sed malè: proximè depen-  
dent ab acrimonia sanguinis & lymphæ quasi mu-  
tia.



riatica, pulmones & loca vicina afficiente, fomes verò morbi reverà existit in stomacho, epulq; vitata digestionem; abolitâ enim & imminutâ chylicatione totum corpus alimento defraudatur, ut exindè tabes ac marasmus metuendus sit necessariò. Nec defunt exempla altos apud Practicos talis oritæ tabis vel phthiseos ex vitio stomachi: vid. imprimis SOLENANDER *Conf. 8. Sect. 1. & Conf. 15. Sect. 2.*, ubi exemplum habet totius corporis extenuationis ex malè affecto ventriculo; BARTHOLINUS *Cent. 5. Histor. 38.*; item in POTERIO non pauca exempla reperietis tabis & phthiseos ex affecto ventriculo subnata, *Cent. 1. cap. 61. & 93. Cent. 2. cap. 3. 70. 71. & 78. Cent. 3. cap. 82.*, & BARBETTE *Prax. lib. 3. cap. 2.* & alia loca, in quibus stomachus accusatur in phthisi, depravans alimenta, & in acrimoniam salis ac mutaticam transmutans. Et sanè in Praxi quotidiana nulla tabes aut phthisis, quàm hæc, frequentior & familiarior esse solet.

*Vitio sanguinis*, cujus occasione etiam necessariò vitia- tor distributus chylus aliàs laudabilis, fit Atrophia seu Tabes, quando sanguis quocunque modo à debita crassi- tudine, in speciem salis, aut acido-salis acris, & plus minus mutaticus redditur, aut alio quocunque vitio inquina- tur, adeoque ineptus est, ut nutriat: & hinc post febres, tam continuas ardentes, quàm intermittentes malè cura- tas, insequuntur lentæ & hæcticæ, Tabem inferentes, partim ex acrimonia acido-salis, partim junctâ visciditate sanguinis & lymphæ. Hinc Scorbutici sæpiùs laborant tabe & atrophiâ, ex acrimonia salis scorbutici, nutrimentum corporis inquinantis: Id quod etiam in malo hypochondriaco confirmato familiare est, ut hi ipsi malo progredien- te in atrophiâ incidant, partim ob vitiosam digestionem primam, partim propter vitium ipsius sanguinis. Pariter & menses retenti, ut & lochia suppressa, vel hæmorrhoi- des retentæ, aut imprudenter sanatæ, atrophiâ subinde inducunt: (confer. etiam BARTHOLINUS *Cent. 2. Histor. 35.*) & quæ sunt aliæ causæ plures, massam sangui- neam diversimodè inquinantes, quæ nutritionem impedi- dere valent.

Quoad *causas externas*: maciem quoque medicamenta acriter immodicè & intempestivè usurpata inferre satagunt, v. gr. salia lixiviosa & volatilia, & ammoniacum, nitrum, &c. quia acrimoniam suâ massam sanguineam nimis solvunt, particulasque solutas, præcipuè serosas, per diuresin & diaphoresin evacuant, sicque corpus extenuant. Aloè si in- consultò usurpatur, ob resinæ lentorem, mucique inte- stinalis viscum faciliè hinc immorans, tandem tabem in- fert: vid. PECHLINUS *de Purgantibus*. Pertinet huc imprimis, quando sanguis crassior & vi- scidior fuerit, & in lymphâ digerenda & partibus im- pellenda deficiat, verb. grat. propter febres diuturnas, hæmorrhagias nimias, aut sanguinis evacuationes solenniores suppressas, exest. grat. hæmorrhoidum, à quarum fluxu suppresso, non secus ab eorum flu- xu nimio, Tabem crebrò fieri HIPPOCRATES *lib. 6. Aphor. 12.* testatur. Imprimis tabes ori- ri solet, quando massa sanguinea ad dylicrasiam dege- nerat, vitio partis cujusdam solidæ nobilioris, pro- pter sui malam constitutionem in functione solita defi- cientis, aut etiam ab abscessu aut ulcere affectæ. Tali in

casu non solum ipsum pus, sed & viscus ulceratum; non amplius sufficiens debita functioni circa sanguinis conservationem, malum eò deterius reddit: quod etiam facit pus ex ulcere cujusdam partis genitum, & cum massa sanguinea permixtum; quod ipsum pus sangui- nem vitiat, putredine inficit, eumque salum, acrem, & glutinosum reddit: undetalis ex visceris cujusdam vi- tio quovis insigniore, ac speciatim exulceratione, massa- que sanguineâ infectâ, nata Tabes in specie Phthisis appel- lari solet.

## ARTICULUS II.

## DE

## PHTHISI.

**P**hthisis significat, utut aliàs vocabulum generale sit, omnem corporis consumptionem, à quacunque causa, & in quacunque parte fiat; Strictius tamen jam usitatè *Phthisis dicitur omnis ea contabescens*, quæ cor- ruptelam, ac speciatim ulcerationem alicujus visceris nobilioris, sequitur. Ita si quis contabescat ob purulen- tum hepatis, purulentos renes, corruptos pulmo- nes, & similia viscera corrupta, tunc phthisis dicitur laborare: quæ dicitur à Græco *phthisis* seu *phthi*, cor- rumpto, confuso, perdo, vel *phthi*, corrumpo, quia scilicet in phthisi totum corpus emaciatur. Hanc phthi- sin PARACELSUS aliquando appellat Ariditatem; Germani vocant. *die Lungen-oder Schwindsucht*.

Interim licet Phthisis ex ulcere varia sit; quoniam verò pulmo præ reliquis omnibus partibus internis ma- ximè expositus est injuriæ aeris externi, à quibus insi- gniter lædi potest ac solet, ipse etiam talem sortitus est texturam, ut facillimè ex sanguine suscipere queat va- ria crecrementa, à quibus facillimè alterabilis existit: hinc etiam ex omnibus partibus frequentissimè pulmo vitia- tur & exulceratur, & propterea *phthisis* Phthi- si dicuntur ii, qui ulcere pulmonum laborant, sive ulcus, sive induratio, sive materia gygrea in hoc aut alio viscere collecta fuerit: Vid. BARTHOLINUS *Hepat. Exautor. S. 6. pag. 666.* FERNELIUS *lib. 5. Pathol. cap. 11.* SEVERINUS *de Recond. Absc. Nat. S. 2. cap. 36.* TIMEVS à *GuldenKlee lib. 6. Epist. 8.* WHARTONVS *Atherogr. cap. 11.* & WEPFERVS *de Apoplexia pag. 114.* Cum Phthi- si hac semper simul conjungitur Febris *Hæctica*, in quacunque parte sit ulcus; qualis Hæctica, & inde Tabes, conjungitur etiam interdum ulceribus partium externarum insignioribus. Si pulmo suppuratus est, sequitur sordidum ulcus, quod magis magisque inqu- nando sanguinem, Tabem admodum exasperat: quæ etiam valent in Phthisi renali, jecorali, &c. Cum enim per viscera continuè circuletor sanguis, hinc faci- lis labe quadam notatus, eandem visceribus, in specie pulmonibus, affricare potest; sicut etiam ex suppurato me- senterio, vel abscessu mesenterii observata fuit Phthisis ab HORSTIO *lib. 2. Observat. 5.*



## Atrophia omnis sit vel Nutrimenti

defectu, ex

luctu.

Alimentis pravis, in pica,  
Distributione chyli impedita,  
Chyli exhaustionem.

vitiis, ob

Stomachum malè digerentem: Huc pertinet omnis Tabes,  
quæ vulgò catarrhis adscribitur, de qua VVILLISIIUS  
*Pharm. Rat. Part. 2. pag. 90.*

Sanguinem corruptum, chy-  
lum inquinantem, in dy-  
serasiam falsam, acrem,  
& muriaticam degeneran-  
tem.

1. Ex vitio digestionis primæ.
2. Ex intermittentibus & con-  
tinuis malè curatis, adeoque  
Hæticâ inferentibus, &c.
3. Ex scorbutica diathesi ac  
hypochondriaca.
4. Ex purulentia cuiusdam ul-  
ceris, sanguinem inqui-  
nantis; hinc Phthisis.

*Phthisis pulmonalis & vomica pulmonum*, cum qua sæpius confunditur, in eo saltem differunt, quod *vomica* sit *ulcus pulmonum clausum* seu *abscessus*; è contra *phthisis* pulmonum *est ulcus fordidum, ex abscessu jam aperto genitum*. Nam in vomica pulmonum seu eorum abscessu est pus purum, album, crassum, laudabile, leve & æquale, quod ipsum interdum suis membranis inclusum circa excretionem in pulmonibus hæret. Verùm, ubi pus tale non expurgatur, degenerat variè à propriâ natura in varias fordes ac sanies acido-viscidas, & tunc supervenit *ulcus fordidum*, quod *confirmatam* dat *phthisin*.

Probè autem hic observandum: quod inter phthises, uti frequentior est pulmonalis, frequentior esse solet ejusdem *exulceratio*. Ast præter hanc & aliæ causæ, viscus pulmonum vitiantes, phthisin inducere valent; adeoque non solum exulcerationem pulmonum, sed etiam quamvis eorum labem insigniorem, ob usum eorum ad sanguinis eu-crasiam & constitutionem vitalem summè necessariam, ad phthisin disponere certum est. Ut aded rectè *phthisis pulmonalis* definiatur in genere *Contabescencia* totius corporis *ex vitio pulmonum nata*, non ex sola exulceratione, ut communiter fieri solet, conjuncta cum febre lenta, difficili respiratione & tussi: Sic & pulmonum corrugatio fide qua supra) tabem potest inferre; non tunc ac si aliquid peregrini in asperam arteriam fuesit illapsum, & in bronchiis hæreret, tunc eadem irritando ad tussim continuam, successivè constitutionem & hinc functionem pulmonum ita lædere potest, ut tabes demum cum febre lenta insit phthiseos superveniat; unde hæc phthisis notha appellatur, quod extra pulmones existat: Sic ex nucleo avellanæ in pulmonem illapso tussim continuam cum emaciatione totius & imminere phthisi videb. apud *BARTHOLINUM C. 1. obs. 11. & Cent. 2. Obs. 27. p. 197.* Pariter ex nucleo pomi in asperam arteriam illapso phthisin perfectam lethale videb. in *M. A. N. C. Ann. 4. & 5. Obs. 24. pag. 26.* Plura exempla ad instituendas cautelâ circa phthisin observanda videb. in *M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 31. p. 58. & Ann. 3. Obs. 111. p. 181. STL. VII Pr. l. 1. c. 24. & HOECHSTEDTERO, item MARCO AURELIO SEVERINO Tr. de Abscess. nothis p. 259.* Sic ut è contra pulmones exulcerati una phthisi observati fuerunt: vid. *KERKRINGIUS in spicileg. Anat. Obs. 72. item M. A. N. C. Ann. 1. Obs. 94. p. 223. & BARTHOLINUS C. 3. Hist. 14.*

*Pars ergò affecta sunt pulmones, sive cum sive sine ulcere.*

Frequentiores autem Causæ Remotæ hujus ulceris phthisici, in specie phthiseos pulmonalis, sunt variz: nempe vel *internæ*, vel *externæ*. Ex internis sæpiissimè est nimia sanguinis, & exinde nata lymphæ acrimonia at falsæ muriaticæ; omnis enim phthisis pulmonalis, quæ à catarrho seu destillatione vel defluxione ex capite vulgò oriri dicitur, à nullo alio est, nisi à sanguinis & lymphæ, & horum succorum acrimonia varia, præsertim acido-falsa; quæ uti lancinando asperam arteriam tussim excitat, ita acrimonia sua substantiam pulmonum erodit. Sæptem autem hæc sæpiissimè in digestionem ventriculi vitiata originem ponit.

Acrimonia hæc probatur per gustum: nam quotiescunque laboramus ulcere in ore, toties maturo ulcere disupto, percipimus saporem æmulantem calcanti quæ; &

hæc ipsa materia purulenta demum producit symptomata recitata in definitione.

Inter causas verò *externas remotas* fortuita plura non raro ulcerationem pulmonum, & hinc phthisin inducunt: v. gr. vulnus thoracem & pulmones penetrans, hinc in ulcus degenerans, contusio seu casus ab alto, indeque sanguis in quodam thoracis loco grumosus, pulmones opplens, eodemque acrimoniâ suâ facile erodens, ut fiant ulcerosi; luxationes vertebrarum, clamores fortiores, sanguinis sputum ut plurimum, si non semper, & similes affectus, &c. sæpius ulcus pulmonum & phthisin pedissequam post se trahunt.

Uterius phthisis pulmonalis aliis morbis non raro supervenit; sicut id videmus post pleuritidem & peripneumoniam suppuratam seu malè curatam, & hæmoptysin, quæ sæpius phthisin post se reliquunt. Peripneumonia enim seu inflammatio pulmonum, si non curetur, antequam sanguis stagnans discutatur, fit ex inflammatione suppuratio, & consequenter in pulmonibus exulceratio. Quia verò omnis sanguis per pulmones transire necessum habet, sequitur, in exulceratis pulmonibus infici totam massam sanguineam una cum succo nutritio chyloso. Hinc dicto modo infecta massa sanguinea tanquam à fermento quopiam peregrino contrahit fermentationem præternaturalem, aded ut ipsi commixtus nutritius succus corpori nutriendo evadat incommodus, quo factò necessum est, ut totum corpus tabescat. Quia verò præterea omnis materia purulenta continet partes acres, sequitur, hanc acrimoniâ puris vellicare asperam arteriam bronchia, ita ut his vellicatis, irriterentur ad *inssim*. Cæteri quia pulmonis structura pure aut consumpta aut oppleta, fit ineptia respirationi, unde accedit *difficilis respiratio*. Variolæ etiam & morbilli non raro phthisin in pulmonibus inferunt. Uterius acr inelementior, vapores acidi & corrosivi mineralium, aquæ fortes, &c. hausti ab operatoribus Chymicis vel metallicis, vapor calcis vivæ, &c. non raro ad tabem ac phthisin disponunt; unde & aquæ tartoris odor aded virulentus ab *HELMONTIO* dicitur, ut sæpius inspiratus tabem & phthisin pulmonalem inferat: unde gypsum & calcem præparantes plerumque phthisici moriuntur, ut rectè observat *LUZITANUS Cent. 4. Obs. 41.* Potus vini nimis acidi & tartareus crebrior ad phthisin disponit: hinc enim teste *HOEFERO in Herr. Med. p. 112.* in Moravia & Austria provinciis propter vinum acido-tartareo crebrius haustum *phthisis* quodammodo *endemica* existit. Item aceti nimius usus corrugationem pulmonum inducit, cum respiratione difficili & dolore pectoris circa asperam arteriam. Faciunt huc acidulæ & omnia vitriolata, quorum frequentior usus eos, qui debiliorem sunt pulmonum, ad phthisin disponit. Fumus nicotianæ copiosius haustus ad phthisin pulmonalem disponit: potus frigidus post incalescentiam corporis pariter eandem infert: vid. *M. A. N. C. Ann. 6. & 7. Observat. 210. pag. 309.*


Denique hæreditarium malum est Phthisis pulmonalis, quod à parentibus per traducem seminalem in foetum transplantatur. Historiam notabilem narrat *LINDANUS in Hariman.* de civitate Enckholz habitante, nomine Augerio Palla, cujus uterque parens ex tabe & phthisi tuit mortuus: post horum mortem prima filia incidit in phthisin, quæ exinde tabida mortua est; hinc filia secunda natu similiter con-

tabe-



tabescens moritur; post hanc tertia idem experitur fatum. Propterea Augerius Passa peregrinas visitat regiones, ut semper esset in exercitio, ne id fatum experiretur, & peregrinatione continua & aeris mutatione malum evitavit. Contagiosa quoque admodum est ulceratio pulmonum phthisica confirmata, si scilicet Phthisicus anhelat sanum, dum fermentum ulceris corruptivum, aut per halitum quoque corporis ex pectore exspiratum, aut per sputum & saniem expectoratum se propagat, & pulmonem aliàs sani similiter inficit, & ad abscessum vel ulcus disponit. Hinc liberi cum parentibus, consortes & conjuges cohabitantes, sibi invicem facile hoc malum communicant, potissimum si in his vel minima ad phthisin dispositio naturalis fuerit, aut dicitur erroribus vacent. Exempla contagii phthisici videbitis in *RIPERII Praxis lib. 17. cap. 17. Cent. 1. Observ. 35. & 99: sic etiam Cent. 4. Obser. 92. observat*

phthisin propagatam per contagium in mulierem, quæ mamma viro phthisico lactandas præbebat: quæ mulier subindè postmodum sororem infecit quoque: Item *BARTHOLOMÆUS Cent. 1. Histor. 46. item Sylvius de phthisi §. 70: Nec non SCHENCKIUS in Obs. pag. 256., ex Baptista Montano refert, adeò contagiosa esse Phthisicorum sputa, ut Medicus subindè olfaciens eadem prunis injecta, exinde factus sit Phthisicus: idem ex FRACASTORO l. 2. de Morbis contag. cap. 9. refert, Phthisicorum vestes ab aliis gestatas, post biennium etiam idem contagium propagasse in alios. Ac sanè non mirabile hoc videri potest, si verum est quod refert PANAROLLUS *Pentec. 2. Observ. 49.,* expectoratum sputum ex confirmato ulcere pulmonum excreta adeò virulentum & malignum esse, ut muscas illud gustantes instar arsenici interimat: Interim tamen hoc contagium non est ita activum, ac febrium malignarum.*



¶ Hæc de natura & causis Tabis in genere, & phthiseos in specie. Pergo ad signa.

### DIAGNOSIS.

*Signa atrophie seu tabis* jam factæ diagnostica sunt facillima, & per se clara: sed serò & difficulter potest curari, & per se clara; incipientis verò difficulter cognoscibilis, & quæ facillè curatur. In tabe incipiente corpus sensim atque sensim emaciatur ac tabescit, hincque virium imbecillitas sensim ac sensim supervenit, donec in confirmata successivè tabe, præter faciem dictam Hippocraticam, (cujus descriptio aliàs per se est nota) costæ in thorace protuberant: Cartilago ensiformis incurvata apparet, scapulæ alarum ac claviculæ arcuum instar prominent, dorsû spina se exerit, venter collapsus constrictusque apparet; clunes pendulæ sunt, vel omnino consumptæ; crura, brachia, pedes, manusque cum digitis arida spectantur, & circa articulos protuberantiæ artolli videntur; ungues curvantur, pili excidunt, cutisque flaccida & corrugata existit; venæ interrim prominent undique conspicuæ & lividæ, corpusque univertum tantum non transparens & pellucidum in quibusdam observatur: uti historia hæc graphicè SYLVIO l. 1. *Prax. cap. 37. in specie 17.*

Præ cæteris diagnoscendæ sunt causæ phthiseos seu Tabis, & (1.) quidem ex spirituum animalium vitio & alimenti defectu tabem inferri per se facillè patet, imprimis ex examine causarum antecedentium, & adjunctorum symptomatum syndrome: Exem. gr. ea tabes, quæ quodam glandularum mesenterii vitio, & consequenter ex denegata chyli distributione accidit, abdomen inflatum ac tumidum cum dolore in ejus profundo obtuso ac plus minus gravativo; itemque cum renitente hinc inde sparsa distictie, circa umbilicum observabili, habere solet: Excreta liquida, aut chylosa excernuntur, & sensim corpus emaciatur: quæ omnia innuunt, vitio chyli denegati oriri atrophiam. Sed (2.) longè magis negotium est cognoscere labem ac subsequenter phthisin, ex vitio nutrimenti, circaquam ad tres causarum fontes imprimis attendendum erit:

1. An tabes sit ex vitio digestionis stomachi?
2. An ex vitio sanguinis ad nutritionem inepti?
3. An ex corruptela ulcerosa cujusdam partis internæ, in specie pulmonum?

Equidem causæ externæ, vel affectus varii præcedentes, qui alterando sanguinem, vel vitiando chylum, ad talem tabem disponunt, ut & symptomata concomitantia & similia, partim ab eorum signis specialibus, partim ægri relatione, aut ex ejus vitæ genere patent.

Præ cæteris tamen inquirendum: an vitio stomachi oriuntur tabes? Nam utut hæc causæ subindè se insequantur, ita ut vitium stomachi, sanguinis & lymphæ sequatur acrimonia, & hanc tandem pulmonum ulcus; interdum tamen etiam separatim existere observantur.

*Ex stomacho esse & dependere Tabem* innuit: si præcesserunt causæ ex rebus non naturalibus, quæ ad digestionis primæ labefactionem dispositæ fuerunt, v. gr. curæ nimis, iracundia nimis, &c.; item si in principio inflammationes stomachi, tumefactio abdominis, angustia præcordiorum, ructus cænerosi, quando scilicet ita depravatum est ventriculi fermentum, ut ejusmodi odorem spirantes ructus percipiuntur; & alia symptomata stomachi quoad appetitum aut quoad digestionem præcesserint.

Alia, quæ immediatè sanguinem afficiunt, hujus læsionis conjecturam faciunt, v. gr. quando ulcus in quodam loco lanatum comitatur phthisis pulmonalis: Sic ex ulcere pedis sanato phthisin lethalem observavimus *THIERMEYER Consil. lib. 2 pag. 85.* Nempe à fermento ulceris unà cum sanie acri per istud evacuati solutâ retentis, cum sanguine hinc inde circumrapis, & in pulmonem dispositis, Malum originem cepit.

Facit huc ipse habitus ægrorum plus minus ad phthisin & atrophiam dispositorum: nempe quotidianà constat experientia seu observatione, succulentus aut obesos minus evadere phthisicos, bene autem macilentos, à natura plus minus attenuatos. Horum nempe sanguis minus temperatus, minus dulcis, & minus oleosus existit, adeoque minus nutrit; è contra acrior, asperior, & salior esse solet, facillèque incalescens, unde tales minus bene nutrirî observantur.

*Phthisis*, quæ à visceris interni exulceratione vel alio vitio dependet, facillius, quàm ejus causæ, cognosci potest, cum in horum vitis nulla occurrant signa pathognomonica, aut plures plurium eorum anomaliz concurrant; adeoque causa harum primaria & prima determinari non possit.



Imprimis si excreta affectu non manifestent: e.g. quando phthisicus conqueritur de dolore, tensione, aliisque abdominis symptomatis, colligi quidem potest, quod aliquod abdominis viscus affectum sit, incertum tamen adhuc manet, an intestina, an mesenterium, an pancreas &c. primariò affecta sint? nec, licet pars affecta dignoscatur, de morbi formalitate mox constat, an nempe scirrhus vel hydrops, vel ulcus, &c. subit? Nec excreta morbum ejusmodi occultum semper manifestant, dum exem. grat. pulmo, qui propter frequentiores cruoris aut puris rejectionem suppuratus putabatur, integer; hepar verò maximè consumptus deprehensus fuit: vid. SCHNEIDERUS de Catarrhis lib. 4. cap. 3. pag. 103. Interim tamen, ut probabilis conjectura de phthisicos hujus causa nobis constet, pars affecta colligatur ex symptomatum ipsi adjunctorum præsentia, & loco affecto seu dolente, ut nec symptomata ejusmodi semper generis, quæ nos ad partis affectu cognitionem ducant, imprimis cum de hujus & illius visceris usu primariò nihil certi adhuc nobis constet, dentur? An verò hoc vel illud viscus exulceratum sit? concludere possumus ex puris rejectione, qualis si non observetur, de scirrhus vel alio simili vitio, ex. gr. hydropse, coniecturandum, ut nec omnium viscerum exulceratio, propter solum profundiores & viarum excretoriarum defectum, puris rejectione leprodat. Frequentissima phthisis est pulmonalis, circa quam inquirendum, an à causa externa, verb. gr. inspiratis? an ab interna oriatur & si ab hac, an affectus secundarius sit? Id est, si pleuritidem aut sputum sanguinis sequatur, affectus antecedentis ratio imprimis habenda est: Si verò est affectus primarius, tunc ista est phthisis pulmonalis, quæ ab ulceratione ejus ex defluxu catarrhali, ut vocant, oritur. Hujus malè sic dicitur phthiseos catarrhalis radix seu ortus est in ventriculo malè digerente, progressus in sanguine aut lymphæ exinde acido-salis factis in pulmonibus, uno alterove ejus lobo, ejusque vesiculis & cellulis plus minus erosio. Unde in loco eroso ulcus supervenit seu suboritur, cujus fermentum nutrimenti proximi corruptivum existit, unde fordium, saniei & puris generatio, ac mediante tussi successiva excretio, donec vel ab illis torribus suffocentur ægri, vel erosio & absumptis maximam partem pulmonibus sanguis debita in crasi deficiens nunc mediante diarrhæa colliquativa, nunc mediantibus tumoribus pedum œdematosis mortem inferat.

Hinc, ut maturè præcognoscatur hujusmodi phthisis ex vitio stomachi oriunda, quippe quæ communissima est, & à veteribus catarrho à capite defluenti falsò adscribitur, ejusmodi historiam, ne fiat confusio in lectione Practicorum, enarrare placet, & est talis: In tali tabe nempe ægri ordinariò, nunc cum præcedente errato aliquo in rebus non naturalibus, vel cura nimia, vel iracundia, ab ingurgitatione potus, aut simili, vel etiam abiquetali manifesto errato, de virium labefactione conqueri incipiunt, cum appetitu plus minus dejecto, aut saltem carnes abhorrente: hinc tempore matutino, dum ex lecto selevant, de sapore in ore peregrino conqueruntur, qui tamen primò solet esse extraordinarius, nec adeo sensilis, postmodum verò saporem salum in ore percipiunt, sub quo ipso magis magisque prostermitur appetitus; successivè titillationes fauces affligunt, quas subinde levis tussicula, sed arida & sicca, insequitur, ideoque negligitur, sentiuntque flacciditiam substantie carnosæ in artubus: malo magis progresso conqueruntur de sapore putrido cinereo, aut de sapore carnum & piscium putridorum, in tali casu semper radix mali in stomacho querenda: tussis sicca, sed in qua tenuia saltem aut aquosa rejiciuntur, successivè fit aspera, imprimis noctu, aut saltem post lecti introitum, quæ sanguinis & lymphæ inquinamentum ostendit; cui tussis sicca difficillor plus minus respiratio supervenit, unà cum febricula lenta, ipsis ægris ferè insensibili, saltem ab omni passu, præter angustias & gravationis sensum circa præcordia, levem quandam calorem, specialiter in manibus, extraordinariò percipiunt. Interim tamen, quocunque tempore tentetur pulsus, semper celer, frequens, plus minus parvus, observari solet: incipiunt exspuere candida tenuia, quæ successivè diu in copia augentur. Procedente malo exasperatur Hæctica, dum non tan-

tom calor post pastum augmentatur notabiliter, sed etiam sudores nocturni copiosi supervenire solent, tussis augeatur in die, supervenit excretio copiosæ materie variz, primus viscidæ albidæ, hinc successivè viscidæ flavæ, interdum viridis, hinc materie lividæ, tætrum saporem exhibentis, tandem genuinum pus, nunc cum nunc sine vestigio sanguinis unà excreti: quo in casu jam exulceratio partis cujusdam, imprimis pulmonis, supervenit: quæ continuè pectus hæc tussis, præsertim vesperti & mane, vesperti minus, mane plus materie corruptæ ejicitur; hinc Hæctica, difficillè respiratio, corporisque intabescencia magis magisque intenduntur, unà cum virium omnium successivà labefactione.

Observandum autem hic ulterius, quod tussis Phthisicorum non statim sit pulmonalis, sed ferè in principio sit stomachalis, cui tandem acrioris lymphæ occasione per glandulas asperæ arteriæ aut pulmonum excretæ tussis pulmonalis supervenit. Deinde attendendum est, non in quavis phthisi aut exulceratione pulmonum tussim adesse, quin interdum citra insigniorem tussim insignis pulmonum erosio aut exulceratio observata fuit: vid. KERKRIINGIUS in Spicileg. Obs. 72: tunc tantum est tussis, quando exulceratione pulmonum factà à purulenta materia acri bronchia solent irritari, licet Vomica pulmonum sine tussi existere, queat, sicut exemplis probat SCHNEIDERUS. Sic quoque rejectum pus frequentius quidem est ex pulmone, non tamen semper, etiam si cum tussi fiat; quin etiam pus in ulceribus aliarum partium, pulmonibus salvis & illæsis, per sputum expurgari potest. Exemplum aliquod habebitis in SCHNEIDERO lib. 4. de Catarrhis pag. 103. de quodam pro Phthisico habito, qui copiosum pus & sanguinem tussiendo rejecit: aperto corpore post mortem pulmo omninò sanus, hepar verò exulceratum & purulentum repertum fuit. Nec mirum hoc esse debet: uti enim pus ipsum, v. gr. pleuriticorum suppuratorum, interdum per alvum, interdum per urinam rejicitur: & uti pus ex ulcere brachii per urinam excretum observavit P. A. RÆUS; ita simili ratione hepatis, renum, & aliarum partium suppurationes etiam excrementa purulenta mediante sanguinis circulo in pulmonibus secerantur, ut mediante sputo ac tussie eici possint. Sic puris sputum menstruum sine phthisi videbitis in M. A. N. C. Ann. 1. Observat. 94. p. 223. item BARTHOLINO Cent. 4. Histor. 17. Rejectione puris & cruoris sunt signa pathognomica phthiseos. Alias non mox præsentem febrem, difficillè respirationem, rejectionem materie copiosæ viscidæ, &c. pronuntiandum, ægrum esse phthisicum: Nam prædicta mala sæpius etiam in depravata chylosi, aliisque affectibus ventriculi reperiuntur.

Si dubius sit Medicus, utrum materia viscida, an verò pus exspuatur; jubent patientem exspuere in aquam frigidam, quo facto, observant, an materia fundum petat? an verò aquæ innatet? Prius si accidat, patiens exspuit pus: si posterius, solum materiam viscidam rejicit; nam visciditati materie pituitosæ magna inest porositas, unde aer huic porositati irretitus in causa est, ne materia viscida fundum petat. Quomodo ex urina cognoscendum, an pus rejiciatur? vel materia viscida, vel genitura? audivitis in Collegio Institut. ubi de urina.

Porò distinguenda est tussis in phthisi incipiente. Sonitus, locus doloris, rejecta, &c. facillè hæc discernere docent; ac tunc demum sumus de labe pulmonum certi, quando toti pulmonum lobi consumpti, aut etiam eorum frustula successivè ejiciuntur; sicut interdum furculi venarum & arteriarum corrosi expectorari observantur. Sic namque furculum venæ arteriosæ expectoratum observavit TULPIUS lib. 3. cap. 12. & pulmo integrè ferè per pus rejectus observatus fuit à S. A. L. M. U. T. H. Cent. 1. Observ. 14. Omnibus his Tabidis, & Phthisicis commune est, ut copiosos sudores nocturnos patientur, ita ut simul atque oculos claudant ægri, sudore diffuant; sicut in malo confirmato defluvium capillorum supervenit: sed tunc viribus exhaustis cessante tussi, aut deficiente ejus expectoratione materie, ægri suffocantur, aut superveniente diarrhæa colliquativa, ad quam maximè propi sunt Phthisici, pedumvè tumore œdematoso, ægri juvantur. Quod si ex visceris cujusdam præcedente in am-



inatione vel abscessu, aut etiam pleuritidi suppurata, aut sputo sanguinis superveniat phthisis, in talibus minus stomachus est incusandus, qui tunc potius insons apparet, sed ad primum morbum est respiciendum. Quæ pars pulmonum afficiatur, an dextra? an sinistra? præter sensum doloris nonnihil obscurum cognoscitur ex decubitu ægri: siquidem æger non potest decumbere in latere sano, sed in latere affecto, aliàs imminet suffocatio; cum contra si in latere ægro decumbat, talia ipsi non accidunt, uti rectè observat SALMUTH *Cent. 1. Observ. 14.* Urina est flammea, & præcipitatur in sabulum subicundum, & materiam pinguem urinæ innatantem.

Pro meliore dictorum intelligence Observ. 1. Omnis atrophia & frequentior ejus species phthisis, vel sunt affectus primarius, vel secundarius, vel comitatus, qui alium sequitur partis affectum; Unde phthisis pleuritidem, sputum cruentum, atrophiam, febres chronicas, scorbutum, &c. insequitur. Illa semper radicem habet in stomacho, & hinc dependente sanguinis dyscrasia, sæpius scorbutica.

Observ. 2. Atrophia & Phthisis primaria, quæ sanguinem sequitur vitiatum, fundamentum etiam habet in stomachi digestionem primam, vel quatenus exinde sanguinis dyscrasia datur occasio, vel quatenus sanguinis alterati occasione & stomachi digestio prima læditur, indeque malum confirmatur. Multum hoc faciunt animi pathemata, cura, terror, Tabem perfectam sine ulcere cujusdam partis inferentia; quatenus enim hæc sanguinem afficere possunt, & digestionem primam turbare, eatenus ad phthisin disponunt.

Observ. 3. Apprimè notandum, quod pulmonum vitio frequens etiam Tabes oriri solet, non solum exulceratorum, sed etiam nutritionis defectu contabescentium item si aliquid peregrini in asperam arteriam illaplum sit, quod irritando ad tussim continuam successivè tabem notam inferre solet, quæ tandem remotione illius recedat, vix exempla *suprà allegavi.*

Plura quidè Tabis & Phthiseos natura desiderat, adeat in specie WILLISIIUM *Pharm. Rat. Part. 2. Sect. 1. cap. 5. & 6.* item SYLVIIUM *lib. 4. Prax. & Tract. de Phthisi*, denique BENEDICTUM in *Theatro Tabidorum.*

## PROGNOSIS.

Quoad *Prognosin*: notum est, Tabem omnem ac phthisin esse malum chronicum, & difficillimum curatum: imò confirmata, quia sine insigni vitæ et humorum dyscrasia, & læsione fieri nequit, sæpè nullus est curationis, nisi sublimiora negotia accedant.

Imprimis tres isti gradus *Phthiseos*, nempe *imminentis incipientis, & confirmata*, quas WILLISIIUS *insinuat c. 1. pag. 106.* probè observandi sunt.

Primus enim facilè, secundus difficiliùs, & tertius planè non curatur. Et quidem in gradu secundo Vulnerarius & laudabili dicitur uti interdum curari, ita ulterior progressus interdum per plures annos retardari potest. Sed necesse est, cautissimè & rigorosè ægri observent omnia; aliàs impossibile est, ipsis succurrere.

Quò melior & sanior est stomachi constitutio, eò uberior sanitatis spes superest: unde tabes incipiens à ventriculi dyspepsia, vermibus, &c. aliquid salutis promittit.

Tabes à cicatrice intestinali, scirrhis ac ulceribus vitæ, scorbuto, fluore albo, gonorrhœa, hydrope, & mensium suppressione, nisi promoveantur, difficulter aut nunquam curantur: Conf. HIPPOCRATES 2. *Predict. 13.*

Qui ex pulmonum ulcere vult evadere, cum 6. Hippocratis signa habere debeat, quæ videb. in SENNERTO *lib. 7. Pr. c. 3. de Phthisi p. 207.* eaque prolixius explicat SYLVIIUS, una cum aliis, *Tract. de Phthisi p. 87.* in sequent.

Diarrhœa spontè superveniens phthisi, aut tumor pedum cedematosus, aut denique deficiens tussis, mortem in propinquo denunciant. Tandem, inquit GALENUS, *Phthisici vivunt, quamdiu extussire, & sputa pulmo-*

*ni expurgare possunt; ubi vero sputa intra manent, obstruuntur via & suffocantur.*

Sisputum Phthisicorum vel per se, vel carbonibus injectum graviter olet, & capilli desuunt, periculosum est signum.

Phthisis denique, quæ à tuberculis & indurata pulmonum compage, nunquam curatur.

## CURAE.

Quoad attinet Curam atrophie, tabis & phthiseos: hæc consistit in eo, ut

1. *Causa*, quæ vel alimentum exhaurit, vel primarius morbus, qui massam sanguineam inficit, *removeatur*. Hæc causæ remotione variat equidem pro earum varietate *suprà recensitis*. Sed in tabe, quæ frequentius curæ subjicitur, vel stomachus rectificandus, vel acrimonia ac lymphæ acidis temperanda, vel denique visceris læsio aut exulceratio plus minus perfecta, in specie pulmonis, sananda, aliavè ejus corruptela corrigenda.
2. *Symptomata* graviora interdum, præsertim in phthisi, mitiganda, qualia sunt, tussis ferina, præsertim nocturna, excretio difficilis, inde respirationis difficultas; item febris lenta, sudor nocturnus, vel diarrhœa.
3. Corpus nutriatur: id quod dixi laudabilis præstat, quam stomachus appetit & facilè digerit; in specie lactea, quæ & chylum subdulcem & subpinguem & probè divitem suggerit, simulque sanguinem temperatum & quali chylosum reddit.

Pro cura hac ritè instituenda:

Observ. 1. quod vomitoria in omni Tabæ ac Atrophie, item in phthisi tam primariò incipiente, quam confirmata, idque secundariò, sint optima, in specie, ubi malum est ex vitio stomachi, & inde nata acrimonia massæ sanguinis salto-muriatæ: uti rectè hoc inculcat LINDANUS, quod scilicet Vomitoria sint maximè necessaria, & se curasse sæpius Tabidos per Vomitoria etiam repetita: Et quisquis, inquit, scilicet vult curare tabem, quando jam non adeò vehemens, ubi tussis, non tamen ulcus, & quamvis incipiat quodammodo, & excretum sit aliquid sputi sanguinolenti aut purulenti, tamen statim accedatur ad Vomitoria: in quo ipso eleganter consentit HARTMANNUS in *Praxi Chymiat. cap. 99. & cap. 185.* Hoc ipso enim radix mali evellitur, & quidem non tam in principio curæ, quam & in ulcere pulmonum confirmato, ubi urget difficilis respiratio, aut est difficilis materis maturæ, utut per se fluidæ, excretio, si vires adhuc contenti, tunc similiter optimè convenit vomitorium: propter quam causam & BARTHOLETTUS *Tract. de difficili Respirat.* & etiam SYLVIIUS in *Praxi*, insigniter commendat Vomitoria in ulceribus pulmonum, etiam in empyemate: Et sanè, uno vomitu plus emittitur ex pectoris cavo, quam 10. diebus tussis. Interim in tali casu, ubi phthisis est confirmata, habeatur ratio sputi sanguinis imminuentis, quo præsentè cauti simus in vomitoriorum usu: contra si non adsit, tutò illa propinemus, cum & semper ipse in tali casu curam à vomitorio propinato incipiam: & certum est, quod vomitorium potenter ac copiosè evacuet fomites saniosos ex pulmonibus, propter quam causam in empyemate etiam commodè Vomitoria usurpari possunt. Curavi aliquando ancillam desperatè phthisicam ex ulcere pulmonum, cui inter alia remedia duo valida præscripti vomitoria, non tamen unâ vice, & vix credibile est, quam variæ & copiosæ fordes cum præsentissimo levamine rejectæ fuerunt, quæ promptissimè facilitabant Curam.

Obs. II. Post Vomitoria, quantum possibile, cavendum est à purgantibus quibuscunque: nam etiam lene purgans Phthisicos & Tabidos maximè & copiosè evacuare solet cum insigni virium noxa, ut ipse observavi; ita ut quod aliàs in statu naturali nil effectus præstaret, in phthisicis cum summa noxa per totum morbi cursum incommensurabili assumptum fuerit, & tales ægri post purgationem semper pejores habent, ac vel per crebrius tussiant. Penitus ergo non sunt purgandi, nec vena est aperienda, nisi quædam



dam sanguinis evacuationio suppressa in causa sit, ubi venæ-  
sectio conceditur, sed post vomitum reliqua cura consi-  
stet in *mitigatione acrimoniae salinae*. Et quidem, quam  
noxia sit purgatio, uti & venæsectio in phthisi, videbitis  
apud BORELLUM *Cent. 4. Observ. 13.* & PROSPERO  
MARITANO in *Hipp. Sect. 4. Aph. 8.* Salum ergo, si ali-  
quid tentandum, primæ viæ, & quidem lenissimis pur-  
gantibus, in principio abstergendæ sunt: vid. hac in parte  
BARTHOLINUS *Cent. 10. Obs. 15.* HIPPOCRATES  
*lib. 2. de Morbis Text. 46. §. 27. & Text. 47. §. 13.*: cui scopo  
Rhabarbarum optimè inservit. Vulgò etiam solent inu-  
rere fonticulos Phthisicis, seducti à catarrho, quem ex ca-  
pite in asperam arteriam depluere existimant: sed nil pro-  
sunt, modò non noceant.

*Observ. III.* Dulcia, Saccharata, & Mellita crebrius  
sub forma Syruporum Linctuumvè usurpata plus nocent  
tabidis ac phthisicis, quam prosunt; fermentativa enim  
sunt Saccharata & putrefactiva, adeoque stomacho, ut  
& visceri cuidam eroso, speciatim pulmonibus, in-  
signiter sunt hostilia, digestionem primam turbant, ac  
imprimis quovis corporis succos viscidiores, ac acti-  
vitate inertiores reddere solent: unde etiam syrupo-  
rum aliorumque dulcium nonnisi moderatus usus in Ph-  
thisicis & Tabidis tolerandus, nisi in quantum ad lu-  
bricandas fauces interdum, sed cautè, pro scopo expe-  
ctorationis usurpanda sunt. Quantum noceat Mel &  
Saccharum, vid. GARENZIER *Traët. de Tab. An-  
glica*, & HELMONTIUS *Traët. de Dispens. Modern.*  
*§. 30. p. 371. Edit. in quarto*, ubi inquit: *Schola omnia*  
*„ Melle & saccharo lervant, & remedium in se alias*  
*„ sat debilius proprietates recundunt, quasi omnium*  
*„ morborum unica medela & apex in dulci staret. Sac-*  
*„ charum enim è diametro fermento acido stomachi aver-*  
*„ satur, ideoque digestionem facit difficiliorem; saccharum*  
*„ enim lixivio calcis vivæ & argillæ figulinæ clarificatur.*

*Observ. IV.* In Phthisi Scorbutica, quæ faciliè super-  
venit Scorbuticis, si quacunque occasione ad tussim dis-  
ponantur, & lymphæ scorbuticorum admodum acri exi-  
sente, præ cæteris optima erunt Lacticia, quibus spi-  
ritus cochleariæ, vel balsamus sulphuris anisatus, vel  
essentia vulneraria, vel spiritus salis ammoniaci, & si-  
milis instillari possunt: imprimis lac caprinum herbis  
antiscorbuticis & vulnerariis prius nutrita caprâ præ  
cæteris ad talem phthisin scorbuticam confert; item  
Portiones vulnerariæ, quibus spiritus cochleariæ permi-  
scendus.

*Observ. V.* Tabes phthisique perfecta ac confirmata  
rarissimè potest curari: vita interim diutissimè potest con-  
servari per hæc tria:

1. Per legitimum usum lactis.
2. Per usum Vulnerariarum.
3. Per mutationem aeris.

In specie ergo, quod attinet dietam lacteam pro nu-  
trientiis phthisicis & tabidis: & ceriè legitimus lactis  
& quorumlibet Lacticiniorum usus in omni casu mul-  
tum valet, imprimis quando malum dependet ab acrimo-  
nia sanguinis & lymphæ falsa muriatica, quippe ad quam  
lactis usus nobilissimus est, ubi cætera ritè præmissa  
fuerint, & dyscrasie contentorum maximam partem  
corrigat: è contra parum proderit, quoties atrophica est  
à colluvie aut corruptela cuiusdam visceris, aut quando  
est à vitio stomachi, nisi hæc impedimenta prius re-  
moveantur, & ventriculi digestio plu minus restitua-  
tur; aliàs enim vix fieri potest, quin lac etiam cor-  
rumpatur in ventriculo, utpote quod faciliè alterabile  
sit ab aeris vel lenissimo contactu, ac facillimè cuiuscun-  
que rei odore, ut sic dicam, inficiatur: adhuc facillimè  
coagulatur, quod lac coagulatum postmodum plus no-  
ceat, quam prodest: Conf. HILDANUS *Cent. 1. Observ.*  
*92.* & de ichoribus & melicer. *cap. 22. & 24.* In atrophica  
ergo ista imprimis lac convenit, quæ est à nimia acrimo-  
nia humorum, conjuncta cum eorum caliditate vel quâ-  
si acredine massæ sanguinæ, ubi opus est, ut humecte-  
tur & temperetur, in hoc casu multum prodest. Nam,  
quantum hoc nutrit, videri potest in infantibus, qui  
solum lacte potenter nutriuntur. Sub ejus usu semper  
aliquid sacchari, vel conservæ rosarum addatur, nè  
tam faciliè coagulari possit: vid. *suprà*, ubi de Hellica.  
Porro in graviore malo, qui lacte utuntur, debent ter-

in die istud sumere, manè scilicet, à meridie, & vespere,  
& vix alium cibum gustare, nisi passulas, aut si-  
biam faciliè digestibilem: idque per aliquot septimanas,  
donec denuo corpus iterum proficiat: & sumpto lacte,  
moderato exercitio, corpus successivè movendum est,  
ut facilius idem distribuatur; non enim longà in stoma-  
cho indiget digestionem, cum potius lac sit chylus antea  
benè præparatus. Modum ejus utendi legitimum videb.  
in *Collegio Schræd. Part. 2.* In ista etiam Tabes, quæ  
ex ulceratione pulmonali oritur, lac itidem præpri-  
mis confert; nam abstergit parte serosâ, nutrit corpus,  
& temperat parte butyrosâ. Convenit præ cæteris lac  
muliebri, quo ipso multus se restitutus vidisse præfer-  
tim FORESTUS in *Observat.* & PLATERUS  
*Traët. T. 3. pag. 499.* & RIVIERIUS in *Observ.*  
*Comm.*; idque si fieri potest, ex mammis nutritis sanæ  
ab agro exluctum, ne ab aeris tactu alterari possit,  
& exinde in putrilaginem verminosam abeat; sicut &  
butyrum ex lacte muliebri confectum ceu summum ar-  
canum in phthisi habetur à BORELLO *Cent. 3.*  
*Observat. 82.* Post lac muliebri est bubulum & capri-  
lum, in specie in atrophica scorbutica, præferum si ca-  
pra prius appropriatis Vegetabilibus, Vulnerariis imprimis  
& antiscorbuticis, nutrita fuerit: item lac equi-  
num cum paucis saccharo, quod laudatur ab HARTMANNO  
in Atrophica Phthisi. Sanè in Scorbutica phthisi optima sunt Lacticia, quibus instillari  
possunt spiritus cochleariæ, aut salis ammoniaci, aliavè  
similia. Veteribus in usu fuit Lac asinum, optimè ul-  
cus detergens, quia serosum: de quo suo loco dixi in  
*Collegio Schræderiano Part. 1. Sect. 3.*

Juxta Lacticia conveniunt etiam ova sorbilia pro  
scopo nutritionis, eaque cum vino generoso assumpta,  
quia insigniter nutriunt & rescitunt; qualis haustus, ad-  
ditis aliquot granis ambre, imprimis in tabe dorsali,  
ac in imbecillitate nimia à venere contracta, est opti-  
mum remedium: aliàs Vinum non usurpatur. Per-  
tinent huc etiam omnia reliqua chylum temperatum &  
dulcem subministrantia, uti sunt radix glycyrrhizæ &  
helenii (generalia hæc sunt in omni tabe ac phthisi)  
& omnia ex his parata: item lactuca, betonica, actul-  
silago, semina oleosa temperata, ut amygdalæ dulces,  
nuclei pinci & pistacei, semina quatuor frigida majora  
& minora, vel ex aut cum his variz præparatæ Emul-  
siones: item semina nymphæ ac stenugræci, chocolata,  
item mucilaginosâ, & reliqua farinacea, milium, hor-  
deum, triticum, &c. Hæc enim omnia temperant oleo-  
sitate suâ quancunque viscosam acrimoniam sanguinis,  
lymphæ, & reliquorum succorum corporis, & nutri-  
unt; unde & cerevisiæ, primariò triticeæ & bordeacæ,  
sunt nutritivæ. Passulæ & passulata, imprimis existunt;  
laudabiles hæc enim sunt, & ceu multum concentratum  
continent sal & sulphur connexum & temperatum: un-  
de similiter omnium optimè quamvis omnium humo-  
rum asperitatem & acrimoniam salinam temperant, in-  
deque massæ sanguinæ crassam talem largiuntur, quâ  
aptior redditur nutritioni uberiori; & hujus respec-  
tu vulgò calidæ & humidæ dicuntur, quin & veteri-  
bus hepar corroborare. Unde quocunque modo adhi-  
bitæ conveniunt, verb. grat. Rob. passularum, Deco-  
ctum passularum cum radice helenii, item cum radice  
cichorii & similibus, in marasmo seu contabescen-  
tia corporis optimè conveniunt. Sic refert LINDANUS  
in *Cent. 4. Obs. 43.* habet exempla pinguefactorum per  
usum passularum. In officinis prostat Electuarium re-  
sumptivum, quod cum rob. de passulis misceri, & ita as-  
sumi potest. Pertinent & huc suo modo carnes ostrea-  
rum; item canerorum fluviatillum & simidum: ut &  
cum caneris fluviatilibus butyrum non saluum mistum,  
dat Butyrum antiphthisicum, multi usus & commenda-  
tionis in tabe. LINDANUS sanè refert, Hæ-  
dicam ex ulcere pulmonum copioso ostrearum esu cura-  
tum. Aquæ ex sanguinibus animalium, item ex carne  
testudinum & cochlearum, maxime laudantur; quæ ta-  
men ego minimi facio.



Quod in specie attinet earum remotionem, lactis usus præmittendus: convenit ratione stomachi imprimis vomitus. Hinc in tabe adhuc incipiente appropriata stomachica, imprimis blanda subacida, conducunt, quæ ceu expecta commendat BARBETTE in sua Praxis. 107. & credo, intelligere illum Tabem ex stomacho: quæ ipsa tamen sub moderata dosi blandiora etiam sub cursu morbi, ut ita stomacho prospiciamus, haud adeo incôtiona sunt. Talia blanda subacida sunt ver. gr. liquor terræ foliatæ tartari, seu sal eius essentielle resolutum, tartarus tartarificatus, spiritus aperitivus Penotti, spiritus talis dulcis, Tinctura vitrioli Martis Zwelferi, nitrum antimoniatum, arcanum duplicatum, sal ammoniacum, tartarus vitriolatus Tabernianus, Elixir proprietatis cum & sine acido, lapilli canerorum cum aceto destillato juxta BARBETTE, & similia:

R. Aqua scabios.

Card. bened. an. unc. ij.

Prophyl. unc. ℥.

Laud. opiat. gr. j.

Syrup. papav. errat. q. l.

M. f. Mixture, cochleatim singulis horis capienda.

D. S.

Resolvens Mixture stomachalis.

Quod etiam videtur facere pulvis CONERDINGII, Archiatri Brunsvicensis, ad phthisin singularem:

R. Salis ammoniaci puri,

Nitri puri an. unc. ℥.

Rad. liquirit.

Ireas Florent. an. unc. j.

M. f. Pulvis:

De quo omni mane & vespere capiatur, quantum cupiscutellæ capit.

Aliquoties observavi in Phthisi ex stomacho incipiente cum tussi, macie, virium labefcentia, anorexia, siti nimia, post vomitorii usum egregie liquorem terræ foliatæ tartari seu arcanum tartari dosi gutt. 40. vel 50. bis quotidie usurpatum. In Tabæ verò quacunque confirmata, in specie ea, quæ jam in ulcus pulmonum transit, tanquam diabolus fugienda sunt acida, imprimis vitriolata, cum hæc phthisicos sine admodum inimica, quia hæc aggrediuntur pulmones, quibus debilitatis phthisis confirmata redditur: Vid. LANGIUS Dissertat. de Acidulis §. 18. Thes. 10. & sequ. Sanè ipse novi quosdam ad phthisin inclinant, qui vel propter scorbutum, vel malum hypochondriacum, viderunt acidulas, & in ipso earum potu, aut brevi post eorundem phthisin confirmatam vel hydropem contraxerunt.

Ratione sanguinis ac lymphæ, hujus acrimonie saltem temperandæ præ cæteris conducunt remedia ex sulphure, succinum, myrrha, antimonium diaphoreticum, antihæticum Poterii, Papaver, Papaverina, & opiat: item tragacantha, amygdalæ, helenium, liquiritia, betonica, tussilago, passulæ, sperma ceti, & ex his & similibus parati compositi varii pulveres pectorales dicti, etiam pulvis Haly contra phthisin, & species, ex. grat. species dia-Ireas, Dia-Tragacanthi, Conservæ rosarum, & chocolata: quibus adjungantur Decocta talia ex lignis, quæ alias in lue venerea usurpantur, aut, uti vocant, contra catarrhos destillantes laudantur, in specie ex ligno sassafras, ac radice chinæ, hinc ex ligno guajaci. Nam ex his lignis parata Decocta resinofam sulphuream substantiam unâ colliquatam obtinent, indeque temperant acre, resolvunt hinc inde hærentes sordes, imprimis in progressu phthisicos seu tabis, speciatim ubi jam dyscrasia sanguinis præcesserit longius, aut pulmones aliudvè viscus jam erosa & exulcerata sint, conferunt; quibus optime Helenium, glycyrrhiza, & omnia ex his parata sociantur, & crebrius, idque absque sudore, talia lignorum remedia usurpantur: quoniam & sumaria his ipsis mista & sæpius usitata denuo conferre. Adeoque conveniunt hæc in phthisi, quæ vulgò à catarrho seu destillationibus originem ducere asseritur, & adhibentur commodissime præmissis vomitu. Præscribendi modum & usum videb. in LOTICHII Observ. pag. 23.

Ratione visceris læsi imprimis Veneraria simplicia, in specie Veronica, scabiosa, hedera terrestris, cherefolium, &c. conferunt: item balsamica, sulphura quæcunque, in specie Antimontalia, fermentum ulcerum corruptivum, sanguinem inquinans, emulsiaria, substan-

tiampuris esulque proventum corrigentia, & ulcus consolidantia; item Balsamus sulphureus, Peruvianus, terebinthina, &c.

In specie hæc ut illustrentur, pro tali scopo præmissis præmittendis universalibus, primas vias imprimis respicientibus, conveniunt v. gr. pulveres pectorales: e. g. pulvis pectoralis D. Michaelis:

R. Facul. seu potius rad. ari. ℥iv.

Rad. Ireas Florent. unc. ij. vel unc. ℥ij.

Magister. seu flor. benzoes unc. ℥ss.

Flor. sulphuris unc. j.

Antib. Poter. unc. ij.

Sacch. unc. ℥ij. aut qu. pl. pro sapore:

M. f. Pulvis.

Qui mane, in specie vespere ante cenam, & sub introitum in lectum, assumptus dosi ℥j. 3ss. ad drach. j. egregius, est acrimoniam sanguinis ac lymphæ temperat, tussim nocturnam quodammodo cohibet. Ratione tamen facultat ari potius pulverem radice ari præparatæ vel potius crudæ usurparem: idque imprimis quando simul mucilago viscida, aut plus minus purulenta, ex pectore rejicienda sint. Vel loco hujus usurpetur Pulvis Lindani ad phthisin seu atrophiam, seu acrimoniam sanguinis, admodum commendatus:

R. Sem. papav. alb. unc. ℥.

Portulac.

Melon. an. drach. ℥ij.

Cydon.

Cucumer.

Bombac.

Pepon. non rancidi an. ℥ij.

Gum. Arab.

Tragacanth.

Amyl. an. drach. ℥ij.

Cornu Cervi,

Ebor. sine igne an. drach. ℥ij.

Succ. hypocist. (est succus ex planta radice cisti fruticosa: vid. SCHROEDERUS Pharm. l. 4. p. 196.)

Boli Arm. an. drach. l.

M. f. Pulvis.

Sumatur ter in die à drach. j. ad drach. ℥ij. cum Decocto rad. chinæ, quæ admirabilis est in curandis Phthisicis, si rectè adhibeatur: sed non debent alio potu, quàm hoc Decocto, uti; nisi enim Phthisici semetipsos arctè adstringant dietæ, non curabuntur, etiam si optimas habuerint medicinas. Mane & vespere simul instituuntur suffusæ ex succino & thure naribus hauriendos. Item

R. Nuc. pin. unc. ℥.

Sem. papav. alb. drach. ℥ij.

Com. l. q. Aqua scabios. & tussilag. l. Emulsiō:

adde

Ebor. sine igne drach. ℥.

Lapul. Cancr. præp.

Matr. perlar. præp. an. ℥j.

Educor. cum rotul. manus Christi perlat.

D. S.

Emulsiō ad potum quotidianum.

Præceteris se offerunt mineralia: quæ inter sulphur, tam commune, utpote quod alias balsamum est pulmonum, & ipsum appellari solet, quàm sulphura antimonialia fixa, flores sulphuris & remedia ejusdem generis sulphurea, sunt optima in atrophia & tabe, ex acrimonie sanguinis enata, quam, uti etiam lympham, optime temperat pinguedo illa mineralis sulphuris; sicuti alias etiam in omnibus pulmonum vitiis ac pectoris affectibus insigniter conducit. In sulphure enim observandæ substantiæ duæ:

1. Est pars ejus pinguis & oleosa.

2. Est pars ejus acida.

Ab oleosa habet vim inflammabilem; per acidam obtinet spiritum acidum, qui in præparatione olei sulphuris per campanam colligitur. Pars hæc acida potius nocet quàm prodest. Verum separare hæc duo, hoc opus hic labor est: Nihilominus tamen, qui artificiosè sciunt sublimare flores sulphuris, acquirunt balsamum pingue absque acido, sed in pauca quantitate. Cum ergo tam difficultis sit acquisitio partis oleosæ & pinguis ex sulphure, propterea exaltatur eadem in balsamo sulphuris, mediante solutione per olea destillata, quæ ipsa tanquam salia volatilia concentrata contraria sunt acidis: utpo-



utpote hac ratione magis obtunditur ejusdem acrimonia acida, è contrà promovetur magis ejusdem vistemperans, & acre corrigens: unde Tinctura sulphuris, extractum sulphuris solidum, præprimis balsamum sulphuris crassum quod habet BOYLE in *Philos. Experiment. Part. 3. Sect. 1. pag. 166.* item quod *pag. 386.* describitur; item balsamus sulphuris vulgaris, tam insignis est commendationis, tam in phthisi pulmonali incipiente, quam in quacunque tæbe alia, ex acrimonia imprimis sanguinis, & hinc corruptione & exulceratione visceris cujusdam intetni, v. gr. pulmonum aut aliarum quarumcunque partium. Præsertim puris acrimoniæ non tantum corrigit, sed & nimium ejus proveniunt optimè coercet, detergit atque consolidat. Olea, cum quibus præparatur hoc balsamum sulphuris, ordinariè sunt oleum destillat. terebinthinæ balsamicum, aut oleum anisi, ceu singularissimum pectorale, aut oleum juniperi renibus exulceratis appropriatum, aut oleum succini. Usurpantur hæc balsama sulphuris à gutt. vi. viij. & x. ad xii. in liquore appropriato, vel decocto chinæ aut Lissafraz, aut etiam in decocto quodam vulnerario, vel Lignorum, aut ex his misto Decocto pectorali, ubi ex pulmone labe in specie oritur atrophia. Misceri etiam possunt hæc Balsama cum syrupo de liquiritia & similibus, quæ egregiè temperant nonnihil eius acorem. Verum cum ignea vis sit in hoc balsamo, ob id in iis, quibus manifestior & gravior est Hæctica & nimia sudatio, cautè aut planè non usurpandus; cum observatum fuerit, quosdam ex nimio balsami sulphuris usu Hæcticam lethalem contraxisse, uti andivisti supra in febris hæcticæ cura: quem in finem præparetur cum oleo ex presso quodam, & cum tantillo olei destillati anisi acuetur: Hinc

*R. Bals. sulphuris cum oleo amygd. dulc. par. drach. ii.*  
D. S.

*Temperans Balsamum pectorale.*

Capiantur guttz 40. manè & vespèri in iusculo avenaceo vel cerevisia calida.

Etiam cum tali balsamo sulphuris optimo cum consilio jungantur Medicamenta Saturnina (in specie saccharum Saturni) quæ & ipsa effraznatum balsami sulphuris ardorem refranant. Nam in ipso Saturno singulare quid latet contra febrim hæcticam, & internas viscerum exulcerationes & corruptelas; hinc vel saccharum Saturni, vel crystalli minere Saturni conjungantur cum balsamo sulphuris, & ita aptius ac convenientius usurpari possunt. In specie autem *species dia-Saturni Mynsichtii* à quamplurimis contra tæbem singulariter laudari solent; hinc & tinctura *antiphthisica D. Michælis* dicta, ex sacchari Saturni part. i. & vitrioli Martis part. ii. Invicem mistis, cum spiritu vini rectificato parata, hoc in passu usitata est; in specie ubi adest corruptio viscerum, ulcus pulmonum aut renum, aut similis cujusdam partis, sanè multæ est laudis & efficaciz, dosi 20. gutt. manè & vespèri, virtuteque sua adstrictoria robur simul & firmitudinem pulmonibus conestiat. Post hanc tinctura Lapid. hæmatitis à 15. guttis, & tinctura sulphuris vitrioli (cuius descriptionem dabo *infra*, quando de hæmorrhagis tractabimus) si & ipsa præterpropter à guttis XV. XX. XXV. ad XXX. subindè usurpetur, egregium erit remedium antiphthisicum. Denique phlegma vitrioli rotidum, quod nihil participat de spiritu acido corrosivo, quem supra rejeci, colobatum & digestum cum proprio capite mortuo aliquoties, experimentum est singulare ad phthises & corruptiones viscerum interiorum, uti hoc refert MARCUS MARCI in *Philos. Vet. Restit. pag. 550. §. 1.* Fuit experimentum HELMONTII junioris in quadam Comitissa.

Cæterum loco sulphuris communis legitima remedia sulphurea antimonialia præferenda sunt; unde etiam antimonium diaphoreticum à quibusdam insigniter contra phthisin laudatur, imprimis si quotidie cum conserva rosarum manè, & vespèri usurpetur: Nam & hoc ipsum ad partium exulcerationes, item ad vomicas pulmonum, ad corrigendum & prohibendum pos., laudabiliter administrari solet. Quodsi ergò antimonium diaphoreticum solum est tam egregium, multò magis conveniet, si combinetur cum sulphure Jovis, in legitima præparatione antihæctici Poterii, quod à gr. xii. ad ʒi. cum conserva rotarum usurpari potest, cuius continuato usu aliquot Phthisicos & Hæcticos feliciter curavit POTERIUS, uti videri potest in *eiusdem Cent. 3. Curat. 20.* In specie Pulveres pectorales dicti, quorum basis ut plurimum sunt flores sulphuris, ac pro communi sulphure etiam eius balsamum,

cum lapill. canerorum, antimonio diaphoretico; Antihæctico Poterii, & omnibus ex antimonio cum Jove & Marte fixato compositis, præsertim in phthisi confirmata, sunt egregii: v. gr.

*R. Spec. dia-Ireos,  
Lapill. Cancr. præp. ʒii.  
Antihæct. Poterii ʒss.  
Croc. ʒss.*

M. f. Pulvis:

Div. in 6. part. æqu. S.

*Temperans pulvis pectoralis.*

*R. Lapill. Cancr. præp. ʒiʒ.  
Flor. sulphuris ʒii.  
Olei destillat. terebinth. gutt. viij.  
Anisi gutt. iv.*

*Sacchari ʒss.*

M. f. Pulvis:

D. S. ut ante.

Item sequens Pulvis ad acrimoniæ massæ sanguineæ temperandam, utut videatur simplex:

*R. Lapill. Cancr. præp.  
Rad. ari. crud. vel præp. an. ʒi.  
Ireos Flor.  
Sem. papav. alb. an. drach. ʒ.  
Mastich ʒii.*

M. f. Pulvis.

D. S. ut supra.

Assumantur quotidie in Decocto hedere terrestris & cherefolii.

*R. Rad. Ireos Florent. ʒiʒ.  
Lapill. Cancr. præp. drach. i.  
Antih. Poterii drach. ʒss.  
Croc. ʒi.*

M. f. Pulvis pro aliquot dosibus.

D. S. ut supra.

Vel cum sacch. fiant Rotulæ: S.

*Rotulæ pectorales.*

Vel fiant Rotulæ:

*R. Spec. dia-Ireos drach. iii.  
Bol. Armen. drach. i.  
Succ. liquirit. Flsp. drach. ʒss.  
Sacch. unc. iii. vel iv. in aqua papav. oval.  
solut. F. Rotulæ.*

D. S.

*Rotulæ contra tussim.*

In Phthisi contra tussim siccam nocturnam, faucium alperitatem, conceptam eorum phlogosin, &c. conducunt

Item pertinent huc suo modo Rotulæ Cnæssellii contra phthisin; item pulveres Cnæssellii ex sulphure & aliis parati: quorum usum videb. in *Cur. Cnæsselliana in M. A. N. C. ann. 6. append. pag. 81.* Compositiones sunt sequentes:

*R. Spec. dia-Ireos,  
Tragac. fr. an. drach. ii.  
Antimonii diaphor. fixi drach. vi.  
Flor. sulph. drach. ʒss.  
Sacch. albi in aqua ruffilag. q. s. dissol.  
Olei destillat. anisi gutt. xii.*

F. Tabulæ ad scatulam mundam.

Dosis 6. 7. & 8.

Vel

*R. Antimonii fixi diaph. drach. iʒss.  
Flor. sulphuris drach. ʒss.  
Spec. dia-Ireos,  
Tragac. frig.  
Succini albi præp. an. ʒi.  
Extract. helen. drach. ʒss.  
Bals. sulph. anisi drach. ʒss.  
Sacch. in aqua fenic. q. s. dissol. unc. iv.  
F. l. a Rotulæ.*

Plura videb. l. a.

Nec sequentes Cnæssellii Rotulæ inelegantes sunt:

*R. Flor. sulphuris ter sublimator. ʒiii.  
Antimonii diaphor. ʒi.  
Mastich.  
Succini albiss. an. drach. ii.  
Croc. orient. ʒi.  
Spec. diatr. frig. id. ʒss.  
Sacch. albiss. ʒiv.  
F. Rotulæ, utror. cum  
Olei destillat. anisi gutt. viij.*

Fiant



Plant magnitudine solidi vel simili moneta. Pro una dosi No. viij sumantur, mane, & 4. horis ante prandium, ut & cubitum iturus: superbibat Decocti alicujus pectoralis vel lignorum bonum haustum.

Exhiberi etiam possunt sub forma pulveris, Item

℞. Spec. dia. Ireos,  
Rad. ari. præp. an. ʒij.  
Extract. enul. ʒj.  
Croci gr. viij.  
Flor. sulphuris ʒj.  
Cum f. q. sacch. f. Rosula Cnasseli.  
Vel

℞. Rad. Ireos Flor. ʒiʒ.  
Flor. sulphuris,  
Antibest. Poterii an. ʒj.  
Benzoes ʒʒ.

Cum f. q. sacchari in aqua scabios. solut. F. Rosula:  
D. S.

Rotule pectorales.

Vel exhibentur sub forma pulveris bis quotidie, mane & ante prandium, vel in Decocto hederæ terrestris, vel in Decocto lignorum, radices chinæ vel sassafras, jubendo, ut æger cubitum iturus assumat. haustum ejusmodi Decocti pectoralis.

Item

℞. Rad. liquirit. ʒij.  
Ari ʒiʒ.  
Ireos Florent.  
Sympb. maj. an. ʒj.  
Gumm. ammoniaci in aceto sol.  
Benz. an. ʒj.

Cum f. q. sacchari in aqua scabios. sol. f. Rotulæ.  
D. S.

Temperantes rotule pectorales.

℞. Bals. sulph. anisat.  
Terebinth. ana ʒj.

Excipiantur f. q. Conf. scabiosæ, & cum sacch. in aqua fenniculi sol. f. Rotulæ vel Morsuli:  
D. S.

Rotule pectorales.

Hiscæ sanguinis & lymphæ acrimoniæ corrigentibus pro scopo temperandi tussim, præsertim diuturnam sistendi, & hinc copiosum nimis puris proventum coercendi, etiam Papaverina & Opiata fuerunt annumerata, quæ sunt optima ad temperandam acrimoniæ salisam muriaticam. Hinc veteris pilulas de cynoglossa usurparunt, quæ tamen admodum sunt crudæ, & cum pilulis de styrace coincidunt: Moderni verò Pilulas de styrace adhibent, quas videb. in SCHROEDERI Pharm. lib. 2. pag. 252., item SYLVII Pilulæ de styrace in l. 1. Pr. cap. 20. §. 36. qui Ambra omittit; ubi etiam ex ejusmodi Ingredientibus Rotulas habet. Succinctæ sunt Compositiones, & non contemnendæ in Tussi nocturna sicca, & quando ex inclementiore aëre tempore hyberno tussis excitatur, tunc in principio affectus propinentur, & erunt elegantes. Propinantur etiam in sicca tussi Gravidis; temperant enim lympham salisam. Conveniunt quoque opiata optime in principio Tabis & Atrophis, ubi nempe præmissus fuerit vomitus, uti etiam in ejus progressu mirabiliter valent sedare tussim nocturnam, uti & sudores nocturnos colligativos. Largas opii, legitime per fermentationem parati, doses præ altis ægris diu sine nocuentis ferre possunt Phthisici: vid. M. A. N. C. Ann. 4. & 5. Observ. 207. pag. 291: ejusque usu imprimis diu conservari. Sic aliquando Phthisico dedi sequentia:

℞. Conserv. rosar.  
Heder. terr. ana ʒj.  
Flor. sulphuris,  
Antibest. Poterii,  
Lap. cancr. fluviatil. præp. an. ʒj.  
Bals. Peruv. ʒij.  
Laud. opiat. gr. xvj.

Cum f. q. syr. diacod. Montani, vel syr. dia-  
sulphuris Willis.

f. Electuarium: S.

Electuarium pectorale.

Vel

Estmull. Oper. Tom. II.

℞. Conserv. heder. terrestr. vel consolid. maj.  
vel veron. vel agrimon. vel charosol.  
vel scord. vel scabios. vel costæ, vel  
flor. hyperici, vel summit. pini ʒj.

Lapill. cancr. præp.

Antibest. Poterii ana ʒʒ.

Succin. præp. ʒij.

Benzoes ʒj.

Cum syr. heder. terrestr. aut etiam sulphuris Willis. &  
Electuarium:

Cui Laud. opiat. aliquor grana addi possunt.

D. S. ut antè.

De priori Electuario æger intra octiduum semper assumpsit, capiendo bihorium ante cœnam bonam dosim; ejus usu semper habent melius ægri, tussis remittit, melius dormiunt, mane facilius magisque cocta expuunt. Sanè hæc Opiata quæ tididè, item essentia opii liquida, successivè ultra tres menses continuata, citra ullam sentilem noxam, certè irritationis sensum sistendo, tussim, item humorum acrium in parte læsa decubitus, & hinc ulteriorem corruptelam & ulcerosum progressum sic inhibent. Hoc etiam commodi habent opiata in Phthisicis, ut vespertino usu sudores nocturnos potenter cohibeant. Confer huc ea, quæ suprà circa tussim de tussi sicca nocturna, catarrhalis Sect. 14. Cap. 3. Art. 3. monita fuere.

Observandum tamen est, quod in statu, quando difficilior est anhelitus, aut etiam eo in in casu, quo multa materia viscida expectoranda est, uti etiam eo in casu, ubi purulentia reiicienda venit per os, quod in hoc passu cautius usurpentur Opiata, aut penitus intermittantur, ne impediatur materiæ reiicendæ motus. & ita difficilior respiratio, aut suffocationis inducatur metus.

Tandem ad hæc ipsa remedia alterantia, crassam sanguinis & lymphæ corrigentia, in incipiente præsertim phthisi pulmonali, pertinent Decocta lignorum, nempe radices chinæ, ligni sassafras, &c. quæ egregiè huc faciunt; quæ alia in morbis chronicis lymphæ vitio, & inde na. is, malis seu affectibus catarrhalibus in usu sunt, quibus ego magis felici successu utimur, si morbo ulterius procedente, similia Vegetabilia vulneraria, fermentum ulcerationis inchoatæ corrigentia, simul addantur. Nam semper, quando Practici dicunt, esse phthisin seu tabem pulmonalem à desiccationibus capitis catarrhalibus, subintelligitur vitium pulmonum, ex acrimonia nimia lymphæ & sanguinis primariò dependens. Hæc ergo in casibus dixi, quod Decocta lignorum & radicum convenient.

Præcæteris hiera lix chinæ eminet. De horum Decoctorum usu vid. GARANZIER Traité de Tabé Anglica, ALPHONSUS FERRE, l. 2. de Ligno Sancto, qui etiam hujusmodi Decoctis Phthisicos tantum non despiratos aenuò sanitati suæ se restitutos refert. Confer etiam RIVERIUS in Praxi lib. 2. cap. 7. item Cent. 1. Observ. 35. & 99. & Observ. à Fomio Commun. 27. item Cent. 2. Observ. 61. & 78.

Modum propinandi hujusmodi Lignorum Decocta optime docet ARCEUS Traité de Vuln. capitis & Febribus; non secus ac ERASTUS in Consil. Scholæ No. 88. dicit: „ se Phthisicos nonnullos planè desperatos & incipientes „ plurimos curasse, per hæc Decocta sc. exhibita, præmissis un. versalibus, per duos vel tres menses, prius purgato corpore, si ægroti sint cacochymici. In Decocto aliquando macerare jubeo faniculum, pedem Leonis, sæpè pyrolam, Quinquifolium & Veronicam, &c. quæ simul subinde usurpantur. Expectorantia sunt aut hæmida, aut sicca, ex speciebus dia Ireos simpl. floribus sulphuris, saccharo Candi &c. His consentit HIL-DANUS, qui Tabidis propinat Decoctum Chinæ cum radice buglossæ, prunellæ, consolidæ majoris, &c.

Præcæteris tamen, præter radicem Chinæ, & Lignum Sassafras eminet propter vim aromaticam, & quod in affectibus à lymphæ vitiosa ortis specialiter convenit. Sed si ritè sibi volunt consulere tales ægri Phthisici, alio potius non debent uti, quam ejusmodi Decocto. Huc facit etiam Decoctum elegans ex sassafras & Vulnerariis POTERII C. 2. Cur. 99. Quibus tamen lignis & aliis usum santalorum, speciatim rubri & citrini, quidam substituunt: quorum Decocta eodem modo atq; Decocta Guaiaci parata & removere pulmonum erosionem, & eandem tactu tollere asserit Fowseca lib. 1. Conf. 58., & conveniunt tam in Tabè ex acrimonia sanguinis & lymphæ simplici, quam quæ jam cum ulcere pulmonum conjuncta est. Præscribuntur ejusmodi

A a Deco-



Decocta, ut dixi, semper cum Vulnerariis, item cum helenio: modus est itaque, v. g. ex radice Chinæ & Ligno sassafras, quæ cæteris præfero:

*R. Raf. ligni sassafr. bend odor. ʒij.*

*Rad. chinæ in taleol. incif. ʒj.*

Macerat in f. q. aquæ in Balneo Mariæ per dies noctemque, & ebulliant ad consumptionem tertiarum partis.

Colaturæ adhuc calenti infund.

*Passul. min. conuass. ʒij. vel liij.*

adde

*Syr. flor. papav. errat. vel papav. simpl. vel de jub. q. f. prograto sapore.*

D. S.

*Potio contra phthisin.*

De hoc calidè semper manè, à meridie & circa vesperam cubitum iturus capiat haustum. Optimum est in phthisi non admodum confirmata.

*R. Rad. chinæ in taleol. incif. ʒij.*

*Flor. papav. errat.*

*Beton.*

*Scabios. an. M. ʒ.*

*Passul. maj. enucl.*

*Min. an. ʒij.*

Cum f. q. aquæ comm. coqu. Colatura edulcoretur, addendo

*Syr. papav. rabad. parum. D. S.*

*Potio pectoralis pro aliquot vicibus.*

Vel

*R. Rasur. ligni sassafr. ʒij.*

*Flor. papav. errat.*

*Beton. an. pug. ij.*

Macerentur per biborium in aqua font., hinc bulliant: Colatura edulcoretur cum

*Syr. papav. errat. D. S.*

*Singularis potio catarrhalis.*

Aliquando in Tussi pulmonali phthisin militante cum successu præscripsi:

*R. Ligni sassafr. ʒj.*

Maceretur in

*Aqu. comm. mens. ij.*

adde

*Herb. hederæ terrestr.*

*Scabios.*

*Pulmon. maculos. an. Mij.*

*Sem. anis.*

*Feniculi an. unc. ʒ.*

*Rad. liquirit. drach. liij.*

*Passul. min. conuassat. unc. j.*

Coqu. ad tertias:

Coatura D. S.

*Potio pectoralis contra tussim pro aliquot vicibus.*

Edulcorationis gratia sint syr. Consolidæ maj., agrimonie, chærefolli, scordii, Nicotianæ, liquiritiæ, enulæ, &c.

Item cuidam perfectè phthisico præscripsi:

*R. Lign. guajac. unc. iij.*

*Cort. ejusd.*

*Rad. cb. n. incif. an. ʒj.*

*Rad. enul.*

*Beton. an. unc. ij.*

*Bacc. junip. drach. liij.*

*Herb. veron. Mij.*

*Heder. terrestr. Mij.*

Incisa macerentur in ʒ. xj. aqu. simpl. per 24. horas: coqu. ad dimid. addendo in fine coctionis

*Sem. anis.*

*Fenic. an. unc. ʒ.*

*Rad. liquirit. ʒj.*

Colatura detur.

Capiebat omni manè bonum haustum in lecto, expectando aliqualem sudorem, addendo simul gutt. xij. bals. sulphuris rebebinib. unicuique haustum: vespertino verò tempore remedia cum opio usurpabantur, sed minus, cum Helicæ æger affligebatur.

Vel

*R. Raf. lign. Sancti unc. iij.*

*Cort. ejusd. unc. j.*

Infund. per 24. horas in f. q. aquæ simpl. manè coqu. in cucurbita cum alembico munita: Colaturæ ʒ. ij. adde

*Herb. veron. Mij.*

*Pyrol.*

*Herb. Quinqu. fol.*

*Sanic. an. Mj.*

*Pass. min. ʒij.*

Coqu. leniter: Colaturæ addatur

*Aqu. superius destillata*

D. S.

*Sanans potio pectoralis.*

Melius fit, si cum ligno guajaco tantulum decoquatur, vel etiam loco illius lignum sassafras sumatur; egregiè enim alterat lympham nimis acidam icorbuticam.

Simile Decoctum vid. *suprà*, ubi de Tussi.

*R. Rasur. ligni juniper. ʒij.*

*Sanic. ʒij.*

Macer. per 24. horas in f. q. aquæ; manè coqu. ad consumpt. medietatis, in fine addendo

*Passul. min. conuassat. ʒj.*

De Colatura clarificata ter in die bibatur bonus haustus absque sudore. Huc pertinent etiam Decocta bina lignorum, cum his Vulnerariis in *Idea Formularum Class. 4. §. 17.* Scilicet pro lymphæ vitis corrigendis, ad ejusdem nimiam effusionem, pulmones nimis irritantem, inhibendam non inepta sunt hæc Ligna, præsertim cum Vulnerariis utrupta, idque præsertim in phthisi, non tam confirmata, quam adhuc increcente.

Parant quidam Essentias pectorales ex his Vegetabilibus, quod pertinet *Elixir pectorale D. Michaelis*, Essentia helenii, quibus addenda essentia croci; qui vocatur à plurimis anima pulmonum. Sperma ceti à ʒss. ad ʒss. in ovo sorbili, omni manè assumptum, admodum convenit in temperanda acrimonia massæ sanguineæ, & curanda phthisi.

Cætera huc facientia, nempe species diatreos, diatreagacanthi, pulvis Haly contra phthisin, seu ubivis nota, in medio relinquo. Pertinet huc Electuarium illud expertum antiphthisicum, quod M. A. N. C. *Ann. 6. Observat. 95 pag. 134* habent. Pertinet & huc denique conserva, seu, ut alii vocant, saccharum rosatum inveteratum, *Germ. der Rosen Zucker*, à pluribus adeò decantatum: ac sanè alcali nonnihil stypticum in floribus rosarum rubrarum est egregium, pluribus scopis, ad acrimoniam præsertim succorum corrigendam, & ulcerum tonum conservandum, inseruiens. Præ cæteris convenit ea, quæ existat in *Dispens. Londinensi*, & quæ in tabe ac phthisi incipiente egregiè convenit. Sed saccharum junctum non æquè omnibus proficuum, & hujus ratione nociva quibusdam observata sunt conserva: vid. SYLVIVS ubi de *Phthisi §. 187.* Aliàs à pluribus expertum, idque sæpius feliciter, est remedium, de cujus efficacia vid. FORESTUS *l. 16. Obs. 58.* VALERIO *l. 5. Obs. 3.* & SYLVATICUS *Cent. 2. Conf. 40.* Usus est, ut conserva antiquissima vel crebrius pro lubitu usurpetur, vel vespertino præsertim tempore ad unc. j. cum ʒss. terræ sigill. vel lap. hæmatit. horâ j. ante cœnam usurpetur. Peculiare quid etiam in *balo Armena* laetetur, unde nec inconvenerit hæc permisceri possunt cum floribus sulphuris, terra sigillata, antimonio diaphoretico, radice Ireos Florent. aliive similibus pectoralibus, & cum conserva rosatum Electuaria parari possunt. Nasturrium Indicum cum conserva rosar. assumptum admodum commendatur, & dicitur fuisse remedium *Dott. MOEBII* J. nensis. In usu quoque sunt conserva Vegetabilium Vulnerariorum, v. g. hederæ terrestris, quæ potenter expectorant: item herbæ costæ. Decoctum pulegiæ à quibusdam tanquam expertum contra phthisin commendatur, cui additur simul succus hederæ terrestris, & Infusum nasturtii Indici. In specie pulveris fungorum salicis in plenilunio mense Maii collectorum ʒss. cum hac conserva crebrius usurpata, tanquam expertum arcanum à quibusdam singulariter laudatur. Nempe spongæ istæ viridiusculæ in salice superius interdum adnascentes exsiccantur in sole, pulverisuntur, & ita cum conserva majoranæ vel veronicæ sub forma Electuarii contra Phthisin usurpantur: Vid. VELSCHIUS *Medic. C. 2. Observ. 60.*

Quæ læsionem partis, præsertim ulceratæ, respiciunt, sunt ea, quæ fermentum acidum partis plus minus ulceratæ corruptivum corrigere, & ita partis ulteriorem proveniunt inhibere valent, adeoque Detergentia & Mundificantes à appellantur. Hinc usurpentur ea, quæ naturæ opus in consolidando loco læsio adjuvent, quantum possibile. Hæc inter excellunt Vulneraria dicta, quorum alcali pluribus usibus in phthisi curanda inservit, si præmissis præmittendis usurpentur, in specie si ventriculi, ac primarum via-



viarum, & his in locis principalioris assumptorum alterationis, habetur ratio. Hinc Decoctum bugulæ seu consolidæ mediæ admodum commendat P O T E R I U S in *Pha-ma.op. Spagyrica* ad ulcera pulmonum curanda. Decoctum verò symphyti & prunellæ cum china & Guaiaco laudat L I N D A N U S, assumendo in quolibet haustu dosin æstimonii diaph., florum sulphuris, antihæctici Poterii, &c. Deul rariæ vi traumatica, ejusque aquæ destillatæ in Phthi si usu, vid. V E L S C H I U S *Mithridat.C. 1. Obs. 60. annex. An. 4. M. A. N. C. R.* rem solis, ac ejus guttulas non pauci specificè commendant, cum hæc plantula rore limpidissimo referta sit, illius etiam sub ardentissimo solis arore; unde etiam eam humectare & rorem nutritivum restituere putant. Hinc & scabiosa, hypericon, helenium, sanicula, consolida major & minor, prunella, Veronica, hederæ terrestris, pilosella, cherefolium, plantago, vinca peruviana, equisetum, flores rosarum, & similia, tam in Decoctis, quam inde paratis pulveribus, aut cum saccharo & melle Eleæuariis, in usu sunt. In specie, ubi acrimonia pulmones erodere incipit, hæc vulneraria, ut scabiosa, veronica, hederæ terrestris, q. æ elegantissima & exoptissima plantula, & cherefolium, vel solitariè vel cum Decoctis lignorum usurpata & crebrius hausta partim possunt diu conservare, partim & restituere phthificos. Tria enim vel quatuor simplicia plus præstant, quam centum: quibus in scorbuticis, apud nos familiaribus, sub finem Decoctiois infundendæ sunt plantæ antiscorbuticæ, quæ sunt nasturtium, plantago aquatica, erifolium aquaticum, & similia. In specie si læsio pulmonum facta sit à causa externa, sola Decocta Vulneraria sufficient, si scilicet omni haustu aliquid additur balsami sulphuris, vel spermatis ceti ʒss. Exempli gratiæ sequenti Decocto Chirurgus quidam *Scotinus* gravi phthisi laborans per multos annos se sustentavit:

R. Herb. alchimill.

Pulmonar. macul.

Sanic.

Cent. min.

Veron.

Auric. mur.

Vinca peruviana.

Flor. hepat. ana Mj.

Coqu. in cerevisia bene desecata.

De colatura bibi manè jejune, item ante prandium, & ante coenam cubitum kurus.

Vel

R. Herb. veron.

Alchimill.

Heder. terrestr. ana Mj.

Scabios.

Cherefol. ana Miij. vel Mij.

Coqu. in f. q. cerevis. desecata:

D. S.

Potio pectoralis.

De quo Decocto æger omni mane bonum haustum capiat, cujus haustibus addatur semper vel *Elixir proprietat.* tam simplex, vel antiscorbut. gutt. ʒ. vel 40, vel gutt. viij. de balsamo sulphuris, vel sperm. ceti ʒj. ad ʒss. Vel

R. Ess. Gum. ammoniaci drach. iij.

Tinctura sulphuris drach. j.

M. D. S.

Essent. a pectoralis.

Continuandæ sunt hæc doses aliquandiu, donec exactè immutetur dyscrasia lymphæ.

Vel in phthisi pulmonali nondum inveterata:

R. Herb. heder. terrestris,

Veron.

Pulmonar. macul.

Roris solis,

Pyrola,

Alchimillæ ana Mj.

Rad. Heleni ʒj.

Vincetox.

Ireos nostras. ana ʒss.

Flor. scabios. Miij.

Fa. far. Mj.

Crocini integri ʒj.

Sem. urtic.

Anisi,

Feniculi ana ʒiij.

Pass. min. ʒss.

Extremul. Oper. Tom. II.

Juj. b. ʒvj.

Ficum pingv. No. vj.

Concil. & contus. dentur ad chartam,

D. S.

Species ad potionem pectoralem.

Vel

R. Herb. heder. terrestris,

Cherefol.

Veron. ana Mj.

Rad. emula ʒss.

Ireos Florent. ʒj.

Sem. anisi ʒiij.

Fenic. ʒij.

Ficum No. iv.

Passul. min. ʒss.

Rad. liquoris. ʒvj.

M. D. S.

ut antea.

Potest ex his fieri Infusum, vel Decoctum, ex Decocto cum saccharo syrupus, aut cum melle Hydromel pectorale, & similia alia.

R. Herb. scabios. Mij.

Heder. terrestris Mj.

Rad. enul ʒiij.

Ireos Florent. ʒvj.

Sem. anisi,

Fenic. ana drach. iij.

Coqu. in f. q. Aquæ si npl. Colatura ʒiij. edulecor. cum syrupo aliquo, e.g., dia-sulphuris Willsi, hederæ terrestris, de symphyto, qui admodum commendantur, aut ubi opus est expectoratione, cum syr. veronica, Nicotiana, &c. q. l. pro gratia saporis.

D. S.

Potio pectoralis.

Apud nos pluribus in frequenti usu est sequens farrago, quæ feliciter pluribus cessit, magis tamen ad phthisin pulmonalem inclinantibus, quam perfectè phthificis: siquidem ob alcali herbarum vulnerariarum aliorumque ingredientium vis alterativa in corrigendis corporis contentis & confirmandis. Isteribus non contemnendi usus est:

R. Herb. pulmonar.

Veron.

Fol. senn. sine stip. ana Mj.

Herb. salu. rec.

Hepat. nob.

Hysopi ana M. ʒ.

Flor. hepat. nob.

Rad. polyod.

Torment.

Liquirit. ana M. j.

Sem. anisi,

Fenic. ana M. ij.

Incis. & contus. coqu. in f. q. Aquæ fontan. additis cochlearibus duobus mellis:

De Colat. ʒvj. vel viij. mane & vespert bonus haustus assumitur.

Vel

R. Herb. pulmon.

Hepat.

Scord.

Cent. min.

Fragar.

Hysopi,

Salvia,

Tussilag.

Euphras.

Prunell. ana Mj.

Flor. cent. min.

Rad. liquoris.

Polyod. ana ʒss.

Jujub.

Sebesten ana No. xv.

Passul. maj.

min.

Ficum ana ʒiij.

Fol. senn. sine stip.

Sem. anisi,

Fenic. ana ʒiij.

Incis. & contus. coqu. in aquæ menj. iv. vel v. in vase causo.

D. S.

Potio pectoralis, de qua sumatur calidè haustus mane & vespert duabus horis ante cibum.

Ad 2

Fa-



**Faciunt huc pulveres antiphtibifici, imprimis Pulvis antiphtibificus D. Erbenii:**

**R.** Visf. pyror.  
Salv. ana unc. j.  
Pulmon. masculof. vel *Consolida med.*  
Veron.  
Flor. suffrag. ana unc. ss.  
Rad. enula drach. ij.  
Saccb. cand. albiss unc. ij.

M. f. Pulvis. Dosis drach. j.

Pertinent huc Elestnaria quorundam, imprimis tamen exsiccationis interservientia, ex pulvere scordii, salviae, rad. Helenii, &c. cum melle ad Elestnarii consistentiam redactis. Sed cum his vulnerariis modò recensitis in specie simul usurpanda sunt Balsamica, quantū hēctica plus minus junctā eorum usum ferre potest, adeoque mīnds confirmatis, seu in Cura magis incipientibus, i. e. in præservatione phtibificos conducunt: qualia sunt aloë, myrrha, balsamus sulphuris terebinthinatus, & similia; item antimonium diaphoreticum, vel antihēcticum Poterii, &c. E. g.

**R.** Herb. salv.  
Scordii ana M. j.  
Pulverisatis adda  
Myrrb.

Antimonii diaph. ana drach. ij.

Cum f. q. mellis, vel pulp. passul. rec. f. Elestnarium spissum, litorandum cum Balsamo sulphuris vel terebinthinato, vel quifaso.

D. S.

**Elestnarium pectorale.**  
Vel Balsami Peruviani gutta j. aut plures cum saccharo aut floribus sulphuris in pilulas redactis, aut etiam guttatim ad gutt. viij. vel x. manē in juscūlo, vel vehiculo calido, aut vitello ovi sorbillis dissolutum balsamum, & qui tidid usurpatum, multum laudatur in phtibis & tace, & ad quasvis partium lēSIONES & exulcerationes: Vid. M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 77. Huc pertinet Balsamus Peruvianus Domini D. DOLAEI in *Encyclopædia Medica de Phtibis* descriptus: Hinc & RIVERIUS multum commendat has pilulas contra Phtibin cum balsamo Peruviano ita:

**R.** Mass. pilular. Russi unc. j.  
Antimonii diaph.  
Gumm. Gūjaci ana unc. ss.  
Cum f. q. Balsami Peruviani f. Massa.

Dosis ʒj Capiatur per mensem integrum.

De Terebinthina res nota est, quantum vi balsamica in quibusvis partium internoarum exulcerationibus valeat, quā detergit & purificat; undē etiam Balsamum Occidentale seu nostrum vocatur. Optimē datur in ovo sorbilli jejuno stomacho, à drach. ss. ad summum drach. j. vel sola, vel addito modico florū sulphuris, ut sit convenientior in ulcere continuando aliquandiu; item permisceri solet eadem cum melle violato, recipiendo

Terebinth. unc. ss.  
Mell. violat. drach. ij.

M. cum paucō vitello ovi:

De quo capiat æger omni mane quantitatem castaneæ in juscūlo calido.

Alii Terebinthinae unc. ss. cum melle rosato & syrupo beder. terrestris vel Nicotianæ miscent, & in forma Boli subinde assumendam suadent.

Sed nimis ingratus hic ejus est usus; omnium optimē in vitello ovi dissoluta capi potest: Vid. VELSCHIIUS *Michomim. l. a.*

Hic peractis demum ad lac accedendum, vid. LOTICHII *Observ. p. 239. & 253.* RODERICUS à Fonseca *l. a. & MARCELLUS DONATUS Hist. Med. Mirab. lib. 3. cap. 10.*

Quidam in phtibis salia volatilia commendant, in specie sal volatiile & spiritum sanguinis humani rectificatum, quem in phtibis hæreditaria & desperata mira præstitisse BOYLE testatur; sicut *Manf. de FEBURE in sua Chymia P. 1.* commendat sal volatile cornu cervi ejusque spiritum, supra balsamum sulphuris digesta & tincta. Alii spiritum formicarum, alii Mercurium microcosmicum, uti vocant, id est, spiritum & sal volatile urinæ, contra phtibin commendant; imprimis si moderatē acido in tertium ammoniacale mutetur, & ad guttas vj. vel viij. propinetur. Sed verū ut fatear, in Tabæ confirmata & exulceratis visceribus nullū modo convenit, nisi saltem in ea, quæ ex defectu distributionis ischyli, ac post morbos chronicos; verū in inveterata hæc nō sufficiunt, nec tamē nobiliora prostant remedia.

Quoad Symptomata in phtibis mitiganda: Tussim quod attinet, præsertim ferinam, hanc mitigant optimē supra laudata opiata, quæ ipsa etiam sudores nocturnos colliquativos satis molestos cohibere solent, absorbentibus appropriatis juncta: hinc aliquando Phtibico perfectio seu confirmatio præscripti sequentes pilulas, quas etiam *Dissert. de Opī virtute diaph. c. 3. §. 8.* atque in *Idea præscrib. Formul. Cass. 2. §. 3.* inserui:

**R.** Antibell. Poterii gr. xv. ad ʒj  
Saccb. saturni ʒss.

Extrac. croci gr. iv. v. vel vj.

Laud. opiat. gr. ij. vel iv.

Cum f. q. Balsami Peruviani f. de Capaybe.

**F.** Pilula pro duabus dosibus: quarum una quæque vesperi duabus horis ante cenam sumebatur: sub usu earum æger semper hilarior reddebatur, sudore nocturno & tussi illa nocte cessante: N. B. post inde non amplius judant.

Item

**R.** Arcan. dupl. ʒij.

Lip. li. cancr. præp.

Antibell. Poterii ana ʒss.

Laud. opiat. gr. iv. vel v. M.

Div. in 4. partes, singulis diebus duabus horis ante cenam capiendas.

Tussim catarrhalem siccam, & à tenuitate aut acrimonia humorum, in specie vespertinam aut nocturnam plus minus siccam, mitigant Lenientia, aut si à materia tenaci & firmius impacta fuerit. Expectorantia. Quæ Lenientia illa, communiter incassantia dicta, sicut ʒ infra, ubi de *Pluvioide*, addictis: quibus & jungi possunt Papatina & Opiata, v. g. pilulae de Syrace ac cynoglossa, copote qualium usu sæpius satis diu conservari possunt Phtibifici, earumque etiam dosin satis largam sine damno ferunt: vid. M. A. N. C. Ann. 4. & 5. Obs. 107: ita tamē, ut cum Expectorantibus alternent.

Vel pro usu vespertino:

**R.** Succin. præp. ʒss.

Myrrb. elect.

Sal. volat. succin. ana gr. v.

Laud. opiat. gr. j. vel ij.

Cum ess. myrrb. vel oleo destillato succin. f. Pilulae. D. S.

Pilula vespertina contra tussim.

Vel

**R.** Essens. opii ferment. ʒj. M. D. S.

Essentia vespertina, de qua 12. guttae sumantur in aqua scabiosa.

Vel

**R.** Extr. sulphuris pulveris. gr. xij.

Myrrb. gr. v.

Extrac. croci gr. iij.

Laud. opiat. gr. j.

Cum essent. Myrrb. f. Pilulae vesperi capiendæ. S.

Pilula vespertina pro 1. dosi.

**R.** Aquæ serpilli ʒij.

Laud. opiat. gr. ij. vel iij.

Syr. veron. ʒj.

M. f. Potumcula:

D. S.

Potio vespertina præna vice.

**R.** Aqua scabiosa ʒij.

Syrup. scabios. vel veron. vel ros. fol. unc. j.

Diacod. Montani unc. ij.

M. S.

Succus vespertinus pro aliquot dosibus.

Vel

**R.** Rad. heos Floribunda

Flor. sulphuris ana drach. j.

Antimonii diaphor. drach. ss.

Laud. opiat. gr. ij.

Olei destillati fenn. gr. xij.

M. f. Pulvis pro aliquot dosibus.

D. S.

Pulvis vespertinus pro aliquot dosibus.

Vel

**R.** Lapill. cancr. præp.

Flor. sulphuris ana ʒss.

Laud. opiat. gr. ix.

Olei destillat. fenn. gr. j.

M. f. Pulvis. S.

Pulvis



*Pulvis vespertinus pro una dos.*  
 R. *Sperm. ceti* ℥j.  
*Flor. benz.* ℥ss.  
*Olei destillat. succini* get. ij.  
 M. f. *Pulvis* pro 2. dos.  
 D. S.

*Pulvis vespertinus .*

Theriaca autem fugiant Patientes: nam utut opium in Theriaca fermentetur, attamen, quia Medicamenta acris copiosa ex feminibus & aromatibus habet admixta, causat sudores nocturnos.

D. MICHAELIS sequentes formulas commendavit:

R. *Pulv. anodyn. gr.* xij.  
*Antibell. Poterii* ℥ss.  
 M. D. S.

*Pulvis vespertinus pro 1. dos.*  
 R. *Conserv. beton.* ℥ss.  
*Pulv. anod.* ℥ss.  
 Cum *Syr. de beton. q. s. f. Bolus.*  
 D. S.

*Bolus vespertinus pro 1. dos.*  
 R. *Aqu. ferpill.* ℥ij.  
*Laud. opiat. gr.* ij.  
*Syr. beton.* ℥ij.  
 M. f. *Potiancula* D. S.  
*Potio vespertina pro 1. dos.*

R. *Aqu. pulm. vicul.* ℥ij.  
*Syr. diacod. Montan.* ℥ij.  
*De beton.* ℥ij. M. S.

*Succus vespertinus pro aliquot vicibus.*

Quoad Symptomata in *seratu*, equidem Nicotiana, & quævis ex ea parata, sunt optima. HEURNIUS in *Praxi* solo syrupo ex succo rite parato quosdam Tabidos phthisicos restitutos fuisse memorie prodidit. Certè ad ulcus pulmonum abstergendum, & sordes acres plus minus viscidas pectori inherentes eliminandas, optima sunt ex tabaco remedia, quæ præter vim expectorandæ, vulnerariam quoque possident. Nam proxima via pulmonibus curandis est per asperam arteriam; hinc tot ferme prostant Electuaria antiphtisica, quot ramuli arteriales & venales, qui tamen sunt innumeri. Formulæ fiant tales:

R. *Herb. botrys.*  
*Malva an. Mj.*  
*Rad. liquoris. ras.* ℥ij.  
*Alb.*  
*Cicbor. an.* ℥ss.  
 Coq. in l. q. *aqu. Colat.* ℥ss adde  
*Lob. de farfar.*  
*Syr. de Nicotian. an.* ℥ij. vel ij.  
 M. S.

*Potio antiphtisica, coquebatim capienda.*  
 R. *Conserv. beder. terre str.*  
*Scabios. an.* ℥ss.  
*Rad. cicbor. cond.* ℥vj.  
*Pinear. rec.* ℥ss.  
*Ebor. sine igne* drachm. j.  
*Antibell. Poterii*  
*Flor. sulphuris an.* drachm. ℥. vel ℥ij.  
 Cum l. q. *Syr. Nicot. f. Electuarius:*  
 D. S.

*Electuarius, de quo ad magnitudinem castaneæ sumendum.*  
 Plura videb. infra cap. 8. Sect. 1. & ubi de Pleuritide & Peripneumonia.

Pariter si sputum multum ac fatidum fuerit, Mel & Myrrha screatum promoventibus semper addenda erunt.

Si adjuncta febris, curatur per Absorbentia, imprimis terrea: Sic ex Mineralibus est Antibelliticum Poterii, antimonium diaphoreticum, crystallus præparata, & absorbentia nota: c. g.

R. *Radic. alibea,*  
*Cicbor. an.* ℥ij.  
*Flor. malo.*  
*Scabios. an. M. j.*  
*Tamarind. drach.* vj.  
*Sebellen No.* viij.  
 Coqu. in l. q. *aquæ bord.*  
 Colaturæ adde  
*Lapill. Cancr. præp. unc.* ℥.  
*Extimul. Oper. Tom. II.*

*Antimonii diaphor.* ℥ij.  
*Syr. violar. solut.*  
*Flor. papap. errat. an.* ℥ss.  
 M. D. S.

*Refrigerans potio pulmonalis.*  
 R. *Lapill. Cancr. præp.*  
*Antibell. Poterii an.* ℥ss.  
 M. f. *Pulvis.*  
 Div. in 3. part. æqu. S.

*Pulvis refrigerans pro 3. vicibus:*

*Diarrhoea colliquativa*, si quæ supervenerit, utut serè nulli sit omnis, absorbentibus, terra sigillata, cornu cervi usso & similibus inhibetur, vitando tunc, quantum possibile est, Mellita, faciliè alias alvum moventia. De suffitiis, odoramentis & similibus nil attinet dicere. Conferatur *suprà* laudatus BONETTUS.

Quoad dietam, ut rite formetur, imprimis ventriculi, ejusque virtutis digestivæ, & hinc dictaminis appetitus habenda est ratio. Hinc alimenta probe nutriencia, copiosum alcali, quodvis acre temperans, suggerentia, & quæ succum minus alterabilem, sed potius glutinosum roridum, nec faciliè exhalabilem suggerunt; hinc cancri, ostreae, &c. subindè utiles Phthisicis observatæ fuerunt, ut *suprà* dixi. Præ cæteris Lac, & quilibet Lacticia, ubi cætera rite præmissa fuerint, & dyscrasia contentorum maximam partem correctæ, convenientissima sunt, de quo pariter jam *suprà* dixi.

Præterea ad dietam, passularum earumque rob crebrior usus, & ova sorbilla, sunt optima: à potu quoque copiosiore, quantum fieri potest, ægri abstinere, ne serum copiosius generetur: vid. WILLISII *Pharm. Rat. Part. 2. Sect. 1. c. 6. pag. 105.* Ex vinis verò dulciora seligant, v. g. Malvaricum & Alacanthinum: vid. SYLVIIUS *de Phthisi* §. 222. Ipse Potus ordinarius Phthisicorum Hæticorum commodissime conditus sit fumo sulphuris, ad imitationem HELMONTII; qui potus sulphurati ad curam phthiseos sunt singulares: Imò & fumus sulphuris cum aliis per os attractus singulare est experimentum cujusdam Medici Hybernici, quo aliquot desperatos Phthisicos curavit, uti refert BOYLE in *Philos. Experiment. pag. 277.*

Ratione aeris saluberrimus videtur Phthisicis siccus & serenus, nisi planè emaciati & exsiccati fuerint: vid. SENNERTII *Praxis l. 2. Part. 2. c. 12. pag. 215.* & MAYERNE *de Arthritide pag. 24.* Aut si crassius, exhalationibus tamen sulphureis refertus, fuerit; quamvis non omnibus æquod phthisicis idem aer proportionatus observetur: Vid. WILLISIIUS *l. a. pag. 85. 86. 130.*

Sunt, qui etiam Transplantationis medio curare satagunt atrophias. Modus vid. in HARTMANNI *Praxi Chymiatr. ubi de Atrophia.* Nempe ovum in urina ægri coquitur, post nonnihil apertum in acervo formicarum sepellitur; sic atrophiam laborantes curantur. Quod & non tantùm D. MICHAELIS aliquoties cum successu expertus fuit; sed præterea quoque Medicus veteranus in Anglia atrophiam correptus se ipsum curavit hoc modo, uti refert BOYLE in sua *Philosoph. Experiment.* Item cum unguento armario: vid. SCHMUCKIUS in *Curat. Magnet. pag. 59. item PARACELSUS de Rebus materialibus. PLINIUS l. 8. c. 32. dicit: Si quis tussiculofus in parva rana, arborescendentis, se exspuat, ipsamque dimittat, à tussi liberatur.* Simile est, quod de equi saliva SEXTUS MARCELLUS scribit: Si equi salivam phthisicis biberint, aut qui male tussiant, sani efficiuntur, equus autem mdrine: Vid. CASPAR à REYES in *Camp. Ebs. Quæst. 53. p. 666.* Sed talia transeant.

Hæc sunt, quæ dicta fuerunt, de Atrophia universali totius corporis. Superest adhuc

## ARTICULUS III

### D II

## ARIDURA PARTIUM.

**A** Trophia seu Tabes particularis cujusdam patris seu membri determinati, quæ aliàs *Aridura Partium*, Ger. *das Glieder schvinden* dicitur, ea est nunc internarum, nunc externarum. Internarum partium aridura, uti cognitum est impossibile, ita sub curam nunquam cadit, nisi suspicio forte sit pulmonum aridorum: de quibus SYLVIIUS in *Praxi cap. 20.*



## C A U S Æ.

Externarum verò partium Aridura seu Atrophia particularis externa duplicem causam agnoscit: nempe quod defectus sit sub nutritione, vel in ipso nutrimento, quod deficit in parte; vel in errore ipsius partis nutriendæ, quæ nec recipit, nec agglutinat nutrimentum. Rarius observatur in quadam parte à causa interna, sed ut plurimum præcedentem quandam occasionem ea sequitur externam. Deficit nutrimentum, quando nempe tam sanguis propriè dictus, quam chylus, non affluit in partem nutriendam determinatam, propter quoddam impedimentum, propter vasorum, arteriarum in specie ad eam tendentis lesionem & compressionem, ex distensione, luxatione, fractura, tumore duro, vinculis & similibus impedimentis. Rarissime tamen ex hoc principio oriuntur *Atrophie particulares*, vel Ariduræ; Motus enim massæ sanguineæ per arterias est vehemens, ejusque insignis per tenues porulos quosvis & angustias penetratio, ut in vasis capillaribus manifestum est.

Potius ergo fit Aridura vitio ipsius partis debilitatæ: nempe vitium subest vel partis non recipientis, vel non retinentis, vel non assimilantis, vel non agglutinantis nutrimentum: Id quod frequenter fit, si pori nimis angustantur, & fibræ exarescunt, ita ut pars fiat inepta, ut neque alimentum, licet conveniens, aut recipere, aut retinere, aut commodè istud agglutinare. Debilitas hæc dependet à spirituum vitio, animali nempe infuso, & hinc infuso, qui ceu agens se habent in nutritione, & alimenti appositione. Debilitatur autem spiritus infusus in manifesta partis & membrorum cum vulnere ac ulcere læsione; quando v.g. in vulneribus vasa ad ea tendentia rumpuntur, nutrimentum partis copiosius effluit, aut per ulcera id copiosè in pus mutatur, & ita cum succo nutritio infuso simul spiritus infusus abluuntur, à quo spiritus infusus conservatio & vigor dependet, pars arefcit, ac difficulter postmodum restitui potest. Usus hoc venit præsertim in articulis profundis vulneribus, & hinc aliarum partium nervosarum similibus læsionibus, quibus copiosior synoviarum fluxus sæpius supervenire solet; ita enim intercipitur nutrimentum, & sub forma puris vel synoviarum excluditur. Nam synovia nihil est aliud, quam liquor chylosus nutritivus, in parte nutrienda occasione vulneris, plus minus ac tendentis, degenerans in liquorem saniosum & aquosum, sub qua degeneratione acorem occultum contrahit, ut exinde vulnera ista partium non solum insigniter contumacia, ac simul periculosa fiant, sed simul partes istæ læsæ, dum destituuntur convenienti nutrimento, necessarii atrescunt. Unde fibræ exsiccantur & contractæ poros partis angustant, eosque magis connivere seu quasi subsidere faciunt; ipso verò spiritu infuso plus minus labefactio, nutrimenti convenientis assimilationis impar redditur. Unde sanato licet vulnere seu ulcere, nihil omnino tamen pars difficilè & tardissime denudè nutri potest, quin potius sæpius pertinax & contumax Aridura sequitur. Quin & cum debilitata dicto modo pars minus robusta sit, atque alia ipsi respondens, (id quod *Robur inæquale* vocat HELMONTIUS) propterea facilius ac sensibilius ferè externorum objectorum impressiones recipit, unde tales ægri restitui licet, tamen quasvis æris mutationes in loco antea læso mox perferunt. Dein alterum vitium latet in spiritu animali, qui per nervos ad partes distributus agentis vicem sustinet, ita, ut mediante hoc nutrimenti agglutinatio & assimilatio peragatur; unde & in hoc puncto spirituum animalium ratio habenda est. Si enim debilitantur in aliis partium nervosarum læsionibus, sine aperta licet continui solutione, his tamen debitis motus spiritus infusi plus minus inhiberi potest; hinc paralytici apoplexiam sequentes, convulsiones articulorum, & hinc compressiones & distorsiones nervorum ac tendinum, item horum ipsorum dislocationes, post luxationes & fracturas ossium, &c. Vid. HILDANUS *Epist. 90. & de labor. ac Melicer. c. 24.* A quibus ipsis, externis licet, & apparenter parvi momenti læsionibus, propter spiritus animalis infusi impeditum plus minus radiosum influxum pars in motu successivè debilior, cum sensu quodam stuporis ac formationis successivè staccior, & plus minus rabida quasi redditur, postmodumque atrophiam particulari corripitur: uti & cicatrices in locis articulorum factæ ad eam disponunt, quatenus per has partes nervosæ & tendinosæ non redeunt, adeoque spiritus animalis intercipitur; unde à gan-

gliis atrophiam particulares observatæ fuerunt: vid. PLATERI *Praxis Tom. 3. pag. 308. & 321.* WURZIUS *Chirurgia Part. 2. Obser. 79.* Quod faciunt casus ab alto, contusioneque partium, imprimis circa articulos, & quæ sunt aliæ causæ successivè inferentes ariduram partium, ita, ut raro vel nulla sit atrophia particularis à causa interna. Pertinet huic denique defluxus cathartalis, quando videlicet sine ulla causa manifesta, saltim ob lymphæ cathartalis decubitus in quadam partem, ejusque articulationem, & inde fibrarum ac tendinum paralyticam plus minus resolutionem, cum sensu doloris obtulo, præsertim vespertino ac nocturno tempore ingravescente, pars successivè ad atrophiam particularem disponitur. Quæ ratio non rarum est, in arthritide vaga scorbutica, aut etiam in aliis arthritidis speciebus, partem, quæ sæpius ac gravius affligitur, debilitari successivè, staccelcere plus minus ac tabescere.

## D I A G N O S I S.

Signa hujus ariduræ particularis per se patent: Causæ, cum semper aut ut plurimum sint externæ, ex relatione ægri expiscandæ.

## P R O G N O S I S.

Omnes hæc Ariduræ difficiles sunt curatæ, idque eo magis, quod magis confirmatæ ac inveteratæ. Præ cæteris tamen optimè de hoc negotio scripsit FELIX WURZIUS in *Medicina Vulneraria Germanicè conscripta, Tract. de synovialis vulnerum c. 19. & 23 p. 580.* Post hunc vid. AGRICOLA in *Chirurgia parva pag. 31.*

## C U R A.

Quoad Curam: hæc eo fit directæ, ut promoveat spirituum animalium, & hinc simul massæ sanguineæ ad partem læsam influxum, quod reparetur sufficiens nutritio, sanguis quidem, & mediante eo nutrimentum adiecti agglutinetur. In specie habenda est ratio causæ occasionalis, quæ introduxerat atrophiam: sc. attendendum est, an cum solutione continui, & effluxu spirituosius nutrimenti induc-ta fuerit aridura? an verò à sola læsione, sine continui solutione, sive hæc à vi externa, aut paralytica passione facta fuerit, sive ab interno lymphæ aridæ decubitu? Nam si prius obtinet, si v.g. successivè ex vulnere subsequuta sit atrophia particularis, remedia magis temperata, pingua, adcoque, uti vocant, moderate calefacientia, sed probe humectantia, & humore rosido oleoso partem persfundentia, adhibenda hic sunt: Sin posterius verò, acris, & partem læsam irritantia, ut vocant commuenter, Calefacientia & facultatem attractilem simulantia, hic conducunt, ut ita sensibilius afficiendo sensum tactus, spirituum oberior radius, humorumque copiosior affluxus, ita in parte conservetur, & inducta convenientia pororum cum blanda frictione restituantur; unde in atrophia post vulnerationes astium membrum in sanguinem bovis modè macerati immittitur. Posterius verò si fuerit, si nempe sine vulnere contigerit, cum Internis seu Sudoriferis Externa discutientia & Resolventia conveniunt. Cæterum catholicum ad quas-cumque particulares ariduras remedium Arcanum aluminis, quod specialiter commendat FELIX WURZIUS in *Chirurgia curato loco*, uti etiam AGRICOLA in sua parva *Chirurgia*, qui duo præ reliquis omnibus Thema hoc tractant. WURZIUS describit hujus Arcani præparationem clare quidem, interim selectus in alumine habendus, quod non vulgare illud rupeum, sed plumeum sumendum. Alias vocatur Germanicè *Das Federvucl*, uti vocat WURZIUS aliquo in loco, quod ipsum amianthi species est. Hoc plumeum, minusque pungens accipitur, juxta illius descriptionem, & cum anaëlis fusi fundatur forti igne in crucibulo, ut refrigerata condescentur in lapidem, cui affunditur postmodum aqua fontana, à qua resolvitur sal, alumen verò ad fundum subsistit. Hoc arcano feliciter omnes Ariduræ possunt curari, si nempe illud debitæ dosi misceatur suo Linimento, vel unguento, & cum pinguedine humana, aut aliis appropriatis, vel oleo laurino, vel oleo speciei subigatur in forma Linimenti; vel destillatur oleum ex pinguedine humana vel urina, quod fit, quando mista cum cineribus vitis destillatur. Addatur hujus unc. iv., AGRICOLA docente, unc. i. olei Philosopho



sophorum, & misceantur hæc cum arcani istius aluminis unc. ij. Jilloque fricentur membra arefcentia. In specie autem, si ab effluxu nutrimenti aut sinoviz post vulnera insigniora sit aridura, conveniunt focius partis cum Decoctis emollientibus, malvæ, althææ, seminis lini, capitis & pedum vervecis, aut ex animalium partibus, v. g. ex capite, pedibus, pulmone & hepate ovi & agni, &c. donec ab ossibus abscedant caro & omnia, quæ adherent, quæ separata ulterius in aqua ipsa coquantur, & cum hoc Decocto membrum lavetur & foveatur. Postmodum fiat Litus ex pinguedine hominis, vulpis, castoris, equi, cati sylvestris, ursi, canis, lupi & taxi, &c. Vel in specie fiat unguentum ex

*Pinguet. ardæ,*

*Ranar. ana ℥ij.*

*Porcellor. ℥ij. vel ℥iij.*

& facto Litu calido applicetur Emplastrum ex cera & pinguedine porcina: Conf. FELIX WURZIUS.

Item convenit succus lumbricorum cum oleo amygdalarum dulcium mistus, si membrum eodem fricetur. Quod si verò ex paralyti, contusione, &c. sequatur aridura, remedia externè irritantia & vellicantia conveniunt, quæ nempe partem læsam variè vellicando, spirituum sanguinisque, & consequenter nutrimenti affluxum promoveant. Hinc ordinariò laudantur frictiones cum urticis recentibus, quod euporiston succedit, si nempe aridum est citra lesionem manifestam à vulnere factam, sed ex compressione saltet emndinum; sicut ipse exempla hacratione curatorum pedum ariduræ laborantium novi. Post frictiones partium deorsum versus institutas, arcanum aluminis Wurzii cum Linimentis & pinguedinibus appropriatis subactum usurperetur, ut jam dictum. Modus autem frictionis est hic: scilicet membrum arefcentis probè fricandum est, incipiendo à summo, & imò repetendo, donec illud, labore hoc diu continuato, calefcat, rubescat, & consequenter vasa turbida appareant. Quando autem membrum ita calefactum rubicundum apparet, illinatur illud Linimento dicto, pannisque calidis probè postmodum custodiatur, hoc repetatur semel, bis vel ter in die, pro necessitate circumstantiarum, donec desinat Aridura. Quod si verò deficiat Arcanum hoc aluminis, Linimentum ex alumine plumoso, pulvere sabinæ, oleo laurino, juniperino, & similibus dictis, prout à WITTIGIO sequenti modo describitur, usurpetur: c. g.

*R. Pingo. taxi unc. ij.*

*Olei laurin. ℥iv.*

*Bacc. junip. unc. j.*

*Sp. cæ. drach. j.*

*Ping. porcina. unc. iv.*

His omnibus ad ignem probè calefactis adde

*Sem. urt. unc. j.*

*Pulv. sabin. unc. ij.*

*Alum. plumos. unc. ℥.*

Hæc mista pro unguento applicari possunt in aridura partium, citra defectum sinoviz.

Quibusdam tanquam secretum commendatur hæc aqua cum vino destillata ex semine urticæ, radice armoraciæ, & similibus, prout describitur ab AGRICOLA l. c. item à SCHMUCKIO *Thesaur. Med. Secret. 50. seq. modo:*

*R. Sem. urtic. Rom. ℥j.*

*Rad. armorac. rec. cont. unc. iv. ad ℥℥.*

*Ari rec. unc. iv.*

*Piperis longi unc. ℥ij.*

Hæc omnia cum vino albo digesta in Balneo Mariæ per 14. dies noctesque, agitando quotidie massam, destillentur.

Aqua spirituosâ acris prodiens inservit huic negotio, si eodem membra cum panno calido probè fricata sæpius illinantur, præsertim in casu, ubi Ariduræ membri sensus fornicationis aut stuporis unâ adsit.

Et hæc quidem conveniunt, si affluxus nutrimenti impeditur.

Præter quæ remedia, si non confirmata aridura, etiam sufficiunt pro frictione medicamenta ordinaria, nempe ex lumbricis terrestribus paratus spiritus ac Litus, aut succus eorum cum oleo amygdalarum dulcium subactus: Quæ ipsa etiam locum habent, si ex defluxu catarrhali doloroso aridura superveniat. In quo casu, præter sudores internis concitatos, optimi sunt spiritus fornicarum &

*Estmull. Oper. Tom. II.*

lumbricorum terrestrium cum paucis spiritu vini, addito alcali fixo, per retortam destillati & rectificati; vel aquæ articulares cum paucis spiritu salis ammoniaci cum calce viva, aut cum oleo saponis imprægnatæ, ita applicentur aut usurpentur, imprimis liquor lumbricorum terrestrium per destillatum in clibano paratus, prout describitur à MOELLENBROCCIO de *Paris p. 2. 270.*, cum usu applicari potest. Item conveniunt oleum lumbricorum terrestrium, oleum nardinum & costinum, & omnia olea nervina composita, cum oleis destillatis juniperi, lauri, ceræ, saponis, unguentis nervinis, c. g. Agrippæ, Nervino Augustanorum, &c. juncta. Linimentis verò his semper præmittantur Balnea aut formata, donec membrum probè in aluerit, hinc, idem ad incallescenciam novam deorsum versus fricetur & emplastrum denique appropriatum, v. g. emplastrum de galbano crocatum, oxycroceum, vel aliud nervinum quoddam applicetur, quotidie repetendo, donec æger in membro vel ruborem, vel fornicationis sensum percipiat; postea enim ad aquas vel spiritus articulares, similesque penetrantiores, accedendum. Pro scopo hoc conveniunt etiam frictiones cum pannis asperioribus, & cucurbitulæ valis majoribus admovendæ, imprimis illæ scroto, quales, post HILDANUM C. 1. *Observat. 80.*, TULPIUS lib. 3. *Observat. 49.* commendat.

Hæc de Ariduris & Atrophiis Universalibus & particularibus, & ita etiam de Nutritione deficiente.

## CAPUT II.

### DE

### NUTRITIONE AUCTA.

Quod auctam atque Nutritionem: sit hæc vel universalis in corpore secundum carnem musculosam, & hinc annexam pinguedinem, in *Corpulentia dicta nimia & Obesitate*; vel particularim, secundum partium nonnullarum & viscerum parenchymata, qua ratione observatæ fuerunt nimia & stupendæ magnitudines hepatis, lienis, renum & similibus partium: de magnis Lienibus jam suo tempore locutus est HIPPOCRATES. De hac particulari auctione quorundam viscerum sufficienter actum fuit in *Physiologicis*.

### ARTICULUS UNICUS.

#### DE

### CORPULENTIA NIMIA.

Quod verò atque universi corporis augmentum in Corpulentia nimia, ea est, quando habitus corporis musculosus insigniter augmentatur; sicuti quando pinguedo copiosè, & in specie partes subcutaneas, infarcit & incrassat, dicitur *Obesitas nimia*. Quod pertinet habitus corporis vocatus succi plenus, i. e. talis status, si totum corpus copioso succo nutritivo abundanter irrigatum, adeoque habitus molis, humidus, tumefactus, & ita uno nomine succi plenus, delicatus, & ad tactum suavis percipitur. Alio nomine vocatur *Corpus quadratum*, dum nempe omnes partes in omnes dimensiones ita abundanter nutriuntur, ut exinde conveniens robur atque firma consistentia corporis concilietur; Metaphorâ desumptâ ex mathesi, in qua corpora quadrata pro firmissimis habentur. Item facit huc *Veterum habitus athleticus* dictus, cujus apud Veteres, in specie *Aphor. HIPPOCRATIS Sect. 1.*, subindè iniicitur mentio, quando nempe carnes musculosæ nimis augentur, & ita postmodum tale robur conciliatur iidem, quale Veteres athletæ habuerunt, qui invicem cōgredientes exercitia athletica suscipiebant. Hic habitui athletico, & succi plenus sunt quasi affines corpulentia nimia, ut adeo corpulentia nimia sit, quando corporis totius, tam utrisque quam artus, peripheria in tantum convenienti nutrimento est aucta, ut actiones, imprimis motus; isque vel thoracis respiratorius, unde corpulenti sunt anthelatores; vel & motus artuum apprehensivus, sive totius corporis progressivus, aut impediatur, aut insigniter vitientur. Cum enim fiat motus per fibras musculorum; hæc autem, dum omnia intercepta musculorum spatiosa succo nutritio in tantum sunt repleta & infarcita, ut nullo modo in se ipsum cedere possit musculus; hinc fibræ nimis distensæ, & per conse-



## C U R A.

Quoad Curam corpulentiam nimiam seu Obesitatis nitamur

1. Ut impediatur copiosus alimenti laudabilis proveni-  
tus; quod ipsum fieri potest per inediam & mo-  
deratam dietam.
2. Ut nutrimentum jam genitum ante sui assimilationem  
matrè removeatur; quod faciunt Diuretica &  
Sudorifera primario, hinc Purgantia & Venæ-  
sectiones: quemadmodum ZACUTUS LUSI-  
TANUS lib. 3. *Prax. Admir. Observat.* 12. prodigiosam  
Obesitatem scarificatione ac hirudinum  
iustis, ac BARTHOLINUS *Ador. Hassnienf.*  
*Part. 1. Observat.* 74. per salivationem, curatam  
testatur. Unde rusticos ob continuos labores, adeo-  
que sudores, raro pingues ac obesos videmus; sicuti  
qui ex vita sedentaria laboriosam subito ineunt,  
successive emaciantur.
3. Ut nutrimentum partem jam assimilatum plus mi-  
nus resolvatur ac liqueat; & ut resolutum, & se-  
ro alluente imbibitum, evacuetur: serum enim,  
ut primò est vehiculum alimentorum, ita post-  
modum vehiculum est excernendorum.

Quoad Indicationem primam: Corpulenti & Obesi  
temperant sibi à cibis *inordinatis* largiis assumptis, & omni-  
bus iis, quæ ad maiorem corporis molem causam aliàs  
præbere possunt: Cæna sit parca, ac somnus brevior. E-  
côntra profunt cibi solidiores & pauciores, probè saliti; nec  
non olera, ratione salis nitrosi alyum & urinam move-  
ntia. Probè autem observandum, ne mox in principio,  
aut intempestivè nimis, corpori nimium, sed singulis sal-  
tem diebus aliquid, subtrahatur; cum vires aliàs debili-  
tarentur.

Dubium equidem oriri potest: an nempe possibile sit,  
ut Corpulentia jam facta nutrimentum semel assimilatum  
denuo resolvatur, & foras eliminetur, adeoque augmen-  
tato ita cesset? Sed respondeo affirmando. Videmus enim,  
quod febrium ardor corpora antea crassa & obesa solet  
insigniter emaciare: item quod scorbutus confirmatus  
corpus fecti plenum breviter reddat emaciatum, unde  
atrophia scorbutica. Ad hæc viscerum ulcera, dum Hæcicæ  
inferunt, ita massam sanguineam insciendo Phthisicos &  
macros reddunt, ut idem fieri cernimus per diabete[m] &  
salivationem, itemque per nimias purgationes: ac in spe-  
cie lymphæ copiosioris ac urinæ fluxus insignior emaci-  
ant, sicut hoc confirmat HELMONTIUS *Tract. 1. de*  
*Duum. Virat.* 6. 59. & *Tract. Latex Humor Negl.* 6. 44. ubi  
refert exempla insigniter obesos per Potiones diureti-  
cas subito emaciorum. Talia exempla habet etiam  
SCHENCKIUS in lib. 3. *Obs. pag.* 456. ubi de Diabete:  
Ibi enim refert, multos, diabete affectos per copiosum  
urinæ profusum subito fuisse extenuatos. Nec minùs  
efficax est copiosa salivæ excretio: notum enim est, quod  
luc Venere laborantes, curati per inunctiones Mercuri-  
ales Gallis frequentes, ubi continuam ac copiosam ex-  
cernunt salivam, quod exinde admodum attenuentur:  
Conf. BORELLUS C. 2. *Obs.* 11., ubi refert, quendam  
per crebriorem masticationem fol. Nicotianæ extenua-  
tum fuisse redditum: hæc enim cum sit forte masticato-  
rium, & uberrimam salivæ proliciat, hinc gelatina nutriti-  
va necessariò simul expellitur: Id quod etiam cum fol-  
lis lauri indicat BORELLUS, quod multas aquas edu-  
cant; si enim masticentur, salivam eliciendo co-  
pus emaciant. Hæc & similia persuadent, quod corpora pin-  
guè facta post resolutionem jam assimilati nutrimenti, à  
latice aquoso partes ambiente imbibiti, & sub forma uri-  
næ aut salivæ copiosè & uberrimè evacuati emaciantur.  
Convenit ergo mercurius dulcis cum Extracto catholico  
aut panchymagogo Crolii, pilulis aloeticis aut aliis le-  
nioribus purgantibus commixtus, quotidie præmissis præ-  
mittendis propinando, donec salivatio largior subsequatur:  
qualem methodum videbitis in BARTHOLINI  
*Abis Hassnienf. Tom. 1. Obs.* 74. Quod etiam pertinet nicot-  
ianæ fumus, mane ac vespere haustus.

De cætero inter remedia denuo emaciantia in specie  
eminet acetum, & omnia ex eo, vini filio degeneri, para-  
ta; imprimis acetum scylliticum cæcè certissimum experi-  
mentum hæc in parte allegatur à CATTIERO *in loco*,  
qui ex STRADA refert exemplum viri militaris admo-  
dum obesi, qui loco vini aceto continuo utens in potu, ita

rursus extenuatus fuit, ut 87. lb. pondere decreverit. Id  
quod confirmat STEPHANUS in *Oper. Medic. Tract. Cosmetice*,  
ad obesitatem tollendam nihil melius esse,  
quàm acetum scylliticum jejuno stomacho haustum, Hinc  
acetum rutaceum, aut etiam potus ordinarius ex aqua  
chalybeata aceto temperata, item acetum scylliticum, in  
quo absinthium est maceratum, & omnia acida sæpius  
usurpata, profunt. Hæc enim faciunt, ut alimenta inges-  
ta admodum dissolvantur & liquecant in terosiores &  
asperiores minusque nutritivum chylum, qui porro tam  
sub digestionem in stomacho, quàm extra eum in duodeno  
tractu fellis, abie in sal tertium plus minus volatile acre,  
ac fit insignis absterfivum, tam sordium nocivarum quàm  
etiam nutrimenti laudabilioris, & diureticum: unde nu-  
trimentum chylosum extenuatum & resolutum tunc sub  
urinæ forma solet emitte, adeoque habitus corpulentior  
successive imminuitur. Sic quoque acetum supra nitrum  
ac sal aliquoties cohobatum, uti acrius & magis diureti-  
cum sit, ita corpus magis ad emaciationem disponit, si as-  
sumatur. Post acida huc etiam spectant Purgantia; hæc  
enim semper aliquid de viribus depravando corpus ma-  
cidum reddunt: Hinc etiam CELSUS inquit: *Crebris*  
*purgationibus adsuescere, est corpus non nutrire*. Nam Pui-  
gantia etiam nutrimentum succum putrilagine afficiunt, &  
sub forma stercoreum exhauriunt. Verùm cum Purgantia  
fortiora seu venenata non semper tuto in usum vocari  
possint, propterea aloetica abstergentia mixta conducunt  
inprimis. Hinc FERNELIUS *Conf.* 14. ad Obesitatem  
exhibet pilulas ex Rha-Barbato, aloè, & agarico paratas,  
quibus aliquandiu continuatis Corpulentia demptæ est.  
Præ cæteris hoc in casu pollet aloè ob amorem, & hinc  
ob vim acidum abstergendi; unde etiam GRUELI-  
GIUS pilulas aloeticas & Francofurtenses obelis com-  
mendavit. Elixir proprietatis sæpius sumptum, corpus  
nonnihil emaciat; uti etiam omnia amaricantia, myr-  
rha v. g., pilulæ de tribus seu pestilentiales, Mass. pilul.  
hieræ cum agarico, vel de aloè cum agarico, congrua sunt  
remedia: ac Practici communiter & rectè dicunt, Eli-  
xir proprietatis exsiccare corpus; quæ exsiccatio tamen  
consistit in colliquefactione succorum nutritivorum. Huc  
pertinent alia amaricantia, v. g. centaureum minus, na-  
sturtium, mentha, absinthium, & ejus essentia, essentia  
myrrhæ, gentianæ, & similia: quæ omnia vulgè exsic-  
care dicuntur, cum tamen reverà corporis nutrimentum  
attenuent & dissolvant, ac sero involvant, quod inter-  
dum excernitur sub forma urinæ, interdum sudoris. Ul-  
terius Diuretica quæcunque fortiora per copiosum urinæ  
fluxum solent extenuare, copiosius usurpata: quæ inter  
eminet radix alparagi, radix fœniculi, petroselinæ; item  
alliata ac Cepacea omnia; syrapi dicti deducibus, item  
de 3. radicibus, qui diuretici sunt; Decoctum cicorum  
subrorum, item cappares, olivæ, amygdalæ amaræ, &  
similia condimenta diuretica. Ad hæc in specie pertinet  
tartarus, remedium vino ipso nobilius, cuius volatilis aci-  
ditas potenter abstergit, ac vi attenuativâ, simul inter-  
dum blandè urinam movet, & omnia ex eo parata: Hinc  
enim FORESTUS lib. 31. *Obs.* 13. talem habet pulverem,  
℞. Tartari crudi ℥j.  
Cinn. Zlj.  
Zingib. ℥j.  
Sacch. ad pondus omnium.  
M. f. Pulvis.

Pulverem hunc, dicit, crebrius assumpsum Aurisabram:  
extenuasse.

Sic etiam EPIPHANIUS FERDINANDUS *Conf.*  
82. specificè commendat tartarum in pulverem redactum  
contra nimiam pinguedinem. Alii commendant pulve-  
rem compositum ex ana tartari & cymarum seu julorum  
coryli, qui crebrius ante pastum & hinc sub introitu lecti  
assumatur, idque eò magis si ℥j. vel ℥ss. irroretur cum  
aceto destillato, idque continuo, donec corpus egregie  
emacietur.

N.B. Quæ dico de tartaro simplici, etiam intelligen-  
da de sale volatili, & nobilioribus præparatis, quod præ-  
suppono.

Pertinet hoc etiam tartarus vitriolatus, qui & ipse ad ema-  
ciandum aptus: Sic quoque nitrum obesitatem impedire vi  
suâ diuretici observatum fuit, ac in specie nitri crudû co-  
piosius usurpatum Nitrum vitriolatum seu arcanum dupli-  
catum Mynsichti, specificè etiam contra obesitatem comen-  
datur. Imò per aquas, nitri, alumen, & martem continentes,  
pin-



pinguedinem nimiam in quodam solutam TIMÆUS & GuldenKlee l. 3. Cap. 3. testatur. D. LANGIUS seu singulare habuit arcanum species diaspolticon Galeni ex nitro & cumino, quod sæpius usurpatum per urinam corpus emaciat. Pertinet huc tartarus vitriolatus Bartholæi ex sale Tartari, & spiritu nitri invicem mistis paratus, egregium sanè appropriatum contra nimiam Corpulentiam: item huc pertinet gummi juniperinum seu sandaracha Arabum (Græcorum Sandaracha est arsenicum) hinc etiam elegantes sunt pilulæ contra obelinitatem nimiam Mynsichtii, quæ basin gummi dicti agnoscunt, & multum valent: Dosis ℥j. est, singulis mane jejuno stomacho. Vel

R. Mass. pilular. de sandar. ℥ij.

Sal. volat. viperar. ℥j.

Cum Elixir propr. f. Pilulæ in lar pili min. D. S.

Pilulæ contra obelinitatem.

Dosis est ℥ss.

R. Sandarac. ℥ij.

Myrrh. elect.

Raf. lizn. sancti,

Extrac. absinth.

Aloes an. ℥j.

Spirit. vitrioli. coag. ℥ss.

M. f. Pilul.

Dosis drach. ss.

D. OSWALD est Autor, qui primus composuit has pilulas contra Obelinitatem, à quo habuit has Mynsichtius.

Semen fraxini seu linguae avis ad unc. j. manè in haullu vini propinatum insigniter commendatur ad evacuandam urinam, ratione cujus & hydropicos curat, & emaciat crassos. Secretum D. ERBENII est semen esule pulverisatum, & omni mane, quantum cultelli culpe capitur, usurpatum & continuatum; hoc enim dicitur expertum remedium. Nec omittenda terebinthina ratione virtutis diureticæ: refert FORESTUS, e. l. de viro valde crasso, qui insigniter extenuatus per pilulas ex terebinthina cum saccharo paratas, assumendo earum majuscularum 5. & 7. per 2. horas ante prandium.

Denique per sudorem etiam corpus emaciatur, sive per interna eliciatur, sive externe per exercitia. Atque hinc omnia Decocta lignorum, in specie guajacæ & ligni sancti, exsiccantur dicuntur, quatenus sudorem copiosorem provocant. In specie autem Sudorifera cum & ex salibus alcalibus parata, qualia sunt salia vegetabilium tam fixa quam volatilia, imprimis sal absinthii, cardui benedicti; item salia theriacalia, quæ corpus insigniter macerum reddere dicuntur, expectando sudorem, egregia sunt. Aliis salia viperarum, item alia remedia viperina, sunt commendata, quæ & ipsa corpus extenuare, & pinguedinem resolvere dicunt. Item salivatio Mercurialis mirabiliter corpus emaciat, ita ut illud sceleti formam repræsentet; Mercurius enim acrimoniâ suâ nutrimentum corporis dissolvit.

Tandem ex fonte Chirurgico huc spectant crebriores venesectiones & plures inusti fonticuli: venesectio enim cum sanguine simul nutrimentum exhaurit; unde subtractio nutrimento emaciat: Ex fonticulis verò sub forma puris nutrimentum partium resolutum evacuat, massa sanguinea depravatur, & ita necessariò emaciatur.

Externè à MYNSICHTIO commendatur Decoctum nucum cupressi compositum, quod sine dubio ratione virtutis adstrictoriæ effluxum alimenti uberiorem reprimat.

De Evacuationibus adhuc notetur: has in obelitis parciore esse debere, quàm in Carnosis seu musculosis, ne corpus jam tum torpidum magis enervetur.

Quidam febrem artificialem excitare jubent, de qua integrum Tractatum JOHANN-DANIEL MAJOR conscripsit; sicut & hoc ipsa sæpe natura nobis monstrat.

Hæc de Corpulentia nimia: Pergo ad Vitium Nutritionis depravatæ, quando nempe partes vitiosæ ac depravatæ nutriuntur.

## CAPUT III.

### DE

## NUTRITIONE DEPRAVATA.

### ARTICULUS I.

#### DE

## CACHEXIA IN GENERE.

Qualitate ergo peccans corporis Nutritio in genere vocari solet Cachexia, si ob vitium nutrimenti pervertit nutriuntur partes. Hactenus equidem à pluribus descripta per tumidam totius corporis mollietatem, & via quasi ad hydropem seu ejus initium credita fuit: At generaliori conceptu opus est, cum sine corporis intumescencia cachexia quoque contingere possit, ut mox dicetur. Est affectus ille, in quo natus & floridus cutis color, ac imprimis faciei nitor, perit, mutaturque in varium, in pallidum, lividum, luteum, virentem, intensè rubicundum, &c., in diversis corporis partibus exanthemata & pustulæ emergunt, ac quoque partium consistencia durior juxta ac asperior cum squamarum decidentia interdum in molliorem mutatur: nonnunquam sudor foetidus exhalat, cutis unctuosa observatur cum pruritu notabili, pilorum contingunt desuvia, dolores diversi partes diversas infestant, ita tamen, ut corpus nonnunquam simul intumescat. Cachexia talis est reverà fructus cacoehymiae; hæc verò est pedissequa Cacoehymiae. Nempe dependet omnis Cachexia ab effusione vitiosi & depravati nutrimenti, i. e. humoris vitiosi, loco nutrimenti hinc inde distributi in habitum corporis ac partes molles; Unde dum nutrimentum non sit assimilatur, ob debitas proprietates deficientes emetgit Cachexia, adeoque prout variant nutrimenti vitia, variat etiam Cachexia. Hinc humor ille, qui ita habitui corporis affunditur, si est albus, dicitur Cachexia in specie; si flavus, dicitur Icterus; si viridiusculus seu luridus aut lividus, aut alio tetro colore tinctus, ut plurimum Icterus niger audit.

Est itaque Cachexia seu malus habitus terminus satis generalis, species diversas habens seu complectens: In genere quancunque corporis & partium tuberculanearum mutationem à statu naturali in deteriorem innuit, ex vitiosa quasi nutritione dependentem; Unde tam variæ Cachexiarum sunt species. Nam præter dictas datur etiam Cachexia scorbutica, & Cachexia hypochondriaca, item scabies, elephantiasis, &c.: in mulieribus ex uteri vel mensium vitio Febris alba dicitur. In specie tamen usus obtinuit, ut vitium illud tantum Cachexia appelletur, quando corpus à nativo colore in pallidum & lividum, plus minus viridem, & habitum subtumidum & flaccidum degenerat, & à sanguificationis defectu in specie dependet. Ut verbo me explicem: sicut biliositas dat Ictericum, ita pituitositas dat Cachexiam in specie ita dictam, utur omnes hos sub generali Cachexiæ nomine legitimo jure comprehendamus, ejusque talis est Historia.

Ægri successivè pallésunt ac colorem plus minus lividum contrahunt, postmodum facies nonnihil intumescit, & tandem quoque habitus corporis; hinc dicunt: pinguescit quidem, sed non est pinguedo naturalis. Præter cutis mutatum colorem juncta simul solet esse in plerisque dispocea, quæ præsertim magis surgetur, quoties corpus, imprimis adscensum alium, tantillum & leviter movetur, quæ ad motum corporis concitatioem augetur, quin tunc sæpius cordis palpitatio, arteriarumque circa jugula temporaque inconlucta pulsatio, observatur: Accidit quoque universi corporis, præ cæteris crurum, lassitudo spontanea & tensio, animæ torpor: ut per non raro compressivus & anxiosus præcordiorum dolor, qui post alimenta assumpta intendi solet: Appetitus in principio cogitat, in progressu verò prostermitur, ac non raro tales ægri fiunt: Adeo sæpe etiam febris lenta, ægro vix sensibilis, & quidem modò continua, modò intermittens, quotidiana serè periodica: Pulsus



Pulsus sunt inæquales, parvi, frequentes & debiles. Urinæ sæpius etiam sunt crudæ, aquæ seu pallidæ, tenues & saltem minus tinctæ; raro, nisi in progressu morbi, prodeunt crassæ & turbidæ cum copioso sedimento albo. Observata tamen fuit Cachexia cum urinæ lacteis, uti hoc habet SYLVATICUS c. 1. Conf. 29. Tandem malolulterius procedente corporis habitus fit turgidus, tumidus, crassus, & pallidus, foveamque post impressionem digiti ostendit, adeoque tunc vocatur *Leucophlegmatia*; si verò evadit turgidus cum quodam splendore & livore, quasi aquæ essent collectæ, vocatur *Anasarca*, seu aqua intercus, tam universalis, quam subinde particularis crurum, & est hydropis species. Antequam *Leucophlegmatia* vel *Anasarca* erumpat, fit, ut pedes saltem intumescant, uteriusque, morbo incrementum capiente, & abdomen intumescit, & sic in perfectum ascitem abdominis; seu hydropem in specie sic dictam, degenerat. Vulgò tumorem hunc pedum edematofum & *leucophlegmatiam* per Morbum intemperiei humidæ explicant: sed non sunt morbus, sed saltem producta morbosa Cachexia. Nullis ac nulli ætati patit Cachexia, licet seminas ob vitam sedentariam frequentius, & ob supervenientia menstruationis vitia contumaciùs ac pejùs afficiat: Quin & sæpiùs comitem habet affectum scorbuticum aut hypochondiacum. In principio morbi ciborum digestionem impediuntur, manente appetitu; tandem etiam anorexia accedit, corpusque summè imbecille redditur. Alvus sæpiùs est obstructa. Plura huc facientia videb. in specie in SYLVIO lib. 4. Prax. l. 1. Tract. de Cachexia.

### PARS AFFECTA.

*Pars affecta* seu *Subiectum* InhæSIONIS est habitus corporis, seu partes ejus solidæ mollioræ, in specie carniæ, in ejus ambitu extrinsecus sitæ, quæ primariò afficiuntur; *Subiectum* verò radicationis, seu *Pars affecta à causa*, est massa sanguinea cacochymica facta. Ex dictis *cachexia* in specie sic dictæ *causa* facillè patet.

### CAUSÆ.

*Causa nempe proxima Cachexia* est nimia *Cacochymia* vel *Cruditas* massæ sanguineæ, indeque dependens deficiens ac imminuta ejus fermentatio, unde chylus & ipse plus minus vitiosus non ritè assimilatur, sed tota massa eodem crudo repleta, cruda & vitiosè fermentans manet, particulæ ejus salinæ obruuntur, morbus magis magisque confirmatur, unde tali crudo sanguine, vel, ut vocant, pituitoso per partes circulato, hæ chylo & sanguine non ritè alteratis nec volatilifatis infarciuntur potius, quam debitâ appositione aut aliquâ assimilatione nutriuntur, ut rectè proinde dicat FORESTUS: corpus ita inflatum non aliter se habere, ac pastam non ritè fermentatam, in qua digiti impressi vestigium hæreat.

*Causa Remota* est multiplex: Observandum enim Cachexiam nunc esse *affectum primarium*, & qui per se impet; nunc *secundarium*, aliosque insequitur morbos, v. g. qui quasvis sanguinis nimias effusiones, aut ejusmodi consuetas suppressas insequitur: in specie mensium suppressio, uti & nimius eorum fluxus, cachecticas reddunt mulieres: sic Gonorrhæas diuturnas, aut fluores albos, item febres chronicas ordinariò insequitur: Mola aut foetus mortuus retentus etiam Cachexiam inferunt: Videatur FORESTUS lib. 19. Observ. 28. in 5. vol. HORSTIUS lib. 5. Observ. 21. Urinæ suppressio, hepatis ac lienis aliorumque viscerum vitia, uti sunt atoniæ, obstructions & tumores facile scirrhescentes, reorum ulceræ, &c. Cachexias inferunt.

*Causæ Remotæ Cachexiæ primariæ* est deficiens chylosis, dum nempe alimenta in stomacho nec ritè fermentando volatilifantur, nec in subdilem aut falsum volatilem abeunt liquorem, sed in pituitam viscidam ac acidam degenerant; adeoque vitiosum in primis vis acidum quasi fixum, nec volatile, primum fundamentum Cachexiæ ponit, quod fovet ulterius semper simul conjuncta bilis inertia, seu deficiens ejus acrimonia salina volatilis, quæ nec corrigit, nec perficit debitè chylum in duodeno nec ritè feces separat. Ac in Cachexia quidem semper peccat cruditas acida, (propterea quoque Martialis dicuntur Anticacchectica;) quæ alimenta non transmutantur in chylum volatilem, sed viscidum: Unde ex vitio dige-

stionis primæ orta cruditas acida ad massam sanguineam delata fermentationem ejus inhibet, hæmatosin turbat, & successivè Cachexiam inducit. Massæ sanguineæ enim particulæ salinæ fermentativæ succo isto crudo atque incongruo obrutæ debitam chyli alterationem & sanguinis assimilationem ritè perficere nequeunt; quin hic exinde crudus, plus minus viscidus, & quasi occultè acidus remaneat; unde de facili stagnans sanguis in præcordiis, dum levi corporis motu celeritè moveretur ad pulmones & cor, dyspnœam & anxietates infert; Quin & massæ sanguineæ debitâ fermentatione vitiatâ & imminutâ imminuitur quoque in feminis menstrua sanguinis fermentatio. Unde Cachexia incipienti, multò magis confirmatæ, supervenit etiam mensium suppressio, quæ ipsa malum postmodum & gravius & contumaciùs reddit; rariùs enim menses suppressi Cachexiam inferunt, sed vitio cachectico supprimuntur. Porro si sanguis crudo chylo inquilinatus circulatur ad partes, tunc nutrimentum illud crudum appositum & congestum, necessariò *Leucophlegmatiam*, summum Cachexiæ gradum, post se relinquit, unde depravatur nutritio, adeoque habitus corporis tumidus insignitè inflatur, & exinde ob fibrarum musculosarum & nervosarum laxatum tonum flaccidus fit. Quod si ex revento qualicunque occasione sero aut lymphæ (cachectici enim non aut difficillimè sudant, & parum quoque miungunt) serosior quoque simul fuerit sanguis, necessariò oritur vitium, quod dicitur *Anasarca*, seu habitus corporis copiosâ aquâ suffusus; quæ eo erit major, si taliter coeruleo aut obstruantur glandulæ partium musculosarum, aut etiam vasa lymphatica, ita ut lymphæ aut saltem serositates, non ritè ex partibus per vasa lymphatica revehi queant, sed debitus earum motus inhibeatur; unde sub cute aquositates congestæ necessariò habitum tumidum inferunt, & vulgò protertia hydropis specie, nempe totius corporis hydropem, habetur. Hinc BORELLUS Cent. 3. Observat. 66. observat corpus Cachecticum crystalli instar translucens. Sive ergo copiosum serum in massa sanguinea peccet, sive motus impeditus lymphæ in causa sit, utroque modo generari potest *Anasarca*. Quod si humorum istorum serosorum plus minus Chylosorum seu pituitosorum ex proprio impetu decubitus fiat magis ad inferiora, unde crura, scrotum, ac tandem abdomen intumescant, erit ordinariùs sic dictus *hydrops*.

Confunduntur equidem subinde *Leucophlegmatia* & *Anasarca*, sed malè; Differunt enim variis modis, & non, nisi subiecto, nempe habitu corporis inter se conveniunt. Nam in *Leucophlegmatia* est habitus corporis pituitosus (i. e. crudus chylosus); *Anasarca* verò est ab ichoroso & crudo sero, in habitu corporis depositò, eo currente totam plus minus vasorum lymphaticorum reptione. Distinguere autem facile est *Leucophlegmatiam* ab *Anasarca*; in *Leucophlegmatia* nempe minus est splendoris ac nitoris, quam est in *Anasarca*, sed habitus corporis pallet: in hac verò corpus plus jussu splendet ac nitet: Deinde vestigia foveæ digito impressæ in *Leucophlegmatia* durant, tandem successivè pereunt, quæ in *Anasarca* facillè & brevissimo tempore disparent. Interim sæpiùs evenit, ut *Leucophlegmatiam* sequatur *Anasarca*, si nempe impediatur sero & lymphæ transcolatio.

Vulgò statuitur, Cachexiam & similes affectus oriri ex hepate, nempe ex intemperie ejus frigida: quæ sententia cum superstructa sit hypothesi istâ, quod hepatis sanguificet mediante suo calore innato & speciali, spontè corrumpit: Quin potius WILLISIUS in Pharmac. Rationali Part. 2. pag. 384. & sequ. materiam esse humorem serosum, efficiens verò sanguinem esse, asserit.

*Causæ remotissimæ* seu *occasionales* seu *procacæ*, ad Cachexiam, *Leucophlegmatiam* & *Anasarcam* disponentes; sunt imprimis errata quædam in sex rebus non-naturalibus: quod pertinet vita delitiosa & sine motu peracta; sicut contra sub motu corporis homines malis hisce minimè soleant infestari, quin curari potius, notante PANAROLLO Pent. 1. Observ. 30. Item ira, moeror, tristitia, & curæ protractæ, aut diutius continuatæ, non raro inferunt cachexiam, quia non rectè volatilifatur sanguis, & intumescunt viscera. Huc pertinent errata in victu: sic enim intemperatè viventes subinde cachectici evadunt. Somnus ni-



minus, & labor deficiens promptè ad cachexiam disponit: & quæ sunt aliæ causæ externæ. Quò facit imprimis Observatio PANAROLLI c. l. de muliere cachectica, multis obstructis parenchymatibus, magis exercitio quam alio quocunque remedio curata: Unde vi oppositorum exercitium & motus deficiens disponunt ad cachexiam. Dum PANAROLLUS inquit, fuisse obstru-  
ctiones parenchymatum, loquitur ex hypothesi, quod cachexia oriatur ex obstructionibus viscerum: de quibus alibi dixi, quod hæc sint imaginariæ, aut si adsunt, superveniant, & potius sint effectiva, quam Causa.

Quoad Cachexiam secundariam: nascitur hæc talibus occasionibus, quæ sanguinem immediatè afficere, vel, idque frequentius, mediante læsione digestionis primæ eundem alterare possunt. Sic ea, quæ spiritus nimis exhauriendo aut dissipando, & hinc fermentationem stomachi lædendo, ut hæmorrhagiæ nimis, gonorrhææ, &c., vel fermentum digestivum alterando, ut menses suppressi, & febres chronicæ & malè curatæ, mediatè sanguinem alterant. In specie tamen post nimiam sanguinis effusionem progerminare solet cachexia, & hæc quidem frequentissima est causa, attestantibus omnibus autoribus, cachexiæ, & hydropis ascitis: vid. FORESTUS lib. 19. Obs. 25. Nam depauperatur massa sanguinea & spoliatur principiis salinis, unde cruda manet, ut exinde minus fermentari, aut chylus assimilari possit. Notum enim est, mulieres fieri cachecticas ex suppressione mensium. Queritur autem: an mensium suppressio sequatur, an inducat cachexiam? Respondeo: defectum mensium ut plurimum præsupponere cachexiam. Dico tamen, ut plurimum; non semper; Nam & fluentes menses, ex terrore verò subito suppressi, cachexiam inferunt, quod nempe sanguis menstruus inquinat massam sanguineam, & turbet ejus fermentationem, adeoque sanguis effectus redditur, utut cachexiam superveniens mensium suppressio eandem exasperet: Hinc Martialia tam in cachexia, quam in mensium defectu, utramque faciunt paginam. Immediatè afficit sanguinem lues Venerea, semper cachexiam comitem adsciscens, uti hoc refert SENNERTUS lib. 3. Prax. pag. 704. cap. de Cachexia. Urina suppressa, viscera, abdominis præsertim, affecta, sanguificationis aliàs perfectioni Interventia, foetus mortuus diu in utero retentus, aut secundinæ retentæ, vel & mola diutius gestata, Cachexiam non rarò inferre solent. Sic cachexiam post foetum mortuum observat HORSTIUS Tom. 2. lib. 1. Observ. 20: item ex Mola Cachexiam observat FORESTUS lib. 19. Obs. 26. Sanguinem enim inquinando debitam quoque ejus spiritus ascensionem impediunt.

### DIAGNOSIS.

*Signa Cachexiæ* in specie sic dictæ ex suprâ dictis facile patent.

### PROGNOSIS.

Quoad *Prognosin*: Cachexia, uti notum, ordinariò malum est admodum chronicum, & tardæ curationis: Imò, quò magis inveterata, & firmitus radicata, eò difficilius curatu, & nisi ei maturè occurratur, sæpissimè in anasarcam, Leucophlegmatiam, & Hydropem ascitem degenerat.

Si non occurrat scirrhus visceris cujusdam, hepatis aut lienis confirmatus, vix cachexia curabitur; sicut & illa, quæ sequitur morbum acutum & febrem ardentem, aut intermittentem chronicam, malè à Medico, vel crebriori potu ab ægro tractatam, difficilis est admodum, imò nullius curationis: Item si cachexia superveniat mulieribus, quibus jam ordine naturæ menses deficiunt, illis difficulter, aut admodum lentè curabitur, eoque gravius reliquis laborare solent.

### CURA.

In Cura Cachexiæ eò attendatur:

1. Ut corrigatur stomachus, ac ejus digestio prima, & cruditas acida emendetur: quod ipsum post Vomitoria imprimis præstant Martialia.
2. Ut corrigatur cruditas, & inde certa dyscrasia massæ

sanguineæ, unà cum intersticia acida acrimonia bilis.

Unde in Cachexia primaria

1. Acidum vitiosum primarum viarum removendum per Absorbentia, in specie Martialia, partes animalium duras, Terreæ, Alcalia, tum fixa tum volatilia.
2. Viscidum incidendum & attenuandum per gummata, salia tam salsa, quam alcalia, item per simplicia stomachica aromatica, ac salina volatilia.
3. Bilis inertia acuenda aromaticis seu resinosis volatilibus urinosis, præsertim amaris, quæ aliàs Hepatica dicuntur.
4. Cruditates primarum viarum & sanguinis plus minus correctæ evacuandæ vomitu & secessu ex primis viis; ex massa sanguinea verò per sudorem & urinam.

In *secundaria* verò Cachexia morbus primarius curandus, aut læsiones ab illo inductæ seu reliquæ eliminandæ, semper digestionis primæ negotium, quantum possibile, observando. Hos scopos ut feliciter obtineamus in cachexia curanda, rectè observandum monet LINDANNUS, quod cachectici, quò lenius tractentur, tantò citius curentur: hinc fortioribus Purgantibus, ab initio statim adhibitis, nos nil efficere, nisi sint Vomitoria; sed ut malum sensim crevit, ita successivè saltem digestiva, aliaque leniora remedia propinanda esse, quæ crassos & viscidos humores incidunt & attenuant, acorem vitiosum corrigunt ac temperant, atque ita successivè evacuationi aptiores reddunt. Undè imprimis in usu sunt Noduli ex aperientibus, ut vocant, i. e. Resolventibus & Incidentibus, blandis Purgantibus mistis, compositi: quibus subinde Martialia remedia sunt interponenda. Et cum Cachexia sit initium hydropiseos, commodè methodus & medicamenta, quæ in principio hydropis conveniunt, etiam in Cachexia adhiberi possunt; & contra ea, quæ in Cachexia usurpantur, validiora tamen & magis diuretica, in Leucophlegmatia & Anasarca quoque profunt. Item illa medicamenta huc pertinent, quæ suprâ Sect. 13. in Morborum chronicorum cura recensita sunt, ac in sequ. de Ibero, Scorbuto, Scabie, Lue Venerea, &c. occurrent. Illud saltem adhuc observandum: ut in Medicamentorum appropriatorum usu aliquandiu perseveremus, ubi præprimis radicatum magis malum est, i. e. tam diu illis inhærendum, quam diu ab ipso bene, aut ad minimum non pejus, se habeat æger, ac medicamentum absque nausea singulari hic admittat; quamprimum verò hujus fastidium subrepat, aut prodesse desinat, gratum atq; optimum licet medicamentum, statim de alia, aut alia certè illius formula Medico cogitandum: vid. SYLVIUS Praxi App. Tract. 5. In specie tamen conveniens regimen diætæ secundum sex res non-naturales observandum, & præsertim motus suadendus: id quod confirmat PANAROLLUS suprâ c. l. de muliere admodum cachectica, exercitio plus quam alio auxilio sanata.

Principium autem Curæ à vomitu, interdum repetendo, faciendum est, & præter Afarina propinata Conferva gratiolæ ad ʒi. vel ʒij. egregiè vomitus movet, & specificè in Anasarca commendatur; vel si coquatur in vino ad ʒij. Gratiola, egregium etiam & blandum est Vomitorium, si propinetur Decoctum. Ante tamen Vomitoria consultum erit, ut Digestiva salina præmittantur, Cruditates solventia, & ad motum disponentia; nunc cremor tartari, nunc liquer terræ foliatæ tartari: vid. ROLFINGIUS, ZWELFERUS: nunc cremor tartarificatus, & cum sale tartari fixo vel alio conjunctus, quod vocant Digestivum tartari universale, Tinctura tartari simplex, quàm etiam tinctura tartari antimoniatæ, arcanum duplicatum, tartarus vitriolatus, sal centaurei minoris, absinthii, sal ammoniacum, sal digestivum, hypochondriacum, dosi à ʒj. ad ʒʒ. bis in die, manè, & meridie aliquot diebus ante usum Vomitorii assumantur: quibus pro acido absorbendo Terreæ adjungi possunt, c. g. Corallia, Lapides cancrorū, mater perlarū, Martialia, Bezoardicum Martiale, Terra sigillata rubescens, antimonium diaphoreticum Martiale, Antihect. Poteril ex part. iv. reguli antimonii & part. v. Jovis, cum triplo nitri detonatis, Bezoardicū Jovale, & similia fixa jovialia. Hinc

℞. Salis digest. hypochondr. ʒj. ad. ʒiv.  
Div. in 4. part. æqu. S.  
Pulvis digestivus.



Vel hujus loco:

**R.** Tartari vitriolati Tachet. ℥ij.  
Salis absinth. ℥j.  
M. div. in 2. part. aqu. S.  
Ut ant.

**R.** Salis ammoniaci ℥ij.  
Div. in 2. part. aqu. S.  
Ut ante.

**R.** Arcan. dupl. Mynf. gr. xv.  
Salis absinth. gr. viij.  
M. S.  
Pulvis digestivus pro 1. dosi.

**R.** Lapill. cancer. præp.  
Salis digest. hypoch. an. ℥ss.  
M. div. in 2. part. aqu. S.  
sal digestivum.

**R.** Crem. tartari drach. j.  
Lapill. cancer. præp. drach. j.  
M. f. Pulvis. S.  
Pulvis digestivus.

Duobus diebus manè in vehiculo calido assumendis.

**R.** Tartari vitriolati Tachet. ℥ij.  
Salis absinth.  
Lapill. cancer. præp. an. ℥j.  
Olei destillat. scorchin. gr. vi.  
Misc. f. Pulvis.  
Div. in 3. part. aqu. S.  
ut ant.

**R.** Corall. rub. præp.  
Lapill. cancer. præp.  
Arcan. dupl. an. gr. xvj.  
Misc. pro pulvere.  
Div. in 2. part. aqu.  
D. S. ut supra.

**R.** Matr. perlar. præp. ℥j.  
Tartari vitriolati.  
Salis ammoniaci depur. an. ℥ss.  
M. f. Pulvis.  
D. S. ut supra.

Dosis quantum cultelli culpidi capi potest, vespere usurpanda:

Manè verò

**R.** Tartari compos. unc. ss.  
D. S.  
Tinctura aperiens.  
Dof. 40. gutt.

**R.** Tinctura tartari acris, vel ex tartaro & nitro calcinati, vel ex coriis reg. quæmon. drac. iij.  
Spiritus salis ammoniaci drach. j. ad drach. iij.  
M. S.  
Aperiens Tinctura.

Dosi. 40. vel 50. gutt. bis vel ter in die in vehiculo calido.

Quibus præmissis una vel altera vice propinetur Vomitorium. Aut si hoc minus conveniat, instituatur purgatio per alvum, inrer quæ est radix esulæ legitime præparata, vel ejus extractum, quo sæpius & frequentissime usus fuit RULANDUS in Curat. Abstinentium tamen à fortioribus & frequentioribus, cum magis noceant, quam profint; vid. HOFFMANNI M. M. L. L. c. 7. §. 1. 2. cap. 6. Pilulæ ex Extractis panchymagogis cum Mercurio dulci sunt admodum utiles; v. g.

**R.** Extr. panchym. Croll. gr. xij. ad xv.  
Mercurii dulc. risè par. gr. xij. vel xv. ad ℥j.  
Extr. troch. alb. gr. j. vel iij. ad gr. ij. & iij.  
Cum Ess. absinth. f. Pilulæ.

D. S.  
Pilula laxativa pro 1. dosi.  
**R.** Mass. pilulæ. de tribus Russi, vel de ammoniac Querc. gr. xv.  
Mercurii dulc. ℥ss. ad gr. xv.  
Extr. troch. alb. gr. iij.  
F. Pilul. min.  
D. S. ut supra.  
**R.** Extr. panch. Croll. gr. xv. vel Mass. Pilul. de ammoniac. Querc. ℥j.  
Martis cum succo pom. g. vj. vel vij. ad ℥ss.  
Troch. Alhand.

Scamm. sulphurat. 20. gr. j. ad gr. iij.  
Cum Ess. Martis f. pilula.  
D. S. Pilula laxativa.

**R.** Mercurii dulc. gr. xv.  
Scamm. sulphurat. gr. iv.  
M. f. Pulvis: S.  
Pulvis laxativus pro 1. dosi.  
Detur in vehiculo calido:

Vel camentrast. Martis, ut pote quod in Cachexia est egregium, & Pilulæ: S.  
Pilula laxativa pro 1. dosi.

**R.** Pulv. jalapp. gr. xv.  
Croci Martis aperit. gr. viij.  
Extr. troch. alb. gr. j.  
M. f. Pulvis: S.  
Pulvis laxativus pro 1. dosi.

Aut etiam Potio Laxativa cum gummi ammon. usurpetur, aut Infusum rhabarbari, quod in sequ. de libero occurret. RIVERIUS in purganda Anasarca utitur succo Ireos recenti per residentiam depurato ad ℥ij. cum ℥ss. manne invicem permixtis, ad serositates abundantes evacuandas.

His præmissis accessus ad Martialia: Hinc tot pulveres & Medicamenta anticachectica, ut vocant, prostrant, qui basin Martem agnoscunt. Martialia hæc diversimodè præparantur: Interim, quod simplicior præparatio, ed melior, & quod minus ab acidis saturatur Mars, ed efficacior erit: unde pulvis cachecticus Quercetani nullus est pretii, quoniam illius primarium ingredientis est Crocus Martis saccharinus; cujus tamen nullus est usus: Ratio, quia saturatus Mars acido sulphuris, instar scoriarum tantum in corpore jacet sine effectu. In specie tamen Martialia, prout nunc acida magis nunc acris peccant, disponuntur: In subiectis enim non delicatis, locum invenit sufficientem limatura Martis, minutissime trita & pulverisata, præprimis ubi acidum fortius peccat. Pariliratione pulvis cachecticus Hartmanni usurpari potest, & in specie de pulveribus anticachecticis, vid. HARTMANNUS in Praxi Chym. p. 204. & 206. E. g.

**R.** Limat. Martis part. j.  
Cinnam. pulveris. part. ij.  
Sacch. ad pondus omnium.  
f. Pulvis.

Qui dosi ℥j. frequenter usurpetur.

Vel

**R.** Antimon. diaph. Martial.  
Salis absinth. an. ℥ss.  
Olei destillat. Ligni sassafr. gr. j.  
M. pro dosi S.  
Pulvis aperiens.

Ubi verò acidum non adeo excessivum, ac stomachus sensibilis, in his casibus Martialia præparanda sunt, aut imprimis vicia Martialia conveniunt, observando quæ ditionem ventriculi plus minus robusti, & qui facilius aut difficilius talia fere possit: v. g.

**R.** Limatur. Martis ℥ij.

Affundantur vini menturæ tot, quot illius uncie sunt, stent invicem per 40. dies nocturnæ; postmodum de hoc uncias aliquot hauriat reger, cui si addantur aromata, majorem efficaciam acquirat.

Quod facit Claretum Martiale Mynsichii, Item Vinum Malvaticum Martiale HARTMANNI, quod habet in Praxi Chymiatr. p. 204. Locovini Malvatici commodius assumitur Rhenanum, quod est acris, & potentius rodit Martem; nec non Extractum Martis cum succo pomorum Borsdorffianorum, vel multo vel Decocto Tamarindor. paratum; vel etiam Extractum Martis Mynsichii (Tincturæ enim Martiales sunt languidæ) deque tall Extracto, quantum cuspisculteri caput, vel ad quantitatem castaneæ, in vino Martiali propinatur. Huc spectat Tinctura vitrioli Martis Zuberli & Ludolci, antimonium diaphoreticum Martiale: loco spiritus vini communis lucius spiritus baccarum juniperi, vel menthe cochleariæ, &c. Bezoardicum Martiale, quod etiam in Anasarca, & incipiente hydropo est egregium. Pertinet huc etiam tartarus Martialis ex infusione solutonis tartari super limaturam Martis; sic enim ab utroque tartari Martiales.

**R.** Solis. Mart. cum succo pom. ℥ss.  
(vel in corbuto part. iij. cum p. j. spirit. Cochl.)  
D. S. Essentia aperiens.

Dosis 40. ad 50. gutt. cum leni motu.

Vel in subjecto paulo robustioris stomachi usurpentur acidulæ naturales & artificiales: vid. P. L. A.



TERUS Observ. l. 3. pag. 408. Prax. T. 3. pag. 114.

Vel

℞. Ligu. Martis solar. ℥ij. vel ℥ij.

D. S.

Essentia acidularum.

De quo primo de gutt. vj. capiantur, secundo vlij. tertio xij. ascendendo ad 15. 20. vel 30. guttulas, ad modum Acidularum in morbis Chronicis:

℞. Salis Martis compos. ℥ij.

D. S.

Sal aperiens.

Dosis omni mane, quantum cuspiscutelli capit.

℞. Aqua fumar.

Genist. an. ℥ij.

Mag. seu Extr. Martis Mys. vel cum succo.

pom. ℥ij. ad ℥ij.

M. D. S.

Potis aperiens coelestem capienda.

Capiat quotidie bis cochl. j. vel ij.

℞. Pulp. passul. per seac. trāj. ℥vj.

Extrac. Mart. cum succo pom. ℥ij.

Rbab. elect. ℥ij. ad ℥ij.

Cum l. q. syr. rosat. sol. vel pomor. f. Elestuarium.

D. S.

Elestuarium aperiens.

Capiatur quotidie mane dosis magnitudine castaneæ.

Martialia hæc aliquandiu continentur, observando tamen interim:

1. Quod post usum horum instituendus sit aliquis motus.

2. Quod sub usu horum alvus semper aperta servanda sit.

Quare consultum est omni septimanâ, ad minimum semel, blanda Laxativa interponere, ut ita, quod curatum est, ab illis evacuetur: e. g. vespertino tempore usurpentur pilulæ suprà de Chylificatione lesa allegata, vel dosis pilularum usualium, v. g. Glassianarum, aut P. F. de ammoniaco & tartareo Quercetani, aut quales describit SYLVIVS in Prax. cap. 7. §. 32. pag. 69. &c. & ita interpolatis vicibus cum istis Martialibus adhibeantur, vel pilulæ in Dissert. de usu & abusu Præcipiant. cap. 3. §. 30.

Item

℞. Galban. cum aceto sol. ℥ij.

Extrac. troch. alband. gr. jx.

Diagryd. gr. ij.

F. Pilulæ pro 3. dosibus. D. S.

Martialibus his ad aliquot septimanas continuatis, fiat progressus ad alterantia volatilia, plus minus aromatica, quæ vulgè vocantur Hepatica, i. e. quæ sunt saporis amaricantis & acris plus minus, & omnia imprægnata sunt sale volatili urinoso, nunc magis nunc minus temperato, tandem Laxantibus mista, ut ita acuetur bilis, alteretur sanguinis dyscrasia, resolvantur cruditates acidæ, & succi vitiosi sensim & per epigræstia simul evacuentur. Aromaticæ illa in genere sunt omnia simplicia amara, & acria, Hepatica aliàs à Veteribus dicta. Ut enim a stomacho sunt amara; ita Amara hepatis grata, quatenus incidunt, & bilem corrigunt. Inter acris illa. Sale volatili plus turgida, eminent cichorium, radix nempe ejus, radix ari, helenij, centaurium minus, carduus benedictus, & maxime Absinthium & agrimonia, cujus Decoctum insigniter laudat POTERIUS; rosmarinus, hyssopus, salvia, mentha, & similia; item omnia antiscorbutica, ut radix armoracis, nasturtium, cochlearia, &c. locum inveniunt in curanda cachexia & Anasarca, quæ laudantur à BACONE de VERULAMIO in Hist. Vita & Morb.; flores genistæ, bellidis, centaurij minoris, hepaticæ nobiliss; quibus porro aromata omnia, quatenus sunt stomachica, & imprægnata sale volatili oleoso, præceteris tamen cinnamomum, galanga, Zedoaria, caryophylli, Zingiber, &c. adduntur. Ex his consci possunt Noduli vino infundendi, nunc solis, nunc Laxantibus iunctis, nunc ante, nunc post Martialia: v. g.

℞. Herb. absinth.

Menth. an. Mj.

Rad. enul. ℥ij.

Gentian. ℥ij.

Rbab. el. ℥vj.

Fol. senn. sine stip. ℥ij.

Rad. helleb. nigr. non præp. 3vj.

Cont. esul. præp. (sic enim præscribuntur) 3ij.

Sal. tartari unc. ℥.

Includantur Nodulo, qui indatur vini Mensuris aliquot.

De Infuso bibateger omni mane haustum, &amp; si placuerit, à meridie.

Vel

℞. Herb. fumar.

Absinth.

Roris mar. an. Mj.

Rad. enul.

Fœnicul. an. 3vj.

Fol. senn. sine stip. unc. j.

Rad. helleb. nigr. crud. 3vj.

Rbab. el. ℥ij.

Sem. c. calid. maj. an. 3ij.

Bacc. junip. unc. ℥.

Cort. aurant.

Cist. an. ℥ij.

Calang.

Zingib. an. ℥ij.

Sal. tartari (quod acuit menstrua pro extendendis Purgantibus) 3ij.

Incis. &amp; contus.

D. S.

Nodulus laxativus in vinum.

℞. Herb. absint. rec. M. ij.

Menth. rec. M. ij.

Roris mar.

Salvia an. Mj.

Rad. armorac. rec. unc. ℥.

Ireos nostrat. rec. unc. ij.

Cort. esulæ præp. 3vj.

Cinnam.

Calang.

Zedoar. an. ℥ij.

Sal. Tartari 3ij.

Incis. &amp; contus. includantur Nodulo pro Vini Mensuris aliquot.

D. S. ut suprà.

℞. Herb. nasturt. rec.

Cochl. rec.

Card. bened.

Absinth. an. M. j.

Fol. senn. sine stip.

Rad. enul.

Armor. rec. an. unc. j.

Helleb. nigr. non præp. 3vj.

Cort. esul. præp. drach. ij.

Bacc. junip. contus. unc. j.

Passul. min. drach. vj.

Sal. tartari drach. ij. vel drach. iij.

Incis. &amp; inclus. Nodulo:

D. S.

Nodulus in vinum.

℞. Herb. menth.

Absinth.

Com. centaur. min. an. M. j.

Rad. enul. unc. ℥.

Fol. senn. sine stip. drach. x

Fol. helleb. nigr. crud. unc. j.

Helleb. nigr. drach. j.

Pulp. colocy. ij.

Zedoar. drach.

Sem. anis. unc. ℥.

Sal. tartari drach. vj.

Incis. &amp; contusa inclua Nodulo.

D. S.

Nodulus in vinum, quo exhausto alvini denud superinfundatur.

Convenit in Cachexia scorbutica jam ad hypochondriam inclinante.

Vel

℞. Herb. absinth. M. ij.

Coclear. rec.

Nasturt. rec. an. Mj.

Rad. armorac. rec. unc. ℥.

Enul. drach. vj.

Cort. esul. præp. drach. iij.

Passul.



Passul. min. ʒij.  
Bacc. juniper. rec. ʒj.  
Sal. tartari ʒij.  
Incl. & contusa incl. Nodulo.  
D. S. ut supra.  
Vcl

R. Herb. rorismar.  
Salvia ana Mʒ.  
Absinth.  
Flor. centaury. min. ana M. j.  
Genistæ vel lupul. p. iij.  
Rhabarb. el. ʒij.  
Cinnam.  
Galang.  
Zingib. ana ʒij.  
Limat. Meris rec. ʒij.  
Includantur Nodulo, vino infundendo,  
pro scopo alterativo.  
D. S. ut supra.

Nam Rhabarbarum non tam propter usum laxandi, quam alterandi, acidum corrigendi, bilem in naturali statu conservandi, urinam movendi, & atoniam hepatis corrigendi, adhibetur; unde etiam nouum anima hepatis quibusdam dicitur. Sanè præmissis præmutendis virginibus, in specie cachecticis, egregium usum observavi tam Rob juniperi solius, quod Theriaca Germanorum dicitur, subinde usurpati, quam ex rob juniperi cum Rhabarb. pulverisato facti Electuarii.

R. Rob. juniper. ʒij.  
Pulv. rha-Barb. el. ʒij.  
Cinnam. el. ʒj.

M. i. Electuarium: S.  
Electuarium aperiens.

De quo omni manè capiat bonum haustum.

Huc etiam pertinent Cerevisia & Vina anticachectica, quorum formulas videb. in Colleg. Pharmac. Schraderiano P. 2, Ludoviciano, & Idea Formular., it. TIMÆO von Guldenklez. in Epist. pag. 428.

Pertinet huc Elixr anticachecticum D. Reinesii. Compositio est Magistralis, quam nemo facile imitabitur; nam 3. Ingredientia interdum plus præstant: propter materiam, tamen Medicam hic apponere lubet:

R. Rad. armorac. ʒiv.  
Helleb. nig. ʒij.  
Gentiana  
Ari ana ʒij.  
Quinque Aperiens. ana ʒvj.  
Juss Flor.  
Asari,  
Epithymi,  
Enula,

Cort. rad. cappar.  
Sem. caribam. ana ʒj.  
Anmeos,  
Ebuli ana ʒij.

Herb. card. bened. Mij.

Cochlear.  
Nasturt. aquat.

Flor. sambuci,

Fol. asari ana M. ij.

Solo.

Beton.

Hyssop.

Rorismar.

Chamaedr.

Chamaep.

Absinth.

Mentb.

Cent. min. ana Mj.

Galang.

Cinnam.

Macis,

Caryoph. ana ʒij.

Santal. alb.

Gran. paradif. ana ʒij.

Piperis albi,

Croci ana ʒij.

Rob juniperi ʒij.

Vini Rhenan. ʒ. xij.

Macerentur in Balneo Mariæ per octiduum, tum exprime & destilla ad siccitatem, cavendo Empyreuma. Aqua

destillata reasfundatur seorsim, & tinctura eliciatur: post calcinentur faeces, & cum aqua pluviali destillata extrahatur sal, quod purificatum tincturae admiscendum.

In officinis præstant species dia-curcumæ, & dia-galangæ: Hinc RONDELETIUS seu expertissimum remedium in omni Cachexia habet has Pilulas:

R. Spec. dia-curc. (est egregium in his affectibus curare.) ʒiv.

Rhab. el. ʒij.

Spec. diarrhod. Abbat.

Dia-galang. ana ʒj.

Cum l. q. syr. de absinth. f. l. a. Pilula, ex ʒj.

No. 30.

Dos. 20. vel 44.

Tandem passule mitè conveniunt in Cachexiis quibusvis, & loco Rob juniperi usurpati possunt, quæ vocantur optimum Hepaticum, id est, quæ egregie conveniunt in temperanda sanguinis dyscrasia, quia sanguinem laudabilem ac temperatum reddunt, bilem optimè in statu naturali conservant, & sanguinis motum fermentativum non nihil restitunt. Sunt enim quasi mustum concentratum. JOEL & RIVERIUS pinguefaciendi vim eis adscribunt. SOLENANDER Conf. ar. Scd. 3. sequens Electuarium parat:

R. Passul. Corinib. ʒij.

Rhabarb. el. (hoc enim solum est insens inter Purgantia) ʒij.

Sacch. ʒiv.

Quæ miscet invicem & servat. Usurpatur interdum ante pastum dosi cochl. j.

„ Incredibile est, inquit SOLENANDER, quantum emolumenti offerant ad sanitatem conservandam, cum abum laxant, ventriculum & primas vias evacuant, & jecori conveniunt, i. e. sanguinis crasso emendant. Loco hujus potest præscribi Electuarium A. genui, aut etiam Electuarium ex passulis HORSTII in Obs. pag. 101, aut quod in Colleg. Pharmacæut. P. 2. Aut præscribi potest Electuarium molle sequens:

R. Pulv. passul. Corinib. ʒvj.

Rha-Barb. el.

Crem. tartari ana ʒij.

Sal. tartari ʒij.

Cinnam. acerr. ʒj.

Cum l. q. syr. de pomis f. Electuarium molle:

D. S.

Electuarium aperiens.

De quo alternatim usurpari potest.

Siquis velit addere Extractum Martis, remedium faciet eo magis conveniens, variando subinde dosin pro circumstantiarum ratione. FINCKIUS in Tract. Chymico Decoctum parat cum tartaro vitriolato.

Sanè, quando in Cachexia bilis acienda, & sanguinis motus fermentativus non nihil restaurandus est, Aromatica talia amara resinosa, & Robi aromatici, optimè conveniunt: Nempe hæc omnia effectum calefactionis post se relinquant. Jam verò intemperies frigida in Cachecticis solet adesse. Decocta Lignorum alibi commendantur.

In fine adibentur omnia salia volatilia, plus minus oleosa, spiritus urinosi volatiles, tam simplices quam compositi, spiritus tartari volatilis, spiritus carminativus, liquor Cornu Cervi succinatus, lumbricorum urinosus, urinæ, salis armoniaci simplex & oleosus, tinctura nephritica Ammelungii, &c. Quibus pro circumstantiarum ratione nunc Febrifuga, nunc antiscorbutica, nunc Emmenagoga, permiscenda, Elixir proprietatis sine acido, imprimis illud rubineum, quod paratur cum spiritu urinæ, vel salis armoniaci, hic enim insigniter convenit; Elixir Præcipitans, Cachecticum polychrestum, vel solitarium, vel cum essentia absinthii, agrimonie, rorismarini, juniperi, tinctura tartari composita, &c. Donec ex affe reconvalescat æger: Hinc

R. Tinctura tartari compos. aut Elixir anticachect.

aut Elix. propr. sine acido ʒj.

Essent. absinth.

Cent. min. ana ʒij.

M. D. S.

Essentia aperiens.

Dosis 40. vel 50. gutt. bis vel ter in die, manè in vehiculo calido, horà quintà pomeridianà, in cerevisia, & sub introitu lecti.



Vel R. calia matutino tempore, à meridie verò recipiatur spiritus salis ammoniaci, vel hujus loco spiritus carminativus de tribus, vel tinctura nephritica, vel liquor cord. cervi succinatus: de quibus à meridie & sub introitu lecti capiantur gutt. 40.

R. Spiritus carminativus de tribus ℥ij.

Solis ammoniaci ℥ss.

M. D. S.

Spiritus resolvens.

Dosis 50. gutt.

Vel horum Loco:

R. Tinctura nephrit. ℥ss.

Liqu. corn. cervi succin. ℥ij.

M. D. S.

Tinctura resolvens & aperiens.

pro dosi sint 50. gutt.

R. Tinctura nephrit. Ammel. ℥ss.

Spir. lumbr. per putr. vel urina per putr. ℥ij.

M. S.

Tinctura urinam pellens.

R. Tinctura nephrit. ℥ij.

Taraxaci ℥j.

M. D. S. ut ant.

Dosis 40. vel 50. gutt.

R. Aqua al' K' Keng.

Petrofel. an. ℥ss.

Malo. juniper. ℥vj.

Tinctura nephrit. ℥ss.

Spir. lumbr. terrestr. ℥ij.

Syr. cinnam. ℥vj.

M. D. S.

Potio nephritica, cochlearim capiunda.

R. Arcan. dupl. Myrs. ℥j.

Salis geniss. ℥ss.

M. D. S.

Sal singulare pro 2. vel 3. dosibus.

Tandem Balsamum sulphuristerebinthinatum vel juniperinum commodè aliquandiu continuandum venit. Item cum Aromaticis istis interdum usurpatis capiatur sub introitu lecti Elæxir menthe, cochlearia, &c. parva dosis, aut hujus loco spiritus baccarum juniperi, menthe, salviae, &c., & horum medio promoveatur digestio prima, acuat bilis, & restaretur denuò sanguis.

Pro meliore illustratione dictorum, observanda venit Ancilla cachectica, aliàs succi plena & formosa, quæ jam ab aliquot mensibus scabie laborans de formis reddebatur, ab alia ancilla per contagium contracta. Scabies erat tumida, pustulata, ingentes, copiosum serum, præsertim in cruribus, fundentes, crura simul insigni tumore edematoso ad genua usque turgebant, manibus etiam tumidioribus existentibus. Conquerabatur simul de sapore dulci nauseoso, insigni siti continua, cerevisiam secundariam bibebat, quia primaria non sapiebat, bene appetebat, probeque comedebat, interdum dulcis & calidus halitus ex abdomine ascendere videbatur, dicebat: ascendere ipsi insister fontis calidi: in abdomine subinde varias agitationes percipiebat, quod exinde nunc parùm tremebat, nunc denuò subsidebat, facies erat pallida & tumida, urina parcius mittebatur, quolibet mane vomitum jejuno stomacho pariebatur, menses inordinatè fluebant, nunc intra 24. dies redibant, nunc ultra mentium tempus deficebant, & bene dormiebat. In hac Cura ad vitium bilis respiciendum erat; & cum ante accessum meum jam purgata esset, ante omnia operam dedi acidum corrigere, viscidum resolvere, & bilem acuire: hinc Amaricantia tribus his scopis satisfacienda credidi, unde beneficio absinthii maximam partem eam restitui: Primò dedi Liquorem Martis solaris ad gutt. 20. quotidie, donec ℥j. assumpta fuisset; omni mane dosim usurpando, quod ægra melius habuit, urina copiosius fluebat, & sapor dulcis evanescebat. Externe ulcusculis scabiosis imponere jussi folia Lapathi acuti recentia contusa, ita illa minus plorabant ferr., nec tumores crescebant, sed pustulæ ad sanitatem properabant. Dein suasi parandum Decoctum ex radice Lapathi, frondibus cynosbati, & herba absinthii, ana cum aqua simpl., quod omni mane calidè bibit, & expectavit sudorem, uti etiam urina fluxit: imò, ut penetrantius esset, quotidie spiritum absinthii urinofum per putrefactionem paratum ad gutt. XXX. In dicto Decocto dedi.

His aliquot septimanis continuatis melius habuit, sed

nondum rectè: unde dedi Vomitorium, ex quo miram saburram cum euphoria rejecit, postea dictum Decoctum continuavit. Cum verò istud nausearet, jussi ex Absinthio cum spiritu vini parare essentiam, de qua mane & vespere cochli. j. assumpsit, simulque instillavit spiritus salis ammoniaci gutt. XXX., & ad aliquot septimanas continuavit; absinthium etiam cum pane butyrato assumpsit, & sic convaleuit.

Si ex officina curari debuisset, digestiva præmissem Martialia, v.g. Solutionem Martis cum succo pom. vel Tincturam vitrioli Mart. & Zvvelseri, vel pulverè cachecticum Hartmanni; Post Vomitorium dedissem vel Purgans Mercuriale; tertio volatilia aromatica amara propter inertiam bilis, ut vinum absinthites, Vinum infusum herbarum amaricantium, vel hepaticarum, item essentiam myrrhæ, lignorum, spiritum carminativum, quotidie à ℥ss. ad ℥j., aliquandiu continuando. Cum his propter scabiem procurassem sudorem.

## ARTICULUS II

DE

## LEUCOPHLEGMATIA

ET

## ANASARCA.

Hæc ipsa similiter conveniunt in Cura Leucophlegmatia & Anasarca, in quibus tamen subinde ad validora, & in specie in purganda Anasarca ad succum iridis nostratis accedendum est, itemque ad Mercurium dulcem, qui in his expurgandis est optimus, si scilicet pilulæ de ammoniaco Quercetani, aut Extracto catholico immiscentur.

Notatu digna est observatio RHODII Cent. 3. Obs. 9. de Femina leucophlegmatica ab iunctione mercurii vivi reconvalescente.

## DIAGNOSIS.

Anasarca signa specialiora quod concernit: In hoc totum corpus molem præternaturalem acquirit, maxime pedes, qui primò intumescere incipiunt; simul totius habitus color pallidus, carnes molles ac flaccidæ extollunt, laborem minimum magna excipit lassitudo, pulsus est parvus, urinae tenues & aquosæ ut plurimum, secus ac in reliquis speciebus hydroptis, quatenus in hoc non tanta feri quantitas extravasatur, imò ad poros partium hoc depositum, aliquantum adhuc, ut ut tardius, circulatur.

## PROGNOSIS.

Anasarca autem, si pectoris atque abdominis hydropti comparetur, minus periculosa est; quia causa hujus continens à vasis sanguineis & lymphaticis, commodius absorberi, ac à sanguine affluente facilius digeri ac dissolvi, vel etiam per excretoria eliminari potest, nisi phthisis aut tympanites superveniat. Imò multò tutior est particularis, & quæ crura tantum occupat, modò ascites ipsi non combinetur, quàm universalis.

Alias verò plus spei est, si Anasarca ascitem, quàm si ascites Anasarcam, superinducat.

## CURA.

Præter Purgantia superius allegata, Sudorifera & Diuretica specialiter laudantur pro habitu totius corporis promptè evacuando, & simul emendando. Sudorifera inter vulgaria eminet Decoctum Lignorum Sudoriferum, radicis Chinæ, Ligni sassafras & guajaci: de quo conf. WILLSIUS Pharm. Rat. Part. 2. pag. 366. & 375. Sic LINDANUS refert, se curasse anasarcam in muliere Decocto Ligni Guajaci, unà cum interposito condito seu Electuario stomachico, & secundam fastam fuisse. Decoctum granorum juniperi diuretica est egregium. Decoctum radicis vincetoxici in vino paratum singulare remedium diureticum, simul



simul & diaphoreticum in anasarca esse, & mira praestare asserunt; non secus ac Decoctum Helenii. Novi exemplum insignis anasarcae mediante *Decocto fructuum cynosbati cum arillis cyatae*. Aliis in usu est, ut accipiant Lignum sassafras, cui addunt lignum juniperi, vel baccas ejus, ut ita fiat remedium & diureticum & sudoriferum: de quo vid. RIVERIUS *Cent. 4. Observ. 82. pag. 49.*, qui rusticum post febrem quartanam confirmatam anasarca laborantem, beneficio vini juniperi per diuresin curavit: Sicut etiam spiritum baccarum juniperi admodum commendat IOEL in *sua Praxi*.

Pro scopo diuretico lixivium ex cineribus absinthii & genista cum vino albo vel aqua appropriata, paratum, est egregium: Nam certe vinum absinthites, aut vinum enulatum, seu Infusiones radicis Helenii, optimè conveniunt pro potu in Cachexia & anasarca. Adde nempe *Amara* post *Martialia* utramque in his affectibus faciunt paginam. Alia, ut essentia lignorum, ligni sassafras, sambuci, vel Essentia rob sambuci, Tinctura coralliorum sassafrata, Malvaticum juniperinum, Elixir febrile Mynsichzii, spiritus theriacalis camphoratus, spiritus tartari volatilis, nota sunt. Semen hyperici ad drachm. j. in vino haustum potens est diureticum. Species dia-cureumae cum Decocto cicero rubrum laudantur imprimis, ubi addit simul vitium mensium suppressorum. Ceterum haec ipsa quoque conveniunt in cachexia virginum curanda, & in specie Martialia. Si verò cachexia sit ex defectu mensium, imitemur FORESTUM *lib. 19. Observ. 34.*, qui *Anasarcam ab obstructione mensium* praemissis universalibus per ea, quae urinas ducunt, & simul menses cient, curavit, ut est asarum ejusque Decoctum, quod mirè prodest, praesertim si cinnamomi aliquid adjungamus, fortiter coquamus, & una herbam *Sabina*, baccas juniperi, & radicem rubiae tinctorum addamus. Praescriptio e.g. potest esse talis:

R. Rad. asari ʒi ss  
Rub. tinctor. ʒi ss ad ʒi  
Herb. sabin. M. j.  
Bacc. junip. rec. ʒvi. ad ʒj.  
Coqu. in f. Aqua simpl. sub finem addendo  
Cinnam. acur. ʒij.  
Cardam. ʒi  
Colatura edulcoretur pro lubitu.

D. S.

Potio aperiens pro aliquot vicibus.

Insuper ipse virum potatorem Leucophlegmatia & anasarca laborantem, cum ipse medicamenta in parva dosi respueret, praescribendo sequens Decoctum per urinam operans, una cum aliis proficuum observavi, restitui:

R. Rad. rec. bryon. ʒj.  
Asari ʒi ss  
Sal. Tart. ʒiij.  
Infund. in f. q. Aqua simpl.  
Stent in loco tepido per noctem: mane adde  
Rad. vinetox. ʒvi. ad ʒj.  
Comar. absinth. M. j.  
Flor. Bellid. M. ss  
Bacc. junip. ʒiij. ad ʒvi.  
Sem. fenic.  
Anis. an. ʒij.  
Incis. & contus. & coquantur simul: Colaturae ʒiv. ad ʒi ss vel ʒiij. adde  
Spir. Sal. ammoniaci,  
Tinctura nephrit. an. ʒij. ad ʒiij.  
Syr. de hyssop. ʒij. vel ʒiij.  
M. S. ut antea.

De hoc assumpsit aeger quotidie, mane, meridie, & sub introitu lecti, bonum haustum, ita uberiori urinae profusio factus est sanus.

D. S.

Potio contra tumorem.

Pertinet huc Pulvis Henrici ab Heer expertus ad Virginum pallidos colores, seu ad Cachexiam virginum cum mensibus suppressis, quem ceu millies expertum commendat in *Observ. oppido rar. Observ. 6.*

R. Rubia ʒi ss  
Sabine,  
Muscord. an. ʒj.  
Croc. ʒi ss  
Lumb. terr. praep. vel loco hujus borrae  
Venet. ʒj.  
Macis,  
Estmull. Oper. Tom. II.

Fol. lauri an. drachm. ss.  
Spec. arom. rosat. ʒj.  
Limat. chalyb. drachm. iij.  
Rad. enulae drachm. j.  
Sacch. duplum omnium.

M. f. Pulvis.

Dosis ʒj. in vino albo.

Lumbricorum Decoctum vel spiritus eorundem per fermentationem seu putrefactionem paratus est expertum Diureticum in Anasarca, imprimis si sit complicata cum Scorbuto, in quo Scorbuto Lumbrici sunt admodum egregii.

Externa, ut Vesicatoria, Escharotica, acuum puncturas, &c. pro anasarcae cura videb. in WILLISII *Pharm. Ration. Part. 2. pag. 269. seq.* Praeterea in Anasarca conveniunt folia bardanae viridia, si leviter contrusa applicentur plantis pedum & juncturis: Nam mirum est, quantum fuliginem extrahant ex toto corpore, cum sensibili egrorum levamine, eamque admodum copiose per poros pedum & surarum eliciunt. Oleum scorpionum inunctum per diuresin anasarca laborantem sanasse, vid. WILLISIUS *l. 2. cap. 5.*

In principio ac declinatione Balnea, tam humida quam vaporosa, conveniunt: Illius generis efficaciora sunt Thermae naturales ac artificiales, sulphure ac sale impraegnatae: Hujus verò vapor aquae mineralis, in sale decoquendae, prope furnos salariorum excipiendus. Spectant huc Laconica, vel sicca cum spiritu Vini accento instituta, quae non tantum poros referant, sed elasticitatem quoque humorum excitando visciditatem horum corrigunt, hinc duplici modo ad sudorem disponunt. Sed Balnea haec vix, nisi in principio ac declinatione locum habent, cum in statu adhibita asthma, apoplexiam, &c. inducere possunt, quatenus corpore nimis calefacto serum ex habitu ad vasa, hincque ad praecordia & cerebrum, cogunt. Quidam corpus Anasarca laborans immergendum suadent in arenam calidam, ut eò promptius absumantur humiditates, quod etiam FERDINANDUS *Hist. 30. pag. 94.* tanquam suum experimentum refert.

## ARTICULUS III

DE

### HYDROPE UNIVERSALI.

Cachexiam modè explicatam frequenter sequitur Hydrops, non secus ac reliquas ejus species, ut Cachexiam Ictericam, hypochondriacam, scorbuticam, & febrilem, tandem insequi solet. Hydrops nomine intelligitur aquarum seu humorum serosorum extravasatio atque praeternaturalis collectio, quam necessarîo tumor & distensio partis, cum ejus tamen mollitie, & non raro fluctuatione, comitantur. A partibus, quas immediatè magis occupat, varias appellationes, i. e. Hydrocephalus, ascites, &c. sortitur; Hydrops enim vox convenienter Latinis aqua intercus redditur. Jam verò hydrops vel totum corpus tumefacit, & dat Hydropem universalem; vel determinatam corporis partem, unde Hydrops Particularis. Ille est vel simpliciter talis, & dicitur Anasarca, & Leucophlegmatia, vel secundum quid talis, & est illa ascitis species, quae successivè post crura tumefacta totum abdomen & thoracem occupat. Hic pro partium varietate, quas affligit, varius est, unde specialia sortitur nomina: sic quando aqua colligitur in capite, dicitur Hydrocephalus: quando in pectore, Hydrops pectoralis: si in pericardio praeternaturaliter abundet lymphæ, est Hydrops pericardii: si in solo abdomine, dicitur Hydrops ascites, ab utre, quia instar utris abdomen repletur & tumefactum est: in utero est Hydrops uteri: in testibus est Hydrocele: In partibus externis, uno alterove membro, Tumores serosi aut aquosi generali nomine appellantur: Imò in omenti bursa copiosae aquae inclusae in insignem tumorem abdomen attollunt, quale exemplum videb. in HORSTII *Observ.* Item in peritonaei duplicatura conclusae aquae hydropis abdominalis speciem praebent; vid. MEEKREUS *Observ. Chirurgic.*

Ex his patet: Hydropem non esse propriè alium morbum, quam ubi est aqua. Hinc Tympanites impropiè est hydrops, cum sit utrumque tantummodò, non verò aquarum, in abdomine collectio sit: Unde saltem propter similitudinem tumoris cum ascite ad hydropes refertur: Eodem modo curatur, ac de Inflatione stomachi supra dictum, in specie spiritu



nitri dulci, & spiritu carminativo de tribus, qui insigniter convenire solent.

Saltem *divisio hydrops in universalem & particularem* notanda venit. *Universalis* est, qui vitio totius corporis oritur, & à pedibus incipiendo tandem abdomen successivè occupat. Frequentissima hydropsis species est ista, quando pedes, scrotum & abdomen insigniter intumescunt & turgescunt: quæ nec propriè *Anasarca* est, cum saltem partes inferiores occupet, utur *WILLISTO* *Anasarca particularis*, minus tamen appositè, dicatur; Neque tamen est *Ascites* propriè dictus, quia præter particularem abdominis tumorem & universa crura subindè immensum tument. Reverà igitur frequentissimus hic Hydrops est quasi *Anasarca* partium inferiorum, cum origine, fiendi modo, ac medicationis ratione inter se convenient; accidentaliter verò differant: de quo *infra*. *Particularis* est, qui vitio determinatæ partis fit, & primò abdomen, dehinc scrotum, tandem pedes occupat, de quo particulari *infra* pluribus.

Hydrops universalis ut plurimum Cachexiam confirmatam inlequitur, ita tamen, ut nunc sit *genuinus*, ubi simpliciter serum peccat; nunc *nostus*, ubi simul cum sero materia plus minus viscida est, adeoque ascitem cum *Anasarca* constituit.

### C A U S Æ.

*Causa hydrops* non est hepar frigidum ob hæmatoseos defectum; quæ Veterum fuit sententia, cum à Modernis hepar dejectum sit ab imperio sanguificationis, ipsique publicè ductæ exequiæ. Deindè adversantur huic sententiæ omnes, qui per experientiam Anatomicam observant, sæpius hepatis infons in Hydropicis, in specie asciticis, fuisse reperiunt; de quo vid. præter *HELMONTIUM Tract. Ignotus Hydrops* §. 10. *SENNERTUS lib. 3. Præcos*, ubi de *ascite*, qui jam suo tempore assertum hoc rejecit: Unde in principio hujus seculi *SYLVIUS LANCEANUS, Medicus Romanus*, peculiarem edit libellum, cujus Titulus: *Hydropem non semper à lecore fieri; excusum Romæ Ann. 1603*. Licet negari nequeat, bilis defectum simul concurrere. Non nego equidem, hepatis & lienis scirrhus fuisse subindè inventos in Hydrope demortuis, sed hoc habent commune cum aliis visceribus. Viscerum enim quorumvis varia & multiplex observata in Hydropicis constitutio præternaturalis, ita ut hæcenus nil certi de parte solida, primariò in Hydrope affecta, colligi queat. Imò fieri potest, ut sine vitio alicujus visceris Hydrops nascatur, quando ab errore externo, aut potu frigido confertum ingello, aqua in abdomine colligitur: Atque adeò non solius hepatis, sed & aliorum viscerum culpa, imò interdum visceribus penitus illæsis, Hydropem generari constat. Ut taceam obscuram esse generationem & fiendi rationem Hydropsis, si ex hepate oriri supponatur.

Propius ergò ad *Causas remotas universales* accedamus. Est ergò Hydrops non levis ac supra memorata Cachexia, nunc *Morbus primarius*, qui per se ex vitio rerum naturalium aut non-naturalium successivè nascitur; nunc *secundarius*, qui ex vitio quodam morbozo præternaturaliter præcedente originem ducit. Nempe oritur Hydrops frequentissimè

I. *Ex febribus intermittentibus chronicis*, quibusvis *male tractatis*, speciatim ex quartana diuturna: præsertim quando ægri in paroxysmo nimis bibunt, frequenter Hydrops oritur. Adeò, ut frequentissimus diuturnarum, & malè tractatarum Quartanarum, pedissequa sit Hydrops, pro qua præservanda diebus intermissionis *amara* ex vegetabilibus febrisfrugis, præsertim *absinthio*, ledulò usurpanda sunt, pro conservanda bilis & sanguinis crassi, debitoque viscerum tono: vid. *M. A. N. C. Ann. 3. Observ. 322*.

II. *Ex Asthmate* (præsertim *orthopnoia*) non solum humoroso, sed etiam convulsivo, cui, si diutius durer, ordinariò hic Hydrops supervenit: item ex aliis pectoris pathematibus hydrops observatur; siquidem aliquando empyema, phthisin & sanguinis spurum hydropem hunc insecutum observatum fuit.

III. *Ex renum vitio* frequentissimus est Hydrops. Vix credo, an possit ascites universalis supervenire sine renum præternaturali defectu, quin ex solis his affectus Hydropem, licet particularem, oriri, præter ea, quæ *HELMONTIUS Tract. Ignotus Hydrops* §. 16. & 20. habet, *PLATERIUS* confirmat in *Observationibus*, ubi ex renibus exulceratis hydropem oritum allegat. Hinc renem, ceu adæ-

quatum artificem omnis hydropsis, asserit *HELMONTIUS l. a.*, vel ex eo imprimis, quod totus hydrops per urinæ fluxum solvatur, *l. c. §. 3*. Totum enim fundamentum, propter quod supervenit Cachexiæ hydrops, consistit patim in renibus, patim in defectu virium vitalium, humores non amplius regere valentium. Semper tenes in hydrope simul sunt affecti, ita ut hydrops frequens renum virium serum vehat. Sanè ex renibus obstructis & debilitatis, aut ab illidem ulceratis, crebrior hydrops observatus; sicut pariter nephritica pathemata, & renes exulcerati frequenter hunc affectum inferunt. Notorium enim est, quod in omni hydrope, tam imminente quàm incipiente, urina pauca, parca, nec respondens potui assumpto, excernatur: quod observent tanquam prognosticon Potatores, qui, neque mingentes neque sudantes multum, certi sint, se evasuros hydropicos. Ut adèd concludendum sit, in hydrope fermentum renum alterans secundum naturam serum sanguinis, vel deficere, vel impediri: & optimam Curam esse, quæ sit per Diuretica & lotium provocantia. Confirmatur hoc ex eo, quod serum, licet materialiter idem sit cum urina, si in abdomine coacervatum extravasetur, neque saporem, neque odorem, neque colorem, neque alias urinæ proprietates obtineat: quod ipsum innuit renum officium deficere, vel panè cessare in hydrope, nec eos transmittere serum. Mictus quoque sanguinis diuturnus hydropem infert, teste *SCHENCKIO in Observat.*

IV. *Ex vitio visceris cujusdam nobilioris*, aut usus necessarii in abdomine, hepate, liene, mesenterii glandulis affectis, utero, &c. frequens hydrops observatus. *RONDELETIUS in Praxi l. 3. cap. 35. de scirrho hepatis* inquit: se ex frequenti corporum dissectione observasse omnes hydropicos vel scirrhus, vel glandulas mesenterii induratas, habere, aut pancreas similiter constitutum. Item ex ulcere mesenterii observatus fuit hydrops, quod confirmat *RONDELETIUS l. a. cap. 36*. Sic ex ulcere mesenterii quinquies hydropem observavit *TULPIUS lib. 2. Observat. 32*. uricem *HOECHSTEDTERUS Dec. 6. Conf. 6*. Si lienem malè affectum, in specie scirrholo factum, hydrops necessariò inlequitur: par est ratio de hepate scirrholo hydropem inferente: & ex vulnere hepatis, sclopeto inflicto, suppurato hydropem natum, videb. in *M. A. N. C. Ann. 6. & 7. Obs. 106. pag. 145*.

V. *Ex liero, & aliis quibusvis Cachexiæ speciebus confirmatis*, tandem nascitur hydrops: in specie scorbutum hydrops sui generis inlequi solet, de quo vid. optimè differentiam *EUGALENUM Tr. de Scorbuto*.

VI. *Ascites à sanguine, vel præternaturaliter excreto vel retento*, frequenter admodum oritur: Sic suppressæ hæmorrhoides aquæ intercutis metum injiciunt: sic propter menstrua consuetæ suppressa hydrops non raro supervenit; e. g. post quamvis hæmorrhagiam, aut nimiam, aut crebrius repentem, semper Cachexiæ & hydropsis metus imminet: sic post vomitum sanguinis, post immodicum sanguinis sputum, hydropem insecutum, &c. observatum fuit: Vid. *RIVERIUS in Observ. Communicatis*.

VII. *Imò ex aliis nimis excretionibus*, præsertim per alvum, tam artificialibus (sic enim Leucophlegmatiam & ascitem à variis Catharticis malè adhibitis, crebrioribus aut fortioribus, notat *POTERIUS Cent. 2. cap. 29*.) & non-naturalibus, quam præternaturalibus: sic ex alvi profusio diuturno observat *FERDINANDUS Hydropem, Hist. 98*: item hydropem gravem succedentem pyralismo diuturno & pertinaci observavit *THONERUS in Observ.* Idem de Dysenteria, ac similibus excretionibus observatum, nec non de veneris abusu.

VIII. *Crebrior & copiosior, aut intempestiva potus*, præsertim frigidi, post nimium æstum, aut corporis exercitium, aut æstum febrilem, *ingurgitatio* subitaneum interdum hydropem ascitem infert: qualium exemplum, præter *PISONEM Tract. de Colluvie serosa*, etiam refert *SENNERTUS l. 3. cap. de ascite pag. 71*. Sic intemperantia ebriosa ad hydropem disponit: Ex haustu copioso frigide post nimium æstum hydrops post tertiana genitus in *M. A. N. C. Ann. 6. Obs. 85. p. 52*. Potus nocturnus in specie ad hydropem disponit. Vid. *BARTHOLOMIÆ Med. Hassniensis Volum. 2. pag. 260. & 262*. In paroxysmo febrili, qui copiosius potant, præsertim frigida, facillimè hydropem incurrunt. Item ex copioso frigide potu in æstate hepatis scirrhus & hydrops vid. in *FONSECA lib. 2. Conf. 39*. item *RIVERIO Cent. 2. Obser. 65*. Alius frigidam quotidie ante prandium bibens hydropicus factus, Authore *PA.*



PANAROLLO *Pent. 3. Observ. 42.* idem confirmat HENRICUS ab HEER. *Observ.* annötans quendam ex assidua ebrietate ictero & hydropo laborasse: acidulas indispositis hydropem accelerare posse, vid. in M. A. N. C. *Obfer.* 180. *Ann. 3.* Quod facit spiritus Vini nimius abusus, & similium potuum aromaticorum aut generosiorum ingurgitatio nimia, colliquationem nimirum inducendo, & lymphæ acrimoniam augendo. Spectant huc etiam fructuum pituitosorum nimii, v. g. lactucæ, endiviz, &c.

IX. Juxta has causas magis particulares observandum: *sensibilis urina excretionis, & sensibilis transpirationis defectum*, ut plurimum, si non semper, adesse in hydropicis.

*Urinæ* quod attinet: sanè hæc non uniuersimodè excernitur in Hydropicis, quando ut plurimum crassa, intense tincta, & perquam lixivialis, pauca tamen excernitur, quæ in aliis è contrà, utut rarius, pallida, tenuis, cruda & pauca, prodire solet. Sanè in omnibus parcius & longè minor copia, quàm assumptorum potulentorum færatio, excernitur, quæ in aliis è contrà, utut rarius. Et serè primam occasionem suggerunt Hydropi renes; imò frequenter ex solis renibus affectis, atque locum non emittentibus hydrops supervenit. Hinc etiam est, quod optima & tutissima hydropicos cura in urinz provocatione consistat, quæ denuò copiosius fluente subito evadunt. Hinc est, quod id serum, quod aliàs sub forma urinz emittendum erat, in abdomine verò coacervatum & exhaustum arte, nullas tamen proprietates urinz, nec odore, nec sapore, nec colore exhibeat, cessante nempe renum functione. SCHENCKIUS in clive Altenburgensi decollato & publicè dissecto renalem adipem maxima ex parte aqueam, defluere vidit, indeque hydropis initia visceribus & testibus inducè observavit; & BARTHOLINUS omentum in Hydropicis computruisse vidit.

Quoad *insensibilem transpirationem*, hujus penuria colligitur ex eo, quod licet multum seri colligant Hydropici, nihilominus tamen difficulter sudant: ideoque & citra madorem illorum corpus est, nec in balneis facillè sudore madescunt; quod ipsum cum aliis Cachecticis commune habent, quod omnes difficulter ad sudorem cogi possunt. Hinc si sudor Hydropicis supervenerit, adèd, ut æger alleviari se senserit, bonum. Forfan observationem hic mereatur, quod SMETIUS *Miscellan. lib. 8.* asserit, illos præcipuè difficulter sudare, quibus jecur & lien ætate morbovè inaruerit, vel obstructione magnè aut scirrho obdurerit.

Præmissis hæc, *Symptomata* necesse erit considerare, quæ præsentia sui hydropem vel præsentem vel plus minus imminuentem, designant. Incipiunt serè pedes in inferioribus locis circa talos intumescere, tumore quidem œdematoso plus minus seroso, impressi digiti vestigia aliquandiu retinente; qui noctu quidem imminuitur, ita ut matutino tempore multò exilior videatur; interdum augetur, adèdque vespertino tempore major longè apparet. Idem tumor paulatim ascendens transit ad ventrem, quem successivè occupat: ut plurimum in serotum sibi parat viam, & tunc simul quandoque intumescunt testes, præputium & colus, qui quandoque penitus occulatur, quandoque quadruplo major & translucidus fit. Dum æger de latere in latus convertitur, murmur & fluctuationem aquæ quasi sentit, quinimò moto corpore aqua ita movetur, ut impetus ejus conspici possit, ut habet CELSUS. *Intumescit* autem abdomen plerumque sensim & vix animadvertentibus ægris, & interdum quasi subito & brevi temporis intervallo. Præterea nunc unum tantum latus tumor occupat, nunc utrumque, ita ut venter quandoque in duas partes divisus videatur, nunc verò aliquantulum distenditur venter ab hypochondriis ad pubem usque; erecto autem corpore sensus ponderis procumbentis in regione inguinum percipitur. Plerumque quidem venter etiam post mortem tumidus manet, raro verò detumescit; quod tamen observavit BALLONIUS *l. 2. Epid. Eph. pag. 270.* in duabus mulieribus, quarum utraque cum hydropica foret, postquam extinctæ essent, ita resedit venter, ac si nunquam intumuisse. Dum sic inferiores corporis partes accrescunt, superiores decrescunt & emaciuntur, præcipuè jugulum, cervix & pectus, quibusdam tamen & facies, præsertim matutino tempore à somno, intumescunt, interdum & ad extremum manus instantur, colore in facie ut plurimum subpallido plus minus ac livido. Multi pruritu admodum molesto vexantur; quidam enim scabie sicca laborant. Abscessus quoque & macula in cruribus quibusdam erumpunt, sæpius tamen lethales. Plerumque febris comitari solet Hydropicos, estque continua lenta, cit-

Estmüller. Oper. Tom. II.

ca vesperam manifestior. Pulsus est parvus, crebrior, subdurus, cum quadam tensione. *Sitis* imprimis ægros muciè vexat, quæ indulgendo crecit, & quo plus jure pota, plus sitiuntur aqua: simul etiam cibi fastidium adest insigne: quod si, quod rarissimum tamen est, sitiant parum, è contrà commodè plus minus appetant, melius omnino signum putandum est. Hinc magnam angustiam circa præcordia sentiunt & spirandi difficultatem, maximè cum loca alta scandunt vel decumbunt, estque unum ex præcipuis, de quo conqueruntur ægri, quæ etiam nondum apparente tumore incipit, hydropemque prælagit, eoque emergente incrementum sumit, adèd, ut sæpius à media nocte orthopnoæciorum more erecti spiritum ducere cogantur: hinc dyspnoæam nocturnam prænunciam hydropis acieis esse asserit PLATERUS in *Observat.* & tunc plerumque etiam tussis sicca, seu manis ad tussendum irritatio, eaque mali omnis, accedere solet. Conf. M. A. N. C. *Ann. 8. Obf. 27.* Alvus nunc clausa est, nunc quibusdam, idque non absque vomitu, subito liberior esse solet. Quandoque & Epilepsia accessit supervenit, & grave periculum plerumque minatur: interdum eadem in apoplexiam lethalem convertitur: Refert enim BALLONIUS *lib. 1. Epid. Eph. pagin. 27.* piscatorem quendam hydropo laborantem epilepticum factum, sæpius convulsam, abscessu circa testiculos & femora facto liberatum fuisse ab hydropo & epilepsia.

Observandum autem, ne obesi nimis habeantur interdum pro Hydropicis, de quo vid. HOECHSTEDTERUS *Decad. 10. pagin. 418.* Probè quoque observandum est, ne confundantur Hydropicæ & Gravidæ. *Discernuntur* autem invicem

1. Ex colore faciei vivido, & bono habitu.
2. Ex tumoris specie. In gravidis tumor abdominis ad præcordia sursum vergit, estque inæqualis: In Hydropicis autem inferior pars abdominis intumescit, materiz detumescunt, & tumor undique æqualis, & quasi œdematosus; ut nudiçam de motu scetus.
3. Certum signum est fluctuatio, nempe ad tactum sentiunt fluctuationem in hydropo.
4. Vivacitas & vigor oculorum significat gestationem: sed ubi Hydrops est, perit oculorum nitor, sunt lividi, &c.
5. Urina in gravidis non sunt ita constitutz, ut supra de Hydropo dictum.
6. Hydrops valdè membrum gravat, in gestatione non item.
7. Quò se vertant Hydropici, eò labitur aqua; id quod non fit in gestatione.
8. Sitis in hydropo juncta est, in gestatione non.
9. Denique sub hydropemenses sæpe fluunt, in gestatione non, &c.

Potrà aquæ istæ serosæ non semper unius generis observantur: Plerumque aqua est pallida & citrina, & urinam ferè refert, vocant Germ. *Aquam helvam*. Interdum lutea, interdum viridis, interdum flava in nigrum vergens, interdum loturæ carniū similes, observatz fuerunt aquæ. Exempli allegata videb. in SENNERTO *lib. 3. Præf. ubi de Ascite pagin. 717.* Easdem exemptas, & leni igne tractatas, in gelatinam albam abire observavit BOYLE in *Philos. Experim. p. 82.* ut & WILLISIUS *Pharm. Rat. Part. 2. pag. 156.* In Gelatinam viridem abuisse observavit SIMSON in *Hydrof. pag. 370.*

Acris quoque est humor ille, salsus serè, aut acido-salsus, qui alti aquæ permixtus spumam instar saponis excitat. Ita refert GABELCHOVERUS civem quendam Augustanum hydropicum alterius consilio dolio (*sabintellige aqua repleto*) insidentem, aquæ salz se immerisise quotidie, & post 15. Lotionis diem ruptum esse umbilicum, & aquam omnem, quæ in ventre continebatur, effusam in aquam Balnei, hanc verò inde spumofam totam redditam fuisse, ut speciem aquæ multo sapone agitatæ refert. Unde etiam acrimoniz illius ratione subindè interanea erodit & exulcerat. Sicut & tubiudè ulcera in externis partibus, præsertim cruribus, exeat, difficulter curabilia; Unde & quod per alvum excernitur, non sine morfu intestinorum, præsertim recti, evenit. *Speciatim* accescenz cujusdam participem illam aquam esse collectam, non immerito suspicatur WILLISIUS *Pharm. Rational. Part. 2. pagin. 164.* Et confirmatur ulterius ex eo, quod sudor Hydropici acidus lac coagulans observatus fuerit: vid. BARTHOLINI *Acta Med. Hassniens. Volum. 4. p. 175.* &c.



quod internè pariter, quàm in specie externè ducitientia tumoricata, ad alcalium naturam accedant; ver. gr. *Aqua calceis viva*, *Limaces ac cochlea*, *lixivia fercorum animalium*, &c.

Sanè ex acrimonia hac, præsertim occultè acida, duo explicanda veniunt *phenomena* ab Autoribus minùs animadvertita. I. *Quod intumescencia illa crurum, scroti, & abdominis sit quidem à contento liquore, sed tamen fortis ista tensio & juncta quasi inflatio non ab eo, qua tali, simpliciter proficisci videatur, sed arbitror potius vim fermentativam habere hunc ipsum liquorem, sive ipse in se fermentet, sive cum contentis cæteris liquoribus, speciatim nutritio succo ad partes illas distributo, motum turgescentiæ, proximum fermentationi, concipiat.*

II. *Dum acre istud contentum acido-salvum undique à partibus membranosis, v. g. cute, peritonæo, &c. concluditur, vix fieri poterit, quin ab eodem vellicentur & irritentur plus minus fibrae illarum partium, qua occasione illæ tendi, & quasi spasmus affectæ obrigescere plus minus incipiunt, quo ipso ocludi poros, & angustari quovis cæteros meatus contingit, adeò, ut non tantùm insensibilis transpiratio, & sensibilis transsudatio eò magis impediatur, sed & tensio hoc modo fibris, & membranis renalibus, etiam uberius urinæ excretio eò magis sistatur. Ad spasmodicam hanc affectionem declarandam faciunt, quæ habet HELMONTIUS pagin. 411. 412. 413. Aliàs sanè non video, quare tam parum transpirant aut sudant hydropici, aut saltem guttarum formâ non copiosius aliquid transmittant per cutem, nisi hæc prius in pustulas erosa fuerit, aut alio modo fibris læsis transitus aquis patet. Adhuc angustia ista præcordiorum in hydropicis, & impedimenta illa respiratoria, quæ non solum circa pectus, sed ferè maximam partem circa hypochondria sentiunt, quasi cingulo ibidem constringerentur, non à sola videtur esse repletionè abdominis, ex eo, quod gravidæ foemellæ gestantes, ut ut ventre maxime tumido, de simili non conquerantur pathemate, quin omnia & tactui cedentia in iisdem ibidem deprehenduntur, cum hydropici tendi circa ista loca, & constringi ita soleant, ut ne digitus quidem infra costas nothas possit adigi.*

His ita præmissis, ad causam proximam Collectionis nempe & extravasationis illorum humorum est dilabendum, in ascite nempe, quæ ad anasarcam proximè accedit, sive in anasarca sic dicta particulari WILLISII, in qua pedes, scrotum & abdomen ad pectus usque & diaphragma intumescunt, & ab ascite propriè sic dicto, seu particulari abdominis hydropice, multùm differit (quæ differentia in historiarum & observationum monumentis probè attenditur.) Presuppono autem hic: humorem istum esse maximam partem serum; & quidem vel naturale, tam alimentitium quàm excrementitium; vel præternaturale. Naturale enim pro contentorum seu mistorum ratione nunc chylolum, nunc pituitosum, nunc cruentum, nunc alio modo affectum, v. g. in lètero & scorbuto, deprehenditur.

Serum laudabile omnium frequentissimè peccat, & post hoc præter-naturale; quatenus utrumque (in ascite particulari) vel per disrupta vasa lymphatica & lactea excernitur, vel sanguinis per venas ac seri per vasa lymphatica motu retrogrado impedito, per substantiam parium idem exsudat.

Vasorum lymphaticorum ac lacteorum ruptura præter lésiones externas dependet vel à lymphæ acrimonia erodente, aut crassitie distendente ac rumpente, vel ab illis, quæ vasis dictis circumstant aut adjacent, ver. gr. glandularum mesenterii intumescencia præter-naturali, atque harum ulceribus: (vid. TULPIUS lib. 2. Observ. 32.) & in femina quadam ante triennium in femore per puncturam vulnerato suspicor, quæ consolidato ulcere, totius pedis tumorum œdematosum patiebatur, forsàn à cicatrice, notabile ali-quod vas lymphaticum ita comprimente, ut à stagnante lymphâ illud disruptum fuerit: quod etiam spectat calus in abdomen, aut ex motu corporis nimio alcires, qualis PLATERUS Prax. Tom. 3. pag. 242. & BARTHOLINUS Cen. 2. Observ. 74. meminerunt.

Seri autem transcolationem per partium substantiam auctam facit)

1. Ejus abundantia, hinc ex suppressa urina potu copiosiore hydropem fieri, & potus abstinentiâ sanari, testatur experientia.
2. Seri fluiditas & aquositas nimia, qualem Mercurii vivi inunctione produci posse BONETTUS Anat. Pract. lib. 3. Sect. 20. cap. 18. perhibet.

3. Ejus motus retrogradus impeditus: vid. LOWE-RUS de Cord. pag. 138.

Huc spectat viscerum substantia lacerata & erosa.

Coacervatur hac in corpore ad hydropem disposito ob deficientem insensibilem transpirationem, & imminutam urinæ excretionem. Generatur autem primitus (adèque hujus hydropis causa proxima erit) ex insigni & notabili vitio in hæmatosi contingente, ac plus minus deficiente, ratione cujus assumpta in chylum mutata cum juncto vehiculo seroso assimilari debuit maximam partem nequeunt, quin hic ipse successivè in sanguine, continuato hujus circulo, alteratus magis magisque attenuatus & resolutus, tandem certis in locis decumbit, & extra vasa cum vehiculo seroso subsistens tumorem talem infert: quod pluribus explicatum videb. in WILLISII Pharm. Rat. Part. 2. Sect. 2. cap. 3. Hinc hæmorrhagias nimias hydrops frequentius excipit. Errorem quoque externum, v. g. insuetum partium refrigerium, huic morbo occasionem præbere, docet SCHENCKIUS Obser. lib. 3. p. 434. Seri autem & sanguinis crassie vitatur ab errore externo, primam digestionem lædente, quod docet, præter appetitus prostrationem præcedentem, frigidæ potus immoderatus, præprimis autem ex febre exsultante corpore assumptus, item spiritus vini abusus, tonum ventriculi destruens. Unde remota causa omnes erunt eadem, quæ cachexiæ, cum, ut supra monitum, hæc frequentissime in universalem, nunc particularem cum ascite junctam, degeneret. Unde dum per se incipit hic hydrops, ferè vitium lætæ in primis viis digestionis subesse solet. Dum autem alios morbos insequitur, pro horum læsione, corporis ejusque partium solidarum, & sanguinis alteratione multiplici, eam multipliciter ad hydropem disponunt: de quibus remotioribus causis superius pluribus actum. Unde pro causarum harum remotarum diversitate subinde tanta diversitas humorum in toto corpore hydropicorum nata fuit. Extravasatur verò idem serum multiforme, non ex vitio vasorum lacteorum & lymphaticorum, nisi saltem per accidens & secundariò; sed revera ex vasis arteriosis in hydropice universali oriri, omninò probabilissimum est. Nempe pro hujus notitia tria hic supponenda erunt:

1. Sanguinis texturam & mixtionem in hydropicis ita esse alteratam, ut minùs exactè cum coacervata uberius colluvie serosa plus minus chylola miscibilis sit, adèque serositates istas facilius separari, & hinc indè extra se quasi diffuere permittere; cum aliàs serum à sanguine facilius separabile existat, ut in sanguine venâ sectâ emissio manifestum evadit.
2. Contentos corporis humores, in specie sanguinem & serum, naturaliter non moveri proprio impetu, quia aliàs omnis motus fieret ad inferiora, nullus verò ad superiora; sed more mechanico à cordis impetu per vasa pelli, adeoque se purè passivè habere, ac superius & inferius nescire: simul verò ac vis ista vitalis seu animalis movens in corde plus minus debilitatur, proprio impetu gravitatis ac ponderis eisdem ferri, ideoque deorsum ruere.
3. Firme stare talo experimenta ista LOWERI de corde cap. 2. pag. 123. 124. 125. seq., quod ligatâ venæ cavæ propagine canis infra cor, brevi post tanquam alente artificiali laborare, ut animalis abdomen aquâ repletur: & ligatis jugularibus tumor aquosus Hydrocephali supervenit: utrumque saltem ex impedito sanguinis ex arteriis in venas circulo; sicut & eadem allegat WILLISIIUS in Pharm. Rat. Volum. 2. pag. 199.

Adeoque ex impedito plus minus sanguinis arteriosi in venas transitu separationem & extravasationem seri facillimè contingere. Qua ratione etiam videntur oriri hydropes subitanei à causa externa sine prægresso interno vitio, ver. gr. dum Hydropem acitem subitaneum ex gestatione oneris graavioris notat BARTHOLINUS Centur. 2. Hist. 74. vel dum è compressione circa os stomachi hydropem notat BORELLUS Centur. 2. observ. 24. Quod si ergò contingat, ut successivè ex cachexia deficient vires vitales motrices, sit, ut cessantis impellentis regimine dicti succi proprio impetu moveantur, & agentis vicem sustineant. Hoc inculcat HELMONTIUS Tract. de Terra, licet hujus sententiæ vestigia appareant in SANCTORII Comment. ad Fen. Aviscynæ. Et certè, quamdiu vires valent sanguinem movere & alios humores, neque Leucophlegmatia, neque anasarca apparebit: quæ inflaciones interdum appa-



apparentes nocturno tempore iterum evanescent.

*Hic ita premiffis, dicendum videtur:* In iis ægris, quibus quocunque ex vizio *hydrops* superuenit, v.g. in *cachecticis confirmatis*, ex virium aliquali defectu, & massæ sanguineæ ferofioris laboriosiori & difficiliore circulo, hanc ipsam proprio impetu acimole magis deorsum ferri, ac hinc difficilius ascendere, indeque impulsam in arterias factam in venis haud leviter imminui, ut difficilius ex illis in has, ob id pleniores, respectivè fiat transitus, sub quo transitu juxta osculorum extremitates sanguis quidem ceu spissior, & qui impetum moventem à corde impressum & per arterias continuatum facilius, quam fluidius serum suscipit ac retinet, in venulas tandem ex arteriis intruditur; ipsum verò fluidius serum, qua data porta suoque impetu fertur, à sanguine secedit, & ad inferiora, præsertimque circa loca, ubi notabilis languescit à corde impressus impetus, congeritur, donec pedetentim magis magisque coacervatus superiora versus tandem vergat. *Hinc enim magis vesperti quam mane*, magis stantibus aut sedentibus quam jacentibus, tumor incrementum solet: ad quod ipsum & suprà insinuata fibrarum stricture non parum facere poterit. Hinc ratio reddi potest, unde fiat, quod morbis chronicis ægri convalescentes tumores pedum pariantur, qui tamen iterum evanescent: item, quare infirmi stantes tumores pedum incurrant: item qua ratione subinde post dyspnœiam & asthma superveniant tumores pedum œdematosi: qui hæcticis & phthificis infestis, eosdem ad mortem deducunt. Vivit hic aurifaber, qui ex Quartana contumaci per annum male tractata, anasarca partium inferiorum cum incipiente ascite laborat, ex qua ipsa suo quoque tempore morietur: Hic quoties quavis ex causa, in specie itacundia vel *erysipelate*, vel *pleuritide notha*, quod sæpius evenit, corripitur, (idque semper cum motu febrili, gravissimo rigore, intensissimo aliquot dierum æstu, & hinc sudore uberrimo superveniente accidit,) toties inextinguibile huius affectus die omnis tumor *hydropicus* evanescit, pedibus, flaccidis & extenuatis apparentibus; dum verò febrilis impetus post aliquot dies remittit, pedetentim etiam decumbenti adhuc *crurum & feroti, tumor* redit. Nempe febrili sub impetu cum alteratione sanguinis in specie rapidior ejus circulus & validior impulsus, quo retruduntur in vasa evacuata serositates, considerandus venit.

Idem extravasandi modus obtinet in *anasarca universali*, hac saltem cum differentia, quod in anasarca virium contenta corporis moventium robur adhuc validum sit, quod æqualiter sursum deorsum eadem qualitercunque constituta moveret; In *anasarca autem particulari* partium inferiorum cum ascite complicata debilius, adeoque regendis eisdem corporis contentis minus sufficiens, hæc ex parte sui motu spontaneo ferri permittit, quæ ob id deorsum magis ruunt, cum aliis undique æqualiter distribuenda forent. Sed dum sub transvaluatione ista ex capillaribus arteriis in venosam, ob pororum & meatuum angustiam, per quos transactio fieri solet, difficilius suo modo, adeoque tardius fiat sanguinis motus, hinc serum facile à reliqua sanguinis massa recedere, partium vicinarum poros subire, & ita undique plus minus stagnando, *anasarcam universalem* inferre potest. Porro & chylo seu pituitoso isto feri contento quædam venulæ capillares, ut & vasa lymphatica obstrui aut angustari plus minus poterunt: qua occasione & difficilius sanguinis circulus, & facilius copiosiorque feri secessus fieri potest.

Summatim *hydrops* fit ex *cachochymia*, quando hæc ex defectu chyloteos, tamque vizio fermenti ventriculi, quam perfectionis à bile fiendæ, inducitur; unde ulterius morbo ingravescente vires deficient, quibus deficientibus non sunt pares regendis humoribus: Adeoque hi, quò remotior circulus à corde est, eò procliviores pondere suo inferiora petunt.

Atque hæc quoad *Theoriam* hydropis ordinariam sufficiunt. Nam observatur quoque præterea *hydrops* magis *extraordinarius*, à *colliquatione natus*, dum non tam coacervari, quam ex contentis aliis humoribus per colliquationem generari serum hydropicum observatum. Docet experientia in febribus acutis & hæcticis, ut aliis excretionibus colliquativæ sunt familiares, ita etiam his subito aqua abdomen intumescere, ita ut præter chylum & sanguinem ipsa etiam pinguedo colliquata in serum abire videatur, ut hoc ipsum in diabeticis quoque fieri solet. Hinc in hydropicis subinde observatur, aquam feri evacuatam arte per paracentesin hodie æqualiter demum abdomen reple-

*Eismull. Oper. Tom. II.*

visse, de quo vid. HELMONTIUS *Tract. Ignorans h. drops* §. 14. Sed in hoc hydropice colliquationis primaria ratio est habenda, utpote ejus effectus ceu productum saltem est ista hydropica intumescencia.

## DIAGNOSIS.

Ratione *Diagnoseos* in paucis saltem partibus *hydrops* adeò manifestus est, ut in tempore appareat: Describitur equidem vulgò *hydrops* per Tumorem; sed ille

1. Interdum tales partes occupat, quæ non facile distendi possunt, v.g. cranium, thoracem, & quæ, utut distendantur, tumorem tamen nobis palpare, aut oculis cernere non concedunt, v.g. pulmones, uterus, &c. Nec

2. Partes sensibus magis obvias & extensiles, abdomen v.g., *hydrops* non semper attollit, nisi ingravescente demum malo. Tumor quidem si adest cum alius signis, præsentiam hydropis augurari suadet; absens verò non statim eam negat. Nihilominus *hydrops* in genere dignoscitur, si in subiectis, in quibus nulla de renum aut vesicæ vitio est suspicio, urina pauca admodum, i. e. potulentis assumtis non proportionata, simulque saturatius tincta reddatur, ideò quod parum admodum feri ad organa hæc abiecerit.

3. Si sanguinis excretiones naturales diutius supprimantur,

4. Si hæmorrhagiæ præternaturales moderate contumant; Ac

5. Tumor alicujus visceris observetur: vid. PISO de *Morbis Serosis* Sect. 4. cap. 3.

Sed præsentem magis manifestant

1. Tumor pedum œdematosus, nisi morbus aut difficilius, aut diuturnior, vel error in dicta præcesserit, licet notu evanescat: cujus rationem vid. in SYLVIO *Tract. de Hydropice* §. 31.

2. Si color faciei hæctenus vividus absque causa evidente in pallidum & luridum mutetur.

3. Si dyspnœa ægrum simul, aut sine aliorum morborum signis, utur sine tumore, adhuc angat: quæ omnia à lymphæ viscida, ejulque circulatione turbata oriuntur: &

4. Si situs intensa superveniat, à feri extravasatione præternaturali ortum ducens.

## PROGNOSIS.

*Prognosis* nostri hydropis egregiè tradit HIPPOCRATES *lib. 2. Prædiction.*, quem locum CELSUS *lib. 2. cap.*

„8. ita vertit: *Aqua inter cutem minime terribilis est, quæ nullo antecedente morbo capie: dein qua longo morbo supervenit. Visque si firma viscera sunt, si spiritus facili, si nullus dolor, si sine calore corpus est, equaliterque in extremis partibus macrum est, si venter mollis, si nulla suffis, nulla sitis, si lingua ne per somnum quidem arefcit, si cibo cupiditas est, si venter medicamentis movetur, si per se excernit mollia & figurata, si non extenuatur, si urina ex vini potatione, & non potu aliquibus medicamentis mutatur, corpus sine lassitudine est, & morbum facile sustinet; si quidem in quo hæc omnia sunt, is ex toto tutus est: in quo plura, ex his sunt, is in bona spe est.*

In specie tota *Prognosis* ratio consistit saltem in accurata consideratione causa remota & constitutione viscerum abdominis, horumque collatione, imprimis renum; ubi enim est uberior urinae fluxus, ibi spes curationis superest.

Omnis *hydrops* periculosus satis est, ejus contumacia naturæ vires, omnemque artis industriam eludere videtur: quam tamen curationis difficultatem moderatur atque intendit

1. Tempus durationis, quatenus hoc longius non solum causæ pertinaciam, viriumque defectum, sed viscerum quoque indurationes atque corruptelas, quarum causa non raro *hydrops* existit, testatur; cum minus inveteratus has conditiones probabiliter detrectet, adeoque plus spei concedat.

2. Causæ diversa vis, utpote quæ, quò magis mobilis atque sanabilis, eò plus sperare, quò potentior & firmior, desperare jubet. Hinc qui à solidatarum partium conformatione læsa, v. g. obstructione, induratione seu scirrhus visceris cujusdam insignioris, aut hepatis, aut lienis, &c. diffculter admodum ac ferè nunquam curatur, aut curatus licet, facile renascitur, qui recidivans ordinariò letalis est; quod observetur in paracentesi iudiciòse instituenda: è contra minus periculosus est, qui à fluidorum tantum dispositione præternaturali, ver. gr. feri copia, aut crassitie, dependet. Nihilominus, qui à crassi sanguinis notabiliter depravata ac diffculter emendabili, ver. gr. scorbuti-



a, dependet hydrops, pro periculoso maximè habendus est; Qui à vasis lymphaticis majoribus aut pluribus ruptis evenit, difficilius videtur curationis, cum vasa hæc lacerata non adeò faciliè coalescere queant.

Qui à transcolatione seu diapedesi aucta, modò hujus causa solubilis sit, v.g. ob menses suppressos, difficilè curatur.

Qui supervenit morbis chronicis & ætate gravescentibus, rariùs curatur: qui autem junioribus, febribus acutis laborantibus, obvenit, non adeò est periculosus, nec curatu difficilis, sed præ reliquis faciliùs curari potest.

Aliàs ex febre, præputis acuta, mali ominis est: vid. HIPPOCRATES *Prognosis. Text. 8. §. 1.*, quod vel singulare sanguinis dyscrasiam, vel viscerum labem, vel utrumque denorat. Quibus accedit, quod vires gravi cuiusmodi morbo à priore fractæ impares valdè sint, quarum intuitu quemlibet alium morbum excipiens hydrops ut plurimum lethalis est: vid. HIPPOCRATES *lib. 4. de Morbis Text. 34. §. 7.* Quod si verò febris à potu frigido assatim hausto superveniat, interdum solvitur. Hydropem majores minui periculum reddunt symptomata conjuncta supervenientia, horumque conditiones. Quippe HIPPOCRATES *Sect. 6. Aphorism. 14. de Iudiciis. Text. 11. §. 20. & 25. Coac. Prænot. Sect. 3. §. 285., 289., & 326.* Hydropis equidem solutionem contingere ait, si aqua ad ventrem confluerit, seu per alvum evacuetur; in principio verò citra cruditatem tamen, dum *Coac. Prænot. 585.* allegatà, hoc fieri debere asserit, fluxus alvi progressu morbis hydropicis contingentes maximè lethales observantur, ita quidem, ut juxta eundem HIPPOCRATEM *lib. 4. de Morb. Text. 34. §. 10.* sentientes & loquentes illi moriantur.

Hydrops ex peruerso Purgantium abusu, admodum periculosus est.

*Urina pauca, rubicunda & crassa*, malum admodum signum est: vid. HIPPOCRATES *Coac. Sect. 3. §. 284.* & WILLISIUS *Pharm. Ration. Sect. 2. cap. 3.* Urina enim, quò minus redditur, eò deterior est hydrops: ut proinde rectè moneat CELSUS, tunc assurgere spem eius, quando plus per urinam excernitur, quàm potu fuerit assumptum.

Hydropicis *suffis vexans*, malum & desperatum signum est, juxta HIPPOCRATEM *Sect. 6. Aphorism. 3. & Sect. 7. Aphorism. 47. & M. A. N. C. Annot. 4. & 5. Observat. 148. pagin. 168.*, nisi scilicet hæc à catarrho, sed ab acrimonia massæ sanguineæ, quam hanc ex defectu feri contrahere, superius dictum; aut à feri copia contingat.

*Hydrops cum febre colliquativa* conjunctus, cum copiosæ materię viscidæ rejectione per asperam arteriam, non semper habet conuersionem phthisin, ut & hoc aliquando observatum.

*Abcessus ac ulcera non faciliè in Hydropicis sanantur*, sæpè propter supervenientem sphacelum lethalia evadunt, juxta HIPPOCRATIS *Sect. 6. Aphor. 8. & lib. 7. Epidem. Text. 13. §. 7. 8. &c.* Item *macule rubra ac livida in cruribus* erumpentes gangrænam minantur, mortemque præ foribus esse innuunt.

Uterius, quando in hydropem, ex cachexia aliisque morbis diuturnis similibus orio, apparent *deiectiones nigrae*, quæ non sunt à Medicamentis Martialibus assumptis, lethale & desperatum malum est.

Hydropicis *convulsionem* periculosæ sunt, annotante eodem HIPPOCRATE *Sect. 3. Coac. Prænot. 287.*

Tandem *recidiva* hydropicis interdum lethalis ab HIPPOCRATE *Sect. 3. Coac. Prænot. 288.* pronunciatur: vid. SCHENCKIUS *Observ. pag. 436.* & SENNERTUS *Pr. lib. 3. pag. 723.*

## CURA HYDROPI.

Quoad Curam: In hac

1. *Humorum colluvies* seu aqua, nunc simplex, nunc cum chylo crudo seu pituita commixta, remouenda.

2. *Eorundem scaturigo sistenda.*

Hoc principale, illud minùs principale. Quoniam verò collecta colluvies impedit potiorem intentionem, propterea quantum possibile & quàm citissimè remouenda; metuendum enim, ne huius retentione viscera erodantur, induantur, aut quocunque modo lédantur, adeoque horum

corruptiones hydropem non tam pariant, quàm sequantur. Potest hoc fieri duplici ratione, imò combinari utraque, scilicet tam per potus abstinentiam, quàm evacuationem.

*Potus abstinentia*, quantum hydropem moderetur & cures, testatur DODONÆUS *Observat. pagin. 116. & 117.* PANAROLLUS *Pent. 4. Observat. 38.* HILDANUS *Centur. 4. Observat. 41.* HOLLERIUS *de morbis internis cap. 39.* RIVERIUS *Prax. lib. 1. cap. 6. ac Observat. commun. pagin. 323.* & WILLISIUS *Pharm. Ration. Part. 2. Sect. 2. cap. 5. pagin. 297.* Quibus minime refragatur, quod SCENCKIUS *Observat. pag. 437.* PANAROLLUS *Pent. 2. Observat. 24.* & DODONÆUS *l. a.* notarunt, quosdam nimio potu ab hydropem liberatos fuisse. Per accidens quidem & non sine suæ vitæ periculo hoc factum, quatenus per rupturam umbilici, diarrhæam, & hæmorrhoidum fluxum, ab uberiore aquæ haustu excitatum, præter omnem expectationem causa hydropis conjuncta eliminata fuit.

Sed manifestius hoc præstant evacuationes, sive Pharmaciæ sive chirurgiæ adornandæ. Prioris generis sunt evacuatio sensibilis *per alvum*, & hinc *per urinam*, vel, quod rariùs est, insensibiliter per sudorem. *Sudor enim vix proficinus est, nisi in anasarca*; in hydropem autem *ascite plus nocet quam prodest*, quia sitim intendit, ac vires exaurit. Ergo operadetur, ut primariò per alvum, hinc per urinam fiat evacuatio.

Posterior indicatio obtinetur *in genere*, massæ sanguineæ crasin, & inde vitiatam hæmatosin emendando, & restituendo, stomachum roborando, digestionem primam corrigendo & promovendo; aliàs enim radicitus curare hydropicam impossibile est. Imò quantum bilis correctæ hoc in casu habeat in recessu, vel hoc solum testatur, quod solo absinthio hydrops quandoque fuerit curatus. *In specio* pro antecedentium causarum varietate, quam secutus est hydrops, & relicta noxa, aliquis ratio & varietas subinde observanda, ut & his ipsis maturè occurratur; nisi enim fomes eliminetur, hydrops non poterit curari. In hoc prominde puncto consideretur: an hydrops icterum, an morbos chronicos secutus sit? Si hoc, aut ex abusu fortiorum medicamentorum purgantium abortus fuit hydrops, ut & his ipsis maturè occurratur, optima erunt Martialia adhibita. Adeoque omnia ea, quæ *supra de cachexia* monita fuerunt, hic repetenda.

Pro his scopis ritè obtinendis cautela sequentes in curanda hydropem sunt observandæ.

1. *Purgantia*, quæ aquam evacuant, in hoc hydropem quidem benè conveniunt, cum experientia constat, eadem urinam seu copiosam aquam ex abdominis cavo eliminasse. Interim tamen notandum, quod uti putatio crebra in omnibus morbis non est necessaria, ita & hic est admodum nociva, accuratioribus id testantibus Practicis. Nam dum Purgantia evacuant serositates, simul utiles succos plus minus colligunt, vires ac viscera debilitant, ac ita plus nocent quàm prosunt, quatenus iterum sanguinis ut causa malè antecedens per illa exagitatum atque fulum, in loca affecta, unde non faciliè remeabile est, uberior adigitur, sicque causa continens evadit, hancque augeat: vid. SYLVIUS *de hydr. §. 154.* RIVERIUS *Prax. l. 1. cap. 6.* POTERIUS *Centur. 3. Observat. 34.* & WILLISIUS *l. a. Sect. 2. cap. 3. & 5.* Hinc rectè dicit LINDANUS: *Qui vult rectè curare hydropem, raro debet purgare, daret tamen tunc debet ea, quæ certo & vehementer purgant, sed raro, uti dixi;* Intermedio verò tempore appropriatis & aperientibus, *nam massa sanguinea vitia ex cruditatibus orta ac reliquorum humorum, corrigentibus, & in naturalem crasim redeuntibus, debet insistere.* Constat hic ea, quæ habet BRUNO in notis ad Jessenii Iudicium de sanguine & vena secta emissio *pagin. 147.*, qui JESSENIUS fuit Medicus Bremensis. Observandum etiam, ut Purgans exhibitum operationem suam ritè assequatur: quod si fiat, bonum; sin minus, malum; cum colligando solidum contenta corporis, alit non evacuando, malum augeat. In principio tamen, & si nimis debilis sit æger, ideoque non par sit validiori Purganti, lenia saltem primas vias abstergentia & per epicrasin blandè evacuantia conveniunt, ut ita meliùs disponantur primæ viæ ad subséquutas fortiores Purgationes. Uterius commodissimè instituntur Purgationes luna decrescente; crescente enim luna & ipsum malum accrescere, decrescente verò eadem etiam malum decrescere, experientia testatur: undè quo tempore habemus adjuvantem naturam, quando scilicet luna per aliquot dies decrescere incepit, purgatio instituenda, idque imprimis ante



antemovillennium, & quidem eo magis, quando luna existeret, ut vocant, in signo aqueo. Verum hæc Purgatio tunc tantummodo convenit, quando in cavo abdominis fluctuat aqua; si enim hæc ipsa aut in omenti buisa conclusa, aut in peritonæi duplicatura, aut in vesiculis melaëricis inclusa fuerit, omnis omnino Purgatio solet esse frustranea.

II. *Observetur, VOMITORIA* in hydropse variis in casibus vocari, nisi forte in principio, dum adest cachexia confirmata; in hydropse autem confirmato rarius conducunt, licet certum sit, quod interdum fructuosius observatus fuerit eorundem usus. Meminit enim CELSUS, in suis scriptis, METRODORI Philosophi, qui fuit discipulus EPICURI, qui hydropicis cum plurimum biberet, sed mox plus vomeret, successivè sic convaleuit; cuius exemplo, inquit CELSUS, Medici vomitum probant, & laudant in iis, qui facillè, & sine molestia vomunt. Facit huc, quod refert FORESTUS *Observat. 32. lib. 19. in Scholio*, ubi quidam hydropicus pro desperato habitus adscendit naviculam, & petiit mare, hinc provocato largo vomitu navigationibus primum consueto, & post vomitum exercitio creberrimo utens, sic fuit curatus. Interdum ergo, ubi adest vomendi inclinatio, aut etiam ubi gravior dyspnœia urget ægrum, commodè institui potest vomitus; sic enim subito libetius respirare solent. Sed necesse est, ut largæ dosi propinentur vomitoria, cum in hydropicis, præsertim confirmatis, rarius vomitum procreare solcant exhibita remedia. Sic enim *Mercurius viæ gr. ij. vel iij.*, quæ aliàs abundè sufficiunt pro vomitorio, hydropicum non movebunt, idque aut ob ventriculationem, aut ob remedium contentis terosissimis acido-salis alterationem, & quasi fixationem.

III. *Observetur, Diuretica in Hydropis Cura* omnium esse optima. Hæc nempe revera sunt hydragoga seu aquas evacuantia, dum naturæ sit mos & consuetudo per vias urinarias superfluum serum naturaliter expurgare: unde præmissis necessariis universalibus, his imprimis insistendum. Dico præmissis universalibus: Hoc enim omnes præcipiunt Prædictæ, ut Diuretica non prius exhibeantur, quam universalia attenuantia, aperientia & laxantia fuerint præmissa, aliàs non tunc ad Diuretica acceditur; Intempestivo enim eorundem abusu impeditur urinae fluxus potius, quam ut hic promoveatur & adjuvetur, quippè omnia specifica anti-hydropica vi diuretica insignia sunt. Aliàs multis satisfaciunt scopis, præsertim quæ sunt ex numero volatiliū, ver. gr. quæ ex urina, lumbricis, busonibus, &c. petuntur, quia salina virtute incidunt, penetrant, & vias abstergunt, viscera aperiunt, & scirrhus induratos resolvunt, &c.

IV. *Observetur, Opiata ac similia Narcotica*, qua talia ac per se, hydropicis exhibita ut plurimum esse *necrotica & lethalia*; uti eorum noxam per experientiam confirmat MOELLENBROGIUS de *Arthritide vagâ cap. 14. pag. 254. & 255.* Id quod verum arbitror, cum opiata in morbis chronicis, ac propemodum ad extrema deductis, ut sit in hydropse, quando vigilæ accedunt, minus profint, quam in acutis, quin vires ulterius deiciant, & viscerum tonum ulterius labefactent, & laxent. Imò post chronicos aut acutos morbos, dum languent adhuc ægri, & quædam adhuc symptomata supersunt, si istam Opio succurrere velimus, periculum est, ne hydropici exinde fiant, quod fieri observatum. Sæpius per accidens visua, ut vocant, anodynâ spirituum impetum nonnihil refranando, & fibrarum nervorumque renalium irritatorum spasmodi demulcendo, si que per meatus apertiores redditos sudorum & urinatum fluxum promovendo, prodesse observata fuerunt. Confer. BARTHOLINUS *Cent. 3. Epistol. 46. & 49. pag. 192. & 201.* ubi referuntur hydropes, in quibus post usum laudati opiati copiosæ aquæ per alvum & urinas evacuatæ fuerunt, idque felicissimo cum successu. Sed hæc exempla, uti eadem admiratur BARTHOLINUS scribens, & LANGELOTTUS respondens, ita ea minus audacter imitanda: quia sedulâ curâ & non, nisi summa circumspeditione, administranda veniant, cum effectus hic sit rarissimus & accidentarius: Vid. BIERLINGIUS *Cent. 1. Advers. 5. pag. 16.* Quod pertinet mirabilis observatio WILLISII *Pharm. Ration. P. 1. pag. 302.*

Auxilia igitur, quæ priori scopo conveniunt, sunt evacuantia, tam interna quam externa: Interna sunt Purgantia, Diuretica, & interdum quoque Diaphoretica: Externa sunt Paracentesis, vesicatoria, escharotica, &c.

Quoad Purgantia: plura hæc & varia passim in usu sunt. *Estimul. Oper. Tom. II.*

Inter multiplicia appropriata, selectiora saltem proponere est animus: quæ inter est primò *gratiola*, cujus Infusum ad ℥ij. aut etiam si ad ℥ij. decoquatur, vel etiam conserva ad ℥ij. usurperur, eleganter solet evacuare aquas hydropicorum. Post gratiolum in usu est *sambucus*, ejusque cognatus *ebulus*: & quidem in specie horum *cortex medianus*, ex quo expressus succus cum *oxymelle squillitico* propinatus insigniter aquas evacuat & solet: sed ita, ut, *Autore FORESTO lib. 19. Obser. 37. in scholiis*, *cortex* iste sursum à ligno abradatur, vomitus conciet; si verò deorsum versus per inferiora abradatur, etiam per inferiora purget: de quo experientia consulenda. Aliàs folia *sambuci* decoctis addita, egregiè etiam solent aquas evacuare. Præ cæteris semper appropriatum & simul violentum Purgans est *radix iros* nostratis flore caruleo. Purgat sanè validè: sed in sapore ejusdem acerrimo simul vim hydropicam alterativam specificam latere existimo; unde quasi singulari proprietate uberimè aquam hydropicorum educat. Usurpari potest vel *radix recens* in taleolas incisa, & ad ℥ij. infusa in vino vel lactis cum cinnamomo, si que sit potio vel infusum catharticum hydropicorum: vel ex radice rasa exprimatur succus, & per residentiam spontaneam sine calore depuretur, qui abjecto sedimento subdosi ad ℥ss. ℥vj. ad ℥j. propinatus, copiosè & violenter evacuat aquas. Dico per residentiam depuratum propinari debere succum iros reiecto sedimento; nam si decoquatur, omnem ferè vim purgandæ amittit. Ne verò acrimoniâ sua fauces lædat ac noceat, cum *sympi violarum* ana mistus propinetur, ac ne ventriculum nimis labefactet, cum aqua *cinnamomi* parùm addita exhibetur; vel *radix recens* incisa blandè ebulliat in juleculo carnis pulli vel gallinacæ, de quo ægro, præsertim debiliore existenti, tantum propinetur successivè, donec sufficiens subsequatur evacuatio. Quidam propinant succi huius ℥ss. cum ℥j. pulveris soldanellæ marinæ, idque, uti dicunt, cum lummo commodo; nam & ipsa soldanella, planta ex speciebus convulvulorum in oris maritimis Galliz crescens, est decantata ad hydropicos purgandos: imprimis cum rhabarbaro convenientissimè iungitur. Dosis pro decocto est à M. j., in substantia datur pulvis à ℥ss. ad ℥i. ad summum ℥i ss. admisto ℥i. pulveris rhabarbari, cum quo, ut dixi, lubentissimè iungitur. Aliàs flores *acacia*, item flores *persicorum* ex benignioribus sunt Purgantibus in Hydropse usitatis: In specie flores *acacia* nostratis vino infusi, vel, quod melius, ad M. j. in sero lactis decocti, blandissimè & copiosè tamen aquas evacuant. Quidam parant syrupum florum *acacia*, qui tamen pro ulu purgationis debent esse recentes, aliàs enim virtute purgante privantur. Syrupus etiam florum *persicorum* ad ℥ij. propinatus suaviter evacuat hydropicorum aquas: quod etiam facit *sympus de spinacervina* ad ℥j. usurpatus; item syrupus hydragogus *Myrsichii*, qui ad ℥j ss. præscribi solet. Radix *jalapæ*, quæ est radix jasmimi Peruviani apud nos in hortis crescentis, à ℥j. ad ℥ss. propinatur commodissimè ad evacuationem aquarum hydropicarum; auretiam ejus *resina*, de qua vid. BOREL-LUS *Centur. 3. Observat. 23.* ad gr. xv. vel scrup. j. cum vitello ovorum dissoluta, & in forma *emulsionis* propinata; aut *essentia* ejusdem *citrata* ad ℥ss. vel ℥vi. Misc. exhibeatur; vel etiam recipiatur huius *essentia* cum spiritu Vini parata; ℥iij. ad ℥ss. vel drach. vj., misceatur cum syr. rosar. solutio; vel dicta *resina*, in qua vis purgandi residet, cum stimulo leni *colocynthidos* commodè præscribitur: e. gr.

℞. *Tartari vitriolati* gr. xii.

*Resin. jalap.* gr. viij. ℥ss. ad gr. xii.

*Troch.* vel *Extrac. troch. alb.* gr. i. vel ii.

*Olei dissill. macis* gutt. ii.

*Cinnam.* gutt. i.

(Semper enim habenda est ratio stomachi in purgatione hydropicorum)

M. f. Pulvis:

D. S.

*Pulvis laxativus.*

℞. *Sem. melon.* drachm. ss. ad drachm. l.

*Res. jalap.* gr. xv.

Cum *Aqu. mentha & cinn. f. emulsiō:*

D. S.

*Emulsiō laxativa.*

℞. *Resin. jalap.*

*Salis tartari* an. gr. viij.

*Syr. rosar. sol.* q. s.

D. D. S.

*Succus laxativus.*

Bb 4

℞. *Jalap.*



**R. Jalapp. pulveris.** gr. xv. ad ℥j.  
*Nitri depur.* ℥ss.  
*Scamm. sulphurat.* gr. j. vel ij.  
*Ol. destill. anisi vel bacc. junip.* gutt. ij.  
 M. f. Pulvis: S.

*Pulvis laxativus pro vna dosi.*

**R. Rad. jalapp.** gr. xvj.  
*Crem. Tartari* gr. xij.  
*Extr. troch. alb.* gr. j.  
*Ol. destill. cinnam.* gutt. j.  
 M. f. Pulvis:  
 D. S. ut ante.

*Gummi gutta* seu chitta chenu, his accensetur, aethus Tinctura cum Tinctura Tartari paranda, aut Magisterium, seu resina, quæ etiam solet præscribi cum salibus digestivis, potenter evacuat hydropicos. Dosis est in substantia ad gr. xvj., Mag. gr. xij., miscetur cum salibus digestivis, ut facilius & securius operetur. Est sanè expertum remedium ad educendas aquas; sed cautus sit gummi guttæ usus, tum, quod incognita sit ejus progenies, tum, quod Autore LINDANO sæpius ab illo exulcerentur pulmones: quin potius omnibus his palmam præcipit *Elaetrium* seu succus inspissatus cucumeris asinini, quo vix datur tutius & præstantius remedium: loco cuius & *essentia* ex radice exsiccata parata elegans est remedium purgans. Modum præparandi docet MORELLUS in *Appendice Materia Med.* ubi de *Elaetrio* pag. 422. Item confici potest Extractum cum spiritu Vini tartarizato, quod frequentissimè & feliciter exhibuit B. D. MICHAELIS. Potest propinari à gr. xij. ad gr. xv. pro varietate præparationis, & ex eo parari possunt pilulæ unæ cum aliis, imprimis Mercurio dulci, utporè quod non secus atque omnia Mercurialia potenter aquas solet evacuare: e. g.

**R. Extr. elater.** gr. xij. ad xv. vel ℥j.

*Resin. jalapp.* pro stimul. gr. ij. ad v.

(vel ubi evacuandum iterum crassum & pituosius,

*Troch. alband.* gr. j. vel ij.)

*Ol. destill. bacc. junip.* gutt. ij.

Cum f. q. *Essent. absinth.* f. Pilulæ:

D. S.

*Pilula purgantes.*

**R. Extract. elater.** gr. xv. ad ℥i.

*Mercurii dulc. rite par.* gr. xv.

*Extract. troch. alb.* gr. i.

*Ol. destill. bacc. junip.* gutt. ii.

Cum *essent. absinth.* f. Pilulæ:

D. S. ut ante.

Quæ assumptæ largiter evacuare solent.

**R. Extract. elater.**

*Panchym. Crollii an.* ℥ss.

*Mercurii dulc.* gr. ix.

*Res. jalapp.* gr. i.

Cum *essent. absinth.* f. Pilulæ:

D. S. ut sup. a.

„Sanè LINDANUS dicit: *Elaetrium* per se esse nobilissimum remedium. Credo meum Parentem eodem centum hydropicos servasse: nampe præscripsit aliquando rusticus gr. viii. *elaterii* in Pilulis, quæ eas *Pharmacopæia* persolvens in præsentia eius statim deglutit. Sed postmodum domum tendens, motu illo pilula coeperunt operari, detrahensque caligas in via deiecit, & per superiora aquam reiecit, sicque venter ejus tumidum amisit. Unde HELIDÆUS PADVANUS Decocto cucumeris asinini curavit aliquando hydropicum. Denique radix *bryonia* tanquam purgans suo modo ab HELMONTIO commendatur in hydropice: sed, ut dicit, *correctæ* primo eius veneno corrosivo. Certum enim est, purgantia esse maligna, unde egent correctione: sed est res non æquè facilis. Optimus purgantia corrigendi modus est per sal tartari fixum, vel per fermentationem. Infusum ergo *bryonia* cum sale tartari paratum, vel Decoctum, ad evacuandas aquas commendari solet. Ac sanè *bryonia* hæc in hydropice curando tanquam evacuans & alterans singulariter convenit: In specie in hydropice utrius singulare quid obtinere videtur. Dosis ℥ss. in infuso, vel syrupo ad ℥ss.

*Colocynthis* denique & ipsa, ubi crassiores & viscidiores sunt aquæ, commodissimè utitur. Aliàs *spiritus vite aureus* Rulandi, seu *Essentia* trochilicorum albandal, est ordinarium purgans hydropicorum: sic loco istius trochisci isti albandal decoquendi sunt in vino, scilicet ad ℥i. bulliant in ℥iii. vini, & sic sit Decoctum utilissimum ad purgandos hydropicos, ubi non solum aqua, sed & humor

oedematofus in abdomine continetur. Experimentum est RULANDI, qui desperatam hydropicam cum sætu mortuo hoc modo curavit: nempe propinato hoc Decocto per superiora & inferiora aquam reiecit, & sætus expulsus est.

His ex regno minerali imprimis adnumeratur luna, & qua excellunt pilulæ lunares: nempe *crystalli* ex luna purissima cum *spiritu nitri* vel aqua forti paratæ, lapore amarissimæ, sed mirabiliter aquas hydropicorum evacuant. Dico ex purissima luna; si enim tantillum, quod facile & sæpè fit, veneris fuerit permixtum, vomitus movet. Accuratissimam harum præparandi rationem cum omnibus encheiresibus optimè descripsit BOYLE Tr. de utilit. Philos. Exper. anglicè conscripto *Observ. 97.* & WILLISIIUS l. a. Sect. 2. cap. 3. *Crystallorum* talium gr. j. vel ij. ad ℥j. cum mica panis in pilulas redactarum aquam copiosam, sine ullo tamen symptomate, evacuare solent; adeò ut his ipsis aliquot hydropici curati fuerint. Aliàs & *Mercurialia decantata* sunt in cura hydropicos; unde imprimis *Mercurius dulcis* ex stimulo appropriato acutus convenit, imprimis in hydropice scorbutico. Huc pertinet *Mercurius vita*, quem sine vomitu in hydropice operari plures testantur, & BULTON *Medic. Mag.* pag. 77. cum oleo salis circumdatum, tanquam specificum in hydropice purgans, commendat; unde *Mercurius dulcis* mistus cum *Mercurio vita* perquam convenientem laxativum est. Hujus remedij & Mixturæ proportionem docet HARTMANNUS in *Praxi Chymiatrica* pag. 25. Edit. Carduicæ in 4. Siquidem sub benè tacta ista miscela, salta *Mercurii dulcis* figunt *Mercurium vita*, ut vim vomitoriam amittat, & evadat remedium maximam partem per inferiora purgans: Nempe

**R. Mercurii dulc.** gr. xv.

*Vite* gr. xij.

Hæc trita invicem Catharticum dant non ignobile.

Præscribitur tunc temporis imprimis cum conserva florum Persicorum sub forma Bolus: v. g.

**R. Conserv. flor. Persic.** vel *gratiol.* ℥j.

*Mercurii vita* cum *Merc. dulc.* mist. gr. xij. ad xv.

(sicut sunt præter propter grana ij. vel iij.

*Mercurii vitæ* correcti.)

*Extract. elater.* vel *troch. alband.* gr. j.

vel ij.

Cum f. q. *Syrup. flor. Persic.* vel de *Spina cerv.* f.

Bolus pro dosi j.

Nam Mercurialia fixa à Chymiatricis, in specie ab HELMONTIO, multum commendantur: (dico fixa.) Denique *segmenta anguinarum* humanorum vino infusa, fortiter etiam purgant. HARTMANNUS præcipit, ut imprimantur umbilico Hydropicorum pro ipsius purgandis: Quod an respondeat experientia? nescio.

Cæterum his Purgantibus semper interponenda sunt *Stomachica* & *massa sanguinea respicientia*, quæ vulgò vi aperiendi prædita dicuntur, & ferè sunt omnia amata, acrida, & quodammodo salina, quæ & sanguinis crasin corrigunt, obstructions & infarctus referant, & imprimis urinam stimulant: inter quæ eminet *absinthium*, quod quacunquè ratione, vel in cerevilla, vel in Decocto, vel sub Extracto aut *essentia* usurpatum nobile est, nec usquam omittendum.

*Diureticorum* autem, Hydropi appropriatorum, quamvis ingens sarrago apud Scriptores observetur, non sine ratione tamen à Practicis haud levioris momenti eorum alia præ aliis sèliguntur ac laudantur, v. g. *linaria*, *petroselinum*, *daucus*, *genista*, *radix rutæ*, *bardana*, *lignum sassafras*, *balnium de capaybe*, *terebinthina*, *semen sciscleos*, *daucci*, *herba cherefolii*, *radix petroselini*, *eryngii*, *ononidis*, *liquiritiæ*, *graminis*, *herba parietariæ*. Inter alia excellunt in specie post *absinthium* ex asaro, *Helenio*, & *gentiana* petita remedia. *Marrubium*, in specie, ubi ab ictero ortus sit hydrops, laudatur à FORESTO lib. 19. *Observ. 10. in Schol.* Icterus enim radicitus curat: Item *chelidonium maius* eiusque radix specificum dicitur HELMONTII in hydropice. Quicquid sit, credo, quod *chelidonium maius* singulariter conveniat in hydropice, sive succus expressus, sive vinum infusum usurpetur. Hisce præ cæteris addatur radix *vincetoxici*, quæ vel per sudorem, vel per urinam operando, à multis tanquam specificum ad hydropem remedium laudatur, si se. eiusdem Decoctum cum vino crebrius & sæpius usurpetur; hoc enim ipsum, & per urinas & per sudores, eleganter curat hydropem. Alii patant *essentiam* vel *Extractum* eius, & hoc ipsum cum successu propinant Hydropicis: hinc est *Destillatum Paracelsi* commendatissimum ad hy-



ad hydropem, ejusdescriptio habetur in HARTMANNO cap. 107, sine tamen spiritu vitrioli, ut vult HARTMANNUS, assumendum venit.

Compositio est sequens:

*R. Tartari rubri ℥i.*  
*Rad. hircundin. seu vincetox. ℥ss.*  
*Colcohar. ℥viij.*  
*Vin. ardent. q. l. pro incorporatione, seu*  
*mistura.*

Destillantur per alembicum, & probè rectificantur.

Hoc omni die bis vel ter dosi ℥ss. ad ℥j. in vehiculo quodam appropriato vel vino Malvatico hauriatur. Pellit urinam, eamque foetidam reddere facit. Continuandus est ejusdem usus per aliquot dies, nam primum nihil, successive tamen egregiè operatur, & ceu certum remedium solet commendari, & credo, quod imprimis, ubi vitium est ex menses teris glandulis strumosis, conveniat vincetoxicum, cum in hoc singularis lateat vis contra strumas.

Huc pertinet & radix acori veri, caryophyllata, curcuma, item rubia tinctorum & similes, ac imprimis capitula alliorum, quæ ob salacrem mirandam præstant in cura hydropis, cum elegantissimum diureticum sit allium. Præter enim exemplum BARTHOLINI Cens. 2. Hist. 74. Hydropici per Decoctum allii in lacte curati, facit huc, quod refert FORESTUS lib. 19. obs. 37, ubi refert Hydropem, aliis in vanum adhibitis, ex continuata comestione allii, multum aquositate per urinam reddendo, insperatè fuisse curatam; sicut & mulierem hydropicam deploratam assumptione succi viridis allii expressi cum jure vervecis vel galli, provocato largiore urinae fluxu restitutam observatum esse: Hinc optimè Infusa diuretica ingreditur radix allii in vino infusa, quia optimè convenit in hydropem. Porro cortices caprarum & tamarisci, item cortices citri aut aurantiorum aliis convenienter adduntur. Eupatorium admodum commendatur à LINDANO ad curam hydropis: usurpatur semper tempore intermissionis à Purgantibus: item anserina, flores cyani, & flores calceatippe; quorum Tincturae solent laudari ab Agricola ad curam hydropis.

Hæc præ cæteris addenda sunt juniperus, tam lignum, quam specialiter ejusdem bacca aromaticæ, & omnia juniperina, quæ multum conducunt contra hydropem. Unde bacca conducunt in vino, vel rob baccarum juniperi, quod simul egregium alterativum existit; essentia & spiritus baccarum juniperi; hinc Malvaticum juniperinum ex spiritu baccarum & rob juniperi, mistum cum Tinctura nephritica, in hydropem egregiè prodest: v. g.

*R. Malvat. juniper. ℥jv.*  
*Tinctura nephrit. aut hujus loco spiritus carm.*  
*distrib. ℥j.*

M. D. S.

Malvaticum diureticum.

Pro dosi cochl. i. vel ij. pro lubitu.

Sanè Decoctum ligni juniperi longè magis appropriatum sudoriferum existimo, præsertim in anasarca, quàm Decoctum ligni guajaci & assafras: Unde & Decoctum baccarum juniperi in vino generoso experimentum est RULANDI, quo ipso per sudorem & urinam hydropem curavit. Conf. M. A. N. C. Ann. 9. Obs. 18; ubi Mj. absinthii cum Mss. baccarum juniperi in ℥vj. cerevisiæ vel vini decocta, addito rha-Pontici pauxillo, mirè commendat VOLCAMERVS, & ut probatissimum extollit remedium, si viscera adhuc salva sint. Viterius ad Diuretica pertinet herba Kali dicta, quæ quidem olim saltem in Ægypto procrevit, nunc verò apud nos reperitur, laporis admodum salis mistar muria, cum in specie prope Halam Saxonum, ubi lacus & fontes planè salii sunt, & in specie Stasfurthi, copiosè provenit. Scilicet accipitur herba Kali recens & contusa, exprimitur, postmodum addendo parum cinnamomi bis quotidie ad ℥ss. surpat in haustu cerevisiæ, vel vinicalidi: ita elicit copiosam urinam beneficio sui salis muriatici, & desperatam hydropem curat, idque singulare quorundam experimentum dicitur: singulis septimanis, tribus tamen diebus usurpatur, aliàs nimis urinam pellit. Reliqua vulgaria aperientia, quæ omnia sunt sudorifera & diuretica simul, cum ubique proflent, transmittito. Interim hæc remedia variis sub formis adhibentur, nunc sicca, nunc liquida, v. g. essentia absinthii, vincetoxici, & rosmarini; quæ admodum laudatur à FERDINANDO, qui miraculosam dicit ad curam hydropis. In specie huc pertinet vinum chalybeatum pro potu ordinario, quod beneficio absinthii, ruscii, cardui benedicti, &c. medicarum redditur, & ad quemcunque hydropem com-

mendat HARTMANNUS pag. 229. Usurpatur tempore, quo vacamus à purgatione. Præter hæc salia, alia sunt, quæ pro usu diuretico hydropicis propinantur, & quidem in hydropem anasarca magis fixa, ubi reliquis Diureticis plus præstare observantur: In ea verò, quæ ad ascitem propius accedit, aut, ubi ex urina crassa, parca, intense tincta, atque luxuriosa strictam nimis sanguinis crasin, adeoque serum in renibus haud decenter secreti suspicari licet, hæc potius noxia existunt, adeoque in ejusmodi casibus salia volatilia, aut nitrosa, conveniunt. Fixa inter, salia sunt lixivialia, sarmentorum vitium, juniperi, genistiæ, stipitum fabarum, fimi columbini, sal cardui fullonum, sal tartari, absinthii, item cardui benedicti, &c. & tartarus calcinatus. Hæc ipsa salia diluuntur in vino, aut aqua appropriata, quæ imbibunt sal diureticum: lixivium filtratur, & ita sub hujus forma propinantur ægris. Admodum commendantur ad evacuandas aquas & & propter fortem penetrationem: v. g.

*R. Salis sarment. vit. v.*  
*Fimi columb.*  
*Juniperin. an. ℥j.*  
*Solvantur in*  
*Vini Rhenan. ℥ss.*  
*D. S.*  
*Lixivium diureticum.*

De hoc subinde hauriatur:

Sed ratione laporis adduntur interdum quedam Aromata, ut firmetur melius tonus stomachi: Vel

*R. Ciner. genist. ad albed. calc. ℥iv.*

Ponantur in vase vitreo ad digestionem cum ℥ij. vini albi, vel aque appropri. per aliquot horas. Colentur. Dosis ℥vj. ad ℥viij. bis in die.

Pertinet huc etiam sal essentielle tartari, item flores salis ammoniaci, vel lixivium diureticum Myrsichtii, itemque lixivium ejus benedictum, quæ ab ℥ij. ad ℥iij. aliquoties successivè propinata, egregia præstant pro cura hydropis; vel quod fuit experimentum D. ELLENBERGERI.

*R. Ciner. tamarisci,*  
*Juniperin.*  
*Sarment. vitis,*  
*Salicis,*  
*Genist. an. Mj.*  
*Rad. vincetox.*  
*Palerian. an. ℥ij.*  
*Urtica ℥ss.*  
*Angelica,*  
*Enul.*  
*Ircos nostras. an. ℥ij.*  
*Liquirit. ℥j.*  
*Baccar. juniper. ℥ss.*  
*Rhabarb. elect. ℥ss.*  
*M. pro Nodulo:*

Qui infundatur vino, vel ana aquæ & acetii vel vini, & de Colatura post infusionem crebrius bonus haustus bibatur.

Præ cæteris tamen in hoc puncto eminent cineres sarmentorum vitium, si dissoluti in aqua appropriata hauriantur. Modò laudatus Practicus lixivio ex stipitum fabarum cineribus, &c. vetulam curavit hydropicam, quæ postea 4. adhuc liberos peperit. Post dictos cineres in specie sal lixiviale juniperi, item ex arbore betulae aut quoque tiliæ in vino Malvatico sub forma lixivii est admodum laudandum, ob vim diureticam per urinam hydropem potenter pellunt. Interim ex his præferenda sunt salia volatilia diuretica, in specie salia volatilia ex tartaro & remediis tartareis elicta, ut spiritus tartari volatilis quicunque cum spiritu sambuci mistus, Tinctura tartari, spiritus carminativus de tribus ex nitro, tartaro, & spiritu vini, Tinctura nephritica, spiritus & flores salis ammoniaci simpli, spiritus salis ammoniaci succinatus, & oleo destillato juniperi oleosus, redditus, sal succini volatile, item Elixir proprietatis cum spiritu salis ammoniaci paratum. ELLENBERGERI arcanum fuit spiritus aperitivus Penosi, qui aperit infarctus probè præparatus, cum spiritu baccarum juniperi admixtus, ad gutt. 40. vel 50. D. MICHAELIS commiscebat essentiam suam hydropicam. Sic quoque ex regno animali conveniunt urina humana, ejus spiritus per putrefactionem, ejusque sal volatile: Nam ita per fermentationem parata urina, dat spiritum admodum volatilem & acrom; qui benè rectificatus ceu summum arcanum commendatur multum à POPPIO in Thesouro Chymico, dum hic nempe spiritum volatilem urine



urina cum ana spiritus vini *reſtificati*, addito pauco *ambra & moschi*, digerit, poſtmodum deſtillando probè unit, ſum-  
mumque dicit eſſe arcanum contra hydropem. Doſis ʒj.  
ad ʒſſ. mane & vesp̄i propinando. Sic juxta urinam hu-  
manam & pro pauperculis urinæ caprarum ac vituli deſtilla-  
tæ, & aliquoties uſurpatæ, non ſecus atque urina humana,  
egregiæ ſunt, & aquas hydropicorum prompte per urinas  
pellunt. Accertè lotium humanum & ovinum aliquot die-  
bus calidè potum vi diuretici ſunt euporiſon pauperum ad  
hydropem: id quod in pauperibus, & aliquot opilionibus,  
expertuſeſt PÉTRÆUS in *Differtat. Harmonicis*, ubi  
notabilia habet; item hydropicos potu urinæ humanæ prom-  
ptè fuiſſe reſtitutos. Pariter CROLLIUS excrementum  
anſerinum viridiuſculum ad ʒj. cum cochleari j. urinæ  
deſtillatæ, vel etiam pulvis ſcarabæorum unctuoſorum lau-  
datur à GLAUBERO in *ejuſdem ſcriptis*, propinatum,  
& ſubinde uſurpatum admodum laudat ad hydropem cu-  
randum.

Imprimis *lumbrici & lumbricalia* ceu ſpecifica ſe offerunt:  
nempe vel *Decoctum lumbricorum* in vino propinatur, vel,  
quod melius eſt, ſi idem putredine colliqueſcant, & ſpiritus  
volatilis urinoſus cum ſale volatili ex his deſtillatur, quod in  
haſtu vini Malvatici, aut *Malvatico juniperino*, & quo-  
cunque vehiculo aſſumptus, egregius eſt in cura hydropis:

Vel

℞. *Spir. lumbric. terreſtr. urinoſ.* ʒij.

*Volat. urina* ʒj. vel ʒij.

M. S.

*Spiritus diureticus.*

Doſis ʒſſ. vel gutt. 60. bis vel ter in die in haſtu vini cum  
baccis juniperi medicati, vel Decocto rad. ſenic. & bacca-  
rum juniperi cum vino aſſumatur, eſt egregium remedium;  
ſuſcitatur enim renes torpidos. Item, quod melius adhuc,  
pateretur liquor ex lumbricis terreſtribus per del. in clibano ad  
imitationem CROLLII in *Baſilica Chym. Hartmannia-  
na Editionis* pag. 349. Nempe lumbrici vivi probè purificen-  
tur beneficio mulci terreſtris, includantur cucurbitæ vitreæ;  
hæc involvatur paſtæ ſarinacæ, & ita in clibanum mittatur:  
ſic fit, ut lumbrici reſolvantur in liquorem limpido, quò  
decantatus doſi cochl. j. bis in die exhibitus, egregius eſt ad  
hydropis curam. Quidam etiam propinant pulverem lum-  
bricorum terreſtrium. Eadem de *aſellis* valent. De modo  
utendi vid. SENNERTUS, ubi de calculo veſicæ. In-  
fundit etiam poſſunt millepedes cum Tinctura tartari, &  
Extracſio, in hydropic ſcorbutico egregia, filtrari. Veletiam  
pulvis ſcarabæorum unctuoſorum laudatur à GLAUBERO  
in *ejuſdem ſcriptis*. De cantharidibus vid. SENNERTUS  
*Prax. l. 3. pag. 787*. In ſpecie *buſones* præ cæteris ſingulare  
quid obtinent in hydropis cura, & quidem quando contin-  
git vitio renum; ſiquidem ſicut primùm caſu inventum hoc  
remedii genus, dum leviter calcinati & hydropico propinati  
eundem leviter per urinam curantur; uti in SOLENAN-  
DRO, HILDANI *Epistoſis*, & HORSTIO in *obſerv.*  
pag. 332. RIVERO *Prax. l. 11. c. 6.* & WIERO *obſerv.*  
pag. 8. poteſt videri: ita poſtmodum præmeditato conſilio &  
uberiori experientiâ comprobati in uſum vocati ſunt. Di-  
citur tamen fuiſſe ſecretum experimentum KYPERI:  
nempe

℞. *Buſones* q. v.

Exſicca in umbra, poſt abſcinde capita, & exime intes-  
tina, quod reliquum, redige in pulverem ſubtiliſſimum.

De hoc vel ſolo, vel cum *pulvere hepatis* proprii miſto,  
datur gr. x. ad xv. uſque ad ʒj.; mirabiliter aquas hydropi-  
corum educit per urinam, idque cum ſummo levamine.  
Poteſt dari pulvis hic 3. vel 4. vicibus, donec proveniat uri-  
næ fluxus; ita tamen, ut 3. vel 4. dies poſt aſſumptiones  
ſemper interponantur, ne nimia fiat urinæ excreſco; aliàs  
nimis debilitaretur æger. Unde autem buſones hæc vi pol-  
leant, non eſt adeò obſcurum. Vis ſiquidem illa diuretica  
dependet ab alimentis, & in ſpecie quia iidem cantharellis  
(ſunt muſcæ inſtar cantharidum aut ſcarabæorum, quas  
avidiffimè devorant in ſtomacho, & colo eorum reperiun-  
tur) veſcuntur. Hi cantharellæ turgent ſale volatili diure-  
tiſco, à quibus hoc, tanquam hydropiſeos remedium, buſo-  
nes accipiunt, unde & putrefacſti ſpiritum & ſal volatile ni-  
troſum ſuggerunt, ſimile ei, quod eſt in lumbricis: poten-  
tiſſimum eſt diureticum; ſicut pulvis buſonum calcinato-  
rum eſt ſtrenuum diaphoreticum. Aliàs *buſones* vivi con-  
tuli lumbrorum regioni applicati per copioſum urinæ proflu-  
vium hydropem ſolvere dicuntur. Differentia hæc inter  
*alcalia hæc diuretica fixa & volatilia* probè obſervanda, nec

promiſcuè uſurpanda. Conſ. WEDELIUS in *Pharm.*  
pag. 156. & WILLISIUS in *Pharm. Rat. P. 1. pag.*  
316. & 367. Ulterius lapis fulminaris cum aqua quadam  
appropriata in alcohol tritus, erat ſpecificum ad Hydropem  
& iterum B. D. MICHAELIS, quod ipſe habebat à  
TILEMANNO & D. HARTMANNO, qui his ipſis  
crebrè uſi fuerunt:

℞. *Lapis fulminaris diſto modo præp.* p. iij.

*Exuviar. ſerpent. ſponſi decident. pulve-  
riſat.* p. j.

Miſcebat hæc, & ita à ʒſſ. ad ʒj. familiariter pro hydropem  
& iſtero curando exhibebat.

Nam obſervatum fuit, notante HELMONTIO, exu-  
vias ſerpentum, inſtar cinguli renum regioni ſeu lumbis al-  
ligatas, diureſin excitatſe.

Denique pertinent quoque huc *opercula teſtarum cochlea-  
rum*, quæ ob ſingularem vim urinoſam, quæ turgent, ritè  
parata, ceu probatum contra hydropem remedium laudan-  
tur. Unde benè depuratorum & ſimpliciter pulveriſatorum  
mane & vesp̄i larga doſis in haſtu vini vel liquore conve-  
niente propinetur; pellunt enim per urinas: Vel, quod me-  
lius, alii cum *ſpiritu ſalis* reſolvunt hæc opercula pulveriſa-  
ta, ita ſit ſolutio urinoſa, quæ coagulatur: quo factò poni-  
tur in locum frigidum, ut ita per deliquium fluat, eodem  
modo atque tinctura vel liquor nephriticus paratur, & ſic  
liquorem nephriticum egregium diureticum antihydropi-  
cum acquirunt: vid. M. A. N. C. ann. 9. *obſerv.* 79. Li-  
quor iſte per deliquium paratus ad gutt. xx. xxv. & xxx. in  
quocunque vehiculo, ſi fieri poteſt, calido, aut & Decocto  
radicum ſeniculi vel petroſelini ad curandos hydropicos eſt  
inſignis. Loco ſpiritus ſalis in vino acidulo vel aceto ſolvan-  
tur, & idem erit. Huc facere videtur *Rumeli Diureticum*  
ex ſpiritu ſalis cum ſale volatili ſuccini coagulato.

Circa Diureticorum uſum adhuc notetur:

1. Ut corroborantibus ac moderatè adſtringentibus, e. g.  
Martialia &c., illa ſemper temperentur, aut ſaltem  
cum his frequentius commutentur; non quod tali-  
bus, ut veteres docuerunt, hepatis tonus confortan-  
dus ſit, ſed ut impediunt, ne ſanguinis craſis ſcutex-  
tura fuſione nimia penitus diſſolvatur.
2. Ne, antequam primarum viarum evacuationes præ-  
ceſſerint, & portio quædam ſeri intra vaſa & ſub-  
ſtantiam partium hærentis educta, nec antequam  
humores viſcidi attenuati, & aciores contemperati  
fuerint, exhibeantur, ne illorum mole aut viſcidita-  
te urinariæ viæ obſtruantur & inſarciantur, acrimo-  
niâ verò eadem erodantur.

Juxta hæc *Diuretica* interdum etiam procedendum eſt ad  
DIAPHORETICA & SUDORIFERA; (inter-  
dum, non ſemper;) teſtatur enim experientiâ, quorundam  
largo ſudore fuiſſe curatos, præmiſſis nempe præmittendis,  
in ſpecie diureticis, & quidem *conveniunt magis in hydropem*  
ad anafarcam accedente, quàm in aſcite: vid. SYLVIVS:  
imò intempeſtivè exhibita nullum levamen, ſed loco hujus  
magnam ſæpè noxam ægrotanti adferunt. Horum enim  
potestas ultra tertiam corporis regionem non extenditur,  
ſed cauſam ſaltem antecedentem in ſecunda & tertia mo-  
vent; ſub hoc tamen periculo, ut Diaphoretica maſſam ſan-  
guineam fundendo, ac ſerum præcipitando, hoc æquè ad in-  
teriora & cavitates, ac per habitus externi poros, deponant:  
Vt taceam, aquas in illis fluctuantes ab horum uſu magis  
exaltuare, ſpirituumque ac humorum motum variis modis  
turbari. Hinc experientiâ maniſeſtum eſt, ſudores ejuſmo-  
di ſubjectis ſemper in deterius cedere, quatenus iis febres,  
dolores capitis, vertiginem, lipothymias, aliaque cetebræ  
& cordis ſymptomata movent, abdomine v. g. interim non  
collabente, ſed magis magisque intumeſcente: vid. PLA-  
TERVS *Prax. Tom. 3. pag. 286*. Atque hoc non parado-  
xon videri poterit illis, qui ex Topicorum calidorum, v. g.  
ſacculorum & ſotuum, ſaltem applicatione anguſtias majores,  
animi deliquia, ſimiliaque ſymptomata ex tempore  
ægris oboriri obſervant, mox ruſus exſpirantiâ localibus il-  
lis remotis, ut experientiâ quotidiana docet.

Non nego quidem experientiâ illam, quam nonnulli de  
curatis per ſudoriſera hydropicis allegant, v. g. BARTHO-  
LINI in *Altiſs. Haſſienſ. Tom. 1. obſerv.* 85; nec illorum,  
quò ſudoribus ſpontè obortis & quaſi criticis hydropem nota-  
rad ſolutum teſtantur, v. g. HOLLERII *Scholiogra-  
phus de Morb. intern. cap. 39.* & BARTHOLINVS  
*Cent. 3. Hiſt.* 33. Diverſæ tamen in allegatis obſervationi-  
bus



bustellant circumstantiæ, quæ dubitandi aniam in ignem subministrant. Scilicet

1. Concedi debet, in anasarca & hydrope cavitatum tali, ubi leri extravasati non adeo multum est, sed major ejus portio intra glandularum ac viscerum substantiam, & vasa adhuc stagnat, sudorifera maximè prodesse, cum per sudoris excretionem, vasis in habitu exinanitis, serum, quod interiora infarcit, ad illa commodè devolvì valeat, paucò illo, qui forsan in cavitatibus fluctuat, vel per naturam, vel per medicamenta, dissipabili; quale quid in hydrope illo vesicario, quem in asciticis interdum SCHENCKIUS ex CORDEO, & communicatione EICHHOLZII, ac SALMUTH Cent. 1. *Observ.* 38. *testatur*, & ex BARTHOLINO Cent. 3. *Epist.* 28. & Cent. 4. *Epist.* 58. suspicari licet, pariter interdum contingere posse probabile sit, quatenus vesiculæ hæc cum fluido intrinseco vel immediatè, vel mediantibus parenchymatibus, communicant, eorumque contenta huic manifestius continua existunt.

2. Longè alia ratio videtur sudoris illius, qui hydropleis quibusdam criticus accidit, & qui arte excitatur: In illo siquidem blandus ac lentus sit fert à sanguine feces, ut aquiliculi augmentum nullum veniat metuendum; In hoc verò non, nisi impetu & exaltatione aliqua secedere ac prodire jubetur illud.

Tandem ac 3. quæ ab Autoribus nominatis allegatur sudor asciten solvens, extraordinariam pororum dilatationem supponit, dum *Scholiographus* HOLLERII inquit: Per destillantem quasi aquam aliquando hydroperem sublatum fuisse; & BARTHOLINUS aquam per poros cutis in immensum dilatare patulos stillasse perhibet.

Ex Sudoriferis atque Diureticis, quorum farrago amplissima deprehenditur, seligantur, quæ incidendi atque resolvendi vi maximè pollent; qualia sunt in specie dicta *inniperina* supra laudata, Decoctum lignorum, Decoctum militi, aliorumque vegetabilium aromaticorum, cum salinis præsertim volatilibus, sale volatili urinæ, vel sale volatili vipersarum, & sub forma liquida magis, propinandis; modò sudore violentià propulso æger ad languorem non debiliatur, sed is lentè, ac repetitis vicibus cieatur; cum nihil ab assumptis Sudoriferis periculi ægris imminet, quamvis nullus sudor promanet. Sed partitis vicibus exhibita humores viscidos solvunt, poros obstructos referant, sicque ad sudorem secuturum omnia blandè disponunt. Occasionem primam, ut aliàs, casus suggestit. Refert nempe LANGIUS *supra citatus*, ut & LIPSIUS *de Hydrop.* de rustico hydrope laborante, clipeum pistorum adhuc calidum ingrediente, & mediante largo sudore ita curato.

Fortan & SALIVATIO MERCVRIALIS interdum cum fructu institui poterit, quam commendat SYLVIVS *de Hydrop.* §. 155., in anasarca scilicet & reliquarum hydroperum specierum nutus adornanda, præprimis cum salivatio interdum spontanea aut cum euphoria in ejusmodi casibus contingat, potissimum in Belgio inferiore; ita tamen cum talibus circumstantiis adornetur, quales ex *Collegio Institutionum* & SYLVIO supponimus. Conf. GREMBSIUS *Tr. Arbor Integra & Ruinosa Hominis lib. 2. cap. 1. §. 6. Aliqui*, inquit, in *Curatione Hydropis* utuntur *Mercurialibus præmisso digestivo*:

- " R. Magist. tartari vitriolæ. 3℔.
- " Facul. bryon. 3j.
- " Salis card. bened.
- " Genist. an. 3℔.
- " Mag. corall. 3j.
- " M. pro 8. partibus;
- " Postea porrigunt sequentem bolum:
- " R. Mercur. dulc. gr. xv.
- " Gum. gamandr. gr. v.
- " Conf. rosar. 3℔.
- " Sum syr. rosar. q. s. f. Bolus.
- " Dosis postea tribus granis augeant,
- " usque dum salivatio oris superveniat.

Hæc sunt interna latissimè indicatæ primæ.

EXTERNORUM usum ipsa docuit natura, quæ nunc per spontaneam in umbilico abdominis tumidi apertionem, nunc per vesicas in Naribus excitatas, nunc foramine in pollice pedis spontè aperto, successivè collectam colluviem evacuando hydropicos curavit. Quando ergò dictis modis urina & aqua hydropicorum evacuari nequeunt, subindè usu venit, ut per varios modos chirurgicos capertos extrahatur aqua. Modi sunt varii.

Quoad umbilici apertionem: non pauca prostant exempla

ita reparatorum, qualia exempla videbitis in SCHENCKIO, item AMATO LUSITANO C. 5. *Cap.* 37. Vnde si tumidus promineat umbilicus, tutissimum est, ut in medio instituat punctio; ibi enim est locus optimus: aut applicentur umbilico apertoria, ut promoveatur apertura; sic enim jucundè & citra incommodum solet evacuari materia. Ad hujus imitationem instituta fuit primitus *paracentesis*, hæc abdominis artificialis apertio, quæ in majori copia & celerius aquas hydropicorum evacuat; & hujus vicaria *scarificatio*: quarum posterior illis, quæ habitum corporis externum inundant; prior aqualiculis tantum curandis intervit; quamvis à MICHAELIO per hanc toti abdomini applicatam asciticis quoque curatis HORSTIVS Cent. *Problem.* Decad. 7. *Quæst.* 8. §. 6. perhibeat. Instituitur nunc veterum inethodo, pertundendo abdomen per lancettam, imponendo hinc capoulam; nunc, idque melius, recentiorum methodo per acum argenteam perforatam. Nec refert, si per scarificationem chirurgorum, si per acum saltem communi, quem WILLISIVS *cap.* 5. commendat, aut stilo argenteo adornetur, modò præceptis ac nimis aquarum profluxus præcaueatur: sic enim, si illuvies hydroptica non satis exauritur, certè in hydrope etiam deplorato vita ægrotum aliquandiu prorogatur. Locus convenientissimus est umbilicus tumefactus, hinc à latere umbilici aliquot digitorum transversorum latitudine, notando simul membranam peritonæi in hydrope valdè crassescere: vid. BARBETTE *Chirurg. & Anatom. Pract. item Observationes, Cultro Anatomico* LYSERI *annex.* pag. 283. & HORNIUS *Microtechnæ* pag. 99. Emittere autem veniit aqua successivè: nam ex subitanea ejusdem extractione mors subindè sequitur: vid. TIMÆVS *von Guldenskes in Responsis* pag. 31. Unciæ verò vj. vij. vel x. pro viriâ ægroti ratione evacuentur. Conferatur TVLPIVS *lib.* 3. *Observ.* 38. item *lib.* 4. *Observ.* 42. HILDANVS *Centur.* 1. *Observ.* 47. Cent. 2. *Observ.* 38. PANAROLLVS *Pentec.* 2. *Observ.* 17. & in genere quivis *Chirurgi*. Operatio hæc in se est tutissima, & quæ aliis remediis internis, præsertim alterantibus ritè adhibendis, optumè inserviet, modò in tempore adhibeatur.

Verum utri præsentissimum non rarè sit remedium; quia tamen intempestivè atque incautè adhibita sæpius quoque aut ægram interimat, aut certè non curat, hinc multis Medicis ejus usus maximè suspectus est: summâ igitur cautione hoc remedii genus tam suaderi quàm administrari debet, ne proficiamus hoc nobile remedium. Nam in duobus imprimis fallit casibus:

1. Quando ea nimis tardè adhibetur: sic enim fit, ut nimis profundè radicata malo, & prius corruptis aut labefactis plus minus à colluvie visceribus internis, ob præterlapsum occasionem malum non cedat. Et sanè magis in ascite, seu hydrope abdominis particulari, quàm universali & anasarca locum habet. Non omni tempore hæc operatio prodest, sed in principio atque incremento morbi duntaxat, cum progressu temporis serum extravasatum acrimoniam contrahat, ac interanea hæcenus sana corrumpat, viresque simul deficiant. Ideoque hæcenus recensitis remediis, haud brevi proficientibus, ad Paracentesin festinandum.
2. Quando cum hydrope ipso coniunctus est scirrhus, vel aliud vitium singulare visceris cujusdam nobilioris, tunc evacuat quidema aqua; resistente tamen scaturigine palliativum saltem est remedium; sic enim hydrops lemel curatus recrudescit iterum. Paracentesis igitur tunc potius administranda, quando suspicio est viscera adhuc esse valida; vasa saltem lymphatica minora, non majora, lacerata; motus humorum facile restitui posse; & à causa evidenti sola, v. g. potu immoderato, hydrops emergit; quando morbus non est adeo inveteratus; tandem quando hydrops particularis est.

His probè observatis, innoxia planè & salutaris evadet hæc operatio: vid. SYLVIVS *Prax. lib.* 1. *cap.* 17. *de Hydr.* §. 128. & 129. ac *de Affect. Epidem. Leidens.* §. 534.

Præterea juxta abdomen & scroti nimis tumidi, ad naturæ imitationem, interdum fit apertio, vel ferro, vel cauterio, atque sic optimè spongiâ admodum successivè evacuat aqua: Quæ ipsa tamen apertio, si per naturam ipsam fiat, est optima; si per chirurgiam, nec maturè administretur, non semper est æquè tuta, quia interdum scrotum hinc gangrenosum



nolum factum decidit, circa tamen periculum agri. Probè igitur hic observandum, ne, quod facile evenit, in loco aperturæ gangrænam concipiat. Labefactatur nempe partium membranarum continentium tonus & spiritus insitui vigor à contenta colluvie, quæ magis per loca aperturæ jugiter destillans faciliè mortificationem inferre potest. Hæc ipsa igitur sedulo præcavenda, defendendo partem circa locum apertum, non communibus saturninis ac similibus remediis, defensus dicitur, ad inflammationem aliàs usitatis, sed additis in specie balsamicis, resinosis, amaris, ad gangrænam curam aliàs usitatis: hinc emplastro de minio Paracelsi adaptatur emplastrum dia-sulphuris Rulandi, seu Præservativum gangrænam inhibens. Interim tamen, si gangræna seroti invaleseat, ut penitus decidat, aquis successivè evacuatis, postmodum carne quadam testis involvente, & instar pilæ eos continente, seroti defectus spontè naturæ resarciatur: vid. TIMÆUS von Guldensee in Cas. pag. 269. Id quod pariter & in hac venerea post seroti sphacelum observavi. Propter periculum hocce hydropicis raro perforatur serotum.

Post serotum & crura subinde scarificari solent, ob hanc rationem, ita excitatum fuisse effluxum aquarum, & ægros evasisse sanos: Nempe circa loca cathosa, & circa suras instituendo scarificationem lenem, ita ut incisiones à se invicem aliquantisper distant, Defensura supra & infra admovento. Promptè enim levi facta curis læsione copiosum serum transudat, linteolo molli extra frictionem abstergendum, vel appositâ spongiâ excipiendum, ac præterea loca vicina propter faciliem gangrænam metum defendenda, necesse est ovendo subinde cum spiritu vini simplici, aut theriacali, aut crocato, & imponenda desuper emplastra balsamica defensiva. Quin & ne vulnuscula gangrænam concipiant, spiritu vini camphorato lubinde eluenda sunt.

Præterea vesicæ spontaneæ subinde in cruribus se aperientes, quibus distillat multa aqua evacuat, unde isdem folium brassicæ est applicandum, utpote quod multum seri extrahit. Observatum fuit, quod plantago aquatica contusa, & pedibus nimis tumensibus applicata, vesiculas copiosas satis excitavit, quæ postmodum apertæ multum aquæ reddidit cum insigni ægri levamine. Ad hujus imitationem quidam vesicatoria locis crurum carnosius applicant, nempe vel prope suras, vel in parte carnosa femorum, & humeris; His enim apertis copiosa colluvies evacuat, & loca ista carnosia minus faciliè gangrænam concipiunt, quàm nervosa. Aquam autem intercutem saltem, non intra cavitates collectam, nisi ex abdomine serum ad crura ruat, educunt, ut, præter RIVERIUM Observat. à JACOZ commun. 21., WILLISIUS testatur; modò subtili cautela applicentur, ne, quia magnam sæpe post se illuviem ex tota vicinia trahunt, spiritusque enervant, ac calorem parrium extinguunt, sphacelum inducant, prout inter alios SEPTALIUS Animadvers. Medicar. lib. 7. §. 56. HILDANUS Cent. 1. Observ. 49. & SYDENHAM de hydropæ, animadvertunt: quæ de causa non tantum artuum extremitatibus, quàm femoribus & humeris, ac in hydrocephalo, externè pone aures ac in nucha admoveantur. Quod si sponte fiant, optimum est.

Cæterum, quoniam confertim nimis per vesicatoria fit Evacuatio, & majus de gangræna imminet periculum, potius Escharotica seu Cantheria, vel actualia vel potentialia, circa loca carnosia applicant, quæ vesicatoriis idè anteponenda, quod in principio lentè magis operentur, & ratione escharæ contra gangrænam partes firmius muniant: vid. WILLISIUS l.c. His ipsis enim successivè per parvum foramen cum minori gangræna metu fit evacuatio. Quibus tamen pariter serum saltem intercutaneum, minimè quod in cavitatibus fluctuat, educitur, nisi forsan paracenteseos vicem in ventre gerant, aut ex cavitatibus serum ad habirum, v.g. pedes, ruat. Verùm non semper imitari possumus; nam in hydrope inveterato, & in quo pedes diuturni, ac partes corruptæ apparent, in quibus casibus periculosissimum est cauteria applicare, quia frequentissimè insequi solet gangræna, quæ repit ulterius, nec eidem resisti potest. Idè non instituenda sunt nisi in corpore robusto & juvenibus, licet & hæc cautela opus sit. Modum applicandi cantheria unà cum defensione crurum à gangræna, optimè refert WILLISIUS Pharm. Ration. P. 2. Nempe fons aromaticus partem confortat debilem, cujus robur per balsamicam vim picis Burgundica conservatur, sicque gangrænae metus optimè præcavetur. Quin & puncturæ cum acubus ob evacuandas aquas optimè institui

possunt: vid. WILLISIUS l.c. Nihil tamen refert, si per scarificationem chirurgorum, si ve acu saltem communi, quam VILLISIUS commendat, paracentesis instituatur, modò aquarum profluvius præceptis ac nimius præcaveatur. Hisce succedit denique profundior paululino anguium abscessio, in specie in digitis pedum, qui modò utilissimus est; hæc enim occasione successivè quasi aqua transudans & destillans hydropicos deserit, idque sine periculo, potius cum emolumento: videatur SCHENCKIUS in Observat. & SENNERTUS l. 3. Prax. P. 8. S. 2. c. 7. Remediis chirurgicis quoque accessentur ligatura expulsiua, quales non saltem in tumoribus pedum oedematosis interdum magnæ efficaciz observantur, sed RIVERIUS quoque à FOMIO commun. observat. 6. in hydrocephalo quoque recens nati infantis, sine ullis aliis remediis effectum singularem præstitisse perhibet: sine dubio, quatenus in partibus compressis influxus seri ulterior inhibeatur, ut reliquum ejus vel à venis ac lymphaticis vasibus resorbeatur, vel per emunctoria solennia eliminetur.

His modis prima Indicationi satisfieri solet.

Hæc interim dum fiunt, & postquam facta, antecedentis etiam causæ habenda est ratio. Quoad secundam igitur Indicationem: In usu sunt ALTERANTIA in genere sic dicta, varianda subinde pro causarum remotarum differentiis. Quæ tamen ordinariò ferè locum habent, sunt imprimis Martialia & amara, aliàs Hepatica & aperientia, calefacientia dicta, humorum visciditatem corrigentia, incidentia atque corrigentia: quæ inter excellit absinthium, adeò ut existimem, potissimam hydropis curandi vim sibi esse in Marte & absinthio. Juxta hæc sunt & veronica, ceterach, satyria, scolopendria, cortex fraxini, vincetoxicum, chelidonium maius, rhabarbarum, marrubium, rubia tinctorum, allium, hederæ terrestris, bellis minor, rob juniperi & sambuci, tartarea quævis, lapis ceramius seu fulminaris: quæ omnia cò nobilioris sunt effectus, quò ipsorum usu, sed additorum aliorum ratione, copiosior urinæ fluxus supervenit. Hinc quælibet Martialia aperitiva, pulv. res. & extr. anticacchctica, præsertim cum tartaro præparata, aut sociata, tartari martiales, croci martis aperitivi, essentia martis liquidæ, & similia, sunt convenientissima, isdem temporibus cum aliis alterantibus usurpanda; quibus à purgantibus vacamus. Martialia magni ab omnibus in his casibus æstimantur, quatenus non saltem acrimoniam humorum temperant, sed eosdem quoque in fermentationes novas cient, prout VILLISIUS de Morbis convulsivis cap. 11. & Pharm. Ration. Part. 2. Sect. 2. cap. 5. docet: sic vinum martiale hydropicum Cnassellii videb. in M. A. N. C. ann. 6. app. pag. 107, ubi simul integræ hydropis cura, tam per interna, quàm per externa reperitur. Quod referenda quoque cura hydropis, quæ recensetur in BARTHOLINI Alis Hassiens. volum. 5. observat. 119. Absinthium nobilissimum est simplex in hydrope quocunque usu; cerevisia, vinum, essentia, extractum absinthii, &c. singulariter hydropicis conducunt. Solius absinthii usu plures hydropici curati observati fuerunt: vid. M. A. N. C. ann. 7. observat. 322. & ann. 9. & 10. observat. 18. RHODIUS Cent. 3. Observat. 12. & FEHRIVS de absinthio pag. 116. Unde quidam regulant spiritum salis cum sale absinthii, & hoc tanquam sal salum tertium seu expertum ad hydropem commendant, cum potenter aperiat. BORELLUS Cent. 2. Observat. 53. Decoctum veronicæ laudat. Vincetoxicum à pluribus decantatum specificum est, cujus Decoctum per sudorem & urinam specificè hydropicis confert: vid. M. A. N. C. ann. 1. observat. 57. Rhabarbarum alterans quoque specificum ad hydropem, ita ut existimem, electuario facto ex rob juniperi cum rhabarb. multum præstari posse in hydrope: c. g.

R. Rob juniper. ʒij.

Extract. Martis cum succepom. ʒʒ. vel ʒvj.

Pulv. rhabarb. elect. ʒij. vel ʒij.

Cum aqu. cinnam. f. electuarium.

Confirmat RIVERIUS in Observat. commun. dum refert, post vomitum sanguinis ortum ascitem per infusionem rhabarbari pro potu ordinario curatum.

Chelidonium maius, item marrubium specifica sunt ad hydropem, præsertim si icterum insequatur. Allium quoque vi alterativa & diuretica hydropicis multum confert, de quo supra, ubi de diureticis.



De *hedera terreſtri* aliquot novi exempla: eſt hiſc vir, maximè ad anafarcam prociſſis, & cujus crura jam aliquoties inſigniter tumefacta copioſum ſerum per aperta ulcuſcula, emiſere; hic per *Decoctum hedera terreſtris & abſinthii* in cereviſia ſecundaria quotidie aliquoties calidè bibitum haſtenus pancreaticè vixit; ſiquidem ſemper copioſum urinae fluxum procuravit; ſicut ſimul quoque *abſinthii* familiaris ipſi erat uſus. Quoad *hederam* verò *terreſtrem*, notabile eſt ſequens exemplum: Mulier quædam deſperatè hydrope laborans, & à medicis relictà, uſu *ſucci radicis iros in vino Malvatico* hauſit, & interno & externo ulu *herba hedera terreſtris* convaluit: nempe aniculae ſuaſu extitit *hederam terreſtrem* locis tumentibus impoſuit, unde notabiliter tumorem remittere obſervavit; quò ipſo animata & ipſam herbam in aqua vel cereviſia decoctam calidè & copioſè hauſit, & tali hujus uſu, cum *ſucco iros* interdum repetito, convaluit. FERDINANDUS *effentiam orisinarum* ſingulariter commendat. *Rob. inniperi & ſambuci* vi alterativà bilis & ſanguinis, diaphoreticà, ac diureticà multum valent in hydropicis, adeoque pro corpore Eleſtuariorum aut aliarum formularum commodè inſervire poſſunt. Ex *tartaro tincturati tartari acris*, vel ſola, vel in ſcorbuto cum ſpiritu cochleatiz miſta, *terra foliata tartari*, *tinctura martis tartariſata Ludovici*, *tinctura vitrioli martis Zuvelferi*, *ſpiritus tartari probe reſtificatus*, ac ſimilia *ſal tartari*, &c. polychreſta ſunt, & tanquam digeſtiva purgantibus præmittenda optimè conveniunt. Quoad *ceranium* præparatum, vid. ſuprà, ubi de diureticis. Pariter hujus loci erit, quod MARCELLUS DONATUS *Hiſt. Mirab. lib. 4. cap. 21.* reſert: quendam hydropicem aſſiduo labore ſine ullis aliis remediis fuiſſe curatum. Illud de digeſtivis ac incidentibus adhuc notetur, quod SYLVIVS ſæpiùs inculcat, ut, dum illa aſſumuntur, in lecto ſe contineat, & ad blandum ſudorem corpus diſponat æger; ſic enim faciliùs præſtant, quæ præſtare debent: quatenus hac ratione illorum morus ad partem affectam, æquè ac operatio in humorem peccantem, notabiliter promovetur.

Ex his variz fieri poſſunt formulæ contra hydropem. In principio imprimis Nodulus cum ſale tartari convenit: v. g.

*R. Rad. vincetox. ʒiſs ad ʒij.*  
*Herb. chelidon. maj.*  
*Marrub.*  
*Abſinth. an. Mj.*  
*Cortic. citri,*  
*Aurant. an. ʒvj.*  
*Sem. fraxini,*  
*Cumini,*  
*Aniſi,*  
*Feniculi an. ʒij. vel ʒiij.*  
*Bacc. junip. contuſ. ʒiſs.*  
*Galang.*  
*Caryophyll.*  
*Gingib. an. ʒi.*  
*Sal. tartari ʒvj. (vel ſal. tart., abſinth. geniff. an. ʒi. ad ʒij.)*

Incis. & contuſ. inſund. vino, pro repetitis pro lubitu hauſtibus.

Idem facile poteſt fieri purgans, addendo radicem Rhabbarbari, hellebori nigri, eſulæ non præparatæ, &c.

Vir quidam hydropicus ſequenti Nodulo fuit curatus, quem mirè per urinam evacuare dicebat:

*R. Rad. cichor. ʒiij.*  
*Gram. ʒij.*  
*Gentian.*  
*Helenii,*  
*Cortic. rad. cappar. an. ʒi.*  
*Ligni ſaſſafr. ʒij.*  
*Com. abſinth. vulg.*  
*Pont.*  
*Fol. card. bened.*  
*Summ. centaur. min. an. p. j.*  
*Flav. cort. citri ʒij.*  
 Ex incisis ſ. Nodulus.

Cui aſſundatur dimidia menſura vini *Malvatici*, ſeu alius *Hiſpanici*, ſtente in loco tepido per diem & noctem: hinc bibatur mane hauſtolus unus, horà unà ante uſum juſculi. Continuentur autem tales poriones necesse eſt aliquandiu.

Omni ſeptimanà ſimul bis *clyſma emolliens & carminans* applicatum ſuit, & ſimul *ſacculus ex aromaticis & carminantibus* in aqua vel vino coctis abdomini & ſcrotò impoſitus fuit. Item

*R. Malvat. inniper. ʒij. ad ʒiſs.*

*Spir. aperit. Penoti ʒij.*

M. D. S.

*Effentia aperiens.*

Dosia guttis 40. ad 50. Item

*R. Spir. carminat. de tribus ʒiſs.*

*Salis ammoniaci ſimpl. ʒij.*

M. D. S.

*Spiritus aperiens.*

Dosia ʒiſs. aliquoties in die, in vehiculo conveniente. Item

*R. Salis ſimi columb. vel ſarment. vitis ʒj.*

*Pulv. buſon. ʒiſs. vel ʒij.*

Miſc. pro pulvere:

Div. in 2. part. æquales:

D. S.

*Singularis pulvis contra hydropem.*

Hæc tantum pro formulis; Uſus & experientia plura docebit.

Item fiat *vinum chalybeatum* ad imitationem HARTMANNI, ubi de cachexia, in quo coquitur *abſinthium*, *rubia tinctorum*, *carduus benedictus* &c., quod commodè propotum ordinario uſurpari poteſt.

*Seri acrimoniam*, quam cauſam interdum eroſionis vaſorum eſſe ſuperius dixi, corrigunt diverſa diverſitati acrimonie reſiſtentia, præprimis tamen lentore notabili denotata, v. g. *tragacanthum*, *maſlux*, *radix cynogloſſæ*; & *olea ginoſa*, ut ſemen violarum, & *hyoſcyami*, ac nucleorum emulſiones; item *Terrea & Teſtacea*, v. g. *lapilli cancro-rum*, *mater perlarum*; & *Balfamica* ſeu *vulneraria*. Quamvis negandum non ſit, ejusmodi acrimoniam rariùs in principio ſubelli, ſed cum ſero demum evacuato contrahit; al às in hydropicis ſequentiores viſcerum eroſiones ſorent. Quod ſi verò vaſorum & viſcerum obſtructiones atque indurationes circulationem ſeri turbent, hinc hydropi occasionem præbeant, harum medelæ incumbendum per illa, quæ diuretica, diaphoretica & attenuantia ſuperius dixi; quamvis parum admodum ſpei in poſteriore caſu ſubelli ex prognòſi conſtet.

Tandem etiam fibrarum coranearum laxitatis & imbecillitatis cura habenda eſt, qualem & per eam hydropem trigus induxiſſe videtur apud BARTHOLINUM *Cent. 6. Hiſt. 17.*, adeoque ſæpè copioſioris ſeri aſſluxus cauſa exiſtit. Scopo huic ſatiſfaciunt nervina ſpirituofa, balneo-rum, pediluviorum, ſotium & licium formæ applicata: e. g. in cruribus œdematoſis optimè applicatur ſpiritus vini, ſpiritus vel aqua articularis, *Balfamus Anglicus*, aqua vitæ Saxonica, &c. item Emplaſtrum de Alcalibus TACHE-NII in *Morbor. Principe*. Adſtringentia, quæ RIVERIUS obſervat. *communic. 9. pag. 369.* MARCELLUS DONATUS *lib. 4. cap. 21.* aliique commendant, merito reſciſci, cum ex pororum occluſione, & hinc tranſpiratione inſenſibili impediua, plura mala oriri, imò ipſe hydrops regenerari poſſit.

Denique ſi *eroſio atque ruptura vaſorum ſimiliumque organorum ſubſit*, conſolidantia ſeu vulneraria propinentur, quatenus agrimoniam, chæreſolium, veronicam, verbenam, *vincetoxum*, &c. hydropicis multum prodeſſe, experientia comprobat.

Et hæc eſt Cura hydropis ordinaria.

De extraordinariis ejus Curis, quando per continuam ſitum, vel per eum halecis ſine omni potu, quale exemplum in *Paraliſomen* habet SENNERTUS *pag. 149.*, item quando æger hydropicus reſit in ſurnum piſtorium, ita ut caput ſaltem promineat, nihil amplius moneo.

Porò in hydrope duo ſymptomata maximè urgent, nempe *difficilis Reſpiratio & clamor ſitis*.

Quoad *Reſpirationem difficilem*: ſuprà ſub puncto anafarcæ curandæ dixi convenire vomitum. Interim uſitatum quoque eſt ſperma ceti à ʒiſs. ad ʒj. in vehiculo fervido vel vino *Malvatico* uſurpatum, quod ipſum remedium efficax deprehendi.

Quoad verò *ſitum clamorſam urgentem*, quæ eſt unum & præmiſſis ſymptomatis hydropicis, cum nimia potus ingurgitatio



glatio noceat, opera detur, ut fallatur, & palliative sistatur; quod fit per mastichen, si nempe grana hujus in ore retineantur, & sedulo masticeantur; sic enim blandus sapor ex illa prolektus sitim compescit. Quò magis enim abstemii sunt à potu hydropici, eò facilius curantur. Siquidem plura prostant exempla hydropicorum solà potus abstinentià curatorum: vid. HILDANUS cap. 4. observat. 41., ubi refert, hydropicum, qui potus abstinentià per 4. septimanas curatus est. Quod si verò necesse sit, ut bibat æger, imitemur RULANDUM, qui meliorem inventionem

R. Bacc. juniper. contus. M. ij. vellij.  
Decoqu. in fers lact. ℥vj.

Et ita hoc Decoctum propinat pro Potu ad sistendam hydropicorum sitim, quod elegans est ob vim diureticam latentem: cui addit parum de succo granatorum.

Nitrum optimè purificatum continuò in ore retentum, ut liquecat, proficuum est hydropicis; aut etiam potui eorundem cuique additum sitim temperat, urinam ciet, & optimè ipsam confert. Sic quoque radix liquiritiæ masticata cum passulis & similibus in ore detineatur, aut assumatur, temperando acce salum, sitim excitans, hanc mitigat. Vinum seu succus granatorum, aut julepus cum succo granatorum temperatus, non immeritò ab HARTMANNO commendatur: vel spiritus salis dulcis parva in dosi subindè propinatus ad sitim egregius est, simulque diureticus; item spiritus salis coagulatus Rhumelli. Acetum aquà chalybeatà dilutum, abluendo os usurpatum, etiam sitim fallit. Subindè etiam tinctura florum bellidis potui additur ad mitigandam ferociam sitis.

Hæc fuerunt Interna.

Præter hæc Interna etiam Clysmata multis usibus hydropicis inserviunt, præsertim cum pectoris ac capitis urgent symptomata, utpote serum è valis atque substantia intestinalium ac mesenterii sine torius massæ sanguineæ exagitatione prolicientes, ita ut illà depleat serum extravasatum, liquantulum imbibant. Enematum ejusmodi ingredientiæ sunt hydragoga cum aromaticis mixta, v. g. herba græcolæ, soldanellæ, betæ, flores genistæ, sambuci, chamomillæ, centaurii minoris, radix ireos nostratis, bryoniæ, cortices interiores sambuci, frangulæ, semen carthami, cumini, carvi, &c.; quæ majoris efficaciz erunt, si in urina decoquantur: v. g. pro clystere stimulante

R. Decoct. fl. chamom. ℥ss.  
Urin. hum. ℥ij.  
El. lenitiv. ℥vj.  
Ol. destill. tereb. ℥j.  
M. pro Clysmate: S.  
Clyster abducens.

Ex acrioribus

R. Cortic. interior. frangulæ,  
Sambuc. an. Mj.  
Herb. absinthii M. ij.  
Rad. bryon. ℥j.  
Ireos nostrat. rec. ℥vj.  
Baccar. junip.  
Lauri an. ℥ij. vel ℥ss.  
Sem. cumini vel carvi,  
Feniculi an. ℥j.  
Coqu. in f. q. urinæ pueri. vel fers lact.  
R. Colatura ℥vij. vel ℥j.  
in qua dissolve  
Electuar. biera cum agar.  
De bacc. lauri an. ℥ss.  
Vitell. ovor. no. j. vel ij.  
M. f. Clysmata pro 2. dosibus: S.  
Clysmata abducens pro 2. dosibus.

R. Cortic. interior. frangulæ,  
Sambuc. an. M. j.  
Rad. bryon. ℥j.  
Ireos nostrat. rec. ℥ss.  
Bacc. lauri,  
Juniper. an. ℥ij.  
Coqu. in f. q. aquæ comm. addendo parum urinae pueri:  
R. Colat. ℥ix.  
adde

Mellis parum.  
M. f. Clysmata: S.  
Clyster abducens.

Muria balneis cum passulis loco clysteris inlici potest Clysmata autem ex urina humana, in specie pueri, perquam sunt egregia, idque in specie, ubi flatu simul adfuerint, quos dispellit urina. Nam varo sola aqua in hydropo peccat, sed sæpe simul exuligine ista simul flatu generantur, exasperantes malum: in quo casu salutarè cum successu applicantur Clysmata cum & ex urina pueri, in qua modicum fermenti ac seminum carminativorum coctum cum melle; vid. VALERIOLE 1. 1. obs. 2. M. A. N. C. ann. 2. obs. 219. in schol. p. 320. & SENNERTUS 1. 3. Prax. cap. de hydropo quorum ad imitationem

R. Sem. apii vel anisi,  
Fenic. an. ℥ij.  
Fermenti comm. ℥ss.  
Coqu. in f. q. Urinae pueri:  
R. Colatura adde  
Mell. despum. ℥ss.  
Ol. destillat. terebinth. ℥ss.  
M. pro Clysmate: S.  
Clyster flatu dispellens & abducens.

R. Sem. feniculi vel anisi,  
Fermenti comm. an. ℥ss.  
Coqu. in aqua communi:  
R. Colatura ℥v. adde  
Urinæ pueri ℥v.  
in quibus solve  
Mellis despum. ℥j.  
M. pro Clysmate:  
D. S. ut antè.

R. Decocti carminat. ℥vj.  
Urinæ hum. ℥ij.  
Fermenti ℥j.  
Salis commun. ℥j.  
Mellis rosati ℥j.  
M. pro Clysmate:  
D. S. ut supra.

Non immeritò terebinthina hæc commendatur, cum clysteres ex mera urina pueri, in qua aliquid terebinthinæ, & nitri dissolutum fuerit, admodum laudentur à WILLISIO l. 4. pag. 318. & 321., utpote qualis clyster non saltem intestinalia ad deponendum serum vellicaret, sed hujus etiam aliquam portionem virtute sua diuretica ad renes moveat: c. 8.

R. Urinae humanæ ℥j.  
Terebinth. Venetæ cum vitell. ovi solut. ℥j.  
ad ℥ss.

Nitri depur. ℥ss.  
M. f. Enema, quotidie applicandum.  
D. S. ut supra.

Præterea externa quoque abdomini asciticorum, ut & scroto tumefacto, vel labiis vulvæ nimis tumentibus, & pedibus ipsis inflatis & tumidis, varia applicanda sunt, ut nempe successivè resolvatur tumor illorum œdematosus, & ipse liquor contentus attenuatus partim insensibiliter, partim sensibiliter discuti queat, nunc per Fomenta, nunc Cataplasmata, nunc sacculos interpassatos in vino vel lixivio. In leviori malo herba chelidonii majoris, aut etiam Gerani Robertiani, contusa, & plantis pedum applicantur. Singulare quid obtinet radix bardanæ, vel folia recentia contusa plantis pedum alligata, conveniunt; singulari enim experimento potenter resolvere, & multas serositates elicere dicuntur. Petroselinum recens contusum & scroto applicatum etiam conducere observatum. Externa hæc scroto, abdomini & pedibus applicanda, in genere sunt in duplici differentia: nempe vel aromatica attenuantia & discutientia, vel salina nitrosa dissolventia: Aromatica discutientia sunt folia & flores sambuci, folia ebuli, folia & semen chamomillæ, folia lauri, menthæ, origanum, absinthium, radix & succus cucumeris asinini, radix bryoniæ, asari, baccæ lauri, & juniperi, semina milii, carminativa calida minora, & similia: in specie chelidonium majus, quod ipsum in tumoribus pedum œdematosi, supervenientibus morbis chronicis aut acutis, acetum ex errore dicitur, aut dyscrasia bilis subor-



subortis, plantis pedum applicatum eisdem solet resolvere & insigniter minuere. Nam *furfures*, & *furfuribus* decoctis parati sacculi, unâ cum pulvere cumini, ventri applicati, admodum commendantur à **STOECKERO** in *Praxi*. Omnium optima sunt *stercora animalium* pro externa emplastratione, quæ ratione salis nitrosi miram vim obtinent discutendi insensibiliter hydropicorum colluviem, in specie *stercus caprillum*, hinc *columbinum* & *bubulum*. *Stercus humanum* quidem aliâs præferunt: sed applicatum nimis ferit nares. Sanè *stercus caprillum* contusum prius, vel *columbinum*, bulliat cum aqua simplici vel calcis vivæ, probè subactum instar cataplasmatidis liquidum applicetur: item *stercus bubulum* subactum cum pulvere cumini cum successu applicatur: fortius est *stercus caprillum* cum urina humana subactum, & cataplasmatidis instar abdomini instratum, aut pedibus aut scroto applicatum mirificè tumorem discutit: aut quoque *stercus vaccinum* aut equinum cum farina hordei mistum, cui addatur acetum destillatum, invicem inflammatio, quam discutit, imminet. Inter salina convenit lacculus ex cineribus acialetoisto paratus: vid. **SYLVIVS** de *hydr.* §. 125. Cum urinis puerorum facta ex vegetabilibus cataplasmata insigniter commendantur. Præ reliquis eminet istud euporiston, nempe *aqua calcis vivæ* seu aqua benedicta chirurgorum singulariter in tumoribus serosis discutendis, vel solitaria, vel imprægnata spiritu vini, spongiâ vel linteo applicata crebrius, & quidem calidè scroto vel toti abdomini insternitur. Ac sanè multum latet in hac aqua ob salia duplicia, quæ habet in recessu. In specie si immineat pedibus oedematosis *gangræna*, quod ipsum ex maculis constat, hæc aqua erit convenientissima, tam quod dissolvat tumores, tam quod à *gangræna* præservet. Cum aqua hac ergo reliqua jam dicta in cataplasmatidis formam coqui, & ita imponi possunt: e.g. ex urina pueri:

℞. *Fol. sambuci*,  
*Fl. sambuci* vel *chamom.* an. Mj. vel ij.  
*Sterc. caprill. contus.* ℞j. vel ℞ij. ad ℞ij.  
*Sem. q. calid. maj.* an. ℞ij.  
*Rad. bryon. rec.* ℞ij. ad ℞ij.

Coq. in f. q. aqua vel urina pueror. ad consisten. cataplasmatidis: S.

#### Cataplasma dissolvens.

Applicetur abdomini vel scroto.

Cataplasma expertum ex radice cucumeris asinini cum pulvere cumini commendat & describit **RIVERIUS** c. 1. observat. 70. & *Prax. lib. 11. cap. 6.* Spectat huc cataplasma ex ramentis coriariorum recentem ex calce viva paratum, quod **RIVERIUS** de *Morbis Infrequentibus* Obs. 33. commendat: item cataplasma ex stercore bovino, sulphure, semine cumini & urina; aut ex raphano contulis; vel quod **RIVERIUS** *Prax. lib. 11. cap. 6.* describit, cuiusque efficaciam *cent. 1. observat. 70. & Cent. 2. observat. 90.* confirmat:

℞. *Stercor. bovin. sicc.* ℞j.  
*Sulphuris vivi*,  
*Sem. cumini pulveris.* an. ℞ij.  
*Urina puer. q. l.*  
 M. f. cataplasma: S.  
 Vt supra.

Præ cæteris singulare quid obtinent contra tumores scroti & pedum *cochleæ* recentes, cum suis testis contusæ, & ventri hydropicorum ac scroto tumenti ad modum cataplasmatidis applicatæ: quæ si sicce fuerint, aliæ rursus imponendæ. Singulariter conveniunt tam in abdominis quam testium tumore; quod remedium ceu secretum & efficacissimum à **CASTRO**, **THONERO**, & aliis Autoribus æstimatur hoc in casu: nempe parant cataplasma ex *cochleis cum testis contusis*, adpersio pulvere *stercoris caprilli* & seminis carvi; aut

℞. *Flor. chamom. simpl.* vel *Rom.* M. ij.  
*Farin. fabar.* ℞vj. ad ℞j.  
*Cochl. cum testis contus.* ℞iv. vel ℞ij.  
*Sterc. caprill.* ℞ij. vel ℞ij.  
*Pulver. sem. cumini* vel *carvi* ℞j.  
 Coquantur in  
*Aqua simplic.*  
*Aceti* an. part. equal.  
 (vel aqua part. iv. & aceti part. j. vel  
 etiam in sola aqua)

#### Pro cataplasmate:

D. S. ut supra:

Et applicentur in excessivo tumore pedum, vel scroto tumente.

℞. *Cochl. cum suis testis contus.* ℞j.

*Pulv. sem. carvi* ℞ij.

*Sterc. caprilli* ℞j.

M. pro Cataplasmate: S.

*Cataplasma discutiens.*

Quod tepidè imponendum est in resolvendis tumoribus serosis, in hydropè tam universali quàm particulari. Et sanè huiusmodi cochleas vel limaces cum testis contritis & applicatas abdomini, ceu secretum singulare commendat **PETRUS à CASTRO**, quo ipse etiam usus fuit in cura Hydrocephali.

Item

℞. *Bacc. juniperi* part. iv.

*Lauri* part. ij.

Pulverisata, & melle excepta insternantur abdomini; quo curatus fuit *Hydropicus*, qui ex nimio spiritus vini abusu hydropem contraxerat: cuius loco Cataplasma ex foliis *rutæ* & *absinthii* ana cum melle subactis, abdomini applicari potest.

Quibus molesta forent hæc Cataplasmata, illi usurpent Inunctiones per olea aromatica, quæ simul etiam urinam movent; prout exemplum à **WILLISIO** l. a. c. 5. de inunctione olei scorpionum anafarcâ laborantis, & per diaresin sanati, testatur: qualia sunt v.g. linimenta ex oleo laurino, sambuci, anethi, scorpionum simplici & composito, in specie busonum, oleo destillato juniperi, carvi, torismarini, & similibus: cum quibus unguentum *Agrippæ*, vel de *Arthanita*, vel *Martiatum*, vel *Emplastrum de baccis lauri*, *hydropicum Augustan.*, vel *diaphoreticum Mynsichtii*, & similia malaxentur, & ita locis tumidis insternantur. Item unguenta ex sulphure & calce viva cum *Vegetabilium acrium Extractis mucilaginosi*: hinc v.g. *Unguentum de calce viva Augustan.* & unguentum, quod **RIVERIUS** *Cent. 3. Obs. 97.* describit, conveniunt:

℞. *Ol. de cappar.*

*Tamarisc.* an. ℞ij.

*Succ. ebul.*

*Cucum. agrest.* an. ℞ij.

Bulliant ad succorum consumptionem.

Colaturæ adde

*Sem. agni casti*,

*Petros.*

*Macis pulveris. subtilissimi* an. ℞ij.

*Ol. nucis.* ℞ij.

*Cera q. l.*

M. f. Linimentum.

Quo illinatur totus venter calidè in introitu lecti. Aliàs etiam locum invenit Inunctio partium tumulentium cum spiritu vini, vel simplici, vel juniperino, addendo parum de oleo carvi.

Alii olea busonum, scorpionum, juniperi, laurinum ana, similiter abdomini illinunt. Vel

℞. *Unguent. de Arthanita* ℞j.

*Agrippæ*,

*Dialthea* an. ℞ij.

*Ol. scorpion. f.* ℞ij.

*Chamom.*

*Aneth.* an. ℞ij.

M. f. Unguentum:

Crebrè tepidè abdomini illinendum: S.

*Unguentum discutiens.*

℞. *Unguent. de Arthanita* ℞j.

*Agrippæ* ℞ij.

*Ol. scorpion. f.* ℞ij.

*Destillat. buson.* ℞ij.

M. invicem & illinantur abdomini.

D. S. ut antè.

℞. *Unguent. de arthanita* ℞j.

*Agrippæ*.

*Dialthea* an. ℞ij.

*Ol. scorpion.*

*Chamom.* vel *anethi*,

*Amygd. dulc.* an. ℞ij.

*Succi raphani* ℞ij.

M. f. unguentum crebrius abdomini illinendum.

D. S. ut supra.

Bal-



Balnea à quibusdam commendantur: sed vix, nisi in Anasarca, locum habent.

Quod si *gangrena aut ulcera pedum vel scroti* in Hydropticis adsint, Topica pro his selecta vid. in M. A. N. C. Ann. 6. & 7. Append. p. 110.

De *Curis magneticis* ad Hydropem usitatis, nempe dum vesica suilla urinæ ægri impletur, in fumo suspendenda; vel dum sanguis ægri putamini ovi includitur, &c. nil attinet dicere. Item, dum rasura unguium manuum ac pedum cum sindone rubra cancro vivo in dorso alligantur, & ita in aquam fluentem proiciuntur.

Hæc de Anasarca, Cachexia, & Hydrope.

Pergo ad alia vitia nutritionis læsæ; & quidem ad affectus cachecticos multa alia pathemata pertinent, adeò, ut etiam sub cachexia *Icterus* seu *cachexia ictERICA* comprehendatur, corpus vel flavescit, vel nigrescit, vel viridescit, vel plumbeo fit colore.

Sit ergo

## ARTICULUS IV.

### D E

### ICTERO FLAVO, NIGRO, & ALBO.

**I**cterus seu morbus argutus, totius corporis cachexia, partibus solidis flavedinem inducens, urinam obscuriore rubedine tingens, ut plurimum cum cardialgia, dolore hypochondriorum, præprimis dextra, torminibus ventris, alvi segnitie, interdum diarrhœa biliosa ac lassitudine membrorum, item lipothymia conjuncta, est multiplex, ejusque tot sunt species, quot colores in corpore efflorescentes observantur: nempe datur Icterus niger, plumbeus, vitidis, qualem PETRUS FABER *Cur.* 28. 69. 71. recenset. Licet autem varii sunt quoad colorem, in radice tamen omnes conveniunt, & sunt unus idemque morbus, ac saltem gradualis causæ morbosæ differentia à se invicem distinguuntur. Quando ægri colore flavo, in corporis peripheria efflorescente, tincti observantur, vocatur *Icterus flavus*: quod si flavedo ista nunc ad viriditatem, nunc ad cæruleitatem, nunc obscurum livorem inclinet, *Icterus niger* vocari solet.

Quoad *Historiam* affectus hujus: Icterus præsens quidem se facillimè manifestat, imminens verò difficulter à priori cognoscitur. Aliàs omnes *IctERICI*, præsertim *primarii*, de dolore compressivo præcordiorum & stomachi, interdum vix tolerabili, miserè conqueruntur: vid. M. A. N. C. Ann. 4. & 5. Obs. 99. p. 102. item Ann. 6. p. 302.: quas præcordiorum inenarrabiles angustias Icterus ferè commutari solet, licet cor planè sit innocens: hinc supervenit fastidium ac nausea alimenterum; subindè cephalalgia admodum intensæ, vertigines & scotomix conjunguntur, ita ut ægro syncope & lipothymia imineat. Adest præterea lassitudo totius corporis & omnium membrorum, sæpius dolores gravativi in regione lumbari: subindè difficiles admodum respiraciones anxietatibus istis præcordiorum junguntur, ita ut spiritus defectu vix verbum proferre queant: *Urina* imprimis icticum flavum manifestat, non quod lutea appareat, sed potius, ut vocat ZACUTUS LUSITANUS, *passæa*, i. e. *crasse tincta, rutilante colore, obscura, crassa, opaca, magis magisque rubicunda*, Germ. *tunckel und garstig, nicht gelbe*, cui linteum candidum immersum flavissimo colore, tanquam si croco tinctum esset, imprægnatum extrahitur, quod aliz urinæ quæcunque colore quamvis intensissimè flavo, non faciunt, & vix in ullo alio morbo contingit, undè certi simus de Ictero: quod si subsederint, sedimentum quasi argillaceum seponunt: interdum ex viridi nigricantes observantur *urine*. Hinc successivè habitus corporis mutatur, & primariò in oculorum albo solet vel flavedo vel nigredo apparere; cujus rei ratio nulla est, quàm quod album oculi sit rete mirabile, ex variis minutissimis arteriis intertextum, uti patet hoc in ophthalmia, ubi hæ ipsæ magis sunt conspicuæ; per quæ vasa distributum contentum flavum, istud insensibile magis tingit, cum minus sit coloratum. Jam ergò cum tanta recrementa in massa sanguinea contineantur, fit ut successivè vitiatior color emergat, donec magis magisque corpus tingatur, quæ Tinctura adeò intensa observata fuit, ut linteamina sudor prorumpens colore flavo infecerit. Sa-

por ut plurimum, idque in confirmatis, non in omnibus, *amaricans*, aut etiam *varius* in ore percipitur, ut plurimum est nonnihil amarus ex lymphâ corrupta, cui ferè semper *sitis clamosa* jungitur, unde & cerevitiâ horrent ægri, alium appetentes potum. Iund Ictero cum febre conjuncto alvus nunc est fluida, nunc diarrhœa quasi biliosa est juncta; sicut talem etiam observavi in puero, feces tinctas excernente: nunc è contrà pertinaciter clausa, & quæ nullis Purgantibus referari potest, excrementis prodeuntibus albicantibus; uti id observavi ipse in muliere per octiduum alvum non deponente, tandem feces albas & candicantes monstrante: idque contingere solet, quando ductus sellei in intestinum hiantes undecunque sunt obstructi, & sic quasi fluxus coeliacus affligit. *Febri interdum juncta est*, interdum penitus abest, interdum adest ante icticum, cui quidem icterus supervenit; nunc criticè, prægressis signis coctionis diebus criticis obveniens, nunc symptomaticè sine coctionis signis prorumpens; per se tamen icterus sine febrili insultu solet emergere. Nunc cum ictero simul advenit febricula levis, ortâ ex fermentatione sanguinis aucta, quæ præcipitantur feces massæ sanguineæ. In quibusdam, non in omnibus, dolor in hypochondrio dextro obtusus in profundo percipitur. Subindè facillè curatur, subindè autem est nimis contumax, aut semel curatus facillimè recidivans; quo in casu sæpius calculi in vesica sellea observati fuerunt, qui ipsi suo modo sunt icteri crebrius recidivantis, aliudque nullum habemus signum calculorum.

Icterus nunc est morbus *primarius*, nunc est morbus *secundarius*. Hic, quando vel febris supervenit, idque iam continuis, quàm intermittentibus chronicis, sive sit *criticus*, post prægressa coctionis in urina signa die judicatorio superveniens, sive sit *symptomaticus*, vel quando à nonnullis venenis assumptis, & imprimis à morsu animalium venenatorum, icterus oritur. Exempla nonnulla curiosa refert MARCELLUS DONATUS in *Hist. Med. Mirabil.* l. 1. c. 7.: & post morsum araneorum irritatarum icticum flavum observavit JOEL in *Praxi ubi de venenis* p. 126.: ex viperæ morsu suboriri ordinariò ferè icticum jam Veteres annotarunt; sicut ZACUTUS LUSITANUS l. 5. *Medic. Princ. Hist.* 29. refert: Nec tantum viperæ, sed & canis rabidi, morsu ortus fuit Icterus contumacissimus: Icterus lethalem à manducatione seminis staphisagritæ notat LOSSIVS in *Obs.* l. 3. Obs. 38. p. 259. Vel denique affectus convulsivos intestinorum, præsertim tenuium, sequitur: sic à partu laborioso subindè observatur superveniens Icterus: passioni hysterice quoque sæpius in muliere quadam supervenire vidi: Colicis torminibus subindè Icterus supervenit: Quod pertinet, quod refert BARTHOLINUS *Cent. 5. Hist.* 62., Ictericum provocatum per medicamentum sudoriferum in Colica assumptum: sic ictericum vulnerato capiti supervenientem die 4. notat HOECHSTEDTERUS *Dec. 8. pag.* 198. Nempe licet vulnerebus capitis gravioribus tertiâ die aut etiam quartâ vomitus biliosus supervenire solet; ita & consensus istius ratione etiam Icterus, nempe secundarius.

Quoad *Ictericum primarium*: Causa remota sunt varix: Non ultimum locum obtinet *irritatio*, quæ nunc inchoat, nunc fovet icticum, teste HELMONTIO *Tract. Sextuplex Digest.* 5; 56. Sic ictericum curatum à tristi nuncio recidivantem referunt BARTHOLINI *Acta Med. Hassniens.* Vol. 3. pag. 82. *Iracundia* etiam non rarò icticum provocat; Nempe RIVERIUS *Cent. 2. Observat.* 9. icticum mirandum in graviora ex ira refert, in qua feces alvi erant biliosæ, & in lecto exiguum, extra illum intensam patiebat flavedinem. Obstructiones ductus choledochi subindè in Ictericis observatæ fuerunt. Ante aliquot annos hic vixit quidam, qui pertinacissimâ alvi obstructione, cum colica intensissima affligebatur, cui icterus & febris continua superveniebant, hique lethales: Ab obitu dissectione factâ adverterunt fellis vesiculam grandem & confertissimam, infimumque porum viscidâ pituitâ penitus obstructum, adeò ut post abscissionem hujus ductus biliaris neguta quidem bilis profunderet, quia bilis ibi contenta crassissima atque tenacissima erat. Ac sanè in pluribus Ictericis vel bilis viscida, amuræ similis, vel calculi plures vel pauciores, majores vel minores, in cystis fuerunt inventi: vid. BARTHOLINI *Acta Med. Hassniens.* Volum. 3. pag. 59. & PANAROLLUS *Pent. 1. Observ.* 27. & *Observat.* 22. DEODATUS in *Valer. pag.* 250. refert Ictericum lethalem cum pruriginosa lassitudine, & vagis hinc inde erumpentibus tuberculis: in cadavere tres lapilli in vesica sellea reperi



reperi fuerunt: Pariter ac **TIMÆUS** non *Güldenlee in Cas.* icteritiam post arthritidem diuturnam, superveniente hydropse lethalem, ex calculo magno in vesicula fellea notat. Ac sanè ad Icterum prout sunt calculosi, ut Observationes Practicorum testantur: vid. *le RHYNE de B. Med. p. 222. & M. A. N. C. Ann. 2. Observ. 189. p. 164.*: calculi enim suo modo sunt origo Icteri crebrius recidivantis. Alias vulgò statuunt Icterum dependere ex folliculo fellis obstrueto, quod interdum quidem verum est, sed non semper; quia etiam sapissimè & frequentissimè a calculis, in fundo folliculi fellis hærentibus, is procreatur. Nec tamen hoc universale est, quia sapissimè in ictericis folliculum felleum aut ductus biliarios apertos esse, non saltem docet debita tinctorum excrementorum excretio; sed etiam sæpius in Ictero demortuis dissectis ductus fellei aperti fuerunt, teste **HELMONTIO** *l.c.*: sicuti in febricitantium Ictero nulla hepatis aut ductuum biliariorum obstructorum suspicio adesse potest: ita ut meatus cylicus satis per se sit patulus, & per eundem bilis ingressus & egressus ab his non impediatur. Ex his ipsis Ictericis aliud quid quam hepatis obstructionem, aut pori choledochi infarctionem, subesse cuilibet facillè patet.

Porro ex ulceribus quibusdã inveteratis crurum occulatis Icterum flavum natum observavit **AMATUS LUSITANUS** *Cent. 2. Curat. 83.*, obicere aliud quid necessum subest, quam solus defectus excretionis bilis: Item ex mensibus instantibus, sed non prodeuntibus, pathema notat **BARTHOLINUS** *Cent. 5. Histor. 62.*, sicuti **HENRICUS ab HEER** *Obs. 6.* moniam Ictericam ac cachecticam ex mensium suppressione observavit: vid. **WILLISII** *Pharm. Rat. P. 2. Sect. 2. cap. 1. p. 240.* Vulnus sclopeti ventriculum penetrans Icterum produxit; vid. **BARTHOLINUS** *Cent. 6. Histor. 85.* Item à scorbutio sine fellorum vasorum angustia Icterum observavit **LOSSIUS** *lib. 3. Obs. 39.* Denique & hepar induratum & inflammatum, aut scirrhus obductum, crebrò Icterus solet insequi.

Dividitur aliàs Icterus in *flavum* (qui viridescens interdum) & in *nigrum*, quem communiter vitio lienis fieri contendunt, & ab humore melancholico derivant: sed hoc tantum ex Veterum præconcepta opinione & hypothese de quatuor humoribus in massa sanguinea contentis. Nam dixerunt: sicut sanguis corpori dat floridum colorem, & suaviter rubicundum, pituita verò habitum cachecticum; ita necessariò bilis vitiosa Icterum flavum, & humor melancholicus iste fictus vitiosus Icterum nigrum inducit: hinc ut præsuppositum falsum præter alias, quas dedit turbas, tanquam antecedens falsum & alia consequentiã falsa produxit. Nam quia bilis in folliculo felleo ex hepate seu excrementum colligitur, & folliculo hoc obstrueto, aut ductibus felleis infarctis, saltem Icteros flavos fieri voluerunt, quoniam nempe, ut dixi, bilem tanquam excrementum per hepar transcolandum non ritè per vasa choledocha expurgari crediderunt. Et quia lien fuit statutus bursa humoris melancholici, ob id necessariò in liene saltem Icteri nigri fontem quæsierunt, quod nempe hic ipse non sufficienter separet ac expurget scorias sic dictas Melancholicas, quin potius hæ ipse in massa sanguinea congestæ ab ejus facultate expultrice, tanquam & matula furiosæ ad habitum corporis deponantur & detrudantur. Hæc autem hypothesis refellitur partim modernorum theoriã, partim experientiã: ac ex suprã annotatis manifestum est, Icterum, in specie flavum, sæpius oriri citra impeditum bilis motum ad intestina, aut citra insufficientem secretionem ex hepate, quod non tantummodò multi sint Icteri flavi, in quibus tamen alvus aperta, & fæces flavo ordinario colore tinctæ conspiciuntur, sicut etiam **RIVERIUS** *Cent. 2. Obs. 9.* observavit; sed etiam post febres, menses suppressos, & seratū morsus natus Icterus flavus sine obstructione tali observatur. Nec à copia & abundantia bilis propter defectum excretionis oriri potest Icterus; sequeretur enim, eandem debere curari per medicamenta bilem præcipitantia & corrigentia, ut acida: contrarium tamen testatur Praxis, cum potius salina volatila acida & insigniter amara in cura Icteri primum obtineant; quæ potius bilem augmentant, & acriorem reddunt, quàm quod imminuant aut corrigant.

Tandem posito, bilem regurgitare ex folliculo felleo in massam sanguineam, quis unquam persuadebit, eam

corpus posse colorare colore aded flavo, cum ea in centro suo elegantissimum absconditum habeat ruborem, cum ejus oleum sit rubicundissimum, quo ipso similiter tingit chylum, licet insensibiliter, in intestinis, ut exalteretur promptius in sanguinem? Potius ergò bilis sanguini permitta ratione salis copiosi ejus rubeam tinctorum exaltet, quàm quod flavedine conspurcet: Item tales Icteri, in quibus fæces alvine colore ordinario à bile tinctæ, sunt ut plurimum (non semper) ii, qui superveniunt ordinariò febribus: qui Icterus superveniens febribus est frequentissimus, & sapissimus in declinatione morbi; quin in continuis citra imaginariam hepatis & folliculi fellei noxam non rarò supervenit Icterus, sive symptomaticè, sive criticè, in quibus nulla labe hepatis conspiciatur, & alvi excrementa sunt flava. *Nigrum Icterum* quod attinet: hunc non oriri ex obstrueto liene, patet inter alia ex eo, quod Icterus flavus diuturnior semper in Icterum nigrum degeneret; unde & *nigrum essentialiter non differre à flavo*, asserit **WILLISIUS de Urinis p. 355.** & humores biliosos aut bili analogos Icterum nigrum producere probabile sit, quatenus sc. ab acido præternaturali interdum in primis vis effuso, frequentius in massa sanguinea abundante, illorum flavedo in virorem, modò pallidiorum, modò obscuriorum, nigredinis æmulum, mutatur, & mediante hoc color parrium naturalis vitatur. Biliosos siquidem humores materiam quasi primam huic productio morbo so suppeditare constat ex eo, quod **PLATERUS** *l. 3. Obs. 375.* observavit Icterum nigrum, in quo excrementa alvi minds naturaliter tincta, sed omnino alba apparuerunt, in quo tamen hepatis potius ac vasorum choledochorum, quam lienis vitium subesse videbatur, hinc *Pr. Tom. 3. pag. 96.* eundem à bile intra vesiculam coacervata deducit. Unde probabile sit: Icterum nigrum vitio hepatis generari, modò si biliosæ moleculæ à sanguine intra hepar non secernantur: si ve hoc fiat ipsius hepatis vitio, aut vasorum angustia; sicut in Ictero nigro laborantibus hepar aliquando scirrhusum **VESALIUS** *l. 5. c. 15. & M. A. N. C. anno 1. Obs. 17.* testantur: si ve vitio lienis, materiam bilis ad secessum non ritè disponens, utpote à cujus aberrationibus similiter interdum Icterum nigrum contingere asserit **FOR ESTUS** *l. 19. c. 20.* & ex *Obs. FABRICII ab AQUAPENDENTE, & BONETTO Sepulchr. p. 1007.* hunc vitio vetriculi laticem ejusmodi fuscum producentis, vid. **WALÆUS** *Prax. c. 8.* nunc vitio bilis crassioris & fuscæ maxime intra vasa biliaria congestæ; vid. **PLATERUS** *Obs. p. 612.* Acidus autem humores ejusmodi colorem æruginosum atque porraceum bili inducere, multa Modernorum experimèta confirmant. Accedit, quod, satente eodem **PLATERO**, nec in liene, nec in alia corporis parte, stratus ejusmodi latex Melancholicæ Veterum æquiparandus observatur: Item quod **THONERUS** *Obs. l. 3. p. 154.* in Ictero nigro laborante oris amarorem biliosum testetur. Sic quoque ritè notat **LINDANUS**, se in Frisia multos curasse, ob laetis usum copiosum & casei, scirrhus ac similes tumores duos lienis habentes, in quibus tamen nunquam vel minimum Icteri nigri observasset vestigium. Et certum est, in Hollandia tales scirrhi & tumores sunt frequentissimi, non tamè Icterus observatur niger, adeoque ut lien sit insons: quod **Sylvius** quoque confirmat, dum testatur, se multos dissectasse etiam Ictericos, in quibus lien fuerit accusatus, & tamen hoc viscus semper sanum & uegetum invenisse. Interim tamen quoad bilem & vasa fellea, & inde orisidum Icterum, non aded omnia sunt plana. *Suprà notatum* fuit, Icterum sæpius observari, dum lapides folliculum felleum replent: Verum non semper sequitur Icterus hos lapides. Memini enim ante plures annos dissectam hic fuisse mulierem capite multatam, quæ in folliculo fellis copiosos lapides majores & minores collegerat, sine tamen Icteri vestigio, nec unquam illum passa erat: Et eodem serè tempore dissectimus corpus masculinum, in quo principium erat anasarca; erat enim subrumidum, & aperta ejus cuticula cum cuticello copiosum serum effluebat, in cujus folliculo felleo ne gutta bilis inveniebatur, in quo tamen nullum Icteri vestigium, qui maxime debuisset adesse, si vera esset communis hypothesis: Sic canibus folliculum felleum posse excindi sine vitæ aut sanitatis incommodo, notum est: sicuti per literas nuperrimè mihi communicatum fuit ab Amico, in universitate Baravo-Lugdunensi quendam Medicinæ Candidatum, ante 3. menses cani totum excidisse folliculum.



felleum, & abdomen denuò confuisse, qui ipse adhuc vivens omnes operationes perficiat sine omni incommodo. Egregium experimentum, quod adhuc potest dare occasionem meditando ulterius de usu folliculi fellis. Sed moneo, quod porus choledochus & reliqui fuerint adhuc salvi & integri. Quo supposito, nihilominus cum Veteribus conciliare licebit recentiores, ita ut bis biliosos equidem humores in Ictero nigro concedamus, non tamen, nisi ab acido, quod Veteres melancholiam vocabant, immutatos in precipitados, adeoque in hunc suum modo ad Icterum nigrum producendum interdum concurrere statuentes: Confer. FERNELIUS lib. 19. Obsvat. 20. & 23.

Ex dictis pate:

1. Quod licet Icteri sint diversæ species & colorum varietates, in radice tamen, causa & modo fendi, omnes conveniant. Omnes enim sunt morbus, nam agnoscunt causam, unam tandemque obveniunt methodum medendi, uti rectè inquit FABER in Paibel. pag. 344. paragraph. 6. Quod confirmat SCHENCKIUS lib. 3. Obs. pag. 423., qui notat Icterum ex obstructione mensium, in quo successivè quatuor colores fuerunt observati. Adeoque Icterus flavus & niger non differunt specie, sicut nec Icterus viridis, quem cum gravissimis symptomatibus notavit PETRUS JOHANNES FABER in Curat. 71., nec colores plumbei, alique plures varii, cum ex uno fonte omnis oriatur, ac in genere omnes Icteri species ex crasi sanguinis insigniter vitiata, seu ex scoriis sulphureis crudioribus primarum viarum sanguini commistis, postmodum cutim tingentibus, dependeant.
2. Immediate nempe sequuntur vitiatam massam sanguineam, eamque à feculentis alimentorum non ritè digestorum impuram redditam, propter confusam heterogeneam, nec ritè permiscibilem; donec imbibita ista recrementa partim per urinam excernantur; unde hæc sunt variè coloratæ, crassæ & turbidæ, hinc deposito sedimento denuò apparent: partim verò, & quidem maxima ex parte, per vascula capillaria quasi filtrata vel trāscolata hinc inde, in specie ad superficiem partium solidarum externarum deponuntur, quæ pro coloris sui varietate, nunc flavedine, nunc viriditate, nunc lividitate, nunc nigredine, tingunt. Vehiculum eorum est serum. Hoc autem non solum in Ictericis post venam sectam flavissimum conspicitur, sed præterea quoque ex excitatis vesicis intensè croceus liquor elicitor. Quod si ita massa sanguinea tandem ad debitum puritatis statum redat, sanitas efflorescit: sin verò hæc ipsa tandem omnino in suam crasim depravetur, mors necessariò sequitur. In statu quasi neutro sunt Ictericis, nunc ad convalescentiam, nunc ad decedentiam proni.
3. Quod dictæ impuritates necessariò massam sanguineam afficientes non nisi ex primis viis deducendæ sunt; Licet
4. In extraordinario Ictero, qui sequitur animalium venenatorum morsum, massa sanguinea à fermento putrefactivo inquinata tandem efflorescat in Icterum.
5. Quod Icterus ordinariò originem ducat ex primis viis, & vel ex corruptione chyli in ventriculo in tale liquamen nidorosum flavum; vel ex chyli corruptione, facta in duodeno à perversa miscela succorum bilis & pancreatici vario modo corruptorum, non ritè chylum perficientium & elaborantium, sed potius insigniter viciatum.

Ergo ea, quæ hæc præstant, sunt partim symptomata in Ictero observabilia, quales sunt anxietates, angustie præcordiorum & lipothymie, partim excreta per alvum plus minus mutata. Unde colligitur, tres quasi esse occasiones, quibus mediantibus excitetur Icterus:

1. Ex corruptione chyli in stomacho in liquamen nidorosum.
2. Ejusdem alteratio in duodeno à succo felleo & pancreatico; Et
3. Fermentum putrefactivum seu venenum, massam sanguineam inquinans.

His ita præmissis, ad causam proximam propius accedamus, quæ est serum nutritivum flavedine præternatu-

rall imbutum, adeoque corruptum: cujus corruptionis triplicem causam concipere licet, aliam nempe in ventriculo, aliam in valis biliariis, & aliam in massa sanguinea.

Ut ergo jam propius ad scopum accedamus, notum est, secretionem tecum alvinarum in intestinis fieri per concursum bilis & succi pancreatici; quiduo succi per modum precipitationis separant à nutritio chymo alvi excrementa, & simul certo modo alterant chylum ad futuram promotionem sanguificationem: vid. TAKIUS de Chrysogenia. Si ergo ritè fiat chyli digestio in stomacho, & ejus precipitatio in duodeno, & consequenter perfecta hæmarolis, rubicundo florido sanguine conspersum corpus viget, dum utilis chymus suggeritur massæ sanguineæ, per quem eadem in continuo flore conservatur, cæteris tamen paribus: simul ac verò hæc ipsa secretio vitietur, necessariò chylus corripitur, qui massæ sanguineæ permiscetur, & inquinatur variis recrementis: quæ ipsæ particule excrementitiae variis salibus imprægnatæ minùs erunt unibiles cum toto liquore, unde necessariò sanguinis mixtura ejusque crasis vitiabitur, & in varias ac insignes dyscrasias eadem degenerabit pro varietate ipsæ separationis speciei à chylo, & hinc natorum variorum excrementorum sanguini permittorum.

Jam verò uti liquor bilis seu liquor balsamicus naturaliter in intestinis tingit chylum (utur invisibiliter propter acidum pancreaticis) sulphure suo rubicundo, ut propius sanguificari possit, & juxta hanc tincturam sanguinis simul chylum balsamico suo sulphure tingit & præservat, quod minùs corruptioni, verminationi & putredini sublit; & tertio cum succo pancreatico eadem conjunctim chylum utilem leparat ab excrementis alvinis: ita necesse erit, ut his duobus succis vitiatis, in specie bile insigniter depravata excrementa heterogenea & copiosa in massa sanguinea colligantur, & dum à bile depravata vitiosè sunt tincta, eminde etiam massa sanguinea varios, nigrum, vel ex nigro viridescens vel flavescens colorè acquirat, idque pro varietate concretionum, precipitationum, ac separationum: quæ sero imbibitæ hinc ad extimam partium solidarum superficiem deponuntur. Cæterum ut à posteriori incipiā, separatio hæc recrementorum fit nunc cum nunc sine effervescentia febrili, & hinc Icterus nunc per se morbum constituit; si ve ea jam ab extra sanguini infundantur, si ve vitio digestionis primæ eidem communicetur. Utroque autem modo mediante sero in extimam superficiem partium solidarum deponuntur, tam externarum quam internarum: cujus rei historiam videbitis in ZACUTO LUSITANO Histor. 3. Prax. Admir. Obs. 56. qui in Ictericis mortuo non extimam saltem corporis habitum, sed etiam interiora viscera flava deprehendit: sicut similiter HILDANUS fortum ab Ictericis matre editum quoque Ictericum vidit. Quod autem impuritates istæ magis ad cutem deponantur, ratio est, quia ibidem sunt glandulæ miliares minime copiosæ, quæ imbibentes serum simul cum eo excrementa imbibunt.

Quoad Colorum in Ictero Varietatem, ut res fiat magis clara, duo tenenda sunt:

1. Quando in genere omnis color dependeat ex textura particularum in superficie concreti minutissimarum, quæ lumen immissum successivè refringentes consequenter varietatem colorum repræsentant: de qua hypothesi vid. WILLISIUS de Ferment. cap. 11. ubi de coloribus per varia mixta excitatis; ROYLE Tractatus de Coloribus, Grimaldi Tract. de Color., ubi apertissimis experimentis demonstratur, quod nunc per varias precipitationes, per salia, nunc acida nunc urinosæ, factas insigniter ac in momento colores possint mutari, se liquorum istorum, in quibus sunt variz precipitationes. Unde

2. Sicut ratione connexionis & texture particularum per varias precipitationes & separationes immutatur perfectio lucis; ita pro ut recrementa Ictericæ diversam habent naturam & texturam, eandem etiam diversum colorem repræsentant.

Ubi magis præponderat vitium olei urinosibilis, ibi magis color flavus conspicitur; ubi verò magis acidum peccat concentrans bilem, color ad lividitatem, viriditatem, & ad plumbeum quasi, declinabit. Rem ita se habere, confirmant experimenta cum sanguine emisso instituta; dum enim huic varii liquores infunduntur, emergit nunc color viridis, niger, aut intensè rubicundus: qualia experi-



experimenta videbitis in BARTHOLINO *Cent. 3. Epist. 97. pag. 421.*, ubi sanguini calido ex ca. e vivo emissio vari liquoris salini fuere immixti pro liquorum salinorum varietate & ipse sanguis varios colores, varias consistencias, & similes proprietates acquisivit.

In genere omnes liquores salini crassiores eidem colorem intensiorem tribuerunt, ver. grat. spiritus salis ammoniaci, & oleum tartari per deliquium, magis tamen hoc ceu alcali fixum, quam illeceu alcali volatile: Omnes & contra liquores acidi obscurum, teitum, sæculentum, & similem ipsi contribuerunt: Pessimus omnium, qui factus per solutionem aluminis, cui sanguis calidus fuit mixtus; ex tali enim niger, sæculentus, ac luridus apparuit.

Jam ergo ubi massa sanguinea in corpore vivo tam variis scoriis excrementis & salibus, ex vitiosa in intestinis separatione, est turgida, necessario facta ista separatione & præcipitatione excrementorum variis & novi colores, quos antea non habebant, exinde emergunt: eadem ratione atque ars imitatrix naturæ ex diversa præcipitatione diversis coloribus liquores tingere & pingere solet, dum antea permixta inconspicua, jam præcipitata & aliquantisper separata reddidit conspicua, adeoque ex diversa luminis refractione colorata.

His præmissis, in specie tres occasiones illas ad Icterus disponentes evolvemus: quarum prima latet in stomacho, nempe in hujus corruptione, aut si assumpta in liquorem flavum amaricans degenerant. Venterculum interdum solum cruditates fellis æmulas loco chyli laudabilis producere inde constat, quod non tantum ejusmodi biliosa sub dyscrasia venterculi vomitu aliquando reiciantur, sed sæpe mox à commissis diætæ erroribus Icterus cum appetitu prostrato & præcordiorum angustia observetur: e. gr. à potu frigidi; item à deglutito Nicotianæ fumo; vid. BORELLUS *Cent. 4. Obs. 81.*: & à Saturni devoratione; vid. FERNELIUS *de Cur. Luis Venereæ cap. 7.*: & quadrat huc HORSTII *Observ. 36. l. 4. recidivæ* in Icterus & febrem ab immodico pomorum, & castanearum escu: item hujus loci videtur Icterus, quem RIVERIUS *Centur. 2. Observat. 9.* præter rationem hepatis accenso attribuit, ita ut vel in Ictericis omnibus per manifestas æquæ ac ignotas vias ex folliculo suo ad venterculum deferri COLTER *Observ. Anatom. Chirurg. pag. 221.* suspicetur, maximam partem in hoc productum videatur. Jam verò in omnibus Ictericis, paucissimis casibus exceptis, observatur urgere primario symptomata venterculi circa digestionem, & ægri circa istud negotium ordinario vitium quoddam sentiunt; imò, si *lunantia* consideramus, post Vomitoria præmissa, Marialia, & hinc amara, totam absolvunt paginam: adeoque in omni Ictero acidum austerum in primis visis activè peccare observatur. Saltim dubium est, an hujus occasione secundum HELMONTII hypothesin ex vitio digestionis primæ, indeque natis scoriis nidorosis plus minus flavescentibus, plus minus amaricantibus, in massa sanguinea distributis & in peripheriam corporis diffusis, Icterus oriat? an verò præfatum vitiosum fermentum, acidum austerum, bilem inquinando, & hinc ejusdem secretionem debitam in hepate impediendo, Icterus interat? Sanè quod ex digestionis primæ vitio, & inde cruditate nidorosa, generentur loco chyli amara recrementa, aut dulcia, flava, & sic porro, docent vomitus flavescentes matutini post crapulam: qui non dependent à bile, cum hæc non nisi in vehementiori vomitu reddatur; sed sunt reverà ex stomacho, tunc nempe per pylorum non rectè fuerunt transmissa, sed retenta, adeoque corrupta. Confirmant quoque excreta copiosa flava ab infantibus reddita, quæ ipsa nil aliud sunt, quam lac in stomacho & hinc in intestinis corruptum; quæ similiter non sunt derivanda à bile, quia non sunt amara, sed quia à catellis appetuntur, idè potius dulcia sunt. Adhuc fructus horæi, cucumeres, &c. pinguis, pisces, &c. in stomacho nidore corrupti similes sordes suggerunt; unde chylus ejusmodi in stomacho corruptus, nec ritè in duodeno perfectus, sed vitiosè à bile & succo pancreatico alteratus, adeoque ad massam sanguineam adductus, necessariò eam corrumpit, & variis præcipitationibus & separationibus demum istos colores & tincturas acquirit, & sic Icterus constituit. Quid igitur obstat, quò minus occasione talis fermenti austeri, dolores stomachi aut præcordiorum inferentis, vitietur digestio prima,

*Estmull. Oper. Tom. II.*

& inde genitæ sordes nidorosæ in corpus distributæ, Icterus inferant? Et sic est intelligenda illa allegati HELMONTII sententia, ubi Icterus ex hac causa natum graphicè delineat: in hoc saltem ipse hallucinatur, quod omnem Icterus hoc modo gigni statuit, quod tamen veritati minimè respondet. Existimo sanè, omnem Icterus, qui supervenit febribus, non bilis aut folliculi fellis vitio, sed diætæ, & digestionis primæ vitiatæ occasione supervenire; Non secus ac istum, qui post venæ sectionis abusum crebrius nasci observatur.

Juxta hunc tamen Icterus, eumque frequentissimum, etiam secundò oritur Icterus à vario modo corruptis succis, fellis & pancreatico, chylum non perficientibus, nec tingentibus, nec debitè à facibus alviis in intestinis secernentibus, unde denique massa sanguinea tota vitiosa redditur. Vasa communibiliaria obstructione, compressione, aut quavis obstructione, bilem naturalem, (cùm modò dictus Icterus ex vitio bilis vitellinæ præternaturaliter in stomacho genitus oriri, ex jam dictis patet) istam nempe, quam in hepate secernenda, & per vasa chodocha excernenda venit, ad massam sanguineam regurgitare, quotidiana docet experientia. Hæc vel vitiosa, vel in debita distributione impedita, Icterus inferit: Illa, causa frequentior graviolem dat Icterus; Hæc, rarior, leviolem inducit. Bilem vitiatam quod attinet, occurrit ejus inertia, seu deficiens acrimonia bilis salina. Icterus verò redditur vel à modo dicto vitioso acido austero primarum viarum, quod imprimis bilis activitatem infringere, vitare, texturam ejus immutare, ac plus minus inspissare valet, cùm, ut supra monitum, in graviore ac pertinaciori Ictero spissior ac tenacior bilis subinde inventa fuerit. Acidum hoc vitiat bilem, aut dum in hepate est generanda aut secernenda, aut eandem in folliculo fellis jam secretam non solum inficiet, hoberabit, incrassabit, & simul ejus sal volatile oleosum in calculos degenerando coagulabit; sed etiam oleum ejusdem vitiat, istudque ineptum reddet pro tinctura chylo legitime communicanda: quibus occasionibus nec debitè excerni poterit; quin faciliè ex mutata consistentia ductus chodochos obstruere, & ita transitum sibi ipsi intercludere poterit. Hinc in quibus copiosi calculi in folliculo fellis reperti fuerunt, imprimis Ictero obnoxii deprehensi sunt; de quo vid. PANAROLUS *Pent. 3. Obs. 22.* Et hoc à nemine negari potest; Nam sic eadem inertia inurit. Vel quoque quando bilis est nimis serosa vel aquosa, ac nimis pinguis, & in specie nimis oleosa, ita ut oleositas fixa obtundat ejus sal volatile acre balsamicum, primæ digestionis correctivum. Ac hinc est, quod ex abusu spiritus vini Icterus abortum observavit SYLVIVS; sicuti ex abusu pinguium simile ego notavi. His ergo modis bile labefacta fit, ut eadem non sufficiat perficiendo chylo, eundem à facibus separando, & tingendo pro futura sanguificatione; unde chylus non ritè separatus vitio bilis, nec ritè ab eadem tinctus, necessariò inquinabit massam sanguineam, ejusque consistentiæ inducet crassio vitiatam. Deficit quoque bilis, quando vel planè non generatur, vel non deferatur ad intestina. Hoc declarat obstructiones in ductu chodochos repertæ; sicuti & excrementa tunc temporis alba, glutinosa, chylola & vitiosa, defectum bilis, non delatæ ad intestina, sufficienter confirmant; quin imò in talibus sæpius lumbrici generantur, propter defectum condituræ balsmicæ bilis; unde & in tali Ictero dolores colici percipiuntur ob acidum tunc temporis abundans, ubi vulgò quidem dicunt, esse *colicam biliosam, sed male*; potius enim est ex acido non temperato à bile: Et Anatome detexit, fuisse in talibus omnem transitum in intestinis præclusum.

Causa verò, ob quam obstruitur folliculus fellis, est, quando bilis debita acrimonia caret: quod si enim eadem eam debitam habeat, quasunque obstructiones removeret, ac ferè impossibile est, supervenire ductus chodochi obstructionem, quamdiu ipsa naturaliter constituta est. Unde denique ex sola distributione bilis lapsa, & inde genita, um sanguine commistione, oritur Icterus, quando calculi meatus obstruunt, aut quando aliunde quavis ex causa ductus hepatici communes obstruuntur; vel quando occasione partium vicinarum, e. g. intestinorum tenuium ac speciatim duodeni, convulsionum, vasa biliaria in consensum trahentium, ac eorum motum peristalticum intertentium, in specie orificium ductus fellis constringentium & condensantium, Icterus oritur: ejus exempla in partu laborioso, passionibus hystericis, &c. supra annotata fuerunt. Nèpè

Cc 2 non



non rarum est, in ictero alvi excrementa hodie pallida, cras denuò flavedine tincta conspici, & ita subinde evacuari, non quod nunc obstruatur, nunc denuò referatur ductus, sed quod occasione spasmi intestinalis nunc constringatur idem, nunc denuò aperiatur, idque diversimodè pro occasionum varietate. Sic HOECHSTELUS Dec. 8. Obs. 3. ac MARCELITERUS DONATUS Hist. Mor. libr. 1. vulneri capitis, BARTHOLINUS Centur. 6. Hist. 85. vulneri ventriculi sclopeti globulo inflicto, & Cent. 5. Hist. 62. & RHODIUS C. 3. Ob. 19. ac FORESTUS libr. 19. caput. 17. colicæ ac iliacæ passioni icterum supervenisse testantur, & à vomitu nimio mihi observari, nec non à partu difficili, contigit. Atque hoc quidem vasa biliaria ætata, tam radicalia quàm distributoria, præstant, quod bilem secretam aut non admittant, aut non emittant; utràque verò ratione ad massam sanguineam illam remeare faciant, hinc intestinorum contentis in ducam naturalem subrahant.

Ex dicto igitur acido fermento vitioso primarum viarum, & bile, vel ex nidore præternaturali genita, vel bile hepatis naturali, eaque aut vitiatâ, aut saltem malè distributâ, omnis ictericorum varietas in colore, ac differentia in symptomatibus deducenda, nempe, prout ab acido præfato in textura diversimodè mutabitur bilis, qualiscunque etiam ista colorum varietas emerget, cum prævalente potest à bilis, vel quantitativè vel qualitativè, sequatur icterus flavus; prævalente verò acido hoc, nunc simpliciter acido, nunc austero seu vitriolaceo primarum viarum (sive ex stomacho secundum HELMONTIUM, sive ex pancreate secundum SYLVIIUM, derivare ve imus) icterus nunc viridis, nunc Plumbeus, nunc niger oritur; quatenus nempe vel oleum bilis concentrat, vel quatenus non tantum vitiosa effervescentiâ in intestinis scybatorum à chymo separationem naturalem depravabit, sed præterea quoque chyum non ritè à bile perfectum depravatione & præcipitatione in varium, obscurum ac tærum colorem tingit & transmutat; unde nunc plumbei, nunc virides, colores emergunt. In horum ergo duorum succorum vitiosis investigandæ sunt omnes icteri causæ. Declarant hoc experimenta Anatomica, quibus diversa acida bilis succo admixta diversum eidem colorem imprimunt; unde deduci potest: quod magis icterus ad nigredinem tendit, eò magis acidum peccare; cum aliàs notum sit, ab infusis acidis bilem naturalem ad obscuriorem colorem, in specie viridem, disponi. Sanè observavi aliquando in urina icterici, cui spiritum salis infusillaveram, sedimentum viride exinde præcipitatum fuisse. Certè dum istas insignes ictericorum cardialgias consideramus, bilis in folliculo notabilem alterationem, per acidum aulterum explicabilem, ut & Juvantia, Martialia, acidum corrigentia, quatenus scilicet hæc, primaria tanquam aliàs remedia contra icterum, acida vitiosa imbibunt & destrunt; amara, aut volatilia, bilis dyscrasiam emendantia (nempe omnia amara hepatis amica sunt; sicut acida stomacho) facile ad acidum tanquam primarium agens deflectere possumus: ut aded inertia bilis, & imprimis ejus oleositas dispositivè; acidum verò activè, concurrat ad icterigenesin: & quidem prævalente bilis vitio vel quantitativè vel qualitativè, sequitur icterus flavus; prævalente verò acido, aut vitriolo succo pancreatico, imprimis icterus niger, ejusque species oriri videntur; ac proinde pro inertia bilis corroboranda salia volatilia acia, pro infringendo verò acido conducant Martialia. Curavi his diebus mulierum, quæ subindè tantum non intolerabili cardialgiâ affligebatur, quam ordinatio sequenti die totius corporis icterus insequēbatur, breviter de novo uno alterove die evanescebat, sed redeunte quavis occasione istâ cardialgiâ, semper superveniebat icterus in paroxysmo cardialgiæ; alvus liberè aliquoties fluebat, utut postmodum clausa esset, pulsus rarus, tardus, mollis, magnitudine moderatus, debilis, prostratio virium summa, sitis clamosa. Dili-genter à me interrogata, an amarorem perciperet in ore? temper negabat: sed sedulâ attentione obicervavit semper, quoties paroxysmus cardialgiæ instaret, sentire se saporem acrem acidulum ex ventriculo eructatum; Hoc sanè quoties sentiebat, toties die aut nocte sequenti paroxysmus cardialgiæ, & hinc icterus, superveniebat. Curaticam pulvere carchedico Harumani, & hinc absorbentibus, alcalinis, & animalium partibus duris.

Existimo, acidum istud austetum irritasse ventriculum ac vicinas partes nerveas, quarum spasmo tam miserabilis cardialgiæ cum respiratione difficili, & totius dorsi dolore, excitata fuerunt; sub quo spasmo & vasa cholo-docha cum folliculo felleo diversimodè nunc constricta, nunc relaxata fuerunt; unde hujus occasione alvi libertas in paroxysmo, cum aliàs sat siccioris esset alvi natura: illius verò occasione bilis impedita distributio, cum sanguine permixtio, in habitu corporis secretio, hinc vagus ille icterus. Hactenus dicta confirmat tristitia & moror, item iracundia, ad icterum, ut supra dictum, dis-ponētia: Nempe tristitia & morore omnes humores increas-savi, acidum fixum augeri, & ita effectus naturæ bilis contra-rii, induci solent. Iracundia omnes humores tenuiores ac mo-biliores, ac acido volatili aciores, reddere solet.

Ad tertiam occasionem, sanguinem nempe, contribuunt venena; vel assumpta, vel inflicta ex morfu venenatorum animalium, v.g. viperarum; vel etiam fermenta pere-grina, v.g. ulcerum occlusorum, cum aliis symptomatis icterum inducentia: quale quid, post GALENUM de loc. aff. l. 5. cap. 7. MARCELLUS DONATUS Hist. mirab. lib. 1. cap. 9. & BARTHOLINUS C. 2. Hist. 89. an-notarunt. Hæc enim suo fermento putrefactivo subito immutant & corrumpunt massam sanguineam, & præ-ternaturalem ac singularem fermentationem ac præci-pitationem inducunt; unde ex mutata ejusdem particu-larum figura mutatur ejusdem color, donec tandem ca-lia recrementa diversimodè tincta, à massa sanguinea se-parata, & hinc sero imbibita, ad extremas partes delata, in glandulis utis miliaribus deponantur, & ibidem alienum colorem inferant. Huc pertinent febres, tam sym-ptomatiæ quam criticæ in icterum degenerantes; item icte-rus à seminis staphisagrie masticatione, observant LOSSIOL. a. item à scorbuto sine felleorum vasorum en-gustia, de quo vid. idem LOSSIUS l. 3. Observat. 83., ac denique à mensium suppressione, vid. HENRICUS ab HEER Observ. 4. BARTHOLINUS Cent. 5. Hist. 62. item WILLISIUS Pharmac. Rational. P. 2. Sect. 2. cap. 1. pag. 240.

Et hi sunt tres fontes, qui inquinando massam sangui-neam icterum faciunt.

Imprægnatâ ita massâ sanguineâ loco chyli vitiosis re-crementis, hoc ipso naturalis ejus fermentatio necessariò turbatur: Unde anxietas in præcordiis, dolor præcordio-rum compressivus, lipothymia, virium dejectiones, & similia symptomata in principio icteri, seu antequam erumpat icterus, sunt frequentissima, donec ita excre-menta à fermentatione sanguinis naturali, aut efferve-scentiâ ejusdem febrili separata, & sero involuta (præci-pitata vocant Chymici) dum cum massa sanguinea circuli motu rapiuntur per partes solidas, in horum porulis tanquam filis & colatoriis hæreant, ibique loco succi nu-tritii subsistant, ac successivè densius agglutinata partes solidas colore aded peregrino inficiant vario, prout varia excrementa variâ præcipitatione in massa sanguinea varias acquirunt colorationes, simul quoque excre-menta ista præcipitata & separata, à sero imbibita, per urinas excernuntur. Unde in principio morbi vi-rum sunt clava, aut saltem simul opacæ, ingruente scilicet sanguinis fermentatione, & excrementitiarum particula-rum separatione. Tandem verò, ubi præcipitata & sepa-rata fuerunt excrementa, urina saturata, & copioso sedi-mento onusta, clava evadunt ac naturales, aperto signo, fermentando separari & segregari in massa sanguinea ex-crementa, quæ aut per urinam excernuntur, aut in ha-bitu corporis deficiunt.

Hæc tragœdia luditur tamdiu, donec succi hi correcti, & correctâ massa sanguinea, hæc ad naturalem crasin redeat, & quoquid in habitu corporis, nunc per sudorem, nunc per insensibilem transpirationem dissipetur.

Modus ergo, quo fit icterus, est hic: In massa sanguinea congesta recrementa varia instar secum in multo fermentante separantur, & separata ac præcipitata acquirunt tam distinctos ac tæros colores, & dum sero involuta hinc inde hærent in partibus solidis, aut cum urina excernuntur, necessariò tam varium iisdem partibus inferunt colorem.

Quæ omnia ut intelligantur, exactam præsupponunt noticiam præcipitationis, quæ observatur in confusione atramenti: quod etiam pertinet tota doctrina colorum, prout latè accuratè à BOYLE fuit tradita; aliàs non pos-sunt intelligi.



## PARS AFFECTA.

*Pars affecta* ratione declarationis sunt tam partes extimæ solidæ, ac imprimis corporis habitus, quam etiam interna thoracis & abdominis viscera: licet enim ZACUTUS LUSITANUS libro 3. *Prax. Admir. Observat.* 136. & 136. refert ictero mortuum, qui omnia interna viscera, imprimis hepar & intestina, colore flavo totaliter infecta habuit. Rarum autem est, quod ossa etiam flavescencia fuerint reperta: *Pars verò affecta à causa proxima est massa sanguinea heterogeneiscrementis imprægnata; sicut horum focus & fomes sunt primæ viæ.*

## DIAGNOSIS.

*Quoniam signa diagnostica:* Icterus præfens faciliè in genere cognoscitur ex habitus & urinæ colore, qui imprimis in oculorum albo se manifestat; sicut urinæ linteum vel charta albicans si intingatur, hæcque colore croceo inficiuntur; *quævis urinam ictericorum non semper linteum tingere* RIVERIUS *Cent. 2. Observ. 9.* annotat: aut si urina succulsa spumam flavam ostendat, & sedimentum ochraceum post horas aliquot dimittat, *Causarum verò signa* dignoscenda majoris difficultatis sunt. Ventriculū nihilominus affectum esse patet: si mala diæta ventriculū immediatè gravans mox præcesserit, qualem verb. grat. ex HORSTIO *supra* allegavi, si cardialgia adsit: si absens bilis præternaturaliter effervescentis indicia ru-  
cus, vomitus, ac fluxus alvi nidorosi ac bilioli observentur, aut fæces colore naturali tinctæ sint.

Sanguinem verò hujusque texturam in ictero læsam monstrat:

1. Causa evidens, si v. g. à morfu animalis venenatis contigerit; si febres, mensium suppressio, timilesque circumstantiæ, quales superius allegatæ, præcesserint, aut adsint.

2. Ventriculus mediocriter, aut bene constitutus; Ac

3. Vasorum biliariorum angustia, bilisque turgescentiæ extraordinariæ nullæ adsint, gortæ, ac internorum contenta naturaliter tincta sint.

Vasorum denique biliariorum, & hepatis angustias, aliæque vitia, monstrant

1. Dolor circa hypochondrium dextrum molestus, nunc cum tensione ac pondere, nunc cum lancinationibus obscuris.
2. Fæces alvi semper albicantes, aut cineritii coloris, hincque difficillimè & nullo labore solvi potest alvus; Ac
3. Convulsionibus viscerum abdominis antecedentes, aut adhuc præsentis.
4. Bilis viscidioris signa.
5. Calculorum per alvum interpolata excretio antecedens.

An icterus superveniens sit criticus, an symptomaticus? signa coctionis urinæ monstrant. Si enim signa coctionis in urina apparent, Icterus est criticus; si citra coctionis signa perfecta supervenit, est icterus symptomaticus.

Urinæ in principio sunt tenues, nonnihil lacteæ; in progressu fiunt turbidæ, obscuræ & crassæ; in statu copiosa deponunt sedimenta, & colore naturali flavo plius minus tinctæ apparent. Et quando urina sit crassa, turbida ac nigra, tunc signum est solutionis morbi, cum viçtoria naturæ: Sic namque huc facit exemplum SCHENCKII *lib. 3. Observat.* de post mictum cruentum seu sanguinis aterrimi excretionem, subito curato ictero: Magis huc facit exemplum HOEFERI in *Herc. Med. pag. 142.* de Ictero nigro, in quo ex usu lapidis Bezoar urina nigra & instar atramenti fuit excreta.

## PROGNOSIS.

*Prognosis* omnis nititur causarum antecedentium consideratione. Est morbus, si quis alius, contumax, si illegitimè tractetur. Per se periculum quidem, non tamen lethalitytem, involvit, nisi ratione causarum, aut supervenientium interdum symptomatum.

Hinc Icterus, qui sequitur vitium quodpiam visceris cujusdam, hepatis ac lienis, confirmatum, scirrhum, *Est null. Oper. Tom. II.*

&c. ferè chronicus, immedicabilis & lethalis esse solet, & nunc immediatè, nunc mediatè, quippe cui ordinarij hydrops lethalis superveniens, ægrum jugulat.

Icterus quò magis flavus existit, eò facilius est curatu: quò verò magis niger, difficilior; cùm hic causam complicatam magis aut certè alteratam, scilicet humorum aciditatem satis pertinacem, foveat.

Icterus flavus, qui est à ventriculi cruditatibus facillimè, & sæpè uno vomitorio, aut Purgante curatur.

In specie niger Icterus Quartanis superveniens solet esse contumacior: sicut FORESTUS libro 19. *Observ. 22.* observat, Quartanæ per 12. annos duranti icterum nigrum contumacem & diuturnum supervenisse. Interim Aphorismus HIPPOCRATIS 62. *Señ. 4.* non semper est verus: vid. HORSTIUS libro 1. *Observat. 20.* ubi Icterus salutaris quartã die in continua febre obvenit: & BARTHOLINUS *Centur. 3. Hist. 4.* observat Icterus in Quartana salutarem, ante diem septimum supervenientem.

Icterus à veneno externo productus periculo non vacat, ob symptomata maligna ipsi communicata.

Icterus à fermento sanguinis intrinseco vix, nisi dy-  
crasia illà ablata, tollitur, v. g. scorbuto, mensium suppressione, &c.

Ex ictero flavo securissimus est, qui in febre est criticus; symptomaticus verò, qui citius, quam coctionis signa apparent, malus observatur, & non raro periculum infert: vid. HIPPOCRATES *Epidem. Señ. 2. Text. 120.* & *superius de Febr. in genere pagin. 403. & 406.*

Post hunc facillioris est curationis & securior, qui ex impedito bilis per meatum felleum motu, hujusque obstructione oritur, modò non nimis pertinax fuerit obstructio.

Icterus ab angustia vasorum felleorum, si fixiorem & pertinaciorem causam hujus angustia foveat, v. g. callum, calculum, &c. semper difficilioris curationis observatur, quàm qui morbilem magis, v. g. obstruentem humorem, agnoscit.

Icterus à scorbuto vix, nisi hoc curato, sanatur; qui verò ex corruptela humorum, est incurabilis.

Calculi in folliculo felleo & inde nactus Icterus difficillimè, raro ac nunquam, curantur; cùm non proficiunt remedia, calculos alterantia, utut spiritus nitri dulcis aliquid præstet: aut curati licet, crebrius recidunt, & mortem inferunt.

Nec qui è mensium obstructione, nisi hac sublata, sanatur.

Pariter Icterus, qui à lienis vitio, non semper eandem habet prognosin: nam qui ab ejus scirrhum oritur, incurabilis est; qui verò à leviori lienis affectu, curari potest.

At intuitu supervenientium, & concomitantium symptomatum, ictero sæpius succedit Hydrops lethalis: non saltem, quod ille hepatis vel lienis scirrhum inducat; sed quatenus chylus bile haud sufficienter tinctus, hincque viscidior, vasorum lacteorum & lymphaticorum obstructiones, hincrupturas parat: & *rara satis est avis icterus cum hydropse curatus*, qualem PLATERUS *Observ. pag. 398.* annotavit.

## CURA.

In Icteri Cura ante omnia in genere prius causæ removendæ sunt; Hinc fermentum acidum austerum.

- I. Fermentum acidum austerum corrigendum, & si ex causis internis adfuerit vitium digestionis in stomacho seu cruditatis ventriculi, vel perfectionis chylis in intestinis, idè istarum digestionum vitia sunt corrigenda, & appropriatis emendanda.

- II. Bilis vitiosa emendanda, & in naturalem crasin re-  
stituenda; quæ verò emendari pequit, per urinas & sudores evacuanda.

- III. Distributio ejus debita promovenda.

- IV. Correcta causâ separatio seu præcipitatio particularum excrementitiarum ex massa sanguinea per appropriata specifica adjuvanda, earumque secretarum, & in porulis partium continentium defixarum, per Sudorifera vel Diuretica excretio promovenda est.



Hinc ratione prima Indicationis conveniunt *Abforbentia*, præsertim *Martialia*; post stomachus per *Vomitivum* purgandus, & per *Stomachica aromatica* corroborandus erit.

*Secunda Indicationi* ratione bilis & succi pancreatici viscosorum satisfaciunt *Martialia*, acidum destruentia; hincque remedia *salina acris* & *amara* plius minus resinosa & *volatilia*, præsertim *appropriata*, bilem restituentia, propinanda sunt: quibus pro laxanda alvo *Rhabarbarina*, *sennæ* &c., pro diureti *Lumbricalia*, &c. simul inserviunt.

In *Tertia præstant Incidentia*, *Aperientia*, & tonum hepatis conservantia, *Hepatica* vulgò dicta, simul blandè adstringentia, ut firmetur fibra, earumque tonus. Quod si malum sit à veneno, tunc hoc assumptum Vomitorio relinquitur, si ore haustum adhuc in primis viis hæreat, ubi etiam *Clysmata* profunt; vel animalium morsu communicatum per appropriata alexipharmaca corrigatur, & quidem modò per fixa, modò per volatilia, v.g. antimonium diaphoreticum, & Bezoardicum minerale, sal volatile Corn. Cerv., viperatum, rob juniperi, Theriaca, &c.

R. Theriac. scrup. ij.

Bezoard. miner. scrup. ss. ad gr. xv.

Sal. volat. Corn. Cerv. gr. v.

M. & Bolus: S.

Bolus expellens pruna dest.

Summatim in *Ictero nigro* primatum obtinent *Martialia*, in flavo *alcalina volatilia oleosa*, *alcali bilis amarum* restituentia, ut utraque conjunctim sæpius propinetur. In specie verò pro antecedentium causarum varietate specialis cura nonnihil varianda, de quibus hinc inde.

Pro hiscepiis obtinendis semper vomitus instituitur, cum ferè impossibile sit, sine vomitu perfectè curare *Ictero*: Ac in specie, si in principio morbi urgeant symptomata stomachi, qualia sunt anxietates præcordiorum, appetitus prostratus, &c. in tali casu nil melius est, quam ut mox ab initio propinetur vomitorium, in specie vitrum antimonii, vel crocus metallorum vino intusus, cujus unc. j. ad unc. ss. filtratum propinandum:

Vel R. Aloes hepat.

Extract. cent. min. an. ℥i.

Troch. alband. gr. vi.

Mercur. vitæ gr. ij.

R. Pilulæ pro 4. dosibus, ubi urgent vomendi conatus.

Quoad *venesectionem*: ea planè non juvat in *Ictero*, utpote quæ potius nocet, ac non rarò malum exasperat, quam ut idem tollat.

Similiter *Purgationes* propriè dictæ in principio morbi administratæ sunt admodum nocivæ, ac ut plurimum majorem discolorationem in superficie corporis inferunt, nisi sint lenia, primatum viarum saltem abstergiva, ut tartarus vitriolatus, acutus cum stimulo Purgantis cujusdam; vel quoque Gummi Ammoniacum, quod solutum, ac in mixtura adhibitur, appropriatum est ad *Ictero*: aut si addit tantummodò lenis obstructio meatus fellei in intestinis, tunc talis obstructio vel unicâ purgatione potest tolli. Locum enim Vomitoria & Purgantia habent in *Ictero* à vasorum biliariorum obstructione, minime ab eorum compressione, nisi hæc à talibus, quæ faciliè catharticis remove re licet, v.g. fecibus alvi induratis, contingat, quæ tendunt per Purgantia æquè ac vomitoria magna pars bilis ad intestina & ventriculum emulgetur, ut PEGHLINUS de Purgantibus c. 36. alii que annotarunt, ac illud observatum KYPERI testatur, dum *Insistat. l. 2. c. 16.* viro cuidam ob frequentiùs ea propinata non tantam bilis copiam restituisse, quanta alvinis fecibus tingendis sufficeret, eumque hinc debilitatum post annum obiisse, refert. In hoc tamen casu non semper à Purgantibus erit incipiendum, cum sæpè sola aperientia, & Digestiva, stimulo purgantis acuta, item salia fixa & volatilia, hanc obstructionem simulque *Ictero* tollant. In progressu verò morbi Purgationes sunt frustraneæ, nisi saltem in fine, appropriatis imprimis præmissis, conveniunt, quin potius in morbi statu diuretica & sudorifera sunt optima.

Quoad *Asterantia* verò & *Specificæ anti-Ictericæ*: inter ea primatum obtinet Mars, isque crudus, seu limatura Martis crudè pulverisata, quæ optima est in quocunque *Ictero*, in specie nigro; his enim in die, manè & vespere,

ad ℥j. radicem & somitem morbi tollit; & cætera ex eo parata, vulgò aperientia dicta, v.g. Essentia Martis liquidæ, & croci Martis, paucò vel nullo acido parati, & omnia *Martialia*, de quibus hinc inde in superioribus injecta mentio, tinctura Martis tartarificatæ, item tartari Martiales, Extracta Martis cum succo pomorum Borsdorffianorum, eaque imprimis in *Ictero nigro* & plumbeo, optima sunt. Hinc etiam Hematites preparatus seu pulverisatus seu experimentum in *Ictero* à quibusdam laudatur, quatenus est hictorus Martialis, seu Martialis pròsapia est. HEINRICUS ab HEER in *Observ. 6.*

describit pulverem compositum ad pallidos virginum colores, quem laudat in *Ictero* mensium obstructioni superveniente, cujus basin limatura Martis cruda, cum aliis Aromaticis mista, constituit. Hinc pulvis specificus ad *Ictero* est nil aliud, quàm limatura Martis exactissimè pulverisata, & subtritura cum oleo destillato aromatico ligni sassafras irrorata, ne scilicet ruginem contrahat; qui à ℥j. ad drachm. ss. commodè & cum successu, nunc solitariùs, nunc cum crystalli preparatæ dimidio propinatur, scilicet ad imitationem pulveris tussifici, imprimis HARTMANNI in *Practi Chymica* cap. 171. §. 5. Item antimon. & diaphoreticum Martiale Ludovici expertum, quod vid. in *ejus Pharm. pag. 330.* & alia *Martialia* &c.; nam hoc vel solum ritè administratum sufficit ad curam *Icteri*: Item Vina Martialis, vel quoque vinum, in quo sæpius aurum extractum, à POTERIO commendatum. Rationem dat BURRHUS in *Epist. ad Bartholinum*, quoniam scilicet ramenta subtilissima aurum communicantur illis liquoribus. Facit huc & experimentum GESNERI *l. 3. Epist. p. 305.* ac PLATERUS cap. de *Ictero* in *Ictero* quocunque tanquam experimentum commendat infusum chalybis cum carbonibus de quercu in vino. In specie ex mensium vitio si fuerit *Icterus*, *Martialia* laudantur. Acidula huc pertinent, quæ desperatos *Icteros* interdum curant; conf. WILLISIUS *Pharm. Rational. Part. 2. pag. 284.* STOECKERUS in *Praxi*: cum hæc ipsæ post *Ictero* relictam humorum dyscrasiam, & viscerum atoniam, præsertim si diuturnior fuerit, optime restituant.

Post *Martialia* fiat accessus ad *Specificæ Ictericæ*, inter quæ primatum obtinet in *Ictero flavo* chelidonium majus, nobilissima planta, & optimum in *Ictero* remedium, præsertim quando ex vitio bilis motu, indeque fecibus alvinis griseis aut candicantibus existentibus *Icterus* oritur; de cujus usu vid. FORESTUS *lib. 19. Observ. 21. & 40.* Usurpatur autem variis modis: vel ut ex planta recenti contusa exprimatur succus, qui, licet nauseosus, in vino aut quocunque vehiculo mitius, quotidie manè hauriatur; quæ ratione ancillam *Ictericam* multosque *Ictericos* nunc præmissis, nunc omisso vomitu, paucos intra dies curavit: vel quando nauseabundus & ingratus est sapor, fiat secundum methodum à CASTRO præscriptam infusio radices chelidonii majoris in vino, quod intensè colore flavo tingitur, & bibitum notabile est remedium & infallibile, ut dicit CASPARO, in *Ictero* experimentum. Item Decoctum huius chelidonii in vino aut quocunque modo paratum, bis quotidie usurpatum, optimum est remedium contra *Ictero*, & fallit rarò in cura *Icteri*, si maturè assumatur. Hinc JOEL Decoctum chelidonii majoris cum grana juniperi tanquam expertum meritò commendat & laudat: videatur WILLISIUS *Pharm. Ration. Part. 2. p. 280.*

R. Rad. chelidon. maj. M. ij.

Bacc. juniperi M. j.

Cum vino in mortario trita, & validissimè expressa, propinetur.

Post chelidonium majus, marrubium, hujusque Decoctum, essentia, & extractum, similiter remedium expertum est; de quo vid. FORESTUS *lib. 19. Obs. 19. & 40.* In schodio, ubi curavit mulierem diuturno *Ictero* laborantem, quæ aliis omnibus irritis solo usu syrapi marrubii curata fuit: quod & omnes Practici confirmant.

Huc spectat centaureum minus, quod interne quocunque modo sumptum, ob amaritatem ad *Ictero* egregium est: Ejus Decoctum cuporiston est Kulandi in cura *Icteri*; imò sunt, qui dicunt, quod centaureum minus recens contusum in calceos immisissum, ut nudis pedibus inter ambulandum ita teratur, cures *Ictero*; fieri enim plantam omnino flavam, ob



Ob id quotidie esse repetendam. Item *taraxacum*, item *flores chamomilla*, herba *grimonia*, *abrotanum*, *anferina*, cujus succus vel Decoctum hauriatur. appropriata sunt icteri remedia: vid. RIVERIUS, FONSECA, & PETRÆUS in *Dissert. Harmonica*. Huc pertinet *sumaria*, cujus solius succo RIVERIUSC. 3. *Observat.* 73. icterum & vomitum biliosum curatum refert: *salvia*, de qua vid. PLATERUS *Prax. T. 3. pag. 141*: & *rosmarinus*, vid. FONSECA l. a. Hæc simplicia omnia, quibus & *co-blearia* addi potest, operantur, corrigendo bilis oleositatem, & sal volatile ejus acuendo. De *succo capillorum Veneris* vid. VELSCHIUS *Mithom. C. 13. Obs. 13*. Facit huc *fragaria*, quæ etiam est remedium expertum *Rulandi*, Decoctum nempe ejus aliquandiu continuatum, aut pro potu ordinario propinatum, quod ipsum sufficiens est in cura icteri infantum: Nam quod etiam *infantes fiant Ictericæ*, observat PANAROLLUS *Pent. 4. Observ. 44*, ubi refert de infante ex utero materno icterico. Magis adhuc convenit, si *fragaria* simul decoquatur cum *passulis*, & ita Decoctum hauriatur, teste RULANDO in *Tthesauro pag. 168*. item FONSECA l. 2. *Conf. 34*, qui dicit, fuisse secretum cujusdam religiosi, qui Ictericos curavit Decocto herbarum & radicis *fragarum* quotidie hausto; vid. etiam BARTHOLINI *Alia Med. Hassniens. Vol. 1. Observ. 120. v. 8*.

R. *Herb. fragar. cum toto M. ij. vel iij.*

*Passul. min. ℥iij. vel jr.*

Hæc coqu. in l. q. aqu. font. pro potu ordinario.

Fit potus gratus sapis usurpandus, quem etiam HARMANNUS commendat in *Praxi Chymiatrica*. Ictericæ enim, utut intense sitientes, male ferunt cerevisiæ potum, partim propter amarorem, partim quod oneret ventriculum, cum non bene digeratur, sed in mucum degeneret. Hinc sitientibus maxime ictericis, convenientissimus potus erit vel modò dictum Decoctum, vel si *fragaria* amaror molestus sit, solum Decoctum *passularum*. *Passula* sanè multum in recessu habent, unde non possum non laudare *Electuarium DIGBÆI P. 1. Experiment. ad quemvis icterum*, paratam ex *passulis minoribus* & *Rha-Barbaro*.

Conveniunt etiam *radices s. aperientes*, *cichorii*, *rubia*, *tinctorum*, *urticæ*, *lignum sassafras*. *Radix hirundinaria* seu *vincetoxici*, ejusque essentia, appropriatum est antiictericum, & à SIMONE PAULI *Qu. Botan. pag. 217*. extollitur, præsertim in progressu & declinatione morbi, si vinum decoctionis ejusdem hauriatur, tam per sudorem quam per urinam egregie operans, & tincturam removens. Ex *℥ij. radicis urticæ majoris* & *℥j. croci* Gesnerus cum vino albo extrahit tincturam, quam tanquam celebre antiictericum per 3. dies dosi ℥iij. assumendum commendat. Ulteriùs *flores hyperici* & *calendulæ* hoc in casu etiam sufficiunt, in specie *croci flores* experimentum sunt ad icterum. *Flores hyperici* commendat Stockerus in *Praxi*, si scilicet flores cum herba perforatæ, i. e. *hyperici*, coquantur in vino, vel aqua, & detur continuò bonus haustus manè: prætereaque herba & flores ponantur in calceos; remedium enim dicit esse expertum. De *floribus genistæ* res interdum certa est; id quod confirmat Observatio BORELLI *Cent. 4. Observ. 31.*, ubi icterus à fumo tabaci obortus curatus per *conservam florum genistæ & calendulæ*. Nec *absinthium*, optimum hepaticum, hic negligendum est; cujus virtutem in ictero cum aliis cachexiæ symptomatibus annotavit SOLENANDER *Seb. 5. Conf. 25*. Icteri diuturni curationem per Decoctum musci pulmonarii quercini videb. in *M. A. N. C. Ann. 3. Observ. 290*. Pertinet huc Decoctum euphoris *Camerasii* ad icterum, quod describit FEHR *de absinth. pag. 29*.

R. *Com. absinth.*

*Flor. rosar.*

*Prun. syr. an. par. viij.*

*Croci part. ℥.*

Decoque in vino diuretico, & exprime pro uso. Aliis semen *aquilegiæ* nobile est specificum expulsum in ictero, quod promovendo expellendoque excrementa icterica massam sanguineam purgat, estque TIMÆI euphoris, unde est basis pulveris *Tunæ* ad icterum experti, cujus Descriptio est hæc:

R. *Sem. aquileg. ℥vj.*

*Croci orient. ℥j.*

*Tartar. vitriolat. ℥j. vel ℥ss.*

*Ess. mull. Oper. Tom. II.*

M. f. Pulvis.

Div. in 7. part. æqu.

Sumantur ex vino & henao calido 7. diebus continuè; omni manè dosim propinando. Testari possum, quod aliquando sartorem ictero flavo contumaciter laborantem, aliis irritis, præmissis Vomitorio, hoc pulvere restituerim: juxta cujus usum imprimis *spiritus camminatus* de tribus præ aliis proficius erat.

Vel convenienter potest fieri Emulsio ex hoc semine: exempl. gr.

R. *Sem. aquileg. ℥ss. ad ℥vj.*

Cum l. q. aqu. flor. aquileg. & *chelidon. maj. f.* Emulsio: adde

*Ebor sine igne, vel rasur. eboris pulv. ℥j. ad ℥jss.*

F. Mixture contra icterum.

Educoresur parum & usurpetur pro lubitu.

D. S.

Emulsio sanguinem purificans.

Benedicere hæc Emulsio; frequentius enim usurpata blando sudore expellit icterum, & tincturam optime delect: inter alia puerperæ, mox à partu fœtus mortui ictericæ, cum successu dedi. Ebor certè, ceu appropriatum absorbens, ut & *corallia*, à multis ad icterum commendantur.

Juxta hanc emulsionem pariter quoque experta est Emulsio *Cnossæliæ* ex seminibus frigidis majoribus, &c. quam videb. in *M. A. N. C. Ann. 4. 1795. Observ. 49. pag. 43. 1794. SYLVIVS* laudat semen cannabæ in lacte ad crepaturam coctum in ictero; vel hæc ex hoc Emulsio cum aqua appropriata; vel

R. *Sem. card. bened.*

*Napi,*

*Aquilegiæ an. p. æqu.*

Cum aqua quadam appropriata f. Emulsio.

D. S.

Ut antè.

Hiscæ accensenda venit *radix curcumæ*, restaurativum sanguinis seu hepaticum, & antiictericum specificum bonum; siue solitaria, siue cum Martialibus in forma sicca, e. g. *antimonio diaphoretico Martiali*, conjuncta propinetur: v. g.

R. *Limat. crud. Martis, vel pulv. cache. Martial.,*  
*Vel antimonii diaph. Martial.*

*Rad. curcum. an. ℥ss. ad gr. xv.*

M. f. Pulvis pro dosi: S.

*Pulvis antiictericus.*

Vel

R. *Rad. curcum.*

*Antimonii diaph. vel Bezoard. minor. an. gr. xv.*

*Sal. vol. cornu cervi vel viperæ. vel succini gr. vj.*

M. f. Pulvis.

D. S. ut antè.

R. *Antimonii diaphor. Martial. Lud.*

*Rad. curcum. an. ℥j. ad ℥ss.*

*Sal. volat. cornu cervi ℥ss.*

M. pro 2. dosibus.

D. S.

Ut suprà.

In specie, si à calculis in folliculo felleo fuerit icterus, radicem hanc ceu experimentum commendat HOFMANNUS in *Clave Schröderiana p. 365*; de quibus calculis exturbandis etiam vid. remedia ordinaria in *M. A. N. C. Ann. 4. 1794. Observat. 99. p. 103*.

Hæc ipsa specifica ex regno quidem vegetabili optime sunt juncta in Essentia contra icterum D. MICHAELIS, cujus Ingredientia sunt hæc:

R. *Herb. marrub.*

*Eupator.*

*Abrot.*

*Anser. an. M. j.*

*Rad. chelidon. maj. ℥ij.*

*Tarax.*

*Fragar.*

*Gramin.*

*Rha Barb. Mon. an. ℥iij.*

*Curcum. (egregium remedium) ℥ss.*

*Flor. hyperici.*

*Calend.*

*Cichor.*

*Hepas. nobil.*

*Geniss. an. p. iij.*

Ex his cum spiritu *chelidon. maj. f.* Essentia.

C c 4 Nec



Nec omittenda sunt ex animalibus, quæ sale volatili, nunc diuretico nunc sudorifero, constant: Hinc *ascler*, & *lumbrici terrestres*, seu eorundem blandè in Balneo Mariæ exsiccatum pulvis ad ʒj. sæpius propinetur: vid. THONER, & LOTICHIUS. Nam hic pulvis bilem infieniter acuit: aut more antiquorum subigendi cum sero lactis vel cerevisiæ: vid. MAROLDUS Pr. p. 171. vel infundendi vel coquendi cum Vegetabilibus aperientibus sic dictis, aut specificis, vel mentes moventibus &c.: aut per putrefactionem vel fermentationem spiritus urinosus ex his paratus ad ʒʒ. subindè exhibeatur, propter sal volatile nitrosum abstergens, incidens, & saporem icteri specificum corrigens, urinamque ciens, ab omnibus Practicis laudatur. Quibus vix cedit spiritus tartari probè rectificatus urinosus, spiritus carminativus de tribus, spiritus urinae humanæ, ad modum ZWELFERI in Mant. Herm. traditum paratus, liquor cornu cervi succinatus ad guttas xxx. Tinctura tartari acerrimæ gutt. xxx., aut loco spiritus urinae spiritus salis ammoniaci efficacior erit; hinc pauperculi urinae potu ab ictero se curare solent; vel quod in multis probatum euporiston, utut foetidum:

R. Succ. abshnb. vel cbelidon & marrub. q. v.  
Misc. cum urina ægri.

De quo bibat bonum haustum, contineat se in lecto & super, sudorque sæpius abstergetur; hoc enim aliquoties repetito subindè restituitur.

Certe præmissis præmittendis (i. e. vomitu & Martialis) post specifica salia volatilia sunt optima icteri remedia. Unde propter huiusmodi volatilem salinam nitroso-ammoniacalè texturam stercorea quorundam animalium tantopere ad icteri curam tàm PARACELSU, quàm alii Practici, commendant; qualia sunt sterco caprillum, gallinæcum, columbinum, equinum, in specie sterco viridescens anserculorum juniorum, imprimis cbelidonio & anserinâ nutritorum, ad ʒj. Nam propter ammoniacalem vim, & anserinam, seu specificum in hoc morbo, qua vesel solent, illud sterco specificum antiicericum fuit Bartholei (vid. FONCESCA l. a. ac GRULINGIUS Prax. l. 3. pag. 307.) recipitque sterco anserinum & lumbricos terrestres: Aut pulverem icericum, quem LOTICHIUS lib. 4. cap. 2. Observ. 6. & 7. describit; quibus WILLISIUS sterco ovillum substituit: item sterco canis ossa rodentis; item sterco album pullorum exsiccatum & pulverisatum: Abundant enim omnia stercorea sale volatili denatura ammonicali, quod ipsum egregiè vitia bilis & succi pancreatici simul corrigit & emendat. Quod facit Tragea stercorearia QUERCETANI in Pharm. pag. 451. ex folis animalium stercoreibus parata: vid. FINCHIUS Chym. p. 145. Hæc omnia à ʒʒ. ad ʒj. propinantur, & ad icterum laudantur; sicut & quidam commendant succum stercois caprae expressum cum lacte seu epergium in ictero remedium. Pediculistres, vel quatuor vivi deglutiti commendantur à quâmpiorimis, & experimento comprobavit ZACUTUS LUSITANUS lib. ultimo Med. Princip. cap. 2. Hisce annuerandi veniunt lapides in felibus animalium reperti, præsertim lapis ille in felle bovis repertus euporiston non est contemnendum, utpote cum sit nihil aliud, quàm bilis naturalis coagulata ab acido, cujus pulvis à drachm. ʒ. ad scrup. ij. imò ad drachm. j. mirè ad icteri curam laudatur; extra quem & lapis ex felle porci egregius est: Conf. M. A. N. C. Ann. 3. Observat. 283. pag. 499. Loco quorum etiam capi solet lapis Beoor, sive Orientalis, sive Occidentalis, ex cujus usu urinas nigras instar atramenti redditas fuisse, observatum fuit in ictero nigro: vid. HOFERUS in Herc. Med. pag. 140. supra allegato: vel calculus humanus, tàm per urinam quàm per sudorem, icterum pellens est. Item spectat huc lapis ceraunius præparatus à scrup. j. ad drachm. ʒ. qui est specificum ad icterum D. Michaels, quo ipso aliquoties curavit, qui quotannis hoc morbo afficiebantur: in cujus defectu lapis in folliculo fellis tauri repertus commodè substitui potest: sic ipse cuidam quotannis ictero laboranti exhibere soleo lapidem ceraunium præparatum. TILEMANNUS & AGRICOLA ex lapide ceraunio pulverem contra icterum præparant. HARTMANNUS & D. MICHAELIS cum exuvils serpentum aut viperarum spontè depositis misceant, & do ʒ scrup. j. propinantur: vid. supra, ubi de Hydrope Artic. 3. Ex quibus variè fieri possunt formulæ: ver. grat.

R. Rad. rubia tinf.  
Cbelidon. mai. an. ʒj.  
Herb. marrub.  
Summis. abshnb. an. M. j.  
Sal. tartari drachm. ij.

Includ. nodulo vino infundendo:

D. S.  
Nodulus sanguinem mundificans.

R. Extr. cbelidon. mai. gummi. drachm. j.  
Lap. Bezoar. occident.  
Aurmonii diaph. Martial. Lud. an. gr. xv.  
M. f. Bolus. S.  
Bolus sanguinem mundificans.

Diluatur in haustu vini, capiat.

BIERLING sequentem commendat pulverem:

R. Bezoard. minor.  
Iovial. ana ʒʒ.  
Matr. perlar. præp. gr. v.  
Biz. Orient. gr. vj.  
M. S.  
Pulvis vesperinus pro una dosi.  
Item

R. Aqu. tarax. ʒj.  
Extr. cbelidon. mai. ʒʒ.  
Sal. volat. Corn. Cerv. gr. ix.  
Syr. card. bened. ʒj.  
M. S.  
Potio sanguinem mundificans pro una dosi.

R. Croci Martis aperit. ʒʒ.  
Extr. Rhabarb.  
Rad. cuscum.  
Fumar.  
Abshnb.  
Cent. min. ana ʒʒ.  
Olei destillat. maior. gutt. vj.  
F. Pilulæ No. 197.  
D. S.  
Pilula sudorifera.

Dosis viij. ad xij. manè & vesperi.

Pro targescentia biliosa mitiganda oplo locus concedi potest: potui ordinario intillandus spiritus salis dulcis, & spiritus nitri dulcis, item spiritus salis ammoniaci ac. dus vid. GRIMMIUS Compendio Medico Chymic. lib. 3. cap. 1. Observ. 26. & 27.

Cæterum in fine interdum, non autem semper, blanda Laxantia adhiberi convenit pro evacuatione primarum viarum, inter quæ huic scopo inservientia hætenus enarratis aut subjungenda, aut interdum etiam permiscenda, semper sint moderata & blanda. Præ cæteris commendantur flores pruni sylvestris, qui blandissimi & appropriatè laxant per alvum, si infundantur in potum ordinariu cum Nodulo, qui crebrius bibatur; vel manipulus horum florum acaciæ infundatur in vidum, maceretur per diem & noctem in loco calido, quod vinum ita hauriatur: Dicitur KAUFFINGER experimenor, laxat blandè, & ad crasin sanguinis confert: vid. Collegium in Schrodorum P. 1. S. 2. Class. 1. Convenit hic etiam infusum foliorum fennæ cum sale tartari in aqua specifica; Nam sal Tartari hic convenit duplici ex fonte:

1. Quoniam absorbet acidum, & præcipitat materiam heterogeneam.
2. Quia adjuvat extractionem mucilaginis purgantis ex fenna, & stimulat quoque, ne adhærescendo phicis intestinorum hypercatarthes inferat: semel enim pro semper moneo, non debere propinari infusum fennæ, nisi adjuncto stimulo sal. tartari.

Extractum adtem foliorum fennæ oil valet. In specie laudem meretur Rha-barbarum, & Rha-Barbarina, quod appropriatum est, utur vulgò bilem evacuet. At hoc non solum præstat, sed potius partim alterat, partim evacuat; idè vim specificam antiicericam habere dicitur, nec sine causa à PARACELSO commendatur. Nempè Rha-Barbarum electum pulverisatum optimè in substantia usurpatur à drachm. ʒ. ad drachm. j; propinetur in jure vel vino calido manè jejunò stomacho, æger non nihil contestus insigni-



signiter sudabit, & à meridie alvum laxum habebit:

Vel

R. Rha Barb. ʒss.

Tartari vitriolat. vel arcan. dupl. gr. xij.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis laxativus.

Usurpetur dicto modo. Et sanè pulvis hic Rha-Barbari in his casibus præferendus est Extractis, utpote quæ nullus sunt pretii: Unde infusum Rha-Barbari cum marrubio est egregium remedium ad curam icteri: Quod pertinet Essentia alexipharmaca laxativa Clauderi ex Rha-Barbaro, vel Elixir cachecticum polychrestum laxativum cum essentia absinthii:

Vel

R. Passul. min. aut earund. pulp. ʒss.

Rha Barb. el. ʒij.

Tartari vitriolat. Tacb. ʒij.

Cum l. q. syr. de cicbor. cum Rha-Barb. f. Electuarium.

D. S.

Aperiens Electuarium sanguinem mundificans.

Vel infunditur Rha-Barbarum in aqua specifica cum foliis fenonæ, addito sale tartari: Vel

R. Fol. fenn. sine stip. ʒijss.

Rha-Barb. el. ʒj.

Rad. curcum. ʒss.

Sal. tartari ʒj.

Infund. in aqu. fumar. per noctem:

Colaturæ adde

Syrup. de cicbor. cum rhubarb. ʒj.

M. D. S.

Potio laxativa sanguinem mundificans.

Vel

R. Summ. centaur. min. p. ij.

Rha-Barb. el. ʒij.

Sal. tartari ʒj.

Infund. in l. q. vini absinthii, sicut in loco calido per noctem:

Colaturæ adde

Syr. de cicbor. cum Rha-Barb. ʒvj.

M. S.

Vinum absinthii purgans pro una dosi.

R. Rha-Barb. el. ʒij. vel ʒij.

Sal. tartari ʒj. (vel crem. tartari ʒj ad ʒj.)

Infus. in aqu. simpl. vel appropri. ʒij.

Sicut in loco calido:

(cum cremore tartari verò ebulliat ad tartari dissolutionem.)

Colaturæ adde

Syr. de cicbor. cum Rha-Barb. ʒj.

M. D. S.

Potio laxativa sanguinem mundificans.

Sanè Rha-Barbarum sub forma pulveris vel infusi in his casibus præferendum est Extractis. In ictero nigro autem infusum bellebori nigri in sero lactis confert, aut pilule ex extracto bellebori nigri cum Extracto Martis concinnatæ: quibus, quantum possibile fuerit, gummam ammoniacum sociandum, quod optimum aperitivum, & mucis viscosi incilivum. Præcipitata Mercurialia pro purgandis ictericis ad curam icteri à quibusdam commendantur: sic Mercurius præcipitatus rubeus cum tartaro ad aliquot grana commendantur à FincKio: Mercurius præcipitatus luteus ad gr. v. vel viij commendatur à SCHNEIDERO in Pharmacopœa: sed transeant, eum tutiora prostant. Pertinet huc Decoctum LINDANI, quo quemvis icterum curat, præsertim, quod probè notandum, præmissio vomitorio; ut plurimum enim in principio curationis vomitorium propinandum venit. Decoctum est tale:

R. Rad. cicbor. aut tarax. ʒij.

Cbelidon. maj. ʒvj. ad ʒj.

Herb. endiv. aut cicbor. M. j. vel ij.

Fragar. M. ʒss.

Marrub. M. ʒss.

Tartari alb. ʒss. ad ʒvj.

Fol. fenn. ʒvj.

Coqu. in l. q. aquæ, aut aquæ & vini ana q. s. in vase clauso: Decocti R. ʒj.

Detur pro usu: addendo, si præstantius desideretur, singulo haustu spiritus tartari rectif. ʒj ad ʒss. sumantur 3. diebus, & omni mane duo haustus, interpolatâ horâ, continuando, donec malum sit curatum.

In hujus usu attendendum, ne sint secessus ultra tres

vel duos indie: si contingat liberalius purgari primo die, aliis sumatur tantò minus. Tali Decocto Amstelodamicuravi mercatorem ex ictero nigro: Tribus septimanis nihilum quidem profecti, urinæ manebant crudæ & splendide; post dies paucos, apparente coctionis signo, aberat splendor, & turbidæ erant urinæ: Prædixi ergo illi solutionem morbi. Continuari igitur medicamentum, & non mutare opus est.

Convenit quoque *Apozema Sylyi* cap. 46. §. 68. pag 432. & Potio sequens BARBETTE, quam habet in Exercit. Prædicis.

R. Rad. rubie tind. ʒj.

Urtica,

Curcum.

Cbelid. maj. an. ʒss.

Fol. marrub.

Cuscut. an. M. j.

Flor. geniti. p. ij.

Sem. cannab. ʒss.

Aquileg.

Petroselin. an. ʒij.

Coque in

Vini albi tenuior.

Aquæ puræ an. q. s.

Colaturæ ʒss adde

Syr. de cicbor. cum Rha-Barb.

Spinacervin. an. ʒij.

Spiritus salis ammoniaci vel carminat. de tribus ʒij. Misc.

Vel

R. Herb. marrub.

Cuscut. an. M. ij.

Flor. genitiæ,

Acacia,

Calend. vel cartham. an. M. j.

Rad. scorzon.

Pilicis,

Cicbor. an. ʒj.

Crem. tartari ʒss.

Coqu. in l. q. aquæ.

Colaturæ adhuc ferventi infunde per noctem

Fol. fenn. sine stip. ʒvj. vel Rha-Barb. el. ʒss. ad ʒvj.

Colatura ad ʒss. D. S.

Potio sanguinem purificans.

Quoad Icterus nigrum, saltem notetur: ut in præscribendis remediis semper acidum absorbendi simul habeatur ratio; siue hoc fiat illa eligendo, quæ utrique humori simul dicata, v. g. per Terrea, Urinosa & Martialia; siue hæc aliis & hætenus dictis commiscendo; siue modo hæc modo illa diversis vicibus propinando.

Hæc fuerunt Interna, de quibus adhuc in genere monco: In medicamentis anti-ictericis esse insistendum ad tempus, quia est morbus chronicus & contumax: & quidem quamdiu urina mingitur tenuis & splendida, tamdiu illis insistendum, donec signa coctionis appareant, & aut sunt crassæ & turbidæ, & cum sedimento repletæ; his enim apparentibus solutio imminet, & spes salutis est in propinquo.

Hisce Internis interdum Externa quoque remedia accedunt, quæ in icteri cura subinde plantis pedum applicari solent, qualia sunt centaurium minus, item radix chelidonii majoris, & hypericonis, de quibus supra dictum. Sic pro delenda penitus tinctura seu colore icterico, qui aliàs sponte evanescere solet dictis hætenus adhibitis, conveniunt frictions seu balnea: nempe ad abigendum colorem mittantur colore peregrino infecti, sani licet sint ægri, in Balneum aquæ tepidæ, ut ita relaxentur cutis pori, fricetur corpus cum sacculis, repletis farina bordet & fabarum, quibus aquæ calidæ immerfis fricandum corpus; ita enim viciosus color quicunque, interdum pertinax, depunitur ac evanescit: vel fiat balneum resolventibus, v. g. senbiosa, saponaria, chelidonio, chamonilla, parietaria, origano; de quo vulgò dicitur, quod colorem ictericum eo usque evocet, ut aqua balnei inde tingatur; hæc, anetho, marrubio, abrotano, radice lapathi, sigillo Salomonis, ex lupinis, nitro, sulphure, calce viva & similibus, quibus corpus abluatur: v. g. usurpetur Balneum ad curam detergendam Mynsichtii, vel

R. Herb. saponar.

Parietar. an. M. ij. vel liij.

Rad. brjon. ʒss.

Rad.



*Rad. Sigilli Salom. ʒiv.*  
*Pulv. pisor. nodulo inclus. ʒss.*  
*Incisa D. S.*

*Species ad balneum.*

Balnei huius Decoctiois aliquoties æger insideat, nonnam semper aquam recipiendo: tunc pisorum pulvis nodulo laxiori inclusus sit.

De *sinca pice*, umbilico vel dextro hypochondrio imponenda, aut plantis pedum imponenda, aut plantis pedum supponenda, quæ exinde flavescere dicitur, & æger sanari; ac de potu & poculo cereo flavo, rem in dubio, ceu incertam, relinquo.

Pertinent huc Externa ad iæterum quemcumque mulierum gravidarum convenientia, quibus propter metum abortus non semper tutum est propinare interna, aut *imbecillioribus*: in talibus quovis iætero correptis expertum est *Cataplasma Joelis*, quod habet

*R. Fol. marrub. virid.*

*Rad. chelidon. maj.*

*Visci quercin. an. M. ij.*

Hæc cum aceto vel vino subacta plantis pedum applicantur: vid. RONDELETIUS.

Aut si tutum videatur, potest ex his fieri Infusum in vino, & propinari internè pro sudoris profectione. FORESTUS l. 19. Obj. 21. gravidæ iætero laboranti, cum jam instaret partus tempus, sequens Claretum cum successu propinavit:

*R. Herb. marrub.*

*Puleg.*

*Artemis.*

*Capill. veneris,*

*Verben. an. p. j.*

*Rad. calam. arom. ʒij.*

*Croci ʒj.*

*Cinam. ʒss.*

*Sacch. q. l.*

Cum vino f. Claretum, quod profuit, & cum ʒ. vel 6. diebus assumpsisset, feliciter peperit, & simul tunc ab iætero liberata fuit.

Pertinent huc etiam curæ magneticæ, uti in aliis morbis chronicis, ita & in specie in iætero proficua. V. g. urinam ægri miscent cum farina hordei, exin formant placentas, quas in aquam piscibus proficiunt, aut cani vel feli devorandas præbent; sic iæterus evanescet. Innotuit hoc HELMONTIUS pag. 595., & in Anglia induabus personis à se expertum refert hoc Dn. BOYLE in *Philos. Experimentalis*. Dicunt, si æger quotidie urticas vivas perstringat, exinde arescere urticas, ægrum verò successivè curari: vid. KESLERUS *Process. Cent. 3. pag. 84.* Vel infundatur ægri urina supra acervum formicarum; vid. M. A. N. C. *Ann. 3. Observ. 89. pag. 146* Sic urina iæterici supra stercore equinum, dum calet, excreta curat iæterum, annotante PLATERO & GRÜELINGIO: vid. WILLISII *Pharm. Rat. Part. 2. pag. 149.* Vel permisceatur urina cum cineribus fraxini, & in globulos redacta prope fornacem exsicceatur: Conf. WILLISIUS l. c. Vel, quod fuit expertum d. CASTRO:

*R. Ovum gallinae*, suo luteo & albumine per mediocrem foramen orbatum, ita ut sola testa remaneat integra, quæ impleatur urina patientis, & facta scrobiculâ in hypocausto sinatur ibi, donec lento calore exsicceatur urina; pari gradu & exsicceatur urina, & tollitur iæteritia.

Potest fieri etiam citius in digestionem cinerum. Si verò per incuriam contingat aduri testam, iæteritia abit in nigram iæteritiam immedicabilem.

Vel sanguine ex mediana ægrotantis extracto, & ovi gallinacei testæ artificiosè incluso, & ita ovo 14. dies gallinæ pro fotu supposito, postmodum cum carne quadam misto, & cani, vel sui famelicæ exposito, ut comedatur, iæterum & morbos ex vitioso sanguine oriundos transplantando averruncare satagunt: vid. BURG-GRAVIUS in *Bolychinio*. Item ex urina ægri & lacte, & addito pane similagineo, fiat jusculum, propinetur cani; qui si non moriunt, nec homo morietur, sed convalescet.

Sequitur

## ARTICULUS V.

### DE

### LUE VENEREA.

**L**ues Veneræ ita dicta, quod ex concubitu & usu cum subiecto impuro frequentissimè & facillimè contrahatur; & est nihil aliud, quàm contagiosa totius corporis cachexia, cum insignibus & crudelibus artuum & locorum quorumlibet nervorum doloribus, pluribusque symptomatis stipata, à corruptis, malignis, & quasi virulentis humoribus dependens; ita quidem, ut prius semper membrum afficiatur, per cuius contactum virus illud corpori primò & immediatè affricatur.

Innotuit hic morbus Europæis non nisi ante duo circiter secula, & quidem circa annum Christi 1493. Dubium ergò mox oritur: an Veteribus cognitus fuerit hic morbus, an non? Prius qui defendunt, non pauci sunt, quos inter est LINDANUS, exactus Veterum scrutator, qui super *Harvannum* asserit, quod GUILIELMUS de PALAZETO, qui floruit Anno 1470 accuratè de hoc morbo scripserit; item BERNHARDUS GORDONIUS, qui floruit An. 1305. & in *Lilio suo Medicinae* de hoc scripsit; item VALESCUS de TARANTA Anno 1417.; imò quod & alii antiquiores citari possint perhibet, quid de hoc affectu scripserunt, & de eo agunt, cum de morbis pudendi scribunt. Alii è contrà Veteribus incognitum volunt, asserentes, eundem in India Occidentali endemium exillere, illumque milites Hispanos ex istis locis redeuntes Anno 1494. reportasse, & hinc in Italia ab eisdem disseminatum, & in specie in Castris Gallorum in Obsidione Neapolitana à scortis urbe exclusis longè latèque propagatum fuisse; undè ab Italis *Morbus Gallicus*, à Gallis *Morbus Neapolitanus*, ab aliis *Syphilis*, quo nomine apud Veteres veniat, ab aliis appellata fuit. Sed hæc est de lana caprina: vid. SENNERTUS l. 6. *Prax. Part. 4. c. 1. p. 121.* MANARDUS Ep. l. 2. p. 99. item MONARDUS de *Simplic. Med. Histor. pag. 312.* HELMONTIUS de *Peste, Fracastorius Tract. Peregrina Lues nova*, &c. qui omnes diversa de ejus origine tradunt.

Exactam ejus historiam enarrare serè difficile est; nam, ut inquit LINDANUS: si *Protheus* est, *Lues Veneræ* est, & credo, non esse morbum, qui tam difficilis sit cognitu, quàm *Lues Veneræ*; nullus enim morbus est, cuius pathologia non possit, adè ut ex multis hoc morbo laborantibus vix duo sint, qui eodem modo efficiantur.

Symptomata enim, quibus morbus hic se manifestat, non semper eadem sunt: quibus tamen innotescere solet, aut primaria aut frequentiora hæc deprehenduntur:

1. *Effluxus humoris spermatici virulenti* ex pene in matibus, ex genitalibus in mulieribus, quem gonorrhoeam virulentam seu venericam appellant, congressum cum persona plus minus suspecta paulò post, interdum tertiâ vel quartâ die, interdum paulò tardiùs, inlequeos. Cum verò sanies, quæ profluit, acris sit, & in confinis præputii, ubi glandi connectitur, subinde retineatur, acrimoniâ suâ irritante inflammationem præputii & tumorem insignem excitat, ita ut glans phymosi quasi affecta detegi non possit; dum interius sanies ista acrior facta glandem potentiùs arrodât: nunc verò præputium tumorem quasi flatulentum contrahit, ita ut in immensum intumescat, & quasi transpareat, & glandem inferius stringat. Quod si intempestivè supprimatur, aut non ritè corrigatur hic fluxus, universum corpus Lues ipsa brevè post perfectè inquinabit.

2. *Bubones in inguinibus* saltè exorti, vel post Veneris usum, vel etiam aliquo tempore post, duri, dolentes, præsertim noctu; qui si evanescant, aut saltè incisione a perti ad suppurationem & mundificationem producantur, res in meliori erit statu: interdum non suppurantur, sed potiùs indurantur.

3. *Lassitudo insignis ulcerosa & torpor gravis* quælibet membra occupat, quasi fustibus contusa essent.

4. *Pustule variae multiformes & stabiles*, in corporis partibus se offerunt: si pene quidem pustulae parvæ præ-



præsertim in glande apparent, item circa coronam, quæ paulatim rumpuntur, & in ulcera alba degenerant, hinc successivè fiunt profunda & callosa, glandis substantiam successivè exedentia & absumentia. Si ex congressu impuro malum sit, ferè in pene primitus, idque ut plurimum cum gonorrhœa, apparent ulcera. Aliàs quoque pustulæ hinc inde in corpore, præsertim tamen in fronte, facie, faucibus, & naribus, hinc cute capitis pilosa, erumpunt, nunc plus nunc minus protuberantes; item circa pubem & coxas, interdum dense labia vulvæ obdunt, suntque squamosæ, scabiosæ, inæquales, coloris rârò intensè rubel, ut plurimum lividi, aut ex livido flavescentes. Nunc aridæ sunt & exsiccæ, & squamæ saltem suggerunt, aliquando sanies quædam acris exinde emanat, ipsæ pustulæ hinc latius serpentes, & se dilatantibus.

5. Procedente malo pustulæ hæc tandem abeunt in *ulcera*, quæ etiam sine illis non rârò accidunt, *sordida*, & *maligna*, nec pus, sed saniem acrem, vicina loca exedentem, suggerentia, nunc materiam tenacem, lividam, viscidam, &c. simul exudantia. Loca occupant imprimis glandulosa, penem & pudenda muliebria, nares, labia, fauces, palatum & papillas. Sanè exulceratio spontanea & diuturna, nec facillè curabilis, aut curata licet, subitò tamen denudè recidivans, in palato & faucibus sine alia causa cognita eveniens & perdurans, unum ex primariis (si alia tamen simul respondeant) ex hujus luis indicis subministrat.
6. *Ulceræ hæc ossa frequenter* quoque adoriuntur, & cariola eadem reddunt, in specie ossa palati, nazium, & propter perpetuum pluit virulentæ affluxum, ac illorum spongiositatem, & cranii maxime, quin & partes internæ in Venerea lue ulceribus obfessæ observatæ fuerunt.
7. *Dolores adfunt* atrocissimi, & hi etiam primarium quoddam symptoma luis constituunt, dolor nempe nunc artuum simul, nunc simul etiam capitis, & quidem non articulo, sed saltem artuum mediorum, nempe mediorum humerorum, mediarum tibiarum, frontis, temporum, item sterni dolores. Hi sunt saltem nocturni, qui circa vesperam horâ nonâ vel decimâ, aut etiam citius, incipiunt exacerbari, & inter tertiam & quartam matutinam solent discedere, totâque die aut nulli aut tolerabiles esse: Sunt *officopi fixissimi*, subinde etiam simul *lancinantes*. Rarum est, quod subinde etiam circa articulos observentur idem; sicuti etiam rârò lumbos & os sacrum occupant. Observavi tamen in scemina morbo hoc inguinali, per sudorem copiosum, quem frequenter deterferat, infectâ, quæ graves dolores nocturnos in dorso & lumbis, & circa os sacrum, pariebatur aliquandiu, antequam ipsa lues perfectè se manifestaret.
8. In dictis locis, medietatibus nempe ossium, item in capite, fronte, &c. observantur quoque *tuberositates* & *tumores*, dicti *gummati*, *nodi*, *tophi*, &c. plani, minùs elati, in mediis ovi & ulterius magnitudinem excrescentes, secundùm ossis situm ferè formati, insigniter nocturno tempore ut plurimum dolentes, rârò indolentes. Hos ipsos sub periosio oriri plures asserunt, unde si diuturniores sint, non rârò ossa ab iisdem arroduntur, & cariola evadunt.
9. *Calor in volis manuum & plantis pedum insignis*, harumque *rhagades*, *fissuræ* & *encoriatio*, sine manifestâ causa.
10. *Verrucæ*, tam depressæ quàm elatæ; item *feus*, *condylomata* & *cristæ* in partibus pudendis muliebribus, & utriusque sexus ano succrescunt.
11. In morbo inveterato *pili desuunt*, tam in capite & barba, quàm supercillis præsertim, cum pustulis, ulceribus, aut scabie sordida junctis, sine alio morbo præcedaneo.
12. *Macula rubescens*, *flavescens*, aut *livescens*, nonnunquam satis latæ, præsertim in pudendis, pectore ac dorso, item in abdomine, subinde comparent, quas pressas albicans vestigium, mox ad pristinum colorem rediens, exhibere PLATERUS *Prax. Tom. 3. pag. 384.*

refertur: vid. SYLVIVS *lib. 4. Prax. Tract. 3. §. 18.*

13. Supervenit *inflammatio testium*; *raucedo*, atque *uvulae laxatio & erosio*.

14. *Tinnitus aurium*.

15. Inveterato denique malo promajore vel minore partium solidarum affectione, fluidarumque alteratione surdi, cæci, tabidi, scabiosi &c. fiunt infecti.

Omnia hæc prolixè explicata videbitis in SENNER TO *l. 6. Prax. Part. 4. SYLVIO lib. 4. Præcor Tr. 3. & BOTALLUS de Lue Venerea*: qui tres instar aliorum omnium sufficiunt.

Atque hæc quidem symptomata non cuivis contingunt, nec omnibus hujus Luis gradibus, nec etiam, utur frequentiora, solitaria observantur; sed alia insuper his complicantur, imò non cunctæ eandem vim diagnosticam habent. Quatenus v.g. non omnis, sed virulenta saltem Gonorrhœa luis Venereæ suspicionem movet; pilorum decidentia sine aliis signis & per se pariter nihil tale arguit; bubones Venerei ab illis, qui extra hanc luem geniti, haud differunt, sicut contra communem sententiam PLATERUS *l. a. pag. 387. & SYLVIVS l. a. §. 134.* per experientiam testantur; ac condylomata non tam luem Veneream, quàm præputium & frequentiore veneris usum, familiarem illis, qui hoc morbo laborant, sequuntur: hincque hujus luis signa propria haud existunt. Ita, ut symptomata hujus morbi primaria maneat gonorrhœa virulenta, pustulæ, ulcera, ossium caries, topi, &c. dolores enormes, nullisque anodynis cedentes: quibus PLATERUS *pag. 384. maculas cutaneas* quoque addit, quatenus ex his solis, si de nulla alia earum causa, præter coitum impurum, constet, Luem Veneream incipientem concludit.

## C A U S Æ.

Afficiendi modus hujus Luis simpliciter est per contagium, isque frequentissimus per congressum Venereum; non quidem frequentiore, sed vel unico leviori actus sufficit, sicut hujus respectu rarissimè aliis modis afficere solet. Pertinet huc etiam *hereditarius character*, quo liberâ parentibus infici solent: Sic FORESTIUS *lib. 32. Observ. 2.* refert Luem Veneream, quæ maritus affecit uxorem, hæc infantem in utero, hic nutricem, hæc tres liberos proprios: Simile vidi in AMATO LUSITANO *Constat. 4. Cur. 4.* Item SCHENCKIUS in *Observ.* refert mulierem, quæ sortum edidit Gallicis ulceribus scatentem, cum conjux hoc morbo afficeretur, illâ sanâ. Reliqui ergo modi præter congressum, quibus contagium Venereum se propagat, sunt varii. Omnes autem fomitem materiam leviùs spirituosum pro fundamento agnoscunt, ut sunt v.g. lectus communis: sic enim HORSTIUS *lib. 7. Observ. 3.* refert Luem Veneream à communi lecto contractam, cum condylomatibus & ulceribus pudendi. Sed hoc ita absolutè minùs probabile videtur, nisi lectus vel copiosis sudoribus, vel sanie ulcerum, ab inquinata fuerit infectus. Sudores certè multum valent. Exemplum novi ancillæ pudicæ, cuidam Venereo ad sopiendos artuum dolores balneo fornicarum subinde utenti, & hinc sudores abstergentis, quæ horum contactu & halituum inspiratione infecta fuit. Sic post scarificationem in Balneo publico, instrumento non benè abterso, Luem Gallicam contractam novit Idem HORSTIUS *lib. 7. Observat. 8.* Par ferè ratio, quando CORNARIUS *Observat. cap. 25.* notat morbum Gallicum ex cucurbitularum impositione, quæ infectæ erant, contractum. Sic hypocaustum huc pertinet: HILDANUS *refert c. 5. Obs. 99.* de muliere sana, aliquandiu in hypocausto, in quo ægri Lue Venereæ laborantes per litus Mercuriales sanati fuerunt, adeoque vapore Mercuriali infecto degens, quæ gravissimum morbum Venereum hinc contraxit. Pertinent huc vestimenta, de quibus Idem HILDANUS *Cent. 1. Curat. 100.* refert, Luem Veneream ex veste hominis hac infecti factam. Communis pécunia etiam hic accusantur; ut quando BOTALLUS *de Lue Venerea pag. 472.* historiam infectæ communi poculo cum veneno refert: Nempe tunc per pocula malum communi-

cari



cari arbitror, quando à sanie ulcerum in palato aut faucibus vel potus vel poculum inficiantur, quod tunc contagiosum malum sit. Per solum osculum Lue Veneream à viro infecto puellæ communicatam refert FORESTUS *Observ. 2. Schol. lib. 32.* Sed tamen, modò osculum tale non sit malitiæ pallium, vix ejus medio contagium communicabitur, nisi ulcera faucium & oris insigniora adfuerint, & hinc vel salivâ, vel linguae intrusione, malum multiplicetur. Per *ophthalmiam* in distans contagiosum morbum Gallicum refert ZACUTUS LUSITANUS *Prax. Admir. lib. 7; Observat. 125.* de quo tamen reverà dubito, an ita fieri possit. Notabile est, quod diu admodum seminarium morbi Gallici latere queat, cum teste SCHORERO in *Observ.* post 2. vel 3. annos demùm pullulescere queat. Par ratio est, quando AMATUS LUSITANUS *Centur. 1. Cur. 49. & 50.* refert, viros lue Gallicæ correptos sanatos, post 7. item 15. annos, pueros eadem infectos ex sanis mulieribus suscipientes.

Afficiuntur autem partes inter solidas primariò loca glandulosa, hinc nervæ, nec nisi mediantibus istis affectis, & partes sanguinæ. Ac sanè potentiùs locis glandulosis se virulentia venerea insinuare, & hinc eorundem ulcerationes, corrosiones & tumores malignos penitus & contumaces, aut, nisi radicis curetur, facillimè recidivantes, efficere solet.

Quoad contenta liquida: inquinat primariò chylosum corporis rorem, & hinc derivatos succos, eorumque vehiculum, nempe serum purius ac lympham: Hinc genituram in gonorrhœa; ossium nutrimentum in tophi, & carie glandularum quarumvis; lympham in bubonibus, & exulcerationibus faucium & narium, pustulis cutaneis; membranarum rorem in doloribus nocturnis otocopis, &c. ordinariò inficit: In quibus omnibus acrimonia acida singulariter corrosiva, cum nutrimenti torridi chylosi in viscidiorum & glutinosiorum consistentiam alteratione, deprehenditur. Inquinantur autem imprimis contenta ista, & horum medio partes solidæ, à contagio ratione acidis specifici fermentativo, & contentorum sui multiplicatione immutativo; ratione verò subiecti cum parvo seu exili viscido & glutinoso, nunc halitus; nunc saniei formâ, vehiculo communicato: parili ferè ratione ac scabiei exile admodum fermentum nobis communicari, & tamen totum corporis habitum inquinare solet.

Ex quibus causa efficiens materialis proxima hujus morbi vel spontè patet: nempe consistit hæc in acido sui generis peccante (cujus tamen natura specifica à priori non adeò exactè determinabilis est) fermenti instar lentè se multiplicante, & contenta corporis pedetentim destruyente, functioneque corporis, primò naturales, lædente: quæ ipsa latius explicata vid. in SYLVIO lib. 4. Tr. 3. de Lue Venerea §. 29. & 63.

## DIAGNOSIS.

Ratione *Diagnoseos*, quamvis morbum hunc adultiorum cognoscere facillimum sit, quamdiu tamen adhuc latet, & sub cineribus saltem gliscit, ejus dignotio difficilior est; præprimis cum teste POTERIO, non rarò sub larva scorbuti & arthritidis latitet, sed etiam ipsi ægri honoris atque dignitatis tuendæ gratiâ rem cum infectis se habuisse constanter negent, & à consortio humano exclusionem metuant. Cautus ergo sit Medicus in judicio, ne infontem accuset, neque reum absolvat, nec se ipsum prostituat.

Quod si verò tale quid se perpetrasse fateantur, simulque de uno vel altero Lue Venereæ appropriato symptomate conquerantur, de morbi specie ulterius dubitandum non est. Interim in priore, & abnegationis casu, in mariti vel uxoris, si in conjugio vivat æger, conditionem & mores inquirendum, utpote ex quibus non leves interdum de infectione conjecturæ hauriuntur: aut porrò investigandum, an cum morbi talis infectio in eodem lecto dormiverit? cum eodem ex uno vase biberit? infan-tem impurum lactarit? &c. Alias & si ex neutro horum aliquid certi de morbo hoc determinari valeat, ægri status præsens potiùs attendatur, qui quidem variat pro temporum diversitate, aliisque observatur in

morbi principio, alius in augmento, alius in statu seu morbo inveterato.

Quod si igitur ex congressu impuro malum hoc propulset, paulò post eundem aut circa penem & vulvam ælius quidam extraordinarius seu inflammatio exoritur, aut ardor urinæ, quem intra biduum aut triduum gonorrhœa excipit, observatur: Inflammationem dictam mox sequuntur pustulæ, hinc excoarctatio atque exulceratio partium dictarum cancræ; imò si inflammatio vehemens, vel neglecta fuerit, hæc in gangrænâ degenerat, crystallinis veliculis se manifestantem. Interdum nulla succedit gonorrhœa, sed virus per cutem potiùs ad inguina mox fertur, & bubones excitat, qui pro diverso malignitatis gradu aut facilitate curantur, aut temporis tractu in ulcera phagedænâ degenerant: quo ipso principii tempore callosa quæque scroto atque peringo contingunt ulcera. Quibus dictis phenomenon non comparentibus interdum ulcus cancræsum atque callosum exile intra præputium & glandem, aut in orificio urethræ, conspicitur, cui ulcers interdum callositas sine ulcere substituitur. De cætero quamvis nulla de coitu nefando suspicio sit, modò bubones atque gonorrhœa complicantur, infallibile luis venereæ signum hoc existunt; ita quidem, ut uno cessante, alterum invalescat: quibusdam intumescunt testes: in sexu verò sequiore fluor albus valde dolorosus, qui quæ partes externas erodit, affligit. Sin verò absque congressu hic morbus contrahatur, semper, ut superius dictum, magis afficitur pars, quam virus seu miasma venereum immediatè tangit: v. g. si ex lactatione infantis impuri, circa papillas & mammas pustulæ, excoarctationes, inflammationes, ulcera depascuntia & callosa; sin ex vestimentis, & concubatione, in cute pustulæ atque efflorescentiæ varii generis excitantur.

Sub incremento autem mali, quacunque occasione contracti, quoniam ipsa massa sanguinea tunc virulentia hac contaminatur, hinc nutritio totius depravatur, unde & sanguinem cæruleum seu subviridem apparere, Practici testantur. Bubones etiam in illis, quibus sine coitu tale quid contingit, protuberant, habitus totius maculis & pustulis defædatur, in impetiginem atque scabiem ulcerosam aut crustosam abeuntibus: quæ tamen pustulæ atque ulcera frequentiora sunt modò his, modò illis membris, v. g. faciei & capiti, & quidem non rarò sub eminentia notabili, brachiis, pedibus, pubi, pudendis, uvulæ, tonsillis, & musculis laryngis, unâ cum partibus carnosis reliquis circumstantibus deglutitioni dicatis, quæ sunt erosæ, inde deglutitio est difficillima: quare res deglutendæ ad œsophagum translate rursus per nares prorumpunt. Capilli decidunt: in volis ac pedum plantis rhagades & fissuræ, circa podicem & pudendam verrucæ nomine condylomatum propullulant, ac gravissimi dolores capitis atque artuum observantur, frequenti serii pituitosi & acris eructatione in faucibus, maximopere in palato, quod interdum cum naribus penitus eroditur, ita ut in os assumpta per nares mox effluant. Præterea adest totius corporis lassitudo, respirandi difficultas, & foeda ozæna. Urinis supernatata crusta livida, plus minus cærulea. Ubi tandem inveterata magis lues venerea, ulcera patiuntur nares, harumque tubuli cartilaginei; item polypus: pariter tumores in pedore atque artubus congeriuntur, in ulcera cancræsa, callosa ac linuosa degenerantes: Dolores otocopi, præprimis nocturni, & partium fixi magis sunt, adsunt dolores continui in ossibus nasi & oculorum, tophi & nodi in partibus emergunt, ossa corumpuntur, imprimis cranii, palati, &c. Refert FERNELIUS, quod in Lue Gallica ossa valida fiant fragilibilia, ut levi ex causa confringantur instar ligni aridi: Ratio est acidum, quod ita corrodit os, ut fiat friabile. Caro dictorum ossium intumescit, & ex livore rubescit ad instar partium frigore læsarum. Superveniunt surditas, cæcitas, febris hectica, diarrhœa, tabes, &c., ut aliorum minus frequentium phenomenon ac symptomatum taceam: v. g. epilepsiæ à sanie, ex carioso cranio, ad cerebri membranas depulente, qualem VIDUS VIDIVS l. 2. Curat. membranam cap. 18; vermium super easdem meninges decumbentium, quales FORESTUS lib. 32. observ. 23. in schol., ipsius cerebri tandem per os rejecti, sicut SCHENCKIUS Observat. lib. 6. pag. 81.; cæcitas, surditas atque loquelæ perditæ, quam PLATERUS lib. 1. Observat. pag. 119. allegavit.

Interim & illud hoc in loco monendum, quod à WIESEMANNO de Lue Venerea capite 1. observatum, alle-



Allegata hactenus symptomata saepius quorundam phantasmata ita subisse, ut postquam coitum nefarium perpetrarunt, mox ipsi persuadeant, se lue venerea, à qua tamen immunes, laborare, i. e. ridiculè satis sibi imaginantur, omnes dolores atque symptomata, de quibus unquam legerunt aut audiverunt, se afficere, ita quidem, ut si Medici ejusmodi aegrorum querelis non auscultent, hoc ægrè ferant, atque ab his recedentes ad impostores abeant, usquedum sanitatem cum nummis perdididerint.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Lues Venerea lentus & diuturnus morbus est, qui tardè procedit, & difficulter admodum curatur; & quidem tam ratione ipsius virulentiae ac malignitatis, quam aegrorum morositatis, praesertim si inveteratus & confirmatus morbus fuerit, ac praeter genitalia plures partes glandulosas & ipsa ossa inquinaverit; ita quidem, ut quamvis ejus symptomata interdum cessent, ut videatur omne malum eradictum, quin tamen recurrant, impedire, adeoque virulentiam plenariè extinguere, ut plurimum magni laboris videatur.

Nihilominus morbum pertinacem aut leviores reddit virulentiae vehementia atque imbecillitas.

Facilius quoque in uno quam in altero curatur: nam cuius contenta corporis magis temperata sunt, minus acria; & quorum corpus undique permeabilius ac perspirabilius est, facilius curantur, quam qui contrà habent.

Curatu facilius observatur recens, quam inveteratus morbus, utpote, qui tardè & difficulter curatur: unde PANAROLLUS *Pent. 3. Obs. 3.* testatur, hujus curam ante sextum mensem non adornatam, nullius efficaciz esse.

Quod si semel sanati iterum lue inficiantur, aut malum redeat, aut nunquam aut non sine insigni difficultate curari, praeter EPIPHANIUM FERDINANDUM moderni perhibent: quali fato quoque gaudent, quibus hæreditario jure malum hoc contingit.

Si incipiat Lues Venerea in corpus calidum & siccum, in illud fermentum virulentum potentius agit, & difficilius longè curatur; & contra corpora humidiora facilius. Unde in corpore robusto & sano illa facilius curatur, quam in tali, qui aliis morbis chronicis laborat, & vitiosis humoribus jam tum scætet, v. g. scorbuti.

Item corpora quò magis sunt transpirabilia, eò facilius succedit cura, praesertim per sudationem; & contra quorum corpus minus perspirat, melius per alvum aut salivationem curantur.

Qui curam Mercurialem sine successu passus, illi difficulter sanantur, & qui post salivationem denuò inficiuntur, nunquam forsan, utpote quorum corporibus Mercurii usus familiaris nimis redditus, hi verò diuturnitate morbi & evacuationibus multis jam tum emaciati fuerunt.

Adjuncta symptomata etiam malum vel facilius vel difficiliter curatu reddunt.

Quod si autem viscera se malè habeant, ac æger hecticus existerit, omnia desperata sunt.

Gummata pariter, denique tumores, quò magis inveterata sunt, & quò magis jam ossa carie affecerint, eò difficiliter malum curatu erit; adeo ut, etiam si curatus appareat morbus, si tamen caries in quodam osse remaneat, licet occulta, nihilominus tamen recidivat morbus: videatur HILDANUS *Cent. 5. Obs. 95.*

Rubones retrocedentes ordinariò sequitur lues ipsa: quò verò facilius suppurantur & melius, eò præstantior erit curandi ratio.

Ossa nasi interiora erosa, aut etiam si ossa interiora capitis sint inquinata, malum incurabile est; cum cerebro & ejus membranis faciliè communicetur.

Affectus catarrhales si in lue venerea superveniant, mali sunt; cum facilius potius partis affectus erosionem secum ducat.

Quod si lethale sit malum, tandem febri quasi hecica incurrunt aegri, aut rabes corporis sequitur, aut exilis partibus respiratione dicatis, suffocati intereunt.

Deviæ lues in curatæ indicia sunt, si sanguis venæsectione emissus sit floridus, & elegantis consistentiæ, cum paucis vel nullo sputo supernante; quò aliàs ferè maculis lividis, aut colore quasi cærulescente in superficie conspicietur, prout nempe malum plus minus inveteratum fuerit.

### CURA.

Quibus suppositis curæ vel universalis, ipsius mali, id est, quæ in massæ sanguineæ purificatione consistit, & indicationi præservatoriæ satisfacti; vel particularis, seu quæ multipli. bus ejus symptomatis in specie debetur, & indicationem curatoriam respicit.

In cura universali acidum illud virulentum speciei saporis corrigendum & extinguendum, viscidum ejus (subjectum) dissolvendum & attenuandum, utrumque verò extra corpus evacuandum.

Obtinemus hos scopos duobus modis: vel per sudationem mediantibus decoctis lignorum; vel per salivationem mediante Mercurio: Qualis horum magis conveniat? tam ratio morbi minus vel magis inveterati, quam corporis naturalis constitutio magis vel minus rara, & contentis vel acrioribus vel temperatis prædita, docebit: Nam luem confirmatam sine salivatione Mercuriali radicitus evellere per quàm difficile est, cum Mercurius illius veneni generum sit alexipharmacum; sicut & contrà in corpore bilioso & melancholico salivatio periculosa est, cum mala gravissima subinde inducat; sanguinei verò, & omnium optimè phlegmatici, salivatione curabiles sunt, ut cum majore molestia, citius tamen, & cum minore recrudescentiæ metu. Hinc pro corporum constitutione, & ratione climatum & victus, facilius longè salvant Galli, citiusque curantur, quam nos Germani, Nostro in climate præstat ut plurimum utrumque modum conjungere: Decoctis nempe sudoriferis liquare contenta, & permeabile ac transpirabile undique corpus reddere; hinc per Mercurium salivationem instituere; quâ factâ, demùm per Decocta illa sudorifera repetita, quicquid per Mercurium reliquum fuerit, expellere, fontes hinc inde adhuc residuas abitergere, & contenta corporis in debitam ac naturalem crasin restituere: ver. gr. præmissis digestivo ex tartaro violato, lapidibus cancrorum & sale v. perarum, & hinc usurpatis pilulis purgantibus Mercurialibus non alterâ vice, paratur decoctum ex lignis, de quo æger quotidie bis bibat manè haustum bonum calidè, expectando manè blandum madorem. Non nimis sudeat, ne renuori discussio sero relinquatur visciditates crassæ, difficulter per Mercurium mobiles; sed sufficit, si liqueant saltem contenta corporis per decocta, cujus signum est mador blandus: alterâ vice bibatur vespèrè sub introitu lecti sine madoris provocatione. Quibus præmissis per ostiduum instituuntur inunctiones Mercuriales in externis, vel horum loco Mercuriale remedium intrò propinatur, hauriendo desuper jusculum calidum. Quod si ab hujus usu primis diebus sequantur vomitus, semper ceteris secundariis obstat, ne aliquid Mercuriale in faucibus hærendo ulcera oris pertinacia & periculosa inferat. Continuat remedium; nam successivè cessant vomitus, donec superveniat salivatio. Peractâ sufficiente salivatione, cum æger nonnihil vires recuperavit, maturè repetendæ portiones sudoriferæ lignorum, præmissis, si opus fuerit, adhuc purgatione, ad ipso decocto radix hellebori vel pulpa colocynthidis quasi incoquatur, ut ita cum sudoribus alvus simul aperta sit. Continuat his per 8. 10. vel 12. dies cura terè absoluta erit; sed hæc in malo inveterato. Minus inveteratum potius sit phlegma decoctis sudoriferis curatur, quod, ut sic paulò diuturnius, non tamen adeò periculosum est, atque cura, quæ fit per Mercurium, in specie apud nos, qui subinde scorbuti sumus affecti, in quibus periculosa est salivatio, quibus quocunque modo depuratus Mercurius nocivus est. De cetero sunt ex recentioribus, qui quamvis salivatio notabilis non intendatur, salivantium nihilominus usu humores ad purgationem & diaphoresin feliciter disponunt.

Quod ergo attinet in specie curam per sudationem: sudorifera interdum mox primum locum inter evacuationes gerunt, frequenter tamen non, nisi purgantibus præmissis, adhibentur, & quidem talia præparata, quæ specificè huic virulentæ resistunt, simulque visciditatem atque aciditatem humorum corrigunt: scilicet primum obtinent inter remedia sudorifera usitiora, in subjectis quidem frigidioribus guajacum, cui libenter jungo lignum juniperinum; in calidis verò sarsaparilla est optima; quinimo ut plurimum utrumque sociatur, augendo tunc hoc nunc illud pro circumstantiarum ratione. Optimè guajacum, item sarsaparillam propinandi, & hoc in medio curandi lue veneream



ream, modum docet **ARCÆUS** lib. 4. de Vula. cap. pag. 158. & 164. de quo dicit **LINDANUS**, quod eodem modo feliciter curaverit, & pater ejusmodi desperatissimos restituerit. Sed notandum, quod dixi, in frigidis guajacum, in calidis sarsaparilla; aliis nihil efficitis: si omnes observationes, quas ille habet, notaveritis, illa curatio nunquam vos fallat: Hactenus **LINDANUS**. His etiam adnumerantur radix chinæ, similacis asperæ, petasitidis, saponariæ & radix bardanæ, de qua vid. **RIVERIUS** observat. commun. pag. 342. Cortex guajaci, ligni sassafras, quercus, buxi, cupressi, & lentisei, Imò **FALLOPIUS** solo ligno sagi quosdam curatos testatur. Herba Perficariæ juxta **PARACELSUM**, secundum alios perforata, saponaria, acnucum putamina, de quibus vid. **BORELLUS** Cent. 2. Observ. 96. **SIMON PAULLI** Quadrip. Botan. p. 363. & **RIVERIUS** Cent. 4. Observ. 29.

Ex quibus omnibus, utut varia in officialis proflent præparata, diversæ etiam queant concinari formulæ pro curatione luis per sudorem, frequentiora tamen & commodiora hactenus observantur decocta, & quidem tam primaria seu potentiora pro sudore movendo, quam secundaria seu dilutiora, alterandis humoribus inservientia, & pro Potu ordinario & toto curationis tractu sumenda: quorum hæc ut plurimum ex remanentia priorum parantur. Sicut autem iisdem medicamentis alterari simulque evacuari possunt humores peccantes: ita in principio sine sudoris excitatione quoque propinanda sunt eorum decocta, quatenus ad sudorem nunquam cogendus est æger, nisi postquam humores dispositi, & ad eum præparati fuerunt: Quod si negligatur, non raro contingit, ut sudorifero assumpto æger sub stragulis frustrâ, ad lipothymiam atque, angatur.

Quare si ad sudoris excitationem transeundum sit,

1. Ex dicta præcedente a liis que signis humorum conditio eruat.
2. Pro horum diversitate sudorifera, modò hæc modò illa, seligantur; Nec
3. Sudor valde urgeatur, sed æger mediocriter saltem tegatur, & observare jubeatur, an ad sudorem sensim inclinet? tunc enim aut jusculo, aut tegumentorum plurius impositio, idem promoveatur: sin secus, à sudoriferorum ulteriore usu humorum præparatio prius expectetur: vid. **SYLVIUS** Tr. de Luc Venerea §. 213 & 218.

Decoctis his sudoriferis non incommode additur antimonium crudum, quod **BORELLUS** Cent. 2. Obs. 96. & **RIVERIUS** Cent. 4. Observ. 22. commendat; item specifica parti afficit, ac symptomatis maximè urgentibus appropriata.

Præterea liquor horum ut plurimum equidens, aquam constituit: in subjectis nihilominus, quorum ventriculi vis digestiva vacillat, vini dimidium, plus aut minus, sub coctionis finem adiciendum; aut hoc statim, & in principio affundatur, diutius saltem cum eo ingredientia solidiora infundantur, aut in cucurbita alembico clausa coquantur, liquorem prolectum decocto addendo. Pro corporibus emaciatis in lacte quidam cocturam instituunt: Verùm lignosis ejusmodi substantiis extrahendis ineptum est menstruum, cujus loco tamen serum lactis magis aptum erit.

Formulæ ejusmodi decoctorum ex **ZWELFERO**, Idea præscrib. Form. Cl. 4. §. 15. & Collegio **Schæderiano** P. 2. ubi de decoctis, patent: v. g.

**R. Rasuræ ligni sancti** ℥iij. ad ℥vj.

Cort. ejusd. ℥iij. ad ℥ij.

**Rad. sarsapar.** ℥i. vel ℥iij. ad ℥ij.

**China**, vel **ras. ligni sassafr.** ℥i.

**Mercurii vrb.** per alcali depurand. & in petia ligand.

**Antimonii grossi contus.** & in petia ligat. an. ℥iij. ad ℥ij.

Infundantur in

**Aqu. comm.** M. vj. ad xij.

Macerentur per 24. live 48. horas in Balneo Mariæ, hinc coqu. ad remanentiam tertiæ partis.

**Colatura** D. S.

**Potio sudorifera sanguinem mundificans.**

**Dosis** ℥iv. ad ℥iij.

Jam

**R. Remanentiam decocti bujus:**

Infundatur de nouo in

**Aque commun.** M. ix.

Macer. per 12. horas: decoqu. ad consumptionem tertiæ partis, in fine addendo

**Passul. min. conquss.** ℥iij.

**Sem. coriandr. cont.** ℥vj. vel ℥iij.

**Rad. liquirit.**

**Polypod. an.** ℥vj.

**Cinnam.** ℥iij.

**Colatura** D. pro Bocchetto: S.

**Potio ordinaria.**

Vel

**R. Rasur. ligni juniper.** ℥vj.

**Cortic. ligni guajac.**

**Rad. bard. in talcol. diss.** an. ℥iij.

**China,**

**Ligni sassafr.** an. ℥ij.

**Mercurii vrb.** in pet. lig.

**Antimonii crudi in pet. lig.** an. ℥ij.

Macerentur in Balneo Mariæ in

**Aqu. commun.** Mens. xij.

Ebulliant ad tertiæ.

**Colatura** D. S.

**Ut supra.**

De qua capiantur v. vel ℥vj. calidè pro dosi.

**R. Remanentiam decocti prioris:**

adde

**Rasur. ligni sassafr.** ℥ij.

**Rad. liquirit.** ℥vj.

**Sem. coriandr.** ℥iij.

**Pass. min.** ℥iij. ad ℥ij.

affundantur

**Aqua commun.** Mens. vj.

Decoqu. ad consumpt. tertiæ partis: colentur per Monicam Hipp. fiat Bocchetum:

D. S.

**Ut supra:**

Item cum appropriatis:

**R. Ras. ligni guajac. cum cort.** ℥iv.

**Sassafr.**

**Rad. sarsapar.** an. ℥iij.

**China** unc. ij.

**Antimonii crud. in pet. lig.** ℥ij.

Infund. per noctem in

**Aqu. commun.** Mens. xij.

Manè coqu. ad tertiæ partis consumptionem, sub finem addendo

**Herb. saponar. cum toto** M. ij.

**Hyssopi,**

**Veron.** an. M. j.

**Rad. liquirit.** unc. j.

**Pass. min.** unc. vj.

**Sem. fenic.** ℥vj.

**Cinnam.** unc. ij.

**Colatura** detur pro usu:

D. S. **Ut supra.**

Aut

**R. Rasur. ligni juniper.** ℥vj.

**Lentisei,**

**Buxi,**

**Sassafr.** an. ℥ij.

**Rad. petasit.** ℥iij.

**Sarsap.** ℥ij.

Macerentur per noctem in

**Aqu. commun.** Mens. ix.

Coqu. manè ad tertiæ partis consumptionem, sub finem addendo

**Vini Rhenani** Mens. iij.

**Herb. rorism.**

**Beton.** an. M. j.

**Cort. aurant. rec.** ℥ij.

**Sem. coriandr.** ℥ij.

**Colatura** adde

**Essent. lignor.** ℥iij.

**Syr. rad. enul.** ℥xij

M. S.

**Potio sudorifera sanguinem mundificans.**

**R. Remanentiam decocti prior. & posterior.**

adde

**Passul. min. contus.** unc. ij.

**Sem. coriandr.** unc. ij.

Coqu



Coqu. cum  
*Aqua simpl. Mens. vi.*  
 ad tertie partis consumptionem: circa finem addendo  
*Cinnam. 3℔.*  
 Colatura D. pro Potu ordinario: S.  
 Potio ad mensam.

Assumuntur remedia hæc (dum nempe his solis curatio per sudorem intenditur absque salivationis adiumento) manè aliquot dies noctesque tantum, donec in curæ principio eorum adsuecat paulatim remedio: quo facto etiam vesperti 2. vel 3. horis ante coenam haustus repetitur, & semper pro virium, & constitutionis plus minus succulentæ ægri ratione sudor plus minus largus expectatur. Ut verò salubrius fluat sudor, non statim ab assumpto sudorifero arte promoveatur, sed post horam, intercedente, si fieri potest, somno. Sudor per horam plus minus protrahatur in principio, postea verò etiam ultra ascendat. Sudandi modi sunt varii: optimus autem pro eradicando morbo modus est, ut stuphas seu æstuarium ingrediatur, quibus æger insidere potest, intendendo & remittendo balnei calorem pro necessitatis ratione: paretur vel siccum cum spiritu vini accenso in succulentioribus aut paulo habitioribus, vel humidum cum evaporatione aquæ calidæ scoris metallicis candefactis vel silicibus ignitis superaffusæ, idque ferè in calidioribus, & sicclioribus naturis. Quod si æger bis sudare nequeat, saltem manè assumpto decocto illo sudorem expectet, à meridie verò decoctum bibat absque sudoris superventu, ut saltem alterando hoc ipsum profic, corpusque disponat, quò insequente manè eò melius provocari possit sudor. Ubi sudor aliquandiu proflixerit in æstuario, & æger haud amplius bene ferre queat, lecto calido immittatur, ibique sudor ulterius sponte fluere permittatur; hinc sudor probè abstergendus, & aer frigidus, quantum possibile, vitandus: mutanda autem sæpius lintamina illa aliaque imprægnata sudore, ex lixivio acri probè eluenda, & aeri libero exponenda, antequam denuò adhibeantur, ne illis denuò infestationem contrahat corpus; quod confirmat HILDANUS *Cens. 5. observ. 95.* Continuantur autem sudationes hæc, aut simplices aut duplices, tamdiu, donec morbi malignitas victa, venenumque correctum & exclusum fuerit: id quod omnium symptomatum, potissimum gonorrhœæ & condylomatum, remotio ostendit, ultra quam tamen aliquandiu adhuc sudatio continuanda venit, quo quælibet vestigia, aut virulenti saltem odores in corpore forsan hinc inde hærentes, omnimodè & sine recidivæ metu discussi fuerint; adeoque subindè à 4. ad 6. septimanas cura hæc continuanda plus minus pro morbi vehementia, & sudorum emanantium copia.

Quod si autem contingat, sudorifera superius enarrata simul per urinam operari, ægerque difficilius sudet, ac urinam crassam cum sedimento multo & laudabili excernat, nullam sibi hinc difficultatem fingat Medicus, cum pleraque sudorifera diuresin simul excitare palam sit: imò in hoc casu intermixtis potentioribus diureticis ad urinarias vias virulentia venerea urgeatur, viscidioris pituitæ, utpote cum lotio commodius excernendæ, involuta, donec successu temporis ad habitum denuò humores vergere constet: vid. SYLVIVS *L. 4. §. 250. & 254.*

Quoad usum sudoriferorum:

1. Hæc per biduum ad minimum bis de die propinentur sine sudore.
2. Sudorifera semper calida, aut cum calidis vehiculis, assumantur, ut ventriculo gratiora magisque activa existant, imò in imminente sudore iusculum calidum exhiberi potest.
3. Eorum dosis moderetur pro malignitate & subiecti robore & textura diversa, v. g. in pueris ʒij. vix transcendat, in adultis ʒss. attingat. Nec
4. Sudor mox valde urgeatur, sed æger mediocriter tantum tegatur, usque dum ad sudorem inclinet, & tunc vel iusculo calido, vel stragulis impositus, vel laconico, adjuvetur.
5. Quolibet ad summum septimo die, quo cura per sudorem administratur, purgans ipsi interponatur hac ratione, usque ad curæ terminum.

Vidus sit moderatus, potius siccus: v. g. in principio ex carnibus magis assatis quàm coctis; in progressu parior instituat victus, aut si à meridie carnis utatur, vesperti passulis aut similibus loco cœnæ sit contentus. Potus sit decoctum secundarium.

Quoad curam salivatoriam: in usu saltem est Mercurius, nunc vivus externè cum unguentis illitus, nunc præparatus pro usu externo. Casu primivus, ut plurima alia medicamenta, inventa sunt à chirurgis, quæ nunc ex instituta administrantur in curatione luis venereæ, aliisque chronicis morbis. Ex Arabum nempe monumentis didicere veteres, ad ulcera contumaciora maligna, ad gangrænam declinantia, commendatum fuisse Mercurium & adhibere ergo illum cum emplastris & unguentis in ulceribus Gallicis, hinc ex accidente & casu copiosa subsecuta est salivatio, & per hanc tam ulceris, quàm ipsius primarii morbi, curatio: vid. JOHANNES CARPUS *Italius, Medicus Bononiensis*, qui primò hæc luem veneream curandi methodo multa millia scutatorum lucratus fuit. Mercurius dulcis quidem rariùs pro usu salivatorio usurpatur, sed potius pro usu laxativo, utut continuatus diutius, aut etiam crebrior sublimatus, sicque fixior redditus, etiam salivationem satis fortem inferat. Et quidem non adeò inveteratum malum solo Mercurio dulci per purgationem sæpius repetitam, interpositis subinde lignorum decoctis, curari potest, modò ferè, quem docet HARTMANNUS *Praxi ubi de Lue Venerea §. 5.*; sicut RHODIUS *C. 3. Observ. 84.* Luem Veneream per Mercurium dulcem tantum sine decocto lignorum curam refert. Notandum tamen, utut ab hujus usu dolores remittant, ulceraque coalescant, mox tamen recurrunt, & nova excitantur, modò salivatio imminuat, aut cesset. Qui verò Mercurio dulci pro scopo salivatorio uti voluit, imitari possunt modum, qui docetur in HORSTIO *l. 7. observ. 12.*

Vel

℞ Mercurii dulc. ʒj. ad ʒss.

Conf. rosar. vel violar. vel conf. al-chem. ʒss.

M. D. S.

Saccharum sanguinem mundificans & purgans.

Singulis 8. diebus continuus exhibeatur horà matutinâ, haustus prius aut post aliquot cochlearibus cerevisiæ calidæ.

Frequentissimè autem internè usurpatur arcæum corallinum, seu Mercurius præcipitatus rubeus, si Mercurius cum nitro præparatur; si fiat præcipitando, adeoque in via humida cum spiritu nitri, & quem Mercurium corallatum vocat SCHROEDERUS in *Pharm. ubi de Mercurio no. 6.*

Vel

℞ Spiritum nuxi, ex nitro & alumine paratum; & in hoc solve Mercurium vivum bene purificatum, & abstrahendo spiritum denuò præcipitatus relinquantur, qui spiritu vine probè edulcorandus.

De hoc 4. ad 5. grana dentur unâ vice, repetitis tamen dosibus, donec præterpropter ʒj. pondere assumptus fuerit, plus minus tamen, ac probè succedet salivatio.

Melior est hæc Præparatio, quàm præcipitatus cum spiritu aut oleo vitrioli paratus, cum oleum vitrioli haud adeò separabile existat, metallicæ magis cum sit prolapsæ.

Sive fiat idem arcæum corallinum sublimando, adeoque in via sicca, cum nitro & vitriolo addito, & præter Crollium deferibitur in SCHROEDERI *Pharm. ubi de Sublimatis Mercurii no. 8.*

Propinantur hæc Arcana Corallina cum conserva rosarum, aut paucis Mercurio, pilulari formâ deglutienda. Mercurius dulcis verò, si pro salivationis magis quàm purgationis scopo propinetur, cum visello ovarum exhibeatur, quoniam sic facilius longè salivationem movet.

Quod si pro usu externo Mercurius vivus addatur unguentis, sumi solet ferè Mercurii vivi quadruplum aut triplum, aut dimidium, plus minus pro ætate & viribus ægri; item pro ratione morbi additur pinguedinibus & oleis convenientibus, ac invicem in unguenti formam rediguntur. Pinguedines inter primatum obtinet axungia porcinæ, loco cuius propter majorem vim anodynâ etiam pinguedo humana recipi potest, quibus tertia vel quarta pars cerebinthinae additur. His, ceu primariis unguentorum Mercurialium ingredientibus, pro circumstantiarum ratione aut Medici intentione oleum destillatum salvis, terebinthinæ, guajaci, rosmarini, ligni Rhodii, item spiritus vini additur; item quibusdam unguentum Martiatum: qualia in convenientibus adduntur, in frigidis præsertim naturis, & quando viscidior veneni fomes est & qui loco vix moveri aut dissolvi potest. Sufficiunt autem pro integra



gra curatione Mercurii  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . vel  $\mathfrak{v}$ . Nam minus, quàm  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . ad  $\mathfrak{iv}$  & magis quàm 6. ad 7.  $\mathfrak{z}\text{ias}$  vix licet assumere: pro circumstantiarum tamen ratione, & celeriore vel tardiore, copiosiore vel parciore salivatione superveniente, dos limitari potest. Absumantur autem de unguento pro singulo litu  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . ad  $\mathfrak{z}\text{ijj}$ , prout plus vel minus imprægnatum fuerit. Formulam talis litus non inconcinnam videb. in SENNERTO l.c. pag. 202.

$\mathfrak{R}$ . Mercurii vivi purif.  $\mathfrak{z}\text{vj}$ .

Adip. suilli non salis  $\mathfrak{li}$ .

Extinguatur cum adipe suilla Mercurius, & exacte misceatur in mortario lapideo: Jam adde

Medull. cerv. bovis  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .

Terebinth.  $\mathfrak{z}\text{ijj}$ .

Olei destillat. terebinth.  $\mathfrak{z}\text{j}$ .

M. s. unguentum,

Vel

$\mathfrak{R}$ . Mercurii vivi  $\mathfrak{z}\text{v}$ .

Pingued. suill. non salis  $\mathfrak{li}$ .

In mortario lapideo, pistillo ligneo contundatur pinguedo, eique sensim misceatur Mercurius, donec planè sit absorptus: adde

Mastic. pulveris.  $\mathfrak{z}\text{j}$ .

Fol. salicæ,

Rorismar. an.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .

Pulp. pom. dulc. coct.  $\mathfrak{ss}$  & a corrice ac nucleis mund. no. ij.

M. per dimidiam horam in mortario ducendo.

D. S.

Unguentum resolvens & purgans.

Vel componatur unguentum ad imitationem HILDANI Cent. 5. Observ. 95. Hujusmodi unguento inunguntur plantæ pedum ac volæ manuum, in malo scilicet recente, hinc quoque tali, carpi, genuum, cubitorum & humeri flexuræ, interdum etiam regiones inguinis (Germ. das Gelencke): quod si gravius aut pertinacius malū sit, aut salivatio non ritè succedat, etiam integra hæc membra, lumbi, & tandem tota spina dorsī, ab osse sacro ad cervicem ascendendo, inungenda. Tutius tamen procedunt, qui artuum flexuras, inguina & alas sufficienter fricant. Abdomen, pectus & caput non inungenda, aut rarissimè, propter gravia & periculosa nervosi generis, quæ ordinariò superveniunt, symptomata: saltem ZACUTUS LUSITANUS lib. 2. Prax. Admir. obs. 138. inunctionem capitis commendat, quando nempe hoc à causa morifica niagis gravetur, & omnia frustra tentata fuerint, exemplumque refert feliciter inuncti capitis. Post quartam vel quintam inunctionem ferè sequitur salivatio. Inunctio pro virium ratione nunc sit bis, manè & vesperi, tribus, & rimis diebus assumpto prius jusculo aut ovo sorbili; si salivatio verò non procedat, addere etiam diem quantum licebit: Quod si procedat, unica inunctio die quartà sufficit. Quod si salivatio legitime & liberaliter procedat, inunctionem remittere oportet; si non verò sufficiens, sed aut planè non, aut potius spurum, moveri videamus, post diem unum intermissum iterum unà vel alterà inunctione excitetur: Interdum inunctio saltem matutina sufficiens est. Instructur autem hæc in loco calido, aut prope fornacem: quavis inunctione peracta membra linteis obvolvuntur, & æger sub lecto, assumpto jusculo calido post bihorium, recubet probe tectus absque iudore, levi saltem madore, ut ita Mercurius ferè bene insinuat queat; promovebitur enim sic multum salivatio. Et quidem si plura inungantur loca, sufficit saltem unica inunctio quotidie: Quod si verò solæ plantæ, aut secundum alios saltem tali & genua inungantur, bis quotidie tribus vel quatuor diebus inunctio continuanda venit.

Inunctiones hujusmodi ferè salivationem excitant, utur in principio subinde etiam diarrheas torminosas inducant, imò interdum magis per alvum, quàm per os moveant: qualis diarrhœa non statim aut violenter sistenda, cum ferè perinde sit, an per glandulas salivales, an verò per glandulas pancreatis & intestinorum, Mercurius evacuando operationem exerat?

Salivatio ipsa nunc in principio, nunc in progressu, promoveri potest per trochiscos sublinguales, aut pilulas majores, factas ex gummi tragacanthæ in aqua rosarum soluta q. s. cum Mercurij dulc.  $\mathfrak{z}\text{j}$ . Vel

$\mathfrak{R}$ . Mastic.  $\mathfrak{z}\text{j}$ .

Mercurij dulc.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .

Gumm. ammoniaci cum aceto sol. & insp. q. s.

### F. Trochisci.

De quibus unum masticet per horæ quadrantem & ultra. Propter dentium tamen læsionem masticatoria ex mercurio in praxi selectiore & tutiore magis exulent.

Alii alias compositiones unguentorum habent pro cuiusvis libitu. Suffitum cinnabarinorum pro salivatione excitanda mentionem haud faciam, cum eisdem plura symptomata secuta fuerint, ut ferè in desuetudinem abierint. Internè aliàs hoc modo penetrat, & efficaciter satis operatur Mercurius, cujus rei exemplum curiosum refertur: nempe præbuerat Pharmacopœus quidam viro robusto & juveni pulverem hydrargyri præparati rubicundum, quo ternis ex ordine vesperis dextri testiculi sarcoma nuper ortum suffumigandum censuit, corpore toto nudo, lodice saltem tecto: post secundi pulveris fumum haustum saliva fluere cepit, sed pauca: largissima verò tertium excepit, ut aliquot pelves majusculas unà die impleverit, satisque copiose ita manarit. Uxor, quæ maritum lodicibus contexerat, vel per semestre spatium nullam sitim sensit, tantam liquoris aquei copiam continuò in ore habuit. Lodices, quamvis spatio biennii quater quinquiesque saponè fuerint elotæ, & in sole siccata, nihilo minus quoties lecto fuerunt instratæ, salivam utrique conjugi denud moverit, ut eas prorsus abicere coacti fuerint.

Potioris ergo usus sunt inunctiones Mercuriales ultra dies tres vix continuandæ, semel aut bis in die, prout plus vel minus unguenti, aut plures vel pauciores artus ita tractantur, quartà præterpropter salivatio expectanda, quâ imminente cessandum. Præmittatur autem evacuatio ventriculi aut primarum viarum vel per vomitus vel per secessus, ne excrementorum colluvies maligna angustias præcordiorum, si flocationes, aliæque symptomata excitet: vid. HILDANUS c. 5. Obs. 92. & RIVIERIUS c. 1. Obs. 77. Imminentis salivationis indicium est, si alvus supprimatur, labia incipiant tumere, gingivæ vel tonsillæ, aliæque in maxillis glandulæ, intumescere ac dolere, odor gravis & fœtidus ex ore exspirare incipiunt, quod tertio, quinto, vel sexto ad summum die contingit: Quoties verò nil tale intra triduum eveniat, inunctionum usu denud pergendum, donec prædicta signa, eorumque monstratus eventus salivatorius, super veniat. Hinc mirandus potius MASSA, quàm imitandus, qui l. 4. cap. 25. quandam jamdum frustra inunctum per 37. dierum inunctionem (interpolatis quamvis vicibus) demum à lue venerea liberavit; quorsum etiam PARÆUS spectat, quando de lue venerea c. 12. die uno aut altero interjecto decies, quinquies & septies perfrictos convaluisse perhibet, nisi quantum quidem intervalla interjecta concessa, segniorem minusque violentam reddiderunt salivationem. Audiendus potius ZACUTUS LUSITANUS Pr. Admir. T. 2. Obs. 135, dum, si per aliquot dies noctesque continuata inunctio, non salivationem, sed anxietates tantum, lipothymias, &c. moveat, ab hac desistendum, & cum sudoriferis pergendum esse monet: quæ tamen symptomata neminem deterreant, modò salivatio sequatur, aut cum aliis, quæ hujus imminentis quasi indices & prodromi sunt, combinetur. Continuanda salivatio pro morbi & constitutionis ægri ratione: 20. dies ordinariè sufficiunt, interdum & ad quatuor septimanas continuare licet: in specie eo usque procedat salivatio, donec post salivam fluidiorem & tenuiorem, qualis primis diebus fluere solet, ultimò viscida, fœtida & glutinosa perquam materia ejiciatur, quæ mucij spissioris formâ fundum vasis petat, glutinis instar, aut parietibus ejus agglutinata hæreat, vera enim est colluvies & sedimentum crassius.

Sub salivationis cursu attendere oportet ad exulcerationes oris; propterea ut præcaveantur, convenit gargarismus ex lacte tepido, raparum decocto aut eorum succo: si verò perfectæ exulcerationes fiant, fiat gargarismus ex decocto guajaci, plantaginis, &c. cum paucis aluminis & melle rosato; quo ipso etiam subinde exulcerationes cum penicillo tangantur. Si verò de alumine metus sit, ne sufflaminetur salivatio, ejus loco sol commune addatur, quod potius fluxum promovebit.

Istis temperantibus & mundificantibus etiam hæmorrhagia oris præcaveri potest; sit enim interdum, ut salivatio, si proinde nimis excitetur, ex acrimonia succorum & impetuosiore eorum motu ingens hæmorrhagia oris excitetur.

Vidū inter salivandum æger utatur parco & moderato:



rato: quò plus comedunt ægri dum salivant, eò tardius curantur, cum non tam ros nutritivus solidarum partium acido venereo infectus sub salivæ forma tunc prodeat, quàm potius alimenta assumpta & in chylum digesta excernantur; utut, si paulo copiosior procedat salivatio, propter oris exulcerationem, dentium stuporem & vacillationem, gingivarum & linguæ erosionem, præcordiorum anxias molestias, & nauseam, parùm comedere queant ægri. Optima alimenta hic sunt iuscula ex pane bis cocto parata. Potus sit decoctum lignorum non adeò forte, aut solitarium, quod melius, aut saltem eodem probè cerevisia diluatur. A vino penitus est abstinendum; nam salivatio eo faciliè sistitur. Nil æquè hostile est salivantibus, quàm *frigus & acidum*: illud in aëre exhibita & potu: hoc in assumptis. Utrumque mox salivationem imminuere, angustias præcordiorum inferre, & artuum musculosarumque partium varia pathemata molesta inducere solet.

Accidit interdum contumax alvi obstructio: nam si præter panem biscoctum in iusculis, aut ovum sorbile, nihil assumitur, corpusque priùs benè evacuarum est, & copiosa salivatio sequitur, faciliè præsumere licet, alvum iri constipatum; In hoc autem casu alvus intacta relinquatur.

Quod si magis affatim & cum impetu præcipitari ad os materiam videmus, periculumque subesse aut faucium atque gingivarum inflammationis nimie, aut totalis erosionis, aut suffocationis, inhibenda est salivatio, & medicamentò aliquo ad inferiora per secessum erit ducenda, aut enemate injecto evacuanda, & os gargarismate nocte dieque sæpiùs abludum; item vesicatoria blanda, aut similia epispastica, variis in locis applicanda: in specie omne hic punctum complent Opiata internè exhibita. Aurum etiam singulari amicitia Mercurium ex corpore evacuat, & ita salivationem sistit. Applicatur affricando externè, vel in ore detinetur, detentum albescit ex attracto Mercurio, incititur igni, depuratur, & iterum in os immittitur. Hac methodo quondam usus in nimia salivatione ROLFINCIUS, applicavit & affricuit externè, in ore detinendo alios similiter aureos, quibus se insinuavit Mercurius; eaque ratione salivatio sublata, adhibito partitis simul vicibus laudano opiato.

Quod si crebriùs licet factis inunctionibus, tamen non sequatur salivatio, sed ex Mercurio, partes internas afficiente, sequantur plura terra aut gravia symptomata, cum reperiantur certæ quædam horum crases, quæ Mercurii vim salivatoriam aut eludunt, aut non suscipiunt; in tali casu, dubitæ alex pleno, aut sudoribus repetitis virulentia per Mercurium inunctum inducta, correctæ unà cum Mercurio ejicienda ad imitationem ZACUTI LUSITANI lib. 2. *Prax. Admir. observ.* 135. cum interdum salivationem cessantem ex humorum ineptitudine sudor promoveat, id quod notabili observatione docet SCHRAEDERUS p. 229.: aut per vomitorium ex Mercurio vitæ in largiore dosi symptomata præcordiorum removenda, internè inunctionibus repetitis continuandum, ut salivationis defectus compensetur frictionum crebritate, donec insensibili transpiratione virus pedetentim evanescat, ad imitationem notatu dignissimi casus HORSTII lib. 11. *observ.* 14. Quò etiam facit singularis RIVERII *Observatio* de horrendis symptomatis sub incipiente pyralismo ex inunctionibus Mercurialibus natis, aliis irritis, vomitorio curatis, C. 1. *Observ.* 77.

Observandum autem probè, quare non succedat salivatio, ac unde ista symptomata supervenientia? an contentorum viscidorum immobilitate, & circa præcordia stagnatione? (nam per mercurialem salivationem ex peripheria & artubus ad centrum moventur contenta maligna; sicuti è contrà per sudores ex centro ad peripheriam eadem distribuuntur:) an verò ex virium ægri debilitate salivatio non procedat? Necesse enim est, ut ægri salivandi habeant adhuc vires utcumque firmas; nam salivando ordinatio debilitantur. Quod si nimis reddantur debiles, cessare, aut saltem admodum imminui solet fluxus, spirituum debilitate non ritè commotis ac circulatis humoribus; unde redeuntibus viribus subinde repetere aliquo modo, sed imminuè, solet fluxus. Ægri tales inuncti, sed in quibus ex virium defectu nimis citò cessat salivatio, sin post laxatam alvum & aliquot dierum moram æquè debiles persistant, sit hoc ex Mercurio intus adhuc delitescente, hinc progressus sit ad sudorifera, successivè tamen. Nam ta-

*Estmull. Oper. Tom. II.*

lium usu redeunt vires, ægri autem mox meliùs exinde habere observantur. Curiosum est, quod venericis talibus, quibus post salivationem peractam, sed non sufficienter, ob virium imbecillitatem, absolutam, propinquantur sudorifera, ab horum usu cum omnia symptomata venerea antea apparuerint quæta, denuò dolores artuum redire solent, acido viscido à Mercurio soluto, & cum fluidis corporis denuò unito, sed non excreto, sudoriferorum vi ad extimos artus horumque loca nervea secreto; quæ non nisi repetitis sudoriferis, applicando simul levem litum Mercurialem, vel imponendo simul emplastrum de ran. scum Mercurio, iisque repetitis, curari possunt, nisi recollectis viribus denuò salivationem instituire velimus. Probè tamen hoc in casu attendere oportet, an vires deficiant? quia sunt reolutæ seu exhaustæ; nam de his hæcenus dicta intelligenda: an verò sint oppressæ ex malignitate per Mercurium commotæ? nam de his intelligendi sunt casus illi ex HORSTIO, RIVERIO, &c. allegati.

Quod si symptomata quædam ex salivatione à Mercurii malignitate nervis inimicissima, aut non sufficiente ejus expulsionem, relicta fuerint, præter remedia solaria, tam internè quàm externè adhibita, convenit in specie decoctum guajaci, de quo vid. THIERMAYERUS l. 2. *Conf. p.* 149: sicuti de remediis solaribus, tam internè adhibitis, quàm externè litus formæ applicatis, pro corrigenda Mercurii malignitate, conf. in specie ZACUTUS LUSITANUS in l. 2. *Prax. Admir. obs.* 134. item RIVERIUS Cent. 2. *obs.* 91. & *Obs.* 13. *commun.* à JACOTIO, ubi cephalalgia diuturna, post curatam per Mercurii litum lucem veneream residua, ex Mercurii malignitate nata, per nummum aureum in ore detentum fuit curata; Aurum enim Mercurium allicie, & ita è corpore secum rapit. Commendatur etiam ab HOECHSTEDTERO *Decur.* 3. pag. 231. Decoctum helenii & sceniculi, expectando sudorem.

Mercurius scorbuto est hostilis & inimicus, illis præsertim, qui ex scorbuto gingivarum & oris ulcerationibus sunt obnoxii. Dubius propterea fuit, an quibus copiosa quasi saliva scorbutica urinas imprægnat, utur quoad cætera parum de scorbuto perceperint, tutò saliva in possit institui, metuendo dentium, faucium & gingivarum pathemata? sed talibus non nocuisse observavi: Imò fauces ancillæ, luis venereæ contagio inquinatæ, cum talibus urinis, amplo foramine, ex lue prope uvulam exulcerato, salivando meliùs habuit, & admotione ungenti Ægyptiaci cum melle rosato curatum fuit ulcus.

Quod si si gravis lue venereæ infecta fuerit, etiam hæc ipsa, modò alia respondeant, præsertim vires, salivatione tractari potest; cum sic simul & factus sanetur, qui alias similiter infectus prodiret. Exemplum videbitur in HILDANO C. 5. Cur. 97. & 98. item VIARDEL in *Observationibus de Partu* pag. 92. item MORISON de morbis mulierum, item SANGÉZ in *Observat.* pag. 377., ubi refert mulierem lue venereæ laborantem, fortissimis inunctionibus Mercurialibus usam & curatam, paulò post puerum sanum peperisse: Conf. BOTALLUS de Lue Venerea: Sicut etiam infantes per Mercurium, tam foris illitum quàm intus propinatum, nunc saltem purgando, nunc salivando, à lue hac liberari possunt. Quoad usum illinitionis, & hanc secutam salivationem, vid. BORELLUS de Lue Venerea pag. 545. Quoad usum Mercurii internum, vid. HORSTIUS lib. 7. *observ.* 114. qui refert puellum sex mensium ætate corpore, & imprimis circa podicem, à lue venerea pustulosum, per repetitum usum Mercurii dulcis ad ʒss & oleo destillato lignorum curatum: sic FABER Lucem Veneream in infanthulo unius anni per repetitam Mercurii dulcis solaris exhibitionem curavit Cur. 39.: item RIVERIUS C. 1. *Obs.* 95. & Cent. 2. *Observ.* 94. Lucem Veneream in puero per Mercurium dulcem & Decoctum lignorum curavit. Suspectum tamen in pusioibus litum meri d habet BALLONIUS: vid. BONETTI *Pharos* pag. 650.

Cæterum antequam vel sudatoria ista, vel hæc salivatoria cura instituitur, priùs scrutentur viscera lue venereæ infectorum, an adhuc robusta? an simul infecta? Nam si hæc jam fuerint appurata, perperam instituitur, cum mors magis acceleraretur. Probè etiam examinanda sunt ossa carie jamjam infecta; si enim hæc ossa secundi paris maxillæ inferioris, vel ossa inferiorem oculi canthum

Dd con-



onstituentia, item ossa cranii, cariosa fuerint, à salivatione est abstinendum, aut ægroto prius indicandum, & in animum inducendum, utrum oculum amittere? an verò Lue Venereâ ulterius infectus esse mallet? Visus enim ossibus oculorum cariosis & separatis, oculis ut plurimum amittitur. Si ossa cranii sint cariosa, salivatione simplici negotium non succedit, sed pericranii apertura necessaria est, quo partes cariosæ aliæque festuæ separatæ eximi possint: id quod sine cruciatibus summis peragi non potest. Ulterius ossa palati, septum narium, imò ipsa etiam nasi ossa, multoties pereunt; hæc enim jamjam atrosa in juncturis suis non facile concresecunt, nec ulcus sanatur, priusquam omnes particule atrosæ separatæ & remotæ fuerint. Hinc nonnunquam post salivationem & curationem vox cum loquela, & facies etiam, dehonestatur: quorum omnium ægrotantes prius bene sunt moneendi.

His itaque præmissis, prius corpus ritè præparandum venit, & primæ viæ mundificandæ, tam per superiora, si circumstantiæ permittent, quàm per inferiora; quia alias vel medicamentorum potentiam eludunt congestæ ibidem sordes, vel commotæ ab iisdem gravia præcordiorum & abdominis symptomata, in specie anxietates, inferunt; quod in specie fit à Mercurio, si universalis ista aliquoties non fuerint præmissa.

*Venefectio*, quam quidam præmittunt Chirurgi, penitus est frustranea; bene autem Digestiva & Præparantia, i. e. succorum corporis vitalium dyscrasiam corrigentia, ex tartaro vitriolato, terra foliata tartari, sale abstinibili, lapidibus cancrorum, sale volatili viperarum, Elixir proprietatis sine acido, Tinctura antimonii tartarificata, Tinctura tartari composita, Tinctura coralliorum assafrata, essentia fumariz, &c. pro circumstantiarum ratione præmitti, & hinc Purgatio una alterave institui potest; aut certe purgantibus talia Digestiva admiscenda, præcipue si per epierasin evacuare aulmus sit, nunquam negligendo specificis.

Quod si peracta sit salivatio, præmissa per alvum purgatione blandâ procedatur adhuc eo ordine, quem docet **HARTMANNUS** §. 38. V. g.

R. Ligni guaiaci lbj.

Corc. eiusd. ʒvj.

Infunde in

Aque comm. lbvj.

Macerentur non tam 24. quàm potius 48. horas, ut vult **LINDANUS**: Coqu. ad medietatem.

D. S.

Potio sudorifera sanguinem purificans.

Magmai velisio affunde denuo

Aque simpl. lbj. xij. ad xv. vel xvj.

et aliquantum coque, circa finem addendo

Rad. liquirit. ʒij.

Passul. min. cont. ʒij.

Factæ colaturæ adhuc tepidæ adde

Cinnamom. acut. ʒij.

F. Bocchetum: S.

Potio ordinaria.

Priori decocto utatur ad ʒiv. vel v. pro sudore manè eliciendo; posteriori verò pro potu ordinario: quo nimirum, si particule malignæ in massa sanguinea nova concreverint, ex mox eliminantur.

Probè etiam est notandum, quod peractâ salivatione omnis amictus, unâ cum lectulis ægrotantium, sit innovandus, ne miasmata pristina instar novi fermenti maligni massam sanguineam subeant.

Pro scopo purgandi Mercurialia primatum obtinent, utpote quibus ritè præparatis nullum præstantius in hoc morbo remedium existit: vid. **HORSTIUS** l. 2. observ. 7. V. g. Mercurius dulcis, qui reliquis facile palmam præripit, annotante **SYLVIO de Lue Venerea** §. 257, arcannum corallinum, de quo pariter vid. **SYLVIIUS** l. 2. §. 283, Mercurius cum Venere præcipitatus, item Mercurius præcipitatus albus, quem **RIVERIUS** Observat. Commun. pag. 321. 337. & 346. commendat. His non immerito addenda colocynthis, de qua vid. **SYLVIIUS** §. 312. V. g.

R. Extract. cathol. vel panch. Croll.

Mass. pilul. coeb. min. an. gr. xij.

Mercurii dulc. gr. xv. ad ʒj.

Extracti troch. alb. vel mag. jalapp. gr. j. vel ij. vel iij.

Olei destillat. lign. guaj. vel cerebinth. gutt. ij.  
Cum s. q. Essent. lignorum, vel ligni sancti, F. pilulæ.

D. S.

Pilulæ sanguinem mundiſcantes pro una doſi.

R. Extract. panch. Crollii, vel belleb. nigri,

Mercurii dulc. an. gr. xv.

Scamm. sulphurat.

Extract. trochisc. al. band. an. gr. ij.

Cum Essent. fumar. F. pilulæ.

D. S. ut antè.

R. Extract. cathol. Andern.

Panchym. Crollii an. ʒss.

Mercurii dulc. gr. xij. ad gr. xv.

Extract. troch. al. band. gr. j. vel ij.

Oleo destillat. guaj. gutt. ij.

Cum Essent. ligni sancti. F. pilulæ.

D. S. ut suprà.

R. Mass. pilular. de fumar. ʒj.

Mercurii dulc. ʒss.

Mag. jalapp. gr. v.

Oleo destillat. cerebinth. gutt. ij.

Cum Essent. lignorum. F. pilulæ.

D. S. ut suprà.

R. Extract. panchym. Crollii vel cathol.

Mercurii dulc. an. gr. xv.

Scamm. sulphurat. gr. vj.

Cum Essent. lignor. F. pilulæ: S.

Ut suprà.

R. Mass. pilular. coeb. min. ʒj.

Mag. jalapp. gr. v.

Turb. miner. gr. jv.

Oleo destillat. guaj. gutt. j. vel ij.

Cum Essent. ligni sancti, F. pilulæ.

D. S. ut suprà.

R. Mass. pilular. coeb. min.

Dia. colocynth. an. gr. viij.

Turbith. miner. gr. ij.

Extr. troch. al. band. gr. j.

Cum Essent. fumar. F. pilulæ.

R. Extract. panchym. Cr. ʒss.

Mercurii dulc. gr. xv.

Mag. gummi guttæ gr. jv.

Jalapp. gr. ij.

Cum Essent. fumar. F. pilulæ.

D. S.

Ut suprà.

R. Mercurii dulc. gr. xv. ad ʒj.

Mag. jalapp. gr. jv. ad ʒss.

Sacch. ʒss.

M. f. pulvis: S.

Pulvis sanguinem purificans pro una doſi.

R. Mercurii dulc. ʒj.

Scamm. sulphurat. ʒss.

M. f. pulvis.

D. S. ut antè.

R. Spec. dia. turb. cum rhubarb. ʒj.

Scamm. sulphurat. gr. vj.

Troch. al. band. gr. j.

M. f. pulvis.

D. S. ut antè.

R. Conserv. fumar. ʒss.

Pulv. cathol. purg. ʒj.

Mercurii dulc. gr. xij.

Cum Conf. fum. F. Bolus.

D. S.

Bolus purgans pro una doſi.

R. Pulp. passul. ʒj. vel ʒij.

Mercurii dulc. gr. xij. ad xv.

Scamm. sulphurat. gr. iij. ad v.

M. S.

Electuarium purgans pro una vice.

R. Conf. fumar. ʒj.

Mag. jalapp.

Scamm. sulphurat. an. gr. vj.

Turbith. miner. gr. jv.

M. f. Bolus:

D. S.

Ut antè.

Observandum autem quoad Purgantia talia, quod ubi Lues Venerea adhuc est in fieri, & genitalia saltem occupet, ut in gonorrhœa, bubonibus, &c. quod tunc vel unica talis



talis præmissa purgatio sufficiat: (vid. PLATERUS Pr. Tom. 3. pag. 420.) ne virus commotum ad loca interiora, occasione irritationis in primis viis factæ, commoveatur; & in specie buboni sub purgatione tali Emplastrum, ut vocant, attrahens, seu exgummatibus acrius vel siccius admovendum. Quod si lues sit inveterata, & in externis præcipue partibus hæreat, non temere purgantibus fortioribus aut repetitis materia peccans intro revocanda, sed unâ alterave tantum præmissâ ad ipsam curam accedendum. Potius ergo in lue nondum adeo confirmata, & cujus inquinamenta adhuc maximam partem fluida corporis occupant, purgatio repetita & fortior, addito Mercurio instituenda. Sub ipsa salivatione, nisi sit nimia, à purgatione penitus abstinendum, nec sub sudationis cursu eadem adeo convenit; bene autem finitâ salivatione, & sudatione unâ alterave vice institui potest, si necessarium videatur; sicut ante salivationem vomitus proficius est, à quo salivatio sequitur facilius: Interdum tamen, si symptomata & indicationes promiscua fuerint, qualibet quartâ vel quintâ die sub sudatione purgatio institui, aut ipso decocto sudorifero purgans quoddam, præsertim colocythis, incoqui potest, ut ubique, quorsum natura vergit, succurramus. Si vel à morbo ipso, vel à purgantium frequentiore usu exciteretur dolor, his unum vel alterum granum laudani opiatî admiscere conveniet. Si purgationes per Mercurialia institutas & frequentius repetitas salivatio sequatur, à catharsi ulteriore desistendum, hæcque vel permittenda, si sufficiens fuerit, vel juvanda, quod tamen primis quatuor diebus, utut salivatio compareat, non attendendum.

Quoad vomitoria: horum assumptionem indicant

1. Ventriculi cruditates, atque sordes eliminandæ.
2. Excrementorum colluvies maligna à salivantibus magis aut simul ad ventriculum commota, atque in hoc molestias, aut anxietates excitans: qualem casum RIVERIUS Cent. 1. Observ. 77. refert.

Præter dicta hætenus remedia commodè etiam alia usurpantur; ut quando sudoriferis decoctis vel talia volatilia & spiritus urinosi, vel essentia lignorum, vel sulphur auratum diaphoreticum secundum HORSTIUM, vel spiritus theriacalis camphoratus, vel mixtura simplex, vel ipsa Theriaca, permiscetur; vel hæc & similia tempore meridiano & vespertino à sudoribus vacuo propinantur, aut etiam ante & post salivationem exhibeantur: quod etiam cinnabarina remedia, viperina, antimonium diaphoreticum, cerussa antimonii, extractum ligni sancti cum sale volatili mistum, rob juniperi aut sambuci, olea destillata lignorum, & similia polychresta, & ex his composita pertinent, v. g. Electuarium *Massa*, quod pulvis subtilissimus ligni guajaci & syrupus de fumaria ingreditur: Aut

*R. Rasur. ligni guajaci, live natural. live artific. ʒj. vel ʒiv.*

*Sulphur. antimonii diaph. ʒj.*

*Sal. vol. corn. cervi vel viperar. gr. xij.*

*M. pro 2. dosibus: S.*

*Pulvis sudoriferus sanguinem mundificans.*

*R. Cerviss. antimonii. vel antimonii diaph. ʒj.*

*Cinnab. antimonii ʒss.*

*Sal. volat. corn. cervi vel viperar. gr. xv.*

*M. f. Pulvis.*

*Div. in 3. part. æqu.*

*D. S. ut antè.*

*R. Mixt. simpl. ʒj.*

*Spiritus ligni guajaci,*

*sassafr. an. ʒj.*

*M. D. S.*

*Mixtura sudorifera.*

*Dosis 40. ad 60. guttas.*

*Aut*

*R. Ess. lignor. ʒss.*

*Viperar. ʒj.*

*M. S. ut antè.*

Hiscè modis hætenus recensitis methodica & ordinata cura peragitur.

Quod si vel malum sit levius, & spes sit, idem facili curari posse, vel æger tam strictæ curæ se subicere nolit, sequentia aliquoties plus minus proficua observata fuerunt.

*R. Cort. ligni sancti ʒss.*  
*Ess. oil. Oper. Tom. II.*

*Rad. sarsaparill. ʒiv.*

*Fol. senn. sine Rip. ʒss. ad ʒij.*

*Rad. liquorit.*

*Helleb. nigri. an. ʒj.*

*Pulp. colocynth. ʒj.*

*Incis. & contul. infunde in*

*Vini*

*Cerevis. an. Mens. iij. vel ʒv.*

*Coqu. in lagena stannea, vel in cucurbita probe clausa in Balneo Mariæ per 4. vel 6. horas:*

*Colaturæ adde*

*Misbridat. ʒj. vel iij.*

*D. S.*

*Potio alterativa apertius.*

De quo bibat æger bis in die 3. vel 4. ʒlas, mane & vespere aliquot horas ante cenam; viscida mucaginosa cum euphoria evacuat.

Cum hoc decocto purgante æger omni tertiâ, vel quartâ die usurpet hoc sudoriferum:

*R. Rad. sarsaparill. ʒv.*

*Ligni sancti ʒj.*

*Cort. ligni sancti ʒjv.*

*Ligni sassafr.*

*Rad. china,*

*Liquirit. an. ʒj.*

*Sem. anisi ʒj.*

*Infundantur & coquant. in*

*Aquæ commun. Mens. x.*

*ad remanentiam Mens. vj.*

Colatura detur pro potu sudorifero, interpolatim, ut monui, cum illo laxativo usurpando:

*D. S.*

*Potio sudorifera sanguinem purgans.*

Ex utriusque decocti remanentia etiam decoctum secundarium fieri potest, quod usurpatur unâ cum illis.

In decocto sudorifero, si placeat, cuilibet haustui pro excitando sudore simul permisceri potest:

*R. Quintæ essent. Matib. ʒss.*

*Spiritus theriac. ʒj.*

*Classi antimonii ʒss.*

*Spiritus ligni guajaci ʒij.*

*Misceantur pro dosi: S.*

*Mixtura sanguinem purificans.*

Pergendum jam ad curam particularem symptomatum, in quibus se offert

## I. GONORRHOEA GALLICA,

Alias Virulenta dicta, item Maligna; estque saltem illa, quæ ex coitu impuro cum foemina lue Gallicæ infecta contrahitur, & quæ in tali, ubi malum illud ulcera in vagina uteri excitavit; tales enim foeminae aptæ sunt, ut per coitum virulentam gonorrhoeam mari possint communicare. Ab aliâ causa nunquam oritur. Effluit in hoc ipso cum acerbis dolore circa penis radicem, ubi sunt prostates glandulosæ, primò seminalis aquosus liquor, ex prostaticis nempe, qui hinc successivè flavescit, tum citrinescit, & magis acrefcit tandem viridescit aut coerulefcit, imò subinde purulentia permiscetur, non raro graviter foetet. Dolor talis est, ut nunquam urina sine acerbis dolore missi possit: supervenit tunc tumor præputii & glandis; Nam liquor hic vellicando præputium primò pruritem infert, dum reliquias ponit intra præputium, illud purulentum reddit; tandem tumorem infert, ut difficulter possit detrahi à glande, unde in conjunctione ulcuscula sunt. Talis gonorrhoea accidit illis, qui visitant Galliam & Italiam: interdum adeo acris est, ut nunc prostates glandulosas, nunc meatum urinarium corrodat & exulceret, ex quibus ulcusculis succrescit postmodum caro præternaturalis instar cujusdam verrucæ, quæ canalem urethrae tandem obstruendo urinæ excretionem impedit, & vulgò *caruncula meatus urinarii* vel penis appellatur. Affligit hæc gonorrhoea continuò, imprimis secundum indolem luis venereæ vespertino aut nocturno tempore cruciat, adeo ut eodem tempore acerbissimi dolores crucient penem, ilque eo acerbiores, si forsitan se extendat & erigat membrum. Sin malum ulterius procedat, superveniunt crudeles ardores nocturni lomborum, & quæ sunt similia symptomata gonorrhoeæ virulentæ.



## CAUSÆ.

*Causa hujus gonorrhœæ est simplex contagium fermentativum venereum per coitum ex muliere infecta, & quæ ulceræ Gallica plus minus in vaginam uteri habet, haustum. Malum enim prolificum est hæc ipsa gonorrhœa Gallica: adeo ut referat BALLONIUS l. 1. Conf. 9. de quodam viro, qui ex coitu impuro gonorrhœam virulentam contraxit; unde postmodum non tantum propriam uxorem inquinavit, sed cum eadem filium quoque generavit, mox à primo ortu eodem malo affectum.*

## PARS AFFECTA.

*Subiectum hujus gonorrhœæ sunt eadem prostata glandulosa (raro enim ulterius repit, ut etiam ipsos testes arripit;) id quod confirmat experientia Anatomica: vid. BONETTUS. Anat. Pr. l. 3. S. 31. Observ. 5. SPIGELIUS de Humanis corp. Fabr. l. 8. c. 17. BARTHOLINUS Anat. Reform. l. 1. c. 23. l. 2. Hist. Anat. 36. ubi aliquot memorantur ex gonorrhœa tali demortui, in quibus prostata glandulosa fuerunt repertæ exulceratæ & excoriatæ: Unde etiam tali gonorrhœa infecti urinam emittunt acerbissimum dolorem in radice penis; ubi illæ prostata sitæ sunt, imprimis percipere solent: id quod signum nunc tumefactæ, nunc excoriatæ vel exulceratæ prostatae glandulosæ, esse solet. Nam dum in coitu intensius incallescunt partes genitales, tunc ulcuscula Gallica vaginæ uterinæ exhalant & exspirant Miasmata fermentativa acris, quæ post excretum semen virile se insinuant in urethram penis, ibique se affigunt, & per meatum ex modo excreta genitura adhuc parulos in prostata glandulas se insinuant, & fermentatione corruptivâ inquinant ibidem lympham seu liquorem elaborandum & discernendum, eumque in acrimoniam acidam corrosivâ malignam, qualis in lue gallica prædominatur, corrumpunt. Unde postmodum exinde talis succus acris acidus corruptivus profluens non tantum in similia ulcera corrodit has prostata, sed etiam meatum urinarium & præputium excoriat, unde saniei foetidæ & ulcerosæ aut ichorosæ continuus profluxus, atque quidem dolorosus, & tam dira & atrocia ac dolorifica symptomata oriuntur, qui fluxus Gonorrhœæ Virulentæ seu Gallicæ nomine venire solet, fluxus Ludovicianus vocatus aliàs. Promotum ulterius & aliud serpens contagium, ita ut per vasa deferentia testes ingrediatur, horum tumorem & dolorificam inflammationem inserit;*

## DIAGNOSIS.

*Diagnosis hujus gonorrhœæ ex primò dicta historia est clara.*

## PROGNOSIS.

*Quoad Prognosin: observandum, quod gonorrhœa hæc in principio leve malum sit; quò citius ipsi occurratur, eò facilius curatur.*

*In senibus ut plurimum ad mortem terminatur.*

*Nisi brevi ista occurratur, in progressu excoriat glandulas, & quandoque absumit.*

*Interdum non ritè curata, sed saltem oppressa, ulterius serpit, & testes inquinat, in quibus tumores, & subinde bubones intert.*

*Tandem in perfectam luem veneream terminari solet, fermento maligno successivè partes vicinas, & cum sanguine universum corpus tandem inficiente, & ita perfectum Gallicum morbum inferente. Et hic est modus communissimus, quo lues venerea contrahitur.*

*Optimè notandum est, frequentius supervenire bubones glandularum in inguinibus, quod malum est; si enim hoc fiat, certum est, universum corpus correptum esse: malum etiam signum est, si spontè iterum dispareant.*

## CURA.

*Quod attinet Curam: in hac fermentum illud Gallicum virulentum appropriatis, partim Mercurialibus, partim acidum corrigentibus, destruendum, & quæ datâ portâ, speciatim per sudores & vias urinarias, ex corpore & massa sanguinea evacuandum, remediis aliis addendo semen*

*violanum, lapides canthorum, radices & signa Superius nominata, utpote, præter vim specificam atque suortiferam, diureticam panter habentiâ. Hinc partes istæ balsamicis abstergantur & consolidentur.*

*Alia autem instituitur cura, si fluxus hic principium morbi exstat, nec ab ipsa adhuc infecta sit massa sanguinea; alia, si eadem simul contaminata, & lues venerea universalis inagis jam tàm juncta fuerit. Quippe in prior casu ante omnia pro olcere prostatae & vesicularum seminalium mundificando, humor acris contemperetur & corrigatur per emulsiones in gonorrhœa aliàs consuetas, præprimis ex semine cantharis paratas; os sepiæ, succinum, terebinthinam, hujus oleum, & balsamum Indicum. Si verò reliquis luis venereæ symptomatis gonorrhœa superveniat, aut hujus virulentia massa sanguinea jam tàm notabiliter inquinata fuerit, universalis cura opus erit.*

*Quod si cui lubeat se præservare ab hac gonorrhœa, quæ nempe venus vexat, interim tamen non certus esse potest, an cum infecta coëat? Is præservationis loco mox ante aut post coitum assumat spiritus seu olei terebinthinæ guttas vi. vij. vel viij. in haustu vini generosi: hujus enim sal volatile oleosum meatum urinarium abstergit, accorripit contagium virulentum forsitan haustum.*

*Quod si verò quis jam affectus sit hoc malo, & laboret gonorrhœa, ante omnia purificetur corpus per universalia purgantia, Mercurialibus sociata: v. g. fiant pilule extr. hellebori nigri, aut extr. catholico Andernaci, aut panchymagogo Crollii, cum ana Mercurii dulcis: His pro stimulo addantur aliquot grana extr. trochiscorum alhandal; colocynthidis enim efficaciam mirè commendata est ab HELMONTIO in cura luis venereæ, præsertim ulcus lignorum.*

*R. Extr. panch. Croll. vel helleb. nigri, vel Mass. Pilul. cathol. Ludov. gr. xij. ad xv.*

*Mercurii dulc. gr. xv.*

*Extr. troch. alband. gr. j. vel ij. ad iij.*

*Olei destillat. terebinth. vel guaiaci gutt. ij.*

*Cum essent. guaiaci F. pilulæ: S.*

*Pilule sanguinem mundificantes.*

*R. Extr. panch. Crollii, vel helleb. nigri,*

*Mercurii dulc. an. gr. xv.*

*Scamm. sulphur. gr. ij.*

*Extr. troch. alband. gr. iij.*

*Cum Essent. lign. fossilifras F. pilulæ:*

*D. S. ut antè.*

*Convenit loco Mercurii dulcis, Mercurius præcipitatus viridis venereus cum calce viva paratus, qui hic est specificus, cujus descriptio vid. in SCHROEDERI Pharm. ubi de Mercurio: Ast usus hujus Mercurii præcipitatus viridis primitus quidem videtur augere malum, sed bonum est signum; si enim continuatur, tandem id cessat: e. g.*

*R. Extr. panchym Croll. vel cathol. gr. xv.*

*Mercurii præcipitatus virid. gr. v. vel vij.*

*Extr. troch. alband. gr. ij.*

*Cum essent. lign. F. pilulæ: S.*

*ut antè.*

*Aut Pilulis de terebinthina, vel terebinthinæ coctæ miscetur Mercurius dulcis: e. g.*

*R. Terebinth. opt. 3j.*

*Mercurii dulc.*

*Offis sepiæ præp. an. 3ss.*

*Cum Oleo destillato succini pro 3 dosibus*

*f. pilulæ irrorandæ.*

*D. S.*

*Pilule sanguinem mundificantes pro 3. dosibus.*

*Non tantum laxant, sed & gonorrhœam respiciunt. Vel fiat Bolus ex terebinthina Cypria cum rhabarbaro ac Mercuriali remedio, vel dulci, vel alio. In subiectis fortioribus:*

*R. Turbit. miner. Crollii gr. vj. vel viij.*

*Cum liq. conserv. rosar. vel alio appropr. f. Bolus.*

*D. S. Bolus sanguinem purificans.*

*Vid. SYDENHAM in Epist. Respons. 2. de Lue Venerea p. 76. Nam licet Mercurialia talia in principio videantur augere malum, illud tamen audacter insistendum; cum non detur appropriatum magis remedium contra virulentiam Gallicam, quam Mercurialia.*

*Evacuatio ita corpore cum Mercurio dulci, sive semel, si ve repetitis vicibus, præ ceteris conveniunt balsamica appropriata, dicta loca abstergentia: inter quæ eminet terebinthina, olei destillatum terebinthinæ, in specie balsamum sulphuris*



*terebinthinatis* ad guttas xij. vel xv. ad xx. bis quotidie assumptus, aut *juniperinus*. Continuetur aliquandiu. His ipsis commodè subjungatur *aqua Quercetani contra gonorrhœam virulentam*, quam se centies expertum esse gloriatur: Videatur etiam SCULTETUS in *Armam. Chirurg. Obser.* 79. qui ipse etiam iactat hujus aquæ experientiam. Loco hujus aquæ balsamus saturni terebinthinatus, ex saccharo saturni & oleo terebinthinæ blando igne paratus, vid. in ZWELFFER O in *Mantissa Hermet.* ubi de Saturno; egregiè conducit, ubi ardor nimius circa renes & genitalia jungitur, vel solus, vel mistus cum oleo juniperi, additâ camphorâ; non absumendo semen, ut vulgò putatur, sed absorbendo acidum vitiosum in hac gonorrhœa peccans: qua ratione etiam camphora conducit, non quod castræt per nates, ut putant, sed tanquam sal volatile oleosum detergit & corrigit acidum venereum.

Vel

R. Olei terebinth. ʒij.

Camph. ʒi.

Sacch. Saturni ʒss.

M. D. S.

*Balsamum sanguinem mundificans.*

Item tinctura antiphthistica ardores renum post gonorrhœam optimè compefcit:

Vel

R. Off. sep. præp. drach. ʒ.

Sacch. Saturni drach. ʒ.

M. f. Pulvis pro tribus dosibus. D. S.

*Pulvis refrigerans & sanguinem mundificans.*

Juxta hæc convenit extractum tormentillæ cum Saturni saccharo, & oleo destillato terebinthinæ in formam pilularum redactum: v. g.

R. Extract. tormentill. ʒi.

Sacch. Saturni ʒss.

Camph. drach. ij.

Cum s. q. olei destillat. tereb.

F. Pilulæ

D. S.

*Pilulæ adstringentes & sanguinem purificantes.*

Pilulæ hæc singulare quid habent.

Item conveniunt pilulæ de terebinthina contra gonorrhœam ZWELFFERI in *Pharm. Reg.* p. 70.

Hicce addatur infusum cantharidum in vino, quod expertum est remedium cujusdam Medici Belgæ; quatenus cantharides acerrimo sale volatili abundant. Parandi modum vid. in *Collegio Pharm. in Sebrad P. 1. S. 3. p. ...* BARTHOLINUS *Cent. 5. Epist. 54. & 55. pag. 343. & Hist. Anat. Cent. 5. Obser. 82.* Decocta lignorum, essentias aut extracta lignorum, ceu per se nota, & ad suam veneream & ejus prodrumum gonorrhœam, commendatissima sicco peie prætereo. Tinctura coralliorum cum spiritu lignorum parata est egregia, sed crebrius usurpanda. Resina ligni guajaci expertissimum est remedium ad hanc gonorrhœam: item essentia ac extractum guajaci cum tinctura tartari vel spiritu vini tartarifato paratum, in aqua plantag. subinde propinatum summum etiam specificum est in hoc casu; nam in resina hæc perfecta consistit cura gonorrhœæ malignæ. Aliâsetiam balsamus de Peru ad aliquot guttas assumptus, vel, qui omnium est præstantissimus & longè excellentior balsamo Peruviano, balsamus de Capaibe, præ et usum externum Chirurgicum, ex fida Belgarum experientia specificum est remedium in gonorrhœa virulenta, ut etiam stranguaria, à guttis ij. iij. ad v. vj. vel viij. in vitello ovi dissolutus, vel cum saccharo in forma pulveris assumptus, & fuit experimentum LINDANI: aut ejusdem cum spiritu vini tartarifato parata essentia in quavis gonorrhœa est proficua. Antimonium diaphoreticum, Bezoardicum minerale & Martiale, & similia laudantur. Item succum limonum cum spiritu terebinthinæ & camphora ex BABRO iam propositi; uti hujus experimentum videre est in SCULTETO *Obser. 79. Armam. Chirurg. citat.* Singulare cujusdam Medici experimentum est aqua Mercurialis vel Hermetica; qui recipit Mercurium vivum, coquit in aqua simpliciter per aliquot horas, decantat aquam, & remanet Mercurius in eodem plane pondere, quo fuerat ante ebullitionem; hinc aquam istam propinat aliquandiu manè & vespere bonum haustum, & est egregium remedium, quo successu vè sedatur gonorrhœa virulenta.

In BARTHOLINO refertur cura gonorrhœæ virulenta.

*Eismull. Oper. Tom. II.*

rolentæ per pulverem sympatheticum; id quod eatenus verum est, quatenus eo processit exulceratio prostatica, ut corrosis vasibus sanguis quoque effluat; Unde talis sanguis purulentus quoque effluens pulvere sympathetico satis noto exceptus in distans curavit gonorrhœam.

Quod si fiat, ut sæpius etiam fit, exulceratio in prostaticis glandulis, indeque dolor & ulcus in meato urinario, tunc conducunt iniectiones per siphonem in penem, quæ fiunt ex succo plantaginis cum melle rosato, quæ diluuntur cum aquis appropriatis: Vel iniecitur liquor ex stercore gallinæ, quem HARTMANNUS pag. 264. in vesicæ ulcere commendat: Aut parentur iniectiones ex aqua calcis vivæ, in qua ebulliant summitates hyperici, flores melilori & verbasci; aloë, melle & Mercurio dulci, & similibus: sicut mihi in usu sunt sequentes omnium optimæ:

R. Aqua calc. vivæ unc. iij. (vel hujus unc. ij. & plantag. unc. j.)

Aloës hepatis ʒss. vel essent. aloës drach. iij.

Mellis rosat. unc. ʒ. vel ʒvj.

M. pro Iniectione in penem cum parva syringa aliquoties in die instituenda: S.

*Iniectio purificans.*

Vel

R. Aqua calc. vivæ unc. iij. vel jv.

Aloës,

Myrrhæ an. drach. ʒ.

Mellis drach. vj.

M. f. Iniectio in penem cum siphone.

D. S.

ut anti.

In malo graviore etiam Iniectionibus talibus pro renata ana Mercurii dulcis respectu aloës addi potest vid. *Idea Formularum Class. 4. § 27.* Vel Decoctum Mercurii dulcis edulcoretur cum melle, quod pro tali Iniectione in usu esse solet: vid. SCULTETUS in *Armam. Chirurg. obser. 79.* Vel mixtura ejus *Paro. 2. Obser. 65.* ex succo plantaginis, melle rosato, aloë, &c.

R. Aqua calc. vivæ unc. jv.

Mercurii dulcis ʒss.

Sacch. Saturni ʒi.

M. S.

*Aqua purificans.*

Vel

R. Decoct. plantag. cum aqua calc. viv. par. unc. jv.

Aqua aloës drach. iij. ad unc. ʒ.

Mercurii dulcis ʒi.

Mellis rosat. drach. vj.

M. S.

*Mixtura ad iniectionem.*

Aut si altius processerit malum, Iniectiones aloeticæ cum modico Mercurii sublimati, aut etiam, ubi ferocius fuerit malum, cum Mercurio sublimato, erunt instituendæ.

Quod si intra glandem & præputium ulcuscula sint, curantur sequenti linimento:

R. Unguent. diapomph. drach. iij. ad ʒss.

Mercurii dulcis gr. xv. ad ʒi.

Aloës rosat. vel hepatis gr. xv.

Mell. rosat. q. f.

M. f. Linimentum pro ulcusculis in glande, item intra glandem ex præputio illinendis:

D. S.

*Unguentum mundificans.*

Vel si ulcus fuerit cancerosum, Iniectionibus jam dictis loco mellis rosati addatur unguenti Ægyptiaci q. f. pro diverso virulentæ gradu: sin verò cancer extra meatum urinarium conspiciatur, ut commodius applicare liceat medicamenta, solutione Mercurii sublimati in aqua appropriata facta contingatur, aut lintecola eadem imbuta probeque expressa superimponentur.

Quod si fissura præputii adfuerit cum alligali ejus tumore;

R. Unguent. diapomph. drach. iij.

Olei tartari. per deliq. ʒss. ad drach. ʒ.

Misceatur & illinatur: S.

*Unguentum sanans.*

Binos studiosos gonorrhœa virulentâ cum dolorosissima mictione, ichore purulento profluente, ex parvis ulcusculis in glande laborantes, curavi præmissis pilulis Mercurialibus purgantibus, cum s. q. olei destillati terebinthinæ paratis: jussi quotidie bis 12. ad 15. guttas balsami sulphu-



risterebinthinat capere; nam hujus usu abstergitur & corrigitur fermentum malignum, & cum urina evacuat, ac impeditur simul, quò minus cæteras corporis partes possit inficere. Item loco balsami sulphuris terebinthinat alio in casu contumaciori balsamus de capaiibe ad guttas v. bis in die usurpatus profuit. Interdum missa præscripsi ita:

*R. Bals. sulphuris terebinth. Zij.  
De capaiibe Zij.  
Misc.*

Dosis gr. xij. vel xv. bis in die.

Alius Studiosus ex coitu impuro gonorrhœæ affectus, hac suppressâ supervenit testiculi dextri tumor admodum dolens; quæ evanescente, cum exercitiis, & speciatim equitationi, indulgeret, recruduit tumor cum gravi dolore contundente, sursum ad lumbos ascendente, & testis affectus alterius magnitudinem bis æquabat. Ordinâtâ purgatione Mercuriali, pro tumore discutiendo sequens præscripti cataplasma:

*R. Far. fabar. Zijj.  
Sem. cumini. pulv. Zij.*

Coqu. in s. q. poscæ ad consistent. Cataplasmatiss; addendo simul

*Lithargyr. pulveris. Zij.  
Misc.*

Hoc calidè subindè poscâ irrigando applicuit seroto tumenti & rubenti in latere affecto, quo continuato primò dolor mitigatus, & hinc tumor nonnihil imminutus fuit.

Interne usurpavit balsamum sulphuris terebinthinatum ad guttas xij. bis in die.

Externè postmodum

*R. Bals. sulphuris Rul. ad extrà Zijj.  
Olei destillat. cumini. Zij.  
Unguenti diatrib. Zij.  
Misc.*

Quo aliquoties in die partem affectam illinebat, & maximam partem evanuerunt symptomata.

Sed cum resolutio tumore durities testis adhuc pertinaciter restaret, ordinavi sequens emplastrum:

*R. Gum. ammoniaci in aceto sol.  
Empl. de cicuta an. q. s.*

Malax cum q. s. olei destill. tartari, vel lign. guajaci.

Induc super alutam, applic. loco affecto, omni biduo vel triduo novum applicando.

Et sic hujus beneficio, quicquid supervenit, penitus discutiebatur. Mox in principio applicassem, sed metu inflammationis abstinui. Dubius eram, an etiam emplastrum de ranis cum Mercurio istis tumoribus commodè applicari posset, quod aliàs in tumoribus & bubonibus incipientibus optimum est, malaxatum cum oleo destillato succini; sed metuebam vim genitalem à Mercurio labefactam iri.

Quod si præputium insigniter tumore ferè inflammatorio cum phlegmâ afficiatur, convenit phlegma vitrioli inspissatum ferè cum linteis multiplicans applicare; vel aqua calis vivæ cum saccharo Saturni quovis modo applicari potest. Quod si insignis dolor ardens adest, canphora in oleo amygdalatum dulcium soluta egregia est.

Quod si Tumor præputii stans lentus plus minus serosus adsit cum hæmorrhœa:

*R. Aqua calc. viv. fßj.  
in qua ebulliant  
Flor. chamomill.  
Sambuci an. M. j.  
Fol. hyssopam. Mß.  
Sem. anisi.  
Fenic. an. Zij.  
Bacc. lauri Zij. ad drach. vj.*

Coletur, cum qua fomentetur pars affecta: S. Fomentum resolvens.

Quod si suspicio sit, longius progressum fuisse, & jam massam sanguineam nonnihil contraxisse inquinamenti, instigatur cura aliquoties sudorifera per decocta lignorum, omni matutino tempore ad aliquot uncias assumenda, expectando sudorem, idque ad aliquot dies noctesque continuando: quorum loco etiam in leviori malo essentia lignorum, tinctura coralliorum cum spiritu lignorum, &c. aliquandiu usurpari possunt.

Vel

*R. Herb. agrimon.  
Fumar. an. M. j.  
Raf. lign. sanct.  
Sassafr.  
Rad. sassaapar. an. drach. vj.  
Sem. coriandr. Zij.*

Incis. & contus. infund. in aqua simpl. per diem & noctem: manè coqu. ad tertiam, circa finem addendo

*Herb. cochlear. M. j.  
Passul. min. contus. Zij.*

Colatur fßij. addatur

*Syr. scelergrb. Forest. q. s.  
M. D. S.*

*Potio sanguinem purificans.  
Vel*

*R. Aqua card. bened.*

*Fumar. an. unc. iß.  
Essent. ligni guajaci drach. j.  
Theriac. drach. ß.*

*Campb. gr. vj.  
Syr. scelergrb. Forest. drach. vj.  
M. D. S.*

Mixtura sanguinem mundificans, cochleatim sumenda.

Præter dictam Gonorrhœam virorum malignam seu virulentam est adhuc

## II. FLUOR MULIEBRIS GALLICUS,

A contagio maligno Gallico oriundus, & exulcerationem cujusdam partis internæ, aut in vagina, aut in orificio uteri, aut prostaticis glandulis; quin etiam exulcerationem ipsorum testium muliebrium insequens: Nam testium muliebrium substantiam in tali gonorrhœa exulceratam PANAROLLUS in suis Observat. Penec. 1. observ. 14. in muliere, quæ ex Gonorrhœa Gallica cum gravibus doloribus mortua fuerat, observavit. Talia ulcera plorant acrem saniem plus minus purulentam ac lividam, cum insigni dolore ac molestia. Hæc ipsa Gonorrhœa maligna mignus fundenda est cum hac Gonorrhœa seu fluore albo, de quo infra lib. 4. Sect. 1. cap. 4. dicetur.

## DIAGNOSIS.

Patet hic affectus ex ægræ relatione, cui insuper in graviore malo jungitur scædæ faciei color, urina turbida, ciborum fastidium, lassitudo, dyspnœia, tumor oculorum & pedum, dolor lumborum, tabes, vaginæ uterina prolapsus, Ilpothymia, & si humor excretus acrior & putrilaginosus exiit, genitalia eroduntur & exulcerantur: vid. GRÆFIUS de Organ. Mulier. cap. 9. & BLAUSIUS lib. 5. Observat. Med. 2. 3. Tandem febris plus minus lenta accedit: vid. HIPPOCRATES lib. 5. Aphor. 56.

## PROGNOSIS.

Fluori albo Gallico si convulsio & animi deliquium accedat, malum est.

## CURA.

Gonorrhœa mulierum Galica originem & modum fieri eundem habet cum Gonorrhœa maligna virorum; cum eundem sit una eademque ratio, & quoad causas, & quoad curam: nempe dependet simpliciter à coitu cum mare lue venereæ correpto; unde etiam eadem ratione atque Gonorrhœa virorum Gallica, aut ipse morbus venereus, curanda venit: nempe inter è per remedia Mercurialia, pilulas Mercuriales, per decocta & essentias lignorum, per balsamica terebinthinata, oleum succini, cum ossè sepiæ, & antimonio diaphoretico, &c. breviteratâ verò curari nequit, nisi per modum curandi luem veneream, tam per sudorifera, quàm per salivationem Mercurialem.

Externè conducunt injectiones ex lignis cum aqua calis vivæ paratæ, addito aloë, melle, Mercurio doli: item decoctum Mercurii dulcis cum melle edulcoratum; vid. SCULTETUS Armam. Chirurg. P. 2. Observ. 65. & liquor ex stercore gallinæ, quem HARTMANNUS

Pr.



Pr. pag. 264. commendat: item unguenta Mercurialia ex superioribus nota, surundis iilita, intrudantur in vaginam uterinam, ut mundificetur ulcus jam factum.

### III. BUBONES.

Bubones sunt glandularum axillarum & inguinalium tumores, ex lymphâ intra dictas glandulas stagnante nati; qua tenus nempe vasa cubitalia & cruralia glandulas has transeunt, & in his ex sanguine serum segregatur; quod succo crudo viscido rurgidum, & à fermento venereo maligno corruptum, receptioni in vasa lymphatica planè inceptum redditur, unde stagnando tumorem producit: idque laudabili naturæ conatu; nam sic præservatur reliquum corpus à lue venerea, ut non ampliùs se exeat. Fermentum hoc & contagium, cujus solo contactu Lues Venerea contrahitur, in materia purulenta consistit, quatenus nempe aura ejus foetida vel ipsum alii in eodem lecto decumbenti communicatur. Ipsum tamen pus è bubone extractum eandem malignitatem non habet, ac ipsa aura aut sudor illinc prolektus, cum per illam concoctionem aut suppurationem miasma venereum malignum nimis subtractum sit. Unde de his dicit CARDILUCIUS in *Offic. Sanitas. pag. 836. Apparet verò crebriùs in sanguineis, aliquin varò vel nunquam nisi gravissimâ Lue Venereâ obnoxius, occultante scilicet eleganti habitu corporis hostem inquilinum, eumque ad inguina protrudente.*

Hinc quia bubonibus spontè suâ evanescentibus lymphæ & sanguinis refluentium vitio tota massa sanguinea, & hinc totum corpus inquinatur, naturæ eorum suppurationi & hinc apertioni pro elicienda virulentia opera danda: Conf. M. A. N. C. ann. 8. obs. 78. Propterea, incautionum Medicorum more, purgationibus vehementioribus aut repetitis, nec venæsectione, nec sudoriferis insistentium, & lymphâ hæc maligna intra corpus trahenda; quod hoc modo facillimè fieri, & arthritidi vagæ scorbuticæ ac phthisi occasionem dare potest: ut ut si bubo evanuerit suâ sponte, & ita metus subsit, ne universum corpus hinc inquinetur, sudorifera fortiora hinc necessaria sint, quorum ope aliquandò rediisse bubonem jam penitus extinctum observavi. Applicanda ergo sunt emplastra ex gummatibus & aromatibus omnihil acriora, & simul irritantia, seu, ut vulgò vocant, attrahentia, nisi canceri, vel aliud symptoma subsit, pro horum suppuratione juvanda: v.g. imponatur emplastrum veralis Vigonis cum Mercurio, malaxatum cum oleo destillato ligni guajaci.

Vel

R. Empl. dia-chyl. magn. seu cum gum. 3℔.

Malaxetur cum oleo tartari ifsa: (quod CARDILUCIUS l. c. tanquam discutiens præstantissimum commendat) aut ligni guajaci, aut philosophor.

D. S.

Emplastrum emolliens.

Vel

R. Pic. Burgund 3ij.

Sapon commun.

Bull. hyperic. ana 3j.

Gum. amm.

Sagap. cum aceto solut. an. 3℔.

Rad. pyretbr.

Sem. eruca an. 3iij.

Cera q. s.

M. f. Emplastrum n. malax. cum oleo tartari fact.

Quibus etiam magnes arsenicalis addi potest. de quo vid. SALA. in *Anat. Vir. Tr. 2. pag. 385. & 386.* nec non BARBETTE *Tr. de Peste. pag. 247.* Item Emplastrum descriptum à SENNERTO, ubi de Lue Venerea, pag. 214.: vel emplastrum Magneticum *Angeli Sala* secundum descriptionem HOFFMANNI. His ipsis, modò protuberare magis incipiat bubo, nonnihil emollire sufficit; non opus enim est perfectam, quæ ratò, aut nunquam fit, expectare suppurationem, sed tunc aperitur maturè apertione largâ, & tractetur ad modum reliquorum bubonum.

Quod si verò simul cancer aliaque symptomata concurrant, à suppurantibus abstinendum, purgantibus potiùs materia peccans evacuanda erit.

Si in bubonibus his simplicibus non procedat alteratio suppuratoria dictis remediis, aut pus bonè coctum,

Profundè nimis lateat, aperiatur lanceolâ profundius intrusâ, aut applicetur cauterium potentiale, ne ad interiora pergere queat venenum. Factum inde foramen diu apertum teneatur, ut saltem fonticuli instar esse queat. Sanè ZACUTUS LUSITANUS l. 2. *Prax. Admir. observ. 131.* fontanellis in inguine spontè apertis quandam à sevo morbo Gallico immunem evasisse asserit.

Aperito tumore vel spontè vel scalpello, suppuratio & mundificatio instituenda balsamo hyperici, mixto cum oleo destillato ligni guajaci, vel tartari, vel unguento de apio, cui additum sit parum de Mercurio præcipitato, vel arcano corallino, superimponatur emplastrum dia-chyloa, malaxatum cum oleo tartari rectificato, exterius, vel applicetur emplastrum Magneticum, quod ulcus apertum, coire non patitur, donec satis emundatum fuerit. Conf. BARBETTE in *Chirurgia*, DIEMERBROCK in *Tract. de Peste*, & NICOLAUS de BLENNY *Tr. de Lue Venerea Gallicè conscripto*. CARDILUCIUS l. c. bubonem aceto madef. & buboni impositum, quo intumescente alium applicandum, aut emplastrum de cicuta, cum oleo philosophor. vel saponis malaxata, commendat; tandem scalpello aperiendum, & saniem cum pure & cruore exprimenda, postea emplastrum opoteldoch applicandum, quod nunquam coalescere sinat ulcus, priusquam omnia fundamentaliter sanata fuerint. Quod si nihilominus suppuratio aut mundificatio tardè ac difficulter, aut planè non, quod sæpiùs accidit, suc edat, eadem emplastra continuanda; quin & cucurbitæ applicandæ, ut viscidissimum hoc serum, in glandulis hisce quasi congelatum, sensim sensimque tandem resolvatur. Internè usurpantur primò lignorum decocta, postea purgantia, in fine sal & spiritus viperarum, quæ curam bubonum absolunt. Quibus etiam irritis infectiois universi sanguinis periculum subest, adeoque cura generalis instituenda venit.

### IV. PUSTULÆ & TUBERCULA.

Pustulæ & Tubercula, præter Luis Venereæ curam universalem, foveantur & abluantur tubinde decocto lignorum, & oleo tartari illuantur: sed cum hæc ratò sufficiant, optimus est mercurius præcipitatus & dulcis, simpliciter cum butyro non salito mistus & illitus, loco cuius etiam ungue cum de Nicotiana, diapompholygos, item de Helenio, vel aliud appropriatum capiatur; aut unguentum pomatum, subactum cum paucis arcano corallino, præstans est: Vel oleo vitrioli, sulphuris, butyro antimonii, aut liquore mercurii saccharato tangantur pustulæ & tubercula quotidie, donec corrosæ decidant; in quem finem etiam mixtura composita ex aluminis rochæ & mercurii sublimati ana 3j. in aqua plantag. aut rosar. aut alius appropriatæ 3j. solutis, quam cum linteolis admovendam describit SENNERTUS de Lue Venerea pag. 216., ad hiberi potest. Melius est sequenti modo:

R. Aqua plantag. 3vj.

Mercurii sublimati 3iv.

Alum 3℔.

Dissoluta invicem

D. S.

Aqua purificans.

Liquore hoc cum penna intincta tangantur verrucæ; sic emarcescunt pedetentim decidunt. SYLVIVS *Tract. de Lue Venerea § 349* laudat spiritus & salia, cupri tincturâ imprægnata, quo pustulas foedas & planè malignas, reliquis frustillâ tentatis, præter spem sustulisse testatur. Hæc ipsa quoque in pustulis penis, ani, faciei, &c. proficua sunt. Spectat huc quoque lac virginis, cujus singulis uncis mercurii sublimati 3j. addendus; item liquor HARTMANNI, ac oleum viridis scris in *Pr. Chym. pag. 322. & 333.* descripta.

In specie in pustulis faciei:

R. Sperm. ranar. 3v.

Mercurii sublimati 3j.

Digeratur in vitro benè clauso, & ita cautè hoc ipso tangantur pustulæ.

D. S.

Mixtura mundificans.

Nec inconcinna est mixtura FORESTI lib. 32. observ. 6.

R. Al.



*R. Album Ovi no. 3.*

Agita, donec spumescat: adde

*Mercurii sublimati,*

*Campb. ana gr. jr.*

*M. f. unguentum;*

quo illinatur pustula.

## V. CONDYLOMATA.

Ad *condylomata* ani mercurius sublimatus in aqua plantaginis aut persicariae solutus cum pauco aluminis convenit. Imò si *condylomata* fuerint maiora, quæ non nisi longo temporis tractu per ejusmodi caustica tolli queunt, ligaturis potius, si radices angustiores habeant, aut ferro secante extirpentur: postquam verò hæmorrhagia sopita, reliquæ Mercurio sublimato absumantur, & ulcera Mercurio sublimato, aut arcæno corallino detergantur ac mundificentur.

## VI. VERRUCÆ.

*Verruca Gallica* si in extremitate oleo vitrioli tangantur, excidentur & decidunt: loco ejus etiam aqua fortis, aut solutio mercurii in aqua forti facta, s. q. aquæ simpl. diluta, adhiberi potest: item pulvis sabinæ inspersus eas absumit: vid. WEDELIUS *de Medic. Facul. pag. 62.*

## VII. ULCERA.

Quoad *ulcera* quarumvis partium, in horum cura semper primò ad cacoethem seu malignitatem veneream respiciendum, quæ non extincta perfecte nec mundificari, nec consolidari possunt: aut consolidata licet, semper recrudescunt; imò à relicto occulto eorum, non perfecte mundatorum, sed præmaturè consolidatorum fermento, Lues curata licet, denuò in universum corpus propagari potest: id quod notabili exemplo docet HILDANUS cum occulta ossis carie venerea *Cent. 5. Histor. 95.* Pro qua malignitate expugnanda primatum obtinet mercurius, tam sublimatus quam præcipitatus, & hic vel corrosivus, vel in specie dulcis, qui semper mundificantibus addi debet. Abluenda igitur sunt ulcera decoctis lignorum, hinc applicandum unguentum ex melle & vitello ovi cum Mercurio sublimato HARTMANNI in *Prax. Chym. 6. 28.* vel unguentum de ceross. malaxetur cum oleo Nicotianæ, & imprægnata cum Mercurio dolci usurpetur: vel unguenta cum Mercurio sublimato, quæ describit SENNERTUS *l. a. pag. 211.* Itali cum bono successu in quibusvis venereis ulceribus utuntur hoc unguento:

*R. Olei commun. ℥vj.*

*Ceruss. ℥j.*

*Minii cribrat. ℥ss.*

Coqu. lento aque ad unguenti mollioris consistentiam: post addunt

*Mercurii sublimati opt. vel Mercurii præcipitati seu Turbith. Minerv. ℥ss.*

*Cera alba ℥j.*

Miscet pro Unguento.

Vel unguentum Basilicum cum sufficiente quantitate Mercurii dulcis misceatur & applicetur, quod ulcera venerea maligna etiam quasi cancerosa curabit. Vid. DIGBY *Recept. P. 2. pag. 12.* Unguentum Ægyptiacum itidem subinde applicari potest, sed vitentur loca ossibus nudata; hæc enim nigrore illud inficere assent HARTMANNUS *l. a. § 28.* Huc pertinet aqua divina Fernelii:

*R. Aquæ plantag. 3vj.*

*Mercurii sublimat. gr. xij.*

Misc.

Quod si mundificata fuerint hæc ulcera, h. e. ubi pus laudabile suggerant, & labia undique rubra & naturaliter tincta, & pro natura partis ulceratæ constituta fuerint, Sarcoticis incarnanda & conglutinanda sunt: pro quo scopo vel Emplastrum HARTMANNI *l. a. § 29. 30. 31.* vel Emplastrum de Ilthargyrio, aut Emplastrum Norimbergense ZWELPERI, cum dimidio Emplastri diaphulphuris RULANDI misceri & applicari possunt.

Io specie *ulcera penis* si fuerint externa, abluuntur cum decocto scabiosæ, marrubii, saponariæ, ligni guajaci, plan-

taginis, &c. In quibus aliquantum sacchari Saturni & mercurii dulcis potest dissolvi; aut decocti calcis vivæ ℥j cum 3j. mercurii dulcis exhibeatur externe. Si sordida fuerint, unguentum Ægyptiacum, aut unguentum ex mercurio sublimato SENNERTII *l. a. pag. 212.* aut linimentum ex pulvere sabinæ, croco metallorum, & butyro recent. HORSTII *l. 4. obs. 54. pag. 257.* adhiberi potest. Pro consolidatione verò decoctum lignorum cum saccharo saturni cum linteis applicatum convenit. Si verò sint ulcera interna intra glandem quidem & præputium tumefactum & contractum, injectio ex iisdem fiat, & hinc cum filamentis carptis, unguento debito imbutis, cum sileo loco affuso auxilium applicandum.

Si ulcera sint in ipso membro, aut glandis molliorem substantiam occupant, aut meatum urinarum affligunt, utroque in loco difficilis perquam sunt consolidationis: sed in specie ex posteriore periculum est, ne succrescat caruncula, quæ meatum oppleat. Injections cum prædictis similes fiant, aut candela cerea, unguento supra citato illinenda, meatui immittenda est. Si enim postmodum ex meatu extrahatur candela, facile lues, ubi sit in membro exulceratio, ex puris in candela vestigio, observari poterit.

Quod si in utero, nempe in vagina ejus sint ulcera talia, inciantur decocta lignorum, aut aqua calcis vivæ cum plantis vulnerariis ebullita & injecta, in quibus parum aluminis solutum sit; hinc cum digito aut pefso immittantur unguenta aut emplastra appropriata, linteo inducta, & ita relinquantur: v. g. præter illa, quæ supra in genere allegata fuerunt,

*R. Unguenti albi campbor. 3℥.*

*Mercur. dulc. drach. j.*

*M. D. S.*

*Unguentum purificans.*

Oris ulcera præ aliis curatu difficilia sunt, quia ex continuo salivæ affluxu copiosas sordes generant, & loca glandulosa afficiunt, in quibus etiam ordinariò ulcera sunt graviora. Curantur per gargarisationem ex decocto sarsaparillæ, corticis guajaci, foliorum plantaginis, scabiosæ, rosarum rubrarum, veronicæ, &c. cum melle solato & pauco aluminis: v. g.

*R. Herb. plantag.*

*Prunell.*

*Scabios. ana M. j.*

*Flor. rosar. rub. p. ij.*

*Rad. sarsap. 3j.*

*Ligni guajaci,*

*Santal. rubri ana drach. vj.*

*Sem. sumach. 3℥ss.*

Coqu. in s. q. Aquæ bordei:

*Colaturæ ℥iiss. adde*

*Syr. de ros. siccis,*

*Dia-mor. ana 3℥ss. vel 3ij.*

*M. D. S.*

*Gargarisma purificans.*

Hoc decoctum, si ulcus ponit palatum, aut in superiore ejus parte exillat, per nares iniciatur; ita tamen, ut æger pro tussu & vomitu vitando os aqua repletum teneat.

Imprimis, si ulcera sordidiora, convenit illis viride æris; unde v. g. unguentum Ægyptiacum cum melle rosato applicatum confert; vel hoc HORSTII *lib. 2. obs. 4.*

*R. Mell. rosar. 3ij.*

*Rob. diamor.*

*Nuc. ana unc. j.*

*Unguent. Ægypt. drach. iij.*

Misceantur.

Vel aquæ virides sic dictæ, quales e. g. describit HARTMANNUS *l. a. cap. 52. §. 4. 5.* cum penicillo subinde applicatæ conferunt: item mel rosatum cum soluto vitrioli acidulatum applicari potest: videatur RIVERIUS *Cent. 1. Observ. 95.* Aut solutione mercurii sublimati & aluminis, aut solutione illa solari, quam SENNERTUS commendat, contingantur: Aut

*R. Sali ammoniaci*

*Spiritus vitrioli an. unc. 3.*

*Aquæ Regiæ unc. i 3.*

Misceantur.

Quo ipso ulcus venereum ingens in palato juxta uvulam contactum, successivè curatum fuit.

Quidam butyrum antimonii cum gossypio ulceri applicant.

Caven-



8 Cavendum tamen, ne causticorum horum aliqui de-  
utiatur.

Narium ulcera per similia curantur, sub forma pulve-  
verum aut Injectionum; quæ tamen, quia mucum ex-  
siccatur, aut simul crustam junctam habeat, in principio  
emollientibus sunt tractanda: c. g.

R. Hord. mund. M. j.  
Rad. alb. drach. vj. vel unc. j.  
Liquirit. unc. ss.  
Sem. cydon. drach. ij.  
Coqu. in f. q. Aqua simpl.  
Colaturæ ss. j. adde  
Olei amygd. dulc. unc. ss.  
M. pro Injectione.  
D. S.  
Iniectione emolliente.

Hinc crusta remota inieciatur sequens:

R. Rad. farsap. unc. i ss.  
Infund. per noctem in aqua plantag. vel aqua ferrat., mane  
coquatur; in fine coctionis adde  
Herb. agrimon.  
Salvia,  
Plantag. ana M. j.  
Flor. rosar. v. lxx.  
Baiaust. ana p. ij.  
Colaturæ ss. j. adde  
Aqua crad. drach. i ss.  
M. S.  
Aqua mundificans inicienda.  
Aut

R. Succ. beton.  
Scroph. maj.  
Pimpinell.  
Plantag. ana unc. jv.  
Mell. rosar. unc. jv.  
Coqu. ad consistent. Linimenti, col adde  
Aqua calcais vivæ part. jv.  
Misc. & iniciatur.

Omnia hæc ulcera hæcenus enarrata sponte consanef-  
cunt, sicuti alia quælibet symptomata venerea sub litu  
Mercuriali per salivationem: Nec metuenda hæc ipsa in  
oris ulceribus; nam & hujus ope ea ipsa citius sanantur:  
Conf. ZACUTUS LUSITANUS lib. 1. Prax.  
Admir. Observ. 72.

## VIII. FISSURÆ MANUUM ac PEDUM.

Fissura seu Rhagades manuum ac pedum abluantur decocto  
calcais vivæ, cum Mercurio dulci imprægnato, præprimis si  
simul aliquid ligni guajaci, ejusque corticis, radicis chinæ,  
farsapatillæ, herba scabiosæ, &c. decoquatur. Si cal-  
lositas aliqua simul subsit, emollientia, v. g. radix al-  
thææ, malvæ, cucumeris agrestis, &c. addantur. Post  
quorum usum applicetur iisdem unguentum enolatum  
cum mercurii sublimati paucis; vel butyrum, pinguedo  
porcina, asserina, gallinacea, &c. cum oleo tartari per de-  
liq. aut arcano corallino, aut cremore calcis vivæ, &c. pro-  
dest; vel denique unguentum diapompholygos cum paucis  
mercurii præcipitati, item unguentum Renovativum  
W EDELII; vid. Tract. de Comp. Medicam. pag. 187.

Vel  
R. Unguent. enulat. 3i ss.  
Mercurii dul. 3j.  
Olei tartari per deliq. 3ij.  
M. D. S.  
Unguentum purificans.

## IX. CARIES OSSIUM.

Caries ossium difficillima est curatu, cujus ratio ex SYL-  
VIO de Lue Venerea §. 364. petatur, sine cuius tamen  
remotione impossibile est vel curare tuem, vel consolidare  
ulcera sine recidivæ continuo superventu. In cura hujus,  
quidquid ossis cariosum ac corruptum fuerit, maturè re-  
movendum, nisi vicinam quoque partem successivè infici  
velimus: Ergo ossi carioso nudato applicandum oleum  
destillatum ligni guajaci cum oleo destillato caryophyllo-  
rum vel inspergatur tutia præparata, pulvis cerussæ,  
lithargyrii, radicis ireos Florentinæ, pulvis euphorbii, &c.

quibus potentiora observantur salia fixa & volatilia, item  
aqua divina Pernelli: sed omnium optimum est vel terra-  
mento debito radere cariem ossis, si levior fuerit, eamque  
ita remove; vel si profundior fuerit, terramento ignito  
aut hinc inde perforare, aut totum os cariosum probe ure-  
re, & hinc spiritum vini largiter irrorare, ut ita promove-  
atur separatio mortui seu cariosi à vivo. Quod si hoc modo  
fieri nequeat, malum ceu immedicabile existimandum, &  
quod ægrum vel ad mortem usque comitabitur.

Quia verò, inter reliqua, pulvis ossa frequenter carie  
eroduntur, necessarium erit, aut locum laminâ argenteâ,  
vel ex auro confectâ, tegere, aut oleus passâ quadam, quæ  
in laminas redigatur parti affectæ recenter applicari debet,  
consolidare: v. g.

R. Mastice 3j.  
Olibani,  
Sandarac.  
Sangu. Dracon.  
Myrrh. el.  
Raf. ligni guaj.  
Succini,  
Rad. ireos Florent.  
Cornu Cerui ass. præp. ana 3j.

Ex subtilissimè pulverisatis, cum f. q. mucilag. Tragacanthæ  
in mortario calido f. Pasta in lamellas redigendâ, &  
ad formam ulceris extendendâ.

Huic, si caries nondum planè extincta, appropriata  
admirari possunt: v. g.

R. Pasta jam præfer. 3j.  
Pulv. rad. aristol. rot. 3j.  
Gentianæ rubræ,  
Euphorb. ana 3 ss.  
Caryoph. 3j.

Com paucis terribinthis misc. pro uso jam dicto.

Sin verò ulcus planè non occludere liceat, laminâ, ex  
lunâ vel sole confectâ, & spongiolis instructâ, illud obtu-  
retur.

## X. DOLORES.

Dolorum cura primaria consistit in ipsius luis remotione  
universalis: Interim pro his in specie interne farsapatillæ  
decoctum laudari solet; papaverinis vespertino tempore  
ante dolorum recrudescentiam non omittis. Extremè op-  
tima sunt primò quidem Pomenta ex ligno guajaci, junit-  
peri & hujus bacis, radice farsapatillæ, foliis pulgii,  
salviæ, rosmarini cum perlicaria; hinc Inunctiones cum  
oleo scorpionum, viperarum, præsertim lumbricorum,  
& ranarum viridium cum pinguedine humana: hinc The-  
riaca, vel sola, vel cum addito oleo guajacino, prodest  
ad dolores tibarum, utilitate AMATO LUSITANO  
C. 3. Curat. 72. Aut recipiatur spiritus vini seu spiritus lum-  
bricorum, in quo aliquid croci & opii dissolutum, & cum  
linteis applicetur.

Item  
R. Pingued. bum. 3ij.  
Olei scorpion. 3j.  
Petra albi,  
Spica ana 3i ss. vel 3ij.  
Destillat. ligni guajac. 3j.  
Rosimar.  
Salv. ana 3 ss.  
Opium cum vino sol. 3j.  
M. D. S.  
Unguentum lenius.

Sed raram est, quod his remediis cedat dolor, nisi eorâ  
universalis perfecta jam præcesserit, & saltem vestigia  
quædam llesionis à malignitate venerea relicta adhuc cos-  
dem foveant in partibus, quæ his & similibus remediis  
posita. Non enim novum est, quod perfectè curatâ lue, &  
omnibus serè remotis symptomatis, nihilominus tam en  
quædam adhuc eorum supersint, pro quibus tamen remo-  
vendi non itatim novacura repetenda: Conferatur RI-  
VERIUS Observ. 10. communicata à POMARET.  
Speciatim ergo unguenta & emplastrâ Mercurialia appro-  
priata pro his doloribus sunt remedia: hinc cerotum de ra-  
nis Vigonis cum Mercurio conveit, imprimitis ad cephal-  
giam; item nervinum cum illo Vigonis mistum: c. g.  
R. Empl.



**R. Empl. de ranis cum quadruplo mercurii ʒij.**

*Olei express. nuc. moscb.*

*Opi cum acet. sol. ana ʒij.*

*Succi Nycot. inspiss.*

*Cinnab. vulg. ana ʒj.*

*Croci ʒvj.*

Cum f. q. terebinthina misc. in emplastrum.

D. S.

*Emplastrum leniens.*

**R. Emplastr. de ranis cum mercurio ʒj.**

*Polychresti Ludov. ʒij.*

*Malax. cum q. f. olei destillas. ligni sancti.*

D. S.

*Emplastrum resolvens.*

Vel

**R. Unguent. aur. officin. unc. i ʒ.**

*Extracti vel succi inspiss. Nycotian. unc. j.*

*Mercurii sublimati ʒij.*

f. Mixtura.

Applicetur parti dolenti.

Quod si dolor evanuerit, sed aliqualis tumor superfit, recipiatur Butyrum insuflum, liquefeat cum vino, & blandè ebulliat ad vini absorptionem; in hoc madescant lintea, & imponantur, discutiet brevi tumorem.

Emplastro huic, si in capite usurpandum sit, addendum venit Balsamum Peruvianum.

## XI GUMMATA seu TOPHI.

*Gummata ʒ. Tophi*, qui sunt tumores duri, taquæ rentes, in osseum medio enati, & iis immediatè incumbentes, duplicis observantur gradus: vel recentiores sunt, ossa superficiei tenus afficientes, adeoque tractabiliores; vel inveterati, adeoque magis coagulati, & parti, cui insident, incamerati suntque vel indolentes, vel subinde miserè dolentes, qui dolor secundum membranarum, periostiorum, nempe, ductum subinde longius diffunditur, ac totam partem occupat, noctu imprimis molestissimus ferè intolerabilis ostocopus, ac finalitè ossa contundantur; unde tandem partes molles subjacentes & ossa subiecta eroduntur & cariosa redduntur.

Ex acido maligno venereo originem ducent, quod aggreditur partes nerveas, in specie ossa, in quibus se firmius implantat, eorum alimentum corrumpit, quod corruptum acore inquinatur, successivè in medio osseum coarctatur, & porro coagulando in ista gummata induratur, donec acidum vicina loca erodendo ulcera pessima excitet.

Recentes, aut saltem minùs inveterati si fuerint, adeoque nondum ossa & partes molles infecerint, profunt sudorifera ex lignis aliisque huius venereæ appropriata; In graviore salivatio Mercurialis; quibus etiam temper viperina & antimonialia fixa remedia sunt intermiscenda.

Præter interna, gummatis emollientibus & resolutivis potentioribus, speciatim tamen Mercurialibus additis, curandi veniunt: emplastrum diachylum simplex, item cum gummatis, & emplastrum diaphoreticum Mynsichtii, in specie oleo destillato ligni guajaci malaxata; quod oleum cariem conservat & curat: quibus tamen semper Mercurius cum terebinthina subacta mistus fuerit, tanquam specificum alexipharmacum: item sæpiùs allegatum emplastrum Vigonis de ranis cum mercurii duplicata, triplicata vel quadruplicata huius dosi, ex PLATERI Observationibus pag. 728., cum oleo guajaci malaxatum; vel emplastrum SENNERTI de Lue Venerea pag. 215; aut poterit Mercurius præcipitatus cum axungia saltem porcina & cera in cerotum redigi: quibus addere convenit gummata aromatica emollientia & resolutiva communiter dicta. Quidam ceu cerotum summe probatum ad tophos venereos dissolvendos commendant:

**R. Gum. ammoniaci cum aceto destillat. acerr. sol. ʒij.**

*Pulv. rad. bryon.*

*Aib. ana unc. ij.*

*Turpetibi min. unc. i ʒ.*

*Cera alba unc. ij.*

*Dusprez. q. ʒ.*

Fiat Cerotum.

Interdum in summa dolorum vehementia Theriaca admitti potest.

Alia sequenti feliciter utuntur:

**R. Emplastr. diachylum cum gummi.**

*Olei olivar. ana ʒij.*

*Cera nova ʒj.*

*Piperis nigri ʒij.*

*Salis commun. ʒij.*

*Cantharid. ʒj.*

*Sem. sinapi ʒj.*

*Mell. insp. ʒij.*

Pulverisanda pulveriscentur, hinc liquefacta cera cum emplastro diachylum in oleo, & ubi medium refrigerint, reliqua extractè incorporantur.

Ufus tempore tumori applicetur sinton subtilissimus, supra quem cerotum applicetur, benè ligetur, quorum quotidie bis mutetur sinton, qui semper erit humidus, & ita paucio tempore extrahetur tumor sine cutis vel carnis læsione.

Ashiberi etiam potest unguentum HARTMANNI ex ungu. aur. officin. part. ij. cum mercurii sublimati part. j., in Praxi Chymica §. 21. & WIESEMANNI de Lue Venerea pag. 20., utpote quod per aliquot dies nocteque linteo inductum, ac parti affectæ, quam priùs vino rubro lavare decet, applicatum, tophos tollit. Quod si autem tumores ac dolores ab usu huius medicaminis cessaverint, pars affecta butyro non salito, & in vino rubro loto aliquandiu foveatur pro reliquiis absorbendis: vel fiat emplastrum cum mercurio vivo & opio, ad imitationem BARBETTE Anat. Pract. P. 1. cap. 3.: vel miscendum est oleum terebinthina cum oleo destillato guajaci, cui addendum est opii q. f. pro doloribus nonnihil leniendis, unà cum Mercurio vivo, & instar linimenti illineodum gummatis dolorosis. Optime enim convenit in tumoribus sanguineis opium, dolorem sistit, & simul resolvit. Vel recipiatur emplastrum de hyoscyamo Ludovici, misceatur cum mercurio, pinguedine subactò. Item emplastrum, quod Patavii in usu est, cuius descriptionem videb. in Collegio Pharmaceut. in Ludovici Pharmaciam. Lamina quoque saturni cum mercurio illata applicetur, si ciclicet adhuc sunt in principio; vel etiam Mercurius à Saturni fumo coagulatus extendatur in bracteam, & ita applicetur; qualis mercurius saturninus præter tophos etiam ad ulcera cancrofa aliaque similia adhiberi potest.

**R. Saturni ʒj.**

Dissolve in cratèro, & liquefactum ab igne remove, & subito palum ferreum in medium saturni immitte, donec incipiat concreescere saturnus: hinc in ferri vestigium immitte.

*Mercurii vivi ʒj.*

Vnde congelascere videbis: Congelatum cultello separa, & ex oleo communi ad ignem eoque, donec oleum conflagravit, idque iterum repete, & mercurius reddetur malleo sequax: Duc in laminas, plagæ vel topho imponendas.

Ad ʒj. mercurii requiritur ʒj. olei.

Foras quoque hic non inutile erit emplastrum Saturninum Clossai, quod describit SCHROEDERUS in Pharm. lib. 2. cap. 53. ubi de emplastris no. 12 pag. 198., & emplastrum ad tophos & gummata venerea Clossai no. 19. pag. 201., in quo, loco cinnabaris Mercurius vivus admiscendus.

Si his non cedant Exosofes, hæ velicatorio admoto tractari, & illud aliquoties repeti poterit, ad imitationem RIVELLI Cent. 4. Observ. 22. 49. 29. Sed in casu posteriore, si inveterati magis sint tophi illi, & viscidiores ex coagulo concentrati, adeoque ipsa ossa profundius, plus minus tamen, infecerint, necesse est, aperiatur tumor, tum per caustica potentia, tum actualia immisericorditer premendo ignem, ut loquitur ZACUTUS LUSITANUS lib. 2. Prax. Admir. observ. 130.: Aperti quavis modo diu aperti servandi sunt, ut ichori maligno & exitus fiat, & os subiectum pateat, quò huic in tempore mederi queamus: Conf. BOTALLUS de Lue Venerea cap. 25. item FALLOPIUS de Lue Venerea pag. 95. Sed summa habenda est ratio musculorum atque tendinum incuribus, ne hi lædantur. Quod si verò huic modis tractari nequeant, sed, p. æmissa licet curâ universalis, etiam salivatoriâ, obstinatè persistant, præsertim dolorosi,

Fonti-



Fonticuli in regione his superiori excitandi sunt; his enim libere fluentibus hoc habetur commodi, quod dolor mitior nonnihil fiat, & ipsi nodi sensim tractabiliores fiant, ita ut post aliquod tempus vel emplastro diachyli simplici plus minus cedant & evanescant.

Internè, præter generalem curam, radix sarsaparillæ in specie laudatur ejusque decoctum pro absumendis hujusmodi topiis.

## XII. ATROPHIA.

*Tabes & Atrophia* Luis Venereæ superveniens præter universalem curam, aut si hæc locum minus habeat, levatur imprimis decocto radicis chinæ cum passulis, vel decocto sarsaparillæ a SEPTALIO incautionibus Medicis adeò laudato, & quod etiam laudatur a SENNERTO lib. 6. *Præf. ubi de Luis Venereæ* pag. 218.

## XIII. SCABIES, SERPIGINES, LICHENES.

*Scabies, Serpignes & Lichenes Galli* removenitur cum unguita porcina, cum oleo tartari per deliqu. in unguenti consistentiam redacta. Quod si debilius fuerit, oleum vitrioli addatur.

Vel

R. *Aqua persicar. aut plantag. f3ss.*  
in quibus solve

*Mercurii sublimati 3 iij. ad 3ss.*

D. S.

*Aqua mundificans.*

Hoc ipso liquore subinde bandæ cum pluma illinantur dicta mala. Valet etiam mariscas; item condylomata in locis obscuris.

## XIV. AURIUM TINNITUS.

*Aurium Tinnitus Symptoma pertinacissimum est; ejus tamen remedia observanda sequentia:*

R. *Ligni jassajr.*

*F. or laudæ ana 3j.*

*Cort. lign. sanct.*

*Castor. ana 3ss.*

*Caryophyll. 3j.*

*Spiritus vini, vel vini & tartari 3 iij. vel 3 ij.*

Digere per dies aliquot, & essentia filtrata tepide cum bombace indatur:

D. S.

*Essentia ad aures.*

Eundem in finem SEPTALIUS commendat urinam asini, in qua per noctem aliquid ligni guajaci, castorii, & menthastræ infusum.

## XV. CEPHALALGIA.

Dolor tandem capitis hisdem mitigari solet, quæ superius de doloribus artuum dicta; potissimum tamen laudatur emplastrum de ranis cum Mercurio Vigonis; aut quod PLATERUS *Observat. pag. 723.* describit, potissimum si aliquid castori & opii ipsis addatur, vel laudanum opiatum simul cum aliis appropriatis internè propinetur. Hinc in casibus pertinacioribus trepanationem adhibere convenit, ut exemplo comprobatur AMATUS LUSITANUS c. 1. *Curat. 4.* & FORESTUS lib. 32. *observ. 23. in Schol.* si scilicet virulentiam veneream maximam partem extinctam esse ex aliorum symptomatum cessatione constet.

Hæc igitur de Luis Venereæ, ejusque symptomatibus curandis sufficiunt.

Cæterum jam supra dictum, quod datur etiam Cachexia scorbutica & hypochondriaca, unde non inconveniens esse duxi, ut huic Cachexiarum tractationi etiam affectus hos duos complicatissimos annectamus, & insimul symptomatum horum curationem absolvamus. Pergo propterea ad

## ARTICULUM VI.

## DE

## MALO HYPOCHONDRIACO,

et ejus summo gradu

## SCORBUTO.

**M**alum hypochondriacum atque sit Cachexia communissima in nostris Regionibus propter multorum diversorum ac diversimodè complicatorum symptomatum syndromen, proprio tamen nomine caret, adeoque mali hypochondriaci nomine innuitur affectus, ratione multorum symptomatum diversimodè complicatus, & cruditate acida plus minus viscida in primis visceribus; cujus superior & quasi eminentior gradus vocari solet. *Scorbutus*. Quoniam verò symptomata frequentissima, quibus hoc malum vexare solet ægros, in specie partim circa regionem hypochondriorum utramque & in regione hypochondriaca imprimis percipiuntur, partim quod causa in hypochondriis videatur stabulari, propterea in specie isto nomine appellatur: ab aliis *malum flagulantum*; sicut Chy-nicis causam morificam nonnihil respicientibus *simul tartarus hypochondriorum* vocari solet. Germanis u plurimum *lienis gravamen* dicitur, interdum etiam *opisthotonus*, ut et sæpissime lien innoctius deprehendatur; viscerum verò mesaraicorum obstructio causæ siletem palliativa sit. Perfectior gradus, ut dixi, & consequens affectus hypochondriaci, scorbuti nomine venit, appellatione; originaliter Germanicâ inferioris Saxonie; quæ tamen in forum Medicum translata, & ita retenta fuit & ob id imprimis hæc vox scorbuti est recepta, quia adhuc multi admodum Auctores inter se deglaniant, an morbus hic etiam veteribus fuerit cognitus? Ratio dubitandi est, quod videatur novus morbus, sicut & malum hypochondriacum. Nihilominus tamen multi cum ibi HIPPOCRATE lib. de affect. intern. sub nomine *lienis magni* exactè descriptum esse asserunt; Alii *omachacem* scelerotyrbem PLINII cum existimant, quæ affectus PLINII ætate in exercitu Imperatoris Germanicæ plurimum grassatus fuerit. Sed his hæc est admodum inanis, cum parum referat, an veteribus fuerit cognitus scorbutus, an secus? At tamen tamen, eundem omnino isdem fuisse admodum cognitum, ut non adeo clarè, quin locis septentrionalibus quasi proprius videatur, nec adeo atque cibis stipatus fuerit symptomatibus. Nam sicut crescentibus delictis crescent poenæ; sic etiam crescentibus luxuriæ & diæteticonibus quod id, mirum, atrocioris furoris etiam nos aggredi morbus, veteribus non adeo graves, ita ut nec eorum descriptiones tanquam nonnihil minores exactè cum nostris conveniant. HIPPOCRATES clima subtilius habuit, propterea scorbutum non tam exactè cognovit.

## PARS AFFECTA

## MALI HYPOCHONDRIACI.

Malum ergo hypochondriacum & ejus non degener filius scorbutus, cum ex varia ista symptomatum complicatione, ut dixi supra, adeoque mirabilis & variabilis sit affectus, ita ut tantum non omnes actiones diversimodè pro subjectorum varietate lædantur; propterea factum est, ut tot diversæ sententiæ & litigationes de Loco & Causa in malo hypochondriaco primario affectu, seu de radicali foco ipsius morbi, exortæ fuerint. Hinc alii nullam determinatam partem in malo hypochondriaco affici, sed vagum esse, existimant; quod tamen non est: alii vasa mesaraica obstructa primarium esse focum: alii intemperiem liccam & calidam *stomachi*: alii intemperiem intellinorum calidam & siccam: alii lienem vitiatum, ejusque aut intemperiem aut obstructionem esse nidum hypochondriaci mali, & hinc dependentis scorbuti, asserunt. Præ cæteris phantasie mirè indulgent ii, qui spatium istud vacuum inter stomachum & diaphragma, hepar & splenem, pectus refertum pro sede primaria mali hypochondriaci aut saltem pro nido, sub tot stabulantur fluctuatione, existimant. Hos inter fuit imprimis HENRICUS LEVI.



LEVINUS FISCHERUS, qui edidit peculiar-  
rem *Tractatum de Loco & Foco mali hypochondriaci*: Nam  
permotus *Aphorismo HIPPOCRATIS* 54. S. 7. sta-  
tuit foream seu *cavitatem* istam juxta stomachum sub dia-  
phragmate inter stomachum & inter lienem esse focum,  
quæ cavitatis multis adimpleatur subinde sceditibus, sive  
promanent ab hepate sive à liene, sive ab alio abdo-  
minis viscere: Unde etiam in isto loco imprimis sym-  
ptomata à flatulentis orta, item rugitus & murmura  
ac similia soleant percipi. Hinc etiam ex ejusdem  
hypothesi asserta veram mali hypochondriaci curam  
in diureticorum legitimo usu consistere ait. Verùm  
consideratis vel obiter variis mali hypochondriaci sym-  
ptomatibus, sponte sua hæc opinio vacillare & cor-  
rui videtur. Quomodo enim tam pertinaciter istæ  
sordes in eodem cavo hære, totum corpus afficere,  
& diversimode excruciare valeant? vid. etiam SÉN-  
NERTUS lib. 3. *Prax. de malo hypoch.* pag. 318. &  
320., qui etiam huc inclinat. Sed miror in re adeo  
clara tam varios esse auctores! Rælo, quod tam in  
varias sententias delapsi sint, videtur, quod non  
observent differentiam inter partem affectam ratione  
causæ radicalis, & partem affectam ratione sympto-  
matum: Nam qui unquam malum hypochondriacum,  
vel incipiens vel confirmatum, examinaverit, ejusdem  
nexum symptomatum consideraverit; aut qui ali-  
quando curationi cujusdam hypochondriaci præstiterit,  
tantum non manu palpare potest, radicem morbi veram  
& unicam hære semper in stomacho, & quidem in vi-  
tio ejusdem fermenti, non rite scilicet digerentis ali-  
menta; Unde, ex læsa digestionem & inde nata  
cruditate acido-pituitosa & Chylus, & Massa Sangu-  
inea, & lymphæ, & speciatim bilis, & consequen-  
ter reliqui etiam corporis machinam regentes humo-  
res, cum spiritibus vitiantur plus minus & deprav-  
antur, & sic demum totum illud, quod malum  
hypochondriacum vocamus, oritur. Quam ipsam de  
foco hujus mali sententiam primariò defendit acriter  
GALENUS lib. 3. *de loc. affect.* cap. 7. ex DIO-  
CLE, HOECHSTEDTERUS in tota Decade  
5. *observationum*, in specie observat. 1. & 2., & SYL-  
VIUS lib. 4. *Prax. Append. Tr.* 7. Id quod etiam  
Highmorus in *Tr. de malo hypochondriaco* & *Passione hy-*  
*stérica* similiter statuit, quod etiam primariò afficiat-  
ur stomachus, ut ut aliis principiis suam opinionem  
superstruat; Uti etiam LINDANUS *super Hart-*  
*mannum*, qui disertis verbis dicit: *Primariò peccat*  
*ventriculi cruditas acida, à qua originem suam habet*  
*& malum hypochondriacum, & huic superveniens me-*  
*lancholia hypochondriaca, quæ passiones nunquam ori-*  
*untur, quin præcesserit prius talis stomachi cruditas.*  
Id quod similiter de scorbutico verum est, qui ta-  
men præter radicem istam primariò suam noxam in  
sanguine & specialiter in lymphæ vitiata explicat.  
Rancescit nempe quasi acidum in corpore, ut in  
vino; unde sæpe vermiculi in maculis scorbuticis, ut  
vult L. A. N. G. I. U. S. & HAUPTMANNUS,  
reperiuntur.

Sed hæc ut pateant clariùs, saltem consideremus sym-  
ptomata, quorum nunc plurium, nunc pauciorum syn-  
drome malum hoc constituit. Symptomata hæc ut ut vari-  
ent & sæpe infinita sint, & quibus ceu signis ejusdem præ-  
sentia dignoscitur, sunt sequentia. In omnibus hypo-  
chondriacis primariò male se habet stomachus, *Aperstia*  
subinde laborant, ut ut frequentius in morbi progressu,  
non semper, a vide tales ægri appetant & comedant, in-  
terdum nimia & canina quasi appetentia laborent: Tales  
aliquot horis post comestionem subinde dolores stomachi  
compressivos gravissimos convulsivos percipiunt. Hy-  
pochondriaci ergo & nimio acido laborantes semper instan-  
te & adhuc urgente appetitu prandium debent finire: Ger-  
mani dicunt: *Wennes am besten selbmeß Ket, soll mau aufhörd iße.*  
*Apetunt acida*, quæ tamen assumpta insigniter eos lædunt:  
stomachi, tam vacui quàm repleti, frequentes inflatio-  
nes adsunt: tam sub jejuniò, quàm præsertim ab omni  
pattu frequenter *crustare* solent: *Rutius*, qui erumpunt,  
dum sunt jejuni, sunt *acidi*; dum verò saturati, nunc  
sunt *acidi*, qui meliores, nunc *insipidi*, qui deteriores:  
Hinc abdomen sæpe post assumpta alimenta inflatur & ab  
his flatibus præter vagam intumesceniam abdominis, mur-  
mura, borborygmi & varia agitationes frequentissimè

sentiantur in eodem, & in omnibus his copiosissimis nec  
unquam deficiens flatuum adesset proventus, quorum acti-  
vitas in specie hypochondria, præsertim finitum, affli-  
git; ibi enim facile compressione manus subsultuum sen-  
sus & *fluctuationes* crebrius recurrentes, & *murmurationes*  
percipiuntur, ex flatibus in colo, ibidem locorum partim  
angustato, partim incurvato conclusis; ubi ex situ coli si-  
mul dolorificæ lincinationes, distensiones & punctiones  
admodum molestæ, lieni equidem vulgò, sed falsò adscri-  
ptæ, persæpe sentiuntur, quibusdam & *fluctuationes* in cavo  
abdominis, in mesenterio & similibus locis se conjungunt.  
Accedit ut plurimum *alvi* pertinax obstructio, ita ut inter  
100. hypochondriacos vix duobus aut tribus alvus quotidie  
respondeat; quin intra quadriduum aut triduum aut bi-  
dium demissæ aut stimulo quodam irritata alvus; aut sponte,  
interdum suum officium facit, in quo ipso tandem dura,  
paucæ, eaque interrupta, *globulorum formæ*, nigra subin-  
de & non absque insigni conatu, interdum etiam non  
absque dolore, excernuntur. Et quidem hypochondriaci  
in hoc malo fortioribus purgantibus parum aut nihil evacua-  
re solent, cum è contra blandiora laxantia, emollientia,  
passulata, prunata, & similia tales solent satis copiose, re-  
spectivè tamen, evacuare; si verò fortius porgerentur, sem-  
per læduntur. Sin forsitan talibus ægris vomitus contingat,  
qui non sunt rari, vel sponte vel arte, rejiciuntur ut  
plurimum aut aquosa, aut sæpissime plus minus viscida  
pituitosa, sed semper plus minus *acida*; ita ut etiam den-  
tibus subinde stuporem inferant & vasa orichalcea in æru-  
ginem corrodant, nisi interdum sub fortiore conatu aliquid  
de bile ex folliculo felleo se admisceat, ut excreta porracea  
& æruginosa compareant, & aliqualem amarorem gu-  
stui representent. Interdum etiam *cardialgie* & *ventriculi*  
adsunt dolores quidam, qui frequentissimè ad regionem  
spinæ dorsi usque se extendunt juxta situm gulæ, ubi nempe  
est orificium stomachi sinistrum, & ignaris subinde pro  
nephriticis doloribus imponunt: Et sæpius hi ipsi post ci-  
bos ingestos se exerunt, idque pertinaciter subinde, ut et-  
iam vix nisi post ingestorum vomitum remittant; inter-  
dum enim conqueruntur: *premi circa præcordia*; malum sci-  
licet hoc semper esse ex stomacho. Observavi quosdam  
ægros in hoc affectu de dolore compressivo in loco colli  
anteriori conquerentes, qui revera ex stomacho ratio-  
ne gulæ, & hujus spasmò & constrictione circa laryn-  
gem, originem duxit: *Phlogoses* & *affluiones* hypo-  
chondriorum, hinc rubor malarum & faciei, item ca-  
lores vagi, modò remittentes modò accedentes, è pri-  
mariis nempe signis præsertim dimidià à pattu bord,  
vel etiam dum adhuc assident mensæ, sunt frequen-  
tes; hinc malæ insigniter rubeat, qualis rubor inter-  
dum etiam ex unico vini haultu similive minus con-  
gruo assumpto, supervenit; quod est signum ex  
primis viis originem esse mali hypochondriaci. *Dolo-*  
*res abdominis lancinantes cum contorsionis sensu*, seu coli-  
ci & iliaci sunt frequentissimi, sique sæpius acerbissi-  
mi, in quibus interdum abdomen contrahi & umbili-  
cus interiora versus velut revelii solet; ut plurimum  
quidem sunt convulsivi, & oriuntur à spasmis ingestio-  
norum: præter hos subinde etiam *iliacos* & *colicos con-*  
*vulsivos dolores* patiuntur, interdum dolores terebran-  
tes, nunc in sinistro, nunc, quod rariùs, in dextro  
latere, qui sunt sæpius à pituita, ut vocant, vitrea,  
vel à muco acido viscido in celullis coli sub hypo-  
chondrio sinistro, ubi incurvatur, & dextro, ubi etiam  
angulum facit; unde hi dolores subinde nunc *remi-*  
*ttunt*, nunc *dolores iliacos convulsivos*, per consensum  
faciunt *Anxietates mentis* &que *perturbationes* citra mani-  
festam causam; *palpitationes cordis* graves, frequenter  
& subinde per paroxysmos, hypochondriacos affligunt:  
Non secus ac difficiles respiraciones imprimis à pattu,  
quarum subinde observatur differentia triplex.

1. Cum *reiectione viscidarum*, & est asthma stoma-  
chale humidum, quod nunc observatur in hypochon-  
driacis, nunc etiam in scorbuticis, ab omni cœna,  
dum conqueruntur de difficili anhelitu, ubi vitium  
est in stomacho à digestionem vitiata: quando autem ægri  
talem *matutino tempore* patiuntur *balium* nonnihil diffi-  
cilem, ita tamen ut simul expuant copiosa viscida, mu-  
cosa, tenacia, sit hoc ex vitio digestionis primæ & re-  
manentiis crudis à cœna vespertina: & frequentissimè  
quidem.

2. *Tensione hypochondriorum*, qua imprimis difficulter  
respi-



respirant, partim propter impeditum diaphragmatis deorsum versus motum, partim propter tensionem in regione hypochondriorum, qua thoracis debita circa costas norhas impeditur dilatio: Hinc quando volunt respirare, impediuntur & dolorem insignem gravativum & sensuum percipiunt in abdomine & circa hypochondria, quæ ipsi quasi cingulo abdomen circa hypochondria cinctum videntur; idque imprimis nocturno tempore, quatenus supini jacentes dormiunt, & hinc ita evigilant, estque à spasmo membranarum in dictis locis. Interrogant enim, ubi sit hoc impedimentum, quod respirationem impediat, dicunt: *Se constrari*; monstrantes regionem diaphragmatis.

3. Cum respiratione depravata decumbunt ex *asthma sicco convulsivo*, quod vitio diaphragmatis aut musculorum thoracis convulsivo subinde evenit. Talem enim difficultatem respirationis imprimis infert diaphragmatis impedita contractio & dorsum versus explicatio; Nam sic per consequens etiam thoracis dilatio impeditur. Talia asthmata convulsiva, patiuntur hypochondriaci confirmati, imprimis ii, qui patiuntur *symptomata mulieribus hystericiis communia*; sed rarò hoc fit.

Porro in confirmatis hypochondriaci interdum tumores viscerum abdominis, imprimis lienis duri & scirrhi, non sunt rari, qui confirmato huic malo imprimis superveniunt, sicuti etiam hepatis infarctus ejusque pertinaces scirrhi & tumores interdum superveniunt: suntque tamen revera potius productum morbosum, utut falsò à quibusdam pro causa & radice morbi habeantur. Nam & malum hypochondriacum & scorbutus in fonte omnino liene aliisque hypochondriorum viceribus, observata fuerunt, teste HORSTIO lib. 9. observ. 4. pag. 442. quicquid etiam in contrarium dicat VELTHUSIUS Tract. de Liene. Percipiunt præterea tales ægri non rarò molestas pulsationes in hypochondriis, uti etiam in regione dorsii, imprimis circa lumbos & regionem lumborum superiorem, à regione pancreatis, (*gegen uber*) ubi sunt dispersi rami arteriæ celiacæ; quin etiam tales pulsationes percipiuntur interdum etiam in aliis corporis partibus, ubi aliàs nullus naturaliter sentitur pulsus, & ferè duritiem arteriæ ex strictura fibrarum convulsiva insequitur. Malo ulterius procedente vertigines graves frequentissimè superveniunt: omnes ferè hypochondriaci præsertim jejuno stomacho sunt vertiginosi, quod signum rarò fallit; uti infra lib. 2. cap. 1. Sect. 3. patet: quæ ipse vertigines saltem assumptis, v.g. panis buccellâ, brevi post denuò sistuntur.

Cephalalgia subinde affligunt in specie sensiva, & hinc capitis obnubilationes, imprimis à pastu, & tandem ingenui torpor & memoriæ lapsus, uti audietis lib. 2. Sect. 3. cap. 4. Artic. 1. ubi de memoria; ut hypochondriaci confirmati interdum necesse habeant, valedicere studiis; tandem interdum memoria planè deficere incipit. A pastu solent esse quasi ebrii, & faciliè terrefiunt hypochondriaci; subinde anxietates frequentes, gravior cordis palpitatio, tristitia & morores citra manifestam causam, atque sic tandem ipsa melancholia, à loco hypochondriaca specialiter dicta, superveniunt; quam insomnia varia & turbulenta & terrifica aut præcedunt, aut etiam comitantur: videat. TIMÆUS Von Guldenklees Casu 16. lib. 1. pag. 34., ubi generosus Nobilis ultra biennium mente anxius, tristis & meticulosus sine causa fuit, cordis percepit angustias, sæpè mortem instare putavit, ac perinde lachrymabundus opem petiit, capitis dolore, vertigine, aurium tinnitu & vigiliis affligtus fuit, &c.

Pulsus sunt variis & interdum admodum inæquales, subinde intermittere videntur & in paroxysmo mali confirmati ferè omni momento mutantur. Nam ubi confirmatum fuerit hoc malum hypochondriacum nunc symptomata stomachi & hypochondriorum, seu potius intestinorum, nunquam omnino remittant, tamen subinde per paroxysmos affligunt, & suas exacerbationes habent, rarius certas, frequentier vagas; ac ipsæ palpitantes & anxietates cordis & capitis, & sensuum symptomata, item dyspnœia, atrociter interdum affligunt; quin etiam interdum viri in graviore paroxysmo ea patiuntur pathemata, quæ evenire solent mulieribus hystericiis: adeo ut revera Passio hysterica mulierum sit certa quadam species Mali hypochondriaci; & ipsi ægri dicunt, se percipere ascendere fumos ex abdomine ad cor & caput, (de quibus infra lib. 2. cap. 2. Sect. 3. ubi de Epilepsia.) item

Essmüller. Oper. Tom. II.

ex liene subinde ascendentes, & postmodum ita tales paroxysmos inferentes, quo ipso vulgi hypothesin de fumorum ex dictis locis ascensu non parum confirmant.

Urina Hypochondriacorum est varia: extra paroxysmum ferè sanorum est sinuillima; dum paroxysmus gravior urget, interdum effluit cruda & tenuis, interdum etiam turbida, pallida, plus minus aquea & crassa, sedimentum habet subinde farinæ laterum analogum, speciatim ubi jam Malum in Scorbutum degenerat; interdum crassa salina eidem urinx supernatant, aut corpuscula salina lateribus vasis adhærescunt, sed ad fundum præcipitantur; interdum corpus puriforme, moto vase in liquorem lacteum dissiliens, observatur, qualem describit DRAWIZIUS de Scorb. pag. 376. & TIMÆUS Von Guldenklees lib. 3. Cas. Med. 48. & PLATERUS lib. 3. Observ. pag. 784., interdum in talibus deprehenditur, post nimias nempe vigilas, intensè tincta. Quod si urinx antea claræ & tenuis usu medicamentorum sunt crassæ & turbidæ & subnigricantes cum copioso sedimento, bonum signum est rectæ operationis medicamentorum.

Ex symptomatibus his multiformes ægrotum querelæ emergunt. Omnia tamen hæc, quorum complicatio malum hypochondriacum constituit, rarò in uno subjecto omnia existunt; quædam enim in hoc, quædam in alio subjecto se manifestant: Sufficiat nihilominus pro malo hoc determinando, si stomachi non ritè digerentis adsint signa, cum torminibus & flatibus abdominis, alvo adstricta, & hinc capitis perturbationibus: quibus tanquam primariis, si alia quædam ex recensitis accedunt, cò facilius malum determinatur, hujusque præsentia certior redditur. Exempli, quæ pro idea hujusmodi ægrotum sufficiant, vid. in HORSTIO lib. 4. observat. 27. & seqq. item HOECHSTEDTERO Decad. supra citata.

## CAUSÆ MALI HYPOCHONDRIACI.

Causa proxima horum malorum complicatorum est stomachi cruditas acida seu acidum ventriculi vitiosum, plus minus austerum, in subjecto plus minus viscido ex stomachi vitiata digestionem enatum, à quo pro varietate subjectorum omnia reliqua symptomata facillimè deduci possunt, modò ea, quæ alio tempore & aliâ occasione de similibus affectibus dicta fuerunt, ruminentur: adeoque subjectum seu pars affecta in malo hypochondriaco (à causa quidem) seu radicationis est ventriculus, ejusque vitiata digestio prima; à morbo verò, seu invasionis, sunt sanguis & bilis: sed non excludendi sunt spiritus insui, præsertim in malo confirmato & inveterato, & qui ad Scorbutum naturam quasi accedit, unde etiam hereditarium existit.

His tanquam productum morbosum superveniunt ipsarum partium corporis continentium seu solidarum multiplices alterationes: & quidem quoad has partes solidas, magis affecta sunt in malo hypochondriaco viscera abdominis, quorum consensu subinde & alia afficiuntur; unde palpitantes cordis, cephalalgia, vertigines, melancholia hypochondriacæ, &c. Scilicet jus digestionis primæ in ventriculo est universale in totum corpus, adeoque tam in theoria quàm praxi morborum maximam semper sui postulat considerationem, uti non minus in Praxi legitima semper quoque ad eam respiciendum est: siquidem, ut sæpius jam dictum, omnes succorum in corpore fermentationes sunt saltem continuationes fermentationis in ventriculo inchoatæ. Hujus ergo actio, nempe digestio læsa, vitio succi ejusdè fermentativi nimis acidi nec ritè volatilis, ratione cujus avidius appetit quàm concoquit, est primaria causa totius mali hypochondriaci.

Ex chylis acido in primis viis depravatur sanguinis crasis, hinc deficit & vitiatur ejus spiritaliscentia seu pneumatosis; hinc hebescit bilis, acieserum & lymphæ, irritaturque genus nervosum ac partes solidæ in abdomine, malè nutritur universum corpus.

Ex his quasi quinque punctis, nempe

1. Cruditate acida in primis viis,
2. Sanguinis crasi depravata,
3. Absumpti deficientes,

E ■

4. Lym-



4. Lymphæ aciditate & acrimonia, &  
5. Bile inerte

omnes lineæ deducendæ sunt, quæ depingunt *malum hypochondriacum*, cuius centrum sit *stomachus*.

*Causa ergo efficiens* Mali Hypochondriaci est vitium acidi spirituosii fermentativi, vitiosæ acidi, nec debite volatilis ac spirituosii, ratione cuius avidius appetit quàm digerit ventriculus; quo ipso fermento assumpta quidem promptè plus minus dissolvuntur, sed eadem dissoluta minus fermentantur ac volatilifantur; unde in pastam acidam aut acido-austera plus minus viscidam flatulentam degenerant, quæ aliàs in chylum salium volatilem transmutari debuissent; unde copiosissimi *flatus* præternaturali fermentativâ turgescentiâ erumpunt, (vid. *suprà cap. 2. Sect. 3. ubi de Inflatione stomachi*;) hinc Ruētus acidi & stomachi Inflationes, & ex materia viscida acida ejusdem graves dolores, aut vomitus materię viscidæ insigniter acidæ: delapsa tandem hæc massa cruda ex stomacho, & occurrens bili in intestinis, vitiosè effervescit, undè copia flatuum. Nam, ut alibi ostensum, flatus sunt ab acido, vitiosè in materia viscida effervescente: Et speciatim, si paulo volatilior ac spirituosior fuerit bilis, incalescentiæ seu subitanæ phlogoses ex hypochondrio dextro subito in totum corpus se dispergunt, (ad imitationem quasi olei vitrioli vel spiritus nitri, vini spiritui rectificato commisti) quod vulgò quidem, sed falso, hepatis calido adscribitur. Unde etiam ruit imaginaria ista ventriculi frigida & hepatis calida in affectu hypochondriaci quibusdam accusata antipraxis, cum tamen potius præsens flatuum proventus continuus, & hinc multiplex intestinorum nata irritatio, continua murmura, & nunquam intermittentes borborygmi abdominis semper ex materia acida viscida oriuntur. Cum verò fæcetales secretæ sint plus minus viscidæ in cellulis intestinorum, coli imprimis, hæc peritineat hærent, quorum acore præternaturali pertinentes dolores, laniationes & terebrationes, pituitæ vitreæ vulgò adscriptæ, generantur: Hinc est, quod subinde conquerantur ægri, se sentire nonnunquam infarctus in abdomine, & monstrando locum istius infarctus situm coli sub stomacho exactè delineant, (ubi scilicet colon cum ventriculo, sinistrorsum versus porrigitur;) *Quando stomachum monstrant dicentes: valdè premit, omnia sunt plena; tum stomachus laborat materia: sed cum sub stomacho premitum sentiunt, ac si lapide quodam graventur, colon est affectum.* Hæc ipsa materia viscida, simulque occultè acida, austera in cellulis coli contenta & quasi condensata alvum contumacem & difficillimæ solutionis reddit.

*Hypochondriacorum excrcta sunt pauca & indurata*, quia coagulantur ab acido plus minus austero: sicut enim bilis, tanquam alcali volatile fluidas reddit fæces; ita acidum easdem coagulat, quare, quia firmiores redduntur in cellulis, dantiùs retinentur, & segnitiam alvi inferunt. Hinc quando ventriculus & vicinæ partes membranaceæ, qui chylo nutiri solent, acido austero succo irritantur, tunc spasmus contrahuntur, fibræque earum stringuntur, sicque tensionis & quasi infarctus sensus circa hypochondria, præsertim sub inspiratione, percipi solet. Quin & aliquorum viscerum nervi ac membranæ nunc in radice, nunc in suo progressu, præsertim mesenterii, eodem sapore malè affectæ spasmus & convulsivos motus patiuntur, per consensum aliàs cordis partes afficientes: hinc varii hypochondriorum & abdominis dolores, illaci, lancinantes, & *tensivi* ægris inducuntur; sicut & palpitatio cordis non rarò in hypochondriacis non tam sanguinis transvalati, quàm nervorum in motu vitio, ut plurimum nasci videtur. Et *resiones capitis circa tempora* sunt nihil aliud, quàm spasmus membranarum in dictis locis ab acido præternaturali irritatarum.

Crudior talis chylus per intestina transcolatus, & Massa Sanguineæ instillatus, & hujus crasin, acore suo vitioso & præternaturali in subiecto nonnihil viscido hærente inquinando, ipsam Massam Sanguineam plus minus crassam & spissam & difficulter fermentescibilem minus; spirituosam scibilem reddit; Unde anxietates, cordis palpitantes & similia cordis pathemata derivantur à grumoso sanguine plus minus coagulato, circa aurículas in ventriculis cordis hærente; unde sanguis & ipellus & crassus observari solet: Conf. SYLVIVS *Prax. lib. 1. cap. 35.* Sui verò

subcolatura sanguinis per viscera, in specie per hepar & lien, de tali crudiore chylo sanguini infuso non-nihil in eorum porulis hæreat, irritatis fibris illorum contractura meatuum, hinc subsistentis materię firmior retentio, tandem à vitioso suo acido coagulatio, sicque tumores & infarctus viscerum superveniunt, & ita his denique scirrhi pedetentim enascuntur. Minus dum spirituosior sanguis jam depravatus, etiam spiritus minus volatiles minusque subtiles, nec satis lucidos, minusque naturaliter temperatos, sed asperiores & ut sic dicam, ad acerosum saporem declinantes, producet, qui facili in motus anormales, *unordentlich*, & exorbitantes prorumpent; adeoque stomacho affecto vertigines, item cephalalgias, &c. inferunt, donec ex dictis, *tristitia, moror, anxietas*, cogitationes fixæ, & tandem melancholiæ symptomata superveniant.

*Causa proxima ergo est acidum excessivum*, minus spirituosum, quod pro ratione aciditatis infert omnia ista symptomata.

Disponunt ad hoc malum ex *Causis remotis* præter ea, quæ *suprà de Apepsia* dicta sunt, speciatim tres:

1. Errata in victu,
2. Deficiens motus corporis; & tandem
3. Vita genus studiis & curis nimis occupatum.

Quæ omnia disponunt ægros ad cruciatus in primis viis.

Quoad *Dietæ Errata*: hæc vitiosum pedetentim chylum suppeditant. Nam alimenta aut nimis acida, aut sumo indurata, aut sale condita, aut difficulter digestibilia, & sale volatili destituta, &c. multum hic conferunt: *Sale condita*, imbiberunt non parum de spiritu acido salis; *sumo indurata* de spiritu acido saliginis multum continent. Facit huc potus facili *acescens* non ritè defæcatus, vel qui ad acelcentiam inclinatur, isque non adeo diureticus, vel in acrum vergens, ad malum hypochondriacum disponit.

*Motus*, qui aliàs instat stimuli & chylosin & hæmatosin adjuvat (nempe motus naturalis) & distributiones succorum promoveret, dum deficit, has omnino impedit, ad cruditatem colligendam non parum confert, & excrementorum separationes, tam per urinam, quàm in specie per sudores, minus promoveret.

*Cura denique & Studia*, nocturna præsertim, spiritus animales abstinent, & vires ita exbauriunt, indeque digestionem primam defectuosam, & Massam Sanguineam minus spirituosam minusque volatilem reddunt; unde inquinatus ita sanguis, & consequenter etiam lymphæ ipsæ, tam glandularum conglobatarum, quàm etiam conglomeratarum, v.g. pancreatis, acrior & acidior reddita, successivè symptomata stomachi, abdominis & intestinorum, & tandem hoc malum infert. Hinc *lucubrationes nocturnæ* statim post cœnam notoriè ad malum hypochondriacum disponunt.

Inquinatus itaque sanguis ipsaque lymphæ, & consequenter reliqua corporis contenta, ipsique aded affecti spiritus, tandem corporis habitum successivè ita immutant, ut exinde malum nascens ad gradum sublimiorem exasperatum & deductum, *Scorbutus* appelletur; qui tamen haud aded frequens, quam vulgò haberi solet, ut optime monet SYDENHAM in *Observat. de Morb. acut. pag. 41.*, quin morbus velignus cognitus, vel nondum sufficienter confirmatus, pallium esse soleat. De cætero rectè quidam dicunt, quod malum hypochondriacum exaltatum, & quasi malignius redditum, constituat Scorbutum, ut præterea & alias causas antecedentes agnoscat. Hunc multi, in specie PETRÆUS in *Dissertat. Harmonicis*, non ineptè inter species *Cachexiarum* referunt, dum scilicet à vitioso sanguine aut atrophia, aut cacotrophia, depravata nempe nutritio, tandem necessarè sequitur; quin tandem exaltatum, & successivè quasi volatilifatum nonnihil istud vitiosum acidum hypochondriacum in Massa Sanguinea & lymphæ, indeque penetrativum & fermentativum factum, tandem miasmata fermentativa & contagiosa de se spargit. Aded ut Scorbutus confirmatus per oscula, per balium, item per pocula communia aliaque media, uno nomine per *contagium*, se multiplicet, inque contagioso fomite præ cæteris efficacissima est saliva in Scorbuticis admodum inquinata: qualia contagia, aut cum aere inspirata, aut cum saliva hausta, fermentationem, & hinc chylo-



fin & hæmatosin, tandem inquinant, ac ita se subinde multiplicant, quin etiam Scorbuti fomes, ubi confirmatas egerit radices, seminali medio à parentibus in liberos traducitur.

Est igitur hic *peculiaris humorum dyscrasia, seu Cachexia*, symptomata adeò varia excitans, ut si aliquod horum infrequens cuidam obveniat, quod ad certum aliquod morbi genus referri nequit, statim Scorbuticum pronunciet: Hincque descriptione angustiore comprehendere vix potest, utrius frequentissimum nostris etiam regionibus hoc Malum existat.

*Symptomata Scorbutica* præter ea, quæ modò de Malo hypochondriaco fuerunt explicata, ex eo imprimis oriuntur, quod (1) *fermentum scorbuticum imprimis glandulas quasunque afficit*, harumque lympham inquinare & inficere solet; quodque (2) istud ipsum, prout contradistinguitur Malo hypochondriaco, in specie nervis insigniter infestum & hostile esse solet; unde etiam Scorbuticos tam varia nervosi generis pathemata solent affligere, & quidem graviora & frequentiora, quàm Hypochondriacos.

Res ut pateat, quod inquinet glandulas, & aciditas ejus sit infesta nervis, specialiora Scorbuti symptomata consideranda sunt: Nempè percipitur lassitudo totius corporis spontanea, & ad motum nunc major nunc minor impotentia, sensus gravitatis in cruribus, ut & aliorum membrorum debilitas, & dolor obtusus; patiens inclinatur ad somnolentiam, nisi adsit febris scorbutica; appetitus ut plurimum est auctus, aut planè destructus, conjunctus cum nausea: semper ferè adesse solent gingivarum laxationes (nam omnia Mali hypochondriaci symptomata sunt etiam in Scorbuto) una cum vaga seu varia earundem nunc *excresecientia & intumescientia*, nunc exesione & exulceratione, item cum infrequente dentium vacillatione ac erosione, atque oris foetore, & fricatæ *gingivæ* nunc sanguinem stillant, cumque intensè salsum, nunc *liquorem* quoddam *serosum*; in talibus *saliva* frequenter admodum est *salva*, interdum, imprimis matutino tempore, manifestè *acida* deprehendi solet, ut in juvene scorbutico observavi. Præterea frequentes sunt in Scorbuto *phlogoses* vel *sudores* etiam nocturni, in quibus *sudor spargit subacidum* odorem, imprimis in habitu corporis, in cruribus, in brachiis; malo procedente varix erumpunt *maculae*, nunc majores, magnitudine interdum thaleri (ut ipse vidi) nunc minores, *pulicum moribus similes*, quales videntur in purpura, Germ. *das Friesel*, interdum manus superant; imò sæpè totos in artus, præprimis tibias, ita diffunduntur, ut quasi una sit macula livida, cum elephantiæ aut sphaceli metu: vid. EUGALENUS de Scorbut. pag. 7. Diversi sunt coloris, nunc rubicundæ, nunc flavescentes, nunc atropurpureæ, lividæ, &c. Cum quibus alternant frequenter exanthemata in artubus, eaque varia, modò lævia, protuberantia, aspera & squamosa. Scorbutici subinde patiuntur *corporis pruritus*, sed dum incipiunt se leviter scalpere, locus intumescendo totius insigniter rubet, sed breviori tempore evanescit; in alio loco iterum *pruritus* & talem *intumescientiam* infert, denuò tamen cessat: Rarum est, quod tumores sint constantes, & si sunt constantes, ut plurimum occupant glandulas artuum, quæ formâ *scrophularum* solent tumescere. Sæpe *pruritus* hic, si scalpatur, dat *ulcuscula graviora*, & in varia ulcera degenerantia, quæ plorant iterum adeò ære, ut quodcumque calcementa ægri fuerint exinde erosa; & quidem talia ulcera sunt difficulter sanabilia, quia facilè degenerant in *gangranam*.

*Urina Scorbuticorum* admodum sunt variæ, intensè subinde rinctæ & flammeæ, absque febre tamen & ictero, & rutilant instar spiritus nitri, etsi nulla febris adsint indicia, cum sedimento copioso & crasso, subinde luteo, ita tamen, ut exterius inspectus matulæ fundus luteo-nigrum ferè carneum quid repræsentet. *Urina hæc flammea* est nihil aliud, quàm latex urinaris nimis salibus contentis saturatus, instar acerrimi lixivii. Interdum tales urinae flammeæ subinde immutantur, & fiunt naturaliter sine tali sedimento rinctæ, sed ita, ut *copiosa arenula rubra* facilè friabiles, quæ sunt salia crystallisata à vasis lateribus, incrustent matulæ fundum & latera, & hæc arenulae sunt unum ex certissimis signis Scorbuti. Præterea interdum flammeæ tali urinae *crusta* quasi *pinguis* seu quædam *pinguedo instar pelliculæ* supernatat, quæ pellicula ad latus

adspecta solet esse admodum variegata, & *pavonis caudam* aut *elegantem coloratam iridem* repræsentat. Est autem nil aliud, quàm salia coagulata, & signum scorbuti infallibile. Sic in Chymicis si aliquid evaporetur usque ad pelliculam, ea apparet variegata, ut plurimum autem in originali reperitur, urinæ effusæ, color quidam caeruleus, qui vix ac ne vix quidem primâ vice abstergi potest. Et si forsitan contingat tenuem, limpidam & planè aqueam nonnunquam excerni urinam, hoc fit, vel à rectementis aqueis hæcenus in corpore congestis & retentis, nunc verò cum impetu excretis, propter particularum salinarum deficientem aut nullam secretionem: unde, etiam hæc urinæ sæpè malorum symptomatum prodromi existunt.

*Respirationis* insignes *lesiones* valdè opore scorbuticos affligunt, eaque non humorales, sed ferè convulsivæ, cum gravissimis anxietatibus & pectoris angustis junctæ. In specie *dolorum* variorum tortutis crudelis est Scorbutus crurum & surarum, nunc vagis, nunc fixis, præ cæteris ventriculi, dorso, lumborum, pectoris atque abdominis; qui abdominis dolores scorbutici sunt omnium crudelissimi, & subinde in dorso & regione lumbari incipiunt (tuncque nephritidem notham constituunt) & cum gravissimo contorsionis sensu hinc inde in abdomine oberant: & ita anteriora versus, ad regionem umbilicalem & distas partes convellendo, contorquentur, ut nephriticis interdum doloribus simillimi sint, absente licet omni calculo; unde *putant ægi, se laborare Nephritide, sed malè: Potius Nephritis notham vocanda est, quæ interdum umbilicum interiora versus retrahit*. Verum quidem est, quod abdomen intumescat & si intumescat, etiam indurescat, non à flatibus, sed à spasmis, & tensione membranarum. Dolores hi nunc solitariè affligunt, nunc in variis corporis partibus tubercula varia non rarò erumpunt, quæ subito increscunt, aut subito etiam denuò dissipant; nunc copiosa parva tubercula, rubra, plus minus pruriginosa, hinc inde protuberant, quæ denuò de facillè evanescunt. Et in quocumque ægro tam vaga & varia observantur symptomata, scorbutus latet; unde etiam scorbuticorum febres erraticæ existere subinde solent: Certissimè scorbutus subest, ubi modò hoc, modò illud *symptoma supervenit*. Præter dictos dolores, qui constituunt Nephritidem notham, sæpius dolores nunc fixi præsertim nocturni, nunc vagi & vagabundi, artus excruciant, dum acerbis dolore nunc crus, nunc brachium, nunc alia pars mutatis vicibus affligitur; nullâ tamen aut leviter sensibili in parte inductâ alteratione, quod symptoma in specie *Arthritis vaga scorbutica* seu *varia*, Germ. *die reisende Gicht*, appellari solet. Dolores hi artuum sunt vel leviores vel graviores: subinde *sensus Vermiculationis* seu *formicationis* in extremitatibus artuum percipitur, similis ferè sensui isti, quando dicunt: *Sentire semotum in artubus, ac si formicae in illis circumcursarent; vel membra ipsi corpore premi*: & est species tactus depravati; unde affectum hunc quidam vocant *Morbum Scorbuticum*. Sæpius membra stupida plus minus sunt paralytica aut saltem dolorosa, idque imprimis post Colicas seu post tormina & dolores abdominis, quibus *Paræsis* supervenire solet, in qua motus perit sensu integro aut saltem doloroso. Interdum motus adest, & sensus deficit, ut si quid in manu teneant, illud non sentiant. Interdum ex tali paralyti *contracta* membra sunt rigida, contracta, & tamen non immobilia. Loco paralyseos è contrâ frequentes admodum *convulsiones*, motusque convulsivi scorbuticos insigniter vexant, sive internas occupent regiones, sive externos agitent artus. Sanè sæpissimè epilepsia & similiter convulsivè morbi, quin & hysterica passio ex fomite scorbutico originem suam aut saltem malitiam obtinent & morbosam virtutem. Præter vagos supra dictos dolores scorbutus etiam interdum infert *fixos*, tam in artubus lacerantes & lancinantes, præsertim nocturnos, quàm *cephaleas* immanes atque habituales contumaces, tam vagas quàm periodicas, quæ sunt frequentissimum & urgens maximè scorbuticorum symptoma, item *Odontalgias* ferè intolerabiles. Interdum stomachum pertinaciter affligunt, unde *vomitibus* admodum contumaces oriuntur, non nisi antiscorbuticis curandi: Interdum occupant *extremitates artuum*, qui sunt gravissimi: hi interdum silent, noctu verò affligunt, & sic magnam habent convenientiam cum



dolore in Loe Venerea occurrente; unde etiam quidam dicunt, nullum affectum magis esse affinem Loe Venereæ præter scorbutum. Præter dicta, crura subinde *intumescunt* constanti tumore, haud quidem œdematoso, sed duro plus minus rubicundo, nunc cum nunc sine doloribus nocturnis; interdum exulcerantur, ita, ut elephantiasin Arabum repræsentent. Quinetiam Tumores duri, Gallicos nodos æmulantes, tam in locis glandulosis, quam etiam in locis musculosis, præsertim cruribus, protuberant doloris expertes, dum quiescunt ægri; dum verò ambulant, aut dum crura pendentia habent, insigniter dolere solent.

Interdum quoque *cruentas dejectiones* plus minus dolorificas falsò à quibusdam dysenterici, ab aliis hæmorrhoidibus apertis tributas, inducunt; aut si non sponte sua accedant, facillimè saltem purgantibus acrioribus provocantur. Nam ægri tales, quando emittunt cruenta, non sunt dysenterici; sit enim sine torminibus; non sunt hæmorrhoides, quia post stercorea produnt: sed est *hæmorrhagia intestinorum*; unde interdum leves *Purgationes Scorbuticis diarrhæam cruentam, interdum atrocia symptomata dysenterica* inferunt, præsertim si pilulari formâ propinantur purgantia. *Signa tamen, quibus hujusmodi cruentæ dejectiones scorbuticorum discernantur à dysenteria & fluxu hæmorrhoidali, descripta videb. in HORSTIO libr. 7. Observat. 25. pag. 393. & 394., ubi egregia est observatio.*

Nec solum per alvum, sed etiam per alia loca, pertinaces *hæmorrhagias*, e. g. *marium, sputum cruentum, &c.* inducit scorbutus, sanguis interdum coruleus vel subviridis apparet: interdum infert *erysipelata* in artubus cautissimè tractanda; nam facillimè gangrænefcunt, aut saltem in ulcera admodum cacoethæa degenerant; sicuti gangrænam artuum, præsertim circa pedum digitos, sponte sua exque causâ interna oriundam, infert semper lethalem: qua de re vid. imprimis SENNERTUS lib. 3. Prax. P. 2. cap. 29. circa finem.

Tandem à malo confirmato frequenter *atrophi* à ut plurimum corpus tabescit, aut superveniente phthisi emacianatur. *Catarrhis quoque & catarrhosis affectibus, usque frequentissimè circa caput, collum, fauces & regiones glandulis magis obstitas; item excoriationibus & exulcerationibus non ita facile curabilibus obnoxii sunt scorbutici.*

*Pulsus est admodum varius, inæqualis, subindè parvus & debilis, interdum formicans, ac subinde planè intermit tens, cum animi deliquiis frequentioribus: adeo, ut qui scorbuti naturam ignorant, facillè à tali pulsu terreantur, ut sit mos scorbuti, ut interdum pulsus tetros vegeto ad huc corpore soleat inducere.*

Præterea subindè observantur *sudores copiosi, imprimis nocturni admodum colligantes*, quibus nonnunquam accedit *nausea & alvi fluxus*: de quibus & aliis minus frequentibus symptomatibus vid. WILLISIUS de Scorbut. cap. 3.

Quoad *Causam proximam*: symptomata hæc multiplicia ut plurimum plus minus convulsiva & similia scorbutica, ex acido specifico sapore aut odore fermentativo scorbutico, spiritus & hinc contenta corporis inquinante, peculiariter nervis & fibris morticibus infesto, interdum plus minus salsedine juncto, deduci optimè possunt; conjungendo ut plurimum utrumque, tam acidi specifici activitatem, quam ex fibrarum sensilium ac morticium irritatione affectum plus minus spasmodicum. *Peccare enim in Scorbutico acidum patet:*

1. *Ex consequentibus, quia remedia Martialia & volatilia conveniunt.*

2. *Ex antecedentibus symptomatibus, exulceratione, & similibus variis glandularum tumoribus.*

Nempe acidum istud Massâ Sanguineâ & hinc etiam lympham inquinans, bilem verò pessundans, hæmorrhagias, deficientem nutritionem, partium exulcerationem, & vitiatam fermentationem, pulsus diversimodè inæquales, &c. infert, dum lymphâ acris & corrosiva in variis locis nervosis multiplices torturas dolorosas, contentorum varios motus, eorumque nunc stagnationem, unde tumores, nunc excretiones &c. excitat. Oris exulcerationes, gingivarum ac dentium plus minus corrosiones, stomacace dictas, contumaces catarrhorum acrum passionem, vagos partium dolores & lancinationes, &c. infert. In meten-

teris glandulis coacervata, & vitioso acore suo membranas & nervos irritans, istud in spasmos convellendo, atrocissimos abdominis cruciatus infert: item motus convulsivos, pathemata hysterica, epileptica, etiam pareses, paralytes, & similia symptomata. Hinc quod largior copia lymphæ talis acris, eò etiam frequentiores sunt convulsionem in corpore. Ut taceam nonnullos de salivæ & oris salsedine valdè conqueri. Quando verò in tali lymphæ acrimonia est vis destruendi partes animalis duras, uno verbo, ossa, accidit, ut ossibus partibus multa crect mala: sic v. g. dentibus summè est exitiosa, quippe quos sensim atque sensim resolvit, atque destruit horum carnem vicinam, nempe gingivas; unde vulgus partem affectam credit solas gingivas. Item artuum juncturas nimica est hæc lymphâ, quare in illis collecta producit arthritidem, dum nimirum membranas, ossa cingentes, acrimoniâ suâ pungit. Item in quibusdam scorbuticis serum ad eò corrosivum fuisse observatum, ut ex naribus eorum profluens linteamina intincta eroderet: aliis serum inter dormiendum per os stillans in genâ in verum sal coagulatum fuit. Quæ asservit de lymphâ nimis acris, a tribus WILLISIUS succo *supernatante acris*, qui proinde facillè potest corrigi, & in lectionibus Autoris hujus observandum. Quo supposito, sal non tam fixum sive alcalicum, quale non nisi fortissimè calcinatione fit, neque acidum, utpote quod sincerum siderationes ac coagulationes mox lethales introduceret, cum sanguis scorbuticorum fluidior justo observetur; sed *acido salsum potius existere puto*: ita tamen, ut in falso hoc sale modò urinosum, modò acidum, prævaleat, quamvis illius portio notabilis humorum massæ semper naturalis & connata, hoc verò toto genere ipsi præternaturale observetur. Atque ab eodem acido, à compari alcali in falsum plus minus commutato, turgida & imprægnata urina intensius rutilat absque crusta & sedimento salino; quin & interdum coloris dilutioris conspicitur, quando salia hæc crystallisata sub arenularum forma in fundo subindè subsident, aut in superficie in cremorem seu crustam illam salinam concresecunt. Illud quidem ab acido parciori minusque potente, sale urinoso magis saturato, ita ut ratione hujus saturationis uberiores sulphureas sanguinis particulas commodius imbibere, hincque urinam rubicundiorè & lixiviosam magis redlere possit; cum è contra, quod plus acidi, minulque alcalici volatilis, acidior seri scorbutici portio sibi relicta urina in ac super-natet, quod urinoso ejus uberius atque intumescit junctum, hujus vim agendi in sulphuream portionem sufflaminet, hinc tineturam minus rubicundam urina concedat.

Maculæ denique, quæ hinc inde corpus tingunt, è primariis signis sunt partis sanguinis corruptæ & quasi gangrænatæ, ut sic dicam, quæ à reliqua massa separata per sanguinis circulum hinc inde designantur sub cute, donec ita successivè insensibiliter exhaleant; unde earum eruptio bonum est signum, depurantis scilicet Massæ Sanguineæ. Cætera symptomata ex suprà & aliis dictis facillè explicari poterunt. Inspeci: tamen consulendi adhuc veniunt Auctores, qui ex professo de Scorbutico scripserunt, v. g. SENNERTUS tamen Praxi, quam peculiari de Scorbutico Tract., SALOMON ALBERTUS, HORSTIUS in Observat. & Tract. de Scorbutico, WILLISIUS in Specim. Patholog. Cerebri, ubi de morbis convulsivis & Scorbutico, DRAVVIZ de Scorbutico, & recentissimè MOELLENBROC. de Arthrit. vag. Scorbut. Protheus intermetiam est scorbutus, dum ordinariò pathemata ex aliis morbis quibuscunque sese associant, omnesque istos graviores aut deteriores aut certè contumaciores simul reddunt, ad eò ut tales morbi præter hoc, quod circa symptomata multum variant, vix citra recidivæ metum sint curabiles, nisi simul appropriatis scorbuticis infringantur. Imprimis febres periculosas stipatæ symptomatibus ex societate scorbuti nascuntur, sicut intermittentes ex scorbutico serè erraticæ sunt.

Si consideramus *remotas Causas* ad scorbutum disponentes, ex sunt varæ; imprimis Res nonnaturales, inter quas

1. Locorum ratio ac regionum, quatum quædam *terra aquarum & alimentorum* causâ magis præ aliis ad hoc malum dispositæ sunt. Aeris præsertim summo perè hic habenda est ratio, cum ab eodem crasis tam



ram sanguinis quam spirituum multum dependeat. Ratione hujus enim Hypochondriaci saltem *septentrionales*, & maris Balthici imprimis accolæ, tandem evadunt Scorbutici, ita ut morbus endemius in inferiori Saxonia, Belgio & Anglia, reliquorumque locorum maritimarum, sit Scorbutus; cum è contrà *Orientalis* & *Meridionalis*, Gallia, & imprimis Hispania, parum aut planè nihil nominatenus de Scorbutosciunt. Hoc autem inquinamentum aeris est aura marina nostras falia admodum, & cum noster aer aequilonatis perferat loca paludosa & lacustria, effluvia ista putrida tecum affert: Hinc ex aere hoc à nobis inspirato istud acidum in nobis exacerbatur, massa sanguinea, saliva, & consequenter fermentum stomachi vitiantur, & tandem scorbuticam corruptelam inducunt; unde locis quibusdam Scorbutus magis familiaris & endemius redditur: vid. RONSÆUS *Epist. ad Hadrianum Junium*, & HORSTIUS *de Scorbuto*. Sic ratione talis aeris & mali victus omnes navigantes, quò diutius in libero Oceano ordinariè consistantur scorbutu, dum aer marinus effluvis acido-salis ex mari elevatis inquinatus, respirando attrahitur, & præ aliis Belgæ & Angli sunt Scorbutici, dum navigant. Conf. WILLISIUS *de Scorbut. cap. 2.* Quin & qui jam consistantur cum Malo hypochondriaco, si peregrinantur in loca puro aere prædita, solent sponte ab istis Mallis purgari. Ille ergò aer nostras effluvis salinis acidis est præditus, & secundum Hartmannum sulphure temperato destitutus est; hinc malum hypochondriacum exasperat, istud acius reddit, & sic in Scorbutum degenerare facit; atque vel hoc quidem ratione crassitiei, ventilationi sanguinis hujusque effluviis heterogeneorum secretioni minus congruæ; vel salta atque sulphura anomala corpori inspirando.

2. In specie *Vitæ ratio* ad scorbutum maximè disponit, cum multorum locorum in te salubrium incolæ scorbutus enormiter affligat; contra maritimis quibusdam locis planè incognitus sit: quatenus hi victu salubriore vinum ab aere contractū lenissimè emendant; illæ verò vel solo victu inconveniente levissimum aeris influxum juvant. Qualem præcipuis suggerunt cibi nimium acidi & viscosi, sale conditi, ac fumo indurati, caro porcina, pisces maritimi, lacustres, & testacei, item cerevisiæ nimium viscidæ & non ritè fermentatæ, aquæ corruptæ, vinum & vini spiritus copiosius hausta.
3. *Optum* excrementorum cunctorum secretiones atque excretiones suffraginans: Hinc scemina, aut studis vacantes scorbutu magis obnoxii observantur, quàm viri, rustici, atque operarii.
4. *Contagium* abientibus reliquis causis Scorbutum produciens, ita quidem, ut annotante DRAWIZIO *de Scorbut. pag. 100.* conversatio cum Scorbuticis frequentior causa videatur, quare apud nos malum hoc adeò commune sit; siquidem per salivam, adeòque per communia pocula, item per sudores, alios inficere solent.
5. *Dispositio hereditaria.*
6. *Viscerum primæ & secundæ digestionis dyscrasia:* Quibus
7. Accedunt alii morbi chronici, febres diurnæ, imprimis quartanæ, & omnium maximè Malum hypochondriacum, quod, ut supra dictum, inveteratum & magis confirmatum, aut degenerat in scorbutum, aut comitem certè hunc sibi associat.

Quibus præmissis vel spontè pater: massam sanguineam & spiritus influos esse subjectum scorbuti; hos quidem in hætionis; illam radicationis; adeò ut mutuo circulo malum magis magis confirmet. In specie spiritus influus à sua crassi degeneres in acrem specificam diathesin descedunt: deinde serum ac lymphæ specialiter hoc ipso sapore imprægnata deprehenduntur, sanguine ob texturam salino-volatili-oleosam non nihil obtrundente eundem; quod manifestius in illis humoribus percipitur, propter quas causas affectus scorbutici partes inter solidas, præcipuè in parvis nervis, se exerunt, & hinc in glandulos locis: unde atrophie, spalmi, convulsiones, paralytes, stupores, do-

*Eismüller. Oper. Tom. II*

lores variæ ac multiplices, ipsaque adeo arthritides; item dolores vagi & fixi, ulcera oris, catarrhalia pathemata, &c. frequenter adesse solent.

*Causa* ergò proxima erit *sapor seu odor* (vocet quis ut lubet, modò minimum fermentativum in hujusmodi morbis, licet chronicis, ubique consideretur, quod in contagio & hereditaria multiplicatione manifestum est) *specificus acidus*, spiritus influos & massam sanguineam imprimis inquinans: specificum saporem voco, utpote à priori à nemine dignè explicatum; de acidi verò natura esse, symptomata confirmant. Dum verò spiritus inquinat, fermentum digestivum ventriculi, ejusque protopepticum acidum simul, idque serè primariò, alterabit; unde primò digestionis ex errato continuatus morbi semel inchoati progressus vel sponte suâ patefcit.

Distinctio scorbuti in eum, qui est ex sanguinis ranciditate sulphurea, qui à sale fixo, & à quibusdam scorbutus *calidus* dicitur, & qui ab acido, & hinc *frigidus* salutatur, quam habet CHARLETON *Tract. de Scorbuto*: aut duplex ista sanguinis diathesis scorbutica, vel sulphureo-salina seu calida, vel salino-sulphurea seu frigida, quam habet WILLIS, non videtur essentialis, sed ex eo saltem nata, quod pro varietate constitutionis nativæ ægrotum seu crasseos sanguinis partium solidarum, ac seminalis diversitate, fermentum seu odor scorbuticus symptomata plus minus diversâ inferat: Eum in finem tamen differentiarum tales saltem observandæ sunt, ut remediorum selectus eò concinnior fieri & methodus medendi exactior institui queat, quatenus in priori remedia magis temperata & venæ sectio, neutiquam aciora & volatilia oleosa conveniunt; in posteriore verò remedia magis activa & sale volatili oleoso abundantia, item Martialia, quæ acidum uberius temperant ac destruant, commendari solent.

Hic itaque prælibatis pergo ad *Signa*.

## DIAGNOSIS

### MALI HYPOCHONDRIACI

#### E T

### SCORBUTI.

*Signa* tam Mali hypochondriaci, quàm scorbuti, ex superius recensitis symptomatibus per se sunt clara & manifesta; nam illa aperte declarant, qualis sit materia? Magistamen specialiter, ubi stomachi non ritè digerentis adfuit pathemata, cum symptomatibus circa abdomen, cum torminibus & flatibus intestinorum, alvi obstructione, & hinc corporis perturbatione, aliisque symptomatibus, nullum dubium est, adesse etiam Malum hypochondriacum. Nam hæc signa primaria sunt mali hypochondriaci, quæ serè semper adesse solent in hoc affectu, & his ipsæ etiam vel sponte se manifestare. Quod si his tantum primariis alia etiam supra enumerata superveniant symptomata, diagnosi Mali hypochondriaci eò est certior.

*Signa* Scorbuti autem *diagnostica* sunt vel externa quedam, vel interna, symptomata nempe corpori in hærentia. Illa sunt parentes Scorbutici, conversatio cum scorbuticis intimior, commoratio in locis maritimis ac paludosis, febres diurnæ, vel alii morbi chronici, ab Antiscorbuticorum usu levamen, ac si quis absque alterius morbi certis indicibus sæpius valetudinarium agat. Hæc verò seu *interna* majoris ponderis sunt, & jam sunt recensita; quamvis eorum alia frequentiora, alia rariora observentur; rarissimè autem cuncta in uno subiecto concurrunt. Scorbutus enim, nisi inveteratus sit, est difficiliter cognoscibilis: interim tamen cum scorbutus sit protheus, & se quibusdam morbis associet, semper pejora symptomata atque in morbo simplici.

Ut igitur cognoscatur latentis Scorbutus, consideret Medicus urinam, quæ est vel nimis flammæa, vel etiam cum arenulis istis ruffis imprægnata, vel & caudâ pavonis est instrata.



Præter urinam attendat Medicus symptoma dolorosa: si patiuntur dolores partium ultra naturam talis morbi, si in alio morbo superveniat dolor lancinans in lumbis, nisi adsit nephritis, signum est adesse scorbutum: quibus si nervosi generis pathemata superveniant, de scorbuti præsentia vix amplius dubitandum erit. Confirmatur, si æger conquærat de doloribus gingivarum & dentium, si hinc inde macula excrecant, quæ quod majores sunt, imprimis in cutribus, eò magis malum manifestum est.

Præter maculas pruritus scorbutus interdum solet inferre, pruriginosam quoque purpuram, quæ certum signum est scorbuti latentis.

Porro jejuno stomacho, frequens est pyralismus.

Signa scorbuti primaria, & quibus tantum non infallibiliter cognoscipotest scorbutus, recenset sequentia LINDANUS: nempe (1) Ardorem & titillationem in gingivis cum subsequente cruentatione, adeo ut si parum fricentur, cruententur, ubi sanguis aquosus & salsus effluere solet, qui postea fit fatidus. (2) Subconcavo oculorum apparet color purpureus, qui est quasi semi-lunaris, inquit LINDANUS. Et hoc unum signum si adest, satis arguit tunc adesse scorbutum: cui si accedat cruentatio gingivarum, res est serè infallibilis. (3) Macula instar morsicellarum pulicum, præsertim in femoribus & inferioribus tibiarum partibus, subinde apparent. (4) Signum admodum singulare & multum conducens ad cognitionem scorbuti est vacillatio genuum, ita ut eorum robur corpus fulciens pereat, & æger quasi sint lapsuri. (5) Adest intensus & insignis factor oris, isque præsertim jejuno ventriculo. (6) Sentiant crebro phlogosin & exsultationem per totum corpus. Hæc cœu signa primaria recenset LINDANUS pro cognitione scorbuti. His addo ego (7) arenulas rubras & faciliè friabiles, si nempe hæ ipsæ fundo & lateribus matulæ adherere videantur.

Hæc quoad Diagnosin: Sequitur

## PROGNOSIS MALI HYPOCHONDRIACI ET SCORBUTI.

Hi duo affectus recentes adhuc, & nervoso generi aliisque partibus solidioribus nondum impressi, idoneis medicamentis & accuratori victus ratione possunt faciliè curari.

Malum hypochondriacum incipiens solus motus corporis curat, ritè institutus.

Verùm quòd magis inveteratum fuit Malum, & nisi simul exacta & cauta observetur diæta, hinc firmiores egerit radices, in specie in negotio digestionis primæ economiam systematis nervosi turbaverit, gingivas ac dentes eroserit, viscera notabiliter contummarit, maculas & exanthemata projecerit, impossibile est, ægrum perfectè curari; sed palliativè tantum iisdem occurrimus, præprimis cum maxima medicinæ opera urgentibus symptomatis tollendis, neglecta causâ continente, non raro impendantur. Accedit & hoc, quod ejusmodi chronici affectus continuatum etiam remedium postulant usum, nec denuò semel mitigati recrudescant ulterius, donec perfectè eradiceantur: in quo ipso tamen maximè inobedientes sunt ægri remedium tardium percipientes; subito enim, ubi paulò melius se sentiunt, ab ipsis ut plurimum desistunt.

Scorbutus enim est lerna malorum atque morborum; haud enim faciliè reperitur morbus, qui non possit originem trahere ex scorbuto.

Imprimis autem producit obstructions varias ob visciditatem sanguinis, omnis generis convulsiones, v. g. colicas, hystericas, hypochondriacas, artuum omnis generis dolores, v. g. odontalgiam, dolores arthricos, cephalalgiam, lippitudines, &c. Adeoque vel singulis annis vel longiore aut breviori intervallo scorbutus excitat tumultus, nunc hic nunc aliis stipatus, symptomatibus, sæpèque ad plures annos protrahitur, donec tandem aut perpetuo languore ægri contabescant, aut hydropici aut phthisici evadant, aut sphacelo hujus vel illius membri corripiantur. Scorbutus enim inveteratus interdum in Cachexiam universalem, interdum etiam in hydropem, terminatur; sæpissimè verò in atrophiam & tabem transiit, lentique morte hominem jugulat.

Periculosa contingit scorbuticis dyspnœa, utpote ex qua ægri non raro pereunt; non quidem in se, sed si non statim commodis solvantur remediis: vid. BARBETTE Prax. pag. 145. Maximè observatu dignum est prognosticon SENNERTII, quod habet lib. 3. Prax. cap. de scorbuto pag. 604. *Respirationis, inquit, difficultas & pectoris angustia periculosum malum est, ob quam, si Medicus & adstantes suum officium non faciant, sæpè ægri syncope præter expectationem intereunt; sin verò fortior natura morbum diutius tolerare possit, plerumque in hydropem ægri incidunt, præcipue ii, qui purgantibus fortioribus subinde vii solent.*

Quibus alvus pertinax, morbus hic gravior evadit.

Porro hæmorrhoidum & mensium fluxus aut similis quædam solennis hæmorrhagia periodica, ut hæc mala insigniter leniunt, ita eorum suppressio aut naturalis emanatio non parum ista aggravat: vid. suprâ, ubi de hæmorrhoidibus pag. 233.

Pulsus in Hypochondriacis est variformis, quandoque intermittit: in scorbuticis verò, imprimis in scorbuto ut sic, est admodum varius, subinde parvus, languidus & inæqualis est, ut æger omni momento, quoad pulsum, videatur expiraturus; sed longè minus periculosus est, quàm in aliis morbis esse solet, & si non alia symptomata adsint, non terreatur Medicus. Pulsus deficiens subinde deprehenditur, quando propter acidum sanguis ad grumescentiam plus minus disponitur, ut hinc inde grumi sanguinis colligantur, qui motum arteriarum impediunt: malum signum est.

Urina in Malo hypochondriaco hætenus tenuis & clara, si vel sponte vel ab usu medicamentorum crassior evadat, melior est, cum illa crassos humores in corpore detineri arguat. Nigræ quoque urinæ sine febre post usum remedium antiscorbuticorum sæpè hunc mortuum solvunt; indicant enim excrementorum præcipitationem ex massa sanguinea.

De cætero Hypochondriaci non raro hydropici & hæctici, interdum melancholici & maniaci, evadunt.

Maculæ scorbuticæ, æquè ac in febribus petechialibus, quòd magis rubent, & quòd sunt grandiores, sunt eò meliores & sine periculo: tamen quòd magis ad cœrurum & lividum atque atrum colorem tendunt, non itecos ac febrium malignarum petechiæ, eò sunt peiores; qui ægritarius evadunt & in aperta si abeant ulcera, difficulter sanantur: semper tamen bonum signum est, cæteris paribus, maculæ rubræ.

In omni scorbuto levant nocturni sudores symptomata, nisi sint nimium frequentes, apprime verò sudores cum efflorescentia maculari.

Porro observanda etiam est mira & continua symptomatum scorbuticorum inter se metamorphosis: Nam dolores vagi transeunt in pertinacem cephalalgiam, nunc in paresin, nunc colicam convulsivam: Colica subinde mutatur in paralytin & paresin; & contra: Item convulsiones scorbuticæ subinde etiam in paralytin nonnunquam terminantur, aut etiam in cataphoram: Nunc transeunt in tumorem modò evanescentem, modò denuò emergentem; nunc transeunt in Asthma convulsivum, subinde & epilepsiam.

Quando scorbutici atrocissimis doloribus artuum laborant, subito lethargo correpti in alium statum mutantur.

Difficilioris curationis observatur scorbutus calidus dictus, quam frigidus, cum in illo particulæ salino-sulphureæ sanguinis massæ intimius junctæ videantur, in hoc verò laxè magis ipsi adhærescant.

Scorbutus morbis diuturnioribus superveniens, aut Valerudinarios ex quacunque causa invadens, ægrius curatur, utpote in quibus & sanguis & viscera jam tum vitata.

Cujus etiam serè generis est scorbutus malæ victus ratione, & imprimis potius generosioris frequentis usu contrahitur: cum è contra, qui per contagium, aeris insalubritatem, aut vitam sedentariam excitatur, minorem curandi difficultatem foveat.

Sic difficulter compescitur scorbutus hereditarius, aut qui lacte materno aut nutricis fuerit instillatus.

Quo fixior est scorbutus, eò difficilior curatur; si vagus melius curatur.

Præceteris gingivarum habenda est ratio, quarum cruentationi & ulcerationi interdum gangraena supervenit, interdum



terdum etiam livor & putredo palatum occupat & corrumpit: vid. SENNERTUS: id quod quibusdam anam dedit, ut purarint esse luem Veneream, cum tamen tantum fuerit scorbutus: Alias certum est, nullum morbum magis cognatum esse Lue Venereæ, quam scorbutum, cum etiam dolores in scorbutis æque nocturno tempore magis affligant, sicuti fit in Lue Venerea.

Humorum per superiora atque inferiora rejectio parum levaminis scorbuticis creat, sed hi potius doloribus & cruciatibus ventris diuturnioribus conficiuntur: vid. EUGALENUS de Scorb. p. 7. & 8. Imprimis scorbutus cum diarrhoea est periculosissimus.

Hoc tamen circa prognosin scorbuti adhuc notetur: illam cautè esse applicandam, cum plurimi pro desperatis habiti reconvascant. E contra et si symptomata mitiora videantur, si abdominis viscera indurata, pulmones corrumpi incipiant, vix successus laudabilis promitti poterit: vid. WILLISIUS de Scorb. cap. 6.

Sed de his & similibus ad Scorbutum & Malum hypochondriacum attinentibus vid. Autores supra citati, in specie REUSNERUS de Scorb. MOELLENBROCCIUS, qui quidem scripsi de Variis seu Arthritide Vagæ scorbutica; sed tamen etiam multa habet, quæ ad scorbuti naturam declarandam optime faciunt, tam quoad Theoriam, quam quoad Praxin; & HORSTIUS in Tr. parvo, sed accurato, de Scorbuto.

### C U R A.

Quod attinet Curam Mali hypochondriaci & scorbuti: in hac ad Mali scaturiginem, nempe stomachum, præsertim est respiciendum. Propterea

1. Acidum viscidum peccans & vitiosæ cruditates, tam primarum viarum, quam in Massa sanguinea & lucis corporis, corrumpitur: idque vel cum generalibus acidum temperantibus, vel specificis, in specie Antiscorbuticis, acidum scorbuticum emendantibus.
2. Corruptum acidum peccans, & ita in ferocem materiam transmutatum, evacuandum, imprimis per vomitum, urinam, & sudores.
3. Stomachi semper exacta habenda est ratio, ejusque fermentativus liquor volatilibus temperandus & volatilifandus, & digestio naturalis, quantum possibile, promovenda, & in naturalem statum restituenda.
4. Lacticinus sanguinis crasis in Scorbuto corrupta, seu cacochymia, emendanda & quali renovanda; unde in Scorbuto imprimis habenda est ratio specificis lapidis scorbutici. Ac
5. Si quæ subsint evacuationum solennium suppressiones tollantur.

Corrigentia acidum sunt vel generalia, nempe Metallica abstergentia, martialia, sturnina, terrea, & quæ de salium fixorum alcalium sunt natura, omne acidum destruentium; item Vegetabilia acris & aromatica, animalium partes duræ, Marina, & ex omnibus his parata multa remedia artificialia: Vel sunt specialia, ut salia volatilia acris & oleosa antiscorbutica ex Vegetabilibus, tam nativa, quam arte facta, & animalis regno ab appropriatis desumpta, nempe lumbicis, &c. crasin massæ sanguineæ sensim alterantia, & ita nunc per sudorem, nunc per urinam heterogenea excludentia. Hæc vulgò Hepatica, item Splenetica, & Stomachica appellari solent: quibus commode elegantiores Tincturæ antimoniales aut solates sociandæ sunt. In quibus scopis simul observanda semper symptomata varia, ut additis convenientibus remediis & horum in ferocia mitigetur. Cumque ex superioribus constat, Causam scorbuticam proximam induplici falsedine præternaturali consistere, utraq; etiâ sui emendationem postulat; & quidem utram in primis viis, si in culpa fuerint, quam in Massa sanguinea. Ratione primarum viarum, quia in his vel occasione calumpnatorum, vel dyscrasie propriæ, cruditates, tanquam scorbuti prima rudimenta, cumulantur, illorum selectio in pars diæretica, hujus emendationem Pharmaceutica docet. Scilicet: alimenta euechyma atque eupepta simpliciora, & facultate incidendi atque resolvendi potentia, adsumantur: crassa, viscida, sale condita, fumo indurata, legumina verò, fructus immaturi, pisces superius inter Causas relati, & alimentorum farrago, evitentur: saccharum & saccharata ratione salis acris &

corrosivi à plurimis in tantum vituperantur, ut ex Recentioribus sint, qui eorum abusus scorbuti hujus seculi adeò frequentis, hujusque augmento multum contribuere autumant. vid. HORSTIUS lib. 7. Observat. 34. MOELLENBROCC. de Variis cap. 8. & WILLISIUS de Scorbuto pag. 303. Potus sit vinum generosum & ventriculo gratum, cerevisia probe defecata, item lac, falsedinem scorbuti quidem eluens atque temperans, ventriculo tamen cruditatibus repleto non adeò facillè exhibendum: Cui etiam substitui potest serum lactis primas vias magis laxans, ac per urinam evacuens, adeoque sufficiens, Fructus ac Batavis hujus quotidianus usus commodum à scorbuto vernaculo existit præservativum. Quibus præter aquam nihil potulentum concessum, aut hanc cum vino temperant, seliguntque fontanam pellucidam minusque limosam; aut chalybeatam bibant; cui tamen acidulæ meritis præferuntur: vid. HORSTIUS l. c. p. 380.

At pro Chylificatione depravata, remediis pharmaceuticis corrigenda, pro meliori Curæ directione observandum:

I. Venæ sectionem quamcunque in his affectibus per se nullius esse usus, neque in Malo hypochondriaco, neque in Scorbuto; utut sint, qui in adjuncto splenis affectu salvatellæ sectionem mirè laudent in manu sinistra: & certum est, quod multi insignes Practici, aliquor observationibus inducti, hujus salvatellæ sectionem in manibus conveniunt: sed tamen re ipsa constat, quod hæc ipsa vena præ aliis venis nullam habeat prærogativam in brachio, unde hujus sectio ridicula est, de qua vid. in specie MARCUS AURELIUS SEVERINUS in Castigatione pseudo-phlebotome: Unde mirari subit, quomodo secutæ sint subinde tam prosperæ curationes post hujus sectionem; nam per se nunquam hoc factum fuit. Interim tamen, utut per se non conveniant; tamen interdum indirectè & saltem per accidens, v. g. in dolore curam scorbutico fixo incipiente, venæ sectio brachii interdum egregiè confert: sic etiam in Cephalalgia scorbutica incipiente, aut sæpius recurrente, & similibus in principio venæ sectio in brachio confert, per accidens autem: non secus ac etiam Fonticuli per se nihil conferunt, à posteriori tamen in affectibus scorbuticis catarrhalibus crebrius affligentibus, per accidens suum proficiunt, crucibus inusti.

II. Diuretica imprimis & hinc Sudorifera blanda sunt optima & naturalissima Mali hypochondriaci & scorbuti evacuantia: Certum est, si in Malo hypochondriaco largiter fuit urina, maximum esse levamen: Sint autem in principio blandiora, ne ex primis viis ad vasa rapiant saburram morbificam. Inter Diuretica conducunt prædictum remedia salina, de alcalium prosapia, non terrea, nec acida, sed alcalia vel fixa vel volatilia nitrosa ex insectis; - spectatim arcanum duplicatum Mynt. perquam egregium est, spiritus tartari volatilis, spiritus lumbicorum terrestrium, &c. sal spiritum fabarum, tinctura tartari si citè parati, vel sale tartari vel ex scorbutis antimonii, vel sola vel cum dimidio spiritus salis ammoniaci mista. V. g.

R. Arcan. dupl. Atys. ℥j.

Sal. centaur. min.

Geniste an. ℥ss.

M. pro tribus vel 4. assibus.

D. S.

Pulvis diureticus.

R. Lapill. cancr. prep. ℥j.

Terra sol. tartari ℥ss.

M. D. S.

Vi. antè.

Vel

R. Tinctura tartari (sed probe tartari sit) ℥ij.

Spir. sal. ammoniac. ℥j.

M. D. S.

Tinctura diuretica.

Dosis 30. guttulæ.

R. Tinctur. Nephrit. Sulzberg. ℥j.

Detur pro duabus dosibus:

S. ut antè.

Vel

R. Tinct. Nephrit. Sulzb. ℥ij.

Spir. carminat. de tribus ℥ij.

M. D. S. ut supra.

R. Spi-



*R. Spiritus tartari volat. 3j.*

*Cochlear. 3℥.*

*Sal. volat. succini gr. vj.*

*M. pro duobus dof. S.*

*Mixtura diuretica pro duabus dosibus.*

Sudorifera dixi debere esse blandiora, cum subinde scorbutici plus debito sudoribus diffuant: sunt vulgaria & usitata cum Antiscorbuticis mixta. **DRAWIZIUS** de *Scorbuto* pagin. 159. commendat spiritum sequentem:

*R. Spir. tart. opt. ℥i.*

*Cochlear. 3iv.*

*Mistis irrorentur*

*Vitrioli ad rubedinem mediocri igne extracti. ℥ij.*

Diger, in Balneo Mariæ per aliquot dies, dein per retortam destilletur spiritus, in fine igne fortissimo, donec spiritu vitrioli transeat. Cuius mixturæ 3℥. vel 3j. per dosi sudorifera sufficit, & conducere astringit.

Conveniunt optimè, quando in Scorbuto partes nervæ externæ graviter affliguntur, observando tamen constitutionem ægri habitus plus minus rarioris, item magis vel minus sudoribus colliquativis affectorum; pro horum enim consideratione vel copiosiora aut rariora, vel fortiora aut blandiora, usurpanda sunt sudorifera: v. g.

*R. Bezoard. Martial. gr. xv. ad 3j.*

*Sal. card. ben. 3℥.*

*M. D. S.*

*Pulvis scorbuticus sudoriferus.*

*R. Antimonii diaphor. gr. xv. ad 3j.*

*Cinnab. antim. gr. xij.*

*Ol. destillat. cochlear. gutt. j.*

*M. f. Pulvis.*

*D. S. ut antea.*

*R. Corn. Cerv. sine igne,*

*Cinnab. antimonii an. 3℥.*

*Sal. volat. viperar. gr. vj.*

*Mag. cochlear. gr. v.*

*M. D. S.*

*ut supra.*

*Usurpetur in sequenti vehiculo:*

*R. Aqu. fumar.*

*Flor. samb. an. 3℥.*

*Spir. cochlear. 3j.*

*Syr. card. ben. 3℥.*

*M. D. S.*

*Aqua ad pulverem.*

*R. Conserv. cochlear. 3j.*

*Bezoard. Martial. 3j.*

*Salis absinth. 3℥.*

*M. f. Bolus: S.*

*Bolus scorbuticus pro una dosi.*

*R. Spir. fulig. 3℥.*

*Cochlear. 3j.*

*M. D. S.*

*Mixtura Scorbutica pro una vice.*

*R. Tinctura bezoard.*

*Spir. cochlearia an. 3ij.*

*M. D. S.*

*Spiritus scorbuticus 30. gutta pro una dosi.*

*R. Aqu. Fumar. unc. j.*

*Ess. lign. compos. cum antiscorbutic. extracti. 3j.*

*Antimonii diaphor. Martial. gr. xv.*

*Syr. de fumar. 3ij.*

*M. S.*

*Potio Scorbutica pro una dosi.*

*R. Aqu. fumar.*

*Carmin. Dornier. an. unc. j.*

*Spir. cochlear.*

*Essent. pini an. 3j.*

*Tinctur. Antimonii tartarif. (vel Spir. viperar.) scrup. ℥.*

*Syr. card. ben. unc. ℥.*

*M. D. S.*

*Potio sudorifera vesperi sumenda.*

Potest etiam loco fumariz aquæ adhiberi aqua scordii, cardui benedicti. &c.

*R. Aqu. antiscorbut. Dornier. 3j℥.*

*Mixt. simpl. 3ij.*

*Spir. sal. ammoniaci sassafr. 3℥.*

*Rob juniper. 3j.*

*Syrup. fumar. 3ij. vel 3ij.*

*M. pro duabus dof. S.*

*Potio sudorifera pro duabus dosibus.*

III. Basis curandi mali hypochondriaci est *Vomitus*, præmissis digestivis, & si alvus constipata, enervate appropriato provocanda, eaque interdum post mentem tepetenda, quæ, ut & primariò vomitus, saburræ primarum viarum exterminat, & firmum fundamentum parat pro prospera futura curatione: vid, **HARTMANNUS** in *Prax. Chymiat. c. 184. §. 1.* Sine vomitu enim præmissis reliqua remedia parum vel nihil operantur. Unde dicunt, optimum esse, si hypochondriaci literati omni spatio mensuræ ad ebrietatem bibant & vomant. Si ventriculus cruditatibus repletus est, nauseam & vomendi conatum patitur, vomitus optimus est, imprimis absente dolore abdominis. Observandum tamen (1) ut ventriculi habeatur ratio, isque debilis fortioribus Vomitoriis non nimis enervetur. (2) Ut præscribantur in majori dosi, cum interdum dupla, imò tripla requiratur, & quidem potiùs in forma sicca, quàm liquida. In Scorbuto, quæ tali, raro convenit Vomitus, nisi forsitan primæ viæ saltem mundicandæ: nam periculum est, ne Vomitorio- rum viacriores scorbuticorum succi commoti varia ac deinde periculosa symptomata primarum viarum inferant, cum ipsi Scorbutici subinde à vomitionibus enormibus aut saltem inanibus, utur pravissimis vomendi conatibus, miserè vexentur.

IV. *Purgantia fortiora* & propriè dicta quæcunque semper & maximè nocent, aut saltem non profunt hypochondriacis, & deteriorem reddunt Scorbutum, imprimi si adest dolor stomachi, quin & intestinorum atque abdominis gravia inferunt symptomata, disponuntque ad dysenterias, ad tormina, & diarrhoeas, &c. Confer. **SENNERTUS** lib. 3. *Prax. ubi de Scorbuto* pagin. 608. **TIMÆUS** *Epistol. pag. 235.* **MOELLENBROCCIUS** de *Varis* pagin. 90. Speciatim si dolores in Scorbuto urgeant vel abdominis vel artuum, sedulo caveamus à Purgantibus propriè dictis, quia augent malum. Ad hæc in hypochondriacis, Purgantia subinde parum aut nihil operantur propter tormina, semper lædunt, saltem pareses aut contracturæ hinc excitantur; Laxantia è contrà optimè profunt, & interdum cum euphoria largiter evacuant. In Mulieribus hypochondriacis vel hysteriis ex levè usu purgantium faciliè dysenteria sequitur.

V. In malo hypochondriaco semper sedulo habenda est ratio mucaginis viscidæ aut pituitæ vitæ, seu familiaris somitis saporis hypochondriaci, à quo ferè diuturnitas ipsius mali ac symptomatum in primis visis pertinacia dependet. Simus ergo semper in ejus Cura solliciti, viscidum pituitosum ut incidatur & attenuetur; hinc blandè & successivè potiùs quàm confertim per primas vias evacuat. In quem finem gummata, & ex his paratæ Portiones ac Pilulæ acuedæ cum extracto trochiscorum alhandal, repetitis vicibus assumendæ, sunt optimæ, quarum formulas infra suo loco: id quod pariter in quibusvis ferè morbis chronicis ac cachecticis observandum.

VI. Inter præcipua Curationis in his duobus affectibus, & imprimis in malo hypochondriaco hoc observandum est, ut alvus semper servetur aperta; nisi enim fluida est, solent insigniter exasperari symptomata, capitis perturbationes, & symptomata melancholica: si in scorbuto non est aperta, dolores artuum & abdominis exasperantur. Ideò æger subinde habere debet aliquot medicamenta familiaria, quibus crebrò utatur, modo hoc, modo illo. Ne autem unius superveniat fastidium, aut ne natura uni assuescendo sine alteratione id accipiat.

VII. Notabile est, quod mox nec **HARTMANNUS** *Prax. Chymiat. cap. 136. §. 9.* ubi dicit: Nota verò subinde usu evenire, ut ab exhibitione aperientium & similium, solutis jam viscerum obstructionibus, ita alvus proriteretur, ut quasi dysenteria subsequi videatur, tunc providendum erit corroborantibus appropriatis, in specie Elixir proprietatis, Tinctura Coralliorum, & similibus viscerum tonum conservantibus.

VIII. Alterantia, vulgò aperientia dicta, non semper fortia aut sicciora, v. g. ablorientia vel Martialis, æquè in-



conducunt; sed interdum leniora & quasi humectantia, præstantiora observantur. Huc facit, quod dicit *Wederling Tr. de Medic. Facultat. pag. 50.*: *Observavi sapienter, contumaces Hypochondriacos cum fortioribus & siccioribus aperientibus frustra quidam fuissent vexati, optime habuisse ab humectantibus huiusmodi, unde & Galenica medicamentorum Chymicis hic commodè miscetur, & in Infusis commodè dantur, in decoctis etiam ob eandem rationem. Item ut summam hæc repetamus: Aquea & liquida magis diluunt & temperant, terrea magis absorbent, salina magis per urinam pellunt, alcalia magis incidunt, acrida magis attenuant & resolvunt, dulcia magis abstergunt, amara simul magis roborant. Pertinet huc quoque notabilis cautela TACKENII de usu Martialis: In iis, in quibus viscera tumida & inflata jam ad scirrhosam naturam degenerant, minus proficua. Vid. *Clav. Med. Hippoc. pag. 181. & 192.**

IX. Compertum est, quod in Malo hypochondriaco etiam medicamentorum antiscorbuticorum aliorumque volatilium optimus sit usus, imò vix sine alterantibus scorbuticis curari possit, quod aliis remediis non cedit. Quod si malum altius profectum sit, Antiscorbutica vel sola conveniunt, non solum in scorbuto propriè sic dicto, sed etiam in malo hypochondriaco paulo molestiore. Præ cæteris spiritus carminativus in hypochondriorum affectibus mirabilis existit.

X. Quod specificorum antiscorbuticorum magna sit varietas, utur propriè sic dicta Antiscorbutica omnia de sale volatilium acris participent; Nunc enim sunt acriora, nunc temperata, nunc aromatica sulphurea. Observanda ergo est constitutio ægri; quidam enim non possunt ferre volatilia acra, ut spiritum cochlearia. Ob id attendant Medici ad constitutionem ægri, semper delectum quandam inter remedia antiscorbutica habendo, cautèque observent, quæ & qualia imprimis uni alterivè subjecto magis sint familiaria: Nam Antiscorbutica acriora & volatilia subinde magnam Scorbuticis inferunt noxam sinistrè usurpata; sive in biliosis subjectis; sive etiam in subjectis, in quibus alcali nonnihil volatilius & acrius peccat. In talibus enim effervescentias acres, & phlogoses, symptomata multiplicia & vaga non raro excitari solent. Quo in casu antiscorbutica acrida non conveniunt, sed fixa præmittenda, aut temperatis aliis vulgò Refrigerantibus appellatis, v. g. cichorio, endivia, acetosa, acetosella, item acidis blandis, succo citri, ribium, aut berberum, spiritu salis dulci & similibus temperanda & emendanda. Quod etiam serum lactis perinet, seu optimum Anuscorbuticorum nimis acrium correctivum.

Selectum Antiscorbuticorum quod spectat, vid. *HELVETIUS Tr. Vir. Aur. pag. 50.*, dum in scorbuto cum maculis cutuleis discoloribusque cochlearia; cum maculis verò rubris acetosa; cum tumoribus artuum quasi hydropicis fumaria; cum atrophis hecubungam imprimis commendat. Par ratio est in hypochondriacis, quippe ubi phlogoses adfunt, non adhibenda oleosa aromatica, quibus potius exacerbantur, sed potius volatilia macra, seu salia volatilia macra seu salia volatilia non oleosa, uti est spiritus salis ammoniaci, carminativus de tribus, &c. Adedque in subjectis, ubi alcali volatile acre, & hinc dependentes phlogoses adfunt, prius fixa Martialia acidum absorbentia propinanda sunt, vel volatiliū acrium loco substituantur.

XI. Acetum nocet tam hypochondriacis quam scorbuticis; succus tamen vegetabilium acridi non nocent, nisi in quantum fermentationes præternaturales excitare queant. Nempe magna est differentia inter aciditatem succorum fructuum, v. g. pomorum aut pyrorum, ab aceto existis succis per fermentationem parato. Quod etiam faciunt succus citri, aurantiorum, &c. hypochondriacis ac scorbuticis non adeo hostiles; qui licet acidi, tamen in talem, quæ spiritibus lociabilis est, aciditatem terminantur, adeoque minus nocua existunt.

XII. Quod huiusmodi Antiscorbutica appropriata seu volatilia acrida non sunt usurpanda mox in principio Curæ, sed consultum est fixa, primarium viarum acidum temperantia & abstergentia, Martialia scilicet, vel salia alcalia præmittere horum usui, aut etiam eadem ipsa subinde interponere, ut cicuratis istis succis peccantes minus exasperari per volatilia, minusque effervescentia queant: (notabilis est cautela.) Hisce præmissis tandem appropriata volatilia subungi possunt. Quæ ipsa quoque si effervescentias aut phlogoses excitare observentur, lacte vel sero lactis aut ad-

ditus acidulis succis, ut lacte tamen universilibus & viscosis acrimoniae in stomacho adhuc digerendo digerenda, regulare enim quid obtinetur lac in scorbuto vitiatum, omne viscosum naturæ, quod duntaxat acrem emendat, partes vitiosas, quæ in triolo rore humectat, unde in lacte vitiatum, quod dant, & ad tabem inclinant, præmittenda sunt nobilissima sunt remedia, & acrimoniae & vitiositatis tollent, imprimis si legitimo modo cum lacte propriis miscantur. In specie commendat præparatum lactis spiritus salis ammoniaci mischis compositum chleatiz, de quo capiatur omni mane de vesperis unus haustus. In hypochondriacis etiam vitiatum regulatur, et vitiositas & obstructions melioratur. Apriatum verò iis magis est serum, utpote absterfori pollens, præprimis si ipsa Hepatica & Splenetica dicta, vel utriusque quantur, vel hoc cum illorum succis & essentia ac ventriculus illud ferat.

XIV. In Cura Scorbuti moment Praefici, ut a Mercurio quibusque omnino abstineamus, aut tamen, ut ne usurpemus; quia metus est, ne Mercurius, ad salivam disponens, pessima ac periculosissima symptomata faciat, & oris inferat: utem Dolores nocturnos in artibus, solas exasperare Mercuri alia, & etiam graves phlogoses, effusiones, & angustias excitare in tali corpore. Interim quo humores acidi sunt in corpore, Mercurius præcipitatus, cum aqua forti fieri solet. Antimonialia adeoque scorbuticis sunt optima. In Malo verò hypochondriaco Mercurius dulcis commodè admodum usurpari potest, miscendo cum cæteris laxantibus, quia fomitem materię viscidæ optimè incidit & abstergit.

His ita præmissis, pergo ad materiam Medicam. Quod attinet ergo rem Medicam in Cura Mali hypochondriaci & Scorbuti proficuum: imprimis DIGESTIVA dicta & præparantia, Sordes viscidas atque acres primarum viarum inciduntia & detergentia, simulque vi diuretica materiam ægri ad libertorem urinæ excretionem disponentia, præmittenda sunt & subinde repetenda; alias enim levioribus evacuantibus cruditates hæc non cedunt, potentioribus verò cum magnis torminibus ciuntur. Talia sunt ex vegetabilibus illa Aromatica, mitiora, quæ digestiva, inciduntia & aperientia communiter dicuntur; v. g. herba scolopendrii, ceterach, centaur. min., hyssopi marrubii, rosis marini, radix gentianæ, polypodii, cichorii, chinæ, petroselinii, liquiritiz, lign. sassafras, myrrha &c., illorumque salia fixa per incinerationem parata.

Ex mineralibus conveniunt terrea, marina & metallica; quæ tamen non tam in viscidum, quam in acidum videntur operari, unde etiam Absorbentia vocantur; v. g. creta, Mars & huius vitriolum, aliaque Martialia & Antimonialia. Ex marinis succinum præparatum, corallia præparata, margaritæ præparatæ. Ex lapidibus possunt hic adhiberi varii generis medicamenta usualia, crystallus præparata, &c. Sæpe notetur hic, non esse adhibendos lapillos, participantis de Marte: nam hi lapides constant ex multis partibus terrestribus, & paucis Martialibus, v. g. lapis hematites, magnes, &c.; hinc absorbent quidem acidum, interim tamen ob copiam partium terrestrium nimis adstringunt. Jam verò notum est, acidum excessivum ventriculi in Scorbuto & Malo hypochondriaco coagulare excrementa, ut inde frequens sit Malum hypochondriacis & scorbuticis alvi obstructio; & revera, non alio modo accidit obstructio alvi, quam quatenus acidum excessivum, concurrens cum partibus excrementitiis terrestribus, degenerat in corpus hypticum.

Ex animalibus conveniunt lapilli cancrorum, lapilli percarum, carphonum, castoreum, illarumque volatilia.

Ex compositis verò magis tartarus vitriolatus, tartarus nitratus, sal digestivum hypochondriacum, i. e. caput mortuum spiritus salis ammoniaci, terra foliata tartari, tartarus tartarizatus, liquor terræ foliatæ tartari, seu sal essentielle ZWELFFERI, quod videb. in *Apel. contra Tach.*, p. 73., & hoc ipsum est, quod commendat inter pulverem suum purgantem MOLLENBROCK *Tract. de Paris sub tit. Tartarus peculiari modo præparatus*. Ante ZWELFFERUM, hoc LOCATELLI describit. Ex sale tartari constat aceti acido ad saturationem usque impregnato; ita impregnatum sal solvitur in spiritu Vini, solutio abstrahitur, donec remaneat corpus laminatum sibi invicem superiacens, hinc



hinc terræ foliatæ nomen accepit: Hoc sal nihil aliud est, quam tartarus regeneratus: Nam si hoc sal essenziale per recto tam destillatur, phlegma & oleū acquiritur, quæ nihil differunt à productis tartari communis adeoque sal hoc est tartarus quidam regeneratus. Sal hoc facillè liquefcit, qui liquor polychrestus usus est in malo hypochondriaco & affectibus scorbuticis. Porro conveniunt Extractum Martis, Tinctura vitrioli Martis Zvvelferi & Ludovici, liquor terræ Mart. solaris, sal Martis compositum, tinctura tartari acris, antimonii ex scorpiis reguli antimonii, tinctura antimonii sicca, pulveres Martiales, crocus Martis aperitivus, limatura crudè pulverisata, tartarus chalybeatus, Antihecticum Poterii, antimonium diaphoreticum ex regulo antimoniali, Bezoard. Martiale, minerale; ex sulphure flores ejus, Elixir proprietatis sine acido & cum dicto sale essentiali paratum, & similia. Præ cæteris omnibus *arcannum duplicatum Mynsichti*, quod in specie destinatum est Scorbuto à MYNSICHTIO, SCHROEDERO, & LANGELOTTO. Hæc sedulo ad unam vel duas septimanas præmittantur; Capiantur quotidie bis bonâ dosi, v. g. *salis digestivi hypochondriaci* quotidie bis ʒj. ad ʒss., *Liquoris terra foliat.* Tartar. j. gutt. 30. 40. vel 50. mane jejuno stomacho in vehiculo calido, à meridie in frigido. Aliàs equidem acida quoque in visciditate primarum viarum corrigenda magni ulus sunt; quia tamen acor quidam ut plurimum in malo hypochondriaco combinatur, cautos nos esse decet in talium propinatione. Igitur non imitandus SENNERTUS C. 2. *Epist.* 30. & 35., ubi spiritum vitrioli Martis & Elixir proprietatis ratione spiritus sulphuris commendat. Salia dicta essentialia, de quibus vid. CHYMIA *Rolsincii*, etiam non perperam adhibentur; nam utot reverà juxta ZWELFFERUM in *Append.* saltem sint tartari, attamen non sunt contemnendi. Porro ex tartaro recentiores pollicentur nonnulli, v. g. LANGELOTUS, *sal volatile amaricans*, quod etiam æstimatur magnarum virium; verissimum est, spiritum tartari urinosum, de quo vid. *supplementum* 2. BECHERI, suam mereri laudem. Ex urina, excreta in loco publico, v. g. in cauponis, elaboratur per blandam calcinationem & elixivationem sal multarum virium, id quod Dreidæ à nonnullis commendatur, tanquam insigne antiarthriticum seu antipodagricum.

Formulas digestivorum varias huc facientes videbitis *supra in Prolegom. Artic. 2. capit. 3.*, item *Secl. 3. ubi de Cura morborum chronicorum*, & in *Cura Cachexia Artic. 1. Cap. 3. Sectionis hujus*, item in *Collog. Inslicue. Artic. 2. Membr. 3. Cap. 2. Secl. 1. p. 276.*

Vel pro corrigendo Acido hypochondriaco.

R. Aqu. cichor.

Fumar. an. ʒi ss.

Solut. Mart. cum succo pom. ʒiij.

Syr. de ʒ. rad. ʒj.

M. F. Mixtura:

D. S.

Mixtura corrigens.

Capiantur mane & vespere duo vel tria cochlearia.

R. Aqu. fœnicul. vel Fumar.

Mentb. an. ʒi ss.

Sol. Martis cum succo pom. ʒss.

Mag. corall. cum succo citri ʒss. ad ʒj.

Syr. cort. aurant. vel fœnic. ʒss. ad ʒvj.

M. S. ut antea.

R. Tinctur. antim. tartarizat. ʒij.

D. S.

Tinctura resolvens; 40. gutt. pro una dosi.

R. Tinct. tart. acerr. ʒss.

S. ut antea.

Dosis 40. gutt.

R. Tinct. tart. acerr.

Ex scorpiis reg. antimonii an. ʒi ss.

Spir. sal. ammoniaci drachm. j.

M. S. ut supra.

Dos. 40. gutt.

R. Arcan. tart. ʒij.

D. S.

Essentia digestiva: 40. gutt. pro una dosi.

R. Elix. propr. antiscorb. ʒss.

D. S.

Elixir aperiens; 40. gutt.

R. Tinct. Martis aperit. ʒij.

Spir. cochlear. ʒj.

Sal. ammoniaci ʒss.

M. D. S.

Tinctura aperiens; 50. gutt.

R. Limar. mart. crud. pulverisat.

Tartari chalybeat. an. ʒj.

Vitriolati ʒss.

Mag. corall. cum succo citri ʒj.

M. f. Pulv. pro ʒ. dosibus.

D. S.

Pulvis digerens mane in juscule.

R. Sol. mart. cum succo pom. ʒvj.

Spir. cochlear. ʒi ss. ad ʒiij.

M. S.

Essentia aperiens; 30. ad 40. gutt.

R. Tinct. Vitrioli Mart. Zvvelf.

Ess. fumar. compos. an. ʒij.

M. S. ut antea.

R. Arcan. dupl. ʒj.

Oc. Cancr. prepar. ʒij.

M. f. Pulv.

Div. in 4. part. equal.

D. S.

Pulvis aperiens.

R. Arcan. dupl. M.

Corall. rub. prep.

Antibet. Pot. an. ʒss.

M. f. Pulv.

Div. in 4. part. equal.

D. S.

Pulvis digestivus mane in juscule calido.

R. Limar. Mart. pulverisat. ʒss.

Ol. destill. fassaf. gutt. ij.

M. f. Pulv. S.

Pulvis digestivus.

R. Pulv. cachet. Martial. ʒss.

Terra tartarizat. ʒij.

Div. in 4. part. equal.

D. S.

ut antea.

R. Corall. rub. prepar.

Ebor. sine igne an. ʒss.

Vitrioli Mart. ad alb. calc. ʒss.

M. f. Pulv.

Div. in 2. part. equ.

D. S. ut antea.

R. Croc. Mart. aperitiv. ʒss.

Arcan. dupl. ʒj.

Sal. absinth. ʒss.

M. f. Pulvis pro ʒ. dos.

D. S.

ut antea.

R. Croc. Mart. ʒss.

Corall. rub. prep.

Salis fumar. gr. v. vel vj.

M. f. Pulvis pro 2. dos.

D. S.

ut antea.

R. Croc. Mart. aperit.

Crystall. tartari,

Pulv. rad. ari an. ʒss.

Mag. cochlear. ʒj.

M. S.

Pulvis digestivus pro ʒ. dosibus, mane in juscule calido: His subjunguntur, & intermiscuntur evacuancia blanda.

Præmissis his digestivis usurpentur Vomitoria primas vias potenter emungentia, eaque reiteranda: inter quæ eminent insula antimonialia, vel tartarus emet. Myns., qui in Malo hypochondriaco optime conducit, à gr. iv. vel mistus cum antiscorbuticis, vel ubi viscidum incidendum, cum salinis, v. g. sale ammoniaco depurato, &c. His simul semper appropriata Scorbutica vel antihypochondriaca misceantur: v. g. si fiat infusio croci metallorum in vino, tunc filtratur addendus spiritus cochleariz, aut alius compositus, aut simplex antiscorbuticus, ut magis approprietur Vomitorium: v. g.

R. Aqu. antiscorb. Dornsr. ʒiij.

Spir. cochlear. ʒss.

Tart. emet. Myns. gr. iij. vel iv.

Extr. Mart. ʒss.

M. S.

Potio emetica pro una dosi.

Quomodo fiant infusa talia, ex superioribus notum est: Post hæc vel loco horum usurpentur blandè evacuantia per alvum,



alvum, & quidem in Scorbuto sic dicto calidiore, in frigidore verò per paulò potentiora: utraque tamen non sæpius reiteranda, cum frequentiora malum exasperent; vid. EU-  
GALENUS de Scorb. 233. 243. & 248. & SALOMON  
ALBERTUS de Scorb. §. 254. Inter hæc conveniunt pilu-  
læ non tam præcisè evacuantes, quam saltem laxantes, pri-  
mas vias abstergentes, aliàs usuales dictæ, usurpari solent.  
Quoad pilulas purgantes, Mafs. Pilul. de gummi amonia-  
co Querc. Mafs., Pilul. tartarear. Querc. & Bonii, item pilu-  
læ de tamar. & aperientes Tilemanni cum Mercurio dulci,  
&c. usurpantur; item Extract. catholicum cum Gummi am-  
moniaco, bdellio, galbano & similibus in pilulas redactum,  
& cum trochiscis alhandal acuatum: quales formulas SYL-  
VIUS Pr. lib. 1. cap. 2. §. 34. cap. 7. §. 53. cap. 14. §. 50. cap. 30.  
§. 138. & cap. 34. §. 102. cap. 35. §. 16. describit, & commodè  
hypochondriacis propinari possunt. Gummi enim ammo-  
niacum laxat & promptè abstergit quasunque sordes in pri-  
mis viis stabulantes. Facit huc Mafs. Pilul. antiscorbutica-  
rum Timæi, quatum hæc est compositio:

R. Mafs. Pilul. melanag. Querc. 3℥.

Extract. fol. senn. 3℥.

Resin. jalap. 3℥. gr. vj.

Tart. vitriolat. gr. xij.

Sal. volat. succin. 3℥.

Sem. nasturt.

Cochlear.

Sinapi, an. 3℥.

M. & cum Aqu. antiscorbutica F. Mafs. Pil.

Quarum dosis est à 3j. ad drachm. ℥. Vid. MOELLEN-  
BROCK.

Saltem hic notetur: subinde pilulis talibus esse adjungen-  
da medicamenta aut Martialis, aut antimonialia, aut Mer-  
curialis, ne alvum post purgationem relinquunt adstrictam.  
Præ cæteris pilulæ usuales sunt communiter quidem aloëti-  
cæ, ex Extracto aloës gummoso, quâ ratione pilulæ rosa-  
cæe Francofurtenses & Glassiana, singulis 8. vel 14. die-  
bus vesperti semel usurpatæ hypochondriacis sanè perquam  
proficue sunt: Item pilulæ aloëtiæ ad imitationem LV-  
DOVICI in Pharmacia, item in Tr. de Volatilibus sal tartari:  
Francofurtenses præprimis cum tartaro vitriolato, simi-  
livè italico stimulo addito, acuatæ. Ipsa alias aloë in se hypo-  
chondriacis aut scorbuticis plus nocet, quam prodest, pro-  
pter virtutem adstrictivam, quam altero die post se relin-  
quunt ordinariò ratione patris resinose, utut primo die la-  
xent: lisenim resinæ purgantium & extracta resinosa mi-  
nus commodè propinantur, nisi forsitan habitioribus & suc-  
culentioribus. Propterea si aloen volumus usurpare, usus-  
pemus substantiam gummosam, quæ potest separari, teren-  
do aut extrahendo aquâ simplici, menstruo aqueo, quæ sub-  
stantia gummosa potest redigi in formam pilularum, & tales  
pilulæ dosi granorum ij, vel iij, blandè laxant alvum, & in  
tali casu hypochondriacis confirmatis omnibus tribus vel  
quatuor septimanis in usu sunt, egregia cum euphoria.  
Omnes hæc vel per se usurpari, vel cum aliis appropriatis spe-  
cificari, & cum tantillo resinæ scammonii aut jalappæ, vel  
extracto trochiscorum alhandal acuari possunt; quarum  
formulæ variz ex Idea Formul. cl. 2. §. 1. & 2., Colleg. Phar-  
maceut. in Schrød. P. 2. Class. 2. Dissert. de Præcipitant. Usu  
& Abusu c. 3. §. 30., supra de Chylificatione lassa Sect. 3. cap. 1.  
& de Cura Morborum Chronicorum Sect. 13. petendæ. Ec-  
sanè ab hujusmodi pilulis usualibus primas latrem vias ab-  
stergentibus longè plus commodi lenuunt hypochondriaci,  
quàm à fortioribus etiam propinatis purgantibus. Vel

R. Mafs. Pilul. de Ammon. Querc. gr. xv.

Gumm. ammon. aceto sol. scrup. ℥.

Scammon. sulphurat. gr. ij.

Troch. alhand. gr. j.

Cum Essent. Mart. f. pilulæ.

D. S.

Pilula laxativa pro una dosi.

R. Mafs. pilul. Cathol. gr. xij.

Gum. ammon. aceto sol. scrup. ℥. ad gr. xij.

M. f. Pil.

D. S. ut antea.

R. Mafs. pil. de Fior. cum agar. gr. xij. vel xv.

Gumm. ammon. aceto sol. scrup. ℥.

Scammon. sulphurat. gr. ij.

Extr. troch. alhand. gr. j. vel ij.

Cum Ess. Mart. vel absinth. f. pill.

D. S. ut sup.

R. Mafs. pilul. de Ammon. Querc. gr. xv. ad 3j.

Extr. Martis cum succo pom. 3℥.

Scammon. sulphurat.

Extr. troch. alhand. ana gr. j.

Cum sol. Mart. cum succo pom. f. Pilulæ.

D. S.

ut supra.

R. Extr. hellebor. nigr. gr. xv.

Gumm. Ammon. aceto sol. 3℥.

Scammon. resat.

Extr. troch. alhand. ana gr. ij.

Cum Ess. fumar. f. Pilulæ: S.

ut supra.

R. Mafs. Pilul. tartarear. Querc. vel Senn.

de Ammon. Qu. ana 3j.

Resin. jalap. 3℥.

Diagryd. gr. vj.

Ol. destillat. cort. aur.

Macis ana gutt. iv.

M. f. Pilulæ: S.

Pilula pro aliquot vicibus.

R. Aloes gummos.

Gumm. ammon. aceto sol. ana 3℥.

Arcan. duplicat. 3ij.

Extract. troch. alb. 3℥.

Cum Tinct. Mart. cum succ. pom. F. Pil.

D. S. ut antea.

Dosis XXIV.

R. Mafs. Pil. de Ammon. Querc. 3j.

Mercur. dulc. gr. xv.

Extract. troch. alhand. gr. j.

Ol. destill. anis. gutt. ij.

M. f. Pil. S.

Pilula pro una dosi.

R. Mafs. Pilul. de Ammon. Querc. gr. xv.

Tartari vitriolat. gr. vj.

Scammon. sulphurat. gr. j.

Cum Ol. destillat. anis. F. Pilulæ.

D. S. ut antea.

R. Mafs. Pil. de Ammon. Qu. gr. xv.

Extr. castor. gr. vj.

Troch. alb. gr. ij.

Cum Ess. castor. f. Pilulæ.

D. S. ut antea.

Conveniunt in Malo hypochondriaco statulento.

Vel

R. Galban. aceto sol. 3℥.

Extr. castor. 3℥. ad gr. xij.

Troch. alb. gr. ix.

Diagryd. gr. vj.

Cum Ol. destill. Carv. f. pil. pro tribus dosibus.

D. S.

Pilula laxativa resolventes pro 3. dosibus.

R. Mafs. Pilul. de tribus Ruffi gr. xij.

Mercur. dulc. 3℥.

Extr. troch. alb. gr. ij.

Cum Essent. Mart. fiant pilula.

D. S.

Pilula purgantes.

R. Mafs. Pilul. de Ammon. gr. xij.

Mercur. dulc. 3℥.

Extract. helleb. nigr. gr. v.

Troch. alb. gr. j.

Cum Ess. Mart. cum succo pomor. f. Pilulæ.

D. S.

ut ante.

R. Gumm. ammon. in aceto sol. aut Mafs. Pilul. de  
ammon. gr. xv. ad 3j.

Merc. dulc. 3℥.

Resin. scammon. gr. iij.

Cum Ess. cast. aut Elix. propr. f. Pil.

D. S. ut antea.

R. Mafs. Pil. Tartarear. vel de fumar. gr. xij.

Mercur. dulc. 3℥.

Mastic. gr. ij.

Extract. troch. alb. gr. j.

Cum Ess. fumar. vel Elix. propr. antiscorb. f.

l. a. Pil. n. 19.

D. S.

Pilula purgantes mane sumende.

R. Mafs. Pil. de Ammon. Querc. scrup. j.

Mercurii dulc. gr. xv.

Extr.



- Extr. troch. alband. gr. ij.*  
*Ol. destill. carvi gutt. ij.*  
*Cum Essent. Gummi ammon. f. Pilulæ.*  
*D. S. ut ante.*
- R.** *Extr. cathol. vel panch. Croll. ʒij.*  
*Galb. cum aceto sol. ʒj.*  
*Mercur. dulc. ʒss.*  
*Extr. troch. alb. gr. xij.*  
*M. f. pil. pro. ʒ. vel 6. dosibus: S.*  
*Pilula aperientes pro aliquot vicibus.*
- R.** *Galb. vel Gummi Amm. cum aceto sol. ʒj.*  
*Vitrioli Mart. gr. xv.*  
*Scammon. prepar. Brendel. gr. xij.*  
*Mag. jalapp. gr. vi.*  
*M. f. Pil. min.*  
*D. S. ut supra.*  
*Dentur 12. usque 15. pro dosi.*
- R.** *Mafs. Pilul. de trib. Ruffi vel Gum. Am-*  
*moniaci in aceto sol.*  
*Extr. Elleb. nigr. ana ʒss.*  
*Vitrioli Mart. ad albed. calc. gr. v.*  
*Scammon. prepar.*  
*Extr. troch. alband. an. gr. i.*  
*Cum Ess. Gum. ammoniaci vel fumar. compos.*  
*f. Pilulæ:*  
*D. S.*  
*Pilula aperientes pro una dosi.*
- R.** *Mafs. Pilul. de Amm. Querc. vel Gummi. am-*  
*mon. cum aceto sol. depur. ʒi.*  
*Vitrioli Mart. ad albed. calc. gr. v.*  
*Trochisc. alb. gr. i ʒss.*  
*Scammon. prepar. gr. i.*  
*Ol. destill. fenic. gutt. ii.*  
*Cum Ess. Gummi Ammon. f. Pilulæ quovis mense ca-*  
*piendæ.*  
*D. S. ut ante.*
- R.** *Extr. panchym. Croll. gr. xij.*  
*Mercurii dulc. ʒss.*  
*Scammon. refat. gr. iij.*  
*Cum Essent. Gum. ammon. f. Pilulæ.*  
*D. S. ut ante.*
- R.** *Mafs. Pilul. de amm. vel Tartarear. Qu. gr. xv.*  
*Mag. jalapp. gr. ii.*  
*Extr. troch. alb. gr. i.*  
*Cum Tinctur. tart. f. Pilulæ.*  
*D. S. ut supra.*

Item evacuantiæ appropriata mista alterantibus sunt optima, ut blandè & successivè per continuatum usum evacuentur & alterentur viscositates acidæ, quod faciunt imprimis Noduli vino infusi, qui ut in omnibus morbis chronicis, ita in specie in Malo hypochondriaco, & hinc Scorbuto, sunt optimi. Et quidem Ingredientia laxativa sunt imprimis omnia sennata, tam infusum herbæ, quàm pulveres sennati compositi, quorum tot sunt descriptiones, quot capita. Post sennata sunt helleborata ex helleboro nigro desumpta remedia; sive extractum ejus; sive essentia radices hellebori nigri, quæ extra scopum laxativum commodè aliis alterantibus in his malis addenda venit; sive alia ex eodem remedia. Denique his stimuli loco aliquid de colocynthide ejusque extracto potest addi, quod non est inconveniens remedium: quod si fortior jam stimulus his addendus sit, radix esulæ præparata recipiatur. Exempla nodulorum in Malo hypochondriaco, Scorbuto, & similibus morbis chronicis, videb. *suprà Sect. 13. & in Cachexia Cura 1. cap. 3. hujus Sectionis*; Vel præscribatur Nodulus antiscorbuticus ex recentibus Ingredientibus talis:

- R.** *Herb. rec. cochlear.*  
*Nasturt.*  
*Roris mar. an. Mj.*  
*Rad. armorac. rec. (Germ. Meer. restich.) ʒijss.*  
*Fol. sen. sine stip. ʒj.*  
*Rhabarb. elect. ʒss.*  
*Helleb. nig. crud. ʒij.*  
*Bacc. junip. ʒvj.*  
*Cinnamom.*  
*Galang. an. ʒijss.*  
*Sal. tartar. ʒij.*

*Incisa & contusa includantur Nodulo: S.*

*Nodulus aperiens.*

*Infundatur Vino simplici vel Absinthii,*

Vel

- R.** *Herb. absinth.*  
*Roris mar.*  
*Centaur. min. an. Mj.*  
*Flor. anth.*  
*Genist. an. M ʒss.*  
*Fol. sen. sine stip. ʒvj.*  
*Rhabarb. opt. ʒss.*  
*Helleb. nigr. ʒij.*  
*Sem. eruca contus. ʒj.*  
*Cinnam. ʒij.*  
*Caryoph. ʒj.*  
*Sal. tart. ʒij.*

*Incis. & contus. includantur Nodulo:*

*D. S. ut ante.*

- R.** *Herb. absinth.*  
*Agrimom.*  
*Centaur. min. an. Mj.*  
*Flor. anthos.*  
*Genist. an. p. liij.*  
*Rad. enul. rec.*  
*Polypod.*  
*Armorac. rec. an. ʒvj.*  
*Cort. fraxini,*  
*Tamarisc. an. ʒss.*  
*Fol. Senn. sine stip. ʒvj. ad ʒj.*  
*Helleb. nig. crud.*  
*Rhabarb. elect.*  
*Agar. albiss. ana ʒss.*  
*Zedoar.*  
*Zingib.*  
*Cinam. ana ʒj. ad ʒjss.*  
*Passul. min. ( hæ enim tanquam blandissimè*  
*temperatæ, his nodulis adduntur ) ʒjss.*  
*Sal. tart. ( est quasi stimulus menstruus ad re-*  
*solvenda ista simplicia ) ʒij. ad ʒss. ( aut loco*  
*hujus Crem. tart. ʒvj. sed falsart. est me-*  
*lius )*

*Incis. & contus. D. S.*

*Species ad nodulum laxativum in vino.*

*Includantur Nodulo, infundantur in Vino, quod omni mane & vespere capiatur, ut relaxetur alvus.*

- R.** *Com. absinth.*  
*Summ. cont. min.*  
*Herb. rec. cochl. ana M ʒss. ad Mj.*  
*Rad. armorac. rec. ʒj.*  
*Genian. ʒss.*  
*Tarax. ʒij.*  
*Fol. senn. sine stip. drachm. vj. ad ʒj.*  
*Rad. elleb. nigr. crud. ʒss.*  
*Esul. non prep.*  
*Sem. anis. ana drachm. jss.*  
*Fenic. drachm. iij.*  
*Cinnamom.*  
*Caryoph.*  
*Zingib. an. drachm. j.*  
*Sal. tart. drachm. iij.*

*Incis. & contus. includ. Nodulo:*

*D. S.*

*Nodulus laxativus in vino.*

- R.** *Herb. persicar. rec. Mij.*  
*Absinth.*  
*Roris mar. ana Mj.*  
*Fol. sen. sine stip. ʒj.*  
*Rhabarb. el. ʒss.*  
*Helleb. nigr. drachm. iij.*  
*Sem. eruc. ʒj.*  
*Cinnam. drachm. ij.*  
*Caryophyll. drachm. j.*  
*Sal. tartari drachm. iij.*  
*Incis. & contus. includantur Nodulo:*  
*D. S. ut ante.*  
**R.** *Herb. rec. fumar. M. j.*  
*Cochlear.*  
*Beccabung ana M ʒss.*  
*Rad. polypod. querc.*  
*Cort. aurant. ana ʒij.*  
*Fol. senn. sine stip.*

*Rba-*



*Rhabarb. opt. ana ʒʒ.*  
*Helleb. nigr. crud. ʒvj.*  
*Galang. ʒij.*  
*Sem. anis.*

*Fœnicul. ana ʒʒʒ.*  
*Sal. tartari drach. iij.*  
Incis. & contus. includ. Nodulo.  
D. S. ut suprâ.

*Herb. rec. fumar. m. j.*  
*Absinth.*  
*Meliss.*

*Summ. cent. min.*  
*Flor. genist. ana m. ʒʒ.*  
*Rad. enul. ʒx.*  
*Polypod.*  
*Helleb. nigr. crud. ana unc. j.*  
*Esula drach. iij.*

*Fol. senn. sine stipit. unc. j.*  
*Zedoar. drach. ij.*

*Caryoph. ʒʒʒ.*  
Incisa & contus. f. Nodulus.  
D. S. ut suprâ.

Facit huc etiam infusum seu similis nodulus contra Ma-  
lum hypochondriacum CNNEFFELIO aliâs usitatus, qui  
sic ex sequentibus:

*Herb. absinth. m. iij.*  
*Centaur. min. m. ij.*

*Rad. helleb. nigr.* (nam hæc fuit ipsius Arca-  
num purgatorium singulare, ubique ab  
ipso commendatum) ʒiij.

*Polypod. Querc. unc. iʒʒ.*  
*Cort. fraxini,*  
*Tartari albiss. ana unc. ʒʒ.*  
*Limat. Martis ʒiij.*

Incisa & contusa conspergantur  
*Spiritus salis dulc. gutt. ʒx.*  
Includantur Nodulo, qui infundatur in  
*Vini Canth. iʒʒ.*  
& more usitato adhibeatur.

Hicce in subjectis siccioribus commodè passularum mino-  
rum unc. iʒʒ. addi potest. Rhabarbarum ipsum ad curam ma-  
li hypochondriaci tanquam optimum, præsertim paulò suc-  
culentioribus, à quibusdam laudatur, alterando simul &  
evacuando: vid. RHODIUS *Cent. 2. obs. 100.*, qui ad ob-  
structionem inveteratam commendat Decoctum vel Infu-  
sum Rhabarbari. Spectat huc etiam Syrupus de Spina Cer-  
vina seu domesticus, it. Syrupus florum acaciæ & de car-  
thamo, qui sunt blandi & maximè conducunt: Aut cre-  
mor tartari cum tantillo radices jalappæ acuat; e. g.

*Crem. tartari vel tartari vitriolati,*  
*Pulv. jalapp. ana gr. xv.*  
*Olei destillat. mac. gutt. ij.*  
M. f. pulvis: S.  
*Pulvis laxativus,*  
Vel

*Tartari vitriolati. vel arcan. dupl. gr. xvj. vel ʒi.*  
*Scamm. sulphurat. gr. ij.*  
*Trech. alband. gr. ij.*  
M. f. pulvis S.  
ut antè.

*Pulv. diasenn. Mont. gr. xvj.*  
*Crem. tartari ʒʒʒ.*  
*Scammon. sulphurat. gr. iv. uel v.*  
M. f. pulvis:  
D. S. ut suprâ.

*Crocis Martis aperis. ʒi.*  
*Scammon. sulphurat.*  
*Sal. tartari ana gr. v.*  
M. f. pulvis:  
D. S. ut suprâ.

*Fol. senn. sine stipit. drach. iij.*  
*Rad. helleb. nigr. crud. ʒj.*  
*Zingib.*  
*Sal. tartari ana ʒi.*

Infund. in f. q. aqua calid. per noctem:  
Colaturæ manè addantur.  
*Aqua cinnum. drach. iʒʒ.*  
*Extract. troch. alb. gr. j.*  
M. D. S.

*Potio laxativa pro una dosi.*  
*Fol. senn. sine stipit. ʒij. vel iij.*  
*Estimull. Oper. Tom. II.*

*Rad. polypod. drach. iij. vel unc. ʒʒ.*  
*Fibr. helleb. nigr. ʒiij. ad ʒj.*  
*Zingib. ʒʒʒ.*  
*Sal. tartari ʒj. ad ʒʒʒ.*

Infund. per noctem in aqua simpl. vel fumar. vel sere lassis:  
mane coquatur leniter: colaturæ unc. iij. adde

*Spiritus cochlear. ʒi.*  
*Syrup. fumar. vel rosat. solus. vel de pom. drach.*  
*iij. ad ʒʒʒ.*  
M. pro dosi.  
D. S. ut suprâ.

Vel  
*Strob. pini tenell. m. j.*  
*Tamarind. unc. iʒʒ.*  
*Rad. helleb. nigr. drach. iij.*

Coq. in f. q. cerevis. secund. in vase clauso & igne  
lenissimo:

Colaturæ ʒv. adde  
*Aqua antiscorbut. Dornier. unc. ij.*  
*Crystall. tartari ʒʒʒ.*  
*Succ. cochl. rec. expr. ʒj.*  
*Syrup. scoloryrb. Forest. unc. ij.*  
M. S.

*Potio purgans pro 3. vicibus: capiatur mane per*  
*3. dies consecutivos.*

Verùm ut alvus obstructa aut saltem contumacior quoti-  
diè laxa fervetur, etiam remedia quædam domestica sedulo  
in usum vocanda sunt: quæ inter primatum obtinent *passu-  
la*, quæ admodum conveniunt in Malo hypochondriaco,  
Scorbuto etiam, & nihil nocent; cum alia *dulcia*, ut *sac-  
charata* & *melissa* hypochondriacis & scorbuticis propter  
facillimam accescentiam & propter contentorum ex efferve-  
scentia concitata turbationem, terra inferant symptomata,  
& affectus recrudescere faciant. *Passula* autem, quatenus  
sunt temperata, potius quam omnique acrimoniam in corpo-  
re temperant, emolliunt & nutriunt, & blandâ ac naturali  
fermentatione (sunt enim instar musti concentrati) viciolam  
sanguinis fermentationem restituunt & renovant, condu-  
cunt imprimis uiris, mulieribus non semper. *Poma* etiam  
*Borsderffiana* aliaque dulcia seu cruda bene matura como-  
sta, seu eorum succus usurpatus, medicamentum sunt laxa-  
tivum, & admodum temperativum in Malo Hypochon-  
driaco. Hinc succo depurato commodè alia remedia alte-  
rantia & laxativa infundi, & ita propinari possunt, qui po-  
tus admodum conducit in Malo hypochondriaco. Quod  
etiam faciunt pilulæ domesticæ seu usuales jam dictæ, omni-  
bus 8. uel 14. diebus semel capiendæ; Item Terebinthina  
manè deglutita, ad quantitatem nucis parvæ, quam HOR-  
STIUS l. 4. Obs. 28. singulariter commendat.

Conveniunt ergo hæc passulæ laxativæ, item pruna laxa-  
tiva, quæ in officinis solent prostrare; quorum vis laxativa  
est imprimis à senna, passularum nempe vel prunorum in  
Senna coctione vel maceratione: Item decoctum passula-  
rum laxativum cum & sine tamarindis; nam & ipsi tama-  
rindi utilissimi sunt Hypochondriacis ac magis Scorbuticis,  
illis præsertim, in quibus phlogoses & æstuationes vagæ sub-  
inde observantur. Formulas dabo infra l. 2. Sect. Membr. 2.  
*Articuli 3. capitis 4. ubi de Melancholia, & in Colleg. Phar-  
macent. in Ludovici Tit. 3. pag. ....* Vel

*Passul. min. unc. iʒʒ. vel unc. ii.*  
Probè conquass. coqu. in f. q. aqua simpl.  
Colat. adhuc ferventi infunde  
*Fol. Sen. sine stipit. drach. iij.*  
*Flor. violar. P. ij. ad iij.*  
*Crem. Tartari drach. j.*

Stent aliquandiu in loco calido, postmodum coletur &  
asserretur pro usu.

D. S.

*Potio laxativa.*

Capiant Hypochondriaci haustulum vitri unius (Germ.  
*ein VVein glasgen voll*) & interservit etiam pro vehiculo reli-  
quorum remediorum, blandè servat alvum apertam. Item

*Passul. min. conquass. unc. iij.*  
Coqu. in f. q. aquæ simpl.  
Colaturæ ferventis ʒij. infunde  
*Fol. Senn. sine stipit. unc. ʒʒ.*  
*Rad. helleb. nigr. non præpar.*  
*Cort. aurant. ana ʒij.*

F f

Galang.



*Galang.**Zingib. ana ʒi.**Crem. tartari ʒij.*

Stent in loco tepido per noctem vase clauso.

Colaturæ a ide

*Spiritus cochlear. ʒʒ.*M. S. ut *supra*.

Vel fiat electuarius hoc modo:

*R. Pulv. passul. min. unc. ij. vel iij.**Arcan. dupl. Mgn. ʒi.**Sal amm. depur. ( actione stomachi: )**Spec. diatrion. piper. ana drach. ʒ. vel ʒij.**Syr. depom. Reg. Sab. q. l.*

M. f. Elect. pro aliquot (9. vel 12.) dosibus usurpandum, quod sufficit inter alium apertam servat.

Si verò alius nimis contumax sit, aliquot granis *trochiscorum albandal* vel horum *Extracti* facile potest acui. Melius autem est in forma liquida propinare. Pertinet huc syrup. de spina cervina domesticus, item Vinum infusionis florum acaciz; qui pro hoc scopo sunt per quàm proficui & blandissimè alium servant apertam; vid. *Collegium Pharm. in Ludovici*. Ut taceam cremorem tartari à ʒi. ad ʒʒ. cum aliquot granis jalappæ acuatum, in jusculo teruido assumptum, egregium.

Præter dicta *Clysters* quoque in Malo hypochondriaco & Scorbuto magnæ sunt efficaciz pro aluo aperta servanda, præsertim in paroxysmo, quando æstus corporis, phlogoses &c. urgent, in abdominis affectibus minuendis, palpitatione cordis, anxietate Melancholica, dolore abdominis Scorbuto; & quidem saltem emollientes & blandè abstergentes sufficiunt; vel, quod melius est, ex urina pueri, qui conveniunt in Malo hypochondriaco cum copiosis flatibus juncto: Si contumacius sit malum, conveniunt *Clysmata* cum lixivio diluta, additis aliquot uncis mellis depurati. Talia *Clysmata* mirè conveniunt intestina abstergendo, in specie si crassiori muco sunt obfessa; vid. *supra* sect. 11. ubi de *Colica*. In doloribus abdominis conveniunt *Clysmata* ex ferolactis, aut ex lacte; vel simplici, cui parum sacchari sit additum; vel cui incoquantur plantæ quædam carminativæ.

Modus præscribendi notus est ex Morello. In specie, si urgeant dolores nephritici nothi, conveniunt *Clysmata* ex lacte cum terebinthina, qualia videb. *supra*, Sect. 9. cap. 3. Artic. 1. ubi de *Dysenteria*; faciunt urinam bene olentem instar violarum, & multum commodè afferunt. Quin etiam *Clysters* nocturni seu qui vesperti injiciuntur sub introitu lecti, & per totam noctem rementur, ad modum commendantur in *Obf. HORSTII*, & ferè ex lacte præparantur, in Scorbuto summè proficui: Imo sunt, qui alterius diebus illorum injectionem commendant, v. gr. RIVIERUSI. 12. Pr. cap. 5. ex. gr.

*R. Lact. bubul. unc. ix.**Elect. lenitiv. ʒi.*

De bacc. laur. unc. ʒ.

*Viell. ovi j.*M. f. *Clysmata* sub introitu lecti injiciendum: S. *Clyster leniens*.*R. Flor sambuc. m. ii.**Fol. hyoscyam. m. i.*

Coqu. in l. q. lact. s. bubul. vel caprill.

Colat. unc. x. ad te

*Viell. ovi j.*M. f. *Clysmata* in doloribus Scorbutoicis.

D. S. ut antè.

*R. Herb. chamomill. cum flor. m. jv.**Rad. gentian.**Bacc. juniper.**Lauri ana unc. ʒ.**Sal. tartari vel ciner. clav. ʒij.*

Coqu. in f. q. aquæ:

Colatur ʒviij. adde

*Elect. lenitiv. ʒi.**Oleu. color. rub. ʒil.*

M. f. Enema.

D. S. ut *supra*.*R. Spec. carminat.**Flor. chamomill. ana m. i.**Rad. levist. drach. vj.**Bacc. juniper. unc. j.*

Coqu. in f. q. urinae pueri:

Colat. unc. viij. adde

*Elect. Hier. cum agar. unc. j.**Mell. ambros. drach. vj.*

Misc. pro enemate:

D. S. ut *supra*.*R. Lact. bubul. ʒi.**Terebinth. cum vitell. ovi sol. unc. ʒ.**Mell. rosar. ʒvj.*M. pro *Clysmate*:D. S. ut *supra*.

Præmissis his universalibus, aut primis viis mundificatis, fiat accessus ad *Martialia salafixa*, aliaque similia, acidum peccans in primis viis emendantia: quibus vel subjunguntur vel simul cum his subministrantur Alterantia, acia quidem, amara, aromatica, quodammodò diuretica in Malo hypochondriaco; nempe conveniunt hic in genere omnia vulgò dicta Aperientia & Hepatica amara, & hinc Stomachica aromatica, & virtute in specie diuretica insignita. Vel horum loco volatilia spirituosia, spiritus ac talia Volatilia usurpantur, pro varietate nempe constitutionis subjectorum. Nam ista phlegmaticis, sanguineis, frigidis, &c. & in quibus bilis stimulo indiget, conveniunt: hæc verò urinoia volatilia Cholericis, junioribus, Melancholicis, & his, qui crebrius æstuationes patiuntur; magis conferunt *Martialia*: Hæc inter eminent nunc Mars crudus, nunc preparata varia plus minus cruda, prout plus minus acidum infringendum venit. Hinc in usu sunt omnes croci Martis aperitivi, qui, quò sunt simpliciores & acido minus concentrato parati, eò sunt meliores. Croci Martis cum salibus, item limatura Martis subtilissimè tria. Facit huc etiam terra Martis preparata, quæ inferri fodinis reperitur, laudata insigniter a ZACUTO. Huc faciunt omnes pulveres cachectici, quorum basis solet esse Mars, adjectis tamen etiam aliis; pulvis cachect. Hartmanni simplex cum cinnamomo, utriolum Martis ad pulveris consistentiam calcinatum, liquor Martis solaris, sal Martis compositum: c. gr.

*R. Conf. fumar. unc. ʒ.**Conf. alchem. ʒʒ.**Martis crudipulverisat. drach. iij.**Maz. corall. cum succo cit. drach. j.*

Cum f. q. syr. pom. uel flor. papav. virat. vel alius appropriat

F. Electuarius.

D. S.

*Electuarius aperiens pro aliquot vicibus.**R. Pulv. passul. min. unc. i.**Lim. Martis pulverisat. ʒi.**Oleu. destillas. cinam. gutt. j.*

M. pro dosi. S.

*Electuarius aperiens pro una vice.**R. Conseru. fumar. unc. ij.**Cochlear. unc. ʒ.**Vitrioli Martis drach. iij. uel Extr. Martis cum**succo pom. ʒʒ.**Corall. rub. præp.**Ebor. sine igne.**Lap. anc. præpar. ana drach. i. ad drach. iʒ.*

Cum f. q. syr. pom. f. Electuarius. D. S.

*Electuarius aperiens pro aliquot vicibus.*

De quo capiatur omni mane don 2. castinearum magnitudinis, subjungendo vesperti Elix. uel Essentiam quandam appropriatam.

*R. Tinctura Martis tartarisat ʒiij.**Spiritus cochlear. essent. drach. i.*

M. D. S.

*Aperiens tinctura chalybeata.*

Dosis 40. ad 50. gutt. bis in die.

Vel in roburioribus:

*R. Liq. Martis solaris drach. iij.*

D. S.

*Aperiens essentia chalybeata.*

De qua primo die capiatur gutt. vi. secundo viij. tertio xij. ascendendo sic ad xv. xx. & xxv. usque ad modum Acidularum naturalium in morbis Chronicis.

Ratione Martis ipsæ acidulæ naturales, quæ origi educunt ex uena Martiali soluta ab acido sulphuris, in his morbis, præmissis præmittendis, sunt adeo egregiæ, in quibus præponderat acidum forte: de qua virtute & efficacia vid. HELMONT. Parad. & TACHENFUS in Hip. Chym. SYLVATICUS C. 1. Conf. 63. & C. 3. Conf. 36. ac RIVIERUS Pr. l. 12. cap. 5. Utinam videbitis in LANGIO de U. Therm. Carol. & Acidularum Egruinarum. Loco quatum liquor Martis solatus, tanquam acidulæ concentratæ, conuocet de lub-



de substitui potest. Aliis autem acidulis artificialibus vulgo dictis quales Clyffus antimonij, &c. nihil tribuo: Siquidem adeo, certum est, quam quod ceratissimum, acidulas naturales, uti præmonitum est, operari respectu partium sibi junctarum Martialis, quæ defunctis acidulis artificialibus. In refranandis autem æstibus febrilibus, etiam malignis, laudas suas his ultro decerno, præprimis clyffo antimonij. Ex talibus acidulis elaborat tincturam suam flosum bellidis noster D. HORNIUS. Quorum stomachus est nimis sensibilis, is loco acidularum naturalium sufficit *tinctura viridolis Martis Zuelff.* solutio Martis cum succo pomorum Bosdorfianorum, item *extractum Martis* cum succo *Tamarind.* vel succo pom. Bosd. extractum. Hoc extractum succo pom. Bosd. extrahitur cum spiritu cochleariz antiscorbutico composito in essentiam seu tincturam Martialis, & est egregia tinctura antihypochondriaca: vid. DR. A. VVIZIUS. Vel solutio Martis cum succo pomor. miscenda cum spiritu cochleariz. Dosis 40. vel 50. gutt. bis vel ter in die.

Martialia hæc aliquandiu continentur, & post eorum ulum blandus instituat motus, alvusque servetur aperta.

I hæc quoque facit antimonium diaphoreticum Martiale, Bezoard. min. Martiale, & in genere quavis pulveres, electuaria, essentia, ac tinctura Martiales, antiscorbuticæ, &c. Et denique laudatur lapis Bezoar tanquam expertum in Malo hypochondriaco, ex eo, quoniam quodcunque acidum promptè absorbet.

Obervandum autem, ne semper Martialia propinentur in siccioribus subjectis, utpote in quibus blandiora & liquida non raro majorum virium observantur. In specie vero ubi viscerum intarctus ad scirrhum inclinans, subinde Martialia non conveniunt, sed malum potius intendunt; vid. *Diff. de præcipitantium usu & Abusu.* 3. §. 18. & T. ACHENIUS *Clav. Hippocr.* pag. 181. & 192. In usu medicamentorum Martialium, in specie acidularum, etiam stomachi habenda est ratio: unde externe Emplastrum de ladanio Cratois, item Emplastrum de cacamahaca, malaxatum cum oleo chamomillæ, in forma scuti Stomachalis applicantur: Item eorum cer vinum cum oleo destillato chamomillæ & menthæ illitum commodè adhibetur. Vel

*R. Olei express. Nucist. 3 ℥.*  
*Destillat. bacc. junip. 3 j.*  
*Cumin. 3 i.*  
*Macis 3 j.*  
*M. D. S.*

*Balsamum stomachale.*

Alterantia hypochondriaca, quæ Veteres consueverunt usurpare præmissis Martialibus, imprimis sunt Vegetabilia amara plus minus aromatica, Hepatica & Splenetica dicta, it. Stomachica, v.g. herba absinth. (optimum in Hypochondriacis succulentis,) agrimonia, cent. minus, rad. armoraciz, aronis, filicis, polypodii, helenii, &c. Præ ceteris fumaria, cent. minus, baccæ iunip. & omnia ex his parata, ut infusa, Decocta, quæ tamen indestudinem abierunt, & Vina Medicata. Magni etiam à nonnullis æstimantur *Cappares*, de quibus audiendus est SENNERTUS *Pr. l. 3. P. 1. S. l. c. 7.* qui difficilis non solum coctionis, sed ratione aceti quoque quo communiter congiuntur, eas suspectas pronunciat, ideoque cum passularum Corinthiacarum tertia parte, saccharo, & tantillo tantum aceti eas præparare jubet. Insigniter autem ex his Vegetabilibus quæcunque fixa lixivialia per calcinationem parata in Malo hypochondriaco conveniunt, quia sunt simul diuretica, ut sal absinthii, cichorii, centaurei minoris, sal Stomachale Mynsichti: item sal illud compositum, quod remanet in destillatione spiritus salis ammon., hoc enim sal est egregium diureticum, & vulgò vocatur sal digestivum hypochondriacum; & similia, &c. Faciunt hæc etiam Vegetabilium essentia; nempe fumariz simplex & composita, & omnia ex fumariz composita remedia, quæ egregia in malo hypochondriaco: Essentia splenis bovis, ess. absinthii ad imitationem DR. A. WIZII parata, aliaque similia: item *essentia aperitiva D. Michaelis*, cujus propter materiz medicæ cognitionem hæc est compositio:

*R. Herb. agrimon.*  
*Scolopendr.*  
*Cuscuta ana M. iij.*  
*Melisse,*  
*Ceterach,*  
*Estmull. Oper. Tom. II.*

*Herb. Cichor.*  
*Tarax.*  
*Marrub.*  
*Capill. Veneris ana M. ij.*  
*Rad. Rhabarb. Monach.*  
*Filicis,*  
*Cichor.*  
*Tarax.*  
*Gramin. ana 3 j.*  
*Curcum. 3 j.*  
*Flor. cichor.*  
*Bellid. min.*  
*Tamarisc.*  
*Hepat. nob.*  
*Genist. ana P. iij.*  
*Cort. cappar.*  
*Tamarisci,*  
*Fraxini ana unc. ij.*  
*Sem. asparag.*  
*Frax. ana unc. ℥.*  
*Anisi,*  
*Fenicul. ana 3 j.*  
*Gum. lacce unc. j.*

M. & fiat cum spiritu vini *simpl.* vel appropriato Essentia Aperitiva.

Elixir proprietatis commune, vel paratum sine acido, vel paratum cum spiritu sal. ammoniaci vinoso, vel mistum cum spiritu sal. ammon., aut etiam cum spiritu cochleariz, vel solum sufficere dicit LINDANUS in Malo hypochondriaco, it. in scorbuto in subjectis paulo habitioribus: Sic etiam Elixir stomachi de D. Michaelis mistum cum dimidia parte spiritus cochleariz, mirè conducit Hypochondriacis. Quin etiam omnia remedia tartarea salina, aliaque volatilia uberior penetrantia, nunc per sudorem, nunc per urinam evacuantia, præ ceteris sunt egregia. Hæc inter eminet sale volatile & spiritus tartari, isque ritè paratus & volatilis: item tartarus vitriolatus, tartarus chalybeatus: Item supra laudatum *arcannum duplicatum Mynsichti*, quod usu diuretico omnibus palman præcipit in Malo hypochondriaco & Scorbuto præferri frequens scorbuticis, quando crebriores phlogoses ægros fatigant; In talibus casibus est nobilissimum; unde etiam in febribus intermittentibus & scorbuticis remedium est sine pari. Tinctura tartari acris ad 40. gutt., mista cum spiritu sal. ammoniaci, item tinctura tartari antimoniatæ, quæ & ipsa est egregia. Mixture simplex, quæ pari modo conveniens est remedium in Malo hypochondriaco, non minus quam in Scorbuto. Pertinet hæc imprimis *spiritus carminativus de tribus*, ex tartaro, nitro & spiritu vini, qui vel solus vel mistus cum ana spiritus sal. ammon. potens est remedium ad malum hypochondriacum. Dosis sunt gutt. XX, XXX. ad L. usque; melius non habebitis remedium in paroxylmo Mali hypochondriaci, quod nunquam me deseruit, & Hypochondriacoz mirabiliter levat. Nam spiritus sal. ammon. per se egregius est ad curam Mali hypoch., isque non tam simplex, sed & compositus oleosus, si Mixture calcis vivæ & sal. ammoniaci addatur spiritus vini infusione *aromaticum* imprægnatus, & hinc fortè igne per retortam destilletur, producit sic spiritus vim aromaticam referens, qui est optimus dosi gutt. XXX. vel XL. in Malo hypochondriaco. Quò etiam pertinet tinctura nephritica Amelungi, & sexcenta alia, à gutt. XX. XXX. ad XL. Ut hæc *volatilia* eò magis reddantur *diuretica*, confusum est, ut imitemur ZWELFERUM, qui miscet spiritum sal. ammoniaci cum ana liquor. terra. sol. tartari, sic est forte diureticum, & tanquam quoddam seccatum à quibusdam habetur in Cura Mali hypochondriaci: Aut etiam hic ipse spiritus sal. ammoniaci miscetur cum spiritibus antiscorbuticis, cum spiritu cochleariz aut cum spiritu antiscorbutico composito, & singulariter confert in Cura Mali hypochondriaci. Ex dictis Formulæ sunt varæ.

*R. Ess. absinth. vel Ess. absinth. tartariz. 3 j.*  
*Spiritus cochlear. 3 j.* M. D. S.  
*Essentia aperiens.*

Dosis 40. gutt. bis in die.

*R. Ess. gum. ammon. unc. ℥.*  
*Spiritus sal. ammoniaci assasv. drach. ij.*  
*M. S. ut anti.*

Dosis 50. gutt.

*R. Elix. propr. sine acido, vel tinctura tart. compo*  
*vel Ess. absinth. 3 j.*  
*Spiritus sal. ammoniaci 3 ℥.*

M. S.



*Præter urinam attendat Medicus symptomata dolorosa: si* patiuntur dolores partium ultra naturam talis morbi, si in alio morbo superveniat *dolor lancinans* in lumbis, nisi adsit nephritis, signum est adesse scorbutum: quibus si nervosi generis pathemata superveniant, de scorbuti præsentia vix amplius dubitandum erit. *Confirmatur*, si æger conquerratur de doloribus gingivarum & dentium, si hinc inde *maculae* excrescant, quæ quò majores sunt, imprimis in cruribus, eò magis malum manifestum est.

*Præter maculas pruritus* Scorbutus interdum solet inferre, *pruriginosam* quoque *purpuram*, quæ certum signum est Scorbuti latentis.

Porro jejunio stomacho, frequens est *pyralismus*.

*Signa Scorbuti primaria, & quibus tantum non infallibiliter cognoscipotes* Scorbutus, recenset sequentia LINDANUS: nempe (1) *Ardorem & titillationem in gingivis*, cum subsequente *cruentatione*, adeo ut si parum fricentur, *cruententur*, ubi sanguis aquosus & salsus effluere solet, qui *postea fit fetidus*. (2) *Subconcavo oculorum apparet color purpureus, qui est quasi semi-lunaris*, inquit LINDANUS. Et hoc unum signum si adest, satis arguit tunc adesse Scorbutum: cui si accedat *cruentatio gingivarum*, res est ferè infallibilis. (3) *Macula instar morsuncularum pulicum*, præsertim in *femoribus & inferioribus tibiæ partibus*, subinde apparent. (4) *Signum admodum singulare & multum conducens ad cognitionem Scorbuti est vacillatio genuum*, ita ut eorum robur corpus fulciens pereat, & ægri quasi sint lapsuri. (5) *Adest intensus & insignis fator oris, isque præsertim jejunio ventriculo*. (6) *Sentiunt crebro phlogosim & exsultationem per totum corpus*. Hæc ceu signa primaria recenset LINDANUS pro cognitione Scorbuti. His addo ego (7) *arenulas rubras & facile friabiles*, si nempe hæ ipsæ fundo & lateribus matulæ adherere videantur.

Hæc quoad Diagnosin: Sequitur

## PROGNOSIS

### MALI HYPOCHONDRIACI

#### ET

### SCORBUTI.

*Hi duo affectus recentes* adhuc, & nervoso generi aliisque partibus solidioribus nondum impressi, idoneis medicamentis & accuratiori victustatione possunt faciliè curari.

*Malum hypochondriacum incipiens* solus motus corporis curat, ritè institutus.

Verùm quò magis inveteratum fuit Malum, & nisi simul exacta & cauta observetur diæta, hinc firmiores egerit radices, in ipse in negotio digestionis primæ economiam systematis nervosi turbaverit, gingivas ac dentes eraserit, viscera notabiliter contaminarit, maculas & exanthemata projecerit, impossibile est, ægrum perfectè curari; sed palliativè tantum iisdem occurrimus, præprimis cum maxima medicinæ opera urgentibus symptomatis tollendis, neglectâ causâ continente, non raro impenduntur. Accedit & hoc, quod ejusmodi chronici affectus continuatur etiam remedium postulantis, ne denuo semel mitigati recrudescant ulterius, donec perfectè eradiceantur: in quo ipso tamen maximè inobedientes sunt ægri remedium tardius percipientes; subito enim, ubi paulò melius se sentiunt, ab ipsis ut plurimum desistunt.

Scorbutus enim est lerna malorum atque morborum; haud enim faciliè reperitur morbus, qui non possit originem trahere ex Scorbuto.

Imprimis autem producit obstructions varias ob visciditatem sanguinis, omnis generis convulsiones, v. g. colicas, hystericas, hypochondriacas, artuum omnis generis dolores, v. g. odontalgiam, dolores arthriticos, cephalalgiam, lippitudines, &c. Adeoque vel singulis annis vel longiore aut breviori intervallo Scorbutus excitatur tumulus, nunc hic nunc aliis stipatus, symptomatibus, sæpèque ad plures annos protrahitur, donec tandem aut perpetuo languore ægri contabescant, aut hydropici aut phibici evadant, aut sphacelo hujus vel illius membri corripiantur. *Scorbutus enim in aetate interdu in Cachexiam universalem*, interdum etiam in hydropem, terminatur; sæpissimè verò in atrophiam & tabem transit, lentèque morte hominem jugulat.

Periculosa contingit Scorbuticis dyspnœa, utpote ex qua ægri non raro pereunt; non quidem in se, sed si non statim commodis solvatur remediis: vid. BARBETTE *Prax.* pag. 145. Maximè observatu dignum est prognosticon SENERTI, quod habet lib. 3. *Prax. cap. de Scorbuto* pag. 604. *Respirationis*, inquit, *difficultas & pectoris angustia, periculosum malum est, obquam, si Medicus id adstantes, suum officium non faciant, sæpè ægri syncope præter expectationem intereunt; sin vero fortior natura morbum diutius, tolerare possit, plerumque in hydropem ægri incidunt, præcipue ii, qui purgantibus fortioribus subinde uti solent.*

Quibus alvus pertinax, morbus hic gravior evadit.

Porro hæmorrhoidum & mensium fluxus aut similis quædam solennis hæmorrhagia periodica, ut hæc mala insigniter leniunt, ita eorum suppressio aut naturalis emanatio non parum ista aggravat: vid. supra, ubi de hæmorrhoidibus pag. 233.

*Pulsus in Hypochondriacis* est variformis, quandoque intermittit: in Scorbuticis verò, imprimis in scorbuto ut sic, est admodum varius, subinde parvus, languidus & inæqualis est, ut æger omni momento, quoad pulsum, videatur exspiraturus; sed longè minus periculosus est, quàm in aliis morbis esse solet, & si non alia symptomata adsint, non terreatur Medicus. Pulsus deficiens subinde deprehenditur, quando propter acidum sanguis ad grumescendum plus minus disponitur, ut hinc inde grumi sanguinis colligantur, qui motum arteriarum impediunt: malum signum est.

*Urina* in Malo hypochondriaco hætenus tenuis & clara, si vel sponte vel ab usu medicamentorum crassior evadat, melior est, cum illa crassos humores in corpore detineri arguat. Nigræ quoque urinæ sine febre post usum remedium antiscorbuticorum sæpè hunc morbum solvunt; indicant enim excrementorum præcipitationem ex massa sanguinea.

De cætero Hypochondriaci non raro hydropici & hectici, interdum melancholici & maniaci, evadunt.

*Maculae scorbuticæ*, æquè ac in febribus petechialibus, quò magis tubent, & quò sunt grandiores, sunt eò meliores & sine periculo: tamen quò magis ad cœruleum & lividum atque altum colorem tendunt, non secus ac febrium malignarum petechiæ, eò sunt peiores; qui ægri citius evadunt & in aperta si abeant ulcera, difficulter sanantur: semper tamen bonum signum est, cæteris paribus, maculæ rubræ.

In omni scorbuto levant nocturni sudores symptomata, nisi sint nimium frequentes, apprimè verò sudores cum efflorescentia macularum.

Porro observanda etiam est mira & continua symptomatum scorbuticorum inter se metamorphosis: Nam dolores vagi transeunt in pertinacem cephalalgiam, nunc in paresin, nunc colicam convulsivam: Colica subinde mutatur in paralytin & paresin; & contra: Item convulsiones scorbuticæ subinde etiam in paralytin nonnunquam terminantur, aut etiam in cataphoram: Nunc transeunt in tumorem modò evanescentem, modò denuò emergentem; nunc transeunt in Asthma convulsivum, subinde & epilepsiam.

*Quando Scorbutici atrocissimis doloribus artuum laborant*, subito lethargo correpti in alium statum mutantur.

Difficilioris curationis observatur scorbutus calidus dictus, quam frigidus, cum in illo particula salino-sulphureæ sanguinis massæ intimius junctæ videantur, in hoc verò laxè magis ipsi adhærescant.

Scorbutus morbis diuturnioribus superveniens, aut Valetudinarios ex quacunque causa invadens, ægrius curatur, utpote in quibus & sanguis & viscera jam tum vitata.

Cujus etiam ferè generis est Scorbutus malâ Victus ratione, & imprimis potius generosioris frequenti usu contractus: cum è contrâ, qui per contagium, aeris insalubritatem, aut vitam sedentariam excitatur, minorem curandi difficultatem foveat.

Sic difficulter compescitur Scorbutus hereditarius, aut qui lacte materno aut nutricis fuerit instillatus.

*Quo fixior est scorbutus*, eò difficilius curatur; si vagus melius curatur.

Præ cæteris *gingivarum habenda est ratio*, quoniam cruentationi & exulcerationi interdum gangrena supervenit, interdum



terdum etiam livor & putredo palatum occupat & corrumpit: vid. SENNERTUS: id quod quibusdam anam dedit, ut putarent esse litem Veneream, cum tamen tantum fuerit scorbutus: Alias certum est, nullum morbum magis cognatum esse Livi Venereæ, quam scorbutum, cum etiam dolores in scorbuto æque nocturno tempore magis affligant, sicuti fit in Livi Venereæ.

Humorum per superiora atque inferiora rejectio parum levaminis scorbuticis creat, sed hi potius doloribus & cruciatibus ventris diuturnioribus consociantur: vid. EUGALENUS de Scorbut. p. 7. & 8. Imprimis scorbutus cum diarrhoea est periculosissimus.

Hoc tamen circa prognosin scorbuti adhuc notetur: illam cautè esse applicandam, cum plurimi pro desperatis habiti reconvalecant. E contra et si symptomata mitiora videantur, si abdominis viscera indurata, pulmones corrumpi incipiant, vix successus laudabilis promitti poterit: vid. WILLISIUS de Scorbut. cap. 6.

Sed de his & similibus ad Scorbutum & Malum hypochondriacum attinentibus vid. Autores supra citati, in specie REUSNERUS de Scorbut. MOELLENBROCCIUS, qui quidem scripsit de Varis seu Atribris de Vaga scorbutica; sed tamen etiam multa habet, quæ ad scorbuti naturam declarandam optimè faciunt, tam quoad Theoriam, quam quoad Praxin; & HORSTIUS in Tr. parvo, sed accurato, de Scorbuto.

## C U R A.

Quod attinet Curam Mali hypochondriaci & scorbuti: in hac ad Mali scaturiginem, nempe stomachum, præsertim est respiciendum, propterea

1. Acidum viscidum peccans & vitiosa cruditates, tam primarum viarum, quam in Massa sanguinea & lucis corporis, corrigantur: idque vel cum generalibus acidum temperantibus, vel specificis, in specie Antiscorbuticis, acidum scorbuticum emendantibus.
2. Correctum acidum peccans, & ita in feralem materiam transmutatum, evacuandum, imprimis per vomitum, urinam, & sudores.
3. Stomachi semper exacta habenda est ratio, ejusque fermentativus liquor volatilibus temperandus & volatilisandus, & digesti: naturalis, quantum possibile, promovenda, & in naturalem statum restituenda.
4. Lactem sanguinis crassus in Scorbuto corruptus, seu carochymia, emendanda & quasi renovanda; unde in Scorbuto imprimis habenda est ratio specifici saporis scorbutici. Ac
5. Si quæ subsint evacuationum solennium suppressiones tollantur.

Corrigentia acidum sunt vel generalia, nempe Metallica absorbentia, martialia, sturnina, terrea, & quæ de salum fixorum alcalium sunt natura, omne acidum destruentium; item Vegetabilia acris & aromatica, animalium partes duræ, Marina, & ex omnibus his parata remedia artificialia: Vel sunt specialia, ut salia volatilia acris & oleosa antiscorbutica ex Vegetabilibus, tam nativa, quam arte facta, & animali regno ab appropriatis desumpta, nempe lumbicis, &c. crassam massam sanguineam sensim alterantia, & ita nunc per sudorem, nunc per urinam heterogenea excludentia. Hæc vulgò Hepatica, item Splenetica, & Stomachica appellari solent: quibus commodè elegantiores Tincturæ antimoniales aut solares sociandæ sunt. In quibus scopis simul observanda semper symptomata varia, ut additis convenientibus remediis & horum ferocia mitigetur. Cumque ex superioribus constet, Causam scorbuticam proximam in duplici falsedine præternaturali consistere, utraq; etiâ sui emendationem postulat; & quidem tam in primis viis, si in culpa fuerint, quam in Massa Sanguinea. Ratione primarum viarum, quia in his vel occasione assumptorum, vel dyscrasie propriæ, cruditates, tanquam scorbuti prima rudimenta, cumulantur, illorum selectum noster præteritica, hujus emendationem Pharmaceutica docebit. Scilicet: alimenta euchoyma atque eucepta simpliciora, & facultate incidendi atque resolvendi potentia, assumantur: crassa, viscida, sale condita, fumo indurata, legumina verò, fructus immaturi, pisces superius inter Causas relati, & alimentorum farrago, evitentur: saccharum & saccharata ratione salis acris &

corrosivi à plurimis in tantum vituperantur, ut ex Recentioribus sint, qui eorum abusus scorbuti hujus seculi adeo frequentem, hujusque augmento multum contribuere autumant: vid. HORSTIUS lib. 7. Observat. 34. MOELLENBROCC. de Varis cap. 8. & WILLISIUS de Scorbuto pag. 303. Potus sit vinum generosum & ventriculo gratum, cerevisia probè defecata, item lac, falsedinem scorbuti quidem eluens atque temperans, ventriculo tamen cruditatibus repleto non adeo faciliè exhibendum: Cui etiam substitui potest serum lactis primas vias magis laxans, ac per urinam evacuens, adeoque sufficiens, Frisus ac Batavis hujus quotidianus usus commodum à scorbuto vernaculo exilit præservativum. Quibus præter aquam nihil potulentum concessum, aut hanc cum vino temperant, seliguntque fontanam pellucidam minusque limosam; aut chalybeatam bibant; cui tamen acidulæ meritis præferuntur: vid. HORSTIUS l. c. p. 380.

At pro Chylificatione depravata, remediis pharmaceuticis corrigenda, pro meliori Curæ directione observandum:

I. Venæ sectionem quamcunque in his affectibus per se nullius esse usus, neque in Malo hypochondriaco, neque in Scorbuto; ut ut sint, qui in adjuncto splenis affectu salvatellæ sectionem mirè laudent in manu sinistra: & certum est, quod multi insignes Practici, aliquor observationibus inducti, hujus salvatellæ sectionem in manibus commendent: sed tamen re ipsa constat, quod hæc ipsa vena præ aliis venis nullam habeat prærogativam in brachio, unde hujus sectio ridicula est, de qua vid. in specie MARCUS AURELIUS SEVERINUS in Castigata pseudophlebotome: Unde mirari subit, quomodo secutæ sint subinde tam prosperæ curationes post hujus sectionem; nam per se nunquam hoc factum fuit. Interim tamen, ut per se non convenient; tamen interdum indirectè & saltem per accidens, v. g. in dolore crurum scorbutico fixo incipiente, venæ sectio brachii interdum egregiè confert: sic etiam in Cephalalgia scorbutica incipiente, aut sæpius recurrente, & similibus in principio venæ sectio in brachio confert, per accidens autem: non secus ac etiam Fonticuli per se nihil conferunt, à posteriori tamen in affectibus scorbuticis catarrhalibus crebrius affligentibus, per accidens sunt proficui, cruribus inusti.

II. Diuretica imprimis & hinc Sudorifera blanda sunt optima & naturalissima Mali hypochondriaci & scorbuti evacuantia: Certum est, si in Malo hypochondriaco largiter fluit urina, maximum esse levamen: Sint autem in principio blandiora, ne ex primis viis ad vala rapiant saburram morbificam. Inter Diuretica conducunt præcelsi remedia salina, de alcalium prosapia, non terrea, nec acida, sed alcalia vel fixa vel volatilia autrota ex infectis, speciatim arcanum duplicatum Mynt. perquam egregium est, spiritus tartari volatilis, spiritus lumbicorum terrestrium, &c. sal spiritum fabarum, tinctura tartari si citè paratæ vel sale tartari vel ex scoris antimonii, vel sola vel cum dimidio spiritus salis ammoniaci mista. V. g.

R. Arcan. dupl. Mynt. ℥j.

Sal. centaur. min.

Gemistæ an. ℥ss.

M. pro tribus vel q. quibus.

D. S.

Pulvis diureticus.

R. Lapill. cancr. prep. ℥j.

Terra fol. tartari ℥ss.

M. D. S.

Vi. antè.

Vel

R. Tinctura tartari (sed probè sortis sit) ℥ij.

Spir. sal. ammoniac. ℥j.

M. D. S.

Tinctura diuretica.

Dosis 30. guttulæ.

R. Tinctur. Nephrit. Sulzberg. ℥j.

Detur pro duabus dosibus:

S. ut antè.

Vel

R. Tinct. Nephrit. Sulzb. ℥ij.

Spir. carminat. de tribus ℥j.

M. D. S. ut supra.

R. Spi-



R. Spiritus tartari volat. 3j.

Cochlear. 3ss.

Sal. volat. succini gr. vj.

M. pro duabus dosi. S.

Mixtura diuretica pro duabus dosibus.

Sudorifera dixi debere esse blandiora, cum subinde scorbutici plus debito sudoribus diffuant: sunt vulgaria & usitata cum Antiscorbuticis mixta. DRAWIZIUS de Scorbuto pagin. 159. commendat spiritum sequentem:

R. Spir. tart. opt. ℞i.

Cochlear. 3iv.

Mistis irrorentur

Vitrioli ad rubedinem mediocri igne ex-

sec. ℞ij.

Diger, in Balneo Mariæ per aliquot dies, dein per retortam destilletur spiritus, in fine igne fortissimo, donec spiritu vitrioli transeat. Cujus mixturæ 3ss. vel 3j. per dosi sudorifera sufficit, & conducere astringit.

Conveniunt optimè, quando in Scorbuto partes nervæ externæ graviter affliguntur, observandotamen constitutionem ægri habitus plus minus rarioris, item magis vel minus sudoribus colliquativis affectorum; pro horum enim consideratione vel copiosiora aut rariora, vel fortiora aut blandiora, usurpanda sunt sudorifera: v. g.

R. Bezoard. Martial. gr. xv. ad 3j.

Sal. card. ben. 3ss.

M. D. S.

Pulvis scorbuticus sudoriferus.

R. Antimonii diaphor. gr. xv. ad 3j.

Cinnab. antim. gr. xij.

Ol. destillas. cochlear. gutt. j.

M. f. Pulvis.

D. S. ut antea.

R. Corn. Cerv. sine igne,

Cinnab. antimonii an. 3ss.

Sal. volat. viperar. gr. vj.

Mag. cochlear. gr. v.

M. D. S.

ut supra.

Usurpetur in sequenti vehiculo:

R. Aqu. fumar.

Flor. samb. an. 3ss.

Spir. cochlear. 3j.

Syr. card. ben. 3ss.

M. D. S.

Aqua ad pulverem.

R. Conser. cochlear. 3j.

Bezoard. Martial. 3j.

Salis absinth. 3ss.

M. f. Bolus: S.

Bolus scorbuticus pro una dosi.

R. Spir. fulig. 3ss.

Cochlear. 3j.

M. D. S.

Mixtura Scorbutica pro una vice.

R. Tinctura bezoard.

Spir. cochlearia an. 3ij.

M. D. S.

Spiritus scorbuticus 30. gutta pro una dosi.

R. Aqu. Fumar. unc. j.

Ess. lign. compos. cum antiscorbutic. extract. 3j.

Antimonii diaphor. Martial. gr. xv.

Syr. de fumar. 3ij.

M. S.

Potio Scorbutica pro una dosi.

R. Aqu. fumar.

Carmin. Dorner. an. unc. j.

Spir. cochlear.

Essent. pini an. 3j.

Tinctur. Antimonii tartarif. (vel Spir. viperar.) scrup. ℞.

Syr. card. ben. unc. ℞.

M. D. S.

Potio sudorifera vesperi sumenda.

Potest etiam loco fumariz aquæ adhiberi aqua scordii, cardui benedicti, &c.

R. Aqu. antiscorbut. Dorner. 3jss.

Mixt. simpl. 3ij.

Spir. sal. ammoniaci sassafr. 3ss.

Rob juniper. 3j.

Syrup. fumar. 3ij. vel 3ij.

M. pro duabus dosi. S.

Potio sudorifera pro duabus dosibus.

III. Basis curandi mali hypochondriaci est Vomitus, præmissis digestivis, & si alvus constipata, enenatie appropriato provocanda, eaque interdum post mentem recuperanda, quæ, ut & primariò vomitus, saburram primarum viarum exterminat, & firmum fundamentum parat pro prospera futura curatione: vid. HARTMANNUS in Prax. Chymiatr. c. 184. §. 1. Sine vomitu enim præmissis reliqua remedia parum vel nihil operantur. Unde dicunt, optimum esse, si hypochondriaci literati omni spatio menstruo ad ebrietatem bibant & vomant. Si ventriculus cruditatibus repletus est, nauseam & vomendi conatum patitur, vomitus optimus est, imprimis absente dolore abdominis. Observandum tamen (1) ut ventriculi habeatur ratio, isque debilis fortioribus Vomitoriis non nimis enervetur. (2) Ut præscribantur in majori dosi, cum interdum dupla, imò tripla requiratur, & quidem potius in forma sicca, quam liquida. In Scorbuto, qua tali, ratò convenit Vomitus, nisi forsitan primæ viæ saltem mundicandæ: nam periculum est, ne Vomitorio- rum vi actiores scorbuticorum succi commoti variæ ac deinde periculosa symptomata primarum viarum inferant, cum ipsi Scorbutici subinde à vomitionibus enormibus aut saltem inanibus, utur pravissimis vomendi conatibus, miserè vexentur.

IV. Purgantia fortiora & propriè dicta quæcunque semper & maximè nocent, aut saltem non profunt hypochondriacis, & deteriorem reddunt Scorbutum, imprimi si adest dolor stomachi, quin & intestinorum atque abdominis gravia inferunt symptomata, disponuntque ad dysenterias, ad tormina, & diarrhæas, &c. Confer. SENNERTUS lib. 3. Prax. ubi de Scorbuto pagin. 608. TIMÆUS Epistol. pag. 235. MOELLENBROCCIUS de Varis pagin. 90. Speciatim si dolores in Scorbuto urgeant vel abdominis vel artuum, sedulo caveamus à Purgantibus propriè dictis, quia augent malum. Ad hæc in hypochondriacis; Purgantia subinde parum aut nihil operantur propter tormina, semper lædunt, saltem patetes aut contracturæ hinc exantur; Laxantia è contrà optimè profunt, & interdum cum euphoria largiter evacuant. In Mulieribus hypochondriacis vel hysteriis ex levî usu purgantium facillè dysenteria sequitur.

V. In malo hypochondriaco semper sedulo habenda est ratio mucaginis viscidæ aut pituitæ vitæ, seu familiaris fomitis saporis hypochondriaci, à quo ferè diuturnitas ipsius mali ac symptomatum in primis vitis pertinacia dependet. Simus ergo semper in ejus Cura solliciti, viscidum pituitosum ut incidatur & attenuetur: hinc blandè & successivè potius quam confertim per primas vias evacuetur. In quem finem gummata, & ex his paratæ Potiones ac Pilulæ acuedæ cum extracto trochiscorum alhandal, repetitis vicibus assumendæ, sunt optimæ, quarum formulas infra suo loco: id quod pariter in quibusvis ferè morbis chronicis ac cachecticis observandum.

VI. Inter præcipua Curationis in his duobus affectibus, & imprimis in malo hypochondriaco hoc observandum est, ut alvus semper servetur aperta; nisi enim fluida est, solent insigniter exasperari symptomata, capitis perturbationes, & symptomata melancholica: si in scorbuto non est aperta, dolores artuum & abdominis exasperantur. Ideò æger subinde habere debet aliquot medicamenta familiaria, quibus crebrò utatur, modò hoc, modò illo. Ne autem unius superveniat fastidium, aut ne natura uni assuescendo sine alteratione id accipiat.

VII. Notabile est, quod mox nec HARTMANNUS Prax. Chymiatr. cap. 136. §. 9. ubi dicit: Nota verò subinde usum evenire, ut ab exhibitione apertientium & similium, solutis nam viscerum obstructionibus, ita alvus proritetur, ut quasi dysenteria subsequi videatur, tunc providendum erit corroborantibus appropriatis, in specie Elixir proprietatis, Tinctura Coralliorum, & j. similibus viscerum tonum conservantibus.

VIII. Alterantia, vulgò apertientia dicta, non semper fortia aut sicciora, v. g. abscondentia vel Martialia, æquè in-  
incon-



conducunt; sed interdum leniora & quasi humectantia, præstantiora observantur. Huc facit, quod dicit Wedelius *Tr. de Medic. Facultat. pag. 50.*: *Observavi sæpius, contumaces Hypochondriacos cum fortioribus & siccioribus aperientibus frustra quidam fuissent vexati, optimè habuisse ab humectantibus huiusmodi, unde in Galenica medicamentorum Chymicis hic commodè miscentur, & in Infusis, se commodè dantur, in decoctis etiam ob eandem rationem. Item ut summam hæc repetamus: Aquea & liquida magis diluunt & temperant, terrea magis absorbent, salina magis per urinam pellunt, alcalia magis incidunt, acrida magis attenuant & resolvunt, dulcia magis abstergunt, amara simul magis roborant. Pertinet huc quoque notabilis cautela TACKENII de usu Martialis: In iis, in quibus viscera tumida & infarcta jam ad scorbuticam naturam degenerant, minus proficua. Vid. *Clav. Med. Hippoc. pag. 181. & 192.**

IX. Compertum est, quod in Malo hypochondriaco etiam medicamentorum antiscorbuticorum aliorumque volatiliacri participent; Nunc enim sunt acriora, nunc temperata, nunc aromatica sulphurea. Observanda ergo est constitutio ægri; quidam enim non possunt ferre volatilia acra, ut spiritum cochlearia. Ob id attendant Medici ad constitutionem ægri, semper delectum quandam inter remedia antiscorbutica habendo, cautèque observent, quæ & qualia imprimis uni alterivè subjecto magis sint familiaria: Nam Antiscorbutica acriora & volatilia subinde magnam Scorbuticis infertunt noxam sinistrè usurpata; live in biliosis subjectis; live etiam in subiectis, in quibus alcali nonnihil volatilius & acrius peccat. In talibus enim effervescentias acres, & phlogoses, symptomata multiplicia & vaga non raro excitari solent. Quo in casu antiscorbutica acrida non conveniunt, sed fixa præmittenda, aut temperatis aliis vulgè Refrigerantibus appellatis, v. g. cichorio, endivia, acetosa, acetosella, item acidis blandis, succo citri, ribium, aut berberum, spiritu salis dulci & similibus temperanda & emendanda. Quò etiam serum lactis pertinet, seu optimum Antiscorbuticum vitæ acridum correctivum.

X. Quod specificorum antiscorbuticorum magna sit varietas, utur propriè sic dicta Antiscorbutica omnia de sale volatiliacri participent; Nunc enim sunt acriora, nunc temperata, nunc aromatica sulphurea. Observanda ergo est constitutio ægri; quidam enim non possunt ferre volatilia acra, ut spiritum cochlearia. Ob id attendant Medici ad constitutionem ægri, semper delectum quandam inter remedia antiscorbutica habendo, cautèque observent, quæ & qualia imprimis uni alterivè subjecto magis sint familiaria: Nam Antiscorbutica acriora & volatilia subinde magnam Scorbuticis infertunt noxam sinistrè usurpata; live in biliosis subjectis; live etiam in subiectis, in quibus alcali nonnihil volatilius & acrius peccat. In talibus enim effervescentias acres, & phlogoses, symptomata multiplicia & vaga non raro excitari solent. Quo in casu antiscorbutica acrida non conveniunt, sed fixa præmittenda, aut temperatis aliis vulgè Refrigerantibus appellatis, v. g. cichorio, endivia, acetosa, acetosella, item acidis blandis, succo citri, ribium, aut berberum, spiritu salis dulci & similibus temperanda & emendanda. Quò etiam serum lactis pertinet, seu optimum Antiscorbuticum vitæ acridum correctivum.

Selectum Antiscorbuticorum quod spectat, vid. HELVETIUS *Tr. Vir. Aur. pag. 50.*, dum in scorbuto cum maculis cæruleis discoloribusque cochleariam; cum maculis verò rubris acetosam; cum tumoribus artuum quasi hydropicis fumariam; cum atrophis hæcæbungam imprimis commendat. Par ratio est in hypochondriacis, quippe ubi phlogoses adsunt, non adhibenda oleosa aromatica, quibus potius exacerbantur, sed potius volatilia macra, seu salia volatilia macra seu salia volatilia non oleosa, uti est spiritus salis ammoniaci, carminat. de tribus, &c. Adedque in subiectis, ubi alcali volatile acre, & hinc dependentes phlogoses adsunt, prius fixa Martialis acidum absorbentia propinanda sunt, vel volatilius acridum loco substituantur.

XI. Acetum nocet tam hypochondriacis quam scorbuticis; succi tamen vegetabilium acidi non nocent, nisi in quantum fermentationes præternaturales excitare queant. Nempe magna est differentia inter aciditatem succorum fructuum, v. g. pomorum aut pyrorum, ab aceto ex istis succis per fermentationem parato. Quod etiam faciunt succi citri, aurantium, &c. hypochondriacis ac scorbuticis non adeo hostiles; qui licet acidi, tamen in talem, quæ spiritibus lociabilis est, aciditatem terminantur, adeoque minus nocua existunt.

XII. Quod huiusmodi Antiscorbutica appropriata seu volatilia acrida non sunt usurpanda mox in principio Curæ, sed consultum est fixa, primatum viarum acidum temperantia & abstergentia, Martialis scilicet, vel salia alcalia præmittere horum usui, aut etiam eadem ipsa subinde interponere, ut cicuratis istis succi peccantes minus exasperari per volatilia, minusque effervescentia queant: (notabilis est cautela.) Hisce præmissis tandem appropriata volatilia subiungi possunt. Quæ ipsa quoque si effervescentias ac phlogoses excitare observentur, lacte vel sero lactis aut ad-

ditis acidulis succis, ut supra monui, temperanda.

XIII. Lac & omnia lacticia in Scorbuto, præmissis universalibus & vitiosum acidum corrigentibus, quamdiu stomachus adhuc digerendo aliquid valet, sunt optima. Singulare enim quid obtinet Lac in corrigenda crassi sanguinis a scorbuto vitiosa, omne vitiosum acidum temperat, saltem acrem emendat, partes solidas imprimis nerveas nutritio rore humectat, unde in scorbuticis, qui nimium sudant, & ad tabem inclinant, præmissis universalibus, lacticia nobilissima sunt remedia, & atrophie ac phthiseos metuunt tollent, imprimis si legitimo modo cum Antiscorbuticis appropriatis misceantur. In specie commodè propinatur in lacte spiritus salis ammoniaci mistus cum ana spiritus cochlearia, de quo capiatur omni mane & vespere semper bonus haustus. In hypochondriacis autem cum facilius coaguletur, cruditates & obstructions metuendæ sunt. Appropriatum verò iis magis est serum, utpote potentioris virtutis absterforia pollens, præmissis si ipsi vegetabilia appropriata, Hepatica & Splenetica dicta, infundantur aut incoquantur, vel hoc cum illorum succis & essentis temperetur ac ventriculus illud ferat.

XIV. In Cura Scorbuti monent Practici, ut à Mercurialibus quibuscumque omnino abstinemus, aut saltem eadem usurpemus; quia metus est, ne Mercurius, ad salivationem disponens, pessima ac periculosissima symptomata faucium & oris inferat: utem Dolores nocturnos in arcibus solens exasperare Mercuria alia, & etiam graves phlogoses, estuaciones, & angustias excitare in tali corpore. Interdum ubi humores acidi sunt in corpore, Mercurius præcipitatur, ut cum aqua forti fieri solet. Antimonialia adeoque scorbuticis sunt optima. In Malo verò hypochondriaco Mercurius dulcis commodè admodum usurpari potest, miscendo cum cæteris laxantibus, quia fomitem mæritæ viscidæ opumè incidit & abstergit.

His ita præmissis, pergo ad materiam Medicam. Quod attinet ergo rem Medicam in Cura Mali hypochondriaci & Scorbuti proficua: imprimis DIGESTIVA dicta & præparantia, Sordes viscidas atque acres primarum viarum incidentia & detergentia, simulque vi diuretica materiam ægri ad liberiores viarum excretionem disponentia, præmittenda sunt & subinde repetenda; aliis enim levioribus evacuantibus cruditates hæc non cedunt, potentioribus verò cum magnis torminibus eiciuntur. Talia sunt ex vegetabilibus illa Aromatica, mitoria, quæ digestiva, incidentia & aperientia communiter dicuntur; v. g. herba scolopendrii, ceterach, centaurea min., hyssopi, marrubii, toris marini, radix gennæ, polypodii, cichorii, chinæ, petroselinæ, liquiritiæ, lign. sassafras, myrrha &c., illorumque salia fixa per incinerationem parata.

Ex mineralibus conveniunt terrea, marina & metallica; quæ tamen non tam in viscidum, quam in acidum videntur operari, unde etiam Absorbentia vocantur; v. g. creta, Mars & huius vitriolum, aliaque Martialis & Antimonialia. Ex marinis succinum præparatum, corallia præparata, margaritæ præparata. Ex lapidibus possunt hic adhiberi varii generis medicamenta usualia, crystalli præparata, &c. Saltem notetur hic, non esse adhibendos lapillos, participantis de Marte: nam hi lapides constant ex multis partibus terrestribus, & paucis Martialibus, v. g. lapis hæmatites, magnes, &c.; hinc absorbent quidem acidum, interim tamen ob copiam partium terrestrium nimis adstringunt. Jam verò notum est, acidum excessivum ventriculi in Scorbuto & Malo hypochondriaco coagulare excrementa, ut inde frequens sit Malum hypochondriaci & scorbutici alvi obstructio; & revera, non alio modo accidit obstructio alvi, quam quatenus acidum excessivum, concurrens cum partibus excrementitiis terrestribus, degenerat in corpus stypticum.

Ex animalibus conveniunt lapilli cancrorum, lapilli percarum, carpium, castoreum, illarumque volatilia.

Ex compositis verò magis tartarus vitriolatus, tartarus nitratus, sal digestivum hypochondriacum, i. e. caput mortuum spiritus salis ammoniaci, terra foliata tartari, tartarus tartarilatus, liquor terre foliæ tartari, seu sal essentiale ZWELFFERI, quod videt. in *Apol. contra Tach.*, p. 73., & hoc ipsum est, quod commendat inter pulverem suum purgantem MOLLENBROCK *Tract. de Paris sub tit. Tartarus peculiari modo præparatus*. Ante ZWELFFERUM, hoc LOCATELLI descripsit. Ex sale tartari constat aceti acido ad saturationem usque imprægnato; ita imprægnatum sal solvitur in spiritum Vini, solutio abstrahitur, donec remaneat corpus laminatum sibi invicem superiacens, hinc



hinc terræ foliatæ nomen accepit: Hoc sal nihil aliud est, quam tartarus regeneratus: Nam si hoc sal essenziale per rectam destillatur, phlegma & oleum acquiruntur, quæ nihil differunt à productis tartarici communis adeoque sal hoc est tartarus quidam regeneratus. Sal hoc facile liquefcit, qui liquor polychrestus usus est in malo hypochondriaco & affectibus scorbuticis. Porro conveniunt Extractum Martis, Tinctura vitrioli Martis Zvvelferi & Ludovici, liquor terræ Mart. solaris, sal Martis compositum, tinctura tartari acris, antimonii ex scorpiis reguli antimonii, tinctura antimonii sicca, pulveres Martiales, crocus Martis aperitivus, limatura crudè pulverisata, tartarus chalybeatus, Antihæcticum Poterii, antimonium diaphoreticum ex regulo antimoniali, Bezoard. Martiale, minerale; ex sulphure flores ejus, Elixir proprietatis sine acido & cum dicto sale essentiali paratum, & similia. Præ cæteris omnibus arcanum duplicatum *Mynsichtii*, quod in specie destinatum est Scorbuto à MYNSICHTIO, SCHROEDERO, & LANGELOTTO. Hæc sedulo ad unam vel duas septimanas præmittantur; Caplantur quotidie bis bonæ dosi, v. g. *salis digestivi* hypochondriaci quotidie bis ʒj. ad ʒss., *Liquoris terra foliat.* Tartar. j. gutt. 30. 40. vel 50. mane jejuno stomacho in vehiculo calido, à meridie in frigido. Alias equidem acida quoque in visciditate primarum viarum corrigenda magni usus sunt; quia tamen acor quidam ut plurimum in malo hypochondriaco combinatur, cautos nos esse decet in talium propinatione. Igitur non imitandus SENNERTUS C. 2. *Epist.* 30. & 35., ubi spiritum vitrioli Martis & Elixir proprietatis ratione spiritus sulphuris commendat. Salia dicta essentialia, de quibus vid. CHYMIA *Rolsinii*, etiam non perperam adhibentur; nam ut ut reverà juxta ZWELFFERUM in *Append.* saltem sint tartari, attamen non sunt contemnendi. Porro ex tartaro recentiores pollicentur nonnulli, v. g. LANGELOT-TUS, *sal volatile amaricans*, quod etiam æstimatur magnarum virium; verissimum est, spiritum tartari urinolum, de quo vid. *supplementum* 2. BECHERI, suam mereri laudem. Ex urina, excreta in loco publico, v. g. in cauponis, elaborantur per blandam calcinationem & elixivationem sal multatum virium, id quod Dreide à nonnullis commendatur, tanquam insigne antiarthriticum seu antipodagricum.

Formulas digestivorum varias huc facientes videbitis *supra* in *Prolegom. Arti.* 2. *capit.* 3., item *Sect.* 3. ubi de *Cura morborum chronicorum*, & in *Cura Cachexia Artic.* 1. *Cap.* 3. *Sect.* 1. hujus, item in *Colleg. Institus. Artic.* 2. *Membr.* 3. *Cap.* 2. *Sect.* 1. f. 276.

Vel pro corrigendo Acido hypochondriaco.

R. *Aqu. cicbor.*

*Fumar.* an. ʒi ss.

*Solut. Mart.* cum succo pom. ʒiij.

*Syr. de ʒ. rad.* ʒj.

M. F. Mistura:

D. S.

*Mixtura corrigens.*

Caplantur mane & vespere duo vel tria cochlearia.

R. *Aqu. fanicul.* vel *Fumar.*

*Menib.* an. ʒi ss.

*Sol. Martis* cum succo pom. ʒss.

*Mag. corall.* cum succo citri ʒss. ad ʒj.

*Syr. corr. aurant.* vel *fanic.* ʒss. ad ʒvj.

M. S. ut antea.

R. *Tinctur. antim. tartarifat.* ʒij.

D. S.

*Tinctura resolvens*; 40. gutt. pro una dosi.

R. *Tinct. tart. acerr.* ʒss.

S. ut antea.

*Dosis* 40. gutt.

R. *Tinct. tart. acerr.*

*Ex scorpiis reg. antimonii* an. ʒi ss.

*Spir. sal. ammoniaci* drachm. j.

M. S. ut supra.

*Dos.* 40. gutt.

R. *Arcan. tart.* ʒij.

D. S.

*Essentia digestiva*: 40. gutt. pro una dosi.

R. *Elix. propr. antiscorb.* ʒss.

D. S.

*Elixir aperiens*; 40. gutt.

R. *Tinct. Martis aperit.* ʒij.

*Spir. cochlear.* ʒj.

*Sal. ammoniaci* ʒss.

M. D. S.

*Tinctura aperiens*; 50. gutt.

R. *Limat. mart. crud. pulverisat.*

*Tartari chalybear.* an. ʒj.

*Vitrioli* ʒss.

*Mag. corall.* cum succo citri ʒj.

M. f. Pulv. pro ʒ. dosibus.

D. S.

*Pulvis digerens mane in juscule.*

R. *Sol. mart.* cum succo pom. ʒvj.

*Spir. cochlear.* ʒi ss. ad ʒij.

M. S.

*Essentia aperiens*; 30. ad 40. gutt.

R. *Tinct. Vitrioli Mart.* Zvvelf.

*Ess. fumar. compos.* an. ʒij.

M. S. ut antea.

R. *Arcan. dupl.* ʒj.

*Oc. Cancr. prepar.* ʒij.

M. f. Pulv.

*Div.* in 4. part. æqual.

D. S.

*Pulvis aperiens.*

R. *Arcan. dupl.* M.

*Corall. rub. prep.*

*Antibell.* Pot. an. ʒss.

M. f. Pulv.

*Div.* in 4. part. æqual.

D. S.

*Pulvis digestivus mane in juscule calido.*

R. *Limat. Mart. pulverisat.* ʒss.

*Ol. destill. fassaf.* gutt. ij.

M. f. Pulv. S.

*Pulvis digestivus.*

R. *Pulv. cachect. Martial.* ʒss.

*Terra tartarifat.* ʒij.

*Div.* in 4. part. æqual.

D. S.

ut antea.

R. *Corall. rub. prepar.*

*Ebor. sine igne* an. ʒss.

*Vitrioli Mart.* ad alb. calc. ʒss.

M. f. Pulv.

*Div.* in 2. part. æqu.

D. S. ut antea.

R. *Croc. Mart. aperitiv.* ʒss.

*Arcan. dupl.* ʒj.

*Sal. absinth.* ʒss.

M. f. Pulvis pro ʒ. dos.

D. S.

ut antea.

R. *Croc. Mart.* ʒss.

*Corall. rub. prep.*

*Salis fumar.* gr. v. vel vj.

M. f. Pulvis pro 2. dos.

D. S.

ut antea.

R. *Croc. Mart. aperit.*

*Crystall. tartari,*

*Pulv. rad. ari* an. ʒss.

*Mag. cochlear.* ʒj.

M. S.

*Pulvis digestivus pro ʒ. dosibus, mane in juscule calido.* His subjunguntur, & intermiscuntur evacuantia blanda.

Præmissis his digestivis usurpentur *Vomitoria* primas vias potenter emungentia, eaque reiteranda: inter quæ eminent infusa antimonialia, vel tartarus emet. Myns., qui in Malo hypochondriaco optimè conducit, à gr. iv. vel mistus cum antiscorbuticis, vel ubi viscidum incidendum, cum salinis, v. g. sale ammoniaco depurato, &c. His simul semper appropriata Scorbutica vel antihypochondriaca misceantur: v. g. si fiat infusio croci metallorum in vino, tunc filtraturæ addendus spiritus cochlearæ, aut alius compositus, aut simplex antiscorbuticus, ut magis approprietur Vomitorium: v. g.

R. *Aqu. antiscorb. Dornier.* ʒiij.

*Spir. cochlear.* ʒss.

*Tart. emet. Myns.* gr. iij. vel iv.

*Extr. Mart.* ʒss.

M. S.

*Potio emetica pro una dosi.*

Quomodo fiant infusa talia, ex superioribus notum est: Post hæc vel loco horum usurpentur blandè evacuantia per alvum,



alvum, & quidem in Scorbutico sic dicto calidiore, in frigidore verò per paulò potentiora: utraque tamen non sæpius reiteranda, cum frequentiora malum exasperent; vid. EU-  
GALENUS *de Scorb.* 233. 243. & 248. & SALOMON  
ALBERTUS *de Scorb.* §. 254. Inter hæc conveniunt pilu-  
læ non tam præcisè evacuantæ, quam saltem laxantes, pri-  
mas vias abstergentes, aliàs usuales dictæ, usurpari solent.  
Quoad pilulas purgantes, Mals. Pilul. de gummi amonia-  
co Querc. Mals., Pilul. tartarear. Querc. & Bontii, item pilu-  
læ de fumar. & aperientes Tilemanni cum Mercurio dulci,  
&c. usurpantur; item Extract. catholicum cum Gummi am-  
moniac, bdellio, galbano & similibus in pilulas redactum,  
& cum trochiscis alhandal acuatum: quales formulas SYL-  
VIUS *Pr. lib. 1. cap. 2. §. 34. cap. 7. §. 52. cap. 14. §. 50. cap. 30. §. 138. & cap. 34. §. 102. cap. 35. §. 16.* describit, & commodè  
hypochondriacis propinari possunt. Gummi enim ammo-  
niacum laxat & promptè abstergit quascunque sordes in pri-  
mis viis stabulantes. Facit huc Mals. Pilul. antiscorbutica-  
rum Timæi, quarum hæc est compositio:

R. Mals. Pilul. malanag. Querc. 3℔.  
Extract. fol. senn. 3℔.  
Resin. jalap. 3℔. gr. vj.  
Tart. vitriolat. gr. xij.  
Sal. volat. succin. 3℔.  
Sem. nasturt.  
Cochlear.  
Sinapi, an. 3℔.

M. & cum Aqu. antiscorbutica F. Mals. Pil.  
Quarum dosis est à 3j. ad drachm. ℔. Vid. MOELLEN-  
BROCK

Saltem hic notetur: subinde pilulis talibus esse adjungen-  
da medicamenta aut Martialis, aut antimonialia, aut Mer-  
curialis, ne alvum post purgationem relinquant adstrictam.  
Præ cæteris pilulæ usuales sunt communiter quidem aloëti-  
cæ, ex Extracto aloës gummoso, quâ ratione pilulæ rosa-  
cæ Francosurtenses & Glassianæ, singulis 8. vel 14. die-  
bus vespertî semel usurpatæ hypochondriacis sanè perquam  
proficue sunt: Item pilulæ aloëticæ ad imitationem LV-  
DOVICI in Pharmacia, item in Tr. de Volatilibus sal tarta-  
ri: Francosurtenses præprimis cum tartaro vitriolato, simi-  
livè salino stimulo addito, acuatæ. Ipsa alias aloë in se hypo-  
chondriacis aut scorbuticis plus nocet, quàm prodest, pro-  
pter virtutem adstrictivam, quam altero die post se relin-  
quunt ordinariò ratione partis resinose, uti primo die la-  
xent: lisenim resinæ purgantium & extracta resinosa mi-  
nus commodè propinantur, nisi forsan habitioribus & suc-  
culentioribus. Propterea si aloem volumus usurpare, usur-  
pemus substantiam gummosam, quæ potest separari, teren-  
do aut extrahendo aquâ simplicî, menstruo aqueo, quæ sub-  
stantia gummosa potest redigi in formam pilularum, & tales  
pilulæ dosi granorum ij, vel iij. blandè laxant alvum, & in  
tali casu hypochondriacis confirmatis omnibus tribus vel  
quatuor septimanis in usu sunt, egregia cum euphoria.  
Omnes hæc vel per se usurpari, vel cum aliis appropriatis spe-  
cificari, & cum tantillo resinæ scammonii aut jalappæ, vel  
extracto trochiscorum alhandal acuari possunt; quarum  
formulæ variz ex Idea Formul. cl. 2. §. 1. & 2. Colleg. Phar-  
maceut. in Schræd. P. 2. Class. 2. Dissert. de Precipitant. Usu  
& Abusu. c. 3. §. 30., supra de Chylificatione l. 1. Sect. 3. cap. 1.  
& de Cura Morborum Chronicorum Sect. 13. petendæ. Et  
sanè ab hujusmodi pilulis usualibus primas saltem vias ab-  
stergentibus longè plus commodi sentiunt hypochondriaci,  
quàm à fortioribus etiam propinatis purgantibus. Vel

R. Mals. Pilul. de Ammon. Querc. gr. xv.  
Gumm. ammon. aceto sol. scrup. ℔.  
Scammon. sulphurat. gr. ij.  
Troch. alhand. gr. j.  
Cum Essent. Mart. f. pilulæ.  
D. S.

Pilula laxativa pro una dosi.

R. Mals. pilul. Cathol. gr. xij.  
Gumm. ammon. aceto sol. scrup. ℔. ad gr. xij.  
M. f. Pil.  
D. S. ut antea.

R. Mals. pil. de Hior. cum agar. gr. xij. vel xv.  
Gumm. ammon. aceto sol. scrup. ℔.  
Scamm. sulphurat. gr. ij.  
Extr. troch. alhand. gr. j. vel ij.  
Cum Ess. Mart. vel absinth. f. pill.  
D. S. ut sup.

R. Mals. pilul. de Ammon. Querc. gr. xv. ad 3j.

Extr. Martis cum succo pom. 3℔.

Scammon. sulphurat.

Extr. troch. alhand. ana gr. j.

Cum sol. Mart. cum succo pom. f. Pilulæ.

D. S.

ut supra.

R. Extr. hellebor. nigr. gr. xv.

Gumm. Ammon. aceto sol. 3℔.

Scammon. rosat.

Extr. troch. alhand. ana gr. ij.

Cum Ess. fumar. f. Pilulæ: S.

ut supra.

R. Mals. Pilul. tartarear. Querc. vel Senn.  
de Ammon. Qu. ana 3j.

Resin. jalap. 3℔.

Diagryd. gr. vj.

Ol. destillat. cort. aur.

Macis ana gutt. iv.

M. f. Pilulæ: S.

Pilula pro aliquot vicibus.

R. Aloes gummos.

Gumm. ammon. aceto sol. ana 3℔.

Arcan. duplicat. 3ij.

Extract. troch. alb. 3℔.

Cum Tinct. Mart. cum succ. pom. F. Pil.

D. S. ut antea.

Dosis XXIV.

R. Mals. Pil. de Amm. Querc. 3j.

Mercur. dulc. gr. xv.

Extract. troch. alhand. gr. j.

Ol. destilli. anis. gutt. ij.

M. f. Pil. S.

Pilula pro una dosi.

R. Mals. Pilul. de Ammon. Querc. gr. xv.

Tartari vitriolat. gr. vj.

Scamm. sulphurat. gr. j.

Cum Ol. destillat. anis. F. Pilulæ.

D. S. ut antea.

R. Mals. Pil. de Ammon. Qu. gr. xv.

Extr. castor. gr. vj.

Troch. alb. gr. ij.

Cum Ess. castor. f. Pilulæ.

D. S. ut antea.

Conveniunt in Malo hypochondriaco flatulento.

Vel

R. Galban. aceto sol. 3℔.

Extr. castor. 3℔. ad gr. xij.

Troch. alb. gr. ix.

Diagryd. gr. vj.

Cum Ol. destilli. Carv. f. pil. pro tribus dosibus.

D. S.

Pilula laxativa resolventes pro 3. dosibus.

R. Mals. Pilul. de tribus Russi gr. xij.

Mercur. dulc. 3℔.

Extr. troch. alb. gr. ij.

Cum Essent. Mart. fiant pilula.

D. S.

Pilula purgantes.

R. Mals. Pilul. de Ammon. gr. xij.

Mercur. dulc. 3℔.

Extract. helleb. nigr. gr. v.

Troch. alb. gr. j.

Cum Ess. Mart. cum succo pomor. f. Pilulæ.

D. S.

ut ante.

R. Gumm. ammon. in aceto sol. aut Mals. Pilul. de  
ammon. gr. xv. ad 3j.

Merc. dulc. 3℔.

Resin. scammon. gr. iij.

Cum Ess. cast. aut Elix. propr. f. Pil.

D. S. ut antea.

R. Mals. Pil. Tartarear. vel de fumar. gr. xij.

Mercur. dulc. 3℔.

Mastic. gr. ij.

Extract. troch. alb. gr. j.

Cum Ess. fumar. vel Elix. propr. antiscorb. f.

l. a. Pil. n. 19.

D. S.

Pilula purgantes manè sumenda.

R. Mals. Pil. de Ammon. Querc. scrup. j.

Mercurii dulc. gr. xv.

Extr.



- Extr. troch. alband. gr.ij.*  
*Ol. destill. carvi gutt.ij.*  
*Cum Effent. Gummi ammon. f. Pilulæ.*  
*D. S. ut ante.*
- R. Extr. cathol. vel panch. Croll. ʒij.*  
*Galb. cum aceto sol. ʒj.*  
*Mercur. dulc. ʒss.*  
*Extr. troch. alb. gr. xij.*  
*M. f. pil. pro. ʒ. vel 6. dosibus: S.*  
*Pilula aperientes pro aliquot vicibus.*
- R. Galb. vel Gummi Amm. cum aceto sol. ʒj.*  
*Vitrioli Mart. gr. xv.*  
*Scammon. præp. Brendel. gr. xij.*  
*Mag. jalapp. gr. vi.*  
*M. f. Pil. min.*  
*D. S. ut supra.*  
*Dentur 12. usque 15. pro dosi.*
- R. Mass. Pilul. de trib. Ruffi vel Gum. Ammoniaci in aceto sol.*  
*Extr. Elleb. nigr. ana ʒss.*  
*Vitrioli Mart. ad albed. calc. gr. v.*  
*Scammon. præp.*  
*Extr. troch. alband. an. gr. i.*  
*Cum Eff. Gum. ammoniaci vel fumar. compos.*  
*f. Pilulæ:*  
*D. S.*  
*Pilula aperientes pro una dosi.*
- R. Mass. Pilul. de Amm. Querc. vel Gummi ammon. cum aceto sol. depur. ʒi.*  
*Vitrioli Mart. ad albed. calc. gr. v.*  
*Trochisc. alb. gr. i ʒss.*  
*Scammon. præp. gr. i.*  
*Ol. destill. fœnic. gutt. ii.*  
*Cum Eff. Gummi Ammon. f. Pilulæ quovis mense capiendæ.*  
*D. S. ut ante.*
- R. Extr. panchym. Croll. gr. xii.*  
*Mercurii dulc. ʒss.*  
*Scammon. rosat. gr. iij.*  
*Cum Effent. Gum. ammon. f. Pilulæ.*  
*D. S. ut ante.*
- R. Mass. Pilul. de amm. vel Tartarear. Qu. gr. xv.*  
*Mag. jalapp. gr. ii.*  
*Extr. troch. alb. gr. i.*  
*Cum Tinctur. tart. f. Pilulæ.*  
*D. S. ut supra.*

Item evacuantiâ appropriatâ mista alterantibus sunt optima, ut blandè & successivè per continuatum usum evacuentur & alterentur viscositates acidæ, quod faciunt imprimis Noduli vino infusi, qui ut in omnibus morbis chronicis, ita in specie in Malo hypochondriaco, & hinc Scorbuto, sunt optimi. Et quidem Ingredientia laxativa sunt imprimis omnia sennata, tam infusum herbæ, quàm pulveres sennati compositi, quorum tot sunt descriptiones, quot capita. Post sennata sunt helleborata ex helleboro nigro desumpta remedia; sive extractum ejus; sive essentia radices hellebori nigri, quæ extra scopum laxativum commodè aliis alterantibus in his malis addenda venit; sive alia ex eodem remedia. Denique his stimuli loco aliquid de colocynthide ejusque extracto potest addi, quod non est inconveniens remedium: quod si fortior jam stimulus his addendus sit, radix cicutæ præparata recipiatur. Exempla nodulorum in Malo hypochondriaco, Scorbuto, & similibus morbis chronicis, videb. *suprà Sect. 13. & in Cachexia Cura 1. cap. 3. hujus Sectionis*; Vel præscribatur Nodulus antiscorbuticus ex recentibus Ingredientibus talis:

- R. Herb. rec. cochlear.*  
*Nasturt.*  
*Roris mar. an. Mj.*  
*Rad. armorac. rec. (Germ. Meer. restich.) ʒijss.*  
*Fol. sen. sine stip. ʒj.*  
*Rhabarb. elect. ʒss.*  
*Helleb. nig. crud. ʒij.*  
*Bacc. junip. ʒvj.*  
*Cinnamom.*  
*Galang. an. ʒijss.*  
*Sal. tartar. ʒij.*

*Incisa & contusa includantur Nodulo: S.*

*Nodulus aperiens.*

*Infundatur Vino simpliciori vel Absinthio,*

Vel

- R. Herb. absinth.*  
*Roris mar.*  
*Centaur. min. an. Mj.*  
*Flor. anth.*  
*Genist. an. Mjss.*  
*Fol. sen. sine stip. ʒvj.*  
*Rhabarb. opt. ʒss.*  
*Helleb. nigr. ʒij.*  
*Sem. cruce contus. ʒj.*  
*Cinnam. ʒij.*  
*Caryoph. ʒj.*  
*Sal. tart. ʒij.*

*Incis. & contus. includantur Nodulo:*

*D. S. ut ante.*

- R. Herb. absinth.*  
*Agrimon.*  
*Centaur. min. an. Mj.*  
*Flor. anthos.*  
*Genist. an. p. liij.*  
*Rad. enul. rec.*  
*Polypod.*  
*Armorac. rec. an. ʒvj.*  
*Cort. fraxini.*  
*Tamarisc. an. ʒss.*  
*Fol. Senn. sine stip. ʒvj. ad ʒj.*  
*Helleb. nig. crud.*  
*Rhabarb. elect.*  
*Agar. albiss. ana ʒss.*  
*Zedoar.*  
*Zingib.*  
*Cinam. ana ʒj. ad ʒijss.*  
*Passul. min. ( hæc enim tanquam blandissimè temperata, his nodulis adduntur ) ʒijss.*  
*Sal. tart. ( est quasi stimulus menstruus ad resolvenda ista simplicia ) ʒij. ad ʒss. ( aut loco hujus Crem. tart. ʒvj. sed saltart. est melius )*

*Incis. & contus. D. S.*

*Species ad nodulum laxativum in vino.*

*Includantur Nodulo, infundantur in Vino, quod omni mane & vespere capiatur, ut relaxetur alvus.*

- R. Com. absinth.*  
*Summ. cont. min.*  
*Herb. rec. cochl. ana Mjss. ad Mj.*  
*Rad. armorac. rec. ʒj.*  
*Gentian. ʒss.*  
*Tarax. ʒij.*  
*Fol. senn. sine stip. drachm. vj. ad ʒj.*  
*Rad. elleb. nigr. crud. ʒss.*  
*Esul. non præp.*  
*Sem. anis. ana drachm. jss.*  
*Fenic. drachm. iij.*  
*Cinnamom.*  
*Caryoph.*  
*Zingib. an. drachm. j.*  
*Sal. tart. drachm. iij.*

*Incis. & contus. includ. Nodulo:*

*D. S.*

*Nodulus laxativus in vino.*

- R. Herb. persicar. rec. Mij.*  
*Absinth.*  
*Roris mar. ana Mj.*  
*Fol. sen. sine stip. ʒj.*  
*Rhabarb. el. ʒss.*  
*Helleb. nigr. drachm. iij.*  
*Sem. cruce. ʒj.*  
*Cinnam. drachm. ij.*  
*Caryophyll. drachm. j.*  
*Sal. tartari drachm. iij.*

*Incis. & contus. includantur Nodulo:*

*D. S. ut ante.*

- R. Herb. rec. fumar. M. j.*  
*Cochlear.*  
*Beccabung ana Mjss.*  
*Rad. polypod. querc.*  
*Cort. aurant. ana ʒiij.*  
*Fol. senn. sine stip.*

*Rha-*



*Rhabarb. opt. ana ʒʒ.*  
*Helleb. nigr. crud. ʒvj.*  
*Galang. ʒij.*  
*Sem. anis.*

*Fœnicul. ana ʒʒʒ.*  
*Sal. tartari drach. iij.*  
Incis. & contus. includ. Nodulo.  
D. S. ut suprâ.

*Herb. rec. fumar. m. j.*  
*Absinth.*  
*Meliss.*  
*Summ. cent. min.*  
*Flor. genist. ana m. ʒʒ.*  
*Rad. enul. ʒx.*

*Polypod.*  
*Helleb. nigr. crud. ana unc. j.*  
*Esula drach. iij.*

*Fol. senn. sine stipit. unc. j.*  
*Zedair. drach. ij.*

*Caryoph. ʒʒʒ.*  
Incisa & contus. f. Nodulus.  
D. S. ut suprâ.

Facit huc etiam infusum seu similis nodulus contra Ma-  
lum hypochondriacum CNNEFFELIO aliàs usitatus, qui  
sic ex sequentibus:

*Herb. absinth. m. iij.*  
*Centaur. min. m. ij.*

*Rad. helleb. nigr.* (nam hæc fuit ipsius Arca-  
num purgatorium singulare, ubique ab  
ipso commendatum) ʒiij.

*Polypod. Querc. unc. iʒʒ.*  
*Cort. fraxini.*

*Tartari albiss. ana unc. ʒʒ.*  
*Limat. Martis ʒiij.*

Incisa & contusa conspergantur  
*Spiritus salis dulc. gutt. jx.*

Includantur Nodulo, qui infundatur in  
*Vini Canth. iʒʒ.*  
& more usitato adhibeatur.

Hiscæ in subjectis siccoribus commodè passularum mino-  
rum unc. iʒʒ. addi potest. Rhabarbarum ipsum ad curam ma-  
li hypochondriaci tanquam optimum, præsertim paulò suc-  
culentioribus, à quibusdam laudatur, alterando simul &  
evacuando: vid. RHODIUS *Cens. 2. obs. 100.*, qui ad ob-  
structionem inveteratam commendat Decoctum vel Infu-  
sum Rhabarbari. Spectat huc etiam Syrupus de Spina Cer-  
vina seu domesticus, ut Syrupus florum acaciæ & de car-  
thamo, qui sunt blandi & maximè conducunt: Aut cre-  
mor tartari cum tantillo radices jalappæ acuatæ; c. g.

*Herb. Crem. tartari vel tartari vitriolati,*

*Pulv. jalapp. ana gr. xv.*  
*Olei destillat. mac. gutt. ij.*

M. f. pulvis S.  
*Pulvis laxativus,*  
Vel

*Tartari vitriolati vel arcand. dupl. gr. xvj. vel ʒi.*

*Scamm. sulphurat. gr. ij.*  
*Troch. alband. gr. ij.*

M. f. pulvis S.  
ut antè.

*Pulv. diasenn. Mont. gr. xvj.*

*Crem. tartari ʒʒʒ.*  
*Scammon. sulphurat. gr. iv. uel v.*

M. f. pulvis:  
D. S. ut suprâ.

*Herb. Crocis Martis aperit. ʒi.*

*Scammon. sulphurat.*  
*Sal. tartari ana gr. v.*

M. f. pulvis:  
D. S. ut suprâ.

*Herb. Fol. senn. sine stipit. drach. iij.*

*Rad. helleb. nigr. crud. ʒj.*  
*Zingib.*  
*Sal. tartari ana ʒi.*

Infund. in f. q. aqua calid. per noctem:

Colaturæ manè addantur.

*Aque cinnam. drach. iʒʒ.*  
*Extract. troch. alb. gr. j.*

M. D. S.  
*Potio laxativa pro una dosi.*

*Herb. Fol. senn. sine stipit. ʒij. vel iij.*  
*Estimul. Oper. Tom. II.*

*Rad. polypod. drach. iij. vel noc. ʒʒ.*

*Fibr. helleb. nigr. ʒiij. ad ʒj.*

*Zingib. ʒʒʒ.*

*Sal. tartari ʒi. ad ʒʒʒ.*

Infund. per noctem in aqua simpl. vel fumar. vel sero lactis:  
mane coquatur leniter: colaturæ unc. iij. adde

*Spiritus coquelear. ʒi.*

*Syrup. fumar. vel rosat. solus. vel de pom. drach.*  
*iij. ad ʒʒʒ.*

M. pro dosi.

D. S. ut suprâ.

Vel

*Herb. Strob. pini tenell. m. j.*

*Tamarind. unc. iʒʒ.*

*Rad. helleb. nigr. drach. iij.*

Coq. in f. q. cerevis. secund. in vase clauso & igne  
lenissimo:

Colaturæ ʒv. adde

*Aqua antiscorbut. Dornier. unc. ij.*

*Crystall. tartari ʒʒʒ.*

*Succ. cochl. rec. expr. ʒi.*

*Syrup. scolotyrb. Forest. unc. ij.*

M. S.

*Potio purgans pro 3. vicibus: capiatur mane per*  
*3. dies consecutivos.*

Verùm ut alvus obstructa aut saltem contumacior quoti-  
diè laxa fervetur, etiam remedia quædam domestica sedulò  
in usum vocanda sunt: quæ inter primatum obtinent *passu-  
la*, quæ admodum conveniunt in Malo hypochondriaco,  
Scorbuto etiam, & nihil nocent; cum alia *dulcia*, ut *sac-  
charata* & *multa* hypochondriacis & scorbuticis propter  
facillimam acescentiam & propter contentorum ex efferve-  
scentia concitata turbationem, terra inferant symptomata,  
& affectus recrudescere faciant. *Passula* autem, quatenus  
sunt temperatæ, potius quam omnique acrimoniam in corpo-  
re temperant, emolliunt & nutriunt, & blandâ ac naturali  
fermentatione (sunt enim instar musti concentrati) vitiosam  
sanguinis fermentationem restituunt & renovant, condu-  
cunt imprimis uiris, mulieribus non semper. *Poma* etiam  
*Borsdorffiana* aliaque dulcia seu cruda bene matura com-  
esta, seu eorum succus usurpatus, medicamentum sunt la-  
xativum, & admodum temperativum in Malo Hypochon-  
driaco. Hinc succo depurato commodè alia remedia ake-  
rantia & laxativa infundi, & ita propinari possunt, qui po-  
tus admodum conducit in Malo hypochondriaco. Quò  
etiam faciunt pilulæ domesticæ seu utuales jam dictæ, omni-  
bus 8. uel 14. diebus semel capiendæ; Item Terebinthina  
manè deglutita, ad quantitatem nucis parvæ, quam HOR-  
STIUS l. 4. Obs. 28. singulariter commendat.

Conveniunt ergò hæc passulæ laxativæ, item pruna laxa-  
tiva, quæ in officinis solent prostrare; quorum vis laxativa  
est imprimis à senna, passularum nempe vel prunorum in  
Senna coctione vel maceratione: Item decoctum passula-  
rum laxativum cum & sine tamarindis; nam & ipsi tama-  
rindi utilissimi sunt Hypochondriacis ac magis Scorbuticis,  
illis præsertim, in quibus phlogoses & æstuationes vagæ sub-  
inde observantur. Formulas dabo infra l. 2. Sect. Membr. 2.  
*Articuli 3. capitis 4. ubi de Melancholia, & in Collez. Phar-  
macent. in Ludovici Tit. 3. pag. .... Vel*

*Herb. Passul. min. unc. iʒʒ. vel unc. ii.*

Probè conquass. coqu. in f. q. aqua simpl.

Colat. adhuc ferventi infunde

*Fol. Sen. sine stipit. drach. iij.*

*Flor. violar. P. ij. ad iij.*

*Crem. Tartari drach. j.*

Stent aliquandiu in loco calido, postmodum coletur &  
asser vetur pro usu.

D. S.

*Potio laxativa.*

Capiant Hypochondriaci haustulam vitri unius (Germ.  
*ein VVein glasgen voll*) & inservit etiam pro vehiculo reli-  
quorum remediorum, blandè servat alvum apertam. Item

*Herb. Passul. min. conquass. unc. iij.*

Coqu. in f. q. aquæ simpl.

Colaturæ ferventis ʒij. infunde

*Fol. Senn. sine stipit. unc. ʒʒ.*

*Rad. helleb. nigr. non præpar.*

*Cort. aurant. ana ʒij.*

F f

Galang.



Galang.

Zingib. ana ʒi.

Crem. tartari ʒij.

Scent in loco tepido per noctem vase clauso.

Colaturæ a lide

Spiritus cochlear. ʒʒss.

M. S. ut supra.

Vel fiat electuarium hoc modo:

R. Pulv. passul. min. unc. ij. vel iij.

Arcan. dupl. Myni. ʒi.

Sal amm. depur. (actione stomachi:)

Spec. diatrien piper. ana drach. ʒ. vel ʒij.

Syr. depom. Reg. Sab. q. s.

M. f. Elect. pro aliquot (9. vel 12.) dosibus usurpandum, quod sufficere inter alium apertam servat.

Si verò alius nimis contumax sit, aliquot granis trochiscorum albandal vel horum Extracti facillè potest acui. Melius autem est in forma liquida propinare. Pertinet huc syrup. de spina cervina domesticus, item Vinum infusionis florum acaciæ; qui pro hoc scopo sunt per quàm proficui & blandissimè alium servant apertam; vid. Collegium Pharm. in Ludovici. Ut taceam cremorem tartari à ʒi. ad ʒʒss. cum aliquot granis jalappæ acuatum, in jusculo feruido assumptum, egregium.

Praeter dicta Clysteres quoque in Malo hypochondriaco & Scorbuto magnæ sunt efficacis pro alio aperta servanda, præsertim in paroxysmo, quando æstus corporis, phlogoses &c. urgent, in abdominis affectibus minuendis, palpitatione cordis, anxietate Melancholica, dolore abdominis Scorbuto; & quidem saltem emollientes & blandè abstergentes sufficiunt; vel, quod melius est, ex urina pueri, qui conveniunt in Malo hypochondriaco cum copiosis flatibus juncto: Si contumacius sit malum, conveniunt Clysmata cum lixivio diluta, additis aliquot uncis mellis depurati. Talia Clysmata mirè conveniunt intestina abstergendo, in specie si crassiori mucus sunt obfessa; vid. supra sect. 22. ubi de Colica. In doloribus abdominis conveniunt Clysmata ex ferolactis, aut ex lacte; vel simplicia, cui parum sacchari sit additum; vel cui incoquantur plantæ quædam carminativæ.

Modus præscribendi notus est ex Morello. In specie, si urgeant dolores nephritici nothi, conveniunt Clysmata ex lacte cum terebinthina, qualia videb. supra, Sect. 9. cap. 3. Artic. 1. ubi de Dy'senteria; faciunt urinam bene olentem inftar violarum, & multum commodè afferunt. Quin etiam Clysteres nocturni seu qui vesperti injiciuntur sub introitu lecti, & per totam noctem rementur, admodum commendantur in Obf. HORSTII, & ferè ex lacte præparantur, in Scorbuto summè proficui: Imo sunt, qui alterius diebus illorum injectionem commendant, v. gr. RIVERIUS l. 12. Pr. cap. 5. sex. gr.

R. Lact. bubul. unc. ix.

Elect. lenitiv. ʒi.

De bacc. laur. unc. ʒ.

Visell. ovi j.

M. f. Clyisma sub introitu lecti injiciendum: S.

Clyster leniens.

R. Flor sambuc. m. ii.

Fol. hyoscyam. m. i.

Coqu. in l. q. lactis bubul. vel caprill.

Colat. unc. x. adde

Visell. ovi. ij.

M. f. Clyisma in doloribus Scorbutoicis.

D. S. ut antè.

R. Herb. chamomill. cum flor. m. jv.

Rad. gentian.

Bacc. juniper.

Lauri ana unc. ʒ.

Sal. tartari vel ciner. clav. ʒij.

Coqu. in f. q. aquæ:

Colatur ʒviij. adde

Elect. lenitiv. ʒi.

Oleo colocynth. ʒij.

M. f. Enema.

D. S. ut supra.

R. Spec. carminat.

Flor. chamomill. ana m. i.

Rad. levist. drach. vj.

Bacc. juniper. unc. j.

Coqu. in l. q. urinae pueri:

Colat. unc. viij. adde

Elect. Hier. cum ager. unc. j.

Mell. ambros. drach. vj.

Mile. pro enemate:

D. S. ut supra.

R. Lact. bubul. ʒʒi.

Terebinth. cum visell. ovi sol. unc. ʒ.

Mell. rosat. ʒvj.

M. pro Clysmate:

D. S. ut supra.

Præmissis his universalibus, aut primis viisritè mundificatis, fiat accessus ad Martialis, salia fixa, aliaque similia, acidum peccans in primis viis emendantia: quibus vel subjunguntur vel simul cum his subministrantur Alterantia, acia quidem, amara, aromatica, quodammodò diuretica in Malo hypochondriaco; nempe conveniunt hic in genere omnia vulgò dicta Aperientia & Hepatica amara, & hinc stomaehica aromatica, & virtute in specie diuretica insignita. Vel horum loco volatilia spirituosia, spiritus ac talia Volatilia usurpantur, pro varietate nempe constitutionis subjeetorum. Nam ista phlegmaticis, sanguineis, frigidis, &c. & in quibus bilis stimulo indiget, conveniunt: hæc verò urinoia volatilia Cholericis, junioribus, Melancholicis, & his, qui crebrius æstuationes patiuntur; magis conferant Martialis: Hæc inter eminent nunc Mars crudus, nunc præparata varia plus minus cruda, prout plus minus acidum infringendum venit. Hinc in usu sunt omnes croci Martis aperitivi, qui, quò sunt simpliciores & acido minus concentrato parati, eò sunt meliores. Croci Martis cum salibus, item limatura Martis subtilissimè tria. Facit huc etiam terra Martis præparata, quæ inferri fodinis reperitur, laudata insigniter à ZACUTO. Huc faciunt omnes pulveres cachectici, quorum balis solet esse Mars, adjectis tamen etiam aliis; pulvis cachect. Hartmanni simplex cum cinnamomo, utriusque Martis ad pulveris consistentiam calcinatum, liquor Martis solaris, sal Martis compositum: c. gr.

R. Conf. fumar. unc. ʒ.

Conf. altherm. ʒʒ.

Martis crudi pulverisat. drach. iij.

Mag. corall. cum succo cit. drach. j.

Cum f. q. syr. pom. uel flor. papav. errat. vel alius appropriatæ

F. Electuarium.

D. S.

Electuarium aperiens pro aliquot vicibus.

R. Pulv. passul. min. unc. i.

Lim. Martis pulverisat. ʒi.

Olei de stillas. cinam. gutt. j.

M. pro dosi. S.

Electuarium aperiens pro una vice.

R. Conseru. fumar. unc. ij.

Cochlear. unc. ʒ.

Vitrioli Martis drach. ii. uel Extr. Martis cum

succo pom. ʒʒss.

Corall. rub. præp.

Ebor. sine igne.

Lap. cancr. præpar. ana drach. i. ad drach. iʒ.

Cum l. q. syr. pom. f. Electuarium. D. S.

Electuarium aperiens pro aliquot vicibus.

De quo capiatur omni mane aoni 2. castinearum magnitudinis, subjungendo vesperti Elux. uel Essentiam quandam appropriatam.

R. Tinctura Martis tartarisat ʒiij.

Spiritus cochlear. essent. drach. ii.

M. D. S.

Aperiens tinctura chalybeata.

Dosis 40. ad 50. gutt. bis in die.

Vel in robustioribus:

R. Liq. Martis solaris drach. iii.

D. S.

Aperiens essentia chalybeata.

De qua primo die capiat gutt. vi. secundo viij. tertio xij, ascendendo sic ad xv, xx, & xxv, usque ad modum Acidularum naturalium in morbis Chronicis.

Ratione Martis ipsa acidula naturales, quæ origi è ducunt ex uena Martiali, soluta ab acido sulphuris, in his morbis, præmissis præmittendis, sunt adeo egregiæ, in quibus præponderat acidum forte: de qua virtute & efficacia vid. HELMONT. Parad. & TACHENIUS in Hip. Chym. SYLVATICUS c. 1. Conf. 63. & c. 3. Conf. 36. ac RIVERIUS Pr. l. 12. cap. 5. Utrum videbitis in LANGIO de U. Therm. Carol. & Acidularum Egrænarum. Loco quatum liquor Martis solaris, tanquam acidulæ concentratæ, conimoto de lub.



de substitui potest. Aliis autem acidulis artificialibus vulgo dictis quales Clyffus antimonij, &c. nihil tribuo: Siquidem adeo, certum est, quam quod certissimum, acidulas naturales, uti præmonitum est, operari respectu partium sibi junctarum Martialis, quæ defunctis acidulis artificialibus. In refragandis autem æstibus febrilibus, etiam malignis, laudas suas his ultro decerno, præprimis clyffo antimonij. Ex talibus acidulis elaborat tincturam suam florum bellidis noster D. HORNIUS. Quorum stomachus est nimis sensibilis, iis loco acidularum naturalium sufficit *tinctura vitrioli Martis Zuelff.*, solutio Martis cum succo pomorum Bosdorfianorum, item *extractum* Martis cum succo *Tamarind.* vel succo pom. Bosld. *extractum*. Hoc *extractum* succo pom. Bosld. extrahitur cum spiritu cochleariz antiscorbutico composito in essentiam seu tincturam Martialis, & est egregia tinctura antihypochondriaca: vid. DRAVIZIUS. Vel solutio Martis cum succo pomor. miscenda cum spiritu cochleariz. Dosis 40. vel 50. gutt. bis vel ter in die.

Martialia hæc aliquandiu continentur, & post eorum usum blandius instituat motus, alvusque servetur aperta. In quoque facit antimonium diaphoreticum Martiale, Bezoard. min. Martiale, & in genere quivis pulveres, electuaria, essentia, ac tinctura Martiales, anticachectica, &c. Et denique laudatur lapis Bezoar tanquam expertum in Malo hypochondriaco, ex eo, quoniam quodcunque acidum promptè absorbet.

Observandum autem, ne semper Martialia propinentur in siccioribus subjectis, utpote in quibus blandiora & liquida non raro majorum virtutum observantur. In specie vero ubi viscerum infarctus ad scirrhum inclinans, subinde Martialia non conveniunt, sed malum potius intendunt; vid. *Diss. de præcipitantium usu & abusu* c. 3. §. 18. & TACHENIUS *Clav. Hippocr. pag. 181. & 192.* In usu medicamentorum Martialium, in specie acidularum, etiam stomachi habenda est ratio: unde externe Emplastrum de ladanio Cratois, item Emplastrum de tacamahaca, malaxatum cum oleo chamomilæ, in forma scuti Stomachalis applicantur: Item corium cervinum cum oleo destillato chamomilæ & menthæ illitum commodè adhibetur. Vel

R. Olei express. Nucist. 3 ℥.  
Destillat. bacc. junip. 3 j.  
Cumin. 3 j.  
Macis 3 j.  
M. D. S.

Balsamum stomachale.

Alterantia hypochondriaca, quæ Veteres consueverunt usurpare præmissis Martialibus, imprimis sunt Vegetabilia amara plus minus aromatica, Hepatica & Splenetica dicta, ut Stomatichica, v.g. herba absinth. (optimum in Hypochondriaco succulentis), agrimonia, cent. minus, rad. armoraciz, aronis, filicis, polypodii, helenii, &c. Præ ceteris sumaria, cent. minus, baccæ junip. & omnia ex his parata, ut infusa, Decocta, quæ tamen infusum abierunt, & Vina Medicata. Magni etiam à nonnullis æstimantur *Cappares*, de quibus audiendus est SENNERTUS *Pr. l. 3. P. 1. S. 1. c. 7.*, qui difficilis non altem coctionis, sed ratione aceti quoque quo communiter condiuntur, eas suspectas pronunciat, ideoque cum passularum Corinthiacarum tertia parte, saccharo, & tantillo tantum aceti eas præparare jubet. Insigniter autem ex his Vegetabilibus quæcunque fixa lixivialia per calcinationem parata in Malo hypochondriaco conveniunt, quia sunt simul diuretica, ut sal absinthii, cichorii, centaurei minoris, sal Stomachale Mynsichti: item sal istud compositum, quod remanet in destillatione spiritus salis ammoniaci, hoc enim sal est egregium diureticum, & vulgò vocatur sal digestivum hypochondriacum; & similia, &c. Faciunt huc etiam Vegetabilium essentia, nempe sumaria simplex & composita, & omnia ex sumaria composita remedia, quæ egregia in malo hypochondriaco: Essentia splenis bovis, ess. absinthii ad imitationem DRAVIZII parata, aliaque similia: item *essentia aperitiva* D. Michaelis, cujus propter materiz medicæ cognitionem hæc est compositio:

R. Herb. agrimon.  
Scolopendr.  
Cuscutæ ana M. iij.  
Melisse,  
Ceterach,  
Estmull. Oper. Tom. II.

Herb. Cichor.  
Tarax.  
Marrub.  
Capill. Veneris ana M. ij.  
Rad. Rhabarb. Monach.  
Filicis,  
Cichor.  
Tarax.  
Gramin. ana 3 j.  
Curcum. 3 j.  
Flor. cichor.  
Bellid. min.  
Tamarisc.  
Hepat. nob.  
Genist. ana P. iij.  
Cort. cappar.  
Tamarisci,  
Fraxinæ ana unc. ij.  
Sem. asparag.  
Frax. ana unc. 8.  
Anis.  
Fenicul. ana 3 j.  
Gum. lacca unc. j.

M. & fiat cum spiritu vini simpl. vel appropriato Essentia Aperitiva.

Elixir proprietatis commune, vel paratum sine acido, vel paratum cum spiritu sal. ammoniaci vinoso, vel mistum cum spiritu sal. ammon., aut etiam cum spiritu cochleariz, vel solum sufficere dicit LINDANUS in Malo hypochondriaco, ut in scorbuto in subjectis paulo habitioribus: Sic etiam Elixir stomachale D. Michaelis mistum cum dimidia parte spiritus cochleariz, mirè conducit Hypochondriacis. Quin etiam omnia remedia tartarea salina, aliaque volatilia ubertius penetrantia, nunc per sudorem, nunc per urinationem evacuantia, præ ceteris sunt egregia. Hæc inter eminet sale volatile & spiritus tartari, isque ritè paratus & volatilis: nempe tartarus vitriolatus, tartarus chalybeatus: Item supra laudatum *arcannum duplicatum Mynsichti*, quod usu diuretico omnibus palmam præcipit in Malo hypochondriaco & Scorbuto præsertim frequens scorbuticis, quando crebriores phlogoses ægros fatigant; In talibus casibus est nobilissimum; unde etiam in febribus intermittentibus & scorbuticis remedium est sine pari. Tinctura tartari acris ad 40. gutt., mista cum spiritu sal. ammoniaci, item tinctura tartari antimoniatæ, quæ & ipsa est egregia. Mistura simplex, quæ parè modo conveniens est remedium in Malo hypochondriaco, non minus quàm in Scorbuto. Pertinet huc imprimis *spiritus carminativus de tribus*, ex tartaro, nitro & spiritu vini, qui vel solus vel mistus cum ana spiritus sal. ammon. potens est remedium ad malum hypochondriacum. Dosis sunt gutt. XX, XXX. ad L. usque; melius non habebitis remedium in paroxylmo Mali hypochondriaci, quod nunquam me deseruit, & Hypochondriacæ mirabiliter levat. Nam spiritus sal. ammon. per se egregius est ad curam Mali hypoch., isque non tam simplex, sed & compositus oleolus, si Mixturæ calcis vivæ & sal. ammoniaci addatur spiritus vini infusione aromatatum imprægnatus, & hinc fortè igne per retortam destilletur, prodit sic spiritus vini aromaticam referens, qui est optimus dosi gutt. XXX. vel XL. in Malo hypochondriaco. Quò etiam pertinet tinctura nephritica Amelungi, & sexcenta alia, à gutt. XX. XXX. ad XL. Ut hæc volatilia eò magis reddantur diuretica, confusum est, ut imitemur ZWELFERUM, quæ miscet spiritum sal. ammoniaci cum ana liquor. terre sol. tartari, sic est forte diureticum, & tanquam quoddam secretum à quibusdam habetur in Cura Mali hypochondriaci: Aut etiam hic ipse spiritus sal. ammoniaci miscetur cum spiritibus antiscorbuticis, cum spiritu cochleariz aut cum spiritu antiscorbutico composito, & singulariter confert in Cura Mali hypochondriaci. Ex dictis Formulæ sunt variz.

R. Ess. absinth. vel Ess. absinth. tartarisat. 3 j.  
Spiritus cochlear. 3 j. M. D. S.  
Essentia aperiens.

Dosis 40. gutt. bis in die.

R. Ess. gum. ammon. unc. 8.  
Spiritus sal. ammoniaci assas. drach. ij.  
M. S. ut antè.

Dosis 50. gutt.

R. Elix. propr. sine acido, vel tinctura tart. compo.  
vel Ess. absinth. 3 j.  
Spiritus sal. ammoniaci 3 j.

F 1 2

M. S.



M. S.

*Elixir aperiens.*

Dosis 40. gutt. ter in die.

R. *Elix. Prop. sine acid. unc. ℥.**Spiritus sal. ammon. caryoph. vel alius oleos. ℥ij.**Cochlear. ℥℥.*

M. S. ut supra.

R. *Tinctura vitrioli Martis Zuelff.**Eff. fumar. comp. ℥℥.*

M. D. S.

*Essentia aperiens.*

Dentur 50. vel 60. gutt. bis in die.

R. *Elix. cachect. alterat. ℥vj.**Spiritus cochlear. ℥ij.*

M. D. S.

*Elixir aperiens.*R. *Elix. prop. sine acido ℥℥.**Eff. fumar. comp. ℥ij.**Spiritus cochlear. essent. ℥i.*

M. D. S. ut supra.

Dentur 50. vel 60. guttulas.

R. *Elix. cachect. alterat. ℥vj.**Spiritus cochlear. ℥ij.*

M. D. S. ut supra.

R. *Spiritus carminat.**Salis ammoniaci.**Cochlear. ana ℥i.*

M. D. pro 4. dosibus: S.

*Spiritus aperiens.*R. *Arcan. tartari ℥ii.**Spiritus sal. ammoniaci ℥i. ℥℥. ad ℥ii.*

M. D. S.

*Mixtura aperiens.*

Dosis 20. 30. 40. ad 50. guttulas.

R. *Aqua fumar.**Flor. Acac. an. ℥iij.**Eff. aperit. comp. ℥℥.**Spiritus cochlear. drach. j.**Syr. de rad. j. vel fenic. vel alius parum.*

D. S.

*Mixtura aperiens: capiatur cochlearim.*R. *Aqua fumar. ℥ij.**Borrag.**Bugloss. an. ℥j.**Spiritus carm. de trib. ℥ij.**Corall. rubr. prap. ℥i.**Syr. papav. err. ℥℥.*

M. S. ut ante.

Caplantur cochlearim in paroxysmo hypochondriaco.

Ratione salum horum & ipsum nitrum depuratum (non fixum) aut antimoniatum, non incongruum est remedium in Cura Mali hypochondriaci, praesertim ubi status urgent, aut phlogoses crebriores affligunt. Et hinc etiam species *diapysitici Galeni* ex nitro & cumini semine in Malo hypochondriaco cum cruditate stomachi non contemnendum est remedium, imo valde commendabile, cujus ulu desperatos Hypochondriacos ad extremam ferè maciem deductos aliquando feliciter curavi, inquit BARTHOLETUS de *Diagnosi* l. 5. cap. 4. pag. 431. Compositionem vid. in WELFERO pag. 179. Et certum est, quod quidam etiam famosus Medicus D. JAHN asserit; quod nulla sit compositio in tota Pharmacopoea usitata, quae magis conveniat in Malo hypochondriaco & ventriculi affectibus, quam illud, utpote quoquam plurimi Hypochondriaci restituti sunt: ubi non prostat, potest ex tempore describita:

R. *Nitri depur.**Spec. diacumin. ana ℥℥.**Olei destillat. cumini. gutt. iij.*

M. f. pulvis:

Div. in 3. part. æquales.

D. S.

*Pulvis resolutus & aperiens.*R. *Spec. dia-Cumin. ℥i.**Nitri depur. ℥j.**Olei destill. cumini. gutt. iij.*

M. f. pulvis.

Div. in 3. part. æqual. D. S. ut ante.

His ac similibus accedente motu ferè curari solet Malum hypochondriacum.

Ab externis nonnulli in crassationem &amp; condensationem humorum aut partium laxitatem metunt, v. gr. S. A. N.

CTORIUS *Meth. l. 2. cap. 8. & SOLENANDER S. 1. Conf. 10.* Ast urgente dolore hypochondriaco, anodyna & disquietientia temperativa haud omittenda, v. g. Unguentum Agrippæ, aut Martiatum cum oleo de capparibus vel chamomilla, unguentum & emplastrum de cicuta, nicotiana, carminativum Sylvii.

Sed præter dicta in Malo hypochondriaco & Scorbuto, tam incipiente quam confirmato, adhuc alta sunt in usu, nempe SPECIFICA alterantia antiscorbutica, quæ istis præmissis specificum & morbum scorbuticum emendare & tollere possunt. Hæc imprimis post *Martialia* usurpanda, sunt in duplici differentia; nempe vel sunt talia, quæ

1. *Respiciunt saltem Dyscrasiam sanguinis & inde oriundorum fucorum ab acido scorbutico factam, & sunt volatilia plus minus acria; vel*

2. *Respiciunt noxam systemati nervoso & partibus continentibus simul illatam, & sunt temperata balsamica seu oleosa sulphurea, nempe ex pino, junipero, & horum succedanea ex lignis & corticibus.*

Pro utroque scopo convenit lac & quilibet lacteicinia.

Antiscorbutica ergo specifica volatilia sunt ferè seqq. *Cochlearia nasturtia* quæcunque, imprimis aquaticum, *chelidonium majus* & minus, *Gammula lovis*, quam mirè laudat HILDANUS, sedum vermiculare, de cujus egregiis in Scorbuto viribus vid. M. A. N. C. *Ann. 6. & 7. obs. 22.* *Barbarea*, *persicaria acris* *piperis*, cujus aqua ex cucurbita destillata mirabilem obtinet acrimoniam; *nummularia*; *radix raphani rusticani*, *armoraciz*, *ari*, *chelidonii maj.*, *semina sinapi*, *nasturtii*, *erucæ*, *cochleariz*, *aquilegiz*. Hæc ferè sunt primaria acria volatilia scorbutica, inter quæ tamen excellit *cochlearia*, hinc *flamula levis*, & tandem *trifol. aquaticum* seu fibrinum, de quo vid. in specie SIMON. PAULI in *Quadr. Rosan. h. Acta Med. Hassn. Vol. 3. p. 123.* Conf. etiam M. A. N. C. *An. 4. & 5. Observ. 123. p. 133.* Ac tandem trifolium hoc in tumoribus pedum scorbuticis, & ubi metus est hydropis scorbutici, multum trifolio tribuit Pauli, cui ceu artificii experto in regione, ubi Scorbuto est endemicus, merito credendum. Quibus ipsius acrioribus volatilibus, quæ non semper omnibus subiectis, in specie junioribus aut acido volatili præditis, conveniunt, pro mutua temperatura commodè vel acetosa & acetosella, *beccabunga*, *chelidonium minus*, vel *Citrus*, vel *succus citri*, *aurantiorum*, & *acetosellæ* addi possunt, juxta observationem Norvegicam in *Alt. Hassn. BARTHOLINI Volum. 2.* Mala enim citria, it. mala aurantia acida, nitè conducunt in præservando & curando Scorbuto imprimis navigantium.

Posteriora quod attinet: sunt in specie summitates & cortices abietis seu pinastri, imo tota *abies alba*, quæ propter egregiam virtutem vocatur Arbor *Antiscorbutica*, in specie sunt coniferi *strobili* teneriores in usu, loco quorum substantiæ possunt ligna, & aliis nota remedia ex lignis patata, speciatim ex ligno juniperi, *sassafras*, *guajaco*, & *rad. china*, *sarsaparillæ*, cortice Winterano: Nam hic singulares habet virtutes antiscorbuticas. Item *leordium*, *abundium*, *ceterach*, *chamedrys*, *chamæpytia*, *sumaria*, *betonica*, *thee*, *radix heleni*, *gentianæ*, *j. aperientes*, *chelidoni maj.*, *scorzon.*, *tarax.*, *angelicæ*, *persilidis*, *levill.*, *Zedoariæ*, *galangæ*, &c. Cortices fraxini, *tamarici*, *aurant.*, & *citri*, &c. sunt admodum convenientes in Scorbuto: Sunt similiter convenientes fructus *chamæmori Norvegici*, de quibus præ aliis vid. SENNERTUS *Tr. de Scorbuto*, quorum Eleætharium ex Norvegia Danicæ cum magna quantitate fertur. It. *Cacao*, de quo vid. VILLISIUS de *Scorbuto* p. 256. Porro flores *geniillæ*, *aquilegiz*, *hyperici*, *sambuci*, & *croci* huc pertinent; item sem. *anisi*, *aquileg.*, *feniculi*, &c. *Baccæ juniperi*, sunt admodum egregiæ; nam multa latent in junipero pro his usibus. Ac denique ex Regno animalis *lumbri*, *stercus asinæ* cum Mense Majo collectum, & ad drach. i. in vino haustum; viem nitrosâ sulphureâ bilem mirè corrigit. Usus horum Antiscorbuticorū est nunc crudorum, nunc præparatorum. Cruda imprimis usurpantur in Infuso: Nam plurima decoctionem non ferunt citra virtutis pæcturam, propter sal volatile, nisi levissimam ebullitionem, & quidem in vase probe clauso, nunc duplici; Vel antiscorbutica cum talibus inter coquendum sunt miscenda, qui illorum particulis volatilibus ligandis ac retinendis apta, v. gr. *folia cochleariz* aut *nasturtii* cum *acetosella*, quorum decoctum cum lacte caprillo SENNERTUS ac IOEL, adeo commendant: Quod tamen ad Antiscorbutica posterioris generis, seu minus propriè sic dicta, haud extendendum, utpote quorum decocta potentius salis, virtutis obiciuntur.

Sim.



Singularem enim habent texturam, videntur abundare facile volatili, simul tamen acido in recessu satis penetranti, quod demonstrant ructus acidi. Menstruum infusionis est vel Vinum, vel lac, aut serum lactis: Quibus cum hoc selectu utendum; nempe quibus vinum fuerit acius, aut qui vinum ob acorem ferre nequeunt, & in quibus sal acius & magis efferatum dominatur & phlogoses excitat, ita tempore æstivo, ita in calidis & biliosis corporibus, commodè vel serum lactis vel ipsum etiam lac præsertim in subjectis macilentis magis & ad atrophiam plus minus declinantibus, & in ipso infundi & aliquandiu continuari possunt. Hinc enim rancidus acor corrigitur & nova fermentatio sanguinis reconciliari potest; ex. gr. si ab usu succi nasturtii aquatici cum sero lactis macula prorumpant, dicitur bonum signum esse, quia iterum fermentationis habetur signum. E contra propinquantur in vino in subjectis contrariis, tempore hyemali, in constitutionibus frigidis & magis succulentis. Modum propinandi & administrandi huiusmodi remedia cruda pro cura Scorbuti, optimè docet HORSTIUS l. 4. Obs. 40. item l. 7. ubi de Scorbuto, ita TIMÆUS von GuldenKlee in Epist. 28. l. 3 p. 425. Reus ut pateat, c. gr.

℞. Herb. rec. cochlear.

Fumar.

Nasturt. ana M. i.

Rad. armorac. unc. i. ss. vel lii.

Enul. rec. unc. i.

Passul. min. (pro temperatura) drach. vi.

Incisa & contusa includantur Nodulo, quibus infundatur vel Vinum, vel serum lactis depuratum, vel lac ipsum.

D. S.

Singulare vinum seu lac antiscorbuticum.

De hoc infuso ægri omni mane jejuni, & ante prandium vel à meridie, bibant bonum haustum cum levi expressione; ita tamen ut primò minorem dosin accipiant, successivè eandem augendo, & sic continuando aliquandiu. Vel

℞. Herb. recent. cochlear. M. ii.

Rad. rec. armorac.

Enula,

Bacc. junip. ana unc. i.

Passul. min. unc. i. ss.

Incis. & contus. infund. vino.

D. S. ut supra.

Quod si metuatur aciditas hypochondriacis & scorbuticis nociva, semper singulo haustui addantur, vel post unumquemque haustum, lapilli Cancr. preparati, à ℞i. ad ℞ss, aut quantum cultelli culpis capit, hi enim omne vini acidum absorbent, & in salum diureticum absterivum egregiè ita transmutantur; qua ratione etiam arcanum duplicatum Mynsichti est opimum Antiscorbuticum, quin & diureticum.

℞. Herb. cochlear. rec.

Nasturt. aquat. rec. ana M. i.

Rad. enul. unc. i. ss.

Acori nostr. unc. i.

Raf. lign. sassaf.

Lim. Martis an. unc. ii.

Corr. aurant.

Citri,

Galang. ana drach. ii.

Incisa & contusa includantur Nodulo: D. S.

Nodulus contra scorbutum vino imponendus.

Item

℞. Summit. pini,

Flor. genist. ana M. i. ss.

Coqu. in f. q. aquæ.

Colaturæ libr. ii. infund. per dies 3

Fol. cochlear. recent. Mj.

Mane coletur.

D. S. ut ante,

℞. Summit. absinth.

Herb. rec. cochlear. ana M. ii.

Nasturt. aquat.

Chelidon. min.

Flor. frax. purp. ana M. i.

Rad. armorac. rec. unc. iii.

Lign. sassaf. unc. i. vel unc. i. ss.

Corr. Vinteran. drach. lii. ad unc. ss.

F. Nodulus pro Vini Mens. ii. vel iii.

D. S. ut supra.

℞. Rad. armorac. rec. unc. i. ss.

Summit. fenic. virid.

Et mu li. Oper. Tom. II.

Herb. rec. cochl. M. ss. ad Miss.

Fumar. M. i.

Absinth.

Chereseol. ana M. ss.

Pom. citri incis. No. j. vel ii.

Passul. min. contus. unc. i. ss.

Incis. & contus. includ. Nodulo. D. S.

Nodulus ad vinum antiscorbuticum.

Nodulis his, si desiderentur purgantes, addi possunt

Fol. Senn. sine thipir. unc. i.

Rad. helleb. nigr. crud. ℞vi.

Rhabarb. el. drach. iii.

Sal. tartari ℞iii.

additis Aromaticis. S.

Nodulus ad vinum laxativum antiscorbuticum.

℞. Herb. persicar.

Nasturt. aquat. ana Miss.

Acetosell. M. ii.

Salv. M. i.

Raf. ligni assafr. unc. i.

Coq. in f. q. Sero lact. vase clauso:

Colatura D. S.

Potio antiscorbutica.

℞. Decoct. Tamarind. cum sero lact. par. &

adhuc ferv. libr. ii.

Cui infunde

Herb. nasturt. aquat.

Beccabung. ana M. ii. vel M. i. ss.

Stent in vase clauso in loco tepido per noctem: Colaturæ adde

Syr. Byzant.

Sceleryrb. For. ana ℞i.

M. D. S. ut antè.

℞. Fol. rec. cochl.

Nasturt. rec. ana M. i.

Rad. rec. armor. ℞ss.

Passul. min. ℞ii.

Limat. Martis unc. i. ss.

Concis. includ. Nodulo: D. S.

Nodulus ad vinum antiscorbuticum.

Caplatur quotidie ter haustus, manè post assumptum jusculum, à meridie, & à cœna. Vel simplicia dicta acria antiscorbutica contunduntur & conquassantur, affunditur serum lactis vel Vinum, exprimitur succus, qui blando calore depurandus, colandus, & pro usu quotidiano in vitris parvis sulphuratis (dix non durant) asservandus, & quando necesse est, aliquando Unciæ aliquot in sero lactis vel vino propinentur.

℞. Succ. cochlear. rec. express. ℞i.

Vini Rhenan. unc. ii.

Spiritus cochlear. drach. ss.

Rotul. manus Christi perlat. drach. iii.

M. S.

Potio stomachalis antiscorbutica, alterno die capienda.

Commodè autem nasturtium aquaticum vel cochlearia cū acetosella contusa ana vel dimidio sociatur, & cum lacte caprino, si febris absit, vel cum sero lactis, si febris, phlogoses & æstusatio vaga adsit, propinatur, & aliquandiu continuatur: vid. SENNERTUS l. 3. Prax. ubi de Scorbutop. 616. item BARTHOLINI Acta Med. Hassn. Vel ad imitationem HORSTII:

℞. Succ. cochlear.

Nasturt.

Fumar. vel piperit. ana unc. iii.

Cichorii,

Acetosell. ana unc. i. ss. ad unc. ii.

Seri lact. depur. in specie caprill. ℞iii.

Seponantur nonnihil, ut depurentur per residentiam, hinc coletur & servetur pro usu.

D. S.

Serum antiscorbuticum.

Dosis pro una vice sint unc. iv. vel v.

Caplantur manè nunc cum nunc absque sudore: potest etiam repeti haustus à meridie: potest etiam cuilibet haustui instillari Ess. Martis cum succo pomorum.

℞. Sero lact. ℞ii.

Succ. citri rec. ℞ii. ad ℞iii.

Ebulliant cum album. ovi, clarif. & pauco Sacch. edulc:

D. S. ut supra.

Vel, quod melius, loco succi citri recipiantur succi pom. Borsdorff. ℞iv. ad vi. imprimis ubi obstructa alvus adeit. Vel

F f 3

℞. Herb.



R. *Herb. flammul. Jovis*,  
Fumar.

*Nasturt. ana M. ij.*

Infund. per noct. in vitro claulo: manè exprimat. & coletur.

D. S.

*Serum præparatum contra scorbutum.*

Dof. unc. lli. ad unc. iv. semel vel bis in die.

Continuatur potus talis præmissis præmittendis subinde per aliquot septimanas, nunc, præsertim matutino tempore, cum blando sudore, nunc, præsertim à meridie, absq; sudore.

R. *Fol. ros. cochlear. M. i.*

Incis. & contus. affund. per diem noctem in

*Aqua scorb. Dornar. unc. li.*

*Vini Rhenan. unc. i.*

Mane exprim. adde

*Ess. Martis liquid. Zi.*

*Spiritus cochlear. 3ss.*

*Mastich. Zi.*

Edule. cum s. q. ros. man. Chr. perl. M. D. S.

*Singularis potio purgans, qua de capiatur cochlear singulo mane.*

Plura videbitis In *Colleg. Pharm. in Schræderum P. 2.* & *HORSTIO P. 384. 392. & 442.* Tales succi puri etiam possunt affundi limatura Martis recenti, sicut aliquamdiu; sic dicti succi redditi Martiales simili modo usurpari possunt. Vel loco talium ex Marte paretur extractum, quando succus Martialis inspissatur, & tunc extrahatur tinctura Martis scorbutica: vid. *HOSTIUS, SENNERTUS, & EUGALENUS.*

Huc pertinet Decoctum herbæ Thee pro Cura Scorbuti, à modernis, præcipue Belgis, admodum commendatum: cui tamen quidem præferunt Decoctum granorum Coffee in Anglia admodum usitatum: item Syrupus scelotyrb. Foresti, syrupus essentific. cochlear. & fumariz, Syrupus scelotyrb. Mynsichtii. Verùm syrupi ob rationes supra dictas nihil valent, nisi forsan ad imitationem *ZWELFFERI* parati sint, quem modum in *Animadv. in Pharm. Augustan. ad syrupum scelotyrbicum Foresti* exponit. Ut taceam, quævis dulcia scorbutico esse infesta, ut superius de saccharatis & mellitis monitum fuit. Dicti succi tamen delicatis vel, qui prout ad effervescentias, minus conveniunt. In forma pulveris *D. MICHAELIS* multum laudat contra scorbutum sequentem:

R. *Aloes,*

*Myrrha,*

*Succin. præp. ana 3ss.*

*Croci Zi.*

*Sem. cochlear.*

*Nasturt.*

*Sinapi ana Zi. Zi. ad Div.*

*M. f. pulvis Dosis Zi.*

R. *Pulv. cachect. Martial. 3 i.*

*Rad. arserud.*

*Arcan. dupl. Myns. ana Zi.*

*Olei destillat. cochlear. vel ligni assrafr. gut. viii*

*M. f. pulvis: S.*

*Pulvis singularis pro aliquot vicibus, capiantur duo culelli cuspides pro dosi.*

Ex hæcenus dictis simplicibus varia sunt præparata, aque destillate, tam simplices quàm compositz, spiritus, Essentia, &c. Spiritus parantur vel per simplicem cohobationem, & ab istis simplicibus vel per fermentationem ipsorum simplicium (*es flegt, aber viel weg*) vel simul per utrumq; modum, si nempe spiritus fermentando paratus affundatur speciebus recentibus, & ita ab iisdem cohobetur: observando, quod Antiscorbuticorum spiritus volatiles in rectificatione attendendi sint, ut mox primà vice spiritus à Phlegmate seorsim blando igne provocetur; quia innumis commistum phlegma vix separabile aliàs existit, & quò læpius rectificatur, eò magis seic enerventur. Hac namque ratione elaboratur spiritus odore & sapore plantam referens. Mediante hoc spiritu præparantur etiam essentia ex foliis recentibus: vid. *SIMON PAULI Quadrip. Botan.* Spiritus isti affunduntur extractis variis, unde essentia compositz, verb. gr. Ess. Martis antiscorbutica, tinctura Corall. antiscorbutica, &c. Mars cum succo pomorum extrahitur, cui inspissato ad extracti formam redacto spiritus cochlearis antiscorbuticus affunditur, sic fit egregia essentia Martis antiscorbutica. Spiritus cochlearis omnibus notus est, cum quo interdum commodè spiritus lumbricorum terrestrium permiscetur. Ad fermentata hæc pertinet etiam Cerevisia me-

dicata per fermentationem, qualis est v. gr. Cerevisia antiscorbutica *TIMÆI p. 428. in Epist.* cujus ingredientia sunt hæc:

R. *Herb. cochlear. rec. M. ii.*

*Fumar. Mi.*

*Corv. frax. 3vi.*

*Bacc. junip. unc. i.*

*Com. absinth. Miß.*

*Rad. cicbor. unc. iß.*

*Enula unc. 3s.*

*Corv. inter. abiet. M. i.*

Incis. & conculata indantur sacco linteo seu ex linteo parato, immitte saccum in dimidium doliolum cerevisia recenter parata, & nondum fermentata, sed potius simul fermentare permittantur: de quo tempore vernali, etiam autumnali, per mentem & ultra bibitur; sic enim optimè conducit ad Curam Scorbuti.

Aliam formulam dedi *suprà Sect. 17. Cap. 3. Artic. 1. ubi de Cachex. & in Idea Formul. Class. 4. §. 7.* In usu est quibusdam spiritus antiscorbuticus *B. D. MICHAELIS* composuit ex his simplicibus committis per cohobationem, nempe

R. *Herb. cochlear.*

*Nasturt.*

*Piperit.*

*Kaphan. russ.*

*Rad. aren. ana q. v.*

Omnibus his recentibus leviter contusis & concisis affundatur spiritus baccarum sambuci vel juniperi per fermentationem paratus, ad eminentiam aliquot digitorum; digerantur per aliquot dies in vase clauso, & hinc destillando in Balneo Mariæ, cohobando eundem spiritum crebrius à novis speciebus, ut eò magis acuetur sale simplicium scorbuticorum volatili, & rectificando spiritus huiusmodi: si aciores sunt ac penetrantiores, & calorem augeant, temperantur optimè cum addito paucio spiritus aperitivi Penoti vel spiritus salis dulcis, egregiè quoque in scorbutico, & à *B. A. R. BETTE* in sua Praxi laudati.

Spiritibus tamen talibus, tam simplicibus quàm compositis, convenienter essentia ex Extractis antiscorbuticis, item ex extracto Martis, parari possunt, sicut & ess. Strobilorum piniantiscorbutica, & Elix. proprietatis antiscorbuticum, acuendo tamen spiritum antiscorb. cum spiritu aperitivo Penoti. Nam revera ingredientia Elix. proprietatis in scorbutico sunt optima, balsamica vi resistunt contentorum corruptioni, & multa symptomata partium solidarum præcavent, ac in specie humidioribus aut serosioribus subjectis conducunt. Item ex antimonio cum salibus per incinerationem paratus paratur tinctura quædam egregia in depuranda Massa Sanguinea Præstat tamen juxta *MOELLENBROCCIIUM* parare hanc cum spiritu quodam antiscorb. utico, cum quo etiam tinctura Corallorum antiscorbutica commodè parari potest. Tinctura hæc convenit, quando corpus est unctum maculis, pullulis & similibus affectibus, ubi opus est expulsiōe; in tali casu est miræ efficaciz. Essentia abstinthii, ess. cochlear, similesque essentia scorbuticis conveniunt, sed parandi modus est observandus: Nempe istorum antiscorbuticorum succus per residuum taceum, optimè depuratus ad extracti consistentiam est inspissandus. Succi hi inspissati vel Extracta, v. gr. abstinthii, helenii, gentianæ, summitatum abietis, rob sambuci &c. cum spiritu cochleariz, raphani rusticani, vel cū alio antiscorbutico, simplici aut composito, in tincturas & essentias simplices ac compositas admodum efficaces, in quibus integra crasis antiscorbutica est recondita, redigi possunt. Huiusmodi verò spiritus & essentia cum fructu usurpantur doli gutt. 20. 30. vel à 3ss. ad drach. i. in vehiculo convenienti, vel aliis medicamentis admiscetur.

Per fermentationem dobitant multi; an ex Scorbuticis debeant parari spiritus quia sub fermentationis negotio maxima pars salis volatilis solet evanescere, quod testatur odor, qui tunc exhalat. Certeum est, pati aliquā jacturā, non tamen omnem; qui per fermentationem cautè parati spiritus antiscorbutici adhuc sunt satis penetrantes; Ut ergo omnibus satis fiat, procedendum est ita: Paretur spiritus per fermentationem ex antiscorbuticis quibusdam; hunc affunde speciebus recentibus & aliquoties cohobetur, & tandem rectificetur. Ceterum in his ipsis Antiscorbuticis Moderni, imprimis Belgæ, commendant flammulam Jovis, uti vocant, vel Clematidem surgentem erectam, ex eaque parata remedia: hæc lapidis est acerrimi, nihilominus tamen seu singulare & expertum remediū, & sufficiens laudatur à *LINDANO*, qui



Recipe flammulam vel ramunculum acrem, q.l., quam cum vinorubro contundit in mortarioligno, infundit ad tempus, digerit, & postmodum blando igne destillat spiritum, quem asservat tanquam egregium remedium ad Curam scorbuti. Potest etiam destillari cum alius Antiscorbuticus, & ita habetur phlegma spirituosum antiscorbuticum pro vehiculo aliorum remedium.

Hiscæ addantur olea destillata ex dictis remediis penetrantissima, in specie ex cochlearia, quando jam incipit referari ejus crasis in semine, tunc oleum ex destillatione per velicam prodiit penetrantissimum, & in largiori copia, quam alias sine semine; quod cum saccharo in formam oleosacchari antiscorbutici redactum est egregium. Modum talis oleosacchari dedit in Colleg. Pharm. in Schraderum P. 2. DRAWITUS vocat magisterium cochleariz, ZWELFERUS vero essentiam siccam. Hiscæ volatilibus nativis non incommodè adduntur remedia volatilissima magis artificialia, spiritus nempe urinosi & salia volatilissima ex animalibus supra laudata, y.g. spiritus & sal volatile salis ammoniaci, tartari, &c. cum spiritu antiscorbutico composito misti, vel cum spiritu cochleariz saltem lociati, &c. Congruum est, ut pareatur spiritus salis ammoniaci compositus, ita ut mixtura pro ejus præparatione infundatur spiritus cochleariz, vel spiritus antiscorbuticus quidam compositus. Interim spiritus & sal volatile lumbricorum terrestrium per putrefactionem hiscæ volatilibus annumerandum venit, tam propter vim diureticam, quam quod affectibus scorbuticis dolorosis conveniat; imprimis egregius est in symptomatibus sensus & motus scorbuticorum corrigendis. Quidam etiam Elixir Propr. cum spiritu salis ammoniaci, Essentiam myrrhecum tinctura tartari, vel cum spiritu salis ammoniaci vinoso cum calce viva parato, &c. ad Scorbutum commendant. De spiritu salis ammoniaci vid. BARBETTE in sua Praxi, qui dicit, quod solus sufficit pro scorbutu; ubi elegans observatio paralyseos scorbuticæ ingentis, solo Decocto rad. armoraciz in sero lactis curatæ: Coquit 3.ii. in sero lact. & colaturæ propinat unc. iij. Huc etiam pertinet tinctura nephritica Ammelungi, & Essentia contra arthritidem vagam D. Michaelis, quæ extrahitur cum spiritu lumbricorum, cornu cervi, & antiscorbutico composito: Sic quidam succum citri inspissatum cum spiritu cochleariz extrahunt pro Essentia antiscorbutica temperata.

Ex dictis etiam subinde Mixtura variz præscribuntur in Cura scorbuti, quando Decocta aut insula sunt nauseola. Formulæ pro usu extemporaneo contra symptomata urgentia sunt v. gr.

R. Aquæ antiscorb. Dornæ. vel Myrs. unc. iv.

Solut. Mars. cum succo pom. unc. ʒ.

Spiritus cochlear. drach. ii.

Syr. de fumar. vel scelos. For. unc. i. M. D. S.

Mixtura antiscorbutica cochleariz capienda.

R. Aquæ cochlear.

Fumar. ana unc. iʒ.

Spiritus cochlear. drach. ii.

Sal. amm. simpl. vel assafr. ʒ. iʒ. ad ʒ. i.

Syr. scelosyrb. For. ʒvi. ad unc. iʒ. M. D. S.

Mixtura antiscorbutica sanguinem mundificans. Vel

R. Aquæ flor. samb.

Antiscorb. Dornæ. ana unc. iʒ. vel unc. ii.

Spiritus cochlear. ʒii.

Lumb. terrestr. per pur. ʒi.

Arcan. duplic. Myrs. drach. ʒ.

Syr. scelosyrb. For. vel fumar. drach. vi. ad unc. i.

M. S. ut anti.

Item sub forma essentiarum:

R. Elix. Prop. antiscorb. drach. vi.

Spiritus aperitiv. Pen. drach. ii. M. D. S.

Elixir antiscorbuticum.

R. Elix. propr. antisc. drach. ii.

Ess. pini,

Cutricu spiritu cochlear. par. an. ʒi. M. D. S.

Mixtura antiscorbutica: 20. ad 30. guttas.

Pro duobus vel ter in die.

R. Ess. fumar. comp. unc. ʒ.

Pini drach. ii.

Spiritus cochlear. vel antiscorb. comp. ʒi. M. D. S.

Essentia antiscorbutica: 30. guttas pro dojs.

R. Elix. propr. sine acido, vel tinctura tartari comp. unc. ʒ.

Spiritus carminat. de tribus, vel tinctura nephrit. Ammel. drach. iii.

Spir. Cochlear. drach. ii.

M. D. S. ut anti. Vel

R. Tinctura tartari compos. unc. ʒ.

Spiritus antiscorb. ʒii.

M. S. ut supra.

Dosis 30. gutt. bis in die.

R. Ess. myrrb. tartarif. unc. ʒ.

Spiritus sal. amm. assafr. vel cochlear. drach. ii.

M. S. ut supra.

R. Spiritus carmin. de tribus drach. iii.

Ess. absinth. scorb.

Cens. min. ana drach. ii.

M. S. ut supra.

R. Solut. Martis cum succo pom. vel antiscorb.

Ess. fumar. ana drach. iii.

M. D. S. ut supra.

R. Tinctura vitrioli Martis Zuverff. vel sol. Martis cum succo pom. drach. iii.

Spiritus cochlear. drach. i. vel drach. iʒ.

M. S. ut supra.

R. Spiritus carminat. de tribus, vel tinctura nephrit.

Ammelun.

Sal. amm. cochlear. ana drach. iii. M. D. S.

Spiritus anti. corbuticus.

Dosis 40. vel 50. gutt. matè & meridie, & sub introitum lecti.

R. Ess. cochlear. vel alius antiscorb. comp. unc. ʒ.

Fumar. drach. ii. M. S.

Essentia antiscorbutica.

R. Ess. aperit. comp.

Tinctura antimonii ex scor. an. drach. iij.

Spir. Cochlear. ʒii. M. D. S.

Essentia sanguinem mundificans.

Pro dosi dentur 40. vel 50. guttæ in die.

Quod attinet Antiscorbutica resina balsamica, non tantummodo Acidum acre scorbuticum temperantia, sed etiam noxam systemati nervoso inductam, & inde natos varios dolores emendantia: eminet hic imprimis lignum assafras, radix chinæ, cujus Decoctum ad imitationem TIMÆI von GuldenKlee videb. Sect. 1. c. 1. Præ cæteris omnibus abies alba picea & pinaster, in specie strobuli pinastri Menfe Martio collecti; (tunc enim tactu sunt pingues & resinosi, vid. SIMON PAULI in Quadrip. Botan.) item futeuli seu germina vel strobuli etiam adhuc resinosis usurpantur, vel crudè vel præparati: Crudè recipiuntur vel recentes vel exsiccati, & iisdem v. gr. ad eorum unc. iʒ. vel unc. ii. infunditur Cerevisia vel Coventi Mens. iʒ., coqu. aperto leniter vale, & ebulliant ad tertie partis contumtionem plus minus; in fine dum omnia fervent, infund. passul. min. consus. q. l. pro edulcoratione; ubi refrigerit colatur. De Colatura omni minæ imprimis haustus bonus calidè capiatur, ac sudor blandus expectetur, repetatur in die semel vel bis, mirabile! quantum doloribus vagis, paresi, contracturæ: ac similibus affectibus scorbuticis, partes nerveas & membra externa magis assigentibus, præmissis præmittendis, conveniat, & præsertim in Decocto, minus in essentia. Aut

R. Summit. pinastri. unc. ii.

Rad. chin. in talcol. incus. unc. i.

Affunde his

Aqu. Cerevis. ana ʒii.

Coq. blando igne ad medietatem. D. S.

Potio Sanguinem mundificans.

Colatura bibitur quotidie bis manè calidè, blandum expectando sudorem; item vespertim sub introitum lecti. Residuum denuò coqui potest paulo distinctius, & dicto modo continuari. Egregiè profunt in Arthritide vaga, paresi, doloribus partium scorbuticis: Vid. MOELLENBROCC ubi de Paris. Interdum quoque bacca juniperi recentes, rasura ligni assafras, aliaque similibus decoctis addi possunt.

Extractum granorum juniperi resolutum cum spiritu cochleariz est egregia Medicina in Cura scorbuti. Loco horum etiam cortex abietis minutim rasus simili modo, diutius tamen, coqui & usurpari potest. Hujusmodi Decocta spirant odorem terebinthinatum, unde forsitan nec terebinthina usus est incongruus in Scorbuto. Summitates abietis concisæ, & vel in aqua, vel in cerevisia, vel etiam simili vehiculo decoctæ & usurpantur, in dolorosis affectibus egregiè conducunt. Vel

R. Cymar. abiet.

Bacc. juniper. rec. ana q. v.

Contulus adde

Rad.



*Rad. chinae incis. minutim alterutrum dimidium.*

Affunde *Aquam* vel *cerevis.*, coq. ad tertiam partem consumptionem: D.S. ut supra: Colatura debito modo usurpetur.

Qui gratiam saporis desiderant, sub finem decoctionis, dum omnia fervent, optimè passulas minores conqussatas pro lubitu addere possunt: Vid. *Colleg. Formular. p.* . . . .

Neque mihi est dubium, quin aliae arbores plures simile quid præstare valeant.

Quod attinet *preparata*: est aqua cimarum abietis, spiritus & *Ess. Strobil. Pini* vel *abietis*, quæ mirabilia sunt in dictis symptomatibus scorbuticis:

R. Nempe *Strob. pini*, iisque contusis copiosam *aquam* affunde, instituitur fermentatio, addendo parum de *fecibus cerevisia*, destilletur, & prodit spiritus admodum snavis, qui pro usu asservetur. Hinc recipiuntur similiter *pini* seu *abietis Strobili tenelli*, ique coquantur tamdiu in l.q. *aqua simpl.* donec eorum sapor & omnis eorum vis aquam impregnent; Decoctum fortiter expressum inspilletur ad consistentiam Rob, quod vel cum spiritu proprio, vel cum spiritu *cochlearia*, vel cum spiritu *compositio antiscorbutica* extractum, dat *Ess. pini* potentissimam in scorbutico, in specie in paralyticis & etiam catarrhosis scorbuticis affectibus: dos. gutt. 30. 40. vel 50. vel solitaria vel cum aliis mista; e.gr.

R. *Essent. cochlear. vel Scorbut. comp.* ʒʒss.

*Pini* ʒii. M. D. S.

*Essentia sanguinem mundificans.*

Dosis 40. vel 50. guttulæ.

Verum in hisce remediis de *pino* observandum est: primò quod eadem non conveniant omnibus, quia nonnihil appetitum lædunt; secundò quod junioribus & calidioribus subiectis propter oleositatem volatilem non nimis diu propinanda sit, alias affectus externos varios, varos, pustulas in facie, erysipelata & febres ardentes inferre solent. Loco horum possunt substitui *lignorum Decocta* & *essentia*, una cum *specificis antiscorbuticis* permixta, expectando sudorem; Imprimis quando *pathemata catarrhalia Scorbuticis* affligunt, sunt optima temperata, additis simul *specificis antiscorbuticis*.

Ex *lumbicis* parata remedia quæcunq; mirè conveniunt in cura Scorbuti; Unde eorum spiritus & cum eo parata *essentia* contra arthritidem vagam (de qua cras) magnè est laudis in Cura Scorbuti. De *Martialibus*, Tinctura vitrioli *Marris Zuvelf.* & similibus, quæ sunt antiscorbutica, item de *Saturninis* nihil dico: Nam ex supra dictis satis clarum est, quod etiam conveniant in Scorbutico. It. de tinctura *Marris cum Ess. pini* vel spiritu *cochlearia*: Quod etiam pertinet *Essentia Martis DRAWIZII*, & ex inde parata Tinctura elegans antiscorbutica cum succo pomorum, vel acetoisæ, vel *cochlearia*, vel *nasurtii*; vid. *Tract. de Scorbutico p. 334.*

Dū dixi, *lac* & omnia *lacticia* esse optima in Cura Scorbuti, unde cum dictis vel post hæc, in specie post universalia & primas vias purgantia & *Martialia*, usurpentur *lacticia*, in specie vero *lac caprillum* ejusque *serum* pro remediis antiscorbuticorum vehiculo modo supra insinuat; qua ratione etiam *FORESTUS l. 20. Observ. II.* usu lactis dulcis, cum *cochlearia* & *beccabunga decocti*, multos, qui non febriunt, Scorbuticos curavit. *Serum* usurpatur in Scorbuticis febricitantibus, vel qui borborygmis in hypochondriis sunt obnoxii, ut & phlogosis vagis, ut supra jam dictum. In reliquis vero melius est, si usurpetur *dieta lactea*; eaque vel stricta ista contra arthritidem usitata; vel laxa, in qua nempe cum lactis vehiculo remedia antiscorbutica propinantur, ut quando v. gr. quotidie semel omni manè, interdum & bis, vespri stomacho vacuo ante cenam, larga dosis lactis calidè hauritur, (*Germ ein Nessel voll.*) cum tantillo *Sacchari*, vel singulis haustibus spiritus sal. ammoniaci & *cochlearia* ana mistorum gutt. 20. 30. 40. ad 50. usque instillantur; continuetur aliquandiu, successivè ascendendo, & tunc etiam descendendo, modò ventriculus æquè ferre queat: multum in recessu habet lactis usus ad curam Scorbuti: Macilentioribus vero, & ubi sapor Scorbuticus acrior existit, convenit *dieta lactea*. Novi mulierem paralyti scorbuticà cum atthritis vaga dimidio ferè annolaborantem, hisce curatam, v. gr.

R. *Lactis caprill. Menf. ʒ.* (id est, *ein Nessel*); & ipsi adde

*Herb. fumar. rec. incis. M. ʒ.* ad M. l.

Hæc ipsa bulliant invicem aliquandiu recto vase, traiciantur postmodum per linteum, & vel pro simplici vel duabus dosibus *lac* ita paratum ita hauriatur, addendo parum *Sacchari*; quod semper observetur, ne tam promptè coagu-

letur; simulque singulo haustui instillando gutt. xii. xv. vel xx. *spiritus cochlearia*, & ita quotidie manè usurpetur, qualibet quartà diè blandum infusum laxativum interponendo.

*Lac* ita paratum scorbuticis est admodum proficuum, in specie ubi laborat genus nervorum & adsunt dolores artuum, & imprimis, quando multum sudant: quin & succi simplicium antiscorbuticorum expressi & depurati vehiculo lacteo optimè usurpantur. Vel

R. *Rad. chinae minutiss. incis. ʒii.*

Bulliant in

*Serilactis caprill. ʒii.*

Colatura ferventi infunde

*Herb. rec. cochlear.*

*Fumar.*

*Nasurt.*

*Trifol. aquat. ana M. l.*

*Rad. rec. armorac. ʒiv.*

*Ennl. ʒii.*

*Sem. eruce contus. ʒvi.*

Sient in digestionem vase clauto per noctem: manè detur colatura. S. *Lac antiscorbuticum.*

Eligitur ex omni lacte imprimis caprillum & ejus serum, quod est optimum & convenientissimum, speciatim si capra appropriatis antiscorbuticis fuerit nutrita. Et hoc vehiculum lactis imprimis tempore verno & æstivo convenit; tempore vero autumnali frequentius cum vino propinantur alia remedia, sive sub forma Infusi, sive decocti, sive alia sub ratione. Sub *dieta lactea* cavendum est ab omni vino & acido, potu haustog; lacte instituat aliquoties ambulatorio, ut proliciat urina. Novi juvenulas ex scorbutico ejusque serosa acrimonia steriles, ab usu lactis bubuli aliquandiu manè hausti secundas redditas esse. Novi quæ fluore albo, ex radice scorbuti nato laborant, liquamine affluente acri erodente partes vicinas, præmissis *Martialibus* ex usu lactis commodius habuisse.

Hæc fere cardinalia ordinatio ita sunt observanda in scorbuti Cura.

Locuti sumus heri de Praxi scorbuti & Mali hypochondriaci; sed præ cæteris in Scorbutico urgent symptomata, eaq; multiplicia, quæ adhuc paucis consideranda restant, & quibus mitigandis etiam prospiciat Medicus, respiciendo Scorbutum uno oculo, altero vero ad symptomata affligentia. Et ista congeries symptomatum, quæ adeò longè se per scorbutum diffundit, etiam Hypochondriacos infestat. Hæc symptomata, utut sint varia, in genere tamen hoc habent commune, ut in eorum medela semper habeatur respectus ad acidum specificum corruptum primarid peccans, & secundariò hujusmodi remediis semper simul addenda appropriata symptomati & parti affectæ convenientia: v. gr. quando adeit *diarrhoea scorbutica*, tunc primariò insuperantur talia, quæ vim acidi scorbutici infringunt, & addantur simul, quæ diarrhoeam sistere valeant; hinc quæ stomachum roborant, & intestinorum tonum restaurant. Hoc certum est, nisi semper ad Scorbutum respiciatur, & appropriata antiscorbutica morbo addantur, quod vel symptomata non cessent, vel eadem deteriora fiant, vel diversimodè in alia symptomata mutantur: Qua ratione Colicæ malè curatæ superveniunt paralyces, hinc convulsiones.

Symptomata talia inter, ut ordine progrediar primo loco maximè conspicua sunt

DENTITUM & GINGIVARUM PATHEMATA.

Nempe *triplicia mala* vexant Scorbuticos circa gingivas & dentes.

1. *Gingivarum laxitas & mollietas*, hinc dentium in suis alveolis laxitas *Vacillatio*, quin interdum digitis vacillantes possunt extrahi.
2. Earum *Intumescentia*, *Crustatio* & *Exulceratio*, cum qua sæpè & Dentium *Caries* complicatur.
3. *Gingivarum Gangraena* & *putrefactio* serpens.

Omnium horum pathematum *Origo est saliva*, sale acri scorbutico imprægnata & inquinata, gingivarum texturam fibrosam laxans, destruens, & dentes rodens, unde gingivæ putrefactio; hinc ex sale acri *excoriatio*, tandemque *putrefactio cariosa*.

Pro his giugivarum affectibus curandis conveniunt:

- (1.) Collutiones oris.
- (2.) Tincturæ gingivis affricandæ.
- (3.) Pulveres; Vel
- (4.) Linimenta cum antiscorbuticis juncta.

Quoad *Collutionem oris*: in his, si quid aliud, eminet *salvia*, quæ est specificum appropriatum, *ros marinus*, flores



flor. ligustri, aquilegia; hyssopus, quercus cum specificis antiscorbuticis, ut cochlearia, nasturtio, vermiculari, nicotiana & similibus decocta, & collutionis instat in ore usurpata. His simul adstringentia, radix bistortæ, aristolochiæ, tormentillæ, ireos Florentinæ, Balaniflorum, rosæ, & similia addi possunt; Item malva arborescens rubra. Nam pulvis florum malva arborescentis rubra est secretum HORSTII in his gingivarum affectibus, & quidem cum alumine permixtus. Sicotietiam lacca, myrrha, alumen, item phlegma aluminis, spiritus salis, &c. utramque faciunt paginam in gingivarum scorbuticis affectibus; item succus cochleariz vel aliorum antiscorbuticorum; item succustalvia & cochleariz, quæ duo reliquis palmam præripiunt, pro collutione & abstersione gingivarum imprimis sunt commendata. Decoquuntur salvia & cochlearia, item nasturtium, vel in aqua, aut quod melius est, in lacte aut ejus sero, aut in vino; si vinum est acrius, interdum etiam ipsius loco Coventum sumatur, & Decocto dicto seu gargarismate gargarizetur os, & purificentur & abluantur gingivæ. Item decoctum lignorum ligustri, & summitatum pini in aqua, addito paucò alumine in dentium morbis præ cæteris est in usu: Imò si exulcerantur gingivæ, hoc Decoctum pini eadem consolidat: Item Decoctum summitatum pini & nasturtii in vino abluendis gingivis mirabiliter prodesse dicitur, gargarismatis formâ subinde usurpatum: Item Decoctum vel florum ligustri in aqua, addito paucò alumine, tanquam expertum gargarisma commendatur à MINDÈRERO in *Medicina Militari* p. 376. Item gargarismus de tormentilla Myns. & Decoctum ad Gingivas roborandas POTERII *Pharm.* p. 12, vel sequens Dentiluvium antiscorbuticum:

℞. *Herb. salic. apr.* Mliß. vel iiii.  
Nasturt. vel cochlear. M. i. vel horum an. M. ss.  
Flor. malv. bortenf. M. i. ad ii.  
Rad. polypod. unc. ss. vel drach. vi.  
F. Decoctio in ℞. i. ad ii. aqua font.  
Colaturæ adde  
Mellis rosat. unc. iß.  
Alum. ussi drach. i.  
Nitri depur. drach. iiii.  
Terra sigillat.  
Lacc. Florent. ana drach. i.

M. pro dentiluvio seu gargarismate oris. D. S.  
Gargarisma antiscorbuticum. Item

℞. *Herb. salic.*  
Cochlear. ana m. iiii.  
Coqu. in f. q. seri lactis:  
Colat. ℞. ii. adde  
Succ. cochlear. unc. ii.  
Syr. flor. aquileg. unc. iv.

M. f. Gargarisma. D. S. ut suprà.

Retineatur aliquandiu in ore, ut suam operationem melius exerceat.

℞. *Herb. salic.*  
Satureja,  
Roris marin.  
Nasturt. ana m. i.  
Rad. ireos Flor. unc. ss.  
Polyd. ℞. i.

Coqu. in f. q. seri lactis in fine addendo *Herb. cochlear. m. ii.*  
Cola & edulcora cum melle rosaceo, pro gargarismate in gingivarum intumescencia.

D. S. ut suprà.

℞. *Herb. aquileg. cum flor.*  
Summit. rubi idæi ana m. iß.  
Herb. cochlear. m. ii.  
Rad. bistort. unc. i.  
Cort. granat. noc. ss.

Coqu. in f. q. ferrarii.  
Colatur. ℞. ss. vel ii. adde  
Syr. ac. rosæ sic. unc. iß.  
Alum. crud. drach. i.

M. pro Gargarismate in gingivarum cruentatione,  
D. S. ut suprà.

℞. *Herb. cent. mun.*  
Scord.  
Plantag.  
Sabin. ana m. i.  
Flor. rosar. m. iß.  
Rad. Aristol. rot. ℞. i.  
Mastic. unc. ss.

Coqu. in f. q. vini austeri.  
Colaturæ ℞. ss. adde  
Unguent. Egypt. unc. iß.  
Alum. crud. ℞. iß.

M. pro Gargarismate in gingivarum putredine.  
D. S. ut suprà.

Præ cæteris optimum est sal mirabile Glauberi in squaque cabungæ solum. Quibuldam placet pro gingivis scorbuticis hæc Mistura:

℞. *Aqua plantag.*  
Prunell.  
Rosar. ana ℞. iv.  
Tinctur. rosar.  
Spiritus cochlear. ana ℞. iij.  
Salis,  
Vitrioli ana ℞. i.  
M. D. S. ut suprà.

Quæ Mistura facientur Gingivæ. Vel

℞. *Aqua salvia,*  
Plantag.  
Rorif. mar. ana unc. i.  
Spiritus cochlear. drach. iij.  
Syr. flor. aquileg. drach. vi.  
Spir. salis dulc. q. l. pro subtili acore. M. D. S.  
Dentiluvium.

Plures formulas vid. in *Id. Form. Class.* 3. §. 2.

Veletiam sunt Gargarismata ex tempore ex aqua cochleariz, nasturtii beccabungæ, sedi minoris, addendo isdem rob dia-Mori, Syrupum florum aquilegiæ, Syrupum nicotianæ cum melle rosato, aut etiam cum melle rutaceo, aut similibus.

Post collutionem oris tincturæ dentibus sunt adfricandæ, quas inter eminet præ cæteris *Tinctura Lacca Myns.* rutæ parata, singularissima in scorbuticis dentium aut gingivarum affectibus, in laxitate, mollitie, exulceratione, & gingivarum gangrena: In his ista tinctura mirabilia facit, & instillabile est medicamentum probè gingivis cum linteo applicata, vel sola, vel mixta cum dimidio tincturæ florum aquilegiæ: c. gr.

℞. *Tinctura Lacca Myns.* ℞. iij.

Flor. aquileg.  
Spiritus cochlear. ana drach. i. M. D. S.  
Tinctura dentium.

Potest tamen meliorari, si lacca addatur myrrha, aut si loco phlegmatis aluminis phlegma vitrioli, in quo aliquid aluminis solum, pro illa conficienda adhibeatur: vel hujus defectu ex tempore potest præscribi (quando non potest haberi) mistura, quæ est similis tincturæ lacce. Nempe:

℞. *Lap. medicament.* Crall. q. l. vel drach. i.  
Aqua sedi minor.  
Cochlear. an. q. ss.

Post solutionem leni & blandâ digestionem filtrentur:  
Colaturæ infunde

Gum. lacca drach. iß. ad ℞. iij.  
Myrrha drach. i.  
Alum. ussi ℞. iij. ad drach. i.  
Flor. aquileg. p. iij.

Sicut in digestionem, donec tingantur, tunc filtrentur:  
Et hæc præscriptio idem valet atque tinctura lacce; quæ imbuitur linteo & affricetur gingivis & dentibus scorbuto correptis. Vidi aliquoties adhibitum.

Facit etiam hinc sequens singulare in Scorbuto oris: Nempe aqua calida affunditur calci vivæ & coquitur, post massæ subsidientiam filtretur lixivium & abstrahatur ad remanentiam salis, quod parum est.

℞. *Hujus salis succrem. calcis vivæ* drach. iij.  
Gum. lacca, drach. i. ad drach. ii.  
Vitrioli de Cypro gr. vi.  
Aqua roris mar.

Salvia, ana ℞. iß.

Mista invicem solve calore leni, & hoc ipso ablue Scorbutum oris & dentes scorbuticos. D. S.

Tinctura pro dentibus scorbuticis.

Post tincturas sunt pulvere spro dentibus, qui sunt varii: Hostamen non ingredientur lapides, vel tartarea; gingivæ enim lædunt. Præ cæteris elegans est pulvis pro dentibus & gingivis scorbuticis. BARTHOLINI *Cent.* 6. *Hist.* 34. cujus descriptio hæc est:

℞. *Fol. aquileg.*  
Cort. rad. cappar.  
Sem. cochlear. ana ℞. iß.

Rad.



Rad. Irees,

Alum. ussi ana drach. iij.

Maxill. lucii pisc.

Corall. alb.

Cornu Cervini. ana drach. ij.

Pulveriscentur subtilissime & irrorentur parum cum oleo Caryophyllorum destillato. Imbuatur hic pulvis ulterius spiritu cochlear., ut ita melius approprietur, adservetur caute, & affricetur saepius dentibus.

Vel excipi potest unguento aquilegia, vel saltem melle.

Vel

R. Pulv. rad. bistort. drach. iij.

Rosar. rubr.

Balauft. ana drach. i.

Alum. ussi ʒij.

Hæ misceantur & irrorentur aliquot guttis olei destillati Caryoph.

M. pro pulvere dentifrico, & ita usurpetur.

D. S.

Pulvis dentifricus.

R. Salis test.

Cin. nicotian. ana drach. ij.

Fol. aquileg.

Salvia,

Nuc. Moschat. ana drach. j.

M. f. pulvis pro Gingivarum Intumescencia.

D. S. ut antè.

R. Sangu. Dracon.

Alum. ussi ana drach. iʒ.

Summ. hyperis.

Fol. salu.

Rad. Irees Flor. ana drach. j.

M. f. pulvis: adde

Olei destillat. cochleariz. gutt. vj.

M. f. pulvis pro gingivarum exulceratione.

D. S.

ut antè.

R. Rad. bistort.

Tormentill.

Cort. granat. ana drach. j.

Hamatis.

Thuris,

Alum. ussi,

Sal. ammoniaci ana drach. ʒ.

M. f. pulvis in gingivar. putredine.

D. S. ut antè.

Denique linimenta convenientissimè imprimis in graviore gingivarum exulceratione & fetore scorbutico. Conveniunt etiam in ulceribus oris & faucium scorbuticis; ex gr. sic instar omnium sequens:

R. Alum. crud. drach. iʒ.

Fol. salu. drach. iij.

Rad. Irees Flor. drach. iʒ.

Myrrb. drach. ʒ.

Omnia probe pulverisata excipe cum f. q. Mellis, & f. Linimentum denibus subinde affricandum.

D. S.

Linimentum pro dentibus.

R. Fol. roris mar.

Salvia,

Flor. aquileg.

Nuc. mosch. ana drach. ij.

Myrrb. el.

Massich. elect. ana drach. iʒ.

Alum. crud. drach. ij.

Cum mell. rosar. vel unge. de aquileg.

F. linimentum in gingivarum intumescencia.

D. S. ut supra.

Aluminosa Linimenta enim convenientissimè adhibentur cum aliis remediis in gingivarum scorbuticis affectibus. Borellus Cent. 2. Obs. 65. recipit alum. parum in Oleo sulphuris ʒi. Conserv. rosar. ʒvj., deterio dentium tartaro, ope scalpelli lignei admoveat, & intra 14 dies, si hæc sæpe fiunt, dentes firmari, dealbari, & carnem gingivarum produci scribit.

Item

R. Unguent. de aquileg. ʒl.

Flor. rosar. rub.

Rad. Irees Flor. ana drach. j.

Alum. ussi ʒij.

Myrrb. drach. ʒ.

M. in Gingivarum flaccidescencia.

D. S. ut supra.

R. Pumic. ussi ʒʒ.

Corall. rub. prepar. drach. iij.

Gum. lacca drach. j.

Myrrb. cum aceto sol. ʒij.

Caryophyll.

Macis ana ʒʒ.

Cum syr. cochlear. f. Linimentum.

D. S. ut supra.

Aliud videb. in Id. Form. Cl. 5. 6. 4. Vel aliis irritis mel rosatum aliquot guttis spiritus salis ad aliqualem acrimoniam impregnatum dat Linimentum egregium ad consummatam gingivarum exulcerationem, excoitationem & cruentationem scorbuticam, & ad summum corruptionis gradum. Convenit etiam in ulceribus oris & faucium scorbuticis. Dico cum aliquot guttis spiritus salis: Nam quidam etiam miscent cum spiritu vitrioli; spiritus verdè vitrioli reddit dentes nigros. Ratio hæc est: In omni spiritu vitrioli semper est liquamen metallicum, quod in ignis tortura spiritus secum rapit per retortam: Probo, quod spiritus vitrioli licet clarissimus, si ad tempus steterit, fit obscurus & turbidus, quia se ipsum præcipitat metallum. Quod si si jam dentibus affricetur spiritus vitrioli vel alius corporis partibus, pars metallica præcipitatur ab effluviis salinis volatilibus, & ita præcipitata pars metallica nigredinem post se relinquit: Ergo commodius spiritus salis usurpatur. Ad hos gingivarum affectus appropriata est Conlecta florum aquilegia: Nam conserva hæc irrorata cum spiritu cochleariz, tanquam quoddam linimentum gingivis illinitur, bene fricando, commendatur contra hoc malum. Elegans denique Linimentum in scorbutico dentium, videbitis in SENNERTO l. 3. Prax. ubi de Scorbutico oris p. 633. Compositio ejus est hæc:

R. Pulv. fol. aquileg.

Mentha crispa,

Salv.

Nuc. moschat.

Myrrb. ana ʒij.

Alum. ussi ʒʒ.

Mellis virgin. ʒiij. vel q. l.

M. f. Linimentum.

D. S. ut supra.

Si ulcera maligna aut etiam gangræna occupent gingivas aut fauces, utque minus videatur sufficere tinctura lacce, tunc in pessimo statu aqua viridis HARTM. Pr. Chym. c. 52. ʒ. 4. & 5., vel Plasteri applicari possunt, quæ in exulcerationibus scorbuticis oris sunt nobilissimæ. Basis harum est viride x s cum aceto. Assumitur quoque colcothar, cerussa, alumen, & vid. SCHROEDERUS Pharm. l. 2. Præ cæteris PLASTERUS in Praxi aquas famosas reddidit. Item conveniunt aquæ Mercuriales (ex Mercurio dulci) caute tamen usurpandæ. Aut etiam, ubi magis urget malum, accedendum est ad unguentum Egyptiacum melle dilutum, & locis exulceratis cum penicillo admotum; vel unguentum de aquilegia cum lucco salvia & paucis spiritus salis mistum illinatur. Denique curatione magnetico-sympathetica potest fieri curatio Scorbuti dentium: Si planta senecionis effodiatur illa radice, Planta hæc & radix lauentur, & cum radice fricentur dentes & gingivæ, ut sanguinem emittant: radicem ita sanguine adpersam iterum in terram suffodiunt, observant ut probe crescat; quantum enim planta crescit, in tantum decrescit Malum scorbuticum in gingivis.

## II. DENTII DOLOR SCORBUTICUS.

Iuxta vacillationem dentium & gingivarum, affectus frequens in Scorbutico est Dolor dentium Scorbuticus, isque contumacissimus, gingivas exulcerans, & etiam subitò dentes erodens. Conveniunt in tali scorbutico dentium dolore radix bistortæ & filicis, folia & flores salvia, folia & flores rosmarini, folia rutæ, plantaginis & hysscyami in aqua vel vino decocta, vel addatur parum aceti, addendo simul colaturæ adhuc calidæ succum cochleariz vel beccabungæ, & ita pro collutione oris usurpetur. Sedum minus seu vermicularum admodum prodest, quod quidam colligere volunt, ex lignatura dentis & gingivarum in foliis: imprimis luccus sedæ vermicularis expressus egregium est remedium in stomacace, & in dolore dentium scorbutico. Decoctum foliorum pini cum spiritu cochleariz acutum pro gargarismo



mate etiam egregie confert. Quod si dolor simul malas torqueat, tempora & reliquas vicinas partes afficiat, commode dictis locis illinitur spiritus cochlearie secundarius seu pblegmaticus cum spiritu lumbricorum terreftrium ana.

### III. ORIS ET FAUCIUM ULCERA SCORBUTICA.

Non raro etiam Oris ulcera, non minus quam in lue venerea, infestant fauces, palatum partesque vicinas. Contra hæc præter Linimenta jam dicta, ad unguentum Ægyptiacum, cum melle vel lacte vel vini spiritu dilutum, & locis exulceratis cum penicillo admotum, accedendum. Singulare & egregium hic est gargarisma RVLANDI, qui

R. Aquæ commun.  
Hydromel. ana ℥j.  
His addit

Alumin. ℥ss ad ℥j.

Ebullire permittit, & hoc Decocto manet à meridie post patium vel vesperi colluatur os, & ita sanantur ulcera oris.

Vel

R. Aquæ nasturt. aquat.  
Plantag. ana ℥ss.  
Nicotian. ℥j.  
Spiritus salis ℥j.  
Ung. Ægypt. ℥ij.  
Mell. rosat. vel rutæ. ℥j.  
Syr. flor. aquileg. ℥ss.  
M. D. S.

Mixtura os mundificans.

Summitates pini his adjectæ erunt quoque proficue, quia hæc virtute balsamica instar cerebinthine ad hæc ulcera sananda multum conferunt. Nec aqua viridis Plateri negligenda, quæ absque periculo usurpatur.

### IV. MACULÆ CUTANÆ SCORBUTICÆ.

Dixi, quod in superficie artuum & partium externarum MACULÆ scorbuticæ subinde erumpant coloris varii, & quod earum eruptio sit proficua ex eo, quia sint semper bonum signum malæ causæ foras erumpentis. Opera ergo danda est, ut conserventur in superficie corporis, & promoveantur, expellendo eas per cochleariam & fumariam. Quia autem lympham acidioram tamquam causam agnoscunt, ad has maculas expellendas internè conveniunt omnia, quæ acidum absorbendo ac edulcorando sanguinem purificant. Præmissa igitur Purgatione leni Mercuriali præferbantur Antiscorbutica, sale volatili aciori turgida, ut Massa Sanguinea purificetur ac floridior reddatur, quæ inter est Essentia fumarie simplex, & imprimis composita, Essentia helentii, persicarie cum spiritu cochlearie permixta, tinctura florum aquilegiæ expellens hic etiam convenit, non minus quam emulsiõ seminis aquilegiæ: tinctura corallorum antiscorbutica reliquis præferretur; egregie enim promovet exclusionem, valdeque conducit; quæ etiam in Purpura puerperarum, de Malignitate scorbuti plus minus participant, egregie confert. Curavi aliquando puerperâ purpurâ scorbuticâ afflicta. Signa erant, quod purpura rubicunda se exhibebat, & erumpebant pustulæ copiosissimæ aquosæ. Hanc, inquam, curavi tincturâ coralliorum antiscorbuticâ, quæ expulit pustulas & purpuram copiosam: Adeoque & hic erit egregia. Alias nota est differentia macularum scorbuticarum. In maculis rubris, internis remediis addendus venit succus acetosæ, ipsa acetosa, acetosella, & succus citri: In cæruleis & lividis cochlearia, & ex hac parata medicamenta, optimè conveniunt; item tinctura coralliorum antiscorbutica, quæ diaphoretica terrea, acidum temperantia & absorbentia, Cornu Cervi sine igne, corallia, rubra præparata, Cinnabaris antimonii, antimonium diaphoreticum simplex & Martiale, Bezoardicum joviale, Antihædonicum Poterii, myrrha, flores sulphuris, &c. e. g.

R. Cornu Cervi sine igne ℥ss.  
Corall. rub. præp. ℥j.  
Antimonii diaphor.  
Flor. sulphuris,  
Cinnab. antimonii, ana ℥ss.  
Myrrh. el. ℥ij.

M. f. pulvis: S.

Pulvis expellens pro aliquot vicibus.  
De hoc quotidie bis vel ter à ℥j. ad ℥ss.

Quod si expulsæ sint maculæ, sponte evanescent; si vero pertinaces resistant, nec evanescere velint, utur nihil mali cessu habeant, quibusdam tamen cutis nitori studentibus in rebus sunt molestæ, & etiam interdum majores ad excoriationem disponunt partes; subinde necesse est, ut removeantur: quod fit optimè per linimentum, paratum ex pulvere sinapi cum aceto in linimenti liquidi formam redactum: hoc enim in balneo vellestropost sudorem illitæ maculæ subitò disparent, quod etiam conducit in Maculis hepaticis. Quod si acrius fuerit, ad modum TIMÆI von GÜDENKLEES convenit Linimentum sequens:

R. Pulv. sem. sinapi subtiliss. ℥ss ad ℥ij.  
Olei amygd. amar. rec. ℥ss. ad ℥vj.  
Succi citri rec. q. s.

M. F. Linimentum, contra maculas scorbuticas, (etiam vulgò dictas maculas hepaticas) egregium, quo post sudorem maculæ fricatur ter vel quater de die, evanescent.

Plura externa sequenti Artic. 7. ubi de affectibus cutaneis: Vid. hic HORSTIUS in obs. p. 401. TIMEUS von GÜDENKLEES in Epist. p. 329. DECKERS Comment. in Praxis Berbetæ, ubi medicamenta nonnulla externa extant. His quoque associari potest infallibile hoc: e. g.

R. Rad. irid. Flor.  
Helleb. albi ana q. s.

Pulverisata misce cum melle virgineo vel oleo amygdal. amar. in Unguentum.

B. D. D. MICHAELIS arcanissimum remedium, in usu erat sequens:

R. Flor. sulphuris p. ij.  
Campb. p. j.  
Arena ad pondus omnium.

Sublimabat, & cum Aqua jecrophulariæ inungebat.

### V. PRURITUS CUM PURPURA.

Non rarum est, quod Scorbutici in ambitu corporis patiuntur pruritus rodentem cum eruptione quasi purpuræ in loco calido, quæ in frigido denuo disparet, idem hæret inter cutem & carnem, mordetque instar urticarum. Pro excretionem intercutanea promovenda nihil melius est decocto summit. pini, expectando sudorem, qui multum expellit. Externè cantharidura manuum ac pedum laudatur in M. A. N. C. Ann. 4. & 5. Obs. 51, quæ ad maculas cutaneas confert.

### VI. CRURUM DOLORES SCORBUTICI.

Pro cæteris notum est, quod doloribus frequentissimis, liffique variis, stipatus sit scorbutus, qui dolores nunc sunt fixi, nunc vagi. Dolores fixi sæpius abdomen, sæpe etiam crura infestant. Ad Dolores crurum, qui magis sentiuntur tempore vespertino & nocturno, sudorifera appropriata sunt optima, præmissa subinde in principio venæ sectione brachii & pedis oppositi, aut etiam cruris ægri, si nempe maturè instigatur, avertendo quasi aut derivando Contritorum motum; potius tamen in brachio, quod bene notandum. sicuti etiam omnia ea conveniunt, quæ postmodum circa arthritidem vagam explicabuntur. Specialim præ cæteris internè conducunt spiritus tartari volatilis seu carminativus, spiritus theriacalis camphoratus, &c. cum spiritu cochlear. aut nasturtii, spiritu baccarum ebulli aut sambuci, aut spiritu antiscorbutico mixtus. Essentia sassafras mixta cum spiritu cochlearie aut antiscorbutico quocumque ad ℥j assumatur, addendo subinde Essentiam opii aut grana aliquot laudani opiat, ad compescendam doloris ferociam: e. g.

R. Ess. ligni sassafr. vel succini sassafr. ℥ij.  
Spiritus antiscorb. ℥j.  
Ess. opii tartarisat. ℥ss. ad ℥j. M. D. S.  
Essentia antiscorbutica.

Convenit item Decoctum ligni sassafras aut summit. pini cum radice chinæ: e. g.

R. Res. ligni sassafr. ℥ij.  
Cort. ligni sancl. ℥j.  
Rad. ebine elect.

Sarsaparil. ana ℥ss.

Stent in infusion, cum aquæ simpl. ℥ij.  
Manet coq. vase clauso, suo alembico munito.  
Colaturæ ferventi infunde

Herb. scord. M. ij.  
Rad. liquoris ℥j.

Polypod. ℥vj.

Stent per diem & noctem, mane coletur, Colaturæ addatur liquor per alembicum prolektus. D. S.

Potio



**Potio antiscorbutica.**

Externè conveniunt fomenta, tam humida quàm sicca. Humida parentur ex decocto althææ, abrotani, fumariz, beccabungæ, pulegi, hyssopi, cochleariz, salviæ, sabinz, nasturtii, floribus chamomillæ, sambuci, & baccis juniperi: verbigratia

R. Herb. salvia,

Flor. chamomill.

Samb. ana M. ss. ad M. j.

Herb. nasturt. aquat. M. j. ad j ss.

Coq. in f. q. lactis vel feri lactis, vel aqua comm. pro sotu calido cum linteis multiplicatis applicando. D. S.

Fomentum leniens.

Aut etiam coq. in forma cataplasmati & ita applicetur.

D. S.

Cataplasma leniens.

Item flores sambuci, quibus adduntur aliquot folia hyoscyami, in lacte cocti commendantur admodum ad scorbuticum crurum dolorem.

Aut fiat Cataplasma ad imitationem D. MICHAELIS:

R. Rob. junip. ʒi.

Succ. inspiss. flor. chamom.

Sambuc.

Nasturt. aquatic. ana ʒss.

Coq. in f. q. lactis coagul.

F. l. a Cataplasma.

D. S. ut antè.

Sed quoniam non æquè omnia subiecta ejusmodi fatus humidus ferunt, fatus siccus fieri potest, v. g. sacculus, qui calefactus imponatur.

R. Mili M. iij.

Salis commun. M. j.

Furfur. tritic. M. ij.

Summis. absint b.

Flor. chamom. ana Mj.

Includantur sacculo, quo dolor brachii gravissimus referatur coratus, in M. A. N. C. Ann. 6. 7. obs. 94. pag. 133. Milil quantitas ad ʒss. & ʒij. augeri potest, uti etiam quantitas salis ad ʒvj.

Horum loco spiritus possunt eodem modo illiniri calidè; quæ ratione spiritus baccarum juniperi camphoratus TIMÆI *Don GuldenKlee* externè illitus etiam est elegans contra hos dolores: vid. ejus *Epist. p. 368*. Spiritus salis ammoniaci cum calce viva, vel, qui omnium optimus, spiritus lumbricorum terrestrium, (sunt appropriati) cum duplo, triplo vel quadruplo aquæ articul. ad extra mistus, & ita crebrius illitus, est optimus, cavèdo, ne acriora sint ingredientia. Galbanetum Paracelsi cū spiritu tartari mistū & circulatū, hinc leniter affricatū, externè dolores crurum fixostedat. Facit huc pediluvium Myos. contra dolores crurum. Imprimis singulare quid obtinet Lixivium Coriariorum, cum dimidio urinz humanæ mistum, in forma humoris vaporosi: (*Balneum vaporosum: crura operiuntur, ne vapor abeat:*) Est singularis efficaciz; vid. M. A. N. C. Ann. 6. 7. Obs. 22. 9. Tandem *Vinacea* & *Infessus vinaceorum* calidorum, ut probe incalescat membrum dolorosum, singulare quid obtinent in corrigendis doloribus artuum: Quando scilicet fermentatione spontaneâ probe incalescunt (si non spontè incalescunt, aspergatur calx viva) pars affecta immersa probe sudet, quâ abstergâ pro ægerio lectum calidum se conferat, donec sponte cesset sudor, & si opus est, ulterius sudet, & sic mirificè hi dolores sistuntur; mirabile levamen est. Ultimò horum loco balneum ex formicis, earumque cubile, itidem hic est egregium. Denique aliis irritis Thermarum aquæ, aut balnea ex luto thermarum, aut thermæ artificiales ex sulphure & calce viva parata, pro lotionè dolentium membrorum sunt convenientissimæ: Sed probe notandum, præmissis præmittendis, Vesicatoria in aut prope locum magis dolentem applicata subinde multum conferre in hujusmodi fixioribus & contumacioribus torturis.

**VII. COLICA SCORBUTICA,**

&

**NEPHRITIS NOTHA.**

Inter alia symptomata scorbutica eminet quoq; VENTRIS DOLOR, COLICA & ILIACA PASSIO, qui sunt affectus acerbissimi, interdum adeo atroces, ut duos exinde rupturam peritonzi passos EVGALENUS p. 86. perhibeat. Variè affligit ægros, ut plurimum conqueritur, circa vertebrae dorsii se pati dolores lancinantes & lacerantes,

unde totum abdomen cruciatur, & spasmodicis convulsio- nibus ad dorsum usque, ubi imprimis mesenterium an- nequitur, se manifestant: subinde umbilicus ad interiora versus retrahitur, & ægri jacent incurvati, interdum to- tum abdomen tumet, & licet ventris expirent flatus, tamen levamen non sentiunt.

Facit huc NEPHRITIS NOTHA, in qua omnia fe- re Nephritidis adsunt symptomata, etiam urinz ardor at- que suppressio, cum dolore lumborum circa renes in regio- ne hypochondriaca ac peringo exquisitissimo, nullo licet præsentè calculo. Frequenter enim decipiuntur ægri, & quæ ac Medici, ut putent, se laborare Nephritide, sed malè; Ex utur urina supprimatur, non tamen statim adest Calculus. Complicati quidem interdum sunt dolores nephritici & ab- dominis, interdum seorsim affligunt. Conqueruntur de an- gustiis cordis: imò subinde eadem symptomata, quæ mu- lieres hysterica: & utut cessent dolores nephritici & abdominis, tempore tamen extra paroxysmum conque- runtur de doloribus lancinantibus & lacerantibus circa re- gionem lumborum, donec variæ causæ externæ evigilan- tes Parotidem inferant.

Dolor hic simpliciter oritur ex spasmis seu moribus convulsi- vis intestinorum, mesenterii, & parvium nervosarum annexa- rum, ab acri scorbutico sale vellicatarum, in quibus imprimis regio lumbaris mirè lacerari & affligi solet, quorum fundamentum hæret in plexu mesenterico nerveo & ibi confitis glandulis, quæ plexibus nerveis mesenterii vici- næ sunt, ubi varios dolores inferunt, & similicursu ab- domen occupant.

De hac Nephritida Notha nemo meliùs, quàm D R A- WIZIUS scripsit: notabilis est locus.

Quoad Curam horum dolorum, in paroxysmo 2. Indica- tiones observandæ sunt:

1. Intestina leviter abstergenda blandis injectis & as- sumptis.
2. Convulsivi impetus & spasmi in intestinis & mem- branis abdominis, tam generalibus quàm specia- libus scorbuticis, imprimis volatilibus oleosis, & opiatis & temperatis compescendi sunt, inter- nis & externis.

Extra paroxysmum Scorbutici Cura primariò attendenda; & in specie post martialia remedia, & ex pino sunt optima; idque cessante paroxysmo, aut extra eum.

Quoad primum scopum: quovis morbi statu à purgantibus fortioribus planè abstinendum & cavendum, quia maxi- mè, nocet symptomata spasmodica exasperari, & dolores ex acerbant, ac non raro hinc secū per os rejectio contingit.

Cum verò alvus subinde pertinaciter sit clausa, usur- pentur saltem blandè abstergentia intestina; inter quæ emi- nent passulæ & omnia passulata, serum lactis, imprimis caprinū, aut lac caprinum cum saccharo & spiritu salis am- moniaci mistum, ad demulcendam acrimoniam salis scorbutici, istas convulsiones spasmodicas in abdomine excitantis. Oleum amygdal. dulcium recens, aut olivarum, in quo rosæ pallidæ fuerint infusæ, ad ʒij. vel iij, vel solum, vel in jusculo gallinaceo, jure pisorum, decocto rad. althææ aut parietariæ haultum, aut sperma ceti cum his assumtū, egregiè temperant acrimoniam salium, blandè alvum le- niunt, & intestina abstergunt. Quoad passulata in alvo ni- mis obstrueta, vid. Timæus à Guldenklee in *Epist. pag. 136*.

Vel.

R. Tamarind. unc. i ss.

Coqu. in f. q. feri lactis ad Mens. j.

Si verò dolores hi adhuc in principio fuerint, leviter tantum affligant, & alvus nondum constipata, statim pur- gantibus materia vitiosa educi debet, illam primò attem- perando per absorbentia & temperantia, ut oleum amygdal., sperma ceti, lapillos cancr., solut. maris cum succo pomorum, &c. Singularis vgrò est encheirisis, quam R I- VERIUS Prax. l. 10. c. 1. commendat, scilicet ut purgan- tibus Opiata commisceantur, quibus mediantibus primò somnus inducitur, hincq; alvo solutâ paroxysmus sedatur.

Quoad Alterantia: variant hæc pro diversitate acrimo- niæ peccantis, quæ modò absorbentia minusque acria, modò sulphurea oleosa aromatica & salia volatilia admittit. Si enim humores, ac æstuant magis fuerint, convenient alterantia absorbentia terrea & marina, v. g. lapides can- crorū, mater perlarum, maxillæ lucii piscis, corallia rubra, margaritæ, martialia, unicornu sine igne, ebur sine igne, &c. Item serum lactis tepidum, aut in quo radix chinæ cū an. flor. borrag. & part. ij flor. tunicæ decoctū, cujus usū pro obtundendo sale acri acido singularem frequentius observa- vi;



vi. Vid. **DRAWIZIUS** l.a. pag. 224. Aut loco hujus emulsiotes sem. 4. frigid. majorum cum semine papav. albi & ebore sine igne: Aut his substituendum saccharum Saturni, & ex hoc parata Tinctura antiphthistica, quæ omnes rodentes & æstuant humores singulariter temperant, observatis tamen illis circumstantiis, quas **DRAWIZIUS** l. a. pag. 126. indigirat. Sin tartarus areniformis simul in urina compareat, frustraneus est lenientium usus, nisi per diuretica moderatissima & abstergentia ille prius tollatur, scilicet per terebinth., syr. de althæa Fern. Emuls. sem. 4. majorum & papav. albi, violarum, ac lapillos Cancr. &c. Præterea ad convulsivos impetus sistendos conveniunt salia volatilia oleosa cum opiatâ mixta, quorum formulas videbitis *suprà Sect. 11. de Colica*. In specie remedia ex castoreo, cochlearia, & corr. aurantiorum, aliisque carminantibus sunt optima, nempe syrupus, aqua, &c. corticis aurantior. Præ cæteris verò Ess. cort. aurant. mista cum Ess. castorei & spiritu cochleariæ est elegans. Spiritus salis ammoniaci mistus cum spiritu cochleariæ, item cum spiritu anisi, & benè circulatus ac unitus, etiam convenit. Spiritus nistri cum spiritu cochleariæ unitus & dulcificatus dat spiritum nistri dulcem cochleariatum contra dolores ventris scorbuticos. Imò *si diutius duresc. paroxysmus*, Martialis sunt usurpanda. Denique *spiritus carminativus de tribus* cum spiritu cochleariæ mistus, etiam cum vehiculo antiscorbutico appropriato assumtus, est nobilissimus in abdominis doloribus. Loco spiritus carminativi potest etiam sumi spiritus *tartari volatilis* mistus cum spiritu cochleariæ vel cum spiritu *lumbriorum* terrestrium, qui in *sevo lactis* assumpti sunt optimi; spiritus enim *lumbriorum* terrestrium, & cum hoc parata Ess. contra Arthritidem vagam, sunt egregia in doloribus ventriculi, abdominis, aliisque scorbuticis. Item Elixir proprietatis antiscorbuticum non incommode usurpatur. Quibus subindè, præmissis præmittendis, laudanum opiatum, laudanum hystericum, aut Essentia opii, consulò addi possunt: v.g.

**R. Aqu. Carminat. Dornet.**  
Antiscorbut. ana 3ij.  
Spir. cochlear.  
Carmin. de tribus ana 3j.  
Ess. opii 3ß.  
Syr. corr. aurant. 3vj. ad 3j.  
M. D. S.

*Mixtura antiscorbutica contra dolores abdominis.*

Præ cæteris externæ Clysteres cum cataplasmatibus, fomentis, ac linimentis antipainmodicis magno emolumento sunt; unde clysteres lactei, tam simplices quàm terebinthinati, sunt perquam proficui. Fomenta ex lacte cum anodynis & scorbuticis, cum anodynis v.g. florib. chamomillæ, sambuci, summæ. absinthii, anethi, althæa, Mercuriali, parietaria, rad. heleni, baccis lauri, foliis hyoscyami, &c. sunt egregia. Hæc enim & similia mista pro clysteribus lacteis coquantur, & vel ventri applicantur, vel Decoctum sub forma clysteris addito oleo violarum, rosarum, ac vitellis ovorum injiciatur: Vel fiant *Clysmata ex lacte*, vel solo vel medicato, cum appropriatis quibusdam addito saccharo; imptimis *lac*, in quo dissoluta terebinthina cum *vitelloovi* est egregium in abdominis doloribus, idque imprimis, si diu retineatur: Vel fiant *clysmata ex sevo lactis*, quibus additur castorei ana 3ß. vel 3ij. ad 3j. cum *syrupi papav. albi* 3j. ad 3ij., vel cum Requite Nicolai ad 3ij.; Sic enim fit clystima appropriatum, & admodum dolores leniens: Aut injiciantur clysmata carminativa anodyna & terebinthina *suprà Sect. 11. ubi de Colica, item infra Sect. 20. cap. 2. Membr. 2. ubi de Nephritis. doloribus præscripta*: Vel

**R. Herb. 3j. flor. chamomill. Mij.**  
Althæa Mj.  
Sal. tart. vel cin. clav. 3j.  
Coqu. in f. q. lactis.  
Colaturæ 3vij. adde  
Meth. Mercurial. vel rosar. 3j.  
M. pro Enemate:  
D. S.  
Clyster leniens.  
**R. Herb. alb.**  
Aneth.  
Mercurial. ana Mj.  
Cin. clavellat. 3j.  
Coqu. in f. q. lactis;  
Colaturæ adde  
Ol. violar.  
Lilior. alb. ana 3ß.  
Estmull. Oper. Tom. II.

*Vitell. ovi No. i.*

M. f. Clystima:  
D. S. ut *suprà*.

**R. Summit. absinth. Mj.**  
Herb. cochlear.  
Hyoscyam.  
Flor. chamomill.  
Sambuc. ana Mß.  
Rad. angelic. 3j.  
Bacc. laur.  
Juniper. ana 3vj.  
Coq. in f. q. sevi lactis:  
Colaturæ 3vij. adde  
Ol. lilior. alb.  
Cochlear. ana 3ß.  
*Vitell. ovi. No. i.*  
Ess. de bacc. lauri 3j.  
M. pro Enemate.  
D. S. ut *suprà*.  
**R. Lact. bubul. vel Decocti flor. chamom. cum lacte & sale tart. 3vij. ix. ad x.**  
Terebinth. cum vitelloovi 3ij. vel 3ß.  
Theriac. Androm. (propter opium) 3j. vel 3ij.  
Sacch. 3ij. vel 3ij.  
Mel. rosar. 3j.  
M. f. Enema.

Vid. *Colleg. Institut. p. 396.*

Sin clysteres nil præsent aut planè retineantur, ab ulterio-  
corum usu desistendum, & solis fomentationibus aut balneis  
negotium tractandum, folia hyoscyami his addendo: vid.  
**DRAWIZIUS** pag. 315. Per reiterata quippè atque retenta  
enemata intestina magis inflantur, hincque dolor augetur.  
Quod si verò spasmi intestinorum ab usu clysterum aliquan-  
tum remittant, illis insistendum, & purgantibus potentiori-  
bus iidem acuendi sunt. Jüngitur ulterius oleum *lumbri-  
corum* terrestrium, oleum cochleariæ, oleum chamomillæ,  
&c. quæ ipsa oleosa etiam externè in dolore hypochondrio-  
rum circumscripto (*sub costis brevioribus*): optimè conve-  
niunt & conducunt; quibus in nephritide notha oleo scorpio-  
nuni, unguentum de liquiritia, althæa, &c. addendum. Reli-  
quis præfertur, *Galbanatum Paracelsi* seu oleum destillatum ex  
Galbano & terebinthina externè regioni umbilicali largiter  
calidè illitum est efficacissimum, imponendo de super lacerem  
calefactum; vel emplastrum de Galbano usitatum seu materi-  
cale, malaxatum cum oleo destillato succini, Philosophorum,  
oleo tartari, castorei, chamomillæ, vel cum balsamo Peruvia-  
no, est optimum. Nam eadem externa, quæ in passione hy-  
sterica usurpari possunt, conveniunt etiam in doloribus hisce  
abdominis; imprimis in hujusmodi doloribus, ubi cum *Neph-  
ritide notha* seu doloribus dorsu lumbis, circa os ta-  
ctum conjunctis & quasi ischiadicis, optimum est emplastrum  
diaphysphuris *Poterii*, quod aliàs præmissis præmittendis in-  
ternis nobile est remedium ad ischiadem: vid. *infra l. 2. Sect. 3. Cap. 3. Artic. 3. ubi de Paralyfi: Valde conducit* in casibus  
scorbuticis ex observatione propria, lumbis applicatum, sed  
glutinis instar adhaeret. Compositio est talis: v.g.

**R. Pic. naval. 3ij.**  
Flor. sulphuris,  
Terebinth. ana 3ij.  
Succini,  
Mastic. ana 3j.

Liquefacta misceantur pro Cerato, in forma quadrata appli-  
cando loco dolenti, gestetur aliquandiu, & in dictis affe-  
ctibus est egregium; elevat interdum pustulas, sed nihil nocet.

**DRAWIZIUS** ejusmodi emplastra planè reicit. Non-  
nulli tamen eo modo suadent, ut modò applicantur, modò  
iterum removeantur. Ubi deficient talia, Forus humidi &  
cataplasmata adhibeantur, qualia parantur ex baccis iani-  
peri, floribus sambuci, nasturtii, hyoscyami & similibus:  
qualia vid. *suprà Sect. 11. ubi de Colica: v.g.*

**R. Flor. chamomill.**  
Sambuc. ana Mj.  
Fol. hyoscyam. M. ij.  
Rad. helen. 3ij.  
Bacc. lauri 3j.  
Incisa & contusa D. S.  
Species ad focum.

Coquantur in lacte, & dictis modis usurpetur.

Præ cæteris tamen convenit forus toti abdomini infernè-  
dus ex fol. hyoscyami in lacte coctis, de quo vid. **DRAWI-  
ZIUS** Tr. de Scorbutop. 385. Aliis urinis infusus in decocto  
Gg emol.



emollientium & carminantium fiat, commendatus à Tl. M. & O. Von Gulden Klee in Epist. p. 236. Laeti incoquendi, imprimis cancri fluviatiles, tantum pro usu Fotus, quam pro usu injectionis.

Extra paroxysmum radicalis Cura Scorbuti postmodum est attendenda, ubi præter *Martialia & antiscorbutica*, imprimis remedia ex pino conferunt. *Decoctum strobilorum pini* aut *baccarum juniperi*, sudore aliquoties repetito, cum *emplastro de pice* sola sufficiunt pro curandis his abdominis doloribus, ne recidivent. Horum defectu *lacticia* cum scorbuticis usurpanda sunt, præmissis *Martialibus* extra paroxysmum: Nam dolores solent præcavere aut imminentes sistere. De Nephritide notha vid. *Dra Wizin de Scorbuto*, M. A. N. C. Ann. 3. *Observ. 44. p. 73.* ubi spiritus salis ammoniaci & lumbr. terrestrum, item Essentia nephritica è ligno nephritico, cum spiritu salis ammoniaci & fragorum extracta, commendatur, propinanda in aqua petroleini, in qua crystallus candefacta extincta.

Vetula 82. annorum laborabat gravi dolore abdominis scorbutico revera convulsivo, una cum vagis artuum lancinationibus: huic pro leniendo paroxysmo præscripti:

R. Aqu. lil. convall.

Flor. til.

Meniba ana unc. j.

Mag. corall. cum succ. citri ʒj.

Spir. sal. ammoniaci ʒss.

Cochlear. ʒj.

Laud. opiat. ferm. gr. v.

Syr. cors. aur. ʒvj.

M. f. potio aliquot vicibus haurienda: cui sociatum clysm blandè emolliens & laxans.

Vesperi verò ordinabam:

R. Mag. corall. cum succ. citri. ʒss.

Castor. gr. iv.

Laud. opiat. ferm. gr. ij.

Cum ess. castor. f. pilulæ, quæ egregiè contulerunt. Sedato paroxysmo pro evacuanda vetula præscripti:

R. Gum. ammon. in aceto solut. depur. ʒss.

Mercur. dulc. gr. vj.

Extr. troch. alband.

Laud. ferment. ana gr. j.

M. f. Pil. quæ iidem egregiè contulerunt.

#### VIII. ARTHRITIS VAGA SCORBUTICA.

Juxta dolores hos etiam familiare est scorbuti symptoma. Dolores nempe vagi arthritici, seu ARTHRITIS VAGA, qui imprimis sunt molesti Scorbuticis. In locis ubi Scorbutus est familiaris, sic solet appellari; Ubi verò rarus est, ibi apud Practicos subinde sub nomine *Dolorum artuum à Rheumatismis* seu *de fluxionibus* natorum, qui ordinariè sunt scorbutici, proveniunt. Veteres dicunt Rheumatismum *Reissen in Gliedern, Gicht*. Revera ergo cum arthritide vera convenit, accidentibus saltem variat. Differt sc. hæc Arthritis vaga ab arthritide vulgari *proprie dicta*, seu Podagra: Nam ut non raro etiam Scorbutus podagræ, seu Arthritidi vulgari se a societate, ita, ut etiam arthriticis, seu podagricis antiscorbutica remedia non sint incongrua, & cum successu applicentur, nihilominus, tamen Arthritis vaga Scorbuticis magis propria est: Deinde & in hoc differunt, quod *Arthritis vera* sit constans, seu in parte, quam semel occupavit, successuè sua tempora absolvat; *Arthritis verò vaga*, quatenus scorbutica, inconstans est, & fixam sedem non habet, & simul mulculosas partes atrocius infestare solet, modò in hanc modò in illam partem irruens, jam in pedes jam in brachia, in specie si forsan per externa frigida admota repellatur, ex improvviso evanescit, modo redit: Interdum fulminis instar articulum locaque vicina occupat, interdum citò disparat. Curiosum est, quod frictione panni calidi dolores mox remittant, sed mox in alio loco se manifestent. In Arthritide vera successuè oriri solent nodi seu topi, Germ. *Knoten und Beulen*, difficulter curabiles; in vaga verò non, & ut etiam tumores interdum observentur (nam fuerunt observati instar oui Gallinacei) nihilominus tamen facilius discuriuntur & disparent, cum tumores tales non sint propter materiam contentam, sed propter contracturas spasmodicas, nunc constantes sunt, nunc inconstantes, modò evanescent, modò denuò comparent. Dolores hi nunc sunt *simpliciter lacerantes*, nunc *profundi, ostocopi*, subinde nocturno tempore per modum febriculæ plus minus lentè affligentes, utut sint maximè fixi & quandoque vagi. Terminatur Arthritis vaga nunc per sudores & urinam, nunc eam excipit excretio cutanea instar purpure, & tota superficies corporis sit alpeta; lo-

co cujus interdum *excrecentia parva*, item *pustula* superacnunt, quæ subinde excrecent. Notabile est, quod si Arthritidem vagam excipiat talis *Purpura*, quod ægritantum pruritum percipiant, ut etiam fricando cuticulam detrahant; Talis purpura est cum rubore corporis totius, instar erysipelatis. Non rarum est, imprimis in nostro climate, quod *Arthritis vaga* sit complicata cum Scorbuto, unde dolores, & symptomata graviora esse solent. *Arthritis vaga* hæc, præter dolores in articulis, simul solet affigere, in specie dum recrudescit paroxysmus, cum *gravissimis anxietatibus præcordiorum*, quod sit in principio paroxysmorum: Adest sitis clamorosa, sudores, totius membri movendi imbecillitas, dolores lancinantes, magis pungentes.

Fundamentum hujus pathematis est *sal scorbuticum velleans* fibras nerveas motrices, carnem, & imprimis peristitum, minus tamen affligens partes tendinosas in articulis. *Notetur autem hic error ingens MOELLENBROCCII*, sal hoc scorbuticum asserentis aliquid volatile, exinde quod subito è parte & in aliam transmigret: Nam revera symptomata hæc non oriuntur à sale, è parte in longè diffitam volitante, cum conflit, salia omnia in corpore esse fluida, & moveri secundum motum humorum ordinatum; sed ex consensu nervorum, cui omne id est attribuendum, quod HELMONTIUS per Morbos potestativos explicat, quando v.g. affecto ventriculo cerebrum & aliz partes afficiuntur.

Pro Cura ergo observandum, ut in paroxysmo

1. Impetus spirituum & humorum, occasione salis scorbutici excitatus, refranetur.
2. Volatilibus appropriatis, nunc urinosis, nunc oleosis amaricantibus, succurrendum, vel per urinam, vel per sudorem, istud evacuando.
3. Paroxysmo declinante remediis ex pino sudoriferis radicis morbi succurrendum; &
4. Extra paroxysmum præter dietam convenientem, lacticiis præsertim mali recidiva præcavenda.

Quoad 1.: *peffime faciunt*, qui in principio paroxysmi usurpant volatilia; frustranea enim sunt: potius ergo in principio & incrementum Venæ sectio, nunc revulsoria respectu partis affectæ, nunc aversoria, subinde cum fructu singulari instituitur, si ægri conditio ferat; non tamen cum tanto excessu, ut facit Sydenham in *Observ. p. 409.*, nec in latere aut membro affecto, sed in opposito, ne circumstantiâ hac neglectâ illud eveniat malum, quod HORSTIUS l. 3. *Observ. 16.* in Matrona quadam observavit. Præsertim convenit, quando suspicio est sanguinis vel suppressi, vel evacuati, & in specie quando menses suppressi sunt. Loco Venæ sectionis cucurbitulæ scarificatæ optimæ sunt: sicut etiam Vomitus in genere in principio hujus mali egregiè convenit. Hinc præmissa clysmate, præsertim, si anxietates præcordiorum urgent, usurpanda sunt fixa & imperum salis scorbutici peccantis refranantia, qualia sunt alcalia, marina & testacea. Eminet hic *arcantum duplicatum Mynsichti*, cum quo simul usurpetur *Antimonium diaphoreticum simplex* & Martiale, vel *cinnabaris antimonii*, item lapilli cancrorum, maxillæ lucii piscis, ossa humana sine igne, dense equi marini, &c. cum opiatibus: interdum *Bezord.* minerale Solare, urinare, &c. item aurum fulminans. Interdum adduntur *salia fixa alcalia*, quæ nunc spontaneo sudore, nunc per urinam leuant ægros, ita ut & symptomata remittant, & dolores postmodum sint mitiores. V. g. in motu materiz nimis excessivo & plus minus perturbato, cujus indicia sunt febris intensior, pulsus inordinator, præcordiorum symptomata graviora, &c. præscribatur diaphoreticum opiarum:

R. Arcan. dupl. Myns. ʒss. vel gr. xv. ad ʒj.

Antimon. diaphor. ʒss.

Laud. opiat. gr. j.

M. f. Pulvis.

Dentur 2. doses: S.

Pulvis arthriticus antiscorbuticus.

R. Arcan. dupl. ʒj.

Antimon. diaphor. Martiale.

Cinnab. antimonii ana ʒss.

Laud. hyss. gr. vj.

M. pro duabus dosibus.

D. S. ut antea.

Vel

R. Antimon. diaphor. Martiale. ʒij.

Cinnab. antim. ʒj.

Laud. opiat. gr. ij.

M. pro duabus dos.

D. S. ut supra.

R. Cim-



- R. Cinnab. antimonii** ℥j.  
Auri diaph. Poter. gr. xij.  
Laud. opiat. gr. ij.  
M. pro duabus dosibus.  
D. S. ut supra.
- R. Antim. diaph. simpl. vel Martial. vel Bez. Mart.**  
Cinnab. antimonii,  
Arcan. duplic. ana gr. xv.  
M. pro dosi expectando sudorem.  
D. S. ut supra.
- R. Lapid. Cancr. prep.** ℥j.  
Cinnab. nativ. ℥ss.  
Laud. opiat. gr. ij.  
M. f. Pulvis.  
D. S. ut supra.
- R. Aqu. fumar.**  
Flor. samb. ana ℥jss.  
Spiris. sal. ammoniaci ℥j.  
Arcan. duplic. ℥ss.  
Antimonii diaph. ℥j.  
Cinnab. Antimonii ℥ss.  
Syr. scolotyrb. ℥vj.  
M. D. S.

Potio antiscorbutica pro aliquot dosibus.

Sabinde & blando laxativo primę vię abstergendę venit. In motu naturę deficientie potius aromatica diaphoretica opiatibus plus minus sociata, ut Essentia lignorum, theriacalis, theriaca cum osteocolla, &c.

Postmodum fiat accessus ad *volatilia*, eaque *generalia* cum *Scorbuticis* mixta, imprimis tamen fiat accessus ad appropriata *volatilia*, quę inter ex tartaro lumbrici antecellunt; lumbrici enim terrestres unā cum aliis, sunt specificum optimum, quod par sibi non habet remedium in hac Arthritide vaga. Nam si lumbricus vivus applicetur loco dolenti, in quo est Arthritis vaga, hic ipse statim exilit, mirę circumgyratur, & tandem moritur, idque cum dolorum levamine, qua contorsione & expiratione arthritidis vaga scorbutica manifestatur; unde hac impostio novorum lumbricorum tamdiu continuanda, donec lumbrici non amplius, aut saltem non tam citō, moriantur, sic dolores egregie sistuntur: videatur WIERUS in *Observ.* item HORSTIUS, FORESTUS, TIMÆUS Von GuldenKlee, MOELLENBROCK de *Variis* & alii, qui hoc unanimi consensu affirmant, cuiusque phenomenon WILLISIUS de *Scorb. c. 9.* exponit. Omnia ergo remedia ex lumbricis parata, externe pariter & interne, erunt optima. Interne usurpantur *crudi*, vel depurati & pulverisati: Sic Decoctum lumbricorum terrestrium cum plantis appropriatis antiscorbuticis in vino laudatur à LOTICHIO: Vel, quod melius est, lumbrici terrestres contusi *insundantur vino* vel *lacte* aut eius sero, quod infusum colatum hauritur quotidie bis aut ter pro vario ægroti statu, & est remedium singulare & egregium contra arthritidem vagam. In vino propinantur, dum æger vinum ferre potest, & si absit febris; si vero adsit febris seu phlogoses, in *lacte*. Pulvis asellorum est probatus: Pulvis scarabæorum unctuosorum similiter commendatur contra arthritidem vagam. Sed quia talia Decocta & infusa quandoque ægri horrent, prius præparantur lumbrici. Lumbrici enim terrestres, putrefacti resolvantur in liquorem, qui destillatus & rectificatus dat spiritum penetrantissimum egregium, & qui mira facit in Arthritide vaga, dosi ad ℥ss in *sero lactis*, vel ipso *lacte*. Cum hoc & ana spiritus Cor. Cer. sale volatili acuat fit *Essentia contra Arthritidem vagam* D. Michaelis, si nempe affundantur isti spiritus speciebus artheticis appropriatis, & nervinis exsiccatis, digerantur & filtrentur; & ita dant *Essentiam* egregiam contra Arthritidem vagam, quam nunc solam ad ℥j. nunc cum *Ess. pini* optime exhibuit: sed aliquandiu continuanda, expectando sudorem. Convenit etiam *liquor pistorius lumbricorum*, in vase massę panis incluso paratus, qui datur ad ℥ss. Quibus carminat. de tribus aliisque *tartarea volatilia* addenda sunt: Vel

- R. Liquor. terre sol. tartari.**  
Spiris. sal. ammoniaci, vel lumbr. terrestr. an. ℥ij  
M. D. S.

*Essentia arthritica antiscorbutica.*  
Dosis 40. vel 50. gutt.

Aut

- R. Aqu. Serpill.**  
Comar. abies. vel pini strob.  
Aqu. Cochlear. ana ℥j.  
Eff. catarrhal. ℥ij.  
Estmuller. Oper. Tom. 11.

- Spiris. lumbr. terrestr. per putr. ℥j.  
Sal. volat. Corn. Ceru. ℥j.  
Succini ℥ss.  
Lapill. Cancr. prep. ℥ss.  
Laud. opiat. gr. iij.  
Syr. rad. helen. ℥j.  
M. D. S.

Potio in arthritide vaga.

Capiatur cochlearum, expectando sudorem. Facit hoc Mistura TIMÆI Von GuldenKlee contra arthritidem vagam, scorbuticam, quę non est incongrua. Compositio verò est hæc:

- R. Rad. vincetox.**  
Enula,  
Aristol. rotund.  
Zedoar.  
Caryophyllat.  
Pæonia, ana ℥ij.  
Summis. sabia,  
Betonica,  
Serpilli,  
Abrotani,  
Ruta,  
Chamedr.  
Chamap. ana ℥j.  
Flor. anthos. ℥jss.  
Spec. dia-Moschi aulc.  
Di-Anthos,  
Lett. Galen. an. ℥j.  
Sem. citri ℥iv.  
Theriac. Androm. ℥ss.  
Facul. ari ℥iv.

Pulverisatis affunde *vini spiritum* vel *vinum Malvacum* tantum, ut emineant 4. digiti, bene clauso vase, stent in digestionem per aliquod tempus: Postea abstrahere spiritum ad consistentiam mellis; Reaffunde *spiritus vini modo abstract.* ℥vj. adde

- Spiris. cochlear. unc. ij.  
Spiris. nasturt. aquar. unc. j.  
Rubi Idæi unc. ss.  
Ess. lumbr. terrestr. ℥vj.

Digerantur per tres dies noctesque, filtrentur & serventur pro usu.

Dosis hujus mixture seu Elixiris est à ℥ss. ad ℥j.

Videbitis hanc etiam in MOLLENBROCCIO, qui ex TIMÆO Von GuldenKlee excerpit.

Hæc etiam declinante paroxysmo usurpatis conveniunt postmodum remedia, quę malum ex ipsis artubus, quantum possibile, eradican, & talia sunt *ex pino* cum antiscorbuticis mixta, essentia pini mista cum essentia lumbricorum terrestrium, aut cum Essentia contra arthritidem vagam, sit egregium remedium: c. g.

- R. Ess. contra arthr. vag. Myrs.**  
Pini ana ℥ij.  
M. D. S.

*Essentia contra arthritidem vagam.*

Loco horum tamen non inconsultò *bacca juniperi*, aut ex iis parata remedia propinentur, imprimis ex *recentibus*; nam & harum vis balsamica in arthritide vaga est egregia; unde *rob. baccarum juniperi* expectando sudorem, aut Decoctum baccarum juniperi, radix heleni laudatur à MOLLENBROCCIO Tr. de *Arthrit. vaga*. In specie Decoctum *contaurii minoris* & *absinthii* in sero lactis est admodum proficuum: (conf. M. A. N. C. Ann. 8. *Observ.* 84. p. 120.) præsertim cum antiscorbuticis mixtum, expectando sudorem, est elegans. *Absinthium* imprimis & omnia ex absinthio remedia, à Galeno laudantur in arthritide vaga: item succus corticis citri & corticis aurantiorum. Præterea card. benedictus, chamædrys, chamæpyris & sabina, rad. armorac., aristol. rotundæ, caryophyllatæ, veronica, & rad. amaræ dulcis cum antiscorbuticis mista, convenientia dant remedia. Necessè est sabinde, ut etiam præscribantur noduli vino infundendi ex antiscorbuticis. *Aqua Analithina* composita (descriptionem videbitis in SCHROEDERI *Pharmac. ubi de aquis*) est magnę commendationis; contra arthritidem vagam. Denique mixtura simplex cum spiritu cochlearis permitta, spiritus salis ammoniaci cum spiritu antiscorbutico, spiritus carminativus & similia sunt egregia. Decoctum strobilorum pini curam ferè absolvit; sicut etiam Decoctum radicis chinæ & sassafras insigniter conducit: Vel



emollientium & carminantium fiat, commendatus à Tl. M. E. O. Von Gulden Klee in Epist. p. 236. Lacti incoquendi, im- primis canceri fluviatiles, tam pro usu Fotus, quam pro usu injectionis.

Extra paroxysmum radicalis Cura Scorbuti postmodum est attendenda, ubi præter *Martialis* & *antiscorbutica*, imprimis remedia ex pino conferunt. Decoctum strobilorum pini aut baccarum juniperi, sudore aliquoties repetito, cum emplastro de pice sola sufficiunt pro curandis his abdominis doloribus, ne recidivent. Horum defectu lacticia cum scorbuticis usurpanda sunt, præmissis *Martialibus* extra paroxysmum: Nam dolores solent præcavere aut imminentes sistere. De Nephritide notha vid. Dr. W. J. de Scorbuto, M. A. N. C. Ann. 3. Observ. 44. p. 73. ubi spiritus salis ammoniaci & lumbr. terrestrum, item Essentia nephritica è ligno nephritico, cum spiritu salis ammoniaci & fragorum extracta, commendatur, propinanda in aqua petrolelini, in qua crystallus candefacta extincta.

Vetula 82. annorum laborabat gravi dolore abdominis scorbuticus revera convulsivo, una cum vagis artuum lancinationibus: huic pro leniendo paroxysmo præscripsi:

℞. Aqu. lil. convall.

Flor. lil.

Menibz ana unc. j.

Mag. corall. cum succ. citri ℥j.

Spir. sal. ammoniaci ℥℥.

Cochlear. ℥j.

Laud. opiat. ferm. gr. v.

Syr. cort. aur. ℥vj.

M. f. potio aliquot vicibus haurienda: cui sociatum clystma blandè emolliens & laxans.

Vesperi verò ordinabam:

℞. Mag. corall. cum succ. citr. ℥℥.

Castor. gr. iv.

Laud. opiat. ferm. gr. ij.

Cum ess. castor. f. pilulæ, quæ egregiè contulerunt. Sedato paroxysmo pro evacuanda vetula præscripsi:

℞. Gum. ammon. in aceto solut. depur. ℥℥.

Mercur. dulc. gr. vj.

Extr. troch. alband.

Laud. ferment. anag. gr. j.

M. f. Pil. quæ iidem egregiè contulerunt.

#### VIII. ARTHRITIS VAGA SCORBUTICA.

Iuxta dolores hos etiam familiare est scorbuti symptoma, Dolores nempe vagi arthritici, seu ARTHRITIS VAGA, qui imprimis sunt molesti Scorbuticis. In locis ubi Scorbutus est familiaris, sic solet appellari: Ubi verò rarus est, ibi apud Practicos subinde sub nomine *Doloris artuum à Rheumatismo* seu *defluxionibus* natorum, qui ordinariè sunt scorbutici, proveniunt. Veteres dicunt Rheumatismum *Reissen in Gliedern, Gicht*. Revera ergo cum arthritide vera convenit, accidentibus saltem variat. Differt sc. hæc Arthritis vaga ab arthritide vulgari *proprie si dicta*, seu Podagra: Nam utut non raro etiam Scorbutus podagræ, seu Arthritidis vulgari se associet, ita, ut etiam arthriticis, seu podagricis antiscorbutica remedia non sint incongrua, & cum successu applicentur; nihilominus, tamen Arthritis vaga Scorbuticis magis propria est: Deinde & in hoc differunt, quod *Arthritis vera* sit constans, seu in parte, quam semel occupavit, successivè sua tempora absolvat; *Arthritis verò vaga*, quatenus scorbutica, inconstans est, & fixam sedem non habet, & simul musculosas partes atrocius infestare solet, modò in hanc modò in illam partem irruens, jam in pedes, jam in brachia, in specie si forsitan per externa frigida admota repellatur, ex improvviso evanescit, modo redit: Interdum fulminis instar articulum locaque vicina occupat, interdum citò disparer. Curiosum est, quod frictione panni calidi dolores mox remittant, sed mox in alio loco se manifestent. In Arthritide vera successivè oriri solent nodi scutopi, Germ. *Knoten* und *Beulen*, difficulter curabiles; in vaga verò non, & utut etiam tumores interdum observentur (nam fuerunt observati instar oui Gallinæ) nihilominus tamen facilius discutiuntur & disparent, cum tumores tales non sint propter materiam contentam, sed propter contracturas spasmodicas, nunc constantes sunt, nunc inconstantes, modò evanescunt, modò denuò comparent. Dolores hi nunc sunt simpliciter lacerantes, nunc profundi, oscocopi, subinde nocturno tempore per modum febriculæ plus minus lentè affligentes, utut sint maximè fixi & quandoque vagi. Terminatur Arthritis vaga nunc per sudores & urinam, nunc eam excipit excretio cutanea instar purpuræ, & tota superficies corporis sit aspera; lo-

co cujus interdum *excrecentia parva*, item *passula* superneniunt, quæ subinde excrescunt. Notabile est, quod si Arthritidem vagam excipiat talis *Purpura*, quod ægri tantum pruritus percipiant, ut etiam fricando cuticulam detrahant; Talis purpura est cum rubore corporis totius; instar erysipelatis. Non tatum est, imprimis in nostro climate, quod Arthritis vaga sit complicata cum Scorbuto, unde dolores, & symptomata graviora esse solent. Arthritis vaga hæc, præter dolores in articulis, simul solet affigere, in specie dum recrudescent paroxysmus, cum gravissimis anxietatibus præcordiorum, quod sit in principio paroxysmorum: Adest sitis clamorosa, sudores, totius membri movendi imbecillitas, dolores lancinantes, magis pungentes.

Fundamentum hujus pathematis est sal scorbuticum velleans fibras nerveas motrices, carnem, & imprimis peristrium, minustamen affligens partes tendinosas in articulis. Notetur autem hic error ingens MOELLENBROCCII, sal hoc scorbuticum asserentis aliquod volatile, exinde quod subito è parte & in aliam transmigret: Nam revera symptomata hæc non oriuntur à sale, è parte in longè distitam volitante, cum constet, salia omnia in corpore esse fluida, & moveri secundum motum humorum ordinatum; sed ex consensu nervorum, cui omne id est attribuendum, quod HELMONTIUS per Morbos potestativos explicat, quando v.g. affecto ventriculo cerebrum & aliz partes afficiuntur.

Pro Cura ergo observandum, ut in paroxysmo

1. Impetus spirituum & humorum, occasione salis scorbutici excitatus, refranetur.

2. Volatilibus appropriatis, nunc urinosis, nunc oleosis amaricantibus, succurrendum, vel per urinam, vel per sudorem, istud evacuando.

3. Paroxysmo declinante remediis ex pino sudoriferis radici morbi succurrendum; &

4. Extra paroxysmum præter dietam convenientem, lacticius præsertim mali recidiva præcavenda.

Quoad 1.: pessimè faciunt, qui in principio paroxysmi usurpant volatilia; frustranea enim sunt: potius ergò in principio & incremento Venæ sectio, nunc reysulforia respectu patris affectæ, nunc averforia, subinde cum fructu singulari instituitur, si ægri conditio ferat; non tamen cum tanto excessu, ut facit Sydenham in Obser. p. 409., nec in latere aut membro affecto, sed in opposito, ne circumstantiâ hac neglectâ illud eveniat malum, quod HORSTIUS l. 3. Observ. 16. in Mattona quadam observavit. Præsertim convenit, quando suspicio est sanguinis vel suppressi, vel evacuati, & in specie quando menses suppressi sunt. Loco Venæ sectionis cucurbitulæ scarificatæ optimæ sunt: sicut etiam Vomitus in genere in principio hujus mali egregiè convenit. Hinc præmittito clymate, præsertim, si anxietates præcordiorum urgent, usurpanda sunt fixa & imperum salis scorbutici peccanti refranantia, qualia sunt alcalia, marina & testacea. Eminet hic arcanum duplicatum *Mysichis*, cum quo simul usurpetur Antimonium diaphoreticum simplex & Martiale, vel cinabaris antimonii, item lapilli cancerorum, maxillæ luci piscis, ossa humana sine igne, dense equi marina, &c. cum opiatis: interdum Bezoard. minerale Solare, urinare, &c. item aurum fulminans. Interdum adduntur salia fixa alcalia, quæ nunc spontaneo sudore, nunc per urinam leuant ægros, ita ut & symptomata remittant, & dolores postmodum sint mitiores. V. g. in motu materiæ nimis excessivo & plus minus perturbato, cujus indicia sunt febris intensior, pulsus inordinator, præcordiorum symptomata graviora, &c. præscribatur diaphoreticum opiarum:

℞. Arcan. dupl. Myns. ℥℥. vel gr. xv. ad ℥ j.

Antimon. diaphor. ℥℥.

Laud. opiat. gr. j.

M. f. Pulvis.

Dentur 2. doses: S.

Pulvis arthriticus antiscorbuticus.

℞. Arcan. dupl. ℥j.

Antimon. diaphor. Martiale.

Cinnab. antimonii ana ℥℥.

Laud. hyss. gr. vj.

M. pro duabus dosibus.

D. S. ut antea.

Vel

℞. Antimon. diaphor. Martiale. ℥j.

Cinnab. antimon. ℥j.

Laud. opiat. gr. ij.

M. pro duabus dos.

D. S. ut suprâ.

℞. Cin-



- ℞. *Cinnab. antimonii* ℥j.  
*Auri diaph. Poter.* gr. xij.  
*Laud. opiat.* gr. ij.  
M. pro duabus dosibus.  
D. S. ut *supra*.  
℞. *Antim. diaph. simpl. vel Martial. vel Bez. Mart.*  
*Cinnab. antimonii,*  
*Arcan. duplic.* ana gr. xv.  
M. pro dosi expectando sudorem.  
D. S. ut *supra*.  
℞. *Lapid. Cancr. prep.* ℥j.  
*Cinnab. nativ.* ℥ss.  
*Laud. opiat.* gr. ij.  
M. f. Pulvis.  
D. S. ut *supra*.  
℞. *Aqu. fumar.*  
*Flor. samb. ana* ℥jss.  
*Spiris. sal. ammoniaci* ℥j.  
*Arcan. duplic.* ℥ss.  
*Antimonii diaph.* ℥j.  
*Cinnab. Antimonii* ℥ss.  
*Syr. scoloryb.* ℥vj.  
M. D. S.

*Potio antiscorbutica pro aliquot dosibus.*

Subinde & blando laxativo primę vię abstergendę veniſſe. In motu naturę deficiente potius aromatica diaphoretica opiatis plus minus sociata, ut *Essentia lignorum*, *theriacalis*, *theriaca cum osteocolla*, &c.

Postmodum fiat accessus ad *volatilia*, eaque *generalia* cum *Scorbuticis* mixta, imprimis tamen fiat accessus ad appropriata *volatilia*, quę inter ex tartaro lumbrici antecellunt; lumbrici enim terrestres unā cum aliis, sunt specificum optimum, quod par sibi non habet remedium in hac *Arthritide vaga*. Nam si lumbricus vivus applicetur loco dolenti, in quo est *Arthritis vaga*, hic ipse statim exilit, mirę circumgyratur, & tandem moritur, idque cum dolorum levamine, quā contorsione & expiratione *arthritidis vagę* scorbutica manifestatur; unde hac impostio novorum lumbricorum tamdiu continuanda, donec lumbrici non amplius, aut saltem non tam citō, moriantur, sic dolores egregie ſistuntur: videatur *WIERUS in Observ.* item *HORSTIUS*, *FORESTUS*, *TIMÆUS Von GuldenKlee*, *MOELLENBROCK de Vasis* & alii, qui hoc unanimi consensu affirmant, cuiusque phenomenon rationem *WILLISIUS de Scorb. c. 9.* exponit. Omnia ergo remedia ex lumbricis parata, externę pariter & internę, erunt optima. Internę usurpantur *crudi*, vel depurati & pulverisati: Sic Decoctum lumbricorum terrestrium cum plantis appropriatis antiscorbuticis in vino laudatur à *Loricchio*: Vel, quod melius est, lumbrici terrestres contusi *insundantur vino vel lacte* aut eius sero, quod infusum colatum hauritur quotidie bis aut ter pro vario ægrorum statu, & est remedium singulare & egregium contra *arthritidem vagam*. In vino propinantur, dum æger vinum ferre potest, & si absit febris; si vero adsit febris seu phlogoses, in lacte. Pulvis asellorum est probatus: Pulvis scarabæorum unctuosorum similiter commendatur contra *arthritidem vagam*. Sed quia talia Decocta & infusa quandoque ægri horrent, prius præparantur lumbrici. Lumbrici enim terrestres, putrefacti resolvuntur in liquorem, qui destillatus & rectificatus dat spiritum penetrantissimum egregium, & qui mira facit in *Arthritide vagę*, dosi ad ℥ss. in sero lactis, vel ipso lacte. Cum hoc & ana spiritus Cor. Cer. sale volatili acuat fit *Essentia contra Arthritidem vagam* D. Michaelis, si nempe affundantur isti spiritus speciebus artheticis appropriatis, & nervinis exsiccatis, digerantur & ſilrentur; & ita dant *Essentiam* egregiam contra *Arthritidem vagam*, quam nunc solam ad ℥j. nunc cum *Ess. pini* optimē exhibuit: sed aliquandiu continuanda, expectando sudorem. Convenit etiam liquor *pistorius lumbricorum*, in vase massę panis incluso paratus, qui datur ad ℥ss. Quibus carminat. de tribus aliisque *tartareis volatilia* addenda sunt: Vel

- ℞. *Liquor. terra sol. tartari.*  
*Spiris. sal. ammoniaci, vel lumbr. terrestr.* an. ℥ij  
M. D. S.

*Essentia arthritica antiscorbutica.*  
Dosis 40. vel 50. gutt.  
Aut

- ℞. *Aqu. Serpill.*  
*Comar. abiet. vel pini strob.*  
*Aqu. Cochlear.* ana ℥j.  
*Ess. catarrhal.* ℥ij.  
*Estmuller. Oper. Tom. 11.*

- Spiris. lumbr. terrestr. per gutt.* ℥j.  
*Sal. volat. Cor. Cer.* ℥j.  
*Succini* ℥ss.  
*Lapill. Cancr. prep.* ℥ss.  
*Laud. opiat.* gr. iij.  
*Syr. rad. helen.* ℥j.  
M. D. S.

*Potio in arthritide vagę.*

Capiatur cochlearim, expectando sudorem.

Facit huc Mixture *Timæi Von GuldenKlee* contra *arthritidem vagam*, scorbuticam, quę non est incongrua. Compositio verō est hæc:

- ℞. *Rad. vincetox.*  
*Enula,*  
*Aristol. rotund.*  
*Zedoar.*  
*Caryophyllat.*  
*Pæonia,* ana ℥ij.  
*Summis. salvia,*  
*Betonica,*  
*Serpilli,*  
*Abrosani,*  
*Ruta,*  
*Chamedr.*  
*Chamep.* ana ℥j.  
*Flor. anthos.* ℥jss.  
*Spec. dia-Moschi aule.*  
*Di-Anthos,*  
*Lett. Galen.* an. ℥j.  
*Sem. citri* ℥iv.  
*Theriac. Androm.* ℥ss.  
*Facul. ari* ℥iv.

Pulverisatis affunde vini spiritum vel vinum *Malvatum* tantum, ut emineant 4. digiti, bene claulo vase, ſtent in digestionē per aliquod tempus: Postea abstrabe spiritum ad consistentiam mellis; Reaffunde spiritus vini modo abstracti. ℥vj. adde

- Spiris. cochlear.* unc. ij.  
*Spiris. nasturt. aquat.* unc. j.  
*Rubi Idæi* unc. ss.  
*Ess. lumbr. terrestr.* ℥vj.

Digerantur per tres dies noctesque, ſilrentur & servantur pro usu.

Dosis hujus mixture seu Elixiris est à ℥ss. ad ℥j.

Videbitis hanc etiam in *MOLLENBROCCIO*, qui ex *TIMÆO Von GuldenKlee* exscripsit.

Huc etiam declinante paroxylimo usurpatis conveniunt postmodum remedia, quę malum ex ipsis artubus, quantum possibile, eradicant, & talia sunt ex pino cum antiscorbuticis mixta, essentia pini mista cum essentia lumbricorum terrestrium, aut cum Essentia contra *arthritidem vagam*, si egregium remedium: c. g.

- ℞. *Ess. contra arthr. vag. Myrs.*  
*Pini* ana ℥ij.  
M. D. S.

*Essentia contra arthritidem vagam.*

Loco horum tamen non inconsultō *bacca juniperi*, aut ex his parata remedia propinentur, imprimis ex recentibus; nam & harum vis balsamica in *arthritide vagę* est egregia; unde *rob. baccarum juniperi* expectando sudorem, aut Decoctum *baccarum juniperi*, radix *heleni* laudatur à *MOLLENBROCCIO Tr. de Arthrit. vagę*. In specie Decoctum *caurii minoris* & *absinthii* in sero lactis est admodum proficuum: (conf. *M. A. N. C. Ann. 8. Observ. 84. p. 120.*) præsertim cum antiscorbuticis mixtum, expectando sudorem, est elegans. *Absinthium* imprimis & omnia ex *absinthio* remedia, à Galeno laudantur in *arthritide vagę*: item succus corticis citri & corticis aurantium. Præterea card. benedictus, chamædrys, chamæpytis & sabina, rad. armorac., aristol. rotundæ, caryophyllatæ, veronica, & rad. amaræ dulcis cum antiscorbuticis mista, convenientia dant remedia. Necessē est subinde, ut etiam præscribantur noduli vino infundendi ex antiscorbuticis. *Aqua Analibina* composita (descriptionem videbitis in *SCHROEDERI Pharmac. ubi de aquis*) est magnę commendationis; contra *arthritidem vagam*. Denique mixtura simplex cum spiritu cochlearis permista, spiritus salis ammoniaci cum spiritu antiscorbutico, spiritus carminativos & similia sunt egregia. Decoctum strobilorum pini Curam ferē absolvit; sicut etiam Decoctum radicis chinæ & *sassafras* insigniter conducit: Vel



emollientium & carminantium fiat, commendatur à Tl. M. & O. Von Gulden Kleo in Epi. p. 236. Lacti incoquendi, im- primis cancri fluviatiles, tam pro usu Fotus, quam pro usu injectionis.

Extra paroxysmum radicalis Cura Scorbuti postmodum est attendenda, ubi præter *Martialia* & *antiscurbutica*, im- primis remedia ex pino conferunt. *Decoctum strobilorum pi- ni* aut *baccarum juniperi*, sudore aliquoties repetito, cum *emplastro de pice* sola sufficiunt pro curandis his abdominis doloribus, ne recidivent. Horum defectu *lacticia* cum scorbuticis usurpanda sunt, præmissis *Martialibus* extra pa- roxysmum: Nam dolores solent præcavere aut imminen- tes sistere. De Nephritide notha vid. *Dra Witzius de Scorbu- to*, M. A. N. C. Ann. 3. *Obser. 44. p. 73.* ubi spiritus salis am- moniaci & lumbr. terrestrum, item Essentia nephritica è li- gno nephritico, cum spiritu salis ammoniaci & fragorum ex- tracta, commendatur, propinanda in aqua petrolei, in qua crystallus candefacta extincta.

Vetula 82. annorum laborabat gravi dolore abdominis scorbutico revera convulsivo, una cum vagis artuum lan- cinationibus: huic pro leniendo paroxysmo præscripsi:

℞. Aqu. lil. convall.

Flor. lil.

Mentha ana unc. j.

Mag. corall. cum succ. citri ʒj.

Spir. sal. ammoniaci ʒss.

Cochlear. ʒj.

Laud. opiat. ferm. gr. v.

Syr. cort. aur. ʒvi.

M. f. potio aliquot vicibus haurienda: cui sociatum cly- sma blandè emolliens & laxans.

Velperi verò ordinabam:

℞. Mag. corall. cum succ. citr. ʒss.

Castor. gr. iv.

Laud. opiat. ferm. gr. ij.

Cum ess. castor. f. pilulæ, quæ egregiè contulerunt. Sedato paroxysmo pro evacuanda vetula præscripsi:

℞. Gum. ammon. in aceto solut. depur. ʒss.

Mercur. dulc. gr. vi.

Extr. troch. alband.

Laud. ferment. ana gr. j.

M. f. Pil. quæ itidem egregiè contulerunt.

#### VIII. ARTHRITIS VAGA SCORBUTICA.

Juxta dolores hos etiam familiare est scorbuti symptoma. Dolores nempe vagi arthritici, seu ARTHRITIS VAGA, qui imprimis sunt molesti Scorbuticis. In locis ubi Scorbu- tus est familiaris, sic solet appellari: Ubi verò rarus est, ibi apud Practicos subinde sub nomine *Doloris artuum à Rheuma- tismis* seu *defluxionibus* natorum, qui ordinariè sunt scorbu- tici, proveniunt. Veteres dicunt Rheumatismum *Reissen in Gliedern*, *Gicht*. Revera ergò cum arthritide vera convenit, accidentibus saltem variat. Differt sc. hæc Arthritis vaga ab arthritide vulgari *proprie si dicta*, seu Podagra: Nam utut non raro etiam Scorbutus podagræ, seu Arthritidi vulgari se- a societ, ita, ut etiam arthriticis, seu podagricis antiscurbuti- ca remedia non sint incongrua, & cum successu applicentur; nihilominus, tamen Arthritis vaga Scorbuticis magis propria est: Deinde & in hoc differunt, quod *Arthritis vera* sit constans, seu in parte, quam semel occupavit, succes- suè sua tempora absolvat; *Arthritis verò vaga*, quatenus scorbutica, inconstans est, & fixam sedem non habet, & simul musculosas partes atrocius infestare solet, modò in hanc modò in illam partem irruens, jam in pedes, jam in brachia, in specie si forsan per externa frigida admota repe- latur, ex improvise evanescit, modo redit: Interdum fulminis instar articulum locaque vicina occupat, interdum citò dis- pareret. *Curiosum* est, quod frictione panni calidi dolores mox remittant, sed mox in alio loco se manifestent. In Ar- thritide vera successuè oriri solent nodi seu tophi, Germ. *Knoten und Beulen*, difficulter curabiles; in vaga verò non, & utut etiam tumores interdum observentur (nam fuerunt ob- servati instar ovi Gallinæ) nihilominus tamen facilius dis- cutiuntur & disparent, cum tumores tales non sint propter materiam contentam, sed propter contracturas spasmodicas, nunc constantes sunt, nunc inconstantes, modò evanescunt, modò denuò comparent. Dolores hi nunc sunt *simpliciter la- cerantes*, nunc *profundi, ostocopi*, subinde nocturno tempore per modum febriculæ plus minus lentè affligentes, utut sint maximè fixi & quandoque vagi. Terminatur Arthritis va- ga nunc per sudores & urinam, nunc eam excipit excretio cu- tanæ instar purpura, & tota superficies corporis sit aspera; lo-

co cujus interdum *excrefcentia parva*, item *pustula* superve- niunt, quæ subinde excreantur. Notabile est, quod si Arthri- tidem vagam excipiat talis *Purpura*, quod ægri tantum *pru- ritum* percipiant, ut etiam fricando cuticulam detrahant; Ta- lis purpura est cum rubore corporis totius, instar erysipelatis. Non ratum est, imprimis in nostro climate, quod *Arthritis vaga* sit complicata cum Scorbuto, unde dolores, & sympto- mata graviora esse solent. *Arthritis vaga* hæc, præter dolores in articulis, simul solet affigere, in specie dum recrudescit pa- roxysmus, cum *gravissimis anxietatibus præcordiorum*, quod sit in principio paroxysmorum: Adeest sitis clamosa, sudores, totius membri movendi imbecillitas, dolores lancinantes, magis pungentes.

Fundamentum hujus pathematis est *sal scorbuticum velli- cans* fibras nervæas motrices, carnem, & imprimis perio- strum, minus tamen affligens partes tendinosas in articulis. *Notetur autem hic error ingens* MOELLENBROCCII, sal hoc scorbuticum asserentis aliquid volatile, exinde quod su- bitò è parte & in aliam transmigret: Nam revera symptoma- ta hæc non oriuntur à sale, è parte in longè diffitam volitan- te, cum constet, salia omnia in corpore esse fluida, & moveri secundum motum humorum ordinatum; sed ex consensu nervorum, cui omne id est attribuendum, quod HELMON- TIUS per Morbos potestativos explicat, quando v.g. affe- cto ventriculo cerebrum & aliæ partes afficiuntur.

Pro Cura ergo observandum, ut in paroxysmo

1. *Impetus spirituum & humorum, occasione salis scor- butici excitatus, refragetur.*
2. *Volatilibus appropriatis, nunc urinosi, nunc oleosis amaricantibus, succurrendum, vel per urinam, vel per sudorem, istud evacuando.*
3. *Paroxysmo declinante remediis ex pino sudoriferis radici morbi succurrendum; &*
4. *Extra paroxysmum præter dictam convenientem, lacticiiniis præsertim mali recidiva præcavenda.*

Quoad 1.: *pejissime faciunt*, qui in principio paroxysmi *usur- pant volatilia*; frustranea enim sunt: potius ergò in principio & incremento Venæ sectio, nunc resylforia respectu partis affectæ, nunc averforia, subinde cum fructu singulari insti- tuitur, si ægri conditio ferat; non tamen cum tanto excessu, ut facit *Sydenham in Obser. p. 409.*, nec in latere aut mem- bro affecto, sed in opposito, ne circumstantiâ hac neglectâ il- lud eveniat malum, quod HORSTIUS l. 3. *Obser. 16.* in Matrona quadam observavit. Præsertim convenit, quando suspicio est sanguinis vel suppressi, vel evacuati, & in specie quando menses suppressi sunt. Loco Venæ sectionis cucur- bitulæ scarificatæ optimæ sunt: sicut etiam Vomitus in gene- re in principio hujus mali egregiè convenit. Hinc præmissio clysmate, præsertim, si anxietates præcordiorum urgent, usurpanda sunt fixa & imperum salis scorbutici peccantis re- fragantia, qualia sunt alcalia, marina & testacea. Eminent hic *arcanum duplicatum Mynsichts*, cum quo simul usurpetur *Antimonium diaphoreticum simplex* & *Martiale*, vel *cinnabaris antimonii*, item lapilli cancrorum, maxillæ lucti piscis, ossa humana sine igne, dense equi marini, &c. cum opiat: interdum *Bezowd.* minerale Solare, *urinare*, &c. item aurum fulminans. Interdum adduntur *salia fixa alcalia*, quæ nunc spontaneo sudore, nunc per urinam leuant ægros, ita ut & symptomata remittant, & dolores postmodum sint mitiores. V. g. in motu materiæ nimis excessivo & plus mi- nus perturbato, cujus indicia sunt febris intensior, pulsus inordinatior, præcordiorum symptomata graviora, &c. præscribatur diaphoreticum opiarum:

℞. Arcan. dupl. Myns. ʒss. vel gr. xv. ad ʒj.

Antimon. diaphor. ʒss.

Laud. opiat. gr. j.

M. f. Pulvis.

Dentur 2. doles: S.

Pulvis arthriticus antiscurbuticus.

℞. Arcan. dupl. ʒj.

Antimon. diaphor. Martiale.

Cinnab. antimonii ana ʒss.

Laud. byss. gr. vj.

M. pro duabus dosibus.

D. S. ut antea.

Vel

℞. Antimon. diaphor. Martiale. ʒij.

Cinnab. antim. ʒj.

Laud. opiat. gr. ij.

M. pro duabus dos.

D. S. ut supra.

℞. Cin-



- R. Cinnab. antimonii** ʒj.  
*Auri diaph. Poter.* gr. xij.  
*Laud. opiat.* gr. ij.  
 M. pro duabus dosibus.  
 D. S. ut *suprà*.
- R. Antim. diaph. simpl. vel Martial. vel Bez. Mart.**  
*Cinnab. antimonii,*  
*Arcan. duplic. ana* gr. xv.  
 M. pro dosi expectando sudorem.  
 D. S. ut *suprà*.
- R. Lapid. Cancr. prep.** ʒj.  
*Cinnab. nativ.* ʒss.  
*Laud. opiat.* gr. ij.  
 M. f. Pulvis.  
 D. S. ut *suprà*.
- R. Aqu. fumar.**  
*Flor. samb. ana* ʒiʒs.  
*Spir. sal. ammoniaci* ʒj.  
*Arcan. duplic.* ʒss.  
*Antimonii diaph.* ʒj.  
*Cinnab. Antimonii* ʒss.  
*Syr. scelerat.* ʒvj.  
 M. D. S.

*Potio antiscorbutica pro aliquot dosibus.*

Subinde & blando laxativo prinę vię abstergendę veniſſe. In moru naturę deficiente potius aromatica diaphoretica opiatius plus minus sociata, ut *Essentia lignorum*, *theriacalis*, *theriaca cum osteocolla*, &c.

Postmodum fiat accessus ad *volatilia*, eaque *generalia* cum *Scorbuticis* mixta, imprimis tamen fiat accessus ad appropriata *volatilia*, quę inter ex tartaro lumbrici antecellunt; lumbrici enim terrestres unā cum aliis, sunt specificum optimum, quod par sibi non habet remedium in hac *Arthritide vaga*. Nam si lumbricus vivus applicetur loco dolenti, in quo est *Arthritis vaga*, hic ipse statim exilit, mitę circumgyratur, & tandem moritur, idque cum dolorum levamine, qua contorsione & expiratione *arthritidis vagę scorbuticę* manifestatur; unde hac impositio novorum lumbricorum tamdiu continuanda, donec lumbrici non amplius, aut saltem non tam citō, moriantur, sic dolores egregie sistuntur: videatur **WIERUS in Observ.** item **HORSTIUS, FORESTUS, TIMÆUS Von GuldenKlee, MOELLENBROCK de Vagis** & alii, qui hoc unanimi consensu affirmant, eiusque phenomenon rationem **WILLISIUS de Scorb. c. 9.** exponit. Omnia ergo remedia ex lumbricis parata, externę pariter & internę, erunt optima. Internę usurpantur *crudi*, vel *depurati* & *pulverisati*: Sic *Decoctum lumbricorum terrestrium cum plantis appropriatis antiscorbuticis in vino laudatur à Lottichio*: Vel, quod melius est, lumbrici terrestres contusi *infundantur vino vel lacti* antequam sero, quod infusum colatum haerit quondie bis aut ter pro vario ægtorum statu, & est remedium singulare & egregium contra *arthritidem vagam*. In vino propinantur, dum æger vinum ferre potest, & si absit febris; si vero adsit febris seu phlogoses, in lacte. Pulvis asellorum est probatus: Pulvis scarabæorum unctuosorum similiter commendatur contra *arthritidem vagam*. Sed quia talia *Decocta* & *infusa* quandoque ægti horrent, prius præparantur lumbrici. Lumbrici enim terrestres, putrefacti resolventur in liquorem, qui destillatus & rectificatus dat spiritum penetrantissimum egregium, & qui mira facit in *Arthritide vagā*, dosi ad ʒss in *sero lactis*, vel ipso lacte. Cum hoc & ana spiritus *Cor. Cerv. sale volatili acuat* fit *Essentia contra Arthritidem vagam D. Michaelis*, si nempe affundantur isti spiritus speciebus *arthriticis* appropriatis, & nervinis exsiccatis, digerantur & filtrentur; & ita dant *Essentiam* egregiam contra *Arthritidem vagam*, quam nunc solam ad ʒj. nunc cum *Ess. pini* optimę exhibuit: sed aliquandiu continuanda, expectando sudorem. Convenit etiam *liquor pistorius lumbricorum*, in vase massę panis incluso paratus, qui datur ad ʒss. Quibus carminat. de tribus aliisque *variæ volatilia* addenda sunt: Vel

- R. Liquor. terra. sal. tartari.**  
*Spir. sal. ammoniaci, vel lumbr. terrestr.* an. ʒij  
 M. D. S.  
*Essentia arthritica antiscorbutica.*  
 Dosis 40. vel 50. gutt.

- R. Aqu. Serpill.**  
*Comar. abiet. vel pini strob.*  
*Aqu. Cochlear. ana* ʒj.  
*Ess. catarrhal.* ʒiij.  
*Estmuller. Oper. Tom. 11.*

- Spir. lumbr. terrestr. per patr.* ʒj.  
*Sal. volat. Cor. Cerv.* ʒj.  
*Succini* ʒss.  
*Lapill. Cancr. prep.* ʒss.  
*Laud. opiat.* gr. iij.  
*Syr. rad. helén.* ʒj.  
 M. D. S.

*Potio in arthritide vaga.*

Caplatur cochleatum, expectando sudorem.

Facit huc *Mistura Timæi Von GuldenKlee* contra *arthritidem vagam*, *scorbuticam*, quę non est incongrua. Compositio verō est hæc:

- R. Rad. vincetox.**  
*Enula,*  
*Aristol. rotund.*  
*Zedair.*  
*Caryophyllat.*  
*Pæonia, ana* ʒij.  
*Summit. salvie,*  
*Betonica,*  
*Serpilli,*  
*Abrotani,*  
*Ruta,*  
*Chamædr.*  
*Chamep. ana* ʒj.  
*Flor. anthos.* ʒiʒs.  
*Spec. dia-Moschi dulc.*  
*Di-Anthos,*  
*Letit. Galen. an.* ʒj.  
*Sem. citri* ʒiv.  
*Theriac. Androm.* ʒss.  
*Fæcul. ari* ʒiv.

*Pulverisatis affunde vini spiritum vel vinum Malvaticum tantum, ut emineant 4. digiti, bene claulo vase, stent in digestionem per aliquod tempus: Postea abstrahespiritum ad consistentiam mellis; Reaffunde spiritus vini modo abstracti.* ʒvj. adde

- Spir. cochlear. unc.* ij.  
*Spir. nasturt. aquat. unc.* j.  
*Rubi Idæi unc.* ss.  
*Ess. lumbr. terrestr.* ʒvj.

Digerantur per tres dies noctesque, filtrentur & serventur pro usu.

Dosis hujus *misturę* seu *Elixiris* est ʒss. ad ʒj.

Videbitis hanc etiam in **MOLLENBROCCIO**, qui ex **TIMÆO Von GuldenKlee** exscripsit.

Hic etiam declinante paroxylimo usurpatis convenient postmodum remedia, quę malum ex ipsis artubus, quantum possibile, eradican, & talia sunt ex *pino* cum antiscorbuticis mixta, *essentia pini mista cum essentia lumbricorum terrestrium*, aut cum *Essentia* contra *arthritidem vagam*, sit egregium remedium: c. 8.

- R. Ess. contra arthr. vag. Myns.**  
*Pini ana* ʒiij.  
 M. D. S.

*Essentia contra arthritidem vagam.*

Loco horum tamen non inconfulto *bacca juniperi*, aut ex iis parata remedia propinentur, imprimis ex *recentibus*; nam & harum vis balsamica in *arthritide vagā* est egregia; unde *rob baccarum juniperi* expectando sudorem, aut *Decoctum baccarum juniperi*, radix *helenni* laudatur à **MOLLENBROCCIO Tr. de Arthrit. vagā**. In specie *Decoctum centaurei minoris & absinthii* in sero lactis est admodum proficuum: (conf. **M. A. N. C. Ann. 8. Observ. 84. p. 120.**) præsertim cum antiscorbuticis mixtum, expectando sudorem, est elegans. *Absinthium* imprimis & omnia ex *absinthio* remedia, à Galeno laudantur in *arthritide vagā*: item succus corticis citri & corticis aurantium. Præterea card. benedictus, chamædrys, chamæpyris & sabina, rad. armorac., aristol. rotund., caryophyllat., veronica, & rad. amara dulcis cum antiscorbuticis mista, convenientia dant remedia. Necessè est subinde, ut etiam præscribantur noduli vino infundendi ex antiscorbuticis. *Aqua Analthina* composita (descriptionem videbitis in **SCHROEDERi Pharmac. ubi de aquis**) est magnę commendationis; contra *arthritidem vagam*. Denique mixtura simplex cum spiritu cochleari permista, spiritus salis ammoniaci cum spiritu antiscorbutico, spiritus carminativus & similia sunt egregia. *Decoctum strobilorum pini* curam ferē absolvit; sicut etiam *Decoctum radicis chinæ & lassastras* insigniter conducunt: Vel



*R. Cymar. resinof. pinast. vel abiet. ʒiij.*

*Rad. chinae in cal. incis. ʒi ss.*

(vel in subjectis serotioribus & humidioribus *raf. assafras ʒi ad ʒi ss.*

*Bacc. iuniperi ʒi.*

*Incis. & contul.*

*Coqu. in l. q. Aqu. commun.*

*Colaturæ ʒi iv. vel vi. S.*

*Posio in arthritide vaga.*

De hoc Decocto capiantur ʒi iv. manè in lecto expectando sudorem, & vesperti sub introitu lecti citra sudorem. Pro sapore ingrato corrigendo *passula minores conquassare* addi possunt.

Febris si non urgeat, lac caprinum, in quo cochlearia & nasturtium bullierint, repetito usu est optimum: vid. T. I. MÆL *Von GuldenKlee Epist. p. 365.* Nempe ut aliàs in quibusvis morbis, ita in specie in scorbutico, eiusque arthritide vaga benè observandus materiarum moras. Quod si enim facile sudent ægri, & corporeorum benè madeat, Diaphoreticis volatilibus vel oleosis vel amaricantibus insistendum: sin minus, temperantibus potius, lacti nempe eiusque sero, insistendum: quibus nunc lubricalia, nunc antiscorbutica, socianda veniunt. Quoad dietam lacteam extra paroxysmum: hæc equidem admodum proficua est, sed necesse est ut semper exactum regimen rerum nonnaturalium observetur, ne in acutum morbum æger dilabatur: Conf. M. A. N. C. *Append. ad Ann. 1. p. 35. & Ann. 2. Observat. 258. pag. 384. seq.*

Quod attinet *Externam* contra arthritidem vagam: in more quibusdam est, ut applicent partibus dolore vago correptis *Linimenta oleosa* ex oleo lumbr. terrestrum, chamomilla, ranunculo, bufonum, pinguedine asnerina, anatis, item ex *sevo hircino* &c. sed male: Scorbutus enim & affectus dolorosi scorbutici (quod etiam valet in paralyti & contractura scorbutica) non ferunt talia, quæ poros oblinunt, sed potius quæ conservant insensibilem transpirationem salvam. *Omissis* ergo his *pinguibus* usurpentur penetrantia & volatilia. Convenit ergo foris siccus seu halitus aut *suffusus* ex Decocto lumbricorum terrestrum & *formicarum* calidè toto membro exceptus, fortiter membra exteriora versus fricando: v. g. si in brachio ad manum versus fortiter sudet membrum, sub quo sudore mirè sistitur dolor, in specie si linteis calidis abstergatur sudor. Radix raphani comminuta & cum lacte cocta instar cataplasmatum utiliter apponitur loco dolenti, non secus ac radix bryoniae, quæ & ipsa contusa recentes non sine successu applicantur. Vel sunt foris vel cataplasmata ex floribus chamomillæ cum radice symphyti maioris, & cum radice bryoniæ decoquantur in lacte, & ita applicantur loco dolenti. Item Aquæ articulares ad extra (de quibus *infra* 2. *Scit. 3. c. 3. Artic. 3.* ubi de paralyti) vel *spiritus baccarum iuniperi*, mista cum essentia castorei, & paucis *spiritu salis ammoniaci* cum *calce viva* destillatis vel solitariè post blandum sudorem, blandâ manu tepidè illinantur: *spiritus lumbric. terrestr. putrefactorum*, item *spiritus formicarum* cum *calce viva* destillatâ, affusa aqua vel spiritus Vini, aut putrefactorum, item spiritus Vini lumbricatus, tam simplex, quam compositus seu ab herbis arthriticis abstractus, omnia sunt convenientia. Aut liquor in clibano paratus, qui multum lenit dolores arthriticis vagæ. Si ardor & rubor in parte dolente, & quasi *Erysipelas*, excitetur, in dictis *spiritibus* solvatur *camphora*, quæ ardoris sensum solet sistere. Vel fiat *Mixtura*: v. g.

*R. Spirit. formicar. cum calce. viv. vel per putref.*

*Lumbric. terrestr.*

*Urina phlegmat. (ne quid nimis) ana ʒi.*

*Spirit. bacc. iunip. camphoras. vel ceras. nigr.*

*camph. ʒi ss.*

*M. S.*

*Spiritus externus contra dolores Scorbuticos.*

Qui tepidè externè loco dolenti inungatur.

Non inconvenientis est compositio *DRA WIZII* externè usurpanda contra arthritidem vagam:

*R. Flor. lil. convall. M. ij.*

*Rorismar.*

*Castor.*

*Sem. cochlear. ana ʒi vj.*

*Erucæ ʒss.*

hæc omnia infundit in spiritus Vini optimè rectificat. ʒviii.

digerendo per triduum; hinc exprimit fortiter & addit *spirit.*

*lumbric. terrestr. ʒi ss.*

*Camph. ʒi ss.*

*M. Exatè pro externa illitione.*

Balsamus etiam antipodagricus Rulandi factus ex sapone Veneto in spirit. Vini soluto, additâ paucâ camphorâ acuatius cum spiritu lumbricor. terrestr. commodè etiam interdum applicari potest; ad cuius imitationem parata est *Tinctura balsamica DECKERS in Comm. ad Prax. Barbette p. 150.*, quæ videtur non inconcinna contra affectus quoscunque dolorosos scorbuticos. Tandem cataplasmata ex floribus chamomillæ, verbasci, foliis hyoscyami, lumbricis terrestribus & farina hordei in lacte coctis externè applicata, vagos dolores sistunt. Hicce addendum cataplasma sordidum quidem, sed optimum, nempe *stercus vaccinum recens* lubactum cum *lumbricis* terrestribus contusis, & instar cataplasmatum appositum locis dolentibus, repetitum, commendatur, & mirè dolorem sistit. Cautè tamen applicentur eiusmodi *cataplasmata*; nam utut calida poros recludant, tamen si frigescent, & quia humida sunt, admodum stringunt poros. Semper ergo calidè applicentur. Vel

*R. Emplast. diaphor. Myns. ʒi vj.*

*Tacamahac. ʒss.*

*Blando igne liquata, malax. cum Ol. Tart. fet.*

Inducatur super linteum, & applicetur articulis.

Quæ omnia tamen, quia sine evacuantibus universalibus insufficientia sunt, ita ratione catharticos notetur, per leniora eam esse inchoandam, ac si dolores exin non sedentur, sed potius exacerbentur, ab eadem planè desistendum. Dantur igitur Laxativa blanda, nempe pilulæ Francos. & Glassianæ singulis mensibus, quæ si cificari possunt aut cum extracto hellebori nigri, aut, si succi sint viscidiores, cum gummi ammoniaci: vid. LUDOVICI *de salutar. volatili*: Vel

*R. Tartari vitriolati gr. xij. ad xv.*

*Scammon. sulphurat. gr. ij.*

*Troch. alband. gr. j.*

*M. f. Pulvis. S.*

*Pulvis laxativus.*

In contumaciori alvi obstructione, & quando symptomata præcordiorum urgent, applicetur Clystma:

*R. Decoct. carminat. cum urina bub. par. ʒi x.*

*adde*

*Elect. de bacc. lauri, vel de hiora cum agar. ʒi.*

*Olei destillat. chamomill. ʒss.*

*Viselli ovi no. j.*

*M. f. Enema. S.*

*Clyster aperiens.*

Mulier quædam floridæ ætatis de lassitudine omnium artuum nonnihil lancinante conquerebatur, quam aliquot ab hinc diebus tumor cruris dextri insequabatur circa talum, it. circa genu, dolens & insigniter lacerans, concolor tamen partibus vicinis, motum crurum inhibens: Calor totius præternaturalis simul aderat, moderatus tamen, &, ut vocant, vapores, unâ cum ardore corporis continuo, pulsi que magno, celeris, frequentis, molli quasi unduloso: urinae erant crassæ, turbidæ, cum sedimento lateritio, sequenti die anxietates superveniebant, tormina & tumultus abdominis, respirationis difficultates: eadem vespertâ ad alterum crus simili modo similibus in locis cruciari incipiebat; Nox erat inquieta, manè pessimè habebat, in brachio sinistro vagè seu variis in locis torqueri incipiebat, manus umida admodum erat, digiti inflati immobiles sine ulla sensibili alteratione. Ægra anxiosa erat, animo subinde deficiebat, caput admodum dolebat, ipsa sudore calido madebat, nullo modo se movere valebat, quia quolibet, tantillo licet motu, dolores exasperabantur: Appetitus erat nullus, alvus clausa, & sitis intensa. Ego ad eandem vocatus, cum esset evasca, succi plena, gulosa, temperamenti sanguineo oserosi, venæ sectionem in brachio institui, cui alias adhieta erat, idque cum levamine; qua præmissa propter symptomata præcordiorum præscripsi Clystma emolliens cum sale tartari cum levamine. Sequenti die iterum ordinabam:

*R. Arcan. dupl. Myns.*

*Antimonii diaphor. ana ʒi.*

*Laud. ferment. gr. ij.*

*M. Pro duabus dosibus: hinc sudor copiosus erumpebat.*

Antea saltem crura dolore & tumore affecta erant, jam etiam brachia dolere & tumere incepere. Continuavi hunc pulverem in Decocto strob. pini cum passulis parato. Post verò insignes passionis hysterice superveniebant; hinc Clystma ordinavi:

*R. Spec. Decocti carminat. M. iij.*

*Salis Tartari ʒi.*

*Coq. in aqu. comm.*



Colatura ʒiʒ. addo

Elel. de bacc. lauri ʒj.

Ol. destillat. succini cum vitello ovi sol. scrup. l.

Misc. pro Clymate.

Interne omni bihorio accepto gutt. 30. liqu. Corn. Cer. succinati: quorum usu passio hysterica evanuit. Hinc pulveres modò laudatos usurpavi jussi; sed ne nauseam excitaret, Decoctum strobilorum piut omisi, & saltem in potu ordinario, cui spiritus cochlear. instillatus, usurpare jussi. Item mutavi hos pulveres, v. g.

℞. Antimonii diaphor.

Arcan. duplicat. ana scrup. j.

Cinnab. Antimonii gr. xv.

Mista capiebat pro 2. dosibus, expectando sudorem.

Pro anxietate præcordiorum & lipothymia usurpavit spiritum carminativum ad ʒjʒ. mistum cum ʒʒ. spiritus cochlear. gutt. xxx. bis, vel ter in die, & statim levamen circa præcordia percepit.

Externè locis tumentibus imponebat lumbricos vivos, donec moriebantur, cum levamine sensibili. In fine morbi usurpavit crebrò spiritum salis ammoniaci & sic convaleuit. Superiorem anno hoc ipsum malum recurrit, hinc post venæ sectionem, præmissa blandâ laxatione, spiritum salis ammoniaci ad gutt. 40. usurpabat, quia aberat febris. Externè jussi usurpare spiritum salis ammoniaci cum calce viva paratum, mistum cum aqua articulari; sed nihil conducebat, potius malum augebat: Unde.

℞. Tacamahac. pulverisat. ʒʒ.

Empl. diaph. Adyns. ʒi.

F. Emplastrum, quod cum l. q.

Ol. destillati Tartari malaxatum inducebat super linteum, applicabat articulis circa genu, manus, &c. quod dolorem leniebat.

Extra Paroxysmum indicationes hæ observentur:

1. Acidum in primis viis hærens evacuetur; &

2. Massa Sanguinea inquinata corrigatur.

Pro indicatione prima ex fonte Pharmaceutico, præmissis prius aliquandiu lapill. Cancr. usu, vel sale tartari essentificatò, omni vespere gutturum sumendo, Vomitus instituatur.

℞. Aqu. menth. ʒʒ.

Cinnam. ʒii.

Syr. emet. ʒʒ. ad ʒvi.

M. D. S.

Potio vomitoria pro una dosi.

Ad secundam indicationem itidem ex fonte Pharmaceutico tam diaphoretica quàm diuretica proficua sunt: e. g.

℞. Antimonii diaphor. ʒj.

Sal. volat. succin. ʒʒ.

Olco sacch. cochlear. gr. vi.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis sudoriferus.

℞. Aqu. fumar. ʒi.

Cinnamom.

Aceti sambuc. ana ʒii.

Theriac. ʒi.

Salis absinth. ʒi.

Syr. scoloryrb. Fern. ʒii.

M. D. S.

Potio sudorifera pro una vice.

Ex fonte dietetico, vitatis vitandis, pro temperanda sanguinis acrimonia profunt lacticia cum succis antiscorbuticis expressis, omni mane jejuno stomacho & vespere bihorio-ante patium haurienda.

## IX. CEPHALALGIA SCORBUTICA.

Potèd præter dolores artuum vagos subinde in Scorbuticis caput dolere solet. Pro Cephalalgia scorbutica sudoriferorum vis est maxima, in specie laudatur sal volatile succini, spiritus vitrioli volatilis cephalicus cum spiritu liliorum convallium paratus, & cum spiritu tartari & cochleariz mixtus: Item Cinnab. Antimonii, succinum catarrhale, ambra; quibus interdum in contumaciori malo addenda opiatra. Conveniunt etiam pilule ex ladano, quas HART-MANNUS Prax. p. 48. describit: Vel

℞. Elix. propr. antiscorb.

Ess. absinth.

Liq. Corn. Cerv. succin. ana ʒij.

Post hæc lactis usus proficuum est in dolore capitis scorbutico, in alio verd noxius.

Externè zedoaria & baccæ juniperi cum aqua vel De-

Essentia Oper. Tom. II.

cocto verbenæ, florum sambuci ac betonica admovei poterunt.

## X. PARALYSIS SCORBUTICA.

Scorbuticis etiam subinde evadunt membra stupida plus minus paralytica, quæ Paralysis scorbutica seu potius Paresis non adeò contestum, ut aliàs in Paraplegia fieri solet, sed potius sensim invadit, & pereunte successivè mori, sensus ut plurimum superstes est, cui interdum conjunctus est sensus formicationis cuiusdam, ac si formice intus currerent, qui sensus læpius præcedit Paralytin scorbuticam, subinde etiam eam comitatur; interdum sensus est lancinans, & est quasi dolor compositus ex lancinante & ostocopo; in paralyti hac, aliquandiu affligente, membra nonnunquam rigida & quasi contracta fiunt. Hæc paralytis scorbutica est grave Malum, quod difficulter curatur, imprimis si inveterata sit, in specie formicationis sensus, quo præsentente vigil sit Medicus, ut possit præcavere paralytin.

In Cura talis paralyseos conveniens est, ut præmissis præmittendis, in specie vomitoriis, nisi metus doloris abdominis subsit, eam incipiamus. Si enim æger per se inclinet in dolores abdominis scorbuticos, à Vomitoriis caveamus; dolores enim ab his exacerbantur: si vero abdomen est sanum, tunc possunt propinari vomitoria, imminente vel præsentente paralyti scorbutica. Purgantia quoque frequentiora ac vehementiora, utpotè materiam peccantem ad genus nervosum magis moventia, affectus hi paralytici haudferunt, sed mixtura talitè concedunt, præprimis ubi paresis & dolores abdominis adfunt; & quidem à clysteribus emollientibus ac purgantibus lenioribus similibusque, de quibus superius ubi de Colica scorbutica erat sermo, inchoandum. Venæ sectio pariter in his symptomatibus parca admodum, imò nulla sit, nisi plethora excessiva aliud suadeat. Præmissis ergo evacuantibus, vel omissis, præmissis etiam reliquis remediis antiscorbuticis, nempe Martialis, in leviori malo lac vel eius serum; appropriatis antiscorbuticis medicatum, confert: In graviore verd Malo iuxta vel unà cum lacte pinus, juniperus cum aromaticis nervinis, cum roremarino conveniunt. Imprimis pinus seu abies alba, & ex hac parata remedia, sunt appropriata ad paralytin scorbuticam, per sudores evacuantia & curantia. Hinc Essentia pini crebrè usurpanda, quæ misceri potest cum ana Ess. catarrhalis, & propinari à gutt. 40. vel 50. bis vel ter in die: Item Decocta ex pino, nempe ex strobilis seu summitatibus, quæ sanè semper intelligendæ, & hinc Decoctum ligni juniperi, & omnia juniperina, Essentia juniperi, spiritus baccar. junip. & similia commendare soleo; loco quorum etiam Decocta reliqua lignorum, imprimis sassafras & rad. china, cum fructu ulurpantur; quin & antiscorbutica cum lacte propinata sunt egregia: qua ratione paralytin scorbuticam contractam, per rad. armoraciz Decoctum in sero lactis, curavit BARBETTE in praxi. Quibus si accedat spiritus carminativus, item spiritus Tartari volatilil, vel simplex vel compositus, cum spiritu cochleariz vel spiritu antiscorbutico erunt magis appropriata. Nam ad paralytin scorbuticam imprimis valent tartarea volatilia interne usurpanda, imprimis quando scorbutica recrementa nervis atque membranis iam tum impacta sunt, quæ tolluntur, si singulis quaternis diebus sudor per dictam mixturam aliudve diaphoreticum moveatur. Spectat hæc decoctum absinthii ab EUGALENO p. 199. laudatum, aut huius essentia, roris-marini & castorei mixta est convenientissima: Item Electuarium Eugaleni, quod eodem loco describit.

Hæc dixi ex BARBETTE, quod curaverit paralytin scorbuticam consumtam per rad. armoraciz decoctum in sero lactis & læpius haustum; hinc nervina, v. g. spiritus liliorum convall., spiritus salis ammoniaci simplex, succinatus, serpillatus, lavendulatus, essent. lignorum succini, simpl. & sassafr., ambra, ac oleum & sal volatile succini aliæque juxta EUGALENUM potentiora Antiscorbuticis mixta propinentur. Juxta quæ ulceritis specificum cephalicum, autum fulminans mistum cum cinnabari antimonii, aut aurum diaph. Poterii, & ossa microcosmi, in rob juniperi vel alio vehiculo antiscorbutico pro scopo sudorifero, repetito tamen usu, sunt insigniter proficua.

Inter ea, quæ externè conveniunt ad paralytin scorbuticam, ferè sunt ea, quæ externè circa arthritidem vagam fuerunt laudata; præsertim radic. lymphiti maioris & bryoniz contusæ, coctæ & impostæ, iunc proficue, præsertim si tumor durus partis resolutæ adsit. Item pro externa fricatione membrorum paralyticorum spiritus baccarum juniperi, lumbricorum terrestrium, essentia



castorei, &c. sunt optima. Quando ita fricatae sunt partes, adspargitur commodè spiritus tartari: hic enim adpersus insinuat se sensim & paralyin solvit. Juxta hæc imprimis *vinacea* & infusus ex iis parati, imprimis in paralyi crurum scorbutica sunt nobilissima; nempe *Vinaceis collectis* & sibi invicem impositis, donec incipiant incalescere, immergatur æger ulque ad regionem iliacam. Hujusmodi *vinaceorum balnea sicca* aliquoties repetita sudorem largum partibus inferunt, & paralyin scorbuticam solvunt. Si non sufficienter incaluerint, adspargatur calx viva *Balsamum Galbani* terebinthinat., seu *galbanerum Paracelsi*, de quo vid. SENNERTUS, SCHROEDERUS, & HARTMANNUS, etiam in paralyi scorbutica præ reliquis est nobile, quod illinendum est repidè à radice membri ad posteriora versus: Vel

R. *Liqu. lumbr. terr.* ʒj.  
*Ol. cochlear.* (vid. *Hild.*) ʒss.  
*Destillat. salvia,*  
*Rorismar. an. gutt. ix.*  
 M. D. S.

*Oleum externum ad unktionem.*

Quod si tumor, ut dixi, cum rigore membri adsit, convenit Cataplasma SENNERTII l. 3. *Prax. de Scorbuto* pag. 639.

R. *Pulv. flor. chamom.*  
*Com. absinth. an.* ʒiij.  
*Rad. bryonia,*  
*Consolid. maj. an.* ʒss.  
*Farin. fabar.* ʒj.  
*Medulle panis alb. ex lacte coct.* ℞ij.

F. Cataplasma applicandum Tumori.  
 D. S.

*Cataplasma externum.*

Quibus admodum commendatur socus siccus seu halitus ex pinguedine anserina, si sc. pinguedine super carbones bene calefacta aliquoties inde suffumigetur quasi & foveatur membrum; est enim penetrans, & in paralyi scorbutica apud VVestphalos usitatum remedium. Alis in usu est illinire membrum paralyticum oleo lumbricor. terrestr. & cochleariæ, addendo aliquot guttas olei destillati salviæ, majoranæ, serpilli, roris marini, balsami Peruviani, & succini, vel ol. lini destillat. Alii usurpant pinguedinem taxi, vulpis, gallinæ, ciconiæ, castoris, serpentum; emplastrum oxycroceum aut nervinum Vigonis; it. quod DRAWIZIUS de *Scorbuto* p. 176. describit: quæ tamen oblinendo poros minus conveniunt in Scorbuticis; pori enim quantum possibile aperti servantur; vid. *Prognos. de Paresi.* HARTMANNUS aliis irritis ad thermas ablegat. Verùm potentiores non conveniunt, sed moderatè saltem, v. g. Embleses & Toplicenes; neque fervidæ nimis adhibeantur ob eandem rationem.

#### XI. CONVULSIONES SCORBUTICÆ.

Subinde etiam convelluntur & tandem contrahuntur membra & universum corpus, ac rigida evadunt, dum corrugantur fibræ musculorum & tendinosæ à sale scorbutico, quæ convulsiones comitantur ferè paralyin scorbuticam; tam miræ sunt interdum & stupendæ, ut ægri ab adstantibus ignavis pro obfessis à dæmone habeantur; qualia vid. exempla in *Parthol. Cerebri WILLISII*, qui in his morbis convulsivis non est inelegans.

Curantur optimè hujusmodi contracturæ & convulsiones scorbuticæ per Vomitoria, quæ magnarum varium observantur; quorum loco etiam purgantium usus repetitus convenit, v. g. Electnarium Marburgensium, ab HORSTIO Cent. Probi. Decad. 10. *Quest. 7.* descriptum. Accedunt his antiscorbutica anticonvulsivis seu genus nervosum & cerebrum confortantibus mista, in lacte imprimis usurpanda: Sic enim Epilepsia talis hypochondriaca cum lacte, in quo *sapo Venetus* dissolutus fuit, curata observatur. Observatio prostat in M. A. N. C. *Ann. 1. Obs. 85.* BARBETTE *Praxi.* Cura hæc nihil ferè peculiare habet à supra dictis remediis contra *Arthritidem vagam* & *paralyin scorbuticam.* Lac præ reliquis hic in usu est, cui adduntur remedia ex castoreo: Item clunab. antimonii, specifi. cephalicum, cum sale volatili succini & camphora, in vehiculo decocti heleni cum bacis juniperi commodè propinatu: v. g. contra Epilepsiam scorbuticam propinavi aliquando cum successu hunc pulverem:

R. *Cinnab. antimonii* gr. xv.  
*Sali. vol. succini* ℞ss.  
*Land. opiat.* gr. j.

M. f. Pulvis S.

*Pulvis antiscorbuticus.*

Cujus vehiculum erat aqua antiscorbutica Dorrereilii, cum spiritu lumbric. terrestr. & cochleariæ probe imprægnata:

Vel

R. *Aqu. antiscorb. Dorn.*  
*Epilept. Langii an.* ʒij.  
*Spir. cochlear.* ʒj.  
*Corn. Cerv.* ʒss.  
*Arcan. duplicat. Atyns.* ʒij.  
*Cinnab. antimon.* ʒj.  
*Syrup. cochlear. essent.* ʒj.

M. S.

*Potio antiscorbutica pro aliquot vicibus.*

Mixturam hanc in Epilepsia scorbutica aliquando egregio cum successu præscripsi. Item convenit Mixtura ex spiritu tartari probe rectificato & volatilato, vel carminativo, cum spiritu cochleariæ & spiritu theriacali camph. castoreo affusus & invicem in essentiam redactis; vel spiritus salis ammoniaci cum spiritu cochleariæ; aut salis ammoniaci cum calce viva & spiritu cochleari destillatus affunditur castoreo pro essentia, contra contracturas scorbuticas egregia: Item Essent. pini cum spiritu cranii humani mista, addito spiritu cochleariæ etiam convenit in Contracturis & Convulsionibus scorbuticis: Essent. ligni lassafraz mista cum essentia fumarie aut pini, addito spiritu cochleariæ aut nasturtii aquatici commendatur etiam contra Contracturas & convulsiones. In genere usurpantur, quæ ad convulsiones adhibentur, mista cum Scorbuticis, & interdum cum opiat. Quibus ad nixum non operantibus, diaphoretica substituantur, & inter hæc decocta lignorum ac radicis chinæ, item scniculi. Sedum vermiculare quid obineat contra rigiditatem & contracturam membrorum Scorbuticam, vid. M. A. N. C. *Ann. 6. & Observ. 23. p. 50.*, internè usurpatum.

Externè usurpantur aquæ articulares ad extra, mistæ cum essentia castorei, cum aqua hirundinum cum castoreo, it. aqua apoplect. cum castoreo: Item spiritus vini insul. cephalicorum, lil. conval., primula veris, lavendulæ, salviæ & similia, unâ cum castoreo imprægnatus, externè affricatus: Item remedia lumbricalia & alia superius jam allegata. Sunt qui recipiunt calcem vivam, eique affundunt oleum lini, destillantque oleum penetrantissimū, quod ad contracturas scorbuticas & Paralyin scorbuticam commendant; Oleum enim lini per se destillatum fit adeo penetrans, ut fortan nullum oleum ei par sit. Alias oleum cochleariæ, oleum lumbr. terrestr., oleum rutaceum cum oleo laurino, angelicæ & cumini, etiam externè commodè usurpantur, ac unctio fida VALERIOLE, quam l. 5. *Obs. 9.* describit. Balnea etiam in contracturis scorbuticis, it. in doloribus scorbuticis, imprimis abdominis, sunt egregia. Tale balneum contra contracturas scorbuticas est hoc:

R. *Herb. gentian. cum. rad.* ℞ss.  
*Gran. junip. cum ramis,*  
*Herb. rusæ mont. an.* ℞j.  
*Agrimon.* Mj.

Hæc omnia in nodulo collecta coquantur pro balneo.

D. S.

Hoc balneum tepidum quotidie per 8. horas repetatur, idque tam diu, donec 40. horæ balneando fuerint consumptæ: Sic enim Contracturas & convulsiones scorbuticas cessare dicunt. Observeatur tamen, quod renovandæ sint species, & non debeat mingi in balneo.

#### XII. DYSPNOEA & ASTHMA SCORBUTICUM.

RESPIRATIO DIFFICILIS & INSULTUS ASTHMATICI in Scorbuto affligentes sæpe extra methodum generalem appropriata urgent, & quidem modò incidentia plus minus aromatica, modò spasmodica, prout nimirum hujus symptomatis causa variat: e. g. crocum, cujus extractum BARTHOLINUS *Alt. Hassnuf. P. 1. cap. 92.* commendat, spiritum cornu cervi, fuliginis, liq. cornu cervi succinatam, castoreata, spiritum & flor. salis ammoniaci, benzoës, rad. aristolochiæ rotundæ cum Decoctis antiscorbuticis: vid. SIMON PAULI *Quadr. Botan. pag. 22. c. 8.*

R. *Aqu. flor. rapar.* ʒiv.  
*Antiscorb. Dorn.* ʒij.  
*Spir. cochlear.* ʒij.  
*Asthmat.*  
*Ess. enula,*  
*Greci ad.* ʒj.

Syr.



Syr. rad. enul. ʒiſſ.

M. S.

Succus ad respirationem pro aliquot vicibus : dosiſ  
2. cochlearia.

In asthma verò merè convulsivo vido scorbuti WILLIS de Scorb. p. 330. & 331. laudano opiato nullum præstantius remedium suspicatur; cui laudanum hyſtericum aliis appropriatis junctum, substituipoteſt. Accedunt his clyſteres aciores cum diaphoreticis ac diureticis, e. g. aſclis, lumbricis: vid. *ſupra Sect. 14. cap. 2. Artic. 1.* ubi de Asthma convulsivo: & si à sanguine circa præcordia stagnante hic affectus oriatur, venæ ſectio inſtituatur.

### XIII. VOMITUS SCORBUTICI.

Præterea affligit etiam ſcorbuticos VOMITUS CONTUMAX, sæpius *peritinaſ naſea* cum continuo vomendi tonatu & cardialgia, ex irritatione ſtomachi ab acrimonia ſalis ſcorbutici. Quo in caſu, præter Vomitoria blanda, quibus purgantia per inferiora, blanda tamen, interdum ſubſtitui poſſunt, conducunt imprimis acrimoniam ſalis ſcorbutici temperantia & præcipitantia; quæ inter etinet ſac, lapilli cancrorum, ebur, corallia præparata, cornu Cervi uſtum, & ſimilia. Ulterius tinctura tartari, elixyr proprietariſ ſine acido, ſpiritus ſalis ammoniaci, arcanum duplicatum Myſtiſchu, flores ſalis ammoniaci & ſimilia, interius cum aquis antiſcorbuticis aſſumta, imò cum opiatſ interdum miſcenda, laudantur: item ſpiritus niri dulcis, aut præſcribatur ſequens Mixtura:

R. Aqu. menth. unc. j. ad unc. jſſ.

Cinamom. unc. j.

Spir. cochlear. ʒij.

Niri dulc. ʒj.

Syr. cydonior. unc. ſſ.

M. D. S.

Potio ſtomachaliſ antiſcorbutica.

Conducit in Vomitu ſcorbutico.

### XIV. DIARRHOEA SCORBUTICA.

Quodſi adſit *Diarrhœa*, forſan & *Dyſenteria ſcorbutica*, adſtringentia non ſtatim adhibenda, utpote quæ lipothymias & maximas præcordiorum anguſtias excitant: ſed loco horum potiùs medicamenta quælibet ex abſinthio, roſis & maſtiche imprimis conducunt; Ut v. g. Eſſentia abſinthii cum Eſſ. lignorum & ſpiritu cochleariæ, it. ſpiritus cochleariæ miſtus cum ſpiritu maſtiche, Decoctum lignorum aut ligni guajaci cum antiſcorbuticis & abſinthio parata: Cum quo ſimul propinquetur ſpiritus maſtiſchii, quò provocando ſudorem diarrhœam etiam ſopit; item liquor martiſ ſolaris, aut loco huius à WILLISIO commendatæ acidulæ.

Quibus præmitti & ſingulis occiduſ reſterari debet evacuatio cum Rhabarbaro, additis aromaticis ſtomachicis. In Dyſenteria ejuſmodi ſatis diuturna atque enormi WIL- LISIUS pilulæ ex rhabarbaro & vulnerariis ſingularis efficaciz commendavit; In quo caſu Clyſteres ex vulnerariis parati magnum quoque levamen præbent.

### XV. HÆMORRHAGIÆ SCORBUTICÆ.

HÆMORRHAGIÆ Scorbuticis frequenter & per diverſa corporis loca contingentes, ſin immodicæ, mox adſtringentium & ſanguinem temperantium & increaſantium uſum poſtulant: Quod optimè præſtant martialia, & quidem illa, quæ magis ſalina & terrea, minùs ſulphurea ſunt, v. g. antimon. diaphoret. martial. vitriolum martiſ, liquor martiſ ſolaris, & tinctura antiphiſtica D. Michaeliſ, &c.

### XVI. ATROPHIA SCORBUTICA.

ATROPHIA SCORBUTICA, ſicut modò chylum depravatam, modò Maſſam Sanguineam nimis acrem & corruptam, modò ſpiruum animalium defectum aut craſin eorum vitiatam, pro cauſa agnoſcit; ita remedia huic ſymptomati appropriata variant. Quippe ſi primarum viarum culpâ alimenta non rite digerantur, diſſeſtiva, vomitoria blanda, ſtomachica aromatica, &c. conveniunt. Aut ſi chylus laudabilis, vel propter vaſa lactea obſtructa, vel propter meſenterii & lumbarium glandularum tumores ſcirrhofos, non rite diſtribuitur, ita ut fluxus coeliacus ſuperveniat, reſolventibus præprimis volatilibus ac acidulis

opus eſt. Quando verò Maſſa eſt ſanguinolentaſi & nati- git, lac & lacticiſia, ſimiliaque, quæ copioſum chylum ſug- gerunt, ſunt exhibenda. Imò totum negotium in alimen- torum luſculentorum & cveptorum uſu conſiſtere vide- tur, quæ antiſcorbuticis temperanda, v. g. ſi lac caprillum cum naſturtio aut cochlearia modo *ſupra deſcripto* decoqua- tur, aut ſpiritus cochleariæ illi inſtilletur; item carniſ vituli- næ, limacum & oſtrearum juſcula cum ſero lactis & anti- ſcorbuticis præparentur. In genere equidem & in atrophia ſcorbutica omni, à quacunque cauſa primarum viarum de- pendeat, dicta lactea vulgò comendatur: ſed magis cum ſto- machus malè conſtitutus exinde lædatur, magisque debili- tetur, & lac corrumpatur, ſpiritibus verò animalibus, ho- rum anomalis corrigendis minùs conducatur. Dicta ergo la- ctea in uſum non vocanda, niſi ſtomachus à forſibus & crudi- tatibus liberatus, & digeſtio ejuſ laudabilis ſit. In ſine paſtus æger ſemper cochleariæ unum paſſulatum probè con- ſarum comedat, ſuperbibendo bonum hauſtum cereviſiæ.

Item

R. Elix. propriet. ſine acido ʒij.

Spir. ſal. ammoniac. ſimpl. ʒſſ.

M. D. S.

Elixyr antiſcorbuticum.

De hoc omni manè dentur 40. ad 50. guttulæ in vehiculo tepido: à meridie verò bihorio ante cenam propinentur tin- ctura antiphiſtica, ex ſaccharo ſaturni & vitriolo martiſ paratæ, 40. guttulæ; continuando ad tempus aliquod. Quod ſi verò ſpiruum animalium craſi vitia à nutritio in ſcorbuticis lædatur, iſ per nervina volatilia, tam externa quàm interna, ſuccurrendum.

### XVII. FEBRES SCORBUTICÆ.

Quotieſcunque accidit, ut Maſſa Sanguinea ſcorbutica amittat viſciditatem ſuam, degeneretque per omnes partes in liquorem aerem corroſivum, toties adeſt in corpore FE- BRIS SCORBUTICA, quo ſenſu omnino accedit Maſſæ Sanguineæ fermentatio nimia, dum ſcil. partes contrariæ improporionatæ impetuoſè in ſe invicem agunt. Hæc febris in noſtris provinciis proſectò eſt frequentiſſima, adeo ut hinc nonnulli ſibi perſuadeant, Hæticam Febrim peni- tus eſſe amiſſam in Pathologia moderna, in ejuſque locum ſurrogatam eſſe febrim ſcorbuticam.

Signa diagnoftica hujus febris ſunt omnia ea, quæ per ſe ſcorbutum ſignificant: palmarum interim notetur ſignum, quod in febre hac aſſint notabilia circa appetitum vitia: v. g. adeſt nimius, ut plurimum autem cum vomitu, aut depravatus, ita ut ad omniſ generis ſalia appetitus feratur: item in febre hac ut plurimum adſunt obſtructiones alvi contuma- ces, in habitu corporis videntur maculæ lividæ, de mumque ſudor odorem ſpargit ſubacidum, reperiturque in lacte manè copioſum rubrum ſabulum, prætereaque adeſt totius corpo- riſ macies.

Signa prognoftica ſunt. Omnis febris ſcorbutica eſt ran- dem periculola, imprimis autem ea, quæ comitatur exulce- rationes. Hæ namque ut plurimum degenerant in gangræ- nam, & ſubſequentem ſphacelum.

Febres Scorbuticæ curantur ut aliæ, in quibus cujuſcun- que generis antiſcorbutica reliquis medicamentis ſemper commiſcenda, obſervatâ tamen ſanguiniſ & reliquorum ſuccorum vitalium craſi, id eſt, ut reſpectu hujus nunc acio- ra, nunc temperatiora adhibeantur. Scorbutico autem ut ta- li, præprimis ingraveſcenti, propria eſt febris erratica cum ſudoribus nocturnis; in quo caſu præter victum aut cenam ſaltem parcio- rem, præmiſſis univerſalibus, martialia ac ſalia fixa atque volatilia, quæ cruditates chyli corrigunt, cum antiſcorbuticis mixta notabilem uſum præſtant, utpote ſine quibus omniſ labor erit fruſtraneus: v. g. conducunt flores & ſpiritus ſalis ammoniaci ſimplex aut ſuſſaſtratus, cochlea- riatus, &c. Arcanum duplicatum opum eſt unum ex opum e- rum reme diis, cum abſorbentibus imprimis locatum, qua- rum formularum jam *ſupra Sect. 13. cap. 2. de Febris in- termittentibus* mentio facta: Vel

R. Elix. propriet. antiſc.

Eſſ. abſinth. tartari ſat. an. ʒſſ.

M. D. S.

Elixyr febrile antiſcorbuticum.

Dofiſ 30. ad 40. guttas.

R. Spir. ſal. ammon. ſimpl. ʒij.

Cochlear. ʒj.

M. S.

Spiritus febrilis antiſcorbuticus.

Vel



Vel R. Spirit. carminat. de tribus 3ij.  
Sal. ammoniaci cochleariat. sine calc. vin.  
par. 3ij.

M. S. ut supra.

R. Arcan. duplicat. 3℔.

Corall. rub. præp.

Specif. stomach. Poterii ana 3℔.

M. f. Pulvis.

Div. in 2. part. æqu. S.

Pulvis febrilis antiscorbuticus.

R. Flor. Sal. ammoniaci gr. xv. ad 3j.

Antimonii diaphor. Martial. 3℔.

M. f. Pulvis.

Dentur 4. doses.

D. S. ut ante.

R. Sal. centaur. min.

Arcan. dupl.

Corall. rub. præp. ana 3℔.

Sal. vol. succini gr. v.

M. f. Pulvis:

cui addi potest

Laud. opiat. gr. j. vel ij.

D. S. ut supra.

R. Flor. Sal. ammon. gr. xv.

Lapill. Cancr. præp. scrup. 8.

Ol. destill. caryoph. gutt. ij.

M. f. Pulvis: S.

ut ante.

R. Aqu. antiscorbut. Dorncr. 3j.

Spirit. sal. ammoniaci 3j.

Laud. opiat. gr. ij.

M. D. S.

Potio febrilis antiscorbutica pro una vice.

R. Aqu. centaur. min.

Antiscorb. Dorncr. ana 3j.

Spirit. cochlear.

Sal. ammoniaci ana 3j.

Arcan. dupl.

Mag. coral. cum succ. citr. ana 3℔.

Syr. scoloryb. For. 3vj. ad 3j.

M. pro aliquot dosibus: S.

Potio febrilis antiscorbutica.

R. Aqu. centaur. min.

Card. ben.

Antiscorb. Dorncr. ana 3j.

Mixt. simpl. 3ij.

Syr. scoloryb. For. 3vj.

M. f. Potio pro aliquot dosibus:

D. S. ut ante.

R. Aqu. menth.

Antiscorb. Dorncr. ana 3j.

Spirit. cochlear. 3j.

Arcan. dupl. Myns. 3℔.

Syr. scoloryb. 3℔.

M. D. S.

Potio febrilis antiscorbutica pro una dosi.

R. Aqu. card. bened.

Cent. min. ana 3j.

Acet. 3vj.

Mixt. simpl. 3ij.

Spirit. cochlear. 3j.

Lapill. Cancr. præp. scrup. ij.

Antimonii diaphor. scrup. j.

Syr. scoloryb. For. 3vj.

M. D. S.

Potio febrilis antiscorbutica pro aliquot dosibus.

Urgente sui convenit Iulepus in Idea Formular. Ch. 3. §. 4.

Item TIMÆI in Epist. 237. Vel

R. Serilact. cum succo citri acidul. 8j.

Decoct. Tamarind. 8℔.

Tinct. flor. bellid. 3vj.

Syr. ex roso citri 3ij.

Spirit. Vitrioli philosoph. q. l.

M. D. S.

Iulepus febrilis antiscorbuticus contra sitim.

Serum enim lactis per succum citri acidulatum valde prodest; nec inutilis est, præmissis absorbentibus blandèque laxantibus, potus lactis extra paroxysmum febrium scorbuticatum, si aliquantulum spiritus salis ammoniaci addatur, & stomachus eiusque digestio bene se habeat; vix enim dici potest, quantum in hoc affectu præstet.

## XVIII. HYDROPS SCORBUTICVS.

HYDROPS SCORBUTICUS, si diuturnior & habitualis, scorbutus autem gravior fuerit, curari vix potest: Qui verò non inveteratus & à causa saltem evidente, v.g. quando à vehementiore purgatione Massa sanguinea scorbutica nimis exagitata fuerit, interdum curatur. Viranda autem sunt purgantia fortiora atque frequentiora, humores scorbuticos, ut iam innui, agitantia, & ad hydropem disponentia, & usurpentur blandiora primas vias tantum evacuantia, e.g. mercurius dulcis cum stimulo appropriato acuat, aut clysteres aciores, hinc resolventia cum diureticis blandis & antiscorbuticis mixta, utpotè quibus solis sine multis evacuationibus hanc hydropis speciem curatam EUGALENUS pag. 244. perhibet. Conducunt ergo millepedes vino infusi, spiritus salis ammoniaci simpl. & compositus, cochleariatus, iuniperiatus, Elix. iuniperinum, Tinctura Tartari cum spiritu cochleariz, item infunduntur millepedes conquisi cum Tinctura tartari, & extractio filtretur.

## XIX. ERYSIPELAS SCORBUTICVM.

Fit subinde ut scorbuticos invadant ERYSIPELATA; levissimæque occasione quæ recidivant, eaque admodum periculosa, quia faciliè in gangrænas aut in ulcera maligna cacoethica abeunt. Conveniunt ergo internè sudorifera sex antimon. diaph. bezoard. minerali aut Ioviali, cum terra sigillata & Corn. Cerv. atque cum spiritu flor. sambuci in misturam antiscorbuticam usurpanda, & omnia remedia ex sambuco appropriatis mixta: Sic essentia rob sambuci cum spiritu cochleariz mixta; quæ essentia fit, quando spiritus sambuci super rob affunditur: item essentia rob sambuci cum ess. persicariz aut Essentia fumariz usurpata; item Decoctum flor. sambuci in lacte bibitum.

Externè pulveres, in specie MYNSICHTII, ad erysipelata conveniunt: it. epithema ad erysipel. ZWELFFERI in Pharm. pag. 91., quod polychrestum est ad exulcerat. humid. in metu gangrænz: e. g.

R. Litharg. 8℔.

Flor. samb. M. ij.

Olibani,

Myrrha,

Mastich. ana 3℔.

Aqu. calc. vin. 8℔.

Acet. destill. 8℔.

Coqu. simul, usque dum lithargyr. fuerit solutum, in sine addendo Camph. 3℔.

Colatura D. pro usu: S.

Epithema discutiens.

Observetur tamen in horum applicatione cautela in Diff. de Precipitantium usu & abusu c. 3. §. 2. allegata. In solo etiam vino coqui possunt.

## XX. SITIS.

Sitis, quæ subinde graviter affligit scorbuticos, præsertim matutino tempore, optimè Decocto radicis Chinæ, aut liquiritiz ad imitationem TIMÆI Von GuldenKlee lib. 3. Epist. 29. p. 237.

## XXI. ULCERA SCORBUTICA.

ULCERA vero Scorbuticorum sive per se, sive post Erysipelata effluerint, periculosa sunt: quod si verò fiat ut partes ulceratæ non sentiant, nec doleant, periculum est, ne immineat gangræna. Contra hæc ulcera ergo convenit optimè aqu. calc. viv. pro eluendis his ipsis, & applicetur desuper unguentum nicotianæ cum saccharo Saturni; it. unguentum diaphoreticum cum succo inspissato beccabungæ mistum, & malaxatum cum oleo nicotianæ. HORSTIUS commendat unguentum de apio, ulcerum horum mundificativum, cuius hæc est compositio:

R. Succ. apii,

Mellisophyll.

Cochlear. ana 3℔.

Chelidon. mai. 3ij. ad 3vj.

Mell. rutac. q. l.

Coqu. ad iustam consistentiam, adiecto thure, aloe, myrrha ac similibus q. l. pro consistentia Unguenti.

Hoc etiam Decoctum in lue Venerea pro istorum ulcerum



ram ablutione est egregium remedium. Quin & decoctum calce vivæ pro eadem intentione commodè usurpatur.

Quod si ulcera sint pejora, ibi succedaneum sunt Decoctum sedi minoris, cui additur aliquantulum de spiritu vitrioli (aliquot gutt.) sic enim partes exulceratæ mundificantur.

Cum verò non semper Scorbutici ferre possint unguenta aut emplastra, præsertim pingua, tunc partes exulceratæ pulveribus inspersis curandæ sunt. Nempe pulvis ex sacch. Saturni, lacte lunæ, olibano, myrrha, croco martis præcipitato & similibus. Internè fomitem horum ulcerum subtrahunt eff. lignorum, Eff. fumariz, traumatica, item tinctura coralliorum antiscorbutica & similia, sanguinem mundificantia.

## XXII. TUMORES.

**TUMORES duri**, qui crura subinde affligunt, resolvantur per Cataplasma ex rad. consolidæ maj., quæ hic est specifica: Cui etiam addi possunt radix bryoniæ, absinthii, chelidonii majoris, farina fabarum & lupin., ex quibus in lacte coctis fiat Cataplasma imponendum: v. g.

*R. Flor. chamomill. M. ij.*

*Rad. symphyti maj. unc. iv.*

*Bryon. unc. ij.*

*Medulla pan. albi No. j.*

Coqu. in f. q. lactis ad consist. Cataplasmat. s.

Vel etiam Cataplasma ex beccabunga & geranio Robertiano locum habet: vid. **WEDELIUS de Compos. Medic. pag. 63.** Vel

*R. Empl. diaph. Myns. unc. j.*

*Succ. inspissat. rad. symph.*

*Beccabung. an. drach. j.*

Malax. cum oleo destillat. chamom. & emplastrum.

D. S.

*Emplastrum discutiens.*

Quod si dolor adsit, *racamahaca* dimidium ad emplastrum diaphoreticum addi potest.

Absolvimus jam Nutritionem læsam totius corporis vitio alimenti nutrientis: Restant vitia cutanea, in quibus pariter alimentum nutritivum a vitioso acido subcutaneo depravatur, ut ex præternaturali sua acredine, in specie acido-salsa, pruritus, pustulæ & maculæ excitet: Unde & medicamenta cosmetica, cutaneis morbis dicata, talia esse solent, quæ acidum istud aut absorbendo aut præcipitando corrigere valent, v. g. sperma ranarum, sal & oleum tartari per deliq. sulphur, Saturnina, &c.

## ARTICULUS VII.

### D E

## AFFECTIBUS CUTANEIS.

### MEMBRUM I.

### D E

### SCABIE.

**A**ffectuum cutaneorum, in specie Scabiei, origo est simpliciter à vitiosa nutritione depravata partium ipsarum subcutanearum. *Causa peccans* est fermentum acidum in glandulis intercutaneis hærens, nunc simpliciter tale, nunc acidum acre seu acido-salsum; hinc enim pruritus, squamulæ, & pustulæ rubræ, interdum pus & sanies: videatur **ECKIUS in Meditat. de Princ. Rerum Natur. & WILLIS Pharm. Rat. P. 2. pag. 476.** Adeoque formalitas scabiei consistit in Nutritione depravata, quatenus illam ut plurimum corporis contabescens, interdum pedum tumores, comitantur. Vitiat autem nutritio partium subcutanearum privata ab acido præternaturali fermentum digestivum impediens, & alimentum partis proximum corumpens. Acidum istud præternaturale fermentativum oritur vel ex transpiratione insensibili nonnihil impedita, indeque retentis effluviis acido-salis, aluique similibus; idque subinde ex immunditie ægri, aut quando e. g. pueri, servi, ancillæ, Phariopeporum aut Atomatiorum aliorumque famuli, corpora sua nunc frigori intensissimo exponunt, nunc à frigore recedentes fornacis calori vehementiori sese obducunt, unde à subitaneis his & læpius repetitis mutationibus

non raro scabiosi fiunt: vel ex ipso vitio nutrimenti allati, sanguinis nempe & chyli, salioris aut acrioris, fermenta præternaturalia sub cute hinc inde generantur, unde oritur fermentatio: vel denique frequenter ex contagio fermentativo, e. g. chirothecæ scabiosæ, extrinsecus hausto, spiritum insitum cutis alterante, quod fermentando se multiplicans partium intercutanearum nutrimentum lædit, & in saniem seu ichorem acido-salsum convertit, simili modo ac crusta lactea infantum subinde florescit ex vitio lactis nutritici.

Ex his patet, non semper in scabie totam Massam Sanguineam affectam esse, sed frequentius nutrimentum intercutaneum seu serum nutritivum in habitu corporis: unde, quicquid Practici de Viscerum intemperie & sanguinis impuritate in omni scabie docent, locum non semper habet; cum à solo sæpe scabiosi contactu vel hujus vestimentorum usu, &c. scabiem contrahamus, ubi præter cutim aliæ partes simul non afficiuntur, quæ tamen si tota Massa Sanguinea semper inquinata esset, viscera interna etiam inquinaret: accedit & hoc, quod scabies sæpe per sola medicamenta externa curetur. Ut ut negari non possit, etiam interdum ex mala dieta & causis internis, v. g. scorbuto, lue venerea, &c. scabiem excitari, aut contagium, quo serum nutritivum in habitu corporis semel affectum, totam Massam Sanguineam successivè inficere potest, unde phthisis, cachexia, & alia similia mala excitantur. Dividitur vulgò Scabies in humidam & siccam; quæ tamen differentia non est essentialis, sed tantum accidentaria, cum pro diversitate corporum plus minus serosorum & sicciorum pustulæ scabiosæ nunc humidiore, nunc sicciores & magis crustosæ, sint: Illæ enim à nutrimento partium subcutanearum magis seroso & magis temperato, adeoque facile corruptibili; Hæ vero à nutrimento minus seroso, sed magis balsamico aut sale volatili oleoso magis imprægnato, oriuntur.

## DIAGNOSIS.

*Signa diagnostica* per se patent: Scabies humida & sicca facile quoque à se invicem dignosci possunt, dum illa apparet sub forma ulcusculorum cutaneorum; hæc verò solum saniem exsiccata & incrustatam representat.

## PROGNOSIS.

*Prognosis quod attinet:* Scabies propter deformitatem & pruritus magis molestum malum, quam periculosum, cum hac affectu pluribus morbis se invicem immunes sint, v. g. à variolis, epilepsia, &c. imò ipsa peste, notante **FORESTO L. 6. Obs. 24. in Schol.**

Scabies recens facile curatur; inveterata verò Medicis multum facessit negotii; interdum in impetiginem ac lepram degenerare, & viscera interna inquinare solet.

In senibus contumax magis est, quam in juvenibus, quibus sæpe insanabilis: vid. **FONSECA Tom. 2. Conf. 18.**

Scabies humida melius curatur, quam sicca; imò vix curari debet: vid. **GABELCHOVERUS C. 6. Obs. 75.** Malè curata multorum morborum chronicorum, infarctorum & inflammatorum causa existit; unde frequens post malam curationem phthisis.

## CURA.

Curantur cutanea Vitia tam per purgantia, quam sudorifera. Externè verò conveniunt, quæ vi absorbendi aut destruendi acidum pollent. Conveniunt ergo internè inter purgantia helleborina, Extractum helleb. nigri & panchym. Crollii, pulveres purgantes cum tantillo antimonii diaphoretici ad imitationem *Comitis de WARWICK*, quibus semper mercurius dulcis addendus erit; adeoque optimè pilulæ mercuriales conveniunt, item Calomelanos Turqueti, i. e. mercurius dulcis cum scam. sulphurato, it. mercurius vitæ per inferiora purgans, de quo vid. **HARTMANNUS in Praxi Chym. c. 4. §. 1.** In robustioribus turbith minerale, mercurius præcipitat. viridis: E. g.

*R. Mass. pilul. de amm. Querc., vel extr. hellebori nigri, vel panchym. Croll. gr. xv.*

*Merc. dulc. gr. xij. ad xv.*

*Extr. troch. alband. gr. j. ad ij. (vel loco hujus Scam. sulphurat. gr. j.)*

Cum Eff. lignor. vel tinct. tartar. antim., vel fumariz, s. pilulæ:

D. S.

*Pilule sanguinem purificantes.*

*R. Mass.*



℞. *Mass. Pilul. de tribus Ruffi* gr. xv.

*Merc. dulc.* ℥j.

*Scammon. sulphurat.* gr. v.

*Cum Eff. lignor. f. pilulæ.*

*D. S. ut ante.*

℞. *Conf. fumar. vel scabios. drach. j.*

*Merc. dulc. gr. xv. ad ℥j.*

*Scammon. sulphurat. gr. j.*

*M. f. Bolus.*

*D. S.*

*Bolus laxativus sanguinem mundificans.*

℞. *Turbith. minor. gr. v. vel vj.*

*Cum theriac. f. Bolus in robustioribus.*

*D. S.*

*Electuarium pro una dosi.*

℞. *Merc. dulc. ℥j.*

*Scam. prop. gr. iv. ad v.*

*M. f. pulvis S.*

*Pulvis purgans.*

℞. *Merc. dulc. gr. ix. vel xij.*

*Scammon. sulphurat. gr. j.*

*Sacchar. gr. v.*

*M. f. pulvis pro puero 7. & 9. annorum.*

*D. S. ut ante.*

Vel fiat Nodulus pro purificando sanguine in genere, simul & alterativus & laxativus, quibus plantæ amaricantes, scorbuticæ & sanguinem purificantes addendæ erunt, v.g. radix enulæ, polypodii, fœniculi, hellebori nigri, Rhabarbari, Armoraciz, &c. fumariz, carduus benedictus, veronica, Scordium, absinthium, flores acaciz, bellidis, &c.

℞. *Herb. rec. absinth.*

*Cochlear.*

*Fumar. an. M. j.*

*Flor. bellid.*

*Cisbor.*

*Cent. min. an. p. ij.*

*Fol. fenn. sine stip.*

*Rad. rec. armorac.*

*Fœnic.*

*Enula an. drach. vj.*

*Helleb. nigri crud. unc. ℥.*

*Rhabarb. el. drach. iij.*

*Galang.*

*Zedoar.*

*Cinamom. an. drach. j.*

*Pass. min. unc. j.*

*Sem. anisi,*

*Fœnic.*

*Nasturt. ana ℥ij.*

*Sal. tartar. ℥ij.*

*Incisa & contus. includ. Nodulo : S.*

*Nodulus sanguinem mundificans.*

℞. *Herb. fumar.*

*Scabios.*

*Veron. an. M. j.*

*Sol. fenn. fist.*

*Rad. Rhabarb. Monach. an. ℥j.*

*Enula,*

*Bryon.*

*Polypod.*

*Helleb. nigri crud. vel Rhabarb. el. an. ℥℥.*

*Pagul. min. cont. ℥j.*

*Cinnam. acut. vel cort. Winteran. ℥ij.*

*Sem. fœnic. ℥vj.*

*Sal. tartar. ℥ij. vel ℥ijj.*

*Incisa & contusa includantur Nodulo:*

*D. S. ut ante.*

Affundantur Mensuræ ij. *Vini Rhen.*, de quo post sufficientem digestionem omni mane aut alternis diebus, capiaturs cyathus unus, plus minus, prout operabitur à meridie, vel diebus intercalariis mane & vespere usurpentur pulveres absorbentes & temperantes, vel essentia purificantes, de quibus infra.

℞. *Herb. fumar. M. ij.*

*Scabios. M. j.*

*Fol. fenn. sine stip.*

*Rad. lapathiac. an. ℥j.*

*Enul.*

*Polypod.*

*Helleb. nigri crud. an. ℥℥.*

*Crem. tartari ℥j.*

*Sal. tartari ℥j.*

*Coqu. in f. q. aquæ fontan. in vase lenitet clauso: Colaturæ ℥℥. adde*

*Syr. violar. solut. ℥j.*

*Fumar. compos. ℥℥.*

*M. D. S.*

*Potio sanguinem purificans:*

*Vel tempore vernali:*

℞. *Flor. acac. rec. M. j.*

*Ser. lat. bubul. vel caprill. Mens. ℥.*

*Coq. leniter in vase clauso.*

De colatura bibatur mane dimidia pars, per dies 7. ad 14. continuando, & singulo manè ex florib. recentibus coquendo.

De usu seti lactis in scabie vid. AMATUS LUSITANUS Cent. 2. Cur. 74., & lactis caprilli PLATERUS pag. 542. & 543. l. 2. Observe.

Inter Sudorifera conveniunt ligna, cortices etiam, in specie ligni sancti, eorum nempe decocta, essentia, & spiritus, uti etiam partes animalium duræ philosophicè calcinatæ, e. g. Cornu Cervi sine igne, ebur sine igne &c., salia fixa & salia volatilia quæcunque, in specie verò sal volatile viperarum, & omnia ex viperis parata remedia: quibus ex regno minerali additur sulphur antimonii, cinnabaris antimonii, antimonium diaphoreticum, aliaque fixa antimonialia; nunc sociata cum aliis, nunc per se cum Rob baccarum sambuci: item tincturæ antimoniales; vid. M. A. N. C. Ann. 6. Obs. 217.

In contumacioribus malis præsertim viperina, aliaque quæ sanguinem purificant, conducunt; & aliis irritis salivatio mercurialis instituenda; sicuti in pessimo rerum statu, adeoque in ipsis leprosis, tandem ad arsenicum fixum confugien- dum erit.

Quoad sudoriferorum formulas:

℞. *Aqua fumar. ℥℥.*

*Antimonii diaphor. ℥j.*

*Sal. volat. viperar. gr. vj.*

*Syr. de succo scabios. drach. vj.*

*M. pro haustulo sudorifero: S.*

*Potio sudorifera pro 1. dosi.*

℞. *Aqua flor. samb. ℥j.*

*Spirit. rheriac. camph. drach. ℥.*

*Antimonii diaph. gr. xv.*

*Sal. volatil. viper. ℥℥.*

*Syr. cort. aurant. ℥℥.*

*M. S.*

*Ut ante.*

℞. *Aqua flor. samb. ℥j.*

*Pulv. viperin. drach. ℥. ad ℥ij.*

*Salis vol. viper. gr. vj.*

*Syr. fumar. drach. ij.*

*M. S. ut ante.*

℞. *Antimonii diaph.*

*Sal. absinth. an. ℥℥.*

*Volat. Corn. Cerv. gr. v. vel vj.*

*M. pro pulvere sudorifero: S.*

*Pulvis sudoriferus pro 1. dosi:*

℞. *Corn. Cerv. sine igne ℥j.*

*Antimonii diaph. ℥℥.*

*Sal. vol. viperin. gr. vj.*

*Laud. ferment. gr. j.*

*M. S.*

*Pulvis sudoriferus expellens.*

℞. *Antimonii diaphor.*

*Corn. Cerv. sine igne an. ℥℥.*

*Myrrh. gr. iij.*

*Sal. volatil. viper. gr. iv.*

*M. S. ut ante.*

℞. *Antimonii diaphor.*

*Corn. Cerv. sine igne an. ℥℥.*

*Myrrh. gr. iv.*

*Salis absinth. gr. vi.*

*M. S. ut ante.*

℞. *Corn. Cerv. sine igne,*

*Flor. sulphuris an. ℥℥.*

*Salis card. ben. gr. xij.*

*M. S.*

*Pulvis sanguinem mundificans.*

℞. *Extr. bals. sulphuris p. iij.*

*Antimonii diaph. p. j.*

*Corn. Cerv. sine igne p. ℥.*



M. f. pulvis.

D. S. ut ante.

De quo omni mane, quantum cuspis cultelli capit sumatur vesperi verò duabus horis ante coenam Elixir proprietatis, sine acido, vel Elixir cachecticum. Vel

R. Salis antimonii diaph. ℥ij.

Pulv. jam praefcripti. ℥ii.

M. pro 4. dosibus: S.

Ut ante.

R. Rob Samb. vel Theriac. ℥i.

Pulv. serpent. calcin. vel non calcin. scrup. i:

Sal. ammon. scrup. ss.

Cum f. q. Syr. cors. aur. f. Bolus.

D. S.

Bolus sanguinem purgans pro 2. dosi.

R. Conserv. fumar. ℥i.

Pulvis viperin. ℥ss. ad ℥j.

Cum syr. rosar. fol. i. Bolus.

D. S.

Bolus sanguinem mundificans.

Item.

R. Tinct. antimon. ex scor. par. (propter alcali commendatur) ℥ss.

D. S.

Tinctura sanguinem purificans.

Dentur pro dosi 20. 30. ad 40. gutt. bis vel ter in die.

R. Ess. viperar. ℥ss.

D. S.

Essentia sanguinem mundificans.

Dentur 20. 30. ad 40. gutt.

Item

R. Tinct. corall. cum spir. lignor. vel assafr. ℥vj.

D. S.

Tinctura corallorum sanguinem purificans.

Dosis 40. vel 50. gutt. bis in die, mane jeiuno stomacho in vehiculo calido.

R. Ol. destillat. terebinth. ℥ii.

D. S.

Oleum sanguinem mundificans.

Dof. gutt. vi. manè.

Vel sumatur Bals. sulphuris terebinth. gutt. viii. ad xv. Vel

R. Bals. sulphuris terebinth. ℥ii.

Succinat. ℥i.

M. D. S.

Balsamum sanguinem purificans.

Dosis x. ad xv. guttulas manè.

Externè conveniunt remedia ex Saturno, Mercurio, sulphure, sale tartari, calce viva, saccharum Saturni, cerussa, minium, Cosmeticum Clavil ex Bismutho paratum seu magisterium Marcasitæ, (vid. SCHROEDERUS in Pharmac. & BEGUINUS in Tyrocin. chymico) lap. calaminaris, spermaranarum, Decoctum cosmeticum Myntichtil, in Armament. Chym. pag. 377., Mercurius dulcis, mercurius praecipitatus cum spiritu nitri seu, ut vocatur ab HARTMANNO, Arcanum corallinum, liquor Mercurii saccharatus Myntichtil l. a. p. 443., essentia benzoës, Oleum nicotianæ, unguentum de liquiritia, de nicotiana, unguentum album camphoratum, de lithargyrio, unguentum emulatum, unguentum dialaterni Zvelffci emulatum & unguentum extutia, dia-pompholygos, emplastrum de Ranis cum Mercurio &c., quæ misce acidum temperant, absorbent, & mitigant.

In usutamen sulphuris & mercurii, nec non unguento- rum saturninorum observandum, ut pori corporis probe aperti maneant, ne fermentum externo illitu repulsum totam massam sanguineam inficiat, pro quo scopo sulphuri semper sal tartari vel aliud alcali adiungendum: E.g. sit sequens ungu. ad scabiem mihi perquam familiare:

R. Ungu. emulat. vel pomphol. vel album vel deliquirit.

Camphor. ℥vi. ad ℥i.

(vel ungu. emul. & alb. camph. an. part. æqu.)

Flor. sulphuris ℥ii. vel ℥iii.

Sal. tartari ℥i. vel ℥ss. (vel ol. tartar. per deliq. ℥ii.)

Cum f. q. Ol. hyperic. vel nicot. f. Linimentum: D. S.

Unguentum mundificans.

Addi huic pro lubitu & gratia odoris possunt

Bals. Peruv. ℥ss.

Ol. ligni rhod. gutt. vi.

Hoc ipso illinantur saltem iunctura brachiorum & pedum,

v.g. articulationi tali, genuum, carpi, & intersticia digitorum, vesperi sub introitum lecti, & corpus bene lectum conservetur: manè manus possunt ablui urinâ propiâ calidâ relicto in pedibus linimento, reiteretur hoc ipsum tamdiu donec malum evanescat. Postmodum ubi evanuerit scabies, ut vestigia rubra deleantur, abluantur manè & vesperi cum aqua calcis vivæ. Vel

R. Ungu. de liquirit. vel

Dia-Saturni Zvelff. ℥vj.

Ol. laurin. ℥iiij.

Pulv. bacc. laur.

Flor. sulphuris, vel sulphuris comm. pulv., an. ℥ij.

Sal. tartar. ℥i.

Cum f. q. Ol. hyperic. f. Linimentum.

D. S. ut supra.

Ubi contumacius fuerit malum, ad mercurialia fiat accessus.

R. Ungu. nicotian. vel pomar. ℥ss. ad drach. vi.

Flor. sulphuris drach. ij.

Mercurii dulc. drach. j.

Cum ol. nicotian. vel jasmini f. Linimentum.

D. S. ut supra.

R. Ungu. alb. camph. vel emulat. vel diapomph. drach. j. ad drach. i ss.

Mercur. dulc. drach. ii. vel i ss.

(vel arcan. corall. ℥ss. ad drach. ss.)

Cum Ol. Nicot. f. Linimentum circa articulos manuum ac pedum inungendum.

D. S. ut supra.

Hæc ipsa præter scabiem etiam in pruritu partium, in serpiginè, Germ. in den Schwinden, it. in lichenibus & similibus cutaneis corporis affectibus, commodissimè usurpari possunt. Auetur vel imminuitur sal tartari quandoque propter nimiam acredinem. Item

R. Unguent. rosar. ℥iiij.

Mercur. praecipit. ℥iij.

M. pro Linimento.

S. ut supra.

Quod etiam externè in gravioribus malis usurpari potest

R. Ol. tartari per deliq. ℥ij.

Amygdal. dulc. q. s.

M. pro Linimento externo.

D. S. ut supra.

Facit etiam hoc Decoctum calcis vivæ polychreston in cutaneis affectibus pro partium affectarum ablutione:

R. Aqu. calcis vivæ ℥ij.

Sulphuris comm. pulv. ℥ij.

Ebulliant invicem aliquandiu:

Colaturæ adde

Aqua rosar. ℥iv.

M. D. S.

Aqua mundificans.

Hæc aqua eluantur membra scabiosa, it. genuum & cubiti articulationes: permittantur sponte siccari, & evanescet scabies & maculae atque pustulae ab hac relictae; & convenit hæc Lotio etiam, si partes Scabie affectæ tumore oedematoso tumeant. Præsertim aqua subsequens est egregiæ virtutis; sc.

R. Decoct. calcis vivæ ℥ij. ad ℥ss.

Mercurii dulc. ℥i. vel ℥ij. ad ℥ij.

Spirit. theriac. camphor. ℥j.

M. pro lotionè partium externarum in scabie ferina, quam sola repetita lotio curat.

D. S. ut supra.

Odoris gratiâ aqua rosarum, interdum etiam sacchari Saturni ℥ss. vel ℥ij. addi possunt: loco cuius etiam

R. Merc. vivi purif. qu. v. c. g. ℥iv.

Ebulliant in ℥iv. aqua simpl. aliquandiu:

Colaturæ ℥ij. vel i ss. S. ut supra.

Quæ solâ partes abluendo, præsertim manus, scabies evanescit.

Qui verò potentius volunt, addunt Mercur. dulc. drach. j. vel drach. i ss. ad drach. ij., & ita calidè utuntur.

Secretum in omni scabie est aqua destillata stercoris humani, lavetur locus, expertissimum est: Item laventur manus in vivo coriariorum calido: felici cum successu vidi usutpatam in scabie ferina puellæ, internè adhibendo simul Essent. viperarum. Denique ungu. auratum, elegans in Alopecia leprosa, quod videb. in M. A. N. C. Anr. 6. Append. p. 179., non inelegans erit.

Sunt qui in remediis externis contra scabiem, it. in aliis similibus pro usu cosmetico externè non raro adhibent Mercurium sublimatum, sed pessimo cum consilio: nam præter alia



alia mala incautus adhibitus dolorem inflammatorium, pustulas, & vesicas ingentes, acrimoniâ suâ corrosivâ, acidâ excitat; vid. M. A. N. C. Ann. 8. Obs. 77. in quo casu optimus est fons lactis tepidi; cessantibus postmodum doloribus, convenientissimum est adhibere aquam calcis vivæ. Aliquando Studiosus ex liquore mercurio imprægnato contra scabiem ex affictione ejus dolorem & tumorem brachii & manus à cubito addigito usque incurrit com crudelissimo dolore; unde præscripsi:

℞. Aqua calcis vivæ ℞j.

Spiritus vini ℥j.

Ceruf. drach. iij.

M. D. S.

Cataplasma leniens.

Applicabatur calidè & optimè contulit:

In casibus pertinacioribus etiam cingulum mercuriale concedendum, de quo vid. BARTHOLINUS C. 3. Hist. 79. cui FONSECA L. 2. Conf. 18. suffium cinabarinum addit, probè tamen prius purgato & contra frigus præmunto vel sub sudore detento corpore: effectus enim ex mercurialium abusu satis deploratos experientia testatur, quos etiam ab aliis externis intempestivè applicatis contigisse Modicorum observationes cum quotidiana experientia testantur: exemplum ab ungu. ex arsenico videbitis in AMATO LUSITANO Cent. 2. Cur. 33. & ab ungu. ex lutharg. in ZACUTO LUSITANO l. 1. Præcos.

Notandum quoque, quod in Scabiæ critica nulla remedia externa applicanda, sed solummodo remediis internis diaphoreticis insistendum esse. In Scabiæ autem forsitan retro-pulsa, & inde natis gravibus symptomatibus, optimè conveniunt viperina, cist. viperarum, sal ejus ad ℥j. cum ℥j. Syr. fumariz.

Tandem etiam in usu sunt Balnea pro delenda scabiè, quæ etiam in Scabiæ critica concedi possunt, ex chamomilla, malva, meliloto, hyperico, nicotiana, scabiosa, fumaria, persicaria, lapathio acuto, enula, laponaria, parietaria & similibus appropriatis: e. g.

℞. Herb. lapathias. M. iv.

Nicot.

Scabios. an. M. ij.

Rad. lapathi ac. ℥iij.

Enula ℥ij.

Bryon. unc. j.

Sulphuris crud. unc. vi.

Calcis vivæ ℞ij.

Incisa & contusa D. S.

Species ad Balneum.

Coqu. in f. q. aquæ moderato igne pro Balneo.

Prius sudet æger cum Cornu Cervi sine igne in rob Sambuci, vel cum Essentia lignorum, dein insideat huic, corpus fricando & à sordibus repurgando; post cum linimento appropriato illinendo. Item:

℞. Herb. fumar.

Nicotian.

Persicar.

Scabios. an. M. ii.

Rad. enula,

Lap. acuti an. unc. ii.

Bryon. unc. i.

Pulv. sulphuris ℞ij.

Nitri,

Calcis vivæ an. ℞ss.

Concisa & Contusa d. ut supra.

Coqu. in aqua dulc. cum ana lixivii acuata, moderato igne benè agitando, F. Balneum.

Vid. HORSTIUS pag. 325. & 327.

Item

℞. Herb. lapathi ac. M. iv.

Parietar.

Saponar. an. M. ii.

Rad. lapathi unc. vi.

Bryon. unc. iii.

Sulphuris vivi unc. ii.

Calcis vivæ rec. ℞ij.

M. D. S.

Species ad Balneum.

Coquantur in aqua simpl. addendo parum lixivii.

## MEMBRUM II

### DE

### PRURITU.

**P**RRURITUS est Scabiæ symptoma individuum, & futuræ signum certissimum.

### CAUSÆ.

Causa pruritum excitans est serum acido-salsum, cujus acrimonia à causa Scabiæ in hoc differt, quod illa tenuior & subtilior sit, atque per minima magis inter cuticulam & cutim se insinuet. Oritur tamen etiam interdum à causa externa, ab urticarum & formicarum contactu, culicum & pediculorum, nec non sironum morfu, item à ligatura stri-ctiore in fracturis & luxationibus.

### DIAGNOSIS.

Diagnosopus non habet, cum malum hoc somnum & alia negotia maximè impediat.

### PROGNOSIS.

In Prognosi nihil peculiare occurrit, nisi quod pruritu diutius vexati scabiæ tandem afficiantur.

In decrepitis incurabilis est: vid. VALESCUS de TARANTA in Chirurg.

### CURA.

In cura si malum sit à causa interna, & quidem totum corpus affligat, conveniunt acrimoniam temperantia. Ante omnia verò purgetur corpus mercurio dulci: e. g.

℞. Conf. rosar. ℥j.

Mercur. dulc. gr. xv.

Res. jalapp. gr. vi.

Scamm. sulphurac. gr. i. vel ij.

Cum syr. fumar. f. Bolus: S.

Bolus sanguinem mundificans.

Non minus etiam conducunt Noduli purgantes, & omnia purgantia iam Membro præced. in scabiæ laudata.

Purgatio sic corpore in Plethoricis V. S. institui potest: post sudorifera temperata etiam acrimoniam salis absorbentia, in scabiæ pariter jam laudata, imprimis ex Antimonio diaphoretico Martiali, Cornu Cervi sine igne, cinna-bari antimonii, &c. præscribenda. Ubi verò pars tantum una vel altera pruritu molestat, unâ cum sudoriferis iam dictis conveniunt omnia externa in scabiæ laudata. Vel fiat Linimentum Rondeletii:

℞. Rad. lapathi ac.

Helen. an. unc. i.

Decoqu. in aceto ad mollitiem:

per Setaceum traiectis adde

Ol. irin. unc. iij.

Salis comm. unc. j.

Myrrha ℥ij.

Lithargyr. unc. iß.

Cera parum

F. l. a. Linimentum.

In malo pertinaciori dictis aliquid mercurii dulcis addi potest, imprimis si malum oriatur à sironibus, in quo casu simul Decoct. colocynthidis applicari solet.

Si à ligaturis diuturnioribus aut strictioribus, pars tantum lavetur cum aqua tepida: si à formicis vel urticis, præter frictionem cum gleba terræ receti, convenit lac tepidum, Decoctum malvæ, aqua sperm. ranarum, vel unguentum diapompholygos, de Tutia, &c. quibus Sacch. Saturni addendum.

Post scabiem & Pruritem sequitur Lepra.



MEMBRUM III.

DE

LEPRA.

**L**EPRA olim abominabilem affectum fuisse, tam ex Sac. Script. quam aliis autoribus constat. Nostro autem seculo cum Scorbutus & lues Venerea ubique ferè se infnuent, Lepra ipsa est rarissima, cum vel sub nomine luis Venereæ, vel ipsius scorbuti lateat. Imprimis convenit cum scorbuto confirmato, utpote quem, malum contagiosum, ab Acido quodammodo corrupto & corrodente ortum, ex Art. 6. & inde ortis symptomatis patet. Aliàs etiam Plora dicitur, & Elephantiasis Græcorum. Ab Elephantiasis Arabum in hoc differt, quod hæc particularis tantum, & senes vino liberalius indulgentes plerumque invadens, affectus quidam sit, pedum nempe tumor rubicundus, lividus seu nigricans. cum ulceribus varicosis, è quibus serpon acre limpidum effluit; interdum etiam solæ crustæ fursuraceæ totos pedes occupant: Illa verò universalis. Vocatur Elephantiasis, quia hæc ipsa affectu tumida cutis, rugosa & aspera, Elephantum instar, apparet. Aliàs etiam vocatur Satyrismus, vel quia nares & labia tumida, aures tabidæ, genæ rubentes, & in fronte excrecentiæ quædam instar cornu hinc inde protuberant, quali facie Satyri pinguntur; vel quod leprosi in principio morbi maximè libidinosi dicantur. Item Leontiasis dicitur; vel quod Leprosi vultum terribilem & frontem rugosam leonum instar acquirant; vel quod eorum anhelitus & excrementa leonem huiusque excrementa oleant. Nihil est aliud, quàm summus & contumacissimus Scabiei Scorbuticæ gradus; unde Scabies & Lepra ab ÆGINETA conjunctione tractantur; in Lepra tamen longè major & habitualis succi nutritil corruptio est, quam in Scabie, adeo ut, quando in hac cutis instar fursuris separatur & decedit, hæc in Lepra squamarum piscium instar decidat, quatenus in hac non tantum cutis, sed etiam subjacentes partes carnosæ exulcerantur: unde & scabies ferina & inveterata in Lepram degenerare solet.

CAUSÆ.

Causa Lepre cum Scabiei causa communis est, longè tamen gravior: salsedo nempe feri muriatica & corrosiva, in specie acido-salsa. Veteres bilem atram, singulariter malignitate præditam accusant; ratione cujus quidam Lepram Cancrum universalem non ineptè dicunt, quatenus eadem ferè causa cum cancro particulari concipi potest, nempe salso-acidum quoddam corrosivum, & partibus solidis maxime infestum: unde acidum absorbentia Lepram mitigant acidorum, contra abusus eam fovet & auget.

DIAGNOSIS.

Circa Lepre Diagnosis Medicus sit cautus & prudens, ne signo uni ac soli credat, sed iudicium dirigat ad signa plura, tam propria, quàm communia; adeoque secundum illa quidem iudicet, secundum hæc verò maximam partem. Colliguntur autem signa hæc vel ab antecedentibus, vel conjunctis. Quoad Antecedentia: Medicus imprimis investiget ex ægri parentibus, consanguineis & agnatis, an horum aliquis lepræ, vel cachexiæ congeneri enormiore laboraret: cum contagium hoc interdum ad tertiam & quartam usque generationem propagari soleat: deinde attendatur vitæ genus, an æger, aut parentum aut consanguineorum quidam cum leprosis degerit? quo videtur & quali diæta utatur? an quartanâ, manîâ, aliisque similibus morbis olim laboravit? an hæmorrhoides, menses vel alia solennis quædam evacuatio, ipsi aliquandiu suppressa fuerit, aut adhuc supprimatur? Ex quibus conjecturæ artificiales formari possunt, ægrum ad Lepram esse dispositum, adeo ut, licet jam nondum leprosus, lepra tamen metuenda sit.

Quod signa concomitantia attinet; hæc sunt vel interna, vel externa. Interna sunt in principio ructus crebriores & molesti, cruditas acida vel nidorosa, alvus obstructa: quibus progressu temporis superveniunt oris & faucium siccitas, sitis intensa, sudor graveolens & fætidus, urioxa subjugalis, cui si juxta LEVINUM LEMNIUM calx saturata injiciatur, hæc fundum ejus non petat, sed supernatet; sunt libidinosi: sanguis venæ sectione educus solet esse fætidus, Etzmull. Oper. Tom. II.

crassus, viscosus & unduosus, adustus, nigrescens aut lividus, sæculentus, & pingui quasi crustâ obductus, qui digitis aut manu agitatus arenæ instar stridet & tactu asper apparet; per pannum verò colatus arenulas, granula & nodos quasi post se relinquit; à granis aliquot salis superinjectis mox dissolvitur, ab aqua verò non adeo facillè diluitur, sed potius cum hac instar gelatinæ congelatur: vid. MARR-CELLUS DONATUS Histor. Mirab. l. 1. c. 4. Pulsus præterea frequens est & debilis, respiratio difficilis, & fætida, ut in phthisi, dyspnœa & asthma, & fætida, & interdum ægri per nares quasi videntur loqui. Accedit his in malo confirmato segnities & lassitudo totius corporis, facilis in frigidatio, abolitustactus, remanente tamen motu; vid. PARÆUS l. 19. c. 7. ut ut ægri interdum pruritus formicarum repertum ad instar percipiant: somnus est gravis cum insomniis turbulentis & incubo, ac si cor eorum claudatur & comprimatur; imò tandem pusillanimiæ quædam supervenire solet.

Inter signa externa apparet cutis, nunc ad colorem lividum & nigrum vergens, nunc flavescens & ex rubro nigricans: vid. VALERIOLA l. 6. Enarrat. 5. Aeri exposita mox corrugatur, exasperatur & infrigescit; tota apparet unduosa, ut aqua ipsi inspersa vix hæreat; sensim crassescit, rugosa & asperior redditur; fursure nunc purpureo, nunc albicante, ac si calce incrustata esset, imprimis in facie adpersa videtur, multisque nodositatibus, tuberculis mobilibus & indolentibus, potissimum pone aures, circa frontem, mentum & artus, descedatur, & morphæa, impetigine & scabie sicca pertinaci, aliisque pustulis afficitur; vid. HILDANUS Epist. 24. Unde etiam continuus, & continuè exinde ortæ vigiliæ, pruritus, ac si acubus pungantur, aut urticæ percussæ essent, aut vermibus roderentur, Leprosos maximè urget; & dum partes cutaneas unguibus scalpunt, paucissima saltem aut nulla materia, neque serosa, neque purulenta, promanat, partesque cutaneæ erose, mox exsiccantur, nec crustâ quadam obducuntur. Cum his simul observatur capillorum defluvium, superciliorū, pilisque veris interdum parvi, lauginis instar, succedunt; frons est rugosa & toberosa, aures tense, earumque pinnae tumidæ; vid. HILDANUS l. a. Supercilia sunt elevata & callosa, & pilis aut desstuntur, aut si evellantur, aliquid cutis & carnis in radice hæret: Oculi juxta GVIDONEM de CAULIACO sunt rotundi, rubicundi, scintillantes & lachrymantes, qui venas tumidas & intra angulos tubercula grandinosa, aut juxta Hildanum l. a. in angulo majore pelliculam acquirunt. Narium extrema dilatantur, superior pars constringitur & coarctatur, in medio cartilaginis corrosio apparet, una cum ozænis, fœtore, polypo, respiratione per nares intereptione, & copiosa sternutatione; nec non palati atque uvulæ erosionem: Labia cum facie pallent, crassa, dura, nigricantia, livida, & fissa comparent; in ore & faucibus hinc inde observantur tubercula flavescencia & sublivida; lingua tumet, nigrescit & fœditur, cujus venæ inflantur & varicosæ evadunt cum tuberculis grandinosis & durioribus albis, viridibus vel lividis: sicuti etiam gingivæ præter modum pallent, tument & rubent, asperæ & corrosæ apparent: saliva maximè est viscida & quali biliosa: Mammæ sunt duræ & tument cum venis varicosis: artus non solum marcescunt, sed etiam in pedum plantis & digitorum interstitiis, nec non in manibus præ cubitum, aliisque artuum locis, fissuræ & ulcera callosa, prætumida, & ad levissimum contactum cruenta, ut plurimum tamen indolentia, deprehenduntur: manuum muscoli, maximè pollicis & indicis, consumpti sunt; ipsique manuum ac pedum digiti frigus & dormitationem, & quasi quandam sensus privationem patiuntur; articuli horum sunt nodosi & distorti, ungues verò lividi, nigri, incurvi & fissi.

PROGNOSIS.

Lepa inveterata incurabilis est: de incipiente verò, à mala diæta aut contagio orta, per diætam accuratorem & remedium generosorum diuturniorem usum aliqua spes adhuc affulget: sicuti Lepre incipientis sanæ exempla videbitis apud Aretæum l. 4. de sign. & caus. morb. c. 12. GALENUM l. 1. c. 12. & HORSTIUM 7. Obs. 18. & 21. unde forsitan rariora sint. Conf. LAURENTIUS de Lepa 18. & PALMARIVS de Lepa c. 4. Sanguis in lepra fætidus & nigrescens: item serpigo & impetigo in manuum ac pedum digitis, cum pilis parvis ascendentibus, malum signum sunt.



## C V R A.

In CVRA sanguis purificetur, tam per evacuantia, quàm sudorifera, & alterantia scorbutica.

Quoad purgantia; propinentur primò mitiora, hinc potentiora & generosiora, qualia suprà de Lue Venerea & scabie fuerunt proposita.

Purgentibus succedunt sudorifera, quæ inter primum locum tenent Viperæ, quas commendat ARETÆVS l. a. & GALENVS l. 11. de simpl. Med. Facult. c. 1. quarum quidem virtutem idubium vocat ERASTVS 4. Disp. contra Paracels. ZACUTVS LVSITANVS l. 1. de Med. Princ. Hist. 5. & PALMARTVS de Elephant. cap. 9. Commendantur autem Theriaca benedicta viperina, pulvis, Ess. & sal volatile viperarum, sal volatile cornu Cervi, spiritus salis ammoniaci, sal volatile & Quinta Essentia sanguinis humani, tinctura Antimonii, coralliorum, antimonium diaphoreticum Martiale, sulphur antimonii auratum. Vbi remedia aliàs usitata & vulgaria non valent, tandem ad arsenicum fixum confugiendum est, quo mediante Doctor RHEFELD leprosum quendam restituit, præmissis digestivis & laxativis per alvum. Nempe dedit sequentia:

℞. Mayr perlar. calc. ℥ij.

Salis fumar. ℥j.

M. f. pulvis.

divid. in 2. part. æqual. S.

Pulvis incidens.

℞. Mercurii vit. egr. iv.

cum Theriaca fecit Bolum. S.

Saccharum purgans.

Quibus præmissis ad arsenicum accessum.

℞. Recrement. uvæ. qu. v.

Redigantur calcinando in cineres, & quibus more solito silixivium, ad dimidium porro incoquendum:

℞. Hujus lixiv. Menf. iv.

Arsenic. albiss. ℔i.

Coqu. in olla per horam unam aut alteram, semper lignea spatula movendo, donec ferè sit consumtum lixivium; sic fiet massa spongiosa: tunc novum affundatur lixivium, & coctio repetatur; sic mox arsenicum, erit resolutum, quæ solutio decantetur in aliud vas purum, in quo pro præcipitatione addatur sequens:

℞. Ceruss. ℔ij.

Acet. destill. q. s. ad solutionem, quæ filtretur.

Hac solutione tantum præcipitetur; quantum possibile, edulcoretur, & exsicceetur.

Exhibuit doles 8. per tot dies, incipiendo à gr. ℥ij. singula aurora gr. j. augendo, & ad ℥ss. assumendo. Potest sumi in Theriaca in forma Bol., vel cum antimonio diaphoretico, & paucis sacchari in juscule vel cerevisia calida, bono semper sequente sudore.

Post balnea & scarificationes simul aliquoties adhibitas squamæ deciderunt, & ita ager sanitati fuit restitutus. Alterantia denique sunt vel interna vel externa. Inter interna eminent ea, quæ Membro 1. de Scabie dixi, & omnia Absorbentia, ut sunt corallia, conchyliæ, lapilli cancerorum, antimonium diaphoreticum simplex & compositum, alique hujusmodi pulveres: quibus & plantæ hepaticæ & spleneticae adungi possunt, e.g. fumaria, eupatorion, chelidonium, de quo vid. HAFENREFFERUS de Affectibus cutis p. 128. Scorzonera seu Viperaria, quæ à ZACUTO LUSITANO laudatur: tinctura tartari simplex & antimoniatæ. De carne asini pulli comesta vid. BARTHOLINUS Cent. 6. Hist. 31. utut carnis hujus esum AMATUS LUSITANUS C 2. Cur. 34. inter causas Lepre externas referat: milvi caput combustum laudatur in SENNER TO Tr. cap. 5. p. 177. sanguis leporis, & cinis leporis item fel & sanguis accipitris: vid. HAFENREFFERUS l. a. p. 130.

Externæ profunt Balnea in Scabie commendata, aut juxta RULANDUM cap. 4. p. 411. ex plantagine, pilis, & foliis quercus, & quod WECKERUS in antidot. Special. l. 2. pag. 604. describit; Unguentum ex succo lapathi majoris Hafenrefferi, unguentum medicamentosum Mönichstii, & oleum sulphuris Rulandi, de quo l. a. Quidam Theriacas commendant, quibus tamen contradicit HAFENREFFERUS l. a. p. 127. & ZACUTUS LUSITANUS loco allegato.

## M E M B R U M I V.

## D E

## E L E P H A N T I A S I A R A B U M.

ELEPHANTIASIS ARABUM ejusque Causæ, item quomodo ab Elephantiasi Græcorum seu Lepra differat? Membro anteced. 3. dixi. Effectus ut plurimum est Criticus; ideo in Cura cavendum ab externis repellentibus, ne sero acriore effluente intempestivè cohibito, & transpiratione insensibili impedita, per metastasin ejus Asthmata, Catarrhus suffocativus, peripneumonia, hydrops pectoris, lethargus, similiaque mala, quæ aliàs à Scabie retropulsa aut ulceribus crurum intempestivè occlusis oriri solent, excitentur.

## C U R A.

In Cura, feri acrimonia temperetur, ejusque colluvies purgantia evacuetur, pro quo scopo confert Mercurius dulcis, jalappa, & omnia suprà membro I. in Scabie laudata. Item

℞. Herb. fumar.

Scordii,

Nummular. rec. an. M. j.

Flor. hyper. Mij.

Rad. enul.

Caryophyllat. an. ℥vj.

Cort. ligni guajaci ℥j.

Sem. anisi.

Fenic. an. ℥iij.

Incisa & contusa includantur Nodulo:

D. S.

Nodulus sanguinem mundificans.

Affundantur Vini Rhenani Menf. ℥j. de quo mane & à meridie bonus haustus capiatur.

Quod si nodulus hic laxare debeat, folia fennæ, helleborus niger, & colocynthis addi possunt.

Externæ conveniunt absorbentia Saturnina, Martialia, & Venerea; unde applicari potest emplastrum griseum seu de lapide calaminari, vel emplastrum de spermate ranarum camphoratum Cnosselii in Append. M. A. N. C. Anni 6. & 7. Tit. 23. p. 186. omniaque in Dissert. de Usu & Abusu præcipitant. cap. 3. §. 2. allegata; item Emplastrum de Alcalib. Tachenii in Morb. Princ. pag. 117. vel ad hujus imitationem concinnatum emplastrum mirabile Meibomii sequens:

℞. Ol. Olivæ. ℔ij.

calefacto adde

Sapon. Venet. ℔ss.

Cerussa alba pulverisat.

Minii cribr. an. ℔j.

Coquantur leni igne in emplastri consistentiam, circa finem addendo

Camphor. ℥ij.

Convenit quoque emplastrum Saturninum polychrestum, quod videbitis in Colleg. Formular. p. .... item en. plastrum nigrum Helmontii.

Pedes autem simul fasciis involvantur, incipiendo à talis usque ad genua.

Quod si inflammatio erysipelacea juncta, quod non rarò accidit, à diutis emplastris abstinendum, donec inflammatio hæc debitis remediis, de quibus suo loco, discussa fuerit.

## M E M B R U M V.

## D E

## S E R P I G I N E &amp; L Y C H E N E.

Affectus hi maximè sibi sunt cognati, & gradu tantum differunt. In lychene enim, Germ. Schwinden, Flechten, Zittermale, cutis est aspera cum pustulis hinc inde erodentibus, crustis furfuraceis, & cum summo pruritu ad partes vicinas serpentibus; in serpigine verò, vulgò Genidiæ in verme, sive verme dormiente, asperitati & pustulis cutis dolor & ardor conjuncti sunt, unde etiam CELSO Ignis sacer vocatur, & serpendo pariter se extendit, hinc etiam vulgò scabies serpens dicitur. Pustulæ hæc, si summitatem tantum cutis erodant, Herpes miliaris; si verò cutis tantum profundiora exedant, Papula fera seu Herpes exedens, item à iatro vocatur. BONTIUS quidem de Med. Indor. Obs. 16. Serpi-



Serpiginem cum Lychene confundit, dum serpiginem per pruritus definit. Verum licet in Lychene nulla symptomata graviora conjuncta sint, certum tamen est, quod in serpiginem major acrimonia, adeoque maior sanguinis & feri dyscrasia peccet.

## C A U S A.

*Causa Serpiginis & Lychenis* est eadem ac de scabie dixi, serum nempe acido-salsum circa glandulas subcutaneas effusum; utut hulus acrimonia ab ea, quæ in scabie peccat, specificè differat, adeoque pro varia cutis textura nunc scabies, nunc serpigo & lychen oriatur.

## P R O G N O S I S.

Serpigo & Lychen sunt sine periculo.

Lychen facillè curatur, difficulter autem Serpigo.

Item si totum corpus ab hac defœdatur, lethalis esse solet, dum simili quoque ratione interiora & exteriora eroduntur.

## C U R A.

In *Serpigine & Lychene* Massa sanguinea purificanda & alteranda; unde etiam eadem methòdo per purgantia, in specie pilulas Mercuriales, & sudorifera instituenda, ac supra *Membro 1.* in scabie dictum fuit; quibus etiam, in casibus desperatis salivatio adjungenda; quod etiam fonticuli pertinent.

Quoad alterantia, præter supradicta in scabie, in Serpigine conducunt Saturnina, in specie saccharum Saturni, balsamus Saturni, tinctura antiphthif. D. Michaelis. Quoad *Externa*, sunt hæc vel blandiora, vel magis potentiora. Inter blanda laudantur in Serpigine & Lychene aqua sperm. ranarum, flor. omnium, calcis vivæ vel solitaria, vel cum saccharo Saturni mista; oleum ovorum, nicotianæ, ceræ, radix lapathi acuti cum aceto in formam Linimenti subacta; Linimenta ex oleo tartari per deliquium, cerussa & camphora; vel linimentum butyriforme BORELLI c. 4. *Observat.* 88. ex oleo tartari per deliq. cum oleo lillorum alborum, amygdalarum dulcium & aliquot granis camphoræ. Vel subigatur fortius lixivium cum oleo baccarum sambuci expresso, donec lactesceat, & applicetur; lixivialia enim Acidum in glandulis subcutaneis stagnans destruit & invertunt. Vnguentum album camphoratum, nicotianæ, à SCVLTETO *Armament. Chirurg. Observ.* 89. laudatum; Vngu. nobile Mynsichti, dia-pompholygos, de Mercurio dulci, saccharum Saturni, tutia. Vel

24. Unguent. nicot. vel rosat. ʒij.

Mercurii dulc.

Olei tartari p. d. an. ʒij.

Cera vel sapon. ʒj.

M. D. S.

Unguentum purgans.

Alias quoque sapo Venerus cum spiritu vini rectificato subactus instar lactis, ac cum linteis inde madefactis applicatus Lychenem tollit, quibus & amalgama Saturni admisceri potest, ad quod imprimis pertinet mumia Saturnina cum unguento digestivo, à *Poterio* P. 3. *obs.* 65. & 80. commendata, & in *Pharmac. Spagyric. Append.* descripta; item empl. ex Saturni saccharo, de ranis cum Mercurio, & omnia externa, sup. *membro 1.* in scabie laudata. Inter potentiora sunt arcanum corallinum, Mercurius sublimatus albus, turpethum minerale, aqua divina Mercurii, liquor Mercurii saccharinus, & liquor Mercurii acetosus Myol., hujus unguentum medicamentosum, unguentum secretum Riverii ex unguenti rosac. ʒj. & Mercurii sublimati ʒj. Vel

24. Aqua calcis vivæ ʒij.

Mercurii sublimati ʒij.

M. D. S.

Aqua purgans.

Cui etiam ʒss. vel gr. xv. camphoræ addi possunt.

Instar epithematis applicetur.

Vel applicantur Epithemata in *Colleg. Form.* p. .... laudata.

In dolore serpiginis enormiore leniendo convenit *Mixtura RIVERII* ex pulp. pomor. putrid. No. vj. cum ʒij olei rosarum, & paucis lactis muliebris: vid. *Observ.* pag. 279. &c.

Notandum adhuc, quod Imperigo seu Lychen in senibus, nec non vino indulgentibus, criticè quasi efflorescat & integros artus, maxime pedes, occupet, quo in casu ratione externorum eadem cautela observanda, quam heri in *Mem-*

*Estnull. Oper. Tom. 11.*

bro 4. de Elephantiasi Arabum audivisti. Prodest in hoc casu Epithema seu Fotus ille elegans contra erysipelata in *Colleg. Formul.* p. .... ex lithargyrio, myrrha & olibano cum vino & aceto laudatus. Aliàs cortex medianus sambuci recens contusus & calidè applicatus, egregiè etiam convenit.

## M E M B R V M . V I

## D E

## P H L Y C T A E N I S.

*Phlyctæna* seu *Phlyctenes*, Germ. die hirtige Blattern, sunt vesiculæ parvæ pruriginosæ, & ferventes, sero limbo repletæ, quæ intra digitos & circa carpos oriri solent.

## C A V S A.

*Causa proxima* est serum plus minus acre sub glandulas miliaris seu subcutaneas.

Remota est frigidus, post ignis aut balnei calorem subito admissum, aut quando aliquis ex loco æstuoso, aut post vehementiora corporis exercitia cum sudore, aeri frigidiori se exponit.

## P R O G N O S I S.

Pustulæ hæc, uti celerrimè generantur, ita citò & intra biduum ad summum evanescent: interdum tamen in scabiem & serpiginem degenerant, imprimis quando nimia feri acrimonia peccat, vel phlyctænæ ex inepta externorum applicatione retropulsæ fuerint.

## C V R A.

In Cura conveniunt purgantia & sudorifera. Quoad Purgantia:

24. Crem. tartar. ʒss. vel gr. xij.

Nitri antimoniæ.

Antimonii diaphor. an. gr. vj.

Scamm. sulphurat. gr. iv. vel v.

Olei destillat. fenic. gntt. j.

M. f. pulvis: S.

Pulvis sanguinem purgans.

24. Salis absinth. vel nier. antimoniæ.

Antimonii diaphor. an. gr. xij.

Pulv. jalapp. ʒss.

Scamm. sulphurat. gr. ij.

M. f. pulvis.

S. ut ante.

Vel in forma pilularum:

24. Extr. cathol. vel panchym. Croll.

Mercurii dulc. an. gr. xv.

Scamm. sulphurat. gr. ij.

\* cum ess. fumar. f. pil. D. S.

Pilulæ sanguinem purgantes.

Inter sudorifera conveniunt, quæ feri acrimoniam simul temperant, v. g. cornu Cervi ustum, & sine igne præparatum, pulvis diaphoreticus Ludovici, antimonium diaphoreticum simplex & Martiale, Bezoardicum minerale, cinnabaris antimonii &c. cum Rob sambuci, theriaca, &c. Vel

24. Aquæ fumar. vel scab. ʒij.

Antimonii diaphor. ʒij. ad ʒj.

1. Bezoard. mineral. ʒj.

Syr. ex toro citro vel rubi idai ʒj.

M. D. S.

*Mixtura sanguinem purgans pro aliquot vicibus.*

Capiatur pro duabus vel tribus dosibus, vel cochleatim pro scopo temperandi. Externè conducunt in principio mucilaginosi temperantia, v. g. mucil. sem. cydoniorum, psyllii, sennæ, nigræ, lini, &c. cum aqua sperm. ranarum extractæ; progressu verò temporis aqua calcis vivæ, ung. de lithargyrio, diaponpholygos, album camphoratum, Linimentum Saturninum Zvvelfferi, vel per se, vel mixta cum amalgamate Saturni: Vel

24. Olei jasmin. vel amygd. dulc.

Aceti Saturn. (ex infus. minii vel litharg. cum aceto parat.)

an. part. æqual. vel q. f.

Mista agitentur probè in consistentiam Linimenti.

D. S.

Unguentum refrigerans.

Vel

Hh 3

24. Crem.



*Mercurii sublimati 3℔.*

*Alumin. 3j.*

hinc vase probe clauso coquatur per horam integram; dum refrigerit, adde

*Camp. gr. xv.*

& tecto vase leviter ebulliant, & ita sponte refrigerari permittantur.

Liquor hic usurpatur, illinendo successivè partem unam post alteram variis affectam; abusu enim huius aquæ continuatè Vari in pustulas, Variolarum instar, efflorescunt, & successivè squamatim decidunt cum insigni dolore: quò facto hic liquor cum ana vel duplo aut etiam triplo aquæ communis temperandus, & ne amplius redeat, præservativè usurpandus. Nec inelegans est essentia benzoës camphoræ, quæ aquæ florum fabarum vel spermatis ranarum ad lactescentiam instillata facies ac mentum sæpe lavari potest.

Denique Oleum vitæ cum melle rosato experimentum est *Timi à Guldenklec in Casl. 6. cas. 19. p. 20. contra varos.*

## M E M B R V M X.

### D E

## L E N T I G I N I B V S.

**L**ENTIGINES, Germ. *Sommer-Sprossen*, sunt maculæ obscure flavoscentes, magnitudine lentis, & ut plurimum totam faciem, collum, pectus, ac manus defordantes.

## P A R S A F F E C T A.

*Pars affecta est cutis & cuticula; & quidem certa illius in facie ac manibus textura.*

## C A U S A.

*Causa proxima est vel interna, vel externa, vel utraque simul. Causa interna est serum nutritium in valvularum lymphaticarum interstitiis, intra cuticulam & cutim partium, calori solis expositarum, stagnans: Inter causas externas notissima est solis ardor, dictum serum in partibus cutaneis, imprimis faciei ac manuum poris, in gelatinam quasi coagulans & exsicicans; unde æstivo tempore suboriuntur, hyberno verò iterum evanescent. Quod verò certa quedam cutis textura imò certa forsàn seri nutritii textura, concurrat, probare videtur, quod si quoque, qui radiis solariibus non adeò exponuntur, & imprimis capillis rufis præditi, lentiginibus ut plurimum afficiantur.*

## P R O G N O S I S.

*Lentigines cuti pertinacissimè adherent, nec faciliè curantur, imprimis in iis, quibus jam per aliquod tempus efflorescere consueverunt.*

## C U R A.

Præcaveri solent lotione faciei ac mandum cum album. ovor. conquassato, & aqua rosarum, vitando simul tempore verno radios solares: sicuti etiam lentiginum cura per sola externa instituitur, & quidem majori cum successu, si à causa externa, quàm interna, originem ducant. Nihilominus tamen præstat etiam laxantia blanda, serum temperantia, exhibere ex flor. acaciæ, sol. sennæ & tartareis; & hinc sudorem provocare, post quem lentigines primo vere prodeuntes facie lintels abstersa tolluntur. Prodest etiam Elix. propteratis tunc acido.

Externa inter conveniunt aqua florum fabarum, flor. omnium, rad. sigilli Salomonis, scrophulariæ, leucil bulbosi, & taryri maculosi, aceti destillati, aut succus citri affriqus, Decoctum cosmeticum, & unguentum nobile Mynsichtii, pulvis rad. irocos Flor. & bryoniæ, Mercurius dulcis, mag. Saturni cum oleo tartari præcipitat. cosmeticum Clavii, & cerussa, antimonialia, camphora, lac virginis, tam Schröderi, *ZWELFFER in Append. Pharm. Aug. p. 299. & WILLSII Pharm. Rat. P. 2. pag. 471. descriptum, tam supra Membro 9. in Cura Varorum communicatum, Oleum ovorum, ligni Heraclini, guajaci, betulæ, ceræ, saponis, Oleum tartari per deliquitum, arcan. tartari, & ex corrosivis liquor Mercurii saccharatus Mynsichtii. B. D. MICHAELIS commendat sequens Linimentum:*

*Ætmull. Oper. Tom. II.*

*℥. Olib.*

*Ceruss.*

*Myrrh.*

*Sulphuris vivi an. 3℔.*

*Camp. 3j.*

cum s. q. pingui gallinæ. s. Linimentum.

Plura qui desiderat, videat JOHANNEM-BAPTISTAM PORTAM in *Mag. Naturali*.

Talia autè externa semper inungantur tempore nocturno, matutino verò aqua fontana rursus abluantur. Ut plurimum verò cutis post tales inunctiones evadit semisquamosa vel furfurea, quæ particulæ demum commodissimè per axungia humana inunctionem separantur.

## M E M B R V M X I.

### D E

## E P H E L I D I B V S.

**E**PHELIDES sunt maculæ cutaneæ fuscæ, & interdum asperæ, mulieribus communes, quæ potissimum frontem, interdum genas, imò collum & manus quoque deturpant, in longum & latum, & sæpe ad palmæ magnitudinem se explicant, gravidas in specie afficiunt, in quibus etiam per reliqua in gravidationis signa dignoscuntur.

## P A R S A F F E C T A.

*Pars affecta sunt partes cutaneæ in dictis partibus.*

## C A V S A.

*Causa proxima est feri acrimonia, quæ tam in gravidis, quàm interdum virginibus & mulieribus non gravidis mensium suppressorum occasione nec non menstruationis tempore non rarè observari solet, unde serum non parum alteratur.*

*Causæ remotæ sunt variae: Ex rebus non naturalibus maxime facit crassus massæ sanguineæ acrior. Ad res non naturales pertinent aromata similiaque acris oleosa, & alimenta fermentescibilia, & colorandi vim habentia, v. g. rad. carotæ, betæ rubræ, &c. cerevisia & mustum recens, fructus horæi & similia menstruationis tempore assumpta.*

## P R O G N O S I S.

*Mulieribus, quæ in matrimonio vivit, nec dictos aut allos dietæ errores commiserunt, conceptionis signum existunt, & in his etiam rarissimè corantur: Imò si evanescent, mox redeunt, & plerumque usque ad & post partum durant: in aliis mulieribus & virginibus facilius cedunt, mensibus scilicet rite aut fluentibus, aut penitus cessantibus.*

## C U R A.

Pro Cura Ephelidum remediis internis non opus est. Inter externa prodest frictio partium affectarum pomo dissecto subacido, vel pomo citrio dissecto. Alias laudatur Linimentum ex pulvere baccharum lauri decorticatarum cum melle, quo facies in balneo inungatur; item emulso seminis canabæ, succus radicis buglossæ, sulphur vivum & flores sulphuris.

## M E M B R V M X I I.

### D E

## M A C V L I S H E P A T I C I S.

**M**ACVLÆ HEPATICÆ ita dicuntur, vel quod hepatis colorè representet, vel quod vitio hepatis obstructi, nec rite sanguificantis, oriri vulgò credantur; suntque maculæ obscure flavi coloris, nunc majores ad palmæ ferè latitudinē, nunc minores, quæ interdum evanescent, mox deo videri emergunt, cum cutis aliquali asperitate & squamis; occupant imprimis collum, pectus, atque dorsum, interdum manus, cum singulari pruritu.

## C A U S A.

*Causa harum nil aliud est, quàm serum nutritium, acidum, plus minus viscidum, in valvularum lymphaticarum*



interstitiis, occasione frigoris aut aeris externi post exercitia vehementiora admissi, in gelatinam quasi coagulatum; unde à lentiginibus rix aliter quam gradu differunt. Taxat quidem PLATERUS SENNERTUM, quod hic Causam harum internam, & Curam unam eandemque cum lentiginibus statuatur. Sed sine ratione, cum Maculae sic dictae hepaticae eundem cum lentiginibus colorem habeant, illosque, quibus lentigines familiares sunt, pariter afficiant. Unde paret, quid sentiendum de illis, qui sanguinem seculentum & melancholicum, tanquam macularum hepaticarum causam, accusant, quatenus etiam hæc subiecta illa, quorum Massa sanguinea facile volatili oleoso seu bilioso constat, afficiunt.

## C U R A.

In cura harum conveniunt absorbentia blanda, & sanguinem purificantia: unde præmissa pleniori purgatione Mercuriali præscribantur vegetabilia amara Antiseptibus juncta in forma Nodulorum, vel essentiarum; quorum formulæ ex hæcenus dictis patent.

Externa sunt vel blandiora, vel fortiora, seu pubefaciencia. Blandiora sunt Cosmetica hæcenus recensita, v.g. rad. bryonis, oxylapathi, Symphyti majoris, sigilli Salomonis, lac virginis, Oleum tartari per deliquium cum Oleo amygdalarum dulcium in formam Linimenti redactum, cui etiam Oles suaveolentia, v.g. Oleum jasmini, ligni Rhodii, &c. ad aliquot guttas addi possunt: Convenit etiam Linimentum ex oleo tartari per deliquium, cerussa & camphora: quibus omnibus mercurius dulcis addendus.

Inter fortiora eminet sem. sinapi viride cum aqua appropriata in formam pulvis redactum, quo in balneo post sudorem cutis fricetur, donec seror & punctio quædam percipiat, hincque cuticula mortificetur.

Ad maculas ergo hepaticas optimum est:

℞. Sem. cruce seu sinapi q. s.

Contunde in mortario, addendo acetum, ut fiat instar pastæ,

adde

Salis comm. ℞i.

Albam ovi. no. j.

M. D. S.

Tataplasmata abstergens & mundificans.

Et hoc ipso in balneo cutis maculata probe fricetur, relinquatur aliquandiu, & abluatur postmodum cum aqua communi. Fiat hoc aliquoties, aut saltem singulis anni quadris: vid. etiam TIMÆUS à Gulden-Klee in Epist. l. 6. Epist. 16. p. 119.

Ad varos etiam usurpari potest.

Pulvis quoque seminis sinapi, cum sapone & succo lapathi acui misceri, & simili modo adhiberi potest.

## M E M B R U M X I I I.

## D E

## G U T T A R O S A C E A.

**G**UTTA ROSACEA, à figura facies cuprea, vulgè Germ. der Kupfer-Handel, est rubor faciei tuberosus, pustulosus, guttis interdum sanguineis similis, qui nasum sæpe & genas inæqualiter & valde tingit, & potatoribus sætis frequens est.

## C A U S A.

Causa est ut plurimum acidum volatile vinosum per glandulas cutaneas secretum, & cutim erodens; unde patet, quod non semper tota Massa sanguinea hæc dyscrasiam laboret, nisi acidum volatile per naturam existat, sed serum tantum nutritum sub faciei cute corrumpatur, cum ejusmodi homines quoad reliqua ut plurimum maxime sani sint.

## P R O G N O S I S.

Malum curatu est difficile, præsertim si facies simul pustulosa & exulcerata fuerit, & tunc ut plurimum ad mortem usque comitari solet.

## C U R A.

Interne præmissa nodulo purgante & sanguinem purificante, & in plethoricis venesectione, conveniunt absorbentia terrea & marina, e.g. os sepiæ, lapilli Cancrosum, Antimonium diaphoreticum Martiale, tinctura coralliorum assafrata, tinctura Antimonii tartarizata, &c. diutius continuando.

Externè Guttam rosaceam optime curant saturnina, quæ acidis illud promptè absorbent, & vulgè propterea refrigerare dicuntur: propterea Saccharum saturni aut cerussa cum aqua appropriata mista, addendo parum camphoræ, optime hic convenit; vel ex Saturno cum aceto destillato soluto, & Oleo rosaceo, fit mistura egregia in tali Gutta rosacea; item linimentum ex saccharo saturnicum succo sempervivi & plantaginis peratum, crebrius illitum, in specie præmissis in graviore malo sanguisugis faciei per vices applicandis (vid. TIMÆUS lib. 6. Cap. 20. p. 282.) vel scarificationibus auricularum ab Hartmanno commendatis. Porro ceu expertum admodum sequens laudatur unguentum:

℞. Piper.

Zingiber. an. ℞i.

Sulphuris vivi ℞i.

Ungv. pomat. q. s.

M. pro Linimento: S.

Unguentum singulare.

Vel saccharum Saturni crebrius in cella in liquorem resolutum cutim albam valde reddit, si antea rubra pustulosa fuerit. His & aliis irritis tandem ad Mercurialia accedendum erit. Quod etiam pertinet Ol. tartari per deliq. in loco humido solutum; e.g.

℞. Aqua flor. fabar.

Sigill. Salom.

Sperm. ranar. an. ℞i.

Ol. Tartari per deliq. ℞i.

Camph. cum spiritu vini solut. ℞i.

M. D. S.

Aqua mundificans singularis.

Occasione affectuum cutaneorum Cosmetica quædam polychresta ad cutim in faciei & aliis hæcenus dictis cutaneis affectibus candidam, glabram & nitidam reddendam comminabo: Sic igitur

## M E M B R U M X I V.

## D E

## C U T I S N I G R E D I N E.

**N**IGREDO CUTIS, in specie faciei & manuum, ab igne aut solis ardore contracta, tollitur cum aceto destillato; cui etiam simul ante destillationem flores fabarum, liliorum alborum, jasmini, cerasi, radix sigilli Salomonis, Scrophulariæ infundi possunt. Melius & magis euphoricon est succus citri, vel caro ejus succulenta, quæ affricando omnem cutis nigredinem tollit. Huc etiam camphora & Spiritus vini camphoratus pertinet: vel de essentia benzoes rubicunda infillitur aqua communi, vel aquæ rosarum quantum velis, & sit liquor albicans laetus, quo mane & vespere abluantur facies & manus, permittendo ut sponte secescant. Quidam cum emulsione, ex nucleis persicorum & amygdalis amaris, cum aqua spermatis ranarum, florum omnium, florum fabarum, &c. parata, cutim aut faciem lavant. Glabram & nitidam cutim imprimis reddit magisterium marscatæ, vel cum unguento rosato vel pomato, aut pulveris formæ applicatum; unde v.g. sequens laudatur pulvis:

℞. Amygd. amar. ex.

Nuel. persic. ex.

Sem. papav. albi,

Rad. Ircos Flor.

Sigilli Salom. an. ℞i.

M. f. l. a. pulvis: adde

Amyli.

Far. fabar.

Mag. marscat. an. ℞i.

M. D. S.

Pulvis mundi ficans.

Huius, qui ferre possunt odorem, addi possunt

Moschi,

Zibc.



Zibetbi an. gr. iv.  
Vel  
℥. Sapon. Venes. rasi & exsec. ℥ss.  
Nucl. persic.  
Sem. papav. albi an. ℥ij.  
M. f. l. a. pulvis:  
cui adde

Ampli puriss. ℥iv.  
Farin. fabar. vel lupinor.  
Pulv. rad. Ireos Flor. an. ℥ij.  
Probè mistis adde pro lubitu  
Moschi opt.  
Zibetbi an. gr. viij.  
D. S. ut supra.

Ufus est, ut tempore vespertino sub introitum lecti ℥j. vel ℥ij. horum pulverum cum sequentibus aquis ad pulvis formam humectentur, & facies, collum ac manus, aut loca pustulosa, leniter eodem illinantur; altero mane cum linteo, præfata aqua humectato; denovo abluantur, & ita aliquandiu moderate continentur.

Aqua in hunc usum sit:  
℥. Aquæ rad. scrophular. ℥ij.  
Flor. fabar.

Rosar. an. ℥ss.  
Rad. lil. albor.  
Sigill. Salom. an. ℥j.  
M. D. S.

Aqua purgans ad pulverem.

Mixtura hæc cum pauxillo olei tartari per deliquium acui poterit.

Item:  
℥. Fecul. rad. bryon.  
Ari,  
Saccb. Saturni,  
Mercurii dulc. an. ℥ss.  
M. pro pulvere: S.  
Pulvis purgans.

De hoc parum cum præfatis aquis humectetur; & dicto modo procedatur.

Delicatiores his non contenti, ad ipsum oleum talci provocant, quod tamen genuinum vix habetur, & quæ sub olei talci nomine venduntur, nil aliud sunt, quàm subtilissima talci calx in alcali quodam fixo obvelata, ad quod plerumque borax, vel sal tartari expetitur: vld. Pharmacent. Colleg. in Schræderum pag. 810. Non inutiliter ergo loco hujus Oleum tartari per deliquium, cum aquis dictis dilutum, adhiberi potest.

Interdum saponem odorati cosmetici expetuntur à virginibus delicatis, quorum compositiones videbitis in Schrædero, to. I. 2. p. 280. Vel

℥. Sapon. Venes. rasi & exsec. ℥j.  
Amygdal. amar. exc.  
Nucl. persic. exc. an. ℥ij.  
M. f. l. a. pulvis:  
adde

Pulv. rad. ireos Flor.  
Aron. an. ℥j.  
Sal. tartari ℥ss.

Com f. q. essent. benzoës cum spiritu rosar. parata  
f. l. a. Massa saponiformis;  
addendo

Ambra gris.  
Moschi opt. ana cum spir. rosar. sol. ℥ss.  
Zibetbi gr. v.  
Olei ligni rhodii gutt. xv. ad xx.

Formentur Globuli saponiformes, leviter exsiccandi.

Tandem sit adhuc fucus multis usibus dicatus:

℥. Mercurii sublimati ℥j.  
bulliat in  
Aqua commun. ℥ij.

quousque sentiat aliquam acrimonia in lingua, hinc adde

Ceruss. ℥ij.

Bulliant parum: Mixtura clarificetur cum albumine ovi, coletur, & usui servetur.

Sub usu agitur crebrò.

MEMBRUM XV.

DE

PORRIGINE.

**P**ORRIGO Capitis Affectus satis foedus est, scorbuticis, lue Venerea affectis, & leprosis familiare.

CAUSA.

Causa est Acidum plus minus salsum, à sero tamen viscido & corrupto temperatum; quod in partibus capitis intercutaneis stagnans poros cutis obstruit, conglutinat, & sic insensibilem transpirationem impedit: unde propter Acidum hujus cum sero viscido combinationem non ulcuscula humida, uti alias ab Acido acriori in sero prædominante fieri solet, sed crustæ densiores, & dense subinde compactæ, & successivè lamellatim sibi invicem superstratæ, eveniunt, quæ successivè exsiccata furfurum instar decidunt.

CURA.

Internè conveniunt Purgationes Mercuriales, Noduli laxantes & sanguinem purificantes, similiaque remedia, quæ Scabiem & Serpiginem curant.

Externè usurpantur Lotiones capitis, singulis septimanis instituendæ: e. g.

℥. Herb. abrotan.  
Betonie.  
Malva.  
Chelidon. major.  
Saponar. an. M. j.  
Rad. albh.  
Lapathi acuti,  
Bardan. an. ℥j.  
Pisor. ℥ss.  
Bacc. lauri.  
Colocynth. an. ℥ss.

Incisa & contusa coqu. in l. q. lixivii.

Colatura D. S.

Lixivium caput mundificans.

ARTICULUS VIII.

DE

CAPILLORVM VITIIS.

**A**D CAPILLORVM VITIA referuntur Calvities, Capillorum destitutum, Alopecia, Capillorum Tinea, & Plica Polonica. Calvities est, quando capilli in summo capite deciderint: Capillorum destitutum dicitur, quando hi undique copiose decidunt: Alopecia, quando cutis nuda hinc inde conspicitur. Tinea pilorum dicitur, quando hi frustillatim decidunt: Plica Polonica verò est, quando capilli in cyrrios contorquantur, ut nullo serè modo explicari possint.

MEMBRUM I.

DE

CALVITIE.

**C**ALVITIES in pluribus malum hereditarium est, quæ in juventute incipiens nullo modo curatur, nisi capillis factis pallietur. Alias ad Calvitie præcavendam MYNSICHTIVS in Armanem Chym. Tincuram suam proprietatis commendat.

Externè præscribuntur Cucuphar Aromaticæ, imprimis si Calvities à nutrimento vicioso oriatur.





MEMBRUM II.

DE

CAPILLORVM DEFLVIVIO.

**C**APILLORVM DEFLVVIVM frequenter Morbis Acoris supervenit, ubi convenit Decoctum rrisimarini in Vino, vel Unguentum Bucetii, quo capilli flavifimul regenerantur.

℞. Fol. Abrot. maris,  
Capill. Veneris an. M. j.

Favi mellis,

Ladani an. ℥j.

Myrtillor. ℥j.

Sem. fenugr.

Lini an. ℥iij.

Ol. Amygd. dulc.

Vini gener. an. ℥liij.

Facta infusione per 24. horas, bulliant ad humiditatis consumptionem, hinc fiat expressio fortis.

D. S.

Unguentum ad Capillos.

Hoc ipso Luna crescente ibinitur caput, quod sub decremento Lunæ ultimoblandè abluitur, hinc Vino rubro aut albis austeriusculis irroratur, & hinc ulterius Linimentum continetur.

Ad CANITIEM tollendam seu obvelandam convenit Luna in aqua forti soluta, & aqua simplici probè diluta & temperata; qua capilli frequenter peccinentur. Quidam peccine plumbeo canos frequenter fricare jubent, donec nigredinem nanciscantur. LANGIVS lixivium betulæ, & BORELLVS Cens. 2. Observ. 2. sequens laudat:

℞. Ciner. Clavell. ℥ij.

Aquapura ℥iv.

Bulliant ebullitione una tantum in vase æneo: in decoctione ab igne remota extingue

Calcis viva ℥iv.

Quæ extinctâ adde

Saturni ussi,

Lithargyr. aur. an. ℥j.

Bulliant omnia simul bis vel ter.

MEMBRUM III.

DE

ALOPECIA.

**I**N ALOPECIA, præter purgationem Mercurialem, convenit Decoctum & essentia lignorum, essentia fumariz, antimonium diaphoreticum, Martialis, & omnia sanguinem purificantia, supra Art. 7. Membr. 1. & 2. in Scabie & Pruritu laudata.

Externè commendatur Unguentum medicamentosum Myrsitii, & unguentum nicotianæ, acuata cum Oleo Philosophorum, ceras, saponis, ligol juniperini, &c.

MEMBRUM IV.

DE

PILORVM TINEA.

**I**N CAPILLORVM TINEA, Germ. in den Mulben, prodest lixivium, in quo pisa, fabæ, semen lupinorum, absinthium, centaurium minus, colocynthis, semen staphisagriz, myrrha, &c. cocta; quo sæpius caput lavandum: sicut & capillorum extremitates forfice rescandæ.

MEMBRUM V.

DE

PLICA POLONICA.

**D**E PLICA POLONICA, Affectu apud nos rarissimo, videatur SENNERTVS in Praxi l. 5. p. 3. sect. 2. c. 9. seq. DAPHISONVS in Commentar. super Petri Severini Dani Ideam Medicinæ Paracelsi pag. 452. & HERCVLES SAXONIA.

Hæc de Vitiis Nutritionis læsæ. Pergo ad

SECTIONEM XVIII.

DE

SANGVINIS EX PARTIBVS REFLVXV VITIATO,

ET EXINDE ORTA INFLAMMATIONE,

tam in genere, quam in specie.

**I**N superiori Capite dictum, quod sanguis ex Corde distributus, in totum corpus & omnes eius partes derivatur, ut in his partim nutritioni inserviat, partim in quibusdam certam fluidi separationem pariat ad recognitionem animalis integritatem maximè necessariam. Jam verò sanguis non perpetuò ibi hæret, sed uti per arterias influxit, ita per partes cibratus, naturaliter derivatur ex arteriis in venas, per venas denuo refluit ad cor: qui motus vocatur circularis, propterea quoniam instar circuli ad id terminat punctum, à quo inchoavit. Jam verò, si arteriæ plus devehunt, quam venæ revellere possunt, læditur etiam distributio seu motus circularis per partes & vasa, unde plus minus vitatur; idque vel

(1.) Quando sanguis in parte quadam hæret, stagnat,

& in viis suis subsistit.

(2.) Quando extra partem effunditur in singularem corporis quandam cavitatem.

(3.) Quando sanguis plane extra corpus effunditur.

Sanguis ergo in suo motu impeditus & in quandam partem solidam depositus, stagnat & hæret in valis capillaribus venosis, & partium spatiosis; vel in minori quanto, ita ut successive insensibiliter evanescere & discuti possit, id quod fit in *Confusionibus*, & inde natis *Suffusionibus*, v.g. Casu ab alto; vel hæret & congeritur in majori quanto sanguis, unde uberius collectus sanguis mox excandescit, ac molestum caloris sensum in parte quadam sensili producit, donec

sensim corruptus in pus vel saniem abeat: Unde prior mutatio vocatur *INFLAMMATIO* seu *πυρρσις*; posterior verò *ABCESSUS* seu *APOSTEMA*. Quando verò sanguis in corporis cavitatem quandam, humoribus naturaliter vacuum effusus, v.g. in pectus, vel cavum abdominis, ac ibidem collectus in pus mutatur, vocatur tunc *EMPYEMA*. Quod si sanguis plane extra corpus effundatur, generaliter fluxus sanguinis seu *HÆMORRHAGIA* vocatur; quod nomen licet in specie tribuatur sanguini ex naribus erumpenti, in genere tamen cuique sanguinis extra Corpus fluxui attribui debet, & etiam solet.

CAPUT I.

DE

SANGVINIS IN PARTE QUADAM STAGNATIONE.

ARTICULUS I.

DE

INFLAMMATIONE IN GENERE.

**R**efluxus igitur sanguinis quicunque impeditus successive inflammationem constituit; quia enim arteriarum



rum motus & per has sanguinis influxus est validus & impetuosus, ac propter canales arteriarum quintuplo crassiores ipsis venis sit interruptus, & omnino perpetuus, necessarius sit, ut dum perpetuo influit, non tamen debite possit refluere, ut exinde in parte hæreat, hinc coacervetur, & coacervatus det Tumores, qui vocantur Inflammationes.

## C A U S Æ.

*Causa materialis proxima* omnis Inflammationis est sanguis collectus & stagnans in parte quadam, ob impeditum suum ex arteriis in venas refluxum, ita, ut plus influat per arterias, quam refluere valeat per venas. Stagnatio hoc in loco est nomen Metaphoricum, desumptum ab aquis, quæ plus ad partem fluunt, quam refluere possunt; nihilque aliud est, quam si sanguis influens non refluit, sed coacervatur: Nempe si qualibet pulsatione 33. sanguinis per arteriam influat, sed 21. per venas saltem refluat, remanet 12. qui stagnat, & dum continuatis pulsibus semper major majorque sanguinis hæret copia, sic necessario oritur Inflammatio. Quod si verò in parte inflammata nihil omnino refluere queat, adeoque reciprocus spiritus insul fiat motus, à quo sustentetur insitus, necessario supervenit tandem gangrena, dum sanguis spiritu vitali insulo privatus corrumpitur & putrescit, indeque pars, suppresso spiritu insito, emoritur.

Jam verò cum sanguis, qui dat inflammationem, sit materia rubra spirituosa & calida, ergo calefaciet partes, & pars necessario exinde rubet: quia verò plus influit sanguinis, quam refluit, dum ita stagnat & in parte hæret, necessario pars intumescit, & cum à tumore distendantur partes fibrosæ, & hinc necessario excitabitur dolor, & consequenter Inflammatio. Hæc ergo quatuor modo dicta pathemata seu symptomata in omni Inflammatione observabilia sunt; sunt enim *Signa Inflammationis pathognomonica* à CELSO enarrata, nempe *Calor seu Ardor, Rubor, Tumor, & Dolor*.

Ceterum DOLOR, qui adest, triplex in omni Inflammatione successivè observatur:

- (1.) *Tensivus,*
- (2.) *Pulsatorius,*
- (3.) *Punctorius.*

*Tensivus* propter partes fibrosas & membranofas, à sanguine congesto & stagnante distentas & convulsas: *Pulsatorius* vel pulsativus, quia sanguis influens repercussionem patitur, à cujus influxione & repercussionis impetu fit pulsationis sensus, & quidem à fibrarum, membranas arteriarum, per quas sanguinis motus debitus non nihil impeditur, constituentium spasmo aut convulsiva tensione, hinc ad diastolen resistencia, unde evenit ut pulsationes sensibiles percipiantur. *Punctorius*, quæ adest in omni Inflammatione, ubi membranz sunt affectæ; & licet hæc ipsæ nihil patiantur, tamen supervenit tandem dolor punctorius, dum suppuratur Inflammatio, & in abscessum degenerat, superveniens, ab acris salinis acido salis particulis, partes nerveas acicularum insularum pungentibus.

Hæc omnibus manifesta sunt in parte externa visibili: Dolor pulsatorius verò in parte interna, adeoque invisibili, item interdum gravativus, ardor, & denique partis ordinaria functio læsa, Inflammationem comitantur. Hinc observatur, quod quia omnis Inflammatio est in parte quadam determinata tanquam in Subiecto, semper hisce modò allegatis 4. Symptomatis, omni Inflammationi communibus, subinde simul prodeunt aut accedunt peculiariora quædam symptomata, ex partis specialis Inflammatione, non morbi ratione, nata: Sic enim v.g. Inflammationi faucium in *Angina* simul deglutitio læsa & difficilis; in *Pleuritide* difficilis respiratio, ratione partis affectæ superveniunt. Et hæc symptomata propria superveniunt inflammationibus, non qua talibus, sed quatenus Inflammatio hanc vel illam partem affligit, adeoque hujus partis Inflammatio speciale sibi symptoma adjunctum habet. Modò dicta quatuor symptomata in Inflammatione partis externæ sunt sensibilia, in interna verò non; unde cum sensu ardoris, doloris, &c. alia simul signa, v.g. febris ardens, conjungenda sunt: Sic in inflammatione pedis res clara est, & quatuor illa symptomata percipi possunt: si verò pars aliqua interna est affecta, tunc alia concurrentia signa conferenda sunt: Sic in visceribus inflammationis semper ponderis gravantis sensus seu *gravativus*, obtusus dolor, præter dicta simul accedit. Ponam exemplum: Quidam conqueuntur de dolore gravativo in hypochondrio

dextro una cum insigni ardore istius regionis, pars ad ratum tumet, insigniter calet, & ad remissionem quandam intumescit, interius dolor pulsatorius profundus, admodum molestus percipitur, tussicula adest inanis, difficilis non nihil respiratio, febris continua acuta, &c. Hæc signa conjunctim arguunt adeste Inflammationem hepatis. Ergo hæc supervenientia posteriora signa inveniunt partem, quam Inflammatio ista obsideat.

**CAUSA EFFICIENS**, quare sanguis stagnet seu Inflammationum, est vel *externa* seu remota, vel *interna* seu proxima. **CAUSÆ EXTERNÆ SEU REMOTÆ** sunt variz, quæ vasa angustando occasionem præbent, ut impediatur sanguinis motus; quallia sunt quæcunque, quæ vel partes & vasa arctè comprimunt, vel eadem angustant, vel quæ adstringunt, v.g. fortiores ligaturæ, & vincula injecta, luxationes, fracturæ, vulnera, ulcera, contusiones graviores, v.g. testium ex equitatione violenta, aut aliæ quæcunque res extraneæ violentæ: Sic spinæ post ossa fracta aut post cranium contusum altius eminentes semper Inflammationes inferunt. Itè repellentia ac adstringentia nunc inferunt, nunc exacerbant Inflammationes. Interdum sola transpiratio à frigore intercepta Inflammationem excitat. Sæpiissime fibrarum nevascularum & tendinosarum dolorificæ crispationes, & contracturæ, & hinc natæ valorum capillarum arctæ constrictiones, Inflammationem inferunt; hinc enim est, quod quibuscunque ferè doloribus, in specie fibrarum nevascularum læsionibus, frequenter superveniunt Inflammationes, aliique tumores. Hæc siquidem irritatæ spasmò convelluntur, quibus convulsis dura redditur pars, unde pori non transmittunt sanguinem, sed pars tumet & inflammatur: e.g. dolori *dentium ab acido radicum* dentis nervam morficante & vellicante, supervenit totius maxillæ, & capitis ipsius affectus Inflammatorius, de quo vid. *infra l. 2. Sect. 2. cap. 3. Art. 1. ubi de Odontalg.* quia fibræ nervosæ & musculosæ vicinæ ex dolore per contentum affectæ se crispant, & levi quasi spasmò se contrahunt, quæ crispaturæ venarum capillares coarctatæ liberum sanguini transitum denegant, unde postmodum tumor & Inflammatio supervenit: Hinc & in arthritide & simili causa tumor Inflammatorius, ut plurimum erysipelaceus, supervenit; item in punctura vespæ, aut intrusione spinæ. Talis tumor non est causa affectus, sed potius effectus, seu productum ejus & consequens doloris, & dependet ex crispatione fibrarum partium. Unde ridicula est ea Cura, quæ ad tumorem, tanquam affectum, dirigitur. Quoniam tales tumores simpliciter curant, ad posterius Curam dirigunt; e contra modò causa dolorifica removeatur, ipseque dolor sistatur, omnis tumor & præcaveatur, & incipiens mox denuò curatur.

**CAUSÆ INTERNÆ** sunt in sanguine ipso influente, nempe sanguinis motus circularis æquabilis ineptitudo per quævis vasa capillaria; vel est in parte recipiente vitium, nempe quodcumque illud, cujus occasione viæ & partes angustatæ ineptæ fiant, ut sanguinem debite non transmittant.

*Sanguis ad motum circularem ineptus est* duplici modo:

1. Quando nimis est viscidus & crassus, ob seri defectum ejusque nimiam absorptionem, quod tamen rarissime evenit; aut propter chyli crudioris ac glutinosioris seu pituitæ viscidæ congestionem.
2. Quando idem sanguis nonnihil congruatus aut quasi semicogulatus in quodam loco sistitur & coacervatur, hinc ita subsistit & Inflammationem ita inferit.

Dispositio hæc ad grumescentiam sanguinis oritur ab acido quodam vitioso occulto, & nimis excessivè sanguini permixto: quippe per experientiam cognitum, hoc potenter coagulare sanguinem, ita quidem, ut quod plus peccet acidum, eò magis sanguis ad grumescentiam disponatur; sive lymphæ nimis acida, sive res quædam externa, sive aliud quid, ipsi acorem imprimat. Quod confirmatur non tantum per experientiam, dum sanguis in liquorem acidum immittitur, sed etiam ex infusione liquoris acidi in venam canis. Hinc enim omnes Inflammationes erysipelaceæ ex grumescencia aliqua sanguinis, facta ab acido occulto, inducuntur tales coagulationes, originem ducunt: Hinc v.g. à subitaneo frigore, post nimium corporis motum ac incallescencia, partibus internis subito communicato, subito quoque spissatur & condensatur sanguis calidus, nimis attenuatus ac resolutus, unde internæ Inflammationes, in specie pleuritidis & angina: hinc expositio corporis concalescenti aeri frigidi, immersio ejus in aquam frigidam, sanguinem ad sui coagu-



cu ab alcali solutum; exinde enim emergit color lacteus. Illustrabo: v.g. si sulphur aut pinguedo quæcunque solvatur ab alcali fixo vel volatili, emergit solutio rubra; huic autem si instillatur acidum, dat præcipitatum lacteum. Jam similiter se habet Massa sanguinea: si solvens plus minus dominatur alcali, emergit rubedo, quæ præcipitata per acidum, colorem album exhibet, & ita effervescentia cessat, quæ cessante, in sal certum, scilicet salum, mutata sunt ambo, & tunc perfecta est suppuratio, quæ evacuata, cavitas remanet in parte, vocata apostema seu Abscessus. Confer hic SYLVIIUS. i. Prax. ubi de Inflammatione item BECKIUS de Experim. circa Renatur. Princ. p. 46 Crassum est pus, quatenus ipse sanguis, ex quo ortum est, plus minus tuit crassus.

ARDOR, qui in inflammatione perquam sensibilis, est ex acidi volatilis motu concitatorij; adeoque pro hujus plus minus acrioris cum alcali, etiam plus minus acriori, plus minus acta effervescentia majori cætera symptomata, Ardor, Rosio, Punctio, &c. plus minus intendi quoque solent. Idem acor vitiosus, siue sanguinem purum coagulando qd inflammationem disponat, siue inflammationi ex alia causa obortæ superveniat, effervescendo in tota Massa sanguinea cum ejus sale volatili causa est adjunctæ febris continuæ ardentis symptomatice, qualis in omni inflammatione interna adest, & est tam acuta, ut in inflammationibus partium internarum à causa interna enatis, v.g. in Pleuritide, Hepatide, &c. quàm lenta, superveniens nempe inflammationibus partium quarundam externarum à causa externa subortis, v.g. in inflammatione mammae ex lactis grumis, &c.

Druidunt vulgo inflammationes in legitimas & illegitimas. Illas, quando sanguis bene constitutus Inflammationem excitat; Has verò seu illegitimas in biliosas, pituitosas, melancholicas, &c. dissecunt, non propter tales humores sanguini permixtos, sed propter variam sanguinis crasin, ac inde ortam temperiem, de qua in Physiol. de Temperam. cap. 2. p. 74 & 75.

## DIAGNOSIS.

SIGNA INFLAMMATIONUM supra sunt recensita: nempe

1. Tumor renitens ad tactum.
2. Rubor.
3. Calor seu Ardor agrum, ac atrectans manum afficiens.
4. Dolor urens, tensivus, pulsatilis, pectorius, & etiam gravativus, dum pars à sanguine distenditur, & gravando distendit partes, quibus est annexa: & quibus denique semper accedit febris, siue symptomatice siue comitata, plus minus acuta, conjuncta cum inflammationibus à causa interna excitatis.

Satis per se patent hæc signa in parte visibili, in invisibili verò parte dolor pulsatorius ardor, febris, & denique partis ordinaria functio plus minus læsa inflammationem innuntiat: quibus in specie accedunt signa unicuique parti læsæ seu inflammatae propria & specialia, quæ nempe aliter se habent in faucibus, aliter in pleura, aliter in pulmonibus, aliter in ventriculo inflammatis.

Signa particularum inflammationum inferius suo loco habebimus.

## PROGNOSIS.

Inflammatio vel sua sponte recurrit, vel non recurrit: Illud, quando sanguis nondum perfectè extravasatus aut congruatus fuit, quo relaxatis fibris aut apertis poris idem stagnare incipiens de novo per venas regurgitat, siue purus fuerit, siue sordibus heterogeneis, in quandam partem depositis, & ita inflammationem occasionaliter inferentibus permixtus; id quod probe notandum est in tumoribus partium criticis semper cum inflammatione junctis: Dum non recurrit inflammatio, omnis in genere, vel illucit, vel suppuratur, vel scirrusefit, vel gangrenescit.

Unde Inflammationis Prognosis duo involvit: Eventum ipsam, & morbi Tempora. Eventus observatur bonus & malus: Bonus scilicet, si inflammatio seu materia peccans vel insensibiliter discutitur & planè dissolvatur (id quod fit imprimis ab operante & prædominante alcali, dissolvente sanguinem grumolum) & ita, vel in alia vasa remeet, vel insensibiliter transpirat; & est optimus & brevior finiendi modus, & inflammationi exiliori non adeò profundæ & quæ à causa externa magis dependet frequens est: hinc est iste,

quando sanguis ille extravasatus non resolutus suppuratur, & ab it in abscessum; id quod fit ex aliquali motu fermentativo acidi & alcali, quæ ambo coeunt in salum tertium: Malus; & quidem toti aliisve membris si evanescat quidem, & insensibiliter resolvatur inflammatio, cum aliorum tamen symptomatum accessu atque incremento; parti verò affectæ, si in gangrenam aut scirrhum abeat. Nam ab acido nimis inspissante abundante & prædominante sanguis in tumorem peccit induratur ac in scirrhum abit, quod malum est propter tumorem contumacissimum & curatu difficilem; nisi enim scirrhii cautè & leniter traclentur humores tales effervescentiam concipiunt, & facile in cancerum exulceratum degenerant, cum cancer occultus & scirrhus dolens in paucis differant. Inflammatio verò ista, quæ ex omnimodo sanguinis, & spirituum in parte motu impedito, & ita ejus mortificatione ac destructione in Gangrenam abit, omnium periculosissima & pessima est, dum acido vitali spirituoso destructo sanguis & pars in putredinem dilabuntur.

Aliæ eventus boni & mali signa quoque petuntur

1. A Subiecto, cujus intuitu Inflammatio in juvenibus, & bonæ constitutionis hominibus, in parte externa & carnosa, minus periculosa ac in senioribus ac cachecticis, in visceribus & membris nervels, existit.
2. A Magnitudine, cujus ratione major & ampla Inflammatio plus periculi, quàm minor, involvit.
3. A Tempore & Loco, quorum intuitu graviores, quæ anni tempore fervidiore & in regione calidiore, quàm quæ in aere & locis temperatis aut frigidiorebus emergunt.

Tempora Inflammationis quod spectat: principium ejus dicitur, ubi tumor, dolor, atque extensio adhuc exilit; quæ symptomata si augeantur, Augmentum morbi dicitur: quemadmodum Status, si cuncta fuerint vehementissima; & Declinatio, si symptomata remittant, siue cum materia insensibili discussione siue suppuratione hoc fiat. Quæ tempora modò longiora modò breviora sunt, adeò ut nonnullæ Inflammationes citius, aliæ tardius terminentur, tam pro diversitate materiae, quàm partis affectæ. Nam quæ à sanguine viscidior, atque crassiore dependet Inflammatio, tardius; quæ à tenuiore & fervidiore, citius; pariter, quæ in partibus carnosiss, facilius, quæ in tendinosiss, difficilius curatur, & lento magis motu progreditur.

## CURA.

Positis his fundamentis facilis est accessus ad CURAM, pro qua in omni Inflammatione in genere observandum est, ut sanguinis stagnatio tollatur & motus naturalis & circularis restitatur in integrum; id quod fit, vel impedimenta, quævis externa, sanguinis motum intrinsecus inhihentia, removendo, vel interne sanguinis grumescientiam crassiorem & ascendentiam corrigendo, siue eadem siens præcaveatur, siue eadem jam facta resolvatur.

Adeoque quoad has

- I. Sanguinis tenuitas & fluiditas conservanda, & circulus ejus concitator reddendus per SUDORIFERA, præsertim alcalinæ nature, tam fixa quàm volatilia: Illa acidum, sanguinem plus minus coagulans, absorbentia: hæc eundem positive dissolvunt & attenuantia, expectato sudore, optime conducunt.
- II. Fermentum vitiosum acidum in parte affecta corrigendum, aut quodvis aliud heterogeneum removendum; id quod tam interna quàm externa præstant.

Interna sunt Absorbentia fixa, aut penetrantia volatilia cum sudore administrata; adeoque sudorifera, ac sudorem procurando, Inflammationibus quibusvis conducunt. Jam verò patet, quod in inflammatione ab acido interno orta, tam præservativè quàm curativè nil melius conferat, quàm ea remedia, quæ sanguinem viscidum & grumolum attenuare ac resolvere, ascendentem corrigere, & ita eundem mobiliorem & fluidiorem denud facere, naturalemque motum ipsi restituere possunt. Hinc sudorifera, & omnia alià ad easum ab alto commendata, optima erunt in curationibus omnium Inflammationum, tam internarum quàm externarum, in specie eryspelacearum. Præ cæteris autem ea sudorifera conducunt, quæ sanguinem grumolum speciatim resolvere valent; sub omni enim sudore, acidum imminuitur, sanguis tenuior ac fluidior redditur, & sic



& sic in naturalem circulum rapidius magis concitatur; unde in omni sudore pulsus est frequentior ac robustior, & percipitur, ut vocant, undosus: Hinc facile patet, quod hic sudorifera præ cæteris conveniant.

Hæc inter autem sudorifera, salia volatilia imprimis palmam obtinent, utpote cum omnia hæc egregiam potentiam habeant coagulata & conglutinata omnia in corpore humano dissolvendi, eademque ad debitam fluiditatem deducendi, simulque sudorem movendi. Hinc est, quod exhibitio tempestive in principio morbi unico sudorifero; ex salibus volatilibus aut similibus parato, sæpius Pleuritides absque ulla venæ sectione in Inflammationibus minoribus, & subjectis non adeo plethoricis citò, tutò & jucundè curatæ fuerint. Id quod similiter de omnibus aliis Inflammationibus intelligendum; horum nempe medio sanguis discutitur parim, partim in naturales alveos deducitur. Ubi hoc, nempe insensibilis discussio, obtineri nequit per sola sudorifera, sed Inflammatio persistit, tunc ad secundum scopum accedendum; nempe externis discutientibus seu aromaticis carminantibus, sale volatili temperato constantibus, applicatis dissipanda est Inflammatio. Quod si verò nec hæc sufficiant, tertius scopus in auxilium vocandus, & suppurantibus & maturantibus sanguinis extravasari ac coagulati in pus transmutatio maturè promovenda, & denique factus abscessus aperendus, mundificandus & consolidandus. Interim cum hinc hi scopi ad Chirurgiam spectent, ideo eos infra tractabimus.

Inter remedia ergo interna, ad Inflammationes in genere proficua, nullo modo conveniunt purgantia, nisi (ceu jurati servi semper, ubi nempe neque morbus, neque symptoma urget, universalia præmittere velimus) interdum primas vias propter junctam sæpius febrem simpliciter blandè evacuari velimus. Alvo tamen in cursu morbi adstricta Clydæres injiciantur ex sero lactis cum ʒi. vel ʒij. mellis: Vel

ʒi. Flor. chamomill. M. ij.  
Cogn. in l. q. feri lactis:  
Colatura ʒviij. vel ix. adde  
Butyr. rec. cum vitello ovi  
solut ʒi.  
Mellis ʒiij.

M. f. Enema: S.

Clyster ablucens.

Quin potius Sudorifera alcalia blanda, quæ sanguinem congruenter resolvunt, ejusque circulum restitunt, huc faciunt. Unde omnia illa, quæ aliis in specie n. pleuritidem, ceu frequentissimam internam Inflammationis speciem, commendantur, & infra declarabuntur, similiter in omni Inflammatione in genere conveniunt; ob id in specie utilia dixi salia volatilia, quæ inter sunt: spiritus tartari, spiritus salis ammoniaci, urinae, & sal volatile cornu cervi, sanguinis humani, oss. humanorum, & similia. Item huc pertinent alia tali alcali occulto imprægnata concreta, acidum potenter absorbentia, v. g. animalium partes duræ, ut lapilli cancerorum, mandibula lucii piscis, dens apri, cornu cervi sine igne præparatum, ebur sine igne, unicorn, lap. carpiæ &c. quibus adde sulphur, & sulphurea mineralia, & metallica fixata, præsertim antimonialia, quæ acidum quodcumque in corpore occulto imprægnata sunt, quæ inter primatum obtinet v. g. antimonium diaphoreticum, item Bezoardicum minerale, tam simplex quam compositum, & similia: Quin & modò dictis addenda Theriaca; spiritus theriacalis, tam simplex quam camphoratus, liquor cornu cervi succinatus, in specie ratione camphoræ. Mixture simplex & tinctura Bezoardica à ʒss. ad ʒj. in principio inflammationis propinanda, præsertim si oriatur illa ex subitaneo corporis frigore quocumque post nimium ejus æstus; tales enim Inflammationes citò, tutò, & potenter dissipat. Faciunt quoque huc omnes pulveres Bezoardici vulgò dicti, semersi & quicunque alii, utpote quorum in prædicentia non tantum Acidum absorbendo & temperando, sed & sudorem excitando, suo modo Inflammationes sistere solent.

His omnibus simul adduntur sperma ceti, ac cancerorum, lapilli cum aceto assumpti, & omnia vegetabilia vulneraria, alcali plus minus occulto temperato prædita, sanguinem congruenter resolvunt, v. g. ea, quæ ex chæresfolio, bellidæ minore, flore sambuci, mentha, scabiosa, papavere rhæados (quorum tincturæ in Julepis) sunt remedia: uti etiam remedia ex sambuco, quia hic est egregius in erysipellate; superius enim monui, omnes Inflammationes internas semper esse de natura erysipellate, adeoque florum,

sambuci spiritus, baccarum sambuci essentia & rob, nec non ex varis plantis antiscorbuticis aut similibus acerbis partibus petita remedia, quæ sunt ex nasturtii speciebus, cochlearia, ex erysimo & similibus parata conducunt. Præsertim spiritus nitri dulcis, in specie cū spiritu florum sambuci per fermentationem paratus, ad ʒss. in aqua chæresfolium syr. papav. rhæados propinatus, ceu appropriatum remedium sudoriferum in Inflammationibus quibuscumque internis, præsertim quando febris ardens acuta simul urgeat, imprimis in Angina & Pleuritide similibusque, admodum est commendatum remedium, imprimis tamen in Angina; quin & omnia nitrata, ratione febris conjunctæ conveniunt, in specie tam nitrum depuratum, quam nitrum antimoniatum, à præparatione & edulcoratione antimonij diaphoretici, Antihæstici Poterii relictum, in potu ordinario dissolutum, idque plus minus copiosè, prout necessarium fuerit. Exempli gratia paucas formulas subministrabo, quibus internæ quæcumque Inflammationes quarumcumque partium facile hîsi & tolli possunt: v. g.

ʒi. Aqua scabios. vel fumar.

Flor. sambuc. an. ʒss.

Spiritus Theriacal. simpl. vel camph. ʒiij.

Dent. apri præp. ʒj. vel ʒij.

Sal. vol. cornu cervi gr. xv. ad ʒj.

Syr. scabios. vel violar. ʒvi. vel ʒj.

M. pro duabus vel tribus dosibus: S.

Mixtura dissolvens pro aliquot vicibus.

Usurpetur pro scopo sudorifero in principio Inflammationum, habitæ ratione Venæ Sectionis.

Quibus etiam pro citius instantiarum ratione Opiata addi possunt. Aut huius loco

ʒi. Unicorn. veri præp. vel fossil.

Maxill. luc. pisc.

Cornu cervi sine igne an. ʒj.

Sal. vol. Cornu Cervi gr. xv.

Laud. opiat. gr. ij. vel iij.

M. pro duabus vel tribus dos. in haustulo vini capiendis, expectando sudorem. S.

Pulvis dissolvens.

Vel loco horum, ac in Incremento Inflammationum, ubi ardor & calor urget,

ʒi. Aqu. Flor. sambuc.

Chæresfol.

Papav. errat. an. ʒj.

Aceti sambuc. ʒiij. vel ʒss.

Maxill. luc. pisc. ʒij.

Lapill. cancer. præp. ʒj. ad ʒss.

Syr. papav. errat. ʒj.

M. pro duabus vel tribus dos. expectando sudorem: S.

Mixtura refrigerans & dissolvens pro aliquot vicibus.

ʒi. Aquæ flor. sambuc.

Card. bened. an. ʒss.

Aceti sambuc. ʒvi.

Maxill. luc. pisc. ʒij.

Lap. cancer. præp. ʒss.

Syr. papav. rhæad. vel rubi idæi ʒvi.

M. pro duabus dosibus: S.

Mixtura refrigerans & dissolvens pro duabus vicibus.

Notandum: cōsulit his Mixturis additur acetum; licet enim illud cum lapillis cancerorum effervescat, non tamen penitus saturatur, sed hoc ipso lixivii naturam assumunt, & in saporem urinosum mutantur, ut dicit HELMONTIUS, ac potentius vitiosa acida absorbere, sanguinemque grumosum mediante sudore dissolvere valent, uti SYLVIVS testatur, se habere ex HELMONTIO; id quod probatur: si enim acetum marinis affunditur, hæc longe melius operantur, quam si solitarie assumerentur.

Vel

ʒi. Lap. cancer. præp. ʒij.

Ebor. sine igne ʒj.

Laud. opiat. gr. ij.

M. f. pulvis pro duabus dos. in haustu Vini Rhenani assumendis, vel in parvo cochleari aceti, expectando sudorem. S.

Pulvis dissolvens.

In Progressu vel Statu morbi, & imprimis quando nimis urget juncta febris acuta,

ʒi. Aquæ flor. samb.

Card. bened. an. ʒss. ad ʒij.

Antimonij diaphor. ʒj.

Syr. card. bened. aut papav. errat. vel acetos.

Citri ʒj.

Spiritus



# Inflammatiō in Genere.

*Spiritus nitri dulc. q. s. p. grato sapore:*

*M. f. portio, S.*

*Potio confortativa refrigerans.*

Capiatur subinde cochleatim, vel produabus dosibus, observando, ut quantum possibile, corpus in madore conserveatur; & inflammationes per sudorem curat, & junctæ febri optimè resistit.

Sub sudoris defectu Opiata non negligenda sunt, quæ figendo spirituum impetum, & hinc fibrarum nervearum solvendo stricturnam, multum promovent sudorem.

Loco potionum istarum, in inflammationum incremento laudatarum, commodè etiam *Mistura theriacalis ex theriaca & aceto*, supra Sect. 15. ubi de febribus malignis, innuata, usurpari potest. Hiscæ formulæ jungantur binæ istæ *Misturæ*, quæ habet *SYLVIVS* in sua *Praxi* l. 1. c. 40 §. 28. in inflammationibus, quæ certè sunt egregiæ, & quibus sæpius Pleuritides, Peripneumonias, & similes affectus & præservavit & curavit.

*4. Aquæ petrosel.*

*H. sup.*

*Fenicul. ana ʒi.*

*Theriaca. simpl. ʒʒ.*

*Spiritus sal. ammoniaci ʒʒ. (prout fortis vel debilis)*

*Land. opiat. gr. iv. (ratione febris & inquietudinis)*

*Syr. papav. errat. ʒi.*

*Misc.*

Hæc ipsa *Mixtura* subinde cochleatim brevi tempore est haurienda, & æger benè contegendus, expectando blandum sudorem.

*Mixtura* alteram videb. l. 4. §. 43. quæ sanguinem congruatum resolvit, & resolutum partim dissipat, partim in naturalem crasin reducit:

*4. Aquæ byssopi,*

*Fenicul. an. ʒij.*

*Acetide stillati ʒvj.*

*Spiritus vini rectif. vel theriacal. vel cujusvis aromatici ʒʒ.*

*Lap. Cancr. præp. ʒi.*

*Sperm. ceti,*

*Mumia ana ʒi.*

*Land. opiat. gr. iv.*

*Syr. de quinque radic. ʒi. ad ʒiʒ.*

*Misc. proportionè.*

Huius *Mixturæ* assumat sæpius æger cochlear unum vel alterum; cujus ope non tantum impediatur sanguinis effusi concretio, sed partes ipsius crassiores incidentur, attenuabunturque paulatim; tenuiores autem unà cum sudore aut insensibili transpiratione discutientur: quæ sola in tempore usurpata periculosas inflammationes curasse gloriatur *SYLVIVS*.

Et tales *Mixturæ* ex fixis cum acidis sunt ipsi in frequentissimo & satis felici usu: quin temperatis ejusdem partibus acrioribus dolor lenietur, tandemque in totum tollitur; ipsæque adeò solvetur ac dissolvitur obstructio: quasi solâ in principio atque diligenter usurpatâ curatæ sunt non semel incipientes plouritides ac peripneumonias, aliarumque partium inflammationes satis graves, atque anxietatibus doloribusve acutis molestæ.

Et hæcenus dicta pro quibuscumlibet sufficient inflammationibus.

Fiunt etiam non raro *Emulsiones*, internæ contra Inflammationes sub morbi statu multum proficue, ex seminibus cardui bened. & Mariæ cum aqua papaveris erratici paratæ, quibus adhuc additur appropriata, antimonium diaph., sperma ceti, & similia supra dicta; quæ etiam ad Inflammationes, speciatim partium pectoris, sunt admodum proficua. Quod si Inflammationes sint erysipelaceæ, imprimis adhibendum simul Rob sambuci, quibusvis formulis additum; aut pro vehiculo pulverem usurpandum, seu appropriatissimum erysipelatis remedium; præsertim quando motus naturæ excretorius deficit, nec debite erysipelas efflorescere potest, tunc loco stimuli usurpatum Rob optimum est. Plura de erysipelate tradam in *Chirurgia Medica*. Porro pro dictis scopis observandum, solenne serè esse in omni Inflammatione ingruente aut præsentè venæ sectionem instituere; & rectè quidem; eamque subinde aliquoties repetere, idque secundum revulsivis, aversionis & diversionis leges & fundamenta alibi explicata. Nempè ubi cæteræ respondent circumstantiæ, aut etiam morbi inflammatorii partium plus minus venæ sectionem urgent, administranda venæ se-

ctio ventilatoria, seu, ut vocant, pro scopo revulsivum & derivativum; (de venæ sectione revulsoria & derivatoria dixi supra in *Prolegom. cap. 3. Artic. 1.* videatur etiam *HIGMORVS* *disquis. Anatom. Corp. Hum. p. 156.*) quod revera suum locum adhuc obtinet, debitis ac selectis in locis instituta, absque tamen nimio ejus secundum alias nationes abusu, in casu quando nimis urgent Inflammatio, & morbus admodum acutus videtur, in tali casu mox in principio vel ante, vel post sudorem prolicitum, convenit sanguinem mittere per venæ sectionem, ut imminuto nonnihil sanguinis quanto, facilius in loco stagnationis seu Inflammationis per vicinos ramos distribui, & ita incrementum nimium Inflammationis præcaveri possit; ita quidem, ut pro scopo revulsivis secetur in regione respectu cordis opposita, in principio sc. Inflammationis: pro scopo vero aversionis secetur vena in regione respectu Inflammationis eadem, sed loco paulò remotiore, in incremento nempe, pro scopo vero derivatorio secetur vena in loco Inflammationis proximo, isto nempe, per quem ordinariò sanguis stagnans refluxere deberet, in statu nempe: ut non semper venæ sectio necessaria sit, nisi in insigni Plethora, aut iis, qui consuetudine se manicarunt, ut statuto tempore inanes instituunt venæ sectiones. Aliàs ingruente Inflammatione repetiti sudores per remedia appropriata, sanguinem congruatum resolventia, & discutientia, subinde quibusvis sanguinis detractionibus præferendi sunt. In principio Inflammationis, tam internarum quam externarum, suadent applicare remedia repellentia, quibus volunt sanguinem stagnantem deponere repellere, vel urgere, ut retrocedat, id est, volunt sanguinem movere à termino ad quem ad terminum à quo. Repellentia autem sic dicta, partim impossibilia, partim sæpè nociva esse, ex hæcenus dictis patet: Nam stante sanguinis circulo, impossibile est sanguinem, qui per arterias influit, per eandem ex loco stagnationis repellere: Nociva autem sunt, quia Repellentia quæcunque, ordinariò ex refrigerantibus aut acidis, aut adstringentibus, & similibus composita, sæpius Inflammationes reddunt deteriores, aut ad scitthos vel etiam ad gangrænam disponere solent: Id quod imprimis in erysipelatibus notum est, in quibus curandis cautiores sunt Chirurghi, quàm Chirurghi, qui omnia humida prohibent, quorum timor sanè est inanis, cum spiritus vini, sperma ranarum, & similia tunc applicentur erysipelati. Verùm, quoniam experientia eas docuit, quod humida, quæ Chirurghi applicant, sæpius deteriora reddunt erysipelata, & omnes inflammationes, quia semper habent Adstringentia, quæ sanguinem antea stagnantem magis coagulant magisque congruunt, & erysipelata in ulcera deteriora transmutant, quæ sunt frequentissima in Gallia propter talem Chirurgorum inertiam; quare cautiores mulieres omnia prohibent aquosa seu Repellentia, quæ sive sint sicca sive humida, semper tamen ex adstringentibus, ut flor. balaustiorum, corticibus capparum & similibus, sunt composita. Certè natura morbi contrarium vult: nam ubi stagnat sanguis, ibi partitumor; ubi partitumor, ibi angustia vasorum sanguinis; ubi major angustia, ibi eadem non per Repellentia aut similia est augenda, quin potius per discutientia aromatica, quantum fieri potest, eadem minuenda, ut materia concreta possit promoveri & removeri. His autem frustra, suppurationis & emollientia externe applicanda sunt inflammationibus. Maximopere ergo fugienda sunt omnia Repellentia & similia, quæ vulgò, utut perperam, Inflammationibus applicantur. Intercipientia quod attinet, seu sic vulgò dicta Defensiva, subinde sunt tolerabilia: sunt autem talia, quæ fermenti acidi vim aut progressum, absorbendo istud aut corrigendo, emendare possunt. Sed de his alibi.

EXTERNA sunt ea, quæ

1. Acidum absorbent, ut saturnina & alcalina.
2. Sanguinem vi aromaticâ alcalinâ dissolvunt, & ita inflammationem discutunt.
3. Quæ temperando murum salium effervescentium concursum, suppurationem adjuvant. Quo facto
4. Abscessus aperiendus, ulcus mundandum, bine consolidandum.

Mundificatio sit exacta, ne tantillum fermenti in ulcere corruptivi residuum recidivas inferre possit. Sed de his externis suo loco in *Chirurgia Medica*.



ARTICULUS II.

DE

INFLAMMATIONE FAUCIUM.

**Q**UOD speciales jam attinet Inflammationes, occupant hæc vel partes internas, vel externas; omnes enim corporis partes, ossibus exceptis, inflammari possunt; quippe his parum sanguinis advehitur. Internas ordine pertractabimus, externas Chirurgie relinquendo. Inter Internas autem Inflammationes se offerunt primò, quando partes faucium internæ, sæpè etiam cum externis, nempe pharynx cum summitate gulæ; Larynx cum aspera arteria; fauces nec non tonsillæ in isthmo faucium sitæ; Uvula; interdum denique musculi faucium & gulæ; musculi laryngis motui dicati, & similes partes vicinæ inflammantur. Inflammatio musculorum colli, in specie laryngis & gulæ, ordinariò nomine ANGINA appellari solet, quæ ita dicitur ab angendo, à Græco ἄγω, strangulo, suffoco. Ab Angina autem excipitur tonsillarum inflammatio, quæ ferè nothæ existit, ac aliàs speciali nomine caret. Angina Barbaris aliàs Squinantia, Germanicè *das Hals geschwür* appellatur. Malè, Pronella, Germ. *die Braune*, quibusdam dicitur, cum linguae saltem ardor, & symptoma sit, & simul quodammodo faucium, in febribus ardentibus familiaris, de qua suprâ suo loco actum. De faucium tamen omnibus ac partium huc pertinentium inflammationibus, cum habeant communem medendi rationem, conjunctim agere placet.

Quoad

ANGINAM

ergò, Fauces afficiuntur in hac ipsa, i. e. ea pars colli imprimis, quam constituit pharynx seu gulæ musculosæ expansio, & larynx seu caput asperæ arteriæ. Et si enim ut plurimum utraque pars, tam pharynx quàm larynx, adeoque utriusque partis musculi, tam interni quàm externi, utur nunc una pars magis, altera minùs inflammantur; tamen pro majori scribiâ theoreticâ Angina à GALENO & TRALLIANO in quatuor species seu differentias, utur saltem speculativas, non autem Practicas, curioso nimis, ut Galenus loquitur, verborum aucupio dividitur, nempe

1. In SYNANCHEN, quando interni faucium seu Pharyngis musculi inflammantur.
2. In PARASYNANCHEN, quando externi faucium seu pharyngis musculi affecti sunt.
3. In CYNANCHEN, in qua internæ laryngis partes sunt inflammatae; &
4. In PARACYNANCHEN, quando exteriores laryngis & gutturis musculi sunt inflammati:

De quibus vid. SENNERTUS l. 2. Pr. Pa. cap. 24. pag. 95. ubi de Angina.

Circa quas observandum est, in Cynanche sæpius simul pulmones plus minùs esse affectos, & non solum internos laryngis musculos, unde etiam tunc temporis tam insignes respirandi difficultates solent adesse, quales in Peripneumonia interdum contingunt, adeò, ut ægri canum more ore hiantes respirent: vid. DECKERS in Barbetæ Prax. p. 47.

FORMALITAS Anginæ consistit in inflammatione, quæ nihil aliud, quàm sanguinis motus retrogradus ex partibus impeditus seu stagnatio est, unde intumescencia laryngis atque pharyngis, respirationem atque deglutitionem notabiliter ledens, nullo aliàs in pulmonibus ac thorace existente vitio.

CAUSÆ.

**CAUSÆ EXTERNÆ** crebriores, quæ in specie Anginam inducunt, præter eas generales, quæ communes sunt reliquis inflammationibus, sunt res ineptæ degluite, quæ in faucibus hærent, & vel nimîa mole eas angustando, & ita vasa comprimendo, vel pungendo, vel acrimoniâ nimio opere eas irritando, ad fibrarum contrakturam, & ad successivas inflammationes, hinc Anginam, disponunt. Sic à spinapiscis in faucibus hærente, it. ex partibus vitri devoratis & faucibus infixis, Inflammationes, & tandem Abscessus faucium & gulæ notatur SCHENCKIUS alique Practici: Ex potu aque fortis aut simillum liquorum corrosivorum, inflammata non rarò fauces & gulam esse, res per se est nota.

Imprimis Inspirata, ut Aer externus, immediato contactu hæc loca irritantia, & ludentia, multum conferunt. Ex simili, sed singulari, inspiratorum vicio, epidemica oriuntur hæc mala, ut plurimum maligna, cum non solum miasma morbosum inspiratum in sui transitu fauces lædat, & acrimoniâ occultâ tanquam tot infixis spiculis eas irritet, sed forsitan etiam sanguinem certo modo alterando, hunc ad facilem sui stagnationem, quin & inflammationem, & febrilem malignam fermentationem disponat; hoc modo enim observate fuerunt Anginæ epidemicæ malignæ.

Ac in specie ad Tonsillarum Inflammationem & tumorem, disponit lymphæ nimis viscida, glutinosa & spissa, eas insarciens ac tumidas reddens, ac naturalem sanguinis motum, ac transitum per & circa glandulas impediens, unde successivè earum tumor. Quin & lymphæ per glandulas oris & vicinarum partium excreta nimis salsa, acris vel acida, ut in affectibus contingit catarrhalibus, excorians aut rodendo dictas partes, nunc graviores nunc leviores inflammationem tonsillarum inferit. Imprimis in hac tonsillarum inflammatione materia viscida, crassa ac mucosa linguam, & fauces incrustat, ac subinde tenacis pelliculæ instar eis adhaeret, ac nihil aliud est, quàm lymphæ tonsillarum ac glandularum vicinarum vitiosa ac impura redditæ, & glutinosa, à nutrimento dictarum partium chyloso, ob earum læsionem non ritè assimilato, ita alterata. Porro tonsillæ habent foramen amplum in summitate sui, seu tonsillarum tunica, crassa foramine apertæ gaudet, quod hiat in fauces, & lympham salivalem nonnihil glutinosam in fauces & gulam emulget pro faciliiori deglutitione: Quando ergò tonsillæ hæc sunt tumida & inflammata, foramina hæc insigniter sunt expansa, & hiant, magisque inde conspicua sunt; unde ab imperitis Chirurgis interdum pro ulceribus Tonsillarum, in earum inflammatione habentur, observante hoc jam olim SCHENCKIO in l. 2. Observ. ubi de Tonsillis.

Præterea inter causas externas ad Tonsillarum inflammationes, item ad faucium inflammationes seu Anginas disponentes, sunt in specie subitaneum frigus inspiratum, aut potus nimis frigidus post nimiam ac intensam corporis incallescencia; his enim læsæ fauces & gula, atque sanguis in istis spissior factus, stagnando, inflammationem inferunt.

Præter has causas externas dantur INTERNÆ, quæ sæpius ad Anginam disponunt, uti sunt consuetæ sanguinis evacuationes suppressæ, imprimis mensium ac hæmorrhoidum suppressio, idque speciatim in talibus subjectis, quæ ante, hac jam Anginâ laboraverunt, & ad Anginam disposita sunt; quando nempe jam istæ partes, quæ fauces formant, quavis occasione prægressâ debilitatæ sunt, & ita robur inæquale patiuntur, faciliè exinde à sanguine stagnante denuò inflammari possunt: Unde etiam mulieres, quando non ritè fluunt menses, aut aliæ ordinariæ evacuationes intermituntur, subinde pleuritidi, item Anginæ sunt obnoxie: hinc quoque in tali casu præservationis gratiâ venæ sectiones instituendæ sunt, sicuti curationis gratiâ venæ sectiones in pedibus imprimis, non verò brachiis: Et novi ipse mulierem, quæ nisi singulæ scarificationes instituat, Anginam incurrat.

Pertinet huc morbi alius in Anginam transitus: quæ ratione dysenteria præcurata, aut intempestivè suppressa, præsertim dysenteria epidemica, ut crebrò pleuritidem, ita etiam anginam inferit, qualia exempla non tantùm recenset LA-MONIER de Fluxu dysenter. cap. 5. sed & HILDANUS Traët. de Dysenteria observat.

Observantur interdum etiam Anginæ epidemicæ, ut dictum, conjunctæ ut plurimùm cum febre continua ardente, eaque in specie maligna, in quibus sanguis ita disponitur, ut faciliè stagnando det Inflammationes: Nam cum miasma morbosum inspirando imprimis attrahatur, hoc in transitu se affigendo faucibus, & laryngis partibus, has ita afficit, ut imprimis istis in locis inflammatio ista seu angina oriatur, qualis fuit ista, quam tractat BARTHOLOMÆUS de Anginæ Epidem. cujus quoque exempla habet WIERUS in suis observat. Et singulare itidem exemplum Anginæ admodum malignæ contagiosæ epidemicæ videbitis in Panarollo Pen. rec. 5. Obs. in puero, ubi parum mordendo digitos obstetricis mox in parte commorsa carbunculus excitatus, & obstetrici simul Anginâ correpta fuerit.

Præter dicta immunis Mercurialis pro cura luis Venereæ ineptè instituta, Inflammationem tonsillarum & faucium subinde inferit, eamque satis periculosa, si nempe nimis copiosa sit salivatio, sanguis circa dicta loca stagnat, ab acrimonia caustica Mercurii fauces vellicante, liquore lymphatico corrosivo easdem rodente, subinde graves faucium In-

flamma-



# Faucium & Tonsillarum Inflammatio.



inflammationes, interdum suffocationes excitantur; quale exemplum observat SCHENCKIUS l. 6. Obs. Conf. T. 4. CHENIUS Hipp. Chym. c. 125. p. 225, & SYLVIUS de lue Venerea. Sane luis Venereæ virus acre, ut speciatim lymphâ glandularum conglomeratarum inficit, ita & hujus ratione sapissimè excoitationes ac inflammationes faucium, subinde perquam contumaces, inserit.

Vulgò etiam Anginæ ex luxatione & compressione vertebrarum colli fit mentio: verum cui nota est structura vertebrarum colli, videbit, quod hæc sententia sit nata ex falsa hypothese, idque ob malè intellectum Aphor. 35. Sect. 4. „HIPPOCRATIS: Si à febre detento repente collum intorqueatur, ut vix deglutiri queat, nullo tamen timore, intus vel foris apparente, lethale est. Hic enim aphorismus ordinariè interpretatur de Angina ex luxatione vertebrarum colli, aniamque huic sententiæ dedit GALENUS, quasi luxatio vertebrarum in eodem loco intelligatur: Sed structura, & articulatio vertebrarum colli vincet, eas difficulter admodum luxationem pati, atque tunc paralyticè potius universalem, quàm Anginam, excitare. Nam in dicto Aphorismo aliud intelligitur, quàm convulsio colli, Emprosithotonon ac episthotonon similis; Utrouque enim in casu suffocationis periculum imminet, cui si superveniat Angina, seu tumor inflammatorius colli, lethale est. Quod non possit fieri talis Angina ex luxatione vertebrarum colli & cervicis, facillè patet, cum impossibile sit, ut luxentur: Nam si luxarentur, necesse est, ut summâ vi id fieret, quòd facillè necessitatè spinalis medullæ contorqueretur, unde abortio sensus & motus, mortisque appropinquatio, & potius affectus apoplexiæ similis quàm Angina sequeretur. Sunt enim vertebrarum cervicis processus ita invicem inarticulati, ut citra fracturam luxari nequeant; & si luxarentur, præsentaneam potius mortem, quàm Anginam, inferrent.

Alias dividere etiam solent inflammationes tonsillarum, & faucium in exactam seu genuinam, & non exactam seu notham. Ista autem, quæ rarior est, tonsillarum inflammatio, quando solus saltem sanguis stagnans in dictis locis inflammationem inserit, adeoque est, ut vulgò dicitur, vel sanguinea, vel biliosa, Acutum malum est, de quo hæcenus dicta ferè intelligenda sunt. Hæc est, quando sanguis chylosus, seu, uti vocant, lymphâ glutinosâ permixtus, stagnando inflammationes inserit, & vocatur Inflammatio notha seu pituitosa; est tantum tumefactio serosa instar partium plus minus oedematosa, & excitatur ferè occasione lymphæ vitiosæ, glandulas dictarum partium malè afficientis, loca vicina rodentis, plus minus excoitantis, & ita junctam phlogosin inducentis. Quæ ipsa vitiosa lymphæ, prout plus minus circa dicta loca stagnat, etiam plus minus easdem tumidas reddit, & circulationem sanguinis plus minus impediendo aliqualem inflammationem, aut ejus dispositionem junctam, habet. Et talis notha Angina frequentius occurrit cum tonsillarum inflammatione, quarum tumor crebrius occasione vitiosæ lymphæ supervenit. Nunc febris expers est hæc notha, nunc lentam saltem junctam habet. Et de ejusmodi Angina notha seu alba dicta, eaque satis periculosa vid. M. A. N. C. Ann. 6. Obs. 152. p. 28. Pertinere huc videtur etiam Angina quasi membranosa species, quæ vid. in SENNERTO Præx. l. 2. P. 1. cap. 24. & M. A. N. C. n. 2. Observat. 14. p. 31.

## DIAGNOSIS.

Quoad DIAGNOSIN; præter signa generalia omnium inflammationum, nempe Calorem, Dolorem, Tumorem, & interdum visibilem Ruborem faucium, quæ facillè possunt conspici, si os aperitur (nisi in Cynanche, ubi vix tumor ullus apparet,) in specie in incipiente inflammatione faucium & tonsillarum adest difficilis colli motus non absque dolore; item difficultas quædam respirandi adest propter vias angustatas; idque imprimis ubi larynx est affligitur: difficilis etiam adest deglutitio, imprimis ubi pharynx, minus verò ubi larynx est inflammatus. Et denique dolor ardens percipitur in faucibus, præprimis, si Angina commune malum observetur, aut causarum quædam externarum præcesserit.

In facta verò jam Angina signa sunt (1.) Respiratio plus minus abolita, & non nisi cum summa difficultate, reiterata, ita ut etiam, in quibus gravius affligitur larynx, his etiam suffocationis metus subinde adfit, sine pulmonum & thoracis affectibus.

(2.) Deglutitio etiam notabiliter est impedita, ita ut

etiam liquor in ore detentus vix gulam intrare possit: aut si assumi debeat, propter summam tamen faucium angustiam & laryngis irritationem denudè sursum per nares regurgitet; quam speciem adeste dicit in Hydrophobia JOSEPHUS ab AROMATARIIS, ut ut pauculi adfuerint.

(3.) Dolor circa guttur & fauces insignis & admodum urgens, tam ardens & rodens, quàm pulsans aut etiam crebrius pungens.

(4.) Febris quoque adest acuta & continua in Angina; quamvis interdum typum tertianæ continuæ aut tertianæ productæ, seu cujus paroxysmi ultra 20. horas durant, habeat, prout vel exquisita magis vel notha est Angina. In illa est acuta, cum pulsu in principio tensivo & quasi convulsivo, magno & undoso, instar pulsus Peripneumonicorum, qui tamen in progressu, & in his, quos suffocatio vehementius urget, parvus, & rarus, tandem creber ac inæqualis, magis observatur, juxta GALENI delineationem; siquidem pulsus ita describit: „Anginæ pulsus tensione quadam præditus est & convulsio similis, magnus & undosus, ut pulsus Peripneumonicorum: quicumque vehementer ex illis suffocantur, habent parvum & rarium; ubi jam angunt, crebrum & inæqualem. In hac tamen subinde febris lenta conjuncta solet esse.

(5.) Lingua rubet, ac insigniter tumet; unde etiam ejusdem motus plus minus impeditur, ac faucibus Anginæ præclusis sæpius simul & lingua filum viscidum propendit, seu copioso muco viscido ac glutinoso continuo obducitur, quod nihil aliud est, quàm lymphæ ex glandulis, speciatim tonsillis affectis inspissata ac inquinata, nempe mucida, salsa, amara & tenax, quæ successivè linguam & fauces intrustat; sæpius etiam est arida aut fissa, interdum scabra.

Omnia hæc symptomata sunt periculosiora & graviora in Angina, ut plurimum remissiora in tonsillarum inflammatione: vid. RIVERIUS & SENNERTUS. Interim, quæ pars magis laboret, an pharynx, an larynx? ex lesionibus respirationis, item deglutitionis, & situ doloris ac tumoris, perscrutandum venit.

Tonsillarum quoque inflammationibus occasione lymphæ vitiatæ, spissioris scilicet & acidæ acrioris, concitatis, febris continua, sed magis lenta, est junctæ, fauces quidem rubent, sed magis inflammatae sunt, tonsillæ verò tumide insigniter prominent.

## PROGNOSIS.

Quoad PROGNOSIN; inflammationes hæc tribus modis finiuntur: aut enim evanescent & retrocedunt subito, aut discutiuntur, aut suppurantur, aut egrum suffocando interimunt: Et si suppurantur, in specie tonsillarum inflammationes, abeunt interdum successivè in ulcera diuturna, & difficulter curabilia.

Quod si ex dictarum partium inflammationibus mori contingat eger, ut plurimum suffocatus interit; & quidem dudum duplici ratione: vel à tumore, vel pure ad pulmones depluo vid. FORESTVS l. 15. Obs. 25. de Angina in pus mutata, quod ad pulmones, & pectus ruens ferè suffocavit egrum.

Quò magis faucium est angustia & spirandi difficultas, ed periculosius malum; ut plurimum enim intra quartam diem strangulat; interdum verò, sed rariùs contingit, per modum criseos, sudore, hæmorrhagiâ, aliove modo terminatur: Refert exemplum FORESTVS lib. 13. Observ. 14. Cynanches verè quarto die per fluxum mensium criticum curatæ; vid. HIPPOCRATES Prognostic. Text. 23. §. 3. 4. 5. Conc. Tranot. 5. 3. §. 96. 5. 4. aphor. 45. Contra, quò magis ad extra tumor fertur, ut respiratio liberior fiat, v.g. in parasynanche, ubi exteriores laryngis musculi magis inflammantur, illi cum rubore, & tumore colli externo, & interdum ad pectus extenso, si cum tumore magis interno, sed exili: media ratione se habet Synanche, ubi interiores laryngis musculi inflammati ad fauces & collum plus minus protuberant.

Quò verò fauces & cervix magis rubent, ed minus periculi; partes enim magis externas inflammari indicio est: vid. HIPPOCRATES Prognostic. loco allegato §. 8. Sect. 6. Aph. 37. & 57. aphor. 49. Qui textus, licet contradicere videatur Observationem ejusdem HIPPOCRATIS, quam Epid. lib. 5. text. 36. allegat; decidi tamen potest, distinguendo inter ruborem partium externarum, qui fit per metastasin, & illum qui fit per epigenesin seu extensionem: quorum hic lethalis, ille minus periculosus existit: vid. LAVRENTIVS Anat. lib. 5. Qu. 5. p. 148.



Fit interitum ut Angina, tumore & rubore foris apparente per metastasim causæ peccantis in principio subito evanescat, sed in pleuritidem mutetur, quæ conversio est admodum periculosa, juxta Coac. *Prenot. S. 3. Text. 101.* nisi ad locum minus periculosum aliam materia peccans conversa, aut critice discussa fuerint, quod præprimis ex tolerantia ægri dignoscitur: Nam inflammatio, quæ facile & subito evanescit, ad interiores faucium partes recurrendo, suffocationem infert, aut alio in loco inflammationes periculosiores concitat. Sic AMATUS LUSITANUS *C. 3. Curat. 37.* periculosum Anginæ in pleuritidem transitum observat: vid. HIPPOCRATES *7. Aphor. 11.* Nam vel ad cerebrum transferatur, unde cephalalgia, deliria, phrenitis; Vel ad pulmones, peripneumonia, pleuritis; vel ad cor, unde syncope; etiam ad alia loca, unde varia mala. Pertinet huc *Aphor. 10. Sect. 5.* HIPPOCRATIS: Quibus ex Angina in pulmonem mali fit conversio i. e. qui peripneumonici sunt, intra 7. diem moriuntur; si verò hoc effugiant, empyici evadunt. Aphorismum hunc optimè explicat LINDANUS; nempe ea Angina, quæ est in arteria aspera circa laryngem, si suppuretur, ut magna ex parte fit, si contingat eam membranam, quæ succingit asperam arteriam, per materiæ suppurationis turgescitiam & pravitatem rumpi, ut metastasis materiæ fiat in pulmones, intereunt intra 7. diem; Inflammationem autem ab hoc materiæ decubitu pulmo, hinc peripneumonia; aut suppuratur pulmo, unde empyema: Conf. HIPPOCRATES *Prognost. Sect. 23. Text. 15. & Coac. Prenot. S. 3. Text. 105. & FORESTVS l. 5. Obs. 24.*

De cætero ex sputo quoque citius tardiusve prodeunte in Angina salutis & mortis signa petuntur: dum Anginosi si non brevi costæ exspuant, lethale, juxta Coac. *Prenot. Sect. 3. S. 141.* ut si nimis arida sputa fuerint, *S. 101.* In Anginis sine signis (nempe Coctionis in sputo quasi criticis) dolores in caput conversi lethale inquit HIPPOCRATES. Nam cum sine crisi à materiæ translatione fiat, manente eadem faucium angustia, morbum non imminui, sed augeri indicio est; vid. Coac. *Sect. 3. S. 112.* itè si ad alias partes sine ejusmodi signis dolor extendatur, v. g. ad crura, hypochondria, juxta *S. 113. & 114. & lib. 5. Epidem. Text. 36. S. 12.*

Febris cum Angina conjuncta sapientius est continens, seu eodem tenore continuò ægros affligens; interdum typum tertianæ continuæ repræsentat; interdum hemitriteos.

Ista Angina, quæ à tertiana continua producta, seu cujus paroxysmi 36. horas perdurant, ut plurimum solet esse lethalis, observante LINDANO in Hartmannum.

Quò minus oculis se sistit tumor, tam in faucibus, quàm extra eos in collo, eò majus imminet periculum; quia interea laryngis & pharyngis partes sunt obsessæ: quò magis verò ab extra conspicuus tumor, eò tutius. Observetur hoc contra perversum usum Adstringentium & Repellentium, quibus in principio adhibitis tumor cogitur, ut interiores partes magis occupet. Cerrè interna talis inflammatio paucis est tuta, unde ex omnibus Anginæ speciebus omnium gravissima & periculosissima est Cynanche, ubi museuli laryngis sunt inflammati; hinc Paracynanche; levior ad huc est Synanche; levissima omnium Parasyynanche.

Denique Anginosi, sicut strangulati & suffocati, spuma circa os apparens sæpè lethale signum est, teste HIPPOCRATE *S. 2. Aphor. 43.* idque imprimis, quando cum tali circa os spuma magna adsit respirationis angustia insignis.

Tandem si in Angina venæ raninæ incisæ nihil aut parum sanguinis fundant, malum signum est; contra si bene fluant.

## C U R A.

Consideravimus Inflammationem faucium & colli, partiumque istarum, tam internarum, quàm externarum: Superest, ut nunc consideremus CURAM, quæ triplici imitatur scopo: scilicet

- I. Ut heterogeneum, si quod est impactum, v. g. spina, tollatur.
- II. Ut sanguinis stagnatio tollatur, ipsique motus naturalis restituatur.
- III. Ut, si illud fieri nequit, per suppurationem id educatur.

Priori indicationi quomodo satisfaciendum, ex Chirurgicis peti debet; Nunc ratione secundæ observandum, illam perfici partim sanguinis missione revulsoriâ ac derivatoriâ, partim dia phoresi & attenuatione humoris impacti, per ab-

sorbentia & sudorifera. Vno verbo: Cura in omnibus est eadem, quoad remedia interna, cum reliquis Inflammationibus. Quoad Externa verò, specialem merentur considerationem Gargarismata, Inunctiones, Cataplasmata, & similia resolutiva, quæ in faucium, oris, tonsillarum, laryngis, pharyngis, uvulæ & similibus partium inflammationibus solent esse peculiariora.

Pro legitima ergo Cura Anginæ ac cognatarum Inflammationum faucium observandum:

1. INTERNE in Angina & reliquis faucium Inflammationibus etiam omnia ea conveniunt, quæ aliàs in omni Inflammatione, speciatim pleuritide, in usu esse solent, verbi gratiâ *Mixtura simplex, spiritus nitri dulcis, densi apri, antimonium diaph. salia volatilia, &c.* Sic VALE-RIOLA *Obs. 12. l. 3.* refert, quod rasura dentis apri ad ʒi. cum oleo amygd. dulc. & saccharo cand. propinata sit optimum remedium Anginæ, non minus quàm pleuritidis. In specie quæcunque animalium excrementa seu stercorea præ reliquis eminentiam habet, & in specie à PARACELSO & HARTMANNO insigniter commendantur interno & externo usu in principio Anginarum; imprægnata enim hæc, & imprimis avium excrementa, sunt sale volatili nitroso quasi ammoniacali, quæ omnes Inflammationes, imprimis Anginas, discutiendo & resolvendo sistunt. Præceteris v. g. stercore equinum, in specie Admissarij, ejusque expressus succus, vel hujus parum in potu ordinario maceratum & expressum si assumatur, expectato sudore, egregiè convenit, & Anginam in prima herba detrunctat; id quod etiam de albo græco seu stercore canis ad ʒi. ut & de stercore ovium & caprarum, similiter assecurari debet: externè convenit nidus cum stercore hircinum. Sanè hæc & similia remedia cum debito sudore, in Inflammationibus administrata, in specie in paroxysmo Anginarum, & quam diu ægri deglutire possunt, multum opus adferunt, quoniam febrem compescunt, sanguinem resolvunt, & ita inflammationem tollunt. Conveniunt ergo in omnibus à causa interna enatis in primis acidum infringentia, sanguinem dissolventia, & mediantè blando sudore partes abstergentia, quæ tempestivè adhibita sapientissime sunt salutaria: e. g.

- ʒi. Aquæ prunell. ʒiii.  
Spiritus nitri dulc. ʒss.  
Dent. apri pulveris. vel lapill. cancr. præp.  
Antimonij diaphor. an. ʒi.  
Laud. opiatij gr. ij.  
Syr. semperparvi ʒi. M. S.  
Potio sudorifera.
- ʒi. Antimonij diaph. vel Bezoard. min.  
Dent. apri, vel ebore, sine igne vel max. luc. pisc.  
Nitri antimoniat. an. ʒi.  
Sacch. ʒi.  
M. f. pulvis. D. S.  
Pulvis refrigerans.

Vrgente febrili sit convenit Julepus & floribus papaveris, eorumque tinctura cum spiritu nitri dulci.

In horum usu & quidem cum diaphoresi, seu sudore persistendum, modò ægri illa deglutire possint; cum canalis ac syringa, quam Riverius Pr. l. 6. c. 7. & c. 3. *Obs. 73.* pro alimentis & medicamentis per gulam ad ventriculum impellendis, non semper applicari possit, nec cum effectu adhibeatur.

II. In Tonsillarum ac quibusvis partium oris, Anginis, & in genere in omnibus Inflammationibus, semper simul lymphæ habonda est ratio, tam quæ nimis crassa, interdum simul acida, aut alio modo vitata, hinc inde partes ferè omnes oris internas dense incrustat, quàm adhuc circa glandylas & in vasis lymphaticis hæreticujus vitis per medicamentum interna antiscarrhalia succinata, myrrhata, item volatilia, & absorbentia, ac similia succurrendum est; unde & liquor Cornu Cerui succinatus expectando sudorem in principio inflammatarum tonsillarum est nobilis.

Cum his III. Si ita visû fuerit, mox ad Venæ Sect. accedendum erit in corpore plethorico, si ve ei præmittatur sudor, si ve ei postponatur perinde est; Nam interdum utrumque in Angina benigna locum habet. Et quidem venæ saphenæ in pede propter revulsionem universalem, postmodum venæ in brachio alterutro vel utroque propter revulsionem particularem seu aversionem, & quidem in statu venæ raninæ sub lingua propter derivationem, instituenda est. Has inter Venæ Sectiones interdum una alterave sufficit, interdum omnes admittendæ sunt; & quidem deficientibus mensibus vel illidem in fluxu suppressis, vel hæmorrhoidibus, vel isiniam-



matris, cum Angina conjunctis, vel concurrente alio simili vicio, semper in pede secanda est vena, secus ac *FORESTUS* l. 4. & *SENNERTUS* Pr. l. 2. P. 1. c. 4. rem sibi conceperunt. Ceterum Venæsectionibus solis non fidendum est, quoniam sæpius ægri, quando videntur meliores, subito non raro suffocati intereunt; cujus rei exemplum notari dignum videbitis in *BARBETTE* Praxi l. 2. c. 1. de Angina, ubi post iteratas Venæ Sect. æger videbatur sanatus, qui tamen subito suffocatus est. Quin etiam præter remedia interna ipsa Venæ Sectio interdum aliquoties repetenda est, pro circumstantiarum, subjecti, temporum anni, affectuum adiutorum, ratione: vid. *Forstus* l. 15. Obs. 16. in Schol. & *SYDENHAM* de morbis acut. S. 6. c. 7. ita ut, prout corpus est juvenile vel senile, prout plethora major vel minor, prout effervescencia febrilis impetuosior vel remissior, prout incrementum morbi acutius remissiusque, prout patiens sanguinis detractionibus magis, vel minus adversus fuerit, eatenus Venæ Sectio nunc semel, nunc sæpius administretur, idque eo magis, quod minus interna remedia ob faucium occlusionem exhiberi poterunt; cautiùs tamen in Angina maligna instituenda, & vix nisi in primo morbi principio.

Ceterum quidam cum Veteribus etiam *venarum jugularium sectionem* fadent, quam commendatam ac illustratam videbitis in *RIVERII* Praxi l. 6. c. 7. p. 298. *ZACUTO LUSITANOL.* 1. Prax. Admir. Obs. 5. *BONETTO* Mercurio compital. p. 15. §. 3. *BARTHOLINO* in eleganti Tr. de Angina puer. epidem. Imo *RIVERIUS* modum eam administrandi prolixè tradit. Verùm subinde est periculosa, & non nisi ab experto & erudito Chirurgo cautè peragenda venit; qui rariores apud nos sunt, hinc meritò ab illa abstinemus. Tutores sunt cucurbitule scarificatæ cervicis, scalpulis, & mento admoveendæ: vid. *ZACUTUS LUSITANUS* l. 4. Obs. 94. Quod attinet Venæ Sectionem raninarum sub lingua: hæc tantummodo in statu morbi convenit, præmissis scilicet reliquis venæ sectionibus, quando Inflammatio jam nullum amplius augmentum capit: Secatur tunc cum in finem, quia *ranina* sunt ista vasa, per quæ naturaliter sanguis reflui solet, qui in locis vicinis stagnando Inflammationem infert, uti etiam ita impeditur stagnatio, & revocatur in motum naturalem sanguis sectis venis raniois: & quidem si aperta hæc ipse quocunque in casu benè fluant cum impetu & quasi saltu, bonum signum est; si verò parum vel nihil sanguinis stillent, pro malo, imò lethali signo habetur: vid. *M. A. N. C.* Ann. 3. p. 576. Interdum sola hæc venarum raninarum sectio præcavet Anginam, si accedente Angina præservationis gratiâ mox aperiatur; idque speciatim eo in casu, quo corpus non est nimis plethoricum, nec fervor ac effervescencia sanguinis febrilis adeò intensa est, sed quando tantum oritur ex impedimento aliquo sanguinem in suo refluxu impediente, si in tali casu mox in principio secetur ranina, prævenitur Malum: Aliâ non nisi in perfectè Anginæ statu utile erit illas secare. Huc etiam spectat, si hirudines venulis his applicentur, de quibus videatur *ZACUTUS LUSITANUS* l. 2. Pr. Histor. cap. 12. Nec obstat, quod minus in casu urgente, & suffocationis periculo imminente, etiam sine alia evacuatione prævia venas has aperire liceat: vid. *ZACUTUS LUSITANUS* l. 4. pag. 287. & *ROLFINCIUS* l. 3. Conf. 6.

IV. Observandum, in Angina febrium malignarum symptomata, seu quod ferè idem est ac Angina epidemica, nihil attendendū priùs, quàm ut specifica ista malignitas corrigatur, & appropriatis SUDORIFERIS, junctis opiatis, maturè discutiatur ac ejiciatur; quoniam curato morbo, symptomata ferè spontè ac facillè acquiescunt. Ex in tali casu locum non habent, aut saltem non nisi cautiùs & in primo principio, antequam malignitas debacchari incipiat, insituantur purgationes & Venæ Sectiones, ut rectè *PETRÆUS*, & *DECKERS* l. 4. p. 49. monent. Quin potiùs præmisso ferè Clysmate, solis sudoriferis & alexipharmacis studiosè est insistendum, quibus nempè ebullitio febrilis sedetur, ac malignitas rejiciatur. Ipse verò Medicus caveat sibi in tali Angina ab halientaliter agrotantium, ne ipse similiter ab hac malignitate corripiatur, cum ferè admodum contagiosa esse soleat.

V. In Angina Cura VOMITORIA à quamplurimis insigniter commendatur, v. g. ab *HARTMANNO* in sua Pr. Chymiatr. p. 130. & *BARTHOLINO* de Angina pueror. & quidè moxente *HARTMANNO* in Angina incipiente & confirmata; item à *RULANDO* in Empyr. observ. l. 2. p. Estimul. Oper. Tom. II.

95. qui sæpiùs cum fructu usus fuit isdem. Ultimo harum singularissimum usum videre potestis in *RIVERII* Praxi, l. 6. c. 7. & Cent. 2. Observat. 10. & 24. item in C. 4. Obs. 60. & in aliis multis locis; qui aquam benedictam morbum non raro intrà biduum dissolvere perhibet. Verùm & laudem & vituperium merentur, & cautè admodum in horum legitimo usu procedendum est. Legitima ergo observanda occasio, seu anima omnis Praxeos, in Vomitoriorum usu: *Dua enim sunt tempora, in quibus conveniunt Vomitoria, nempe principium, aut periculosissimus status morbi.* Quoad principium morbi, subinde admodum proficua sunt Vomitoria: Fit enim, interdum sæpe, ut dicit *LINDANUS*, ut causa occasionalis remota Anginæ sint vitiosa excrementa in stomacho & in primis viis itabulantia, in specie humor, quem vocant bilem fruginosam, in qua, uti notum est, peccat acidum imprimis, dum illa bilis subtilia & morsicantia effluvia mittit ad oesophagum & fauces, ubi ipsorum stimulo fit inflammatio & angina. Quando ergo ægri testantur, se sub primo principio morbi percipere vitiosos sapores in lingua, fruginosum, acrem, amarescentem, plus minus nidosum cum ardore quodam, quasi sode in gula quandam titillationem, seu quasi erosionem, fluctuationes in stomacho, nauseam, ac anxietates præcordiorum, id quod sæpiùs fit in Angina; in tali casu protinus & audacter operanda est vomitoria, in specie antimonialibus, imprimis aqua benedicta *Rulandi* seu Infusione antimoniali, ut ita præcaveantur futura symptomata, dum non tantum quoscunque vitiosos humores ex ventriculo tollit, sed juxta vim emeticam etiam interdum sudorem movet. Ita quando gravitas in hypochondriis sentitur, vomitoria itidem conveiunt. Præterea in Angina maligna & epidemice grassante, & que per contagium afficit egrum, de quibus videatur *WIERUS* in observat. non secus ac in peste vel febribus malignis contagiosis, optimum videtur consilium, mox in primo principio interdum suppeditare vomitorium, utpotè in quibus eorum usus est maxime necessarius, modo maturè administretur. Ceterum post primum principium conveniunt etiam Vomitoria in periculoso morbi statu, nempe eo in casu, quando scilicet jam facta est suppuratio, & symptomata maxime urgent, v. g. quando fauces abscessu sunt præclusæ, dum propter angustiam, & ineptitudinem loci, aut profunditatem situs, abscessus suppuratus scalpello aperiri nequit, quin potius ex tumore imminuat suffocatio; aut si spontè aperiatur, metus sit, ne ruptus abscessus in pulmones irruat, & similiter egrum suffocet, aut in stomachum irrumpat, & eundem insigniter viciet. Tali sub anxio statu, ubi aliàs arcta sunt auxilia, ut abscessus aperiatur vi, ne desperatum relinquamus egrum, ultimum quasi refugium est vomitus, quo quasi concutiat abscessus jam maturatus. & ita ruptus, pus per superiora effundat; quod *RIVERIUS* C. 4. & *RULANDUS* Observ. all. confirmant.

Periculosum equidem est remedium, dum fauces occlusæ, provocare vomitum, propter suffocationis metum, quatenus *TRINCAVELLIUS* l. 3. c. 7. testatur, feminam quandam ex assumta cassia secuto vomitu strangulatam fuisse; *interim tamen satis tutum est remedium, quod est unicum, dicit CELSUS.* Quod si medicamenta vomitoria non possint semper deglutiri, nihilominus tamen, si tantillum deglutire possunt ægri, sufficiunt Infusa antimonialia; sin verò nil deglutire queant, vel pluma oleo illita subinde irritandæ fauces, vel liquor vomitorius isdem subinde instilandus, aut *Mercurius vitæ melle* exceptus faucibus illinendus. His enim modis ad vomitum provocatur stomachus, gula concutitur, & ita abscessus rumpitur.

VI. Purgantia, quemadmodum in quibusvis Inflammationibus internis, ita in Angina quoque vix locum habent, nisi primas vias statim in principio pharmaco blandiore, progressu temporis clysteribus, evacuare mens sit, quos quotidie repetere convenit.

VII. In Tonsillarum Inflammationibus sæpiùs subindè recurrentibus, præsertim illa, quæ ex lymphæ vicio, v. g. scorbuto aliove simili habituali, crebriùs recidivat, præsertim ubi ætatis aut aliarum circumstantiarum ratione à priori malum non benè curabile existit, *FONTICULUS*, brachio in usus convenientissimus est consilium præservativum. Sæpiùs enim evenit, ut qui semel in quadam parte inflammationem suppuratam fuerint passi, & forsan fermenti ulcerosi aliquid residuum manserit, & facillè occasione ex irritatione undecunque facta, præsertim in corpore cacochymico, mox recidivet inflammatio, idque facillè in locis glandulosis; Quibus in



bus in casibus pro Cura palliativa fonticulus videtur convenientissimus; potissimum cum Anginâ singulis annis repetente, fonticulus sub mento à natura excitatum præservasse. ZACUTUS LUSITANUS l. 1. Prax. Admir. Obs. 96. testetur. Unde non incongruens erit, statim in Anginæ principio post primam sanguinis missionem vesicatorium cervici apponere; vid. RIVERIUS. Pr. l. 6. c. 7.

VIII. Non confundendæ sunt Inflammationes alique faucium partiumq; vicinarum tumores, live à sanguine, live ab aliis contentis excitentur, cum PRUNELLA, isto nempe lingvæ & faucium symptomate, quod in febribus acutis, ac in specie Castrensibus seu Hungaricis, familiare est. Ut plurimum hoc evenire solet, ut omnes de Angina tractantes Practici remedia contra prunellam usitata ad Anginam simul consignent, facili cum legentis confusione. Et talia prunellæ dicata remedia sunt in specie ex Canceris, sempervivum majus (annumerantur adstringentibus vulgò, sed qua ex ratione, non video) prunella, mucilagineus, sal ammoniacum, nitrum, butyrum, lardum, &c. quæ ipsa minus Anginis, nisi aliis temperata vel cautè applicata, convenire possunt. Quando talia laudat PARACELSUS, respicit ad Prunellam, symptoma illud febris ardentis & morbi Hungarici; adeoque non in Angina, sed Prunella locum habens, qualia sunt:

℞. Aquæ semperviv. maj. ℞j.  
Succ. ejusd. mediocr. expr. ℞iij.  
Sal. Ammon. ℞j.

M. F. Gargarisma:  
D. S.

Dissolvens gargarisma.  
Vel

℞. Cæter. fluxiat No. vj  
Herb. semperviv. maj. M. ℞ij.

Contundantur, succus exprimatur;  
D. S. ut antè.

Succus hic in prunella, febris ardentis ac morbi Hungarici comite; non verò in Angina, conveniet.

Item.

℞. Aquæ ex succ. semperviv. maj. ℞j.  
Succ. Cancer. fluxiat. ℞vi.  
Sal. Ammon. ℞iij.

M. pro Gargarismate.  
D. S. ut antè.

IX. Externa remedia ipsis partibus inflammatis, faucibus, tonsillis, &c. applicabilia, ut sunt gargarisationes oris, tincts, cataplasmata, unguenta & emplastra, & similia, ed sint directæ, ut (1.) quantum potius, resolvant & discutiant sanguinem stagnantem, & inde natam inflammationem; & talia sunt blanda incidentia, seu penetrantia volatilia, &c. Scopus hic contrarius est vulgari methodo, qui in principio Repellentia, Adstringentia & Refrigerantia, quæ tamen pessima sunt, suadet. Quod si tamen hoc fieri nequeat, (2.) ejus suppurationem seu maturationem adjuvent; uti sunt temperata & emollientia: (3.) Tandem maturatum abscessum aperiant, eadem aut acrioribus mista; item auxilla Chirurgica, aut denique vomitoria: (4.) Aperitum abscessum purificent & consolident per Vulneraria & Adstringentia: (5.) Partem restitutam denuò firmet, ac naturalem tonum ejus restituant, nempe per adstringentia, ne harum atonia in causa sit, ut sepius recidivent inflammationes. In principio quidè ratione vulgaris medendi methodi in gargarismatibus Resolventia sola rarò usurpantur, sed adstringentia, nunc sola, nunc discutientibus addita, ut nempe internè partibus oris & faucium nonnihil adstrictis nimium tumoris partium Internarum incrementum preveniatur, ne deglutitio aboleri, aut suffocatio inferri possit: sed quæ præposterè hoc fiat, ex doctrina Repellentium manifestum; ac præterea periculum est, ne hujusmodi Adstringentibus superiora saltem loca proximè stringantur, tumor autem & inflammatio partium inferiorum sic intendatur, & ad interiora convertatur, hinc strangulationis metus intendatur, ut rectè comprobant MARTIANUS in Hippocr. lib. 2. de Morb. Sect. 1. §. 24. HEURNIUS in Praxi de Anginâ, ac SYLVIUS l. 1. Prax. cap. 49. §. 81. & seqq. ut etiam DECKERS in Comment. super Prax. Barbette, p. 37. ut taceam periculi, quod in Angina maligna ex ejusmodi Repulsionem metuendum. Repellentia idèò dammandæ, quia repellere est impossibile, ac hunc tumores, quatenus non refluit sanguis; dum contra adstringentibus affluxum & refluxum impedimus, exasperamus tumorem: unde cauti sumus in lectione Practicorum quod hoc pñctum, cum planè insulsus datur quàm

plurimorum, in hoc passu, processus. Potius ergo gargarismata talia conveniunt in declinatione morbi, ut Adstringentibus talibus partes per inflammationem læsæ & plus minus relaxatæ firmentur denuò, & in debitum tonum restituantur. Sola ergo in principio conveniunt Resolventia, & hinc emollientia, tam gargarismata, quàm cataplasmata. Vitanda tamen sunt nimis laxantia, & emollientia quoque, ne nimio horum usu affluxui fores pandantur. Quoad gargarismatum usum observandum est, ea quodammodo suspensa esse, quia partes inflammatas nimis commovent, quæ tamen potius quietem postulant, ne ex motu dolor, ex dolore tumor, adeoque inflammatio saltem doloris ratione sic intendatur. Cum enim partes faucium doleant, difficulter & non sine dolore ægri possunt gargarizare: nec gargarismata siphonis vi, eaque magnâ, impelli debent; violentior enim syringatio partes inflammatas magis irritat: Sic in Anginis nihil molestius est, quàm gargarizare, cum propter liquidam aeris cum aqua gargarizando in angustis faucium labor, motus, dolor, &c. inflammationem potius augeant & exasperant. Propterea saltem in principio conveniunt gargarismata, in progressu autem & statu morbi quidam omnino prohibent ea, quæ sunt cum motu; & LINDANUS tales suos ægros nunquam gargarizare, quin potius tantummodò de gargarismate unum alterumve cochlear aut q. s. in ore tenere, ac ita sensim ad fauces depellere resupinato corpore atque paulisper sine insigni agitatione retinere, & sic postmodum ex ore denuò effundere jubet, modò sepius repetatur. Nam quò frequentius, eò melius erit, ut ita horum operatio successivè se exerat: vid. RIVERIUS Pr. l. 4.

Pro his scopis inter REMEDIA, quæ aut gargarizando, aut illinendo, aut externè tanquam cataplasmata applicando, ad Anginas accognatas Inflammationes usurpantur, sunt eadem ferè cum aliis ad inflammationem extrinsecus admoventia, in specie ea, quæ

1. Sanguinem stagnantem resolvunt, & tumorem incipientem discutunt, v. g. Aromata plus minus volatilia, item penetrantia & alterantia, ut horum medio sangui con-grumatus dissolvatur, attenuetur, & Inflammatio in principio sistatur. Talia sunt pro cataplasmatibus, emplastris, gargarismatibus, &c. herbe & flores chamomillæ, sambuci, mentha crispa, salvia, veronica, thymus, origanum, pulegium, hyssopus, scabiosa, morsus Diaboli, semen lini, sennæ-græci, farina fabarum, semen anethi, cumini, sinapi, rapæ, radix Ilquiritiæ, lignum hederæ, fungus sambuci, radix tarax. crocus, camphora, item succus Cæcri flux. sempervivi maj. Decoctum hordei, raparum, aqua verbenæ, scabiosæ, hyssopi, sal ammoniacum, acutum (incidit & resolvit) sambucineum, Oxymel, nitrum crudum, vel depuratum vel cum sulphure fixatum, seu lapis prunellæ, qui aliàs ab omnibus insigniter commendatur, spiritus vini, urinæ, salia volatilia &c. dactyli, passulæ majores & minores, jujubæ, cepæ, & omnia ex cepis.

Moderni, speciatim WALEŪS M. M p. 66. & DECKERVS super Barbette Pr. p. 32. in spiritu vini, item sal ammoniacum, ac similia volatilia gargarismatibus addere jubent; sicut etiam gargarisma ex luco lempervi majoris, in quo parum salis ammoniaci dissoluti sit, insigniter cōfert: Aliicui experimentum commendat aquam destillatâ ex succo lempervi majoris, in qua sal ammonicum dissolutum. Et sanè existimo, spiritum vini maximè conferre, ut & salium volatilius usum tantum, quàm partes affectæ, aliàs admodum dolentes, perferre possunt; idque confirmat hoc ipsum etiam, quod in Inflammatione & tumore tonsillarum vrina calida propria modò emissa, gargarisationis loco adhibita, optimè prodesse dicatur. Et LINDANUS refert, quod vulgus contra tonsillarum Inflammationem familiare habeat remedium, ut caligas glandulis apponere soleat, id est, internos calceolos siue soles tibialium; sic resolvunt tumorem: Ratio est, quia scatent sudoribus, & vaporibus pedum, in quibus est vis digerendi & resolvendi, propter sal volatile, quod copiosè imbibunt. Ex quibus clarum fit, volatilia talia pro Inflammationum harum resolutione esse optima. Commendant etiam sterces canum, item sterces proprium, sterces vaccinum, cujus aquam REISNERUS Obs. 191. laudat. Spectat huc nidus hirundinum, & hujuscataplasma, de quo vid. UALERIOLÆ lib. 2. Obs. 10. & AMATUS LUSITANUS c. 3. Curat. 28. Item MYNŒICHT. in Arm. Chym. & SENNERTUS de Angina; quatenus scilicet ratione excrementorum, sale nitrolo turgidorum, vim resolvendi habet. Ex præparatis sunt o'eum amygdalarum dulcium, unguentum dialthæ, emplastr. de mellilotto, de mucilagin. ac defensivum.

Hæc



Hæc sunt resolventia seu attenuantia.

2. Conveniunt ea, quæ *emolliunt*, seu tumorem, qui discuti nequit, ad abscessum & maturationem perducunt: cum quibus semper asperitatem faucium & dolorem ardentem ac rodentem mitigantia, socianda veniunt. Conveniunt igitur temperata quævis, v.g. althæa, malva, melilorus, chamomilla, violaria, caricæ pingues, radices liliorum alborum, althææ, passulæ, jujubæ, mucilago distorum seminum & radicum, flores malvæ arboreæ, semen fœnugræci, medulla panis triticeæ, Gummi ammoniacum, ungu. dialth. resumptivum, emplastrum de meliloto, diachylon, Decoct. hordei, lac tepidum, oleum amygdalarum, dulcium, oleum liliorum alborum chamomælinum, anethinum, violarum, irinum, ovorum, oleum decoctionis exuviarum serpentum, butyrum recens, vitella ovorum, pingui. caponis, gallinæ humana, porcina, vel ubi fortius agendum, locum habent pinguedo anserina, cepæ imprimis sub cineribus coctæ, cataplasma ex pane triticeo cum melle, cinis hirundinum, cochlearum combustarum, cancrorum fluviatilium, cinis noctuæ; *nidus hirundinum cum stercore* est optimum pro omnibus & quasi universale ad Anginam, tam resolutioni, quàm suppurationi abscessus interveniens, non secus ac alia *stercora*, in specie canis sive *album græcum*; item hirundinum, gallinarum, columbarum, equinum, &c. conveniunt; Illa ipsa enim, quia multum *salis ammoniaci* quasi *nitrosi* continent, propterea plurimis scopis satisfaciunt: Item detineri poterit in ore medulla castæ, ut sensum liquidatæ vid. RIVERIVS l. 4. p. 284. RVLANDIVS cataplasma ex fermento & melle & flor. chamomillæ, aceto, & oleo; ex stercore canino & melle; ex stercore caprillo, aceto & melle; item ex absinthio coctus & pinguedine porcina eundem in finem commendat.

3. Abscessum jam factum & apertum mundificant & consolidant simplicia vulneraria, eorumque Decocta, imprimis cum aqua ferrariorum, addito melle, alumine, &c.

4. Sublatâ Anginâ & consolidato abscessu, aut discusso tumore, si necessarium fuerit, ad partes roborandas fiat Decoctum ex herba prunellæ, plantag. & flor. rosarum in vino decoctis; quibus addendum rob dianucum, diamorion, rob caricar. succus acaciæ, citri, granat. syr. de rosis siccis, myrtillor. cydonior. &c. q. s. pro gargarismate blandè adstringente. Adstringunt etiam myrtilli, rhus sive sumach. gallic. flor. bellidis, balauit. cortex granator. jugland. folia rubi & myrti, uvulariæ, plantag. alumen, aqua seu phlegma aluminis, phlegma vitæfoli, aqua nucum jugland. destillata, aqua prunellæ, plantag. aqua ferrariorum, solani, bursæ pastor. aut alio convenienti vehiculo diluta; Item sacch. Saturni, cerussa, &c.

Interim toto morbi decursu potui ordinario semper nitrum probe depuratum aut antimoniatum addatur, seu optimum febricitantium ac impensè sitientium egrorum auxilium, ita ut ad ʒij. potius misceatur nitri ʒss.

Ex hisce variæ possunt fieri formulæ: sic enim v.g. pro gargarismate sufficit vel solum Decoctum raparum, quod egregium est in principio hærum inflammationum, vel quod melius, adde parum salis ammoniaci, aut si in principio ardor adsit, vitri parum: Item eminet hic in principio gargarismus SCVLTIETI, ut & in incremento, reverà polychrestus, quem videb. in *Armat. Chirurg. Observ.* 32. inhibet nimium tumoris incrementum, mucilaginem fauces obliuentem egregiè solvit & foras elicit, & denique abscessum rumpit. Feliciter etiam sequens usurpavit RIVERIVS *Cens.* 4. *Obs.* 76. v. g.

ʒj. Aqua plantag. ʒss.

Aceti vini ʒss. ad ʒij.

Sacch. albi ʒss. ad ʒij.

Pulv. sem. sinapi ʒj.

M. pro Gargarismo.

quo calidè gargariseturos.

Convenit etiam in principio & incremento inflammationis gargarismus Hartmanni quasi catholicus in *Pr. Chymiatr.* cap. 85. §. 3. pag. 726. resolvens & discutiens, quem commendat in omnibus ferè faucium affeccionibus. Descriptio autem ejus hæc est:

ʒj. Flor. malv. hortens. vel arbor. M. j.

Rosar. rubr.

Prunell. Veron.

Salv. ana Mj.

Rad. polypod. ʒij.

Coquantur in

Aqua commun. ʒiv.

Estmull. Oper. Tom. II.

Aceti vini ʒss.

ad casum transversæ pollicis cum levi expressione.

Vbi viscidior mucus, præsertim in tonsillis inflammatis, adfuerit, *sem. sinapi* vel *saponis Venet.* ʒj. ad ʒij. similiter decoqui poterit; sicuti, ubi acrior videtur talis *gargarismus*, cum leni expressione colaturæ *sacch.* ʒj. ad ʒij. aut *mellis*, vel *simpl.* vel *rosac.* addi potest; est enim egregium in incipiente & augmentante Angina: Ad imitationem DECKERS in *Comment. ad Barbette Praxin* tale gargarisma in principio & incremento inflammationis præscribi poterit; v.g.

ʒj. Herb. hyssop.

Flor. sambuc.

Chamomill.

Herb. melilot. ana M. j.

Sem. sinapi. ʒss. ad ʒj.

Passul. min. ʒss. vel ʒvj. ad ʒj.

Coquantur in f. q. aqua simpl.

Colat. ʒss. ad ʒij. adde

Spiritus vini ʒj. ad ʒij.

(vel hujus loco spiritus sal. ammoniaci ʒj. vel sal. ammoniaci crudi ʒss.)

M. pro Gargarismate: S.

Gargarisma resolvers.

Confer. quoad talia gargarismata discutiencia DECKERS in *Commentar. ad Barbette* p. 19. 52. 57.

Vel

ʒj. Flor. sambuci Mij.

Herb. salv.

Hyssopi ana Mj.

Albigrac. ʒss.

Coqu. in f. q. aquæ vel cretæ vis. secundar.

Colaturæ ʒj. ʒss. adde

Spiritus theriacal. campb. ʒvj.

Sem. sinap. ʒss.

Rob dia-Mor. (vel si minus adstringere voluerimus rob dia-Nucum) ʒvj.

M. pro Gargarismo.

D. S. ut supra.

ʒj. Flor. sambuci M. ij.

Chamom.

Herb. melilot. ana Mj.

Alb. Græc. ʒvj.

Sem. crucæ contus. ʒij.

Passul. minor. ʒss.

Coqu. in f. q. Cretæ vis. secundar.

Colaturæ ʒss. adde

Sal. ammoniaci ʒss.

M. pro Gargarismo.

D. S. ut supra.

Item sequens Gargarismus resolvens & discutiens, quem dedi in *Colleg. formul. cap. 4. p. .... &c. .... & Id. formular. Class.* 4. §. 26.

ʒj. Rad. levis. ʒvj.

Apii ʒij. vel ʒlij.

Flor. sambuc. M. ij.

Fol. malvæ M. j.

Passul. mai. indif. ʒj.

Coqu. in f. q. aquæ comm. vel Decoct. hord.

Colaturæ ʒss. adde

Sal. ammoniaci depurat. ʒss. ad ʒj.

M. pro Gargarismo. S.

Gargarisma resolvers.

Loco pastularum maj. adde Colaturæ

Mell. mercurial. ʒj.

Spiritus theriacal. ʒvj.

(aut in Angina maligna ac contagiosa spiritus vini camphor. ʒss.)

Spiritus sal. ammoniaci ʒss. ad ʒj.

M. S. ut antè.

Vel in decocto quodam diluto dissolvatur q. s. sal. tartari. & sal. ammoniaci, ut ita sui juris fiat sal volatile, ac ita penetrare queat, addito pro temperanda Volatilitum acrimonia aut melle rosato, aut syrupo violarum, aliove simill temperante. Sanè loco gargarismatis domestici optime in his casibus convenit Decoctum hordei vel avenæ, in quo parum sal. ammoniaci dissolutum est; imò sola urina humana calida aut calefacta loco gargarismatis adhibita multa composita superat.

Item:

ʒj. Herb. mors. diab. M. iv.

Scabias.



*Veronia. ana Mj.*

*Albi Graci ℥ss.*

Coqu. in f. q. *aquæ simpl.* pro Gargarismate.

D. S. ut *suprà.*

℥. *Aqua mors. diab. ℥vj.*

*Bezon.*

*Scabios. ana ℥ij.*

*Rob. nucum,*

*Dia-mor. ana ℥ss.*

*Alb. græc. ℥j.*

M. pro Gargarismate,

S. ut *suprà.*

Vid. *Colleg. Pharmacæus. in Schræderum pag. 669.* Præter talia gargarismata resolutiva, ulterius etiam Externa pro similibus scopis in usu esse solent; v. g. pro discutiendo & resolvendo tumore convenit *Cataplasma suprâ laudatum ex absinthio rec. contus. cum pinguedine porcinâ, quod RULANDUS p. 101. in principio & incremento est egregium: Vel stercus caprillum cum aceto & melle; vid. RULANDUS pag. 28.* Insuper appropriatissima Cataplasmata, in principio & incremento morbi convenientia, parantur ex nido hirundinum & albo Græco; de quibus *infra* ubi de *suppurantibus*. Pro scopo autem resolvendi & discutendi nidus hirundinum cum vino coquendus. In omni inflammatione specificum est sequens Oleum, tam in inflammationibus à frigore, quam calore ortis:

℥. *Sulphuris citr. pulveris.*

*Sal. tartari ana ℥j.*

Probè mixta liquefiant blando igne in lebetæ; massæ frigefactæ & pulverisatæ affundantur

*Olei amygd. dulc. ℥ij.*

*Campb. ℥ss.*

Stent in digestionē per tres dies;

adde

*Flor. hyperic. Mj.*

Iterum digere, & usui serva.

Vel

℥. *Olei amygd. dulc. ℥j.*

*Spiritus sal. ammoniaci q. s. pro consistentia Linimenti.*

M. D. S.

*Unguentum dissolvens.*

Quod extrinsecus locis tumentibus calidè crebrè illiendum.

Vel ex *terebinthina*, cum *sale volatili urinae* aut *sale Ammoniaci malaxata*, & hinc cum *Unguento dialthææ*, *emplastro de meliloto* mixta. Vel

℥. *Empl. de melil. q. s.*

malaxetur cum *Oleo Philosophor.*

vel *Ol. de siliis. succini aut cere.*

D. S.

*Emplastrum resolvens.*

Externè enim applicatum incipientes inflammationes tonsillarum & faucium tollit & discutit. Vel

℥. *Ungv. dialth. ℥ij.*

*Olei lil. alb.*

*Chamom. ana ℥ss.*

*Philos. vel succin. ℥ij.*

M. pro Linimento externo, S.

*Unguentum resolvens.*

Quodsi verò nequeat discuti talis tumor, in progressu morbi pro maturando abscessu, ob dolorem & excoriationem faucium & phlogosin, nil, quod tantillum acre sit, sed simpliciter dulcia temperata emollientia adhibeantur, ne dolores exacerbentur. Quo in casu in incremento & statuto talia conveniunt gargarisma temperatum emolliens & ad suppurationem disponens:

℥. *Rad. liquirit. ℥ss.*

*Ebuli,*

*Ireos ana ℥ij.*

*Flor. chamom.*

*Rosar. rub.*

*Hyperic. an. P. ij.*

*Dactyl. no. iij.*

*Ficuum no. j.*

*Sem. fenugræc. ℥ij.*

*Albi Græci ℥ij.*

Coqu. in *Decocto raper.*

Colaturæ ℥ss. adde

*Syr. capill. veneris,*

*Jujubin. ana ℥j.*

M. pro Gargarismate. S.

*Gargarisma leniens.*

Nam propter dolorem & fauces excoriatas in progressu morbi vel minima acia sunt admodum dolorosa. In progressu ergo morbi talia dulcia ac blandè detergentia, & detergendo maturantia conveniunt:

℥. *Ras. alib. ℥ij.*

*Liquirit. ℥j.*

*Herb. malv. Mj.*

*Chamom.*

*Melilot. ana Mj.*

*Fic. pingv. incif. no. ij.*

*Alb. Græc. ℥ij.*

Coqu. in f. q. *aquæ comm.* vel *Decocto raper.* vel *Seri lactis*, vel ubi minor adest æstus & nimius dolor, ipso *lacte cum aqua misco* vel *lacte ebullato*, pro Gargarismate: (nam serum lactis & ipsum lac calidum in ore detentum potenter detergunt, dolores leniunt & abscessum maturant.)

D. S.

*Gargarisma emolliens.*

℥. *Herb. malva,*

*Melilot. ana Mj.*

*Rad. alib. ℥j.*

*Fic. pingv. no. vj.*

Coqu. in f. q. *lactis*, aut ubi ardor & inflammatio intensior, in *fero lactis*. Colatura à ℥ss. ad ℥ij. usurpetur vel ita, undè, vel addatur

*Syr. violar. vel mell. despum. q. s.*

M. pro Gargaris. anodyno & maturante in statu:

D. S. ut *ante.*

Cui, si materia suppuranda pituitosior ac viscidior fuerit, aliquid *sapon. Ven.* unà incoqu. Vid. *Coll. Form. l. a. pag. ....*

Præter ea gargarismata, etiam externè conveniunt emplastra, unguenta, & cataplasmata. Inter unguenta usitatum est unguentum dialthææ cum Oleo chamom. vel amygd. dulcium; inter emplastra, emplastr. de meliloto; inter *Cataplasmata*, emollientia & suppurantia: v. g. sequenti modo communiter solent ordinari:

℥. *Medull. panis trisic. ℥ss.*

*Rad. alib.*

*Lil. alb. ana ℥j.*

*Sem. lini ℥vj.*

*Fen. græc. ℥ss.*

Coqu. in *lacte dulc. q. s.* ad consist. pulvis; trahantur per setacum; adde

*Ol. amygd. dulc.*

*Lil. alb. ana ℥ss. vel ℥vj.*

*Butyr. rec. non salis. ℥ij. vel ℥ss.*

*Cerei ℥ss. ad ℥j.*

*Visell. ovor. no. j. vel ij.*

M. applic. pro Cataplasma. omnibus horis repetendo: S.

*Cataplasma Emolliens ad collum.*

Temperata enim huiusmodi temperant acrimoniam salium in inflammatione suppurante effervescentium; & quod magis temperant acrimoniam, eò magis dolorem minuant, & suppurationem promovent.

Vel

℥. *Fic. pingv. no. vj.*

*Herb. malva,*

*Melilot. ana Mj.*

Coqu. in f. q. *lactis*:

Colaturæ ℥ss. adde

*Mell. despumat. ℥ij.*

M. f. Cataplasma suppurans contra tumorem tonsillarum.

D. S. ut *suprà.*

℥. *Herb. malva Mij.*

*Melilot. Mj.*

*Flor. chamom.*

*Samb. ana M. ss.*

*Ficuum ping. par. iij.*

Coqu. in f. q. *lactis* ad purillag. trahantur per setacum.

*Pulpæ trajecta ℥i. adde*

*Pulv. sem. lini,*

*Fenu Græc. ana ℥j.*

*Olei lil. albor. ℥ij.*

M. pro Cataplasmate.

D. S. ut *suprà.*

Cata-



Cataplasma suppurans & discutiens cum myrrha vid. in HORSTII Obs. 125. & 126. Vel

℞. *Cepam* cavam, immitte *Theriacam*, & impone.

Ceterum appropriata hic magis sunt ea, quæ sunt ex nido hirundinum (quod plus stercoris habet, eo melius, quod nitrosum & ammoniacale imprimis convenit in cura anginae) subigitur & coquitur cum melle, axung. Porci, inspergendo alb. Græcum, & sic fit cataplasma, simplex quidem, sed admodum egregium in Cura anginae. Vel

℞. Nidi hirund. cum sterc. no. j.

Albi Græci Mj.

Hæccoquantur in vino, in principio morbi, ubi discutendum; vel in incremento & statu, ubi maturare & dolorem sistere animus est, in lacte: trahitur per cribrum, & sæpius applicetur instar Cataplasmati colli & faucium regioni, quod admodum egregie convenit.

D. S.

Singulare cataplasma ad collum.

Qui autem composita Cataplasmata desideraverit, præscribat emplastrum seu cataplasma de nido hirund. *Mysicib. in thesaur. secl. ultim. pag. 524.* Item Pauli Luteri, in SENNERTI ubi de Angina; item BARBETTE & DECKERS in Chirurg. ubi de Inflammatione, in specie de Angina pag. 55. & 58. Vel potest fieri tale Cataplasma compositum.

℞. Nidi hirund. cum sterc. num. j. cur adde

Herb. malv.

Albæ ana Mj.

Flor. chamom.

Melilot.

Sambuc. ana Mij.

Farin. bord. ℥ij. (vel bujus & farin.

Fabar. ana ℥ij.)

Croci ℥i.

Olei rosar. ℥ij.

Chamom. ℥ij.

M. coqu. in aqua vel lacte, & instar cataplasmati applicentur.

D. S. ut supra.

℞. Rad. alb.

Lilior. alb. ana ℥ij.

Flor. chamomill.

Melilot.

Malvæ ana Mj.

Sem. fan. Græci.

Lini,

Psylli ana ℥ij.

Alb. ℥ij. ad ℥ij.

Nidi hirund. no. j.

Alb. Græci ℥ij.

Fic. ping. no. iv. vel vj.

Incis. & contus. coqu. in aqua simpl. vel lacte, vel sero lactis, ad consistentiam pulvis: Pulver. trajecit adde

Olei lilior. alb. ℥ij. vel ℥ij.

Rutac. vel chamomillæ ℥vj. ad ℥ij.

Pulv. noctuæ comb. ℥ij.

Croci ℥ij. vel ℥ij. ad ℥ij.

Vitell. ovor. no. ij. vel iij.

M. pro Cataplasmate resolvente & emolliente in inflammatione tonsillarum.

D. S.

Cataplasma emollient.

Omnibus 4. vel 5. horis repetatur.

His ipsis cataplasmatibus ceparum sub ciner. coctarum ℥ij. vel etiam succus ceparum convenientissimè additur, imprimis in inflammationibus nothi, ubi non sanguis purus, sed magis pituitosus seu chylomagister temperatus inflammationem excitaverit, cum succus ceparum potenter maturet simulque abscessum rumpat. Loco seminum, eorum farinæ pulvis trajecit addi possunt: e.g.

℞. Nidi hirund. cum sterc. num. ij.

adde

Herb. malv.

Alb. ana M. j.

Flor. chamom.

Samb. ana M. ij.

Farin. bord. ℥ij. vel ℥ij.

Cep. sub cin. coct. no. ij.

Coqu. ad consist. Catapl. adde

Extrem. Oper. Tom. II.

Olei chamom. ℥ij.

M. S. ut supra.

Applicetur externè Anginis & faucium inflammationibus.

℞. Nidi hirund. cum sterc. num. j.

Cepar. sub cin. coct. num. iij.

Flor. sambuc. M. ij. vel iij.

Coqu. in cerevisia vel lacte:

Pulver. trajecit add.

Albi Græci ℥ij.

Olei de stillat. chamom. ℥ij.

Cum f. q. Olei Chamom. coct. vel lilior. albor.

F. Cataplasma. D. S.

Cataplasma emollient.

℞. Nidi hirund. No. ij.

Alb. græci,

Rad. lilior. albor.

Alb. ana ℥ij.

Fic. ping. No. iv.

Flor. chamomill.

Melilot.

Malvæ ana Mj.

Sem. fan. Græci.

Lini,

Alb. ana ℥ij.

Cepar. ℥vj. (BARBETTE Prax. pag. 23.)

Coq. in aqua prunell. & semperviv. ad putrilag. postea tralico per setac. adde

Pulv. noctuæ comb. ℥ij.

Ol. lil. albor. q. s.

M. pro consistentia pulvis S.

Pulv. externa ad collum.

Applicetur calidè: Experimentum est D. MICHAELIS. Loco cinerum noctuæ usurpari possunt cineres hirundinum.

Vel

℞. Rad. alb.

Lil. alb. ana ℥ij.

Cepar. super ciner. coct. ℥vj.

Nidi hirund. No. j.

Ficuum.

Dactyl. ana no. iij.

Alb. Græci ℥ij.

Coqu. in f. q. aquæ bordei:

Colaturæ ℥ij. adde

Farin. tritic.

Sem. lini,

Fan. Græci,

Rad. alb. ana ℥ij.

Vitell. ovor. no. ij.

Croc. Orient. ℥ij.

Olei chamom. ℥ij.

M. pro Cataplasmate.

D. S. ut supra.

Præmittantur his Cataplasmatibus externæ inunctiones ex ungu. dialthææ, vel aliis emollientibus supra dictis, & de super Cataplasma applicetur pro meliori operatione, quod toties repetendum & reiterandum est, quoties siccet; sic enim nullius est usus.

Suppuratâ his ipsis Inflammatione, pro melliori abscessus apertione fauces illinantur internè cum melle, vel solo, vel cui additum sit q. s. albi Græci, quæ probè permixta & subacta illinuntur cum pluma vel penicillo; hoc namque admodum maturat abscessum, & suppurationem promovet: Vel mel aut Syrupus de rosis siccis cum cineribus hirund. subactum, & abscessui illitum optimè solet maturare & aperire; aut etiam, si fieri potest propter dolorem, parum salis ammoniaci addendum est, & erit eo melius: item noctua combusta cum melle mixta & illita promptè abscessum aperire astringitur. Quidam commendant tanquam specificum ad Anginam filum purpureum, cum quo strangulata fuit vipera, si collo circumdetur, de quo experientia consulenda: Res mihi videtur admodum dubia. His ipsis si sponte aperiatur abscessus, res salva est: verum si hoc non fiat, coquatur Gargarisma ex sinapi in hydromelite; e.g.

℞. Hydromel. ℥ij.

Sem. sinapi ℥ij.

Hoc coctum in ore detineatur & gargassetur donec abscessus apertus. A SENNERTO in Praxi, ubi de Angina, laudatur ad citò resolvendum: in suffocationis discrimine admodum præstans habetur.



Alii recipiunt spiritum vitrioli, cui pluma leviter intincta, hac ipsa attingunt abscessum, ac ita rumpatur.

Vel

℞. Vini alb. vel etiam aquae font. ℞ij.

Olei vitrioli gutt. XXX.

M. D. S.

Gargarisma aperiens.

Hoc sæpius gargarisetur ac eluatur iisdem os, ac fauces; sic enim citò ruptus fuit abscessus, & est Euporiston RVLANDI in Thesauro suo.

**BARTHOLETUS** seu secretum ad rumpendum abscessum commendat Cataplasma externè applicandum, factum ex cremore radic. Ireos recentis, cum butyro & oleo violaceo, quod mirabili cum successu abscessum rumpere asserit.

Allis irritis fereatus, tussis, ac tandem vomitus provocandus est, quæ abscessum nonnihil aperiunt. Quibus etiam Irritis, scalpello incurvato, si pateat abscessus, (si aliquo modo videri potest,) aperiendus & incidendus, ut à suffocatione liberetur aeger.

Quod si suffocationis imminet periculum, aut molestia hæc nec tumor, nec abscessus, removeri aut aperiiri queat, ne suffocetur aeger, *Laryngotomia*, quam Germani pavidè abhorrent, administrari potest; auxilium tamen aliud est sat tutum, & absque ullo periculo coniunctum, de quo vide Chirurghi Practici, v. g. **BARBETTE** in Pr. &c. Aperto abscessu, tertio loco ulcus in faucibus mundandum & demum consolidandum est; pro quo scopo inservit Gargarisma ex aqua mulsa, in qua aliquoties ferrum, ignitum sit extinctum si eadem eluantur fauces: vel

℞. Decoct. bord. ℞ij.

Mel. rosar. ℞ij. vel ℞iv.

M. D. S.

Gargarisma eluens.

Quod sufficit: Item adhibeatur Decoctum plantag. cum rad. & foliis quercus vel mespilorum, cui mel aut rob diamoron additum sit, quæ purificant, & consolidant: vid. RULANDUS p. 58. Vel mixtura TIMÆI 1. Cas. 1. sub linctus specie usurpanda; item Decoctum veronicæ cum melle; quibus in abscessibus contumacioribus, & quæ consolidari nolunt, addatur parum spiritus vitrioli, quantum saltem ad blandam aciditatem necessarium est, partim melius purificat, partim consolidat abscessum; ut ne probe observandum sit, quod sordida ac contumacia conflata ulcera ordinarij ferè pro fundamento habere soleant lumen Venercam. Vel

℞. Herb. prunell.

Veronis.

Salvia,

Scabios. ana Mj.

Rad. liquirit. ℞ij. vel ℞j.

Alum. crud. ℞i.

Mellis rosar. ℞ij.

Coqu. in f. q. aqua simpl. pro Gargarismo.

Colatura D. S.

Gargarisma eluens.

℞. Herb. prunell.

Veronis.

Salv. ana M. j.

Rad. polypod.

Liquirit. ana ℞ij.

Alum. crud. ℞j.

Mellis rosar. ℞ij.

Coq. in f. q. aqua simpl.

Colatura utatur pro Gargarismo purificante & consolidante:

D. S. ut ante.

Quod si propter latentem scorbutum ulcera talia faucium sint contumaciore, optimum est, si mel rosaceum imprægnetur cum spiritu salis benè rectificato q. s. ad suavem aceticentiam, quo ipso multa præstati possunt in faucium & oris exulcerationibus.

Quod si sordidiora sint ulcera, ad viride æris recurrendum erit; nempe vel ad aquam viridem PLATERI, aut HARTMANNI, quam videb. in ejus Pr. Chym. cap. 52. thes. 4. & s. Quibus ipsis attingantur ulcera penicillo, & hinc vel gargarismus vel luvium cum melle rosaceo instituat; vel horum loco recipiant Chirurghi unguentum Ægyptiacum, subigunt cum melle rosaceo, ita, ut acrimonia eius nonnihil temperetur. Hoc ipsum cum penicillo attingunt & mundificant ulcera, præsertim sordida, aut jam ad gangrenam declinantia. Consoli-

dat postmodum talia ulcera Decoctum veronicæ cum melle, quod ed potentiusest, si de Alumine aliquantulum simul addatur. Tandem & linimenta cum paucillo aluminis pro consolidando abscessu non sunt incongrua; hinc ad imitationem TIMÆI von Guldenkle, e. g.

℞. Rad. ireos Flor. ℞ij.

Myrrhæ el. ℞j.

Alum. usi ℞j. ad ℞ij.

Mell. rosar. ℞ij. ad ℞ij.

M. P. Linimentum ulcera mundificata consolidans. S.

Unguentum consolidans ad collum.

Conf. TIMÆUS von Guldenkle in Casib. lib. 2. Cas. 1. p. 78. qui sequens habet linimentum:

℞. Rad. ireos Flor.

Angelic.

Caryophyllat. ana ℞j.

Aluminis usi ℞ij.

Mell. ros. ℞ij.

Misc. & loco abscessus illinatur.

Tandem si necessarium fuerit, ad roborandas partes lesas in fine morbi fiat Decoctum prunellæ, plantaginis & florum rosarum in vino decoctis; quibus addatur syrupus dianthi q. s. pro gargarismo blandè adstringente. Vel

℞. Aquæ prunell.

Plantag.

Betonie. ana ℞ij.

Robnucum,

Diamor. ana ℞ij.

M. pro Gargarismo adstringente.

D. S.

Gargarisma adstringens.

Quoad Anginam nostram seu puerilem, aliàs albam, optimè hanc pertractat MINDERERVS in Medic. milit. p. 109. & seqq. In hac venæ sectione haud opus est, nisi in plethoricis, ne affluxus major contingat. Convenient potius in principio sudorifera, & post hæc purgantia leniora, cum externis solventibus. Nempe ubi lentor viscidus obsidet linguam, prodest absterasio faucium mediante linteolo cum aceto, & fiat postea gargarisatio cum Decocto florum ligustri, salvia, & origani, rad. pyrethri, sem. sinapi, in aqua cum pauculo aceto, vel cum aqua florum ligustri & plantaginis, additâ myrrhâ, particulâ salis ammoniaci, item juxta DECKERS Prax. Barbett. p. 51. spiritu vini, & spiritu salis ammoniaci; sin verò apertæ adsint, loco salis ammoniaci addatur alumen; loco aceti etiam succus sempervivi recens, acutus cum sale ammoniaco, utilis est pro abstergenda lingua. Quibus tumor suppuretur, appropriata superius recensita substituuntur: vid. SENNERTVS lib. 2. Part. 2. c. 24. Purificato ore succus sempervivi recens inungi potest cum robnucum vel diamor. subactus cum pauculo melle rosato. Collo verò externus admoveantur res solventia, qualia sunt salvia, hyssopus, serpillum, flor. chamomillæ, radix levis. liquiritiæ, &c. Quod si verò ex inflammationis augmento & symptomatum circa vesperam exacerbatione in abscessum vergat, Resolventibus dictis adiungantur emollientia, v. g. herba & flores meliloti, violarum, rad. althææ, malvæ, sem. lini, fenugr. caricæ, lactepidum, oleum lil. alb. chamom. empl. de meliloto, &c. Ruptus abscessus vel sola aqua mulsa, vel gargarismus ex Decocto florum rosar. plantag. veronicæ, rad. liquirit. & consolidat. maj. cum melle simplici & rosato detergitur, & ad cicatricem usque mundificatur.

Propter materiæ affinitatem consideremus Aphthas.

M E M B R V M I.

D E

A P H T H I S.

**I**N Infantibus APHTHÆ dicuntur Germanicè die Schwammigen, quæ nihil aliud sunt, quàm albuginis ex-coriatio aut levis exulceratio omnium oris partium, subinde & œsophagi ac ventriculi; id quod patet tunc in rejectis excrementis, cum quibus squamulæ reiciuntur, seu leves quæsi crustulæ.



## C A V S Æ.

Aphthæ succedunt ferè febribus ingentibus & æstuosis, suntque pustulæ, quæ successivè in ulcuscula abeunt, & in febribus vehementioribus his excitantur ex acrioribus humoribus, & ferè istis febribus superveniunt, quæ homines *crudi ventriculi*, seu qui sunt *æuginosis seu porraceis recrementis referti*, corripunt. Hunc si Medicus evacuare in tempore neglexerit, aphthæ necessariò sequuntur. Vt autem ventriculus purus sit, nihilominus interdum aphthæ oriuntur, nempe à *saliva corrupta* à salis & acri humore. Quæ à ventriculo initium capiunt, in imis faucibus observantur; Quæ verò ab ichore salivali corrupto, plerumque incrustare solent linguam, quæ tunc fit arida, pallida, viscosa, & varia, prout peccant humores.

## D I A G N O S I S.

Aphthas futuras in morbo cognoscimus ex sopore & singultu; quozoto morbi decursu non dormiverunt, in soporem incidunt, & tunc aphthæ prodeunt: Singultus accidit, si sunt ex ventriculo, & tunc plerumque sunt deteriores.

## P R O G N O S I S.

Pessimæ autem sunt, quæ ex ventriculo non purgato veniunt: Totum enim ductum per gulam usque ad fauces obfidere solent.

Optimæ sunt albæ, quæ planè candidæ, fungosæ, molles, quando instar floccorum videntur tumere: Sed quando sunt glabræ, viscidæ, subsidentes, compactæ, tales significant morbum periculosum & diuturnum.

In infantibus discere possumus naturam aphtharum, quæ sunt ex corruptione lactis; Non rarè namque corripitur infans Aphthis primis 7. diebus. Nihil autem melius, quam lac ipsum præbere; inde enim absterguntur, modicè humectantur & molliuntur.

Sunt & Aphthæ rubræ & molles, prioribus deteriores, livide, virides; Nigræ verò omnium pessimæ.

Malum signum est, non facile coqui, emolliiri, humectari, & longo tempore siccas, aridas, compactas, planas & qualesque manere, & quidem diutius durantes.

Longum morbum significant aphthæ quæ intra triduum veniunt & abeunt: Has enim sequuntur novæ, adeò, ut sæpius succedere soleant, & tantò futurus est longior morbus, quantò Medicus frequentius purgat. Nil enim pejus, quam sæpè purgare, eotempore, quo Aphthæ adsunt, vel etiam proximè adsuerunt.

## C U R A.

CURATIO tota consistit in humectatione, quæ emolliat & leniter calefaciat. Cum verò Aphthæ coctæ sunt, abstergere illas oportet vel spongiolâ alligatâ bacillo, vel linteaminibus, alterutrum intingi debet in Decocto aliquo emolliente, flor. salviæ in aqua ferrariorum decoctorum: Quando igitur lingua incipit exasperari; id quod præcedit Aphthas:

℞. Fol. sedi mai.

Detrahatur pellicula ab utraque folii parte, hinc in aqua rosarum imponantur ut humida servantur, postea imponantur linguae ad humectationem.

Pari ratione adhiberi possunt folia portulacæ, aut mucilagosem cydoniorum cum aqua portulacæ extracta. Cum autem jam adsint Aphthæ, optimum est Decoctum raparum, ex quo expressus succus imponatur linguae, humectat & abstergit. Si parum salis prunellæ vel vitri addatur, ardorem simul restinguit. Vel oleum raparum, in quo saccharum quantum potest, dissolutum ori illinatur; vid. M. A. N. C.

Ann. 4. Obs. 28. p. 73. Aut

℞. Herb. bellid. cum toto Mj.

Ficuum ping. no. ij.

Coqu. in aquæ communis q. s.

Colaturæ adde

Salis prunell. parum.

M. D. S.

Aqua os purgans & refrigerans.

Quo humedantur fauces & lingua sæpius.

In maxima autem oris siccitate:

Ettmull. Oper. Tom. II.

℞. Butyr. rec. insuls.

Misc. cum saccharo cando rubro, ut f. instar Boli; S.

Unguentum os leniens.

Teneatur in ore, emolliat & abstergit.

Addi potest parum salis prunellæ.

Quodsi ulterius progrediuntur Aphthæ, degenerant in ulcera oris successivè depascentia; quæ ipsa oris ulcera etiam ex aliis causis nata frequentius ferè curantur abstergentibus, quæ inter est Decoctum fol. ligustri, vel aqua destillata sub forma gargarismatis, vel sequens.

℞. Herb. veron. M. ij.

Coqu. in f. q. aquæ simpl.

Colaturæ adde

Mell. q. s.

M. D. S.

Aqua os purgans.

& adhibeatur.

Addi etiam potest herb. plantag. effectum eo meliori. Decoctum saturiæ in vino à quibusdam laudatur, sed suspecta, quia acris est quasi ignea, potius prædicta conducunt: item phlegma vitrioli cum aqua prunellæ & plant. mistum, egregium & in ulceribus oris partiumque vicinarum: Rob dia-moron, item dia-mecum, detergunt & purificant ulcera: Quibus in malo contumaciori orarum spiritus vitrioli aut salis rectificati pro suavitate acida addi possunt, præsertim si scorbuticum subsit vitium. In huiusmodi ulceribus Gallicis optimæ sunt aquæ virides Plateri aut Hartmanni, de quibus supra dictum. Confer & HILDANUS Cent. 6. Obs. 18.

## M E M B R U M II.

## D E

## U V U L A E X U L C E R A T A.

PAR ratio est UVULÆ EXULCERATÆ, underunque etiam nata, in qua etiam hæc ipsa remedia, in specie Gargarismus HARTMANNI Tr. Chymiatr. pag. 264. polychrestus commodè usurpari potest, qui in affectibus ori communibus & angina est præstans.

Sicut de his & cognatis oris ejusque partium malis videatur citatus locus.

## M E M B R U M III.

## D E

## V U V L Æ P R O L A P S V.

VUVULÆ verò PROLAPSUM seu RELAXATIONEM optimè curare docet HILDANVS cap. 2. Obs. 21. sicuti & instrumentum singulare pro uvula nimis tumente abscindenda describit BARTHOLINVS Centur. 2. Hist. 88. Portione abscissa, pro hæmorrhagia arcenda non nunquam sufficit collutio vel pulvis adstingens, instrumento certo applicandus.

Alias recentem uvulæ prolapsum curant;

Recipiendos fermentic. (piscu cum vini humect. ℞j.

Succi albi ℞j.

Massich. ℞ij

Mixta vertici imponunt.

Item

Oleum succini solum, vel unguent. Horstii ex gummi elemi cum eodem malaxatum bregmati applicant; vid. WEDELIUS de Compos. Med. pag. 181. unà cum gargarismate, & Decocto florum ligustri cum nitro & sale prunelle. Vel

℞. Decoct. prunellæ ℞j.

Sal. ammoniaci ℞j.

Alum. crud. ℞ss.

M. f. Gargarismus: S.

Singularis gargarismus.

℞. Herb. prunell. M. ij.

Plantag. M. j.

Gall. ptyerisat. ℞ss. ad ℞vj.

Coqu. in f. q. aquæ simpl. vel ferrarior.

Colaturæ ℞v. adde



*Syr. de ros. sic. 3lb.*

*Alum. crudi vel usti ʒj ad 3lb.*

M. pro Gargarismate in prolapsu, & faucium exoriatione:

D. S. ut antè.

Item sal decrepitatum cum paucis pipere applicari potest uvulæ ita prolapsæ. Loco salis communis optimum est sal armoniacum, subinde uvulæ applicatum. Spiritum aluminis commendant alii.

Quod si simul

**UVULÆ INFLAMMATIO** adhibere optimum est *Decoctum herbarum aut rad. taraxaci*: Suffusus succini ore exceptus specificum est **RULANDI**: Vel semen cannabis in posca parum coctum & colatum, pro Gargarismate adhibitur, est unum ex optimis remediis; Vel rad. tormenitillæ & uvulariæ herba anatica proportione in cerevisia secundaria coctæ, & Colatura cum modico mellis edulcorata, adhibeatur pro Gargarismate; Vel decoctum vincæ pervincæ cum vino paratum. Nempe uvula est parva glandula in imis faucibus à palato pendens, laxa quidam membrana tecta, in qua tanquam in sacco pender; Non enim hæc tegitur, sed præter hanc, propriam membranam suam obtinet. Destillat ex ipsa glandula tenuis salivæ humor sui generis in membranam perforatam, & per hanc in palatum; quoties autem materia est viscida, membrana oppletur, & impeditur influxus sicque, fit laxitas & distensio membranæ, modò dictis corrigenda. Quibus si dolor ex irritatione, aut dispositio inflammatoria exinde accedat, *Syr. dia-Codii Montani* parum modò dictis addi potest.

### ARTICULUS III.

#### DE

#### INFLAMMATIONE STOMACHI, ejusque ABSCESSU.

**PO**st fauces non raro quoque INFLAMMATUR STOMACHUS, quæ inflammatio est affectus periculofus &c, si quis alius, peracutus.

#### CAUSÆ.

Causas habet easdem, quas reliquæ Inflammationes in genere: In specie interdum assunta acris aut vitiosa Inflammationem ventriculi inducunt: Sic etiam aciculæ deglutitæ subinde Inflammationem ventriculi periculosissimam inferunt, de qua **HILDANUS** C. 1. obs. 34 ubi notat Inflammationem ventriculi cum febre ardente & horrendis symptomatibus conjunctam ex deglutita acicula. Inflammatur rarissimè ventriculus integer, id quod est malum adeo furiosum, ut penitus sit desperatum; aut saltem unum alterumve ejus officium.

#### DIAGNOSIS.

**Quoad Signa**: Inflammatio stomachi facile cognoscitur imprimis, ubi cum febre ardente acuta conjunctus est simul aliqualis tumor in præcordiis, circa ventriculi regionem sub costis, nothi dolens insigniter, cum gravi usu ejusdem loci, siti inexplebili, corporis jactatione, & vigiliis.

Malum est, ut dixi, peracutum, superveniunt subinde deliria, item convulsiones non raro lethales, speciatim si officium unum alterumve fuerit inflammatum; nauseant ægri, & assumpta ferè evomunt.

Non confundantur autem, sed distinguantur Inflammatio ventriculi cum inflammatione lobi hepatis, vel musculorum rectorum abdominis, ubi ventriculo incumbunt. Nam in *Ventriculi Inflammatione ardor & dolor magis in profundo sunt*; hepatis autem inflammatio magis circumscripta est; musculi verò recti externam abdominis in thoracis confinibus occupant regionem, ac dicta symptomata magis extorsum vergunt.

Item Inflammatio stomachi raro est sensibilis, nec potest contangi; Loborum verò hepatis musculorumque abdominis nunc patent sensibus, nunc manu contrectari possunt.

Porrò in *Ventriculi Inflammatione sævissima & peracuta* adsunt symptomata, secus ac in loborum hepatis & muscu-

lorum abdominis inflammationibus; in his siquidem mitiora urgent symptomata.

#### PROGNOSIS.

*Ventriculi Inflammatio est malum peracutum*, ex quo pauci evadunt, tertio vel quarto die finiri solet, & ferè semper lethalis est, imprimis ubi in principio sunt vires infractæ.

Interdum, sed raro, ad suppurationem tendit; Quo facto, melius est, ut abscessus aperiatur intra ventriculum, & per inferiora excernatur, quàm si extra ventriculum intra abdomen effundatur; quod malum; pus enim peritonæum aut intestina inficere, aliamve quampiam partem, & mediante gangrænâ ægrum interficere solet.

#### CURA.

**Quoad CURAM**: hæc eodem modo se habet, atque reliquarum Inflammationum in genere Curationes. Ante omnia sudoriferis tumorem discutientibus insistendum est. In specie tamen cautio in Venæ sectione adhibenda est, quod monet **FORESTUS** L. 10. Obs. 1. ne plus, quàm opus sit, sanguinis evacuetur. Cùm enim gravia symptomata affectum hunc comitari soleant, syncope etiam, ob dolorem vehementem & virium summam imbecillitatem, propterea, ne vires nimis prosterantur, summa cautio hic adhibenda erit. **PURGATIO** verò in principio & progressu morbi non est adhibenda; irritando enim ventriculum, magis malum exasperat, ut hoc confirmat exemplo quodam ab alio petito **FORESTUS** L. 10. Obs. 31. de puella, quæ cùm tertiâ die ab Inflammatione ventriculi sumisset purgans, quintâ die interiit. Clysmata tamen blanda & abstergentia convenienter inilci possunt: vid. **FORESTUS** L. 19. Obs. 31. Aliàs in Cura primum obtinent sudorifera.

**REMEDIA** igitur **INTERNA** in principio & incremento sunt ex *papav. rhæad. & carduibenedicto*, imprimis ex nitro parata, ut in specie nitro antimoniat; sicuti solo nitro, tam purificato quàm fixato, in *Decocto bordei* soluto & sapius propinato, curavit. filiam suam Inflammatione pylori laborantem **LINDANUS** super *Hartmannum*. Unde illud possumus præscribere ita:

ʒj. Decoct. hord. ʒj.

Nitri depur. vel antimoniat. ʒss.

M. D. S.

Potio refrigerans.

Præterea potui interserviat *Infusum* aut *Decoctum liquoritice* rase in aqua simpl. cum succesu adhibitur in *Ventriculi Inflammatione* à **RULANDO**, vid. ejus *Thesaur.* pag. 175. Conveniet & hoc præsertim cum nitro depurato aut spiritu nitri dulci in parva quantitate imprægnatum, sapius haustum non incongruum est ad Inflammationes Ventriculi; sicuti etiam spiritus nitri dulcis copiosè potest exhiberi. Porro mixtura simplex, aut monuquidiaphoreticum; antihæcticum *Poterii*, cum nitro depurato mixtum & propinatum convenienter usurpari possunt. *Saccharum* etiam *Saturni*, item crystalli mineræ *Saturni* paratæ ex minera cum spiritu nitri, cum aceto distillato acuat, sunt egregiæ; Vel

ʒj. Nitri depur. vel antimoniat. gr. xv. ad ʒj.

(melius est in hoc casu depuratum & antimoniatum, quàm fixum.)

Antihæct. Pot. ʒss.

Sacch. Saturni gr. v.

M. f. pulvis pro dosi:

D. S.

Pulvis refrigerans.

Vel

ʒj. Pulpa tamar. ʒj.

Tartari nitriolat. Tach. gr. xv.

Bez. mineral. ʒss.

Cum syr. uiol. q. s. f. Bolus: D. S.

Bolus refrigerans.

**Quoad EXTERNA** Inflammationi ventriculi convenientia; laudant quidam, imprimis **DEO DATUS** in *Panth. Hygiæ*, succum canerorum fluvialium, calidè cum unâ cum aceto subactum, in principio applicantes; qui tamen minus convenit: quin potius proderunt cataplasmata vel Unguenta ex plantis aromaticis in vino vel aqua



aqua decoctis parata, ut ita partim discutiat, partim ad suppurationem blandè promoveatur. In principio focus ex *chamom.*, & *rosis rubris* imprimis convenit, in vino aut saltem aqua coctis, & crebrius applicatis; Vel fiat focus aut cataplasma ex foliis caulium rubr. scabiosæ, dentis leonis, ficubus, uvis passis & similibus, quæ in sero lactis decoquantur, & ita externè applicentur. Aquam plantaginis & folani cum saccharo Saturni pro foku insigniter commendat **PARACELSUS** ad Curam inflammationis stomachi. Quod si ad suppurationem videatur vergere malum, fiat focus vel cataplasma:

℞. Fol. branc. urfm.

Rad. alb.

Ros. rubr. an. Mß.

Quibus ad putrilaginem coctis, adde  
Farin. hord.

Flor. chamom.

Sem. fan. Græc. an. ʒj.

cum oleo rosar. & chamomill. f. Cata-  
plasma.

D. S.

Cataplasma emolliens.

Quotempore, præter mox laudatam scabiosam, & interne, passula cum ficubus malva, & similibus, in sero lactis coctis, adhiberi possunt.

Tandem, ut citius maturetur abscessus, fiat cataplasma ex stercore columbino & fermento, ad imitationem **SENER TI** l. 7. Prax. ubi de Inflamm. ventriculi, quod fortius est, & ad apertionem abscessus disponit.

℞. Sem. fanugr. ʒij.

Sterc. columbin. ʒij.

Ferment.

Mell. an. ʒj.

Olei chamomill. ʒij.

M. pro Cataplasmate, quod applicetur stomachi regioni inflammatae. Quoad abscessum: interne convenit *terebinthina* egregiè, qua nihil melius est, quocunque modo usurpata; hæc enim cum aqua absinthii mediante ovi vitello soluta, si bisterve detur, resolvit, maturat, mundificat & consolidat abscessum, imprimis si cum aqua mulsa sumatur; sicuti etiam aqua, succus, syrupus scabiosæ, & omnia ex herbis hac parata, interne frequentius usurpata, vel sola vel cum melle mista, simili modo conducunt & sanant quoscunque, præsertim ventriculi, abscessus, & disponunt; ut is interiora versus aperiatur. Quibus & spiritum tartari rectificatum nonnulli addendum suadent: c. g.

℞. Aquæ scabios. ʒij.

Spiritus tartari rectif. vel carm. de tribus ʒj.

Syr. de succ. f. ab. ʒij.

M. D. S.

Potio maturans.

Quod si aperto abscessu jam genitum sit ulcus, usurpetur Decoctum hordei vel hyssopinum melle, item serum lactis aut lac chalybeatum; mundificant & consolidant: Decoctum quoque rad. china cum herbis scabiosæ paratum confert. Item cornu cervi ustum, terra sigillata, bolus Armena, &c. Oleum seu balsamum mastichis cum oleo hyperici expertum fuit in Cultrivoro Prussico; de quo vid. **BECKERUS** p. 182. de Cultrivoro Prussico, ubi plura huc facientia reperiuntur. Vel

℞. Aquæ scabios. ʒij.

Menth. ʒj.

Cinam. spirituosæ,

Acet. destillatum an. ʒij.

Lapill. caner. præpar. ʒj.

Antimonii diaphor. ʒj.

Extr. flor. hyper. ʒss

Syr. de sympb. Fern. vel scabios. ʒj.

M. F. Potio: S.

Potio mundificans cochlearim sumta.

Dosis cochlear. ij.

℞. Extr. flor. hyper. liquid. ʒss.

Bals. Peruv.

Sulphuris anif. an. ʒj.

M. D. S.

Balsamum os mundificans.

Dosis gutt. v.

Cæterum **BARTHOLETUS**. Tr. de Respirat. ad aperiendum abscessum ventriculi seu singulare hac in parte laudat lapidem Pavonium seu Malachiten. quem absinthium redolere dicit, abscessum ruptum, in forma pulveris

ad ʒj. assumtum, simul mundificantem & consolidantem. Verum cum nemo sciat, qualis hic sit lapis: miror, cur eum obrudat.

Quod si ex acerbis corrosivis aut similibus assumptis artus aut exulceratus fuerit ventriculus, præmissio, in principio vomitorio, lacticia, item terra sigillata, sunt convenientissima. item tragacanthum in aqua flor. rosarum solutum: vid. **BARTHOLINUS** Cent. 6. Hist. 21. Vel

℞. Mucilag. sem. psyll.

Cydon.

Tragacanth. cum aquæ ros. extr.

Syr. violar.

Rosar. solut. an. ʒj.

M.

Vid. **BARBETTE** in Pr. p. 134. & 136.

Abstratum malum est Inflammatio stomachi; exempla tamen videb. in **AMATO LUSITANO** Cent. 3. Curat. 39. **FORESTO** lib. 18. Observ. 1. 30 31. item **ZACUTO LUSITANO** Med. Princ. lib. 2. Hist. 63.

## ARTICULUS IV.

De

### INFLAMMATIONE INTESTINORUM.

#### CAUSÆ.

**I**uxta stomachum etiam inflammantur subinde Intestina, quæ præter alias CAUSAS INTERNAS, omnibus reliquarum partium inflammationibus communes, interdum pertinacem & quasi iliacam alvi obstructionem, interdum herniam, interdum dysenteriam immediate suppressam, interdum quoque EXTERNAM læsionem, v. g. violentam contusionem, &c. præsupponunt. De illo enim notum est, quod contumacem secum trahat inflammationem intestinorum; sic de hernia quoque patet, quod intestina in loco hernioso ad inflammationem perveniant. Inflammantur intestina, tam tenuia quam crassa, utur frequentius tenuia.

Ex causis externis, non tantum à corporis incalescentia, **FORESTO** l. 21. obs. 18 sed etiam abdominis refrigeratione, intestinorum inflammatio observata fuit; qualem etiam observavit **RHODIUS** C. 2. obs. 78. ab incurvata colla spuria, colon pungente.

#### DIAGNOSIS.

Quoad pathemata inflammationis intestinorum, quibus malum cognoscitur, facilia; & quidem sunt ea: quod in loco inflammationis tumor quidam rotundus tactui renitens percipi solet. quem Veteres in specie **CHORDAPSUM** appellarunt, quia chordæ instar intestina convoluta ac indurata apparent; cui chordapsi confirmato, cum sæpissime iliaca passio superveniat, hinc factum est, ut chordapsi & iliaca passio pro synonymis habita fuerint, utur differentia intercedat seu causa particularis, & chordapsi nomen traxerit ex traditione vulgari, qua instar chordarum intestina convolvi putantur.

Præterea in loco isto intensus ardor & vehemens dolor, in specie pulsatorius, fixus, distendens, &c. percipitur. Gravis affectus est, habet cruciatus insignes; sed sicut sunt vehementissimi, ita brevissime durant. Alvi contritio, & podex non raro strictissime stringitur seu contrahitur, ut ne specillum admittat; interdum interiora versus retrahitur; quod quando fit, signum est certissimum, quod excrementa per os rejiciuntur, & tunc vocatur Ileus. Hoc si eveniat clystere paulò ante immisso, ipse clyster per os redditur, quia intestina subinde superiora versus contorquentur. Febris adest acuta, lipytia, tepent extrema, uruntur interiora. Præterea urina interdum supprimitur, venter ferè inflatur, respiratio est difficilis, vires languent &c. Quod si tenuia inflammata sint intestina, omnia symptomata graviora & periculosiora esse solent, & sitis doloris & caloris imprimis medium ventrem & regionem circa & infra umbilicum occupat, dolor & tormina ad superiora magis vergunt, stomachi disSENSIO adest, spiritus angustia, nausea & vomitus affidi, &c. Ubi verò afficiuntur intestina crassa, omnia symptomata nonnihil sunt remissiora, & sitis peripheriæ intestinorum crassorum, eorum affectum.



affectum demonstrat; dolor enim ad hypochondria magis pertingit, vomitus non ita continuè durat, ac lumborum adest gravitas.

### PROGNOSIS.

Inflammatio intestinorum in genere *periculosum & peracutum est malum*: quæ intestinum ileon occupat, periculosissima est, brevissimè durat, & non rarò intra biduum aut triduum cursum suum absolvere solet, & faciliè ac sæpius in gangrænam & sphacelum intestina inflammata terminantur; quæ inde patent, quod subito cesset omnis dolor: Neque enim inflammationes internæ subito cessare debent, sed tractu temporis.

Omnis ergò subitanea cessatio doloris infallibile argumentum est extinctionis seu mortificationis partis: sæpius etiam sine Gangræna in ileum terminatur frequentius lethalem, unde perfectà Inflammatione intestinorum laborantes rarò evadunt ægri, sed sæpissimè intereunt.

Non rarò etiam in abscessum terminatur, cujus ruptura ad intestinorum cavitatem tutior est, quàm ad cavitatem abdominis, dum per cavitatem intestinorum pus faciliè evacuari potest, uti *supra Articuli. anteced. de ventriculi inflammatione* dixi.

### CURA.

In CURA tractentur leniter, ne irritentur crabrones, adeoque aut mortificatio aut ileus citius provocetur. Sangvis è *secta* in brachio *vena* revellendus, idque interdum, etiam repetitis vicibus. Hinc si alvus aperta non sit, CLYSTERES frequentes injiciantur, inque tales, qui non requirunt longum tempus ad præparationem, quia morbus præceps, sed sit *ivvisor*: verbigr. solum *Decoctum hordei cum melle*, aut *saccharo rubro*, aut *nitri depurati* ℞. ad ℞iij. Vel *clysteres ex lacte parati cum saccharo violaceo*, vel *melle rutaceo*, vel *ex lacte cum succo plantaginis*, aut etiam *ex lacte cum nitro depurato*; Item *clyster ex succo aut Decocto cancerum fluvialium*, qui tamen magis in inflammatione intestinorum crassorum, minus in tenuium, prodest.

Vel ad imitationem BARBETTE in *Pr. l. 4. c. 7.*

℥. Herb. *semperviv.*

Tarax. an. Mj.

Tamarind. ℞j.

Sem. melon. ℞ss.

Tartari crud. ℞ij.

coqu. in f. q. *Decocti hordei.*

Colat. ℞x. adde

Syr. rosat. solut. ℞j.

M. pro Clystere. S.

Clyster leniens.

Hinc leniendi causâ externè applicetur *cataplasma* discutiens in lacte ejusve sero coctum. Præ cæteris commendatur hic à LINDANO omentum vervecinum, animali vivo extractum, & ventri calidissimè impositum. Oportet igitur in eodem conclavi animal discindere, omentum extrahere, & leniter involutum immediatè abdomini imponere, pulvillis calidis superimpositis. Si dolor non cessat, aliud omentum imponatur, imò tertium. Item paratum balsamum ex oleo saturni per distillationem, mistum cum Oleo rosaceo, & externè inunctum, remedium est commendatum ab Hartmanno.

Quoad autem interne; ea sunt, quæ reliquis Inflammationibus, in specie pleuritidis dicata: specialiter ergo conveniunt, præter diaphoretica & discutientia, nitrata, spiritus nitri dulcis, &c. qui certè egregius est. Oportet internè simul dare anodyna, v. g. *laudanum opiatum*, quibus si dolor successivè remittat, & somnus succedat, salva res est, si non, & delirium sequitur, mors certa: Sin dolor subito cessaverit, ex gangræna æger brevi moritur. Commodè etiam videtur præscribi posse mistura elegans BARBETTE, quam habet in sua *Praxi cap. 7. lib. 4. p. 231. ubi de ilco*; nempe

℥. *Aquæ prophylacti.* ℞ss.

Rosar. ℞ss.

Card. bened. ℞iijss.

Succi *semperviv. maj. depur.* ℞j.

Bezard. mineral. ℞j.

Syr. de portulac. ℞iij.

Misceantur.

Hauriatur cochlearim subinde benè testio corpore. Aut loco hujus,

℥. *Aquæ card. ben.* ℞iij.

*Aceti sambuc.* ℞ss.

S. cc. *semperviv. maj. depur.* ℞j.

*Rob sambuci* ℞ij.

*Bezard. mineral.* ℞j. ad ℞ss.

*Syr. de portulac.* ℞vj. ad ℞j.

M. F. Porio: S.

Porio dissolvens, cochlearim sumenda.

Item saccharum saturni, aut Oleum saturni per deliq. paratum, similiter conveniunt internè.

### ARTICULUS V.

De

### INFLAMMATIONE ANI.

### CAUSÆ.

Cæterum juxta intestina frequentissimè eorum extremitas seu Recti exitus, Anus, etiam inflammatur; idque à violentia CAUSÆ EXTERNÆ, contusione nempe, aut vehementi concussioni, ut ex equitatione nimia, quale exemplum observatur in *FORESTO libr. 22. Observat. 12.* item ex irritatione externa per acria facta, quando nempe adhibentur chartæ vitriolatae aut piperratæ podici pro anitergo, quale exemplum habet *PLATERVS*; Vel ex INTERNA CAUSA, inter quas imprimis hæmorrhoides suppressæ, aut etiam cæcæ, inflammationem in intestino recto seu ano excitare solent.

### DIAGNOSIS.

Signa autem Ani inflammati sunt necessariò dolor ejus insignis pulsatorius, qui propter arterias hæmorrhoidales & sanguinis impeditum motum sequitur, & tumor adest nunc magis nunc minus sensibilis.

Dolor quoque ac sensus ardoris nunc in profundo seu parte interna, nunc in parte magis externa hæret, in qua palpari potest digito non immisso, sed externè applicato; aut ano pressio, interdum tumor oculis inspicere potest.

Peculiariter quoque foramen seu podex ipse, circulus nempe ultimus intestini recti, intorsum versus retractus percipitur, alvus difficulter redditur, accedit febris, &c.

### PROGNOSIS.

Quoad eventum; Inflammatio hæc Ani sæpè est periculosa, & nisi maturè discutatur, citèque tractetur, in gangrænam, in abscessum abit, & hic in fistulam difficillimæ curæ; quæ fistula interdum penetrat in vesicam, hinc crepitus & stercorea subinde per vesicam emittuntur.

### CURA.

Quoad CURAM ergò, mox in principio oportet revellere *secta vena* in brachio, & hinc ante aliorum applicationem opera danda est, ut protinus alvus solvatur & aperta servetur. Fit hoc quidem cum aliquali dolore & Inflammationis aggravatione; omnia tamen hæc symptomata graviora sunt, si feces retentæ aut induratae postmodum excernuntur: Ob id ergo protinus clyster leniens & emolliens ex lacte, ac etiam ex alio decocto emolliente in lacte paratus, vel ex decocto foliorum & florum verbasci, parietariæ, & folijs meliloti injiciendus; addatur saccharum. Quod si verò induratae jam sint feces, ℞. *salis gemmæ*, potenter dissolvētis easdem, addenda. Quod si unum clyisma alterumve injectum & rejectum non sufficiat, aliud injiciendum cum oleo rapistræ, seu rapæ sylvestris & lini mistum; hoc enim est appropriatum, & sic præcavetur abscessus: Suspensâ autem quasi manu & blandè clyisma applicandum, ne dolor & ardor augeantur. Formulas dedi *suprà sect. 9. c. 1. art. 2. ubi de passione iliaca*. Sin verò minus externa talia scopi suffecerint, aut clysmata nequeant injici ex metu majoris irritationis, convenientissimum erit, ut per blanda, passulata aperiantur alvos & fluida servetur, uti audivisti *suprà l. 4. & sect. 17. cap. 3. Artic. 6. ubi de malo hypochondriaco*. Acris enim quæcunque, fortius intestina stimulantia,



ela, ac inter ea imprimis laxativa resinosa, fugienda, ne hord visciditate malum reddatur pejus; hocq; probe observetur in fistulis ani, quæ per resinosa semper solent exasperari; ac proin passulata lententia sufficiunt.

**EXTERNE** foveatur anus cum Decocto agrimonie & menthæ Saracenice ex aqua & aceto, vel horum loco cum vino coctarum, quod est appropriatum discussivum in Inflammatione ani; Vel decoquantur hæc simplicia in aqua calcis viuæ, quod decorum ita medicatum nobilissimum est, in specie si metus gangrænæ imminet; vel etiam aqua calcis viuæ, in qua ebullierit chamomilla, commodè adhibetur: Folia etiam & flores verbasci in aqua vel sero lactis cocta pro fotu eidem egregiè conveniunt ad huiusmodi calidos abscessus; quibus folia solani et portulacæ, aut etiam si dolor nimis urgeat, commodè parum fol. hyoscyami simul addendum est, cautè tamen: Mucilago seminis psylliæ aut cydoniorum cum aqua semper vivi extracta, addito saccharo saturni, & applicata, est utilis. Sin acrimonia orta acribus externis, nil melius est quàm lac, vel simplex vel cum linaria, chamomilla, ac floribus sambuci decoctum, & in forma fotus vel cataplasmatidis calidè admodum: item lac cum albumine ovorum agitato misum, & ita pro fotu applicatum, convenit etiam in podicis ardore & Inflammatione, in specie piperatorum & rerum adurentium contactu facta, teste PLATERO in Observ.

Et hæcenus dicta in incipiente Inflammatione possunt usurpari.

**INTERNE** diaphoretica & sudorifera blanda sunt optima.

Quod si Inflammatio ani discuti nequit, & jam factus sit abscessus, præter emollientia & resolventia imprimis conferre bals. sulphuris, ad extra Rutandi, ex sulphure cum oleo papaveris paratū, quod optimum est remedium, & describitur ab HARTMANNO in Prax. Chym. ubi de mamillar. affectibus; hinc enim & maturat & mundificat, & consolidatiōnem promovere, & præprimis imminentes fistulas præcavet:

Item

℞. Lact. chalybeat. ℥i.  
Terebinth. cum vitell. ovi sol. ℥vj.  
Mell. rosati ℥j.

℞ pro Enemate, pro exulceratione intestini recti:

D. S.

Clyster ulcerationem mundificans.

Item præparetur Unguentum Nicodemi, ut vocatur, & describitur in Antid. WECKERI. quod bals. sulphuris pernitum optimum erit remedium pro curando huiusmodi abscessu. Hoc ipsum tamen maturè faciendum est, quia aliàs in fistulam degenerat, quæ interdum in vesicam urinariam hiat.

**Ad HÆMORRHOIDUM EXULCERATIONEM** Linimentum ex auro fulminante, cum oleo amygdalarum dulcium paratum, singulare est Anglorum experimentum.

Sin abscessus in fistulam abierit, hæc facile non curatur; optimum tamen remedium esse dicitur oleum dulcis mercurij, quod vid. in AGRICOLÆ Commem. in Populium.

**INTERNE**, ubi Intestinum rectum exulceratum, usurpari possunt Potiones vulnerariæ; e. g.

℞. Herb. beder. terr. M. ij.

Plantag.

Sanic. an. M. ℞.

℞. Cornu Cerui ℥ij.

Coqv. in f. q. aqua:

Colat. ℥viii. adde

Syr. corallor.

De sympb. Fernel. an. ℥j.

M. D. S.

Potio vulneraria consolidans & mundificans.

Ter hauriatur in die cum gutt. 4. bals. sulphuris.

## ARTICULUS VI.

De

### MESENTERII INFLAMMATIONE ALIISQUE AFFECTIBVS,

& inde orto

#### ABSCESSV.

**P**ergimus ad MESENTERII INFLAMMATIONEM, cuius tumores & inde nati abscessus sanè typius suut origo & fons chronicorum & latentium admodum morborum, & fomes mirabilium turbarum & complicatorum affectuum, qui latentes mirè vexant ægros, & Medicos insigniter turbant; sicut & variformes sunt passionēs, quæ ex affecto mesenterio originem ducunt. Affectus hi aded latentes sunt & occulti ex eo, quoniam difficillimè cognoscuntur, cùm mesenterium in profundo situm, aliis quoque partibus hinc inde circumseptum sit, & propter sensum obtusum minus clara sint ejus pathemata, unde sæpissimè & ægros & Medicos fallunt, ut raro de his possimus esse certiores: Accedit præterea & hoc, quod corpus mesenterii variis glandulis sit infarctum, quæ ipsæ diversimodè affectu similiter varia abdominis symptomata inferunt, tam per se, quàm ratione lymphæ, adeoque evenit, ut tam intricati affectus oriantur: Item accedit textura, divaricatio, & distributione rerum per mesenterium sparsorum varia & mirabilis, unde uno affecto aliæ etiam partes facile per consensum simul afficiuntur, ut nequeamus ob id rectè distinguere proprios MESENTERII AFFECTVS ab aliis. Affectus seu morbi, qui vitio mesenterii oriuntur, tumores & abscessus, sunt varii & vagi, interdum frequentius, idque in paulò obessoribus, plus minus dolorosi, nunc circa dorsum & lumbos dolorem, nunc in abdomine, ac præsertim circa umbilicum, tormina inferentes, lenti tamen omnes & diuturni; subinde cum febricula erraticâ complicati, ac continis aut saltim vagis æituationibus & intercurrentibus interdum horribus levibus comitati, quæ symptomata propria sunt ferè membranosis partibus affectis. Corpus simul ut plurimum successivè emaciatur, respiratio evadit difficilior, & subinde aliquid molesti, quod ipsi ægri satis explicare nequeunt, in profundo abdominis circa & infra umbilicum & circa præcordia se perferire affirmant. Venter nunc inflatur ac plus minus tumet, ut interdum ægri quasi tympanitide laborare videantur; nonnunquam tenditur abdomen, nunc ad interiora dorsum versus quasi retrahitur; dolor autem & tumor lumborum aut abdominis subinde per intervalla recurrit, & sæpè multis annis affligit; flatulentia plures infimè ægros vexare solent. Frequentissimè tamen Mesenterii Inflammationes alii tumores inde nati & occulti abscessus sequuntur, hinc etiam variis glandularum tumoribus duris scirrhis & strumosis mesenterium afficitur, qui nunc suppurantur, nunc manent sine suppuratione, sicut & steatomata, atheromata, melicerides & similes tumores intra duplicaturam mesenterii congeruntur. Infantibus, quibus affectum est mesenterium, non raro atrophia & tumores quasi tympanitici abdominis supervenire solent. Febres ardentes ceu metastasi critica in abscessus mesenterii terminantur; quin & aliis febribus aut morbis complicatæ Inflammationes, & inde nati abscessus mesenterii, eos intricatos & molestos magis reddunt, unde non ineptè exinde SENNERTUS derivat febres semitertianas l. 3. Prax. p. 445.

**CURANTUR** tamen hæc pathemata mesenterii ferè ut alii chronici affectus, cachectici aut hypochondriaci, interuè quidem per salia salsa, tartarea, vitrolata, vitrosa, abstergentia, & hinc per martialia & volatilia, item aromatica, amara, aperientia aut hepatica vulgè dicta, interpositis blandis purgantibus, quem modum supra Sect. 3. & Sect. 17. Cap. 3. Artic. 1. de Cachexia tetigi. Tractentur tamen cautè & sine violentia; aliàs exasperantur & deteriores evadunt ob nervos tunc irritatos. Externè emplastrum ex gummatibus, de cicuta, de nicotiana, emplastrum Vigo-  
niseranis cum Mercurio, vel ex gummatibus & mercurio, descri-



descriptum a BARBETTE in *Anat. Pract.* p. 557. Plura videb. *suprà Sect. 3.*

Multa præterea tumorum & abscessuum occultorum in mesenterio hinc inde prostant observata: v. g. Callum inter venas mesenterii natum lethalem; item Calculos in mesenterio, refert SCHENCKIUS in *Observat.* l. 3. Hydropem à vesiculis mesenterii recenset TULPIUS l. 2. *Observat.* 34. Mesenterium lapidosum, hinc atrophiam lethalem PANAROLUS *Pent.* 5. *Obs.* 19. abscessum mesenterii, ubi cum pure simul vermiculi excreti, THONERUS l. 1. *Observ.* p. 173. Tumorem mesenterii durum circa medium pancreas per emollientia curatum videbitis à FORESTO lib. 21. *Observ.* 1.

Ex scirrbofo mesenterii tumore helicam incipientem, menses albos, tormina TRINCAVELLIUS l. 3. *Consil.* 22. p. 372. Mesenterium scirrbofum in hysterica in M. A. N. C. *Ann.* 4. *Obs.* 32. p. 107. Glandulas mesenterii induratas & augtas, ventrem tumidum reddentes, apud PLATERUM l. 3. *Observat.* p. 464. Sed de his & similibus mesenterii affectionibus, tam veris quàm falsis, præ cæteris omnium optimè scripserunt FERNELIUS in *Pathol. speciali*, & post hunc MATTHÆVS MARTINI de *Morbis Mesenterii abscessu* foribus, qui laudem meretur, & hinc SENNERTVS l. 3. *Prax.* ubi de Mesenterii Morbis. In his ut ut vera falsis, & bona sint mista malis, cum licet non theoriam plausibilem, sed pro temporis illius ratione mancarn, ex sanguinis circulatione, lymphæ & glandularum observatis aliisque hodiernis experimentis emendandam, nec remedia bona notæ offerant; horum tamen *Historia* observata, *Diagnosis*, *Prognosis*, & *Praxis* satis commoda, pro ulteriori indagine uberiorem occasionem subministrant.

Speciatim jam consideranda est mesenterii Inflammatio, & hanc subsequens Abscessus.

Satis autem frequentes sunt mesenterii Inflammationes, quoniam copiosissima habet vasa sanguifera, simulque copiosissimis instructum est glandulis, unde faciliè excitatur Inflammatio, ut ut ferè cum aliis morbis conjungatur, ac sub aliis morbis se præsentare soleat, idque imprimis, dum illud ob varios casus Inflammationem pati queat, in specie accedente intestinorum affectu: Vnde mesenterium nunc solum, idque rariùs, nunc unà cum intestinorum parte, inflammarì solet: Si hoc, melius est pro Medico, qui ita faciliùs eam cognoscere potest; pejus pro ægro magis patiente; quale exemplum habet CHIFFLETIVS *obs.* 37. de Mesenterii & Intestinorum Inflammatione cum umbilici dolore conjuncta.

### C A V S Æ.

Ex causis, quæ Inflammationem Mesenterii inducunt, præter eas generales Inflammationum reliquarum CAVSAS, duæ imprimis sunt *speciales* in mesenterio, nempe dysenteria & hernia. Dysenteria enim præve curata, in specie suppressa, ac adstringentibus intempestivè tractata, sæpius in Inflammationem Mesenterii periculosa & lethalem degenerat, observante hoc HILDANO, LA'MONIERE, & MATTHÆO MARTINI c. 1. p. 27. Quoad Herniam verò, dum in hac, ubi cum intestinis tenuibus mesenterium simul in scrotum descendit, non potest non mesenterium contractum aut vitiòse compressum sanguinis circulum turbare & impedire, & ita Inflammationem incurrere. Præterea & febres ardentes per metastasin quasi criticam materiz morbosæ in mesenterii abscessum terminantur, ut *suprà* jam dictum.

### D I A G N O S I S.

Quod attinet SIGNA DIAGNOSTICA, Inflammatio hæc non secus ac reliqui ejus tumores & abscessus, difficulter COGNOSCUNTUR, quia latent in profundo, & sæpiùs sunt indolentes; aut dolentes licet, pro uterinis, colicis aut nephriticis pathematis subinde habentur, cum nausea & vomitus subinde accedant. Nihilominus tamen in Inflammatione Mesenterii percipitur quasi pondus in abdomine, ac imprimis in ejus profundo, quod in specie sensibile fit, dum æger se in lecto volvit; ardor simul adest non rarè præcordiorum aut circa umbilicum; dolor pulsatorius in profundo abdominis, cum leni tamen ardore absconditus; cum quo etiam ardore percipitur tensionis qu-

dam sensus sub ventriculo & circa ejus regionem, & in abdomine, idque tamen citra vehementem, & quæ non nisi pressu animadvertitur, duritiem; interdumque adfunt egestiones chylosæ ac plus minus serosæ, citra tamen ventriculi vitium præiens excitatæ: Ratio faciliè patet. Dolor vehemens aut acris adest nullus, sed tensivus, obtusus, plus minus pulsatorius urget: Adfunt signa Inflammationis reliquarum abdominis partium, quæ aliàs faciliè confunduntur.

Observandum ergò, ne confundatur Inflammatio umbilici cum Inflammatione Mesenterii, sed probe distinguenda est. Nam umbilicus in parte sui interna non externa, circa musculos rectos non rarè inflammatur & suppuratur, unde pus per eum evacuat. Nempe in umbilici Inflammatione circa regionem ejus in profundo dolor magis sentitur, tumor apparet prominulus & propior, qui in mesenterio est rembrior, ardor & febris sunt magis intensæ, ægerque in abdomine majorem tensionem perientiscit; Quando verò Inflammatio ad abscessum pervenit, percipit tunc horrorem, interdum rigorem, cum superveniente insigni æstu.

Cauti etiam simus, ne Inflammationem Intestinorum confundamus cum Inflammatione Mesenterii: Nam circa umbilicum tres vel quatuor sunt digiti, ubi imprimis locus est mesenterii, in quo præ aliis tangi atque cognosci potest ejus Inflammatio aut abscessus; Nam si ipsi non adest Inflammatio, non potest percipi tactu si ipse umbilicus inflammatus, percipitur propior tumor, qui in mesenterio est remotior.

Febres diversæ etiam in Mesenterii Inflammatione & Abscessu adiunguntur, pro diversitate loci inflammati: Sinè profundè Mesenterium inflammatum, ut plurimum febres non sunt continuæ, sed lentæ, languidæ, absque siti insigniori aut gravioribus symptomatibus, & quæ interdum circa vespèram exacerbantur, oriuntur: Interdum nulla febris indicia adsunt, teste RHODIO c. 2. *Observ.* 95. Sin verò circa exteriores ejus partes, ubi reliquis abdominis contentis visceribus jungitur, Inflammatio mesenterii accidat, præsertim cum intestinalis, tunc symptomata dicta omnia existunt graviora, febres ardentes plus minus acutæ, non rarè semitertianæ conjunguntur, & graves dolores affligunt, innuente SENNERTO cap. de Inflammat. Mesenterii lib. 3. *Prax.*

In genere, dum suppuratio fit, ut aliàs in quavis Inflammatione, febris, dolor & symptomata reliqua sunt graviora. Dum Apostema suppuratum rumpi incipit aut rumpitur, HORROR INSIGNIS, interdum RIGOR quatit ægrum, cum superveniente æstu non rarè insigni, quem puris, præsertim per alvum, excretio successivè comitatur: Confer HORSTIVS lib. 14. *Obs.* 25. & 26. item BARTHOLINVS Centur. 4. *Epist.* pag. 49. & c. 4. *Histor.* 96.

### P R O G N O S I S.

Quoad PROGNOSIN; Inflammationes mesenterii aut resolvuntur, aut frequentissimè suppurantur, & in abscessus abeunt, aut diutius durando, in scirrbo degerant, qui non tam in mesenterio inflammato, quam ejus glandulis observati satis sunt.

In *Observationibus* mesenterii supervenientes cruentæ defecationes subinde salutare sunt: vid. BARTHOLINVS Cent. 6. *Hist.* 41.

Suppurationes Mesenterii admodum sunt lentæ, ac non nisi tardè suum absolvunt cursum, unde etiam ægros vix in consuetis functionibus impediunt. Diuturno hoc malo afflictis successivè aut ad tabem & helicam, aut tandem ad cachexiam deveniunt. Eructante pure, post abscessus ruptionem, allum in locum quàm in alvum, excretioni idoneum non repiente, gravis affectus colicæ similis non rarè observatur. Sin verò in abdominis cavum effundatur, tunc membra vicina vel inficit, ut gangrænam concipiant, vel acedine corrodit, & malorum quamplurimorum auctor est.

Interdum abscessus ruptus optimè non tantùm per alvum, quod sæpius, quàm, quod rariùs, per urinam, rarissimè per uterum expurgatur, intestina corrodit, & eadem siderata seu sphacelata reddit: Exemplum suggerit TVLPIVS *Obs.* 37. l. 2.

Ut autem discernatur, nec confundatur, excretio purulenta facta ex mesenterio, ab excretionem purulentam visio excretionis intestinorum, observetur hoc signum distindrum, quod



quod si confertim uno impetu, & copiose, & sine dolore, per alvum fluant purulenta, & eaque plerumque permixta cum sanguine plus minus, ex mesenterio effe: quod si verò purulenta pauciora, & tardius cum magnis torminibus ac præcedente febre acuta sentim ac successivè effluant, signum est, esse ab ulcere intestinorum, ac horum cum mesenterii simul conjuncto.

Observationes singulares ac præ aliis curiosas Inflammationis Mesenterii, ejusque abscessuum, cum gravissimis symptomatibus, secutà tamen excretionem copiosà purulentà, videbitis in BARTHOLINO Cent. 4. Epist. p. 490. item in C. 4. Hist. p. 96. sicut etiam rarum est, quod refert RHODIUS cap. 2. Obs. 95. de Abscessibus mesenterii interdum sine febris observatis, ut, uti dixi, ut plurimum adhuc febris lenta; & TULPIUS l. 2. obs. 37. ubi notabilem habet casum, Inflammationem scilicet mesenterii suppurati, & ad sphacelum dispositi.

Porro evenit interdum in Mesenterii abscessu, ut emitatur urina copiosa, & eaque laudabilis cum sedimento laudabili: quod si fiat sine levamine ægri, quin potius cum incremento dolorum, malum est; innultenim fluxum colliculativum, ægrum tibi ac heciticæ, brevique post mortem traditurum.

## C U R A,

CURA ferè cum reliquis Inflammationibus est eadem, mutatis saltem mutandis, ratione nempe partis affectæ, & conjunctorum symptomatum.

Notandum saltem, quod venæ sectio nil profit, nec ipso morbo, nec sanguinis effruescentia febrili adeò acutis existentibus. Præceteris tamen sanguinis quibusvis evacuationibus vasorum hæmorrhoidalium apertio, præsertim per hirudines applicatione factà, suo cum fructu in mesenterii morbis institui solet, naturà monstrante viam, & per dicta loca subinde felici cum successu se ipsam exonerante.

PURGATIO quævis propriè dicta seu vehemens ex se & per se potius est nociva, irritat crabrones, & absque euphoria ægri evenit. Clysmata verò emollientia, lenientia, abstergentia & anodyna, pro circumstantiarum ratione subinde injecta, imprimis quando jam per alvum purgatur abscessus, sæpius sunt utilissima.

De cætero tota Inflammationis mesenterii Cura consistit in solventibus & emollientibus, ut rectè loquitur HARTMANNUS in Pr. Chym. Illis quidem solventibus internis; his verò emollientibus externis. Interna ferè sunt nota ex superioribus, præter quæ in specie tartarea, v. g. tartarus vitriolatus, liquor terra sol. tartari ritè paratus, tinctura tartari, spiritus tartari simplex, aut carminativus, tinctura vitrioli martis Zuvelfferi; item alia blanda Martialis, est. martis cum succo pomorum, tinctur. tartarificata martialis Ludovici. item essentia amara aperientes dictæ, ut absinthii, centaurei min. fumaria, cardui ben. chelidonii majoris, gummi ammoniacum, &c. Quibus adjungenda sunt, speciatim si febris lenta adsit, diaphoretica; antimonialia; unde antimonium diaph. præsertim martiale, hinc etiam bezoardicum martiale, antihect. Pot., & similia in morbi cursu sunt præstantissima & frequenter usurpanda. Externe applicatum emplastrum de cicuta usitatum, vel solum, vel cum gummi ammoniaco subactum, juxta curiosam HARTMANNI compositionem, est egregium in tali casu; hæc tamen simul observatà cautela, ut, si citra dolorem emplastrum hoc emolliat, & inflammationem discutiat, res bene se habeat; sin verò dolorem intendat & exacerbet, malum signum est; certum enim est, factam jam esse inflammationem ac abscessum, adeoque emplastrum removendum erit, & ab eodem abstinendum. Aliàs quoque præter consueta emplastra, cataplasmata & fomenta emollientia ex betonica, solano, agrimonia, chamomilla, verbasco, meliloto, liliis albis, absinthio, & similibus in vino coquenda, & cum spongia vel aliis appropriatis applicanda, conducunt. Quod si cum Inflammatione & Abscessu Mesenterii febris lenta plus minus conjungatur, interne martialis & antimonialia reliquis suprà enarratis addantur remediis, præsertim lap. cancr. antihect. Pot. &c. cum paucis sale ammoniaco socianda erunt.

His ipsis vel resolvitur Inflammatio & abscessus, vel ut plurimum suppuratur, unde rupto abscessu sequitur tandem puris ut plurimum per intestina vel per urinam excretio, & eaque in principio confertim, & postmodum successivè, continuatur ad perfectam usque abscessus expurgationem,

Interdum remittit puris excretio, post aliquot dies tamen recurrens, idque crebrius, mutatis sic vicibus, quando nempe tanquam in vomica purulentia successivè colligitur, donec in quanto sufficienti collecta excernatur. In hujusmodi suppurationibus & abscessibus mesenterii adhuc notabile est, quod refert MARCELLUS DONATUS in Histor. Med. Mir. lib. 4. Hist. c. 7. supervenire sæpè his copiosum urinæ profluvium, sed sine alleviatione doloris ægri. Ob sedimentum autem, quod in matulæ fundo reperitur, laudabile, nullam salutis spem concipere debet Medicus, cum istud colliquamentum potius quoddam corporis contabescens existat, non autem genuinum urinæ sedimentum. Quod si ergo remediis hætenus dictis Inflammatio resolvinequeat, sed degeneret in Abscessum, tunc Abscessus ita factus est expurgandus, mundificandus, & consolidandus. Et quidem dum apertus est, quod docet rigor & horror cum phlogosi, alvus clysmate acriore injecto stimulanda est, & diureticis pus promovendum, ut maturè id evacuetur. In mundificatione verò & consolidatione Abscessus eadem omnia conveniunt, quæ aliàs in phthisi, ab exulcerationibus partium internarum orta, sunt proficua, & superius Sect. 17. Cap. 1. Artic. 2. laudata; speciatim terebinthina & omnia terebinthinata, hinc vulneraria vegetabilium reliqua, primum obtinent, unde balsamum sulphuris terebinth. aut succinatum, ni intensior febris obstiterit; item bals. Peruvianum in jasculo calido vel ovo sorbili ad gut. viij. x. xij. &c. assumptum, pilulæ de tereb. item tereb. Cypria cum vitello ovi assumta, reliquis præferuntur merito remediis à MARTINI laudatis; quibus subinde & blandiora martialis, præsertim in forma liquida, tinctura, extracta & essentia martiales quæcunque, v. g. Essentia Martis liquida, Extract. martis cum succo pomorum, item tinctura sulphuris, vitrioli, & tinctura antiphthisica addenda; quia abscessum & mundificant & consolidant. Hinc acidulis cum fructu usus fuit THONERUS in suis Observ. p. 173. Potiones vulneraria aliàs notæ sunt, speciatim tamen in hoc casu proficua sunt agrimonia, hypericum, persicaria, ceu appropriatum Abscessuum mesenterii remedium. Decoctum ligni sancti & saffras in principio ruptionis abscessus insigniter conveniunt; quibus addenda & radix glycyrrh., scorzonera, ficus, jujubæ, & similia, quæ mundificant Abscessum & purulentias acres simul temperant & absterpunt: item Decoctum rad. China cum passulis, & minoribus & majoribus, glycyrrhiza, rad. scorzonera, caryophyllata, cinnamomo & similibus in sero lactis parandum; vel aqua etiam, ut ut priori modo melius sit. Formulas videb. in MARTINIO. Serum lactis etiam est egregium absterfivum & consolidativum ulcerum internorum, ratione suæ nitrositatis; id quod vel solum propinetur; vel Decoctum cum rad. cicorii, liquiritiæ &c. usurpetur. Rhabarbarum, tam pro scopo absterfivo, quam scopo adstrictorio & quasi vulnerario, non negligendum venit. Sed plura de his videb. in specie in modò laudato MARTINIO.

Cæterum tumores mesenterii duri, scirrhusi, scrophulosi vel ipsi suppurantur, & simili modo curantur, vel præmissis internis martialibus, ad salia volatilia & penetrantia accedendum. Externe verò usurpanda empl. ex gummat., vel sola, vel cum addito Mercurio vivo; uti & prodest emplastrum de ranis cum mercurio, à quo nullum periculum metuendum est.

## ARTICULUS VII.

## DE

## INFLAMMATIONE PANCREATIS.

Quæ hætenus de Mesenterio dicta fuerunt, etiam de PANCREATE ferè monenda sunt; cuius morbi & affectus ut perquam occulti sunt, ita plurimum difficultum & intricatorum morborum subinde origo sunt. Ex pluribus pauca annotare sufficiat.

Tumorem scirrhusum Pancreatis cum affectione hypochondriaca, vel potius scorbuto, eleganter curatum videb. in RIVERO Cent. 3. obs. 85. RIOLANUS Anthropogr. lib. 2. cap. 16. in Thuanò melancholico pancreas amplitudine suà & pondere ipsum hepatis æquans totum scirrhusum, multis globulis speciei ovæ columbinæ repletum refert: & CATTIERIUS observat. 10. pancreas insolite atque stupendæ magnitudinis allegat, ex quo renis è suo



descriptum a BARBETTE in *Anat. Pract.* p. 557. Plura videb. *suprà Sect. 3.*

Multa præterea tumorum & abscessuum occultorum in mesenterio hinc inde prostant observata: v.g. Callum inter venas mesenterii natum lethalem; Item Calculos in mesenterio, refert SCHENCKIUS in *Observat.* l. 3. Hydriopem à vesiculis mesenterii recenset TULPIUS l. 2. *Observat.* 34. Mesenterium lapidosum, hinc atrophiam lethalem PANAROLUS *Pent. 5. Obs.* 19. abscessum mesenterii, ubi cum pure simul vermiculi excreti, THONERUS l. 1. *Observ.* p. 173. Tumorem mesenterii durum circa medium pancreas per emollientia curatum videbitis à FORESTO lib. 21. *Observ.* 1.

Ex scirrroso mesenterii tumore hædicam incipientem, menses albos, tormina TRINCAVELLIUS l. 3. *Consil.* 22. p. 372. Mesenterium scirrrosus in hysterica in M. A. N. C. *Ann.* 4. *Obs.* 32. p. 107. Glandulas mesenterii induratas & auctas, ventrem tumidum reddentes, apud PLATERUM l. 3. *Observat.* p. 464. Sed de his & similibus mesenterii affectionibus, tam veris quam falsis, præ cæteris omnium optime scripserunt FERNELIUS in *Patbol. speciali*, & post hunc MATTHÆVS MARTINI de *Morbis Mesenterii abscessu* foribus, qui laudem meretur, & hinc SENNERTVS l. 3. *Prax.* ubi de *Mesenterii Morbis*. In his ut ut vera falsis, & bona sint mista malis, cum licet non theoriam plausibilem, sed pro temporis illius ratione mancarn, ex sanguinis circulatione, lymphæ & glandularum observatis aliisque hodiernis experimentis emendandam, nec remedia bonæ notæ offerant; horum tamen *Historia* observata, *Diagnosis*, *Prognosis*, & *Praxis* satis commoda, pro ulteriori indagine uberiorem occasionem subministrant.

Speciatim jam consideranda est mesenterii Inflammatio, & hanc subsequens Abscessus.

Satis autem frequentes sunt mesenterii Inflammationes, quoniam copiosissima habet vasa sanguifera, simulque copiosissimis instructum est glandulis, unde facile excitatur Inflammatio, ut ut ferè cum aliis morbis conjungatur, ac sub altis morbis se præsentare soleat, idque imprimis, dum illud ob varios casus Inflammationem pati queat, in specie accedente intestinorum affectu: Vnde mesenterium nunc solum, idque rarius, nunc unà cum intestinorum parte, inflammari solet: Si hoc, melius est pro Medico, qui ita facilius eam cognoscere potest; pejus pro ægro magis patiente; quale exemplum habet CHIFFLETIVS *Obs.* 31. de *Mesenterii & Intestinorum Inflammatione* cum umbilici dolore conjuncta.

### C A V S Æ.

Ex causis, quæ Inflammationem Mesenterii inducunt, præter eas generales Inflammationum reliquarum CAVSAS, due imprimis sunt speciales in mesenterio, nempe dysenteria & hernia. Dysenteria enim præve curata, in specie suppressa, ac adstringentibus intempestivè tractata, sæpius in Inflammationem Mesenterii periculosam & lethalem degenerat, observante hoc HILDANO, LA'MONIERE, & MATTHÆO MARTINI c. 1. p. 27. Quoad Herniam verò, dum in hac, ubi cum intestinis tenuibus mesenterium simul in serotum descendit, non potest non mesenterium contraçtum aut vitiôsè compressum sanguinis circulum turbare & impedire, & ita Inflammationem incurrere. Præterea & febris ardentes per metastasin quasi criticam materiæ morbificæ in mesenterii abscessum terminantur, ut *suprà* jam dictum.

### D I A G N O S I S.

Quod attinet SIGNA DIAGNOSTICA, Inflammatio hæc non secus ac reliqui ejus tumores & abscessus, difficulter COGNOSCUNTUR, quia latent in profundo, & sæpius sunt indolentes; aut dolentes licet, pro uterinis, colicis aut nephriticis pathematis subinde accedant. Nihilominus tamen in Inflammatione Mesenterii percipitur quasi pondus in abdomine, ac imprimis in ejus profundo, quod in specie sensibile fit, dum æger se in lecto volvit; ardor simul adest non raro præcordiorum aut circa umbilicum; dolor pulsatorius in profundo abdominis, cum leni tamen ardore absconditus; cum quo etiam ardore percipitur tensionis qui-

dam sensus sub ventriculo & circa ejus regionem, & in abdomine, idque tamen citra vehementem, & quæ non nisi pressu animadvertitur, duritiem; interdumque adsunt egestiones chylosæ ac plus minus sterose, citra tamen ventriculi vitium præiens excitatæ: Ratio facile patet. Dolor vehemens aut acris adest nullus, sed sensitivus, obtusus, plus minus pulsatorius urget: Adsunt signa Inflammationis reliquarum abdominis parvum, quæ aliàs facile confunduntur.

Observandum ergò, ne confundatur Inflammatio umbilici cum Inflammatione Mesenterii, sed probe distinguenda est. Nam umbilicus in parte sui interna non externa, circa musculos rectos non raro inflammatur & suppuratur, unde pus per eum evacuat. Nempe in umbilici Inflammatione circa regionem ejus in profundo dolor magis sentitur, tumor apparet prominulus & propior, quin mesenterio est remotior, ardor & febris sunt magis intensa, ægerque in abdomine majorem tensionem perentiscit; Quando verò Inflammatio ad abscessum pervenit, percipit tunc horrorem, interdum rigorem, cum superveniente insigni astu.

Cauti etiam simus, ne Inflammationem Intestinorum confundamus cum Inflammatione Mesenterii: Nam circa umbilicum tres vel quatuor sunt digiti, ubi imprimis locus est mesenterii, in quo præ aliis tangi atque cognosci potest ejus Inflammatio aut abscessus; Nam si ipsi non adest Inflammatio, non potest percipi tactu si ipse umbilicus inflammatus, percipitur propior tumor, qui in mesenterio est remotior.

Febris diversæ etiam in Mesenterii Inflammatione & Abscessu adjunguntur, pro diversitate loci inflammati: Sin, profundè Mesenterium inflammatum, ut plurimum febris non sunt continuæ, sed lentæ, languida, absque sitis insigniori aut gravioribus symptomatibus, & quæ interdum circa vesperam exacerbantur, oriuntur: Interdum nulla febris indiciæ adsunt, teste RHODIO c. 2. *Observ.* 95. Sin verò circa exteriores ejus partes, ubi reliquis abdominis contentis visceribus jungitur, Inflammatio mesenterii accidat, præsertim cum intestinalis, tunc symptomata dicta omnia existunt graviora, febres ardentes plus minus acutæ, non raro semitertianæ conjunguntur, & graves dolores affligunt, innuente SENNERTO cap. de *Inflammat. Mesenterii* lib. 3. *Prax.*

In genere, dum suppuratio fit, ut aliàs in quavis Inflammatione, febris, dolor & symptomata reliqua sunt graviora. Dum Apostema suppuratum rumpi incipit aut rumpitur, HORROR INSIGNIS, interdum RIGOR quatit ægrum, cum superveniente astu non raro insigni, quem puris, præsertim per alvum, excretio successivè comitatur: Confer. HORSTIVS lib. 14. *Obs.* 25. & 26. Item BARTHOLINVS *Centur.* 4. *Epist.* pag. 49. & c. 4. *Hist.* 96.

### P R O G N O S I S.

Quoad PROGNOSIN; Inflammationes mesenterii aut resolvuntur, aut frequentissimè suppurantur, & in abscessus abeunt, aut diutius durando, in scirrhus degenerant, qui non tam in mesenterio inflammato, quam ejus glandulis observati satis sunt.

In Obstructionibus mesenterii supervenientes cruentæ dejectiones subinde salutares sunt: vid. BARTHOLINVS *Cent.* 6. *Hist.* 41.

Suppurationes Mesenterii admodum sunt lentæ, ac non nisi tardè suum absolvunt cursum, unde etiam ægros vix in consuetis functionibus impediunt. Diuturno hoc malo afflictis successivè aut ad tabem & hædicam, aut tandem ad cachexiam deveniunt. Eructante pure, post abscessus ruptionem, alium in locum quam in alvum, excretioni idoneum non repiente, gravis affectus colicæ similis non raro observatur. Sin verò in abdominis cavum effundatur, tunc membra vicina vel inficit, ut gangrenam concipiant, vel acedine corrodit, & malorum quamplurimorum autor est.

Interdum abscessus ruptus optime non tantum per alvum, quod sæpius, quam, quod rarius, per urinam, rarissimè per uterum expurgatur, intestina corrodit, & eadem siderata seu sphacelata reddit: Exemplum suggerit TVLPIVS *Obs.* 37. l. 2.

Ut autem discernatur, nec confundatur, excretio purulenta facta ex mesenterio, ab excretionem purulenta visio exulcerationis intestinorum, observetur hoc signum distinctivum, quod



quod si confertim uno impetu, & copiose, & sine dolore, per alvum fluant purulenta, eaque plerumque permixta cum sanguine plus minus, ex mesenterio effluunt: quod si vero purulenta pauciora, & tardius cum magnis torminibus ac præcedente febre acuta sensim ac successivè effluant, signum est, esse ab ulcero intestinorum, ac horum cum mesenterii simul conjuncto.

Observationes singulares ac præ aliis curiosas Inflammationis Mesenterii, ejusque abscessuum, cum gravissimis symptomatibus, secutà tamen excretionem copiosà purulentà, videbitis in BARTHOLINO Cent. 4. Epist. p. 490. item in C. 4. Hist. p. 96. sicut etiam rarum est, quod refert RHODIUS cap. 2. Obs. 95. de Abscessibus mesenterii interdum sine febris observatis, ut uti dixi, ut plurimum adfit febris lenta; & TULPIUS l. 2. obs. 37. ubi notabilem habet casum, Inflammationem scilicet mesenterii suppurati, & ad sphacelum disposiri.

Porro evenit interdum in Mesenterii abscessu, ut emitatur urina copiosa, eaque laudabilis cum sedimento laudabili: quod si fiat sine levamine ægri, quin potius cum incremento dolorum, malum est; innuit enim fluxum colligefactivum, ægrum tabi ac heclicæ, brevique post mortem traditurum.

## C U R A,

CURA ferè cum reliquis Inflammationibus est eadem, mutatis saltem mutandis, ratione nempe partis affectæ, & conjunctorum symptomatum.

Notandum saltem, quod venæ sectio nil profit, nec ipso morbo, nec sanguinis effusio febrili aded acutis existens. Præ cateris tamen sanguinis quibusvis evacuationibus vasorum hæmorrhoidalium apertio, præsertim per hirudines applicatione factà, suo cum fructu in mesenterii morbis insitui solet, naturà monstrante viam, & per dicta loca subinde felici cum successu se ipsam exonerante.

PURGATIO quævis propriè sic dicta seu vehemens ex se & per se potius est nociva, irritat crabrones, & absque euphoria ægri evenit. Clysmata verò emollientia, lenientia, abstergentia & anodyna, pro circumstantiarum ratione subinde injecta, imprimis quando jam per alvum purgatur abscessus, sæpius sunt utilissima.

De cetero tota Inflammationis mesenterii Cura consistit in resolutivis & emollientibus, ut rectè loquitur HARTMANNUS in Pr. Chym. illis quidem resolutivis internis; his verò emollientibus externis. Interna ferè sunt nota ex superioribus, præter quæ in specie tartarea, v. g. tartarus vitriolatus, liquor terra sol. tartari ritè paratus, tinctura tartari, spiritus tartari simplex, aut carminativus, tinctura vitrioli martis Zuvelfferi; item alia blanda Martialis, scilicet martis cum succo pomorum, tinctura tartarisa martialis Ludovici, item essentia amara aperientes dictæ, ut absinthii, centaurei min. fumaria, cardui ben. chelidoni majoris, gummi ammoniacum, &c. Quibus adjungenda sunt, speciatim si febris lenta adfit, diaphoretica; antimonialia; unde antimonium diaph. præsertim martiale, hinc etiam bezoardicum martiale, antihect. Pot., & similia in morbi cursu sunt præstantissima & frequenter usurpanda. Externe applicatum emplastrum de cicuta usitatum, vel solum, vel cum gummi ammoniaco subactum, juxta curiosam HARTMANNI compositionem, est egregium in tali casu; hæc tamen simul observatà cautela, ut, si citra dolorem emplastrum hoc emolliat, & inflammationem discutiat, res bene se habeat: sin verò dolorem intendat & exacerbet, malum signum est; certum enim est, factam jam esse inflammationem ac abscessum, adedque emplastrum removendum erit, & ab eodem abstinendum. Aliàs quoque præter consueta emplastra, cataplasmata & fomenta, emollientia ex betonica, solano, agrimonia, chamomilla, verbasco, meliloto, liliis albis, absinthio, & similibus in vino coquenda, & cum spongia vel alitis appropriatis applicanda, conducunt. Quod si cum Inflammatione & Abscessu Mesenterii febris lenta plus minus conjungatur, interne martialis & antimonialia reliquis suprà enarratis addantur remediis, præsertim lap. cancr. antihect. Pot. &c. cum piceo sale ammoniaco solanda erunt.

His ipsis vel resolvitur Inflammatio & abscessus, vel ut plurimum suppuratur, unde rupto abscessu sequitur tandem puris ut plurimum per intestina vel per viam excretio, eaque in principio confertim, & postmodum successivè, continuatur ad perfectam usque abscessus expurgationem,

Interdum remittit puris excretio, post aliquot dies tamen recurrens, idque crebrius, mutatis sic vicibus, quando nempe tanquam in vomica purulentia successivè colligitur, donec in quanto sufficienti collecta, excernatur. In hujusmodi suppurationibus & abscessibus mesenterii adhuc notabile est, quod refert MARCELLUS DONATUS in Histor. Med. Mir. lib. 4. Hist. c. 7. supervenire sæpè itis copiosum urinae profluvium, sed sine alleviatione doloris ægri. Ob sedimentum autem, quod in matulæ fundo reperitur, laudabile, nullam salutis spem concipere debet Medicus, cum istud colliquamentum potius quoddam corporis contabescens existat, non autem genuinum urinae sedimentum. Quod si ergo remediis hætenus dictis Inflammatio resolvinequeat, sed degeneret in Abscessum, tunc Abscessus ita factus est expurgandus, mundificandus, & consolidandus. Et quidem dum apertus est, quod docet rigor & horror cum phlogosi, alvus clysmate acriore injecto stimulanda est, & diureticis pus promovendum, ut maturè id evacuetur. In mundificatione verò & consolidatione Abscessus eadem omnia conveniunt, quæ aliàs in phthisi, ab exulcerationibus partium internarum orta, sunt proficua, & superius Sect. 17. Cap. 1. Artic. 2. laudata; speciatim terebinthina & omnia terebinthinata, hinc vulneraria vegetabilium reliqua, primum obtinent, unde balsamum sulphuris terebinth. aut succinatum, ni intensior febris obstiterit; item bals. Peruvianum in jusculo calido vel ovo sorbili ad gut. vii. x. xij. &c. assumtum, pilulæ de tereb. item tereb. Cypria cum vitello ovi assumta, reliquis præferuntur merito remediis à MARTINI laudatis; quibus subinde & blandiora martialia, præsertim in forma liquida, tinctura, extracta & essentia martiales quæcunque, v. g. Essentia Martis liquida, Extract. martis cum succo pomorum, item tinctura sulphuris, vitrioli, & tinctura antiphthisica addenda; quia abscessum & mundificant & consolidant. Hinc acidulis cum fructu usus fuit THONERUS in suis Observ. p. 173. Potiones vulneraria aliàs notæ sunt, speciatim tamen in hoc casu proficua sunt agrimonia, hypericum, persicaria, seu appropriatum Abscessuum mesenterii remedium. Decoctum ligni sancti & sassafras in principio ruptionis abscessus insigniter conveniunt; quibus addenda & radix glycyrrh. scorzonæ, ficus, jujubæ, & similia, quæ mundificant Abscessum & purulentias acres simul temperant & abstergunt: item Decoctum rad. Chinae cum pasulis, & minoribus & majoribus, glycyrrhiza, rad. scorzonæ, caryophyllata, cinnamomo & similibus in sero lactis parandum; vel aqua etiam, ut uti priori modo melius sit. Formulas videb. in MARTINIO. Serum lactis etiam est egregium absterisivum & consolidativum ulcerum internorum, ratione suæ nitrositatis; id quod vel solum propinetur; vel Decoctum cum rad. cicorii, liquiritiæ &c. usurpetur. Rhabarbarum, tam pro scopo absterfivo, quam scopo adstrictorio & quasi vulnerario, non negligendum venit. Sed plura de his videb. in specie in modò laudato MARTINIO.

Cæterum tumores mesenterii duri, scirrhusi, scrophulosi vel ipsi suppurantur, & simili modo curantur, vel præmissis internis martialibus, ad salia volatilia & penetrantia accedendum. Externe verò usurpanda empl. ex gummat., vel sola, vel cum addito Mercurio vivo; uti & prodest emplastrum de ranis cum mercurio, à quo nullum periculum metuendum est.

## ARTICULUS VII.

## DE

## INFLAMMATIONE PANCREATIS.

Quæ hæc genus de Mesenterio dicta fuerunt, etiam de PANCREATE ferè monenda sunt; cujus morbi & affectus ut perquam occulti sunt, ita plurimum difficultum & intricatum morborum subinde origo sunt. Ex pluribus pauca annotare sufficiat.

Tumorem scirrhusum Pancreatis, cum affectione hypochondriaca, vel potius scorbuto, eleganter curatum videb. in RIVERIO Cent. 3. obs. 85. RIOLANUS Anthropogr. lib. 2. cap. 16. in Thuanio melancholico pancreas amplitudine suà & pondere ipsum hepatis æquans totum scirrhusum, multis globulis specie ovi columbini refertum refert: & CATTIERIUS observat. 10. pancreas insolite atque stupendæ magnitudinis allegat, ex quo renis è suo



Ad suo loco naturali dimotio facta sit cum hypochondrii dextri dolore gravissimo, & dyspnœa gravi: TULPIUS *item* L. 2. *observ.* 32. cum steatomate mesenterii pendente B. 18. quod aquam intercutem emittiebatur, pancreas pingve & ponderosum refert. Abscessum in pancreate latentem perpetuas vigilias, lipothymias, aliaque gravissima symptomata inducentem, refert SCHENCKIUS L. 3. *Observat. de Mesent. Pancreas suppuratum* lethale BARTHOLINUS *Centur.* 2. *Hist.* 39. Pancreas lapidosum, vomitum lethalem continuum causans, PANAROLLUS *Pent. Observat.* 44. Idem corruptum & sphacelatum & vomitum continuum lethalem BARBETTE in *Traxi*. Puellam per 8. annos miserè vexatam, hecticâ febre mortuam, in qua pancreas scirrhosum & induratum, vid. apud PETRUM PAWIUM *Observ.* 14. Mortem repentinam ex pancreate sphacelato vid. in *M. A. N. C. Ann.* 1. *Obs.* 99. p. 230. & *Ann.* 3. *Obs.* 45. Ex pancreatis excrecentia marasmodum in *M. A. N. C. Ann.* 3. *Obs.* 31. p. 57. Interdum pancreatis morbi superveniente salutari fluxu cruento curantur, Autore BARTHOLINO *Cent.* 6. *Hist.* 41.

## ARTICULUS VIII.

## DE

## OMENTI TUMORIBUS.

**N**ec omittendum hic penitus Omentum, quod nihil aliud est, quàm expansio quædam membranacea, ex duplici constans membrana, in figuram orbicularem ad iostas marsupii aucuparii explicata, pluribusque vasis sanguiferis & copiosiori pinguedine intertexta, intestinis non saltem superinfrata, sed anfractibus quoque ac circumvolutionibus eorundem immersa, cujus respectu non absurdè Epiploon seu innatans vocari solet. Altera enim & exterior ejus ala à fundo ventriculi & hujus communi tunica oritur, simul atque in hepatis atque lienis cavo compingitur; Anterior autem & postica mox diaphragmate à principio mesenterii & colo sub ventriculo collocato, hinc ultrò umbilicum descendit, rariùs ad inguina usque expanditur, ita ut herniæ scrotales ex hujus dislocatione non adeò infrequenter contingere possint, ac communiter creditur & dicitur.

Vasa Omento intertexta sunt:

1. Arteria epiploica, & gastro-epiploica, dextra & sinistra, ab hepatico & splenico cœliacæ ramo emergentes.
2. Venæ ex duplici ejus ala, amplâ radice protuberantes, quæ in quatuor pariter caudices, iisdem cum arteriis nominibus insignitæ, confluent, ac demum in mesentericum & splenicum venæ portæ truncum se exonerant.
3. Accedunt nervi exilissimi à plexibus abdominis diversis, potissimum primo & quinto emergentes & propullulantes.

Vas his communibus MALPIGHIUS de Omento peculiare adiposum ductus addit, qui videri potest. A BARTHOLINO, HILDANO, aliisque glandulæ quoque plures omento adscribuntur; sed harum potissimæ sunt morbosæ aut protuberantiæ adiposæ, præter binas saltem; quarum altera majuscula non procul ab illius cum pyloro commissura deprehenditur: altera minor lienî adhærescit, ut ut hæc duplex, imò triplex nonnunquam, conspiciatur.

Usum omenti tandem quod spectat; hunc FALLOPIUS in *Obs. Anatomicis* rectè obscurissimum pronunciat, & nondum certus est, cùm ea, quæ circa eundem GALENUS, VESALIUS, & CORDÆUS scripserunt, commentis similibus videantur; imò nec, quæ de hoc MALPIGHIUS profert, sufficientia sunt, ut ipse fateatur.

In hoc, tanquam in bursa, humores, vel ilatus collecti, item glandulæ ejus subinde scirrhosæ aut steatomosæ factæ, varia Pathemata inferunt: Conf. BARBETTE in *Anat. Pract.* sicut & admirandos omenti tumores videbitis in MARGELLO DONATO *Hist. Med.* L. 7. ab HORSTIO adiectos; item in HORSTIO *de cad. 6. Pract. Quæst.* 10. HILDANO *Cent.* 3. *Obs.* 62. Quibus SCHENCKIUS in *Observ. de Omento* addatur.

## ARTICULUS IX.

## DE

## INFLAMMATIONIBUS PARTIUM THORACIS INTERNARUM,

In specie de

## INFLAMMATIONE PLEURÆ, PLEUROPNEUMONIA, PERIPNEUMONIA, PLEURITIDE VERA, ET NOTHA.

**O**mnium frequentissimæ Inflammationes sunt præ reliquis, quæ afficiunt partes internas ad thoracem pertinentes, & serè semper fiunt ab aliquali sanguinis in præcordiis grumescencia, & acescentia, suntque frequentius erysipelacea, nunc magis humorosæ seu sanguinæ; quâ ratione v. g. pleuram inflammatam decuplo crassior, quàm naturaliter est, observavit RIOLANUS in *Anthropogr. lib.* 3. cap. 5. p. 318.

Frequentia autem harum inflammationum dependet ex eo primariò, quod thoracis interiora, nempe sanguis in pulmonibus, aeris alterationibus vel maximè sint exposita, cujus occasione & vitio alteratus sanguis promptissime loca thoracis lateralia & alias ejus partes afficit, quia partium harum arteriæ proximæ sunt cordi, undè vel simpliciter vel respectivè sæpius inflammationes excitantur; & hi thoracis inflammatorii affectus VINCENTIO BARONIO *Tract. de Pleuropneum.* in genere PLEUROPNEUMONIA appellantur; quæ postmodum, prout modò hæc modò alia pars inflammatur, in specie varias sortitur appellationes. Inflammatio enim utriusque pulmonum partis dicitur PERIPNEUMONIA; si altera verò pulmonum medietas inflammatur, vocatur PLEURITIS; quia in hac semper serè simul illius partis membrana, pleura, est inflammata; sicuti & contrà cum pleura semper quoque pulmo illius partis observatus fuit inflammatus.

Communis quidem inter Pleuritidem & Peripneumoniam hæc asseritur differentia, quod in illa Pleura, in hac Pulmones tantùm afficiantur; utraq; tamen interdum combinantur, & invicem transmutantur. Sunt interim nonnulli, v. g. ZECCHIVS *Consult. Med. Conf.* 26. in *Append. PLATERVS lib.* 2. *Prax.* p. 409. & L. 3. p. 365. cujus rationes amplius deducit HOCHSTETTERVS *de cad.* 7. *Cas.* 4. p. 92. & LÆLIVS à Fonte *Conf.* 91. ubi refert; observatum semper fuisse in Pleuritide correptis, quod non solum pleura, sed pulmonis medietas simul in isto latere inflammata fuerit; muniti præprimis autoritate HIPPOCRATIS *de loc. in hom. Text.* 24. quibus quidem SENNERTVS & RIVERIVS respondent: vid. *suis locis*. Nihilominus raro forsan inflammatione pleuræ sine pulmonum inflammatione existit; id quod pariter confirmant modernorum Anatomicorum Observationes in Pleuritide demortuis: Conf. SENNERTVS *lib.* 2. *Prax.* P. 2. c. 16. *de Pleur. Quæst.* 2.

Locopleuræ interdum quoque cum pulmonibus inflammatur MEDIASTINUM, duplicatura nempe Pleuræ sub parte sterni anteriore, quæ inflammatio tamen peculiari nomine caret; quin & DIAPHRAGMA interdum inflammatur cum pulmonibus, cui ordinariò supervenire solet delirium leve, quod speciali nomine Paraphrosinon & PARAPHRENITIDEN appellare solent Veteres, à Phrenæ quod diaphragma significat.

Non autem solum lateraliter afficitur Pleura, sed etiam interdum simul cum pleura & pulmone membrana buccri, item membrana jæguli, & similes vicinæ membranæ, afficiuntur, observante TVLPPIO L. 2. *Obs.* 1. cum pleura ita inflammata impossibile videatur, quin & inflammatio musculis contiguis intercostalibus internis communicetur. Siquidem interdum accidit, ut in vera pleuritide phlegmone versus exteriores musculos ob magnitudinem affectos simul tendat, & dolor etiam primo tactu percipiatur; quin curiosum est, quod observavit BARBETTE, interdum nempe diaphragma juxta processum inferiorem ignaris representasse speciem nephritidis seu renum inflammatorum. Præ cæteris, quoad historiam Pleuropneumoniarum in genere & in specie, conf. VINCENTIUS BARONIVS *Tract. de Pleuropneumon. lib.* 1. cap. 1.



3. cujus vestigia terit SCHNEIDERVS in *Dissert. de Pleuropneumonia*.

## CAUSÆ.

**CAUSA PROXIMA** *Pleuropneumonia*, sub quo nomine omnes inflammationes thoracis comprehendendo, est sanguinis coagulatio atque stagnatio, ab acido in eo peccante orta, cujus ratione hic ad facilem & successivam sui coagulationem & congruescentiam disponitur, & hinc vel in pulmone, vel in pulmone & pleura simul, aliisve vicinis locis hærendo, acidò simul membranaceas partes vellicando, & ad crebriores contracturas stimulando, hos affectus insert: Conf. HELMONTIVS *Tractat. Pleura Furens*, HOLTERHOFF. *de Error. Medicor. Part. 2. Sect. 2.* Hinc sanguis, qui vena secta emittitur, subinde nunc semigrumofus prodire observatur, teste GABELCHOVERO C. 4. *Curat. 70. & 79.* nunc promptissime coagulabilis exillit, ita, ut ferè exundo congruescat, teste Helmontio cit. loco, ipsi verò extravasato pellicula tenax subalbida viscida supernatare solet, teste W. LLISIO in *Pharm. Rat. Part. 2. p. 178. & 198.* Relicta acidi hujus peccantis vestigia in parte affecta, etiam curato abscessu, recidivas crebriores in eodem loco facere solent. Quod si sanguis haud perfecte coagulatus minus firmiter infixus inhæreat, minorem quoque dolorem inferat, facile resorberi, & hinc per *metastasin Pleuropneumoniae* ad diversas partes transferri potest.

**CAUSÆ REMOTÆ** harum inflammationum in thorace obvenientium, sunt variz: Frequentior imprimis solent esse *frigus externè* haultum, post immoderatos calores aut corporis motus & incalascencias; sanguinem enim coagulando, eum ad stagnationem disponere potest: Et quidem est una ex frequentissimis causis, siue aer inspiratus, siue potus ingurgitatus fuerit frigidus: Sic HORSTIUS lib. 3. *Observat. 10.* Pleuritidem observat ex haustu vini frigidò post æstum & corporis refrigerationem: RIVERIUS Obs. 14. & DIONISIO POMARET *Communic. ex nimio cursu & potu frigido* Pleuritidem notat: Conferat. HILDANUS C. 4. *Observ. 25.* qui habet Peripneumoniam ex indefessa saltatione, & hanc excipiente potu frigido: FORESTVS lib. 16. *Observ. 28.* observat juvenem, post exercitium, ex aquæ frigida potu in Pleuritidem incidentem: HORNUNG in *Cista Med. pag. 276.* observat Peripneumoniam in Clerico concitatam ex eo, quod benè potatus sæpe in templo cantasset: Vid. etiam M. A. N. C. *Ann. 2. Observ. 285. p. 284.*

Occasionem Pleuritidis quoque præbent *potus spirituosi nimia* ingurgitatio, motus *vehementior*, &c. Præterea *ordinarie suppressa sanguinis evacuatione* non raro dant Pleuritides, in specie tamen *mensis suppressi*; pari enim ratione ac menses suppressi dyspnoeam procurant, ita & idem Pleuritidem generare poterunt; quorum etiam occasione acidum vitiosum interdum colligi solet: Sic DEODATUS in *Pulcrud. p. 219.* observat ex mensem ante legitimum tempus emansione hæmoptysin cum pleuritide: Item pertinet huc casus TIMÆI à Guldenkle, lib. 2. *Cas. 7.* quod etiam sæpe usu venit, ubi habet exemplum mulieris pleuritice ex *subitanea mensium suppressione* propter casum in fluxum frigidum: Præterea *dysenteria suppressa* aut adstringentibus male curata non raro dat Pleuritides, observantibus Autoribus omnibus, in specie SENNERTO in *Praxi cap. de Pleurit.* item SCHNEIDERO *Tract. de Pleurop.* Unde etiam HELMONTIVS rectè asserit; quod benè observetur pro Praxi; Dysenterias & Pleuritides non differre in radice, sed tantum quoad locum affectum. Imprimis consideranda aeris constitutio *epidemica*, & *malignitas*: Hujus siquidem ratione non raro Pleuritides grassantur subinde *epidemico more*, quo tempore Pleuritides tales ac Peripneumoniz ut plurimum sunt malignæ, & contagiosæ plus minus; quod multorum Practicorum testantur observationes, v. g. FORESTI lib. 16. *Observ. 34.* WIERI in *Observ. ubi de Pleurit. maligna*, Baronii de *Pleuripneumonia* in *Prax. & c. 1.* item BARTHOLINI p. 69. lib. de *Incendio Bibliothecæ*. Facit huc LÆLIVS à FONTE Conf. 31. & 83. qui observavit Anginas, Pleuritides & Peripneumonias conjunctim, & simul vulgariter grassantes, in quibus secta cadavera, quæ catervatim mortua fuerunt, pulmones ingentibus abscessibus correptos, ex quibus apertis pus copiosum & foetida materia effluxit. Hinc patet, quod hi affectus differant non radice, sed loco affecto; unde

etiam eodem modo curantur, ac unus in alium sæpius mutatur; de quo vid. RHODIUS cap. 2. *Observat. 11.* ubi habet exemplum ægri, qui ex angina in peripneumoniam, & ex peripneumonia in pleuritidem incidit; ita ut, hirtres sint unus idemque morbus, unam eandemque habeant methodum medendi, & differant tantummodo loco affecto. *Febribus quoque continuis* non raro supervenit Pleuritis, qualis etiam observata fuit post morbillos in M. A. N. C. *Ann. 4. Observat. 7. pag. 10.* adeoque tanquam symptomata aliquod iidem subinde se associat, ut rectè SYDENHAM in *Observat. pag. 355.* Pleuritidem nunc *essentialem* seu *primarium affectum*, nunc *symptomaticum* febris, esse asserat. Similiter *scabies repropulsa*, uti *asthma*, sic & peripneumoniam & pleuritidem insert, observante hoc AMATO LUSITANO Cap. 2. *Cur. 62.* ubi scabies sicca repropulsa pleuritidem intulit. Insuper *periodica* subinde est peripneumonia & pleuritis, idque, uti rectè insinuat HELMONT, tunc temporis, ubi non adeò fuit ritè curata, & fermentum remanet: & quidem *periodum* habet interdum *annuum*, teste ZACUTO LUSITANO lib. 3. *Prax. Admir. Observat. 112.* vel aliis modis crebrius recidivat, de quo vid. BORELLVS C. 4. *Observat. 83.* de viro septem vicibus pleuritide detento, qui tandem hydropse perlit. Tandem *causæ externæ*, casus, lætus, indeque natæ contusiones, aliaque pathemata similia, quæ sanguinis ordinarium motum per vasa intercostalia plus minus remorantur, ad pleuritidem disponunt: Sic ex *risu & sternutatione simultaneis* pleuritidem natam videbitis in BARTHOLINI *Act. Med. Hassn. Volum. 2. pag. 239.*

Hæ ferè sunt causæ ordinariæ pleuritidis & peripneumoniz.

Denique *Pleuritis notha à vermibus intestinorum* oriunda à QVERCETANO in *Pharm. & BARTHOLETO Tractat. de Respir. lib. 3. cap. 3.* observata fuit. Et hæ pleuritides se manifestant, quod præter pleuritidis signa simul adsint signa intestinorum affectionum: videatur AMATVS LVSITANVS Cent. 1. *Curat. 52.* item ZACVTVS LVSITANVS lib. 8. *Prax. admir. Hist. Observat. 7. cap. 3.*

## DIFFERENTIÆ.

Observandæ sunt ob id DIFFERENTIÆ, quod nempe

- I. Alia est vel *benigna*, vel *maligna*: interdum epidemica, de qua supra; quando nempe acidum pleuriticum singulariter corruptum acrimoniam perquam hostilem & venenosam acquirit.
- II. Alia est *primaria*, alia est, *secundaria*, seu quæ alios insequitur morbos: v. g. quando scabies repropulsa pleuritidem insert; vid. AMATVS LVSITANVS C. 2. *Obs. 62.* vel Pleuritis febribus continuis aut affectibus thoracis aliis supervenit.
- III. Alia est *simplex*, alia cum peripneumonia aut cum alterutra reliquarum thoracis partium inflammatione, v. g. diaphragmatis, juncta.
- IV. Quædam est *periodica*, quæ sæpe recurrere solet, imprimis non ritè curata: vid. BORELLVS l. a. item ZACVTVS LVSITANVS l. a. sicut non inaudata est multoties recurrens in uno subiecto affectio: aliæ, & quidem ut plurimum, non sunt periodica.
- V. Porro (quæ omnium differentiarum solennis magis est) Pleuritis nunc est vel *vara*, de qua saltem hætenus locuti sumus; nunc est *notha*, quæ aliæ extraordinarias agnoscit causas: *Vera* est Inflammatio medietatis pulmonum & pleuræ illius lateris, juncta hinc cum febre acuta aliisque symptomatibus superius explicatis; *Notha* verò sine febre, aut cum febre lenta admodum.
- VI. Pleuritis tandem est vel *ascendens* vel *descendens*, ratione loci, doloris, & extensionis. Fundamentum hujus divisionis consistit in distributione vasorum descendendum, & ascendendum, per quæ sanguinis recurrit impeditus inflammationem insert. Hinc *Ascendens* consistit in duobus spatiis trium costarum superiorum, quæ nempe sunt intra secundam, & tertiam vertebra, à jugulo



à jugulo numerando: *Descendens* verò Pleuritis dicitur, quæ consistit in reliquarum s. costarum inferiorum 4. spatiis, i. e. intra tertiam & quartam, quartam & quintam, quintam & sextam, sextam & septimam. *Ascendens* dicitur, quia spatia illa intercostalia recipiunt vasa sua certa à truncis supra cor, ex vena nempe & arteria axillari: *Descendens* verò Pleuritis, quia spatia illa accipiunt vasa à truncis infra cor, nempe ex inferiori trunco arteriarum magnarum. Hæc differentia scitu necessaria, & probe observanda est, ob legitimam administrationem venæ sectionis.

Pleuritis notha est varia, imprimis quintuplex.

- (1.) *Ista*, quæ à SENNERTO ita dicitur l. 2. *Prax.* P. 2. cap. 16. ubi de *Pleuris.* p. 225. & 240. quo loco intelligit inflammationem musculorum thoracis externorum & internorum intercostallum, in qua febris est nulla aut non adeo acuta, sed saltem lenta, tussis pariter non nisi rara & catarrhalis, sine cruentorum expectatione, pulsus minus durus, dolor mitior, saltem pulsans, minus pungens, & qui externo contractu minus exasperatur; adeoque cum vera pleuritide parum vel nil habet commercii, nisi cum vera graviore hæc simul juncta sit.
- (2.) *Est ista*, quæ usitato magis *Pleuritidis notha* nomine venit, estque dolor insignis *punctorius* in uno alterove latere, *sine febre ac siti*, aut saltem cum febre catarrhali simili, hinc cum pulsu quoque, ferè laudabili, nisi in quantum doloris ratione immutatur & frequentior redditur; tussis adest aut nulla, aut si quæ est, non adeo frequens aut vehemens, saltem catarrhalis aut lymphæ vitio, unde & febris catarrhalis similis tunc ferè jungitur. Cuncta autem hæc symptomata, utut vulgò à flatu oriri asserunt, oriuntur ex acido vitioso, vehiculo lymphæ aut feri stagnantis intra pleuram delato sine hujus inflammatione, sine pulmonum alteratione, & potius dolor *Pleuriticus*, quàm *Pleuritis* appellanda venit. Atque talis affectus in *Scorbüticis* aut affectibus generis nervosi obnoxiiis, non raro observatur, cum appetitu non raro laudabili, pulsu naturali, dolor tamen non adeo fixus est, sed locum sæpius mutat: vid. *DRAWIZIVS de Scorb. Tit. 7. & WILLISIVS l. a.* Item symptoma hoc est, variolarum & morbillorum eruptionem interdum antecedens, aut scabiem intempestivè curatam excipiens: vid. *SENNERTVS Prax. lib. 2. P. 3. cap. 6.* Item Gallico morbo affectis aliquando accidere solet: vid. *SENNERTVS loc. supra alleg. pag. 236. Quæst. II. item WILLIS, Pharmac. Ration. l. a. p. 199.*
- (3.) *Ad hujusmodi Pleuritidem*, male sic dictam notham, seu potius *dolorem pleuriticum*, etiam pertinet ille dolor pectoris, qui à flatibus aut vaporibus, pleuram ac musculos intercostales divellentibus ac distendentibus, subinde oriri dicitur. De quo vid. *SENNERTVS l. a. Part. 3. c. 6.* Nulla enim in hoc observatur febris, nec tussis; nihil etiam cruenti, licet tussis superveniat, expuitur; dolor quoque vagus est minusque perpetuus, sed per intervalla recurrens, non tamen pulsans, nec pungitivus, nisi quando pars affecta manu comprimitur. Oritur ab humore seroso acri sine inflammatione singulari. Hæc cum Pleuritide notha primæ speciei, quia utraque saltem externa est, præter febris acutæ defectum à vera facile dignoscitur, & hoc commune habet; ut ægri in *Pleuritide notha* ut plurimum in latus oppositum potius quàm in morbosum seu partem affectam decumbere queant, secus ac in Pleuritide vera, utpote in qua contrarium observatur: vid. *AMATUS LUSITANUS Cent. 2. Cur. 67. Annot. & Cent. 7. Cur. 62. SENNERTVS l. a. p. 2. c. 16. p. 232. & WILLISIUS Pharm. Rat. p. 2. Sect. 1. cap. 9.* In Pleuritide vera enim, cum æger decumbit in latus oppositum, pars inflammata pondere suo divellitur, majoremque patitur distensionem; minus in Pleuritide notha. Spectat huc
- (4.) Similis dolor pleuriticus à vermibus intestinorum, qui ab horum putrescentium vapore fieri dicitur; de

quo videatur *QVERCETANUS in Pharm.* ob servatam à se notham Pleuritidis speciem, quæ in omnibus symptomatibus veram & legitimam æmuletur, ortam à malignis & acris vaporibus, ab inferioribus sursum in pectoris regionem delatis, ex quorum virulentia & acrimonia pleuræ inflammatio, nec non venarum erosio excitata fuit, unde sanguinis expulsiō, spirandi difficultas, febris, & alia symptomata; ubi purgatio cum aqua benedicta Rulandi instituta, sanguinis detractioni & eccoprotici exhibitioni longè lateque præferenda. Imprimis vermes & corruptionum incommoda tollere jubet, à quibus sæpe numero hæc *spuria pleuritis* oritur; id, quod præstarent antimonialia. Simile ferè exemplum recenset *BARTHOLETUS de difficili respiratione lib. 5. cap. 3. pag. 548.* dum inquit; se curasse Pleuritidem in quadam virgine, cui omnia pleuritidis veræ seu legitimæ signa adfuere in principio, quam tamen post primos dies malignam ex pravo vermium halitu se manifestasse, & prorsus absque sanguinis missione fuisse curatam: vid. etiam *lib. 5. cap. 11.* ubi similia habet. De lumbricis quoque vid. *AMATUS LUSITANUS Cent. 1. Cura 32. & ZACCVTVS LVSITANVS lib. 8. Prax. Hist. Obs. 7. cap. 3.* Item Pleuritidem à verme *RHODIVS C. 2. Observ. 12. SCHENCKIVS l. 2. Observat. 92. GESNERVS l. 3. Epist. pag. 49. BONETTUS Med. Sept. pag. 174. RIVERIVS c. 1. Observ. 75. & HOECHSTEDTERVS Decad. 7. p. 49.* notarunt. Atque hæc pleuritides nothæ se manifestant, quoniam præter signa pleuritidis communia adsunt simul quoque signa intestinorum affectuum, & quæ vermibus sunt propria, maxime si ventriculi angorem secum habet conjunctum.

*Pauciores differentias patitur Peripneumonia*, quatenus I. vel primario & sine alterius morbi interventu generatur, vel aliis morbis, v. g. anginæ aut pleuritidi, succedit: Quorum hoc iterum duplici modo fit; aut enim pleuritis in peripneumoniâ commutatur, dum priore morbo cessante, alter excitatur; aut morbo laterali pulmonia supervenit, i. e. illi manenti hæc combinatur. Hinc II. alia Peripneumonia est simplex, alia pleuritidi juncta. III. Alia benigna est, alia maligna, de qua vid. *BARONIUS l. a. cap. 7. 9. & 10.* Circa diaphragmatis aut mediastini inflammationem peculiare nil occurrit Practico attendendum.

## DIAGNOSIS.

**DIAGNOSIS** inflammationum partium thoracis, earumque signa & symptomata comitantia, quædam sunt vel communia omnibus inflammationibus, quædam vel propria magis & distinctiva, pro partium affectarum ratione varia.

Signa communia Pleuritidis, Pleuropneumoniæ, Peripneumoniæ, diaphragmatis & mediastini inflammationum, sunt sex: Nempe

1. *Adest in omni thoracis Inflammatione respiratio plus minus difficilis, anhelosa adeoque, simul trequens nempe & parva, nec sufficiens occellitati naturæ.*
2. *Deinde adest febris continua acuta, cum insigni ardore ut plurimum, & insigni febrilium symptomatum syndrome conjuncta, interdum tertiana typum observans.*
3. *Pulsus est admodum frequens, celer, magnitudine moderatus, qui saltem in progressu parvus fit, & in specie durus simul, ob arteriarum tensionem insignem quasi convulsivam, à membranarum inflammationis affectu pleuræ quasi spasmodicè consentientem. Talis pulsus (interdum, quod sæpius observavi, pulsus est intermittens, quoniam quarta nunc septima pulsatio deficit) est hic, quem vocant aliàs ferrinum seu ferratum, qui licet aliàs à LINDANO in Collegio super Hartmannum pro figmento habeatur, cum tamen sano sensu explicatum Pleuritidi ferè proprium plurimi testantur Medici.*
4. *Facies in omnibus his pectoris inflammationibus rubet insigniter, oculi turgent, genæ sunt quasi inflatæ & efflorescunt, nisi declinaverit morbus*



ad mortem; tunc enim facies confidet. Et quidem mirandum est, si altera saltem pulmonum medietas seu pleura, e. g. lobus dexter fuerit inflammatus, rubor faciei seu malarum respondeat saltem lateraliter parti pulmonum affectæ, ita ut si dextra pars pulmonum sit affecta & inflammata, etiam mala dextra rubeat, & contrà. Durat hic rubor genarum à principio ad finem usque & tunc cætera allegata symptomata magis in uno, quàm altero latere, observantur.

5. *Tussis semper enormis*, frequens admodum & molesta adest, in principio quidem sicca, hinc progressu temporis sensim rejicitur materia tenuis, aquosa, nonnihil spumosa, mox variè tincta; hinc sputum totum fit cruentum, tandem verò albescit, crassescit & spissescit, fitque mucilaginosum & tenax, & tunc vocatur *sputum coctum*.
6. In omnibus thoracis inflammationibus *caput dolet insignitè*, & ad sunt simul *agrypnia*, sitisque intensissima, & similia febrilia symptomata fatigant ægros, interdum cum supervenienti delirio.

Hæc sunt signa communia.

Quoad verò signa & symptomata propria magisque distinctiva horum affectionum à se invicem, ea oriuntur ex speciali partis affectæ habitudine, & sunt:

- (1.) Quod in *Peripneumonia* adstir major admodum respirandi difficultas cum summa pectoris angustia, anxietate atque inquietudine, ita quidem, ut suffocatio ægros magis urgeat, adeoque hi interdum nonnisi erecti cogantur spiritum ducere: Interdum nec bibere, nec loqui commodè possunt, ob *respirationis angustiam*, qualem respirandi difficultatem HIPPOCRATES vocat *sublimem*.
- (2.) Dolor in pectore gravativus, profundus admodum, spinam dorsu quasi attingens, & obscurus aut intertussendum saltem observabilis, quique tamen in thoracis etiam ambitu, si pleuritis scilicet fuerit junctus; quando verò membrana succingens pulmones simul inflammata non fuerit, dolor semper remissior est.
- (3.) In *Peripneumonia* primis diebus vomitiones magis familiares sunt, secus ac evenit pleuritidis, observante PISONE Tr. de Colluv. ferosa p. 230.
- (4.) Febris adest continua, ut plurimum acuta, cum symptomatibus intensioribus, utut febrem mollem, seu *Epialam* subinde se observasse referat LINDANUS.

Contra in *Pleuritide* semper conjunctus observatur dolor ambientis lateris seu pleuræ affectæ acutus, quando inspiramus, aut punctiorius auctus, & tunc imprimis molestus; cujus originem ab acido & fiendi modum per contracturam fibrarum pleuræ eleganter explicat HELMONTIUS Tr. Furens Pleura. Adeoque rarum est, quod refert LINDANUS, dolorem hujusmodi punctiorum non in omni esse pleuritide; utut & pleuritis sine punctiorum lateris dolore observata fuerit à ZACUTO LUSITANO in Hist. Med. Princip. qualem & ipse TULPIUS observavit.

Notabile est, quod præterea addit BARBETTE in Præxi, quod nempe Pleura in regione dorsu, ubi adnascitur diaphragma, inflammata, interdum ab incautis habeatur pro *Nephritide*, licet hoc fiat cum summo detrimento ægri.

In inflammatione DIAPHRAGMATIS simul extrema costarum spuriarum circa finem sterni imprimis dolent, & ista ventris pars, ubi diaphragma est extensum, dolorem percipit; dolor tamen exiguus est, inspirationem saltem aliquo modo turbans, & saltem molestia quædam juxta sternum inspirando percipitur. Tussis magis sicca in principio æquè ac progressu morbi existit, & si humida, nec cum tam copiosis excretis, atque in pleuropneumonia, adesse solet. Et denique cinguli instar supra lumbos, ventrem dolor ambit, & hypochondria tendi seu constringi videntur. Facile tales delirant ægri, quod delirium Paraphrenitidem appellant Exemplum elegans diaphragmatis inflammationis, vid. in PLATERO Observ. l. 1. pag. 158. Respiratio est inæqualis, modò parva, modò magna, modò frequens, modò rara: &c. solent etiam non nunquam accedere convulsiones, & palpitare interdum videtur diaphragma: vid. PLATERVS l. a. p. 170.

Denique in inflammatione MEDIASTINI paria ferè modò dicta observantur, ut plurimum in anteriore pectoris

regione incalescentia & dolor quidam non nihil gravativus in & sub sternum percipitur, citra tamen puncturam aut citra insignem aliam molestiam, nisi sub inspirando. Tussis verò quoad omnia instar pleuriticorum se habet, nempe in principio sicca, postmodum humida, in qua rubra & flava rejiciuntur, non tamen adeò copiosa observantur. Pulsus qualis pleuriticorum.

HEPAR inflammatum subinde paria ac Pleuritis habet symptomata; in eo tamen distinguuntur, quod dolor sit in latere dextro & circa dextrum hypochondrium gravativus, non punctiorius, ut dolorosa quædam plus minus tensiva molestia ad jugulum usque ascendere videatur: Pulsus est undosus, non durus; tussis sicca, non adeò frequens; nec tanta respirandi difficultas.

Quod si progrediatur malum, ita ut Pleuritides & omnes Inflammationes hæc degenerent in suppurationem, tunc hanc sententiam quidem monstrat rigor, qui certum est indicium, & qui necessariò omnes internarum partium, præsertim membranacearum, suppurationes comitatur; nec non exacerbatio doloris, febris, vigiliarum, ac simillimum symptomatum: factam verò iam suppurationem monstrant dolor imminutus, febris remissior, respiratio liberior, & virtus vitalis non adeò debilis. Verum licet confecto pure & febris & dolor mitescant, tamen instante disruptionis tempore vehementius cum horrore ægri denovo febricitant, ac difficilius ferè quàm antea respirant.

## PROGNOSIS.

PROGNOSIS affectus hos binos unà cum mediastini ac diaphragmatis inflammatione periculosos admodum pronunciat; ita tamen, ut ex his *Pleuropneumonia* variis quasi speciebus, cæteris paribus, levissima omnium sit *Pleuritis*, etiam si interdum pulsum intermittentem habere videatur, qui in ea minus periculosus est: vid. M. A. N. C. Ann. 2. Observat. 227. p. 339.

Vehementior autem & periculosior est *Peripneumonia*, utpote quod morbi genus juxta CELSUM plus periculi, quàm doloris habet.

Adhuc vehementior & periculosior, cæteris paribus, est *diaphragmatis Inflammatio*, quæ acutissimus morbus est, atque ægrum citò in fumorum discrimen deducit, sæpè jugulat, & sicuti etiam *mediastini Inflammatio* est periculosior pleuritide.

Quod si absque interitu ægri finiantur hæc *Pleuropneumonia* & his conjuncti affectus, curantur. Vel

- (1.) Insensibili discussione & resolutione ipsius inflammationis; id quod fit nunc criticè, nunc Medicè.
- (2.) Quando successivè per spui crebrioris rejectionem solvitur.
- (3.) Quando Inflammatio successivè suppuratur, ac in abscessum vel *empyema* abit, quam suppurationem sententiam ostendunt doloris, febris & vigiliarum exacerbatio.
- (4.) Si per raram ac singularem materiam morbificam metastasin terminantur: v. g. nunc per phrenitidem, nunc in singulares morbos articulares, nunc in abscessum in sura, nunc in ulcera tibiæ.

Si terminantur resolutione vel per sudores, vel diarrhasas, vel urinæ copiosum fluxum, vel hæmorrhagias, vel aliis modis, imprimis est observandus motus naturæ criticus, qui nullo modo impediendus, sed, si possit, potius promovendus. Nam in diebus criticis natura sibi relicta imprimis solennes tales instituit evacuationes: vid. AMATUS LUSITANUS Centur. 7. Curat. 28., qui refert Pleuritidem sævam sine venæ sectione die 14. per sudorem criticum curatam: Porro PISO Tract. de Colluvie ferosa p. 229. in Edition. in quarto observat Pleuritidem die 7. per sudorem curatam: VALERIOLA lib. 4. Observat. 4. habet Historiam curiosam Pleuritidis gravissimè gravis 8. mensium, quæ solus naturæ ope sine venæ sectione die 4. per sudorem fuit curata: & c. l. aliam refert gravidam Pleuritidem, quæ variis licet aliis adhibitis remediis, tandem die 7. 11. & 14. robore naturæ per copiosos sudores fuit curata; item lib. 7. Observ. 6. simile ferè refert exemplum.

Quod atinet hæmorrhagias, v. g. narium, hæmorrhoidum, aut mensium fluxum, hæmorrhagiam septimo die criticam in Pleuritide salutarem refert LOTICHIVS lib. 3. cap. 3. Observ. 3. item FORESTVS l. 16. Observ. 35. & Observ. 37. habet Pleuritidem per fluxum sanguinis ex naribus die 14. curatam: sicut Pleuritidem in



## C U R A.

Omnes huic cognati morbi simili modo tractantur, quorum Cura tribus gaudet indicationibus. Nempe

- I. Sanguis stagnans est resolvendus, & blandis sudoriferis, tam generalibus quam specificis, acidum corrigentibus, in naturalem suum circulum revocandus.
- II. Hoc si fieri nequit, exsecratio, & copiosa sputatio, quantum possibile, est promovenda, in principio quidem temperantium seu incastantium moderatum ope, in progressu vero per incidentia, miscenda hæc variè, prout sputi conditio & expectorationis ratio requisiverit.
- III. Sin & hæc sint frustra, suppuratio inflammationis expectanda, ac adjuvanda per Pectoralia temperata, anodynis mista, & pus confectum educendum.

Pro his scopis melius obtinendis observandum:

I. Sæpius in primo morbi insultu esse instituendam, **VENÆ SECTIONEM**, eamque aliquoties interdum esse repetendam, prout necessitas & conditio affectus requisiverit. Interim tamen notandum, eam semper simpliciter necessariam non esse, quia potius tunc temporis appropriata remedia, ac in specie diaphoretica dissolventia, quæ sanguinis grumos resolvunt & sudorem movent, citra Venæ sectionem non raro malum tollunt: vid. **HELMONTIUS** *Tract. Pleura Furens*, qui est egregius, **HOLTERHOFF** *de Errorib. Med. c. 1. §. 2.* Quinimò hoc certum est, quod si sine sudore per Venæ sectionem Pleuritis curetur, nihilominus ad suppurationem tendat, quæ tamen per sudorifera posset præcaveri. Ac sanè per se nullum locum obtinet Venæ sectio, saltem ubi copiosior adest sanguis, & nimis acutus seu præceps morbi ad statum motus; in tali casu per accidens interdum instituta, & repetita Venæ sectio aliquale levamen affert: sic **LINDANUS** necessitate coactus mulieri gravide intra 24. horas quinque venam secavit, urgente nempe affectu. Propterea de tempore non multum deliberandum venit, si veperi sive manè sive medio noctis fuerit; dum necessaria est (quod tamen in nostro climate rarius evenit) instituenda erit. Pluribus hanc de venæ sectionis in pleuritide usu controversiam ventilatam: vid. **HOECHSTETTERO** *Decad. 7. pag. 107.* & **M. A. N. C.** *Ann. 8. §. 10. Obs. 190.*

Ubi ergo secunda est vena, observanda erit differentia. Pleuritidis ascendens & descendens. Nam eadem pro usu revulsionis instituitur in pede, si est Pleuritis ascendens; aut in brachio, si est Pleuritis descendens. Aversio seu Revulsionis particularis sanguinis gratiâ secetur in pede vena, & quod melius, oppositi lateris, si est descendens; in brachio vero pro aversione, si est ascendens, &c. Quibus paucis prolixæ istæ controversiæ de loco Venæ sectionis, quas agitarunt veteres insigni fervore, decidi possunt: Conf. **WILLISIUS** *Pharm. Ration. Part. 2. p. 204.* Præstat autem ut venæ sectio fiat aliquot vicibus, nec longis intervallis, neque magnâ quantitate, ut loquitur rectè **HILDANUS**. In Peripneumonia Cura venæ sectione nec revulsoria, nec aversoria, nec derivatoria locum habet: Quod igitur à corde recipit, ei denique iterum remittit. Interim sæpius & særutissimè Pleuritis benigna absque venæ sectione curari potest, per diaphoretica, volatilia præsertim & specifica. Jam verò licet in Pleuritide benigna venæ sectio si non juvat, non noceat; in maligna tamen vix locum inveniat, sed semper erit nociva, in quam nunquam sine periculo vena aperitur; ergo ab illa abstinendum. Refert **BARTHOLETUS** sibi diuturnâ Praxi esse compertum, omnes fere, quibus in Pleuritide maligna vena tunditur, mori; è contra periculo defungi, qui sine phlebotomia sunt curati: Videatur etiam **GESNERUS** *l. 1. Epist. p. 19.* qui similiter asserit, venæ sectionem esse inutilem in maligna Epidemica: Videantur ejus observationes. Quod sanè in Pleuritide maligna verum arbitror, utur in Epidemica non adeo semper locum inveniat; **DODONÆUS** enim *Obs. cap. 21. p. 38.* refert, in Pleuritide epidemica administratam venæ sectionem salutarem; neglegiam verò lethalem.

II. Observetur: in Pleuritide aut in Peripneumonia **PURGATIONES** omnes esse frustraneas, subinde nocivas; disponent enim ad Diarrhæas exitiales, in specie, ubi sputum copiosius rejectum retrocedit, adeoque cavemus nobis à purgantibus, ne motum naturæ impediamus. Purgatio ergo in Pleuritide non convenit, quia sanguinem exagitat, & in partem affectam altius impingit, nisi ad declinationem Malum pervenerit. Et si interdum conveniat Purgatio, ut plurimum tamen ante diem septimum perniciofa est: Videatur **RIVERIUS** *Cent. 1. Obs. 98.* Imprimis verò procedente sputo abstinendum à purgatione, per experientiam confirmante hoc

*Ettmull. Oper. Tom. II.*

**ZACUTO LUSITANO** *l. 1. Prax. admir. Obs. 107. §. 116.* quicquid etiam in contrarium dicant quidam Practici, in specie **RULANDUS** in *Thesauro practico* p. 129. ubi defendit acriter, quàm maximè ex usu esse in principio Pleuritidis fortem purgationem, & exempla refert plerorumque per vomitum & secesum ex aqua benedicta à se curatorum. Quidam cum **RULANDO VOMITORIA** valde laudant: Verùm de vomitoriis vid. *Judicium datum supra art. 1. in Angina.* Sanè per se nil valent in Pleuritide, potius nocent, adeoque ab his est abstinendum, cum humores ad pectus magis commoveant, per accidens verò, ubi fomes & vitiosa excrementa, in specie acidum & eruginosum in primis visceribus & intestinis stagnaverit: In tali casu primo in principio (ad quod nihilominus Medicus raro vocatur) prodest vomitus; Deinde etiam in morbi declinatione, factâ suppuratione, vel ad abscessum rumpendū, vel hoc rupto ad ulteriorem puris evacuationem vomitus aliquando conducere potest. Benè hic differit **LINDANUS**, dum dicit: se in Cura Peripneumoniae non audere vomitorium dare. Nec video, quod possit, nisi statuatur ventriculus onustus æruginosa cruditate, à qua sanguis vitiatum impetum faciat in pulmonem; sed in tali casu non respicerem ad Peripneumonia, sed ejus radicem, nempe ventriculorum malum. Ita nec in progressu vomitoria conveniunt; nil enim pulmonibus nocentius est: Si enim tempestivè purgentur, diarrhœa accidit, cum alvus per se mollis sit; illa autem accedente, sputum non coquitur, nec pus maturatur, & pereunt ægri. Interim Clysteres, ubi alvi obstructio, magno cum fructu iniici possunt.

III. Observetur: ex omnibus remediorum generibus, quæ huic morbo mirificè opitulatur, nil melius esse, quàm **SUDORIFICA** & **DIAPHORETICA**, in specie anti-pleuritidis juncta. Ex omnibus enim auxiliis in Pleuritide primum est sudor, qui ex toto corpore, & imprimis circa thoracem, provocandus, & sic citò & jucundè omnes thoracis inflammationes curari possunt: Id quod omnes elegantiores Practici ferunt: vid. **BARONIUS** & **SCHNEIDERUS** citatis locis; item **PETRUS JOHANNES FABER** *Cur. 8. 10. §. 20.* qui plurimos Pleuriticos curavit per sudorem, cum antimonio diaphoretico propinato, præmisso clystere, interdum etiam venæ sectione, applicando externè balsamum sulphuris cum emplastro disulphuris *Rulandi*. Confirmat hoc pariter **HILDANUS** *c. 1. Cur. 52.* item **RENEALMUS** in *Obs. 32.* qui Pleuritidis aliquot secta vena flores antimoni diaphoreticos exhibuit, & statim prodeunte sudore omnes dolores pectoris abierunt. De antimoni diaphoretici usu vid. etiam **M. A. N. C.** *Ann. 3. Obs. 72.* Et sanè ipsa natura vel viam monstrat, toties per sudores spontaneos pectoris curas ejusmodi inflammationes. Imprimis in principio adhibeantur cum specificis aliis volatilia, in statu verò fixiora; vid. **LUDOVICI** *Phar. p. 237.* Singularis enim encheirisis est Pleuritidi mederi mox in principio sal. volat. & opiata, est quævis maximo nihil obstat.

IV. Malè quidem in principio morbi, id est, quando natura ad sputum nondum inclinât, præscribunt Practici plures **EXPECTORANTIA**, seu talia, quæ tussiendo materiam expectorationem & sputum promovere. Nam talia cum tussim stimulent vel adjuvent, non solum materiam crudam emittendam sollicitant, quod tamen frustra fit; sed & concussionem thoracis, pulmonum, ac pleuræ inferunt, quibus in principio dolor intenditur, & mala hæc exasperantur, ut rectè observavit **GABELCHOVERUS** *c. 2. Cur. 93.* Idèò sumus cauti, ne expectorantibus nimis maturè usurpatis exasperetur morbus, & intendatur Inflammatio; ac proin saltem in incremento ac statu expectorantia dissolventia usurpemus. Ex hæc inter remedia, quæ sputi coctionem aut suppurationem Inflammationis faciunt, malum, dicit **LINDANUS**, *Decora pectoralia, quàm Symplos & saccharasa.* Nobilissimum pectorale habemus in liquiritia & in passulis. Saccharum malè pectoralibus additur; nam constat, omnia dulcia, & mellita faciliè accedere in ventriculo, cui nil inimicius, quàm illud sylvestre acidum. Præscribantur autem radices & herbe pectorales, sed omittantur semper ista dulcia, nec credatis, gaudere pectus; dulcibus gaudet equidem insipidis, & quæ non habent qualitatem excedentem, non dulcibus extremè, ut saccharum. Liquiritia igitur convenit, quæ tamen in paucâ quantitate sumenda, cavendo ne uratur; tunc enim prava & acris fit.

V. Opiata non negligenda sunt in Cura harum Inflammationum, sed usurpentur saltem in principio & incremento, saltem ad suffocandam nimiam morbi vim & sistenda pathemata dolorosa, quæ ipsa quoque ad corrigendam materiz expudentem cruditatem, adeoque eandem coquendam seu in crassandam multum præstare solent: vid. **WEDELIUS**

Kk 2

Opiol.



*Opioi. p. 111. & 112. In statu verdē & declinatione vitanda sunt, ne impediatur expectoratio, atque materia cocta nihilis perturbatione sic inhaereat, id quod sine suffocationis periculo vix fieri potest; qualem Observationem ZACUTUS LUSITANUS l. 1. Pr. admir. Obs. 116. testatur. Solum Papaver rhæas ejusque flores seu optimum specificum in toto morbi decursu locum habet.*

VI. Bene observandum est, ut omnia, quaecunque egri bibunt, calidè assumant. Nil nocentius est in his affectibus, & quod magis exasperare eisdem solet, quam frigidas potus, qui coctionem impedit, excretionem remoratur, rursus provocat, inflammationem intendit; & laedendo pulmones respirationem difficiliorem facit, quæ omnia in calido potu contrario modo se habent. Est autem potus optimus *Decoctum hordei & liquiritiæ*, idque in toto morbi decursu; item *Decoctum papaveris rhæados cum syrupo scabiosa aut violarum aut capillorum Veneris*. In contagiosa seu maligna *Decoctum rasuræ cornu cervi crudi*, vel cum vel sine floribus papaveris, aut etiam cum *sarsaparilla*, optimum est potulentum. Potui ordinario addatur gelatina dentis apri, & tinctura florum papaveris erratici, cum sero lactis parata, Julepis: hinc pro potu ordinario, imprimis si febris ardens conjuncta, inferviunt Julepi, quos dedi in Coll. Formular. pag. .... Vel

24. Flor. papav. errat. Mj.

Violar. M. 8.

Infund. c. f. q. spiritus niri dulcis.

Infunde in f. q. Decoct. priap. vel cornu cervi;

Seent in loco calido horis aliquot.

Colat. Bib. adde

Syr. flor. papav. errat.

Violar.

Scabios. an. 3j.

M. S.

Julepus refrigerans & dissolvens.

Præmissa igitur vel omittenda uenæ sectione progrediendum statim est ad SPECIFICA PLEURITICA, sanguinem stagnantem dissolventia, sudorem ptolientia, inflammationesque erysipelaceas sistentia; circa quæ notandum: quod eadem sint, quæ in dysenteria & angina aliis locum habent, uti rectè loquitur & experientia comprobavit HELMONTIUS: Deinde, quod omnia ea specifica, quæ conveniunt in Pleuritide, etiam convenientissimè in aliis quibusvis internarum partium inflammationibus à causa interna enatis, ut faucium, stomachi, intestinorum &c. profint, cum omnes ejusdem sint naturæ scilicet erysipelaceæ. APPROPRIATA talia remedia in Pleuritide ex regno vegetabili sunt papaver erraticum, flores acaciæ nostratis, bellidis rubri, roserum rubrarum, chamomillæ, carduus benedictus, carduus Mariz, papaver album, taraxacum, scabiosa, pimpinella, ulmaria, hederæ terrestris, cherefoliudi, radix bardanæ, eryngii, semen cardui benedicti, Cardui Mariz, papaveris albi, aquæ destillatæ illorum simplicium, in specie aqua florum acaciæ, aqua florum papav. rhæados, & aqua florum chamomillæ, hyssopi, & similes; singulatiim præ cæteris omnibus hæc tria, papaver rhæas, carduus benedictus, & Mariz, quocunque modo usurpata, nunc simplici, nunc repetita vice, expectando sudorem, sunt optima, exque his parata; ut aqua, syrupi, tinctura, pulvis florum, succus & conserva horum, sunt convenientissima. Usus hujus decantatum habet VALERIOLA lib. 5. Obs. serv. 5. & 10. Item ex sem. cardui ben. & Mariz sunt emulsionem cum aliis, quæ in euta pleuritidis sunt elegantissima; v. g. præscribantur emulsionem, quas dedi in Coll. Formular. pag. .... vel

24. Sem. card. ben.

Mar. an. 3ij.

Papav. albi (ratione doloris) 3j.

Cum f. q. aqua cherefol. card. bened. & flor. papav.

errat. f. Emulsio:

adde

Dent. apri prepar. vel maxill. lucii pisc. 3j.

aut an. 3j. ad 36.

Antimonij diaph. 3j.

M. edulcoretur parum.

D. S.

Emulsio confortans contra pleuritidem.

Subinde hauriatur expectando sudorem: mihi expertissima est in desperatis casibus. Vel

24. Sem. card. ben.

Mariz an. 3ij.

Cum f. q. aqua cherefol. vel card. bened.

F. Emulsio: adde

Lap. cancr. prap. vel maxill. luc. pisc. 3j.

Antimonij diaph. 36.

Edule. cum syrup. papav. simpl. D. S.

Emulsio leniens contra pleuritidem.

Item.

24. Aqua Ulmar. vel cherefol. 3ij.

Bezoard. mineral. gr. xij. vel xvj.

Syr. flor. papav. errat. 36. ad 3j.

M. D. S.

Potio contra pleuritidem.

Subtilissimè adhuc in Materia medica, Pleuritidi curandæ dicata, & præter papaver rhæas, cardium benedictum & Mariz, etiam prodest cherefolium, ejusque aqua destillata, utpotè aliàs satis decantatum ad sanguinis grumos quoscunque resolvendos. A multis laudatur radix bardanæ, succus scabiosæ, & præ cæteris succus taraxaci seu dentis Leonis, item succus pimpinellæ seu sanguisorbæ. Quoad succum taraxaci, cum hoc egregiè & expertam præscribit mixturam BARBETTE in sua Praxis l. 3. c. 1. Compositio hæc est:

24. Succ. tarax. depur. 3j.

Aqua plantag.

Rosac. an. 3ij.

Prophylact. 36.

Ocul. cancr. crud. cont. 36.

Syr. papav. errat. 36.

Misc. in phiala.

Loco aquæ prophylactice sumi potest acetum destillatum, hæc mixtura solâ mulierem periculosâ pleuritide laborantem liberavit, cochlearia aliquot hauriendo singulis horis quadrantibus.

Ad hujus imitationem concinnior erit sequens formula:

24. Aqua Card. ben.

Cherefol an. 36.

Theriacal. 3vj.

Succ. tarax. depur. 3j. ad 36.

Lap. cancr. prap. 36.

Syr. papav. errat. 36. M. D. S.

Potio dissolvens contra pleuritidem.

Mixturam sumat æger quovis quadrante horæ, 2, cochlearia, operationem ejus mirabimini.

Post succum taraxaci est imprimis decoctum eryngii.

Quod ad radicem verò bardanæ, CASTRO Veronensis cum summa copia grumosi sanguinis, per ipsum intra bidduum rejeçti, absque uenæ sectione curavit Pleuritidem; primo externè applicando & singulo bitorio renovando lintea duplicata cum spermate ranarum non destillato, sed per se servato, applicando, & ita per bidduum continuando; hoc enim est singularissimum remedium ad quascunque inflammationes compescendas, si applicetur. Secundo internè radice bardanæ seu lappa majoris vere collectæ crescente Luna, autumno verò decrecente luna.

Servantur radices, ac in umbroso loco siccantur & pulverisatæ dantur dosi cochlearis j. in vitro generosi vini; vel Decoctum bardanæ ritè paratum seu appropriatum sudoriferum Pleuropneumonici convenit.

Pertinet huc ratiōe salis volatilis lignorum, fuligo furnorum, quæ est nobile specificum pleuriticum D. HORSTII Junioris, dum fuliginem benè tritam lavat scilicet cum aqua florum sambuci, exsiccat, & ita pulverisat: hujus pulveris ita præparati dosi 36. ad 3j. in aceto sambuci vel infuso papaveris rhæados, vel aqua specifica quadam, propinat expectando sudorem: Sic Pleuritidem lævam pulvere fuliginis camini ad 36. in aqua cardui ben. die septimo curatam habet RIVIERIUS Centur. 1. Obs. 79. Laudantur quoque flores buxi; de quibus vide RIVIERIUS Pr. l. 7. cap. 2. spiritus tartari, fuliginis, &c.

Uterius quoque priapi ceti, cervi, & tauri seu singularia remedia à quibudam ad Pleuritidem commendantur, quorum rasorum vel pulverisatorum, præ reliquis tamen ceti, ad 3j. in aqua specifica assumitur; aut ex his paratum Decoctum, seu corpus juleporum, cum aliis permiscetur & optime propinatur. Hinc & BARTHOLETUS in Peripneumonia & Pleuritide maligna rasuram priapi tauri commendat; cui tamen revera ceti & cervinus præferendus, aut alia Alexipharmaca ordinari possunt.

Conveniunt ulterius partes animalium duræ, sale volatili turgidæ, acidum sanguinis imbibentes, præsertim in principio, & multò magis exinde parata salia volatilia & spiritus urinosi, mediantes sudore subtilissima remedia, qualia sunt lapilli



lapilli cancrorum, dens apri, castoris, maxillæ lucii piscis, aut quælibet ossa lucii piscis, lap. carphonum, *percarum*, tali leporis, corallia rubra, hincq; alia genera marina, ut & cornu cerui & ebur. Ex quibus speciatim *dens apri* & *ossa lucii piscis*, lap. carp. & *percarum*, uti cætera marina, primas tenent, ut potè quæ per se à ʒj. ad ʒʒ. vel ʒij. præter propter in convenienti vehiculo insigniter commendantur ad Pleuritidem. Commodè etiam propinantur in emulsionibus: & in specie sal volatile maxillarum lucii piscis primatum ducit, tam in malignas, quàm benigna Pleuritide. Loco hujus salis volatilis tamen etiam salia volatilissima alia substitui possunt, uti & pulveres antioleulitici compositi *Augustanorum*, *Mysicibii*, *Ludovici*, *Wedelii*, *Trag.* antioleulitica *Hartmanni in Praxi Chym.* Porò in sanguine Hirco legitime præparato expertissimum remedium est contra pleuropneumoniam, ad ʒj. propinatum in aqua appropriata. Methodum parandi hunc legitimam beneficio abscissionis testium ex hirco, videb. descriptam apud *HELMONT. Tr. Sextuplex. Dig. ʒ. 75.* & hinc à *ZV. ELFFERO*: quo si ab ejus usu non statim sequatur sensibile levamen, repetatur aliquoties, idque faciendum mox in principio, antequam facta sit suppuratio; facta enim suppuratione frustra adhibetur remedium. De hoc sanguine, ut & dente apri, vid. *Tachenius Morb. Princ. p. 126.* Pariles virtutes habet sanguis leporis rite collectus, si nempe lepus, à canibus in venatione captus, vivus stranguletur laqueo, ut sanguis in unum confluat & grumescat, aperitur postmodum, & sanguis in fumo siccat. Dosis est à ʒʒ. ad ʒj. Vid. quædixi de *Dysenteria Sect. 9. cap. 3. artic. 1.* Huc quoque pertinet *Bezoar German.* seu *Agagropilæ*. His adnumeranda *stercora animalium* sudorifera & antioleulitica vi pollentia, quæ hic non sunt negligenda, quoniam mirè conveniunt in Cura Pleuropneumoniæ. Præ cæteris expertum est præsertim apud Anglos, *stercus equinum* masculinum, si scilicet pila una stercoris hujus recens excreti haustu potus ordinari infusa, aut cum vino, vel aqua papaveris erratici macerata & subasta, probè exprimatur, & succus iste expressus propinetur mox in principio, & quò citius, eò melius, expectando sudorem, & quoties opus fuerit repetendo: *Conferatur WILLISIUS Pharm. Ration. Part. 2. p. 181. & 209. du HAMEL de Affect. Corp. pag. 310. & HELMONT. de Febris.* Huic non cedit *Album Græcum*, & pulvis stercoris columbini, à ʒʒ. ad ʒj. in liquore conveniente propinatus, quem pulverem secretum Magnatum ad curandam Pleuritidin *PANAROLLUS Pent. 4. Observ. 14.* affirmat: Aut maceretur hoc stercus cum aqua papaveris erratici, & hinc facta expressione propinetur. Ab aliis admodum extollitur *stercus ovillum*, nempe recipiunt stercoris ovilli pilas, subigunt in mortario cum aqua papaveris erratici, vel cardui benedicti seu scabiosæ, & exhibent statim in initio, quod facit *LINDANUS*, & vocat nobile medicamentum: Nam, „ dicit, præstat id ob sal nitrosum volatile quasi ammoniacale; Habent enim stercora copiosum sal ammoniacum. Porò multum convenit quoque *sperma ceti* à ʒʒ. ad ʒj. in vehiculo calido assumptum; Nam hoc ad sanguinis grumos dissolvendos conducere in professo est; hinc etiam usu *spermatis ceti* cum castoreo visci curavit Pleuritidem ex suppressione mensium natam *TIMÆVS von Guldenkle in Cas.* imprimis si ex terrore subito menses fluentes supprimantur, & ita Pleuritidis oriatur.

Denique quoad regnum minerale: excellit imprimis *spiritus nitri dulcis*, seu potius *spiritus antioleuliticus*, imprimis ubi urget æstus febrilis; magis tamen sic convenit, dum nempe spiritus vini digeritur & cohobatur aliquoties à specificis antioleuliticis, postmodum hic spiritus subtiliori vegetabilium substantiâ imprægnatus, loco spiritus vini simplicis miscetur cum parte dimidia spiritus nitri invicem, digeritur, & cohobando destillatur; egregium dat spiritum antioleuliticum, cujus dosi ʒj. ad ʒij. in aqua cardui benedicti, vel alia appropriata; expertum est remedium in Pleuropneumoniis, sudorem movet, inflammationes solvit, & simul expectationem promovet, febresque sistit, qui aliis in omnibus inflammationibus internis satis commendatus. Loco hujus paratur à quidam non inconcone *tinctura bezoardica*, recipiendo loco spiritus vitrioli spiritum nitri, & ita ulterius lege artis procedendo: nobile est remedium ad ʒj. in aqua appropriata, has inflammationes sudore mediante levans.

His adnumeratur *Mixtura simplex*, sulphur, ejusque flores, qui optimè pariter conducunt, & non ultimum remedium dant in Pleuritide à ʒj. ad ʒj. vel solum vel cum aliis: conf. *WEDELIVS loco alleg.* Hinc quoque pulvis pyrius *Estimul. Oper. Tom. II.*

egregium remedium est contra pleuritidem, ad ʒj. repetitis vicibus propinatus, tam nitri, quàm sulphuris ratione. Pertinent huc quælibet sulphurea antimonialia fixa sudorifera; & hinc etiam *cinnabaris antimonij*, *antimonium diaphoreticum*, *bezoardicum minerale*, *Martiale*, *bezoardicum solare*, *antimonium solari irradiatione calcinatum*; sub qua calcinatione & pondus augetur antimonij, & singularissimam vim alexipharmacam acquirit: Sub qua operatione multum est reconditum. Pertinent huc *pilule antioleulitice BARTHOLETI*, quibus nullum præstantius remedium inveniri asserit *l. 5. de Dyspn. c. 3. p. 451.* Compositio est hæc:

ʒj. Extr. flor. papav. rubrad.

Malt. arb. rubr.

Visci querc. an. ʒij.

Raf. dentis apri,

Corn. rhinoc. an. ʒij.

Maxill. lucii pisc. ʒij.

Cort. intern. avell. ʒj.

Anod. mineralis, vel nitri antimonias. ʒʒ.

Mag. corall. ʒij.

Cum tinctura seu succo densato scabiosæ f. Pasta.

Dosis ʒj. cum aqua flor. papav. errat., vel etiam cum Olei amygd. dulc. ʒij.

Quod ad FORMVLAS huic scopo applicandas, præter Emulsiones & Mixture supra dictas:

ʒj. Aqua cherefol.

Card. ben. an. ʒij.

Maxill. lucii pisc. vel lap. cancr. præp. vel

Antimonij diaph. ʒʒ.

Sal. vol. maxill. luc. pisc. gr. xvj.

Laud. opiat. gr. ij.

Syr. scabios. ʒij.

M. D. S.

Mixtura discutiens cochlearum sumpta.

ʒj. Aqua cherefol. vel papav. errat.

Flor. sambuc. an. ʒij.

Maxill. luc. pisc. ʒj.

Sal vol. earund. vel cornu cervi gr. xij. ad xv.

Laud. opiat. gr. ij.

Syr. flor. papav. errat. vel alius appropri. ʒij. ad ʒj.

M. pro tribus dosibus, aut capiatur cochlearum semper bene agitando: D. S.

Mixtura dissolvens.

ʒj. Aqua papav. errat.

Scabios. an. ʒj.

Antimonij diaph. ʒj.

Sal vol. maxill. luc. piscis gr. xij.

Laud. opiat. gr. ij.

Syr. papav. errat. ʒʒ. M. D. S.

Mixtura discutiens pro una vice.

ʒj. Aqua flor. acac.

Card. Mar.

Cherefol. an. ʒʒ.

Pulv. antioleul. Aug. ʒj.

Antimonij diaphor. ʒʒ.

Laud. opiat. ferment. gr. j. ad ij.

Syr. papav. errat. ʒij.

M. D. S.

Ut antea.

ʒj. Aqua Card. Mar.

Cherefol.

Papav. errat. an. ʒj.

Spiritus theriacal. campb. ʒij.

Lapill. cancr. præpar. vel dent. apri sine igne, vel antimonij diaph.

Maxill. luc. pisc. an. ʒʒ.

Sal vol. maxill. luc. pisc. gr. xij. ad xv.

Laud. opiat. ferm. gr. iij.

Syr. papav. errat. aut scabios. ʒvj. ad ʒj.

M. D. S.

Ut antea.

ʒj. Dent. apri præp. ʒij.

Sang. bircin. præp. ʒʒ.

Laud. opiat. Lang. gr. ij. vel iij.

M. pro pulvere:

Divid. in tres part. æqual. S.

Pulvis dissolvens.

ʒj. Maxill. lucii pisc. ʒj.

Sal card. ben. ʒʒ.

Uol. dent. apri gr. v.

Laud. opiat. gr. ij. M. f. pulvis: S. ut antea.

Kk 3 ʒj. Sang.



℞. Sang. hirci ppt. ℥j.  
Bezoard. mineral. ℥ss.  
Laud. opiat. gr. j.  
M. f. pulvis.

div. in 2. part. æqual. S.

Pulvis dolorem sedans & dissolvens.

℞. Maxill. luc. pisc. vel pulv. antiscorbut. ℥ss.  
Sal. vol. cornu Cervi vel maxill. luc. pisc. gr. vij.  
Laud. opiat. gr. ss.

M. f. pulvis in principio & incremento; S.  
Pulvis dissolvens.

℞. Arcan. duplicat.

Succin. prap. vel flor. sulphuris ana gr. xv.

M. f. pulvis in Pleuritide cum febre acuta.

D. S.

Pulvis refrigerans.

mox dolor & calor remittunt, & materia cocta sine ulla  
difficultate commodè reicitur.

Vel

℞. Arcan. dupl. ℥j.

Antimonii diaph. ℥ss.

M. D. S.

Pulvis calorem sedans.

Vel

℞. Arcan. dupl. ℥ss.

Maxill. luc. pisc.

Antimonii diaph. ana gr. xv.

M. Div. in 2. part. æqu. S.

Pulvis alterations.

℞. Mixt. simpl. ritè parat. vel tinctura bezoard. ℥j.

Spiritus cornu Cervi essent. ℥ss.

Ess. opii tartarizat. ℥j.

M. pro duabus dos. S.

Mixtura sudorifera.

℞. Spiritus theriac. camphor. ℥ij.

Ess. croci ℥j.

M. D. S.

Essentia discutiens, & leniens: 50. usque ad  
60. gutta pro 1. dosi.

Pro meliori confirmatione d'ctorum, notanda venit obser-  
vation in muliere plebeja 42. annorum, ad quam pleuritide  
gravissima & jam desperatâ laborantem die demum septimo  
decubitus sui vocabar: aderat tussis gravis, excretio viscida,  
nonnihil sanguinolenta, dolor in latere dextro, qui prius  
fuerat in sinistro, palpitatio cordis, sudor frigidus in periphe-  
ria corporis, summa debilitas; pulsus quinquâ qualibet vice in-  
termittens, omni momento suffocanda videbatur, licet clamo-  
sa, vox rauca: Huic præscripsi sequentem Potionem:

℞. Aqua papaver. errat.

Card. ben. an. ℥ss.

Maxill. luc. pisc. prap. ℥j.

Salis vol. maxill. luc. pisc. gr. xii. ad xv.

Laud. opiat. ferm. gr. ij.

Syr. scabios. ℥ss.

M. f. Potio.

Quæ exhibita fuit cochleatim, & exinde superveniente  
copioso sudore mirabile levamen omnium symptomatum  
percepit; continuato etiam hujus mixturæ usu, successivè  
convaleuit.

Interim ut expectorationem materiz viscidæ, quæ cum  
tussi supererat, melius promoverem:

℞. Aqua scabios.

Hyssop. ana ℥ss.

Spiritus sal ammoniaci anis. ℥ss.

Syr. scabios.

Violar. ana ℥ss.

M. D.

Cepit cochleatim.

Cum egregiè quidem & copiosè viscida rejiceret, tamen de  
anxietatibus repetentibus, ut & doloribus intensè recrud-  
escentibus, denuò conqueri cepit, cum respirationis difficul-  
tate; ob id missis expectorantibus ad sudorifera interna ac-  
cessum feci: Ergo conscripsi:

℞. Aqua flor. papav. errat. ℥ij.

Lapill. Cancr. prap. ℥j.

Sal. vol. maxill. luc. pisc. gr. xv.

Laud. opiat. ferm. gr. ss.

Syr. scabios. ℥ss.

Misc. f. potio.

Usurpabatur repetitis vicibus cum copioso sudore & suc-  
cessu. Item

℞. Aqua flor. papav. err.

Card. ben. ana ℥ss.

Lapill. Cancr. prap. ℥j.

Salis vol. max. luc. pisc. gr. xv.

Laud. opiat. gr. ij.

Syr. flor. papav. errat.

Scabios. ana ℥vj.

M. pro Potione.

Pro dolore punctorio leniendo externe simul ordinabam:

℞. Ung. dialth. ℥j.

Olei amygd. dulc. ℥ss.

Destillat. cummin. ℥j.

Camph. gr. ix.

M. f. Linimentum.

Quod calidè illitum crebrò lateri dolenti optimè profuit.

His continuatis per Deigratiam sanata fuit. Sed cum ad-  
huc ægra copiosa viscida tussiendo rejiceret, pro reliquiarum  
harum evacuatione succus raphani recens paratus cum sac-  
charo per copiosam sputi excretionem optimè contulit. Sed  
cum curata, nihilominus tamen adhuc tussim humi-  
dam, difficilem nonnihil respirationem & alia pateretur  
symptomata, adeoque metus subesset de phthysi pulmonali  
imminente; ob id

℞. Charesol. rec.

Heder. terrestr. rec. ana q. v.

Concisa coq. in cervisia.

Assumit manè & vespere calidè bonum haustum, continuav-  
it aliquandiu, benè profuit, & hoc phthysin etiam impedivit.

Supervenerunt tamen adhuc sudores nocturni continui  
pleno rivo emanantes, emaciantes & debilitantes insigniter:  
Prohis tollendis præscripsi:

℞. Antihect. Pot. gr. xv. ad ℥j.

Laud. opiat. ferm. gr. ss.

M. pro pulvere.

Assumit omni vespere vel ante cenam, sed moderatissimam,  
sub introitum lecti, hunc pulverem: cum aliquoties sum-  
sisset, præsentaneam opem sensit, & penitus convaleuit.

Sic viro ætatis consistentis gravi pleuritide correpto, cujus  
pulsus cum semper post tres pulsationes intermitteret, præ-  
scripsi octavo demum die vocatus sequentem Potionem:

℞. Aqua flor. papav. errat.

Scabios. ana ℥ss.

Antimonii diaphor. ℥ss.

Syr. nicotian.

Scabios. ana ℥vj.

Spiritus nitri dulc. q. s. pro grato sapore.

Misc.

Potionem hanc bis usurpavit, primâ statim vice sensibile  
levamen exinde percepit; sed alterâ vice mirè recruduit mor-  
bus (sicut alias superiores potiones cum salibus volatilibus  
magis proficuas observavi, quàm hanc cum spiritu nitri dul-  
ci, unde pleuritidis nonnisi præmissis sudoriferis volatilibus  
præscribenda) ut moribundus videretur omnibus, & sempe  
quidem circa vesperam morbus recrudescere, præcedente  
gravi rigore, insequente vehementissimo calore, sub quo &  
delirus & summè imbecillis evadebat, unde 10. die præter  
propter præscripsi:

℞. Sem. card. bened. ℥ij.

cum aqua papav. errat. & scabios. q. s.

F. Emulsiō: adde

Maxill. luc. pisc. ℥j.

Sal. vol. carund. gr. xij.

Miscendo f. Potio, quæ edulcorabatur saccharo.

Assumpsit cochleatim, mirè profuit.

Reliquias expurgandas jussu succo raphani cum saccharo  
pro expectoratione; sed hujus continuo & nimio usu diar-  
rhæam & quasi lienteriam incurrit: hinc

℞. Spiritus nitri dulc. ℥ss.

Usurpabat pro dosi 30. ad 50. usque gutt. bis in die, & bene  
contulit.

Sed propter calorem vesperti recurrentem, sudorem noctur-  
num copiosum, & tussim continuam, sequentes præscripsi  
pulveres:

℞. Antihect. Pot.

Flor. sulphuris ana ℥ss.

Mista pro duabus dosibus continua vit aliquoties.

Item

℞. Aqua papav. rhæad ℥ss.

Antimonii diaphor. ℥j.

Syr. flor. papav. ℥j.

Spiritus nitri dulc. q. s. pro grato sapore.

D.S.



## D. S.

Potio confortans &amp; refrigerans.

Melancholico cuidam Peripneumonia laboranti cum dolore gravativo pectoris, difficili respiratione & capitis atque oculorum dolore, præscripti sequens in incremento morbi:

℞. Conserv. heder. terr. ℥j.

Antimonii diaphor. ℥ss.

Sal volat. succin.

Bals. Peruv. anagr. v.

M. cum syr. scabios. & F. Bolus.

Cum citra manifestam causam aliquot noctes insomnes duceret:

℞. Conf. flor. borrag. ℥j.

Conf. Alkerm. gr. xv.

Sal vol. succin. gr. i. v.

Laud. opiat. gr. iß.

Cum syr. papaver. F. Bolus.

Ordinabatur etiam spiritus sal. ammoniaci, cum spiritu carminativo mistus.

Hiscæ remediis ritè adhibitis & subinde reiteratis, si non succedat per inflammationis discussionem, adeoque diaphoresin & sudores, legitima morbi solutio, promovendum erit sputum, & adjuvanda materia intra pulmones partemque vicinas congestæ alteratio seu coctio, & hinc expectoratio, utpote quæ tunc ordinariò naturaliter supervenire solet. Hic conveniunt aliàs nota, in principio quidem temperantia, sputi acrimoniam, idque incrassantia; Postmodum verò, quando sputum album, crassum, & viscidum emittitur, usurpentur attenuantia, incidentia, & expectorantia.

Ad promovendam sputationem profunt potius Decocta pectoralia, quam syrapi aut Linctus pectorales, quoniam minus perferunt tales ægri saccharata. Convenit ergò in principio Decoctum hordei cum radice glycyrrhizæ, helenii, scabiosæ, cum syrupo violarum, de jujubis, de russilag. papaveris, &c. Item Decoctum & rob pullularum, Decoctum helenii, scabiosæ, violarum, polypodii, veronicæ, salviz, russilaginis & papaveris erratici, aliaque similia temperata, ad materiz, ut vocant, coctionem; egregiè enim temperant acres succos, & expectorationem blandè promovere: Cum verò copiosius sputum apparere incipit, usurpandum venit Decoctum hyssopi cum nelle rosaceo ad promovendam meliorem excretionem materiz. Ad coctionem quoque si quid aliud, imprimis facit oleum seminis lini, & hinc oleum amygdal. dulcium, sed recenter expressa, tam à veteribus quam modèrnis Practicis, experientia duce, laudata: Nempe TACHENIUS alicubi spiritum vini camphoratum cum ana essentia croci, cum olei lini vel amygdalarum dulcium datum, raro fallere asserit: Vel

℞. Olei lini rec. expr. ℥ij.

Syr. violar. ℥ij.

Aqua hyssop. ℥iv. v. vel vj.

Dentur ℥ij. vel ℥ij. pro dosi, aliquoties in die: S.

Potio solvens coctilem.

Vel saltem oleum lini recens sine igne extractum, cum saccharo mistum, & ita exhibitum egregiè confert:

Vel

℞. Olei lini ℥ij. vel ℥ij.

Miscetur cum syr. scabiosæ vel aqua card. ben.

aut quocunque vehiculo.

Quo suos Pleuriticos egregiè restituit GESNERUS in Obs. & Epist.

Sic PISO ceu expertum habet oleum lini ad ℥iv. cum pulvere dentis apri ad ℥j. mistum, & ita propinatum, præsertim in principio: D. CAROLUS REIGERVS adhibuit oleum lini cum speciebus dia-Ireos felici cum successu: vid. M. A. N. C. Ann. 4. Obs. 7. p. 11. Plura qui cupit de oleo lini, vid. GABELCHOVERUM Cent. 4. Cur. 68. Hujus loco oleum amygdalarum dulcium, sed recens, ab ℥ij. ad ℥ij. in principio morbi propinatum crebrius, egregium est, emollit, dolorem lenit, expectorat, subducit alvum, &c. Confer. THONERUS & PLATERUS, quibus in usu fuit. Pertinet huc experimentum Quercetani & Bartholeti, quod est pomum excavatum, & ℥j. thuris repletum, & ita ad ignem coquendum, hinc deglutendum, aut cum ℥ij. aut iv. aquæ card. ben. propinandum; hoc enim multos restituisse refert RIVERRIUS Cent. 1. Observat. 56. & C. 2. Obs. 63. Quidam mastichen addunt: Quidam indunt ℥ss. thuris, & superaddunt simul ℥ss. florum sulphuris, & ita coctum, assunt; & præstantissimum remedium esse dicit FONSECA l. 2. Conf. 85. Aliàs quoque, ubi sputatio copiosior, promunt spiritus salis ammoniaci simplex, anisatus & succinatus,

Estmull. Oper. Tom. II.

tingtura sulphuris. Conveniunt etiam flores asæ dulcis, seu ipsa asæ dulcis probè pulverisata, & permixta cum syrupo seu conserva violarum, syrupo de russilagine, papaveris rhæados, & in specie de jujubis, qui egregiè temperant acres humores seu succos, & expectorationem blandè promovere: id quod satis notum est.

Quod si facta Coctione fortius expectorandum sit, conveniunt incidentia & expectorantia in specie sic dicta, v. g. scapius dictis postmodum addendi sunt syrapi de hyssopo, de erylimo, nicotianæ ritè præparatus, de quo vid. Epiphanius FERDINANDVS Hist. 32. & 45. mel rosatum, spermaceti, spiritus nitri dulcis, &c. Quibus omnibus tamen præfero succum raphani recenter expressum, mirabiliter expectorantem. In specie spiritus nitri dulcis moderatà dosi dictis remediis additus multum ad expectorationem materiz coctæ promovendam facit. Item aqua mulsæ in difficili anacatharsi per sputum, princeps est remedium, cui simul specifica varia ac pectoralia incoqui possunt. Huc pertinent Potiones supra annotatæ: vel

℞. Aqua hyssop.

Scabios. an. ℥ij.

Spiritus sal. ammoniaci anis. ℥j. ad ℥ij.

Muxill. luc. pisc. ℥ij.

Syr. diacod. seu violar. ℥j.

M. D. S.

Mixtura pectoralis, coctilem sumenda.

℞. Herb. chærefol.

Hyssop.

Scabios. ana Mj.

Rad. liquirit. ℥ss.

Enul.

Polypod. ana ℥vj.

Ficuum ping. num. vj.

Coq. in s. q. aquæ.

Colaturæ ℥ij. ad ℥ij. adde

Ess. croci ℥ij. ad ℥ss.

Syr. nicot. ℥ij. vel ℥ij.

M. pro Potione maturante & expectorante.

S.

Potio expectorans.

Inter SYMPTOMATA Pleuriticis vexantia in toto morbi cursu, præ cæteris nil magis urget, quam dolor ille pectoris, acutus, mirè excrucians ægros; Pro quo liniendo, præter internum laudani opiatum usum, conveniunt externæ variæ anodyna & resolventia, in principio, uti dixi, applicatur spermaranarum bomo cum successu; Item spiritus vini camphoratus, aut crocatus est egregius; CLAUDERVS Tr. de Balsam. Corpor. sal ammoniaci p. i. & ciner. clavellat. ad p. ii. in aqua simplici vel aquis destillatis solutorum in sedandis & sopiendis punctiõibus pleuriticis admodum commendat; Vel illinatur linimentum suprâ præscriptum, vel unguentum pleuritic. Mmsichtii in Armament. Medico-Chymic. p. 485. calidè applicetur; item oleum antipleuriticum PETRI à CASTRO, quod describitur in M. A. N. C. Ann. 1. Obs. 10. p. 29. Vel

℞. Ung. di-alth. ℥j.

Olei amygd. dulc. ℥ss.

M. D. S.

Unguentum leniens.

Simplex est unguentum, sed expertissimum RULANDO & ZACUTO LVSITANO, cujus effectum pariter observavi, si singulis bihoriis aut trihoriis ad summum, loco dolenti illinatur, ad imitationem RVLANDI. Addere soleo interdum olei destillati cumini ℥j. & gr. ix. camphoræ, meliori cum effectu. Conveniunt oleum jasminum, seminis lini, chamomillæ, hyperici, anethi, arancæarum, liliorum alborum, papaveris, hyoscyami, scorpionum, florum verbasci, septem florum Myns. servum hircinum, unguentum pectorale, empl. de meliloto, de mucilag., item ireatum, & de cumino, quod DECKERS Pr. Barbett. pag. 78. & 79. describit: Item emplastrum de meliloto cum oleo hyperici aut chamomillæ aut Philosphorum malaxatum; oleum etiam camphoræ excellens est, ut & oleum chamomillæ destillatum, & oleum cere, pinguedo muris montani (cui posse substitui arbitror serum hircin.) est experimentum PARACELSI, qui tale medicamentum ordinat.

℞. Pingu. mur. mont.

Olei chamomill.

Rosar. ana ℥ij.

Amygd. dulc. ℥j.

M. f. Linimentum.

Kk 4

Vel



Vel

℞. Ping. mur. mont. vel apri ℥i.  
Olei amygd. dulc. ℥ss.  
Destillat. chamom. ℥j.  
M. D. S.  
Unguentum leniens,  
Vel

℞. Pingv. mur. mont. ℥ss.  
Olei chamomill. ℥ij.  
Absinth. ℥j.  
Destillat. cumm. ℥ss.

Croci ℥i.  
Camphor. ℥ss.  
M. F. Linimentum.  
D. S. ut supra.

Item convenit balsamus sulphuris terebinthinatus, & Rulandi, superimponendo emplastrum dia-sulphuris Rulandi. Dicta applicentur tepide, & imponatur desuper lintecum crassum, vel lapis calefactus, ut melius penetret remedium:  
Item

℞. Ungv. dialth. ℥vj.  
Empl. filii Zach. ℥ss.  
Olei sepi. flor. Myrs. ℥ij.  
Hyoscyam. expr. ℥ij.  
Destillat. aneth. ℥j.  
Camph. ℥ss.  
M. pro Unguent. resolvente:  
D. S.

Unguentum resolvens.

Calidè illinantur aliquoties, repetendo desuper laterem calefactum.

℞. Emplastr. de Melilot.  
Filii Zach. an. ℥j.  
cum s. q. olei verbasci f. emplastrum resolvens.  
D. S.

Emplastrum resolvens.

Succus caulium seu brassicæ & ex eo paratum unguentum à multis simpliciter est expertum: Sic factum emplastrum ex succo caulium cum pulvere cumini insigniter commendatum est à GABELCHOVERO Cent. 4. Curat. 68. Sic etiam ex pulvere caulium cum pulvere cumini, caryophyllorum, & melle, expertum emplastrum sic contra Pleuritidem BARTHOLETI. Quibusdam singulare habetur emplastrum, subsequens, præmissis præmittendis, applicatum:

℞. Picis naval. ℥ss.  
Sulphuris trit. ℥ss.  
Cere flav. ℥vj.  
Terebinth. clar. ℥ss.  
Olei chamom. q. s.

M. pro Emplastro.  
D. S. ut supra.

Præmissa Venæ Sectione, si opus sit, & sudorifero, calidè applicetur.

Huc etiam pertinet sterus gallinarum cum oleo chamomillæ, quod certè admirandas præstat virtutes. Fomenta quoque parari solent ex malva, althæa, flor. sambuci, meliori, chamomillæ, &c. quorum prolixam catervam apud Autores invenietis: e. g.

℞. Herb. cherefol.  
Nasturt. hortens.  
Fol. hyoscyam.  
Flor. sambuc.  
Melilot.  
Chamomill. an. Mj.  
Cepar. submer. assat. ℥ij.  
Farina fabar.  
Lupinor. an. ℥j.

Nid. hirund. no. j.  
Coqu. in s. q. lact. ebulyr. ad consistent. Cataplas-  
matis:

adde

Camph. ℥j.  
M. pro Cataplasmate resolvente ac maturante:  
D. S.

Puls. resolvens &amp; maturans.

Quod si nec per sudorem, nec per sputi expectorationem desinant Pleuropnevmoniae, seu quæcunque inflammationes thoracis, necesse est, ut successivè suppurentur inflammatio-  
nes, & ita in perfectum abscessum abeant, circa quem

1. Suppuratio promovenda.
2. Abscessus perfecti ruptio adjuvanda.

3. Abscessu aperto partis ulcerosa mundificatio & consolidatio, ac finalis puris excretio, instituenda.

**SUPPURATIO** hæc in Pleuritide frequentius contingit, in qua nunc saltem apostema colligitur intra pleuram, idque frequentius, nonnunquam simul ex parte intra pulmones istius lateris, idque rarius: Nam hoc reverà sputo solvitur, dum illud sæpius suppuratur. Semper tamen in suppurationis hoc negotio ad utrumque respiciendum. Pleuritis suppurata intra pleuram, nunc rupto abscessu intra cavum thoracis fuit, nunc intra saccum ex dilatata pleura colligitur. Probè hoc observavit LINDANUS, qui dicit: Autores semper crediderunt, suppuratione facta pus infundi in cavita-  
tem thoracis atque empyema fieri: Verum sæpe tantum est collectio puris in parte autè affecta, quod vidi in filia D. Pi-  
sonis, quæ in Pleuritidem incidit, quæ in suppurationem transiit. Locum Chirurgus candela exploratoria exploravit altè, sed inde nihil pecunius colligere: Nam puella mortua cum dissecta fuerit invenimus membranam, succin-  
gentem pleuram, dilatatam in immensum saccum, in quo subsidebat omnis purulentia. Illud tamen magni Medici, hac de re consulti, omnes esse putabant. Verum hic frustrà fuit Paracensis facta, & miserè obiit. Ad maturationem autem abscessus promovendam optima remedia sunt nicotiana, hederæ terrestris, cherefolium & scabiosa, quæ quatuor aliis suppurantibus omnibus præferantur; unde usurpetur syrupus de nicotiana, de hederæ terrestris, de symphyto Fernellii, de hyssopo.

Externè vero ad suppurandum abscessum, ejusque apertio-  
nem, conveniet lac coctum cum malva arborecente, & ita sub forma cataplasmatum crebrius impositum; mirè enim maturat & rumpit abscessum. Porus etiam stercoris asini, non minus quàm stercoris caballini, in aqua appropriata vel vino dissoluti, facta jam suppuratione maturat & rumpit apostemata: vel conveniet etiam emplastrum filii Zach. vel alia emplastra externè applicata: Vel apponuntur cataplasmata ordinaria, ad maturationem & ruptionem abscessuum usitata.

Ubi facta suppuratio, opera danda, ut **ABSCCESSUS RUMPATUR**, & pus evacuetur. Apertio enim abscessus factam cognoscimus ex spuitione puris cum ichore plus minus cruento. Ut autem rumpatur seu aperiatur abscessus in tempore, optimum remedium est, si vomitus aut ster-  
nutatio excitentur, & patiens altè voce clamando de latere in latus se volvat. Optimum esset, ut, quoties certi esse-  
mus de maturato abscessu, saltem perforentur spatia inter-  
costalia, cum hoc securè fieri possit, modò locus, in quo ab-  
scessus contingit, certè & exactè cognosci possit, qui non-  
nunquam rubore, tumore & dolore ad extra se manifestat. Neque enim in eoloco, quo in empyemate & pure, jam in thoracis cavitate collecto, sectio fieri solet, apertio instituenda; sed ex pondere, dolore & calore locus, in quo abscessus hæret, investigandus, & intra duas costas leniter aperiendus, &c. sed cautè omnino procedatur: Quæ apertio quoque in ab-  
scessu intra pleuram locum habet. Si in pulmonum quo-  
dam lobo simul suppuratio fiat, necessariò empyema expe-  
dandum venit. FERDINANDUS in Hist. Med. 32.  
& 45. Decoctum tabaci & illius post convenientem digestio-  
nem paratum syrupum, nec non tabaci sumum, ad rum-  
pendam vomitum suppuratorum seu empyematicorum, & evacuandum pus non potest sufficienter commendare. Ec-  
cessor Deum, me anno elapso non tantum à morte revocasse mulierem, quæ jam erat per tres menses pleuritica & sup-  
purata cum febre hectica, quæ ab istius Decocti, nempe ni-  
cotianæ, assumptione per tres dies, & ad hujus sumo accepto, tribus vicibus plus ℥vj. puris albi, tribus diebus ussi evo-  
luit, & nunc est sana. Decoctum est hoc:

℞. Fol. tabac. ℥j.

Bulliant in Aquæ dulcis ℥ij. ad consumptionem  
medietatis, addendo in fine

Fol. malvæ,  
Branc. ursine,  
Violar. an. Mj.

Colentur, & cum supra misc., & detur calidiuscu-  
lum pluries.

Fumus vero est:

℞. Fol. tabaci;

Reponantur in cineribus adhuc ignitis, & fumus per fistu-  
lam seu embolum assumatur.

Cum quibus & terebinthinæ usum subinde adhibuit.

Facta ergò ruptione abscessus, & puris in thoracis cavum  
evacua-



evacuatione, ad evacuationem hujus vomitus, convenit. Ad **ULCUS** verò **MUNDIFICANDUM & CONSOLIDANDUM**, vel si alia partes antea inflammatae labem patiantur, præter remedia pus expectorantia eadem ferè medicamenta, imprimis ex nicotiana, hederæ terrestri & chærefolio, sunt experta; quam hederam terrestrem ejusque succum & syrupum **LINDANVS** præfert omnibus aliis remediis ad curandos abscessus suppuratos; egregiè enim *apostema mundificat*, & denuò consolidat, ne æger in empyema desperatum & phthisin incidat. Nam & *hederæ terrestres*, Ger. *Gunderman*, & chærefolli sunt vulneraria, & in læsione partium inflammatarum, post Peripneumoniam residuâ, & exinde imminente phthisi, optimè conveniunt. Quibus spiritus seu oleum terebinthinæ, & cum eo paratus balsamus sulphuristerebinthinatus & anisatus, flores eius & modicum terebinthinæ, in specie in vitello ovi solutæ, & extractum sulphuris siccum, item syrupus sulphuris **VVIII**si, item balsamus Peruvianus & hujusmodi cura commode addi possunt. Sunt enim optimum ulceris pleuriticum mundificativum & consolidativum: vid. Colleg. **LANGII** supra *Fabrum* cap. de Peripneumonia.

Huc referenda sunt omnia ea, quæ supra *Scff. 17. cap. 1. Artic. 2. de phthisi pulmonali* ex eorum exulceratione monui, & etiam infra cap. 2. de empyemate monebuntur. Potus toto morbi cursu sit Decoctum hordei & liquiritiæ, vel Decoctum papaveris rhæadoscum syrupo capillorum Veneris. Convenit etiam potus sulphureus quicumque, secundum **HELMONTII** hypothesein præparatus.

Et tantum de Pleuritide vera.

### CURA PLEURITIDIS NOTHÆ.

Quoad **PLEURITIDEM NOTHAM**: prima ista, quæ est ab inflammatione partium externarum, internis diaphoreticis, ad quaslibet inflammationes supra laudatis, & externis fuculis ac fomentis discutientibus levatur, nisi plethora aut ingens sanguinis stagnatio sanguinis missionem quoque urgeat.

Hæc diebus occurrit *juvenis INFLAMMATIONE SUB AXILLIS* insigni correptus; facta post aliqualem suppurationem apertione supervenit altero abhinc die Inflammatio, quæ medium pectus occupabat, cum dolore ad tactum sensibili, respiratione difficili, ita ut ferè erectus in lecto subsistere cogeretur. Erat *Pleuritis notha primi modi* ex **SENNERTO**, quæ facillè curata fuit per Potiunculam ex lapillis cancerorum cum aceto destillato, supra *Artic. 2. ubi de inflammatione ingeneri*, commendatam; quam bis usurpavit cum blando sudore.

Aliquando gravis *Pleuritis notha secundi modi* occurrebat in alio, cum dolore gravissimo punctorio:

4. *Aquæ scabios.*

*Card. bened. ana ʒij.*

*Spiritus sal. ammoniaci ʒij.*

*Essent. opii ʒij.*

*Corall. rub. præp. ʒij.*

*Syr. scabios. ʒij.*

*Misc.*

Capiebatur cochlearim.

Anno 1675. Catarrhus epidemius totam ferè Germaniam pervadebat, sub quo quidam gravi dolore punctorio in alterutro saltem latere maximè affligebantur, occupante spatia collarum notharum & à regione spinæ dorsi lumbari sursum anteriora versus ad sternum usque ascendente. Reliciebatur in taliter constitutis quibusdam cruenta & viscida glutinosa, horrida, non tamen purulenta. Aderat simul in principio ardor intensus cum pulsu crebro, celeri, magnitudinis & vehementiâ moderato, qui tamen, uti & excretiones, doloribus cessantibus cessabant. In hac ratione lymphæ acris peccantis, tanquam causæ materialis, salina volatilia; ratione doloris verò, in quo Pleuritis notha cum vera certat, opiata adhibebantur, additis specificis in pleuritide vera aliàs usitatus, adeoque profuerunt spiritus salis ammoniaci, dens apri, liquor cornu cervi succinatus, tinctura tartari cum spiritu salis ammoniaci anisato, sal volatile lucii piscis, unde ordinabatur alis mixtura:

4. *Aquæ card. bened.*

*Flor. papav. errat. ana ʒij.*

*Spiritus sal. ammoniaci anis. ʒij.*

*Laud. opiat. gr. iij.*

*Syr. chærefol. ʒij.*

*M. F. Potio.*

Capiebatur cochlearim.

Cuidam, qui vespere circa costas notas doloribus pungiti vis cum intensissima pectoris angustia, æstu magno adjuncto, pulsu magno, præcedente frigore, affligebatur, præscripti:

4. *Aquæ flor. samb.*

*Scabios. ana ʒij.*

*Lap. canceror. præp.*

*Dent. apri præp.*

*Antimonii diaphor. ana ʒj.*

*Sal. vol. maxill. lucii piscis. (cujus loco etiam*

*Aliud substitui potest) gr. xij.*

*Laud. opiat. ferm. gr. iij.*

*Syr. card. ben. ʒij.*

*M. pro potione.*

Mixturam hæc aliquoties in die hauriebat, & sudorem urgebat, unde altera mane magnam partem levabatur, reliquis per sudorem & expectorantia sublatis.

Cæterum urine in hac Pleuritide nothæ erant crassæ, turbidæ, cum copioso sedimento, quod precipitatum erat sub effervescencia ex lymphæ & sanguine. Pro hoc scopo, naturæ juvamen præstando, præmissis sudorifero, diuretica adhibebantur, inter quæ prævalebat tinctura tartari, ratione alcali fixi: v. g.

4. *Aquæ mentha,*

*Serpilli ana ʒij.*

*Tinctura tartari. ʒij.*

*Spiritus sal. ammoniaci ʒij.*

*Syrup. hed. terrestr. ʒvj.*

*M. F. Potio.*

Capiebatur etiam hujus mixturæ loco tinctura tartari cum dimidio vel tertia parte spiritus salis ammoniaci, pro dosi 40. gutt. Arcanum quoque duplicatum Mynsichti die bis ad ʒj. propinavi, præsertim ubi urine lateritigæ apparebāt, pro quibus corrigendis proficuum erat: Insuper cum his internis pro doloribus mitigandis applicabantur externa, ubi tamen litus & unguenta oleosa, item emplastra mucilaginosæ nocebant, aut saltem nil juvabāt, quia sortem pororum obstructionem procurabant; quin potius Potus calidi sicci omnem spei paginam explebant, adeoque æger ad fornacem sedentes sensisse levamen dicebant, ubi præsertim blanda frictio cum panniscalidis accederet. Quod si vero dolor anteriora magis affligeret, sacculi tunc avenæ impleti & calefacti loco dolenti, permutando subinde eosdem, imponebantur, ubi avena quidem nil salutis promittere potuit, nisi quod calorem fovere apta fuerit. Tandem quoque egregium erat illud emplastrum, ex sale volatili urine & terebinthina constans; scilicet

4. *Sal. vol. urine ʒij.*

*Terebinth. ʒi.*

Hæc mixta in mortario rediguntur in consistentiam spissiorē; quibus pro consistentia emplastri acquirenda, addebatur nonnihil empl. de meliloto, hincque inducebatur super alutam, & applicabatur absque siadone.

Restat unus adhuc scrupulus eximendus circa opii & opiatorum usum hoc loco allegatum: Scilicet posset horum usus esse suspectus, cum impediatur naturæ motum in lymphæ vitiosæ expectoratione consistentem: nam ut ille spirituum, ita quoque humorum motus sistit. Observavi quippe in muliere, cui liquorem cornu Cervi, succinatum cum essentia opii præscripseram, conquestam fuisse ex hujus usu, esse ipsi vaporosum quid circa pectus. Sciendum tamen, opium scilicet non curare, sed saltem symptomata palliare, simul autem atrociora ex doloribus continuis imminencia præcavere; hinc quò commodiorem agendi occasionem accipiat Medicus, rectè usurpari poterit; & quidem in principio & incremento eius usus semper convenit, quando nempe tussis sicca & febricula vespere affligere solet; in statu verò opiata in usum non sunt vocanda, quia iam tum collecta est materia mucosa.

Tertia Pleuritis notha ab acido acri intra Pleuram & musculos intercostales solitarie collecto, per Diaphoretica, salina volatilia, opiatis mixta tollitur, in specie spiritu salis ammoniaci anisato cum dimidio essentiae opii mixto, & propinato, expectando sudorem, & patiens meliùs se habuit. Egregiè quoque conducit antimonium diaphoreticum cum maxilla lucii piscis, dente apri, & opiatis propinatum: vid. **M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 72.**

In Pleuritide nothæ, quæ est à seculo scorbutico, diaphoretica maximi usus sunt, quibus quamvis rariùs Venæ sectio iungenda: vid. **DRAVVIZIUS de Scorbuto Tit. 7.** potissimum cum per hæmorrhagias criticas illa interdum solvatur, v. g. mensium fluxum, vid. **RIVERIUS c. 1. Obs. 47.** Imò in scorbutico antiscorbutica illis miscenda. Valent hic etiam sacculi



culi ex resolventibus, aut unguentum, quod DRA WIZIUS l. a. p. 252. describit sequens:

24. Succ. nasturt. aquat. ℥vii.

Absinth. ℥v.

Butyr. rec. ℥vj.

Bulliant lento igne ad consumptionem humiditatis: adde

Olei destillat. succin. albi non rect. ℥℥.

Chamom. ℥ij.

M. f. Linimentum.

Si a fluxibus hæc fuerit, carminantia, discutientia, atque diaphoretica interna & externa conveniunt. Non raro tamen venæ sectione quoque opus esse testatur RIVERIUS c. 3. Obs. 63. & FORESTUS l. 16. Obs. 42.

Quod attinet PLEURITIDEM VERMINOSAM, ea medicamentis verminosam progeniem necantibus curatur. Præceteris convenit aqua mercurialis seu Hermetica, parata ex aqua cardui benedicti, in qua agitatus fuerit aut aliquantum ebullierit mercurius vivus; ubi subsederit mercurius, decantata aqua propinetur cochleatim: ita omnes vermes certò interficit & exturbat, quibus ejectis affectus ipse cessat. Conf. RIVERIUS c. 1. obs. 75. Sic quoque phlegma & spiritus vitrioli, item phlegma & spiritus sulphuris in convenienti vehiculo usurpatus, vermes egregiè abigit: v. g.

24. Aqua violar.

Card. bened.

Ferrar. an. ℥ij.

Syr. hyperic. ℥ss.

Spiritus vitrioli dulc. gutt. vj. vel x. vel q. s. pro modica aciditate.

M. D. S.

Potio contra vermes.

Hæc mixtura capiatur cochleatim: haud tamen negligantur Diaphoretica interna, ac resolventia externa.

## ARTICULUS X.

De

### INFLAMMATIONE HEPATIS,

& inde orto

### ABSCESSU.

**V**lterius inter reliqua viscera HEPAR etiam interdum & satis periculose INFLAMMATUR, quod ipsum inflammatum interdum abit & degenerat in abscessus, totum ejus parenchyma devastantes. Non enim tantum in SCHE NCKIO leguntur exempla abscessuum in hepate post inflammationem, ubi totum parenchyma suppuratum fuit; sed etiam imprimis FORESTUS Segregium habet casum l. 19. Obs. 10. de hepatis apostemate, seu inflammatione in abscessu mutato, qui in ulcus malignum & depascens, tandemque in gangrenam lethalem abiit. Vocatur aliàs HEPATITIS.

## CAUSÆ.

Rariores equidem sunt tales inflammationes: & in specie quod causas agnoscunt easdem inflammationes hepatis, quas reliquarum partium inflammationes; subinde tamen externa læsio, in specie confusio circa regionem hepatis & casus ab alto in hypochondrium dextrum, disponunt ad hujus inflammationem; Item præter has nonnunquam emplastra & unguenta nimis calida hepatis ac stomachi regioni, ubi lobus hepatis hunc attingit, admota hujus inflammationis causa sunt; uti etiam cucurbitulæ hepatis regioni crebrò affixæ, non raro hepatis inflammationem inferunt: Conf. HILDANVS c. 7. Obs. 46. & 47.

## DIAGNOSIS.

Quoad DIAGNOSIN: Hepar esse inflammatum ex symptomatis adjunctis cognoscitur. Cautè autem considerentur omnia SYMPTOMATA, quæ sunt admodum diversa, dum inflammationem hepatis comitantur; hinc circumspèctus requiritur Medicus, prout nempe inflammatio est vel in parte hepatis gibbea, vel convexa, vel prout eadem est in parte concava seu sima. Nam si inflammatio hepatis est in parte gibbea, magis urgere ferè solent symptomata Pleuriticis

simillima, seu quæ aliàs observari solent in Pleuritide vera; si verò inflammata magis sit pars ejus concava, urgent magis symptomata stomachi & intestinorum.

Non faciliè Hepar inflammatur, aut si inflammatur, febris tamen & æstus, ac cognata symptomata non adeo intensa sunt, quàm pro ratione partis esse deberent, quia nempe hepar parvam habet arteriolam. Jam verò in omnibus inflammationibus à sanguine arterioso magis, quàm venoso, intendi solent symptomata. In genere verò percipitur in omni hepatis inflammatione dolor obscurus & tensivus ratione membranarum, ac gravativus ratione visceris, isque circa regionem hepatis in dextro hypochondrio & ejus profundo, qui sub suppuratione punctorius plus minus evadere solet.

Equidem non raro apparent dolores punctorii in hypochondrio dextro, qui tamen nunquam sunt ex hepate inflammato, falsèque dicunt: Hepar purgere, aut nescio quid ibi esse corruptum: Sed revera tunc vitium in colo hæret, ac vicinis partibus, quæ aptæ sunt, ut dolorem talem repræsentent. Adest simul in inflammatione hepatis mox febris, nunc quidem magis acuta, ubi maior est inflammatio, nunc verò minus acuta, sed sapius lenta, pro ratione circumstantiarum in eo inflammato observabilium, prout nempe inflammatio vel intensior, vel remissior, ac nunc profundas plus minus, nunc externas magis partes occupat: vid. FORESTVS l. 19. c. 7. in sebol. Nam perpetuò inflammationis magnitudinem vehementia febris analogicè comitatur.

Quod si hepar inflammatum simul afficiat diaphragma, cui per ligamentum latum firmiter est annexum, dolor ad jugulum ascendens percipitur, quasi ad inferiora traheretur, præteritum dum vehementius æger inspirat, idque propter pondus hepatis inflammati diaphragmati mediante ligamento lato alligati: Ob id tussis arida seu inanis per intervalla affligit, & difficultas respirationis ægros cruciat, nec non de rubius in latere afflato est difficilis, non secus ac in latere opposito, unde ferè supini iacent ægri; pulsus est frequens, celer, inæqualis &c. Adest simul sitis intensa, anorexia, lingua arida, calor mordax totius corporis, &c. Et in specie urgent hæc symptomata quasi pleuritica, si pars hepatis gibbea fuerit inflammata: Sin verò hepatis pars cava labores, præter supra memorata symptomata generalia urgent in specie symptomata stomachi, singulisque frequenter oboritur, & perpetuò ferè singultuum ægri, vomitus bilis subinde supervenit, interdum & diarrhæa adest, item nausea, anorexia, & similia. Si verò pars gibbea afficitur, acris est dolor circa cordis foveam, decubitus in dextrum latus est, difficilior, dolor ex pressura exacerbatur, tumor manifestus apparet, partes ad iugulum dextrum sursum trahi, & symptomata cætera partes thoracis apparenter affectas sequi videntur.

Cum verò dicta symptomata sæpius in pleuritide etiam adsint, ob id necesse est, ut accuratè distinguatur pleuritis vera ab inflammatione hepatis, in specie cum symptomata hæc multos fecerint, & non pauca exempla prostant curatarum hepatis inflammationum pro pleuritide, aut saltem pleuritidi similitum. Exempla jam nota prostant in Galeno, quæ videantur imprimis in VALERIO LA, HORSTIO, ZACUTO LVSITANO lib. 2. Med. Princ. Hist. 101. item conf. SCHENCKIUS in Obs. l. 3. PANAROLLVS Pentec. 1. Obs. 37. & FORESTVS l. 29. Obs. 12. Aded ut referat AMATVS LVSITANVS, se observasse jecoris inflammationem cum tussi & sanguinis scretu conjunctam, idque Cent. 4. Obs. 1. In specie, si pleuritis circa costas nothas dextri hypochondrii affligerit, facillimè cum Hepatide confundi potest. SIGNA ergo DISTINCTIVA sunt imprimis dolor punctorius, qui in pleuritide est longe acutior acerbiorque; parvus verò vel nullus in hepatis inflammatione: Item inspiratio in hepatis inflammatione est difficilis, exspiratio verò facilis, cum utraque difficilis satis sit in pleuritide. Ad hæc tussis longè & vehementior & frequentior, eaque humida in pleuritide, quæ in hepatis inflammatione est mitior, arida & sicca: ac in specie rejiciuntur in pleuritide copiosa; quæ contra pauca sunt in Hepatide: Pulsus pleuriticorum est durus, ac ut vocant ferratus, qui in Hepatide magis ad undosum accedit: Denique pondus gravans & quasi deorsum trahens thoracem percipitur in latere dextro, quando hepar est inflammatum, ubi etiam non raro tumor aut renisus quidam percipitur tactu, quando hepar in parte sui convexa est inflammatum, quæ minus in pleuritide apparent.

In genere in pleuritide vera omnia sunt acerbiora & vehementiora, in abscessu verò seu inflammatione hepatis omnia sunt remissiora.

Fit inter-



Fit interdum etiam, ut cum hepate inflammato concurrant dolores ventris, unde contingere solet, ut à quibusdam hepatitis inflammatio habeatur pro Colica: Exempla inter alia, habet HILDANUS Cent. 7. obs. 48.

Distinguntur verò faciliè per adjuncta symptomata, per febrem, per tussim, per difficultatem respirandi, & similia, quæ in colica ferè abesse solent.

Non raro linea ex rubro nigricans latissima cum vesiculis elatis in hypochondrio dextero, maximis stipata doloribus, hepatitis inflammationem patefacit: vid. M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 215.

Porro MUSCULORUM ABDOMINIS exteriorum descendantium & ascendantium INFLAMMATIONES circa hepatitis inflammationem fallunt interdum Medicos, ut illas habeant pro inflammatione hepatis, idque imprimis, si profundè sint inflammati. Exemplum elegans & curiosum talis fallaciæ habet VALERIOLA l. 4. obs. 5. item BARTHOLINUS C. 2. Epist. 45. p. 543. ubi prostat notabile exemplum ex contusione ortorum inflammatorum musculorum, loco hepatitis curatorum.

Distinctio tamen horum affectionum est facilis, cum ut plurimum in inflammatione musculorum abdominis percipitur dolor pulsantis, qui ferè est nullus aut saltem exiguus in inflammatione hepatis, propter parvam & unicam ejus arteriolam: Præterea peccoris symptomata absunt in inflammatione musculorum abdominis, quæ tamen adsunt in hepatitis inflammatione: Tactus etiam circumscriptum percipiens tumorem, eumque non adeò profundè nimis situm, sed sensibilibus protuberantem, faciliè judicat, an hepar an musculi sint inflammati? Si enim musculi abdominis, imprimis externi, sunt inflammati, tumor magis est circumscriptus & tactu percipibilis; qui tamen minùs cognoscibilis est, si hepar in gibbæ sui parte fuerit inflammatum: Insuper symptomata interna, puta febris, sitis, & pathemata alia in hypochondrio, sunt longè intensiora in inflammatione hepatis, quàm musculorum abdominis.

Denique dum inflammatio musculorum abdominis incipit suppurari, dolor est punctorius; contra in hepatitis inflammatione dolor ferè nullus percipibilis est.

Interim tamen, quod rectè monet SENNERTUS, cavendum, ne fallamur, si tumor in medio ventre appareat, cum quibusdam etiam hepar ad medium ventris extendatur.

Sed quoad hæc conf. imprimis SENNERTUS l. 2. Præx. ubi de Hepatis Inflammatione, ejusque Epitomator, RIVERRIVS.

Pro majore dictorum illustratione placet exemplum notabile apostematis in jecore ex COITERO ejusque Observationibus Anatom. Chirurg. Miscell. subungere, qui ita dicit p. 120. Civis quidam Norbergenfis, notus annos 42. totus ebrius, leni iussu correptus de molesto quodam hypochondrii dexteri dolore, edendi appetitus amissione, totius corporis languore, æstu, affatim & plerumque post cibum, faciem, manuum, palmas pedumque plantas invadente, & oris ariditate conquævisse cepit. Vimorbi crescente, decrescentibus viribus, corpore extenuato totius anni spatio post coactus fuit decumbere, tandem & me accersiri iussit. Inveni inter cætera quandam erraticam febrem atque tumorem tensumque in hepatis regione, ad medium ventris & umbilicum usque protensum. Febris minimè erat intensa, & periodica, sed hecticæ similis, quæ incerto tempore subinde per totum corpus diffundebat æstum solito majorem, qui interdum citius, interdum tardius remisit, magis potus quàm cibi desiderio molestabatur, ut ferè semper hominibus, qui similibus affectibus urgentur, usu venire solet. Tumor erat durus, cum magna tensione & vehementi punitione, doloreque ulcerofo coniunctus: quamvis nulli lateri incumbere potuerit; tamen facilius dextro quàm sinistro, ad quod aliquid ponderosi in corpore commotione prolapsus fuisse. Alvus erat difficilis, urina subflava, tenuis, cum paucis sedimentis, eoque divulso. Punitione, quæ eorum omnium molestissima erat, nullis unctionibus, emplastris, &c. mitigari posuit. Tandem barbitonsor quidam doloris mitigationem pollicitus est, & apposuit cataplasma anodynum, emolliens & suppurans, inde tumor crevit, efferebaturque magis ad umbilicum, & dilatabatur, ita ut quidam suspicati sint, hunc morbum in hydropem terminaturum. Aliquot diebus post, in illo dextro in conspectum venit tuber, quod barbitonsor existimavit ab apostemate intra musculos abdominis generato prodixisse, quare apertionem suavit. Ego cum nec indicationem nec alia suppurationis signa manifesta sibi deprehendere potuerim, conatus ejus restiti, æger verò permixti sibi lapidem causticum apponi. Hic lapis causticus triduo, maximo ægri dolore ac cruciatu, abdominis musculos ad peritonæum fere usque pervo-

nit, & antequam abdomen penetraret, pus in folliculo collectum intus folliculum rupit, atque per abdominis cavitatem inter peritonæum & intestina usque dispersum est, tumor desedit, & durities evanuit. Eodem die aliquot deliquis animi correptus egger moritur. Aperto corpore invenimus vomitum sine hepatitis parti, cujus non parum putruerat, connatam, eamque satis magnam & apertam, reliqua fuisse sana.

## PROGNOSIS.

Quoad PROGNOSIN: Aut discutitur hepatitis inflammatio, aut successivè suppurata, eadem abit in abscessum, ac malè curata in scirrhum degenerat. Si suppuratur, ruptus abscessus frequentissimè nunc per alvum, vid. SALMUTH Cent. 1. obs. 27. & HERCULES SAXONIA pag. 16. nunc per urinam, vid. SALMUTH l. 2. obs. 28. expurgatur.

Speciè dicunt Practici: Si inflammatum sit hepar in parte gibba, expurgationem fieri imprimis per urinam; sin in concava, magis per alvum: quod ipsum, an verum sit? videant.

Interdum etiam, sed rariss, pus hepatitis copiosum per vomitum elicitur; quale exemplum videb. in SALMUTH Cent. 1. obs. 27. & 28. & FERNELIO Parbol. lib. 6. cap. 4.

Rariss adhuc fit, ut ipsum purulentum excrementum hepatitis suppurati per sputum & tussim, more Pleuritidis reiciatur: Exempla tamen videbitis in SCHNIEDERRO lib. 4. de catarrh. pag. 103. ERASTO lib. 4. Diss. de Febr. putr. & FRIDERICO HOFFMANNO M. M. pag. 313.

Rarissimum adhuc est, quod hepatitis abscessus maturatus per metastasin materia transferatur in furas; quale exemplum videbitis in SCHENCKIO lib. 3. Observat. de hepate, & IACOTII Comm. ad Cone. Hipp. pag. 349. & 826. nec non BAUHINO de Observat. pro- priis.

Aliis periculosum & acutum malum est Inflammatio hepatis, & quæ sæpius ad mortem deducit ægros.

Ea Inflammatio, quæ in cavo hepatis contigit, periculosior esse solet propter graviora ventriculi symptomata, concurrentia, magis inappetentiam, nauseam, vomitum biliosum, & sitim ingentem affert: quæ verò in parte gibba, mitior est, majorem tamen respirandi difficultatem, frequentiorè tussim & dolorem usque ad dextæ partis jugulum infert.

Sic singultus admodum contumax, superveniens hepatitis phlegmoni seu inflammationi, lethale ferè est signum, ac malum portendit: conf. in specie FORESTUS lib. 19. obs. 8. HIPPOCRATES sect. 5. apbor. 98. & sect. 7. apb. 17.

In inflammatione hepatis, si sub cursu morbi ex usu nitri & nitratorum sequatur copiosa urinæ excretio, res salva est, & optimum indicium.

Hepatis Inflammatio, si dies & noctes 27. excedat, & febris perduret, tumore non subsistente, in suppurationem fertur: Vid. HIPPOCRATES 4. Acutor: Exemplum Ann. B. M. A. N. C. obs. 24. quæ vomitu purulento, die 40. obtingente, curata.

Quibus Hepar aut Lien suppuratus est, his plerumque hæmorrhagia narium supervenit primis septem diebus, paucis undecimo, rarissimè decimo quarto, & confert illa hæmorrhagia, si è die recto fiat.

Pessima signa Inflammationis sunt febris ardens, sitis inextinguita, lingua scabra, refrigeratio extremorum, dum interiora uruntur: Vomitus item niger & porraceus.

Morti proximis venter in tumescit rupto abscessu, & frigidum sudans circa collum & faciem, atque animo liquunt.

Cum hepatitis inflammationem febris ardens & continua comitatur, malum est, quia vehementer viscus inflammatum significatur.

## CURA.

Quod attinet ergo CURAM Inflammationis hepatis: eadem est cum omnibus reliquis partibus internis inflammationibus, sive pulmo, sive fauces, sive ventriculus, sive renes inflammantur. Unde omnia antipleuritica, præsertim camphoratis mista, etiam hic in usu erunt: saltem quoad sputum variat cura; simul quoque ad partem affectam, cujus tumor faciliè ledi potest, & qui amaris præsertim conservatur, semper



semper respectus habendus est. Nam præmissa vel omissa  
**VENÆ SECTIONE** in brachio, & hinc in pede, blan-  
 daque laxatione cum pulvere Comitæ de Warwick detri-  
 bus, imprimis **DIAPHORETICA**, v.g. *Mixtura simplex*  
 ad ʒj liquor cornu cervi succinatus, salia volatilia, *Spiritus*  
*nitri dulcis*, *antimonium diaphoreticum*, *Sudoriferum ma-*  
*gnum Fabri*, *Bezoardicum Joviale*, ut & alia ex Jove, dens  
 apri, flores sulphuris, & similia conveniant: e.g.

ʒj. Cornu Cervi sine igne gr. xv.

*Antimonii diaphor.* ʒj.

Salis vol. cornu Cervi vel *Viperar.* gr. viii.

M. F. pulvis: S.

*Pulvis hepaticus resolvens.*

In principio & incremento assumatur in aquis diastis hepati-  
 cis, aqua agrimonie, cichorii, endivie, taraxaci, &c.

Vel

ʒj. *Antimonii diaphor.* ʒj.

*Bezoard. Jovial.* gr. xii.

Salis card. bened. ʒj.

*Laud. opiat.* gr. ii.

M. pro pulvere.

div. in 2. part. æqual.

D. S. ut ante.

**PURGANTIBUS** reliquis & **VOMITORIIS** omnibus  
 prætermisiss, nitrum antimoniatum, nitrum simpliciter de-  
 puratum, & quælibet nitrata, item *antihecticum Poterii*,  
 interno usu laudari assolent: item saturnina, v.g. saccha-  
 rum Saturni, crystalli mineræ saturni cum spiritu nitri, &  
 similia, quæ plus in recessu habent. **ZACUTUS LUSI-**  
**TANUS** l. 2. *Prax. Admir. obs.* 39. & 40. ceu expertum  
 commendat Cassiam fistulosam recenter conditam, item  
 colum, fructum quendam per grinum ex Guinea allatum.  
 Quibus omnibus Amara quævis, Hepatica dicta, associari  
 possunt. Pro **POTU ORDINARIO** inserviant Tempe-  
 rata, imprimis si Inflammatio pergere minetur ad abscessum:  
 qualia sunt *Jalapum ex Decocto radicis cichorii cum flori-*  
*bus papaveris erratici, cum nitro & saccharo*; sed oportet  
 dare calidum, & minimè confertim: vel detur *Decoctum*  
*hordei & radicis graminis cum radice cichorii, passulis, &*  
*tantillo liquoris, & syrupo violaceo aut capillorum Veneris.*  
 Circa finem tamen inflammationis addenda simul diuretica,  
 radix apii, petroselinii, agrimonie, & similes. Sub princi-  
 pio autem & incremento morbi operam demus, ut discuti-  
 tur Inflammatio, & præcaveatur Abscessus.

Cum his internis **EXTERNE** in Inflammatione hepa-  
 tis circa principium conveniunt *Linimenta & Epithemata*,  
 penetrantia, discutientia, & ardorem compescencia, calide  
 tamen applicanda: e.g.

ʒj. *Ung. dialeb.* ʒj.

*Ol. absinth.* ʒj.

*Destill. anethi* ʒj.

*Camph.* gr. ix.

M. D. S.

*Unguentum hepaticum leniens*

& resolvens.

*Spiritus vini blandè camphoratus*, cum aqua plantaginis  
 vel rosarum dilutus, vel solitarie cum linteo multiplicato  
 calide applicatus, à **YELERO** laudatur: Vel præscriba-  
 tur tale Epithema:

ʒj. *Aqua hyoscyam.*

*Plantag.*

*Nymph.* ana ʒj.

*Nitri depurat.* ʒj.

*Camph. in spiritu vini solut.* gr. xv.

M. f. Epithema,

applicandum cretius calide

D. S.

*Epithema hepaticum.*

ʒj. *Aqua flor. sambuc.*

*Chamomill.*

*Hyoscyami,*

*Plantag.* ana ʒj.

*Spiritus vini camphor.* ʒj.

*Nitri depurat.* ʒj.

F. Epithema.

pro inflammatione Hepatis applicandum;

S.

*Epithema refrigerans.*

Vel

ʒj. *Aqua hyoscyami,*

*Nymph.*

*Lil. alb.*

*Plantag.*

*Rosar. rub.* ana ʒj.

*Sacch. Saturni,*

*Camph. cum spiritu vini solut.* ana ʒj.

*Nitri depurat.* ʒj.

M. S. ut antea.

Et hoc tepidè admoveatur regioni hepatis cum linteis mult-  
 plicatis.

ʒj. *Aqua flor. sambuc.*

*Chamom.* ana ʒj.

*Spiritus vini camphor.* ʒj.

M. S.

*Epithema resolvens.*

Insuper ex aliorum consilio nitrum, cum aceto rosaceo,  
 & succo sempervivi majoris vel & Telephii (*fette Henne*,  
 Germanicè vocant) solutum, sub forma Epithematis exter-  
 nè tepidè regioni hepatis admoveeri potest: Vel imitemur  
**FORESTUM** lib. 19. *obs.* 12. & 19. qui mirè commendat in  
 Inflammatione hepatis, ad abscessum quoque tendente, dis-  
 cutienda hunc solum.

ʒj. *Flor. Chamomill.*

*Melilot.*

*Rosar. rub.* ana p. j.

*Sem. anisi,*

*Fenicul.*

*Lini* ana ʒj.

*Santal. rubr.* ʒj.

Coqu. in aqua simplicis:

Colaturæ adde

*Acet. vini* ʒj.

*Aqua endiv.* ʒj.

M. F. Epithema pro hepate: S.

*Epithema hepaticum.*

Tandem casum & curam singularem Inflammationis hepa-  
 tis ex nimia salacitate venerea videb. in **JOEL**, in sua *Præ-*  
*xi* lib. 5. *sect.* 4. *Artic.* 3. ubi de Hepatis Inflammatione, pag.  
 11. quo loco habet peculiare remedium, nempe lecora galli  
 „ nigri in aceto dissoluta & propinata, dum dicit: *Ubi In-*  
 „ *flammatio hepatis ex immoderata Venerea salacitate est*  
 „ *oborta, nisi tempestivè curatur, subsequitur hepatis cor-*  
 „ *ruptio & resolutio; quare statim post venæ sectionem,*  
 „ *(quæ an conveniat dubito?) sequens haustus est propinan-*  
 „ *das.*

ʒj. *Callum nigrum viventem per medium pectus*  
 dissectum:

Iecurque ejus adhuc calens in aceti rosacei ʒiv. con-  
 jicit, & minutissimè conterit, ut rota ejus substan-  
 tia in aceto resolvatur: tandem colat & tepidè  
 ægro propinat.

Deinde sequentis potionis quotidie haustusum tepidum sum-  
 mo mane offert:

ʒj. *Rad. Liquirit.*

*Cichor.* ana ʒj.

*Rhabarb.* ʒj.

*Flor. Cent. min.*

*Hepar.* ana Mʒ.

*Cort. inter samb.* M. j.

Contusa cum aqua ʒiij. in Mariæ Balneo coquantur per  
 2. horas:

Cujus liquoris colati quotidie accipit ʒiv., in quibus dis-  
 solvit

*Sperm. Ceti* ʒj.

F. Haustus.

Hæc est ejus Cura in Inflammatione hepatis à nimia salaci-  
 tate.

Quod si his administratis Inflammatio discuti nequeat, sed  
 nihilominus ad suppurationem tendere videatur; id quod do-  
 cet dolor, febris, aliaque symptomata ingravescencia, rigo-  
 res nullo ordine accedentes, quos calor exacerbatio sequi-  
 tur; confecto vero pure omnia illa mitescunt, vires tamen de-  
 biliores relinquuntur, pulsus frequens, languidus, & inter-  
 dum animi deliquium: tunc internè temperantibus *suppu-*  
*ratio est promovenda.* Propterea fiant cataplasmata ex emol-  
 lientibus & blandè discutientibus, cum addito croco & sum-  
 misatibus absinthii, pro hepatis tono mellis conservando, in  
 moderata licet quantitate. Pro usu interno:

ʒj. *Rad. China in taleol. incif.* ʒj.

Macerentur in Mariæ Balneo per noctem in aqua  
 simplici.

mane adde

*Rad.*



*Rad. liquoris. ʒij.*  
 Coqu. ad medias: huic infunde  
*Passul. conquassat. ʒij.*  
 Post refrigerationem colatorem  
 ʒij. adde  
*Syr. de scabios.*  
*Violar. ana ʒij. vel q. s.*  
 M. D. S.

*Potio hepatica.*

Suppurato abscessu, ejus apertio est promovenda; id quod, præter artificialem apertionem, ut plurimum sponte fieri, & diversimodè nunc per alvum, nunc per urinam, nunc per vomitum, nunc per purgum, expurgari solet. Rarum quidem est, quod per vomitum ex hepate fuerit excretum, de quo SCHNEIDERUS l. 4. Verùm inflammationem hepatis suppuratam, vomitu purulento solutam, videb. in M. A. N. C. Ann. 5. Observ. 74. pag. 121. Quod si ergo in parte cava fuerit Vomica, cum tussi, corporis qualicunque jactatione, aliisque similibus modis, ejusdem suppuratio est promovenda. Sin verò inflammatio sit in parte hepatis gibba, ac exteriora versus satis promineat tumor suppuratus, etiam extrinsecus per apertionem quatuor musculorum abdominis ejus regionis, mediante scalpello, abscessus seu vomica perforari, vel caustico potenciali aperiri, & ita pus evacuari potest; vid. HERCULES SAXONIA *Prælect. Præd. lib. 2. pag. 159.* SENNERTUS in *Praxi*, BARTHOLINUS *Cent. 2. Epist. p. 629.* HORSTIUS in *Problem. p. 29.* item AMATUS LUSITANUS *Cent. 7. Cur. 76. & 77.* SCHENCKIUS *lib. 3. Obs. Rupto seu aperto abscessu optimè convenit oxymel, vel simplex vel diureticum; ac alia quoque Diuretica, & imprimis blandæ alvum laxantia, quæ excretionem puris per urinas promovere; vid. SALMUTH Cent. 1. Observat. 27. & 28. Quod si itaque ad intestina rejicitur pus, idque imprimis, dum cavum hepatis suppuratum fuerit, mediantibus vasis choledochis, internè attemperantibus acrimonia puris est mitiganda, simulque hydromel plus minus medicatum exhibendum; Externè verò blandis clysteribus intestina abstergenda, & excretio promovenda. Quod si verò per renes evacuetur purulenta materia mediante sanguinis circulo, imprimis dum hepatis gibba pars inflammata sit, supradictum oxymel diureticum, item serum lactis plus minus medicatum, emulsionem seminis violarum, item decoctum radicis apii petroselinii, agrimonie, baccarum juniperi, &c. cum hydromelae factum, præsertim si juncta febris mitior fuerit, propinare convenit. Si regurgitatio ex intestinis vomitu rejicitur materia purulenta, promoveatur hic ipse attemperantibus pinguibus, jure pinguidiusculo, cerevisiâ butyratâ, oleo amygdalarum dulcium, &c. Quod si verò fiat, ut ab acrimonia puris in facta abscessu erodatur hepatis membrana, adeoque pus in cavum abdominis excidat, periculum est, ne contentæ corporis partes, præsertim membranosæ, & ipsæ erodantur, atque ad sphacelum plus minus disponantur. In tali casu Veteres ad incisionem abdominis accesserunt, ne scilicet aliquid intentatum relinquerent; de quo intelligendus *Aph. 45. sect. 7.* HIPPOCRATIS. Observatum tamen fuit, pus ita in cavum abdominis effusum per alvum evacuatum fuisse, etiam forsitan in quodam loco intestinorum substantiâ, & ita excreto pure. Aded semper in puris post ruptum abscessum evacuatione naturæ ductum Medicus sequatur, & educat, quò illa vergit. Sub tali puris evacuatione non tantum naturæ ductum Medicus sequatur, sed & simul ex abscessu relictum ulcus mundificet & consolidet. Quo pertinent imprimis Decocta vulneraria cum lignis, item decoctum radicis china vel sarsaparillæ; ista enim Decocta simul urinam promovere. Inter vulneraria ista Agrimonia, & omnia ex hac parata, sunt optima. Serum lactis, cui talia vulneraria incocta sint, pro absterfione & per urinas evacuatione est optimum: c. g.*

*24. Ras. ligni Juniper. ʒij.*  
*Sassaf. ʒij.*

Macerentur per noctem in ʒiv. aqua comm. macerata adde

*Herb. Veronic.*

*Heder. terrestr.*

*Alechimill. ana Mj.*

*C. C. raspat. ʒvj.*

Coqu. invicem ad casum tertie partis, vel medietatis:

Colatorem adde

*Syr. de symphyt. Fernel.*

*de Hyssopo ana q. s.*

M pro gratia saporis: S.

*Potio hepatica sanguinem mundificans.*

Quibus subinde simul addenda venit Terebinthina cruda in vitello ovi soluta; hæc enim mundificat & consolidat, & reliquias mali absumit: Item balsamum sulphuris terebinthinatum, vel solitariè, vel cum saccharo Saturni mistum, est elegans. Verùm ex abscessu & ulcere hepatis, nisi superficiale aut leve fuerit, rari sunt, qui evadere solent, omnibusque inflammationibus suppuratis male curatis supervenit Phthisis. Applicari aliàs possunt ea, quæ in mesenterii abscessibus & ulceribus adhibet MARTINI loco supra citato.

## A R T I C U L U S X I.

### D E

## I N F L A M M A T I O N E L I E N I S.

POST hepar interdum LIEN etiam INFLAMMATUR, utut rarissimè contingere soleat, cum pauca ejus prolesit observata, quorum exempla tamen videbitis in FORESTO *lib. 20. obs. 5. & 6.* atque LOSSIO *Cent. 3. obs. 45.*

### C A U S Æ.

Cause sunt eadem cum reliquarum partium Inflammationibus.

### D I A G N O S I S.

Quoad signa & pathemata concomitantia: ea sunt Calor, Ferror, ac teretis Tumor, & pondus gravans non nihil, seu dolor gravativus in profundo sinistri hypochondrii. Cum verò ren sinister sit elatior dextro, & ibidem proximè adiaceat spleni, ita ut inflammatio renum facile possit confundi cum inflammatione lienis, ob id cautè hæc ipsæ discernendæ sunt. Distinctio imprimis petenda est ex dolore insigniter pulsatorio, qui in liene est satis sensibilis propter arterias quas splen obtinet, copiosissimas, aded ut à quibusdam dicatur, quod appositâ manu regioni lienis pulsatio ferè sensibilis extrinsecus percipi possit, de quo tamen meritò dubitatur; cum è contrâ talis pulsatio pauca, vel nulla sit in renum inflammatione. Symptomata quoque in renis inflammatione magis posteriora affligunt; contrâ eadem in splene inflammato anteriora non nihil latera & superiora occupant. Insuper in renis inflammatione dolor est aded ingens. Febris in lienis inflammatione adest continua, sed non aded intensa; respiratio non nihil difficilis, propter diaphragma lienis vicinum & per consensum affectum, simul adest.

### P R O G N O S I S.

Quoad PROGNOSIN, Lienis Inflammato superveniens hæmorrhagia narium, imprimis naris sinistri, vel loquuntur Practici, aut fluxus alvi, aut hæmorrhoidalis, idque præsertim die critico, & præcedentibus conditionis signis, saluberrimum est; vid. FORESTUS *lib. 20. Obs. 6. in feb. 10.* vel urinæ profluvium, & tunc solvitur lienis inflammatio, vel quia discutitur, vel quia aliò transferitur. Quo facit sententia HIPPOCRATIS: *„Inflammationem hepatis in lienem conversi melius est, quàm si lienis ad hepar deferatur; vel suppuratur vel scirrhus sit.“*

### C U R A.

CURA est eadem quæ reliquarum partium internarum Inflammatarum, eademque remedia hic locum habent. Opera enim danda est, ut quantocyus discutatur ac sistatur inflammatio, ne male curata, quod aliàs facile fit in scirrhum ejus contumacissimum degeneret. Salvatella sectio, quam in lienis affectibus & præcipue ejus inflammatione, commendant, fundamento caret. Præter alia, imprimis remedia saturnina primariò convenire dicuntur in liene inflammato, qualia sunt saturni saccharum, crystalli mineræ Saturni, Saturnus diaphoreticus, ad imitationem Iovis diaphoretici paratus, ac similia internè cum reliquis diaphoreticis in aquâ appropriata propinata.

EXTERNE Emplastrum de cicuta, malaxatum cum paucis oleo



*oleo camphoræ* applicari solet. Equidem suadent nonnulli, ut eidem addatur saccharum saturni: aut melius Linimentis immisceatur cum oleo rosaceo & vitello ovorum. *Poppius* applicat *Theriacam*, aut ejus loco *Rob Sambuci*, cui *saccharum saturni* permiscuit, & sub forma spissi linimenti regioni splenis illinit; id quod pariter in renum inflammatione quoque locum habet.

Quod si verò inflammatio hæc in scirrhum degeneret, conveniunt unguenta, linimenta & emplastra incidentia & res solventia, qualia *supra Sect. 8. ubi de cura morborum bronchicorum*, annotata sunt: e. g.

*℞. Empl. de Meli.*

*Gummi sal ammon. in acet. quocunque subact. an. 3vj.*

Liquefactis adde

*Fulig. pulveris. 3℔.*

*M. & malax. cum oleo destillat. tartari.*

Inducatur super alutam in forma usitata.

*D. S.*

*Emplastrum resoluens.*

## ARTICULUS XII.

### DE

## RENUM INFLAMMATIONE ET EXULCERATIONE.

### CAUSÆ.

**I**NFLAMMANTUR etiam RENES ex hisdem causis internis, aliarum partium inflammationibus communibus, subinde acido vitioso, ex primis viis eo delapso.

Quoad EXTERNAS in specie occasionaliter subinde excitatur ex nimia corporis succussione, v. g. equitatione, dum corpus equitatione succussum, facile dat renum inflammationem. Interdum etiam supervenit calculo renum insigniori, qui aut nimis magnus distendendo ac comprimendo, aut minor, nimis dolorosus pungendo, atterendo, & ad spasmos irritando, inflammatio interdum supervenit: uti etiam ex nimio Veneris exercitio subinde renes ad inflammationem disponuntur. Excitant hanc quoque non raro læsiones externæ, ut lapsus, ictus & vulnus, in lumbis perpeffa, item diureticorum medicamentorum abusus. Quæ inflammatio renum in specie NEPHRITIS, sicuti inflammatio hepatis Hepatitis appellari solet.

### DIAGNOSIS.

Signa renum inflammatorum & symptomata concomitantia ordinaria sunt: *Mictio ardens*, dum urina exeundo plus minus fervere, & fervendo quasi adurere partes percipitur, adeoque etiam *stranguria* & mictio frequens, cum acerbis cruciatu, ita ut tales ægri crebrius quidem, sed & parcius mingant; urina inter tum suppressitur. Corporis flexio ferè est impossibilis, vel admodum graviter fieri potest, *dolens à retro*, & decubitus in dorso exacerbat dolores. *Urinæ* sunt paucæ & flammæ, interdum etiam aquosæ & claræ, sed quæ semper sine ullo impedimento in vesica exeunt. Dolor interdum est pulsans, si nempe ista renū pars superficialis inflammatur, in qua arteriæ sūt magis insertæ; obtusus, si centralis aut media quasi carnosæ renum substantia magis inflammata sit. Calor & dolor lumbaris gravativus, lancinans & tensivus, qui ob partium continuitatem & consensum non raro sursum dorsum æquè & versus costas nothas, ut ægri nec erigere se, nec commodè incedere possint, interdum deorsū ac ad inferiora, secundum ureterum ductum, ad vesicam, item coxendicem & femora usque extenditur. Combinatur huic febris vehemens, continua ac inordinata. Stupor cruris etiam de regione renis inflammati percipitur. Supervenit interdum per consensum vomitus biliosus, isque satis contumax. Interdum, licet raro, observante hoc HIPPOCRATE, uno rene inflammato alter, licet sanus & non inflammatus, cessat agere officium urinam secernendi, ut sæpius omnimoda fiat *Ischuria* seu *urinæ suppressio*: cujus rei causa & ratio videtur esse, quod ren etiam sanus ex consensu cum inflammato ratione suarum fibrarum aliquid convulsivi & quasi spasmodici patiatur, unde porulis contractis urinæ cesset transitus; vel videtur causa esse, quod sanguis nimis copiosus ac universum serum per emulgentes ad renem sanum promotum, nimis suâ copiam sibi ipsi quodammodo viam præcludat, quo minus suo transitu per renes separari queat.

Symptomatis his interdum alvi suppressio accedit, quod huic morbo peculiare FORESTUS lib. 14. obs. 30. ait, cum extremorum frigore.

Cæterum, ut ritè DISTINGVATUR CALCULVS à NEPHRITIDE seu renum Inflammatione, nec confundantur, præter signa Inflammationis renum diagnostica, ulterius consideranda sunt Signa distinctiva horum affectionum à se invicem; Unde observetur,

1. Quod nephritidi perpetuè sit juncta febris continua Synochus; calculo verò minime aut admodum raro adsit eadem.
2. Quod dolor in Inflammatione sit magis continuus, & pulsanti plus minus similis; in calculo verò sit magis interpolatus seu periodicus & gravatius.
3. Quod plerumque renes inflammati comitem habeant urinam ardentem, ejusque stillicidium seu mictionis difficultatem; contra verò res se habet, ubi renes calculo sunt obfessi, in quo affectu urina sæpius admodum libera fluere solet, & non semper Ischuria se offert, sed tunc demum, ubi calculus ipsis ureteribus firmiter fuerit impactus: vid. VNZERS & CHARLETON. Tr. de Calculo.

### PROGNOSIS.

Inflammatio renum periculosum est malum, & in non adeo robustis, imprimis macilentis, & viribus exhaustis, frequentius lethale, præsertim si febris acuta cum delirio adsit.

Urina alba, tenuis, ac purulenta absque febris ac cæterorum symptomatum remissione, & cum crurum ac femorum extenuatione, mortem portendit.

Hæmorrhoidum fluxus renum Inflammationi superveniens est salutaris.

Tandem, nisi Inflammatio renum discutatur, sed suppuretur, dat ulcera renum difficulter curabilia, & quæ interdum ad mictum cruentum disponunt, vel in phthisi renalem transeunt, de quibus inferius.

### CVRA.

Pro hujus CVRA ex eodem fundamento, quo de inflammationibus in genere dictum, remedia ferè sunt desumenda, & quæ sunt reliquarum inflammationum internarum. Cum omnibus inflammationibus quoad Externa secundum curam Anginæ procedendum, quod Interna verò secundum curam Pleuritidis. Ante omnia sanguinis stagnatio per Venæ sectionem revulsoriam ac derivatoriam solvenda, post clysteris emollientis injectione instituendâ. Pro revulsione fiat VENÆ SECTIO in brachio sub principium morbi, & si plethora adsit, in progressu verò pro aversione in talo seu mallole: vid. FORESTVS lib. 24. obs. 30. & 31. & RIVERRIUS Cent. 2. obs. 15. Forfan optimo cum successu hæmorrhoides per hirudines possent aperiri. Imò in iis, qui hæmorrhoidibus assueti, ac quibus tument, hæc omnino aperiri debent, cum si natura eas moveat, valde proficuum hoc observetur. Quo facto, vel pro circumstantiarum varietate, omisso, notandum, quod noceant PURGANTIA propriè dicta quæcunque, nisi pro spasmodicis dolorificis sistendis clysmata lactea cum terebinthina in vitello ovi soluta interdum commodè injici possunt; aut etiam quæ sunt ex parietaria, malva, summitatibus anethi, floribus sambuci, violarum, chamomillæ, semine lini: aut ex his parata Fomenta; item ex lacte ejusve sero cum nitro simpliciter vel antimoniato. Clysteribus quoque secundum RIVERRIUM Cent. 4. Observant. 7. addi potest aqua benedicta Rulandi ad ʒij. vel liij. Sin cruditates ventriculi combinentur, conveniunt Laxantia mitiora ex manna, tamarindo, syrupo rosarum solutivo, aut mercurio dulci, quem HARTMANNVS in affectibus nephriticis extollit. Nocent autem DIVERTICA in principio, ut potè quæ nimis urinæ fluxum promoveant, & inflammationem irritant; adeoque non nisi in declinatione morbi, ubi dolor remiserit, & materia cocta deprehenditur, pro reliquarum absterfione conducunt, & quidem temperatiora tantum, & quæ simul vim anodynam sanguinemque congruatim solvendi habent; vid. FORESTVS l. c. obs. 31. v. gr. ex fructibus alkekengi, quæ simul vim anodynam & sanguinem congruatim dissolvendi habent, althæa, liquiritia, terebinthina; item emulsiones seminum 4. frigidorum majorum, violarum, lapilli cancerorum &c., sicut & nitrum & nitrata locum habent.



24. *Aqua althæe.*

*Genista,*

*Hyperic. ana ʒj.*

*Acet. distill. ʒvj.*

*Spiritus sal. dulc. ʒʒ.*

*Tartari vitriolat. gr. xv.*

*Syr. thet. correct. ʒʒ.*

*M. S.*

*Mixtura renes refrigerans, coctionem sumit.*

*Dosis aliquot cochlearium.*

In ipso ergo morbo conveniunt Alterantia, quæ sint nitrata quæcunque, ut nitrum crystallatum, præsertim nitrum cum antimopio fixatum, item saccharum saturni: quibus adnumerandæ emulsiones seminum quatuor frigidorum, majorum cum semine papaveris, lactucæ, portulacæ, violarum, junctis simul seminibus cardui benedicti, cardui Martii, &c. ad Pleuritidem laudatis, cum aqua eqqiseti, florum nymphææ, portulacæ, sempervivi, lactucæ; item syrupo nymphææ, portulacæ, papaveris, & similibus. Aliis succus cancerorum fluvatilium seu astacorum recens expressus, qui blandum alcali in recessu habet, tam cum jusculo quàm decoctione nymphææ, prunorum, &c. exhibitus, tanquam singulare remedium meritis ab HARTMANNO in *Praxi Chymiatrica* commendatur; & non absurdum est, quia ad quasvis inflammationes canceri interne mirè conveniunt, quorum alcali macrum inflammationes potenter resolvere, & vi diuretica simul renibus speciatim convenire videtur; non secus ac ipsi lapilli cancerorum acidum sanguinis absorbendo conveniunt: decoctum florum papaveris erratici & acetosæ; item terreæ, & absorbentia, cum opiatas interdum miscenda & propinanda sunt.

Inter EXTERNA cum his internis sedandæ & discutendæ inflammationi regioni renum applicatur succus nymphææ, sempervivi majoris, succus plantaginis ac portulacæ cum succo cancerorum fluvatilium expresso addendo iidem Camphoram; oleum item camphoræ illitum, est nobile: quibus etiam interdum parum de opio pro sistendo dolore addi potest. In principio præ reliquis conveniunt camphora cum oleo amygdalarum dulcium, vel rosarum, vel violarum, vel septem florum Mynsichti soluta, quod crebrius illitum ad Inflammationem renum est egregium; in camphora enim maximum est sedatorium inflammationum, dicit LINDANVS: vel dissolutum hyoscyami expressum, aut oleum papaveris expressum, pro illinitione externa convenit: item ex succo nymphææ, sempervivi majoris & succo cancerorum fluvatilium, vel cum oleo rosarum, aut aliis oleis, vel cum unguentis mediante vitello ovi mutuo in mortario plumbeo mixtis fiat litus, externe egregius; cui urgentibus doloribus tantillum opii crudi addi potest: vel unguentum ex succo sempervivi majoris & succo cancerorum fluvatilium cum oleo rosaceo ad humiditatis phlegmaticæ evaporationem ebullitis, hinc in mortario plumbeo diuturnâ agitatione, ut ramenta saturni se insinuare possint, mistis, sit unguentum refrigerans, quod applicatum conducit, quia absorbet acidum inflammationem excitans. Huc spectat & unguentum renale Mynsichti. Denique unguentum ex alumine crudo pulverisato, & cum albumine ovi misto, frigide applicatum laudatur à LANGIO in *Fabrum cap. de Renum Inflammatione*.

His verò irritis, dum resolvi nequit Inflammatio, renum suppuratio expectanda, eaque debitis externis promovenda est; INTERNE per Temperata ex Decocto bardii, glycyrrhizæ, malvæ, parietariæ; EXTERNE verò cataplasmata ex mollientibus, in lacte coctis, applicanda. Vlcere rupto, mistus sit purulentus. Exinde non rarum est

## U L C U S R E N U M.

### C A U S Æ.

Vlceris renum frequentissima CAUSA est eorum abscessus & inflammatio, utut etiam calculi asperiores, renes atterentes, successivè eos ad ulcerationem disponant. Sicut etiam quodvis acre, vehiculo feri per renes transcolatum, eosdem erodere & hinc exulcerare potest: quod pertinet etiam pus aut sanies acris, ex aliis locis ad renes fluens. Eosdem lues Venerea quoque subinde exulcerat, teste HORSTIO lib. 4. obs. 43. sicut & gonorrhæam Veneream inconsultò suppressam renum insignis ardor, & hinc non rarò exulceratio, insequi solet.

## D I A G N O S I S.

Exulceratio renum præter dolorem in lumbis rodentem, plus minus simul gravantem, urina purulenta excretio ostendit. Hinc seß. 4. aphorism. 75. HIPPOCRATIS, Si quis sanguinem aut pus mejat, renum aut vesicæ exulceratio significatur. Sic aph. 76. Quibus cum urina crassa exigua carunculae in velu si pilis exeunt, ii à renibus excernuntur: quod et si GALENVS in Comm. se vidisse neget, ab alijs tamen observatum est.

CAVSAS ANTECEDENTES antecedentia ferè ostendunt. In specie si ulcus est ex Inflammatione, multum puris apparet in lotio, & cum mingitur, apparet album, sed cum steterit, deponitur pus: quod si bene est costum, & urina sanorum similis, suppurationem subesse indicat.

Si verò erosio est à calculo, mingitur urina alba instar lactis butyrati, statim subsidet, & planè alius est consistenzæ instar cinerum, quos etiam colore refert, & minore gravitate excernitur.

Præterea dolor morficans & rodens in lumbis sentitur, à sero acris & nitroso, quod in transitu irritat & rodit, unà cum caloris sensu.

## P R O G N O S I S.

Quoad PROGNOSIN: Vlceres renum sunt difficulter sanabilia, & satis periculosa, sæpius lethalia.

Quæ sunt ab inflammatione suppurata, minus sunt periculosa, faciliora curatu: quæ verò sunt à calculo in renibus, periculosa sunt, & non rarò in totius renis consumptionem degenerant.

Sic quæ ab erosione sunt ulcera, etiam periculosa iis, quæ ab Inflammatione.

Quò magis inveterata quoque fuerint, eò difficiliora curabilia existunt.

Alioquin ulcus renum lumbos perforasse, ibique in fistulam degenerasse, curioso exemplo potavit VVillis de Urin. pag. 364.

Dejectiones foetentes sunt bonæ; innunt enim ruptum abscessum, & evacuationem puris per inferiora.

## C V R A.

Quoad CVRAM: Mundificantia & hinc consolidantia utramque faciunt paginam, ubi priùs universo corpori ejusque contentis prospectum fuerit, partim EVACUANDO, partim temperando hæc ipsa, ne occasione horum magis exasperetur ulcus: in quem finem VOMITVS à pluribus laudatur: vid. RIVERIVS in *praxi* pag. 146. HORATIVVS AVGENIVS lib. 12. *Epistol.* pag. 693. VALERIO-LA lib. 6. *Observat.* pag. 453. Hinc mercurius dulcis pro mundificando renum & velicæ ulcere cum terebinthina in forma pilularum usurpatus, admodum laudatur ab HARTMANNO; Pilulas in ulceribus & vulneribus renum proficuas videb. in BARBETTE *Chirurg.* Part. 2. cap. 7. lib. 3. pag. 336. & Pilulas Quercetani, quæ in Dysuria occurrunt. Lacterebinthinatum PLATERI in *Obs.* lib. 3. pag. 304. usque ad 850. ex terebinthina cum vitello ovi agitata bene, & in quovis liquore appropriato soluta: Vel

24. *Resin. abiet. vel laric. ʒʒ.*

*Vitell. ovi No. 1.*

*Mell. (quod abstergit) ʒʒ.*

*c. l. q. Aqua flor. Fabar. f. Potio lactea. D. S.*

*Lac renes purgans.*

Hinc serum lassis vel hydromel copiosè potum, item decoctum herbae Syriacis fragariæ, sed imprimis hypericon, proficuum est ad ulcera renum; unde ex semine hyperici Eleſtuarium ad ulcera renum TIMÆVS von Gulden-Klee in *Casib.* pag. 422. DOERINGIVS in *Tr. de Stridat.* decoctum radicis petroselinii commendat: quod etiam pertinet decoctum chærefolii & decoctum cicerum rubrorum pro purificatione ulcerum, quod SEBIZIVS in *Tr. de Facult. Medicam.* laudat. Præmissis mundificantibus pro consolidatione Decoctum lignorum cum agrimonia, hyperico, chærefolio: Decoctum agrimoniz cum hyperico in vino, quod POTERIVS etiam, uti & D. MICHAELIS in *Colleg. Ionſoniano* singulariter commendant; & decoctum hederæ terrestris cum Chærefolio in vino, vel chærefolii in vino vel cerevisia, &c. sunt optima. Quod etiam pertinet Eleſtuarium Hartmanni ex conserva rosarum & malvæ cum semine hyperici: Vel

24. *Herb.*



24. *Herb. Agrimon.*  
*Flor. hyperic. ana M. j.*  
*Lign. lentisc. ʒij.*  
*Rad. Consol. maj. ʒʒ.*  
*Sem. hyper. ʒij.*

*Incisa & contusa dentur pro Decocto: S.*

*Species ad decoctum.*

*Pertinet huc decoctum ad ulcera renum Quercetani, vel illud, quod dedi in Colleg. Formular. pag. .... Vel*

24. *Rad. China ʒj.*

*Liquirit. ras. ʒʒ.*

*It. Agrimon.*

*Cheerfol.*

*Heder. terrestr. ana M. j.*

*Flor. Hyperic. M. ʒ.*

*Ras. cornu Cervi ʒj.*

*Coq. in f. q. aqua simpl.*

*Colat. ʒij. adde*

*Syr. de symphyt. Fernel. ʒij.*

*Essent. vulner. Mich. ʒj.*

*M. D. S.*

*Potiores sanans, pro aliquot vicibus.*

*Terebinthina Cypria* optimum est auxilium, detergit renes, & per inferiora derivat. Dosis à ʒij. ad ʒʒ. In specie convenit, si ex abscessu exulceratio fuerit orta: quod etiam præstat balsamus de Capaibe à gtt. x. ad xv. Ut consolidantia eo melius operari possint, inter hæc eminent remedia ex cancris fluxatilibus, sive succus, sive eorum in plenilunio exsiccatorem pulvis.

24. *Cancr. fluxiat.*

Plenilunio ponantur in vase terreo non vitreato ad eos furni, ut exsiccentur paulatim, ne cremantur: postea contundantur in mortario lapideo.

Renum & vesicæ ulcera egregie curant; quibus dicta quædam Vulneraria appropriata, in specie ex iis simplicibus, quæ suo loco infra ad medium cruentum laudabuntur, superaddenda sunt.

Nullum efficacius autem remedium ad renes exulceratos dari, quam *trochiscos de Alkekengi*, videb. in AUGENIO lib. 12. Epist. pag. 693. *Syrupum magistrale* in ulcere renum, expertum videb. in HILDANO Cent. 6. Obs. 44. Denique *acidularum* usus non penitus contemnendus in ulcere renum de quibus vid. HILDANUS citato loco, item HEER Obs. 1. Nempe mundificando optime conveniunt, tum consolidando. *Decocta vulneraria*, item *electuaria ex absorbentibus cum bolo Armena*, terra sigillata, lapillis cancrorum, cornu Cervi usto, & similibus, imprimis conducunt.

Observetur tandem, quod interdum renes magis in parte extrema dorsum versus, suppurentur, & apostema musculorum dorsum circa spinam simul cum tumore doloreve occupet: in quo casu ab extra facta abscessus apertio est optima, ut extrinsecus in lumbis eorum pus queat evocari; de quo vid. HORSTIUS in Obs. pag. 260. lib. 4.

## ARTICULUS XIII.

### DE

## INFLAMMATIONE VESICÆ URINARIÆ.

### CAUSÆ.

**I**NFLAMMATUR etiam vesica urinaria, sed ex CAUSA INTERNA rarissime, nisi calculus huc referendus; vid. FORESTUS l. 25. obs. 27. in schol. frequentius vero occasione EXTERNA, scilicet in specie à contusione, aut illa violento in regione pubis & perinæi accepto; vid. Bonneti Sepulchret. pag. 1232. & FORESTUS Obs. 27. frequentiori equitatione. Denique supervenit eadem etiam interdum sectioni calculi ineptæ, vel in operatione, vel post operationem, si nimirum hoc sectio non recte tractetur vesica, ejus corpus, quacunque etiam ex causa, laceratur, aut alio modo læditur: sicut & Inflammatio Vesicæ accelerari solet, si ægri post sectionem frigida potent, tunc enim subinde ad summum die quarto, interdum citius, supervenit ejus Inflammatio, quæ tunc temporis aut in gangrenam lethalem, cui intra biduum mors supervenit, aut si malum est minus, in pessimum ulcus fistulosum degenerat. Hoc unicum periculum ex lithotomia imminet, alias ferè nullum; quod si præcaveatur, operatio est securissima. Præ-

terea Cantharides quoque tam externo quam interno usu inepto, acrimoniam suam rodendo, Vesicæ Inflammationi non nunquam occasionem præbent, quod observatum ex vesicatorio ex cantharidibus extra appolito, conf. Miste. A. N. C. Ann. 2. Obs. 103. p. 178.

## D I A G N O S I S.

Ceterum pathemata, quæ ordinariò Inflammationem Vesicæ, comitantur, sunt *Tensio*, *Durities*, *Ardor*, *Tumor*, ac *Dolor* in regione pubis & vesicæ; & quidem admodum is est sensibilis, ac levissimotactu exasperatur; cui accedit urinæ in vesica suppressio seu urinam reddendi impotentia, & in specie, si Inflammata est Vesica in loco infimo propè collum: item supervenit propter connexionem cum ano *tenesmus*, interdum alvi suppressio; adest simul febris acuta, plus tamen aut minus, prout major vel minor fuerit Inflammatio, & vel partem membranosam, vel simul circa collum carnosam, affecerit: quibus interdum vigilæ & deliria superveniunt; unde rarum est, quod observavit HILDANUS Cent. 3. Obs. 68. abscessum vesicæ ex casu ab alto, sine febre & sine dolore.

## P R O G N O S I S.

Utut rara sit Vesicæ Inflammatio, quoniam minora admodum & exilia vasa habet; eadem tamen vera & perfecta juxta FORESTUM gravissimus & periculosissimus est morbus, quia ut plurimum lethalis, ex facili superveniente gangræna; In partibus nempe nerveis facilis gangræna producit, adeo ut ex omnibus vesicæ affectibus nullus sit deterior Inflammatione; Intereunt enim ægri quarto aut ad summum septimodie; interdum, si symptomata mitiora, evadunt, sed rariùs, cum metastasi materiæ morbificæ circa hypogastrium & perinæum, per erysipelas aut urinæ fluxum copiosorem, de quo SENNERTUS Prax. lib. 4. Part. 8. sect. 2. cap. 4.

Inflammatio & abscessus, quæ fiunt circa collum Vesicæ, ubi sunt fibræ musculosæ, interdum suppurantur, & in pus mutantur, succeditque exinde ulcus vesicæ, curatu difficilimum.

Mutatam verò jam esse Inflammationem in abscessum, innuit imprimis doloris, febris & ardoris, remissio, HIPPOCRATE asserente.

Facto postmodum abscessu, si ulcus rumpatur intra vesicam, pus cum urina effluit; si verò ad exteriora tendat in cavum abdominis aut perinæum, supervenit abscessus in inguinibus, ibique sibi viam parat.

## C U R A.

Remedia eadem ferè conveniunt, quæ in pleuritide & inflammatione renum sunt utilia: & in specie, cum urinæ aut alvi suppressio malum sepiùs exasperent, ob id, quantum possibile, removeantur. Hinc optimum est *Ulyster anodynus* ea solo lacte, aut ex lacte, in quo nitrum depuratum dissolutum est, injectus, quibus etiam terebinthina addi potest. Internè a PURGANTIBUS & DIURETICIS omninò abstinendum; saltem juxta sudorifera *Decoctum bordei cum nitro depurato* aut antimoniato, cui interdum aliquid sacchari saturni addi potest, est optimum. Aliis profunt emulsionibus seminis portulacæ, lactucæ, papaveris albi, quatuor frigidorum majorum, & inflammationi renum dicatæ emulsionibus, quibus semper nitrum aut saccharum saturni addendum; hoc enim & omnia saturnina internarum Inflammationum sunt optima remedia. Spiritus nitri dulcis etiam hic non negligendus. Denique spiritus vitrioli Philosophicus (qui reverà est spiritus salis rectificatus) dulcificatus interdum assumptus ad compescendam febrem conjunctam est optimus.

Externè quoque conveniunt imprimis Balnea seu Insesus; Item Fomenta humida ex aqua tepida cui incocta sunt radix & folia malvæ, althææ, parietariæ, folia salicis, capita papaverina, & similes herbæ diaphoreticæ seu carminantes, cum linreis multiplicatis, sed blandè, apposta. Hinc post Insesum vel solum blandissimè inungatur pecten cum oleo anethino, chamæmelino, papaveris albi, rosarum aut nymphææ, & similibus, in quibus aliquid camphoræ dissolutum sit, ut ibi discutiat Inflammatio; vel etiam succus cancrorum fluxatiliū expressus cum oleo rosarum & nymphææ in mortario plumbeo ductus, addendo saccharum Sa-

tural,



turni, vel oleum ejus per deliquium, extra applicari potest, & in asperitate doloris additur simul oleum papaveris, aut hyoscyami expressum.

Denique cum interdum metus sit supervenientis gangrenæ in inflammatione vesicæ, hæc ut præcaveatur aut inhibeatur, imitemur consilium RIVERII in Praxi, jubentis, ut admoveantur cataplasmata roborantia ad gangrenam alijs usitata (de quibus in Chirurgia), v.g. ex radice scorzonera, ex farina fabarum & lupinorum in vino decoctis, addendo simul aloen, myrrham, & postmodum camphoram, aut spiritum vini camphoratum, pro meliori penetrantia.

Hiscæ modis, si possibile, detor opera, ut disentiatur inflammatio; sin minus, suppuratio & hinc abscessus & vlcus expectanda: Illam promovemus Emollientibus & Temperantibus, sopius hæcenus recensitis.

Quidam Vesicæ Inflammatae liquores refrigerantes, inepto satis consilio, inicere jubent, cum tamen syringa non applicari, nec liquor injici, aut si injiciatur, commode relict non possit: vid. HERCULESSAXONIA loc. allegato. Quoad

## U L C U S V E S I C E

PRæter inflammationem suppuratâ etiam calculi acutiores vesicam ledentes item cantharides interius propinate, interdum vel externè admotæ, item acris acida sub vehiculo urinæ ad vesicam delata, vesicam nunc ad scabiem, nunc excoarationem & exulcerationem, disponunt: vid. Miscell. A. N. C. Ann. 3. Obs. 88. pag. 148.

## D I A G N O S I S.

Comitatur ulceratam vesicam urinæ purulentæ excretio, ita quidem, ut si vesica incipiat exulcerari, primò sanguis exit; si sit perfecta, pus; si magis adhuc, squamæ & ramenta, quæ Græcis *ipaxidi*; si gravis & consummata est exulceratio, gravis fætor in urina est. Dolor adest gravis in pectine & pube: quoties ægri mingunt, urinæ difficultas accedit; sæpe & tenesmus, & membri virilis erectio.

Nec autem confundatur exulceratio vesicæ cum meatu urinarii exulceratione, observandum: Si pus & sanies præcedant urinam, aut statim in primo exitu appareant, aut etiam sine urina effluant, in pene vitium est: si verò talia cum urina permixta sint, in vesica malum est. Propterea in pene vitium est, inter mehendum dolor percipitur, quod in vesicæ ulceribus non accidit, nisi juxta ejus collum vlcus consiliet.

## P R O G N O S I S.

Sunt autem omnia vesicæ vlcera difficillimè curabilia, ut plurimum incurabilia; periculosiora quæ ex erosione; gravissima, quæ à magno calculo, quæ sine extracto calculo curari nequeunt.

## C U R A.

In CURA præmissis internis universalibus convenient

1. Acrimoniam humorum temperantia propter Urinam imprimis, exulcerationem subinde exasperantem.

2. Vlcus sine morfu abstergentia seu mundificantia, ob fermentum ulceris acidum & hinc pus: vid. Artic. 12. ubi de Renum exulcerationum Cura.

3. Consolidantia, ob resolutionem partis exesæ.

4. Anodyna, propter dolorem imprimis urgentem.

Talia tam internè quàm externè adhiberi solent. Et quidem acry temperant lac, althea, liquiritia, passula, violæ, violaria, semina quatuor frigida maiora: hinc decoctum chamæpitryos in lacte mirè laudatur à quibusdam crebrius usurpatum: sic experit Potio THONERI, in Obs. pag. 196. quæ, ut ipse ait, quasi miraculosum effectum præstitit, & exulcerationem cum urina cruenta sustulit:

℞. Herb. Agrimon.

Plantag.

Equiset. ana Mj.

Rad. Liquirit. mund. ℞j.

Decoquantur in

Aqua Plantag.

Beron. ana q. s. ad consumptionem tertiar partis.

℞. Simul. Oper. Tom. II.

In colatura ℞. dissolve

Mell. rosar. ℞j.

Misceatur.

Simul æger singulis horis per Syringam portionem in vesicam inject.

Mundificant Terebinthina, decocta vulneraria cum melle, balsamus sulphuris terebinthinatus & succinatus, oleum terebinthinæ, mercurius dulcis, trochisci de alkekengi, de carabe, trochisci Gordonii, &c. quæ specificè laudantur.

Consolidant decocta lignorum cum vulnerariis, uti agrimoniam, hypericum, plantago, hederæ terrestres, &c. quibus addantur corallia, lapilli cancrorum, terra sigillata, bolus Armena, succinum, tinctura sulphuris vitrioli, tinctura antiphthisica, &c.

Dolorem leniunt opiata, papaverina, lacticia, in specie, si à cantharidibus fuerit causum, &c. De lacte ait AETIUS, nescio an post ullum aliud remedium secundo saltem loco id sit habendum? nam & asperitatem lenit, & exulcerationes exiit: cui etiam serum substitui potest.

Ex his variè possunt fieri formulæ:

℞. Rad. Liquirit. ℞j.

Aith. ℞j.

Saxifrag. ℞ij.

Herb. Agrimon.

Plantag.

Portulac.

Heder. terr. ana Mj.

Flor. Malv. arbor.

Nymph.

Violar. ana M. ℞.

Sem. aith.

Papav. alb.

Portulac. ana ℞ij.

Fruct. alkekeng. No. vj.

Sem. ciccr. rub. ℞ij.

Hord. mund. M. ℞.

Coqu. in s. q. aquæ simplicis:

Colat. ℞ij. adde

Syr. violar. sol.

Agrimon. ex succo,

Capill. veneris,

Mell. rosar. ana ℞j.

M. D. S.

Potio temperans.

De quo bis vel ter quotidie bonum haustum æger capiat.

Terebinthinata imprimis conducunt, in specie PLATE-

RO usitata fuit sequens Mistura terebinthinata:

℞. Terebinth. ℞j.

Mellis ℞j.

Vitell. ovi. No. j.

Vini Malvat. ℞iv.

Diluta servanda ad usum.

Dosis ℞j. vel

℞. Terebinth. ℞j.

Vitell. ovi No. j.

Mellis ℞j.

Agitentur in Mortario, donec albescant:

addo

Vini albi,

Aqua parietar.

Flor. s. bar. ana ℞ij.

Syr. limon. ℞j.

M. D. S.

Mistura mundificantis.

Imosolum lac, cui terebinthina cum vitello ovi soluta, cum paucis saccharo permixta, sufficit pro leniendi scilicet & temperandi scopo.

Nec acidula ad vlcera vesicæ mundificanda reicienda sunt: vid. RIVERIUS lib. 14. c. 1. SCHOLZIUS Confess. & 161. & TULPIUS lib. 2. Observat. 33. ubi refertur vlcus vesicæ desperatum, per fontem Spadani usum curatum.

Sic præterea Indicatione:

℞. Rasur. lign. sancti ℞ij.

Rad. Sarsaparill.

Liquirit.

Eryng. ana ℞j.

Herb. agrimon.

Veronic.

Heder. terr. ana M. ℞.

Flor. rosar.

℞. i.

℞. i.



*Molar. ana p. liij.*  
*Rassul. maj. ℥ij.*  
*Coqu. in s. q. aquæ ad ℥ij.*  
*Colatura capiatur epebritis;*  
*D. S.*  
*Potio resolvens.*

Nobilis est observatio THONERI lib. 3. de Morb. ves.  
 obs. 3. pag. 176. ubi refert exulcerationem ingentem vesicæ  
 cum urina retenta, & intensissimis doloribus, post calculi  
 perfectionem extraxionem, aliis omnibus frustra adhibitis,  
 potu quodam ex radice liquiritiæ curatam;

℥. Rad. liquirit. ras. ℥j.

Rassul. min. M. j.

Jussib.

Sebest. ana M. j.

Rad. china ℥ij.

Incisa & contusa dentur.

℥. De his M. j.

Hord. M. j.

Coquantur in Mens. aqua, &c.

Hinc

℥. Herb. Agrimon.

Equiset.

Plant. ana M. j.

Rad. liquirit. mund. ℥ij. vel ℥j.

Decoxit in aqua Plantag. & Beton. ana q. s. vel sola

aqua ferrariorum ad consumptionem tertie pastille

In colatura ℥ij. dissolvit.

Mell. ros. ℥j. ad ℥ij.

Misc.

Et eger singulis horis portionem per Syringam instillet.

Interdum etiam sannaiculam & Alchimillam addidit. Ad-  
 di etiam potest Essentia myrrhe cum spiritu vini cartarilato  
 parata, vel scilicet aloes ℥ij. ad ℥ij. Vid. Colleg. Formul. pag.  
 & Idea Formulæ class. 4. §. 29.

Inter externa injicienda sunt varia; vel per catheterem,  
 vel per Syringam: quod pertinent clysmata terebinthinata,  
 supra Sect. 9. cap. 3. Artic. 1. ubi de Dysenteria, prescripta.  
 Sumatur etiam lac recens, serum lactis, mulsum, succus  
 equiseti, vel plantaginis, aqua ferrata, in qua radix sym-  
 phyti modice bullierit. Convenit aqua calidis virga cum Sief-  
 albo Rhasis secundum BARBETTE in Chirurgia, vel Inje-  
 ctiones PLATERO abstergere usitate sunt:

℥. Rad. liquirit. ℥ij.

Cicer. rubr. p. i.

Cort. fabar. ℥j.

Fol. plantag. M. j.

F. Decoctum in aqua:

Adde parum lixivii.

In decocti hujus ℥ij. dissolvit

Terebinth. in melle dissol. ℥ij.

Misc.

In graviore malo potest addi unguentum Egyptiacum.

Tandem fieri potest injectio consolidativa:

℥. Herb. Equiset.

Plantag.

Summ. Hyperic. ana M. j.

Rad. bistort.

Consol. maj.

Lil. alb. ana ℥j.

Cort. Granat. ℥ij.

Coqu. in aqua ferrar. ℥ij.

In Colat. dissolve

Trech. alb. Rhaf. s. opio ℥ij.

Bol. Armen. ℥j.

Misc. S.

Inpersio sanans

℥. Herb. Equiset.

Plantag.

Summ. Hyperic. ana M. j.

Rad. bistort.

Cort. Granat. ℥ij.

Coqu. in aqua chalybeata:

Colat. ℥ij.

Adde

Terebinth. latic. cum vitell. ovi sol.

Mell. crudi per transcol. dopur. metodo.

Zuvelss. ana ℥j.

M. F. Injectio:

D. S. ut antè.

Quæ per Syringam in vesicam instilatur.

Huc pertinent Injections & clysmata terebinthinata,  
 proposita in Colleg. Formulæ. pag. ...

Vel.

℥. Herb. Alchimill.

Summ. Hyperic. ana M. j.

Coq. in liq. aqua calidis virga:

Colat. ℥x. adde

Syr. de Symp. Ferack. ℥j.

Ess. Pulverar. ℥ij. ad ℥ij.

M. pro Iniectione. S.

Iniectio mundificans.

Sic ad ulcus in collo vesicæ, & inde sanguinis per penem  
 egressum, præter interna convenit injectio:

℥. Vitrioli Roman. ℥ij.

Aqua comm. ℥ij.

f. Decoctio.

VID. FORESTUS lib. 26. Obs. 3. schol. in fine.

Nec Theriacum usus ad exulcerationes vesicæ & renum  
 negligendus: vid. Consil. SCHOLZII pag. 383. Sed de ve-  
 sicæ exulceratione curanda vid. in specie HORSTIUS  
 Observat. 478. & hinc PLATERUS in Observationi-  
 bus.

## ARTICULUS XIV.

### DE

## INFLAMMATIONE MEMBRANARUM CEREBRI.

seu

### PHRENITIDE.

**P**orro inflammantur interdum quoque partes superiori-  
 ventris, membrana nempe cerebri, & forsan, ut ra-  
 rius, ipsum cerebrum: vid. FONTANUS Anat. c. 1.  
 FORESTUS lib. 10. Obs. 11. in schol. RHODIUS Cent. 1.  
 obs. 39. & WILLISIUS de Anim. Brut. lib. 2. cap. 10. Nam  
 cerebrum ipsum si inflammari contingat, brevi ad corrup-  
 tionem & hipemortificationem tendit, adeoque à MON-  
 TANO multisque aliis dubitatur, an cerebrum vel inflam-  
 mari possit? vel si contingat, an sub curam Medicorum  
 De ejus tamen membranæ, imprimis matre tenui, res ex-  
 tra dubium est quoad inflammationis possibilitatem, cum  
 copiosis respersæ sint arteriis, quibus respondent venulæ in  
 sinus terminatæ, simulque perquam sensiles sint, in qua-  
 rum vasibus si contingat sanguinis motum & circulum impedi-  
 ri, sequitur Inflammatio: quæ membranarum cerebri vel  
 solitaria, vel cum parte quadam cerebri sociata Inflammatio,  
 modernis vocatur PHRENESIS sive PHRENITIS,  
 sed perperam, & perverso vocabulorum usu. HIPPO-  
 CRATI enim & Græcis Anterioribus diaphragma vocatur  
 enim, quod ad intelligendam in lectione Veterum aspi-  
 cimus probe notandum; unde Phrenitis proprio ac genuino sen-  
 su est Inflammatio diaphragmatis, quam ordinario inle-  
 quitur Delirium. Dicitur autem enim diaphragma, vel  
 quia antiquis mentis sedes fuit reputatum, vel quod in dia-  
 phragmate affecto & inflammato mens perturbetur: quæ  
 veterum opinionem, quod obiter moneo, renovavit BAR-  
 THOLINUS in Examine Paradox. Med. qui statuit in-  
 centro diaphragmatis nerveo sedem esse fundamentalem  
 animæ. Cum igitur Interpretes mentem HIPPOCRA-  
 TIS non intellexerint, Phrenitidem interpretati sunt per  
 delirium graevius, febribus ardentibus superveniens, idque  
 ob ignorantiam styli Hippocratici: Adedque Phrenitis pro-  
 prio & genuino sensu est diaphragmatis inflammatio, apud  
 veteres Græcos satis frequens, cum & ejus in scriptis Hip-  
 pocraticis crebra fiat mentio. Nam hoc observetur, quod  
 omnia vocabula Græcorum Medica in 74 terminantia  
 tempe significent inflammationem ejus partis, cujus acce-  
 perunt denominationem, ut apparet in vocabulis Nephritis,  
 Hepatitis, Pleuritis, & sic per consequens Phrenitis. An-  
 tiqui e contra Inflammationem membranarum cerebri, aut  
 ipsius cerebri vocarunt sphacelum seu sphacelismum, uti  
 patet ex apborismo HIPPOCRATIS 50. sect. 7. ita sonan-  
 te: Quibus cerebrum fiderationem, intra tres dies inter-  
 cunct si vero hos superaverint, sanis sunt; Ubi per fideratio-  
 nem seu sphacelum cerebrum inflammationem intelligitur.  
 Hinc male interpretes explicarunt fiderationem cerebri,  
 cum potius explicandum sit: quibus cerebrum inflam-



## D I A G N O S I S.

*inflammatum est.* Tanta confusio vocabulorum ab HIPPOCRATIS tempore orta fuit. Partium igitur mortificationem totalem HIPPOCRATES & Veteres vocarunt *Necrosin*, quæ hodie abusive *sphacelus* dicitur: adeoque *sphacelus* secundum HIPPOCRATEM & Veteres proprio & genuino sensu est Inflammatio membranarum cerebri; *necrosis* verò antiquis *mortificatio partis*, quatenus scilicet pars omnino erat extincta; serpens verò adhuc extinctio, dum est in fieri, *Gangrena* vocabatur, quod vocabulum adhuc in tali sensu in usu habemus. Proprie ergo *sphacelus* in genuino & proprio sensu est membranarum cerebri Inflammatio, ut ut idem adhuc significet *necrosin* seu mortificationem, via ad quam est gangrena; Phrenitis verò proprie est inflammatio diaphragmatis, sicut *sphacelus* est inflammatio cerebri & membranarum ejus: Conf. SENNERTUS *Pr. lib. 1. Part. 1. cap. 23. pag. 203. & 205.* Sed cum verba valeant ut nummi, recepto usu *Phrenitis*, Modernorum vocabulo, veterum *sphacelus*, id est Inflammationem cerebri, ejusque membranarum, & inde natam febrem acutam plus minuscōtinuam, peracutumque ac gravissimum delirium, intelligamus.

In Phrenitide ergo modernorum seu ista Inflammatione cerebri membranarum, calor, rubor, dolor & pulsus, tanquam necessaria & quasi pathognomonica omnis Inflammationis signa, sunt obvia. Dolor ratione partis affectæ, ex Inflammatione & impedito sanguinis motu, est intensissimus, quoniam inflammate meningis intensè dolent, cum certum sit, nullam corporis partem sensiliorem esse, quàm ejus membranas, & quidem dolor acerbissimus, & horridus lacerativus percipi solet. Hinc videmus veros *phreneticos* (ut plurimum enim confunditur *phrenitis* cum delirio in febribus ardentibus superveniente) *avellere capillos* præ nimio dolore, & immenso quasi furore *caput immaniter concutere*: propter quem etiam acerbissimum dolorem malum adeo est acutum, ut tertio die sit lethale; quoniam propter dolorem istum sensibilibus spiritus animales nimis dissipantur, & faciliè istarum partium Inflammationem sequitur *gangrena*, & inde *necrosis*. Præterea hi ægri propter spiritus animales impetuose & inordinate motos mox *delirant*, adeo ut quæ sit de circumstantiis caloris vel doloris v.g. eas sufficienter expromere nequeant Unde talibus insigniter delirantibus tandem gravissima symptomata, in specie *convulsiones*, superveniunt, idque tunc præcipue, quando jam gangrena imminet. Præterea *pulsatio in capite* adeo est vehementissima, de quo in primo principio conqueruntur ægri, propter arteriarum in cerebro motum impeditum; & quanta talis pulsatio & inde *dolor capitis pulsatorius* sit, exinde potest colligi, si attentè aspiciatur collum; apparebit enim tunc, quod vehementissimè pulset arteria *carotis*, idque propter impeditum legitimum sanguinis transitum in suis extremitatibus. Ex quo colligi potest, quantum impetum & quantam pulsationem sanguis affluens & in cerebro vel loco inflammationis subteranio stagnans, inferre valeat.

Moderni ergo usu *Phrenitis* erit *delirium intensissimum ex membranarum cerebri Inflammatione ortum*, febre ardente & peracuta coniunctum; & hoc, ut dixi, erit Veterum *sphacelismus* seu *sphacelus* cerebri, ut ut jam adhuc majori abusu ferè quodcunque *delirium grave*, febre ardenti aut malignæ superveniens, similiter vocari soleat Phrenitis.

Patet ex his, veram seu Veterum *phrenitidem* rarissimum esse affectum, & quæ ferè intra biduum vel triduum insequitur mors.

## C A U S Æ.

**CAUSÆ Phrenitidis INTERNÆ** sunt ræ, nisi forsitan præcedens sanguinis quædam excretio suppressa, aut alius inflammationis metastasis, occasione *vera phrenitidi* seu *sphacelo* subministrat. Sic enim in puerpera propter suppressam nonnihil lochia, phrenitidem observavit HORSTIUS *lib. 2. obs. 25. & 26.* ut etiam idem observavit phrenitidem ex suppressione hæmorrhoidum, *cit. loc. obs. 26.* Fit etiam interdum, ut Peripneumonix seu pleuritides non raro per metastasin materiam abeant in *phrenitidem veram*, tunc temporis ut plurimum lethalem. Exemplum subministrat Schenckius *lib. 1. obs. pag. 61.* Et quidem curam phrenitidis superveniens pleuritidi elegantem describit BARTHOLETUS in suo libro de *Respiratione lesa*. Inflammatio cerebri per abscessum soluta *veram phrenitidem* representans, videri potest in LOSSIO *Obs. p. 18.* à vermibus verò PARACEL. *SUS l. 2. §. 2.*

Ex his **SIGNA phrenitidis** per se patent. Nempè phrenitidem imminere, concluditur ex vigiliis pertinacibus, somniis turbulentis, sermone immodico, mutatione morum, urinâ primò crassa, mox tenui, imò diaphanâ, capite tactu calidiore, oculorum torvitate, item dolore capitis intenso, præprimis circa occiput, & arteriarum colli atque capitis pulsatione nimia.

*Delirium verò simplex à phrenitide in hoc distinguitur*: quod illud sit levius cum intervallis; hæc vehementior & ferè continua cum intensis doloribus capitis, quorum ratione hoc sæpius fricant; respiratione difficili, febre continua & siti nulla, quamvis hujus causæ ad sint. Si inflammatio quædam subit, in gangrenam degenerans, ferocia remittit, oculis clausis prostrati decumbunt, & lethargici evadunt ægri.

## P R O G N O S I S.

Quoad **PROGNOSIN**: *Vera phrenitis* seu Inflammatio cerebri ejusque membranarum ut plurimum affectus est peracutus, ut plurimum lethalis, juxta HIPPOCRATEM *lib. 7. aphor. 50. & lib. 2. epidem. sect. 3. Aegrot. 4. pag. 733.* & tertio vel quarto die ad summum septimo uniens, ita ut brevi post superveniat necrosis perfecta, ægrique convulsi intereant. Nam & PROSPER ALPINUS *lib. 1. de Med. Egypt. cap. 12.* refert: vidisse se in Ægypto phrenitides planè lethales, ita ut tertio vel quarto die jugulaverint ægros.

Aliàs in Inflammationis cerebri incremento dejectiones alvi albicantes, & urinx crudæ albidæ & pallidæ existentes, pessimæ sunt; ut plurimum enim ægri intereunt, teste HIPPOCRATE *sect. 4. aphor. 72.* sicut etiam GALENUS *lib. 1. Prædict. Comm. 1. tit. 12.* nullum phreniticum, qui similes urinas emisit, servatum vidisse scribit; & cum similes urinas reddidisset *Philista 2. in 3. Epid. Aegrot. 4.* vehementer insanivit, & quinto die defunctus est. Hujusmodi Phrenitis fera est, & convulsionem tandem accersere solet. 2. in *Epid. Aegrot. 4.* urinas tenues ac pallidas habuit, circa meridiem vehementer insanivit.

Si quis in phrenitide vera dentibus stridet, delirium grave imminet; sin verò jam adsit delirium, convulsio lethalis est in proximo.

In Inflammatione cerebri membranarum, quibus, ut loquitur HIPPOCRATES, tremulæ aut obscuræ sunt desipientiæ, id est, si ægri sunt minus furiosi, sunt periculosiores, quàm quibus sunt desipientiæ tumultuosæ: id est, interdum phrenetici apparent, quasi dormiant, aut quodammodo quieti sunt, ut ut nihil minus faciant, quin variis hinc inde insomniis conturbantur, & in se ipsis delirant, adeo ut interrogati licet, ineptè respondeant: & tales phrenetici cum talibus variis insomniis & tremula desipientia, ferè periculosiores sunt, quàm phrenetici magis furiosi, cum vociferationibus, artuum contorsionibus & similibus.

Lethalem phrenitidem denuntiat dyspnœa, facies cadaverosa, sudor syncopiticus, lingua & manus tremulæ, stridor dentium, rigor, si floccos legant ægri, stillicidium narium, dejectiones, & urinx minus tinctæ observantur. Sin verò febre mitescente delirium non cesserit, ut plurimum in lethargum, maniam, aut melancholiam mutatur; ita quidem, ut affectus soporosi ex phrenitide raro curentur; hinc notatu digna sit observatio ZACUTI LUSITANI *lib. 1. Prax. Admir. obs. 15.* quamvis in illo subiecto somnus non adeo profundus extiterit.

De cætero Phrenitis solvitur vel per sudorem, vel per largam narium hæmorrhagiam, vel diarrhæam, qualem etiam annotavit FORESTUS *lib. 10. Obs. 1.*

Quod si Inflammatio hæc suppuretur, lethalis est; unde rarissimum est, quod HERCULES SAXONIA refert de quodam phrenetico servato, cui pus per os & aures eruperit.

## C U R A.

Supereft **CURA**, quæ tamen nil habet peculiare præcursu in febribus acutis cum delirio conjunctis, & sub delirio commodius tractatur, cum in phrenitide curanda ad duo respiciendum sit: nempè ad ipsam febrem ardentem inflammationem, quæ non secus ac pleuritis & aliæ similes curanda; & hinc ad urgentia pathemata, imprimis dolorem capitis & delirium. Adeoque convenit venæ



*℞. Herb. Agrimon.*  
*Flor. hyperic. ana M. j.*  
*Lign. lentisc. ℥ij.*  
*Rad. Consol. maj. ℥ss.*  
*Sem. hyper. ℥ij.*

Incisa & confusa dentur pro Decocto: S:  
*Species ad decoctum.*

Pertinet huc decoctum ad ulcera renum *Quercetani*, vel illud, quod dedit in *Colleg. Formular. pag. ....* Vel

*℞. Rad. Chinae ℥j.*  
*Liquirit. ras. ℥ss.*  
*℞. Agrimon.*  
*Chercfol.*  
*Heder. terrestr. ana M. j.*  
*Flor. Hyperic. M. ss.*  
*Ras. cornu Cervi ℥j.*  
*Cog. in f. q. aqua simpl.*  
*Colat. ℥ij. adde*  
*Syr. de symphyt. Fernel. ℥ss.*  
*Essent. vulner. Mich. ℥j.*  
*M. D. S.*

Potiores sanans, pro aliquot vicibus.

*Terebinthina* *Cypria* optimum est auxilium, detergit renes, & per inferiora derivat. Dosis à ℥ij. ad ℥ss. In specie convenit, si ex abscessu exulceratio fuerit orta: quod etiam præstat balsamus de *Caparbe* à gr. x. ad xv. Ut consolidantia eo melius operari possint, inter hæc eminent remedia ex canceris fluvialibus, sive succus, sive eorum in plenilunio exsiccatorum pulvis.

*℞. Cancr. fluviat.*

Plenilunio ponantur in vase terreo non vitreato ad eos furni, ut exsiccantur paulatim, ne cremantur: postea contendantur in mortario lapideo.

Renum & vesicæ ulcera egregie curant; quibus dicta quædam *Vulneraria* appropriata, in specie ex his simplicibus, quæ suo loco infra ad medium cruentum laudabuntur, superaddenda sunt.

Nullum efficacius autem remedium ad renes exulceratos dari, quam *trochiscos de Alkekengi*, videb. in *AUGENIO lib. 12. Epist. pag. 695. Symplicum magistralium* in ulcere renum, expertum videb. in *HILDANO Cent. 6. Obs. 44.* Denique *acidularum* usus non penitus contemnendus in ulcere renum de quibus vid. *HILDANUS citato loco*, item *HEER Obs. 1.* Nempe mundificando optime conveniunt, tum consolidando. *Decocta vulneraria*, item *electuaria ex absorbentibus cum bolo Armena*, terra sigillata, lapillis cancerorum, cornu Cervi usto, & similibus, imprimis conducunt.

Observetur tandem, quod interdum renes magis in parte extrema dorsum versus, suppurentur, & apostema musculorum dorsum circa spinam simul cum tumore doloreve occupet: in quo casu ab extrâ facta abscessus apertio est optima, ut extrinsecus in lumbis eorum pus queat evocari; de quo vid. *HORSTIUS in Obs. pag. 260. lib. 4.*

## ARTICULUS XIII.

### DE

## INFLAMMATIONE VESICÆ URINARIÆ.

### CAUSÆ.

**I**NFLAMMATUR etiam vesica urinaria, sed ex CAUSA INTERNA rarissime, nisi calculus huc referendus; vid. *FORESTUS l. 35. obs. 27. in schol.* frequentius vero occasione EXTERNA, scilicet in specie à contusione, aut ista violento in regione pubis & perinæi accepto; vid. *Bonneti Sepulchret. pag. 1232.* & *FORESTUS Obs. 27.* frequentiori equitatione. Denique supervenit eadem etiam interdum sectioni calculi ineptæ, vel in operatione, vel post operationem, si nimirum hoc sectio non recte tractetur vesica, ejus corpus, quacunque etiam ex causa, laceratur, aut alio modo læditur: sicut & Inflammatio Vesicæ accelerari solet, si ægri post sectionem frigida potent, tunc enim subinde ad summum die quarto, interdum citius, supervenit ejus Inflammatio, quæ tunc temporis aut in gangrenam lethalem, cui intra biduum mors supervenit, aut si malum est minus, in pessimum ulcus fistulosum degenerat. Hoc unicum periculum ex lithotomia imminet, aliàs ferè nullum; quod si præcaveatur, operatio est securissima. Præ-

terea *Cantharides* quoque tam externo quàm interno usu inepto, acrimoniam suam rodendo, Vesicæ inflammationi non nunquam occasionem præbent, quod observatum ex vesicatorio ex cantharidibus extra appposito, conf. *Misc. A. N. C. Ann. 2. Obs. 105. p. 178.*

### DIAGNOSIS.

Ceterum pathemata, quæ ordinariò Inflammationem Vesicæ, comitantur, sunt *Tensio*, *Durities*, *Ardor*, *Tumor*, ac *Dolor* in regione pubis & vesicæ; & quidem admodum is est sensibilis, ac levissimotactu exasperatur; cui accedit urinæ in vesica suppressio seu urinam reddendi impotentia, & in specie, si Inflammata est Vesica in loco infimo propè collum: item supervenit propter connexionem cum ano *tenesmus*, interdum alvi suppressio; adest simul febris acuta, plus tamen aut minus, prout major vel minor fuerit Inflammatio, & vel partem membranosam, vel simul circa collum carnosam, affecerit: quibus interdum vigilæ & deliria superveniunt; unde rarum est, quod observavit *HILDANUS Cent. 3. Obs. 68.* abscessum vesicæ ex casu ab alto, sine febre & sine dolore.

### PROGNOSIS.

Utut rara sit Vesicæ Inflammatio, quoniam minora admodum & exilia vasa habet; eadem tamen vera & perfecta juxta *FORESTUM* gravissimus & periculosissimus est morbus, quia ut plurimum lethalis, ex facili superveniente gangræna; In partibus nempe nerveis facilius gangræna producit, adeo ut ex omnibus vesicæ affectibus nullus sit deterior Inflammatione; intereunt enim ægri quarto aut ad summum septimodie; interdum, si symptomata mitiora, evadunt, sed rariùs, cum metastasi materiæ morbificæ circa hypogastrium & perinæum, per erysipelas aut urinæ fluxum copiosorem, de quo *SENNERTUS Prax. lib. 4. Part. 8. sect. 2. cap. 4.*

Inflammatio & abscessus, quæ sunt circa collum Vesicæ, ubi sunt fibræ musculosæ, interdum suppurantur, & in pus mutantur, succeditque exinde ulcus vesicæ, curatu difficilissimum.

Mutatam verò jam esse Inflammationem in abscessum, innuit imprimis doloris, febris & ardoris, remissio, *HIPPOCRATE* asserente.

Facto postmodum abscessu, si ulcus rumpatur intra vesicam, pus cum urina effluit; si verò ad exteriora tendat in cavum abdominis aut perinæum, supervenit abscessus in inguinibus, ibique sibi viam parat.

### CURA.

Remedia eadem ferè conveniunt, quæ in pleuritide & inflammatione renum sunt utilia: & in specie, cum uring aut alvi suppressio malum sepiùs exasperent, ob id, quantum possibile, removeantur. Hinc optimus est *Elyster anodynus* ea solo lacte, aut ex lacte, in quo nitrum depuratum dissolutum est, injectus, quibus etiam *terebinthina* addi potest. Internè a PURGANTIBUS & DIURETICIS omninò abstinendum; saltem juxta sudorifera *Decoctum bordei cum nitro depurato* aut antimoniato, cui interdum aliquid sacchari saturni addi potest, est optimum. Aliàs prosumt emulsionem seminis portulacæ, lactucæ, papaveris albi, quatuor frigidorum majorum, & inflammationi renum dicatæ emulsionem, quibus semper nitrum aut saccharum saturni addendum; hoc enim & omnia saturnina internarum Inflammationum sunt optima remedia. Spiritus nitri dulcis etiam hic non negligendus. Denique spiritus vitrioli *Philosophicus* (qui reverà est spiritus salis rectificatus) dulcificatus interdum assumptus ad compescendam febrem conjunctam est optimus.

Externè quoque conveniunt Imprimis Balnea seu Infusæ; item Fomenta humida ex aqua tepida cui incocta sunt radix & folia malvæ, althææ, parietariæ, folia salicis, capita papaverina, & similes herbæ diaphoreticæ seu carminantes, cum linteis multiplicatis, sed blandè, apposta. Hinc post infusum vel solum blandissimè inungatur pecten cum oleo anethino, chamæmelino, papaveris albi, rosarum aut nymphææ, & similibus, in quibus aliquid camphoræ dissolutum sit, ut ibi discutiatur Inflammatio; vel etiam succus cancerorum fluvialium expressus cum oleo rosarum & nymphææ in mortario plumbeo ductus, addendo saccharum Saturni,



turni, vel oleum ejus per deliquum, extra applicari potest, & in asperitate doloris additur simul oleum papaveris aut hyoscyami expressum.

Denique cum interdum metus sit supervenientis gangrenæ in inflammatione vesicæ, hæc ut præcaveatur aut inhibeatur, imitemur consilium RIVERII in Praxi, jubentis, ut admoveantur cataplasmata roborantia ad gangrenam aliàs usitata (de quibus in Chirurgia), v. g. ex radice scorzoneræ, ex farina fabarum & lupinorum in vino decoctis, addendo simul aloem, myrrham, & postmodum camphoram, aut spiritum vini camphoratum, pro meliori penetrantia.

Hisce modis, si possibile, detur opera, ut disentiatur inflammatio; si minus, suppuratio & hinc abscessus & vlcus expectanda: Illam promovemus Emollientibus & Temperantibus, spissis hæcenus recensitis.

Quidam Vesicæ inflammatione liquores refrigerantes, inepto satis consilio, inlicere jubent, cum tamen syringa non applicari, nec liquor intici, aut si inticiatur, commodè reici non possit: vid. HERCULESSAXONIA loc. allegata. Quoad

## U L C U S V E S I C Æ

**P**retet inflammationem suppuratam etiam calculi acutiores vesicam ludentes item, cantharides interius propinate, interdum vel externe admotæ, item acris acida sub vehiculo urinae ad vesicam delata, vesicam nunc ad scabiem, nunc excoriationem & exulcerationem disponunt: vid. Miscell. A. N. C. Ann. 3. Obs. 88. pag. 148.

## D I A G N O S I S.

Comitatur ulceratam vesicam urinae purulenta excretio, ita quidem, ut si vesica incipiat exulcerari, primò sanguis exiat; si sit perfecta, pus; si magis adhuc, squame & ramenta, quæ Græcis *σπυλίδες*; si gravis & consummata est exulceratio, gravis fetor in urina est. Dolor adeo gravis in pectine & pube: quoties ægri mingunt, urinae difficultas accedit; sæpe & tenesmus, & membri virilis erectio.

Nec autem confundatur exulceratio vesicæ cum meatu urinarum exulceratione, observandum: Si pus & sanies præcedant urinam, aut statim in primo exitu appareant, aut etiam sine urina effluant, in pene vitium est: si verò talia cum urina permixta sint, in vesica malum est. Propterea si in pene vitium est, inter mendum dolor percipitur: quod in vesicæ ulceribus non accidit, nisi juxta ejus collum vlcus consistat.

## P R O G N O S I S.

Sunt autem omnia vesicæ vlcera difficillimè curabilia, ut plurimum incurabilia; periculosiora quæ ex erosione; gravissima, quæ à magno calculo, quæ sine extracto calculo curari nequeunt.

## C U R A.

In CURA præmissis internis universalibus conveniunt

1. Acrimoniam humorum temperantia propter Urinam imprimis, exulcerationem subinde exasperantem.
  2. Vlcus sine morfu abstergentia seu mundificantia, ob fermentum ulceris acidum & hinc pus: vid. Artic. 12. ubi de Renum exulcerationum Cura.
  3. Consolidantia, ob resolutionem partis exesæ.
  4. Anodyna, propter dolorem imprimis urgentem.
- Talia tam internè quàm externè adhiberi solent. Et quidem acre temperantia, althea, liquiritia; passula, viola, violaria, semina quatuor frigida, maiora: hinc decoctum chamæpityos in lacte mirè laudatur à quibusdam crebrius usurpatum: sic expetit Potio THONERI, in Obs. pag. 176. quæ, ut ipse ait, quasi miraculosum effectum præstuit, & exulcerationem cum urina cruenta sustulit:

℞. Herb. Agrimon.

Plantag.

Equiset. ana M. j.

Rad. Liquirit. mund. ℞j.

Decoquantur in

Aqua Plantag.

Berol. ana q. l. ad consumptionem tertiaz partis.

Accum. Oper. Tom. II.

In colatura ℞ss. dissolve

Mell. rosar. ℞j.

Misceatur.

Simul æger singulis horis per Syringam portionem in vesicam infundat.

Mundificant Terebinthina, decocta vulneraria cum melle, balsamus sulphuris terebinthinatus & succinatus, oleum terebinthinæ, mercurius dulcis, trochisci de alkekengi, de sarabe, trochisci Gordonii, &c. quæ specificè laudantur.

Consolidant decocta lignorum cum vulnerariis, uti agrimonie, hypericum, plantago, hederæ terrestris, &c. quibus addantur corallia, lapilli cancerorum, terra sigillata, bolus Armena, succinum, emulura sulphuris vitrioli, cum Annæ antiseptica, &c.

Dolorem leniunt opiatæ, papaverina, lacticia, in specie, si à cantharidibus fuerit malum, &c. De lacte ait AETIUS, nescio an post ullum aliud remedium secundo saltem loco id si habendum? nam & asperitatem lenit, & exulcerationes emittit: cui etiam serum substitui potest.

Ex his variè possunt fieri formulæ:

℞. Rad. Liquirit. ℞j.

Alth. ℞ss.

Saxifrag. ℞ij.

Herb. Agrimon.

Plantag.

Portulac.

Heder. terr. ana M. j.

Flor. Malv. arbor.

Nymph.

Violar. ana M. ss.

Sem. alib.

Papav. alb.

Portulac. ana ℞ij.

Fruct. alkekeng. No. vj.

Sem. cicér. rub. ℞ij.

Hord. mund. M. ss.

Coqu. in s. q. aquæ simplicis:

Colat. ℞ij. adde

Syr. violar. sol.

Agrimon. ex succo,

Capill. veneris,

Mell. rosar. ana ℞j.

M. D. S.

Potio temperans.

De quo bis vel ter quotidie bonum haustum æger capiat.

Terebinthinata imprimis conducunt, in specie PLATE-RO usitata fuit sequens Mistura terebinthinata:

℞. Terebinth. ℞vj.

Mellis ℞j.

Vitell. ovi. No. j.

Vini Malvat. ℞iv.

Dilota servanda ad usum.

Dosis ℞vj. Vel

℞. Terebinth. ℞ss.

Vitell. ovi No. j.

Mellis ℞ij.

Agitentur in Mortario, donec albefcant

adde

Vini albi,

Aquæ parietar.

Flor. fabar. ana ℞ij.

Syr. limon. ℞j.

M. D. S.

Mistura mundificans.

Imò solum hoc, cui terebinthina cum vitello ovi soluta, cum paucis saccharo permixta, sufficit pro leniendi scilicet & temperandi scopo.

Nec acidula ad vlcera vesicæ mundificanda reicienda sunt: vid. RIVERIUS lib. 1. c. 1. SCHOLZIUS Conf. 155. & 161. & TULPIUS lib. 2. Observat. 93. ubi refertur vlcus vesicæ desperatum, per fontem Spadani usum curatum.

Sic præsertim indicatio:

℞. Rasur. lign. sancti ℞ij.

Rad. Sarsaparill.

Liquirit.

Eryng. ana ℞j.

Herb. agrimon.

Veronic.

Heder. terr. ana M. ss.

Flor. rosar.



## D I A G N O S I S.

*inflammatum est.* Tanta confusio vocabulorum ab HIPPOCRATIS tempore orta fuit. Partium igitur mortificationem totalem HIPPOCRATES & Veteres vocarunt *Necrosin*, quæ hodie abusive *sphacelus* dicitur: adeoque *sphacelus* secundum HIPPOCRATEM & Veteres proprio & genuino sensu est Inflammatio membranarum cerebri; *necrosis* verò antiquis *mortificatio partis*, quatenus scilicet pars omnino erat extincta; *serpens* verò adhuc extinctio, dum est in fieri, *Gangrena* vocabatur, quod vocabulum adhuc in tali sensu in usu habemus. Proprie ergo *sphacelus* in genuino & proprio sensu est membranarum cerebri Inflammatio, ut ut idem adhuc significet *necrosin* seu mortificationem, via ad quam est gangrena; Phrenitis verò proprie est inflammatio diaphragmatis, sicut *sphacelus* est inflammatio cerebri & membranarum ejus: Conf. SENNERTUS *Pr. lib. 1. Part. 1. cap. 23. pag. 203. & 205.* Sed cum verba valeant ut nummi, recepto usu Phrenitis, Modernorum vocabulo, veterum *sphacelum*, id est Inflammationem cerebri, ejusque membranarum, & inde natam febrem acutam plus minus continuam, peracutumque ac gravissimum delirium, intelligamus.

In Phrenitide ergo modernorum seu ista Inflammatione cerebri membranarum, calor, rubor, dolor & pulsus, tanquam necessaria & quasi pathognomonica omnis Inflammationis signa, sunt obvia. Dolor ratione partis affectæ, ex Inflammatione & impedito sanguinis motu, est intensissimus, quoniam Inflammatæ meninges intensè dolent, cum certum sit, nullam corporis partem sensiliorem esse, quàm ejus membranas, & quidem dolor acerbissimus, & horrendus lacerativus percipi solet. Hinc videmus veros phreneticos (ut plurimum enim confunditur phrenitis cum delirio in febris ardentibus superveniente) *avellere capillos præ nimio dolore*, & immenso quasi furore *caput immaniter concutere*: propter quem etiam acerbissimum dolorem malum adeo est acutum, ut tertio die sit lethale; quoniam propter dolorem istum sensibillimum spiritus animales nimis dissipantur, & facillè istarum partium Inflammationem sequitur *gangrena*, & inde *necrosis*. Præterea hi ægri propter spiritus animales impetuose & inordinate motos mox delirant, adeo ut quæ sit de circumstantiis caloris vel doloris v.g. eas sufficienter expromere nequeant Unde talibus insigniter delirantibus tandem gravissima symptomata, in specie *convulsiones*, superveniunt, idque tunc præcipue, quando jam gangrena imminet. Præterea *pulsatio in capite* adeo est vehementissima, de quo in primo principio conqueruntur ægri, propter arteriarum in cerebro motum impeditum; & quanta talis pulsatio & inde *dolor capitis pulsatorius* sit, exinde potest colligi, si attentè aspiciatur collum; apparebit enim tunc, quod vehementissimè pulset arteria *carotis*, idque propter impeditum legitimum sanguinis transitum in suis extremitatibus. Ex quo colligi potest, quantum impetum & quantam pulsationem sanguis affluens & in cerebro vel loco inflammationis sub cranio stagnans, inferre valeat.

Moderni ergo usu Phrenitis erit delirium intensissimum ex membranarum cerebri Inflammatione ortum, febre ardente & peracuta conjunctum; & hoc, ut dixi, erit Veterum *sphacelismus* seu *sphacelus* cerebri, ut jam adhuc majori abusu ferè quodcunque delirium grave, febris ardenti aut malignæ superveniens, similiter vocari soleat Phrenitis.

Patet ex his, veram seu Veterum phrenitidem rarissimum esse affectum, & quem ferè intra biduum vel triduum insequitur mors.

## C A U S Æ.

CAUSÆ Phrenitidis INTERNÆ sunt ræ, nisi forsitan præcedens sanguinis quædam excretio suppressa, aut alius inflammationis metastasis, occasionem veræ phrenitidi seu sphacelo subministrat. Sic enim in puerpera propter suppressa nonnihil lochia, phrenitidem observavit HORSTIUS *lib. 2. obs. 25. & 26.* ut etiam idem observavit phrenitidem ex suppressione hæmorrhoidum, *cit. loc. obs. 26.* Fit etiam interdum, ut Peripneumoniæ seu pleuritides non raro per metastasin materiam abeant in phrenitidem veram, tunc temporis ut plurimum lethalem. Exemplum subministrat Schenckius *lib. 1. obs. pag. 61.* Et quidem curam phrenitidis supervenientis pleuritidi elegantem describit BARTHOLETUS in suo libro de *Respiratione lesa*. Inflammatio cerebri per abscessum soluta veram phrenitidem representans, videri potest in LOSSIO *Obs. p. 18.* à vermicibus verò PARACEL. *SUS l. 2. §. 3.*

Ex his SIGNA phrenitidis per se patent. Nempè phrenitidem imminere, concluditur ex vigilis pertinacibus, somniis turbulentis, sermone immodico, mutatione morum, urinâ primò crassâ, mox tenui, imò diaphanâ, capite tactu calidiore, oculorum torvitate, item dolore capitis intenso, præprimis circa occiput, & arteriarum colliatque capitis pulsatione nimia.

Delirium verò simplex à phrenitide in hoc distinguitur: quod illud sit levius cum intervallis; hæc vehementior & ferè continua cum intensis doloribus capitis, quorum ratione hoc sepius fricant; respiratione difficili, febre continua & siti nulla, quamvis hujus causæ adsint. Si inflammatio quædam sublit, in gangrenam degenerans, ferocia remittit, oculis clausis prostrati decumbunt, & lethargici evadunt ægri.

## P R O G N O S I S.

Quoad PROGNOSIN: Vera phrenitis seu Inflammatio cerebri ejusque membranarum ut plurimum affectus est peracutus, ut plurimum lethalis, juxta HIPPOCRATEM *lib. 7. aphor. 50. & lib. 2. epidem. sect. 3. Ægrot. 4. pag. 733.* & tertio vel quarto die ad summum septimo silens, ita ut brevi post superveniat necrosis perfecta, ægrique convulsi intereant. Nam & PROSPER ALPINUS *lib. 1. de Med. Egypt. cap. 13. refert*: vidisse se in Ægypto phrenitides planè lethales, ita ut tertio vel quarto die jugula verint ægros.

Aliàs in Inflammationis cerebri incremento dejectiones alvi albicantes, & urinae crudæ albidæ & pallidæ existentes, pessimæ sunt; ut plurimum enim ægri intereunt, teste HIPPOCRATE *sect. 4. aphor. 72.* sicut etiam GALENUS *lib. 1. Prædict. Comm. 1. tit. 12.* nullum phreniticum, qui similes urinas emisisset, servatum vidisse scribit; & cum similes urinas reddidisset *Philista 2. in 3. Epid. Ægr. 4.* vehementer insanivit, & quinto die defunctus est. Hujusmodi Phrenitis fera est, & convulsionem tandem accersere solet. 2. in *Epid. Ægr. 4.* urinas tenues ac pallidas habuit, circa meridiem vehementer insanivit.

Si quis in phrenitide vera dentibus stridet, delirium grave imminet; sin verò jam adsit delirium, convulsio lethalis est in prociectu.

In Inflammatione cerebri membranarum, quibus, ut loquitur HIPPOCRATES, tremulæ aut obscuræ sunt desipientiæ, id est, si ægri sunt minus furiosi, sunt periculosiores, quàm quibus sunt desipientiæ tumultuosæ: id est, interdum phrenetici apparent, quasi dormiant, aut quodammodo quiescant, ut ut nihil minus faciant, quin variis hinc inde in somniis conturbantur, & in se ipsis delirant, adeo ut interrogati licet, ineptè respondeant: & tales phrenetici cum talibus variis in somniis & tremula desipientia, ferè periculosiores sunt, quàm phrenetici magis furiosi, cum vociferationibus, artuum contorsionibus & similibus.

Lethalem phrenitidem denuntiat dyspnœa, facies cadaverosa, sudor syncopiticus, lingua & manus tremulæ, stridor dentium, rigor, si siccus legant ægri, stillicidium narium, dejectiones, & urinae minus tinctæ observantur. Sin verò febre mitescente delirium non cesset, ut plurimum in lethargum, maniam, aut melancholiam mutatur; ita quidem, ut affectus soporosi ex phrenitide raro curentur; hinc notatu digna sit observatio ZACUTI LUSITANI *lib. 1. Prax. Admir. obs. 15.* quamvis in illo subiecto somnus non adeo profundus extiterit.

De cætero Phrenitis solvitur vel per sudorem, vel per largam narium hæmorrhagiam, vel diarrhæam, qualem etiam annotavit FORESTUS *lib. 10. Obs. 1.*

Quod si Inflammatio hæc suppuretur, lethalis est; unde rarissimum est, quod HERCULES SAXONIA refert de quodam phrenetico servato, cui pus per os & aures eruperit.

## C U R A.

Superest CURA, quæ tamen nil habet peculiare præcursu in febribus acutis cum delirio conjunctis, & sub deliriis commodius tractatur, cum in phrenitide curanda ad duo respiciendum sit: nempè ad ipsam febrem ardentem inflammatoriam, quæ non secus ac pleuritis & aliæ similes curanda; & hinc ad urgentia pathemata, imprimis dolorem capitis & delirium. Adeoque convenit venæ



señiolargissima in principio interdum repetenda : quin & premixtis clysmatibus & vomitorio in omni morbi principio mox sudorifera adhibeantur, ut sanguinis stagnatio maturè primo vel secundo die discutatur; nam nisi hoc maturè fiat, superveniente necrosi agri intereunt. Inter alteram tamen Julepus sequens est elegans:

*M. Hord. mundar. M. ij.*

*Rad. scorzon. ℥i.*

*Liquirit. ℥ss.*

*Fol. acetos. M. j.*

*Flor. borrag.*

*Rosar. Rubr.*

*Violar. ana p. ij.*

*Passul. min. cont.*

*Raf. Cor. Cer. ana ℥i.*

*Cran. human. ℥ss.*

*Coqu. in s. q. aquæ.*

*Colat. & iv. aciduletur cum spiritu vitrioli q. s.*

Reliquam Coram relegatam volo usque ad Membrum s. Articuli 3. Capis. 4. Scilicet 3. lib. 2. ubi suo tempore pluribus tractabitur.

## ARTICULUS. XV.

### DE

## OCULORUM INFLAMMATIONE,

### VERA ET NOTHA.

**I**NFLAMMANTUR subinde etiam OCULI, malum satis frequens & ubique cognitum, quod in specie vocatur OPTHALMIA: Est vitium contradistinctum lippitudini, epiphoræ, & similibus.

Ophthalmia autem est vel vera, vel notha, seu sicca etiam vocata: Illius DUÆ sunt SPECIES, vel SANGUINEA, vel SEROSA seu LYMPHATICA proprio nomine epiphora dicta, coincidens fere cum Lippitudine, nisi quod Lippitudo & Epiphora saltem subiecti proximitate nonnihil differant. Inflammatio sanguinea est inflammatio tunice adnatæ, cum rubore, ardore, & dolore, tumore & lachrymis, nunc plus vel minus fluentibus: Hac verò est affectus suo modo catarrhalis, nempe copiosa & continua lachrymarum destillatio ex oculo, quæ nunc acres sunt, adeoque dolorem, morsum, ardorem, ruborem junctum habent, & vulgò dicitur Humor seu Catarrhus calidus, nunc mitiores sunt, & sine symptomatum talium syndrome affligunt, diciturque Humor five Catarrhus frigidus: sicut Lippitudo est affectus similis palpebrarum, in quo copiosissima lymphæ lachrymalis, tam ex glandulis angularibus, quam etiam glandulis palpebrarum à STENONE detectis, erumpit ratione cujus notabilis in ophthalmia symptomatis CELSUS ophthalmiam Græcorum, Latine Lippitudinem appellavit.

### SUBJECTUM.

In ophthalmia vera afficitur oculus quoad membranas communes, in specie quoad membranam externam, quam adnatam appellant; subinde verò etiam cornea & uvea non leviter affliguntur: quæ membranz, imprimis extrinæ, contextæ sunt ex copiosissimorum vasculorum textura, tam venularum quam arteriolarum: Impedito ergò motu sanguinis in his vasculis, sequitur inflammatio aded ut vasculæ hæc sanguine stagnante distenta magis fiant conspicua, & subinde totus oculi bulbus intensissime rubeat. Cum verò membrana hæc adnata intimè connectatur cum tunica sclerotica, à dura matre orta, & hac mediante etiam cum uvea à pia matre nata, ipsa adnatæ à pericranio originem ducente, propter hanc membranarum oculorum connexionem cum cerebri membranis mutua partium dictarum conspiratio & pluræ pathemata per consensum oriri solent. Nempe ratione pericranii fit, quod in gravi ophthalmia simul capitis dolor, si non pulsatorius, tamen contractivus, præter gravativum, percipitur. Patet etiam ratione conjunctionis cum internis membranis oculorum & hinc membranis cerebri, quare contusionibus cranii, & lesionibus membranarum cerebri, interdum superveniant ophthalmia, eæque ut plurimum quarto aut septimo die, interdum nono aut undecimo, accedant, aut saltem fluxus oculorum cum eorundem rubedine; ut in nosodochio Pasavino aliquoties observavi: quæ ipsa fuerunt signa periculosa ac imminens mortis, quatenus ostenderunt

jam factam cerebri membranarum lesionem aequalem inflammationem, & exinde gangrænam & necrosin. Certè si hæc sponte sequantur, periculosum signum est: Nam dum stagnat sanguis in cerebro ejusque membranis per arterias carotides affectis, fit ut uberius affluat ad oculum, ubi impeditur in motu, & ophthalmiam inserit. In Epiphora, ad glandulas, ex quibus tale stillicidium oritur, imprimis respiciendum, sive sint in oculorum angulis, sive palpebris: de quibus videatur STENO in Observ. de glandulis oculorum & narium.

## CAUSÆ

### OPHTHALMIÆ VERÆ.

CAUSA Ophthalmiæ in genere est spina oculo alicui in externa ejus superficie infixæ, cujus occasione oritur dolorosa fibrarum strictura, sanguinis remora in motu, lymphæ ejus uberior per glandulas infusio; vel est quodcumque hostile, aut inimicum, acidum aut acre, præsertim si oculum affecerit, plus minus irritaverit, sicque ad inflammationem occasionem dederit: esseque vel Internum, vel Externum.

CAUSÆ EXTERNÆ, ut contusio, lesio, vulneratio, pulveres acres in oculum illapti, ut & fumi metallici se insinuantes in oculos, aura asperior, &c. satis sunt cognitæ: Sic enim pulveres afficiendo partes oculi sensiles, & irritando, faciunt ut sequatur contractura fibrarum in tunicis oculi, & ita sanguis stagnans inflammationem inducit. Unde colligi potest, cur fiat, ut inflammatio oculorum semel facta, nec adeò rectè curata, subinde recidiverit? nempe si illud ob tantillum fermenti remanentis.

Causæ verò INTERNÆ sunt omnes eæ, quæ quacunque ratione occasionem dare possunt, ut sanguis stagnet in vasculis minutissimis: sic v.g. in specie variolæ, quatum sanguis acris & acido-salsa oculis insensibilis, propter fermenta acris relicta, sapissime ophthalmias, & quidem pertinacissimas aut sæpius recurrentes post se relinquunt, ut supra ex LIPSIUS in elegantia Tr. de Variolis monitum, ubi exemplum habet sæpius recidivantis Epiphoræ, modò in uno, modò in altero oculo, ex malè curatis variolis. Nam oculus semel inflammatus facile levi de causa postmodum denudè inflammatur, ita ut nunc in hoc, nunc in altero, nunc in utroque oculo recurrat, idque propter robur partis tunc læsum, vel propter ejusdem tonum laxatum, & etiam propter fermenta acris plus minus purulenta in parte relicta. Nempe tantillum fermenti remanens intra tunicas oculorum est instar spinæ digito infixæ, quod excitatum facillimè inflammationem oculorum inserit &c. Imprimis si aliàs solennes sanguinis in corpore evacuationes negligantur & supprimantur, si levis accidat in oculo irritatio; inflammationem inferunt; hinc suppressos menses, hinc tinea infantum, vel malè curatam vel spontè evanescentem, propter relicta acris salum (à morbillis, variolis,) sequuntur non raro ophthalmia. Exemplum habet GABELCHOVERUS Cent. 4. Cur. 38. de Inflammationibus oculorum propter ommissas solennes scarificationes: Item ophthalmiam observat ex recentis menses Cent. 3. Cur. 61. Infantes prout ex aurium purulentis fluxionibus cessantibus, subinde in ophthalmias pertinaces & contumaces incidunt. Speciatim tamen acre quodcumque ex corpore externum, cum sanguine, aut lymphæ lachrymali aut quacunque occasione ad oculum delatum, irritando oculum ad inflammationem disponit.

Uterius ratione modi afficiendi Ophthalmia interdum est epidemica, & interdum contagiosa, item periodica. Epidemica est ex aere nempe inclementiori, & effluviis acrioribus inquinato, quo oculos feriente inflammatio oborta: qualem epidemice grassantem Ophthalmiam observavit AMATUS LUSITANUS Cent. 7. Cur. 80. Contagiosa observata fuit, e.g. si quis ophthalmicos intueretur, simul quoque eodem malo corripere ratione atmospheræ, quæ ab alterius oculo recepta hunc irritando & vellendo instar pulveris acris ad inflammationem disponit, vid. FORESTUS lib. 9. Obs. 4. ZACUTUS LUSITANUS lib. 1. Prax. Hist. cap. 13. PLEMPIUS Ophthalmiogr. lib. 5. cap. 12. & SENNERTUS lib. 1. Prax. ubi de Ophthalmia, Periodicam denique, & modò in hoc, modò in alio loco recidivantem, à variolis natam, videbitis in LIPSIUS l. a. pag. 70.

Differentias etiam habet Ophthalmia graduales, & in tres gradus dividitur: si enim inflammationis saltem initium adit,



adfit, cum nempe oculus cum rubore & calore humidior fiat, & nonnihil doleat, dicitur *Ταφῆς*, seu levior oculi Inflammatio, ut plurimum serè occasione externà nata: Quodsi Inflammatio suprâ dictâ insignior, præcipue ex causis internis, oriatur, est *Ophtalmia* *αἰματώδης* dicta: Si verò facta sit Inflammatio intensior, ut & palpebræ afficiantur, & quasi invertantur, cum insigni tumore, nec claudi possint, albumque suprâ nigrum oculi intumescat, ita ut nigro quasi subsidente hiatus veluti in oculo appareat, *Χύμας* dicitur, ut plurimum ex causa externâ nata. Cont. SENNERTUS, ubi de *Ophtalmia*.

## C A U S Æ

## EPIPHORÆ &amp; LIPPITUDINIS.

Quoad causas EPIPHORÆ & LIPPITUDINIS; eas sunt triplices:

I. Est nimia glandularum oculorum laxitas, quando eadem undecunque, præsertim sub nutritione propria, viciatæ, aut aliàs irritatæ, flaccidæ & nimis spongiosæ redduntur, per patula nimis ac patentia foramina lymphæ copiosam continuè effluere aut potius elabi sinit, ipsâ lymphâ aliàs naturaliter tunc constitutâ; unde hic affectus nulli insigniori symptomati est adjunctus, nisi aliquanti oculorum rubedini, ex sanguineis vasis, ob copiosorem & faciliorem ejus effluxum & ob inanita semper vasa majorem turgelcentiam. Malum hoc senibus & morientibus est familiare; hinc spontè illachrymari in acutis morbis periculosum ex HIPPOCRATE: Illud (in senibus) ob nativam ratione ætatis imbecillitatem, dum flaccidæ & quasi detritæ sunt glandulæ: Hoc verò (in morientibus) propter morbosam summam prostrationem virium, & hinc spirituum animalium defectum, & glandularum flacciditatem. Facit hic defectus caruncula lachrymalis in affectu Græcis *ῥῖς* dicto, quæ caruncula nihil aliud est, quàm substantia tenera carnea, juxta glandulas lachrymales sita, & se instar operculi lymphæ & glandularum lachrymalium habens, unde ea vel resoluta, vel ferro ablata, vel à lymphâ acri vel ulcere exesa, vel imminuta, sui absentia successivè infert continuum & involuntarium lachrymarum fluxum: quîn & robur oculi læsum, seu quando glandulæ oculorum semel laborarunt Epiphora, & sepiùs postmodum ex imbecillitate hinc contracta idem patiuntur malum; unde sordium, puris, &c. proventus, quibus oculus & vicinæ glandulæ irritatæ continud plorant: de qua oculi glandula majore, vulgè caruncula lachrymali dicta, vid. WARTONI *Adenograph. cap. 26. pag. 160.* Hæc est prima causa Epiphoræ.

II. Causa Epiphoræ est læsio & irritatio oculi sensibilissimi ab externis causis, quocunque modo oculum continuè irritantibus, ut substantia ejus glandulosa laxetur. Quod pertinent pulveres in oculos illapsi, item effluvia acra, v.g. cepacea, alliata & piperata, quæ salibus volatilibus turgida oculos pungunt & mordent; etiam aer externus nimis frigidus aut asper, qui oculum lædit: ex quarum rerum læsione & irritatione copiosus, & continuus lymphæ vitiosæ ad oculum contingit affluxus, & sic Epiphora catarrhalis. Durante effluxu diutius ex copiosè affluente sanguine, & ob exhaustum laticem ejus pro impendio lachrymarum, sanguis nonnihil spissescit, ut in angustissimis istis vasculis stagnans Ophtalmiam tandem seu oculi Inflammationem inferat, modò majorem, modò minorem, cum ejus rubore, dolore & tumore, de quibus jam dictum.

III. Epiphora causa propriè Catarrhum constituit, quando nempe ex vitio lymphæ catarrhali habituali, ab interna causa profecto, per modum catarrhi præternaturalis lachrymarum fit effluxio; proprièque & frequentius Epiphoram constituit. Vitium lymphæ est, quando eadem nimis acris & salsa-acida in corpore existit, quâ concurrente cum oculi debilis spongiosa magis substantia glandulosa effusionem lachrymarum copiosam faciliè excitare potest. Unde hæc lymphæ acido-salsa continuè oculos rodit & vellicat, unde eorum pruritus, & interdum palpebrarum exulceratio. Ex pruritu & irritatione magis magisque sanguinis & lymphæ affluxus promovetur: Nam omnis lymphæ sub se continet subtilem quandam acrem abitergentem & detergentem; hinc fit, ut in naturali statu oculi tali lymphæ lachrymali humectati, sint faciliè

Est null. Oper. Tom. II.

mobiles, & ab omnibus sordibus purificati; simul verò atque hæc lymphæ lachrymalis fit nimis acida, tunc non raro varia oriuntur oculorum mala, imprimis externa, v.g. dolor, oculorum rubedo, pruritus, tumor, corrosiones, lippitudines, Inflammatio oculi periculosa, pustulæ, ulcera, fistulæ lachrymales &c. quîn & in cæcitatem interdum terminantur hæc Epiphoræ catarrhales, quatenus ab acrimonia lymphæ nonnihil corrosæ membranæ oculorum fiunt asperæ, ex asperitate crassæ, ex crassitie tandem opacæ minusque perspicuæ, ita ut exinde necessariò sequatur cæcitas.

Causæ hujus Epiphoræ remotæ sunt omnes eæ, de quibus suo loco in Catarrhis dicam. Inter has sunt assumptæ, quædam ad eam disponentia, ut nuclei malorum persicorum, de quibus vid. RHODIUM Cent. I. Observat. 80. pag. 43. in se ipso Epiphoram ex esu malorum persicorum notantem: Interdum specialiter concurrat potus nimis vini aciduli oculis nocens: Interdum etiam parentum concurrat vitium, cum hæreditate materna aut paterna oculi infantum disponantur, ut accedente internæ lymphæ vitio similem in Epiphoram incidant.

Cæterum omnium horum affectuum ordinarius comes est copiosissima lachrymarum destillatio, quæ, si affectus est copiosus, degenerant à naturali more; & sunt in duplici differentia, quæ adhuc observanda pro Cura melius insituenda, idque, si ex causa interna oriatur ophtalmia: Nam interdum lachrymæ effluunt acres, tenues, acido-salæ, vel quasi plus minus corrosivæ, pruritus inferentes, & cutim malarum corrodescentes, idque in inflammatione periculosiore, utpote quæ tunc magis dolet, ardet, & instar erysipelatis cujusdam infestat; idque tunc vocant Catarrhum acrem, licet non semper vitium catarrhale adfit, sed innuunt lympham lachrymalem admodum acrem salinam & rodentem; & quibusdam Ophtalmia biliosa dicitur: Interdum lachrymæ non sunt corrosivæ, ac sine acrimonia ulla, sed potius subdules, simpliciter insipidæ, & in his ophtalmiis subinde oculi palpebræ quasi conglutinantur & inviscantur, & tunc lymphæ lachrymalis magis crassa, magis viscida & tenax esse solet, oculos incrustans & conglutinans, concurrente tamen tunc simul aliquali nutrimenti proximi in parte læsa, vel in glandulis, vel in superficie oculi, alteratione, quod depravatum Lemas ordinariò vocatur; unde hujus imprimis occasione inviscari palpebræ solent; quæ lymphæ tamen crassa melior est, quàm tenuis & salina.

Ex qua lachrymarum differentia quatuor ophtalmiæ tempora DISTINGUENDA: nempe Principium est, quando humor tenuis ac plurimus defluit: Augmentum, quando dolor augetur, humorque fit crassior: Status, cum magis coctus videtur humor, h.e. temperatus, adeoque crassus, ut etiam palpebras conglutinet: Declinatio, cum symptomata remittunt.

Licet autem hæc lachrymæ sint ordinarium symptoma, tamen distinguuntur eadem: Nam interdum se habent instar causæ, interdum instar producti. Communiter dicunt: esse catarrhum; sed malè, cum etiam ex rebus extrinsecus illapsis copiosus lachrymarum proventus obriat, licet oculus sit insens. Ergo attendendum; an vitium fit à causa externa? an verò interna, à qua generantur lachrymæ? Aliud namque est, quando fit Epiphora in pueris extinea repressa, aliud est, quando ex irritatione quadam externa: Hinc posteriori in casu adstringentia prosunt; in priori ea nocent.

Quoad OPHTHALMIAM NOTHAM, seu ut aliàs vocatur SICCAM, hæc est ista, in qua lachrymæ serè nullæ exsillant, ut ut plus minus noctu palpebræ coagulati soleant. Talis ophtalmia sicca nil commune habet cum vera, præter ruborem; oculi enim rubent, plus minus tument, atque plus minus pruriunt; unde tres ejus sunt gradus:

1. Quæ est cum pruritu, & exigua fluxione salsam & acrem conjunctam habet, & dicitur *ἥρα δακρυα*.

2. Quæ cum pruritu & dolore levi & aliquali gravitate sine fluxione est, adeoque saltem rubri & tumidi sunt oculi, & dicitur *ἥρα δακρυα*.

3. Denique sine pruritu, fluxione, & cum duritie ac asperitate palpebrarum est, & dicitur *καλυσπδακρυα* seu dura lippitudo.

Oriuntur ex subtili, salsa vel acri lymphæ, oculos naturaliter humectante, alterante, & ita oculos malè afficiente.



## DIAGNOSIS.

Manifesta sit Ophthalmia per se ex dolore, ardore, rubore, & tumore oculorum, & ipsarum palpebrarum; quæ omnia sunt signa inflammationum communia; sicuti etiam per se, & ex relatione ægri manifestum erit, an ophthalmia à causa interna? an ab externa originem ducat?

Sanguis inflammationem excitans nunc per vasa oculi exteriora movetur, nunc per interiora: Si per exteriora, tumor, dolor, pulsus in fronte ac temporibus, percipiuntur: Si verò à vasis & membranis interioribus, dolor profundior & vehementior erit, pruritusque in palato ac naribus sentitur, ac sternutatio frequenter sit.

Signa diagnostica Epiphoræ per se patent: Causæ tantum distinguendæ sunt, partim ex relatione ægri, partim ex scientia Medici.

## PROGNOSIS.

Quoad PROGNOSIN: Nulla ophthalmia est negligenda; in specie si est à causa interna, quia semper oculorum, necesse est fiat læsio: interim tamen una major, altera minor existere solet, hinc secundum supra monitos gradus magis vel minus periculosa ac curabilis est.

Ophthalmia vera pro subjectorum ratione, in iisque humorum, præsertim lymphæ ac sanguinis, constitutione, facilius vel difficilius curatur.

Ophthalmia per consensum à membranis cerebri internis, dura nempe & pia matre, & à partibus circa cranium contentis, se viora & periculosiora habet symptomata, & difficilius, curatur quàm ea, quæ sit per essentiam affecto oculo.

Dolor diu in ophthalmia perseverans pessimum signum est; materiam enim aut corrodentem, aut distendentem, aut suppurantem arguit.

Ophthalmiam diuturnam, aut sæpius recurrentem, faciliè visus hebetudo insequi potest, partim ob membranas incrassatas, partim ob humores impuros redditos.

Quando res edevenit, ut Inflammatio non possit derivari, vel digerì, vel suppurari, serè perit oculus. Interdum suppurat, & tunc periculum cæcitatis & gangræne pariter imminet; quod si idè devenerit malum, melius est dimittere oculum, quàm certò perire & mori, adeoque oculus maturè extirpandus est, ne per consensum cerebro gangræna communicetur, & mors superveniat.

Ophthalmia discutientibus aliàs curatur: sin sæpius recurrat, periculum cæcitatis minatur, dū occasionem suggerit, ut nebulæ, panni, aut cicatrices in perforatione uvæ & corneæ nascantur, vel nutrimentum proximum corruptum, & in humore aqueo successivè conglutinarum, suffusionem inducat.

Ea ophthalmia, quæ supervenit graviori capitis læsioni, frequenter est funesta & lethalis.

Ophthalmia laborantem superveniens alevi profluvium liberat: vid. HIPPOCRATES *sect. 6. aph. 17.* & GALENVS *contra Julianum cap. 1.*

Taraxis à causa externa nata, si maturè curatur, sine periculo est; periculosior autem est Chemosis seu Ophthalmia perfecta & consummata.

Notha ophthalmia non adeò periculosa est, quàm vera; diuturna tamen est, & admodum chronica.

Quoad ophthalmiæ serosæ sive Epiphoræ prognosin: Infantes frequenter lachrymari solent, & quidem sine insigni periculo; quoniam diætâ, & procedente ætate spontè hoc vitium corrigitur: Invetrata autem aut natu majoribus accidens, contumacior, faciliè fistulam lachrymalem potest inferre.

Qui in febribus aut aliis morbis acutis voluntariè lachrymantur, nec oculi sint affecti, aut crisis per hæmorrhagiam insit, inconveniens est: si verò citra & præter voluntatem hoc faciunt, malum signum est; innuit liquidum affectum esse cerebrum, & resolutionem facultatis, ut vocant, & periculum portendit, teste GALENO & HIPPOCRATE *sect. 4. Aphor. 52.*

Epiphora verò, quæ sit ex læsione caruncule lachrymalis, serè est incurabilis; uti est pessima, quæ à caruncula, quacunque ex ratione ablata, oritur; uti facilius est curatu, quæ est ab illius erosione, quàm excisione.

## CURA.

## Quoad CURAM:

I. Causa externæ quælibet, oculum hostiliter afficientes, sunt removendæ; hinc causis internis prospiciendum; Et tandem

II. Sanguis in oculis stagnans resolvendus, & ad naturalem statum & circulum reducendus, & inde orta Inflammatio removenda est.

Cum verò causæ internæ imprimis sint duplices, ob id vel sanguinis motui, qui oculum tumefacit & inflamat, per revulsoria remedia prospiciendum, vel acre quodcunque oculum vellicans & irritans corrigendum.

Inflammationi leviori, imprimis ex causa externa natæ, & ubi non est tantum ægri periculum, ut in rubore, ac moderato dolore, pauca externa saltem ex PHARMACEUTICO FONTE sufficiunt remedia. Ubi verò Tumor & Inflammatio sunt magna, aut gravius imminet periculum, simul per remedia interna curatur, quibus & alia ex CHIRURGICO FONTE pro Revulsione, Aversione, & Derivatione adhibenda.

In graviore ergo Ophthalmia, imprimis ex causa interna nata, si corpus vel plethoricum, vel sanguinis evacuandi suppressio fuerit, venæ sectio admodum necessaria erit, cum interdum facta sic Venæ sectione sensibilis alteratio in inflammatione observata fuerit. Convenit ergo pro scopo revulsione universalis quidem venæ sectio in pede, pro scopo aversionis verò in brachio, pro scopo derivationis, si fieri poterit, in fronte. Et quidem quod in pede secanda sit vena, confirmat & illustrat egregium exemplum LINDANI super Hartmannum, dum dixit, se vidisse, quantum valeat venæ sectio legitima in ophthalmia in Chirurgo Amstelodamensi, cui dexter oculus fuit inflammatus, ut patet ex historia superius in Prolegomenis Cap. 3. Artic. 1. allegata. Unde rectè dicit LINDANVS: quod in principio & gravi ophthalmia primò venæ sectio sit instituenda in pede pro revulsione, hinc in brachio, loco contrario oculo inflammato, pro revulsione particulari, quæ vel sola in leviori ophthalmia sufficit. In pede secatur vel vena saphæna, vel, quod melius est, vena poplitea, utpote, quæ satis conspicua, & satis manifesta est. Quod verò attinet derivatoriam venæ sectionem; sanè ad derivationem nil melius est, quàm venam frontis incidere: sed hocce habet incommodi, ut subinde pro secanda vena frontis laqueus collo injiciendus sit, ut pro meliori illius intumescencia venæ jugulares constringantur, ubi periculum imminet, ne constructis ita venis jugularibus simul insigniter augeatur oculorum inflammatio; unde non aperienda est; nisi tundi possit vena frontis sine hac adstrictione, & per se pateat, & potius omnino eadem est relinquenda. Non tamen nisi præmissis præmittendis hæc vena frontis incidatur; siquidem post eam intempestivè sectam ophthalmiam gravissimam, visus & loquelæ perditionem observavit HILDANVS *Cent. 5. Obs. 18.* Interdum etiam pro derivatione ARTERIOTOMIA temporalis in Ophthalmia contumacissima instituitur: vid. NICOLAVS FONTANVS in *Respons. 99. Curat. Med. l. 1. pag. 30.* ubi habet exemplum Ophthalmiæ per intervalla sæpius recurrentis, idque cum periculo visus, quæ tamen incisione arteriæ temporalis curata, & fonticulo in brachio præservata fuit. Nec in casu difficiliore venarum jugularium incisio inepta & adeò, ut vulgò creditur, periculosa est, testante HILDANO *Cent. 4. Obs. 14.* ut eaeam NICOLAVM FONTANVM l. 4. MERCATVM, & RIVERIUM, qui omnes ex GALENO arteriotomiam commendant. Primò igitur venæ sectio in parte remotiore, hinc propinquiore, ut vena frontis, vel pone aures administranda, nec auscultandus ZACVTVS LVSTITANVS *lib. 1. Prax. Hist. cap. 13.* ubi in ophthalmia magna & atrociori primùm à parte affecta sanguinem mittere jubet. Huc etiam pertinent cucurbitulæ scarificatæ pone aures applicandæ, vid. RHODIVS *Centur. 1. Obs. 79.* qui testem harum usum habet, utut rarò in usum vocentur. Quod etiam spectant VESICATORIA nuchæ, in vice, loco venæ frontis secandæ, aut etiam pone aures applicata, sub pinnula siue lobo, quæ pro aversione usitatissima ac sanè proficua sunt; mirum est, quantum hæc juvent in inflammatione oculorum: vid. LVDOVICI in *Pharmac.* Vtut enim



epim hac saltem sint remedium palliativum, & medeantur ophthalmiæ à posteriori, tamen verissimum est, quod multum illa valeant. Neque ipse credidisset horum fructum adeò insignem esse, nisi ipse eundem vidissem. Et quidem nuchæ applicatae juvant sensibiliter, si recte fiant, quia ibidem arteria cervicalis se dividit in duas partes, in anteriorem, etiam ad oculum progredientem, & in posteriorem circa nucham hinc inde disseminatam: unde vesicatoria, dum in nucha faciunt dolorem, auctiorem eò sanguinis promouent fluxum, dum ex ramo quo interiori sit derivatio quasi ad ramum anteriorem, ut minori impetu ac copiam sanguis ad oculum affluat. Quibus autem non est cutis sanabilis, facile non conveniunt vesicatoria, ut Hydropicis; nam ad gangrænam disponunt: vid. ROLFINCIUS. In contumacissima ophthalmia, ubi non sufficiunt vesicatoria, cum ulcus superficiale post aliquot dies denud sanetur, setaceum applicetur nuchæ, (quæ apud Veteres diversis membris applicata in usu fuerunt,) perquam molestum quidem, sed potentissimum & summè proficuum in oculorum affectibus diuturnis remedium, quod potentiùs & cum majori efficacia serum eliminat, atque ejus stagnationem corrigit: tamdiu autem apertum fervetur, usque levamen æger inde sentiat; de quorum egregia præstantia in Ophthalmia vid. GABELCHOVERVS Cent. 4. Observat. 38. in Schol. HORSTIVS Dec. 7. quæst. 1. HILDANVS Cent. 1. Observ. 41. & 42. & Cent. 4. Observ. 6. 7. 14. 19. & 71. GLANDORPIVS cap. 7. & 14. & SCVLTETVS lib. 1. Tab. 3. Figur. 2. & 3. Loco cuius tamen adeò molesti, in ophthalmiis vel inveteratis contumacioribus, vel ex causa interna crebrius recurrentibus, quales in specie in infantibus observantur, FONTICVLI optimo consilio non raro in brachio vel pede illius lateris, ceu palliativum remedium, excitandi sunt, qui inusti mirum est, quantum possint, in infantibus etiam quinque vel sex annorum, qui sub pubertatis annis, si ita visum fuerit, denud consolidari poterunt. ROLFINCIUS tamen in Epith. Meth. Cogn. & Cur. partit. Corporis Affectus pag. 91. fonticulum in cervice vel bregmate excitat; RIO-LANVS Encheir. Pr. pag. 235. in cavo auris postico; & RIVERIVS Obs. à Martino Comm. 7. in nucha sive spatio inter scapulari; denique, & quidem commodissimè, in brachio lateris oculi affecti. Aut loco setacel in nucha remedium est quasi vicarium fonticulus auricularis, auriculare quasi setaceum, ex radice Thimelæe arborescentis (est ista Thimelæa in specie, quam TABERNÆMONTANVS lib. 3. nomine Thimelæe grana cuiusdam describit, loco cuius & chanielæe vulgaris seu Mezereon, item cortex radiceisfulæ, & hellebori nigri, potest substitui,) qualem fonticulum auricularem, ex radice vel hellebori vel laureolæ seu Mezerei confectum, ceu lingule nobis communicavit Dn. D. MICHAELIS: de quo etiam vid. RIVERIVS Cent. 4. Observ. 100. item VELSCHIVS Mithomim. Cent. 1. Obs. 63. annex. Appendici Miscell. A. N. C. Ann. 4. pag. 39. BARTHOLINVS C. 4. Obs. 80. & TIMÆVS lib. 1. Epist. 22. pag. 52. & TABERNÆMONTANVS lib. 3. pag. 10. Nempè radícula dissecatur in fibrillas, quæ lobo auris perforatæ immittuntur: nempè exsiccata in orbiculis dividitur, postea maceratur in lixivio ex vitium cineribus facto, vel in aqua, in qua nitrum solutum sit; sine præparatione enim aures corrodit & inflamat, quæ acrimonia etiam acidis obtundi poterit. Perforatâ aure, filo butyro pingui trajecto, promotâ suppuratione, secundâ vel tertiâ die fibula radiceis vel orbiculorum imponitur, quæ humores potenter ex capite elicij: singulis diebus recens immittitur; priortamen exsiccata & purgata secundâ & tertiâ vice usum eundem præstat. Confert non solum in graviore ophthalmia, sed & in suffusione incipiente, aliisque malis visum hebetantibus; item in Epiphora magnam affert commodum. Hujus loco radice hellebori recipit TIMÆVS von Gulden Klee in Epist. 20. lib. 1. pag. 52.

Ceterum vesicatoria dictis locis applicanda variè parantur, ordinariò quidem ex fermento, cantharidibus & aceto; malè tamen; cum excitent vesicam dolorosam, & præter hanc id noxæ secum ferunt, quod vesicæ excitatæ non adeò commodè fluant. Porius fiant sequenti modo:

#### 24. Empl. citrinum:

Subigatur hoc cum pulveris cantharidum quantitate debita, prout major vel minor excitanda est vesica, & in forma emplastri applicetur nuchæ, ita sentim excitat vesicam.

Vesica semel facta aliquamdiu fervetur aperta, pro quo Etmull. Oper. Tom. II.

scopo vulgò quidem solum brassicæ rubræ calesfactum applicant, quod quidem aliquid præstat, brevi tamen iterum coalescit vesica. Et peccant hic Chirurghi: nam utut folia illa cum caule applicantur, tamen iterum coalescit vesica. Præter hæc admovent quoque Emplastrum de spermate ranarum; sed hoc adhuc pejus est; quin potius optimum pro apertione servanda est, ut applicetur emplastrum citrinum, vel emplastrum de cerussa, vel de spermate ranarum, cui pro stimulo tantillum pulveris cantharidum additum sit, talis nempe quantitas hujus, quæ solum irriter & pungat, non autem vesicet: Ita quidem vesica semel excitata ad aliquot septimanas optimè potest in continuo fluore conservari. Pulveris hujus pro subjectorum varietate plus vel minus sumendum est, plus scilicet in iis, qui cutim densiorem, minus, qui molliorem obtinent. Aliàs ex cantharidibus nil periculi imminet, nisi quod excitent in quibusdam multum cruentum, exulcerationem vesicæ, vel stranguriam, quod tamen inter mille vix unicontingit. In delicatioribus subjectis loco setaceorum & vesicatoriorum, etiam sacculus HARTMANNI sufficit, ex pulvere seu farina seminis crucæ vel sinapi paratus, qui nuchæ applicatus cutim rubefacit, & ophthalmiam inhibet: vid. Pr. Chymiatri. pag. 99.

Confert quoque Sapphirus in ophthalmiis & nimia oculorum lippitudine, si circulus circa oculum ducatur.

Præter hæc & INTERNE ex FONTE PHARMACEUTICO ophthalmiæ contumaciores, aut ex lymphæ dyscrasia sæpius recidivantes curandæ veniunt, adeoque, præter PURGATIONEM cum Jalappa factam, Decocta lignorum, radiceis chinæ & sarsaparillæ, præsertim ligni juniperi, & omnia juniperina, sunt optima, & à ZACUTO LUSITANO lib. 1. Prax. Histor. cap. 13. commendantur. Sic HORSTIVS lib. 2. Observat. 32. observat ophthalmiam contumacem aliis irritis Decocto sassafras & lignorum curatam. RULANDUS quoque in Thes. Pract. pag. 61. refert de muliere quadraginta annorum, quæ oculi rubore, dolore, lachrymis & cecitate diu affecta, post alia plurima tentata, decem mœnum spatium hisce convaluit. Purgata fuit pridus pilulis hinc Decocto ligni sancti per decem dies usa, post sudorem imposuit aquam ophthalmicam ex antimonio, & sic convaluit. Conf. GALENUS lib. 13. M. M. cap. 11. & ROLFINCIUS lib. 3. Consult. Med. 3. Ac sanè causarum ophthalmiam antecedentium magna habenda est ratio: Nam ophthalmia ex sumis metallicis, frustaneis externis per interna mineralia curata fuit ab HORSTIO lib. 7. Observat. 27. Sic BARTHOLINUS ophthalmiam in prægnante, quoties uterum gerit, pertinaciter recurrentem, sternutatoriis & venæ sectione curavit, Cent. 6. Histor. 31. Ophthalmiam Gallicam Mercurii ope curatam videbitis in ZACUTO LUSITANO lib. 1. Prax. Obs. 45. Denique cinnamomum jejuno stomacho comestum fluxiones in oculum promover, teste PANAROLLO Pent. 2. Obs. 28. Quibus insuper accedunt alterantia cephalica & exsiccantia vulgò dicta, exempli gratia fœniculum, rosmarinus, euphrasia, betonica, Valeriana, & ligna aromatica, horumque decocta & essentia.

Quoad remedia EXTERNA seu TOPICA, ipsi oculis admovenda, sunt varia: Practicis pluribus in usu est communi, ut applicentur lat, imprimis muliebri, nunc solitarium, nunc aliis mixtum; sed pessimo consilio: item interdum propter dolorem quidam applicant opium, sed sæpissimè periculoso cum eventu; opium enim demulcet quidem dolorem, sed simul in ophthalmia illud & omnia opiata sunt nociva, quia facile inflammationem ad cecitatem & gangrænam disponunt, & inhibent insensibilem transpirationem. Sic quoque lacticia nocet: quodcumque si recens instilletur oculis, incrustat eos unctuositate suâ, & quasi sordibus inficit, unde impedit insensibilem transpirationem ejus, tunc maxime necessariâ, Inflammationem potius augeat: Si verò lac non recens applicetur, nocet subtili suo acore, quoniam lac muliebri, sicuti omnia alia lacticia, facili acorem contrahit, & ita accescendo oculum lædit, grumescit, & in caseum abit; qui grumi oculis incumbentes eos excitant maxime sensiles, adeoque Ophthalmiam majorem reddunt: unde caveamus nobis ab opio & lacte, nisi summa urgeat necessitas. Rectè igitur LINDANUS



dicat; se sapissime vidisse lac & opium applicatum, nunquam tamen felicem usum observasse. Quæ ergo conveniunt in ophthalmiis externæ, sunt imprimis *sperma ranarum*, vel per se asservatum, vel secundum TACHENIUM destillatum, item aqua cancerorum fluvialium ex iisdem contusis, & cum putrescere incipiunt, maturè destillatis, elicita, in specie aqua cancerorum fluvialium cum chelidonio maiori aut succo ejus destillata: de modo vid. MYNSICHTH in *Armat. Chymic. pag. 296.* Item CROLLIUS in *Basil. Chym. Item oleum seu potius liquor florum cyani, liquor florum calcatrippæ aut florum cichorii per deliquium in furno pistorioparati, admodum efficaces & nobilissimi sunt, quos omnes Auctores unanimiter commendant. Parandi modus vid. in SCHROEDERO, ubi de Cichorio, & HARTMANNO, ubi de Ophthalmia. item in SENNERTO, ubi de Ophthalmia pag. 786. Sed observandæ sunt encheirises: Flores rose matutino humidi vitro includantur, (vitra sint crassa, & quod crassiore crustâ farinaceâ obducuntur, eò melius est,) materia sinenda est aliquamdiu in aere sicari, ne disrumpatur. Rarè unâ vice sequitur liquor, relinquatur donec bis coquatur panis, & diutius. Nobile remedium est, in quacunque Ophthalmia egregium. Succus baccarum herbæ paridis expressus excellens habetur remedium ad Ophthalmias & epiphoras; vid. VELSCHIUS *Mistom. 25. cap. 1. annex. Anno 4. M. A. N. C.* Huc pertinet phlegma spiritus vitrioli epileptici, quod alterâ vice prodit, oleum sacchari per deliquium, spongiæ sambuci, aquæ florum sambuci aut calcatrippæ, infusæ & applicatæ. Mucilagines etiam seminis Psylli, Cydoniorum, sœnugræci, althææ, cum aqua chelidonii majoris aut alia appropriata extractæ, addito saccharo Saturni, & tantillo camphoræ, etiam sunt egregiæ, cum linteis multiplicatis applicatæ, in specie si à causa externa oriantur Ophthalmiæ: ver. gr.*

℞. Aqua Fl. Cyani ℥ij.

Mucil. sem. Cydon. cum aqua sperm. ranar. extr. ℥j.

Croc. gr. vj.

M. f. Epithema,  
D. S.

Epithema refrigerans & leniens.

℞. Mucil. sem. Cydon.

Hormini,

Sœnugr. ec. cum aqua chelidon. mai.  
vel flor. Cyani extract. ana ℥ss.

Sacch. saturni gr. vj. jx. ad xij.

Diluantur cum l. q. aquæ fœnicul. vel chelidon. maior. vel euphras.

usurpatur pro Collyrio.

D. S. ut antea.

Nam ipsum Saccharum Saturni cum aqua appropriata dilutum & oculis impositum, est egregium antiophthalmicum. Vel

℞. Aqua Euphras.

Fœnic. ana ℥j.

Album. ovi Num. j.

post conquassationem dissolve

Sacch. saturni ℥j.

M. S. ut supra.

Applicatur tepide cum linteis.

Saccharum Ioviale, ut vocat LINDANUS, est præstantissimum, quod sequens est:

Teratur saccharum candi probe contritum in cyatho vel scutella stannea nova, nec usurpata, cum novo cochleari stanneo, idque tamdiu, donec saccharum bene tritum & agitatum fiat instar plumbi lividum, & quod magis liver, eò est melius. Nec potestis nimis diu terere, & sic habebitis optimum ophthalmicum, quod vel in forma pulveris seorsim potest oculis insufflari, vel cum aliis appropriatis admisceri; verbi gratiâ:

℞. Aqua Plantag.

Rosar. vel sperm. ranar.

Fœnic. ana ℥ss.

Sacch. candi Iovial. ℥ij. vel ℥iij. ad ℥ss.

Tutia præp. ℥ss.

Cruci Or. gr. ij. vel iij. ad gr. jv.

M. f. exinde Collyrium.

De quoter vel quater in die guttæ aliquot in oculum instillantur. Dicit esse anodynum optimum, refrigerare &

discutere dolores. In principio enim morbi, dum dolor, rubor, fervor, & lachrymarum acrium fluxus urget, absorbentia metallica appropriata imprimis conveniunt, qualia sunt in specie tutia preparata, rubrica, cerussa, creta, & hinc flores zinci, flores Iovis à BARBETTE laudati, quæ sunt appropriatissima absorbentia & correctiva acris plus minus acidi, oculos inflammantis: quibus addatur mater perlarum, lapides cancerorum, lapis calaminaris exactissime preparatus; verbi gratiâ:

℞. Aqua Fl. Cyani

Euphras.

Verben. ana ℥ss.

Tut. præp. ℥j.

Matr. perlar. præp. ℥ss.

M. D. S.

Aqua ophthalmica.

De qua mixtura instilla aliquantulum oculis, & simul madentes petias impone. Vel

℞. Aqua Chelid. maj.

Euphras.

Fœnic.

Ruta ana ℥j.

Tut. præp. ℥j.

Margar. præp. gr. vj.

Camph. gr. iij.

M. S.

Aqua ophthalmica singularis.

℞. Aqua Plantag.

Fœnic.

Sperm. ranar. ana ℥j.

Tut. præp.

Ceruss. pulveris. ana ℥ss.

Camph. gr. vj.

Croc. gr. iij.

stent in loco calido:

D. S.

Collyrium.

Facit huc Collyrium Lipsii contra ophthalmiam ex variolis sapissime recurrentem. Casus notabilis & curiosus: descriptio rudis hæc est:

℞. Tut. præp. ℥j.

Vitrioli alb.

Sarcocoll.

Nihil alb.

Aloes lotæ ana ℥j.

Camph. gr. xv.

Aqua fœnicul.

Rosar.

Chelidon.

Pimpinell. ana ℥iij.

Album. ovi Num. j.

Offis sc. ℥j.

M. f. Collyrium.

Quo ipso post variolas secutam oculi ungulam seu unguem etiam feliciter sustulit.

Vel in eodem casu convenit sequens formula, quam dedi in Colleg. Formular. pag. ....

℞. Aqua Plantag.

Euphras. ana ℥j.

Tut. præp. ℥ss.

Camph. gr. v.

Croc. gr. iij.

M. pro Collyrio: S.

Collyrium.

Instilletur aut applicetur oculo; visum præservat à variolis.

Porrò phlegma aluminis primò prodiens insigniter laudatur à POTERIO, & etiam aliis. Egregium etiam est albumen ovi cum aqua spermatis ranarum bene conquassatum, in principio applicatum. Egregiè etiam convenit albumen ovi cum frusto aluminis probe concussum & conquassatum in patina stannea tamdiu, donec unguenti consistentiam adeptum sit, nunc solitariò, nunc ana, respectu aluminis ovi, vel parum aquæ rosarum aut fœniculi addendo: Conf. BORELLUS Cent. 1. Obs. 31. Hoc extenditur suprâ linteum duplicatum, & tepidè oculis applicatur, conducit in principio Ophthalmiæ. Vel

℞. Aqua Tormentill. vel rosar. vel flor. cyani,

Plantag. ana ℥j.

Album. ovi Num. j.

Alum. gr. v. vij. ad vij. vel ℥ss.

Con-



Conquassentur probe:

D. S.

*Mixtura oculos refrigerans.*

Cum quo coincidit, si recipiatur *Lithargyr. aur. pulveris.* q. v. idque decoquatur in *aceti vini* q. s. ita surgit liquor dulcis adstrictorius, quasi aluminosus, qui filtratus per chartam, & cum linteis oculis impositus, egregie prodest.

Infusa etiam antimonialia sunt optima: nempe aquæ destillatæ florum cyani & calcatrippæ, chelidonii majoris, euphrasæ, sœniculi, &c. optimè infunduntur croco metallorum, vitro antimonii, aut, quod melius, capiti mortuo butyri antimonii pulverisato; quæ probe filtrantur. Siquidem ad hunc modum parantur *aquæ ophthalmicæ Crollii & Rulandi*, quæ oculis instillatæ, vel cum linteis multiplicatis, sunt egregiæ, addendo simul, ubi ardor urget, saccharum Saturni aut parum camphoræ, v. g.

℞ *Vitr. antimonii pulveris.* ℞. ad ℥j.

Infund. in

*Aqua flor. cyani**Calcatripp. vel euphras.**Sperm. ranar. an. ℥j.*

Stent in loco calido per noctem; manè filtrentur; adde

*Sacch. Saturni* ℥j. ad ℥ss.*Camph. gr. iij. vel iv. ad vij.*

M. D. S.

*Collyrium.*

Instillantur oculo, &amp; cum linteis multiplicatis tepide applicentur eidem.

Quod si intensus æstus simul adfuerit, addi possunt sacchari Saturni ℥ss., & Camphoræ gr. v. Vel

℞ *Vitr. antimonii pulveris.* ℥ss. ad gr. xv.

Infunde in

*Aquæ sperm. ranar. vel fragor. ℥ij.*

Stent in loco calido per noctem; manè filtrentur; adde

*Ceruss. vel sacch. Saturni subtilissimè pulver.**℥j. ℥ss. ad ℥j.**Camph. gr. vj.*

M. S.

*Collyrium.*

Pertinet denique huc etiam *Vitriolum album*, Germanicè *Gallitz - enstein*, & hinc *vitriolum Cyprium*, quæ egregia ad oculorum inflammationes sunt remedia, si scilicet horum unum albumini ovi indurato & excavato indatur, ut liqueat; sic enim fit *collyrium ophthalmicum* magnæ commendationis: in specie misceri possunt cum tutia præparata, ubi lachrymæ acriores adfuerint. Vel

℞ *Ov. gallinac. integrum* ad duritiem coctum, & dempto vitello excavatum:

Cui immitte

*Sacch. Saturni gr. vj.**Vitriol. alb. gr. viii.**Camph. gr. ij.**Mell. rosar. ℥ss.*

Hæc indantur ovo, & fiat expressio fortis: expressus liquor instilletur subinde oculo:

D. S. ut suprà.

Ubi observetur, quod tale *collyrium* imprimis conveniat, ubi lachrymæ nonnihil sunt crassæ, & ubi inviscantur palpebræ oculorum.

Quantum enim valeant *Misuræ* ex vitriolo albo in ophthalmiis, vid. in *RIVERII Praxi*, *BARBETTE Chirurg. p. 150.* & *THONERO in ejus Obs. p. 116.* ad cujus imitationem aliquoties præscripti:

℞ *Aquæ rosar.*

*Plantag. ana ℥ij.**Solan. ℥j.**Vitrioli albi* ℥j.

solve, filtra, &amp; adde

*Tut. præp. ℥j.*

M. D. S.

*Collyrium.*

Hoc *collyrium* bene agitatum cum linteis imbuto & expresso repide applicatur oculis, quod egregie profuit: interdum aliquot grana camphoræ addita fuere.

De aqua rosarum vid. *TACHENIUS in Hippocr. Chym.* cujus loco potius aqua florum cyani vel spermatis ranarum sumi posset.

Aliam formulam vid. in *Colleg. Form. l. a.* Vel

℞ *Aquæ Chelid.*

*Fœnicul. ana ℥vj. ad ℥ss.**Vitriol. alb. gr. liij. iv. q. l. v. ad ℥ss.*

dissolutis &amp; filtratis adde

*Tut. præp. gr. iij. iv. v. vi. ad ℥ss.*M. pro *Collyrio*, oculis applicando.

D. S. ut suprà.

℞ *Aquæ Chelid. mai.*

*Flor. Cyani**Calcatrippæ ana ℥j.**Vitrioli albi gr. xii.*

solutum filaretur per chartam:

adde

*Tutia præp. ℥ss.*

M. D. S.

*Collyrium.*

Vel

℞ *Aquæ Fœnic. vel rutæ,*

*Euphras,**Flor. Cyani ana ℥ss.**Vitrioli albi gr. iv. vel viii.*

Solutionem filtra per chartam emporeticam:

adde

*Sacch. Jovial. ℥ij.**M. f. Collyrium*

D. S. ut suprà.

℞ *Vitrioli alb. ℥ss.*

*Aquæ chelidon. mai.**Fœnic.**Flor. Cyani ana ℥vj. ad ℥j.*

filtra &amp; adde

*Tut. præp. ℥ss.*

M. S. ut suprà.

Calidè instilletur oculo.

℞ *Aquæ Euphras.*

*Flor. Cyani ana ℥ss.**Vitrioli de Cypro ℥ss.*

solve &amp; filtra:

adde

*Tut. præp. gr. xv.*

M. S. ut suprà.

Ac sanè in statu morbi mirabiliter conveniunt hæc *collyria vitriolacea*, quorum aliquot egregia exempla videbitis in *BARBETTE Praxi*, ubi de *Catarrhis*.

Cum his tamen simul observetur differentia lachrymarum aut sordium in oculis: ubi enim sunt viscidæ, glutinosæ, ibi dilutiora magis conveniunt; ubi sunt nimis copiosæ, sed non acres, moderate adstrictoria, speciatim vitriolacea, conducunt; ubi verò acriores sunt & corrosivæ, in tali casu semper remediis simul pro his temperandis metallica fixa addenda sunt, v. g. *Tutia præparata*, *Cerussa*, *saccharum Saturni*, *lapilli cancrorum præparati*, *lapis calaminaris*, *margaritæ præparate*, imprimis flores *zynci*, vel flores *Jovis*, quos *BARBETTE l. a.* insigniter commendat in corrosivis & acribus lacrymis, & inde ortis ophthalmiis. In *BARTHOLINI Alti. Med. Hafniens. Vol. 2. pag. 302.* sequens laudatur *Unguentum*.

℞ *Ungu. Nihili*

*de Tut. ana ℥ss.**Marg. præp.**Corall. rub. præp.**Lapill. Caner. præp.**Tutia præp.**Sacch. Saturni an. ℥j.**Camph. gr. xii.**Fol. Auri,**Lune ana Num. iv.*f. *Unguentum*.

Horæ decubitus lentis magnitudine cantho oculi majori indendum, & infra palpebras illinendum.

Aliàs supervivum cum foliis sœniculi contusum & applicatum etiam elegans ophthalmicum est incipiente ophthalmia.

Quod si verò rubor & tumor oculi est saltim superficialis ex causis externis, in specie ex rebus & pulveribus incidentibus in oculos, tunc conveniunt leuiter discutientia, præter mucilagines suprà præscriptas; egregium remedium est frustum recens carniæ vitulina vel bovina crude, magnitudine & crassitie thaleri, tempore decubitus oculis admotum; hoc enim ardorem, rubedinem & tumorem oculorum à causa externa insigniter discutit.

Quod si malum sit occasione aeris inclementioris, cum ventus aliquid adflaverit, similiter mucilagines jam laudatæ sunt optimæ.



Cæterum sæpius urget in *Ophthalmia* intensissimus dolor & ardor oculi, malum exasperans, pro quo, etiam illis in casibus, compescendo nil melius est *Cataplasmate* ex pomis dulcibus & benè odoratis, sub cineribus aut cum aqua appropriata coctis, parato; v.g.

℥. Pom. Borsdorff. sub ciner. assat. vel poma recentia Num. iij.

coqu. in f. q. aquæ flor. Cyani, vel Euphras. & rosar. ad mollitiem, trajiciantur per setaceum:

Pulpæ trajectæ adde

Tutia præp. vel facebar. albiss. vel Jovial. Lind. ℥ij.

Campb. gr. x. vel xij.

Croc. gr. iij. vel iv. vel v.

M. f. Cataplasma:

D. S.

Cataplasma leniens.

Applicetur tepidè cum linteis multiplicatis. Experimentum est TIMÆI von Guldenkle, contra dolorem partium, in specie ophthalmiam, in Casibus lib. 1. Cap. 21. pag. 48. BARBETTE in Chirurg. item SCULTETI in Armam Chir. Observ. 25. & D. MICHAELIS in Colleg. Jonsen.

Quod si *Ophthalmia* ex istu apis, curatur optimè collyrio ex alumine & albumine ovi supra dicto.

Quoad OPHTHALMIAS NOTHAS seu SICCAS: eadem ferè conveniunt: Præcipuè tamen aquæ cancerum, mucilagines, alumen cum albumine ovi supra laudatum; item Lithargyrium in aceto coctum, modo supra laudato egregium est. Vel

℥. Butyr. rec. non salis. ℥ss.

Sacch. Saturni

Tut. præp.

Lap. calamin. præp. ana ℥j.

Campbor. gr. j.

M. f. Linimentum.

D. S.

Unguentum ophthalmicum.

quo palpebræ sæpe illinantur.

## CURA EPIPHORÆ.

**I**N cura Ophthalmiæ magis serosæ seu Epiphoræ, causarum habenda est ratio: unde

1. Læsiō & irritatio à causa externa est removenda, & inducta læsiō corrigenda.
2. Lymphæ interdum vitium, ejus scilicet aciditas & acrimonia internis catarrhalibus generalibus est corrigenda; unde quæ in genere in Catarrhis laudantur, hic observanda: exterius verò acrimoniam ejus temperantibus, & blandè adstringendū humorum excretionem impediētibz, succurrendum, ubi ferè in genere ea conveniunt, quæ jam in Ophthalmia commendata fuerunt.
3. Glandularum tonus laxus blandè adstringentibus est firmandus.

Desternutatoris resest dubia, an in affectibus oculorum lachrymalibus aut in quibusdam aliis conveniant? Et sanè unumquemque terrere debent exempla ab experto HILDANO adducta Cent. 1. Observ. 24. item Cent. 2. Observ. 13. item Cent. 4. Observ. 12. & 13. ubi inter alia sternutatoris, aut nimis, aut in affectibus oculorum aliàs adhibitis, cecitatem inductam refert. Econtrà suadere eadem possunt ea, quæ habet BARTHOLINUS Cent. 2. Epistolarum pag. 267. & Cent. 4. pag. 4. 11. & 523. Et hæc ipsa roborari possunt ex STENONE, qui observat vasculum quoddam excretorium ex utroque oculo ad nares tendere, & sub ejusdem membrana intima per longum ejus protendi, & tandem in narium cavum aperiri: ratione cujus vasculi non raro collyria seu medicamenta ophthalmica externè oculis applicata, subindè in ore paulò post gustata fuerint, ratione istius ductus, quo in nares, hinc in os, medicamenta ophthalmica fuere translata. Sed quicquid horum sit, fateor, me esse admodum timidum in applicandis sternutatoris in oculorum affectibus: Nam HILDANI vestigia me terrent. Si tamen interdum eadem usurpanda, (1.) applicanda sunt eadem non in principio, sed in declinatione; (2.) sedatà jam maximà ex parte inflammatione, quæ ut plurimum accedere solet; (3.) moderata applicanda sunt sternutatoria, nullo verò modo aciora aut fortiora.

Quæ ergo conveniunt remedia in Epiphora, blandè adstringentia sunt.

Commendatur igitur sequens experimentum, non inelegans, quod laudat TIMÆUS von Guldenkle in Epiphora:

℥. Rad. Tormentill. grosso modo pulv. ℥j.

Alum. gr. v.

Aquæ rosar. vel flor. Cyani,

Plantag. ana ℥j.

stent in loco calido per diem & noctem, filtrantur & referuntur ad usum: S.

Adstringens ophthalmicum.

Totia præparata, & cum aqua sceniculi subacta, oculis instillata est egregia. Valde quoque prodest Decoctum corticum granatorum, quod habet HARTMANNUS in Praxi Chymiatr. cap. 36. & etiam commendatur ad præservandos oculos in variolis: si adest tumor, parum de floribus chamomillæ potest addi; hoc enim vi suâ adstrictoria optimè eam sistit; sicut & illi, si lachrymæ aciores affligant, Tutia addi potest.

Alii insigniter commendant cortices myrobolanorum citrinorum: hos infundunt in aqua rosarum per tres dies, deinde exsiccant atque pulverisunt; iterum infundunt, idque ter vel quater: pulvis ita præparatus mirabiliter oculorum lachrymas consumere, & oculos eleganter adstringere prædicatur.

Porro verno tempore, cum floret salix, incisio cortice effluit liquor, qui oculis instillatus aut illitus mirabiliter superfluum humiditatem absorbere, lachrymas oculorum, sistere, & hebetem visum confortare dicitur à SOLENANDRO Conf. 8. sect. 2. Quidam commendant etiam ad lachrymas involuntarias Rutam siccam, quam miscent cum melle & aceto, coquunt, colant per pannum lineum, & colaturâ oculis inungunt, & certò lachrymas sistere dicunt. Thus alii cremare, & septies in aqua rosarum extinguere jubent, & aquam istam postmodum oculis instillant pro sistenda Epiphora. FORESTUS lib. 11. Observ. 14. commendat hoc collyrium, quod multis etiam lacrymis emanantibus cum oculorum rubedine, ita ut etiam ægylops impenderet, profuit, & convenit etiam in Epiphora catarthali:

℥. Tutie præp.

Sarcocoll. ana ℥j.

Vitrioli Rom.

Sem. sumach. an. ℥ss.

Ligentur in nodulo, qui imponatur huic aquæ.

℥. Aquæ Euphras.

Rosar.

Fenic. ana ℥j.

quæ agitata invicem pro collyrio oculis instilla, aut his oculis fomententur.

Decoctum ossium bubulorum & palearum tritici est secretum BURRH in Epiphora, uti hoc videbitis in ejusdem Epistol. de Humoribus Oculorum restituendis pag. 54. Liquor seu oleum florum cichorii & cyani, vel & liquor sceniculi saccharatus ex BARTHOLETO, sunt egregii. Descriptionem communicavi supra in Cura ophthalmiæ veræ. Quin tutia præparata cum aqua sceniculi oculis instillata admodum temperat aciditatem; item saccharum Saturni, cerussa, mucilago seminis cydoniorum cum saccharo Saturni, florum zyncl, lapilli cancerorum minutissimè pulverisati, succinum pulverisatum, & denique lapis calaminaris præparatus, qui singulare remedium dicitur fuisse PARACELSI in talibus casibus. Modus præparandi est:

℥. Lap. calaminar. ℥j.

Pulverisetur subtilissimè & superfund.

Spiritus vini opt. ℥ss.

Hinc incendatur & consumatur spiritus:

Remanentia iterum pulverisetur, & superfundatur

Vini albi clari, aut loco vini aquæ rosar. ℥ij.

vel liij.

& ita f. Collyrium, manè & vespere applicandum.

Tandem potest etiam usurpari Decoctum soliorum cydoniorum, laudatum à RIVERO in Praxi contra ophthalmiam, quod exscripsit ex SOLENANDRO: Nempe

℥. Fol. Cydon. primo vere collect. integror. illæsor. & à corruptione diligenter præservator.

M. j.

coqu. in aqua puriss.

quo decocto subindè oculi humectentur ac irrorentur. Insigniter commendat hoc ipsum ad discutiendum ruborem, & etiam curandam ophthalmiam.

Vel albumen ovi Num. j. cum saccharo Joviali & aqua rosarum



rum miliceatur, & vesperi oculis applicetur. Vel albumen ovi conuassatum cum succo sempervivi & flor. fabarum impositum confert. Egregium etiam est, si dimidium pomi Borsdorffiani, putrefacti nuchæ alligatur: Vid. D. LANGIUS in *Miscell.* Alla, ut lapis hematites, aqua sigilli Salomonis, aqua rosarum, infusio *Sumach*, aqua ophthalmica Maximiliani Imperatoris, &c. ex Practicis sponte innotescunt.

Quod si pulveres in oculos incidentes vel aliæ res inducant Epiphoras, tunc optime retrahuntur hi ipsi beneficio lapillorum cancrorum, si scilicet hi imponuntur oculis, ita, ut pars cava oculi bulbum tangat, & ita clausis palpebris agitur hinc inde in oculis, & inde subito illapsa extrahantur. Vidi hoc probatum. Semen selææ oculis intrusum etiam ad extrahendas res alienas ex oculis admodum laudatur. Si incidat in oculum festuca vel palea, extrahitur cum frustulo succini, prius panno bene affrici. Si scobs ferri vel chalybis in oculos inciderit, magnes oculo aperto applicanda secundum experimentum HILDANI *Cent. 5. Observ. 21.* Modum chirurgicum rem illapsam extrahendi per instrumentum, vos docebit HILDANUS *Cent. 2. Obs. 14.* item *Cent. 4. Obs. 18.*

Denique si lymphæ concurrat vitium, vel nimia acrimonia, ea, quæ in Ophthalmia vera fuisse laudata, conveniunt: In specie opera danda, ut acrimonia salsa temperetur, & acida corrigatur.

Remedia hæc etiam in Lippitudine conducunt.

## ARTICULUS XVI.

### DE

## INFLAMMATIONE AURIUM, earumque ULCERE.

**D**ENIQUE INFLAMMANTUR etiam interdum AURES, nempe auris interna, ejusque membrana meatum auditorium succingense idem subiecta esse solet.

### CAUSÆ.

Præter EXTERNA occasionaliter hæc inferentia, qualia sunt vel vulnerantia, aut contundentia, nec non auribus intrusa, quorum exempla videbitis in FORESTO *lib. 11. cap. 3.* & HILDANO *Cent. 1. Obs. 45.* subinde, etiam sponte sua ex CAUSA INTERNA eadem concluditur. Nam in Parotidibus dolor auris inflammatorius percipitur, qui tamen mox transit.

### DIAGNOSIS.

Cognoscitur ex insigni ardore in aure, ex dolore continuo tensivo & pulsatili vehementissimo in aure, & cernitur interdum rubor quidam auris externæ, quod magis nempe ad exteriora vergit inflammatio; quæ ubi fuerit gravior, ad malas, & tempora usque se extendit; sicuti, ubi magis interiora inflammantur, pulsatorius dolor gravior esse solet, in quo casu & febris & subinde delirium etiam, imò & interdum motus convulsivi superveniunt: vid. FORESTUS *l. a. Obs. 5.*

### PROGNOSIS.

Interdum satis periculosum malum Inflammatio aurium esse solet; in tantum lethale est, & graviora symptomata conjuncta habet: nam hæc insensibiliter discutitur, aut suppuratur, & in abscessum degenerat, qui ulcus aurium post se relinquit.

Dum suppuratur, res non caret periculo, propter febrem & conjunctum dolorem, quo interdum cerebrum ejusque membrana periculosissime afficiuntur, sicque delirium supervenit.

Pueris & juvenibus periculosus est, quàm senibus; hi enim brevi & ante diem septimum mori solent: sin verò superveniat suppuratio, & materia in pus laudabile convertatur, maior spes reconvalescentiæ expectanda. Sic enim EPIPHANIUS FERDINANDUS *Histor. med. 14. lib. 1.* refert Inflammationem aurium & dolorem intensum cum febre acuta, delirio gravi, &c. per excretionem copiosam puris die morbi nono, Inflammationis septimo, criticè curatam. Mirabile Inflammationis acris exemplum est, quod

BARTHOLINUS *Cent. 3. Epist. 17. pag. 67.* refert, in abscissu aurium erumpens pus & vehens simul secum dentem, sine defectu dentis ullius in maxillis.

Subinde Hemiterania alique similes chronici affectus capitis, per abscessum auris, solute observantur; vid. HORSTIUS *lib. 2. Observ. 10. pag. 444.* ut nec auris suppuratio propter erosionem tympani, vel ipsius nervi auditorii, aut alia symptomata graviora supervenientia, omni periculo, ad minimum surditatis, careat; adeoque insensibilis Inflammationis discussio tutior est, quàm suppuratio. Unde si auris inflammatio interiora magis occupaverit, & suppuretur, superveniunt interdum ulcera diuturna, pus ab aurium abscessibus natum tympani membranam exedit, quæ quandoque integra reicitur, interdum putredine absumitur: vid. HORSTIUS *lib. 9. Observ. 8.* Cæterùm quod dicat, tympani hanc excretionem observatam fuisse citra auditus læsionem, dubito, & suspendo hæc in parte judicium.

### CURA.

In CURA sudorifera repetita, & venæ sectio, alique UNIVERSALIA præmittenda sunt: loco verò venæ sectionis scarificationes pone aures institui, aurium venis hirudines admoveri possunt, utpote quarum usu favas & desperatas aurium inflammationes solutas ZACUTUS LUSITANUS *lib. 1. Prax. Admir. Obs. 64. & lib. 1. Princ. Hist. cap. 14.* testatur.

EXTERNA quoque nonnisi cautè & consideratis probe omnibus circumstantiis applicanda: Nam talia plus interdum nocent, quàm prosunt. Vid. *Miscellan. A. N. C. Ann. 6. Observ. 82. pag. 117.* Id quod in specie de actu frigidis aut repellentibus intelligendum venit, quæ etiam reliciuntur à RIVERIO *lib. 2. Prax. cap. 2.* SCHNEIDERO de *Catarrh. specialib. pag. 181.* SEPTALIO *Animadvers. lib. 6. §. 103.* & HERCULE SAXONIA *Prælect. P. 1. cap. 12.* Optimè curatur, vel quando maturè discutitur, vel quando suppuratur, & degenerat in abscessum. Opera igitur danda est, ut discutatur quantocyus tumor inflammatorius: quod si fieri nequeat, ad suppurationem perducatur. Discutient tumorem oleum chamomillæ cum balsamo sulphuris mistum; balsamum siquidem sulphuris per se nobile est: interim si hoc paulò acrius sit, misceatur cum oleo chamomillæ. Præterea etiam conducit oleum chamomelinum, vel oleum rosaceum, in quo millepedes vel lumbrici bullierint, vel oleum scorpionum & lini, oleum decoctionis lumbricorum terrestrium, vel millepedum, &c. tepidè auribus instillatum, vel oleum rosaceum cum mucilagine seminis cydoniorum applicatur, aut cum bombace isdem intincta immittitur; oleum vitellorum ovorum egregium est remedium ad inflammationem aurium, & laudatur admodum à PETRO JOHANNE FABRO *Curat. 53. & 54.* & ZACUTO LVSITANO *Hist. Med. Princ. Histor. 59.* utpote quod non solum anodynum est, sed etiam in principio Inflammationem discutit, factam verò suppurationem subito aperit. Nobilius est oleum, in quo cancri fluviatiles confusi bullierint, quippe tale ob alcali susceptum laudatur à THEODATO in *Panth. Hygiæ*. tam ad Inflammationem aurium discutiendam, quàm mitigandam, si instilletur; efficacissimum enim est ad dolores & ardores aurium curandos. Decoctum absinthii, centaury minoris, abrotani, & alia aromatica auribus immissa, vel spiritus vini, vel spiritus salis ammoniac cum mica panis calida auribus applicetur. Videatur SYLVIVS de *Morbis Infantum capit. 9. paragr. 87.* Instillantur vel applicantur hæc ipsa cum bombace auribus. Item succus sempervivi majoris auribus instillatus egregiè convenit in Inflammatione; nam etiam aperit: v. g.

2℥. Succ. semperviv. mai. ʒiʒ. ad ʒij.

Ol. rosar. vel scorpion.

Lumbric. terrestr.

Chamomill. ana ʒj.

M. D. S.

Mixtura resolvens.

Applicantur cum bombace auribus, vel instillantur.

Fomenta aurium ex Decocto plantarum emollientium & discutientium externe applicata egregiè conducunt.

His & similibus si non discutatur Inflammatio, sed ad abscessum pergat, properemus ad suppurationem, pro qua pro-



promovenda speciatim convenit cataplasma ex medulla panis albi in lacte cocta, addendo vitell. ovorum, ut describitur à RIVERO:

℞. Medull. panis alb. ℥j.  
Coqu. in lacte caprino ad pulvis consistentiam;  
deinde adde  
Vitell. ovor. num. ij.  
Ol. rosac. ℥ij.  
Croci ℥j. vel ℥ij.  
F. Cataplasma.

quod extra applicatum auri suppurationem promovet.

Sicuti in specie Cataplasmata cepacea, aut capita allii sub cineribus cocta, bene contusa & auribus applicata, has Inflammationes & maturant & abscessum aperiunt: v. g.

℞. Cepar. sub ciner. assat. num. j.  
Butyri ℥ss ad ℥j.  
Olei Chamomill.  
Amygd. dulc. ana ℥ss.  
Croci ℥j.

Misceantur, pistentur, & calidè in forma cataplasmatismis auribus inflammatis ad suppurationem tendentibus applicentur. Conf. RIVERIUS lib. 2. Prax. pag. 206. FORESTUS lib. 12. Obs. 4. AMATUS LUSITANUS Cent. 7. Curat. 92. & HOFERUS in Hercul. Medic. pag. 62.

Vel

℞. Herb. Malv.  
Alth.  
Violar.  
Flor. Chamomill. ana M. j.  
Rad. alth. pulveris.  
Lil. alb. ana ℥ss.  
Caric. pingv. num. vj.

Coqu. in f. q. aquæ ad consistent. Cataplasmat.  
adde

Medull. panis tritic. ℥ss.  
Farin. sanogr. ℥ss.  
Olei chamomill.  
Lil. alb. ana ℥j.  
Vitell. ovor. ℥ss.  
M. D. S.

Cataplasma maturans.

Post Inflammationem aurium sequitur subinde Abscessus, adeoque

## U L C U S A U R I U M.

ULCERA AURIUM aliàs sunt vel VERA vel APPARENTIA: VERA vel ex abscessu post Inflammationem nato, vel ex acriori lymphæ eò delata, meatum interius exulcerante: APPARENTIA Ulcera sunt, quando sanies subinde multiformis ex auribus effluit, vix cum, nunc sine præcedente earundem dolore, qui effluxus subinde diu durat, & quo cessante varia capitis & cerebri superveniunt symptomata, quæ levantur sub fluxus continuatione; uti in infantibus subinde observatum est, qui per huiusmodi aurium fluxus plus minus sordidos à pluribus malis, tam externis quam internis, levati solent.

## P R O G N O S I S.

Vera aurium ulcera, si diuturna aut inveterata sunt, facile in fistulam degenerare solent, vel erodendo occasionem membranis suggerunt, ut hyper-sarcoma (Ger. Wild fleisch) succrescat, quod auditum obturet.

Pus quod effluit, si sit album, æquale, substantiæ mediocris, melius est, quam si inæquale, foetens, saniosum &c. fuerit.

## C U R A.

In CVRA observandum est, ne apparentia huiusmodi ulcera aurium, seu effluxus eorundem plus minus saniosus citò nimis sanentur, præsertim in subjectis vel humidioribus, vel excretionibus capitis cutaneis, vel affectibus cerebri & capitis internis obnoxiiis, idque in infantibus imprimis observandum, ne major noxa inde oriatur; sufficit, si modò mundus servetur meatus auditorius, id quod optimè mediante urina humana assequimur.

Quoad ulcera vera: præmissis præmittendis internis, v. g. PURGANTIBVS, aut SUDORIFERIS, aut essentialiognarum, &c. ulcus mundificandum, & hinc consoli-

dandum venit. Mundificat optimè urina humana infusa, aut urina, in qua rasura ligni guajaci maduerit; item phlegma urina spirituosum. Vel

℞. Vini alb. subtilis dulc.  
Urina pueror. ana ℥j.  
Mellis ℥ss.

Ebulliant leviter,  
D. S.

Mixtura mundificans.

Quibuscumque meatui auditorio instillatis, aut cum tu rundulâ isdem ebrâ immixtis, ac mane & vespere repetitis, ulcus mundificabitur.

Item succus, vel syrupus, vel essentia absinthii, aut marubii, cum paucis melle rosato, item syrupo Nicotianæ, egregiè conveniunt. LYSERVS in Observ. pag. 233. refert ulcus periodicum auris curatum per instillationem succi marubii, misti cum melle. Sic alumen ustum cum vino mistum, in aurem si infundatur, potentissimè ulcus exsiccatur. Puer decem annorum surdus ex variolis permanens, & cui per tot annos sanies ex aure fluebat, liberatus fuit succo cepæ & Rhodomelite instillato, teste FORESTO lib. 12. Obs. 7.

Denique si antiquum & sordidum ulcus fuerit, applicanda venit urina pueri cum paucis unguento Egyptiaco imprægnata. Hicce si mundificatum & abstersum fuerit ulcus, id quod ex eo patet, si minor sordium ac pusis quantitas effluerit, pro consolidatione istis modò dictis Tutia & Pompholyx addenda sunt, pro ejusmodi perfecta consolidatione.

## C A P U T II.

### D E

SANGUINIS EXTRAVASATIONE IN PECULIAREM CORPORIS CAVITATEM.

## ARTICULUS UNICUS.

### D E

## EMPHYEMATE.

Abolvimus doctrinam inflammationum in genere, & etiam in specie. Jam dictum fuit in principio huius sectionis, quod præter sanguinis impeditum refluxum impediatur etiam ulterius ejus circulus, quando is penitus extra sua vasa effunditur, idque vel ex istis intra spatia, partim intercutanea, in Ecchymomate seu suffillatione, aut quando effunditur intra corpus & insigniores ejus cavitates, vel quando penitus extra corpus effunditur, ut sit in Hæmorrhagiis, & hæc constituunt alteram speciem seu impedimentum sanguinis circulationis. Quando verò SANGUIS planè extra sua vasa IN CAVITATEM CORPORIS quocunque modo EFFUSVS mox ad corruptionem tendit, acorem contrahit, hinc coagulatur & congruatur, tandem in loco calido successivè fermentando suppuratur: hæc puris inde nati collectio in quadam corporis cavitate insigniori, humoribus aliàs vacua, Empyema dicitur, ab Apostemate seu VOMICA distinctum, quæ est collectio puris in quodam viscere ex inflammatione partis ejusdem induta. Ita dum pus colligitur in pulmone aut renibus, est vomica pulmonum aut renum: si verò colligitur pus in quodam corporis, thoracis vel abdominis, cavo, Empyematis nomine venit. Caterum oritur Empyema duplici modo: vel

1. Quando ex sanguinis à causa externa in quadam cavitate extravasati corruptione; v. g. quando quis ex vulnere thoracis patitur effusionem sanguinis in thoracem; & si sanguis transmutatur in pus, est Empyema primi generis: vel
2. Ex vomica sive abscessu cujusdam visceris inflammato interiora versus ruptione, cujus pus tandem ex parte in cavum corporis influit: v. g. quando ex pleura suppurata ac tandem rupta pus effunditur in thoracis cavitate, est Empyema secundi generis.

Veteribus alia horum vocabulorum fuit acceptio, dum propriè loquendo Vomica Latini est id, quod Græcis Empyema, seu collectio puris in aliqua parte, præsertim interiori, & Empyici propriè sunt, quibus pus in aliquo viscere oboritur: sicut purulentum hepar HIPPOCRATIS



**CRATIS** *Sect. 7. Aphorism. 43.* Idem quod *Empyema*. Tale malum Latinis dicebatur *Ponica*: Ita enim **CELSVS**. Moderni ex ignoratione substituunt *abscessum*, & in specie *pulmones purulentos* aut *Empyem Ponicam* appellant. Quoniam verò frequentissime post pleuritidem puris in cavitate *thoracis* collecti, rupta *ponica*, fieri solet, ob id *Empyema* primario de puris in thorace collectione intelligitur, secundario tamen etiam, si in aliis locis colligatur. Frequentissime dixi: quod post pleuritidem suppuratam sequatur tale *Empyema*, quoniam pus in cavitate thoracis tandem effunditur. Verum singulare est exemplum, quod refert **LINDANVS** *super Hartmannum*, se nempe observasse in quodam puerulo, pleuritide suppurata affecto, facta thoracis apertione pro extractione & facta exploratione cum candelâ (secundum leges paracenteseos thoracis) cerâ, nihil tamen puris fuisse excretum: Mortuo tandem puerulo thorax pro scrutinio viscerum fuit apertus, & inventum fuit, quod scilicet membrana costas succingens, seu pleura, dilatata fuerit in immensum saccum, in quo omnis purulenta materia, tanquam in suo receptaculo fuerit comprehensa, ita ut aperto thorace nihil potuerit puris evacuari: id quod sæpissime fieri arbitror.

### CAVSÆ.

**CAVSÆ**, propter quas sanguis aut ecchymomata constituit, aut extra sua vasa intra cavitates partium effundatur, congruescat & suppuretur, raro aut nunquam sunt internæ, sed semper læsiones, aut imprimis injuriæ **EXTERNÆ**, nempe vulnera punctim facta, vel contusio partium internarum. De vulneribus penetrantibus notum est, quod non sine sanguinis ex valis in cavitate corporis singulare effusione fiant. Ex contusione, si lacerantur vasa inter-utanea capillaria, & sanguis in partibus subcutaneis externis hæreat, oritur sanguinis suffusio seu *Ecchymoma*, ad Chirurgiam pertinens: *si vero interiora loca occupet*, hujus est considerationis.

Ad Contusionem pertinet in specie **CASVS AB ALTO**, in quo vel rupture vasorum, vel partium violenta contusione, aut eandem nimis validâ contusione, vel aliâ laceratione, & laceratis plus minus vasis sanguis per vasa læsa effunditur, inque certam corporis cavitatem infunditur, ita ut hæc contusio sit una ex primariis causis. Sanguis ergo extra vasa effusus ex his læsionibus externis, in cava collectus, & ex vitali consorcio proscriptus, mox ad corruptionem tendit, hinc sanguis ita coagulatus immediatè acorem præternaturalem antea occultatum contrahendo spissescit seu coagulatur, aut in grumos abie. Similis hic est ratio atque cum lacte, quod facili levi ex corruptione accescit, & magis magisque grumescit: id quod multo magis faciet sanguis lacte genitus, in quo particulæ salinæ copiosiores exsunt, dum nutritivæ temperiores & oleosæ in partium nutrimentum abeunt. Sanguis occulto tali acore grumescit successivè incipit fermentare, dum acidum in sanguine coagulato cum alcali volatili massæ sanguineæ satis copioso concurrendo donec mutuâ fermentatione tandem in salum tertium, nempe *Pus*, abeant. Omne autem pus est saporis salis, quatenus nempe generatur ex alcali & acido; album & lacteum verò præcipitatione sulphuris massæ sanguineæ, solutæ ab alcali ejus volatili (quod antea dabat colorem rubeum) facta per acidum præternaturale, unde, illustrante rem Chimiâ, emergit puris color albus, & tunc mutato nomine *Empyema* dicitur; cujus duplicem fendi modum supra insinavi.

Duobus ergo modis generatur *Empyema*: vel immediatè ex sanguine in partis cavum effuso, corrupto & suppurato: vel mediatè ex sanguine partem quandam prius inflammantem, hinc apostema faciente, cujus pus ex parte in cavum corporis influens, *Empyema* constituit. Prioris exemplum suggerit vulnus thoracis penetrans cum copioso sanguinis interiora versus influxu, hinc in pus corruptione: Posterioris exemplum dat Pleuritis suppurata, cujus pus rupto abscessu in thoracem effluit. His modis generatur sanguinis effusio in cavitates corporis.

### DIAGNOSIS.

Signa causarum ipsarum per se patent; cognoscendum saltem est, an sanguis grumofus in quodam loco colligatur?

aut etiam pus in quodam loco coerceatur? Cognoscitur hoc imprimis ex antecedentibus causis, nempe læsione externa, & ex symptomatibus junctis.

Cavitates autem corporis insigniores, in quibus sanguis effusus corrumpitur, imprimis sunt tres: vel abdominis, vel pectoris, vel capitis.

In specie ergo 1. *Sanguinem collectum & congruatum IN ABDOMINE* *hæere*, non rarum est, quod fit per vulnera abdominis, in specie contusione & casu ab alto. Hoc, præter vulnus penetrans, imprimis ostendit abdominis tumor, hinc inde sparsus livor, primò per superficiem abdominis, & quasi plumbea nigredo: post sanguinis effusi grumescitiam & suppurationem, durities quædam & renifus abdominis ad tactum in superficie abdominis, præsertim in loco, ubi est sanguis grumofus, non simpliciter ex repletione, sed ex tensione membranarum peritonæ, quæ quasi spasma laborant, horrentibus partibus vivètibuscadaver sanguinis. Ad hoc non raro superveniunt *liporhymia* vagæ, ex consensu cum stomacho affecto, item virium deflectiones insignes, *respirationes* nonnihil impeditæ, & interdum tumor & abscessus circa inguina, per quos sanguis effusus interdum felicissimè evacuat, & similia symptomata.

Quoad 2. *IN PECTORE esse collectum sanguinem* ibique congruatum & suppuratum, monstrant, præter causas antecedentes, insigniores *respirationis læsiones*, *tussis* admodum molesta, *dolores pectoris* varii, imminens & frequens syncope, virium prostratio insignis, *gravius* ac pondus circa costas nothas, extremorum *frigus*, *febris* plus minus acuta; quæ omnino comprobant modum læsionis: v. g. si quis cadit ab alto, & frangit costas, consequenter propter ruptionem vasorum costis sublestorum necessariò sequitur sanguinis in pectus effusio: Item si quis fuerit punctim aut caesim læsus, mox infra costas, ubi sunt venæ & arteriæ, tunc est signum effusi sanguinis in thoracem, & factè ejusdem congrumationis, corruptionis, & sic *empyematis*.

Denique, quoad 3. *IN CAPITE* & sub calvaria ejusdem collectum esse sanguinem congruatum, monstrat, præter læsionem externam, *dolor* ejus *gravius*, item *sensus* insignis *pulsationis* in capite hinc inde perceptibilis, propter motum arteriarum impeditum, oculi nonnihil spontè *lacrhymanes*, uti *Artic. 15. capit. 1.* de ophthalmia dictum, & *rubor faciei*; supervenit etiam varia symptomata stomachi, imprimis vomitus billosi, nausea, ac interdum, sed raro, singultus &c. quæ pathemata si superveniunt læsionibus capitis, signum sunt, sanguinem in caput esse effusum & grumofum. Sanguis nunc per os, nunc per nares, nunc per aures, exitum molitur, quæ magis sanguinem intra meninges cerebri effusum & congruatum indicant. Quibus septimo vel octavo die accedunt vigilie pertinaces, aphonia & similia, quæ gravius malum portendunt; Interdum ægri obstupescunt, aut brevi post læsionem stupidi redduntur: Accedunt denique causæ antecedentes aut validâ contusione cranium affligentes, aut forti incisione, cranium dividentes. Sanguinem verò intra calvariam effusum ac congruatum suppurari, testantur febris superveniens intensior, plus minus acuta, pro varietate circumstantiarum; item ardor in ista parte, in qua fit suppuratio: accedunt insigniter præcordiorum anxietates, vigilie & interdum deliria, &c. In specie ex rigore & febris suppuratio se manifestat.

Hæc ipsa posterius enarrata signa etiam ostendunt sanguinem in alio loco congruatum ad suppurationem tendere, quia interim in loco quodam externo, v. g. si sanguis coagulatus in abdomine hæreat, circa inguina oritur abscessus, in quo & per quem sanguis congruatus & suppuratus postmodum feliciter evacuat.

*Empyema* jam factum seu pus collectum facili ex eo cognoscitur, quod remittat febris, æstus ac reliqua symptomata, quin potius fluctuatio quædam puris hinc inde percipitur.

Quod attinet alteram speciem *Empyematis*: ea est, quando abscessus suppurati ex inflammationibus nati aperiuntur, & ex his apertis pus in corporis quandam cavitate effunditur, inter quæ istud gravissimum est, quod fit post pleuritidem & peripneumoniam suppuratam; quæ uti sunt altioris indagnis, ita & difficilioris cognitionis & curationis.

Cum ergo frequens sit *Empyema thoracis*, ex suppurata peripneumonia natum, specialiter probè cognoscendum est; hinc loco omnium proponam, ut de reliquis simile fieri queat judicium. Signa ejus, siue fiant à vulnere, siue



sive inflammatione aut pleuritide (quæ præter ea, quæ pleuritidem suppuratam comitantur, si materia intra quatuordecim dies sputo non reiciatur, vid. HIPPOCRATES lib. 5. Aphor. 8.) Rumpitur autem Vomica circa vigesimum, interdum trigesimum, aut quadragesimum diem. Dum vero rumpitur vomica, rigor fit & febris intensior supervenit: vid. HIPPOCRATES lib. 5. Aphor. 5. Adest tussis continua & frequens, item obscura, & quasi è profundo cavoque producta, sonus est obscurus, quia tota hæc tussis actio est à diaphragmate, non verò pulmonum: Illud enim gravatur ab incumbente pure. Porro inter tussendum sentiunt ægri in cavo pectoris concussionem aliquam & fluiditatem, ac imprimis in eo thoracis medio, ubi est pus effusum, quia materia diaphragmati incumbens, per tussim agitata & sublata, denudò recedit, aded ut sæpe nihil excernatur; In progressu verò post multos demum tussendi conatus materia plus minus purulenta excernitur, & tandem etiam aliquid saniosum. Febris adest, quæ in principio magis acuta esse videtur, in progressu verò mitior & lenta magis redditur, ad hecticarum ferè naturam accedens, quæ vespere præsertim exacerbatur, & circa noctem vehementior est. Respiratio semper est gravis ac difficilis, unà cum sensu gravativo pectoris, quando Patientes stant aut sedent. Si verò decumbunt, in specie in dorso sentiunt aliqualem fluctuationem, & decumbendo optime se habent, & sine molestia ferè respirant. Quando verò inclinant, v. g. calceos aut solvere aut ligare volunt, videntur suffocari: hinc enim à pondere puris incumbentis diaphragmati, & pulmones inundantis, diaphragmatis motus ferè antrosum versus impeditur. Anxietates tubine vexant, superveniunt interdum palpitaciones cordis, item sudores colliquativi nocturni; ulterius sentiunt frequentissimè evaporationes ex pectoris cavo ad os adscendentes instar aquæ calidæ, ac in specie mala è regione partis affectæ subinde phlogosi quadam, nunc apparente, nunc transeunte, rubet, ita ut, quando empyema sinistrum latus occupat, mala quoque sinistra phlogosin patitur. Tandem in ulteriori mali progressu percipiunt frequenter saporem quandam tetrum, cinereum, & quasi putridum continuò in ore. In pulsu talium hoc est singulare, quod creberrimis vicibus in una aut altera pulsatione intermittat, idque in specie, si tangatur in carpo lateris affecti, in altero carpo pulsus subinde se ritè habente; ita ut intra quatuor pulsationes semel penitus cesset, quod etiam in pleuriticis fit gravioribus. Pusculæ in thorace erumpunt cum reliquis phthiseos aut tabis phænomenis: vid. Scd. 5. aph. 15. Prognost. Tex. 16. §. 11. 12. Ac denique, si in dextro latere est Empyema, tunc decumbentes in eodem bene habent; Sin verò decumbunt in sinistro latere, male habent, & contra. Tumor intercostalis mollior comprer, vid. PLATERUS Obs. p. 734. aut potius, annotante RIVERO Prax. lib. 7. cap. 4. latus affectum tumorem cedematofum monstrat à tenuiori materiæ aliquali transudatione. Plura videbitis in HIPPOCRATE Progn. 16. §. 6. 7. &c.

### PROGNOSIS.

PROGNOSIS variat in his affectibus pro quantitate sanguinis effusii, & pro qualitate loci in quem effusus est, quod etiam intelligendum est de pure. Nam sanguinem collectum plus minus congruatum subito evacuari, aut si hoc non citò fiat, suppuratum facile per vias naturæ consuetas, vel per factum & apertum quovis in loco abscessum externi, optimum est. Si hoc non fiat, periculosum est; nam ex pure retento interdum gangrena & partium corruptio lethalis infertur.

Casui ab alto, percussionibus & læsionibus capitis si superveniunt vomitus, funestum est signum; innuit enim gravem læsionem cerebri, cranii & meningum, & nisi tempestivè instituat Trepanatio, mors sequitur.

Febres interdum periculosæ his affectibus superveniunt, interdum ulcera internarum partium, adeoque phthisis & tabes accedunt, interdum gangrenæ & consequenter mors sequuntur.

Ac in specie Empyema pectoris, ut plurimum ex læsione pulmonum, nisi maturè curetur, phthisin pulmonalem & tabem inferet; si verò sanguis in cavitatem abdominis effusus suppuretur, frequenter apostemata circa inguina infert, eaque salutariter.

Sanguis in capite infra cranium collectus est malum peracutum, & ut plurimum lethale, quia citius ægrum morti tradit, antequam ad suppurationem veniat, proin eò maturè exitus procuretur.

Urinæ rubræ turbidæ cum sedimento multo in lateribus matulæ, indicant communiter læsionem visceris cuiusdam interni, præprimis à causa externa, à verberare, vel casu; huic natura malum à bono segregat, & pro levamine ægri instituit. Præcipue autem illud sedimentum in lateribus indicat pinguedinem renalem dissolutam, & cum urina excretam.

(Tunc temporis Dn. D. ETTMULLERUS nobis monstrabat urinam talem civis cuiusdam Lipsiensis, ab idus fortiori lesi.)

PROGNOSIN in empyemate pectoris HIPPOCRATES text. 17. §. 9. 10. &c. innuit, evasuros scilicet, quos febris aut ruptura deserit, qui cibum citius appetunt, non amplius sitiunt, nec diarrhæa laborant, & pus leve, album, & æquale expuunt; & contra morituros, quibus symptomata illa permanent, aut recrudescunt, cum puris flavi, viridi, lividi, fetidi, viscidis, & spumosi expuitione: quibus accedit dyspnœia major minorve, quorum illa ob puris copiam celeriter suffocat, hæc salutem promittit: Item Scd. 5. aphor. 15. si empyema intra quadraginta dies & noctes sputando, aut aliaratione, v. g. per urinam, non expurgetur, in tabem degenerat.

Suppuratio, quæ utramque thoracis partem occupat, periculosior est, quàm quæ unicam.

Quibus robustis viribus pus per alvum aut vias urinarias copiose excernitur, evadunt.

Quicumque suppurati uruntur aut secantur, si pus purum & album fluat, evadunt; secus, quibus subruentum, fetidum, &c. vid. HIPPOCRATES lib. 7. aphor. 45. item quorum pus specillum argenteum velut ignis tingit: vid. WILLISIUS Pharm. Rat. P. 2. pag. 193.

### CURA.

In CURA considerandus est sanguis effusus, & postmodum pus exogenitum. Sanguinem effusum & congruatum quod attinet, sive illud sit à vulnere, sive casu ab alto acciderit, eò primariò est resolvendum, ut

1. Sanguinis grumi resolvantur.

Et hinc

2. Per convenientes vias quantocyus evacuentur.

3. Quod si sanguis affusus vel dissolui ante suppurationem commodèque evacuari nequeat, suppuratio promovenda, & febris adjuncta tunc non nihil mitiganda est, ac tandem enatum pus evacuandum.

4. Pus factum per debitas vias quantocyus evacuandum.

5. Læsiō partis à pure curanda, & in integrum restituenda, quod in omni empyemate æqualiter obtinet.

Via istæ convenientes, per quas tam sanguis grumofus, quàm pus exindeginitum, ex corporis cavitatibus evacuantur, sunt hæc, ad quas vel spontè vergit natura, & monstratur nobis imprimis à loco, in quo sanguis congruatus hæret, quando interdum evacuat per vias consuetas, alvum, sudorem, urinam; Interdum per alia loca, vel quas docet ars per vias inconsuetas arte Chirurgica factas, dum sanguis in cavitatibus collectus, vel grumofus, vel omnes exindeginitæ purulentæ, optimè evacuantur earum perforatione: v. g. si in abdomine hæreat sanguis vel pus, facta debita paracense, aut vulneris majori dilatatione, si punctum factum est illud, dictis via aperienda, vel alio modo infra umbilicum cum lancetta vel scalpello fiat apertura. Thoracis apertio, seu intra quintam vel sextam costam (à supremis numerando) sectio, optimè evacuat sanguinem & empyema thoracis. Ac denique, si facienda apertio in capite, optimum remedium est ejus Trepanatio seu cranii perterratio. Hi sanè modi sunt optimi, qui citò & tutò latus curant, modò, quoad legitimum usum, maturè instituantur hæ operationes chirurgicæ, & temporis habeatur ratio, & non perverso nostro more, aut nunquam, aut tardè nimis instituantur, quando vel vires sunt prostratæ, vel sanguis jam tum firmiter congruatus est, vel quando pus ita est alteratum, ut commodè evacuari neq; quin potius, quò celerius instituantur tales operationes & perforationes, eò promprior & optatior est successus: de quibus tamen cautellis & requisitis aliis videantur renum chirurgicarum Scriptores, in specie SCULTETUS in Anam. Chirurg. HORNIUS in Microtechnæ, & imprimis THOMAS FIENUS in lib. 12. Chirurg.



**Chirurgia**, ubi insignes operationes describuntur, ac denique **GVILLEMEAV**, *Gallus, de Operat. Chirurgicis.*

Quod si verò medilis Pharmaceuticis agendum sit post casum ab alto, vel etiam alio casu, pro sanguine plus minus grumoso, in quodam corporis loco existente, dissolvendo & dissoluto evacuando, subinde necesse est, ut in gravioribus vulneribus & his supervenientibus inflammationibus & extravasationibus sanguinis, in primo principio venæ sectio instituat, inque in specie aut in corpore plethorico, aut ebrio, aut subiecto, cujus sanguis alius est aptus ad suscipiendas turgescencias febriles. His in casibus convenientissima est sanguinis missio ad ceræ pondus, pro circumstantiarum ratione, ut ita immutaturæ qualiter sanguinis quantum; & impetus ejus per vasa se effundens impediatur, ne in vasisuberius turgescens, confertim omnis, & nimis copiosè per vas læsum in corporis cavitatem irumpat; observando tamen semper circumstantias & regulas revulsionum quoad locum venæ sectionis, in quem induit sanguis, ut nempe in contrario seu opposito loco venæ secetur vel aperiatur: v. g. dum suspicio est sanguinem fluere in abdomen, aut per inferiora thoracis vasa in thoracem, secetur in brachio; si verò ex superioribus thoracis vasis, secetur in pede; si in capite, venæ sectio brachii sufficit.

Facta vel omisa venæ apertione maturæ sanguis omnis grumosus resolvendus est, & resolutus, ut dixi, vel ductu naturæ per convenientes vias evacuandus, vel per meatus arte apertos arte exhauriendus. *Resolvunt grumum sanguinem omnia ea, quæ absorbent acidum pluvium, qualia sunt vulneraria plurima ratione alcali plus minus occulti, vi cujus absorbendi acidi cessat coagulatio.* Equidem latus campus horum pater, quæ inter in specie eminent rubia tinctorum, & hinc artificiale illud tinctoribus usuale paratum, Germ. *Crapp*, quod in specie aceto ebullitum & potum egregiè dissolvit grumos: e. g.

*24. Rad. rubia tind. præp. 3ß.*

*Ebull. in l. q. aceti.*

*Colat. capiatur pro duabus dosibus.*

*D. S.*

*Potio dissolvens pro duabus dosibus.*

*Eger in lecto se probe contegat, sudoremque expectet.*

Sic quoque laudanda sunt radix tormentillæ, bardanæ; symphyti majoris, bistortæ, caryophyllatæ, polygonati, scabiola, absinthium, abrotanum, hypericum, bellis minor, quam singulariter tanquam secretum commendat **HARTMANNVS**, chærefolium, carduus benedictus, feniculum, hyssopus, & in specie hedera terrestris; item sabina, verbascum, geranium Robertianum cum vino decoctum, succus geranii, arnica, decujus usu egregio vid. *Misc. A. N. C. Ann. 9. Obs. 2.* nempe radix ejus, folia & flores à pug. j. ad ij. in robustis decoquantur in cerevisia, decoctum calidè propinatur imperando sudorem; semen cardui Benedicti & Mariz, Chærefolii, hyperici, &c. item conveniunt Rhabarbarum, radix Angelicæ, vincetoxici, pimpinellæ, aristolochiæ rotundæ, aquæ horum simplicium, in specie chærefolii, scabiosa, alkekengi & cionamomi, syrupus acetosiratis citri, scabiosa, hyssopi, &c. Reliquis tamen omnibus palmam præfert acetum vini, in quo lapilli cancerorum sunt soluti, ubi evadet liquor urinosus egregiè diureticus & sudoriferus, qui sanguinem congruatum dissolvit, & dissolutum per convenientes vias evacuat. Huc pertinet *Sperm. ceti* à 3j. ad 3j. in cerevisia vel alio vehiculo calido propinandum, quod nobilissimum & expertissimum est remedium & mirabilis efficaciz; in specie si sanguis congruatus sit in pectore, cum respiratione difficili, expectorationem promovet. Vid. *Diss. de Sperm. ceti* cap. 2. §. 8. Porro castoreum, sanguis birci secundum **HELMONTIUM** Tr. *Pleura Furæ*, sitè collectus ad 3j. propinatus. *Munia* ad 3j. hic etiam communiter laudatur, sed nihil valet, quia non habemus genuinam; Vulgaris enim est liquamen ex corporibus bitumine & asphaltis conditis, unde tutius ab eo abstinemus, deficiente genuina. Hicce adduntur Bezoar Orientale, lapilli cancerorum, lapides percarum, carpinum, bovini è felle, albus græcum, dens apri cum aceto, corallia rubra, & marina quæcunque seu ex piscibus parata, egregia sunt, maxilla lucii piscis, succinum album præparatum, carbonæ liliz ad 3j. vel 3ij. in aqua chærefolii propinati commendantur ab **HARTMANNO**, osteocolla cum aceto destillato, propinata, marga Saxorum, terra Hibernica, terra sigillata, bolus Armena, cerebintina, folligo; vel pulvis factus ex carbonibus liliz, lapillis cancrosum, & herba chærefolii, cujus 3j. datur in aceto. Hinc

pulvis Augustanorum ad casum in aceto vini, vel destillato, species diamumli Mynsichti, sterco passeris in aceto dissolueum & propinatum, &c. in sanguine concretò sunt singulare: Item his adnumeratur *pinguedo humana* & canina, quæ ab 3ß. ad 3j. liquefacta, & in potu cerevisiæ assumpta, est egregia in casu ab alto; item antimonium diaphoreticum, Bezoardicum minerale, & reliqua consueva sulphures antimonialis fixa, &c. acidum plus minus absorbentia; essentia myrrhæ, florum hyperici, in specie essentiz quæcunque vulnerariæ, tinctura, succus & extractum florum bellidis, tinctura corallorum Mynsichti, spiritus theriacalis camphoratus, spiritus tartari, liquor cornu cervi succinatus, mixtura simplex, tinctura bezoardica, & similia, quæ ab alto in casibus chirurgicis post vulnera adhibentur.

Ceterum in propinandis his remediis contra casum ab alto, seu contra sanguinis grumos resolvendos, si causa externa siue interna occasionem dederit malo, observetur necessarid hæc cautela: ut nempe cum his sanguinis grumos resolvendis semper talia misceantur, quæ sanguinem congruatum resolutum simul per convenientes vias evacuare queant, adeoque simul, vel ut alvus laxetur, vel urina aut sudor uberius fluant, opera danda est; quid enim confert, ut dissolutus cruor in corpore hæreat? Unde si sanguis dissolutus hæreat in abdomine, aut locis alva vicinis, & adfuerit hujus inclinatio ad scellum, aut natura per alvum ejicere inclinet, simul laxantia remediis istis, v. g. fossa senne, vel, quod melius, Rhabarbarum, aliaque similia blanda abstergentia addenda erunt; nam & ipsum Rhabarbarum simul sanguinem resolvit: e. g.

*24. Herba Chærefol. M. j.*

*Rhabarb. elect. 3j.*

*Fol. Senn. sine stip. 3j. vel 3iß.*

*Sal. tartari 3j.*

*Coqu. in l. q. aquæ simpl. leniter.*

*Colat. adde*

*Lapill. cancer. præp. 3j.*

*Sperm. ceti 3ß. ad 3j.*

*Pulv. contr. cas. Aug. 3j. ad 3ß.*

*Syr. scabios. q. s. pro edulcoratione.*

*Misc. pro bina dosi:*

*Idque quando simul blandè evacuandum est per inferiora.*

*D. S.*

*Potio resolvens bene agnanda pro duabus vicibus.*

*24. Herba Chærefol. M. j.*

*Sal. tartari 3j. ad 3ß.*

*Coqu. in l. q. aquæ.*

*Colatur. infunde per noctem*

*Rhabarb. elect. 3j.*

*Fol. Senn. sine stip. 3iß.*

*Mane exprime, & adde*

*Lapill. cancer. præp. 3j.*

*Pulv. contr. cas. Aug. 3ß.*

*Syr. scabios. q. s. pro grato sapore.*

*M. detur pro duabus dosibus.*

*D. S. ut supra.*

*24. Decoct. Chærefol. aut, quod melius, bedæ. terrestr. 3j.*

*Infunde huius tepido adhuc per noctem in loco calido*

*Rhabarb. elect. 3j.*

*Fol. Senn. sine stip. 3ß.*

*Sal. tartari 3ß.*

*Mane adde expressioni*

*Lapill. cancer. præp. 3j. vel 3iß.*

*Pulv. contr. cas. 3ß. ad 3j.*

*Syr. bedæ. terr. q. s. pro grato sapore.*

*M. D. S.*

*Potio dissolvens pro aliquot vicibus.*

*De hoc subinde eger capiat haustum; ita enim sanguis solvitur, & per inferiora excernitur.*

Si verò in pectore, vel locis vicinis & remotioribus sanguis congruatus hæreat, & natura inclinet evacuare per urinam, Diuretica sunt addenda, quæ sanguinem resolutum per vias urinarias amendant. Sin in sudorem natura egri vergat, & in partibus aut vasis magis exterioribus hæreat sanguis, tunc sudorifera præsertim sunt optima, quæ resolutus ita sanguis extramittatur.

Facit huc etiam egregia Cura **LINDANI**, qui curavit aliquando



Aliquando fabrum quendam lignarium, & summo vesdo decidentem, dum ipsi ades edificaret, & duas costas frangerem, simulque sanguinem multum expuentem cum suffocationis metu, unde collegit, sanguinem in ipsum cavum pectoris effusum esse. Paravit ergo Decoctum ex brassica rubra, artemisia, consolida Saracenica, & floribus bellidis minoris; cui Decocto infudit aliquid Rhabarbari, & hinc post infusionem addidit aliquid spermatis ceti: tunc sumit seorsum lapillos cancrorum, & illis ad eminentiam transversi digiti affudit acetum vini, & eodem fervor defervuisset, dedit acetum huius bene agitati cochlear unum, & miscuit cum uncis quatuor vel quinque prioris Decocti, & ita hauriendum dedit, ex quo potu sanguinem congruatum antea, postea resolutum protinus mejere cepit, & quidem integras matulas, cum magno levamine, & terito die continuato potu venit visum, quid agerent ceteri operarii: Vid. Comment. in Prax. Chymiatr. Haytmanni.

Acetum potius praestat a Diuresicis incipere; in fine autem non incommodum est, aliquid sudoriferum subnectere. Adeoque convenit in dictis casibus Mixtura polychresta ex lapidibus cancrorum cum aceto destillato, Diaphoretica & Diuretica, & g. confici possunt tales formulae:

℞. Lapill. cancr. prap. ℥ss.

Acet. vin. ℥j.

M. D. S.

Mixtura resoluens pro una vice.

℞. Lapill. cancr. prap.

Sperm. ceti.

Sang. bircin. legitime coll. vel antimonii diaphor.

à ℥j. ad ℥ss.

M. pro 2. dosibus in aceto assumendis:

D. S.

Pulvis dissolvens.

℞. Sang. bircin. prap. secundum Helmont. ℥j.

Terra sigill. vel marg. Saxer.

Antimonii diaphor. ana ℥ss.

M. Div. in 2. part. equ.

D. S. ut supra.

Vel praescribatur talis pulvis contra casum ab alio r

℞. Lapill. cancr. prap. ℥j.

(cum aceto sunt magis diurectici)

Rhabarb. ℥i.

Sperm. ceti.

Castor. vel Myrrba.

Sang. bircin. leg. prap. ana ℥ss.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis dissolvens pro aliquot vicibus.

Dosis ℥j. in decocto cheresolii vel saniculi. Item

℞. Lapill. cancr. prap.

Osteocoll. prap. ana ℥j.

Nuc. moschat. ℥ss.

M. D. S.

Pulvis consolidans.

Alias convenienter etiam pro scopo sudorifero & diuretico praescribuntur Potiones, supra Art. 1. Cap. 1. ubi de Inflammatione in genere commendata, vel Mixtura polychresta SYLVII, quae est:

℞. Aqua flor. papav. errat.

Scabios. ana ℥ss.

Spiritus theriac. campb. ℥ij. ad ℥vj.

Acet. vini ℥ss. ad ℥vj.

Lapill. cancr. prap. ℥j. vel borum & maxill.

Lucii piscis ana ℥ss.

Syr. flor. Pap. errat. vel scabios. ℥ij.

Misceantur.

Capiatur cochleatim.

℞. Aqua Menth. vel scabios.

Cheresol. ana ℥ss.

Acet. vini simpl. destillat. ℥j.

Corall. rub. prap. ℥j.

Lapill. cancr. prap. ℥j.

Laud. opiat. gr. ii. vel ℥ij.

Syr. card. bened. ℥vj. vel ℥j.

M. D. S.

Mixtura dissolvens cochleatim sumenda.

Hae est Potio generalis; usurpari potest cochlear unum, vel pro binis aut tribus dosibus, & partim per sudorem, partim per urinam operatur.

Notandum: Quando haec miscentur, fieri effervescentiam, & ita ex his prodire concretum novum.

Vel

℞. Aqua ceras. nigr.

Lil. convall.

Meliss. ana ℥j.

Acet. Rutac. ℥vj.

Lapill. cancr. prap. ℥j.

Cinn. antimonii ℥j.

Sal. volat. succin. gr. xij.

Syr. flor. junic. ℥vj.

M. pro aliquot dosibus.

D. S.

Potio resoluens pro 3. dosibus.

Item iuxta Clysmata repetita etiam:

℞. Aqua cheresol. ℥j.

Ceras. nigr.

Lil. convall. ana ℥vj.

Ess. hyperici ℥ss.

Spiritus sal. ammoniaci ℥j.

Lapill. cancr. prap. ℥ss.

Syr. de beton. ℥j.

M. D. S. ut supra.

Capiatur cochleatim.

℞. Aqua mentha.

Cheresol. ana ℥ss.

Acet. vini ℥j.

Lapill. cancr. prap. ℥ss.

Corall. rub. prap. ℥j.

Cinnab. antimonii ℥ss.

Laud. opiat. gr. ij.

Syr. card. bened. ℥vj.

M. pro 3. dosibus.

D. S. ut supra.

℞. Aqua cheresol. ℥j. vel ℥ij.

Acet. vini ℥ij. ℥vj. ad ℥j.

Lapill. cancr. prap. ℥j. ad ℥j.

Terra Lemn. vel Corall. rubr. prap. vel antimonii diaphor. ℥j.

Syr. bedera terrestr. vel de beton. vel card. ben.

℥ij. ad ℥vj. M. S.

Potio alterativa.

Capiatur pro duabus dosibus, vel cochleatim.

Quod si caput simul laesum fuerit, & metus ad sit convulsio-num, in his casibus loco coralliorum ℥j. vel ℥ss. cinnabaris antimonii addi potest commodè, quae utilissima est, si sudet conserum zger: Vel

℞. Lapill. cancr. prap. ℥j.

Antimonii diaphor. ℥j.

Myrrb. el. gr. xij.

M. pro 2. dosibus.

possunt etiam gr. ii. laudani opiat addi:

D. S.

Pulvis caput confortans.

Si gravius sit malum, necesse erit, ut praescribatur Decoctum vulnerarium, cui addi potest mixtura ex lapillis cancrorum cum aceto parata.

In vultu aeger utatur crebrius cheresolio minutim inciso in iusculis pro multiplici scopo:

Sanguis ita extravasatus suppuratur & fit Empyema. EMPYEMA vero quod attinet EJUSQUE CURAM, si ve quando pus factum est, & in cavitate quadam fluctuat & stagnat, praesertim THORACIS, tribus scopis absolven-da venit:

1. Ante omnia evacuatio puris, si ve mediate si ve im-mediate, per convenientes vias est necessa-ria.

2. Dum hoc fit, simul acrimonia ejus noxia corrigenda seu temperanda.

3. Latio partii vel à pure vel ab abscessu indulta, debitis remediis restituenda: id quod in quolibet observan-dum est empyemate.

Cum vero praeter ceteris empyemata thoracis sint frequentia, hujus curationem proponemus, ubi quae de hoc dicuntur, de aliis simul intelligenda sunt.

Pro primo scopo eadem observanda sunt, quae supra in cap-sula alio pro sanguine grumoso dissolvendo, nempe per con-venientes vias instituenda venit puris evacuatio. Via eva-cuationi puris dicata, pro varietate partium & ipsae variant, suntque vel naturales, vel artificiales: Illae, quibus natura molitur evacuationes, & quae subinde per varia loca inimi-tabili arte purulentias evacuat; urdum v.g. Pleuriticorum; vel aliis in thorace suppuratorum purulentias, nunc per urinas, nunc per alvum, nunc frequentissime per spiritum

EVACUAT,



evacuat, imò per purulentam in toto corpore scabiem (quod de videb. Miscellan. A. N. C. Ann. 2. Observat. 146. pag. 230.) solvi observatum fuit. Sanè pus Empyici per urinam excre- cum cum dolore quasi nephritico & stranguria refert HOR- STIUS lib. 3. Observat. 10. simile videb. apud PANA- ROLLVM, item BORELLVM Cent. 1. Obs. 17. & RHODIVM Cent. 2. Obs. 12. & 15. SCHENCKIVM Obs. pag. 243. & 252. Ipse me curavi mulierem gravi pleu- ritide correptam, cui suppuratæ supervenit foetidissima materia purulentæ urina, quâ per decem vel plures dies continuante cum sensibili allevatione ipsa sanabatur. *Præcavebam simul phthisin ac tabem per pulveres ex anti- hectico Poterii, myrrha, lapillis cancerorum, antimonio diaphoretico, balsamo sulphuristerebinthinato, &c. Eli- xyr proprietatis rarò propinabam, quia hoc semper a vi fluxum sistebat, ut necesse esset, eam denud provocare clysmate.* Sicut jam supra Artic. 10. & 11. capit. 1. hu- jusmodi variæ excretiones circa hepatis & lienis abscessus insinuatæ fuerunt. Facit huc quod refert HILDANVS Centur. 3. Hist. 39. nempe ulcus diuturnum in brachio ex icu scolopeti, quod quia per urinam pus exercebatur, ulcus siccabatur; quamprimum verò ulcus recenter flue- bat, tum patiens rursus urinas laudabiles nullo pure permixtas reddebat. Per quas vias materia empyematis in pectore v. g. deferatur ad urinam, aut alvum, aut etiam ad alia pro exspuione, plures Auctores litigant: Conf. SEN- NERTVS lib. 2. Prax. ubi de Pleuritide Quest. 3., WILLIS Pharm. Rational. Part. 2. pag. 150. & 201. Miscellan. A. N. C. Ann. 3. Obs. 213. pag. 393. & Ann. 6. Obs. 41. pag. 75. His in casibus, si moliatur aliquid natura, semper minister ejus est Medicus, dum, quod illam vergere videt, eò simul motum illius promoveat: v. g. quando in pleuritide suppurata redditur urina puru- lenta, dentur Diuretica; si verò in empyemate pecto- ris diarrhœa purulenta appareat, alvum stimulantia & laxantia; si natura inclinet ad os mediante tussi, pro- pinquentur vomitoria vel blandè Temperata, Expectoran- tia vulgè dicta; si verò rupto abscessu & collectio jam Em- pyemate pectoris, naturam nil moliri observat, pro copia puris, dum vires adhuc constent, evacuanda similiter Vomitus convenit, cujus insignes utilitates pluribus PISO de Colluvie serosa declarat, quippe qui mirabiliter con- tenta & pectoris purulenta evacuat, ita ut unicus vom- itus plus excernat, quam septem diebus tussi rejicitur; modò absit periculum sputi sanguinis, in quo casu Me- dicus horreat vomitoria; contra si illud absit, tutò sua- deat vomitum. Quodsi tamen, sub metu licet sputi cruenti, natura inclinet evacuare per os, substituat Me- dicus fauces lubricantia & expectorantia; hinc sputum imprimis promovendum, ut hujus medio, ceu per pro- ximas vias, modumque magis ordinarium puris, fiat eva- cuatio. Pro quibus scopis convenit secretum Freitagii ad Asthma, Artic. 1. Capit. 2. Section. 14. descriptum; item Nicotiana est egregia, cujus usum supra l. a. ex FERDI- NANDO declaravi.

In spuo hoc promovendo habenda simul ratio qualitatum materię purulentæ evacuandæ: quæ quid acrior fuerit, ac re- nuior, eò magis temperantia, simul usurpanda sunt; quod si verò non acere, sed crassius sit pus evacuandum, incidemia & abstergentia magis in usum vocanda. In specie mel & ex eo paratum hydromel seu aqua mulsa, oxymel squilliticum, &c. inter expectorantia primatam ducunt; in qua mulsa hyssopus, scabiosa, parietaria, belenium, Iris Florentina, marrubium, liquiritia, jujube, passule, &c. pro indicantium varietate, simul incoqui & propinari possunt: sicut etiam decoctum ex scordio & scabiosa tota, cum oxymelle squillitico edul- coratum, & calidè haustum, egregiè convenit: Vel fiat mix- tura expectorans:

℞. Aquę hyssop. ℥ij.  
Asthmat. ℥ij.  
Oxym. squillit. ℥vj.  
Syr. Nicotian. ℥℥.  
Emetic. ℥ij.  
M. D. S.

Mixtura expectorans cochleatim.

Capiatur pro lubitu.

Artificiales vię pro evacuando pure sunt PARACEN- TESIS, quæ ubi priores illæ naturales vel non suffecerint, vel suffecturas suspicio est, in tempore institui potest. Vid. SYLVIVS lib. Prax. c. 20. §. 18. In tempore dico; ut quan- do natura empyema non expurgat per urinam, statim institu- Estmull. Oper. Tom. II.

enda paracentesis, ne pus in saniem convertatur, nec vires frangantur: aut pulmo à sanie corruptatur. Fonticuli etiam à quibusdam intra costas inuruntur. VOLCAME- RVS in M. A. N. C. Ann. 9. & 10. Obs. 19. in schol. mentionem facit. Emplastri Norimbergensis Ebrsingeri, seu potius Ga- leni, cujus in educendo pure in abdominis cavitate con- tento vires insignes expertus est, adjunctis intus potionibus traumaticis.

Pro secundo verò scopo, quæ acrimoniam puris & ejus no- xam corrigunt, h. e. ut allas dicunt, ulcus abstergant & mundificent, optima sunt sulphurea remedia, pinguedine suâ quodcumque acre, in specie pus falsum, temperantia, & balsamica quasi suâ vi læsionem partium à pure oriun- dam corrigentia ac præcaventia, & ulteriorem progressum apostematis & puris inhibentia; & sanè sulphurea opti- ma sunt in omnibus empyematum purulentis tempe- randis. Talia sunt sulphur & antimonialia fixa, ut flo- res sulphuris, antimonum diaphoreticum, antihecti- cum Poterii, Bezoardica mineralia, myrrha, pulvis pe- thoralis Lindani cum antimonio diaphoretico, balsamus Peruvianus, balsamum sulphuris.

Ea verò, quæ læsionem partis post abscessum suppuratum & empyema restituant, & eam quasi consolidant, sunt vulneraria: quæ inter eminet bedera terrestris, quæ no- bile simplex est, imprimis in empyemate pectoris post pleuropneumoniam suppuratam orto: sic pertinet huc scabiosa & cheresolum; quod Trifolium simplicium, ut ita dicam, in viscerum læsionibus ex empyemate con- tractis multum valet: item lignorum & radicum sudo- riferarum Decocta, in specie ligni Sassafras, radice chinæ & ligni guajaci, quæ hic sunt optima, partim purulentias corrigunt, partim labem partibus indurctam corrigunt: vid. A. R. C. Æ. V. S. cap. de Capitis Vuln. & SYLVIVS Prax. lib. 1. cap. 24. §. 22. pag. 196.

Cæterum dum hitres scopi intenduntur, observandum, ut semper simul habeatur ratio (1.) puris, ut hoc vel prius vel simul evacuetur, adedque cum vulnerariis pus promo- ventia adhibenda erunt: (2.) Adjuncta febris, ne hæc plus mi- nus intensa magis intendatur; Nam semper conjuncta est febris lenta, plus minus ad Hecticam inclinans. Hinc præ- mixta puris evacuatione quacunque,

℞. Aquę hyssop.

Scabies. an. ℥ij.

Fl. sulphuris ℥℥.

Antimon. diaphor. ℥j.

Bezoard. lousal. ℥℥.

Syr. de Nicotian. vel Hyssop. ℥j.

M. f. Potio

D. S.

Mixtura mundificans cochleatim.

Usurpatur vel pro duabus dosibus vel cochleatim ad corri- gendam partim purulentiam in empyemate, partim ad corrigendam noxam à pure indurctam partibus: cui, si intensior fuerit febris, simul nonnihil spiritus nitri dulcis addi poterit.

Vel

℞. Aquę papav. errat. ℥ij.

Acet. distillat. vini ℥ij. ℥℥. ad ℥vj.

Lapill. cancr. præp. ℥j.

Antimonij diaphor. ℥℥.

Syr. flor. papav. errat. ℥vj.

M. S. ut antè.

Capiatur cochleatim, præprimis tempore æstus.

Vel

℞. Amygd. dulc. ambros. ℥ij.

Sem. melon.

Papav. alb. an. ℥ij.

cum s. q. aquę papav. errat. f. Emulso:

Cui adde

Maxill. lucii pisc. ℥℥.

Antimonij diaphor. vel Antibed. Pot. ℥j.

Edulcoretur cum paucis saccharo:

D. S.

Emulso mundificans.

Captatur sepius, & quando placuerit, imprimis in æstu.

℞. Conf. rosar. rub. ℥ij.

Elect. diacord. Erac. ℥ij.

Conf. Alchem. ℥j.

Corall. rub. præp. ℥ij.

Antibed. Poter. ℥℥.

Syr. borrag. vel flor. junicæ, vel rosar. rub. q. s.

M m

M. f.



## M. f. Electuarium:

De quo usurpetur ter in die, mane, à meridie, & vespere, quantitas castaneæ vel nucis juglandis.

Nec inelegans est liquor betulae recens collectus, sapiens in die, etiam in ipsa febre, haustus, tam solus, quam cum potu ordinario mistus; vel in mensura una potus ordinarii dissolvatur ℥ij. vel ℥iij. Gelatina cornu Cerui, vel rasura ossium bovinorum, &c. Egregie profunt, ubi juncta est aestuatio corporis & defectus virium.

Decoctum cherefolii, item hederæ terrestris, certè egregium est, & præ ceteris vulnerariis excellit, præmissâ puris evacuatione, in empyemate quocunque curando, omnibus ceteris præferendum; aut ex hoc succo paratus syrupus; item essentia, quæ aliis addita, aut cum antimonio diaphoretico assumpta, sunt nobilissima; aut denique, si ojus succus semper cum decocto guajaci permisceatur. Certum est, quod hederæ terrestris sit inestimabilis in hoc casu; hinc sunt, qui maximè æstiment:

℥. Succ. Heder. terr. ℥iv.

Præstij ℥ij.

c. f. q. Sacchari f. Syrupus, addendo

Thuris,

Myrrh. cl. ana ℥j.

M. D. S.

Succus sanans.

Et subinde usurpetur.

Uti etiam Decoctum radice chinæ, propinandum cum omni ejus haustu ℥ss. ad ℥j. antimonii diaphoretici; hoc enim mirabiliter suppurationes quascunque abstergit & corrigit, sanguinem grumosum & empyema, imprimis pectoris, tollit; & cum radice chinæ vel ligno guajaci aut salisfras simul coquenda sunt hederæ terrestris, marrubium, tussilago, consolida major, capillus Veneris, hyssopus & similes, præsertim si viscidum aliquid adest, & similes aliæ plantæ pectorales. Non opus est multa addere, simplex sufficiat decoctum, cum quo propinetur antimonium diaphoreticum, aliaque sulphurea, fumendo Decocti bonum haustum, quotidie bis, mane & vespere. ARCÆUS loco allegato egregium modum docet curandi empyemata & vomicas pulmonum beneficio Decocti ligni guajaci, cujus methodus est optima, & quâ ipsa aliquot empyematici fuerunt curati. Nec incommodè ligna santala hic recipiuntur; & 8.

℥. Rad. chinæ in taleol. incif. ℥ss.

Rad. liquirit. ℥vi.

Santali rubri ℥ij.

Infunde in aquæ comm. ℥vij.

Macerentur in Balneum Mariæ per 24. horas: mane adde

Passul. min. conquass. ℥ij.

Coquantur blando igne ad remanentiam ℥iv.

Colatura D. S.

Potio pectus mundificans.

℥. Raf. lign. guajac. ℥j.

Sassafras ℥ss.

Macera per 2. horas in aquæ comm. ℥vij.

Coq. ad consumpt. ℥ss.

adde

Herb. Heder. terr.

Com. flor. hyperic.

Herb. Veronic. ana M. j. ad M. ij.

Rad. liquirit. ℥ss.

Sem. fenicul. ℥vj.

Passul. min. conquass. ℥ij.

Coq. ad remanent. ℥iv.

Colatura D. S.

Ut supra.

De quo Decocto ager ad minimum tertio die, etiam tempore pastus, capiat, subjungendo & alia remedia, ut myrrham, elixyr proprietatis, ob aloem & myrrham.

Sulphur pariter ejusque flores, item balsamus sulphuris, tam terebinthinatus, quam pro ratione partis affectæ juniperinus cum oleo juniperino; anilatus cum oleo anisi pectoralis; aut cum oleo succini ad guttas xx. succinatus, sive fiat etiam ex sulphure communi, sive ex sulphure aurato antimoniali ex POLEMANNO, quod nobilissimum: cui non incommodè potest substitui balsamus Peruvianus, de Capaibe, item tintura sulphuris, &c. Egregia sunt ad quæcunque suppurationem, & internarum partium ac viscerum corruptionem curandam: propinentur ad aliquot gut-

tas in vehiculo Decocti hederæ terrestris, mundificant ulcera, & ulteriorem corruptionis progressum præcavent. Sed hæc posteriora sunt volatilia, acris & nimis calida, unde ratione februm minus conveniunt, sed saltem temperata aut fixa antimonialia optimè conveniunt: si autem volatilia usurpanda, & igneuse eorum, imprimis balsami sulphuris, calor permisceatur, convenienter miscentur cum saccharo saturni vel antihæctico Poterii, quæ dictis in casibus etiam sunt egregia, & inhibent noxam aliàs inducendam vel metuendam; vel fiat decoctum brassica capitata rubra, vulgaris quidem, sed nobilis plantæ, cum tantillo sacchari temperatum, quod perquam egregium est remedium, promovendo simul materiæ purulentæ effluxum per urinam; in quo usurpetur antihæcticum Poterii, vel flores sulphuris & similia. Lac quoque caprillum cum saccharo rosato usurpatum pro ultimo hoc scopo est egregium: vid. M. A. N. C. Ann. 1. Obs. 19. pag. 78. Conferatur cum his WILLIS. Phærmac. Ration. P. 2. ubi de Phthisi & Empyem. Terebinthina denique & quæcunque ex ea parata, imprimis Emulsio terebinthinata cum vitello ovi, melle, succo citri, & aqua fragurum vel vino, suam etiam hanc laudem merentur.

Sed pergo ad

## CAPUT III.

Tertiam nempe fluxus sanguinei extra vas speciem.

## ARTICULUS I.

## DE

## HÆMORRHAGIA IN GENERE.

Tandem etiam vitatur sanguinis motus, quando hic ex suis vasis & receptaculis penitus extra corpus effunditur; idque in hæmorrhagiis: quæ vox, dum derivatur ab aqua sanguis, & pio fluo, generaliter quæcunque sanguinis effusionem præternaturalem extra corpus innuit, ut ratione loci, per quem fluit, & ratione modi, quo effluit, distinctas habeat rationes, ac in specie postmodum varias sortitur appellationes: ex naribus enim Hæmorrhagia narium; ex pectore Hæmoptysis; & per vomitum Vomitus cruentus; ex alvo Fluxus alvi cruentus; ex vasis ani Fluxus hæmorrhoidum; ex vesica Mictus cruentus; & in seminis ex vasis uteri, Menses, Hæmorrhagia uteri, & Lochia nimia, &c. dicitur, utpote ex unius generis causis dependentes.

## CAUSÆ.

CAUSÆ Hæmorrhagiæ cujuscunque in genere sunt; vel (1.) ipsorum extimorum osculorum in venis & arteriis apertio quasi spontanea & hiscentia, & dicitur aliàs communiter Anastomosis: vel (2.) est ipsorum vasorum violenta læsio & soluta unitas, sive hæc fiat à causa externa per instrumenta acuta, quæ pungendo, incidendo, contundendo, vel quovis alio vulnerandi modo lædant, sive fiat à causa interna per humores acidos & acres extremities osculorum vasorum erodentes, aut ipsas tunicas vasorum tenuiores penitus perforantes, quæ posterior species vocatur Diuresis, item Diæspores. Quidam addunt (3.) Anæsthesiam, quæ tamen admitti nequit; siquidem intelligitur talis sanguinis tenuitas, quæ per vasorum tunicas transfudare possit, quod tamen citra osculorum apertionem vel ipsarum tunicarum vulnus vix est credibile; cum scilicet non in vasis juxta veteres, sed in substantia partium tantum concipere licet: sunt enim satis densæ satique validæ & tenaces venarum, multò magis arteriarum tunicæ, ut impossibile sit, per easdem tantillum transfudare posse de ipsa massa sanguinea integra, ut ut sero transitus per easdem non denegandus sit.

Cæterum locus seu VASA, per quæ effluit in hæmorrhagiæ sanguis, sunt imprimis arteriæ; nam ex venis vix & nunquam effluit, nisi his ipsis simul incisis aut crosis, ut in vulneribus; aliàs maximè arteriarum per anastomosis fit apertio. Sanguinem autem, qui sponte effluit, stillare ex arteriis, pater ex eo, quod omnes hæmorrhagiæ, v. g. narium, hæc stillatim guttatimque & subinde notabile spatium



spatium temporis inter unam vel alteram guttam cadentem observetur; id quod liquidissimè patet venire ex arteriis nunc dilatatis nunc subsidentibus, non autem ex venis, ratione pulsus. Nam dum cor sanguinem per arterias impellit, eo ipso etiam idem per arterias apertas expellitur; subsidente verò arteriâ in systole, sanguis non amplius adeo confertim effluit, & ita successivè sanguis stillatim erumpit: Id quod simili modo etiam patet in arteriotomiis seu erosionis sive studiosè administratis, in quibus etiam subsaltim tantùm & repetitis vicibus propulsus ratione sanguis erumpit: ex venis vero uno ductu effluit. Ut proin probabile sit, nisi promiscuè vasa aperiuntur in hæmorrhagiis arterias solum sanguinem stillare.

Quoad CAUSAS Hæmorrhagarum REMOTAS, ANASTOMOSIS seu osculorum vasorum apertio sit vel vitio sanguinis, vel vitio vasorum, vel utriusque. Vitio sanguinis sit propter eundem vel abundantem, vel turgescientem, vel serescientem seu aquescientem; vitio vasorum verò propter hæc inæqualiter stricta aut laxa.

Adeoque anastomosis vasorum est quadruplex. 1. Nimia sanguinis abundantia seu plethora vera aut absoluta, eaque rarior: unde annuè sanguinis missiones plethoricis solennes negligè frequentiùs hæmorrhagias excitare solent: unde e. g. suppressionibus mensium superveniunt hæmorrhagiæ narium, sputum cruentum, & quidem sine damno ac cum euphoria.

2. Est Plethora respectiva seu apparens, eaque frequentior, propter nimiam sanguinis turgescientiam vel auctam fermentationem in vasis, dum sanguis uehementiori motu intestino, aut maiori vel minori motu & exercitio corporis, vel potu generoso, vel alimentis aromaticis, magis incallescit & turgescit, aut etiam, quando effervescentiâ febrili nimis ebullit; sic enim sanguis turgescens mole quasi auctus ordinariis vasis & receptaculis contineri amplius nequit, quin per orificia vasorum capillarium distenta erumpat: quod sit frequenter in principio & incremento februm continuarum, tam benignarum quàm malignarum, item variolarum ac morbillorum, in quibus spumescens sanguis & extraordinariè ebulliens orificia vasorum aperit & erumpit; quod in specie contingit meliùs, & facillius, si accedat suppressa quædam sanguinis evacuatio ordinaria: quod testatur fluor ille mensium nimius ab ira, terrore &c., de quo vid. LOSSIUS lib. 4. Observat. 6. Simul tamen in his & ad statum vasorum à sanguine pertransiente plus minus irritatorum, hinc ad sanguinis motus variationem, respectus habendus: hinc & obesi frequenter hæmorrhagiæ narium sunt obnoxii, propter vasa compressa ab habitu corporis pingui, quia vasa non possunt cedere, unde patet apertio: item vini potatores, exercitiis nimis dediti, ad hæmorrhagias frequentius inclinant; quod illa hæmorrhagia narium testatur, quam à musti & vini Hispanici ingurgitatione FORRESTUS lib. 1. Obs. 12. observavit.

3. Est sanguis nimia tenuitas & fluxilitas, ob abundantiam maximam seri eiusque nimiam aquositate; unde sit, ut in tali constitutione & fibrarum & membranarum tonus laxetur, & ipse etiam sanguis suâ tenuitate facillè orificia venarum permeet, eademque ira aperiat. Unde hæc ambobus concurrentibus, dum nempe à nimio sero fibræ flaccidæ sunt, & ita tonus à sanguinis à fluxibilitate latus, unde consequenter sanguis tunc effluens minus tinctus & minus in debita consistentia conspicitur, quin potius liquidus & loturæ carniū similis, sicuti contra in prioribus duobus casibus, quando nempe nimia sanguinis copia hæmorrhagiam infert, ipse sanguis crassus, turgescens, floridus & copiosus solet effundi, idque cum impetu, cum tamen aliàs sanguis tenuis existens pedetentim effluat, & quasi per vasorum orificia hiantia sudet; ut plurimum tamen & hic acrimonia sanguinis plus minus salsa, aut acido-salsa, adeoque occultè rosivæ accedere solet. Vulgò vitio hepatis hæmorrhagia hæc, in qua serosa effunduntur, contingere dicitur, unde ex defectu huius sanguificationis sanguis serosus generetur, qui inferat talem hæmorrhagiam: Sed falsum est: sicut enim error alter alterum tradit, ita & cucurbitulæ & epithemata regioni hepatis applicanda malè suadentur. Revertè autem vitium hoc in casu hæret in primis viis, & læsa digestionis prima, eiusque deficientie perfectione in duodeno, & inde nata vel serositate vel acrimonia sanguinis, ac in specie si alimenta nimis

Ettmull. Oper. Tom. II.

colliquecant. Dispositivè simul concurrunt nimius potus, urinæ deficiens excretio, aut sudoris paucitas & consueti suppressio.

4. Vitio denique vasorum anastomosis oritur, quandos per hæc æquabilis sanguinis circulus per arterias in vena interruptitur, ita ut æqualis vel per arterias distributio, vel ex arteriis in vena transvasatio impediatur; idque ferè ob spasmus fibrarum nervosarum, tam (1.) ipsorum vasorum sanguiferorum, quàm (2.) partium, vasa recipientium. Adeoque si ex priori modo contingat, uti in uno alterove surculo cuiusdam arteriæ fiat restrictio, & quasi per eundem liberior sanguinis motus impeditus, unde sarculus vicinis maiori sanguinis mole distensus, necessariò in extremitate aperitur, & factà ita anastomosi sanguis effunditur. Splenetici hoc videtur familiare, quibus interdum superveniunt sanguinis vomitus, ita tamen, ut percipiant priùs fortes pulsationes circa splenem, locaque vicina, quæ pulsationes innuunt motum sanguinis nonnihil impeditum per arteriolas in splene; unde si sunt turgidæ, ramuli arteriosi vi aperiuntur in stomachum, & ita vomitum sanguinis inferunt. Hinc quando cum insigni capitis pulsu sit hæmorrhagia narium, signum est impediri sanguinis per vasa vicina: unde vasa narium aperit, & hæmorrhagiam infert. Virum novi, hæmorrhagiæ narium obnoxium, qui ut plurimum molestiam quandam in sinistra thoracis parte percipit, antequam hæmorrhagia narium superveniat. Quod si posteriori modo acidat, ut fibræ nervæ partium recipientium quæcunque ex causa irritatæ se fortius stringant, & ita sanguiflua vasa plus minus coarctent, ex impetu sanguinis per arterias eius influxus adhuc continget, sed non refluxus, qui plus minus impeditus per venarum magis flaccidarum aut molliorum ora restricta, per vicina loca, qua data porta, ruit, arteriolarum anastomosis facit, sicque hæmorrhagiam infert. Sic nempe nimia narium irritatio ab euphorbia, &c. hæmorrhagias sæpe gravissimas inducit: vid. KERKRINGIUS Spicileg. pag. 100.

Pertinent ad anastomoses hæc scorbuticorum hæmorrhagiæ insignes admodum, & crebrius ingruentes, per quæcunque loca hiant; Partim ob sanguinis crasin plus minus vitiatam, & ad diathesin acidam plus minus declinantem; imprimis sanguis tenuis simul est salsus acris, adeoque facilliori apertioni occasionem præbens; Partim propter tonum laxatum, quo resoluta vasa eorumque fibræ debilitantur, & admodum flaccescunt, unde vasorum ostiis minus restrictis hæc hiscunt; hinc sit, ut hypochondriaci, scorbutici, & cachectici variis & stupendis hæmorrhagiis non raro sint obnoxii, ita ut sanguis non unciatim, sed libratim, effluat: vid. MEARA in diatrib. contra Pyrotolog. Willisi, LOWERI Resp. contra Mcaram, & M. A. N. C. Ann. 2. Observat. 48. & Anno 3. Observat. 22. 24. & 243. Item Ann. 6. & 7. Observat. 90. pag. 130. quia ob tonum fibrarum partium vitiatum & resolutum paralyticis affectibus obnoxii sunt, quo resoluta fibrarum tono & vasis sanguis effluit, isque serosus, cumque acrior sit scorbuticorum sanguis, hinc in hæmorrhagias recidivantes incidere solent; hinc mulieres scorbutici etiam nimio mensium fluxu laborant, item viri scorbutici enormes hæmorrhoidum fluxus patiuntur: Partim denique quod scorbuticorum nervosum systema pathematis convulsivis obnoxium admodum sit, unde irritatum quodam in loco, è spinis salinis scorbuticis alicubi infixis mox tendi fibræ, pulsationis aut tensionis sensus, hinc hæmorrhagiæ oriri solent. Comprobat hoc notabili observatione WILLISIUS Pharm. Ration. Part. 2. Quod etiam referendum sputum cruentum ab ulcere pedis diuturno coalescente, quale RHODIUS Centur. 2. Obs. 35. annotavit.

In hæcenus enim dictis anastomoseos causis, tam ad sanguinem quàm vasa ut plurimum respiciendum venit, ita quidem, ut frequentissimè acidum consuetum sanguinis motum ad orgasmum præternaturalem concitans, aut itidem acidum plus minus salsum vasa eorumque aut partium vicinarum fibras vellicans, considerandum veniat.

Hæc de Anastomosi.

DIÆRESIN & DIABROSIN inducunt omnia Externa, quæ aut incisio, aut punctura, aut confusio, ne, vasa aperiunt; uno verbo: omnia Externa, de quibus in



*Chirurgia.* Ex causis internis est quodcumque acce, imprimis acidum aut acido-salsum orificia vasculorum corrodens: quæ inter interdum lymphæ acrior nimis & acido-salsa multum habet in recessu, aut etiam ipsa crasis massæ sanguineæ acidissima redditur. Pertinent huc suo modo quæcumque nimis acris inspirata. Nam hæc, ut narium vasa irritare, ita & pulmonum vascula erodere valent, unde dictarum partium hæmorrhagiæ faciliè postmodum superveniunt.

Causæ occasionales plures etiam sunt: nempe (1.) motus corporis nimius, e.g. sternutatio, tussis, vociferatio, vomitus, & ponderum incongrua elevatio unde v. g. menses nimis vid. FORESTUS lib. 28. Obs. 14. & 16. (2.) Animi motus vehementiores, ut ira, gaudium; hincque menses nimis ex LOSSIO supra allegato. (3.) Acris ineptè applicata, ut helleborus albus in sternutatoriis, suppositoria, & enemata acriora, hæmorrhoides concitantia: vid. FORESTUS lib. 23. obs. 4. nec non purgantia acriora, e.g. scammonium, de quo vid. MONARDES lib. 12. Epist. 3.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet SIGNA DIAGNOSTICA: Diagnosi, in-  
dus hæmorrhagiæ per se patet; differentiæ saltem causarum observandæ sunt, pro quarum varietate variis etiam est sanguinis affluentis modus; dum sanguis, qui effluit, floridus, rubicundus, copiosus, &c. innuit factam anastomosi propter aliqualem sanguinis abundantiam & turgescen-  
tiam: observandus tamen simul cum his est causarum antecedentium impetus.

Sanguis effluens in loco cum forti regionis plus minus vi-  
cinque pulsatione, innuit impeditum plus minus sanguinis mo-  
tum, per unum alterumve arteriole furculum.

Sanguis effluens tenuis, aquosus, & instar loturæ car-  
nium, ut loquuntur, plus minus signum est nimis sangui-  
nis serositatis & aquositatis.

Denique humores acres excedentes ubi præcesserint, non  
possunt causæ latere, observatis simul ceteris concurrentibus  
signis; manifestò plus minus acris salus sanguis effluens quæ-  
stari solet.

In genere adhuc notandum, Sanguinis fluxum futurum  
interdum prædicere hypochondriorum tensionem atque pul-  
sationem, & difficultatem spirandi, imprimis si solennior  
quædam sanguinis evacuatio suppressa fuerit, aut causa  
quædam sanguinem exagitans præcesserit, vel symptomati-  
stictis combinetur; quamvis etiam sine his frequentius il-  
le fluxus contingat.

Ex qua parte autem hæmorrhagiæ expectanda præter con-  
suetudinem, quæ quidam ad narium hæmorrhagiæ, vel  
hæmorrhoidum fluxum proclives sunt, lésiones & sympto-  
mata partium, & morbi præsentis idea, v. g. variolarum,  
quæ narium hæmorrhagiæ adjunctam sæpe habent, mon-  
strant.

In specie hæmorrhagiæ per nares imminuentem indicant  
dolor capitis & cervicis, pulsus arteriarum capitis & colli  
auctus, vertigo, oculorum rubor, aurium tinnitus, ac na-  
rium pruritus: per asperam arteriam difficilis respiratio &  
tussis: hæmorrhagiæ uteri imminuentem, præter tempus  
mensium consuetum, monstrant tensio in regione hypoga-  
strica & lumbis, eorum gravitas & æstus; hæmorrhoidum flu-  
xum nimium innuit præter tempus consuetum: pulsus in hy-  
pochondriis, lumbis & dorso, venarum ani dolor & tumor,  
atque tenesmus.

Pertinent huc præ ceteris hæmorrhagarum differentiæ præ-  
bè dignoscende: Hæmorrhagiæ enim est vel spontanea vel non  
spontanea; spontaneæ sunt operæ naturæ exonerantis corpus,  
ut in fluxu mensium patet, aut hæmorrhoidum, aut hæmor-  
rhagiis narium periodicis, &c. Spontaneæ iterum vel critica  
est vel symptomatica: Critica hæmorrhagiæ fit in fine morbi  
cum euphoria ægri, quam post materis coctionem natura  
in morbo facit, ut unà per illam curet: Symptomaticæ sunt,  
quæ in principio aut incremento febrium ardentium & va-  
riolarum superveniunt, suntque ex orgasmo sanguinis,  
mollentis effusionem. Non spontaneæ sunt, quæ subinde in  
cursu morbi accidunt, citra euphoriam, vi auterrato ali-  
quo externo. Unde spontaneæ critica non est curanda, quia  
est laudabilis naturæ conatus, quin potius promovenda, nisi  
nimia sit, & cū insigni virum prostratione fiat, juxta Apho-  
rismum HIPPOCRATIS 2. sect. 1. Spontaneæ sympto-  
matica cautè tractanda est, nisi sit immodica, ac nisi impe-

diat alium naturæ conatum, relinquenda: sic e. g. si superven-  
erit in incremento variolarum aut petechiarum, ne retro-  
cedant, supprimatur: similiter critica, si nimia sit, maturè  
compescatur. Non spontaneæ quæcumque symptomatica, cum  
morbus sit, aut procedat ex habitu corporis morbofo, ne-  
cessario est sistenda & præcavenda. Deinde hæmorrhagiæ  
est vel habitualis, vel accidentalis: Habitualis crebrius, & vel  
brevis vel nullà præcedente occasione, redit & affligit: Ac-  
cidentalis verò raro, nec nisi magnà datà occasione, contin-  
git & affligit. Accidentalisis est vel cum febre, vel sine febre;  
ibi ad turgescen-tem & ebullientem sanguinem simul plus  
minus respiciendum; item, an critica magis? an sympto-  
matica fuerit?

Aboluta fuit Theoria Hæmorrhagiæ in genere unà cum  
signis diagnosticis. Superfunt signa prognostica.

### PROGNOSIS.

Quoad PROGNOSIN in genere observandum, quod om-  
nis hæmorrhagiæ sit excretio planè præternaturalis, ita qui-  
dem, ut etiam critica suo modo aliquid præternaturale sit  
nulla enim, præter menses & lochia, naturalis est: vid.  
FORESTUS lib. 6. Obs. 11. in feb. Adeoque om-  
nis, nisi tempestivè supprimatur, periculosa, & aliquid  
mali portendit, præter illam, quæ morbis aliis, præpri-  
mis cum febre junctis, criticè supervenit, illosque sol-  
vit, aut certè notabiliter imminuit, optima enim crisis fit per  
hæmorrhagiæ: vid. ZACUTUS LUSITANUS  
Prax. Admir.

Minus quoque periculi portendit hæmorrhagiæ plethori-  
cis adfectis, quibusvè evacuatio solennior suppressa, aut  
membrum aliquod detruncatum fuit, cui sanguis destinatus,  
nunc verò cohibitus, plethoram facit.

Moderata & consueta & plus minus periodica hæmorrhagiæ,  
quocumque in loco fiat, si subiecti conditio respondeat, &  
hoc faciliè ferat, salubris, cum deficientem varia mala, non  
secus ac excedentem, insequi soleant. Moderata igitur talis  
non sistenda est.

Hæmorrhagiæ quæcumque à causa interna ceteris pari-  
bus & periculosiores & cautiùs tractandæ, quàm quæ ab ex-  
ternis.

Hæmorrhagiæ nimis quæcumque, uti ad animi deliquia,  
æquæ & virium prostrationes immediatè disponunt, ita  
mediatè cachexias & hydropes successivè inferunt.

Periculosior est, quæ copiosior, quæ faciem citrinam,  
plumbeam aut fulcam reddit, cui convulsiones superveni-  
unt, quæ pituitosos & melancholicos, aurà quacumque  
causa emaciatis corripit, quæ morbum, cui accedit, non  
sedat, quam rigor excipit, utporè qui de spiritibus exha-  
stis restatur: unde morbos chronicos, scilicet tabem, hydro-  
pem &c. hæmorrhagias immodicas sequi non adeò infre-  
quens est.

In specie, ubi sanguinis fluxui supervenit extremorum  
refrigeratio, propinqua est syncope.

Digressis arteriæ & venæ insignis & plurium, aut ejus Dia-  
brosis, periculosissimæ & curatu difficiles sunt, nisi harum  
vulneribus remedia immediatè applicari possint.

Quæ ab anastomosi vitio sanguinis, vel absolutè vel respecti-  
vè abundantis, nascitur, curatur facillimè.

Quæ verò vitio sanguinis ferecentis, tardè & quasi medio  
modo se habet.

Quæ est ab acrimonia sanguinis, hujusque fluxu impe-  
dito, difficulter sedatur potissimum si posterior casus causam  
pertinaciorè, v. g. scirrhum hepatis, agnoscat.

Quæ vitio vasorum contingit, pro ratione morbi primarii  
plus minus curabilis esse solet.

Difficiliores sunt hæmorrhagiæ, quæ sunt lésis arteriis,  
quàm à venis; item quæ à venis majoribus, quàm quæ à mi-  
noribus ruptis, contingunt.

### CURAM.

Quod ergo attinet CURAM: in ea ante omnia conside-  
randum est, an curanda sit hæmorrhagiæ, an verò suenda?  
de quibus supra. Deinde in habituali distinguenda est cura  
in eam, quæ fit tempore paroxysmi, adeoque est curatoria,  
& eam, quæ est extra paroxysmum, adeoque præserva-  
toria. Tertio præbè considerandum, an ipsa hæmorrhagiæ  
sit morbus solitarius & primarius? an verò secundarius?  
& si



& si hoc, an sit cum febre? an sine febre? Hinc omnis hæmorrhagia spontanea & critica, per quæcunque loca fiat, item quæ naturæ solennis est, & cui adueta, similiter in iis, quibus eiusmodi solennes sanguinis evacuationes suppressæ, nunquam curandæ, nisi forsitan modum excedant, viresque notabiliter exsolvant, nec ipsi evacuatio quasi succedanea instituat. Symptomatiæque verò hæmorrhagiæ quæcunque sistendæ sunt.

Consistit autem Cura hæc vel in proximarum causarum remotione, vel affluxus inhibitione, vel sanguinis aversione, per venæ sectionem, cucurbitulas, hirudines, & fonticulos; vel in vasorum præter naturam apertorum fibrarumque partium consipatione atque obturatione, per interna sanguinis impetum coercentia, & externa, quæ vasorum ora adstringunt, & sanguinem profluentem incrassant. Diæreses verò vasorum per interna, acce quidvis temperantia, & externa, vasa plus minus arrosa adstringentia, consolidantia, conglutinantia, &c. sunt restituendæ. EXTERNA ista, eorumque administrandi rationem, in sequentibus, ubi de Hæmorrhagiis in specie, pluribus explicabo. Hac vice INTERNA culvis hæmorrhagiæ speciei plus minus applicabilia consideranda veniunt.

#### Quoad Anastomosa:

- (1.) Sanguis nimis vasorum ora aperiens imminuendus lentè per pauciores dictam viamque tenuem; confestim verò magis per sanguinis missiones quasvis, nunc venæ sectiones, nunc scarificationes.
- (2.) Idem turgescent, ut in plethora, vel præcipitantibus vel absorbentibus fermenta ista acida volatilia, vel acidis, aut blandis, aut fortioribus, volatili acidum figentibus & coercentibus, compescendus: qualia sunt v.g. acetum, tinctura florum bellidis, spiritus vitrioli, hæmorrhagiæ narium scorbuticas subinde figens: Conf. M. A. N. C. Ann. 3. Observ. 196. pag. 176. Nitrum in aqua fontana solutum atque propinatum: vid. RIVERIUS Cent. 1. Observ. 48. & AGRICOLA Chirurg. parv. pag. 190. Pulvis hepaticus rubeus tinctura, lapidis hæmatitis, saccharum Saturni, hincque cum vitriolo martis parata tinctura antiphthifica, corallia, unicornu fossile, terra sigillata, lapis hæmatites, usnea, camphora, & opiata. Huc etiam pertinent vegetabilia nitrosa & moderatè adstringentia seu vulneraria, nempe portulaca, plantago, sedum seu sempervivum, &c. opiata, camphorata.
- (3.) Idem aquosus & nimis serosus & tenuis maturè corrigendus, temperandus, & in debitam consistentiam revocandus, vel exsiccantibus aut imbibentibus, aut incrassantibus, & deinde evacuantibus serum superfluum per alvum, vel vesicam, vel per habitum corporis, & digestionem primæ prospiciendum.
- (4.) In anastomosi verò vitio vasorum acidum illud, nervorum spasmos, nec non aliqualem obstructionem inducens, corrigendum per vulgò nota aperientia, in specie Martialia, in morbis convulsivis & hæmorrhagiis habituantibus pro eradicandâ radice optima; de quibus alio loco dictum.
- (5.) Quoad causas remotas diæreseos; si hæc fiat vitio sanguinis acrioris, succi acres salii erodentes obduntur per blanda temperantia, & sanguinis crasin corrigentia, ut passulata, lacticia, martialia & similia. Si vitio vasorum onerosorum, vulneraria adstringentia & incrassantia sunt convenientissima.
- (6.) Laxitas denique atque porositas partium præternaturalis condensantibus atque roborantibus, quorum hæc Repellentia dicere liceret, corrigitur; qualia sunt, præter Alterantia dicta & mox dicenda, stercus asinum, lichenes equorum, de quibus vid. du HAMEL Tractat. de Affect. Corp. pag. 312. talus suis, vid. BARTHOLINUS Cent. 5. Hist. 97. aqua ex typis ceruinis, pulvis sperniolæ Crollii: quibus deum accedant narcotica, v.g. semen hyoscyami, laudanum opiatum, eleæguarium diascordii &c. item crocus

Estmull. Oper. Tom. 11.

Martis cum aceto paratus, nitriolum Martis, acidulæ artificiales, & tinctura antiphthifica Michaelis.

Pro hic scopis obtinendis.

Observ. 1. Conuenit interdum, ut dixi, VENÆ SECTIO, seu alia sanguinis evacuatio. Dico interdum: nam perversa Chirurgorum est consuetudo, ut in omni hæmorrhagia sanguinem mittere velint. Verum hoc stultum est, cum licet sanguis non abundet, & jam tum effluit, eundem velle ulterius evacuare; scilicet in quavis hæmorrhagia sanguis purè passivè habet, movetur nempe eo, quo spirituum moventium & organorum impetu pellitur, & effluit ubicunque vasorum ora aperta sunt, utut occasionalis causa interdum in sanguine hæreat. Non ergo sanguinem evacuando, sed causas occasionales, sive in sanguine sive in parte, per quam fit effluxus, hæreant, removendo corrigendæ sunt. Unica ergo abundantia sanguinis, sive plethora vera, & quibusdam incalibus apparens, sive turgescentia, aut inde natus impetus ad locum, per quem effluit, postulat venæ sectionem. Ideoque etiam in solenni evacuatione sanguinis suppressa sanguinis detractio locum habet, nec non in hæmorrhagia præternaturali periodica, paulò ante hujus invasionem; vid. FORESTUS lib. 24. Observat. 9. in schol. Hæmorrhagia verò à fluxilitate aut acrimonia corrodente sanguinis, & reliquis omnibus casibus, quæ oriuntur, ibi vana & insulsa est venæ sectio. Ubi verò secunda, ibi studiosè leges revulsionis, derivationis & aversionis observandæ, quas venæ sectio parior & aliquoties reiterata, item scarificatio atque cucurbitulæ præstant. Sanguis quoque à parte affecta averitur per Interceptientia, in specie per ligaturas & cucurbitulas, tam scarificatas quàm non scarificatas, partibus tamen potius remotioribus quàm vicinis applicandas.

II. PURGATIONES ipsæ etiam sunt ridiculæ, & quæ tales non conveniunt, nisi interdum nimia abundantia laticis aquosi, nimis fluxilem aut acrem faciens sanguinem, sul excretionem urgeat: in tali enim casu utique purgantia, blanda aquas per inferiora conveniunt, uti in talicasu rectè eadem commendat FORESTUS lib. 24. obs. 12. FORTIS Cent. 1. Conf. 92. & RIVERIUS in sua Praxis lib. 4. cap. 8. & confirmatur etiam hoc ipsum per experientiam RONDELII, qui curavit quendam singulis diebus duas vel tres libras sanguinis relicientem, solis syrupis serosos humores evacuantibus; feri enim copia, quod vehiculum sanguinis est, subinde fluxus hujus est causa, præsertim si acris idem fuerit; Quin & per SUDORES vel diuretica aquosum laticem uberiores cum salibus heterogeneis emittentia hoc commodè fieri potest. Utut enim sudor, dum actu fluit, dissolvat massam sanguineam, eamque ita fluxiliorem reddat, postmodum tamen ubi cessavit sudor, sanguis sero depauperatus nonnihil crassefcit, spissescit, & salibus superfluis aut heterogeneis liberatus, mitior evadit aut dulcescit, & ita hæmorrhagia plus minus sufflamatur & cessabit. In specie, ubi cum febre fuerit hæmorrhagia symptomatica, per sudoriferam, non quidem volatilia, sed additis opiatis compescenda venit. Confer. ble WILLISIUS Pharm. Rational. Part. 2. pag. 418.

III. OPIATA generalia sunt hæmorrhagiarum remedia, dum & irritationis sensuum in hac vel illa parte undecunque excitatum sopiunt, & spirituum moventium impetum plus minus refrænant, adeoque quovis rapidiores sanguinis inde concitatos motus quietiores reddunt, quo ipsi sum catholice in aqua, id est, sanguinem sistens, merito habentur, internè & externè adhibenda. Experimenta huius rei novissimè retulit Medicus quidam Hassiacus, MICHAEL BERNHARDUS VALENTINI, in Epist. ad D. Doct. Widium, Archiatrum Spirensem, de Nova Matricis & Morbone Muliebris Anatome, ubi fusè ostendit, quantum opiata in narium æquè ac uteri hæmorrhagia valeant. Videt etiam HORSTIUS in Obs. ubi arteria loco venæ secus admotione opii fuit sedata.

Ex dictis pater, REMEDIA ad hæmorrhagias usitata esse.

(1.) Vulneraria & adstringentia, sanguinem partim inspissantia, partim vi alcalinâ, acida vitiosa absorbentia, partim vasorum læsiones restituentia, ut plantago, portulaca, pilosella, bellis minor, rosa, &c.

Vel

Mm 3

(2.)



(2.) *Absorbentia*, tam *Martialia*, hisque cognata *corallia*, *hematites*, *terrae boli*, &c. quam *animalia*, ut *Cornu Cervi sine igne*, *ebur sine igne*, *unicornu verum*, *dens bippopotami*, &c. Sanè *Martialia* plurimis scopis in *Curis hæmorrhagiarum* satis faciunt; in specie hæmorrhagias ex nimia sanguinis acrimonia, item ex obstruptione vasorum sanguiferorum, item hæmorrhagias habituales hypochondriacorum, scorbuticorum & spleneticorum, quæ subinde sunt stupendæ, vomitu sanguinis splenetico sæpius recurrente, (sive sit revera talis sive non, loquor cum vulgo) optimè sistunt *Martialia*. Hujus rei singulare exemplum habet **LOWERUS** contra *Mearam* cap. 3. pag. 19. ubi habet hæmorrhagiam stupendam chalybeatorum usu curatam: *Conf. M. A. N. C. Ann. 2. Observat. 222. pag. 324. & Ann. 3. Observat. 106. pag. 175.* Sunt præstantissima, partim quod acidum vitiosum, hæmorrhagiæ occasionalem causam, absorbent, partim quod radicem in primis viis, unde affectus spasmodici hæmorrhagiarum superveniunt, excindant; quin etiam in sanguinis serositate tenui & falsa optimè conferunt. *Martialia* nempe remedia per se semper *adstringunt*, per accidens verò *aperiunt*; unde perinde est interdum, si in hæmorrhagiis *Martialia* dicta *aperientia* sive *adstringentia* usurpentur, modò *acida vitiosa* primarum viarum, & inde dependens sanguinis crasis vitiosa corrigantur, & affectus convulsivi hinc producti in radice emendentur. *Observavi hoc aliquoties*, in specie in mulieribus menstruantibus, in quibus liquor Martis solaris ritè usurpatus & ciet menses deficientes, & suppressi eosdem nimis fluentes; quod etiam circa *tincturam vitrioli Martis Zruefferi* observavi, quæ aperit mensium obstruptiones, & tamen in inordinato & sæpius recurrente fluxu cum fructu, pro eodem sistendo, observavi. Adeoque in cachecticis, hypochondriacis, scorbuticis, &c. cum sanguinis fluxibus præternaturalibus, vel cum iisdem naturalibus, sed vitiosis aut inordinate contingentibus, aut deficientibus aut excedentibus *Martialia* pro curatione utramque faciunt paginam, quippe quæ citra animalium partes pariter non nisi absorbendo, aut *acida vitiosa fermenta* & inquinatam massam sanguineam falsam corrigendo, operari solent:

Vel

(3.) In hæmorrhagiis serosis serum imbuentia & incrassantia, ut *ustia*, *terrea*, aut aliunde evacuantia, ut *Purgantia*, *Diuretica*, præsertim ex classe vulnerariorum. Vel

(4.) *Sanguinem attemperantia* & quasi *edulcorantia*, ut *passulæ* & *passulata*, quæ planè singulare sunt remedium in curandis hæmorrhagiis nimis, in specie cachexiis & scorbuticis; quatenus temperant acre quodcumque, & sanguinem dulcem & minus rosivum reddunt. Sic ipse novè exempla infantum, imò & adultorum, frequenter hæmorrhagiis narium obnoxiorum, toto frequenti passulatum usu curatorum. Hinc quoque *lac* & *lacticia* uti possunt scorbutum, ita eorum usus hæmorrhagiam corrigit.

Ex his patent facillè remedium formulæ: v.g. in hæmorrhagiis ex turgescente nimis sanguine cum impetu febrili & phlogosi vaga, convenit *Potio* ex alumine & spiritu vitrioli pag. 124. præscripta, *Apozema SYLVII in Prax. lib. 1. c. 23. §. 34. pag. 187.* Vel

℞. *Aquæ plantag.*

*Semperviv. mai. ana* ℥ss.

*Syr. papav. alb.* ℥j.

*Tinct. flor. bellid. cum phlegm. vitrioli par.* ℥ij.

*Spiritus vitrioli q. s. ad gratiam aciditatem.*

*M. D. S.*

*Mixtura sanguinem sistens pro aliquot vicibus.*

Capiatur cochleatim pro lubitu ad sistendam sanguinis turgescientiam.

In hæmorrhagiis habitualibus ex eodem sanguine turgescente ex acido volatili, v.g. in vini potatoribus, &c. adedque in iis, qui vulgò ex sanguine bilioso & hepate nimis calido hæmorrhagias pati dicuntur,

℞. *Dent. bippopot. præp.* ℥ss.

*Corall. rub. præp.* ℥j.

*Lap. hemat.* ℥ss.

*Sacch. Saturni* ℥ij.

*Laud. opiat.* ℥ss.

*M. f. Pulvis: S.*

*Pulvis vaporans.*

Capiatur subinde manè quantitas cultelli cuspidis.

Item

℞. *Extr. flor. Zlij.*

*Ebor. sine igne.*

*Dent. bippot. ana* ℥ss.

*Corall. rub. præp.* ℥j.

*Hemat. præp.* ℥ij.

cum f. q. *Syr. ros. rubr. & papav. erras. f.*

*Electuarium.*

*D. S.*

*Electuarium sanguinem sistens.*

Extractum florum paratur sequenti modo:

℞. *Flor. ros. rub. p. ij.*

*Papav. erras.*

*Bellid. rub. ana p. j.*

Per multiplicem infusionem in aqua simplici hinc expressio- nem & inspissationem, f. l. a. Extractum.

Sic parabitur extractum succosum ad imitationem **ANGE- LI SALÆ**, ubi de *Extractis Vegetabilium*.

In hæmorrhagiis habitualibus ex sanguinis tenuitate serosa.

℞. *Passul. min. conquass. aut eorundem pulpa* ℥ss.

*Rhabara. el. Zij. vel Zlij. pro lubitu.*

*Tartari vitriolati Tach. Zj.*

cum f. q. *Syr. Pomor. f. Electuarium.*

*D. S.*

*Electuarium sanguinem temperanter sistens.*

Capiatur manè & vespèri duabus horis ante cenam quanti- tate castanea; Vel

℞. *Passul. min. vel confervo. Rosar. rub. Zlij.*

*Rhabarb. el.*

*Corall. rub. præp. ana* ℥ss.

*Ebor. sine igne* ℥j.

*Denn. equimar.* ℥ss.

*Extr. Mart. cum succ. pom. Zlj. vel Zlij.*

cum f. q. *Syr. ros. rub. f. Electuarium.*

*D. S. ut supra.*

Utile est & per sudorem occurrere tali hæmorrhagiæ:

℞. *Cornu cervi ust.* ℥j.

*Terræ sigillat.* ℥ss.

*Laud. opiat. gr. iij.*

*M. pro 2. dosibus.*

cum sudore usurpandis.

*D. S.*

*Pulvis sanguinem sistens.*

In hæmorrhagia ab acriori sanguine, à lymphæ auterosione, omnibusve modis concitata, sanè polychrestæ est *Mixtura SYLVII lib. 1. Prax. cap. 9. §. 20.* Ad cujus imitationem sequentes, omnes reliquas compositiones superare videntur:

℞. *Aquæ plantag.* ℥ij.

*Cinnam. Zij. ad Zlij.*

*Acet. vini Zlij. ad ℥ss.*

*Corall. rub. præp. Zlj. aut loco horum Croci Mar- tis adstr. ℥ss.*

*Terræ sigillat. ℥j. vel ℥ss.*

*Laud. opiat. gr. iij.*

*Syr. Myrtin. vel Portulac. Zlij.*

*M. D. S.*

*Potio sanguinem sistens.*

Capiatur pro aliquot dosibus. Vel

℞. *Aquæ portulac.*

*Plantag. ana* ℥ss.

*Cinnam. Zlij.*

*Acet. destill. ℥ss.*

*Trochisc. de Carabe, vel terræ sigill. vel Bosi Arm. Zij. ad ℥j.*

*Corall. rub. præp.*

*Unicorn. fossil. ana* ℥j.

*Laud. opiat. gr. ii. ad lv.*

*Syr. Corall. Querc. vel Myrtin. vel de rosæ sic. Zvi. vel ℥j.*

*M. D. S. ut antè.*

Capiantur cochleatim, cohibent enim fluxum hæmorrhoidum nimium & symptomaticum.

Huc quoque pertinet *Electuarium HELIDÆI PADUANI*, de quo infra, ubi de *Hæmoptysi*.

In hæmorrhagia symptomatica, e.g. febrium malignarum, præscribi potest sequens:

℞. *Aquæ scorzonæ. Zij.*

*Tenell. Cornu Cervi* ℥i.

*Acet. destill. vel simpl. Zvi. vel succ. Curi* ℥i.

*El. diascord. Frac. Zij. ad Zlij.*

*Antimonii diaphor. ℥j.*

*Syr.*



Syr. Rubiidei ꝑ.

M. pro tribus dosibus

D. S.

*Mixtura sanguinem sistens, pro tribus dosibus.*

Hæc observatis, in genere ad hæmorrhagiam quamcunque, pluribus indicationibus, nempe adstringendo, consolidando, vasa claudendo, & sanguinem temperando satisfacienda, imprimis sequentia, & quidem ex regno Vegetabili, sunt: Portulaca, plantago, symphytum majus, & ex his paratus syrupus compositus, quem videb. *suprà Sect. 6. cap. 1.* polygonum, millefolium, folia tenella Quercus, rosæ rubræ inodoræ, semen sumach, cortices granatorum, lysimachia, bursa pastoris, flores balauſtii, sanicula, pyrola, polygonum, bellis minor, ruta, vinea pervinca, hederæ terrestris, urtica minor & radices urticæ majoris, (vid. RORDERICVS à Castro de Morb. Mul. lib. 1. cap. 3. & RIVRIVS Pr. lib. 4. cap. 8.) symphyti majoris, tormentillæ, pimpinellæ, sanguisorbæ, millefolii, bistortæ, folia quercus teneriora, mucus terrestris, quercinus, &c. fructus myrtilli, acacia nostras, gallæ, rubi; horumque simplicium decocta & syrupi, aqua & syrupus portulacæ, plantaginis, syrupus de symphyto, syrupus coralliorum, mirtillorum, de hederæ terrestris, &c. quæ omnia adstringunt, & sanguinem quodammodo incrassant: item semen portulacæ, lactucæ, urticæ; item papaver & papaverina, semen hyoscyami, opium, & quælibet alia hujus generis anodyna certo experimento hæmorrhagias sistunt. Pertinet hoc radix acori aquatici seu pseudoacori, & ex hoc paratum *Nectar adstringens* D. Langui, ex succo nempe cum saccharo in consistentiam syrupi inspissato; & sanè egregium est remedium adstringens, & quodammodo sanguinem inspissans, indeque in quocunque tam sanguinis, quam aliorum humorum fluxu commendo; item syrupus coralliorum, syrupus myrtinus: in specie, succus urticæ majoris recens expressus ad uncias aliquot internè assumptus contra quamcunque hæmorrhagiam narium. Sputum sanguinis, vomitum cruentum, ab omnibus laudatum experimentum existit; in specie vid. RIVERIUS in Praxi, ZACUTVS LVSTITANVS, & AMATVS LVSTITANVS, qui non possunt satis commendare hunc ipsum, utpotè quo variz hæmorrhagiæ & hæmoptyses curatæ fuerunt. Datur hic succus ab ꝑ. ad ꝑ.ij. vel ꝑ.ij. Quidam syrupum ex succo urticæ in promptu habere solent, quem ad recurrentes hæmorrhagias solent subinde propinare: sic urticam majorem vulgarem contusam plantis pedum & volis manuum, & item membro virili, applicatam maximè commendat BORRELLVS Cent. 1. Obs. 95. sic fungi betuli ramenta ad miraculum hæmorrhagiam externam sistunt, teste CROLLIO Basil. Chym. pag. 308. TACHENIO Morb. Princ. pag. 187. Porro muscus seu usnea cranii humani ex cranio violenter intercepti desumpta, nobilis & mirabilis est in sistendis hæmorrhagiis, quatenus per mumiam microcosmi imprægnata est, dosi à gr. xij. ad ꝑ.ij. vel ꝑ.ij. propinatur in aqua burse pastoris cum syrupo coralliorum &c.; externo & interno usu periculosissimas sistit hæmorrhagias, & divinum vocatur remedium à LANGIO; Prostant enim exempla hæmorrhagiarum desperatarum beneficio hujus usneæ feliciter curatarum: vid. BECKERI Medicus Microcosm. & HILDANVS Epist. 17. LINDANVS refert, se Comitissam, cui nullis remediis sedari potuit hæmorrhagia, restituisse per solam cranii humani usneam; unde & HILLERVS in Cent. 1. Cura 20. confirmat, se periculosissimam hæmorrhagiam narium ex potu vini excitatam, per ꝑ. cranii humani, & ꝑ. usneæ, cum aqua burse pastoris sedasse. Externè inditur naribus, aut ubi sanguis aliàs effluit, compescit insigniter fluxum hunc. De variis ex hoc paratis medicamentis, tum internis, tum externis, vid. M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 53. pag. 100. Loco hujus tamen solet substitui muscus prunorum sylvestrium & quercinus, qui tamen minoris est pretii. Hisce accensetur sanguis draconis: verum cum genuinus rarè apud nos habeatur, caveamus ab usu ejus, & potius exhibeantur malix, sarcocolla, thus, myrrha, aloë, gummi Atabicum, mumia, succinum, & similis sanguinem temperantia & incrassantia. Passula *suprà laudatæ* fuerint, & conducunt in specie hæmorrhagiis ex visio sanguinis acrioris, serosioris, acido-salsioris &c.: Nam tali ex causa hæmorrhagias habituales natas crebrior passularum minorum comestio sublevat. Rhubarbarum denique non tam pro sero evacuando, quam sanguine alterando, &

Ettmull. Oper. Tom. II.

crasi ejus restituenda, in hæmorrhagiis & serosiore sanguine confert. Camphora non negligenda, quæ spiritus afficit, & fermenta peregrina acida sanguinis misicè corrigit.

EX REGNO MINERALI reliqua remedia superat Mars, omniaque Martialia *suprà* laudata, & subiecta reliqua Martialia: qualia sunt lapis hæmatites, qui virtute Martiali confert ad hæmorrhagiam, tam in substantia præparatam, quam ejus tinctura; terræ Martiales, bolus ruber, item Armena, terra sigillata, terra vitrioli dulcis, &c., quæ huc suo modo pertinent, Corallia, eorumque tincturæ, vitriolum Martis, & acidularum potus, &c. Ex omnibus convenit tinctura sulphuris vitrioli, quæ revera est saltem, tinctura Martis adstringens, ad omnes & quascunque sanguinis hæmorrhagias expertissima. Equidem paratur vulgò ex capite mortuo vitrioli Martis benè edulcorato, sed meliorem modum docebo:

4. *Vitriolum Martis nativum*, & si non habetur genuinum (nam nihil debet participare de venere, aliàs si tantillum veneris adsit, loco facultatis adstringentis facit vomitus) solve vitriolum in aqua, & injice limaturam ferri, sic præcipitabitur omnis venus, & præcipitata in forma crustæ cupreæ supernatat solutioni, quæ filtrata inspissetur & dabit vitriolum Martis genuinum.

Hoc facto:

4. *Solutionem vitrioli hujus Martis*, & insilla eidem, guttatim lixivium salis tartari, vel oleum tartari per deliquium, sic cadit crocus Martis in fundum; hocque fiat tamdiu, donec fiat saturationis punctum, filtretur: (liquor blando igne evaporatus seu crystallizatus dat Tartarum vitriolatum Tachenii:) Crocus verò præcipitatus edulcoretur probè copiosâ aquâ simplici, lotusque exsicceetur, sic habebitur pulvis flavus instar croci, qui præferendus est omni alio croco Martis adstringenti, & est egregius in erosione capitis, & ulceribus manantibus.

Porro Crocus hic præcipitatus solvatur in spiritu nitri, vel spiritus salis composito, ita fiet insignis effervescencia & incallescencia; solutio filtretur, abstrahatur per retortam ad consistentiam mellis, massa remanens postmodum ponatur in locum calidum cum spiritu vini probe redificato, & digeratur, sic habetur tinctura Martis, quæ filtrando separetur; & hæc tinctura vulgò *Tinctura sulphuris vitrioli*, rectius tamen *Tinctura Martis* appellatur.

Hæc tinctura adstringit, & est nobilis & egregia in omni hæmorrhagia, ritè parata, datur ad guttas xx. xxx. & xl. in quocunque vehiculo usurpata.

Facit hoc quoque Extractum Martis adstringens HARTMANNI, quod habet in Praxi Chymiar. cap. 50. de Hæmorrhag. narium, estque compositum corpus ex terra, & marte; confert tam externè, quam internè, in manibus detentum. Est experimentum LINDANI, cui instar omnium remediorum est; utpotè quo puerum desperatâ hæmorrhagiâ narium laborantem curavit. Datur ad gr. v. vel ix. cum conserva quadam adstringente in forma Boli. Item saccharum saturni & ipsum hæmorrhagias compescit. Similiter facit huc hæmatites artificiales ex vitriolo Martis & saccharo Saturni. Modum habet GLAUBERVS in P. 3. Teutschlandes wohlfarth. Processus est legitimus, utut non rarè dictus Autor mentiat. Item loco acidularum liquor Martis solaris ad hæmorrhagias chronicas aut sæpius recurrentes conducit, præternaturales nimios fluxus sanguinis sistendo, & è contra naturales aut deficientes aut inordinatos restituendo; item pulvis hæmatitis cum aceto aut succo granatorum acidorum propinatus; item liquor stypticus ex terra sigillata cum spiritu vitrioli vel nitri paratus; item tinctura antiphrisica ex saccharo saturni & vitriolo Martis parata, egregiè convenit in quacunque hæmorrhagia. Quibus Essentiæ & extracta Martialia quæcunque commodè annumerari possunt. Spiritus vitrioli *suprà* laudatus coagulando blandè sanguinem, hæmorrhagiam sistit, in specie quæ ex turgescencia aut nimia ebullitione sanguinis oritur, quatenus orgasmum ejus sistit & blandè coagulat. Io quo casu etiam niterum depuratum, & omnia nitrata, interno & externo usu, in specie interno, cum fructu usurpari possunt, etiam hæmorrhagiæ per iracundiam excitatæ fuerint, & à FELICE WURZIO tanquam speciale arcanum contra hæmorrhagias commendatur. Pertinet huc pulvis sympatheticus ex vitriolo Veneris benè depurato, & radiis solaribus, Sole in Leone versante, exposito & calcinato

M m 4 para-



paratus, pro usu externo, qui sanguini effluens sive ex utero sive e naribus, sive pectore (de omnibus habeo experientiam) inspersus, aut saltem, si linteum sanguine isto adhuc madidum eo saltem adspargatur, aut linteum cruore effuso ebrium solutioni dicti pulveris immergatur & applicetur, certo & mirabili experimento ad hæmorrhagias quasque sistendas maxime proficuum est, quæ ita sympatheticè curantur: vid. DIGBY in Orat. eleg. de pulv. Sympathetico.

EX ANIMALI REGNO conveniunt in genere ad hæmorrhagias animalium partes duræ, in specie *rhur sine igne*, *unicornis verum*, *dens bippopotami*; *Cornu cervi ustum*, &c. absorbentia vitiosa acida, & incrassantia sanguinem; item remedia ex ranis, *sperma ranarum*, cuius aqua destillata interne hausta, & externe convenit, quod solitariò cum paucis aceto rosato applicatum, singularem vim obtinet hæmorrhagias compescendi; inde etiam ex hoc paratus pulvis *sperniolæ Crollii* est admodum commendatus ad hæmorrhagias, dosi ℥ss. ad gr. xv. vid. SCHROEDERUS. Permiscetur cum aliis in quacunque forma: aut etiam pulvis AGRICOLÆ sequens:

℥i. Sacch. Saturni.  
Thuris,  
Myrrh. ana ℥ij.  
Croci,  
Camphor. ana ℥i.  
M. F. Pulvis.

Quicum aqua *spermatidis ranarum* imbibitur, & lente exsiccat. Nam licet myrrham contineat, quæ aliàs facit hæmorrhagias reluscit, nihilominus tamen *sperniola* innocenter usurpari potest, nunc solitaria, nunc aliis mixta: v. g. ad coercedam hæmorrhagiam:

℥i. Lap. hamat. pulveris. ℥ss.  
Sperniol. Croll. gr. xv.  
Laud. opiat. gr. iij.  
M. f. Pulvis;  
divid. in 2. part. æquales,  
D. S.

*Pulvis contra hæmorrhagiam in duabus dosibus.*

Nam papaverina & opiat quavis semper remediis contra hæmorrhagias nimias addenda sunt, imprimis si dolor adjunctus sit. Vehiculum horum pulverum potest esse:

℥i. Aqua portulac.  
Semper v. mai. ana ℥i.  
Syr. Plantag. vel portulac. q. s.  
M. S.  
Aqua ad pulverem.

Porro excrementa quorundam animalium singularem vim habent ad hæmorrhagiam sistendam. Cetera omnia antecellit stercus asininum suillum, & stercus canis ossa rodentis, quæ tria utut apparenter foetida, sunt tamen reverrà expertissima contra quasque hæmorrhagias, externo pariter & interno usu. Sandè, præter pulverem ex his paratum, ex stercoribus suillo & asinino exprimitur succus, qui ab ℥ss. ad ℥i. vel ℥ij. in convenienti vehiculo propinatus, est efficacissimus; aut ex horum succo cum saccharo fiat syrupus ad hæmorrhagias, qui vid. in PRÆVOTIO, & in JOELIS Praxi. Hi ipsi syrupi admodum egregii sunt in compescenda hæmorrhagia: item permiscetur hi succi stercorum cum succo urticæ, & ita interne propinatur. Conf. RODERICUS à CASTRO de Morb. Mul. lib. 1. cap. 1. pag. 48. & ZACUTUS LUSITANUS lib. 1. Prax. Histor. cap. 2. nu. 4. Vel, quod alii faciunt:

℥i. Succ. sterc. asinin. rec.  
Syr. myrtillor. vel myrtin.  
Portulac. ana ℥ss.  
Aqua plantag. ℥vj. ad ℥i.  
M. pro haustu.  
D. S.

*Potio hæmorrhagiam sistens pro uno haustu.*

℥i. Succ. sterc. asinin. ℥ij.  
Syr. myrtin.  
Aqua plantag. ana ℥i.  
M. S. ut supra.

Stercus canis verò pulverisatum in substantia convenienter admodum propinatur, loco quorum quidam pro secreto commendant ipsum sanguinem proprium per quæcunque loca excretum, arefactum, & à ℥ss. ad ℥i. ipsi ægro in liquore appropriato propinatum, item externe, si fieri potest, loco hæmorrhagiæ applicatum istam mirificè sistere dicunt:

vid. SCHMUK in Curat. Magico-Magneticæ. De laëc supra dictum.

Supereest adhuc *buso*, mense Julio aut Sole in Leone existente captus, per caput transfolius, & ita enecatus, atque siccatus, & in sindone rubra appensus, quæcunque hæmorrhagiam ex nimio spirituum fervore & impetuoso motu concitatam, ob pavoris ideam ex hominis præsentia contractam, feliciter sistit; vel etiam si tantum sub axillis lateris istius, quo sanguis fluit, applicetur, ut probe incalescat; vel etiam, si tantummodo buso exsiccatus in manu detineatur, donec incalescat. Speciatim convenit ita *buso* in hæmorrhagiis narium symptomaticis in principio febrium malignarum, in specie variolarum admodum periculosis: In his buso dicto modo præparatus, aut etiam recens contusus sub axillis applicatus, aut etiam regioni cordis appensus, perquam egregius est, tam ratione malignitatis, quam ratione urgentis symptomatis. Juxta busones & ranæ, in specie virides, exsiccant & omnia ex ranis, earumque pulvis in vino rubro propinatus mirificè hæmorrhagias sistit; quæ vivæ contusæ, earumque sperma, pariter applicari possunt ad quæcunque, tam virilem quam muliebrem, hæmorrhagiam compescendam.

Unum adhuc de partium, præprimis internarum, hæmorrhagiis curandis notetur, ut his sedatis medicamentis grumos sanguinis dissolventia propinentur atque applicentur, in principio tamen moderata, v. g. *sperma ceti*, *marga saxorum*, *lapilli cancerorum*, *terra Hibernica*, & cum adstringentibus, v. g. pulvere *sperniolæ* & *Agricolæ* modo commendato, temperanda. Progressu temporis & potentiora sola & cum sudoris aliqualis provocatione exhibenda, qualia, præter diaphoretica, sunt radix polygonati, caryophyllatæ, rubiæ tinctorum, cherefollium, sabina, verbascum, Geranium Robertianum cum vino decoctum, terebinthina, fuligo, sanguis hirci, &c. Nisi enim talia applicentur, metuendum, ne grumi putrescentes acrimoniam contrahant, hincque, erodendo, novam hæmorrhagiam aut ulcus, aut simile quid corpori detrimentosum parent.

In hæmorrhagiâ à *cantharidibus* convenit lac, decoctum nucum pineæ cum visco quercino, passulæ, ichthyocolla, gummi arabicum & tragacantha: vid. JOEL Prax. lib. 3. pag. 280. quæ omnia acrimoniam hanc vel illam corrigunt.

Restant tandem ipsa officia vasorum atque pori partium constringendi ac constipandi. Quibus medentur Emplastici, sive Conglutinantibus sive adstringentibus. Utraq; saltem Externa sunt; & priora quidem albumen ovi, thus, sarcocolla, sanguis Draconis, mastix, aloë, farina fabarum; unde PARÆUS pag. 384. dimidium fabæ in hæmorrhagiâ ab hircudinum tactu commendat, parti affectæ applicandum: Item hujus loci est gallina seu columba per medium dissecta, & calidè applicata, quatenus harum sanguis grumescens officia vasorum obturat. Posterioris generis iterum duplicia sunt: Scilicet eadem vel austeritate notabili pollent, nempe vitriolum, hujus spiritus, tinctura sulphuris vitrioli, crocus Martis adstringens, tinctura lapidis hæmatitis, acetum simplex & rolaceum, lac virginis, fructus & succus acaciæ, succus hypocistidos, bistorta, millefolium, muscusterrestris, potissimum quercinus, de tegula & cranio humano; vid. HIL DANUS Centur. 2. Observat. 5. Flores rosarum, balaustrorum, cortices granatorum, myrtilli: Vel sanguinem constringentia, huncque imbibentia, quæ vasorum extremitatibus firmitus adhaerescunt, adeoque hos obturant, scilicet bolus Armena, terra sigillata, gypsum, alumenustum, pili leporini, & crepitus lupi. De argilla cum aceto in cataplasma redacta, & fumo succini albi, vid. RULANDUS lib. 1. Obs. 15. pag. 73. stercore porcino ac asinino, vid. FORESTUS l. a. Obs. 13. de spiritu vini rectificato, spiritu terebinthinæ & opio, HORSTIUS lib. 9. Obs. 12.

Atque ex his varia commendantur composita, e. g. liquor ille stypticus Gallorum, qui ceu secretum ad quasque hæmorrhagias, etiam ex vasorum sectione, laudatur. Li-quorem hunc mihi transmissum examinavi, experiesque sum, quod sit nihil aliud, quam solutio aluminis, cui dimidium præter propter de vitriolo martis fuit additum: Nempe binæ aluminis partes & una vitrioli martis mista & soluta in liquore appropriato, dat hunc liquorem. Hoc probavi ita: Infudi Decoctum gallarum huic liquori, & ecce! præcipitatus est in liquorem nigrum, de-

ditque



ditque distinctos aluminis crystallos. Liquor hic externè, cuicunque loco admotus, ubi effluit sanguis, ceu certissimum remedium fuit deprehensus. Ad imitationem hujus facile alius liquor potest parari; vid. WEBERUS *Tr. de Ligu. styptico*: Item

℞. Limet. martis part. j.

Spiritus vitrioli part. iv.

Digerantur in loco tepido, affundendo

Phlegm. vitrioli vel aquæ pluvial. destillatæ q. s. pro solutione & dilutione, ut commodè filtrari possit.

Filtrato liquori addatur

Solut. Alum. crudi la refracta dosi, & usul servetur.

Vid. BARTHOLINUS *Ab. Hafniens. Vol. 2. Obser.*

133.

Huc quoque pertinet pulvis ille Chirurgi Hollandicis familiaris, quem TULPIUS *lib. 1. Observat. 49.* describit; scilicet

℞. Bol. Armen. ℥ij.

Calcis vivæ,

Vitrioliusti,

Alum. ustri ana ℥vi.

Lap. Hemat.

Aloes lucid.

Sang. Dracon.

Terræ Lemn.

Croci martis,

Mumiæ ana ℥ij.

Mastich.

Thuris, ana ℥j.

M. f. Pulvis subtilissimus.

## ARTICULUS II.

### DE

## HÆMORRHAGIA NARIUM.

Considerabimus jam speciales rationes diversarum hæmorrhagarum, inter quas in principio hæmorrhagia narium se offert, seu sanguinis fluxus præternaturalis ex naribus, in quarum intimam superficiem terminantes arteriole hæmorrhagias istas excitant. Subinde copiosissimus sanguis est, & qui per plures poros ex naribus effluit, quem tunc ex sinu cerebri falciformi aut ejus vasis apertis ad nares pervenire multi asserunt, quod tamen falsum, sicuti sufficienter hoc dogma reliquit SCHNEIDERUS *Tr. de Offe cribriform. pag. 411. & seqq.* ubi sufficienter demonstrat, nullo modo ex sinu falciformi decidere quamecunque sanguinis guttulam. Quin potius vasa, ex quibus in hæmorrhagia narium effluit, sunt propagines rami arterialis à cavoside interna, qui juxta processum mamillares plures, inter furculos quosdam per foramina ossis cribrosi transmittit ad membranam narium superiorem glandulosam, per quæ vasa, seu per quas arteriolas & lymphæ simul affertur materia, per glandulosam istam texturam excernenda, ita ut ex orificiis istis apertis, & propter continuam à lymphæ homeostationem naturaliter laxioribus, narium hæmorrhagiæ accidant: Conf. WILLISIUS *Pharmac. Ratiop. Part. 2. pag. 40.*

### CAUSÆ.

Præter CAUSAS INTERNAS cum aliis hæmorrhagiis communes, EXTERNAS inter motus animi vehementiores, ut ira, gaudium, &c. hæmorrhagiam hanc interdum excitant: quod pertinet etiam illa hæmorrhagia narium, quam cuidam ex vitulino boatu, & carnis vitulinæ conspectu contigisse Rhodius Centur. 1. Obs. 39. refert; item pulveres sternutatorii fortiores inspirati aut alia, quæ vis inspirativa acriora inepte applicata. Hujus exemplum habet KERKRINGIUS in *Spicil. Obs. 32.* ubi lethalem observat hæmorrhagiam narium ex helleboro albo in sternutatorio datam.

### DIAGNOSIS.

Quoad SIGNA DIAGNOSTICA. Imminentem eam ostendit motus sanguinis sursum versus, cujus INDICIA sunt dolor capitis & colli sensus, temporum verò dolor

gravis plus minus pulsans, oculorum edigo vel splendor, lacrymæ copiosæ involuntariæ, rubor malarum, oculorum pruritus, tinnitus aurium, titillatio narium &c. quin & interdum aliqualis manuum tremor accedit.

Hæc signa tam in quàm extra morbum hæmorrhagiam narium pronunciant.

Imò & pulsus in carpo durus & quasi vibrans, arteriarum colli & capitis auctus, hæmorrhagiarum recurrentium, & quidem vitio vasorum, signum esse solet.

An autem sanguis ex vasis narium an cerebri promanet, dignoscitur ex hoc, quod sanguis ex narium vasis parce & stillatim ferè; ex vasis cerebri autem majori fluxu & impetu effluit; sicut ex his libras viginti quatuor sanguinis profufluxisse BAUHINUS *Theatr. Anatom. lib. 3. cap. 8.* notat.

Si in febribus acutis & ardentibus lachrymæ involuntariò profuunt, his sanguinis eruptionem ex naribus expectare, convenit, ut loquitur HIPPOCRATES.

### PROGNOSIS.

Quoad PROGNOSIN; ea instituenda est, tam de imminente, quàm præsentè.

Hæmorrhagia narium, quæ fit in morbis acutis, & quidem præprimis in statu, funesta est. Si fiat confertim cum euphoria ægri, est salutaris: illicidium verò sanguinis, id est, exigua sanguinis & stillatim facta ex naribus eruptio & fluxus in morbo acuto, præsertim maligno & die quarto, malum signum est, nisi forsitan causa externa vel excita verit, vel ejusdem incipientem fluxum inspissando vel retinendo impediverit.

Notabile est, quod HIPPOCRATES jam olim monuit in affectibus hepatis & lienis, dum dicit: Fluxus sanguinis è naribus non è directo factus, (id est, qui in nare diversa est, h. e. in dextra, si lien laborat, & è sinistro, si hepar) molis; nam tales hæmorrhagiæ, si debent esse profusæ, ut r'iqn, id est restitutum, fieri debent.

Quibus in febribus ardentibus aures obsurduerunt, his non solum febri, delirare necesse est: solvit autem inter alia & sanguinis è naribus eruptio.

Interdum in morbis acutis ægri contrectant nares, quod pessimum signum est; innuit enim naturam moliri aliquam hæmorrhagiam, quæ tamen propter imbecillitatem & imminutum sanguinis circulum non procedit.

In febribus Hungaricis aliisque malignis ægros sanat critica hæmorrhagia, quam imminuentem indicat surditas in statu veniens.

Si in principio variolarum larga narium hæmorrhagia advenit, & sponte cesset, bonum est, & facile evadent ægri.

Eruptiones sanguinis è naribus sæpius sunt admodum copiosæ, aliquot librarum pondus accedentes, adeo ut etiam ad libras quatuor sanguis effluerit, hoc tamen citra ægri virium lapsum. Item observatum fuit ad libras octo vel decem excreatum fuisse sanguinem non citra periculum, utut absque vitæ jaçtura.

Aliàs nimis copiosa hæmorrhagia narium si affligat, eadem prognosis faciendâ, quam heri in genere de hæmorrhagia nimia indicavi. Tam largiores enim sanguinis evacuationes, quàm ejusdem plus minus aut etiam planè non consueta, saltem intempestivæ suppressiones morbos excitant: hæc quidem pathemata cerebri & nervosi generis epileptica, soporosa, &c. illæ, absumendo spiritus vitales, syncopes, cachexias, singultum & convulsionem.

### CURA.

In CURA Hæmorrhagiæ narium imprimis attendenda est causa proxima, an sit nimirum effectus anastomoseos & quæ frequentior; an verò erosionis vasorum seu diæreseos: quæ rarior. INTERNA sunt eadem, quæ de Hæmorrhagia in genere artic. præcedente hæcenus dixi; saltem in hæmorrhagia narium ex nimia turgescencia & ferore sanguinis conveniunt blanda acida, sanguinem, & hujus impetum ad nares, quantum possibile, cohibentia & quodammodò coagulantia, quallia sunt spiritus acidi ex mineralibus, essentia martis adstringens, tinctura sulphuris vitrioli, liquor stypticus, syrupus factus ex succo stercoris asinini, miquscum syrupo myrtillorum; item opium & opiata, quorum formulas dedi, uti & absorbentia, supra Artic. 1. Vel

℞. Ebor.



℞. Ebor. sine lene,  
Terra sigill.  
Corall. rub. præp. ana ℥j.  
M. f. Pulvis.  
D. S.

Pulvis contra hæmorrhagiam.

Si verò narium hæmorrhagia sæpè recurrat ex nimia tenuitate serosa, conveniunt passulata crebrò usurpata, in specie sub forma Electuarii *Artic. Anteced.* præscripti, de quo manè jejuno stomacho & vespèri duabus horis ante cenam capiatur quantitas castaneæ, vel nucis juglandis, vel quantum placet, ut corrigatur sanguis. Convenit in genere in quocunque sanguinis vitio, quod Veteres aliàs derivarunt ex hæmatosi lassa vitiosi hepatis; moderni verò deducunt ex vitio fermentationis sanguinis. Ubi adest lymphæ acrimonia, præter ea, quæ suprà in hæmorrhagia in genere dixi, conveniunt & potio sequens:

℞. Aquæ portulac.  
Plantag. ana ℥ss.  
Acet. destill. ℥vj.  
Terra sigillat. ℥ij.  
Corall. rub. præp. ℥j.  
Spermiol. Croll. gr. xv.  
Land opiat. gr. iij.  
Syr. Portulac.

De symph. Fernel. ana ℥ss.

M. pro aliquot vicibus:

D. S.

Potio hæmorrhagiam sistens.

Quales mixturæ in omnibus casibus applicari possunt.

In hæmorrhagia narium habituali experimentum est herba Menthæ recens cum pane & butyro comesta, vel ejus succus frequentius assumptus.

Præter hætenus enarrata **INTERNA**, eaque respectu causarum varia, in paroxysmo per externa sanguinis impetus ad nares, quantum possibile, avocandus, vel spirituum impetum sopiendo, vel sanguinis ipsarum aut turgescen-  
tiam refranando, & deinde orificia vasorum aperta occludendo.

Quoad priorem scopum: ligaturæ extremorum dolorificæ, sanguinis missio in brachio, pro scopo aversionis, vel in pede pro scopo revulsionis, frigidorum & adstringentium, nucha, fronti, item scroto, manibus, mammis in mulieribus, interdum & hepatis applicationes; item terror in perfusione aquæ frigidæ in faciem & nucham, aut quovis modo inductus, (vid. ROLFINGIUS *Ord. & Meth. Comment. lib. 14. sect. 3. cap. 12.*) dolores graviores circa remotiora loca excitati, aut lipothymia inductæ, spirituum & hinc sanguinis motum partim sistendo, partim aliunde derivando, subinde proficue existunt. Sic sunt, qui ceu remedium revulsorium proponunt *incurvationem minimi digiti*; cum enim vehemens illa compressio intensum dolorem pariat, hujus occasione forsitan hæmorrhagiæ medela erit. Nec alia ratio videtur, quare contumax hæmorrhagia per cauteria actualia plantis pedum adnota curata fuerit à ZACUTO LUSITANO *lib. 1. Prax. Admir. Obs. 66.* Quibus & SPECIFICA quædam, quæ singulari & sympathetica plus minus vi sanguinem cohibent, simul sociantur, inter quæ primum locum habet *buso*, cujus jam aliquoties facta fuit mentio, diebus canicularibus transfossus, & ita exsiccatus, sub axillam alligatus, aut fronti admotus, mirè sistit hæmorrhagiam narium: quod etiam facit pulvis busonum narium inperfus: hinc & emplastrum magneticum CNOEFFELII ex busone locum habebit. *M. A. N. C. Ann. 6. Append. pag. 23.* item busonis sub dio suspensi, donec caro universa sit absumpta, os femoris denudatum, narium inditum hæmorrhagiam subito & continuo compescere asserunt. Lignum fraxini, sympatheticum dictum, certo tempore decisum, revera nobile experimentum est, quippe quod narium admotum gravissimas hæmorrhagias sistit, ut experientia testatur, sicut felicem successum aliquoties stupens observavi; licet & hoc interdum, sicut alia, fallat: Sufficit tamen quod plurimum proficit, non secus ac pulvis sympatheticus. *Hæmatites* in manu detentus interdum, allis irritis, egregie juvat, ut vulgò notum; si nempe tamdiu detineatur in manibus, donec incalasciat. Est autem differentia observanda inter hæmatitem, cum non omnis hoc præstare soleat: Egregiam hinc observationem, quoad ejus electionem, videbitis in BOYLE de Gemmis. Idem facit & bursa pastoris in manu detenta: vld. LANGIUS *lib. 3. Epist. 1. pagina 942.*

Jaspis geminus, cujus rubedo venalis herbaceis est distincta, argento cinctus insigniter sistit hæmorrhagias, in ista manu sub pollice, ex cujus lateris foramine narium sanguis fluit, detentus vel narium admotus, quod observavit SCHMUCKIUS in *Curat. suis Magico-Magnet. pag. 16. in casu 3. Medicorum desperato*, qui hoc modo hæmorrhagiam narium desperatam curavit tenendo hunc jaspidem in palma manus. Confirmatur hoc etiam à BOOTIO *Tr. de Gemm. & Lap. pag. 202.* Videatur etiam HILDANUS *Cent. 3. Obs. 2.* item BOYLE de Gemmis. Verum cum Jaspis non ubique proster, substituant huic succedaneum, umbilicum nempe marinum in forma cochlearis conformatum, qui in parte plana & averfa leviter humectetur cum saliva, & applicetur circa interstitium oculorum, ubi decurrit vena frontis; ita sistere eum hæmorrhagiam narium observatum est, ac confirmat hoc BOOT. *loc. all. uti & hujus effectum probavit GABELCHOVERUS Cent. 4. Obs. 3.* Verum non credo, vim umbilicum hunc specialem obtinere, quin potius convenit, quatenus ab eo valide applicato comprimuntur vena & surculi ibidem descendentes; quia etiam moneta argentea sive thalerus frigide aquæ immersus, postmodum eidem firmæ compressione applicatus, compescit hæmorrhagiam narium. Unde probabile est, umbilicum dictum iuvare ratione firmæ compressionis factæ in vena frontis, aut etiam ratione refrigerationis productæ in sanguine, per dicta vasa distributo. Ager nunc in aere libero ac frigido, nunc clauso ac calido detineatur &c.: prout enim sanguis & corporis habitus magis vel minus transpirabiles existunt, tales, si magis transpirent, in lecto, si minus, extra lectum continendi sunt; vid. WILLISIUS *loc. cit.* Nam omnia hæc vel spirituum plus minus irritatorum impetum, vel sanguinis orgasmum & fluxibilitatem coercendo, operationes suas exerunt.

Quoad secundum scopum: ea quæ narium eorumque apertis vasibus applicantur, sunt alumen, vitriolum, stercora, fuligo, thus, ac quælibet adstringentia, de quibus omnibus in specie iam agendum. Confer. WILLISIUS *Pharm. Rational. pag. 2.* Præterea cum externis his venæ sectiones interdum locum habent, ut uti raro, non secus ac *curbitula*, nunc cum nunc sine scarificatione; observande tamen ubique *revulsionis & derivationis leges*. Horum loco frigida & adstringentia, sanguinem plus minus coagulantia, eiusque nimium motum intestinum fermentativum, tam naturalem, quam præternaturalem, refranantia, adeoque ab effectu Refrigerantia dicta, externe applicantur. Aliàs applicatur etiam cataplasma Galeni ex aloë, myrrha, pillis leporinis combustis, & albumine ovorum, quod oscula vasorum aperta restringendo occludit. Imò hic inter alia convenit imprimis solum cataplasma, vulgare quidem, sed egregium, ex argilla calcinata, quæ ipsa cum aceto subacta, vel ex furno pissorio, aut bolo Armena, cum aceto invicem permixtis, ac fronti tum temporibus ac nuchæ immediate applicatum & subinde remotum, medicamentum est egregium, quod sine interpositione lintei hæmorrhagias egregie cohibet; Nam omnia ex aceto externe conveniunt. Idem cataplasma scroto & testibus in manibus applicatum ceu expertissimum habetur à RIVERO, quod in mulieribus mammis applicari potest; potenter enim hæmorrhagiastam narium, quàm uteri, cohibet. Si verò cataplasma tale applicatum non satisfecerit, interdum necesse est, ut præterea vertici capitis, item collo admoveantur, pro sanguine ad caput adscendente in media quasi via alterando. Loco tamen argillæ potest etiam sumi bolus communis, Martialis naturæ existens, & eodem aceto subigi, & fronti applicari. Alii gypsum cum aceto dictis modis applicant. Item Epithema ex aceto simplici vel rosaceo, aut solo, aut cum succo sempervivi majoris misto, & sale vel nitro, addito plus minus camphoræ, testibus & scroto applicatum mirabiliter hæmorrhagiam narium sistit. Mulieribus applicantur mammis eodem pariter cum successu, præsertim in narium hæmorrhagia ex turgescencia sanguinis, orta ab ira aut nimia commotione, item in febribus. Nā sicut aliàs scroto frigidæ aquæ immersum ebrietatem & furorē mentis discute, ita frigida similiter eiusmodi laudantur in hæmorrhagia narium; ac observatum fuit, talia mammis mulierum applicata nunc narium, nunc verò uteri hæmorrhagiam sedasse:

℞. Succ. semperviv. mai. rec. express. ℥vj.  
Acet. vini acerr. ℥i. ad ℥ss.  
Nitri ℥ii.  
Campb. ℥ss.

M. f.



M. f. Epithema,  
Fronti, collo applicandum.  
D. S.  
*Epithema hæmorrhagiam sistens.*

Vel

℥. Aqua Fl. papav. errat.  
Sperm. ran. ana ℥iv.  
Acet. rosac. ℥ij.  
Opil cum acet. solut. ℥j.  
Boli comm. pulveris. ℥iv.  
M. D. S. ut antè.

Sunt qui talia etiam regioni hepatis applicant ex aqua appropriata, e. g. aqua portulacæ, plantaginis, spermatistarum, semper vivi majoris, addendo hujus succum cum aceto, camphora, nitro & similibus, ac desperatis narium hæmorrhagiis consulunt, & curiosa admodum est observatio HORSTII lib. 4. obs. 46. ubi notabile occurrit exemplum suppressæ hæmorrhagiæ narium desperatæ ex tali epithemate hepatis applicato, sed insequente diarrhæa biliosa;

e. g.

℥. Aqua hyoscyami,  
Nymph.  
Plantag.  
Semper viv. ana ℥ss.  
Sperm. Ranar. ℥ij.  
Nitri ℥j.  
Campb. cum spiritu vini sol. ℥j.  
M. f. Epithema,  
D. S. ut suprà.

Cum pannis multiplicatis tepidè regioni hepatis applicandum.

Porro ex fuligine, albumine ovi & aceto destillato mistis Frontale parant, quod egregiè conferre, & rarè in graviore hæmorrhagia fallere dicitur: vid. du HAMEL de Affect. Corp. pag. 312. Convenit etiam albumen ovi probe subactum cum alumine: nempe frustulum aluminis recipitur, agiturque cum albumine ovi, additur parum aque rosarum, quæ invicem subacta, in forma emulsionis cujusdam spissæ imponantur cum lintels multiplicatis fronti & temporibus ad sistendam hæmorrhagiam. Succus urticæ etiam cum lintels naribus inditus sanguinem fluentem sistit. Si sperm. ranarum cum paucis alumine vel cum aceto subactum, fronti ac temporibus applicatum, vel linteam in eo aliquoties intinctum, iterumque exsiccatum, idque repetitis vicibus, tempore usus fronti ac temporibus impositum, egregiè hæmorrhagias deprimit.

℥. Aqua Sperm. Ranar. ℥iv.  
Acet. rosac. ℥ij.  
Sperniol. Croll. ℥j.  
M. S.

*Epithema externum.*

Applicetur tepidè fronti. Vel

℥. Sperm. ran. cum nitro & alum. asserv. ℥ij.  
Sacch. saturni ℥i ad ℥ij.  
Campb. ℥i ad ℥j.  
M. pro Epithemate,  
D. S. ut antè.

Applicetur ut suprà.

Ut suprà vena sectiones & cucurbitulas scarificatas reuulsiõnis gratiâ usurpari assertum fuit, ita pro eodem scopo non pauci applicant cucurbitulas non scarificatas hypocondriis, hepatis nempe & lienis regionibus, ratione lateris, ubi per nares sanguis effluit, ita quidem, ut stillante nare dextrâ applicandas cucurbitulas cum flamma suadeant regioni hepatis, nare sinistra verò affectâ regioni lienis. Prostant observationes apud Veteres: sic AMATUS LUSITANUS Cent. 2. Curat. 100. mediante cucurbitula splenis regionem admodum, & epithemate frigido testibus applicato, ingentem hæmorrhagiam narium sedavit. Verum tamen frustranea & nociva sæpè fuit ejus applicatio, quatenus hoc remedium falsam sapit hypothesin, quod ex hepate & splene mittatur sanguis ad nares: unde hic cautos nos esse debere monet RIVERIUS, alique Practici, cum interdum cucurbitulas tales admodum sequatur gravis inflammatio viscerum sub cucurbitulis sitorum; quale exemplum refert RIVERIUS & HILDANUS in suis Obs. adeoque cauti in applicatione harum sumus. Potius nucha venosa magna impositæ locum interdum inveniunt: Conf. M. A. N. C. Ann. 6. Observat. 90. pag. 120. Quod pertinent cucurbitulæ suprà pedes, in superiori puta surarum parte, admodum, vel scarificationes infl-

cutæ, quæ miraculi instar hæmorrhagiam narium sistunt, Autore FORESTO lib. 23. observat. 14. coercetur enim sanguinis fluxus sursum, & coercetur impetus ad loca superiora. Ad dicta epithemata pertinet Frontale POTERII Cent. 1. Cap. 67. ex croco martis, bolo Armena, & opio, cum oleo rosarum mistis, & temporibus applicatis; quo ipso contumacem hæmorrhagiam curavit.

Quoad auxilia & remedia tertii scopi, eminet Alumen: Hoc vel ita integrum naribus intruditur, vel pulveris forma insufflatur: e. g.

℥. Alum. pulveris. q. pl.  
adde

Lac. pistor. quæ Germanis vocatur Kugel-lack (est compositum ex creta) q. s. pro coloris suavitate.

M. f. Pulvis.

D. S.

*Pulvis sanguinem sistens.*

In hæmorrhagia narium nimia naribus insufflatus, vel cum turundâ in aqua vel albumine ovi humectatâ, vel aliâ ratione naribus applicatus, efficacissimè graves narium hæmorrhagias sistit: vid. M. A. N. C. Ann. 1. obs. 24. pag. 90. Ann. 2. Annot. ad Obs. 223. pag. 403. & 404. item BORELUS Cent. 4. Obs. 7. & 50. Partitio est vitrioli: Hujus solutio, vel ad albedinem calcinati pulvis, dictis modis applicatus, coagulando sanguinem, & adstringendo orificia vasorum, egregium est; item caput mortuum vitrioli, si in istud aliquot guttæ sanguinis incidant; item caput mortuum vitrioli cum albumine ovi mistum, & instar turundæ naribus applicatum. A RIVERIO Cent. 1. Obs. 13. oxycratum, ab aliis pulvis lichenum equinorum naribus insufflatus, aut formæ & vapor stercoris suilli commendatur, de quo vid. RULANDUS pag. 74. Stercora enim animalium, in specie suis aut asini egregii usus sunt in hæmorrhagia narium, vel naribus insufflata sub forma pulveris, vel cum succo plantaginis mistus eorum succus expressus, cum bombace vel turundâ naribus immixtus, potenter sanguinem sistit; imò, ut IOEL refert, stercus suillum etiam recens excrctum, & naribus admotum, solo odore hæmorrhagias narium sistit, quod ipsum unum est ex extremis remediis: Vid. M. A. N. C. Ann. 9. obs. 56. Unde quidam in capsula gerunt pulverem stercoris suilli, ut in casu necessitatis eundem olfactant, aut naribus intrudendo sanguinem sistant & compescant. De pulvere bufonum vid. HARTMANNUS pag. 114. & HOFERUS Herc. Med. lib. 2. cap. 10. Et sicutura sulphuris vitrioli, paucâ aquâ plantaginis diluta & naribus immixta, virium magnarum deprehenditur. Sic phlegma vitrioli acidulum, cum potentissimè sanguinem inspisset & coagulet, naribus immixtum fluxum reprimit. Facit hæc etiam decantatus liquor stypticus seu essentia styptica recentissima Galli hæctenus in secretis habita, quæ tamen revocata ex vitriolo Martis & alumine solutis & mistis principalliter constat; si enim in hunc liquorem galli iniciuntur, nigrescit. Autor est GALLUS VIVIENT: vid. in specie Bartholinus in Ad. Med. Hassniens. Vol. 2. Observat. 41. pag. 116. & observat. 133. pag. 352. nec non Vol. 3. cap. 2. M. A. N. C. Ann. 9. & 10. Observat. 152. & WILLISIUS citato loco: quo ipso, uti in genere quæcunque hæmorrhagiæ quibuscunque in locis externè usurpato sistuntur, ita in specie & narium hæmorrhagia supprimuntur. Scilicet ex hæ ipsa ratione atramentum laudatur, quod quocunque modo naribus applicatum & intrusum, præsertim gossypium atramento scriptorio imbutum, aliquantulum expressum, & in turundæ forma naribus immixtum, ratione vitrioli sanguinem cohibet. Vel

℥. Aqua Plantag.  
Bursa pistor. ana ℥ij.  
In quibus dissolve  
Vitrioli martis ℥ij.  
Alum. ℥j.

M. D. S.

Externè applicandum, vel in nares attrahendum, vel inspergendum.

Vel

℥. Alum.  
Vitrioli ana ℥j.  
Phlegm. Vitrioli ℥j. ad ℥ij.

Ebulliant ad dissolutionem contentorum;

Liquor filtratus spiritus vitrioli aliquot guttulis adhuc adductur.

D. S.



D. S.

*Aqua sanguinem fissens.*

Vel

℞. Alum. crud. ℥ss.

Terra vitrioli dulc. gr. xv. ad ℥j.

Pblegm. vitrioli spiritu vitrioli nonnihil acidul.

℥ss. ad ℥ij.

M. S. ut antd.

Iojiciantur naribus.

Ned forsan spiritus vini per se rectificatus, naribus paulo profundius injectus, omnibus his prestat: siquidem ab illo quivis sanguis fluidus, etiam calidus & adhuc recens, citissime mirabili cum spectaculo coagulari solet.

Fuligo furni supra laudata cum albumine ovi mista, turundæ illica & naribus immissa, egregie sistit hæmorrhagiam; vel simpliciter de cataplasmate ex aceto cum argilla combusta, supra dicto naribus nonnihil immisum fluxum sanguinis sistit; aut etiam albumen ovi cum alumine subactum dicto modo applicatum. Nempce est in fuligine acidum cum terreis particulis admistum, à quibus vis adstrictoria. Prestantissima fuligo est ista, quæ è fundo vasorum & cacaborum æneorum, quæ in culina usurpantur, colligitur; fuligo cultello separata ac naribus intrusa, vel pulverisata cum sanguine patientis mista, & turundarum formâ naribus immissa, sanguinem sistit; remedium etiam à WILLISIO citato loco tanquam expertum commendatum. Sic denique Decocta adstringentia naribus immissa hæmorrhagias subinde periculosas sistere valent: Conf. M. A. N. C. Ann. 2. Observat. 223. pag. 224. & in Annotat. ad banc Observat. p. 403.

Præter dicta adhuc observandum, Topica hoc in casu non naribus saltem esse attrahenda, nisi in injicienda, aut cum penicillis lineis adaptanda, sed vertici etiam quædam imponenda, v. g. muscus de tegula aceto impregnatus, de quo vid. BARTHOLINVS Cent. 5. Hæmor. 97. Ut illos taceam, qui certa remedia dentibus atterendo aut lingue subdendo fluxum narium sanguinolentos sibi posse sibi persuadent, v. g. radicem cicchorii albi circa festum S. Iacobi in meridie collectam, aut radicem nigellæstri seu nigellæ, quam inter similes plantas masticatam, & naribus inditam, primum hoc in passu obtinere SENNERTVS & SIMON PAVLI perhibent.

## ARTICULUS III.

DE

## GINGIVARUM HÆMORRHAGIA.

POst nares etiam subinde Gingivæ gravem hæmorrhagiam patiuntur, eamque satis copiosam, aded ut observaverit SCHENCKIUS lib. 1. Observ. HOLLERIVS Comment. 2. ad Aph. 18. lib. 2. sect. 2. Conc. Hipp. 1180. lethalem sanguinis ex gingivis fluxum. Fluxus hic ex gingivis, si est spontaneus, nunc est criticus, de quo præter SCHENCKIUM vid. ZACVTVS LVSITANVS lib. 1. Præf. Admir. Obs. 86.; nunc periodicus, de quo SCHENCKIUS lib. 1. Obs. ZACVTVS LVSITANVS Cent. 5. Cur. 3. ARNOLDVS BOOT cap. 7. nunc vagus. Criticæ hæmorrhagiæ gingivarum morbum solvunt: Periodicæ affligunt, quando aliàs consuetæ sanguinis in certo loco evacuationes sunt suppressæ; tunc enim non raro periodicè per gingivas solet effluere. Vagæ verò sunt, quando ex variis causis effluit sanguis per gingivas, & præter supra nominatas CAUSAS, cum aliis hæmorrhagiis communes, in specie subinde est vel gingivarum laxitas scorbutica, & conjuncta cum aliqua earundem erosione vasculorum à saliva nimis acris, aut sale scorbutico salso-acris facta, de quo aliquid Sect. 17. cap. 3. Artic. 6. ubi de scorbuto: vel est naturæ consuetudo, quæ certo & statuto tempore per istas vias solet se exonerare. Sequitur tamen etiam, quod frequentissimum est, hæmorrhagia frequenter ex gingivis post ineptas dentium evulsiones, quando arteria radicalis in dente laceratur, quam subinde desperata ferè hæmorrhagia gingivarum subsequitur.

## CURA.

Hæmorrhagia gingivarum, quæ est spontanea, ut critica, aut periodica, non est curanda, sed cœu salutaris relin-

quenda, nisi succedanea substituat evacuatione. Ista verò, quæ est non spontanea, sed est à scorbuto, ex laxitate nempè gingivarum, vel ex erosione vasculorum ex saliva acris, curatur imprimis optime per antiscorbutica, in quibus primatum obtinet tinctura Laccæ Mynsichti, item linimentum illud, quod habet DECKERS in suo Comment. super Præf. Barbett. ubi de scorbuto pag. 156. in edit. 12. illud enim est egregium in hac scorbutica hæmorrhagia gingivarum: item Decoctum radices tormentillæ cum alumine. Si verò oritur gingivarum hæmorrhagia ex dente evulso, curatur eadem optime vel cum bombace intincto tinctura sulphuris vitrioli, ut aliàs vocatur, & alveo ita applicato, hinc enim subito cessabit sanguinis fluxus, uti id per experientiam observavi: Vel hujus defectu applicetur solutio vitrioli, quæ sanguinem sistit: vel imponatur gummi Arabicum, quod ipsi glutinositate suâ sanguinem ex arteriis ob dentem evulsum emanantem inspissando, consequenter fluxum ejus sistit: vel applicetur decantatum Emplastrum Galeni, ex aloë, thure & pilis leporinis, contritis & cum albumine ovi exceptis, gingivis impositis; Tale ZACVTVS LVSITANVS loc. cit. Obs. 85. usurpavit feliciter, & ingentem sanguinis ex gingiva eruptionem curavit. Quocunque in casu convenit Decoctum gargarisandum, quo coaguletur sanguis, hærens circa radices dentis evulsi; vel fiat Decoctum ad gargarisandum:

℞. Rad. Tormentill.

Bistort. an. ℥ij.

Gall. contus. ℥ss.

Sem. Papav. alb. ℥ij. vel ℥ij.

Coqu. in f. q. Aquæ simpl.

Colatur. adde

Boli Armen. vel vulg. ℥ij.

Alum. vel tartari, aut Aceti parum.

M. in forma Gargarismatis; in ore aliquamdiu detineatur, donec cesset hæmorrhagia gingivarum:

D. S.

*Gargarisma sanguinem fissens.*

Convenit etiam suo modo aqua spiritu salis ebria pro eluendo ore. Conf. M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 316. pag. 334.

Aliis irritis Cantherium aduale admoveeri potest: Conf. M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 48. pag. 87.

## ARTICULUS IV.

DE

## SPUTTO SANGVINIS.

POst sanguinis ex gingivis fluxum non raro per os etiam rejicitur ille in affectu, qui vocatur Sputum sanguinis, seu Hæmoptysis appellata, idque ad differentiam vomitus sanguinis, de quo supra Sect. 6. cap. 2. actum fuit. Jam verò sanguis iste, qui spuendo seu expectorando rejicitur, ex variis locis promanare, & hinc in os derivari solet: nempè nunc ex summitate narium emanat, nunc saltem ex palato, nunc gingivis, nunc faucibus, nunc œsophago, nunc ex larynge, nunc ex pectore, nunc ex pulmonibus, omnibusque aliis vicinis locis. In specie autem istud sanguinis sputum in considerationem venit Medicam, & etiam speciali nomine Hæmoptysis vocatur, quando sanguis cum tussi ex respirationis organis, speciatim ex pulmonibus, per os tussiendo rejicitur, & est consideratione dignum. Manat sanguis tunc ex arteriis, vel pulmonalibus, vel ex arteriis trachealibus, ex arteria nempè aorta oriundis, ut rectè & accuratè has distinguit WILLISIVS Pharmac. Rational. P. 2. pag. 151. Nam ordinariò quidem cum tussi sit hæmoptysis, nempè quando pulmo affectus est, aut profundiores tracheæ rami: Rarissimum enim est, Hæmoptysin veram vitio pectoris contingentem absque tussi observari, quando nempè saltim superior tracheæ pars affecta est; qualia exempla hæmoptyses ex vitio pulmonum ortæ sine tussi videb. in M. A. N. C. Ann. 2. Observ. 45. pag. 83. Anno. 9. & 10. obs. 135. pag. 309. WILLISIO loc. cit. & RHODIO Cent. 2. pag. 83. & 84. in quo casu cum aliquali plus minus ferè prævio sanguis erumpit: sicuti è contrario non omnis sanguis, qui tussi rejicitur, præcisè ex thorace est: Interim frequentissimè eidem tussis adiungi solet.



## P A R S A F F E C T A.

**PARS AFFECTA** in Hemoptysis nunc est superior larynx, ejusque cavitas, nunc intermedius ductus tracheales, nunc eorum ultimæ extremitates orbiculares, adeoque ipse pulmō. Quæ partis affectæ differentię probè attendendæ sunt ad explicandos diversos hæmoptysicos modos.

## C A U S Æ.

**CAUSÆ** Hæmoptysicos sunt vel in sanguine, vel in vasis sive hæc anastomosi, sive dierefi, aperiuntur. *Generales* istæ causæ suprà Artic. 1. ex generali hæmorrhagiarum theoria patent: In specie tamen frequentiores sunt duæ. Nempe frequentior est (1.) *Ruptio* insignis cujusdam vasis in pectore aut pulmonibus, quod fit ex clamore nimio & forti corporis nisu & tensione pulmonum sub gestatione graviori cujusdam oneris, qua spiritus cohibetur; item ex casu ab alto, plagis pectori indictis, ex tussi nimis concitata agitante pulmones; item ex copioso effusioneque risu, de quo vid. ZACUTUS LUSITANUS in lib. 2. Prax. Hist. cap. 6. dum ex hoc hæmoptysin lethalem observavit; saltatione nimia ROLFINGIUS Meib. Comm. lib. 2. sect. 3. cap. 53. pag. m. 122: quæ omnia ruptionem vasorum in pectore & pulmonibus inferre queunt. Disponunt ad faciliorem talem hæmoptysin ex hac causa imprimis solennis cujusdam sanguinis evacuationis suppressio, præsertim in partibus corporis inferioribus: Sic enim nihil frequentius est, quàm quod suppressionem mensium & hæmorrhoidum subsequatur sanguinis sputum, ex sanguine nempe circa præcordia plus minus coacervato, stagnante in pulmonibus, & anastomosi vasorum inferente, qualis hæmoptoe periodica ex menstrui fluxus imminutione observata est in M. A. N. C. Ann. 9. & 10. obs. 27. Pertinet huc, quod observavit DEODATUS in Valerud. pag. 219. de hæmoptysi insigni cum pleuritide suppurata, oriunda ex nimis citâ mensium emanatione. Plura exempla videb. in SCHENCKIO Obs. lib. 2. & BORELLO Cent. 1. Obs. 24.

(II.) Causa frequentior est vasorum, imprimis in pulmonibus, erosio, facta aut ab externis inspiratis, v.g. fumo sulphuris incensi, halitu aquæ fortis sub laboribus chymicis, &c. vel ab internis, hisque omnino frequentissimis in variolis, lymphæ in specie nimis acri & acido salsa, scorbutica, aut aliâ simili labe inquinatâ, successivè vasa tenuia pulmonum erodente, & ita hæmoptysin procurante, quam subinde solet præcedere tussis quædam sicca non a ferina; quam hæmoptysin, quia ab acriori lymphæ oritur, frequentissimè ulcus & vomica pulmonum, & phthisis pulmonalis insequi solet. Præterea pertinet huc, quod observatum narrat RHODIUS Cent. 2. obs. 35. quod post sanatum pedum ulcus supervenerit sanguinis sputum, dubio procul ex retrogresso fermento ulceris acri & corrosivo, mediante massa sanguinea ad pulmones delato, & massam sanguineam inquinante, ac partes pulmonales erodente.

Hæ sunt ordinariæ sputi sanguinis causæ. Rarum est, quod hirudines cum potu assumptæ, & in faucibus hærentes, ibique sanguinem emulgentes, sputum cruentum induxerint. Exemplum hujus rei videb. in SCHENCKIO lib. 2. Obs. 6. BORELLO Cent. 1. obs. 24. Sic non minus curiosum est, quod thermarum usus in quibusdam hoc malum excitaverit, Autore WILLISIO Pharm. Rational. P. 2. pag. 155.

Observandæ ulterius sunt Hemoptysicos differentię, dum nempe (1.) sanguis, qui reicitur, vel est floridus, vel semigrumosus: (2.) est vel copiosus vel parvus & paucus, prout nempe conditio vel vasis aperti, vel impetus sanguinis undecunque concitatus fuerit: (3.) vel facile vel difficulter elicitur: (4.) quod hæmoptysis nunc sit recens, nunc inveterata; & hæc (5.) vel vaga vel periodica. Sanè hæmoptysium inveteratarum periodicarum innocuarum, quia potius cum euphoria egrorum contingentium, plura hinc inde prostant exempla: conf. BARTHOLINUS Ab. Med. Hafniens. Vol. 1. pag. 146. & THIERMAYER Conf. lib. 2. pag. 24. Sic anniverfariam hæmoptysin observavit RHODIUS Cent. 2. Obs. 34. sic diurnam periodicam sanguinis sputationem notat AMATUS LUSITANUS Cent. 6. Cur. 49. Casus reverà est singularis, cum eger singulis horis interdum expuit sanguinem, noctu verò, licet vigilaret, non. Indolens subinde est hæmoptysis; nunc verò cum dolore plus minus conjuncta, vel contractivo pulmonum, vel gravativo ob-

tuso eorundem, vel rodente & plus minus irritante in aspera arteria, &c. pro causarum nempe varietate.

## D I A G N O S I S.

Quod attinet SIGNA: Hæmoptysis per se patet. Cum autem ex tam variis locis, naribus, palato, œsophago, larynge, &c. possit elici sanguis cum sputo, necesse est, ut imprimis attentus sit Medicus ad cognoscendum locum, in quo sit vas lesum sanguinem fundens: quod ut cognoscatur, partis affectæ differentię probè attendendæ, & artificiali conjecturâ causæ antecedentes, & excretionis modus, examinanda sunt.

Causas antecedentes quod attinet: considerandum, an ex suppressa consueta evacuatione sanguinis, vel ex progressu clamore, vel tussi ferina, vel casu ab alto, vel contusione pectoris, vel capitis, vel ex esu rerum acrium & similibus, supervenerit sputum cruentum, ut consideret, quamnam partem causa antecedens primariò afflixerit. Ubi enim ut suppressâ consueta evacuatione sanguinis, vel ex progressu clamore, vel tussi ferina, &c. semper est suspicio lesionis vasorum in pulmonibus; secus, si aliæ præcesserint causæ.

Quoad autem excretionis modum: attendatur, an sputum cruentum eliciatur cum conatu & screatu levi? an cum tussi plus minus laboriosa? item an sanguis ejiciatur plus minus floridus? vel observetur, an spumescat, vel non spumescat? an paucus vel multus? an periodicè recurat vel non? & quæ sunt aliæ similes circumstantiæ & concurrentia pathemata observanda. Sanguis nempe, qui exspuitione levi absque tussi, ex ore reicitur, est saltem ex partibus superioribus palatinis, naribus aut vicinis superioribus; qui verò levi screatu, exspuitur, est ex naribus, capite & faucibus, œsophago, summitate asperæ arteriæ, ac in specie si paucus fuerit, ex vicinis locis, iis scilicet, qui ad thoracem præcisè non spectant, & congruatus prodit. Confirmabit hoc causa antecedens laryngem aut œsophagum afficiens. Qui verò copiosus & tussi, præsertim reiterata, profunda, & accedente conatu, reicitur sanguis, ut plurimum ferè est ex thorace, & lesus in specie pulmonibus; ubi tamen hæc cautela attendatur, ut tussis præcedat sanguinis sputum. Non ramen semper omnis sanguis, qui tussi reicitur, præcisè ex thorace est; propterea & alia concurrentia signa simul perpendenda erunt: nam sanguis confertim ex œsophago & faucibus erumpens, & laryngem plus minus affligens, sputum sanguinis cum tussi inferre potest, utur malum non sit in aspera arteria vel thorace, sed tunc tussis aut sequitur, aut conjuncta est cum sanguinis sputo. Quod si ramen tussis præcedat, & post hanc sequatur sputum sanguinis, signum est, sanguinem provenire ex pectore, aut pulmonibus aut aspera arteria; unde spuma in sanguine excreto apparens ut plurimum sanguinis ex pectore, & specialiter ex pulmonibus erumpentis, signum est, idque ed magis, si cum tussi præcedente & floridus euaguetur, idque imprimis, si simul dolor pectoris in ejus profundo concurret, si respiratio plus minus difficilis, aut alia symptomata affectum pectoris indicantia adsint. Spuma fit, quando sanguis aliquamdiu cum aere quasi concutitur, quo commodè in spumam abit. Quod si sanguis, qui elicitur per sputum, sit floridus coccineus, & magis robicundus, tenuis, ex arteriis emanare indicio est; si verò nigricans, crassus, grumosus plus minus, aut obscurus, ex venis effluit, neque tam ex pulmonibus quàm pectore ibidem extravaasatus prodit.

Pari modo sanguis copiosè rejectus, magis est ex pulmonibus & pectore; minus copiosè excretus ex faucibus esse uideretur. Qui quò diutius in pulmone, thorace, aut loco vicino hæserit, & ita demum elicitur, niger, obscurus, plus minus grumosus observatur. Sic quoque sanguis periodicè qui cum sputo elicitur, ut plurimum est ex pectore, rarò ex alio loco promanat.

Qui ex thoracis cauo, minimè spumofus, sed grumofus est.

Qui ex gutture & aspera arteria, est floridus ac paucus. Quidenique à membris remotioribus, nigricans & paucus cum horum symptomatibus reicitur.

In his ergo artificioso stochasmo utatur Medicus, ac consideret partem affectam, ut eam ad curam dirigere possit.



## P R O G N O S I S.

Quoad PROGNOSIN: Omnis in genere hæmoptysis est suspecta & periculosa. Ex læsis pulmonum venis sputum sanguinis oriundum, sæpius ulcus & vomitum pulmonum vel empyema pectoris, (si enim sanguis non eicitur, in pus mutatur,) hinc phthisin pulmonalem & tabem, interdum peripneumoniam, post se trahit, præsertim si præcedentem insequatur erosionem.

Quod verò ex vasis pectoris læsis & aliis locis est sputum cruentum, minus periculosum esse solet.

Intempestive nimis suppressa hæmoptysis, in specie, quæ subsequitur vel sanguinis turgescentiæ vel suppressam evacuationem sanguinis, interdum non raro inferre solet tabem periculosam, & peripneumoniam.

Hæmoptysis, quæ fit ex pulmonibus, periculosior est ea, quæ fit ex pectore, h. e. majus periculum subest, si læsa sint pulmonum vasa, quàm vasa intercostalia.

Denique sputum cruentum si est *primarius morbus*, periculosus est, quàm si est *morbus secundarius*, h. e. qui pleuritidem, peripneumoniam, aut alios pulmonum affectus, insequitur.

Sputum sanguinis periodicum, si sine pulmonum singulari noxa contigerit, minus periculosum est, quàm si cum pulmonum vitio junctum fuerit.

Prognosin specialem videb. in BARTHOLINI *Alf. Med. Hassn. Volum. 2. pag. 10.*

## C U R A.

Quoad CURAM Hæmoptyses: hæc vel in *paroxysmo*, vel extra *paroxysmum* instituitur.

## IN PAROXYSMO

1. Causa, hæmorrhagiam in pectore vel pulmonibus vel vicinis locis excitans, maturè removeatur & corrigatur.
2. Vascularum læsio tollenda.
3. Sanguis effluens, ejusque impetus ad partem affectam, & hinc dependens hæmoptysis, sanguinem coagulantibus & condensantibus, ejusque motum nimium inhibentibus, maturè supprimatur & sistatur.

Causa removeatur, vel saltim *suspensione* & sanguinis motus certà determinatione, h. e. vel spiritu impetum, vel sanguinis turgescentiæ, vel copiam, &c. *revellendo*, derivando, papaverinis &c. cohibendo.

Posteriores scopi peraguntur *Vulnerariis* & *Adstringentibus*.

CURA EXTRA PAROXYSMUM PRÆSERVATORIA consistit in eo, ut *recidiva* præcaveatur.

1. Causam ex toto removendo.
2. Ut, sputo deficiente, si quid restat sanguinis grumosus in pectore, vel locis vicinis, resolvatur, & resolutus maturè expectoretur vel discutiat, ne aliquando relictus acrimoniam concipiat, ichoret, vomitum & empyema, & consequenter phthisin inducat.
3. Læsi pulmonum vel partis Vulnerariis vegetabilibus, succino & succinatis remediis, restituitur:

Quæ indicationes semper probè sunt observandæ.

Pro his scopis obtinendis subinde necesse est in *paroxysmo*, ut præmittatur.

I. *VENÆ SECTIO* in principio curæ, in casu nempe, quo sanguis nonnihil abundat, observatis tamen simul revulsioni & aversionis regulis, ut imminuto sanguinis quantum sub liberiori circulo minus confertim per venam læsam effluat; ita quidem, ut venæ sectio non instituat in pede, si ramis superioribus læsis oriatur hæmoptysis. Hinc v. g. ubi sanguinis sputum est ex mensibus vel hæmorrhoidibus suppressis, secetur vena in pede; ubi ex hæmorrhagiæ varium solenni suppressa, secetur in fronte aut sub lingua, aut in brachio. Non tamen hoc in omnibus æquè obtinet, cum in quibusdam phlebotomia malum exasperare solet; conf. WILLISIUS *Pharm. Rational. Part. 2. pag. 167.* adeoque circumstantiæ suprà Artic. 1. circa venæ sectionem in hæmorrhagiis instituendam in genere insinuatae probè notandæ. In ista autem hæmoptysi, quæ est ex corrosione acrimoniam contentorum, inepta penitus & frustranea est venæ sectio.

II. *PURGANTIA* vitentur. *DIURETICA* &

*Diaphoretica* potius sunt optima: vid. BENEDICTUS *Theatr. Tabidor. Exerc. 30.* Nam hæmoptoici minus ferunt catharsin, utpote à qua facile in tabem concipiuntur. Ac sane ipsi, uti & alii, cognatis pectoris affectibus ad phthisin facile terminabilibus affecti, copiosissime, etiam à levi purgante, adeoque non sine noxa, purgantur.

III. Inter oia Adstringentia ante & sine avertentium administratione non facile usurpanda, ne sanguinis inconcinna suppressio suffocatio aut peripneumonia excipiat.

IV. Nec adstringentia externa, multo minus actu frigida, pectori admoveantur; cum ab his sputum cruentum augeri posse illud suadeat, quod sola partium pneumaticarum ab aere refrigeratio hæmoptoen non raro excitet; illorum verò incommodum PLATERUS *Pr. Tom. 3. pag. 715.* & SCHENCKIUS *pag. 241.* testetur.

V. Præ aliis hæmorrhagiarum speciebus, præsertim in hæmoptoe, OPIATA sunt perquam proficua & satis efficacia, qualia sunt pilule de cynoglossa, laudanum opiatum, confectio narcotica Mynsichti, pulvis Helldæi, &c. & inter hæc ipsa in specie hyoscyami ejusque semen nobile specificum, præsertim si malum est ab acrimonia corrosidente. Sanè ab omnibus Practicis, tam Veteribus quàm Modernis, ad hæmoptysin commendatur: Imò jam ab ipsius HIPPOCRATIS temporibus decantatum est remedium: unde specificum Hewinii contra sanguinis sputum est *Electuarium* ex conserva rosarum & violarum cum semine hyoscyami, coralliis, bolo, lapide hæmatite &c., de quo vid. *Commentar. HEURNII in aphor. 13. sect. 5. Hipp. pag. 103.* vel quod HELIDÆUS PADUANUS, Medicus olim Bononiensis, felici cum experimento ad hæmoptysin, omnesque tales affectus adhibuit. Alii

24. *Sem. Hyoscyam. alb.*

*Papav. alb. ana 3x.*

*Terra sigillat. vel hamatit. præp.*

*Corall. rub. præp. ana 3v.*

*Cons. rosar. Veter. (quia est magis adstringens, quàm recens) q.s.*

*M. f. Electuarium.*

Capatur crebrius. Vid. RIVERIUS *lib. 7. Pr. cap. 6. pag. 348.* Quod semen quoque detur cum lapillis cancerorum, ut & sistatur sputum cruentum, & temperetur aere, & dissolvantur grumi sanguinis, quod imprimis faciunt lapilli cancerorum, si vel soli, vel cum aceto destillato propinentur. PLATERUS *Obs. pag. 789. & 793.* habet Tabellas & Trochiscos de hyoscyamo: Vel

24. *Conf. Rad. Consol. mai.*

*Rosar. rub. ana 3j.*

*Troch. de terra sigill. 3j.*

*Pulv. sem. hyoscyam. 3ij.*

*c. f. q. Syr. Heder. terrestr. f. Electuarium:*

*D. S.*

*Electuarium sanguinem sistens.*

Simus tamen cauti in usu hyoscyami propter vim narcoticam, qua pollet, ac proin non in nimia dosi exhibeatur, sed repetitis vicibus; quod melius est, quàm semel in dosi excedere; maniam enim inducit: vid. HELMONTIUS. Cavendum etiam ob acrioribus seu calidioribus, monente PLATERO *Prax. Tom. 2. pag. 715.* v. g. Theriaca & Mithridato.

VI. Quoad REMEDIA cetera, quæ internè conveniunt, sunt omnia ea, quæ suprà Artic. 1. de Hæmorrhagiâ in genere fuerunt insinuata; in specie semper simul ad acrimoniam sanguinis vasa erodentem, quæ frequentissima est ex hæmoptyses causis internis, respiciendum: pro quo scopo conveniunt *Pilule Sylvii lib. 1. Pr. p. 48. §. 20.* Vel

24. *Aqua Plantag.*

*Portulac. ana 3j.*

*Acet. vini 3ij.*

*Corall. rub. præp. 3j.*

*Terra sigill. 3ß.*

*Syr. papav. err. 3ijj.*

*M. pro 2. dosibus*

*D. S.*

*Potio sanguinem sistens.*

24. *Aquaurse pass.*

*Portul. ana 3ß.*

*Corall. rub. præp.*

*Terra sigillat. ana 3ß.*

*Lapill. cancr. præp. gr. xv.*

*Laud. opiat. gr. iij.*

*Syr.*



Syr. de Symph. Fern. ʒʒ.  
M. D. S.

Portulacæ adstringens.

De hac mistura cochli. i. per intervalla assumi potest.

ʒ. Conf. beder. terr.

Rosar. rub. ana ʒʒ.

(vel Conf. rosar. & costæ veræ ana ʒvj.)

Hamat. præp. ʒij.

Corall. rub. præp. ʒj.

Terræ sigillat. ʒij.

Laud. ferm. gr. iij.

Cum syr. Papav. simpl. vel diacod. Mont. f. Electuar.

D. S.

Electuarium sanguinem sistens.

Capiatur pro lubitu. Item

ʒ. Conf. ros. rubr. ʒij.

Sem. papav. alb. ʒʒ.

Ebor. sine igne ʒj.

Hemat. præp.

Sacch. saturni ana ʒʒ.

Cum syr. de symph. Fern. f. Electuarium:

D. S.

Electuarium adstringens coehleatim sumendum.

Præter istam tamen portulacæ & Plantaginis sunt insignis commendationis: Nam portulacæ quocunque modo usurpata, ejus etiam succus & syrupus adunctas aliquot propinatus, insigniter commendatur, imprimis si hisdem aliquid de opio admisceatur: nam & sanguinis motum sistit, & simul acrimoniam corrosivam, si quæ subest, temperat, sicuti distis scopis succus & syrupus plantaginis suo modo sufficit, de quo superius sed. 6. cap. 2. de Vomitu sanguinis dixi, quod nempe succus symphyti majoris & plantaginis sint remedium egregium in fluxibus sanguinis. Quidam insigniter commendant Decoctum portulacæ cum radice symphyti & herba prunelle in vino rubro si propinetur; quorum etiam succi aut syrupi unciatim propinati commendantur; aquæ verò horum simplicium nihil valent, eum vis specifica alembicum adscendere nequeat. FONSECA lib. 1. Conf. 8. dicit, quod sanguis non erumpat, si manducet quis in venæ sectione portulacæ semen, de quo experientia consulenda. Præter has symphytum majus specificè medetur hæmoptysi, si ve blandè decoquatur, si ve syrupus Fernelli propinetur. Post hæc est imprimis Hedera terrestris, quæ in sputo sanguinis est planè mirabilis, idque imprimis post paroxysmum; nam temperat acrimia, consolidat vasa rupta exesaque, & sanguinem dissolvit congruatum: hinc ejus syrupus, Decoctum, vel conserva egregia. Fiat ergo ex conserva bederæ terrestris, additis aliis appropriatis, tale electuarium non inelegans;

ʒ. Conf. bed. terr. ʒʒ. vel ʒij.

(vel huius & conf. rad. symphyt. maj. ana ʒj.)

Rosar. ʒj.

Terræ sigillat. c. spiritu vitrioli imprægn. (sic circumstantiæ id patiantur; sin suspicio erosionis, abstinemus ab ejus usu) ʒʒ. ad ʒij.

Hemat. præp. ʒj.

Trochisc. de Carabe (quæ sistunt sanguinem, resolvuntque ejus grumos, & temperant acrimia) ʒij. ad ʒj.

Laud. opiat. gr. iij. ad vj.

Cum syr. de symph. Fernel. vel portulac.

f. Electuarium.

M. D. S.

Electuar. adstringens.

De quo subinde indie magnitudo pucis castaneæ vel juglandis capiatur.

ʒ. Conf. beder. terrestr. ʒj.

Rad. symph. maj. ʒʒ.

Extr. succos. plantag. ʒij.

Hamat. præp. ʒʒ.

Boli Armen. præp. ʒij.

Mastic. ʒj.

Laud. opiat. gr. vj.

Cum f. q. syr. de symph. Fernel. f. electuarium:

D. S. ut antè.

Appropriata magis hic sunt Trochisci de Carabe, vel Trochisci quoque de terra sigillata, de spodio, pulvis Scaligeri, quem SCHENCKIUS Observ. pag. 241. & PETRÆUS in Nosolog. lib. 1. Dissertum. describunt, terra-

catechu, centummodium, chamædrys, & Decoctum foliorum aristolochiæ rotundæ; succus urticæ ab AMATO LUSITANO Cent. 6. Hist. 4. FORESTO lib. 6. Obser. 16. RIVERO, & omnibus serè Autoribus plenibuccis laudatus, species diaphantaginis Myrsinehi. Cum festuicis fecalini quæ vulgò ineptè mater siliginis dicuntur, in aqua plantaginis propinatis, hæmoptem diuturnam curavit Empiricus: Vid. VELSCHLIUS Michem. Obs. 27. Cent. 1. annex. Anno 4. & 5. M. A. N. C. Porro Trochisci certè de carabe multis scopis satisfaciunt, hinc in quacunque hæmoptysi ex quacunque causa acri sufficit hæc formula:

ʒ. Aquæ hurs. pastor.

Plantag. ana ʒij.

Acet. vini acerr. vel destillati ʒvj.

Troch. de Carabe ʒj.

Spernioll. Croll. gr. xv.

Hemat. præp. ʒʒ.

Lapill. cancr. præp. gr. xv.

Syr. Portulac. ʒj.

M. D. S.

Potio adstringens.

Detur pro aliquot dosibus. Vel

ʒ. Aquæ Plantag.

Portulac.

Cheresol. ana ʒj.

Tindur. sulphuris vitrioli ʒj.

Trochisc. de Carabe ʒij.

Laud. opiat. gr. v.

Syr. de symph. Fernel.

Portul. ana ʒʒ.

M. f. Potio.

D. S.

Potio adstringens pro aliquot dosibus.

Ubi tamen loco trochiscorum de Carabe Electuarium diascordii Fracastorii etiam in similibus misturis usurpari potest. Obiter moneo, aquas ex plantis adstringentibus non adhiberi, ut adstringant, quia nullam vim adstringentem obtinent, sed loco vehiculi.

Hinc pariter conserva rosarum rubrarum antiqua, item pulvis summitatum & pilosarum excrecentiarum cynobati, Ger. Schlauff. Kuntzen, egregia specifica sunt in hoc malo; non secus ac oleum lini coehleatim usurpatum mira præstat: Confer. M. A. N. C. Ann. 6. & 7. Observ. 269. pag. 308. De succo urticæ superius locutus sum. Sic & spiritum vitrioli commendat CASTELLUS, seu potius oleum vitrioli, in suis epistolis, in aqua plantaginis, vel alia appropriata, quia coagulando sanguinem, eundem condensat, ejusdem eruptionem sistit, & ita in paroxysmo hæmoptysicos nimis optime convenit; quod ex experientia propria conc firmat HOFFMANNUS, & THONERUS in Consilio 37.

ʒ. Aquæ plantag. ʒvj.

Syr. de ros. sic. ʒj.

Spir. vit. rectif. vel ejus ol. ʒj.

M. f. Mixtura.

De qua subinde aliquot cochlearia ab ægro capiantur: tam in sputo, quàm vomitu sanguinis admodum convenit, in specie ubi simul ebullit nimis aut effervesceat sanguis. Vel

ʒ. Herb. Centummod.

Vincæ pervinc.

Plantag.

Bellid. ana M. j.

Flor. rosar. rub. Mʒ.

Rad. Tormentill.

Urticæ ana ʒj.

coqu. in f. q. aquæ ferrat.

Colat. ʒviij. adde

Syr. de symph. Fernel.

Flor. hyperic. ana ʒvj.

Spiritus vitrioli q. s. ad aliqualem acorem:

D. S.

Potio adstringens.

Conf. simul HARTMANNUS, ubi de sanguinis sputo. „ Sed in usu hujus acidæ vitriolacæ, cave, dicit LINDANUS, ne propines, si aliqua ulceris in faucibus sit suspicio, aut aliquis metus phthisicos, aliàs nocemus hic magis pulmonibus. Prodest aliàs ad fervorem sanguinis restinguendum, quatenus acre serum præcipitat, & ducit ad vias urinarias. Aliàs, si copiose fluat sanguis, addatur adhuc Euporiston LINDANI, quod nobile est remedium simplex,



plex, familiari usu ipsi expertum contra hæmoptysin, paratum ex pomo cotoneo:

℞. Poma Cydonia, sive matura sive immatura, quocunque modo haberi queant.

Eaque discinde minutim in tenues lamellas, quas coque diu in diplomate in aqua communi, donec penitus mollescant; quo facto separa aquam decoctionis largiter, & laminas pomorum bene mollitas fortiter exprime.

Hujus succi expressi cochlearia ii. vel iij. ter quaterve in die propinat, quod ipsum egregie in hæmoptysi conducere, asserit præmissa venæ sectione, ut ut etiam corrosi fuerint pulmones: aqua verdisti, in qua decocta poma, per residuum clarificata, addit tantillum sacchari candi, vel Decoctum hordei, in quo passulæ Corinthiæ & coltæ fuerunt, & propinat simul absque saccharo pro potu ordinario: quo ipso segravissimas hæmoptyses, etiam ex erosione pulmonum ortas, curasse, & nunquam sine successu usum fuisse asserit.

GESNERUS in Epist. pag. 108. commendat malum cydonium excavatum, drachmā unā thuris impletum, assatum & propinatum, quo ipso egregie aliquot hæmoptoicos restituisse asserit. De succo, sirupo & pulvere stercoris asini & suilli supra actum fuit; vid. quoque BALLONIUS lib. 1. Epid. & Ephemer. Consil. 22. pag. 62. Ad hæmoptysin in specie stercus muris à ℥ss. vel ℥ij. ad ℥j. cum succo plantaginis commendatur in spuro sanguinis, addito saccharo paucopro gratia saporis, subinde manè stomacho jejuno, & vespere in introitu lecti, dandum per aliquot dies. Convenit in specie, si fuerit hæmoptysis ob ruptum pulmonum vas. Cetera, ut lapis hamatites, bolus Armena, Martialis, in specie tinctura sulphuris vitrioli à guttul. xx. xxv. ad xxx. in vehiculo appropriato, & tinctura antiphthistica, ex supra dictis jam nota sunt. In malograviori autem ex causis externis læpè recidivante, Decocta pectoralia ex lignis sunt egregia, de quibus conf. WILLISIUS Pharm. Rational. Part. 2. pag. 167. & 171. Ex quibus facile variz possunt fieri formulæ; e.g.

℞. Tincturæ Antiphth. ℥ij.

D. S.

Tinctura consolidans 30. Gutta serdæ manè sumende.

℞. Tincturæ Lap. hamat. ℥ij.

D. S. ut antè.

Dentur guttæ 20. ad 30.

℞. Tinctura sulphuris vitrioli ℥ij.

D. S.

Tinctura adstringens.

Dentur guttæ 30.

℞. Aquæ Plantag. ℥ij.

Tinctura martis adstring. ℥j. ad ℥jss.

Syr. Papav. alb. ℥vj.

M. D. S.

Potio adstringens.

Dentur cochlearia.

℞. Terra sigill. ℥j. ad ℥ss.

Lapill. cancr. præp. ℥ss.

Laud. opiat. gr. j. vel ij.

M. f. Pulvis, S.

Pulvis adstringens.

℞. Conf. Rosar. rub.

Rad. symph. mai. ana ℥j.

Terra sigillat.

Hamat. præp.

Corall. rubr. præp. ana ℥j.

Pulv. hepat. rub. ℥ss.

Laud. opiat. gr. iij.

Cum syr. de symph. Fern. & de Corall. Quercet.

f. Electuarium. D. S.

Electuarium adstringens.

℞. Conf. heder. terr. ℥j.

Corall. rub. præp. ℥vj.

Antihell. Poter.

Hemat. præp. ana ℥ss.

Pulv. sem. hyoscam. ℥x.

Cum f. q. syr. portulac. f. electuarium.

D. S.

Electuarium adstringens.

℞. Conf. Rosar. rub. ℥jss.

Violar. ℥vj.

Hemat. præp. ℥ij.

Sem. papav. alb. ℥jss.

Cum syr. de symph. Fernet. f. Electuarium.

D. S. ut antè.

℞. Conf. Rosar.

Costæ,

Heder. Terrestr. ana ℥vj.

Hemat. præp. ℥ij.

Corall. rub. præp. ℥j.

Terra sigillat. ℥ij.

Cum syr. Papav. simpl. f. Electuarium.

D. S. ut supra.

Externè quæ dixi applicanda esse testibus in hæmorrhagia narium, commodè possunt applicari iisdem in hæmorrhagia pulmonum seu spuro sanguinis.

VII. Hic potissimum observetur, quod superius Artic. 1. de Hæmorrhagia in genere dictum, scilicet excretionem aliquantulum sedata Resolventia & expectorantia leniora esse jungenda, ne sanguis extravasatus ulcus creet; qualia sunt sperma ceti, cornu cervi, antimonium diaphoreticum, lapilli cancrorum, unguentum potabile rubrum, syrupus de scabiosa, oxymel squilliticum, oleum succini, quod ex CÆSALPINO RIVERIUS commendat.

Tandem & VIII. Pulmonibus læsis vulnerariis & balsamicis prospiciendum, v.g.

℞. Herb. Scabios.

Hed. terrestr. ana Mjss.

Rad. Torment. ℥j.

Sem. anisi ℥ss.

Coqu. in f. q. aquæ & cerovis. ana p. æqu.

Colat. ℥ss. adde

Syr. heder. terr.

De symph. Fern. ana ℥ss.

M. F. Potio, S.

Potio consolidans.

De qua pro lubitu hauriatur.

Curavi anno 1678. Jurium studiosum gravi hæmoptoe laborantem, ipso ex aliquot annorum tussi humida, spiritu minus libero, nativa corporis constitutione, aliisque similibus supervenientibus ad phthisin disposito; cui in paroxysmo propinavi Mixturem istam polychrestam supra Artic. 1. in Hæmorrhagia, ab acriori sanguine à lymphâ aut erosione, &c. concitata, laudatam, cujus usu & sputum cessavit. Hinc pro reliquiis grumosis resolis vendis præscripta:

℞. Aquæ Chercfol. ℥ij.

Acet. vini ℥ij.

Lap. cancr. præp. ℥j.

Antimonii diaphor. gr. xv.

Syr. scabios. ℥ss.

Misc.

His præmissis, ad imitationem SYLVII præscripti Decoctum pectorale ex lignis:

℞. Ras. santal. rub. ℥j.

Lign. sassafr. ℥ss.

Macerentur per 12. horas in aquæ comm. ℥vij.

Coqu. ad consumpt. ℥ss. adde

Herb. heder. terr.

Veronic.

Com. hyperic. ana M. ij.

Sem. fœnic. ℥vj.

Passul. min. conqnaß. ℥ij.

Coqu. ad remanent. ℥ij.

circa finem decocti adde

Rad. liquirit. ℥ij.

De colatura capiebatur bonus haustus manè, meridiè & sub introitu lecti.

Uso horum remediorum contumax malum sævire desit, ipso egro cetera commodè habente, saltem quod calor quasi hecticus ab omni pastu, cum tussi moderatè humida, & copiosissimis sudoribus nocturnis, etiam sub primis somni horis, superessent. Interea ad demulcendum calorem hecticum ordinavi sequentem pulverem:

℞. Lap. cancr. præp.

Antihell. Poter. ana ℥ss.

Corall. rub. præp. ℥j.

M. pro 2. vel 3. dosibus.

Item ob sudores nocturnos, debilitantes & emaciantes, coercendos optimè contulit pulvis sequens:

℞. Lap. cancr. præp.

Antihell. Poter. ana ℥ss.

Arcan. duplic. ℥ij.

Laud. opiat. ferm. gr. jv. vel v.

M. pro 4. vel 5. dosibus vespertinis, hora 5.

præter præter à meridiè assumendis.

Vid.



Vid. Diss. de Opii virtute diaphoretica cap 3. § 8.

Aliam hæmoptysin ex orgasmo massæ sanguineæ curavi in muliere quadam juvene, hilari, vegeta, & gracili, cujus vasa sanguine turgescabant. Hæc septimâ vice gravida erat, ultimamque gestationis tempus agebat, cum ante menses quatuor vel quinque tempore æstivo ex cursu & motu in orto in sputum cruentum incidisset, breviter quidem cessavit, sed antecedente septimanâ ex improvise vespere cum tussi sicca, copiosum sanguinem floridum spumofum emisit, cessante, tussi lectum petens, suaviter dormit. Mane vocatur Medicus ordinarius, qui, præter pulveres confortantes ratione factus, ordinat, ut cucurbitulæ scarificatæ applicentur scapulis & brachiis pro aversione sanguinis: sed ego vocatus non probavi consilium; parum enim evacuavit, & tamen sanguinem versus pectus alliciunt, & metus est, ne circa vesperam hæmoptysis major recurrat; quod etiam factum fuit. Quapropter altero die jussi venam secare in brachio ad 3ij. vel jv. simul ordinando sequentem misturam:

4. Aqua Plantag.

Portulac. ana 3j.

Acet. vini 3ij.

Corall. rub. præp. 3j.

Terre sigillat. 3j.

Syr. flor. papav. errat. 3vj.

Misc. pro 2. dosibus.

Interim nullum sanguinem reiecit, sed saltem subinde sreat, & quoties sreat, toties sputum cruentum reiecit,

quod saltem ex capite laryngis derivatum fuit; nam levius sreatu ex pulmonibus non potest relinqui, unde iudicavi, læsionem saltem esse in larynge. Vespere sanguinis sputum recur-  
rebat, eodem impetu, unde ægra delassabatur, sætu fortius se movente; Unde ordinabam quietem, prohibebam Vinum Rhenanum, sed imperando dulce, simul quoque præscribebam sequens Eleæuarium:

24. Conf. heder. terr.

Ros. rub.

Coffe. ana 3vj.

Hæmatit. præp. 3ij.

Corall. rub. præp. 3j.

Terre sigillat. 3ij.

cum Syr. papav. alb. f. Eleæuarium.

Libenter ordinassem trochiscos de Carabe: sed quoniam eos ingreditur opium crudum, propter sætum timui. Eleæuarium sæpe sumpsit, & multos dies sine fine sputo cruento.

In Hæmoptysi aliàs ex orgasmo sanguinis & spirituum, egregie convenit Camphora: vid. IOEL pag. 279.

Præservativè conveniunt lac & acidulæ cum medicamentis traumaticis.

Inter EXTERNA convenit Pulvis Sympatheticus. Busto tempore balsamico, Iunio & Julio, per caput transossus axillis subicitur: vid. FABER & HELMONTIUS Tum. Pest. Conducit etiam immersio testium in acetum rosatum, vel linteam in aceto immersum, & circa testiculos obvolutum.

## S E C T I O XIX.

D E

### MOTU SANGVINIS AD VISCERA.

**S**equitur motus sanguinis ad viscera: quæ sanguis sub suo circulo inferiore per arterias descendentes alluit, sicut Liē, Hepar, & Renes. Interim de lienis & hepatis morbis pauca monenda restant, quæ nō suprà fuerunt monita.

#### C A P U T I.

D E

#### LIENIS AFFECTIBUS.

**S**anguis in totum corpus distribuitur ex corde, ut istud nutriat, & beneficio spiritus vitalis inesse vitali conservet. Verum præter hunc usum etiam in singulis partibus ac visceribus internis idem sanguis aliquid patitur, non tantummodo quatenus in quibusdam singularem & determinatam patitur alterationem, sed etiam, quatenus fit separatio quedam singularis cuiusdam liquoris ab eodem, ut potè cum videamus, in hepate & folliculo fellis bilem separari, in renibus urinam, in glandulis partem materis lymphaticæ ex sanguine unâ expurgari, & sic in reliquis partibus. Speciatim pro varietate partium distinctim distribuitur, & quidem pars altera deorsum per arteriæ aortæ truncum defertur, cujus insignis portio per ramum splenicum, aliàs dictum coeliacum, lienem infertur, qui omnis per venam splenicam in truncum venæ portæ, & ita in hepar defertur, sicuti simul omnis sanguis ab intestinis etiam refluens per venam portæ hepatis inluditur, quæ quoad hunc usum arteriæ ferè officio fungitur: qui sanguinis omnis per furculos venæ cavæ in hepar distribuitur, venæ cavæ tandem infertur. Exilis est arteria, quæ ex ramo arteriæ splenico, seu potius ex arteria celiaca, ad pancreas, item ad hepar, uti etiam ad folliculum felleum defertur, quæ arteria hepatica, unâ cum vas scholodochis & nervis hepaticis paucis, intra capsulam communem coercetur. Conspiratio lienis cum hepate, quâ omnis sanguis ex liene immediatè in hepar abit, ostendit peculiarem in officio consensum, ita ut probabile sit disponi in liene sanguinem, ut eo facilius in hepate, alterari, & bilis ex eodem conficiat transcolari queat. Præter quæ vasa etiam copiosi admodum nervi ex pari nervorum vago lienem inferuntur, sicuti lymphatica quedam vasa non tantum ad eam copiosa ex liene ad receptaculum commune pergunt, ipso hepate & folliculo felleo copiosis admodum lymphæ ductibus instructis, in receptaculum commune se inlignantibus. An in Liene vasa lymphatica, vid. RUYSCHIUS & BLASIUS: Copiosa lymphatica hepatis minutissima apud RUDBECKIUM.

Estmull. Oper. Tom. II.

Lienis viscus est substantia potius nervæa, quàm propriè dicta sanguinea: nempe consistit ex congerie membranarum, in cellulas & multiplices concamerationes efformatarum, per quas glandularum minimarum copiosi racemi ut videntur æmulantes dispersi sunt; uti hoc ipsum eleganter describit MALPIGHIUS Tract. de Structura viscerum, ubi de liene: id quod etiam mediante statu circa lienem demonstrari potest. Veteres dixerunt, Lienis substantiam esse tantum parenchyma.

Lienis viscus quoad suum usum non est simpliciter ad esse vitale animalium necessarium, cum canibus & fuis sine ulla sensibili functionum læsione excindi queat; sed tantum ad bene esse confert, ita, ut ad majorem saltem sanguinis perfectionem, sed accidentalem tantum, facere videatur (vid. M. A. N. C. Ann. 1. Obs. 29. p. 101. DECKERS in Barbette. Generationes habent communes post excissionem lienis. BARTHOLINUS ex FIORAVANTO idem notat de excisso liene humano, sed experientia una est nulla: vid. MAJOR in Chirurg. infus.) Quod ipso etiam convincitur, quod ea, quæ HELMONTIUS de usu lienis statuit, deque ejus cum ventriculo duumviratu profert, de Fermenti inspiratione à Liene, de primorum conceptuum formatione, somni & vigiliarum sede, virtute generativa ex splene, in Tract. sedes animæ, item Ins duumviratus &c. omnia falsa, nec minùs veritati congrua esse.

Pro usu Lienis meliùs cognoscendo observandum est, quod Lien omni cavo singulari sic destitutus, adeoque nec recipiendo nec digerendo cuidam humori aut excremento sit destinatus: unde etiam receptio succi melancholici, & ejus in stomachum eructatio per vas breve, ex Veterum sententia, etiam spontè corrumpit. & præter anatonem, eam sufficienter destruit CONRINGIUS Tr. de Gener. & usu sanguinis cap. 12 & 14.

Modernorum quod attinet sententias: tot ferè de usu lienis sunt sententiæ, quod Medicorum capita. Plures Veterum sententiam, sed suo modo correctam & magis enligatam arripiunt, quatenus nunc sanguinem crassum melancholicum in eo magis fermentari, nunc sanguinem plus quàm perfici, nunc chylum crudum in eo alterari, nunc excrementa tartarea in eo fermentari, & ad promptiorem separationem disponi asserunt. Confer. hic MOEBIUS in suis fundamentis pag. 381. item VELTHUSIUS de usu Lienis, item SYLVIUS Dissert. 5. de usu Lienis.

Frustra reverà Lien non est conditus, quin ad sanguinis laudabilem & naturalem statum, pro universi corporis economiæ salute, & conservandum & restaurandum multum cō-

N n

ferre,



ferre, & structura ejus & connexio demonstrant: sed quod hoc sit, quod conferat, quaeritur? Probabilissimū videtur, in Liene ratione copiosissimarum glandularum, uti & ratione multiplicium nervorum ad lienem distributorum, & sensui ac motui minimè inservientium, preparari certum quoddā fermentum subacidum, insigniter tamen volatile, quod sanguinem, ipsi infusum, impraegnet & disponat, & ad promptiorem fermentationem ac spiritus ascensionem, simulque hoc ipso partes sanguinis heterogeneas nec rite miscibiles facilius separari faciat, ut commodius per convenientia loca, in specie renes, evacuari possint.

Illustrant hęc: quod observetur iis, quibus Lien benè constitutus est, eorū corpus florere; quorum verò Lien vitiosè augetur, eorū corpus imminui. Ad hęc omnes splenetici reverà tales, seu in quibus lien malè affectus aut tumidus deprehenditur, hi omnes sunt salivatores, teste HIPPOCRATE, & tales ægri optimè per medicamenta salina urinam provocantia curantur, teste LAVRENTIO in *Controvers. Anatom.* ubi experientia testatur, urinas, quę sub ipso morbo fuerūt crudę, tenues, restituto liene prodire turbidas, obscuras, & cum copioso sedimento coctas, tandem sensim clarescere, & ad naturalem colorem redire. Ad hęc Lien animalium, vel assatus, vel coctus, vel alio modo preparatus, si gustetur, deprehensus est austeri, pontici, & plus minus acerrimi saporis, teste WALZEO in *Epist. de motu sanguinis*, item HIGMORHO in *Disquis. Anatomica de splene*. Hoc insuper notabile est, quod splenes animalium, in specie cervi & bovis, preparati aut in Decocto vel essentia usurpati, affectibus spleneticiis & imprimis cachexiæ virginum & mensibus suppressis, specificè conducant.

Quoad AFFECTVS LIENIS præternaturales: ejus actio læditur, quando vitatur, viscus vel

- (1.) Intemperie, ratione spiritus infest.
- (2.) Quando læditur in conformatione sua, ex ejus infarctu & obstructionibus, indeq; nato tumore inflammatorio, & tandem scirrhuscentia.
- (3.) Denique, quando læditur in functione, ratione speciei ejus fermenti plus minùs alterati aut deficientis, vitio præsertim spirituum animalium, copiosius aliàs ad lienem distributorum.

VITIA tamen hæc LIENIS non sunt adeò frequentia; & si tamen adsunt, sunt nunc hæreditaria, nunc, idque frequentius, aliis superveniunt morbis chronicis, in quibus vulgò, cęu asylum ignorantie, Lien accusari solet.

## ARTICULUS I.

### DE

### LIENIS INTEMPERIE VITIATA.

**N**on levis quidem abusus circa affectus spleneticos occurrat, dum punctiones & rosiones in hypochondrio sinistro occurrentes, & nescio quę mala alia, (subindè splen), licet infanti, attribuuntur, quod tamen falsum est, eadē splenis substantia ferè insensibilis inepta sit tali dolori. Interim non penitus rejiciendū sunt, sed ferè se produnt, imprimis intemperies ejus vitata, per SYMPTOMATA convulsiva seu spasmos ratione consensus nervorum, & hinc perturbationem mentis. Præterea se produnt ordinatidolore gravi obtuso, quasi confidente, (minimè omnium punctioris, quem apud nullum spleneticum observare potui) tensivo, ex ejus inflammatione, aut gravativo ex ejus pondere, & subsequētib; spasmis.

### C V R A.

*Lenis Intemperiem* vitiatam corrigere difficile est, nisi acidū ejus præternaturale alteretur, resolvatur, & eliminetur.

Pro scopo evacuatorio:

℞. Mercurii dulc.

Extr. helleb. nigr. an. gr. xv.

Troch. alb. gr. j. vel ij.

Cum solut. martis cum succ. pom. f. Pilulæ.

Pro scopo alterativo usurpantur Martialia, vesperi & sub introitum lecti, volatilia plus minus aromatica.

EXTERNÈ lieni imponatur Emplastrum de ranis cum duplo Mercurii, vel solum, vel cum Emplastro splenetico usitato, vel cum Gummi ammoniaco: malaxetur cum Galbaneto Paracelsi, vel oleo destillato succini: Vel

℞. Empl. de Nicot.

Ran. cum duplo mercurii an. q. f.

Malax. cum f. q. olei tartari fetidi, aliquoties super cornu cervi ustum rectificati.

Applicetur sine sindone.

Hactenus dicta exemplis illustrabo: **STVDIOSVS QVIDAM** repentino dolore hypochondrii sinistri profundo corripiebatur, superveniente Lipothymia gravi cum aphonia ferè, & spasmis, moribus convulsivis, ac doloribus lancinantibus in omnibus artubus, præsertim manibus. Malum radiciduserat ex splene.

**MERCATOR QVIDAM** conqueritur de continuo dolore in hypochondrio sinistro, quasi obpressivo, levamen sentie egregium ex applicatione Emplastri de Nicotiana cum anacanamabacæ (vel istis Emplastris in Colleg. Formul. pag. . . . & Id. Form. Class. 5. §. 5. præscriptis) sed corripitur hinc hemiparesi gravi partis sinistrae, urgente præsertim circa regionem, temporum istius lateris dolore, turbante simul caput insigniter. Remoto verò Emplastro, in isto latere evanescit hemiparesis, redeunte hypochondrii molestia. Totus affectus erat ex splene.

**MVLIER** dolore hypochondriaco sinistro profundo & quasi lacerante afficiebatur, sentiebat exindè dolores lancinantes & lacerantes, universum abdomen torqueri, & totū intestinorum situm recurrentibus creberrimis doloribus affligi. Affectus revera erat spasmodicus, ob plexum Lienarem nervum, ex m. illo habente splene in spasmos actum.

**STVDIOSVS NOBILIS** in pueritia diurnā quartanā, & hinc hydrope affectus, tandem ab hoc, mediante copioso urinæ fluxu, curatus, redditus erat summè spleneticus, cum mentis perturbatione & melancholia. Nempe quoties insigniter tempestatis, in specie verno aut autumnali tempore, immineret mutatio, toties sensū palpitantis in imo seu profundo hypochondrii sinistri propè spinam dorsi ferè percipit, quam dolor gravativus & obscurus lienis in isto loco comitatur hinc caput turbari, anxius ipse reddi, & c. Incipiebat, aded, ut uno altero die, antequam contingeret, tempestatis mutationem imminere, dictis in locis & modis ipse perciperet, cum aliàs in dicta regione nullam pulsationem perciperet, animosus & hilaris, optimè animo & corpore valens esset. Adedque & hic Quartanæ confirmatæ splenem simul afficientes, & huius malè affecti pullatio hypochondrii, quam HELMONTIVS urget, & hanc insequentia melancholica patibernata, considerata veniunt.

**VIR** quidem per aliquot dies noctesque laboraverat frequentibus pathematibus. Ante meridiem sanus & vegetus erat, horā verò primā præter propter à meridie dolorem obtusum gravantem, uellicantem, quasi contundentem in hypochondrii sinistri profundo percipiebat; ex quo loco brevi post insignes dolores lancinantes & contorquentes universū abdomē, cū insigni huius quasi tympanica inflatione occupabāt, unde miserè affligebatur æger; dolores & cruciatus isti sursum versus ad pectoris regionem etiam protendebantur; hinc subinde vomitus superveniebat, tandem sensu & motu voluntariodestitutus, brachia cum digitis tendebat, & ita cum dictis symptomatibus usque ad ingruentem noctem torquebatur; nulla febris aderat, nocte moderatè dormiebat, manè comodè habebat. In paroxysmō à vomitu levamen sentiebat, injectum fuerat clystma, inde post ternam evacuationem in paroxysmo etiam melius habuit. Vocatus ego dixi, esse affectum convulsivum, esseque dolores spasmodicos, natos ob plexum lienarem nervum ex malè habetē splene in spasmos actum, unde per consensum quolibet reliqua symptomata nata: malè habebat splen, ut suspicabar, ex acido vitioso, & eorumque ejus turbante.

Pro cura ergò paulò ante meridiem dedi liquoris martis solaris gutt. xxx. Externè regioni splenis applicandum jussi Emplastrum de Nicotiana, ordinando simul clystma, tempore, quo rediit, paroxysmus, injiciendum. His administratis nullus paroxysmus rediit. Altero mane dedi gr. iij. tartari emetici, & sequentibus diebus omni mane liquorem Martis solaris continuandum jussi; & sic penitus nullo amplius redeunte paroxysmo, convalescit.

**VIRGO** annorum 12. ex hereditate materna splenetica, & hinc nonnihil melancholica, sub primo somno insulitibus epilepticis corripiebatur, levioribus quidem, omni nocte tantum recurrentibus: præmittebam tincturam vitrioli Martis Zwelferi, ejus ʒʒ. ad ʒj. omni mane capicodam; hinc pro abstergendis primis viis præscripsi:

℞. Tartari vitriolat. gr. xv.

Scamm. sulphurat. gr. ij.

Troch. arab. gr. j.

Misceantur pro pulvere.

Hinc vomitorium ex syrupo emetico.

Sub usu horum sub ingressu lecti jussi capere pulveris epileptici



septici antimonialis gr. iij. ad iij. idque omni vespere.

Quibus ita adhibitis, & sedato paroxysmo, pro radice morbi in splene evellenda præscripti:

24. Liqueoris Martis solar. 36.

Capiebat iij. guttas omni mane.

Externe Emplastrum de ranis cum Mercurio, malaxatum cum s. q. olei destillati tartari foetidi, applicabatur regioni splenis. Quibus continuatis non amplius rediit malum, idque cōtutius, quod aliquo temporis spatio interjecto mentes primi supervenirent.

## ARTICULUS II.

DE

### LIENIS CONFORMATIONE LÆSA, & INDE NATIS TUMORE, & SCIRRHO.

&

## ARTICULUS III.

DE

### FERMENTI SPLENETICI LÆSIONE.

**Q**uod attinet vitium ex conformatione læsa, ut Tumores, scirrhus & similia, &c. Magnitudo & color lienis uti singulis animalibus est proprius, ita & homini etiam sano magnitudo ejus multum variat, color verò, qui in foetu est ruber, in adulto semper deprehenditur obscurior & nigricans. In se & ratione sui usus ad chronicos saltem affectus disponit Lien, inde & affectuum dictorum melancholicorum sedes ordinariò dicitur. Interim tamen, Autore SYLVIO aliisque, in melancholicis affectibus mortuis sepius salvus & sanus lien quoad sui structuram repertus fuit; ex quo tamen non statim concludi debet, planè in fontem esse Lienem in talibus morbis, cum id quoad fermentum ejusdem specificum, aberratio fieri possit multivaria, ipsa structura materiali adhuc salva. Ut ut ergo chronicorum affectuum, speciatim hypochondriacorum, scorbuti, quartanae, melancholicarum, &c. primum fontem stomachum existimo; certum tamen est in dictis affectibus, in specie confirmatis, simul vitium splenis subesse, à quo ipso hujusmodi affectus sanè longè contumaciores, curatu difficiliore, & aegris propter multiplicia vaga symptomata molestiores esse solent. Ob id studiosè moneo, ut dictis in affectibus, in specie inveteratis, semper simul ad splenem ratio habeatur pro meliore cura, & hujus vitia quæcunque maturè præcaveantur, aut simul curentur.

## CURA.

Lienis inflammatio Art. 21. cap. 1. sect. præcedentis tractata est.

Infarctus verò, Tumores, & scirrhus leuiore aut incipientes, emendant omnia dicta aperientia, item gummata, uti superius Sect. 8. ubi de morbis chronicis in genere, egimus.

Quoad fermenti lienis restaurationem: hanc vix, nisi talibus, quæ spirituum animalium defectus restaurare valent, curare possumus; qualia sunt omnia volatilia assumpta, de quibus Infra l. 2. Sect. 1. cap. 1. plura, ubi de spirituum animalium vitiis.

Convenient ergo pro splene curando imprimis Martialia, & Saturnina, acidum nimium absorbentia, & ita per accidens læsioni fermenti splenetici occurrentia; hinc alcalia volatilia, præ reliquis omnibus Tartarea volatilia, imprimis spiritus carminativus de tribus, & similia carminantia, præprimis ubi adefit dolor sensibilis. Dolori verò grauius spiritus sal ammoniaci penetrans & aperiens, uti universo corpori in morbis chronicis, ita imprimis spleni confert; item aperitiua Martialia. Cum quibus simul diuretica, imprimis tartarus vitriolatus, sal digestivum hypochondriacum, tinctura tartari, liquor terræ foliatæ tartari, sal Martis compositum, ex ana vi trioli Martis cum terra sol. tartari, sedulo jungenda, & crebrius repetenda erunt. Refert enim SCHENCKIUS lib. 3. Observ. de Liene, quendam lienis tumore laborantem per 15. annos annuatim bis vel ter per urinæ profluuium instar atramenti convaluisse.

Estmull. Oper. Tom. II.

## CAPUT II.

DE

### HEPATIS LÆSIONIBUS.

**A**LTERUM VISCUS, cui occurrit sanguis, est HEPAR cum annexo FOLLICULO FELLEO, quæ invicem sibi intertextæ & connexæ conspirant circa bilis generationem, separationem & distributionem. Hepatis quod attinet viscus & usum: hujus parenchyma ex glandularum globulis copioso sanguine suffusis & irrigatis compositum, eleganter demonstratum est à MALPIGHIO in supra citato Tractatu de structura viscerum. Huic eò in sanguificationis negotio ductæ fuissent exequiæ, omnes statim hepar colatorium esse bilis asseruere: id quod jam structura ejus glandulosa ulterius confirmat, quod bilis in hepate secreta à sanguine derivetur partim immediatè per ductus cholodochos in intestinum, partim verò in folliculo fellis prius collecta exinde etiam ad intestinum per ramum cysticum abeat. Jam verò certum est, eam bilem, quæ per ductus hepaticos excernitur, ex hepate oriri, in eoque secerni ex sanguine, per venam portæ vecto id quod experimenta MALPIGHII & FRACASSATI confirmant, cum etiam canibus sel cum suo folliculo excindi possit, salvis ductibus cholodochis, & jugi adhuc bilis ad intestina motu per ductus hepaticos durante: quæ ipsa contra hypothesein SYLVII notanda sunt. Helmontius dicit, vulnera folliculi esse lethalia, sed non tam folliculi, quàm propter hepatis copiosa vasa, unde sanguinis effusio maxima.

Ut ut autem certum sit, omnem bilem, quæ ex ductibus hepaticis oritur, verè elici ex hepate; dubium tamen superest de bile, quæ in folliculo fellis continetur. Hanc non in hepate, sed in ipso folliculo ex sanguine, per arteriam propriam in eum transmissa, produci, vult SYLVIVS Diff. 6. §. 42. & SCHWAMMERDAMMIUS de Respir. Sect. 3. c. 1. pag. 86. Unde sanguis eò delatus per fermentationem à bile jam præfente in similem bilem mutetur: ex quo etiam potius ingressus ex folliculo in hepar ex eo innotescet, quàm contrà; quia folliculo injectum atramentum denigret hepatis parenchyma, ut vult FRACASSATUS. Huic verò hypothesei obstant experimenta MALPIGHII, qui ligatis arteriis hepaticis, & abscisso pariter folliculo felleo, nihilominus continuum bilis proventum ex sanguine venæ portæ observat.

Hepatis ergo officium versatur simpliciter circa bilis elaborationem: secreta nempe in hepatis glandulis materia ex sanguine, ibique certo modo alterata & mutata in bilem, partim immediatè per porum cholodochum hepaticum ad intestina derivatur, partim mediatè in vesiculam prius collectam per ductum hujus cysticum ad intestina pariter ablegatur. Plura huc pertinentia videb. in Colleg. Institut. P. 1. cap. 13. p. 93. & seq.

Quoad læsiones hepatis præternaturales: non sunt adeò frequentes, ut specialem considerationem mereantur: Vel

I. Communes sunt reliquis partibus, quales sunt conformationis vitia, ut Obstructiones, tumores, inflammationes, abscessus, scirrhi, &c. de quibus in superioribus suo loco dictum.

II. Læditur hepatis functio, Læso spiritu infuso, seu, ut vocant, in morbo intemperiei, dum intemperies excedit vel occasione acidi vitiosi ad instar spinæ infixæ spiritum laceffentis, vel dum deficit intemperies occasione spiritus deficientis, aut exhausti: Vel

III. Sunt hepatis proprii, & omnes læsam bilis generationem constituunt, quando nempe sanguinis vitio læditur functio hepatis circa secretionem bilis; aut pori ejus sunt vitati, quando nempe hepar ineptum est, ut in eodem aut generetur aut transcoletur materia bilis, unde bilis aut nimis salsa, aut nimis pinguis, aut nimis aquosa, aut iners, aut planè non generatur, ita ut potius ipsius bilis præternaturalis vitia, quàm hepatis morbosa pathemata, dici debeant.

Bilis autem vel defectus, vel inertia, ut plurimum fouet morbos chronicos, cachecticos & hydropicos, ut supra monitum; item vitia bilis ad icticum suo etiam modo disponunt; sicuti bilis degener facta à statu naturali scorbuticos admodum fouere, & malum grauius reddere solet. Sicuti eadem deprauata & vitiosa acrimoniâ prædita, indeque vitiosè cum acido effervescentes, phlogoses vagas solet efficere; de quibus uideri possunt ea, quæ supra Sect. 17. c. 3. ar. 4. ubi de ictico egimus; Confert à SYLVIVS l. 1. Pr. c. 44. & sequ. Vulgò morbi chronici, tantum non omnes febres intermittentes, malè hypochon-

N n a dria.



driacū, & similes morbi, obstructionibus hepatis, lienis & mesenterii adscribuntur, ex quibus obstructionibus, tanquam causis remotis, postmodum tales affectus contumaces oriuntur; quibus ipsis etiam postmodum per medicamenta, Aperientia dicta, mederi volunt. Verum tales scititæ obstructiones reuera sunt spissimè asyllum ignorantie, cum à nullis unquam demonstratæ sint, aut explicatæ, quomodo tales morbi exinde oriuntur? Interim tamen non nego, subinde in his affectibus subesse intumescencias hepatis & lienis, non raro etiā deprehendi scirrhus in his visceribus: sed hi tumores non sunt causa istorum affectuum, sed potius ex illegitima Cura istis affectibus superueniunt, dum nempe ex vitiosa sanguinis crassi, indeque deficiente hæmatosi coactæ crudi succi crudi, & cum sanguine circulati hinc inde in viscerum porulis stagnant, donec densius agglomerati visceris tumorem inferant, & tandem proprio acido coagulati in scirrhus indurentur; suntque tales viscerum affectus producta potius morbosa, quam talium morborum radices. Oriuntur potius hi affectus chronici ut plurimum ex vitio diete, & depravatâ digestionē primâ, seu chylosi, qua chylus vitiosus, ut plurimum vitiosè acidus sanguini infusus, eiusdem crasin naturalem pervertit, fermentationem ejusdem depravat, corporis nutritionem inquinat, & reliquos corporis succos, tam lympham, in specie pancreatis, quam bilem, vitiosis qualitatibus & saporibus tingit, unde & consequens vitiosa sycum alvinarum à chylo separatio, & chyli in primis viis ab istis succis vitiosis inquinatio, contingit, unde ex inde postmodum tot actanta symptomata oriuntur. Vitiosam istam succorum constitutionem per salia definendam, veteres *antipræxiā* seu *contrarietatem viscerum* appellarunt; intelligentes hoc ipso imprimis hepar & stomachum læsum: id quod moderni potius per facultates salinas, à statu naturali degenerantes, indeque depravatas succorum crases explicant.

Curantur autem hepatis vitia vera, conformationis quidem, per *Aperientia* supra dicta.

Intemperiei vitia curantur, corrigendo acidum vitiosum illud, spiritum afficiens, & confortando tonum hepatis per

amara & moderatè *stypica*, ut sunt *rhabarbarum*, *absinthium*, &c.

*Sanguinis & bilis errata*, defectus nempe & depravationes, & reliqui morbi chronici, visceribus læsis dicati, præmissio vomitorio nunc per Martialia, quæ acidum vitiosum primarum viarum & alios sapores vitiosos absorbent & præcipitant, nunc per remedia sale volatili oleoso prædita, primariò *amara* hepatis dicata, secundariò *aromatica*, nunc plus nunc minus *acria*, prout vitium bilis requisiverit. Verissimum enim est istud Practicum effatum: *ut acida stomacho sunt amica, ita amara sunt hepatis balsama*; & ob id *Rhabarbarum* anima hepatis etiam dici solet, non tam evacuant quam corrigens bilem. Imò cochlearia, absinthium, rosmarinus, centaureum minus, sel terref, chelidonium majus, marrubium aut similia, vulgò *febrifuga* aut *Aperientia* appellata, & quæ supra *sect. 80.* ubi de vitio separationis secum in intestinis, item in ictero laudata, in affectibus, ubi subsunt vitia bilis, adeoque in affectibus chronicis, sunt optima bilem restituentia: sicuti etiam *aromatica*, ut cardamomum, cubebe, galanga, Piperata, Crocus, &c. etiam acuant bilem, eamque volatilem & acriorem reddunt, nunc parando nodulos, vino infundendos, nunc *Decocta*, nunc essentias aperitivas, &c. quorum virtute salinâ imprimis de alcali volatili participante, vitiosa crasis massæ sanguineæ, & inde vitiorum succorum, corriguntur, ut stomachi tonus & fermentum emendetur, & ita eger restituitur. Quod pertinet non incommodè salia volatilia plus minus *aromatica*, spiritus salis ammoniaci oleosus, spiritus tartari volatilis, spiritus carminativus, spiritus cornu cerui, qui omnes habent olei secum: item fixa, ut sal digestivum hypochondriacum, arcanum duplicatum, &c. bilem & contrâ luxuriantem nimis pinguem, in speciem acrem, indeque vitiosè effervescere aptam, corrigunt imprimis acida, primariò spiritus nitri dulcis, & spiritus sulphuris per campanam. Tandem in statu quasi naturali conseruant, aut vitiatam blandè corrigunt pastulæ & passulata; unde pulpa passularum cum pulvere rhabarbari imprægnata tam nobile Hepaticum dicitur, seu potius bilis correctivum.

## S E C T I O XX.

### D E

#### SERI SVPERFLVI SALIBVS RECREMENTOSIS

#### IMPRÆGNATI PER RENES EXCLVSIONE.

**T**ERTIUM VISCUS, cui occurrat massa sanguinea, sunt RENES, in quibus secernitur *lixivium volatile*, seu latex aquosus, sale volatili salso oleoso, seu composito ex acido & urinoso, imprægnatus. Sanguis enim ulterius, per arterias emulgentes distribuitur ad renes, ex quibus per venas emulgentes redit, ut ibidem serum salibus partim superfluis, partim recrementosis, aliisque sanguinis impuritatibus, imprægnatum transcolatur & separatur. Est enim latex aquosus aliàs serum commune, tam succorum nutritivorum quam excrementorum, vehiculum, cujus medio illi per universum distribuuntur corpus, hi verò in certis coloratilis separantur & amandantur: quod si fiat per renes, urina appellatur; sin verò per cutis poros, sudoris nomine venit: vid. *PISO de colluv. serasa*, *BARBATUS & SCHENCKIUS de sero & sanguine*.

Est autem urina duplex, ut rectè distinguitur ab *HELMONTIO*, *urina potus* & *urina sanguinis*. Urina sanguinis est *lixivium* quoddam volatile, aqua nempe sale salso volatili quasi ammoniacali imprægnata; aliàs *Lixivia* sunt salia fixa. Sæpe hoc volatile salsum constat ex acido & alcali, ambobus volatilibus, quæ tamè temperata sunt partibus sulphureis seu oleosis satis copiosis, uti hoc ipsum demonstrat anatomicæ urinæ spagyrica, quæ patet, quod per se det phlegma, & remaneat magis flavum; cui verò, tam urinæ quam magmati, si additur alcali, ab hoc absorbetur acidus, & prodit spiritus urinosus: si à calore viua abstrahitur, purissimè accipitur sal alcali, de quo vid. *HELMONTIUS de Lithiasi* c. 3. *WILLISIUS Tr. de Urinis*, ex quo sua habet *MOEBIUS in Instit.* quæ fideliter exscripsit. Spiritus urinæ semper habet contagium sulphureum, unde se colorat; spiritus salis ammoniaci autem est purus. Urina potus est, quæ mox sub labore digestionis primæ in primis viis secernitur, de qua supra, ubi de *motu chyli*, *sect. 13.* Hæc urina, ut ut pallida, tamen & ipsa est

salva: quæ fædore partim volatilis est, tum ex assumptis in *salis* mutatis, tum ex pancreatico succo & bile in salsum volatile abeuntibus; partim verò, & quidem maxima ex parte, hæc *salis* fædore est fixa, ex sale communi cum alimentis assumpto, quod hoc modo immutatus ferè denuò excernitur, & post urinæ distillationem in capite mortuo reperitur, ex quo similiter spiritus acidus tanquā ex sale communi distillari potest, vid. *HELMONTIUS de Lithiasi* §. 21. & *Colleg. Instit.* p. 1. cap. 14. pag. 96. Sed cum hac urina potus nihil hic nobis negotii.

In omni urina sanguinis, à Medico observandæ, tres conditiones probè sunt attendendæ, nempe

1. Urinæ color,
2. Eiusdem consistentiā,
3. Eiusdem varia contenta.

Omnes has proprietates habet urina ratione particularum in ejusdem latice aquoso dissolutarum, instar nempe *lixivii* communis à salibus imbutis diversimodè affecti: *Lixivium*, quò plura habet salia, eò magis rubescit; Nam salia semper de oleo adhuc aliquid habent. Quod si contenta salia oleosa porulis laticeis cōmentis sint probè unita, ut radii luminosi equatiter maximā ex parte transeant, fit urina clara seu perspicua: sin verò particule contentæ liquoris porulis non sint equè unitæ, ut impediatur radiorum progressus, urina fit turbida: Quod si radii luminosi transeuntes ex parte quadam sui refringantur, & ita modifictor, urina fit colorata, plus minus intensè, prout magis minusve à salibus contentis copiosioribus vel parciolioribus talis radiorum refractione contingit: Quod si cōtenta ista in vehiculo aquoso sint pauca, urina quoad consistentiā est tenuis: Quod si eadem sint copiosa, urina est crassa.

Quoad contenta hæc vel naturalia sunt, vel præternaturalia. Naturalia hæc cōtenta sunt nulla; siquidem, ubi ritè sunt digestionis, in specie prima, absque contentis urina excerni solet: Quod si verò errore primæ digestionis, imprimis propter



errorem externum læsa, non ritè digeratur totus chylus, & ita consequenter in secunda digestionem non ritè totus assimiletur, pars hæc crudior à parte aquosa imbibita una cum urina excernitur, & sedimentum sanorum constituit. Preternaturalia verò contenta sunt recementa salino-sulphurea, aliaque vitio chyloso & hæmatoso successivè in massa sanguinea congesta, quæ ubi ad saturitatem ferè sanguinem impleverint, per fermentationis motum separata, & instar fecum præcipitata, à latice aquoso imbibita cum urina unà excernuntur.

Prout ergo se habent chyli & sanguinis digestionem, ita etiam se habent in suis attributis urina. Hinc si salia, reliquæque urinam constituentes partes, per fermentationem, benè subactæ, & à latice aquoso ritè imbibitæ fuerint, urina est clara, sin verò hæc non ritè inter se sint unita, urina fit turbida. Quod si verò fermentatio sanguinis videtur, & partes ejus salinæ depravatæ factæ, nec inter se, nec cum reliquis ritè uniantur, nec subigantur, id quod ordinariò fit ex salium, tùm inter se, tum cum aliis particulis intermixtis, proportionem & ametriam læsa, ex chylo præcipuè & primæ digestionis vitio orta; urinae sunt opacæ & turbidæ, donec fermentando se mutuo subigant sanguinem constituentes partes salinæ, & heterogeneas, nec ritè miscibiles portiones, extrudant, & quasi præcipitent: quo factò, æquabilis sanguinis redit fermentatio, ac tales urinae copiosum sedimentum seponendo separatas feces successivè deponunt, adeoque ad naturalem colorem & consistentiam denuò redeunt; prout etiam ipsa salia lixivium hoc constituentia copiosius hinc liquorem imprægnant, & in specie, prout magis vel minus cum particulis pinguis, ac oleosis unita ac subacta fuerint, eò plus vel minus tinctæ apparebunt. Speciatim in morbis, coctionis & cruditatis materiæ, ut vocant, morbosæ signa æstimanda sunt: Nam urina, quæ excernitur tenuis aut pallida, aut intensè tincta, sed clara, cruda dicitur, in qua nempe nulla salium heterogeneorum jam facta est separatio in sanguine; è contra urinae crassæ turbidæ, copiosum sedimentum deponentes, aut multiplicibus contentis saturatæ, coctionis signa exhibent, seu recementa vitiosa & salia heterogenea copiosè ex sanguine extrudi, & instar fecum præcipitari ostendunt: Conferatur hic SYLVIVS l. 1. Prax. c. 55. Nubecula in urina, in morbis tam chronicis quàm acutis, est signum redeuntis in stomacho fermentationis, & recuperatæ plus minus digestionis. & omnis turbida urina latens plus minus acidum continet: Vid. *suprà* §. 4. 15. cap. 1. ubi de Febris, in genere.

Sanguis ergo ad renes per arterias emulgentes delatus patitur ibidem feri salibus turgidi separationem, hujusque simul certam alterationem, ita, ut materialiter quidem urina in sanguine existat, sed non formaliter. Testantur hoc attributa & proprietates urinae singulares in colore, odore, sapore, &c. distinctè admodum à latice sanguinis seroso, & in nullo alio corporis succo reperibiles: adeoque medium separationis, seu secretionis urinae mechanicum sunt renes, quorum structura, mechanica trāscolationi speciali accommodatissimam eleganter docet BELLINVS *Tract. de Usu & Structura Renum*, & MALPIGHIVS in *Scrutin. Viscerum*; quod nempe per fibras, quas obtinet fistulosas, certo modo conformatas, renum parenchyma maximam partem constituentes, tanquam per minutissimam filtra & spongiolas angustas trajiciatur serum pro urina materia. Medium verè alterationis, & à quo sanguis sui transitu per renes disponitur, ut uberius dimittat serum, & à quo simul serum determinatam pro urina proprietatem acquirit, est fermentum quoddam peculiare, renibus insitum, naturæ salinæ volatilissimæ, ab effectu & proprietatibus stercoreum & loti putrefactivum dictū HELMONTIO, de quo vid. *Tract. de Litibasi*, Impr. cap. 4. (in renibus coctis odor fracidus urinosus deprehenditur à relicto fermento urinario.)

Quoad trāscolationem ergo mechanicam, sanguis ad renes per arterias emulgentes delatus ad membranam usque extimam tendit, ubi fibræ occurrunt tenues & perforatæ, quas ceu filum subintrat liquidior ac fluidior sanguinis pars seu serum, parte sanguinis crassiore à venis emulgentibus absorptā, & denuò venæ cavæ infusa. Serum jam fibras illas seu canaliculos intras ac corpus usque papillare tortuosum promovetur, per cujus poros transfunditur in expansam interiùs membranam, pelvim dictam, ex qua tandem per continuatum ureteris ductum in vesicam destillat.

Quod vero attinet alterationem fermentativam, quam patitur urina substantia sub isto per renes transitu, fit eadem beneficio fermenti renum salini fracidi, de naturā, ut probabilissimum videtur, lixiviali seu alcalinā, à quo & sanguinis

susio, & ita copiosior feri separatio promovetur, simul ipsa urina materia peculiarem odorem & quodammodò saporem acquirit, talemque simul consistentiam, ut promptius ac facilius per renes trāscolari possit: vid. de hoc imprimis WILLIVS *Pharm. Rational. P. 1. pag. 138. 139. & sequ. de Diuresi*, &c. HELMONTIVS de *Litibasi* cap. 4. §. 30. TASICHENIVS in *Clave Medicinæ Hippocr. cap. 9*. Quæ enim olim credita est urinae per trāscolationem in renibus facta secretio, jam insufficiens, imò minus subtilis videtur, nisi lixiviale accedat fermentum.

Urinam per ureteres stillantem excipit vesica, ob id urinaria dicta, quæ moderatè plena nil sentit incommodi; sin verò urina sit nimis copiosa, nimia & dolorifica ejus fit distensio; vel si sit nimis acris, vesicæ fit vellicatio, ut in stranguria, tunc excretionem urget; hinc urina ceu liquidus spontè effluit, adjuvantibus fibris circularibus musculosis membranae vesicæ secundæ, quarum contractione angustata vesica urina expellitur. In subsidium etiam veniunt musculi abdominis recti, & horum appendices pyramidales, qui se contrahendo subjacentem vesicam ita premunt, & ita urinam unà expellunt.

## C A P I T U L U M

### D E

#### LÆSA URINÆ IN RENIBUS SECRETIONE.

**H**is præmissis, LÆDITUR hæc urinae secretio in renibus quatuor modis:

1. Quando nulla fit, & est ABOLITA.
2. Quando eadem est IMMINUTA, & non sufficiens pro necessitate naturali.
3. Quando est NIMIA seu AUCTA, ita, ut continuus & excessivus adsit urinae fluxus, cujus extremus gradus vocatur Diabetes.
4. Quando eadem est DEPRAVATA, ut quando v. g. alio, quàm fieri debet, modo urina excreta, conspicitur quod accidit, quando aberrat natura à naturali modo, vel colore, vel consistentia, vel contentis, vel aliis proprietatibus, dum excernitur cruenta, purulenta, nimis pinguis, & similliter: de quibus WILLISIVS de urina, item SYLVIVS in Praxi.

Urinam dixi Lixivium, constans duabus partibus, aquosā nempe & salibus superfluis salis oleosis, seu compositis ex acido volatili, & ex urinoso seu alcali volatili, imprægnata. Hi duo sapes in urinis omnium inveniuntur, & mutua unio- nem sal volatile salum constituunt. Et quidem hæc de urina sanguinis imprimis intelligenda: Nam de urina potus hic nihil nobis negotii. Jam verò in istis urinae secretionibus utraque hæc pars constituit urinam probè attendenda, & nunc hæc, nunc ista consideranda, cum juxta utramque constituentem partem lædi possit ejus secretio. Interdum enim v. g. læditur secretio juxta latice aquosum, qui nimis copiosus, paucis contentis salinis saturatus, & tunc urina ut plurimum est pallida & tenuis, alio nomine cruda dicta, qualis urina excerni solet in scirrhis hepatis & lienis, in morbis chronicis, uti etiam in principio februm: è contra interdum contenta salina sunt nimis copiosa; vel propter defectum laticis aquosi exhausti per inediam, aut absumpti per sudores &c. vel propter copiam salium vitiosorum in massa sanguinea cum urina excernendorum, ut fit in Hypochondriacis, in scorbuticis, & similibus, ubi urinae rutilæ & rutilantes copiosissimis contentis sunt imprægnatæ. Hæc in genere de læsa secretionem urinae. Jam in specie

## A R T I C U L U S I & II.

### D E

#### URINÆ SECRETIONE IMMINUTA & ABOLITA.

**I**MMINUTA URINÆ SECRETIO est, quando minus ejus trāscolatur, quàm decet, ratione nempe proportionis ad serum in massa sanguinea: quando ei parum inest feri, hinc in iis, qui parū potant, aut copiosioribus sudoribus distillant, aut ferū alibi colligitur, ut in ascite, in casibus urina pauca emissā non potest dici præternaturaliter imminuta, quia in his serum nō nimis abudat, sed proportionaliter sero in sanguine residuo respondet. Tunc ergo est imminuta urinae secretio, quando tam parce emittitur, ut debitā proportionem non respondeat assumptis, & inde collecto sero in massa sanguinea; sicuti ABO-



LITA vocari debet, quando nihil excernitur, id quod aliàs dicitur ISCHURIA SEU URINÆ SUPPRESSIO (differunt saltem gradu, & proin ubique eadem applicari poterunt.) Hic defectus urinæ in genere consideratus fit vel vitio renum urinam non secernentium; vel vitio vesicæ urinam non excernentis. Multum cum AETIO *Tet. 3. ser. 3. c. 21.* Ischuriam habent pro affectu vesicæ proprio, quandocunque scilicet urinam hæc ipsa colligat, nec reddat: quo sensu GORRÆUS in *Defin. Med. pag. 199.* aperte docet Ischuriam propriè dici urinæ in vesica retentionem. Communiter autem ejus significatio ampliatur, ut istam quoque urinæ compressionem comprehendat, quæ vitio renum contingit, vacuâ omnino vesicâ.

Ischuria ergo communiter statuitur duplex: vera, seu quæ fit vesicâ plenâ existente; & falsa, seu ubi hæc urina vacua est, quatenus hujus nihil à renibus adducitur. Quarum hanc urinæ secretionem; istam ejusdem excretionem læsam, pronuntiare liceret. Dignoscuntur ambæ, ac distinguuntur à se invicem, quod in illa præter renum & ureterum pathemata, de quibus hætenus, nulla tensio, nullus dolor ac urinandi stimulus, similevè quid circa vesicæ regionem, & in hypogastrio observetur, nec cathetere immisso urina profuatur; dum contra in hac æger, quamdiu sensus & mens integra, de tensione ac dolore molestissimè dictæ regionis, simulque insigni & frustraneo conatu conqueratur, imò hæc ad tactum tumida cum molestia quoque insigni deprehendatur. Hoc loco saltem Ischuria vitio renum non secernentium considerata est, cujus leviores causæ imminutam & deficientem urinæ secretionem efficiunt. De Ischuria verò vitio vesicæ in sequ. cap. agetur.

## M E M B R U M I.

### D E

## ISCHURIA RENALI. seu URINÆ SECRETIONE LÆSA.

### C A U S Æ.

Causa proxima, propter quam non secernunt renes urinam, est vel in ipso sanguine ineptio, ut ab hoc separaretur materia urinæ, vel, idque ut plurimum, in ipsis renibus redditis ineptis ad urinæ secretionem. In ipso SANGUINE frequenter VITIUM hæret, vel in qualitate, vel etiam certo modo in quanto. In Quali quidem, quando massa sanguinea tota, ejusque serû seu latex aquosus, adeoque omnes ejus partes, ex læsa crassi ita sunt disposita, ac firmiter inter se se connexa & cõtecta, seu, ut loquitur WILLSIUS *Phar. Rat. Part. 1. pag. 166.* quando sanguinis compages ita est serrata, ut amplexibus his arctioribus se extricare, & serum per angustos renum porulos & tubulos commode transire, & in iis ex reliquo sanguine legitime urina secerni nequeat. Vitium hoc nunc à lymphæ austeritate seu acore præternaturali, nunc visciditate, oriri videtur: vid. PLATERUS *l. a* & SYLVIVS *Tr. de Cach. 6. 29. & 295. & l. 1. Prax. c. 55. §. 8. & 9.* Observari hoc solet sæpius in febribus statu cruditalis, imprimis in morbis chronicis, cocochymia, cachexia, &c. ad hydropem inclinatibus, leucophlegmatia, hydrope, affectibus hypochondriacis, scorbuto confirmato, &c. vitio aut scirrhophepatis aut lienis conjunctis: in talibus enim pauca urinæ ut plurimum est secretio, ejusque simul crudæ, seu paucis contentis in latice aquoso saturatæ, utut tales ægri aliàs sint copiosi salivatores, aliosque affectus à seri abundantia patiantur (pedes tumidos.) Verum post medicamentâ appropriatâ, imprimis salinâ, vitiosam sanguinis crasin alterantia, & scirrhus viscerum solventia, ubi antea pauca & cruda fuit excreta urina, evenit, ut urina successivè copiosa & diversimodè affecta, crassa, turbida, interdum nigra excernatur. Fieri hoc videtur ex eo, quod ex læsa viscerum circa sanguinis perfectionem functione & viciata sanguinis crasi, talis hujus mixtura fiat & compositio, ut nihil aut parum per angustos poros renum fibrosos secerni aut separari possit; unde postmodum, alteratâ per remedia salinâ, maxime alcalinâ, ista sanguineâ massâ & renovatâ ejusdem miscelâ, tunc heterogeneæ particulæ ab aliis separatæ & præcipitatæ, à latice aquoso uberius imbibuntur, & ita figuratæ redduntur, ut facillimè renum meatus ingredi, & ita sub forma urinæ copiosè turbidæ crassæ, &c. excerni possint. Imò huc referri poterit RIVIERIUS *Cent. 1. Obs. 1. & 89.* ubi quidem Ischuriæ causam vasis emulgentibus tribuit, quasi hæc ob plethoram nimis distenta se contrahere nequiverint: Item forsân M. A. N. C. *Ann. 3. Obs. 212. & Ann. 4. Obs. 159.* Cujus tamen symptomatistologia M. WILLSIUS *Pharm. Ration. T. 1. Sect. 4. cap. 3.* tam per propriam,

quàm Lovveri experientiam ab humorum strictiore combinatione deducit, Præter dictâ, Urinæ secretio imminuitur, si serum sanguinis aliorum ablegatur, & à viis urinariis averatur, v.g. in catarrhis, sudore nimio, diarrhæa, hydrope, &c. quibus presentibus urina parcior, remotis verò uberior, secernitur atque excernitur. In Quanto sanguis peccat, quando is propter nimiam abundantiam, aut propter ejus crassitiem, aut quamcunque aliam rationem, legitime licet circulatus, parum tamen aut nil in renibus ex se dimittit; simul verò ac secatur vena brachii, & ejus quantum ita imminuitur, copiosus urinæ fit effluxus: quale exemplum admodum curiosum habet TULPIUS *lib. 2. Obs. 2. c. 43.* ubi quidam Ecclesiastes singulis pleniluniis urinæ suppressione affligebatur, quæ non excernebatur, nisi vel declinante Luna, vel per venæ sectionem in brachio; quoties enim vena brachii secabatur, toties urina liberè mittebatur. In anatome postmodum defuncti reperiita fuit pelvis renalis sinistri admodum distenta, ut ferè vesicæ vicem & magnitudinem expleverit. Ratio ex qua factum, fuit, ut secta vena fluere sanguis, vid. apud TULPIUM, qui egreium habet de hoc casu discursum.

Raræ autem sunt hæc secretionis urinæ imminutæ, quæ sunt ex vitio sanguinis: frequentiores sunt Ischuriæ, quæ vitiorum renum sunt, quarum triplex ferè subest causa.

- (1.) Quando renum caruncule, id est meatus fibrarum renalium, pori & canales, sunt admodum angustissimi, obstructi, aut infarcti, ita, ut per illos nihil feri possit transudare. Vel
- (2.) Hi ipsi inepti sint redditæ, quod minùs secerni possit urinam; idque vel ob tonum earum resolutum, ut in ætrie, ita ut sit paralyticæ; sive sit nimis quasi firmus, ut in spasmodicâ earum constitutione vel convulsione. Vel
- (3.) Denique vitio ipsius fermenti renalis urina supprimitur, quando illud deficientis, aut inertis, aut alteratum, plus minusque corruptum, non sufficit negotio, uti subinde in affectibus cachecticis, hydropticis, aut ad hydropem inclinantibus, quibusdam hypochondriacis, aliisque chronicis affectibus, &c. manifestum est, in quibus deficientem renalis fermenti acrimoniam urinofam volatilem potissimam causam exillimo.

QUOD AD Dergò PRIMUM VITIUM: interea, quæ obstruunt canales fibrosos renum, sunt (1.) interdum sanguis grumofus, vel ex casu ab alto circa renes collectus, vel ex aliis partibus, in quibus sanguis grumofus hæret, per sanguinis circuitum ad renes derivatus, & ibi collectus, id quod causæ antecedentes confirmabunt; sicut & ex sanguine in pectore extravasato, si is scilicet resolutus, fit mictus cruentus. (2.) Est etiam pus vel ex ulcere renis, vel ex aliis partibus abcessu laborantibus, cum sanguine ad renes derivatum, quo ipso sæpè urina supprimitur, id quod pariter ex antecedentibus, vel renis vel aliarum partium Vomielis aut suppurationibus suspicari licet; sicut etiam peripneumonis suppuratæ per urinæ fluxum purulentum feliciter solvuntur. Circa pus ejusmodi notandum, lethalem interdum urinæ suppressionem intulisse: vid. SANCHEZ in suis *Obs. p. 374.* de omnimodâ urinæ suppressione lethali, post cujus corporis sectionem renes exulcerati & purulenti reperti sunt. (3.) Obstruunt renes humores pituitosi, crassi ac viscosi, vitio digestionis primæ, tam cum urina potus ad renes delati, quàm etiam cum sanguine ad eosdem distributi, qui obtinentes renis porulos, eosque obturantes, ineptos reddunt pro urinæ secretionem: Tale exemplum est, quod recenset AMATUS LUSITANUS *Cent. 6. Cur. 12.* de puero contumaci ischuria laborante, ob nimiam crassitiem & visciditatem lactis nutritis. Assumpserat pro jentaculo vir quidam de cætero sanus caseum, quæ vocant Hollandicum, ad fatietatem, cerevisiam tenuem ac diureticam superbibendo: Elapsis aliquot horis urina citra ullum vesicæ renumvè dolorem supprimitur, ut ne guttam quidem excernere ad tertium usque diem potuerit. Innotescit hoc vitium, quando talium humorum presentia in corpore observatur, qui nempe in testina & primas vias obfidet, aut quando urina antea effluit solida, excernitur turbida ac crassa, cû sedimento copioso mucilaginoso, postmodum tale contentum in urina deficit: presente simul gravitate in lumbis. (4.) Frequentissima causa est calculus renes obsidens, & eorum meatus ac tubulos obstruens, renes irritans, & ad inflammationem disponens: indeq; frequenter urinam supprimens: quale exemplum habet LOTICHIVS in *obs. lib. 4. fol. 376.* ubi refert omnimodam urinæ per 12 dies suppressionem, eamque lethalem, in qua ren dexter ex ulcere omnimodè absumptus, sinister verò copiosissimis calculis fuit repletus: Sic BARTH.



**THOLINUS** Cent. 4. *Epistol. pag. 91.* observat urines suppressionem ex calculo renum lethalem undecim dierum, &c. quorum admodum frequentium omnium Practicorum observationes sunt plenae. Plura infra. (5.) Hisce annumeranda sunt comprimentia, nempe tumores, v.g. nephritis; & (6.) Constringentia, v.g. frigus externum, si lumborum regio preprimis æstuans magis ipsi exponatur.

**QUOAD II. RENUM VITIUM** conferens ad Ischuriam, dixi esse *tonum eorum plus minus vitiatum*: Notum est, quod renes continent copiosas fibras & tubulis excavatis quasi, per quas fit urines transitus. Hinc preter obstructiones & infarctus imprimis tonus fibrarum renalium observandus est, si ve laxus is sit in atonia, si ve nimis strictus in spasmo. Quando ergo fibræ renales laborant atonia, seu quasi resolutæ sunt, fiunt flaccidæ & connivent unde supervenit suppressio urines. Nempe hæc atonia est istud vitium, quod vulgo vocantur *imbecillitatem renum* ex facultate secretrice aut attractrice lesa natum. Jam vero, cum omnes istæ partes agant per structuram partium mechanicam, linguamus has facultates illis, qui attrahere possunt, & dicamus, consistere has revera in *atonia renum*, id est tali nervorum renalium & canaliculorum fibrosorum laxitate seu flacciditate, ut defectu imprimis spirituum animalium non sustineantur in debita tensione, quin potius & nervi & ipsi canaliculi fibrosi postmodum quasi resoluti & flaccidi concidant, indeque officia conniveant, ita, ut propterea parum vel nihil de sero sanguinis transmeant, ac ex sanguine secerni possit. *Exemplum* siquidem aliud illustre videb. in **BARTHOLINO** Centur. 4. *Epist. 18. 38. & 39.* qui ex paralyti scorbutica omniolum partium corporis inferiorum, seu infra diaphragma talem relaxationem & ischuriam refert. Pertinet huc observatio **HOECHSTEDETRI** in *Obs. Decad. 5. cas. 10.* ubi Ischuria longior ex externa renum refrigeratione in marmore nive frigefacta, unde postmodum epilepsia & mors; & *Decad. 6. Cas. 1.* ab abusu Narcoticorum. Quibus insuper accedunt alii renum morbi, e.g. erosio, scirrhus, ulcus, vulnus, &c. Quod pertinent morbi acuti, febres ardentes, *variole*, &c. subinde ischuriam conjunctam habentes; unde *ischuriam* talem absque omni dolore, supervenientem aliis morbis acutis, seu signum singulare lethale, ob extinctam facultatem attractricem seu atoniam renum, habet **HORSTIUS** lib. 4. *Obs. 45.* vid. etiam **SCHENCKIUS** lib. 4. *Obs. p. 464.* & sequ. ubi aliquot talia sunt exempla Ischuriarum lethaliū vitio renum. non potentium transcolare serum, ut nulla adfuerit obstructio, sed quia potius molles & resoluti appa-  
verunt. Pertinent huc suppressiones istæ urinae, quæ ob dorsum vertebrarum luxationem, aut ictum aut lapsum, aut vulnus spinalis medullæ accidunt, ac in genere quævis alia ischuria, vitio nervorum plus minus resolutorum eveniens, utpote quæ ipsa non minus à paralyti aut laxitate fibrarum renalium ac vesicæ interdum contingere, non impossibile est. Huic Atoniæ contrarium interdum observatur vitium, nempe *strictura pororum*, & nimia fibrarum perforatarum & glandularum renalium angustia, quasi spasmo quodam contractarum, qualem nonnunquam in Colica renes pati videntur, & qualis fit interdum in affectibus calculosis, dum uno rene lito à calculo, grumisve sanguinis irritato, alter ab omni obstructione salvus, subinde cessat agere; quod fit ex crispatura & strictura fibrarum, quatenus unius renis fibræ convulsæ, & ita ex nimia strictura & crispatura poris clausis, clauduntur etiam alterius pori, ob ramificationis nervosæ communicationem; & ita Ischuria inducitur: vid. **FORESTUS** l. 24. *Obs. 26.* in *Schol.* item **BARTHOLINUS** *Act. Med. Hassn. Vol. 4. p. 103.*

III. Denique CAUSA erat ex parte fermentum renum plus minus deficiens, nec satis acre, aut alio modo vitiatum ac depravatum, unde etiam deficit plus minus transmissio, ut supra insinuaui: si nempe deficit fermentum in sua acrimonia salina volatili urinosa, sub cuius defectu cessat operatio secretionis urinae, quam tale fermentum promovere solet; sicut hoc ipsum in Hydropicis patet, in quibus ex defectu aut alteratione fermenti renalis adest Ischuria. Plura videbitis in **WILLISII** *Pharm. Ration. pag. 165.*

Huius etiam loci sunt, quæ urines secretæ defluxum ad vesicam turbant, ureterem nempe angustia urinam non transmittens horumque vulnera atque ulcera, urinam ad cavitatem abdominis deponentia; quæ quidem rariora sunt: vid. **PLATERUS** *Prax. Tom. 3. c. 3.* Angustia hæc oritur vel obstructibus, e.g. calculo, vid. **SALMUTH** Cent. 2. *Obs. 82.* & **TULPIUS** l. 2. *Obs. 45.* sanguinis grumo, vid. **SALMUTH** l. 1. a. mugo viscido, vid. **BAUHINUS** *Theatr. Anat. l. 1. c. 22.* **FORESTUS** l. 24. *Obs. 15.* & **SULZMANNUS** *Obs. Anat. pag. 8.* *Emull. Oper. Tom. II.*

64. l. a. nervorum renalium affectibus spasmodicis, e.g. in nephritide notha, vid. **DRAWIZIUS** de *Scorbuto Tit. 9.* aut colica convulsiva, vid. **WILLISIIUS** de *Anat. Brut. l. 2. c. 15.* Hæ sunt Causæ, propter quas fit Ischuria renum vitio. Sequitur

## DIAGNOSIS.

Hæc Ischuria, quæ fit vitio renum, cautè consideranda est, ne confundatur cum Ischuria vitio vesicæ urinariæ obveniente; idèdque causæ antecedentes & symptomata probe pensanda sunt.

Signa **URINAM ESSE SUPPRESSAM** vitio renum, sunt ea, quando nulla urina adest in vesica, adeò ut immisso licet cathetere, seu intrusione cujusdam cannulæ argenteæ, & factâ etiam suctione, exploratio instituat, nihil tamen excernatur urines. Accedit, quod nullus vesicæ tumor circa regionem pubis, nulla gravitas perinei, aliavè similia symptomata vesicæ, urinam aliàs suppressientia, adfunt.

Quod si accedant signa renum calculosorum res èst clarior, ortam tunc esse ex calculis ex obsessis renibus obstructionem urinae.

Quod si extra calculi suspicionem gravitas circa lumbos, variaeque symptomata corporis ex sero regresso & retropulso contingant, res èst clarior.

Superveniunt autem suppressionem urines symptomata varia, prout nempe seri urinarii in renibus plus minus alterati metastasis ac transcolatio in partes solidas varia, vel sanguinis aliorumve contentorum alteratio & immutatio plus minus gravior facta fuerit. Symptomata ista sunt angustia & anxietates præcordiorum, sudor fetidus, urinosus, item halitus fetidus, torpor sensuum & omnium facultatum internarum animalium, non raro epileptica pathemata, interdum alscites, & pedum tumores edematosi, vomitus, aliaque similia symptomata adfunt. Sudor fetidus interdum plus interdum minus urinosus est; qui urinosus sudor præsupponit jam alterationem quandam à fermento renali factam, ita ut urinae per pelvium transitus sit interclusus, & ulterius pergere non potuit.

Quod si vitium sit ex obstructione renum, causæ antecedentes imprimis eam ostendunt. Si enim adsint crassi & viscosi humores obstruentes, apparet ex similibus vitis, nempe quæ monstrant crassos humores, si nempe intestina & primas vias obideant; item quando urina antea excreta fuerit turbida & crassa cum sedimento copioso & mucilaginoso, superveniat urines suppressio cum gravitate lumborum, signum est renum à tali materia obstructorum. Sin verò sanguis grumulosus obstruat renes, monstrant illud imprimis antecedentes causæ, vel casus ab alto, vel si urina cruenta antea emissâ fuerit, & Ischuria superveniat, aut equitatio, aut fortis circa renes percussio, aut similia signa & causæ, etiam causa obstruens clara est.

Pus denique infarcire renes, colligitur ex abscessibus aut ulceribus renum aliàs consuetis; item quando est empyema aut vomica ex viscere nobiliore, ubi per sanguinis circulum eò defertur pus; vel quando aliàs observata fuit purulentia cum urina excreta, atonia renum, affectus paralytici, vel universales, vel plus minus particulares nervorum innuuntur, spasmi vero dolores circa regionem renum ut plurimum excitant.

Fermenti vitium patescit, si aliis causis ferè absentibus sine debito ac consueto odore & sapore urina excernatur, unde ex collatione ac syndrome symptomatum judicandum est de Ischuria renum & vesicæ.

Calculi signa suo loco habebimus.

## PROGNOSIS.

**PROGNOSIN** quod concernit: est vel generalior & omnibus Ischuriæ speciebus communis, vel specialior, seu ad certos casus restricta.

In genere grave ac periculosum malum est urines suppressio, & quidem hæc, quæ renum fit vitio, periculosior eâ, quæ fit vitio vesicæ: vid. **M.A. N.C. am. 4. Observat. 159. pag. 201.**

Item urinae suppressio, quæ fit vitio renum, si sine dolore, magis periculosa est, quam quæ est cum dolore tensivo, cuius phaenomeni rationem **ANTONIUS SANTORELLUS** de *Sanitatis natura* lib. 22. c. 15. reddit.

Quod si **SYMPTOMATA** supra dicta adsint, utpote angustia & anxietates præcordiorum, &c. ne introeuntis quidem seri in renum parenchyma, indicium erit, adeòque sepe lethalis est Ischuria.

Et quidem quibus urina suppressa est renum vitio, si de-



propter septimum ante diem mēiere incipiat, servari possunt; sin minus, ut plurimum intereunt; quæ communis Practicorum est sententia: quod tamen non semper contingit, sed fere ut plurimum ad 10. aut 11. diem supprimi potest, antequam mors superveniat.

Licet tamen post septimum diem urina denuò profluere incipiat, copiosa etiam & varia; tamen partim ob infectam febre massam sanguineam, partim ob vitium partibus solidis affricum, postmodum intereunt: vid. TULPIUS l. 4. Obs. 29 & RODERICUS à Fonseca T. I. Consil. 87. Adeoque rarsum est, quod ischuria 11. dierum curata fuerit: vid. M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 30. pag. 58. ann. 4. Obs. 159. item ann. 6. Obs. 112. pag. 149. ann. 9. Obs. 78. pag. 209. de ischuria 10. dierum curata vid. ann. 3. Obs. 39.

Interim tamen quidam diutius, quidam minus diu urinæ suppressæ supervivere possunt; restantur enim observationes, urinam per plures dies suppressam ex vitio renum, tamen curatam esse. Sic RIVERIUS C. 4. Obs. 45. & TULPIUS l. 4. Obs. 26. observat ischuriam 18. dierum: item HORSTIUS l. 4. Obs. 45. quatuordecim dierum ischuriam ex calculo renum, & nihilominus tamen tandem curatam: FORESTUS l. 26. decem ac 18. dierum, ac CORNARIUS Obs. 21. urinam etiam 14. dierum suppressam, in observat: ischuriam 22. dierum propter tumorem seu abscessum in collo vesicæ non lethalem, vid. in M. A. N. C. ann. 2. Obs. 176.

Fere tamen intra 14. dies jugulantur ægri, rard ad 20. vivunt: Et quidem si cum urina ita suppressa aut sudor copiosus, aut vomitus crebrior, aut uberius seri per alium locum effluxus concurrat, diutius supervivere possunt ægri, & minus periculosum est malum. Sic FONSECA l. 1. Consil. 87. ad 17. dies postesse, ac per multos menses; item lib. 2. Consil. 96. refert monialem Patavinam, quæ supervixit, licet per 6. menses urina fuerit suppressa, quia sudabat quotidie circa ventrem & umbilicum. Exemplum notatu dignum refert PISO de morbis ex serosa colluvie Sect. 4. cap. 6. Edit. Languevel. pag. 95. ischuriæ in moniali 19. dierum, sed tamen conjunctæ cum sudore perpetuo, adeo ut postmodum etiam curata fuerit: Sic observata fuit desperata ischuria vitio renum orta, in qua per umbilicum copiosus sudor fuit ejectus; vid. M. A. N. C. ann. 3. Obs. 208. p. 394. Ipsemet aliquando observavi ischuriam vitio renum 17. dierum in muliere, quæ in decima septima die ex usu Emulsionis seminis violarum solvabatur, sed cum gravibus insultibus epilepticis, sine tamen interitu ægri, quæ tamen post aliquot septimanas recidivans lethalis erat; Alii e contra citius & ante septimum diem ex ischuria renali pereunt; e.g. intra triginta horas, vid. HOECHSTEDTERUS Dec. 6. Cas. 1. Aliis optimam prognosin suggerit FORESTUS, nempe suppressio urinæ, ad decimum vel undecimum diem durans, plerumque mortem sollet inferre, ac rara proin exempla in contrarium prostantia non denegant huic effato veritatem.

Insuper urinæ suppressio, quæ est à calculis renum majoribus, si vel dissolvi, vel emitti nequeunt, ut plurimum est lethalis, quia vix potest curari.

De cetero, si à resolutione seu atonia renum evenierit ischuria, semper fere observata fuit lethalis, adeoque ab HORSTIO, SCHENCKIO, & similibus Autoribus, reventio totalis urinæ in morbo, sine doloris sensu, instantis mortis signum esse asseritur.

Denique suppressio urinæ, cui singultus supervenit, & ubi odor urinæ in egri ore ac naribus percipitur; item à spinali medulla insigniter læsa, incurabilis ac lethalis est. De hac HIPPOCRATES lib. 2. Prorrhæ: Medulla spinæ si quis laboraverit ex lapsu, seu alia de causa, homo & cruribus impotens sit, ut neque, si tangatur, percipiat, & ventre ac vesica, ut primis temporibus neque sterqus neque urinam excernat, nisi coactè inveterato morbo, non ut genitè homine, sterqus & urina, ne prodeunt, moritur postea non multo interposito tempore.

### C U R A.

Quoad CURAM: ut suppressa urina revocetur, removenda est imprimis suppressionis causa, renes obstruens; adeoque quoad causas proximæ, vel corrigendum sanguinis vitium, vel renum præternaturalis dispositio. Nempe impedimenta in his removenda, tonus debitus conservandus, fermentum renale acuendum.

Quod attinet sanguinis vitium, hisce succursimus vel impletoricis per levem vengsectionem. prout Observationes superius ex RIVERO Cent. 1. Obs. 1. & 89. item ex TULPIO lib. 2. Obs. 43. allegatæ, confirmant: vel cum ut plurimum oc-

currant in morbis chronicis, & ischuria tunc fit prodeum morbosum, per dyscrasie sanguinis corsectionem, præafficius primarii varietate, alterantibus aliisque appropriatis, methodo in morbis chronicis consuetâ, de qua vid. supra Sect. 17. cap. 3. Art. 1. de Cachexia, eademque curabitur. Hinc Diureticorum quoque selectus erit habendus, ita ut nunc acida, nunc urinosa, nunc pituitosa, nunc terrea, nunc sulphurea, propinentur.

Quod verò attinet renum dispositionem præternaturalem removendam, hæc immutari debet pariter pro hujus varietate: subindè necesse est ac sepe fructuosum, præmittere levem alvi solutionem per assumptam LAXATIVAM in forma pulveris, quæ primas vias laxant, ac blandè evacuant; cum sepe observatum sit, alvo irritatâ simul in fluxum concitari urinam; e.g. tartarum vitriolatum, terram soliatam tartari, &c. (quæ sunt blanda diuretica simul) cum blando stimulo acuata; uti de vi laxativorum ad urinæ fluxum promovendum vid. BARBETTE in Praxi cap. de suppressione urinæ, ubi viro, ulcere renum laboranti, cum superveniente per biduum urinæ suppressione, præscripsit huic haustum:

24. Syrup. de ciccho. cum rhubarb.

• Rosar. solut.

De ciccho, seu de cartham. ana ʒi.

Lapill. cancr. præp. ʒi.

Aquagram. q. l. Misc.

Vulgatissima hæc est Mistura & tamen blandè alvum & copiosam urinam provocat.

His internis adduntur CLYSMATA terebinthinata injecta, cum oleo terebinthinæ aut succini parata, de quibus in cura Calculi renum agitur, ut potè cum his ipsis sepe promoveatur uberius urinæ secretio. In specie, si adsit vitium renum obstruorum, idque fiat à sanguinis grumo, curanda venit per sanguinem grumosum resolutentia, DIURETICA, quæ inter in specie rubia tinctorum ejusque radix, & inde paratæ Crapp, sperma ceti, succinum, & succinata quælibet, quæ à multis singulariter commendantur in retentione urinæ. Omnis enim vis diuretica à sale volatili succini cum HELMONTIO derivanda. Sive malum sit à crassis humoribus, sive sanguine congrumato, sive pure, lapilli cancerorum cum aceto assumpti, & alia simplicia vulneraria selecta, cheresolium, agrimonia, hedera terrestris, quæ per se sunt diuretica, ac feniculum; item hypericon, ejus flores & semen, & similia plus minus diuretica, quæ superius Sect. 18. cap. 2. de sanguine congrumato habui, conducunt. Hypericon enim potenter urinam movet; unde etiam internè, cum sit vulnerarium, in purulentis & sanguinis grumis convenit, inungendo simul externè regioni renum & lumborum oleum scorpionum, oleum ceræ, item petroleum, & similia. Sin verò obstruictio renum sit à pure, terebinthinata, simplicia Vulneraria, in specie balsamus sulphuris terebinthinatus aut juniperinus, succus aut syrupus de hedera terrestris, essentia & extractum agrimonie, hyperici, &c. profunt. Quod si pituita tenax & glutinosa renum meatus ac tubulos obstruxerit, præmissis laxantibus, cruditates pituitosas per alvum evacuantibus, (quod probe observandum est, ne intempestivo Incidentium diureticorum usu copiosior cruditatum pituitosarum ad renes fiat delatio, sicque malum potius augeatur, quàm imminuatur) conveniunt hæc dissolventia, pro Varietate scilicet causarum, diuretica blanda, imprimis Raphanacea quælibet, alkekengi, succus limonum, vel solus, vel cum vino, succus parietarie cum oxymelite, in specie salina, ut tartarus vitriolatus, tinctura tartari, sal volatile succini, spiritus urinæ, salique volatilia, spiritus urinæ, seu sal ejus volatile, item sal volatile ammoniacale, & similis generis remedia, hinc Mistura Sylvii in Praxi lib. 1. cap. 55. & 62. sunt proficua. Radix raphani, in specie ejus succus, item armoracie radix in vino infusa & pota, ubi vel arena, vel sabulum, vel mucus viscidus obfleserit renum tubulos, in specie conducunt, & urinam promovere. Succus limonum & citri admodum egregius est in hoc casu, egregiè incidens & dissolvens mucum viscidum in renibus, si ad ʒij. vel iij. usque ad iv. in aqua appropriata assumatur, multum laudatur ab AMATO LUSITANO Cent. 3. Obs. 71. sicut & HELIDÆUS PADUANUS succum limonum cum oxymelite propinat, ubi renes à sordibus viscidis, quas removeret, obfidentur: in quo casu etiam spiritus salis dulcis non est incongruus in Decocto diuretico, v.g. radicis petroselinæ in jure cicoris rubri, præsentim spiritus vitrioli Philosophici; unde apozema Sylvii lib. 1. Prax. c. 55. & 61. non inconveniens erit. CNOFELIUS ann. 3. M. A. N. C. Obs. 208. extollit spiritum salis ammoniaci acidum per se præparatum in omnibus obstruccionibus exitium valorem,



in quo calu ex Vegetabilibus conveniunt fructus alkekeengi, qui sunt egregium diureticum, radix rubiæ tinctorum, quæ est admodum efficax. Herba parietariæ, ejusque succus recens expressus cum oxymelite assumptus, experimentum est HELIDÆI PADUANI. Sed necesse est, sit parietaria non tamen quælibet, sed ea, quæ in rudibus parietum antiquorum crevit: ratio, quia hæc sub putrimeto secum sal nitrosum in parietibus ratione calcis vivæ latentis attrahit, ratione cujus salis nitrosi hæc parietaria adeo insignis est diureticum, quacunque ratione data, imprimis succus ejus expressus, & cum saccharo in *syrupum* redactus, ut eam propterea quidam in suppressa urina, aut imminuta hypodiplocorum, seu singulari secretionem habeant. Quod si à calculo sit renum obstructio, conveniunt vel hunc maturè pellentia diuretica, vel eundem diffingentia, utut rara, &c. *methodo inferius suo loco explicanda*. Abrotani comæ pulverisatæ ad ʒi. cum tantillo nitri iis commendatur, quibus ob calculum urina supprimitur: vid. SIMON PAULI in *Quadrup. Botan.*

Quod si ischuria oriatur vicio renum in tono suo vitiatorum, tunc in atonia Nervina aromatica, imprimis terebinthinata, bacca juniperi & Juniperina, nobilia sunt, unde & Malvaticum juniperinum, quod est egregium remedium, speciatim commendandum, item spiritus baccarum juniperi et oleum destillatum, cum Juniperina ratione virtutis aromaticæ sint Nervina; item Decodum & Infusum diureticum in *Colleg. Form. p. ....* & .... stimulant urinam, Cinnabarina & Succinata, specificè conducunt. Primatum obtinet sal volatile succini excellentissimum Diureticum, quod HELMONTIO merito audit apex remedium diureticorum, si à gr. vi. vel xij. in aqua appropriata usurpetur.

Sin verò ex contractura spasmodica fibrarum renalis viciū oriatur, curanda est per Opiata, item cinnabarina, imprimis cinnabarina antimonii cum sale volatili succini: Quod forsitan quoque facit quod DECKERUS in *Prax.* refert, *Mithridatium* cum decoctione quadam diuretica datum mirificè urinam provocare. Huc spectat vitrum in polinem redactum, à nemine hactenus, nisi à GESNERO *lib. 3. Obs. 4. 5. & 6.* commendatum.

Quod si fermentum renale heberatum, aut iners plus minus factum fuerit, hocque in causa sit, tunc semper conveniunt propriè sic dicta Diuretica; nunc acria salina urinosa, tam volatilia quàm fixa, dictum fermentum renale acuentia, & acrimoniâ suâ quasi stimulantia, & secretionem promoventia; nunc simul oleosa temperata: y. g. conducunt radix raphani, tam orbicularis quàm armoraciæ, succus raphanorum, & quæcunque ex raphano præparata remedia, item radix armoraciæ vino infusa & pota, quæ multum valent in stimulauda urina. Quibus merito addenda capita allii & cepæ, sal & spiritus urinæ per fermentationem, spiritus salis ammoniaci, spiritus lumbricorum per putrefactionem, infusum cantharidum, salia fixa salia ex simplicibus diureticis, ac tandem terebinthina, juniperus, semen violarum. In specie quod attinet capita allii, hæc sale volatili acri insigniter sunt surrida, quæ ipsa singulariter fermentum renum acuiunt, & minutim concisa cum vino assumpta, vel cum aquæ vitæ juniperina propinata, egregiè præsistant urinam. Hicce jungi debet *semen urysimi*, quod Germ. dicitur *wilder Senff*, salinum, & acre gustui, ad ʒi. in forma pulveris assumptum in vino albo, quibusdam singulare ad retentionem urinæ est experimentum. Vid. FONSECA *lib. 1. Conf. 10. & lib. 1. Confil. 96.* De parietaria supra dictum. Flores tunicæ, & in specie *cyani, calcatrippa*, præsertim juncti, in vino colli vel conservæ formæ spiritui salis acidulati & propinati, blandè urinam cient. Super remedium Agricolaë usitatum. Uterius folia ribes nigra, urinæ odorem spirantia, egregiè urinam pellunt: item hedera arborea, ejusque bacca, sunt usitatæ: Glomi cynosbati, & eorum pulvis, & ex his paratus spiritus Hartmanni, sunt satis decantati. Herba ononidis & hedoræ terrestris sunt satis utiles. Denique succus *passinacæ luteæ* seu *siferis alterius Athioli* perquam egregiè urinam promovet, etiam allis remediis irritis; in specie puerorum urinas suppressas misce efflu hic succus stimulat. Salia volatilia, spiritus & sal tartari, item tinctura nephritica diuretica Ammelungii clystiformis, parata ex antimonib, nitro, tartaro & silicibus solaribus sunt silices certi, Germ. *seher roth insyendig*, quos putant imprimis auri (semine) in vicem mistis, spiritus etiam carminativus, quæ omnia spiritu volatili tartari maximam partem participant, optima sunt diuretica, urinas pellentia; Idque imprimis in locis, ubi copiosè vinum hauritur. Imprimis spiritus tartari, si quisque volatilisetur arte, ut fiat in-

flar spiritus salis ammoniaci, habetur potentissimum diureticum, in specie calculorum præservativum. In specie inter acria diuretica eminet sal volatile succini, quod nobile est, & HELMONTIO commodè diureticorum apex vocatur, loco ejus tamen oleum destillatum est egregium, imprimis in sanguine grumoso ratione hujus sal. acris comode adhiberi potest. Pertinent huc insecta, in specie lumbrici, scarabæi Lucanici, cocconella, aselli, ac imprimis cantharides. Hæc insecta sale volatili acri subtilissimo per quàm diuretico insigniter polleant, adeoque perquam in Ischuria conveniunt: ex lumbricis nempe terrestribus spiritus per fermentationem seu putredinem paratus & rectè rectificatus, vel recentis vino contriti & expressi, egregiè profunt. Pulvis asellorum, aut hi ipsi vino infusi & expressi & potati, multum conveniunt ad proliciendam urinam. Cantharides, multis videntur suspectæ, quia non tantum internè propinatæ, sed etiam extra applicatæ, imò etiam in manu detentæ, ac in bursa gestatæ, vesicam & vias urinarias exulcerant, ut mistio cruenta subsequatur. Vid. LANGIUS *Tom. 1. Ep. 47.* SOLENANDER *Conf. Med. 2. p. 13.* SMETIUS *Obs. Misc. p. 44.* & SCHENCKIUS *lib. 7. Obs. Med. p. 872.* Nihilominus tamen non semper contingit, teste SENNERTO *Tract. de Dysur. cap. 2. p. 14.* sed vino ritè infusa & maceratæ ita corriguntur, ut potentissimum diureticum subministrant, si vinum filtratur, & aliquot cochlearia propinentur, observatis observandis cautelis. Modum salutare infundendi videbitis in BARTHOLINO *Cent. 5. Hist. Anat. 82.* Usus verò eorum felicem in *Cent. 4. Epist. 21. pag. 92. Epist. 12. pag. 143. Epist. 54. pag. 346. Epist. 65. p. 400.* WILLISIO *Pharm. Ration. pag. 154.* quibus iungantur M. A. N. C. *ann. 1. Obs. 133. pag. 296.* ZACUTUS LUSITANUS *Praxi Admir lib. 1. Obs. 31.* WELSCHIUS *Schol. in Obs. 89.* RUMLERI.

Quod si præter spem miellus crepentes superveniret, tunc huic convenire potest liberior lactis haustus, sale tartari imprægnatus.

Quidam Magisterium ex cantharidibus cum spiritu nitri præparant, quod cum oleo tartari præcipitatur, sed vis diuretica potius pervertitur, vid. LUDOVICI *Pharm.* hinc potius laudatur *essentia diuretica ex cantharidibus per tincturam tartari parata*, de qua vid. WILLISIO *Pharm. Rat. P. 2. p. 158.* Loco horum spiritus lumbricorum, vel ipsi lumbrici v. vel vi. aut aselli benè loti, lineo inclusi, contriti vino infusi, expressi & potati, promptè urinam eliciunt, de quorum efficacia vid. HILDANUS *Cent. 6. Obs. 50.* Hicce animalibus acrioribus addendum quoque vile illud quidem, sed optimum remedium, simus nempe equinus; observavit enim FORESTUS, urinam ad quatuordecim dies postestque in rustico suppressam, allisiritis, simo equino curatam, infundendo huius ʒii. in vino Rhenano, exprimendo & exhibendo, & ecce! urinæ largior secutus est fluxus ratione salis ammoniacalis, quo est imprægnatum. De hircoribus nota est, quod sicut cervus totus est alexipharmacus, ita hircus est diureticus, unde urina hirci calida pota, omento & intestinis hircinis ad ventrem applicatis, in desperatis casibus admodum laudatur. Juxta hæc, salia fixa urinosa acria & salia diuretica, aut his similia, aut cognata concreta fixiora terreæ, animalium partes duræ, præ cæteris marina, conveniunt: v. g. lapides cancrorum, qui ex egregium temperatissimum in se habent sal alcali, vino aut aceto infusi, & ita simul potati, pro urina elicenda nobilissimi sunt; nam cum acido sunt egregiè diuretici, in specie ubi sanguinis grumi adsunt, in quo casu cum Decocto cherefolii, vel rubiæ tinctorum, vel hyperici, seu vulnerariorum, exhibeantur. De ciceribus rubris, eorumque Decocto diuretico, res est nota. Post lapides cancrorum sunt testæ oorum, in specie ear, ex quibus jam exclusi sunt pulli; quæ vel crudæ, vel calcinatæ, quod melius, ut quibusdam placet, ad ʒi. assumptæ, omnia reliqua superare dicuntur à BARBETTE; calcinatæ sunt insar cuiusdam calcis vivæ, quæ per se, vel vino infusæ assumptæ potenter urinam pellunt. Potentioris tamen adhuc efficacitæ sunt testæ quorum struthiocameli, quæ vel crudæ assumptæ, vel in spiritu salis dissolutæ ita liquorem egregiè diureticum constituunt. In operculis cochlearum, quæ sponte suâ vere oovo erumpentes remonent, singularem prædicant virtutem diureticam, & insar arcagi summi in urinæ suppressione & calculo commendant nonnulli, si pulvis ejus cum capitulo spiritus salis mistus, sive per se part. ii. cum parte una lapillorum cancrorum, propinetur: Vid. M. A. N. C. *ann. 9. Obs. 79.* Pertinent huc salia fixa cineritia ex plantis diureticis & nephriticis debite calcinatis prolucita, ita nempe, ut non perfecte alcaliscentur, sed potius salia permancant: Nam omnia vulneraria & omnia diuretica in



ea in se habent sal falsum, & etiam istud in cineribus relinquunt. Verum si nimis calcinentur, abeunt in sal alcali, de quibus TACHENIUS in Hippoc. Chym. unde etiam tartarus vitriolatus potentius est diureticum, quam ipsum sal tartari fixum; adeoque sal fimi columbini, stipitum fabarum, sal genista rite secundum TACHENIUM paratum, sal prunella, &c. urinas egregie cient. Sal fimi columbini non cedit ipse fims columbinus nitrosus, vino infusus, solutus, expressus & propinatus; blanda enim vini aciditas concurrens cum alcali stercoris dat tertium falsum, alias vix esset diureticum. Huc faciunt tartarea remedia, ut spiritus tartari volatilis, & sal eius volatile, quæ in Ischuria ex vini potu orta multa præstant: sal tartari, tartarus vitriolatus, tinctura tartari, omniaque Tartarea, Cremor tartari cum sale tartari junctus, tartarus tartarificatus dictus, sequenti modo præparandus:

℞. Sal. tartari ℥ij.

Solve in f. q. aque comm. copiosa:

Filtrato liquori ebullienti blando igne insperge successivè Crem. tartari pulveris. ℥ij.

Inspissentur leni igne, & pulverisa: Huic affunde

Spiritus vini simpl. q. s. ad extractionem vel solutionem: Stent in loco calido, & filtra pro tinctura tartari tartarificata.

In silicibus calcinatis, & subinde in vino extinctis, lateet etiam vis diuretica non vulgaris; Nam ulnum istud extinctionis silicum urinam remorataam prouocat.

Omnibus his annumerandus succus betule seu aqua betulinæ ex arbore incisa profluens, egregium scilicet diureticum: Vid. HELMONTIUS de Lithiasi, de qua cras Deo volente, ubi de Calculo renum, plura.

Tandem Terebinthina quacunque ratione usurpata est egregia in urinæ defectu, singulariter renibus & affectibus urinaris dicata: Nam Terebinthina est singulare remedium ad urinam suppressam, ad detergendos & abstergendos renes, eorumque corrigenda vitia; in specie oleum destillatum terebinthinæ, & balsamus sulphuris terebinthinatus, item pilulæ de terebinthina apprimè hic conducunt, vel ipsa terebinthina Veneta à ℥ij. ad ℥ss. cū f. q. vitelli ovi n. j. vel q. s. & aquæ graminis vel appropriatæ q. s. addendo nonnihil succi limoniæ, fiat Mixtura instar emulsionis, quæ egregie urinam promouet, & renes mundificat. Conf. PLATERUS in Obs. ubi de affect. urinaris, p. 310. 314. & 320. Item TIMÆUS in Epist. p. 242. Addendū est nonnunquā mel, præsertim in pure renum, ut ut non omnibus æquè conveniat, cum mulieribus quibusdā propter mellis societate hysterica pathemata excitare soleat: e. g.

℞. Terebinth. Venet. ℥ss.

cum f. q. vitell. ovor. & aquæ gram. vel fragor.

f. Emulsiō. Sed est ingrata. D. S.

Vel ℞. Emulsiō urinam promovens.

℞. Terebinth. Venet.

Mellis an. ℥i. ad ℥vi.

Vitell. ovi num. j.

Succ. limon. ℥i.

Aquagram. q. s.

M. in consistentiam Emulsionis. D. S.

Emulsiō urinam promovens pro aliquot vicibus.

Est egregium remedium: nam succus limonium per se est egregius, ubi renes sunt insarcti à crassa materia & humoribus, si ℥ij. vel iv. assumantur.

℞. Terebinth. opt. ℥vi.

Vitell. ovi num. j.

Mell. rosac. ℥ss.

Vini opt. vel Rhenan. ℥vi. ad ℥lss.

Aquæ parietar.

Flor. fabar. an. ℥ss.

Succ. vel syrup. acetos. citr. vel dialth. Fern. ℥j.

M. D. S.

Singularis emulsiō pro aliquot vicibus.

Dosis ℥i. ad ℥ss.

Item Emulsiō ex sola terebinthina cum aqua fragorum, mediante oui utello.

Semen tandem uolarum purpurearum, & inde cum aqua ueronicæ, vel appropriata, parata Emulsiō, enporis non est optimum, HARTMANNO & CRATONI insigniter commendatum. urinam, imprimis vitio renis suppressam, blandè, simulq; aluū laxat. Vocatur Emulsiō nephrocathartica, e. g.

℞. Sem. violar. purp. ℥i.

Lithosperm. ℥i.

cum f. q. aquæ petrosol. vel fragor. f. Emulsiō.

Pro aliquot dosibus: addi simul possunt testar. ovorum pulverisatæ. vel calcinatæ. vel testarum ovorum struthiocamei, vel alius pulveris, sed candidi, ℥i. Edulcoretur parum:

D. S. ut supra.

Conf. Idea Form. Class. 3. s. 6. & Coll Form. p. .... & .... Præter hanc in usu etiam sunt Emulsionēs ex nucleis persicorum & sem. genistæ, ut & similibus; e. g.

℞. Sem. violar. ℥iij.

Nucl. persic. ℥iij.

cum f. q. aquæ petrosol. & fragor. f. Emulsiō.

D. S. ut supra. Item

℞. Aquæ ononid. vel alkekengi,

Petrosol. an. ℥i. ad ℥ss.

Malvat. iuniperin. ℥vi. ad ℥i.

Spiritus lumb. terr. per putr. ℥ss. ad ℥ss.

Tartari volat. vel carminat. ℥i.

Olei destillat. terebinth. gutt. iij.

Syr. heder. terrastr. ℥iij. ad ℥vi.

M. D. S.

Potio urinam promovens.

Capiatur cochleatim. Item

℞. Tartari vitriolat. ℥i.

Salis stip. fabar.

Fimi colum. an. gr. xv.

Volat. succini gr. xii.

M. pro pulvere:

Div. in 3. part. æqual. S.

Pulvis urinam promovens.

Externè promouet urinæ fluxum inunctio cum oleo scorpionum & unguento dialtheæ; sicut & petroleum hoc in casu externè illitum nobile est: quibus addendum est oleum destillatum terebinthinæ, cumini, & camphoræ: Vel

℞. Unguent. dialth. ℥iij.

Olei scorpion. ℥i.

destillat. terebinth. ℥i.

M. f. Linimentum: S.

Linimentum urinam promovens.

℞. Petrol. alb. ℥iij.

Olei scorpion. ℥iij.

Destillat. baec. iunip. vel terebinth. ℥i.

Misc. pro Litu blando.

D. S. ut antè.

## MEMBRUM II

### DE

## CALCULO RENUM.

**C**ausas inter, quæ meatus renales obstruendo urinæ secretionem impediunt, crebrior est CALCULUS RENUM, qui præterea etiam urinæ excretionem per vesicæ non raro tollit. In renibus quidem quando hæret, secretionē & distributionem, quando uerò in vesica subsistit, aut eius collum & meatum obstruit, urinæ excretionē impedit. Calculus seu Lapis ille frequenter renes & vesicam affligens; & ischuriam interdum infert, undè pergimus ad generationem & curam calculi, tam renum, quam vesicæ. Equidem CALCULUS in se non est morbus, sed saltem productum morbosum, effectus scilicet illius renalis affectus, qui alias propriè LITHIASIS dicitur, & significat dispositionem talem renum & vesicæ calculosam, à qua facillè urina mutatur, & successivè generatur calculus. Productum uerò hoc morbosum calculus ipse, à PARACELSO propriè *Dualech*, nomine lapidi humano proprio (calculi nomen tantum est metaphoricum) vocatur, quasi diceret concrementum quoddam ex duobus contrariis mutuo coagulatis & arctè junctis. Quod attinet calculum renum & vesicæ: sub uno conceptu considerantur, quia se mutuo subsequuntur sepius. Notum autem aliàs est, observatos esse calculos ubique in universo corpore, tam partibus solidis, ut renibus, lingua & cerebro, quam liquidis, ut in folliculi fellis liquore, & in massa sanguinea (ubi observatum quod in venæsectione calculus cum sanguine profuierit) genitos; frequentissimus tamen & ordinarius eorundem nidus sunt renes, vesica urinaria, & hinc vesicula fellea, nempe propter sal alcali copiosius ibidem hærens: & si in aliis partibus observati fuerint, rariùs tamen hoc factum fuit. Isti uerò calculi, quando vesicæ incumbunt, ut plurimum ex renibus, utpote in quibus acidum manifestum cum alcali volatili & terrea urinæ substantia coagulantur, (vid. TACHENIUS Hipp. Chym. c. 14.) vel calculi minuti forma, vel arenarum majuscularum facie, successivè in vesicam illapsi sunt, ut ut ibidem retenti successivè augmententur, adeo ut credam, rarissimum esse vesicæ calculum, qui in eadem prima rudimenta concretionis ponat;



ponat; ut ut omnes majores calculi, qui amplitudinem ureterum, tam naturalem, quàm morbosè *auctam*, superant, omne suum incrementum in vesica acquisiverint. Dico morbosè *auctam*: Observatum enim, quò sæpius calculi per eos transierint, eò magis soleant distendi: In iis enim, qui sæpius calculo laborant, ex crebriori calculorum majorum transitu ureteres interdum ad digiti amplitudinem distenti reperiuntur; undè quò sæpius calculo afficiuntur acri, eò mitius solent habere, ratione dilatationis ureterum. Quando igitur in vesica hærent calculi majores his ureteribus, infallibile est, acquisivisse illos augmentum in vesica.

Hilapides sunt concretum tertium salsum, ex sale volatili urineum acido stomachali oberrante coagulatum. Quod atinet MODUM GENERANDI, seu causam efficiensem CALCULI RENALIS: materialiter & formaliter ex urina oritur. Non confundendus est modus, quo generantur lapides veri in macrocosmo cum hujusmodi concretionem arenosa calculi in microcosmo; Dispar enim ubicunque est ratio. Nam quod plures de succo petroso, spiritu lapidifico aut Gorgonio proferunt, qui vel spontè in petras abeunt, vel alias res in petras transmutant, saltem nuda sunt nomina, nil explicantia; quin potius causa efficiens, quæ cum materiali coincidit, fieri videtur per modum coagulationis duorum salium contrarium & præternaturalium, acidi præternaturalis & alcali volatilis urinosi. Nempè calculos generari puto, dum acidum manifestum, adeoque vitiosum, in specie digestionis primæ errore ex stomacho dilapsum, occurrit sibi contrario alcali volatili seu urinoso puriori in renibus vel reliquis partibus, cum quo promptissime & necessitate nature concurrente coagulantur invicem in concretum arenosum. Hoc ipso hi concurrunt simul *levem terrestrem substantiam*, in omni urina reperibilem, & quicquid coagulationi aptum, simul apprehenderint, id cum urina potius ad vias urinarias delatum cum his duobus unum coagulum suscipit, & ita arenulas, ut majores et diversas, ita & firmiores constituit, & in silicem concretum abeunt. Hinc adeò duræ evadunt exinde arenulæ calculosæ, quarum firmitudinem seu duritiem mirandam in poliendo & corrodendo vitro exploratam videre possumus in PANAROLLO *Pent. 4. Obs. 25.* qui pariter *Pent. 1. Obs. 35.* arenularum, tam albarum quàm rubrarum, diversitatem cum microscopio examinavit in *Pent. 1. Obs. 33.* Nempè TRIPLEX calculorum est DIVERSITAS, ut plurimum nunc alborum, nunc rubrorum, nunc ruforum seu flavorum, qui frequentissimi: Flavido est simpliciter urinæ folius progenies, ex sale nempè urinx coagulato: calculus albus fit, quando sub coagulatione duorum horum salium simul concurrunt mucilago quædam viscida, ex vitio nutritionis renalis oriunda, aut ex attritis membranulis renis transudans, quæ unâ cum salibus istis concreta calculos albos constituit: Rubescunt e contra & obscuri calculi sunt, dum minutissimæ sanguinis guttæ ex uno vel altero vasculo, aut eroso aut lacerato, transudantes simul coagulantur, & concresecunt: hinc calculi candidi sunt longè duriores, quàm rubri & rufi. Plura de generatione calculorum videb. in *M. A. N. C. Ann. 4. & 5. Obs. 167. pag. 220.*

Hæc duo elementa salina calculos componentia confirmantur ex examine calculorum chymico: Hi enim quando destillantur, oleum fetidum & empyreumaticum, spiritum urinosum, instar urinæ, & sal volatile in notabili quantitate præbent, remanente capite mortuo instar calcis vivæ: vid. TACHENIUS 4. & HELMONTIUS *Traité Tartarus non in potu §. 7.* An verò alcali hoc urinosum, frustulis calculi à distillatione relictis & friabilibus planè denuò assusum, eadem sollicitissima iterum reddat, prout Tachenius perhibet, ejus asserti fides sit penes Autorem. Ex hoc interim patet adesse

1. Sal volatile oleosum urinosum.
2. Simul subesse acidum propter effervescentiam in fusione salis alcali.

Ex hoc habemus binos coagulatores, duo salia, acidum & alcali, quæ duo invicè coeundo se ununt, & quicquid simultaneè coagulationi aptum, arripiunt & coagulant in consortium lapidis. Idem calculus per calcinationem quoque alcaliatur; si cum dupla portione carbonum mixtus igne reverberii per quinque aut sex horas calcinetur, postmodum cum aqua calida solvatur, filtratur, & crystallifetur. (2.) Confirmat id odor & sapor calculorum: omnes enim calculi, etiam per aliquot annos asservati, urinam spirant; sicut tritici aut affrici, item pulverisati. Nec (3.) aliud voluit, v.g. HELMONTIUS *Traité de Lithiasis*, quia iam producunt mechanico-chymicam rationem generandi, si nempè coagulum fieri volunt à spiritu quodam vinoso, concurrente cum spiritu urinx; non secus ac spiritus vini rectificatissimus subito coagulatur in consisten-

tiam opacam seu offam albam, cum permixto spiritu urinx volatili per fermentationem parato, aut, loco hujus, spiritu salis ammoniaci cum sale tartari parato. Id quod fieri putant ratione subtilis acidi in spiritu vini adhuc reperibilis, alcali volatile in spiritum urinx arripiens; ut ut integrum experimentum adhuc claudicet, cum non propriè dicta coagulatio, sed saltim *apparens*, & pinguedinis ex spiritu vini præcipitatio sit: Nihil crystalliforme apparet in offa hac HELMONTII, est ergò præcipitatio pinguedinis ex spiritu vini; spiritus salis ammoniaci enim phlegma spiritus vini statim assumit, unde ratio patet, quare idem spiritus urinosus à calore vivæ abstractus non amplius cum spiritu vini ita concresecere soleat.

Ut ista duo elementa calculi, acidum & urinosum, melius cognoscantur, quod acidum observandum est, quod ordinario sæpe à thritici confirmati sint etiam calculosi seu nephritici, & contra; aut calculosi etiam ut plurimum sint, aut evadant etiam arthritici: quatenus hi duo morbi dependent ab acido præternaturali in stomacho genito, quod pro varietate partium, quas affligit, varias dat turbas, & quod articulis dolorem infert, in renibus coagulat calculum. Porro utrumque malum commune & endemium videtur in locis, in quibus vina bibuntur copiosiora & acidiora pro potu ordinario, ut fit in regionibus ad Danubium sitis, e.g. Franconia, Moravia, Austria, & similibus locis. Nempè idem videtur esse efficiens acidum, quod artuum nervosas partes pungens & rodens synoviam in iisdem coagulat in nodos, quod in renibus similibusque in locis a calculi urinario occurrens, istud in calculum cogit. Adeoque in talibus acidum copiosius sub falso urinæ sapore occultatum oritur ex primis viis, v.g. ex vino copiosius ingurgitato, indeque citra vomitum retento, hinc vitiosè digesto: quod acidum vitiosum ex stomacho dilapsum, uti suo illo acore universo corpori est hostile, & ubique dolores ac punctiones infert; ita copiosior salinis urinæ contentis materiam suggerens, seu illuc pertingens, sub forma spiritu seu acidi paulò fixioris sub urina potus, & in eadem reperiens alcali quoddam volatile, ab acido debito non rite saturatum, subito hoc aggredditur, & in calculum cum eo coit. Experimentum etiam habemus elegans, vinum in topfos & calculum coagulari: recipiatur nempè nitrum per carbonem perfectè fixatum, misceatur cum parte silicis, fundantur igne forti, coeunt in vitrum: hoc effusum in laminam aurichalceam, citò pulverifetur: hinc affundatur spiritus vini, & brevi post tingetur colore rubro hyacinthino; defundatur, & novus spiritus affundatur, tandem mensuro spatulo fit oleum rubicundissimum, cujus aliquot guttæ in vitrum vini instillatæ mox coagulant vinum in substantiam gypseam, similem calculo seu topfo in articulis podagricorum. Ratio est, quia alcali nitri urinosum cum spiritu vini exaltatum arripit acidum vini, quod coagulat in calculum seu substantiam tophaceam. Propter hoc acidum vitiosum vini tales incolæ etiam affecti sunt paræsi, præcipue ex colica, seu artuum post colicam contracturâ, affectu apud nos raro, ac reverà colicarum convulsivarum gravissimâ specie, ab acido in intestinistorminoso, in artubus verò stupefactivo. Pacit huc imprimis exenteratio calculosi cujusdam, cujus omnia contenta liquida acidum intense spirabant: Conf. *M. A. N. C. ann. 2. Obs. 243. p. 344.* Hinc est, quod THONERUS in *Obs.* dicat: Melancholicos esse dispositos ad calculum. minus biliosos; quia in melancholicis abundat fermentum seu succus calculosus. Ratio, quæ confirmat, hæc est, quod in biliosis prædominetur sal volatile alcali, in Melancholicis verò obtineat acidum. Facile ergò videmus, THONERUM esse in nostra sententia.

EFFICIENTIS igitur locum acidum obtinet, nunc ipsius urinæ, nunc verò ex primis viis elapsum copiosius, inde urinam magis imprægnans & salisorem reddens, & ita copiosiorum aut firmiorum calculorum genesis promovens. Unde etiam Vomitoria subinde à calculo præservant, contenta primarum viarum eliminando: id quod etiam faciunt vel *Terebra lapidea fixa*, aut *Calcinata*, quatenus acidum absorbent; vel per alcalia, tam fixa, quàm volatilia, acidum in salum mutantia, & per urinam evacuantia.

Præter hoc acidum, alcali præsentiam in calculi genesis illustrat, quod frequentissime calculi, imò in tota æconomia animali humana frequentiores non, quàm in renibus, & hinc in vesica fellea, reperiuntur; quia in his locis manifestius reperitur alcali volatile urinosum, quod promptè potest corripui ab acido vitioso, cum naturaliter constituta urina sit salia, & consequenter alcali jam ab acido sit saturatum, & vix ex eodem, quâ tali generari poterunt calculi; Nam cum salis sapor ex acido & alcali volatilibus, debitâ proportionè & coagulatione unitis, originem ducat, tam cum acido quàm cum alcali permiscibilis est, sine ulteriore immutatione; Unde in cætera sanis,



sanis, ut ut urinae insilluntur acida, aut licet urinae in corpore permisceatur acidum, v. g. in *stranguria*, quae oritur ab acido insensibili ex primis viis praeternaturaliter urinae permixto, tunc tamen non generatur calculi; quoniam acidum per se solum non sufficit, & sal urinae tunc temporis naturaliter constitutum est, h. e. sal volatile urinae salsum, seu à compari suo acido debite saturatum existit, unde non potest coagulari ab eodem, vel alio quovis vitioso acido, ac pallida quiddam turbida nonnihil, non verò in arenulas spissata excernitur urina. Aliud quid ergo subest: nempe ut coaguletur alcali urinae ab acido ex primis viis delapso in lapidem, necesse est, ut sapor urinae falsus dividatur, i. e. ut istud alcali volatile urinae per se existere incipiat, & purius ac manifestius fiat; Dum enim ita urina facile suscipit putredinale fermentum, ab acido proprio nonnihil separatum, nec debite saturatum existat, ut ita proprius ab acido plus minus naturalis aut vitioso corripitur, & ita in calculum construngi possit. Fit hoc, quando urina in renibus alterationem praeternaturalem; uno nomine: aliqualem *putredinis* praeternaturalis notam, incurrit, qua levi *putredine* dissolvitur nonnihil ejus mixtura, & ita sapor ejus falsus dividitur ista alteratione, ut abundans, sal alcali, & proprio praedominans acido, ab eo nonnihil separetur, & utraq; salia hac activa manifestiora fiant, donec novo & plane heterogeneo coagulationis modo societur, aut praeternaturali acido vitioso, alcali denuò sub coagulationis jugum mittatur, et demum in calculum coeat: v. g. videmus, quod urina sanorum hominum clara & perspicua excreta, si ad tempus in matula, praefertim stannea, aut vase vitreo steterit, imprimis tempore aestivo, aut in loco calidior, ut corrumperetur & leviter putrescere inchoet, cujus indicium foetor existit, quod tunc arenulae, & successivè *calculosa crusta*, parietibus sese affigat, quod fit per putredinem, separatis salibus, proprium urinae acidum, debile licet & paucum, sal tamen volatile proprium aliqualem putredine separatum ac resolutum, denuò novo coagulo spissat, & ita in novum concretum, arenulas, cogit, quae instar tartari lateribus matulae adherent; nempe nunquam urina, nisi cum alcali fixo praecipitata aut putrelacta, suum sal volatile promittit, ubi simul etiam *terrestrem* & quasi *sabulosam* saburram putrescendo de se reddit. Haec Mechanica subministrat viam indagandi, quomodo alteratio haec urinae putredinalis in renibus, seu *Lithiasis* aut dispositio ad calculum, fiat? nempe

• adest in renibus fermentum putredinosum praeternaturale, quo disponitur urina in renibus ad aliquam sui putredinem, & consequenter propriae texturae dissolutionem, unde sal volatile quodammodo liberius factum, ab acido praeternaturali digestionis primae cum particulis his terrestribus (sub putrescentia potius genitis, quam formaliter praexistentibus) simul facile coagulari in arenulas & calculos.

Illustratur & confirmatur hoc negotium imprimis historia

HELMONTII *Traët. de Lithiasi* de Jurisperito, qui ex esu asparagi copiosioris contraxit nephritidem. Asparagus enim eo ipso, quo intensè foetidam reddit urinam, qui foetor nota est certa inchoata in urina putredinis, eo ipso eam ad aliqualem putredinem, & ita salium divisionem disponit, unde vitiatum sale alcali oleoso, separatoque ab occurrente vitioso acido, facile fiunt calculi, sicut è contra *macis*, *juniperus* & *terebinthina*, dum balsamica vi renibus amississima urinam à corruptione praeservant, & suaveolentem reddunt, etiam *Lithiasis* suo modo sunt remedia.

ALTERATIO verò haec urinae PUTREDINALIS fit in renibus ab horum fermento alterato, plusq; minus enervato seu inerti reddito; quod sicuti in statu naturali constitutum promoveat urinae secretionem, & eà certo modo alterat, ita, si fermentum hoc in renibus fuerit praeternaturaliter alteratū & corruptū, ut deficiat in debita alteratione urinae, & sic degeneret & disponatur per renes colata urina ad praeternaturalem sui putredinem in renibus, fit, ut corruptione ejus sal volatile oleosum separetur, & cū acido praeternaturali concurrente tales affectus calculosi oriantur. *Lithiasis* ergò seu dispositio renum ad calculos consistit in fermento renū corrupto: ipsū verò ejus productū seu calculus fit ex sale volatili urinae, coagulato ab acido urinae, mediata alteratione urinae putredinali: unde quia difficulter corrigibile est hoc vitium, difficilis etiam est *Lithiasis* eradicatione. Ceterum fermentum hocce renū vitiosum in quo FUNDAMENTUM LITHIASIS consistit, est primitus acquisitū, nunc *visio diat.* ut ab asparago, aut similibus simplicibus diureticis, quae omnia urinā reddunt foetidam; unde fermentum renum labeficitur, atque, ut probabile videtur, occasione vitiosi acidi fermentativi ex primis viis, adeoq; vitio fermenti ventriculi sub urina potus, aut quocunque alio modo, ad renes transmissi, enervatur, nunc communicata *Lithia-*

*sis* seu transplantata, idq; vel à parentibus ad liberos, vel etiam cum lacte nutritis, quale exemplum *Lithiasis ex nutrice* contra habet HELMONTIUS *Traët. Infantis Nutritio ad vitam longam*; Sicut alià in vulgus notum est, *hereditarium* malum est *Lithiasis*.

Ex his patet, dispositionem quandam certam inesse renibus ad generandum calculum, salsumque esse dogma, quasi hi ex his vel aliis alteratis praecise generarentur; sub quacunque enim *dieta* in praedispositis oriuntur calculi, in nondispositis verò nulli, licet eodem nutrantur victu. Ponamus enim septem Individua, unum idemque alimentum & potum assummentia, ubi sanus ex alimento non generabit calculum; cuius autem renes in sermōto debili corrupti sunt, ex omni alimento in *Lithiasis* incidet. Interim tamen in dispositis est ratio alimentorum quaedam differentia; prout scilicet.

1. Eadem plus vel minus in primis viis acescunt; plus vel minus disponunt ad calculi generationem.

2. Prout magis vel minus eadem glutinosa sunt, eatenus quoque in dispositis plus minus duri generantur idē.

Hinc post *Lacticiam* & *caseosa*, similiaque assumpta, saepius reascuntur calculi, non quod materiam, quae facile in calculos abit, in se contineant, sed quoniam haec partim acido vitioso in primis viis facile corrumuntur, partim alcali terreo promptè in calculum coagulabili sunt imprægnata, & postmodum cum urina potus ad renes delata promptissime cum reliquis salibus coagulantur: vid. SALMUTH *Cent. 2. Obs. 97.* qui exemplum habet, ex abusu casei, calculi vesicae lethalis ad magnitudinem ovi gallinae concreti. Vina ratione salis acidi fixi magis praedisponunt ad calculum, quatenus magis acidum coagulabile continent.

Hoc modo producantur ex his CAUSIS OCCASIONALIBUS ut plurimum nunc *parvula* tantum *arenulae* & *granula* in renibus, in specie in pelvi, rarius massulas majusculas compingi arbitror; salia enim dum coeunt, minutissima granula constituunt, quae facile sunt solubilia, quae leione membranarum & pelvis, & transudatione succi nutritii aut sanguinis, accessione novarum in vicem conglutinatæ, tandem in maiores lapillos, nunc verò mox in majores & durissima saxea, monstra & tophos concreunt: adeo ut in confirmato etiam malo totum tenue parenchyma his ipsis in lapidem mutatum observatum fuerit, quin & non raro tota pelvis, omnesq; hinc producti tubuli lapideo tali concremento sparsim infarcti & repleti reperiuntur. Notatu dignum talis rei exemplum subministrat idem SALMUTH *Cent. 3. Obs. 30.* de calculo totam renum amborum cavitatem replente, & urinā per orbitam, quandam in lateribus calculi excavatam prodeunte. Arenulae autem istae seu calculi minores geniti velociter augmentum capiunt per ureteres in vesicam urinariam delapsi; vix enim continetur calculus primario in vesica; laesa autem plus minus pelvis, aut ureterum tunica nervosa, item ipsa etiam vesica attritu calculi nonnihil vitiatā plorant haec partes laesae nutrimentum suum proprium chylosum sub forma mucilaginis crassae ac spissae, quae ipsa mucilago postmodum una cum urina calculosorum excreta, interdum admodum copiosa, habetur vulgo pro pituita, ex qua per calorem arefacta calculi generantur. At falsò, cum, uti dixi, reverà sit alimentum vesicae proprium & ureterum, ex eorum laesione in vesicae cavum destillans, & ita excretum; quod praeter HELMONTIUM jam olim demonstravit JOUBERTUS in *Praxi*, ubi dicit, istum mucum esse partium nutrimentum, quod ipsum laese dimittant. Jam verò haec ipsa mucilago, uti aliquantum ejus subinde adheret calculo, ita saepe circa calculos parvos in vesica coacervatur, unde postmodum successivè supervenientibus salibus coagulabilibus, simul in coaguli consortium rapitur, & exinde calculi primum minimi oriuntur augmentum infigne. Nam isti vesicae calculi majores lamellatim concreti reperiuntur, seu in quibus instat ceptarum corticis, vel lapidis bezoar, vel lapidis ex folliculo bovis felleo, sibi mutuo incumbunt, qui ipsi cortices nil aliud sunt, quam talis mucus pedetentim coagulatus à salibus istis, mucum in coaguli consortium praecipitantibus. Idem centro parvus ordinariò lapillus, vel in vicem coagmentatae arenulae, ex renibus per ureteres eò delapsae reperiuntur, quae per succum nutritium, & alia ad calculi seu tophi apta accidentia successivè augentur & coagulantur; quod eleganter declarat BOYLE in *Philos. Experiment. Part. 2. pag. 29.* Simile reperiunt in BORELLO *Cent. 2. Obs. 62.* qui etiam observavit calculum vesicae, in quod infra nucleus lapideus invenit, qui arenulae instar ex renibus descendens in vesica exinde augmenta lamellatim acquisivit.



## DIAGNOSIS.

Quod attrinet signa calculi renum, aut etiam Vesicæ: calculi renalis aut vesicæ signa saltem sunt à posteriori, nempe symptomata, quæ ejus occasione superveniunt; in se enim non est morbus, licet morbosa symptomata inferat. Propterea Autores Præctici duo etiam distinguunt tempora in calculo, nempe in paroxysmo, & extra paroxysmum.

Adeoque symptomata sunt pauca vel nulla, dum calculus seu arenulæ sunt quiescentes in pelvi vel ureteribus, nisi quod dolor aliquis gravativus, si calculus major subsit, afficiat; si quidem calculi etiam insigniores subinde in renibus latent, absque ullo præternaturali symptomate; Confer. *M. A. N. C. ann. 4. Observat. 29. pag. 31. & 23. Observ. pag. 33.* Adeoque tunc tolerabile est tempus extra paroxysmum. Gravia verò & varia tunc sunt symptomata, dum calculus & arenulæ moventur, & ex renibus ad pelvim & ureteres, & hinc ad vesicam trahuntur, & tunc tempus est paroxysmi.

Symptomata omnia oriuntur ex attritu doloroso calculi ad membranas pelvis & ureteris, unde hæc spasmo correptæ & alias partes per consensum simili spasmo affici faciunt: propter quem consensum ratione nervorum renalium ex plexibus mesentericis derivatorum & vomitus & colica tormina supervenire solent; sicuti in mulieribus hysterice excitantur paroxysmi. Adeoque plurima ista & sæpe mira symptomata, quæ calculi aliosque dolores nephriticos insequuntur, partim ex spasmis variarum partium, partim ex retenta plus minus, & per metastasin aliorum translata urina, oriuntur.

Omnia autem hæc symptomata, quæ saltem ex dolorosa impressione dictarum partium originem ducunt, non sunt propria calculo, sed etiam aliis doloribus nephriticis ab alia causa & non præcisè à calculo natis, v. g. doloribus nephriticis Scorbuticorum, per acriora salia istas partes arrodentia natis, communia, ut & eandem originem habere solent: vid. & RIVERIVS *Praxi lib. 14. cap. 1.* & DRAWIZIVS *de Scorbuto cap. 9.* Quinimò post multiplicia per consensum pathemata tam facile symptomata nephritica, colica, hysterica, &c. confundi solent, adeo ut non pauca prostant exempla calculorum pro colicis per vero modo curatorum, ut inde cauti & accurati simus in signis.

Symptomata ergo, quæ in paroxysmo affligunt, sunt varia, ut etiam satis exercitatus Medicus fallatur. Imprimis quando calculus incipit moveri, oritur dolor acutus, modò intensior, modò remissior, in regione lumbari, minus tamen pungens; isque modò sinisterior, modò dexterior vergens, prout ren dexter vel sinister est affectus, ac proin raro dolor purior sentitur: simul & sensus & dolor gravativus, plus minus obtrusus, seu sensus ponderis gravantis & prementis in dictis locis adesse solet, adeo tamen molestus & cum tantis anxietatibus juctus, ut nec interdiu, nec noctu quiescere queant, dicantque ægri: esse ipsi, ac si centum pondo plumbi essent intergo; quo ipso explicant dolorem istum. Ubi verò movetur calculus ex reni pelvi ampliori in ureteres angustos, tunc dolor lancinans, lacerans, & molestissimè tensivus & pungens magis, excitatur, neque cessat, donec calculus ex uretere denud ad vesicæ cavum descenderit, aut ad renis cavum remearit. Simul notabile est quod refert BARTHOLINVS *Cent. 4. Epist. 6. pag. 27.* quod in Lithiasi interdum adsit hemigrænia, istius in specie lateris, cujus ren calculo est affectus.

Urina subinde variat, cum sub paroxysmo ingruente Urina pauca, acres tamen seu admodum stimulant, & aquosè minguntur. Subinde perfectè ejus suppressio sequitur, si sc. uterque ren simul afficiatur. Interdum, imò sæpius, urina apparet intensè rubra, crassa, ferè subruenta & quasi sanguine esset diluta, & quidem interdum revera est ex permixto pauco cruore & vulnere partium, seu laceratis vasculis, à calculi asperitate emanante, &c. Interdum tamen talis urina subrubra & quasi sanguinea, perspicua tamen est, absque sanguinis consortio; quin talis urina interdum subrubra, crassa sæpe fit à copiosis salibus resolutis, & cum urina una excretis, leni, ut alii vocant, tartaro resoluta (ex quorum coagulatione colliguntur arenulæ) quod frequenter fit in Scorbuto ac malo hypochondriaco. Non igitur terreatur Medicus, quod sit sanguinea, monente HORSTIO in *Observat.* Subinde imprimis, ubi calculus est in motu, aut etiam in calculo vesicæ, urina excernitur pallida, aut saltem parum tineta, cum copiosa materia crassa, viscida & glutinosa, in fundo matulæ hærente, & mediam urinæ partem subinde replente; quæ materia est nil aliud, quàm uterimentum proprium partium membranarum, pelvis, ureterum & vesicæ, à cal-

culo lassarum plus minus, & sic cum urina extravasatum: de quo vid. imprimis WILLISIVS *de urinis cap. 5. pag. 364. & 365.*

Interdum arenulæ quoque in calculosis cum urina excernuntur, quæ fundum matulæ petunt. Verùm subinde excernuntur etiam arenulæ similes in non calculosis, quæ frequentissimè sunt coloris rufi & sunt friabiles; non sunt arenulæ renales, sed sunt arenulæ hypochondriorum, seu salia coagulata scorbutica; si verò non sunt friabiles, sed duræ, & subinde grandiores, & quæ fundum saltem occupant matulæ, sunt arenulæ renales, & ad calculum disponentes.

Uterius in paroxysmo calculosi nō possunt se erigere, nec corpus incurvare; sub talibus symptomatibus stupor cruris, ex istius sc. regione affecti renis, frequenter est perceptibilis, ita ut si ren dexter soveat calculum, dextrum quoque crus stupeat, & contrà. Hoc tamen nun fit semper, sed in primo saltem calculi paroxysmo: qui non frequentius calculo laborant, minus solent crurum pathematis affligi. Percipitur etiam dolor tensivus, & quasi contractivus, ex regione lumborum per longitudinem ossis sacri deorsum usque, juxta os ileum, secundum ureterem ductum deorsum in regionem pubis & vesicæ terminans; unde etiam in viris similiter testiculus istius lateris, cuius ren est affectus, spasmo quodam correptus retrahitur sursum ad os pubis molestè & dolorosè; quod ipsum observetur pro dilucidando spasmo.

Interdum quoque Tenismus simul corripit ægros calculo renum laborantes; idque observavi in foemina, ac notat quoque TIMÆVS *von GuldenKlee in Epist. p. 242.*

Præterea superveniunt simul sub calculo renum anxietates precordiorum, nausea, appetitus dejectus, non raro difficilis respiratio, quasi cingulo cōstringerentur costæ inferiores, ita ut quidā asthma videantur laborare, cū tamen affectus nephriticus hoc symptomata inducat; idque in cōsensum renum & diaphragmatis non immeritò videtur rejicere SANCTORIVS in *Comment. in Art. parv. Galeni P. 2. Digress. 83. p. 994.* Item vomitus enormes subinde insequuntur motum calculi renalis. Imò convulsiones digitorum, brachiorum, pavores dormientium &c. subinde calculo renum supervenire observantur; dolorem quoque titillantem sentiunt in extremitatibus glaudis penis: vid. *Atl. Med. Hoffm. Vol. 4. p. 103.*

Frequentissima omnium symptomatum sunt tormina colica acerbissima, cum nausea & vomitu, ac similibus cognatis symptomatibus juncta, quæ sunt nil aliud, quàm tormina convulsiva, propter nervos in plexu mesenterico spasmo correptos, ad dictas partes, nempe renes, intestina & stomachum derivatos. Nervulis enim renalibus, qui in renibus dolorum sunt organa, ex dolore spasmo correptis, continuatur idem spasmus ad plexus mesenterii usque, qui simili spasmo affecti; plexus enim mesenterii surculos derivant ad stomachum & intestina, unde per consensum afficiuntur propter spasmus. Adeoque calculus renum in viris colicam convulsivam, in mulieribus pathemata hysterica dicta, inferre solet, ut etiam hæc nephritica colica exercitatissimos fallat Medicos. Imò in gravidis calculosis interdum dolores partus mentiri solet: vid. HOEFERVS: semper tanta patiuntur tormina, ut non recusent decies dolores partus sustinere. Pulsus est durus propter spasmus aut convulsivam contractionem fibrarum arteriarum.

Interim hæc symptomata non reperiuntur promiscuè in omnibus calculosis, sed modò hæc in hoc, alia in aliis, ac interdum urgent talia symptomata per consensum, nempe vomitus, dolores colici, passionēs hystericae, &c. antequam percipiant ægri ullum dolorem circa renes. Interdum colicam patiuntur, antequam calculus in renibus sentiat: vid. SENNERTVS *de Calculo Renum.* In specie stupor crurum innuit calculum.

Cæterum origo tam variorum symptomatum est saltem ex consensu, ratione connexionis renum cum aliis partibus per nervos & plexus. Notum enim est ex Anatomia nervorum, nervos renum oriri ex plexu mesenterii, qui oriuntur ex nervo paris vagi, & intercostali; unde vel uno nervulo renum spasmus convulso à calculo, alterius renis nervi spasmus convelluntur, qui semper continuantur ad plexum usque: hinc omnes nervi ex istis plexibus similiter convelluntur, adeoque colica illa convulsiva in calculo, frequens vomitus, retractiones testiculorum, tenismus, dolor quasi parturientium, qui sunt spasmi uteri & intestinorum, similiter ex hoc spasmis difficilis respiratio, & omnia reliqua symptomata spasmodica, per consensum nempe nervulorum deducenda sunt. Sic v.g. punctura nervi in brachio: dat convulsionem & spasmus brachii. Dum verò, quando calculus est quietus, nec



nec irritatur ren, nec convelluntur nervi renum, & omnia hæc symptomata, modò calculus sit in vesicam delapsus, vel excretus, cessant.

Probè ergo **DISTINGUENDA** pathemata calculi ab affectibus cognatis, in specie à colica per essentiam, & colica nephritica. Hoc ut citè fiat, observandum est, quod in colica nullus adhit pedis stupor; item quod in tali colica egri se possint erigere, cum illi, qui calculo renum laborant, ut plurimum incurvati sint, quasi palus per vertebrae esset transfixus, & non sine doloris exacerbatione spinam rectam extendere, & in rectam lineam flectere possint: id quod quasi primum diagnosticum. *Calicis dolor* sit subito, modò remittit, modò succedit, cum calculi renalis dolor ferè sit continuus. Et quidem imprimis locus doloris manifestat, an ex calculo, an ex alia causa sit? Nam junctus fixus dolor in dorso, calculum innuit, licet alia simul concurrant symptomata: nec in nephriticis talia murmura aut agitationes in intestinis concipiuntur, latque in colicis. Alia quoque urinarum est conditio. Dolor quoque vagus in abdomine modò auctorsum, modò retractorum, modò à dextris, modò à sinistris, colicam innuit. Plura huc facientia vid. in SENNERTO lib. 3. Prax. ubi de calculo Renum, RIVERIO, & DRAWIZIO de scorbuto pag. 9.

### PROGNOSIS.

Quod **PROGNOSIN** concernit: calculus renum morbus est gravis, & non tantum molestissimus ratione doloris atrocis, sed etiam admodum periculosus ratione symptomatum variorum, in specie quando inflammationes, interdum exulcerationes renum, vigilæ, febres, ischuria lethales, & gravissimi morbi nervosi generis, supervenire solent.

Et femina calculo renum frequenter laborantes, si gravidae reddantur, facile moriuntur, aut abortum patiuntur, vid. PANAROLLUS *Pentec. 3. obs. 8.*

Certè, quod majores aut asperiores calculi, eò res periculosior; & contrà quod minor & glabrius, eò minus periculosus. Pertinaciter renibus impactus, subinde ischuriam lethalem, aut epilepsiam tandem lethalem excitat.

Calculus renum si crebro affligit ægrum, Inflammationes certè, & has ordinariè sequentes exulcerationes renum insert: vid. M.A.N.C. *Ann. 1. obs. 16. & ann. 2. obs. 31.*

Calculo renum, si ad plures dies noctesque perseveret, neque ullis medicamentis cedat, superveniens frigidus extremorum, aut sudores frigidi, idque imprimis cum omnimoda urinae suppressione, mortem in propinquo innunt.

Et contrà si urinae tenues antea excretæ, emittuntur crassæ & turbidæ, ac in specie cum sabulo, arenulis, & quasi frustulis lapideis, bonum signum est comminuti quasi calculi & minus solidi.

Interdum certas quasi periodos observat calculus renum, cum, teste HELIDÆO PADUANO in *Observat. pag. 156.* si est motus in quarto, in septimo ut plurimum solet prodire, ceteris nempe paribus; si enim sit magnus, non valet. Sic typum tertianarium aliquando observavi in viro ex calculo nephritico, dum tertiâ quoque die à meridie dolores abdominis & lumborum spasmodici reverterentur, & per noctem durarent, donec spontè successivè remitterent.

Lethargus ex nephritide ut plurimum lethalis est.

An unquam curabilis scilicet ad calculum producendi dispositio, quam Lithiasin vocant, merito dubitatur, nisi forsan in primo statim principio eam observare contingat, qui tamen casus vix dabilis videtur. Minus tamen adhuc spei supererit illis, quibus affectus hic hæreditarius, aut cum ulcere renum contingit: vid. HIPPOCRATES *Aphorism. 6. Sect. 6.*

### CURA.

Cura calculi renum est vel in vel extra paroxysmum: IN PAROXYSMO habetur saltem respectus ad motum calculi præsentis, & inde nata symptomata spasmodica dolorosissima. Ergò ante omnia dolores & partium inde nati spasmi, & hinc ureterum contractura sistendæ; hinc quantum possibile calculus præsens diureticis blandis & appropriatis promovendus, (vid. LUDOVICI *Pharm. p. 449.*) vel specificis confringendus: idque quò citius, eò melius, ne sub mora intra corpus calculus incrementum nimium capiat. Sectio nem renalem à quibusdam jacturam habeo pro Non-Ente.

EXTRA PAROXYSMUM verò si absint calculi, respiciendum, ut præaveantur, ne denuò regenerentur; Si ve-

rd novè jam incipiant generari, si maturè Diureticorum ope efficiendi, antequam dolorem pariant, ne nimium incrementum capiant.

Ea autem, quæ in genere calculos efficiunt, sunt Diuretica quæcunque: Nam specialia calculum pellentia, ut sic, non dantur. Quæ enim pellunt, id faciunt vi diuretica, quatenus promovent urinae fluxum: aliud siquidem est pellere calculum, aliud comminuerè calculum.

Pro his scopis observandum:

I. Ut **DIURETICA**, aut Lithonriptica dicta, quocunque modo pellentia, imprimis fortiora, in principio fugiantur, dum urgent dolores & spasmi partium abdominis; quoniam malum exasperant; nec prius applicentur, antequam omnes dolores & spasmi cessarint, quia aliàs viæ attritu calculi irritatæ dolorificè crispatione vel contractione se angustant, & hinc malum exasperant: Si in statu fortioribus Diureticis violentius protrudatur calculus, crabrones irritantur; adeoque quò gravior dolor in paroxysmo est, eò minus aut mitiora adhibenda Diuretica. Saltem ergò in declinatione, sedato dolore, primis viis repurgatis, & acrimoniâ humorum nonnihil temperatâ, Diuretica, sed nonnisi temperata, nec sola, sed cum opiatâ mista, usurpanda sunt, ne calculus validè nimis commotus exacerbet paroxysmum. Simul, quantum possibile, artificiosè conjecturetur ex collectione circumstantiarum, calculi magnitudo, an sit hic major ureterum ductu, aut æqualis, aut minor? Si minor, tunc tutò in tantis symptomatis possumus usurpare Diuretica, opiatâ mista, ut citò ejiciatur: si æqualis, sedentur symptomata, & idoneis pellentibus maturè promoveantur, ne majus capiant incrementum, & postmodum difficilè per ureteres transeant. Quod si calculus major sit viis urinariis, ita ut elicere eundem sit impossibile, tunc cessandum ab omnibus pellentibus, quia impossibile est promovere, nisi prius confrigatur. Ergò infringendum, vel à re, seu impossibili, desistendum, cum **APERTIO perferrum CHIRURGICA**, si non impossibilis, saltem periculi plenissima sit. Verùm cum non semper conjecturando possit Medicus assequi, an parvus an magnus delitescat calculus? cum non rarò variis formis aut asperitatibus ludat, hinc tutissimum est, ut sedato dolore, tam internis quàm externis, præsens calculus per Diuretica, quantum possibile, promoveatur, cum quamdiu dolores continuant, tamdiu membranarum ac ureterum major contractura ac spasmus vigeat, à quo penitus calculo via intercluditur.

II. Quia præsentè calculo, ac doloribus nephriticis urgentibus, urina subinde acrior ac falsior observatur, à quo dolores exasperantur; ob id in paroxysmo simul talia administranda, quæ istam urinae acrimoniam tollere, & ita dolorem nonnihil imminuere possunt. Id quod faciunt omnia ea, quæ vulgò dicuntur emollire, viasque laxare in calculo; quod tamè per se est ridiculum: Nam si talia assumpta deberent laxare renes ac meatus urinarios, necessum esset laxaret prius stomachum & intestina, utpote quæ propriè attingunt. Talia autem sunt Emulsiones oleosæ, non quatenus laxant vias calculi, ut veteres dixerunt, quos Helmontius merito ridet, sed potius, quatenus acrimoniam urinae temperant & tollunt, inde natos dolores leniunt; quibus sopitis, crispationes & dolorifici spasmi meatum tolluntur, ac ita vel spontè ad debitam amplitudinem viæ antea arctatæ redeunt.

III. Cum symptomata colica, flatulentia & borborygmi, alvi obstructio plus minus, similiaque symptomata, in paroxysmis ægros admodum crucient, ob id opera danda est, ut primæ viæ à sordibus quibuscunque sint liberæ, ne hæ ipsæ concervatæ malum exasperent, adeoque Diuretica stent post principia. Ergò semper in principio & fine paroxysmi opera est danda, ut alvus laxa sit; aliàs colica & alià dicta pathemata abdominis insigniter exasperantur. Præsentè ergò calculo, & urgente paroxysmo doloroso nephritico, pro alvo aperienda nil æquè convenit, quàm blandus **CLYSTER**, aut emolliens aut anodynus, injectus, qui certè tempestivè adhibitus multum ad leniendum dolorem confert, & sæpè totum curationis negotium absolvit: vid. SCHENCKIUS *Observ. pag. 475.* Et quidem parantur ex lacte, urina, radicibus liliorum alborum, althææ, liquiritiæ, herba malvæ, violariæ, parietariæ, de qua vid. SIMON PAULI *Quadrupart. Botan. pag. 109.* Veronicæ, summitatibus anethi, floribus chamomillæ, meliloti, sambuci, semine foenu græci, oleo violarum, liliorum alborum, amygdalarum dulcium, Unguento clymatico, pinguedine caponis, cuniculi, butyro recenti, &c. Ubi



- 1.) Decocta simpliciora compositis magis præferenda; Decoctum v. g. chamomillæ, malvæ, parietariæ, violariæ, aut juxta CRATONEM veronicæ.
- (2) Ex lacte paratis male varia simplicia, præter dictam veronicam, aut flores chamomillæ nostratis, radicem althææ, &c. incoqui,
- (3.) Clysteres in minori quantitate esse iniciendos, præcipuis in prægnantibus ne mole sua premant, & dolorem augeant, diutius verò retineantur. vid. ZECCHIUS Conf. 50.

- (4) Si contumacior sit alvi obstructio, oleum dia-colocynthidis, & Eleotaria purgantia addere conveniet: item terebinthina, renibus & ureteribus grata; & si dolor aliquantum deservuerit, baccæ juniperi, sul volatile succini, similiaque Diuretica. Quin nudus Clyster ex urina saltem pueri conducit, vel cui semina carminativa incocta sunt, qui lenit dolorem & calculi motum blandè promoveat. Exempli gratia:

4. Herb. parietar. M. j.

Malva,

Violar. ana M. ʒ. ad M. j.

Flor. chamom.

Samb. ana p. ij. vel lii.

Rad. alth. ʒvj. ad ʒij.

Coqu. in f. q. urinae puer. vel feri lactis:

Colaturæ ʒvii. adde

Terebinth. cum vitello ovi sol. ʒij. ʒliij. vel ʒʒ.

Olei lil. alb. ʒʒ. ad ʒvi. & ʒj.

Scorpion. ʒj. ad ʒij.

M. pro Clysmate: S.

Clysmaleniens.

Cut etiam nitri antimoniatij ʒij. addi possunt:

Blandè abstergit, simulque non nihil stimulat renes acrimoniâ volatili, ut sub electione clysmatis irritetur calculus propter contiguum situm: Vel

4. Herb. violar.

Malva,

Parietar.

Flor. chamom. ana M. j.

Coqu. in f. q. urinae humanae:

Colaturæ adde

Olei lil. alb. ʒʒ.

Destillat. succini gutt. x.

M. pro clysmate: D. S. ut suprà.

4. Flor. chamomill. M. ij.

Herb. veron. M. j.

Rad. alth. ʒvj.

Liquirit. ʒʒ.

Coqu. in lacte vaccino;

In Colaturæ ʒvj. vel vij. dissolve

Elect. lenitiv. ʒj.

Terebinth. cum vitell. ovi solut. ʒʒ.

Olei lil. alb. ʒvj.

M. f. Enema emolliens. S.

Clyster emolliens.

4. Flor. chamomill. M. ij.

Herb. veron.

Cherfol. ana M. j.

Bacc. iunip. ʒj.

Sem. dauci ʒʒ.

Coqu. in f. q. urinae pueri;

In Colaturæ ʒʒ. dissolve

Terebinth. cum vitell. ovi. sol. ʒʒ.

Olei scorpion. ʒʒ.

Destillat. bacc. iunip. ʒʒ.

M. f. Enema magis diureticum: S.

Clyster calculum promovens.

4. Decoct. emollient.

Carminat. ana ʒij.

Terebinth. cum vitell. ovi diss. ʒj.

Olei destillat. terebinth. ʒʒ.

Misceantur pro Clysmate:

D. S. ut suprà.

4. Spec. emoll. M. ij.

Sal tartari ʒj.

Coqu. in f. q. aquæ;

Colaturæ ʒix. adde

Terebinth. cum vitell. ovi sol. ʒij.

M. f. Clysmata:

D. S. ut suprà.

4. Spec. emoll. M. i.

Bacc. iunip. ʒj.

Rad. liquirit. ʒʒ.

Coqu. cum f. q. aquæ;

Colaturæ ʒvii. adde

Elect. lenitiv. ʒʒ.

Terebinth. cum vitell. ovi sol. ʒij.

M. pro Clysmate:

D. S. ut suprà.

4. Decocti fl. chamom. ʒvi.

Urinae hum. ʒlii. adde

Olei destillat. terebinth. aliquot guttas.

M. f. Enema.

Aut si contumacior sit alvi obstructio:

4. Lact. bubul. vel decoct. flor. sambuci aut cham.

cum lacte ʒviii. ad ʒi. adde

Terebinth. cum vitell. ovi sol. ʒij. vel ʒlii. ad ʒʒ.

Mell. colat. vel rosac. ʒvj.

Misc. f. Enema pro una vel duabus vicibus applicandum.

D. S.

Clyster aperiens & calculum promovens.

4. Spec. carmin. M. ij.

Coqu. in urinae hum.

Colaturæ ʒvii. adde

Olei destillat. terebinth. ʒj.

Misc. fiat Clyster: S.

Ut antea.

4. Spec. emollient. M. iij.

Sem. quatuor calid. mai.

Sal. tartari an. ʒj.

Coq. in f. q. aquæ simplic.

Colaturæ ʒix. adde

Electuar. hiera cum agar ʒj.

Olei destillat. terebinth. ʒj.

Vitelli ovi. num. j.

M. pro Clystere: D. S. ut suprà.

4. Olei lini,

Rapar. an. ʒv.

M. pro Clystere:

D. S. ut suprà.

Addi etiam potest olei dia colocynth. ʒvj.

Post Clysmata dolorem & spasmus partium internarum longius leniunt INSESSUS ET FOMENTA, si nempe illidem insideat æger, ex vegetabilibus emollientibus, carminantibus, nervinis, nonnihil diureticis, vel sic dictis Lithontripticis parata. Sic quoque sufficere possunt Balnea aquæ tepidæ, quibus insideat aliquandiu æger; loco eorum tamen fieri potest Balneum medicatum ita:

4. Herb. malva,

Alth.

Parietar.

Mercurial. an. M. ij. vel liij.

Flor. chamom.

Sambuc. an. M. iij.

Bacc. iunip. ʒij. iij. ad ʒvj.

Sem. lini,

Fanugraci ana ʒliij.

Inclusa omnia duobus sacculis lineis decoqu. In aqua; Cui æger usque ad diaphragmatis regionem insideat. Dum verò insidet, observetur, ut dicti sacculi balneo incocti admoveantur regioni lumborum, & anteriori umbilicali regioni.

Vel

4. Herb. malva,

Alth.

Parietar. ana M. liij.

Summit. chamom. M. iv.

Sem. fanugraci ʒiv.

Bacc. iunip. ʒʒ.

Incis. & contus. D. S.

Herba contra dolores calculi.

Decocta tepido insideat æger. Vel

4. Herb. malva,

Parietar. ana M. liij.

Summit. aneth.

Flor. chamom.

Melilot. an. M. ij.

Rad. alth.

Lil. alb. an. ʒvi.

Sem. lini

Fanugr. ana ʒliij.

P. species pro Balneo.

D. S. ut antea.

4. Herb.



- ℥. *Herb. malva*,  
*Melliori*,  
*Flor. chamom.*  
*Sambuc. an. M. j. ad M. ii.*  
*Sem. lini*,  
*Fenugr. an. ℥j. vel ℥ij.*  
*Quatuor calid. mai. an. ℥℥.*

*Incisa & contusa M. f. Sacculi num. ij.*  
*D. S. ut ante.*

Qui calidi, vel siccī vel in lacte cocti, applicandi lumbis pro doloris sedatione. Vel

- ℥. *Herb. malva*,  
*Alth.*  
*Parietar.*  
*Flor. chamom.*  
*Sambuc. an. M. ii.*  
*Bacc. juniper. ℥vi.*

*Incisa & contusa includ. duobus sacculis.*  
*D. S. ut ante.*

Coquantur in aqua pro Balneo; sacculi admoveantur regioni lumborum & regioni anteriori umbilici, ut dolores & spasmī remittant.

Quibus verō displicent Balnea, his sufficiunt Fotus humidi cum sacculis instituti: e. g.

- ℥. *Herb. & flor. chamom.*  
*Salv.*  
*Serpilli, ana M. i.*  
*Bacc. iuniper. ℥ii.*  
*Sem. anisi.*

*Anethi an. ℥℥.*  
*Incis. includ. saccul. No. i.*

*D. S.*  
*Fotus leniens.*

- ℥. *Herb. charesfol.*  
*Parietar.*  
*Flor. sambuc.*  
*Chamom. an. M. i.*  
*Sem. lini ℥i.*

*Fiant Sacculi aut Fotus.*  
*D. S. ut ante.*

Præterea cum his Fotibus & Balneis blanda Diuretica, interdum calculus nonnihil stimulantia, usurpanda, ut scilicet sub istis fomentationibus calculus simul promoveatur per urerem nonnihil flaccidum.

Post Balnea, vel etiam sine his, conducunt inunctiones externæ ad emolliendas partes & spasmos ureterum sistendos, doloresque leniendos, quæ sunt ex emollientibus suaviter laxantibus & lenientibus: quibus interdum penetrationis gratiâ addenda sunt olea quædam destillata, partim nervina, propter partes membranaceas in & circa renes spasmō affectas, partim diuretica, ut blandè promoveantur urina & calculus, cum oleo amygdalarum dulcium, papaveris, hyoscyami, chamomillæ, scorpionum, liliorum alborum, unguento dialthæ, medulla cervina, pinguedine asferina, oleo spicæ, petrae albo, baccarum juniperi, succini, terebinthina, camphoræ. Sic v. g. fiat Linimentum emolliens:

- ℥. *Ungu. dialth.*  
*Olei scorp. vel express. sem. hyosc. ℥ii.*  
*M. in Linimento: S.*  
*Unguentum leniens.*

- ℥. *Ungu. dialth. ℥iii.*  
*Olei amygd. amar.*  
*Scorpion. an. ℥i℥.*  
*Petrol. ℥ii.*  
*M. pro Linimento.*  
*D. S. ut ante.*

Cum his crebrius locus dolens circa lumbos, regionem umbilici, addomen, & ductum ureterum illinatur; potest etiam illiniri regioni umbilicali. Additur huic compositioni merito petroleum, quod merito à PANAROLLO Part. 2. Qbs. 2. ceu externum remedium nobile mirè commendatur, & calculus imminuere creditur, ubi tamen sufficit, si modò promoveat eum: e. g.

- ℥. *Petrol. alb. ℥ii.*  
*Olei iuniperini vel terebinth. ℥i.*  
*M. D. S.*  
*Oleum calculum promovens.*  
 ℥. *Ungu. dialth. ℥iii.*  
*Olei scorpion. ℥ii.*  
*Terebinth. ℥j.*

*M. pro Linimento: S.*

*Unguentum calculum promovens.*

- ℥. *Ungu. dialth. ℥i.*  
*Olei petrae alb. ℥ii.*  
*Misc. pro Linimento:*  
*D. S. ut ante.*  
*Etiam ℥. olei spicæ*  
*addi potest.*

- ℥. *Ungu. popul. ℥i.*  
*Olei scorpion. ℥ii.*  
*M. D. S. ut ante.*

- ℥. *Olei lil. alb.*  
*Chamom. an. ℥ii.*  
*Petrol. alb. ℥℥.*  
*Ol. destillat. spicæ,*  
*Bacc. iunip. an. ℥i.*  
*M. pro usu externo: S.*  
*Oleum leniens, & promovens.*

- ℥. *Ungu. dialth. vel anodyn. ℥℥.*  
*Olei amygdal. dulc. ℥ii. (vel huius & lil. alb. ana ℥i.)*  
*Scorpion. ℥i℥.*  
*Petrol. alb. ℥i.*

*M. pro Linimento: S.*  
*Unguentum leniens, & promovens.*  
*Addi pro lubitu potest*

- Olei destillat. bacc. iuniper. ℥℥.*  
 ℥. *Ol. amygd. amar.*  
*Chamom.*  
*Lil. alb.*  
*Scorpion. ana ℥ii.*  
*Petra alb. ℥iii.*  
*Destillat. spicæ.*  
*Bacc. iunip. an. ℥i℥.*

*M. D. S.*  
*Oleum ut ante.*

- ℥. *Olei amygd. amar. ℥i.*  
*Pingued. gallin. ℥vi.*  
*Petrol. alb. ℥i.*  
*Ol. destillat. bacc. iuniperi ℥℥.*  
*M. f. Linimentum: S.*  
*Unguentum ut supra.*

- ℥. *Olei petrae alb. ℥iii.*  
*Papav. expr. ℥℥.*  
*Hyoscyami expr. ℥℥.*  
*M. pro Linimento anodyno:*  
*D. S. ut ante.*

- ℥. *Ol. papav. rec. express. ℥℥.*  
*Hyosc. expr. ℥j.*  
*Destillat. succin.*  
*Macis an. ℥℥.*

- M. S.*  
*Oleum dolores sedans.*  
 ℥. *Ol. petrae alb. ℥i℥.*  
*Sem. papav. vel hyosc. expr. ℥i.*  
*Destillat. succini ℥℥.*  
*M. D. S.*  
*Oleum leniens.*

- ℥. *Ungu. dialth. ℥i.*  
*Ol. petrae alb. ℥iii.*  
*Iuniperi ℥i.*  
*Ess. opii ℥℥.*  
*M. S.*

- Unguentum leniens.*  
 ℥. *Ungu. dialth. vel servi cerv. ℥i.*  
*Olei petr. alb. ℥iii.*  
*Destillat. iunip.*  
*Camphora an. gutt. xx.*

*Opii ℥i.*  
*M. D. S.*  
*Unguentum leniens & calculum promovens.*

- ℥. *Ungu. nervin. ℥iii.*  
*Olei express. hyoscyami ℥i.*  
*Destillat. terebinth.*  
*Iuniperi ana ℥℥.*

- M. S. ut ante.*  
 ℥. *Ungu. dialth. ℥i℥.*  
*Olei lil. alb.*  
*Amygd. dulc. an. ℥℥.*  
*Scorpion. ℥iii.*  
*Petrae albæ ℥i℥.*



Destillat. juniperi ℥℥.

M. D. S.

Unguentum dolores sedans.

SCHARFIO lib. 1. de usu juniperi pag. 282. in usu fuit sequens:

℥. Olei scorp.

Melilot.

Chamom. an. ℥ij.

Amygd. amar.

Arill. cynosbati an. ℥℥.

Ol. terebinth.

Juniper. an. ℥j.

Petrol. alb. ℥℥.

Misc.

℥. Ol. amygd. dulc. ℥℥.

Destillat. succini ℥℥.

M. D. S.

Oleum leniens.

℥. Picis communis ℥℥.

Subige cum f. q. butyri non saliti in consistentiam

Unguenti. S.

Unguentum leniens.

℥. Ungu. di. albh. ℥j.

Ol. lil. alb.

Amygd. dulc.

Hyoscyami expr. an. ℥ij.

Scorpion. ℥℥.

Succini ℥℥.

M. f. Linimentum.

D. S. ut antè.

Pertinent etiam huc Linimenta Memb. anteced. ubi de ischu-  
ria Renali, præscripta: Vel

℥. Ungu. rosat. camph. q. v.

adde

Laud. opiati q. f.

M. f. Linimentum:

D. S. ut supra.

Pertinet huc unguentum nephriticum Mynsichtel, & ejus  
anodynum; item unguentum hoc, quod commendat  
CRATO:

℥. Unguent. rosac. ℥℥.

Ol. amygd. amar.

Scorpion. simpl. an. ℥vj.

Amygd. dulc. ℥℥.

M. f. Unguentum.

Quin etiam dictis unguentis oleum camphoræ convenienter  
addi potest, vel genuinum, vel per dissolutionem campho-  
ræ in oleo amygdalarum dulcium paratum, quod est egre-  
gium: Nam camphora peculiarem vim diureticam, paucis  
notam, obrinet. Addi etiam post oleum destillatum cumi-  
ni, oleum destillatum baccarum juniperi, oleum terebin-  
thinæ, cæu remedia nervina, admodum grata: Item oleum  
destillatum succini quoque addi solet; sed quia est nimis pe-  
netrans & diureticum, metus est, ne exasperet dolorem.  
Similia ergo Linimenta crebrius usurpentur, illinendo re-  
gioni lumbari vel umbilicali. Juxta hæc conducit Empla-  
strum de melliloto, cum oleo chamomill. & anethi malax.  
addendo oleum cumini, & petrol. regioni lumborum appli-  
catum bene confert: Vel

℥. Empl. nervin.

Tacamah. an. ℥j.

Bals. Peruv. ℥ij.

M. pro Emplastro.

Extendatur super alutam in forma quadrata:

D. S.

Emplastrum leniens.

Item si renum calor intensior, preparatur Cataplasma Cra-  
conis, quod hic maxime commendat, ex cancris fluviatili-  
bus eorumque succo, subactis cum oleis blandè emollienti-  
bus: vid. CRATO lib. 1. Conf. 17. Nempè

℥. Cancr. fluviat. nu. x.

quos contusos coquit in lacte, & succum fortiter exprimit:

addit

Medullæ panis albi ℥ij.

Vitell. ovor. No. iii.

Butyri rec.

Olei chamom. an. ℥i.

Croci ℥℥.

Misc. pro cataplasmate applicando.

Sicuti & BRUNNERUS simile Cataplasma ex cancris  
contusis cum malva, raphano & parietaria, pro leniendo  
Ætremull. Oper. Tom. II.

dolore, & eodem nonnihil moderando, subactum, regioni  
renum applicatum admodum commendat in paroxysmo ne-  
phritico, de quo vid. SENNERTUS pag. 814. Item cata-  
plasma ex medulla panis albi cum lacte. Hujusmodi Litus  
crebrò renoventur calidi super imponendo postmodum sac-  
culos, aut etiam post balnea eadem illiniri solent.

Cum his & similibus externis, etiam INTERNIS malis  
prospiciendum: & quidem, ubi dolor est remissior, aut non-  
nihil placatus, (haud citius, vid. RIVERIUS Pr. lib. 14.  
cap. 1.) primæ viæ repurgatæ, & acrimonia humorum tem-  
perata, blanda tunc diuretica conveniunt, qualia sunt tin-  
ctura nephritica, spiritus carminativus de tribus, spiritus  
nitri dulcis, &c. de quibus infra, cum aliis internis usur-  
pentur. Interdum ergo in principio convenit blanda aliqua  
LAXATIO, primas vias abstergens, respiciendo tamen  
simul nonnihil renes, & modicè calculi excretionem irri-  
tando: v. g.

℥. Tartari vitriolat. gr. xij. ad xv.

Salis genist. gr. iij. iv. v. vel vi.

Scamm. rosat. gr. iij. vel iv.

Olei destillat. juniperi, vel terebinth. gutt. i.

M. f. Pulvis in principio paroxysmi assumendus: S.

Pulvis aperitivus.

℥. Arcan. dupl. gr. xii.

Scamm. præp. gr. iij.

M. f. pulvis: S.

Pulvis laxativus.

℥. Corall. rub. præp.

Maxill. lucy pisc. an. ℥℥.

Auri fulm. gr. v.

M. f. Pulvis.

D. S. ut antè.

Detur in jusculo calido.

℥. Rad. albh. ℥iii.

Helleb. nigr. ℥i.

Zingib. gr. xii.

Tartar. vitriolat. gr. xvi.

Coqu. in f. q. aquæ;

Rhabarb. elect. ℥℥. ad ℥ii.

Colaturæ adhuc calidæ infundatur per noctem in loco calido

Manè iterum colet. & addatur

Syrupi domest. ℥ii.

M. D. S.

Potio laxativa.

℥. Pass. min. conquis. ℥ii.

Ebull. in f. q. aquæ simpl.

Colaturæ ferventi infunde per noctem

Fol. senn. sine stip. ℥℥.

Crem. tartar. ℥℥.

Manè bulliat paulatim

Colatura D. S.

Potio laxans aperitiva.

℥. Syr. de cichor. cum rhab.

Spina cerv. an. ℥℥.

Scamm. præp. gr. iv.

Aqua Ononid. ℥ij.

M. D. S.

Succus laxans aperitivus.

℥. Passul. min. laxat. ℥℥.

Lapill. cancr. præp.

Arcan. dupl. an. gr. v.

M. S.

Passula laxativa.

In specie etiam pro tali scopo conveniunt imprimis Te-  
rebinthinata in principio, alvum simul moderatè laxan-  
tia, & simul renibus calculosis insigniter conducentia:  
hinc pilulæ ex terebinthina cum rhabarbaro usitatissimæ  
in principio affectus præscribuntur; rhabarbarum enim à  
PARACELSO singulariter æstimatur. Item sunt emul-  
siones ex terebinthina, de quibus heri dixi, aut sunt pilulæ  
de terebinthina Mynsichti præscribendo à ℥℥. ad ℥ij.  
pro dosi: Item Catharticum terebinthinatum Mynsich-  
ti. Nam certum est, quod terebinthinata insigniter con-  
veniant in nephritide: sic enim FORESTUS lib. 24.  
Observat. 20. observat Matronam calculo renum & mor-  
bo articulari affectam, quæ imprimis terebinthinæ usu  
fuit curata: item FONTANUS in Consil. & Res-  
pons. pag. 116. refert septuagenarium dolore nephritico  
diu excruciatum, qui tandem usu terebinthinæ Venetæ  
ejectione 4. lapidum fuit curatus. In quem finem tere-  
binthina leniter inspissata in pilulas redigi potest, ita ut  
Oo lingu-



ſingulo ꝑi. vel ꝑß. gr. iij. vel iv. ſcammonii ſimul permifceantur; quæ ipſæ ita paratæ pro doſi in vehiculo aſſumptæ, in principio paroxyſmi ſunt egregiæ: e.g.

Ꝓ. Terebinth. coſt. ꝑß.  
Tartari vitriolat. gr. vi.  
Scamm. præp. gr. iij.  
M. f. pilulæ: S.  
Pilula laxativa.

Vel ſiant pilulæ ex terebinthina, ſuccino & Rhabarbaro à PARACELSO laudatæ: vid. HOEFERUS in Herc. Med. pag. 175.

Ꝓ. Terebinth. pur. ꝑi.  
Rhabarb. pulverif. ꝑi. ad ꝑi.  
Succini præp. ꝑß.  
Cinnam. ꝑß.  
cum f. q. Olei terebinth. f. Pilulæ pro aliquot doſibus.  
Ꝓ. Maſſa pilular. de tereb. cum rhabarb. gr. xvi.  
Tartari vitriolat. gr. vi.  
Troch. alband. gr. ii.  
F. Pilulæ: D. S. ut ſuprà.  
Vel

Ꝓ. Maſſa pilular. de amm. gr. xv.  
Tartari vitriolat. gr. v.  
Extracti troch. alband. gr. i.  
cum eſſent. mentb. f. Pilulæ.  
D. S.

Pilula laxativa.

Nam purgantia fortiora nullo modo conveniunt in principio affectus calculoſi.

Sic etiam convenit Emulſio ſeminis violarum nephrocathartica, cum aqua veronica, aut cum alia aqua appropriata, in ſpecie bedere terreſtris, cuius ſupra membro Antec. de Iſchuria mentio facta; quæ ipſa reverà poteſt dici nephrocathartica: præſcribitur à ꝑi. ad ꝑi. in principio. paroxyſmi nephritici: Cui propter doloris rationem & papaverina ſimul addi poſſunt; e.g.

Ꝓ. Sem. violar. ꝑi. vel ꝑß.  
Mili ſolis.  
Papav. albi an. ꝑi. ad ꝑi.  
cum f. q. aqua alkekeng. vel mentbæ, vel fragor. vel veron.  
f. Emulſio ad ꝑi. vel iv.  
adde  
Aque cinamom. ꝑi. vel ꝑi. ad ꝑi.  
Lapill. percar. præp. vel caneror. præp. ꝑi. vel  
ꝑi. ad ꝑi.  
Sacchari parum. M. D. S.  
Emulſio nephrocathartica.  
Ꝓ. Amygd. dulc. ambror.  
Sem. melon. an. ꝑi.  
Violar. purp. ꝑß.  
cum f. q. aqua mentbæ & fragor. f. Emulſio ad ꝑi.  
adde  
Lap. percar. præp. ꝑi.  
Sacch. parum. M. S.

Emulſio aperitiva pro aliquot vicibus

Conf. M. A. N. C. Ann. 6. Obſ. 102.

Evacuatis ita primis viis, & ſublatis impedimentis, dum adhuc urget dolor, & hæreat calculus, propinanda talia, quæ, quantum poſſibile eſt, dolorem tollere poſſunt: Vel

Ꝓ. Olei amygd. dulc. rec. expreſſ. ꝑi.  
Deſtillat. macis ꝑß.  
M. S.

Oleum lenitivum.

Cum quibustamen ſimul ad acrimoniam humorum temperandam reſpectus habendus. OPIATA ergo conducunt, ſed appropriatis miſta, in ſpecie ubi urgent graviora ſymptomata, ac proinde proſtat Eſſentia urinaria anodyna D. Michaelis, ex Vegetabilibus ſc. diureticis cum ana opii & ſalt. tartari, quibus aqua aſſunditur: ſtint in digeſtione, deinde evaporatur & ſuperfunditur ſpiritus vini: Item accipiatur Malvaticum iuniperinum cum eſſentia opii miſtum, de quo cochleatim hauriatur ad ſiſtendos dolores, & mitigandum paroxyſmum.  
Vel

Ꝓ. Lapill. caner. præp. ꝑi.  
Cinnab. antimonii vel nat. (propter ſpaſmos part. internarum) ꝑß.  
Laud. opiat. gr. i. vel ii. (vel pulv. anodyn. Lu. dov. gr. iij.)  
M. f. Pulvis: S.  
Pulvis lenitivus.

Detur pro doſi in graviore paroxyſmo.

De his vid. in ſpecie LUDOVICI in Pharm. pag. 449. & Colleg. Pharmaceus. in Ludovic. Vel ad imitationem WEDELII:

Ꝓ. Lapill. caner. præp.  
Sperm. ceti an. ꝑi.  
Sal. volat. ſuccin. gr. v.  
Laud. opiat. gr. j. vel ij.  
M. f. Pulvis;  
D. S. ut ſuprà.  
Ꝓ. Lapill. percar. præp. ꝑß.  
Cinnab. antimonii,  
Sal. volat. ſucc. an. gr. xij.  
Laud. opiat. gr. iij. ad v.  
Miſc. pro ꝑ. doſibus.  
D. S. ut ſuprà.

Ꝓ. Aqua petroſel.  
Alkekengi an. ꝑi.  
Eſſ. opii ꝑi.  
Syr. de alb. Fern. ꝑi.  
M. S.

Miſtura dolorem ſedans.

In uſu Opiatorum ſimul cauſi, ne liſdem abutamur.

Ꝓ. Tinctura baſſ. Peruv. vel capivi cum tinctura tartari par. ꝑi.  
Eſſent. opii ꝑß. M. D. S.  
Tinctura calculum leniens.  
Dentur 40. guttæ pro doſi.

Ꝓ. Tinctura tartari acerr. vel compoſ. vel rhabarb. tartariſ.

Spiritus carminat. de trib. an. ꝑi.  
Eſſent. opii tartariſ. ꝑi.  
M. S. ut antè.

Ꝓ. Milleped. viv. No. xij.  
Contunde cum Tinct. tart. acerr. ꝑi.  
filtratæ adde  
Eſſ. opii ꝑi. M. S. ut ſuprà.  
Doſis 30. vel 40. guttæ.

Ꝓ. Olei deſtillat. terebinth.  
Bacc. iunip.  
Eſſ. opii an. ꝑß.  
M. S.

Oleum calculum promovens pro aliquot vicibus.

Ubi vomitus ſimul & ſingultus.

Ꝓ. Extr. acori veri gr. xvi.  
Caſtor. vel Zedoar. gr. iv.  
Laud. hyſſer. gr. i. vel vi.  
cum oleo terebinth. f. Pilulæ: S.  
Pilula ſtomachales & calculum lenientes.  
Ꝓ. Aqua mentb.  
Meliff. cum vino,  
Cinnam.  
Carbunc. an. ꝑß.  
Spiritus corblear. ꝑi.  
Tartari vitriolat. ꝑi.  
Laud. opiat. gr. ii. vel iij.  
Syrup. cori. aurant. ꝑß.  
M. D. S.

Miſtura ſtomachalis & calculum leniens corbleatim ſumenda.

Ꝓ. Aqua fragor.  
Alkekengi an. ꝑi.  
Cinnam. ꝑi.  
Lap. caner. ꝑi.  
Teſt. ovor. calcin. ꝑi.  
Nuri depur. ꝑß.  
Laud. opiat. gr. ii. vel iij.  
Syr. de alb. Fern. ꝑi.  
M. S. ut ſuprà.

Ꝓ. Lap. percar. præp. ꝑi.  
Pulv. epilept. antimonial. gr. iij.  
M. pro pulvere:  
Div. in 2. part. æqual. S.  
Pulvis leniens.

Ꝓ. Lap. caner. præp. vel corall. rub. præp. ꝑi.  
Auri diaphor. gr. xv.  
Campb. gr. ii.

M. pro pulvere:  
Divid. in 2. part. æqual. S.  
Pulvis leniens contra calculum.

Ꝓ. Corall. rub. præp.  
Lap. percar. præp. an. gr. xiv.  
Auri diaphor. gr. xij.

Campb.



*Camp h. gr. liij.*

Misc. pro pulvere:

Div. in 2. part. æqu. S.  
ut antea.

24. *Corall. r. præp.*

*Lap. percar. præp. an. 36.*

*Salis genist. gr. iv. M. S.*

*Pulvis sedans.*

24. *Tacamach. part. ij.*

*Bals. Peruv. part. j.*

E. Emplastrum stomachale in forma usitata absque  
sindone: S.

*Emplastrum stomachale.*

Mulier quædam, aliàs nephritica, conquerebatur ali-  
quandiu de appetitu prostrato, cum carnis nausea & potus  
consueti fastidio, adeo ut spem conceptionis conceperit: sed  
post supervenientem mensium fluxumprehendunt eam ac-  
cerbi dolores in lumbis lancinantes, & ad pubem usque ex-  
currentes, cum calicrum tremore, qualis aliàs puerperis  
sub partus labore accidere solet, & ita summo quasi partu-  
riendi conatu nihil aliud, quàm mucosa viscida summo cum  
dolore, unà cum urina, exernebat, ita ut quoties urinam  
emitteret, mucosum tale quid unà eliminaret: stimulus pro  
urina admodum erat frequens; dum exernebat, dolorem  
dictum percipiebat, & etiam, dum non exernebat, subin-  
de excretorios istos quasi puerperiales experiebat conatus;  
urina emissa erat minus tincta, aliquantisper turbida cum  
sedimento copioso viscido, albido, non tamen purulento.  
Judicabam, malum esse nephriticum, natum primitus oc-  
casione calculi renalis, & inde productæ erosionis in pelvi  
membranacea; unde idem calculus ulterius progrediendo  
afflictus suo læserit plus minus vesicæ collum; quo factum  
fuit, ut non solum dictarum partium degener nutrimentum  
chylosum tam copiosi muci speciem suggesserit, sed etiam  
imprimis irritatione vesicæ dolorosi excretorii conatus su-  
pervenerint: ob id pro abstergendis his locis & mitigandis  
symptomatis, præmissis Clysmate:

24. *Aqua cherefol.*

*Alkekeng. an. 36.*

*Aceti vini 3ij. ad 36.*

*Lapill. cancr. præp. 3i.*

*Laud. opiat. gr. iii.*

*Syr. heder. terr. 3vj. Misc.*

Capiebat cochlearim, quod factum cum euphoria, & sym-  
ptomata lumborum maximam partem levata fuerunt. Hinc  
pro istis scopis præscripsi:

24. *Massa pilular. de terebinth. simpl. 3ij.*

Div. in 2. part. æqu.

Cepit, benè habuit, symptomata plerumque evanue-  
runt: sed nixus vesicæ excretorius subinde rediit, calculo  
nempe in vesica existente, utut mucosa materia multum  
imminueretur, ne tamen forsan exulceratio colli vesicæ su-  
perveneret, præscripsi:

24. *Essent. hyper. 3ij.*

Dabam pro una dosi.

Aqua tamen nullam utilitatem percepit. Ob id balsamo  
sulphuristerebinthinato, uti jubebam: sed antequam hunc  
assumeret calculus oblongus cum urina unà emittebatur,  
unde levamen insigne in omnibus. Pariter tribus ab hinc die-  
bus cum continuatus fuisset balsami usus, adhuc alius, sed  
minor, calculus prodie, post cujus excretionem adhuc  
muci aliquantulum reiectum fuit, sed quod brevi cessavit.  
Pro reliquis ergo nephriticis removendis spiritum sal. am-  
moniaci aliquandiu continuavit, qui ipsi optime contulit.

Oleum amygdalarum dulcium, vel cum vel sine lapide  
percarum, & syrupo de althea Fernellii, (quod nonnulli  
etiam cum succo citri aut limonum miscent) similiter in usu  
est. Emulsio ex amygdalis dulcibus, & seminibus dictis  
quatuor frigidis majoribus, violarum, nucleis persicorum,  
& similibus, quibus lapides percarum, aut lapilli cancrorum  
addi solent, subinde in hoc casu in usu sunt, quæ hauriuntur  
ad dolorem leniendum, & blandè urinam ciendam; porissi-  
mum si hujus Emulsioni aliquid papaveris albi hujus syrupi,  
aut Laudani opiat. addatur; Nam hæc Narcotica spasmis  
renum horumque meatuum non tantum medentur, sed so-  
mnium inducendo spiritibus robur addunt, hinc excretionem  
calculi insigniter juvant: vid. HOFFMANNI M. M.  
pag. 437. & DECKERS Exerc. Pract. pag. 636. Item deco-  
cta emollientia, simulque anodyna, blandè temperantia,  
& urinam pellentia, quorum formulam vid. in BARBET-  
TE Praxi, ubi de *Dolore nephrit.* Ad imitationem hujus  
Ettmull. Oper. Tom. II.

24. *Rad. alth. 3j.*

*Liquirit. 3ij. vel 36.*

*Herb. malva M. j.*

*Sem. violar. 36. vel 3vj. ad 36.*

*Coqu. in l. q. Decoct. hord.*

*Colaturæ 36. ad 36. adde*

*Syrup. papav. albi vel errat. 36. ad 36.*  
(vel de iunib.)

*Violar. an. 36.)*

*Lapill. cancr. præp. 3i.*

M. D. S.

*Potio lenitiva urinam pellens.*

Inflar omnium etiam hic convenit Decoctum expertum FO-  
RESTI, quod præscribit lib. 24. Obs. 26. 28. & 29. & descri-  
ptum prostat in SENNERTO lib. 3. Prax. ubi de *Calculo*  
*Renum*, pag. 812. quo Decocto curavit virum desperatè *sup-*  
*pressionem urinae ex calculo renis sinistri ureteri impacto labo-*  
*rantem cum intensissimis doloribus, summa virium prostra-*  
*tione, & cum jam per sex dies ne guttulam quidem urinae*  
*emississet, usurpato hoc Decocto Foresti, urina confestim*  
*emanavit, lapilli cum imperu protrusi, & æger curatus fuit.*  
Præscriptio est hæc:

24. *Sem. malva,*

*Alth. an. 3ij. ad 36.*

*Cicer. rub. 3ij.*

*Quatuor frigid. mai. an. 3ij.*

*Hordci 3ij.*

*Caric. pingv. No. viij.*

*Sebesten No. vij.*

*Rad. liquirit. ras. 3vj.*

*Coqu. in aquæ 36. ad dimidiæ partis consumptionem.*

Sicuti Decoctum non incongruum à ZWELFFERO  
correctum videb. in *Pharmacop. Reg. pag. 89.*

Ad imitationem ergo hujus similia Composita possunt pa-  
rari.

Addi simul possunt Decocto huic certe proportione vel  
*bacca juniperi*, vel semen hyperici, aut semen dauci, vel si-  
milis, quæ istud magis appropriatum reddere valent. De-  
coctum *florum chamomille* singulariter excellit in paroxysmo  
nephritico (vid. SIMON PAULI *Quad. Botan. pag. 255.*)  
& veronicæ, quod CRATO l. a. extollit. Item hujus loci  
est Decoctum *nymphæ*, quo nihil promptius ad ureterum  
contracturam laxandam & dolorem placandum in paroxys-  
mo nephritico à TACHENIO *Hippoc. Chym. cap. 14. pag.*  
*97. Edit. 2. extollitur.* Præterea non incongruum est consi-  
lium TIMÆI von Gulden-Klee, jubentis, ut omni hau-  
stui Decocti cuiusdam addantur aliquot guttæ spiritus salis  
dulcis communis cum huius vis egregiè sit diuretica. Sanè  
spiritus salis extremo igne prolectus, adeoque acido-salsus,  
singularis est ad promovendum & refringendum calculum:  
vid. TACHENIUS l. a. nisi inflammatio atque erosio par-  
tium subit; loco eius tamen & spiritum nitri à Sylvio tanti  
æstimatum, utrumque vel simplicem, vel dulcem, com-  
modè potius usurparem, qui magis est diureticus. R H U-  
MELIUS recipit spiritum salis, miscet cum sale volatili suc-  
cini, coagulati in formam crystallinam, & potentissimum  
est Nephriticum diureticum.

Quibus ita peractis, si imminuatur dolor, & calculus ul-  
terius promoveatur, res benè est: Ubi verò, sicut doloribus  
aliquis pathematis plus minus placatis, calculus vel in re-  
nibus, vel ureteribus, vel vesica, adhuc hæret, fiat acces-  
sus ad ea, quæ diuresi blanda & specificè urinam promovere  
possunt; aut, si grandior, propinanda ea erunt, quæ lapil-  
lum, quantum possibile, diffringere valent, ut ita contra-  
ctus & comminutus eo commodius possit propelli.

Substituimus heri in Cura, quæ pertinet ad calculum, &  
dictum fuit, in paroxysmo esse efficiendum, ut calculus  
promoveatur, minimè tamen molestià, unde tam internis  
quàm externis dolor demulcendus: Et his factis propinanda,  
quæ vi diuretica pollent, & simul cum urina pellunt calcu-  
lum; aut loco horum dentur simul lithonotriptica seu calcu-  
lum frangentia. In horum tamen usu hoc observandum, ut  
ubi ad tempus frustra adhibita fuerint medicamenta, subsi-  
statur, & quæsi seriè permittantur naturæ, ne illo usu nimio  
plus, quàm par est, ad renes moveantur cruditates. Curiosa  
est hoc in loco *Observ. EPIPHANII Ferdinandi Hist. 54.* ubi  
dicit, inviolabili lege observandum esse, ut quandoque à re-  
medii abstineamus, dum refert exemplum doloris nephriti-  
ci, in quo post novem dies & noctes plura remedia propinata  
& applicata absque ullo usu & effectu: sed cum postmodum per  
10. & 11. quies naturæ fuisset relicta, hæc ipsa sponte sua sub fine

O o

unde-



undecimi plures calculos rejiciendo, agrum liberavit, DIURETICA hujusmodi usurpantur in specie in paroxysmo calculoso, sub introitu balnei: vid. RIVIERIUS l. a.; ut dum hujus usu relaxantur viæ & demulcentur dolores; illorum ratione melius promoveatur calculus: Sicut etiam blandus motus corporis calculi descensum ex renibus promovere, qui aliàs a gaudio in exitu promovetur, amara vero vel terrore retardatur: Conf. Aët. Med. Hassniens. Vol. 3. pag. 33. Sunt qui vomitum eundem in finem commendant, sed non sine notabili molestia & periculo: vid. BARTHOLINUS Epist. 55. Cautius quoque Diureticis utendum, si mihius cruentos combinetur, præprimis calidioribus & aromaticis, habebuntque tunc potius locum Terrea & Emollientia blandiora: Commendat eundem in finem FORTIS C. 3. Conf. 95. Theriac vitriolatas adstringentes æquæ ac calculum promovere: Ast non ubique teriarum hæc præstò sunt.

Diureticis tamen talibus longè præferenda sunt LITHONTRIPTICA propriè dicta, seu calculos ipsos confringentia remedia, de quorum existentia multi dubitant, speciatim SYLVATICUS in Conf. & PANAROLLUS in observ. aliique magni nominis Medici: sed ordinariò Chymix ignari, sanè ridere eos, qui dicunt calculum in corpore humano simul compactum iterum posse dissolvi vel in minores particulas diffingi. Et sanè res non caret scrupulo, utut simpliciter non neganda, licet rara sint, sublimiora talia remedia, quæ reverà calculum confringunt.

Difficultatis ratio prima, ob quam impossibilis videtur calculi solutio, est: quia est concretum terreo-salsum, ex duobus salibus, alcali & acido volatilibus, firmissimo tamen nexu junctis, oriundum, intercedente substantià quadam terrea firmiter coagulante, adeoque nec acida nec alcalia eum dissolvere possunt, quia calculus ex utrisque est saturatus, & tanquam ex ambobus compositus, unde difficile videtur reperiri tale menstruum, quod concretum tale salsum adeò firmum, aequaliter de acido & urinoso participans, in corpore comminuat & dissolvat, utpote cum talia Concreta se æqualiter misceant mensuris acidis & urinosis, neque tamen ab ullo possint perfectè dissolvi. Necesse ergo est, ut remedium calculum frangens ita sit constitutum, ut ferè de utroque, acido nempe & alcali, participet, ut ita concretum tale salsum penetrare, & istud amica sua vi denuo blandè, & ita quasi liquesciendo, resolvere possit.

Secunda difficultas est, quod posito, talia remedia & Menstrua reperiri, quæ extra corpus solvant calculum; hæc ipsa tamen longo isto transitu, donec ad calculum perveniant, in vi sua lithontripica non parum infringantur. Unde errant, qui calculos humanos excretos certis & variis liquoribus infundunt, expectantur, quis liquor citius & felicius calculum dissolvat, ut postmodum eodem liquore & intus propinato eundem effectum in renibus & vesica obtineant. Hæc enim præconcepit hypothesis est removenda, quia est falsissima. Nam longè aliud est dissolvere calculum extra corpus, quàm in corpore. Et utut talia extra corpus in calculum operentur, in corpore tamen sunt languida; quia talia Lithontripica, in primis viis, in stomacho & intestinis, bilis & succi pancreatici subsali, vel acidi tactu, ut & intermediis locis, ac denique in renibus ab urina insigniter alterantur, necessariò alteram novam acquirunt naturam seu texturam, indeque alterata & imbecilla vim diffringendi calculum omninò exuunt, quod ipsum interdum verissimum est experientia comprobante. Ut taceam, non ejusdem duritie compaginis in omnibus Nephriticis videri calculos, quin subinde molitum variant duritie, firmitate, ac similibus plùs minus proprietatibus. Cæterum expertum est ex omnibus vulgaribus mensuris hæcenus tentatis, spiritum nitri maximam habere vim in calculo, vel comminundo, vel friabilem reddendo, & quasi mollificando. Ergo remedium illud lithontripicum, necesse sit tale, quod istà insigni alteratione in primis viis intactum, adhuc maximam partem integrum transeat ad vias priurias, ibidemque calculum concretum imminuat.

Tertia Difficultas est, quod remedium lithontripicum, quod calculum, utpote concretum durum, dissolvere valet, non debeat esse corrosivum, sed quod citra stomachi, intestinorum, & aliorum locorum noxam possit propinari; cum hæc ipsæ partes sint longè molliores, & facilius dissolvantur, quàm concretum calculi, partesque attritu calculi antea plus minus læsæ ab acrioribus remediis admodum lædantur, indeque dolores aliaque pathemata exasperentur. Verùm hoc ingenii phantasma est nullius momenti, cum nitatur falsà hypothesis, quasi calculus non esset dissolubilis, nisi per corrosionem, adeoque unum ex mensurorum requisitis sit, ut

corrosivitate gaudeant. Male autem ad corrosivitatem in calculum frangentibus respicitur; Corrosio enim est respectus saltem tributus rebus ratione gustus, adeoque planè accidentarium consequens; siquidem etiam reverà dantur menstrua plus minus insipida, aut planè non aut parùm corrosiva, quæ tamen validissima etiam concreta diffingunt. Nil dicam de Rore Maiali, & ex hoc ritè parato menstruo minus acri, quod tamen magnam vim habet resoluendi & diffingendi corpora. Notum est de aqua Laurembergii, in qua aurum injectum ita soluebatur, ut penitus instar cere liqueceret. Similiter de mensuris solventibus Chymiatrochim res clara est, quæ licet ferè insipida sint, efficaciam tamen suam in Mineralium solutione probant. Et Dominus BOYLE in Philosophia Experimentalis, & de Origine formæ reflat, se habere tale menstruum ferè insipidum, æqualiter tam cum acidis, quàm liquoribus alcalinis, sine effervescencia & ulla alteratione ac immutatione miscibile; id quod innuit, quod de utroque participet: quod ipsum tamen menstruum insipidum, etiam aquas fortes subinde virtute superat (scilicet ex basi viridis aris, & sale ammoniaco conficitur) ut taceam Mercurium vivum sub amalgamatione auri & argenti hæc ipsa aliaque metalla in minimas partes dissolvere, utut ipse sit insipidus: adeo, ut corrosivitas mensuri naturam non definiat.

Quid igitur est, quod maxime considerandum in mensuris dissolventibus? Respondetur: consideretur proportio ista formalis, quæ est inter particulas mensuri solventis, & particulas, ac poros corporis solvendi, ut hinc utriusque corporis particule mutuo nexu se invicem jungere valeant: si enim particule istæ mensuri ita sunt figuratæ seu conformatæ, ut exactè respondeant porulis corporis, prompta & cita fit solutio; si verò hæc duo nullo modo conveniunt, aut nullam habeant convenientiam aut proportionem requisitam, frustra est spes solutionis.

Proportio ista materialiter originem ducit ex convenientia seu identitate in radice & essentia: hinc dicunt: menstrua debent esse homogenea cum rebus dissolvendis. Hinc concreta sulphurea per menstrua sulphurea, salina per menstrua salina & aquea, optimè solvuntur; id est, requisitus in mensuris particularibus certa quædam habitudo ad ipsam rem solvendam: vid. BECHERUS in Phys. subterr. lib. 1. pag. 399. WILLISIUS de Fermentatione pag. 63. Hinc v.g. aqua solvit saccharum, alumen, vitriolum, & similia, quæ non dissolvit spiritus vini, & contra serum, ceram, bitumen, succinum, terebinthinam, & similia subjecta, licet molliora quàm vel alumen vel vitriolum & similia, aqua non dissolvit. Spiritus vini probè rectificatus dissolvit succinum & omnia corpora resinosa, quæ non resolvuntur ab aqua; nihilominus tamen spiritus vini hic probè rectificatus non attingit saccharum, neque sal commune. Porò aqua fortis, seu spiritus nitri rectificatus, dissolvit lunam atque metalla, sed non aurum, aut lignum, aut ceram aut piecem: Huic aquæ fortis si injiciatur aliquid salis ammoniaci, tunc promptè solvet aurum, sed non attingit amplius lunam. Hic videmus, quod aqua v.g. quoniam ejus particule facillimè se insinuant in poros corporum salinorum, etiam promptè eadem corpora salina dissolvat: iam verò, quoniam plinguium poruli rotundi & cavernosi in cera, bitumine, succino, &c. ita sunt confirmati, ut particule aqueæ extrinsecus quidem lambere, sed ipsos poros intrare nequeant, propterea etiam corpora talia oleosa pinguiora non dissolvuntur ab aqueis. Minutissimè & contra spiritus vini particule etiam durum succinum intrare, ac in istud se insinuare possunt, adeoque etiam in elegantissimam tincturam dissolvere; quæ particule spiritus vini improporionate saccharo molli, idem relinquunt. Hinc est, quod solus salis communis aut sal ammoniaci mixtura cum aqua fortis fiat aqua regia, seu menstruum pro solvendo auro, ita, ut non amplius attingat lunam, ob discrepantiam scilicet radicalem cum mensuris; ista enim adjectione salis particule mensuræ ita fuerunt immutatæ, & ex adhesionem & conjunctionem mutua taliter reddite figuratæ, ut promptè aurum ingredi, nullo verò modo lunam subintrare possint.

Ex his patet, omninò dari menstrua, quæ intactis stomacho & intestinis calculum in renibus attingunt, & eundem dissolvunt; dispar enim est ratio: ut taceam, gustum male corrosivitatis indicium exhibere. Multa enim nobis insipida & dulcia videntur, quæ in se admodum acria, & plus minus corrosiva, ut arsenicum, Mercurius vita, sulphur antimonii, Mercurius virgatus, &c. Lingua v.g. ineptus index est mensurorum. Ut taceam acria, & respectu certorum corporum acerrima, nobis & ventriculo potro esse innocua, nec nisi in objectum



objectum appropriatum agere: v. g. sicut videmus in aceto, quod solvit corticem testaceum lapideum ovorum durum, substratam verò membranam tenuem aut mollem non attingit, copiose à nobis etiam assumptum in stomacho est innocuum. Si itaque ista concreta terrea, nempe corallia & testæ ovi, dissolvantur ab aceto, integrâ tenui membranâ manente quidni etiam possit dissolvi à medicamento menstruocalculus, ut utillud stomachum non attingat. Sic cantharides acrimoniam suam circa renes & vesicam saltem explicant, ea exulcerando, quæ tamen stomacho, quem immoderate ingrediuntur, intestinis & aliis partibus sunt innoxie. Ergo præter hoc, quod dentur Menstrua insipida, attendenda etiam est varietas menstruorum, quæ non simpliciter in corrosivitate, sed in particularum ejus textura, materia & conformatione mechanica consistit. Unde nullum dubium est, dari posse talia remedia, quæ instar menstrui, citra notabilem gustus acerbitatē, partim ex sui textura, partim ex admixtione variorum succorū nostri corporis promptè calculos renales in corpore aggregi, eorum poros penetrare, & particulas unitas instar cancrorū diffringere aut comminuerē possint; eaq; imprimis ex prosapia salina, ut id concretū calculi salinū subtiliter penetrent & dissolvant. Unde non ad corrosivitatē in specie respiciendum est in remediis calculum frangentibus. Confirmant hoc observationes quædam calculorum in corpore dissolutorum. Nihil dicam de PARACELSI & HELMONTII Ludo, quia, cum rarus sit, & neuter possit ostendi, apud incredulos non merebitur fidem. Sed urgeo saltem, quod persicaria & succus betulæ, item semen danci sint, quibus experimenta ad calculum frangendum destinata, quorum frequenti ac continuato usu calculum eomminui observatum fuerit. Hinc enim Dn. BOYLE in *Philosophia experimentali* aliquot exempla refert, per solum danci semen frantum fuisse renum calculum. Sic persicaria quoque secretum est quorundam Anglorum, AUGENII, & LAUREMBERGII, contra renum calculum, quod ejus aqua diutius continuata calculum ita comminuerit, ut frustulatim ipse fuerit ejectus. Experimentum etiam ad calculum vesicæ imminuendum sunt millepedes, de quibus infra dicam. Hæc nullo modo sunt corrosiva, tantum acris volatilia. Sic ipse quoque amicum, Medicinæ Doctorem, Diefidæ novi, qui spiritum instar sal. ammoniaci ex tartaro habet volatilem insignem, mediante quo crebro usurpato, aliquoties renum calculos fellei experimento intra corpus comminutos, frustulorum parvorum formâ successivè expulit. sal. simi columbini benè præparatum, uti postmodum habebimus, & ipsum observatum fuit, aliquando dissolvisse calculum, & frustulatim eundem ejecisse. Reverà ergo dantur Lithontripica, modò præparare studeamus tales liquores, vel talia Menstrua, quæ assumpta citra violentiam calculi ponisse insinuare, eodem permeare, & ita coagulum ejus subtiliter solvere possint. Observanda tamen hic est sedulo diversitas calculorum in duritie, de qua supra; unde & aliqualis varietas tam in ipsis remediis, quàm eorundem effectibus circa calculi dissolutionem, observanda erit. Quædam enim sunt potentiora & magis universalis, quædam verò magis particularia & imbecilliora, quæ saltem quosdam calculos, & in quibusdam tantum subjectis, possunt dissolvere, quos in aliis subjectis intactos relinquunt.

Sed talia vera Lithontripica reverà sunt rara & paucā. Sufficit, ut loco horum in paroxysmo calculi, sedatis maximam partem paroxysmi doloribus et gravioribus symptomatibus, Diuretica plus minus acris aut fortia appropriata, sed malè Lithontripica dicta quibusdam, in usum adhibeantur, quæ partim in paroxysmo, partim extra paroxysmum ad præservationem possunt inservire; sive in præservationis negotio operentur acidum absorbendo, ut Testacea, Lapides minerales & animales; sive vi diuretica renes & loca urinaria abstergendo, ut omnia raphanacea, liquor betulæ, &c. seu balsamica vi fermentum renum conservando, ut Juniperina, Terebinthinata, &c. DIURETICA talia à quibusdam, malè licet Lithontripica dicta, sunt multiplicia: & quidem ex Vegetabilibus herba & radix liquoritæ, radix fœniculi, petroselinii, pimpinellæ, lapathi majoris, apii, baccæ juniperi, radix rubiæ tinctorum, eryngii, bardanæ majoris, ononidis, cujus essentiam egregiè Lithontripicam vid. in *Colleg. Pharmaceut. in Schræderi Pharmacop. Medico-chym. P. 1. in Regno Vegetab. pag. 86. De semine bardanæ in M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 122. & ann. 6. Obs. 102. Imprimis omnia raphanorum genera, sale acris diuretico prædita, conveniunt; Nam Raphanacea non tantum præservant à calculo abstergendo renes, sed etiam calculi geniti excretionem diuresi fortiter promouunt. Oper. Tom. II.*

movent; hinc infusum eorum cum spiritu vini TACHENIUS 1. a. commendat: ac præ cæteris raphanus sorbicularis prodest. Certè decantatus succus raphani ad ℥ij. mistus cum ana vini Malvatici à TIMÆO von Gulden-klee laudatur. Eminet hæc inter radices armoraciæ, quæ vino infusa recens, & aliquoties hausta, volatili suo sale renes abstergendo à calculo præservat, eundem verò præsentem fortiter pellit. Alii insuper armoraciæ, tam radicem quàm folia incisa, infundunt vino, & vase clauso per quatuordecim dies in cella relinquunt, quem liquorem per alembicum destillatum ad calculum promovendum hinc mirè commendant. Interim tamen ejusmodi remedia allata acriora non semper æquè tuta sunt, cum ardores renum in illis soleant intendere, qui aliàs istdem vexantur. Usurpentur autem talia Diuretica præmissis, ut dixi, præmittendis, tam internis primas vias respicientibus, & symptomata mitigantibus, quàm externis anodynemollientibus. Commodè etiam propinantur sub introitum balnei, ut eò commodius tunc operari queant. Pertinet huc porro hederæ terrestris, item capillus veneris, cherefolium, parietaria, fragaria, & veronica, de cujus Decocto & aqua destillata vid. M. A. N. C. Ann. 1. Obs. 107. p. 245. & CRATO in *Consil.* folia quercus tenella, agrimonia, &c. Conveniunt etiam cepæ & allium, præsertim ejus capita, quæ sale volatili acris penetrantè diuretico, tam acidum, calculi coagulatorem, corrigunt, quàm renes abstergunt, eorumque fermentum ad calculum disponens suo modo alterant. Hinc multis non incongruè in usum positum est singulis noviluniis capitulum, vel aliquot saltem allii dentes, 6. 7. 8. 9. &c. minutim conscindere, & in aquæ seu spiritus baccarum juniperi cochleari uno vel altero, vel spiritu vini haurire, ad præservationem & curationem calculi, cujus remediis efficaciam laudat Bartholinus in *Epist. Medicinalibus* Medicus quidam seu optimum experimentum contra calculum venditavit sequens:

24. Herb. heder. terr. sicc. M. j. vel ij.

Capitul. allii No. j. ij. vel iij.

Discerpantur in frustula, affundatur

Spiritus vini ℥ij.

Stent per dies & noctes aliquot probè clausa, deinde agitati & probè colati liquoris detur cochlear j. vel ij. pro præservatione singulis pleniluniis & noviluniis; hoc enim certissimè præservare, & continuato usu calculum curare asserit.

Corticis avellanarum interiores etiam laudantur. Abrotani pulverem cum nitro SIMON PAULI *Quadrip. Botan. pag. 183.* extollit. Huc pertinet & Fraxinus, in quo, imprimis semine, non contemnenda est vis contra calculum, præsertim in oleo destillato ac sale volatili seminis fraxini; hinc etiam in ejusdem cortice interloze; quæ singulariter laudantur à GLAUBERO *Conf. Al. Anglic. No. 43.* Hinc non inelegans est hoc oleum lithontripicum ad modum balsamicum & potens, quod contra Lithiasin alii conficiunt, & tanquam secretum in calculo renum commendant.

24. Cort. rad. frax. inter. ℥ij.

Bacc. junip. rec. ℥ij.

Terebinth. ℥ij. ad ℥ij.

Terenda terantur, & cum terebinthina misceantur, & in ℥xii. aquæ in vase obturato in digestionem vel putredinem ponantur per tres menses, postmodum destillantur leni igne, ut dent oleum potentissimum, cuius guttæ viij. vel x. in vino albo capiendæ, mirè conducere dicuntur tam præservando quàm curando calculo.

Porrò laudantur baccæ juniperi, hederæ arboreæ, ciceres rubri, fructus alrerengi & avellane, quarum egregiam efficaciam expertus est AMATUS LUSITANUS in *Cent. Cynosbati cocti* seu conditi commendantur: vid. UNZERUS de calc. p. 965. & BORELLUS *Cent. 3. Obser. 22.* Item horum arilli & oleum inde expressum, & spongia, quæ simul anodyna est: vid. CRATO lib. 6. *Conf. 83.* & SIMON PAULI *Quadrip. Botan. pag. 65. & 57.* Præter dicta flores genistæ, vngæ aureæ, item flores cyani & calceatrippæ, semen mili folii, in specie semina hyperici, dauci & cymini, vulgaria quidem remedia, sed optima Nephritica, & plus habent in recessu. In hyperici semine res est clara, quod manu contritum & contusum terebinthinam spiret & sapiat; iam autem nota est vis terebinthinæ contra calculum. Convenit ergo cum ea, tam vi balsamica, quàm diuretica; unde ZAPATA in *Clave Med. cap. 10.* mirabiliter extollit ad præservandum calculum sequens *Electuarium*:

24. Pulv. hyperic. ex sem. in Julio vel Autumno collect. & exsicc. ℥ij.

Sacc. vel conf. ros. vel viol. vel rob. junip. ℥i. ad ℥ij.

Oo 3

Misc.



Misc. fiat EleQuarium.

Dosis est ꝑ. omni septimana semel vel bis pro circumstantiarum ratione, tribus ante prandium horis usurpandum.

Laudetur quoque hoc ipsum tam præservationis quam curationis tempore ab EPIPHANIO FERDINANDO tanquam experitissimum, *Hist. Med.* 54. De dauco & semine eius quantum in calculo valeat, imprimis vid. HELMONTIUS *Tract. de Lithiasi*, ubi experimentis & rationibus comprobatur ejus vim antinephriticam; & Angli partim ad præservationem, partim ad curationem paroxysmi nephritici frequenter utuntur hoc semine, tam in substantia, quam, ut moris est, in cerevisia Medicata, addendo cerevisiæ, dum fermentare incipit, dauci semen contusum, ita, ut fermentando recludatur à cerevisia, & vis lithontripctica imbibatur; hæc enim ratione per talem cerevisiam nephriticam multum præstant in curando & præcavendo calculo, quod ipse novi. Conf. BOYLE in *Philos. Experiment. De junipero*, ejusque baccis & Lignis, item de *Lignonephritico* Indiarum Orientalis, res per se nota est, quid hoc in casu præstent? ex quibus paratum Decoctum vel infusum potenter calculosos resistit, uti videre potestis in SENNERTO, ubi de calculo, item in scriptoribus illis, qui scripserunt de exoticis, in specie in BAUHINO. Gummi cerasorum solutum in vino, vel sub forma pilularum instar terebinthinatæ propinatum egregie præservat & pellit calculum. Item in *Persicaria* acris saporis multa latitare contra calculum, apud omnes in confesso est, cujus aqua distillata in Balneo Mariæ, & aliquoties à recenti planta cobobata, experimentum est quorundam Anglorum contra renum calculum, cujus potu se præservant, quod pluribus explicat BOYLE l. a. *Succus citri* aut *Limonum* ad ꝑ. cum vini malvarici ꝑ. ad exturbandum calculum non iniuriâ à TIMÆO von Gulden-klee, aliisque laudatur; sicut succus parietariæ & veronicæ, item rob juniperi, rob cynosbati, & ex his paratum Malvaticum juniperinum, aut cynosbatinum; non secus ac succus seu aqua betula, mense Martio collecta ex ramis tenellis betulae, non trunco, & instar acidularum gradatim potata, elegantissimum & decantatissimum est contra calculi pathemata: de quo vid. HELMONTINS *Tract. de Lithiasi cap. 8.* ubi videtur egregia de succo betulae, & egregiam cerevisiam medicatam contra calculum. Post HELMONTIUM cum etiam commendant CHARLETON de *Spiritu Gorgonio seu calculo* pag. 179. BARTHOLINUS in *At. Med. Hafnienf.* P. 1. *Observ.* 19. pag. 49. BOYLE *Philos. Experim.* Tom. 1. pag. 102. Item de cerevisia Medicata cum betula vid. *Colleg. Pharm.* in SCHROEDERI, *Pharmacop. Medico-Chim.* Part. 1. *Seç.* 1. pag. 21. KERGERUS de *Ferment.* pag. 178. *M. A. N. C. Ann.* 2. *Obs.* 155. pag. 278. & *Ann.* 4. *Obs.* 231. pag. 276. Ex his aliisque quamplurimis vegetabilibus fiunt vulgò *Essentia* & *Extracta*, nephritica dicta, composita, imprimis ex hyperico, baccis alkekengi, parietaria, cynosbato, allio, hedera terrestris, baccis juniperi, veronica & similibus, cum spiritu haccarum alkekengi, glomorum cynosbati, vel spiritus vini tartarifato parata: quibus pro lubitu opium addendum venit, ut eò majorem vim anodynâ possideant.

Nec prætereundum est atcanum contra calculum TIMÆI von Gulden-klee, in l. 3. *Epist.* 32. tale:

ꝑ. *Nenafira* (h. e. anserin.)

Calendis Mali ante Solis exortum  
colleçt. M. viij.

*Leface* (fecale) virid. M. iv.

Exprime ex his succum:

adde

Vini rubri ad pondus omnium:

Misce, & filtra.

Exhibeantur quotannis primo, secundo & tertio die Mali in aurora ꝑ. vij. purgato prius corpore. Agitur ob sal volatile nitrosum anserinæ, & Sal volatile roris majalis, quo ante solis ortum herbae imprægnantur.

Porro pertinent huc etiam salia, tam alcalia quam salia, in specie nitri, & quæ nitrosæ sunt profapiz, ad calculos solvendo, & vi diuretica promovendo. optima: speciatim tamen excellunt hic salia ex dictis vegetabilibus diureticis parata, ut sal genistæ, sal spiritum fabarum, sal ononidis, stercoris columbini; & in specie omnibus his meliora sal volatile succini & sal urinæ egregia sunt diuretica antinephritica. Nitrum fixum, & omnium maxime spiritus nitri dulcis, nobilia sunt remedia, quæ multum obriunt in Cura calculi: & imprimis stercus columbinum nitro feracissimum; item lac caprinum, lotium capra, ut & aliorum animalium stercora & lotia pro-

pier sal nitrosum in ipsis contentum, ad calculosos affectus sunt perquam usitata. De qua vi, vel efficacia stercoris columbini, præter communem Autorum consensum, in specie vid. FORESTUS lib. 24. *Obs.* 25. in *Schol.* Hinc recipiunt quidam stercus columbinum, moderatè calcinant, & sal exinde nitrosum in vino acidulo propinant ceu nobile diureticum; uti & alii recipiunt stercus columbinum, istudque macerant in aceto per diem, & noctem, postea filtrant: Aceti hujus ꝑ. ij. addunt mellis depur. part. j. miscent & propinant ceu probatissimum remedium contra calculum POLEMANNI sal Lithontripctici recipit etiam nitrum; cujus præscriptio est hæc:

ꝑ. Nitri purissimi ꝑ. ij.

Fluat in igne, injiciendo deluper frustum sulphuris communis magnitudine fabæ, quod deflagrato aliud superinjice, donec hujus sulphuris ꝑ. absumpta sit: Ubi omnia resfrixerint, ac denuò pulverisata fuerint, denuò eodem modo procedatur, atque hoc tertiâ vice repetatur, semper successive sulphuris ad ꝑ. adiciendo. Jam

ꝑ. Nitri ita præp.

Salis absint. b. an. ꝑ. ij.

Succini ꝑ. 36.

Sacch. albi ꝑ. 71.

Olei destillat. succin. Div.

Misc. pro pulvere.

De hoc dosis, quantum tres cultelli cuspides capiunt, propinetur unâ vice, bis, ter vel quater in die, pro circumstantiarum variatione. Omnem laburram ex partibus urinariis evertit, & calculum recentem comminuit.

Hiscæ etiam addatur sal compositum, quod in paroxysmo nephritico ad sistendum dolorem nephriticum & promovendum calculum est egregium, cujus præparatio hæc est:

Fiat sal fixum ex nitro mediantibus carbonibus:

Hoc nitrum exponatur aeri, ut liquecat ad pulvis consistentiam saltem: Huic affundatur

Olei vitrioli rubri ana;

Et facta ebullitione, & eadem cessante abstrahatur liquor ex retorta forti igne, & remanebit sal candidum subacidum; quod ipsum præter usum singularem nephriticum etiam ali-quid singulare obtinebit in usu Pharmaceutico & Alchimistico in puncto solutionis corporum.

Porro præter dicta salia nitrosa, vi nephritica etiam innotuerunt hæcenus ipsi lapides tam minerales, quam animales, ad pellendos & præservandos calculos, unde v. g. Lapis Judaicus, lapis lyncis, lapis spongia, lapis nephriticus, lapides seu oculi cancrorum, lapis in vesica apri seu bovis re-pertus, mandibulae lucii piscis, dentes trutarum, lapides percarum, carponum, aquilæ, item testæ ovorum, maxime struthionis, &c. præcellunt in calculo curando. Verum hæc ipsa raro per se solent convenire, sed acidum, calculi coagulatorem, in corpore peccans saltem absorbendo, acrimoniam feri urinarii in paroxysmo temperant, ac mutatione sui saporis in salum tertium, vim diureticam egregie acquirunt. Melius est, si dissolvantur cum spiritu salis composito, ex sale communi & sale ammoniaco parato. De ovibus struthionum cum spiritu salis solutis, vid. TACHENIUS l. a. Dant liquorem nephriticum salum præstantem. In pelliculas mucilaginosas spiritus salis testas ovorum solvit, quæ pelliculæ urinosi saporis sunt. Si his autem pelliculis additur sal fixum, præcipitat se pulvis quod probat, pelliculis his adhuc acidum adfuisse. Faciunt huc Liquores nephritici disti, ex hisce lapidibus parati, quibusdam in usu, pro varietate Autorum varii: v. g.

ꝑ. Lapill. cancr.

Lapid. Judaic.

Lyncis,

Spongia,

Aquila,

Glac. Mariae an. qu. v.

Solvantur in spiritu salis decrepitati rite destillato (id est, ultimo ignis gradu elicit) vel spiritu salis compos. Solutio saporis adstrictorii decantatur, filtratur, coagulatur leni calore in vitro ad siccitatem. Materia hæc siccata iterum pulverisanda, & hinc in cella per deliquium dissolvenda, filtranda, & ita pro usu asservanda.

Liquor hic salsus elegans diureticus ad 20. vel 30. guttulas in declinatione paroxysmi nephritici ad eliminandum calculum in vino frequenter propinatur, pellit calculum per urinam instar massæ coagulatae, seu massæ crassioris. Alias calculus ex selle bovis desumptus & pulverisatus, ad gr. v. assumptus, admodum probatum contra calculum dicitur remedium; nam spiritu salis fit ita diureticus, & insigniter expel-



expellens. In canceris fluviatilibus singularis latet vis antinephritica ratione virtutis diureticæ, quæ in alcali eorum latet, unde Decoctum cancerorum fluviatilium ovulis prægnantium egregiè ad curandum & præservandum commendatur calculum. Item

#### 24. Cancr. fluviat.

Coqu. in vino in olla probè obturata tamdiu, donec pulverisari possint.

Hujus pulveris ʒj. propinata aliquot desperato calculo laborantes, & incredibiliter ejulantes restituit, atque hoc certum est.

De calculo humano vid. Colleg. Pharmaceut. in Schraderi Pharmacop. Part. 1. Sect. 2. cap. 8. Dosis ʒj. ad ʒj. urinam pellit. Quibusdam hinc accedit superstitio, quod proprios calculos devoratos præservare à calculo dicunt. Promovent quidem urinam, sed curativè & præservativè nil valent.

Dictis modò Lapidibus vicariè sunt testæ ovorum, & quidem testis ovorum communibus meliores sunt testæ ovorum, ex quibus exclusi sunt pulli: omnium optima sunt oua struthionum. Unde etiam testæ ovorum struthionum ingredi simul solent liquorem nephriticum. Aliàs etiam testæ ovorum calcinatæ à multis laudantur. In specie BARTHO-LINUS multa habet de virtute testarum ovorum calcinarum contra calculum in Hist. Anatom. imprimis in Cent. 4. Epist. pag. 451. & 526. refert aquam nephriticam Decoctio-nistalis calcis testarum ovorum mirè prodesse, & in specie aquam calcis ostreorum ad calculum in mucilaganem dissol-vendum, multum prodesse refert. Nam ovorum testæ, uti & Marina testacea, calcinando in corpus instar calcis vivæ abeunt, cujus calcis vivæ lixivium ad calculum in paroxys-mo promovendum est laudatum. Sanè in ipsa calce viva vul-gari singularis vis antinephritica residet, unde & spiritus cal-cis vivæ Basilii ritè paratus seu singularissimum calculum frangens laudatur; loco cujus sal ex calce viva cum sale am-moniac calcinando & elixivando paratum commodè sub-stitui potest. Unde etiam ex calce viva cum tartaro tincturæ nephriticæ parari solent non inelegantes: Sic famosus ali-quando Medicus tincturam nephriticam habuit talem: v. gr.

#### 24. Calcis vivæ p. iv.

Tartari crud. part. ii.

Coqu. in olla cum aqua font. (tartarus enim alcalifatur.) Liqueor filtratur, coagulatur, & emergit sal fixum planè sin-gularis naturæ: quod ipsum vel crudum usurpari potest; vel fundatur, hinc extrahatur cum spiritu vini probè rectificato, donec rubescat, & sapore urinosum & fortiter pene-trantem acquirat. Hinc sub nomine tincturæ nephriticæ, quæ est egregium remedium in calculo in & extra paroxys-mum, similibusque morbis tartareis, à ʒj. vel ʒss. ad ʒj. usurpatur:

Quod pertinet antinephriticum D. HELVETII, qui scripsit de vitriolo aureo ex calce viva.

#### 24. Calcis viva q. v.

affunde

Aceti destillati optimi ad eminent. trium, vel quatuor digitor.

Coque, frigesac, decanta, inspissa, seu ad siccitatem evapora: sal candefac in crucibulo, & extrahe vel cum spiritu vini, vel cum vino Hispanico.

Dosis gutt. 10. ad 20. in calculo.

Externè contra podagram ʒj. infunditur in Vinum aut uri-nam proprium, & eo laventur partes podagræ affectæ.

Tandem lumbrici, & horum spiritus per putrefactionem paratus, egregium sunt nephriticum, qui adhuc superantur ab a fellis ritè præparatis, de quibus infra Memb. 2. Art. 1. cap. 2. ubi de calculo vesicæ. Speciatim scarabæi Maiales præ cæ-teris insigniter conveniunt: imprimis ale horum superiores ac dure pulverisatæ & propinatæ in vino usurpatæ egregium dant antinephriticum. Vel

#### 24. Scarab. maial. mense Majo, vel medio Junii cap-

ptos, & absque attractu manus contextos: Suffoca in spiritu vini, suffocati ita blandè exsiccantur: exsiccati diseindun-tur, & in eorum medio reperitur istud liquidum viscosum, quod eximitur & asseruatur. De hinc ipsum corpus pulve-risat, misce cum proprio liquore unctuosio, ut acquirat consi-stentiam debitam. Post

#### 24. Huius Balsami ʒj.

Olei destillat. anisi,

Caryoph. à gutt. iij.

M. f. Pilulæ.

Harum pilularum ʒj. gr. ij. & propina Nephriticis & ar-theticis, manè jejuno stomacho, in aqua flor. sambuci, vel ro-sæ. Escmull. Oper. Tom. II.

farum. Ager moderatè vivacis diæta, sic brevi post excita-bitur stranguria, quæ per 30. dies durabit. Si autem non statim superveniat stranguria, reiteretur secundo die, & opta-tum habebis eventum in curando calculo. Conf. Colleg. Phar-mac in Schraderi Pharmacop. Part. 1. Sect. 2.

Huc pariter pertinent scorpionis, si nempe pulvis factus ex quatuor, quinque, vel sex scorpionibus lavatis, sicque vivis per 24. horas in vino Malvatico relictis, postmodum in olla supra folia salviæ positus in furno blandè crematis. Dosis gr. iij. iv. aut v. in ovo sorbili vel vino propinata, calculum pro-movet.

Grilli domestici, inrusticorum hypocaustis familiares, egregium sunt Lithonripticum, si nempe unus alterve, ab-jectis capitibus, alis ac pedibus, in aqua petroselinæ vel alia appropriata macerentur, idque tamdiu, donec in liquorem lacteum faceant, liquorque propinetur: multoties experi-mentum hoc factum, & ad miraculum in urinæ retentione fluxus secutus; quin etiam vel integer vel resolutus calculus prodire coactus fuit: vid. M. A. N. G. Ann. 9. 19. no. Obs. 71. Huc etiam facit essentia reguli avis Gærlicensium, quam vid. in Dispensat. quæ valde commendatur in calculo: Nam regulus avis singulariter convenit in affectibus urinaris, in specie in promovenda urina, & pellendo calculo.

Ex dictis Diureticis sequentes Formulæ concinnandæ:

#### 24. Aqua heder. terrestr.

Petrosel.

Alkekeng. an. ʒj.

Malvat. juniper. ʒss.

Spiritus lumbric. terrestr. ʒij.

Salis ammoniaci, vel urina ʒss.

Syrup. heder. terrestr. ʒj.

M. f. Potio: S.

Mixtura diuretica cochleatim sumenda.

#### 24. Rad. alth.

Petrosel. an. ʒj.

Rubia tinct. ʒvj.

Liquirit.

Bacc. iunip. an. ʒss.

Ficum ping. Num. viij.

Fruct. alkekeng. Num. vi.

Sem. malva,

Violar.

Urtica an. ʒij.

Coqu. in f. q. aqua comm.

In Colaturæ ʒij. dissolve

Syrup. de quinque rad. ʒj.

Spiritus salis dulc. ʒj.

M. D. S.

Potio diuretica.

#### 24. Malvat. juniper. ʒij.

Spiritus salis ʒj.

M. D. S.

Elyxir diureticum.

Dosis ʒj. ad ʒij.

#### 24. Tinctura tartari,

Antimonii an. ʒj.

M. D. S.

Tinctura diuretica.

#### 24. Liqu. terra fol. tartari ʒij.

Tinctura tartari ʒj.

M. S. ut antè.

Dosis 40. vel 50. guttulæ.

#### 24. Liqueor. tartari tartarifat. vel tinctura tartari acerr. ʒij.

Dosis 40. guttulæ.

#### 24. Tinctura nephrit. ʒij. S.

Tinctura diuretica.

#### 24. Pulv. coctionelle ʒj.

Salis fimi columb. gr. xvi.

M. pro pulvere.

Div. in 2. part. æquales.

#### 24. Tartari vitriolati ʒj.

Lap. cancerorum præp. ʒss.

Sal sterc. columbin. gr. xv.

Volat. succini ʒss.

Misc. pro tribus dosibus, capiendis in vino.

#### 24. Lap. cancr. præp. ʒss.

Salis volat. succin. ʒss.

Misc. f. Pulvis. S.

Pulvis diureticus.

Huc quoque pertinent Emulsiones terebinthinatæ cum melle,



melle, vitello ovi, aqua petroselinii vel appropriata quadam, & succocitri.

## CURA PRÆSERVATORIA.

Ceterum & ea, quæ extra paroxysmum Nephriticos curant, sunt præservativa, seu talia, quæ præcavent, ne generetur de novo calculus. Talia in quatuor scopos distinguuntur; scilicet

1. Sunt ea, quæ primas vias frequentius abstergunt, & expurgant.
2. Acidum coagulans primarum viarum, & hinc viarum urinarum vitiosum corrigunt aut absorbent, aut cum urina evchunt.
3. Quæ renes moderatis Diureticis abstergunt, & ita arenulas & rudimenta calculi maturæ tollunt, & ulterius arenularum concretum, et calculorum coagulationem, successivè prohibent.
4. Ea, quæ in specie renibus, eorumque fermento appropriata sunt, illudque conservant, ejusdem alterationem præternaturalem corrigunt, putredinis præternaturalis notam urinæ imprimendæ tollunt, id est, vi suâ balsamica, in sale volatili olensofundatâ, putredinalem dispositionem in renibus remonent.

Ratione primarum viarum conveniet, harum cruditates singulis tribus vel quatuor mensibus purgatione solenniore, singulis verò septimanis laxante, evacuari: Quorum tamen nec illa fortiora sint, id est, quæ humores nimis exagitant, & ad renes commovent: (vid. NICOLAUS PISO lib. 3. *Pract. cap. 35.* & UNZERUS de *Nephritide lib. 1. pag. 972.*) sed mitiora, qualia præter superius recensita sunt helleborus niger, folia sennæ: (vid. MONTANUS *Consil. 167. & 168.*) pulvis *Solenandri* ex senna, Rhabbarbo, turpebo; Syrupus rosarum solutivus, &c. Hinc quotidie etiam assumantur juscula, in quibus radix liquiritiæ, polypodii, flores violarum, &c. ebullierint, aut Decoctum prunorum simplex, vel cum foliis sennæ; item cremor, & crystalli tartari, &c. Imò hujus loci imprimis quoque erunt Vomitoria, quæ ipsa subindè repetita multum conferunt in præservando calculo, teste HILDANO *Cent. 5. obs. 61. & Epist. 55.* & UNZERO l. a. *pag. 973.* & quidem modò mitiora, modò potentiora, pro circumstantiarum varietate. Acidum coagulans temperant ac absorbent Terrea absorbentia, vel mineralia, vel animalia, lapides nempe supra memorati, & testacea, v.g. lapis spongiæ, cancerorum, corallia, silices, & calcaria fixa ex diureticis parata; item Lixivium tale, in quo silices candefacti extincti sunt. His salia volatilia & spiritus urinofos addere licet, frequentius cum pastu aut post pastum assumptos, quæ omnia acidum præternaturale in primis viis imbibunt & destruunt, hinc calculi coagulationem prohibent.

Vel

24. Arcan. dupl. ʒj.  
Corall. rubr. præp.  
Matr. perlar. præp. an. ʒß.  
Misc. pro pulvere:  
Diu. in 2. part. æqual. S.  
Pulvis digestivus.

Tertio scopo satisfaciunt Diuretica volatilia, ut salia volatilia quæcunque, in specie spiritus & sal volatile tartari, spiritus carminativus de tribus, quadraginta gr. spiritus salis ammoniaci & urinæ, tinctura nephritica Ammelungii, spiritus lumbricorum, elixyr proprietatis.

24. Tinctura tartari acerr.  
Compos. an. ʒiß.  
M. S.

Mixtura stomachalis.

24. Aqua alkek.  
Ceras. nigr. cum nucl. an. ʒiß.  
Malv. juniperin. ʒvj. ad ʒj.  
Tinctura nephrit. ʒij.  
Lapill. cancer. præp. ʒß.  
Laud. opiat. gr. ij.  
Syrup. fragor. ʒß.  
M. D. S.

Mixtura renes purgans cohibeatim sumenda.

Addunt his nonnulli lac & lacticia, excepto caseo. Verum cum omne lac plus minus substantiæ caseosæ in se habeat, de eius usu in lithiasi merito dubitatur: Vid. HORATIUS AUGENIUS T. I. l. 2. *Epist. 1. cap. 8. 9. &c.* &

UNZERUS l. a. *pag. 963.*

Renes quoque abstergunt serum lactis, acidula, aquæ quævis, & pinguis frequentius hausta: Hinc ZEGCHIUS *Consult. 13. & 17.* Juscula pulli gallinacei, vitulinæ aut vervecinæ carnis, item aquam tepidam simplicem immediate ante pastum quemlibet commendat, tanquam renes singulariter purgantia ac temperantia. Ast potentius agunt hæc Diuretica, quamvis nonnulli sint, quæcorum usum in præservatione à calculo planè interdicit, scilicet Crato apud Scholizium *Consil. 246.* Henricus Methodo ad Praxin lib. 2. cap. 12. & RUBÆUS in *Celsum lib. 4. cap. 10.* Ab aliis tamen ea maximè commendantur, v.g. UNZERO, RIVERIO, &c. Sed controversia hæc faciliè componi potest, modò observetur in eorum usu, ut

1. Mitiora sint.
2. Jejunò stomacho, & longè ante pastum;
3. Et non, nisi purgatis prius primis viis, propinentur.

Talia sunt Terebinthinata, Juniperina, de quibus vide AMATUS LUSITANUS; radix barbaæ, raphanorum genera cuncta, v.g. armoraciæ radix & folia, si vinum ab his destilletur, liquor betulæ, de quo heri dictum; semen dauci, quod cum cerevisia fermentatum contra calculum commendat BARTHOLINUS *Centur. 3. Epist. 30.* & BARTHOLINUS *Ab. Hassniens. Part. 1. Observat. 19.* Succus veronicæ in saccharo inspissatus, & cum semine violarum mixtus: vid. CRATO l. a. Ex scarabæis subcoerulis combustis BORELLUS *Centur. 4. Observat. 72.* addendo tantillum caryophyllorum, pulverem parat: Alii pulverem scorpionum exhibent: Ab aliis verò acidula non seneratione laudantur: Sicut autem superius dictum de usu Diureticorum nonnullos Practicos dubitare, ita non adeò frequens esse debet, & sufficere bistantùm in mense, aut vix intra tres septimanas illa assumere; quamvis observatio, cujus AMATUS LUSITANUS *Cent. 2. Obser. 68.* mentionem facit, Terebinthinæ usum frequentiore concedere videatur.

Pro quarto scopo conducunt ea, quæ præservant à putredine renali, qualia sunt Balsamica, Terebinthinata, Juniperina, balsamus sulphuris terebinthinatus ad quindécim guttas, Hypericata, remedia ex dauco, anisata, moschata, in specie crocus, macis, allium & alliata, succus betulæ, rhabbarbarum, & similia renibus dicata.

## ARTICULUS III

### DE

### URINÆ SECRETIONE NIMIS AUCTA.

**H**Actenus de calculo renum occasione suppressionis urine. Contrarium huic vitium est immodica & nimia urine excretio, dum plus effluit ex corpore, quam aut assumpta potulenta materia, aut serum in massa sanguinea proportionaliter suggerere possunt, in affectu qui aliàs dicitur Diabetes.

## MEMBRUM UNICUM.

### DE

### DIABETE.

**A**liàs Diabetis nomine duo vitia insigniuntur, idque promiscuè, adeoque nec absque confusione. Nam primò est Diabetes, (mingere nimium,) quando immodicè urina effluit, & plus quidem, quam bibendo homo assumit: cujus rei exemplum stupendum suppeditat DIGBY in *Oratione de Pulvere sympathetico*; sicuti etiam SCHENCKIUS in *Observ. lib. 3. ubi de Diabete*, aliquot profusi hujus urinæ profluvii habet exempla: Inter alia refert quendam, qui quotidie supra quatuor cantharos minxit, utut vix quadrantem biberit: Idem notat exemplum puellæ plus paucis diebus mingentis, quam ut tota ponderaret: Item BARTHOLINUS in *Actis Hoffniens. Volum. 1. Observ. 5. pag. 14.* refert virum, qui per aliquot septimanas quotidie ad ʒß xxvj. urinæ emisit: Vid. etiam M. A. N. C. *Ann. 2. Observ. 162 pag. 260. & Observat. 167. pag. 265.* uti etiam TULPIUS, qui l. 2. *observat. 86.* Diabete refert cujusdam, qui quotidie sex libras mingeret, utut parum vel nihil biberet. Cum modò dicta copiosa nimis urinæ excretionem simul



Simul intensissima sitis, debilitas virium, macies totius corporis, febris continua lenta, ardor in & circa regionem dorsum lumbarem, & similia symptomata; uno nomine symptomata instar *Hætica* confirmata aut instar *Tubis dorsalis*, sicuti etiam cum urina copiosa aliquid pingue excerni, & tandem ut plurimum mors subsequi solet. Equidem non rarum est, copiosiores urinae excretiones naturæ opus esse, quæ e. g. in febre acuta motu critico aut huiusmodi se ipsam à morbis liberat, unde cum ægri euphoria contingit, nec adeo diu durare solet. Si verò excretio salis urinae sit *Diabetes* morbosus, paulatim & insensibiliter crescere solet, ita ut æger in principio haud adeo curet, sed successivè uberior quantitas prodit, & quia tenuis, aquosa, uno nomine sic dicta cruda, quam & oris siccitas & sitis, virium insignis defectus, & viscerum interiorum ardoris quidam sensus, &c. comitantur. Quod si urinam aliquando contineant ægri, lumbi, coxæ & testes cum gravitate intumescunt. Alio autem sensu etiam *diabetes* dicitur cità nimis potulentorum & liquidorum assumptorum, aut plañe non, aut parum admodum mutatorum per vias urinarias excretio, ita ut non raro forma, h. e. color, odor & sapor assumptorum liquidorum in excretis per urinam adhuc sint sensibiles, quem celiacæ & lenteriaæ similem *GALENUS* lib. 6. de loc. aff. cap. 3. pronunciat. Exempla huius rei non sunt pauca: Sic *BARTHOLINUS* Cent. 1. *Hist.* 68. talem *diabete* calculosi recenset, vinum rubrum assumptum mox per vias urinarias eadem formâ demum reddentis; uti etiam *HOEFERUS* in *Herc. Med.* pag. 171. vinum rubrum immutatum per vesicam excretum refert, adeo, ut decepti Medici quidam illud vinum pro urina sanguinolenta habuerint: sic *HILDANUS* Cent. 3. *Observat.* 53. refert *Diabete* ex usu acidularum, in quo lac amygdalarum assumptum non immutatum tantum cum urina excretum: sicut *HOESTIUS* quoque in *Observat.* pag. 327. observat *Diabete* mirum, in quo vinum & Emulsio seminis violarum & amygdalarum dulcium eodem modo, ut assumpta fuerunt per urinam, denuò excreta. Imò observatum fuit, grana anisi, semina coriandri integra, semina ficuum comestorum, & denique radículas apii incisas, & similia unâ cum urina fuisse reddita: vid. *SENNERTUS* in *Praxi* ubi de *Diabete*. Quoad semen coriandri legi in *Chirurgo Gallo PIGRÆY*, qui dicit, quod viderit grana coriandri post pastum assumpta pro stomacho roborando, postmodum cum urina reddita: De semine ficuum ipse vidi exemplum, quod post decoctum ficuum, in quo semina incoctis, potum, una semina cum urina reddebantur: Mirabilia urinae excreta vid. in *M. A. N. C. Ann. 2. Observat.* 157. p. 248. *Obs.* 168. pag. 266. & *Annotat. ad Obs.* 157. p. 401.

Cæterum hi duo affectus distinctissimi, uno nomine *Diabetes* vulgò veniunt, quæ tamen vox propriè, & secundum vocabuli vim posteriori affectui, nempe immutata assumptorum excretioni, convenit. Dicitur enim *Diabetes à sustinere*, quod est citò transire, ita ut prior species, nempe copiosior urinae excretio, improprie *Diabetes* dicatur, & *Diabetes* propriè sit affectus, in quo potulenta citò per corpus transiunt, & propterea melioris doctrinæ gratiâ *Diabete* in verum & nothum seu spurium distinguo.

Verus est iste posterior, cuius typum huc dedimus, nempe immutata ingestorum potulentorum per urinam excretio. Exempla videb. in *BARTHOLINI* Cent. 1. *Hist.* 68. *HOEFERI* *Herc. Med.* pag. 171. & *HILDANI* Cent. 5. *Obs.* 33. Nothus seu spurius erit copiosa saltem & colligativa urinae excretio, excedens longè potulentorum quantitatem, cum tunc, scilicet, febre & similibus affligens. Exempla videb. in citato *DIGBY*, *Orat. de pulvere sympathet.* & *SCHENCKIO* *Observat.* item *TULPIO* lib. 2. *Obs.* c. 46.

His quoque tertius, & quasi intermedius gradus addi potest, celiaca nempe urinalis seu ad matulam, quando nempe chylus cum urina aut loco urinae prodit, qualem *TIMÆUS* von *Gulbenklee*, lib. 3. *Casu* 43. sub *pultacea mictionis* termino annotavit.

### C A U S Æ.

Quoad causas, de his distinctis distinctas causas narabo.

Quod ergo attinet *Diabete* nothum seu spurium, id

est nimiam, seu copiosissimam urinae excretionem, huius causa investigari perquam est difficilis. Et quidem duo consideranda veniunt.

1. Unde tanta materia quantitas, quæ excernitur?

2. Quare in specie eadem per vias urinarias amandetur?

Quoad quantitatem urinae excretæ, quæ septies, interdum duodecies, excedit potulentorum quantitatem, sicut exemplum, supra allegatum *BARTHOLINI Actis Hassniensibus* testatur, hic quaeritur: unde urinae tantæ Quantitatis origo? Aliquid lucis afferunt eorum exempla, qui insigniter, licet corpulenti, per usum tamen remedium diureticorum admodum emaciati fuerunt, mediante nempe copioso hinc per Diuretica conchato urinae profluvio. Exemplum habet *HELMONTIUS* *Traité. lus duumvir*. §. 59. item *Asthma & Tussis* §. 44. item *Latex Hum.* *Neglect.* §. 44. item *SCHENCKIUS* *observat.* lib. 3. ubi de *Diabete*, qui etiam refert, obesos crebrâ mictione subito extenuatos; sicut aliàs nimia corpulentia per salivationem Mercurialem curata fuit; uti à *BORELLO* Cent. 2. *Observat.* 12. refertur, continuâ maturatione foliorum *Tabaci* crassitiem & pinguedinem corporis insigniter fuisse immutatam. In omnibus his per colligationis modum, tam contentorum corporis, quam ipsius pinguedinis, hæc ipsa in texturam serosam resoluta illis modis fuerunt excreta: sicut *Purgantia* acrioria simili colligativa viratione alcali acris humores alterare, & flaccidam feri texturam mutare solent, ut succi colliquefacti formâ liquidam excant. Hoc posito, arbitror, massam sanguineam, & hinc reliquos corporis succos liquidos primariò ipsam partem ejusdem chylosam nutritivam, ipsum etiam rorem & succum corporis nutritivum, ipsamque adeo tandem pinguedinem resolveri & colliquefieri, atque ita faciscere in consistentiam ac formam aquosi liquis; ac ita sub ejus forma per loca urinaria excerni. Hinc enim *urinae Diabeticorum* horum excretæ mira dulcedo, ex pinguedinis aut roris chylosi liquefacti cum salibus urinariis mixti, mutuâ temperaturâ, & in dulcedinem vergente, texturâ: Confer. *WILLISIUS* *Pharm. Rat. Part. 1.* pag. 164. & 172. Huius colliquescentiæ causa, & inde genita copiosa urina subministratur nobis, dum fluxus hinc ita dispositus est, ut præcisè per renes, non verò per alia loca transeat; unde causa simul investiganda est in renum fermento nimis acro, quod ex natura falsa degenerat in successivam urinosam acrimoniam insignem volatilem feri sanguinis, similem acro isti volatili sali, quod in *cantharidibus*, *asellis*, *scarabæis minoribus*, ac his cognatis insectulis, deprehenditur, quæ ex primis viis derivata mediante chylo sanguini, & hinc unigrosso corpori, communicata est; quæ acrimonia urinosa resolvit, attenuat, colliquat, & ita acidum pingue talia coagulans dissolvendo fatiscere cogit sanguinem & nutrimentum corporis chylosum, & ex eo productam pinguedinem. Patet hæc acrimonia colligativa urinosa ex eo, quod in *Diabete* incipiente urina semper acris, & ob ejus rationem cum ardoris ingnoris sensu excernatur: Item quod hic nothus *Diabetes* ferè curetur à Prædicis eodem modo atque febris *hætica*, per ea nempe quæ acrimoniam feri falsam nimiam temperare valent, qualia sunt v. g. *Lacticia*: denique, quod hic *Diabetes* nothus inter alias causas remotas ex abusu remedium diureticorum, contenta corporis attenuantium, ac renes stimulantium excitari soleat, quod patet ex observatione *TULPII* loco supra citato, & *HELMONTIO* l. a. & ex *AMATO LUSITANO* Cent. 2. *observat.* 49. ubi natus fuit *Diabetes* ex usu vini meracioris, & muria feniculi marini, quæ potens est diureticum; item *SCHENCKIUS* in *Observat.* p. 455. ex diureticorum usu *Diabete* natum memorat: sic à nimio succi betulae, cujus vis diuretica nota, usu *Diabetes* lethalis observatus fuit in *M. A. N. C. Ann. 2. obs.* 198. pag. 300. item à potu spermatis ranarum insignem diabete *LOSSIUS* habet in *Observat.* pag. 314. & ex abusu Thee *GRIMMIUS* in compend. *Medico Chym.* pag. 255. Nam omnia *Diuretica* hæc alcali subtili plus minus prædita in acre salsum volatile in primis viis abeundo hinc acriorem reddunt massam sanguineam, cæteraque contenta, hincque liquefactum humorem nutritivum, stimulando simul renes, sub forma urinae excerni faciunt. Hinc est, quod acida volatilia potulenta ob vim



vim diureticam, quam in primis viis acquirunt, etiam Diabetem excitant: sic ex *Cydoniorum* usu diabetem notat SCHENCKIUS in *Observat.* Item ex *pomaceis*; item ex *abusu vini Rhenani*, unde incurabilem diabetem notat WILLISIUS *Pharm. Rat. P. 1. cap. 3. pag. 171.*

Acrimonia autem hæc sanguinisque feri, colliquans fermentum renum, dependet à fermento ex primis viis, nempe ventriculi digestivo, quavis ratione vitiato aut alterato, adeoque prout ventriculi prima digestio basis est reliquarum omnium, ita & hujus ratione vel macri vel pingues reddimur; & consequenter ex alterato eodem pingues emaciarì denuò possunt, prout scilicet fermentum ejus spirituosum plus minus acre vel temperatum fuerit, indeque similis notæ chylus corpori undique distribuitur, quo tota massa sanguinea, hinc & alia liquida, & tandem etiam solida afficiuntur ita, ut ab acrimonia alcalina, destructo acido pingui, seu mitionis in sanguine seminali vinculo, liquefiant in talia serosa liquamina; sicut crebrius ex primæ digestionis errato, indeque acri colligativo fermento enato, fluxus alvi colliquativus exoritur, cum infegni, ex corporis macie, virium debilitate, vel sicut remedia purgantia ferè simili colliquescentia operantur; ita pariter simili ex origine aliud acre volatile fermentum, contentorum corporis colliquescentivum, & in serosam consistentiam resolutivum, renasci potest, quo factò satiscit massa sanguinea in substantiam aquosam. Quod etiam intelligendum de pinguedine, antequam coagulata sit ab acido blando: hoc itaque destructo, necessariò illa degenerat in liquamen serosum, utut Bartholinus *Act. Hassniens. Vol. 1. Obs. 5. Diabetis spurii periodici mentionem faciat*, qui sine ulla corporis consumptione evidenter contigerit.

Dubium adhuc est saltem, unde tanta quantitas urinae excreta per tam longum tempus, quæ aliàs non æquivaleret toti massæ sanguineæ, & omnibus ejus succis? Non incongruum est, quod nonnulli existimant, nempe cum aeris inspiratione effluvia aquea cum massa sanguinea esse absorpta, & in urinam transmutata.

Sicuti enim omnia alcalia fixa & volatilia sunt vacua, unde humidum ex aere attrahunt, & promptè liquefunt; ita forsitan acre hoc alcalinum in massa sanguinea, ad instar reliquorum alcalium imbibitione humiditatis ex aere ambiente sub inspiratione, copiam urinarii laticis augeat. Sed non est adeò probabile. Certum tamen est, salia alcalia, quò magis acra, eò magis acri expòsita, copiosum phlegma attrahere.

Quoad posterius, Quare colliquati ita succi ac pinguedo in specie per renes, urinæ sub forma, expurgentur? Non est solum textura resoluti & ferescentis Fluidi, facile per poros renum transeuntis, sed quandoque ipsi renes simul affecti, & ab acri isto volatili acido salso fermento lenibiliter vellicari & irritari videntur, cujus occasione dolor, ardor, &c. circa renes in lumborum regione percipitur. Spirituum quoque impetus eò magis hinc concitatur, adeoque & massa sanguinea eò uberius quasi movetur, non secus ac ex stimulo purgantium ad intestina, ex stimulo Mercurialium ad glandulas gingivarum, uberius moventur & excernuntur contenta corporis.

Alteram Diabetis speciem, nempe genuinam, quod attinet: oritur hæc ipsa ex nimia laxitate & apertura viarum istarum, licet nondum sufficienter detectarum, per quas urina potius ex primis viis ad renes vel loca urinaria mandatur, concurrente forsitan simul pyloro nimis laxo, elabi sinente potulenta seu fluidiora, antequam perfectè sint alterata. Equidem fateor, vias has pro urina potius nondum detectas esse: Nihilominus autem plures rationes firmiter persuadent, ob quas eam existentiam affirmo, considerando impossibile esse, ut proximè viâ ex primis viis potulenta sine alteratione, his negatis, deferantur. Fieri enim nequit, ut semina integra coriandri & anisi, frustula radicis apii, excreta cum sanguine rapi, & hinc inde per vasa capillaria circulari potuerint; Item, quia nimum rubrum, aut emulsio amygdalarum dulcium & sanguini permisceri & circulari eodem, sine insigniore alteratione nequeant; adeoque qua data proximè viâ & occasione ex primis ad loca urinaria transeunt. Confirmatur hoc ex eo, quod inter causas remotas ad hanc diabetem verum, seu viarum laxitatem disponentes imprimis sint acidula. Jam verò, uti rectè asserit HELMONTIUS, Acidula vix ascendunt suprâ diaphragma. Nam eadem vix haustæ,

imprimis continuato eorum usu, subitò per urinam denudè transeunt limpida & clara in eodem quanto, & in eadem ferè forma, qua fuerunt assumptæ. Ab hoc ergò subito ac sæpius repetito acidularum haustiarum transitu laxatæ istæ viæ, ex primariis viis ad urinarias tendentes, etiam potulentiore concedunt transitum, & sic talis Diabetes supervenit. Willisius quidem Diabetem hunc verum in *Pharm. Rat. P. 1. sect. 4. c. 3.* omninò negat; sed contra experientiam, quatenus GALENUS l. 6. bis eum vidisse dicit, & BARTHOLINUS cap. 1. *Hist. 68.* refert, urinam uino in paroxysmo nephritico epoto adeò similem redditam fuisse, ut ignaris pro ipso uino propinari potuerit; sicut à B. SYLVATICO sibi narratum fuisse dicit, de quodam, qui curis & marasmo senili emaciatus post emulsiões & consummata mox urinam illorum odore tinctam excreverit.

Sic etiam HILDANUS in suis *Observat. c. 3. Obs. 53.* ex usu acidularum observat diabetem, in quo lac amygdalarum immutatum transit: pariter ZACUTUS LUSITANUS *Prax. Admir. Observat. 80.* quinquies tale quid se observasse; sicut & LOSSIUS cerevisiam immutatam redditam refert. Et JOHANNES PIGRÆY, Chirurgus quidam Gallus, in sua Chirurgia refert, se vidisse grana coriandri, durante acidularum usu post pastum pro roborando stomacho assumpta, immutata cum urina reddita. Unde etiam PETRUS PAW in *Observat. p. 4. quartæ Centur. Hist. Bartholinianarum amexis*, in Diabete mortuo renes admodum flaccidos à frequenti liquido rum transitu observavit. Verum, ut existimo, non flacciditate resolutionis seu paralyticæ, aliàs enim potius supprimeretur urina; sed flacciditate nimis aperture, qua renes instar spongiæ porosæ molles & flaccidi, fibræque admodum permeabiles reddita fuerint. Post acidulas etiam frequens calculus disponit ad hunc diabetem. Denique rarum est, quod SALMUTH *Cent. 2. Observat. 53.* observavit talem Diabetem potius planè immutati in febre maligna.

## DIAGNOSIS.

Signa diagnostica quod attinet: signa Diabetis veri, seu immutati potius transitus, facile patent, modò conferantur assumpta potulenta cum excreta urina.

Diabetes verò notus, seu copiosum urinæ profluvium, cum paulatim insensibiliter crescat, in principio vix percipitur. Interdum enim fit, ut copiosa urinæ excretio sit naturæ opus, conjunctum cum aperto ægri levamine, & verum ubi copiosam mitionem continuatam debilitas virium, corporis macies cum pinguedine urinæ supernatante, oris siccitas & sitis intensissima, unde etiam diabetes diplacis audit, ardor ac calor in dorso, & similia symptomata sequuntur, signum est diabetis periculosi. Interdum urina talis est tenuis aquosa & pallida, uno nomine admodum cruda. Curiosum est, quod observavit WILLISIUS in *Pharm. Rat. p. 164. & 173.* quod urina Diabeticorum admodum dulcescat, propter alcali urinosum acre solvens pinguiam, unde sapor mutatur. Particulæ enim aciores salinæ, v.g. diureticorum, menstrui instar nutritivam gelatinam & spissiore sanguinis consistentiam, quin & acrimonia particularum suarum cuneorum instar findunt, & affricatu suo alterant pinguedinis & carnis musculosæ texturam molliorem, nec adeò tenacem, adeoque hoc modo resolvunt denuò easdem. Ex hoc Diabeticorum mira dulcedo derivanda videtur.

## PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Diabetes verus parum habet periculi, quia interdum sponte cessat, estque partim facilis curatu, partim non adeò nocivus.

Rarum est, quod duret per totum vitæ cursum, quod sine noxa observatum in M.A.N.C. *ann. 2. Observat. 175. pag. 274.*

Diabetes verò notus, seu copiosum urinæ profluvium est periculosum malum, & sæpe lethale, imprimis nisi in principio, maturè nempe cognitum, curetur; deducit enim successivè ad tabem lethalem homines.

Idem quoque post immodicum laborem, post nimium Veneris exercitium, post chronicas denique febres, plerumque incurabilis est.



## C U R A.

Quoad modendi rationem: In diabete notho tres observandæ sunt Indicationes.

- I. Ante omnia temperanda est acrimonia nimia alcalina volatilisferi, tam per remedia ex fonte Pharmaceutico, quam diæretico.  
Unde ratione fontis diæretici
  - II. Alimenta chylosa succulenta temperata & subpinguia subministranda.
  - III. Narcoticorum moderatorum interpolato usu nimia succorum coctio, & urinæ secretio nonnihil impedienda, additis simul blandis adstringentibus, & renes ac partes corroborantibus.
- Ea, quæ primo scopo conveniunt, in specie sunt sulphurea, quippe quæ ab alcali dissoluta istud temperant, & hinc præcipitando compescunt; & absorbentia; hinc acida, moderatè austerà eadem alterantia quasi figentia, & plus minus adstringentia. Quæ verò ex fonte diæretico, sunt alimenta succulenta, imprimis Lacticia. In genere rectè asserere videtur ZACUTUS LUSITANUS lib. 18. Med. Princ. Hist. cap. 17. Hujus affectus curationem in quamplurimis convenire cum hætica febre; quia tam in sex rebus nonnaturalibus, quam etiam in medendi ratione, is ordo servandus, ut corpus refrigeretur & humectetur, firmetur renes, & eorum exuberans caliditas attemperetur, ut loquitur ZACUTUS LUSITANUS l. 4. imprimis secundum ea, quæ circa sex res non naturales, ac in specie alimenta & potulenta observanda sunt.

Ante omnia ergo quoad Pharmaceutiam vomitus commendatur in hoc notho diabete: Apertè enim BRENDelius in Conf. 83. cui alii consentiunt, ex PLATERO asserit; principium curationis esse vomitum, jubendo, ut, dum maximè ager torquetur siti, copiosam deglutiat frigidam, hancque repentè revomat, quod fit singulis quatuor diebus. Certum hoc est auxilium pro revulsione. Item ZACUTUS LUSITANUS dicit: prodest vomitus iis præsertim quibus falsa vel viscida pituita in ventriculo abundat. Conf. etiam EPIPHANIUS FERDINANDUS Consil. 37. item HORATIUS AUGENIUS Tom. 1. lib. 12. Epist. 3. & RIVERIUS Pr. lib. 14. c. 6.

Hoc ergo præmissis ad ea, quæ corrigunt acrimoniam, dicti fermenti, est accedendum, quæ inter appropriata, imprimis sunt remedia, quæ præparantur ex plantagine & portulaca, nymphæa, papavere, sive eorundem succi, sive syrapi, aut Decocta usurpentur; vi enim suâ stypticaliquali simul nonnihil incrassant corporis succis, eorumque colligescationem impediunt: Item Lapis hæmatites, tam naturalis & ejus præparata varia; quàm artificialis ex vitriolo maris & saturni saccharo paratos sublimat enim hæmatites quasi verus, primitus à GLAUBERO edoctus, tandem contra diabete nothum descriptus in M. A. N. C. Ann. Observat. 143. pag. 227. descriptus sub nomine Lapis Chymicus, qui reverà nil aliud est, quàm. Lapis hæmatites artificialis. Processus est legitimus, & nobile remedium per experientiam probatum. Loco hujus etiam saccharum Saturni cum vitriolo Martis mixtum; hinc etiam tinctura sic dicta sulphuris vitrioli aut martis adstringens, ex croco martis & spiritu nitri parata, tinctura martis solaris, saccharum Saturni, & ex eo & vitriolo martis parata tinctura antiphthifica usurpari possunt. Hæmatites naturalis quoque in vehiculo acido est usurpandus, operatur vi acido-austerà. Conveniunt etiam corallia, & varia ex his parata, imprimis eorum solutiones & tincturæ cum succo citri, vel limonum, Magisterium coralliorum cum succo citri, vel mixtura ex coralliis cum aceto polychresta SYLVIO usitata, de qua vid. lib. 1. Prax., cap. 30. §. 183. pag. 573. & M. A. N. C. Ann. 2. Observat. 183. pag. 345. qualis in Cura diabetes sepe experta fuit; Vel

24. Aqua plantag. ℥iij.

Aceti vini simpl. vel destillati ℥vi.

Corall. rub. pulver. (præparata enim magis discontinuata sunt, unde non danda) vel terra sigill. ℥j.

Laud. opiat. gr. ij.

Syr. portulac. ℥j.

M. D. S.

Mixtura adstringens bene circumagitanda.

Capiatur cochleatim.

Porro alumen, & ut alii volunt, spiritus alum., cum convenienti vehiculo est egregium remedium. Et hæc sunt selectiora, præter quæ tamen etiam succinum & succinata, pinguedine suâ sulphureâ temperatâ imprægnata, locum inveniunt; item trochisci de carabe, de terra sigillata, vehiculo subacido assumpti profunt optimè. Quibus speciatim vespertino tempore Opiata sunt intermiscenda, suavis, BRENDelius & RIVERIUS l. 4. Antihecticum Poterii Bezoardicum Joviale, imprimis quando urgent febres, item ardores in regione lomborum, item Bezoardicum Saturninum & similia, sunt optima. Tandem Aqua calcis vivæ, sive simplex sive composita, subinde hausta nobile & singulare est experimentum contra hunc diabete: vid. WILLISIUS in Pharm. Rat. Part. 1. p. 174. & 177. dosi ℥ij. iv. ad v. & vj. ter indie. Alia, ut C. C. ustum, crocus Mart. adstringens, &c. vel spontè ex dictis manifesta evadunt.

Et hæc sufficiencia sunt primo & tertio indicato.

Cum his quoad secundam indicationem ea, quæ temperant, & nutrimentum suggerunt, simul in auxilium vocanda: inter quæ eminent lacticia, quæ temperant, ac præsertim lac chalybeatum. Hinc Itali ac veteres commendant lac asininum, in quo imprimis ferrum candens extinctum, & ita chalybeatum factum, quod cum Philonio Tersico permixtum ZACUTUS LUSITANUS l. 2. Prax. Admir. Observat. 7. commendat, qua ratione diabete desperatum curavit. Loco asinini aut caprini lactis lac bubulum commodè etiam usurpatur, imprimis cum chalybe probe imprægnatum; Item emulsionem factam ex amygdalis dulcibus, seminibus quatuor frigidis majoribus (quæ ipsa tamen in pauca dosi addenda) & minoribus, cum semine papav. albi, &c. exque crebrius & copiosius hausta subinde usurpanda sunt: vid. GRIMM. l. 4. qui diabete cum macie ex abusu potus Thee curavit cum diata ex lacte, & emulsione sem. quatuor frigidorum majorum, quibus syrupus de nymphæa, & syrupus de papavere est intermiscendus. Lac chalybeatum semper cibis est adjungendum seu permiscendum & tempore nocturno seu vespertino opiata non negligenda.

Externè Sacculi & fomenta ex plantagine, foliis quercus &c. in Aqu. chalybeata cocti, subinde regioni renum applicentur: Item cancri, fluviales aut recentes contusi, eorumque succus recens expressus, dicto loco admoveantur.

Diabetes propriè dictus & verus, seu potulentorum nimium immutatorum transitus, convenienter curandus venit per adstringentia talia, quæ stomachum nempe & primas vias blandè adstringendo roborant, qualia sunt in specie Martialia, & Vegetabilia adstringentia aromatica. Nempe par ratio est, atque quando in potu acidularum subinde usurpanda sunt omni paitu blanda aromatica & adstringentia, quæ stomachum nempe & viscera firmant. Fugienda autem sunt in hoc diabete Cydonia & Cydoniata, aut saltem non crebrò nimis usurpanda; utut enim sint adstringentia, summè tamen sunt diuretica, uti hoc non tantum observat BARTHOLINUS Cent. 5. Hist. 22. sed etiam SCHENCKIUS in Observat. Ergo Martialia & adstringentia cum aromaticis & alia Vegetabilia adstringentia, quæ ex plantagine; tormentilla, ex consolida majore, mentha, & similibus parantur; item Decoctum prunorum sylvestrium, Decoctum corticum aurantium, quercuum, & similia usurpanda veniunt. Crocus Martis adstringens, etiam tinctura sulphuris vitrioli, bolus Armena, terra sigillata, cum conserva rosarum vitriolata, & conserva radicis symphyti conducunt. Potus sit plantago in aqua chalybeata cocta. Tandem ceu singulare experimentum commendatur, si recipiatur crista galli calcinatur, eaque manè & vespere in propria ejus urina propinatur, quod ceu probabile secretum contra diabete venditant, & eâ fide, qua accepi, communico.

Qui plura de his cupit, adeat præter MOEBIUM & WILLISIUM de urinis Sylvium in Praxi c. 55. qui tres Autores sufficient.

## ARTICULUS IV.

## D E

## URINÆ DEPRAVATÆ IN RENIBUS SECRETIONE.

Versamur adhuc in vitili Urinæ Secretionis, & superest depravata urina in renibus secretio, cujus modi non tantum



tantum ferè sunt innumerebiles, dum scil. diversimodè affecta urina in colore consistentia & contentis excernitur; speciatim tamen sub Praxin Medicam cadit

1. Urina nimis pinguis, & oleaginosa.
2. Urina rubra sanguinolenta.

## M E M B R U M I.

### D E

## URINA PINGUI & OLEAGINOSA.

**Q**uod attinet urinam pinguem seu, ut aliàs vocant, oleaginosa, diversimodè accipi potest. Nempe hic ante omnia distinguendum inter urinam pinguem, quæ est talis saltem ratione superficiali, & ratione consistentiæ. Quoad consistentiam: an scilicet ita exactè tota urina materia excreta oleum quoddam repræsentet, vix credo, nisi forsitan in Diabete vero pinguis & oleosa assumpta sub forma propria demum excernantur, quod tamen unquam me legisse non memini. Aliàs etiam urina talis, perfectè scilicet oleaginosa, fieri nequit, ob incompatibilem aquæ cum oleo miscelam, quæ nullo modo possunt conjungi, nisi sit sal alcali fixum in urina, pinguedinem solvens, ut videmus in saponibus. Cum verò in urina tantum sal salinum volatile, non verò purum alcali insit, idè nec urina pinguis & oleaginosa excretio quoad consistentiam concedi potest. Pinguis ergò sæpè excernitur urina, quando nempe in superficie ejus quasi crusta aut pellicula pinguis supernatat; quæ ipsa tamen crusta, probè distinguenda, an sit vera pinguedo? an verò sit saltem crusta salina, pinguedinem saltem mentiens? uti in scorbuticis & hypochondriacis usu venire solet. Differentiæ ratio in eo consistit, quod talis crusta supernatans, si consistet ex concrementis salinis in pelliculam inspissatis, quod tunc ad latus juxta lucem aspecta varios colores instat caudæ pavonis, vel instat iridis in sua superficie repræsentet; id quod infallibile signum est crustæ salinæ ex malo hypochondriaco aut scorbutico, in quibus salia heterogenea abundant. Testantur hoc omnes solutiones salinum ad pelliculam inspissatæ, quæ pingues videntur. Ubi autem vera est pinguedo, quæ urina supernatat, si ne ullò colore solet esse conspicua, & etiam subinde quasi guttulas repræsentat, quæ & ipsæ deficiunt in crusta urina salina. Pinguis autem sit talis urina ex colliquatione partis pinguioris massæ sanguineæ, in specie pinguedinis corporis, unde pinguedo talis frequenter apparet in urinis, febre ardente colliquativa aut etiam hæctica, tabe, ulceribus renum, & similibus afflictorum. Et hæc ipsa colliquatio oriri videtur ex defectu aciditatis in massa sanguinea, quod ipsum aliàs spissat & blandè coagulat pinguedinem nutritivam, cujus defectu ipsa denudè liquefit pinguedo, & ita cum urina denudè excernitur, quæ tamen cum non possit intimè urina misceri, supernatat, & sub forma olei conspicitur.

## C U R A.

*Quoad curam:* curatur hæc crusta salina, pinguedinem in urina mentiens, facillè, curato morbo primario; ac in specie conducunt Martialis, acidum peccans absorbentia, & hinc volatilia, illud ad vias urinarias deducuntia, & per cutim emittentia. Urina verò, cui pinguedo vera supernatat, curatur spontè, modò primarius curatus fuerit morbus, in specie per acida blanda, pinguedinis liquefactionem impediencia, eamque coagulantia, ut spiritum salis dulcem.

## M E M B R U M II.

### D E

## M I C T U C R U E N T O.

**P**orro Urina cruenta seu sanguinolenta excernitur, quando ipsi permiscetur sanguis, nunc copiosus, nunc parvus quidem; unde interdum minus tincta loture carni similes apparet urina, interdum verò intensius rubet, si magis tincta, spissa ac crassa apparet, vel potius ex opaco nigrescit, ita ut etiam linteum immersum spectro rubore sanguineo inficiat, & interdum cum sanguine in

fundo matule subsidente apparet. Sanguis iste, qui tingit urinam, ut plurimum ex renibus effluit, seu in renibus ipsi permiscetur, interdum tamen etiam in ureteribus, interdum etiam in vesica, interdum ex lesis arteriis in pene, quale exemplum vid. in GRAEFIO lib. de Organis Generat. viror. pag. 221. Rarius verò ex aliis partibus ad loca urinaria eo deferuntur, ut cum urina simul excernatur, ver. gr. in casu ab alto, aut si grumi sanguinis in pectore, vel alio quodam loco hæreant, qui successivè ad vias urinarias deferuntur. Id quod tamen sit rarius, accitrat ullum viarum urinaryarum incommodum; sicuti rarum est, quod propter inflammationem aut contusionem hepatis urina cruenta interdum emitatur. Ex causis etiam antecedentibus facillè cognoscitur.

## C A U S E.

Causæ urine cruenta, non secus atque aliarum hæmorrhagarum (est enim miæus cruentus species hæmorrhagiæ) in genere oriuntur interdum ex anastomosi vasorum sanguiferorum in viis urinaryis, interdum, idque frequentius & crebrius, ex eorum diresi, vel diabrosi seu ruptura vasorum sanguiferorum in locis urinaryis. Quoad anastomosi seu aperturam vasorum: hæc frequenter fit nunc vitio contentorum, in specie impetu sanguinis, aperientis suæ irruptione concitatore oscula vasorum, nunc vitio ipsorum vasculorum renalium, quando poruli renum sunt nimis aperti cum eorum tubulis, unde sanguis per hiantes poros una cum lorio variè transmittitur; adeoque à tubulis renum nimis apertis miætionem cruentam interdum accidere rectè asserit WILLISIUS Pharm. Rat. pag. 166. quod vitium Veteres vocant Imbecillitatem Renum, estque hujusmodi miæus ferè indolens, minusque ingens tinctura urinae, minusque crassa. Quoad sanguinis impetum, inferentem vasorum anastomosi, sequitur interdum miæus cruentus post equitationem nimiam, item post nimium motum corporis, saltum nimium; & facillè in renibus, impetu in sanguine concitato, Orificia aperiri, & ita miæus cruentus inferri potest: Vid. HILDANUS Cent. 6. Observat. 46. In specie Miæus cruentus per anastomosi nunc est spontaneus, nunc novè spontaneus seu symptomaticus: Ille nunc criticus, nunc periodicus, nunc vagus, &c. est. Precedere autem solet Dolor quæ gravationis & tensus, uti & comitari solet hujusmodi cruentam miætionem perceptibilis in isto loco, in quo sanguis suo impetu anastomosi inferit: sequitur enim interdum solennes excretiones sanguinis suppressas miæus cruentus; hinc etiam FORESTUS lib. 24. Observat. 7. inquit: Urinam cruentam ex alto delapsis statim emitti videmus, idque sæpius etiam ex nimia Venere in adolescente nobili, in mulieribus etiam mensibus suppressis, & in viris hæmorrhoidibus fluxu consuetis & retentis. Truncatà etiam manu vel pede, aut pleno corpore, ex abscessibus ulcereque cruento, urinam cruentam emittam fuisse scio: id quod ulteriori Observatione confirmat de Miæu sanguinis, ex suppressis hæmorrhoidibus per intervalla oriundo, HILDANUS Cent. 1. Observat. 11. Quin & periodica quibusdam urine cruenta miæia observatur: vid. Præter SCHENCKIUM in Observat. SALMUTH c. 3. Hist. 47. de miæu sanguineo periodico & quasi menstruo, qui conturbat mortem intulit. Criticus observatur sanguinis miæus, dum morbi solvantur urine sanguinolentæ excretionem: Sic ZACUTUS LUSITANUS lib. 2. Prax. alvir. Observat. 69. miæum cruentum criticum in febre ardente observavit; sicuti etiam pleuritides interdum per sanguinis miæum judicate observantur ab HILDANO Cent. 1. Observat. 31. & SCHENCKIO lib. 2. Observat. 22. ex MARCELLO DONATO. Pertinet hæc ruii abusus ad miæum cruentum disponeos, de quo vid. ZACUTUS LUSITANUS Med. Princ. Hist. 139. Item Diuretica fortiora aut aciora, v.g. post spiritus terribilissimam nimiam dosin, miætionem cruentam refert HILDANUS Cent. 5. Observat. 52. Tandem abusus veneris anastomosi vasorum, & ita etiam urinam cruentam inferunt, dum in actu Venereo nimio præcipue circa vesicam & partes genitales vasa sanguifera nimis turgida hincunt & aperiuntur, quæ aperta sanguinem fundunt: Talia exempla non sunt rara: inter alia refert FORESTUS lib. Observat. 10. & 13. miæum sanguineum ex nimia Venere, qui

spont.



*spengia aceto calido infusa, & lumbis ac partibus genitalibus circumposita, curatus est; aceturum enim temperando temperat æstus, & blandè vasculorum ruptorum oscula adstringit.*

*Hæc de Anastomosi.*

Quoad *Diuresin*, & in specie *Diabrosin*; hæ frequentior causa urinæ sanguinolentæ existunt vitio contentorum acrium, aut erodentium, aut alio modo lædentium vascula dictorum locorum, dum nempe à sero nimis acri vascula sanguifera circa vias utinarias eroduntur: vid. FORESTUS lib. 8. *Observat.* 6. 11. 12. & 13. Quod etiam pertinent *exulcerationes & excoriationes renum & vesicæ*, quas ipsas partim propter erosiones vasculorum non raro mictus cruentus, partim sensus doloris plus minus rodentis, aut etiam alius in parte affecta molestus comitatur. Tali ex causa mictus nati cruenti scorbuticis, catarrhosis, & sero acido salisiori, aut aliàs plus minus corrosivo præditis, accidere solent: Calculus itidem asperitate suâ lædens & lacerans renum, ureterum aut vesicæ membranulas, subinde talem mictum inserit: Faciunt etiam huc imprimis *cantharides*, de quibus notum est, quod aut ineptè assumptæ, aut etiam extrinsecus cum Vesicatoriis sine iudicio applicatæ, imprimis absque acidis, mictum cruentum subinde admodum dolorosum, & vesicæ excoriationem inferunt, in quosimul penis erectio, & simul ad Venerem excitatio adesse solet: Vid. FORESTUS lib. 24. *Observat.* 7. Dico si applicantur absque acidis: Communiter enim ex pulvere cantharidum, fermento & aceto vesicatoria parantur. Ubi tamen observandum est, quod talia vim vesicatoriam imminuant, & eorum corrosivitatem & sal volatile nitrosum temperent, quod minus potenter quidem possunt vesicare, sed minus etiam hac ratione interioribus nocent. Cantharides enim habent sal volatile nitrosum, quod cum acidis destruitur, absque acido verò applicatæ cantharides mictum cruentum inferunt, quod quotidiana loquitur experientia. Mictum à vermibus cruentum habet SCHENCKIUS *Observat.* lib. 3. *Observat.* 294. Pertinet huc curiosa ista *Observatio & historia*, quam habet HORSTIUS lib. 4. *Observat.* 43. mictionis purulentæ & sanguinæ ex ulcere colli vesicæ; propter carunculam ibidem loci ex acidularum usu suppuratam. Præter *cantharides* etiam observatus fuit mictus cruentus ex *abusu altii*, teste SCHENCKIO in *Observat.* Item ex nimio aloes usu urina cruenta enata refertur in BARTHOLINI *Act. Med. Hassii. Volum. 2. pag. 167.* Tandem in morbis malignis, ac speciatim in *variolis*, supervenit subinde mictus cruentus, qui, quando oritur erosione vasculorum aut vesicæ, est pessimus & admodum funestus, cum ordinariò intereat ægri. Exempla in SCHENCKIO, HOECHSTEDTERO, item in SALMUTH, aliisque similibus inveniuntur, quod nempe sanguinis mictus in variolis ferè semper fuerit lethalis. Forlan & isti mictus cruenti, qui in aliis febribus malignis observantur, huc pertinent, ut quando hæmorrhagia penis nimia in febrè maligna, aut hæmorrhagia narium lethalis: Vid. HOECHSTEDTERUS *Decad. 1. Casu 3.* Quin & in peste observata fuit urina sanguinolenta, quæ inter pessima tunc temporis recensetur signa. Tandem urethram vulneratam, exulceratam, &c. etiam mictum cruentum intulisse, GRAEPIUS de *Organis Viril.* pag. 150. refert.

*Hæc quoad Causas Mictus Cruenti internas.*

Quoad *causas externas*: quilibet violentus motus ruptioni circa loca urinaria occasionem suggerens, mictum cruentum inserit: Talia sunt saltus nimius, casus ab alto in dorsum aut lumbos, thorax vulneratus: Vid. RHODIUS Cent. 2. *Observat.* 19. Item contusio vehemens circa loca inferiora facta.

## DIAGNOSIS.

Sequuntur signa, quæ satis sunt clara, quoad *Diagnosin*: Nam urinam esse cruore instam, facillè per se patet, modo probè distinguatur rubor urinæ sanguineus à rubedine salina, quando nempe contentis copiosioribus salinis oleosis probè unitis cum liquore continente, idque ferè viacti, rubeus representatur color; quæ urinæ differentia facillè cognoscitur. Urina enim rubra interdum emittitur, cui nihil sanguinis est admixtum, ubi urinæ rutilantes & quasi sanguinæ excerni solent. Rubedo hæc ex contentis salibus ordinariò est perspicua, clara & quasi fulgida,

ac non adeò crassa, aut quæ præcipitata sedimentum vel intensè croceum, vel instarcinnabaris, vel incarnati non, nihil coloris, suggerit: & contra quæ est à sanguine rubra, semper est opaca, turbida & crassiuscula plus minus, prout plus minus sanguinis est permixtum. Unde & à salibus contentis orta rubedo splendet quasi: simili namque ratione ac lixivium lotricum, quod magis est alcalibus imprægnatum, eò magis ad rubedinem vergit; ita & urina quod magis salibus turget, eò magis flavescit aut rubescit: quæ vero est à sanguine, absque splendore obscure minisque clara observatur. Illa interdum in febribus, interdum in scorbuto, malo hypochondriaco & similibus, subinde accidere solet: Hæc etiam in aliis agris deprehenditur.

Et urina cruenta, si ex sanguine constet, si aliquandiu steterit, uno alterovè die crassamentum seponere solet ex intensè rubro quasi nigrescens, & sanguinem grumosum exactè referens.

Verùm cognoscendum ulterius, ex quo loco affecto sanguis profluat? Si enim est ex affectu renum aut vesicæ, semper dolor aut gravativus, aut acutus rodens percipitur circa locum affectum: Quorum ille quoque dignoscitur, si sanguis copiosior fuerit, & urinæ intimius permisceatur; item liquidus, ac non grumosus subsideat: Hic, si sanguis parcius urinæ non aqualiter perfundatur, cum grumescencia subsideat, ac cum dolore urina prodeat.

Interdum tamen culpâ meatus urinarii tale quid contingit, cuius læsi signa præcesserunt, sanguis sine urina effluit, & mox concretus subsidet.

Si est ex alio loco sanguis, alius partis affectæ signa & symptomata concurrent.

Ex quibus verò causis oriatur urina cruenta, ostendunt antecedentia & adjuncta. Hinc de omnibus mictus cruenti differentiis Medicus sit curiosus, quoad indagandas causas, an nempe sit ex anastomosi? an ex diuresi? & si est à causa externa, saltu, cantharidibus, &c. patet ex ægri relatione; sin à causa interna, examinandus est æger, an sit scorbuticus? an ordinariò aliàs sanguinis evacuationis suppressione laboret? an percipiat dolores circa renes aut vesicam? Nam si casus ab alio præcesserit, loca læsa, & circa quæ sanguis extravasatus hæret, non possunt esse incognita, in quibus suspicatur sanguinem de vici ex alijs locis ad renes.

Si aliàs adsunt symptomata calculi, semper de renibus, aut de vesica affectis, horumque laceratione, suspicio ingruit: vid. Forestus lib. 8. *Observat.* 6. 11. 12. & 13. item ulcera vesicæ aut renum antecedentia aut concomitantia ex diuresi mictum cruentum ostendunt; simul adesse solet dolor acutus rodens, mortificans, in specie molestus circa pubem, aut vesicam; item si præcesserit stranguria; dysuria, &c. manifestum signum est, mictum cruentum oriri ex excoriatione & erosione vasculorum.

Observandus simul motus naturæ, sive criticus, sive periodicus, qui ferè citra ullius partis urinariæ affectum, contingit, ne impediatur, & pro morbofo habeatur, qui tamen salutaris.

Quod si malum sit à causis externis, à cantharidibus, à radice rubiæ tinctorum, quæ colore rubro inficit urinas; item si ab esu fructus Indici majoris seu opuntia oriatur, quæ ipsa etiam tingit urinas, ex relatione ægri cognoscendum.

In specie si sit à cantharidibus, adesse simul solet intensus stimulus Veneris, ita, ut penis sit tensus & rigidus, & ægri ad Venerem insigniter stimulentur, & si quæ sunt alijs similes circumstantiæ.

## PROGNOSIS.

Quoad *Prognosin*: omnis mictus cruentus, imprimis copiosius ac sæpius recurrens, periculosum malum est, invahens eadem varique symptomata, quæ hæmorrhagias nimias insequi solent: Nam v. g. ex mictu sanguinis diuturno hydropem observavit SCHENCKIUS lib. 3. *Observat.*

Minus periculosus est sanguinis mictus ex pudendis, & à calculo; magis periculosus, qui ab erosione ac exulceratione vesicæ, cum metuendum sit, ne in vesica subsistens periculosa urinæ suppressionem, aut sui corruptelâ varia symptomata inferat.

*Omnium maxime periculosus est, qui ex renibus, præsertim*



sertim crosis, aut eorum, ut vocant, imbecillitate, malum ortum fuerit.

## C U R A.

Quoad ergo attinet *Curam*: in hac primario multiplex causarum remotarum varietas attendenda, & hinc cura, nonnihil varianda: unde causa removenda, adeoque anastomosis tam venesectione quam remediis adstringentibus curanda, Diuresis autem vel Diabrosis vulnerariis consolidantibus & appropriatis corrigenda, hinc in specie acrimonia seri erodens aut exulcerans temperanda, & vas aperitum vel erosum Vulnerariis & adstringentibus consolidandum; speciatim tamen, cum frequentissima causa interna soleat esse acrimonia seri erodentis, & plus minus exulcerantis, hanc imprimis *acrimoniam temperantia*, adeoque maximam partem ad *hemoptysin* dicata remedia, conducunt. Imò cum serum urinarium plus minus acre omne miſtum cruentum undecunque ortum exasperare soleat, semper unà *attemperandi* scopus probe attendendus venit; unde *Papaverina* ac *Opiata*, item *que supra Sect. 18. cap. 1. Art. 12. & 13. circa exulcerationem renum & vesicę fuerunt monita*, locum invenient.

II. *Venasectio* interdum locum habet. Nempe pro scopo vel *revulsorio* vel *derivatorio*, quando nempe occasione solennis cujusdam sanguinis excretionis suppressę miſtus cruentus ortus fuerit; qua ratione per *phlebotomiam* miſtum cruentum ex meri nimia potione in *Plethorici* curavit *ZACUTUS LUSITANUS cit. loco*.

III. *Purgantia*, quę talia, non conveniunt, cum facili acrimoniā suā exasperare malum queant. Saltim *Rhabarbarum* est, quod convenit, & magis pro scopo *alterativo*, quàm *laxativo*, adeoque in ferofiore corporis habitu, aut in acriori sanguinis crasi, item in *renum imbecillitate* *Rhabarbarum* est optimum. Hinc *pilula Rhabarbaro cum succo plantaginis*; item *pulvis Rhabarbari parum torrefacti*, & in specie *pilula ex terebinthina cum rhabarbaro* aliquandiu continuatur, nobile sunt experimentum *HOEFERI Herc. Med. pag. 172.*

His ita premisſis, *Remedia* vel sponte patent.

In genere ergo quęcunque remedia *supra Sect. 18. Cap. 3. art. 1. de Hemorrhagia in genere dicta*, & inter has in specie *Mixtura ista polychresta SYLVII in Idea Prax. ubi de cruento vomitu*, locum habet:

℥. *Aqua Plantag. ʒij.*

*Cinnam. ʒij.*

*Aceti destillati ʒss.*

*Corall. rub. præp. ʒss.*

*Sangu. dracon. ʒss.*

*Laud. opiat. gr. ij.*

*Syr. myrtin. ʒss.*

*Misc.*

Hęc *Mixtura* cochleatim sepius assumpta curabit pleraque vasorum rupturas, & *supra* multorum expectationem sanguinis effluxum brevi tollet, secundum experientiam *GRAEFFII Tr. de organ. Genit. Virorum pag. 154.* ubi exemplum habet miſtus cruenti periculossissimi ex lesis penis arteriis propter casum; quem allis irritis ista *mixtura Sylviana* egregie curavit. Item *Martialia* & *Opiata* conducunt.

Cum verò semper ad *acrimoniam* seri urinarii aciduli plus minus respectus sit habendus, præ ceteris ob id convenit *portulaca* quovis modo usurpata; item *plantago*, & speciatim ejus *succus* ad ʒij. vel iv. haustus, & omnia ex his parata remedia, quò simplicius, eò melius: Vid. *R. I. VERIUS. Syrupus* item compositus ex succo radicis *symphyti*, & succo foliorum *plantaginis*, quem communicaui *supra Sect. 6. cap. 2. ubi de Vomitu Cruento*. Post hanc est *equisetum*, ejusque *Decoctum*, quod & ipsum egregie conducit. Hinc *consolida major*, *millefolium flore albo*, ejusque *Decoctum*, quod egregie commendatur ad consolidationem. Convenit quoque *bursa pastoris*, *hedera terrestris* in *cerevisia* cocta. *Decoctum auriculę muris* & *pimpinellę Italice* in *lacte caprino* commendatur ab *HORSTIO lib. 4. Observat. 52.* Hisce in specie addatur *agrimonia*, seu *eupatorium vulgare*, quod imprimis est remedium ab omnibus Practicis expertum contra miſtum cruentum quocunque modo usurpetur, tam interne quàm externe, adeo ut etiam in ipsa renum & vesicę exulceratione probe conducat, sive *agrimonia* sola, sive eadem cum hy-

pericomista, usurpetur; Unde *LINDANUS* *agrimoniam* miscet cum quinquifolio, & millefolio, seu selecta simplicia contra miſtum cruentum. Hisce imprimis sociandum *hypericon*, tam *planta* quàm ejus *semen*; si quidem hoc etiam specificum est ad *ulcera renum*, ratione odoris sui & saporis terebinthinati; unde etiam cum hoc *TIMÆUS von GuldenKlee* parat *Electuarium elegans contra exulcerationem renum*, quod proſtat in casibus, ubi *Medicamentor. Descriptiones pag. 421.* Vel

℥. *Herb. Agrimon.*

*Millefol.*

*Summ. hyper. flor.*

*Musci prun. silvestr. an. M. j.*

*Rad. symph. mai. ʒij.*

*Sem. hyper. ʒij. vel iij. ad ʒss.*

*Incis. & contus. coqu. vel in vino* (cui tempore usus addatur parum de *lap. cancr.*) *vel in Aqu. ferrar. vel in lacte*, vel in *sero lactis chalybeato*:

*Colatura edule* preter cum *syr. de symph. Ferncl.*

*D. S.*

*Potio adstringens.*

De *Decocto* hoc bibatur subinde haustus, addendo simul, si *Decoctio* facta fuerit in *lacte* vel *sero lactis*, *lapill. cancr. in aceto solutos*. Egregium est ad compescendum miſtum cruentum. Vid. etiam *Sect. 18. cap. 1. artic. 12. Decoctum in ulcere renum præscriptum*.

Egregie quoque conducit tam præservativè quàm curativè *hedera terrestris*, sive in *Decocto* cum aquę & *cerevisiæ ana*, sive in *Extracto*, ebulliendo nempe eam in *Aqu.* vel in *succum* exprimendo, & *colatum saccharo* condiendo.

A quibusdam etiam insigniter laudatur *bellis minor* ac tota ejusdem *planta*. Porro *chamæpitys* seu *Iva arthetica* commune est experimentum *POTERII*, cujus *Decoctum* in *jussulo carnis* paratum in miſtu cruento & *ulceribus renum* optimum, & specificum *SULZBERGERI* est. Item pertinet huc *Decoctum ad miſtum cruentum Mynsichtii in suo Armament.*, quod est egregium. In specie *lac ovillum* ad ʒiv. cum ʒj. boli *Armenę* assumptum omni mane experimentum est, aliquoties comprobatur, uti hoc videre est in *FORESTO lib. 24. Obs. 12.* quod etiam expertum est cum successu; item *TIMÆO von GuldenKlee in Cas. lib. 3. Cas. 40. pag. 180.* qui sæpe hanc bolum *Armenam* cum *lacte ovillo* feliciter propinavit; Imprimis conducit, si ab *acrimonia* seri & *exulceratione* partium, sive etiam casu ab alto, cruentus miſtus oriat. Adhuc *succinum* & omnia *succinata*, in specie ex hoc parati *trochisci de carabe*, etiam in hoc casu cum fructu usurpari possunt, si cum vel sine terra sigillata sumatur in *Aqu. plantaginis*, unà cum paucis *aceto* acidulata; sic enim melius operantur. Conferatur *TIMÆUS von GuldenKlee Epist. 23. pag. 248.* ubi *trochisci de carabe* ad ʒj. cum boli *Armenę ʒss.* in *Aqu. plantaginis*, cum sepius probatum remedium laudantur: Quibus in malo contumaciori *Opiata* addenda. Huc quoque *Trochisci Gordonii*, & species *dia-plantaginis Mynsichtii* pertinent. Curavi aliquando *virum*, miſtu cruento laborantem, ex *acrimonia* seri scorbutica nato, propinando *trochiscos de carabe cum lapillis cancerorum* & paucis *sacchari Saturni*, Sed utut hec juvarent, constantiam tamen sanitatis conciliavit liquor *Martis salaris*, dosi guttul. decem ad quindecim omni mane ad aliquot dies continuatus. Hinc & *tinctura* ista polychrestæ, *tinctura sulphuris virioli*, & *tinctura antiphthisica* ex *saccharo Saturni*, in quolibet miſtu cruento sunt proficue; ista quidem, ubi magis est adstringendum; hec verò, ubi magis est temperandum. In specie ratione *Martis hæmatites* inter ea, quę in genere ad *hemorrhagias* nimias conducunt, & ex eo parata remedia conveniunt, ita ut assumptus cum copioso *lacte* etiam ad miſtum cruentum à *cantharidibus* exortum prosit: loco hujus commodè etiam *terra sigillata* & quęcunque pingues, item bolus *Armena*, in usum vocantur; *acrimoniam* enim insigniter temperant. Quod etiam pertinet *hæmatites artificialis*. Emulsiones etiam ex semibus *lactiferis* cum *liquoribus adstringentibus* parari possunt; e. g.

℥. *Sem. quatuor frigid. mai. an. ʒj.*

*Papav. albi ʒij.*

*Aquę Plantag. vel urticę,*

*Millefol. an. ʒij.*

*Rosar. ʒss.*

*F. Emul.*



**1. Emulsio; cul adde**

*Corall. rub. præp.*

*Unic. fossil. vel terra sigill. an. ʒi. vel ʒij.*

*Edulcora cum paruat syr. agrimonie.*

*D. S.*

**Emulsio adstringens & temperans.**

*Opiata* autem per se nota sunt: in specie *Electuarium Melidei Paduani ad sputum sanguinis ex conserva violarum & semine hyoscyami*, *suprà Sect. 18. Cap. 3. Artic. 4. laudatum*, commodè hic applicari potest.

Ut pro scopo vulnerario hæc consolidantia ed meliùs operari possint, inter hæc eminent remedia ex cancerisfructu-  
viatilibus, sive succus sive eorum in plenilunio-exsiccato-  
rum pulvis usurpetur: quibus dicta quedam vulneraria,  
appropriata, in specie ex jam dictis simplicibus ad mi-  
ctum cruentum laudatis, superaddenda sunt. Ultra  
Cancerina & Vegetabilia hætenus dicta præ cæteris ex-  
perrus est continuatus terebinthinæ usus crudus, abster-  
gendo & consolidando omnibus scopis satisfaciens, ac in  
specie, ubi mictus cruentus ex diatesi vasorum fuerit;  
Vnde vel *Potio Plateri terebinthinata*, quæ vid. in *Obser-  
vatus*, c. 8.

**2. Terebinth. ʒvj.**

*Mellis ʒi.*

*Vini Malvat. ʒiv.*

*Pitell. ovi No. i.*

*Diluantur, ferventur ad usum.*

*Dosis ʒvj. Optime conducit in mictu cruento & puru-  
lento. Vel*

**2. Terebinth. ʒʒ.**

*Pitell. ovi No. j.*

*Mellis ʒi.*

*Agitentur in mortario, donec probe miscantur;  
adde*

*Vini albi,*

*Aqu. parietar.*

*Flor. fabar. an. ʒʒ.*

*Syr. Limonum ʒi.*

*Misc. F. Lac.*

*Confer. Colleg. Formulæ. p. ....*

Vel *Pilulae ex terebinthina cum Rhabarbaro* correfacta  
paratæ, quas continuo usu admictum cruentum despera-  
rum singulariter commendat *HOEPERUS l. 4. Quibus*  
*Rhabarbarum additur ob vim suam nephriticam renibus*  
*dicatam; sicuti ad acrimoniam sanguinis & feri, & inde*  
*ortum mictum cruentum, succus plantaginis cum Rha-*  
*barbaro assumptus commendari solet ad exulcerationem*  
*renum & vesicæ; Vel Pilulae Barbette in Chirurgia lib. 2.*  
*cap. 11. sunt optima remedia; Oleum verò & spiritus te-*  
*rebinthinæ, & Balsamus sulphuris terebinthinatus, sunt*  
*nimis acris. Unde potius terebinthina recens, vel cum vi-*  
*tello ovi soluta, vel cum ovo sorbilli aut cum vitello ovi,*  
*& aqua fragor. in formam Emulsionis aut mixturam la-*  
*team redacta.*

Denique hæc externè subjungatur usus pulveris sym-  
pathetici, vel caput mortuum vitrioli non aded, exactè  
calcinatum.

Quod si ex renum & vesicæ vitio erosio aut exulcera-  
tæ mictus cruentus oriatur, præter ea interna, quæ ha-  
ætenus suo loco fuerunt recensita, speciatim conducunt  
*injectiones* similes in vesicam, quales *suprà Sect. 18.*  
*cap. 1. artic. 13. in vesica exulceratione laudavi. In spe-*  
*cie*

**2. Aquæ plantag. ʒij.**

*Trochis. de carabe ʒi.*

*Misc. f. injectio: S.*

*Injectio adstringens.*

Vel fiat *injectio* etiam in exulceratione vesicæ non incon-  
grua:

**2. Herbi. Agrimon.**

*Equiseti.*

*Plantag. an. ʒʒ.*

*Rad. liquoric. mund. ʒij.*

*Decoqu. in aqua beton. vel potius in aqua chalyb. ferrar.  
(sic etiam aqua vitriolica)*

*In Colat. ʒʒ. dissolve*

*Mell. rosat. ʒi. vel ʒʒ.*

*Ess. resin. aloes cum Spiritus vini extr. ʒʒ.*

*M. S. Injectio purificans.*

De quo ager singulis horis portionem per syringam inli-  
ciat.

Huc etiam referendi *Clysteres terebinthinati* pro inje-  
ctione in vesicam, quos descriptos reperieris *suprà Sect.*  
*9. cap. 3. Artic. 1. ubi de dysenteria: Imò solum lac, cûl*  
*terebinthina cum vitello ovi soluta, permixta cum paucis*  
*saccharo, pro temperandi & leniendi scopo sufficit. For-*  
*tior est Injectio ex Emulsionē papaveris albi cum lapide,*  
*hamatite preparata, vel succus plantaginis cum pulvere*  
*lapidis hamatidis per syringam injectus. Si à calculis &*  
*arenulis sit sanguinis mictus, quomodo curandus, vid. RI-*  
*VERIUS in Praxi.*

Quod si fiat, ut sedato mictu cruento, ac etiam purifi-  
cato ulcere renum vel vesicæ, sanguis congruatus adhuc  
hæreat in vesica, tunc, ne hic ipse suppressionem urinæ  
inferat, dissolvendus est per remedia appropriata; quæ ta-  
men non nimis citò danda, ne aperiantur denuò vasa.  
In quorūsum imprimis succinum, quod sanguinem coagu-  
latum dissolvit, & cruentum cohibet, & omnia succina-  
ta, præcæteris sunt egregia, quæ sanguinem resolvunt,  
& eundem fluentem siliunt.

Cætera vid. *suprà, Sect. 18. cap. 3. Artic. 1. ubi de Hæ-*  
*morrhagia.*

C A P. II.

D B

URINÆ PER VESICAM EXCRE-  
TIONE LÆSA.

**V**rina ex renibus secreta & alterata in vesicam per  
irregulares destillans, tamdiu ibi continetur, donec  
vel nimia copia vesicam distendens, vel acrimoniæ suæ  
eandem irritantæ, sui excretionem urgeat, unde aperto  
sphinctere in collo vesicæ hæc sui constrictione urinam ex-  
pellit, idque secundum liberum voluntatis arbitrium.

Læditur autem hæc urinæ per vesicam excretio juxta  
læsam urinæ in renibus secretionem tribus præterpropter  
modis:

1. Quando omnino urinæ excretio aboletur, & urina  
supprimitur; id quod fit in *Ischuria, vitio vesti-*  
*cæ contractæ.*
2. Vitatur urinæ excretio, quando eadem augetur  
certo sensu, id est, quando à dormientibus aut  
vigilantibus urina involuntariè effluit, ut in  
urinæ *Incontinentia.*
3. Denique, quando depravatur urinæ excretio ita,  
ut hæc ipsa cum doloris & ardoris sensu non abs-  
que ægri nisu & conatu fiat, ut in *stranguria,*  
& *Dysuria, & similibus affectibus.*

ARTICULUS I.

D E

URINÆ EXCRETIONE  
ABOLITA.

M E M B R U M I.

D E

ISCHURIA VESICALI.

C A U S Æ.

**Q**uod suppressam urinæ excretionem seu Ischuriam  
vesicalem: hæc *suprà* nunc ex vitio renum, nunc  
ex vitio vesicæ, oriri assertum fuit.

Supprimitur urinæ excretio, seu fit *Ischuria vitio vesti-*  
*cæ*, vel vitio vesicæ urinam non emittentis, vel vitio ca-  
nalis urinarii, urinam non transmittentis. Requiritur au-  
tem ad naturalem urinæ excretionem

1. Urinæ consistentia, de qua in *Ischuria vitio renum*  
iam actum.
2. Urinæ presentis stimulus.
3. Vesicæ ab urina stimulata contractio.
4. Relaxatio musculi sphincteris orificium vesicæ strin-  
gentis.
5. Meatus patulus, per quem urina excernitur.

Vesica non emittit urinam, vel quia ipsa se non stringit pro  
illius excretionem, vel quia sphincter ejus pertinacius se  
clau-



claudit. *Non stringit se vesica*, vel vitio quasi paralytico, vel vitio relaxati fibrarum toni, quando nempe est nimis distenta: Canalis vero non emittit, quando est obstructus ab intra, aut quando est compressus ab extra.

*Vesica fit quasi paralytica*, quando sensus & motus ejus constrictivus est torpidus, ita, ut quamvis vesica plena ac urinæ copia distenta sit, non tamen sentiat stimulum urinæ; aut quando vesica se contrahere, & ita urinam expellere nequit. Nam notum est, quod media membrana sit fibrosa, & gaudeat motu peristaltico naturali. Quod si ergo fibræ fiant ineptæ contractioni, tunc vesica non potest exprimere urinam, utut aliàs se sphincter laxet. Id quod fit vel universaliter, ver. gr. in moribundis; vel particulariter, ver. gr. à medullæ oblongatæ parte inferiori, aut nervis læsis, iis nempe, ad vesicam qui derivantur. Sic enim AMATUS LUSITANUS Cent. 4. Observ. 10. observat suppressionem urinæ propter vesicæ resolutionem seu paralytin ex diuturna mora in aqua frigida contractam. *Facit etiam huc læsio nervorum vesicæ* constrictioni inservientium, sub inepta testis extractione, unde dolorosa mictio, & ferè urinæ suppressio induta fuit, teste Hildano Cent. 4. Obs. 61. Sic pariter ZACUTUS LUSITANUS l. 2. Med. Princ. Hist. pag. 146. ex torpido vesicæ sensu urinæ suppressionem notat. Quod etiam pertinet vertebrarum luxationes, aut ictus, aut lapsus, aut spinalis medullæ vulnera ista in loco circa os sacrum, unde nervi ad vesicam distributi maximam partem prodeunt, quibus compressis vel laceratis, non percipitur urina stimulans, & sic non emittitur urina: vid. GALENUS l. 6. de loc. aff. cap. 4. *Facit huc*, quod aliquando observavi in viro, qui non aut saltem difficulter urinam poterat emittere, priusquam manu regionem ossis sacri probe fricaret, tunc urinæ sequebatur fluxus. Forasan usus flagrorum in re venerea negotium hoc illustrat.

Quoad distensionem nimiam vesicæ: lædit hæc necessarium fibrarum ejus musculosarum tonum, propter quem eadem se amplius contrahere nequit; siquidem distentissimi, & ita quodammodo laceratæ fibræ musculosæ, ita propter urinam copiosioram diutius retentam, ita in suo tono leduntur, ut nimis distentæ fibræ amplius vesicam contrahere nequeant, & quamvis tota repleatur vesica, nil tamen omnino excernere valet: ex. gr. quando pudibundi nolunt iusto tempore emittere urinam, fit, ut posthinc vesica in tono debilitata se nequeat contrahere. & ita urina supprimitur: qualia exempla refert SCHENCKIUS lib. 3. Observat. 5. pag. 484. ubi notat Ischuriam periculosam ex eadem causa nimis diu in vesica cohibitam; sicut similem Observationem habet FORESTUS lib. 25. Obs. 14. Unde egger, quoties volebat urinam emittere, toties manibus calefactis abdomen comprimebat, & ita urinam exprimebat. Quod malum, utut apparenter leve videatur, nihilominus tamen ordinariè ferè inflammatio vesicæ, & hinc gangrena lethalis supervenit. Videatur FORESTUS l. a. Observat. 2. in Schol. GALENUS l. a. PANAROLLUS Pentec. 1. Obs. 72. HILDANUS de Lithiasi cap. 3. PARÆVS l. 16. cap. 48. & RIOLANUS Encheirid. Anat. Pathol. lib. 2. cap. 3.

Huc quoque faciunt vermes in vesica stabulantes, lacerando & pungendo fibras vesicæ irritantes, hincque suppressionis urinæ autores: vid. SCHENCKIUS l. 3. Observat. 312.

Pertinent etiam huc vesicæ ulcera & vulnera, ejusque laceratio & erosio, item inflammatio (vid. FORESTUS l. 25. Obs. 27. & 28.) quæ vim ejus constrictoriam turbant; tunicarum vesicæ constituentium induratio seu soliditas præternaturalis (vid. BONNETTI Sepulchreum lib. 3. Sect. 24. Obs. 16.) & paralytis seu laxitas involucri ejus carnosius, v. g. à coitu nimio; vid. BALLONIVS Epidem. & Ephem. l. 2. pag. 156.

Musculos quoque abdominis, dum quacunque de causa non sufficienter contrahuntur, & vesicam comprimunt, Ischuriam excitare posse non improbabile est; quod de tumorebus eorundem Hildanus Epist. 56. suspicatur.

Quoad sphincteris vitium; hujus debita relaxatio atque colli vesicæ apertura deficit, quando hic spasmus quasi affectus, pertinaciùs se stringit: Id quod interdum observare datur in doloribus abdominis spasmoticis, quorum occasione subinde sphincter stringi, & urina supprimi potest, uti hoc in colicis convulsivis subinde observavi, atque imprimis in dolore abdominis scorbutico; Item in do-

lore nephritico, ceu non rarum pathema plurius deducitur à DEAWIZIO Tract. de Scorbutico cap. 9. pag. 354. & WILLISIO de Anat. Brutorum lib. 12. c. 15. Ischuriam, qua cervix vesicæ obcuratur à calculo, BARTHOLINVS Cent. 2. Epist. 86. annotavit. Forasan huc cantharides pertinent, utpote de quibus refert Dn. D. FEHR de Scorzonera pag. 88. & 133. quod ex Vesicatoriis, surtis admotis, urinæ suppressio nata fuerit: nempe stimulo continuo & irritatione sphincteris vesicæ, adeoque superveniente convulsiva ejusdem strictura, vel ex nato irritationis vicinarum partium tumore, & hinc colli vesicæ & meatus urinarii compressione, Ischuria talis originem traxisse videtur.

Quoad vitia canalis seu meatus urinarii, urinam non transmittentis, ea sunt varia: imprimis se offert ejus angustia variis ex causis enata. Est enim angustatus vel obstructus ab intra, idque frequentius à calculo vesicæ eadem infarciens, quod frequentius: vid. ZACUTUS LUSITANUS Prax. Admir. lib. 2. Observat. 75. 76. & 77. Item caruncula seu verruca post exelam in aliquo loco urethram, ex quo erosionis loco caro parva, verrucæ instar, plus minus dura & sensilis, enascitur, urethram penitus occludens; quæ caruncula frequentissimè gonorrhœam diuturnam virulentam insequitur, & per catheteris vel candelæ impositionem, ubi sita sit, optime cognoscitur: qualem ex vesicæ suodo ad urethram emergentem, hancque consistantem, in semina quadam SYLVIVS Pr. lib. 1. cap. 57. §. 7. annotavit: Ischuriam quoque à carunculis urethræ cavitatem occupantibus refert RIVERIVS Cent. 1. Observat. 81. Refertur etiam huc scirrhus oui gallinacæ magnitudine collium vesicæ obturans, quem HILDANUS Cent. 2. Observat. 65. describit: vid. BARTHOLINVS Cent. 2. Hist. 52. FORESTUS lib. 25. Observat. 10. RIOLANUS Anthropol. lib. 2. cap. 28. aut alter ille, cujus de Lithiasi cap. 3. meminit. Item pituita viscida & glutinosa, quod recens natis solemne; huc colligatur in vesica ex renibus & ureteribus à calculo læsis, huc cum urina edeseratur vitio digestionis primæ; obstruit meatum urinarium, & Ischuriam insert. Quod facit nimia crassities lactis nutritis, Ischuriam in puero quodam inducens: vid. AMATUS LUSITANUS Cent. 6. Observat. 12. sic ZACUTUS LUSITANUS lib. 2. Pr. Admir. Observat. 64. urinæ suppressionem lethalem à filamentis crassis instar calami scriptorii induram refert. Et sanè, quicumque humor viscidus in vesicam delapsus, angustant meatum, obstructionem insert: Inter quos humores sepe etiam sanguinis grumi in vesica urinaria resistentes, (vid. GALENUS lib. 6. cap. 4. de Loc. aff.) item pus crassum ex vesicæ ulcere vel renem, vel aliarum partium edelatum, & circa vesicæ collum collectum, obstruendo urethram inferunt Ischuriam periculosam. Quin & quæcunque comesta, quæ promptè cum urina potius ad loca urinaria moventur, aut validiora diuretica intempestivè assumpta, nempe vel mox post alimenta, vel antequam primas vias abstergentia præmissa sint, subinde Ischuriam inferunt, dum occasione celerioris & copiosioris feri urinarii secretionis tanquam vehiculi nutrimenti & excrementi una chylosa cruda, aut etiam alia contenta viscosa seu pituitosa, ad loca urinaria rapiuntur, ibique mediante obstructione urinam supprimunt. Sic etiam ex potu vini recentis, nec ritè desiccati, partim renes partim ureteres infarciens urinæ suppressionem observavit HILDANUS Cent. 4. Observat. 52. qui etiam observat periculosissimam urinæ suppressionem ex usu terebinthina post cibos crudos & viscidos assumptæ Cent. 5. Observat. 59. Ab extrâ vero compressæ est meatus urinarius propter tumores in ejusdem radice abortos, quos inter eminent tumores prostaticarum glandulosarum in collo vesicæ collocatarum seu sitarum: Fit nempe nunquam, ut post nimium exercitium Venericum supprimatur urina, quale exemplum habet FORESTUS, PLATERVS in Obs. p. 161. HILLFRIVS Cent. 1. c. 17. & RIOLANUS l. a. nec non RHODIVS Cent. 2. obs. 37. Nam tumefacti spongiosæ prostaticæ seu glandulosæ, si diutius subsistat tumor, necessariò comprimunt urethram, & ita impediunt urinæ transitum. Sic, cum essem Romæ, mortuus est Princeps Tuscianus ex contumacissima urina in vesica suppressione, cum gravi dolore, quam neque catheter, neque candela cerca, neque res ulla alia proliferare poterat: post mortem, cadavere aperto, nihil vitii in meatu



mentu urinario aut vesica inventum fuit, præterquam inflammatio, & tumor durus proflatarum ad radicem penis sitarum, observatus fuit, à quo tumore lethalis urinæ suppressio exorta fuit. A scibus nimium induratis SCHENCKIUS Ichuriam observavit lib. 3. *Observ.* 8. pag. 485. Tandem inflammatio colli vesicæ, vel inflammatio etiam perinæ, quatenus angustat meatum urinarium, etiam urinæ suppressionem infert. Exemplum tale legitur in ZACUTO LUSITANO lib. 7. *Med. Princ. Histor.* pag. 149. & 150. Ichuriam de tumoribus vesicæ cervicis adnatis habet M. A. SEVERINVS de *Abcess.* pag. 276. BARTHOLINVS *Cent.* 1. *Epist.* 23. & RIVÉRIUS *Pr.* lib. 14. *cap.* 8. Item, dum urethrae canalis post vulnera aut ulcera coalescit; aut, quod HILDANVS *Cent.* 6. *Observ.* 49. addit, quando idem canalus in decrepitis concidit, ut anfractuositates & obacula talia per catheterem se interdum deprehendisse testetur, Ichuria fieri solet. PLATERVS lib. 2. *Observ.* pag. 564. refert, glandem penis à præputio ita fuisse oclusam in recens nato infante, ut ne quidem guttulam lotii reddere potuerit. Similes historias videb. in BONETTI SEPVLCHRETO pag. 1237. Nec dubium est, simili urinæ suppressione urgeri sceminas, quas atretas vocant, si vel à nativitate vel alio errore vulva ocludatur in totum.

Hec de Causis.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa: Ichuria vesicalis à renali distinguitur, quod in hac aut vitio ureterum nulla gravitas, nulla tensio, nullus dolor circa pubem percipitur, adfuntque potius renum & ureterum afflictorum pathemata. Contrà, si vitium in vesica hæreat, atque ea urinâ repleta sit, quam excernere non possit, tumor & protuberantia circa vesicam contingit; æger quoque, quamdiu vesicæ sensus salvus est, de tensione & dolore molestissimo, & insigni urinam emittendi nixu, frustraneotamen, conqueritur; ac Medicus, si regionem vesicæ contrectet, tumidam eandem, sed non absque insigni dolore, percipit. Ichuria hæc ex vitio vesicæ eveniens, malum est per se facillè cognitu, saltè causarum primarum perscrutatio necessaria est, ac imprimis causæ antecedentis, unà cum modo atficiendi, quomodo nempe talis causa prima Ichuriam inferre queat.

Causas has dignoscimus partim ex vesicæ aut aliarum, partim vicinarum affectuum signis, partim ex rebus prægressis & concomitantibus. Attentus ergo sit Medicus ad investigandam causam proximam Ichuriæ: e. g. Vitium vesicæ paralyticæ latere nequit ex indolentia & insensibilitate vesicæ, vel regionis vesicæ, licet distente.

Vitium fibrarum distentarum latere nequit ex eo, quod urina antèd fuit nimis diu retenta, & quod admotâ licet syringâ nihil effluxit, postmodum verò, compressâ regione pubis manu, urina profluxerit.

Causam veram esse in ocluso plus minus meatu urinario seu urethra, ex eo patet, quod ingens tumor in pube, ubi sita est vesica, ilque admodum dolorificus, in ea percipitur, & quod ex levi loci tumentis compressione hic dolor insigniter exasperetur.

Si adest insensibilitas vesicæ, vel dolores circa os sacrum, signum est oriri ex vesica læsa: si præcesserit nimia vesicæ distensio à retentione urinæ, hærebit vitium in vesica ab atonia contractum. Unde verò sit angustatio meatus urinarii, ex adjunctis & antecedentibus conjecturare licet: nempe ex signis calculi vesicæ, ex mictu cruento antecedente, ex casu ab alto, vulnere, ruptura partium vicinarum, &c. quæ suspicionem de sanguine congrumato & extravasato inferre possunt. Materia viscida sæpius cum urina excreta, aut etiam pus, obstruere meatum ostenditur, si æger solitus sit cum urina subindètalem materiam rejicere, quod malum hoc subindè soleat recurrere. Indicium hujusmodi suppressionum, præter tumorem & dolorem vesicæ ex repleta urina, optimè suggerit catheter, qui intrusus per sphincterem vesicæ penetrat, & ita aperiendo meatum urinarium, & removendo impedimenta, urinæ fluxum promovet: Vid. RIVÉRIUS *Pr.* l. 14. c. 8.

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: Suppressio omnis urinæ malum est periculosum, & quod diutius durat, eò est gravius, quia acutum dolorem, sæpè inflammationes, & interdum ex nimis doloribus epilepticas convulsiones infert, ut plurimum die 11 necat.

Melius tamen est, si ægri ex urinæ suppressione percipiunt dolorem: Nam retentio urinæ totalis in morbo sine dolore, instantis mortis solet esse signum; innuit enim jam deficientem vim sensibilitatis corporis.

Ista, quæ fit ex vesicæ paralytâ Ichuria, item, quæ ex nimia corporis eius distensione oritur, contumacissima, & sæpius periculosissima esse solet: Vid. PANAROLLVS, & HILDANVS l. a.

Pari ratione se habet, quæ à scirrho cervicis, aut partis cujusdam vicinæ tumore incurabili oritur, collum sc. & meatum urinarium consipante aut comprimente.

Brevius morituros denotat tenesmus & singultus.

Contrà frequentius solvitur ea, quæ à grumo calculove minore inducitur.

### CURA.

Quod ergo attinet Curam: in hac varietatis causarum imprimis habenda est ratio: Unde

1. Hæ ipsæ, impediētes transitum urinæ, imprimis removendæ.
2. Interna diuretica, præsertim salina, seu urinam acrimoniam suam promoventia, propinanda.
3. Externis vesica subinde stimulanda.

Sin ergo malum est à vitio nervorum, vel vesicæ minis sensilis, vel aliàs quasi paralyticæ, conveniunt Nervina intrinsecè quæ propinanda, ac exterius admovenda: internè e. g. malvaticum iuniperinum, oleum destillatum baccarum iuniperi, succini, aut terebinthine conveniunt, idque ad imitationem THONERI in *Obs.* pag. 175. qui Ichuriam & stranguriam gravissimam ab intemperie frigida & humida cum humoribus phlegmaticis, præmissis internis, curavit per oleum destillatum succini ad gr. vii. cum aqua petrolei. Item conveniunt aselli. Quod etiam spectat cerebrum picarum à RIVÉRIO *Obs. communic.* pag. 340. laudatum. Injiciendi sunt Clystères, primò quidem blandè emollientes, ex parietaria, &c. quale dedi in Cura calculi Renalis Cap. 1. Membr. 1. postmodum etiam acres ex centauro minori, colocynthide & similibus; aut administranda blanda Purgantia, quæ aluum stimulare, & per consensum simul vesicam ad excretionem urinæ plus minus irritare valent: Vid. LANGIVS in *Misc. Med. Gymnas.* 6. pag. 14. ubi laudat Autor hic Clystma in casu suppressæ urinæ vitio vesicæ. Item comprimat ur abdomen, detineatur anhelitus, ut ita uti quasi urina proluciat: quod nisi urina spontè sequatur, catheter usurpetur, ut ejus medio urinæ patefiat exitus. Sed quoniam gravia & periculosa subinde symptomata vel ineptè vel crebrius usurpatus catheter inferre potest, de quo vid. LYSERVS in *Obs.* pag. 250. item PANAROLLVS *Pens.* 2. *Obs.* 20. tutior est candela cerea, melle aut oleo amygdalarum dulcium illita, si immittatur ad imitationem SYLVII *Traçt. de cachexia* §. 275. vel usurpetur fistula membranacea seu coriacea ad imitationem HELMONTII *Traçt. de lithiasi cap.* 7. §. 34. mediante qua simul per spononem applicati liquores commodè possunt injici, ut ita istis mediis retenta proluciat urina. Proleat sic urinâ, injiciatur vesicæ liquor decoctionis salviæ, origani, pullegii, calaminthæ, rutæ, florum tilis, rosarum, castorei, ac similibus nervinarum, antiparalyticarum, ut sensus & motus vesicæ redeat: Item applicanda sunt Fomenta ex decocto similibus Nervinorum cum anetho, chamomilla, abrotano, parietaria & similibus in Aqu. vel vino cocta: vel fiat *Forus ex Decocto*:

℞. Herb. parietar. M. iv.

Sam. anisi,

Petrosel. an. ʒj.

Herb. filipend. rubr. M. j.

Zedoar. ʒij.

Bacc. lauri ʒj.

Decoqu. omnia in vino vel Aqu. & vel instar forus applicantur cum spongia aut linteolis multiplicatis, vel infunduntur in vesicam.



Proficuum est in quavis ferè lſchuria vesicali.

Vel etiam folia tiliæ in vino cocta, & super peſtinem imposita subito urinam proliciunt. Vel apponitur Cataplasma ex parietaria cum oleo scorpionum, quod ipsum aliàs est egregium in quacunque urinae suppressione. Litus item ex oleo scorpionum, castorei, nardino, rutaceo, hyperico, oleo destillato juniperi, terebinthinæ & similibus regioni pubis & perinæ commodè illiniri potest, etiam circa os sacrum: Item unguentum dialbæ cum oleo scorpionum mistum pubi, vel lumbis illinatur, addito petroleo. Denique oleum massicis destillat. umbilico inunctum remorantem urinam promovet; e.g.

24. Ungu. dialb. ʒʒ.

Olei scorpion. ʒij.

M. D. S.

Unguentum urinam promovens.

Illinatur pubi ac peſtini.

24. Ungu. dialb. ʒʒ.

Olei scorpion ʒij.

Destill. bacc. junip. ʒʒ.

M. S. ut auct.

Quo illinatur regio pubis.

Item conveniens est Emplastrum nervinum applicatum regioni ossis sacri & pubis, malaxatum prius cum oleo destill. succini.

Tandem, ubi in graviore vel pertinaciori malo nec hæc suffecerint, Infessus & semicupin ex emollientibus & nervinis appropriatis, ex materia Medica notis, instituuntur, quibus insideat æger, exhibendo paulò ante infessum blanda diuretica, v. g. aliquot guttas olei destillati succini vel terebinthinæ, aut aliquot grana salis volat. succini in aqua seu spiritu juniperi, vel alio liquore appropriato.

In ardentibus aut malignis febribus si suppressa sit urina, vel ægri aliquandiu circumducendi sunt deambulando (conf. SYDENHAM in Observ. de Morbis acutis pag. 212.) vel illinatur regio pubis cum unguento iam dicto; vel imponantur fomenta & cataplasmata.

Si fiat suppressio urinae ex extensiore vesicæ nimia, præter blandiorem compressionem cum manu, in specie conveniunt externi similes foci nervini ex parietaria, anetho, floribus chamemille, millefolio, origano, pulegio, meliloto, semine lini, sænu græci, & similibus: Item cataplasma ex chærefolio, parietaria & persicelino, in butyro frixis, quod expertum est à SIMONE PALVI in Quadrip. Beron. pag. 175. Vel cataplasma ex parietaria, & cepa cum oleo scorpionum peſtini impositum egregiè prodest: item Cataplasmata ex cepis, vel parietaria, de quibus infra, applicari possunt, si prius modis supra dictis per catheterem, &c. urina fuerit evacuata. Fiac quoque Litus ex oleis destill. aromaticis, cumini, terebinthinæ & juniperi; vel emplastrum de meliloto, malaxatum dicto oleo, applicetur regioni pubis.

Quod si vitio sphincteris supprimatur urina, litus in perinæ & pubis regione ex Unguento nervino, dialbæ cum oleo papaveris, castorei ac succini confert, & applicetur totus ex nervinis recensitis. Internè verò simul propinantur volatilia antispasmodica cum opiatis mista: sed modò primarius curatus fuerit morbus, secundarium hoc symptoma spontè evanescit. Sic v. g. si à cantharidibus ortum fuerit, lac, & emulsiones lactæ, sunt optimæ.

Si ab hæmorrhoidum intumescencia, aut prolapsu sinus pudoris, bernia, inflammatione vesicæ, partiumque vicinarum, similibusque tumoribus dissolubilibus, fotibus appropriatis removeri debent.

Quod si obstructa sit urethra, tunc pro diversitate causarum vel materiæ effluentis, varianda remedia. Nam si sit à grumo sanguinis, dentur internè hunc resolventia, ac in specie solutio lapillorum cancerorum in aceto, cum decocto radices rubiæ tinctorum, aut Krapp: item dandum Decoctum artemisiæ cum Decocto chærefolii, hyperici; vel mumia, myrrha, trochisci de carabe, sperma ceti, essentia chærefolii, essentia hyperici, essentia traumaticæ. Cum quibus iungatur Infessus aut foci ex Decocto simplicium emollientium & resolventium sanguinis grumos, sicut propriâ experientia docet TIMÆVS von GuldenKlee lib. 3. Cas. 41 quales sunt optimi in sanguinis grumis, vel aliis irritis in sanguinis grumositate vesicam obstruente. Externè expertum remedium est in grumis sanguinis stercus bouinum, quàm recentissimè adhuc excretum, peſtini, pudendo, & perinæ applica-

tum; hoc ipsum egim euporison discuti & emollit sanguinem, quo resolutio emanabit urina; si desiterens stercus, adhibeatur siccum, oleis appropriatis ad ignem permistum: Vid. ZACUTUS LUSITANUS lib. 2. Pract. Adm. Obs. 65.

Quod si malum sit ab aëre & obstruione à materia viscida & mucilaginosa, post purgans blandum conveniunt internè Raphanacea ex armoracia, raphano communi, terebinthina cum pulvere liquiritiæ frequentius exhibitæ, Decoctum aperiens & diureticum superbibendo; item succus parietariæ, & similia Incidentia; item spiritus gummi ammoniaci compositus, qui est optimus; aut etiam spiritus salis dulcis, qui etiam est egregius: Nam simul urinam stimulat. Imprimis succus limonum vel citri ad ʒij. vel jv. usurpatus: appropriatissimum est remedium vid. AMATVS LVSITANVS Cent. 3. Cur. 71. Vel ad imitationem RIVERII in Obs. 42. à FOMIO communicata:

24. Vini albi dulc. ʒij. vel iv.

Succ. limon. ʒi. vel ʒij. ad ʒij.

Spiritus terebinth. ʒi. ad ʒij.

Misc.

Mucilaginem dissolvit, & urinae transitum parat.

Item succus parietariæ cum oxymelise experimentum est HELIDÆI PADVANI &c. FORESTUS ceu singulare experimentum commendat folia ribes nigra, ut nempè Decoctis urinam cientibus debeat addi: Hæc enim folia adeò pellere urinam, ut etiam sanguinem proliciant, res est probabilis; Nam ipsa folia odorem urinae foetidissimum obtinent, ita, ut nulla matula sit adeò foetida, quàm hæc folia.

Si malum sit ex tumoribus proſtatarum circa radicem urebræ, præter cataplasmata cepacea & alliata, prodest beccabunga cum floribus chamemille, instarimenti aut cataplasmatibus, regioni perloxi & vesicæ applicata.

Si pus tenacius obſtiterit, succinum cum vino propinatum est egregium remedium; item Succinata, balsamus sulphuris succinatæ, terebinthinatus, & oleum juniperinum, succini, & similia ferè, quæ modò circa grumos sanguinis fuerunt insinuatæ, sunt egregia; imò etiam vesicæ injicienda: cum quibus simul debitus catheterum usus non negligendus, qui tamen, ubi vesica simul, aut aliàs, inflammata, locum non habet.

Quod si supprimatur urina à caruncula inter meatum urinarum genita, hæc quantocius removenda est; illud erosio & ablatio tentanda, methodo ab AMATO LUSITANO Cent. 4. Obs. 14. delineatà. Convenit in specie sequens:

24. Merc. præcipit. ʒij.

Ungu. de ceruss. ʒij.

Misc. pro Linimento.

Pro magnitudine affectus aliquid olei nitrioli addi potest.

Supra ceream candellam ponitur, & hoc ipso caruncula aliquoties, sed modeste, in die attingitur: vel Merc. præcipitatus dulcescens seu Turbit mineralis cum emplastro triapharmaco candela cerea apponitur, & dicto modo usurpatur: Vid. VELSCHIVS Midiom. Cent. 1. Obs. 54. annex. M. A. N. C. Ann. 4.

In malo leviori candela ex cera alba, cui admiscetur antimonium crudum pulverisatum, vel, qui melior, crocus metallorum, leviter aufert carunculam. Quod si gravius aut pertinacius fuerit, magna ex Mercurio sublimato & viridi æris cum cereo applicetur: Conf. M. A. N. C. Ann. 8. Obs. 92. pag. 152.

Obiervandum autem, ne virgæ aut candelæ sint ex pura cera, quia faciliè nimis franguntur, sed admiscenda est terebinthina.

24. Cera alba ʒij.

Terebinth. Venet. ʒj.

Liquefiat cera, post addatur terebinthina: quibus liquatis tingantur ellyebnia, fiantque candela.

Unguentum de calce viva, fuscum Felici Wurzii, cum melle rosato etiam carunculam absumit: Conf. BARBETTE in Chirurg. pag. 269.

Quod si exesa fuerit caruncula, pro consolidatione reliqui ulcusculi unguentum album camphbratum immissum consolidat.

Applicantur tamen candela corrosivis imbuta cautè, ne ex nimia corrosione gangræna oboriatur, cujus exem-



exempla videb. in **LUSITANI** *Observ. pag. 250.* Cætera pro hoc scopo usitata remedia videb. in **SENNERTO** *lib. 3. Præf. item BORELLO* *Cent. 2. Obs. 179.*

Externè in quacunq. lſcuria convenientissimus est sor-  
tus supra laudatæ ex semine anisi, petroselinii, & similibus  
in vino coctis, hinc remedia ex *allii & cepis* cum oleis, coctis  
aut frixis, pubi aut pectini applicatis, lſcuriam vesicæ optime  
collunt. Cephæ albæ concisæ in vino decoctæ, instar somenti  
applicentur; vel

*℥. Cephæ sub ciner. cocta:*  
adde

*Pingued. anser. ℥ss.*

Misc. sub forma Linimenti: S.

*Unguentum urinam promovens.*

Illinatur hoc ipsum umbilico & pubi; subirdenim promo-  
vet urinam. Probatum hoc est in multis casibus, & aliis nil  
juvantibus. Conveniens etiam est perinco applicatum, si à  
Veneris abusu suppressa sit urina, prout in tali casu expertus  
est **HILLERIUS** *Cent. 1. Cur. 17.* Vel

*℥. Cephæ alb. crud. Num. vj.*

*Cap. allii Num. ij. vel iv.*

Contusis in mortario adde

*Pingu. anser. q. l.*

*Olei scorpion. parum.*

Adspargantur aliquot guttulæ olei destillati juniperi.

Misc. pro Cataplasmate.

D. S.

*Cataplasma urinam promovens.*

Applicetur regioni renum & pubis.

Post hæc egregium etiam est *Cataplasma ex parietaria* (in-  
telligo semper eam, quæ crescit in parietibus antiquis propter  
rationes supra dictas) contusa, cocta cum cepis & cum oleo  
scorpionum instar cataplasmatibus pectini imposita, quod expe-  
rimeptum singulare est **HELIDÆI PADUANI**. *Mercuri*  
*sejellæ*, dicit **FORESTUS** *lib. 25. Obs. 8.* Vel decoquatur  
Parietaria, cum vigo, & subigatur cum cepis in formam  
Cataplasmatibus; Vel

*℥. Herb. Parietar. M. ij.*

*Chereseol. M. ss.*

*Flor. chamom. M. j.*

Incisa coqu. ad mollitiem, adde

*Butyri rec. ℥ij. vel ℥iv.*

*Olei scorpion. ℥ss. ad ℥ss.*

M. f. Cataplasma

D. S. ut supra

Applicetur calide pubi, & de super operculum calidum.  
Hoc ipso lſcuriam puerperæ ex frigore subitaneo desperatam  
curavit **FORESTUS**: *Vid. l. 2. Notabilis est casus.*

Tandem etiam in lſcuria ex vitio vesicæ convenit Litus  
externus cum oleo amygdalarum amaratum; item cum oleo  
nucleorum Persicorum; item fiat linimentum cum unguen-  
to dialthææ, & oleo nucleorum persicorum, oleo scorpion-  
um, acuato cum aliquot guttis olei destillati terebinthinæ,  
succini & similibus, regioni pubis, perinco & umbilico inun-  
gendum, de quo supra dictum.

Vel

*℥. Olei petreæ albæ ℥ss.*

*Destill. bacc. junip. ℥ss.*

Excip. cum f. q. *Unguent. dialth.* pro Litu externo;

D. S.

*Unguentum urinam promovens.*

Denique oleum massicibus destill. inunctum umbilico, remo-  
vantem urinam egregie pellit. Tandem quorundam dici-  
tur experientum, ut ægro inscio immittantur pedes in  
aquam fervidam, seu benè calentem; sic enim perterrefac-  
tum ægrum subird urinam reddere asserunt. Quod etiam  
prodesse dicunt in Tussi.

## MEMBRUM II.

### DE

### CALCULO VESICÆ.

**Q**uod si calculus vesicæ meatum urinarium obtoraverit,  
hic removendus venit. An unquam aliquis in vesica  
calculus producat, dubitat **FERNELIUS**, omnemque,  
qui in ea reperitur, rudimentum suum in renibus traxisse,  
in vesica verò postmodum incrementum sumpsisse, putat,  
ideò, quod in contritis vesicæ calculis nuclei sæpius repe-  
riantur, diversi à reliqua eorum crusta coloris ac substantiæ,  
*Estmull. Oper. Tom. II.*

nullusque observetur calculo laborans, nisi qui nephriticis  
doloribus vexatus fuerit. Et quidem *Calculi vesicæ* frequen-  
tissime ex calculo renum primariam sui originem ducunt:  
conf. *M. A. N. C. Ann. 6. Observat. 109. pag. 147. Lesa*  
*enim ureterum tunica nervosa, ipsa etiam vesicæ calculi*  
*motu nonnihil attrita, plorant hæc partes læsæ nutrimen-*  
*tum proprium sub forma mucilaginis crassæ & spissæ;*  
*quæ mucilago unâ cum urina calculosorum excreta ha-*  
*betur vulgò pro pituita, ex qua per calorem arefacta*  
*generetur calculus, cum tamen reverà sit alimentum*  
*proprium ureterum ac vesicæ, in vesicæ cavum destillans,*  
*& ita concretum. Hæc ipsa tamen mucilago, ubi aliquan-*  
*tulum ejus subindè adhæret calculo renali eo delapso,*  
*in hujus augmentum cedit. Accrescentibus enim pluri-*  
*mis arenulis, aut advenientibus salibus coagulabilibus*  
*ex urina, simul in calculi consortium rapiuntur, & ex-*  
*indè calculi vesicæ augmentum oritur. Hinc vesicæ calculi*  
*maiores lamellatim concreti reperiuntur, instar nempe cepa-*  
*rum cortice uno supra alterum concreto, facile tamen à se*  
*invicem separabili. Siquis unquam vidit lapidem bezoar,*  
*vel lapidem ex folliculo felleo bovis, is tales lamellas pariter*  
*in calculo vesicæ inveniet, ita, ut in centro parvulus lapillus;*  
*vel compactæ arenulæ reperiuntur, quod eleganter decla-*  
*rat BOYLE in Phil. Experiment. Confer: BOREL-*  
*LVS Centur. 2. Observ. 62. & VELSCHIVS Hecar. 2.*  
*pag. 32.*

Nihilominus autem, utut frequentissime rem ita se ha-  
bere concedi debeat, id est plurimi calculi rudimenta sua  
prima renibus debeant, in vesica verò morbosum incremen-  
tum recipiant; contrarium tamen quoque, id est, quampluri-  
mos calculos ipsam etiam vesicam pro prima minera agno-  
scere diversa persuadent.

1. Quod multi pueri sine nephriticis symptomatis an-  
tecedentis calculo laborent.
2. Plures etiam calculi è vesica protracti, quoad nu-  
cleum & corticem eundem substantiæ modum,  
quoad interiora & exteriora, habeant.
3. Calculus vesicæ non rarò adnascatur per tuni-  
cam quandam: vid. **RIVERIUS** *lib. 14.*  
*cap. 2.*

## D I A G N O S I S.

Signa diagnostica calculi vesicæ sunt ferè difficillima,  
potissimum in principio morbi; grandior autem redditus  
signa ferè facilliora præ se fert: vid. **SALMUTH** *Cent.*  
*1. Obs. 25. RIOLANUS Antropogr. lib. 2. cap. 24.*  
**HILDANUS** *de Lumbi vesicæ cap. 3. & Sæbologra-*  
*phus HOLLERII lib. 1. de Morb. intemperiei cap.*  
*30.*

Conjecturari interim licet calculum in vesica ex sequ.  
Nam percipitur imprimis impedimentum quodcumque in  
vesica, ita ut sentiant ægri quasi aliquod obstaculum, quod  
se opponit meatui urinario sub urina excretionem, & in me-  
dio sui cursu urina subito supprimatur, unde assiduus ad  
urinam mittendam stimulus, & summa mejendi difficultas  
& urinae stillicidium.

Item anus in consensum trahitur, & unâ tenesmo affli-  
gitur, quod unum ex potissimis est signis: Imò tenes-  
mus hic interdum est tantus, ut ex crebriori egeren-  
di conatu sæpius procidentiam intestini recti comitari so-  
leat.

Uterius ægri calculo vesicæ correpti percipiunt obrutum  
dorem perinco seu colli vesicæ, qui circa finem mictionis  
exasperatur; & si calculus majorem molem contraxerit, pon-  
dus in perinco & tota pectinis regione.

In penis glande seu balano est dolor & pruritus ex continua-  
tione membranæ internæ vesicæ ad glandem penis, ita ut æ-  
gri interdum putent, calculum hæere in balano seu glan-  
de: vid. **HILDANUS** *Cent. 6. Observ. 49.* hinc uri-  
nam reddituri glandem fricent, comprimant & protrahant.

Subindè continuam erectionem atque tensionem penis  
patiuntur, idque ex irritatione membranæ vesicæ in-  
ternæ cum membrana meatus urinarii circa radicem pe-  
nis.

Sanè **HELIDÆVS PADVANVS** ceu exper-  
tissima calculi signa vesicæ habet, præter urinae difficulta-  
tem, si post mingendi desiderium etiam adsit desiderium ex-  
cernendi feces intestinorum, & si ægri, dum aliquem pa-  
lum, & simile quid humo attolliero volunt, dum se incli-  
nant,



Iniciantur quoque clysteres, quorum formulas dedi supra Membro 2. Artic. 1. §. 2. Capit. 1 ubi de Calculo Renum. Tandem si hæc irrita fuerint, operanda erit, ut sectione removeatur calculus. Sectio hæc ut peragatur, ex Chirurgicis petatur: cui addenda illa vesicæ cervicis perforatio, quam in desperatis RIOLANVS Enebert. *Anatomico-pæthol. lib. 2. cap. 30.* & ZECHIVS *Consult. 38.* describunt & commendant. Facile verò excinditur calculus vesicæ, & nulum subest periculum, nisi fuerit admodum ingens, aut metuenda vel vesicæ inflammatio, vel superueniens gangræna lethalis, vel fistula post sectionem relicta.

Hæc genus de calculo, occasione suppressionis urinæ.

## ARTICULUS II.

DE

URINÆ EXCRETIONE AUCTA.

MEMBRUM UNUM.

DE

URINÆ INCONTINENTIA.

**I**n affectibus, qui in urinæ excretionem læsa conveniunt, adhuc versamur, & absolvimus jam abolitam vesicæ vitio. Contrarium huic vitium est *aucta seu frequens nimis urina excretio*, seu quando urina ad voluntatis imperium & arbitrium diu satis retineri nequit, & præter voluntatem effluit, quod vitium communiter aliàs dicitur *Urinæ Incontinentia*, seu *involuntarium urinæ profusum*.

Vitium hoc duplici modo affligit ægros: aut enim dormientes solummodo urinam continere nequeunt, ut in *Lætimingis*, seu *lis*, qui stragula permungunt: aut vitium hoc diurno pariter ac nocturno tempore infestum est, ita ut *vigilantibus ac dormientibus æqualiter urina involuntariè effluat*: Quod etiam spectat, si urina satis diu retineri nequeat, sed ad mictionem frequentiorē urgeat.

### PARS AFFECTA & CAUSÆ.

*Subiectum & Causa* huius affectus proxima, quam Veteres retentricem læsam aiebant, est deficiens contractio sphincteris vesicæ: Sphincter enim musculus vesicæ est, qui fibris suis circularibus collum ejus inuestit, fortiter constringit, arcuque claudit, ita ut non, nisi voluntatis imperio relaxatus, urinæ transitum permittat, quando verò vis huius contractoria in fibrarum legitimo tono residens tollitur, vel vitatur, eo ipso etiam urinæ Incontinentia adest. *Causa ergo proxima est deficiens sphincteris Vesicæ contractio.*

*Causa Remota*, per quam debita sphincteris huius contractio, modo sympathicè modo idiopathicè, deficit, est 1. *Paralysis vel Resolutio vitio nervorum eveniens*, sive universalis totius corporis, sive partialis, solam vesicam & sphincterem afficiens, dum nempe ex impedimento nervi injecto spirituum animalium irradiatio debita fieri nequit. Si ergo ex quacunque causa, vel interna vel externa, læduntur nervi ad sphincterem abeuntes, eumque stringentes, spiritibus resolutis fibræ relaxatæ se minus stringunt, & Incontinentia Urinæ infertur. Similiter quoque contingit hæc sphincteris resolutio interdum a casu ab alio, siquis ad regionem lumborum, ossis pubis, aut ossis sacri impingat, ubi nempe nervi ex spinæ li medulla derivantur ad vesicam: sic Luxatio etiam vertebrarum in locis istis subinde urinæ Incontinentiam infert, qualis exempla videb. apud SCHENCKIUM in *Obs. lib. 3. ex BENIVENIO*, & in *Observ. lib. 3. ZACVTVM LVSITANVM l. 2. Med. Princ. Hist. 143.* Item refert AMATVS LVSITANVS *Cent. 2. Cur. 11.* de quodam, qui ex lapsu in dorsum urinam retinere non potuit, ex ultima vertebra affecta. Imò diuturnior mora in aqua frigida & ipsa resolvere sphincterem vesicæ, & sic urinæ Incontinentiam inferre valet. Pertinet huc, dum morbis acutis, ægrisque summè debilitatis, superuenit urinæ Incontinentia ex defectu spirituum animalium, adeoque viribus pendexhaustis: id quod & *Etmull. Oper. Tom. II.*

*apoplecticis* ordinariò ferè accidere solet, in quibus involuntariò & scæces alui & vesicæ effluunt.

Deficit etiam II. sphincteris vesicæ contractio ob fibrarum sphincteris etiam nimiam relaxationem, sive tonum omnino læsum, idque sæpius propter nimiam distensionem, si nimium distendatur sphincter, ut non possit iterum in situm naturalem redigi. Causa hæc subinde affligit in specie mulieres primiparas in partu difficili, factio propter nimiam fetus magnitudinem; hinc enim, dum fetus eluari nititur per istas angustias, vaginam uteri, & simul collum vesicæ, ejusque sphincterem, vaginæ uteri implantatum, nimis dilatando in causa est, ut sæpius postmodum urinam retinere nequeant. Exemplum tale recenset PLATERVS in *Observat. pag. 256.* de mictu involuntario, ob cervicis vesicæ in partu dilacerationem, & quasi scissionem.

Tandem III. Quando fibræ sphincteris contractoris omnino lacerantur, ac plùs minùs intense læduntur, etiam cessat urinæ retentio. Fit hoc non tantum in vulneribus istarum partium fortuitis, sed etiam imprimis in *liboromia*, seu sectione calculi vesicæ, incuratè instituta, fibrisque sphincteris in collo vesicæ plùs minùs discissis, ut ob id postmodum retineri nequeat: exemplum videb. in *SCVLTETI Armament. Chirurg. Obs. 63.* Pertinet huc etiam obstetricum ineptitudo, quæ vesicæ collum aut carunculam myriformem majorem, orificio vesicæ præpositam, in parturientibus subinde digitis aut unguibus lacerant, & inde non rarò gravissimam Incontinentiam urinæ inferunt: Ut taceam in difficiliore partu rumpi quasi vesicæ sphincterem; vid. HEINRICVS ab Heer in *Observat. 14.* item SALMVTH in *Observat. C. 1. Hist. 39.* Fit hoc interdum etiam in mulieribus propter prolapsum sinus pudoris, in quo casu etiam ex dilatazione & relaxatione fibrarum membranae vaginæ, simulque relaxatione fibrarum sphincteris, subinde urinæ Incontinentia oriri solet: Vid. BARTHOLINVS *Cent. 4. Hist. Anat. 2. pag. 213.* ubi urinæ Incontinentiam refert ex ulcere vesicæ cum prolapsu uteri.

Cæterum pertinet huc suo modo vitium istud, quando urina satis diu retineri nequit, cum quidem potest retineri urina, sed non satis diu, & subinde emitte necesse est, atque nisi hoc fiat, spontè effluit: id quod ferè propter continuum ac sensiliorem in vesica stimulum contingit: ita ut & sæpe & parum excernatur, absque tamen dolore in excretionem, aut absque ulla molestia; sin verò retineri debeat diutius urina, tunc vesica doleat, aut irritata excretionem stimulet. Contingit hoc interdum in calculo vesicæ, qui incumbens collo vesicæ clauso, sua mole aut asperitate, aliaue ratione continuo irritando, mictionem urget: Item contingit hoc etiam interdum gravidis ultimis gestationis mensibus, dum moles uterina premit vesicam, aut subsidendo distendit vaginam uteri, sicque per consequens orificium vesicæ simul dilatat, unde continuus percipitur stimulus, nec sufficienter urina retineri potest.

Facit huc etiam vitium, quando excoriata aut exulcerata est vesica, in specie ejus orificium; sic enim ab excoriatione ad excretionem stimolata vesica urinam mittit, ut propterea frequentius & sæpius mingatur.

Denique etiam risus & tussis diuturnior & gravior ad hoc vitium disponit, dum ægri crebrius tussientes simul urinam emittunt, quod etiam observavit SALMVTH *Cent. 2. Observat. 30.* item PLATERVS *lib. 2. suarum Observat.* in specie in mulieribus corpore magis obeso aut habitiori præditis: nempe coguntur in tussim cum diaphragmate quilibet abdominis partes internæ, quibus concussis etiam vesica concutitur, & sphincter se laxat, idque eò magis, quò minus in obesiori corporis habitu partes externæ cedunt, ut ita quasi impetu protrudatur tanquam ex siphone urina. Fit denique hoc etiam malum in casu, quando vesica ob suam angustiam seu naturam parvitatem urinam multam, aut diu, retinere nequit, tam naturam sub prima generatione, quam ascititiam propter tumorem vel proprium vel partium vicinarum, ex quarum compressione angustatur, ut urinam diu satis retinere nequeat, v.g. in inflammatione musculorum rectorum abdominis in pubis regione vesicæ superjacentium: vid. TIMÆVS *von guidenKlee lib. 3. Cas. 45.*

Hæc sunt vera & propriè dicta *urina Incontinentia*, vigilantibus pariter ac dormientibus conveniens.

Verum, quod improprie dictam *Incontinentiam Urinæ*, seu



seu quando interdum optimè retinetur urina, noctu verò dormientes saltem stragula permungunt, vitium istud aut est ex debilitate facultatis retentricis, ut vulgò loquuntur, rectius verò facultatis animalis, i. e. vel ex deficiente activitate, & ita torpore spirituum animalium, aut ex eorundem defectu, dum sc. hi aut deficientes aut torpidi non satis firmant tonum fibrarum sphincteris vesicæ constrictoriarum. Unde videmus, quod in specie Infantibus aut senellis propter spirituum torporem aut segnitiam vitium hoc frequens sit, dum nempe spiritus animales nequeunt validè per nervos ad fibras nocturno tempore irrere. Interdum etiam senibus in ultimo senio obvenit nocturna Incontinentia urinæ; quia & interdum morbis acutis superuenit, ex prostratione nempe facultatis animalis, seu ex defectu spirituum animalium. Frequenter autem solet affligere senes propter muscolum sphincteris semiparalyticum, & propter spirituum animalium vigorem deficientem. Imprimis & his imprimis familiaris est urinæ Incontinentia, qui sub consistente ætate nimis indusserunt potui, & qui obnoxii fuerunt calculo. Interdum etiam consuetudo hic superuenit; ita ut pueri, interdum etiam adulti, ex prava consuetudine stragula largiter permungant. Facit etiam huc imaginationis vis, quatenus nonnulli à nimio potu, acriter urina, aut sensibilitate vesicæ majori stimulatæ lectum permungunt, somniantes se matulam tenere: Utrumque non tam Medicamentis, quam flagris aliisque fraudibus cedens.

### DIAGNOSIS.

Quoad signa diagnostica, affectus hic facilissimus est cognitu; Nam si ægri tacent, loquuntur stragula & vestimenta: Saltem causarum diversitas partim ex relatione ægri, partim ex antecedentibus circumstantiis expiscanda venit, vid. RIVERII Praxis lib. 14. cap. 7. & TIMÆVS von Gulden Klee l. a.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin verò, istud urinæ profluvium, quod dormientibus saltem obvenit, levius est, quam quod vigilantibus contingit.

Quodsi adsit talis urinæ Incontinentia ex vitio nervorum paralyticorum, in specie vitio cerebri, aut spinalis medullæ, difficilis curatu & periculosus est affectus, nempe ex vitio sphincteris exortus: Vid. PLATERVS Obsev. pag. 805.

In senibus urinæ Incontinentia est ut plurimum immedicabilis, nisi quod interdum forsitan thermæ iisdem succurrant.

In febribus acutis aut aliis morbis acutis, siue à delirio, siue spirituum resolutione proveniant, superueniens urinæ Incontinentia, summum periculum innuit, & mortem ut plurimum portendit: indicat enim deficientem penitus vim animalem, & deficientes spiritus animales, tonumque nervorum iam satiscentem.

Puerperis ex læsione violenta superueniens urinæ profluvium rarè curatur.

In pueris interdum per incrementum annorum subinde spontè cessat, sc. intra annum vigesimum quintum: Nam ubi tunc non cessat, metus est, ne ex HIPPOCRATIS mente sit immedicabilis. Observat tale exemplum TIMÆVS von Gulden Klee in casibus lib. 5. Conf. 22. pag. 258. de puero Incontinentiâ urinæ laborante incompe- scibili, quæ ipsa tamen succedente ætate spontè naturâ curata fuit.

### CURA.

Quod attinet Curam Incontinentiæ urinæ; in hac imprimis causæ remotæ corrigendæ, hinc frequentissime in malo hoc musculus sphincter adstringentibus & Nervinis aromaticis roborandus, siue internè propinentur, siue externè admoveantur. Pro quo scopo in genere conveniunt omnia adstringentia, nervina simplicia antiparalytica: Et quidem si malum adsit à paralyti seu resolutione, remedia externa non tantum vesicæ, sed etiam lumbis, ossique sacro, ubi sibi sc. nervorum vesicæ est exortus, imò ipsi cerebro, applicanda sunt. Purgantibus aliisque

Evacuantibus hoc in casu vix videtur opus, nisi humores pituitosos & serosos abundare constet, ubi Decocta sudorifera ex lignis singularis efficaciz à RIVERO l. a. proclantantur.

In genere ergo ad quamcunque ferè urinæ Incontinentiam laudantur quædam euporista, per usum appropriata observata, ut calamintha & mentha, & omnes his cognatæ simplicium species cum vino coctæ, & ante pastum haustæ. Deinde alchimilla & agrimoniz usus, calaminthæ additæ, specificè quocunque modo conveniunt ob vim adstringentem vulnerariam. Hisce accensetur callorem, quod imprimis in affectu nervino paralytico egregium est remedium. Galanga, non secus atque lignum aloes resinosum subtilissimè pulverisatum ad ℥j. cum cyatho dimidio vini albi generosi, aut etiam in ovo sorbilli assumptum, manè & tempore somni insigniter in hoc prodest. Item plantago, radix consolida majoris, cyperi, nuces cupressi, equisetum, succinum, flores & semen hyperici, semen agrimoniz, glandes & medullâ glandium, mastix, &c. Certè pulvis massicis ad ℥j. crebrius haustus in vini haustu admodum etiam confert; uti etiam, myrrha, si propinetur in vino Decoctionis seu Infusionis calaminthæ. Ulteriusbus ejusque pulvis, item gummi Arabicum ad ℥j. in vino assumptum, laudantur, præsertim quando occasione Stimuli præternaturalis non bene retinetur urina. Unde JOEL sequentem commendat pulverem, ad locontinentiam urinæ paralyticam; v. g.

℥j. Calaminth.

Myrrhæ,

Castor. an. ℥ij.

Gland. ℥v.

Hæc pulverisata subtilissimè propinentur ad ℥j. cum vino emulso.

Glandes singulare sunt adstringens. Specifica inter talia conveniunt guttur galli tostum, tritum, & cum vino propinatum ad ℥j. est unum ex optimis specificis, tam in diurna, quam in nocturna urinæ Incontinentia, quod mirè laudatur à SOLENANDRO Sect. 4. Conf. 11. vid. SENNERTVS l. 3. Præx. ubi de Incontinentia urinæ, ac HORSTIVS in Problema, item HARTMANNVS in Præx. Chym. & LINDANVS. Commendat etiam hoc puerperis, si à partu difficili malum ortum fuerit, HOEFERVS in Hæc. Med. pag. 340. Porro pulvis erinacei combustus vel calcinati, inter alia etiam specificum optimum & certissimum est ad omnem Incontinentiam urinæ, quod B. D. MICHAELIS frequenter, felici aliquoties cum successu, adhibuit; qui retulit etiam, quendam Medicum, qui 20. annos hoc affectu laboraverat, postmodum solo hoc medicamento feliciter curatum fuisse. Ipse etiam in puero 12. annorum, post morbum acutum urinæ Incontinentiâ laborante, hunc pulverem erinacei cum medulla Saxorum mistum, cum successu adhibuit. Hinc BARTHOLETVS in Encyclop. cap. 104. contra urinæ Incontinentiam adhibet pulverem compositum ex interioris tunice & ventriculi gallinarum (quæ exsiccata est instar cornu pulverisabilis) part. j. & cineris erinacei (qui tanquam singulare specificum in vehiculo calido usurpatur) part. iij. quæ duo pulverisata insigniter commendantur ad eodem. Unde etiam erinaceus est basis pulveris expecti Montagnani pro his, qui lectum permungunt. Compositio est hæc:

℥j. Tunice stomachi gallin. pulv. ℥ss.

Herb. agrimon. ℥j.

Erinac. combust. ℥ij.

Misc. f. Pulvis.

Dosis ℥j. cum iure, vel vino propinatur.

Porro vesica suis vel apri colla, item vesica capræ exsiccata ad ℥j. data valdoperè commendatur ab HARTMANNO Præxi pag. 269. Præ cæteris vesica capræ præ vesica suis & apri commendatur. Hisce addatur medulla lapidis, Germ. das Stein-Marek, quæ apud Jenenses & Rochlicenses invenitur; est etiam expertum specificum, contra Incontinentiam urinæ: dosi ℥j. ad ℥ss. in vino generoso propinatum, quo TACHENIVS nobilissimè quendam urinæ Incontinentiâ laborantem citra spem & expectationem curavit. Unde quidam admodum commendant hunc pulverem compositum in Urinæ Incontinentia:

℥j. Pulv. medull. lapid. ℥ij.

Grân. mass. ℥j.

Ligni aloes resinosi exactè pulveris. ℥ss.

M. fiat



M. fiat pulvis pro aliquot dosibus.

Propinetur pro dosi ℥j. in quocunque vehiculo.

Item huc spectat pulvis pro lectioningis, quam officinis suis usulem HOECHSTEDTERVS Dec. 2. Hist. 2. describit. Piscis in ventre lucii inventus & propinatus commendatur ab HARTMANNO; sicut etiam sunt alii, qui hunc ipsum pro singulari venditant arcano. Porro pudendum suis seu vulva suilla, quocunque modo preparata, tam in pulvere propinata exsiccata, quam ex eadem paratum sarcimen aegro offerendum, singulare est experimentum: non tantum commendatur à SCHENCKIO in *Tbes. Med. c. 1. ceu remedium sæpius sibi observatum in Praxi*, sed etiam D. MICHAELIS altis irritis in usu fuit in urinae Incontinentia, tam vigilantium quam dormientium. Hoc tamen observat SCHMVKIVS, quod sarcimen ex pudendo masculi sit pro masculino remedium faciendo, & foemellæ pro foemina. Alias cinis pudendi suilli convenit, & loco sarciminis substituitur, quo ipso puer 18. annorum, ab ineunte ætate hoc malo affectus, curatus dicitur: conf. *M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 21. pag. 36. ac Ann. 9. Obs. 10. Obs. 150.* Alii loco vulvæ suillæ ungulas porcicæ strati siccitas & subtilissimè pulverifatas in haustu vini, vel potu communi propinant, ad sistendam urinae Incontinentiam. Mures exsiccati & pulverisati, vel mures in butyro elixi & ita propinati, sæpius expertum sunt specificum contra urinae Incontinentiam, tam vigilantium, quam dormientium. Conf. *M. A. N. C. Ann. 6. Obs. 38. pag. 124. FORESTVS lib. 25. Obs. 22.* Item cineres eorum. A GALENO laudantur cerebrum & testiculi leporis exsiccati aut combustis item cochleæ cum testis combustis: alii stercois leporis propinant, item stercois capræ: vid. *Brunschweig pag. 67.* & hæc ipsa promittunt ad quancunque urinae Incontinentiam, tam diurnam, quam nocturnam, sunt proficua. In specie verò, si dormientibus saltem contingat hoc malum, tunc ex experientia HELIDÆI PADVANI convenit pulviscupularum glandium in aqua, vel vino balsamentis. Item terra sigillata cum pulvere castorei in junioribus ad ℥j. adultis ad ℥ij. in haustu vini, vel aquæ parietariæ sub introitum lecti propinetur: item pulvis pulmonis hedi tosti, & ad ℥j. exhibiti, ceu specificum commendatur. Facit etiam huc Pulvis Augustanorum pro lectioningis, quem etiam commendat HOECHSTEDTERVS Decad. 6. Cas. 2. in Scob. ubi habet mixturam contra Incontinentiam urinae nocturnam. Pulvis est hic:

℥j. Pell. stomach. gallin.  
Masticb.  
Galang. an. ℥j.  
Agrimon.  
Lapill. craner.  
Alchimill. an. ℥ij.  
Capul. gland. ℥ij.  
Nuc. myrist. ℥j.  
Erinac. comb. ℥j.  
Saccb. ℥ij.

Misc. f. pulvis.

Detur ℥j. ad ℥ij. in aqua plantaginis.

Denique cuidam singulare experimentum venditur rana viridis per medium scissa, & renibus applicata. Nutrices & mulieres interdum pueris penes constringunt cum quodam vinculo, ne lectulos permigrant; sed sit hoc cum summo periculo. Exemplum videb. in BARTHOLINO Cent. 3. Hist. Anat. 52. pag. 103. Ubi ex penis constrictione periculosa secuta notat symptomata.

Laceratio & distensio sphincteris vesicæ à partu difficili curatur per trochiscos de carabe, glandes quernas, bolum Armenam, guttur galli tostum, &c.

His occurrunt etiam Externa, inter quæ imprimis Balnea & Fomenta laudantur, facta ex incoctis plantis nervinis atque adstringentibus, ut mentha, absinthio, floribus rosarum, balauftiorum, radice tormentillæ, bifortæ, foliis quercus, imprimis radice symphyti; quæ etiam deservat utuntur virgines; vid. HOECHSTEDTERVS; & similibus, ut ex HORSTIO lib. 5. Obs. 20. constare potest. Balnea hæc fiunt cum aqua ferrariorum, quæ vitriolaceæ prosapiæ, adeoque adstrictoria est. Loco horum artificialium speciatim Therma sunt proficua in malo contumaciori, idque primariò sensibus. Harum enim in sessione vir 72. annorum ab Incontinentia urinae fuit levatus. Novissimè qui à potu, mox atque unicuique potum hauriret, continuo eoque perquam doloroso vesicæ cruciatu, & ad continuum mictum stimulo, afficiebatur: aliis multis irritis profuerunt internè jussula decoctionis carniū & gallinarum calida, loco potus assum-

Estmull. Oper. Tom. II.

pta; externè vero Therma. Juxta hos Insessus convenit etiam inunctio lumborum & regionis pubis cum oleo absinthii, masticis, mentha, rutaceo, castorei, unguento nervino Augustanorum, item styrace liquido, balsamo Peruviano, oleis nervinis destillatis, oleo destillato macis, terebinthinæ, juniperi, succini, semine dauci vel carvi. Item emplastrum oxycroceum vel nervinum, vertebri lumborum applicatum, malaxatum cum Balsamo Peruviano & oleo succini, commendari solet à JOELE Pr. lib. 6. pag. 134. Item à TILMÆO von guldenkle in Cas. p. 338. Tandem singulare remedium est pulvis busonis viri in nova olla usti, & in sacculo collo appensi; quod est Veterum experimentum ad quancunque urinae Incontinentiam à quacunque causa: vid. HEINRICVS ab Heer Observ. 14. Putabam primitus falsam hanc esse relationem; tamen confirmatur simile exemplum à DIGBY & BOYLE in Philos. Exper. pag. 217. ubi refert, in Anglia fuisse reiteratum hoc experimentum, idque feliciter cum successu in Incontinentia urinae ex latione vesicæ in partu difficili, cujus curationem videb. in *M. A. N. C. ann. 3. Observ. 325. SENNER TO lib. 4. Prax. P. 2. cap. 9. pag. 466.* qui eandem curat balneo & unguento ex catellis. Quidam hoc Unguentum ceu singulare commendant contra profusum urinae muliebri, seu potius urinae stillicidum, quo subinde mulieres post partum difficilem affligi solent:

℥j. Lap. calaminar. in aceto destillato & aqua rosar. bis vel ter loti & subtiliss. pulverisati ℥iv.

Lithargyr. argent. ℥ij.

Ceruss. prap. ℥j.

Olei rosar.

Chamomill. an. ℥v.

Agitentur simul per horas duas & cum axungia birci ℥ij. f. l. a. Unguentum, benè agitando ad horæ quadrantem, donec consistentiam debitam acquirat.

Hoc ipso leniter inungenda est pars affecta, ac linteo cooperienda; miræ dicitur efficacie, vidique sæpius comprobatum.

Puerperis post partum, à laceratione & distensione sphincteris, conveniunt Insessus & fotas ex radice consolidæ, foliis quercus, hederæ, gypso usto, bolo & vitriolo; suffimigia ex plece, thure & mastiche: vid. PLATERVS l. a. Unguenta ex catulis Sennerti: Item, ubi incontinentia urinae ex vesicæ exulceratione:

℥j. Aquæ rosar.

Plantag. an. ℥ij.

Saccb. cand. ℥ij.

Ceruss.

Litharg.

Alum. crudi

Plumosi an. ℥ij.

Campb. gr. v.

Vngu. Egypt. ℥ij. M. S.

Aquila.

Quod si dictis modis non cessat malum, pro cura palliativa vascula quedam arte applicanda veniunt in maribus, quibus urina continuo depluens colligatur, ut cum minore fastidio vivant: quale Instrumentum videb. in HILDANO Cent. 6. Obs. 54. & 55. Foemina verò inserviet, quale ab HEER l. a. fuit explicatum.

Habuius ita imminutam & auctam etiam excretionem urinae ex vesica: Nunc sequitur

### ARTICULUS III.

DE

### URINÆ EXCRETIONE DEPRAVATA.

DEPRAVATA denique urinae est excretio, quando urina cum dolore, ardore, insigni difficultate, vel alio modo præternaturali excrenitur: quæ inter vitia communissimum ferè est Stranguria.

MEMBRUM I.

DE

### STRANGURIA.

Stranguria dicitur à τὸ σπῆρμα, à gutta, latine urinae stillicidium, quia in eadem urina guttatim excernitur, id-



que et si acerbis dolore colli vesicę, & urethrę, tam in quàm post mictionem, remanente nihilominus continuà ad mingendū stimulatione. Et quidem in suo genere similissimū stranguria est affectus cum *senesimo*, ubi continuū est conatus excernendi excrementa, unà cum gravi dolore sub excretionē. Nam sicuti se habet Tenesmus in podice ejusque sphinctere, ita se habet stranguria in vesica, ejusque musculo constrictore, dum uterque continuò irritatur; & sicut in tenesimo peccat acidum in subiecto viscido, ita in stranguria peccat acidum in subiecto aquoso, quod ad vesicam delatum stranguriam inducit. Equidem communiter hoc malum oriri volunt ex refrigeratione abdominis & partium urinariorum, in specie vesicę, vel à potu etiam frigido internè assumpto; Unde Germanis vocatur *die kalte Seiche oder Pisse*, quod se oriat ex refrigeratione præsupposita. At hæc Theoria falsa est;

### CAUSÆ.

Potius *Causa proxima* hujus strangurię est vitiosa *urina aciditas*, quę acore suo, fibris nervosis inimico, stimulando vesicam, in specie circa collum, ubi admodum sensibilis existit, & rodendo suo transitu meatum urinarium, continuum ferè mingendū conatum acerbūque dolorem diu permanentem infert. Urina verò guttatim prodit, quia, dum vesicę sphincter se laxat, ut urina effluat, ab urinę acrimonia acida vellicante subito denuò se stringit, post denuò se laxat, & iterum stringit, & sic porro, unde guttatim prodit. Dolor iste primariò percipitur tam in urethra, quàm in vesicę collo, idque post mictionem; interamen, qui urethram affligit, acerbior est illo, qui vesicam & ejus collum afficit. Ratio est: licet enim urethra & interior vesicę membrana sit continuata & una eademque substantia; tamen vesica interior est oblita mucro crasso, nonnihil viscido, qui eam ad instar intestinorum oblinens ab acrimonia urinę plūs minūs rosiq; defendit, ita ut minor ex acido in vesica oriatur dolor; & nil aliud est, quàm superfluum nutrimentum membranę vesicarię transudans in cavum proprium; quo cum careat urethra, eò acerbius à transeunte cruciatur *urina acida*, qui acor urinę est ex parte urinę unica *causa* stranguriam inferens. Hunc *urina acorem* peccantem confirmat HELMONTIVS in *Tract. Pleura Furens*, qui demonstratur in urina stranguriosorum peccare acidum, sumere jubet urinam naturalem, i. e. constantem ex sale volatili salso, seu composito ex acido & alcali volatilibus, & huic addere tantillum vini acidi, & injicere in vesicam urinariam; sic enim subito percipi dolorem strangurię simillimum: item quod in *nosocomio Lugdunensi* taliter affectorum urina gustata manifestum acorem linguis representavit. Confirmatur hoc ulterius per Curam, quę per talia, quę acidum corrigunt in primis viis, istudque destruant aut obtundendo demulcent, peragitur: hinc etiam urina opaca & turbida, albicantes & plūs minūs lactea, & hoc in specie in senibus, excernuntur, qui vitio digestionis primæ laborant; inque enim urina tales digestionis cruditate acidam.

*Acor hic in urina* vitiosus, stranguria Autor, natales habet suos primis in viis, seu in stomachi digestionē, ejusque in duodeno perfectione vitiosa, ex cruditate acida, & aque ut plurimum vitio assumptorum. *Causa dispositiva* est *inertia fermenti bilis*, non debite perfectientis in duodeno chylum: dum nempe assumpta, in primis potulenta, non digesta citè, sed acore, aut stomachi aut proprio adhuc tincta & inquinata, è stomacho elapsa rapiuntur ad intestina sine transmutatione in falsum, & ita rapiuntur cum urina potus ad vias urinarias; unde postmodum in vesica collecta hanc suo acore stimulant, & stranguriam inferunt.

Confirmat hoc quotidiana experientia, dum unusquisque observare potest, quod potus non citè fermentati, sed facile adhuc fermentescibiles, indeque acrescentes, ut *vinum meracum*, vel *mustum*, vel *cerevisia* nova non citè defæcata, aut copiosius, aut intempestive assumpta, & similia subinde inferant stranguriam: Vid. HOFERVS *Herc. Med. lib. 3. pag. 155.* item GVILIELMVS FABER *f. 574.* Talia enim facillimè præternaturaliter in primis viis acrescunt, & acorem conceptum pertinaciter retinent; unde nec adeò facile, nec in stomacho, nec in duodeno à bilis sale volatili oleoso temperari possunt, quin ulterius acor pergat ad loca urinaria, ibi urinam inquinat, & suo acore inficiat, quę urina exin acida facta hostilitate sua continuum stimulum, infert in vesica, & extendè malum stranguriam excitat: Unde urina in senibus simul crassa observatur, quia oritur ex

cruditate acida ex primis viis eò delata, interdum quoque vesicā excoriatā, nutrimentum proximum plorante.

Aliis undecunque natę *excoriationes, exulcerationes*, item *attritiones* à calculo, ita vesicam disponunt, ejusque interiorē superficiem adeò irritabilem reddunt, ut nullius rei acedentis contactum, etiam urina naturaliter constitutę, nisi cum summo dolore ac molestia, adeoque continua irritatione perferre queat, quin continua adsit stranguria: unde & *ulcus vesicę* aut renum, occasione acrioris puris, stranguriam molestissimam infert: sed rarum est, quia talia potius ad dysuriam disponunt.

Causa ergo proxima strangurię est continua irritatio vesicę, ab acido præternaturali in urina, unde continuus mingentium conatus cum ingenti dolore inter mingendum oritur. Causa remota est digestio prima non citè peracta, in specie vitio assumptorum. Causa verò salis positiva est inertia fermenti bilis. Et hæc quidem est stranguria ordinaria.

Præter hanc ordinariam stranguriam datur etiam virulenta stranguria, utut hæc magis ad dysuriam referenda sit, iis frequens, qui laborant lue Venereā, ac quę difficillima est curatu, ac subinde in ulcus penis & prostaticum ejus terminatur; quin & hæc stranguria virulenta cum quibusdam consensescit ac commoritur, observante SCHENCKIO *lib. 3. Obs.* Originem habet ex prostaticis glandulis circa radicem penis inquinamento Venereo infectis, & ita lympham acrem plus minus corrosivam plorantibus. Interim rarum est, quod oriatur stranguria admodum pertinax ac torminosa ex *incantatione*; quale exemplum strangurię incantatorię singulare refert HELMONTIVS *Tract. de Lithiā*, quam per succum betulę, seu cerevisiam betulinam curatam refert, cum ipsa betula ad incantationes sit singularis.

### DIAGNOSIS.

Stranguria per se patet ex relatione errorum, quibus malum hoc insigniter est molestum. Causarum differentia ex circumstantiis antecedentibus est cognoscenda: idè interrogandus est æger de usu Externorum assumptorum, cum sepius ex causis externis oriatur.

### PROGNOSIS.

Quoad *Prognosin*: stranguria, si ex vitio Urinę, periculosa non est, utut admodum molesta.

In senibus autem malum curatu perquam difficile, propter deficientem digestionem primam, & inertiam fellis.

Cæterum diuturniorem aut contumaciorē stranguriam, ulcus vesicę interdum pedetentim insequi solet.

Quę ex vitio vesicę est, curatu difficillima, ac subinde periculosa existit.

### CURA.

Curam Strangurię quod attinet: in hac imprimis

1. Acre acidum urinę corrigendum ac temperandum.
2. Vesicę qualiscunque læsio restitucoda.

Quoad *primū*: ante omnia imprimis ventriculus est rectificandus, inter quę in malo contumaciori primatum obtinent Vomitoria, quorum utilitatem in stranguria & aliis urinariis affectibus multis commendat RIVERIVS in *Tr. lib. 14. c. 2.* & confirmat per experientiam HILDANVS *Cent. 6. Obs. 52.* Porro ad rectificandum stomachum præter vomitoria, etiam pro scopo a verisiorio *Purgantia* blanda interdum propinantur: quę inter sunt imprimis pilule de terebinthina cum Rhabarbano, præter vim laxativam simul acrimoniā urinę temperantes, jalappa cum terebinthina; item spiritus dia-Turbith cum Rhabarbano, ac denique Extractum panchymagogum cum Mercurio dulci, idque imprimis in virulenta stranguria ex lue venerea, vel quę ad aliquam exulcerationem vult terminare. Sunt qui cassiam quoque hic commendant; experientia tamen multorum Practicorum docet, illam non raro dolores augere: vid. HORSTIVS *lib. 4. Obs. 4.* PIGRÆVS *Chirurg. lib. 7. cap. 4.* & HILDANVS *l. a.* Quoad posterius, ea, quę in vesicę exulceratione supra fuerunt posita, locum obtinent.

Inter remedia pro corrigendo acri acido egregiè convenit radix glycyrrhizę, ejusque decoctum, ac radix malvę cum nummularia in jure pulli: vid. GABELCHOEKEVS: portulaca, sonchus lęvis, glandes pulveris, aut etiam in specie gallę, flores violarum, nympha, chamomillę; fructus etiam alkakengi, & trochisci de alkakengi, cum & sine opio,



opio, optimè conveniunt in Stranguria. Præ cæteris quoque *corrices aurantiorum* pulverisati, aut etiam Tinctura seu essentia corticum aurantiorum cum spiritu vinitartarificato parata, aut etiam, idque primariò, *oleum de stillato corticum aurantiorum* ad aliquot guttas assumptum, optimum sunt ad stranguriam experimentum. Convenit præsertim si à causa externa assumptorum malum ortum fuerit: Horum enim sal volatile oleosum, acidum potenter destruit, & acuit bilem eadem ex ratione. Pulvis nucleis moschata curat stranguriam ab usu cerevisiæ crudæ vel novellæ enatam, cerevisiæ immixtus: Vid. de hoc successu FORESTVS lib. 25. Obs. 2. Insuper ribes, quæ spirant urinæ odorem, in usu sunt, & tam baccæ, quàm folia: item gemmæ ribes nigre ad ʒʒ. cum semine dauci in vino rubro decoctæ, singulariter commendantur à FORESTO lib. 28. Obs. 4. quo gravem stranguriam curatam refert. Porro decoctum raparum domesticum ferè sine pari remedium est, atque specificum GABELCHOVERI Cent. 3. cur. 2. p. 6. utpotè qui hoc decoctum in affectu urino, præsertim in stranguria & dysuria, feliciter adhibet, & in quacunque acrimonia acido-salsa est optimum: Conf. CRATO & SYLVIVS in Praxi. Conveniunt quoque semen canabis, 4. semina frigida majora, ex hisque cum papavere albo paratæ Emulsiones: Nam huiusmodi oleosa semina acrimoniam urinæ obrundunt. Quod pertinet oleum amygdalarum dulcium cum syrupo de althæa, additis lapillis cancerorum ita assumptum: lac ipsum huiusque serum in coctis præprimis floribus cyani & calcatrippe, malvæ radix & flores; unde horum conservam RIVERIVS & AMATVS LVSITANVS Cent. 6. Hist. 58. & foliorum Decoctum, FORESTVS l. 25. Obs. 4. & GABELCHOVERVS Cent. 1. Obs. 21. in stranguria mirè extollunt. Pariter pulvis radices althææ cum saccharo, aut huius cum jujubis Decoctum, item semina mucilaginosæ, & exinde parata Decocta & syrupus: vid. HARTMANNVS Prax. pag. 271. Item huiusmodi albumen ovi cum aqua rosarum conquassatum, Decoctum florum chamomillæ cum lacte, ac Decoctum brassicæ rubræ, de quibusidem FORESTVS l. 1. a. Obs. 3. Decoctum item herbæ & baccarum alkekengi cum passulis non immeritò laudatur ab AMATO LVSITANO Cent. 6. Cur. 92. qui miras virtutes habere dicit. Balsamum Peruvianum sunt, qui exhibent à guttis x. xv. vel xx. ad summum ʒj. interius assumptum in vehiculo appropriato, miras in contumaci stranguria habere dicunt vires; cui tamen à LINDANO meritò præfertur & specificè commendatur Balsamus ille Indicus de capaibe dictus, ad guttas aliquot in decocto petroselinæ assumptus, utpotè quod nobile etiam experimentum in stranguria contumaci, in specie, quæ comitatur gonorrhœam virulentam, vel Inem Veneræam: non secus ac balsamus sulphuris, oleum ceræ, succini, macis, si ab erosione vesicæ malum, in aqua aut decocto appropriato, v.g. cicerum rubrorum, propinatum, locum invenit. Quod si peritaci fuerit malum, & vitio digestionis solo à cruditatibus ibidem detentis sit Stranguria, id quod v.g. in senibus frequentius evenit, conveniunt Aromatica, & horum olea stomacho grata huiusque digestionem faventia, v.g. galanga, zedoaria, nuges moschata, crocus, cortices aurantiorum, species diacumini; item porus vini Hispanici, aut Malvasici, aut Malvaticum juniperinum usurpentur; vel etiam convenit vinum, in quo filices candefactæ aliquoties sunt extinctæ; Fit enim sic vinum diureticum, omnis acidi absorptivum: propter quam rationem in stranguria etiam conveniunt subjecta alcalisata, v.g. lapilli cancerorum, qui imprimis acidum stranguriæ absorbent. Ac sanè in canceris absoluta est stranguriæ cura, vi alcalinæ diureticæ pluribus scopis satisfaciens. Hinc sunt, qui recipiunt duos caneros fluviatiles, quibus canceris in mortario confusis affundunt aquæ appropriatæ vel cerevisiæ q. s. succum exprimunt, & contra stranguriam propinant.

Quibusdam in usu est, ut propinent oleum amygdalarum dulce cum syrupo althææ Fernelii, quibus adduntur lapilli cancerorum. Lixivium ex testis ovorum calcinatis cum vino paratum; item nitrum in vino datum, spiritus viri dulcis, spiritus salis marini dulcis, qui ab Helmontio in stranguria senum laudatur, &c. Pariter huius loci sunt fortiora absorbentia, sc. Lapidæ percarum, testæ ovorum, cornu cervi usum, creta, sal tartari, sal silicium, stipitum fabarum, tinctura tartari, spiritus tartari, spiritus carminativus ex tribus, ex nitro, tartaro & spiritu vini, qui insigniter laudatur: item, ubi alia incassum sunt adhibita, boracis ʒj. exhibeatur: Item spiritus vini bibulus dum cubitum itur, præservat à stranguria. Spectat hoc quoque succinum & succinato, v.

g. trochisci de carabe: Item vesica capreoli seu capellæ præparata, hincque pulvis simplex vel compositus, quem HOECHSTEDTERVS Decad. 6. Cas. 2. describit. Faciunt huc etiam pilulæ Quercetani, quibus utitur in omni stranguria, in omni dysuria & renum exaceratione. Earum compositio hæc:

- ʒj. Thuris,  
Myrræ,  
Massic. an. ʒij.  
Succini,  
Croci an. ʒʒ.  
Campb. ʒj.  
Antimonii diaph. ad pondus omnium.

Cum terebinthina dissol. f. Pilulæ.

quarum dosis sit ʒj. utendo aliquandiu.

Tandem cepæ non ultimum sunt stranguriæ remedium: Nempè cepæ minutim incisa insudatur in aquam simplicem vel althææ, per 24. horas, aqua infusionis hausta stranguriam sistit. Nam sal volatile cepæ egregium est remedium diureticum, & simul absorbet acidum. Ratione calculi & ulceris vesicæ, quomodo hæc tollenda, petatur ex suis locis. Ratione diætæ breviter monendum, cuncta acria, motusque corporis vehementiores, v.g. equitationes esse vitandas; vid. GABELCHOVERVS l. 1. a. Item strigus, hinc potulenta cuncta calidè assumantur. Hinc variz fieri possunt formulæ; v.g. in principio:

- ʒj. Terebinth. Cypr. ʒij.  
Mag. jalapp. gr. vj.  
f. Pilulæ: S.  
Pilulæ evacuantes.  
Vel  
ʒj. Massæ pilular. terebinth. cum Rbab. gr. xv.  
Mercurii dulc. ʒʒ.  
Extr. troch. alb. gr. j.  
M. f. Pilulæ.  
D. S. ut antè.  
ʒj. Extr. panch. Crollii,  
Mercurii dulc. an. gr. xv.  
Extr. troch. alb. gr. j.  
Cum tinctura tartari f. Pilulæ.  
D. S. ut antè.

- ʒj. Conserva malvæ, vel violar. ʒj.  
Res. jalapp. gr. xij. ad gr. xv.  
Tartari vitriolat. gr. viij.  
M. f. Bolus, in fine usorandus: S.  
Saccharum evacuant.

- ʒj. Tincturæ Tartari acerr. ʒij.  
Olei de stillat. cort. aurant. ʒj.  
Mac. an. gr. xij.  
M. D. S.  
Tinctura leniens.  
Dosis 20. guttæ.

- ʒj. Essent. cort. aurant.  
Zedoar. an. ʒʒ.  
M. f. ut antè.

- Detur 40. guttæ pro dosi.  
ʒj. Olei de stillat. cort. aurant. ʒj.  
Zedor. ʒʒ.  
M. S.

Oleum singulare contra Stranguriam.

- ʒj. Olei de stillat. mac. gr. iv.  
Galangæ,  
Rac. junip. an. gr. liij.

- Sacch. albiss. ʒʒ.  
M. f. Elæosaccharum pro 2. vel 3. dosib.  
D. S.

Saccharum leniens.

- ʒj. Spec. dia. Cum. ʒij.  
Pulo. nuc. mosch.  
Lapill. cancr. præp. an. ʒj.

Cum sacch. in f. q. aquæ simpl. sol. f. Rotulæ, aspergendæ cum oleo de still. cort. aurant.  
D. S.

- Rotule lenitiva.  
Dosis no. v. vj. viij. &c.

- ʒj. Mithridas. ʒj.  
Ol. de still. rutæ,  
Cort. aurant. an. gr. ij.  
M. D. S.

Saccharum sedans.

Opiata tamen miqus conveniunt in his malis.

ʒj. Conf.



*℞. Conf. flor. malva ℥ij.*  
*Calam. arom. condit. ℥vj.*  
*Spec. diagalang.*  
*Diacymn. an. ℥ij.*  
*Lap. cancr. præp.*  
*Succ. præpar.*  
*Nyc. mosch. pulv. an. ℥℥.*  
*Cum syr. violar. vel de alibea Fern. f. Electuarium: S.*  
*Electuarium leniens.*  
 Convenit quoque pulvis supra scđ. 11. ubi de colica descriptus.

*℞. Malv. juniper. ℥iv.*  
*Spiritus carm. de tribus ℥j.*  
*Syr. cort. aurant. vel de juiubis ℥j.*  
*M. S.*  
*Succus contra stranguriam pro aliquot vicibus.*  
*℞. Ol. amygd. dulc.*  
*Syr. de alb. Fernel. an. ℥vj.*  
*Succ. cancr. fluu. cum aqua malv. ext.*  
*Lap. cancr. præp. ℥j.*  
*Misc.*

*℞. Sem. q. frigid. mai. an. ℥ij.*  
*Pap. alb. ℥ij.*  
*Cum f. q. Decoct. rad. alb. f. Emulsio:*  
*adde*

*Aque cinnam. temperas. ℥℥.*  
*Lapill. cancr. præp. ℥j.*  
*Syr. de alb. Fernel. q. f.*  
*M. D. S.*  
*Emulsio leniens.*

*℞. Rad. alb. ℥j.*  
*Liquirit. ℥℥.*  
*Fol. alkekengi,*  
*Malva,*  
*Nymular. an. m. j.*  
*Fruñ. sebesten,*  
*Alkekeng. an. no. x.*

*Coqu. in f. q. aqua simpl.*  
*Colaturæ ℥. iß. ad ℥ij. adde*  
*Syrup. de juiub. ℥ij. vel ℥ij.*  
*D. S.*

*Potio leniens.*  
*℞. Terebinth. vulg. vel Cypr. ℥℥.*  
*Dissolv. cum f. q. vitelli ovi:*  
*adde paulatim*  
*Vini Malvas. ℥vj.*  
*Syr. de alb. Fern. ℥ij.*  
*M. D. S.*  
*Emulsio leniens.*

*Dosis ℥j. ad ℥ij.*

Vir ætatis consistentis, nephriticis & podagricis affectibus crebrius obnoxius, urgente intenso hyemis frigore tussim siccam ingentem & validam, crebrius pectus conculcentem, affligebat, quaquidem ejiciebat pauca saltem & viscida, ejiciebat. Locum, ubi tussis excitabatur, monstrabat anteriùs in collo asperæ arteriæ: accedebat levior invasio podagrica circa manum dextram & cubitum sinistrum, Ego vocatus, pro urgente tussi sicca, mota propter acrimoniam lymphæ, cum vestigiis hinc inde podagræ, præscripsi sequentem Potionem:

*℞. Aqua scabios.*  
*Menth. an. ℥ij.*  
*Spiritus sal. ammoniaci anis. ℥ij.*  
*Flor. sulphuris ℥℥.*  
*Syr. scabios. ℥vj.*  
*Misc.*

Interdum etiam gr. j. ad gr. iß. de laudano opiato tempore vespertino addit. Hinc tussis quidem evanescebat, sed podagra exasperabatur; Unde iterum præscripsi:

*℞. Spiritus sal. ammoniaci ℥ij.*  
*Cochlear. ℥j.*  
*Misc.*

De quo ter, mane, à meridie & vespri sub introitum lecti 40. guttas sumebat, Imperato simul aliquali sudore; sed sudare non poterat propter pororum constrictionem: Hinc continuato spiritu cessavit quidem affectus podagricus sine sensibili superveniente evacuatione, sed secundà vel tercià die superveniebat stranguria cum gravi dolore in lumbis & vesica. Alkali enim volatile spiritus sal. ammoniaci destruit quidem acidum, unde paroxysmus podagricus cessavit. Sed quia acidum hoc non in totum correctum, sed par-

tibus nervis infusum, ope huius spiritus tantùm resolutum, & in motum concitatum fuit, & à sero absumptum, stranguriam intulit. Pro acido ergo temperando & urina promovenda præscripsi:

*℞. Amygd. dulc. Anbr. ℥℥.*  
*Sem. violar. ℥ij.*  
*Papav. albi ℥ij.*  
*Cum f. q. aqu. alkekeng. f. Emulsio ad ℥vij.*  
*adde*

*Lap. percar. præp. ℥j.*  
*Misce & perum edulcora.*

Optimè conferebat hæc Potio, unde ter vel quater repetita fuit cum plenaria sanitate.

Tandem ad derivandum acrius serum per alvum, blandum laxativum præscripsi:

*℞. Conf. rosar. ℥℥.*  
*Tartari vitriolat. gr. viij.*  
*Res. ialapp. gr. v.*  
*M. f. Bolus.*

Unde 6. vel 7. per alvum excrevit, & ita penitus convaleuit. Hinc

*℞. Cort. aurant. ℥ij.*  
*Lap. percar. præp. vel test. ovor. calc. ℥℥.*  
*Olei destillat. cort. aurant. gtt. ix.*

Cum paucosaccharo f. Pulvis pro 3. dosibus: Vehiculum erat vinum dulce, vel in quo silices candefacti extincti.

Externa ea sunt pauca: v. g. sebum commune seu candela liquefactum, umbilico calidè largiter inunctum convenit, quatenus nempè ex vesica ad umbilicum usque urachus continuatur. Loco istius tamen sebum hircinum cū aliquot guttis Olei destillati macis, ceræ, corticum aurantium, massichis, &c. optimè confert, umbilico illita: v. g.

*℞. Sevi hirc. ℥ij.*  
*Olei destillat. ceræ,*  
*Cort. aurant. an. gtt. v.*  
*Misc. pro Litu.*

Solum quoque oleum destillatum corticum aurantium umbilico illitum optimum præstat levamen. Item non inconviens erit inter mingendum, penem in aquam vel lac tepidum aut decoctum anodynum demergere. Non incongruum etiam est, si instituatursuffumigium ad imitationem RVLANDI, quod habet in *Thesauro Pract. seu Curat. Empir. lib. 3. pag. 291.* nempè

*℞. Raphanus:*

Incidatur & decoquatur in vino, vase benè obturato; quibus probè ebullientibus imponatur vas sella: benè perforata, cui æger insideat, & vesicæ regionem suffumiget, ac ita hoc ipso euporisto meatus referari, stranguriam demulceri, & urinam defluere & temperari, affirmat allegatus Autor. Confert etiam hoc ipsum in suppressione urinæ ex vitio vesicæ.

Aliàs usitatum est quasi sympatheticè & magneticè curari stranguriam: Sc. ascendunt focum cineribus calidis adhuc repletum: hinc abstergunt istos cineres, & largiter permungunt adhuc focum calidum; sic enim excusciatur vel elicitur fumus, qui largiter excipiendus est circa locum vesicæ seu à partibus genitalibus, sicque curari stranguriam assuerunt. (Satis esset, si vinum colaretur per setaceum pecten puerorum, ut largius extensum maiorem de se dare possit vaporem.)

Conveniunt Chyleres, nunc acriores, si alvus fuerit contumaciore; nunc emollientes & anodynæ magis, in specie ex lacte, vel solo, vel cum serpillio, malva, althæa, ruta, parietaria, &c. cocti & injecti. Ex quibus etiam fieri possunt balnea, item cataplasmata ex parietaria & ruta, cum lacte & oleo scorpionum cocta & applicata: vid. AMATVS LV-SITANVS Cent. 2. Cur. 92. Quinimò & ipsa melleo lactis in vesicam, imprimis lactis Chabybeati, est egregia in stranguria: Quæ sūt optima ad acrimoniam urinæ temperandam; vel loco huius oleum amygdalarum dulcium recens expressum simili modo usurpatur, quod ipsum temperat acrimoniam acidæ urinæ: Item Emulsiones seminum 4. frigidorum, albumina ovorū conquassata, & trochisci alkekengi syringæ vesicæ immissa. SANQVEZ in *Observat. suis* lac cum quibudam pediculis vivis per syringam vesicæ immisissum efficacem reperit. Venter verò totus inferior oleo rosarum, nymphaeæ, nunguento refrigerante Galeni, rosaceo & oleo scorpionum inungatur.

Senibus, & quibus tonus fibrarum vesicalium læsus, conveniunt Therme, quarum Infusus vitia urinario optimè corrigunt: id quod in Syndico Dresdeni ante aliquot annos exper-



expertum audiui. Hic quoties fuit jejuno stomacho, toties optime se habuit; simul ac in prandio vel coena tantillum bibit, intensum dolorem in ceruice sensit, cum stranguria continua & diuturna. Urina ejus erat non lactea, nec purulenta, sed in superficie blandè pinguis: tandem thermis curatus fuit, & per biennium se bene exinde habuit. Audiui tamen, malum voluisse recrudescere, quod propter inertiam bilis in senibus facile fit; hinc in iis stranguria difficilis est curatu.

## MEMBRUM II.

## DE

## DYSURIA.

**H**abuius Stranguriam, tanquam effectum concenterem vitia urinae excretionis: sed præter Stranguriam vitatur etiam urinae excretio in affectu Stranguriae admodum cognato, nempe in *Dysuria* seu *Urinae Difficultate*, quando nempe cum magno mingendi conatu & labore ægri, accedente non levi dolore, urina effluit. Dolor iste concurrens, cum inter mingendum quasi *ardoris sensum* inserat seu exprimat, ob id exinde malum hoc alio nomine etiam *Ardor Urinae* venire solet. Conqueruntur enim ægri in tali affectu: *uris, ac si aqua calida curreret*, ut solent exprimere hoc urinae malum. Cognatus est hic affectus cum Stranguria, differunt tamen ambo à se invicem in eo:

1. Quod in *Dysuria* urina non guttatim, sed sine interruptione, & sæpius in debita quantitate, utur cum conatu & labore, in Stranguria verò guttatim, effluit.
2. Quod etiam *Dysuriae dolor* tantum inter mingendum percipiatur, non verò ante, aut raro etiam post mictionem, ut in Stranguria, ubi post mictionem dolor adhuc urget; qui dolor quoque alterius planè generis est, quam qui in *Dysuria* afficit, cum hic ardoris quidam sensus subsit.
3. Quod rariùs ex propria urinae acrimonia, sæpiùs verò partium urinosarum, vesicæ puta, aut vicinarum, partium affectus, in specie quidem læsio vel erosio, plus minus excoriatio aut exulceratio orificii vesicæ seu principii meatus urinarii *Dysuriam* inferant. Stranguria verò saltem à sola urinae acrimonia nimia acida originem ducat.
4. Quod in Stranguria urina cum continuo ad mingendum stimulo, tenesmo podicis non absimili, excernatur; *Dysuria* nihil horum sentiat.

## CAUSÆ.

*Causæ* horum symptomatum quomodo differant, nonnulli equidem, & inter hos *SENNERTVS* *Pr. lib. 3. P. 8. Sect. 2. cap. 4. & 5.* eruerè conati fuerunt; sed multis contradictionibus se immerferunt. *Causæ* ergo talis urinae difficultatis ac ardoris seu *dysuriæ* est aut in ipsa urina, quæ excernitur, aut est, idque frequentius, in partibus urinariis, vesicâ nempe & partibus vicinis, per quas eadem excernitur. Hæ ipse enim præternaturaliter affectæ, etiam ab urina naturaliter constituta præterfluente læduntur, & hinc doloris sensum concipiunt.

Quod ergo attinet primò urinae: hæc quidem, licet rariùs, *Dysuriam* gravem aut habitualement inferat, quando nempe *acris* nimisque *falsa*, *acido-falsa*, aliâve ratione mutata existit; sive hoc fiat à salibus copiosis imbibitis, ut fit in *Hypochondriacis* & *Scorbuticis*, qualem *Dysuriam* lethalem ex acrimonia seri *Scorbutici* cum mira penis retractione observarunt *M. A. N. C. Ann. 4. Obs. 155. p. 197.* Sive eadem fiat à pure acriore nimisque *falso* permixto, quod pus aut exulcerationem renum aut vesicæ, aut aliarum partium exulcerationem insequi, & cum urina permisceri, & acrimoniâ suâ vesicam affligere solet. Pertinent huc cantharides vesicam ulcerantes, & corrosivo suo veneno urinae imprægnando *Dysuriam* inducentes, aut applicatæ externè, aut perperam propinatæ internè. Pertinent huc quoque *Mercurialia*, imprimis præcipitata non rite præparata, quæ aliàs ad gonorrhœam virulentam adhiberi solent; nam & hæc ad *Dysuriam* disponere, observavit *FORESTVS*, qui vid. lib. 25. *Obs. 37.* de quodam nauta, qui gonorrhœa laborans & mingendi difficultate, cum usurpasset pilulas ex mercurio sublimato paratas, exinde in urinae ardorem duplo majorem incurrit.

Sed rarum est, uti dixi, quod urina præcisè affecta *dysuriam* inferat; frequentius est, ut aut ipsæ partes urinariæ aut vicinæ malè affectæ *Dysuriam* inferant, sive per essentiam, sive per consensum fiat; ut plurimum in vesica aut ejus collum, aut etiam meatus urinarius excoriata, aut exulcerata, ingentem & acerrimum concipiunt dolorem, dum urina transiit, & si quæ alia, certè hæc est frequentissima causa. Hinc etiam non raro vesicæ calculus eandem attritu suo successivo nonnihil excorians, aut alio modo circa collum, quo continuo incumbit, lædens, urinae etiam naturaliter constitutæ, nunc Stranguriam, nunc *dysuriam* pertinacem, inducere solet. Præter calculum etiam exulceratio colli vesicæ *Dysuriam* gravem infert, ita, ut etiam mitissima urina non sine dolore laboriosè emittatur. Pertinent huc prostatæ malè affectæ, seu glandulæ istæ, quæ in radice penis juxta collum vesicæ sunt sitæ, imprimis à contagio *Venerico* per congressum impurum affectæ, unde & gonorrhœæ virulentæ sunt subiectum, & subinde etiam exulcerantur, quibus exulceratis ab urina præterfluente, immensum dolent. Quin & ita affectæ loco lymphæ blandioris elaborant succum acrem, & virulentiam corrosivâ *Venericâ* insectum, qui ipse succus, dum urethram, per quam fluit, excoriât & lædit, & hoc ipso *dysuriam* admodum crudelem inferre solet. Difficillimæ curæ tunc est talis *Dysuria*, aut interdum in ulcus penis terminatur, quando & hæc ipsa virulenta cum quibusdam consensescit & moritur, uti observat *IOHANNES SCHENCKIVS* lib. 3. *Observat.* Verum præter affectus per essentiam, etiam per consensum vicinarum partium affectarum *dysuria* interdum inferitur: Sic enim affectu autem in mulieribus, aut affectu intestino recto in viris, nil frequentius est, quam superponere simul *Dysuriam*. Hinc propter inflammationem intestini recti, & tenesmum & *Dysuriam* molestant observavit *AMATVS LVSITANVS* Cent. 6. Cur. 84. item ex consensu cum hæmorrhoidibus dolentibus urinae ardorem & stillicidium, curatum postmodum per clystera ex oleo violarum, annotat *SCHENCKIVS* lib. 3. *Obs. ubi de hæmorrhoidibus.*

Observandum simul est, subinde in modò dictis affectibus, Stranguria & *Dysuria*, excerni materiam crassam, mucilaginosam & pituitosam, quæ ipsa, ut dixi, nihil aliud est, quam nutrimentum vesicæ spermaticum, aut partium illarum urinarum proximum, quod ex partibus istis læsis & nonnihil excoriatæ continuo exstillans, sub forma talis mucilaginis crassæ aut lactis unâ cum urina excernitur; à quâ mucilagine urinae ardor magis augeri solet, quatenus meatum urinarium nonnihil obstruendo difficultatem affert in meiendo, ut non absque conatu, & non absque labore, urina fiat excretio. Hinc est, quod refert *VESLINGIVS* in *Obs. anat. à Bartholino editis* p. 146. quod in demortuo ex *dysuria* vesica mucosa & lentâ albicante materia plena observatur.

## DIAGNOSIS.

Signa hujus *dysuriæ* diagnostica, per se & ex se facile patent, cum relatio ægri eadem insinuet.

Imprimis autem causæ antecedentes considerandæ, & speciatim ad excoriationem vel exulcerationem vesicæ respiciendum, quæ ex exercitiis cum urina & circumstantiis antecedentibus facile patet.

## PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: *Dysuria* variam habet per se, pro varietate causarum.

In genere malum est perquam molestum quidem *Dysuria*, non tamen per se lethale, utut subinde contumax admodum, & diuturnum sit, sub qua diuturnitate, ex quacunque sit causa, periculum est, ne exulceretur tandem vesica, aut facta jam ejus exulceratio insigniter exasperetur, aut etiam, si diutius affligat, urinae incontinentia superveniat.

In senibus, cum sequatur ordinariâ aliquam vesicæ exulcerationem, difficile & rarissime curatur, nisi forsitan potius vini *Malvatici*, aut frequentior usus jusculorum gallinaceorum eandem sublevet; sicuti idem vinum *Malvaticum*, uti etiam pulvis stomachalis *Quercetani*, optime convenit, si conjuncta cum ista mucilagine materia crassa & alba, &c.

Quæ est cum excretionem mucilaginis viscidæ, est periculosa, quæ est sine tali mucagine:



Si à mucilagine crassa, quæ interdum in dysuria effluit, oriatur suppressio urinæ ex obstructione canalîs, per quem fuit, malum est periculofum, aut faltem moleftum.

## C U R A.

Quod attinet Curam: in hac attendatur ante omnia ad causas, adeoque

1. Acrimonia urinæ ladens temperetur;  
Et hinc
2. Partes urinariæ quocunque modo læsæ, in specie vesica exulcerata aut exoriata, consolidentur.  
Ac denique
3. Vicinarum partium affectus maturè removeantur.

Conveniunt ergo in Dysuria temperantia acrimoniam urinæ, & hinc Balsamica, vesicam exoriatam consolidantia; adeoque omnia, quæ in stranguria conveniunt, etiam mutatis mutandis, huc applicari possunt. Pluribus scopis in dysuria satisfacit oleum amygdalarum dulcium, quod perquam egregium est sæpiùs usurpatum; item oleum amygdalarum dulcium cum syrupo de althæa permistum, additis lapillis percarum, & pulvere lapillorum cancerorum in forma Potionis mista & crebriùs usurpata. Malva etiam, ejusque conserva florum, aliaque Maluacea, specifice commendantur, quatenus egregiè urinæ aut puris acrimoniam obtundunt, sensum vesicæ irritatæ demulcent, & loca læsa quasi mucilagine temperante oblinunt. Hinc conserva florum malvæ per experientiam comprobata mirè laudat AMATVS LVSITANVS Cent. 6. Cur. 58. ubi ardorem urinæ cum caruncularum missione beneficio conservæ ex floribus malvæ curavit. Conferatur & HOECHSTEDTERVS Decad. 6. Cas. 2. Schol. Vt & syrupus de Malva: Exemplum videb. in HORSTIO Juniore Epist. & Obs. pag. 50. Item mucilagines seminum cum Decocto alibæ paratæ, & cum hoc ipso propinatæ, sunt euporiston HARTMANNI in Praxi Chymiatr. Potiùs ex his Decoctum fiat, quod vel ita, addendo lap. cancerorum, usurpetur; vel addatur nitrum, & potuserit gratus. Decoctum pariter Foresti supra, Membro 2. Articuli 1. & 2. ubi de calculo renum, laudatum confert. Decoctum herbæ & baccarum alkekengi, siæstas est, & haberi possunt, cum passulis itidem in Dysuria singulariter est laudatum: Vel decoctum florum nymphae, petroselinî, fenehi lapidis cum Saccharo & nitro adhibeatur. Similiter Decoctum florum & herbæ malvæ cum passulis, juiubis & sebesten, pro usu interno admodum commendatur: Nam, si quid aliud, certè decoctum granorum sebesten cum aqua semperuivi omni mane ad 3j assumptum, à GABELCHOVERO ad Dysuriam laudatur. Alii grana sebesten incisa decoquunt vel in Aquæ semperuivi majoris, vel hordei; quod Decoctum ad 3v. omni mane usurpatum insigniter ardorem & dolorem urinæ lenire dicitur, idque imprimis, si tantillum de croco fuerit additum, uti hoc commendat GABELCHOVERVS Cent. 1. Cur. 21. STOECKERVS in Praxi laudat Decoctum hordei, sebesten & glycyrrhizæ, mane vesperique haustum, unâ cum syrupo papaveris. Commune euporiston est pulvis radicis alibæ cum saccharo mistus & usurpatus: Emulsionem ex amygdalis dulcibus, semine melonum, nucleis Persicorum, additis lapillis percarum, sunt egregia. Porrò lac, serum lactis, & omnia lacticia, uti in omni dysuria singulariter conveniunt, ita in specie profunt in ea, quæ est à cantbaridibus, quarum corrosivi veneni appropriata medela & alexipharmacum est in lacte: in quo casu lac copiosum assumatur, vel decocti sint in eo flores chamomillæ, qui sunt anodynî; sic enim illud magis anodynum fit; loco florum chamomillæ non inconueniens etiam est, si cum lacte ebullierint, aut flores cyani vel calcatrippæ, qui egregiè sunt diuretici; sic enim lac fit magis abstersivum. Hauriantur autem Lacticia copiosè & calidè: Id quod pariter de omnibus Potulentis intelligendum, ut, quantum possibile, calidè hauriantur; cum certè potus frigidus assumptus, aut aer frigidus extrâ susceptus, insigniter stranguriam & ischuriam soleant exasperare. Uterius terebinthina & omnia terebinthinata, uti in aliis affectibus urinariis, ita & in Dysuria, vitio vesicæ enata, optime conveniunt, quocunq; modo usurpentur; excoriationes enim & exulcerationes inchoatas sistunt, & maturè tollunt. Cautè tamen spiritus seu oleum terebinthinæ adhibeatur, quia nimis acria sunt. Potius pulveres convenientes, v. g. olivani, myrrhæ, mastichis, succini, boli Armeniæ, sanguinis draconis, & præ omnibus antimonii diaphoreticum excipiantur cum terebinthina, sicque redigantur in pilulas, v. g. pilulas Querc-

etani contra dysuriam & stranguriam, supra Membro 1. laudatas.

Faciunt huc sequentes pilulæ ad ardorem urinæ experte Ellenbergeri, Medici olim Halensis. Compositio est hæc:

2℥. Succiliquirit. depur.

Succini,

Thuris an. q. v.

Incorporentur cum terebinthina Cyprica, f. Pilulæ. Dentur manè & vesperti, jejuno ventriculo. Dosis 3ss. ad ʒij.

Facit etiam huc Pulvis Joelis ad Dysuriam admodum commendatus, compositus ex testis ovorum, semine urticæ & succino; nam succinum & succinata omnia admodum profunt. Unde etiam trochisci de carabe, item trochisci de terra sigillata, uti etiam trochisci de alkekengi, in officialis usurpantur ad dysuriam, idque in specie, ubi exulceratio aut excoriatio locorum urinariorum subest. Remedia quoque ex myrrhæ & mastiche sunt optima. Vesica capræ præparata, item vesica apri sylvestris masculi siccata & pulverisata, ad stranguriam & dysuriam præstantissima dicuntur remedia, ita ut ægri miraculi instar levamen sentiant, uti loquitur HOECHSTEDTERVS Decad. 6. Cas. 2., ubi etiam habet quædam de malva. Hisce etiam addatur oleum destill. carui quo THONERVS in Obs. aliquot Dysurias graves subitò curavit, guttulas v. propinando. Pulegium quovismodo assumptum ad Dysuriam commendari solet. Pulvis nucleorum persicorum cum calicibus, insigniter conducit in Dysuria pertinaci, etiam senili, uti hoc per experientiam refert GABELCHOVERVS Cent. 1. Cur. p. 39. Loco hujus dactyli sunt ferè salubriores; ex his enim tale quorundam euporiston paratur:

2℥. Dactyl. qu. v.

Ossa limâ redigantur in pulverem tenuissimum; caro verò scindatur in particulas, & in clibano exciccetur, pulverisetur in mortario, & misc. cum pulvere ossium, addendo

Sacchar. albiss. part. equ.

Hujus pulveris manè & vesperti capiatur tantum, quantum mucrone cultri semel aut bis accipi potest; continuetur aliquandiu, idque in mistura sequenti:

2℥. Syr. de alth. Fern. vel de juiub. ʒij.

Cichor. cum rhubar. ʒj.

Aquæ nymph.

Lactuc.

Chamom. an. ʒiv.

Cinnam. lactesc. ʒss.

M. pro vehiculo istius pulveris.

Hoc expertum commendatur in dysuria.

Item

2℥. Lap. percar. præp.

Off. sep.

Cancr. calcem.

Pulv. nuc. mosch. an. ʒss.

Extr. opii ʒj.

M. F. Pulvis.

2℥. Conserv. violar. ʒss.

Rob juniperi ʒvj.

Pulv. sem. hyper. ʒij.

Lapill. cancr. præp. ʒj.

Percar. præp. ʒss.

Laud. op. gr. ʒss.

cum f. q. syr. scabiosæ f. Electuarium.

D. S.

Electuarium leniens.

2℥. Conf. bederae terrestr. ʒss.

Rob juniperi ʒj.

Sem. violar. purp.

Hyperici, an. ʒij.

Lapill. percar. præp. ʒj.

Essent. opii ʒj.

cum f. q. syr. de alth. Fern. f. Electuarium.

Externè serpillum calefactum, & partibus urinariis applicatum, dolorem sedat, & urinam promovet, quod expertè à se esse dicit MONTAGNANA Conf. 187. Cataplasma ex alibæ, malva, meliloto, parietaria, cum lacte aut oleo scorpionum pubi imponatur; aut saltem ruta & parietaria in oleo scorpionum cocta & apposita præsentissime juvant, dicit AMATVS LVSITANVS Cent. 6. Cur. 93.

Vel

2℥. Herb. parietar. m. ij.

C. beresol.

Flor. chamom. an. m. j.

locif. coqu. in lacte ad mollitiem:



Pulpæ per ſetaceum trajectæ adde

Butyr. rec. ʒj.

Olei ſcorpion. ʒʒ.

Miſc. per Cataplaſmate:

Imponatur calidè regiõni pubis, & deſuper operculum calefactum.

Porro *chyſteres* crebrò in uſum ſunt vocandi, nunc blandè *ſimulantes*, nunc *lenientes*, ex lacte, aut ſimiles *Clyſteres* anodyni, qui dolorem & calorem mitigandi admodum leuant; nam quò contumacior eſt alvus, eò intenſior eſt dyſuria. Unde uſitatiffimus eſt eorum uſus, de quibus, ut & Balneis, vid. ſuprà.

Tandem Injectiones ex lacte vel ſimplici, vel Decoctionis Anodynorum, item ex oleo amygdalarum dulcium, conveniunt: loco quarum in exulceratione veſicæ Injectiones primò mundificantes, hinc conſolidantes inſtituantur: V. g. Injeſtio mundificans in exulceratione veſicæ:

ʒ. Rad. liquirit. ʒj.

Cort. fabar. ʒj.

Sem. cicer. rubr. part. j.

Fol. plantag. M. j.

E. Decoct. in aqua, addendo parum lixivii. In-

Colat. ʒ. j. diſſolve

Tereb. lar. vel pulgar. in mell. diſſol. ʒvj.

Unguent. *Ægyptiac.* tantum, quantum ferre poteſt.

Idque ſaltem quantum neceſſitas urget, miſc. pro Injectione.

D. S.

Injeſtio mundificans.

Injeſtio conſolidativa:

ʒ. Ramul. equiſeti,

Fol. plantag.

Sem. hyper. an. M. j.

Rad. chereſol. maj.

*Biftorta*,

*Tormentilla* an. ʒj.

Cort. granat. ʒij.

Coqu. in ʒ. j. aquæ ferrariæ. vel *Martiatæ*:

In Colatura diſſolve

*Trochiſc. alb. Rhæſis ſine opio* ʒʒ.

*Boli Armen.* ʒj.

Miſc. pro Injectione.

D. S. ut ſuprà.

Anteà commendavi Laſticinia internæ & externæ: Quò etiam pertinet experimentum SANQVEZ de pediculis vivis cum lacte injectis, ſuprà, *Membrò* ubi de *ſtranguria*, allegatum; quod etiam laudatſi audivi à D. MICHAELIS.

Item præter Injeſta convenit hoc unguentum expectum ad urinæ difficultatem:

ʒ. Unguenti *Martiat.*

*Agrippæ*,

*Olei laurin.* an. ʒj.

Miſceantur optime: S.

Unguentum ſingulare.

Hoc blandè calidè ungatur regio pubis, & ſubito fluet urina, idque abſque dolore.

Hæc de affectibus urinaris, & qui ad illas pertinent.

Pergo igitur ad

## SECTIONEM XXI.

### DE

## GLANDULARUM VSV ET NATURA LYPHÆ, EIVSQVE IN GLANDVLIS SEPARATIONE, ET MOTV DEBITO LÆSIS, INDEQVE ORTIS CATARRHIS IN GENERE ET IN SPECIE.

**V**T pateat Connexio cum ſuperioribus, notandum: quod ſanguis (de quo jam ſuperius Sect. 19. etiam dictum) ad omnes partes moveatur æquali circulo, in quarum quibusdam (uti etiam dixi) aliquid par-

titur, imprimis quidem in viſceribus; quò pertinent ſolemnès quædam ſecretiones ab iſdem factæ: Quò etiam facit, dum poſt renes ſanguis per arterias movetur etiam in particularia viſcera, ad glandulas per univerſum corpus diſſeminatas (de quibus vid. concinne agens STENO. *Tract. Obſerv. de Glandulis & Muſculis*; ſicut iſdem ſpecialiter quoad ſtructuram agit WARTHONVS in *Adenographia*) ut in iſdem ex ſanguine & ſpiritibus animalibus aliquid ſeparetur, quod ad conſtitutionem & elaborationem lymphæ requiritur, idque tam in glandulis conglobatis, quàm conglomeratis. Utræque hæ glandulæ verſantur in elaborando peculiati quodam humore, *Lympha* à BARTHOLINO appellato, qui etiam pro varietate glandularum diſtribuitur diverſimodè. Et quidem omnis *lympha* infra cor per ductum thoracicum infunditur in venam axillarem ſiniſtram; ſicut *lympha* in regione ſupra cor tandem etiam per axillarem ſiniſtram infunditur & admisceetur ſanguini. E glandulis conglomeratis per ſingulares ductus in certam quandam corporis cavitatem effluſus, peculiaria obtinet nomina & officia, ut ſunt ſaliva, ſuccus pancreaticus, lachrymæ &c.: & glandulis verò conglobatis, tam regionis inferioris quàm ſuperioris, per peculiaria vaſa, *lymphatica* dicta, ſanguini in venâ axillari ſiniſtra infunditur: Vid. de hiſ in ſpecie SYLVIVS *Diff. 5. & 8.* item BARTHOLINVS de *vaſis lymphaticis*, item RVDBECIUS *Tract. de Vaſis hepatis & glandularum ſeroſis*. Ubi enim ſunt glandulæ conglobatæ, neceſſario oriuntur *lymphatica vaſa*. Omnibus autem glandulis conglomeratis inferitur nervus.

Glandulæ ergò omnes, cum habeant cum lymphaticis commercium, ita ut nuſpiam reperiatur vaſ lymphaticum quod non ex glandulis ducat originem, patet: glandularum hunc eſſe uſum, ut præparent lympham, eamque præparatam per ductus certos aliorum derivent; & quidem per ductus lymphaticos ex glandulis conglobatis in venam axillarem ſiniſtram; per ductus verò peculiareſ excretorios ex glandulis conglomeratis in certam cavitatem quandam,

Similis glandularum ſtructura ſimilem in genere humorem ab iſis emulgeri demonſtrat, ita quidem, ut *lympha* omnium glandularum in hoc conveniat, quod ſit liquor aquoſus ſpirituoſus, ut plurimum acidulus. Conglomerarum verò diverſitas etiam certam quandam in humore inde elaborato innuit diverſitatem non eſſentialem, ſed accidentalem, diverſis nempe uſibus deſtinatam: Sic eſſentialiter quidem convenit *lympha* quæcumque cum ſaliva verbi gratiâ, & ſucco pancreatico; accidentaliter tamen pro diverſitate glandularum in textura, in quibus elaborantur, diſſerunt. Unde etiam diverſas functiones adminiſtrare apti nati ſunt, v. g. dum alius uſus eſt ſalivæ, alius lachrymarum, alius ſucci pancreatici, & ſic porro, prout variant nonnihil diſti liquores ex diſtinctis glandulis oriundi.

Materia ex qua componitur *lympha*, maximam partem hauritur ex maſſa ſanguinea: idque in ſpecie in glandulis conglomeratis, quæ ſpongiarum inſtar ex ſanguine arteriarum emulgent liquorem ſeroſum limpidum, & ut probabiliffimè putatur, occultè acidulum, quibus ſe ſociare videntur ſpiritus animales per nervos ad glandulas derivati: Conglobatarum verò glandularum lymphaticarum eodem modo ex ſanguine elaboratur. Interim tamen admodum probabilis videtur iſta hypotheſis, quæ ſpiritus animales in partes per nervos allatos, condensatos ſimul maximam partem, cum hac *lympha* conſtituere aſſerit; ita quidem, ut hi ipſi, dum laboribus non abſumantur, omnes cum alimento partium aquoſiori ſe jungant, & ita ſubtilitatem ſuam ſpirituofam amittant, ac denuò in aquoſam ſubſtantiam condensentur. Hic ergo limpidus liquor à glandulis imbibitus, & humori ex ſanguine emulſo permixtus, *lympham* glandularum conglobatarum conſtituere videtur; de qua hypotheſi vid. SYLVIVS in ſuprà cit. *Diff. 5.* item SEGERVS in *Diff. de Quiditate & Materia lymphæ*. Dixi verò, quòd ex ſanguine in glandulis elaboretur ſuccus vel liquor quidam acidulus, qui temperetur à ſpiritu iſto volatili condensato, hoc guſtus lymphæ ſubacidus interdum obſervatus confirmat; vid. BARTHOLINVS *Cent. 2. Epist. 55. & 69.* item *Cent. 3. Epist. 93.*

Uſus lymphæ in glandulis conglomeratis eſt, ut excreta per



per ductus excretorios in determinatas cavitates vel loca, certis functionibus & alterationibus proflit, de quibus sub speciali partium usu. Quod verò attinet lymphæ, usum in glandulis conglobatis elaboratum, & in venam axillarem sinistram infusæ, hic non adeo est evidens. In genere tamen ejus propè cor cum sanguine commissio, & immediata cordis ventriculo dextro infusio cum sanguine, certum quendam pro sanguificatione ejusque renovatione sanguinis in corde & pulmonibus adjuvanda usum hujus lymphæ arguit; quod lymphæ ascendenti ab inferioribus cum chylo in ductum thoracicum miscela ulterius confirmat. Unde dicendum videtur cum SYLVIO Exerc. 8. Lympham, quatenus est succus subtilis spirituosus volatilis, disponere sanguinem certo modo ad eam fermentationem & spiritua- scentiam, quam in suotransitu per cor & pulmones patitur. Ubi nec negligendum puto, quod chylus, dum à lymphâ diluitur, hoc ipso facilius cum sanguine permiscetur, & ab eodem subigatur & assimilatur.

Consideratâ Theoriâ, nobis jam incumbit vitia seri evol- vere. Jam ergo vitatur & læditur hæc lymphæ secretio, & debita ejus in partes distributio, tribus imprimis mo- dis.

1. Dum ipsa vitiosè generatur. Degenerat nempe à naturali crassi & textura, tam in quanto quàm in quali, quatenus generatur aut nimis copiosa, aut nimis acida, aut nimis salsa, aut alio modo vitata.
2. Dum eadem vel naturaliter vel præternaturaliter constituta vitiosè distribuitur, & ex glandulis conglomeratis in partes & cavitates infunditur.
3. Dum eadem tam naturaliter quàm præternaturaliter constituta impeditur in suo motu ex glandulis conglobatis per vasa lymphatica.

A prioribus duobus vitiis lymphæ oriuntur catarrhi dicti, seu omnes catarrhales Affectus. Et quidem prius vitium hinc varia & distincta producit pathemata, pro glandularum & partium vicinarum varietate; cum glandulæ sint fontes, ex quibus omnes catarrhi originem ducunt. Quando enim ex vitiatis glandulis vitatur lymphæ generatio, ita ut hæc exinde fiat acida, aut etiam nimis salsa, aut alio peregrino sapore infecta, indeque distribuitur in partes, in specie ex glandulis conglomeratis, tunc oriuntur catarrhi. Alterum dat Affectus Catarrhales propriè sic dictos. Tertio verò lymphæ vitio, nempe in motu impeditæ, oriuntur omnes Hydropes particulares & Tumores serosi particula- res.

## C A P. I.

### DE

## LYMPHÆ VITIOSA GENERATIONE.

**V**itatur lymphæ generatio tam in quanto, quàm in qua- li, vel obiecti vel subiecti vitio. Obiecti seu materiæ ex qua (quæ maximam partem est serum sanguinis) vitio vitia- ta generatur lymphæ, quando hoc serum parcius vel copiosius, tenuius, vel à contento chylo soro crassius, dulcius, & vitio- sè acrius fuerit; nam & hinc necessariò lymphæ varia vitia contrahit. Subiecti denique vel glandularum vitio vitatur lymphæ generatio, quando earundem tonus & textura se- cretoria, & alia requiæta ad lymphæ genesis necessaria non ritè se habent.

Frequentissimum vitium est, quando observantur, hincque plus minus intumescunt, ut plurimum à materia lymphæ gene- randæ viscidore, vel gelatina chylosa magis turgida, quæ undecunque coagulata aut inspissata, tam à frigore aliavè causa externa, quàm interna, sicque in pituitam abiens, Tu- mores glandularum majores aut minores, molliores aut durio- res, benigniores, & cum sensu punctorio maligniores, con- stituit. Circa quorum affectuum Theoriam & Praxin consulen- dus venit SYLVIVS lib. 1. Prax. cap. 49. 50. 51. 52. 53. & 54. Ubi saltem hoc simul addidero pro his affectibus curandis, illis præsertim, qui ex obstructis glandulis originem du- cunt, præter Mercurium dulcem pro Purgatione, optima remedia esse sudorifera ex lignis, præsertim juniperino; pa- tala: v. n.

24. Rasur. ligni juniperin. ʒij.

Sassafr. ʒij.

Cori. lign. guaiaci ʒj.

Herbaror. mar. M. liij.

Bacc. junip. ʒij.

Infund. in f. q. Aqu. & vini ad ʒij.

Macerata per 24. horas, coqu. in Balneo Mariæ in cucurb cum suo alemb. juncto ad medias;

Colatum & Destillatum misce, & adde

Spiritus sal. ammoniaci ʒij.

Syr. flor. calend. ʒij. ad liij.

M. D. S.

Potio catarrhum dissolvens.

Hoc ipso, præmissa Purgatione Mercuriali, nupere scem- nam cum mensium suppressione, tumores parotidum, & glandularum in collo habentem, cum capitis gravedi- ne, narium obstructione, oris siccitate & difficili anhe- litu, & pectoris ac pulmonum quasi repletionem, inter- dum suffocationem quandam minante, restitui, capien- do omni mane bonum haustum calidè, & expectando hinc in lecto sudorem.

## C A P. II.

### DE

## LYMPHÆ VITIOSA DISTRIBUTIONE

### ARTICULUS

### DE

## AFFECTIBUS CATARRHALIBUS.

**C**atarrhi vocem quod attinet: in sensu Hippocratico quemcunque decubitus seu depositionem alicujus humoris, ut plurimum acrioris, in quodam loco vel parte innuit, adeo ut ratione hujus sub generali catarrhorum nomine etiam Diarrhœa, Diabetes, & alii similes morbi HIPPOCRATI Catarrhi audiant. Verum tamen in specie, & nunc usitato catarrhi seu Defluxionis nomine, innuitur non decubitus seu effusio lymphæ aut icho- ristenuis, sive jam serum hoc sit mite & insipidum, sive acre, asperum, salinum, ad aliquam certam & determinatam partem. Et hoc est propè Catarrhus; nempe præternatu- ralis à sero plus minus vitiatum in quacunque parte facta al- teratio seu functionum læsio. Vocatur Catarrhus à κατάρρεω, fluo.

Ulterius Veterum de Catarrhis hypothesis, quod nempe ex intemperie stomachi frigida & jecoris calida exhalant copio- si vapores sursum, qui in capite, tanquam alembico, à loci fri- giditate denud condensati in liquores seu aquas ferofas, cu- mulati, postmodum exinde per foramina ossis cribriformis, tanquam per rostrum alembici, successivè in partes inferiores, easque interiores, nares, fauces, oculos, aures, gulam, asperam arteriam, pulmones, &c. deflu- ant, & ita Catarrhos internos constituent: Vel quod per loca intercutanea externa, later membranarum nempe cranii extimas deriventur in totam corporis peripheriam, etiam ul- timos artus usque, à quibus defluxionibus, seu, ut vocant, defluxionibus varia mala, in specie arthritici affectus & simi- lia oriuntur, satis notum est; Nam stomachum ex intem- perie frigida copiosum phlegma generare; ideo verò ex in- temperie calida incumbens stomacho istud phlegma in vapo- res & fumos resolvere, qui copiosè ex ventriculo exhalan- tes, & evaporantes Catarrhos externos constituent, dixe- runt. Et hæc est Veterum hypothesis adeo decantata, & à multis adhuc recepta.

Sed hanc Theoriam Veterum sufficienter discussit tam HELMONTIVS in eleganti Tract. Catarrhorum delirant. vocato, quàm etiam SCHNEIDERVS in Operibus suis prolaxis de Catarrhis: ejus proluxa volumina hunc nu- cleum continent, quod asserat & defendat, non à capite seu cerebro depluere serum pro catarrhis, sed istud ex arte- riarum vasculis, à massa sanguinea facultate expultrice aper- tis, seponi, & per membranas transfundendo excerni; unde pro varietate membranarum, per quas fiat ista transfusio, & pro varietate seri, ex sanguine per arterias ita exclusi, & hinc inde sepositi, varii etiam oriuntur Catarrhi. Et totum hoc est, quod habet SCHNEIDERVS in omnibus suis li- bris; correxit tamè suam sententiam, & loco membranarum glandulas supposuit. In qua doctrina glaciem prius fregit ac SCHNEIDERO tam HELMONTIVS, quàm etiam CARO.



CAROLVS PISO in erudito scripto de Colluvie serosa, cui SCHNEIDERVS multum debet; sicut & PISONI multum debet WILLISIVS, quoad Pathologiam cerebri.

Sed, ut propius ad rem accedamus, equidem in hoc non culpandi sunt Veteres, quod serum statuerint materiam catarrhorum, utut lymphæ vitiosæ. Moderni hoc adscribant: Nam serum Veterum collectum, quod HELMONTIO dicitur Latex aquosus seu Humor neglectus, propriè loquendo, Modernorum est lymphæ, & reverà in radice conveniant; utut in explicanda causa & fiendi modo Catarrhorum errarint; Glandularum vasorumque lymphaticorum naturâ & usu nondum cognitis: Vid. SYLVIVS lib. 1. in Praxide læsa transcolatione lymphæ. Serum autem catarrhorum est materia, quozies nunc mediât ex arteriis cum sanguine excretum, & motu suo plûs minûs impeditum, & in spatiola partium mollium effusum, etiam varios affectus, quos vulgò pariter Catarrhos vocant, infert; nunc verò, Idque primariò, mediât, mediante nempe sui in lympham mutatione, & hinc ex glandulis conglomeratis in certa loca effusione, Catarrhos propriè dictos seu defluxiones, aut rectius loquendo cum modernis, Influxiones constituit. Materia ergo propriè dictorum catarrhorum est lymphæ glandularum conglomeratarum, tam naturaliter, quàm præternaturaliter constituta, copiosè, & imprimis uberiùs, in partes effusa. Fontes verò, unde scaturiat hæc, dictum, quod glandulæ circa lympham elaborandam & distribuendam sint occupatæ, dum secundum STENONEM in Observat. de Glandulis & Musculis nullum detur vas lymphaticum in corpore, quod non oriatur à glandula quadam, vel in glandulam non terminetur. Fontes ergo Catarrhorum sunt meritis glandulæ conglomeratæ; unde glandulosa saltem vel ipsi vicina loca, vel quæ cum glandulis habent correspondentiam, propriè dicti Catarrhi affligunt. Scaturigo prima Catarrhorum denique est massa sanguinea. Cùm ergo frequentissima glandularum conglomeratarum & conglomeratarum textura circa cerebrum cohereat (nam totus ejus cortex seu substantia cerebri corticalis minutissimarum glandularum est textura, demonstrante hoc MALPIGHIO in scrutinio viscerum); cum itidem in cerebri medulla copiosæ glandulæ sint compositæ, vel etiam in locis cerebri vicinis, oculis, faucibus, larynge, auribus, &c. copiosè & insigniores sint glandulæ, ac denique collo & asperæ arteriæ copiosæ adhæreant glandulæ, & hinc caput & partes respirationi inseribiles præ reliquis externi aeris injuriis & læsionibus sint expositæ; ob id non mirum erit, si propriè dicti catarrhales affectus frequentius capiti, ipsiusque partibus vicinis, laryncibus ac asperæ arteriæ, ac consequenter pulmonibus & pectori, sint molesti, i. e. ratione causæ efficientis externæ & materialis proximè ad catarrhos hæc partes sint dispositæ, idque eò magis, quò magis externis injuriis, in specie aeris, modò dictæ partes sunt expositæ.

Dixi modò, Catarrhorum materiam esse lympham; fontes verò glandulas. Quod verò attinet membranas Schneideri, in specie binas pituitarias, anteriorem & posteriorem, ab eo lib. 3. de Catarrhis accuratè delineatas, per quas materia catarrhorum ab eodem transudare dicitur (utut in ultimo Tomo de Catarrhis addat his ipsi seriem glandulas, tanquam opercula vasorum) observandum est, quod rectius aliis his glandulis, seu cribris aut transcolatoriis, originem Catarrhorum adscribant; imprimis cùm hæc ipsæ membranæ Schneideri à parte posteriore texturam copiosarum glandularum habeant adharerentem, ex quibus glandulis, seu fontibus, per vasa minuta excretoria, membranas istas perforantia, omnes Catarrhi excernuntur, sicuti naturaliter per hæc vasa lymphæ, fauces & nares aliasque partes oblinens, hoc modo excernitur: Vid. STENO in Obs. de Glandulis & Musculis.

Per has igitur glandulas conglomeratas lymphæ aut nimis abundanter per loca exclusa, aut vitiosè simul præparata, & ita excreta catarrhos constituit, i. e. defluit lymphæ aut copiosa, aut vitiosa ex glandulis, imprimis conglomeratis circa caput, fauces, collum, laryngem, asperam arteriam, aliasque similes vicinas partes, & proximè constituit Catarrhos. Unde huic lymphæ depositioni non tantum modò functionum istarum partium læsiones, sed pro vario lymphæ vitio varia etiam simul symptomata superveniunt. Et sanè hoc sensu nil obstat, quin gonorrhææ virorum, fluôr albus mulierum, salivationes quolibet, quin & interdum diarrhææ, ad Catarrhos referri queant.

## CAUSÆ.

Vidimus Catarrhorum materiam, nempe lympham vitiatam; vidimus fontes, nempe glandulas sub membrana tegmine reconditas: quare pergo ad Causas, à quibus ita movetur lymphæ vitiosè, aut generatori vitiosa, & consequenter Catarrhi. Equidem ipsa, seu humor sui generis, spontaneo imperu non, nisi fluidi gravitatione, deorsum movebitur, adeoque purè passivè se se habebit ad hoc, ut copiosior, aut plus minûs vitiosa, per glandulas conglomeratas moveatur, & ita spirituum influxum moventem, & organorum seu instrumentorum dispositionem catarrhalis influxio imitabitur. Ut igitur per glandulas quasvis conglomeratas catarrhalis lymphæ fiat excretio, causa proxima, propter quam lymphæ vel naturaliter vel præternaturaliter constituta effunditur, & ita vitiosè distribuitur, semper est irritatio & læsio quædam in parte quadam plus minûs sensili, in qua vel cujus vitia sunt glandulæ copiosæ. Hujus enim irritationis seu læsionis occasione lymphæ ob fibrarum stricturam ex glandulis vicinis uberiùs exprimitur, & ita semper restaurata continuus quasi rivus eò derivatur; quæ ipsa, quò plus vel minus gravem affectum catarrhalem constituit: v. g. sicut spina digito infixæ causa est sanguinis effusionis & inflammationis in loco, ubi plura sunt vasa sanguifera, ita similis spina, v. g. acidum inspiratum, aut inspiratus fumus sulphuris, ibidem lymphæ uberiorem effusionem, indeque ranciditatem aut tussim subindè chronicam, & materiæ mucosæ copiosam ejectionem faciet; aut si cuidam pulvis incidit in oculum, mox ex irritatione dolorosa effunduntur copiosæ lachrymæ, qualis lachrymatio est quasi catarrhus à causa externa ortus. Quod si verò ab interna oritur talis copiosa lachrymatio, tunc rectè dicitur catarrhus. Læsis ista, prout nunc magis superficialis, adeoque irritatio quædam saltem partis fuerit, vel prout nunc gravior, quæque non sensum saltem partis afficiat, sed etiam texturam ejus & spirituum insitum simul alterare valeat, etiam Catarrhum, nunc graviores nunc leviores, infert. In quo posteriore, loco laudabilis alimentum vitio spiritus insiti ex propriè digestionis & coctionis læsione vitiosum continuè excrevit excrementum, quod similiter novum alimentum corrumpendo, partem magis magisque lædet, unde catarrhus habitualis seu perennis catarrhi scaturigo; ut in phibisi manifestum est, de quo infra.

Causa ergo proxima est irritatio quædam molesta, ubi sunt glandulæ; sive irritatio ista fiat à fermento exotico, sive ab alia causa, perindè est: v. g. si fermentum aliquod exoticum in parte relictum eandem affligit; nam mox in glandulis vicinis copiosæ lymphæ effusio, & consequenter Catarrhus, producitur.

Causa Remota, & quidem materialis irritans, & nunc saltem sensum nunc spiritum insitum magis afficiens, utut sit varia, tam externa, quàm interna, speciatim tamen est acidum acre, vel salso-acidum acre, quod occasionem dictæ catarrhali defluxioni subministrat atque infert. Non est excludenda hæc causa efficiens formalis, quæ est spiritus imperum faciens, & occasione istius irritationis catarrhalem lymphæ excretionem efficiens.

Causa externa, quæ irritant partes & loca glandulosa, occasioneque subministrant catarrhis, sunt speciatim aeris injuriæ, inspirati nempe vitia, ratione cujus evenit subindè, ut epidemici fiant Catarrhi, ilque nunc cum nunc ubique malignitate; sicut ex eadem ratione febres malignæ catarrhales epidemice observatæ frequentius fuerunt, hyberno tempore communissimæ. Epidemici hi catarrhi ab aere inspirato originem ducunt duplici modo; quatenus externa inspirata partim lympham ac serum inquinant, & præternaturali ejus alterationi occasionem præbent; partim quoque, quatenus irritant loca, per quæ transeunt, nares, fauces, &c. unde ibidem lymphæ vitiate seu catarrhalis uberior in dictis locis fit excretio. Sepius tamen sine vitio aeris epidemico etiam ex alia ratione aer vitiosus catarrhis occasionem præbet. Quòd ii pertinent, quando cum aere sumi acres metallici & mercuriales inspirantur in laboratoriiis chymicorum & aurifabrorum, quorum acidum gas & particule acres acide membranas nasarium, faucium, laryngis, & sub his reconditas glandulas copiosas, congruâ irritatione ad fibrarum contracturam & copiosam lymphæ excretionem stimulant; quin & ipsam lympham non raro vitiant, ut acrimoniam acidam,

spissio-



per ductus excretorios in determinatas cavitates vel loca, certis functionibus & alterationibus profit, de quibus sub speciali partium usu. Quod verò attinet lymphæ usum in glandulis conglobatis elaboratum, & in venam axillarem sinistram infusæ, hic non adeo est evidens. In genere tamen ejus prope cor cum sanguine commissio, & immediata cordis ventriculo dextro infusio cum sanguine, certum quendam pro sanguificatione ejusque renovatione sanguinis in corde & pulmonibus adjuvanda usum hujus lymphæ arguit; quod lymphæ ascendentis ab inferioribus cum chylo in ductum thoracicum miscelæ ulterius confirmat. Unde dicendum videtur cum SYLVIO Exerc. 8. Lympham, quatenus est succus subtilis spirituosus volatilis, disponere sanguinem certo modo ad eam fermentationem & spirituositatem, quam in suotransitu per cor & pulmones patitur. Ubi nec negligendum puto, quod chylus, dum à lymphâ diluitur, hoc ipso facilius cum sanguine permiscetur, & ab eodem subigatur & assimiletur.

Consideratâ Theoriâ, nobis jam incumbit vitia feri evolvere. Jam ergo vitatur & læditur hæc lymphæ secretio, & debita ejus in partes distributio, tribus imprimis modis.

1. Dum ipsa vitiosè generatur. Degenerat nempe à naturali crassi & textura, tam in quanto quàm in quali, quatenus generatur aut nimis copiosa, aut nimis acida, aut nimis salsa, aut alio modo vitata.
2. Dum eadem vel naturaliter vel præternaturaliter constituta vitiosè distribuitur, & ex glandulis conglomeratis in partes & cavitates infunditur.
3. Dum eadem tam naturaliter quàm præternaturaliter constituta impeditur in suo motu ex glandulis conglobatis per vasa lymphatica.

A prioribus duobus vitis lymphæ oritur catarrhi diffinitio, seu omnes catarrhales Affectus. Et quidem prius vitium hinc varia & distincta producit pæthemata, pro glandularum & partium vicinarum varietate; cum glandulæ sint fontes, ex quibus omnes catarrhi originem ducunt. Quando enim ex vitiatâ glandulis vitatur lymphæ generatio, ita ut hæc exinde fiat acida, aut etiam nimis salsa, aut alio peregrino sapore infecta. indeque distribuitur in partes, in specie ex glandulis conglomeratis, tunc oriuntur catarrhi. Alterum dat Affectus Catarrhales propriè sic dictos. Tercio verò lymphæ vitio, nempe in motu impeditæ, oriuntur omnes Hydropes particulares & Tumores serosi particulares.

## C A P. I.

### DE

## LYMPHÆ VITIOSA GENERATIONE.

**V**itatur lymphæ generatio tam in quanto, quàm in quali, vel obiecti vel subiecti vitio. Obiecti seu materiæ ex qua (quæ maximam partem est serum sanguinis) vitio vitata generatur lymphæ, quando hoc serum parcius vel copiosius, tenuius, vel à contento chyloso rore crassius, dulcius, & vitiosius acris fuerit; nam & hinc necessariò lymphæ varia vitia contrahit. Subiecti denique vel glandularum vitio vitatur lymphæ generatio, quando earundem tonus & textura secretoria, & alia requiritæ ad lymphæ genesis necessaria non rite se habent.

Frequentissimum vitium est, quando obstruuntur, hincque plus minus intumescunt, ut plurimum à materia lymphæ generandæ viscidore, vel gelatina chylosa magis turgida, quæ undecunque coagulata aut inspissata, tam à frigore aliavè causa externa, quàm interna, sicque in pituitam abiens, Tumores glandularum majores aut minores, molliores aut duriores, benigniores, & cum sensu punctorio maligniores, constituit. Circa quorum affectuum Theoriam & Praxin consulendus venit SYLVIVS lib. 1. Prax. cap. 49. 50. 51. 52. 53. & 54. Ubi saltem hoc simul addidero pro his affectibus curandis, illis præsertim, qui ex obstructis glandulis originem ducunt, præter Mercurium dulcem pro Purgatione, optima remedia esse sudorifera ex lignis, præsertim juniperino; pæsertim à V. G.

24. Rasur. ligni juniperin. ʒij.

Sassafr. ʒij.

Corr. lign. guaiaci ʒj.

Herbar. rar. mar. M. liij.

Bacc. junip. ʒij.

Infund. in f. q. Aquæ & vini ad ʒij.

Macerata per 24. horas, coqu. in Balneo Mariæ in cucurbitum suo alemb. juncto ad medias;

Colatum & Destillatum misce, & adde

Spiritus sal. ammoniaci ʒij.

Syr. flor. calend. ʒij. ad ʒij.

M. D. S.

Potio catarrhum dissolvens.

Hoc ipso, præmissa Purgatione Mercuriali, nupere fecimus cum mensium suppressione, tumores parotidum, & glandularum in collo habentem, cum capitis gravedine, narium obstructione, oris siccitate & difficili anhelitu, & pectoris ac pulmonum quasi repletionem, interdum suffocationem quandam minante, restitui, capiendū omni mane bonum haustum calidè, & expectandū hinc in lecto sudorem.

## C A P. II.

### DE

## LYMPHÆ VITIOSA DISTRIBUTIONE ARTICULUS

### DE

## AFFECTIBUS CATARRHALIBUS.

**C**atarrhi vocem quod attinet: in sensu Hippocratico quemcumque decubitus seu depositionem alicujus humoris, ut plurimum acrioris, in quodam loco vel parte, inquit, adeo ut ratione hujus sub generali catarrhorum nomine etiam Diarrhœa, Diabetes, & alii similes morbi HIPPOCRATI Catarrhi audiant. Verumtamen in specie, & nunc usitato catarrhi seu Defluxionis nomine, innuitur hæc *ἰσχυρὸν* decubitus seu effusio lymphæ aut ichoristenus, sive jam serum hoc sit mite & insipidum, sive acre, asperum, salinum, ad aliquam certam & determinatam partem. Et hoc est prope Catarrhus; nempe præternaturalis à sero plus minus vitiatum in quacumque parte facta alteratio seu functionum læsio. Vocatur Catarrhus à *κατὰ*, suo.

Uterius Veterum de Catarrhis *hypothesis*, quod nempe ex intemperie stomachi frigida & jecoris calida exhalant copiosi vapores sursum, qui in capite, tanquam alembico, à loci frigiditate denuò condensati in liquores seu aquas serosas, cummulati, postmodum exinde per foramina ossis cribriformis, tanquam per rostrum alembici, successivè in partes inferiores, easque interiores, nares, fauces, oculos, aures, gulam, asperam arteriam, pulmones, &c. defluant, & ita Catarrhos Internos constituent: Vel quod per loca intercutanea externa, inter membranas nempe cranii extimas deriventur in totam corporis peripheriam, etiam ultimos artus usque, à quibus defillationibus, seu, ut vocant, defluxionibus varia mala, in specie arthritici affectus & similia oriuntur, satis notum est; Nam stomachum ex intemperie frigida copiosum phlegma generare; iccirco verò ex intemperie calida incumbens stomacho istud phlegma in vapores & fumos resolvere, qui copiosè ex ventriculo exhalantes, & evaporantes Catarrhos externos constituent, dixerunt. Et hæc est Veterum *hypothesis* adeo decantata, & à multis adhuc recepta.

Sed hanc Theoriam Veterum sufficienter discussit tam HELMONTIVS in *eleganti Tract. Catarrhorum delirant.* vocato, quàm etiam SCHNEIDERVS in *Operibus suis praxiis de Catarrhis*: ejus proluxa volumina hunc nucleum continent, quod asserat & defendat, non à capite seu cerebro depluere serum pro catarrhis, sed istud ex arteriarum vasculis, à massa sanguinea facultate expultrice aperitis, seponi, & per membranas transudando excerni; unde pro varietate membranarum, per quas fiat ista transudatio, & pro varietate feri, ex sanguine per arterias ita exclusi, & hinc inde sepositi, varii etiam oriuntur Catarrhi. Et totum hoc est, quod habet SCHNEIDERVS in omnibus suis libris; correxit tamè suam sententiam, & loco membranarum glandulas supposuit. In qua doctrina glaciem pridè fregerunt SCHNEIDERO tam HELMONTIVS, quàm etiam CARO.



CAROLVS PISO in erudito scripto de Colluvie serosa, cui SCHNEIDERVS multum debet; sicut & PISONI multum debet WILLISIVS, quoad Pathologiam cerebri.

Sed, ut propius ad rem accedamus, equidem in hoc non culpandi sunt Veteres, quod serum statuerint materiam catarrhorum, utut lymphæ vitiosæ Moderni hoc adscribant: Nam serum Veterum collectum, quod HELMONTIO dicitur Latex aquosus seu Humor neglectus, propriè loquendo, Modernorum est lymphæ, & reverà in radice conveniunt; utut in explicanda causa & fiendi modo Catarrhorum errarint, Glandularum vasorumque lymphaticorum naturam & usum nondum cognitis: Vid. SYLVIVS lib. 1, in Praxide læta transcolatione lymphæ. Serum autem catarrhorum est materia, quoribus nunc mediata ex arteriis cum sanguine excretum, & motu suo plus minus impeditum, & in spatiola partium mollium effusum, etiam varios affectus, quos vulgò pariter Catarrhos vocant, infert; nunc verò, idque primariò, mediata, mediante nempe sui in lympham mutatione, & hinc ex glandulis conglomeratis in certa loca effusione, Catarrhos propriè dictos seu defluxiones, aut rectius loquendo cum modernis, Influxiones constituit. Materia ergo propriè dictorum catarrhorum est lymphæ glandularum conglomeratarum, tam naturaliter, quam præternaturaliter constituta, copiosè, & imprimis uberius, in partes effusa. Fontes verò, unde scaturiat hæc, dictum, quod glandulæ circa lympham elaborandam & distribuendam sint occupatæ, dum secundum STENONEM in Observat. de Glandulis & Musculis nullum datur vas lymphaticum in corpore, quod non oriatur à glandula quadam, vel in glandulam non terminetur. Fontes ergo Catarrhorum sunt merito glandulæ conglomeratæ; unde glandulosa saltem vel iis vicina loca, vel quæ cum glandulis habent correspondentiam, propriè dicti Catarrhi affligunt. Scaturigo prima Catarrhorum denique est massa sanguinea. Cum ergo frequentissima glandularum conglomeratarum & conglomeratarum textura circa cerebrum cohercat (nam totus ejus cortex seu substantia cerebri corticalis minutissimarum glandularum est textura, demonstrante hoc MALPIGHIO in serutino viscerum); cum itidem in cerebri medulla copiosæ glandulæ sint compositz, vel etiam in locis cerebri vicinis, oculis, faucibus, larynge, auribus, &c. copiosæ & insigniores sint glandulæ, ac denique collo & asperæ arteriæ copiosæ adhæreant glandulæ, & hinc caput & partes respirationi inferentes præ reliquis externi aeris injuriis & læsionibus sint expositæ; ob id non mirum erit, si propriè dicti catarrhales affectus frequentius capiti, ipsiusque partibus vicinis, laryngi & faucibus ac asperæ arteriæ, ac consequenter pulmonibus & pectori, sint molesti, i. e. ratione causæ efficientis externæ & materialis proximè ad catarrhos hæ partes sint dispositæ, idque eò magis, quò magis externis injuriis, in specie aeris, modò dictæ partes sunt expositæ.

Dixi modò, Catarrhorum materiam esse lympham; fontes verò glandulas. Quod verò attinet membranas Schneideri, in specie binas pituitarias, anteriorem & posteriorem, ab eolib. 3. de Catarrhis accuratè delineatas, per quas materia catarrhorum ab eodem transudare dicitur (utut in ultimo Tomo de Catarrhis addat his ipsæ etiam glandulas, tanquam opercula vasorum) observandum est, quod rectius aliis his glandulis, seu cribris aut transcolatoris, originem Catarrhorum adscribant; imprimis cum hæ ipsæ membranæ Schneideri à parte posteriore texturam copiosarum glandularum habeant adhærentem, ex quibus glandulis, seu fontibus, per vasa minuta excretoria, membranas istas perforantia, omnes Catarrhi excernuntur, sicuti naturaliter per hæc vasa lymphæ, fauces & nares aliasque partes oblinens, hoc modò excernitur: Vid. STENO in Obs. de Glandulis & Musculis.

Per has igitur glandulas conglomeratas lymphæ aut nimis abundanter per loca exclusa, aut vitiosè simul præparata, & ita excreta catarrhose constituit, i. e. defluit lymphæ aut copiosa, aut vitiosa ex glandulis, imprimis conglomeratis circa caput, fauces, collum, laryngem, asperam arteriam, aliasque similes vicinas partes, & proximè constituit Catarrhos. Unde huic lymphæ depositioni non tantum modò functionum istarum partium læsiones, sed pro vario lymphæ vitio varia etiam simul symptomata superveniunt. Et sanè hoc sensu nil obstat, quin gonorrhæe virorum, fluor albus mulierum, salivationes quilibet, quin & interdum diarrhææ, ad Catarrhos referri queant.

## CAUSÆ.

Vidimus Catarrhorum materiam, nempe lympham vitiatam, vidimus fontes, nempe glandulas sub membranarum tegmine reconditas: quare pergo ad Causas, à quibus ita movetur lymphæ vitiosæ, aut generator vitiosa, & consequenter Catarrhi. Equidem ipsa, seu humor sui generis, spontaneo impetu non, nisi fluidi gravitatione, deorsum movebitur, adeoque purè passivè se se habebit ad hoc, ut copiosior, aut plus minus vitiosa, per glandulas conglomeratas moveatur, & ita spirituum influxum moventem, & organorum seu instrumentorum dispositionem catarrhalis influxio imitabitur. Ut igitur per glandulas quasvis conglomeratas catarrhalis lymphæ fiat excretio, causa proxima, propter quam lymphæ vel naturaliter vel præternaturaliter constituta effunditur, & ita vitiosè distribuitur, semper est irritatio & læsio quædam in parte, quadam plus minus sensibili, in qua vel cujus uterina sunt glandulæ copiosæ. Hujus enim irritationis seu læsionis occasione lymphæ ob fibrarum strictionem ex glandulis vicinis uberius exprimitur, & ita semper restaurata continuus quasi rivus eò derivatur; quæ ipsa, quò plus vel minus gravem affectum catarrhalem constituit: v. g. sicut spina digito infixa causa est sanguinis effusionis & inflammationis in loco, ubi plura sunt vasa sanguifera, ita similis spina, v. g. acidum inspiratum, aut inspiratus fumus sulphuris, ibidem lymphæ uberius effusionem, indeque ranciditatem aut tussim subinde chronicam, & materis mucosæ copiosam ejectionem faciet; aut si cuidam pulvis incidit in oculum, mox ex irritatione dolorosa effunduntur copiosæ lachrymæ, qualis lachrymatio est quasi catarrhus à causa externa ortus. Quod si verò ab interna oritur talis copiosa lachrymatio, tunc rectè dicitur catarrhus. Læsis ista, prout nunc magis superficialis, adeoque irritatio quædam saltem partis fuerit, vel prout nunc gravior, quæque non sensum saltem partis afficiat, sed etiam texturam ejus & spiritum insitum simul alterare valeat, etiam Catarrhum, nunc graviorem nunc levior, infert. In quo posteriore loco laudabilis alimentum vitio spiritus insiti ex propriè digestionis & coctionis læsione vitiosum continuum excrevit excrementum, quod similiter novum alimentum corrumpendo, partem magis magisque lædet, unde catarrhus habitualis seu perennis catarrhi scaturigo; ut in phibisi manifestum est, de quo infra.

Causa ergo proxima est irritatio quædam molesta, ubi sunt glandulæ; sive irritatio ista fiat à fermento exotico, sive ab alia causa, perindè est: v. g. si fermentum aliquod exoticum in parte relictum eandem affligit; nam mox in glandulis vicinis copiosæ lymphæ effusio, & consequenter Catarrhus, producitur.

Causa Remota, & quidem materialis irritans, & nunc saltem sensum nunc spiritum insitum magis afficiens, utut sit varia, tam externa, quam interna, speciatim tamen est acidum acre, vel falso-acidum acre, quod occasionem dictæ catarrhali defluxioni subministrat atque infert. Non est excludenda hic causa efficiens formalis, quæ est spiritus impetum faciens, & occasione illius irritationis catarrhalem lymphæ excretionem efficiens.

Causæ externæ, quæ irritant partes & loca glandulosa, occasionemque subministrant catarrhis, sunt speciatim aeris injuriæ, inspirati nempe vitia, ratione cujus evenit subinde, ut epidemici fiant Catarrhi, itaque nunc cum nunc absque malignitate; sicut ex eadem ratione febres malignæ catarrhales epidemice observatæ frequentius fuerunt, hybernò tempore communissimæ. Epidemici hi catarrhi ab aere inspirato originem ducunt duplici modo; quatenus externa inspirata partim lympham ac serum inquinant, & præternaturali ejus alterationi occasionem præbent; partim quoque, quatenus irritant loca, per quæ transeunt, nares, fauces, &c. unde ibidem lymphæ vitiatæ seu catarrhalis uberior in dictis locis fit excretio. Sæpius tamen sine vitio aeris epidemico etiam ex alia ratione aer vitiosus catarrhis occasionem præbet. Quò si pertinet, quando cum aere fumus acres metallici & mercuriales inspirantur in laboratoris chymicorum & aurifabrorum, quorum acidum gas & particule acres acide membranas narium, faucium, laryngis, & sub his reconditis glandulas copiosas, continuà irritatione ad fibrarum contractionem & copiosam lymphæ excretionem stimulant; quin & ipsam lympham non raro vitiant, ut acrimoniam acidam, spissio-



spissorem, aut alio modo vitiatam qualitatem, acquirat: Sic frigus pariter externum aere mediante vehementius aut diutius haustum similiter has partes laedit, easque ad catarrhales defluxiones disponit: Similiter, quando nos ex inclementia aeris autumnalis & hybernicae raucedo, tussis & coryza affligit, qua ab aere extrinsecus inspirato dicta loca irritantur, unde sternutationes, tussis &c. non secus atque in sternutatione acrimonia Inspiratorum irritantur narium membranae & vasa lymphatica excretoria, ut exinde lymphae copiosa, subinde mucocrasso impregnata, profluat: Imò si nares vel vicina loca ab alia praeternaturali causa irritentur, idem quomodo evenire solet; siue enim aer inspiratus, siue pulveres sternutatorum vellicent nares, idem est: v.g. si solutionis vitrioli, in specie Venenis, aliquot guttæ inspirentur naribus, sic lymphae copiosae destillabit, & habetur coryza artificialis, hemicrania istius lateris &c. acrimonia autem illius solutionis roduntur membranae narium superiores, unde lymphae copiosae destillare solet. Jam lesio haec & irritatio interdum eo usque procedit, ut etiam alimentum, seu nutrimentum, partis laesae proximum exinde vitiose alteratum appositioni fiat ineptum, adeo ut sub forma muci crassi, spissi, varii coloris & consistentiae, una cum lymphae non raro excernatur. Porro non raro frigus externum etiam post corporis insignem aestum aut nimium motum nudo capite exceptum, aut pleno ore haustum, promptissime ad catarrhos disponit; Tunc enim ex improvise fitit intensibilis transpiratio, quia subito clausis poris transpiratio coercetur, & id, quod insensibiliter aliàs exhalare deberet, in lympham quodammodo spissatur; Unde cum salibus acerbis sit praeditum omne id, quod transpirare debet, (uti patet ex sudore,) talis lymphae asperior seu acrior & falsior redditur, quae copiosius per glandulas, capitis imprimis, emulsa, aut hinc inde deposita, Catarrhos hinc suggerit.

Hae de causis externis.

*Causae efficientes Internae*, quae loca glandulosa irritando, & partem quandam laedendo, & ita ad catarrhos disponunt, sunt duae.

1. Est in ipsa parte.

2. Est in ipso sero seu lymphae effusa, quae acrior irritando partes facit, ut successivo effluxu Catarrhus fiat.

Quoad priorem; in ipsa parte quidem causa catarrhorum haeret, quando aliquid praeternaturale, ut plurimum acre, ex digestionem privata laesa in parte quadam enatum, & successivè congestum, pertinacius in eadem haerit, & quasi fermentum, in specie acidum salsum, sensum molestum parti intulerit, unde occasione talis irritationis sub digestionem particulari copiosior ex loco vicino lymphae effunditur, & ita consequenter Catarrhus excitatur. Huius exemplum sit character phthiseos hereditarius, successivè phthisin catarrhalem inferens; vel acidum istud fermentum circa dentium vitiatorum radices haerens, dolori, tumori, ac similibus pathematibus catarrhalibus occasionem praebens. Lymphae ipsa verò causa catarrhi est, quando eadem praeternaturali acrimonia acido falsa affecta est, dum per partes distribuitur, eas irritat, ac necessariò dolorem commovet, & ita ad uberiores sui excretionem stimulat. Ut res per exemplum sit evidens, observandum est: quod sub laboribus chymicis Gas acidum sulphuris vel antimonii inspiratum irriter laryngem, tussim, & ex lymphae praeternaturalis effusione raucedinem, tandem seriatim copiosum, inferat, & hoc est, quod Catarrhus à causa externa dicitur: Quod si ex ista occasione larynx & pulmo graviter laesi fuerint, ita ut sub nutritione, ex deficientia spiritus insiti, alimentum proximum debite assimilari nequeat, sed istud plus minus subinde depraverit, occasione nata inde molestiae & irritationis saepius recidivans tussis aut raucedo excitatur, & sic Catarrhus ex causa interna, digestionis nempe depravatae errato, excitabitur. Facile enim fit, ut evanescente licet malo, in dictis locis remaneant reliquiae ex dicta digestionem depravata, quae successivè evigilando irritationem faciunt, ut superveniat nova effluxio lymphae catarrhalis: sicuti v.g. post curam ulcerum tantillum fermenti ulceris relictis infert novum ulcus; ita etiam, si in glandulosis partibus ex catarrhis remaneat tantillum fermenti, quo depravatur digestio, fit deinde gravis lymphae effluxus; unde dicuntur Catarrhi accidentales & habituales. Quod si verò lymphae, naturaliter aliàs humectans laryngem,

citra occasionem talem datam in se acrior, falsior & acrior fuerit, hoc ipso laryngem vellicando successivè tussim, raucedinem, sputum copiosum, & tandem phthisin catarrhalem sic dictam inferet. Par ratio est cum oculo: festuca oculo illapsa dolorem, calorem, tumorem, & copiosam lymphae continuam effusionem inferit: quae mala à causa externa nata, quasi catarrhum oculi representant. Quae pathemata si ab interna oriantur causa, seu spontè superveniant, dicuntur Catarrhi, si sc. talis quasi quaedam festuca à variolis oculis infixam manserit, cujus occasione crebrior recidiva catarrhi excitabitur: v.g. si in scorbuticis acrior lymphae oculum, utpotè teneriorem, forsàn, laeserit, dicta superveniunt symptomata, quae constituunt catarrhum vitio lymphae enatum. Quod si verò talia pathemata post variolas in oculis superveniant, ex fermento praeternaturali in palpebris haerente, & ibidem digestionem propriam vitiantem, & hinc oculi continuè irritationem ista symptomata cum crebriori recidiva inficiente, est catarrhus natus ex particulari partis vitio.

Ut pressius examinemus has causas, Catarrhus, qui ex ipsius partis ejusque privatae digestionis laesione oritur, supervenire solet, quando pars quaedam vel à violentia externa, vel à quacunque causa interna laedatur, ut ita spiritus insitus seu archeus debilitetur; ex tali enim occasione, digestionem particulari deficientem, Catarrhi crebrius recidivantes superveniunt: vid. hic praeter HELMONTIVM Tractatu Catarrh. Deliramenta, imprimis PETRVS IOHANNES FABER in sua Patholog. Inter Causas aliàs ad lymphae vitia disponentes imprimis consideranda vitia stomachi digestio, dum nempe ventriculus impotens non sufficiens est digerendis & coquendis Ingestis (propterea senes imprimis obnoxii sunt catarrhis propter digestionem primam successivè deficientem) siue quod ejus fermentum, sit nimis iners & debilitatum, siue quod ipsa assumpta, imprimis potulenta copiosè nimis assumpta, ejus vini infringant; unde locum invenit hic vulgatum illud: Potulenta generant fluentia. Idque tunc imprimis, quando accedit pauca urinae excretio, aut imminuitur sensibilis transpiratio, vel sensilis sudatio: Hinc etiam propter frigus aeris ambientis, & imminuta sensibilis transpirationem, frequentiores in hyeme sunt Catarrhi, quam aliis anni temporibus. Ventriculus ergo in istocasu colliquat potius, quam reverà concoquit assumpta, chylum facit aquosum nimis & vitiosè acidum, aut etiam vitiosè salsum; unde sanguis aut ipse aquosior & acrior generatur, inde & necessariò etiam tandem lymphae in quibusvis glandulis elaborata simul vitiantur. Unde & tabem ex acrimonia sanguinis ordinariò aut praecedunt aut concomitantur raucedines, tussis, coryzae, similesque ex acrimonia lymphae orti affectus. De Veteres erroneè Tabes istas à defecationibus à capite oriri voluerunt ob falsum fundamentum, raucedinem, tussim & coryzam ex capite originem habere, cum revera ex glandulis particularibus locorum affectorum, & lymphae acri falsae suae acrimonia dicta loca irritante, aut exulcerante & ad phthisin disponente, tabes & dicti catarrhi derivandi sint. Sed quoad alia subiecta, in specie scorbutici obnoxii sunt acerbis & corrosivis catarrhis vitio stomachi, & inde iniquatione totius massae sanguineae & feri ortis, unde etiam lymphae salivales scorbuticorum adeo falsa, acris & acida est, uttinguarum fibras erodere, eas flaccidas reddere, & hinc omninò exedere soleat. Unde & aliarum glandularum, tam conglomeratarum quam conglobatarum, lymphae similiter male affecta necessariò non raro catarrhos ac febres dabit catarrhales, plus minus lentas, & plus minus intensas; quae originem ducunt à lymphae vitio, quae sanguini infusa naturalem fermentationem turbat, & ad praeternaturalem effervescentiam disponit.

Jam quoad differentias catarrhorum, Catarrhus omnivariatione modi affligendi potest distingui in accidentalem & habituales. Ille est, qui ex improvise, & quasi fortuito casu, vel ex incidentia, parti supervenit, & ejus spiritum insitum afficit, adeoque facile debilis exiit, & fere occasione externa propullulat, v.g. raucedo & tussis ex nimis diuturna concione; lymphae enim, quae naturaliter fauces irrorat, si fit acrior, acida & similis, & acrimonia sua fauces dolorosè irritat, tunc majoris lymphae sequitur effluxus & major Catarrhus. Hinc ex tali causa supervenit phthisis catarrhalis, quatenus sc. talis lymphae fauces ad tussim, & ex hac phlogoses &c., disponit, donec tandem phthisis catarrhalis inferatur. Hic verò, habituales, est, qui saepius in eodem loco gravius recrudescit



seu recidivat, & successivè spiritum insitum graviter labefactat, ac vel levi occasione datà repetit, & nunc ex vizio hereditario, nunc contentorum notabili dyscrasia supervenit, & ita firmiter in parte radicatum causam aut occasionem innuit. *Causa crebrioris Catarrhi recidivantis*, seu habitualis est partim loci semel affecti *læsus tonus*, ex spiritus insiti deficientia, unde fibræ ex laeso tono laxantur, adeoque ex laeso tono facilis lymphæ copiosioris quocunque modo restitutæ receptio: quibus accedit & glandularum læsustonus, qui exinde spongiosiores & tumidiores factæ facilius lympham præternaturali modo effundi faciunt: *partim* verò est *remansens fermentum* præternaturale in glandulis & locis plus minus vicinis ex digestionem privata læsa enatum, quod plus minus commotum & exasperatum, irritando istas partes sensiles, Catarrhum in eodem loco sæpius provocat, & recrudescere facit. Non secus enim ac simile tale fermentum in loco quodam exulcerato relictum crebrius ulcus recidivare facit, ita simili ratione fermentum præternaturale acidum in quadam parte relictum, ob id Topicum dictum, crebrius ulcus recidivare facit; Unde & vulgus per experientiam edoctus dicit: Catarrhi ubi semel alicui obveniunt, sæpius redire solent; idque, ut dixi, propter *partis robur læsum aut inæquale*, ut HELMONTIUS scitè explicat, idque aut propter atoniam ejus: aut propter spiritus insiti aliqualem defectum, indeque digestionem læsam.

Porro etiam Catarrhus, qui cum sensibili materiæ cujusdam excretionis est conjunctus, sub duplici substantia lymphæ extra corpus solet fieri excretio; nunc tenuis aquosa, plus minus acris; nunc crassiuscula viscida: Sub priori schemate incedens dicitur *Catarrhus tenuis*, salus, acris: Sub posteriori *Catarrhus coctus & crassus*. Hinc tempora *paroxysmi Catharralis* probè distinguenda sunt, pro quorum ratione catarrhus nunc *tenuis*, nunc *crassus* dicitur. Nempe in principio omnis catarrhus, qua talis, solet esse plus minus tenuis, seu crudus, salus, acris, successivè tandem evadit crassus coctusque. Lympha nempe, quamdiu sincera fluxerit, eadem tenuem seu crudum pro lymphæ ratione constituit Catarrhum. Dum verò diuturniore aut copiosiore lymphæ irritatione laxatur pars, & successivè exasperatur, adeoque superficiei tenus exoritur, tunc nutrimentum partis læsæ proprium se associat, quæ lympham antea tenuè spissiore, antea acrem temperatam dulcem & quasi insipidam reddit, id quod ut in *incremento & statu paroxysmi* atque hoc *materiam coctam & inerasatam* appellare solent, cujus excretionis, & partis læsæ spontaneâ restitutione *Declinatio paroxysmi* absolvitur.

Tandem *ratione qualitatis* ipsius lymphæ effusæ & catarrhum inferentis hoc observatur, quod nunc sit *mitior*, seu insipida, dulcis, &c. idque rarius; interdum, idque frequentius, eadem est acris, in specie acida nunc acidofalla plus minus corrosiva, à qua acrimonia partes membranose catarrho affectæ lædi & nonnihil exoriri solent; unde mox dolent, insigniter rubent, & aliquid inflammationis, plus minus tamen, patiuntur, ut v.g. in *epiphora*, *oculorumque catarrhis* subinde est manifestum; Imò partes affectæ perfectè exulcerantur, ut v.g. in *coryza* diuturna, aut in tussi diuturna observari solet; unde aut narium *ozæne* aut oris exulcerationes Catarrhis aut diuturnioribus, aut frequentioribus succedunt.

Ab his ergo symptomatibus seu Productis catarrhi morbosus, nempe à dolore, rubore, inflammatione &c. differentia inter catarrhum vulgò appellatum *calidum* vel *frigidum* explicanda; qui catarrhi propriè non sunt tales, sed ab istis talia symptomata inducuntur. Nam in catarrhis à lymphæ insipida seu dulci, sæpius insimul præternaturaliter crassa, uberius effusa, aut cui mox copiosus mucus adjungitur, *Catarrhus frigidus* appellari solet; à lymphæ verò acriori & corrosiva Catarrhus si excitatus fuerit, propter excitatam partium affectarum phlogosin *Catarrhus calidus* dicitur.

Hæc ipsa, tantum non omnia, mutatis paucis mutandis, applicari etiam possunt ad *Catarrhum minus propriè dictum*, ex sericum sanguine infusione per arterias, nunc immediate, nunc mediatè, in lympham mutati, sed ob fibrarum aliqualem, ob irritationem undecunque factam, stricturam, aliqualem remorà & in parte plus minus coacervationem enatam, hincque partis variam, tam ex lésione plus minus sensibili, quam feri plus minus insipidi aut acris, parioris

vel copiosioris effusi alterationem & functionem læsam. Sic enim ex refrigeratione partis cujusdam nocturna post aliqualem sudationem, manè in variis partibus musculosis, in scapulis, brachiis, circa femora & similia, &c. dolor plus minus sensibilis, catarrho adscriptus percipitur. Vulgò dicitur Catarrhus, quod non verum est, sed, ut sæpius evenit, quod sub quiete noctu membra denudantur, aut aeri externo exponuntur, aut nonnihil madida aeri liberiori committuntur, tunc ex impedita transpiratione dolor talis solet percipi: *Nempe subito clausis poris*, id quod insensibiliter aliàs exhalare deberet, in lympham acrem spissatur; unde interstitiis musculorum distentis talia pathemata ex partis irritatione varia superveniunt. Sic ex *seri scorbutici* in loco quodam, speciatim in pedibus, facta irritatione, & hinc dolorosa alteratione, dolores lancinantes & lacerantes, præsertim nocturni, qui catarrhis tribuuntur, oriuntur: Sic pariter ex dentium irritatione & dolore, & hinc fibrarum strictura natus tumor maxillæ serofus itidem Catarrho tribuitur: Ex sero paulo acriori *pleuram* fortuito irritante natus *Dolor in Pleuresi notha*, Catarrhis quoque tribuitur.

*Causas* hi Catarrhi nothi agnoscunt easdem, quas illi supra dicti Catarrhi: Nam quoad *materiam*, serum vel immediate ex arteriis cum sanguine elapsam, vel mediatè in lympham prius commutatam, hanc constituit: Quoad *Causam efficientem occasionalem*, insequuntur *lesionem* irritatam; vel ex occasione externa, præsertim refrigeratione partis, v.g. post sudorem; vel ex ipsius feri pro materia lymphæ distributæ acrioris, in specie acido-salis, partes nervosæ aut membranosas vellicantis; vel *habituali in malo ex vitioso fermento* ob læsam digestionem privatam, spiritus insiti vitio collabefactatam, nato, quod data occasione quavis excitatum, ex irritatione tanquam spina infixa *catarrhales affectus* insert. Per catarrhales tales debuxiones ipsæ glandulæ, per quas fit lymphæ vitiatæ transitus, non leviter læduntur, quia earum conus interdum insigniter laxatur, ipsæque exinde promiores sunt, ut sæpius & copiosius lympham vitiatam transmittant. Unde ex robore glandularum læsarum ad alias glandulas inæquali facilius & sæpius ex interna causa nata Catarrhi unam, eandemque partem postmodum afficiunt, adeo ut sæpius recurrere, & unam eandemque partem afficere deprehendantur.

Tandem pro varietate partium affectarum, in quibus fit lymphæ effusio & inæpta distributio, etiam Catarrhus variis specialibus nominibus insigniri solet: Nam qui per nares erumpit, ipsique vicinas partes infestat, dicitur *coryza*; qui infestat oculos, *Lippitudo* aut *Epiphora*; qui infestat laryngem, ipsique annexam asperam arteriam, eanque nimis humectat, *Bronchus* seu *Rauco*; qui acrimoniâ suâ nimia membranam ejus continuè irritat & pungit, quasque titillat, *Tussis catarrhalis*, ut plurimum tempore vespertino affligens; qui verò alias partes, generali Catarrhi seu Rheumatismi à *pneumonia* fluo, vel defluxionis nomine venire solet: Si artus infestat lymphæ vitiatæ, communiter dicitur *Catarrhus frigidus*, *Catarrhus externus*, &c. quo ipso citra sensibilem partis mutationem dolor acerbus eanlem excruciat, aut etiam sensus ac motus partis hebescit, aut omnino tollitur, aut etiam sensus quidam formicationis percipitur. Quæ symptomata ex tali lymphæ acriminiâ, sæpius nimis acido, originem ducunt.

Deoque interdum conjuncta esse solet cum catarrhis *febris plus minus acuta*, *Catarrhalis* ob id dicta, de qua supra Sect. 15. ubi de *Febris*, non tantum in catarrhis epidemicè affligentibus, sed etiam in catarrhis ceteris, inter unam alteramve personam observabilis; & eadem febris nunc lenta plus minus, nunc magis vel minus intensa esse solet, prout magis vel minus vitium lymphæ, præsertim glandularum conglobatarum, sanguini in vena axillari sinistra infusæ, junctum fuerit; unde etiam ipsa *febris effervescentia* aut major aut minor excitatur, & vespertino tempore, aut nocturno præsertim, hæ ipsæ febres exasperantur & incrementum capiunt, & præcedentibus levissimis horroribus & dorsi refrigerationibus momentaneis, subinde molestæ esse solent. In senibus propter spiritum insitum nimis deficientem difficillimè curantur.

Abolvimus superiùs Theoriam Catarrhorum, dicendo, quod materia sit lymphæ, fontes sint glandulæ, Causa modò interna stomachi & massæ sanguinæ, modò externæ lésiones. Sed si omnia hæc rectè consideremus, manifestum evadit, omnem catarrhi hætenus traditam



Catarrhi ex lymphæ motu nonnihil impedito vel aliâ ratione cerebrum inundant, periculosi sunt & uti senibus sunt familiares; ita varia & funesta iis inferunt symptomata, nempe lethargica aut paralytica aut alios systematis nervosi morbos. Nam glandulas minutas cerebri, in specie plexum choroideum, circa lympham esse occupatas, & structura earum, & locus seu situs sufficienter demonstrat; quin & reliquæ cerebri glandulæ pinealis, pituitaria, &c. simile omnino officium obire videntur. Ab his ergo lymphæ non ritè secreta, tam in quanto quàm in quali, & non ritè distributa, sed in cerebrum deposita, istud inundat, & ita periculosa capitis symptomata inferit.

Porrò minus periculosus est Catarrhus, qui fluit per nares, vel patulum os; magis suspectus verò qui asperam arteriam aut laryngem infestat.

In catarrhis cum sensibili materiæ excretionē coniunctis, quod citius in iis materia cocta relictur, eò tutiores sunt, quia periculum est, ne ex graviore læsione partis, gravius malum ipsi imminet. Quod tardius, eò periculosiores, quia metus subest, ne subsistens acrimoniâ suâ partes corrodat, aut etiam exulceret, hinc prava inferat symptomata.

## C U R A.

His ita præmissis pergo ad *Curam* Catarrhorum, in qua semper tria Capita primaria sunt consideranda: nempe

1. *Causa efficiens* remota.
2. Ipsa materia catarrhalis, seu lymphæ effusæ conditio; Et
3. Locus catarrhalis seu pars affecta; & maior vel minor ipsi inducta læsio.

Quoad 1. *ratione causæ efficientis* plus minus irritantis considerandum: an sit catarrhus à causa externa? an à causa interna? & hæc, an sit lymphæ vitium? an verò topicum partis affectæ vitium.

Quoad II. materiam scilicet catarrhalem, observandum: an ea plus vel minus acris aut melleis, insipida, tenuior aut crassior extiterit?

III. Ratione partis affectæ consideretur præservatio, ne recidivæ Catarrhi, in specie roborandæ eadem, & à recidivæ præservandæ.

Catarrhus, qui à causa externa, & læsione, in specie aeris, curatur, si percipitur in suo principio, sensum irritationis tollendo, & ita lymphæ affluxum præcavendo. Ob id in principio commodè Opiata, cum salibus volatilibus oleosis, imprimis succinatis, mista usurpentur, expectando, si fieri potest, sudorem. Instituantur etiam suffitus capitis & oris, aut verticis inunctiones cum oleis destillatis aromaticis. Nam opium sensum irritat, & hinc humorum motum suffaminat; salia volatilia vitia lymphæ corrigunt, & per diaphoresin poros aperiunt, & vitium partis topicum quasi ablunt; Externa ab ulteriori noxa præservant. Si verò jam incrementum sumpsit affectus, Opiata minus tuta sunt, nisi universalia præmissa fuerint. Usurpentur ergo salia volatilia oleosa, & ubi Indicatio aut præsentia materiæ peccantis adest, evacuetur, speciatim in tussi & stertore per os: quo facto, tunc opjata vel sola, vel appropriatis mista, denuò usurpari possunt. Si verò Catarrhus oriatur ex vitio lymphæ peccantis, ipsiusque vitiose constitutionis, hæc ipsa vitiosa acris, salia & acida, partes nerveas vellicans & rodens, aromaticis & volatilibus, in specie salibus volatilibus oleosis temperatis corrigenda, & nunc per urinam, nunc, idque optimè per sudores eliminanda. Eadem verò lymphæ crassa vel nutrimento partitis in mucilaginem degenerato impregnata, attenuanda, incidenda & resolvenda; ubi tamen observetur, modò pars affecta sit restituta, sponte hæc relictur. Fontes verò citius, imprimis digestionis primæ vitia, & hæc sequens torios massæ sanguineæ corruptela, in specie ab acrimonia salsa emendanda: hinc Juniperina, sassafrasata ac myrrhata, ferè primatum ducunt cum exercitio moderato, idque imprimis extra paroxysmum. In paroxysmo verò salia volatilia, oleosa, opiatas mista, propinentur. Nimirum, uti rectè monet SCHNEIDERUS, materiæ, causæ, & loci ratio sedulo incuræ catarrhorum habenda. Quod si catarrhales affectus crebrius recidivantes oriuntur ex vitio partis & glandularum, aut obstruendarum, aut alio modo læsarum, propter digestionis privationis lésiones, & propter reliquias quasi fermentativas in parte affecta, hæc ipsa ex parte removeantur, & hinc pars firmetur. Tales catarrhos curant im-

primis sudorifera, partium sordes eluentia & abstergentia; item vesicatoria, loco affecto aut huic vicino applicata; aut si fieri potest, leni suppuratione factâ per abscessum contumax vitium removendum: v.g. tumor catarrhosis melle, crebrius recurrens vitio dentis, ex priuata digestionē læsa carioli, huius evulsionē radicitus curatur; sin minus, inustis fonticulis talis catarrhus palliativè curandus sic v.g. tonsillarum tumores sæpius recurrunt catarrhali vitio, qui vix radicitus curantur, nisi factâ aliquando suppuratione perfectâ, & inde nati abscessus legitimâ mundificatione, & ita vitii particularis correctione, hoc enim modo, quicquid heterogenei fermentativi partem obfederit, removeatur.

Pro his scopis ritè obtinendis observandum est:

I. Remedia, quæ hic conveniunt, in genere videntur esse Evacuantia, quæ primum locum obtinent. Attendendum igitur est: an, & quando, & quibus in casibus, conveniant. Per alvum quidem talia minus in catarrhis sunt commoda, quin potius feliciori & promptiori successu per urinam, & hinc per sudorem, euacuando lymphæ augmentum, tollatur; Unde Diuretica, & imprimis sudorifera ex salibus volatilibus v.g. succini Cornu Cervi, & imprimis salia volatilia aromatica ex succino, myrrha, &c. ac hinc ex lignis sudoriferis, in specie ex ligno sassafras, erunt optima; In catarrhis enim si sudor moveatur, ipsorum insultus definit. Ubi tamen Catarrhus fuerit contumacior, si magis universaliter plures partes corporis affliguntur, aut idem ex stomachi vitio graviore dependeat, vel etiam corpus impurum offendant, subinde necesse est ad Purgantia progredi; Imò interdum in recidivante & contumaciore malo, ex vitio stomachi & lymphæ orto, etiam ad vomitoria pergendum suadent PROSPER MARTIANUS in l. 4. Acut. l. 202. & RIVERIUS in sua Praxi: id quod confirmat per experientiam in Centur. 2. Obs. 90. ibi enim refert catarrhum in pulmones cum aspera tussi defluentem, cum insequenti gravi dolore capitis, qui tandem curatus fuit per vomitum, per masticationem foliorum tabaci procuratum.

II. In Catarrhis chronicis & sæpius recurrentibus v.g. in senibus, aut similibus affectibus catarrhalibus scorbuticis recurrentibus, imprimis quando ex feri vitio aciditas, ac partes nerveas magis afflixerit, semper inter novilunia, interdum & ante plenilunia, vel evacuantia blanda appropriata, vel à catarrhis aliàs præservantia, usurpanda sunt, cum affectus à lymphæ oriundi, & partes nerveas affligentes subinde lunæ moribus auscultare soleant. Inter hæc remedia eminent succinata, myrrhata, spermaceti, Juniperina, & similia temperata oleosa quasi balsamica, lympham seu serum corrigentia, & partes lasas roborantia.

III. In Catarrhis calidis distis, aut à lymphæ acrimonia vitiosa, præsertim salsa, vel acri, tenui, &c. à causa externa Opiata optimè profunt præservantia, & in principio morbi curativè; ac hinc veteribus in talicatu, nempe in catarrho, ut vocant, tenui pilula de cymoglossa fuerunt in usu, quas dixerunt inspissare catarrhum tenuem, edulcorare catarrhum acrem, ac refrigerare catarrhum calidum. Quarum Ingredientia cum nimis sint cruda, minusque præparatis Narcoticis composita, v.g. opio, hyoscyamo crudo, & similibus, ob id in desuetudinem ferè abierunt, utut in Belgio adhuc usurpentur. Earum autem loco ferè Opiatis ritè paratis, ut laudano opiato & hysterico, utimur, quibus opiatas Catarrhus, nocturnus imprimis, optimè evertitur & curatur.

Sola tamen Opiata vix usurpanda, sed, ut iam monui, succinatis & appropriatis Catarrhalibus aromaticis semper mista, nempe succino, sulphureis, cephalicis, & similibus aliis, ut simul vitia lymphæ corrigantur, & præsertim diaphoresis auctior ab eorum usu expectetur. Decantat admodum horum Opiatorum usum HELMONTIUS in Affect. Catarrhalibus Tract. Catarrhor. Delirium. Tussis & asthma, cussos errans, & ius duumvirat. §. 62. 64. 65. & inter alia felicem prædicat ægrum, cuius auxiliator Medicus sciat lethalia à papavere separare, retento auxilio excitatore potestatis in duumviratu. Salutarem præterea quoque horum usum confirmat experientia, cum iissem ex Modernorum consuetudine frequenter usus fuerit RIVERIUS, qui Cent. 3. Observat. 15. observat catarrhum contumacem cum raucedine curatum per tria grana Laudani opiatas assumpta; item in eadem Cent. 3. Observat. 69. refert Catarrhum diuturnum cum tussi per dupli-



cem usum gr. iii. laudani opiatum curatum; & eadem *Cent. Observat.* 74. Catarrhum serinum cum variis febrium complicationibus, præsertim per laudanum opiatum curatum, observat. Assumuntur talia *Opiata*, cum primis tempore vespertino sub introitum lecti, uti aliàs est consuetum; vel aliquot horis ante introitum lecti, aut etiam paulo ante, quando moveri solet catarrhus; vel duabus horis ante cenam, quod melius est, cum cæna parca & moderata. *Observandum tamen*, ne abutamur his ipsis, suspendendo nempe & inhibendo catarrhalem motum, *istis nempe in Casibus*, quando catarrhali influxione alius morbus solvitur, vel quando epidemius fuerit affectus catarrhalis, vel quando ad incrementum jam pervenerit malum. In talibus casibus non statim suspendenda materia catarrhi; Plus enim nocu mentis aliàs contingit, nisi *divertentibus, sudoriferis, diureticis & similibus* mista fuerint *Opiata*.

IV. Chirurgia in Catarrhorum Cura ferè tacet, nisi in his corporibus interdum locum habeat, ubi Catarrhi à posteriori jam removendi, causæ nempe ferè sunt incorrigibiles, aut ubi sunt admodum contumaces, aut ubi sunt sæpius recidivantes, aut ubi sunt similes affectus vitio lymphæ exoradmodum contumaces. Tunc enim à posteriori, non à priori, radicem Catarrhi & causam efficientem tollendo, sed productum morbosum saltem removendo, deceptivum & palliativum *fontanellarum* remedium, interdum est adhibendum, item *Vesicatoria*. Ista enim voluntaria ulcera palliativè & à posteriori his tantum affectibus catarrhalibus medentur, aquam nempe exhaustiunt, non autem fontem ipsum, ne nimium feri aut lymphæ Catarrhalis inundatio partem debilitet, aut tonum ejus nimium destruat. Productum morbosum eliminant, causas verò ipsas radicales relinquunt. Ubi tamen à priori, vel partis vitio topico, vel vitio lymphæ, ex læsa digestionem prima dependente, catarrhorum contumaciæ & crebriori recidivæ semper Medicus medicamentis occurrere nequit, per fonticulum à posteriori ferociam ejus nonnihil mitigare intendat, subtrahendo scilicet hujus medio laticem plus minus corruptum, & cruorem in parva quidem, sed continua quantitate, quem cum vitioso latice, nec non utili alimentitio succo, in pus corruptum emungit, & ita imminuendo materiam catarrhalem, imprimis vitio cujusdam partis sub digestionis læsæ enatam, horum insultus mitiores reddit. Per se enim totus fonticulus ad eadem valet, ad quæ vesicatoria; horumque auxilia in cruoris & laticis seu feri minuta quidem, sed continua, exhaustionem consistunt; adedque à posteriori & palliativè tantum illis propriè conferunt affectibus, qui oriuntur à scorbuto, qui à sordibus quibusdam vitio primæ digestionis, aut vitio læsæ in sanguine fermentationis, aut vitio corrupti feri in massa sanguinea enascuntur, aut vitio specialis cujusdam partis sub digestionem propria deficientis, enascuntur, ita ut labe illa à priori propter subiecti ineptitudinem radicitus, v. g. vel ob senium, vel in mulieribus propter mensium naturalem defectum, aut propter characterem hereditarium, sit incorrigibilis. In talibus ergo casibus conveniunt fonticuli in nucha & brachio, ut unà cum sanguine & nutrimento laudabili vel sero evacuetur simul id, quod est nocivum, & etiam, quia excrementitium omne per se naturæ hostile ab æconomia vitali est proscriptum, propterea istud facili, imò facilius quàm utiles succi, separatur, & ita per fonticulos excernitur. Sicut interdum fit ut ipsa natura hinc inde in quibusdam subiectis cacochymicis spontanea facit in partibus ulcera, quæ clausa per artem varios morbos nec levia incommoda inferunt; denuò verò aperta ab aliis malis se liberet, & corpori sanitatem restituat: Vid. egregia hujus rei exempla in SCULTETO in *Observat.* 55. & 57. Et sanè id, quod SCULTETUS hic observavit in ulceribus spontaneis, interdum etiam in fonticuli, intempèstivè oclusis observatum fuit. Præterea pertinent huc Vesicatoria, quando v. g. in affectibus catarrhalibus, in specie oculorum, in nucha excitantur vesiculæ: ubi notum est, quod hic affectus in oculo à priori non curetur, cum non removeatur istud, quod irritat oculos. Jam verò cum hoc à priori fieri nequeat, hinc ut saltem nimius lymphæ affluxus inhibeatur, solemus applicare Vesicatoria in nucha ac propè aures, adedque à posteriore mitigantur symptomata: ac in specie conveniunt fonticuli & vesicatoria, quando oritur catarrhus vitio partis topico & fermenti peregrini. Hæcenus dicta declara-

bimus exemplo: Notum est, qui patientur carlem dentium & crebriorem odontalgiam faciliè recidivantem, quod simul pariantur sæpius tumorem maxillæ, tuncque dicunt: Est catarrhus: quod suo sensu verum est: Jam quicquid admoveatur, sive sint discutientia, resolutentia, vesicatoria, &c. à posteriori saltem & palliativè medeatur: Radicis enim cura consistit in evulsione dentis, quia partis adest vitium topicum, quo evulso omnia symptomata cessant. Quod si ergo dense vellatur, à priori curatur; Sin verò hoc nequeam præstare in oculo, palliativè saltem, & à posteriori Fonticulis & Vesicatoriis ægro succurrendum est.

V. Quoad *vene sectionem*, negotium hoc per se locum non invenit: Sin verò subiectum sit *plethoricum*, aut consuetæ sanguinis evacuatio suppressa, &c. quibus & aliis similibus occasionibus intenderetur affectus catarrhalis, consultum est, venam secare observando *revulsionum & aversionum regulas*. Quin etiam, cum confertim nimis sit decubitus catarrhalis in quandam nobiliorem partem, ad imperum illum refrigendum venæ sectio in loco opposito, secundum *revulsionem & aversionem* instituta, subinde solet in *Praxi* admodum esse proficua: vid. HERCULES SAXONIA *Prælect. Pract.* P. 1. pag. 58. & 60. & JULIUS CÆSAR CLAUDINUS de *Catarrhis*. Si tumor capitis ex odontalgia, opposito in brachio secatur vena. Per se autem & primario non convenit, sed tantum pro scopo ventilatorio.

Jam prego ad remedia interna: Inter quæ (1.) primum obtinent *Opiata*, causæ efficientis activitatem nonnihil tollentia; hinc (2.) remedia vel *sudorifera*, in specie aromatica & hinc volatilia, quæ partes eluunt, earundem sordes mediante sero commodè abstergunt, ac ipsum serum simul corrigunt ac minuunt; tandemque (3.) *aromatica vel balsamica* quæ tam somitem ipsum lymphæ vitiosæ in stomacho corrigunt & emendant, quàm partes solidas læsas denuò restitunt & roborant, sunt utilissima in paroxysmis catarrhalibus. Hæc ipsa enim indicationibus suprâ factis maximam partem satisfaciunt.

Observata ergo legitima medendi methodo, remedia simplicia in affectibus catarrhalibus utiliora, magisque appropriata, & imprimis catarrhis à causa interna enatis succurrentia, sunt *serpillum*, quod est singulare catarrhale, quodque ut dicit LINDANUS simul corrigit stomachum, & ita antecedentes causas removet; porro *satureia, thymus, maiorana, mentha, hyssopus betonica, salvia*, præsertim *ros marinus*, horum flores, & omnia ex eodem præparata remedia. Flores lavendulæ, liliorum convallium, lignum *sassafras*, & omnia *sassafrata, guaiacum, lignum lentiscinum, lignum juniperinum*, & similia ligna, quæ communia Decocta sudorifera ingrediuntur: Quin & *baccæ juniperi*, & omnia *juniperina*, & ex earum *baccis* paratum *Rob. Decoctum ligni, Malvaticum juniperinum* &c. macis, acorus verus & adulterinus, *Zedoaria, cinnamomum*, &c. & similia usitatissimè usurpantur: quibus *succinum*, quod instar omnium est, in affectibus catarrhalibus, succinum catarrhale, & quælibet *Succinata, myrrha* quoque, extractum myrrhæ, quæ egregia sunt: Tandem sulphur, & omnia sulphurea temperata, *cinnabaris* tam nativa quàm antimonialis, *salia volatilia*, tam simplicia quàm oleosa, opiatia, &c. profunt; & denique omnia ex & cum eo parata remedia aliis addenda sunt. Quoad *sassafras lignum*, imprimis egregium præ omnibus est ad catarrhos remedium, aded, ut etiam propterea à BRUNNERO in  *suis Consil.* proprium catarrhorum vocatur alexipharmacum; Sal enim aromaticum habet nobile, odorem & saporem feniculatum, ideo vocatur & lignum feniculare. Corrigit optimè feri & lymphæ vitia, tam acida quàm salsa, prætereaque eam simul per urinam & sudores evacuat, abstergit vitia partium topica, & noxas eis inducendas eludit, simulque digestionem primæ succurrit; nobile enim est stomachicum. Unde commune *decoctum ligni sassafras*, & essentia ligni *sassafras*, vel tinctura *sassafras Myrsicæ*, egregium est remedium ad sistendos & curandos catarrhos, cochleatim usurpata, expectato blando sudore: vid. MYNSCHTIUS in *Armat.* quoad tincturam ligni *sassafras* pag. 52. Pertinet huc etiam *Essent. Catarrhalis D. Michaelis*, quæ paratur ex ligno *sassafras* cum spiritu *serpilli*; siquidem *serpillum* & ipsum decoctum simplex est contra catarrhales affectus, unde etiam aquam suam *benedictam, serpilli* tantopere commendat MYNSCHTIUS in *Armat.* quæ nobilis. Præparatio ejus est hæc: nempe



24. *Summ. serpill. campestr. rec. qu. pl.*

Hisq[ue] collectis aut[em] ortum solis dum nocturno rore adhuc madent, affundatur

*Pini Malv. q. f. utres vel quatuor præterpr. digitos emineat.* Digerantur per dies & noctes quatuordecim in Balneo Mariæ vel arena; hinc destilletur per Balneum moderato igne aqua saltem spirituosâ, quæ denuo affundatur recentibus serpilli summitatibus eodem modo collectis; ac denuo dicto modo digerantur ac destillentur, quæ aliquoties ab alio serpilli cohobetur, idque, quod sit sæpius, eâ aqua sit efficacior, & magis spirituosâ evadit. Tandem hæc ipsa aqua seu spiritus serpilli affunditur *Rasura ligni sassafras*, & debite digeruntur, donec egregie imprægnetur à sassafras, & egregie rubescat; hinc ad usum servatur.

Dosis hujus Tincturæ, prout magis vel minus spirituosâ fuerit aqua serpilli, ad gr. L. vel LX. aut si debilius fuerit menstruum, cochl. j. potest propinari, idque manè, meridiè & vesp[er]i, vel etiam urgente necessitate quocunque tempore.

Pertinet huc aqua ista contra Catarrhos descripta ab HOFFMANNO in *Clave in annex. Thes. pag. 6.* Cujus Aquæ, nec non benedictæ, dosis cochl. j. ad ij. nunc manè, nunc meridiè, nunc vesp[er]i, vel quocunque alio tempore, propinari potest, estque egregium præservativum & curativum in catarrhis, quæ lymphæ vitia quæcunque corrigit & emendat; ut taceam vim ejus præservativam ab apoplexia in senibus, & curationem in vertigine.

In Catarrho scorbutico miscenda sunt remedia sassafrata cum summitatibus pini recentibus, ut unâ decoquantur. In tali casu commodè miscetur hæc Tinctura ligni sassafras cum remediis ex abiete alba, essentia pini balsamica, & erit egregium remedium contra Catarrhum scorbuticum, imprimis si simul immineat paralytis notha seu scorbutica; aut Decoctum utriusque simplicis fructuosè usurpatur. Essentia pini cum spiritu proprio paratur, quæ in affectibus catarrhalibus à lymphâ scorbutica orlundis instar omnium est, speciatim si cum catarrho scorbutico paralytis scorbutica vel notha velit imminere, vel conjuncta sit. Strobuli enim tenelli pinastri, Germanicè dicitur *non Kuffern*, sunt singularissimum in catarrhis scorbuticis. Colligantur con[tra] seu strobuli disti pini, vel abjectis juniores in fine Martii, & initio Aprilis, & coqu. in Aqu. simpl. seu cerevisiâ. Postmodum 3ij vel iv. bibendæ ante passum. Juxta remedia ex ligno sassafras subinde & aliorum lignorum Decocta fructuosè usurpari possunt, uti videri potest in *Observ. LOTICHII lib. 2. cap. 3. Observ. 2. & lib. 2. cap. 1. Observ. 1. & 6.* sicut & admodum fructuosus Decoctorum lignorum usus in affectibus catarrhalibus in POTERIO *Cent. 2. Obs. 71. & Pharm. Spag. lib. 1. pag. 333 & pag. 655.* item GABELCHOVERO in *Observ. qui etiam singulis catarrhosis decoctum radices Ching contra catarrhos fructuosè præscribit.* Alii non sine ratione commendant decoctum ligni lentiscini, ex quo destillat massix; eûm igitur massi sit nobile contra catarrhos, nullum dubium est, quin ligni lentiscini decoctum æquè sit egregium atque lignum sassafras ad curandos catarrhos: Cui tamen ligno, ceutaro, potius decoctum ligni juniperi potest substitui. Pertinet huc decoctum sarzaparillæ & lignorum, quod vid. in *Colleg. Formular. pag. . . .* & antimoniali, nec non decoctum lignorum diaphoreticum antiscorbuticum, de quibus in *Colleg. Pharmaceut. in Schræderi Pharm. Part. 2. pag. . . .* Item

24. *Rasur. ligni sassafr. 3j.*

*Misc. quercin.*

*Lentiscin an. 3vi.*

*Fol. beton M. i.*

*Antimonii in pet. ligat. 15ß.*

Coqu. in Aqu. plur. mens. iv. in Balneo Mariæ ad consumpt. 15ß.

Colatura D. S.

Potio singularis contra catarrhos.

Pertinet quoque decoctum Catarrhale *Mysichtii in arm. p. 376.* quod ex similibus paratur. Aliàs non minus, quàm lignum sassafras, cortex tamarisci ad curam catarrhorum laudari solet; sic.

24. *Cort. tamaris. 3vj.*

*coqu. in*

*Aqu. simpl. mens. vi.*

ad remanentiam dimidiæ partis.

Hoc enim decoctum vel solum usurpatum sæpius est contra lymphæ quæcunque abundantiam, indeque affectus catarrhales quoscunque optimum remedium.

*Estimull. Oper. Tom. II.*

Faciunt etiam huc vina medicata ex infusione aut decoctione istorum simplicium vegetabilium parata contra catarrhos, in specie ex rasura ligni sassafras, additis aliis aromaticis, v. g. junipero & rore marino qualia SENNER-TUS *Pr. l. 1. p. 712.* habet: quæ inter est decantatum illud Paracelsi, quod pro basi agnoscit radicem caryophyllatæ & acori adulterini:

24. *Rad. caryoph.*

*Acori adul. an. 15ß.*

*Summ. maior.*

*Flor. samb. an. M. iij.*

*Euphras. M. ij.*

Infund. in vini mens. aliquot,

Stent ita per octiduum.

De hoc vino omni mane ieiuno stomacho, & vesp[er]i sub introitum lecti, capiatur haustus.

Vid. HARTMANNUS *Praxi Chymiatr. c. 21.* Nam PARACELSUS in *Consiliis*, ubi prostat vinum & Ele-ctuarium, radicem acori aquatici & caryophyllatæ singulariter commendat ad roborandum caput, & ad præservandum à quibuscunque defluxionibus catarrhalibus: vid. etiam POTERIUS *Cent. 3. c. 68.* Sic, v. g. sequens unum medicatum admodum laudat LINDANUS in Cura catarrhorum, & ad affectus catarrhales chronicos, speciatim lymphæ & stomachi vitiogenitos:

24. *Ligni guaiac.*

*Cort. tamaris. an. 3ij.*

*Ligni Rhodii,*

*Sassafr. gum. an. 3ij.*

*Herb. absint. vulg. M. j.*

*Scolopendr.*

*Lupul. vel cupator.*

*Mentha,*

*Hyssopi an. M. ß.*

*Rad. enul.*

*Cent. mal.*

*Zedoar.*

*Galang.*

*Cinnam. an. 3j.*

*Vini mens. jv.*

Stent in Infuso, & de hoc Infuso semper sumatur bonus haustus horâ unâ vel alterâ ante passum in casu, quando vitia catarrhi oriuntur ex vitio lymphæ, aut ex vitio digestionis primæ & massæ sanguineæ fuerint orti.

Ros marinus nobile est simplex in catarrhis curandis; unde egregium est sequens Decoctum Catarrhale modò laudat Lindani:

24. *Ras. ligni sassafr. 3ij.*

*Rad. caryophyll. 3i.*

*Herb. rorismar. rec. M. i.*

*Vini generosi Mens. ii.*

Coqu. lent igne vase benè clauso in Balneo Mariæ horis 6. 7. vel 8. Hinc removeantur ab igne, ut refrigescant, & colatura amara usurpetur eodem modo vel inter cibandum, vel in lecto calidè, expectando blandi sudorem.

Vinum est utilis compositionis, sed egregiarum virtutum, & expertum in chronicis catarrhalibus affectibus. Decoctum fiat secundum modum ZWELFFERI: Vid. etiam HARTMANNI *Praxis de Decoctis.* Caryophyllata radix, dicit LINDANUS, admirabilis est in emendando sanguine & confortando ventriculo; unde sibi expertissimum esse hoc vinum & magnarum virtutum in curandis catarrhis, eûm & ventriculo succurrat, & sanguinem emendet, & in specie lymphæ vitia egregie corrigit.

Huc pertinet Decoctum Catarrhale Michaelis:

24. *Decocti ligni sassafr. cum 3i. rad. caryoph. par 15ß.*

*cui serventi infunde*

*Com. rorismar. 15ß.*

*Flor. papav. errat. M. i.*

Stent in Balneo Mariæ per aliquot horas. In fine leniter in vase bene clauso bulliat:

Colatura D. S.

Potio catarrhalis.

24. *Herb. hyssopi,*

*Veron.*

*Scabios.*

*Summ. serpill. floresc. rec. an. M. i.*

*Flor. anthos M. ß.*

Incisa ebulliant in f. q. Aqu. simpl.

adde in medio Decoctionis

*Rad. glycyrrhiz. rase 3i.*

Q 9 3

Caric.



*Caric. pingu. No. liij.*  
*Colaturæ ℞. adde*  
*Syr. flor. tunic.*  
*Beton. an. ℞i.*  
*M. S. ut supra.*

Pertinet huc *Vinum Adriani Papæ dictum contra Catarrhos* aliàs admodum decantatum: *Vid. lib. i. Prax. SEN- NERTI, ubi de Catarrh. pag. 712.* Aliàs etiam sunt egregie Essentiæ lignorum compositæ; item tinctura coralliorum, sassafrata, seu cum spiritu ligni sassafras parata; item essentia florum anthos, essentia salviæ, essentia serpilli, præ cæteris essentia succini, de qua postmodum; spiritus serpilli, liliorum convall. cerasor. nigror. & similia.

Præter dicta Vegetabilia, ex iisque paratas essentias & tincturas, &c. ulterius conveniunt baccæ juniperi, *malva- ticum juniperinum*, & *electuarium Paracelsi*, quod videb. in *eiusdem consiliis*. Corpus est rob juniperi cum aromatis, egregium remedium stomachale & anticatarrhale, tam præservativum quàm curativum. Ac novi hoc *Electuarium* ab amico paratum insignium virium fuisse, Compositio PARACELSI non æquè succedit propter zingiber crudum nimium Ingrediens, & quia nimia quantitas sacchari additur, quod tamen non omnibus convenit: Conditum contra zingiber est enervatum, quia radix hæc prius coquitur in aqua, quæ abicitur. Optime ergo sequenti modo parari potest:

℞. Bacc. junip. contus. ℞i.

Coquantur probe in *Vino*:

Decoctum inspissa usque ad consistentiam rob seu mel- lis crassioris: Tum

℞. Hujus Rob. ℞vj.

adde

Pulv. Zing. ℞.

Acori veri

Macis an. ℞ij.

Cubebæ. ℞i.

Cum s. q. sacchari redige in consistent. *Electuaril.*

Hoc in vitro probe clauso exponatur soli pro ulteriore digestionem, & habebitur optimum *Electuarium* stomachale, post singulos pastus assumendum: continuatur per duos menses.

Dosis ℞i. ad ℞iij. Egregium est in apoplexia, catarrhis, & senibus, qui carent digestionem in stomacho, & ita catarrhi somitem absunt.

*Succinum*, & omnia ex succino parata remedia, interna & externa, summa sunt specifica contra catarrhos: Sic succinum solito modo præparatum, seu, quod melius, *succinum catarrhale* ad modum D. Michaelis cum aqua serpilli spirituosâ, vel essentia serpilli, vel solitariâ, vel huius part. ij. cum part. j. *cinnab. nativâ* præparatum, & largiter imbutum: quinimò essentia succini parata cum spiritu vini rectificatissimo (nisi enim probe fuerit rectificatus, extrahit nihil ex succino) est appropriatum remedium ad quæcunque vitia lymphæ, quæ à guttis 20. vel 25. plus minus, prout magis vel minus est spirituosâ, propinatur: Vel fiat cum spiritu serpilli *essentia catarrhalis D. Michaelis*: Item olea destill. v. g. oleum majoranæ, oleum succini, rosamarinæ, vel pura, vel ex iis cum saccharo parata elcosacchara, interne crebro usurpantur: quin & balsamus sulphuris anisatus ad aliquot guttulas, vel ex hoc paratum elcosaccharum, admodum conducit in catarrhis: Sal volatile succini à gr. xij. ad ℞i. & sal volatile cornu cervi adeoque ex iis paratus liquor cornu cervi succinatus, maxime egregia sunt in catarrhis per sudorem curandis: v. g.

℞. Spiritus cornu cervi benè rectif. & proprio sale vol. imprag. ℞. vel ℞iij. cui addantur

Salis vol. succ. probe ab oleo proprio liber. ℞iij.

Hæc mista per reiterata cohobia uniuntur in liquorem, qui vocatur liquor cornu cervi succinatus.

Egregium est catarrhale, cuius gr. xx. vel xxx. assumi possunt: aliàs egregium est antepilepticum, imprimis infantibus exhibitum.

Item spiritus salis ammoniaci succinatus ex sale ammoniac, calce viva, spiritu vini & rasura succini, per retortam factus itidem est egregius: idque eo magis, si affundatur myrrha, & ita essentia catarrhalis elegans pareatur. Ex succino & myrrha quoque cum spiritu salis ammoniaci Essentia fieri potest, loco quorum etiam & alia salia volatilia, spiritus salis ammoniaci anisatus, Balsamum uervinum D. D. Schæfferi, Poliatrici Francos. Celeberrimi, ex sale vol. cor-

nu cervi, sale ammoniac, oleo macis & spiritu vini, &c. egregia sunt in his affectibus, tam curative sudorem movendo, quàm præservative contenta corporis alterando. Post succinum est myrrha, tam in substantia ad ℞. quàm eiusdem essentia cum spiritu vini tartarifato, vel Essentia salutis cum tinctura tartari, aut etiam cum spiritu salis ammoniaci vinoso parata (*vino cremato seu adusto confecta*) catarrhorum præservativum & curativum optimum est. Post hæc est sperma ceti, quod acres catarrhos egregie temperat, modò habeatur recens, & non rancidum; hoc namque & corrigit acrimoniam lymphæ catarrhalis, & simul lympham crassam & viscidam incidit, resolvit, & ad expectorationem disponit; & sic utrique scopo mirè convenit. Addi possunt olibanum, massix, benzoe & similia, quæ lymphæ acrimoniam temperant, & substantiâ pingui noxas tollunt. Formulas dedi *suprà Sect. 14. Cap. 3. Artic. 3. ubi de tussi*, ex olibano, thure, succino, laudano opiato, &c. nam his sulphureis subiectis optime permiscetur laudanium opiatum. Faciunt huc *Pilule Montagnanæ* ad catarrhos curandos & sistendos egregie: Compositio est hæc:

℞. Myrrha,

Stor. calam.

Croci an. ℞i.

Opii gr. xiv.

Cum syr. rosar. s. pilulæ maiores.

De quibustres aut quinque accipiantur duabus horis post assumptam cenam.

Quin & ipsum sulphur, & ex eo parata quæcunque remedia, flores sulphuris rite parati, optime conveniunt in curandis catarrhis, si tam simpliciter in forma sicca ad ℞i. usurpentur, vel cum aliis misceantur, imprimis cum succino, aut si ex his cum extracto enulæ campanæ fiant pilule Catarrhales, quas insigniter commendat RHUMELIUS in *latrochymia*; quàm in forma liquida cum oleo destillato terebinthinæ, aut succini aut anthos, aut baccarum juniperi, aut anisi, &c. in balsamum sulphuris redacti, affectibus catarrhalibus mirè resistit: vel fiat ex tempore Elcosaccharum sulphuratum compositum non inele- gans:

℞. Olei destillati succini ℞i.

Anthos. ℞.

c. s. q. sacchari (pro ℞i. sacchari sumantur gr. iij. olei) s. Elcosaccharum: adde

Flor. sulphuris ℞i.

M. S.

Saccharum Catarrhale.

De quo capiat eger mane & vespere, & sub introitum lecti.

Item Benzoe, tinctura sulphuris cum spiritu vini tartarifato elicita (prius fonde sal tartaricum sulphure) & similia sunt optima: Item Tragea ex balsamo Peruviano, sulphure & saccharo. Hæc sunt appropriata remedia ad catarrhos.

De Opio & Opiatis, eorumque usu in catarrhis, ea sufficiunt, quæ *suprà de Tussi catarrhali* l. a. monui. Speciatim si febris catarrhalis affligat, nil melius est volatilibus sudoriferis, quibus subiungatur opium. Ad opiata pertinet *Theriaca*, à Veteribus imprimis ad præcavendam, item, ad sistendam excretionem catarrhalem nimis ruentum usitata, tam vetus, quàm recens, in qua vis opii fermentando non est nimis infracta. Assumitur vel sola, vel additur ipsi aliquid de bolo Armeno.

Ex his igitur variæ & innumerabiles ferè fieri possunt formulæ: e. g.

℞. Ligu. Cornu Cervi succin. vel spiritus sal. amm. anis. vel essent. succini ℞iij. vel ℞. essent. opli Tartarif. ℞i.

M. S.

Essentia Catarrhalis.

Dosis, gr. 40. 50. 60. expectando sudorem; vel misceantur in formam Potionis cum aquis destillatis, & Syropis appropriatis.

Item convenit spiritus salino-volatilis oleosus cum essentia opii: vid. *Dissert. de Precipitant. usu & abusu*.

℞. Aqua serpill.

Roris mar.

Feniculi an. ℞i.

Ess. ligni sassafr. ℞iij.

Sal. volat. succini ℞i.

Syrupi de hyssop. ℞.

M. S.



Potio Catarrhalis pro aliquot vicibus.

℞. Aquæ menth.

Hyssopi an. ℥i.

Cinnam. ℥ss.

Spiritus cornu cervi essent. ℥ss.

Salis volat. succin. gr. xv.

Syrup. de hyssopo ℥vi.

M. D. S.

Potio sudorifera pro aliquot vicibus.

℞. Flor. sulphuris ℥i.

Benzoes,

Succini præp. an. ℥ss.

Myrrh. lb.

Tragac. an. ℥i.

Extr. croci ℥ss.

Laud. opiat. gr. iij.

Cum sacch. ℥ss. in Aqu. feniculi sol. f. Rotulæ; adspargen-  
de cum oleo destill. anisi vel succini.

D. S.

Potio in tussi catarrhali.

℞. Spec. dia. Trag. ℥iij.

Gumm. Arab. ℥i.

Laud. Op. gr. v.

Cum f. q. sacch. in Emuls. papav. albi solut. f. Rotulæ.

D. S. ut antè.

Monitum sile superius; interdum opus esse pergere  
ad Purgantia, quæ tamen semper miscenda sunt cum ap-  
propriatis catarrhalibus: unde massa Pilular. de succino  
Cratonis ferè primatum obtinet; sunt blandè aromaticæ,  
& commodè senibus catarrhosis & debilibus præscribi pos-  
sunt; v. g.

℞. Massa Pilular. de succino Crat. ℥ss. gr. xv. ad ℥i.  
Extracti absinth. vel card. bened. gr. v. vj.  
ad ℥ss.

Resin. jalapp. gr. ij. iij. vel jv. ad v.

Scamm. sulphurat. gr. j.

Cum oleo destillat. succini f. Pilulæ.

D. S.

Pilula catarrhales pro una vice.

Blandè evacuant lympham peccantem.

℞. Massa Pilular. de succino Crat. ℥i.

Scamm. sulphurat. gr. iij.

Extracti troch. alb. gr. iij.

Cum ess. succini f. Pilulæ. S.

ut antè.

℞. Massa pilular. de succino Crat. gr. xvj. ad ℥i.

Extr. agar. gr. viij.

Troch. alb.

Scamm. sulphurati an. gr. ij.

Cum essent. ligni sassafr. vel succini f. pilulæ asper-  
gende cum succino præp.

S. ut antè.

℞. Massa pilular. de succino Crat. gr. xv.

Extr. absinth. ℥ss. ad scrup. j.

Troch. alband. gr. j.

Cum oleo succini, vel essent. sassafr. f. Pilulæ.

D. S.

Pilula catarrhales.

Æquidem in Catarrho à lymphâ tenui, acri, falso, re-  
sina jalappæ; in catarrho verò dicto crasso loco jalappæ ex-  
tract. trochisc. alband. gr. ij. magis conveniunt. In affecti-  
bus senum etiam valent, immo et à doli stimuli.

Aliàs etiam Jalappa ordinarè præscribitur; siue solitariè  
dosi scrup. j. addito aliquid de nitro, vel arcano dupl. sic  
enim melius operatur; siue cum Mercurio dulci mixta  
propinetur. At si tenacior mucus se junxerit, Colocynthis  
locum invenit. RIVERO in usu est in graviore malo in-  
stituere Purgationem ex Mercurio dulci, addito scammonio  
sulphurato, vel jalappa, ita ut ad purgandos catarrhosis re-  
cipiat Mercurii dulcis scrup. j. cum radicis jalappæ gr. viij.  
scrup. j. uti videre potestis Cent. 3. Obs. 28. 31. 41. 46. ubi uti-  
tur hoc pulvere pro Purgante catarrhali, idque imprimis,  
uti dixi, in catarrho tenui. In Catarrho vero spisso, seu ubi  
adest muellago crassa, colocynthis convenit, siue Extra-  
ctum extrochiscis, siue alio modo correctæ. Correctio opti-  
ma fit, quod obiter moneo, per terram solitam tartari,  
vel sal tartari. Porro Magist. Gumm. de Peru seu resina,  
Gumm. guttæ à gr. vij. ad scrup. j. specificum dicitur porgans  
Catarrhorum.

Aliis in usu est pro purgandis catarrhosis usurpare helle-  
borum nigrum, imprimis mense Octobr. collectum, eius-

Annul. Oper. Tom. II.

que decoctum & infusum; siquidem THONERO & PE-  
NOTTO de Medicam. Autoribus perfecta catarrhorum co-  
ra consistit in helleboro nigro. Unde etiam POTERIUS  
in suis Observat. Decocta melanogoga, seu remedia melan-  
choliæ purgantia, unà cum ligno sassafras, & rectè,  
usurpare solet: Et credo, quod in affectibus catarrhalli-  
bus penitus extirpandis multum valeant Helleborina, mo-  
dò virulentia Laxativa corrigatur. Pilulæ aloephanginæ,  
aliæque similes usuales, si radix mali fuerit in stomacho  
& primis viis, usurpari possunt, &c. Senibus autem ca-  
tarrhosis Vina medicata laxativa præscribi possunt; e. g.

℞. Bacc. iunip. rec. ℥vi.

Calam. arom. rec.

Fol. fenn. sicc. stip. an. ℥ss.

Rad. helleb. nigr. crud. ℥i.

Cinnam.

Galang. an. ℥i.

Zingib. ℥i. ad ℥ss.

Crem. tartari ℥ij.

Vini Rhenani ℥ss.

Stent in loco calido per tres dies & noctes, ut dissolvatur  
cremor tartari, hinc coletur aliquoties per manicam Hippo-  
cratis.

adde

Sacch. ℥ij.

S. Potio catarrhum laxans.

Hæc de Internis.

Quod attinet Medicamenta externa in catarrhosis affecti-  
bus usurpanda: applicanda sunt vel ipsis partibus affectis,  
vel locis glandulis catarrhos fundentibus vicinis; partim  
noxam inductam tollendo, partim præcavendo. Hæc ipse  
glandulæ, quoniam nempe in capite aut circa caput partem  
que ipsi vicinas sunt consistit aut locatæ, hinc in affectibus  
capitis catarrhalibus remedia imprimis vertici, & hinc  
temporibus admoventur sub forma Lituum & Emplastro-  
rum; in affectibus vero faucium & asperæ arteriæ suffituum  
formâ, ut melius penetrent, conveniunt. Suffitus hi con-  
stare possunt ex resinosis, v. g. ex succino, quod primatum  
obtinere; sandaracâ, benzoe, olibano, mastiche & gummi  
anime &c. carbonibus injectis: expiratus fumus excipitur  
eapite medianibus Lintheaminibus probè hujusmodi suffitu  
impregnatis: e. g. secundum DECKERS in Praxi Barbet-  
se lib. 1. cap. 4.

℞. Succini ℥i.

Mastic. scrup. j.

M. f. Pulvis grossus.

Quo multos catarrhosos restitutos perhibet. Vel

℞. Sandarac. vel gummi anime, vel ladani ℥ss.

Succini ℥ii.

Thuris,

Mastic. an. ℥i.

Benzoes ℥ss.

Raf. ligni Rhod. ℥i.

Misc. & contundantur grosso modo:

D. S.

Pulvis ad suffitum contra catarrhos.

Inter externa illinenda primatum obtinet oleum destil-  
latum succini, beegmati, vertici, locisque vicinis illitum.  
Mirum est, quantum faciat ad præservandum & curandum  
catarrhum, imprimis si adsit simul grauitas capitis, aut le-  
thargus, aut torpor sensuum. Hoc, ubi acrius & fortius  
uisum fuerit, substituatur balsamus Peruvianus, qui ma-  
gis temperatus, vel eum simpliciter illineendo, vel in vi-  
cello ovi prius dissolutum, & cum spiritu iuniperi mistum,  
partilege subinde affricando: vid. TIMÆUS von Guldem-  
Klee: e. g.

℞. Bals. Peruv. ℥i.

dissolve cum

Yell. ov. Noi.

adde

Spiritus bacc. iunip. ℥iij.

D. S.

Aqua externa contra dolores catarrhales.

Ceu expertum commendatur in doloribus partium mu-  
sculosarum, qui sunt à defluxionibus seu catarrhis fri-  
gidis.

Juxta hæc est oleum masticis, item oleum destilla-  
tum maioranæ, menthæ, oleum macis, &c. Oleum  
destill. cornu cervi potentissimum est, vertici aut tem-  
poribus illitum, modò eiusdem fætor non sit adeo gravis  
aliàs cum hoc oleum sit turgidum sale volatili, esset sum-  
mum remedium. Obseruandum tamen, ut si eiusmodi  
olea



etia penetrantiora & membranas sensiles magis efficientia partibus extus admovenda, sint, talia subjecta vim eorum penetrantem ferre queant, cum, qui capitis sunt debiliores, ab huiusmodi fumosis lædantur, & vel solo odore, sternutatio & incipiens coryza istis exelatur. Facit huc etiam unguentum Horstii ex Gummi elemi, cum oleo succini malaxato, imprægnato, vel Emplastrum de bēroniæ, item emplastrum de bregmate usitatum, item de cagmahaca, quæ sunt optima anticatarrhalia, si malaxata cum oleo succini vel appropriatis, Emplastri formâ bregmati applicentur: v.g.

24. Empl. de bēroniæ. usit.

Cum. Tacamah. ap. q. s.

Malax. cum s. q. ol. succini vel Bals. Tereviani; Inducatur super alutam, & obducatur sindone rubrâ, in formâ orbis medii, f. Emplastrum pro capite.

D. S.

Emplastrum pro capite.

Vel applicetur Ceratum ex Ladano, gummi elemi, sandaraca, olibano, Syrace liquida, &c. vel ex aloe, pulegio, calamintha, ladano, &c. utraque à MONTAGNANA Antiod. cap. 3. descripta: Item emplastrum ex mastiche, gummi juniperi, caryophyllis, & Ladano, Cratonis lib. 6. Conf. 12. Pertinet etiam huc fumus tabaci seu nicotianæ haustus, cujus moderatus usus sanè egregium est remedium ad catarrhos capitis & pectoris, imprimis si ex lymphæ oriantur vitio, & omnibus hunc in finem debet esse commendatus: Sal enim eius volatile acerrimum penetrat, abstergit & resolvit hostile illud irritans, corrigit acrimoniam lymphæ acidam, incluit eandem crassam & viscidam atque fluxilem facit, abundantemque per ductus salivales evacuat: vid. MAYOW lib. 1. cap. 9. Ratione verò olei sui narcotici, quo Opiatorum virus æmulatur, insigniter sistit effectos motus catarrhales, & irritationis sensum sopit & mitigat, ac vi salivatoris nimium lymphæ pro ventum immittit. Concinnius est, si tali Nicotianæ, usitate aliâ in Catarrho ad brachia & pulmones defluo, pro fumo simul permiscetur semen anisi, coriandri; vel pulvis succini, mastichis, sandaraca, Syrax, vel pulvis cardamomi, aut cubebarum; vel si irroretur aliquot guttus olei succini, aut anisi; sic enim fit remedium eo magis appropriatum. Certe fitis, quod in affectibus catarrhalibus vix habetur par remedium fumo Tabaci; omnibus enim satisfacit scopis. Nec metusamus ab hoc fumo exsiccationem capitis: Falsum etiam est abusu huius simul nigrescere cerebrum, ut ad subsidentiam disponatur: Pulmones verò magis immediate læduntur, qui aridi, squalidi, flaccidi, & hinc inde liquidis maculis conspersi redduntur crebriori huius sumi haustu, cujus rei experimentum videb. in THONERi Observationibus. Hi sunt catarrhi propriè dicti.

Uterius Lindani super Hartmannum mentionem facit Catarrhi quasi nothi, ita enim differit: Nostis sapere veni (sunt verba LINDANI) ut surgentes homines mande sentiant doores, præsertim in scapulis, interdum in humis, nunc in brachio, nunc in femore aliisque locis: id quod vulgò statim (inquit) refertur ad catarrhos, ubi tamen duo sunt observanda. (1.) Non semper esse à catarrho, nec videretur esse à flatibus in locis, ubi muscoli se invicem contingunt conclusi, ut alii dicunt; Potius, dum corpus noctu sub stragulis satis est, perspirabile, adeo ut tunc natura solet libera iter per habitum corporis se evacuare; unde, si forsan manus vel alia pars extra lectum denudata eximatur concluditur iste insensibilis vapor, qui ex tunc erat, & sic dolor admodum molestus ibidem excitatur, nunc fixus, nunc vagus, & qui subinde remittere, ac iterum ingravescere videtur. (2.) Interdum etiam fit, ut solummodo sub forma flatulentie hæreat. Uterque dolor satis molestus est: Is, qui à flatu, est vagus, qui agitari, subinde remittere, ac de novo recrudescere, videtur: Si ibi hæreat liquor, fixus est dolor & continuus interdum aliquot dies. Plura de huius catarrhi nothi Theoria audivisti supra. Curantur tales nothi catarrhi, si sunt graviores, persudorifera, imprimis per salia volatilia, vel spiritus salinis volatiles, opiatæ mista, qualia sunt spiritus salis ammoniaci, spiritus Cornu Cervi cranii humani, & similia. Hi enim spiritus urinosi acedum viscosum absorbent & præcipitant, Opiata verò acorem temperant, & simul dolorem imminuunt. Externe cavendum est ab omnibus oleis unguentis: Hæc enim inducunt crustam quasi inducunt cuti, porosque constringunt & implent. Emplastra itidem hic nocent. Optimum in hoc dolore & casu est emplastrum ex gummi Tacamahaca, so-

luto in vino, atque extenso super alutam vel linteum, & parti dolenti impositum: si non bene hæreat, addi debet tantillum cerebinthine, quæ facit, ut adherat. Hoc ipsum emplastrum applicatum egregie resolvit istas humiditates: id quod patet ex eo, quod sub illo ut plurimum membra sudent, & omnis dolor promptè evanescit. Convenit etiam interdum cum hoc ipso conjungere gummi caranne, huius part. ij. ad illius part. ij. recipiendo, dum duo ista gummata ita imposita optime resolvant lympham crassam. Quod si eveniat, ut cutis non bene ferre queat gummatum applicationem, sed attollatur in pustulas, cum non omnis curis ferat Emplastra, quia mox in excoriationem incurrunt, tunc potius cura instituenda est per tincturas, seu essentias spiritu vini extractas, & ita inungas, nempe infunduntur ea aromatica, quæ potentem vim habent incidendi, attenuandi, penetrandi, resolvendi, & ita simul calefaciendi, v.g. quatuor semina calida maiora, nigellæ, crucæ, allium, sinapi, maiorana, salvia, serpillum, origanum, piper longum, & similia. Ex quibus ipsis cum spiritu vini paratur essentia seu tinctura diluta, qua partes affectæ fricentur mano, superimpositis linteis probe calidis. Sufficit quoque spiritus vini à plantis cephalicis nervinis abstractus, seu aqua articularis ad extra; nunquæ solitarie, nunc mista cum spiritu salis ammoniaci cum spiritu vini parato, externe calidè illinendo, & locum dolorosum probe affricando; ita optime dolores sistuntur. Sed rarum est, quod cutis non ferat gummatum impositionem, quæ omnium sunt optima.

Hoc quoque pertinet sacculus ex succino cum spiritu vini irroratus, aut ex chamapityde cum oleo succini conspersus: vid. HARTMANNUS Pr. pag. 93.

## ARTICVLVS II.

### DE

### CORYZA.

Specialiter inter Catarrhos frequentissimus est catarrhus narium, qui vulgo etiam coryza Græcis, aut quia caput gravat, Latinis Gravedo, & Germanis der Schnupfen, dicitur. Est, quando copiosa lymphæ, tenuis & acris, in principio quidem per nares, defluit, donec successivè adjuvante se nutrimento instar partium ex earum læsione corrupto, liquor crassus, spissus, tenax, varièque subinde coloratus, insequitur. Simul percipitur in principio titillatio quædam in naribus, supervenit sternutationes crebriores post incipit caput dolere, & quidem dolore gravativo. Naturaliter equidem à lymphæ insipida moderate crassa intus oblinuntur nares, cujus vasa & fontes videb. in STENONE de glandulis oculorum, narium, oris, &c. quæ ipsa lymphæ blandè humectant non tantum internam narium membranam, & defendit ab externis inspissatis, sed etiam suo modo facilitat odoratum. Ipsa tamen moderate crassa continuò neris inspiratu attenuata crassiores partes relinquit, spissioris sub mucii forma emulgentes. Quodsi verò præternaturalis lymphæ fiat excretio, ita, ita ut copiosa, tenuis, & quæ minus temperata, sed acrior & sæpè acida effluat, vocatur Catarrhus narium seu coryza, dum lymphæ ista aerior, rodendo & irritando membranam narium, primitus sternutationes frequentes (modum habuimus Sect. 14. cap. 3. Art. 1. ubi de sternutatione) deinde ex narium læsione dolorem, hinc ruborem; interdum etiam eorundem excoriationem & exulcerationem infert; id quod jam suo tempore observavit FORESTUS lib. 13. Obs. 14. cujus exulcerationis remedium sit unguentum pomatum seu de cerussa.

### C A U S A.

Causa huius coryzæ præter causas generâles, speciatim, internas, communes omnibus catarrhis, (vitium nempe lymphæ & massæ sanguineæ internæ, quæ interdum motu naturæ spontaneo per hæc loca tanquam emundatoria quædam auspiciâ expurgantur) sæpius solet oriri ex errore externo, ut dubitem, an præcisè oriri possit à causa interna, imprimis ex vitio aeris austeri, vel inclementia hybernâ aut autumnali? Aer enim hybernus efflu-



effluvis acidis acutis viderur imprægnatus, unde talis aer simul partes sibi expõsitæ, labia imptinens, faciem, manus, in specie nares & laryngem, solet lædere: & sicuti facies, & manus exinde finduntur, & quasi corroduntur in fissuras (quæ ipsæ fissuræ optimè curantur per lesionem, aut saltem humectationem, cum urina propria, tanquam remedio sale volatili prædito, quo alteratur acidum; vel per illinitionem cum medulla vitulina vel sero candelæ, vel unguento pomato, vel oleo, vel misto cum cerussa aut creta, absorbendo & temperando acidum;) ita à simili aere inclementiore, aut effluvis acrioribus acidisque imprægnato, in inspiratione hausto, læsa interiora narium, simulque fauces & larynx, ex irritatione ista mox copiosam fundunt lympham puram, tenuem, & ex lesione partium insigniter acutam, à qua in naribus coryza, in faucibus asperitas & dolor, (propter membranam pituitariam,) in larynge rauco & tussis superveniunt: Hæc ipsa enim ut plurimum in coryza tempore hyberno solent concurrere.

*Subiectum patiens coryzæ* est summitas interior narium, ubi est membrana, quæ aliàs solet esse subiectum olfactus, cujus structuram vid. in SCHNEIDERO de oss. cribiformi, in qua etiam ex oss. cribiformi inferantur multi tubuli nervei. Quando ergo à dicta acrimonia vellicatur hæc membrana, superveniunt Petnatationes, quando tubuli aliquid convulsivi patiuntur; unde tubulis his vellicatis, corrugatis, & convulsivis crispaturis affectis, similiter membrana cerebri dura, hisce tubulis continua, simili spasm. crispatur, unde dolor gravativus capitis; qui dolor similis videtur, quasi caput interius stringatur; estque nunc in toto capite, nunc in altero saltem hemisphærio, pro parte dextra vel sinistra affecta. Notum autem est, quod membrana narium naturaliter humectetur à lymphâ temperata, pro faucium olfactu, & inspiratorum abluitione. Quando ergo irritatur hæc membrana, sive à lymphâ acri, sive aere inclementiore, excoriatur eadem, & copiosus fit lymphæ effluxus ex irritatione, & hæc effluens lymphâ, abluendo subiectum vellicans, est principium coryzæ. Cæterum, continuatur hic fluxus lymphæ, nunc blandioris, nunc acrioris; in principio morbi omnia saltem profluunt aquosa & serosa, succedens magis magisque acris, unde quamdiu durat, tamdiu odoratus magis obtunditur, donec ab aeris, simulque lymphæ vitio læsæ, & nonnihil excoriatæ, narium interne partes doleant, rubeant & plorent nutrimentum proprium, sub forma mucilaginis crassæ, quæ narium supremâ obstruendo inspirationem tollit, usque dum hæc sponte effluat, & ita noxa inducta deleatur: Iam faucibus hærens copiosum sreatum facit, & laryngem incrustans frequenter tussis relucitur: Quin & non raro in fauce duritiem in naribus conerescit, quale exemplum observat HENRICUS ab HEER in Obs. 28. Omnia ergo hæc recensita symptomata, generatio muci, rauco item ac tussis, ordinariò superveniencia, semper oriuntur ex irritatione membranæ narium & tubulorum nervorum ab aere inquinato effluvis acidis, unde & gustus cessans, inspiratio læsa, & alia faciliè derivanda sunt.

Præter aerem inclementem inspiratum subinde etiam alia externa possunt coryzam inferre. Nam *sternutatoria acriora*, nimisque frequenter usurpata, continuò stimulo membranâ irritando copiosam lympham effluere faciunt, & tandem coryzam producunt pertinacem. Mihi enim hoc ipsum evenit tempore æstivo (quo aliàs non sunt frequentes coryzæ) præparanti clystum antimonii; nescio autem, quo facto frangebatur retorta; quo facto copiosus attraxi fumos, aded ut postmodum per aliquot septimanas in coryzam & tussim molestissimam inciderem. Solutio vitrioli in aqua simpliciter facta, naribus attracta, gravem coryzam cum dolore & æstu capitis admodum molesto solet inferre, quæ coryza artificialis simillima existit coryzæ naturali gravissimæ: Id quod notandum contra eos, qui dicunt: coryzam sapitati conducere; sunt enim talia in naribus recrementa, quæ sub tali forma ante non præexistebant in sanguine vel corpore.

Quando est à causa externa, ut aere externo, Coryza, ut plurimum frequentem sputationem ac tussim supervenire videmus, partibus scilicet ipsis, per quas aer rigidus tranfit, quæ copiosis glandulis hinc inde sunt obsitæ, naribus tamen læsis & irritatis, hinc lympham copiosam & vitiatam sub forma catarrhi plorantibus; imò ex partibus istis ita læsis continuò aeris expiratione exhalantis miasma fermenti quasi obtineor naturam, unde & contagiosa percipitur coryza, ita ut ista effluvia aliorum naribus inspirando attracta, vel per halicium, vel per lintea, seu per pocula communia

communicata, irritativa sua acrimonia instar pulveris sternutatorii membranam narium vellicando, & hinc narem lædendo, ac lympham alterando, similem etiam in altero subiecto coryzam inferant, ut adeò rarissime & parcissime coryza à causa interna notetur. Adeò sane falsum est, quod coryza semper sit salubris, ut vulgò dicunt, per coryzam purificari massam sanguineam, quasi existat in massa sanguinea. Nam ut hoc verum sit, si à causa interna oriatur, quæ tamen coryza rarissima est, non tamen semper procedit negotium, cum ut plurimum occasiones externas agnoscat, & talia potius fiunt in naribus; & faucibus, quàm quod aliò deferantur. Qui ulla hæc magis dilucidata, conferat in specie HELMONTIUM Tract. Tussis & Asthma, item Catarrhor. Delirior. ubi reperiet satisfactioem suorum dubiorum.

## DIAGNOSIS.

*Diagnosis coryzæ facilis, etiam aniculis nota est.*

## PROGNOSIS.

*Quoad Prognosin: Coryza per se est malum insons, quod caret periculo; saltem observetur:*

1. Quod crebrior repetens olfactum magis obtundat, & nares ad facilem coryzam disponat.
2. Quod lymphæ effluens nimis gravis aded graviter exulceret interiora narium, & ita orinas, vel narium ulcera periculosa producat. De quibus orinas alio tempore. Imò observatum fuit, ex tubulis nerveis nonnihil eros, supervenire excrementum carneo-fibrosam, seu polypum.

## CURA.

*Cura communis est cum aliis catarrhis scilicet conveniunt ea, quæ superius Art. 1. de Catarrhis dicta fuerunt. Duo autem tempora sunt observanda ad Coryzæ Curam:*

- I. Tempus coryzæ inchoatæ, quando incipiunt sternutamenta, & caput dolere, & lymphæ apparet tenuis.
- II. Tempus coryzæ confirmatæ, quando mucus obsidet narium summitatem.

Unde opera danda est, ut ratione prioris irritatio membranæ narium interne superioris, ejusque inde oriunda lesio, sistatur maturè & corrigatur, sic enim mox in principio supprimi potest coryza; ratione vero posterioris est attendendum, ut genitus mucus nares obsidens crassior & viscidior in progressu morbi maturè evacuetur. Quibus ipsis pro conditione subiecti patientis, & ipsius catarrhi, vel epidemici, vel non epidemici, copiosioris vel parioris, nunc blandè Laxantia, nunc in specie sudorifera, socianda veniunt. Conveniunt ergo pro primo scopo obtinendo in principio ad irritationem sistendam & lesionem præcauendam salia volatilia oleosa odorata, quæcumque formâ adhibita, in specie, si à causa interna oriatur: maxime tamen conveniunt externa vel naribus applicanda, vel vertici inungenda, vel in ore masticanda, vel inspiranda; hinc suffitus, inunctiones, uariis odoramenta, &c. coryzam inchoatam curant, & in prima herba suffocant, quatenus lesionem inductam plus minus corrigunt, acidum vellicans temperant, & irritationem sistunt. Imprimis illinition narium cum oleo destillato anisi, succini, aut alio simili oleo aromatico. In specie oleum destillatum anisi, mox in principio illitum ante excoriationem narium, est egregium. Oleum succini hæc superat, in specie si illinatur vertici, mirum quantum leuat coryzam, quin & naribus potest illini, idque ed præsentiori effectu, in aliquot gutt. olei destillati Caryophyllorum ipsi adduntur: sed quoniam est acrisculum hoc oleum, ob id tantillum hominibus ipsi intingatur, & inde subinde per olfactum naribus admoveatur; nam & sic coryza tollitur. Item balsamus apoplepticus naribus illitus & præservat à coryza in inclementiore constitutione acris, (quæ tempore hyberno metu coryzæ nares largiter inunguntur, ut inde inserendis nares condiantur & loricentur; ut eodem per illius halitum quasi præmuniantur, quò minus ab aere exteriori lædi possint) & eandem etiam incipientem curat. Tandem solus odor ex cornibus & ungulis raspatis, v.g. cornibus bouinis, aut in præparatione pectinum perceptus, etiam coryzam recentem subito sistit, sicut & proficuum est, si rascentur ejusmodi cornua limâ ferreâ, quo facto salibus volatilibus excitatis, & nares penetrantibus, aufertur coryza. Nec incommodum est, si hæc suffitus pro coryza narium: sicuti



Senti enim in catarrhis aer attractus inspirando infert asperitatem narium, faucium & laryngis; similiter inspirati suffitus alterationem ab aere præ reliquis tollunt, & harum partium impressas lésiones denud restitunt, & quasi abstergunt. Sunt isti suffitus imprimis ex gummatibus, quorum accensio salia volatilia oleosa interiora narium & faucium penetrando, acrimoniam lymphæ & corruptelam nimiam tollunt. Hæc inter excellit suffitus, præsertim ex succino: post succinum suffitus ex mastiche, olibano, & similibus est expertus. Experimentum videbitis in Barbette Praxi, ubi de Catarrhis. Denique suffitus ex gummi animæ experimentum est *Hortmanni*, insigniter commendatum à *LINDANO*. Hic & similis suffitus naribus, ore & totâ facie, repetitis vicibus, exceptus, vitium lymphæ corripit, & lésionem jam induam mitigat, & perinde hos affectus curat; v.g. suffitus super in catarrhorum Cura præscriptus: vel quoque præscribatur suffitus talis compositus *Lindani*:

℞ Gummi juniperin. ʒi.

Anima.

Succini an. ʒij.

Thuris,

Mastich. an. ʒi.

Benzoes (in affectibus faucium & laryngis, & hinc pulmonum; est enim anima pulmonum) ʒii.

M. f. Pulvis: S

Pulvis ad suffitum contra catarrhos, Vel

℞ Gummi animæ ʒvi.

Succini ʒi.

Syrac. calam. ʒij.

Thuris,

Mastich.

Benz. an. ʒij.

M. f. Pulvis:

D. S. ut antè.

Qui carbonibus injectus successivè excitat suffitum suavem, naribus crebrius excipiendum ad sistendam coryzam, quæ ipse etiam capiti imponenda erunt. Semen lini sine Storax carbonibus impositus, cujus suffitus in nares attractus, aut semen anisi calefactum, linteo inclusum & odoratum; item tenere faciem super vase aquæ verè calidæ, à quibusdam laudatur. Pertinet & huc suffitus *Tabaci*, aliquot guttis olei destill. anisi prius imprægnari, si scilicet ita præparatus tabacus per fistulam consuetè attrahatur, & fumus inspiretur. Convenit etiam, si recipiatur oleum amygdalarum dulcium, in quo q. s. solum sit camphoræ, quod ipsum oleum extrinsecus ossi nasi, vel intrinsecus superficiei ejus illitum, eleganter coryzam sistit. Perhibetur esse secretum *TACKII*.

Quod si verò ed usque processerit malum, ut sub incremento & statu ejus pathemata graviora capitis affixerint, nec non copiosus, nimis crassus, nimisque viscidus mucus partium summitates occupaverit, & nares obstruxerit, tunc attenuantia, resolventia, & excrementa eliminantia locum habent; unde optimus est suffitus aceti super ferris candens effusus, & ex gummi animæ & succino jam laudato: Sic etiam loco suffitus conveniens est spiritus salis ammoniaci odoratus crebrius, quæ penetrant ac incidunt mucum, materiam resolutam fluxilem faciunt, & nares aperiunt, ac lésionem inductam corrigunt; item oleum camphoræ amygdalinum jam laudatum, quo illinantur summitates narium extrinsecus, vel internè earum superficies; sic sal volatile camphoræ optimè solvit mucum latitantem. Ulteriori pro simili scopo optimè conducunt sternutatoria appropriata, lymphæ protitendo fluxum, ejus beneficio membranas narium abstergentia, quin & dictum mucum crassum & viscidum eliminantia. Fiant ordinariò ex pulvere *Tabaci*, ex floribus & radice liliorum convallium, majorana, euphorbio, & similibus:

℞ Pulv. *Tabaci* Ind. ʒi.

Major.

Flor. lil. convall. an. ʒi. ad ʒij.

Olei destill. salu. vel rosi mar. vel anisi, major. an. gtt. vi.

Misc. pro Pulvere Sternutatorio subindè naribus hauriendo:

D. S.

Pulvis sternutatorius aperitivus.

Huic, si placet, pro ditiore subindè addi possunt

*Ambra* gr. iij. ad v.

*Moschi* gr. vi. ad ʒi.

Misc.

Ita hæc conjuncta dant Pulverem sternutatorium præparatum.

Vel etiam scelegans pulvis sternutatorius ex pulvere radiceis *Ireos* *Florentine*, cui tantummodò aliquot grana euphorbi pulvisari adduntur; hoc enim potenter materiam suâ forti irritatione, rivali instar, profluere facit.

Pertinet huc etiam pulvis sternutatorius *Helmontii* in hoc casu expertus, ex pulvere radiceis hellebori nigri cum ana sacchari mistus, naribus attractus, quibus aliquot gutta olei destillat. caryophyllorum, vel cinnamomi addantur, quæ etiam ceu egressum commendat *RIVERIUS* in sua *Praxi*. Vid. *HELMONTIUS* *Tract. Tuss. & Asthma*. His ipsis enim corrigitur mucus, & denud liberantur nares. Item folia *Nicotianæ* irrorantur aliquot guttis olei destillati majorana, & ita odorantur; vel exsiccata pulverisuntur: blanda, sed egregia sunt sternutatoria. Conveniens etiam est semen nigellæ cum majorana in forma pulveris, vel sola, vel cum camphora: semen basilici pulverisatum sternutatorium non incongruum est, in principio quoque coryzæ usurpandum. Optima denique sternutatoria sunt ex vitriolo; mitiora, si tantummodò ad albedinem calcinetur; potentiora, si ad aliquam rubedinem uratur seu comburatur: quæ inspirata potenter penetrant, omnesque narium latebras emungunt. Cæterum, ne nimis acris sit, solvatur tantillum vitrioli albi, seu ad albedinem calcinati, in aqua majorana seu aqua liliorum convallium, aut in aqua salivæ diluti, ita ut gr. v. vel vi. pro ʒi. Aq. sufficiant. Liquoris filtratus & naribus attractus qualvis narium latebras emungit, & insigniter convenit coryzæ:

℞ Flor. lil. convall.

Herb. major. an. M. ʒi.

Nicos. M. ʒi.

Coqu. in f. q. Aquæ & vini in vase clauso

Colaturæ ʒvi. adde

Vitrioli albi ʒi.

Colentur per pannum densum ob vitriolum.

D. S.

Aqua abstractiva ad usum.

Quæ optimè quoque mucum nares obstruentem resolvit in statu coryzæ.

Quidam usurpant olei *Nicotianæ* & olei nigellæ ana partes æquales cum aliquot guttis olei destillati majorana;

Vel

℞ Olei viri,

*Nicotin.* an. ʒi.

Destill. major. gtt. iij. iv. v. ad ʒi. & ʒi.

(vel huius & olei destillat. succin. an. p. æqu.)

M. S.

Oleum aperitivum ad usum.

Subindè intra nares attrahatur, vel cum turundula naribus immittatur, vel naribus extrinsecus illinatur: mucum narium insigniter solvit & elicit, sistitque ita coryzam narium confirmatam.

Melius est oleum anisi, si interiora narium eodem illinantur; referat enim nares obstruktas, & si sit ab effluviis inspiratis, lympham temperat, ne fauces & sanguinem feriat attenuata: vel sumatur oleum anisi, & ita naribus cum bombace in parva turunda immittatur; ita enim egregiè resolvitur mucus crassus, superiores narium partes obstruentis vel oleum succini, vel oleum caryophyllorum, quæ propter acridinem cum oleo amygdalarum dulcium temperentur. *TACHENIUS* camphoram in duplo olei amygdalarum dulcium solvit. Sic conveniens est, ut naribus admoveatur Nodus cum stilo ex semine nigellæ confectus, qui nodulus subindè olfactus admodum corrigit, & emendat coryzam, in specie nares obstruentem; est remedium *Tabernmontani*, quod insigniter commendat. Possunt addi folia majorana, aut præparata ex majorana, in specie oleum majorana; nam & hoc ipsum curat ornam: v. g.

℞ Fel. maiorem. part. iij.

Sem. nigell. confus. ʒiij. vel ʒiij.

Olei destill. majoran. gtt. iij. vel iv.

Succini,

Anisi an. gtt. i. vel ii.

M. f. Nodus:

detur cum stilo: S.

Nodus odorandus.

Quod si caput perturbatum sit, grave & obnubilatum, convenit vel *Balsamum Peruvianum*, vel, ubi fortius agendum, oleum destillatum succini, aut ejusdem balsami vertici illitus; unde



unde dolor capitis tenivus ejusque perturbatio successivè remittunt. Loco horum adhiberi etiam possunt Cucuphar suprà laudatæ:

24. Flor. anthos,  
Lavend.  
Stœch. Arab.  
Rosar. rub.  
Lil. convall.  
Salv. an. pug. ij.  
Sem. nigelle,  
Raf. succini an. ʒij.  
Syrac. calam.  
Benz. ana ʒi.

Cancif. & contus. irrorentur cum guttis aliquot olei destillati succini: includ. sacculo quadrato ex sindone rubra interpassato.

D. S.

Sacculus vertici imponendus.

Quod si pro derivatione lymphæ catarrhalis prius pro preservatione partium oris aliquid agendum sit, pilulæ conveniunt vel trochisci parvi ex mithridatio, mastiche & olibano facti, & in ore retenti: Catarrhum enim & læsionem partium sistunt, dolorem oculorum, dentium fœtorem, & gingivarum corruptelam, &c. tollunt, atque in principia imprimis conveniunt.

## ARTICULUS III.

DE

### TUSSI, RAUCEDINE, ALIISQUE AFFECTIBUS CATARRHALIBUS.

EX modò distiseriam Raucedo, & Tussis, faucium phlogosis & dolor, gustus abolitio, similesque faucium affectus catarrhales, tam cum quam sine coryza, ordinariò assilientes curari possunt, cum omnia mutuo invicem concurrant, & partim per læsionem ex causa externa factâ, partim per lympham ex glandula pituitaria superiore in coryza depluente, & hinc ad fauces dependente, & ita loca vicina magis magisque irritante, originem ducant. De qua membrana pituitaria, & per hanc transudante coryza, vide SCHNEIDERUS, partim Tract. de Osse cribiformi, partim Tract. de Catarrhis.

CURA.

In specie tamen quoad curam horum, similiter duo tempora observentur: inchoata nempe tussis & raucedo, & confirmata. In priori præter Suffitus suprà insinuos, hic etiam convenientissimos, specialiter opjata, additis salibus oleosis, tempore vespertino in principio horum affectuum adhibita, multum conveniunt, idque ex methodo Helmontiana: Quibus in principio mali, ubi lymphâ adhuc existente nimis acri & tenaci, aut nimis acidâ, aut corrosivâ, partium affectarum dolores, rubores, phlogoses, &c. superveniunt, subindè acrimoniam temperantia & demulcentia usurpanda, quæ aliàs incrassantia dicuntur: qualia sunt Papaverina, & quæ sunt ex jujubis, glyzyrrhiza, sicibus, passulis, sulphure; item pilulis de Syrace, &c. In statu verò morbi, ubi mucositas & viscidior genitus istas partes obsideat, pro expectoratione conveniunt Expectorantia vulgò dicta, ex hyssopo, Nicotiana, oxymelibus, spiritu salis dulci, spiritu nitri dulci, & similibus usurpanda, suprà Sect. 14. cap. 3. Art. 2. Membr. 2. & Art. 3. ubi de Tussi, & Raucedine actum fuit, explicata. Mulierculi nostratibus præsentissimum tussis & raucedinis à causa externa, aere nempe frigido, præbent passula maiores, macerata in spiritu anisi, quarum quædam manè jejuno stomacho masticata & deglutita fauces & asperam arteriam præservant ab insultu & læsionibus aeris hyberni; sicut etiam radix zingiberis in India condita assumpta manè & masticata, eidem usui confert. Inductos verò jam catarrhos faucium & laryngis serè curant per caricas, quibus in frustula dissectis aquam vitæ seu spiritum vini infundunt, & hunc desuper accendunt, & sic deslagrare sinunt, continuò agitando; hinc frustula illa semiasata vespertino tempore comedunt, & sic tussim & asperitatem faucium egregie corrigunt, sicque lympham acrem & acidam temperant, & demulcent.

Hæc de lymphæ vitiis, indeque ortis catarrhis: Pergo ad

## ARTICULUM IV.

DE

### EPIPHORA.

TAndem præter nares, oculos subindè affligunt Catarrhi, ex lymphæ diluvio præternaturali orti. Naturaliter equidem humectantur oculi à lymphâ subtili, eaque tenui, moderatissimè salâ, ut faciliter eorum motus, & à salsedine lymphæ continuatâ absterisione eorum nitor & claritas, ad visum summè necessaria, conservetur: Hinc si nimia frequentia & copia excernatur hæc lymphâ oculorum, lachrymarum nomine venit, quæ largiter manantes subindè in oculos influunt, ubi sensibili, sed subtili, salsedine imprægnatæ gustantur.

Lachrymæ hæc aut naturaliter effluunt solo quanto excedentes in animi pathematis, aut præter naturam emanant in statu morbofo, vitioque catarrhali.

Fontes hujus lymphæ, tam naturalis quam præternaturalis, sat manifesti sunt, glandulæ tùm istæ, quæ in utroque cantho seu angulo sunt conspicuæ, tùm etiam cæ, quæ in interiore palpebrarum facie sunt sitæ: de quibus imprimis consulendus est STENO Tract. suprà cit. de vasis oculorum; ubi etiam habet nonnulla egregia de naturali lachrymarum fluxu.

Lachrymarum ille nimius effluxus morbosus abusivè aliàs vocatur Epiphora: abusivè dico; legitimo enim usui Epiphoræ vox in genere humoris in quamcunque partem influentis impetum significat; quæ ratione & uteri, & ventriculi Epiphoræ apud Veteres observantur. In specie tamen ex Modernorum abusu Epiphora nimium lachrymarum fluxum seu Catarrhum oculorum innuit, de qua egi, ubi de Ophthalmia.

## CAPUT III.

DE

### LYMPHÆ MOTU IMPEDITO, INDEQUE ORTO HYDROPE IN GENERE & IN SPECIE.

PRæter affectus catarrhales à lymphâ, vel primariò vel secundariò peccante, enatos, lymphâ etiam peccat in motu, quando impeditur, ut in suo motu stagnet, & hinc loca vicina occupet; unde oriuntur tumores aquosi & serosi, seu Hydropes particulares.

Hydropis nomine sub generali conceptu nil aliud intelligitur, quam aquarum, seu, uti loquuntur, serosorum humorum præternaturalis collectio; Latinis aqua intercus non ineptè dicta, quam necessariò tumor & distensio partis, cum ejus tamen mollitie, & non rarò fluctuatione comitantur, utur hoc ipso vocabulo certa Hydropis species determinetur. Aqua hæc collecta vel totum imprægnat corpus seu tumescit, vel saltem determinatam ejus partem. Illud dat Hydropem universalem, qui dicitur imprimis Anasarca & Leucophlegmatia, cui addatur Ascites cachectica, à pedibus successivè ascendens, usque dum suffocentur ægri: quos Hydropes universales suprà Sect. 17. Cap. 3. Art. 1. 2. & 3. discussi: Hoc verò dat Hydropem particularem, qui pro partium varietate, in quibus aqua colligitur, variat etiam, & specialia sortitur nomina. Si enim caput sit hydropticum, seu quando aqua colligitur in capite, dicitur Hydrocephalus; si colligitur in pectore, eodemque vel toto, vel una, saltem ejus medietate, dicitur Hydrops pectoris seu Sternites; si in pericardio præternaturaliter abundet lymphâ, est Hydrops pericardii; si aqua particulariter colligitur in abdominis cavo, vocatur Hydrops ascitis, ab asce, utre, quia abdomen instar utris repletum, tumefactum & distentum apparet: qui Hydrops ascitis abdominis particularis non confundendus est cum Hydrope ascite magis universalis, qui cachexiam comitatur, & præter abdomen etiam pedes universos ac scrotum tumefacit, de quo jam suprà l. a. siquidem cachexia confirmata vel in Hydrope anasarca, vel in ascite partium inferiorum universalem terminari solet. In utero collecta aqua dat Hysteridum, seu hydropem uteri; si in scroto, dicitur Hydrops serotis in testibus dat Hydrocele; si in partibus vel membris externis particulariter oritur in uno alterove membro, vulgò tumoris aquosi aut serosi gene-



generali nomine appellatur. Imò in omenti bursa copiosa aquæ conclusæ in insignem tumorem abdomen attollunt, qualia exempla HORSTIUS in *Observat.* habet; & hic est mulier, quæ videtur gravida, & tamen tantum est Aqua collecta in omento: Item in duplicatura peritonii conclusæ aquæ speciem hydropis abdominis mentiuntur, quale exemplum habet JOB à MECKERN in *Observ. Chirurg.* cap. 52.

Ex quibus diù patet: Hydropem ab Aqua, *Id est* dictum, non esse alium, quàm, ubi est Aqua. Hinc hydrops dictus *Tympanites* improprie est hydrops, cum flatuum tantum, non verò aquarum, in abdomine sit collectio; unde de eo videantur, quæ *suprà* *Sect. 5. cap. 2. dixi de Ructibus & Flatibus stomachi.* Unde tantum propter aliqualem similitudinem tumoris cum ascite particulari, & quia raro absque aquarum aliquali colluvie contingat, Tympanitidem eundem etiam ad hydropes retulerunt.

Superiori septimanâ incepti discurrere de Hydrope, tam in genere quàm in specie, & quidem tantum Præliminaria præmissi: pergo in his, & præmoneo, quod cum ascites sit frequentissima Hydropis species, & omnium maximè occurrat in Praxi, quæ dicuntur de ascite, etiam de Hydrope in genere intelligenda sunt.

De Hydrope universali, tam anasarca quàm ascite, omnium partium inferiore universali, cachexias insequente, *suprà* *l. a.* monitum fuit.

## ARTICULUS I.

### DE

### HYDROPIBUS PARTICULARIBUS IN GENERE.

### C A U S A.

**I**N specie quod attinet Causas hydropis particularis, seu collectionis aquarum, aliter à Veteribus, aliter à modernis derivantur. Veteres hepar affectum accusant, quod nempe, ut notum est, recenter advectum sanguinem non rite præparet, unde fiat, ut tandem serum in abdomen distillans hydropem inferat.

Sed his contrariatur (1.) Modernorum de sanguificationis organo hypothesis, cum, ut notum est, dejectum sit ab imperio cruento hepar, ipsique publicè ductæ exequiæ.

(2.) Adversantur huic sententiæ omnes, qui observationes Anatomico-Præcticas scripserunt, v. g. Bartholinus, Tulpius & similes: Hi enim omnes aperto ore clamitant, sæpius hepar in fons in Hydropicis, in specie asciticis, fuisse repertum: Hinc refert LINDANUS *super Hartmannum*, se aliquando vidisse Enchusæ virginem hydropicam, cujus ventre dissecto ingens aquarum colluvies profuxit, interne nulla labes viscerum abdominis fuit inventa, donec minister ventriculus totus putridus, corruptus, & liquore instar atramenti foetidissimi plenus fuerit inventus; unde origo istius mali. Unde etiam SENNERTUS suo tempore rejecit, quod ex hepate semper oriatur hydrops, imprimis ascites; quia potius ex quacunque causa viscera debilitata in genere, modò sanguificationem impediunt, esse hydropis ascitis origines: imò impugnat omnes, qui hepar affectum defendunt, *lib. 2. Prax. cap. de Ascite.* Unde in principio huius seculi SYLVIVS LANCEANVS, Medicus Romanus, peculiarem edidit libellum, cujus est Titulus: *Hydropem non semper à jecore fieri*; excusum est hic Tractatu Romæ Anno 1603.

Non nego equidem, hepatis & lienis scirrhus fuisse subinde inventos in hydrope demortuis: Sed hoc commune habent cum aliis visceribus, & etiam subinde reperiuntur exempla asciticorum, in quibus post mortem aut hepatis aut lienis, aut alius visceris scirrhus fuit inventus, qualia vid. in FORESTO *lib. 19. Obs. 29.* & in SCHENCKIO *Obs. pag. 433.* Viscerum enim quorumvis varia & multiplex in Hydropicis constitutio præternaturalis observata, ita ut haec genus nil certi de parte solida, primariò in hydrope affecta, colligi queat: Imò fieri potest, ut sine vitio alicuius visceris hydrops nascatur, quando ab errore externo, à potu frigido confertim ingesto, aqua in abdomine colligitur, atque adeò non solius hepatis, sed & aliorum viscerum culpa, imò interdum visceribus pænitus illæsis, hydropem generari constat.

Quæstio autem superest; an hi tumores sint causa hydro-

pis? an verò eum tantum antecedant? aut ex labæ sanguinis eum comitentur; sicut videmus v. g. Quartanas, Tertianas diuturnas, &c. sæpe habere comites scirrhus lienis; qui scirrhi lienis aut hepatis superveniunt istis morbis, adeoque ad morbos producta potius referendi, quàm quod sint radicales eorum causæ. Id quod etiam de Hydrope ascite, qui succedit post morbos chronicos, in specie Quartanas & Icteros, observandum est.

(3.) Tertium, quod est contrarium huic opinioni, est, quod explicanda restet ratio & modus, si ex hepate oriri supponatur, quo fiat collectio & destillatio materiæ aquosæ in abdominis cavum, aut alias partes, v. g. in caput, pectus, &c. Nam hæc est consuetæ naturæ lex, per experientiam quotidianam comprobata, simulque per insignia experimenta, quod nihil excernatur ex massa sanguinea purum, nisi per cribra certa, seu per certos & determinatos poros ac meatus. Quæritur ergo: per quæ loca? quomodo? per quas vias destillentur aquæ, & colligantur, nunc in capite, nunc in pectore, nunc in abdomine, &c. Transudatio est leue effugium, ex vasis nempe sanguifluis. Tunica enim venarum, ut taceam de arteriis, tenaces admodum ac densæ non permittunt hos succos effluere ac loca determinata. A vasomosis si adest, necessariò tantillum sanguinis adestet, ut ob id serum instar loturæ carniū, & quasi sanguineum observaretur in Hydropicis: quod tamen non est. Necesse est ergo, ut veterum assertis missis, aliter explicetur Hydrops generalis. Optimum autem & probabile inventum est Modernorum nonnullorum, qui particulares variorum locorum hydropes optimè dilucidant per vasa lymphatica aut lactea, quorum læsorum occasione commodissimè ista aquarum collectio deduci potest; Impe'dito enim lymphæ motu per hæc vasa, quid aliud, nisi huius in partibus stagnantis collectio, indeque hydropica intumescencia insequitur? Quod si per totam corporis peripheriam, ut in leucophlegmatia, vitio glandularum & lymphæ ductuum obstructarum, aut alio modo infarctarum lymphæ per glandulas transcolatio, & eius per vasa ad massam sanguineam motus impediatur, anasarca aderit, sicuti, si in uno vel altero membro particulari hoc contingat, anasarca particularis, ascites particularis, &c. supervenit. Primus, qui mentem huic direxit, fuit BARTHOLINUS in *Tract. de vasis lymphat. c. 7. p. 245.* quem tanquam Præceptorem sequitur ejus discipulus SIMON HEINRICUS PAULI in *Anatomia anatomie Biliana pag. 86.* Causam hydrocephali statuisse lympham, quæ ex obstructis vasis lymphaticis jugularibus, aliisque cephalicis inter cutim & pericranium, vel inter cranium, & meningis, colligatur. Terit eadem vestigia similiter SYLVIVS, tam in Scriptis Theoreticis quàm Practicis, in specie *lib. 1. Prax. cap. 17. & cap. 50.* qui in specie ascitem ex hoc fonte derivat. Sanè ubique per totum corpus & qualibet viscera dispersa sunt vasa lymphatica, tamque per partes internas, quàm per externas, quæ semper habent suam correspondentiam cum glandulis. In his ergo lymphæ contenta si impediatur moveri, sive sint vasa rupta, sive erosa, eum interim continuus ejus sit proventus, necessariò tamen lymphæ collectio seu tumor aquosus seu hydrops particularis in ista parte, ubi sit lymphæ impeditus motus, excitatur, & tam in partibus internis, v. g. ex lymphaticis capitis, Hydrocephalus; ex lymphaticis pulmonum, aut ex lymphaticis glandularum pectoris, Hydrops pectoris; ex lymphaticis hepatis vel lienis vel testium, tam virilium quàm muliebrium, vel lacteis thoracicis &c. Hydrops ascitis particularis, & Hydrocele inducitur; non secus ac in partibus externis à lymphaticis artuum Tumores serosi partium externarum superveniunt.

Causa verò generalis, propter quam non movetur lymphæ, in ordinariis vasis, est aut ruptio aut erosio vasorum lymphaticorum. Si enim in quodam loco glandulæ, & ex his derivata vasa lymphatica obstruantur, necesse est, cum lymphæ fiat continuus proventus, ut exinde huius fiat collectio in glandula, aut ejus cursus in vase ita impediatur, ut necessariò hinc lymphæ in parte colligatur. Et quidem si obstructum sit vas lymphaticum (præsuppono hic exactam vasorum lymphaticorum noticiam) à materia crassa & viscida, seu, ut vocant, pituita, hoc ipsum vas obstructum à lymphæ per istud distribuenda insigniter distenditur, tandem rumpitur, & ita lymphæ successive effunditur; aut etiam si ipsa lymphæ fuerit acidior, salsior, acriorque aut alius quicunque humor corrosivus vas lymphaticum tenella exciserit, necessariò etiam lymphæ motus naturalis in ista parte sic impeditur, ita ut lymphæ exinde in quendam locum præ-



CAUSA.

ternaturaliter effusa & collecta tumores aquosos particula- res, aut hydropem particularem, inducat.

Confirmant hanc Hydropis particularis, per lymphatico- rum vasorum vitia, originem *Hydatides viscerum*, (bullæ aquosæ,) in specie *hepatis & lienis*, quæ subindè observatæ sunt, aut prodromi, aut comites *hydropis particularis*, ut in specie hoc rectè observat SCHENCKIUS lib. 3. *Observ. de Hydropi* item PLATERUS in *Observ. pag. 196.* qui ob- servat Hydropem ex lienis & hepatis vesiculis, & SEN- NERTUS in *Praxi, ubi de Hydropi*. Equidem *hydatides* hæ præ aliis partibus frequenter in pulmonibus, *hepates*, ac liene, & similibus visceribus sunt observatæ. De *hydatidi- bus* insignioribus pulmonum vid. CAROLUS PISO in *Tract. de Colluvie serosa pag. 214.* De *hydatidibus* insigniori- bus hepatis vid. PANAROLLUS *Pentec. 5. Observ. 16.* qui quædam egregia habet: quia horum viscerum vasa lym- phatica magis exteriora ambiunt, unde humorum horum seu aquarum contentarum collectio magis sit conspicua. Sci- licet dictis in locis vesiculæ aquâ turgidæ, nunc minores ac copiosiores, nunc grandiores conspiciuntur; quæ ipsæ sunt nihil aliud, quam vasa lymphatica, in quibus motus lym- phæ est impeditus. Hæc ergo lymphæ in iis hæret propter in- terjectas crebriores in vasis lymphaticis valvulas, eaque sen- sim distendit, & dum intercepta est lymphæ distendens intra valvulas, quibus plurima vasa lymphatica sunt instructa, spatiosa ista intermedia distendendo tumefacit, & ita vesicularum aquosarum faciem repræsentant. Quod si rum- patur una alterave valvularum, aut ipsorum vasorum lym- phaticorum lymphæ sub membrana visceris tenui coercita, & effusa, sensim majores vesicæ & grandiores, ad nucis juglandis magnitudinem interdum observatas, exhibebit, donec tandem ruptis auterosis *hydatidibus* lymphæ extrava- satio, in cavo corporis quodam collectio, & ita *hydrops* post- modum particularis oritur.

Post *Hydatides* illustrant *hydropis* ortum ex lymphæ mo- tu impedito *ascites* seu *Hydropes abdominis vesicales* dicti, h. e. in quibus Aqua abdominis tumorem quidem faciens, non in cavo ejus fluctuaverit, sed potius viscera copiosis & innu- meris vesiculis aqua turgidis observata fuerint, ita ut post abdominis aperturem nihil aquæ effluerit. Exemplum ali- quot enarrat hujusmodi *hydropis* vesicalis SENNERTUS c. 1. *ubi de Hydropi*, item TULPIUS, qui observat hydro- pem *asciten* ex copiosis vesicis mesenterii lib. 2. *Obs. 34.* item vid. HOEFERUS in *Herc. Med. pag. 142.* ubi similes hy- dropes vesicales refert, item HORSTIUS lib. 10. *Observ. pag. 513. & 579.* similiter & BARTHOLINUS *Cent. 4. Epist. 18 pag. 370.* observat *asciten* ex glandulis vel vesiculis inomento sero repletis, nec non in *Alis Med. Hassi. Volum. 1. pag. 17.* sicut & in VALERIOLA. Hæ ipsæ vesiculæ pariter oil aliud sunt, quam vasa lymphatica, & hinc par- tium interstitia membranosa, hinc inde ex lymphæ in motu impedita, ut ratione interjectarum valvularum in lympha- ticis vasis tales vesicæ repræsentent; aut rumpantur licet vasa, si tamen lymphæ effluens in membranis ambien- tibus supra dicto modo coarceatur, successivè in copiosas- tes vesiculas coarceatur & colligitur.

ARTICULUS II.

DE

ASCITE PARTICULARI.

**F**requentior autem præ cæteris *Hydropis* particularis speciebus est *Hydrops abdominis* seu *Ascites* particula- ris, idque duplici ex ratione:

1. Quia copiosa & insignia continet viscera, eaque omnia plus minus copiosis vasis lymphaticis suis in- structa, v.g. hepatis, lienis, renum, testium ut- riusque sexus, quibus speciatim accedunt vasa lymphatica ab inferioribus locis ad receptaculum commune ascendunt.
2. Ratio secunda est, quia mesenterium etiam instru- ctum est copiosis vasis lacteis, chylum in se tenuem & limpidum vehentibus, quibus plus minus ruptis aut excisis similiter *ascites* & eadem pathemata in abdomine sequuntur, quæ aliàs lymphaticis vasis abdominis ruptis: nam quod his lacteis læsis, etiam sequatur *ascites*, de hoc vid. SYLVIUS cap. 17. *Prax.*

Quoad *Causas*: equidem LINDANUS *Asciten* Parti- cularem semper à colliquatione oriri asserit, quod tamen vix universale videtur. Plausibilissima est lymphæ chylosæ alteriusve humoris impeditus motus per vasa lactea, unde pariter omnia symptomata hic obvia derivari possunt. Adeo- que *Causa proxima* investiganda est vel in vasis lymphaticis quacunque causa erosis; vel vasis lacteis obstructis, ruptis, & consequenter lymphæ distillationem patientibus; vel ex sanguine, quodam in loco coagulato, qui putrescendo tran- sit in aquam, cujus occasione supervenit interdum talis Hy- drops *Ascites* particularis.

Res ut pateat exactius, observandum est, vasa lactea ra- tione structuræ & compositionis revera eadem esse cum vasis lymphaticis, talem contenti ratione à se invicem differunt, dum nempe vehunt chylum distinctum à lymphæ. Hinc enim est, quod truncus lacteorum & lymphaticorum communis, nempe ductus thoracicus, utriusque liquori vehendo, tam chylo quam lymphæ sit destinatus. Lactæ ergo hæ venæ tenuem & aquosum chylum vehunt, si aut ipsæ in mesenterio ob- struuntur, aut glandulæ mesenterii, per quas chylus me- diantribus vasis lymphaticis primi generis traiecitur, in la- ctæas secundi generis, (de quibus imprimis videndus WARTHONIUS) si inquam glandulæ aut vasa lymphatica obstruantur, necessariò sequitur exindè chyli effusio, & inde tumor *asciticus* supervenit. Necesse est enim, ut chylus, qui per se est admodum tenuis & aquosus, utpote per angustos intestinorum poros percolatus, tunc subsistat, aut circa glandulas infarctas, aut in lacteis obstructis, hinc vasa distendat, eademque tandem rumpat, usque ruptis in abdomen influat, quod continuata congestione tandem di- stendit, & ita tandem tumorem *asciticum* inserit. Hanc chyli in abdomen per nonnulla vasa lactea ex occasione qua- rundam glandularum obstructarum distillationem unam ex communissimis causis *ascitis* arbitratur SYLVIUS cap. 17. lib. 7. Hanc quoque sententiam illustrat imprimis illud ex- perimentum BOYLEI *Tract. de Usu Philosophia Experi- ment. P. 2. pag. 38.* in quo refert aquam *hydropici* cujusdam per paracentesin evacuatam, fuisse spissam, crassam, opa- cam, & albam, gustu subdulcem, colore turbido; bland- do igne leniter inspissatam dedisse materiam albam, albumi- ni ovorum similem, magis inspissatam in gelatinam plan- crassam concrevisse, quæ aliàs chylo & liquoribus chylo per- mixtis propria esse solet: Sicuti hæc ipsa, quæ dico de vitiis vasorum lacteorum & glandularum mesenterii, illustrent ex- empla *asciticorum* eorum, in quibus, reliquis visceribus salvis mesenterii tantummodò glandes obstructæ, hinc tumideæ aut scirrhosæ, inventæ fuerunt; item quando ex ulcere mesenterii, in quodubio procul excisa fuerunt vasa lactea, crebrò observatus fuit *hydrops*: Id quod confirmat RON- DELETIUS in *sua Praxi* lib. 3. cap. 35. ubi inquit, id no- tatum dignum esse, quod ex frequenti dissectione corporum observaverit, nempe *Hydropicos* glandulas mesenterii indu- ratas vel scirrhosas habere: Sic TULPIUS lib. 2. *Observ. cap. 33.* observat *hydropem* abdominis propter glandulas mesenterii oedematosas; quod etiam PANAROLLUS testatur, uti etiam HOEFERUS in *Herc. Med. cap. 143.* Sic ex ulcere mesenterii quinquies *hydropem* observavit TULPIUS lib. 2. *Observ. 32.* ut etiam HOECHSTED- TERUS *Decad. 6. Cas. 6.* ex glandulis mesenterii oedema- tosis, scirrholis & exulceratis.

Ex his ergo frequentes sunt *Hydropes* particulares abdo- minis, & sanè ubique prostant *Observationes* *Ascitis*, nati ex affectis mesenterii glandulis; hinc enim distillat serum, plus minus chylum in abdomen, ruptis vasis lymphaticis aut lacteis. Ex hoc fonte etiam causa est *Ascitis* particula- ris, qui supervenit quibusdam, quando copiosus potus frigi- dus ingurgitatur in æstu, aut nimio veneris ardore; frequen- ter enim observatum est, quod ex solo haustu frigido post æ- stum nimium, aut corporis exercitium, sudorem nimium aut æstum febrilem, aut nimium calorem, interdum subita- neus ortus fuerit *hydrops ascites*; qualium exempla PISO *Tract. de colluvie serosa* habet, dum refert *Ascitem*, natum ex haustu frigidi in declinatione tertianæ: Simile etiam exemplum refert SENNERTUS lib. 3. cap. *de Hydropi. Ascite* pag. 711. Dicit nempe, se observasse in puella, quod- cum in tertiana vehementer sitient totam mensuram cerevisiæ secundariæ ebibisset, inde in *ascitem* incidere. Item FONSECA lib. 7. *Cur. 29.* observat *asciten* ex potu frigidi vini



ini post longum iter, dum æger admodum esset exæstuat. Observatum crebrò fuit, quòd messorès tempore æstatis ex haustu cerevisiæ secundariæ in æstu reddantur Hydropici: Sic ex ingurgitatione aquæ in æstu tertianæ febris observavit hydropem ascitum RIVERIUS *Cent. 2. Observ. 65. Conf. M. A. N. C. Ann. 6. Observ. 52. p. 85.* Nullus ergò potus frigidus nimis, imprimis febricitantibus, præsertim tempore paroxysmi porrigendus, ut quote quamvis moderatè ac intempestivè assumptus coagulationi lymphæ & chyli intra vasa lactea, hincque Asciti, non rarò occasionem subministrat. Utut enim HIPPOCRATES frigidæ potum in febribus passim concedat; hic tamen nostræ texturæ minus, quàm Græcorum, aliosumque regiones fervidiores inhabitantium, conveniet: vid. POTERIUS *de Febris lib. 2. cap. 9.* Sicut quoque rationem hujus effectus, quod nempe ex potu aquæ frigidæ sequatur hydrops, ex obstructis vasis lacteis, eleganter reddit SYLVIVS *lib. 1. Pr. cap. 17. & cap. 50. §. 6. & 7.* hanc; quòd mucus seu pituita intestinorum naturalis à calore vel æstu soluta, attenuata, & fluidior reddita, ex intestinis in vasa lactea penetret, quæ postmodum à superveniente frigore, aut externo, aut ex frigore potus seu haustu frigido, denuò conspissata & incrassata vasa lactea & mesenterii glandulas obstruat & infarciat; unde vasis distentis & ruptis magis, vel minus hydrops subitanus sequatur, prout plures vel pauciores lacteæ hoc modo fuerint affectæ: Vid. in specie SYLVIVS *Tr. de Hydrope*, & LOWERUS *pag. 124.* BARTHOLINUS *Tract. de Vasis lymph. cap. 7.* SIMON HEINRICUS PAULI *Anat. Bils. pag. 85.*

Ascites igitur hic seu hydrops abdominis particularis in specie est collectio aquarum seu colluviei serosæ & aquosæ saltem in abdominis quadam insigniore cavitate, idque subito intra octo ferè dies, nonnunquam intra tres, cum ascites universalis sensim accrescat, manus, pedes & artus omnes cum manibus fiunt flaccidi, molles, & successivè contabescunt, primumque tumor est mollis, post durus. Et non solum in ipso abdomine colligitur aqua; sed etiam in fraduplicaturam peritonæi, cujus exemplum habet JOB *van MECKERN in suis Observat. Chirurg. Belgicè conscriptis*; vel intra cavum omenti; vel saltem lymphæ stagnans intra partium vesiculas membranofas in mesenterio, aut locis vicinis, hydropem talem abdominis repræsentat: quorum modorum apud Præcticos hinc inde leguntur observationes.

Verùm præter vasa lymphatica erosa, & lactea rupta, interdum liquores alii hydropes ascites inferre possunt; Unde in una causa universali quodam asciten vix subsistendum, sed omnes circumstantiæ probe expendendæ: v.g. ex renibus affectis sæpissime hydropes generantur, adeò ut ex solo hoc fonte Hydropicorum aquas deducat HELMONTIUS *Tract. Hydrops Ignotus*, quod scilicet renes non secernentes serum ab ejus in abdomen ex renibus destillatione tandem supervenit Hydrops: Unde notum est, non tantummodò patcam & imminutam urinæ in quam plurimis Hydropicis esse excretionem, & etiam non rarò dissectis Hydropicis ipsos renes tumidos, & vitiosè turgidos esse repositos: sic à renibus turgidis & perforatis, item ex renibus exulceratis, oportum asciten observat PLATERVS *Prax. Tom. 3. pag. 239. & in Obs. pag. 622. 630. & 638.*

Potèrò alia etiam viscera abdominis non rarò etiam dant Tumores ejusmodi & Ascites, utut non semper puros, sed potius aquoso-purulentos. Sic superius ex LINDANO habui exemplum Hydropis ascitis pro natæ uno testiculo, &c. Sic & Hydropem ex testibus muliebribus tumefactis oriri retulit RIVERIVS in *Praxi de Hydrope* BARBETTE in *Anat. Præct. p. 154.* dicit, quod mensibus suppressis interdum superveniat Hydrops ascites, quatenus materia vitiosa & aquosa ex tubulis uterinis in talibus subjectis in duplicaturam peritonæi influit, cujus rei se testem ocularem esse affirmat. Quò etiam scit exemplum proflans in *Observationibus, Culero Anatom. LYSER I annexis, pag. 282.* de Hydrope ex collectione amuræ foetidæ intra cutim & abdominis musculos, ob menses suppressos. Asciten à vesica observavit DODONÆUS *Observat. cap. 34.* atque PLATERVS *Prax. Tom. 3. pag. 244.* & ab uteribus PLATERVS *l. a. 1. uti & BONETTUS Sepulchr. pag. 1075.*

Asciten Particularem à sanguine quod attinet, hujus subito facta suppressio, vel etiam extrinsecus facta in quodam loco contusio, & ita interna cujusdam partis læsio, ibique sanguinis effusio facta congruunt, interdum ad hunc hydropem disponit. E quidem notum est, quòd asserit HEL-

MONTIUS, dum derivat illum hydropem ex renibus, in quibus ac circa quos sanguis congruatus fuerit collectus; sicut etiam observavit hydropem ex congruato sanguine. Interim hoc effectum non est universale, licet interdum vitium sit in rene non ritè emulgente; prostantque alia exempla hoc confirmantia: v. g. ex *suppressione testiculorum*, talem Asciten particularem hic Liphæ observavi, quæ nulla arte potuerunt revocari, copiosissimæ aquæ in Omento continebantur, quia tumor circumscriptus erat circa umbilicum; brevi post, intumescente abdomine in immensam molem, concepit secundà vice, partumque edidit, denuò lochia supprimebantur, unde abdomen magis intumescere, candelæ lumen admodum translucebat, & suffocata ægrâ abdomen spontè rumpebatur, & incredibilis Aquæ copia evacuabatur. Præterea hujus rei se aliud offert exemplum, ubi ex *contusione* extrinsecus in hypochondrio dextro in viro paupere, aliàs sano & robusto, Asciten cum tympanitide particularem observavi; brevem post contusionem, abdomine & seroto tumidis factis, tandem interit. Forsan huc facit LOWERI *experimentum Tr. de Corde, Centur. 2. pag. 125. & 125.* ubi similiter ex sanguinis motu, ex arteriis in venas impedito, Hydrocephalum ortum recessit.

In his Ascitis speciebus Causa Remota est notabile vitium, occurrens aut in chylosi, aut in hæmatosi. Nam materia ista, quæ cum lymphæ simul colligitur, & stagnando tumorem ex oedematoso serosum infert, nihil est aliud, quam chylus crudus, vitio depravatæ hæmatoseos collectus. Hic ergò chylus, aut vitiosus aut sanguini non assimilatus, sero dilutus, ut in inferioribus locis successivè subsistit, ac dum simul lympham inquinat, glandulas ac vasa lymphatica ubique obstruit, unde necessariò & lymphæ stagnatio, & perfectus tandem hydrops supervenit, progrediente successivè malo ulterius, & abdominis superiora petente. Hinc est, quòd nimias hæmorrhagias talis insequatur hydrops: sic observat MEARA in *Exam. Febr. Willisii. pag. 20.* hydropem ex hæmorrhagia nimia: sic SCHENCKIUS *l. 3. Observat.* aliquot observat hydropes ex diuturna & copiosa narium hæmorrhagia; item ex nimio fluxu hæmorrhoidum, & similibus aliis nimis hæmorrhagiis; quia scilicet massa sanguinea nimia excretionem de pauperatur, aut etiam, quando hic hydrops succedit morbis chronicis, per cursum morbi effecta hac reddita definit in naturali fermentatione; unde inepta est chylum ut assimilet, idque eò magis, quòd hic ipse vitio stomachi suggeritur vitiatus.

Hæc est Ascites ordinaria ex lymphæ & sæpius etiam ex chylo crudo, nec non sanguine congruato, collecto orta.

Cæterum præter dictas interdum extraordinariæ & planè singulares ascitis reperiuntur causæ: Sic mirum quòd refert BARTHOLINUS *Cent. 2. Hist. 74.* de Hydrope ascite subitaneo, ex gestatione diuturna oneris gravioris oborto: Item BORELLUS *Cent. 2. Obs. 24.* observat hydropem ex compressione nimia circa os stomachi; sed ut dixi, hæc sunt causæ extraordinariæ. Non possum, quin quæ de ascite particulari habet LINDANUS *super Hartmannum*, proferam: Hydrops, inquit, est duplex: Unus ex causa frigida, altera à causa calida. (Linquimus Lindano has delicias, illumque suo sensu abundare permittimus) Ille, inquit, est ab aquositate & nimia sanguinis dilutione, quia nempe chylus nimis aquosus suppeditatur sanguini, qui in sanguinem bonum converti nequit: Altera species, inquit, est ab intemperie calida, quando sanguis colliguatur & uritur in ichorem acrem, qualis est, qui immediatè post febres ardentes sequitur. Hic posterior, inquit LINDANVS, vocatur Hydrops siccus; (videtur quidem contradictio, sed ab explicatione suppeditata tollitur) prior verò vocatur Hydrops humidus, qualis est, quando omnia marcescunt præter abdomen. Nam, inquit, Queritur hic, quòd sit Hydrops siccus Hippocratis in *Secl. 4. aphor. 11.* Omnes Autores dicunt: hic intelligendum esse hydropem tympanitidem, & sequentem præcessorem Galenum. Ego ex Hippocrate & aliis monstravi, esse intelligendum ascitem, qualis est, quando omnia marcescunt præter abdomen. Nam, inquit, quomodo? Sunt duæ ascitis species. Una est, in qua ab aquis collectis non tantum venter tumet, sed etiam serotum & pedes, ubi interdum pustula aperiantur, & effluit humor, & hæc ordinaria est species: sed præter hanc videbitis & speciem aliam, ubi nullus nempe in seroto tumor, neque etiam in pede, sed in abdomine omnis humor colligitur; pedes autem & reliqua membra contabescunt & marcescunt, ut squa-



mas concipiant. Cetera vix offibus haerent, facies est arida & squalida. Et hic est Hydrops siccus Hippocratis. Dicitur igitur siccus ab illa ariditate, squalore & macie totius, & hydropica aquea sunt lutea, quae expurgantur: In hydropice sicco urinae sunt splendide, instar aquae planae crocae, instar assericorum, sed non habent illam crassitiam, sunt paucissima, & vix 2. vel 3. cochlearia, in ignem effusa ardent. In ascite vero humido urinae sunt albae, pallidae & crude, interdum, ubi renes non sunt affecti, satis copiosae. Hec LINDANUS. Exemplum huiusmodi Ascitis particularis videb. in specie in HOECHSTEDTERO Decad. 10. cas. 7. Obs. 78. Ex quibus patet, hydropem siccum cum appellari, qui fit ex vitio mesenterii, & imprimis vasis lacteis; Hydrops vero humidus, qui fit ex antecedente haemorrhagia, vitioque sanguinis depravate.

Hec de Causis & origine Hydropis ascitis.

Sequuntur Signa: Ascites particularis facile cognoscitur; saltem in eo Medicus sit cautus, ut artificiosa conjectura & consideratione omnium circumstantiarum possit cognoscere, an in cavo peritonei? an in omento, aut utero, aut aliis similibus locis aqua collecta contineatur?

Duobus serè modis inchoat. Primam ejus invasionem praeter signa generalia in hydropice universali supra Section. 17. Cap. 3. Art. 3. recensita, prodit epigastricae regionis tensio continua equidem, quam tamen alimenta assumpta intendunt: malo vero ingravescente aut abdomen successivè intumescit, hinc pedes & lerotum, quando vitium haeret in ruptis vasis lymphaticis vel lacteis abdominis; aut verò frequentissimè inchoat Ascites, ita ut prius pedes intumescant, & hinc tumor successivè ascendat, & abdomen occupet, tandemque perfectum Ascitem inducat. Et quidem, quando pedes intumescunt, ut plurimum non sola Aqua, sed simul materia quaedam crassior ac spissior concurrit, adeo ut non solum tumor serofus & aquosus, sed simul sit tumor edematofus: uti fit, quando in cachecticis vel diuturnis morbis sequitur hydrops: & ita ascendit sensim tumor talis oedematofus; donec abdomen occupet. Superiora è contrà, nisi anasarca adjecta sit, contabescunt, quamvis extrema manuum ob pulsus debiliorem aliquantum inflantur. Ager in latus conversus fluctuationem quandam aquae instat, interdum etiam murmur percipit, intumescente magis latere, in quod incumbit; & quò magis intumescit abdomen in Ascite, eò magis contabescunt partes superiores, nisi quòd interdum ad extremum, ut modò dixi, etiam manus inflentur & tumescant.

Supervenit tandem difficultas respirandi admodum molesta, praetermisit ab alimentis assumptis, propter diaphragmatis liberum impedimentum motum, imò interdum orthopnoea, ita ut aeger non, nisi corpore erecto, quiescere queat. Platerus in observ. dicit, quod dyspnoea nocturna praenunciet hydropem ascitem; in ipsa verò Ascite sit dyspnoea continua.

Interdum & sit est admodum intensa, idque tunc imprimis, quando vitio mesenterii ruptis lacteis sit hydrops ascites: interdum sit est parva, quando massa sanguinea ex vitata haematofia est gravata copiosis succis crudis, (non enim omnes Hydropici siccunt) Tussis etiam sicca supervenit, aut, quae in principio adsuit, notabiliter augeatur.

Ad hac attentus sit Medicus, ne confundat ascitem particularem cum graviditate: nam quòd interdum cum hac confundatur, patet ex exemplis; sicuti hic novi Medicum, & etiam Halæ Saxonium, qui gravidas pro Hydropicis curaverunt. Siquidem & mulieribus gravidis subinde copiosae aquae intra uterum colliguntur, in quibus natus foetus; sicut etiam huiusmodi nunc ante hunc post medium gestationis tempus crocra non raro tumescere assolent, idque tamdiu, donec superveniente partu mediantibus lochiis successivè subsistant. Ne ergò fallamur, nec sanè & arti detrimentum conciliemus, probe observentur signa quaedam distinctiva, quae inter optima sunt, quae proponit LINDANUS, qui dicit; quòd hydrops discernatur à graviditate

1. Ex colore faciei vivido & bene habito, qualem in specie in gravidis, & ceteris paribus sanis, magis floridus, vividus, Hydropici verò male se habeant, sint ut plurimum pallidi, colore livido.

2. Distinguuntur invicem ex tumoris specie: siquidem in gravidis tumor abdominis magis ad praecordia & sursum versus prominat, latera autem sunt caeva, estque inaequalis, nisi, quòd tamen raro, gerat gemellos; tunc enim etiam lumbi sunt distenti; & in specie tumor magis ad umbilicum & supra umbilicum exsurgit primo gestationis tempore, sicuti

ultimo versus inferiora: Eò contra in Hydropicis totum abdomen, etiam latera & lumbi, tumidi sunt, & magis inferiùs acuminatam tumorem post medium gestationis tempus.

3. Si motus percipitur aliquis, nempe foetus, graviditatis praesumptio patet.

4. Denique certum & optimum signum est fluctuatio; sic nempe interdum Hydropici, quando se movent & jectigant, percipiunt aliquam fluctuationem in cavitate corporis, quae deest in graviditate. Interim tamen fluctuatio non semper hydropem abdominis comitatur: quando enim membrana peritonaei ex spasmò est distensa sine fluctuatione, solent ibidem aquae contineri.

5. Oculi in gravidis, utur ipsae male se habeant, ut plurimum tamen solent esse fulgidi & clari: In Hydropicis verò nitor oculorum perit, ipsique oculi apparent quasi cornei, lividi, & sic porro. Vel si hydrops est siccus, oculi interdum apparent ignei seu fulgidi.

6. Porro urinae in gravidis non sunt aquae coloris, ut in hydropice.

7. Hydrops admodum naturam seu membrum genitale mulierum premit, quòd non fit in gestatione foetus.

8. In hydropice, quò se convertunt, eò dilabitur aqua, & tumor; quòd non fit aequè in graviditate.

9. In hydropice menses interdum aquosè fluunt; in gravidis non, aut rariùs.

10. In hydropice languet appetitus; in gestatione verò non est prostratus appetitus, sed optime vorant non raro.

Plura signa prognostica distinctiva supra, ubi de Ascite universali egimus, videri possunt. Quibus probe observatis, vix fallere potest Medicum hydrops.

## PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: levior & minus periculosa est Ascites particularis, quam universalis, & facillime curatur, modò maturè cura instituat, ne occasione retentae collicui aquosae viscera interiora abdominis inficiantur, & ad sui corruptelam disponantur; tunc enim per accidens lethalis fieri potest ascites.

Ascites anasarcae superventens melioris spei habetur, quam si sit solitarius fuerit, id est, propter tumores viscerum abdominis, v. g. hepatis aut lienis, aut propter vasa lactea, & lymphatica rupta contigerit; eum prioris affectus causa continens & procacitica saepe tollatur aut imminuatur, posterioris verò utraque difficulter admodum aut ut plurimum incurabilis existat, aut licet curatus semel, tamen subinde denud renascitur, & talis hydrops curatus denud renascens lethalis est, uti habet HIPPOCRATES in Observ. Coctis, item DEODATUS in Valetudin. pag. 160.

In hydropice post cachexiam & similes morbos diuturnos deiectionem nigram lethalem pronunciat PLATERUS lib. 3. Observat. pag. 670.

Hydrops ex perverso Purgantium usu admodum periculosa est, quia haec admodum inquinant massam sanguineam, uti hoc habet POTERIUS Cent. 2. cap. 29.

Hydrops post febrem leviolem ortus non est adeo periculosus, nec adeo curatu difficilis, quam qui à se ipso invadit.

HIPPOCRATES aphor. 43. Sect. 6. hanc habet observationem: Qui lienosi dysenteriam corripiuntur, iis dysenteria diutius durante Hydrops aut lenteria supervenit, & moriuntur. Expositionem huius Aphorismi habet SENNETUS lib. 3. Prax. cap. de Hydropice, quae satis est accurata.

Porro, quantò minor urinae copia excernitur, tantò deterior est hydrops, quia serum copiosum augmentatur; Unde etiam dicit CELSUS: tunc demum in hydropice secundam valetudinem sperandam esse, cum plus per urinam excernitur, quam fuit assumptum per os. Nam optime Hydropici curantur per diuretica.

Hydropi superveniens tussis, malum, inquit HIPPOCRATES Sect. 6. aphor. 35. Sect. 7. aphor. 47. & M. A. N. C. Ann. 4. & 5. Observat. 148. p. 163.

Abcessus vel maculae in cruribus erumpentes lethales sunt, observante etiam hoc HIPPOCRATE in Epi. demicis.

Hydrops, qui oritur à partium vinarum, renum, ureterum, vesicae, &c. rupeura aut exulceratione, ut plurimum



simum lethalis est, nisi partes hæc celerius coalescant, aut urina per ulcus abdominis effluat.

Si Asciticorum aqua à propinatis medicamentis copiose & cum euphoria evacuetur, ac venter detumescat, aliqua curationis spes est; sin verò medicamenta hæc nihil aut parum evacuent, sed viscera inde irritata cum abdomine magis intumescunt, omnino desperandum erit.

Iste Ascites particularis, in quo aquæ intra corpus membranofum, omentum, peritonæum, uterum &c. collectæ, cum eo ægri plures annos, cæteris paribus, sani manere possunt.

Tumores ferosi artuum particulares vix, nisi alii supervenientibus morbis, lethalityatem inferunt, utut eorum unus altero difficilius, vel ratione causæ, vel aliarum circumstantiarum, sanetur.

Tandem viscerum interiorum hydrops nunquam periculo vacat, sed ut plurimum funestus existit.

Hæc de Signis Diagnosticis & Prognosticis in genere & in specie. Ubi adhuc observetur: in cognitione Ascitis maximam haberi rationem causarum antecedentium, in quibus legitime cognoscendis curæ totius curæ consistit. Et hoc est, quod reddit Medicum eruditum, nempe iudicii vis in cognoscendo affectu & causis; & hinc in Medico præferrem iudicium memoriæ.

Habuius Theoriam Hydropis in genere & in specie, superest Praxis.

### C U R A.

In Cura ascitis hujus particularis attendendum est:

1. Ut aquositates collectæ, quantum fieri potest, evacuentur per vias, per quas evacuatio commodè, & cum majori ægri euphoria fieri potest.
2. In vasis lymphaticis & lacteis factæ obstructions solvantur, vel erosiones illorum consolidentur, ut & sanguis grumofus, si adeo, maturè dissolvatur.

Præcipue fit per Purgantia, hinc, utut raro, sudorifera, & speciatim Diuretica; omnium optimè per abdominis paracentesim, modernorum more cum acu argentea faciendam, de qua vid. BARBETTE in Chirurg. Utilissima & tutissima est hæc operatio, præsertim in hac hydropsis specie, modò maturè instituatur, antequam colluvies excrementitia diuturna retentione corrumpatur, & partes contentas solidas inquinet; unde etiam umbilicus spontè apertus talem hydropem curat. Posterius fit per salia diuretica, vel volatilia vel fixa, v.g. arcanum duplicatū Myrsichitii. Sudor vix in alio hydropse quam in hydropse universali seu anasarca convenit. Simul tamen etiam causarum antecedentium habenda est ratio, &que variaz, prout scilicet eadem sunt diversæ; ut plurimum tamen mucus viscidus vasa lymphatica obstruens, & lympham incrassans, incidendus, dissolvendus, & fluxilis reddendus. Ulterius promoveatur consolidatio, quæ spontè succedit, quia talia vasa, quæ rose spermatico chylifero nutriuntur, sunt glutinosa, & spontè coeunt. Sed in specie, quoad hanc medendi methodum, vid. SYLVIVS l. 1. Prax. cap. 17. cum quo conf. SENNERTUS. Quod si vitium sanguinis congruati, aut alia ex causa collecti, morbum intulerit, per appropriata naturæ succurrendum, de quibus jam supra.

Remedia, quæ huic scopo satisfaciunt, ubertim nota, sunt ex Ascite universali; Hinc enim ex Purgantibus convenit Elaterium: c. g.

24. Extr. elater. gr. xv.  
Res. jalapp. gr. v.  
Extr. troch. alband. gr. j.  
Olei destillat. bacc. junip. gutt. ij.  
cum f. q. Malvat. iunip. f. pilulæ. D. S.  
Pilulæ purgantes.

24. Succ. Ircos nostr. per resid. depur. 36. vel 3vi.  
ad 3i.

Aqua cinnam. 3ij.

Syr. violar. 36.

M. D. S.

Succus purgans pro una vice.

24. Aqua fragor. 3j.

Pulv. jalapp. 3j.

Tartari vitriolat 36.

Syrup. rosar. solut. 36.

M. S.

Potio purgans pro una vice.

Ex diureticis; sal genistæ, stipitum fabarum, spiritus tar-

tari volatilis eminent; in specie in hydropse seu ascite particulari nitrum & omnia Nitrata sunt optima in tali casu, imprimis quando post febrem vel in febre ascitæ talis supervenit subito, optimum tunc est nitrum crudum probè depuratum, in potu quotidie assumitur in magna dosi ad 36.

Ex sudoriferis verò volatilia quæcunque in juncta tympanitide. Præ cæteris spiritus nitri dulcis, & hinc spiritus carminativus de tribus, miræ sunt efficaciz: BORELLUS Cent. 4. Observ. 16. sanguinis humani Elixyre Hydropicos biscuravit desperatos & conclamatos intra tres dies, 36. quilibet vice propinando per tres vices.

Quoad externa: habuimus hæc supra in Hydropse Universali.

Fit etiam mentio apud Practicos Hydropis per colliquefactionem, seu in quo sanguis in liquamina serosa fatiscit, de quo jam superius ex LINDANO quædam allegavi. Et est ille hydrops, qui v. gr. febres ardentes immediatè sequitur, in quo extrema gracilescunt, abdomen contra intumescit. Talem hydropem nomine hydropis sicci ab HIPPOCRATE lib. 4. Aphor. 11. insinuari asserunt. Rarus est hic hydrops, & in eo curando observandum, quod nulla Purgatione conducant, sed uno & simplici remedio, nempe nitro probè depurato, tales Hydropici curandi sunt, dando nempe quotidie solum nitrum in vino Ribuano, ita ut quotidie nitri 36. abstineatur, idque per 24. horas, nempe non simul & semel, sed partitis vicibus; & quoties aliquid bibunt, nitri puratissimi 3j. addi debet, & nil præterea agendum. A purgatione abstinendum: quantò enim magis expurgabis, tantò magis mox intumescunt, & lotia eò magis indies splendescunt & inflammantur, sicuti in diabete. Temperandus est sanguis nitro; hoc enim sedat sitim, temperat astum, & ciet urinam. Et quando hæc in tali hydropse post nitri usum non amplius splendent, signum est propemodum superari mali, & æger in declinatione morbi est constitutus, tuncque oportet dare bonum aliquod conditum corroborans & confortans. Vid. LINDANUS.

Absolvimus Praxin ascitis in specie, pergo ad

### A R T I C U L U M I I I.

#### D E

### H Y D R O C E P H A L O.

Inter Hydropes particulares eminet in specie post ascitem Hydrocephalus seu Hydrops capitis, quando nempe colligitur aqua in sphaera capitis. Interim Hydrocephalus hio ratione subjecti immediati, in quo colligitur aqua, ordinatio solet esse triplex:

1. Prima species est, quando aqua colligitur intra partes cutaneas & cranium.
2. Quando aqua colligitur intra cranium & ipsum cerebrum, sive sit supra sive infra meninges, in specie duram.
3. Tertia species est, quando aqua colligitur in ipso cerebro, speciatim in ventriculis cerebri, nimia copia cerebrum & ipsam calvariam distendens, & ita Hydrocephalum inferens.

Priorum Hydrocephalorum exempla sunt frequentiora; varia autem ista quæ Hydrocephalum internum talem demonstrant, utut hujus primus mentionem fecerit VESALIUS de structura Corp. Hum. lib. 1. cap. 8. de puella, in qua cerebrum à collectis aquis omnimodè excavatum, & singulariter distentum fuit. Præter hunc simile exemplum refertur à TULPIO lib. 1. Observat. cap. 24. item cap. 25. de puero quinquenni, Hydrocephalo mortuo, in quo 36. v. aquæ in capite inventæ sunt. Cerebrum autem amissa figura globosa, induit figuram convexi forniciis, & ab exuberante aqua adeo fuit distenta medulla ipsius cerebri, ut instar membranz crassiusculæ adheresceret cranio, manentibus tamen semper salvis operibus naturæ: Id quod sit, sive in utroque ventriculo seu latere colligantur aquæ, sive in alterutra saltem medietate cerebri aquarum Hydrocephali collectio fiat; cujus exemplum videb. in TULPIO Cent. 2. Obs. 25. Hydrocephali nempe dimidiati capitis, in cujus cerebri altero ventriculo ultra 36. ij. aquarum tam stricte inclusa fuerunt, ut altera cerebri pars planè illæsa & integra perlisteret. Illustrat verò hoc NICOLAUS STENO in Anat. capitis vitulini hydrocephalici instituta: vid. BARTHOLINUM At. Med. Haffn. Volum. I. pag. 249. & seq. Cæterum infantes huic Hydrocephalo imprimis sunt obno-



pii, quia in illis ossa capitis teneriora, quæ non sunt futuris firmiter juncta, facilius hifcunt, & ob molliem talem obsequentiora facilius distenduntur, unde aquis successive colligendis cedunt. Aliàs raro observatur Hydrocephalus internus in adultis, in quibus propter ossium cranii firmiter compagem futuræ discedere nequeunt, adeo ut potius alios morbos aquæ in cerebro collectæ inferant. Non tamen penitus defunt: vid. HILDANUS *Cent. 3. Observat. 48.* Nam puellam hydrocephalam notat PANAROLLUS *Pens. 5. Obs. 74.* septimo anno pereuntem, in qua aqua partim per quasdam suturas dilatatas, partim per cranium perforatum egressa erat: ut externè extra cranium partes in adultis intumescere posse in hydrocephalo extra dubium sit: Sic PISO in eleganti Scripto de *Colluvie serosa* notat Hydrocephalum in puella 22. annorum semel atque iterum periodicè recurrentem: ZACUTUS LUSITANUS *lib. 3. Prax. Admirand. Obs. 12.* stupendum refert Hydrocephalum curatum in viro, cujus caput bovis æquavit. In infantibus etiam interdum vitiatum in utero materno situm (quando embryo nimis citò se vertit) ad Hydrocephalum disponit, quando nempe infantes cum capite diutius ossi pubis insident, in quo posito interdum ad aliquot septimanas observantur; Ex hac enim occasione interdum in ipso utero matris, ex impedito lymphæ reditu, in capite infantis collectæ aquæ Hydrocephalum inferunt, qui propter molem capitis necessariò patrum difficilem efficit: quam causam urget PLACENTINUS in *Obs.* sicut talia exempla duo observata fuerunt Uratislaviæ. Aliàs *imaginatio materna*, quoque signando fœtum, Hydrocephalum infert, teste HILDANO *Cent. 5. Obs. 2.* ut etiam MARCELLUS DONATUS *Hist. Med. Mirabil. refert lib. 2. cap. 1.* quod ipsum gravissimum est malum, quando Hydrocephalo laborant infantes, dum adhuc in utero matris constituti sunt.

## C A U S Æ.

*Causam proximam* quod attinet: solet esse lymphæ stagnatio in præfatis locis, propter ejusdem naturalem distributionem impeditam, ex obstructione vasorum lymphaticorum, nunc extra, nunc intra cranium oriunda. Adeoque hic ad lymphæ ductus respiciendum est, ut non tantum vult PAULI in *Anat. anatomie Bilisane pag. 85.* sed vel maxime confirmat HEERTODT in *Crocolog. pag. 282.* de puero, Hydrocephalo mortuo, in quo vasa lymphatica cerebri partim turgida, partim rupta visa. Interdum præter aquas solas etiam flatus simul colligi solent, qui cum aqua caput distendentes tumore hydrocephali insigniter augent: sed raro oriuntur tales Hydrocephali. Interdum per artem agyrtæ inducunt Hydrocephalum artificiosum per insufflationem aquæ juxta nucham intra cranium & cutem capitis.

## D I A G N O S I S.

*Signa Hydrocephali* sunt satis manifesta, quia *conditiones & circumstantiæ tumoris* facile rem innuunt, ac vel visui vel tactui malum patet.

Discernendum autem imprimis: an flatus, an verò humor solus tumorem Hydrocephali inferant? si enim flatulentia seu flatus peccant, nunc solum, nunc conjunctè cum aqua, solet adesse insignis cutis distensio, ut caput leviter pulsatum instar tympani cujusdam resonet: Deinde si digito prematur tumor, aut non recedit, aut si recedat non nihil, ad pristinum tamen statum illiò redit. Si verò est ab humore solo, & quidem extra cranium collecto, cognosci potest ex conditione tumoris; videtur enim cutis mollior, caput quasi implendescens observatur, à candela admodum translucet, percussum nullum edit sonum, & faciliè digito prementi cedit, nec statim ad statum pristinum revertitur.

Quod si verò intra cranium & cerebrum contineatur aqua, tumor non est ad tactum adeò mollis, nisi valida fiat compressio, obstantibus nempe ossibus; in specie frontis quasi extra protrusus est, palpebrarum tumor, oculi tumidi extra orbitas quasi prominere videntur, seu vix intra orbitas retinentur; simul etiam frequenter lachrymantur, concurrunt insignis omnium sensuum hebetudo, & ad somnolentiam inclinatio, cum dolore capitis tensivo.

Quibus successu temporis tam in infantibus, quàm interdum in adultis, accedit capitis intumescencia ac moles reliquo corpori minus proportionata, & sæpè vix credibilis, quale exemplum HILDANUS *Cent. 1. Observ. 10.* recenset.

*Estmull. Oper. Tom. II.*

His absentibus circumstantiis; tumente nihilominus insigniter capite, suspicio est, in cerebri ventriculis radices egisse Hydrocephalum.

## P R O G N O S I S.

Quoad *Prognosin*: difficile est malum & periculosum, minustamen periculosus est Hydrocephalus externus seu supra cranium, & faciliè curatur. Internus verò; seu intra cerebrum, periculosus est, & plerumque malum incurabile, quia superveniente lethargo, aut apoplexia, aliisque gravissimis affectibus, ægri moriuntur. Intra cranium & cerebrum collectæ aquæ subindè, utut raro & difficulter, curari solent.

## C U R A.

## In Cura

1. Ante omnia aqua sunt evacuanda.
2. Caput accerebrum aromaticis volatilibus appropriatis roboranda.

Quoad Evacuantia: hæc sunt vel interna, sensibilibus id exhaustientia; vel externa, insensibiliter discutientia; vel Media Chirurgica, secta cute humori vias patefacientia.

Interna ergo, quæ evacuant, sunt omnia Hydragoga dicta, in Hydrope quocunque usitata, quæ pro robore subiecti patientis determinanda, & præsertim in infantibus, in quibus saltem mitiora & temperata usurpantur: e.g. *Mercur. dulcis* gr. vi. cum *syrupo rosarum solutivo* aut *syrupo de Rhabbarbo*, aut de *spina cervina*, aut *manna*, cui tantillum succi & syrapi ireos nostratis admixtum est; Item prodest blandum Infusum & Syrupus ex mediano cortice sambuci; sicuti adultis generosiora Laxativa, & eadem quæ in ascite in usu sunt, conveniunt, v.g. *Elaterium*, vel post hoc *succus radicis ireos recens*, &c. Clysteres etiam tam infantibus quàm adultis mirè conducunt: sed in sint acres & fortiter stimulant, v.g. ex radice bryoniæ, ireos, soldanella, gratioli, cortice sambuci, & similibus. Sic D. MICHAELIS aliquando famulum cujusdam mercatoris hujus loci Hydrocephalo laborantem clysmatibus factis ex fortiter stimulantibus, & aquas potenter evacuantibus, restituit. Laboraverat autem antea hydrope in partibus inferioribus, quo soluto tumor quasi ad caput raptus fuit, ita ut non tantum cutim valdè distenderet, sed & oculos ex cavernulis foras protruderet, quin & organa aliorum sensuum laderet, & idem bruti ad instar in lecto jaceret: Sed jussu D. MICHAELIS clysmasequens applicabatur:

24. *Herb. soldanell.*  
*Gratiol.*  
*Fol. ebuli,*  
*Asari an. Mß.*  
*Fol. sambuc.*  
*Genist.*  
*Persicor. an. p. ii.*  
*Cortic. inter. samb.*  
*Frangul. an. 3ß.*  
*Rad. ireos nostras.*  
*Bryon.*  
*Esula an. 3iil.*  
*Pulp. colocynth. 3i.*

In urina pueri coquebatur; quo applicato, factis simul aliis faciendis, sanitati restitutus fuit.

In infantibus Clysteres blandiores Inticiendi sunt. Cum his simul internè vel tinctura tartari infantibus ad guttas x. commodè propinatur pro stimulanda urina; aut spiritus tartari volatilis; & quæcunque volatilia ex tartaro propter vim diureticam & penetrantem ad promovendum urinæ fluxum commodè misceri possunt; sicuti etiam spiritus Paracelsi ad Hydrocephalum ex tartaro, vitriolo & radice vincetoxici, (vid. HARMANNUS) tanquam universale remedium, egregius est in Hydrocephalo, quem egregiè commendat POTERIUS *Cent. 1. Observ. 2. cap. 13.*

Cæterum cum his internis simul usurpanda sunt Externa, eaque primariò Discutientia, & Tumorem insensibiliter resolventia, vel sensibilibus Evacuantis. Inter illa sunt Cataplasmata & Fomenta ex aromaticis discutientibus, facta ex chamomilla, meliloto, artemisia, stachade Arabica, calamintha montana, roremarino, absinthio, origano, pulegio, cumino, serpillio & similibus: quibus farina fabarum, farina lupinorum, sterus columbinum, caprillum, semen anisi & cumini, ac similia, commodè addi possunt.

R r

Con-



Convenient etiam olea discutientia, ut oleum chamomillæ, oleum anethinum, oleum laurinum, & similia. Hinc usu expertum est præstans pleum seu linimentum FORESTI lib. 3. Chirurg. Obs. 7.

24. Olei chamom. vulg. 3iv.

Sulphuris pulveris 3i.

Probè invicem mixtis, & digestionè unitis, constituunt Linimentum.

Hoc diu continuatum externè illitum, insensibiliter emollit & discutit Hydrocephalum: cui si addantur aliquot gutta vel 3i. olei destillati cumini, vel succini; vel aliis Unguentis addatur Balsamus sulphuris terebinthinatus aut unguentus, erit unguentum eò penetrantius. Imò nullum est dubium, quin ipsum balsamum sulphuris vulgare terebinthinatum, aut, hoc nobilius, anisatum, blandâ manu illitum, potentius sit Hydrocephali discussivum. Tandem AVICENNÆ & RODERICI à CASTRO remedium sunt cochleæ recentes in decocto quodam cephalico, e.g. stœchados Arabicæ, calaminthæ montanæ, &c. confusæ, & in forma Cataplasmatidis capiti applicatæ; quod & ipsum remedium modernorum experientiâ compertum est, & in seroti tumore aliis mirabile est; item cataplasma ex cochleis contusis cum pulvere stercoris caprilli & seminis carvi. Conf. etiam M. A. N. C. Ann. 4. Append. pag. 46. Tandem quoque foris ex lixivio calcis vivæ egregium admodum est in discutiendo Hydrocephalo, & quibuscumq; tumoribus serosis in partibus externis, quo feliciter in puerorum Hydrocephalo AQUAPENDENS usus fuit, & vix similem sibi habet. Facit huc illa historia, quæ prostat in Observationibus Cætro Anatomico LYSERI annexis, ubi prostat hydrops vulvæ in ancilla quadam, curatus simpliciter per lixivium calcis vivæ; unde etiam in Hydrocephalo lixivium hoc est egregium, & meritò à SENNERTO commendatum remedium; nuncquidem illud simpliciter & solum adhibitur; nunc verò, si in eo priùs ebulliat sulphur & nitrum, quo decocto percolato caput foveatur, ut dispareat tumor. Quin & huc aquæ calcis vivæ quædam aromatica cephalica, ut rosmarinus, &c. infundantur, & fomentum magis appropriatum reddi potest. Denique essentia rosis marini, salvia, hyperici, & pro externo litu crebrius repetendò, ad discutiendas aquas à quibusdam adhibentur. FORESTUS in loco supra cit. pueris recensentis Hydrocephalo correptis solâ olei hyperici continuâ inunctione, addito pulvere Myrtillorum; auxilium attulit.

Hæc insensibiliter discutientibus, & similibus remediis irritis, ad Sectionem Chirurgicam, ut sensibiliter evacuentur aquæ, accedendum erit; idque in specie in Hydrocephalo externo: id quod præstat imprimis sectio, quæ fit in loco tumoris maximè eminente, nunc per figuram crucis, nunc literæ V, nunc literæ H, de qua variè hinc inde in Chirurgis, in specie HILDANO Cent. 3. Observat. 17. annotata videntur, qui consulendi. In interno verò, qui cerebri ventriculos occupat, & hinc exteròrum plùs minus fertur, periculosissima est, teste HILDANO l. 4. ubi observat, & experimentis testatur, non semper sine periculosis Hydrocephali sectionem, quia metus gangrænæ, aut etiam mors superveniat. Qui verò destituta cranium, & cerebrum, non nisi cautè, & perquam circumspèctâ sectione, tractandus venit, observando cautelam, ut unicâ vice nimium exauriatur. Conf. hic MARCUS AURELIUS SEVERINUS in lib. de Efficacia Medicina.

## ARTICULUS IV.

### DE

## HYDROPE PECTORIS.

**P**Ræter caput, ut dixi, interdum etiam, sed rarò, Hydrops Pectoris observatur, quando nempe in cavo pectoris fluctuat aqua, vel lympa plùs minus copiosa, eaque hydropeum infert. Affectus quidem hic non semper est obvijs, interim tamen hinc inde apud Practicos hujus Observationes prostant, in specie multa hujus exempla egregia & curiosa observavit PISO Tract. de Colluvie serosa: Conferatur etiam WILLISIUS Pharm. Ration. Volum. 2. Sect. 1. cap. 12.

Hydrops huius Pectoris particularis Causa sunt eadem cum aliis hydropis speciebus. Nempe nunc vitium est in vasis lymphaticis & lacteis, per quæ, impedito lymphæ motu, huius ex vasis ruptis ac exesis effusio in thoracem, & hinc collectio, supervenit; unde frequenter ex hydatidibus in pulmone observatis Hydrops Pectoris natus fuit; Vid. BARTHOLINUS Cent. 2. Hst. 66. Nam & hic lactea, pariter & lymphatica pulmonum, tamque ad pericardium tendunt, quàm furculos quosdam ductus subinde primariò considerandose esse, non saltim confirmatur à BARTHOLINO Cent. 1. Epist. pag. 327. sed etiam imprimis à WILLISIO Pharm. Rat. Vol. 2. pag. 261. Vel vitium est in massa sanguinea, quando v.g. simul cum hydrope universali, vel cum hydrope omnium partium inferiorum, simul etiam conjungitur superveniens Hydrops Pectoris: quin etiam ad majorem lymphæ copiam & hydropis incrementum multum conferat habitus corporis magis vel minus cachecticus, ut & vitium renum, & aliæ causæ in hydrope universali observabiles, nullum est dubium. Curiosa & singularis observatio hoc in puncto est MEARÆ in suis Historiis Medicis Rarioribus pag. 153. Hydrops nempe Pectoris ex discussa Hydrocele oborti. Sanè jam olim LAVRENTIVS in sua Anatomia observat singularem quendam consensum pulmonum & pectoris cum testibus, adeò ut ipse notaverit à tussi diuturna & vehemente ortam hydrocele; unde hæc controversiam de consensu pulmonum & testium decidit l. 1. lib. 7. Quæst. 5. pag. 532. Aqua hæc in Hydrope Pectoris nunc in utraque thoracis parte, nunc, utut rariùs, in altera ejus medietate hærerè observatur.

## DIAGNOSIS.

Quoad Signa Hydropis Pectoris: percipitur in hoc ut plurimum in cavo thoracis dolor gravans ob materiæ aquosæ abundantiam, & plerumque illud cum empyemate commune signum, nempe aquæ fluctuantis sonitus obscurus in imo pectoris, dum æger corpus movet: Quæ tamen materia fluctuans in hoc à pure distinguitur, quod hoc inflammatio præcedat, illam verò non: hoc quoque brevius; illa diutius ut plurimum, observatur. Cum empyemate hoc quoque commune hydropis pectoris habet, quod ab epithematum, aut Cataplasmatum calidorum applicatione angustia pectoris intendatur, uti WILLISIVS Pharm. Ras. T. 2. p. 335. confirmat; quæ tamen angustia hydropis ab empyemate per signa jam recensita distingui possunt.

Tussis est sicca, cum nil externi queat, respiratio difficilis & frequens, subinde urget orthopnæa (quod signum pathognomonicum cum PISONE de Morbis ex colluvie serosa lib. 1. Sect. 3. cap. 7. RIVERIUS Praxi lib. 7. cap. 5. refert,) ita ut ægri non possint decumbendo respirare, & imprimis vesperti ac noctu, ut & primo morbi tempore intendi, post mediàm verò noctem denuò remitti observatur: Vid. BARTHOLINUS Ast. Med. Hassniens, Vol. 2. pag. 298. quin etiam, dum in somnium inclinant, subitaneo quasi terrore correpti denuò evigilant.

Pathemata hæc nunc in toto pectore, quando totum ejus cavum impletur, tunc in altera saltem medietate, percipiuntur.

Interim rumor pedum supervenit, & si tumor cessat, mors: Appetitus posternitur, inde rumor pedum & palpitatio cordis supervenit, & imprimis, quando corpus anteriora versus movetur, angustias insignes præcordiorum percipiunt, subinde quoque febricula accedit: vid. in specie PISO c. l.

Tandem his interdum jungitur unius vel alterius brachii dolor atque debilitas seu resolutio, cujus phænomeni causas idem PISO l. 4. pag. 293. & 297. explicare conatur.

## PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Hydrops Pectoris & pulmonum, quia non, nisi à ruptis vasis lymphaticis ac viscerum hujus ventris induratione dependet, organa vitalia & respiratoria immediate afficit, periculosior est ascite; imò brevius suffocat, præprimis cum pulmones cordi agglutinet, & polypum cordis, vel ut causam, vel ut productum morbosum, commitem habeat. Hinc grave & periculosum malum est, & rarò felix & faustum, quin sæpius ad mortem deducit ægros.



Et licet idem affectus, siue medicamentis quibusdam curatus fuerit, siue post apertionem thoracis æger levamen senserit, non tamen est adeo diuturna allevatio, quin recidivante malo ægri suffocati intereant: vid. TULPIUS lib. 2. *Observ.* 16. RIVERIUS *Cent.* 1. *Obs.* 88. & SALMUTH *Cent.* 2. *Obs.* 4 & 16. nisi saltem laceratis valis lymphaticis minoribus, ac visceribus integris contingat, & materia peccans per ulcus thoracis sensim effluat, qualem observationem WILLISIUS *Pharm. Ration. P.* 2. *Seß.* 1. *cap.* 13. perhibet.

At magis lethalis est Hydrops Pectoris, qui anasarca aut ascitis supervenit.

## C U R A.

In Cura facillimæ sunt Indicationes, & ante omnia evacuandæ & resolvendæ sunt aquæ, & firmandæ seu roborandæ partes interiores pectoris.

Pro evacuatione conveniunt eadem, quæ in ascite, tam Pharmaceutica quàm Chirurgica. Quoad Pharmaceutica evacuatur aqua per Purgantia, Diuretica, & imprimis per Sudorifera. Pro scopo purgante conveniunt ea,

qua in Ascite universali & particulari curando fuerunt laudata; imprimis succus bryoniæ, & hinc succus ireos nostratis laudari solet; vid. HARTMANNUS in *Prax. Chym.* RIVERIUS cum succo bryoniæ curavit aliquot Hydropses Pectoris, nec non calomelano suo, i. e. Mercurio dulci & scammonio sulphurato mistis: vid. *Centur.* 4. *Observat.* 3. *Conf.* 19. WILLISIUS c. 1. pag. 269. Possunt etiam diætæ aquæ per sudorem aut urinam, quantum fieri potest, evacuari; hinc ea quæ sudorem movent, sunt optima; sic enim beneficio decocti sudoriferi in sene Hydropem Pectoris curavit RIVERIUS *Cent.* 4. *Obs.* 71.

Quoad media Chirurgica: omnium optima est paracetes thoracis, quæ maxime salutaris, simillima isti, quæ debet institui pro evacuatione empyematis. Et hæc quidem operatio est facilis, tuta, & sine ullo periculo; de qua vid. WILLISII *Pharm. Ration. Volum.* 2. pag. 163. ubi de sanguinis sputo.

Et hæc de Hydropsis speciebus. Hydrocele & hydrops uterini ad sexuum affectus pertinent; Tumores partium externarum ad Chirurgiam.

Pergo ad

S E C T I O N E M XXII.  
D ESANGVINIS MOTU AD CORPORIS CIRCUMFERENTIAM,  
FACTAQVE IBIDEM INSENSIBILI TRANSPARATIONE.

Cutis nostra est rete seu nassa, extriplici minutissimorum vasculorum capillarum seu fibrarum genere tanquam tot filamentis, artificiosè constructa, ex vasculis nempe capillaribus, venarum, articularum, & in specie filamentis nervorum, ex quibus contextitur nassa cutis. Spatiola intermedia replent glandulæ parvæ excretoriis suis valis, exteriora versus spectantibus, instructæ, quæ poros cutis constituere videntur: Videatur STENO *Tract. Myologia specim.* ubi in piscis *Anatome*; item MALPIGHIIUS *Tract. de externo Tactus organo* p. 32. & 39. BARTHOLOINUS *Cent.* 3. *Epist.* 65. 67. & 97. PÉCHLINUS tandem de *Purgantibus*, & in *Collegio nostro Institut. Part.* 1. c. 16. pag. 100. Cutis est naturæ tendinosa: In cute propterea videntur transversum fibræ.

Glandulæ hæc conglomeratæ ex sanguine vasorum capillarum emulgent copiosè partem ejus aqueam, salibus oleosis superfluis acido-salis, aliisque particulis inutilibus imprægnatam, quæ ipsa sub forma halituum per se invisibilem per vascula excretoria expirat, adjuvante non parùm calore, tam ipsius corporis expirantis, quàm corporis ambientis, & insensibilis Transpiratio appellatur; cujus insignem copiam, simulque pro varietate circumstantiarum varietatem, & consequenter summam necessitatem, videb. in SANCTORII *Medicina statica*, & *suprà Seß.* 17. ubi de *Nutritioe*.

In materia hac insensibiliter transpirante considerandum est & continens & contentum. Continens est latex sanguinis aquosus. Contentum verò sunt partes sanguinis inutiles, id est, tam superflue, quàm diuturniori cum sanguine circuitu effecitæ factæ, quæ sufficienter pro omnimoda transpiratione, adjuvante simul inspiratione, attenuatæ & volatilizatæ, salinæ volatiles oleosæ, quæ istum liquorem imprægnant. Hujus maxima pars, uti cum urina sanguinis ablegatur, ita residua portio in sanguine à sero ejus dissoluta, dum cum eo circulator per partes continentes seu solidas, sapore suo salso instar saponis abstergit & abluit nutrimentum harum roridum, non perfecte post cessantem accretionem assimilatum aut coagulatum, (Vid. *Seß.* 17. de *Nutritioe*, & *cap.* 3. *Prolegom. Artic.* 2. ubi de sudore) sed jam diuturniore morâ inutile aut quodammodo excrementitium redditum. Hoc ergo simul abstergit, ne aliquid sordium à nutritione remaneat, secundariò insensibiliter simul exhalat. TACHENIUS in *Hippocrate Chymico* sal volatile ex halitu insensibili facit ex indusis lixivio maceratis, lixivium absorbet acidum insensibile transpirans, & sal volatile liberatur: vid. *Collegium Institut. l. a.* Nonnulli carent insensibili Transpiratione, ut indusia per tres septimanas tam

pura permaneant: vid. *Acta Societ. Reg. Angl.* pag. 103. ubi ex deficiente Transpiratione insensibili anasarca, & indusium per quinque & sex septimanas tritum puritate non cesserit indusio unum diem trito.

Quod si massa sanguinea ex quacunque causa dissolvatur, & quasi liquefcat, indeque majorem concipiat calorem, uti vel in exercitiis corporis, vel post assumpta volatilia salina contingit, sudor oboritur, dum transpiratio in tantum augetur, ut copia materiæ à glandulis imbibitæ confestim sub guttularum minutissimarum forma erumpat, quæ unitæ rivulorum specie promanant. Materia sensilis hujus Transudationis in statu naturali est eadem, quæ insensibilis Transpirationis, saltem quod copiâ majori excedat; sed tùm si sæpius contingat sudatio, ex massa sanguinea nimis attenuata copiosæ etiam partes utiles, ipsumque nutrimentum partium solidum roridum attenuatum & liquefactum, simul forasque educuntur. Ut nihil dicam de partibus spirituosissimis in omni sudore evolutibus; hinc enim est, quod nimius sudor debilitet, simulque corpus emaciet, & exsuccum reddat. Sed in statu præternaturali quæcunque sanguinis, uti & partium continentium heterogeneitates auspiciatissimè & copiosissimè cum sudore excernuntur, quando scilicet eadem priùs à sanguinis arctiori miscela separatæ & quasi præcipitatæ sunt; tunc enim ab aquosis partibus imbibitæ, vel spontaneo naturæ motu in declinatione morbificæ excernuntur, ut etiam in fine patoxyfismorum febrilium in Intermitteatibus contingit, vel medicamento diaphoretico attenuata & liquefacta massa sanguinea eadem excludit.

Ufus ergo insensibilis Transpirationis & sudoris primarius est, ut purificetur massa sanguinea, singulæque partes ab excrementis salinis aliisque, necessitate materiæ in sanguificatione & nutritione pronatis; unde his excrementis retentis turbatur sanguinis fermentatio, & progignuntur immediatè febres: secundariè sunt, ut acceleretur per sudorem massæ sanguinæ motus, sanguis spissus attenuetur & resolvatur, ne fiat ejus stagnatio, sed promoveatur potius ejusdem ventilatio.

Atmosphæram unusquisque homo circa se habet, quam propter raritatem materiæ non videmus; hinc sub tegmine calor, uti pelles propter copiosos pillos, ubi Transpiratum quasi impeditur, calorem faciunt.

An autem ex præcordiis vel interioribus visceribus immediatè interdum sudor prorumpat, ut acutè hoc urget DEUSINGIUS *Exercit. de Depur. Alim.* pag. 157. & *Append. pag.* 343. Item in *Diff. de Lat. Seß.* 2. §. 63. id sanè valde probabile, licet ob modi, quo fiat, & viarum, per

R r

quas



quas fiat, latentiam res obscurissima sit. SALMUTH observavit sudorem cerevisæ: post iuscula calida sudor est in tergo, post porum etiam frigidum sudor in toto corpore. In calore autem sanguis dissolvitur; si frigus advenit, serum quasi coagulatur & condensatur, & eò magis serum etiam separatur propter condensationem.

Sudor frigidus in omnibus morbis funestus est. In acutis, quando ægri non possunt sudare, & tandem sudor spontaneus, viribus prostratis, supervenit, malum signum est; sit enim ob defectum virium, sudorque hic nil aliud est, quam ros nutritivus partium solidarum per poros cutis sub forma sudoris emanans; hinc etiam talis sudor glutinosus, nonnihil viscidus, percipitur, & est signum lethale. Sudor particularis circa caput rectè ab HIPPOCRATE malus dicitur; hinc rarissimum est, quod observavit SCHNEIDERUS, quod sudor capitis aliquando fuisse criticus, & morbum solvens.

In Praxi observatur sudor vel excedens, vel depravatus, raro deficiens.

## CAPUT I.

## DE

## SUDORE NIMIO.

**E**xcedens sudor frequens solet esse Scorbuticis, qui copioso sudore tantum non dissolvunt, interdum pariter ac noctu: Hinc etiam Phthysici confirmati tempore nocturno sudores copiosissimos solent effundere. Rationem non incongruam suggerit WILLISIUS in Pharm. Ration. quod nempe tales sudores excessivi eveniant propter deficientem assimilationem nutrimenti assumpti & chylicum massam sanguineam, ita ut tales sudores sint colligativi, & per quos succus nutritivus, qui assimilari nequit, foras emittitur.

## CURA.

Hinc in Cura respiciendum imprimis ad corrigendam sanguinis crassam: Id quod fit in scorbuticis per usum Martialium, & salium volatilium oleosorum, nempe partitis vicibus, tandem per usum Lactis & Lacticiniorum. In phthysicis imprimis lac ad tales sudores compescendos conveniens est: sicut Phthysicorum sudores & inde natas debilitates palliative sistit Antihæsticum Poterii cum laudano opiato, vespertino tempore assumptum; quod est optimum sudores nimios sustaminans: vid. Dissert. de Opii Virt. Diaphor. cap. 3. §. 8.

Idea Formul. Class. 3. §. 2. Colleg. Formular. pag. .... & supra Sect. 17. cap. 1. Art. 2. ubi de Phthysi, item SYLVIUS ubi de Febre sudator. Convenit etiam Tinctura antiphthysica, Tinctura solis. In scorbuticis:

24. Solut. Martis cum succo pom. 3liij.

Spiritus cochlear. 3j.

M. S.

Tinctura scorbutica.

Post sudorem nimium in morbis acutis & malignis;

24. Aqua Ceras nigr. 3iv.

Phlegm. vitrioli 3ss. vel hujus loco Class. antimonii 3ii. vel 3ss.

Syr. rub. Idem 3j ad 3ss.

M. D. S.

Pectio confortativa cochlearum sumenda.

## CAPUT II.

## DE

## SUDORE DEPRAVATO.

**S**udor depravatus fit in specie ex ratione seri ejusque contentorum; quæ prout plus vel minus à statu naturali deficiunt, ita etiam plus vel minus sudores depravatos reddunt; hinc pro varietate depravationis sudoris varia etiam subinde Cura instituenda venit.

## CAPUT III.

## DE

## SUDORE DEFICIENTE.

**D**eficiens sudor contingere solet, vel vitio pororum, vel vitio sanguinis ejusque seri, vitio pororum, dum hi arde plus minus clausi, infarcti aut obstructi sunt, unde lotiones corporis, frictiones rerum calidarum, laterum calidorum applicationes, &c. sudorem promovent. Vitio sanguinis vero deficit sudor, quando tam arde substantia serosa cum massa sanguinea unita est, ut conveniens seri secretio per glandulas fieri nequeat; id quod interdum in febribus continuis, speciatim malignis, usu venire solet. In tali casu remediis sudores moventibus, tam positivè, ut alcalibus fixis vel volatilibus, quàm privativè calidibus, ut sunt lapilli cancerorum, cornu cervi, &c. simul acida blanda addenda erunt, in specie acetum; hujus enim medio deficiens sudor commodè potest excludi.





# LIBRI SECVNDI

## SECTIO I.

DE

### SPIRITVVM ANIMALIVM GENERATIONE

AC DISTRIBUTIONE LÆSA

in genere, indeque

### SENSVS ET MOTVS LÆSIONIBVS.

**P**ost sanguinis ad corporis circumferentiam motum, cum non amplius superfit affectus in regione inferiori, pergo ad regionem corporis superiorem, scilicet ad caput, & ibidem reconditum cerebrum, & systema nervosum. Nempe uti movetur sanguis ad omnes partes, imprimis internas, in quibus præter hoc, quod easdem sustentet nutriendo, & vegetet spiritu vitali perfundendo, etiam in quàm plurimis singulare quid patitur; ita per arterias carotides & vertebrales distribuitur etiam ad caput, cerebrum ac cerebellum, in cuius medullam hæc arteriarum ramos quosdam hinc inde spargunt, maxima verò pars in capillaria distributa vasa ubique superficiem ejus dense irrorat, ita quidem ut extimam cerebri & cerebelli superficiem, Cortex cerebri appellatam, ubique copiosissimæ arteriolæ investiant, sanguinem ita ibi infundant, qui in sinus duræ matris resorbetur, & ita per venas jugulares, istis sinibus continuas, tandem in venam cavam refunditur: Vid. HIGH-MORUS. Arteriolæ dictæ ubique investientes cerebri superficiem, eidem certum motum tribuere videntur, qui tamen non cerebro est proprius, sed saltem ab arteriarum motu communicatus. Motus cerebri observatur depressorius & subfultorius: Vid. SPERLINGIUS *Anthropol. Phys.* Probat: si nempe instantur arteriæ carotides, nunc attollitur nunc deprimitur cerebrum. In ipso cerebro ac cerebello duplex observabilis est substantiæ diversitas; corticalis nempe subcineritia, & medullaris eleganter candida: Illa ex copiosissimis glandulis minutulis ovalis figuræ constat, in quas se insinuant dicta vasa sanguifera: Hæc ex filamentis & ductibus nervis delicatissimis invicem certo ordine convolutis, existis glandulis oriundis, est constructa: quæ ipsa postmodum à se invicem separata ac divisa, duplici tamen adhuc meningum membranâ investita, spinalem medullam & nervos hinc inde distributos constituunt; de quo vid. MALPIGHIIUS *Tr. de struct. viscerum, ubi de cerebri cortice*, item in *Epist. eius de Cerebro*.

Substantiæ talis diversitas diversum item usum innuit; qui tamen in hoc conspirat, quod nempe earum usus sit, ex sanguine subtilissimam substantiam, spiritum animale, suo modo conficere & separare. Dari autem quendam spiritum, ab officio Animalem dictum, ex hoc serè illustratur, v.g. quod nervo dissecto, & ita spiritus animalis fluxu seu irradiatione læsa, partis infra sectionem sensus ac motus perire soleat. Objectiones contra hujus existentiam discussas videb. in ROLFINCIO *Exerc. Anatom.* Optimum ejus scriptum est. Speciatim verò cortice mediante spiritus volatiles sanguinis, Vitales dicti, separantur à sanguine, & per subtilissimæ agillimæque filtrationis modum penetrando, transeunt in cerebri medullam, sanguine ipso ceu crassiore corpore ob pororum angustiam, vehiculo ejus ac quo ob pinguem & oleosam quasi cerebri substantiam, exclusis, ita quidem, ut spiritus vitalis in cerebro fiat animalis, non per modum novæ cujusdam elaborationis aut fermentationis in cerebro perficiendæ, sed per nudam ac simplicem separationem, & quasi per filtrationem, vel per subtilem irradiationem, sine nova cujusdam elaboratione, aut in cerebro fermentatione, aut in cerebro transmutatione; de quo vid. WILLIS in *Anat. cerebri cap. 9.* item SYLVIIUS in *Disq. 4.* Spiritus hi, animalis & vitalis, essentiâ non differunt, sed paucis accidentibus. Qui jam separatus existit, aliàs simul in massa sanguinea erat. Differunt tantum loco & nomine; indeque sine formali alteratione spiritus animalis existit.

*Estmull. Oper. Tom. II.*

Separatus ita in cortice cerebri glanduloso spiritus vitalis, & agillime penetrans in ipsam substantiam medullarem, in hac ipsa, ceu regio palatio, spiritus isti volatiles luminosi debitis motionibus, expansionibus & agitationibus, & inde per nervos in omnes partes radiosæ excursionibus, operationes animalibus proprias, sensus nempe, in specie internos, & motus perficiunt.

Determinatur autem modò dictus spiritus animalis numero & essentiâ unus, adeoque ex se indifferens, ad diversas adeo actiones obeundas à partium organicarum dispositione & proprietate, ratione cujus nunc in hac parte hanc functionem, in alia aliam perficit; Nam is ipse, qui v.g. per musculus movet pedem, is conferret suo modo ad visum, si esset in oculo: Et sicuti unus aer diversos sonos pro varietate & formatione fistularum efficit, ac ab una aqua variæ machinæ moventur; ita & unus spiritus pro organi varietate diversas edit functiones. In operationibus quidem externis, nempe in Instrumentis sensuum, magis passivè se habet, quatenus fibras in tensione conservat. Sed quoad internos, & inde dependentem motum animale, magis activè se exhibere solet, ita ut hoc in spiritu primariò anima animalium, tam brutorum quàm hominum, consistat, cum sipe primarii auctores actionum animalibus propriarum. In homine superior adhuc est anima rationalis, cui tamen cum œconomia corporis vitali ac animali, quatenus tali, nullum est commercium.

Ab hoc enim spiritu animali & sentiendi habemus potestatem, & simul movendi activitatem, cum ratiocinationis sublimiori actione: in qua uti spiritus animalis verè & soli anime, nempe rationali, tanquam principali agenti, instrumentaliter inservit; ita pro ejus spiritus animalis varia constitutione non tantum in latitudine sanitatis diversitas operationum animalium in singulis individuis observatur multiplex, sed etiam in constitutione morbosa variè in sensu & motu, quin & divini intellectus operationibus, læsiones oriuntur.

Naturalis spirituum animalium, hinc operationum animalium, & inde dependens ingeniorum, diversitas, ex varia crasi & mistura massæ sanguineæ, & hinc diversa constitutione cerebri, ratione compositionis materialis, ratione pororum & meatuum, &c. dependet. Prout enim diversa est massa sanguinea, ipsumque cerebrum, diversi etiam emergunt spiritus, tam vitales quàm animales, qui diversimodè in cerebro moventur & agitantur. Quoad cerebrum: variat hujus constitutio, tam secundum compositionem seu texturem naturalem, quàm conformationem mechanicam. Quoad compositionem naturalem: præter constitutionem seminalem, sub generationis primordiis natam, multum varietas ejus dependet à sanguine & spiritu infuso; variat enim hic ejus nutritio & naturali textura, plures aliæ proprietates, Qualitates dictæ, & inde emergens temperatura in caliditate & humiditate, siccitate & mollietate, &c. variant. Sicuti in ipsa conformatione mechanica ratione pororum, meatuum & ductuum, diversitas deprehenditur, quæ omnia & spiritum animale, ejusdem constitutionem, generationem, distributionem & motum variant. Hinc ista in actionibus animalibus insignis differentia, Cholericorum, Melancholicorum &c. ex quibus Ingeniorum diversitas deducenda. Ergo spiritus isti animales plus minus vitiosè geniti, & præter naturam alterati, unà cum organorum corporeorum, tam cerebri, quàm aliorum,

R r 3

rum,



rum, varia constitutione quasvis *Lesiones in sensu & motu* inducunt.

Quod si *spiritus* in debita quantitate & subtilitate, blando & moderato, eoque ordinato, motu agitentur, indeque cerebrum implendo proprio motu quodammodo expandant, & ita ex eodem secundum filamentorum cerebri medullarem substantiam constituentium, ductum continuato quasi rivulo aut radio in corpus ejusque partes influant, omnium Actionum Animalium sequitur exercitium, h. e. Vigiliæ: Vigiliæ enim sunt exercitium sensus ac motus. In somno autem respectivè quiescit tantum sunt spiritus animales, quia si acu pungitur membrum, sensus spirituum præsentiam & aliqualem operationem ostendit. Sin verò quacunque ex causa perturbati inordinato, vago, & subinde impetuoso motu cieantur, in cerebro exinde deliria varia, speciatim phrenetica, in partibus verò feliquis spasmi & motus convulsivi subinde mirabiles produciuntur.

Dixi deliria fieri in hominibus ex perverso ac inordinato spirituum animalium motu: Nam functiones ratiocinationis dependent suo modo à spirituum animalium motu, quatenus nempe hujus occasione anima rationalis diversos conceptus & ideas sibi fingit. Prout ergo sit iste spirituum motus vel ordinatus vel inordinatus, etiam ipsæ mentis ideæ seu conceptus vel ordinati erunt vel confusi & vagi; unde ibi legitima ratiocinatio, hic confusa mentis perturbatio, h. e. delirium, superveniet. Bruta enim non delirant; est enim delirium læsio ratiocinationis. Et quidem ingeniorum diversitas primariò ab his animalibus spiritibus, & hinc à cerebri constitutione variæ, tam quoad conformationem non tam externam sensilem, quàm quoad internos meatus insensilem, tum quoad materialem texturam, aliàs temperiem dictam, dependere videtur. Hinc etiam his circumstantiis plus minus ætate vel morbo mutatis, plus minus etiam in eodem subiecto variat ingenii habitudo: de qua Ingeniorum Varietate videndi sunt in primis, qui ex professo de Ingeniis scripserunt, quos inter quatuor primatum obtinent, JANUS HUARDUS, Medicus Hispanus, qui scripsit de *scrutinio Ingeniorum*, JOHANNES BARCLAJUS Politicus Gallus, qui scripsit *Iconem Ingeniorum*, ÆSCHACIUS MAJOR, & NEUHUSIUS, Philosophus Belga, qui scripsit *Theatrum Ingenii humani secundum constitutiones annorum*. Omnes per diversas vias unam materiam tractant, & ad unum scopum collinquant. JANUS HUARDUS in *scrutinio Ingeniorum* in genere varietatem ad studia varia inclinantium ex fundamentis physicis Aristotelico-Galenicis scrutatus fuit. Autor est, si quis alius, elegans, tantummodò hoc observetur, ut scilicet ea, quæ is tribuit cerebro ratione caliditatis, humiditatis, & siccitatis, potius certo modo applicanda sint spiritibus animalibus; eorundemque variæ constitutioni, subtilitati, agilitati, torpori, & aliis similibus proprietatibus. Nam quod attinet temperaturam cerebri: temperatura ista tam capitis (uti etiam aliàs monui) quàm omnium partium, à massa sanguinea dependet, quæ quando est calida, vel quando est humida, etiam omnes partes, per quæ transit, similes proprietates acquirunt; quæ ipsæ tamen parum ad actiones faciunt, quia tantummodò leviter easdem modificant: Sicut videmus in cholericis ita dictis, in quibus massa sanguinea turget salibus volatilibus oleosis, eos videmus promptos in actionibus, videmus agiles, & quadam cum ferocia & audacia conjunctos. In his enim partes subtiliores & facile mobiles blandà in orbem circulatione in spiritibus animales volatilisantur, qui in cerebro promptè moti & agitati, & à massa sanguinea calidiore non nihil fervidi, in istam audacem actionem erumpunt, ex mente HUARDI: ergo caliditas & siccitas hic accusata potius est agilitas & subtilitas spirituum. ■ BARCLAJUS in *Icone animarum* scripsit Politica & Historica magis quàm Physica; lectio tamen ejus hoc habet commodi, ut videamus, quantum valent ingenia pro climatibus diversitate pro vario regionum sita, & pro consuetudinis diversa ratione. Denique NEUHUSIUS Philosophus, scripsit in *suo Theatro ingeniorum* simul Politica & Physica, sed minus profunde rem scrutatus fuit, quin potius generaliter, nonnihil fuscè tamen, ea tractat. Hi tres simul conjungendi sunt, & præmeditatè legendi; sic enim magna lux in hac materia effulgebit.

Hinc si spiritus isti volatiliores celerius & agilius moventur, subtilitatem seu acumen ingenii & quatenus

nempe hoc in corpore humano à spirituum animalium motu dependet) alacritatemque singularem actionibus conciliat, cui si constitutio cerebri mollior vel durior, indeque vel flexilior vel rigidior accesserit, ibi inconstantiā, hic verò maiorem pertinetiam efficiet, uti v. g. in Gallorum ingeniiis patet. Quod si his spiritus purus quidem, non tamen adeò subtilis ac agilis sit, indeque tardius, ordinatè tamen, moveatur, acuta & accurata, non tamen nimis velocia, conciliat ingenia, cum actionum quadam maturitate, ut in Italis & Hispanis, & in iis, qui dicuntur esse naturæ aliquantè melancholicæ naturalis, manifestum est. Sin verò torpescant spiritus, minus sint agiles, aut propter filamenta cerebri duriora nimis implicata, motus spirituum minus sit agilis aut ordinatus, stupor & ingenii hebetudocum reliquarum actionum torpore obvia est, ut in phlegmaticis sic dictis, item in rusticis, manifestum est. Ingenium quasi ingenitum, id est, ratio judicandi & solus, est primò à puritate spirituum, & deinde conformatione externa & interna.

Quod si animalium spirituum vigor naturaliter non nihil torpeat, vel ob deficientem quantitatem, vel ob deficientem subtilitatem, indeque parcius ac tardius moventur, sensus quiescunt, & alta quies occupat membra, h. e. somnus obrepit: non quod non sint præsentia spiritus animales in partibus corporis, sed quod non sint sufficientes.

Causa ergo somni est:

1. Quando spiritus deficiunt, exhausti v. g. ob labores.
2. Quando sunt torpidi & tardius mobiles: quod fit (a) ob cerebri aliqualem humectationem sub ejusdem nutritione, vel quod ex continua spirituum sub vigiliis actione aliquod aquosi simul in cerebrum destillet: (b) ob eorum fixationem sive condensationem ex assumptis sive applicatis medicamentis narcoticis.

Dupliciter cerebrum humectatur; primò à socco nutritionis; deinde à sero.

Sed his & similibus Physiologicis omissis, ad Pathologica revertor; & Practica, in quibus considerantur vitia imprimis spirituum animalium morbosa; spiritus enim isti animales vitiosè geniti, & præter naturam alterati, læsiones in sensu & motu inducunt.

Quod attinet horum spirituum animalium generationem vitiatam; tria sunt vitia, quæ in Praxi occurrunt:

1. Quando deficiunt, & nimis pauci sunt, unde hebetudo sensuum, imbecillitas corporis, defectus in motu, &c. apparent; uti videre est v. g. in senibus, aut in iis, qui gravè ex morbo sensum convalescunt. In his enim talis debilitas & impotentia actionum omnium adest propter defectum spirituum animalium.
2. Quando abundant.
3. Quando depravantur, & plus minus à debita crassi degenerant.

Deficiunt hi spiritus, vel propter sui consumptionem, labore, Venere, Rudis: quibus omnibus nimis agitati in cerebro adeò subtilisantur, ut promptissimè dissipabiles existant; vel propter deficientem debitam sanguinis spirituum ascensionem, in constitutione præsertim ejus cacochymico-cachectica, ac primariò ex vitio digestionis primæ, dum non ritè chylus spiritusascit in primis viis: quod faciunt inedie, ac alimenta mali succi & minus spiritusascencia & similia; vel vitio cerebri & ejusdem corticis, Inepti ad separationem spirituum vitalium ex sanguine, propter vicium conformationis & læsionem cerebri, contusionem aut concussionem incalubalto, mearum obstructionem, & similia. In quibus casibus poruli ut insensiles meatus cerebri aut subsidentes, aut compressi, aut omnino aboliti, & sanguinis debitum circuitum ac spirituum animalium ex eo separationem impediunt. His ergo deficientibus sensus & motus deficit, minus vel plus, prout illi vel magis vel minus deficiunt.

Interim defectus hic spirituum facile & optime curatur per medicamenta spiritusosa assumpta, ob id Analeptica dicta, ut vinum generosum, spiritum liliorum convallium, cerasorum nigrorum, aquam apoplecticam, Quintam Essentiam Matthioli, essentiam ambre cum spiritu rosarum paratam, spiritum liliorum convallium cum sale volatili cornu cervi circulatum, aut sale volatili succini mistum, spiritus volatiles, olea destillata, aut ex his paratos spiritus vel



salia volatilla oleosa, aliasque aquas spirituofas aromatas & similia, & quæ aliàs in Lipothymis adhiberi solent. Sicut si vitium est in conformatione cerebri & læsione externa, curatâ hac externâ læsione, sponte defectus spirituum curatur.

Secundum *vitium* spirituum animalium est, quando abundans, & hinc impetum quandam extraordinarium actionibus animalibus, & ex nimia eorum agilitate insignem promptitudinem actionum, tam in sensibus quàm moribus, conciliant. Id quod videmus in iis, qui alimenta laudabiliora usurpant, potuique vini generosi moderatè indulgent, ut agiliores & hilariores fiant, accedente simul blando corporis motu, & vitâ curis vacuâ.

Abundantia hæc spirituum raro curationi offertur, quia sponte vel per incediam, vel per somnum, naturâ aut arte provocatum, aut denique per motum vehementiorem corporis aut animæ in studiis severioribus cessat.

Denique tertio *vitiosè generantur spiritus animales*, quando depravantur idem plus minus in sua crasi, unde motus eorundem variè exorbitant & anomaliz, unde crasseo vitiatæ ratione idem vel stupidi vel torpidi, vel fixi, imò quasi immobiles, vel e contra nimis agiles vel confusi & inordinatè mobiles, minus subtilis, plus minus acres & intemperati, generantur, aut alio vix intelligibili modo vitiosi & depravati. Unde variè in sensibus defectus, & in motu exorbitantiz, & anomaliz dependent. Spiritus animales enim sunt nature sulphuræ volatilis, seu nihil aliud, nisi substantia oleosa volatilis, adeoque pingues, & in recessu acidi instar subtilissimi cuiusdam spiritus vini. Equidem paradoxon dicere videor: Dico tamen adhuc, esse eos instar (ad meliùs illustrandam eorum naturam) subtilissimi rectificati spiritus vini. Hoc præsupposito, depravatè spiritus animales generantur, quando vel in motu, vel in sua substantia, & hinc consequenter in motu vitiosi redduntur. In substantia quidem, quando degenerant à sua substantia, volatili, quando degenerant à subtilitate, volatilitate & spirituositate, evaduntque quasi phlegmatici; vel à sua puritate, ita ut spirituosa heterogenea eorum naturam vitient, unde in natura & crasi defectus sequitur. Deficiunt in motu, quia per motum reguntur totum corpus spiritus animales, unde quando vel in motu deficiunt, dant Torpores, vel quando nimia agilitate excedunt, vel quando vitiatum ac depravatur motus eorum debitus in confusa agitatione, vel quasi exploduntur, læditur spirituum animalium natura & officium. Vicia hæc, pro specialium hinc dependentium affectuum ratione, diversimode sunt curabilia, quorum cura in sequentibus patebit.

Accedimus ergo ad

## CAPUT I.

### DE

## FACULTATIS ANIMALIS AFFECTIBUS IN GENERE.

**A**Ntequam autem in specie *Affectus facultatis animalis* consideremus, notanda in genere quædam universalia pro iis, quæ in posterioribus dicentur:

I. Totum systema nervosum cerebri, cerebelli, spinalis medullæ, nervorum inde natorum, & quarumcunque partium nervosarum, membranarum, tandem & ligamentorum, non nisi ex *fibris*, nunc *delicatissimis*, nunc minus delicatis, sed paulò *firmioribus*, constare. Quæ fibræ sunt stamina fundamentalia, ex quibus pro majori vel minori, ardore aut laxiore, unione variæ partes nervosæ compinguntur; & quidem fibræ maximè delicatæ constituunt substantiam levem cerebri & cerebelli, ejus substantiam medullarem; densiores uerò constituunt nervos maximè quidem firmiores, & quò magis hi à cerebro in spinalem medullam prodeunt, eò firmiores sunt & magis robusti; & fibræ hæc pro explicandis phænomenis paulò sensibilibus, ratione suæ texturæ in naturali statu *tense* quidem sunt, sed simul continuum quasi nixum, aut impetum aut vim quasi *elasticam* obtinent ad motum, quævis, modò impetu interno spirituum animalium roboretur, *motum animale* quemvis, tam spontaneum quàm naturalem, infert; sicuti tense hæc fibræ, si ab objecto quodam externo commoveantur, constituunt Passionem, scilicet sensum externum, dicimusque sentire; & contra, si moveatur nixus ille elasticus ab impetu spirituum interno, fit motus membro-

Estmull. Oper. Tom. II.

rum, siue voluntarius siue involuntarius, ita ut spirituum diversè constitutorum diversè motus, & fibrarum nervearum diversa textura & constitutio, basin constituat omnium phænomenorum, quæ aliàs Facultatis Animalis nomine veniunt, & totam sic dictam animam sensitivam absoluant.

II. Cerebrum & nervos singularem quasi consensum habere ad extra cum motu lunæ: cùm observationibus constet, secundum phases lunæ affectus cerebri, nervorum, & partium nervosarum, in sensu ac motu consistentes, plus minus exacerbari, plus minus remitti: Itemque quod quæcunque symptomata cerebri & nervorum, in specie Epilepsia, pro stationibus lunæ decrecentis vel accrescentis, habeant suum augmentum & decrementum. Unde tales secundum lunæ stationes mutabiles affectus non nisi partibus nervis contingunt, & propriè *Ephemerides* ægrorum dicantur, ubi ex læsione partium fibrosarum remanet talis peculiaris sensus in parte, ut ægri percipiant mutationes temporum, sanis non perceptiles. Ratio, cur fiat, quod systema nervosum magis alteretur à luna quàm à sole? dissimilis videtur: Interim, si indulgendum est speculationibus, inde videtur haurienda. Quidam Philosophi sublimiores ex sole, ratione ejusdem radiorum, & exinde nati caloris, & ratione spiritus universalis ex eo prodeuntis, vim vegetativam universæ naturæ derivant. Quod ipsum etiam exactè patet in regno vegetabili, cùm virtuti vegetativæ vis nostra vitalis quodammodo respondeat, unde dicimus; Uti ratione solaris luminis sulphur ejusdem ac universalis spiritus & calor dependet, & certâ ratione alteratio virtutis vegetativæ in natura, & consequenter major vel minor vegetatio nostræ vitalitatis oritur, ita è contrario ex modificato solis lumine etiam luna magis afficit facultatem animaleam & cerebrum; unde mutata luna in ejus phasibus, & mutato motu solis, subito etiam mutatur cerebrum, genus nervosum & similia.

III. Observandum ante omnia, mirabilem consensum habere cerebrum & partes eidem connexas cum visceribus abdominalis, in specie cum ventriculo, ita ut quoque propter hanc continuam conspersionem sæpè contingat, ut origines morborum subinde inuicem confundantur, cerebrique morbi causam proximam ac fomitem habeant in ventriculo & primis viis, sicut contra stomachi affectus in cerebro fomitem obtinent. Sanè mirabilis est inter has ambas partes consensus, idque exemplis confirmari potest: v. g. ex læso cerebro superveniunt subinde ordinariò vomitus, idque ex capite aut cerebro gravius percusso, sæpè nausea, appetitus dejectus, & similia, ex imminente vomitu vertigo, &c. Hæc ipsa HELMONTIUM admodum turbant, hinc Observata ejus Practica & res facti in Tract. Duumviratus, Ius Duumviratus, Sedes Animæ, Demens Idea, Ignota Actio Regiminis, &c. sunt optima; sed theoriæ & reflexiones speculativæ nil valent, & nullo modo admitti possunt. Consensus interim notissimus est, ut monitum. Similiter ex imaginatione, v. g. ex auditu rei horridæ supervenit nausea, subversio stomachi, appetitus dejectus, & quæ sunt alia symptomata, simpliciter ex cerebro & spiritibus in cerebro, certo motu motis, enata.

Qui difficulter concoquunt aut digerunt, ex stomacho subinde patiuntur vigilias, vertiginem, &c. Vertigines serè semper ex stomacho oriuntur: Nam hypochondriaci si non omnes, de quo adhuc dubitamus, certè quamplurimi, dum jejuni sunt, vertigine corripiuntur; quod si uerò aliquid & uel buccellam panis assumant, cessat vertigo. Vir quidam sexaginta quatuor annorum graui corripiebatur vertigine, vesperti quidem sanus lectum petens manè euigilabat, & de lecto surgens in cubiculo præcedebat vertiginosus, hæcque vertigo usque ad meridiem durabat, assumpto autem iusculo uomebat, unde vertigo cessabat. Hanc ergò vertiginem simpliciter ex stomacho fuisse, inde persuasum habeo, quia quæsitus dicebat, urgente vertigine simul affligere anxietates præcordiorum; factâ autem materię morbosæ excretionem solui vertiginem. Quin puto, ipsam imaginationem & sensus externos suo modo dependere ex stomacho & hypochondriis affectis; hinc enim, quando mulieres ex uenarum suppressione picâ laborant, phantasiam pravam & imaginationem læsam obtinent, cujus fomes tamen est in stomacho; unde ex affecto stomacho læditur phantasia, secundum quam nonnunquam superuenit appetitus rerum ridicularum: Sic hypochondriaci ex hypochondriis affectis fiunt melancholici,



unde curato vitio in hypochondriis, cessat & melancholia. Præterea motus convulsivos universales radicaliter fieri ex affecto abdomine probò, quia mulieres hysterica sæpius superveniente epilepsia corripiuntur: Sic in partu difficili ex abdomine affecto supervenit epilepsia universalis, unde excluso factu cessat etiam hæc epilepsia. Ut ideo certum sit, in omnibus operationibus in sensu & motu, nempe internis, dependere cerebrum à stomacho & hypochondriis, adeoque in Praxi semper uno oculo considerandum cerebrum & nervosum genus, altero verò conspiciatur stomachus & hypochondria. Confirmat hoc, quod remedia excitent aut etiam sistant symptomata capitis & cerebri, dum adhuc existunt in stomacho: Sic vomitoriis assumptis, dum incipiunt operari, ægri corripiuntur vertigine, utut ipsum remedium corporaliter in stomacho sit, & simpliciter in stomacho operetur. Pariter manifestum est, quod Opiata omnia vix assumpta, v. g. *hyoscyami semen*, *opium* &c. dum adhuc in stomacho hærent, facultatem animalen afficiant, & certas alterationes inducant, ac in specie ad somnolentiam disponant: Vid. exemplum HELMONTII *Tractatus Duumviratus* §. 22. de caustico, loco seminis anethi sumente seminis hyoscyami drachmas duas, quid deliravit & plane stupidus factus est; semine autem hoc per vomitorium rejecto cessavit delirium & stupiditas. Hæc & similia exempla observari debent, ac injecerunt ejusmodi phenomena jamdudum ingentem scrupulum HELMONTIO, qui videre est *Tractatus Duumviratus*, item *Ignota Albro Regim.* item *Sedes Animæ*. In his Tractatibus mirabilia introducit exempla affectuum cerebri ex affecto stomacho & hypochondriis. Cæterum hic ipse Autor in hoc puncto est plane paradoxus, quia primos conceptus fieri in splene putat, quorum conceptuum executivum sit cerebrum; capis autem exsulto splene vigilat & somniat. Equidem quædam observata exempla, est elegantissimus; quædam superstruam verò theoriæ, & quidem officium splenis, nullo modo admitti potest. Cæterum si dicendum aliquid, unde nam oriatut hic firmus consensus cerebri cum stomacho & hypochondriis? simpliciter per nervos, ad hæc partes ex cerebro derivatos, fieri statuo. Quod verò hæc partes magis conspirent cum cerebro & cerebello, quàm aliis partibus, id explicare conatur quidam scriptor Gallus, nomine CORDEMOY *Tr de Discrimine Animæ & corporis*, ubi rationem ex prima sæctus formatione in utero derivat: Nam, inquit, *embryo sentire incipiens vix alibi, nec ullas pars in homine vel in utero adhuc recondita, vel extra uterum exclusa, prius sentit, quàm orificium stomachi, dum ratione nutrimenti per os affectus diversas patitur alterationes. Dum ergo ibidem sit prima sensatio, omnes alterationes mater imprimit alimentis, quæ impressionem faciunt in sæctum, in ejus orificio stomachi sinistro. Hinc accedit, ut etiam primò ex cerebro ad alliciantur spiritus animales & alterentur, unde sit semina maxime patula, unde levi motu paratur via, spirituum animalium ex cerebro ad stomachum, ita ut in universo corpore non detur pars magis sensilis, quàm orificium stomachi sinistrum.* Unde tam facilis sit consensus inter cerebrum, cerebellum & stomachum partesque vicinas, ratione nervorum.

IV. *Spiritus animales cum materiam admodum subtilem, conditiones etiam subire certo modo materiales.* Jam verò notum est, quod ex sanguine materialiter fiant, sive sulphureo salinæ, sive lucidæ, sive opacæ, sive alius sint naturæ & conditionis, necessariò pro varia sanguinis crassi patiuntur diversas conditiones materiales, id est, ut, crasse loquendo, nunc sint asperi, nunc mites, nunc dulces, nunc acres, nunc lucidi, nunc opaci: &c. unde pro varietate suæ constitutionis, & inde naturæ proprietatum, variant etiam eorum attributa, & consequenter nunc plus nunc minus appropriati, amici vel hostiles nervis totique eorum systemati in medulla cerebri & cerebelli, itemque reliquis fibris per totum corpus dispersis, existunt. Vnde pro variis constitutionibus & texturis, materialiter ex textura sanguinis enatis, etiam varia pathemata secundum sensus internos & motus corporis, secundum vigiliæ & somnum, erunt derianda.

Hæc in genere præmonuisse sufficiat. Vnum adhuc monéo: Nihil dixi de anima sensitiva aut de eiusdem operationibus: ratio, quia non credo esse animam sensitivam, neque in brutis, neque in homine, quia hoc, quod aliàs vocatur Anima sensitiva, seu sentiens, ac omnes huius operationes, commodissimè per systema nervorum ex cerebro protrulorum, & spirituum animalium in systemate illo

contentorum explicari, & modo mechanico dilucidari potest: quâ in parte terò uestigia Cartesianorum & Anglorum, uti obiter in scriptis CARTESII *de Homine*, item in VILLISII *Anatomia cerebri* & aliis in locis videri potest.

## CAPUT II.

## DE

FACULTATIS ANIMALIS AFFECTIBUS  
IN SPECIE,

seu

## MORBIS CAPITIS.

IN specie quod affectus facultatis animalis, seu sensitivæ & motivæ virtutis, attinet; de iis optimè agit VILLISIIUS *Tr. de Anima Brutor.* l. 2. Spiritus nempe vitales, dum per corticalem cerebri substantiam scaturiunt, ac transfudant in cerebri medullam fibrosam, ulterius derivantur in nervos, & inde in universum corpus, ac ita motu suo extra cerebrum vim motuam distribuunt in organa sensuum, inde in naturalis subtilitate ordinatè moti majorem vim conciliando fibriseas sic disponunt, ut fortius tensæ faciliè mobiles redantur, & ab objectis externis recipiant impressiones, per quas fit motus. Uti ergo, dum hoc modo cõtinuò influunt animantibus spiritus animales in organa sensuum, ut promptè excipiant objectorum externorum impressiones, & sic sensuum passionibus sustinent, ita promptè varios motus excitant & obediunt, quo in statu animal *vigilare* dicitur; ita quidem ut *vigiliæ* dependeat à continuo motu spirituum animalium extra cerebri & cerebelli orbitas in organa sensuum externorum, quorum privatio est *somnus*: quæ duo necessaria vicissitudine se motu insequuntur naturaliter. Ac idè radiæ *vigiliæ* primariò in cerebro, minus verò in cerebello investigandæ sunt; sicut & *somni* ipsius. Unde dum sensibus externis feriamur, feriat etiam sensus internus, unde animal dicitur dormire. *Vicissitudo hæc mutua si tollatur, ita ut somnus vel penitus deficiat, vel saltim paucior sit, & continuæ sint vigiliæ, vitium hoc vulgò vocatur Agrypnia* Græcis, Latinis *Pervigilium*, seu *vigiliæ nimia*.

## ARTICULUS I.

## DE

## VIGILIIS NIMIIS.

Sicut somnum naturalem in moderata spirituum animalium quiete, hinc ad sensoria externa influxu cessante consistere, ex hæctenus dictis supponimus; ita quicquid quietem hanc interrumpere, illosque ad motum conciliare potest, *Vigiliæ* seu *Pervigilium* inducit. Atque hoc iterum vel aliorum morborum symptoma est, v. g. febrium, dolorum, dyspnæiæ, tussis, &c. vel sine alia ægritudine evidente, & ut morbus solitarius, afficit, ita tamen, ut nonnulli hoc sine molestia singulari ferant, alii verò mox languorem & appetitum prostratum inde percipiant.

## CAUSÆ.

Queritur: quænam sit causa Nimiarum Vigiliarum? Respondeo: omnis seu nimiarum Vigiliarum *Causa proxima* est *motus spirituum animalium*, aut nimius aut saltim continuatus in organa machinæ corporeæ, vel interna vel externa, cujus influxus, ut vocant, seu motus ratione promptè sensuum objectorum impressiones recipiunt, & postmodum pro ratione motionis in organo impressæ similiter ipsi in cerebro commoti varias animæ rationallis discursuum occasionibus subministrant. Ubi verò in sensibus externis nil percipitur, necessariò animal dormit, adeoque saltim ratione externorum sensuum, & hinc consequenter sensus communis, Vigiliæ vel Somnus oriuntur.

*Causa* verò *perpetui aut nimii spirituum influxus* seu *Remota* est duplex:

1. *Objectum sensibile* externum, fortius organon quoddam, tam intra quàm extra corpus, efficiens; adeoque



que tunc per modum symptomatis saltem se habent *Vigilia*.

2. Est ipsum vitium morbosum aut spirituum animalium aut cerebri, quo iidem mobiliore sunt.

*Spiritus animalium vitium* est, quando quavis ex causa mobiliore & quasi magis elastici redduntur iidem. *Cerebri vitium*, cuius occasione isti in continuo motu conservantur, est, aut pororum eius nimia apertio atque hiatus ex aliquali ejus ariditate seu siccitate, commodique nutrimenti defectu, unde etiam cerebri poris patulis spiritus in continuo sunt motu, unde tandem urgentur vigiliæ; aut irritatio quædam ipsarum fibrarum cerebri aut membranarum ejus propter nutrimentum acius aut falsius, aut propter serum acius, undecunque cerebro communicatum.

Præcipuam causam quod attinet: quando obiectum quoddam fortius organa sensuum afficit, necessariò spiritus agitantur & fortius moventur, quæ motiones secundum nervi ductum ad cerebrum usque continuatæ ceteros spiritus in cerebro similiter movent, unde necessariò vigiliat animal. Hinc videmus, quod clamor fortior, dolor quicumque, tam externus, v.g. capitis, quam internus, v.g. colicus, nephriticus aut iliacus, &c. in sensoriis externis spiritus in motus inordinatos cogant, somnum tollant, & vigiliis continuas inducant: item tussis, quatenus concutitur subinde totum pectus & totum nervosum systema, necessariò in Vigiliis deducit. Quin & dyspnoia, orthopnoia, &c. ordinariò Vigiliis infert, sed saltem symptomaticas, ob sensibilem illam molestiam, quam in pulmonibus & præcordiis excitat.

Præterea Obiectum spiritus afficiens sæpius in primis viis investigandum. Sanè in omnibus *Agrypnias* pertinacioribus vel vitium est in spiritibus animalibus & cerebro, vel per consensum est, ex vitio primarum viarum, digestionisque, plus minus vitiatæ ratione & undecunque præternaturalis, quæ oritur vel ex assumptis vitiosis, vel malè digestis, vel vitiosis alteratis, vel perversè distributis, quæ irritando partes sensibiles in illis locis, etiam nobis non sentientes, *Agrypnias* inferunt: v.g. qui largius cenant, infomes noctes ducunt; quibus alvus clausa est nimis, somnum interruptum habent. *Agrypnia infantum*, item pavores in somno, ex primis viis, præsertim circa stomachum, radicem habent.

Hæc de prima causa seu Obiecto quod inducit Vigiliis. Quoad secundam causam: est ipsum vitium spirituum animalium varium, à quo iidem ad concitatores & pertinaciores disponuntur motus: quod fit in junioribus & vegetioribus subiectis, laudabili & generoso victu & potu, moderatis tamen, utentibus, quibus spiritus nimis mobiles ac nimis agiles generantur; in his namque subinde vigiliæ solent urgere. Pertinet huc totius cerebri fervor & incallescencia in febribus ardentibus & similibus, cuius occasione velocius spiritus moti necessariò inducunt pertinaces Vigiliis: unde etiam in ætate, item in juventute, & ætate virili, in genere in cholericis, promptiores sunt agrypnia, somnique minus profundi. Hinc in ætate ab aere æstivo & servidiore, item sub climate æstivante sanguis, & ab hoc spiritus animales, quasi commoventur, hinc Vigiliæ excitantur. In specie miasmata petegrina & maligna, aut spiritus animales irritando & corrumendo, & inordinatè agitando, aut cerebrum ejusve membranas præternaturali sensu afficiendo, pertinaces Vigiliis inducunt in febribus malignis, quas deliria & variæ phreneses excipiunt; quia spiritibus animalibus vinosis quasi minus sociabilia sunt hæc miasmata, unde eosdem turbant. Similia miasmata spiritus exagitantia & in herba Theæ ac Coffeæ potione quoque concipere convenit. Quod etiam facit ejus carniarum ferinarum, in quodam vigiliis movens: Vid. RHODIUS Cent. 1. Obs. 3. Ad hunc causarum fontem pertinet etiam ipsa anima rationalis, curis intensis vel meditationibus & similibus occupata. Cum enim hæc ipsa utatur, seu instrumento, ministerio spirituum animalium, quorum motum graves curæ aut anxie meditationes intensiorem reddunt, necessariò Vigiliis Nimias inferunt. Pertinent hunc tandem animi affectus, ut amor, ira, insignis terror, pavor, metus in gradu intenso, &c. in quibus ob velociore & inordinatos motus nimis coacti spiritus non facile cessant, quin continuato motu *Agrypnias* inducant.

Quod verò attinet cerebri vitia: hoc Vigiliarum causa evadit, si meatus ejus patuli magis & laxiores exsunt, adeoque spiritibus animalibus nulla repagula imponuntur. In quo casu hoc peculiare observatur, quod ejusmodi ægri nullum torporem, nullam ad somnum propensionem, nullam-

que aliam molestiam inde percipiant; cuius causa aliqually cerebri & fibrarum medullæ ariditas, & squalor, ex defectu humoris nutritii (vel quatenus hic non generatur, vel quatenus absumitur) cerebrum humectantis, & sub nutritione poros angustantis, ratione cuius inane quoddam tractibus illis medullaribus contingit; hinc inedia diuturnior pervigilium inducit, de quo vid. MARCUS MARCI Phil. Veterum Rest. pag. 392. Nempe alimentis, imprimis temperatis roridis, humectatur cerebrum, & blandè moratur, ipsique adeò spiritus quasi aquosiores facti placidiore motu somnum inferunt; sed sub inedia, cerebro minus humectato, sed magis arido & poroso facto, ipsique spiritus animales subtiliores redditæ Vigiliis inducunt. Et hoc modo intelligenda est illa locutio plebeja; Æger non edito, ideoque non potest dormire. Faciunt huc etiam alimenta acriora & spirituosiora assumpta, & oleosa volatilia, tam aromata, ut piperata, cinnamomum, &c. quam alia, ut alluata, cepæ, cruccæ &c. à talibus enim spiritus animales sunt insigniter volatiles, acuti & quasi acres, unde ex velociori motu irritatum quodammodo cerebrum, & genus nervosum alteratum, Vigiliis inducit. Hinc Venus nimis, abusive instituta, causat Vigiliis nimias, partim quatenus ea spiritus animales insigniter commoventur, partim quatenus Venus exhaurit rorem nutrimentum cerebri ac partium spermaticarum nutritioni dicatum. Quod etiam facit agrypnia à sudore nimio & lienteria, item ab intemperativo purgantis usu, dum quidam sub fervore caniculari ex haultu purgantibus factis fuit agrypnus per tres septimanas; vid. M. A. N. Ann. 7. Obs. 185. p. 346. & tabaci abusu; dum quidam ex nimio abusu tabaci inciderit in agrypniam septendecim dierum. Equidem tabacum per se est narcoticum, interm ex nimio usu prævalet sal ejus volatile acre, quod salivam excitat, & simul rorem corporis chylosum evacuat, cerebrumque ita porosius reddit: conf. Miscell. Acad. Nat. Cur. loc. alleg. In specie scribis imprimis frequens symptoma est agrypnia, idque non tam ex spirituum vitio, quam partim cerebri textura alterata, partim digestionis primæ vitio. Nempe cerebri pori, nutritione in senibus nonnihil naturaliter deficientes, nimis aperti ac nimis patuli liberrimum spiritibus commeatum undique continuò permittunt, quorum placida quidem, sed continuatà motione, somnus deficit. Quoad digestionis primæ vitium verò; non saltim circa primas vias insensiles molestia spiritus turbant, dum minus commodè ea procedit, sed etiam deficientis chyli nutritivi causa, cerebrum partemque nervosam aridiores ac sicciore ferè redduntur: quare etiam his calefacientia, v.g. vinum, aliaque spirituosiora, somnum conciliant, ventriculi digestionem juvando; minimè verò humectantia & refrigerantia communiter dicta. Modò etiam agrypniam infert succi chylosi acrimonia, qualem scorbutus interdum inducere solet: quod etiam spectat, quæ de Theæ & Coffeæ supra adducta. Accedit hic senum ad rem attentio; senum enim continua sedulitas, & continua cura circa rem familiarem, quibus senilis ætas est exposita, calcar addunt spirituum animalium contumaci & magis continuo motui, unde Vigiliæ.

Denique Melancholici, maniaci & similes, præ aliis molestissima patiuntur pervigilia, ita ut quidam Melancholici per quatuordecim menses fuerit vigil & infomnis: et tales Melancholici, ut etiam per aliquot dies, imò menses, in continuis sint vigiliis, continuato cursu hoc malum sine virium debilitate perferunt; ac quidem multiplici ex fonte. Nam præter phantasmatum melancholici continuam speculationem supra insinuatam, eorum massa sanguinea acior, & vitio digestionis primæ acidior esse videtur, unde spiritus animales & ipsi minus volatiles degenerant à debilitate crassi, & aciores & asperiores, quodammodo acidiores & fixiores generantur ita inquinati, qui fibras cerebri medullares impetuosius vellicant, quæ commotæ motum novum & extraordinarium ipsis spiritibus denuò imprimunt: Unde ex pertinaci spirituum per eodem poros motu, præter alia pathemata continuè oriuntur vigiliæ, quæ & camphorâ curantur: In quo contiguo motu spiritus animales ne fortissimis etiam oplatis aufeulant, & somnum capiunt. Interim meculolitas & meditatio suum pensum huc conferunt.

## DIAGNOSIS.

Signa diagnostica per se sunt nota; æger enim si non dormit, satis manifestat se vigilare.

Præ ceteris tamen cognoscendæ causæ vigiliæ, quæ sunt faci-



faciles, quando æger fatetur se affligi curis, affectibus indulgere. In febribus ardentibus & malignis facile patet, unde sint vigilæ.

### PROGNOSIS.

Quoad *Prognosin*: *Vigilia nimia* non sunt contemnendæ, cum necessarii omnes vigilæ notabilem virium debilitatem inferant, quæ in somno reficiuntur, ac præsertim non raro in febribus acutis deliria ac motus convulsivos post se trahunt. Hinc HIPPOCRATES *Secl. 7. Aphor. 13.* à vigiliis convulsio aut delirium, malum pronunciat.

Deinde *Vigilia in ætate consistente aut in sexu muliebri* plus nocent, quàm in ætate juvenili aut in sexu virili.

Interim *Vigiliæ in morbis acutis* diu nequeunt durare, imprimis in febribus puerperarum, juxta canonem; quod caret alternâ requie, durabile non est: sed vel ad salutem vel ad mortem terminantur. In *chronicis* verò *morbis*, speciatim in affectibus melancholicis, interdum satis diu citra noxam continuantur vigilæ; v. g. in puella illa, cujus modò ex MARCO MARCI mentio facta fuit. Sic enim observatæ sunt eadem quadraginta quinque dierum continuæ. FERNELIUS *Patholog. lib. 5. cap. 2.* & SCHENCKIUS *lib. 1. Observat.* refert Vigilias quatuordecim mensium in mente capto.

Sed utut minus malæ sint in chronicis talibus Vigilæ, quàm in acutis; tamen quò diuturniores, eò tamen pejora symptomata tandem post se trahunt, ac nonnunquam in delirium & fatuitatem terminantur & stupidos reddunt, ut experientia testatur: sic PANAROLLUS *Pent. 5. Obser. 40.* refert puerum biennem sex menses in somnem, postea fatuum redditum: Aliquibus tamen minus exitiosæ existunt: vid. M. A. N. C. *Ann. 3. Observat. 185.*

### CURA.

In *Cura* Vigiliarum Agrypnia causarum remotarum, seu antecedentium imprimis habenda est ratio, adedque vel

1. *Obiectum* externum, quocunque modo systema nervosum afficiens, partes sensibiles plus minus irritans, & consequenter spiritus animales in Vigilias symptomata commovens, *removendum & sistendum*; aut
2. *Nimia spirituum animalium* agilitas & impetus blandis anodynis aut bene correctis narcoticis moderatè sistenda, itque ad motum blandiorem & torpidiorem quasi disponendi; aut
3. *Blandis temperatis & nutritivis*, & moderatis oleosis, *cerebro* ipsorumque spirituum animalium, dyscrasie, *prospiciendum*, ut spirituum acrimonia temperetur, & cerebri liccitas, hujusque meatuum amplitudo, per alimenta boni succi & humectantia seu oleosa corrigatur; ventriculi autem digestio vitiosa, si in culpa fuerit, emendetur.

Laceffentia exteriora, quomodo removenda, ex hætenus dictis partim constat, partim in vulgus innotescit. Causæ quia sunt vel acrimonia, vel motus sanguinis impetuosior, vel miasmata heterogenea, patet, quod *Universalis* vulgò dicta, nempe *venæ sectiones*, aut *purgationes*, etiam digestiva, &c. in Vigilis per se nil conferant, sed vel prioris indicari tantum intuitu alicujus usus sunt, ut nempe per accidens causam occasionalem auferant: scilicet quamvis v. g. *venæ sectio* interdum, ubi vigilæ urgent, postulatur, sit tamen hoc propter morbum adjunctum, sive causa vigiliarum existat sive secus: v. g. ubi peccat acrimonia scorbutica, catharsis aut evacuatio per sudorem; ubi exæstuat sanguinis, inflammatio dolorifica, &c. *venæ sectio* locum habet: vid. FORESTUS *lib. 10. Obs. 16.* Sic etiam refert DEODATUS in *Valetud. pag. 25.* Vigilias pertinaces aliis irritis per *catharticum melanogogum* fuisse curatas, quodque per accidens tantum, nempe ventriculi cruditatibus evacuandis, vigiliis aliquid contulisse, probabile videtur.

Pro secundo verò scopo satisfaciunt medicamenta hypnotica & narcotica dicta, quæ figere solent spiritus potenter, & promptè Vigilias sistunt. Nam utut sint maligna, tamen interdum coactus Medicus iisdem utitur, sed sint probè correctæ. Hæc ipsa narcotica sunt imprimis *Papaverina*, usitatissima jam antiquis, exque papavere inspissatus succus, aut expressione elicitus, dictus meconium, quod est nostrum opium; aut succus incisione spontè exstillans, quod est ge-

minum opium, quod correctum vigilias compefct; quia unum est ex genere solanorum exoticorum: sicut etiam omnes solanorum species narcoticam vim obtinent; nicotiana, radix folia & semen hyoscyami, mandragora ejusque radix, flores ligustri, item stramonium ejusque semen à BARTHOLETO commendatum tanquam singulare narcoticum, & quod simul hilaritatem inducat; uti & species ejus nobilior, *Datura Indorum* dicta. Hisce etiam *crocus* ejusque præparata; & suo modo *absinthium* addenda sunt; quæ duo cum papaverinis & opiatis frequentius usurpantur; reliquorum enim usus non adeò tutus est, quemadmodum ex radicis hyoscyami esu BORELLUS *Cent. 4. Observat. 45.* dementia annotavit. Aliàs notum est, quod opium assumptum ab incolis orientalibus, præter somnum, inferat somnia jucunda, contra verò septentrionalibus turbulenta, gravia, ac visiones cacodæmonum, &c. producat. Ex his ipsis hypnoticis varia sunt composita, & veterum & modernorum. Veteribus in usu sunt Philonium Romanum, Pilonium Persicum, Requies Nicolai, Pilulæ de cynoglossa, &c. quæ tamen ipsa remedia, cum cruda narcotica recipiant, jam propemodum in desuetudinem abierunt. Lococorundem à modernis Theriaca, Mithridatium, syrupus de papavere simplex & compositus, diacodium, electuarium discordii, ac laudana opiata infinita, & similia imprimis usurpari solent, inter quæ extractum opii cum tinctura tartari, aut per fermentationem *Laugelotti*, aut per digestionem cum sale tartari aut aliis salibus lixivialibus, item fermentum narcoticum *Conderingii*, excellunt. Et sane egregium est Laudanum opiaticum, si rectè præparatum fuerit. Permiscetur cum pulveribus; v. g. cum alexipharmacis mistum fit pulvis anodynus alexiterius; cum confortantibus fit pulvis anodynus confortans; item cum alexipharmacis liquidis fit Essentia theriacalis anodyna. Nam raro opium adhibetur, quin appropriatis addatur. Quibus etiam accensum aquam hypnoticam *Dornreilii*, aquam somniferam *Langii*, extractum & pilulas de stramonio, quæ easdem habent virtutes cum opio. BARTHOLETUS liquorem somniferum quendam præparat hoc modo:

24. *Sem. Papav.*

*Cucumer.*

*Stramon. nostr.*

Contusa cum f. q. aquæ ponit in digestionem simi equini per quatuor horas, postmodum filtrat, & ex retorta destillat lento igne.

Dosis est ʒss. ad ʒj. tanquam blandum somniferum.

Pilulas verò ex stramonio hoc modo præparat:

24. *Frucl. Stramon. ʒvj.*

Contundit & bullit in

*Aqu. lactuca ʒxj.*

ad tertie partis consumptionem:

Decoctum exprimit & digerit in sole, postmodum imbibit cum *Aqu. ardente* seu spiritu vini, & exliccat: Iterum spiritu vini humectat, & denuò liccat; hinc succi siccati vel inspissati ʒj. addit

*Croci ʒß.*

*Olei Cort. Citri scrup. ij.*

Miscet pro pasta pilulari.

Dosis à gr. j. ad gr. ij. quæ pilulæ præter somnum blandum etiam quoscunque fluxus sistunt.

Loco huius convenit Essentia seu Pharmacum phantasticum BARTHOLETTI, ac Laudanum sine opio sive ex fructibus daturæ Turcarum sive Indorum ejusdem, quod BARTHOLETUS in suo *Tracl. de Respirat. lib. 5. cap. 1.* describit; scilicet ex daturæ hujus pomorum succo expresso inspissato cum spiritu vini conficit Tincturam; cui ad consistentiam extracti inspissatæ addit crocum & nucem moschatam. Ac sanè datura infert somnum cum quadam lætitia coniunctum. Commendat etiam BARTHOLETUS essentiam opii cum spiritu vitrioli volatili paratam, & spiritum lolii quem omnium præstantissimum proclamat. Speciat huc etiam primum ens Veneris ex vitriolo cum sale ammoniacoparandum; item sulphur vitrioli anodynum, quamvis huc posteriori nihil ejusmodi virium concedat BARTHOLETUS l. a.

Sed de Opiatorum usu in Agrypnia benè observandum, quod monet WINCLERUS *Tr. de Opio pag. 244.* nempe quod opiata licet in vigiliis singulariter utilia sint, tamen iis nec semper, nec in omnibus utendum sit. Est enim, quando vigilie sunt instantis criseos signum; ubi ferè sunt omittenda opiata, nec natura labor impediendus. Est etiam, ubi senes diuturnis vigiliis torquentur, ubi potius analeptica,



conducunt, ut spiritus di-moschi dulcis, di-ambra, Ambra, & similia. Est tandem etiam, ubi Vigilia sunt ex angustia pectoris, ex dyspnoea, in hydrope, ubi opiata vix puto usurpantur; metus enim est ne somno fortiori provocato suffocentur acri. Est etiam, ubi vires exhaustae sunt, spiritusque deficiunt, ubi quoque minus opiata conveniunt. Hæc WINCLERUS. Et si quando usurpanda sunt, usurpentur eadem in quantitate parva, partitis vicibus, ut recte monet SEPTALIUS, adeoque repetitis crebrius in parva dosi eorum usu, quoniam eorum animam labefaciunt, & eos stupidi ingenti reddunt. In agrypniis melancholicis nihil faciunt, sed saltem temperata adhibenda sunt ex passulis, liquiritia, borragine, & similibus. Ex. gr.

℞. Conf. flor. papav. err. ʒj.

Theriac. vel Elect. diascord. ʒʒ.

Laud. opiat. gr. j.

M. f. Bolus. S.

Electuarium serotinum pro una vice.

℞. Cinnab. nativ. vel antimoni, vel mag. Corall. c. f. c. gr. xv.

Sacch. saturni gr. viij.

Laud. opiat. gr. j. vel ij.

cum ess. Croci f. Pil.

D. S.

Pilula vespertina ad quietem.

Sumantur vesperti hora ante pastum.

Pro tertio scopo, ut nempe temperatis nutritivis cerebro & dyscrasiis spirituum animalium prospiciatur, ad Vigiliis profunt vulgo sic dicta Refrigerantia & Humectantia, hinc temperata plus minus oleaginosa, & quasi lactescentia, chylosa blandè nutritientia, ut lactuta, & totus lactucarum exercitus, ejusque esus: hæc ipsa etiam jam à GALENI temporibus est in usu contra vigilias nimias. Videantur ZACUTUS LUSITANUS libr. 1. Med. Princ. Hist. 14 ubi refert, vigilias ex nimis meditationibus, aliis frustra adhibitis, peresum lactucarum, & per oleum nymphae naribus inunctum, curatas fuisse; Ubi etiam refert de GALENO, quod ipsi lactuca fuerit alexipharmacum vigiliarum, &c. Item Nymphae, ejus folia & flores, imprimis externo usu. Papaveris & ipsum hic convenit, item fench, chondrilla, flores verbasci, & plura inde parata remedia; In specie fructus seu nucleis & semina lactescentia, scilicet semina quatuor frigida maiora & minora, hordeum, amygdalæ dulces, piceæ, pistaciæ, nucleis persicorum, ut & ex iisdem nunc foliatis nunc cum semine papaveris & portulacæ, factæ emulsiones sunt usitatae & in specie cum semine stramonii, cujus gr. j. vel ij. addita mira faciunt, de quo supra. Hæc Emulsiones humectant blandè, temperant acrimoniam turgescientium humorum, blandè nutriunt, & successivè somnum inferunt: vid. SYLVIVS Pr. pag. 221. S. 25. Vel

℞. Sem. 4. frig. maiora ʒʒ.

Papav. alb. ʒij.

Amygd. dulc. ʒij. ad ʒʒ.

cum f. q. Aquæ Nymph. f. Emulsio:

cui adde

Aquæ Cinnam. ʒʒ.

Educor. cum syr. Nymph. vel Papav. vel cum

Rot. manus Christi perlat.

M. D. S.

Emulsio confortans ad quietem.

Vel

℞. Sem. Papav. alb. ʒʒ.

Melon.

Amygd. dulc. an. ʒij.

Aquæ flor. Sambuc.

Acac.

Hypnot. Dorner. an. ʒij.

f. Emulsio,

Educor. cum syr. Nymph. S.

ut antea.

His emulsionibus postmodum pro affectuum ratione, imprimis in acutis morbis, & alia morbis appropriata ulterius addi possunt: Verbi gratia ponam agrypniam in febre maligna, tunc

℞. Amygd. dulc. Amb.

Sem. Papav. albi an. ʒij.

Quatuor frig. mai. an. ʒij.

cum f. q. Aquæ scorzon. & Nymph. f. l. a. Emulsio:

cui adde

Aquæ Cinnam. (ratione virium) ʒʒ.

Bezoard. mineral. ʒj.

Educoretur oculis man. Christi. perlat.

D. S.

Emulsio vespertina pro una vice.

Hauriatur subinde. Hic enim Bezoardicum minerale resistit malignitati, in febre, quam suppono, obvia.

Decoctum hordei factum cum papavere & radice liquiritiae commendatur à LINDANO in agrypnia propter inedia vel defectu roris nutritii humectantis cerebrum; sicuti hordeaceorum temperatum usum proficuum expertus est BORELLUS Centur. 4. Observat. 89. in agrypnia, tussi & macie: Summatim: quæcunque diæta nutritiva & quasi semilactea ad talem agrypniam est optima.

Hæc de Internis & opiatis. Sed, ut dixi, imprimis habenda est ratio causarum; in specie ex inedia vel deficiente rore nutritio & siccitate, ubi conveniunt humectantia, hordeum, passulæ & glycyrrhiza, item emulsiones.

Quoad Externa: ad agrypniam in genere usitata sunt vel anodyna narcotica opiata, vel blanda humectantia, nunc temporibus ac fronti, nunc manibus ac pedibus in forma pediluviorum applicanda, quævis eorum usum S. A. N. CTORIUS Meth. l. 13. cap. 2. & PRIMEROSIUS de Error. vulgi lib. 4. cap. 45. nullius efficaciam judicent: scilicet Epithemata aut Lotiones ex decoctis vegetabilium emollientium & anodynorum, flor. ligustri, violarum, paralyseos, jaceæ, chamomillæ, nymphae, herba lactucæ foliorum nymphae, solani, summitatum anethi, foliorum salicis, vitis, violarum, corticis mandragoræ, capiti & seminis papaveris albi contusi, & similia. Emulsiones pariter ex nucleis persicorum, semine papaveris albi, quatuor frigidis majoribus & minoribus, hyoscyami, lactucæ & stramonii (quibus HARTMANNUS semen anethi, foeniculi, & anisi addit) cum aqua nymphae vel alia quodam, specifica vel lacte muliebri paratæ, fronti ac temporibus cum linteis multiplicatis applicatæ; sicuti & linteola lacte tepido madida fronti imposita insigniter conveniunt. Hujus etiâ loci sunt spongiæ cynosbati, Ger. die Schlaf Kunze & liquor vermiculorum in his repertorum, mense Augusto collectorum. Vermiculi hi conquassentur seu contundantur inter duos lapides, ut liquor exeat, qui colligatur in vitro & asservetur, quo liquore illinantur tempora; est enim sua ve & blandu hypnoticu sine omni periculo narcoleos. Item spongia somnifera ab HEURNIO Meth. lib. 2. cap. 7. descripta, ex succor. hyoscyami, papaveris albi, mandragoræ, morceli immaturorum, coriandri, lactucæ ana ʒj. Opii ʒj. Spongia ita humida facta vel imprægnata his succis, postmodum leni calore exsiccat, & naribus admoventur pro conciliando somno. Hinc sunt Emulsiones ex medulla crurum vituli & cervi recenti, quæ temporibus aliquoties tempore somni illitæ blandum somnum inducunt; vel accipiat xungia ex cruribus bovinis elixanda in aqua simplici elicita, quæ separata asservetur in vitro, & radis solaribus vel alii blando calore exponatur, ut depuretur, & post temporibus illinatur. Item suavem infert somnum pinguedo lucii piscis, vel leporis, oleum nymphae, anethinum, papaveris albi, nucis moschatæ expressum, hyoscyami, nucleorum persicorum, & similia. Quod etiam pertinet unguentum populeum recens, de alabastris & hypnoticum usitatum; quibus aliquot guttæ olei hyoscyami, interdum aliquantum croci interdum aliquot grana opi, addi possunt, imprimis ubi cum Vigiliis infestant dolores capitis. Denique pertinet huc Balsamus hypnoticus Mynsichti, & cerumen ex auribus asini quantitate pisi temporibus illitum in agrypnia febrium ardentium potens dicitur narcoticum. Sed observetur, ne augeatur dosis; aliis nimis profundus & diuturnus, somnus inducitur. Sunt quoque odorem quoque ejusmodi odoriferorum commendant, v. g. florum ligustri SENNER-TUS Pr. lib. 1. pag. 231. Item ZACUTUS LUSITANUS Prax. Hist. l. 1. p. 163. odorem decocti ex rad. mandragoræ, hyoscyami, semine lactucæ, opio, &c. commendat. Quod etiam odor Croci spectat, ejus gratia facculus, in quo hic asservatus fuit, à vulgo culcitæ supponitur. In M. A. N. C. Ann. 6. Observ. 171. aliquot prostant eyporista somnum conciliantia, qualia sunt: aures leporinæ abscessæ & pulvinari suppositæ; unguen illud seu crassamentum unctuosum, quod rotis molaribus agglutinatur, temporibus illitum; cranium humanum agro infuso subditum; succus nasturtii aquatilis cum aceto naribus illitus; pinguedo item lucii piscis eodem modo adhibita; pulvis ex foliis & semine hyoscyami albi sacculo capiti dormituri vel pulvinari suppositus, quod habet LANGIUS Epist. lib. 3. cap.



cap. 6. qui etiam aliquando hircines post aures applicuit, & remotis eis gr. j. opii vulneribus imponere solitus est; sicut etiam turundam ex grano uno & altero laudani opiatum cum aliis misti naribus efficacissime inditam videbitis in TIMÆI von Gulden-Klee Casib. pag. 94. Præterea specificè hic prodèst sanguis calidus animalium timidorum: v. g. recipiatur pul- lus gallinaceus trium vel quatuor septimanarum, subito- que disrumpatur, quò sanguis calidus in frontem patientis decadat.

Cæterum apud Practicos etiam clysmata & suppositoria magno cum fructu interdum ad somnum conciliandum inil- ciuntur, quibus gr. v. vel vj. Opii adduntur, ubi tutò in- ternè usurpari nequit opium: sed hæc vix adhibeantur, nisi Vigiliæ oriatur ex incessinorū dolore aut fluxu alvi; secus violentum sunt remedium; ZACUTUS enim LUSITA- NUS habet aliquot exempla mortuorum ex suppositoriis opiatis. Probatur clysterem habet SCHMUCK ex cort. radicis mandragoræ, & capitibus papaveris cum semine, in lacte coctis, & applicatis.

Formulæ somniferorum externorum sequentes esse pos- sunt:

- ℥. Fol. Aris,  
Salicæ,  
Nymph.  
Herb. Chamomill. cum flor. an. M. j. vel ij.  
Rad. Rhod. ʒj.  
Caryophyllat.  
Ircos Florent. an. ʒss.  
Cap. Papav. albi cum sem. contus. No. iv. vj.  
vel viij.  
Coqu. in f. q. Aqua simpl.

Quo decocto primò benè foveantur tempora, hinc laven- tur manus & pedes, ac linteis tandem involuti spontè exsic- centur. Vel

- ℥. Fol. latic. Salic.  
Viol. an. M. j.  
Fl. Ligustri,  
Nymph.  
Chamomill. an. M. ij.  
Cort. Mandra. ʒvj.  
Cap. Papav. No. x. vel xij.  
Locif. D. pro Pediluvio: S.  
Species ad pediluvium.  
℥. Olei Nymph. ʒj.  
Anethi ʒss.  
Expr. Papav. ʒj.  
M. S.  
Oleum ad somnum.  
℥. Ol. Papav. expr. ʒj. vel ʒij.  
Nucist. expr. ʒss.  
M. S.  
Unguentum somniferum.  
℥. Ol. Papav. expr. ʒij.  
Hyosc. expr.  
Nuc. mosch. ana ʒj.  
M. S.  
Ut antea.  
℥. Olei hyosc. cum ol. pap. compos. Lud. ʒj.  
Nucist. expr. q. s.  
M. S. ut supra.  
℥. Ol. expr. Papav. ʒij.  
Hyosc. ʒss.  
M. S.  
Oleum externum ad somnum.  
℥. Ungu. popul. vel hypnot. Off. ʒij.  
Extr. Opii cum spir. vini par. gr. lxx. ad viij.  
vel loco huius olei expr. sem. hyosc. ʒss.  
M. S.  
Unguentum somniferum.  
℥. Ungu. popul. ʒss.  
Ol. expr. Nucist. ʒss.  
Destill. Aneth. gr. xij.  
Extr. Opii scrup. ʒ.  
M. D. S. ut ante.  
℥. Ungu. alabastr. ʒij.  
Extr. Opii ʒss.  
Ol. destill. Aneth.  
Anis. an. ʒj.  
M. S. ut supra.  
℥. Ungu. alabastr. ʒij.

Ol. expr. hyosc. an.

Papav. an. ʒij.

Destill. Aneth. gr. vi.

M. S. ut supra.

℥. Nuc. persic. ʒij.

Sem. Papav. alb. ʒj.

Aque hypnot. Dorner. vel latic. muliebr. ʒvj.

f. Emulsio: adde

Opii gr. vj.

Croci gr. v.

M. S.

Emulsio externa ad somnum.

℥. Nuc. persic. ʒss.

Sem. Papav. albi ʒij.

Anethi.

Hyosc. an.

Lactuce an. ʒij.

Cum aqua hypnot. Lang. f. Emulsio:

D. S. ut ante.

Temporibus ac fronti applicentur.

℥. Aqua hypnot. Lang. ʒiv.

Philon. Rom. ʒij.

Camph. ʒj.

M. S.

Mixtura externa ad somnum.

Vel ad imitationem RULANDI in pertinaciori malo, imprimis quando simul ad sunt deliria:

℥. Aqua Rosar. ʒvj. vel viij.

Opii ʒij. ad ʒj.

Croci ʒj. ad ʒij.

Misceantur.

Mixtura hæc imbuta lintea tepidè applicentur tempori- bus, donec somnus accedat.

De Senum Vigiliis, aut etiam in Vigiliis, quæ insequun- tur diuturnas curas & meditationes, jam monitum fuit, non tam anodyna quàm confortantia plus minus aromatica, ventriculi digestionem primam promoventia convenire, vixque locum habent humectantia illa aut opiata, & que- cunque narcotica, quæ sunt pessima, adeoque talia reme- dia sic dicta calida, potus vini Malvatici, aut alius dulcis, item aqua vitæ apoplectica & aromata, essentia absinthii, & similia somnum inducentia. In specie verò vinum dulce & spiritus vini à pastu senibus convenit, in vigiliis ex vitiis cerebri dependentibus. Conferatur hic exemplum elegans HEINRICI ab HEER, qui Observ. 2. & 5. aliquot granis piperis albi conditi, nuce moschata, Zingibere, acoro vero & ambrâ griseâ Vigiliis sedatas testatur; sicut etiâ SCHEN- CKIUS lib. 1. Observat. refert mulierem Patavinam quin- decim diebus infomnem, tandem usu panis cum vino Mal- vatico quacerati somnum recuperasse; pariter remedia am- brata & moschata laudantur in WEDELII Opiolog. pag. 38. Sic quoque Agrypnis in affectibus sic dictis frigidis, v. g. in catarrhis, per usum piperis albi, item per electuaria ex aromatibus & calidis optime sopiuntur. Spectat huc etiam consilium RONDELETII Meth. curandi lib. 1. cap. 17. ubi ventriculo refrigerato, pro vigiliis tollendis olea & un- guenta calida; illis autem, qui ob merorem & curas vigi- lant, vinum meracissimum aut Hippocraticum commen- dat. Alii in vigiliis nimis à cruditate ventriculi spiritus vi- ni usum post cenam commendare solent: Siquidem omnia hæc promouent digestionem, & ad somnum blandum dispo- nunt. Sic pariter in agrypnis cum virium exhaustionem, spi- rituumque absorptionem Analeptica talia ex vino dulci sunt optima: aut si propinanda Papaverina aut Opiata, eadem aromaticis, in exigua admodum dosi, socianda, & sub ana- lepticis semper vehiculis propinanda sunt: quem morem Veteres in Philoniorum compositionibus observarunt. Ju- re-Consultus quidam ex diuturno literarum studio quatuor menses sine somno fuit, ita ut iam putaretur planè fatuus, nullis præsidiiis proficientibus Philoni Persici drachmâ unâ cum vino Malvatico exhibitâ bis vel ter, ad somnum rediit, Autore ZACUTO-LUSITANO lib. 1. Med. Princ. Hist. 13.



## ARTICULUS II.

## DE

## SOMNO NIMIO.

**A**bsolvimus Vigiliis nimias, quibus ipsi contrarium vltimum est *somnus* & *sopor nimius*, dum ægri aut nimium in somnum sunt propensi, aut actu nimis dormiunt. Multi autem affectus sub nomine affectuum sopororum solent circumferri, sed cum insigni confusione & errore. Fit hoc, iudicante sic LINDANO, quod propter neglectos fontes Hippocraticos alios Autores promiscue scrutantur; indeque in confusos errores promiscue lapsi fuerunt: quonon parum facit garrulitas GALENI, ejusque fallax autoritas, cujus vestigia alii insistentes, confuse admodum de affectibus soporosis egerunt. Interim optime distinxit hos affectus LINDANUS in *Melet. Med. & Chym. pag. 282.* cujus vestigia nos terimus. Cæterum antequam ulterius in explicatione sopororum affectuum progrediamur, distinguendus ante omnia est *somnus præternaturalis* & *nimius* ab *impotentia vigilandi*, ægris quibusdam ex nimia virium prostratione familiari. Nimius somnus est propensio in somnum, ita ut ægri in somnum inclinantes revera dormiant. Impotentia vigilandi verò est, dum scilicet ægri ex nimia virium prostratione & operationum animalium imbecillitate oculos apertos non amplius tenere, nec membra alia movere queunt, sed instar dormientium quieti jacent, utut revera oculis saltem clausis & conviventibus vigilent, nec perfectum somnum capiant. Quod patet ex eo, quod accessu personæ cujusdam inconsectæ, aut ad ejus auditam loquelam oculos nonnihil aperiant, gestus faciant, & se nonnihil moveant, sed mox collabi oculos sinant, & quod interrogati præ imbecillitate respondere vix possint, omnia tamen audire indicant, & si oculos haberent apertos, omnia viderent, utut impotentes sint ad obeundas actiones vigiliarum. Hic somnus non est præternaturalis, sed saltem impotentia ad vigilandum, Germ. *esist ein Matter Schlaf*, ubi nullo modo usurpanda talia, quæ aliis in affectibus soporosis conveniunt, sed potius restituentia, confortantia spirituosa, in specie ambata, sunt optima.

Observandum porro est, *somnum nimium* esse naturaliter alium *præternaturalem*, alium *nonnaturalem*. Somnus nimius naturalis est, quando quis ex habitu, consuetudine, aut alia causâ nimium dormit, quando scilicet dormit 24. horas. Nonnaturalis fit, quando quis ex errore externo quodam ad nimium somnum quasi disponitur, v. g. si quis ex abusu opii vel vini, vel post diuturnas vigilias, post exercitia, nimium motum, nimias lassitudines aut labores graviores: qualis somnus trium dierum & noctium contingens ob prægressam lassitudinem, vid. in PLATERI lib. 1. *Observat. pag. 5.* Conferatur etiam SALMUTH. *Cent. 3. Observat. 66.* de virgine quadam saltationibus defatigata, adeo ut per biduum sine somno esset, postmodum quatuor dies & noctes integras somno consumpsit. Sic refert alium ex itinere fessum, qui octodecim horas profundissime dormivit. Hic & similes somni naturales sunt, minusque ad affectus præternaturales sunt referendi. Quod etiam facit, quando post sanguinis excretionem, alvi profluvia, dolores magnos, animi pathemata graviora aliquamdiu continuata, adeoque in genere in omni spirituum, præsertim subito exhaustorum defectu, somnus naturalis imminet. *Observandum* quoque, quod imminentes *lipothymia* sub specie *somnolentia* seu propensionis in somnum interdum impo-  
nant, ex spirituum animalium defectu oriundæ: v. g. *hysterica* in graviore paroxysmo subinde admodum *somnolentæ* sunt; quibus tamen *lipothymia* imminet. *Mulier* quædam post partum debiliores *somnolentæ* sunt, sed revera *lipothymia* imminet. Post largiores *venæsectiones* aliasque sanguinis effusiones *somnolentia* observatur, sed quæ revera *lipothymia* minatur.

Sed quoad *somnum præternaturalem nimium*, adeoque affectus soporosos, affectus multi huc pertinent, qui cadunt sub considerationem Medici, variis nominibus, iisque confuse admodum insigniti, utut parum referat. Genuinam affectuum sopororum explicationem nominalem videb. in LINDANI *Meletematibus Physicis & Medicis pag. 282. seqq.* Placet hic SYLVII recere vestigia: adeoque præternaturalis *somnolentia* & inde dependens somnus vel

*solitarium* malum est, vel eadem *somnolentia delirium ferè comitem habet.*

Uti verò somnus naturalis ex imminuto spirituum in organa externa influxu dependet, propter aliqualem eorundem torporem, dum minus volatiles minusque subtiles, sed potius quasi phlegmatici redditæ, minus prompti sint ad obeundas animales functiones per solitas expansiones & excursionem; ita etiam in statu præternaturali somnoque præternaturali nimio nimius spirituum torpor considerandus venit. Dictum autem fuit, in somno naturali esse imminutum spirituum influxum in organa externa, nempe respectu motus eorum in vigiliis; non tamen penitus est abolutus: id quod ex eo est manifestum, quia etiam in somno partes externæ moveri possunt. Dictum etiam fuit ad organa externa influere spiritus: nam in somno internæ spiritus in cerebro velociter satis moveri & agitari possunt; quâ ratione in somno occasionem animæ rationali pro variis in somniis subministrantur.

Somnia sunt vel *asimantica*, nihil significantia; vel *simantica*, aliquid significantia, ut pollutio nocturna à copia gentium.

Hos inter affectus soporosos in specie horum quinque primariæ species considerentur: nempe (1.) *Carus*, (2.) *Coma*, *somnolentum & vigil*, (3.) *Lethargus*, (4.) *Noctambulones*, & (5.) *Catalepsis*.

## MEMBRUM I.

## DE

## CARO.

**C**arus est somnus adeo profundus, ut ager vix aut nullâ ratione denuo excitari queat, quin stertendo profundè admodum dormiat, salvâ tamen manente & integrâ respiratione; & licet à fortiori subiecto, e. g. punctura aciculæ, fortius commotus excitatur, unum vel alterum membrum moveat & loquatur, perfectè tamen excitari non potest, sed jacet talis æger sensu & motu destitutus, salvâ saltem respiratione, quæ sita enim non intelligit, multò minus ad hæc responderet: Uno nomine: *Carus proximus ad apoplexiam gradus*, proprièque est sopor gravis à vino, & hinc dicuntur *Carotici*, qui post vini nimium ab usum ita profundè dormiunt instar *caroticorum*, hinc traducta est appellatio. Propriè ergo *Carus* non tam morbus est, sed ex illo symptomatum genere quæ ex quocunque errore externo manifestæ sunt, v. g. ex nimia ebrietate; Nam si ab interna causa repentetali oritur somnus, revera ad apoplexiam pertinebit, eritque primus apoplexiæ gradus, seu apoplexia levior. Hinc *Carus* est, qui ab usum vini & spiritus vini insequitur; spiritus enim vini sulphureus non ritè cum spiritibus corporis humani junctus, iistam confuse permixtus continuum somnum insert. Præter tamen ebriositatem vinosam etiam abusus opii & narcoticorum *Carum* pertinacem insert, quacunque ratione applicetur; exemplum videb. in SALMUTH. *Cent. 2. Observat. 97.* ubi talis affectus fuit inductus à drachma una opii per clysterem injecti, & curatus per aliud clyster ex vino Malvatico injectum. Pertinent huc *fumi & gas carbonum* incensorum hauri; nam carbonem sulphureo sunt imprægnati, quod ipsum figendo spiritus *Carum* insert: exemplum videb. in FORESTO lib. 10. *Observat. 39.* ubi refert *Carum* à fumo carbonum ad expugnandum frigus in paroxysmo quartanæ. Ita sulphura mineralia immatura inspirata disponunt ad *carum*. Facit huc *gas & halitus potuum nimis fermentescensium*, vinorum, cerevisiarum & similium expirantes, qui ut suffocationis inferunt metum, ita etiam respiratione attracti somno profundo quasi obruunt ægros pariter & sanos. Facit huc etiam halitus calcis vivæ, parietibus recentè incrustatæ, unde in tali cubiculo dormientes ægri sunt *carotici*. Item facit huc nimius odor croci, qui vi narcotica ad gravem *carum* disponit, ut observavit BORELLUS in *Observat.* in famulo aromatarii, qui dormiens super sacculum croci semimortuus repertus fuit. Aliud exemplum videb. in Colleg. Pharm. in Schred. P. 1. p. 43. ubi de Croco. Pertinet huc abusus *summi nicotianæ*, cujus oleum ut ipsum est admodum narcoticum, & vi narcotica suâ caroticos reddit nimium haurientes: vid. OSVALDUS GREMBS in *Arbore Integra & corrupta Hominis lib. 3. cap. 1. §. 37.* Item nux juglans, vel potius, qui sub arbore



conducunt, ut spiritus diambrosi dulcis, diambra, Ambra, & similia. Est tandem etiam, ubi Vigiliae sunt ex angustia pectoris, ex dyspnœa, in hydropi, ubi opiata vix tuto usurpantur; metus enim est ne subito fortiori provocato suffocentur acri. Est etiam, ubi vires exhaustae sunt, spiritusque deficiunt, ubi quoque minus opiata conveniunt. Hæc WINCLERUS. Et si quando usurpanda sunt, usurpentur eadem in quantitate parva, partitis vicibus, ut recte monet SEPTALIUS, adeoque repetitis crebrius in parva dosi eorum usu, quoniam eorum antiam labefaciunt, & eos stupidi ingenti reddunt. In agrypniis melancholicis nihil faciunt, sed saltem temperata adhibenda sunt ex passulis, liquiritia, borragine, & similibus. Ex. gr.

℞. Conf. flor. papav. err. ʒj.

Theriac. vel Elect. diacond. ʒʒ.

Laud. opiat. gr. j.

M. f. Bolus. S.

Electuarium serotinum pro una vice.

℞. Cinnab. nativ. vel antimoni, vel mag. Corall. c. f. c. gr. xv.

Sacch. saturni gr. viij.

Laud. opiat. gr. j. vel ij.

cum ess. Croci f. Pil.

D. S.

Pilula vespertina ad quietem.

Somantur vesperti hora ante pastum.

Protertio scopo, ut nempe temperatis nutritivis cerebro & dyscrasiæ spirituum animalium prospiciatur, ad Vigiliæ profunt vulgò sic dicta Refrigerantia & Humectantia, hinc temperata plus minus oleaginosa, & quasi lactescencia, chylosa blandè nutritiva, ut lactuca, & totus lactucarum exercitus, ejusque essus: hæc ipsa etiam jam à GALENI temporibus est in usu contra vigiliæ nimias. Videantur ZACUTUS LUSITANUS libr. 1. Med. Princ. Hist. 14 ubi refert, vigiliæ ex nimis meditationibus, aliis frustra adhibitis, peresum lactucarum, & per oleum nymphae naribus inunctum, curatas fuisse; Ubi etiam refert de GALENO, quod ipsi lactuca fuerit alexipharmacum vigiliarum, &c. Item Nymphae, ejus folia & flores, imprimis externo usu. Papaverhæas & ipsum hic convenit, item fenchî, chondrilla, flores verbasci, & plura inde parata remedia; In specie fructus seu nuclei & semina lactescencia, scilicet semina quatuor frigidamajora & minora, hordeum, amygdalæ dulces, pinæ, pistaciæ, nuclei persicorum, ut & ex iisdem nunc solitariis nunc cum semine papaveris & portulacæ, factæ emulsiones sunt usitatae & in specie cum semine stramonii, cujus gr. j. vel ij. addita mira faciunt, de quo supra. Hæc Emulsionem humectant blandè, temperant acrimoniam turgescientium humorum, blandè nutriunt, & successivè somnum inferunt: vid. SYLVIUS Pr. pag. 222. §. 25. Vel

℞. Sem. 4. frig. maior. ʒʒ.

Papav. alb. ʒij.

Amygd. dulc. ʒij. ad ʒʒ.

cum f. q. Aquæ Nymph. f. Emulsio:

cui adde

Aquæ Cinnam. ʒʒ.

Edulcor. cum syr. Nymph. vel Papav. vel eorum

Rot. manus Christi perlar.

M. D. S.

Emulsio confortans ad quietem.

Vel

℞. Sem. Papav. alb. ʒʒ.

Melon.

Amygd. dulc. an. ʒij.

Aquæ flor. Sambuc.

Acac.

Hypnot. Dornet. an. ʒij.

f. Emulsio,

Edulcor. cum syr. Nymph. S.

ut antea.

Hæc emulsionibus postmodum pro affectuum varietate, imprimis in acutis morbis, & alia morbis appropriata ulterius addi possunt: Verbi gratia ponam agrypniam in febre maligna, tunc

℞. Amygd. dulc. Ambr.

Sem. Papav. albi an. ʒij.

Quatuor frig. mai. an. ʒj.

cum f. q. Aquæ scorzon. & Nymph. f. l. a. Emulsio:

cui adde

Aquæ Cinnam. (ratione virium) ʒʒ.

Bezoard. mineral. ʒj.

Edulcoretur rosulis man. Christi perlar.

D. S.

Emulsio vespertina pro una vice.

Hauriatur subinde. Hic enim Bezoardicum minerale resistit malignitati, in febre, quam suppono, obviæ.

Decoctum hordei factum cum papavere & radice liquiritiæ commendatur à LINDANO in agrypnia propter inedia vel defectu roris nutritii humectantis cerebrum; sicuti hordeaceorum temperatum usum proficuum expertus est BORELLUS Centur. 4. Observat. 89. in agrypnia, tussi & macie: Summatim: quæcunque dicta nutritiva & quasi semilactea ad talem agrypniam est optima.

Hæc de internis & opiat. Sed, ut dixi, imprimis habenda est ratio causarum; in specie ex inedia vel deficiente rore nutritio & siccitate, ubi conveniunt humectantia, hordeum, passula & glycyrrhiza, item emulsionem.

Quoad Externa; ad agrypniam in genere usitata sunt vel anodyna narcotica opiata, vel blanda humectantia, nunc temporibus ac fronti, nunc manibus ac pedibus in forma, pediluviorum applicanda, quamvis eorum usum SANCTORIUS Meth. l. 13. cap. 2. & PRIMEROSIUS de Error. vulgilib. 4. cap. 45. nullius efficacie judicent: scilicet Epithemata aut Lotiones ex decoctis vegetabilium emollientium & anodynorum, flor. ligustri, violarum, paralyseos, jaceæ, chamomillæ, nymphaeæ, herbæ lactucæ soliorum nymphaeæ, solani, summitatum anethi, foliorum salicis, vitis, violarum, corticis mandragoræ, capitum & seminis papaveris albi contusi, & simillium. Emulsionem pariter ex nucleis persicorum, semine papaveris albi, quatuor frigidis majoribus & minoribus, hyoscyami, lactucæ & stramonii (quibus HARTMANNUS semenanthos, feniculi, & anisi addit) cum aqua nymphaeæ vel alia quadam, specifica vel lacte muliebri paratæ, fronti ac temporibus cum linteis multiplicatis applicatæ; sicuti & linteola lacte tepido madida fronti imposita insigniter conveniunt. Hujus etiâ loci sunt spongiæ cynobati, Ger. die SchlafKunze & liquor vermiculorum in his repertorum, mense Augusto collectorum. Vermiculi hi conqussentur seu contundantur inter duos lapides, ut liquore exeat qui colligatur in vitro & asservetur, quo liquore illinantur tempora; est enim suave & blandi hypnotici sine omni periculo narcoleos. Item spongia somnifera ab HEURNIO Meth. lib. 2. cap. 7. descripta, ex succor. hyoscyami, papaveris albi, mandragoræ, morcelsi immaturorum, corlandri, lactucæ ana ʒj. Opii ʒj. Spongia ita humida facta vel imprægnata his succis, postmodum leni calore exsiccat, & naribus admoveatur pro conciliando somno. Hinc sunt Emulsionem ex medulla crurum vituli & cervi recentis, quæ temporibus aliquoties tempore somni illitæ blandum somnum inducunt; vel accipiat axungia ex cruribus bovinis elixanda in aqua simpliciter elicitæ, quæ separata asservetur in vitro, & radiis solaribus vel alii blando calore exponatur, ut depuretur, & post temporibus illinatur. Item suam vim hinc somnum pinguedo lucii piscis, vel leporis, oleum nymphaeæ, anethinum, papaveris albi, nucleis moschatæ expressum, hyoscyami, nucleorum persicorum, & similia. Quod etiam pertinet unguentum populeum regens, de alabastris & hypnoticum usitatum; quibus aliquot guttæ olei hyoscyami, interdum aliquantulum croci interdum aliquot grana opii, addi possunt, imprimis ubi cum Vigiliis infestant dolores capitis. Denique pertinet huc Balsamus hypnoticus Mynsichi, & cerumen ex auribus asini quantitate pisi temporibus illitum in agrypnia febrium ardentium potens dicitur narcoticum. Sed observetur, ne augeatur dosis; aliàs nimis profundus & diuturnus somnus inducitur. Sunt quoque odorem quoque ejusmodi odoriferorum commendant, v. g. florum ligustri SENNERIUS Pr. lib. 1. pag. 237. Item ZACUTUS LUSITANUS Prax. Hist. l. 1. p. 163. odorem decocti ex rad. mandragoræ, hyoscyami, semine lactucæ, opio, &c. commendat. Quod etiam odor Croci spectat, ejus gratia sacculus, in quo hic asservatus fuit, à vulgo culcitæ supponitur. In M. A. N. C. Ann. 6. Observ. 171. aliquot prostant eyporista somnum conciliantia, qualia sunt: aures leporinæ abscissæ & pulvini suppositæ; unguen illud seu crassamentum unctuosum, quod rotis molariibus agglutinatur, temporibus illitum; cranium humanum agro infuso subditum; succus nasturtii aquatici cum aceto naribus illitus; pinguedo item lucii piscis eodem modo adhibita; pulvis ex foliis & semine hyoscyami albi sacculo capiti dormituri vel pulvini suppositus, quod habet LANGIUS Epist. lib. 3. cap.



## ARTICULUS II.

## DE

## SOMNO NIMIO.

**A**bsolvimus Vigiliis nimias, quibus ipsi contrarium vitium est *somnus* & *sopor nimius*, dum aegri aut nimium in somnum sunt propensi, aut actu nimis dormiunt. Multi autem affectus sub nomine affectuum sopororum, solent circumferri, sed cum insigni confusione & errore. Fit hoc, judicante sic LINDANO, quod propter neglectos fontes Hippocraticos alios Autores promiscue scrutantur; indeque in confusos errores promiscue lapsi fuerunt; quo non parum facit garrulitas GALENI, ejusque fallax autoritas, cujus vestigiis alii insistentes, confuse admodum de affectibus soporosis egerunt. Interim optime distinxit hos affectus LINDANUS in *Melet. Med. & Chym. pag. 282.* cujus vestigia nosterimus. Ceterum antequam ulterius in explicatione sopororum affectuum progrediamur, distinguendus ante omnia est *somnus praternaturalis* & *nimius* ab *impotentia vigilandi*, aegris quibusdam ex *nimia virium prostratione* familiari. Nimius somnus est propensio in somnum, ita ut aegri in somnum inclinantes revera dormiant. Impotentia vigilandi verè est, dum scilicet aegri ex *nimia virium prostratione* & operationum animalium imbecillitate oculos apertos non amplius tenere, nec membra alia movere queunt, sed instar dormientium quieti jacent, utut revera oculis saltem clausis & conviventibus vigilent, nec perfectum somnum capiant. Quod patet ex eo, quod accessu personarum cujusdam inconsoetæ, aut ad ejus auditam loquelam oculos non nihil aperiant, gestus faciant, & se non nihil moveant, sed mox collabi oculos sinant, & quod interrogati præ imbecillitate respondere vix possint, omnia tamen audire indicant, & si oculos haberent apertos, omnia viderent, utut impotentes sint ad obeundas actiones vigiliarum. Hic somnus non est praternaturalis, sed saltem impotentia ad vigilandum, Germ. *es ist ein Matter Schlaf*, ubi nullo modo usurpanda talia, quæ aliàs in affectibus soporosis conveniunt, sed potius restituta, confortantia spirituosas, in specie ambrata, sunt optima.

Observandum porro est, *somnum nimium* esse naturaliter alium *praternaturalem*, alium *nonnaturalem*. Somnus nimius naturalis est, quando quis ex habitu, consuetudine, aut alia causâ nimium dormit, quando scilicet dormit 24. horas. Nonnaturalis fit, quando quis ex errore externo quodam ad nimium somnum quasi disponitur, v. g. si quis ex abusu opii vel vini, vel post diuturnas vigilias, post exercitia, nimium motum, nimias lassitudines aut labores graviores: qualis somnus trium dierum & noctium contingens ob prægressam lassitudinem, vid. in PLATERI lib. 1. *Observat. pag. 5.* Conferatur etiam SALMUTH. *Cent. 3. Observat. 66.* de virgine quadam saltationibus defatigata, adeo ut per biduum sine somno esset, postmodum quatuor dies & noctes integras somno consumpsit. Sic refert alium extirpare fessum, qui octodecim horas profundissime dormivit. Hic & similes somni naturales sunt, minusque ad affectus praternaturales sunt referendi. Quod etiam facit, quando post sanguinis excretionem, alvi profluvia, dolores magnos, animi pathemata graviora aliquamdiu continuata, adeoque in genere in omni spirituum, præsertim subitè exhaustorum defectu, somnus naturalis imminet. *Observandum* quoque, quod imminentes *lipothymia* sub specie *somnolentia* seu propensionis in somnum interdum impo-  
nant, ex spirituum animalium defectu oriundæ: v. g. *hysterica* in graviore paroxysmo subinde admodum *somnolentia* sunt; quibus tamen *lipothymia* imminet. *Mulieres* quædam post partum debiliores *somnolentia* sunt, sed revera *lipothymia* imminet. Post largiores *venæsectiones* aliasque sanguinis effusiones *somnolentia* observatur, sed quæ revera *lipothymia* minatur.

Sed quoad *somnum praternaturalem nimium*, adeoque affectus soporosos, affectus multi huc pertinent, qui cadunt sub considerationem Medici, variis nominibus, illisque confuse admodum insigniti, utut parum referat. Genuinam affectuum sopororum explicationem nominalem videb. in LINDANI *Meletematibus Physicis & Medicis pag. 282. seqq.* Placet hic SYLVII terere vestigia: adeoque praternaturalis *somnolentia* & inde dependens somnus vel

*solitarium* malum est, vel eadem *somnolentia delirium* ferè comitem habet.

Uti verò somnus naturalis ex imminuto spirituum in organa externa influxu dependet, propter aliqualem eorundem torporem, dum minus volatiles minusque subtiles, sed potius quasi phlegmatici redditi, minus prompti sint ad obeundas animales functiones per solitas expansiones & excursions; ita etiam in statu praternaturali somnoque praternaturali nimio nimius spirituum torpor considerandus venit. Dictum autem fuit, in somno naturali esse imminutum spirituum influxum in organa externa, nempe respectu motuum eorum in vigiliis; non tamen penitus est abolitus: id quod ex eo est manifestum, quia etiam in somno partes externæ moveri possunt. Dictum etiam fuit ad organa externa influere spiritus: nam in somno internè spiritus in cerebro velociter satis moveri & agitari possunt; quâ ratione in somno occasiones animæ rationali pro variis insomniis subministrantur.

Somnia sunt vel *asimantica*, nihil significantia; vel *simantica*, aliquid significantia, ut pollutio nocturna à copia genturæ.

Hos inter affectus soporosos in specie horum quinque primariæ species considerentur: nempe (1.) *Carus*, (2.) *Coma*, *somnolentum* & *vigil*, (3.) *Letargus*, (4.) *Noctambulones*, & (5.) *Catalepsis*.

## MEMBRUM I.

## DE

## CARO.

**C**arus est somnus adeo profundus, ut aeger vix aut nullo laratione denuo excitari queat, quia stertendo profundè admodum dormiat, salvâ tamen maente & integrâ respiratione; & licet à fortiori subiecto, e. g. punctura aciculæ, fortius commotus excitatur, unum vel alterum membrum moveat & loquatur, perfectè tamen excitari non potest, sed jacet talis æger sensu & motu destitutus, salvâ saltem respiratione, quæ sita enim non intelligit, multò minus ad hæc respondet: Uno nomine: *Carus proximus ad apoplexiam gradus*, proprièque est sopor gravis à vino, & hinc dicuntur Carotici, qui post vini nimium abusum ita profundè dormiunt instar caroticorum, hinc traducta est appellatio. Propriè ergo *Carus* non tam morbus est, sed ex illo symptomatum genere quæ ex quocunque errore externo manifesto fiunt, v. g. ex nimia ebrietate; Nam si ab interna causa repente talis oriatur somnus, revera ad apoplexiam pertinebit, eritque primus apoplexiæ gradus, seu apoplexia levior. Hinc *Carus* est, qui abusus vini & spiritus vini insequitur; spiritus enim vini sulphureus non ritè cum spiritibus corporis humani junctus, istam confusè permixtus continuum somnum insert. Præter tamen ebriositatem vinosam etiam abusus opii & narcoticorum Carum pertinacem insert, quacunque ratione applicetur; exemplum videb. in SALMUTH. *Cent. 1. Observat. 97.* ubi talis affectus fuit inductus à drachma una opii per clysterem injecti, & curatus per aliud clyster ex vino Malvatico injectum. Pertinent huc *fumi* & *gas carbonum* incensorum hausti; nam carbonem sulphureum narcotico sunt impræguati, quod ipsum figendo spiritus Carum insert: exemplum videb. in FORESTO lib. 10. *Observat. 39.* ubi refert Carum à fumo carbonum ad expugnandum frigus in paroxysmo quartanæ. Ita sulphura mineralia immatura inspirata disponunt ad carum. Facit huc *gas* & halitus potuum nimis fermentescentium, vinorum, cerevisiarum & similium expirantes, qui ut suffocationis inferunt metum, ita etiam respiratione attracti somno profundo quasi obruunt ægros pariter & sanos. Facit huc etiam halitus calcis vivæ, parietibus recentè incrustatæ, unde in tali cubiculo dormientes ægri fiunt carotici. Item facit huc nimius odor croci, qui vi narcotica ad gravem carum disponit, ut observavit BORELLUS in *Observat.* in famulo aromatarii, qui dormiens super sacculum croci semimortuus repertus fuit. Aliud exemplum videb. in Colleg. Pharm. in Schred. P. 1. p. 43. ubi de Croco. Pertinet huc abusus *fumi nicotianæ*, cujus oleum ut ipsum est admodum narcoticum, & vi narcotica suâ caroticos reddit nimium haurientes: vid. OSVALDUS GREMBS in *Arbore Integra & corrupta Hominis lib. 3. cap. 1. §. 37.* Item nux juglans, vel potius, qui sub arbore



bore juglandis dinctis versantur aut dormiunt, Caro corripitur, hinc etiam à Grecis veteribus nuces *capiv* dicuntur, quod somnum caroticum sive capitis grauedinem inducant: uid. HILDESHEIM in *Spicileg.* 4. pag. 394. de *Affect. capitis*. Denique hydrargyri seu Mercurii vapor intrò haustus, uti varia inferre symptomata facultatis animalis, ita pariter interdum Carum inferre, Autore PALMARIO de *Morb. Contagios.* dum uapore hydrargyri naribus excepto faber quidam aurarius statim graui somno correptus coneidit, & difficillimè postmodum curari potuit. Adeoque hi sunt propriè carotici, qui ex errore quodam externo in talem profundum somnum incidunt. Quò referendi etiam sunt ii, qui post graues purgationes, concussiones capitis, ejusque contusiones, siue casu ab alto siue quacunque læsione externa, profundo somno sepulti, & quasi apoplectici, jacent. Carus ergò pertinet ad affectus, qui oriuntur errore externo, narcoticà nempe alicujus rei ut, aut alià causà extrinsecus in corpus, siue assumendo siue inspirando illata, & omnes hi affectus Carotici proxime ad naturam apoplexiæ accedunt.

## M E M B R U M II.

## D E

COMATE SOMNOLENTO,  
ET VIGILI, seu CATA-  
PHORA.

Quoad Coma, illud est duplex; uel somnolentum, uel uigil. Si enim somnolentia jungatur cum delirio tali, in quo excitati egri fere deliria loquuntur, ac denuò in somnum relabuntur, uocatur *Coma somnolentum*, & *Cataphora* ab aliis dicta; hæc enim duo HIPPOCRATI sunt unum idemque. Insignem egri habent ad somnum propensionem, ita ut etiam actu dormiant, similiter tamen propter uaria insomnia sub somno delirent, faciliè excitentur, & excitati ad quæ sita respondeant, simul quoque in profundum somnum relabuntur. *Coma* hoc propriè non est morbus, sed est symptoma tantùm morbi; est enim sopor præternaturalis, qui febrientibus interdum accidit, tam in febribus continuis quàm intermittentibus, ubi egri admodum in somnum inclinant, imò etiam sæpè profundè dormiunt. In *intermittentibus* quidem rariùs, imprimis in principio paroxysmi, sed potiùs incremento, quando frigus in æstum mutari incipit; tunc enim febricitantes tales tali symptomate corripì solent, in specie si febres diuturnæ fuerint. In *continuis* uerò obseruatur sæpiùs *Coma somnolentum*, uel in principio morbi, uel cursu, uel declinatione: In principio quidem, quando egri graui morbo sepulti jacent: in declinatione, quando per metastasin materiæ morbificæ factio raptu defertur ad caput. Si autem cum tali somno adsunt uigiliæ internæ seu Insomnia, dicitur *Coma Vigil*, in quo egri habitu corporis externo, & organis sensuum externis, id est clausis & in somnum propensis oculis atque torpore, in somnum propendent, acetiam dormiunt, licet quoad internas operationes animales reuerà uigiliæ seu potiùs fortiora adsunt insomnia, dum tales somniando delirant, subinde faucibus apertis clamitant, interdum membra inordinatè mouent, excitati uerò faciliè oculos aperiunt, ineptè respondent & delirant. Uno nomine, adest, quoad externa sensuum organa, somnolentia summa; quoad interna. perpetuè uigiliæ cum delirio. Tale *Coma Vigil*, quod aliàs etiam dicitur *τυφωπία* seu *τυφωμανία*, ita ut hoc & coma vigil pro uno habeantur, rarè est affectus solitarius, sed ut plurimum aliis, v. g. phrenitidi, lethargo, speciatim in febribus malignis, solet esse obuius, in quibus tamen potissimum signum esse solet imminentium phrenitidum & convulsionum, uti rectè obseruat FORESTUS lib. 6. Obs. 38. in schol. adeò vix ab illis peculiarem curam postulat, modò illorum remediis adjungantur cephalica resoluentia, aut potiùs modò uigiliis, modò sopori, medela fiat, prout scilicet hunc aut illas prævalere obseruamus, id est, aut perfectus somnus, aut perfectæ uigiliæ inducantur, in quo posteriore casu postmodum opiata totum negotium absolunt. Conveniunt cataplasmata, qualia dabo Sect. 2. Cap. 3. Art. 6. ubi de Cephalalgia febrili. *Comata* hæc obseruantur interdum, sed rarè, sine febre: obseruatum enim fuit *Coma* ex crudis julis sambuci comestis abque febre in BARTHOLINI *Act. Med. Hafn. Volum. 1. pag. 64.* Sanè, ut rectè dicit VVE-

DELIUS de *Opio* pag. 46. rarissimos esse affectus soporosos, in quibus non simul calor præternaturalis percipitur; ita comata ut plurimum sunt symptomata febris, siquidem in *intermittentibus*, præsertim chronicis, non quidem in principio, sed sub incremento, quando mutatur frigus in æstum, statu & declinatione paroxysmi; egri profundè dormiunt; quin & in *continuis* subinde comata obseruata fuerunt, in quibus delirium vehementius subinde convulsionibus imminentes præfigit. Non solùm obseruantur in principio & cursu morbi, sed superveniunt etiam in declinatione, quando per metastasin materiæ morbificæ factio rapturà defertur ad caput, & ibidem coma insert.

## M E M B R U M III.

## D E

## LETHARGO,

Pertinet ad hos soporosos affectus tertio *Lethargus*, seu *Veternus* Latinis, Veteribus *Arabibus* *Subeth*, dictus qui propriè est sopor profundus ejusdem generis cum comate somnolento, cum delirio & insigni oblivione omnium rerum conjunctus, in quo affectu egri profundè dormiunt, & excitati licet, subito tamen in somnum denuò relabuntur, stupidi simul sunt & admodum obliuiosi, ita ut *Lethargici* excitati, si interrogantur, respondeant quidem, aliquid autem postulantes, e. g. matulam aut aliud quid petentes, dum illam adhuc in manu tenent, missionis tamen aut actionis perficiendæ obliviscantur, ita ut nesciant, quid cum repetita facere velint, ac in somnum relabuntur: Adest præterea delirium; excitati enim lethargici respondent quidem, sed inconditè & inconvenienter, non secus ac ii, qui naturaliter ex somno profundo excitati non adeò subito vel appositè respondent, sed inordinatè & ridiculè loquuntur. Cum hoc lethargo febricula lenta est coniuncta, eaque continua, quæ tamen serè vespertino ac matutino tempore exacerbatur; calor nec acris nec mordax est, pulsus sunt frequentes & magni, urina ut jumentorum redditur turbida. Primariam essentiam lethargi constituit sopor obliuiosus.

## M E M B R U M IV.

## D E

## NOCTAMBULIS.

Pertinet quarto ad hos affectus etiam, quando cum somno insomnia juncta sunt, ut in incubo & noctambulis, ut ut reverà propriè loquendo non sit affectus morbosus. Est enim reverà res maximam partem naturalis, dum clausis organis sensuum externorum egri tales dormiunt; validà uerò animæ rationalis, cum imaginatione, actione per spiritus paulò fixiores agitados uigilent, à quo posteriori etiam moveri quidam solent, nescientes tamen quorsum, adeoque est quasi *somnus uigilans*, & *uigilia somnians*. Uno nomine est *validum somnum*, quod non secus atque nos ipsi interdum in somno ea loquimur, quæ somniamus, movendo linguam, laryngem & maxillam inferiorem, interdum quoque pedes aut brachia movemus; ita hi *noctambulones* moventur ad istas actiones, ad quas somnium dirigit, dum dormiendo surgunt, ambulant, & varia opera pro exercendis ipsis vigilantibus aliàs insueta & horribilia, vel formidantia, vel impossibilia exercent, idque nunc clausis nunc apertis seu potiùs semi-conniventibus oculis. *Clausis quidem oculis* in iis locis, quæ interdum sæpius peragere solent; in locis uerò minus consuetis, in quibus etiam non sine nocumento versantur, oculis subinde *conniventibus* solent versari; idque interdum cum damno, dum cadunt ab alto, interdum sine nocumento. *Symptoma* hoc *hypochondriacis* est familiare, iisque, qui simul ad pathemata melancholica nonnihil inclinant, adeoque suo modo est iqualis affectus mixtus ex affectibus melancholicis & soporosis. & quasi gradus quidam levior delirii aut *melancholia hypochondriacæ*, ac simili etiam ratione curandus venit. *Auscultat* uerò subinde *luna phasibus*, unde nunc plus nunc minus affligit; unde etiam à quibusdam tales vocantur *Lunatici*, ut ut hoc nomine interdum etiam intelligatur epilepsia inveterata secundum lunæ phases plus minus affligens, usitatus tamen hoc



pamen hoc nomine noctambulatorum affectus venit.

Hos inter affectus primariam considerationem meretur Lethargus (nam cæteri aut sunt rari aut à causa oriuntur externa, aut alios comitantur morbos) qui revera est morbus primarius, nec aded rarus, simulque periculosus, & subinde in Praxi occurrit.

## CAUSÆ LETHARGI,

& reliquorum

## AFFECTUUM SOPOROSORUM.

Quoad causas somni præternaturalis, cujusque variorum modorum: sicut somnus naturalis dependet ex imminuto spirituum in organa externa influxu, ex aliquali eorundem torpore, dum minus volatiles minusque subtililes, sed potius phlegmatici facti, minus prompti sunt ad obeundas functiones animales per solitas expansiones & excursions; ita pariter causa proxima & ratio formalis Lethargi, & aliorum affectuum soporosorum in genere, est spirituum animalium nimis torpor seu elasticitas fracta, & plus minus impeditus motus intra cerebrum, quo inepti fiunt motionibus & expansionibus debitæ ad obeundos sensus & functiones necessarias, undè consequenter somnus supervenit.

Causam remotam, propter quam torpidi redduntur & deficiunt in motu, suggerunt ea, quæ naturaliter somnolentiam & nimium somnum inferre valent: nempe causa est vel

1. Spirituum paucitas & hebetudo.
2. Nimia aquositas ac pituitositas massa sanguinea, & in specie hinc cerebri, indeque phlegmatica spirituum animalium constitutio, qua instar spiritus violi non rite dephlegmati deficiunt in debita volatilitate & mobilitate, & torpidi redditæ faciunt tales affectus.
3. Virulencia stupefactoria quædam, quæ speciali virtute spirituum animalium impetum sistere, adeoque narcosis seu stupore eos inquinare & afficere, valet.
4. Quæ cerebrum mole sua comprimunt, v.g. sanguis tam intra vasa stagnans, quàm extravasatus, cranium depressum, & cerebri tumores.

Quod verò causæ hæc modò Coma, modò Lethargum, modò Carum producant, vehementiâ distinctos affectus, partim ex earum potentia maiore, partim quod exteriores & corticales magis quàm interiores & medullares cerebri tractus horumque spiritus afficiant, dependet: vid. RIVERRIUS Pr. lib. 1. cap. 2. & WILLISIUS de Anim. Brut. P. 2. c. 3. & 4.

I. Primò ergò spirituum paucitatem & hebetudinem, somnolentiæ ejusmodi autorem existere posse colligitur, quod quæ spiritus enervant ac dissipant, scilicet hæmorrhagiæ, coitus nimis, vigiliæ, lassitudo, &c. talem non raro producant: vid. PLATERUS Observ. pag. 6. & 7. quod etiam Catalepsis ex amore pertinet, de qua vid. TULPIUS lib. 2. Observ. 22.

II. De secunda causa remota, quod sæpè oriuntur affectus soporosi à nimia humiditate & inundatione cerebri, facta à sero & lymphæ, & ita à spiritibus animalibus quasi phlegmaticis constitutis, res minus dubia est.

III. De tertia causa queritur: an citra externa inspirata, assumpta aut admota, etiam humores in nostro corpore ita præternaturaliter alterari queant, ut vim anodynâ & plus minus narcoticam acquirere, & ejusmodi narcosis ex causis internis generari possit? Id quod affirmatur à SENNERTO Pr. lib. 1. Part. 2. cap. 32. & 33. ac WILLISIO de Anima Brutor. P. 2. cap. 3. §. 8. & 9. Quia extra corpus res non narcotica per certam mutationem secundum minima fiunt stupefactoriæ, quod videmus in musto, quod ante fermentationem nullam possidet vim inebriativam seu stupefactivam; quando verò mustum incipit fermentare, exhalat Gas insigniter stupefactivum: Vinum fermentatum pariter fit narcoticum, propter spiritus fermentatione in eo genitos: Sicut enim ex musto per fermentationem & secundum minima alterationem; sicut quoque ex ligno & carbonibus per combustionem natis & incensis, emergit de novo virulencia talis narcotica, quæ antea formaliter in iis non præexistebat: ita simili ratione nostro in corpore humores diversimodè alterari, ac similem virulentiam stupefactivam inducere ac acquirere possunt. Simili modo ac morsus

hominis irati venenosus est: vid. RHEDI de Vipera, Archiater Florentinus, contra quem quidem scripsit CHARRAS, natione Gallus. Hinc HELMONT. Venenum inebriativum soporosos affectus producere ait. Et talem vim anodynâ etiam subinde in affectibus soporosis, præfertim Lethargo, pro causa similiter agnoscit WILLIS. de Anim. Brutor. P. 2. cap. 3.

Quod ergò attinet agnoscatem & inundationem, ac pituitositatem sanguinis & cerebri, indeque oriundum torporum spirituum animalium, notum est ex structura cerebri, quod in hujus substantia corticali separantur spiritus ex sanguine, ita ut depuratissimi ab omni phlegmate aquoso seu ab omni latice in cerebrum scaturiant; hinc non tantummodo substantia cerebri medullaris pinguis & quasi oleosa percipitur, nihil aut parum aquositate admittens, sed etiam ob id receptacula in cerebro hinc inde pro recipiendo sero sunt excavata, nempe ventriculi. Præterea reperiuntur etiam hinc inde confixæ glandulæ copiosæ, quæ, quicquid superfluum est aquæ, absorbent, & sub lymphæ nomine aliorum derivant, cum & ipsa tota corticalis cerebri substantia, per quam imprimis fit spiritus animalis filtratio & quasi destillatio, glandulosa sit, lympham & latitem uberrimè absorbens, & volatiles exinde generans spiritus animales. Quodsi ergò fiat, ut nimis humectetur aut irrigetur præternaturaliter cerebrum à tali seroso latice aut lymphæ, sive in istud influente, sive in ventriculis ejus, & per consequentiam etiam substantiâ, stagnante, veletiam ex massa sanguinea, mediante collunie serosa variis recrementis onusta, in cerebrum destillet, qua ratione loco criseos Lethargum subnatum, per decubium materiæ morbosæ in cerebro observat WILLIS. cit. loco; qui ipse tam in Anatom. Cerebri, quàm P. 2. de Anim. brutorum cap. 3. in Lethargicis quoque alia loca sero inundata obser. A tali causa spiritus volatiles animales in porulis cerebri hinc inde refertis, propter impedimenta motus debitæque expansionis, minus mobiles, torpidiores & quasi phlegmatici ac minus mobiles redduntur, & hinc in nervos radiatio admodum impeditur, unde pathemata soporosa lethargica, item obliuio & expeturbato spirituum motu delirium supervenit. Vid. quoad hanc materiam WILLISIUS in Anat. cerebri, qui sepius in lethargicis ventriculos cerebri semper aquâ seu copioso sero repletos invenit; item Tract. Anima Brutor. P. 2. ubi de Lethargo pag. 309. quod idem confirmat CAROLUS PISO de morb. serosis Sect. 2. Part. 2. cap. 3. & 6. His ergo repletis, id quod superest laticis aquosi, necessariò cerebrum inundat, & ita necessariò occasionem lethargo præbet. Hinc est, quod subinde ex Hydrocephalo oriatur lethargus, teste HILDANO Cent. 1. Obs. 10. Item Cent. 4. Observ. 10. sicuti etiam SEVERINUS observat infantem hydrocephalo laborantem, in eleganti Tr. de Occulta Abscessuum natura. Hinc illi, qui constitutionis sunt phlegmaticæ, naturaliter somnolenti esse magis solent, non secus ac naturaliter infantes propter eorum cerebrum fluidius, mollius & humidius, copioso sero rorido inundatum, & spiritus animales ob id torpidiores minusque subtiles, admodum soleant esse somnolenti. Hinc observatum fuit, quod à crebriori capitis lotionem coma somnolentum enatum in nobili Polonio refertur in M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 327. p. 541. Sic quando incipiunt affligere catarrhi, & similes affectus capitis serosi, lymphæ in cerebri partibus copiosius congestæ ante sui excretionem nimis humectando cerebrum, ut plurimum ad gravitatem capitis & extraordinariam quandam in somno propensionem solet disponere. Hinc est, quod suppressio urinae à calculo renum subinde insignem soporem solet inferre: Sic coma vigil à sero enatum in senere refert PISO Tr. de Colluvie serosa pag. 78. & SANCHEZ in Observ. pag. 380. refert, quendam, quicum laborasset comate vigiliis, febre continua, in capite ejus inventi sing. cerebri ventriculi multà aquâ pleni. Unde etiam petenda ratio, quare lethargicis facies fit pallida & tumida, oculique tumidi, ut serè lis evenire solet, qui crapulam nondum edormiverunt, vel lethargici quoad faciei habitum quasi Leucophlegmatici videntur. Facit huc observatio DECKERI in Barbette, pag. 36. de lethargo gravi, sternutatorio curato, copiosissimum pus per nares alliciente. Sic lethargum periodicè repetentem cum arthritide ex vitio seri observat PISO cit. loco: sicuti similem lethargum periodicum singulis annis eodem die recurrentem notat BORELLUS Cent. 4. Observat. 67.

Quod attinet vim narcoticam succorum corporis ex eorumdem præternaturali degeneratione enatam, spiritus anima-



Cari prognosifemper est mala, praesertim si febris con-  
eluis aliisque morbis cephalicis, & plagis succedat: siue au-  
tem ad salutem siue mortem terminetur, ab it non raro uel  
in apoplexiam, uel in paralyfin & spasmus; Vid. WIL-  
LISIUS loc. all. cap. 4.

## C U R A.

In Cura Lethargi respectus habendus est imprimis ad Cau-  
sas remotas supra deductas, adeoque uel

1. Nimum phlegma, massam sanguineam ac im-  
miscerebrum inundans, est euacuandum; nunc  
per aluum, nunc per sudorem, nunc per uesica-  
toria, nunc per sternutatoria & similia; Vel
2. Spiritus torpidi excitandi; nunc acidis, si uirulen-  
tia narcotica peccauerit; nunc uolatilibus acro-  
ribus plus minus aromaticis, & ita uirulentia  
narcotica corrigatur: ubi à nimia humiditate ce-  
rebrum malum originem duxerit, interne acibus,  
sensuum organa uellicantibus, somnus nimis  
impediendus.
3. Cerebrum aromatibus, & spiritus animales in-  
motu deficientes restituendi, & in statum natura-  
lem redigendi sunt.
4. Lesiones externae, si adfuerint, per Chirurgiam cu-  
randae.

Quoad primam indicationem: inter euacuanda venae-  
sectio in Lethargo à sola narcosi interna uix conuenit; ast ubi  
à colluuierecrementorum, mediante sanguine & sero ce-  
rebrum inundante, malum ortum fuerit, uenae sectio ferè  
semper necessaria est pro scopo auerforio aut derivatorio, &  
quidem primò in brachio, uel secundum quosdam recentio-  
res in uenis iugularibus (uid. WILLISIUS loc. cit. pag.  
319. RIVERIUS loco all. & RIOLANUS Enchirid.  
Anatom. Patholog. lib. 3. cap. 93.) postmodum, si opus fue-  
rit, in crure; siue sanguis causae principalis, siue adiu-  
uantis, rationem habeat, modò grās & uires illam ferant,  
quae non tam ex actionibus nunc deficientibus, quàm qua-  
les ante insultum fuerint, estimandae. Quem in finem, &  
quò sanguiniseductio repeti queat, non una uice tantum,  
quantum opus est, statim sanguinis emittatur, cum per le-  
ratam sanguinis missionem Reuulsio commodius fiat, uires-  
que magis conseruentur. Quibus non sufficientibus altero  
die cucurbitula scarificata intra scapulas, aut hirudines  
fronti, temporibus, & prope aures applicari possunt.

Simul uerò mox in principio acris & fortiter stimulantia  
clysmata iniecta & suppositoria optimo cum successu con-  
ueniunt, praemis si Purgantia non possint conuenienter  
adhiberi: quibus imprimis addenda salia uolatilia: v. g.  
sunt tales clysteres ex Centauro minor, maiorana, sal-  
ua, origano, absinthio, serpillio, ruta, pyrethro, selle  
tauri inspissato, pulpa colocynthidos in petia ligata, cum  
electuario de hiera picra cum agarico, cum electuario Indo,  
& similibus: v. g.

24. Herb. Absinth.

Centaur. min.

Fol. ruta an. M. j.

Rad. Pyrethr. ʒiij.

Pulp. Colocynth. in per. lig. (aliàs exulcerat  
intestina) ʒss. ad ʒi.

Coqu. in f. q. Aquae commun.

Colat. ʒix. adde

Elect. hier. cum Agar. ʒi.

Fellis tauri inspiss. ʒi.

Salis vol. succini ʒss.

Miscell. ovi No. i.

(Vel ubi fortius stimulandum

Salis gemm. ʒss.)

M. f. Clyisma; S.

Clyster abstergens.

Aut

24. Fol. Asari uel Nicot.

Herb. Ruta,

Flor. Centaur. min.

Stachad. Arab. an. M. ʒss.

Rad. bryon.

Gentian. an. ʒss.

Pulp. Colocynth. in per. lig. ʒss.

Coqu. in f. q. Aquae comm. uel urinae hum.

In Colat. ʒvii. dissolue

Elect. hier. picr. cum agar. ʒi.

Ettmull. Oper. Tom. II.

Fell. tauri inspiss. ʒi.

Eff. Castor. ʒiij.

M. f. Enema.

D. S. ut supra.

Vel ad imitationem PLATERI Pr. Tom. 1. pag.  
322.

24. Succ. betae ʒij.

Ruta.

Saturcia an. ʒi.

Mell. rutac. ʒss.

Ol. nucum ʒij. vel diacolocynth. ʒi.

M. f. Enema.

Item subinde applicentur suppositoria, eaque etiam acu-  
tiora; nunc scilicet suppositoria acuta usitata, illita cum  
felle tauri, aut illita cum oleo Colocynthidos Quercetani;  
vel praeparentur de nouo ex melle inspissato cum sale gem-  
mae, aut ex felle tauri inspissato, cum speciebus hie-  
rae picrae, & similibus, quae cum melle coniunguntur in formam  
suppositoriorum applicanda:

24. Spec. hier. cum Agar. ʒss.

Sterc. mur.

Fell. tauri inspiss. an. ʒi.

Cum f. q. Mell. anthosaf. vel rutac. f. supposito-  
rium,

Cum oleo dia-Colocynth. aut Myrrhae illinendum.

Quod si nec resuscitari uidetur aeger, praemissis talibus ve-  
sicatoria largiora & paulo acriora, item sternutatoria, sum-  
mo cum successu usurpantur in lethargo, & tunc imprimis,  
quando oriuntur affectus comatosi in declinatione cuiusdam  
morbi; tunc enim propter metastasin materiae usurpantur:  
illa quidem pro scopo auerforio; haec autem pro scopo exci-  
tatorio, ac simul euacuatorio, sed non nisi illis prius pra-  
missis: v. g.

24. Pulv. Cantharid. ʒi. ad ʒij.

Euphorb. ʒss. ad gr. xij.

Castor. gr. xv. ad ʒi.

Ferment. accrr. ʒss. ad ʒi.

M. f. Cataplasma vesicatorium,

D. S.

Emplastrum vesicatorium.

Nam acris ac dolentia in talibus aegris omnino requi-  
runtur. Vel

24. Empl. citrin. vel diachyl. Irac.

p. iij.

Pulv. Cantharid. p. j.

Misc. & malax. cum ol. Euphorb. pro Vesicatorio.

D. S. ut antè.

Applicari nunc possunt ordinario modo nuchae, id est lo-  
co circa aures uel collum, nunc vertici, nunc ad imitatio-  
nem WILLISII sineipiti, nunc occipiti, nunc brachiis,  
nunc scapulis, pro scopo derivatorio; nunc erubribus pro  
scopo revulsorio: uid. WILLISIUS de Anima Brutor.  
cap. de Lethargo. Imò etiam applicentur parotidibus, pra-  
emis si has in tumorem attolli observatur, cum inter-  
dum soporosi affectus per has resoluantur, & lethargum  
surditate solum ZACUTUS LUSITANUS l. i. Prax.  
Admir. Obseru. 18. annotavit. Quanta autem efficacis in  
his casibus vesicatoria sint, WILLISIUS l. a. duobus exem-  
plis notabilibus testatur.

Curavi puellam quatuor annorum, quae laborabat tinea  
capitis, qua evanescente superueniebat Epiphora, oculi  
dextri cum sensu oculi atrophia. Hac cessante, superue-  
niebat febricula lenta, omni vespere exacerbabatur cum  
continua in somnum propensione, quae omnino superuenie-  
bat extineae capitis & eiusdem fermento acris, mediante  
lymphæ ad interiora raptis: puella erat intractabilis, om-  
niaque remedia respuebat, unde defectu aliorum remedio-  
rum applicabam vesicatorium nuchae ex emplastro citrino,  
liquefacto cum cantharidibus, quod ingentem vesicam ef-  
ficiebat cum copiosissimo feri profluvio: unde altera die  
omnis febris & somnolentia evanescebat, epiphora cessa-  
bat, & tandem tertia die restituebatur.

Quod si ab his affluxum aliquantum sedatum esse digno-  
scas, maturè adhibeantur Purgantia. Inter ea autem pri-  
matum obrinet Vomitus, qui si commodè potest institui (sta-  
tim enim in principio, nisi à causa externa, aut à uirulen-  
tia narcotica interna fuerit, obesse potius quàm prodesse  
videtur, prout contra communem agendi modum testa-  
tur WILLISIUS loc. all.) admodum proficiuus est, ut  
vel uirulentia narcotica, vel copiosi succi evacuentur: sic  
enim RIVERIUS Cent. 4. Obseruat. 18. puerum quin-  
que



que annorum veterino correptum acri clystere & vomitu curavit. Hæc inter, uti notum est. eminent. Emetica antimonialia seu vina emetica: Item Tinctura Nicotianæ cum spiritu vini extracta, ad drachm. ij. propinata. Loco Vomitoriorum si non sufficiant illa, aut forte nequeant vomitus instaurari, Purgatio per alvum instituitur citò, neglecta temporum electione; Neque enim timidus aut cunctabundus Medicus in purgandis Lethargicis debet esse, & quidem forti medicamento fiat, aliàs enim eventus frustrabitur. Inter Purgantia imprimis est purgans ex scammonio, cui semper Castoreum, quod affectuum sopororum appropriatum est alexipharmacum, commisceatur, & jam à TRALLIANI ætate fuit celebratum: v. g.

℞. Castor. ℥ij.

Scamm. præp. ℥j.

M. pro 2. dosibus, & detur in vehiculo oxy-mel.

Quociravit BORELLUS virum quinquaginta quinque annorum, uti videre est in Cent. 1. Obser. 52. Conf. ZACUTUS LUSITANUS lib. 1. de Med. Princ. Hist. 16. ac FORESTUS lib. 10. Obs. 33. qui curavit Lethargum beneficio pilularum Cochiarum, cum castoreo propinatarum. Aliàs Extractum melanagogum Quercetani à scrup. j. ad drachm. ℥. item Extr. esula aut trochiscor. albandi à gr. vj. ad xij. usurpatur, aut aliis addita pro stimulo conveniunt.

℞. g.

℞. Extr. phlegmag. Querc. ℥. g. ad ℥. j.

Castor. vel Castor. pulveris. ℥. g.

Troch. alband. gr. ij.

Resin. Jalapp. gr. i. ij. ad V.

Cum es. Castor. f. Pilulæ.

D. S.

Pilule purgantes.

℞. Masse Pilular. cochiar.

Hier. cum agar. an. gr. jx.

Mag. Jalap.

Extr. Castor. an. gr. iij.

Troch. alband. gr. ij.

M. f. Pilul.

D. S. ut antè.

Disquis pilulis commodè etiam Mercurius dulcis addi potest, cum hic in similibus affectibus aliàs sit egregius. Vel

℞. Crystall. Tartari gr. xv.

Scamm. præp. ℥. g.

Mag. gum. de Peru gr. iij.

M. f. Pulvis. S.

Pulvis purgans.

℞. Ess. Jalapp. ℥. g.

Scamm. ℥j.

Castor. ℥. g.

Syr. dia. Caribam. ℥. li.

M. S.

Essentia purgans.

Præmissis hisce modò narratis universalibus, idque imprimis in casu, quod oriuntur affectus soporosi à colluvie serosa (nam si virulentia narcotica hos affectus induxerit; vomitus sufficit) progressus faciendus est ad ea appropriata, quæ aut spiritus animales excitant, volatilisant, & agiles reddunt, eorum torporem excutunt, & ita somnolentiam nimiam compescunt, acrimoniâ suâ subtili penetrando, & sensuum organa vellicando, aut eosdem plus minus restituant & augeant, aut virulentie narcotice resistunt.

In casu ergo colluviei serosæ peccantis alcalia acris volatilia plus minus aromatica, ex plantis acris cephalicis desumpta, sunt optima; sicuti, quando virulentia narcotica peccat, acida, imprimis acetum, sunt optima. Utroque in casu primum ducit Castoreum, reliquis remediis semper sociandum: singulare est remedium contra affectus soporosos; hinc quævis inde parata interna & externa, vel sola, vel cum acidis, vel alcalibus mixta, præsertim eius essentia cum spiritu salis ammoniaci urinoso parata, in largiori dosi propinata, est egregia. Conveniunt ergo in priori casu ruta, serpillum, Pulegium, Organum, satureia, salvia, Calamus, aromaticus, Raphanus, Cubeba, semen sinapi, Ervæ, Nasturtii, &c. quæ ipsa insigniter laudantur ad curandum lethargum; Scilla & stipellia acris volatilia, exque his parata remedia, spirituum animalium torporem corrigentia: Hinc & salia volatilia quæcunque, tam acris quàm olensia facta, in Lethargo, apoplexia & Caro, salubriter usurpantur: nempe spiritus salis ammo-

niaci. spiritus formicarum volatilis, spiritus seminis sinapi, sal volatile urinæ, succini, & quæcunque alia, quod acriora, eò meliora, cum vehiculo aquæ liliorum convallium spirituose propinata, sunt optima, quibus WEDELIUS plus præferebat in affectibus soporosis, quàm spiritibus aromaticis sulphureis: Videatur Opiologia eius pag. 46. 47. & 52. Quibus spiritus, olea & essentia vegetabilium adiungenda, v. g. Essentia anthos, maiorana, liliorum convallium, ruta, croci, spiritus & elixir citri, Essentia ambregum spir. rosarum vel spir. liliorum convallium, cerasorum nigrorum, oleum anthos maiorana, ruta, caryophyllorum, salvis, satureia, similiaque, tam simplicia quàm composita, per se nota, adduntur. Decoctum herbe Theæ à modernis admodum decantatum optimè convenit, somnolentiam nimiam naturaliter discutens citra virium dispendium; hinc commodè cum aliis appropriatis, in specie post crapulam, usurpari potest. Est plantula Sinensis & Japonensis foliis myrtinis: hæc collecta coquitur in aqua, istiusque decocti, quod saporem acquirit aromaticum, haustus interius assumptus mirum est quàm arceat omnem somnum, ita ut quis etiam per triduum sine somno continuò persistere possit: hinc etiam acuit admodum ingenium. Venetiis, ni fallor, in Germanico domo, in Emporio Germanorum, est in usu. Preparandi modus & descriptio huius herbe videatur in TULPIO lib. 4. Observat. cap. ult. item in WORMII Mus pag. 165. item BORELLO Cent. 2. Observat. 39. item SCHROEDERO in Pharm. Append. item DEODATI Valetudinar. pag. 169. Denique est radix Indica, quæ vocatur radix Cusci, quam mirificam externo usu esse ad curandum Lethargum refert KIRCHERUS in Regno Natura Magnet. pag. 45. De his acris remediis torporem spirituum excutientibus, vid. SYLVIVS lib. 2. Prax. cap. 26. E. g.

℞. Aquæ Maioran.

Ruta an. ℥. g.

Apopl. ℥. vi.

Ess. Castor. ℥. g.

Spir. fulig. ℥. ij.

Syr. de Beton. ℥. j.

M. S.

Mixtura emolliens cochlearum sum.

℞. Spiritus serpill.

Cort. Citri an. ℥. g.

Sangu. hum. ℥. j.

M. D. S.

Spiritus emolliens.

℞. Conf. Salvia,

Anthos

Lavend. an. ℥. j.

Spec. di Anthos ℥. g.

Pulv. Cubebar. ℥. j.

Sem. sinapi

Castor. an. scrup. ij.

Cum syr. flor. pæon. f. Electuarium:

D. S.

Electuarium emolliens ad Caput.

De reliquis infra Sect. 3. Capit. 3. Artic. 1. ubi de Apoplexia, dicetur.

Quod si verò virulentia narcotica vel ab externa vel ab interna excitata causa affectus soporosos induxerit, conveniunt acida volatilia internè & externè: qualia sunt acetum vini, acera medicata diversa, in specie acetum hystericum Myrsichti, acetum cui castoreum infusum, acetum & oxymel squilliticum, spiritus sulphuris per camp. Veteres oxymelle squillitico fuerunt contenti; hodie spiritus imprimis vitrioli volatilis utimur, cuius legitimum signum est, quod non guttatim, sed in forma titrurum in alembico appareat. Parator ex vitriolo artificiosè calcinato, ita ut phlegma saltem evaporet, remanente spiritu volatili, qui postmodum per rectificationem à spiritu fixiore separandus; sic enim fit spiritus vitrioli volatilis excellens in cura lethargi. Excellit hic etiam spiritus aris viridis volatilis; vel per se adjectâ arenâ; vel cum aceto preparatus, qui loco spiritus vitrioli volatilis potest commodè usurpari: Spiritus vitrioli regeneratus, seu ex capite mortuo, aeri exposito, denudè destillatus (qui non tam est vitriolaceus quàm potius nitrosus) & ipse commendatur ad curam lethargi; vel adhibetur spiritus vitrioli cephalicus D. Michaelis, paratus ex eodem capite mortuo auri exposito, quod irroratur largiter cum spiritibus vegetabilibus cephalicis, cerasorum nigrorum, Borum tiliæ, liliorum



florum convallium, majoranæ, salviæ: Hoc destillatum more solito, & post rectificatum, dat spiritum cephalicum admodum penetrantem & volatilem, qui in cura lethargi mirabilis est. Propinatur ad gutt. 10. vel 30. in aquis appropriatis liliorum convallium, rutæ, majoranæ, soris marini, cerasorum nigrorum, serpilli, aqua quadam apoplectica, & similibus. Admodum convenit, & egregie restituit ægros, spiritus vitrioli epilepticus Quercetani cum urina pueri paratus, loco cuius spiritus æris viridis jam dictus usurpatur. His præ cæteris addatur acetum vitriolatum benedictum, D. LANGIO in secretis positum, remedium quidem singulare in affectibus catarrhosis, & etiam in affectibus soporosis. Modus præparandi est hic:

*Vitriolum* in crucibulo leniter calcinatur ad absorptionem phlegmatis: exhausto autem phlegmate crucibulum tegitur operculo, & hoc contegitur carbonibus vivis, ita ut per quadrantem horæ calcinatum exactè rubescat: hoc modo calcinatum pulverisatum, per setaceum subtiliter trahitur: postmodum

4. Carbon. faginar. duror. bene pulverisat. ac

per setaceum trahet.

*Vitrioli istius præpar. an. 3ij.*

Benedictæ indantur vasi pleno & latis patulo terreo, quodque igni tamen resistere valeat, imponatur carbonibus in furno venti, benè calcinentur, continuò agitando cum ratibulo ferreo tam diu, donec nulla amplius scintilla in missura appareat: Hinc

4. b. m. vitriol. præparatum:

Affundatur acetum destillatum acerrimum, ponatur in digestionem in loco calido, aut saltem vase benè contexto, exponantur radiis solaribus, idque per quatuordecim dies & noctes, hinc filtretur acetum per chartam, eritque sic paratum acetum vitriolatum benedictum.

Dosis est à gutt. x. ad xij. in aqua appropriata assumendum: In omnibus catarrhis frigidis, ut vocant, item in affectibus soporosis, admodum commendatum.

Hæc ipsa internè & externè in Lethargo narcotico sunt optima; quibus omnibus semper castoreum addendum est, summum specificum in his affectibus, tam in forma pulveris, quàm essentia, extracti; vel aqua hirundinum cum castoreo, vel aliis modis, usurpatur: e. g.

4. Aqua ceras. nigr.

Serpill. an. 3ij.

Aceti hysser. Myns. vel squillæ. 3ß.

Ess. Castor. 3ij.

Oxymell. squillæ. 3vj.

M. S.

Mixtura emolliens ad caput, cochleatim sumenda.

4. Succin. præparat. vel catarrhal. Mich. 3j.

Cinnab. antimoni. 3ß.

Castor. 3ij.

M. f. pulvis:

Divid. in 4. part. æqu. S.

Pulvis caput confortans.

Quibus ac similibus ritè administratis in fine Cura Sudorifera, ex lignis imprimis parata, curam claudat.

Post hæc & sternutatoria & apophlegmatismi applicentur. Illa, eaque acria, faciendæ sunt ex radicibus & floribus liliorum convallium, castoreo, turpetho minerali, & paucoradicis helleborialbi, & euphorbi; item ex pulvere nicotianæ cum euphorbio, utut cautè, quibus pro meliori penetrantia grana quadam salis volatilis urinæ, vel salis ammoniaci volatilis, &c. addi possunt, in specie in apoplectis; aut spiritus salis ammoniaci cum calce viva paratus. Nam hæc salia volatilia commodè permiscerentur cum talibus sternutatoriis acrioribus, cum fortiter penetrant cæteris addita, dum interea alia acria sternutatoria vellicant. *Vitriolum ad albedinem calcinatum* ad 3j. solutum cum aqua majoranæ 3j. constituit liquorem, qui naribus attrahendus subinde, pro sternutatorio satis eleganti. Ad tertium autem diem, & post Purgantis operationem, differantur, ne materiam peccantem ad cerebrum magis commoveant apoplegmatis ex sem. nigellæ, radic. pyrethri, confect. anacardina, theriaca, &c. Sternutatoria per pennam naribus insufflanda sunt: v. g.

4. Pulv. Nicotian.

Lil. convall. an. 3j.

Rad. helleb. albi 3j.

Castor. gr. xij. ad xv. vel 3j.

Estmull. Oper. Tom. II.

Olei destill. Maior. gutt. vj.

M. f. pulvis: S.

Pulvis sternutatorius.

4. Spec. dia. Tabac. Myns.

Castor. an. 3j.

M. f. pulvis.

D. S. ut ante.

4. Spec. dia. Maior. 3j.

Pulv. rad. helleb. alb. 3j.

Castor. gr. xij.

Olei destill. rutæ gutt. vj.

M. f. Pulv.

D. S. ut ante.

Vel sternutatorium TIMÆI von GuldenKlee in affectibus soporosis expertum, quod habet in Cas. pag. 20.

4. Elleb. alb.

Castor.

Piper. alb. an. 3j.

Olei destill. rutæ.

Maioran.

Salv. an. gutt. ij.

M. f. Pulvis.

Sternutatorium ex Turbith cum pulvere glycyrrhizæ videb. in BARBETTE Praxi cum comment. Beckeri, pag. 76.

4. Theriac. Androm. 3ij.

Extr. castor. 3ß.

Pulv. rad. Pyrethri 3j.

Olei destill. succin. gutt. vj.

M. pro apophlegmatismo, palato illinendo: S.

Electuarium abstersivum ad Palatum.

Cum his & externo usu simul usurpanda, quæ aut spiritus excitare, eorumque torporem discutere valent, acria, penetrantia, & sensuum organa plus minus vellicantia, Admoveatur igitur crebrius naribus spiritus salis ammoniaci acris, sal urinæ, vel oleum tartari cum sale ammoniaco, &c. in vitro angusti sed longi colli, potenter lethargicos & apoplecticos ac alios soporosos, non secus ac mulieres hystericas, excitans. Post hunc alias non inelegans experimentum est HARTMANNI ex aceto castoreo imprægnato, cum linteo vel spongia naribus admoto, & epithematis loco fronti & temporibus applicato. HARTMANNUS commendat spongiam cum succo apii, scintilli, & aceto rosaceo vel rutaceo, cui adspersit pulverem castorei, & ita crebrius naribus admoveendam; vel succus scintilli, aut etiam succus rutæ recens expressus cum aceto & castoreo naribus admotus, vel cum lintels multiplicatis temporibus, fronti & plantis pedum applicatus, admodum laudatur. Quod etiam facit acetum radicatum Riverii, simili modo usurpatum; nam acetum admodum convenit ad arcendum somnum, & adducendas vigilias. Hæc aceta potentiùs penetrabunt, si cum semine nigellæ, rutæ, castoreo &c. cocta, laminæ ferreæ candenti affundantur, quod vapor nares ægri subeat: vid. HOFERUS Herc. Med. Part. 1. lib. 1. pag. 32. Interim & simul tempora, frons, nares ac facies aquis apoplecticis ac spirituosis, oleis destillatis, succini, majoranæ, anthos, rutæ, saturejæ, serpilli, nigellæ &c. horumque balsamis, aliisque cephalicis illinantur, quæ ipsa etiam linguæ infra affricentur. Curavit WEDELIUS loc. all. affectum soporosum in puella spiritu salis ammoniaci volatili, cum aqua liliorum convallium spirituosa propinato: externè inunxit tempora, nares & præcordia oleo succini, & camphoræ cum pinguedine castorei, & in sacculo appendit camphoram, nigellam & castoreum. Capiti quoque admoveantur fomenta nervina, v. g. decoctum saturejæ, cuius etiam aliquot guttæ auribus instillantur: vid. SCHENCKIUS pag. 69. Artus nihilominus frictionibus asperioribus trahentur. Sinapi etiam cum aceto subactum, si hoc ipso fricentur plantæ pedum, vel instar epithematis applicetur, excitat lethargicos &c. Item epithema ex sem. sinapi, piperis, &c. cum spiritu vini & aceto: Vel fiat acetum aromaticum acre ex infuso & decocto baccarum lauri, juniperi, Zedoariæ, herbæ soris marini, seminis sinapi & nastureii, & simil. e. g.

4. Olei destill. Salv. 3ß.

Castor.

Succin. an. 3j.

M. pro Oleo, temporibus & faciei illinendo: S.

Oleum expergeficiens.

Sc 2

4. Olei



24. Olei destill. rutæ,  
Saturciæ,  
Serpill. an. ʒi.  
Castor. ʒss.  
Cum s. q. Corp. pro Balsamis misc.  
D. S.  
Balsamus caput expergesciens.
24. Herb. Apii M ʒ.  
Sem. nigell. ʒss.  
Castor. ʒi.  
Ex incis. & contusis f. Nodus, aceto rutaceo irro-  
randus: S.  
Nodus odorandus.
24. Aqua hirund. cum castor. ʒi.  
Spiritus crystall. virid. aris ʒi.  
M. pro temporibus & facie irroran-  
dis: S.  
Aqua externè applicanda.
- Vel
24. Aquæ hirund. cum castor. ʒi.  
Carbunc. ʒi.  
Spiritus Serpilli,  
Virid. aris an. ʒi.  
M. S. ut antè.
24. Aceti rutæ. ʒi.  
Spiritus virid. aris sulphur. ʒi.  
Ess. Castor. ʒss.  
M. S. ut antè.
24. Succ. rutæ rec. expr. ʒiij.  
Spiritus virid. aris ʒi.  
Sem. Erucæ pulveris ʒss.  
Pulv. Castor. ʒi.  
M. l. Epithema: S.  
Epithema externum.
24. Herb. Saturciæ  
Rutæ an. M ʒ.  
Zedoar. ʒss.  
Bacc. limip. ʒvi.  
Lauri ʒss.  
Sem. Nasturt.  
Sinapi an. ʒi.  
Coqu. in s. q. aceti pro Epithemate.  
D. S. ut antè.

Quodsi à sanguine extravasato, cranio depresso, similivē tale quid contigerit, hæc per remedia appropriata remo-  
veantur: de quibus in Chirorgicis videri potest, Elevato-  
rium scilicet, Trepanum, &c.

Comata febrilis quæcunque optimè curat acetum naribus applicatum, quò validius, eò melius; unde & spiritus vi-  
triosi reliquis præfertur.

Comata vigila, præter modò allegata, curat cataplasma ex raphano recentium rotæ, aceto, fermenti s. q. & sale communi subacta, plantis pedum applicata, & subinde rei-  
terata: vel ex ranunculo cum sapone nigro, sale marino, & fimo columbino, similibusque acribus invicem mistis para-  
tum cataplasma dicto modo pedibus applicetur.

Quodsi Carus ex narcoticorum externo insultu, aut va-  
poribus venenatis Mercurialibus, aut ex esu nucum jugland. contractus; item qui inspiratum Gas liquorum fermentes-  
centium sequitur &c. curatur, si vomitus maturè instituitur, hinc acetum, præsertim cum castoreo imprægnatum, naribus est applicandum, & etiam internè cum castoreo propinandum, ac postmodum spirituosis internis spiritus animales denuò volatilisandi. V. g. ex fumo carbonum, vaporibus venenatis, &c. si oriuntur talia mala, vomitus præmittatur, cum pars affecta soleat esse circa orificium stomachi, & tales ægræ conquerantur de angustia circa præcordia: In talibus enim apparet suffocatio, unde mox instituatur vomitus per valida vomitoria, post propinentur internè acida cum castoreo probè subacta, eaque in largâ dosi, e. g.

24. Aqua Menth.  
Rutæ,  
Aceti rutæ. an. ʒi.  
Ess. Castor. ʒvi.  
Syr. acetos. citri ʒss. vel mentha ʒi.  
M. D. S.  
Mistura spiritus excitans.  
Capiatur crebriò cochlearim.

Naribus verò subinde admoveatur Castorei frustum aceto intinctum. Eadem valent, si malum sit à croco.

Quodsi quis ex abusu opii vel simillum in carum aut san-  
porosos inciderit affectus, præmissio vel omisso vomitu, ad-  
cipiatur acetum vini vel rutaceum, acetum vitriolatum be-  
nedictum, vel scilliticum, in quo dissolvatur castoreum;  
quod est optimum. Hoc etiam figit opium & opii sal vola-  
tile oleosum omniq. destruit. Unde etiam acetum assu-  
mitur à quibusdam ad præparationem laudani opii. Fa-  
milus cuiusdam materialista cum aliquando ʒi. crudi opii  
pro reconciliando somno receperet, binas noctes & dies  
continuò dormivit: tertiâ die vocatus Medicus recipere,  
juber acetum squilliticum, in quo extractum castorei dis-  
solutum fuit, quod infudit copiosè ori, hæcque mixtura  
frontem ac tempora, pulsus etiam manuum ac plantas  
pedum, & imprimis genitalia, irroravit largiter, & sedulo  
fricanda iussit, sicque successivè denuò evigilavit, & ex  
mortis faucibus ereptus fuit. Si affectus soporosos ex opio  
contractus h's corrigi non potest, præferuntur sinapi,  
pruæ &c. salia quippe volatilia languentia illa organa  
excitant. Clyster etiam ex vino Hispanico curat narcosi-  
m ex opio.

Quodsi ex ebrietate, abusu vini, spiritu vini ac simili  
potu generoso Carus aut eiusmodi affectus soporosos oria-  
tur, præmissio vomitorio, si non spontè sequatur, acetum  
fronti ac temporibus applicandum, vel solum vel cum  
succo apii mistum. Epithema verò ex succo semper vivi  
maioris, cum aceto & nitro scoto aut testibus admove-  
ndum, ac subinde removendum; Potenter enim ebrieta-  
tem discutit. Sic WEDELIUS affectum soporosos à  
spiritu vini inducendum curavit, applicando testibus lineæ  
oxyerato imbuta, ubi statim natura spontè se liberavit  
vomitu, ubi postea propinavit Elixyr cephalicum, cum  
spiritu urinoso salis ammoniaci fortius acuat: Vid.  
Opiol. pag. 37. Spiritus enim salis ammoniaci volatilis aut  
suliginis corrigit & destruit acidum volatile vini, &  
inde natam ebrietatem, si sudor expectetur; sicuti & ille  
ante vinum assumptus, facit ut non inebriemur: si post po-  
tum assumitur, crapulam statim discipit.

In Genere ut melius observetur methodus medendi af-  
fectuum soporosos, considerandum, quod affectus so-  
porosi vel à causa externa vel à causa interna originem  
ducant. Si à causa externa, assumptis vel inspiratis, post  
vomitum conuepit acetum & castoreum: si à causa inter-  
na, habenda est ratio, an per se & primariò morbum con-  
stituunt? v. g. lethargus: an vero febribus, aut aliis mor-  
bis in statu demum aut declinatione denuò superveniant?  
Si per se morbum constituunt, attendendum, an vis narco-  
tica in succis nostris enata; an vero colluvies recremento-  
sa, in specie serosa, vel alia in cerebri substantiam effusa,  
eum inducat. Quodsi ergo per se ex colluvie recremento-  
rum originem duxerint, vel aliis morbis supergentiant, &  
metastaseos materię morbose suspicio fuerit, vomitoria  
purgantia, & clysteres, item vena sectio averforia & de-  
rivatoria, hinc sternutatoria & vesicatoria sunt optima;  
quibus tandem acria volatilia, spirituum torporem excu-  
tientia, optime subiungantur. Hinc enim & comati uigi-  
li, item comati soporoso malignarum vesicatoria nuchæ vel  
parotidibus, & cataplasmata pedibus applicata conveniunt.  
Si verò ex causa interna, siue vi narcotica plus minus ma-  
ligna, originem ducant affectus soporosi, post vomitum,  
vel præmissum vel omisum, acria excitantia conducunt  
seu quæcunque acria volatilia, sensuum organa fortius  
vellicantia, & spirituum torporem ac immobilitatem cor-  
rigentia, vel in specie acida, acria, volatilia, virulentia  
narcotica speciatim contraria.

## M E M B R U M V.

## D E

## C A T A L E P S I.

Pertinet ultimò ad hos affectus etiam Catache seu Cata-  
lepsi, affectus rarissimus & summè mirabilis, qui est,  
quando in ægro cessat omnis sensus internus & externus,  
undè cum cessante motu, ita ut ægriorum membra rigida &  
instar statuarum in sua positura, qua ægros corripit af-  
fectus, pertinaciter persistant, impulsa tamen moveantur,  
sed tamen denuò in ista per motum acquisita figura fi-  
xa persistant, oculis pertinaciter hiantibus, toruli vi-  
dent, in eodem, quo ponuntur seu collocantur, membro-  
rum



non posito permanent. Non dormiunt sales agri, sed videntur dormire, dum nihil sentiunt, & tamen moventur, non abintrinseco, sed saltim ab impulsu externo, instar machinæ cuiusdam. Quamvis autem in gradu ejus remissione interdu nonnihil audiant, videant, ac sublato paroxysmo referant, immoti tamen ut plurimum sine voce ac tactu manent; hinc vulgò pro Ecstatis habentur.

C A U S Æ.

In hoc affectu, quomodo verè constituti sint spiritus animales? vel quodnam spectale eorum vitium? adhuc inexplicabile est. Fixatos eorum spiritus esse, minusque mobiles, quàm naturaliter esse debent, certum est. Simul tamen etiam eosdem continuà suâ præsentia membra acturare, & in nodo debito conservare & animare, ex eo confirmatur, quod tales stent, sedeant, impulsu progrediantur, oculos apertos servant, adeoque, ut ut ipsi etiam hoc nesciant, semper figuram antiquam retineant. Unde ad convulsiones refert Catalepsin VALENTINI *Disp. Inaugural. de Convulsionibus*, ejusque causam dicit esse nimium spirituum motum, quatenus uno impetu cerebrum relinquenter, in utrumque musculum antagonistam irruunt, nec inde statim retrocedere possunt, underigor ille notabilis. Hoc fusè confirmat ex antecedentibus, concomitantibus, invariantibus, & nocentibus: Hinc D. D. DOLÆUS catalepsin apoplexiam inversam, haud inconcinne vocat in *Encyclop. ad. Med. Tract. tit. de Catalepsi*. Chimici derivant ex fumis quibusdam vitriolaceis acidis, spiritus animales coagulantibus: SYLVIVS *Pr. lib. 2. cap. 24.* spirituum animalium coagulationem quandam, à spiritu quodam quasi urinoso volatili acri, qui sit similis spiritui urine per fermentationem parato, coagulante spiritum vinosum rectificatum in quoddam colostrum candidum & spissum: Sed rem dubiam relinquit. Scriptores in hoc conveniunt, inesse certam quandam spirituum animalium coagulationem, tam in toto quàm in partibus, id est, ut in illa spiritus non tantum in cerebro, sed intra nervos quoque, & musculos quasi coagulentur: qualis verò sit coagulatur ille? difficile dictu, cum nec spiritum illum vitriolicum seu acidum, quem nonnulli in hoc morbo sibi concipiunt, nec spiritum illum urinosum atque volatilem. Spiritus animales instar spiritus vini coagulantem, ut SYLVIVS suspicatur, concipere liceat. Rarissimus aliàs est affectus, & qui varias habet antecedentes causas: Vid. imprimis HEINRICVS ab HEER *Observat. 2.* ubi duo singularia Catalepticorum exempla habet, RONDELETIVS *Meth. Med. lib. 1. cap. 20.* FERNELIVS *Pathol. lib. 5.*

cap. 2. Sic FORESTVS *lib. 10. Observat. 44. in schol.* refert, puellam, cum nubere cogeretur, hoc affectu fuisse correptam: Item *lib. cit. Observat. 41.* à frigore quosdam rigidos instar Catalepticorum fuisse redditos. Item FON-SECA *lib. 1. Consultat. 92.* refert catalepsin singulis septimanis recurrentem, sex horas tantum durantem, in muliere post mensium suppressionem obortam. HILDESHEIM in *Spicil. Affectuum capitis pag. 224.* meminit cuiusdam hypochondriaci Catalepsi correpti, idque, ut ipse affirmat, ex vaporibus ex liene adscendentibus. A vermibus quoque aliquoties Catoche observata est, qualia exempla refert MARCELLVS DONATVS *lib. 2. Hist. Mirab. c. 2.* & SCHENCKIVS in *Observat.* ubi aliquot historias mirabiles Catalepticorum habet. In paroxysmis febris intermittentis Catochen observavit DODONÆUS *Observ. 44.* A fumo & vapore carbonum accensorum similimum Catalepsi affectum refert PLATERVS *lib. 1. Observat. pag. 28.* Jucundum hujus catalepticos exemplum est, quod refert TVLPIVS *lib. 1. cap. 22.* Juvenis Britannus impensius amori indulgens, ex inopinato repudio matrimonii catalepticus factus est: cum verò illi acclamaretur, desideratam eum habiturum amicam, quasi excitatus ex profundiore somno actutum ad se rediit, & profiliit.

P R O G N O S I S.

Catalepsis morbus admodum periculosus est; periculosior tamen, si graviora ipsi combinentur symptomata, scilicet dyspnoea, excrementorum suppressio, viriumque imbecillitas.

C V R A.

Remedia hactenus proficua sunt Vomitoria antimonialia, spiritus vini rectificatus, sive internè sive externè usurpatus: Item cataplasmata acria. Sic HENRICVS ab HEER refert Capuccinum catochicum factum, per acre suppositorium excitatum.

Locus sum superius de vitiis spirituum animalium, ac eorum generatione, à quorum legitimo motu & expansione, aut aucta, aut imminuta, sequuntur vel vigiliæ vel somnus: Pergo ergo nunc ad passiones animales, sive ad sensus externos, & ad impressiones in iisdem factas, prout hi ipsi (nempe sensus) ex impressione objectorum sensibillum in organis particularibus machinæ corporeæ variè alterantur & læduntur. Sic ergo

S E C T I O I I.

D E

SENSIBVS EXTERNIS EORVMQVE LÆSIONIBVS.

Officia quibus præfunt animales spiritus, sunt Sensus & Motus, utriusque vel interni vel externi.

Externos quod attinet Sensus, cum hi reverà consistant in passione seu motione organi, inducta ab objecto externo sensibili, per certum ab hoc factum motum seu impressionem, adeoque saltem in motione filamentorum nervorum organi, spiritus animales in his hoc saltem præstare videntur, ut suo influxu filamenta nervæ organum sensus proximè constituentia, in debito tono & tensione conservent, quò facilius ab externis objectis moveri, & ita sensatio externa fieri possit.

Exposita scilicet corporea nostra machina est quorumcunque corporum ambientium activitati & insulsi: Hæc ergo ambientia, dum in partem quandam agunt, id est motionem certam inducunt, in ejus nervis, quæ morio, seu ab objecto externo facta impressio, continuato nervi ductu, ad cerebrum usque seu ad nervi originem continuatur, quem nervi ab externa causa morum ibidem circa ejus radicem in sequutus determinatus spirituum animalium in vicina cerebri medulla motus ab isto excitatus, qui constituit sensum internum; occasione cuius determinati spirituum animalium motus anima rationalis format in nobis conceptum seu ideam, representantem exactè rationem externæ impressio-

Estmull. Oper. Tom. II.

nis, sitque tunc formalis cognitio seu sensuum externorum mediantibus internis perceptio: id quod dolor imaginarius eorum, quorum membra fuerunt amputata, illustrare videtur; post membrum enim amputatum observatur tamen dolor in digito majori.

Vires istæ objectorum externorum, quæ vulgò Qualitates sensiles dicuntur, quibus ambientia corpora agunt in certas corporis partes, organa sensoria dictas, consistunt saltem in certa talium corporum, quoad minimas sui particulas, textura vel conformatione; quæ prout hoc modo nunc in hanc, nunc alio modo in aliam corporis partem agit, & certum motum inducit, tam varias qualitates sensiles seu in organa sensus agendi potestates habere dicitur: vid. hic DIGBY in *Tr. de Natura Corporū Tr. 1. c. 1. p. 3.* BOYLE in egregio scripto de *Orig. Formarū & Qualit.* Rem exemplo declarabo: suppono me corticis aurantiorū frustulū in manu tenere; hoc frustulū in se reverà est tantum ens unicum, ex particulis minutissimis in unum corpus coalitum, & tamen diversos in meis sensibus effectus producit: Visus in eo colorem aureum; Olfactus odorem suaveolentem; Gustus saporem amaricantem; Tactus denique frigus, scabritiem, mollitiem, &c. deligit: Sensus diversimode ita affecti seu moti nuntios, ratione continuati ductus nervi, ad phantasiam mittunt, tanquam certin-



res facturi, quid quisque in frustulo illo deprehenderit; ita ut ratio postmodum flavedinem, suaveoleptiam, amaritiam, frigus, scabritiem, mollitiem, &c. separatim consideret; unde diversae notiones in mente quasi tot diversorum entium oriuntur, quae tamen reverà in illo frustulo nullatenus distinguuntur, nec aliud sunt, quàm ipsa illa materia, pro varia organorum dispositione diversimode me afficiens: v.g. eadem particulæ frustulum corticis aurantiorum contexentes, quatenus peculiari modo situatae lucem reflectunt, coloratae nobis apparent; quatenus certo modo figuratae papillas linguae vel membranarum afficiunt sapidae & odoratae sunt; quatenus denique inaequaliter contextae, multae eminent, multae depressae sunt scabritiem quandam seu superficiem inaequalitatem tactui representant.

Modus ergo quo objectum sensibile afficit organon sensationis, non fit per talem qualitatis ex objecto emanantis in organo receptionem, ut facultas sentiens (hujus qualitatis quasi intuitu) sentiat, sed fit per certum motum, in quem instrumentum sensus proximum cietur, eumque varium pro diversa objecti materiali textura, & hinc alia atque alia ad organum movendum aptitudine; & in hac organi motione formaliter sensus externus seu impressio ab objecto in organo facta consistit. Constant autem sensuum organa variis & distinctis partibus, ita tamen subordinatis, ut una sit primaria, & cujus per objectum externum motione fit sensatio externa, & haec semper solet esse nervus, cujus filamenta nunc in membranam expansa, nunc in capicula papillaria sunt coagulata, reliquis partibus saltem certum usum eumque varium, habentibus.

## CAPUT I.

## DE

## VISUS LÆSIONIBUS.

**O**mnes sensus externi quolibet numero recte comprehenduntur, quos inter eminet *Visus*, nobilissimus præ omnibus reliquis, cujus objectum est Lux, primario solis & ignis, & inde diffusum in orbem. Lumen, quod nihil aliud est, quàm ignis rarefactus. Lumen tale vel immediate in recta linea, vel mediate, mediantie nempe, à corporis opaci superficie, reflexione tali, transit per tunicam oculi corneam & humorem crystallinum, donec impingat in tunicam retinam seu expansionem filamentorum nervi optici, ubi talem facit motionem seu impressionem, quæ ad cerebrum usque continuata à nobis dicitur Visio.

Est scilicet oculus reverà camera obscura optidorum, in quo humor crystallinus est vitrum lenticulare, in quo ut plurimum fieri solet decussatio radiorum luminosorum, donec impingat in tunicam retinam, ubi objectum externum exactissime, inverso licet situ, representatur, & prout hi intersectionis anguli majores vel minores, etiam res visa major vel minor in tunica retina depingitur, & consequenter ita judicatur.

Quaecunque ratione radii luminosi ad oculum deveniant, pro mediis, per quod transeunt, diversitate vel rarioris vel spissioris, refringuntur diversimode, unde res non præcisè in eo loco, in quo reverà existit, apparet; nam radii transiendo ex medio rariori in densius, ex aere in aquam, refringuntur ad perpendicularem, transiendo verò ex densiori in rarijs, ex aqua in aerem, refringuntur à perpendiculari.

Quod si radii isti luminosi, qui sunt subtilissima & tenuissima quædam materia, sub sua in orbem diffusionem impingant in corpora opaca, resiliunt propter deperitum transitum plus minus exactè ad eos angulos, ad quos inciderant, ita ut incidentiæ & reflexionis anguli perpetuò sint æquales: id quod in omnibus speculis conspicui manifestum est, quando ex radiorum reflexorum in uno puncto concursu vis causifica emergit.

*Corpus opacum*, à quo reflectuntur radii, est vel politum, vel ex particularum in superficie inæquali situ asperum: Unde radios eodem fere modo atque incidunt reflectit, & sic tale corpus secundariò quasi luminosum, splendere dicitur: Hoc verò radios intra istas inæqualitates superficie: seu poros & meatuos plus minus partim abscondit, & ita cum umbris miscet, partim verò certa ratione, plus minus tamen, à primitivâ figurâ mutatos, ad oculum reflectit; unde taliter modificatum lumen color dicitur.

Ita ut Color nihil aliud sit, quàm luminis pro corporis opaci diversâ in superficie textura modificatio, & modificati ad oculum reflexio; Unde Colores ex luce & umbra oriri non ineptè dicuntur. Hinc prout textura particularum concreti mutatur imprimis per solutiones & præcipitationes, immutantur colores; dum v.g. solutio vitrioli perspicua, cum Decocto gallarum tantillum flavescere permissa, atramentum constituit: de qua colorum genesi vid. BOYLE Tr. de Coloribus.

*Visus hic leditur quatuor modis.*

- I. Quando penitus aboletur, ut in *Cecitate*; aut
- II. Quando saltem imminuitur, ut in *Visus Hebetudine* varia; quæ propriè est, quando objecta remota obscure, aut objecta minuta, licet propinqua, difficulter, & non nisi magna etiam objecta, in distantia non adeò remota clare & distinctè cernuntur.

Quò etiam pertinet *Nyctalopia*, id est istud vitium, quando homines interdum rectè, vespere parum, noctu etiam accensis candelis nihil videre possunt.

Vitia hæc aboliti aut imminuti visus sunt, quando unum alterum vè illorum requisitorum ad Visum rite peragendum plus minus deficit. Ad naturale autem visus exercitium necesse est:

- (1) Ut radii possint rite per foramen pupillæ & per corneam transire, adeoque pupilla pateat.
- (2) Ut ipsa cornea, pupillæ foramen obducens, satis perspicua & exactissime translucida sit.
- (3) Ut post hanc tres humores oculi reliqui, speciatim crystallinus, in quo fit specierum decussatio, satis sint puri, desecati, & absque ullo excremento heterogeneo perspicui & puri.
- (4) Ut expansio nervi optici, tunicam retinam efformans, tensa, fortiter expansa, ac à spiritibus animalibus debite imprægnata sit, quo vel lenissimò luminis, aut puri aut colorati, impulsu moveri, & sic per spirituum animalium motum firmati visio fieri queat.

## III. Depravatur visus, idque variè vel

- (1) Quando res vel dexterior, vel sinisterior, quàm est; item res una apparet duplex: id quod fit ex diviso pupillæ situ, & ex diverso situ humoris crystallini; quando nempe v.g. in iis, qui strabismo laborant, in quibus res omnis apparet geminata propter diversam pupillam; siquidem hic mutantur planè oculi, quibus mutatis etiam axes visus moventur, sic etiam fit propter diversum situm humoris crystallini, si in uno loco magis superiora versus, in altero versus inferiora & similiter pergat, visus geminatur, & res geminata apparet; Vel
- (2) Quando res integræ perforatæ vel dimidiatæ apparent, ex re extranea medium vel dimidium pupillæ occupante: Vel
- (3) Quando res videtur perforata, dum pupilla à materia opaca in certo sui loco obscuratur, seu quando unica cornea à materia heterogenea inrustatur, ut foramen pupillæ non ubique in circulo sit pervium & perspicuum; Unde in quocunque loco est impedimento, vitium in objecto judicatur: Sic si est in medio, res in medio perforata apparet; si in superiori vel inferiore pupillæ regione, res alterâ suâ parte truncata videtur; si per medium sui sit objecta, res dimidia apparet.

Vel denique

- (4) Depravatur Visus, quando res videntur apparere, quæ non sunt; v.g. quando splendores, coruscationes & scintillationes Latipis, Hippocrati verò Marmarogæ dictæ, ante oculos vespere videntur; item quando flocculi, muscæ, filamenta, festucæ, pulvisculi & similia ante oculos versantur.

Prius fit ex motu convulsivo insigni fibrarum tunicæ retinæ præternaturali, simili isti motui, in quem citantur ab objectis externis & radiis visivis: propter similem enim motum internè excitatum, fit idem iudicium quasi tales colores ante oculos versentur. Posterius vitium est, in humore aqueo, in quo collectæ sunt quædam sordes; nempe in varias figuras extensæ, faciunt ut talia objecta videantur ante oculos versari; & solent esse prodromi suffusionis talia filamenta.

Per-



Pertinet hoc duplex illa visus lesio:

- (1.) Quando obiecta remota optime, proxima verò vel omnino non vel difficillime videntur, & vocatur *Senum Visio*. Fit quando crystallinus humor postiora versus propius ad tunicam retinam recedit; quod interdum senibus quibusdam, item literatis accidit. Huic
- (2.) Contrarium vitium est, quando interdum propinqua seu propius admota, etiam minutissima, acutè & benè videmus, paulò remotiora verò difficulter aut planè non, qui affectus vocatur *Myopia*. Fit quando humor crystallinus magis anteriora versus tendit, & magis in anterioribus radiorum visivorum fit intersectio.

IV. Denique vitatur Visio, quando eadem quasi videtur *angere*: quod fit, quando obiecta etiam naturaliter constituta, vel nimis colorata, & nimis splendida ac lucida, apparent, ita ut Visus omnibus quasi maiorem gradum tribuat, & obiectum Visus intensius reddatur: unde fieri solet, ut talis Visio non absque molestia aut dolore & oculorum lésione percipiatur; verbi gratia, quando oculus inflammatione laborat. aut quando oculi ex percussione non nihil tument; tunc enim levis candellæ splendor instar luminis solis intensus ac nimis lucidus apparet. Causa est: quando partes oculorum membranæ sunt nonnihil læsæ, ex quacunque fiat causa, in specie tunica retina; unde facta irritatione fit admodum mobilis: hinc etiam ordinaria, obiecta impingentia in tunicam retinam, eandem nimis movent, & sic ex impressione tunc fortiore graduata, nimis colorata, aut quasi splendida apparent; v.g. dum oculus inflammatione plus minus laborat, levis candellæ splendor nimis lucidus, ac instar luminis solis intensus apparet.

Pertinet huc ille affectus, quando quidam noctu cernunt, quorum quedam leguntur exempla, ut talis Visio nocturna non sit continua, sed tantum, quando evigilant, vident, quod tamen Visus acumen pedetentim immittitur & tollitur.

Hæc in genere de Visus lésionibus: In specie jam considerabimus affectus oculorum frequentiores, & quidem eo ordine, quo radii visivi, à quibus primariò dependet Visio, occurrunt membranas & humores transire solent.

## ARTICULUS I.

### DE

### VISU ABOLITO.

### MEMBRUM I.

### DE

### IMPEDITO RADIORUM VISUALIUM per pupillam INGRESSU.

## PUNCTUM I.

### DE

### PALPEBRARUM PARALYSI.

**V**T ergo dictum ordinem observemus, necesse est prius, ut oculi palpebræ pateant, adeoque oculi aperti sint. Vitatur hoc in paralyti palpebrarum undecunque nata, quæ, dum attolli nequeant, oculum obstinatè claudunt.

### CURA.

In hoc casu convenit emplastrum ex tacamahaca & caryophyllis in regione frontis infima applicatum; vel oleum destillatum tartari nigrum cum pauca cera in forma emplastri admoveatur: Conf. M. A. N. C. Ann. 4. Observat. 210. pag. 296. Vel imitemur ZACUTUM LUSITANUM lib. 1. Prax. Admir. Observat. 56. cui in paralyti palpebræ post multa frustra tentata ex usu fuit Unguentum ex balsamo Peruviano, cum aqua vitæ commistum.

## PUNCTUM II.

### DE

### UNGUE seu PANNUS OCULI.

**I**ngressus radiorum per pupillam impeditur propter corneæ perspicuitatem ablatam: quod fit in specie ob *tunicam* quandam præternaturalem, ab uno oculi angulo, & ut plurimum à cantho maiore circa nasum, frequentius enatam; quæ ipsa successivè accrescendo tandem ad pupillam pervenit, & corneam obtegit, quæ obfectione oculi fenestra, foramen pupillæ, foras clauditur, & nullus radio visivo luminoso transitus conceditur. Græcis malum id dicitur *τρίψιον*, quasi dicere velint Alam, quoniam instar alæ obtegit pupillam; Latinis verò *Ungula* seu *Unguis* aut *Pannus* appellatur.

*Tunica* hæc non semper uniformis existit, sed habet suas differentias, nunc est plana, nunc tenuis, & albida circa solem & lunam apparere solet, & propriè *Tunica* appellatur & *Ungicula*: interdum verò est crassior & carnosior, vestigiis rubicundis venularum & arteriarum nonnihil conspersa, & tunc alio nomine dicitur *PANNUS*, Germanis *ein Fellüber-dem Auge* nuncupatur.

### CAUSÆ.

Causa huius *Tunicæ* est eadem cum reliquorum locorum nerveorum excrecentis in corpore: nervæ enim partes propriè saltem crescunt & excrescunt, quibus sanguineæ portiones demum accrescunt, quod in Chirurgia ad peculiare caput de Excrecentiis pertinet. Præcedit nempe semper aliquis lésio carnis istius, hoc est, glandulæ in oculi angulo sitæ, unà cum aliqua lésione membranæ adnatæ illius loci, talis quidem, ut dissolvatur continuas carnis in isto angulo, unde successivè membranæ distæ accrescit. Modus est hic: quando in ophthalmia, v.g. variolis seu aliis similibus nocuentis, lacrymæ salino-acidæ aut acres carnem in angulo maiore sitam nonnihil arrodunt, huiusque simul membranam oculi adnatam ledunt occasione subtilissimæ saltem talis erosionis nutrimentum glandulæ istius in angulo maiore, & imprimis nutrimentum istud membranæ adnatæ proprium, utrumque chylosum, per porulos, ubi fit subtilissima corrosio, dum non amplius à tono fibrarum lesarum coercetur, successivè transfundat & foras emanat, & secundum membranæ lésæ determinationem, ab illius spiritu infuso pariter in concretum ejusmodi membraneum coagulatur & ita successivè augetur, & juxta oculi extensionem, ubicumque spatium invenerit se applicat, & ita continuato augmento in tantum accrescit, donec integer oculus obtegatur.

Prout igitur ratione lésionis nutrimentum istarum partium lesarum, & in membranam coagulatam, nunc plus nunc minus degenerat à statu naturali, & acido præternaturali impregnatum est, etiam tunicarum *diversitas* oritur; ut alia dicatur nunc simplex & benigna, alia verò maligna & plus minus cancerosa: Hæc quidem, quando pannus est nonnihil lividus, nigricans & dolorosus: quin imò, prout antecedens lésio membranæ & glandulæ in angulo maiore fuerit major vel minor, ita ut etiam minutissima vascula sanguifera simul lésant, ut hinc & sanguis cum nutrimento transfundans sese admisceat & suo motu vascula nova, antiquis unà excrecentibus, continuè efformet, & vasis sanguiferis respersus pannus hic generari solet: Benigna verò est, si pannus est candidus, clarus, tenuis, nec adeò crassus & indolens; quando enim est nimis crassa, aspera, obscura & dolorosa, tunc talis pannus est cancerosus.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa: malum hoc per se oculis patet. Conditiones unguis vel tunicæ adnatæ ejus naturam representant. Tunica enim alba, indolens & tensa, est naturalissima; si verò sit crassa, dura, nigricans, & nonnihil dolorosa, unguis est periculosus, nempe cancerosus, prout nutrimentum fuerit magis vel minus corruptum.



## P R O G N O S I S.

Quoad *Prognosis*: Unguis hic *aggravescens*, pupillam obtegendo tandem, cæcitatem infert. Malum recens uti facile medicamentis curatur, ita *inveteratum* difficulter, & vix sine Chirurgo potest removeri: neque hoc fit facile, quia nimis pertinaciter adhæret.

Si *Tunica* est *cancrofa*, non attingenda, ne exasperetur, quia curato minore malo, majus succedit, & subinde in *cancrum* exulceratum degenerat.

Si cum panno incipiente observetur, quod simul adsit principium quoddam suffusionis in oculo, uti fit post variolas, tunica hæc non attingatur, sublato enim ungue suffusio citius perficitur.

## C U R A.

Ante Curam specialem, in genere, quæ in oculorum curationibus observanda sunt, præmittant.

I. Oculi, cum partes sint perquam sensibiles, adeoque facile irritabiles, ac, texturæ admodum delicatæ, minimè fortia, sed levia, ac quantum possibile, temperata, minusque acria ferunt remedia. Conf. FORESTUS lib. 2. Obs. 17. in schol.

II. Inter interna ophthalmica in oculorum affectibus felicissimè exhibetur decoctum *salustias*, longa enim experientia didici, plurimum facere in oculorum malis à causa frigida & humida provenientes, dicit FERDINANDUS Hist. 51. Hinc feniculum, & omnia inde parata, item Euphrasia, ac similia internè conducunt. Facit huc vinum, ophthalmicum egregium descriptum in M. A. N. C. Ann. 6. App. pag. 71.

III. Vinum aliàs in oculorum morbis non semper æquè convenit, præsertim si cum phlogosi aut lachrymarum acrimia influxu juncti sint, aut ab acrimonia humorum ortum duxerint: interdum tamen, ubi opus est discussione, resolutione & attenuatione adhiberi potest. Conf. BORELLUS Cent. 1. obs. 77.

IV. Frigida nimis oculis admota iisdem perquam nociva sunt; sicut etiam fervida & calida nimis admota, iidem ferre minus possunt. Temperata ergo & tepida ut plurimum sint, quæ oculis admovenda veniunt.

V. Ex acidularum usu oculi primò lædi videntur, cum tamen solummodo repurgentur, & confestim clarescant. Scio equidem quosdam ex acidularum potu quasi occæcos fuisse, qui tamen secundà vel tertîa die longè, quàm antea habebant, clariorem lucidioremque visum sunt adepti: protruduntur nempe ex oculis feces & purulentia: quædam per angulum lachrymalem. Conf. MINDERERUS de Mytriolo cap. 11.

VI. Alcalia ergo & his cognata sunt optima remedia, ac oculis imprimis proficua: hinc aquæ ex cancris tantillum, putrescentibus destillatæ, item aquæ ophthalmicæ *Nynsichti* ex cancris & chelidonio majori. Facit huc polychrestus liquor, nempe ex flor. cyani aut cichorei, per deliquium in furno pistorio paratus (vid. Sennertus & HARTMANNUS) in quamplurimis oculorum affectibus convenit: item sperma ranarum, de quo & exinde paratis aquis ophthalmicis vid. M. A. N. C. Ann. 6. Append. pag. 83. Hinc ablutio oculorum cum lotio proprio matutino multum iisdem conferre solet: Conf. BARTHOLINI *Alia Med. Hassn. Volum. 2. pag. 252.* Item phlegma ex iurina & vitrioli destillatione in aqua epileptica *Quercetani*, item phlegma spiritus urinæ per putrefactionem parati, egregia sunt; Unde etiam aqua stercoreis humani destillata ad oculorum affectus multum est comendata: Hinc QUERCETANUS magnificat sequentem aquam:

℞. Urina pueror. ℞.  
Vitrioli albi,  
Tutia an. ℞iv.  
Succ. Chelid. ℞ij.

Stent in digestionem per aliquot dies & noctes, postea destillantur & asserventur.

Tutia tamen frustraneam additionem arbitror.

Alii

℞. Rad. Chelidon. mai.  
Valerian. an. ℞ij.  
Herb. Rutæ,  
Siler. mont.  
Euphrag. an. M. jv.

Sem. Anisi,  
Fenic.  
Levisti. an. ℞ij.  
Flor. calend.  
Rosar.  
Borrag.  
Consol. mai. an. M. iv.  
Cancror. fluv. No. xv.

Omnia incide minutissime, & superfunde

Phlegm. vitrioli,  
Succ. Chelid. an. q. s.

Digerantur per mensem: postea destillantur, & in alembico ponatur

Campb. drachm. j.

Liquor prolatus dividatur in duas partes æquales: Una pars per se asservetur; alteri parti infundantur.

Croci metall. drachm. ij.

Stent ita per duas horas, postea filtretur, & reservetur usui.

Aquaocularis HARTMANNO famillaris tunc talis:

℞. Aqua sanie.

Anisi an. ℞. j.

In quibus solve

Vitrioli alb. purif. unc. β.

Ac postea rad. enula campana pulverisatam cum iisdem digere: tandem Colatura in vitro mundo servetur.

Valcet ad unguem, albuginem, cicatricem, maculam, item ad rubedinem & caliginem & quamplurima oculorum vitia. Vel

℞. Aqua flor. Calcatr.

Cyani,

Solani an. unc. j.

Vitrioli albi (crup. β. ad gr. xij.)

Solutio filtretur per chartam: adde

Tutia præp. drachm. β.

Applicetur tepidè cum linteolis, vel instilletur canthis, est optimum in ophthalmia.

Extat etiam in THONERI Obs. pag. 116. Ad unc. j. aquæ sufficiunt vitrioli gr. liij.

Denique remedium pro affectibus oculorum inastimabile vocatur LINIANO mistura ista, quam habet HARTMANNUS *Prax. Chymiatr. cap. 43. §. 3. pag. 304.* quæ se in quamplurimis oculorum affectibus cum felicissimo successu usum fuisse, refert.

VII. Optimus utendi modus hujusmodi Collyriis humidis est, ut æger vel in dorso decumbat, vel stans aut sedens caput probè retineat, ut uterque oculus perpendiculariter cælum versus tendat, & ita guttatim liquor aliquoties in die instilletur in canthum oculi majorem, hinc oculus tegatur, ut ita liquor undique per oculi peripheriam externam diffundi queat; sic enim paucæ guttulæ plus commodi habebunt ex bina tali applicatione, quàm si decies drachmâ una corpore erecto oculi saltim abstergantur.

VIII. In quibusvis verò oculorum vitiis Vescatoria & Fonticuli sunt optimi: Vescatoria quidem in nucha aut pone aures in morbis recentibus adhuc incrementibus sunt optima: Fonticuli verò in collo & hinc in brachio ad eodem inveteratos, & jam in statu perfectò constitutos, admodum proficui observantur: sicut etiam moderatus errhinorum usus iisdem multum conferre solet. Conf. BARTHOLINI *Alia Med. Hassn. Vol. 2. pag. 64. & Volum. 3. pag. 21.*

In specie autem in Unguis oculi cura tunica hæc præternaturalis ante omnia est removenda, aut medicamentis abstergentibus & subtili acrimonia blandè erodentibus & resolventibus, aut opera manuum chirurgica successivè cum acu detrahatur, vel cum instrumento separetur. Hinc remotâ tunica blandè adstringentibus fibræ ac hinc poruli circa radicem partis læsæ claudendi & firmandi sunt, ne revertatur denudatum.

Pro his ergo scopis obtinendis, pro removenda hac ungue conveniunt saccharum candum, mel, os sepia, cornu cervinum, testæ ovorum calcinatæ, aut testæ in aceto acerrimo solutæ, siccatae, & in subtilissimum pulverem redactæ: quæ pulveres oculis insperguntur, & similia blandè abstergentia, subtiliter erodentia & detergentia unguenta, item collyria extrinsecus applicanda, quæ inter usitata est aqua ophthalmica *Quercetani* blandè detergentis:

℞. Aqua



24. *Aqua euphras.*

*Chelidon. maj.*

*Fenic. ana ʒi.*

*Croci metallor. vel vitri antimonii (quorum loco etiam optimè butyrum antimonii recipi potest) ʒi.*

Stent per aliquot septimanas loco calido; filtretur & usurpetur.

Experta est in ungue non adeò inveterata, & calidè instillatur: frigida enim maximè oculis nocent.

Vel

24. *Vitr. antimonii pulveris. scrup. ʒ. ad gr. xv.*

infunde in

*Aqua flor. cyani,*

*Euphras.*

*Fenic. ana ʒi.*

stent in loco calido per noctem, manè filtra, & adde

*Camph. gr. vi.*

*M. S.*

*Collyrium.*

Hujus aliquot guttæ instillandæ sunt oculo, ægro supinatum jacente, & hoc interdum repetendum, prout opus fuerit. His si addatur simul parum Camphoræ & Croci, ut meliùs penetrarent, conveniunt etiam in suffusione live Cataracta:

24. *Salis gemm. ʒi.*

dissolve in

*Aqua rosar.*

*Fenic. ana ʒi*

*M. pro Collyrio.*

*D. S. ut ante,*

Quo attingatur pannus cum penna, vel gutta una vel altera immittatur in oculum super Unguem. In specie conveniunt *Fellapiscium*, speciatim *fel mustelæ* & *lucii piscis*, humusque aqua destillata, item hujus *Essentia*, mirè conveniunt in resolvenda hac tunica, in extimo oculi adnata. Preparandi modum videb. in SENNERTO *Pr. lib. 1. ubi de Vitiis Oculorum p. 796.* item in HARTMANNI *Traxi Chym. cap. 39. pag. 99.*

Vel in hujus defectu, dum non semper potest esse ad manum,

24. *Aqua Lencorii bulbosi vel sperm. ranar. ʒiʒ. ad ʒi.*

*Fell. lucii piscis. ʒi.*

Mista stent in loco calido per noctem; mane filurentur, & ita instar collyrii applicentur.

*D. S.*

*Aqua singularis.*

Loco hujus fellis lucii secretum BURRHI in his casibus est *fel humanum* destillatum ex cucurbita vitrea humili per alembicum æneum seu cupreum, uti videre potestis in eius *Epist. ad BARTHOLINUM de Humoribus Oculorum. Restituendis p. 55.* Aliàs ex stercore anserum juniorum, mense Aprili collecto, etiam aqua per alembicum destillatur egregia, quæ olim dicitur fuisse usitata Maximiliano Imperatori ad obscuritatem Visus, tunicas oculorum detergendas & alia oculorum vitia, imprimis si superficies oculi post variolas læsa sit. Si pertinacior fuerit pannus, ad aquam *sapphircam Chirurgorum* progrediendum, quam videbitis descriptam in SCHROEDERI *Part. 2. Pharmacop. cap. 29. de Aquis, mox post aquas destillatas, num. 5. pag. 151.* Nempe

24. *Vas aneum,*

cui instillatur

*Aque calcis vivæ cum aqua calcatr. par. lbʒ.*

*Sal. ammoniaci ʒi.*

Relinquantur donec coloretur.

Vel ex tempore recipi potest aqua *sementis* vel *chelidonii majoris*, & in ea solvisal. ammoniaci tantillum, ut moderatissime linguam seriat, infundendo in *pelvum aneam*, donec coloretur; sic variè dilui, & ita eius acrimonia pro lubitu infringi potest: filtretur & sic oculis instilletur. Optimum est in detergendo ungue, albugine, maculis à variolis relictis, & ulceribus oculorum. Conf. TACHENIUS *Hippocr. Chym. Edit. 2. pag. 11.* item RIVERIUS *Cent. 3. Obs. 45.* item Collegium in Schræderi *Pharmac. Part. 2. p. .... Id. Formular. Class. 4. §. 19.* & Colleg. *Formular. pag. ....* Ulteriùs de Chelidonio majori nota est ejusdem egregia vis ophthalmica; unde ipse succus ejus expressus, dilutus cum rore *saniculo* insidente, & matutino tempore collecto, vel cum

aqua euphrasæ aut alia appropriata, præstans est Collyrium, quod absumit tunicas & pannos oculorum, illitum aut instillatum.

Præterdicta etiam pulveres quidam in forma sicca oculis insufflentur, aut diluti cum aquis, applicari possunt. *Vitriolum album* etiam est egregium, quod laudat POTERIVS. Imprimis observatu digna est ejus Curatio unguis oculi post gravem ophthalmiam relictæ, lib. 2. cap. 8. contra inflammationem & dolorem.

24. *Vitrioli Cypr. ʒi.*

*Tutia præpar.*

*Sacch. candi,*

*Collyr. albi Rhaf. an. ʒiv.*

*Camph. gr. vi.*

*Aqua Verben.*

*Flor. Euphras.*

*Rosar. an. ʒiv.*

*Misc. pro Collyrio:*

Quo Inflammatio & inflatio curata fuit. Hinc pro ungula, tunc appatente, removenda:

24. *Off. sepia ʒi*

*Sacch. candi ʒi.*

*Vitrioli alb. ʒiʒ.*

*Tutia præp. ʒi.*

Misc. in forma pulveris subtilissimi, qui vocatur Sief:

*S.*

*Pulvis ad oculos.*

Inspergendus vel potius insufflandus in oculum, applicando de super linteam aqua florum cyani vel chelidonii majoris imbibitum; & pulvere hoc, quem ex POTERIO suppresso Autoris nomine abtulit RIVERIUS *Pr. lib. 2. cap. 18. pag. 184.* optimè detergit ungulam, eamque absumpt;

Vel

adde huic pulveri:

*Aqua Chelidon.*

*Calcatripp. an. ʒi.*

*Misc. probè & agit.*

*D. S.*

*Collyrium.*

Beneficio cujus unguis oculi aliquando perfectè fuit curatus.

24. *Vitrioli albi ʒi.*

*Aque fenic. vel chelid. mai.*

*Euphras. an. ʒiʒ.*

*M. S. ut supra.*

Ad pelles oculorum, pro pueris in specie, convenit. Pondus vitrioli est augendum vel minuendum pro tolerantia ægri. Sanè vitriolum album aliis permistum blandè detergit. & excrecentias istas præternaturales absumit.

Facit hoc collyrium LOTICHII in *Obs. pag. 108.* quo unguem seu pannum secundum lunæ motum nunc accrescentem nunc decrecentem delevit:

24. *Aqua rosar.*

*Euphras.*

*Fenicul. an. q. v.*

In dictis aquis mis. seq. pulv. quæ mixtura cum pluma tunice illinatur, cavendo pupillam, ne acrimonia vitrioli eandem exasperet:

24. *Lap. bœmatit. ʒi.*

*Vitrioli alb. leviter calc. gr. xv.*

*Myrrha,*

*Croci an. gr. v.*

*Sacch. cand. alb. scrup. j.*

M. in forma pulveris subtilissimi, cum aqua supra dicta vel alia appropriata subigendi; & sic cum pluma ptervigiò illinatur, cavendo pupillam.

Facit hoc etiam aqua ophthalmica familiaris Hartmanni, utilis ad ungues, maculas & albugines oculorum, ad cicatrices & similia vitia, quam supra dedi.

Tandem aliis irritis in malo pertinaciori ad Mercurium sublimatum totò confugiendum est, imitando hoc in puncto PLEMPIUM in *Ophthalmogr. qui ceu secretum mirabile & expertum in puella, quæ per aliquot annos ex ungue oculorum fuerat cæca, laudat.* Nempe

24. *Mercurii sublimati gr. v. vj. usque ad ʒi.*

Dissolvantur in ʒiʒ. ad lbʒ. aquarum Ophthalmicarum, e.g.

*Aqua rosar. vel chelidon.*

*Euphras.*

*Fenic. an. ʒi. ad ʒiʒ.*

Misce



Misce & filtra,  
D. S.

*Collyrium clarificans.*

Et de tali mistura & solutione omni mane, item vesperi, etc. j. vel ij. infundantur oculo in loco panni, donec removeatur, & sic sensim absumitur ungula: quin etiam curantur hoc pacto suffusiones, Germ. *die Staare*, de quibus postmodum.

De cetero, si aliquid est, quod confert ad delendas oculorum membranas & tunicas, est sanè succus formicarum, rubrarum, in arboribus resiniferis habitantium, expressus, qui vel per pannum depuratus, & ita vel crudus, vel cum aqua appropriata dilutus, oculo instillatus, removel has tunicas. Quod pertinet etiam RULANDI duæ aquæ ophthalmicæ mirabiles; quarum una parata ex formicis artificialibus, & altera aqua ophthalmica ex infusione vitri antimonii, quæ vid. In ejus remed. & sunt stupendæ in quibuscunque ferè oculorum vitiis.

Superius locutus sum de felle lucii piscis: seu experimentum commendantur omnia extra lucii piscis cum felle, hepate & omnibus reliquis visceribus, quæ dissecta in minutas partes, adjecto M j herbae fœniculi, ejusque seminis contusi, & conquassati, & ita destillantur. Liqueor, qui prodit, utilis est ad absumendos pannos & oculorum tunicas.

Quod si delicatius sit subiectum, aut sint pueri hoc malo correpti, qui non possunt terre acriuscula, & qui lachrymantur, aut tunica sit recens, adeoque nondum inveterata aut tenax, in tali casu sufficit mel illitum pelvi æneæ, & suppositis carbonibus ignitis lentè calefiat pelvis, donec mel lenem viriditatem contraxerit; corroditur sic pelvis à melle, quod etiam facit V. M.

Tunc isto melle calido in loco tunicae blandè illinatur oculus, donec deleatur tunica. Fuit experimentum FORESTI lib. 1. Obs. 7. in scholio.

Hæc de Tunica & Panno.

## MEMBRVM II.

### DE

## TUNICÆ CORNEÆ VITIIS.

**H**ætenus de impedito radiorum visualium ingressu per pupillam. Sed præter hunc etiam evenit saepe, ut pars cornea perspicua, foramini pupillæ obfusa, visum obscuret, quando crassescit aut vitiosum colorem contrahit: dum enim obscuratur aut crassescit, radios impedit; aut si penetrant, omnia vitiosum colorem repræsentant. Fit hoc imprimis in Leucomate seu Albugine, quæ est macula alba in cornea, ob quam Visio læditur.

## PUNCTUM I.

### DE

## NUBECULA, ALBUGINE, ET SUGGILLATIONE.

### CAUSÆ.

**V**itium primum fit, quando in nutritione corneæ perspicuæ vitiatà alimentum chylosum, seri subtilioris vehiculo distributum, successivè non nihil crassius & viscidius suggeritur; hinc tollitur politura & pororum æqualis situs in cornea, unde fit, ut obscuratà nonnihil cornea ægris omnia obscura & quasi per nubeculam appareant; imò si densior fuerit hæc cornea, planè visus pereat; unde vitium hoc Latinis communiter NUBECULA Oculi appellatur, propter quam impeditur radiorum transitus.

Vitium 2. fit, quando CICATRICULA ab aliqua erosione vel latione consolidata tunicae corneæ, v.g. in variolis, aut in ejus ulcusculis, aut post ejus vulnus remanet. Talis enim cicatricula non secus ac aliæ cicatrices, cum crassior sit ac spissior, minusque polita, quam reliqua corneæ pars, albedinem repræsentat, quæ non ritè permittit transitus radiorum visualium, tuncque ALBUGO seu LEVCOMA specialiter appellatur.

Vitium 3. fit, quando post istum vel casum, item post plagas oculo illatas, vel similes injurias externas, læduntur vasa oculorum, ex quibus effunditur sanguis, qui effu-

sus & congruatus, si in albo oculi seu cornua hæret, & ita vitiosos colores, cæruleum, lividum & sanguineum inducit, visusque impedimentum inserit; quod malum SUGGILLATIO oculi dicitur.

## DIAGNOSIS.

Signa horum malorum oculis patent; Nam cicatrix instar parvæ cujusdam maculæ albæ apparere solet (unde etiam vocatur Macula); In nubecula verò Cornea nonnihil albicans & spissa cernitur: Et in suggillatione color cæruleus, lividus, &c. etiam spontè patet.

Causæ antecedentes, nempe contusiones, plagæ, &c. ex relatione agrorum patent.

## PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Vitia hæc corneæ per se patent, & in specie Cicatrix, difficillima sunt curatu, propter summam subtilitatem, simulque exquisitissimum sensum corneæ oculi tunicæ, idque eò magis, quod crassior vel magis inveterata fuerit vel Nubecula vel Cicatricula.

Suggillatio verò, nisi sit nimia, facilè removeri potest. In pueris tenellis, modò tractabiles sint, facilius potest abstergi macula, & ipsa tenuis, quàm in ætate consistente, ubi spissior & contumaciore esse solet.

Post variolas, oculos infestantes, imprimis observetur, ut insequens macula vel cicatricula citò amoveatur, antequam in perfectam abeat spissitudinem.

## CURA.

In Cura Nubecula materia crassa, inquinans perspicuitatem tunicae corneæ, attenuanda, & discutienda aut removenda: Leucomatis macula & cicatricula abstergenda & detergenda. In Suggillatione sanguis congruatus resolvendus & discutiendus. Propterea in duobus prioribus conveniunt subtilia nonnihil acra & fortiter penetrantia; mitiora quidem in Nubecula, fortiora in Cicatrice.

Pro Nubecula ergò & Cicatrice delenda conveniunt sequentia remedia: semen hormini Sylvestris seu Sclarea, Germ. *der Scharlach*, in incipiente Nubecula tempore somni oculo impositum purificat oculum à sordibus, eumque abstergit, & multum in macularum & albuginis cura conducit: Vid. de hoc RIVERIUS in Praxi, & etiam in Observ. Unde etiam ad fomenta oculorum hæc semina & folia adhiberi solent à POTERIO, qui etiam folia hormini Sylvestris in oculorum fomentis præscribit. Effectus hujus ratio est, quod hoc semen oculis impositum à lymphæ, oculos continuò humectante, extrahatur in mucilaginem, quæ istum effectum abstergendæ albuginis præstat. Aqua fellis bubuli destillata Cicatrices oculorum delet: Aqua Ophthalmica Imperatoris Maximiliani, & Quercetani pag. 63. nec non fel lucii piscis, perdicis, bovis, &c. cum aqua spermatis ranarum temperatum, vel eorum aquæ destillatæ, nem essentia. FORESTUS in lib. 1. Observ. 29. habet exemplum pueri, qui ex variolis incidit in pustulas oculorum; quæ pustulæ tandem fuerunt exulceratæ, & exinde oborta est Nebula oculorum: hinc profuit sequens Collyrium:

℞. Aquæ feniculi. ℥ij.

Fell. Anguill. ℥j. ad ℥ij.

Sacch. candi pulveris sub. ℥j.

M. stent in loco calido per noctem.

D. S.

*Collyrium.*

Spiritus urinæ cum vitriolo destillatus egregius est. Convenit etiam succus euphrasie aut fœniculi recens extractus, cui tantillum balsami Peruviani admissum sit; potenter enim Albuginem discutit, pennà blande oculis illitus: vid. RIVERIUS Prax. lib. 2. cap. 7. Vel loco hujus magis penetrat & detergit liqueor fœniculi saccharatus, qui colligitur ex saccharo, caulibus fœniculi excavatis indito & relicto, ut liqueat: vid. supra, ubi de Ophthalmia seu Inflammatione Oculi. Liqueor hic est egregium remedium ad huiusmodi externos corneæ defectus delendos; Vel recipiatur succus feniculi per residentiam nonnihil depuratus, & addatur saccharum leviale; sic magis appropriatum redditur remedium ad dictam hebetudinem corneæ, & cicatriculum.

Præ reliquis optimum specificum est liqueor oleosus ex hepate



hepate mustelæ piscis in malo le viorel saltem palpebris illitus; acris enim admodum & penetrans existit: vid. HARTMANNUS Prax. Chym. cap. 27. pag. 98. & SENNER-TUS Pr. lib. 1. Part. 3. Sect. 2. cap. 16.

In graviore vero malo, in specie Cicatricula magis tensa, etiam cum penna subtilissimè potest illiniri, quod etiam unguibus, item suffusioni, conveniens admodum existit. Oleum papyri, aut panni seu linteorum combustorum, cum penna subtilissimè oculo illitum loco cicatriculæ, est optimum remedium. Ubi validius agendum est, recipiatur aqua mellis vel simplex, & quidem prima, aut acuata cum secunda flava, vel composita Amati Lusitani. Simplicem quod attinet: mel destillatum dat primò aquam albam, secunda flavam: Prima est mitior, secunda acris. In incipiente macula prima est optima, in graviore sumatur secunda: vid. SCHROEDERI Pharmac. ubi de Melle: cum penna illita ad delendas Maculas & Cicatrices oculorum est commendata. Hinc etiam convenit aqua mellis composita à FONSECA Tom. 2. Conf. 55. & AMATO LUSITANO Centur. 3. Cur. 53. ubi Nubeculam graviores discutit.

℥. Mellis in fav. ℥ii.  
Summis. flor. sambuc.  
Euphras.  
Fenicul. an. M℥.  
Sacch. cand. ℥iv.

Destillentur in Balneo Mariæ igne fortiori non-nihil.

Liquor prodiens ad oculorum nubeculam & cicatricem ipsi Amato Lusitano per experientiam comprobatus est. Melenim abstergit & resolvit Leucomata, præsertim si misceatur cum succo chelidonii majoris exactè, & ita blandè illinatur. Succus Anagallidis flore cœruleo, imprimis florum ejus, expressus; item succus Chelidonii majoris expressus, vel solus oculo instillatus, vel cum melle rosaceo mistus & applicatus, tollit Maculas; unde & hic commendari solet aqua anagallidis cœrulea destillata, non minus quàm aqua leucollis bulbosi destillata; sicut etiam integra herba est singularis ophthalmica: qui succus illitus egregiè confert, quamvis mordeat: Sidiscerpitur caulis, liquor intense flavescens transfundat: tali caule attingenda est moderatè Nubecula vel Cicatricula. Sic diluitur succus à lachrymis supervenientibus, & tandem deletur nubecula & cicatricula. Vel fella animalium cum mellis modico subacta exactè itus formâ oculis applicatur: Vid. HARTMANNUS Pr. Chymiar. cap. 37. & Misc. Acad. Nat. Cur. Ann. 6. Observ. 126. pag. 208. de felle serpentum. Locis succi chelidonii succus rutæ etiam capi potest, qui instillatus simili pollet efficaciâ. Tandem, graviora fuerint mala, aqua sapphinea Chirurgorum supra laudata, vel cum aqua castæ vivæ in pelvi ænea, vel sine calce vivæ cum solo sale ammoniaco, & aqua simplici aut appropriata, ut lentissime linguam feriat, in vase æneo vel orichalceo, donec cœruleum acquirat colorem, etiam egregia est ad dicta oculorum vitia detergenda; hæc enim sublata sunt maculæ densissimæ, & oculo ex diuturna ophthalmia progenitæ: Vid. RIVERIUS Cent. 3. Observ. 45. Tandem egregium est experimentum PLATERI, quo omnes albugines & cicatriculas feliciter curavit, lib. 1. Obs. pag. 112. & 382.

℥. Pulp. pomor. odorat. acidul. Quartarium iß.  
(Utem quod iß.)  
Incidentur minutim, & in aqua rosar. & fenic. coquantur, donec in pulcem redigantur; cui contus. & permisc.

Mucil. sem. fenugr. ℥ij. vel ℥ij.

Album ov. Num. ii. vel iii.

Lap. hamat. minutiss. tric. vel preparat. ℥.

ad ℥i.

Cort. Grauat. pulveris. ℥ii.

M. f. Cataplasma,

oculo clauso imponendum, continuò gestandum, & bis in die removendum.

Convenit, si imprimis malum obveniat cum inflammatione, & insigni lachrymarum acriuscularum fluxione, in albugine, & cicatricula. Pariter & HORSTIUS lib. 2. Observ. 39. Leucomata ex variolis nata simili cataplasmate resolvende feliciter curavit; applicatis simul in tali casu post aurem vesicatoriis.

℥. Pulp. pom. dulc. ℥vi.  
Coqu. in l. q. aquæ sanis. & rosar.  
ad consistentiam pulvis:

adde

Mucil. sem. fenugr. ℥ii.

Misc.

Applicetur per dies aliquot, imprimis somni tempore. Post huius Cataplasmatidis usum:

℥. Aqua rosar.

Fenic. an. ℥iij.

Margar. præp. ℥i.

Misc.

Cutis follis usu continuò frequenter maculas & suffusiones omninò curatas refert. Conf. PLATERUS lib. 1. TIMÆUS von Guldenklee Cas. lib. 1. Cas. 21. pag. 48. Idea Form. Class 4. § 23. & Colleg. Formular. p. ....

Tandem liquores ex floribus cicorei cœruleis, aut flor. cyani, per deliquium seu colliquationem in furno pistorio parati (Descriptionem videbitis in SCHROEDERI Pharmac. & HOFFMANNI Clave. HARTMANNO, & SENNERTI Praxi, ubi de Ophthalmia) specifici sunt singulariter ad nubeculas, & Albugines delendas. Porro curavit aliquando FORESTUS puerum, qui ex variolis in phlyctenas incidit, quæ exulceratæ in oculorum cicatrices abierunt, cum collyrio ex aqua feniculi, adiecto felle anguillæ vel paucò saccharo. Tandem pulvis ex osse sepiæ, imprimis calcinato, vel solitario, vel cum saccharo albisimo, in pauca quantitate oculis inflatus prodest; uti etiam CNOEFFELII pulvis compositus ex exuviis serpentum, & lapillis cancrorum minutissimè tritis & invicem mistis ita usurpatus, vel cum melle illitus, vel cum aqua appropriata applicatus, Cicatriculas egregiè delet; qui pulvis etiam experimentum egregium est in vulneribus, in ulceribus, item in cancro oculorum, in quibus oculorum malis singularissimus est. His etiam in casibus peculiariter convenit aqua ophthalmica ex chelidonio maiori & cancris fluviatilibus destillata. secundum methodum MYNSICHTI & CROLLII in Basil.

Omnium fortissimum medicamentum est Mercurius sublimatus, quem solum in aqua appropriata uti ad unguem laudavi, ita & ipsius usus casu ad Nubeculam & Cicatriculas inventus; sicut enim in PLATERO lib. 1. prostat observatio de quodam Chirurgo, qui curaturus Nubeculam, nescio quo errore seductus, loco sacchari pulverisati insusavit oculo patientis Mercurium sublimatum, unde gravis quidem nata fuit oculi inflammatio, sed hac sublata mox Nubecula simul omninò disparuit, unde ad huius imitationem levissima solutio mercurii sublimati in graviore casu commendari, & cum iudicio tamen, applicari potest.

Cæterum infantes tenellos sæpe etiam affligunt hæ Nubeculæ & Cicatriculæ, post variolas præsertim, vel etiam si ophthalmiam patiantur: quos ut curemus, non incommodum est, si mater vel nutrix masticeat sigen feniculi aut ipsum feniculum; & halitum oris mox immitat in oculum infantis, idque frequenter, ita enim sæpe Nubeculam incipientem discussam observarunt. Fortius erit, si post masticationem etiam lingua tangat Albuginem, ut ipsa saliva feniculo tincta blandè eam irriget.

Quod si verò suggillati sint oculi, seu sanguis in oculis & in tunicam corneam effusus & coagulatus, indeque visus impediatur, ad resolvendum & discutendum sanguinem grumosum convenit satus ex aqua cheresolii, florum cyani & hyssopi, quæ cum lintels multiplicatis calidè crebrò oculis applicatæ & instillatæ suggillationem auferunt. In graviore malis semen cumini vel caryophylli terantur intra dentes, probeque masticeantur, hinc halitus oris in oculum suggillatum frequenter immitatur, & mirè confert; & hinc est, quod BURRHUS in Epist. ad Bartholinum laudet halitum oris simplicem. Magis appropriatum redditur cum semine feniculi. Vel in malo contumaciori sumatur coma hyssopi, eaque contusa ebulliat in vino vel aqua calida; decoctio isto in forma Forus postmodum calidè largiter foveatur oculus, idque crebrius, donec successivè sanguis extrafus discutiatur, & resolvatur; Nam apertè sanguinem extrahere congruatum asserunt, & confirmat hoc ROLANUS in Tract. de Affect. Oculorum. Tandem ultimum est & quasi anchora sacra decoctum radicis symphyti majoris vel solæ, vel, quod melius, conjunctæ cum dimidio radicis sigilli Salomonis, pro soto usurpatum certissime Suggillationem oculi tollit; e.g.

℥. Rad. consol. mai. ℥vi.

Sigill. Salom. ℥ij.

Flor. sambuc. ℥iij.

Farin.



*Farin. fabar. ℥j.*

Incisa & contusa hæc vel in forma decocti vel Cataplasmatibus, adeoque sub forma Fatus humidis, applicentur; vel trita excipiantur butyro recenti, & in formam Linimenti redigantur, quod extrinsecus oculis imponatur.

In graviore oculorum contusione:

*℥. Rad. consol. mai.*

*Minor. an. ℥. ss.*

*Flor. chamomill.*

*Melilot. an. ℥ij.*

*Farin. fabar. ℥iv.*

*Butyr. rec. ℥ij.*

*Sem. fenugr. ℥j.*

*Croci ℥ss.*

Coqu. bene secundum artem pro Cataplasmate.

*D. S.*

*Puls. resolvers.*

Resolvit & discutit potenter, ac dolorem simul insigniter mitigat. Melius tamen est, si sub forma Fatus adhibeatur; pinguis enim oculis sunt nociva: quod etiam de Unguento Nihili notandum. Aut

*℥. Flor. chamomill.*

*Summ. hyssopi an. p. li.*

*Rad. smpp.*

*Sigill. Salomon. an. ℥ii.*

*N. f. Nodulus.*

Instar Fatus humidis applicandus.

*D. S.*

*Sacculus discutiens ad fatum.*

*℥. Flor. ciani*

*Calcatripp. an. p. i.*

*Summ. hyssopi M. ss.*

*Rad. consol. mai. ℥ij.*

*Sigill. Salom. ℥ss.*

Incis. & contus. coqu. in f. q. spiritus vini:

*Colaturæ ℥ij. vel iij. adde*

*Spiritus vini campb. ℥ij. vel ℥ij.*

*M. D. S.*

*Fatus externus ad oculos.*

Tandem egregium est Linimentum *Mynsichti* contralivorem faciei in *Armam. Chym. pag. 503.* quod, uti quascunque faciei contusiones & livores curat, ita speciatim oculis suggillatis convenit.

## PUNCTUM II.

### DE

### HYPOTIMIO.

**L**æditur quoque tunicæ corneæ pelluciditas ab *Hypotimio* seu pure sub cornea, dum ab hoc nunc tota pupilla, nunc eiusdem limbus seu circuitus tantum tegitur.

### DIAGNOSIS.

Suppurationi huic quia ordinariè occasionem præbent ophthalmiæ enormiores & suggillationes, commodè ex morbis præcedentibus dignoscitur, & ad motum oculi movetur eadem materia, imò oculus suppuratus altero interdum prominentior apparet,

### CURA.

In *Cura* puseducendum, præmittendo huic, si reliquæ inflammationis subsint, remedia de *Ophthalmia superius commendata*. Educatio autem illa à discutientibus, quæ vulgò commendantur, nunquam speranda, sed ex Chirurgia petenda erit.

## PUNCTUM III.

### DE

### PHLYCTÆNIS seu OCULORUM PVSTULIS.

**P**ertinent ferè huc *pustula* in annata & cornea tunica, subinde observabiles, grani milii magnitudinis, cum pruritu, ardore, &c. Græcis *Phlyctæna* dictæ; quæ, si iuxta pupillam sint, post sui ruptionem cicatricem relin-

quunt, visum abolentem; sin verò tunicam corneam occupent, eamque exedant, humoris aquei profluvium facere possunt.

### CAUSÆ.

Oriuntur ex retentis acerbis transpirandis, sed ad transpirationem ineptis, adeoque retentis; hinc in pustulam collectis, quæ successivè rumpuntur, & nunc exilia corpuscula, nunc cicatrices post se relinquunt, suntque quasi particularis oculorum scabies.

### CURA.

Vnde in *Cura* ad acrimoniam acido-salsam temperandam respiciendum, cætera satagente natura. Convenit ergo aqua vitriolata Hartmanni, quæ vid. in eius *Praxi* cap. 25, §. 3. & cap. 28. Imò simplex vitrioli albi solutio cum addita tutia sufficit: saccharum saturni, item cerussa cum appropriatis aquis instillata, conducit.

Vel

*℥. Lapid. calamin. præp. ℥ss.*

*Tutia præp. ℥ss.*

*Sacchari Saturni ℥ss.*

*M. f. Sief.*

Oculo pedetentim insufflandum.

*D. S.*

*Pulvis leniens ad oculos.*

Aqua albuminis ovorum egregia est, si phlyctænae aperiantur & exulcerentur, detergit & consolidat.

## MEMBRUM III.

### DE

### HUMORIS AQVEI VITIIS.

**P**orrò per pupillam transiens radius visus ulterius penetrat per humorem aqueum, qui propterea tenuis, purus, & exactè limpidus esse debet. Posito iam, quod nunc pupilla sit aperta & perforata, nisi tamen permittatur liberior transitus radiis visoribus per pupillam ad tunicam retinam, solet etiam impediri visus. Si ergo in humore aqueo, inter pupillam uveæ & humorem crystallinum impedimentum aliquod se offerat, quod radiis transitum neget, Visio tollitur. Fit hoc, quando materia quædam, reliquo humore aqueo paulò crassior & spissior, sensim in eodem colligitur, quæ primò minutissimorum pulvisculorum formâ sensim in filamenta tenuissima, texture araneæ simillima, conrescit, donec hæc ipsa textura tandem in tantum augeatur, ita ut perfectè crassescat & spissescat, & in membranam consistentiam conglutinetur & coalescat. Membrana hæc vulgò *Cataracta* oculi dicitur: malum verò ipsum *Suffusio* oculi, Græcis *ὑμῶπις* vel *ὑμῶπις*, Germanis *der Staar*, appellata.

## PUNCTUM I.

### DE

### CATARACTA ET GLAUCOMATE.

**C**ataracta est nil aliud, quàm membrana quædam successivè intra humorem aqueum, vel in eo intra pupillam & crystallinum humorem, obducta, quam vocant Germ. *den Staar*.

Non autem confundenda sunt mala plura hoc nomine insignita: sic enim dicitur Germ. *der schwarze Staar*, id est, Cataracta nigra, quando anterior oculi pars fenestrata, serena & diaphana apparet, ita ut nihil vitii in oculo appareat in illo malo, quod vulgò *Gutta Serena* dicitur. Speciatim verò Cataracta propriè dicta ingravescens, Germ. *der grune Staar*, id est, Cataracta viridis, appellatur, eò quod pupilla ob nubeculam subtus enatam colorem velut marinum & viridescantem exhibet. Perfecta verò Cataracta, Germ. *der weisse oder Milch-Staar*, id est, Cataracta alba, sive lactea, dicitur ob pupillam ab albescente viscidoque humore exaltius obstructam: hinc increvens illa Cataracta respectu depositionis cum acu faciendæ etiam dicitur Germ. *der unreisse Staar*, id est, Cataracta immatura, cum subtilissima illa & quasi araneacea filamenta nondum firmiter aded



adeo cohaerent, ut acu mediante absque divulsione possint subtrahi. Cataracta verò perfecta, in qua filamenta ista in membranaceam tenacitatem coaluerunt, adeoque ab acu semoveri patiuntur, Germ. *der reiffe Staar*, id est, Cataracta matura, dicitur. Cataracta hæc nunc sita est post membranam uveam, inter hanc & humorem crystallinum, nunc sita est ante uveam inter hanc & corneam, utrobique in humore aqueo: quædam corneæ vel uveæ accrescit, quædam non: imò suspicor, omnem adhærere iisdem, atque reverà ex filamentis uveæ membranaceis, præternaturaliter oblongatis & excrecentibus, originem habere.

## C A U S A.

Communiter enim *Causa* hujus suffusionis vel *Cataractæ* est materia ista quasi nutritiva, ex qua in suo esse conservatur ille humor aqueus; sive ex arteriis derivetur; sive ex quibusdam glandulis conglomeratis vicinis, earumque lymphæ subtilissima originem ducat; sive, quod alii putant (quæ sententia tamen minus placet) aqueus humor sit tantum simpliciter spiritus animalis, vel opticus, inquam condensatus. Hæc ipsa materia reddita impura, & inquinata particulis crassioribus vel excrementosis, ut puritatem humoris aequi tollit, ita si tales particule vitiosæ plus minus glutinosæ successivè invicem connectantur, & magis magisque cohaereant, tandem talem substantiam membranaceam, Cataractam, efformant; ita ut in principio saltem subtilissima filamenta instar telarum aranearum soleant hinc inde in oculo vagari, postmodum verò successivè videntur uniri, & varias figuras representare, donec tandem magis magisque compacta obscurant oculum, & membranulam incipiunt constituere. Sed, ut monui, probabilius omnino videtur membranarum, uveæ aut alterius cujusdam, fibras præternaturaliter excrecentes suffusioni occasionem subministrare. Hinc si postmodum membrana talis successivè coagmentata totam pupillam obregat, visus planè aboletur, plus minus, prout nempe densior vel rarior fuerit: si verò tantummodò dimidiatam pupillam obvelet, omnia dimidiata saltem apparent: si tantum parva saltem incipiens cataracta medium exactæ pupillæ occupet, omnia quasi perforata apparent, & hæc est *suffusio vera*.

Nam datur præterea etiam alia, quæ vocetur *suffusio notha*, sed minus propriè ita dicta, qualis interdum quibusdam, imprimis hypochondriacis, & quibus *teinnis* variæ, circa oculos filamenta versari videntur, accidit, quæ etiam illis, qui diutius crapula & stomachi vitio laborant, dantur aut pulvisculi, aut *floesuli*, aut *musæ*, filamenta aut similia ante oculos versari videntur; aut quando oculi penitus occæcantur, id quod in specie in statu febrium & morborum oculorum, instante crisi per hæmorrhagiam narium, aut etiam in vitis cerebri, & hinc ex vitis stomachi, oritur. Curiosum hujus suffusionis notæ exemplum refert T. MÆUS *von Guldenclee*, in *Cas. pag. 62*. in paroxysmo febris tertianæ tantum affligens, in quo æger omnino cæcus redditus, extra paroxysmum optimè videns cælum.

Malum hoc subito transit, iterum redit, & sic porro, & in aliis sanis sæpius stomachum vitiosum pro fomite agnoscit, quocunque etiam modo exinde ad oculum fiat transitus, exceptis saltem febribus ardentibus, vel ex lymphæ etiam subtilissimè coagulata; hinc etiam Notha hæc suffusio post crapulam in hypochondriacis assumpto jentaculo cessat: unde probabile est, eam per qualemcunque consensum ex stomacho dependere. Quæ aliis morbis supervenit, his curatis ferè cessat. In specie, qui ex vitio stomachi hac laborare solent, optimè aloeticis ventriculum purgantibus, in specie pilulis usualibus aloeticis, item mastichinis & aloepbanganis, omni menstruall tempore purgantur, sicuti etiam per usum zingiberis, aut crudi aut in India conditi, manè jejuno stomacho masticati aut citati curantur. Hypochondriacis malum familiare est; quando verò edunt, cessat.

*Distingnendum* autem est inter *suffusionem veram*, & inter GLAUCOMA; quippe qui affectus sunt distinctissimi, ut apud BORELLUM *Append. Cent. 3. Obser. pag. 279*. alioque Practicos, sæpe confusio fiat. Origo verò confusionis est, quia Veteres Græci non distinxerunt Glaucoma & Suffusionem, sed subinde, eodemque nomine, ambos affectus apprehenderunt, quia quædam suffusiones se, simili colore offerunt; & quod veteres Græci Hypochyma vocarunt, juniores Glaucoma dixerunt. Res tamen ut præ-

teat, dico; Hypochyma denotare suffusionem; Glaucoma verò nil aliud esse, quam tale *humoris crystallini* vitium, quando hic debita suâ perspicuitate, quæ se habet instar vitri clarissimi, sit nonnihil opacus, & consequenter obscure coloratus, adeoque albedine fusca seu obscura, h. e. glauco colore, suffunditur & inquinatur, unde & perspicuitas ejus læditur. Hinc enim in tali humoris crystallini constitutione evenit, ut neque radii visorii rectè possint transire, & color serum pertransientium vitietur. Simili enim ratione, quo magis obscuratur vitrum, per quod artificialis fit visio, ita etiam, si vitrum lenticulare crystallini humoris fuerit opacum, vel vitiosè coloratum, Glaucoma provenit.

Vitium hoc *senibus* tandem naturaliter ferè supervenit, aliàs præternaturaliter, & quidem simpliciter ex mutata humoris crystallini consistentia, & majori ejus siccitate, densitate & impuritate originem ducit; sic enim minus perspicuus, sed opacus & nonnihil coloratus redditur. Confirmat hoc mechanica anatomica: si nempe humor crystallinus extra oculum sumatur, per eum instar lentis constitutum omnia objecta majora videntur, quod elegans est spectaculum; si verò idem exsiccetur, vel in aqua servidat, ebulliat, sit opacus, densior, & nonnihil albus. Hinc est, quod in senibus sit naturale vitium hoc Glaucoma, ob vitium in iisdem humorem crystallinum. Quod si vitio ætatis decrepitæ accadat, incurabile est, utut possint præservari.

Quod si in junioribus oriatur ex nimio Veneris usu, sive, crystallini sive aquei humoris vitio, convenit in specie, præmissis præmittendis, fomentatio oculi cum spiritu vini, mediante linteoduplicato oculis sub introitum lecti imposito, & per noctem ibidem contento, quæ ratione glaucoma etiam præservari potest. Melius est, si recipiantur flores borraginis vel buglossæ, infundantur cum spiritu vini, quæ tinctura applicata præservat aut curat in junioribus imminens Glaucoma. Alii laudant tincturam buglossæ cum phlegmate aluminis, addita aqua albuminis ovorum destillata, paratam.

*Causæ remotæ*, quarum occasione humor aqueus particulis excrementitiis inquinatur, & cum iis quasi congelatur, sunt intempestivæ lachrymationes, ex qua BARTISCH *Part. 1. cap. 3.* & HILDANUS *Cent. 4. Obs. 15.* cataractam observarunt; oculorum inflammatio, & Venus, tam intermissa quàm nimia; frigida potus. de quo vid. BARTISCH *l. 4.* & PANAROLLUS *Pent. 2. Obs. 6.* ac *Pentec. 3. Obs. 32.* contusio item & vulnera, vid. HILDANUS *Cent. 5. Obser. 13.* repellentium fortiorum, v. gr. in ophthalmia, abusus, nec non externa corrosivorum applicatio, vid. BARTISCH *Part. 5. cap. 1. pag. 57. & 59.*

His quoque accedit cataracta connata, qualem BOYLE *de Util. Philosoph. Experim. Tom. 2. Part. 1. pag. 72.* sanam refert.

## D I A G N O S I S.

*Signa* in suffusione vera faciliè se manifestant, & in incipiente rarè fallunt: Nam conqueruntur gregi in cataracta incipiente de variis punctis, filamentis, flosculis, fumis, aranearum telis, rete vel cribro, & similibus ante oculos obverfantibus, muscis oculos circumvolitantibus, objectis sub alieno colore, aut duplicibus, multiplicibus, dimidiatis, fissis, &c. Id quod ut plurimum rudimenti primi pro Cataracta est indicium, ut ut non æquè semper in perfectam suffusionem terminentur: Conf. BARTHOLINI *Alta Hafniens. Volum. 2. pag. 244.* Hinc visus sensim plus minus obscuratur, & color pupillæ nonnihil glaucus, quasi marinus, aut vitreonebuloso similis, apparet.

Quamvis interdum signa hæc planè desint, & ex improvviso & subito satis Cataractæ oriuntur, & quidem non tantum occasione causarum externarum apud HILDANUM *l. 2.* sed internarum quoque, ita ut experientia testetur, aliquos oculos sanis obdormientes, cæcos vigilasse, & ad humum lyncæos flexos itidem cæcos se exexisse, quem admodum FERNELIUS *Pathol. lib. 5. cap. 5.* HILDANUS *Cent. 5. Obs. 14.* & BARTISCH *Augendientst.* sive oculorum servitium, *Part. 4. cap. 2. pag. 44.* perhibent.

Quod si Cataracta sit perfecta, visus omnino tollitur, & pupilla oculum insipienti nunc similis vitro contaminato, aut saltem obscuro aut minus perspicuo similis, nunc gypsi, nunc argenti vivi, nunc viridiusculus, nunc lividus, nunc alius color in eo apparet.



Tandem perfectus color albus, aut etiam alii post pupillam se exhibentes, jam perfectam suffusionem innuunt. Imò suffusionem quoque completam conspici per experientiam constat.

Cum verò hæc modò vera, modò notha sit, sciendum: in notha rerum circumvolitantium & obversantium phenomena crelescere ac decrelescere, imò interdum planè evanescere, majora atque frequentiora observari ventriculo repleto, vel digestionè primà peracta, item in plenilunio & aere turbulento. Omnia, tunc per sumum & nebulam videri videntur, interdum penitus cæcitas inducitur, & si attente inspicitur oculus, insignis & profunda albedo circa pupillam apparere solet: E contra si vera fuerit, corruscationes & apparitiones illæ sunt continuæ, semper augentur, adeoque visus magis magisque obscuratur, ut plurimum, unum saltem oculum occupat, quemadmodum notha, ob causam communem utrumque, aut si & vera oculum utrumque afficiat, contingit tamen hoc non simul, nec similiter.

Ipse humor aqueus itidem crassescere, & ita visum plus minus impedire observatus fuit in affectu anonymo, ut ad suffusiones à quibusdā itidem referri soleat.

### P R O G N O S I S.

Quoad Prognosin horum pathematum: omnis suffusio malum est difficultè curabile.

Recens, & in qua ægri objecta omnia secundum magnitudinem, figuram, numerum, motum, &c. adhuc discernunt, medicamentis discuti potest; quæ verò magis confirmata est cataracta, ac densius concrevit, in qua æger lumen aut solis splendorem propius admotum etiam vix aut non videt, medicamentis nunquam, chirurgiâ difficultè curatur, licet etiam oculo sanoclauso pupilla ægra dilatetur.

Quò magis recens suffusio, sive in fieri, sive in factò, ed faciliùs curatur; diuturna verò & confirmata difficultiùs. Unde suffusio seu Cataracta imperfecta & incipiens in corpore aliàs bonæ constitutionis & mediæ ætatis faciliùs & per sola medicamenta curatur; facta verò non curatur medicamento, sed semper chirurgiam postulat, quamvis SCHENCKIUS *lib. 1. pag. 159.* & BOYLE *de Util. Philos. Experim. Part. 2. Sect. 1. pag. 72.* hanc solis quoque medicamentis interdum curatam perhibeant.

Vulgò multa de pupillæ amplitudine & nigredine in prognosi habentur, sed sunt fallacia. Nempe dicunt: quibus altero oculo conniventibus & palpebrâ fricata, una alterius pupillam dilatari contingat, si punctio admittatur, recipiendi visum spem esse, aut per medicamenta aut per chirurgiam; quando verò pupilla non dilatetur, nec constringatur, ea incurabilis sit: item quæ suffusio nigra est, & quæcunque splendoris nitorisque expers, nullo modo curari posse. Sed tamen hæc ipsa non adeò universalia sunt, quin revera subinde fallant. Distinguantur ergo exercitii gratia tria tempora suffusionis, ita ut primum tempus sit, quando varia saltem filamenta ante oculos versantur, & hæc est incipiens: secundum tempus, quando filamenta coeunt in membranam, quæ visum impedit: tertium tempus est, quando membrana ista est adeò densa & firma, ut nullo modo possit videri. Prius tempus suffusionis curatur facile medicamentis appropriatis: secundum vix medicamento; non desperandum tamen est, quia optimè mediante acu tolli potest: tertium medicamentis planè non, chirurgiâ difficultè admodum, interdum frustra cura suscipitur.

Porro membrana hæc, in qua æger lucem claram admotam adhuc obscure videt, potest optimè acu chirurgica curari; si ea adeò fuerit densa, ut lumen, clarum licet, nullo modo alterationem faciat in oculo, aut percipiatur, talis etiam per chirurgiam incurabilis est.

Item si oculo suffusione affecto, alter oculus comprimitur, & inde oculus æger non nihil humidus fiat, & pupilla in eo dilatetur, signum adhuc habetur, curabilem esse per chirurgiam; si non, est malum desperatum: si enim debet per chirurgiam curari, suffusio sit in secundo & tertio gradu, & membrana jam sit facta, non in fieri. Hinc distinguunt Chirurgi inter suffusionem maturam & immaturam: Matura est, quando compressio oculo ægri membrana intus obtensa in eodem situ permanet, atque erat ante compressionem; si verò post compressionem incipit moveri & fluat, est adhuc immatura. Hoc confirmant etiam colores membranae, ratione cujus distinctæ diversæ & quæque primariae

sunt species, nimium suffusio alba seu argentea, cinerea, cerulea, viridis, & flava seu buxea. In specie color albidus aut glaucus, & instar coeli, signum est, cataractam maturam & aptam esse pro depositione chirurgica: quando vero color membranæ est albicans, sicut Ger. *wie Sahne*, ac etiam planè obscurus & lividus, signum est densissimæ Cataractæ. Suffusio cerulea & viridis instrumentorum vim elidunt; dum argentea, cinerea & flava per chirurgiam interdum sanantur; modò hæc posterior nondum valde inveterata sit, utpote quæ uveæ tunicæ firmius adhærescit, & corneam atque osseam duritiem contrahit, unde vulgò Cataracta vitrea, sive felina, audit. Cataracta autem Germanis Nigra, planè non est loci huius, utpote cujus formalitas non in crassitie, aut heterogeneitate humoris aequi, sed spirituum animalium per nervos opticos denegato influxu consistit, ut *infra Puncto 1. Membri 4.* patebit, & speciali termino Gutta serena audit. Ea ferè nunquam curatur, quamvis eam curatam HILDANUS *Ccut. 5. Observ. 20.* & BARTISCH *l. 4. pag. 88.* testentur.

Sicut autem inveterata nimis Cataracta nec chirurgiam cedit, propter tenacitatem, quæ corneæ aut uveæ tunica arctius connectitur, ut sine harum laceratione vix detrahi queat, ita minus incrassata seu non sufficienter maturata instrumentis contingere haud licet, ne discontinuata totum humorem aqueum turbet, aut mox iterum concretescens magis callosa evadat, utraque autem ratione visum enormiter lædat.

Annatam esse tunicis dictis pelliculam dignoscitur: si (1.) acriorum & rodentium externorum usus præcesserit; (2.) si lineolæ albicantes, corneæ, flavæ, &c. iridem oculi, oblique spectati, transeant; vel & jam (3.) in ipsa cornea, si hæc rectè inspicitur, punctula albicantia, id est, ipsa suffusione splendidiora, appareant: imò uveæ etiam coherere concluditur, si post oculi compressionem atque frictionem pupilla non dilatetur.

Maturationem verò convenientem ante sextum vel septimum annum olim vix exspectabant, hinc ad illud usque tempus operationem differebant cum tamen sola temporis mensura cataractæ crassities ac maturitas sufficiens determinari nequeat, eò quod suffusionum alia citius alia tardius vel pro diversa materiae quantitate, vel coagulatoris v. g. caloris majore aut minore vi, eam acquirat: ita alba vix ante sextum annum chirurgiam admittit, & si citius instrumentotrahetur, ab hoc instar lactis dissolvitur. Pariter si operatio diutius differatur, per eandem in lamellas tenuiores instar glaciæ frangitur. Cinerea verò citius maturescit, id est, sæpius intra quinque vel sex menses.

Cerulea minus frequens & curatu difficillima est, cum tardius ad soliditatem decentem peringat, spiritus interim valde debilitet, vel potius humorum pelluciditatem destruat, ita ut, pellicula licet separata, visus tamen obscuritas & imbecillitas remaneat.

Viridis & flava citius maturescunt; posterior tamen, prout superius dictum, nisi mox detrahatur, instar cornu durefcit, hinc chirurgiam respuit.

Porro Cataracta in junioribus potest faciliùs deponi, & sine recidivæ periculo: in ætate autem senili sponte suborta suffusio unius oculi successivè ubi confirmata fuerit, etiam alterum oculum infestat, & ita ægri perfectè cæcunt: non potest deponi, & si deponitur, recidivat, vel regeneratur, vel senes non adeò perspicuum visum recuperant.

Quæcum dolore capitis præcedente vel præsentè, diffinitionis curationis est.

### C U R A.

In Cura suffusionis, in primo & secundo gradu existentis, substantia ista heterogenea, in humore aqueo ahuc fluctuans, ante sui concretionem discutienda, & concreta jam, quantum possibile, attenuanda, resolvenda aut dissipanda, idque saltem in incipiente; sicuti firmius concreta mediante acu deorsum versus ex situ suo removenda est.

Remedia ergò, quæ hic conveniunt internd, sunt ea, quæ oculis in specie dicata sunt, remedia ophthalmica, qualiacunque fuerint: quæ inter eminent millepedes, quorum usus internus procurandis suffusionibus mirabiliter extollitur à BOYLE in *Philos. Experim. pag. 55.* Laudatur etiam Euphrasia, cuius usu septuagenarios visum recuperasse testatur HILDANUS *Epist. 59.* Item decoctum viperarum cum aquis ophthalmicis paratum videb. in CLAUDINO



*Consult.* 36. A plurimis laudantur Decocta liquorum sudorifera cum euphrasia, chelidonio, verbena, foeniculo, & betonica parata: vid. CLAUDINUS & ZECCHIUS.

Quoad remedia externa: necesse est subtilia, & quantum possibile, penetrantia sint, quæ oculis instillanda veniunt, frustra aliàs laborabitis. Ut igitur melius penetrare queant, conveniens est, ut prius fomentetur oculus vel facculo emolliente, vid. HARTMANNUS *cap.* 41. §. 3. vel usurpetur Forus *Plempii*, descriptus à TIMÆO von Guldenklee *lib.* 1. *Epist.* 24. Quibus subjungantur ea, quæ oculis instillanda sunt subtilia: quæ inter præceteris eminent aquæ ophthalmicæ antimoniales, quæ nobilissimæ sunt in quamplurimis oculorum affectibus, & in specie suffusionibus: vid. *suprà* *Seß.* 18. *cap.* 1. *Artic.* 15. ubi de *Ophthalm.* & *Puncto* 2. huius *Seß.* *Membr.* 1. ubi de *Ungue Oculi*. Antimonium enim in se habet subtile sulphur acidulum & penetrantissimum. Ego propter tale subtile sulphur sunt optima infusa antimonialia, quatenus tunicam oculi penetrant, & ibidem suggillationem delent.

Convenit ergo Infusum vitri antimonii pulverisati; loco cuius vitri non immerito alii caput mortuum butyri antimonii, vel crocum metallorum pulverisatum, pro infusione in aquis ophthalmicis, v.g. aqua foeniculi, euphrasie, chelidonii majoris, &c. suadent: quæ Infusa in loco calido aliquandiu digesta, & hinc filtrata, additis aliquot granis camphoræ & croci, in forma collyriorum crebrius quotidie oculis instillata, & aliquandiu continuata, sunt optima: v.g.

24. *Vitr. antimonii pulveris.* ʒʒ. vel gr. ʒv.

Infund. in

Aqua flor. Csanj,

Euphras.

Fenic. ana ʒi.

Stent in loco calido per noctem:

Mané filtr. adde

Camph. gr. vj.

M. S.

Collyrium.

Hujus aliquot guttæ instillandæ sunt oculo, ægro supinacim jacente, & hoc interdum repetendum; hac enim ratione prostant exempla curatarum suffusionum. RIVERIUS pro simili infusione commendat vinum album. Post hæc conveniunt etiam egregiæ aquæ compositæ ex formicarum ovis cum felle mustellæ piscis præparatæ, quæ mirè à quibusdamp laudantur. Nempe

24. *Ovip. formic.* ʒiv.

Fell. must. pisc. No. xxx.

Mista omnia lento igne destillanda sunt, exit enim sic aqua turbida, quæ filtrata servetur ad usum, & tempore vespertino pro collyrio ad cataractam delendam oculis applicanda.

Et sanè credo, hoc non fore frustraneum: Notum enim est, quam mirabilis, & singulari FORESTI experientia confirmatus, sic liquor hepatis mustella piscis, qui extrinsecus saltem palpebris clausis illitus (penetrantissimus enim est) est nobilis in suffusione vel præcavenda vel etiam confirmata curanda: vid. FORESTUS qui à se expertum commendat. Hepar mustellæ piscis (Germ. *Aalraupe*) affigatur ligno, postmodum imponatur in vitrum, & exponatur radiis solaribus tempore æstivo, sic enim destillat & resolvitur in oleum aurei coloris acre. Tempore hyberno non succedit, & dicunt hoc quidem fieri, quia mustela hoc tempore Veneri indulget & generat: At verò hæc nos relinquimus. FERDINANDUS verò in *Hist. Med. mirab.* 25. laudat pro collyrio aquam destillatam ex stercore humano, in qua dissolutum sit fel mustella piscis, aut etiam leporis, cum tantillo sacchari candi, & margaritis subtilissimè præparatis: Illorem hunc oculis instillare crebrius jubent, est egregius ad curandas Cataractas incipientes. Nec omittenda venit ayungia viperarum, vel instillata vel inuncta saltem. Chelidonium majus seiputrefactum, item cancri fluviatiles dum incipiunt putrescere, destillata suggerunt aquam alcali subtilissimo ebriam, insigniter penetrantem, & contra suffusiones utilem. Quod si non videntur sufficere, hæc, confugiatur ad aquam istam ophthalmicam Quercetani, quæ sub destillatione spiritus seu aquæ epilepticæ ex vitriolo & urina pueri, aliquandiu digestis, hinc destillatis, primò prodit, ubi duplex phlegma colligitur, utrumque penetrantissimum, salsum volatile, quod sine sensu oculum penetrat, & confert egregiè in suffusionibus etiam jam factis resolvendis. Vid. SCHROEDERUS in *Pharm.*

ubi de *Vitriolo*, & TACHENIUS: vel loco hujus paratusex tempore sequens ad modum Quercetani ex urina puerorum & vitriolo. Phlegma hinc elicitum est subtilissimum, & quod penetrando fortiter discentit suffusiones: v.g.

24. *Urina pueror.* ʒʒ.

*Vitrioli alb.* ʒiv.

Stent per aliquot dies in digestionem, & postmodum destilletur exinde aqua ophthalmica volatilissimæ penetrationis, oculis instillando, egregia ad suffusionem.

Potest etiam ipsis succi chelidonii majoris libra una admisceri, & ita invicem destillari.

Nec minus penetrans est ille liquor, quando vel albumen ovi induratum interiùs excavatum perforatur & repletur saccharo candi & vitriolo albo, & ita suspenditur in cellam; sic enim destillat per deliquium liquor, diluendus cum aqua euphrasie, qui egregiam dat aquam ophthalmicam.

Pertinet huc etiam aqua Hartmanni ex lapide scissili & sale, in *Praxi sua Chymatr.* pag. 206. descripta. Extractum Chelidonii majoris, succus nempe inspissatus, magnitudine aciculæ capitis oculo impositum, multum laudatur in incipiente suffusione ab HILDANO *Epist.* 59.

De Anagallide flore purpureo, ejusque aqua, vid. HOLLERIUS *lib.* 1. de *Morb. Intern.* *cap.* 21. Liquorem ex pane, cum sem. foeniculi & rutæ, cum medico mellis mixto, & recenter ex furno protracto, atque intra duas patinas stanneas concluso, proleum commendat MERCURIALIS *Tom.* 1. *Consil.* 87. & ZECCHIUS *Consult.* 27. Spiritus vini cum linteis multiplicatis oculo impositus extollitur à TIMÆO von Guldenklee, *Epist.* 26. Forsan spiritus salis ammoniaci cum calcis vivæ tantillo acuat, præstantioris erit usus; quin vix aliquid subtilius noverim hoc ipso spiritu, qui pariter quoque cum aquis appropriatis vel applicari vel instillari poterit.

Denique HARTMANNUS *loc. all.* *cap.* 43. §. 3. habet aquam ophthalmicam Zinziberatam, quam non potest sufficienter laudare Lindanus in affectibus oculorum serè quibuscunque, in specie ad suffusiones; testatur enim LINDANUS, quod aliquoties dicta aqua ophthalmica Zinziberata suffusiones etiam factas curaverit, in specie quandam mulierem quæ in utroque oculo suffusiones habuerit.

In præservandis & curandis suffusionibus his, observandum simul, quod subinde etiam cum fructu & felici successu in principio seu incipiente suffusione adhibeantur vesicatoria in nucha aut prope aures; quæ multum faciunt in affectibus oculorum, teste HILDANO *Epist.* 67. sicut in senibus Fontanellæ feliciter inuruntur; talibus enim solis contumacissimæ subinde & confirmatæ suffusiones curatæ fuerunt: sed in confirmata parum valent. Conveniunt quoque setacea & hujus farinae alia: vid. HILDANUS *Cent.* 1. *Observat.* 41. & 42. *Cent.* 4. *Observat.* 6. 7. 19. & 17. GLANDORPIUS *cap.* 24. & SCULTETUS *lib.* 1. *Tab.* 3. *fig.* 2. 3. &c. Quod si hæc nimis molesta videantur, locorum egregium quoque & singulare remedium est secretum Schlegeri, nempe radix Thymelæ arborecentis seu Mezerel vel Laureolæ majoris, (Germ. *Kellersbals*) in aqua solutionis nitri, vel lixivio ex cineribus vitium, mace-rata & siccata (aliàs enim nimia acrimonia corrodit aures) lota auris priùs acu perforato immissa, instar fonticuli successivè phlegma copiosum eliciens, adeoque in quibusvis affectibus capitis catarrhalibus, imprimis in affectibus oculorum, & incipiente suffusione, singulare est remedium. Hujus Thymelæ radices mentionem facit RIVERIUS *Cent.* 4. *Obs.* 100. item TIMÆUS von Guldenklee in *Epist.* pag. 52. de perforatione aurium. Conf. etiam BARTHOLINUS in *oculorum affectibus*.

In subjectis habitioribus aut copiosiore sero turgentibus in principio mali sumus nicotianæ laudandus venit.

Denique si alia irrita, ipsa verò Cataracta in perfectam firmamque nondum coalescit membranam, dubium, an non salutaris Mercurialis simili modo, atque in Venerœ lue instituta, penetrante intimè mercurio, instituenda veniat idque eò magis, si ex lue venerœ oriatur. Inclinat ad hanc affirmativam FONSECA *lib.* 1. *Cas.* 29. Per experientiam verò felicem hoc illustrat BOYLE *Philos. Experim.* pag. 65. Conf. etiam SCHENCKIUS *Obs.* ubi de lue Venerœ pag. 159.



M E M B R U M I V.  
D E  
V I T I O N E R V I O P T I C I.  
P U N C T U M I.  
D E  
G U T T A S E R E N A.

**V**itiatur etiam visio, quando, licet rectè radii visivi extrinsecus illapsi pertingant per totum oculum usque ad tunicam retinam, eamque feriant, nulla verò sequatur visio, utut nulla aperta aut sensibilis in oculo appareat lesio aut alteratio, tunc vitium hoc dicitur Græcis *Amaurosis*, Latinis *Gutta Serena*, Germanis *der Schwarze Star*, sive *Cataracta nigra*, & est quomodocumque *Cæcitas*, uti usitatius in specie vocatur.

C A U S Æ.

*Cæcitas* huius *Causa* querenda est ferè semper, cum præsupponitur oculus saluus, vel in nervo optico, vel eius expansione, quæ tunicam retinam constituit. In nervo optico quidem contingit *Gutta Serena*, quando hic vel obstruitur, vel comprimitur, vel alio modo læditur, tam circa radicem, quàm progressum, ita ut impediatur propterea spirituum animalium influxus & transitus, unde necessarîo *Cæcitas* supervenit: vid. BARTISCH AUGEN-DIENST Part. 6. cap. 1. LOSSIUS lib. 1. Observ. 27. PLATERUS Observ. pag. 103. & 110. & RIVERIUS Pr. lib. 2. cap. 1. quibus à SCULTETO Observ. 16. etiam contabescencia distorum nervorum accensetur. Sic *Guttam serenam* à tumore globoso in cerebri, nervos opticos premente, provenientem notat PLATERUS lib. 1. Observ. pag. 103. non minus ac PAW Observ. Anatom. 2. (quæ addita sunt BARTHOLINI Observationibus) notat *cæcitatē* ex improvîso ortam in diabetica, ob vesicam ingentem aquâ copiosâ plenam circa conjunctionem nervorum opticorum inventam. Sternutatio nimia etiam *cæcitatē* induxit Auctore HILDANO Centur. 1. Observ. 24. vid. etiam M. A. N. C. Ann. 1. Obs. 71. pag. 174. A fortiori cerebri commotione, v. g. post casum, observavit HILDANUS Cent. 1. Observ. 8. ab alapa ZACUTUS LUSITANUS lib. 1. Prax. Admir. Observ. 52. & AMATUS LUSITANUS Centur. 7. Observat. Med. 44. Pariter interdum post alios morbos plus minus acutos curatos supervenit talis *gutta Serena*, nunc per metastasin nunc alio modo commotâ causa materiali occasionali, obstruante vel vitiante nervum opticum: Sic enim ex *scabie scorbutica retro pulsa* *cæcitatē* observat SENNERTUS lib. 1. Prax. pag. 886. item ex *sublatanassa* ex nucha *Guttam serenam* observavit HORSTIUS in Observ. pag. 374. item ex *ulcere pedis* intempestivè clauso similem *Guttam serenam* notat T. I. MÆUS von Guldenklee lib. 2. Cas. 28. pag. 60. ex usu decocti guajaci in lue Venerea, non purgato corpore, *Amaurosin* notat HENRICUS ab Heer Observ. 4. non secus ac RHODIUS ab intempestivo sudorifero notat Cent. 2. Obs. 37. à venæ sectione FONTANUS Exempl. 10. f. 48. ex veneno TULPIUS lib. 1. cap. 32. à purgatione fortiore AMMANUS Med. Crit. Cas. 79. pag. 530. &c. Ubi nulla alia huius phænomeni potest inveniri causa, nisi quod lædatur exinde nervus opticus, & vel obstruatur vel comprimitur. Aliàs curiosum est, quod refert BARTHOLINUS Cent. 2. Epist. pag. 275. de monacho, qui quoties barbam raseret, visum amisit; quando verò ea iterum crevit, visum recuperavit: quod fuit factum vitio nervi optici quocunque modo læsi. Sed præter nervum hunc opticum, vitiatum interdum etiam huius nervi expansio membranacea in bulbum oculi, quæ tunicam retinam constituit, interdum causa primaria est *guttæ serenæ*, quando nempe huius tonus, tunica retinæ nimium, & legitima tensio, quæ fortiter expansa in oculo, à quovis visualium radiorum illapsu movetur. Vnde si hæc ipsa membrana redditur vel paralytica, & deficiat in debito tono, vel quando læduntur fibræ, & vel contunduntur, vel lacerantur, vel alio modo remittunt à debito tono, relaxetur, & ita *flaccidæ* ac molliusecula evadat, ita ut non nisi à forti, aut etiam

à nullo radio visivo moveatur, necessarîo omnino *cæcitas* plus minus intensa sequitur.

Quò etiam facit, quando ex *Causis externis*, forti percussione oculi, vel ex casu in occiput, vel ex forti sternutatione (vid. HILDANUS Cent. 1. Obs. 24.) aut etiam ex nixu nimio epileptico, laceratur quasi, aut alia etiam ratione vitiatum membrana tunica retinæ. Hinc observatum, post epilepsiam gravem *cæcitatē* incurabilem ortam fuisse, quatenus nempe à nimis convulsionibus tunica retinæ plus minus lacerata vel læsa *Guttam serenam* infert. Porro ad istas causas, quæ possunt inferre læsionem tunicae retinæ, & inde *Guttam serenam*, accensendus venit objecti nimis splendentis, v. g. solis, diutinus nimis aspectus, aut etiam diuturnior & continuata lunæ plenæ inspectio, cuius exemplum habet HEINRICVS ab HEER loc. all. item SALMUTH Cent. 2. Hist. 83. quatenus ab horum radiis violenter impressis, propter nimium talem motum fibræ ipsius tunicae resolvuntur, & quasi paralyticæ disponuntur, unde *Gutta Serena*.

Quod etiam facit, quod ex bombardarum horribili coruscatione & impetu visus sine externa nota subitò amissus fuerit, teste SCHENCKIO in Obs. Quod etiam facit, si ex percussione oculi ex casu in occiput vitietur huiusmodi membrana, ut exinde deficiat visus. Pertinere huc videntur convulsiones, quæ subinde in *cæcitatē* terminasse visæ sunt, item epilepsie, item dolores colici. PLATERVS nempe lib. 1. Observ. pag. 102. observat dolores colicos cum convulsione & *cæcitate* quotannis recurrentes; item Obs. pag. 100. & 103. alia exempla refert ejusmodi *cæcitatē* post convulsiones hatarum; non secus ac SCHENCKIUS in Obs. ex colicis doloribus excæcatam mulierem refert: Sic HILDANUS Cent. 1. Obs. 5. *cæcitatē* ortam refert post curatam epilepsiam per vomitum. Hæc in specie ad *Guttam serenam* disponentes fuerunt causæ. In genere observandum, nil magis nocere oculis, quàm nimium Veneris exercitium, adedò, ut huius solius occasione quosdam *gutta Serena* affectos meminerim.

Sunt porro, quorum oculi ex idiosyncrasia à quibusdam assumptis notabiliter alterantur. Novi virum, qui ex variolis à pueritia oculos habet debiliores, qui, quoties caneros comedit fluviatiles, toties exasperantur parthematæ oculorum; id quod & ex milio ipsi evenit: Sic alium novi virum, ex cancris idem malum contraxisse: Aromatarium, novi, qui ex volatilibus acrim, armoraciæ, cochleariæ, sinapi, &c. abusu notabilem oculorum hebetudinem incurrit; hinc communiter sæpè oculis hostiles dicuntur: Novi virum jam senescentem vertiginosum, qui ex usu spiritus salis ammoniaci notabilem visus hebetudinem percipit.

Singularem *guttam serenam* gravidis solennem, quæ statim ab imprægnatione invadit, & ad aliquot menses, imò per totum gestationis tempus, moleste est, & post partum spontè remittit, videbitis in BARTISCH AVGENDIENST; qualem etiam talem, quæ mensium suppressione laborant, evenire, neque, nisi his restitutis, evanescere, testatur.

D I A G N O S I S.

Cæterum *guttam serenam* in *Cæcitate* adesse, non semper manifestum est; nam possunt etiam occulta oculi vitia *Cæcitatē* inferre. Hinc ut adedò vitii retinæ conjecturam probabilem hauriamus, attendatur: quando nullo vitio sensibili aut notabili in oculo præsentē homo nihilominus *cæcuse* vadit, & quidem *Cæcitas* ista si fiat paulatim, suspicio est, quod ex vitio partium quarundam in oculo non apparente fiat *Cæcitas*: quæ verò confestim fit, aut breviter sua incrementa capit, citra sensibilem læsionem, ex vitio nervi optici quod fiat, probabilissimum est, si præcesserit lesio cerebri aut capitis, nervos plus minus afficiens. Aliàs quæ de amplitudine, dilatatione pupillæ &c. proferuntur indicia, ferè fallacia sunt, quibus solis non fidendum, dicit PLATERVS in Praxi. Dicunt enim, si fricando oculum unum, & alterum comprimendo, in pupilla ejus, qui fricatur, appareat dilatatio & restrictio. nervum opticum esse illesum, spiritumque liberum habere comæatum, atque tunc ceteris paribus vitium hærere in tunica retinæ, vel in alio oculi loco. Si nulla planè sit dilatatio, vitiatos esse nervos opticos: nam amplitudinem pupillæ etiam in hominibus sanis, ad loca tenebrosiora se convertentibus, naturaliter dari; In casu verò alibi habentis luminis excellentioris pupillam arctius restringi, ne oculus nimia radiorum uber-



ubertate obstruatur, certissimum est. Parilis subest error quoad dilatationem: nam dum ager luci obvertitur, ut pupilla tantò clariùs videri possit, pupilla identidem ad luminis excessum connivet, quod etiam culvis sano accidit.

## P R O G N O S I S.

Quoad Prognosin: senes naturaliter quoad visum hebescent, & interdum ex relaxata tunica retina omnimò excecantur, unde Gutta serena laborantes non restituuntur, siue debeat eadem ex vitio nervi optici, vel retinæ.

In genere enim omnis Gutta serena difficulter curatur, in specie quæ subito fit, e.g. ab fortem capitis plagam, aut casum ab alto; quia ejusmodi affectus est talis, ut remedia, antequam ad oculos penetrant, suam vim amittant.

Difficilis etiam curationis est Gutta serena, quæ fit à tumore, qualem Platerus Obs. pag. 108. describit; à nervorum laceratione; eorundem labe, quæ visum penitus abolet, ut hanc, modò causa mobilis fuerit, interdum curatam PLATERUS l.a. pag. 110. testetur. In imperfecta, verò Gutta serena major salutis spes est, vid. BARTISCH l.a. in præfat. & cap. 3. RIVERTUS l.a.

## C U R A.

Sicut quicumque oculorum affectus sunt difficiles curari; ob nimiam nempe organi sensibilitatem & delicatam structuram, ita præ cæteris Gutta serena per quàm difficulter curatur, siue ea jam tunicæ retinæ, siue nervi optici vitio accidat, perinde est. Si tamen adsit cæcitas ex Gutta serena, curatur ea partim internis, partim externis. Internæ quidem conveniunt Evacuatio per sudorem & alvum, & alterantia, quæ per experientiam visum confortare, tam internè quàm externè, hæcenus observata fuerunt. Imprimis diæta exquisita summopere necessaria est. De cætero quoad remedia evacuantia, Vomitoria cautè usurpentur, cum HILDANUS Cent. 5. Observat. 19. referat, exhibitò vomitorio egrum visum amisisse, ejusdemque beneficio eundem recuperasse; sicuti idem Cent. 5. Observat. 5. post curatam epilepsiam per vomitum cæcitatem ortam esse refert. Tutius ergò est, alvum simpliciter per inferiora, eum alvi profluxum restitui interdum observati sint oculi. Quæ alvum evacuant, temperata sint; ut ut enim à veteribus pilulæ lucis, ut vocant, & quidem maiores pro senibus, & minores pro juvenibus, præscribi soleant, minus tamen ipsis fidendum est, cum scammoniata & quæcunque purgantia acris in oculorum affectibus magis noceant, quàm prosint, secundum PANAROLLUM Pentec. 4. Observat. 9. Magis ergò temperata, & minus resinosa, sed moderatè acris usurpentur. Pilulæ aloephæginæ singulis noviluniis ad 36. assumptæ, & deinde continuatæ, ad oculos nebulosos mirè commendantur. Alias etiam Infusum semis & agarici cum sale tartari in aqua euphrasie & fœniculi pro purgatione in oculorum affectibus adhibetur; aut pilulæ ex extracto panchymagogo cum oleo destillato fœniculi subactæ conveniunt. Hermodactylorum genulorum pulvis singulariter etiam ad oculorum affectus pro scopo purgante laudatur à THEODATO in Valetud. pag. 153. Potest etiam fieri vinum medicatum alterativum & laxativum ita:

24. Herb. Euphras. Mj.

Flor. Beton.

Calcatripp.

Cyani an. p. ij.

Fol. Semine fœnic. 3j.

Rad. Helleb. nigr.

Esul præp. an. 3j.

Sem. Fœnicul.

Cubebæ.

Cardam. an. 3ij.

Sal. tartari 3j.

Incis. & contus. includ. Nodulos

D. S.

Nodulus laxativus ad oculos.

Infundatur in Vinum, hocque hauriat zeger manè, & vespertidum cubitum eundem est; & sanè hujusmodi noduli ad Guttam serenam non contemnendi sunt. Moderata ergò sint laxativa ad Guttam serenam.

Inter sudorifera excellunt, quæ ex lignis parantur, & imprimis sassafras conveniunt. De cætero inter alterantia

appropriata aromatica blanda oleosa, & nonnihil amara, oculis singulariter conveniunt: sed acris & volatilia manifeste, v.g. cepa, & quæcunque alliata, armoracia, spiritus salis ammoniaci etiam, internè oculis nocent: sic novè viros, qui quoties armoraciâ utuntur, semper in obscuritatem visus incidunt: hinc cum aliquando cuidam seni adhuc Veneri & vino indulgenti, & aliis affectibus nervorum, & oculorum affectibus obnoxio, ordioassem cum aliis spiritum salis ammoniaci, ex hoc maximum percepit cæcitatis periculum, ut ut aliàs hoc remedium sit infons. Cæterùm palmam ducit Euphrasia, indeque parata conserva, vinum euphrasiatum, essentia euphrasie & similis, quæ ab omnibus Practicis laudata sunt. GABELCHOVERUS Cent. 3. Curat. 100. non sufficienter commendare potest euphrasiam. Post euphrasiam est Valeriana, ejusque radix, mirè laudata à TABERNÆMONTANO, ubi de Valeriana, ad visus restorationem. Post hanc Chelidonium majus singularissimum est ophthalmicum, item Levisticum ac Fœniculum, omniaque horum præparata, hinc etiam lignum Sassafras, omniaque Sassafrata, fœniculi odorem spirantia, egregia sunt virtute ophthalmica in Gutta serena: unde etiam lignum Sassafras ad nyctalopiam admodum commendat FERDINANDUS in Hist. Med. Mirab. pag. 51. Porro hisce addantur bacca Juniperi, & omnia ex his parata, Carduus benedictus, ruta, semina quatuor calida majora, helenium, rosmarinus, & omnia ex roremarino parata, oculis & cæcati optimè conducunt; ex quibus spiritus essentia, vina medicata, &c. parari possunt.

Hinc conveniunt Noduli ex hujusmodi simplicibus vino infusis, in & ante pastum subinde hauriendo, quorum descriptiones: videb. in Cent. 1. KESLERI Processuum pag. 69, & HARTMANNI Prax. Chymiatr. cap. 15. §. 2. pag. 94. ubi vinum medicatum prostat, cujus usum admodum in hebetudine visus commendat. Simili ratione parantur etiam Essentia ophthalmicæ ad intra, qualis fuit D. MICHAELIS, similibus ex speciebus paratæ. Vinum oculatum & rosmarini etiam oculos confortare dicuntur.

Facit huc pulvis pro conservatione visus laudatus:

24. Herb. Beton,

Ruthæ,

Chelid. mal.

Euphras.

Levisti.

Sem. Anisi,

Rad. Levisti.

Valerian.

Cinnam. an. 3j.

Cardam.

Zingib.

Galang.

Sem. Fœnic.

Petrofœl.

Siler. mont.

Herb. origani an. 3j.

Sacch. 3j.

Ex quibus f. Pulvis, qui aliquandiu ante pastum & in pastu sumatur.

Serenissimus Elector Fridericus magnificè pulverem, hunc, qui visum restituit vni, per septem annos ætate, postquam eo usus est quindécim dierum spatio.

Electuario ex seminibus ad visum imbecillitatem simplicis, sed efficacissimo, usus olim INNOCENTIUS III. ex semine fœniculi, sileris montani, apii, anethi & petroselinii, cum melle, quo viro centum annorum visum amissum restitutum fuisse dicitur; quod ex Manuscripto antiquo Sereniss. Principis Mantuani 1448. adnotatur: Vid. VELSCHIUS Mistom. Centur. 1. Observ. 97. SOLENANDER Sect. 2. Conf. 9. ad imbecillitatem visus mirè commendat hanc pulverem:

24. Stere. falcon. sic. 3j.

Sem. fœnic. 3j.

Subtilissimè trita misceantur, & partim quotidie usurperur internè, partim tantillum caligantibus oculis imponendum.

Hinc & Quinta essentia rosmarini, & Quinta essentia fœniculi, pro visu corroborando pluribus in usu sunt.

Excellunt etiam ex regno animalis ex formicis quævis parata remedia, quæ ad roborandum visum internè misceantur.



condocunt, ut aqua magnanimitatis, item lumbricalia, & tandem ex millepedibus parata. Nam quantum valeant, millepedes vino infusi ad visum restitendum & suffusionem curandam, de quo omni mane assumatur haustus. Huius rei singularia exempla refert BOYLE in *Util. Philosophia Experimentalis* pag. 54. & 155. ubi observat, quod mulier cataractâ confirmatâ unius oculi detenta, per usum millepedum, ascendendo à paucis numero ad numerum majorem usque ad 60. cum vino albo assumendo singulis mane, perfecte curata fuerit à suffusione: sicuti etiam alia curata fuit à suffusione utriusque oculi, qui ipsi etiam millepedes interno usu ad alia oculorum vitia erunt proficui.

In Gutta serena à solo spirituum opticorum defectu, propter evacuationes nimias, e. g. Venerem nimiam &c. dissipatorum, sola alimenta cupepta & aromatica analeptica conveniunt: conf. PANAROLLUS *Pent. 3. Observ. 46.* Sicuti alias cum haecenus diâis, ritè & prudenter administratis, diæta tenuis observanda, vitando simul alimenta crassiora & statulenta, quatenus RIVERIUS *Observ. 29.* à FOMIO *Communic. testatur*, Guttam serenam casu per incediam solutam fuisse.

Hiscæ Internis etiam addenda sunt *Externæ*: quæ Inter ad oculos sanos confirmandos & præservandos, debiles verò restituendos, multum conveniunt ros majalis plantis ophthalmicis, & speciatim feniculo, insidens, oculis bis de die instillatus & crebrius usurpatus. Iis, qui lucubrationibus nocturnis oculis nocuere, convenit liquor feniculi saccharatus Bartholæi, quem dedi in *Colleg. Pharmacent. in Schræderi Pharm. ubi de Feniculo* pag. 530. Sicuti etiam infusa antimonialia prostant, & aqua ex fellibus piscium destillata, quarum jam supra facta mentio, in specie lucii, in confortando & restituendo etiam in gutta serena non sunt contemnenda; item aquæ ophthalmicæ exemplum non inelegans videbitis in BARTHOLINI *Artis Med. Hafniens. Volum. 2. pag. 304.* quæ tam solitarie usurpari, quam pro infundendis antimonialibus egregie adhiberi potest: item aqua stercoreis anserculorum destillata commendatur ad conservandum visum. Inter alia etiam eminet *supra laudatum illud oleum sive liquor hepatis muscæ piscis*, de cujus efficacia mirabilem habet observationem FORESTUS *lib. 2. Observ. 28.* cum quo conf. BORELLUS *Cent. 3. Observ. 91.* Hispî Autores dictum liquorem, per experientiam confirmati, ad Guttam serenam extollunt, si palpebris clausis oculis, saltem illinatur. Huc etiam facit pinguedo viperarum, quam tum in hoc tum in omnibus oculorum vitiis mirè prædicat LVDOVICI in *Pharm. & WEDELIUS de Facul. Medic. cap. de Ophthalm. pag. 182.* His addatur succus seu liquor de formicis majoribus expressus, & per residentiam spontè depuratus, quibus in die instillatus omnes cæcos curare laudatur. Quin etiam aqua ista, quæ verno tempore ex pampinis vitis incisis destillat, ad oculorum vitia similiter commendati solet.

Denique convenit etiam liquor iste, qui ex lumbricis, vitro & massa panis fermentatæ inclusis, in clibano per deliquium solutis, emergit: nempe si oleum istud sumatur, per linteum densum transcoletur, & cum tantillo camphoræ acuetur, qui liquor blandissime oculis illitus maximè laudatur à quibusdam ad cecitatem tollendam. Quidam mirifice commendant contra oculorum hebetudinem & cecitatem sequens unguentum expertum BRENDLII *Conf. 55.* ubi refert, quod Uratislaviz femina, quædam per quatuordecim annos altero oculo cæca visum recuperavit: nempe

*℞. Mel. anthosar. & despumatum,*  
ut bene fluat:

elique adde

*Zingib. pulveris.*

*Caryoph. 2. minutiss. pulveris.*

*Salis comm. an. 3℞.*

Miscentur hæc omnia invicem cum melle in Unguentum liquidum.

De quo particulam quantitate seminis sinapi indidit oculo; qui quidem exinde primò velleatur, sed statim desinit, & postmodum plurimum humiditatis ex oculo effluit: quod continetur aliquamdiu, donec effectus succedat speratus.

Denique vesicatorium pone aures aut nucham applicetur, eoque exsiccat vel fonticulus vel seraceum in nucha excitatum multum valent ad guttam serenam: conf. SCUL-

TETI *Armat. Observ. 34.* Vel potius duplex excitetur fonticulus ad latera quartæ, aut quintæ colli vertebrae; imò ipsi vertici inurendum esse fonticulum, & vesicatorium toti capiti admoveendum, RIVERIUS *loc. allegat.* monet.

Nec negligenda sunt Masticatoria, quæ PLEMPIUS *Ophthalmogr. lib. 5. cap. ultim. & SPIGELIUS Disquis. Corp. Hum. lib. 7. cap. 2.* sternutatoriis præferunt; unde etiam usum sumi nicotianæ approbat HILDANUS *Epist. 67.*

## ARTICULUS II.

DE

VISU IMMINUTO,

& in specie

DE

NYCTALOPIA.

Cæcitati suo modo cognatum malum est Nyctalopia, quando æger de die mediocriter, vespere parum, ad lucem candelæ serè nihil cernit. Exempla hinc lode observantur; imprimis HEER *Obs. 4.* notat Nyctalopiam, cui in serena tempestate apparent nebulae; in turbido verò & obscuro loco non. In specie MANARDUS *lib. 6. Epist. 15.* refert quandam interdiu imbecilliter, vespere parum, noctu nihil cernentem, nisi lucerna geminata sit.

CAUSÆ.

Ex jam dicto exemplo serè concludo: *Causam* Nyctalopie videri paralyticam tunice retinæ laxationem, quæ non nisi fortiore & intensiore objecto ac lumine moveri potest.

Remotas inter causas dicta mala multum promovet Nyctalopiam, teste HOECHSTEDTERO *Decad. 9. pag. 346.* Ex usu lollacæ panis notat SCHENCKIUS *Hist. gen. humor. cap. 2.*

CURÆ.

Nyctalopia hæc difficilis curatu est, ac præsertim inveterata non curatur: Remedia inter alia decoctum ligni sassafras multum commendat FERDINANDUS in *Hist.* Item jecur anguillæ super carbones assatum aliquoties ante cibum assumptum, specificum est PANAROLLI *Pent. 3. Observ. 49.* cujus loco hepar bovis coctum in tres partes discissum, & omni mane jejuno ventriculo parscum successu usurpata fuit: Vid. M. A. N. C. *Ann. 3. Observ. 232. pag. 243.*

Denique pulvere ex semine feniculi, anisi, coriandri, &c. curata fuit nyctalopia à GABELCHOVERO *Cent. 4. Cur. 49.*

Absolvimus lésiones visus & vitia ad visum pertinentia: Pergimus in examine sensuum exteriorum ad

## CAPUT II.

DE

AUDITUS LÉSIONIBUS.

POST Visum sequitur Auditus, noctu dieque æque vigans, cujus obiectum movens externum nil aliud est, quam aether seu aeris subtilissima substantia (vid. WILLIS de *Anima Brutor.*) diversimodè, impetuosè, tamèn & violenter nonnihil, vel percussione vel statu commotus, qui undique undulatorio motu in orbem diffusus per anfractus auris externæ ad aurem internam, & speciatim ad nervum auditorium seu acusticum, in cochleæ extremitate in membranam expansum, impingit, eamque quasi percute: qui motus distæ percussioni analogus, & ad oerebrum continuatus, à nobis sonus; ejusdem verò dijudicatio seu perceptio Auditus, dicitur Undulatorius motus.

Platus



Flatus etiam est percussionis species, qui per spatium liberum leuem habet sonum; sed si cum impetu per locum angustum fertur, fortior est sonus.

Motiones huiusmodi ethereæ ad aurem continuatæ, prout sibi invicem certâ, secundum Arithmeticæ leges, proportionem in majori vel minori gradu, & intensione aut remissione respondent, gratum vel ingratum, seu harmonicum vel non harmonicum efficiunt sonum; & prout istis motionibus respondentes in cerebro spirituum animalium se habent motus in impetu majori vel minori, ordine vel confusione, &c. varii effectus Musicæ in nobis exsurgunt; quin & à nervo auditorio ramusetiam ad gingivas prodit, unde ingratum sonus etiam dentes quasi afficit.

Motus talis ætheris, prout vel vehementior vel debilior, fortior vel remissionem nobis repræsentat sonum: prout fortior & celerior, acutior; prout remissior & tardior, gravior: sicut impingens ætheris motus in corpus densum, repercutitur diversimode, ita tamen, ut angulus percussionis angulo incidentiæ exacte sit æqualis, indeque repetitum sonum seu Echo constituit, quale in cavitate instrumentorum Resonantia dici solet: vid. SCHOTTUS in *Mag. Naturali*, item KIRCHER in *Phonurg. Musica*.

Ad ætheris motiones flatu factas, tanquam per instrumentum pneumaticum, pertinet motus ejus in animalibus per tracheam seu asperam arteriam factus, *Vox* dictus, quæ simplici per laryngem, imprimis epiglottidis adjumento, elitione Vocales, per linguam verò, dentes & labia modificatione Consonantes, effingit: quæ literæ in hominibus, pro impositionis & consuetudinis ratione, mille modis combinatæ, & artificiosè articulatæ, sermones constituunt; unde & solâ motus organorum sermonis observatione surdus, & mutus ab ortu per oculos seu visum exacte audiens, & ita loqui perfecte reddi potest: Vid. DIGBY de *Immortal. Anima Tractat. Angl.* item *Amicus hominis surdi, & muti*, qui tamen maximam partem in DIGBY invenitur.

Auditus hic læditur duobus fere modis:

1. Quando imminuitur in Obauditione, h. e. in difficili auditu, aut quando omnino aboletur in surditate: Ac
2. Quando depravatur aut vitatur, ita ut soni, qui non sunt, audiri existuntur, in affectu TINNITUS & sonitus AURIUM appellato, de quo postmodum.

## ARTICULUS I. DE AUDITU IMMINUTO, ET ABOLITO. MEMBRUM I. DE SURDITATE.

Contingunt hæc læsiones, tanquam symptomata, vel in morbis malignis aut acutis, idque ut plurimum fausto omne, dum interdum crisin portendunt, interdum verò conatum saltem criticum ad parotides; vel extra hos, idque nunc vitio proprio undecunque contracto, nunc aliis chronicis affectibus superveniunt, v. g. lvi Venæ.

### CAUSÆ.

Quoad causas: hauriendæ sunt ex quatuor fontibus. Imminuitur enim aut aboletur *Auditus*

I. *Vitio auris externæ*, si scilicet hæc sit abscessa, vel alio modo læsa; tunc enim tantum obscurus & raucus minisque distinctus sonus percipitur: unde taliter affecti manibus cavis auribus ad motus defectum istum refarcire coguntur. Quod pertinet etiam alia instrumenta otica pro surditatibus, quæ vid. apud SCHOTTUM in *Mag. Nat. lib. 3. Art. 2. Syn- tagm. 4. Pragm. 1.*

II. Imminuitur & aboletur auditus vitio meatus auditorii, obstructi scilicet aut infarcti, quod minus aure externâ motâ possit æther interius ad aurem internam progredi: quod sit non tantummodò à rebus extrinsecus illapsis, pisis, Estmull. *Opér. Tom. II.*

nucleis, cerasorum, &c. sed etiam ipsa ceramina diutius in auribus retenta & tandem indurata subinde idem præstant. Degryllo in aurem ingresso vid. M. A. N. C. *Ann. 4. Observ. 30.* Nec tantum meatus auditorius externus, sed internus in fauces hians, similiter angustatus, *Auditus* difficultatem infert. Quod facit surditas ab incremento nimio glandularum, prope quas excurret meatus auditorius in os, observata à TULPIO *lib. 1. Obs. cap. 35.*

III. Imminuitur vel aboletur auditus vitio membrane tympani. Sanè dubium non est, quin viciatâ hac membrana tympani lædatur plus minus auditus; cum certum sit, ipsam non frustra esse conditam in meatu auditorio: saltem de usu ejus est dubium, qui probabiliter saltem statuitur Præservatorius auris internæ, & nervi intrinsecus expansi auditorii ab externa vi frigoris, aeris, pulveris, similibusve injuriis; nec magis pertinere ad auditum ipsum videtur, quàm vitrum in fenestris ad visum; id est, sicut hoc intro-mittit lumen sine offensione eorum, qui sunt in conclavi, ita illud permittit sonum transire, & excludit, quæ aliâs læderent organum, quemadmodum apparet in experimento, quo fractâ membranâ tympani canis videtur nihilominus audire per aliquot septimanas, donec aliâ causâ, v. g. frigore externum, corrumpunt organon: Sic HORSTIUS *lib. 7. Observ. 8. pag. 444.* notat tympanum per abscissum putredine absumptum, sine ulla tamen auditus læsione; Sicuti etiam SCHNEIDERUS *lib. 3. de Catarh. pag. 451.* eandem membranâ ruptam, aut totam fere excretam, nullam tamen noxam auditus attulisse, observat.

Læditur auditus vitio hujus membrane vel ruptæ, v. g. à causa externa, imprimis ex forti nimis sonitu, cujus impetu divelli & plus minus lacerari vel rumpi solet (vid. HILDANUS *Cent. 3. Observ. 7.*) hinc fit interdum, ut ab explosione scopeti huic non assueti surdastri fiant; vel exese & plus minus exulceratæ, ut observatur in abscessibus aurium internis, item in variolis & morbillis interiora auris obfidentibus; aut etiam secundum RIVERIUM vitio membrane relaxatæ nimis, nimisque humectatæ, tam propter causas internas in affectibus catarrhalibus, quàm externas, nempe humidam aeris constitutionem: hinc quidam sub tempestate pluviali, vel constitutione aeris austriana vel humidior, graviores habent auditum, membranâ istâ ab aeris humiditate plus minus relaxatâ; ex qua causâ videtur orta surditas ex copioso oleo communi auri instillato, quàm refert TIMÆUS *Don Guldenklee in Resp. pag. 109.* in serena verò & sicciore, admodum acutè: uno nomine paralyticæ factæ: aut denique vitio ejusdem convulsæ ac fortiter nimis expansæ. Requiritur namque ad debitum aeris moti seu soni transitum, ut membrana ista sit tensa, & firmiter dispansa; aliâs laxata membrana certò extingueret & supprimeret sonitum, pariter ac in tympano videmus: Conf. *Atti. Anglic. Volum. 1. pag. 553.* Nam quoad paralyticam membranæ hujus constitutionem, pertinet huc ista surditatis species à WILLISIO de *Anim. Brutor. Part. 1. cap. 14.* observata, quando quidam sunt surdi & nihil audiunt; quando autem pulsatur tympanum, vel campana, vel inflatur buccina, sub tali fortiori sonitu impulsâ redit in debitum tonum, & sic alios intelligunt. Novi mulierum aliquamdiu surditate laborantem, tandem auditu sonitu in capite, ac si bombardâ exploderetur, cessavit; dicebat: Illam non opinatam esse, quod esset in capite suo, interrogavit igitur circumstantes, annon & ipsi idem audivissent. Credo sanè, & probabilissimum est, quod viciatâ hæc membrana tympani, lædatur tandem auditus successivè viciatâ labyrintho & cochleâ ab externis irruentibus, ut jam supra ex HORSTIO & SCHNEIDERO loc. cit. probavi. Pertinet huc etiam stupefactio tympani, vel ab aere frigidiore, vel narcoticorum abusu, vel inersatione, vel exsiccatione, aut per ætatem, aut ineptâ calidiorum applicatione, quale exemplum de pane calidiore annotavit BAR. THOLINUS *Cent. 6. Hist. 77.*

Quoad convulsionem hujus membrane: arbitror, subinde convulsivi quid pati, quatenus ratione musculorum convellitur, & ita nimis tensa & expansa redditur; tunc enim propter talem tensionem & spasmus nequit commodè ab aere externo percuti, sed ille sine fructu retrocedit. Fit hoc v. g. in Hypochondriaciis, quibus sæpè aliquid ante aures obtendi videtur, quod nihil aliud innuit, quàm quod ista membrana tympani convulsa tendatur; quando verò iterum relaxatur, iterum audiunt, unde dicunt: cadere ipsam repente ante aures, & citò iterum abire: ibi subito tendi nimis, subito remittere, denuò videtur. Sanè etiam



In auditu lésione ventriculus cum nervis confusus subinde attendendus, utrum à priori non adeò bene explicabilis, cum subinde, prout ventriculus vel vacuus vel plenus est, remitti aut intendi etiam malum observetur.

IV. Tandem *vitio nervi auditorii* seu acustici in cochleam expansi ut plurimum imminuitur vel aboletur auditus. Si nempe hic sit (1.) *vitiosè conformatus*, ita ut non ad aurem internam, sed ad alium locum deriveretur; quod fit sub prima fœtus formatione, unde tales ægri subinde ab ortu solent esse surdi, & ut plurimum simul muti, vid. DEUSINGIUS. Aut etiam (2.) si nervus præternaturaliter est affectus, nunc in exortu, nunc in progressu: In exortu, circa basin cerebri, quando illud est compressum & angustatum, unde intercipitur spirituum animalium motus per hunc nervum ad expansionem in cochlea & labyrintho: In progressu, quando ipse nervus est angustatus, sive sit obstructus, sive sit compressus, sive alio modo huc faciente vitatus, adeò ut spiritibus animalibus omnem transitum intercludat, à quacunque fiat causa, vel in casu ab alto, illusione temporum ex casu, aut eorum & cerebri gravi percussione & contusione, morbo Gallico, vel in affectibus catarrhalibus à lymphâ subtili se insinuante, & membranâ ejus atque ipsas fibras nerveas plus minus humidas, & flaccidas reddente, ut in debito tono cessent; vel etiam subinde in morbis acutis ad statum properantibus, & per hæmorrhagiam criticam finiturs, arteriis & venis intra *labyrinthum* magis distensis, hincque nervum auditorium comprimentibus. (3.) Quando hic nervus in membranâ intra cochleam & labyrinthum se expandit, & membrana ista vitatur, auditus læditur; idque duplici modo: quando vel quasi paralyti, vel quasi spasmò corrigitur. Paralyticam constitutionem quod attinet, quando scilicet fibræ ejus sunt aut ruptæ aut divulsæ, aut relaxatæ plus minus, aut alio modo vitatæ, adeoque à naturali tono remittunt: hinc etiam convulsis fibris rigidior quasi evadit membrana, & ab externo motu vix mobilis: illud frequentius, hoc rarius arbitror vitium. Nam in paralytica constitutione membrana ista propter atoniam suam inepta erit, ut moveatur ab impellente aere, unde ita auditus necessariò tollitur. Hinc fit sæpius, ut post nimis acutos sonos homines fiant surdi, v. g. in insuetis ex explosione sclopetorum auditus ad tempus tollitur, aut plus minus debilitatur. Quidam reddunt rationem, quod interna expansio nervi acustici aut membrana auditoria in cochleam & labyrinthum ingressa, à sono gravi tam fortiter moveatur, ut aut fibris laceratis aut nonnullis fibrillis ruptis, distentis, vel aliâ ratione male affectis, auditus plus minus lædatur, unde soni non percipiuntur; vid. H. LDANUS *Cent. 3. Obs. 7.* quod tamen non videtur probabile, quia membrana tympani extrinsecus obstat, quæ omnes foras sonitus retundit, quò minus possint penetrare. Potius ergo tympanum læderetur, quam membrana acustica in cochleam expansa, quod fit saltem à causis externis.

Nam quoad internas, si dicta membrana nimis laxetur, & humidetur, unde & eadem paralytica facta in tono remittit, & minus fortiter à sono potest moveri & percuti, & ita auditum difficilem & obscurum infert: id quod etiam in catarrhali vitio à lymphâ in suo motu impedita, ibique plus minus excreta, fieri potest. Item si, saltem tantillum recrementi ex privata illius nervi aut membranæ nutritione relicti, aut aliunde cum sanguine transmissi, auditus lésionem inferre poterit, prout vel irritando ad convulsivas, vel nervum obstruendo ad paralyticas aut similes affectiones disponere valebit: quò & metastasis materiæ seu potius fermenti in morbis acutis aut etiam chronicis pertinent; item incongruus usus unguenti Mercurialis pro sordibus capitis detergendis; vid. TIMÆUS *lib. 1. Epist. 29.* Spasmodicam affectionem membranæ quod attinet; eadem, quacunque occasione irritata, convulsis fibris rigida quasi evadit, adeoque ab externo movente vix mobilis: Facit huc observatio BARTHOLINI in *Cent. 4. Epist. pag. 235.* de sene, qui ex surditate acutum visum recuperavit, sed curatâ surditate antiquum visum vitium rediit. Vitium videtur hæc in exortu nervorum, ut spasmus nervi acustici spiritus animales ad nervum opticum penetraverint, quo reſerato, in tanta copia ad opticum non pervenerunt.

## D I A G N O S I S.

Vitium Obauditionis & Surditatis per se patet, saltem, scrutinium causarum incumbit Medico, quatum differentias à priori perscrutari perquam difficile est; saltem ratio causarum antecedentium, & ita fiendi modus nunc repetitus nunc successivus, item adjuncta aliarum partium symptomata, vel capitis, vel sensuum reliquorum, item an surditas continua sit? an interrupta? an conjungatur cum morbis hypochondriacis & aliis pathematibus? easdem subinde plus minus manifestant. Ex his enim origo seu causa surditatis artificiosa conjectura eruitur.

Causam esse vel defectum auris, vel obstructionem meatus auditorii, vel tympani lésionem, vel etiam malam conformationem, facile per se & levi ex circumstantiâ patet. Sin verò vitium nervi obstructi aut alio modo læsi addit, id solâ conjecturâ difficulter admodum à Medico deprehenditur & percipitur.

Affectum esse catarrhalem, ostendunt pathemata catarrhalia conjuncta; item progressus Tinnitus aurium aut etiam Sonitus: Item si sensus fuerit ex aliquali obstructione, item difficultas successivè & inchoat, & successivè incrementum capit.

In morbis acutis subito fit surditas, ex quacunque etiam oriatur causa.

Si sit à causa externa, à casu super aurem, à sonitu gravi, &c. ex relatione ægri cognoscitur.

## P R O G N O S I S.

In Prognosi habenda est ratio differentie surditatis, quatenus observatur vel in morbi acuti imprimis statu, vel morbo chronico.

In acuto surditas subito facta, si est à causa externa, nil habet in recessu.

Surditas superveniens in febribus acutis, urinâ existente crudâ, delirium grave portendit; sin verò surditas in acutis & malignis febribus cum signis coctionis, aliisque signis bonis conjungatur, ut plurimum bonum signum esse solet, cui ipsi interdum aut hæmorrhagiæ narium, aut forsan dejectiones biliosæ plus minus, per diarrhæam criticam superveniunt, & sic finitur morbus; aut si nihil tale eveniat, saltem ex obauditione, febribus acutis superveniente, decubitus quidam & motus translocatorius ad parotides ferè innotuit. Nam quod non semper sit malum signum, videbitis præter ZACUTUM LUSITANUM in *lib. 1. Med. Princ. Histor. Dubio 40.* & PAULI in *Digest. de Febr. Mal. pag. 16. & 17.*

Si in morbis acutis surditati superveniat delirium, vigiliæ & similia, pejus est, quàm si surditas superveniat delirio; & si tale delirium surditati superveniens cum anxietatibus, vigiliis, aut etiam cum vomitu conjungatur, periculosum morbum innuit.

Quibus surditas cum gravitate capitis, & hypochondriorum tensione, & oculorum ad splendorem perturbatio adest, ista hæmorrhagiæ narium indicatur: quod eò magis confirmatur, si ægri vellicant nares.

Surdi abortu curantur raro; nihilominus tamen loco aurium illis inserviunt oculi, quoniam arte tales surdi possunt assuescere, ut oculis, considerato motu labiorum & lingue, omnem loquelam possint intelligere, & sic ipsi loquentes reddi possint: Sic D. WALLIS, Mathematicus Oxoniensis, duns Nobiles Anglos abortu surdos, arte, mediante solo labiorum & lingue motu, ut loquentes intelligant, & accurate respondeant, edocuit: Simile exemplum habet DIGBY in *Traſſ. de Immort. Anima Humana*, de Nobili quodam à nativitate muto, ita instructo, ut quoscunque loquentes perciperet ex solo adſpectu, etiam linguam ignoram loquentes. De hoc *Traſſatum Anglicum* scripsit D. BRAUN, dictum *Philocophos*, ubi prolixè differit, quomodo surdi possint institui, ut voces audiant, & accurate loquantur.

Interim tamen surditas, quæ per se morbum constituit, aut chronico morbo successivè supervenit, contumax & difficile curatu malum est: quod ubi semel radices egit, aut facile redit, aut pertinaciter affligit.



## C U R A.

Cura pro varietate ipsius affectus ejusque causarum imprimis varianda. Et quidem si adsit Surditas in morbis acutis, attendendus est criticus naturæ motus, & quorsum eadem verbat, & talis surditas raro curatur à Medico, quia sub morbi mutatione serè sponte cessat, salutari cum effectu: aliàs Cinnabarina interdum conveniunt. Si post morbum acutum supersit, vel aqua Anhalina, cum bombace auribus immissa, prodest; vel cucurbitulæ prope aures affigendæ, & fumus tabaci subinde hauriendus: Conf. M. A. N. C. Ann. 6. Observat. 110. Si verò sit à morbo non acuto, sed per se affectum primarium serè constituat, varietas causarum observanda est, pro quarum varietate cura varianda. Quæ ex abscissione vel in defectu auris externæ oritur, curatur per instrumenta quædam concava, extrinsecus auribus admotæ: vid. SCHOTTUS loco all. Si obturatæ sunt aures, in specie à cerumine, idem emollientibus & liquefacientibus attenuetur, & educatur, quod sit v.g. per succum absinthii instillatum, vel per essentiam absinthii, vel per urinam pueri, aut spiritum urina non adeò rectificatum & acrem infusum: quibus liquantur cerumina indurata, quæ postmodum eximantur. Sin ex aliis causis internis fuerit malum, serè semper membranæ tympani, & hinc nervi acustici habenda est ratio, ut horum tonus, quantum possibile, aromaticis, & appropriatis nervinis, præmissis internis, aut conservetur aut restituatur.

Quoad Interna; affectibus catarrhalibus internæ conveniunt, ut volatilia, succinata, sassafrata, & similia, quæ ex suprâ dictis lib. 1. Sect. 21. cap. 2. Artic. 1. cognoscantur: c. 8.

24. Ess. flor. rosmar.

Hyperic.

Ligni sassafr. an. ʒij.

M. D. S.

Essentia Catarrhalis.

Inter remedia externa præ reliquis granum unum, vel alterum Moschi, vel Ambra, vel Zibethi cum bombace involutum, optimum est remedium, quod auribus immittatur vesperi sub introitum lecti, sive solitarie usurpetur, sive post medicamenta quæcunque auribus instillata talis bombax moschatus applicetur; Item bombax essentia Ambraæ imprægnatus ita intrudatur. Ac sanè in surditate senum vix melius remedium efficitur, quàm Ambra, imprimis ubi simul adest spirituum animalium defectus. Datur interne vel per se, vel ejus essentia crebrius, vel externe dictis modis. Hamburgi Medicus quidam ejus beneficio cuidam auditum restituit antea à veneno læsum; sicut & pastor quidam surdus Zibetho cum bombace auribus indito feliciter restitutus: Sic balsamum Peruvianum cum spiritu vini dilutum, & cum gossypio auribus applicatum, admodum confert: Vel aqua origani cum vino destillata, vel aqua cardui benedicti, per crebriorem à nova planta cohobationem parata, sapius usurpata, fuit polychreston Cratonis; guttatum auribus instillata, vel cum linteolo hac humectato applicatæ conducunt: Item aqua fraxini, ista nempe spontè ex ligno recenti quoad unam extremitatem igni injecto, in altera extremitate exsudans & collecta, experimentum est Cratonis contra surditatem, cum nimia aurium caliditate conjunctam: aut si surditas oriatur à causa calida, aqua picarum cum castoreo, aqua formicarum, aqua muscarum per alembicum destillata, &c. similiter insigniter conducit: Succus raphani, succus cepæ, cum oleo succini & amygdalarum amararum conjunctus auribus instillatus insigniter conducit.

In specie tamen aromatica penetrantia conducunt, ut aqua seu spiritus theriacalis, essentia absinthii, essentia cardui benedicti, castorei, thymi, essentia caryophyllorum, cardamomi, & essentia compositæ, spiritus quoque acusticus Mynsichti & Mindereri (prostat descriptio in fine Aloedarli) item Barbette, vel aliæ similes compositæ aquæ spirituosæ, vel guttatum instillatæ, vel cum bombace crebrius admotæ auribus, sunt egregiæ. Essentia itidem ex fellibus animalium cum spiritu vini paratæ præ ceteris omnibus commendari solent; egregium enim sunt remedium ad auditum amissum: sic fel humanum cum spiritu vini mistum, aut etiam fel leporis, vel fel anguillæ, si affuodatur spiritus vini, sicut in digestionem, & per

Etzmull. Oper. Tom. II.

filtrum separentur, horum essentia mand & vesperi ad gutt. ij. vel iij. auribus instillantur, & ut singulare specificum commendari solent. Alii

24. Fel. bovin.

Vini Malvat. an. part. equ.

Destillant per alembicum: liquor, qui prodit, vel ad paucas guttas auribus instillatur, vel cum gossypio auribus imponitur, & sæpius repetitur, in aure sano postmodum superdormiendo: Vid. MARTINI SCHMUCKS Thesauriol. Secretor. Part. 2. pag. 91.

Facit huc essentia acustica, specificum singulare ad auditum. Practici cujusdam celeberrimi Brunscienlis, quæ cum successu crebrius ususest:

24. Rad. helleb. nigr. ʒß.

Calam. arom. ʒij.

Pulp. Colocynth. ʒj.

Bacc. lauri excort. sel. ʒi.

Sem. Cumin. ʒij. ad ʒijß.

Spiritus vini ʒiv.

Incisa & contusa sicut in infuso per aliquot dies in vase vitreo obturato bene, postea coeuntur cum expressione & filtrantur: cujus essentia aliquot guttæ singulis octo horis auribus instillandæ, vel cum bombace meatui auditorio applicandæ sunt; sicque curavit surditatem inueteratam.

Potest acui cum tantillo essentia ambre, vel in ea dissolvatur parum moschi aut Zibethi, & erit eò efficacior; vel applicetur cum bombace, in quo antea moschus vel Zibethum jacuit.

Facit huc etiam oleum destillatum succini, anisi, laueudæ, &c. Idem gossypio involutum auribus admoendum. LINDANUS sel perdicis cum oleo succini sæpius rectificato destillat; sic enim potens remedium efficitur. Aut oleum destillatum anisi cum oleo amygdalarum amararum, vel cum oleo nucleorum persicorum, permistum instillandum venit. Quo etiam pertinet oleum destillatum succini, majoranæ & scniculi, similibus modis applicatum. Liquor ex ovis formicarum expressus, si quid aliud, admodum confert, & mirè commendatur; aut etiam ova formica, cum contrita cum succo ceparum permista & in aurem instillata, quàm vetustissimam surditatem sanant. Quidam

24. Ovior. formic. ʒj.

Fell. leporis No. vi.

cum duplo mellis in mortario bene trita & subacta auri instillant, & ita surditatem curant.

Veletiam sola aqua ex ovis formicarum per Balneum Mariæ destillata in usu esse solet, & commendatur à KUNRATHO in Medulla Destillatoria. Item remedia ex formicis, in specie aquæ magnanimitatis dictæ, cujus descriptionem communicavi in Colleg. Pharmac. in Schræderum. P. 2. pag. .... Spiritus item formicarum admodum laudatur in gravi auditu & surditate. Facit huc mistura HEERTODII de Crocopag. 107. & oleum istud singulare ad quosvis aurium affectus, surditatem, tinnitum, & similia mala laudatum, à quamplurimis mirè commendatum, & à nonnullis profecreto habitum, quod sit ex vermiculis albicantibus, qui in quercu inter corticem & lignum gignuntur. Modus est hic:

24. Horum vermicul. No. xx.

ebulliant in

Olei olivar. immat. ʒijß:

deinde excavetur radix cyclaminis, eaque repleatur oleo dictorum vermiculorum, super addendo

Præp. rad. Pyrethri

Costi aromat. an. ʒß. ad ʒj.

Olei costi. & rutac. quantum

adhuc capere potest.

Occludatur denuò radix cyclaminis, & sub cineribus assetur, & postmodum contundatur in mortario marmoreo, & exprimat succus fortiter.

De liquore expresso oleoso immittantur aliquot guttæ per oſto, novem vel decem aut etiam plures dies in aurem, & est mirabile remedium, quod multi admodum commendant; sicut de TIMÆO à Guldenkle, refertur, quod hoc modo Surditatem serè naturam curaverit. Vide THEODATUS CAMERARIUS in Memorabil. & PE-TRÆUS in Dissert. Harmon. 11.

Hicce adnumeranda venit axungia serpentum, meatui auditorio illita, aut cum gossypio applicata, quæ pro magno arcano à quibusdam habetur: Vel serpentes coquantur



In aqua, cui supernatas pingendo separata, & cum spiritu rectificato juncta, ad consistentiam olei: sic pinguedo viperina cum guttis paucissimis olei succini auribus infusa, admoto postea pane recenti calido, commendatur in VEL. SCHII MICTOMIM. Cent. 1. Obser. 39. annexis Anno 4. M. A. N. C. Huic vix cedit pinguedo Anguillæ, collecta, dum anguilla pinguis assatur in veru: excipitur ista pinguedo exstillans foliis lauri, hinc colligitur, & tepide auri instillatur contra surditatem, vel solum, vel additis aliquot guttis olei destillati anisi, obturando postmodum.

Vulgò solet commendari ad surditatem papis recens fyrno extractus, spiritu vini imprægnatus, & auribus ita calidè admotus: sed non suadendum juxta BARTHOLINUM, qui maximam exinde noxam observavit. Quidam panem pistorium cum semine anisi, fœniculi & cumini præparant, & recentem auribus applicant.

Vaporem ex spiritu salis ammoniaci, sive simplici, sive anisato; aut mixturæ ex sale ammoniaco, misto cum oleo tartari per deliquium, aut duplo calcis vivæ cum aqua simplici, ex vitroparvo angustiori officii, sed longioris & curvæ colli, probè calefacto auribus excipiendum commendat. LUDOVICI in Pharmac. pag. 311.

Cæterum de remediis hiscæ auribus applicandis, observandum est in genere, ut nempe (1.) quoties talia medicamenta quæcumque auribus sint instillanda, aurem semper obturandum esse facta instillatione cum bombace moschato aut ambrato: (Bombacium in quo Moschus fuit impositus:) aut cui unum alterumve moschi, vel ambræ granum est impositum; cum, ut suprà monitum fuit, solus talis bombax gratissimus sit auribus; & per se ad surditatem gravem auditum sit egregius. Adhæc (2.) quoad hæc remedia vel instillanda vel intrudenda, quod oleosa non sint immittenda, nisi prius benè auri sit absterfa & purificata, & hinc renovetur remedia applicatio. (3.) una vice tres vel quatuor guttas immisisse sufficit. (4.) quoque, quæ sub forma liquorum subtilium, essentiarum, vel spirituum volatiliū aut similibus auribus instillantur, ferè solent esse mitiora, quàm oleosa ac plus minus viscidula. (5.) ea, quæ in aurem immittuntur, nunquam sint intensè calida aut frigida, sed tantum tepida, calori aurium appropriata. Tandem (6.) post medicamenti applicationem dormiat æger super aure sana, ut ita remedii vis aurem egram cò melius ingrediatur & penetret.

Quando aurium affectus sunt vagi, adedque in specie, quando habent fomitem in cerebro, & sic ad modum affectuum catarrhalium solent affligere, optimum est, si percipiatur imminens paroxysmus, ut vertici imponatur lintheum spiritibus penetrantibus apoplecticis imprægnatum, illinatur vertici oleum destillatum succini, & similia, quod etiam simul observandum, quando suprà dicta aromatica & spirituosæ auribus applicantur, in vitio imprimis nervi acustici; nam & talium usus ob auditionem subinde notabiliter levat.

Inter alias causas surditatis sit interdum, ut à nimio sonitu externo, uti dixi, lædatur auditus: in tali casu saltem dictum remedium ex pane locum habet: Nempe recipiendæ sunt bacce juniperi vel lauri probè contusæ, subigendæ cum massa papis fermentata, & ita, ut reliquis papis coquendus est vel pinfendus: postmodum panis hic medicatus calidissimè furno est extrahendus, discindendus, & per medium apertus ita calidè singulo mane, jejuno ventriculo, auribus ita admovendus; sic enim denuo restituitur auditus.

Item.

24. Herb. majoran.  
Salvia,  
Roristmar.  
Flor. rosar. rub. ad. M. S.  
Bacc. junip. 3j.  
Sem. cumin. 3ß.

Incisa & contusa includantur sacculo interpassando, qui probè calefactus Auri imponatur, vel per se, vel irroratus cum aqua vita Saxonica, aqua magnanimitatis, balsamo Angelico, &c.

Hicce addatur spiritus seu aqua cephalica Anhaltina, cujus descriptionem videb. in SCHROEDERI Pharm. quæ auribus instillata experimentum fuit THONERI, & cujus salutarem usum sæpius feliciter expertus est in surditate pariter ac aurium tinnitu, & similibus affectibus,

Tandem axungia serpentum, quæ, cœn suprà dictum, superparat, dum in aqua coquantur, separata, cum spiritu vini rectificato juncta dat liquorem seu oleum ad deperditum auditum excellentissimum.

Præter dicta etiam suffitus interdum pro auribus instuantur, qui ex asaro, origano, absinthio, verbena, sabina, serpillio, colocynthide, baccis lauri & baccis juniperi, & similibus sunt, in vino vel aqua decoctis, & ita auribus exceptis. Quidam cœn singulare & perquam egregium commendant suffitum ex decocto limaturæ Martis, cum aceto destillato parato, adjectis herbis cephalicis; quod decoctum instar suffitus in aures excipitur. Sunt etiam, qui suffitum styrum sulphuris singulariter commendant ad surditatem: scilicet recipiunt infundibulum, & hoc immittunt carbonibus, quibus sulphur vivum fuit ipsectum, & per foramen sumum sulphuris facie benè obvelata excipiunt in aurem, quod aliquoties reiteratum admodum commendant. Facit hujus mentionem FONSECA lib. 1. Consil. 15. & lib. 2. Consil. 58. Post suffitum oleum fœniculi destillatum cum gossypio applicandum.

In chronicis auditus læsionibus, imprimis si oriuntur vel in subiecto senili, vel in ægris, affectibus catarrhalibus obnoxiiis, Thermae subinde proficiunt observantur, in quibus non solum æger se lavet, sed etiam spongiam amplam capiti imponat, quæ aquam thermarum per epistomium embrochæ modo excipiat; sicuti etiam ex fonticulo, brachio in regione auri affectæ inulto, surditatem diuturnam cum nervosarum partium affectionibus, ex lymphæ præsertim scorbuticæ affectionibus natam, insigniter levare observavi.

Denique sit interdum etiam surditas ex casu ab alto, contusione, læsione capitis externa, & similibus. In tali casu aqua cyclaminis per alembicum destillata reliquis præfertur, vel emplastrum egregium est in tali casu, quod sit Tacamahaca & ceroto de betonica, ana q. v. ex quibus paratum emplastrum capiti raso imponendum; exinde enim cessat affectus: conf. HOECHSTETTERUS Decid. 9 pag. 320. Sicut LYSERUS Obser. pag. 233. refert surditatem ex icu curatam per iteratam injectionem urinæ calidæ ex lepore fuga interempto: Et sanè GABELCHOVERUS Cent. 1. Curat. 60. in schol. urinam leporis impositam auribus summum surditatis remedium asserit; hinc spiritus urinæ talis non aded acris forsan proficius erit.

Extremum remedium in auditus defectu, idque in casu desperato, est salivatio-Mercurialis, sive in specie ex lue Venerea oriatur surditas, sive à causa interna alia, in specie vitio nervi acustici: vid. FONSECA lib. 2. Cas. 58. Sanè undique penetrat Mercurius, & quovis etiam angustissimos meatus perrepat; unde si ex obstructione vel simili causa oriatur malum, proficius ejus usus probabilis est, utut nemini auctor esse velim, ut huic Mercuriali medicamento se facile exponat. Aliis autem in casibus penitus inutilis erit. Curam aliàs surditatis à lue Venerea, videb. suprà lib. 1. Sect. 17. Capit. 3. Artic. 5. Membr. 13.

Per transfusionem sanguinis ex agno in canem surditas in cane curata fuit, de quo Journal des Sçavans Ann. 1668. Acta Societ. Reg. Vol. 1. pag. 705.

Hæc de Auditu abolito & imminuto: Sequitur jam alterum Auditus Vitium, nempe

## M E M B R U M I I.

### D E

### SONITU ET TINNITU AURIUM.

**I**N quibusdam depravatur Auditus, ut sonitus quidam aut Tinnitus, qui non est, audiatur. Sonitus est, quod vocant Germ. *das Sausen und Brausender Ohren*; Tinnitus vero est, *das Klingen der ohren*.

Affectus hic nunc continuus est, adedque subinde diuturnus & chronicus, nunc intermittens, subinde vagus, qui subinde accedit, & brevi post iterum remittit. Item nunc est per essentiam, nunc per consensum: si per essentiam, nunc per protopathiam, dum per se affectum constituunt; nunc per deuteropathiam, dum morbis acutis acq. chronicis superveniunt.



## C A U S Æ.

*Causa* omnis Sonitus & Tinnitus, item murmurationis aurium, querenda est vel in aere isto, qui continuè in cavo tympani seu concha auris continetur, & qui etiam replet labyrinthum & cochleam; partim verò in nervi acustici excursionem membranacea in intimo cochleæ organon constituyente; quia in naturali auditu adest fibrarum hujus membranæ motus cum aere interno moto. Quoad aeris istum motum: naturaliter quidem non, aut parum admodum movetur; quodsi verò fiat, quacunque ex causa, ut aere extrinsecus moto & hinc aer internus moveatur, ut expansionem nervi membranæ in cochlea feriat, auditus sit naturalis; quod præsuppono ex Physiologicis. Quodsi verò citra auræ externæ motum à causa interna præternaturaliter moveatur, qui in concameratis labyrinthi & cochleæ locis crebrius percussus ad nervi expansionem continuè allidat, sonitus præternaturalis & ita viciata auditio contingit. Quod si motus iste aeris interni, & quidem subtilioris & tenuioris, sit velox, celer, & plus minus vehemens, qualis sit, v.g. quando à nervis vel chordis testudinis fortiter tensis excitatur sonus, tunc excitatur sonus acutus sive tinnitus; sin verò tardius, obscurius & confusè moveatur aura ista interna, ut sit in chordis laxioribus, & ipsa aura hæc sit crassior, & minus pura, sit sonus gravis, obscurus & raucus, cum murmurationis sensu.

*Causa* ergò, quæ movet hanc auram internam, intra tympanum & concham contentam, querenda vel in ipsa aura undecunque commota, vel in membrana tympani, dictam auram movente.

Auram ipsam commotam quod atinet: hujus motus causa communiter dicitur spiritus flatulentus seu flatulentæ quedam auralis admodum subtiles, ex massa sanguinea per arteriolas edexhalantes, & dictæ auræ permixti, qui in locis istis concameratis inclusi motu suo præternaturaliter eandem agitando & extraordinariè movendo, istum præternaturalem sonitum & auditum excitent. Nam halitus peregrini in dictis locis vix quieti persistunt, sed hinc inde moti aerem ibi præsentem similiter movebunt.

Experimentum fieri potest cum charta, auribus applicata, German. *Gerollet*; sonus enim in charta ab aere in illa contento auditur, affectum tamen saltem vagum & brevi durantem inducere potest. Præter dictam causam & arteriolarum, interiora aurium subeuntium, fortior pulsatio aerem movere, & ita sonum peregrinum representare potest, de quo infra.

Tympanum quod atinet seu membranam ejus: hæc à quacunque causa, vel interna, vel externa, crebrius & præternaturaliter irritata aut molestata, & hinc plus minus motu convulsivo agitata, auram istam in tympano & internis cavitatibus movere, & consequenter auditum depravare valet. Confirmat hoc exemplum H I L D A N I *Centur. 6. Observat. 10.* qui observavit in rustico quodam Tinnitum ultra annum molestum propter gryllum in autem ingressum, qui sorde involutus tympano agglutatus fuit; hoc extrahito omnis Tinnitus cessavit, cessante nempe irritatione præternaturali, & hanc membranæ tympani à musculis propriis motione; Gryllus enim hic juxta membranam hæsit, & eandem commovit, quæ motà continuè Tinnitus fuit perceptus. Pertinet huc, quando post graves quosdam sonos à valida aeris externi percussione Tinnitus supervenit, cujus occasione etiam Auditus depravari solet, quando membrana tympani laceratur quodammodo, ex qua læsione semper convulsiones quædam patitur, propter quos motus convulsivos continuatus iste motus solet percipi. Unde quicquid membranæ hanc irritare, & in convulsivos motus agitare valet, etiam Tinnitum vel sonitum Aurium inferre potest. Quin imò ipsa membrana forti impetu translocata nonnihil, ac ossicula translocata etiam inferunt continuum sonitum, vel Tinnitum, donec in debitum statum ac situm redeant.

Hæc duæ causæ videntur ordinariæ: nempe aer extrinsecus commotus, & hinc membrana tympani continuè commota ac vibrata. Sane quilibet diuturnior & contumax aliquot annorum Tinnitus & sonitus minimè ab auris interne primariò affectu vitio, sed potius à partis cujusdam ipsius organi malè affectu ratione, oriri videtur; quas inter, hæc

*Etm. Op. Tom. II.*

tympani membrana, & hinc nervi acustici expansio membranacea, primatum obtinent.

Quod tandem atinet membranam auditoriam seu expansionem membranaceam nervi acustici in cochlea, seu alteram causam efficientem Tinnitum & sonitum aurium: hujus fibrille laceratæ, aut quodammodo translocatæ, postmodum continuè suà motione sonum ingentem & malè affectum representabunt. Imò videtur etiam sonitus & Tinnitus talis oriri posse ex ipsis filamentis membranæ hujus acusticæ motis, & convulsivo spasmo variè agitatæ: v.g. si cur in imminente epilepsia & apoplexia non raro varii colores & splendores ante oculos versari pugantur, propter convolutionem fibrarum nervi optici in tunica retina expansi; ita etiam eodem in casu, item in vertigine, varii sonitus representari videntur, ex spirituum nempe & hinc fibrillarum istarum simili excitato motu, atque aliàs ab objectis externis excitari solet. Nempe hinc videtur oriri, quod auris externæ, temporum, aut capitis vehementiorem percussione, item sonitus vehementiores in aurem violentius irrumpentes, subinde Tinnitus aut sonitus contumax soleat insequi, saltem ex affectione & læsione membranæ nervi acustici. Quodsi celeriores & fortiores sint fibrillarum motiones, Tinnitus; sin verò rariores & remissiores sint, sonus gravis percipi videtur.

Ex hac causa febribus Tinnitus Aurium supervenire, videtur ex motu humorum, ut vocant, ad superiora, hinc & ad parotides & loca vicina; unde membranularum in istis locis convulsiva plus minus affectio. Nempe non rarum est, quod ex sanguinis turgescencia, in specie febrili, cum dolore capitis, subinde etiam Aurium Tinnitus adsit, ex motis nempe velocius & vehementius arteriolarum. Hinc etiam oriri videtur, quod in talibus morbis acutis hæmorrhagiam narium interdum Tinnitus seu sonitus Aurium præcedere soleat, ex sanguine turgescente & effervescente, in istis & vicinis locis quasi stagnante, & ex forti arteriolarum pulsatione, adeoque membranæ acusticæ affectione, Tinnitum inducente; unde tunc in talibus malis, superveniente hæmorrhagia narium, Tinnitus Aurium cessat, sanguine per alium locum evacuato. Facit huc observatio T U L P I I *libro 1.* ubi observat Tinnitum aurium ex incremento nimio glandularum, prope quas excurret meatus auditorius. Imò si ex alia quacunque causa, aut ex sanguinis motu circa loca auribus vicina nonnihil impedito, sæpius continua & diuturna talis auditus sit depravatio.

Sed quid sibi vult motus & raptus humorum ac sanguinis ad caput & aures, & hinc excitatus aurium sonitus? Scilicet motus iste humorum, sursum & deorsum in morbis à natura factus, ritè explicandus venit: Moventur humores cum sanguine, & ab hoc mediante cordis pulsu indeterminatè tam sursum quàm deorsum; quod verò magis unam partem præ alia occupare, ibidem congeri, & hinc per eandem tandem evacuari soleant, non humorum, sed partium solidarum ex causa evenit, dum harum membranæ & fibræ à causa quacunque, interdum ipso humorum influentium vitio, irritatæ, spasmo affectæ, plus minus stringuntur; sicque æquabilem & liberum contentorum circulum aliquo modo sufflamant, & ita phænomena, quæ aliàs ab *avapponia* humorum, seu rapto eorum ad caput, oriri dicuntur, exitant. Multa hic quæ de sorditate ex vitio nervi acustici *suprà Membr. 1.* monita fuerunt, etiam huc applicari possunt, dum non rarum sit, permutari invicem ob auditionem cum Tinnitu.

Catarrhalia huc pertinent vitia, sic dicta depositio serli, vitioso sapore inquinati, aut saltem nutrimenti chylosi, illius vehiculo ad unum alterumve nerveum aut membraneum locum distributi, errata, nervosis partibus inimica, sive membranam tympani sive nervi acustici afficiant. Interim talis Tinnitus non videtur posse esse chronicus, quin potius brevi tempore transit, aut non adeò diuturnus est.

## D I A G N O S I S.

*Causarum* omnium harum varietas, præsertim remotarum, non nisi ex circumstantiis probe examinatis cognosci possunt.

Sonitus & ipse Tinnitus Aurium ab ægro refertur. Causæ si sint externæ, patet ægro; ubi verò sint internæ, in



morbis acutis, febribus ardentibus & similibus, facile possumus cognoscere, esse à sanguinis & spirituum animalium inordinato motu; si sint ex alia quacunque causa, raro à priori cognosci possunt, in locis nempe adeo profunde sitis.

### PROGNOSIS.

**Quoad Prognosin:** Si in febre ardente sonitus Aurium, cum oculorum caligine contingat, cum narium tensiva gravitate, eadem inquit, quæ de surditate *Membro Anteced.* dicta sunt; nempe si est cum signis coctionis, hæmorrhagia narium expectanda venit, præsertim si pulsationes in capite simul percipiuntur.

In febribus quibuscunque Tinnitus Aurium & sonitus ferè spontè curatur sine medicamentorum usu.

Si verò per se morbum constituat, ex se sine periculo est, nisi quod chronicus & molestus esse soleat. Interdum etiam ad omnimodam surditatem terminatur: sicut aurium tinnitus diuturnus chronicus extra febrem, &c., ut dicunt, qui biennium & ultra duravit, solet esse satis gravis & periculosus, & raro perfectè curatur; & utur curetur, sæpe tamen recidivat. In specie ordinarius quasi est prodromus apoplexiæ.

Tinnitus Aurium, qui ex frequenti percussione in caput, ac in regione temporum exoritur, propter internam membranæ acusticæ læsionem, non adeo faciliè curatur, quin in surditatem degeneret.

### CURA.

In *Cyna* Tinnitus & Sonitus Aurium consideranda est causarum efficacia ratio.

De cæteroremedia & auxilia ea, quæ, præmissis universalibus, conveniunt in sonitu & Tinnitu Aurium, ferè sunt similia his, quæ *Membro Anteced.* commendata fuerunt in surditate. In specie tamen ad Tinnitum Aurium inchoantem *Suffusus* seu Vapor ex absinthio & verberna, in lacte vel aqua communis decoctis, auribus exceptus, admodum laudatur ab HARTMANNO in *Praxi Chym.* pag. 106. Loco quorum quoque semina quatuor calida minora, baccæ lauri & juniperi, & similia adhiberi possunt. *Suffusus* etiam ex succino, oilbano, item ex gummate animæ, commodè auribus exhiberi potest contra tinnitum, & sonitum. Singulare quid obtinet fumus seu vapor aceti bullientis, auribus exceptus, quem laudat LANGIUS in *M.C.* pag. 6. & in specie confert, si aceto incoquantur specifica nervinalia, & decoctio infundatur limatura Maris, & dum maxime bullit, vapor excipiat auribus. Item oleum vermiculorum quercinorum, item oleum nucleorum persicorum cum castoreo mistum, conducunt. Præter hæc egregius est spiritus volatilis urinæ seu spiritus salis ammoniaci cum bombace in aurem immixtus, qui in diuturniori aurium sonitu etiam tanquam singulare laudatur à LINDANO in diuturno aurium sonitu; penetrantia enim huius spiritus maxime cognita est. Egregius esse solet vapor ex sale ammoniaco, cum oleo tartari per deliquium permixto, exurgens, *supra Membro 1. in surditate* commendatus. Spiritus succini auribus cum bombace aliquantulum inditus, in Tinnitu & susurratione convenit. Præter dicta, Essentia florum Anethi, Essentia ligni sassafras, castorei, in specie essentia seu tinctura sulphuris, ut & sellium animalium, hominis aut lucii piscis, perdicis, imprimis fellis bovis, gutt. j. ad ij. cum bombace simili modo in usu esse solent, quod quotidie bis reiteretur, auribus prius purgatis: item fel humanum vel lucii piscis est optimum. Melius est, si recipiantur fella aliquot luciorum, & vitro inclusa pasta farinacea occludantur, & coquantur in clibano, donec panis est coctus; de hoc liquore aliquot guttæ auribus instillantur, quibus injectis, bombax cum zibetho imponatur. Item liquor ex cortice tenello betule, spiritu formicarum aut aqua magnanimitatis cum bombace inditus. Aqua picarum cum castoreo instillata, vel cum gossypio applicata, etiam convenit, & in frequentiori usu erat D. MICHAELIS; non secus atque granum unum aut alterum Zibethi aut mosci bombace involutum: Nam talis bombax cum Zibetho aut moscho non tantum Tinnitum aurium, sed etiam gravem auditum, mirè curat. Sacculus ex milio tosto, & sale tosto cum anetho, & chamomilla mistis factus, probè calefactus, & auri externè applicatus mirè convenit, imprimis si ali-

quot guttis olei destillari caryophyllorum prius fuerit irrigatus:

24. Herb. & flor. chamom. M. j.  
Anethi vel salvia,  
Majoran.  
Rorism. an. M. ß.  
Milii tosti ʒj.  
Salis torref. ʒß.

Inclusa includantur sacculo interpassando, qui probè calefactus auri applicandus.

Frequentissimum auxilium solet esse vapor panis recenter ex furno extracti, paratex massa fermentata cum semine cumini, feniculi, anisi, origano, serpillio, baccis lauri mista, & sic in clibano excocta, calidè auribus admota. Interdum juvat, sed cautus sit ejus usus; nam subinde videtur nocere: Sic BARTHOLINUS *Cens. 6 Hist. 77.* notat surditatem ex pane calido auribus applicato. Convenit etiam hic oleum illud mirabile ex vermiculis quercinis & item oleum destillatum caryophyllorum aut lavendulæ & cumini, destillata invicem mista. Pertinet huic oleum oticum seu Catholicum ad aurium affectus laudatum: Nempe est oleum nucleorum persicorum expressum cum floribus Persici subinde infusum & clarificatum, quod ad gutt. iij. vel iv. in dolore, tinnitu, strepitu aurium, & auditus difficultate, auribus instillatum egregium est: sicuti ad Tinnitum Aurium etiam inveteratum seu præstantissimum admodum laudatur sequens remedium:

24. Helleb. albi,  
Castor. an. ʒij.  
Costi Arom. veri ʒij.  
Ruta ʒij.  
Euphorb. ʒß.  
Olei Amygd. amar. vel nucl. persic. ʒj.

Decoquantur leniter & successivè in duplici vase in C. q. olei rutacei: quod oleum cum bombace auribus immittatur, vel guttæ quædam tepidè instillantur auri.

RONDELETII experimentum fuit:

24. Rad. helleb. albi ʒij.  
Fol. lauri  
Ruta an. M. ß.  
Fraxini M. j.

F. Decoctio in oleo Amygd. amar.

vel nucum cum vino albo aut Malvatico, ad consumptionem vini cocta: Exprimantur, colentur & auri immittantur.

Convenientius tamen est, si loco decoctionis in oleis distillatis species potius infundantur in spiritum vini, & exinde fiat Essentia, addendo castoreum, ambram aut moschum pro lubitu, cum bombace auribus applicanda contra tinnitum & sonitum aurium. Vel præparetur Essentia Practicæ ejusdem Brunsvicensis *Membro Antec.* data. Sicut oleum nucleorum persicorum expressum cum castoreo impræparatum in usu est. Tandem decoctio sinapi pulverisati in vino sub forma suffusis auribus excepta, est exporiston STECKERI non contemnendum; hinc forsitan spiritus sinapi potè applicatus erit proficiuus. In diuturnioribus malis, præsertim ubi suspicio est catarrhalis affectus, fonticuli in brachiis, item cucurbitulæ pone aures, subinde sunt proficiuæ. In dyscrasia pituitosa convenit oleum Barbette, quod commendat lib. 2. Anat. Pract. cap. 1.

24. Olei hyoscyami,  
Ruta an. ʒß.  
Destill. Major. ʒ. ß.  
Castor. gr. vj.  
Croci gr. iv.  
Misc.

Quod si Tinnitus Aurium fiat ex casu ab alto aut percussione capitis, aliisque causis externis, imitetur PLATERUS lib. 1. Observ. pag. 114. qui præmissis præmittendis mulierem ex casu ab alto tam gravi Aurium Tinnitu correptam, ut nihil ferè audierit, præmissis universalibus restituit:

24. Spiritus vini Cochlear j.  
Succ. Cepar. rec. cochl. ʒ.  
Olei destill. spicæ gutt. iv. vel v.  
Misc.

Et auribus tantillum ejus instilletur, & ita fuit curata. Huc etiam pertinet cataplasma ex cepis Favertini, quod FORESTUS libro 12. Observat. 1. & 4. describit.

Præter dicta remedia subinde convenit, in specie in junioribus aut



aut plethorici venam brachii è regione auris sonantis secare; sicut etiam sternutatoria moderata in aurium affectibus diuturnis, præmissis universalibus subinde conducere solent. Fit non raro, ut Tinnitus & sonitus, etiam surditas, nunc remittant, nunc denuò accedant in affectibus quasi catarrhalibus: In tali casu, ubi percipit æger redire malum, optimum est applicare vertici cum linctis duplicatis aquam apoplepticam spirituofam, aut etiam spiritum urinæ, item oleum destillatum succini; hoc ipsum enim uti catarrhos, ita etiam huiusmodi pathemata, præcavere solet.

Ex remediis internis, aurium affectibus dicatis, præmissis universalibus duo præ ceteris eminent: nempe sassafras & succinum, & quæcunque ex illis parata; quæ eò melius conducere solent, si post eorum usum blandus sudor instillatur.

Hæc ferè in Tinnitu Aurium per essentiam observanda, fuerunt.

Sed non rarum est, Hypochondriacos pati aurium sonitus, eosque hypochondriorum vitio contractos, qui cum pathematis abdominis modò exacerbantur, modò remittunt, Speciatim ex hypochondriacum esse, ex eo clarescit, quod pro vario statu stomachi in inedia aut à cibatione plus minus exasperari affectus aurium, aut remitti observetur. Præmissis præmittendis Martialis, carminativa, & hinc salia volatilia urinosa conveniunt, speciatim liquor cornu cervi succinatus, cum leni sudore. Externe essentia castorei confert.

## CAPUT III.

## DE

## LÆSIO TACTU.

**P**ost Auditum tertio modo est Tactus, ubique ferè in corpore reperibilis; ubicunque nempe filamenta reperiuntur nervea, quæ ab objectis externis mille modis horum approximatione affici, & variè moveri possunt. Filamenta talia, uti in contextenda cutanea massa locum primum obtinent, ita ubique hinc inde in capitula papillaria conglobata ex cute nonnihil prominent, & sub cuticula genuinum & naturale Tactus externum organum constituunt: vid. MALPIGHIIUS in Tr. de Externo Tactus Organo. Sensus enim communissimus est Tactus, per totum omnino corpus diffusus; nam omnes reliqui sensus externi nonnisi quidam Tactus speciales sunt, & certè sunt simpliciter per Tactum, quæ sensationes externæ constituunt in impressionibus factis in organo sensuum, quæ impressiones consistunt in motu. Requiritur ergò pro recta sensatione, ut fibræ nervæ sint in legitima tensione beneficio sui toni, qui dependet ab influxu spirituum animalium. Gustus nil aliud est, quàm tactus certus. In hepate ipso nullus est sensus, quia est corpus glandulosum absque nervis. Corpora externa, quæ sui approximatione dicta filamenta & eorum extremitates papillares afficiunt, hoc faciunt solâ particularum minutarum in superficie, sexturâ, earumque certâ vel motione vel quiete; Exinde enim fiunt Qualitates istæ quæ à nobis dicuntur tactiles. Objectum dicitur aliàs Qualitas tactilis. Sed hæc qualitas tantum in structura filamentorum consistit; quando enim corpus, cui v. g. manus admoveatur, cedit defectu firmæ minimorum cohesionis: dicitur exinde molle, si non cedat, sed resistat, ex sorti earum combinatione, dicitur durum; si quædam particule mobiles invicem cohereant, simulque organo adhæreant, dicitur viscidum; si nihil adhareat, dicitur siccum seu aridum; si fiat celerissimus & repetitus, in papillis ab objecti externi minimis motis, motus dicitur calor; si nullus, dicitur frigus; & sic in infinitum ferè. Aqua enim, e. g. per se nec frigida, nec calida est: membrum frigidum in nive sentitur calidum nonnihil. Aqua calida per se frigescit, quia remoto moveante externo, igne, cessat calefieri: Vid. BOYLE Tr. Origo Qualit. & Formar. & Tract. de Fluiditate.

Vitiatur autem Tactus diversimodè: Nam præter abolitionem & immutationem suam apoplepticam & paralyticam privativam, item præter ejus Abolitionem positivam in Stupore, Tactus interdum depravatur seu potius augetur & exasperatur in affectu, dicto dolor.

## ARTICULUS I.

## DE

## STUPORE.

**D**e stupore qui & affectui Tactus obveniens est, nihil addo, cum rarissime ejus cura incumbat Medico.

## PROGNOSIS.

Nam particularis stupor clera manifestam causam obveniens, subinde prodromus esse solet aut paralyseos scorbuticæ, aut si plura occupet membra, Hemiplegiæ, aut etiam universalis Apoplexiæ.

## CURA.

Ex stupor quidem, qui maximam corporis partem, et etiam universum corpus, quod tamen rarissime evenit, invadere solet, optimè per lignum sassafras & medicamenta sassafrata, quocunque modo adhibita, curatur & propellitur. Pergo ad

## ARTICULUM II.

## DE

## DOLORE.

**Q**uod ergò Dolorem attinet, omnibus sensibus externis communis is est affectus Dolor. Nam ut omnes sensus sunt per certum tactum vel per contactum seu per impressionem quandam objecti sensibilis in organum proximum, quam impressionem sequitur talis spirituum animalium motus in organis, qui vocatur sensus; ita si in organum tam vehemens fiat impressio, ut illud nimis moveatur & vibretur, & exinde nimis rapidè & vehementer in eo spiritus agitur, sequitur sensum adjuncti molestia, ex præternaturali & nimis vehementi objecti, organum contingenti, impressione resultans, quæ ipsa molestia communi nomine Dolor appellatur. Sic enim v. g. datur visio dolorifica, ex subito aspectu rei nimis lucidæ seu lucis fulgidæ post tenebras, ob vehementem & præternaturalem motionem membranæ retinae; datur auditus molestus seu dolorosus & tediosus ex nimio sono, impetuosius tangente aurem internam, ac nimis fortiter movente membranam auditoriam in cochlea; quod ipsum etiam facit inequalis motus membranæ in sono non harmonico & inequali: Idem fit etiam similiter in gustu & odoratu. Speciatim si fibrillis nerveis objectum quoddam tactile in specie sic dictum occurrat, quod eas nimis fortiter & non absque quadam vehementia moveat, sequitur tactui conjuncta molestia, seu in specie sic dictus Dolor.

In specie ergo consideratur Dolor, quatenus est symptomaticus ferè præcipuum, tam internas quàm externas partes excrucians.

Pro cognoscendo ergò Dolore præsuppono ex Physiologicis, quod fibræ in genere subiectum sint tactus & cuiuscunque sensus; in statu quidem naturali tantum modò, & quæ extra cutim sub cuticula in papillas protuberant, sive in membranas subtilissime contextantur, sive in corpora papillaria conglobentur, sive nudæ aut solitariæ distribuuntur; præternaturali verò in statu etiam reliquum fibrarum systema & ipsum tangendo afficitur, & in specie Dolor sentitur. Neminem ergò confundat, quod in vulgibus vel ulceribus &c. ubi vel nervi, vel nervæ fibræ tanguntur, & ubi nullæ tales sunt papillæ & membranæ, sensus tamen percipiatur acutissimus & dolorificus insigniter; nam fibræ nervæ sentiunt, id est promptè moventur. Hæc tamen intercedit differentia, quod in papillis naturalis & blandus fiat motus & sensus, Tactus scilicet simpliciter sic dictus; in fibris verò nerveis ex violento & nimio earum motu, tactus dolorificus & quasi præternaturalis. In membrana autem vel puncta, vel discenta, vel rupta, eadem ratio militat atque in fibris nerveis solitariis. Unde hæc præternaturales affectiones naturali & ordinario tactus organo nil derogare valent.

Fibræ hæc, earumque subtilissime fibrillæ, ubi ex fortiori & vehementiori objecti actione & motione quacunque ratio-



ratione à se invicem violenter separantur, divelluntur, & quasi lacerantur, sequitur in iis adeo vehemens & molestia motio & vibratio, adeo ut ex situ equali & ordine naturali vitiatas, quædam ab aliis divulsæ quasi contractivæ vi abbrevientur, quæ & alias illæsas in naturali situ violenter quasi trahunt ac lacerant, ad eum modum, quod dolorem ex puncto nervo explicat SYLVIVS lib. 2. cap. 27. §. 165. hinc molestia illa accidit, quam *Dolorem* nominamus: & huc videntur respexisse Veteres, dum dolorem solutionem continui definiverunt.

Affectis fibris, vibrationis istius occasione, spiritus animales & ipsi ad certum motum determinantur, ad cerebrum nempe, ubi in sensu communi fit formalis *Doloris perceptio* seu sensus Doloris Internus: Conf. SYLVIVS Pr. lib. 2. cap. 27. §. 168. & WILLISIUS Pharm. Ration. Part. 1. Sect. 7. Hoc ipso simul convulsivi quid patiuntur, & in spasmos aguntur, ita ut motus fibrillarum velocissimus & convulsivus seu spasmodicus sit istud, in quo ratio formalis Doloris consistat. Unde fit quod non raro Dolores sequantur convulsiones ac motus convulsivi, si scilicet sint aut diuturniores, aut graviores, ex inordinata scilicet & veloci spirituum animalium, occasione Doloris, in cerebro motione; ut v. g. ex punctura nervi dolorifica convulsio membri, aut à nephritide vomitus superveniat: Imò in quovis dolore semper convulsio quædam, occulta licet, jungi solet; hinc enim tendi plus minus pars dolens, & typè pulsatoria molestia simul supervenire solet: adeoque hic circulus observandus, ut & à Doloře convulsio, & à convulsivo impetu Doloris incrementum. Hic est primus Doloris actus. Quod si jam fibrilis lēsis & non nihil laceratis, objecti, naturali licet impressione, agentis fiat contactus, tunc fibrillæ antea non nihil laceratæ aut diuulsæ, vel tantillo objecti contactu nimis agitatæ & vibratæ novam Doloris impressionem representare faciunt: Unde vel levissimus specilli contactus in partibus vulneratis aut ulceratis intolerabilem Dolorem concitat; magis tamen in partibus nervosis ob fibrillas copiosiores, minus in partibus sanguineis ob fibrillas rariores, vel etiam dispersiones.

Similis interim motus seu tactus ab objectis in extremitate fibrarum nervearum in fibris partis sang, post abscissionem membri sphacelo correpti, sæpius producit, tum ignorantes egri existimant, se in digito manus, ante aliquot dies licet abscisso, dolorem percipere; qualia exempla habentur in HILDANO, Cent. 3. Observat. 14. & 15. Item in SCULTETO Armam. pag. 67. & BINNINGERO; idque ubi continuatas tales nerveas fibras ex parte sana ad partem usque antea abscissam, obquam contumacitatem naturalem dum similis fit motus fibræ circa eius medietatem post abscissionem, qualis antea fiebat in fibræ extremitate, ante huius cum parte separationem, hinc fit, ut ex identitate motus etiam in sensu interno & imaginatione idem feratur iudicium, & estimatur pars jam abscissa adhuc sentire, quasi toti adhuc coherereat.

### C A U S Æ.

Ex his *Causa Doloris proxima*, materialis nempe læsio, & violenta ac vehemens motio fibrarum nervearum organi ab objecto præternaturali, & formalis, spirituum hinc rapidior, singulariter tamen determinatus, & ad cerebrum usque continuatus motus, per se patet. Illa pro sensu doloris externa: Hic pro sensu Doloris interno.

Remota est omne id, quod Dolorem inferre valet, quod ipsum, prout est varium, & ipsæ quoque partes prout variant, etiam tam variæ Doloris species exsurgunt, indeque etiam postmodum variæ appellationes acquirunt, quorum sanè innumerabiles sunt species, cum unumquodque obiectum peculiari modo agat, & unaquæque pars alio & distincto ab aliis modo impressionem recipiat. Communiter equidem sex Doloris species recipientur: Sed, ut dixi, innumerabiles sunt Doloris species, si exactè velimus exseruari; omnis tamen in eo convenit, quod violentam ac nervis impressionem in fibrillis nerveis, & consequenter earum aliqualem læsionem, inferre valeat.

Causæ hæ Remotæ sunt vel externa vel interna: Externa sunt notissimæ, ut omnia ea quæ contundunt, secant, vulnerant, lacerant, urunt, erodunt, & similia, quæ per se patent.

Causa interna Dolorem efficienter inferentes, imprimis

sub acore vitioso, qui ut plurimum acerbissimos Dolores & rosiones, etiam puncturas inferre solet, utpote nervis inimicissimo, militare solent, ita ut sæpe in omni Doloře acerbissimo, à causa interna enato, acidum aut acido-salsum peccans in recessu sit. In omni enim acido sunt particule admodum acutæ, simulque duræ, quæ & se insinuant in fibras, easque pungunt, lacerant, & quasi scindunt, & ita acerbum istum Dolorem inferunt, quin & sæpius simul ardoris & ustulationis quendam sensum junctum habent; v. g. si quis vel guttulam spiritus nitrici cuti affundat, ab huius acore excessivo intensus Dolor, unà cum sensu ignis quasi ardentis, inferitur & talis Dolor etiam in arthritide & Doloře ischiadico, item in erysipellate, & pleuritide, & similibus Doloribus ab acido ortis est obviuus. Acidi huius peccantis dolorosi origo ut plurimum est ex stomacho primisque viis, verbi gratia in arthericis, in scorbuticis, ischiadicis, rariò ex privato partis affectu in digestionem, propria læsæ vitio: v. g. in affectibus dolorosis chronicis aut sæpius recurrentibus ab acido natas, in odontalgia, quando ex læsione private digestionis acidum colligit, quod Dolorem infert: Sic in osse carioso sæpe recurrens Dolor observatur à nutrimento privato vitioso.

Differentiæ Dolorum sunt tantum non innumerabiles, ex varietate objecti lædentis, multiplicitate organi læsi, & motus horum ad se invicem proportionem oriundæ: in speciem tamen primariæ differentiæ sunt ratione diversi status causæ proximæ, & deinde ratione diversi modi afficiendi partes.

Quod varietatem causæ attinet; Dolor prout excitatur ab acido plus minus volatili seu spirituofo, vel minus volatili, seu & prout fixo, hæret in subiecto humoroso, seu vehiculo subtiliore & tenuiore, ut lymphæ, vel crassiore & viscidior, ut chylo, item prout acidum dolorosum, plus vel minus parti dolenti infixum fuerit: etiam vel pertinaces magis, vel facilius aut difficilius mobiles, adeoque nunc vagi nunc fixi esse solent; item exinde plus minus recidivantes, aut faciliè curabiles, cum aut sine partis erosionis juncti, observantur Dolores, adeoque variis modis mutabiles & alterabiles: sic contumacissimi sunt Dolores Venerei, & ut plurimum cum erosionem partis juncti, propter acidum acre in muco glutinosissimo, pertinacissime parti infixum.

Doloris vagi, adeoque ab acido magis volatili spirituofo, magis spiritu infuso, in subiecto seu vehiculo tenuiori partibus communicato, exemplum habemus in arthritide vaga scorbutica: è contra Doloris fixi, ab acido magis fixo vel austero in subiecto viscidior vel tenacior hærere; exemplum habemus in arthritide ordinaria in articulis, hoptante; item in colica à mucilagine viscida acida in cellulis coli flagante, & pertinacissimum Dolorem inferente.

Frequenter recidivantes quod attinet Dolores: iidem in uno eodemque loco ut plurimum cum proprio & privato partis vitio conjuncti esse solent, vitio nempe ejusdem digestionis læsæ, indeque recrementorum acrimia dolorosorum proventu oriuntur, & sæpe tempestatum mutationibus auscultantes, ægrorumque ephemerides constituunt; id quod v. g. in odontalgia est manifestum. Maxime post articulos graviter vulneratos Dolores remanent pertinaces, quavis tempestatum mutatione recrudescentes, ex fermento vitioso, in parte ex spiritus insiti debilitate genito, ab externis commoto, & partes sensibiles notabiliter uellicante.

Simile sæpe atque supra dictum, Dolor nunc est continuus, nunc interruptus; & hic vel periodicus, vel non periodicus. Periodicus est, qui certa observat tempora, & frequenter nocturnus, v. g. scorbuticorum vel Venereorum, esse solet, quando nocte gravis lacerans Dolor subsequitur, de die verò nihil sentiunt. Continuus præsupponit acre intensius parti fortiter inherens: Non continuus, acre remissius, saltem occasionibus quibusdam externis mobile & excitabile, & minus firmiter agglutinatum, & minus fortiter partem afficiens.

Porro Dolor omnis est nunc cum tumore, nunc sine tumore conjunctus; qui tumor est tam sanguineus, quam serosus, scirrhusus &c. Tumor interdum est causa Doloris, interdum, idque frequentius, tumor est effectus seu productum Doloris: v. g. inflammatorius tumor & suppurans causa est Doloris ardentis, rodentis, pulsatorii: E contra Dolor est causa tumoris in arthritide, odontalgia, &c. ex fibrarum strictura convulsiva, quabilem con-



contentorum motum & circulum remorante. Ordinariò in Doloribus arthriticis, quando adest tumor, vel in aliis partibus Dolor, dicuntur Catarrhus, hinc Dolor, hinc tumor, sed falsò; quia ex Doloze supervenit tumor, unde cessante Doloze, cessat tumor: v.g. homo spina pungitur intra digitum, vel vulneratur in quâdam parte, ubi nullum antea habet Dolorem, sed post vulnus supervenit Dolor, post Dolorem tumor. Reverà ergò semper tumor sequitur Dolorem, quia ex objecto dolente seu acido vellicante partes nerveas, & Dolorem excitante, in istis partibus supervenit fibrarum nervearum spasmus ac convulsiones, unde angustantur pori partis, adeoque remoratur sanguinis circulus, unde tumor; Si verò discutitur Dolor anodynus, & removetur spasmus, Dolores cessant spontè. Sic qui in arthritide & similibus volunt curare tumores, curam à posteriori inchoant; sistantur in odontalgia Dolores, & tumores evanescent.

In specie pro meliori methodo medendi, observetur differentia Dolorum, imprimis ex causa interna ortorum, quæ ratione efficiendi modi (vid. SYLVIVS de Dolor. Intest.) est decuplex: Has inter species sit

### I. DOLOR GRAVATIVUS.

*Dolor Gravativus*, premere, & tam graviter jacere dicitur, quando sensus quasi ponderis cuiusdam prementis & gravantis percipitur, v.g. in hepate tumido aut scirrhoso, in calculo renum ingenti, sed quieto.

Oritur in parte sensu aut paucò aut obscuro præditâ, sentiente tamen nonnihil membrana cincta, quæ ipsa pars infarscata & tumefacta imprimis à materia vel crassa, vel viscida, vel fluida, minus acris, sed serè dulci & insipida, ponderis gravioris sensum representat, uti est pituita, sanguis, serum, lymphæ, &c.

Sequitur

### II. DOLOR seu SENSUS PUNCTORIUS.

Membranis propriis: (pungit instar acuum:) dum ex improvise repetitis vicibus quasi aciculis aut acutis instrumentis membranæ punguntur, & interruptim vellicantur, ipso punctiōis sensu ad magnum spatium se diffundente: qualis dolor v.g. est in pleuritide, & similibus locis membranosis.

Oritur ab acido acris, firmitus partium membranarum infixo vel impacto, eandem pungente & rodente, quæ hunc convulsivo spasmò crispatur, unde doloris intensio.

Sequitur

### III. DOLOR TEREBRANS seu ACUTUS.

Dolori punctoriæ cognatus, simul tamen terebrationis aut perforationis sensum coniunctum habens, jacet & pungit in uno loco, fixus est, quasi terebra aut palo pars perforaretur. Qualis e.g. in arthritide, in erysipelate, & similibus affectibus est satis cognitus; item in dolore colico, cephalæa, &c.

Oritur à viscido plus minus acido, partium eidam impactò.

Est

### IV. DOLOR RODENS seu MORDAX.

Mordet & rodit, quando percipitur sensus cuiusdam rosonis & morsionis, quasi vermiculi continuò fodicarent, & roderent, qui membranosis locis proprius.

Oritur ab acris salso succo, nervosa & membranosa loca rodente & vellicante.

Hinc vicinis est Dolor pruriginosus, ut in purpura & scabie.

Est

### V. DOLOR PULSATORIVS.

Pulsat ac si Gallina rostro &c. cibum sumas, quia in eodem pulsatorius sensus aut arteriæ pulsatio exactè percipitur, ita ut quoties arteria pulset, toties etiam Dolor exasperatur. Proprius est inflammationibus & partibus inflammatis, v.g. in digiti à spina infixa inflammatione.

Provenit hic Dolor, quando in parte quadam tumente & dolorosa tenduntur fibræ & membranæ & cum membra-

nis etiam simul tunicæ membranaceæ ipsarum arteriarum; tunc enim sanguinis per arteriam impeditur nonnihil motus egitimus, & propter fibrarum tensionem difficilis sit sanguinis ejaculatio in dictam partem, quin potius fibræ sanguine irrumpente irritantur; id quod observatur imprimis in stagationibus humorum, adeoque ortis tumoribus, unde præceteris hæc Doloris species observatur in digiti à spina infixa inflammatione, aut fortioribus membranarum tensionibus, item in cephalalgia.

Est

### VI. DOLOR OSTOCOPOS, aliàs FRANGITIVUS.

In quo ossa in sui profundo quasi frangi & malleis contundi videntur, qualis v.g. in lue Venerea affectis, imprimis nocturno tempore, contingit; nec scorbuticis aut hypochondriacis inveteratis & similibus est rarus. Afficitur proximè membrana investiens ossa seu periostium, quod ab acido vellicatum dolores istos representat.

Oritur ab acido non adeò acris, interdum in materia plus minus viscida hærente, pertinacius periostio affixa.

Hinc Dolori vicinus est Dolor contundens, profundiora loca occupans, ac mitius urgens.

Est

### VII. DOLOR TENSIVUS & DISTENDENS.

Quando quasi disrupa pars dissepta videtur. Proprius hic dolor præprimis partibus membranosis, aut membrana quadam densa involutis, per se nullo aut admodum paucò & hebeti tactu præditis, quæ spasmò correptæ tensionem dolorem representant: v.g. qui caput subinde affligit post crapulam, aut dum in odontalgia dimidium caput tendi videtur.

Oritur à spasmò partium membranarum, & fit in specie in malo hypochondriaco, ex irritatione membranarum partium ab acido molesto.

Distinguendus est hic dolor à dolore distendente: Distendens est quando à se replente, v.g. flatibus, membrana cingens distenditur, & dolorem tensionis representat, ut in inflatione stomachi, hypochondriorum, colica flatulenta, tympanitide, ascite, & similibus.

Est

### VIII. DOLOR LANCINANS & quasi LACERANS.

V.g. Exardescens fremitus, & in capite, &c. quasi quis unguibus laceraretur, qualis sæpe in cruribus percipitur. Frequentissimus est in Praxi. Membranis est proprius.

Oritur ex acido acris plus minus salso subtili, serè volatili & tenui, partes membranas rodente, vellicante, & variè morficante. Nunc autem acrius est, nunc salius, unde nunc lancinans, nunc lacerans, nunc tensionis, nunc similis sensus percipi solet. Scorbuticis est non rarus, qui, ut ut uno saltim in puncto subinde affligat, per consensum tamen membranarum aut nervorum sæpe integrum nervi ductum vel quoddam membrum afficit: v.g. malum ischiaticum, tantum prope os sacrum est, sed tamen in toto corpore per consensum dolor percipitur.

Est

### IX. DOLOR ARDENS.

Quasi ignis scintillulæ hinc inde urerent, ab acido subtili acris, serè volatili, partes fibrolas & membranosas afficiente, v.g. in erysipelate, in quo pars membranosa solida afficitur, tanquam si spiritus nitri rectificati aliquot guttæ fuerint in spissâ subinde vero in partibus dolor ardens talis percipitur ab humoribus contentis effervescentibus & à dominante acido volatili producitur.

Denique est

### X. DOLOR ALGENS.

Friget & alget, ab acido minus acris, sed singulariter fibræ alterant, & quasi stupore afficiente.

Sed variz sunt dolorum species pro varietate objectorum & partium affectarum. Pergimus ad signa:

DIA-



## D I A G N O S I S.

De signis diagnosticis res clara est, quia Dolores satis manifestantur ab aegris.

Differentiæ Dolorum à modo afficiendi & circumstantiis gnoscentur.

## P R O G N O S I S.

Quoad Prognosin, Prognosis Dolorum variat pro circumstantiarum supra allegatarum conditione.

Fit interdum, ut cum gravioribus Doloribus coniungatur Pulsus intermittens, qui tamen non debet terrere Medicum, cum hoc frequentius eveniat, sedato enim dolore statim pulsus ad naturalem redit rhythmum, vid. BARTHOLINUS in *Observ. Anatomicis*.

In genere tamen nullus Dolor in quocunque corporis parte negligatur, semper enim aliquid mali prænuntiat, cum certum sit, quod ubicunque ægri doleant, ibi laborent morbo: Conf. HILDANUS *Cent. 4. Observ. 7*. Hinc & HIPPOCRATES inquit: *Ubi Dolor, ibi morbus*.

## C U R A.

In Cura Dolor omnino tollitur, aut quaecunque causam removendo, aut eam temperando, sicque Dolorem demulcendo, aut sensum partis stupefaciendo.

Ea quæ causam Doloris removere, sive ab interna, in specie sunt sere *alkalia* tam fixa quam volatilia, tam *macra* quàm *pinguia*, sive *oleosa* sive *aromatica*, pro circumstantiarum ratione eligenda, quatenus penetrant, acidum corrigunt & tollunt, viscidum incidunt & attenuant, vi sudorifera acidum humorosum resolvunt & discutunt, absurgunt & removere. Quæ secundo dolorem demulcent, sunt *anodyna* blanda, acrimoniam acidi temperantia, fibrarum quæ tensionem & irritationem demulcentia.

Quæ verò tertium faciunt: *Narcotica* dicuntur, *Temperant* & *demulcent* *pinguia oleosa*, *mucilaginosa*, quæ acre quodcunque obtundunt, mitigant, fibrarum spasmodum & tensionem blandè emolliunt. *Narcotica*, ut *Opiata*, *hyoscyamus*, & similia, *stupefaciunt*, quatenus fixiores minusque mobiles reddunt spiritus animales, eatenus etiam dolorosam objecti impressionem, partisve irritationem percipi inibent. Usurpantur hic ipsa tam interne quàm externe. Interna in specie *opiata*, & hinc *volatilia aromatica*, quatenus hæc acida destruunt, & vel per *sudorem* vel per *urinam* evacuant, simulque nervis grata existunt. Prefertim *sudores* ad corrigendos Dolores etiam contumacissimos subinde sunt summe proficui, dum eorum medio & viscidum, in contumacioribus Doloribus simul peccans, plus minus emendetur.

Inter *Purgantia* excellit imprimis *Mercurius dulcis*: Conf. VELSCHIUS *Necat. lib. 2. pag. 40*. Quibus evacuantibus pro fomite morbofo circa primas vias destruendo *Martialis*, *Saturnina*, *solaria*, ut aurum diaphoreticum, addi solent. Sicuti externe pro causæ peccantis remotione nunc *vena sectio*, *hirundines*, *vesicatoria*, *caustica*, &c. magis inserviunt: v. g. POTERIUS *Cent. 3. Cur. 84*. Dolorem refert *tibia* contumacissimum sudoriferis nullis curandum, aperta *tibia caustico* curatum. Inventa ibi materia dura, subalbida & sebacea, quæ sublata Dolo rem evanuit. SCHENCKIUS *lib. 5. Observationum* Dolorem omnium membrorum refert, excitatis per phlegmos copiosis pustulis, & evacuato sero, curatum.

Sanè Dolores artuum graviores ex sero acri scorbutico nati, & in quibus nulla ferè partis alteratio sensibilis observatur, per applicatum *vesicatorium* optimè curantur: Sic ZACUTUS LUSITANUS *lib. 2. Prax. Admir. Observat. 57*. refert, lumborum sequum dolorem impositis supra lumbos *hirundinibus* curatum: Idem cum vel *Observ. 72*. refert, immanem inguinum dolorem *salvatella sectia* ne curatum. Ubi dolor sæpe nullis remediis cedit, proficua observatur sectio venarum raninarum sub lingua, de sanguine calido & furioso conf. BORELLUS *Cent. 1. Observat. 47*. HORSTIUS *lib. 8. Observat. 9*. habet diuturnum & contumacem brachii dolorem, *diata sudorifera* curatum.

Res ut melius pateat, de *narcoticis* observandum est, quod eadem dolorem quidem tollant, sed saltem palliati-

ve & quasi à posteriori curent, doloris symptoma sistendo, sed causam materialem nec corrigendo, nec remouendo; adeoque necesse est, cauti simus in eorum usu de quibus cautelis optimè differat. JOHANNES CHICOTIUS in *dissert. & Epist. Med. in Dialogo de Dolo*re, dum dicit: *si rodens humor excruciet te, narcotica tutè ex hibeantur*, utpote quæ minus hos affectus quam alios, ledunt quippe & tenues vel acres & calidi huiusmodi humores sunt. Hæc autem narcotica non solum salutaria sunt, quod sensui torporem inducant, sed etiam quod humorum Penuritatem cogant & quasciquant. Ubi verò crassi & glutinosi humores cum acore coniuncti excruciant, in specie simul acor infestat ex irritatione, alienissima sint opiata, quæ torporem inducunt, nempe interdum quidem dolorem mitigant, sed deteriore reddunt partium affectarum dispositionem, ut in colicis doloribus, in quibus v. g. ex opio, hyoscyamo, & similibus remedia membra ad patiendum reddunt idonea, & in pleuritide talia dolor em non sanant, sed doloris sensum tollunt, partem enecant, & ad gangrenam disponunt. In his ergo casibus talis cura deceptio est. Hactenus CHICOTIUS. Cautè ergo narcotico rum usus adhibeatur, & non nisi urgente necessitate, & saltem appropriatis respectu causæ peccantis & partis affectæ mista, præmissis præmittendis, adhibeantur. Hinc etiam opiata minus conveniunt in dolore pulsatorio, quoniam metus est, ne ad gangrenam perducant; non conveniunt in dolore ostocopo, in specie lue Venerea correptorum; quamvis enim sedetur dolor, alio tamen tempore ed atrocius solet urgere; Magis tamen conveniunt in dolore ostocopo scorbuticorum semper tamen addantur appropriata volatilia. Conveniunt vero in doloribus punctoris, tensivis, etiam dissidentibus, lancinantibus, & lacerantibus, in doloribus uagis, & quæ sunt aliæ circumstantiæ.

Præter has circa narcotica cautelas in quovis Dolo re curando ad tria semper respiciendum:

1. Ad partem affectam plus minus sensilem, adeoque ferè plus minus carnosam & nerveam.
2. Ad Causam efficientem occasionalem plus minus acrem.
3. Ad subiectum seu quasi vehiculum causæ, vel viscidum, vel glutinosum, successivè attenuandum, vel tenue & subtile, faciliè discutendum.

V. g. in nodis & gummatis Veneris nocentissimus est spiritus salis ammoniaci applicatus, cum implacabiles Dolores inferat, in acidum acre impetuosius agendo: Unde effervescentiæ quasi concitato motu, & resolutio nonnihil subiecto viscido, crudelissimè exacerbantur dolores. Nempe quò sensilior est pars, eò magis temperata conveniunt: Item quo acrior fuerit causa occasionalis: Item quo viscidior est fomes, eò minus volatilia discutientia, sed successivè emollientia magis conveniunt. Ad removendam causam, si eadem observatur, quod sit acidum vitiosum, præterejus omnimodam per quascunque vias evacuationem, conveniunt omnia, tam interna, quam externa, *alkalia*, acidum quodcunque corrigentia, aut in tertium, aut insipidum, aut in salsum minus dolorificum transmutantia.

Remedia igitur ad primam classem pertinentia *alkalia* plus minus aromatica, à priori Dolores curantia, quatenus acidum destruunt, sunt sequentia: Absinthium, Anethum, Chamomilla, Malva, Althea, sambucus, in specie eiusdem flores, Mentha, Verbascum, in specie eiusdem flores, & Parietaria. Sanè contusum Absinthium, & cum Parietaria decoctum, & instar Cataplasmatum applicatum, in plurimis Doloribus resolvendis & discutendis perquam convenit; siue à causa externa, contusionibus nempe, dati fuerint; siue etiam interne ex acri humore seroso ortum duxerit, tam in capitis dolore, quam aliarum partium: Sic v. g. AMATUS LUSITANUS *Cent. 1. Curat. 57*. Dolorem spinæ ad os sacrum intensum per tale cataplasma ex Absinthio & Parietaria in oleo frigida applicata curavit. Porro folia lauri, radices altheæ, lillorum conuallium, crocus, baccæ lauri & juniperi, semina cumini, anethi, carui, lini, fenugræci, anisi fœniculi, etiam hic conducunt. Ubi catarrhi vel abundans serum acre Dolorem infert, fons humidus, v. g. ex floribus salviæ, vel salvia, item Majorana, item roremarino, non conveniunt, sed dolores ingentes causant. Proficue in hoc casu magis sunt Fumigationes ex succino, ut fumigetur pars dolens sic serum acre temperatur, fons verò humi-



Aut Dolores magis augeat. Ex his parata aqua vitæ seu spiritus volatiles, aqua arcticulæ ad extra & intra, imprimis acuatæ cum spiritibus urinosi, ad Dolores præsertim lacerantes & lancinantes, imprimis scorbuticos, nocturno tempore assilientes conferunt. Item urina humana, & omnia ex ea parata remedia, ut spiritus salis ammoniaci, spiritus & sal volatile urinæ humanæ, insigniter conveniunt; nam talia absorbent omniem acorem. Non secus ad huiusmodi Dolores ab acido volatili ortos, imprimis volatilia, ex animalibus petita remedia, conducunt, in specie ex insectis quæ inter sunt imprimis lumbrici, & ex his paratus spiritus lumbricorum terrestrium, formicæ, & ex his parata remedia; unde & scarabæis cornutis & liquori ex his parato singularem vim tribuit GLAUBERVS. Hinc v. g.

24. Aqua artic. ad extr. ℥ij. ad ℥ij.

Spiritus urinæ, vel salæ ammoniaci cum calce vivæ par. ℥vj.

Lumbr. serr. per putr. cum salæ vol. acuat. ℥ij. vel ℥ij.

M. D. S.

Aqua articularis externa.

Vel surpeture externe, membra prius fricando.

Vel

24. Fol. Nicot.

Salæ.

Rorism. an. M. j.

Rad. Angel. ℥j.

Ari.

Pyrethri an. ℥ij.

Flor. Anthos.

Lavend.

Stach. Argb. an. p. ij.

Sem. cruce ℥vj.

Castor. ℥ij.

Concis & contusis affund.

Spiritus vini p. ij.

Spiritus Lumbr. p. j.

Scent per aliquot dies vase clauso, in locotepido

Liquor filtratur, S.

Spiritus siue essentia pro articulis externe applicanda.

Pertinet huc etiam sapo Venetus in spiritu vini dissolutus & ita in forma liquida silius; hic enim ratione alcali oleosi Dolores ex acido ortos rodentes, etiam arthriticos, subinde compescit. Quodsi ardoris sensus conjunctus sit, in spermate ranarum solvatur; sin minus, solvatur vel liquefiat in spiritu urinæ ac lumbricorum terrestrium, aut spiritu vini, addita camphora & croco, & ita cum pluma subinde applicetur. Olea ex flor. verbasci, vel ex florib. sambuci, per putrefactionem & in clibano digestionem, insignia sunt & egregia anodyna; uti supra, ubi de Affect. oculor., de hoc medicamento addivisus. Pertinet huc etiam camphora, potenter anodyna, cum tota sit sal volatile oleosum concentratum, simulque admodum penetrativa, Dolores ab acido optime compescit; hinc spiritus vini camphoratus ad sopiendos Dolores inflammatorios, in specie erysipelaceos est optimus. Spiritus vini crocatus camphoratus in artubus dolorosis est optimus, unde etiam solutioni saponis Veneti nonnunquam camphora additur, idque egregio cum successu. Rana quoque huc pertinent: imprimis eorum sperma, alcali temperato singulariter anodynoturgidum, unde & arthriticos huiusque cognatos Dolores sopire valet: sicuti oleum ranarum citè paratum egregium quoque est lenitivum plurium dolorum. Sic ex succo ebulli singulare sit oleum per deliquium ad Dolorem & contractionem nervorum; nempe succus ebulli reconditur in vase vitreo, & involvitur cum pasta panis fermentati, immititur in furnum pistorium, donec succus bene sit coctus: dein excipe vas vitreum, & succus ita liquefactus à crassamento separatus asservatur prout, qui est res optima in Doloribus & contractionibus nervorum; adduntur interdum pro meliori efficacia olei ranarum part. v. vel vi. quod mirabiliter operari solet. Simili modo proceditur cum floribus verbasci & chamomillæ. Dixi oleum ranarum: Fit enim etiam oleum ex bufonibus, catholice anodynum, in omnibus doloribus, dum scilicet bufones macerantur in aqua salsa seu aqua marina, postmodum decoquuntur, & aqua inspissatur ad remanentiam salis, quod sal dissolutum cum oleo amygdalarum dulcium dat oleum anodynum ad compescendos Dolores quoscunque. Post oleum bufonum etiam sunt olea lumbricorum terrestrium, lilio-

rum alborum, oleum septem florum seu anodynum Mynsichti, & oleum Chamæmelinum, Anethinum, oleum papaveris & hyoscyami expressum, olea destillata, tam aromatica, cumini, anisi, quàm foetida, ex animalium ossibus pinguedinibus, cera, &c. in specie foetida, oleum destillatum tartari foetidum; item oleum ossium humanorum destillatum, oleum pinguedinis humanæ, oleum Ilgoi guajaci foetidum, oleum buxi per descensum: foetida quidem, nobilissima tamen sunt in Doloribus nervorum, vel artuum ab acido ortis. Viterius oleum cere cum spiritu vini ana circulatum & probe digestum, ac inunctum in partium nervosarum Doloribus ex contusione est egregium: Videatur RIVERIUS Cent. 4. Observat. 51. Sic oleo destillato pinguedinis humanæ dolorem brachii diuturnum curavit BORRICHIVS de Hermet. Sap. pag. 371. Liberari possunt à febre cohobando super caput mortuum.

Facit huc Galbanetum Paracelsi seu oleum istud ex galbano cum terebinthina & spica oleo destillatum (vid. SENNERTVS in Praxi, ubi de Colica, & SCHROEDERVS in Pharm.) quod speciatim in Doloribus artuum & partium nervosarum chronicis & sæpius recurrentibus est admodum egregium remedium. Facit huc Balsamus Peruvianus, qui egregie anodynus, ad nervos contusos, combustos ac punctos egregius; item in nervorum & articularum Doloribus nulli cedit remedio, imprimis cum spiritu vini dissolutus. Hinc TIMEVS von GuldenKlee in Doloribus partium musculosarum à defluxionibus seu catarrhis frigidis ut vocant, commendat sequentem misturam: Nempe

24. Bals. Peruvi ℥j.

dissolvatur cum vitello ovi:

adde

Spiritus bacc. Junip. vel stor samb. ℥ij.

Misc.

& utere externe illinendo: egregie Dolorem compescit.

Vel etiam sacculus ex milio & sale applicari potest, qui extat in M. A. N. C. Ann. 6. Obs. 94. Gummata denique, tam ammoniacum, quàm galbanum, sagapenum, &c. in Doloribus fixioribus, à vitioso acido natis, & in specie emplastrum ex tacamahaca, vel sola, vel cum Caranna applicatum, sunt quasi catholice anodyna in artuum & partium musculosarum Doloribus, in specie ubi nervæ partes, vel à causa interna, v. g. sero, vel lymphæ acida, adeoque catarrhis aliâ tribuitur, vel externa, sunt egregia; unde & emplastra diaphoretica dicta, e. g. Mynsichti, vel emplastrum ex tacamahaca, vel sola, vel cum gummi carannæ, egregium est in dictis affectibus, ex sero acri contumacioribus, proficua observantur. Potentiora sunt & penetrantiora, sed aciora & non ubivis obvia, ex dictis gummatibus, ut Emplastrum de galbano crocatum, empl. de meliloto, ad Dolores à contusione vel ex casu ab alto efficacissima sunt remedia, auctore THONERO; quæ exaltantur in suo vigore, si malaxentur cum oleo destillato succini vel cum oleo destillato tartari, vel balsamo Peruviano. Alias emplastrum de meliloto item terebinthina, teratur cum salibus volatilibus vel spiritu salis ammoniaci siccant misturam tenacem albidam instar ejusdem emplastri quod itidem Dolores potenter resolvit: non secus ac emplastrum Vigonis de ranis cum Mercurio est egregium in Doloribus artuum Venereis nocturno tempore assilientibus; quod ut etiam in doloribus à materia viscida acida natis, item in doloribus cum tumoribus duris plus minus scirrhis & chronicis, & omnibus reliquis, merito præfertur, in specie in Doloribus scapitis venereis.

His addi possunt stercorea animalium, egregie anodyna, ex quibus optimum est humanum, seu stercoreus vaccini, vel recens applicatum, vel cum oleo rosarum mistum, sub forma cataplasmati in graviore dolore brachiorum & pedum mirabiliter conducere solet, ut hoc expertus est sapiens ipse THONERUS. Linteum cruore menstruo tinctum, exsiccatum, & Dolori applicatum, cum evanescere facit.

Hæc sufficiant pro primo scopo.

Quoad alteram remedium classem: Dolorem temperant & demulcent anodyna, suntque temperantia, blando sensu partes nerveas assicientia, imprimis lac & quælibet lacticia, vel sola, vel cum aliis in forma fomenti aut cataplasmati applicata: emulsionem internæ & externæ ex seminibus quatuor frigidis majoribus, papavere, amygdalis dulcibus. Hinc althæa, malva, melilotos, verbascum, ejus



ejus & sambuci flores, ac omnia emollientia, mucilagines istarum plantarum, & ex seminibus emollientibus, *oleum lumbricorum amygdalarum dulcium*, liliorum alborum, *septem florum Mynsichti*, althææ, malvæ, verbasci, sambuci, ovorum, laurinum, &c. quæ egregiè anodyna: Sic *lac caprinum* cum paucis melle ebullitum, & loco dolenti applicatum calidè, ad sedandos Dolores à RULANDO commendatur; oleo nempe & alcali dives est lac, unde præ aliis anodynum: sic RULANDUS etiam

℞. *Lactis* ℥v.

*Olei Rosar.* ℥ij.

*Nymph.* ℥ij.

Quæ invicem calefacta cum linteis multiplicatis crebrè parti dolenti applicantur pro leniendis Doloribus: quo dolor brachii totius ingens tanquam fomento brevi tempore curatus fuit.

Pertinet huc *cataplasma* istud Chirurgorum ubique usitatum anodynum, ex mica panis albi (Ger. *Weisse Semmel*) in lacte cocta, addit croco, & cataplasmatibus instar applicatum. Vel ad imitationem RULANDI in dolore lumborum ex defluxionibus aliquoties ab eo probatum:

℞. *Medull. panis albi*

Maceretur in lacte vaccino, per cribrum æneum trajiciatur: adde *Vitella ovi* & cum *butyro recenti* & seqq. oleis q. s. misce, & hinc calido linteo applica.

℞. *Olei Chamomill.*

*Anethi,*

*Lilior. alb.*

*Lumbr. terrestr. an.* ℥ij.

Misc.

Item *cataplasma* ex plantis appropriatis narcoticis & anodynis, in lacte coctis, applicatum prodest.

Pertinet huc & liquor iste oleosus ex floribus verbasci & sambuci per deliquium in clibanum paratus, potenter anodynus. Pertinent huc etiam *pinguedines animalium* anodyne, ad oblinendam acrimoniam causæ dolorificæ, v. g. butyrum, pinguedo anatis, humana, gallinacea, suilla, tæxi, anserina, cuniculi, vulpis, & similes, cum oleis subinde miscendæ. Vel ad dolorem brachii ex scarificatione in scapula expertum fuit hoc Unguentum:

℞. *Olei lumbr. terr.* ℥ss.

*Pingu. taxi,*

*Vulpis an.* ℥ij.

Misc. & illinatur brachium vel pars affecta.

Vel etiam cum aqua hirundinum cum castoreo eadem simul illinatur & foveatur.

Faciunt huc Unguentum dialthææ, unguentum alabastrinum, anodynum, hypnoticum usitatum, balsamum hypnoticum Mynsichti, & similia usitata.

Quæ tandem *vinæ narcotica* stupefactivâ dolores sistunt, sunt quælibet narcotica, ut omnia *Papaverina*, internè & externè, in specie omnia opiata, v. g. opium correctum, essentia opii, &c. Juxta hæc est hyoscyamus, in specie ejus semen, & quævis ex hyoscyamo parata remedia, in specie *oleum hyoscyami* expressum, externè potissimum narcoticum. Item stramonium ejusque semen & exinde paratum extractum. Solanum furiosum & ipsum vi stupefactivâ insigni pollet, ut etiam mandragora, ejusque radix & raditis cortex. Sunt qui ex semine hyoscyami parant oleum catholicum penetrans ad quoscunque dolores compescendos: recipiunt semen hyoscyami, ex eoque instar seminis lini oleum exprimunt, cui addunt Camphoram, crocum, & spiritum vini: Hæc omnia simul mista claudantur in vase vitreo, quod obducitur massâ farinaceâ fermentatâ, & ita simul coquantur in furno pistorio tamdiu, quamdiu solet panis pinis, quo factus liquor eximitur, & ad longum tempus pro usu asservatur, qui decantatus optimus est in crurum graviore dolore.

Huc quoque pertinent oleum ligni buxi, unguentum anodynum Mynsichti & unguentum populeum: e. g.

℞. *Ungu. hypon.* ℥ij.

*Olei expr. nuc. mosch. unc.* ii.

*Sem. hyoscyami unc.* i.

M. S.

*Unguentum lenitivum.*

℞. *Olei Anethi,*

*Expr. Papav. an.* ℥ij.

*Hyoscyami* ℥ss.

M. S. ut antè.

Ex his facile patet, quomodo speciales dolores curari debeant: Nempe

## DOLOR GRAVATIVUS

Curatur materiæ remotione. Hinc *vena sectio*, *Purgantia* & *sudorifera* locum habent; item *fonticuli*, variatis his ipsis pro circumstantiarum varietate.

Externè olea destillata penetrantia inungenda, in specie si dolor gravior oriatur ex lymphâ inundante partes, si à materia viscida & tenaci, usurpentur *emplastra* ex gummatibus & narcoticis, ut ex *tacamahaca*; item *emplastrum diaphoreticum*, de *cicuta*, *nicotiana*, de ranis cum Mercurio, & alla, contra scirrhus & scrophulas usitata.

## DOLOR PUNCTORIUS

Curatur internè per salia volatilia sudorifera, subinde cum opiatis mista, v. g. *spiritum salis ammoniaci anisatum cum essentia opii*.

Externè conducunt *Fomenta emollientia & aromatica*, discutientia; item *Litus* ex temperatis, ex oleis & pinguedinibus blandè volatilibus mistis, ut *unguentum dialthææ*, *oleum amygdalarum dulcium*, addito paucis oleo destillato *chamomillæ* & *camphoræ*; item *litus* ex volatilibus penetrantibus, ut *spiritus vini camphoratus*, *spiritus salis ammoniaci*, *sperma ranarum*, &c. Conducunt etiam ex sapone remedia, ut sapo in spiritu lumbricorum dissolutus, &c. qualia in pleuritide, & hinc arthritide usitata sunt.

## DOLOR TEREBRANS

Requirunt internè *incidentia & evacuantia*, præsertim, ex gummatibus, item *mercurio dulci*.

Externè *gummata*; item *emplastrum carminativum*, *Sylvii*, *emplastrum de galbano trocatum Mynsichti*, *emplastrum de ranis cum Mercurio*, &c. conducunt.

## DOLOR PULSATORIUS

Internè curatur per sudorifera acidum destruentia, subinde cum opiatis mista; non tamen semper.

Externè sedatur per fomenta ex aromaticis vino incoctis, ut discutiant & resolvant, doloresque sistantur. Item *empl. de meliloto cum theriaca* confert.

## DOLOR OSTOCOTOS

Tollitur, præmissa purgatione, imprimis per sudorifera; sed cum ut plurimum sit contumax, aliquamdiu continuanda, adeoque interdum per *diasam sudoriferam*, ex lignis institutam.

Externè confert *emplastrum ex gummatibus*, speciatim ammoniacis; item de ranis cum Mercurio, malaxatum cum oleis destillatis, imprimis fatidis, nempe *tartari*, *ligni guaiaci*, *cornu cervi*, *succini*, *petroleo destillato*, &c.

## DOLOR TENSIVUS

Internè volatilia temperata cum opiatis postulat.

Externè conveniunt fomenta demulcentia, anodyna, opiata, *lacticinia*, ex quæ talibus parata *cataplasmata*.

Cognatus dolor est

## DOLOR DISTENDENS

Qui internè carminantia seu volatilia oleosa, v. g. *spiritum salis ammoniaci anisatum*; externè discutientia & fomenta aromatica carminantia, &c. requirit.

## DOLOR ARDENS

Curatur, si in internis partibus observetur, per absorbentia, aliàs effervescentes humores præcipitantia dicta. Externis in partibus removetur per saturnina, item ranina, ut *sperma ranarum*; non peractia, malum magis exacerbantia; non per pingua ardorem, oblinendo potius, magis intendunt.



## DOLOR ALGENS

Curatur per aromatica, vel oleosa, olea destillata, v.g. galbanetum, spiritum vini crocatum, aquam articularem, &c.

Post hos dolores in genere & in specie, considerandi sunt quidam dolores atrociores particulares, quos inter acerbissimi & satis frequentes esse solent Dolores lancinantes & lacerantes artuum, & Odontalgia. Sit ergo

## ARTICULUS III.

### DE

## ARTUUM DOLORIBUS LANCINANTIBUS & LACERANTIBUS.

**D**olores hi frequentes sunt, imprimis in scorbuticis, tam vagi quam fixi, speciatim fixi crudeles & perniciatissimi sunt.

## CAUSAE.

Oriuntur hi Dolores fixi ex subtili acido, fibrilistendinis aut membranis quibusdam se insinuante, cum intenso dolore, unde universum partis fibrarum membranarumque systema compatitur, & compatiendo mediante coacta fibrarum crispatura totum membrum dolere facit, ut ut plurimum ne minima quidem partis dolentis percipiatur alteratio. Confirmat hoc, quod in male schiastico laborantibus, ubi malum haeret circa coxendicem, integra crura gravissimo contipi soleant dolore. Similiter insignis quidam nervus ab acido rosus & afflicus totum fibrarum nervosarum systema in consensum trahit, & ita talem Dolorem representare facit. Tales Dolores lacerantes scorbutici in partibus musculosis & nervosis fixi diurno tempore ferè acquiescunt, aut mitius affligunt, sed nocturno tantum tempore per duas vel tres horas ante & post mediam noctem exacerbari solent, & post hanc per horas binas vel ternas remittunt, in quo ipso simillimi sunt hi Dolores Doloribus Veneris & ipsis nocturnis. Dolores isti lacerantes fixi in quadam parte, ut ut saepissime, pro fomite agnoscent scorbutum, interdum tamen etiam sine scorbuto saltem manifesto agri patiuntur Dolores tales contumacissimos ubi à rheumatismo oriri dicuntur, in quibus etiam interna remedia subinde parum ferè operantur, externa verò applicata malum subinde potius exasperant, quam quod illud corrigant; narcotica verò applicata istud aliquomodo mitigant, sed postea malum contumacius & rebellius reddunt. Memini virginem adultam scorbuticam, crebriori haemorrhagiarum obnoxiam, hac per lignum sympatheticum fraxini suppressa incidisse in huiusmodi Dolores lancinantes nocturnos intolerabiles & implacabiles, ab hora decima vespertina ad secundam post mediam noctem constanter affligentes, hinc remittentes & somnum concedentes: Interdum bene habebat, quavis nocte statim tempore dolores crudescerant, idque per aliquot septimanas. Verum, quare in specie nocturno tempore recurrant, adhuc latet. Prae ceteris de his Doloribus, & quid in recessu habeant videri potest HORSTIUS lib. 3. Observ. 13. 14. seqq. elegantissima ibi inventiuntur.

## CURA.

Pro curandis his & similibus doloribus venesectio subinde, praesertim in principio, proficua esse solet (vid. M. A. N. C. Ann. 9. Observat. 120.) observatis tamen Revulsione & derivationis regulis. Hæc ut ut per se hæc mala non curet, per accidens tamen, quatenus liberior sanguinis & contentorum conciliatur motus, occasione doloris & fibrarum strictione plus minus deficiens, v. gr. quando crus affligitur tali dolore, ibi vel in brachio opposito, vel crure opposito secatur vena, & ad aliquot uncias sanguis emittitur, cum sensibili levamine agri melius se habent. Vesicatoria quoque in membro dolente convenienti loco applicata, saepius sunt proficua. Interdum ad fonticulos accedendum est, imprimis si pertinacius persistat malum, aut crebrius repetat, qui tamen sedato dolore iterum consolidari possunt.

Interne, cum acidum peccet, ante omnia observandum est, ut destituatur dictum acidum peccans, & vel per fixa absorbentia quodvis mista, illud in primis vils destruenda, partim & imprimis per sudorifera volatilia, singulas partes perreptantia: unde ratione prioris Martialis, & antimonialia sulphurea, ut antimonium diaphoreticum Martiale, cinnabaris antimonii, partes animalium durae & ossæ, conveniunt: hisque praemissis ratione posterioris salia volatilia alcalia, omnia antiscorbutica & antiarthritica, conducunt, in specie ex lumbis tartaro ac urina parata remedia volatilia subinde subiungenda sunt. Item decocta lignorum sudorifera, quæ veteribus Practicis in usu fuerunt, nec contemnenda sunt, praesertim ubi contumacior observatur dolor, ex radice chinae, ligno sassafras lignoque juniperino, de quibus videri potest in HORSTIO cit. loc. ubi talis Dolor Decocto lignorum fuit curatus. Quod etiam pertinere videtur insignis ille Dolor costarum, aliis frustra tentatis, per decoctum sequens curatus à PETRO POTERIO Centur. 1. Cur. 83.

Rad. Vincetox. ʒij.

Fol. Myrti M. j.

Sem. hyperic.

Rhabarb. cl. an. ʒij.

F. Decoctio in lq. aquae communis.

In colat. ʒvj. dissolve

Syr. capill. veneris ʒij.

Misc.

Per alvum & per sudorem dolorem curavit.

Decocti aliàs formula, quam in eiusmodi casibus observari proficua, est hæc:

ʒij. Rasur. ligni juniperia. ʒij.

Cym. pini inqior. ʒij. rec. M. ij.

Herb. rorismar. M. j.

Incisa minutim macerentur in aqua simpl. ʒvj.

Stent in Balneo Mariae per noctem: mane coq. ad tertiam.

Colatura detur pro Haustu matutino sudorifero, praemissis universalibus.

In specie huiusmodi formulam utilem notavi, ubi glandularum circa caput ac fauces obstructions & tumores simul occurrerunt.

Praeter interna ad externa subinde fiat accessus. Verum cauto opus est. Pinguia enim unctiosa, viscosa & similia, oblinendo poros magis exasperant malum quam leniunt, adeoque saltem subtilia volatilia penetrantia, nunc urinosa acra, nunc spiritiosa, conveniunt. Hinc spiritus vini camphoratus, item spiritus theriacalis camphoratus, in specie cum castoreo impregnatus, spiritus liliorum convallium, cerasorum nigrorum, salis ammoniaci cum spiritu liliorum convallium subactus & illitus, spiritus urinae, spiritus tartari volatilis, qui reliquis praefertur pro usu externo, aqua hirundinum cum castoreo, &c. externe conducunt.

Vel

ʒij. Spirit. lil. convall. non adeo rectif. ʒij.

Sal. ammon. cum calce viva ʒij.

Ess. Castor. ʒij.

M. pro usu externo.

D. S.

Spiritus articularis externe applicandi

Vel:

ʒij. Aqua articul. ad extr. ʒij.

Spiritus sal ammoniaci cum calcis viva ʒij.

Lumbic. per putr. ʒij.

M. D. S.

Aqua articularis externe applicanda.

Cum panno calido exterius affricetur membris dolentibus crebrius.

Vel

ʒij. Fol. Nicotian.

Origan.

Flor. Sambuc. an. M. j.

Rad. Angel. ʒij.

Art.

Pyrethri an. ʒij.

Flor. Stechad. Arab.

Lavend.

Lil. convall. an. p. ij.

Sem. cruce ʒij.

Castor. ʒij.

Concisa & confusa infund. in

Spiri-



## DOLOR ALGENS

Curatur per aromatica, vel oleosa, olea destillata, v.g. galbanctum, spiritum vini crocatum, aquam articulare, &c.

Post hos dolores in genere & in specie, considerandi sunt quidam dolores atrociores particulares, quos inter acerbissimi & satis frequentes esse solent Dolores lancinantes & lacerantes artuum, & Odontalgia. Sitergo

## ARTICULUS III.

### D E

## ARTUUM DOLORIBUS LANCINANTIBUS & LACERANTIBUS.

**D**olores hi frequentes sunt, imprimis in scorbuticis, tam vagi quam fixi, speciatim fixi crudeles & pertinacissimi sunt.

## C A U S A E.

Oriuntur hi Dolores fixi ex subtili acido, fibris tendinis aut membranis quibusdam se insinuante, cum intenso dolore, unde universum partis fibrarum membranarumque systema compatitur, & compatiendo mediante *occlusa fibrarum crispatura* totum membrum dolore facit, ut ut plurimum ne minima quidem partis doloris percipiatur alteratio. Confirmat hoc, quod in male schiastico laborantibus, ubi malum haeret circa coxendicem, integra crura gravissimo corripi soleant dolore. Similiter insignis quidam nervus ab acido rosus & affligus totum fibrarum nervosarum systema in consensum trahit, & ita talem Dolorem representare facit. Tales Dolores lacerantes scorbutici in partibus musculosis & nervosis fixi diurno tempore ferè acquiescunt, aut mitius affligunt, sed nocturno tantum tempore per duas vel tres horas ante & post mediam noctem exacerbari solent, & post hanc per horas binas vel ternas remittunt, in quo ipso simillimi sunt hi Dolores Doloribus Veneris & ipsis nocturnis. Dolores isti lacerantes fixi in quadam parte, ut ut saepissime, pro fomite agnoscunt scorbutum, interdum tamen etiam sine scorbuto saltem manifesto agri patiuntur Dolores tales contumacissimos ubi à rheumatismo oriri dicuntur, in quibus etiam interna remedia subinde parum ferè operantur, externa verò applicata malum subinde potius exasperant, quam quod istud corrigant, narcotica verò applicata istud aliquomodo mitigant, sed postea malum contumacius & rebellius reddunt. Memini virginem adultam scorbuticam, crebriori hæmorrhagiarum obnoxiam, hæc per lignum sympatheticum fraxini suppressa incluisse in huiusmodi Dolores lancinantes nocturnos intolerabiles & implacabiles, ab hora decimæ vespertina ad secundam post mediam noctem constanter affligentes, hinc remittentes & somnum concedentes: Interdum benè habebat, quavis nocte statotempore dolores recrudescerant, idque per aliquot septimanas. Verum, quare in specie nocturno tempore recurrant, adhuc latet. Præ ceteris de his Doloribus, & quid in recessu habeant videri potest HORSTIUS lib. 3. Observ. 13. 14. seqq. elegantissima ibi inveniuntur.

## C U R A.

Pro curandis his & similibus doloribus venæsectio subinde, præsertim in principio, proficua esse solet (vid. M. A. N. C. Am. 9. Observat. 120.) observatis tamen Revulsionis & derivationis regulis. Hæc ut ut per se hæc mala non curret, per accidens tamen, quatenus liberior sanguinis & contentorum conciliatur motus, occasione doloris & fibrarum strictione plus minus deficiens, v. gr. quando crus affligitur tali dolore, ibi vel in brachio opposito, vel crure opposito secatur vena, & ad aliquot uncias sanguis emittitur, cum sensibili levamine agri melius se habent. Vesicatoria quoque in membro dolente convenienti loco applicata, saepius sunt proficua. Interdum ad fonticulos accedendum est, imprimis si pertinacius persistat malum, aut crebrius repetas, qui tamen sedato dolore iterum consolidari possunt.

Interne, eam acidum peccet, ante omnia observandum est, ut destillatur dictum acidum peccans, & vel per fixa absorbentia quodvis mista, istud in primis vils destillata, partim & imprimis per sudorifera volatilia, singulas partes perseptantia: unde ratione prioris Martialis, & antimonialia sulphurea, ut antimonium diaphoreticum Martiale, cinnabaris antimonii, partes animalium dura & ossa, conveniunt: hisque præmissis ratione posterioris salia volatilia alcalia, omnia antiscorbutica & antiarthritica, conducunt, in specie ex lumbicis tartaro ac urina parata remedia volatilia subinde subiungenda sunt. Item decocta lignorum sudorifera, quæ veteribus Practicis in usu fuerunt, nec contemnenda sunt, præsertim ubi contumacior observatur dolor, ex radice chinæ, ligno sassafras, ligno juniperi, de quibus videri potest in HORSTIO cit. loc. ubi talis Dolor Decocto lignorum fuit curatus. Quod etiam pertinere videtur insignis ille Dolor costarum, aliis frustra tentatis, per decoctum sequens curatus à PETRO POTERIO Centur. 1. Cur. 83.

Rad. Vincetox. ʒij.

Fol. Mori M. j.

Sem. hyperic.

Rhabarb. cl. an. ʒij.

F. Decoctio in f. q. aqua communis.

In colat. ʒvj. dissolve

Syr. capill. veneris ʒij.

Misc.

Per alvum & per sudorem dolorem curavit.

Decocti aliis formula, quam in eiusmodi casibus observari proficuum, est hæc:

Rad. ligni juniperi. ʒij.

Cim. pini immor. ʒij.

Herb. variscar. M. j.

Incisa minutim macerentur in aqua simpl. ʒvj.

Stent in Balneo Mariæ per noctem: mane coq. ad tertiam.

Colatura detur pro Haustu matutino sudorifero, præmissis universalibus.

In specie huiusmodi formulam utilem notavi, ubi glandularum circa caput ac fauces obstructions & tumores simul occurrerunt.

Præter interna ad externa subinde fiat accessus. Verum cauto opus est. Pinguis enim unctiosa, viscosa & similis, oblinendo poros magis exasperant malum quam leniunt, adeoque saltem subtilia volatilia penetrantia, nunc urinosa acra, nunc spirituosa, conveniunt. Hinc spiritus vini camphoratus, item spiritus theriacalis camphoratus, in specie cum castoreo imprægnatus, spiritus liliorum convallium, cerasorum nigrorum, salis ammoniaci cum spiritu liliorum convallium subactus & illitus, spiritus urinae, spiritus tartari volatilis, qui reliquis præfertur pro usu externo, aqua hirundinum cum castoreo, &c. externe conducunt.

Vel

Spir. lil. convall. non adeo rectif. ʒij.

Sal. ammon. cum calce viva ʒij.

Ess. Castor. ʒij.

M. pro usu externo.

D. S.

Spiritus articularis externe applicandi.

Vel

Aqua articular. alex. ʒij.

Spiritus sal. ammoniaci cum calce viva ʒvj.

Lumbic. per putr. ʒij.

M. D. S.

Aqua articularis externe applicanda.

Cum panno calido exterius affricetur membris dolentibus crebrius.

Vel

Fol. Nicotian.

Origan.

Flor. Sambuc. an. M. j.

Rad. Angel. ʒij.

Seri.

Pyrethri an. ʒij.

Flor. Stechad. Arab.

Lavend.

Lil. convall. an. p. j.

Sem. eruc. ʒij.

Castor. ʒij.

Concisa & contusa infund. in

Spiri-



*Spiritus vini part. ij.*

*Spiritus lumbrie. part. j.*

Digere per dies noctesque aliquot, & filtra.

Convenit quoque Sapo Venetus in *spiritu vini* dissolutus, cum *spiritu ceraforum nigrorum & lillorum corvalli* mistus, & externè illitus. Imprimis *spiritus tartari volatilis* reliquis præfertur cum *spiritu vini* temperandus, ubi acrior fuerit. *Galbanetum Paracelsi* quocunque modo paratum etiam hoc in casu mirabiliter convenit; sed cum *spiritu vini* seu simili volatili temperatum, aliquamdiu circulatum, ut penetrantius fiat, & ne nimis crassum sit. *Radix consolide maioris recens confusa*, & cataplasmatibus modo manè & vesperti loco dolentibus inposita, singulare quid obtinet. Confecti hic potest HARTMAN. NUS ubi de *Paralyti*. Proficuum etiam observavi lixivium coriariorum jam usitatum mistum cum dimidio vel ana urinæ humanæ, ex quibus fiat *suffitus* seu *Fotus vaporosus*. Hæc mixtura probe calida in jectis lipidibus vel ferris ignitis in vaporem resolvitur, qui vapor parte dolente, desuper probe testâ, excipiendus, ut sudor hinc concitetur, & subinde repetendus; in tali dolore crucis egregiè admodum confert. NB. multum in recessu habet. Vid. *Id. Formular. Class. 4. §. 12. & Colleg. Formular. pag. ....*

*Therma* denique, earumque infusus, auxiliatur *thermarum & lapides thermales* in aqua probe bulliti, instar *thermarum naturalium* usurpati, etiam huiusmodi dolores crurum lancinantes insigniter placant. Ante paucos annos, (vix est biennium) vir quidam hic tali enormi dolore pedum affligebatur, idque sine ulla manifesta causa, & etiam sine ullo externo apparente læsionis signo, ultra dimidium anni miserabiliter cruciabatur: Tandem omnibus remediis irritis, suasu cujusdam amici accepit huiusmodi lapides, eosque confusos probe coxis in aqua simplici pro balneo, in quo subinde balneavit pedes, hos immittendo, & per longum tempus ita retinendo, unde tumores pedum contraxit. Sed patiens nihilominus dolorum & vitæ pertæsus pergit, & balneum hoc diutius continuat quo factò non tantummodo tumor, sed etiam omnis dolor omnino evanuit, ægerque perfecte curatus fuit. Similia balnea, thermis naturalibus succedanea, aut thermæ artificiales, parari possunt ex aqua, calce vitæ, & sulphure, ad imitationem ZWELFERI in sua Mantiss. Spagyr. pag. 40. ult. Edit. ubi de sulphure: Vid. Colleg. Pharmaceut. in Schræderum Part. 1. pag. 481. & 246. Integer formicarum acervus sacculo inclusus in aqua coquitur, cui æger insidet: Item balnea ex vinaceis.

#### ARTICULUS IV.

##### DE

#### ODONTALGIA.

**D**olor dentium seu Odontalgia, quibusdam dentium podagra, nunc per essentiam, nunc per consensum ex affectu gingivæ, nascitur.

##### CAUSÆ.

Si per essentiam fuerit, Causa huius sæpius est acor vitiosus: nunc ex vitiosa dentium nutritione seu alimentum eorum proximi corruptione proveniens, qui dum rodit substantiam dentis rodit etiam radicem, membranam nervi & sensibillissimam investitam, ex qua variz fibræ in dentis cavum penetrant, unde si acor dictus hanc membranam rodit, tam immanis lancinans dolor emergit: nunc feri vehiculo, dum nutrimentum dentium chylosum, vitioso & acore occulto plus minus inquinatum, huius medio ad eos derivatus, ad dentem quendam depositum, ut in scorbutò & lue Venerea subinde obvium. Subinde etiam lymphæ quædam acidæ per errorem distributionis ex vicinis glandulis derivatæ talem dolorem inserit; est enim affectus catarrhalis. Forsam interdum & collecti humores acres in cavernula ossium maxillæ superioris infra oculum multum contribuant. Vid. MOEBII Fundam. Physiol. t. 2. pag. 414.

Corruptio ista alimenti proximi non assimilati in acorem vitiosum interdum eò usque procedit, ut etiam ex corruptela dentium ac gingivarum subinde vermiculi in-

alveolis dentium generentur, qui ipsi dolorem istum intensum dentium non leviter exasperant: Vid. BARTHO. LINI Acta Hassniens. Cent. 5. Observat. 108. BONETUS lib. 2. Med. Sept. Sect. 4. cap. 13. M. A. N. C. Ann. 9. Observat. 24. & 107. Imò ab acore isto sæpius ro-dente dentes dolorificè, & corruptente ejusdem alimentum, interdum eorum compages ossia adeò corroditur, ut exinde dentes carioli fiant & excaventur, ac eorum compages laxetur, ut frustulati tandem excidant.

Ipsi quidem dentes non dolent, sed membrana dentium intima investiens, ex expansione nervi orta, & cujus fibræ hinc inde per dentium porosulos & meatus in eorum substantiam penetrando se insinuant, doloris istius acerbissimi sunt. Dolorem hunc vicinarum partium & fibrarum nervearum crispationes, leuesque contracturæ per consensum continuitatis insequuntur: unde quousque hæc fibrarum crispatio dolorifica continuatur, eò usque dolor hinc se extendere videtur, ita ut exinde perfecta hemiplegia superveniat; & dum ab ista contractura fibrillarum nervearum angustantur poruli, & stringuntur meatus, per quos sanguis aut alii humores meando circumflantur, hinc nunc sanguis, nunc serum aut lymphæ in motu impeditæ stagnant, adeoque isti dentium dolori supervenit tandem ut plurimum aut inflammatio maxillæ cum dolore tensivo & pulsatorio, totum capitis hemisphærium occupans, aut etiam tumor, vel sanguineus, vel serosus, vel œdematosus, saltem ab acido membranam nervi dentis rodente & vellicante.

Causa ergo proxima formalis in dolore dentis est spiritus impetum faciens; cujuratione membrana dicta, huiusque fibræ sentiunt, ac dolorem percipiunt: materialis vero est acidum in radice dentis hærens.

Causa remota, quæ vel nutrimentum dentium priuatum corrumpunt, vel acidum præternaturale eò distribuunt, nunc sunt externæ, nunc internæ. Ex internis, quæ nutrimentum vitiosum acore peregrino infestum feri vehiculo denti communicant, sunt imprimis ipsius alimentum proximi vitia, seu cacochymia sanguinis & humorum in lue Venerea aut scorbutò; Mox enim ingentes tumores in scorbuticis & lue Venerea laborantibus supervenire solent. Externæ sunt imprimis assumptæ, quæ dum inter interstitia se insinuant, successivè acorem contrahunt, & partes denti vicinas rodunt, & nutrimentum priuatum inquinare solent. Inter hæc excellent saccharata, dulcia, servida, nimis frigida, imprimis acida, spiritum instum dentium labefactantia, & hinc huius materialem texturam vitiantia: speciatim dentibus nocent saccharata & mellita, quæ facile fermentando acorem, eoque satis subtilem, contrahunt.

##### DIAGNOSIS.

In odontalgia æger satis sunt querullus, per quos malum manifestatur: saltem quoad causas remotas observetur, quod sæpius in scorbuticis acutissimi dentium sint dolores; sicuti in lue Venerea hi ipsi sunt crudelissimi, planè intolerabiles, lique nocturni; id quod à Medico cognoscendum pro facilliori instituenda cura. Vitiosum enim, horum morborum causa, acidum, dum in talibus dentes antea non bene se habent, facile illis se insinuat, nutrimentum priuatum inquinat, & rodendo malum exasperat: Vel dum alius dens per se dolece incipit, facile ejus occasione acidum præternaturale in corpore concurrere, ac dentis dolorem & vicinorum locorum pathemata crudeliora, efficere valet.

##### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: per se quidem Odontalgia in adultis nullum periculum habet, utut per accidens consumacior vel diuturnior convulsiones, in specie musculi temporales, vigiliis pertinaces, aliaque similia symptomata gravia inferre potest.

Adhuc doloribus his interdum superveniunt tumores, lique inflammatorii, qui ad suppurationem tendunt, & aperti interdum in fistulas degenerant.

Ob id ergo maturè compescendus est dolor.



C U R A.

In cura acidum in dentibus peccans est corrigendum, dens cariosus evellendus, & tandem vermiculi geniti enecandi; imprimis tamen, quantocyus fieri potest, dolor sistendus, addendo remediis his semper simul, quæ morbo primario, e. gr. scorbuto aut lue Venerea, à quo Odontalgia etiam tanquam symptoma dependet, appropriatè conveniunt. Sic enim in dolore dentium scorbutico, quod etiam ille pertinet, qui ex malo hypochondriaco subinde excitatur, vulgaribus odontalgicis simul misceantur subinde appropriata antiscorbutica, v. g. lac & lacticia, internè & externè; sicuti etiam sola sufficit herba cochlearia, aut in hujus penuria nasturtium aquaticum, aut etiam nasturtium indicum, & similia: si nempe dictæ plantæ cum salula, (quæ est appropriata in affectibus gingivarum & dentium,) rosmarino, rosis, plantagine & similibus, pro oris collutione subinde misceantur & decoquantur. Sic dolor iste, qui in lue Venerea obvenit, appropriatius non habet remedium, quàm quod malignum istum acorem euincere potest; ex quo genere decoctum guajaci cum aqua communi, aut ejus essentia, in oleum destillatum, & similia optima sunt remedia. Sed de his & similibus videbitis plura in STROBELBERGERI Tract. eleganti de Podagra dentium, propriè autem Odontalgia.

Remedia ergo, quæ ad dolorem dentium compescendum usurpantur, & acidum temperant, sunt innumerabilia, & tot, quot sunt ægri, qui patiuntur dolores. Ordine progrediar. In usu sunt Decocta plantarum quarundam in ore tenenda, aut gargarisimata ex origano Cretico, foliis Nicotianæ, herba persicariæ, radice pyrethri, tassa ligni sancti, buxi, sabina, chamomilla, serpillio, foliis & radice hyoscyami, item teneris germinibus quercus, & similibus, in vino decoctis: e. g.

24. Herba Persicariæ.

Serpill. an. M. j.

Rad. lapath.

Urtic. an. ʒj.

Pyrethri,

Ros. lignituxi,

Sandian. ʒß.

Sem. hyoscyam. alb. ʒj.

Coq. in f. q. aquæ.

Cum Colatura gargarisetur os.

Vel sola persicaria cum corticibus hyoscyami in vino cocta dolorem sistit. Frequenter coquuntur in aceto, ubi dolor dentium est à causa calida, ut vocant, ubi simul est tumor sanguineus, in vino, ubi dolor est à causa frigida, quando conjunctus est tumor serosus & oedematofus: utut hæc parum referant, cum potius sint producta morbosa. Sed decocta in aceto cautè applicentur, seu penitus intermittantur: nam acetum acore suo dentibus hostile est, & ejusmodi decocta plus nocent quàm profunt, dentium compagem solvendo aut friabilem reddendo, & stuporem inducendo: sic mulier quædam doloribus dentium correpta acetum feruidum in os sumpsit, ubi cessavit quidem dolor, sed dentes frustulatim exciderunt. Vel decoctum sabinae cum bacis juniperi in ore detentum commendatur à BRENDelio. Decoctum itidem radicis & herbae hyoscyami in vino vel aqua & aceto paratum, in ore detentum, potenter dolorem dentium sistit. Melius est, si ex manuductione PARACELSI recipiatur herba Persicariæ cum cortice radicis hyoscyami, decoquantur in vino, & in ore detineatur: quidam enim simpliciter radicem hyoscyami, seu ramenta hujus radicis, in specie recentis, aut in vino macerata, loco dentium dolenti applicant; sic enim acerbis dolor intra horæ spatium fuit aliquando curatus. Oleum hyoscyami ex semine expressum denti applicatum, vel interiùs vel exterioriùs, in specie quando vermiculi adsunt, convenit. Loco hyoscyami usurpatur commodè Nicotiana, cujus fumus, præmissa, ubi opus est, purgatione, egregius est; sicuti sola nicotiana denti dolenti attrita & masticata (ne tamen saliva deglutitur) solet vi narcotica dolorem dentium sistere, teste RIVERO in Observat. unde decoctum Nicotianæ cum floribus Chamomillæ in ore detentum ac masticatum remedium fuit HEURNII in dentium dolore: Decoquitur vel in cerevisia secundaria, vel in lacte, vel in lactis sero. Vel

Essentia Oper. Tom. II.

24. Piperis nigr.

Rad. Pyrethri,

Sem. Staphisagr. an. part. æqu.

Coqu. in vino.

Colatura detur pro gargarisatione. Vid. PARACEL-  
SUS.

Sic gummi Juniperinum seu sandaracha Arabum in omnibus doloribus dentium admodum laudatur, si scilicet gummi juniperini ʒi. in vini ʒss. decoquatur, quo ipso coluatur os; hoc enim multum conferre dicitur ad compescendum dolorem dentium, etiam à lue Venerea obortum: Conf. AMATUS LUSITANUS Centur. 5. Cap. 21. Aliàs experimentum hocce etiam laudatur:

24. Flor. spicæ nardi,

Coqu. in Vino.

Et Colatura sæpiùs, & aliquamdiu in ore detineatur; nam & hoc multis prodesse dicitur.

Præ cæteris conveniunt Opiata: nempe fiant pilule ex opio vel laudano opiato, quæ ipsæ denti dolenti vel cavo immittantur subito dolorem sistunt; vel ejus essentia aut extractum excipiat cum bombace, & vel denti immittatur, aut extrinsecus dentibus ac gingivis affricetur.

Vel

24. Extr. ligni Guaj. gr. iij.

Laud opiat. gr. ij.

Olei destill. orig. Cret. vel caryophyll. gutt. ij.

M. f. Pilulæ,

D. S.

Pilule dolorem sedantes.

Denti cavo intrudantur.

24. Flor. benz gr. vj.

Opii in spiritu vini sol. ʒss. insp. gr. iij.

Cum f. q. Extr. theriac. f. pilulæ.

D. S. ut ante.

WEDELIUS in Opiolog. pag. 138. commendat sequens:

24. Laud. opiat. ʒj.

Olei Camph.

Caryophyll. an. gutt. v.

Corp. pro Bals. ʒj.

M. f. Balsamum, denti dolenti applicandum.

Interim notabile est, quod refert SALMUTH Cent. 3. Observ. 34. ex Laudano opiato, dentibus dolentibus in tempestivè adhibito, omnium sensuum stuporem, vertiginem & gravedinem capitis oborta fuisse: Et Zacutus Lusitanus libr. 1. Med. Princ. Histor. 61. ex opio in dentis cavum sæpiùs pro ejus sistendo dolore immisso mortem observavit, aded ut hic subinde universalia præmittenda. Pertinet huc sotirella parva Augustanorum: Descriptio videatur in Pharmacop. August. Ex qua pilula una vel altera aut denti cavo intrusa, aut intrinsecus admota, denti dolenti etiam, dolorem sistit. Virtute opii etiam Theriaca recens applicatur denti dolenti; vel ex theriaca recenti paratur emplastrum malæ dolenti imponendum, in specie quando tota series gingivarum cum malis & temporibus dolet. Cera Catholica Burrhi generis applicata quoque convenit, quem in finem & pilularum formâ denti inferi potest. Quod si dolor & ardor erysipelaceus adsuerit, tali emplastro ex theriaca salis absinthii ʒi. addendus: internè lac tepidum simul crebriùs in ore tenendum, præsertim quando suspicio est de latente scorbuto. Optimum & singulare est Camphora, itidem denti dolenti imposita, aut integra, aut soluta in spiritu vini rectificatissimo: aut, qui mihi in usu est, spiritus salis ammoniaci paratus cum spiritu vini & calce viva, in quo camphora soluta sit, cum bombace denti cavo immittatur, aut gingivis in loco dolenti imponatur; præsentaneum levamen infert, utut maxime mordeat: vel oleum camphoræ per eius in oleo amygdalarum dulcium dissolutionem factum, non incongruum est. Essentia quædam vegetabilium aromaticæ mirè etiam conferunt, ut essentia ligni sassafras cum spiritu ulni parata, vel essentia ligni guajaci cum spiritu vini parata. FABER commendat essentiam thymi, satureiæ, serpilli, salviæ, calaminthæ, Zingiberis, &c. quæ sunt nobiles in dentium dolore, si his ipsi gingivæ fricentur, aut etiam cum bombace denti dolenti immittantur. Quod etiam facit Tinctura odontalgica Myrsiceti, & Wedelii ex ras. ligni sancti ʒi. caryophyllorum & radicis pyrethri ana ʒß. cum spiritu vini rectificato extractis. Omnium optima est Essentia Benzoini. Hoc habent commodi, ut convenienter cum

Vu

essentia



essentia opii misceri, & ita ed præstantius remedium constitutere queant. Ego vidi aliquando dolorem dentium, curatum per essentiam catarrhalem assafratam denti applicatam. Loco harum essentiarum etiam *Elixir Proprietatis sine acido*, cum bombace vel alio modo denti dolenti applicatum, certè dentium dolorem sistit. In specie videatur *Tinctura odontalgica* M. A. N. C. *Ann. 6. Append. pag. 76.* Præcellunt adhuc his essentiis *olea destillata*, utpotè salia volatilia concentrata, acidum vellicans destitutiva, v.g. *oleum destillatum caryophyllorum*, &c., quod præstantius est, *oleum destillatum origani Cretici*: quibus tantillum camphoræ additum eadem reddit tantò præstantiora. *Rulandi experimentum* certissimum fuit *oleum Heraclinum* ex corylo paratum; loco cujus *oleum destillatum buxi* per descensum, & per velicam rectificatum, convenienter potest recipi; vi enim narcotica nobile est ad odontalgiam: cui præfertur *oleum sabinae destillatum*, perquam egregium; sicuti ipsum *sabinae decoctum* in cerevisia secundaria vel vino paratum, in ore iuxta locum dolentem detentum, excretum, & subinde ita repetitum, excellens est, expellens simul dentium vermes. **WEDELIUS**, ex oleo destillato ligni guajaci & caryophyllorum additâ camphorâ parato *oleum odontalgicum*, cujus guttas duas vel tres denti carioso cum bombace immittit. His oleis destillatis in acerbissimo dolore tantillum de oleo hyoscyami expresso convenienter addi potest. **CLAUDINI** remedium fuit *oleum terebinthinæ* cum tantillo camphoræ; aut ipsemet *balsamus sulphuris terebinthinatus* cum bombace dentibus inditus etiam confert: cum quo potest, uti dixi, misceri camphora. Præter dicta etiam *oleum destillatum rosismarini*, *oleum salviæ*, juniperi, tandem *oleum succini*, admodum commendatur. Videatur etiam *balsamum odontalgicum* in M. A. N. C. *cit. loc.* *Plumbaginis radicem*, ceu verum experimentum, laudat **PANAROLLUS** *Pentec. 4. Observat. 10.* Radix hujus plumbaginis contusa, & carpo manus imposita, per noctem relicta, manè maculam plumbeam relinquit, & dentium dolorem evanescere facit: id quod à multis fuit probatum, ratione cujus effectus etiam à quibusdam Denticaria vocatur. Sulphur auratum antimonii confert etiam, si ejus tantillum cum bombace in dentem cavum immittatur, aut denti dolenti applicetur; imbibitione enim acidi corrosivi dolorem citò sopit, quod ipse aliquoties observavi.

Præter hæcenus recensita etiam *Cura Magnetica* ac *Transplantatione* in usu sunt. *Magneticas* inter eminet **PARACELSI** *Cura quoad Persicariam*, dum eam recentem in aqua maceratam imponit loco dolenti malæ, donec probè incalcescat; hinc sepeliatur in fimo, ut citò putrescat; sic enim dolor cessat: vid. **HELMONTIUS**, & **MARCUS MARCI**. Pertinet huc *officulum brachii bufonis*, quod exprimentum **HELMONTII** & secretum **HEURNII** fuit, qui recipit os dextri femoris bufonis ab omni carne nudum, hoc gingivæ dentis dolentis subinde & fortiter fricat, & subito cessat dolor. **HELMONTIUS** *officulum brachii dextri bufonis* recipere jubet, quod loco dolenti applicatur, quodque levamen affert, sed non semper, utut sæpius; vidi tamen etiam sine successu applicatum. Quidam recipiunt *frustulum ligni acutum*, fricant dentem dolentem seu gingivæ, post verò lardo infigunt; sic brevi post evanescit dolor. Lignum fraxini iusto tempore caesum, dentium cavitatibus intrusum, dolorem fugat, ubi & gingivis affricari poterit.

*Quoad Transplantationem*, imprimis cum corylo, hinc cum sambuco & salice, ea instituitur, si nempe ab his, separato nonnihil cortice, excindatur festuca, qua ipsæ gingivæ & loca dentis affecti punguntur, usque dum sanguinem fundant; tum lignum cruentum denuò immittatur loco, unde excisum, cortex denuò applicetur, & luto probè circumdetur: vid. in **JOHANNESOPHRON. KOZAK Traß. de Sale pag. 513.** Alii ungues abscindunt à manibus, & pedibus, dentesque à foribus mundant, hæcque omnia linteolo involuunt, atque die Veneris ante solis exortum sambuco pridè discissim immittunt; quò citius foramen illud concrevit ed citius dolor remittit. Conveniunt ejusmodi Curæ in sæpius recidivantibus & quasi habitualibus odontalgis. Quamvis videatur aliquid superstitionis illi actui subesse, ob ceremonias, quæ observantur in illo actu, tamen reverà superstitione caret, & ceremoniæ, quæ adhibentur, non

sunt de essentia artificiali; nam & eis absentibus feliciter procedit Cura.

Subinde etiam à *Chirurgis* externè temporibus emplastra applicari solent eum in finem, ut saltem consensum doloremque per consensum hemisphericum tollant, quod etiam præstant. Fiunt ex *gummi tacamahacæ*, vel galbano, quod est melius, vel carannæ, malaxatis cum oleo papaveris expresso, vel cum *balsamo Peruviano*; quæ super linteum in forma thaleri extensa, sanè in odontalgis gravidarum non sunt contemnenda; & quidem, si in maxilla superiore doleant, temporibus; si in inferiore, propè aures sunt applicanda. Alii *gummi elemi* vel mastichen recipiunt, & eadem parant pro gravidarum doloribus. Alii mastichen & ceram; quidam etiam *gummi ammoniacum* aceto dissolutum, instar emplastri applicant.

*24. Theriac. Androm.*

*Tacamahac. an. 3ß.*

*Bals. Peruv. 3j.*

Inducatur super linteum densum, & universæ malæ dolenti applicetur.

D. S.

*Emplastrum sedans.*

Quod si phlogosis quasi erysipelacea adsit:

*24. Theriac. 3ß. ad 3vj.*

*Salis Absinth.*

*Bals. Peruv. an. 3j.*

Misc. & admoveantur.

Fit subinde, ut cum *Odontalgia* etiam ingens maxillæ tumor coniunctus sit, tunc Chirurghi imperiti applicant *emplastrum de meliloto*, quo ipso sine ratione abscessum inferunt; nam modò sistatur dolor, tumor & omnia symptomata spontè evanescunt. Potius ergò tales tumores fomentis discutientibus & resolventibus, quàm emplastris suppurantibus, sunt curandi: e.g.

*24. Flor. chamomill.*

*Sambucian. M. j.*

*Pulv. rad. Ileos Flor. 3ß.*

Incisa adspargantur

*Oleo Papav. expresso.*

Includantur sacculo interposito:

D. S.

*Sacculus externus.*

Qui calefactus probè ita imponatur, & subinde recitatur.

Fit etiam interdum, ut in gingivis circa radicem dentis dolentis superveniat aliqualis tumor parvus intensè dolens, qui pedetentim ad suppurationem tendit, qui tumor ut ed felicius suppuretur, ne præmature evanescens recidivam inferat, sed potius maturè suppuretur, convenit *lac tepidum* in ore tenendum, vel, quod melius, *frustula ficuum*, vel crudarum vel nonnihil assatarum, tuberculo imponenda, quæ insigniter suppurationem promovent: (*citò rumpit, sed valde dolet.*) Abscessus postmodum apertus sedulo aquâ multâ, qua eluatur os, vel melle illito mundificandum, ne nimis citò consolidetur, aut ne in fistulam abeat; Tantillum enim fermenti remanens crebriorem ejusmodi tumoris recidivam facit.

Subinde contumaces *Odontalgie* adeò sunt, ut propter seri copiosioris retentionem circa partem dolentem periculose sint, imò crebrius adeò periodicæ, ut subinde quibusvis, etiam generosissimis artis præidiis, curari vix queant. Exempli singularia videb. in M. A. N. C. *Ann. 8. Observat. 62. pag. 104.* **BORELLO** *Centur. 3. Observat. 7.* **HILDANO** *Centur. 4. Observat. 21.* In talibus, ubi purgatione opus est, aut saltem metu gravioris mali, eadem instituenda videtur, *Jalappa* est convenientissima: juxta quam & ad sanguinis missionem interdum accedendum venit: Hinc **Thonerus lib. 1. Observat. pag. 214.** dolorem dentis per venæ sectionem ad animi usque deliquium curatum refert: Idem *cit. loc.* dolorem dentium à sanguine copioso seruido per cucurbitulas scapulis, cervici, cubito applicatas, aliis irritis, curatum memorat: sic dolor dentium contumacissimus nullis cedens remediis per impositionem cucurbitulæ maxillæ sanatus observatur à **FORESTO lib. 14. Observat. 6.**

Pro reuulsione **PARÆUS Chirurg. lib. 16. cap. 25.** alium tritum illâ manu, in quo latere dolor percipitur, gestatum conferre ex **MESUE** refert: vid. **PLATERUS lib. 2. Observat. pag. 371.**

Quoad



Quoad dentes cavae aut cariosos: pro his nulla adfunt remedia; quamvis dolor leveretur, semper tamen recidivat: unde dens cavus & erosus evellendus aut extrahendus est; vicini enim dentes simul carie inficiuntur. Evulsio hæc non est quidem genuina odontalgia cura; nihilominus tamen, quia in dente corroso adhuc hæret fermentum acidum rodens, quod subinde recidivare facit dolorem, optimum est eundem evellere; Etenim quando est evulsus, facta sic fovea interdum liquor copiosus limpidus solet evacuari, à quo abluatur quasi caverna loti, ne malum possit recrudescere. Nam observatum est, quod odontalgia sæpius evulso dente fuerint curata: sicut & confirmata caries alia ratione, quam evulsione, curari non potest: Quamdiu verò vel nondum eo usque processerit malum, vel propter pericula, sub dentium evulsione interdum observata, hæc nimis metuatur, remediis res tentanda est, cariei scilicet progressum ulteriorem inhibendo.

Evulsio appropriato peragitur instrumento, ac succedit eo melius, quò minus firmiter dens hæserit, & quò magis idem vacillaverit. Faciunt hoc aegyptæ; & hinc Chirurghi. Ut verò facilius & minus dolens fiat dentis evulsio, optimum est, remedia quædam denti applicare, quæ dentem vacillantem reddant, & ejus casum aut evulsionem promoveant. Hinc inter varia convenientia:

24. Gum. Ammon.  
Sem. hyoscyam.  
Succ. hyoscyam. an. ʒiʒ.

Quæ cum pinguedine ranæ viridis, & pauca cera misceantur in unguentum, denti extrahendo illinendum vel indendum, vel circa gingivas applicandum, & eundem vacillare facit.

Succus ranarum dentibus illitus ita eos labefaciat, ut sine dolore sequantur trahentem, inquit GESNERUS in suis Epistolis. Succus Chelidonii maioris dentibus cavis illitus vel inditus, frangit eos, & elicit. Ulterius lac Tithymali, vel nudè denti carioso inditum, aut si ex eo & sale ammoniaco formetur globuli, & denti indantur, aut cum farina triticea subactum fiat pasta, & cavitati dentis indatur. Præter tithymali lac, & alia ex simili lacteorum genere, pari vir. ut. pollent: ut lac ficulneum (seus) farinae admixtum; vel ex lacte tithymali cum farina triticea subacto fiat pasta, quæ in pinguedine ranæ viridis frixa denti evellendo applicata, promoveret brevi eiusdem casum sine dolore; aut lac caprutæ miscetur cum farina siliginis, ut fiat instillatilis, quæ plus denti cavo indita, sicque aliquamdiu permittatur, brevi eiusdem casum promoveret. Sal ammoniacum etiam cum succo hyoscyami convenit. Phlegma item ranarum viridum dentibus affricata, aut eisdem indita dentium casum promoveret: nempe coquantur ranæ in olla vitreata, affusa aqua communi, & pinguedo quædam innatabit, quæ dentis evulsionem promoveret.

Cariei verò ulterior progressus per artem & medicamenta inhibetur, efficacissime imprimis per inunctionem, dentis cariosi in loco carioso cum cauterio actuali, sive ex ferro, sive ob subtilitatem commodiorem, ex argento vel auro factio; quo facto auro foliato dens cavus repleatur; præservatur enim sic à maiori putredine & corruptione: vel ex cera cum myrrha probe subacta, vel potius ex cera viridi propter admixtam æruginem impleatur dentis cariosi excavatio. Ipsa myrrha, denti indita, egregia est in hoc casu. Confer. hic RIVERIUS in Observat. Communie. pag. 309. ubi refertur, quod dentes terebinthina implantantur, & cauterio actuali dens inuratur in carie. Loco actualis cauterii, ubi necessum visum fuerit, potentiale adhibeatur; sic aqua fortis denti carioso admoda, vel spiritus vitrioli gutta j. vel ij. bombacè inditæ, ac denti adhibite, mirè corrosionem juvare & præservare dicitur. Item Zinziber in oxymelle coctum, & in cavernam dentis immixtum, præservat corruptionem. Coralliorum pulvis denti cavo inditus, vel os sepiæ, item camphora, cariei ulteriorem progressum inhibent: vel ex pulvere coralliorum alborum, cum melle rosato ad consistentiam linimenti crassioris redacto, dentibus illitum cariem inhibet.

Denique vermiculi in dentibus nidulantes sunt enecandi, quod optime facit Decoctum sabine cum vino paratum, in ore loco dentis dolentis detentum, quod copio-

Æscmull. Oper. Tom. II.

fos vermes elicit. Item suffusus ex semine hyoscyami & cera, in globulos redactis, specificus est per Infundibulum dentibus cavis receptus, vermiculos enecat, & mirabiliter egredi facit: Conf. BARTHOLOMIÆ Med. Hassiens. Volum. 1. pag. 209. Melius est si loco huius ex fructibus halicacabi contulis, cum cera mixtis, fiat exinde pasta, & iniciatur in laminam ferream ignitam, quæ sumum suggerit, quo ore excepto, cateruatim vermes cum spuro copioso reieci, & crudelissimi dolores sopiti, observati fuerunt. Spiritus sulphuris vel vitrioli quoque dentibus cum bombace inditus vermes optime necat, & dolorem inde oriundum placat: vel pulvis gallicum cum succo radices pyrethri impregnatus, & cum fermento in pilulam redactus, optime vermes expurgat, si denti, ubi sunt vermiculi, indatur. Decoctum radicis vel corticis fraxini etiam vermes in dentibus stabulantes enecat. Serum cervinum ad ignem liquefactum, & gingivis impositum, quantum contra vermes dentium valeat, vid. BARTHOLOMÆUS Cent. 3. Hist. 96.

Absolvimus Odontalgiam. Pergoigitur ad

## ARTICULUM V.

### DE

## DOLORE OCULORUM.

### CAUSÆ.

**D**olent etiam non raro Oculi varii in casibus, tam quando inflammantur, quam etiam, si lachrymæ aut lymphæ eosdem humentans acrior & acido-salfior fuerit, unde rosio, morsicatio, dolor, & rubedo. Pertrahunt huc res externæ quæcunque in oculos incidentes, & Oculorum Dolorem insistentes.

Patiuntur etiam Oculi Dolorem ex rebus intrinsecis illapsis, & ex lachrymis acrioribus seu lymphæ salfioribus: Hi posteriores Dolores parum habent in recessu.

### DIAGNOSIS.

Malum per se patet in diagnosi.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Dolor in bulbis Oculorum, sine ophthalmia, funestissimum signum est, si in principio morbi acuti egredi tali conquerrantur; mox enim delirium & convulsionem adfunt, quod sæpius observavi.

Ceterum nihil est, quod addam, nisi id, quod superius P. 1. Sect. 18. Cap. 1. Artic. 19. monui in Ophthalmia.

### CURA.

In Cura sublata causa tollitur effectus, curata ophthalmia cessat Dolor. Adedque si res externæ in oculos illapsæ fuerint, quantocius eodem remouendæ; in quem finem convenit imprimis homini semen oculi immixtum, quo ipsum à lymphæ oculari humectatum reddit mucilaginem, qua inviscantur ea, quæ in oculos inciderunt, & ita extrahi possunt. Item Perla parva, vel parvus lapillus cancri, immittatur in Oculum, & hinc inde facta agitatione elici solent; quæ inciderant: vid. WORMIUS. Magnes admoveatur oculo in scobe Martis aut scoria chalybis: conf. HILDANUS Cent. 1. Obs. 13. & Cent. 5. Obs. 21. Quomodo aliàs instrumentis chirurgicis externa ista ex oculis eximenda sint, vid. HILDANUS Cent. 2. Obs. 13. Cent. 4. Obs. 17.

In inflammatione à causa interna, hæc ipsa appropriatis curanda venit, in specie propter Oculorum dolorem: præter remedia superius notata in Ophthalmia, decoctum pomorum dulcium applicetur, idque solum, si sit à causa interna, vel sociatum cum albumine ovi bene agitato, si sit à causa externa. Expertum quoque est sequens collyrium Hildani:

24. Mucil. sem. cydon. cum sperm. ran. extr. ʒij.  
Campb.

Vu 2 Craci



Crocian. gr. v. vel vi.

Misc.

Imponatur oculis cum linteis multiplicibus instar collyrii.

Aqua Foeniculi cum saccharo Saturni ardore in Oculorum dolore tollit: si addatur parum camphoræ, erit magis potens.

Vel

℥. Aqua Chelidon. maj.

Flor. Cean.

Caicatr. an. ℥j.

Vatrioli. alb. gr. xij.

Soluta filtrantur per chartam adde

Tur. præp. ℥ss.

M. S.

Collyrium.

Cum linteis imponitur oculis.

Singulari est experimentum radix morsus diaboli, si scilicet quinque tales radices sunt decrefcente collectæ appendantur in fine de collo patientis; tunc enim fit, ut tollatur mirabiliter nimius dolor, &amp; omnes exacerbationes Oculorum effectuum impedit &amp; aufert. Experimentum hoc est quorundam in casibus, ubi alia incassum sunt adhibita.

Sic & arteriotomia in Oculi hoc dolore subinde administranda venit: Videantur BARTHOLINI *Acta Hassniens. Volum. 1. pag. 13.* Si addit lymphæ corrosiva in oculo, vel lachrymæ acriter, adhibeatur in specie Tutia præparata aut, flores Cinci, ac loco hujus flores Jovis secundum manu ductionem ZWELFERI parati. Hi cum collyriis applicari, absorbendo acrimoniam lymphæ, corrigunt & temperant; qua ratione etiam in Epiphora dolorosa applicari potest. His omnibus præfertur Cataplasma resoluens & discutiens ex pomis dulcibus, quod omnes Practici unanimi consensu mirè deprecant & commendant, applicando oculo dolenti; verbi gratia:

℥. Pom. dulc. cod. &amp; express. vel sub ciner. assat.

Num. iij.

Album. ovi coagul. Num. j.

Sacch. albiss. ℥ij.

Campb. gr. x. vel xij. ad xv.

Crocigr. v.

M. f. Cataplasma oculis imponendum.

D. S.

Puls. leniens.

Vid. supra de Albugine, &amp; Colleg. Jonston. D. MICHAELIS.

Si sit malum à causa externa, applicatur cum albumine ovi bene inuicem mixtis & agitatils; si sit à causa interna, albumen commodius omittitur. Convenit in quovis undecunque nato Oculorum dolore, etiam inflammatorio. Experimentum fuit TIMÆI *van Gulden-Klee in Cas. pag. 48. vid. Chirurg. BARBETTE pag. 150. 151. & 188. Item Armam. Chirurgic. SCULTETI Observ. 23* qui egregias de hoc cataplasmate vires recenset; HORSTIUS *Observ. pag. 443. Idea Formular. Class. 3. §. 23. & Colleg. Formular. p. ...* Pro optimo euporisto habet BORELLVS *Cent. 1. Observ. 31. sequens.*

℥. Album. ovi.

Et cum Aluminis feussulo, tandiu agitur, donec pulvis consistentiam acquirat: postea linteo subtili involvantur, &amp; scuto clauso palpebræ imponatur, sæpè rehouando.

Specialis est dolor, qui oculos subinde affligit, estque sensus vehementissimæ compressionis & quasi simul ejusdem lacerationis, sine manifesta oculi læsione vel alteratione. Urget vesperi, & mane quando surgunt, sætim interdum lineolæ rubræ in & circa membranas oculi hærent. Subinde sine causa manifesta urget. Credo esse quasi affectum spasmodicum tunicarum oculi. Dolor hic compressivus & lacerativus curatur per aquas ophthalmicas antimoniales quascanque, ex infuso antimonii, vel vitri antimonii, vel capitis mortui butyri antimonii, vel croci metallorum (vid. de Ophthalmia supra l. a.) cum aqua spermatis ranarum vel fragorum: quibus commodè addi possunt Cerussæ vel sacchari Saturni ana ℥j. ad ℥ss. vel ℥ij. subtilissimè pulverisati; Item fomenta POTERII in *Cent. 3. cap. 9. ex decoctis ophthalmicis extra adhibitis.* Decoctum radicis lapathi majoris quotidie potum, oculisque illitum, tanquam singulare commendatur: Item verberna, feniculum, euphrasia, rosa, sumach, tutia in aqua & vino decocta applicata; vel ad imitationem HILDANI,

℥. Mucil. sem. Plantag. vel sanagr.

Cydonior.

Hormini seu scleræa, cum sperm. ran. exte. an. ℥j.

Crocigr. vj.

Campb. gr. iv.

Quæ mixta applicentur contra dolorem.

Quibus quidam & lac muliebre addere solent: vid. HILDANVS lib. 1. *Observas. 2. pag. 13. Folia item Nicotiana recentia leviter confusa oculis imposita, vel haberi non possint recentia, accipiantur sicca, macerata nonnihil in vino vel spiritu vini, applicentur; Sic enim ratione salis volatilis oleosi dictum Dolorem solvunt. Uterius saccharum Joviale cum aqua rosarum mistum, & instillatum, est nobile ophthalmicum, quod mirè commendatur à LINDANO in oculorum doloribus: Ficta: Saccharum albißimum vel candisatum in mortario vel scutella stannea cum cochleari stanneo teritur usque ad exulitatem. Saccharum hoc Joviale singulare fuit LINDANO ad quoscunque oculorum affectus, in specie affectus dolorosos: Vel*

℥. Aqua plantag.

Fenicul. an. ℥ss. vel ℥vj. ad ℥j.

Sacch. Jovial. Lind. ℥j. vel ℥ij. ad ℥ij.

Tutia præp. gr. vij. vel viij.

Crocigr. iij. vel iv.

M. pro Collyrio contra huiusmodi dolores usurpando.

D. S.

Collyrium leniens.

Solummodò etiam saccharum Joviale instar pulveris insufficitur.

Huc pertinet dolor superciliaris periodicus, arthriticis imprimis familiaris, cum vesicatorio retrò aurem curatus, qui vid. in M. A. N. C. *Ann. 3. Obs. 252.* Hic enim dolor prognosticat brevi ingruentis arthritidis aut iam factæ.

## ARTICULUS VI.

## DE

## AURIUM DOLORE.

**D**olent etiam subinde Aures graviter in Otalgia, Germ. Ohrzwanges, idque imprimis ratione membranæ interpe, meatum auditorium investientis.

## CAUSÆ.

*Causa hujus Doloris est vel frequentissime Inflammatio, de qua jam supra suo loco dictum fuit, juncta cum sensu ardoris ac pulsationis, subinde lancinationis molestissimæ, cum sensu æstuationis in regione externa: & quidem, licet non videatur primitus Dolor ab inflammatione, tamen superveniente puris fluxu & levamine, res ipsa se prodit. Conf. in specie, quæ notabiles aurium dolores cum curatione notant, M. A. N. C. *Ann. 6. Observ. 82. pag. 117.* Vel est humor acris & salsus, membranam internam pungens & admodum corrodens; item, lymphæ catarrhalis viscosa, aut nimio acore imprægnata. In catarrhalibus affectibus, per errorem distributionis ad aures delata, quæ ad otalgiam disponit, & lancinantem dolorem infert. Eundem dolorem etiam infert iste humor, ex quo naturaliter concrefcunt cerumina, depravatus, qui si præternaturaliter reddatur acris & salsus, membranam internam pungit & nonnihil ærodit, & sic Aurium Dolores infert. Dixi humor, ex quo naturaliter concrefcunt cerumina: nam utur hæc ipsa cerumina sub consistentia spissiore flavescunt, naturaliter in adultis dicantur amarescere (unde egregium adeo est vulnerarium & ulcerarium), quæ in infantibus dulcescunt; prima tamen eorum genesis est ex quodam humore tenui seu lymphæ; quod ex eo patet: si quis cerumina aurium expurgans cum stylo alitids intruso vellicaverit membranam meatus auditorii, tunc humor tenuis roridus fluere percipitur; quod etiam digito profundius immisso per se patet: Imò si copiosius forsan fluat in aures, apertè sensu fluxionis percipi potest. Hic*



Hic ipse ad exteriora Auris effusus resolutur per aerem , & inspissatur tandem in sordes crassas , quas nos Cerumina vocamus . Tandem sunt etiam vermes , nunc in aures irrepentes , nunc etiam interdum in ipsis auribus geniti , inde ex auribus etiam ad ipsum cerebrum penetrant , qui non raro atroces Dolores Aurium , eosque varios , inferre solent , cum sensu rofionis , punctiori pruritus ; item cum sensu reptionis seu progressu vermium in interiori auris meatu : Vid. PANAROLLUS *Pentec. 4. Observ. 27.*

### DIAGNOSIS.

Ex modo dictis facilia sunt signa : Nam uti videri est , Otalgia cognitio patet ex relatione ægri , saltim causarum distinctio probe attendenda .

Si Dolor sit ab inflammatione , adest dolor pulsatorius , coniunctus est sensus ardoris in aure , subinde etiam auris externa rubet .

Si sit ex alia causa humerosa , Dolor sine ullo insigni ardore , cum levi saltem pulsatione , percipitur , & Dolor tantum acutum , pungens & quasi perforans , in Auribus adeste solet .

Considerentur simul signa affectuum catarrhallum , capitis gravitas , &c. item dolor à tali causa nunc acerbior & gravior , nunc remissior esse solet ; item per diuturnitatem se manifestat .

Vermes etiam facile patent ; percipitur sensus rofionis aut punctura ; item percipitur subinde pruritus à vermicibus , interdum etiam reptionis seu progressus sensus in auris internum meatum percipitur ; obseruentur simul circumstantiæ antecedentes .

### PROGNOSIS.

Aurium Dolor , præsertim inflammatorius , admodum periculofum malum est ; atrocior enim si fuerit , deliria , gravia cerebri pathemata ipsam interdum etiam mortem inferit ; idque ed magis , si in profundo affectus hæserit , & magis magisque nervorum acusticum afficiat .

Infantibus frequens malum esse solet , & quod facile superuementi materiæ cuiusdam plus minus purulentæ excretioni se jungit , seniores verò gravius & periculosius laborant .

Reliqui Aurium Dolores levis momenti esse solent , utut graulter torquant ægros .

### CURA.

Quoad Curam : varietas causarum obseruanda est , Imprimis distinguendus est Dolor inflammatorius Aurium ab aliis eorundem doloribus . De Inflammatione supra p. 1. dictum . In specie tamen , vel in genuino Doloze , vel eo , qui supervenit Otalgia , expertum est cataplasma ex cepis Faventini , quod FORESTUS in lib. 12. *Observ. 1. & 4.* describit : Nempe

℞. Cep. sub ciner. calent. coct. ℥.

Assat. No. j.

Olei Chamomill. ℥ij.

Anethi,

But. rec. an. ℥b.

Croci ℥j.

Misc.

Sub forma cataplasmati applicetur extrinsecus auri affectæ ; quo aliquot tales acerbissimos aurium dolores conjunctos cum odontalgia feliciter curavit .

Item cepearum assatarum succus cum oleo irino expressus laudatur *Observat. 2. l. 4.* In genere etiam Dolorem Aurium sistunt fomenta ex anodynis & emollientibus in lacte coctis , ut radice althææ , semine sænugræci , Boribus chamomillæ , meliloti , betonicæ , &c. applicata , præsertim si malum sit à causa externa : Vid. HIL-  
DANUS *Centur. 1. Observat. 5. & 6.* Item FORE-  
TUS lib. 12. *Observat. 3.* Convenit etiam oleum cha-  
momillæ , rosarum , rutaceum ; etiam oleum , in quo cancri fluviatiles incocti ; per alcali enim olei acidum de-  
struitur : cui in Doloze inflammatorio nonnihil campho-  
ræ addi potest : Item fumus Nicotiana cum fistula inver-  
sa auri immixtus etiam confert ad Dolorem Aurium com-  
pescendum ; vel folia nicotianæ , aut recentia , aut aqua  
appropriata vel spiritu vini vel vino macerata , parum

Estnull. Oper. Tom. II.

contusa auribus applicata , Dolorem promptè sistunt . Præ-  
ceteris utilia sunt olea auribus instillanda , ut oleum ovo-  
rum , insectorum , asellorum , oleum scarabæorum , oleum  
scorpionum . Nempe aselli in oleo violarum , aut nymphææ ,  
vel communi , si infundantur & ebulliant , præstans est  
remedium anodynum in quocunque Aurium Doloze ,  
etiam inflammatorio , auri instillatum . Non cedit hic  
oleum scarabæorum , si scilicet hi contusi aut vivi injiciantur  
in oleum rosaceum vel simplex cum aqua pauca , &  
ad aquæ consumptionem coquantur , hinc exprimantur ;  
vel vivi in oleo nymphææ infundantur . Præ ceteris ex-  
pertum est remedium oleum scorpionum , ritè paratum  
per diuturnam digestionem in sole , cum bombace loco  
dolenti applicatum , vel solum , vel mixtum cum di-  
midio olei amygdalarum : Hæc enim duo olea auri-  
bus , decumbente ægro super aurem sanam , mirificè con-  
ferunt .

Vel

℞. Olei scorpion. ℥j.

Amgd. dulc. aut , si opus est aliquali de-  
terfione , amar. ℥b.

Destill. Anisi.

Carvian. ℥b.

M. D. S.

Oleum leniens .

De mistura hac blandè calefacta auri dolenti instille-  
tur , ægro in aure sana recumbente , aut etiam cum bom-  
bace paulò profundius immittatur ; quibus non inferius  
est , oleum lumbricorum rectè paratum .

In Doloze Aurium , ubi aut adest inflammatio , aut  
merus est , ne inflammatio superveniat , optimè præscri-  
bitur hocce :

℞. Succ. semperv. maj. ℥ij.

Olei scorpion.

Lumbr. terr.

Chamom. an. ℥j.

Mista instillentur aut saltem cum bombace his oleis  
intincto auris obturetur : egregiè confert in ejusmodi do-  
lore .

Singulariter etiam non tantum ad Dolorem aurium ,  
sed etiam simul ad surditatem , laudatur bulbus seu radix  
panis porcini aut cyclaminis , quam excavant in forma  
scutellæ , & oleo liliorum alborum aliore appropriato re-  
pleant , ad ignem relinquunt usque dum probe cocta fue-  
rint : post coctionem integram radicem benè exprimunt ,  
& de liquore expresso auri dolenti vel immittitur , vel cum  
gossypio applicatur . Porro , ubi nulla est inflammationis  
suspicio , vel nullum ejusdem signum apparet , præter di-  
cta ; ( nam hæc conveniunt in omni Aurium Doloze )  
Imprimis olea destillata vegetabilia conveniunt , quæ in-  
terfunt oleum destillatum origani . Convenit itidem oleum  
castorei , item Decoctum caryophyllorum aromaticorum  
in vino auri instillatum , ipso caryophyllo desuper ap-  
plicato : Etiam confert ad dolorem ex lymphæ crassa .  
Urina etiam pueri recens , aut potius ejus spiritus phleg-  
maticus non adeo acris , auri instillatus est egregius , item  
spiritus otalgicus Mynsichti , qui est egregius spiritus , &  
optima compositio , aut spiritus otalgicus BARBETTE  
in Anat. Pract. lib. 2. cap. 1. cujus compositio elegans est  
hæc :

℞. Ovor. formic. maj. No. C.

Castor.

Pulp. colocynth.

Majoran.

Sabin.

Abfinth.

Rutæ an. M. j.

Sem. Cumini ,

Anisi ,

Feniculi ,

Carvian. ℥ij.

Bacc. lauri exc.

Juniperi. an. ℥b.

Corr. mali Pun. ℥vj.

Rad. belleb. nigri ,

Cyperivor.

Raphanimin.

Cyclam. an. ℥j.

Cep. medioer. No. vij.

Amgdal. amar. ℥ij.

Infund. in spiritu Vini q. s.



Per Balneum mariae abstrahatur.

Aut extracta saltem Essentia auribus instilletur, vel cum bombace applicetur.

Spiritus hic quoque non tantum in obauditione à quacunque causa sine inflammatione, sed etiam in tinnitu aurium & surditate est egregius, si duæ vel tres guttæ instillantur, & postmodum auris obturetur cum bombace moschato aut ambrato: nam & hæc admodum commendantur in aurium affectibus, de quo postmodum. Quibus si gravior in malo non cedat, aut ubi dolor est nimis acutus, in spiritu hujusmodi otalgico aut alio, aut tantum spiritu vini tartarifato, dissolvatur parum opii vel laudani opiat, vel addatur tantillum essentia opii, & ita hoc modo auribus instillantur; sed cautè hoc fiat, ne auditum lædamus. Conf. FORESTUS lib. 20. Obs. 1. 3. & 4. Interdum fumus tabaci auribus insufflatus antiquos & inveteratos dolores promptè sistere solet. Denique oleum à ligno coryli destillatum item oleum ligni buxi, acerbissimos aurium dolores subito sistit: sed olea scorpionum & asellorum instar omnium sufficere possunt.

Præsentissimum remedium ventilatur, si ex ceruo excius globus sumatur, latèque tundatur, & postea auris comprimatur.

Si Dolor Aurium à vermibus fuerit, ille quanto citius eliciendi sunt vivi, aut intus enecentur, & ita extrahantur; dolor enim tunc vagè lancinans, hinc inde rodens, percipitur. Lac tepidum auribus cum spongia aut linteo extrinsecus applicatum, dulcedine sua vermes allicit, ut ita prodeant; vel lac infundatur in aurem, vid. PANAROLLUS Pentec. 4. Obs. 27. qui notat dolorem aurium intensissimum per lactis infusionem, evocatis vermibus curatum. Pomum etiam dulce assatum auri applicatum simili modo convenit, uti refert PANAROLLUS Pentec. 4. Obs. 27. His non sufficientibus interficiendi sunt. Interfici vel angit eisdem succus absinthii, aut centaurei minoris, aut cucumeris asinini, aut foliorum persicorum, item oleum nucleorum persicorum recenter expressum, amygdalarum amararum, diacolocynthidis Quercetani; quibus aliquantulum mercurii dulcis addi potest.

Vel

℞. Olei Nuc. Persic. rec. expr. ℥j.

Diacolocynth. Quercet. ℥ss.

Mercurii dulc. gr. vj. ad ℥ss.

M. probe. S.

Oleum contra vermes in aure.

Guttatim instilletur, vel cum bombace immittatur auribus.

Vel aqua Hermetica, h. e. aqua hyperici vel graminis, in qua Mercurius vivus purificatus aliquantulum bullierit, vel cum qua probè agitatus fuerit, decantata à Mercurio vivo auribus instillata aut injecta, non erit inconveniens. Elixir proprietatis ratione myrrhæ & croci, si duæ vel tres guttæ instillantur auribus, etiam conducit ad evacuandos vermes, vel injiciatur Decoctum ex summitatibus absinthii, aloë, vel aliis, mediante siphone pro eluendis auribus; e. g.

℞. Aloës ℥ij.

Myrr. ℥j. ad ℥ij.

Colocynth. ℥ss.

Summ. Absinth. M℥.

Coq. in f. q. vini vel aquæ comm.

Colatura detur pro Injectione in aurem: S.

Injectio in aurem contra vermes.

Vid. BARBETTE Anat. Pract. lib. 3. cap. 1. pag. 110.

Suffusus myrrhæ auribus receptus, & ipse vermes evocat, item infusus seminis nigellæ in aqua vitæ, sive spiritu vini cum bombace auribus applicatum multos vermes eduxit, uti hoc observat SCHENCKIUS. Pro vermibus aurium commendat Agricola sequens unguentum:

℞. Salis Jupit. (salis Saturni)

Cerum. aur.

Olei nuc. Coryli expr. an. part. æqu.

Misc.

Cujus felicem usum expertus est contra dolorem aurium.

Aliàs etiam oleum destillatum corylinum omnes vermes aut enecat aut expellit.

Suffumigia amara cum antimonio juncta non auribus tantum, sed etiam ore & naribus excepta eosdem vermes

expellunt; est enim meatus ex auris concha in os, teste SALMUTH. Cen. 2. Obs. 39. Quo facit etiam unguentum HARTMANNI ex pinguedine capi, oleo coryli & mercurio sublimato aut dulci; nam & hoc egregiè aut enecat aut expellit vermiculos. Vel etiam ex semine hyoscyami cum cera formentur parvæ candelæ; quæ accensæ, aut carbonibus injectæ, spirant fumum, qui auribus exceptus mox vermes expellit. Oleum destillatum juniperi, item balsamum sulphuris terebinthinatum, enecat animalia in aurem ingressa; sicuti etiam suffusus gummi ammoniaci quædam ejecit: Conf. M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 266. pag. 480. si gryllus in aurem irrepserit, oleo infusionis gryllorum denuò ejicitur: Vid. M. A. N. C. Ann. 4. Observ. 50. pag. 44. In specie si musca ex improvviso irrepserit, accipiat Terebinthina, eaque cum bombace & stylo immittatur in aurem, & inviscata musca extrahatur. Quod si ex improvviso bryo in aurem irrepserit, tunc subito auris externa perfundatur sanguine recenti cujusdam animalis, sic enim ad sanguinem prorumpunt hîrudines, & ita egrediuntur, qualem historiam habet BARTHOLINUS Cent. 4. Hist. 74. Vel injiciatur aqua solutionis salis communis. Quod si pulex in aurem se insinuaverit, laudatur à RIVERO globulus ex pilis caninis compositus, extrinsecus auribus applicandus, vel cum stylo in aurem immittendus; pilis enim subito pulices se insinuant & extrahuntur.

## ARTICULUS VII.

De

### CEPHALALGIA.

PRæ aliis multiplex & sæpius sævus est dolor, qui caput crebrius affligit, in genere Cephalalgia dictus, non quod caput integrum doleat, sed tunc saltim ista capitis suprema pars, quæ ossibus cranii circumscribitur; nam reliquæ partes in capite dolentes peculiaribus serè appellantur nominibus. Et quidem in dicta parte capitis, quæ circumscribitur ossibus cranii, membranae sunt solummodo ex fibris nervis multiplicibus, cruciatim sitis, sensibilibus contextæ, & ex istis natæ nervorum tunica; uti & istæ membranae, quæ varias cerebri cavitates & anfractus investiunt, quæ in dicto dolore primariò cruciantur seu afficiuntur, eaque tam externa, cranium & caput, quàm interna, cerebrum in ejusdem ambitu, cingentes. Unde dolor capitis alius est internus, qui saltem meningis in toto sui ambitu solet affligere, & externus, quando externæ saltem membranae dolent, de quo optimè scripsit WILLISIUS lib. de An. Brutor. Part. 2. cap. 1. & 2. pag. 180. cujus etiam vestigia sequemur.

Quoad internas membranas: hæc sunt dura & tenuis meningis, utut de hac propter ejus tenuitatem dubitet LINDANUS. Dura verò mater seu dura meninx duplici constat tunica, per quam vasa sanguifera multis anfractibus, imprimis ex vena jugulari, transeunt, donec perveniant ad vasa capitis, & tunc ad cerebrum; hinc non potest fieri, quin pro vario sanguinis statu molestantur hæc membranae. Si igitur dilatentur vasa à sanguine, necessario dilatatur tunica, & divellitur ejus duplicatura; Unde necessario sic insequitur Dolor capitis. Utut autem caput omnis generis patiatur dolores, in specie tamen ordinario pulsatorii & tensivi esse solent, qui hanc membranam affligunt, quæ ipsa etiam per consensum pericranium capitis afficere solet; interna enim tunica seu pia mater minus dolorosa videtur propter nimiam sui subtilitatem. Jam verò cum membrana ista dura comitetur nervum opticum usque ad oculum, & ibidem tunicam quandam, sclerotidem nempe, constituat, ob id frequenter in graviore Capitis Doloze ipsi etiam oculi intensè dolere solent; hinc est Dolor Capitis internus.

Quoad Capitis Doloze externam: sit hic, quando saltem membranae cranii, speciatim pericranium, hinc panniculus carnosus, muscull, ipsaque aded cutis, vel per consensum duræ meningis, vel propter læsionem externam in contusionibus aut concussionibus, aut similibus ex causis externis, afficitur; item quando materia præternaturalis recrementosa ibidem colligitur, uti in



uti in iure Venerea fieri solet, acerbè dolent, qui dolor externus faciliè tactu externo perceptibilis & sensibilis. *Subiectum* ergo quod dolet in capite, non est cerebrum, neque cortex, neque medulla, sed saltem membrana in & extracranium existunt: Unde frequens est dolor capituli tensivus & pulsatorius; extraordinariè autem solet esse lacerans & lancinans; sicuti etiam dolorem pundtorium, & ostocopum caput perferre solet.

Dolet autem caput nunc uniuersum, totus nempe ab ossibus cranii tractus circumscriptus, atque tunc generaliter *Cephalalgia* audit, qualis iste est dolor, qui subinde homines post crapulam, vel sub aerismutationibus, vel in febribus ardentibus & intermittentibus, vel alia simili causa affligit, quique secundarius est, & nunc incipit, nunc occipit (quod tamen rarissimè contingit) magis affligit. Quod si verò Dolor talis capituli uniuersalis sit grauior, diuturnus & contumax, mutato nomine *Cephalaea* dicitur, & causam ut plurimum agnoscit fixam in ipso capite, aut certè eo loco radicatam & fixam. Quod si dimidium saltem caput, imprimis ratione futuræ sagittalis, quæ caput in partem dextram & sinistram dirimit, vehementer & pertinaciter tantum doleat, ita ut altera medietas sit indolens, est *Hemicrania*, ut plurimum diuturnior & admodum contumax. Quod si unica tantummodo pars capituli inter sagittalem & temporalem futuram afficiatur, dicitur *Ovum*, à magnitudine nempe loci affecti, quæ ovum non excedit. Quod si dolor porro in uno paruo sit loco, contumax tamen & fixus, quasi clavus ibidem sit intrusus, dicitur *Clavus*, sola magnitudine partis affectæ ab ovo differens. Dolor item in ovo est maior, in clavo minor; ovum idem per vices solet intendi & remittere, clavus verò non item; est enim ferè continuus eodem modo durans & affligens, nisi à causa externa, forsitan intendatur. Tandem, utut frequens percipiatur dolor in syncipite, interdum tamen solum occiput dolet, idque frequentius in mulieribus, qui dolor muliebris ferè conjunctus est cum sensu frigoris illius loci, quasi glacies intra calvariam esset recondita. Talis dolor fit imprimis per consensum uteri, & rarè fallere solet, quin ut plurimum ex utero oriatur, utut connexionis ratio haud æquè nota sit, & interdum etiam senes mares affligat: Imò quoque senes, tam mares, quàm vetulas, talis dolor occipitis solet affligere, qui tamen ex alio est fonte.

Ab adjuncto *Cephalalgia* vel calida, vel frigida dicitur: *Calida*, prout nempe sanguis vel ipse magis fervet, vel ex membranarum spasmio circa capituli partes, præsertim anteriores, magis detinetur; tunc enim caloris manifestus sensus, præsertim circa frontem, percipitur: *Frigida* e contra dicitur, ubi nil tale occurrit, sed potius frigus sentitur, aut saltem gravedo capituli adest.

## C A U S Æ.

*Causa* hujus, quemadmodum omnis doloris, est, quicquid fibras dictarum partium distendere ac rodere valet: quod quia à quamplurimis causis nunc immediatè magis, nunc mediatè fit, distinguenda est ante omnia *Cephalalgia* in eam, quæ est per essentiam, ubi vitium & origo mali hæret in ipso capite, v. g. dum caput dolet ex vulnere, contusione capituli &c., ab ea, quæ est per consensum, quando nempe vitio, aut massæ sanguineæ, aut partium quarundam inferiorum, caput dolet & compatitur; estque hæc *Cephalalgia* omnium frequentissima in Praxi, quæ verò fit per essentiam, contumax magis, & ferè *Cephalaea* esse solet.

Per consensum partium inferiorum fit *Cephalalgia* absque ulla vaporis aut humoris transmissione atque ascensu, utpotè à WILLISIO aliisque Neotericis refutato, sed simpliciter per solam communicationem membranarum & nervorum cum partibus aliis membranosis ac nerveis spasmodicam, intercedente simul certo nervorum conjugio. Nam sicuti ex contusione capituli aut gravi cerebri ejusque membranarum vulnere concitatur vomitus vehemens solo consensu; & sicuti ex jejuniis in hypochondriacis concitatur vertigo in cerebro, interdum etiam in quamplurimis *cephalalgia*; solo consensu cum stomacho; ita etiam ex solo consensu ventriculi cum cerebro ejusque membranis, dolor inten-

sus excitari potest: quod confirmat FORESTUS lib. 9. Observ. 46. ubi juvenis biliosus, cum jejuniis ambularet, dolore capituli tentabatur; assumpto verò pauxillo cibo subito omne malum remittebat. Ac sanè fit non alio modo, quàm per spasmos alibi inceptos, & nervorum ac membranarum ductu in caput usque continuatos: sic enim per consensum dolores oriuntur: vid. WILLISIUS de Anim. Brut. Pars. 2. cap. 1. *Cephalalgia* ex liene & ex hypochondriis nil frequentius; quia lien copiosus nervis est dotatus, ratione quorum & ejus constitutionis membranaceæ, ejus spasmus *Cephalalgiam* inferre solet. Par ratio est, quando per consensum uteri fit *cephalalgia*: vid. FORESTUS lib. 9. Observ. 51. RIVIERIUS Cent. 2. Observ. 56. & RIEDELIUS Observ. 10. BARTHOLINUS in Hist. Pannonicam observat mulierem, quæ hemicraniam semper affligebatur, cum utero non gereret; quando verò conceperat, nihil sensit. Imprimis quando mulieres dolore in occipite laborant, Practici dicunt, laborare uterum: siquidem cum utero membranoso, ejusque partibus ipsi connexis, uniuersum systema nervosum & membranosum consentit; id quod patet in nixu parturientium, in quo sæpè ob consensum membranarum & reliquarum partium nervosarum convulsio epileptica superuenit; ita etiam ex vitio uteri partiumque vicinarum quocunque sensiles cerebri membrane graviter affici per consensum, & hinc dolere possunt. Sunt enim membranæ quæcunque totius corporis continuatæ & connexæ membranæ, cerebrum involventibus, adeoque faciliè pars una alteram per consensum ex spasmio afficere potest: vid. D. CROON, Medicus Angliæ Londin. de Motu muscutorum, in WILLISII Tr. de Nervis adjunctus, qui Anonymus ille Autor est.

Ex omni *cephalalgia* per consensum frequentissima est ista, quæ fit ex stomacho, ejus hinc inde variè prostant observationes: Vid. FORESTUS lib. 9. Observ. 44. 45. 46. WILLISIUS l. a. cap. 1. pag. 303. & 305. & LOTICHIUS in Observat. Sic dolore immanem capituli à phlegmate acido in stomacho cum vomitu conjunctum observat THONERUS in Observat. pag. 141. Quando enim vitiosa recrementa in stomacho sunt, solent inferre graviores *cephalalgias*. Uti etiam BORELLUS Cent. 2. Observ. 1. ex hoc fonte hemicraniam observavit; quod rarum est. In specie in iis, qui laborant *Spasmodicâ* stomachi, item in hypochondriacis & similibus, frequentissimi sunt capituli dolores & tensiones circa frontem per consensum stomachi, imprimis mucilaginis acidæ infarcti, & partium vicinarum membranacearum; percipiunt enim semper simul tensionem circa hypochondria. *Cephalalgia* hujus exempla videb. apud FORESTUM Observ. 48. 49. ac RIVIERIUM Cent. 1. Observ. 11. Interdum philtre ineptæ *cephalalgias* crudeles inferunt: Duo exempla hujus rei refert LOTICHIUS in Observat. pag. 152. 154. Porro hemicranie per consensum causa subinde est dens cariosus: Conf. THYRMAYER Conf. lib. 2. pag. 128. & HILDANUS Centur. 2. Observ. 10. Estque omnino dolor per consensum saltem sensitivus, & hinc pundtorius ac pulsatorius. De utero supra dixi, quod frequentissimè inferat *cephalalgias*, in specie quæ occiput occupent, & sensum glaciæ representent. Præter uterum renes affecti, imprimis calculo obsessi, per consensum *cephalalgiam* inferunt: Imprimis in BARTHOLINI Cent. 4. Epist. 6. curiosa est observatio hemicranie illius lateris, ejus lateris reo calculo erat obsessus; sic ex dolore nephritico similes *Cephalalgias* observavit FORESTUS lib. 9. Observ. 51. in scobol. Quæ fit propter nervos affectos, qui in renibus dolorum sunt organa, ortos ex plexibus mesenterii, qui eorum surculos derivant ad stomachum & intestina, unde per consensum afficitur propter spasmum. Tandem & vermes intestinorum subinde contumaces *cephalalgias* inferre solent: Vid. FORESTUS l. a. Observ. 47.

Hæc sunt *Cephalalgia* & *cephalæ* per consensum.

*Cephalalgiam* verò per essentiam quod attinet: fit, quando malum & radix doloris ipsum caput occupat, qualis est v. g. in clavo & ovo. Talis dolor capituli per essentiam est frequentissimus in hemicrania, non tamen semper, ubi sæpius adest stagnatio sanguinis, ejus impeditus motus in uno alterove vasorum ramulo alterius



medietatis. Nam dura mater ipsumque cerebrum in duas dirigitur partes; hinc altera tantum in hemisphæria afficitur, quod ex Anatomicis obiter noto.

Ratione causarum est vel *accidentalis*, vel *habitualis*. *Accidentalis* est, quando sine procatarxi aut dispositione prævia à causa evidente solitaria originem ducit, rerum scilicet non naturalium maloregimine, & fortuitarum incongrua invasione, v. g. à crapula, insolatione, exercitio vehementiore, contusione, Mercurii intra cranium lapidas, vel à medicamentis Mercurialibus salivantibus, vel à sumis Mercurialibus collectione. Habitualis vero, quando causa certa morbifica disposita hæret in cerebro ejusque partibus, propter quam vel continuò affligit, vel per vices, & à levissima occasione redit ille dolor. V. g. caput vulnere vel contusione graviori læsum per essentiam quidem, sed tamen sine causæ internæ fomite, dat dolorem seu hemisphæriam accidentalem: Quod si vero post vulnus curarum remaneat, vel atonia partis læsæ, vel ex nutritione deficiente, subindè recrementa quædam generentur, quibus occasionibus, aut sub omni mutatione tempestatis anni aut lunæ, sæpius redeat Cephalalgia gravis, talis per essentiam, & quidem *habitualis*, erit: Sic FORESTUS lib. 9. Observat. 34. observat Cephalalgiam post curatum vulnus diuturnam, apertâ cute cranii inventum fuit os corruptum, quo exempto, dolor curatus fuit.

Utraque hæc Cephalalgia per essentiam oritur frequenter tam à causa externa seu evidente, quàm interna & latente. Prioris generis infinitæ possunt dici, scilicet contusiones & vulnera, aeris inclementia varia, crapula, motus corporis, curæ, studia, esus castanearum, glandes quercuum, lactis potus, coriandri assumptio. Posterior vero seu interna causa habituali cephalalgia magis propria, triplicem fontem agnoscit: Est (1.) vel à sanguinis ejusque motu in vasculis cerebri plus minus vitiatum: vel (2.) à lymphæ in glandulis cephalicis vitiosis secreta aut malè distributa: vel (3.) à digestionis privatione in cerebro ejusque membranis internis & externis errore & vitio, unde generantur heterogenea recrementa, quæ Cephalalgiam inferunt: Quò in specie viscidior mucus, vermes, lapilli; abscessus, calculi, &c. in cerebro geniti pertinent: vid. WILLISIUS *Anim. Brutor. Part. 2. cap. 1.* qui optime omnia tractat, qui instat omnium. Ac sanè in habitualibus hujusmodi cephalalgis semper ferè observatur simul partis affectus debilis constitutio, & hinc facilius materiæ morbificæ occasionalis vel receptio vel generatio.

Quoad I. A sanguinis vitio, ejusque motu depravato, in specie Dolor Capitis tensivus, pulsatorius, cum insigni capitis incalescentia & distensionis sensu excitari solet. Fieri hic solet, dum sanguis aut nimis abundans, vel verè, vel apparenter in turgescencia quadam præternaturali, nempe febrili, quacunque occasione agitur, aut à suppressione solennis evacuationis coarctatus, valcula meningum harumque fibras præter modum distendit, in suo motu remoratur, & ita Cephalalgiam ex hac causa satis frequentem infert. Iste dolor Capitis, speciatim qui ex turgescencia & aucta sanguinis effervescencia oritur, semper conjunctus esse solet cum sensu pulsationis in capite tensivo, plus minus gravatius; & prout aut intensior aut remissior fuerit ista sanguinis turgescencia, etiam major vel minor percipitur Cephalalgia. Hinc est, quod tempore æstivo in nimis æstibus canicularibus, aut diuturniore sub sole mora, aut exercitio quovis corporis nimio, & ex motu sanguinis rapidiore, ejusque effervescencia nimia, sudoribus, &c. præprimis quando his frigus repentinum superveniat, excitari soleant graviores Cephalalgia: Hinc est, quod post crapulam ex nimio vini & cerevisiæ potu, præter eruditates relictas, turgidus sanguis postero die Cephalalgiam inferat, cum artuum ferè lassitudine, nisi blando sudore partim præveniat, partim curetur: Hinc est, quod refrigeratio capitis, sique impedita sanguinis transpiratio, Cephalalgiam inferat, dum retenta effluvia transpirabilia, vasa distendendo & sanguini certam turgescenciam plus minus inferendo, Cephalalgiam excitant: ut taceam ipsa transpiranda salina, partibusque membranosis infixa, dolores inferre. Pariter sanguinis occasione quælibet suppressæ consuetæ evacuationis ejus ad Cephalalgiam disponunt: Hinc hæmorrhagiarum narium suppressæ contumacissimas habituales cephalalgias inferunt: Hinc est, quod hæmorrhoidibus,

mensibus obstructis, solenni quadam sanguinis evacuatione intermissa, sæpius contumacissimæ oriuntur cephalalgia, observantibus hoc omnibus Practicis, in specie FORESTO: aut quod quibusdam mulieribus non raro uno alterove die ante mensium eruptionem Cephalalgia sint frequentes propter sanguinis turgescenciam tunc obuescentem. Speciatim febres quæcunque, tam continuæ, quàm intermittentes, benignæ pariter & malignæ, item febres Castrenses, ordinarium comitem cephalalgiam pducere solent, uti quotidie experimur; ex turgescencia, nempe & fermentatione sanguinis aucta. Huc pertinet phrenitis seu sphacelus cerebri, in quo ob factam inflammationem membranarum cerebri & corticis ejusdem, intolerabilis est dolor. Hæc & similes causæ cephalalgiam inferre solent. Facere huc videntur odores fortiores, cephalalgiam non raro inferentes: Sic curiosum est exemplum, quod ex odore moschi & ambra in viro dolor capitis ortus fuerit: Pariter non rarum est, rosarum odore iis, qui tenuioris sunt in systemate nervoso textura, Cephalalgiam inferri, quasi particulæ hujusmodi odoriferæ acrimoniæ suæ vellicent membranarum narium superiorem, & ad hæc derivata à dura matre filamena nervæ, quibus una vellicatis & dura mater simul tendi, hinc sanguinis circulus quasi remorari, & dolor hic pulsatorius & tensivus capitis superuenire solet. Quod etiam gas carbonum incensorum, item rerum fermentescensium, pertinet, suo inspiratu pertinaces cephalalgias interdum inducens.

Quoad II. Porro ad procatarxin ejusmodi spectat, causaque conjuncta evadit serum, item lymphæ, quæ aut vitiosa aut stagnans in quodam capitis loco, aut, quod sæpius fit, ex lymphæ vitio genitus humor acidus plus minus viscidus, & in quodam interno capitis loco coarctatus, aut ex nutritione membranarum vitiosa collectus, aut ex quacunque ratione in capite depositus, gravæ Cephalalgias & hemisphærias infert, cum dolore lacertante & lancinante, interdum etiam capitis gravatius, subinde tensivo, vitio lymphæ circa glandulas collectæ exgerendæ, adjuncto plus minus sensuum torpore. Curiosa est observatio hemisphæria ex his causata, per stillicidium aquæ frigidissimæ per naves coratæ: vid. MISCÉ. N. C. Ann. 3. Observat. 184. pag. 455. Hinc in affectibus catarrhalibus frequentes sunt Cephalalgia: hinc sensibus frequentes & diuturni exinde oriuntur dolores. Quin etiam contumacissimæ & subinde vix tolerabiles Cephalalgia scorbutica subinde periodica, speciatim nocturnæ, ex lymphæ vitio orti videntur, quatenus à sale acris scorbutico membranæ cerebri, tam internæ, quàm externæ, vellicatæ dolores lancinantes & lacerantes crudelissimi excitantur. Imò serum sæpius causam conjunctam Cephalalgia existere, non saltem ex observationibus Anatomicis, quas collegit PISO & RIVIERUS, alique, confirmare licet, quibus Cephalalgias sæpe pertinaces per excitationem seri diversis generis & nariibus solutas, ac lympham copiosam in cerebro post Cephalalgiam repertam fuisse constat; sed vel coram incipiens, aut dolor ex sero quidem & lymphæ successiva collectione gravatius, sed simul interdum quoque tensivus, præcedens testatur: Sic cephalalgiam lethalem à copia humoris ferosi notat RIVIERUS Cent. 1. Observat. 37. Nec, juxta WILLISIUM, improbable est, chylum, utut legitime constitutum, in capite prædispositum idem præstare, fibrasque ac membranas suo appulsu gravare, cum non saltem hujus doloris paroxysmi post totidem à passu horas repetant, sed mutata quoque viâ ratione quoad quantitatem, qualitatem & assumendi tempora, variant.

Tandem III. propriæ digestionis privatione errore quocunque, occasione internâ vel externâ vitiosa, & circa membranosa capitis loca congestæ, aut retentæ aut genitæ, subinde oriuntur Capitis Dolores, ique ut plurimum diuturni difficulter curabiles, unde in cephalgis, in hemisphæria, clavo etiam & ovo, subinde ex hoc puncto causæ perferuntur sunt. Unde dolor nunc quasi ostocopus ut plurimum simul rodens & pungens, observari solet, dum materia quedam viscida plus minus actis, vulgò dicta tartarea, aut sanguis congruatus, sub cranio quovis in loco congestus, istos dolores inferunt. Hæc materia si in altera medietate in capite hæreat, ut sanguinis motum aliquantisper impediat, inferit hemisphæriam. Mercurialia in hoc puncto sunt opti-



optima, quoniam dissolvunt & attenuant materiam caput occupantem. Unde subinde senes Decrepiti contumacissimis cephalæis sunt obnoxii, & vulgò vocantur Cephalalgæ & cephalæ à causa frigida, & in tali conjuncta est grauedo capitis seu Dolor Capitis gravativus: imò caput minus calet, quin potius friget, dolor est contumax, & qui egros nocte dieque affligit. Hinc subinde grauis Cephalalgia sunt & vermibus in cerebro ex vitiata ejus partem digestionem genitis: qualis dolor gravissimus & ferè intolerabilis subinde occurrit in febre Ungarica, quæ ipsa propter capitis dolorem istum quibusdam Vermis Cerebri dicitur, cum observatum sit, non raro vermes rejectos per nares fuisse cum levamine: vid. SCHENCKIUS in *Observ. de Febre Ungarica*, & RULANDUS *Tract. de Morbo Castrensi*; item HILDESHEIM in suo *Spicil.* aliquot refert exempla cephalæarum continuarum ex vermibus in cerebro genitis ortam; vid. BARTHOLINUS *Cent. 2. Epist. 74. & Cent. 1. Observ. 64.* ubi pariter post varias vehementissimas Capitis Dolor à verme in cerebello fuit excitatus; item *Cent. 6. Obs. 3.* Cephalæam habet contumacissimam sedatam post vermes per nares excretos. Similia exempla contumacissimarum Cephalæiarum reperietis in SCHENCKII *Observat. de Cephalalgia*: Non secus ac FORESTUS *lib. 7. Observat. 9. & lib. 21. Observat. 18.* notat Cephalæiam admodum intensam, postmodum excreto verme per nares sublata. Plura vermium post cephalæias & naribus excretorum exempla habentur in *Misc. A. N. C. Ann. 1. Obs. 99. pag. 229. & Ann. 2. Obs. 174.* apud SCHNEIDERUM de *Off. cibis. pag. 440.* FEHR in *Hiera Picra pag. 79.* BLEGNY *Zodiaco Gall. Mens. April. Obs. 3.* KERKRINGII *Obs. Anat. 43.* TVLPIUM *lib. 4. cap. 11. pag. 251.* HILDESHEIM *Spicil. lib. de Cap. affect. pag. 41.* BORELLUM *Cent. 3. Hist. 47.* HOLLERIVM *lib. 1. de Morb. Intern. cap. 54. in Schol. HILDANVM Cent. 1. Obs. 8. & Cent. 5. Obs. 1.* MONARDVM *Hist. Med. simpl. cap. 14.* MARCELLVM DONATVM *lib. 4. de Hist. Med. Mir. cap. 26.* nec non ALSARIVM in *CRUCE de Quæst. per Epist. Cent. 3. EBVSINA lib. 3. fen. 1. tr. 2. c. 3.* ex Medicorum quorundam Indorum fide, cephalæiam quandoque generari jam edocuit à vermibus in capite generatis, motu suo, tensione & læsione lædentibus, addens: Nam vermes multoties nascuntur in anteriora capite & super locum, qui est in fradura narium, &c.

Post vermes subinde etiam calculi in cerebro geniti pertinaces Dolores inferunt, qui per nares & alia loca postmodum excreti, Cephalæias levamen intulerunt: Exempla videb. in SCHENCKIO in *Obs.* & etiam BARTHOLINVS *Cent. 1. Obs. 33.* refert Dolorem Capitis sedatum post lapillos per nares excretos.

Fit interdum, ut humor quidam lentus & viscidus sapidis ex vicio digestionis ultimæ seu propriæ genitus se insinuet intra suturas cranii, quas sensim à se invicem separare, & mutuo discedere facit, cum intensissimo dolore, ut sensum spatium inter commissuram futuræ possit percipi. Exempla de hac futurarum cranii dissectione videb. in BOOTII *Tract. parvo, sed eleganti, de Affectib. omiff. cap. 4.* Exempla etiam nonnulla refert HILDANVS in suis *Obs. Cent. 2. Obs. 8.* Paria exempla refert BARTHOLINVS *Cent. 2. Epist. 74.* SCHENCKIUS in *Obs.* Mentionem etiam illius facit MINDERERVS in *Med. Militar. pag. 227.* Aliquando B. Doctor MICHAELIS in Principissa vidua Isenacensi observavit talem acerbum Capitis Dolorem, in quo manifestè cranii futura à se invicem discesserant, idque manifestò cum sonitu, ut adstantes percipere potuerint; quem tamen feliciter curavit: & tales dolores sunt pertinacissimi & intensissimi.

Porrò lues Venerea capitis dolores horrendos & implacabiles, in specie nocturno tempore affligentes, inferit: Acor enim malignus luis venereæ alimentum cranii proximum chylosum ita corrumpit, ut assimilari nequeat, sed in materiam viscidam & acidam corrosivam sensim degeneret, quæ coærvata super cranium, aut etiam sub cranio, tumores illos inferit, qui etiam in aliis ossibus reperiuntur, & Gummata Gallica vocantur: à quibus uti postmodum corroduntur ipsa ossa, & per consequens ipsum cranium, unde caries cranii, cujus exemplum, supelsum habet MEARA in *Bliss. Med. pag. 136.* ubi

habet Cephalæiam cum totius cranii carie ortam à lue Venerea, & SCHENCKIUS in *Obs. pag. 51.* qui ex cranii carie interna similiter implacabilem Capitis Dolorem notat; Ita ab istdem vicinæ membranæ corrosæ pertinaces & implacabiles dolores inferunt. Sed tamen non tantum in ipsa lue Venerea fit dolor, quin & subinde post curam luis Venereæ, post inunctiones Mercuriales minus ritè institutas, ex Mercurii virulentia, pertinacissimi capitis dolores remanere solent, ex Mercurio scilicet, nervis membranosisque partibus inimicissimo, hinc inde in capite collecto: de quo vid. POTERIVS *Cent. 3. Curat. 6.* qui habet Dolorem Capitis contumacem, concitatum abusu hydragryri, quem curavit per decoctum chinæ cum oleo Sulphuris subacido. Talia exempla ex Mercurio post curatam luem Veneream observat RIVERIUS *Cent. 2. Obs. 91.* item in *Obs. commun. ZWINGER. in Theatro Vita Hum. Tom. 1. fol. 520.* ex CARDANO de *subtilit.* Idque partim ex reliquo, non satis salivando evacuato, partim ex ipsa Mercurii malignitate, partes nervæas afficiente: quas Cephalæias Mercuriales curavit per nummum aureum in ore detentum, ut scilicet mercurius præceps ad aurum accurrat, & ita extra corpus eliminetur. Dolor hic Capitis ex lue Venerea nocturnus magis est, & in uno loco instat clavi affligit.

Interdum abscessus interiores capitis partes occupant, qui ipsi contumacissimas Cephalæias inferunt, & abscessus hypocranii dicuntur. De his non paucæ prostant observationes Cephalæiarum, per excretionem puris per os, nares, oculos, aures, &c. solutarum: vid. BORELLUS *Cent. 1. Obs. 73.* & WILLISIUS de *Anim. Brut. Part. 2. pag. 203. Edit. Amst.* In specie BOOTIUS de *Affect. omiff. cap. 1.* ex abscessu pericranii gravem & continuum Capitis Dolorem refert. Similia exempla hinc inde etiam reperiuntur in BARTHOLINO, ubi intensus Capitis Dolor refertur, excreto per nares pure sedatus: Sic SCHNEIDERUS *Observ. 223.* refert Cephalæiam crudelissimam à pure intra ossa cranii latente. Abscessus hi non semper ex causa externa, sed frequentissimè vicio digestionis vitiata oriuntur.

Juxta abscessum sub cranio locisque vicinis, subinde læsiones capitis externæ, contusiones, vulnera, casus, gestationes ponderis seu oneris gravioris in capite, & similes causæ, etiam curatæ, diuturnas Cephalæas & Hemicranias post se relinquunt, quatenus aut cranium ipsum insignitè lædunt, aut pericranium, vel fibras sacutarum duræ meningi continuatas; aut quatenus fissuram quandam in cranio inferunt, imprimis in interiori lamina; unde humor seu succus nutritivus extra duplicem lammellam per istam fissuram pedetentim destillat in tunicas cerebri, ibique corruptus, hinc acrior factus, gravissimos Capitis Dolores inferit: vel quando aliqualis sanguis grumulosus circa membranas hæserit: & similes causæ, quæ postmodum etiam diuturnas Cephalæas inferre possunt: Sic namque post curatum vulnus capitis Cephalalgia diuturna oborta fuit, aperto tandem cranio, in vulnere fuit os nonnihil corruptum, quo exemplum etiam dolorem curavit, observante hoc FORESTO *lib. 9. observat. 30.* Quod etiam pertinet notabilis observatio SCHENCKII *lib. 1. pag. 51.* ubi graviore pondere in caput suscepto & congesto, laminæ cranii internæ portiuncule nonnihil diffractæ duodecennalem dolorem capitis creaverunt, quibus per nares excretis dolor ille remissus.

Speciatim viscida, tenax & firmiter impasta est materia, quæ Ovum & Clavum primariò efficit, vel proprio partis dolentis vicio genita, vel cum sanguine edelata, vel denique externæ læsionis occasione relicta. Eadem suspicio est, quoad Hemicraniam, cum & ipsa sit satis contumax, & in qua subinde simul vitium in sanguinis motu, in uno alterove vasorum ramulo alterius saltem cerebri medietatis, conjunctum videtur: Nam dum mater ipsumque cerebrum in duas dirimuntur partes, hinc altera tantum in Hemicrania affici solet. Unde senes decrepiti contumaci Cephalalgia sunt obnoxii propter successivam recrementorum vitiosorum intra cranium collectionem.

Observandum hic est, non rarum esse, Cephalæas observare certas periodos, uti etiam Hemicranias, ita ut subinde lunæ periodos, subinde solis periodum diurnam,



nam, subinde similes motus, regulariter soleant observare: Conf. SCHENCKIUS lib. 1. obs. pag. 47, ubi proflat exemplum doloris capitis, qui cum sole oriente inchoabat, circa meridiem maximè lateolus erat, quò magis verò sol inclinabat ad occasum, eò magis remittebat: In eodem SCHENCKIO pag. 48. est Hemisrania, quæ certis lunæ periodis tantum ægros infestat: Sic notabile exemplum est PLATERI lib. 2. obs. pag. 246. de Hemisrania periodica, singulâ hyeme certis noctis horis recurrente, & miserabiliter torquente, curatâ tandem per emplastrum Vigonis de ranis cum mercurio: Sic idem PLATERUS loc. cit. de Hemisrania fortis & continua quindecim annos durante à partu naturali, quæ postmodum post quindecim annos per fœtus masculi exclusionem statim sine ullo medicamento fuit curata. Huc pertinet exemplum BALLONII supra citatum conf. 40. in feb. de muliere, quæ cùm Hemisrantiâ conflabat, dum non esset gravida, quàm primum autem concepit omnis Hemisrania cessavit: Sic FONSECA lib. 7. confil. 87. observat Hemisrantiâ lateris dextri periodicam, quæ singulis octo diebus die Lunæ tantum in eadem hora repetit, & per triginta horas acerbissimè afflixit, postmodum verò sine ullo symptomate ageretur sanus usque octo dies fuissent præterlapsi: Conf. etiam M. A. N. C. Ann. 4. Append. pag. 32. item Ann. 6. obs. 173. pag. 236. Et talia exempla ferè ubique plura observata prostant. Hæc adduxisse sufficiat.

Pergo ad Signa.

### DIAGNOSIS.

Capitis Dolor indicatur ab ægris, cum sint satis queruli de eo; saltem, signa distinctiva à Medico præprimis sunt observanda ratione causarum, quas omnes accuratè distinguere arduum est, subinde impossibile. Distinguitur autem: an sit per consensum? an per essentiam? Et quidem per consensum esse Dolorem Capitis, ferè ex eo cognoscitur, ubi nulla causa evidens, caput lædens, præcesserit, aut ubi nulla insignior & pertinacior functionum animalium læsio simul juncta fuerit, partes verò corporis inferiores aliquo modo laborant, ac pro hujus diversa ratione Dolores Capitis exacerbeantur.

Dolor itidem subinde varius est, nunc est intensior, nunc est remissior; qui verò capite primario affecto accidit, sepius est continuus: Signa adsunt massæ sanguinæ non legitimè constitutæ, aut etiam adsunt signa viciatæ functionis in quadam parte inferiori læsa, simulque prout pars talis plus minus affici sentiatur, etiam Dolor Capitis aut intenditur, aut remittit, & quæ sunt alia signa ex circumstantiis haurienda, ex quibus prudens Medicus hauriri potest, an per consensum fuerit cephalalgia? In specie stomachi habeat rationem: quamvis non raro Dolorem Capitis per consensum & essentiam conjungi experientia testetur.

Quod si verò Dolor sit per essentiam, patet, si præcesserit capitis & cerebri læsio quædam notabilis: item si dolor secundum siderum motus & phases, præprimis lunæ, variet: vid. FONSECA, PLATERUS: item si vitæ genus est tale, ut faciliè noxam quandam cerebri possit inferre. Continuus magis dolor esse solet: aut si est interruptus, erit tamen periodicus, & statò tempore recurrens, qualis per consensum excitari nequit, præsertim si causæ antecedentes respondeant, adeoque radicem & diathesin altius fundatam hoc ipso insinuat.

Quæ verò præcisè sit causa huius doloris per essentiam? difficultus cognoscitur: nam vermes, calculi, &c. alicubi coacervati, ferè nulla sui præbent signa.

Abcessus quoque hypocranii & similes difficiles sunt cogniti, utut, quantum possibile, eorum indicia describat BOOTIUS loco cit. saltem ergo conjecturæ locum habent.

A sanguine si fuerit vitium, faciliè cognoscitur, cum ut plurimum sanguis, vel turgescens, vel in moto suo per vasa plus minus impeditus, affectum induxerit, dolor pulsatorius ardori capitis conjunctus est: vid. FORESTUS lib. 9. obs. 10. & 11. Item levamina ex sanguinis missione rem manifestant: vid. RHODIVS Cent. 1. obs. 73. ac RIVERIUS observ. communic. 37. pag. 272.

Si à chylo, id cognoscitur, quod certis post pastum horis paroxysmi repetant, post somnum evanescent, & pro assumptionum circumstantiis variant.

A lymphæ aut simili serosa materia, aut etiam à materia viscida aut acida collecta, fieri Cephalalgiam, monstrat gravamen capitis, somnolentia, dolor gravatius magis ac tensivus, qui nocturno tempore solet affligere; cum glandularum interdum morbis circa caput, frigus, ætas senilis & similia, quæ persuadent à tali causa oriri Hemisrantiâ, imprimis ubi reliqua consenserit signa. Et si hæc acrimoniam solveat, v. g. scorbuticam, scorbuti quoque, similiumque recrementorum salinorum signa præstosunt. Quæ ex lue venerea malè curata, ex hujus signis, item quod nocturnus magis & in uno loco instat Clavi affligat dolor: vid. RIVERIUS Cent. 2. obs. 91. Si vitium fuerit ex viciata digestionis propria, unde coacervantur recrementa & humores viscosi intra calvariam, dolor fixus est & pertinax, crebrior recidivans, nullisque remediis cedens; & si acrimoniarum materia hæc expers, gravatius magis, cum sepsu frigoris in parte affecta, in specie si externa præcesserit læsio, ut vermes & calculi, simili modo possunt affligere.

### PROGNOSIS.

Prognosis Cephalalgie curam promittit vel faciliorem, vel difficiliorem, vel nullam: quorum intuitu accidentalis faciliùs curatur, quàm habitualis.

Habitualis tamen quoque, prout cum procatarxi sua magis inueterata, ita ut ejus paroxysmi à multis annis aut spontè aut à levi quavis occasione repetant, eò minus spei curationis habet, præprimis si maximam partem dolor hic continuus fuerit, utpotè quem à causa magis fixa, scilicet pituita viscidior, tumore, abcessu, calculo, vermibus, &c. prodire, probabile sit, & qui à tali causa dolor immanis est, ut plurimum alia symptomata cephalica graviora, scilicet vertiginem, convulsiones, &c. item vomitum sibi comites assumit, & cum his interficat, aut in apoplexiam, epilepsiam, paralytin, cæcitatem, surditatem, &c. degenerat: vid. HIPPOCRATES Sect. 1. Conc. Prænot. 6. RIVERIUS Cent. 2. Obs. 37. RHODIVS Cent. 1. obs. 33. PAW. Obs. Anat. 8. M. A. N. C. Ann. 1. obs. 68. WILLISIUS loc. cit. pag. 296. 301. & 302. & BONETUS Sepulchret. lib. 2. sect. 1. obs. 1. & 2. & BOOT. de Affect. omiff. cap. 2.

Nihilominus & qui per consensum oritur, nunc facilius, v. g. culpâ ventriculi, nunc difficilius, v. g. ex affectibus uterinis, hypochondriaco malo, item à lue venerea, &c. curationis observatur.

Pariter in morbis aliis Dolor Capitis malus interdum propheta existit, quatenus in vehementi Capitis Dolori cum febre acuta, si urinæ conspiciantur cruda, seu clara & albæ, pessimum signum est, deliria, convulsiones, & tandem mortem portendens; item si aliquod lethalius signorum supervenerit: vid. HIPPOCRATES Prognosis, Text. 22. §. 22.

Item Dolor Capitis fortis, imprimis in febribus & morbis acutis, subito desinens, non sequente aliqua evacuatione per crisin, est lethalis, quoniam subinde signum est gangrænæ cerebri, aut omnimodæ insensibilitatis membranarum cerebri.

Simili ratione Dolores Capitis soporosi & gravativi, aut cum convulsione, Gravidis ut plurimum periculosi existunt: vid. HIPPOCRATES l. 1. Prædict. Text. 14. §. 2. & sect. 3. Conc. Prænot. 105.

Ubi frigent extrema in vehementiori dolore capitis, pessimum est signum; periculum enim inflammationis internæ denotat.

Si dolor capitis circa frontem & tempora sit continuus & admodum vehemens, cum febre acuta, apparente die quarto, signo pernicioso, septimò ferè die mors ingruit.

Si dolori capitis superveniat manifesta quædam excretio, aut aquæ, aut sanguinis, aut puris, sive sit per os, sive per nares, sive per aures, (quæ exempla prostant quamplurima) si tum est solutionis morbi secundum HIPPOCRATEM apb. 11. sect. 6.

Facit huc notabilis aphorismus HIPPOCRATIS sect. 4. apb. 32. Quibus nempe ex morbis partium inferiorum convalescentibus dolor capitis vehemens supervenerit, si non præcedat excretio manifesta, iis in cerebro futurus est abcessus, morbi materia ab inferioribus ad superiora conversæ.

Quicumque in febre non lethali cum capitis dolore & obscu-



obscuritate præ oculis conqueruntur de cardialgia sed de morfu & angustia præcordiorum, iis subinde vomitus biliosus salutaris supervenire solet, præsertim si rigor intra hypochondria supervenerit.

Quibus verò in ejusmodi febribus caput dolentibus visus betude contingit, aut splendores circa oculos observantur, aut præ cardialgia aliquid tenditur in hypochondrio dextro, aut sinistro, neque cum dolore neque cum inflammatione, iis sanguis ex naribus fluat.

Dolores chronici extra morbos acutos minus sunt periculosi, nisi quatenus nimia molestia aut continuis vigiliis ad affectus melancholicos disponere solent.

In gravidis Dolores Capitis soporosi cum gravitate quadam obvenientes, sunt mali.

## C U R A.

In Cura propter insignem causarum cephalalgiae varietatem, ipsa etiam cura varianda est, adeo ut non ita commodè determinatis regulis illa ipsa circumscribi queat, sed.

Observ. I. ante omnia: an per essentiam, an per consensum sit cephalalgia? Hæc, præmissis universalibus, in specie Vomitorio & Laxativis convenientibus, & sublato affectu primario, facillè sistitur; illa verò difficulter, adeoque ipsi capitis affectui appropriata remedia simul in usum adhibenda. Ad summum dolor idiopathicus accidentalis phlebotomia, quæ, sudore, & levis opiatu, tollitur: vid. FORESTUS lib. 9. obs. 1. 2. & 3. In habituali verò per essentiam tam sanguinis & lymphæ, quam capitis dispositio prava corrigatur. Posterius raro perficere licet. Nihilominus quia causam haud accuratè dignoscere haud conceditur, æger prognostico vix omnimodè linguatur, & si aliud Medicus hoc in passu præstare nequeat, morbi fomitem præcindendo ac interceptando, crebriores paroxysmorum accessiones inhibeat, cum experientia testetur, hæc ratione Cephalalgias contumacissimas non raro curari, i. e. fibras indispuestas spontè suâ ad pristinum tonum redire. Observetur tamen insimul hic cautela nonnullorum Practicorum: In dolore capitis diuturno plus præstare caput frequentius roborare, quam evacuationibus pertinaciter insistere.

II. Opiatis & Narcoticis in genere ut omnis dolor, ita & Cephalalgia, compescitur; unde etiam subinde intermiscenda veniunt. In his autem ad capitis dolorem sistendum usurpandis sumus cauti; metus enim est, ne post narcotica non possimus denuò expurgare ægrum, uti rectè hoc monet CELSUS: sæpè quippe accidit, ut in gravioribus doloribus parva & ordinaria dosis opii, aliquoties licet repetita, nihil adjuvet, unde postmodum usurpata fortiori dosis, si dolorem aliquando sedat subito lethargicus serè superveniat somnus, ita ut vix ac ne vix denuò possint excitari ægri: quibus tunc si aliquid eveniat, per acetum est succurrendum, aut humorum motum sistendo Cephalalgias graves tandem reddit: vid. FORESTUS lib. 9. observat. 14. & 37. Anodyna ergo, quin & narcotica, quando usurpanda, adhibeantur primum in parva dosis & levi, & successivè fiat progressus ad fortiorè & majorem dosin, idque saltem appropriatis additis. Quod si externis in locis applicanda sint narcotica, fronti saltem & temporibus, nullo modo futuris, eadem imponenda esse, monent Practici, metu soporosi affectus: Nec instante crisi adhibenda, quia periculum est, ne motus naturæ impediat, & æger tandem ita interimatur. Sanè opiata utur sistant dolorem, quia tamen causam seu fomitem relinquunt, & cum magis fixum reddunt, morbum magis in deterius labi faciunt, & propterea magis in dolore per consensum, minus in eo, qui fuerit per essentiam, locum inventiunt.

III. Semper in omni Cephalalgia, nisi forsitan febris malignæ periculosiori conjuncta sit, ut alvus sit laxior & aperta; hæc enim quo magis obstructa, eò magis Capitis Dolorem exasperat; aperta verò, si non verum, cerè palliativum maximeque lenitivum inter alia remedium erit.

IV. Ex omnibus doloribus Dolor Capitis scorbuticus est contumacissimus, simulque atrocissimus, lancinans admodum, rodens & lacerans, nocturno præsertim tempore gravissimè affligit, nec facillè nisi appropriatis scorbuticis tollitur. Hinc internè sal volatile succini, spiri-

ritus vitrioli volatilis cum spiritu liliorum convallium, tartari, & cochleariæ mixtus, cinnabaris antimonii, succinum ambræ, pilulæ ex ladano Hartmanni in Pr. pag. 48. descriptæ, decocta sudorifera, præsertim ex ligno juniperino, cui rasura ligni buxi addita remedium magis reddit appropriatum, sunt usitata. Hinc lac, quod sicut alias per consensum Dolorem Capitis inferre solet, ita idem in doloribus scorbuticis optimum est remedium, demulcendo acrimoniam salis scorbutici. Externè vesicatoria propè aures applicata; item epithemia cancrorum infra dicendum; item flores papaveris rhæados recentes contusi & applicati conveniunt, item zedoaria & bacce juniperi cum aqua vel decocto verbenæ, florum sambuci ac betonicæ.

V. In genere in quocunque Capitis Dolore, præter ordinariam evacuationem, per vomitum imprimis si per consensum ventriculi fuerit, vel per alvum, non omittendam esse dietam sudoriferam, quæ interdum, imprimis in malo contumaciore, valde conducit. In specie in Cephalalgia antiquis, aut etiam in Hemigranitis inveteratis, necessarium est interdum ad Decocta sudorifera lignorum accedere, imprimis à colluvie serosa aut pituitosa, per effusum si fuerit dolor excitatus; quæ ipsa Decocta etiam talibus in casibus optimum solent habere successum. Attenuant enim, dissolvunt, & mediante sanguinis circulo remouent ex capite causam materialem viscidiorè ac fixiorem, idque magis, quando ex feri aut lymphæ vitio malum ortum fuerit: de quibus conf. FORESTUS lib. 9. Observat. 50. AMATUS LUSITANUS Cent. 4. curat. 95. sicuti POTERIUS Cent. 3. cap. 6. Dolorem Capitis continuum ab hydrargyri usu concitatum decocto cephalico cum cinæ & oleo sulphuris curavit. Modum præscribendi & usurpandi notum præsuppono ex Materia Medica, vel MORELLO. Loco illorum vel essentia lignorum, vel ligni cassiæ, interdum usurpari possunt in majori dosi.

VI. Chirurgica præsidia, præsertim circa humorum motum corrigendum occupata, multi usus sunt in Cephalalgia, qualia sunt Venesectio, Arteriotomie temporum, & incisiones venæ frontis, &c. quin & Velicantia, Setacea, imò ipsum Trepanum ad pertinaces & graviores Cephalalgias sunt optima: illa, ubi in vasis sanguiferis vitium hæret; Hæc, ubi ex feri vitio malum oritur. Sed necesse est, ut prius ritè præmissa sint universalis, aliàs metuendum esset, ne, parili ratione atque cucurbitule, non præmissis universalibus, in Capitis Dolore sunt viderentur, (vid. HILDANUS Cent. 5. Observ. 69.) etiam alia præsidia chirurgica malum augerent.

In specie Venesectionem quod spectat: In gravioribus Cephalalgia à sanguinis aut copia aut turgescencia, ut plurimum malum levat, illam imminuendo, hanc compescendo affluxum verò illius ad caput moderando. In paroxysmo vena cubiti dextri (ob rationem ab HIGHMORO Corp. Human. Disquisit. Part. 1. lib. 2. cap. 2. adductam) derivationis ac interceptionis gratiâ; extra eandem & revulsionis causa in partibus inferioribus, v. g. in talo, aut hemorrhoidales in assuetis.

De Arteriotomia temporum imprimis noto, quod eadem subinde nobile præsidium sit in contumacioribus malis, speciatim in Cephalalgia & Hemigranitis desperata, mirabilem habeat successum, uti refert LINDANUS, cujus usum ipsa monstravit natura, vid. Misc. A. N. C. Ann. 8. obs. 72. pag. 120. contradicente quamvis WILLSIO l. 4. Vid. PAREUS lib. 16. cap. 4. ZACV-TUS LUSITANUS Pr. Admirand. lib. 1. observat. 11. RIVERIUS Cent. 2. obs. 56. TULPIUS lib. 1. observ. 48. SCHENCKIUS lib. 1. observat. pag. 51. & SEVERINUS Chirurg. Effac. Part. 2. pag. 41. & 47. Item RIVERIUS Observ. communic. à Jacoz pag. 118. in observ. 31. à Fomio Comm pag. 339. ubi habet hemigraniam lateris dextri intolerabilem, quæ per arteriotomiam ad 3v. intra dimidiam horam omninò fuit sanata. Et jam olim GESNERUS lib. 3. Epist. 96. dolorem hemigraniti quotannis resurgentem secunda arteria in tempore affectu curavit. Refert namque LINDANUS, sibi satis usitatum esse arteriotomiam celebrare in hemigranitis inveteratis desperatis, emittendo interdum in latere affecto largiter 3v. x. etiam xij. ad xxx. vel xxx. sanguinis. Operatio non est difficilis, nec periculosa, modò peritus & artificiosus sit Chirurgus: nec est me-



est metuendum aneurisma, tumor nempe arteriæ, & intra biduum vel triduum hæmatis potest sisti; Nam si tantum terra vitrioli dulcis cum terra seigillata mista, vel solitaria, vel cum albumine ovi subacta, externe applicetur, superinijciendo sortem ligaturam, intra triduum arteria coalescit: Vid. *JOBUS von MECKREN*. Differt à venæsectione secundum majus & minus licet difficilius coëat arteria quam vena, utrobique tamen par ratio postulat fortiora emplastica medicamenta & fortiores ligaturam: supra temporalem musculum transcurrentes frontem versus arteriolæ spongia calente aqua imbuta, abrasis prius accuratè pilis, fovendæ, ægri collum mappa stringendum, capitis sicut declivis sit, ut arteriæ intumescent, & transversim incidantur: vid. *JOHANNIS van HORNE Microtechnæ pag. 151. & seqq.*

Alias post arteriotomiam, seu loco arteriotomiæ, *Inciso venæ frontis* in Doloribus contumacibus Capitis etiam commendatur: Exempla habet *FORESTUS lib. 9. obs. 11. in schol. & obs. 54.* ubi observat Cephalalgiam seu Cephalæam antiquam & diuturnam per sectionem venæ in fronte aliis non juvantibus curatam: Sic *obs. 20.* Dolorem Capitis quotannis in autumno admodum affligentem notat curatum per sectionem brachii venam, & de tonsis capillis in fronte: Item *obs. 22. in scholio* vir quadraginta annorum, cum in occipitio diuturnum Capitis Dolorem habuisset, neque medicamenta juvarent in fronte venæ sectione curatus fuit: Vid. *RIVERIUS Pr. lib. 1. cap. 16. ubi de cephalalgia; item Cent. 2. obs. 21. & BORELLUS.*

Loco hujusmodi arteriotomiæ interdum possunt adhiberi *Hirudines* utrinque ad tempora, quarum admotionem commendat *ZACUTUS LUSITANUS loc. alleg. obs. 9.* Item pone aures, item ad nucham fieri potest applicatio: Confer. in specie *M. A. N. C. Ann. 4. Append. pag. 51.* ubi hemicrania hirudinibus fronti applicatis fuit curata: & *Ann. 6. & 7. M. A. N. C. obs. 9. pag. 20.* idem effectus ab iisdem, arteriis temporalibus applicatis, fuit secutus.

Mulier diuturna Cephalalgia sæpius recurrente jam per plures annos afflicta, ita ut levè de occasione, vel excapitis ab aere inclementiore refrigeratione, vel ejusdem propè focum nimia exæstuatione, vel ex instante mensium fluxu, eandem recurrentem pateretur: Dolor erat per essentiam; utrum enim sub dolore graviore vomitum pateretur, idque cum dolore levamine aliquali, tamen hic ventriculus propter sui cum capite consensum subvertebatur. Causam remotam noverat nullam, nisi quod sibi puellæ hæmorrhagia narium familiares fuisset, quæ suppressa Cephalalgia ista supervenerat. His intellectis cum alia auxilia essent frustranea, ad venæsectionem, vel hirudinum ad tempora applicationem, consilium direxi: frontis venam incidi non permittebat, constrictionis faucium impatiens, ob id *hirudines binas* utrinque temporibus applicui, & copiosius sanguinem evacuare permisi, bono cum successu.

Item hujus loco pro scopo averforio Cucurbitulas scarificatas post venæ sectionem in brachio, aut propè scapulas, applicant alii, v. g. *FORESTUS*; imò ipsi capiti, ut parti affectæ, vid. *VELSCHIUS Epilogm. Obs. 10.*

Alias refert *RHODIUS in Cent. 1. obs. 76.* quod inciso venæ inter indicem & pollicem manus præsentaneum observatum fuerit hemicranie remedium, cujus aliquot habet exempla. Quod confirmare potest sententiam *RIVERII*, qui ad Cephalalgias contumaces fonticulum inter indicem & pollicem manus excitatum commendat in sua Praxi, ubi de Cephalalgia. Siquidem aliàs in diuturnioribus capitis doloribus aut sæpius recidivantibus fonticuli aut in brachio, aut in nucha, aut juxta scapulas, aut ipso loco dolenti ac vertici excitati, non contemnendum sunt remedium (palliativum nimirum: non enim radicidus curant) quosquidem damnat *WILLISIUS loc. all.* quasi humores magis ad partem affectam traherentur: commendant tamen alii, & quidem per experientiam, scilicet *ZACUTUS LUSITANUS Pr. Admir. lib. 1. obs. 12. FORESTUS lib. 9. obs. 12. schol. PETRUS SALIUS DIVERSUS in Aliomar. cap. 11. RODERICVS & FONSECA Tom. 1. Conf. 63. TVLPIVS lib. 1. cap. 32. RIVERIUS obs. 31. & FOMIO commun. pag. 329. POTERIUS Cent. 3. obs. 8. & VELSCHIUS obs. 11.* sic enim, evacuata acri lymphæ,

tandem capiti levamen offertur. Quin imò interdum vesicatoria toti capiti raso, vel nuchæ, vel circa aures, vel toti cranio instar cucuphæ sunt applicanda pro cura pertinacium talium Cephalalgiarum à serbo natarum, lacerantium aut lancinantium, speciatim nocturnarum: vid. *MEARA in obs. Med. pag. 128.* Simile exemplum reperietis in *RIVERIO Cent. 1. observ. 37.* ubi etiam observat Capitis diuturnum Dolorem per vesicatorium instar cucuphæ capiti applicatum curatum: Sic *TULPITS Cent. 1. observ. 37.* Dolorem Capitis periodicum per vesicatoria occipiti admora curavit: *HILDANVS verò Cent. 4. observ. 6.* Dolorem capitis vagum extra cranium contumacem, & alteram tantum capitis partem occupantem, setaceo curavit. Cujus radiosissimi auxilli loco auriculare quasi setaceum aut fonticulus infra nucham excitandus venit: Vid. *M. A. N. C. Ann. 3. observ. 156.* Apud veteres subinde occurrit mentio Fonticuli in capite, in concursu futura coronalis & sagittalis facti, ad graviora capitis & nervosi generis pathemata usurpati, qui jam ferè in desuetudinem abiit, dum cauterio ad os cranii adacto faciliè hujus & membranarum cerebri inflammatione excitari possit: cujus tamen medio Cephalalgia inveterata scorbutica curata refertur in *M. A. N. C. Ann. 3. obs. 81. pag. 138.* Sic *POTERIUS c. 3. observat. & curat. cap. 3. p. 210.* Dolorem Capitis periodicum in vertice præcisè, ad ciceris tantum quantitatem se extendentem, sine ullo signo sensibus obvio, post paucam materiam purulentam loco affecto per potentiale causticum aperto curavit. Mulier gravissima laborabat Cephalalgia frontis ac temporum, descendebat illi per tempora ad malas, post in collum & humeras, ita ut quo se vertere nesciebat. Idque imprimis nocte à nona hora usque ad tertiam seu quartam matutinam. Causa occasionalis, ut ipsa referebat, fuerat excretio & emunctio materię variæ viridis & viscidæ quasi purulentæ per nares, qua deficiente & suppressa, ita ut nares, penitus exsiccæ essent, illi dolor supervenit. Accepit pilulas Mercuriales, item spiritum carminativum de tribus, qui bene contulit aliquamdiu, sed sine perfecta sanatione. Naribus oleum nicotianæ cum pauca camphora applicavit, sed frustra. Aliis ergo irritis jussi applicari sibi curaret Vesicatoria bina, utrinque juxta aures, quorum beneficio curata fuit. Juvenis nobilis Cephalalgia gravissima affectus cum intenso oculorum dolore, nullo licet p. n. in oculis apparente, quæ præsertim vesperi erat gravissima, malum ægro alias subinde familiare. Præmissis primas abstergentibus, & spiritu carminativo de tribus, ordinaui cataplasma ex fermento acerrimo misto cum semine sinapi contuso, pauco spiritu vini addito, nuchæ applicandum (vid. *Idea Formular. Class. 4. §. 23. & Colleg. Formular. pag. .... sequ.*) idque eò magis, quia oculi simul tumerent. Hujus usum perquam dolorificum, bonum tamen Cephalalgia remedium, expertus est.

Trepanum tandem quod attinet: Dolorem Capitis hujus medio curatum, videb. in *RHODIO Centur. 1. observ. 69. & 70.* In specie *AMATVS LVSITANVS Cent. 1. Curat. 2.* refert capitis dolorem intensissimum à lue Gallica jam curata ortum & incurabilem, sed trepano, aperto cranio, curatum. Vix tamen, nisi à læsione externa malum, aut suspicio de abscessu latente, admittendum, vid. *FORESTVS l. a. obs. 38. in schol. SEVERINVS de efficac. Chirurg. pag. 137. WILLISVS loc. alleg.*

Sunt denique, qui in casibus desperatis extra luis Venereæ suspicionem Salivationem commendant, & quidem omnibus probè ponderatis circumstantiis, si non semper cum levamine, certè sine periculo, utur hoc *WILLISIUS loc. alleg. pag. 293.* magnum admodum proclamat.

VII. Vomitoria in Cephalalgia, quæ fit per consensum, esse tutiora; in ista verò, quæ est per essentiam, non nisi cautissimè adhibeantur. Purgantia in hac conveniunt, quæ inter eminet Colocynthis, radix Jalappæ, scammonium, speciatim Mercurius dulcis ritè paratus: Conf. *VELSCHIUS Hecat. 2. pag. 40.* in Cephalalgia per consensum stomachi aut uterinarumque partium abdominis pilula massicbina & de succino Cratonis sunt optima, v. g.

2℥. Pil. Massicbin. ʒj.

Extr. Helleb. nigr.

Caster. an. gr. v.



*Trochisc. alband. gr. ij. vel Extr. corund. gr. j.*  
Cum f. q. *Elixir. Propriet. f. Pilula:*

D. S.

*Caput purgans pilula.*

**POTERIVS** elegantur usurpat pilulas suas Catholicas ad ℥j. quibus addit gr. iv. laudani opiat; sic enim dolorem sedat & somitem tollit: id quod & nos facere possumus, premissis in alio doloris capitis pertinacioris casu Mercurius dulcis sit adhibendus: e. g.

℥. *Extr. panchym. Crost. vel Helleb. nigr. (quod magis appropriatum capiti)* gr. xv.

*Verbenae* gr. vij.

*Mercurij dulc.* ℥ss. ad gr. xv.

*Laud. opiat.* gr. ij.

*Scamm. sulphurat.* gr. ij. vel ℥ij.

Cum f. q. *Ess. Croci f. Pilulæ.*

D. S. ut antè.

Vel

℥. *Extr. panchym. Cr.* gr. xv.

*Mercurij dulc.* ℥ss.

*Extr. troch. alband.* gr. ℥ss.

Cum f. q. *Ess. Croci f. Pilulæ.*

D. S. ut antè.

℥. *Extr. Helleb. nigr.* gr. xv.

*Mercurij dulc.* ℥ss.

*Extr. troch. alband.* gr. ij.

Cum *Ess. Succin. f. Pilulæ.*

D. S. ut antè.

Tardè, sed. eleganter, operantur in Hemiparalyt. con-  
sumaci.

℥. *Extr. Agaric. (quod potentissimè caput pur-  
gat)* ℥ss.

*Helleb. nigr.* gr. vj.

*Aloes rosas.*

*Res. scammon. an.* gr. ℥ij.

*Olei destill. anib. vel Orig. Cres. gutt. j.*

M. f. *Pilula.*

D. S. ut suprà.

Profunt in Cephalalgia à pituita & per consensum ven-  
triculi.

℥. *Mass. pilul. aloepbang. cum diagr.* ℥j.

*Mag. jalapp.* gr. vj.

Cum *Ess. Succini f. Pilulæ.*

D. S. ut suprà.

℥. *Extr. aloes tartaris.* ℥j.

*Mag. scammon. gr. viij.*

f. *Pilulæ.*

D. S. ut suprà.

℥. *Conf. flor. anth.* ℥j.

*Crem. tartari* ℥ss.

*Sulphuris aurati antimon. gr. v.*

*Mag. jalapp. gr. iij. vel iv.*

M. f. *Bolus. S.*

*Purgans Electuarium capitis pro una vice.*

℥. *Conf. flor. anth.* ℥j.

*Mag. jalapp.* ℥ss.

*Extr. troch. alband. gr. j.*

M. f. *Bolus:*

D. S. ut antè.

VIII. Ex Alterantibus, præter decocta lignorum suprà  
laudata, quibus semper Rosmarinus addendus est, con-  
veniunt succinum & succinata quolibet. In specie ejus  
sal volatile, & cum eo paratus liquor cornu cervi, est  
nobilis in Cephalalgia, sive per essentiam fiat, sive per  
consensum ventriculi aut uteri: permiscetur sal hoc vola-  
tile commodè cum Cinnabari, tam nativa, quàm artifi-  
ciali antimonij, & cum hac parato cephalico specifico, aut  
cum Bezoardico Jovis aut Lunari; aut etiam his additur  
aliquantulum de laudano opiato; item diaphoretica anti-  
monialia, & salia volatilissima unguis jungenda, & imprimis  
Camphora subinde permisceri potest, & sic fit pulvis com-  
positus ad cephalalgiam. Est enim camphora mirabile re-  
medium in Cephalalgia à causa calida, si unum alterum-  
ve ejus granum internè usurpetur, aut externè spiritus vi-  
ni camphoratus crocatus aut theriacalis crocatus, aut oleum  
camphoræ in epithematibus aut unctionibus applicetur,  
quod à PARACELSO admodum commendatur. His  
etiam tinctura vel Essentia lunæ genijna merito accenseri  
potest. Tandem spiritus vitrioli volatililis, vel per se,  
vel addito spiritu vini paratus, est egregius & in frequen-  
ti usu. Quibus simul adnumeranda est herba Thee,

ejusque decoctum, MOEBIO, & TVLPIO lib. 4. obs.  
60. ad dolores Capitis quoscunque admodum commenda-  
tum; si nempe

℥. *Dist. Herb. Thee* ℥j.

*Coqv. f. q. vini aut aqua simpl.*

*Colatura leniter filtretur, & addatur  
aliquid Sacchari.*

Sumitur calidissime imprimis à cœna vel prandio, & bre-  
viter quemcunque Dolorem capitis lenit.

℥. *Pulv. Bezoard. Lud. vel succini præp.* ℥ss. ad  
gr. xv.

*Cinnab. antimonij* ℥ss.

*Laud. opiat.* gr. j.

*Olei destill. ligni Sassafr. gutt. i.*

M. f. *Pulvis.*

D. S.

*Pulvis caput leniens.*

℥. *Cinn. antimonij vel nativ.* ℥ss.

*Extr. ligni aloes* gr. xij. vel xv.

*Castor.* gr. viij. vel ℥ss.

*Laud. opiat.* gr. iv. vel v.

M. f. *Pil. pro 4. dosibus:*

D. S.

*Pilula caput lenientes.*

℥. *Conf. flor. salvia,*

*Anibos,*

*Tunic. an.* ℥vj.

*Succin. catarrhal.* ℥j.

*Cinn. Antimonij vel nativ.* ℥ss.

*Spec. diamb.*

*Diamoschi dulc.* an. ℥ij.

Cum *Syr. flor. Tunic. f. Electuarium:*

D. S.

*Electuarium caput confortans.*

℥. *Aqua Ceras. nigr.*

*Verben. an.* ℥j.

*Lal. convul. cum Vin.* ℥vj.

*Liqu. Cornu Cervi succin.* ℥ij.

*Syr. Betonic.* ℥ij. vel ℥ss.

M. S.

*Potio caput confortans.*

℥. *Spiritus cornu cervi cum sale vol. vel liqu. cornu  
cervi succin.* ℥ij.

*Ess. opii tartaris.* ℥j.

M. S.

*Essentia caput leniens.*

*Dosis gutt. 40. vel 50.*

℥. *Liqu. cornu cervi succinat.*

*Ess. Castor. an.* ℥j.

M. S. ut antè.

℥. *Quinta Essentia Rosismar.* ℥ij.

*Lavend.* ℥ss.

M. S. ut antè.

*Dosis gutt. 20.*

℥. *Ess. Castor.* ℥j.

*Al. sint.* ℥j.

M. S. ut antè.

*Dosis 40. guttule.*

Convenit item essentia castorei composita ex ana Casto-  
rei, zedoarie & salviæ, cum spiritu salis ammoniaci vinoso  
extracta.

℥. *Elix. Propr. sine acid. vel tartaris.* ℥j.

*Ess. rosmar.*

*Succini an.* ℥j.

M. S. ut suprà.

*Dosis 30. ad 40. guttulas.*

℥. *Ess. Castor. compos.* ℥j.

*Succini.*

*Liqu. cornu cervi succinat. vel spiritus Bezoard.*

*Buss. an.* ℥j.

M. S. ut suprà.

Prodest in cephalalgia catarrhali. Vel

℥. *Ess. catarrhal.* ℥ij.

*Castor. vinos.* ℥j.

M. S.

*Essentia in cephalalgia catarrhali.*

Item

℥. *Ess. succin. vel Catarrhal.* ℥ij.

*Spiritus sal. ammoniaci anis.*

*Succinat. an.* ℥j.

M. S. ut antè.

Varien-



Varientur formulæ pro varietate causarum.

IX. Quod aliàs atinet *Externâ* in genere contra Cephalalgias usitata, celebris est insigniter *Verbena*, quæ est celeberrimum remedium ad quemcunque Dolorem Capitis, sive interno usu ejusdem aqua aut essentia usurpatur, sive externè ipsa planta, tam recens contusa & in forma cataplasmatiss, quàm succus, ac linteis duplicatis, fronti & temporibus applicetur; sicuti etiam herba amuleti instar appesa pertinacissimum Capitis Dolorem sistit; de qua virtute contra cephalalgias amuletica singularissima vid. FORESTUS lib. 9. obs. 52. utut non æquè ubique succedat. Sunt tamen qui floribus *Papaveris rhæados* non minorem, quàm modò laudatæ *Verbena*, laudem contra Cephalalgias tribuunt: Confer. M. A. N. C. Ann. 4. Append. pag. 33. Et sanè aliquando cephalalgiam pertinacem nocturnam floribus *papaveris rhæados* leviter contusis fronti & temporibus applicatis curavi. Juxta verbenam est *Betonica*, anodyna & egregia ad Dolores Capitis, nonnihil narcotica: de qua vid. Bartholinus de *Betonica*.

℥. *Betonicam*:

Coque in *Vino*.

Colatura apponatur capiti per noctem, in dolore capitis ex apostemate.

Vel ubi virtute anodynâ, discussione & resolutione, opus est:

℥. *Herb. beton. M. ij.*

*Abfinib. M. j.*

*Cubebæ. ℥ij.*

*Vini ℥ij. vel q. s.*

Decoqu.

Colatura hauriatur, vel instar Epithematis applicetur Capiti; remouet egregiè Dolorem.

Sedum majus, item *Matricaria* recens contusa, & fronti applicata, Capitis Dolorem sistit, modè illius odorem ferre possit æger. *Radix Rhodia* etiam non inelegans experimentum est PETRI à CASTRO, Medici Veronensis, qui pertinacissimo capitis dolore recipit *Radicem Rhodiam recentem*, eamque cum lapideo pistillo contritam iterat cum aqua *Verbena* & flor. *sambuc. ana*, cataplasmatiss instar fronti applicat. Integra etiam planta contusa sub forma cataplasmatiss fronti circumponitur.

Vel

℥. *Rad. Rhod. ℥ij.*

*Flor. papav. errat.*

*Rosar. an. Mj.*

*Capit. papav. Num. iij.*

Incisa & contusa coqu. in aqua simpl.

Colatura applicetur tepidè fronti & temporibus.

Alii loco radicis hujus pulverem radicis *zedoaria* recipiunt, & cum aquis appropriatis capiti applicant: v. g.

℥. *Aqua Verben.*

*Flor. sambuc.*

*Aqua beton. an. ℥j.*

*Pulv. zedæar. ℥j.*

M. D. S.

Epithema capiti applicandum.

Et ita applicetur capiti, tam fronti, quàm ubi ita visum fuerit, etiam nuchæ. Sed hoc saltem valet in Cephalalgia ex causa frigida.

TIMÆO von *GuldenKlee* in epist. pag. 195. in usu fuit tale Epithema:

℥. *Aqua Verben. ℥j.*

*Beton.*

*Sambuc. an. ℥j.*

*Pulv. rad. Rhod. aut ligni Rhod. ℥ij.*

*Acet. rosar. ℥vj.*

M. pro Epithemate Cephalico.

Hiscæ addatur ejusdem PATRI à CASTRO euphorion, nempe cortex medianus trunci arboris juglandis, qui contusus, & cum pauco sale mistus, utrinque temporibus applicatus ad quoscunque capitis dolores ab eo fuit usurpatus. Pertinent huc in specie & ea quæ aliquali vi narcotica plus minus pollent: qualia sunt semina *Papaveris*, *anethi*, nuclei *Persicorum*, vel semen *hyoscyami* & similia: ex quibus sunt emulsiones, quæ nunc intrinsecus propinatæ, aut, quod ferè frequentius, extrinsecus sub forma epithematis applicatæ, admodum conveniunt: verbi gratiâ

℥. *Sem. anethi ℥ij.*

*Nucl. Persic. ℥ij.*

*Sem. Papav. alb. ℥ij.*

Cum s. q. aqua *Verben. Beton. & flor. Persic.*

f. Emulsio.

D. S.

Emulsio circa caput.

Hæc tepidè linteis multiplicatis adhibetur fronti & temporibus ad sistendam Cephalalgiam.

Vel

℥. *Nucl. Persic. ℥ij.*

*Sem. papav. alb. ℥ij.*

Cum s. q. aqua *Verben. beton. vel flor. nymph. & solani* f. Emulsio:

D. S. ut suprà.

Epithematis formâ tepidè cum linteis duplicatis fronti & temporibus applicanda, ad sistendam nimiam cephalalgiam.

℥. *Nucl. Persic.*

*Sem. papav. alb. an. ℥ij.*

*Anethi ℥ij.*

*Hyoscyam. ℥ij.*

Cum aqua *flor. Sambuc. & Chamomill. f. Emuls.*

D. S. ut suprà.

Vid. quoque *Idea Formul. Class. 3. §. 6. & Colleg. Formular. p. ....* Possunt etiam tales Emulsiones fieri recipiendo loco liquoris in dictis emulsionibus decoctum rad. *rhodia*, vel *verbenæ*, vel *betonica*, vel similia: quibus cum decoctis ex istis seminibus emulsiones efficaciores componuntur. Imprimis semen *hyoscyami* potens est remedium pro placando dolore capitis, uti quocunque, ita, in specie scorbutico; unde quidam ceu certissimum hoc laudant:

℥. *Sem. hyoscyam. ℥j.*

*Acet. rosar. ℥vj.*

M. in phiola benè obturata, & ponantur in digestionem Balneo Mariæ per 5. aut 6. horas, ita tamen, ut ne bulliat.

Postea accipe fasciam ex linteo subtilissimo, quæ ligetur capiti infirmi, atque cum spongia, hoc acetò madida, humectetur fascia, sicque subito dolorem capitis tolli asserunt.

Tandem & Litus seu Inunctiones convenient, ubi eminet unguentum alabastrinum, quod admodum laudatur in quavis Cephalalgia, ex quacunque etiam causa nata, sive sit per consensum, sive ex contusione, sive ex alia causa, in specie in Cephalalgia quarumcunque febrium, à quâ plurimis, præsertim FORESTO in lib. 9. obs. 33. cui pro circumstantiarum ratione nunc oleum *papaveris* expressum, nunc oleum *hyoscyami* expressum, nunc unguentum *populeum*, nunc *camphora*, nunc aliquid de *laudano opiato*, nunc aliud simile, addi potest: E. g.

℥. *Olei expr. sem. papav. ℥j.*

*Nucl. Persic. ℥ij. vel ℥ij.*

*Hyoscyami,*

*Destill. aneth. an. ℥j.*

(vel olei destill. aneth. & chamom. an. ℥j.)

Cum s. q. *Cera*, vel ol. *nucistæ* expr.

F. Linimentum, temporibus applicandum,

D. S.

Unguentum ad Caput.

Vel

℥. *Olei hyosc. cum oleo pap. compos. ℥j.*

*Expr. Nucist. q. s.*

M. S.

*Balsamus capitis dolores sedans.*

Item, quod in familiari usu habuit D. MICHAELIS.

℥. *Extr. fræ succ. inspiss. Verben. ℥j.*

*Olei expr. Hyoscyam. ℥j. (plus minus, prout requirit occasio vel dolor,)*

M. & f. Linimentum.

Inungitur caput & tempora in Doloribus Capitis, præprimis scorbuticis.

Vel

℥. *Extr. Verben.*

*Anethi an. ℥ij.*

*Olei expr. Papav. alb.*

*Hyoscyam. an. ℥j.*

*Destill. Aneth.*

*Chamomill. an. gutt. v.*

M. S.

Unguentum



*Unguentum ad caput.*

- ℥. Olei expr. nucl. Persic.  
Sem. Papav. an. ℥j.  
Hyoscyam. ℥ss.  
Destill. Aneth. ℥ss.  
M. S.

*Oleum dolores sedans.*

- ℥. Ungu. alabastr. ℥ij.  
Medull. crur. vir. ℥j.  
Olei expr. Papav. ℥ss. vel ℥j.  
Hyoscyam. ℥ss.  
Cum f. q. Cera f. Unguentum.  
D. S.

*Unguentum dolores sedans.*

Sed hæc & similia narcotica externa, uti in genere Dolores sistunt Capitis, ita in specie non nisi urgente gravius dolore, locum habent, idque magis in accidentalibus quam habitualibus, tutius verò in doloribus per consensum, item in doloribus, qui comitantur morbos acutos, conducunt; sicuti dolores Chronici, aut Cephalæ, aut clavi, minus huiusmodi curari, leviter saltem palliari solent. Potius in chronicis doloribus seu diuturnis egregia sunt emplastra appropriata, v. g. de *Tacamabaca cum balsamo Peruviano* malaxata, & capiti raso in forma emplastri applicata, quod etiam convenit in doloribus scorbuticis. Loco balsami Peruviani substituat oleum destillatum succini, imprimis, qui affectibus cerebri & nervorum sunt obnoxii. Sed hæc sunt generalia.

X. Cum verò pro varietate causarum & circumstantiarum subinde varianda sint remedia, propterea ad Cephalalgiam, quæ oritur ex sanguine, ejusque motu effervescente aucto & febrili, convenit sanguinis missio variis modis adornanda, de qua *suprà* Nota VI. dictum. Antequam tamen sanguis educatur, clystere alius expurgetur, postmodum verò interna propinentur, quæ febriles paroxysmos aut sanguinis turgescientiam solvunt, nempe diaphoretica blanda, acidum temperantia, ex absorbentibus, modicèque condensantibus, v. g. lapidibus cancrorum, unicornu fossili, terra sigillata, &c. Quibusalterationis gratiâ decocta & Julepi cum blandis acidis, de quibus in curatione febrium dictum, jungere convenit. Externè verò convenit succus sempervivi majoris aut portulacæ cum paucis aceto rosaceo, (si enim multum aceti sumitur, facit egros agrypnos;) fronti ac temporibus, item testiculis, instar epithematis applicatur, sed calidè; Nam omnia epithemata tepidè admouenda. Convenit etiam emulsio seminis papaveris albi, cui aliquantulum camphoræ additum fuerit. Vel convenit Epithema cephalicum *Hartmanni* cum camphora, quod habet in *Prax. Chymiatr. lib. 2. cap. 1. de Cephalalg. §. 18.* uel quod describit §. 7. Imprimis Epithemata ex gammaris fluviatilibus contusis & applicatis, aut ex succo cancrorum fluviatiliu expresso instar epithematis usurpato, egregia & singularia sunt in Cephalalgia febrili: quibus ipsis etiam sub contusione acetum rosaceum, aut aqua papaveris rhæados, spermatis ranarum, phlegma vitrioli, aut aliæ quædam aquæ appropriatæ, addi possunt: sicuti etiam *unguentum populeum* uel *alabastrinum* cum oleo papaveris expresso, uel anethi, non sine fructu illinitur: Quibus in declinatione addenda magis appropriata, v. g. radix & herba uerbene, radix Rhodia, zedoariæ, item opiatæ: v. g.

- ℥. Ungu. ros. ℥ss.  
Olei expr. sem. papav. ℥ij.  
Hyosc. ℥ss.  
Nuc. Mosch. ℥j.  
M. f. Linimentum: S.  
*Unguentum cephalicum.*

- ℥. Ungu. alabastr. ℥ij.  
Olei papav. expr. ℥ss.  
Hyosc. expr. ℥j.  
M. S.

*Et ante.*

- ℥. Ungu. alabastr. ℥ij.  
Theriac. Androm. uel Philon. Rom. ℥ss.  
Olei express. nucis mosch. ℥ss.  
M. D. S. ut præcedens.

- ℥. Ungu. popul.  
Alabastr. an. ℥ij.  
Extr. Verben. ℥ss.  
Camph. ℥ss.

M. D. S. ut *suprà*.

- ℥. Succ. cancr. fluvi. rec. expr. ℥ij.  
Aqua beton.

Flor. Chamom.  
Sambuc. an. ℥j.  
Pulv. Zedoar. ℥ij. uel ℥ss.  
M. f. Epithema,  
D. S.

*Epithema cephalicum externum.*

- ℥. Succ. cancr. fluvi. cum aqua Verben. extr. ℥ij.  
Sal. ammoniaci ℥ss.  
Pulv. rad. Rhod. ℥ij.  
M. pro Epithemate.  
D. S. ut ante.

- ℥. Herb. Verben.

Violar. an. Mj.

Flor. rosar.

Sambuc.

Violar. an. Mss.

Ineludantur sacco, vino acidiusculo incoquendo.

D. S.

*Sacculus capiti applicandus.*

- ℥. Nucl. Persic. ℥ij.  
Sem. papav. alb. ℥j.  
cum f. q. aqua Nymph. f. Emulsio:  
adde

Succ. cancr. fluvi. uel Verbenæ ℥ij.

Spiritus theriacal. campb. ℥ss.

Pulv. Zedoar. ℥ss.

M. S.

*Epithema cephalicum.*

Vel juxta PLATERUM lib. 2. Obs. pag. 368.

- ℥. Empl. de beton.

Alabastr. an. p. ss.

De ran. cum mercurio p. 1.

Misc. pro Emplastro: S.

Quibus si acrimonia conjuncta, interponantur absorbentia sepius recentia.

Quod si in febribus ob nimios dolores Capitis metuantur deliria aut convulsiones, adeoque, ut aliàs dicunt, raptus matreque ad caput:

- ℥. Fol. ruta rec. M. ij. uel iij.  
Rad. raph. incis. Num. ij. uel iij.  
Salis comm. M. j.  
Ferm. acerr. M. ij.  
Acet. rutac. q. s.

M. f. Pulmentum: S.

*Emplastrum plantis pedum applicandum.*

Quod applicetur plantis pedum, item capiti, & repetatur, si exsiccatum fuerit. Reuulsorium est remedium ratione irritationis, unde in comate vigili febrium egregium est.

Vel

- ℥. Fol. ruta M. ss.  
Fimicolumb. ℥j.  
Salis comm. ℥ss.  
Ferm. acerr. ℥ij.  
Cum aceto flor. sambuci f. Cataplasma,  
D. S. ut *suprà*.

Vid. BARBETTE in Obs. de Peste:

- ℥. Rosar. cum sale cendis. ℥ss.  
Nitri ℥ij. ad ℥ss.  
Camph. ℥ss.

M. f. Cataplasma.

D. S. ut *suprà*.

XI. A feri vel copia vel acrimonia peccante si Dolor urget, pro illius affluxu sedando in subiectis plethoricis convenit ante omnia venæsectio, quatenus vasis exinanitis serum non adeò copiose transudat, quodque ejus exsillavit, à venis facilius resorbetur. Extra quem tamen casum post clysteris injectionem, aut laxantis blandioris usum, vesicatoria cernui aut pone aures, imò in dolore atrociori toti capiti applicentur: vid. RIVIERIUS Cent. 1. observ. 37. TULPIUS lib. 1. cap. 13. & MEARRA Hist. pag. 128. simulque per opiatum ulterior affectus & dolor mitigetur, usque dum hoc aliquantum sedato reliquias serosas per potentiora purgantia, diaphoretica, & diuretica, educere liceat. Pro recidiva verò evitanda fonticulus in brachio aut crure excitetur, prout scilicet aliæ circumstantiæ hunc locum determinabunt. Pur-

gatio-



gationis scopo, infertur Hydragoga communiter dicta, in principio tamen mitiora, scilicet radix Jalappæ, scammonium, massa pilularum de succino Gatonis, luna, hydragoga, &c. Diaphoresi verò atque diuresi lignorum decocta & essentia cum catarrhalibus & nervinis aromaticis & diureticis miscenda, v. g. decoctum catarrhale, in *Id. Formul. class. 4. §. 11. pag. 371.*

Vel

*℞. Rad. enulæ,  
Caryophyll.  
Sarsapar. an. ʒvj.  
Ireos Flor.  
Raf. ligni Sassafr. an. ʒß.  
Herb. rorismar.  
Salv.  
Cherid. fol. an. M. ʒ.  
Galang. ʒij.  
Sem. fœnicul. ʒijij.  
Coq. in f. q. Aquæ:  
Colat. ʒij. adde  
Syr. Betonic. vel papav. errat. ʒij.  
M. D. S.*

*Decoctum catarrhale cephalicum.*

De hoc ʒij. vel ij. bis, vel ter de die propinentur.

XII. Quod attinet Dolorem capitis fixum & nimis contumacem, seu Cephalalgiam, quam vocant à causa frigida, seu potius Cephalæam, à materia viscida aut glutinosa ac acri hinc inde impacta, in specie in Cephalalgia senum, præter sudorifera lignorum decocta, aut similia medicamenta sudorifera, de quibus iam antè dixi, confert imprimis balsamum & oleum destillatum succini vertici illitum. Item præ cæteris præstantissimum est Emplastrum de ranis Vigonis cum Mercurio, capiti raso impositum, quod ratione Mercurii penetrat, & causam viscidam, acidam corrigit, quo ipso desperatas cephalæas curavit PLATERUS, qui videatur in *Observat. pag. 371. & Præxi.* Parandum est hoc emplastrum more consueto, nunc dosi ordinariâ, nunc dosi duplicatâ Mercurii, & summum est remedium Mercurius vivus, usurpatur vel solitariè, vel malaxatum cum balsamo Peruviano, oleo Irino, destillato succini, unguento alabastrino, &c. Item emplastri hujus p. r. potest addi emplastri de betonica & unguenti de alabaastro p. ʒ. & sic horrendam Cephalæam PLATERUS loc. cit. mirabiliter curavit. Ipse aliquando in vetula octogenaria, quæ jam ab aliquot annis continuâ & gravissimâ occipitis laboraverat Cephalæâ, felici cum successu hoc emplastrum, malaxatum cum oleo succini, usurpavi. Convenit etiam in dissectione futurarum cranii, affectu periculoso & difficili; unde Principissæ Isenacensis dissectionem futurarum, aliis irritis, curavit D. MICHAELIS mediante hoc emplastro, & clysmatibus acrioribus, & usitatis tantummodo, in quibus tamen præscripsit dissolvenda sequentia: Nempe

*℞. Elect. hier. pier. cum agar. ʒjv.  
De bacc. laur. ʒij.  
Pulv. rad. belleb. nigr. ʒij.  
Fell. tauri insp. ʒijij.  
Misc.*

Cujus uncias duas semper clysmati domestico addendas jussit; quæ clysmata crebrius fuerunt repetita. Capiti verò ad imitationem PLATERI (ut ipse D. MICHAELIS professus est) hoc emplastrum applicari præcepit.

*℞. Empl. de ran. Vigon. cum mercurio ʒij. ad ʒij.  
Cerat. de beton. usq. ʒj. ad ʒij.  
Pro bregm. ʒij. ad ʒvj.*

Mista malaxanda cum Unguento alabastrino.

(loco cujus oleum succini commodè etiam sumi potest)

Inducatur super alutam, & applicetur capiti in forma Emplastri.

Quod ipsum modò dictum Emplastrum, & de ranis cum Mercurio, egregiè etiam convenit in Doloribus Capitis non surnis contumacibus Gallicis seu Veneris, hujusque mali reliquiis: vid. BARTHOLINUS Cent. 3. Epist. 55. Ita tamen ut ex SILVATICI consilio stillicidium quoque aquæ calentis sulphureæ huic substitui queat: vid. RHODIUS Cent. 1. Observ. 75. Non negligenda illa, quæ primario morbo appropriata deprehenduntur remedia, à qua etiam applicatione decente omnes Ce-

phalalgia per consensum exortæ tolluntur. Aliàs in hac futurarum dissectione jubet MINDERERUS in *Medic. Milit. pag. 327.* præmisâ fortè capitis ligaturâ & postmodum derafis capillis, ceratum ex pelle aristina cum gummi elemi, & pauco cerato de betonica loco affecto BOOTIUS applicare, & egregiè confert: Vid. quoque loco supra citato. In genere in Cephalalgis ubi subest suspicio peccantis materiæ crassæ, viscidæ, acidæ, &c. ex vitio digestionis privatæ, ibi non habetur melius emplastrum, quàm hoc, idque imprimis propter Mercurium penetrantem, & optimè resolventem; fluxilem enim facit materiam illam, quæcumque etiam sit, & vocetur ut jubet. Alternandumque hoc etiam erit cum Decocto ex speciebus cephalicis, lixivio & vino parato, quale PLATERUS l. a. commendat: Aut

*℞. Herb. rorismar.  
Verben.  
Betonie.  
Flor. Chamomill. Rom. an. M. ʒ.  
Coqu. in Vino pro Epithemate.  
D. S.  
Epithema cephalicum.*

Aut

*℞. Empl. de ran. cum mercurio p. ij.  
Beton. p. i.  
Malax. cum olei destill. Anetbi:  
D. S.*

*Emplastrum cephalicum.*

XIII. Aliàs, ubi opus est dissectione, & hujus modò doloris sedatione, item resolutione in Cephalalgia ex causa frigida, speciatim externo frigore, optimè conducunt sacculi ex milio & sale communi, qui sunt egregii, & mirè commendantur à LINDANO; nempe

*℞. Milii leviter tosti p. iv.  
Salis communis similiter leviter tosti p. i. vel ii.*

Ex quibus fiant sacculi, suffumigandi cum gummi animæ, & ita applicentur capiti.

Varia appropriata possunt pro varietate circumstantiarum, verb. gr. origanum, cum floribus chamomillæ, thymus, flores sambuci, verbenæ, betonica: vid. FORESTUS l. a. Observ. 21. in schol. Exempli grat.

*℞. Milii tosti M. j. vel ij.  
Salis comm. parum tosti M. ʒ. vel i.  
Herb. Verben. vel beton. vel flor. samb.  
Flor. Chamomill. an. M ʒ. vel M. j.  
Pulv. rad. Rhod. ʒß.  
M. f. Sacculi interpassati,  
calidè capiti applicandi, & ita gestandi;  
D. S.*

*Sacculus contra dolores.*

*℞. Milii tosti ʒvj.  
Salis tosti ʒiv.  
Herb. thymi,  
Flor. sambuc. an. Mj.  
Zedoar. ʒj.  
Includ. 2. sacculis interpass.  
D. S.*

*Sacculus ad caput.*

Vid. *Idem Formul. class. 4. §. 10. & Colleg. Formular. p. ...* Conducunt etiam tales sacculi imprimis in doloribus capitis continuis senum, quibus admodum sunt appropriati. In quibus & similibus gravioribus capitis doloribus etiam vesicatoria occipiti & nuchæ, interdum pond aures applicata, conferunt.

XIV. Quod si Dolor Capitis sit à causa externa, ex vulnere vel casu ab alto, aut ex contusione, hincque relicta debilitate, ibi optimè convenit Ceratum Alexandri Benedicci, mediante quo curavit senem, qui ex percussione trabis quindecim dies & noctes obmutuerat? Nempe

*℞. Gummi bedera vel elemi ʒijij.  
Resin. purgat. ʒß.  
Cera,  
Terebinth. an. ʒijij.  
Ol. rosac. ʒijij.  
Gummi anima aceto sol. ʒj.  
Succi corymb. beder. ʒiv.  
Farin. fabar. q. l.*

Ex quibus omnibus tritis f. Emplastrum.

Hoc



Hoc egregium est in Doloribus Capitis ex contusione, casu, &c. Vid. de hoc etiam HENRICUS ab HEER in *Observ. Obs. 21.* item FORESTUS *lib. 9. Obs. 35. in schol.* & VALERIOLA *lib. 5. Obser. 9.*

Aliàs ad dolores ex percussione, etiam unguentum alabastrinum proficuum observatum fuit. Convenit etiam facculus Hartmanni ex succino pulverisato, cum essentia piperis irrorato; aut eadem hac cum oleo succini in emplastrum redacta.

XV. Quod si Cephalalgia sit à vermibus, horumque adsint suspiciones, siue in cerebro geniti fuerint, siue per loca externa ad cerebrum usque transierint, in tali casu gravis labor & Medico & aegro subest. Nemo ejus curandi methodum melius præscripsit, quàm HILDESHEIM, qui pertinacissimam à vermibus ita curavit: Habuit curæ agrum graviore Cephalalgia correptum, in quo cum præmissis universalibus & copiosis vermibus per alvum rejectis, nihilominus in gravi Capitis Dolo persisteret, ipse verò non vulgarem suspensionem haberet vermium in capite, propterea ante omnia sincipiti applicavit emplastrum tale:

℥℥. Pulv. aloes,  
Lumbr. terr. an. ℥ij.  
Fell. tami ℥j.  
Ol. Absinth.  
Cera an. q. s.

M. in forma Emplastri.

Extendatur super alutam, & sincipiti applicetur.

Hinc profaciendo sumo Pulverem ordinavit:

℥℥. Pulv. Centaur. min.  
Marrub.  
Beton. an. ℥ij.  
Zedoar. ℥ss.  
Rad. angel. ℥ij.  
Succini ℥j.  
Antimoni crudi ℥j.  
Mili ℥ij.

(foran sub nomine milii Zingiber intelligitur.)

Boli Arm. j.  
Aristol. rotund. ℥ij.  
Absinth. ℥ij. vel ℥ijj.  
M. f. pulv. grossus pro sumo.

Cum hoc emplastro usus esset, & fumum terquaterque naribus & ore excipiendum admisisset, tandem tredecim oblongi vermes villosi seu lanuginosi vivi instar crucurum siue oniscorum per fauces, nates & aures prodierunt, quos ipse digito apprehensos extraxit. Continuavit modò dicta, unde tantos dolores & cruciatus postea non sensit, quantos antea; sed tamen omnes nondum semotos dicebat ipse, cum adhuc in sincipite laterent aliqui: unde post aliquot menses prodierunt adhuc duo, non tamen ita magni ac priores, & ita agrum restituit. Vid. HILDESHEIM in *Spir. 1. de Affect. cap. pag. 45.* Ad hujus imitationem, si suspicio est vermium, Medicus similis potest invenire & applicare. Quod etiam facit ZAGUTUS LUSITANUS *Prax. Admirand. lib. 1. Obs. 7.* ubi potentiore sternutatorio ex pipere & castoreo vermum, Cephalæ d'uturnæ causam, rejectum testatur. Item hujus loci est fumus myrrhæ & spiritus vini, in quo nigellæ semen infusum, auribus immisus, quorum SCHENCKIUS *Observ. pag. 176.* meminit; item SALMUTH *Cent. 2. observ. 39.* qui suffitu amarorum & antimoni vermes per nates eductos refert. Sin oriatur à calculis, malum à priori non est curabile, nisi natura vias inveniat, & calculos foras protrudat.

XVI. Cephalalgia ab ebrietate & crapula, aliisque ventriculi cruditatibus, præmissio vomitorio, vel purgante, Stomachicis atque nervinis sedatur: e. g.

℥℥. Pulv. rad. asari,  
Crem. tartari an. β.  
Gummi de Peru corr. gr. v.  
Olei destill. macis gutt. ij.  
M. S.

Pulvis cephalicus & stomachalis pro una vice.

Inter stomachica convenit piper, vel integrum vel in partes divisum, deglutendum, quia absument cruditates in ventriculo; item mastix & hujus spiritus, essentia ligni aloës, spiritus vitrioli cephalicus, &c.

℥℥. Elix. Propr. ℥ij.  
Spiritus vitrioli cephal. ℥j.

Estmull. Oper. Tom. II.

M. S.

Elixir cephalicum & stomachale.

Hinc non adeò paradoxon videtur, quod CARDANUS *Art. Parv.* refert, contumacem Dolorem Capitis cerato ventriculo imposito sedatum. Item quod VELSCHIUS *loc. all. obs. 12.* hemicraniam pane succogranatorum imbuta intra triduum solutam testatur: Vid. FORESTVS *lib. 9. obs. 44. 45. & 46.* In Cephalalgia ab Ebrietate & Crapula convenit Piper, vel integrum, vel in partes diuisum, deglutendum, quia absument cruditates in ventriculo. Item caput leuiter irrorandum, testes verò in aquam frigidam aceto missam immergantur. Pari methodo tractandæ sunt Cephalalgia ex liene, utero, scorbuto, &c. obortæ, morbi scilicet primarii ante omnia semper rationem habendo.

XVII. Gravissima species Cephalalgia est Hemicrania, in qua præter arteriotomiam temporum, quam valdè per se suadet LINDANVS in *Colleg. Præst. super Hartmann. lib. 2. cap. 1. § 17.* & aliis irritis aliquoties expertus est PARÆVS *lib. 6. cap. 4.* aut hirudinum applicationem ex LINDANO & RIVERO supra laudatam, aliaque universalis supra memorata, experimentum singulare est cataplasma factum ex radice cucumeris asinini seu sylvestris, aut bryoniae cum verbena & absinthio, quod applicandum est lateri dolenti, tanquam euporiston à quam plurimis usitatum & commendatum; vel ex eadem radice additis emollientibus fiat Cataplasma, in specie pro soluenda Hemicrania per abscessum ac suppurationem, de quo vid. curiosa obs. HORSTII *lib. 2. obs. 10.* Vel locotalium Cataplasmatum, quæ sunt difficilia, etiam fieri potest tale Decoctum pro foru hoc modo:

℥℥. Rad. cucum. asin. rec. ℥j.  
Herb. Absinth. M. β.  
Flor. Violar. p. i.

Coqu. in ana Vini & Aquæ.

& decoctum colatum subinde applicetur loco dolenti in hemi-crania; quod egregie confert.

℥℥. Rad. Cucum. asin. rec. ℥j.  
Fol. absinth.

Verben. an. M. j.

Coqu. in f. q. aquæ.

Colatura applicetur, uti dictum.

Nempe fit hoc ad imitationem Medici veteris PAVLI, qui in hemicraniis recipiebat radicem cucumeris sylvestris viridem minutim concisam, & absinthium: Hæc incoquebat Hydrolæo ad putrilaginem usque. Cum hydrolæo hoc calente modiciter partem dolentem inungebat, hinc radicem & absinthium desuper applicabat. Loco hujus radicis cucumeris sylvestris convenienter etiam radix bryoniae veræ recipi, & feliciter usurpari potest; si nempe.

℥℥. Rad. bryon. ℥j.  
Fol. absinth. M. ij.

Coqu. in aquæ.

In decocto spongia nova subinde immergatur, & calidè locus dolens foueatur, idque aliquoties, inungendo postmodum unguentum alabastrinum.

Sanè FORESTVS *l. 4. obs. 13.* GABELCHOVERVS, FONSECA, & plures alii Prædici, multum commendant radicem cucumeris asinini ad hemicraniam. His quoque irritis, præprimis ubi pituita viscida, hinc frigoris sensus observatur, adhibentur oleum Euphorbii seu costinum, item sequens Linimentum, quod FORESTVS *lib. 9. obs. 7. & 58. in schol.* describit, & ceu singulare commendat ad Hemicraniam:

℥℥. Euphorb. ℥j.  
Ol. dulciss. lbj.  
Dissolu. & ebulliant inuicem:

postmodum adde

Cera ℥ij.

f. Vnguentum.

Hoc ipso linimento dimidiè frontis & temporis parti & musculis temporalibus in hemicrania commodè inungitur, & admodum convenit ad hemicraniam, imprimis frigidam, ut vocant.

Aliàs euphorbium aceto dilutum, applicant lateri dextro, dolente sinistro, aut contra; nam & sic confert dicunt: vid. etiam BINNINGER in *observ.* Item

℥℥. Aqua rosæmar.

Salviae,

Serpilli an. ℥j.

Spiritus eberiacal. vel serplli, vel lilior. contr. ℥ss.

Xx

Spir-



*Spir. Cornu cervi vel sal. ammoniaci cum cal-  
ce virga 3ij.*

Misc. S.

*Aqua cephalica externa.*

Aliis irritis multi ad arteriotomiam, item ad sectionem venæ frontis confugiunt, de quibus consulendi Prædici.

XVIII. Denique in *Dolore Capitis mulierum ex utero*, seu *Dolore occipitis frigido*, specificus est *sacculus Harimanni ex succino pulverisato*, & spiritu vini, vel *essentia piperis*, cum spiritu vini extractâ, irrocatâ, citato loco §. 19. & ita crebrius applicetur. Sicuti etiam *emplastrum ex tacamahaca cum succino*, & oleo succini malaxatum admodum convenit in talibus muliebribus doloribus, talis capillis loco dolenti applicatum, vid. BARTHOLINUS Cent. 3. Epist. 14.

Hæc externa semper cum internis usurpentur, quia sola non sufficiunt.

## ARTICULUS VIII.

### DE

## DOLORIBUS ARTICULORUM

seu

### ARTHRITIDE.

**D**olent præterea frequenter articulationes quælibet in affectu, Arthritis dicta in genere, quæ in specie, pro articulorum varietate, in pedibus Podagra, in genibus Gonagra, in manibus Chiragra, in dentibus à STROBELBERGERO Odontalgia, in coxendicis articulis Ischiadicus Morbus seu Dolor appellatur. Præter quas partes tamen & scapulas & vertebrae colli, & interdum sternum occupat: Imò observavi in senæ admodum podagrico & alteram nasi quasi medietatem fuisse affectam. Arthritis ferè per paroxysmos affligere solet, extra quos, nisi in inveterato malo, satis comode habent ægri. Quoties imminet paroxysmus, alvus ferè segnior evadit, ægri molestiam quandam haud benè explicabilem circa præcordia sentiunt, consuetum excrementum intra pedum digitos non reperitur, & circa articulos tensio percipitur: Hinc supervenit dolor circa articulos, qui in incipiente podagra ut plurimum pollicem pedis majorem unius, hinc & alterius pedis, successivè occupat, hinc repetente aut procedente crebrius malo alia etiam loca successivè, genua, hinc brachia, occuparet solet. Dolor, quem percipiunt ægri, ferè triplex est, pungens, lacerans, & pulsans, plus minus tamen intensus: quibus interdum & dolor ardens simul accedit, cum tumore simul erysipelaceo, in Arthritis nempe sic dicta calida, quando acidum magis volatile & acre peccat, ruborque partis affectæ intensissimus & æstus accedunt: In qua etiam arthritide omnia symptomata sunt atrociora, sed simul paroxysmi sunt breviores, quàm in Podagra dicta communiter frigida, in qua acidum magis obrutum & viscidum, dolores remissiores, & tumor plus minus edematofus, cum nullo vel levi saltem rubore, affligit, diutius tamen persistente paroxysmo, nec tam facile evanescente tumore. Ægri ut plurimum anxii sunt circa præcordia in paroxysmo, præsertim in incremento ejus, minus in statu: Conqueruntur ægri de ardore seu aestu circa regionem stomachi, hinc frigida appetunt; item de gravissima siti & anxietatibus præcordiorum, stomachi monstrando regionem, quæ sunt eò graviores, quò minus potu se onerant: Appetitus penitus est prostratus, chylmata autem & blandè laxantia optime, anxietates has leniunt. Subinde accidit, ut cum crebrius repetito, sed inani vomendi conatu, affligat, sicque anxietates insigniter exacerbent: Imò observavi, quod cum lipotymia gravibus, subinde repetentibus, paroxysmus in principio & incremento ægros, præsertim inveterato malo laborantes, vexaverit, quæ pathemata tamen in ejus statu, dum dolores & tumores increverunt, & plures partes occupatæ fuerunt, penitus remisissent: Accedit ferè semper febris symptomatica continua, non adeò quidem acuta, magis tamen in principio paroxysmi affligens, mitius in statu, quàm ad febriam catarrhalem naturam accedere asserit SYLVIVS lib. 4.

Hæc ipsa symptomata etiam in dolore ischiadico ferè oc-

currunt, ubi dolor præter os & in articulo, ubi femoris caput inferitur coxendici, imprimis percipitur, etiam clunes seu nates hinc intra ossis sacri & lumborum regionem plus minus occupans; quin nervorum & membranarum connexarum & deorsum protensarum ratione, inferius verius suram & pedem usque, & ad extremum malleolum tandem extenditur, nosseque ferè gravius affligit: & quia partes primariò dolentes in profundo sub tegmine copiosorum musculorum, delitescunt, ferè nulla eximiseccus mutatio facta conspicitur.

Sæpius equidem dolores alii istam superiorem cruris, & coxarum regionem occupant, & subinde pertinaciter affligunt, non tamen præcisè dolorem ischiadicum constituunt: Confer. SENNERTUS Tract. de Arthrit. cap. 6. pag. 45. Quodsi crebrius redeant paroxysmi, ac pro more vehementius affligant, insigniter debilitantur articuli, ac motus eorum multum imminuitur, adeò ut tandem ad paralyticam quasi constitutionem redigantur, flaccescent simul, & in nutritione deficient, subinde laxentur. Interdum circa articulos contrahuntur & rigida manent membra, aut saltem intra articulos contrahuntur seu tophi & nodi colliguntur, qui motum articulorum impediunt.

Ischiadicus dolor speciatim ad claudicationem, nonnunquam coxa luxationem, aliquando cruris atrophiam, disponit. Imò si inveteratum fuerit malum, præsertim si in paroxysmi declinatione sudores neglexerint ægri, persistencia in articulis vestigia relinquit arthritidis, adeò ut levi occasione & vel fortiore saltem articuli motu & agitatione mox nonnihil recrudescat, aut saltem punctioibus supervenientibus se manifestet.

### PARS AFFECTA.

Pars affecta erit pars admodum sensibilis circa articulos saltem situata, adeoque nil aliud, quàm membranæ ligamenta, ipsos articulos vincientia & colligantia. Quinimò his affectis ipsum periostium in locis ossium articulationi proximis pati simul, probabile videtur ex acerbitate lacerante doloris, in profundo imprimis siti & apparenter ossium capita immediate afficientis. Sed quod articulos in specie afficiat, videtur esse ex synovia seu aqua glarcoli, Germ. das Glieder Wasser, quæ est ros dulcis chylosus, seu acido temperato turgidus, qui cum nutrimentum ligamentorum & membranarum, ipsorumque forsan ossium, abundans intra articulos collectus pro motu facilitando, & instar axungie oblinens ossium articulationes. Hoc seu appropriatum specificum arthriticorum acidi objectum inquinari imprimis solet, quo facto mox varia circa articulos pathemata superveniunt, dum partes vicinæ membranaceæ necessariò rodi incipiunt; hinc successivè synovia ista ab acido peccante instar albuminis ovi spissari, & tandem in cretaceam seu gypseam substantiam coagulari solet, ut patet ex tophorum seu nodorum intra articulos collectione, qui incisionis viâ exempti calceum & gypseum tophum omnino repræsentantur, & effectum, non causam arthritidis, constituunt: quorum tophorum examen chymicum videb. in KERKRINGII Spicileg. Obs. 28. & M. A. N. C. Append. ad Obs. 65. pag. 395.

### CAUSÆ.

Quoad Causam Efficientem: omnium optimè eadem in TACHENII Morborum Principe expressa & explicata videtur: Nempe acidum volatile spirituosum, sui tamen generis seu specificis saporis, spiritui insueto maritatum, synoviam imprimis & partes vicinas membranaceas inquinans & affligens, primarius tortor est. Prima huius acidum spirituosum origo est ex primis viis, quam potius ex depravata digestionem prima cum TACHENIO, quàm ex pancreate aut glandulis cum SYLVIO, derivare placet: adeoque non in pedum articulis ipsam podagram esse, rectè dicitur, sed eius solum fructum, cujus radix habitat in stomachi fermento vitali; ita ut licet dolens pes abscinderetur, podagra proinde non sanaretur. Quodsi maturè non occurratur malo, acidum illud spirituosum furtivè & successive acido stomachi fermentativo se associat, donec fermenti more pedetentim hoc superet; ita ut imposterum, nec naturali nec artificiali separationi obediat, adeoque lave-



inveteratum incurabile sit, ut eleganter loquitur TACHENIUS cit. l. p. 438. Hinc nempe

1. Hereditaria observatur podagra, cum spiritu in suo genitili odore acido podagrico communicato sortui. Nobilem curavi iuvenem, qui ab ineunte octavo ætatis anno sæpius podagra correptus fuerat, quod parens ejus & ipse insigniter podagricus in ipso paroxysmo eum genuerat.
2. Hinc etiam animi pathematibus gravioribus aut diuturnioribus curata observatur podagra, ut subitanea consternatione, aut ira insigni, aut merore diuturno, ut in divitibus vel pauperioribus factum: Conf. BARTHOLINUS Cent. 6. Hist. 28. LOTICHIIUS Observat. pag. 489. SALMUTH Cent. 1. Obs. 48. TACHENIUS Morbor. Princip. pag. 336. Quod etiam pertinet tortura, ex HILDANO Cent. 1. Observat. 79. Nempe perturbatio animi & spirituum peculiaris motus ac alteratio extinxit fermentum podagricum, aut saltem plus minus alteravit illud, principaliter quidem in stomacho primario, qui cum reliquis præsideat digestionibus, & has exinde alterari necesse est: vid. TACHENIUS cap. 1. pag. 357. & 360. quantum nempe animi pathemata fermenti digestivi & hinc digestionis primæ negotium alterent; quod etiam confidentiam agri erga Medicum vel remedia pertinere per se notum est.
3. Hinc ut plurimum etiam arthritici nephritici esse solent, eodem acido spirituofo utrobique autore.
4. Hinc læticitia modernorum methodo, sed continuato usu, ut invertantur quasi humores corporis, spiritus & fermentum digestivum, curant arthritidem.
5. Vini abusus, volatilis acidi ratione spiritus imprimis afficiens, plures in hoc malum præcipitat. Observanda tamen differentia inter vina; dum ea, quæ plus de tartaro vel acido faciliè fermentant in nobis continent, nocentiora sunt. Quod alia vegetabilia plus minus tartarea pertinent, ut rectè asserit GLAUBERUS. Ex spiritus vitrioli usu nimio TACHENIUS podagræ ortum notat, in Hipp. Chym. Hinc.
6. Abstinencia vini contra quosdam ab arthritide liberasse observata est: Videatur SENNERTUS cit. loc. pag. 16. Sic LOTICHIIUS in Observat. pag. 88. refert, podagram ex abstinencia per integrum annum cessantem, sed hujus copiosâ ingurgitatione recidivantem.

Ex eo est, quod in arthritide producenda tria ista vulgò nota seu causa remotæ principales conspirare videntur; dum Bacchus seu pater vini, quo innuitur nocturnum acidum, ex nimio abusu à fermento stomachico minus debite superabile ac corrigibile; Venus seu mater, quatenus repetito congressu post copiosos spiritus influos, chylo temperato alcalino prædites sub genitura forma succus nutritivus excernitur, & hinc nervosum systema insigniter debilitatur; & Ira, seu Obstetrix, commovendo contenta corporis & spiritus, & acidum volatile in nobis augendo, adeoque & spiritus influos asperiores reddendo, in producendo arthritidis sætu occupata rectè dicuntur. Distis ex causis & viri magis quam femine arthritidi obnoxii dicuntur, cum ex HIPPOCRATE Sect. 6. Aph. 29. mulieres non laborent podagra, nisi menses deficient; ut ut hodie contrarium experiri liceat, cum secundum SENECAM non natura, sed vita mulierum mutata sit.

Par ratio est Eunuchorum, quos nec podagra laborare, nec calvos heri olim HIPPOCRATES pronuntiavit; item puerorum, quos ante Veneris usum non laborare podagrâ asseruit. Quæ ita quidem sub præsci ævi innocentia & temperantia obtinuerunt; hodie verò ex parentum & avorum vitis ipsa progenies adhuc vitiosior nata, & ulterius exorbitans, dictorum veritatem eludit: Non secus ac ciconia inter podagræ remedia relata, tamen & ipsa podagrica observata in BARTHOLINI Ast. Haffn. Vol. 4. p. 154.

Scorbutici quoque admodum obnoxii sunt podagræ, quæ Estmull. Oper. Tom. II.

subinde eos atrocius affligit. Curiosum est, quod contagiosa interdum observata fuerit à BARTHOLINO Hist. Med. idque mediantibus vestibus in M. A. N. C. Ann. 6. & 7. Observat. 143. pag. 205. & Anno 9. & 10. Observ. 44. pag. 118. & 119.

Acido igitur arthritico spirituofo cum spiritibus quarvis occasione insignitus commoto, quod v. g. in motu corporis aut animi, aëre frigido, humido, pororum aperturam debitam prohibente, post effervescentiam in sanguine febrilem imprimis se insinuat synoviz, & hujus medio articulorum loca affligit, & cum hac ipsa simul aliqualem probabiliter effervescentiam facit; donec acido spirituofo maximam partem ab eadem intra articulos suscepto ulterius illa spirituum & humorum cesset agitatio, sed in articulis adhuc malum hæreat, non citius cessans, quam acido spirituofo saturato ab alcali, & in salum volatile mutato; hinc dolore cessante, fibrarum contractura cessat, & pori aperti magis liberiores transpirationem permittunt, quo facto omnia reliqua symptomata abfunt.

Sed observandum, crebrius vel recurrentes paroxysmos, vel diutius articulos affligentes, relinquere sui vestigia, hoc est, ultra partis dolentis debilitatem, ex spiritus insiti aliquali deficientia, obruti plus minus à spirituofo acido peregrino, & fibrarum nervorum relaxato tono, ipsis partibus membranis solidis antea dolentibus infixæ permanere de acido peccante occulta spicula, quævis & facili occasione ac motu in actum dolorosum excitabilia, & spirituum reliquorum hinc facta commotione, paroxysmum novum provocantia. Nempe ex acido isto podagrico, imprimis in fermento digestivo stomachi commoto, & hinc totum corpus penetrante, anxia ista præcordiorum pathemata originem ducunt. Patet autem ex distis, ut in quovis paroxysmo debilitentur plus minus articuli seu partes solide, fluidas tamen, tam humorosas quam spirituosas, eo ipso quasi depurari: si quidem non tantum acidum illud spirituosum spiritibus saturatum, dum synoviam inquinat, illorum spirituum consortium plus minus deserit, sed etiam subinde alia massæ sanguineæ heterogenea fermenta, febrili effervescentiâ secreta, nunc una circa loca dolentia colliguntur ex fibrarum partium dolentium contractura, nunc per sudorem excernuntur in declinatione; sicut in incrementum hi ipsi moderatè proliciunt maturant articulorum ab acido podagrico invasionem, & hinc abbreviant insigniter paroxysmi tempora.

Hæc ipsa etiam patefaciunt, quare tam varia & mirabilia pathemata subinde accidunt, acido podagrico alias partes, ac frequentissime nervosos plexus, occupante, extra articulos, quæ omnia superveniente paroxysmo cessant: vid. Misc. A. N. C. Ann. 6. Observat. 208. pag. 307. Sic arthritidem in colicam, & contra, mutabilem refert CASTRO: Epilepsiam gravem notat LOTICHIIUS: sicut paroxysmo non ritè procedente, nec acido volatili sufficienter excluso, vel ob internatum partium defectum spiritibus istis languentibus, & acido podagrico nimis in contentis corporis dominante, vel ob externorum ineptam applicationem, tam diuturna virium prostratio & languor & appetitus deiectus supersunt: Interdum palpitatio cordis, sæpius tussis sicca, aut sæpius adhuc asthma occulta convulsiva, subinde ipsa mors, superveniunt.

Quoties arthritici, quibus plures articuli alias occupari solent, paroxysmo corripiuntur, qui non more consueto successive articulationes istas quoque occupet (nisi per curam præservatoriam malum plus minus in radice mitigatum fuerit) si vel diutius languidi permanent, vel brevi post novo paroxysmo corripiuntur, vel alius gravioris morbi, aut etiam mortis ipsius periculum subeunt. Id quod notavit etiam SENNERTUS de Arthrit. cap. 4. ut & HOEFERUS Herc. Med. pag. 222. Hinc in podagricorum vel leviter confirmatorum, & aliis morbis correptorum cura ad acidum podagricum simul respiciendum venit, quod in omnibus aliis morbis symptomata intendere, & morbum vel graviores aut contumaciorem reddere solet, idque tamdiu ferè, donec vel ipsum vi naturæ aut artis correctum fuerit, aut artus occupavit, quo facto omnia remissiora & leviora mox apparere solent.



## PROGNOSIS.

Ex haftenus enarratis Prognoseos maxima dependebit ratio. Nam *Arthritis morbus lethalis non est*: saepe enim arthritici *diu vivunt*, senesque fiunt, unde quibusdam sana aegritudo dicitur, & potius ex podagra deficiente, quam eadem ordinariâ ratione superveniente, moriuntur.

Quoties alvus segnior est, & consuetum excrementum intra pedum digitos non reperitur, & crura intumescunt, paroxysmum instantem significari dicitur TACHENIUS *Morb. Princ. pag. 172.*

Curatio eius perquam difficilis est, tam in, quam extra paroxysmum, idque eo magis, quod magis inveterata fuerit: hinc quoniam saepius in primis paroxysmis negligitur, facile successive incurabilis evadit.

RHUMELIUS eleganter distinguit inter podagram haereditariam nodosam, & solutam: & hanc curabilem, illam incurabilem ait. Sed tamen etiam soluta, nisi recens, subinde inter incurabiles refertur.

Inter omnes arthritidis species *ischiadicus dolor gravissimus est*: nihilominus tamen in principio facilius quam ceteri curari solet; sicut in progressu aequè rebellis esse solet.

In senibus Arthritis incurabilis est.

Si articulo principio nervorum proximos afficit, & graviora symptomata conjuncta habet, difficilius curatur, & saepe mortem portendit: vid. SENNERTUS *loc. cit. p. 25.* & DRAWIZIUS de *Scorbuto p. 21.*

Si in arthritide contingat luxatio, difficulter sanatur, aut prorsus insanabilis est, membranis & ligamentis nimis laxatis, repositum membrum membranis & ligamentis non firmantibus. Ut taceam intra articulos ex synovia coagulata collectam materiam curam impedire: Hinc HIPPOCRATES *sect. 6. aph. 59.* Quibus diuturno coxendicium dolore infestatis coxa excidit, rursumque incidit, iis mucos supergeniunt.

Si dolores sensim ingravescentes ad iugulum & superiores partes transierint, perniciem minantur: Item quod plura & frequentiora conveniunt symptomata, eo difficilius curantur; ut sit, quando ab externis repellentibus aut stupefacientibus aegri in anxietates, asthma, colicam, epilepsiam, convulsiones, palpitationem cordis, lipothymias, aut alia mala incidunt.

Dolor ischiadicus quidem acerbissimus est; in principio tamen sui interdum reliquis arthriticis doloribus facilius sanatur: sicut temporis progressu femoris luxationem, claudicationem, & atrophiam inducit; quod similiter in arthritide vaga attendendum: vid. DRAWITZIUS de *Scorb. p. 23.*

Solvitur Arthritis sepe quatuor modis:

1. Ordinariò ferè in totum finito paroxysmo discedit morbus in articulo, ut nullum sui relinquat vestigium, nisi successu temporis superveniant topi.
2. Rarum est, quando tumor podagricus in materiam ichorosam aut saniem purulentam mutatur, quæ partibus intercutaneis erosiores exsudet.
3. Quando topi post paroxysmos relinquuntur.
4. Quando incipiens paroxysmus sua tempora non absolvit, aut planè deficit, acido podagrico alias partes extra articulos occupante: id quod pessimum est, & mille mala post se trahit.

## CURA.

Quoad Curam, duo respicienda sunt tempora:

1. Tempus paroxysmi, ut curetur.
2. Tempus extra paroxysmum, ut praeservetur.

Quoad paroxysmi tempus: cum in hoc imprimis motus naturæ vigeat, cuius impetu ille excitatur, unde ex deficiente naturæ robore deficientibus paroxysmis aegri in periculoso sunt statu; ob id non sistendus, sed promovendus, impedienda removendo, acidi specifiçi vini maturè infundendo, urgentia nimis symptomata mitigando, semper simul pro legitima remedium administratione quatuor particularia morborum tempora attendendo: Adeoque

I. Ingruente podagra Vomitus convenit, sed praemisso digestivo absorbente ex lapidibus cancrorum preparatis, oileocolle, & sale tartari. Nam acidum ejus oritur in

stomacho: hinc imminente podagra, appetitus sine manifestâ causa est prostratus, & sudores consueti aliis spontè supprimuntur. De quo vomitus usu vid. HILDA-NUS *Cent. 6. Observat. 84.* MERCATUS de *Morb. Intern. lib. 3. cap. 18.* RIVIERIUS *Prax. lib. 16. cap. 1.* & SYLVIIUS in *Praxi Tract. 8. §. 152. 154. & 156.* Sin minus vomitus institui queat, Purgantia blanda, sed mistis temperantibus acida, v. g. ossibus humanis preparatis, vel calcinatis, &c. in primo principio instituta, conducunt; aut si, præter Clysmata, in cursu paroxysmi aliquid peragendum, infusum sennæ passulatum, aut pilule aloeticæ saltem, vel solæ, vel cum appropriatis propincentur, ad imitationem TACHENII *l. 4. p. 439.* Vel passulæ laxativæ, pruna laxativa.

Vel

2. Crem. tartari,  
Salis absinth.  
Arcan. duplicat. an. gr. viij.  
Diagryd gr. iij.  
M. f. pulvis: S.  
Pulvis arthriticus laxativus.

2. Conf. rorismar.  
Salviae an. ʒvj.  
Pulv. antipodagr. purg. Parac. ʒiʒ.  
Mag. talapp ʒʒ.  
Cum Syr. de spin. cerv.  
f. Eleqtuarium  
D. S.

Eleqtuarium arthriticum laxativum pro aliquot vicibus.

Alias Purgantia qualibet vitanda, utpote quæ in paroxysmo magis nocent, quam prouent; æger enim, ut monet HARTMANNUS in *Prax. Chymiatr. cap. 32. §. 2* in paroxysmo medicamentis purgantibus non desatigetur, sed afflictione liberetur. Sanè in arthritide, id quod peccat, purgando minus aufertur, sed contenta turbantur, spiritus irritantur, & malum exasperatur: Conf. TACHENIUS *l. 4. pag. 149. & 151.* & SENNERTUS *Tr. de arthrit. Quæst. 11. pag. 104.* In statu tamen paroxysmi, ubi malum contumacius in articulis hæret, ac febris & alia symptomata planè intermiserint, Purgatio blanda institui potest ad imitationem Riverii per Mercurium dulcem & scammonium sulphuratum: vel mercurius dulcis misceatur cum aloë; vid. VELSCHIVS *Medicomm. 4. Cent. 1. annex. M. A. N. C. Anno 4. & 5. Vel*

2. Mass. Pilular. de trib. Russi.  
Extr. helleb. nigr. an. ʒʒ.  
Turb. mineral. cum spiritu Sulphuris par.  
gr. iij. vel iij.  
M. f. pilulæ S.

Pilula arthritica purgantes.

Laudatur etiam radix bryonia ad ʒʒ. in infuso, vel ejus syrupus ad ʒʒ.

II. Opiata sunt nunquam ferè proficua, nec internè, nec externè; sic enim malum contumacius reddunt, utut dolores remittant, motumque naturæ impediunt, & ut vocant, conservant podagram in corpore. Imò abusus opiatorum ad paralytin arthriticos disponit: vid. M. A. N. C. *Ann. 4. & 5. Append. pag. 335.* Adeoque cautè usurpentur, nec, nisi præmissis universalibus, nec nisi adjunctis purgantibus, aut sudoriferis, aut specificis; vid. HILDA-NUS *Cent. 6. Hist. 85.* PLATERVS *Prax. Tom. 2. cap. 17.* & RIVIERVS *Prax. lib. 16. cap. 1.* Suspicionem tamen, commodè propinari posse eadem ingruente paroxysmo, præmissio vomitu cum specifico sudorifero. Quoad mistionem cum Purgantibus: illustant hoc pilula antipodagrica Rhumelii, quas vocat: *Veni Amice, surge & ambula.*

2. Mass. Pilular. aloepbang. ʒi.  
Laud. opiat. ʒʒ.  
M. f. Pilulæ.  
div. in 4. part. ʒqu.

Quarum una pars in vino assumenda & tribus vel quatuor horis jejunium imperandum.

Conf. etiam quoad opiatorum usum VELSCHIVS *Hecat. 2. obs. 27.* Mistio verò cum diaphoreticis etiam vulgò nota est; inter quæ salia volatilia blanda, & spiritus salino-volatiles, opiatas mista, qualia sunt spiritus salis ammoniaci, spiritus cornu cervi, cranii humani, item spiritus tartari volatilis, proliciendo sudorem præ ceteris conveniunt. Præter hæc, fixa acidum absorbentia, uti ossa microcosmi præparata, antimonium diaphoreticum, cinnabaris antimoniæ, bezardicum solare, &c. opti-



optimè conducunt, imprimis si sal volatile cornu cervi aut viperarum aut sanguinis humani addantur. Et quidem cum subinde apud nos radix podagræ sit à scorbuto, his commodè spiritus lumbricorum terrestrium per fermentationem paratus; item essentia contra arthritidem vagam, item spiritus cochleariæ, &c. istis diaphoreticis adduntur. Hæc enim volatilia & fixa acidum vitiosum absorbent; opiata vero dolorem temperant: v. g.

℞. Lapill. cancr. pr. sp.  
Arcan. dupl. Mmf. an. gr. xij.  
Salis vol. succin. gr. vj.  
Laud. hyster. gr. iij.  
M. f. pulvis: S.

**Pulvis arthriticus sudoriferus pro una vice.**

℞. Theriac. ℞. ad ℞j.  
Salis Absinth. ℞j.  
Sumatur in haustu vini pro sudore.  
D. S.

**Electuarium sudoriferum pro una vice.**

℞. Aqua fenicul.  
Card. bened. an. ℞ss.  
Spiritus lumbr. terr. per putr. ℞ss.  
Sal. ammoniaci  
Mag. corall. cum suc. citr. an. ℞ss.  
Laud. opiat. gr. ij.  
Syr. cort. aurant. ℞ss.  
M. S.

**Potio arthritica sudorifera.**

III. **Vena sectio** in Arthritide, qua tali, inutilis est; quin sine necessitate aut intempestivè adhibita potius multum nocet, vires debilitando, & naturæ motus ad articulos impediendo, ut observavit BECHERUS *Phys. subterr. lib. 1. pag. 493.* Adeoque non nisi Plethoricis, aut quibus insigniter sanguis bullit, idque saltem in principio, antequam plures articuli perfectè jam occupati sunt, eadem interdum locum habet: Vid. CRATO apud Scholtz. *Cons. 239.* MERCATUS l. a. RIVERIUS *Observat. 9.* à MARSINO *communic. pag. 295.* SYDENHAM de Podagr. *pag. 35.* & WILLISIUS de Anima Brut. *lib. 2. cap. 14.* Loco Venæ sectionis quidam in usu habent, ut sub incremento dolorum cucurbitulas sacrificatas adhibeant, hinc loco sacrificato sal commune probe costum adspargunt, auxilio quidem doloroso, sed interdum proficuo. Probè tamen observandum, ubi affigantur cucurbitulæ, & incisiones fiant, ne tendines aut nervæ membrana sub cute delitescentes periculosè lædantur: ac sanè in profundiore vulnere non aperta nos abstrahere debent ea, quæ habet HOFFERUS in *Herc. Med. lib. 4. cap. 1. pag. 220.* In dolore autem ischiadico in principio paroxysmi venæ sectio ut plurimum necessaria est, præsertim si dolor cum pulsatione est conjunctus: (vid. POTERIUS *Cent. 3. Curat. 94.*) idque ferè in crure dolente, si fieri potest commodè ad derivandum, rarissimè in brachio ad revellendum, nec nisi in summè plethoricis, aut ubi aliæ circumstantiæ id urgeant. Et quidem si dolor in crure magis extrorsum vergat, secunda vena ad malleolum externum, ob usum insignem Ischiadica dicta; si vero dolor magis introrsum vergat, vena saphæna aperienda. Quando autem venæ sectionem non instituere volumus, commodè ejus loco in lumbis potest sacrificatio institui. Conferatur de venæ sectione & cucurbitularum & articulorum applicatione in malo ischiadico SANCTORIUS in *Method. Vitandi Error. pag. 189.*

IV. **Alvus** ut plurimum *seignoir* in paroxysmo esse solet, & qui purgantibus vix auscultat, hinc dolorem, febrem & anxietatem præcordiorum ferè intendit: adeoque clysmata emollientia & abstergentia sunt optima; vel usurpentur pilulæ aloëticæ saltem, vel alia blanda Laxantia, de quibus *suprà.*

V. His ita pro circumstantiarum circa ægrum ratione probè variè determinatis, in paroxysmo utramque faciem paginam absorbentia, seu acidum invertentia, & blanda diuresi ac diaphoresi imprimis successivè efficiunt. Siquidem ex CRATONE refert Sennertus: *quamprius, minus sudor desinetur aut inbibetur, maxime si consuetus foret, imminet paroxysmus podagricus; adeoque ex opposito summè proficua erunt diaphoretica.* Conveniunt autem tam fixa, si in primis viis adhuc persistat alteratio, in principio & incremento; quàm volatilia, si jam malum sit in articulis, præsertim in statu.

*Etymull. Oper. Tom. II.*

Illa sunt partes animalium doræ, ossa microcosmi præparata, quæ commendat TACHENIUS l. a. *salia fixa, antimonialia, antimonium diaphoreticum, bezoardicum solare, & cinnabarina, &c.* imprimis si cum sale volatili cornu cervi aut viperarum aut sanguinis humani acuantur: e. g.

℞. Corall. rub. prap. ℞j.  
Cinnab. antimonii ℞ss.  
Salis vol. cornu cervi ℞j.  
M. f. pulvis,

cum vel sine laudano opiato in statu paroxysmi.

Hæc verò sunt salia & spiritus urinosi volatiles, quos inter spiritus cornu cervi, cranii humani, spiritus tartari volatilis, spiritus carminativus, item spiritus salis ammoniaci, proficiendo sudorem, præ cæteris primatum ducunt. Quin decocta lignorum temperatiora, in specie ex radice sarsaparillæ, chinæ, bardanæ majoris, aut ligno juniperino parata & subinde propinata, commodissima sunt: Sic SALMUTH. *Cent. 3. Obs. 74.* refert podagram hereditariam universalem, decocto lignorum curatam; item RIVERIUS *Cent. 2. Obs. 50.* Dolores arthriticos contumaces per decoctum lignorum curatos refert. Et quidem, cum subinde apud nos radix podagræ sit à scorbuto, his commodè spiritus lumbricorum terrestrium per fermentationem paratus, item essentia contra arthritidem vagam, item spiritus cochleariæ, &c. istis diaphoreticis adduntur. Huc facit quoque Trifolium aquaticum seu palustre, quod in cerevisia costum & usurpatum mirè arthriticos juvat: M. A. N. C. *Am. 4. Observat. 123.* tam curandi quàm præservandi sine usurpatur: Sic PETRUS JOHANNES FABER arthriticis antiscorbutica cum successu dedit, nempe succum cochleariæ & anagallidis aquaticæ cum spiritu vini tartarificato: Vid. VELSCHIUS l. a. *Observ. 46.* De sudoriferorum usu confertur HILDANUS *Cent. 5. Observ. 53. & Cent. 6. Obs. 23.*

VI. **Quoad Topica seu Externè applicanda, observandum:**

1. Quod non debeant esse adstringentia, austera, acida, aut cuti ejusque fibris molesta, quæ harum contracturæ & clausuræ malum potius exasperant, tumorem & igneum fervorem magis accendunt, Repellentia ob id dicta; unde quælibet reiicienda.
2. Non nisi præmissis universalibus locum habent, adeoque non maturanda eorum admotio, cum vix præterquam in fine incrementi aut statu paroxysmi, articulo sint applicanda.
3. Sint talia, quæ & acidum blandè (hoc est, sine effervescentia excitata) corrigere, illud in salum mutare, & hinc transpirabile reddere, ac simul dolorem suaviter lenire possunt; unde hic anodyna (narcotica enim quantum possibile fugienda, vid. MERCATUS l. a. & SYDENHAM *pag. 114. & 118.*) ibi discutientia dicta locum habent, utrobique alcalia temperata sunt optima.
4. Habeatur simul eorum delectus debitus, considerando & cætera dolori adjuncta symptomata, ardorem, tumorem, ruborem &c., utut, quoad externa talia, certè quid pro quovis subjecto universaliter determinari nequeat, quia uniuscujusque ferè ægri specialis idiosyncrasia multum variat, adeoque huic auxilium fertur à remedio, à quo alius detrimentum capit.

Ex innumeris pauca annotasse sufficiat: Nempe in Podagra calida aqua spermatis ranarum legitime destillata calida, vel sperma ranarum per transcolationem depuratum cum aliquot granis camphoræ, vel paucis spiritu salis ammoniaci simplicis mistum, & in statu applicatum: vid. TACHENIUS in *Hipp. Chym. cap. 19. pag. 148.* Eiusdem *Clave pag. 204. & Princ. Morb. pag. 193.* ubi modus procedendi & cautelæ habentur: Item Spiritus cancrorum fluviatilium non aded exactè redificatus, aqua articularis ad extra, magnanimitatè, spiritus lumbricorum terrestrium, spiritus fornicarum, vel per se vel cum spiritu lumbricorum mistus, spiritus vini crocatus & camphoratus, præprimis à roremarino redificatus, item spiritus vini camphoratus cum Saccharo saturni, spiritus theriacalis camphoratus, spiritus urinae, spiritus salis ammoniaci cum spiritu vini mistus;



gus mixtura ex calce viva & sale ammoniaco affundatur spiritus vini, & huic destillato addatur camphora; sic optimum habebitur specificum in inflammationibus podagrae. Hæc acidum podagricum dolorosum & ardores potenter extinguunt, & sic arthritidem cum inflammatione junctam tollunt: c. g.

℞. *Aqua artic. ad extra.* ℞ij.  
*Spiritus sal. ammoniaci* ℞ij.  
M. S.

*Aqua articularis ad extra.*

Applicetur, præmisso Fotu ex lixivio coriari-

rum.  
Vel

℞. *Aqua artic. ad extra* ℞ij.  
*Spiritus lumbri* ℞ij.  
*Sal ammoniaci* ℞ij.  
M. D. S.  
*Spiritus ad extra.*

Elegans existimo remedium, quod commendat LIN-

PANUS:

℞. *Pl. Sambuc. contus.* q. v.

Inilce ollæ recenti, donec exactè plena sit: hanc bene clausam sub terra desode, donec flores in liquorem abierint: sed necesse est, sicut per aliquod tempus donec flores computruerint.

Hunc liquorem calide cum linteo applica, egregiè compescit dolores. Egregium etiam in erysipellate dicitur remedium.

Alii recipiunt flores verbasci, illisque ampullam vitream replent, & orificio obturato solt exponunt; sic enim in liquorem diffuunt, qui cum linteo parti affectæ impositus, dolorem lenit. *Res est mirabilis & expertissima in omni dolore podagrico sistenda*, dicit RAYUS; Et credo, quod liquor talis propter acidum temperatum, putredinis motu extraversum, multum proficit pro usu externo. Idem dicitur de liquore ex radice vitis albæ rasæ seu bryoniz, simili ratione, aut ex radice excavata, & proprio operculo testæ, parato, qui locis podagricis illitus egregiè confert; sicuti etiam cum floribus hyoscyami eodem modo liquor summè anodynus haberi potest. Vel flores sambuci in lacte cocti pro fotu subinde applicentur. Porro folia Valerianæ majoris recentius imposita, & subinde renovata, aut folia bardanæ majoris ob sal nitrosum conquassata nonnihil durioribus nervis & parti molliori imposita egregium levamen asserre observavi. Lac & omnia lacticia, alcali oleoso turgida, itidem mitigant dolorem & ardorem, præsertim quando cum hyoscyamo simul ebullierit; hinc usitatissimum est cataplasma, factum ex medulla seu mica panis (Gemm) in lacte decocta, additis aliquot ovorum vitellis cum croco; & cataplasma ex floribus chamomillæ & lentile aquatica, in lacte decoctis, cum farina hordei applicatum: cui & inferiunt Melilotus cum Malua & Althæa, Organum, satureja, artemisia, betonica, lauendula, &c. f. gr.

℞. *Medull. panis tritic.* ℞ij.  
*Pulv. rad. alab.*  
*Flor. Chamom.*  
*Far. fabar. an.* ℞ss.  
*Far. sem. lini,*  
*Fenugr. an.* ℞ij.

Coqu. in f. q. lactis ad consistentiam pultis, adde

*Ungu. anod.* ℞j.  
*Bals. Sapon.* ℞ij.  
*Vitell. ovi* Num. j.  
M. f. Cataplasma

D. S.

*Cataplasma dolorum sedans.*

Hic caseus ovillus recens planè impositus egregium venimen præstat. Item optimum malagma præbet vetus & uermiculofus caseus cum jure, in quo perna suilla adtalem decoxerit, quod articularum etiam topis multum prodesse dicitur. Caro bubula, alcali ditissima, lacti & prædictis ferè omnibus præfertur; huius enim frustum crudum sine pinguedine partem dolentem superligatum, manè & vesperti mutatum, feliciter dolores compescit, locum nigredine conspurcatum relinquens. Insuper pulvis radicis consolide majoris cum aqua communi in pul-tem coctus, quæ minimi digiti grossitie loco dolenti applicata, podagram novellam inuasionemque primam opti-

mè mitigat; Vid. TACCHENIUS *Morb. Princ. pag. 198. & seqq.* Hinc stercus bubulum, & quod præstantius, stercus humanum optimè dolores hos sistunt. Cataplasmate sequenti HILLERUS feliciter usus fuit, quo una nocte dolorem & tumorem in genubus & pedibus maximum curavit:

℞. *Stere. bovis* ℞j.  
*Aqua rosar.*

*Veron. an.* ℞ij.

*Album. ovi, cum frusto alum. conquassis,*  
Num. j.

*Croci* ℞j.

*Camph.* ℞j.

Misc.

Facit huc etiam uripa humana, præsertim nonnihil putrefacta, egregia anodyna, vel per se, vel cum adjecto cinere communi ex balneo destillata; vel aqua, absorptiva ex salis ammoniaci pulverisati & alcali tartari ana in aqua simplici soluta: vid. TACHENIUS *l. a. pag. 197.* Hinc CNOEFFELIUS in usu habuit extractum cassiæ fistulæ cum spiritu vini parti affectæ imponendo: sicut & stercus hircinum cum urina ægri subactum, & instar cataplasmatibus applicatum, egregiè convenit. Vel recipi potest urina vacæ mense Majo, & imponi pedes aliquamdiu: dein imponatur emplastrum Norimbergense, vel, quod melius, emplastrum de alcalibus Tacheni, cum vel sine camphora pro circumstantiarum ratione, vel emplastrum de spermate cæti. Denique calx viva propter suum alcali hic locum habet: nempe si aquæ calcis vivæ imponantur pedes, extrahit dolorem, & resolvit tumorem. Item urina, in qua calx viva extincta est, applicata bene convenit; loco cujus urina ætustior usurpari potest. Sunt, qui ceu singulare remedium podagricum laudant, recipiendo spiritum vini septies vel octies super sale tartari rectificatum, affundunt hunc calci vivæ, abstrahunt fortiter; hinc enim spiritus vini uim subtilissimam & penetrantissimam tartari articularum resolutivam acquirit, & ut per sudorem possit euacuari, hunc disponit. Quod si spiritus hic accensus desagret in cochleari, relinquit pinguedinem butyrosam, & ipsam pro illitione contra podagram admodum accommodatam, meliorem, quam ipse ferè spiritus, qui citra metum applicari potest. HAUPTMANNUS miscet tinduram tartari acerrimam cum saccharo saturni, quod, tanquam arcano in podagra, affectum locum illinire jubet, & mirandos effectus promittit. Denique suffusus ille ex decocto scobis corticum ligni abietini & querni coriariorum, cum urina humana, egregius ad quamcunque Arthritidem est, ut partès affectæ eo foueantur; hoc ipso enim Comes quidam à podagra contractus factus, restitutus dicitur: vid. M. A. N. C. *Ann. 6. & 7. Observ. 229.* Forsan lotio cum ipso decocto non esset incongrua: Vel

℞. *Lixiv. Corarior.* ℞ij.

*Urina human.* ℞ij.

M. S.

*Fotus ad extra.*

Pertinent huc Saturnina, in specie saccharum saturni cum appropriatis applicatum: nempe solutio ejus in spiritu vini aut spermate ranarum, additâ paucâ camphorâ. Hinc quidam emplastrum de spermate ranarum rite paratum copiosiore addito saccharo saturni, non sine effectu applicant. Curaui virum, qui habuit dolores arthriticos in genu cum aliquali rubore erysipellato, cui optimè conferebat emplastrum de spermate ranarum, cum copioso saccharo saturni: cum denud posset ambulare, pro spina infixa euellenda ordinavi aquam arthriticam ad extra cum spiritu salis ammoniaci, optimè habebat per quinque vel sex dies: Sed abusu huius spiritus recrudescere paroxysmus, & intensior fiebat à spiritu. Pertinent huc emplastrum ex alcalibus Tacheni, & emplastrum bina *Barbette* multum laudata ad podagram, tam calidam quàm frigidam *lib. 1. cap. 4.*

Fugienda sunt nimis unguenta pingua, quæ poros oblinendo malum sepiusculè potius exasperant, & insensibilem transpirationem inhibendo, tandem contumaces contrahunt inferunt; unde loco unguentorum emplastrum, varia nervinis constantia, & cataplasmata dicta calidè adhibenda sunt. Hæc ipsa tamen sæpius renovanda, ne actuali suo frigore postmodum stricturam pororum inferendo, malum exasperent.

Quoad



Quoad podagram frigidam si dictam: spiritus vini cum spiritu salis ammoniaci, præsertim cum calce viva parato, convenit. Sapo Venetus uti in quavis podagra, ita in specie in frigida laudatur: Nempe volatilibus subinde sunt iungenda oleosa quasi ferventia, v. g. destillata Tacamahacæ, fuliginis, tartari, &c. rectificata. Recipiatur Sapo Venetus, solvatur in spiritu vini & aqua sambuci, & ita illinatur cum pluma parti dolenti. Vel ad imitationem Doctoris MICHAELIS;

℞. Sapon. Venet. ℥ij.

Campb. ℥vj.

Croci ℥ss.

Spiritus lumbricor. terrestr. q. s. pro solutione.

Misc.

Quæ illinantur cum penna partes dolentes calidè.

Coincidunt hæc cum Balsamo antipodagræico Rhumellii;

℞. Coag. sulphuris animalis & alcali,

id est, Sapon. Venet. ℥ij.

Gum. mercurial. & sulphurea natura,

id est, Campb. ℥ss.

Quins. Essent. Vegetabilis,

id est, Spirit. Vini q. s.

Digerantur, & separatim speciebus reliquæ ad usum referentur, & cum linteis parti dolenti applicentur.

Siquidem in forma liquida quæ adhibentur, majorem, sæpe & tutiorem effectum relinquunt. Loco spiritus vini melius recipitur spiritus lumbricorum terrestrum.

Alii saponem Venetum liquefaciunt cum spiritu vini super carbones, addito oleo juniperi & petroleo faciunt unguentum & applicant.

In specie oleum destillatum saponis Veneti est potens remedium, præsertim in Arthritide frigida; hinc etiam in dolore ischiadico egregium est idem. De usu ejus polychresto in Doloribus podagricis vid. HORSTIUS lib. 2. Observat. 23. Sicuti præparationem ejus cum addita calce viva & camphora idem describit lib. 8. Obs. 2. Oleum petrolei, in quo decocta est radix hellebori nigri, laudatur ab HARTMANNO in Prax. Chymiatr. ubi de Arthritide §. 14. & confirmatur ceu expertum à LINDANO, uti & balsamum Peruvianum cum vitello ovi & aqua articulari seu spiritu lumbricorum mistum. Aliis convenienter usurpantur Tacamahaca vel Caranna, malaxata cum oleo succini; emplastrum ex pice; ac Poterii ex pice, navali & sulphure; vel emplastrum diaphoreticum Mynsichi, malaxatum cum oleo destillato tartari fixido vel succini applicatum est egregium.

Vel

℞. Empl. diaphor. Myns. ℥ij.

Liquefacto addè

Theriaca. ℥ss.

Malax. cum ol. philosophorum vel potius cum tartari fixido:

D. S.

Emplastrum.

Si inflammatio circa articulos adsit, optimè miscentur cum camphora. Convenit etiam ad discutiendos tumores in declinatione podagræ relictos.

Vel ad imitationem POTERII paratur emplastrum in Idea Form. class. 5. §. 5. Hisce etiam Opti ejusque tincturæ tantillum subinde addendum venit: magis tamen in arthritide calida quàm frigida. Theriaca emplastri modo applicata etiam vi anodynæ egregie convenit, cui subinde in calida de sale absinthii, in frigida de spiritu salis ammoniaci plus minus addi potest. Alia remedia externa, & compositiones elegantes & multiformes, videbitis in M. A. N. C. Ann. 1. obs. 142. pag. 318. & Ann. 6. & 7. Append. pag. 158. seqq. Ann. 9. & 10. Observat. 80. ubi Balsamum arthriticum, & cera Catholica Burri, cuius compositionem etiam dedi in Collegio Pharmaceut. in Schraderum p. 2. pag. ....

VII. Vesicatoria ex cantharidibus an convenient? equidem doloris ratione dubium videtur: sed cum balsamus iste ex sapone Veneto, item inunctio cum oleo saponis, pustulas in loco dolente excitent, ex quibus ichor acris profluit cum tali ægri usu, ut rariùs redeat paroxysmus, sicut etiam observavit HORSTIUS lib. 2. Observat. 23. & illa ipsa vesicatoria subinde optimè contulisse visa fuerint, (cons. Ab Societ. Reg. Vol. 1. pag. 533.) sanè haud dubio, quin interdum, idque, ut suspicor, in podagra

Est null. Oper. Tom. II.

frigida, ubi acidum intimè magis viscidior aut copiosiore synovia sociatum, pertinaciter circa profunda articulorum & ossium loca heret, proficua esse queant; cautè tamen, monente SYLVIO de Arthrit. §. 182. in ischiade inveterata in loco affecto applicata proficua observata fuerunt: vid. BORELLUS Cent. 4. Observat. 53. siquidem in SCHENCKII Observat. refertur ischiadici morbi fortuita, excitatis copiosis vesiculis, curatio. Ut sanè illud Moxæ Sinica, quæ haud ita pridem tanquam specificum, ad hunc affectum innotuit, auxilium, cui tamen & nostratum vegetabilium lanugines substitui possunt, v. gr. artemisiz, Marrubii aut Stoechados, haud alià ratione, quàm ratione escharæ aut pustulæ, ceu cauterium, actuale, licet levius, prodesse videatur? Ut taceam externi ignis acidum in interno evacuando fortè non parum conferre.

VIII. Tophos quod attinet arthritidis paroxysmi residuos, decura eorum vid. HARTMANNI Praxis: præstans imprimis est emplastrum ejus attractivum, §. 39. etiam CNOEFFELIO usitatum in M. A. N. C. Ann. 6. & 7. Append. pag. 163. Præterea & casei veteris cum decocto carnis suillæ applicatio hic proficua est; nam cutè disrupta successive topis exitum parat. Emplastrum de ranis cum Mercurio à quibusdam modò malagmate ex caseo putri & spiritu vini vidi obtemperare. Plumbea bractea subtilis imposita per mensem juvat, aut saltem uberius incrementum prohibet ex ZACUTO LUSITANO lib. 2. Prax. Admir. Observat. 178. Egregius quoque est spiritus calcis vivæ, de quo supra dixi, si illinatur.

IX. Quoad Malum ischiadicum, cujus Cura nonnihil variat à cæteris in hoc, præmissa venglectione, ut supra monitum, etiam præterea hirudines subinde locum habent, si hæmorrhoidibus applicentur, siue etiam ipsi loco affecto. Quoad prius; FORESTUS lib. 29. Observat. 4. refert, Arthritidem quamplurimorum articulorum tertianæ intermittenti succedentem, ex hæmorrhoidibus restrictis, quibus dequò fluentibus arthritides cessant. In tali ergo casu hirudines applicatæ hæmorrhoidibus sunt optima: Nam SCHENCKIUS refert in Observat. coxæ dolorem hæmorrhoidum fluxu curatum: sic ZACUTUS LUSITANUS lib. 2. Prax. Admir. observat. 162. ischiadicum venæ sectione & aliis nll juvantibus, hirudinum usu ano affixarum, curavit. Idem cit. l. observat. 159. refert coxæ dolorem, hirudinum succu supra partem affectam sanatum, quod idem in aliis arthritidis speciebus prodesse ait. His plus minus usurpatis, clysteres imprimis repetiti conveniunt, & quidem acres necesse est sint isti: unde hic clyster à quibusdam haudatur:

℞. Pom. colocynth. Num. j.

divid. in 4. partes æquales:

Quarum prima in nodulo coqu. in Vin.

Urine puer. an. ℔ij.

addendo

Herb. Marrisi v. M. l.

Coquantur, donec remaneat tertia pars, quæ Clysteris loco inficitur.

De cætero tutius, quàm in alià Arthritidis specie, Purgantia in principio adh beri possunt, præsertim Vomitoria: sicut in progressu morbi subinde contumaciori, & pleno statu, etiam ad fortiora purgantia, præsertim Mercurio dulci & trochiscis alhandal. accedi potest cum in Sinovia glutinosiore aut copiosiore firmius conceñeratum malum eradican- dum sit: Sicut his præmissis sudorifera ex lignorum decocto aliquamdiu continuata, aut his similia conveniunt: vid. POTERIUS Cent. 2. cap. 85. ubi & aurum ejus diaphoreticum, & hinc Cinnabarina, salia volatilia, &c. sed id in usum vocanda sunt: Vid. TACHENIUS Princ. Morbor. pag. 204.

Externè omnibus encomiis dignum est emplastrum Poterii de pice sulphuratum: vide Cent. 2. Obs. 10. 13. & 86. Descriptio est hæc:

℞. Picis naval. ℥vj.

Terebinth. ℥ss.

Massich.

Succini an. ℥ij.

Sulphuris comm. pulv. ℥ss.

M. f. Cerotum.

Hoc applicatum perquam proficuum est, ut expertus sum, ac præter dolorem ischiadicum etiam egregium est in dolore nephritico notho scorbutico; item in colica convulsiva lumbos lacerante optimè hisdem applicatur;

X x 4

item



item in subluxatione vertebrarum lumborum supra os sacrum applicatum, etiam cum fructu adhibetur. Ob difficultatem detrahendi lapis calefactus ante remotionem applicetur.

Juvenis Nobilis Malo ischiadico in utraque coxa graviter affectus, ita ut in incremento morbi ne tantillum corporis motum sustineret, prorsus in subiecto sanguineo yene se quidne, prescripsi:

24. Antimonii diaphor.  
Bezoard. martial. ana ʒʒ.  
Auri diaphor. gr.v.  
Misc. pro pulvere.

Subinde repetatur.

Item

24. Aquę serpilli,  
Menthae,  
Flor. samb. an. ʒi.  
Spiritus sal. ammoniaci ʒiʒ.  
Oss. Microcosmi præp. ʒij.  
Antimonii diaphor. ʒj.  
Laud. opiat. gr. iij.  
Syr. card. bened. ʒvj.  
Misc. pro portione.

Usurpet cochleatim, continuando sudorem. Denique

24. Spiritus sal. ammoniaci,  
Liqu. Cornu Cervi succin. an. ʒiʒ.  
Misc.

Externè loco dolenti emplastrum Poterii jam dictum applicabatur, quod ita ad aliquot dies noctesque admodum mirè contulit. Tandem hoc ablato, pro reliquis discutientis,

24. Aqua artic. adextr. ʒiʒ.  
Spiritus sal. ammoniaci cum calce virga ʒvj.  
Misc.

Externè affricabatur.

Item

24. Aqua artic. adextr. ʒiʒ.  
Spiritus bacc. lupin. ʒi.  
Bals. Peru. cum vitello ovi dissoluti ʒij.  
Mise & affricabatur.

Præterea etiam Emplastra ex Tacamahaca, galbano, gummi ammoniaco, & Opio, locis dolentibus applicantur, seu ex semine sinapi, eruce, radice pyrethri, euphorbii, (quod cum oleo lini applicat TACHENIUS l. a. pag. 207.) cum pice navali, gummi elemi, & tacamahaca exceptis, & emplastri formâ applicatis: uti & acria antiscorbutica rubificantia externè imponuntur, qualia sunt cataplasma illud à plurimis commendatum ex piperitide, nasturtio, liberide seu lepidio, id est raphano rusticano, (Germ. *meer-Kettich*;) cum vino coctis, & hinc farina lupinorum, floribus chamomillæ & similibus misceantur, & applicentur, de quo confer. SENNERTUS de Arthrit. cap. 6. pag. 47. Radicem bryoniæ recentem cum oleo lini commistam & tepide applicatam laudat TACHENIUS l. a. Veteres externis & aliis irritis candentibus ferramentis tribus aut quatuor locis supra costam inquisitionem insituebant, loco cuius apud nos sepe Vesicatoria usurpari possunt.

Denique universi cruris frictio cum spirituosiss, oleosis, & urinosiss liquoribus, ut sunt spiritus formicarum, lumbicorum, &c. aqua articularis adextra, cum spiritu salis ammoniaci, & similia adhiberi possunt. Quæ inter non negligendum balneum ex vinaceis, item ex acervo formicarum supra Art. 3. incuria Doloris lacerantis laudatum.

Quod si finito paroxysmo doloroso nihilominus adhuc tumor adsit; hic optimè discutitur vapore de cruce, absinthio, & artemisia, in aqua & vino coctis, ac pedibus calidè suffumigatis: Vel emplastrum Norimbergense dictum cum oleo tartari malaxatum, aut etiam solitarium, applicetur. Ut verò roborentur articuli, finito paroxysmo convenientissima sunt vina balsamica ex vegetabilium aromaticorum decoctis parata, qualia sunt decocta Poterii Cent. 2. cap. 10. & 13. aut qualia prostant in M. A. N. C. Ann. 6. & 7. Append. pag. 165. Quod si ægri extra paroxysmum præ nimia membrorum imbecillitate progredi nesciant, cum tamen topi nondum appareant, his Fonticulos in diversis corporis partibus excitatos prodesse, ait HORSTIUS lib. 8. Observat. 8. aut usurpari potest emplastrum de pice supra laudatum, quod firmat tendines, & resolvit nimias humiditates; aut usurpentur

remedia BARBETTE ex Anat. Practica cap. 9. & 10. De podagra male tractata audivissis supra p. 1. Sect. 3. cap. 1. ubi de cura chylicationis lætæ.

XI. Quod ad curam extra paroxysmum, in hac omnis eò directâ sit cura, ut partim radix podagræ ex corpore evellatur, partim articuli antea affecti roborentur. Pro priori scopo inserviunt remedia tam diætetica quàm pharmaceutica, æchirurgica. Quoad diætam, exactissimè est observanda arthriticis: sicut enim hæc neglecta secundæ mater podagræ est, ita observata eadem hunc suum scutum abortivum rursus abolet. Verùm de hac cum ubi vis plura prostant, eaque vel SENNERTUS Tr. de Arthrit. cap. 7. & TACHENIUS l. a. recensent, saltem adhuc sequentia observanda. Nempe nil melius est, quàm omnia acida, & quæ in volatiliem aciditatem citò transeunt, aut vim fermenti digestivi enervant, quantum possibile, vitare, convenienti diætæ regimine digestionis primæ negotium & ceteras functiones quasvis sartps re- & asque servare, & hinc specinco antipodagrico saporem acidum volatiliem, spiritibus sociabilem, ex prima stomachi culina oriundum, corrigere, & in prima herba extinguere, idque per remedium pharmaceuticum, quale CNOEFFELIO fuisse dicitur, & hodie TACHENIUS jactat. Sed, cum paucis liceat adire Corinthum; hæcenus generalibus necesse est contenti vivamus; existimotamen in Mercurio, & hinc antimonia libus rite preparatis, vim absorbendi, & in radice corrigendi hoc acidum podagricum, delitescere. Lac & diætâ lactea quoque hic remedii vim obtinent contra podagram, tædiosa quidem methodo, sed aliquoties jam felici eventu, cum funditus eadem podagra eradicata sit. Utendū modum delineatum videbitis in M. A. N. C. Ann. 1. Observat. 141. pag. 310. & Append. huius anni, Anno 2. annexa, pag. 33. Ann. 6. Observ. 58. SENNERTO de Febr. lib. 2. cap. 2. pag. 351. Sicut de cura lætis in arthritide integrum Tractatum edidit GREISELIUS: Cui sociari poterit disputatio lectu dignissima de Cura lætis, podagricorum solatii, à Dn. D. WALDSCHMIDIO Marpurgi nuper habita, ubi aliquot hujus rei experimenta videbitis. Iis autem saltem convenit subiectis, qui bene & sine corruptione in ventriculo illud perferre possunt, item qui graciles ac macilentis sunt; de quo vid. TACHENIUS l. a. pag. 414. Sub usu autem huius æger ab omnibus reliquis alimentis absterneat: vid. BONNETI Mercur. Compital. pag. 21.

XII. Quoad auxilia pharmaceutica: Vomitus primum tenet, adeo, ut ab omnibus Practicis commendetur præservationis gratiâ. Crebrius aut rarius, ad minimum omni verno & autumnali tempore circa solstitia, insitueretur, nempe in stomacho podagra cuditur faber. Hinc, quoad evacuantia, per inferiora, Mercurius dulcis, Turbith minerale cum spiritu sulphuris paratum; & alia Mercurialia ex regno minerali sunt optima; sicut ex vegetabili helleborus niger, & hinc Colocynthis, præ aliis conveniunt. Hermodactylorum laus non amplius tanta est ac olim, cum genuini apud nos vix habeantur, utut pulvis arthriticus Paracelsi, descriptus in HARTMAN. Nl. Prax. Chymiatr. de Arthritide §. 17. & ex hoc natum Elestuarium Caryocostinum, quod videb. in SENNERTO de Arthrit. pag. 55. pluribus sit commendatissimum; non secus ac Elestuarium Catharticum violatum Myrscheli mirè laudatur contra arthritidem à LINNÆO, dum dicit: optimum esse medicamentum, ad præveniendum paroxysmum podagricum. Quo remedio aliquando Studiosum Juris hic felicissimè curavi, qui pessimè habuit & arthriticus fuit adeo, ut quasi contractus videretur; verum hoc medicamento intra paucos dies curavi. Vnde etiam in purgandis arthriticis extractum hellebori nigri & hermodactylorum POTERIO usitatum fuit, &c.

24. Conf. Chamædr.  
Chamæp.

Anthos an. ʒʒ.

(Vel loco harum conservarum recipiatur pulpa pasin- lar. ʒiʒ.)

adde

Pulv. antipodagr. Par. ʒiʒ.

Mag. Islapp. gr. ix.

Cum syr. de betonica

F. Elestuarium.

At præ fortioribus purgationibus convenientiores longè arbitror blandas purgationes per pilulas usuales, non nihil



nihil acutatas, qualium pilularum loco videntur optima pilula balsamica Cnossii M. A. N. C. Ann. 6. & 7. Append. pag. 59. ex helleboro nigro & massa pilularum de tribus Russi concinnata, imprimis Mercurio fixo acuat, cit. loc. pag. 147. Sanè in ventriculi vigore conservando multum his tribuerem: alio autem, pilulas de tribus Russi ingrediens, ita preparata sit, ut pars ejus gummosa magis extrahatur, resinosa verò separetur. His omni novilunio relictis, tres vel quatuor dies ante usum adjungantur sudorifera, & alia appropriata, podagricum acidum & corrigentia, & correctum per sudorem eliminantia. Hinc quovis anni quadrante sudores per aliquot dies repetiti proliciantur, quocunque libuerit remediis, sæpius urinosa, tam fixa quam volatilia, hinc sulphurea apimonialia, item antimonium diaphoreticum & antihæsticum Poterji continuando. Sanè spontaneos sudores seu potius madores vel omni mane in habitioribus & succulentioribus, vel quavis septimana semel aut bis expectando, prosequos admodum notavi, temporibus extra paroxysmum, præsertim si sub introitum lecti conveniens dosis spiritus salis ammoniaci præmittatur, Post sudorifera etiam Diuretica extra paroxysmum in cura præservatoria sunt optima, quæ duo in plurimis conspirant, ita ut unum alterum sublevet. Imprimis verò Diuretica, tam in præservando quam curando, præmissis vomitu, sunt optima; magis tamen in præservando: & speciatim nulla purgantia, nulla violenta sudorifera, tantum valent, quantum appropriata diuretica, imprimis volatilia: qualia sunt spiritus salis ammoniaci, vel simplex vel lavendulatus, aut infusio aromatum cum spiritu vini oleosus factus, tartari volatilis, carminativus de tribus, (qui aliquoties multum præstitit in abusu vini ad præcautionem veterum malorum, quatenus urinam movet) spiritus cornu cervi, liquor cornu cervi succinatus, essentia liguorum, &c. Curavi aliquando Podagricum, paroxysmo imminente subito præscribere spiritum salis ammoniaci & spiritum cochleariæ, ut temperaretur acidum. Consilium erat straneum: cogitabam de sudore excitando, & continuabam spiritum salis ammoniaci; sed nil profeci, quia ad sudorem adigi non poterat, potius superveniebat ardor urinae dolorosissimus ob salia viscosa, quæ cum per sudorem non discederent, per urinam deducebantur, & evanescebat podagra. Sic egregia sunt Lumbricæ in podagra ad diuresin; item arcanum duplicatum Myrsichti, præmissis fixis, est nobile; vel sal ammoniacum depuratum, borax, sal volatile succini, &c. E. g.

24. *Lapill. caner. præp. 3j.*

*Corall. rub. præp. 3j.*

*Salis volat. succini gr. xv.*

*M. pro tribus dosibus: S.*

*Singularis Pulvis articularis.*

Possit etiam calculos.

Hinc scarabæi, speciatim unduosi, Germ. die *blauen Mayen Kaser*, nobile suggerunt remedium ad podagram præservandam, & curandam per urinam, propter copiosissimum sal diureticum, quod habent, ut cum dolorosa stranguria operentur: Vid. *supra* p. 1. ubi de *Calculo Renum*, & *BORELLUS Cent. 4. Obs. 73.*

Remedia alterantia, quod concernit: eadem profusè hic conveniunt, quæ *supra* Art. 2. de *Doloribus in genere* sunt laudata, varia nempe nervina, aromatica & volatilia, calefacientia vulgè dicta, quæ sale suo volatile acidum podagricum invertit, & per transpirationem insensibilem eliminare solent; quibus in specie semper adjungantur specifica & appropriata, chamædrys, chamæpitys, Iva arthetica, spiritus salis ammoniaci, spiritus & sal volatile lumbricorum, carminativus, aliquoties in septimana bihorio ante prandium ad 40. vel 50. guttas, usurpati; Item liquor betulae, herba Thee, &c. Videatur *SENNERTUS*, *RIVERIUS*, *WILLISIUS*, alii, ubi & plures indicæ concinnatæ formulae occurrunt: Vel

24. *Rad. Enula.*

*Pgonio.*

*Caryophyllat. an. 3vj.*

*China el. 3j.*

*Herb. Salvia.*

*Melissa.*

*Chamædr.*

*Chamæp. an. M.*

*Summ. rorismar. M. ij.*

*Bacc. junip. 3j.*

*Gulone.*

*Zingib.*

*Cinnam. an. 3ij.*

*Sal. tartari 3ij. ad 3j.*

*Incisa & Contusa includantur Nodulo:*

*D. S.*

*Nodulus articularis confortans.*

*Infundatur in Vino.*

*Vel*

24. *Herb. Chamædr.*

*Fragar. an. Mij.*

*Ononid.*

*Flor. hyperic. an. M. j.*

*Rad. bryon. 3ij.*

*Sarsapar. 3j.*

*Lign. Nephrit. 3ij.*

*Bacc. junip. rec. 15j.*

*Coff. arom. veri 3ij.*

*Incisa & contusa*

*D. S.*

*Species ad cerevisiam medicatam.*

Includantur nodulo suspendendo in cerevisia fermentata, vel species injiciantur cerevisiæ colatura adhuc calenti ante fermentationem.

De salivatione movetur dubium, annon & hæc aliquid usus conferre possit ad radicem podagrae extra paroxysmum exhaustendam? & videtur eam confirmare KERKRINGIUS *Spicil. obs. 28.* Conferatur in specie SYLVIIUS de *Arthrit. 9. 174. & seqq.* & ROLFINCIUS *Ord. & Method. Special. Commentar. lib. 6. sect. 3. cap. 1. & WEDELIIUS lib. 2. de Medic. Facult. sect. 2. cap. 12.* qui successum salivationis adhibere exemplis confirmant. Tentari posses, sed malo nondum adeo confirmato; aliàs periculum esset, ne magis adhuc offensis articulis, & laxis partibus nervis, paralyticæ contractura acceleretur.

XIV. Ex fonte chirurgico venæ scissio pro præservatione parum conferre videtur, nisi ordinariæ excretiones vel suppressæ vel imminutæ sint: sicuti *supra* exemplum ex *FORESTO lib. 29. Obs. 4.* allegavi de *Arthritide* quam plurimorum articularum, tertianæ intermittenti succedente ex restrictis hæmorrhoidibus, quibus denuò fluentibus arthritides cessant. Quidam tamen scarificatione pedum juxta pedis pollicem, una vel alterâ horâ ante novilunium adornatâ, se præservare videntur, de quo vid. *SALMUTH Cent. 3. Obs. 46.* Fonticuli, ut alias, & hic remedium fontium quidem ex se proficiunt, nisi per accidens in viciis artibus aut habitioribus, aut vitæ sedentariæ agentibus, aut quibus ulcera aut similia emissaria consolidata sunt, interdum conferant. In serosioribus tamen non sine fructu artibus excitantur, in quibus paroxysmos arthriticos egregiè præservare solent. Præ ceteris in ischiadico malo conducunt, nunc in sura excitati, vid. *SCULTETUS in Anamnest. Tabul. ult. lit. k.* ubi præstans eius declaratur usus; nunc juxta popliteum, secundum *HILDANVM Cent. 4. obs. 73.* nunc super locum affectum excitati, nunc in inguine, qua ratione *WILLISIVS Pharm. Rational. Volum. 2. pag. 450.* Ischiadicam inveteratam per fonticulum in inguine curavit. Illustrat hunc in inguine fonticulum observatio, quam refert *FEHR de Scorzon pag. 114.* de muliere, ischiade pertinaci laborante ex impuro concubitu, bubone, quo ea affligebatur, quo per apertionem curato, malum ipsum curatum fuit.

XV. Articulos denique firmant Lixivia pro balneatione pedum, dum poros servant apertos, & alcali suo acidum spiritum ferè evocant, de quo præter experiendam conf. *HORSTIVS lib. 8. obs. 3.* præsertim si *baccæ juniperi q. l. e. g. p. ii. & fol. salviae aut rorismarini p. j. in pitj. aqua commun. & lixivii comm. p. i. incossa sint; Aut*

24. *Bacc. junip. 15j.*

*Herb. rorismar. M. vj.*

*Serpilli, vel thymi,*

*Majorane, vel salvia an. M. ij.*

*Incis. & contus. D. S.*

*Species ad pediluvium.*

Coquantur in lixivio pro Pediluvio, tempore vespertino sub introitum lecti instituendo. Sufficiunt species pro tribus vel quatuor vicibus. Post balneationem pes adhuc humidus linteis involuitur tepidis, & ager lecto committitur: Vid. *Id. Formular. Cl. 4. 5. & 6.*

Præ ceteris conveniunt Vinacea, exque disparata lincea & fomentationes pedum subinde repetitur; vid. *DVRETIVS in Holler. lib. 1. de Morb. Intern. cap. 63. & SOLENAN-*



DER *sect. 4. consil. 21.* quæ cum non semper recentia haberi possint, quidam iis siccatis utuntur, in vino & aqua coquunt, salivam aliaque nervina addendo. Theriæ huc pertinent, quæ cum remedium externum saltem sint, productis morboris levandis saltem conferre poterunt, ipsa radice ut plurimum in corpore relicta; unde incipientes podagrici aliquale levamen exinde percipere possunt, confirmati nullum, quin potius contractura ac rigiditas articularum sic acceleratur: vid. SENNERTUS *de Arthrit. Quest. 11.* Ad hæc si adjumenti quid adferunt, in frigida potius quàm calida conferre videntur: Videatur TIMÆUS *lib. 5. Epist. 7. & Act. Societ. Reg. Vol. 1. pag. 822.*

De Transplantatione quædam adhuc monenda forent, sed sufficiant hæc ea, quæ refert, & per experientiam confirmat TIMÆUS *von Guldensee, lib. 7. Epist. 7. & 8.* Catellus Melitensis podagra afflicto appositus, anodynus est: vid. observat. BORELLI, & BARTHOLINI, qui catellos hos podagricorum pedibus applicatos claudicasse referunt.

## CAPUT IV.

## DE

## LÆSIONIBVS GUSTVS.

**R**esane adhuc inter sensus externos Gustus & Olfactus. Gustus nil aliud est, quàm tactus linguæ specialis, & singularis, dum itidem sit per nervos in delicata filamenta divisos, quæ ad superficiem linguæ sub ejus membranam delata conglobantur in similes papillas nerveas, tanquam in capitula fungorum seu cornua limacum. Hæc ergo ratione suæ peculiaris texture ita sunt constitutæ, ut præter communiam tactus objecta, ut durum, molle, asperum, &c. specialem à particulis salinis recipiant impressionem seu motionem. Sunt nempe salinæ particule minutissimæ genuinum gustus objectum, quæ ratione texture, rigidæ, acuminatæ, & diversimodè figuratæ, vehiculoque imprimis dilutæ, se insinuant in linguam, ejusque modò dicta filamenta, & speciatim eorum papillas, variè movendo, pun-gendo, scindendo, secando, &c. talem in iis motum efficiunt, qui à nobis Gustus dicitur. Vno verbo: Sapor consistit in figuratone partium salinarum, quatenus nempe papillas linguæ nerveas pungunt, &c.

Solæ scilicet salinæ particule, nunc solitariae, nunc aliis particulis materialibus intertextæ, adeoque plus minus vel mutatae, vel exaltatae, vel retusæ. Ex varietate talis texture vim obtinent impressionem certam in linguæ papillas facere, indeque, quod nos vocamus, varios sapes exhibere: Hinc enim acida & urinosa, mutuâ unione mutando texturam, fiunt falsa: acida particule aceti cum minio seu saturno calcinato junctæ in tantum texturam mutant, ut ex acutis quasi quadrata aut octoëdrica, & ita quodammodo aluminosa, fiant, indeque dulcem saporem representant.

Res quod magis sapida, ed magis saliva affluit in os; similem enim motum faciunt, ac si nunc iterum edere vellemus, & ideo pro masticatione saliva affluit.

Laditur Gustatus, seu propria linguæ actio, dupliciter: Vel

1. Quando Imminuitur aut aboletur, ita ut parum vel nihil gustare possimus.
2. Quando Depravatur, ita ut res & objecta quædam alienum saporem, quàm naturaliter habere solent, continuè in ore representent, eumque putridum & foetidum.

## ARTICVLVS VNICVS.

## DE

## GUSTU IMMINUTO ET DEPRAVATO.

## CAVSÆ.

**I**mmittitur vel aboletur Gustus:

I. Vitio spirituum animalium ad linguam distribuendorum, qui vel vitio conformationis nervorum penitus in lingua deficiunt, quale exemplum habet COLVMBVS in sua *Anatome* de quodam vitri & carbonum vorace, quia

varia sine Gustu ullo devoravit, in cuius anatome post mortem invenit nervos naturaliter ad extremitatem linguæ derivandos, juxta spinam dorsi posteriora versus reflexos: aut quando præter hoc in apoplecticis, paralyticis, &c. affectibus Gustus linguæ laeditur, in quibus casibus cum sensu Tactus & Gustus (est enim Gustus tactus linguæ specialis) etiam motus linguæ simul plus minus perit; quo ablato, cum voces articulare nequeant, Loquela amissa appellatur.

II. Leditur Gustus, quando lingua ejusque fibræ nervæ, & specialiter harum extremitates papillares, à nimia eaque vitiata lymphæ irritatæ ita resolvuntur, & ob atoniam ita relaxantur, ut flaccidæ ac molles, & quasi paralyticæ, minus ab objectis rapidis moveri, & horum impressio percipi possit, pariter atque odoratus: unde etiam in gravedine & coryza graviore, aliisque affectibus catarrhalibus, dum os continuè copiosâ tenui falsaque lymphâ scatet, cum coryza præter olfactum deficientem simul etiam Gustus aut imminui plus minus aut aboleri solet.

Depravatum quod attinet Gustum, in quo objecta peregrino videntur affecta sapore, sit hic imprimis vitio salivæ, vitiis recrementis & humoribus variis vel sale impregnatis, quæ nunc per se, nunc rebus gustabilibus sub masticatione permixta, organum Gustus simul afficiunt, & inde talem saporem vitiosum lymphæ imprimunt: Hinc in Ictero, inquinatâ salivâ, omnia assumpta obscure videntur amaricari: hinc similiter in scorbuto & malo hypochondriaco omnia plus minus accescere aut falsescere; in catarrhis omnia assumpta plus minus falsa muriatica apparere solent. Quod fortè *Picantium Gustus* referendus est. Interdum sapore putido & fere inexplicabili, & quasi cinereo, objecta infecta videntur: id quod sit imprimis, quando unum alterumve viscerum internorum ulcere aut apostemate incipiente laboret; in his enim à purulentâ istâ infecta saliva saporem cinereum & putidum representare facit, ut subinde sit in phthisi similibusque morbis, quatenus nempe lymphæ salivales ex iisdem corruptionibus inquinantur; ita ut sæpe semper Gustus depravati causa in saliva inquinata investiganda sit: ac hinc est, quod observavit MEARA *pag. 160. in Hist. Med.* Gustum depravatum, ortum ex auri ulcere, forsitan pure successivè ad os delato, quem tamen ipse curavit per Topica auri admoda. Rarum est, quod refert DEODATUS *in Valetud. p. 272.* de sapore amaro in apice linguæ perceptibili, idque ex affectu hypochondriaco.

## DIAGNOSIS.

Affectus hi facile patent ex ægri relatione; uti etiam causæ antecedentes per eundem & per adjunctas circumstantias, aut pathemata manifestantur. Vbi enim adsunt simul aliæ operationum animalium labefactiones, de affectu paralytico non est dubium: sin adsit simul vitium catarrhale, v.g. coryza, vel rauceo, & similes defectus, res est facilis. Causa, quæ gustum depravat & salivam inquinat, ex affectu adjuncto per se patet: Sic in Ictero, scorbuto, putredine oris, &c. facile patet affectus primarius, unde afficitur saliva.

## PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Gustus læsiones in catarrhis per se nullum periculum portendunt, quibus curatis spontè cessant. Idem de aliis enarratis hætenus Gustus vitiis sentiendum. Sin verò inveterata sint, difficilia sunt curatu.

## CURA.

In Cura causæ sunt removendæ, & fibrarum linguæ debilitatus nervinis restituendus & conservandus, aut actionibus quasi stimulandus in Imminutione ejus aut Abolitione: Hic ad catarrhum respectus est habendus; Hic verò nervina varia & aromatica conveniunt. Pro posteriori scopo in specieraphanus ante pastum usurpatus & masticatus gustum acuit, & eundem deficientem quasi sensilem reddit, teste HOFERIO *in Herc. Med. p. 75.* HARTMANNVS gar-garissimum habet, & etiam linimentum egyptium ad Gustus læsionem, quæ videbitis in *Praxi eius Chym. cap. 83. §. 3. & 4.* Egregius quoque est succus acetosæ, vel solus, vel ex ana succi acetosæ & succi portulacæ, cum ana sacchari paratus syrupus, confert multum ad abolitum saporem, teste ZACUTO LUSITANO *lib. ult. Prax. cap. 2. num. 10.* quo



quo os & lingua subinde abluenda & abstergenda; quin &, si deglutitur, nihil incommodi affert, sed ventriculum simul egregie abstergit. Quod si verò gustus sit depravatus, e.g. in ictero, ita ut omnia videantur amara, falsa, & similiter, in specie tunc convenit vomitus: quo præmisso usurpetur serum lactis acidulatum cum succo citri, vel cum spiritibus quibusdam mineralibus, vel etiam quæcunque acida conveniunt in Gustu nimis amaro, non secus ac radix cichorii condita, item zedoaria, vel radix gentianæ crebrius affricta, eundem juvant. Locum etiam habet Gargarismus, item Linimentum Hartmanni iam allegatum. Sed curantur hæc vitia optime, curato primario morbo. Hinc postmodum nervosis appropriatis partium nervosarum lingue tonus restituendus, & corrigendus.

Sed quæ in specie linguam roborant, ejusque sensum, & motum restituunt, sunt nervina, & ea, quæ aliàs etiam ordinariò in Aphonia & loquela amissa applicari solent, quas hac occasione jam tractabimus.

## M E M B R U M I D E A P H O N I A.

**D**istingendum autem est, propriè loquendo, inter Loquelam amissam, & inter Aphoniam.

Aphonia est, dum vox nulla editur: id quod fit vitio laryngis, ejusque musculorum movementum, aut paralyticorum, aut convulsorum, aut nimis humectatorum. Hac namque ratione in passione hysterica mulieres aphonæ jacent, uti etiam fit in apoplexia graviore, paralyti, malo hypochondriaco & passione hysterica, ubi ægrum non raro omnimodam patiuntur Aphoniam, propter convulsionem musculorum laryngis, cartilagine movementum, quam convulsionem percipientes quasi laqueo fauces cōstringerentur, molestiam se percipere asserunt, ac si collum ipsis torqueretur.

Loquela verò amissa fit vitio lingue, quando quidem sonus aut vox, sed incondita, à larynge formata ob motum lingue, siue ex toto, siue ex altera saltem medietate paralytica, plius minus amissum aut non sufficientem, in verba articulati nequit, aut alia lingue vitia suis signis se exhibent: quæ in Aphonia secus se habent, in qua nullum lingue vitium, præsertim quoad motum, observari solet.

Aphonia dicitur aliàs Anaphtia, quæ HIPPOCRATI sunt distincta, à modernis verò confunduntur: Aphonia enim HIPPOCRATI idem ac Apoplectica, cum Aphonia nomine intelligat illos, qui ne motum quidem nullum præreticum siue voluntarium retinent: Anaphos verò eos, quibus vitio laryngis vox deficit: Vid. GORRÆUS in Definit. Med. pag. 77. & pag. 81. Aphonia ista, prout communiter accipitur, fit ex vitio nervorum & musculorum, nunc paralytico, nunc spasmodico. Quod vitium paralyticum, Aphonia fit frequentissimè à paralyti musculorum laryngis, siue hæc vitio proprio, siue vitio nervorum recurrentium ad eos distributorum, accidat: Nam in canibus dissectis, vel licatis illis nervis, Aphonia in promptu est: sic videmus non raro aphonos fieri, qui magna rancidine laborant. Id quod fit probabiliter à nimia humiditate & consequenter resolutione musculorum laryngis, ut flaccidi fiant, & impotentes ad motum. Manifestum hujus rei exemplum est, quod refert TULPIUS lib. 1. cap. 40. pag. 78. Hinc etiam tardior loquela cujusdam ob abundans phlegma, qui anno duodecimo demum loqui coepit, teste AMATO LUSITANO Cent. 6. Curat. 3. Pertinet huc etiam crapula, subinde Aphoniam inferens paralyticam: Videat. HOECHSTETTERUS Decad. 3. cas. 9. Quod etiam facit Aphonia ex casu ab alto, & inde contracto vitio nervorum paralytico, quam refert POTERIUS Cent. 2. cap. 11. & jam olim notata observatio GALENI, quam videt in SENNERTO lib. 2. Prax. pag. 354. Sic ex terrore nervorum vitia oborta, aphonia pro apoplectica restituta, vid. in BARTHOLINI Aët. Med. Hassniens. Volum. 1. Obs. 101. pag. 193. Curiosa, etiam est Aphonia paralytica ex globulo plumbeo per vomitum moto, indeque recurrentes motus deprimente, de quo vid. DEODATUS in Valetud. pag. 97. Ut taceam nervos recurrentes, quovis infortunio abscessos vel resectos: Conf. SENNERTUS lib. 2. Prax. Part. 3. cap. 4. pag. 359. Observavi etiam Aphoniam in virgine, quæ cubans noctu in hypocausto,

ac suaviter dormiens, ob extinctam verò lampadem ex oleo constructam, & hujus fumo successivè inspirato altero mane surgens, cetera sanissima, aphona erat. Videbatur subesse vitium quasi paralyticum laryngis ejusque musculorum ex isto fumo inspirato laesorum. Curabatur per electuarium ex scordio pulverisato cum melle excepto, crebrius assumpto, & deglutito. Atque hæc Aphonia ad constitutionem nervorum & musculorum paralyticam pertinent, si in paroxysmo apoplectico accedant, & hoc cessante etiam aliquamdiu affligant, siue sine eo, aliis functionibus omnibus salvis, ægros subito prehendant.

Quoad alterum Aphoniae sciendi modum: hunc ex convulsione musculorum & nervorum laryngis fieri insinuavi. Observatur tamen crebro talis in graviore paroxysmo hysterico, in quo aphonæ jacent ægræ, pariter ac epilepticis convulsionibus sæpius Aphoniæ superveniunt. Speciatim vid. hic epileptica aphonia per venæsectionem curata apud HOECHSTETTERUM Decad. 4. cas. 1. & conf. casus parallelos, nempe Cas. 2. & 40. Item ex vermibus in ventriculo & intestinis subinde obmutescencia observatur, teste FORESTO lib. 21. Obs. 28. schol. & lib. 14. Obs. 33. schol. Noti nempe varii spasmodici affectus sunt, occasione vermium obvenientes. Pertinere etiam huc videtur curiosa observatio in BARTHOLINI Aët. Med. Hassniens. Volum. 1. Obs. 86. pag. 170. Nam ex constrictionis sensui in loco affectio spasmus nervi recurrentis, ad fuisse probabiliter concludi potest. Foran & huc pertinet Aphonia ista mirabilis M. A. N. C. Ann. 3. obs. 121. pag. 193. Spontè sua ex improvviso affligens, & spontè sua denuò cessans ac recidivans, &c. Nempe viæ paralyticum, sed potius convulsivum quid subesse videtur. Foran etiam huc pertinet Aphonia suborta ex retentæ gonorrhæe virulenta, fonticulis in inguine apertis curata, apud ZACUTUM LUSITANUM lib. 1. Prax. Admir. Obs. 97. Nempe acre luis venenum facillè nervos recurrentes vel musculos laryngis irritando, ex spasmo Aphoniam inferre potuit. Quoad Aphoniam in febribus interdum supervenientem: res dubia, an paralyticum potius an convulsivum vitium sit? Sane quantum colligere valeo, ad convulsivum vitia potius referrem; nam & quæ in variolis non raro observantur Aphoniæ (vid. HILDANUS Cent. 6. Obs. 14.) ex convulsione laryngis potius esse videntur; cum convulsione pathemata non raro in illis observentur: dum scilicet acre variolarum venenum, nervos recurrentes irritando, ad spasmos illos cogit: sicut tussim, rancidinem, ac his affinia, aspera arteria ac laryngis mala, eadem inferunt. Sed præter paralytin ac convulsionem etiam subitanea spirituum perturbatio ad Aphoniam disponere valet: sicuti videmus, quoddam nimio terrore percussos plane quasi obmutescere. Pertinet huc mirabile exemplum apoplectici ex visis cancri in M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 145. pag. 229. & Ann. 3. Obs. 187. pag. 348. Præ qua longè curiosior est subitanea ista Aphonia cum perfecta in toto corpore anæsthesia, omnibus cæteris, tam vitalibus, quam animalibus, functionibus salvis in M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 251. pag. 454. quæ omnia tamen symptomata beneficio venarum ramularum sectionis breviter evanuerunt. Revocarem hoc observatum in dubium, nisi ab autore, viro fide digno, DANIELE LUDOVICI, fuisset relatum.

## P R O G N O S I S.

Quoad Prognosin: Apoplexia iuncta Aphonia difficiliter curatur, ac interdum diuturna esse solet.

Quæ cum singultu sunt Aphonia pessima sunt, autore HIPPOCRATE.

Balbi profluvio alvi maxime corripuntur, teste HIPPOCRATE sect. 6. §. 34. & hoc ipso ferè sanantur.

Aphonia oper se & solitaria, modò siue tractentur ægri, successivè curabiles sunt.

## C U R A.

In Cura ad primarium morbum, cujus symptoma est Aphonia, aut saltem ad ejus causam antecedentem, respiciendum, ut his remotis facilior prædicti symptomatis fiat curatio. Pro quo curando ad laryngem & eius musculos, ac nervos recurrentes imprimis respiciendum, tam eorundem paralytin undecunque natam, quam spasmus ex nimia irritatione removendo, internè per volatilia aromatica & nervina, aliàs Cephalicâ dicta, ex. gr. spiritum salis ammoniaci castoreum, succinatam, spiritum cornu cervi succinatam,



cinatum, & subinde sudorem simul provocando, & etiam psyalismum masticatoriis promovendo. Imò in contumaciori malo præsertim paralytico, diata sudorifera ex lignorum decoctis instituenda venit.

Hinc externa remedia topica collo, & imprimis regioni, ubi situs est larynx, sunt applicanda, spirituosa nempe & nervina appropriata, quæ inter est Infusum Majoranæ, florum Chamomillæ, lavendulæ & salviz cum spiritu vini paratum, quo sub forma fatus cum linteis multiplicatis calidè antèrè regionem colli crebriùs, donec vox redierit, admoto, aliquoties Aphonias curavi: aut sacculi ex nervinis aromaticis, spiritu vini irroratis, exterius collo applicandi; vel aqua articularis ad extra, maritata cum essentia castorei, aut spiritus apoplectici cum spiritu lumbricorum vel formicarum eodem in loco calidè cum linteis multiplicatis applicandi; aut olea destillata nervina, succini, lavendulæ, ruta, juniperi, cum theriaca permixta, ac cum balsamo Peruviano subacta, ibidem frequentius illinenda; aut etiam essentia castorei, vel solitaria, vel illis sociata, sedulo admovenda: Item

℞. Herb. salu.

Rorismar. an. M. j.

Sem. Eruc. ℥ij.

Cobu. in f. q. aquæ simpl. in vase clauso:

Colat. ℔j. adde

Spiritus Ceras. nigr. ℥vj.

Sal. ammoniaci ℥j.

Mell. anthosar. ℥j.

M. pro Gargarismate

D. S.

Singulare Gargarisma.

Convenit in aphonia, laryngis affectu, post paroxysmum apoplecticum.

Pro quorum omnium meliori successu, ubi circumstantiæ aliæ permiserint, & venæ sectio sub lingua interdum institui potest.

## MEMBRUM II.

### DE

### LOQUELA AMISSA.

**L**oquela amissio est, quando sonus & vox formatur quidem à larynge, sed ob motum linguæ aut amissum, aut non sufficientem, vox formari & in loquelam articulare nequit. Vitium hoc paralyticis & apoplecticis imprimis familiare est, & subest paralytis linguæ major vel minor, ad quam pertinet suo modo Balbuties, ex deficiente itidem aut impedito linguæ motu oriunda.

### CURA.

Hic affectus curatur in specie aromaticis oleosis aut spirituosus, linguæ extrinsecus admotis. Convenit hic Decoctum gallitrici, salviz, hyssopi, pyrethri, zingiberis in aqua & vino, quo ipso lingua vel fauces eluendæ, vel etiam instar gargarismatis applicandum. Porro Decoctum salviz, & erucæ vel sinapi in vino paratum, propter hujus sal volatile acre, à quibusdam tanquam singulare arcanum commendatur; Item decoctum pulegii & nasturtii in vino: quæ possunt aculeum salibus volatilibus, ut in ore detenta melius penetrant; e. g. in pertinaciori malo:

℞. Herb. rorismar.

Maiozan.

Salu. an. M. j.

Rad. Pyrethr. ℥ij. ad ℥ss.

Sem. Erucæ, vel sinapi ℥ij. vel ℥liij.

Caryophyll. ℥j.

Coqu. in f. q. aquæ simpl. in vase clauso:

Colat. ℥x. ad ℔j. adde

Spiritus ceras. nig. vel bacc. innip. ℥vj. ad ℥ss.

Spiritus sal. ammoniaci cum calce viva, vel caryophyllar. ℥j. ad ℥ss.

Mell. anthosar. ℥vj. ad ℥j.

M. f. Gargarismus: S.

Gargarismus confortativus.

Præ cæteris salviz succus in linguæ paralyti & loquela amissa commendatur, si eo fricetur lingua frequenter: cui tamen pulvis castorei aut semen sinapi contusum commodè addi possunt; Nam sic etiam frictio linguæ cum theriaca,

addito pulvere seminis erucæ vel sinapi, quibusdam commendata esse solet. Pro gargarismo hoc commendat Stoeckerus cum sequenti mistura:

℞. Salu.

Hyssopi,

Acori, an. M. j.

Coqu. in f. q. aquæ:

Colatoræ adde

Oxym. Squillit. ℥j.

M. pro Gargarismate.

Hinc

℞. Sem. Erucæ,

Squilla,

Cepar.

Apii an. ℥ss.

Zingib.

Trium piper.

Cinnam.

Nuc. mosch. an. ℥j.

Spec. di. Ambr.

Dia-Mosch. dule.

Di. Anthos an. ℥liij.

Cum f. q. aquæ vitæ f. Mistura crassiuscula pro illinitione linguæ & palati.

Porro in affectibus paralyticis aut apoplecticis præ cæteris olea destillata, spiritus aut aquæ spirituosæ, & essentiz penetrantiores, sunt egregiæ, v. g. essentia florum anthos, salviz, lavendulæ, imprimis essentia castorei, quæ est expertum remedium in aliquot apoplecticis, cum penna sub lingua illitæ inferiùs juxta locum frenuli, aut ubi nervi sunt motrices. Castoreum ipsum sub lingua detentum, & omnia ex eo parata, uti in loquela amissa, ita etiam in aliis loquelæ vitiis, in specie in balbutie infantum aut puerorum corrigenda, & quando tardiùs loqui incipiunt, multum convenit: in quo affectu masticatio nucis moschatæ etiam confert. Fortius est, si essentia castorei fiat cum spiritu vini, sale volatili cornu cervi aut succini imprægnato, quæ linguæ illita, vel sub lingua applicata, ad restituendam loquelam & paralyticos linguæ affectus est egregia. In specie spiritus cerasorum nigrorum, acuat cum aliquot guttis olei destillati caryophyllorum, apici linguæ illitus, aut ori infusus, in malo ab apoplexia est admodum efficax. Aliàs etiam oleum destillatum anisi apici linguæ frequenter illitum tanquam singulare specificum ad linguæ paralytin & amissam loquelam ab HARTMANNO laudatur. Conducit etiam spiritus vltioli cephalicus, mistus cum aia vel duplo spiritus cerasorum nigrorum, orique infusus, ac probe linguæ applicatus, est egregius. Quod pertinet spiritus theriacalis camphoratus, mistus cum spiritu baccarum juniperi aut spiritu liliorum convallium, & similia penetrantia maxime profunt: Non secus ac oleum destillatum succini ad gutt. viij. cum aqua maioranæ vel liliorum convallium, vel cum aqua lavendulæ & salviz, ori infusum est admodum efficax. Vel fricetur lingua cum theriaca aut extracto theriacali; Vel

℞. Mithridat. ℥liij.

Extr. Castor. ℥ss.

Olei destill. lavend.

Succini,

Anisi an. gutt. lv.

M. pro illinitione aut frictione linguæ.

Conf. M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 207. Ann. 4. & 5. Obs. 128. pag. 137. & Ann. 6. & 7. Obs. 92. pag. 132.

Uterius in usu etiam sunt Elecvaria sub forma lituum linguæ applicanda; v. g. singulare Elecvarium in paralyti linguæ, Loquela amissa & cognatis affectibus à STOECKERO admodum laudatur, cuius crebrior facta est experientia, nempe

℞. Mithridat. ℥liij.

Rad. acori condit. & subtilissimè trit. ℥j.

Zingib.

Nuc. Mosch. an. ℥liij.

Salis comm. vel loco huius potius

Salis vol. succ. ℥j.

M. omnia in mortario;

quibus adde

Succ. Salu. depur. ℥j.

Mell. despum. q. s. ad consistentiam debitam

Elecvarii.

Quod irroretur cum oleo destillato anisi, Maiorana, Salmia, succini, &c.



Sumatur quantitas avellanae, teneatur sub lingua, sensum ac sensum deglutendo, fricetur simul lingua aliquoties, tam in summitate quam in parte inferiori juxta frenulum, donec loquela redeat, ad cuius defectum expertum est remedium.

Si vero in sene adest difficilis loquela, optimum est euphorion essentia florum lavendulae, infusa in spiritu vini, de quo infuso propinetur omni mane & vespere sub introitum lecti &c. Sanè hoc ipso remedio RULANDUS aliquando curavit Loquelam amissam ex paralyti linguae in sene 86. annorum; sicut etiam in tali casu convenit nuxmoschata, si particula hujus probe massicetur, & in ore agitur.

Tandem cum dictis Internis subinde & Externa in usum vocanda. Cataplasma factum ex fermento, addito simul pulvere succini aliisve appropriatis nervinis, vertici impositum, experimentum est RULANDI in Loquela amissa; sicuti etiam oleum destillatum succini vertici aut nuchae illitum, aut in aqua spirituosam vel lavendulae vel salviae linguae admotum, & crebro applicatum, insigniter recommendatur ad restaurandam amissam antea Loquelam. Sic FORESTUS lib. 14. cap. 32. refert paralytin linguae ex catarrho, praemissis universalibus, per vesicatorium nuchae applicatum curatam. Sic & apertio venarum sub lingua subinde cum fructu institui potest. Conf. curiosa observatio in M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 251.

## CAPUT V.

### DE

#### LESIONE OLFACTUS.

**G**ustui proximus est Odoratus, cum ut plurimum maximum inter se consensum habeant, ita quidem, ut intensè sapida simul odoratum fortiter afficiant, & contra, uti in oleis destillatis, salibus volatilibus, &c. apparet, adeo ut Tactus, Gustus, & Odoratus non nisi pura gradatione majoris vel minoris materiae immersionis distinguantur, & tactus diversimodè modificatus sint.

Organum hujus odoratus minus probabiliter statuntur processus mammillares, sed potius hoc videtur esse membrana ista tenera summitati narium, juxta confinia ossis cribri-formis incus obtensa, uti eleganter hœdemonstrat SCHNEIDERUS Tr. de oss. cribri-formi: quin & ex analogia cum tactus, & gustus organo de præseptis certarum papillarum, ex filamentis nervis contextarum, vix dubitandum videtur: de quibus tamen per anatomen, simulque per armatos microscopio oculos, ulterior instituenda est inquisitio.

Dum ergo cum aere pro inspiratione attractio varia simul & innumerabilia nares subintrant effluvia, & miasmata, ex quibuscunque corporibus, insensibiliter licet emanantia (adeo ut omnia corpora certam quasi suam & determinatam atmosphæram circa se habere videantur) quædam eorum effluviis ratione determinatæ suæ texturæ & cōformationis insinuant se dictæ narium membranæ, eamque vellicando, pugnando, titillando, talem in filamentis ejus motionem efficiunt, quæ Odor à nobis dicitur. Omnia enim corpora atmosphæram effluviis habent; ut magnes habet effluvia, item succinum, quod probat attractio palearum, &c. Res odoratæ etiam talem atmosphæram habent.

Particulæ talem quæ habent texturam & conformationem mechanicam, ut speciatim hanc membranam ejusque filamenta nervea movere possint, suntque, quæ communi nomine sulphurea dicuntur, & sulphurea seu pinguis sunt naturæ. Nam vix odorem habemus, qui non ex sulphureo tali oriatur principio: unde & prout particulæ tales pingues, seu sulphureæ, excoaleu cum aliis, speciatim salinis, particulis, mutant texturam, & vel volatilifantur vel figuntur, aliavè ratione immutantur, Odorum exurgit varietas: Hinc v.g. Moschus odoris expertus, si in lattrinam suspenditur, sulphureæ particulæ se iterum insinuant in moschum: Oleum terebinthinæ suaveolens cum floribus sulphuris ritè combinatum, scetidum balsamum sulphuris constituit; præcipitatio sulphuris, vel scoriarum reguli antimoni, cum aceto fetorem contrahit; spiritus salis ammoniaci urinosi saporis & odoris cum Marte inodoro combinatus, croco aut floribus calendulae maximè similem repræsentat odorem.

Leditur Olfactus tripliciter;

1. Quando *imminuitur*, odoratusque est nimis hebet: Aut
2. Quando omnino *aboleatur*, ita ut parum aut nihil odorare queamus:
3. Quando *depravatur*, dum odores alieni in specie, putridi & fetidi, qui non sunt in rebus, continuè à nobis odorari videntur: id quod fit in ulceribus narium, imprimis ex lue venerea interiora nasi occupante; item ex vitio Dentium scorbutico, eorumque putredine, & similibus vitiis: de quo Odore depravato, cum curatis istis exulcerationibus, sponte cessare solet, nihil ampliùs monendum est.

## ARTICULUS I.

### DE

#### OLFACTU IMMINUTO

aut

#### ABOLITO.

#### CAUSÆ.

**I**mminuitur aut aboleatur Odoratus, ut parum vel nihil odoremur, triplici ex causa: primò ex vitio cerebri, ac nervorum non dimittentium spiritus animales in organo odoratus, v. g. in affectibus apoplecticis, paralyticis, & quando e contra ex spirituum impetu convulsivi quid patitur membrana narium, olfactus organum, uti fit in epilepticis motibus & vertigine caduca, in quibus objectorum impressiones percipere nequeunt ægri propter spasmodicam membranae narium internæ, unde Olfactus ad tempus aboleatur. Item obstructio summitatis narium, & hinc inducta filamentorum nervorum ex dura matre per os cribri-forme in nares protensorum (de quibus SCHNEIDERUS de oss. Cribri-formi) compressio.

2. Imminuitur odoratus plus minus ob membranam læsam, istam nempe, quæ narium summitatem succingit, ac odoratus primarium organon videtur, siue lædatur à causa interna, siue externa. A causa interna quidem, quando eadem nimis humectata, & à copiosiore lymphâ irrorata ac nimis relaxata, frequentissimè odoratum abolet aut imminuit. Uti etiam naturaliter hæc membrana madet blandâ lymphâ pro facilitatione odoratus, ita hæc ipsa nimis humectata inepta fit, quæ impressiones odoriferas recipiat, cum ex paralytica quasi constitutione, qua fibræ ejus nimis relaxatæ & humectatæ ad impulsus vel contactus rerum odoriferarum immobiles ferè sunt, & ipsi quoque animales spiritus edelati à copioso humore inquinantur, segnes ac plus minus corpidi redduntur, unde consequenter cessat Olfactus. Hinc in coryza & gravedine ac similibus affectibus narium & capitis catarrhalibus, in quibus humectata nimis nares succingens membrana, odoratus omnino aboleatur; hinc in constitutione aeris aëquilonia, seu humidiori & frigida, odoratus insigniter hebetatur; unde etiam canes venatori tunc temporis minus sagaces esse solent, cum eorum odoratus hebetetur, ut referunt Venatores, ut nimis fortis existat. Coryzam & gravedinem quod attinet: circa hanc notum est, quod ordinariò, quando diutius effluit lymphâ catarrhalis per nares, cesset olfactus.

Inter causas externas membranam lædentes est continuus nimis fortiter odoratorum olfactus, aut etiam sternutatoriorum abusus. Ab his enim fortiter odorantibus & narium membranam nimis stimulantibus ex forti impressione, & hinc spirituum animalium nimis motione fit, ut postmodum leniora obiecta vel omnino non, vel saltem parum, sentiant, quatenus in tono suo vitata est dicta membrana: ob id enim campborata crebriùs odorata olfactum ledunt, quia vis ejus odorifera est penetrantissima; vid. BARTHO-LINUS Cent. 4. Hist. 91. Universale nempe hoc est omnibus sensibus externis, ut ex fortiori impressione & motione ab obiecto facta in organum huius fiat læsio, & sic cesset ejus actio, unde non nisi à valido obiecto postmodum moveri & sensualem impressio excitari possit. Sicut enim splendor intensus visum lædit, sonitus auditum; simili ratione fortiter odorifera crebriùs naribus admotâ, olfactum pessundant, quatenus lacerando quasi destruunt membranæ odoratus eorum. In specie dum ista fortiter odorantia, aut acrida membranam



branam ferientia, ita alterant membranam, ut postmodum leuiora obiecta uel omnino non, uel saltem parum sentiantur, imprimis in sternutationibus crispata, & quasi conuulsuo motu affecta, narium tunica exinde in tono suo ita uitiatur, ut non nisi fortissimorum obiectorum impressione fibras eius moueat. Obseruatur hoc in Italis, qui fere semper secum gestant puluerem sternutatorium ex nicotiana, & quotidie cum naribus insufflant, nec non aliis honoris gratia offerunt; hinc in his continuato abusu horum puluerum cessat tandem fere in totum odor, adeo ut dum nos Germani ex simplici sternutatorii odore, aut eius tantillo, ad sternutationem mouemur, Itali, copiose licet ingerant, nullam tamen sternutationem sentiant, & grauitates odores percipiant: unde & idem Itali interdum in iunioribus annis cum imminuto olfactu hebetudinem uisus patiuntur, cum sternutationes noceant oculis. Conueniunt ergo sternutatoria in quibusdam affectibus, sed non nisi moderato usu.

### DIAGNOSIS.

Signa odoratus deficientis ex relatione egri per se patent; sicut causarum diuersitas ab eodem, simulque iunctis circumstantiis aut pathematis aliis, facile colligitur.

Nempe affectus apoplectici & paralytici per se noti sunt: membranam narium esse humectatam aut ex excretionem, aut ex affectibus catarrhalibus patet, imprimis quando lymphæ destillans est copiosa, tenuis, &c. uti fit in catarrhis.

Denique abusus odoratorum & puluerum sternutatoriumum etiam ab egro inquirendus est.

### PROGNOSIS.

Quoad *Prognosin*: pro uarietate causarum maius uel minus periculum imminet ex olfactus lesione. Hincque lesio odoratus fit ex uitio lymphæ catarrhalis, curatur facile; Nam curato catarrho, facile cessat: Sin uero odoratus lesio sit antiqua, præsertim ex causis externis nimis odoriferis, in membrana impressionem facientibus, inducta, talis raro aut nunquam curari solet.

Porro quando egger in morbis acutis odores non consuetos sentit, ut ut non ad sint obiecta talia odorifera, v. g. quando percipit odorem piscium putridorum, luti, buryri rancidi, &c. mala signa, & fere fatum portendunt.

### CURA.

*Cura* pro uarietate causarum variat, nempe omnis causa removenda: adeoque

1. Pathemata cerebri & nervosi generis tollenda.
2. Affectus catarrhalis curandus, & hinc membrana narium nervinis aromaticis in tonum naturalem restituenda.
3. Externa quælibet, præsertim obiecta nimis odorata, maturè sunt removenda.

Præmissis ergo præmittendis, & pro causarum uarietate variantibus, pro restituendo Olfactu imprimis duo excellent, *Majorana*, & *Nigella*. *Majorana* quidem, & quælibet ex hac parata remedia, tam interna quam externa, conducunt: Sic novi mulieres, quæ uti semper sunt medicæ, coryzæ laborantes cum olfactu & gustu perduto, interne sumunt cochleare unum *majoranæ* arefactæ cum cerevisia vel alio vehiculo calido, idque summo cum levamine, & hoc euporiston sæpe egregiam & optimam tulit opem: Sic etiam Extractum *Majoranæ* ceu expertum remedium laudatur ab *HARTMANNO*, si omni mane & vespere usurpetur à gr. vj. vel viij. ad ʒß. Item Essentia *Majoranæ* cum Essentia *Pulegii* mista, vel Extractum *Majoranæ* cum saccharo mistum, addendo aliquot guttas olei destillati *Majoranæ*, in forma Eleosacchari vel rotularum accipitur. Conueniunt etiam *pulegium*, *rosmarinus*, & ex his parata olea, essentia, &c. Hinc etiam *Balsamus Majoranæ* ex ejus oleo destillato factus, naribus illitæ præ reliquis confert; Vel usurpetur oleum sequens:

ʒj. Ol. *Nigell.*

Ireos an. ʒß. vel ʒj.

Destill. *Maior.* ʒß. vel ʒi.

M. D. S.

Oleum ad nasum.

Quo ipso illinantur interiora narium. Conueniens in specie

est in odoratu deperdito, speciatim si simul ex affectibus catarrhalibus addit obstructio summitatum narium; in tali obstructione vix habetur melius remedium hoc ipso oleo. Quod si volumus hanc reddere acriorem, addi etiam possunt aliquot guttulæ olei destillati anisi & succini: Vel fiant etiam noduli olfactorii ex *majorana* & semine *nigellæ*; v. g.

ʒj. *Herb. Maioran.*

Sem. *Nigell. contus.* an. p. ij. vel ʒij.

Irrorantur aliquot guttulis

Ol. destill. *Maior.* vel anisi,

f. l. a. Nodulus cum stylo,

qui subinde naribus admoveatur.

D. S.

Nodulus ad nasum.

Egregie confert.

Denique in odoratu deperdito experimentum *PETRI à CASTRO* sequens laudatur:

ʒj. Sem. *Nigell.* in aceto fortiss. infus. & postea exsiccc.

*Ruta,*

*Fumar.*

*Castor.* an. ʒj.

Subtilissime trita, leniter subigendo misceantur cum urina pueri, ut fiant in forma mellis liquidioris seu Syrupi tenuioris.

Hujus omni mane stomacho jejuno quinque vel sex guttas ægri attrahant per nares fortiter, & postea caput versus posteriora inclinent, & in ore aquam calidam detineant: continentur ad 3. 4. 5. vel 6. dies, donec ægro odor redeat.

Plura qui vult de *nigella* in usu hoc contra olfactum abolitum, vid. *TABERNÆMONTANUM de Nigella.*

Alias in Abolitione Olfactus etiam *Menthastrum* foliis acutis, & floribus albis sub forma extracti cum decocto rutæ, *majoranæ*, *abrotani* & *nigellæ*, interno usu laudatur: sicuti externè eodem decocto menthastrum caput est lavandum.

Denique suffitus ex succino, item gummi animæ, vel ex his duobus mistis, dum catarrhos sistit, etiam deperditum Odoratum nonnihil restituit. Foran & suffitus ex spiritu salis ammoniaci, & aliis volatilibus spirituosis, nervinisque penetrabilibus, non erit inconueniens.

## ARTICULUS II.

### DE

### POLYPONARIUM.

**A**D narium obstructionem pertinet etiam *Polypus*, qui est Sarcoma seu excrementum carnosum in naribus, ex earum summitate pronasceos, & nasum nunc replens, nunc in fauces usque descendens. Ad imitationem polypi piscis ita dicitur, dum mollis est & lubrica, & nunc unâ, nunc pluribus radiculis & pediculis, in loco, ubi excrevit, naribus se affigit.

### PARS AFFECTA.

*Pars affecta* seu locus, unde excrecat, sunt nunc, idque rariùs, membrana glandulosa in summitate narium, nunc, idque frequentius, sunt filaments nervea os spongiosum opplentia, ex quibus nunc uno, nunc pluribus pediculis, huiusmodi *Polypus* excrevit. Excrementum hac nunc alba, nunc rubra, nunc livida, &c. apparet; nunc solummodò narem implet, nunc adeo increvit, ut etiam in fauces descendat, ac strangulationem minuetur: Quod si livida, dolens, &c. appareat, fere cancerosam naturam sapit.

### CAUSÆ.

*Causa efficiens* hujus *Polypi*, non secus ac aliarum excrementarum, est nutritio nimia naturalis, & idem dictarum partium nutrimentum plus minus alteratum, & acrimonia degeneri acidâ plus minus inquinatâ: unde differentia *Polypi* plus minus cancerosi. Omne punctum in efficiente occasionali situm est, quod est læsio unitatis in quodam loco dictarum partium,



partium; siue diffensio, aut vellicatio, aut ruptio, aut exulceratio fuerit; unde in loco laeso fibrae excrecentes copiosiore nutritu in tale corpus successivè excreseunt: Sic Catarrhos aciores narium interdum infectus polypus observatus fuit; A sequenti narium frictione polypum lethalem notavit KERKRINGIUS *Spicleg. Obseruat. 14.*

## PROGNOSIS.

Quoad *Prognosin*: quò magis mollis, albus ac indolens fuerit Polypus, eò facilius curationis; qui verò fuscus vel lividus est, praesertim acutè subinde dolens, vix curatur, quia cancerosam naturam sapit.

Quò profundius hærent ejus radices, adeoque, quò magis attingit filamenta ista nervea, eò periculosior: quia facile sub radicem extirpatione occasione doloris inflammatio membranarum cerebri potest oriri; quod si verò radices penitus non extirpentur, semper de novo pro-ullulat.

## CURA.

Quoad *Curam*: Excrecentia hæc removenda & eradicanda, idque auxiliis praesertim externis, nunc Pharmaceuticis, nunc Chirurgicis. Rarum enim est, quod polypos duos per sola medicamenta interna, dietam, pharmaciam & sudorem, curaverit sine externis HORSTIUS *lib. 2. Observat. 48.* uti & polypum fonticulo curatum videb. in *Miscell. Academ. Natur. Curios. Anno 9. & 10. Observat. 6.*

Antequam autem Externa adhibeantur, si corpus est impurum, & universalis evacuantia & alterantia praemittantur, ne ex doloris ratione contenta corporis quovis modo intensius commota malum exasperent, aut ob plura symptomata curam difficiliorem reddant. Si verò ex vulnere malè curato sit malum, vel simili latione externa, in corporibus praesertim puris, non adeò necessaria sunt ista, sed statim Polypus aggrediendus, & extirpandus.

Quoad remedia ergò externa: hæc imprimis decrefcente luna usurpanda veniunt; tunc enim tumor minor esse solet. Medicamenta ergò quæ absumunt, & successivè mortificant, ac ita eradicant hoc sarcoma, sunt nunc lenia, nunc aciora plus minus caustica. Lenia sunt v. g. succus granatorum acidorum; vel si ipsum pomum cum tota sua substantia pistetur, bulliat cum melle usque ad spissitudinem unguenti, ac imponatur polypo. carnem superfluum successivè erodit: Conferatur FORESTUS *lib. 13. obs. 18.* & M. A. N. C. *loc. alleg.* ubi pulvis ad polypum absumendum usualiter extat: Vel sinapi pulverisatum, cum aceto mistum, ita immittatur & applicetur Polypo. Succus onopoli (species est cardui) contusi specificus est, & sæpius admovei debet: Sicut & ipsa herba contusa convenit etiam ad cancerum narium; mediante quo plures curavit rusticus, teste BORELLO *Cent. 2. Obs. 51.* Vel pulverem heliotropii specificè commendat POTERIUS ad polypum sine morfu absumendum, sic cum gossypio naribus immittatur: vid. *Cent. 3. obs. 63.* Succus nasturtii aquatici crebrius cum gossypio ad-motus remedium dicitur, mediante quo plures curati fuerunt: Loco hujus per experientiam commendat LINDANUS succum radicis ariæ ex radice contusa expressus, cum tinctum gossypium naribus intrudatur, quod ter in die repetatur; sicque successivè consumptus fuit Polypus. Perinde autem esse dicit, anarum? anarifarum? an serpentaria pro hoc recipiantur?

Fortiores paulò sunt placentulae ex Mercurio sublimato, ærugine, & fermento applicatae, quas videb. in M. A. N. C. *Ann. 8. Obs. 91. pag. 151.* Spiritus minerales acidi quilibet successivè Polypum absumunt: sic aqua fortis tactus Polypus statim flaccescit, cui tamen etiam aliquantulum auripigmenti addi potest. Vel

℥. Succ. Granat. p. liij.

Olei vitrioli p. i.

Misc. S.

Mixtura de vorans.

Vel

℥. Ol. vitrioli ℥i.

Alum. usi ℥i.

Aqua Plantag. ℥i.

Misc. S. ut antè

Irroretur hinc inde polypus.

Unguentum Ægyptiacum eadem eundem absumit: Sic RIOLANUS

℥. Cerati myrtin. ℥i.

Ungu. Ægypt. ℥ii.

Misc. pro Linimento.

Quo præterea feliciter uti solet in absumendis excrecentiis, callis, verrucis, condylomatibus. Hoc unguento attingendus sæpius polypus, aut turundæ extremum, quod attingit polypum, unguento eodem illinatur. Unguentum Myrtinum, ubi non extat, ex tempore ita parari potest:

℥. Ol. Myrtin. ℥i.

Pulp. Myrtill. ℥i.

Cera rubræ q. s.

M. pro Cerato.

Ubi unguentum Ægyptiacum non suffecerit, acuetur Mercurio præcipitato, qui benè edulcoratus pluribus lotionibus additur: sarcoma egregiè absumit sine ullo aut exiguo dolore. Hic vel cum melle rosaceo miscendus, eoque intincta turunda in nares immittenda, vel hoc ipso imprægnetur unguentum ab HARTMANNO, praesertim in *Praxi cap. 55. §. 1.* descriptum, vel unguentum Ægyptiacum, aut unguentum Apostolorum addatur pro eradicando Polypo: Vel ad imitationem PLATERI:

℥. Unguent. Ægypt. ℥6.

Cort. granat.

Gallar. an ℥6.

Ol. vitrioli ℥i.

Misc.

Quolpsotangatur quotidie aliquoties Polypus, donec exarscens excidat.

Quod hujusmodi acris aut caustica adhibenda sint, cauti simus, ne partes parium vicinæ attingantur; adeoque vel per fistulam argenteam immittantur, ita, ut fistulae extremitas Polypum ambiat, & ita medicamenta ad eum ferri possint, intactis naribus: aut gossypium aut turunda, medicamentis imbuta, applicentur, ita ut sarcoma tantum attingatur.

Quod si cancerosus fuerit Polypus, ne attingatur quidem metu majoris mali. Si exulceratus Polypus sit, difficulter curatur, in eodem tamen aquæ & cineres ranarum & pulvis cancerorum, saturnus calcinatus & dulcificatus, crocus Martis & similia adhibeantur: Vid. HILDANUS *Epist. 61.*

Quoad remedia chirurgica: si à petiolo simplici hæreat Polypus, ita ut commodè ferro possit rescindi, optimum est, ut abscindatur, aut saltem filo sericeo benè cerato circa radicem ligetur; sic enim intra aliquot dies nutrimento destitutus excidat: vel denique forcipe pepeculari abscindatur, quam describit SENNERTUS *libro 1. Prax. ubi de Polypo pag. 93.* SCULTETUS *Ar-mament. pag. 9. & 10.* Abscissione facta abstergentibus hæmorrhagia sistatur. Ne verò redeat polypus, pulvis gentianæ cum succo scrophulariæ cum turunda naribus immittatur: de quo conf. HENRICUS ab HEER *Observ. 28.*

## ARTICVLVS III.

### DE

### ODORATU DEPRAVATO

### ET

### OZÆNA.

Inter ea, quæ Odoratum depravant, imprimis est ulcus vel abscessus in naribus latens, quod ubi vetustum est ac putridum, simulque fetorem tam ægro quam adstantibus gravem continuè expirat, Ozæna dicitur. Ulcus hujusmodi nunc successivè serpit, & partes vicinas erodit, nunc occasionem suggerit, ut polypus superveniat, nunc copiosam saniem plus minus acrem, plus minus sordidam, affluere facit, nunc graviolem hæmorrhagiam narium infert.



## P A R S A F F E C T A.

*Pars Affecta* sunt nunc partes solum molles membranosae in naribus, nunc verò etiam interstitia cartilaginosa & ossa, nunc ipsum os cribrosum, plus minus simul affectum est.

## C A V S A E.

*Causae* sunt nunc externae, nunc internae: Illae variae inspiratae: Haec in specie lues Venerea, quae inquinando lympham, membranas narium obliquentem, frequentes ozænas junctas habere solet.

## P R O G N O S I S.

Sunt autem quælibet narium ulcera curatu difficilia.

Recentia ac munda facilius curantur: immunda, sordida, crustosa, &c. difficulter curantur, praesertim si simul os ethmoides infecerint.

Denique cautè tractanda sunt, ne cancerosa fiant.

## C U R A O D O R A T U S D E P R A V A T I.

*Cura Odoratus depravati* est facilis, modò curetur vel lues Venerea, vel ulcus. Interim tamen propalliativo remedio optimum est, ut recipiatur Vinum, in quo decoctum fuerit Centaurium minus & calamus aromaticus, quod omni mane & vespere è vola manus attrahatur in nares tamdiu, donec in palato sentiat, & ita ulcus mundificetur. Vel mel acuatur cum myrrha, saccharo candi & paucò cinnamomo: quod dilutum cum s. q. aquae majoranae intra nares attrahatur, ut ad palatum usque penetrare valeat.

## C U R A O Z A E N A E.

Quoad *Curam* verò ozænae, praemissis praemittendis, praesertim Mercurialibus internis, ulcus mundificandum, & hinc consolidandum. Si levius fuerit, curatur per folia nicotianae recentia concisa naribus immissa, & cum per aliquot horas ibi sunt retenta, eximantur, & illigatur: unguento sequenti:

℥. Ungu. de nicot. vel albi campb. ℥iij.

Bals. sulphuris ad extra ℥j.

M. S.

*Unguentum mundificans.*

Continuato horum usu subinde cedit. Nam nicotiana & unguentum ex nicotiana, quod describit WECKERUS in *Antidot.* perquam egregium est, hoc imprimis peculiare obtinens, quod ante mundificationem non consolidat: Hoc etiam ungueniam nicotianae laminæ saturni industum, ac ita applicatum, ceu expertum commendat VELSCHIUS *Hecatoest.* 2. pag. 24.

Quod si verò crusta adfuerit, vel oleo amygdalarum dulcium, vel oleo rosarum, vel butyro recenti non salito illita crusta prius removenda, & hinc mundificantibus pergendum. Vi excutienda crusta non venit, ne irriteretur ulcus, & fluxio exasperetur.

Inter *Mundificantia* egregium est Horminum sylvestre seu selarea, decocta cum paucò melle rosato, & ita subinde applicata, & dein singulis mensibus repetatur, ne recrudescat malum: Aut recipiatur *succus selareae*, subigatur cum melle rosato, ut fiat Unguentum bene mundificans: Quorum loco Decoctum agrimoniae & verbenae cum melle, item urina pueri, subinde iniici & applicari possunt; aut usurpetur *unguentum mundificans Hildani* expertum *Cent. 2. observat.* 23. Fumus quoque candelae ex cera rubra naribus exceptus egregius est, & in ulcere inveterato à RONDELETIO expertus: Nempe cinnabaris est, unde hæc efficacia dependet, unde aliis additis candelae compositae pro hoc casu fieri possunt. Formulas videbis in HARTMANNI *Praxi Chym.* cap. 12. §. 6. Aut etiam usurpentur alii summi cinnabari compositi ad imitationem BARBETTE l. 3. *Chirurg.* c. 7. Utilis quoque est aqua SENNERTII lib. 1. *Prax. Part. 2. sect. 4. cap. 1.*

Item

℥. Aquae Majoran.

Plantag. an. ℥iij.

Spir. vini rectific. ℥iij.

Mell. rosat. ℥vi.

M. S.

*Mixtura mundificans.*

Ex vola manus recipiatur, vel cum parva syringa.

Quod si his ipsis contumacius malum cedere nolit, Mercurialia sunt optima: imprimis iam dictae mixturae Mercurii sublimati gr. vi. vel ℥ss. addi potest, aut Mercurius dulcis cum aqua plantaginis subinde applicetur: Vel

℥. Aquae Plantag. ℥iv.

Mercurii sublimati gr. xij.

M. S. ut supra.

Solutio filtrata usurpetur pro mundificanda ozæna.

POTERIUS sanè *Mumia sua minerali*, ex Mercurio dulci probe edulcorato cum unguento rosaceo plures, praemissis universalibus, maligno ulcere narium, herpete exedente, &c. curavit *Cent. 3. Cur. c. 80. 86. 13. &c.* In specie in ozænis Gallicis optimum est Mercurius praecipitatus cum unguento rosaceo subactus, & mediante turunda locis affectis applicatus. Aliàs unguentum Aegyptiacum, item aqua viridis Hartmanni, cum penicillo contumaciores ozænas aut similes partium vicinarum exulcerationes curat: Videatur *Prax. Chym.* c. 53. §. 5. Vel oleum vitrioli, in quo parum gossypii madescat, eoque duabus vel tribus vicibus optime tangatur, quo facto debitum unguentis curetur. Remedium est optimum ad interna narium ulcera, quantumcunque fuerint maligna: Vid. FERRARA *Obs. Chirurg.* 88.

Hæc de sensibus externis. Pergimus jam ad

## S E C T I O N E M I I I.

D B

S E N S V V M I N T E R N O R V M  
ET FV N C T I O N V M A N I M A L I V M L A S I O N E .

**A**bsolutis sensibus externis, sequuntur Interni. Sensus internos quod attinet, illi rectè dicuntur triplices: *Sensus communis*, *Phantasia*, & *Memoria*. Negotium est obscurius, propter insignem, quam hic observatur, confusionem operationum animalium & & rationalium. Cum enim nostra cognitio intellectualis, & omnis ratiocinatio praesupponat spirituum animalium exercitium, occasione quorum diversimodè motorum anima rationalis spiritalis diversos sibi formet conceptus seu phantasmatas, cum nihil sit in intellectu, quin prius fuerit in sensu, adeoque sensus animales interni & intellectio in nobis semper sint conjuncti; evenit inde, ut nesciamus, quomodo sensus interni, separatim considerati, se habeant. Unde factum, ut omnino similitudo, quoad actiones externas, intercedat non levis inter homines & quasdam bestias. Huc pertinet brutorum docilitas, ut etiam brutis co-

gnitio propriè sic dicta tributa fuerit, & consequenter ad minimum semirationalia reddita fuerint, h. e. nobis propria ipsis similiter tributa sunt.

Exactius si volumus scrutari negotium, necesse est, ut accuratè abstrahamus & separemus res animae rationali proprias, h. e. quae cognitione reflexa in nobis ipsis percipimus, ab iis, quae spiritibus & cerebro sunt propriae, & consideremus, quâ ratione hæc posteriores fiant, cum in his sensuum Internorum ratio consistat. Quo facto, manifestum evadet, sensus internos in sola spirituum animalium varia & multiplici in cerebro & cerebello consistere motione & agitatione: unde & brutis omnis perfecta & propriè sic dicta deneganda est cognitio, uti hoc primùm asseruit CARTESIUS, & ex ejusdem hypothese uberius confirmavit FLORENTINUS SCHVYL in sua *Praefat. in Cartesii Hom.* Et non alio modo se habebunt bruta, quàm teneri infantes, utpote inter



inter quos & bruta nulla est, quoad quasunque actiones, differentia, dum rationalis anima nondum actu secundo operatur. (Operationes brutorum ex consuetudine sunt, vel ex mechanica constructione; vid. DIGBY de Anim. Immort.) Hinc & organicæ quæ lædunt cerebri conformationem secundum poros & meatus, adeoque spirituum animalium motiones & filamentorum nervorum varias applicationes, impediunt & tollunt etiam sensus internos; sicut quæ spiritus animales turbant, & in varias motionum anomalias cogunt, pervertunt sensus internos: sicut istud in confusionibus capitis gravioribus, hoc in deliriis manifestum evadit. Anima enim rationalis, seu ens spirituale, ab objectis quibuscunque materialibus est immutabilis.

Aded ut sensus interni in genere considerati ita se habeant, quod nempe nervorum filamenta, in organis sensuum externorum commota, motum suum continent in cerebrum usque ad radices dorsorum nervorum, unde motus similes in corporibus striatis excitati, & consequenter in spiritibus animalibus sint; id quod sensus communis dicitur, quæ motiones exinde repercussæ in corpus callosum usque, ibi spiritus animales uberim scaturientes occasione fibrarum motarum agitantur, in quo consistit id, quod vocatur phantasia: & inde reflectuntur suum motu ad spinalem medullam usque, ibique impetu facto variis, nunc in cerebelli, nunc cerebri nervos motorios derivantur; illuc in cerebello pro motu partium internarum, corde nempe, diaphragmate, &c. & excitatione affectuum, hic pro motu membrorum externorum: ita ut varii hi motus nunc sensus communis, nunc phantasie nomine veniant, sicut iidem sæpius eodem modo recurrentes Memoria appellari solent: Vid. hæc pluribus deducta in scriptis WILLISII, speciatim *Tract. Anim. Brutor.* An bruta habeant animam contradistinctam materiæ, Veteres, ut & HELMONTIUS statuunt; negant autem CARTESIUS & SCHUYL, & hoc verum est.

Motum quod attinet partium animalium: nempe quarumcunque, sive internarum sive externarum, ejus organon proximum sunt fibræ nervæ, quæ nunc arctius sunt conjunctæ in unum systema, quod vocatur musculus; nunc à se invicem sunt separata, & circulari ut plurimum ductu partem ambiunt, v. g. in stomacho & intestinis, quæ propriâ appellatione carent.

Fibræ hæc in motu dependent à spiritibus animalibus, per nervos in partes distributis; hinc negato eorum influxu pars sensu & motu privatur. Fibræ partium circulares, quæ motum partium internarum peristalticum perficiunt, obtinent nervos ex cerebello distributos, & sine prægressa cognitione sensuali motum cient, adeoque talis motus nec promoveri nec cohiberi potest, unde vulgò motus naturalis simpliciter dicitur.

Musculorum verò fibrarum systema nervos ex cerebro distributos obtinent, ac eos gubernat motus, qui prægressam cognitionem sensualem vel intellectualem sequuntur, adeoque à nobis vel impediti, vel promoveri possunt.

Musculi structura ex copiosis constat fibris, in medio sui coagulo sanguineo seu carneo vestitis, quorum plures sibi invicem inæqualiter quidem, æquali tamen ordine superimpositæ ita situantur, ut utrinque, tam in principio quam sine, fibræ circa carnis intermediæ substantiam incurvatæ figuram & corpus rhomboidæ eleganter constituent, super angulos obtusos, donec in rectos mutantur, mobile: Vid. STENO *Tract. Elementorum Myolog. Specimen*, seu *Musculi Descriptio Geometrica*.

Movetur musculus & omnis fibra mortuæ, quando eadem abbreviatur, & quasi in se contrahitur, ita ut musculi unica sit actio seu contractio, quam sequitur partis annexæ motus, ejusque mutata figura & situatio. Quod si ita contractus persistat musculus, dicitur *Motus tonicus*; si relaxetur denuò, ita ut nullo musculorum agente membrum sit in figura & situ naturalibus, in figura media positum esse dicitur.

Motus hic fibrarum siue contractio à tribus dependet causis:

1. Ipsa fibrarum extensarum & partibus annexarum spontanea ad sui contractionem inclinatio, instar chordarum extensarum sponte se contrahentium.
2. Accedit impetus radiosus (propter velocitatem sic nominatus) spirituum animalium per nervos diffusus, qui in fibræ substantiam diffusam replent, ac quasi inflant, & ita breviorē reddunt, Estmull. *Opér. Tom. II.*

quod imprimis in musculorum ventre observabile est.

3. Sanguinis arteriosi in musculum copiosior influxus supervenit, qui in ventre ejus dilatato, minorem inveniendō resistētiā uberius infunditur, unde & turgescētia musculi & contractionis vigor maximè completur.

Vid. de hoc STETTERUS, STENO, & Autor de Ratione motus musculorum D. CROON in WILLISII *Tr. de Anatom. Nervorum eorumque Structura*. Nullus motus sit sine sanguinis arteriosi affluxu; an verò sanguis saltem uberiori suo influxu motum musculorum promoveat? an verò ex sanguine oriāntur particulæ elasticæ dictæ, quæ in musculorum fibris occurrendo spiritibus animalibus certam explosionem, & ita insignem dilatationem efficiant? in medio relinquo. Videri tamen hic potest WILLISIIUS de *Pathol. Cerebri & Motib. Convuls.* item MAYOW *Tract. de Motu musculorum, & de Nitro Aerco*.

## CAPUT I DE

SPIRITUUM in CEREBRO, & hinc SENSUUM  
ORGANIS INORDINATA seu PRÆ-  
TERNATURALI AGITA-  
TIONE, indeque orta  
VERTIGINE.

**V**itia inter, quæ sensus internos motusque animales lædunt, præ cæteris eminet Vertigo. Præsuppono hic ante omnia exactam notitiam cerebri, & ejus vasorum, indeque producti sensus & motus, aliàs me nunquam intelligetis.

Vertigo, ita à *vertendo* dicta, est iste affectus, quo omnia extrinsecus circumagi, & tam ipsum caput & corpus ægri, quàm omnia nos ambientia & oculis apparentia corpora, quasi in circulum rotari & gyri videntur, ut hæc omnia sint firmissima, nullogue pacto gyrentur, Per artem imitari possumus hunc affectum, clausis oculis corpus celeriter circumgyrando; sic enim subito quiete apertis oculis tanquam vertiginosis omnia circumagi videntur: Nonnaturaliter hoc fit in ebriosis, quibus pariter omnia videntur in gyrum agi. Interim tamen non necesse est, ut semper fiat circumgyratio. Sufficit enim motus tremulus & undulatorius, & similis: Nempe est similis affectus illi, qui nobis accidit, quando corpus in circulum agitamur, vel quando diutius aspiciamus rotas circa axin circumactas.

Ratione graduum (non specierum) triplex esse solet Vertigo:

1. Vertigo simplex, utur promiscuè sic dicta, quæ Græcis *Δις & ἄγχι* audit, quando scilicet corpus ægri & omnia exteriora circumagi aut circumgyrari, & omnia nunc sursum; nunc deorsum, nunc alio modo moveri videntur, subito tamen evanescente *καρῶν*, & est vertigo simplex; in cæteris enim gradibus, ubi nulla rotatio observatur, quin potius visus obtenebratur, & plus minus aboletur, improprie Vertigo dicitur.
2. Gradus secundus est *Ξαίνα & Ξαρόδιν*, aut *Ξαίνα σκοτία*, Vertigo tenebrosa seu *Scotomia*, in qua oculi simul velut affusæ caligine obscurantur, ita ut Visus tandem omnino pereat, aut etiam varii colores, obscuro, flavi, cærulei, virides, nigrescentes, &c. coram oculis versari videntur, qui insequente tali caligine evanescent.
3. Tertius vertiginis gradus est *Vertigo caduca*, quando ista oculorum caligo vertiginosa in tantum invalescit, ut protinus æger concidat, nisi prehensus, aut proximis adminiculis prehensis, se fulciat.

Cerebrum huic Vertigini leves motus convulsivi, & deinde vera epileptica affectio, huic ultimo gradui superveniunt; unde proximus ad epilepsiam, interdum apoplexiam, gradus haberi solet, propterea parva epilepsia quibusdam vocatur, cum e contra Epilepsia levioribus comitatæ convulsionibus Vertigines graviores interdum Prædictis dicantur. Vix enim est insultus epilepticus qualiscunque, quem non aut antecedit aut proxime comitetur Vertigo gravior aut scotomia. Unde ingruente insultu epileptico ferè dicunt: *mutari*



*ipsis obiecta ante oculos, variosque ostendere colores: sicut alias quaecunque spirituum animalium eclipses & deliquia insigniora, & in motu ataxias & antecedere & comitari solet Vertigo, ut v. g. in lipothymias, doloribus ingentibus, gravioribus paroxysmus hysteriis, &c. manifestum est.*

A gyratione ergo & rotatione, seu nobiliore symptomate, Vertiginis ratio imprimis desumitur: Nihilominus tamen, praeter oculos, & alii sensus simul afficiuntur, imprimis in secundo & tertio vertiginis gradu: Nam sibilus & tinnitus, quin & rancus interdum & obtusus sonus in auribus percipitur; subinde in tertio gradu perit motus membrorum, & licet apprehendant aegri adminicula, quibus se fulciant, tamen saepius eadem minus firmiter comprehendere valent, ita ut tandem concidant.

## P A R S A F F E C T A.

Quoad Vertiginis subiectum: vulgo rotationem spirituum animalium in cerebro esse causam istius apparentiae existimant, quod tamen falsum est: in oculis enim simpliciter, non vizio cerebri, fit ista rotatio seu motus iste inordinatus, qui Vertiginem infert; Nam visui res gyrationi & similia pathemata apparent. In organo ergo visionis seu oculo necessarium erit vitium, cum in cerebro non videamus. Nemo sane concipere poterit, quomodo spiritus in cerebro agitato apparere res faciat rotari extra oculum? Vertigo scilicet fit in medio videndi, non in vidente ipso, uti neque in obiecto viso; Medium vero hoc est oculus. Par ratio est, quando oculis videntur obversari nubeculae, flocculi, muscae &c., quae res videntur esse in aere, cum tamen revera sint in oculo, in specie in humore ejus aqueo; unde etiam dum res externa gyrationi videntur, hoc fit in oculo, non extra oculum, vel in cerebro, vel obiecto externo. Nemo est, cui non igitur vel flammula noctu in tussi graviore vel percussione oculorum in aere versari & extrinsecus moveri videantur, quae omnia tamen revera sunt in oculo; hoc enim non saltem fit in tenebris, sed etiam in quibusdam interdiu: ita etiam dum externa obiecta gyrationi videntur, talis motus fit in oculo. Quod si quis vulgari scholastica Philosophia additus dicere velit, revera visionem formaliter fieri in sensu communi, non vero in oculo, cum oculus non videat, sed sensus communis tantum, unde gyrationi spiritus in medulla cerebri circa principium nervorum, ubi fit sensus communis, vertiginem inferant: Respondeo ego ipsi ex illius hypothesebus, quas tamen nullo modo facio meas, distinguendo inter circumgyrationem ipsam, & ipsius motus apparentiam, cuiusque a nobis perceptionem. Concedo ex eorum hypothese, ipsam apparentiam quidem, seu representationem ipsius circumgyrationis, fieri in sensu communi, adeoque in cerebro, non vero actualem circumgyrationem, quae causa est talis vertiginis. Totum hoc negotium, appositissimè, desumpto à speculo, illustrat PETRUS JOHANNES FABER in Pathol. sua, quae videatur. Nempe si habemus vitrum aqua plenum, & per hoc videmus obiecta externa, illa videntur quiesca, quamvis liquor agiteretur; si vero accipimus speculum, hocque movemus, pro motu speculi etiam obiecta externa simul moveri videntur; & si in gyrum rotatur speculum, etiam ipsa obiecta circumvoluta apparent: conf. WILLISIUS de Anim. Exor. Part. 2. cap. 7. pag. 204. In oculis ergo, in specie post humorem aqueum in humore vitreo prope tunicam retinam, fit talis gyratione, qua motus spirituum animalium se habet instar aquae communis in vitro, rationem speculi habet tunica retina, quod notum est ex Physiologia.

## C A U S A.

Causa ergo vertiginis proxima & generalis, ad quasvis earum differentias se extendens, est inordinatus, confusus plus minus, ac interdum plane interruptus spirituum animalium motus: (hic in secundo gradu, ille in priore) & in partes externas influxus, unde omnia caetera dependent symptomata; quae pluribus videantur adducta in WILLISIO l. a.

Motus hic dum fit in oculo, & dum spiritus animales in oculo rotundo concamerato agitantur, hinc necessario rotundo motu in gyrum agitantur & moventur. Quod si sub motu isto spirituum animalium perturbato nimis, pe-

nitus deficiat spirituum istorum radius in oculis, caligina & tenebris oculi obfuscari videntur. Verum non in solo oculo, sed in reliquis etiam sensuum organis, praesertim auribus, similis fit inordinata agitatio, unde & sonitus aurium; in partibus vero externis minus firma obiectorum apprehensio & casus contingere solet.

Ut ergo rotatio in vertigine fit manifestior, tunica retina consideranda est, quae est speculum, in quo depinguntur obiecta. Pro hujus ergo motu etiam obiecta moveri videbuntur. Jam vero non motus spiritus in oculo, sed motus in speculo visorio oculi, infert vertiginem; adeoque sicuti visus naturalis fit per contactum radiorum visualium ad tunicam retinam, & sicut contactus seu appulsus aeris interni, moti ad tunicam cochleae nerveae, auditum excitat; ita etiam spiritus animales, qui in vertigine se habent instar aquae communis in vitro, in oculo gyrationi, dum sub motu illo illudunt in tunicam retinam, ejusdem fibrillas agitant, & ibidem impulsionem faciunt, talem obiectorum visorum circumgyrationem apparere faciunt; sicuti appulsus ad tunicam cochleae sonitus istius apparere facit. Sane peculiarem & ipsius tunicae retinae simul concurrere motum, patet simul ex variis coloribus, imò & splendoribus, subinde in Vertigine caduca, quando denuò ingruit paroxysmus, ante oculos apparentibus; item epileptiis, nec non mulieribus hysteriis, ingruente paroxysmo; item ebriis tales colores & splendores interdum ante oculos versari videntur flavi, caerulei, virides, & similes; quae in dictis affectibus ab inordinato motu spirituum in fibris tunicae retinae talis impulsus seu motus fit in tunica retina, qualis alias fit à radiis visualibus ab obiectis luteis vel caeruleis, aut splendentibus in speculum illabellescentibus. & tunicam retinam determinatq; motu ferientibus, ut alius motus sit, quando obiectum apparet album, aliud, quando nigrum &c. sic si à causa interna talis motus in tunica retina excitatur, similis fit in sensu communi iudicium, & similis apparitio, unde cogitamus, tales esse colores: vid. BOYLE. Imò si nimis inordinatus & tantum non interruptus sit motus, praesertim ad oculum, in tantum visus exinde perturbatur, ut etiam obscuratio oculi & caliginis apparentia superveniat.

Quod attinet caliginem: hujus alia ratio est, quod nempe videantur tenebrae. Caliginis talis sensus fit, non tam ex perverso spirituum motu, sed quando nihil videmus, concipimus tenebras, quando claudimus oculos, caliginem percipimus in oculo. Unde fit caligo vel ex defectu obiecti lucidi aut colorati in oculo, vel ex ejus nulla perceptione; Nam utroque in casu tenebras & caliginem nobis imaginamur. Jam vero in Vertigine caliginosa in secundo gradu, sunt obiecta lucida, nec tamen eadem vident aegri. Fit igitur, dum in interrupto spirituum animalium motu abruptitur eorundem ordinata & radiosa series, & in specie in oculis iidem deficere incipiunt, videntur adesse tenebrae, unde caligo quasi representatur. Ulterius, si ex spirituum istorum animalium inordinato motu ad musculos usque fit continuatio, nunc ex eorum hinc inde quasi abruptorum defectu cessans obiectorum apprehensio, & casus, dum simul volunt cadere aegri, quia spiritus non sufficiunt pro apprehensione adminiculi; nunc ex inordinato influxu leves convulsiones, imò interdum graves epileptici insultus, superveniunt. Adeoque non solum spiritus visorius in oculis immediate perturbari videtur in vertiginis affectu, quin totum spirituum animalium systema impetuosis in cerebro concitari in graviore vertigine videtur, ita ut & reliquorum sensuum organa simul afficiantur. Qui affectus vero, quia imprimis in oculo est notabilis beneficio gyri, ob id à principiori fit denominatio, & Vertigo appellatur, cum posteriores duo gradus ad Lipothymias vicio spirituum animalium proprius accedant.

Quaestio iam est de Causa Remota; unde ille motus spirituum inordinatus in cerebro, & hinc in organis sensuum, dependeat, pro qua motus varietate variae sunt apparitiones in organis sensuum? Hujus ratione Vertigo est vel per essentiam, quae morbum constituit, v. g. ab affecto cerebro quacunque immediate orto; aut ratione vicii cujusdam in cerebro conturbantis spiritus animales, quando vertigo non plagas aut cerebri convulsiones sequitur: vel per consensum, quae est saltem symptoma morborum aliorum, quando v. g. vicio stomachi, aut partium quarundam, infc-



Inferiorum, uti à passione hysterica, &c. Vertigo oritur. Sed verum ut fatear, rarissima est Vertigo per essentiam, quandoquidem quotidiana Praxis & Practicorum observationes monstrant, Vertiginem ferè omnem esse ex vitio partium inferiorum, utut diutius affligens & sæpè recurrens usque ad spiritus animales & cerebri texturam per motus spirituum præternaturales alterare & immutare valeat, ut tandem ex vitio cerebri proximo affligere videatur. Adeoque si est per essentiam Vertigo, ferè occasione causæ antecedentis externæ caput ac cerebrum plus minus lædenti successivè oriatur; vel quod crebriore affectione Vertiginis cerebrum & spirituum animalium systema ita sit dispositum, ut cerebrum quasi per essentiam videatur affici: raro à causa interna. Utraque est vel habitualis, seu ferè nullo non tempore afficiens, ac à causa interna ac radicata dependens; vel accidentalis, à causa tantum evidente oriunda, hinc non, nisi hac præsentè, affligens.

Partes istæ, quarum consensu sit Vertigo, primariò est Venterculus, speciatim à sordibus vitiosis in aut circum commotis. Huius varia peccata, imprimis vitiosus sui generis acor volatilis, orificium superius affligens, vertiginem infert, propter spirituum animalium versus cerebrum recursum inordinatum. Hinc enim frequenter iuvenes diligenter literis incumbentes, in specie etiam senes, sæpius sunt vertiginosi, quamdiu leivnus est stomachus; subito verò atque unam, vel alteram tantum panis buccellam aut similibus esculenti comederint, malum cessat; unde etiam matutinis horis tantillum comedendo vertiginem talem sæpius præcavent. Hinc etiam qui laborant affectu hypochondriaco, ordinariò sunt vertiginosi, specialiter quando sunt ieiuni. Est vir hic laborans scabie, quem præmissis præmittendis lubeant se inungere cum unguento quodam, sed calidè: dum autem cubitum petit, accipit unguentum, illinit artus: sed quia cubiculum est frigidum, accipit vas carbonum, & calefacit artus, & sic cubitum petit: Mane evigilans totus erat vertiginosus, & non audebat tres gradus progressi, ne corrueret: Dicebat: sentire anxietatem & molliorem, ac si omnia deberet vomere: Suspicio erat, an scabies esset retropulsa, quia ager etiam inunxit præcordia, brevi tamen post superveniebat vomitus cum euphoria ægri. Ordinavi quendam stomachicam: vesperti iussit asferri vas carbonarium, inunctionem repetiturus, & subito atque olfecit carbonem, vertiginosus factus est: Hinc manifestum est, Vertiginem ortam fuisse ex fumo carbonum. Hæc ergo Vertigo erat per consensum stomachi, quia eiusdem pathemata, vomitus, factus cum euphoria ægri, satis ostendit in stomacho fuisse radicem mali. Notum autem est, fumum carbonum reddere homines caroticos, interdum apoplecticos; In hoc verò homine hic fumus affecit orificium stomachi. Unde si ex fumo carbonum Vertigo oritur, & ille est ex stomacho, quidni etiam, si ex fumo carbonum oritur carus, erit ultimum in stomacho? Contagia enim non tam sedunt caput, quam ventriculum, inspirata suspiciendo: vid. supra P. 1. ubi de Febr. Malign. Inter partes ergo per consensum inferentes Vertiginem, primariò est orificium stomachi sinistrum; hinc semper conqueruntur de angustis præcordiorum, vomunt ferè semper; postmodum vomitoria assumpta, dum incipiunt operari, ut plurimum scotomiam solent inferre, utut vomitoria adhuc hæreant in stomacho; hinc literatos ordinariò liquor maris solaris curat; unde si mane quid assumitur, subito cessat vertigo. Pertinent huc hysterice mulieres, quæ admodum sunt vertiginosæ, & ut plurimum præcedentibus scotomiis suffocatio dicta uterina inchoat, aut etiam incipiente paroxysmo hysterico, & dum adhuc primos insuleus sentiunt circa præcordia, Vertigine gravi subinde corripuntur, in qua tamen male uterus accusatur, utpote qui est insignis; est enim saltem modus quidam affectus hypochondriaci hæc suffocatio. Mulieres tales si patiuntur Vertiginem, certè sunt, ingruere paroxysmum, unde tunc usurpant clysmata, quibus & vertigo curatur, & paroxysmi præcaventur. Senes etiam, ut dictum, sæpius Vertiginem, non ex vitio capitis, nisi interdum, quando præcessit læsio, sed ex stomacho sunt obnoxii, concurrentibus tamen simul proximè spiritibus animalibus debilioribus, cum vitiosa singul plus minus cerebri textura; unde vel levi occasione, nempe capitis refrigeratione, attentà meditatione, aut levi corporis agitatione, paroxysmum vertiginis corripuntur; imprimis peius habent, dum sunt iei-

iuni. Quidam senex vertiginosus tempore hyberno præprimis, dum exit ieiunus, peius se habet, quàm alias quid assumat. Malum ergo hic est ex stomacho. Ebrietas quoque ad Vertiginem disponit, unde ebriosi omnes vertiginosi sunt; ipsis omnia duplicia esse apparent: in paroxysmo quidem per essentiam vitio spirituum animalium ab alimento nondum ritè assimilato, ut & spiritu vinoso inordinatè vel confusè agitatorum; extra paroxysmum verò ebrietatis vertiginem saltem per consensum ventriculi patiuntur. Porro nonnulla assumpta, v.g. statulenti cibi sic dicti (non enim sunt statul in cibis, sed sunt in stomacho) ut cepæ, allium, nasturtium, rapa, brassica, raphanus hortensis & rusticanus, & similia oleracea, etiamnum in ventriculo hærentia, in quibusdam etiam spiritus salis ammoniaci vertiginem & scotomiam in nonnullis excitant. Imprimis sordes præternaturaliter, fortius impactæ orificio stomachi, commotæ vertiginem inferunt; unde si proprium fermentum stomachi ieiunum has sordes aggreddatur, Vertiginem infert. Vitia quoque intestinorum, v.g. vermes, subinde graves inferunt vertigines & scotomias; sicut etiam interdum epilepticas convulsiones. Præterea tamen ex liene, utero male constituto, renibus, aliisque partibus nerveis insignioribus, per consensum itidem oriri potest Vertigo. Sic etiam calculus renum, ex pelvi in ureteres commotus, in quibusdam graves inferre solet Vertigines & scotomias. Quod etiam facit Vertigo à dolore acuto, ulcere, aut sphacelo artuum, cujus WILLISIUS l. 4. meminit.

Sed quomodo fiat talis Vertigo per consensum? quæstio est. Vulgò ad vapores, exhalationes & effumationes ex inferioribus partibus in cerebrum elevatis confugitis: Sed impossibilis est horum vaporum transitus, viis omnibus sufficienter munitis, imprimis cum etiam HELMONTIUS in suis scriptis, & hinc SCHNEIDERUS de Catarrh. lib. tribus, sufficienter discusserint hos ipsos vapores vel halitus, qui è membris aut è cavitatibus corporis exhalare finguntur. Dicendum potius, subesse tunc ut plurimum leviores partium internarum spasmos, quorum occasione spirituum versus cerebrum radiativorum inordinatus & quasi undulatorius in eo supervenit motus, & quasi resiliens impetus, qui reliquias eorum copias in cerebro impetuosius commovens, eosdem in motus inordinatos & confusos cogit, sicque Vertiginem infert: Vid. imprimis WILLISIUS de Morb. convulsiv. Dum verò spirituum iste recursum & resiliens plus minus vehemens ab objecto inadæquato, præternaturaliter partem sensilem nerveam vehementius afficiente, nata contingit, & ad cerebrum usque deferretur, Formicatio talis, seu velut aure frigida adscensus, persentiri videtur; utut hoc non in omnibus æquè contingat: e.g. ex graviore in quodam loco dolore quidam vertiginosi redduntur objecti dolorifici occasione, spiritibus ad partem dolentem commotis, & aliquid spasmatici plus minus efficientibus: fortioris verò ab objecto doloroso impressionis ratione repulsi, iidem & quasi resiliens, vertiginis pathema inferunt. Exemplum dicta illustrans est, quod refert FONSECA lib. 2. Consult. 30. ubi refertur mulier, quæ incepit pati per intervalla hebetudinem quandam repentinam circa oculos, cum quadam ventris perturbatione, quo tempore corpus regere non poterat, ni caderet: tempore accessionis dicebat se sentire, summum quandam ex partibus ventris sursum ascendentem, parum tamen durare hoc symptoma: simul admodum prompta est ad vomitum, ita ut quotidie ferè vomat biliosa, ac pituitosa. Malum hoc est affectus ille, quem Vertiginem per consensum uteri vocant, cum tamen circa hypochondria minora, materia & occasio sensibilibus, delitescat, quod vomitus persuadet: quæ commotæ, & partibus nerveis istorum locorum alteratis, supra explicato modo sumi adscensus præsentat, donec Vertigo superveniat. Roversæ ad passiones dictas hystericas pertinet. Fumus hic, quem sentit mulier ascendentem, sunt revocata spasmi, qui inchoati in plexibus mesenterii, & continuato nervorum paris vagi & intercostalis tractu, supra dorsum sursum prorepentes, talis progressus sumi elevati speciem referunt, donec isti spasmi ad cerebrum usque continuati ibidem spiritus animales in confusiones agant, quibus confusis consequenter in sensuum organis motus Vertigo oritur. Sic BARTHOLINUS Centur. 1. Histor. 74. habet Vertiginem quinque annorum vaporis instar ex pede sinistro in caput ascendentis, accedente simul vago capitis dolore; qui ascensus reverà nil



allud est, nisi spasmus nervorum ad pedes protensorum, qui antecedit occasione objecti irritantis: impetuosius autem inde resiliens spiritibus, nervi successivè spasmò correpti talem motum adscensionis apparere faciunt, unde vulgò vapores & fumi adscendentes accusantur. In praxi sæpius occurrit, quando ægri dicunt: *repiit sursum, idque possunt sentire*. Pluribus deduxit WILLISIIUS in *Anat. Cerebri, Patholog. Cerebri, & de Anima Brutor. lib. 2. cap. de Vertigine*. Ulterius consideretur pro confirmatione calculus, qui simpliciter motu suo extra pelvim in ureteres ad vertiginem disponit, ut supra innui. Calculus enim in suo motu excitat spasmum omnium partium abdominis, hinc inferunt colicam spasmodicam & vomitus, quæ pathemata spasmodica continuant usque ad radices nervorum in cerebro, cujus fibræ ibidem vellitate universum spirituum systema simul commovent, qui commoti vertiginem inferunt. Item considerentur vomitantes, quando malè se habent, qui cum labii tremore simul vertiginosi quid patiuntur, quod ex spasmò fit: Eadem enim tunica, labia & stomachum investiens, stomacho affecto, simul convellitur, unde tremit labium inferius. Utplurimum ergo, ubi tales accusantur fumi, ad sunt nervorum spasmò, aut ubi non adsunt tales spasmò, adest saltim massa sanguinea halituoza & quasi vaporosa, quæ etiam ad hoc malum disponit. Talis massæ sanguineæ halituoze status apparet in hypochondriacis & scorbuticis, in quibus subinde subito venæ turgent, & etiam subito iterum concidunt, sine manifesta causa. Unde interdum, utut raro, à tali sanguine ad cerebrum delato & spiritus animales inquinantur, & inordinatè agitantur, ac Vertigines oriri solent; adeo ut LINNÆUS omnem Vertiginis rationem ex tali sanguine halituoza deducat. Illustratur hoc ipsum, quando Vertigo supervenit mulieribus ex mensium suppressione, vel viris plethoricis *verapour*: Hinc in tali vertigine, quæ vitio sanguinis fit, subinde venæ sectio optinè convenit: Conf. HORSTIUS in *Probl. 3. Decad. 2. pag. 12.* Unde Vertiginem diuturnam casuali hæmorrhagiâ narium solutam LOSSIUS *lib. 1. obs. 3.* testatur. Reverà autem in Vertigine per consensum utplurimum ipsarum partium inferiorum spasmò adsunt, seu occasione mali hypochondriaci, hysterici, splenetici, vomitantis, aut alius similis excitantur, quarum partium spasmò successivè in cerebrum vibrati, & spiritus ibidem in motiones agentes, vertiginem inferunt: Vid. WILLISIIUS in *Anat. Cerebri*: quæ vertigo per consensum, imprimis stomachi, est frequentissima. Quod si sæpius repetat talis per consensum vertigo, fit tandem, ut alteratâ cerebri texturâ à cerebroribus istis & inordinatis animalium spirituum excursionibus, tandem vel levi data occasione in similes inordinatos motus spiritus animales erumpant; & ita tandem suo modo per essentiam evadat.

Quoad attinet Vertiginem per essentiam, ferè triplici modo fieri solet:

1. A conformatione cerebri plus minus vitiosa occasione causarum externarum, quando per contusiones, plagas, concussiones cerebri, casus ab alto fortiores, vulnera capitis graviora, vel etiam sanata, & similes causas, quæ quoscunque poros cerebri, & canales eiusdem minores, adeoque ipsam texturam, ita immutare valent, ut spirituum animalium cursum & expansionibus naturalibus impeditis hi ipsi postmodum vitioso & inordinato moveantur motu, unde Vertigines, & Epilepsie: Sic DEODATUS observavit Vertiginem ex casu ab equo, ita ut tandem supervenerit apoplexia lethalis; ibi enim ex concussione cerebri pori & delicatæ fibræ compressæ sunt, unde spiritus animales in motu impediuntur. Interdum, sed raro, sine talibus manifestis causis læsio cerebri interna, indeque collectio heterogenei, causa occasionalis vertiginis existit, à quibus seu causis occasionalibus facillimè Vertigo inferitur. Faciunt nempe huc fumi metallici, in specie Mercuriales, qui frequentius hausti per nares imprimis cerebrum affligunt, & ita Vertigines per essentiam inferunt: cuius exemplum reconfer FRAMBESARIUS *lib. 2. Consult. 3. de Vertigine tenebrosa*, sine ulla intermissione in Chirurgò, qui crebrò luc Gallica infectos curaverat beneficio inunctionis Mercurialis, unde à viru-

lencia Mercuriali, generi nervoso ac cerebro infecta, ipsi communicata, malum ortum traxisse probabile est.

2. Ab heterogeneitatibus cum Sanguine ad cerebrum adductis. Heterogeneum istud in cerebro existens triplici modo vertiginem infert: (1.) Quando aliquid heterogenei sanguini & spiritibus animalibus est permixtum, ut fit v. g. in paroxysmo ebrietas, vitio nempe spirituum animalium per spiritus vini copiam inquinatum; Spiritus enim vini volatiles, nondum ritè isdem assimilati, isdem permiscetur, unde impuri redduntur, & in cerebrum translati in suo motu turbantur: Idem etiam fit sub haustu fumi tabaci in non aduersis. Vel (2.) quando aliquid excrementitii præternaturalis cerebro immixtum fuerit cum sanguine aut sero influentibus; hinc enim suppressiones sanguinis consuetæ extraordinariè subinde vertigines inferunt. Vel (3.) quando ex læsione ipsius cerebri quacunque ex vitio digestionis privatae crementa varia in eodem generantur, à quibus retentis spiritus animales turbantur, unde vertigines & alia mala oriuntur: sic v. gr. ex sero caput & cerebri interiora replente vertiginem observavit PLATERUS *Obs. p. 102.* & SCULTETUS *Arment. obs. 19.* Vertiginem in juvene ex vesiculis aqua limpida plenis in cerebri sinistra parte inventis, observavit WEPFERUS *Tr. de Apopl. pag. 96. & 70.* & ROLFINKIUS *Dissectat. Anatom. lib. 1. cap. 13.* Item similia exempla ferè habet SCULTETUS in *obs. Chirurg. obs. 10. 11. & obs. 25.* refert foeminam ex contusione synepitris curatam, quam infecta, vertigo gravissima, quæ tandem in apoplexiam desit: aperto cranio repertus fuit folliculus aquosus in cerebro, ratione cuius probabile est, Vertiginem coactam fuisse: sic ZACUTUS LUSITANUS *lib. 7. Med. Princ. Histor. Observ. 12.* observat paroxysmum vertiginis per abcessum materię purulentæ ex aure aliquoties curatum. Facit hæc vertigo singularis SCHENCKII in *Observ. ubi de Vertigine*, curata ingenti purulentæ materię per dentium alveolos & os excretionem: A vermibus vid. BONETTI *sepuchr. lib. 1. sect. 1. obs. 116.* ex sphacelo cerebri, vid. BARTHOLOMI *Acta Hassniens. vol. 1. obs. 33.*
3. Ob sanguinis & spirituum defectum, v. g. in Syncope, vigiliis diuturnis, longiore inedia, hæmorrhagiis, gonorrhœis, &c. Hinc ex nimia Venere Vertiginem cum aphoniam & intolerabili capitis dolore notat BALLONIUS in  *suis Histor. absumptis nempe spirituum animalium copiis, & exhausto plus minus cerebro, facit quid vertiginosi cum sanguine instillare porit.*

## DIAGNOSIS.

Sequuntur signa. Signa Vertiginis partim ex antedictis per se patent, partim ex relatione ægri cognoscuntur, saltem observanda sunt signa distinctiva Vertiginis per essentiam & per consensum.

Per essentiam Vertigines fieri suspicio tunc est, quando morbi capitis præcesserint graviores, vel Vertiginem concomitantur, v. g. insomnia graviora, dolor capitis, aurium tinnitus, &c. aut etiam si externæ quædam læsiones seu molestiæ, v. g. vulnera, &c. antea acciderint capiti.

Per consensum verò fieri Vertiginem suspicio est, quando non propriè affligit cerebrum, sed si sine distorum præsentia & cum debilitate & noxa partium aliarum inferiorum, ut affectu hypochondriaco aut hysterico, Vertigo observatur: Ita v. g. ventriculorum Vertiginis Autorem existere, cognoscitur ex huius symptomatis, quando per vomitum Vertigo aut levatur, aut insigniter curatur; item si Vertigo ante passum potius, quàm à passu affligat, aut post assumptum alimentum quodcunque Vertigo fiat levior, &c. Vertigines stomachales enim raro affligunt à passu.

Vertigines mulierum hystericarum, & hypochondriacorum per se patent.



## P R O G N O S I S.

Quoad Prognosin: Observandum est, quod Vertigo symptomata accidentalis levior ac recens parum habeat in recessu, & curatu facilis existat: habitualis verò: gravior præcipue & diuturnior, imprimis Scotomia, in specie extra manifestam causam externam inchoans, hypochondriaci mali ferè sit indicium & difficulter curetur: ut plurimum verò in senibus apoplexiam, in iunioribus epilepsiam, certissime prænuñciat.

Sanè in senibus Vertigo confirmata raro fallit, quin comitem secum ducat apoplexiam. Unde etiam Vertigo in senibus longè periculosior ac difficilior curabilis, quàm in iunioribus.

Hinc pro varietate graduum etiam plus, vel minus affligit: si quidem Vertigo caduca omnium gravissima & periculosissima est; minus Vertigo tenebricans, quando simul caput & corpus gyrat: minimè omnium Vertigo simplex, in qua tantummodo externa circumagi videntur, non tamen caput aut totum corpus.

Quia autem modò anteriorem, modò posteriorem magis, capitis partem afficit: Illa pariter magis tuta & curabilis est, dum nonnunquam vel hæmorrhagia narium, vel mensium & hæmorrhoidum fluxu solvitur: vid. LOSSII Observat. lib. 1. Obs. 9. ubi vertigo nullis cedens remediis tandem casu ab alto, superveniente hæmorrhagia narium, curata est: quum verisimile est, à sanguine provenisse, ex toto corpore per arterias in cerebri ventriculum anteriorem irrepsisse, qui in plexu choroide agitato turbulento sensus & motus reddiderit. quamvis interdum in cephalgiam quoque commutetur: E contra hæc, quia spirituum ad nervos influxum magis turbat, longè periculosior observatur, quatenus frequentius in apoplexiam, paralyin & morbos convulsivos abit: vid. WILLISIUS l. a.

## C U R A.

In Cura huius morbi duo tempora consideranda sunt:

1. Tempus extra paroxysmum, ut præservatio influatur; &
2. Tempus in paroxysmo, in specie vertiginis caducæ, ut rite sistatur, & curatio peragatur.

Quoad Præservationem, seu Curationem extra paroxysmum: ea respicit fomitem morbosum, ubi in specie causa antecedens vertiginis perferenda & removenda, adeoque præsertim viscerum abdominis ratio habenda, hinc spiritus animales appropriatis & roborandi, & impetuosus eorum motus sistendus: & cùm malum frequentissimum sit per consensum ex stomacho seu primis viis, ob id vomitoria, juxta HIPPOCRATEM lib. 4. Aphor. 17. & hinc remedia stomachica & aromatica communiter dicta, primum obtinent; quibus subjungantur specifica, Vertigini dicata. Vomitoria, si fomes extra ventriculum & vertigo diuturna fuerit, substitui solent Purgantia, eaque blandiora; nam fortia omnino erunt vitanda (juxta HIPPOCRATEM Prorrh. l. 1. c. 9.) utpote quæ vertiginosus motus etiam in non-vertiginosis cient; vid. à CRUCE de Quæst. per Epist. Cent. 4. pag. 427. Cum verò in genere supra dictum sit; Vertiginem graviores esse parvam quasi epilepsiam, & hanc subinde illam insequi hinc vertiginem in specie omnia ea appropriata sistunt, quæ epilepsia conveniunt; sicuti è contrà omnia anti-vertiginosa etiam epilepsia medentur.

In Curatione ipsius paroxysmi, præsertim Vertiginis secundi & tertii gradus, vel vomitus, vel opiata, vel anti-epileptica, in specie volatilia nervina & aromatica, qualia de Epilepsia notabimus, tam externa quàm interna, sunt optima.

Pro his scopis melius obtinendis, observandum:

I. In Vertigine per consensum vomitoria in utroque casu sunt omnium optima, præsertim in malo contumaciori, vix sine vomitu curabili, in specie cum frequentissimè Vertiginis radix hæreat in stomacho. Monstrat hanc viam nobis ipsa natura, quæ in Vertigine per consensum nauseam excitat, interdum vomitus cum ægri euphoria: sic refert PISO Tr. de Colluvie serosa pag. 69. de quodam, qui vertigine quinque annorum laboravit, & insigniter commotus fuit, curato per spontaneum naturæ motum, per vomitum frequentem & copiosum aquæ puræ & limpidæ. Sequamur ergo in Vertigine naturam, & imprimis à vomitoriis curam inchoemus: è g.

Estmull. Oper. Tom. II.

24. Tartari emet. Myns. gr. ij.

Sal. ammoniaci depur. gr. ix.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis emeticus.

Loco vomitoriorum, aut etiam post eorum usum, incilian- tur clysteres aciores, quales infra Art. 1. Cap. 3. ubi de Apoplexia, annotabo.

II. Post vomitoria in Vertigine diuturna inueterata aut contumaciori, in specie si est per consensum, convenit fomitem morbosum blandis purgantibus evacuare: quæ inter eminent massa pilularum de succino Cratonis, quæ egregiè conveniunt, adiecto pro stimulo extracto colocynthidis; item massa pilularum aloephanginarum, de aloë, Angelicæ dictæ, massa pilularum de nitro. pilule etiam massichinæ præ cæteris conveniunt, imprimis in vertigine per consensum stomachi, aut etiam uteri, ut vult FORESTUS: Pilule cochineæ commendantur, ubi vitium est in ipso cerebro; sunt enim satis vehementes & validæ. Item Extractum hellebori nigri cum Mercurio dulci, uti egregium est purgans epilepticorum, ita etiam vertiginosis prodest. Dabo exemplum.

24. Mass. pilular. massichin. ℥j.

Extr. Agar. gr. v.

Scamm. sulphurat. gr. ij.

Oleum destill. Succiniquit. ℥j.

Cum Ess. succini f. Pilulas:

D. S.

Pilula cephalicæ.

Ut ut potius conveniant stomacho ratione vertiginis per consensum; in signatura simus faciles. Vel

24. Mercurii dulc. gr. xv.

Scamm. sulphurat. gr. iij.

M. f. pulvis. S.

Pulvis laxativus.

Præ cæteris obseruetur, in malo inueterato per consensum minus convenire Purgantia, sed præservationis gratia convenire potius pilulas usuales, quæ blandè evacuant primas vias, aliquot sedes moderatas prouocando, & singulis noviluniis & pleniluniis instantibus, uno vel altero die ante murationem lunæ, vespere usurpari possunt. Fiant ex aloë, gummi ammoniaco, myrrha, massiche, & similibus, adiecto stimulo leni, ut mundæ ferrentur primæ viæ, ac fomes ex abdomine evacuetur, & sic subtrahatur Vertigini fomes.

III. Venæsectio per se vix convenit. Interdum tamen, ubi adest ordinaria sanguinis evacuatio suppressa, vel ubi est sanguis copiosus cum vita sedentaria, aut hic facile sic ebulliens ac turgescens, qui aliis statuosus dicitur, aut quando à sanguine plus minus fouetur malum, tunc optimè conducunt venæ sectiones: de quo vid. imprimis HORSTIUS in suis Probl. Decad. 2. Quæst. 3. ubi habet exemplum vertiginosi plethorici, qui aliis irritis per venæ sectionem optimè fuit curatus; item SENNERTUS Præx. lib. 1. Part. 2. cap. 4. pag. 269. sicut etiam Vertiginem diuturnam hæmorrhagiâ narium casuali solutam LOSSIUS lib. 1. Obs. 18. testatur; imò idem HORSTIUS l. a. PLATERUS, & SYLVATICUS Cent. 1. Conf. 40. arteriotomiam quoque interdum commendant. Aliis in casibus vix locum habet.

IV. Observandum: A STERNUTATORIIS omol- nò esse abstinendum, cum in Vertigine per consensum nil conferant, in essentiali autem Vertigine nihil evacuetur ex cerebro, sed saltem circa naves & partes vicinas: genus nervosum nimis commovet (est enim sternutatio motus convulsivus) indeque facile spiritus animales in inordinatos motus cogunt: & quævis nonnulla vitiosa materiæ pars evacuari videatur (posito esse per essentialiam) tamen symptoma exiitè potius magis concitatur, quia motus est, ne excutatur convulsio thoracis, & sic ad epilepsiam promptius disponatur æger. Ut taceam, sternutationem oculis minus esse convenientem, sed potius nocivam.

V. Fonticuli, Vesicatoria, & Setacea, in senibus & sab- jectis cacochymico-serosis, in vertigine imprimis per essen- tiam inueterata, curatiuè, & ratione apoplexiæ præserva- tivæ, sunt optimi & singularis usus, brachio inniti, ubi as- fectus simplex; capiti verò aut nuchæ applicandi in Vertigine caduca, aut apoplexiam aut epilepsiam minitante: vid. ZACUTUS LUSITANUS lib. 1. Præx. Admir. Obs. 78. Si verò ex suppressis hæmorrhoidibus, vitio uteri, ulcere aut fistulâ coalescente, cruribus inuendat.

Y y 3

VI.



VI. Præmissis ergo præmittendis, factâ totius corporis purgatione, sedato paroxysmo, in præservatione opera danda, ne redeat malum, adeoque imprimis vel roboretur stomachus, & alteretur digestio vitiosa, vel specificè Vertigini resistatur.

Quoad stomachica: inter talia eminent aromatica volatilia & paulò acriora, ac vi aromatica prædita, quæ imprimis senibus conveniunt; v.g. Galanga, Zingiber, nux moschata, cubebæ, semen sinapi & similia, v.g. semen sinapi omni mane crudum comestum, est egregium ad Vertiginem, imprimis per consensum. Idem etiam convenit senibus, quando sub vertigine metus est apoplexiæ.

24. Galang. ʒss. ad ʒj.  
Cubebæ. ʒij. ad ʒiij.  
Sacch. ʒiij.

M. f. Tragea:  
D. S.

Trisunctum caput confortans.

De qua assumantur ʒij. cum pane biscotto, vino generoso in tincto, hora unâ alterâve ante cenam & prandium.

Vel ad imitationem LINDANI usurpetur pulvis:

24. Gran. Pæon.  
Coriandr.  
Nuc. moschat.  
Visc. querc.  
Cubebæ.  
Galang. an. ʒij.  
Piperis long.  
Zingib.  
Rad. tormentill.  
Fol. rosismar. an. ʒi.

M. f. pulvis compositus:

De quo sumatur mane & vespere ʒss. sive cum, sive sine saccharo pro libitu.

Imò vel sola galanga mista cum succino ab eodem commendatur ad curam vertiginis. Convenit itidem Elixir proprietatis mistum cum spiritu mastichino; sicut in genere omnia mastichina, præsertim in vertigine à stomacho, sunt optima: item Elixir Menthe & similia cum spiritu mastichis mista, præservant à vertigine. In senibus ad præcavendam vertiginem, simulque apoplexiam, convenit imprimis Electuarium ex aromaticis stomachicis crebrius usurpatum:

24. Conf. flor. anthos,  
Salvia an. ʒss. vel ʒvj. ad ʒj.  
Majoran. ʒss. ad ʒvj.  
Zingib. in Ind. cond.  
Nuc. Mosch. cond. an. ʒiij. vel ʒss.  
Sem. c. nuc.  
Sinapi an. ʒij. vel ʒiij. ad ʒj.  
Succini præp. ʒij.  
Cardam.  
Cubebæ.  
Galang. an. ʒj.  
Salis vol. Succin. ʒss.  
Spiritus Ceras. nig. ʒj.

Cum f. q. Syr. flor. tunice f. Electuarium:  
D. S.

Electuarium cephalicum & stomachale pro aliquot vicibus.

Difficilibus addi potest aliquantulum Confectionis alchermes, quæ ratione ambre & moschi senibus imprimis conducit. Capiat per omni mane & sub introitu lecti quantitas nucis castaneæ; post passum verò masticeatur sem. Sinapi pug. ij. vel iij.

24. Conf. Menthe,  
Meliss. an. ʒss.  
Cinnab. antimonii ʒss.  
Olei destill. rosismar.

Succini an. gutt. ij.  
Cum Syr. Menthe f. Bolus:  
D. S.

Electuarium caput confortans pro una vice.

Hic equidem Vertigo accidentalis seu minus inveterata, præsertim per consensum, curari solet. In habituali seu inveterato malo verò undecunque nato requiruntur præterea, istis tamen non neglectis, specifica Vertigini appropriata: qualia ex regno vegetabili sunt radix doronici imprimis, cheresolium, calendula, salvia, rosmarinus, buxus, thea, cubebæ, semen sinapi, flores liliorum conval-

lum, radix peroniar, de qua vid. RIVIERUS Obs. commun. & in genere quælibet cætera cephalica & epileptica. Doronicum quidem singulariter à quibusdam laudatur ad curam vertiginis: Sed vereor, ne ex præconcepta magis opinione, quàm rei veritate, fiat. Putant enim rypicapras Alpinas ejus usu reddi aptas, ut citra Vertiginem montes adscendant; quod ipsum tamen naturæ proprium & consuetudinis videtur beneficium. Unde etiam lapis in eorum stomachis repertus, seu, ut alii vocant, Agagropila, pulverisatus assumtus commendatur à WORMIO contra Vertiginem. Quidam parant ex Doronico Essentiam, eamque singulariter ad Vertiginem commendant. Funambuli quoque ejus usu contra Vertiginem se munire dicuntur, saltando in funibus, quod ipsi sibi tanquam singulare secretum referunt; attamen pariter dubium. Post doronicum est cheresolium admodum laudatum, quocumque modo usurpetur, sive cum juleulo assumatur, sive Essentia aut extractum paratum cum spiritu proprio usurpetur, in specie, quando est Vertigo ex vitio stomachi. Hinc salvia & rosmarinus sunt egregia. Salvia decoctum in aqua vel vino, tam interno usu quàm externo, si eo ablatur caput, ac applicetur fronti & temporibus, singulariter laudatur à STOECKERO in Praxi. Essentia salviae cum spiritu proprio parata non est inconveniens. Sanè aliquando Essentiam compositam ex solo cheresolio & roremarino proficuum in Vertigine per consensum expertus sum; item Essentiam catarrhalem Michaelis, vel essentiam ex ana salviae, castorei, zedoarie, cum spiritu salis ammoniaci paratam, ad 40. guttas exhibitam, vel aliud sal volatile aromaticum & oleosum à 30. ad 40. guttas. Rosmarinus ejusque Essentia admodum commendatur à FERDINANDO in contumacissima Vertigine, in specie, si exasperetur malum in frigore hyberno, id quod senibus sæpe familiare, tunc Essentia modò ex roremarino admodum convenit. Præter dicta hæc vegetabilia etiam Melissa, Majorana, euphrasia, sceniculum, semina calida minora, item sæpe omnia aromata, in specie Zingiber & Galanga, commendantur contra vertiginem; item castoreum, ambra grysea, & ex his vegetabilibus paratae essentia, spiritus, & olea: V.g.

24. Ess. cheresol.  
Salvia,  
Ocrum sive basil. an. ʒj.  
Castor. ʒij.  
Ambra ʒss.  
M. D. S.

Essentia contra vertiginem.

Dosis 40. usque ad 50. guttas, bis in die per biberium ante passum.

Buxus, in specie ejus oleum destillatum, vel in epilepsia, ita in vertigine optimum judicatur remedium Intus & extra, quod FONSECA Consil. 16. mirè laudat: singularem vim habet narcoticam, extrâ quidem inungendo quotidie temporum arterias post aures, hinc pulsus in manibus ac pedibus; intus verò propinat ita:

24. Conf. flor. anthos vel calend. ʒiij.  
Olei destill. buxi,  
Nuc. mosch.

Mentha an. ʒss.  
Cum f. q. Syr. cort. Citri f. Electuarium.  
Dosis est ʒss.

Imò si guttae vi. viij. vel ad summum x. olei destillati buxi cum aliquot uncis aque peroniar exhibeantur, egregium esset remedium inquit, cujus defectu & oleum corylinum non inconveniens est.

Cubebæ masticeatæ stomacho jejuno, aut etiam vino infusæ, sicque bibitæ, multum conveniunt; non secus ac semen sinapi crudum contusum, jejuno stomacho quotidie comestum, expertum est ad Vertiginem, etiam senum, estque simul egregium antiepilepticum & apoplecticum. Expertum est etiam ad Vertiginem cum caricis pinguibus & semine sinapi paratum Electuarium, quod pro usu præservatorio Vertiginis est egregium. Lignum aloes, item santali, ab HILDESHEIMIO Spicil. pag. 455. commendatur, & conserva florum calendula à RIVIERO Prax. lib. 1. cap. 9. Ex compositis aliis in usu est quibusdam Theorica Hippocratis dicta: scilicet

24. Succ. absint.  
Marrub.  
Stæchad.  
Pulv. Mastich.

Rhabarb.



Rhabarb.  
Chamedr.  
Chamap. an. ʒij.  
Hysopi ʒi.

Agar. ad pond. omnium.

Loco hujus usurpetur Electuarium à SOLENANDRO  
feli. 1. Conf. 2. commendatum:

ʒi. Theriac. Androm.

Conf. flor. salu. vel beton. vel Anthos an. part. j.

Rosar. p. ii.

cum Mell. Anthosaf. f. Electuarium.

Ex regno animali pavo ejusque sterco, seu singulare specificum mirè laudatur ab omnibus Practicis, cujus non tantum carnem comestam, contra Vertiginem admodum laudat BARTHOLETTUS in Encyclop. Sed in specie sterco pavonis exsiccatum nobile est specificum contra vertiginem, tam in forma liquida quam sicca usurpatum, quod ab omnibus, qui ejus fecerunt periculum, maximè commendatur. Quidam dicunt, habendam esse differentiam ratione sexus: sed videtur huc negotio parum subesse ponderis. Modus præparandi est varius: Usurpari potest vel forma pulveris cum ana sacchari, ratione saporis, de quo pulvere æger crebrius capiat. LINDANUS dicit, se felici cum successu expertum esse sterco pavonis, præcipue præmissis universalibus propinat in forma sicca, exsiccatum sterco, & hujus stercoreis siccati, j. propinat in ʒij. aquæ appropriatæ: Sic in QUERCETANI Dietat. Polyhist. illustre est exemplum curatæ Vertiginis beneficio stercoreis pavonis, idque feli. 2. cap. 1. WILLISIUS in Anim. Brutor. Part. 2. cap. 2. de Vertigin. habet pulverem compositum, cujus basis est sterco pavonis; ad cujus imitationem aliquando viro cuidam à tempore Paschatis ad principium hyemis insigniter vertiginoso præmissis præmittendis præscripsi:

ʒi. Sterc. pavon. ʒij.

Rad. Peon. mar. ʒi.

Pulv. Caryophyll. ʒij.

M. f. pulvis.

De quo capiebat quotidie bis largam dosin manè jejuno stomacho in vehiculocalido, & bihorio ante coenam in frigido, continuavit per aliquot septimanas, usurpavit bono cum successu. Jussu continuare, quia sub tempestatum mutationibus aliquid sentiebat, & continuando sanus evasit. Omni vespere sub lecti introitu accepit, simul spiritus salis ammoniaci anisati guttas xxx. vel xl. pro dosi. Varia tentaverat, etiam fonticulum inuri curavit, sed frustra; vertigo erat vehemens cum cephalalgia intensa in summitate verticis ad magnitudinem palmæ manus: etiam liquor cornu cervi succinatus, item spiritus vitrioli epilepticus Dn. D. MICHAELIS, vomitoria, cathartica, martialia, &c. frustranea erant. Procephalalgia linimentam dedi ex oleo destillato succini, vertici applicando desuper emplastrum de ranis cum mercurio capillis rasis.

Potest etiam hoc sterco in forma Electuarii usurpari:

ʒi. Sterc. pavon. mense Maio collect. & in sartag. leniter exsiccatum, ut pulverisari possit.

Misc. cum Conf. flor. Rorismar. & Maior. vel Melisse, vel simil. q. f.

de quo quotidie bis capiatur: quo feliciter usus est LINDANUS in Praxi.

Vel in forma liquida usurpatur, qua ratione quidam recipiunt M. j. fimi pavonis, subigunt cum s. q. vini, dividunt in tres partes: cujus duas partes post duos paroxysmos vertiginosis propinant, provocato sudore; & tertia dosi post bihorium post tertium paroxysmum propinatur, & sic certò, inquirunt, curari Vertigines.

PETRUS à CASTRO, Medicus Veronensis, remedium admirandæ virtutis ad præservandam vertiginem esse dicit:

ʒi. Ster. fimi pavon. masculi pro maribus, mense Maio collect. & exsic. ʒi.

Macerat per noctem in vino albo, manè traiecit per linteum, liquorem exhibet vertiginoso, continuando à novilunio ad plenilunium usque, manè expectando blandum sudorem.

An præcisè requiratur distinctio sexus ratione agrorum, ita ut sterco masculi pro maribus, femellæ pro foeminis vertiginosis sit capiendum, in medio relinquo.

Loco stercoreis pavonis, Catti masculi pro mare, foemellæ pro foemina, exsiccatum & pulverisatum commendatur.

Etemull. Oper. Tom. II.

A quibusdam laudatur cerebrum passerum: unde Bartholetus Electuarium ex cerebris animalium in Encyclop. p. 166. describit, quod vocat electuarium præsentaneum contra Vertiginem. Compositio est hæc:

ʒi. Cerebr. passer. Num. 2.

Vituli in vino loti & in fumo exsiccati

Avellanar. ana ʒi.

Mithridas. opt. ʒij.

M. & cum syr. de cort. citri f. Electuarium.

Idem BARTHOLETUS etiam cerebrum pavonis ad Vertiginem laudare solet.

Egregius etiam est liquor Cornu cervi succinatus, castoreum & castoreata. Hepate rupicaprarum vertiginem curatam refert VELSCHIUS Hecat. 2. pag. 6. Dubium tamen, annon additum eleosaccharum citri partis cum hepate fuerit virtutis.

Denique ex Regno minerali ad Vertiginem remedia sunt succinata quæcunque, petroleum album, Cinnabaris vel nativa depurata, vel antimonii cinnabaris, insigne remedium Cratonis, trium Imperatorum Archiatri, qui cinnabarin uti magnetem epilepsie, ita Vertiginis, appellat: Unde super baln. cinnabaris antimonii exstructi pulveres cephalici specifici erunt in omni Vertigine convenientissimi. In Cinnabari multa latent; unde promiscuè potest usurpari dosi ʒi in specie circa mutationem lunæ; egregium est remedium & antepilepticum, & contra Vertiginem, sive per se, sive cum aliis adhibeatur; potest enim fieri pulvis compositus cum sale volatili succini, cubebis, galanga, & similibus. Vehiculum potest esse aqua quædam cephalica, acuta spiritu liliorum convallium, elixyr menthæ, & similibus. Hinc v. g.

ʒi. Sterc. pavon. pulveris ʒij.

Cinnab. antimonii vel nativ. ʒi. ad ʒij.

Cubeb.

Galang.

Salis vol. succ. ana ʒi. ad ʒss.

M. f. pulvis:

cui addatur

Eleo. sacch. anis. q. f. pro gratia saporis & odoris v. g. ʒi. ʒss.

M. D. S.

Pulvis contra Vertiginem pro aliquot vicibus.

De quo capiatur subinde, quantum cuspis cultelli capit.

Vehiculum hujus pulveris contra vertiginem sit tale:

ʒi. Aqua Cheresol. ʒij.

Salvia ʒss.

Cinnam. ʒvj.

Spir. lil. convall.

Salvia an. ʒij. M. D. S.

Aqua ad pulverem.

Vel

ʒi. Aqua Cheresol. ʒij.

Meliss. cum vino ʒss.

Cinnam. cum vino ʒvj.

Spir. lil. convall.

Salvia,

Ceras. nigr. an. ʒi.

M. pro vehiculo pulveris,

D. S. ut supra.

Vel

ʒi. Aqua Cheresol. ʒij.

Liqu. Cornu cervi succin. ʒi.

M. pro vehiculo dicti pulveris, capiendo aliquot cochlearia.

Cum Cinnabari in specie salia volatilia & olea nobilia sunt contra Vertiginem, internè & externè. Hinc internè sal volatile succini, succinum, liquor cornu cervi succinatus, in specie junioribus, & quæcunque succinata: Nam & ipsum succinum est egregium remedium in vertigine; sive internè sumatur succinum præparatum, cum aqua appropriata, in specie cum spiritu vel aqua salvia; sive etiam eius sal volatile assumatur; aut etiam oleum, & cum hoc paratum oleosaccharum, ut facilius assumatur, addendo ad ʒi. sacchari gutt. iv. olei; vel dictum oleum vertici illitum externè, egregia sunt remedia contra Vertiginem.

Oleorum succini & buxi loco Petroleum album, imprimis in senibus, usurpari potest, quod non inconueniens est in vertigine per consensum stomachi, præsertim in hypochondriacis. Memini me aliquando Juveni studio hypochondriaco crebrà vertigine, sive jejunos, sive postus esset, affecto, præmissis præmittendis, & etiam aliis adhi-



bitis convenientibus, frustis tamen omnibus, consuluisse, ut in fine cuiuscunque passus 6. 7. ad 8. guttas olei succini in ultimo haustu capiat, eoque iungat leviter præcordia seu regionem scrobiculi cordis. Fecit aliquamdiu, & optimè profuit, nihil habuit incommodi præter ructus. Hinc ad huius imitationem alii Juveni, præmisso vomitu, aliud dedi Eleæuarium:

℞. Conf. Menth. ʒj.  
Flor. Antheos ʒʒ. vel ʒvj.  
Petroli. albi ʒi. ad ʒiʒ.  
Cuni. f. q. Syr. Menthe vel flor. tunicæ f.  
Eleæuarium.

De quomodo manducabat quantitatem castaneæ, & bono cum successu accepit. Acui potest remedium, si addatur simul sal volatile succini à gr. xv. ad ʒʒ.

Aliis nil juvantibus sacra anchora erit *Lindani opiatum*, imprimis appropriatis, præsertim *succinatiss*, mistum, quod quoscunque spirituum animalium inordinatos motus compescit, eosque frigendo promptè sedat.

Externè commendantur pinguedo scuri, damæ, & serpentum, temporibus illita; item oleum buxi, & ab HOE-  
FERO pulvis bombycum capiti adpersus, *Her. Med. Tom. 1. lib. 1. pag. 31.*

Hæc in usu sunt extra Paroxysmum.

Quoad Curationem in paroxysmo: In ipso paroxysmo Vertiginis graviore & crebriori, in specie Vertiginis caducæ, dum ægri corruunt, & ad tempus jacent, antequam se erigere queant, conveniunt præceteris mox infusa vomitoria, quæ eos optimè exsuscitant; loco quorum etiam *chyleres* acres applicantur, cum syrupo emetico vel infuso antimoniâ infundendi, usitati aliàs in epilepsia, apoplexia, &c. *Chyleres* faciunt revulsionem, retrahunt spiritus aliquantisper à Capite, qui inordinatè ibi se movent. Pro derivatione autem ponuntur cucurbitula in cervice. Vomitoria sunt meliora. Hinc præmissis vel omisiss talibus, usurpetur mixtura ex spiritibus cephalicis, & aromaticis nervinis, quallia sunt spiritus vitrioli volatilis, aut cephalicus, spiritus cerasorum nigrorum & liliorum convallium, sal volatile succini, cornu cervi, & similia, in aqua majoranæ, salviæ & cerasorum nigrorum. Castoreum etiam, ejusque Essentia, commodè usurpatur simul, præsertim mulieribus. Item oleum succini ad aliquot guttas in aqua appropriata, assumptum & propinatum imprimis convenit.

Externè verticel, temporibus, naribus, scrobiculo cordis & similibus, inungitur essentia castorei, spiritus salis ammoniaci, oleum destillatum succini, aut etiam balsamus Peruvianus, vel apoplecticus, aut similia antapoplectica & antepileptica; aut obijcitur naribus nigella Romana, sive ejus semen aceto irrigatum. Radix peroniæ ritè collecta, & de collo suspensa, Vertiginem desperatam aliquando curavit. Uno nomine, simili ferè modo curatur in paroxysmo, atque aliàs tractari solent *insultus epileptici*, & passiones graviores hysterica & similes in paroxysmo. Quibus volatilibus in malo pertinaci interdum addantur opiata, quæ sistunt Vertiginem graviozem in paroxysmo, in specie si misceantur volatilia; v. g. præmissis præmittendis

℞. Aqua salu. ʒʒ. vel ʒiij.  
Menth. ʒi. vel ʒiʒ.  
Spiritus lil. convall. ʒiij.  
Sal. ammoniaci, vel hujus loco Ligu.  
Cornu cervi succin. ʒiʒ.  
Land opiat. gr. ij. vel iij.  
Syr. cort. aurant. vel fanic. ʒiij. ʒʒ. ad ʒvj.  
M. S.

Potio contra vertiginem.

Huic in mulieribus essentia castorei commodè addi potest.

Vel

℞. Aqua Ceras. nig.  
Menth.  
Lil. convall. cum Vin. ana ʒi.  
Spir. Ceras. nig. ʒiij.  
Ess. Castor. ʒi.  
Salis vol. Cornu Cervi ʒi.  
Succini ʒi.  
Syr. flor. tunic. ʒʒ.  
M. S. ut supra.

Convenit etiam, ubi metus est apoplexiæ.

Si Vertigo sit uterina, potest præscribi hæc mixtura in paroxysmo cochlearum assumenda:

℞. Aqua hirund. cum Castor. ʒʒ. vel ij.  
Meliss. cum Vino ʒi. vel ʒiʒ.  
Spir. lil. convall. ʒi. ad ʒiij.  
Salvia, vel ceras. ʒi.  
Sal ammoniaci ʒʒ. ad ʒiʒ.  
Salis vol. succini gr. xv.  
Land. opiat. gr. ii. vel iij.  
Syr. cort. aurant. ʒʒ. vel ʒvj.  
M. S. ut supra.

Absolvimus superius doctrinam Vertiginis, & ea, quæ eo pertinent; Pergo jam ad

## CAPUT II.

### DE

#### SPIRITUUM ANIMALIUM NIMIO & INORDINATO subinde ac VITIOSO MOTU in PARTES EXTERNAS, MOTUI DICATAS,

Indeque ortis

#### CONVULSIONIBUS, MOTIBUS CONVULSIVIS seu SPASMIS, & EPILEPSIA.

D istum fuit supra, quod ex inordinato motu systematis spirituum animalium in cerebro, & hinc in sentium organis, talis in functionibus animalibus sequatur perturbatio, quæ dicatur Vertigo; quæ ipsa interdum usque eo procedat, ut etiam ægri concidant, quæ *vertigo* sit proximus ad *Epilepsiam* gradus, ita ut continuo isto post casum spirituum animalium inordinato motu ad partes motui destinatas, exinde extra cerebrum *Convulsiones*, & tandem *Epilepsia* superveniant; hinc restat ad *Convulsiones* & *Epilepsias* pergamus.

Doctrina hæc in Praxi est frequentissima, utut in Theoria difficillima. Pro rei historia præsuppono, hæc primariò in spasmò motum, secundariò sensus internos & externos. Notum etiam est ex *Parte Medicina Physiologica cap. 21. pag. 121.* omnis motus corporis organon proximum esse fibras, quibus tanquam funiculis partes moveantur & contrahantur, easque inflatas per spiritum animale sui coactione moveri, concurrente tamen adjumento sanguinis, siue fibræ istæ collectæ & unitæ in unum musculi systema coeant; siue hinc inde circulariter dispositæ & intertextæ membranorum corpus constituent, ut v. g. in intestinis, vesica, & similibus obvium est; siue partes illas fibrosæ ex cerebro nervos accipiant; in motu voluntario; siue ex cerebello in motu involuntario, seu sine sensuum progressionem, propterea naturali, utut perperam, vocato; siue & spiritus animales moventes, partim ex cerebro, partim ex cerebello acquiruntur. Quodsi igitur secundum voluntatis imperium moveantur musculi, aut reliquæ partium internarum fibræ motrices naturali modo & ordine, motus fiet secundum naturæ leges: sin vero præter voluntatis imperium moveantur hæc fibræ, & ex illis constituti musculi, vel non absque insigni dolore, aut cum insigni violentia contrahantur & agitentur partes, siue internæ, siue externæ, *Convulsio* appellatur Latinis, Græcis *Spasmus*. *Σπασμός* Græcis dicitur à *σπᾶν* seu *εἶναι*, quod est trahere; propterea, quod quasi summâ vi & insigni violentiâ trahantur potius partes per fibras & quasi lacerentur, quàm ut legitime moveantur.

*Convulsio* autem hæc seu *spasmus* in genere est duplex: vel *Conductio*, vel *Concussio*: de quo vid. LINDANUS in *Meletem. Physiologicis*, qui ex HIPPOCRATIS sensu rectè deduxit. Per *Conductionem* intelligunt *Convulsionem* in specie sic dictam; per *concussionem* verò motum convulsivum. *Conductio* dicitur *Convulsio tonica*; *concussio* verò est *Convulsio clonica*, quando ægri tremunt: Nam *κλονεῖν* significat præcipuè inaequalem membri motum, unde etiam vocatur *motus convulsivus* ulterò citroque, seu quod idem est, invita membri contractio & extensio, unde *σπᾶσμι*: *κλονᾶσμι* seu pulsus vibrans, quando scilicet arteria quasi in motu retracta vibrando pulsus edit. Tonus verò est juxta CELSUM immobilitas & rigor membri, quod membrum contractum sit immobile: Ita ut *Conductio* seu *Convulsio tonica* membri rigidi contractio-



tractionem, & in uno situ sive figura permanentiam, indicet; *Concussio* verò seu *Convulsio* clonica innuit variam agitationem & vibrationem, modò extensionem, modò contractionem. *Convulsio* igitur in genere dicitur insolita & præternaturalis musculorum aliarumque partium fibrosarum contractio: quæ retractio si perpetua, adeoque membrum immobile fuerit, *Convulsionem* in specie & propriè dictam constituit; si verò interpolata, & membrum variè agitur, motus convulsivus audit.

*Contractura* cognata est *Convulsioni tonica* affectio, quæ membrum semel convulsam semper postmodum rigidum manet.

*Conductio* seu *Convulsio vera* varias sub se complectitur symptomatum species, nempe *Tetanus*, *Emprostotonon*, & *Opisthotonon*: Quod & aliz species pertinent; Nam pertinet huc etiam, (nempe ad *Conductionem*) *Priapismus* & *Satyrasus*; item pertinet huc *Spasmus Cynicus*, cui adiunctum symptoma dicitur *Risus Sardonicus*: Pertinet huc etiam, quando contrahitur brachium & obrigescit ex inepta venæsectione, quando nervus pungitur; item quando tendines obrigescent ex luxatione: Pertinet huc ille affectus innominatus, quando genua contrahuntur & rigida manent propter contractum nervum ac tendinem, quæ per cavum genu transeunt.

In specie famosi sunt isti tres capitis affectus: *Emprostotonon*, qui est conductio musculorum collo instratorum seu mastoideorum, hinc est, quod his mentum pectori affigatur: Contrarium vitium est *Opisthotonon*, conductio musculorum occipitis, quibus occiput versus dorsum & posteriora detrahatur: *Tetanus* denique est conductio simultanea & anteriorum & posteriorum capitis musculorum, hinc enim caput ad nullum latus verti potest, sed caput & collum rigidum & immobile permanent. Sunt tamen qui non solum capitis versus truncum, sed totius trunci tales conductiones sub his nominibus intelligunt: Conf. SYLVIVS lib. 2. *Præcos* cap. 23. §. 19.

Ad *Emprostotonon* pertinet *Aphorismus* HIPPOCRATIS sect. 4. aph. 35. Si febre detentorepente collum intorqueatur, ac vix deglutire queat, nullo existente tumore, lethale est: quem aphorismum vulgò, sed malè, de angina & luxatione vertebrarum interpretantur, nam revera intelligit HIPPOCRATES speciem *emprostotonon*. Comprehendit enim iste casus morbum, quem nos vocamus, Germ. den Hals umbreben, id est collum intorquere; quando nimirum tunc musculus mastoideus convellitur & rigidus manet; sic enim caput circumducitur, aspera arteria comprimitur, & tales ægri tandem suffocantur.

Hæc de Convulsionibus seu spasms in genere.

## ARTICULUS I.

### DE

## CONVULSIONE CLONICA

### ET

## EPILEPSIA.

Quoad *Concussionem* seu *Convulsionem clonicam*, aut, uti vulgò appellatur, motus convulsivos, quando unum seu plura membra moventur inæqualiter, sunt varii, pro varietate partium convulsarum, quales sunt omnes species epileptiarum, pertinentque huic *Cramba*, seu, ut vocant, *Spasmus flatulentus*, Germanicè, *der Krampf*, cui imprimis ebriosi, item qui ad arthritidem nonnihil inclinant, sunt obnoxii. Pertinet huc etiam experimento Autorum ista concussio parva, quæ in emissionem seminis Venerea accidit; unde quibusdam Philosophis & Medicis, in specie DEMOCRITO, coitus Epilepsia Parva vocari solet.

Dixi, quod ad *convulsionem* etiam pertineat *Epilepsia*. Epilepsia ergò quod attinet: hæc sunt revera tales concussiones seu motus convulsivi, in quibus universum corpus, aut plura ejus membra, diversimodè contrahuntur, vibrantur & agitantur, sensuum exercitio quocunque ut plurimum abolito: cujus sub sua latitudine tres sunt modi seu gradus (voca ut lubet.)

*Primus gradus*, isque abusive seu improprie *Epilepsia* tribuitur est; quando ægri subito concidunt & corruunt, aut saltem, sive stent, sive sedcant, omnium sensuum functionibus ac motus exercitio subito privantur, & quasi somno

arctissimo sepulchricè ullam animalem functionem ita perstunt, ut nullus spasmus sensatus sive externarum partium convulsio accedat; licet, si per consensum fiat partium abdominis, v. g. in *Hystericis* aut *Spleneticis* & similibus, subinde spasmus partium internarum nervosarum concurrant, sub *Lipothymia* conceptu vulgò exprimentur; unde dicunt communiter: sunt deliquia. *Epilepsiam* vocare nolunt. Hic epilepsia modus est potius tertius gradus, ad tertiginem caducam pertinens, quam Epilepsia dicimus gradum proximum, cum facillimè sibi Epilepsiam veram comitem adsciscat.

*Secundus gradus Epilepsia* seu secundus affligendi modus est, quando variis motibus & agitationibus corpus universum percutitur & convellitur, sensibus quibusvis, tam internis quàm externis, & ratione, aut integrè perstantibus, aut in delirium abreptis, dum interim quoad externas partes convulsi, sub convulsionibus istis saltant & cantant, interdum rident, nunc lachrymas fundunt, hinc inde percurrunt, pectus percutiunt, interdum ridicula narrant, vociferant, post paroxysmum verò omnium secum astorum, sive delirent sive non delirent, in paroxysmo recordantur, eaque optime, nunc nihil, sciunt. Exempla talia stupenda videb. in WILLISII *Patholog. Cerebr. de Morb. convulsiv.* ubi de Epilepsia; item in RIVERII *Praxi*, ubi de Epilepsia, qui refert talem Epilepsiam in moniali, in qua sensus interni & externi vignerunt, tantummodo epileptica variazque partium convulsionem adfuerunt: NEUCRANZIUS *Tract. de Purp.* cap. 23. simile habet exemplum: Sic TIMÆUS von Guldenklee miram etiam huius rei refert historiam in *Epist.* 9. pag. 22. ubi puer epilepticus ascendit in altum sensibus integris: Sic BARTHOLINUS *Cent.* 2. *Hist.* 90. pag. 301. miras describit gesticulationes & actiones epilepticorum. Nam certè tam stupenda & tam variaz eorum sunt gesticulationes, motus, actiones, gyrationes, ut vix absque stupore legi, nedum aspicere possint. Talis Epilepsia sepe in melancholia hypochondriaca obvenire solet, & optime curatur per liquorem cornu cervi succinatam. Pertinet huc Epilepsia cursiva BOOTII *Tr. de Affect.* Omiss. cap. 6. qui refert exemplum pueri epileptici duodecim annorum, qui paroxysmo epileptico vexatus, continuo cursu semper restà percurrere per ignem & aquam, per montes, per omnia loca, idque tamdiu, donec obstaculum offendeat, ut longius currere non posset. Vocat ob id Epilepsiam *Cursivam*. Similem casum habet VALENTINUS *Tr. de Convuls.* qui & Epilepsiam *rotariam* observavit: Vid. M. A. N. C. *Ann.* 8. *Obs.* 71. ubi virgo à fulgure territa, mentis tamen compos, alteri innixa eruri, cubiculi penes parietes discurrere cogebatur, venæsectione & internis antispasmodicis curata: Sic Epilepsiam, in cuius paroxysmo diu & multum agra ridet, videb. in M. A. N. C. *Ann.* 3. *Obs.* 304. pag. 526. Item Epilepsias mirandas, in quibus sensus omnes & intellectus fuerunt illæsi, videb. in FEHR de Scorzon. pag. 96. Et sepius in his Epilepsis tam mira sunt symptomata, ut vix commodè enarrari possint: Conf. SALMUTH *Cent.* 2. *Hist.* 42. qui habet Epilepsiam, in cuius paroxysmo oculus extra cavum instar pugni proindebatur, & tamen post paroxysmum in naturalem statum redibat: item *Cent.* 2. *Hist.* 41. visiones & spectra apparentia observavit, tam ante quam post epilepticum paroxysmum.

*Tertius gradus Epilepsia* seu modus, & quidem communior, est iste, qui ex utrisque modò dictis videtur conflatus, ita ut omnis tam sensus quàm rationis usus pereat, simulque variis motibus corpore ejusque membra agitentur & concutiantur, ad humum prosterantur, dentibus strideant, brachia jactent, pollices arcte claudant in manus, pedibus tremant, corpus insigniter attollant & denuò deprimant, instar globi incurvent, spuma per os reluciat, labia & lingua mortuæ lendantur, &c. Quibus omnibus successivè remittentibus æger tanquam sopore oppressus jacet, gravi suspiratione (quod signum est, pectus antea convulsam fuisse) ad se rediens, nihil omnino scit, tantum de torpore & gravitate quadam capitis, & omnium artuum gravi lassitudine, conqueritur, quod sit ex laceratione fibrarum ex impetu spirituum ad easdem derivatorum. Et hic tertius gradus est omnium frequentissimus & gravissimus: *Primus gradus* non nihil est rarus; *secundus rarissimus*, sed vulgò ignoratur: Idem *gradus secundus* est terribilissimus; nam tales subinde proobscissis à demone habentur, nisi Medici prudentia & scientia innocentiam ægri defendat.

Ex his patet, quod convulsio, motus convulsivi & Epilepsia, non differant in radice, sed saltem modo sentiendi. Epilepsia,



sepsia ergo consistit in motu depravato, nempe in motu involuntario, inordinato, interrupto & nimis impetuoso; Convulsio vero seu convulsio consistit in motu involuntario pulso & continuo à spiritu nimio & inordinato ac rapido influxu. Unde illud, quod *subiectum est motus naturalis*, id ipsum necessarîo etiam subiectum erit huius motus præternaturalis; & id, quod afficitur in naturali brachii contractione, aut involuntaria sæcum alvi exclusione, id ipsum etiam afficitur in his motionibus præternaturalibus. Cum ergo fibræ nervosæ sint *subiectum* omnis motus naturalis in corpore humano, tam voluntarii in musculis, quàm non voluntarii in partibus corporis internis membranosis, & ubicunque sunt membranae, v. g. in intestinis, ob id etiam necessarîo in Convulsione & Epilepsia fibræ istæ nervæ contractionum morbosarum *subiectum* erunt: siquidem in omnibus corporis partibus, ubi est motus, ibi sunt fibræ, & ubicunque sunt fibræ, ibi necessarîo fit quidam motus; ita ut fibræ hæ nervæ sint *subiectum commune*, muscoli verò & membranae, ex istis fibris contextæ, sunt *subiectum proprium seu speciale*.

*Fibræ nervæ* dico: Nam ipsi nervi nil aliud sunt, quàm congeries talium fibrarum juxta se variato nexu situatarum, quæ tunica duplici à meningibus cerebri continuatâ investitæ corpus nervi constituunt. Similiter fibræ alio modo systematicè coagmentatæ constituunt musculos, demonstrante hoc STENONE. Similes fibræ partibus circulariter, cruciatim, vel alio modo intertextæ, nunc in forma plana constituunt membranas, nunc in forma cylindricas constituunt stomachum & simil. motusque internos involuntarios excitant. Fibræ igitur, & partes per fibras motæ erunt *subiectum Convulsioni & Epilepsia*.

Ex dictis sunt differentia, eûm Epilepsia & spasmi dividuntur in internas & externas. Externæ sunt, quæ saltem membra externa cruciant & concutunt, v. g. convulsiones brachiorum, capitis, oculorum, pedum, thoracis in asthma convulsivo, oris, &c. Internæ verò Convulsiones sunt, quæ viscera interna membranosa variis Convulsionibus mirè torquent; verbi gratiâ in Colicis scorbuticis convulsivis, item in passionibus hysteriis, dum intestina, mesenterium, & annexæ partes convulsionibus spasmodicis mirè affliguntur; in paroxysmis nephriticis, singultu, vomitu, torminibus infantum, tussi & similibus: qui affectus appositè Germanis mulieribus (in nullo Scriptore Latino tale quid invenietis) dicuntur: *die schwere Noth im Leibe* id est, Epilepsia in corpore: item *die innerliche schwere Noth bricht aus*, id est, Epilepsia interna erumpit. Pertinent huc tensiones abdominis & hypochondriacæ, quando conqueruntur de tensione regionis hypogastriacæ, quæ frequenter eveniunt in subiectis scorbuticis, hypochondriacis & similibus; item tensiones circa tempora, &c. Et ubicunque sunt membranosa partes, si illæ spasmō aut convulsione afficiantur, indurari, obrigescere & inflari membranæ tympani fortissimè tendi solent ex fibris, ex spirituum impetu ita afflicti.

Talis etiam affectus est, quando in nephritide convulsos stomachus vomitus, & convulsa itidem intestina tormina colica patiuntur: item quando cor palpat & convellitur: (omnis enim palpitatio est convulsio) quales Convulsiones etiam in hypochondriacis, ac quod idem est, hysteriis, plures observantur, cum in his subiectis quamplurima vaga & subinde varia ac mira symptomata maximam partem extalibus spasmis partium internarum oriantur, imprimis quando plexus nervi, quales plures sunt in abdomine, speciatim magnus ille in mesenterio, afficiuntur: vid. WILLIUS l. a. Cum enim ex his deriventur nervi in reliquis abdominis partes, facilè totum abdomen, affectis his plexibus, aut saltem plures illius partes convulsiones patiuntur: Et cum hi plexus mesenterici ex pari nervorum vago, nempe octavo, oriundi, conjuncti sint nervis intercostalibus, ob id sæpius affectis istis plexibus, & pectoris & capitis partium convulsiones tandem insequuntur, adeò, ut istarum partium internarum convulsiones sæpius ad radicem nervorum usque continuatæ, ibique systema spirituum in confusos motus agentes, terminentur tandem in convulsiones partium externarum, quod vocant: Epilepsia interna erumpit. Quâ ratione non rarò Passionibus Hysteriis gravioribus associatur Epilepsia universalis seu convulsio partium externarum: ut & partui difficili non rarò supervenit epilepsia, toties repentes, quoties ad conatum parturienti gravis accingit. Nam illi dolores parturientium, nempe dolores abdominis & dolores post partum, nil aliud sunt,

quàm partium abdominis, in specie uteri, mesenterii, & subinde intestinorum spasmi seu Convulsiones.

## CAUSÆ.

Quoad Causas: præsupposito spiritu animali, tanquam motore universali ex cerebro pro motibus voluntariis, ex cerebello pro motibus involuntariis seu naturalibus, per nervos distributo in omnes partes (hoc tamen adhuc patitur suas limitationes, vid. WILLIUS) qui, quacunque ratione fiat, fibras ad earum contractionem disponat, sive solitariè hoc faciat, sive adjutus simul copulâ elasticâ ex sanguine suppeditata, necessarîo idem spiritus etiam movebit in contractione partium morbofa & præternaturali: verbi gratiâ uti spiritus per nervos brachii influens movet digitos & brachium ex meo arbitrio, ita si fiat punctura nervi & inde convulsio brachii (cûm hic motus, nempe convulsivus seu hæc convulsio, sit idem motus cum priore brachii contractione voluntaria, tantummodò in eo differens, quod convulsio inuito convulso contingat, & non absque violentia insigni, concurrente simul interdum dolore: conf. SYLVIVS l. 2. Prax. cap. 23. de Morb. Capit. §. 30.) sequitur necessarîo, spiritum animale, qui secundum arbitrium movet brachium, etiam in convulso brachio ex rapidiore & impetuosiore ejus, propter irritationem & insequentem ejus continuum motum tremulum, (in quo motu consistit dolor) influxu, istius convulsionis brachii esse autorem: Sic idem omnino est motus, siue sponte & per jocum rideo, siue epilepticus paroxysmus cum risu involuntario Sardonio eveniat: eadem nempe est musculorum in utroque risu actio & pars affecta, idem motus, ergò idem etiam efficiens seu movens, nempe spiritus animalis. Hæc tantum interest differentia, quod, ut ordinatè & placidè mori spiritus, idque distante prius sæpe animâ rationali, dant motum naturalem partium & risum naturalem, ita idem spiritus inordinatè, confusè & rapidè in stimulo morbofo agitati, & quasi cum impetu per nervum in partem explosi, Convulsiones & motus convulsivos, & v. g. risum convulsivum, inferant. In Epilepsiis tamen habitualibus, hoc est, inveteratis, & sæpius levi ex causa recurrentibus, item hæreditariis, sæpè suspicor deviare tum ipsos spiritus animales & naturali sua crasi & constitutione, & magis elasticos, facilius inordinatè, idque cum impetu mobiles reddi, ut in quo alterata hæc constitutio præcisè consistat, determinari certò nondum queat.

Causa ergo proxima formalis Convulsionis & Epilepsia cujuscunque erit impetuosius, rapidus, & maximè violentus spirituum animalium motus in partes fibrosas motui inservientes, interruptus quidem diversimodè, inordinatus magis & confusus in concussionibus & Epilepsiis; continuus verò & ordinatus in conductionibus seu in specie sic dictis Convulsionibus.

Causæ rapidi & inordinati istius motus spirituum animalium generaliter considerati ad duo capita causarum, nempe remotarum, seu materialium aut occasionalium, referri potest. Prima causa est irritatio quadam in parte quadam sensili ac nervæ, quâ occasione spiritus animales in partem irritatam copiosè & impetuosius moti, Convulsionem nunc leviorem nunc gravioiorem, nunc continuum in Convulsione tonica, nunc interruptam in clonica seu epilepticis motibus, inferunt: Sic punctus nervus ob irritationem in loco puncturæ, quæ consistit in subtili & celerrimâ fibrillarum ejus motione, vibratione & uellicatione, ad cerebrum usque continuata, commoventur simul spiritus per nervum eum blandè influentes, quorum motu tremulo & celerrimo, unâ cum moto nervo concurrente, commoventur simul reliqui spiritus, ita ut hi ipsi aperto quasi tramite per nervum istum cum impetu ferantur, & ita Convulsionem fibrarum, istarum & musculorum, ad quos terminatur nervus, inducant. Hinc nervus per uenæ sectionem latus aut punctus, brevi post brachio convulsionem insignem infert; vid. SYLVIVS l. a. Prax. cap. 23. Sic ex irritatione stomachi à medicamento antimoniali, huius sit convulsio seu vomitus: ex irritatione cordis fit huius palpitatio: Sic notum est, quod, quando nares irritantur ab objecto acriori, superveniat sternutatio, quam tantillum hellebori narium membranæ infixi concitat; hæc reuera nil aliud est, quàm motus epilepticus thoracis, consistens in convulsiva expiratione; unde & SALMUTH in Obs. ex suppressa sternutatione gravem epilepsiam ortam refert, quæ sequitur simpliciter irritationem aut uellicationem membranæ parium;

Et



Et quidem convellitur thorax, dum vellicantur nares. Jam cogitate, sicut tantillum acre, quod vellicat nares, tam insignem impetum, motum & convulsionem inferre totius thoracis, ita & in aliis Epilepsis & motibus convulsivis tantillum irritans saepe in loco remotiore existens, e.g. tantillum fermenti acidi circa membranas cerebri confusi, occasionem Epilepsie suggerit: Conf. hic notabilis locus in M. A. N. C. *Ann. 6. obs. 77. pag. 173.* Sic tantillum acidi in plexu mesenterii tam insignes turbas inferre potest in abdomine: sic ex irritatione faucium, aut ex penna in gulam immissa, sequitur vomitus: Sic helleborina ac similia notorie Convulsionēs inducunt; vid. TULPIUS *obs. 25.*

*Secunda causa Remota generalis est ataxia* spirituum animalium convulsiva, quando aliquid praternaturale excrementitium vel vitiosum, aut in cerebro hærens, certis intervallis commotum, eorum motum turbat, aut iis ibidem permixtum, eosdem vitiose & cum impetu exagitat. *Uterque modus*, si spiritus in motus perturbatos, inordinatos, vagos & confusos, cogat, non tantum sensum omnium, tam internorum, quam externorum, (ad quos placidus & moderatus, isque ordinatus spirituum requiritur motus) hebetudines, sed etiam ex inordinato motu eorum in partes extra cerebrum, tam internas quam externas, variis motus convulsivi superveniunt. Nempe huic commode vis elastica recrementorum praternaturalium potest applicari, dum sui generis recrementa spiritibus animalibus impermiscibilia, mutuo tamen concursu explosivum motum concipientia, Epilepsias inferunt. Experimur hoc non tantum in febribus à sanguinis exagitationibus nimis, aut heterogeneitatibus ex hujus materia visceribus ac spirituum Systemati suffusis, sed eandem illustrant diversi animi affectus graviores, v.g. ira, terrores nimis, & similes, qui spiritus animales nimis exagitando, eorumque motum insigniter turbando, motus convulsivos aut Epilepsias subitaneas non raro inducunt: id quod præsertim in infantibus notum: Conf. HOECHSTETTERUS *Decad. 4. cap. 8. in schol.* SCHENCKIUS in *lib. 2. Obser.* ubi mulier ex terrore obadium incensionem oborto, Convulsionēs passa: Exemplum notatu dignum habet G. A. BELCHOVERUS in *Centur. 4. Curat. 59.* item *Curat. 25. & 24.* de quodam, qui ex facillima iracundia in gravem Epilepsiam incidebat, & superaffusa aqua frigida confectum in ipso paroxysmo subito levabatur & curabatur.

*Ex fomite morbofo*, ubi nempe vel vellicantur aut irritantur nervi, vel ubi sunt recrementa heterogenea spiritus turbantia, oritur divisio Epilepsie in *idiopathicam* seu *per essentiam*, ut vocant, affecto primario cerebro aut cerebello circa principium spinalis medullæ, & spiritibus hujus incolis; & in *sympathicam* seu *per consensum*, quando ex alia parte affecta superveniunt convulsiva pathemata; Ita ut idiopathicarum causa semper in parte convulsa hæreat, v.g. à læsione nervi; in sympathicis extra eam, v.g. convulsionēs partium externarum à lumbricis intestinorum. Per consensum est frequentissimè Epilepsia, & sæpius irritationes nervorum sequitur. Quæ vero per essentiam est, existit rarior, nisi in membranis cerebri aut in ejusdem ventriculis fomes irritationis hæreat; tunc enim sæpe per essentiam esse videtur: Ut v.g. quando in contusione cranii occasione festuæ cerebri membrana graviter læsa epilepticis moribus occasionem præbet. Quæ ex recrementis heterogeneis, spiritibus permixtis, contingit Epilepsia, frequentior est per essentiam, nisi mediantē massa sanguinea ex alia parte fomes morbosus insilietur cerebro, ibique spiritus plus minus afficiendo Epilepsiam inferat. Quod attingit istam irritationem, quam dixi frequentissimam Epilepsie causam, fit hæc variis modis, & varias occupat regiones: nunc enim circa principium; nunc circa medium, præsertim circa plexus; nunc circa finem seu insertionem nervi cuiusdam contingit. Ad principium nervi etiam cerebrum & cerebellum, itemque medulla spinalis, unde oriuntur nervi, pertinent: Unde dum in loco irritationis ex aucto & simul nimia rapido & inordinato spirituum ad locum irritationis in nervo motu, sensim inchoat convulsio, hæc est primò tantum fibrarum levior contractura, quæ ipsa tamen ob continuatum spirituum impetum sensim continuata successivè secundum ductum nervi ipsique annexarum fibrarum sursum magis magisque pergit, indeque pars immobilis redditur, donec isto convulsionis motu, ad ipsam principium nervorum continuato, spiritus anima-

les in cerebro violentius agitati, facto quasi agmine & impetu per eundem etiam & per vicinos nervos explodi quasi & expandi incipiant. Unde ex inordinato isto motu intra cerebrum non tantum omnium sensuum perturbatio, sed etiam ex simili depravato motu in partes externas Convulsionēs, tam partis istius primariæ affectæ, quam etiam partium aliarum non affectarum, sequuntur. Dum verò successivè inchoatus spasmus seu motus convulsivus secundum nervi ductum, ex spiritibus propter irritationem impetuosius irruentibus, sed ex parte simul nonnihil resistentibus, sursum pergit, & urget istam fibrarum contrakturam, unde membrum fit immobile, percipiunt aut imaginantur sibi agri, præsertim cum formationis quidam sensus interdum superveniat, quod materia quædam subtilis seu aura quædam, ut vocant, aut spiritus quasi volatilis, ex uno vel altero membro ita sursum repat, & ubi ad cerebrum pervenerit, ibidem Convulsionēs epilepticas inferat. BARTHOLINUS & LINDANUS habent exempla leuem auram ex membro ascendente ad collum, unde cadunt. Confirmat hanc eorum mentem, quod ligatura strictior supra partem primariæ dolentem, ubi aura ista residere creditur, injecta paroxysmum incipientem præcaueat, quasi aura adscensus inhibeat. Illustria exempla suppeditat LINDANUS, quæ postmodum habebimus, v.g. quando ex pollice percipitur quasi adscensus auræ & hinc Epilepsia, ligatura circa pollicem Epilepsiam præcauet. Ipsa vero ligatura non convenit impediendo adscendentem auram volatilem, sed potius, quatenus eadem firmâ ligaturâ pars inferior quasi stupida, indeque minus sensibilis & minus irritabilis redditur, unde & irritationis sensus, & rapidus spirituum animalium impetus, & sic etiam fibrarum contractura & Convulsio, aut omnino tolluntur, aut saltem, quò minus vehementes sint, impediuntur & suspenduntur. Par ratio est, quando in hysterica passione ligaturâ foris hypochondriorum nimium incrementum præcauetur: Fit hoc non propter auras adscendentes sic quasi exclusas, sed propter inchoatam convulsionem partium inferiorum, quæ istâ ligaturâ impeditur, & ulterior progressus quasi sufflaminatur. Exemplum talium epilepticorum non sunt pauca; unum tamen, atque alterum curiosum referam: TULPIUS *Centur. 4. Observat. 1.* & 2. talem refert Epilepsiam ex pollice pedis: Pariter BORELLUS refert Epilepsiam ex pollice ortam, per cauterium ibidem applicatum curatam, *Cent. 2. observat. 53.* Sic HEINRICUS ab HEER in *obs. 24.* refert Epilepsiam ex subita animi conseruatione & terrore ob sollicitudinem stupri, in cujus paroxysmo agra continuo fricabat pollicem pedis, in quo facto cauterio cum butyro antimonii, fuit sanata: SALMUTH *Cent. 1. obs. 90.* habet Epilepsiam concitatam per auram ab extremis adscendentem, per ligaturas partibus istis injectas præservatam: Refert LINDANUS de quadam muliere, quæ quoties paroxysmus epilepticus in prociū erat, dicebat, intra pubem à regione pubis sentire se leuem quandam morsiculam (quod non potuit esse nisi in utero, quoniam laborabat vitio uretri & mensium defectu, & nunquam reddita fuerat gravida) post morsiculam sentiebat sibi aliquid surgere, & designabat accuratè locum: Inde à medio corpore infra & supra umbilicum ad superiora: & ista aura, ut vocabat, non surgebat celeriter, sed paulatim, & cum appropinquaret circa cor, incipiebat illi cor palpitare, & tunc post unum vel alterum pulsuum animi deliquio afficiebatur; postmodum, cum pulsus denud inciperet, tota citò conuellebatur, & superatâ illâ convulsionē ad se redibat, donec novus succederet paroxysmus. Porro idem LINDANUS: *Curat. puellam octo, decim annorum, quæ laborabat epileptica obstructione, lienis scorbutica* (morbi enim lienis ut plurimum convulsivi sunt.) Hæc à me examinata, recitavit se sentire tempus invasionis paroxysmi, se enim sentire ex sinistro hypochondrio transversum quid, & cum ad medium pervenit corpus, retrogredi, & deinde sursum tendere, & quoad cor perveniret, animi deliquio corripiri, & hinc Epilepsiam subito supervenire. Fui præsens aliquando, & exactè designavit locum, quomodo moveretur ista aura. Tertiò refert LINDANUS de juvene Franckeræ, qui habuit carlem ossis in pollice pedis, ex quo subinde sentiebat surgere auram instar aquæ fervide, quæ, ubi supra regionem hypochondriorum perveniret, Epilepsiam intulit. Poterat præagere paroxysmum, & quamprimum, ille in pede sentiebat morsiculas istas, statim fasciis



cruralibus, quas ex fune confecerat, supra genu arctissime circumdagebat: & si hoc faceret, impediēbat paroxysmum; si vero non faceret, statim epilepsia corripiebatur. Semper, dicit LINDANUS, quasi ex eo, ansentiat, aliquid in capite? qui respondebat, se nil in capite, nisi vereiginem quandam sentire. Ex contusione pollicis pedis vid. M. A. N. C. Ann. 2. obs. 95. pag. 160. & Annus 6. & 7. Observat. 77. A genu lotumescēte, RHODIUS Observat. 58. Sic refert HELIDÆUS in suis Conf. pag. 29. de epileptico, qui ante paroxysmum frigiditatem & dolorem pungentem in manu sinistra percipiebat, cujus annularis digitus antea ex vulnere sensum motumque amiserat. BARTHOLINUS Cent. 1. observat. 82. refert Epilepsiam singulis noviluniis cum tuncore digiti pedum minimi recurrentem, cauterio isti infuso curatam: Tandem notabilis est Observatio 25. Centur. 6. HILDANI de muliere epileptica ex aura quadam & sinistrae manus medio digito ascendente reddita. Paroxysmus quoties redibat, de summo digiti dolore queritabat: tum manus contrahitur, brachium convellitur, & tandem motu convulsivo totum corpus percutitur: Cum nullis uti vellet medicamentis, facta circa carpum & brachii partem musculosam ligatura forti ex corio humano, evanere omnes insultus, nec ab eo tempore quicquam eorum percepit. Parile exemplum videbitis in M. A. N. C. Ann. 3. Observat. 336. Vid. etiam DECKERS in Barbette Prax. pag. 2. ex dextrae manus pollice: RHODIUS Cent. 1. Observat. 57. Haec & similia exempla ex irritatione ortarum Epilepsiarum sunt creberrima. Aura haec assurgens, non nisi sensus fallacia est: Nec enim movens adest, quod auram istam propellere, nec spatium, per quod moveri aura ista queat, sed potius, dum in loco irritationis ex aucto & simul inordinato spirituum ad locum irritationis motu, in illo loco sensum inchoat convulsio aut convulsivus motus. Quod verò percipiat ut plurimum frigida, sit (1.) quod spiritus animales aliquo modo conferant ad calorem partium, hinc in paralyticis partes ordinario sunt frigidae. (2.) per spasmus partium spirituum motus & influxus liber plus minus sufflaminatur: & (3.) ordinarius est pathema, membrum dum incipit spasmo convelli, quod refrigerationem videatur percipere: Sic imminente vomitu percipimus quandam refrigerationem, & simil.

Partes, per quarum consensum Epilepsia oriuntur, sunt variae, pro varietate nervorum affectionum in toto corpore: vid. hic imprimis SENNERTUS ubi de Epilepsia pag. 625. Praeterea ex retentis corruptis, v. gr. suppressione mensium aut haemorrhoidum, item ex defectu exercitii Venerei in mulieribus, non raro sunt epilepsiae per consensum, quoniam suppressa excretio liquoris seminalis, & inde nata acrimonia non raro in mulieribus Epilepsiam per consensum infert, irritando partes nervosas circa genitalia: Sic FORESTUS lib. 20. Observat. 115. observavit Convulsionem ex utero totius corporis, ob Liquoris genitalis corruptionem: nil proficientibus remediis aliis, facta utillatione per mulierem in genitalibus cum oleo lilaeo, cui Zibethum immixtum erat, illico sanata est; Putrefcit enim liquor genitalis saepe, accedunt humores, hinc convulsionem: Sic idem FORESTUS recenset exemplum suffocatae ex uteri affectu, quam tonfor erinibus pudendorum apprehendit, unde revaluit: Sic HILDANUS Cent. 6. Observat. 25. refert, mulierem epilepticam ex utero cum convulsionibus ad eum modum, quo cum viro coire consueverat, à utro longè antea absente per coitum mox curatam, neque amplius, cum Medico illo conjugali vixente, convulsionibus correptam: Epilepsiam à carnosio cerebri tuberculo videbitis in RHODIO Cent. 1. Obs. 55. ex hypochondrii dexteri obstructione Observat. 56. Ex vitio stomachi frequens est epilepsia. Item lumbrici creberrimè tam in infantibus quam in adultis efficiunt epilepsiam, qualem ex vermicibus intestinorum refert BARTHOLINUS Cent. 6. Hist. 20. ZACUTVS LVSITANVS lib. 2. Med. Princ. Hist. cap. 17. PISO lib. 2. de Morb. Cognosc. & Cur. c. 19. FORESTVS lib. 10. Observat. 65. GRVELINGIUS Cent. 3. obs. 74. MOEBIVS Instit. lib. 2. part. 2. c. 12. & RHODIVS Cent. 1. obs. 59. à praegnatione obs. 60. Mulieres gravidæ, item mulieres parturientes, aut etiam quibus suppressa sunt lochia, saepe incurunt Epilepsiam, quam ex utero cum insequente partu refert TVLPIUS lib. 1. Obs. 10. Ex ulcere in crure sanato epilepsiam, quo rursus aperto ea cessavit, vid. in AMATO LUSI-

TANO Cent. 2. Hist. 6. Item ab occluso ulcere in crure, ex quo ascendens aura epilepsiam infert, vid. in BARTHOLINO Centur. 3. Hist. 20. HOTSTIO lib. 2. Observat. 10. HILDANO Centur. 2. Observat. 10. Ab hepate in RHODIO Centur. 1. Observat. 62. Ex liene, qualem idem lib. 1. Observat. 9. SCHENCKIUS in Obser. HORSTIUS in Obser. &c. referunt. Ex renibus & vesica calculosa, de qua vid. BARTHOLINUS Cent. 5. Hist. 61. Ex abscessu abdominis interno, de quo vid. LOSSIUS lib. 1. Observat. 11. Ex mesenterio, vid. RHODIUS Centur. 1. Observat. 61. Variola & morbilli ante sui eruptionem, vel etiam post non sufficientem excretionem, familiarissimè Epilepsiam inferunt. Sic melancholia subinde in Epilepsiam abit, vid. SALMUTH. Centur. 2. Observat. 42. sicuti & contra epilepsia subinde in melancholiam transit. Ante triennium sub cura habui puerum decem annorum Epilepsia habituali correptum, noctu suaviter dormiebat, mane, evigilans dolorem in sinistro hypochondrio percipiebat, & decem vel duodecim in die paroxysmos patiebatur: Curavi eum cum pulvere epileptico antimoniāli, sed eo ipso puncto, quo Epilepsia non redibat, aderat melancholia, & quidem ridiculosa; recidivante autem post aliquot septimanas epilepsia, melancholia evanuit. Colica non rara est, nempe convulsiva ista, quæ epilepsiam infert non secus, ac purgantia acriora. Nixu parienti in dispositis epilepsiam excitari supra insinuatum est. Arthritis desinens in epilepsiam terminabatur, quæ cessavit revertente arthritide, Authores RIVERO Centur. 3. Observat. 85.

Haec sunt Epilepsiae per irritationem, idque per consensum. Raræ sunt, quæ fiunt per essentiam cerebro affecto, ut ut semper percipiantur tales nervorum spasmi.

In specie, quod Causas remotas attinet, siue per essentiam, siue per consensum Epilepsiam inferant, causa irritans nunc externa quæcunque lædens, nunc interna est.

Ex internis frequentissima solet esse acidum vitiosum nervis inimicissimum; id quod in hypochondriacis, scorbuticis, hystericis, &c. manifestum est, quibus Epilepsiae habituales & chronicae familiares sunt; Ita quidem, ut HOGELANDUS Oecon. pag. 186. & 187. Epilepsiae primariam radicem in lienis peruerso fermento concipiat: quales etiam aciditas causa videtur illius morbi convulsivi à lue Gallica; cuius BARTHOLINUS Centur. 6. Hist. 23. mentionem facit. Uno nomine: est acidum vitiosum ex primis viis oriundum, sed volatile magis, minus fixum, hinc inde penetrans, quod vellicando nervos aut partes cognatas, huiusmodi mala infert. Jam ergo siue sit humor acidus, siue fermentum tantum odore acido, se insinuans, facillimè Epilepsias inferre potest. Acidum enim hoc subinde se insinuat in partes musculorum fibrosas ac tendinosas, easque hinc rigidas, duras ac intradabiles reddit, posthac ipsos nervos quocunque in loco affligendo, epilepticos paroxysmos infert, propter huiusmodi vitiosas aciditates quibusque in locis residentes, non præcisè in musculo contracto, speciatim glandulas & plexus mesenterii occupantes, imò ibidem nutrimentum earundem spermaticum seu chylosum coagulans, in materiam gypseam & tartaream, ut vocant, interdum transit. Unde omni penitus motu sublato pars ista admodum contracta & immobilis manet. Prae cæteris scorbutici, hypochondriaci & hystericæ, in quibus manifestiora acoris peccantis sunt indicia, adeo crebris obnoxii sunt affectibus spasmodicis, motibusque convulsivis & epilepticis, in quibus circa glandulas mesenterii collectum vitiosum acidum, aut ex pancreate in intestina effusum, & hinc in mesenterium promotum, subinde spasmodicas convulsiones cum rugtu ventris, cum globi in abdomine sensu, cum umbilici ad interiora versus retractione & similibus affectibus infert: Conf. DRAWITIUS in Tract. de Scorb. & RIVERIUS. Unde iuvant plurima antispasmodica, & antiepileptica naturæ alcalicæ, vel acidum destruentia, vel istud obtundentia aut demulcentia. Inter graves Epilepsias hactenus exercitii gratia virginem pauperem sub cura habui, quæ inter alia, præter insultus epilepticos, nunc ante, interdum post paroxysmum, insultu maniaci corripiebatur; item patiebatur fluxum menstruum ordinarium, sed singulis binis mensibus: tertio erāt admodum vorax: quarto, quoties dedi vomitorium, semper melius habebat. Ex his potest inferri, quod Epilepsia & mania ex communi radice oriri possint:



- (1.) Quatenus in mania spirituum motus internus vi-  
riatur, in Epilepsia autem externus.
- (2.) Quia adest in omnia voracitas, testis copiosi acidi.
- (3.) Quod faber masticin stomacho & primis viis hæ-  
reat; Unde
- (4.) Vomitus semper eam circūant.

Limatura martis nihil valebat, lixivium cineris clavellati etiam non valebat; præ reliquis autem subinde egregium effectum habebat viscum coryllinum; levamen quoque sensit ex pulvere quodam præscripto ex gillj. pulveris epileptici antimoniæ. Propter hoc acidum mulieres hystricæ corripuntur epilepsia. Sic etiam podagrici alique arthritici non raro patiuntur convulsionem ex acido. Ob id in his, quibus accessura est primū podagra vel chiragra, in illis plerumque antecedunt convulsionem, aut saltem afficiuntur cram-  
pulis. In specie in podagricis sæpius antecambulationes sunt con-  
vulsionem. Et vitium istud, quod contracturam appellant, sit ab acido, ob omnino rigidum redditum nervum, quo acido corrumpitur nutrimentum proximum, induratur par-  
tes, & continuè contractæ manent & rigide.

Alteram quod attinet causam remotam, recementa nempe vitiosa plus minus explosiva seu elastica nitro-sulphurea, ut dicuntur WILLISIO, quæ per spiritum acidum volatilem explicat SYLVIVS, hæc in cerebro locisque vicinis congesta, aut spiritibus animalibus permixta, eorum crasin vitiant, quæ quibusvis occasionibus, sive immediatè, sive mediante spirituum agmine vehementius commoto, v.g. in animi affectibus excitata, motus spirituum inordinatè turbando, & impetuosiùs agitando, graves epilepticos paro-  
xysmos excutit. Quicquid horum sit, sedulo habenda est ratio hujus Epilepsie, etiam non adeo raræ. Videtur hoc evenire in epilepsia propriè sic dicta, sine causa manifesta, ægros affligente, in specie quæ supervenit variolis & mor-  
billis, ex quibuscumque febribus malignis, in quibus fre-  
quentius observatur, à tali miasmate spiritus animales eo-  
rumque motum turbante. Quod talis copula explosiva de  
natura acidi sit, probatur per juvenia, salia nempe volatilia, &c. Pertinet hæc Epilepsia hæreditaria: Nam ut ut hæc ipsa etiam radicem possit habere in quodam abdominis vi-  
ticere; nihilominus tamen certò spirituum vitiosè constituto-  
rum, & in crasi sua deficientium, simul videtur subesse  
erratum. Crebrius observata fuit Epilepsia, post cerebrum  
vulneratum & non ritè sanatum orta, propter fermentum  
quoddam acre malignum in & circa basin ejus collectum &  
relictum; Item post casum ab alto in caput sanum, ubi san-  
guis hæret sub cranio, qui putredine corruptus & plus mi-  
nus acescens, Epilepsiam insert. Hæ enim causæ, quibus  
cerebrum lædi contingit, etiam spirituum ordinatum mo-  
tum in consensum permutare valet, aut eos inficiendo, aut  
his se permiscendo. Superiori anno cum quidam gravi vulne-  
re læderetur in latere capitis dextro, quod ex bregmatis pe-  
netraverat cum meningibus & cerebro, observari paucis post  
diebus supervenisse Convulsionem, sed levem, lateris læsi  
seu vulnerati; è contrà perfectam paralyin ac resolutionem  
totius lateris sani: sed cum paroxysmi epileptici subinde su-  
pervenerint, utrumque latus, ejusque partes promiscuè  
convellabantur: Sed extra talem paroxysmum paralyis pars  
sana, spasmus pars ægra, laborabat. Potius hæc pertinent  
febres malignæ, aut etiam benignæ continuæ malè judica-  
tæ, quæ occupando cerebrum, ibique spiritus animales tur-  
bando, præter deliria, convulsionem epilepticam ordinariò  
inserunt, quas tractio & subsultus, aut quædam vibra-  
tio tendinum circa carpum imminentes inveniunt. Pertinet  
hæc Epilepsia lethalis post aurium dolorem discussa, sed  
non suppurata, materiâ, quam refert HORSTIUS in  
obs. lib. 2. obs. 21. Item quando ex suppressa hæmorrhagia  
narium paralyis lateris dextri, & ab hac sanata, epilepsia  
nata fuit, Autore BARTHOLINO Cent. 4. Hist. 69. Ex  
suppressa quoque urina, renum vitio supervenit Epilep-  
siam, urinæ sero cerebrum inundante, non rarum est.  
Suppressi consueti sanguinis effluxus, v.g. hæmorrhoidum,  
menstrui &c. subinde Epilepsiam inserunt, cerebri ac spi-  
rituum alteratorum vitio. Quod etiam facit incipiens gra-  
vidatio, cujus occasione quædam Epilepsie sunt. Præ-  
teris sanguinis recementa vitiosa & acria sub lymphâ vehi-  
culis cerebro juxta ejus glandulas communicata, irritando  
hujus membranas, creberrimè Epilepsiam hæc per essen-  
tiam inserunt, quocumque etiam in loco collecta fuerit pec-  
cans ista lympa; de qua vid. SCHNEIDERUS in suo  
Tr. de Catarrh. lib. 2. pag. 103. qui aliquot habet exempla  
epilepticorum post mortem dissectorum, in quibus sero-

sirates vitiosæ in ventriculis cerebri fuerunt repertæ: Similia  
exempla refert SCHENCKIUS in suis Observat. pag. 144.  
& BONTIUS Med. Indor. Observat. 1. Item BOREL-  
LUS Cent. 2. Obser. 78. habet exemplum epileptici mor-  
tui, cujus in cranio aperto inter cerebri ventriculos ma-  
gnam materiæ adipis emulsi copiam reperit: Pus in cerebro  
observavit TULPIUS Cent. 1. cap. 32. & quæ sunt similes  
causæ, quæ inserunt Epilepsiam per essentiam. Denique  
apoplexia interdum in Epilepsiam transit, & contra; vid.  
M. A. N. C. Ann. 6. & 7. Obs. 212. pag. 311.

Quoad causas externas: eæ sunt innumerabiles. Præ-  
teris considerandus Mercurius & omnia Mercurialia, cujus  
etiam miasmata minima generi pervoso sunt insensa; Si  
enim tantillum ejus circa cerebri confinia hæserit, quocum-  
que modo illi communicata, ad Epilepsiam disponunt, pro-  
pter irritationem, ab acrimonia Mercurialium particula-  
rum patam. Hinc enim unguenta Mercurialia capiti con-  
tra lineam infantibus illita Epilepsiam non raro inserunt;  
quale exemplum videri potest in TIMÆO von Gulden-  
Klee in Resp. pag. 126. Pertinent hæc fumus Joviales, & qui-  
bus per nares attractis, ob mercuriales halitus adhuc lati-  
tantes, Convulsionem & Epilepsiam obortas notat SAL-  
MUTH Cent. 3. Hist. 39. Ex coturnicum esu Epilepsiarum  
& Convulsionum exempla notat SCHENCKIUS lib. 1.  
pag. 124. Vini etiam usus nimis Convulsionem excitat ob  
aciditatem.

Abfolvi ferè ea, quæ ad Theoriam Convulsionum & Epi-  
leptiarum pertinent. Plura qui cupit, adeat WILLI-  
SIUM in Pathologia Cerebri, ubi ex professo tractat de  
morbis convulsivis: & quidem jure meritoque: nulli enim  
affectus post febres sunt frequentiores, quàm isti morbi con-  
vulsivi, utur, quod obiter noto, interdum aliquantisper  
confusè, interdum dubiè, loquatur: Dubiè quidem,  
quando insert suam copulam explosivam, quam ex mias-  
sa sanguinea derivat, coniungendam cum spiritu animali;  
quæ quid aut qualis sit? fateor me ignorare: confusè loqui-  
tur, quia non exactè ad origines convulsionum propedi-  
tur, sed potius datâ quacumque occasione convulsionem mo-  
do hæc modò illuc determinat: Conf. SYLVIVS lib. 2.  
Præx. UNZERUS Tr. pecul. de Epilepsia.

Inter pathemata, quæ epilepticos vexant, non ultimum  
est stridor dentium, maxillarum vehementissima contractio,  
idque ex convulsivo impetu. Sed dentium contractio,  
quod probe notandum extra Epilepsiam interdum observa-  
bilis, ex paralyi aliquando musculorum, maxillam infe-  
riorem deorsum trahentium, non semper ex convulsione  
est: Conf. THYRMAYER Conf. lib. 2. pag. 174. Item  
Spuma, quæ ante os epilepticorum interdum conspicitur.  
Hæc saliva est rarefacta ab aëre, dum contractis & coangu-  
statis spasmus plus minus faucibus, saliva plus minus copio-  
se expressa, ab aëre per illas angustias vi explosiva agitata, in  
talem spumam texturam abit; hinc etiam ex naribus  
interdum materia talis excerni solet. Conf. PECHLINUS  
in Tr. de Acris & Alimentis defectu.

## DIFFERENTIÆ.

Quoad Differentias Epilepsie: hæc est vel universalis;  
vel particularis, quando unum alterumve membrum, aut  
aliquot saltem partes corporis epileptici convulsionibus ve-  
xantur: Vid. SENNERTUS Institution. lib. 2. Part. 3.  
sect. 1. cap. 9. de Epilepsia, ubi curiola Epilepsie particu-  
laris recensentur exempla.

His præmissis pergo ad signa Convulsionum & Epilepsia-  
rum.

## DIAGNOSIS.

Quoad Diagnosin: Signis diagnosticis pro Convulsionibus  
& Epilepsia præsentibus determinandis vix est opus, cum  
per se sit aperta, & facillimè cognoscatur; sive sit Convul-  
sio tonica, dum membrum convulsus in suo situ permanet;  
sive sit convulsio clonica, dum membrum convulsus va-  
riè agitur.

Dolor facis etiam frequenter adest in Convulsione: verum  
non semper, sed tantum interdum supervenit.

Convulsivus motus tremori equidem in pluribus est co-  
gnatus; in hoc tamen facillimè discernuntur: quod tremor  
semper coniungatur cum motu voluntario, v.g. manus  
nunquam tremet, pes nunquam tremet, nisi ad cursum  
adigatur, ita ut semper motui voluntario coniungatur tre-  
moris.



moris symptoma: in motu convulsivo, ipso egro inscio, aut præter voluntatem ejus, sunt motus convulsi. Denique tam in paralyti quam spasmus motus membri voluntarius observatur; hæc tamen est differentia, quod in paralyti membrum resolutum sine omni difficultate trahi, flexi & tractari possit; contrarium fit in convulsione, in qua membrum est rigidum, & quod non sine acerbo dolore extendi potest.

*Gradus Epilepsia primus à lipothymia & caro distinguitur*, quatenus in lipothymia pulsus parvus & rarus, in Epilepsia robustus & frequens, carus verò similisque affectus soporosi peripetio recursum haud obnoxii sunt, nec facile cedunt; sicuti Epilepsia per paroxysmos recurrentis facile solvitur.

Præterea in febribus ardentibus & morbis acutis malignis consultum est, prænoscere imminentem Convulsionem & Epilepsiam: quod ex eo patet, quod ægri ex improvise aurium tinnitu, sensuum hebetudine, capitis gravitate, & cordis palpitatione corripiantur, splendores ac coruscationes, & variorum colorum apparitiones, ante oculos versari soleant, ac objecta peregrino colore vestita appareant; istiusmodi enim ignitos splendores creberrimè succedere solent symptoma epilepsia: vid. BARTHOLINUS Cent. 3. Hist. 45. & M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 97. pag. 170.

Si in principio morbi de dolore in bulbis oculorum lineæ ophthalmia conqueruntur, mox delirium & convulsionem adsumunt; quod tanquam sanctissimum signum sapienti observari.

Quando muscæ capiunt, & floccos colligunt, lectumque dellicant, mala sunt signa: Illa delirium, & simul motum in oculis convulsivum, & Convulsionem supervenientes innuntiat: Hæc jam instantem convulsionem denunciat. Item, quando dicunt, se percipere motum quandam membrorum tractorium, aut ex his aliquid sub auræ frigidioris specie, versus caput ferri: vid. RIVERIUS Prax. lib. 1. cap. 7.

Speciatim huc de stillationis à capite ad pectus & ventriculum ruentis species, quæ quidam apud TULPIUM lib. 1. Obs. 15. Convulsionem periodicam per abusum euphorbii contractam ante oculos sibi præfigere poterat.

Observatur etiam duplex status: ægri enim nunc delirant, nunc non: si delirant, nihil percipiunt & nihil dicunt. Quando igitur æger delirantia phænomena aut non percipiat, aut indicare nequeat, v.g. in febribus continuis, & acutis, Medicus, si tangit carpos & tendinosas partes, proximâ occasione de imminentibus convulsionibus usque lethibus, certus sit, si scilicet quasdam tractiones ac tensiones, aut quosdam subsultus, aut quasdam vibrationes tendinum, qui frequenter supra carpum repunt, in his deprehendat.

Vertigo citra causam manifestam iuniores, præsertim non hypochondriacos, aut frequentius aut fortius affligens, Epilepsia est prodromus.

Denique crebrior ephialtis seu incubi sub somnum invasio signum est imminentis Epilepsia, testibus ferè omnibus Practicis.

Ipsa Epilepsia præsens ex ejus gradibus supra explicatis per se patet: nihilominus tamen homo subito corruit, aut si non corruit, tamen variè membra agitantur: animales functiones aut abolentur aut depravantur in epilepsia, cum deliriis, risu, gesticatione, & similibus coniuncta.

Speciatim quoque consideret Medicus, an convulsionem oriatur ex viscerum internorum vel partium externarum spasmo? Convulsionem & Epilepsia partium externarum ex motu convulsivo membrorum facile patet: Interna verò cognoscuntur ex motu convulsivo, murmurationibus & borborygmis abdominis, (quos status dicunt, qui tamen non semper adsunt) ex subitanea hujus abdominis aut contractione aut intumescencia, ex tensione & duritie abdominis, interdum cum sensatione superiora versus repentis, unde infantibus epilepticis imminente epilepsia solet indurari abdomen; interdum ex umbilici interiora versus retractione, ex acerbis doloribus contorquentibus in abdomine, in specie intestinorum & mesenterii, quos ægri, præcæcis hypochondriaci, exprimere nesciunt; item ex præcordiorum tensione & constrictione, ex dolore lacerante circa lumbos, ubi anhexum est mesenterium: superveniunt subitanea respiratio difficilis, interdum sensus suffocationis, aut quasi laqueus collo iniiceretur. Subinde externarum partium Epilepsia supervenit. Unde patet, quanta sit con-

nexio hujus Epilepsia Internæ cum passione hysterica & didacta, quæ cum Epilepsia in radice conspirat, ut sit unus idemque effectus, & tantum circumstantiis quibusdam variis: hinc etiam omnia antiepileptica hysterica passionem, quælibet & contra hysterica epilepticos curant.

Pro investigando fonte morbi à Medico cognoscendum est ulterius, an per essentiam? an verò per consensum sit epilepsia? Si per essentiam sit epilepsia, ferè nulla paroxysmi futuri seu invadenti præcognitio præcedit, nec jungitur sensatio quædam molesta in quodam loco, sed dictum factum ex improvise eodem corripitur ægri: jungitur quædam sensatio, quando nimis est rapidus spirituum motus, aut post paroxysmum pars dolore lancinante & lassitudine solet affici. Ubi verò est per consensum, ibi ut plurimum alteratio quædam, v.g. aut dolor, aut motus vermiculationis, aut simile quid, in parte quadam extra caput præcedit, ex quo postmodum Epilepsia quasi surgere percipitur; modò dictus dolor aut motus comitatur, modò cessante demum paroxysmo observatur. Imprimis fit hoc, quando focus epilepticus est in partibus remotioribus: Ibi enim imminens paroxysmus percipitur ex motu quasi aura quadam, quæ sursum adscendente Epilepsiam in promptu esse, facile patet. Quod etiam faciunt signa lumbricorum, calculi, &c. quæ spasmos ex improvise & sine causa manifesta contingentes exinde exsurgere, probabile est.

Præcæcis in Epilepsia per essentiam capitis affecti signa adsunt, torpor quidam in actionibus animalibus internis, aut saltim depravatio quædam, hebetudo sensuum, capiti gravitas, vertigo, &c. adstant sequuntur: vid. RIVERIUS l. c. Interdum graviori in malo fatuitas sequitur, & præcesserunt ferè causæ externæ, quæ cerebrum aut capitis partes ledere potuerunt. Imprimis lunæ motibus auscultat epilepsia quævis, magis tamen ea, quæ est per essentiam, & nonnunquam ad lunæ varias periodos diversimodè afficit: id quod non equè observari potest, quando Epilepsia est per consensum, in qua ut plurimum adsunt signa visceris cujusdam vitati & ejusdem operationis labefactæ, aut privatæ partis affectæ; ut ut interdum inveterata & gravior per consensum Epilepsia etiam ad lunæ motus, alterato plus minus cerebro, variare soleat.

## PROGNOSIS.

*Prognosis Convulsionis & motuum convulsivorum pro varietate virium & circumstantiarum variat.*

Convulsio, quæ fit per consensum, minus periculosa est, & facilius, cæteris paribus, curabilis, quàm ea, quæ ex cerebro per essentiam originem ducit.

In febribus acutis, præsertim malignis, supervenientes Convulsionem sunt periculose & sæpius mortem portendunt, nisi per exsurgant solvantur: vid. HIPPOCRATES sect. 4. Aph. 10.

Epilepsia habitualis & per se morbum constituens sine periculo vitæ subinde ad plures annos durat, ut ut sæpius recurrentes ægros plus minus paralyticos, delirantes aut stupidos reddat; quamvis interdum sua sponte in subiectis junioribus circa pubertatem terminetur: vid. FORESTUS lib. 16. Obs. 57. in schol.

Si toto corpore à convulsionibus immuni aut labium convellatur, aut palpebræ, aut lingua, prævum symptoma & periculosum putandum est, & quod merito timorem incutere debet egro; nam aut mors imminens, aut gravis epilepsia, innuitur. Conferendi huc sunt varii Aphorismi HIPPOCRATIS, qui de Convulsionibus agunt.

Quod motus in Convulsione est vehementior & diuturnior; aut plures, vel cerebro vicinas, v.g. labia, palpebras aut linguam, vel nobiles magis partes, v.g. præcordium afficit, eo periculosior Convulsio est; hinc epilepsia reliquis speciebus semper periculosior.

Epilepsia hæreditaria, quæ sæpius dantur, vel omnino nunquam vel rarissime curatur.

Epilepsia ante pubertatem eveniens curabilis est; post annum vero vigesimum quintum superveniens ferè usque ad mortem durat, teste HIPPOCRATE sect. 5. Aphor. 7. WILLISIO de Morb. Convulsiv. cap. 3. pag. 37. Quod tamen non semper procedit, quia prostant exempla aliquot in Observat. RHODII etiam Epilepsiarum post vigesimum quintum annum curatarum: Vid. etiam RIVERIUS l. c. Ideoque de infantibus epilepticis bene sperandum.

Si quid magis universale, est Aphorismus HIPPOCRATIS 45. sect. 2. Epilepsia laborantes iuniores cum



*Sus liberat*: Nempe quandoque in pueris pubertatis mutatione ac Venus; in puellis vero menstruorum initium, morbum huiusmodi tollere solet. Conf. FORESTUS lib. 10. obs. 35. in schol.

Paroxysmi quod sepius repetunt, edgrauiores evadunt, & tandem totam functionem animalem evertunt.

Observatum etiam fuit, quod in paroxysmo epileptico, sieger ad usum sternutatoriorum non sternutet, malum sit indicium, atque argumentum; naturam succumbere & prostratam esse.

Si mulierem micro-gerentem fortis Epilepsia invadat, magnum periculum minatur, saltem periculum abortus imminet: id quod tamen non semper absolute verum deprehenditur; siquidem RHODIUS, Cent. 1. Observat. 60. refert matronam pregnantem, quæ dum utero gereret, post sex septemve menses epileptici insultibus affligebatur, parum vero enixa optime convaleuit: Sic etiam SCHENCKIUS in Observat. non omnes prægnantes epilepticas abortum pati annotavit.

A copioso sanguinis fluxu singultus aut Convulsio malum; vid. HIPPOCRATES sect. 5. Aphor. 3. ac 36. & sect. 7. aphor. 9. A sanguinis profluentia desipientia & convulsio malum.

Pariter ab hypercatharsi Convulsio aut singultus malum; sect. 5. Aph. 4. & sect. 7. Aphor. 25. nam singultus est species convulsionis.

Convulsio ab helleboro lethalis: sect. 5. Aphor. 1. Raro enim ægri à convulsionibus post purgantia talia fortiora, abortis evadunt, unde non desperandum sit, quin opiatas & theriacalibus alexipharmacis denuo convalescant: sicuti nonnulla exempla eorum, qui evaserunt, adducunt SENNERTUS Prax. lib. 1. pag. 565. & PETRÆUS NOBILIOG. Harmon. lib. 1. Diss. 8.

Ab ileo omittis; singultus, Convulsio, aut delirium, malum: sect. 7. 10.

Huc facit ulterius aphor. 66. sect. 4. ubi inquit: In acutis febribus Convulsio, & circa viscera dolores vehementes, malum.

Item aphor. 13. sect. 7. In ardoribus vehementibus convulsio aut tetanus, malum: uti Convulsionēs, quæ graves phrenitides sequuntur, lethales sunt.

A vigilis convulsio aut desipientia, malum: sect. 7. §. 18.

Febris convulsioni supervenit, melius est, quam febris convulsionem: vid. HIPPOCRATES sect. 2. aphor. 26. GALENUS super aphor. 54. sect. 4. modo febris non sit maligna: & ipso aut tetano si febris accesserit, morbum solvit, HIPPOCRATES sect. 3. aphor. 17. Conf. SENNERTI Prax. lib. 1. Part. 2. cap. 23. pag. 566. & TOLPIUS lib. 3. Obs. 42. ubi eleganti discursu hoc declarat. Distinguenti autem sunt casus in horum explicatione: nempe intelligitur convulsio & motus convulsivus chronicus, circa quos observatum fuit, quod superveniens febris eosdem curaverit.

Quartana correpti non admodum convulsionem patiuntur: Si vero prius tentati sint, superveniente quartana liberantur, sect. 5. aphor. 70. Exemplum quartanae solventis Epilepsiam videb. in SALMUTH Cent. 2. Histor. 84.

## C U R A

Hiscæ præmissis pergo ad ipsam Curam Epilepsiae, & quidem ad curam imprimis in genere adolutorum: nam Epilepsia infantum & mulierum ad morbos infantum & mulierum pertinet.

Quoad Curam Convulsionum & Epilepsiarum, hæc in statuenda venit tam extra paroxysmum præservatoria, quam in paroxysmo curatoria.

Quoad præservatoriam: ante omnia attendendum est, ut causa remota materialis, nempe ea, unde oritur inordinatus spirituum motus, remodeatur, corrigatur, & eius crebrior recidiva mature præcaveatur, sive per essentiam, sive per consensum fuerit orta Epilepsia & Convulsionēs. Hinc cerebri seu nervorum ac spirituum animalium diathesis aromatis ac volatilibus conservanda, perverfus vero motus anodynis corrigendus. Provarietate autem huius causæ com specificorum usu varianda subinde non nihil curatio, semper attendendo, an sit ex irritatione quadam partis nervæ? an inquinati spiritus animales? In specie considerandum an Convulsionēs & Epilepsiae sint affectus primarius, & per

se morbum constituent, adeoque plus minus habituales sint an vero saltem affectus sint secundarii, & symptomatis rationem habeant, adeoque accidentales? Hinc considerandum, an per consensum saltem? an vero per essentiam ortum traxerint? an causæ remota externa vel interna fuerit? an sedes fomitis sit intra corpus? an vero extra corpus in membro quodam particulari? Pro quibus omnibus circumstantiis omnino varianda venit Cura, dum alius respectus est habendus, quando Epilepsia est in febre maligna, alius, quando est in mulieribus hysteriis, alius, quando est à scorbuto, alius, si in quodam membro particulari, eoque in specie externo, radix mali fuerit. In tali enim casu aut ligatura fortis membri peccantis, aut ibidem, ubi residere percipitur materia stimulans & convulsionem excitans, luvum cauterium, vel excitatus fusticulus, præservat paroxysmum imminentem, interdum fermentum irritans evacuando omnino Epilepsiam curat.

Observandum igitur I. Cum Epilepsia & Convulsionēs, quæ in specie ut morbi à causis internis oriuntur per se exantur, adeoque chronici sunt, & in genere ferè in hypochondriaco aut scorbutico malo fluunt, utut ab hoc minus affligi videantur ægri, ut plurimum originem ducunt ab acido vitioso, eoque plus minus volatili, & huius inconvulsi ferè semper in antea primas vias lateant, ubi in genere vel à destruendi & primarum viarum evacuandarum habenda est ratio. Pertinent nempe hæc varia tentamina & experimenta curæ ad artem Epilepsiarum, u. g. per lac lactinum cum sapone Hispanico decoctum, & medicamentum quoddam ex vitriolo Martis, quibus Epilepsia hypochondriaca per annum durans curata: vid. BARBETTE Prax. ubi de Epilepsia, item M. A. N. C. Ann. 1. obs. 95. pag. 203 uel Acidulas, Conf. RIVERIUS Prax. cap. 7. aliæque Mitralia: Sic HENRICVS ab HEER Obs. 1. Epilepsiam cum opithorono gravissimam, cuius paroxysmi præcedebant orationes & pandiculationes cum cordis angustia, quæ uel quinta die recurrentes, per fontes spualios curata refert. Et quando marina, fesiacea, ossia, ut ungula aleis, unicorni verum, crystallus, smaragdus, lapis cerædinus, & similia pro cura epileptice laudantur, hæc non nisi absorbendo curam operari possunt: Sic BORELLVS Cent. 2. obs. 34. refert epilepsiam, in cuius paroxysmo corpus intus dolli intumescerebat, per sul abjunctu, coralliorum & perlaram curatam.

II. In genere semper observandum, ut appropriata seu specifica antiepileptica, quæ per experientiam observata sunt, cum istorum membrorum appropriatis, ex quibus Epilepsia oritur, misceantur, & simul continentur. Hæc sunt varia. In hostiam conveniunt, quod vel virtute alcalina destruunt acidum, vel virtute sulphurea temperant acidum & frigore spiritus operantur. Et quidem appropriata talia antiepileptica conducunt non nisi præmissis universalibus, speciatim ubi Epilepsia est per essentiam, aut si per consensum sit, tamen si non præcise in membro quodam externo, sed in partibus internis hæreat.

Hinc

III. In his Epilepsiis per consensum partium internarum vomitus antimonialibus provocatus primarum obtinet, si malum potissimum fuerit recens (vid. RIVERIUS Prax. lib. 1. pag. 61.) aut si omnes mali hæreat in primis viis, singulis mensibus quatuordecim ante plenilunium repetendus: vid. ACUTUS LUSITANUS Prax. Admir. lib. 1. Observ. 24. & 31.

IV. Purgantia sint mitiora; secus ac RIVERIUS Prax. pag. 60. suadet; cum frequentiora & potentiora sæpius plus nocent quam prosint. Inter purgantia cum aliis permixtus Mercurius dulcis, primum obtinet: Sed necessarium est, ut recte præparetur Mercurius dulcis, & bis vel ter sublimetur, utroque tandem Satyrallinus, & nihil de volatilibus arsenicali Mercuriali retineat. Purgantia huiusmodi vel proprietaria, vel etiam saltem Laxantia, conveniunt quæ quidam ante novi vel plenilunii usum pati solent: Sicuti etiam massæ appropriata Epilepsie remedia ante lunc imprimis mutationes, præsertim ante novilunia & plenilunia, aut ejusdem quadraturas, seu tempore harum mutationum, optime usurpantur.

V. Observandum quod si ex fomite in humoribus à natura crasi degenerantibus, non adeo exactè à priori cognito, oriuntur convulsionēs, pro istis emendandis diata sudoriferis ex decoctis lignorum, si reliquorum remediorum vis minus proportionata fuerit, observantur proficue: Vid. SENNERTUS lib. 1. Prax. ubi de Epilepsia. HOEFERUS



*Hercul. Med. pag. 10. FONSECA lib. 2. obs. 8. & THONEUS lib. 2. obs. 94.* Commodè his decoctis lignorum viscus coryllium, quercinum, tiliaceum, radix pconiae, steracus pavonis, ac similia, tanquam appropriata, addi possunt: vid. *HORSTIUS Decad. 2. Probil. 9.* Sic de ligni guaiaci usu in Epilepsia conf. *SCHOLZIVS Consil. 40. & 41. JACHINVS in lib. 9. Rhasis c. de Epilepsia, & ALPHONSVS FERRARIVS. THONERVVS Epilepsiam à colica per Decoctum lignorum curavit lib. 2. Observat. pag. 92.* Non fecus ac *SCHENCKIVS in Observat. Vertiginem difficillem per Decoctum lignorum cum appropriatis curatam refert.* Sed bene prius praemissa debent esse *Universalia ac primas vias euacuantia.* Certe continuato usu & evocato pro virum ratione sudore, multum valent in quibusvis affectibus chronicis decoctu ista lignorum diaphoretica. Alterant simul humorum dyscrasiam & successivè vitiosum quod est, evacuant; id quod vel lues Venerea persuadet, continuato tallum decoctorum usu curabilis.

VI. Interdum & in casibus desperatis salinatio Mercurialis convenit; vid. *WILLISIVS loc. all. pag. 46.*

VII. Sternutatoria singulis matutinis horis attrahenda: vid. *WILLISIVS loc. all. pag. 44. Ex. gr.*

24. *Fol. Majoran.*

*Ruta an. 7ij.*

*Flor. Lil. conuall. 3j.*

*Helleb. alb.*

*Castor. an. 7j.*

*M. S. pulvis: S.*

*Pulvis sternutatorius cerebrum purgans.*

VIII. Praeter ligaturas fortes, fonticulos & cauteria, de quibus supra dictum, similia auxilia chirurgica, Setacea, Vesicatoria, & cranii apertiones, juvare observantur, ad naturam nempe imitationem, quae non saltem digito quasi monstrat, illam per sponte erumpentia ulcera sanando: qualia exempla *TVLPIUS lib. 1. obs. 8.* suppeditat de duobus infansibus, per ulcera capitis spontanea ab epilepsia curatis, quae c. l. refert: Epilepsiam sponte a natura per lentem in fauces inluxionem curatam, in *HILDANO Cent. 1. obs. 41.* Sed accidentaliter & per infortunium excitata idem praestant, quale quid v. g. *WILLISIVS loc. all. de puella quadam, per motus convulsivos super carbonem accensos devoluta, hinc caput diversimodis locis concremante, refert.* Quod etiam facit *RHODIVS Cent. 1. obs. 62.* quae citidam ab humore calido herpete sanato epilepsiam contigisse refert, brachii fetaces solutam. Vnde rectè Vesicatoria, fonticuli & setacea à *RONDELETIO Meth. Med. l. 1. cap. 36. PLATERO obs. pag. 2. 6. MONTANO Conf. 50. PARÆO l. 10. cap. 25. FORESTO lib. 10. obs. 16. HENRICO ab HEER obs. 24. HOLLERIO de Morb. Intern. l. 1. cap. 15. HILDANO Cent. 1. obs. 41. & TVLPIO l. 4. obs. 2. & 3.* commendantur; In illo tamen tantum casu admittenda, si per essentiam & à causa magis universali malum hoc contingat; sicut ex scabie retropulsa aut similibus occasionibus nata Epilepsia per vesicatoria curanda venit, teste *HILDANO Cent. 3. obs. 10.* Sic Lugdubensibus familiare est vesicatorio suo Epilepsias curare, ulcere ad annum aperto servato, quod videb. in *VELSCHII Mithomim. 32. Cent. 1. annalis. Ann. 4. & 5. M. A. N. C. Item Ann. 9. obs. 14.* Epilepsia refertur gravior puerperae vesicatorio curata. Imò trans apertio interdum proficua observatur, nempe, ut refert *SCHENCKIVS in Observat.* quidam vulneribus capiti inflicis ab antiqua Epilepsia fuerunt curati: Item *RHODIVS Cent. 1. obs. 66.* refert *SPIGELIUM* sibi memorasse, juvenem quendam nobilem Patavinum sepius epilepsia afflictum ob gravem lapsam à scalis, à *FABRICIO ab AQUAPENDENTE* apertione cranii per ferream curatum: Vid. etiam *RIVERIUS loc. all.* Si quando ex calvaria, ex lue Venerea cariola facta, oritur Epilepsia, praesertim mediante fistione eradicanda venit: Vid. *SCHENCKIVS lib. 2. obs. 1.* Hae ipsa pariter ad fonticulos quoque, item ad vesicatoria locis certis admoveunda, accommodari possunt: Nam *PANAROLLUS Pent. 4. obs. 30.* narrat, puerum epilepticum, aphonum, solidum, vesicatorio in futura coronali sanatum. Si à nervo lesio in quacunque, remota quoque, corporis parte oriatur, uti supra ex citatis *M. A. N. C.* patet, cauterio potentiali loco afflicto applicato, curatur.

IX. Observandum, quod si cum Epilepsia iuncta sit sanguinis consueti suppressio, vel huius occasione excitatur plus minus Epilepsia, Vena sectio aut alia quae vis sanguinis misfio erit proficua locis in variis, pro circumstantiarum varie-

tate. Sic enim epilepsiam apertis haemorrhoidibus curatam refert *RHODIVS Cent. 1. obs. 65. Idem obs. 64.* Epilepsiam in puero octenni ob sanguinis abundantiam vene sectione curatam refert: Item *ZACVTVS LVSITANVS l. 1. Prax. Admir. obs. 6.* refert, Epilepsiam seivam post partum hirudinibus internae uteri parti applicatis curatam: Idem *Obs. 27.* gravidam septimo mense epilepticam vene sectione in taloruto curatam memorat: Item gravida non mestrus ex suppressione haemorrhoidum epileptica, sectus in tale venis, & hirudinibus ano applicatis, curata fuit *obs. 25.* De vene sectionis in talo usu in Epilepsia videb. *M. A. N. C. Ann. 4. & 5. obs. 81.* Imprimis notabile videtur, quod idem *ZACVTVS LVSITANVS lib. 1. Med. Princip. Histor. 16.* notat, gravidam Epilepsia ab utero correptas, secta in brachio vena perisse, in tale vero non.

X. An opiata & narcotica in paroxysmo convenient? disputant Auctores. Illorum usus utilis & noxius est: bene distinguere experti est *Dolitoris*, inquit *BARBETTE Prax. pag. 5.* Imò *DECKERS loc. all.* eadem plane refert: E contra tamen *PLATERVS in Praxi & SCHMIZIVS in Encheirid. Prax.* leniora in gravioribus insultibus commendant. Opiata magna sunt remedia epilepsiae, inquit rectè *FONSECA l. 1. Conf. 80.* Nam ferociiores spirituum motus compescunt, indeque sensuum perturbationes & motus inordinatos tollunt. Hinc ad praecavendum paroxysmum Epilepsiae, tam internè quàm externè, tunc conveniunt opiata, & nunquam omittenda, appropriatis & specificis epilepticis mista, imprimis cum Camphora, quae singulare est ad coercendos spirituum animalium effervescentium motus: Vid. *WEDELIVS Opilog. pag. 107.* Hac ratione pilulae ex Laudano opiato cum oleo camphorae paratae ad imitationem *HARTMANNI in Prax. Chymiatr. aph. de Epilepsi.* sunt egregiae; unde etiam hic laudanum hystricum suum usum obtinet egregium: & externè *FONSECA cit. loc.* inunctionem cum oleo buxi tanquam insigni narcotico in temporibus, naribus & pulsibus, propter vim aynodnam imminente paroxysmo, (cui alia anodyna vel narcotica substitui possunt) optime convenire dicit. Sed abstinemus ab his narcoticis ante praemissa universalia. Deinde non tam ad curationem crebrius, sed saltem ad praeservationem aut atrocioris paroxysmi mitigationem, adeoque rariis usurpentur, quia epilepsias diuturnas subinde fatuitas supervenire solet; & periculum, ne opiatorum abusus haec ipsa magis promoveatur.

XI. Cerebri & spirituum animalium dispositio praeternaturalis corrigatur per medicamenta appropriata epileptica, maximam partem acidum in corpore peccans absorbentia, singulis diebus ab evauationibus vacuis propinanda; qualia eadem sunt tantum non innumerabilia, & duplici imprimis classis, nempe vel fixa absorbentia, vel volatilia positive fomitem morbosum corrigentia, selectiora tamen ex regno animali, partes animalium ossae & cornea, in specie cranium humanum, cornu cervi, unicornu maris, margaritae, & denique Hippopotami, steracus pavonis: cujus loco epilepticis quidam magis commendant steracus leonis, & aquam ex eo destillatam, qua *Illustr. Comes à SCHARF-FENBERG* feliciter usa est: Vid. *VELSCHIVS loc. all. leg. No. 9. Castoreum*, ex his parata salia volatilia, liquorem corou cervi succinatum, spiritum sanguinis humani, secundine humane, &c. Ex regno vegetabili eminent visca, quercinum, tiliaceum, & speciatim corylinum, flores liliorum convallium, pconiae, opium, camphora, &c. Ex regno minerali cimabaris nativa, à *GRATONE* Magnes Epileptic dicta, vel antimoni, & alia sulphures antimoniales fixa; Item sulphur bitrioli, tam fixum, quam in spiritu volatile, v. g. in spiritu vitrioli epileptico, vel etiam in spiritu volatili vitrioli ad epilepticum *HARTMANNI*, unde *SIMON PAVLI* ait: Qui Epilepsia mederi volunt, ex vegetabilibus pconiam, ex animalibus castoreum aut hirundines, ex mineralibus vitriolum sibi commendata habeant. Huc pertinet succinum, eiusque sal volatile & oleum, Crystallus, &c. quibus omnibus iuncta sunt anodyna.

Universalia ergo remedia praeter vomitum sunt, v. g. helleborina, ex colocynthide, & Mercurialia; Helleborus nempe niger ritè preparatus, eiusque extractum cum Mercurio dulci: Sed cum parum purget, quin tantummodò laxet, ob id optime permisceatur cum aliis, & quidem cum extracto hellebori nigri. Semper autem in Epilepsia per essentiam fortiora purgantia requiruntur.

24. *Extr. helleb. nigr. gr. xv. ad 3j.*

(vel



(vel Extr. cathol. Andern. aut panchym. Croll.  
quodcunque lubet, gr. xv.)

Mercurii dulc. risè par. gr. xv.

Extr. troch. alband. gr. j. iij. vel iij.

Olei destillat. juccini gutt. ij.

Cum f. q. Ess. Myrrhæ, vel Castor. f. pilulæ.

D. S.

*Pilule laxativæ pro una vice.*

Vid. Colleg. Pharm. in Schraderum Part. 1. sect. 3. pag.

865. Vel ad imitationem RIVERII prescribatur:

℞. Mercurii dulc. gr. xv. ad ʒj.

Scamm. sulphurat. gr. jv. vel v. ad ʒʒ.

Misc. sub forma pulveris pro dosi una.

D. S.

*Pulvis laxativus pro una vice.*

Ex quo cum Conserva florum anthos etiam Bolus parari potest.

Vel

℞. Conf. flor. anthos ʒj.

Pulv. rad. lalapp. ʒʒ.

Mercurii dulc. gr. xv.

Cum f. q. syr. pomor.

F. Bolus S.

*Saccharum laxativum pro una vice.*

Potest etiam acicum gr. iij. scammonii rosati.

Invulgari usu sunt Pilulæ Cochiz, Arabicæ, scetidæ, imprimis in Convulsionibus partium internarum, suffocatione uterina, & similibus; Optimè conducunt ad gr. xv. præscribuntur cum stimulo appropriato, addito Mercurio dulci; aut, quod convenientius est, pulvis panchymagogus mineralis Hartmanni ex Mercurio dulci cum Mercurio vitæ, forti ac largâ trituratione probe uniti evadunt egregium laxativum per inferiora; amittit enim sic Mercurius vitæ vim vomitoriæ, quatenus hæc corrigitur ab acido salis in Mercurio dulci, & fit *Pulvis purgans antimonialis mercurialis* optimus, qui subinde cum aliis miscetur: Vid. HARTMANNUS in *praxi Chymiatr. ubi de Purgantibus Mineralibus*.

Quod ergo attinet *specificis antiepilepticis*, ex toto acervo & cumulo omnium antiepilepticorum (cùm nullus sit Medicus Practicus, qui non habeat suum specificum antiepilepticum) tantùm pauca & magis probata referam. Eminent ex Regno Vegetabili imprimis ruta, Dentaria, anagallis, hyssopus, cujus infusum cum spiritu vini RULANDUS Cent. 10. Curat. 95. commendat: *Pæonia* jam à GALENI temporibus laudata, eaque mas, seu quæ conspicietur foliis latioribus & magis rotundis (nam semina habet folia longiora & magis acuta) cujus radix, sole in leone existente, tempore meridiei, mense Martio vel Aprili in ariete, vel luna & sole in ariete existentibus, ante solis ortum lunâ decrescente collecta mirabilis est ad curam Epilepsiæ, tam pulverisata ad ʒj. interius usurpata, ejusque aqua & Syrupus, quàm eadem appensa & instar amuleti gestata; aut grana seu semina nigra *Pæonia* interno usu laudata in forma emulsionis. Ratio, quod in defœtitudine abiit, fuit deficiens selectus. Certè mirabile simplex est hæc *Pæonia*, vi ad epilepsiam specificâ certo tempore collecta. Expertus est ejus vim amuleticam, jam suo tempore GALENUS, cujus experientiam confirmat FORESTUS l. 10. obs. 69. sicuti etiam videndus est BARTHOLINUS Cent. 4. Hist. 69. Et experimentum hujus rei de vi amuletica *Pæonia* habetur etiam in RIVERO, *Observat. à D. des GRANDS PREZ* communicata: Vid. item SIMON BERGER de *Pæonia*, qui quinque tempora habet colligendi, ut & HARTMANNUS pag. 71. Amicus retulit, se aliquoties radice maris *Pæonia*, effusa die Julij 33 intra horam undecimam & duodecimam, amuleti instar appensa aliquoties curasse Epilepsiam; tunc nempe temporis ordinariò sol leonem ingreditur: Conf. M. A. N. C. Ann. 6. & 7. Append pag. 63. Sic quidam Medicus veteranus Anglus optimo cum successu usurpavit *pæoniam* marem appensam contra vertiginem optimo cum successu. Post *pæoniam* est imprimis *lilium convallium*, egregium ad Epilepsiam specificum, cujus aqua & spiritus legitime paratus, non tamen sulphureus per fermentationem, sed ad imitationem LINDANI paratus, & essentia legitime parata, sunt optima. Ut autem legitime destilletur *Lilium convallium*, iubet LINDANUS recipere flores liliorum convallium bene maturos, adhuc rore matutino madidos (cùm in hoc rore singularis vis lateat) ante solis ortum; hinc proti-

Estmull. Oper. Tom. II.

nus, atque collecti fuerint, abscondendi à suis petiolis & immittendi in lagenam, lisque affundatur vinum Hispanicum, lagena bene claudatur, deinde ita per cucurbitam destilletur aqua egregiè spirituosâ, quæ recentibus floribus, similiter rore madentibus affundatur, & in balneo iterum abstrahatur, idque aliquoties ita repetatur, donec acquiratur spiritus liliorum convallium egregius & antiepilepticus: qui postmodum castoreo affusus, suggerit vel destillando spiritum, vel extrahendo essentiam castorei, ad epilepsiam egregiam, quæ à ʒʒ. vel ʒj. potest dari adulto, prout fortior vel debilior fuerit. In usu etiam sunt flores lavendulæ, Pæoniæ, hyperici, anethi, radix angelicæ, Valerianæ sylvestris, annotante PANAROLO *Pentec. 1. obs. 33.* antequam caulem contrahant; Vincetoxici, acori, de quo vid. HEURNIUS in *Secl. 1. Aphor. 44.* bryoniæ, cujus succum REUSNERUS *Obs. 158.* commendat: Semen Saponariæ ante paroxysmum assumptum, semelque in mense per tria novilunia ad ʒj. paroxysmos valde imminuere; & ruta M. j. in vini amphora infusa, & per tres dies sumptæ, idem præstare observavit BORELLVS Cent. 1. obs. 18. Quin & si appendatur viscus corylinus, amuleti instar contra Epilepsiam laudatur: Nam in corylo multa latent, unde etiam ex ligno coryli justo tempore collecto RVLANDVS destillat suum oleum famosum & spiritum, *Heraclium* dictum, cujus stupendos effectus videbitis in eius *Praxi Empirica*, & *Thesaurò Practico*. Hinc etiam ruli corylini turgent sulphure vegetabili, quod spargunt tempore verno, & mirabile est specificum ad Epilepsias infantum. Ante triennium rustica uirgo erat ab octo annis paroxysmo epileptico quotidie correpta, cui cùm menses ritè fluerent, præmissio vehementi vomitorio, quo varia & copiosa excrevit, post usurpauit viscum corylinum, quo ter uel quater repetito, paroxysmi cessarunt, & quoties eundem percipiebat recurrere, hunc pulverem sumebat, *coque sentiebat, quomodo supprimebat*: usu huius pulveris per tres menses sana fuit, sed postmodum morbus superuenit contagiosus, quo interit. Ante biennium uirgo pauperula hic erat, quam epilepsia affligerat à tenera ætate usque ad duodecim annos: præmissio vomitorio dedit ad gr. vj. tartari emetici: Melancholica simul erat; et si Epilepsia non affligeret, melancholica erat, & semper per plures menses sine omni somno erat: ipsa tamen post pulverem coryli, sub introitu lecti assumptum, dormire incipiebat ab hora nona vesperti usque ad secundam pomeridianam diei sequentis, quod miratus fui: Surgebat cum euphoria mitis, tamen adhuc melancholica: Continuato pulvere Epilepsia cessabat, omni tamen novilunio redibat; ipsa tamen plus minus melancholica existente ultra quadrantem anni, ita ut etiam aliquando super gdes præcipientem se dederit, unde interit. Lignum sanctum, sassafras, item viscus quercinus, inter 15. Augusti & 8. Septembris collectus, hinc tiliaceus, & qui omnium optimus est corylinus, qui plus habet in recessu, nobilissima sunt remedia contra Epilepsiam contumacem, seu habitualement inueteratam, præmissis præsertim vomitoriis, multum conferunt, pulverisati à ʒ. ad ʒj. sunt enim leues usci: in aqua appropriata assumptus viscus quercinus nobilissimum est ad convulsus spasmos specificum BOYLEI pag. 185. in *Philosophia Experimental*: quæ ipsa tamen potiori iure intelligenda de visco corylino, qui quercino adhuc potentior est, mense Martio decrescente lunâ collecto; qui pulverisatus à ʒʒ. ad ʒj. propinatus non satus decantatum est specificum ad epilepsiam, dormiunt post usum, & quando ante paroxysmum assumunt, subito supprimit: in omni epilepsia, nisi summe sit rebellis, optimum est: Vid. HARTMANNVS loc. alleg. Sed observandum, huiusmodi viscos repetitobus fingere & concentrare fermentum epilepticum in sua quasi minera, unde facile fieri potest, ut alii morbi, præsertim febres acutæ, exinde superveniant; quippe post eorum usum subiungenda sunt subinde Purgantia, ne quid remaneat, quod alios morbos inferre queat: Vid. *Diss. de Precipitantium Usu & Abusu cap. 3. §. 4.* Quin & instar amuleti appensus idem viscus quercinus, similiter est admodum laudatus. *Viscus tiliaceus* in memoria revocaturam Epilepsiam per acidulas vegetabiles ex tilia, de quo vid. Misc. A. N. C. Ann. 6. & 7. Append pag. 52. Vix cedit his lignis lignum buxi, ita ut etiam oleum buxi destillatum habeatur succedaneum olei ligni *Heraclini*, & quod etiam in hujus defectu commodè substitui

Zz

potest,



potest, si à gutt. 4. 7. 8. 9. ad 10. in aqua florum tiliæ ad aliquot dies propinetur, vi anodynâ & nonnihil narcoticâ celebre: vid. FONSECA, qui internè propinat aliquot guttas, & imminente paroxysmo externè illitum commendatur etiam; loco quorum autem oleum destillatum succini non incongruè substituitur. Pertinet huc fungus quercinus, de quo vid. BORELLUS Cent. 2. observat. 95. cerasa nigra, acetum, spiritus cerasorum nigrorum, de quo vid. RIVELLIUS Cent. 4. observat. 10. asa foetida, camphora, spiritus fuliginis, extractum & essentia agallochi. Post hæc singulare quid obtinet sulphur vegetabile, quod colligitur ex *lycopodio seu musco terrestri clavato*: nobile est antiepilepticum, præsertim pro infantibus. Colligatur mense Augusto. Nobilius tamen est sulphur simile tempore verno ex *julis corylicol-lectum*. Sulphura hæc sunt remedia non inelegantia ad morbos convulsivos, dosi ʒi. ad ʒi. & singulari vi pollut acidum destruendi, quod excitat epilepsiam per consensum: Imprimis in iunioribus sunt elegantia: Vid. M. A. N. C. Ann. 1. observat. 97. pag. 225. seqq. & Ann. 3. observat. 15. Pulvis hic maximè inflammabilis est; si enim candelæ admoveatur, strepitum instar bombardæ dat. *Carbo Artemisæ rubræ* circa festum S. Iohannis, ipso potius S. Iohannis die ante solisortum, circa meridiem, sub eius radice effossus, etiam nobile est specificum ad Epilepsiam, uri per experientiam in Illustri persona factam allegat PETRÆUS in Diss. Harmonic. lib. 1. Dissert. 6. §. 33. pag. 83. ut etiam JOEL in Praxi de Epilepsi. pag. 85. idem refert de carbonibus sub artemisia effossis: & quidem dicit, tantummodò reperiri die Festi S. Iohannis, alio tempore non. Putavi prius, esse fabulam: nihilominus novi mulierem, quæ fodiendo sub artemisia rubra invenit carbonem, & mihi monstravit, quibus egregiè curavit aliquot pueros epilepticos cum aqua florum tiliæ propinatis. Quod sint? vid. DECKERS in Comment. in Praxin Barbettianam, ubi de Epilepsia pag. 7. qui fraudem detexit, quod sint radices annosæ artemisæ, quas vulgus pro carbonibus peculiaribus habet. De floribus tiliæ res nota est, quod sint optimum ad epilepsiam remedium; unde liquor radicis tiliæ, de quo vid. TILMANNUS de Mat. Medica, & aqua & spiritus florum tiliæ sunt in vulgatissimo usu. Florum Amaranthi conservâ cum oleo succini feliciter est usus PETRUS ASSELINÆUS; vid. VEL-SCHIUS l. a. No 10. Syrupus Nicotianæ mirificè commendatur à ZACUTO LUSITANO lib. 1. Prax. Admir. obs. 23. & 24. paratus nempe ex succo foliorum viridum cum melle: Hoc Syrupus, aliis omnibus irritis remediis, pertinacissimam Epilepsiam, quotidie quadraginta dierum spatio assumpto, curavit. Primaria ferè hæc sunt ex regno vegetabili, quibus tamen subinde etiam alia remedia cephalica quæcunque in specie & aromatica ex eodem regno addi possunt; Ex hisce enim emergunt compositiones aquarum epilepticarum admodum multiplicium, ut aqua epileptica Langii, Kolreuteri, Dorncreilii, & similes aliæ. Modus præparandi pro varietate Autorum variat: Exempli gratia sic sequens aqua cephalica, epileptica & apoplectica:

24. Herb. & flor. salviæ ʒvi. ad ʒviii.  
Flor. lil. convall. ʒiii.  
Lavend. odorat. ʒi. ad ʒii.  
Rad. Peon. mar. ʒii. ad ʒiii.  
Fol. & flor. Maioran. ʒi. ad ʒi.  
Cinnam. elect. ʒii.  
Cubebar. ʒʒ.  
Carophyll. ʒiil.  
Macis ʒii.

Infund. cum Vin. Maluat. aut Rhenan. opt.

Macerentur per dies & noctes 14. hinc destillentur in Balneo Marie.

Potest parari cum & sine castoreo: Item post rectificationem potest addi q. l. de spiritus salis ammoniaci, vel simili volatili, ut fiat remedium ed generosius. Qui novit materiam Medicam, facile potest combinare tales aquas.

Ex Regno Animalis ad epilepsiam commendantur imprimis remedia humana seu ab homine desumpta; quæ inter eminent sanguis humanus, & remedia ex hoc parata, spiritus nempe, sal volatile & oleum, specifica sunt hæc remedia, imprimis spiritus sanguinis humani cum sale volatili acuat, qui etiam tanquam nobilissimum remedium in Epilepsia hereditaria, si quid aliud, conferre dicitur ab

HELMONTIO, in quo quamplurimi Practicorum consentiunt. Sed observandum secundum LINDANUM, eligendum esse sanguinem humanum ab homine recenter decollato collectum, \*cui alius sanguis vix talem efficaciam habeat, qui vel per se destillandus, vel in vase vitreo prius cum paucis spiritu vini circulandus, & ita lege artis in spiritum, sal volatile ac oleum destillandus, remedium, quod ritè paratum est egregium ad Epilepsiam & Apoplexiam commendatissimum. Ipse reddit rationem hanc, quod scilicet in homine decollato præ metu mortis spiritus eius quasi coaguletur & concentretur. Quicquid sit, hoc certum est, quod spiritus & sal volatile sanguinis humani sint decantata ad Epilepsiam remedia. B. Doctor MICHAELIS sanguinem dicto modo collectum & congruatum decantato sero deponebat, donec situm contraheret; Sic enim copiosiores spiritum ac sal volatile eliciebat, quo sæpius utebatur in Epilepsia, nunc solo, nunc cum spiritu vitrioli cephalico (de quo postmodum) evadit exinde mistura subviridis & subcærulea cæcærulea elegans, qua ipsa etiam hereditarios epilepticas se curasse idem testabatur. Post sanguinem humanum est imprimis Secundina humana, quæ putrefacta dat spiritum volatilem, qui præter effectus singularissimos in affectibus mulierum, præsertim puerperarum lochiis, Epilepsiam potenter curat: Secretum fuit CNOEFFELII, quo aliquando Rex Poloniæ fuit curatus: Datur dosi à guttis xv. ad xxx. xl. vel ʒʒ. sub insignibus lunæ mutationibus. Vel ipsa secundina in elibano blandè torrefacta, pulverisata dosi ʒʒ. ad ʒi. luna imprimis decresciente in aqua spirituosâ florum tiliæ aut liliorum convallium propinanda venit. Sequitur cranium humanum ex homine violenter interempto desumptum, in specie quidem os triangulare vel triquetrum ex concursu futuræ sagittalis & lambdoideæ, quod iuxta PARACELSUM in Epilepticis reperitur, tam rasurâ eius simpliciter pulverisata, quàm quocunque modo præparatum, vel Philosophicè aut cum igne calcinatum, vel, quod omnium optimum, eiusdem sal volatile ac spiritus-urinosus, sale volatili concentrato turgidus, egregiè conducunt ad curandam Epilepsiam. Cranium sine igne, aut solum præparatum, datur à ʒi. ad ʒʒ. ʒii. & ʒi. spiritus vero prout fortis vel debilis à gutt. xv. xxx. ad ʒʒ. & ʒi. Sal volatile à ʒʒ. gr. xv. ad ʒi. Primus hæc manifestavit PARACELSVS, qui præter gelatinam, spiritum & sal volatile, oleum cranii humani, quod simul prodit per distillationem, rectificatum à capite mortuo, & verticij iunctum, præsentissimum dicit remedium ad arcendum paroxysmum epilepticum (quod credo; est enim sal volatile concentratum.) Quin & oleum succini, aut succinum permixtum cum cranio humano pulverisato, de novo destillatum forti igne gradatim, dat oleum antiepilepticum penetrans & excellens. Si fœtor est inimicus, circuletur oleum prius ante usum aliquamdiu cum spiritu vini rectificato vel tartarisato, & ita cum eodem leni igne à calcinatis destillentur, dat oleum suavius, & egregiè penetrans. Juxta cranium, cerebrum humanum est egregium antiepilepticum, cuius spiritus & oleum ad imitationem HARTMANNI præparata sunt egregia antiepileptica. Hæc ipsa pariter & multo magis de Usua cranii humani, ex patibulo seu capite rota fracti collecta, intelligenda sunt, in qua confermentata est mumia capitis microcosmici, egregia contra Epilepsiam. Quin & ossa hominis reliqua, ex homine violenter occiso desumpta, destillata aut præparata, ad affectus convulsivos sunt egregia; uti & aliorum animalium partes osses & coracæ, imprimis unicornu marinum, dens hippopotami seu equi marini, spina muscæ piscis, dens lupi, lapilli carpiorum, rasura cornu cervi, unicornu fossile, & ex his quæcunque præparata, salia etiam volatilia, spiritus cornu cervi, item liquor cornu cervi succinatus, sunt egregia antiepileptica. Dens hippopotami (vid. WORMIUS in Musco) est durissimus, & singulare specificum in Convulsionibus quæcunque per consensum abdominis, qui præparatus sine igne, aut ex eo destillatum sal volatile, mirè confert ad convulsivos affectus, pariter internos & externos. Externe quoque ex hoc dente à quibusdam sunt annuli, (vid. WERNERUS) qui membro seu digito convulso inserti, aut etiam digitis pedum, in spasmo statulento sive cramba applicati, imprimis gravidarum, sunt perquam proficui. Laudantur etiam hepata ranarum viri-



viridium, de quorum preparatione vid. HARTMAN-  
NI *Prax. pag. 67.* & FINCKII *Encheir. Pract. pag. 29.* coa-  
gulum leporis, cornuicam ova, pulvis millepedum,  
hepar lupi, cuius usu quendam epilepticum perfecte sana-  
tum fuisse, qui postmodum multos similiter hoc reme-  
dio curavit, vid. BORELLUS *Cent. 2. obs. 95.* testiculi  
apri, vid. AVGENIUS *Tom. 2. l. 8. Epist. 2.* fel catuli ni-  
gri, vid. UNZERUS *de Epilepsia pag. 245.* corpus thur-  
is simile, quod in acervis formicarum reperitur, vid.  
REUSNERVS *obs. 15.* picæ, corvus combustus, & mus  
calcinatus, vid. *Idem obs. 13.* & 152. materia, quam  
pullus equinus vomitu relicte, vid. HIERONYMUS  
DONZERINUS *l. 6. Consil. 35.* à SCHULZ.O editus:  
spiritus urinæ, sanguis leporis in venatione probe agitati,  
hinc pavore capti & iugulati, collectus & exsiccatus, ad  
3l. assumptus, singulare HELMONTII est remedium;  
aut sumatur linteum eo tinctum, infundatur inhaustum  
vini, donec omnis color extractus, postmodum hauria-  
tur, & remedium erit planè singulare. Pertinet huc ca-  
storeum, nobile & singulare antiepilepticum, & ad affe-  
ctus quoscunque nervorum, imprimis quidem, si ad imi-  
tationem BARBETTE *cap. 1. Prax.* iunctum salibus vo-  
latilibus infundatur in spiritu vini, vel liquore alio spi-  
rituoso salino-volatili urinoso, quæ Essentia cum aqua cin-  
namomi vel salviæ est nobilis: v. g.

24. Salis vol. succin.

Cran. human. an. 3l.

Castor. 3ii.

Infund. in f. q. spiritus vini. Digerantur & cir-  
cutentur; sic exinde Tinctura antiepileptica  
elegans.

Vel spiritus salis ammoniaci vinosus cum calce viva &  
spiritu vini paratus, castoreo affusus, egregiam quoque  
Essentiam & Tincturam extrahit. Imprimis autem con-  
venit castoreum eiusque Essentia, uti & ex castoreo &  
asa foetida cum tinctura aut spiritu tartari parata, in  
Epilepsia & Convulsionibus internis seu spasmodicis partium  
internarum, per consensum abdominis & viscerum infe-  
riorum enatis: quales sunt colica convulsiva, suffocatio  
hypochondriaca, hysterica, & similes: sicut etiam in  
quacunque partium Convulsione tonica ab omnibus auto-  
ribus mirè commendatur externè usurpatum; quin &  
applicatum castoreum cum clysteribus in Epilepsia inter-  
dum admodum conducit. Quæ *suprà cap. 2. de vertigine*  
dicta fuerunt de *stercore pavonis*, & ipsa similiter valent  
in Epilepsia, in qua non minoris pretii est pavonis ster-  
cus. Videbitis egregiè de hoc differentem SCHOL-  
ZIVM *Conf. 42.* BORELLVM *Cent. 3. Observat.*  
13. qui habet experientiam de cura Epilepsia per stercus  
pavonis, quacunque ratione applicetur; si in substan-  
tia sub forma pulveris cum appropriatis; si in infundatur  
in vino, maceretur & propinetur. De alce, eiusque  
ungula, horumque salibus volatilibus & spiritibus, de  
hirundinibus, & earum aqua cum & sine castoreo, nil  
dico, cum hæc per se nobilissima sint, quod conveniant  
singulariter in Epilepsia. Adhuc ova cornuicis huc per-  
tinent, quæ exsiccata, & pulverisata ad 3ß. propinata,  
sunt expertum specificum HOEFERI in *Herc. Med. pag.*  
12. De his & similibus ex animali regno antiepilepticis re-  
mediis iudicium videbitis in LVDÓVICI *Pharm. pag.*  
932.

Pergo ad REGNUM MINERALE, in quo prima-  
tum ducunt ad curam morborum convulsuorum sulphu-  
ra antimonii plus minus fixa, de natura solis participan-  
tia, quæ præ aliis decantata sunt; partim quod generalem  
habeant vim temperandi quodcunque acre excessuum;  
partim quod similiter singularem habeant ulmanodynam,  
adeoque spirituum animalium feroces motus sedent, ubi  
sulphur antimonii fixum multum in recessu habeat; par-  
tim etiam, quod vi emetica tollant fomitem morbi, si  
est in primis viis. Observatum enim est, si fomes fuerit  
in primis viis, excitasse vomitus, hinc fomitem sublato,  
vomitus non amplius movisse. Hæc inter eminet primò  
cinnabaris antimonii, aliàs magnes Epilepsia appellata,  
quæ insignes virescunt magnè Epilepsiam obtinet: sed  
necesse est, legitimè sit preparata, & aliquoties subliman-  
do ab omni volatili sulphure purgata & separata, accum  
aqua spirituosâ quacunque in aëre libero super porphy-  
ritidem laevigata. Optimum est, in specie si superveniunt  
Epilepsia aut motus convulsivi morbis acutis, ubi nunc  
solitariè usurpatur, nunc cum salibus volatilibus, cum

Ettemull. Oper. Tom. II.

quibus eius color augetur. Qui norunt ex hac cinnabari  
parare cum spiritu quodam vegetabili tincturam, habe-  
bunt egregiè antiepilepticam. Huc facit remedium, quod  
vocatur quibusdam Astrum Mercurii secretum, factum  
ex cinnabari antimonii beneficio menstrui ex nitro &  
sale gemmæ parati, quod tandem precipitatur in crystallos  
auratas instar croci, quæ mirificè conveniunt in Epilep-  
sia. Verum præter cinnabarum hanc antimoniale adhuc  
est subtilissimum & fixius sulphur antimonii, ex scorpiis  
reguli antimonii; dum nempe more solito per secundam  
precipitationem ex his separatam fuit sulphur antimo-  
nii, auratum dictum, adhuc semel ex liquore isto fil-  
trato simultaneâ iniectione aceti destillari & spiritus uri-  
næ aut salis ammoniaci precipitatur sulphur subtilissi-  
mum & admodum elegans, coloris aurantium, quod  
in minima dosi, ad unum alterumve granum, mirabiles  
effectus anodyno-epilepticos exerit in curanda Epilepsia  
infantum & adultorum, & cinnabarum antimonii longè  
superat. Interdum ratione circumstantiarum prius facit  
vomitus, interdum prius somnum, interdum sudorem;  
in aliquot Epilepsia in febribus beneficio huius sulphuris  
nobile vidi effectus. Dosis infanti unius anni ad usque  
duos gr. si ad gr. i. adultis 9. vel 10. annorum, gr. iii.  
præter propter. Juxta antimonii cinnabarum etiam cinnabaris  
nativa selectior, & ex eadem parata remedia va-  
ria, non infimæ notæ erunt. Cinnabaris hæc nativa  
Ungarica multum de sole habet, & optimè cinnabari an-  
timonii substituitur, vel coctione vel lotionem purgata,  
merito dicitur à Cratonè Magnes Epilepsia. Post fixa  
antimonialia commendatur etiam minera argentea instar  
rubini transparens, Germanicè Roth gulden Erztz. Vi-  
triolum optimum est remedium, mirè commendatum à  
PARACELSO ad eorundem Epilepsia: Sed hæc intelli-  
genda sunt de eius substantia sulphurea, sulphure vitrioli  
anodyno fixo, de quo tantæ laudes HELMON-  
TII hinc inde prostant; & deinde etiam de spiritu vi-  
trioli volatili egregiè sulphureo-anodyno, qui per novum  
alembicum est prolektus, uti loquitur PARACEL-  
SVS. Hic spiritus vitrioli est genuinum ingrediens mix-  
turæ simplicis, quam PARACELSVS sub nomine *Spe-*  
*cifici in Peracutis*, primum commendavit ad affectus  
epilepticos; non vulgarem istam, spiritibus nullis pre-  
titi adulteratam. Spiritum enim vitrioli volatilem cum  
spiritu tartari volatili, & spiritu theriacali camphorato  
miscuit. In Officiis ingreditur *Mixturam simplicem* spi-  
ritus vitrioli, non volatilis sed corrosivus, item phlegma  
ex tartaro; unde est impostoria composita. Modi ad hunc  
spiritum vitrioli volatilem acquirendum sunt varii. Nota  
ejus est, ut ipsum phlegma sub distillatione striatum an-  
tecedat: (Stria sunt signum spiritus) propterea eligendum  
imprimis vitriolum in aëre blandè calcinatum, sub qua  
blanda calcinatione phlegma eiusdem aquosum sensim  
exhalet, simulque aliquali vitrioli eiusque subtilioris sul-  
phuris per aërem resolutione, faciliter spiritus vitrioli  
volatilis egressus. Alii recipere malunt caput mor-  
tuum vitrioli, quod aliquamdiu aëri expositum, ac ita  
de novo imprægnatum fuit. Cùm verò non omnibus  
æquè liceat parare eiusmodi spiritus volatiles, ob id eli-  
guntur ii, qui proximè ad eos accedunt, quos inter emi-  
nent volatilisationes vitrioli beneficio *urina humane* aut  
beneficio *spirituum volatilium vegetabilium*. Quoad uri-  
nam humanam: notus est spiritus vitrioli volatilis ante-  
pilepticus, è vitriolo Veneris cum urina humane præ-  
paratus juxta QUERCETANI descriptionem in  
*Tetr.* quæ etiam reperitur in HARTMANNO. Nempe calcinetur vitriolum in sole, donec perfecte  
albefcat; (id quod fit optimè in diebus canicularibus  
mense Julio & Augusto, quod etiam paratur pulvis sym-  
patheticus) deinde spiritus urinæ, qui absque fermenta-  
tione paratur, ipsi commisceatur, ut ex mistura vi-  
triolum instar pultis evadat. Ex hoc tunc destillatur or-  
dine spiritus ex arena igne tamen paulò fortiori. Hic  
postmodum quinquies bene est rectificandus, & sit spi-  
ritus vitrioli antiepilepticus non inelegans. Hic spiritus  
est maximè sulphureus volatilis salis, non acidus, de  
quo retulit D. MICHAELIS, se etiam huius  
usu Epilepsiam hæreditariam curasse. Nam in hoc sul-  
phur vitrioli metallicum ab alcali urinæ dissolvitur, ita  
ut cum eodem & spiritu acido proprio in forma spirituo-  
sa sulphur vitrioli volatile extraxeretur, elegantem spiri-  
tum vitrioli volatilem epilepticum constituat. Dixi etiam



quod volatilis spiritus vitrioli beneficio spirituum volatiliū, qua ratione spiritus epileptici & cephalici nostrates sunt: V. g. paratur spiritus vitrioli epilepticus aut cephalicus ad imitationem D. MICHAELIS, qui

*℞. Vitriolum Ungaricum dephlegmatum in Balneo Mariae & pulverisatum;*

Illudque irrorat cum spiritu vegetabili composito cephalico vel epileptico, id est, cum spiritu vini à vegetabilibus cephalicis & aromaticis post præviam digestionem abstracto. Permittentur hæc ad consistentiam pulvis spissioris, destillantur per retortam in igne aperto, more consueti; spiritus qui prodit, adhuc aliquamdiu digeratur in loco calido, hinc rectificetur per alembicum in arena, & prodit primò spiritus volatilis striatus quodammodo nebulosus, quem insequuntur guttæ phlegmaticæ: quibus apparentibus mutetur receptaculum & seorsim capiatur phlegma: quo cessante, & dum nebulæ postmodum denuò surgunt, & sapor acidulus se manifestat, novum applicetur receptaculum, & capiatur spiritus volatiles nebulosi, & ita sub nomine spiritus vitrioli epileptici vel cephalici admodum egregie asservetur, qui est iste, miscendus cum spiritu sanguinis humani ad curam Epilepsiæ hæreditariæ, ut antea monui.

Loco vitrioli crudi dephlegmati sæpe etiam accipit caput mortuum vitrioli per regenerationem denuò ab aëre impregnatum, & cum spiritu vegetabili cephalico imbibitum ad consistentiam pulvis, dicto modo tractavit.

Sic quidam miscent vitriolum Hungaricum cum rasura cranii humani, & destillant.

Tandem inter mineralia est adhuc succinum, ejusque essentia cum spiritu vini extracta, sal volatile ac oleum, egregia & potentia ad integrum systema nervorum, & Epilepsiam, & convulsiva pathemata remedia, imprimis in febribus malignis & affectibus hystericis superveniant. Hinc liquor cornu cervi succinatus, tam solitarius, quam idem liquor aut sal volatile succini eadem methodo cum spiritu sanguinis humani mistum, sunt compositiones egregie in & extra paroxysmum: Nam in cura Epilepsiæ necessaria sunt, quæ cum impetu quodam penetrant. Quibus ipsis interdum camphora additur, quæ figit quodammodo spiritus animales, & ad motum naturalem reducit eosdem: Unde & camphora vim somniferam obtinet: Sicut & HARTMANNI secretum in Epilepsia & suffocatione uteri, seu molestia quavis uteri ex laudano opiato & camphora, quod medicamentum ante paroxysmum, præservationis gratiâ porrigi potest. Crystallus denique montana præparata in Epilepsia per consensum abdominis ubi est opus forti penetrantioris acidi absorptione, multum præstat.

Ex modò dictis simplicibus & similibus plures & innumerabiles ferè possunt fieri compositiones & formula antiepileptica: verbi gratia

*℞. Aqua Ceras. nigr.*

*Lil. convall. an. ℥ss.*

*Epil. Lang. ℥j.*

*Liqu. cornu cervi succin. vel spiritus cran. hum. rectif. ℥j.*

*Syr. flor. rum. ℥j.*

*M. D. S.*

*Potio antiepileptica.*

*℞. Aqua flor. tilia,*

*Salvia,*

*Cerasor. nigr. vel Meliss. à ℥j. vel ℥ij.*

*Liqu. cornu cervi succin. ℥ij.*

*Spiritus theriacal. camph. vel Ess. castor. ℥j. ad ℥ss.*

*Ess. Opii ℥j.*

*Syrup. flor. Paon. ℥j.*

*M. S.*

*Ut supra.*

De quoter vel quater de die, duo, tria, vel quatuor dentur cochlearia pro dosi.

Vel

*℞. Aqua Etyphis cervi. ℥j.*

*Cerebr. human. spiritusnos. ℥j.*

*Spiritus sangu. hum. ℥ss.*

*Cran. human. præp. ℥j.*

*Salis vol. Cran. hum. gr. xv.*

*Succin. ℥ss. ad gr. xij.*

*Land. opiat. gr. iij. vel v.*

*Syr. Stachad. Arab. ℥j.*

*M. S.*

*Ut supra.*

Item:

*℞. Aqua flor. Paon. ℥ij.*

*Cerebr. hum. cum vin. ℥vj.*

*Spiritus sangu. hum. essent. ℥ss.*

*Unicorn. ver. præp. ℥j.*

*Cinnab. antimonii ℥ss.*

*Landi opiat. gr. ij.*

*Syr. Stachad. Arab. ℥ss.*

*M. S. ut supra.*

*℞. Aqua flor. Paon.*

*Tilia an. ℥j.*

*Cinnam. spiritusnos. ℥ss.*

*Cornu cervi sine igne ℥j.*

*Cinnab. nativ.*

*Bezoard. miner. an. ℥ss.*

*Land. hyst. gr. v.*

*Syr. flor. Paon. ℥ss.*

*M. S.*

*Ut supra.*

*℞. Aqua flor. Paon. ℥ij.*

*Visc. corylin. ℥j.*

*Cinn. nativ.*

*Bezoard. miner. an. ℥ss.*

*Land. hyst. gr. vi.*

*Syr. flor. Paon. ℥ss.*

*M. S. ut supra.*

Dosis cochl. i. quater vel bis in die.

*℞. Aqua fanicul.*

*Flor. Tilia an. ℥j.*

*Spiritus sal. ammoniac.*

*Liqu. cornu cervi succin. an. ℥ss.*

*Ess. Castor. ℥j.*

*Syr. Papav. simpl.*

*Stachad. Arab. an. ℥ss.*

*M. S. ut supra.*

*℞. Aqua flor. Paon. ℥ij.*

*Puleg. ℥j.*

*Aqua apopl. vel Epilept. Lang. ℥vj.*

*Salis vol. cornu cervi gr. xii.*

*Succin. gr. vi.*

*Syr. flor. Paon. ℥ij. vel ℥ss.*

*M. S. ut supra.*

*℞. Aqua Meliss. ℥ij.*

*Salvia ℥j.*

*Ess. Cast. ℥j.*

*Liqu. cornu cervi succin. ℥j.*

*Syr. flor. Paon. ℥ss.*

*M. S. ut supra.*

*℞. Cinnab. antimonii ℥ss.*

*Salis vol. succini gr. xii.*

*Land. opiat. ferm. gr. ii. vel iii.*

*M. f. Pulvis:*

*div. in 2. part. æqu. S.*

*Pulvis contra epilepsiam.*

Vehiculum sic:

*℞. Aqua salvia,*

*Lil. convall. an. ℥j.*

*Spirit. lil. convall.*

*Ceras. nigr. an. ℥ss.*

*M. S.*

*Aqua ad pulverem.*

*℞. Cran. human. sine igne ℥j.*

*Cinnab. antimonii ℥ss. vel ℥ij.*

*Salis vol. cornu cervi gr. xii.*

*Succin. gr. vi.*

*M. f. pulv.*

*div. in 4. part. æqu. S.*

*Pulvis caput confortans.*

*℞. Cinnab. antimonii gr. xv.*

*Salis vol. cornu cervi,*

*Viperar. an. gr. iv.*

*Camph. gr. ii. vel iij.*

*M. f. pulv.*

*D. S. ut antea.*

*℞. Antimonii diaphor.*

*Cinnab. nativ.*

*Succin. præp. an. gr. viiij. ad ℥ss.*

*Salis vol. Succin. gr. iij. ad v.*

*Land.*



*Land. opiat. gr. i.*

*M. f. pulvis.*

*D. S. ut supra.*

*℥. Cinnab. antimonii,*

*Succin. prap. an. ℥j.*

*Castor. gr. xij.*

*Salis vol. succin.*

*Cornu cervi an. ℥℥*

*Camph. gr. liij.*

*M. f. pulvis:*

*dia. in 3. part.*

*D. S. ut supra.*

*℥. Cran. human. sine igne ℥j.*

*Cinnab. antimonii ℥℥.*

*Castor. gr. xv.*

*Salis vol. Cornu cervi,*

*Succin. an. ℥℥.*

*M. f. pulvis pro aliquot dosibus,*

*D. S. ut supra.*

*Horum vehiculum sit:*

*℥. Aquae lil. convall.*

*Ceras. nigr.*

*Flor. lilae an. ℥j.*

*Ess. flor. anthos. vel castor. ℥ss. ad ℥ij. vel ℥iij.*

*Spiritus cram. human. essent. ℥j.*

*Syr. flor. Tunic. ℥vj. vel ℥j.*

*M. pro vehiculo. S.*

*Aqua ad pulverem.*

*In quo caplatur praefatus pulvis, vel pulvis epilepticus Lædonici in Pharm. pag. 642. vel pulvis ex secunda humana in Coll. Pharm. in Schraderum P. 2. p. ...*

*Vel*

*℥. Cran. human. pulveris.*

*Cinn. antimonii vel nativ. ℥℥.*

*Salis vol. Cornu cervi gr. vj.*

*Succin. gr. liij.*

*Land. opiat. gr. ij. vel liij.*

*M. f. pulvis:*

*divid. in 3. part. æqu. S.*

*Pulvis epilepticus.*

*Vel*

*℥. Cran. human. sine igne,*

*Unic. marin. an. ℥j.*

*Cinn. antimonii ℥ss. ad ℥ll.*

*Salis vol. Succini,*

*Cornu cervi an. gr. ix.*

*Camph. gr. liij.*

*M. f. pulv. pro tribus vel quatuor dosibus.*

*D. S.*

*Ut supra.*

*Caplatur in vehiculo sequenti:*

*℥. Aquae lil. convall. ℥iij.*

*Apopl. vel epil. ℥ss.*

*Syr. flor. Peon. vel tunic. ℥vi.*

*M. S.*

*Potio ad pulverem.*

*Vel*

*℥. Aqua flor. Peon. ℥ss.*

*Cinnam. ℥j.*

*M. S.*

*Ut antè.*

*Inter Externa ad Epilepsiam commendata eminent Amuleta: quæ inter primatum obtinet sambucus super salicem crescens, cuius applicandi rationem & usum videb. in HARTMANNI Praxi Chym. ubi de Epileps. SIMONIS PAULI Quadrip. Botan. class. 2. pag. 140. Experimentum verò egregium eius videb. in BARTHO. LINO Cent. 4. observat. 69. Pica cacat super salicem, inde crescunt rami sambucini, quoniam antea de sambuca comedit: vid. KERGERUS sect. 1. cap. 6. pag. 55. De auribus, quæ vocantur Nuss-Eller, id est Nucivore, & quæ nucis moschatas denotant, ubi postmodum eorum excrementa cadunt, crescit Arbor Moschata. Radix Oslu. seu Imperatoriz, Germ. Meister-wurcz, recens dissecta & pollicibus manuum ac pedum alligata commendatur in M. A. N. C. Ann. 4. & 5. Observat. 42. pag. 38. BOO. TIUS de Lap. & Gemmis lib. 2. cap. 53. & ZECCHIUS conf. 44. Smaragdum commendat: Alii radicem & semen Pæoniæ, vid. FORESTUS lib. 10. observat. 59. & BOYLE loc. alleg. Alii ungulam alicis, Estimul. Oper. Tom. II.*

alii viscum quercipum, alii dentem hippopotami & exinde paratos annulos, de quo supra dictum fuit. Crinescaulis nigerrimi cum aliis in amuleto appenso laudat FORESTUS lib. 10. obs. 60. pag. 391. De amuleto ex electro maiori Paracelsi notum est, quod etiam commendetur à quamplurimis in cura Epilepsie & convulsionum. Cinnabarinativam externè collo appensam, vel carpis manuum annexam in paroxysmis epilepticis convenisse observatum est. Vterius vèrtici, spinæ & partibus convulsis applicari possunt cucuphæ, emplastra, olea & inunctiones cum oleis recensitorum cunctis: v. g. oleo destillato succini, si epilepsia est per consentum, ubi cum oleo spinæ illinatur abdomini; cum oleo lavendulæ, anthos ruta, serpilli, maioranæ, castorei, coryli, & similibus; item cum Balsamo Peruviano egregiè conducunt. Probat autem perspecta sit idiosyncrasia agri, qui nempe possunt ferre talia; sunt enim quidam, qui ab eiusmodi odoratis magis læduntur, nimis affectis & commotis ab iisdem spiritibus. Misceri possunt dicta olea destillata cum oleis insulis & costis, umbricorum terrestrium, rutaceo, mastichino, castorei & unguentis nervinis; item emplastro Catonis, quod lib. 4. epist. ad Iordanum pag. 282. describit; item emplastrum, ex emplastro diacalcith. ℥iij. diachyl. iriat. ℥ss. & de betonica ℥ij. compositum. Speciatim pinguedo cati sylvestris in paroxysmo, aut eodem imminente, umbilico illita singulare est remedium ad Epilepsiam, & quæcunque convulsivæ pathemata, secundum Schmuckium; habito tamen respectu ex mare promaribus, &c. In Epilepsia ab affectu splene, cum vel sine tumore scirrhoso, optimum est emplastrum de sanis cum Mercurio, in subiectis robustis cum dupla dosi mercurii. Sic in virgine tredecim annorum, cuius mater epileptica erat, observavi, quod eam melancholia aliquando invaserat cum aliquibus insultibus epilepticis. In somno, ipsi tamen nesci: Mane de lassitudine artuum conquerebatur, primò dolor obscurus affligebat in hypochondrio sinistro: Præmissis ex sale hypochondriaco digestivo, cum vomitu bis repetito, propinavi liquorem Martis solaris gradatim ascendendo ad septimanam: externè admovei emplastrum de sanis cum mercurio, malaxatum cum oleo destillato smilod: quibus se benè iterum habuit. De cingulo ex corio humano res nota est, si lumbis spasmo correptis seu convulsis circumligetur, aut etiam hypochondriorum regioni circumducatur. Hoc ipso efficaciter dicitur nervus crurum insignior parti convulsæ circumligatus. An verò corium humanum habeat vim specialem ab aliis cingulis fortiter ligantibus distinctam? dubitatur.

*Hæc ita se habent extra paroxysmum.*

*Quod Curam atinet in ipso paroxysmo: Si sit gravior, ad excitandum epilepticum mirè conducunt omnia ea, tam interna quàm externa, quæ quovis sensus seu eorum organa fortiter vellicare, & ita spirituum inordinatas commotiones seu fortiora oblecta in ordinem revocare possunt, qualia remedia supra in soporosis affectibus fuerunt propolita: adeoque præter vengsectionem & vomitoria evacuantia universalia vix habent locum. Vengsectio scilicet propter evidentissimam tantum plethoram, aut sanguinis alicuius evacuationis solennis suppressionem, semper illam DECKERI in Praxi Barbettiiana pag. 5. animadversionem observando, ut patet satis sanguis educatur; alias enim paroxysmi semper graviores redeunt. In graviore malo mirè conveniunt vomitus, qui aliis irritis sunt nobilissimi. Ceterum duæ urgent incommoda, quæ huius excitationem præprimis inhibent: Scilicet quando ardè clausa labia sunt, & propter convulsos temporales musculos maxillæ arctius seruantur; & secundò, quando in graviore paroxysmo propter musculorum oesophagi & pharyngis convulsionem, non possunt deglutire. Propterea cum non potest aperiri os, ad modum BORELLI in Observat. os ac dentes aperendi, admoveendo nempe pollicem cum minimo digito, vel spatulam aut cochleare, ad oris latera & intra dentes inferendo, fortiterque comprimere; sic enim licet eum dolore facile os aperietur, quod beneficio cochlearis potest servari apertum: quo facto instillandum est ori vel medicamentum forte vomitorium, quod admodum conducit ad suscitandum epilepticum, aut alia appropriata. In posteriore vero casu, non possunt deglutire, penia oleo irino aut alio acriori intincta, granis aliquot, tribus aut quatuor, mercurii vitæ vel solum antimonii, aut syrupo*



emetico cum grano mercurii vite acuto, imbuta faucibus immittenda, & in specie pharynx illioatur, & ita vomitus stimulandus: vid. FONSECA *Consil.* 15. lib. 1.

Vel

24. *Aqua rosar.* 36.

*Cinnam.* 3ij.

*Syr. emet.* 3ij.

M. S.

*Succus emeticus.*

Infundatur hoc ori, quocunque demum illud fieri queat modo.

Aut fumus nicotianæ faucibus infusetur: vid. RIVERS *Cent.* 2. *obs.* 60. Preporionis tamen vomitoria locum habent, si ex ventriculo & hypochondriis item ab assumptis malum fuerit: vid. SENNERTVS *Prax.* lib. 1. pag. 396. & WEPFERVS *de Cicur. aquat.* pag. 319. & 324. Hinc pueris quoque ex cruditatibus aut laetis coagulo tale quid contrahentibus proficua observantur, vid. RIVERS *Cent.* 4. *obs.* 59. Loco vomitorii, præsertim si nequeat adhiberi, & tamen novus inflet paroxysmus, clysteres acres frequentius iniiciantur, quales *supra de affectibus soporosis* descripsimus, & *infra Artic. 1. Capit. 3. ubi de Apoplexia*, & lib. 4. *sect.* 3. cap. 3. ubi de suffocatione hysterica, describemus, sunt per quam egregii, impuimus si morbi convulsivi sint per consensum: quibus semper stercus pavonum, castoreum, aut ejus essentia socianda, & pro stimulo aqua benedicta, *syrupus emeticus*, aliæque Infusa similia antimonialia addenda: sicuti commodè olea destillata fortiter penetrantia, aut salia volatilia à 3j. ad 3℥. verb. grat. Spiritus seu sal volatile sanguinis humani vel cornu cervi vel sal succini addi potest. Mirum conveniunt hæc salia volatilia cum clysmatis applicata, in specie si iuncta sit Epilepsia interna. Ulterius *sternutatoria* ex radice pyrethri, hellebori albi, castoreo vitriolo calcinato, & sale vitrioli & similibus naribus insufflata, interdum potentioribus, v. g. succo aquilegæ, cum succo lumbricorum terrestrium, quibuldam in usu sunt; excitant enim epilepticos. Cautè tamen hæc fiant, (nisi in primo Epilepsiæ gradu, & ubi Convulsionum manifestarum nulla adhuc comparent indicia, eaque moderatissima, & in declinatione demum paroxysmi adhibenda: vid. WEDELIUS *de Facult. Medic.* pag. 215.) ne per sternutationis convulsivum motum Epilepsia aut suscitetur, aut exasperetur: Nam aliud est in apoplexia vel comate aliisque affectibus soporosis, ubi excitandi sunt spiritus: aliud in Epilepsia, in qua spirituum exagitatio & orgasmus nimius potius sedari, quam per sternutationem excitari debet. Est enim sternutatio per se motus convulsivus, & quasi particularis thoracis convulsio & epilepsia. Propterea loco salium potius salia acris volatilia macra, fortiter penetrantia, eorumque spiritus, in vitro longicollis naribus admoveenda erunt: v. g. spiritus salis ammoniaci cum calce uluæ, qui penetrans est, sal volatile & spiritus urinæ, & similia; aut urgente necessitate naribus ac linguæ infundenda, ut excitentur epileptici:

Vel

24. *Pulv. rad. Helleb. nigr.* 36.

*Salis vol. sal ammoniaci*; vel *urina*, vel *Cornu cervi* 3j.

*Sacch. albiss.* 3j. vel q. f.

M. f. pulvis: S.

*Pulvis sternutatorius.*

Suffusus succini admodum convenit etiam in suscitandis epilepticis; aut etiam olei destillati succini, guttæ tres, quatuor vel quinque, in aqua appropriata intus propinata, in paroxysmo optime conducunt, quæ tamen extra paroxysmum lachere dicuntur. Quin & similia spirituosæ antispasmodica volatilia & discutientia, v. g. ex spiritu theriacali simplici & camphorato, cerasorum nigrorum, sanguinis humani, salis ammoniaci simplici, succinato, lavendulato, urinæ, sale volatili succini, castorei, essentia castorei, liquore cornu cervi succinato &c. de quibus *supra dictum*, per os iniicienda in paroxysmo, ut facilius & citius ad se redeant ægri: c. g.

24. *Aqua Ceras nigr.*

*Flor. salvia*,

*Tilia an.* 3j.

*Spiritus theriacal. camph.* 3vj.

*Liqu. Cornu cervi succin.* 3ij.

*Syr. ex succ. Paon.* 3j.

M. S.

*Potio epileptica.*

Vel

24. *Aqua ex renell. cervi* 3℥.

*Cerebr. human.* 3j.

*Spiritus sang. human.* 3℥.

*Salis vol. Succini gr. xv.*

*Syr. de Stach. Arab.* 3j.

M. S. ut ante.

Successivè infundatur in os, donec ad se redeat æger: quibus etiam *Castoreum* addi potest.

Huc etiam spectat pulvis epilepticus antimonialis.

De cætero revellendo & avocando quasi in paroxysmo quoque agunt frictions extremorum, & partium convulsarum extensiones; quas tamen moderatas jubent SENNERTUS *loc. cit.* pag. 395. DECKERS, & WILLISIUS *loc. cit.* partim ne duobus laboribus fatigetur æger, partim ne materia peccans motu externo cohibito intra cerebrum reclineatur, partim ne ossa luxentur aut frangantur. Hujus etiam loci sunt ligaturæ, communicationem spasmodicam inhibentes, si scilicet ab extremitatibus Convulsiones inchoentur: vid. BARTHOLINUS *Cent.* 6. *Hist.* 78. DECKERS in *Praxi Barbett.* pag. 2. & SALMUTH *Cent.* 1. *obs.* 90. Item huc spectant spina dorsii & extremorum per nervina inunctiones, imò rubificantium usus: vid. Hollerius *lib. 1. de Morb. internis* cap. 15. & HEINRICUS ab HEER *obs.* 24.

Lingua, in paroxysmo vehementius sauciata à dentibus, curatur insperione pulveris lapidum canerorum, & illuminatione extracti cujusdam vulnerarii saccharati: Vid. Misc. A. N. C. *Ann.* 4. & 5. *obs.* 209. pag. 195.

## ARTICULUS II.

### DE

### CONVULSIONE TONICA.

**M**oddè dicta in genere omni Convulsioni, & in specie Convulsioni tonica seu epilepsia, conveniunt: Sed præter dicta in Convulsione partium tonica, dum pars convulsa rigida manet, ac tetus est, ne quomodò contrahi permaneat, quadam adhuc monenda sunt.

### CAUSÆ.

*Causa* hujus Convulsionis in specie sic dictæ est irritatio partis nervæ, admodum sensilis continua, in eodem loco, & eodem serè modo. Cujus occasione continuata nec interrupta copiose influunt spiritus animales, & ita in continuata contractura fibras, & consequenter partem ipsam retineant. Irritatio hæc nunc est manifesta, seu ab agente, quod sensibus patet, inducta; nunc est occulta, seu ab agente minus sensili nata. Ex manifesta irritatione fit Convulsio in venæ sectione, si nervus lædatur punctim: Item in purgationibus nimis, qua ratione ex assumptione vitrioli albi vel Gille vomitive Theophrasti, Convulsionem trigena horarum lethalem refert HEER *obs.* 26. Pariter antimonialia & Mercurialia non ritè præparata, & intempestivè adhibita, eandem dant calamitatem: De Euphorbio simile exemplum habet TULPIUS *l. 1. observat.* 15. Item læsiones partium externæ, ut cum ex fractura tibiæ, ex ictu scopulæ, spasmus opisthotonum, tandem tetanum, & sic mortem notavit HOECHSTETTERUS *Dec.* 5. *cas.* 6. Sic ex clavo pedis digito infixio opisthotonum refert SCHENCKIUS in *observat.* ubi de Convulsion. Per venæ sectionem læso nervo convulsio lethalis oborta, referente SCHENCKIO *loc. cit.* Ex læsionibus nervorum in cruribus spasmus cynicum idem notat. Et in genere, quævis læsiones nervorum, membranarum, tendinum, præcipue in articulis, Convulsionem inferre solent. Vulnera capitis quoque huc pertineant: Siquidem ex cutis vulnere in latere sinistro capitis spasmus ingentem cynicum, & universi corporis tetanum, observavit HILDANVS *Cent.* 5. *obs.* 9. Mercurialia ingruentia huc pertinent, ex quorum usu Convulsionem capitis ad latus sinistrum, ut natus & humerus redâ lineâ copularentur, &c. refert BARTHOLINVS *Cent.* 4. *Hist.* 42. Conf. HEVRNIVS de *Affect. Capitis* cap. 23. De-



23. Denique ex epota aqua forti membrorum insignem contractionem uideb. in BARTHOLINI *Art. Med. Hist. nienf. Volum. 1. pag. 210.* Acida enim quodammodo corrumpant partes nervaeas; quod patet in corio, quod cum acido se corrugat, cum alcalibus non; Unde etiam lacticiis, quae acidum temperant, tales curant.

Quoad irritationem occultam: non rarum est, febres quatuor, praesertim acutas & malignas male judicatas, terminari in Convulsiones: sic Convulsionem à tertiana per metastasin febrem soluisse, testatur BARTHOLINUS *Cent. 1. Hist. 92.* Ex erysipelate & febre spasmodicam opisthorum refert SCHENCKIUS in *Observ.* Hinc podagra laborantibus superuenit interdum convulsio, contra GALENI assertum: de quo uid. HOEFERVS *Hercul. Med. pag. 14.* Nec rarum est, in arthriticis, item hypochondriacis, & similibus, si acidum illud volatile peccans se insinuet profundius in partes musculorum fibrosas & tendinosas, easdem rigidas, duras & intractabiles reddat, ibidem nutrimentum earum spermaticum chylosum coagulari, & in materiam tartaream quasi gypseam transire; Unde omni penitus motu sublato, pars ista postmodum contracta & immobilis manet. Pertinent huc variacrementa intra cerebrum deposita, spasmos inferentia: sic RHODIUS *Cent. 1. obs. 49.* refert de muliere convulsa, in qua omnes cerebri uentriculi sero limbo bilioso repleti fuerunt, ex quibus etiam in spinalem medullam profuxit: Et SCHENCKIUS in opisthorono mortui capite duo cochlearia aqua acris intra membranam duram & cerebellum invenit. Facit huc observatio TULPII *Cent. 2. cap. 32.* ubi Convulsiones corporis cum dolore capitis, expulso pure ex naribus, curatae. Huc quoque referendi vermes, brachiorum pedumque contracturas excitantes: quo in casu tamen ut plurimum tumor ventris simul adest: vid. FORESTUS *lib. 10. observat. 117.* SCHENCKIUS *l. 1. observ. 217.* DRAWIZIUS de *Scorb. Tit. 2. pag. 127.* M. A. N. C. *Ann. 3. obs. 62.* & *Ann. 6. & 7. obs. 136.* Denique in India Orientali opidum malum est varii generis Convulsio, de quo eleganter scribit BONTIUS de *Medic. Indorum cap. 2.* Pertinet huc spasmus flatulentus, vulgo dictus Germ. der Krampff, non crura saltem, sed etiam alia musculosa loca subinde affligens, ex subtili acri humore seroso, muscululos subinde affligente, oriundus.

Ex dictis patet, quodnam sit subiectum Convulsionis? ita quidem, ut nunc in ipso subiecto invasionis seu parte contracta simul sit fomes seu radix mali seu subiectum radicationis, nunc verò differant: unde Convulsio partis, nunc per essentiam, nunc per consensum esse dicitur.

## C U R A.

Quoad Curam: In hac imprimis causa removenda, partes nervaeae leniendae, ac irritatio earum sopiendae; hinc eadem roborandae, adeoque semper universalia praemittenda sunt: quae inter clysmatum injectio perquam proficua observatur, sicuti urgente interdum graviore dolore simul ad opiata, sed appropriatis mista, accedendum.

Remedia interna sunt quaelibet Carminativa, Cephalica, & antiepileptica, id est specie castoreum, & omnia ex hoc ipso preparata, salvia, lavendula, succinum, rosmarinus, ejusque decoctum, spiritus vini theriacalis, spiritus vini camphoratus; item pestinaciori in malo decoctum liquorum, praesertim Guaiaci & Juniperi, sunt optima: hinc cinnabaris & quaelibet alia epileptica, praesertim volatilia, conducunt.

Quoad Externa: conveniunt ea, quae sub forma inunctionis oleosae & spirituosae applicantur: quae ipsa tamen in genere, quod minus sunt unctuosae & viscida, minusque oblinunt aut insarciunt poros, magisque sunt penetrantiora, & spirituosiora, eo melius conducunt. Praeteris lumbrici vivi applicati & lumbricaria hic conveniunt: Nempe, liquor oleosus per deliquium in cibano ex lumbricis terrestribus, item oleum decoctionis lumbricorum terrestrium: quae ipsa quoque de formicis intelligenda sunt. Aut sequens linimentum, quod expertus est FORESTUS in Convulsione à cholera, cum intensissimo dolore juncta:

24. Olei irin.

Verm. terrestr. an. 3ij.

Estmull. Oper. Tom. II.

Castor. pulverisat. 3ij.

M. constitudo agitando.

Quo indefinenter fiat inunctio membri spasmò correpti calide, donec cessent contractiones. Ubi ab inunctione abstinetur, statim redibant convulsiones; continuata verò inunctione cessarunt: Vid. *l. 10. obs. 110.*

Praeterea spiritus vini crocatus, spiritus aut aqua theriacalis camphorata, essentia ex infusione nervinorum, &c. Oleosa & piagnia quae usurpantur, sunt oleum vulpinum, de castoreo, oleum ex catellis, imprimis oleum vel axungia anseris assando destillans ex anseris, simplicibus aromaticis cephalicis & nervinis prius repleto, optimè confert in Convulsionibus partium externarum. Pinguedo hæc per assationem ita prolecta Unguentum dicitur, quo unico saltem Convulsio curata fuit in Praxi RIVERII, ubi de Paralyti, & observat. 8. à PACHEQUO communicata, ubi videbitis modum preparandi & applicandi; item infra *Artic. 3. Capit. 3. ubi de Paralyti.*

Sunt, qui convulsos & membrorum contractura laborantes sic sanant:

24. Urinam veterem:

Coquunt cum micapanis filigines, addendo parum asae fetidae, & ita inungunt parti affectae.

Porro oleum laurinum, oleum lini, cujus inunctione duos tetano affectos curavit RULANDUS in *Curat Empiric pag. 51.* Pinguedo humana & canina, (vid. FORESTVS *l. 10. obs. 122.*) castorei, medullae animalium. Olea acriora ac penetrantiora contra Convulsiones sunt oleum succini, quod cum petroleo mixtum, illitum in contractura rigida, à causa frigida occasionali orta, admodum commendatur; oleum Philosophorum, olea item destillata juniperi, succini, spicae, terebinthinae, galbani, hinc Galbanetum Paracelsi, in ejusmodi convulsionibus tonicis in usu sunt: quibus etiam subinde oleum de Euphorbio additur, quod optimum, sed quia nimis forte, cautè adhibendum. Hinc

24. Olei Terebinth.

Lumbric. terr. an. 3ij.

Pingu. human. 3j.

Canis 3j.

M. f. Litus:

Quem habet SENNERTVS *l. 1. Prax. Part. 2. c. 28. pag. 569.* Vel

24. Pingu. human. vel canin. vel anser. 3ij. ad jr. vel vj.

Ol. destill. terebinth. 3ij.

Bacc. junip. 3ij.

Spica 3j.

M. S.

Unguentum membra confortans.

PENOTUS sequens linimentum mirè prae dicat ad Convulsionem brevi tempore dissolvendam:

24. Olei terebinth. 3j.

Dest. Caryophyll. gutt. vj.

Mucil. bryon. q. s. pro consist.

Misc. & inunge locum affectum.

Item spiritus theriacalis camphoratus cum castoreo mixtus, aqua hirundinum cum castoreo, & similia, externo usu sunt egregia.

Denique unguentum spasmodicum Mynsichti, nervinum, dialthæ, &c. commodè applicari possunt, imponendo de super emplastrum nervinum usitatum.

Hæc in genere.

Speciatim si est Convulsio ex lesione nervi per puncturam in inepta venæ sectione, convenit, si vulnus dilatetur, & olei destillati terebinthinae calidi pauxillum instilletur, vel oleum laterinum, vel oleum cerae, hoc modo applicetur: quae optima sunt. Sed confertur in specie hic SYLVIVS *l. 2. Prax. ubi de Convulsion. cap. 23. §. 84.* ex PARÆO Vel hoc ipso in casu, si vulnus fuerit grandius, ut imponi possit emplastrum, imitetur SCVLTVS, qui in *Armat. Chir. obs. 64.* sequens commendat:

24. Euphorb. 3j.

Terebinth. 3j.

Cera parum.

Mista dant emplastrum, quod talibus laesionibus vel solitariè, vel permixtum oleo terebinthinae, de super applicatum est nobile.

Quod si verò fiat, ut post scarificationem & venæ sectionem ineptam pars quaedam doleat aut tumida fiat, tunc ad imitationem RULANDI



℞. Pingu. Pulpis,

Ta xi an ℥ij.

Ol. deſt. ſpice ℥ſſ.

Maſtiche ℥ij.

Vini ℥ij. vel ℥iij.

M. ad ignem.

Illinatur erebrò calidè totum membrum.

Pertinet huc baſſamus ſpaſmodicus Mynſichti, & pinguedo aſſerina ſuprà laudata, ſicut in dolore, tumore, ac livore partis Cataplaſma ſequens egregium eſt:

℞. Herb. agrimon.

Chereſol.

Flor. Chamomill. an. M. j.

Rad. Conſolid. mai. ℥iij.

Sigill. Salom. ℥j. ad ℥ſſ.

Sem. lini,

Fenugrec. an. ℥ſſ.

Coqu. in ſ. q. aquæ ſimpl. ad conſiſtentiam Cataplaſmatis:

Per ſetaceum trahiciatur, & ſubinde applicetur,

D. S.

Cataplaſma contra tumorem.

Si nex luxatione articuloꝝ aut ejus reſtitutione ſuperveniat convuſio, quomodo curari debeat? vid. SCULTETUS in *Armament. Chirurg. Tab. 8. obſ. 28. pag. 74. Edit. Venet.*

Quodſi ex vulnere partis fiat Convuſio, illinatur pars oleo ſeu potiùs liquore oleoſo lumbricorum terreſtrium, oleo deſtillato terrebintbine, vel vulnere inſtilletur baſſamum, ſulphuris terrebintbinatum.

Quodſi fiat Convuſio ex iſtâ venenati animalis, vel in levioꝝe malo oleum ſcorpionum illitum convenit; vel in graviore cucurbitula ſcarificata, vel cauterium actuale, ſupra partem læſam imponatur, aut etiam emplaſtrum magneticum arſenicale, malaxatum cum oleo buſonum, aut ſcorpionum, imponatur. Internè theriaca cum gentiana miſta propinetur, imperando ſubinde ſudorem.

Si ex hypercatharſi, vel violentiore purgante oriatur Convuſio, internè opiata & theriacalia ſufficiunt.

In ſpaſmo flatulento ſeu Cramba friſtio levis partis aut panno aſpero & calido, aut manu calida, intincta ſpiritu baccarum juniperi aut ſpiritu theriacali, vel ſpiritu vini rectificato, vel inunſtio pauxillæ theriacæ, cum aqua juniperi, ſtatim ceſſare facit malum. Vel ſi malum ſit gravius, fiat reſugium ad expertum Unguentum Cratonis & pariter.

℞. Axung. aſſer. rec. ℥jv.

Ol. deſt. Caryophyll. ℥ſſ.

Cinnam. gutt. v.

M. pro curando ſpaſmo ventoloſo ſeu Cramba.

Nervi ungulæ alci à quibuſdam circumligantur membris ſpaſmo obnoxio.

In ſpaſmo gravidarum præſertim flatulento euporifſion eſt matricaria: Herba illa contundatur, ut fiat ſucculenta, imponatur cervici, nunc ſola, nunc verberna miſta.

In Contraſtura à cauſa interna volatilia acidum corrigenda, & hinc temperata, illud obtundentia, & ſuccum nutritivum laudabilem ſuggerentia, ſunt optima. Sic Contraſturam totalem ex arthritide relictam, continuato lactis uſu curavit TACKIUS in *Thaſ. Soph. 2. pag. 128.*

## ARTICULUS III

### DE

### TREMORE.

**L**ocuti ſumus hætenus de convuſſione, motibusque convuſſivis & morbis, qui huc faciunt: quibus aſſine malum eſt Tremor, in quo cum motu naturali & voluntarij ſimul aliquid convuſſivi concurreat, dum in motu membri, v. g. ſurſum ereſti, membrum ſubinde remittit, & in contrariam nonnihil partem abducitur, prævalente tamen motu intento primario. Unde pro ut ratione graduum Tremor eſt vel maior vel minor, ſic etiam vel ſimplex eſt, vel convuſſivus: Simplex eſt minor & vulgaris Tremor, qualis v. g. poſt crapulam, aut poſt aſſectus animi graviores, in ſpecie iracundiam, ſubinde apparet: Tremor vero convuſſivus eſt maior, & qui interdum in remiſſione

paroxyſmorum epilepticorum accidit, donec omnino ceſſet cum ipſo paroxyſmo. Et dicitur hic Tremor Convuſſivus, quæſum tremor. Adeo ut Tremor ad motus corporis depravatos omnino revocandus ſit; Quia in tremore egri membra liberè movere, & protenſa ac ſuſpenſa ſufficienter continere nequeunt, quin vibratione potiùs, & modò ſubſultatione, modò declinatione variâ, depravetur motus, ſive totum corpus omneſque artus quacunque ratione, ſive unum tantum alterumve membrum particulare ita ſit aſſectum.

## CAUSÆ.

Tremor ipſe nunc eſt univerſalis, nunc particularis, nunc magnus, nunc parvus. Vulgò Cauſa Tremoris reſcitatur in facultatem motricem debiliorem & gravitatem membri, ita ut illa ſufficienter movere membrum nequeat, quia hujus gravitas ob facultatis motricis imbecillitatem præponderat. Sed quacunque ratione explicetur hæc ſententia, & quicquid etiam intelligatur per facultatem motricem, tamen inſufficiens eſt. Ratio, quia in Tremore omnino ſufficienter movetur membrum, extenditur pes, arripitur aliquid brachio & manu, & etiam retinetur, ſed depravatè. Vitium nempe cujuſdam inquietudinis, & præterea inordinati membri motus, adjunctum eſt, adeoque non immutè, ſed depravatè, membrum movetur. Facultas enim motrix debilitata præſupponit motum immutatum, non depravatum. Deinde ſi quæſetur Tremor à facultatis motricis imbecillitate, ut dicunt, tunc non fieret Tremor, ſed tantum fieret tardior & imbecillior membri motus, non vero depravatus.

Cauſa igitur genuina Tremoris eſt actio duorum plurimùm musculorum ſimultanea, ſeu eodem tempore inſtituta, ſive ſint antagoniſtæ muſculi, ſive non, ſed tantum tales, qui aliquomodo ad membri motum concurrere ſolent, vel eum adjuvant. Inter tales musculorum actiones, alia eſt principalis & intenta, alia minùs principalis & præternaturaliter adjuncta; Ita eſt dum unus muſculus brachium extendit, alter ſimul agens eundem nonnihil torquet & flexit, vel alio modo vitioſè movet; unde prior actio dat motum voluntarium intentum; poſterior vero dat motum præternaturalem & convuſſivum quaſi ſupervenientem, quibus junctis emergit Tremor.

Cauſa duplicata hujus musculorum præternaturalis actionis ſunt ſpiritus animales, qui uti naturali motu influentes movent membra naturaliter, ita etiam præternaturali motu depravatè eadem agitant: Et quidem vitium ſpiritus animalium in Tremore eſt talis motus inordinatus, ut cum in unum muſculum agiliùs & copioſiùs influere debeant, motu ſerè uniformi in geminos ſeu binos plures diſtinctos diſtribuantur, & ita diſſormem motum inducant; idque vel ex proprio vitio, licet rariùs, vel ex vitio ipſius partis recipientis, idque frequentius.

Proprium vitium eſt, cum iidem ſpiritus confuſè admodum & inordinate moventur in aſſectibus animi gravioribus, ita ut pro voluntatis arbitrio minùs ordinatum motum inſtituere queant, v. g. intra, metu, terrore, & ſimilibus. Et cum iidem facultate narcotica ſunt nonnihil fixiores, depravatè & inordinatè per nervos feruntur; Qua ratione poſt potum vini generoſi nimium ex vi ejus narcotica membra ſubinde tremunt; non ſecus ac poſt inconſuetum narcoticorum uſum, v. g. opiatorum, hyoſcyami, &c. unde ut plurimum Tremores magis univerſales ſunt: ſic FONSECA l. 1. Conſil. 38. Tremorem ex largo vini ejusque ſemiconſumpti potu reſert: Conſ. BARTHOLINUS Cent. 5. Hiſt. 38. ubi varia Tremoris exempla habet. Sed huiusmodi tremores magis tranſitorij & accidentales videntur & qui facilè denuò ceſſant.

Partij recipientis vitio ſit Tremor, quando vel nervus, per quem influere, vel muſculus, in quem euvibrari debent ſpiritus animales, ita ſunt vitiati, ut ob poros aut meatus in ſitu mutatos & malè conformatos, aut propter fibras non legitime ſitas aut diſpoſitas, aut etiam propter quodaſm meatulos, ob lapſum vel ariduram, aut cauſam aliam variam, omnino interceptos vel obſtruſtos, legitimus motus ſpiritus animalium nonnihil pervertatur, ita ut & in muſculum primario motui inten-



## P R O G N O S I S.

Intento destinatum, & simul quasi quadam deviatione in vicinum ferantur. Sæpius enim in Tremore aliquid irritati circa nervi principium, progressum, aut inflectionem occurrit, cujus occasione sub motu voluntario spiritus ipsius non præcisè ad determinatum muscolum, sed simul ad alios vicinos ferantur, sicque tremulum motum inferant. Hinc CASTRO *Tract. Quæ ex quibus*, pag. 102. Tremores qui febribus superveniunt, reverà motus convulsivos esse asserit; & HOECHSTETTERUS *Decad. 4. cas. 7. pag. 413*. Tremores ad convulsivos motus non absurde refert: adeoque in omnibus Tremoribus gravioribus plus minus inveteratis aut habitualibus aliisque, ad partem ipsam spirituum motum recipientem respiciendum est.

His ipsis causis ac fiendi modis facile cause remotiores occasionales accommodari possunt: quas inter eminentissimas sumi Mercuriales, auri & argenti; hinc enim operarii, qui talia tractant, v. g. aurifabri, subinde tremunt. Item qui incaute cingulo sapientie seu Mercuriali contra scabiem utuntur, subinde Tremore corripiuntur. Ad tremorem etiam sæpe disponit Venus nimia, & nimia partis refrigeratio. Sic BORELLUS in *Obs. Cent. 1. observ. 84*. Tremorem à nimio frigore venæ sectione curatum refert. Hinc etiam potius nimis frigidum, v. g. copiose aquæ frigidæ in febribus, aut potus nivæ vel glaciæ immoderate refrigeratus, Autore SENNERTO, ubi de Tremore, interdum Tremores partium inferunt. Excretiones sanguinis salubres suppressæ & ipsæ suo modo Tremorem inducunt; aut saltem mala Tremori vicina, quæ inter sunt primariò mensium & lochiorum suppressiones, item secundinæ fatiscque motui retentio: vid. LANGIUS lib. 3. *Epist. 1.* qui refert Tremorem brachiorum & cordis ob defectum evacuationis lochiorum in puerpera. Facit huc etiam observatio curiosa FORESTI in lib. 10. *Obs. 109*. ubi mulieri ob obstructos menses vitio uteri singulis diebus vapor quidam seu spiritus ascendebat, potissimum sub noctem, ex imo ventre, qui tandem repens per venas, & arterias, etiam colli, ita ut ipsam & ibidem Interiùs sentiret, qui ad musculos maxillarum ascendens, ad tempus hærebat, palpitationem quandam & jectigationem manifestam inducens, mox in genis ruborem inferens & dolorem, sine tamen epileptica procidentia, per uterinam aperientia autem curata fuit. Idem FORESTUS *Obs. 10*. mulieri fluentibus mensibus mense Maio venam secavit, unde menses statim retracti ad superiora & restituti fuerunt: post singulis mensibus minus profluebant, & semper eodem tempore simul experiebatur palpitationem tremulam in brachio, eodem spectatim in loco, in quo venæ sectio priùs fuerat instituta, non sine molestia ac magno dolore, atque hæc singulis mensibus patiebatur: tandem ad ciendos menses secta venâ saphenâ curata fuit. Fuit hic affectus similis tantum Tremori.

Denique notum est, quod in febribus malignis etiam interdum Tremor, sicut convulsio non raro supervenit: Sic etiam EPIPHANIUS FERDINANDUS *Hist. 41*. observat tremorem criticum certam continuam solventem. SALMUTH lib. 3. de Tremore periodico exemplum habet.

## D I A G N O S I S.

Quod attinet signa diagnostica: Tremor seipsum oculis prodit, tam universalis quàm particularis, tam magnus quàm parvus. Et ab aliis affectibus, in specie paralyti, & motibus convulsivis propriè sic dictis, ex eo distinguitur, quod semper conjunctus esse solet cum motu voluntario, cui supervenit: Nisi enim membrum moveatur voluntario motu, aut extendatur, nunquam Tremor oritur; v. g. manus vix unquam tremat, aut pes, nisi ad cursum adigatur, ita ut semper motui voluntario conjungatur Tremoris symptoma: In motu verò convulsivo, ipso ægro nescio, ac præter voluntatem ejus, motus convulsivi accidunt.

Diagnosis causarum ex antecedentibus & adjunctis circumstantiis facillimè cognosci possunt: Si enim vitium sit spirituum animalium, & alia signa facultatis, ut vocant, animalis læsæ simul notantur: Si verò in ipsis membris residuat vitium, sæpe particulare est symptoma, præcesserunt causæ speciales, membrum unum aut alterum plus minus lædentes.

Quoad Prognosis: Per se nihil periculi portendit.

Si superveniat, aut succedat paralyti, non est malum; indicium enim est paralyseos remittentis, & motus naturalis non nihil redeuntis.

Tremor ipse à causis internis pendens, prout in se non sit periculosus, quoniam tamen facile degenerat in alios graviores affectus nervinos, v. g. in paralytin, apoplexiam, lethargum, spasmus, &c. ob id ratione horum consequentium, non est negligendus.

Tremor senum vix curari potest, quia ut plurimum hos ad mortem comitatur.

Tremor hereditarius, seu cujus parentes simili affectu laborarunt, item qui ex vitiosa diæta successivè genitus, sed jam confirmatus est, in his raro etiam perfecte curatur.

Tremor si permuetetur in convulsionem, periculosum est.

Item, si in febre ardente Tremoribus succedat delirium, ex metastasi materiæ morbificæ, periculosum est; cum delirium periculosius sit symptoma, quàm Tremor, imprimis si ex metastasi oriatur materiæ.

Item HIPPOCRATIS est prænotio: Qui tremores, inquit, ad manus resiliunt, mali sunt. Interdum enim, si ægri manus attentè consideratur aut attingatur, contremiscentem illam quasi subito revelli animadvertimus. Est spasmustromodes, seu motus ex convulsivo & tremore compositus, & periculum non leve portendit, imminentem scilicet convulsionem, similiaque pathemata, idque in specie in febribus ardentibus.

Tremor, qui supervenit mulieribus post partum, ex retentis quibuscunque in utero, periculosus est affectus; subinde enim epileptias lethales infert.

Et denique Tremor in apoplexia aut lethargo accedens, malum signum est, prostrata scilicet sæpe penitus facultas animalis, ejusque functionum.

Si Tremor est in labiis inferiore, notum est sequi vomitum; qui tamen Tremor in labio est potius motus convulsivus, quàm reverà Tremor.

## C U R A.

Quod attinet Curam: In hac removenda imprimis sunt causæ quæcunque remotæ; hinc appropriatis nervinis & cephalicis, tam internis quàm externis, Tremori succurrendum; quæ inter sunt omnia ea, quæ in paralyti, apoplecticis & convulsivis morbis conveniunt. Adeoque pro varietate causarum determinanda nonnihil cura: in malignis nempe usurpantur alexipharmaca; in retentis vitiosis uterinis usurpantur expellentia ex secundina: si ex summis metallicis & Mercurialibus, imprimis mineralia conducunt; cum minerales morbi nonnisi per remedia mineralia curari queant: Quodsi evacuandi sit scopus in Tremore, pilulæ arthetice officinales, aut extracta catholica, aliæque laxativa cum Mercurio dulci in usu esse solent.

Alias remedia appropriata ad Tremorem sunt, ut dixi, nervina imprimis, tam interna quàm externa. Hæc inter sunt primariò salvia, & quæcunque ex hac parata. Inter plura autem Essentia salviæ, spiritus salviæ, &c. quâ ratione FORESTUS lib. 10. *obs. 99*. cerevisiam salviatam pro potu ordinario mîrè commendat: dicit enim se novisse artificem valde trementem, qui continuè hac cerevisiâ salviatâ utebatur, & etiam salviâ crudâ, cum pane butyraceo, aut salviâ præparatâ cum cibis; unde sic tandem beneficio salviæ à tremore liberatus fuit. Unde etiam essentia salviæ cum spiritu liliorum convallium parata, & cum essentia castorei mista, internè sunt usitatissimæ: sicuti etiam pro usu externo infusum salviæ cum vino aut aqua, & similia laudantur, si nescipe quotidie his laventur manus aliquoties, & per se siccari permittantur: Aut etiam spiritus salviæ infusione castorei imprægnatus, vel etiam essentia salviæ, mista cum castoreo aut ejus essentia, fricando aut inungendo partem affectam, usu externo adhiberi solet pro cura Tremoris: Conf. BARTHOLINUS *Hist. Anat. Cent. 5. Hist. 38*. Juxta salviæ eminet Stoechas Arabica, Primula veris, Rosmarinus, melissa, majorana; imprimis melissa, & ex eadem remedia spirituosa parata, ejus & spiritus essentia, item folia melissæ.



melissæ in vino generoso vel spiritu vini infusa, præ cæteris sunt egregia in cura Tremoris: Potius radix acoris veri, uti etiam acorus conditus, radix pæoniæ & helenii, semenque pæoniæ laudantur. In baccis juniperi uti egregia inest vis nervina, ita speciatim essentia baccarum juniperi per spiritum vini tantum parata, spiritusacoleum, malvaricum juniperinum, continuato aliquandiu usu interno & externo, item Rob juniperi, imperando simul sudorem, sunt convenientissima; aut ipsæ baccæ spiritu vini infusæ, ita ut quotidie tantillum hujus infusi bibatur, simulque quotidie decem grana baccarum infusarum devorentur; sic enim & nervi roborantur, & Tremor tollitur: Item decoctum ligni juniperi per modum diætæ sudoriferæ propinatum. Sanè in quibuscumque facultatis animalis & nervosi generis diuturnis ac inveteratis morbis nil utilius adhiberi poterit, quàm decoctum lignorum vite paratum, & hæc inter in specie ligni juniperini per aliquot septimanas continuatum, præmissa corporis debita evacuatione: Substantia nempe aromatica dicti decocti mediante sudore penetrat undique per universi corporis poros ac meatus, dissolvit mucositates, abstergit sordes, purificat sanguinem & corporis habitum, & ita in paralyticis convulsivis Tremoribus, apoplecticis, & similibus affectibus æquè polychrestus eorum est usus, ac in catarrhalibus affectibus. Quidam decoctum aliaque medicamenta ex fraxino, ob signaturam tremuli seminis laudant.

Aromata, seu egregia ad affectus nervinos per se sunt nota, in specie Nux moschata, Caryophylli, & Cinnamonum. Castoreum & omnia ex castoreo parata, essentia, oleum, extractum, interno & externo usu singulariter laudantur ad curam tremoris: quod etiam facit essentia florum anthos, essentia chamædryos, summitatum hyperici, ambra, aqua theriacalis Stapediana, pulvis analepticus Mindeseri, confectio alchermes, &c.

Cerebrum leporis assatum & comestum ab antiquis admodum laudatur. De hoc ipso refert FORESTUS lib. 10. obs. 99. sibi esse relatum à Pharmacopæo fide digno, artificem Bruxellensem esu continuo cerebri leporis assati solum à Tremore liberatum fuisse. Aliàs notum est, quod usus eiconiarum, usus palumborum in cibis, item solum cerebrum palumborum assatum & devoratum, conducant contra Tremores.

In Tremoribus senum nimis laudatur præ cæteris sinus pavonis, cum s. q. spiritus vini vel aquæ vitæ subactus, & in potu usurpatus temporibus matutinis, pro una vice s. q. sufficit. Vid. BORELLUS in observ. Cent. 3. Obs. 98. Quæ supra de oleo buxi, corallino, &c. contra convulsiones fuerunt insinuata, pariter etiam tremori applicanda sunt. Aliàs etiam cinnabaris antimonii, specificum cephalicum, imprimis si ex fumis metallicis, antimonium diaphoreticum, & similia sulphurea antimonialia, cum ossibus humanis præparatis mista & propinata, blandum sudorem expectando, adhiberi solent. Præsertim quidem, si à mineralibus, imprimis Mercurialibus, excitatus fuerit Tremor, insigniter conducunt talia mineralia, ad hoc nempe, ut beneficio eorum eliciatur foras Mercurius, quo sublata causâ tollatur effectus. Aliàs decoctum helenii & sceniculi ad eliminandum extra corpus Mercurium, & delendam ejus malignitatem in corpore; tanquam summum experimentum est. Potio ista HOECHSTETTERI in Observ. Decad. 3. cap. 4. pag. 231. & ex eo D. MICHAELIS in Collegio Præctico, quæ hæc est:

℞. Rad. helen. ℥ij. vel iij.  
Fenicul. ℥ij.

Quæ infundendæ in Vini vel liquoris cujusdam quartarilis quinque, id est, ℥iij. infusæ per diem naturalem, coquantur ad consumptionem tertiæ partis.

Dividatur Colatura in partes quatuor, bibat æger partem unam manè & vespere, ac sudet coopertus; sic enim partim expellitur Mercurius sub forma sudoris citrini, partim corrigitur; quæ ratione utendum, donec talis color non videatur amplius.

Aliàs in tali casu remedia solaria, ac ipsum aded aurum foliatum assumptum, non omittenda sunt; Mercurium enim alliciunt, & ita à corpore fecum rapiunt. ZACUTUS LUSITANUS inungit unguentum ex auro, quia Mercurius se subito jungit auro. Ut ergo hic ipse eliciatur ex corpore, tale unguentum erit admodum conveniens.

Inter Externa contra Tremorem quemcumque, à qua-

cunque causa excitatum, seu singulare & indubieatum experimentum commendat FORESTUS lib. 8. obs. 5. frictionem & lotionem membri cum urina propria recens excreta: Loco cujus spiritus formicarum, item spiritus lumbricorum terrestrium, qui præ cæteris palmam præfert, & cum his paratæ aquæ articulares ad extra, item spiritus salis ammoniaci conducunt pro fricandis membris, præsertim nucha & spina dorsii, in loco benè calido.

Vel

℞. Aqua articul. ad extr. ℥ij. vel ly.  
Spir. lumbr. terr. ℥ij.  
Formicar. ℥vj. ad ℥j.  
Ess. Castor. ℥ij. vel ℥ij.  
M. D. S.

Externa aqua articularis.

Aliàs partibus trementibus utiliter PETRUS à CASTRO illinit aquam destillatam ex urticis minoribus, Germ. aus den Eyter-Nesseln, ut vocant, mense Majo collectis & destillatis. Tempore somni hac ipsa aqua benè perfricandæ sunt partes trementes, idque sæpius repetendum & continuandum. Fraxinus, cum ejusdem semen, sit in continuo tremulo motu, ob id commendatur à quibusdam Lixivium imprægnatum seu superfusum foliis Fraxini, quo lixivio partes trementes lavandæ, & spontè exsiccandæ; sic enim curati Tremorem afferunt. In malo diuturno conveniunt Thermae, item Inseffus seu Balneum ex cubili formicarum subinde repetitus; egregius enim est pro cura tremoris. De hoc cubili videatur infra, Artic. 3. Cap. 3. ubi de Paralyti.

Præter dicta conveniunt oleum nardinum & costinum, oleum castorei, oleum lumbricorum terrestrium, item oleum laurinum, oleum destillatum juniperi, salvia, majorana, & ex his oleis parata balsama pro inunctione membrorum trementium.

His ita pertractatis, de morbis convulsivis & convulsionibus, pergo ad

## CAPUT III.

### D'E

## SPIRITUUM ANIMALIUM MOTU ET INFLUXU ABOLITO.

### ARTICULUS I.

#### D'E

### APOPLEXIA.

Opposita ferè vitia sunt, dum omnes functiones animales in sensu & motu constitutæ subito cessant, ita ut taliter affectus non secus ac ex improvviso quasi fulmine in terram percussus & attonitus jaceat, (unde etiam Morbus Attonitus & Sideratus dicitur,) sensus omnis internus, atque externus, ac motus, imprimis tamen spontaneus cesset, simulque vox aufertur, respiratione ipsa plus minus imminuta, cum aut sine stertore, pulsu adhuc nonnihil vegeto & perquam duro, nisi in statu seu casu admodum periculoso, ubi deficiat, interdum est pulsus, interdum verò vix observabilis. Quando ergo motus & sensus totius corporis ita perit, dicitur Apoplexia, Ger. der Schlag; Nempe ut plurimum saltem functiones & actus spontanei seu voluntarii læduntur, minus verò motus naturalis, ut ut interdum & hi afficiantur: (cordis motus) color faciei & oculorum ut plurimum rubet, facies tumida est, & corpus simul calet, ut ut interdum & in paroxysmo diuturniore facies pallere observetur: Membra omnia sunt laxa, & si brachium vel pes levetur, pondere suo statim dilabitur: Æger fortiter tactus, irritatus, vel acclamatus, nec sentit nec loquitur, ore hiant, & interdum stertente, profundum dormit; Resolvitur subinde simul vesicæ & ani sphincter, unde feces alui, aut injecta enemata, & urina inscio sponte sua & involuntariò effluunt. Verbo: Apoplectici non differunt à mortuis, nisi quod supersint vestigia respirationis, pulsus, & aliquis color in facie. Supervenit tandem & spuma circa os, unde respiratio cessat. Hæc dum ita fiunt, est Apoplexia universalis seu fortis. Dividitur enim communiter ratione pulsus & respirationis superstitis in leuem, vehementem, fortem, & fortissimam; ita ut in priore pulsus & respiratio sint adhuc

lati



Satis naturales, in reliquis speciebus magis magisque deficient cum calore frigido; & quidem in forti cum stertore & spuma, in fortissima respiratio ad sensum omnis aboleatur, pulsus vero languidus, parvus ac celer, evadat. Deinde ratione subiecti dividitur Apoplexia in *universalem* & *particularem*; quatenus illa cum capite totum corpus: hæc modò dimidium caput & trunci mediam partem affligit, diciturque *Hemiplegia* seu *Hemiplexia*; nunc capite integro omnes partes corporis attonitas reddit, & peculiari nomine destituitur; nunc hoc vel illud tantum membrum motu ac sensu subito privat, sub *Paraplexia* & *Paraplegia* nomine. *Hemiplexia* est *affectus talis dimidii corporis*, quando homo quoad omnes, vel dexteram vel sinistras tantum, partes ita afficitur, inde à sagittali sutura per mediam lineam exactè usque ad perineum; ita ut mirum sit, quod ad sagittalem usque suturam una, saltem medietas, privetur sensu & motu, altera verò & sentiat & moveatur: Sic in talibus dimidia lingua nihil sentit nec movetur, altera verò medietas utrumque præstat. Denique addit his LINDANVS quandam speciem *Apoplexia*, hæcenus inominatam, seu *que proprio nomine caret*, quando nempe toti corpori perit sensus & motus excepto tantum capite, ubi quicquid infra collum est, manus, pedes, &c. omnia resoluta sunt & attonita jacent, excepto solummodo capite, in quo lingua loquitur, aures audiunt, &c. quæ ipsa species rarò quidem, interdum tamen, observatur. Quoad ultimam Apoplexiæ speciem, *Paraplexiam* seu *Paraplegiam*, ea tantum in uno alteroque membro, majore vel minore, contingit, ut eius sensus & motus subito incertum pereat, & privetur eisdem. Hanc ipsam tertiam speciem, qui modus Apoplexiæ particularis, Autores passim solent referre ad *paralyin*; sed male, ut rectè demonstrat & asserit etiam LINDANVS, HIPPOCRATES, ARETÆVS (qui etiam fuit Græcus) & alii Autores, imò omnes antiqui, qui distinguebant accuratè *Paralyin* ab *Apoplexia*: & quos affectus ex interna causa natos hodie ad *paralyin* referimus vulgò, illi ad *Apoplexiam* retulerunt, quod nisi faciatis, nemo commodè explicare poterit, quid sit *Apoplexia levis*, & *Apoplexia vehemens*? Genus enim sensu apud Veteres *Paraplexia* vocari solet talis affectus, quia fiendi morbo, curatione & symptomatibus quibuscunque talis particularis *Apoplexia* cum universali convenit: unde *Apoplexia* universalis in *paraplexiam* desinere solet: quo sensu, etiam Aphorismus HIPPOCRATIS sect. 1. aphor. 42. „*Apoplexia levis facillè solvitur, Apoplexia vehemens nunquam sine febre*, interpretandus venit. Commentatores super hunc aphorismum variè se torquent, GALENUS obiter transcurrit, & ipse CARDANVS, qui explicat, tantummodo Grammaticum agit, non Medicum: Sed ex dictis explicatio facilis est, dum per *vehementem Apoplexiam* intelligit LINDANVS illam totius corporis *universalem*, & de illa nemo curatur, nisi superveniat febris; per *Apoplexiam* verò *levem* intelligit vel *hemiplegiam* vel *inominatam*, vel aliam. *Levis* est dicta respectu nempe totalis & *universalis*, & videmus quod tales hemiplectici diu supervivunt, cum omnes affectus apoplectici & paralytici sint difficulter curabiles. Quando ergò sensus & motus corporis ita perit, vel in toto, vel in parte, questio est, de causa; quæ hujus cessationis subitaneæ actionum omnium animalium? Per motum enim æquabilem spirituum animalium in cerebro & cerebello, & ex his per nervos in partes organicas, fit sensus & motus, & omnis animalis functio, uti superius aliquando præsupposui ex Physiologicis. Cessante ergò hoc motu spirituum animalium æquabili & naturali, etiam cessat subito omnis animalis actio. Unde facillè patet. Quod *Apoplexia* sit affectus, qui affligit vel partem principalem, unde sensus ac motus dependant; vel ministeria sensui ac motui dicata, & quidem remotè, quod in apoplexia non affligantur proximè organa sensui ac motui dicata, patet: quod his salvis & sine eorum alteratione ingruat & cesset *Apoplexia*. Reverta ergò in spiritum animalis hæcbit causa *Apoplexia*.

Circa Causas *Apoplexia* considerandæ sunt & causa generationis, & causa permutationis. Causa proxima generationis formalis est deficient spirituum animalium motus in cerebro, interdum simul etiam cerebello, & hinc vorundem cessans influxus in membra reliqua. Et quidem si cerebelli culpa fiat, non tam apoplexia erit, in qua, nisi fortissima fuerit, saltem motus spontanei plus minus aboleatur, non verò naturales in pulsus & respiratione: quæ *Syncope cardiaca*, in qua cordis motu penitus sublato, circulationis sanguinis cessatio, ejusdem in cerebrum distributio, & spirituum animalium & vitalium necessaria anxio, omnino tollitur, & mox pulsus & respiratione plus minus interdum ad sensum penitus sublatis sine sensu & motu mortuorum instar jacent; siue sanguinis visio, quod rarius, siue nervorum cardiacorum culpa, v. g. convulsorum, ut in affectibus hysteris & similibus; siue spirituum in suo ex cerebello influxum inhibitorum causa eveniat. Confer. WILLISIVS de Anim. Brutor. Part. 1. cap. 8.

Causa Remota materialis seu occasionalis est vel interna, vel externa. Vtriusque, præcipue interna, ratione fit *Apoplexia* vel *accidentalis*, vel *habitualis*: de quibus vid. WILLISIVS de Anim. Brutor. Part. 1. cap. 8. ubi de *Apoplexia*. *Habitualis* est, quæ post certas prægressas in corpore occasiones, & dispositiones interdum supervenit: *Accidentalis* verò, quæ subito, interdum fortitè, sine præcedente certa in corpore alteratione, ægros prehendit: quod frequentissimè à causis externis oritur.

Utraque est vel *privativa*, vel *positiva*, secundum HELMONTII doctrinam Tr. de Lithiæ cap. 9. seu ult. ita distinguendo. Illa, *privativa* est, quæ citra directam activitatem in spiritibus animales, aut citra peculiarem eis inductam alterationem, saltem impedimenta quædam insert, propter quæ legitime idem aut generari, aut distribui nequeunt; adeoque talis causa à posteriori & indirectè saltem, vel spiritibus animalibus producendis materiam subrahendo, vel eorum motum atque emanationem inhibendo, *Apoplexiam* insert: v. g. qui ex suspensio, (suspendium) est *Apoplexia*, aut casu ab alto, aut sanguinis intra cranium effusione, aut meatuum cerebri obstructione quacunque, *Apoplexiam* patiuntur: *Positiva* verò *Apoplexia* est, quæ à tali fit causa, quæ spirituum animalium crasin & constitutionem vitare, eisdem ad motum & inde dependentes functiones plane ineptos reddere, & ita narcosi & stupore quodam eisdem afficere, aut instar liquorum fermentescentium Gas eisdem quasi extinguere & suffocare valet: qualis vis in opiat, carbonum fumo, fulmine, & similibus utilissima est.

Quod attinet *Apoplexiam privativam*: ea fit, vel ob sanguinis deficientem naturalem circuitum ad & per cerebrum, & inde cessantem spirituum animalium generationem, quo sanguinis circulo sublato subito omnis animalium sensus & motus, & subito omnis spirituum animalium motus, ex sanguine in cerebro scaruerentium, cessat & tollitur; idque vel vitæ vel sanguinis ipsius culpa; vel ob spirituum denegatum motum in cerebro, & consequenter effluxum, ob pororum cerebri & meatuum ejus vitium, vel obstructionum vel compressionum, siue in ejus centro medullari, adeoque in ipso corpore calloso fiat, siue in ejusdem progressibus, scilicet corporibus striatis & caudicis medullaris initio; idque nunc in universo cerebro, nunc in altera saltem ejus medietate: Confer. WILLISIVS, qui de *Apoplexia privativa* optime agit; sed de *positiva* nihil.

Sanguinis motus & influxus ad cerebrum deficit, vel vitio vasorum, arteriarum nempe carotidum & vertebrarum obstructione, aut compressione, aut penitus laceratione. Sanguinis hunc motum circularem deficientem, & inde natam *Apoplexiam*, illustrat ligatura fortis collo injecta: hanc enim ligaturam colli, si fortius stringas tanquam hominem suspenditurus, eo ipso momento, quo arteriam carotides & venæ jugulares in collo constricte sanguinis motum ad cerebrum tollunt, eo ipso quoque momento omnis motus sensusque perit in talibus, ut ut adhuc ad tempus & aliquot horas supervivunt: unde postmodum remoto



moto vineulo dicunt, se nihil vidisse, nec sensit amplius, quod testantur, qui saepe dissecto liberati fuerunt. Patet hoc etiam experimento Anatomico in canibus, in quibus si facta cutis colli apertione ligentur fortiter arteriae carotides, ita tamen, ut parvae arteriae cervicales adhuc liberæ relinquantur, canis exinde somnolentus, torpidus, & stupidus jacet, & tamen ad biduum fere supervivit, actionibus tamen animalibus maximè immixtis, de quibus quicquid superest, id obtinet beneficio arteriolarum cervicalium adhuc liberarum, tandem tamen moritur.

*Causa ergo hujus Apoplexie*, ut loquitur HIPPOCRATES, est *obstructio venæ*. Per *venam* verò hoc loco tam venam propriè dictam, quam arteriam intellecta fuit apud Veteres. Hic enim mos fuit Veterum, non distinguere hæc duo vasa, sed uno venæ nomine ambo nominabantur. Hoc non tantummodò apud HIPPOCRATEM, sed etiam patet hoc ex C E L S O, qui inquit: *Pe- na credimus rei incertissima: ubi arteria pulsus in-* unitur. Veteres etiam per venam arterias & nervos intellexerunt.

Verùm hic loci non existimandum est, deficientem influxum sanguinis per unum alterumve arteriarum carotidum ramum inferre Apoplexiam, sed potius ex impedito sanguinis per venas refluxu, & hinc ejusdem in cerebri cerebellique confinis, aut stagnatione aut extravasatione immodica potius, aut externorum comprimentium violentia, v. g. luxatione vertebrarum colli enormi, Apoplexiam oriri, WEPFERO concedimus. Contra hanc enim hypotheseo, arteriarum nempe carotidum ac vertebrarum à causa interna angustiam, & hinc sanguinis denegatum affluxum ad cerebrum, rectè & eleganter disputat WILLIS loco supra citato, & majus periculum ex sanguinis abundantia, quam defectu apoplecticis imminere asserit, cum arteriae carotides vel vertebrales mutuis anastomosis coeant, adeoque quavis forsan in uno latere arteria sit compressa aut obstructa, alterius tamen lateris arteria sanguinis transcolationem peragere, & totum cerebrum irrigare possit. Unde & SYLVIVS lib. 2. Prax. cap. 21. pag. 160. §. 36. Edit. Belg. minùs hoc concedere vult, dum vasa arteriosa obstrui aut comprimi posse, indeque Apoplexiam oriri non putat: ita ut non nisi raram, & saltem propter externæ causæ violentiam talem apoplexiam, ex denegato sanguinis per arterias influxu dependentem, oriri existimet, quin potius propter impeditum circulum ex denegato refluxu, & hinc cerebri aut repletionem, aut compressionem, aut à fero extravasato repletionem, sicque spirituum impedito motu in cerebro, & impedito influxu ad partes reliquas, Apoplexias hujusmodi privativas, vitio sanguinis circuli contingentes, oriri arbitror.

*Causa*, verò propter quam sanguinis refluxus impediatur, est vel in vasis aut vasis, vel in sanguine ipso. In vasis vel vasis, quando hæc angustatur aut ex obstructione, aut ex contusione, laceratione in capite, rupitione, aut anastomosi aperta, & similibus occasionibus, sanguis præternaturaliter in cerebrum vel cerebri ambitum effunditur, ejusque naturalis circulus impeditur: meatus enim cerebri & substantiam plus minus angustando, Apoplexiam infert.

In sanguine verò hæret vitium seu causa ejus stagnationis, quando hic crassus, grumosus, aut nonnihil coagulatus existit, & ita in vasis stagnat aut hæret; sive in vasculis meningum, sive in sinibus cerebri, sive in ramis carotidum aut jugularium, sive denique in ramis pulmonalibus. Nam & in hisse coagulatus existat, Syncope cardiacam aliis dictam, vitio sanguinis natam, aliis verò Catarrhum suffocativum dictum, infert. Nam hic affectus est finitimus & similis Apoplexie, adeo ut catarrhus talis suffocativus ex sanguinis stasi in pulmonibus, & apoplexia ex sanguinis stasi in cerebro aut ejus vasis, loco tantummodò differant. Stagnante enim sanguine in vasis pulmonalibus ipsoque corde, est Catarrhus suffocativus: in cerebro verò & ejus vasis si idem contingat, est Apoplexia: Vid. supra ubi de suffocativo catarrho, Sect. 14. cap. 3. Artic. 4. Qua ratione etiam Syncope ab Hermeticis dicitur lunaris ecclipsis: apoplexia verò solaris ecclipsis. Nec ullum est dubium, tales agros sive à sanguine stagnante suffocatos, sive apoplecticos, eodem modo interfici: Unde etiam teste FRACASSATO in Epist. de cerebro ad Malpigh. apoplecticorum vasa sad-

guifera in pulmonibus interdum admodum turgida aut penitus disrupta, inventa fuerunt. Facit hoc etiam exemplum PANAROLLI de quodam morbo, apoplectico insultu simillimo, orto ex sanguinis copia & una stagnatione. Sed de his & similibus pluribus & Apoplexia ex hæc causa rara, vñ. in primis WEPFERUS de Apopl. & de loco affecto in Apoplex. Videtur etiam SCHNEIDERUS Tract. de Catarrhis, in specie ubi de Catarrho suffocativo, & de Catarrho sanguinis.

Communis Veterum sententia est, in Apoplexia cerebri ventriculos repleri, & exinde spirituum animalium motum tolli. Sed experientia testatur, sæpius aliis morbis mortuos exhibuisse ventriculos cerebri repletos & obstructos, nulla autem secuta sit Apoplexia: Sic refert LINDANUS, Amstelodami dissectum fuisse caput viri, qui per tres annos dolore capitis acerbissimo laboraverat, cujus ventriculi ita repleti fuere humore seroso aut limbo, simili lymphæ vasorum lymphaticorum, ut integra Pinta Hollandica, exinde potuerit eximi, nunquam tamen fuerat apoplecticus: Sic FERNELIUS exemplum recenset inter alia aperti cujusdam capitis apoplectici, in cujus cerebro nihil noxæ inventum fuit, sed tantummodo in vena juglari repertos esse sanguinis grumos: id quod convenit cum NYMMANNI sententia de Apoplex. qui sedem Apoplexiæ statuit in torculari Herophili seu loco concursus quatuor sinuum duræ meningis, & dicit, sanguinem abire in grumos, & grumositates ibi stagnantes impediendo motum humorum Apoplexiam inferre: quod etiam videbitis accedere HOFFMANNUM in Instituta. Ignoravit autem Nymmannus circulationem sanguinis, unde spirituum influxum cum sanguine denegatum causam asserit; cum potius ex impedito refluxu, hinc sanguinis stagnatione, & cessante in cerebro circulo, Apoplexia inde oriatur. Rarissimæ sunt ergo Apoplexiæ ex impedimento sanguinis versus cerebrum, nisi fiant à maxima violentia externa: Sic aliis notum est ex concussio aut depresso cranio secutam Apoplexiam, ex porulis ac meatibus cerebri nimium depressis, & invicem conniventibus; unde & sanguinis & spirituum animalium motus omnino fuit interceptus.

Ex dictis patet, quod Apoplexiæ causæ proximæ sint re impeditus spirituum animalium motus in cerebro, vel impeditus sanguinis circulus per cerebrum. Hæc causæ proximæ adjungendæ causæ remotiores, quæ quacunque ratione proximæ inferunt, & per consequens Apoplexiam causant. Hæc verò omnes eò conducunt, quatenus sanguinis, ut & spirituum animalium, influxum & motum, & sanguinis circulum tollunt.

*Remotiores causæ*, quæ ad Apoplexiam hanc, ex sanguinis deficiente motu oriundam, disponunt, sunt variae: nempe frigus repentinum aut frigus nium congelando quasi sanguinem & ita inspissando, ejus motum impedit, aut quocunque modo alterando sanguinem aut spiritus, ad Apoplexiam disponit. Facit hoc, quod juxta HIPPOCRATEM Aphor. 15. & 23. l. 3. aer frigidus & humidus, hyems, autumnus; item aer aquilonis continuus imbris irrigatus, ad Apoplexiam disponat: quæ ipsa & confirmantur à FORESTO l. 10. obser. 30. E contra verò ætus nimius aut calor ambiens nimius, liquando nimis massam sanguineam, & ipse disponere potest ad Apoplexiam, teste SCHENCKIO l. 1. Obs. de Apoplex. Obser. 1. Sic cum quidam in tertiana intermittente die intermissione se diutius exposuisset solis ardori diebus canicularibus, apoplecticorum more repente concidit, & altero die extinctus est: vid. PISO de Colluv. serosa. Forfan & huc pertinet suo modo lauta nimis & larga dicta cum vita sedentaria conjuncta; hinc enim rectè dicit HENRICUS ab HEER Obs. 18. quod nos septentrionales imprimis ex ingluvie & comessationibus corripiamur Apoplexia. Quod facit loto capitis illegitima cum aqua tepida, si scilicet subito caput exponatur aeri frigido: Exemplum tale observavit AMATUS LUSITANUS Cent. 1. Caput. 36. in puella, quæ ex lotionem capitis in Apoplexiam incidit, quæ ipsa Apoplexia postmodum in paralyfin lateris sinistri desit (unde dicitur Paralysis, sed est potius Paraplegia.) Ex tumore cranii externo sanato Apoplexiam natam refert BARTHOLINUS Cent. 4. obs. 86. Morbi melancholici in Apoplexiam quoque abeunt, quod præter MOEBIUM in Instit. etiam observavit FORESTUS l. 10. obs. 78. Post nimia purgantia sanguis draconis pro adstrictione alvi adhibitus Apoplexiam infert, teste BARTHOLINO Cent. 2. Epistol.



*Epistol. pag. 680.* Speciatim suppressa quaedam solennes sanguinis evacuationes per hæmorrhoides aut uterum, aut hæmorrhagiam narium, &c. frequenter admodum ad Apoplexiam disponunt, & hanc etiam inferunt. Sic ex suppressa narium hæmorrhagia consueta Apoplexiam observat HILDANUS *Cent. 3. observ. 11.* Quia sanguis suppressus coarctatus facilius sic stagnat hinc inde, aut per anastomosi vasorum, aut eorundem ruptionem in cerebro & vicinis locis extravasatione Apoplexiam infert. Sic in ZACUTO LUSITANO *l. 7. Hist. Med. Princ. cap. 7.* observatio est de juvene florentis ætatis, per scalas altè decedente, unde ingens hæmorrhagia per nares secuta est: Et sanguine rectè fluente optimè se habuit æger; hac ipsa verò hæmorrhagiâ suppressâ æger in Apoplexiam incidit, quæ non priùs sublata fuit, quàm copiosa institueretur venæ sectio. Item in puerpera ex non ritè fluentibus lochiis Apoplexiam obortam venæ sectione in brachio curatam refert FONTANUS *l. 1. Curat. & Respons. p. 25.* Et hinc est propter talem sanguinem extravasatum, aut ex anastomosi effusum, quod tam sæpe in Apoplexiâ mortuis sanguis congruatus & coagulatus in cerebro ejusque ventriculis fuerit repertus: Sic BARTHOLINUS *Cent. 2. Hist. 60.* & RHODIUS *Cent. 1. Observ. 67.* ex sanguine congruato & extravasato, ventriculos cerebri replente, ex plexibus choroideis edeffuso Apoplexiam lethalem observat: sicut etiam in occipitio sanguis congruatus sæpe repertus fuit: Sic HILDANUS *Cent. 3. Observ. 22.* observat mulierem, quæ menstrua suppressa sæpius per os & nares excrevit, quæ tandem & hac suppressâ excretionē Apoplexiâ lethali correpta fuit, & post mortem post triginta sex horas sanguinem adhuc per dicta loca excrevit: sicuti etiam in *Observ. 11. citata Cent. idem HILDANUS* tale refert: Vid. BORELLUS *Cent. 3. Hist. 34.* Venus è contra nimia, potissimum in senibus ad apoplexiam multum disponit: Vid. HENRICVS ab HEER *observ. 18.* & PLATERVS in *observat.* Pertinent huc imprimis affectus animi graviores quicunque, qui tanquam causa procacitica apoplecticos insultus excitant; quos inter imprimis est ira, quæ cum inducat sanguinis ebullitionem ejusque insignem fervorem, in prædisposito cerebro facili stagnationem sanguinis & Apoplexiam infert. Et cum primis homines *avæque* subinde Apoplexiâ correpti observantur ex iracundia, monente FORESTO *l. 10. obs. 70.*

*Spirituum animalium quod attinet deficientem motum:* cessat hic serè ex pororum ac meatum convenientia & subfidentia quasi, cujus plures possunt esse occasiones: à contusione v. g. cerebri & valida commotione; item à materia tenui, subtili & quasi lymphatica, successivè circa cerebri corticem glandulosum congesta, subitò & impetuose interiora versus irruente, & ita poros & meatus obstruente: quam causam in habituali Apoplexiâ imprimis accusat WILLIS. *cit. loc.* Item à sanguine grumoso, v. g. post capitis contusiones extravasato: Item ab abscessu in meningibus rupto, aut alia vitiosa materia extrinsecus cerebro instillata, aut intrinsecus in cerebro collecta, aut circa ejus basin congesta, ibique compressionem cerebri, & in specie radices medullaris & nervorum principii inferente.

An etiam mucus viscidus & pituita præternaturaliter extrinsecus circa medullam spinalem colligi, eandem comprimere, & ita Apoplexiam aut cognatos affectus inferre valeat, prout asserit SYLVIVS *lib. 2. Prax. cap. 21. §. 49. pag. 162.* seu dubium & minus probabile in medio relinquo, ob lentum pituitæ motum, nisi vehiculo feri aut lymphæ, à motu naturali quacunque causâ oberrantis, ad ista loca delata & collecta fuerit: vid. HELMONTIUS *Tr. de Lithiasi.*

Disponunt ad hanc Apoplexiam contusiones, & concussionēs capitis, tam cum quàm sine manifesta ejus læsione factæ; sive collabantur & angustentur saltem pori, sive sanguinis simul vitietur circuitus intra cranium, v. g. ex nimio sonitu: commotum enim & concussum cerebrum, subfidet quasi, ita ut poris ejus sic collabantibus & angustatis, aut distortis, aut vitiose difformatis, spirituum meatus & viæ deleantur: Sic ob casum ab alto, ex gravi cerebri concussionē, Apoplexiam lethalem observavit HORSTIUS *l. 2. obs. 12.* sicut etiam DEODATUS in *Vale. end. pag. 121.* ex casu ab equo vertiginem, quæ tandem in Apoplexiam lethalem defuit, observavit: sic notum est ex alapa inflata, apoplexiam fuisse obortam, qualia exem-

pla talia habet SCHENCKIUS ex BENIVENIO in *observ.*, utletiam HILDANUS *Cent. 3. obs. 85.* & *Cent. 6. obs. 11.* Item ex ista oculi nimio, indeque valida capitis & cerebri concussionē, Apoplexiam in puero observavit FERNELIUS *lib. 2. de Abdit. Rer. Causis cap. 15.* Non secus atque idem FERNELIUS *cod. loc.* refert, virum quendam ex vulnerato oculo apoplecticum, in quo dissecto sanguis grumofus copiosus circa cerebri basin decubuerit. Sic ex percussione oculi cum raphano Apoplexiam vidit obortam SCULTETUS in *Armament. Chirurg. obs. 21.* Apoplexiam à cranio depresso & sanguine extravasato, præter quotidianam experientiam, etiam testatur DURETUS in *Hipp. Coac. Prænot. pag. 366.* BORELLUS *Cent. 2. obs. 34.* HENRICUS ab HEER *obs. 12.* WEPFERUS de *Apoplex. observ. 1.* & 2. BARTHOLINUS *Cent. 1. Hist. 60.* & BONETTUS *Sepulchret. l. 1. sect. 2. observ. 7. 8. 12. ac 13.*

Præter sanguinis collectiones intra cerebrum, pertinent huc etiam vitia feri & lymphæ, quatenus, ut supra monitum, inundando cerebrum, & omnes ejusdem poros replendo, Apoplexiam non raro periculofam inducere possunt, Autore MARCELLO *Donato lib. 2. Hist. Med. Mirab. cap. 6.* qui refert de quodam forti Apoplexiâ peremto, in cujus aperto cranio tota cerebri substantia aquoso humore perfusa & oppleta fuit reperta, qui ipse humor etiam in cerebri ventriculis redundavit: dissectis carotidibus ingens sanguinis crassi melancholici emanavit copia: Sic asserit COLUMBUS in *sua Anat. cap. 15.* quod apoplecticorum capita dissecta exhibuerint sæpissimè cerebrum magis aque glutinosæ copiâ distentum. Facit huc Observatio JOHANNIS DANIELIS HORSTII, filii, in *Obs. Anat. 3.* de Principe apoplectico mortuo, in quo præter alia observatum fuit cerebrum magnum & grande, sero & pituita plus quàm refertum, maximè in ventriculis; arteria autem venosa ac orta nigro humore, atramento similis, fuit repleta & perfusa, qualem Princeps ante Apoplexiam ad aliquod tempus in lingua & faucibus habuerat. Plura exempla vid. apud WEPFERUM *obs. 4. & 15.* ac WILLISIUM *Anat. Cerebri c. 12.* Adeo ut probabile videatur, interdum à lymphæ & sero copioso, cerebrum inundante & replente, oriri posse apoplexiam. Facit huc suo modo potus vini nimius & crebrius repetita ebrietas, quæ multos, & quidem ætatis consistentis, & aliàs optimi habitus, ad Apoplexiam disponit: Nam ex his ortam Apoplexiam refert FONSECA *lib. 2. Conf. 89.* uti etiam FORESTUS *l. 10. Conf. 69.* Non enim totum vis narcotica spiritus vini, spiritus animales alterare & Apoplexiam inferre potest, sed & copiosa lymphæ generatio & cerebri inundatio à potu vini copiosi huc pertinet, dum post nimium eius potum Apoplexiam & inde paralyfin (quæ potius fuit Paraplexia) lingue & lateris dentri observat PISO *Tract. de Colluv. serosa pag. 88.* Apoplexiam à tumore, v. g. steatematico, vid. apud BONETTUM *loc. all. obs. 33. seroso*, apud PANAROLLUM *Pent. 1. observ. 17.* Pertinet huc etiam scabies retropulsa, ex qua Apoplexiam in viro ætatis consistentis observavit MOEBIUS in *Instit. pag. 265.* Variola etiam huc videtur facere nonnihil, repulsa Apoplexiam inferentes, teste FORESTO *lib. 10. observ. 70.* qui refert de puella, quæ post expulsa variolas, cum se citius aeri pluvioso exposuisset, ut & ad fossam aqueam decubuisset, intra biduum Apoplexiâ tacta interit: vid. SENNERTUS. Ita ut privativa Apoplexia, quatenus ex causa saltem externa oritur, pro faciliiori praxi nunc sanguinea, vitio nempe sanguinis in cerebro extravasati, & grumosis cerebri tirocturam & spirituum motum lædentis, nunc serosa seu lymphatica dicenda sit: Vid. *Observ. Anat. in BONETTI Sepulchreto:* (dico: pro meliori Praxi; nam in Theoria vix omne ferre poterit punctum:) quorum ista hominibus mediæ seu consistentis ætatis, iracundis, corpulentis, obes, ebriosis, & aliàs apparenter sanissimis, posterius verò senibus decrepitis, catarrhosis, & similibus, obvenire solet.

Vapores Mercuriales pariter Apoplexiam inducunt, vid. LANGIUS *Epist. l. 1. Epist. 44.* hinc qui Venetiæ specula Mercurio illinunt, ad Apoplexiam declinant: Vid. *Acta Societ. Reg. Vol. 1. pag. 18.* Præterea vapores thermarum sulphurearum Apoplexiam inferre notat SCHENCKIUS *l. 1. Observ. 2.* Sicuti ex nimio calore ex vaporibus putcorum cœnosorum Apoplexiam refert MARCELLUS *lib. 2. c. 6. Fumi narcotici, metallici, carbonum, cerevisiarum, & vino.*



& minorum effervescentium, etiam referuntur à quamplurimis ad causas Apoplexiæ privativæ remotas, quatenus spiritibus animalibus vincula inticiunt, ut ipsa experientia loquitur. Verùm hi ipsi sumi narcotici potius Carum inferunt, quàm perfectam Apoplexiam, & inferunt quidem interdum carum sæpius satis profundum & Apoplexiæ finitimum, non tamen, vel dixi, Apoplexiam perfectam.

In talibus caroticis, à narcoticis sumis obortis, probabile est admodum, præter spirituum animalium fixationem à narcotico, simul etiam accedere aliqualem sanguinis coagulationem, quatenus tales affectus sæpius in pleuritides & peripneumonias (post fumos tales haustos) & similes affectus, à sanguinis coagulo ortos, desinunt: Vnde rectè quibusdam talis carus similis apoplexiæ, aut proximus saltem ejus gradus, habetur. Cui etiam causarum generi adscribendus venit terror ac gaudium immodicum: de quorum priorè vid. HILDANVS Cent. 6. obs. 12. & LOSSIVS lib. 1. obs. 14. qui refert, terrorem ex sclopeto exploso Apoplexiam intulisse; quatenus spirituum motum & agilitatem sistendo, horum influxum ad inferiora inhibent: Sicut ex nimio sonitu Apoplexiam obortam, etiam notat FONTANVS in Curat. & Respons. l. 1. pag. 49. & AMATVS LVSITANVS Cent. 3. obs. 16. à tonitru BENIVENIVS c. 13. Quod etiam pertinent Apoplexiæ ex fulmine, quæ notæ sunt ex MARCELLO DONATO, & SCHENCKIO.

Sed ultra hanc privativam Apoplexiam, etiam alteram dari positiuam, confirmant tam opiata in majori dosi usurpata, quàm Gas carbonum, aut liquorum fermentescentium, quando in cellis vinariis subito Apoplexiâ instar suffocatorum intereunt; uti & spiritus vini vel vini generosioris abusus, quæ positivè efficaciam narcoticam, & stupefactivam qualitate Apoplexiam inferunt, spiritus animales alterando & stupefaciendo, unde in motu cessant. Sed cum hæc fiant saltim à causa externa; tamen & talem etiam à causa interna oriri, primus docet & accuratè defendit HELMONTIVS, & probabile sit ex eo, quod alii affectus soporosi, spectatim comata, lethargi & catalepses, ex causa interna oriantur: quidni ergo & apoplexia? quæ vix essentialiter ab istis differre videtur: Scilicet HELMONTIVS Tr. de Lithiasi cap. 9. à §. 41. ad §. 90. In eo est totus, ut propriè sic dictam Apoplexiam à causa interna enasci asserat, eaque positiva, nempe à certo quodam veneno anodyno & glaciali in stomacho hærente, ex digestionis propriæ errore enato, occasione cujus archeus horrescat, fugiat, & ideas cadaverosas illius recrementi pariat, quo ipso cerebrum cum pedissequis potentiis, horum nempe spirituum insitum, in sui obsequium trahat, per actionem regiminis stomachi aut duumviratus. Vnde talis terror in spiritibus dictorum locorum incolis excitatur, propter quem terrorem nunc utrumque, nunc debilius medullæ latus, contrahitur, unde paralytis Apoplexiæ supervenire dicitur. Quia HELMONTIVS est obscurus, conferatur GREMBS Tr. Arbor Ruinosa & Integra Hom. l. 2. cap. 1. §. 43. & seqq. pag. 268. qui meliùs explicavit hypothesein HELMONTII.

In hac hypothesei duo consideranda:

1. Res ipsa, an sit talis Apoplexia positiva?
2. Modus rei, quo se habeat, ut ex tali fonte morbo in præcordiis hærente inferatur Apoplexiæ?

Quoad prius: excitari Apoplexias à causis internis, spiritus animales vitiantibus, & stupidos ac torpidos reddentibus (ut nostro loquendi modo rem declarem) & ita positiuè operantibus, illisque circa stomachum seu ventriculi superius orificium consitis seu hærentibus, h. e. dari Apoplexiam positiuam ex præcordiis excitatam, verissimè arbitror: Idque (1.) à iuvantibus: Observatum enim frequenter, quod vomitus optimum sit in quamplurimis Apoplexiis etiam fortissimis remedium; quod citius provocatur, eò melius. Præter HELMONTII effata vid. LANGIVS in Misc. pag. 11. & 12. ubi binos fortes apoplecticos per vomitum curatos refert: HENRICVS ab HEER Obs. 18. ex observationibus præfert vomitus venæ sectioni in Apoplexia: quod etiam observavit BARBETTE in Praxi, qui dicit, venæ sectionem rarò convenire in Apoplexia, sed potius vomitoria. Certum est, in Apoplexia, sed positiva, optima esse vomitoria, quorum loco clysmata acria in Praxi vulgari usurpari solent; Perinde enim est, si ve stimuletur anus, si ve vomitus excite-

tur. Item subtilia aromatica, odorifera & omnia stomachalia, brevi recreant tales apoplecticos. (2.) A nocentibus: Nempe Gas seu halitus carbonum oretenus inspiratus interdum Apoplexiam, utut ad cerebrum non perveniat, sed dum affigit orificium stomachi, graves vertigines, item caroticos affectus insert, ex affecto imprimis stomacho. Dicuntur afficiendo sanguinem etiam successivè afficit cerebrum: Sed posito, rem ita se habere; certum tamen est, quod hoc Gas imprimis simul afficiat orificium stomachi; unde ex stomacho affecto vertigo & Apoplexia superveniunt: qua ratione imprimis ex stomacho affecto Apoplexiam deducere conatur HELMONTIVS, utut non possit dici modus aut ratio fiendi; Nam ob id nominatus juvat: Hinc cupediarum artifex ex carbonum Gas inebriatus, mortui instar in carbones incidit candentes, sine sensu totum semur comburens. Par ratio est in his, qui vaporibus vini ac cerevisiæ fermentantis subito suffocati intereunt; Nam vel vomitus superveniens, vel mox institutus, est salubris. Facit huc vini generosioris abusus, item Nicotianæ fumus, qui manifestè Apoplexiam talem positivam ex præcordiis oriundam insert: Vid. GREMBS lib. 2. cap. 1. §. 37. pag. 465. cit. Tract. qui hanc HELMONTII sententiam de veneno narcotico in præcordiis, apoplexiam excitante, confirmat nobili exemplo per tabaci abusum, quandam ex eo redditum esse adeò stupidum, ut cum stertore instar apoplecticorum jaceret. Fuit Apoplexia positiva ex vi narcotica, per vomitoria curata. Nicotianæ fumus ergo in specie circa stomachum hærendo, & per consensum cerebrum afficiendo, Apoplexiam intulit. Sic ex esu fungorum excitatam Apoplexiam, vomitu, quo fungi ex stomacho rejecti fuerunt, imprimis curatam, videb. in BARTHOLINI Aët. Hassi. Volum. 2. pag. 295. (3.) Ab Adjunctis, quæ in talibus observata sunt: Curavi ante biennium mulierem quadraginta annorum, ex causa interna apoplexia fortiter improvise enata correptam, quæ brevi in Hemiplexiam totius lateris sinistri desinebat: Hæc in insultu & post conquerebatur in paroxysmo de gravissima angustia & anxietate præcordiorum, simul cum insigni in somnum propensione: Non erat debilis ex spirituum animalium defectu, non in membris, nec imminabat animi deliquium, sed in somnum propensio positiva; Aliud enim est defectus virium ex spirituum animalium defectu præcisè, aliud somnolentia ex eorum torpore. Summe debiles ex spirituum animalium defectu ad ultimum vitæ articulum sunt insomnes: isti verdè aliàs validi ex improvise somnolenti sunt. Et quidem recrudescente subinde paroxysmo, præcedebat præcordiorum angustia, cui superveniebat somnolentia: Illa cessante & hæc cessabat. Vnde & alio tempore, sex vel octo septimanis à primo insultu, propinatum ex alia causa vomitorium antimoniale, cum anxietate præcordiorum viris imbecillitatem & insignem ad somnum propensionem inferebat. Jam verdè quid vomitoria præstant ad somnum proferendum? Confirmat hanc hypothesein HELMONTII, quod nempe tunc circa stomachum vomitorium dum inferret angustias, & ægra inclinaret ad somnum, & quod hæc Apoplexia somitem suum in orificio stomachi habuerit. (4.) Ab antecedentibus: Sic vertigo diuturna, per consensum stomachi enata, est prodromus Apoplexiæ insensibus. Dico: in sensibus; nam homines consistentis ætatis sine ulla tali præcedente apoplectici sunt. Plura huius novi exempla: Parenti meo certò imminet Apoplexia: Plures sunt anni, quod vertigine per consensum stomachi laborat, & hæreditario vitio ad apoplexiam inclinat: unde certus sum, quod hæc vertigo ex stomacho certò prædicet Apoplexiam. Omnes ejus ex materna linea parentes Apoplexia tacti fuerunt: Avia materna hoc affectu interit, & mater jam semel Apoplexiæ correpta fuit: Vnde hæreditarius character à parentibus apoplecticis in liberos delatus patet. Nam si quid aliud, Apoplexia est malum admodum hæreditarium, quod ab omnibus Practicis asseritur. Notatu dignum hujus rei exemplum refert FORRESTVS l. 10. obs. 70. de sene quodam sexagenario crasso & obeso, cujus frater apoplexia interierat: cui cum inter ambulandum annuntiatus fuisset, quendam octogenarium virum sibi familiarem subito extinctum esse, subito pes sinister ipsi tremere cepit, & domum reversus Apoplexia correptus fuit: qua sublata, sequente annodenuò ab Apoplexia tactus interit, non secus ac pater, ac ejus frater. Sed talis character hæreditarius apoplecticus, qui à parentibus transfertur in liberos, antequam ipsi Apo-



Apoplexiâ correpti fuerint, revera *positivi* quid in Apoplexia subesse innuit, à quo *vertigo* etiam ex stomachi consensu. & tandem *Apoplexia* supervenit. (5.) Experientia POTERII idem persuadet, qui omnes Apoplexias & paraplegias, etiam post Apoplexiam supervenientes, curavit per *aurum* suum *diaphoreticum*, præmissis universalibus; quod habet adhuc in se corporale aurum, adeoque ejus efficacia se exerit in stomacho, & primis viis, ultra quas non extenditur: quia est remedium fixum. Hoc etiam confirmant remedia alia appropriata, v. g. *cinnabaris antimonii* & similia, non nisi intra primas vias *positivè* operantia, quæ ad Apoplexias & paralytes sunt egregia. (6.) *Modus fiendi subitaneus* & frequenter *momentaneus* rem per *humorum defluxum*, aut *viarum oppilationem*, quæ per successionem saltem fit, vix sufficienter explicat, adeoque aliud quid subest necesse est, quod tam subito malum inferat. Sed hoc *Gas rerum fermentescentium* suâ penetrante narcosi & momentanea operatione optimè illustrat. Ob id etiam WILLISIIUS non acquiescit in solo humorum serosorum aliorumve in cerebri medullarum præternaturali translatione, sed simul *vim virulentam*, spiritus animales fugantem & extinguentem, unâ accusat. Equidem sapientissimè signa quædam *circa caput* & animalem facultatem præcedunt, quæ imminenti Apoplexiæ metum incutiunt: vid. SYLVIIUS lib. 2. cap. 21. §. 32. & seqq. Sed hæc ipsa medio se habent modo, ita ut capitis affectum per essentiam, ut & per consensum, insequi possint; sicut vertigo ex stomacho in senibus tale existit prodromum symptoma in habituali Apoplexia. Unde *sedulo* semper investigandum: an aliæ concurrentes circumstantiæ generales plus minus affectum capitis per *πρωταρχίας*? an verò per *δευτεροαρχίας* designent? Sicut non rarum est, epilepsias universales per abdominis consensum excitari, & remedia, quæ abdominis apt hypochondriorum spatia non excedunt, & delirium & spasmi & cephalalgis optimè subvenire, v. g. Martialia, cinnabaria, vomitoria, clysmata, &c. Mulier epileptica, laborans malo hypochondriaco, conquerebatur de dolore capitis, & simul de tensione hypochondriorum. Jam verò quoties usurpabantur Martialia, remittebat tensio hypochondriorum & dolor capitis; si verò repetebat tensio hypochondriorum, etiam dolor capitis reperebat. Unde symptomata ista, quæ sunt prodromi Apoplexiæ imminenti, possunt fieri ex capite, per consensum & per essentiam affecto.

Quoad posterius, nempe Apoplexiam ex affecto stomacho: hæc quidem quoad rem ipsam satis clara esse videntur, sed quoad modum rei res obscura & intricatissima est: Ad veterum vapores & halitus, aut Chymistarum effluvia vitriolica stupefactiva adscendentia, effugere est ridiculum: Ignoram Actionem Regiminis HELMONTII profiteri, est palliare propriam ignorantiam: Consensus, qui per nervos saltem explicabilis est, & hic vix locum mereri videtur, cum hic semper sensum, & hujus demum ratione consensum præsupponat, qui in apoplectici penitus torpet; nisi dicere velimus, per consensum irritatorum nervorum circa præcordia, stringi cerebri fibras nervorumque principium, cujus contracturæ occasione spirituum in partibus externis deficiat motus, qui in cerebri medullis perurbatus sensum & rationem tollat: Per sanguinis & spirituum animalium circulem motum negotium quodammodo illustrari posset, sed & hic quamplurima obstant. Res ergo difficillima est: Narcosi quidem percuti & stupefieri spiritus animales, seu figi, & quasi plus minus coagulari, plausibile est: quomodo verò hoc ex præcordiis fiat? res hæret & à priori latet. Nempe sicuti opiata vel semen hyoscyami, fungi vel Gas carbonum in stomacho adhuc hærentia, inferunt affectus soporosos & caroticos, & hac ratione spiritus animales inficiunt & torpidos reddunt; ita etiam similis virulentia narcotica ex causis internis in corpore nata, & circa præcordia existens in regione stomachi, spiritus animales afficiendo Apoplexiam positivam inferre solet. *Modus tamen rei latet*. Sufficiat pro meliori doctrina, & ad Praxin manu ductione, differentiam apoplexiæ in privativam & positivam insinuisse: observando simul, ex causis externis frequentiores esse accidentalem; sicut ex internis habituales: & has inter, quæ ex causis internis oriuntur, serè frequentiores esse positivæ, quàm privativæ.

Consideremus jam *Causas remotas* Apoplexiæ positivæ: sed si has ipsas, prout à Scriptoribus consignatæ deprehenduntur, consideremus, eadem serè ad *privativas*, minus ad *positivas* Apoplexias pertinent, ut notabilis & curiosa sit observatio WILLISII de Anima Brutor. Part. 2. cap. 8. Deinde magis accidentales serè, quàm habituales sunt Apoplexias istæ, quas referunt. Adhuc *remota* istæ *causæ*, exceptis iis, quæ manifestâ læsione caput afficiunt, potius *πρωταρχίας* sunt seu *antecedentes*, quæ *causam continentem* movent; aut saltem sunt subinde *causæ procatalitice*, quæ *dispositionem morbosam* internam commovent, ut ex proximis constituant. Ut taceam in Observationum Anatomicarum consideratione ex inspectis cadaveribus facillimam, modò non frequentem, esse *fallaciam à non causa ut causam*; ita ut vel præternaturale quid forsitan repertum, pro causa morbi mortisque habeatur; vel etiam productum quoddam morbosum pro genuina illius habeatur origine.

Quoad causas permutatæ Apoplexiæ: tribus serè modis permutatur hæc; vel terminatur ad salutem ægri integram, remota & correctâ plus minus causa proxima; vel terminatur ad mortem, cessante tandem cordis motu pulsatorio, unde suffocati intereunt ægri; vel denique ex universali in particularem transit Apoplexia, nunc pauciora, nunc plura occupantem membra.

Quoad (1.) fit, quando post successivam evacuationem, sive sanguinis, sive per vomitoria, sive per alvum, in specie per sudorem solvitur pedetentim Apoplexia ad perfectam ægri salutem. Quod pertinet, quando mediante salivatione uberiore, vel spontanea, vel remediis Mercurialibus instituta, successivè curatur Apoplexia; quod observavit SENNERTUS in Praxi lib. 1. Part. 2. cap. 23. pag. 664. ubi de Apoplexia, & DECKERS in Barbetæ Prax pag. 21. & 29.

Si verò (2.) terminatur ad mortem, fit, quando successivè ægri suffocati intereunt. Fit, quatenus cessat plus minus spirituum animalium motus, etiam ex cerebello ad cor & organa respiratoria, deficit pedetentim pulsus & respiratio, quibus cessantibus ægri suffocati intereunt: cujus rei prodromus est stertor profundus, cum spuma per asperam arteriam elevata, & pedetentim circa os appareat. Nam talis spuma signum est manifestum sanguinis motus per pulmones planè impediti, qui in pulmonibus hærens, per aliquam aeris inspirationem concussus & agitatus, resolvitur in talem spumam; eodem modo ac cerevisia agitata in aere in similem spumam abit. Quod talis spuma sit sanguis ita attenuatus & resolutus, testatur anatomia mortuorum; quia TULPIUS lib. 5. cap. 57. refert in iis, qui Apoplexiâ moriuntur, quod aspera arteria spumoso sanguine repleta reperitur: Sic HIPPOCRATES dicit, quod strangulati & suffocati ad se non redeant, quibus circa os spuma collecta appareat; item, qui repente obmutescunt cum stertore, intra septem dies pereant, nisi febris superveniat; item, qui repente obmutescunt & stertunt, si spuma circa os appareat, intereant. Distingendum tamen est inter spumam, quæ ex profunditate pulmonum erumpit; & istum humorem viscidum, qui in ægro, catarrho suffocativo laborante, cum aliquo stertore solet emitte, qui originem ducit ex membrana posteriori & inferiori Schneideri. Cessante tandem pulsu & respiratione, apoplectici suffocati intereunt.

(3.) In paralyfin seu in Apoplexiam particularem paroxysmus mutatur, quamvis nec hoc modo æger semper serveretur, sed sæpè aut prior morbus redeat, aut sopor lethalis superveniat. De modo, quomodo aut Hemiplexia aut Paraplegia seu Apoplexia particularis quædam Apoplexiæ universali succedat; v. g. ut brachium post universalem Apoplexiam maneat tantum paralyticum, reliquis partibus omnibus sensum & motum recuperantibus? res difficilis est. Equidem cum Apoplexia sanguinea in paraplegiam transeat, quodcumque etiam sanguinis, vel motu deficientis, vel extravasati, fuerit vitium, serè hæreo: quin potius talem Apoplexiam ut plurimum lethalem, rarids curabilem perfectè, existimo, nisi forsitan venesectio largior opem ferat: vid. TULPIUS lib. 1. cap. 7. & ZACUTUS LUSITANUS Medic. Princip. Histor. cap. 7. ubi habet juvenem florētis ætatis per scalam decidentem, cui copiosa hæmorrhagia.



rhagia narium secuta est, quâ depressa, in Apoplexiam incidit, à qua venæ sectione fuit levatus. Aut si paraplegia supervenerit, probabile est, ex sanguine congruato aut plus minus subsistente laticem aquosum fecisse secessum; & vel interius profundius penetrans, scilicet per cerebrum in caudicem medullarem; vel exterius defluxisse secundum situationem spinalis medullæ, & ita unius alteriusve nervi læsione vel oppressione paraplegiam intulisse. *Privativa verò lymphatica Apoplexia* successivâ lymphæ materiæ peccantis ulteriori progressionem, & in caudicem medullarem interiora versus insinuationem, adeoque certis in locis vel obstructione vel compressione paraplegiam inferre posse, satis plausibile videtur, in qua nunc motus solum deficiat in leviori malo, nunc sensus tantum in graviore, & in quo omnis spirituum animalium transitus penitus intercludatur. *Positivam* etiam excipere paraplegiam res nota est: Sed modus est obscurissimus; interim ob occultum modum vel rem ipsam negare, absolum est. Paraplegiam esse contracturam partium nervosarum, quâ impediatur spirituum promotu transitus, non improbabilis est HELMONTII assertio: sed quomodo fiat? & quibus differentiis à propriè sic dicta contractura seu spasmo partium differat? difficile est determinatu, nisi forsitan dicere velimus, nervos eorumque fibras circa radicem aut prope exitum ex caudice medullari contractos, inducere paraplegiam; sicut ipsi nervi in progressu sui ipsius cum toto nervorum & fibrarum nervosarum, cum quibus connectuntur, systemate contracti, dare convulsionem.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa: Apoplexiâ tactum esse hominem facile patet, si subito omnis sensus ac motus pereat & simul vox repente auferatur, solâ respiratione nunc libera, nunc satis difficili remanente: *Æger* quasi dormiens aut semimortuus, nisi adhuc aliquis faciei color & pulsus animadvertatur, jacet nam: quidam apoplectici pulsum adhuc habent naturalem; quidam pusillum; quidam omnino nullum, uti rectè observat LINDANUS, prout plus vel minus sanguinis circa præcordia stagnat, aut prout etiam nervus cor movens simul afficiatur. Color faciei & oculorum interdum rubet, tumidus est, & simul corpus calet, in illa ipsa Apoplexia, quæ est ex sanguinis stasi seu impedito circulo: è contrâ uerò interdum facies pallet, flaccidaque est, & corpus sensum infrigidatur, ubi aliud vitium, quàm sanguinis stasis, Apoplexiam infert. Membra omnia in Apoplexia sunt laxa, & si brachium vel pes levetur, pondere suo statim denuò concidit. *Æger* tactus, irritatus, acclamatus, nec loquitur, ore hians, & plus minus stertente quasi profundum dormit. Resolvitur interdum simul anisphincter, unde alui feces, aut injecta clysmata, denuò infuso egro ejiciuntur & rejiciuntur. Denique memoriæ subitanea læsio absque causa externa imminens Apoplexiæ indicium habetur.

Ut autem ritè distinguatur Apoplexia, qualis sit? an *positiva* an *privativa*? ab antecedentibus, & hinc ab adiunctis cognosci debet: Illam causæ externæ, vitæ genus, habitus ægri, diæta, &c. suggerunt; facile tamen *positiva privativam* supervenire, & invicem complicari possunt: Illius occasione, sanguinis motu sufflaminato, & ita circa cerebrum eodem stagnante, *syncope cardiaca*, similis affectus Apoplexiæ, oritur, ut *suprà* monitum. Sic v. g. si æger aliàs laborat vertigine, quæ sæpe semper ex stomacho, si antea fuit natus à parentibus apoplectici, hæc præsumunt esse Apoplexiam positivam: Sicut etiam si Apoplexia corripitur juvenis *ιουνατος*, plethoricus, vitam sedentariam agens, suspicio est, malum esse Apoplexiam privativam ex sanguinis vitio. Si corripitur Apoplexia senex, qui sæpius fuit catarrhosis, suspicio est, esse Apoplexiam privativam vitio lymphæ, ex uberiore lymphâ in ambitu cerebri natam. Si æger in mediocri Apoplexia aliqua signa possit edere, ubi urgeat, & manu tangit præcordia, certum signum est, esse positivam: quando vellicat caput, & movet manum ad caput, signum est privativæ.

Dixi, quod vicinissimus affectus sit Apoplexia cum *syncope cardiaca* seu Catarrho suffocativo, & differant tantum loco affecto, adeo ut quidam etiam Apoplexiam

ad affectus cordis referant, & eodem modo curent. Cautus ergo sit Medicus, ut cognoscat Apoplexiam à catarrho suffocativo: Scilicet differentia est facilis, modò cognoscatur respirationis negotium plus minus laboriosum. Signa ergo, quæ pro distinctione Apoplexiæ & catarrhi suffocativi observentur, sunt hæc: quod in *syncope cardiaca*, seu *catarrho suffocativo*, ex sanguinis stasi in pulmonibus æger difficillimè respiret, & signa adsint gravissimæ in pectore angustię, ipse æger omni etiam conatu membra & artus movere conetur, utur mortuorum instar jaceant. Qui autem Apoplexia graviore corripitur, is vix manifesta vitæ habet signa, neque tamen tanta spirandi difficultate vexari solet. Nam in catarrho suffocativo difficillimè respirant, in Apoplexia etiam parum, aut tardè, aut saltem *naturaliter* spiritum ducunt, nisi in summo gradu ejusdem. Pulsus quoque, qui in *syncope cardiaca* sæpe deficit, in affectibus apoplecticis sæpe durus observatur, ita ut aliqui pulsum servant, alii pusillum habeant, raro, nisi in fortissima Apoplexia, nullum, prout nempe plus vel minus præcordiorum sanguis stagnat, aut nervus cordis afficitur. Præterea in *syncope cardiaca*, externa frigent, facies pallescit, sudor frigidus erumpit, pulsu evanescente, & respiratione penitus ablata. In Apoplexia, abolitis functionibus animalibus, nihilominus respirant, arteriæ pulsant, extrema calida ut plurimum deprehenduntur, & facies rubicunda observatur: Vid. WEPFERUS de loc. affect. in Apopl. Præterea in Apoplexia quavis fortis stertor est, quia spiritus animales, qui à cerebro accedunt musculis thoracis ad complementum respirationis, solum sunt ablati, durante adhuc per cor & pulmones sanguinis circulo; unde in *syncope cardiaca* nullus est stertor, quia cor ipsum subito occupatur.

In gravi passione hysterica etiam ægræ instar apoplecticarum jacent, unde confunditur cum Apoplexia interdum. Distinguuntur tamen facile, quod in *suffocatione uterina* dicta præcesserint symptomata affecti abdominis; item quod in *suffocatione uterina* interdum vis sentiendi persistat, nec respiratio tam facile impediatur; & quod in *suffocatione* hac pulsus fiat obscurus, debilis aut parvus, aut sæpe nullus; qui sæpe in Apoplexia admodum sensibilis est. Et in specie cum subinde in Apoplexia faciei color sæpe persistat, imò rubitundi ac tumidi subinde in facie appareant, hic in *suffocatione uterina* omnino color perit, quin potius facies pallescat.

A Caro facile distinguitur Apoplexia in eo, quod sensum invadat, non adeo subito ac Apoplexia: item caro etiam laborantibus est respiratio facilis sine omni stertore; aut si adsit stertor, adsit cum somno, eoque satis profundo.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Notum est, quod Apoplexia sit acutissimus & periculosissimus affectus, qui ægrum ut plurimum trucidet; & licet non semper exin moriantur ægri, paralytici tamen evadant. De hoc dicit HIPPOCRATES *sect. 5. Aphor. 5. Item sect. 6. Aphor. 51.* quod quicumque sani repente doloribus capitis tententur, statim obmutescant & stertent, in septem diebus pereant, nisi febris eosdemprehendat, quæ Apoplexiæ superveniens conducit.

Febris tamen non sit à stagnatione sanguinis circa cerebrum aut phlegmonode hujus constitutione, nec lenta: Imò & hoc addere convenit, nisi à comprimente extrinseco fuerit malum, illudque tempestivè tollatur.

Dicit etiam *sect. 2. Aphor. 41.* quod Apoplexiam fortem solvere impossibile sit, debilem verò non adeo facile: (quid per debilem & fortem intelligatur, *suprà* dixi) Interim vitæ periculum variat pro diverso morbi gradu, huicque magis aut minus difficulti combinatâ respiratione. Vehementia autem hæc & periculum Apoplexiæ ex noxa, quam respiratio affert, imprimis cognoscitur; nam qui Apoplexia moriuntur, omnes suffocati intereunt. Unde quò liberior est respiratio, eò minor est Apoplexia, & major salutis spes; & contrâ, quò magis impeditur respiratio, eò majus periculum solet imminere apoplectico.

Imprimis quidem, ubi Apoplexia in tantum lædit respirationem, ut præter stertorem etiam spumâ circa



os apparere incipiat, ferè lethale Apoplexiæ signum est, ut rectè hoc affirmat **FOR ESTUS** lib. 10. *Obs.* 74. in *schol.* ubi dicit, quod spuma circa os apparens sit unum de præcipuis signis lethalibus, cum sit extremum signum, à quo rarò evadunt: Item **TULPIUS** lib. 1. *Observ.* cap. 51. refert, quod in iis, qui Apoplexiâ moriuntur, aspera arteria reperiri soleat post obitum spumoso sanguine repleta.

Spuma ista, ut jam supra *Sect.* 14. *Cap.* 3. *Artic.* 4. de Catarrho suffocativo monui, certum & infallibile signum est sanguinis motus omninò per pulmones impræditi: ex quo sanguine in pulmonibus, & tandem in ipso corde, ita gnante per aëris validam & reciprocam, sed stultitiam, respirationem elewantur spumæ, unde hæc ipsæ etiam non nisi in ultimo ferè articulo apparere solent. Unde dicit etiam **HIPPOCRATES** *sect.* 2. *aph.* 43. quod strangulati & suffocati, nondum tamen mortui, ad se non redeant, quorum circa os spuma collecta appareat. Multum hic litigant Autores: optima est interpretatio **LINDANI**: *Strangulatio hic non à collo, sed per eos intelligitur, quibus subito à causa interna respiratio intercipitur. Hæc à multis potest intercepti, v. g. in suffocatione uterina. Itaque Hippocrates hoc vult: Potest respiratio intercepti, & non redire: sed an reditura sit? cognosces, si spuma oriatur circa os, tunc certus esto, eam suffocationem esse circa cor, à stagnatione sanguinis circa illud. Quando enim natura extremo conatu voluit sanguinem propellere, inde suborta in pulmone spuma est, & ad os detrusa; & si aperto ore spuma prodierit, desperata res est.* Hæc **LINDANUS**. Nempe spuma non præcisè mortis, sed supremis videntium conatus est in talibus agris; hinc non semper & necessariò mortem portendit, quemadmodum **TULPIUS** lib. 1. *observ.* 7. testatur, cum materia spumæ hujus modò serum ex pulmonibus transudans, modò salivæ humiditas ad os deposita, & per difficiliorem & crebriorem respirationem in spumam redacta sit: quorum illud suffocationis instantis signum, Apoplexiam semper lethalem; hæc non semper, indicat: vid. **SENNERTUS** *Præx.* lib. 1. *Part.* 2. *cap.* 33. & **TULPIUS** lib. 1. *Observ.* 6. Observandum ergò est hic, ne confundatur spuma vera cum viscoso quodam liquore vel saliva viscida effluente. Fit enim nonnunquam, tam in catarrho suffocativo, quam Apoplexia, ut ægri ita jacentes humorem viscidum copiosè per os rejiciant, qui nihil habet consistens cum spuma, sed ex membranæ pituitariis Schneideri, vel potius ex glandulis sub illis latentibus emungitur. Omnis spuma oritur ex aëris & humoris plus minus viscidæ mixtura, adeo ut etiam sanguis in spumam albam subrubicundam abeat, ad instar cerevisiæ obscuræ, per agitationem tamen cum aëre in candidam spumam abeuntis. Spuma autem vera non nisi est parva, nec adeo copiosa, ex imo pectore sensim scatet, & sursum fertur, sensim sensimque augmentata. Non ergò levis ista spuma adeo periculosum signum est, quæ ex saliva intra fauces agitata oritur, & qualis in paroxysmis epilepticorum ordinariò observatur; sed illa ferè fatalis est, quæ ex imo pectore seu ipsis pulmonibus ex sanguine plus minus stagnante, per aëris reciprocum motum attenuato, & ita in spumam rarefacto, oritur, & ita in fauces foras ebullit: adeo ut observati sint apoplectici in **SCHENCKII** *Observationibus*, quibus etiamnum post mortem talis copiosa fervida spuma per nares, os, & prominentes oculos fuerit excreta. Quò major spuma in ore, eò majus est periculum: quò major pulsus, eò melior spes. Ex spuma eò magis afficiuntur pulmones, quia agitur aër, nec promoveretur in locum consuetum, scilicet cor.

Deinde de sterore equidem certum est, & illum ut plurimum, quò vehementiorem, eò difficiliorem morbum ostendere: nihilominus etsi hic remittat, reliquis symptomatis tamen non simul remittentibus, non salutis, sed mortis certissimæ signum evadit; & contra, ubi mox cum sensu & motu respiratio aboletur, quamvis nec steror nec spuma appareat, fortissima & lethalis Apoplexia erit dicenda.

Denique apoplectici, si in difficillima respiratione supervenit sudor, lethale est; Est enim sudor symptomaticus, & quasi syncopæ (ein Angst-Schweiß, ut vocant) non verò naturalis sudatio, & signum est deficientis plantæ facultatis vitalis.

Apoplectici curati facillè recidunt, & hi ipsi melius

Estmüll. Oper. Tom. II.

habentes post universalia, bonum est; aut aliquomodo excitati, si denuò somnolenti aut plus minus torpidi fiant, illud periculum recidivæ imminet; siquidem apoplectici, perfecte licet curati, facillè tamen recidunt.

De cetero si erecto corpore locatus æger, aut post sanguinis missionem, aliquantum ad se redeat, aliqua spes affulget: sin verò post hæc & alia remedia affectus ultra 24. horas in eodem statu permanet, aut cum somnolentia, vertigine, ac torpore recrudescat, de ægro adum erit.

In Apoplexia correptis imprimis habenda distinctio ætatis, & hinc dependentis corporis status; cum Apoplexia juvenum, aut mediæ ætatis sanguinem corripiens, vix sit ejusdem rationis cum Apoplexia, quæ senem, aut debilem, aut emaciatum, aut similem affligit.

Solvitur Apoplexia, quando evacuationibus per inferiora aut per sudorem tora discutitur, aut si eadem in paraplegiam quandam aut etiam hemiplexiam desinit. Observatum fuit, terminari interdum Apoplexiam fluxu auris lymphatico, qualis lue Venereâ laborantibus post inunctionem Mercurialem accidit. Unde etiam **BARBETTE** in curanda Apoplexia talem inunctionem commendat. Aut etiam ipsa apoplexia facillè somni admodum profundi, ægrum interimit. Cetera vid. in **SCHENCKII** *Observationibus*.

## C U R A.

Quod ergò attinet Curam, hæc duplex est: Curatoria, seu quæ instituenda est in ipso paroxysmo, in quo exsultandus quasi est æger, ut spirituum animalium motus redeat; ac Præservatoria, seu extra paroxysmum, quæ causarum antecedentium tantum rationem habet, quo tempore observatis debitis evacuationibus, simulque usurpatis caput ac ventriculum roborantibus aromaticis, redditus paroxysmi est præcavendus. Neque enim cum æger apertè reconvaluit, scopi curationis sunt negligendi; nam tales sæpius diu stupidi manent, variæque accidentia eos vexant, adeo ut si Medicus sit negligens in Cura, facillè eveniat, ut paroxysmus revertatur, unde ægri postmodum moriuntur.

In ipso paroxysmo duo imprimis Præsidia generosiora sunt, quæ aut liberant ægros rectè administrata, aut eos trucidant, malè applicata: & hæc sunt Vomitus & Venæsectio, quorum unum ut plurimum necessariò adhibendum est, interdum utrumque simul. Nam de clysteribus eorumque usu, item de suppositoriis, quæ acriora & fortiora semper sunt applicanda, etiam omnes concordant Medici Prædici, quod in omni paroxysmo apoplectico, & post eundem etiam, tutissimè & etiam necessariò usurpentur. Clysteres tales acres in minore copia subinde injiciuntur, nempe à ℥ss. ad summum ℥viij., quia sic diutius retinentur & melius operari solent. Quod si non retineantur, aut saltem non satis diu persistant in corpore propter sphincterem ani resolutum, repetendus est eorum usus, idque eò frequentius, quò magis urget morbus: Si verò nullo modo in actum deduci possit clyster, tunc remanentia clysmatis, seu materia decocti remanens, instar pultis est coquenda, super pannum extendenda, & toti abdomini instar cataplasmatis imponenda. Hoc enim remedio feliciter usus fuit **D. MOEBIUS** in curando **SLEVOGTIO** apoplectico.

Sed ut redeam ad Vomitus & Venæ sectionem, motus admodum est in Vomitu, ne suffocationis imminens acceleretur periculum, quod non paucos, accuratos etiam, Medicos deterret, adhuc cum deficiat motus corporis, & etiam partium internarum: Et sanè posito, quod ex impedito sanguinis motu fiat Apoplexia, privativa, vix tamen videtur conveniens vomitus & necessarius, sed nocuus dicitur; imò periculum est, ne sub vomendi conatu sanguis ac serum circa collum & caput retineatur, & hinc istæ partes magis obruantur, cum naturaliter sub vomendi conatu facies rubescere, oculi tumescere, & collum inflari soleat. E contra venæsectionis medio sanguinis circularis motus in quavis Apoplexia plus minus impeditus promoveri potest. Interim de venæ sectione ipsius **CÆLSI** est pronuntiandum, quod sanguinis detractio in Apoplexiæ paroxysmo admodum, aut occidat aut



liberet ægrum, i. e. prout tempestivè vel intempestivè magis applicatur. Unde etiam venæ sectionem rejicit BARBETTE per experientiam confirmatus in sua *Praxi* cap. 2. tanquam frustraneam, sæpiusque nocivam: uti etiam observandum est imprimis illud, quod habet HEINRICUS ab HEER in *Observat.* 18. quod nempe nostrates, qui ingluvie & comestationibus ferè Apoplexiam incurrant, phlebotomià vix unquam curentur, ob id etiam vocat dubium remedium venæ sectionem in Apoplexia, adeò ut centesimus ægrè, educto sanguine, evadat: *Quæ etiam causa est, cur prudentiores Medici* (verba sunt HEINRICI ab HEER) *nostro cælo ferè ab illa abstinant.* Et in tali casu reverà vomitus præ venæ sectione longè magis necessarius videtur. Res ut aliquantisper fiat clarior, pro decisione observanda est differentia Apoplexiæ, quam supra insinuaui. Si enim signa adsint, vel suspicio quædam saltem probabilior, sanguinem imprimis peccare, & sui stagnatione aut in cerebro aut in pulmonibus inducere Apoplexiam, tam positivam, quàm privativam, ut in his, imprimis junioribus, qui sunt corpore *ισχυρά* & succi pleno, qui vitam agunt sedentariam, in quibus facies insigniter rubet sub paroxysmo apoplexiæ, quibus consuetæ sanguinis per uterum, nares &c. evacuatio sit suppressa, in talibus pro imminendo sanguinis quanto & ejus circulo promovendo venæ sectio instituenda est, quam pluribus commendat SYLVIVS lib. 2. cap. 11. §. 96. CORTNULMIUS de Morbo Attonito cap. 60. NYMMANUS de Apoplex. cap. 39. idque quò citius eò meliùs, ut sub liberiore circulo fiat melior respiratio: Hinc ZACUTUS LUSITANUS *Prax. Admir. lib. 2. observat.* 104. sceminam suppressione mensium laborantem, & venæ sectionem negligentem, Apoplexiâ mortuam; in alia verò apoplectica, ritè quamvis fluentibus mensibus, eandem cum euphoria administratam, lib. 1. de Medic. Princ. Hist. 38. testatur. Ubi verò à sero malum, præservativè tantum venæ sectio agit, i. e. vasa deplendo ab affluxu sanguinis præservat, & ut serum faciliùs intra lymphatica & venas resorbeatur, præstat. Ad id positiva à narcosi, sive interna, sive externa, per se nihil, sed per accedens tantum aliquò levaminis præstat, stagnationem sanguinis circa præcordia declinando & solvendo: qua ratione in omnibus quoque reliquis Apoplexiæ speciebus, item in illa, quæ à terrore, similive affectu animi, non inutilis videtur: vid. PROSPER MANTIANUS in lib. 4. de vult. Acutorum §. 42. HILDANUS Cent. 3. *Observat.* 11. & 12. NYMMANUS de Apopl. pag. 216. & 217. ac SYLVIVS *Prax. l. a. §. 114.* Cautè nihilominus illa est adhibenda, aut de quorum virium debilitate (ante paroxysmum) constat, ne simile contingat, quod mulieri Hebrææ apud AMATUM LUSITANUM Cent. 4. Hist. 23. vid. HEINRICUS ab HEER: Adeoque pariter vix locum habet, ubi sanguinem viscidiorum & mucosum hariolamur; vid. WEPFERUS de Apopl. pag. 218. aliàs enim Apoplexia, quæ talis, non postulat venæ sectionem. Sed in senibus aut in debilibus ante paroxysmum, aut in ebriosis, & qui ex ingluvie præcedente corripiuntur Apoplexiâ, ubi cruditates ventriculi, ubi narcosis, sive interna sive externa, aut quibus jam vertigo & alia signa quædam capitis affecti præcursant, ubi potius videtur subesse lymphæ vitium, aut saltem in quibus nullum sanguinis primarium deprehenditur vitium, his convenit potius Vomitus, & nociva est venæ sectio, & sedulò hic observandum est monitum supra allegatum HEINRICI ab HEER in *observat.* 13. Uno nomine: In Apoplexia privativa magis Venæ sectio, aut loco ejus in senibus cucurbitulæ, scarificationes &c.; in positiva magis vomitus, & loco hujus, præsertim in senibus, clysmata acris conveniunt. Hinc illis præmissis, in privativa sudorifera volatilia, vesicatoria, fonticuli, cucurbitulæ &c.; in positiva verò Apoplexia aromatica, metallica sulphurea, & majora arcana, & stomachica conducunt. Quæ omnia ex circumstantiis secundum res naturales, nonnaturales & præternaturales, in cuiusvis ægri cura semper observandis, diversimodè adhuc limitantur.

De vena incidenda eadem observanda, quæ circa affectus soporosos monita; imprimis verò jugularium, venarum incisio maximè commendatur; vid. BOYLE de Apopl. cap. 11. aut in Plethoricis utriusque brachii ve-

næ; vid. TULPIUS l. 5. *obs.* 7. Pro venæ sectionis negotio illustrando confert cura cuiusdam ancille, mox à media nocte insultu apoplectico tactæ: Accedens manè horà octavâ illam habitus carnosus, succi pleni, robustam, facie & membris insigniter rubram, quasi sanguis undique flagaret, offendi, membra difficillimè, & saltem brachia equaliter, movere poterat, de summa præcordiorum anxietate, tremula & vix intelligibili voce, conquirebatur, Innuendo serobiculum cordis. Hinc præscribebam vomitorium in dosi intensiori; aliquoties, sed non vehementer purgabatur, suprà & infra. A meridie venæ sectionem in brachio ordinabam, & præscribebam misturam ex spiritu salis ammoniaci, seu basi, cum aliis spirituosissimis aromaticis nervinis. Cordi verò jubebam applicare linteam multiplicatum, spiritu vini calidè probe imprægnatum, idque sæpius repetere. Accedens altero manè eam paulò meliorem offendebam, facie adhuc admodum rubicundâ cum pulsu duro: hinc cum hæmorrhagiam observassem, non obstante jam factâ venæ sectione, jubebam etiam in crure, brachio, in quo venæ sectio facta fuerat, opposito, circa talam venam incidere. Noctè sequente adhuc supervenit fluxus menstruus. Unde continuatè spiritu salis ammoniaci interno, & spiritu vini externo, cum interposito semel pulvere laxativo, intra octiduum convaleuit. Et ita in hac ancilla corpulenta & staturæ brevis, ast robusta, natura ultra duplicem venæ sectionem, adhuc hæmorrhagiam narium & uteri provocavit. Videbatur mihi in subiecto hoc sanguinis circulus admodum lentus, non præcisè ex copia, sed ex fibrarum neruearum ac membranosarum strictura quasi spasmodica, quâ occasione sanguinis refluxus nonnihil moratur, ruborem illum faciei & artuum exhibet, sanguine ipso ob tardiorē transuasionem ex arteriis in venas, præter venæ sectionem nunc oscula vatorum narium, nunc uteri per anastomosis aperiente.

In genere verò & ut plurimum tutius & simul potentius remedium in paroxysmo est Vomitus, quàm venæ sectio, quem etiam suadet imprimis LINDANUS in suis scriptis; adeò ut Vomitoria fortiora antimonialia, in specie ex Mercurio vitæ, admodum commendentur ad apoplecticos curandos in tempore, ubi non opus venæ sectione; quam ipsam tamen rarissimè adhibendam suadet. Et quidem vomitus optimè suscitatur ægros, & quod aliàs irritando clysmate intendunt Practici, hoc efficacissimè obtinemus vomitu, præsertim cum experientia ejusdem usum sæpius comprobaverit. Quantum enim in apoplecticis valeat vomitus, duo egregia habebitis exempla in *Misc. Curiosiss.* LANGII pag. 1. & 12. ubi sunt due curæ notatæ digne propter usum vomitoriorum; & PETRUS à CASTRO in *Merb. Med.* se vomitoriis ultra spem plurimos desperatos excitasse affirmat, & antimonialia valdeperè commendat. Conf. ulterius JULIVS CÆSAR CLAUDIVS in *Empir.* pag. 349. & POTERIVS, qui croci metallorum vulgaris granis tribus vehementissimum apoplecticum excitavit, inundo simul ori oleo cinnamomi; item RIVERIVS, & alii plures. Infundenda ergò semper Vomitoria in forma liquida, ut spontè quasi per gulam desfluere queant, (malè enim deglutiunt, propterea sicci pulveres non conveniunt,) miscendo eadem unâ cum vehiculis spirituosissimis, cum aqua cinnamomi spirituosâ, sicut facit FABER, cum aqua & spiritu salvis, spiritu cerasorum nigrorum, & similibus, quæ valent excitare Apoplecticos, ut horum medio simul spirituum vigor nonnihil promoveatur. Et quidem augenda nonnihil in paroxysmo Vomitorii dosis, ut & aliorum remedium, quæ excitare debeant ægrum, cum torpor ægri insignem aliàs efficaciam ejus eludat: imò, monente HARTMANNO in *Praxi Chym.* duplâ dosi dentur, prout scilicet torpor major minorve est. Hinc syrupus emeticus ad ℥vj. & ℥i. præscribendus, item aqua benedicta. Rulandi. Essentiam quoque nicotianæ ad ℥ij. cum melle exceptam, & in os infusam, potenter educere, laudant RIVERIVS Pr. l. 1. cap. 2. & HARTMANNVS l. a. pag. 74. & 81. Occurrit curanda mulier ægæta, sed jam statim nonnihil decreverat, correpta affectu ex apoplexia & epilepsia quasi mixto: Vocatus manè, præmissâ venæ sectione, (utut non tam affectus, quàm adstantium ratione facerem,) præscribebam Portionem cum syrupi emetici Salæ ℥vj. capiebat sine alteratione; denuò ordinabam ℥ij. ejusdem, quas capiebat iterum sine alteratione: tandem adhuc ℥ij. ejusdem in pauca Portione præscri-



prescriberebam, ut successive caperet, & sic tandem, aliquoties supra & infra purgata, melius habuit. Postea, de prima Mistura aliquid deperditum fuisse, cum ex ore aliquid deflueret, tamen ad minimum ℥j. ad ℥ix. huius syrupi intra biberium accepit, nec tamen adeo insigniter purgata fuit.

In paroxysmo igitur ante omnia opera danda, ut excitetur ager, & ut servetur respirationis actio & usus, quantum possibile, integra. Hinc prioris ratione sensuum organa quaecunque & partes quævis sensiles fortius affricandæ: posterioris ratione in loco non nimis clauso, aut vapedo, sed temperato, & aëre libero perfato, sive extralectum, si viribus potens, sive intra hunc, ita situandus est ager, ut corpore erecto quasi sedeat, partim pro liberiore respiratione, partim pro humorum affluxu moderando, partim pro somnolentia arcenda, ac sanguinis ebullitione vitanda; quin & ventus artificialis subinde circa eum faciendus. Mox igitur venæ sectio instituitur, in brachio dextro: quæ peracta vel vomitorium ordinandum, vel clystma acre, quod juxta WALÆUM sanguinem etiam proliciat, injiciendum. Non differenda vomitoria, ut monet LINDANUS, cum in forti Apoplexia occasio præceps; & si quid revellere potest, ac consopitum agrum suscitare, ceteræ vomitoria possunt. Horum ergo uno alterove administrato, aut etiam leviori in malo his penitus omissis, clysterium acrium & fortiter stimulantium usus semper est commendatus; quales partim supra, ubi de Letargo, videantur, partim & ex dicendis jam patebunt. Perinde enim est, sive stimuletur anus, sive vomitus excitetur, quia intestina sunt ventriculus continuatus.

Parantur autem ejusmodi Clystere ex *salvia*, lavendula, majorana, origano, *calamintha*, centauro minori, ruta, serpillio, foliis nicotianæ, asari, radice cyclaminis, pyrethri, ireos nostratis, cortice radicis ebuli, cortice mediana sambuci, semine urtiæ, &c. Quibus incoquatur pulpa colocynthidis in petia ligata, aut addatur infusum aut decoctum croci metallorum ab ℥j. vel ℥ij. usque ad ℥iv. quod RIVERIO in usu fuit: item adduntur commode sal gemma, aut sal ammoniacum. Oleosa omittenda sunt, quoniam temperando & oblinendo acrimoniam, stimulum tollunt, non secus quam mellita. His ipsis Clysteribus commode etiam addi possunt Salia volatilia, ut penetrent, & exsuscitent egros. De horum usu revulsorio vid. CORTHNUMMIUS de Morbo Alion. c. 66. §. 23, p. 347. Modus prescribendi est notus; c. ■

℥. Fol. nicot.

Salvia,

Flor. chamom. an. M. j.

Rad. pyrethri ℥ss. ad ℥vj.

Pulp. colocynth. in pet. lig. (subtilissima enim ramenta tormina inferunt) ℥j.

Coqu. in f. q. Aqua simpl. Colatura ℥ix.

adde

Mell. anthos. vel rosas. ℥ss. vel ℥vj.

Elect. bier. cum agar. ℥ss. ad ℥j.

Castor. pulveris. ℥j. ad ℥ss.

Salis gemmae ℥ss. vel ℥ij.

M. f. Clyster. S.

Clyster revellens.

℥. Herb. serpilli,

Fol. nicotian.

Summ. centaur. min. an. M. j.

Flor. lavend. M. ss.

Rad. pyrethri,

Ireos nostras. an. ℥iij.

Sem. urticæ ℥ij.

Pulpa Colocynth. in pet. lig. ℥ss.

Coqu. in f. q. urine humanæ:

In Colatura ℥viiij. dissolve

Elect. bier. cum agar. ℥j.

Ext. troch. alband. ℥ss.

Ess. castor. ℥j.

M. pro Enemate.

D. S. ut supra.

℥. Flor. chamom. M. j.

Rad. pyrethri ℥vi.

Sem. anisi ℥ss.

Pulp. colocynth. in pet. lig. ℥j.

Coqu. in f. q. aquæ communis: Colatura ℥ij. adde

Elect. bier. cum agar.

Attnull. Oper. Tom. II.

Mell. Mercurial. an. ℥j.

Olei deffillat. bacc. iunip. ℥ss.

M. pro Clysmate:

D. S. ut supra.

℥. Dec. Rusa, in quo ℥ss. Croci metallor. decocta, ℥ix. adde

Fellis tauri inspiss. ℥ss.

Extr. troch. alband. ℥ss.

Mell. anthos. ℥ss.

M. pro Clystere:

D. S. ut supra.

℥. Decoct. flor. chamom. ℥ss.

Infus. croci metall. cum Vinq ℥ij. vel ℥iii.

Mellis ℥ss. ad ℥j.

M. pro Clystere:

D. S. ut supra.

℥. Decoct. emoll. usit. ℥ss.

Elect. lenitiv. ℥ss. ad ℥j.

Syr. emet. Ang. Salæ ℥vi. ad ℥j.

M. f. Enema.

D. S. ut supra.

Cautelas circa horum compositionem videbitis in CORTHNUMMIOL. a. p. 311.

Quinimò urgente necessitate Clystma ex infusculo quodam communi, addito lixivio, vel cum ℥i. j. aut ij. salis communis acuato, addito Infuso vel syrupo antimoniæ in dupla, vel tripla dosi, imò interdum quadrupla dosi, ex tempore infundi potest.

Adeoq; hæc Enemata frequentius erunt repetenda, præprimis si non adeo diu subsistant: aut ipsis substituantur suppositoria pariter acerrima: e. g.

℥. Rad. belleb. albi pulveris,

Scamm. sulphuratis.

Troch. alband. an. ℥ss.

Castor. pulver. gr. viij.

Sal. ammoniaci ℥j.

Cum f. q. Mellis f. Suppositorium:

D. S.

Acre Suppositorium.

Cum his ipsis & aquæ vitæ spirituosæ, apoplectica, ut vocant, &c. instillantur ori & faucibus, acuandæ præsertim salibus & spiritibus urinosi & oleosi: verbi gratia Mixtura in paroxysmo usurpanda præmissis præmittendis fatalis:

℥. Aquæ apoplect. ops. ℥j.

Lil. convall. ℥ss.

Quintæ essentia Matsbiol. ℥ii.

Liqu. cornu cerui ℥j.

Syr. flor. runic. ℥ss.

M. S.

Suscitant mixtura, coehleatim sumenda.

Vel

℥. Aquæ lil. convall. vel Cerasor. nigr.

Mentha an. ℥ss.

Spiritus Ceras. nigr. ℥vi.

Liq. cornu cervi succin. ritè par. vel Spiritus sal ammoniaci, vel sang. bum. aut alius volat. ℥ss. ad ℥iii.

Ol. deff. succini gutt. iv. vel vi.

Syr. flor. runic. ℥ss.

M. S. ut antè.

Cochleatim usurpetur crebrius in paroxysmo apoplectico.

Additur spiritus cerasorum nigrorum, qui optimus est Interne in paroxysmo apoplectico; vid. KESLERUS in Process. Chymic.

℥. Aquæ flor. lavend.

Salvia an. ℥j.

Epilep. Lang. ℥vi.

Ess. Castor. ℥ss.

Spiritus sal. ammoniaci ℥j.

Ol. deff. Succini gutt. viii.

Syr. de Stachad. ℥j.

M. S. ut supra.

℥. Aquæ epilept. vel Apoplect. Lang. ℥j.

Spiritus serpill. ℥ii.

Liqu. cornu cervi succin. ℥j.

Syr. flor. runic. ℥iii.

M. S. ut supra.

Pertinent hæc mixturæ in paroxysmo epileptici supra c. 2. Artic. 1. præscriptæ: Item

℥. Aquæ



24. *Aqua apoplest.* ℥ij.  
*Hirund. cum Castor.* ℥i.  
*Spiritus theriacal. camph.*  
*Liq. cornu cerui succin. an.* ℥ij.  
*Conf. alchem. compl.* ℥℥.  
 M. S. ut supra.
24. *Aqua lil. convall. cum vin.* ℥ij.  
*Flor. samb.* ℥j.  
*Carmin.* ℥℥.  
*Liqu. cornu cerui succin.* ℥ij.  
*Conf. alchem. compl.* ℥j.  
 M. S.
- Mixtura pro capite confortando.*
24. *Aqua Ceras. nigr.* ℥ij.  
*Spiritus ceras. nigr.*  
*Theriac. simpl. an.* ℥℥.  
*Syr. flor. tun.* ℥j.  
 M. S.

*Potio caput confortans.*

Facit huc Eleſtuarium arcanum Timæi von GuldenKlee contra apoplexiam & epilepsiam, præsertim si juncta Aphonia, quæ inter symptomata apoplexiæ maximè terribilis est; imò contra omnes soporosos affectus, uti & contra suffocationem hysterica. Mixtura ejus est hæc:

24. *Salis vol. succin.* ℥i.  
*Theriac. Androm.* ℥ij.  
*Pulu. castor.* ℥ij.  
*Olei destillat. ruta,*  
*Succin.*  
*Rorismar. an. gutt. liij.*  
 M. f. Opiata:

De qua, quantum cuspidis cultelli capit, dissolvatur in aqua quadam apoplectica, vel epileptica Langii, vel in aqua hirundinum cum castoreo, vel in aqua spirituosa lavendulæ, & ægro in os infundatur, ut deglutiat, simulque lingua, palatus & partes vicinæ hoc ipso Eleſtuario fortiter fricentur.

Potro Theriaca & extractum theriacale cum extracto salviae, rutæ, castorei &c., & cui aliquod salis volatilis succini, olei destillati succini, rutæ &c., & camphoræ additum fuit, pro fricanda lingua, palato, & partibus vicinis admodum laudantur, ut dictæ partes in sanguine & motu redeant. Diſſe etiam partes fricari possunt cum spiritu theriacali, vel simpliciter vel probè camphorato; item cum spiritu liliorum convallium, melissæ, ceraforum nigrorum rectificato, vel solitario, vel cum paucis guttis olei destillati cinnamomi aut caryophyllorum acuator; item essentia castorei & similibus.

Vel

24. *Aqua lil. convall. cum vino* ℥ij.  
*Spiritus bacc. junip.* ℥j.  
*Ess. castor.* ℥ij.  
*Salis vol. aromar.* ℥℥.  
 M. D. S.

*Mixtura ad palatum.*

Si his præmissis post horæ quadrantem non redeat ad se, æger, repetantur, & naribus sequens sternutatorium forte & æcre infusetur:

24. *Rad. belleb. albi,*  
*Pyretbri,*  
*Fol. maior.*  
*Flor. lil. convall.*  
*Castor. an.* ℥j.  
 M. f. Pulvis sternutatorius, naribus insufflandus:  
 D. S.

*Suscitant pulvis sternutatorius.*

Vel

24. *Flor. lil. convall.* ℥j.  
*Rad. belleb. albi.* ℥j.  
*Pulverisati, adde*  
*Olei destillat. caryoph.*  
*Major. an. gutt. liij.*  
 M. S. ut antè.

Naribus etiam, pro suscitandis Apoplecticis, subinde obijciuntur odores acres, præsertim ex salibus volatilibus & spiritibus urinosi penetrantioribus, in liquore aquæ dissolutis: imprimis spiritus urinæ, liquor cornu cerui succinatus, & spiritus salis ammoniaci: item Balsama apoplectica, & cephalica, e.g. rutæ, Schæfferi, &c. Vel pro temporibus & naso:

24. *Aqua meliss.*  
*Lil. conv. cum vino* ℥ij.

*Aqua apopl.* ℥j.

*Acet. ruta* ℥ij.

M. D. S.

*Aqua pro temporibus & naso.*

Convenit etiam suffitus castorei, & suffitus succinatus, naribus ad motus.

Hinc succinum & omnia succinata, uti in hysteriis aliisque spasmodicis affectibus nulli cedunt, ita perquam egregia sunt in Apoplexia, & præservanda & curanda. Imprimis in Apoplexia curanda oleum & sal volatile præcellit, in præservanda verò succinum præparatum, vel etiam succinata quæcunque. Guttæ 3. vel 4. olei destillati succini, cum aqua appropriata in paroxysmo infusi, mirificè commendantur in paroxysmo apoplectico: hinc RHUMELIUS in suo aptidor. P. 1. pag. 167. parat oleum peculiare ex succino, quod vocat apoplecticum, dum oleum succini non rectificatum miscet cum dimidio olei roris-marini, superaffundit aquam fontanæ, & ita per vesicam destillat: sicque oleum rectificat. Dosis sunt guttulae 6. ad 12. vel 15. pro usu interno in aqua appropriata. Externe eodem inunguntur vertex, tempora, nucha, & spina dorsi: additâ camphorâ paucâ efficacius medicamentum fit. Similiter digerendo succinum cum oleo fuliginis insigne aliquod Apoplecticum fieri potest. Hinc sola essentia succini, præsertim cum spiritu ceraforum nigrorum, vel liliorum convallium mediante spiritu vini Malvatici abstracto, parata, à guttulis 30. vel 40. ori indita, loquelam restituit Apoplecticis. Item à quibusdam instillantur auribus aquæ apoplecticæ: nam PETRUS JOHANNES FABER apoplecticis propinat vomitorium interne, & auribus atque naso instillat essentiam caryophyllorum, essentiam thymi cum tantillo oleo cinnamomi: vid. in Curat. 40. Camphorâ pariter, & oleum, & omnia camphorata, his ipsis instillandis & affricandis commodissime adduntur.

Cum dictis subinde simul hant ecclena Inunctiones verticis, nuchæ & temporum, cum oleis destillatis, & ex iis paratis Balsamis apoplecticis, aut cephalicis. Sufficiunt oleum destillatum succini, majorana, lavendulæ, spicæ, roris-marini, salviæ, cinnamomi, caryophyllorum, & similia: item emplastrum nervinum, malaxatum cum oleo destillato lavendulæ & succini, vertici imponitur; vel Unguentum, quod describit DECKERS in Praxi Barbette p. 22.

24. *Olei expr. nucif.* ℥ij.  
*Destillat. ruta* ℥j.  
*Spicæ,* ℥j.  
*Succin. an.* ℥℥.  
 M. D. S.  
*Balsamus cephalicus.*

Vel

24. *Olei petræ alb.* ℥ij.  
*Destillat. succ.* ℥j.  
*Lavend.*  
*Major.*  
*Salviæ an.* ℥j.  
 Misc. cum vel sine corpore:  
 D. S.

*Balsamus pro capite confortando.*

Ejusmodi Inunctiones etiam commodè regioni stomachali possunt inungi, superimponendo laterem calefactum.

Sed observandum, ut hujusmodi Odorata oleosa non nimis largiter aut copiose dictis locis illinantur; nam non omnes eadem ferre possunt, & redeunt ad se ægri de insigni capitis perturbatione & gravitate ex oleorum huiusmodi fumosorum illinitione conqueruntur.

Si non redeat ad se æger, unum alterumque repetendum venit; v.g. Vomitoria subinde reiteranda, iniectiones desuper clysteribus, extremorum vellicationem, puncturam, & similia, quæ externos sensus afficiunt, continuanda. Horum quidem effectum SYLVIVS Pr. l. 4. §. 29. ico. &c. in dubium vocat: Verum quantum strictio plantarum pedum cum muria acris, aut hujus loco cum aceto & sale, cum seraceo proficit ad excitandos tales, videbitis in M. A. N. C. Ann. 8. observ. 96. pag. 160. Puncturarum vero efficaciam videbitis in HEINRICO ab HEER obs. 21. Quin etiam Rubefaciencia & Vesicatoria ampla iuxta Willisium pone aures, ceruici, brachia, præsertim in carpi parte interna, & cruribus propè inguina, lutos, &c. applicanda. Si redierit æger ad se nonnihil, sed non sufficienter, interna spirituosâ continuanda, Vesicatoria appli-



applicanda, quin & cucurbitula, nunc cum nunc sine scarificatione, scapulis & brachiis admovendæ: qualia HEINRICUS ab HEER *Obs.* 21. commendat; aliaque administranda, prout æger ad se rediens de uno alterove symptomate magis, vel minus querulus fiat.

Mulier constitutionis aliàs robustæ, ætatis jam tum consistentis, & cui ordinariò adhuc fluebant menses, ex improviso, prægresso anxioso cordis sensu, & scotomiâ insequente, corripitur Apoplexiâ, quæ mox in hemiplegiam lateris sinistri terminabatur, subinde tamen insultu apoplectico recurrente: hinc mox vocatus, idque vespere horâ sextâ, præscribebam potionem ex volatilibus & spirituosis cephalicis, unâ cum clymate acri, & balsamo pro naribus, nucha & præcordiis, ex cephalicis odoriferis; hinc post cœnam, propter recurrentes sæpius insultus apoplecticos, vomitorium antimonialia ex syrupo emetico ad ℥vj. aliquantulum, sed non adeo copiosè, evacuans: Die sequente Solis, cum saltem esset hemiplegica, imperabam venæ sectionem in latere parti affectæ opposito, potionem ex volatilibus & spirituosis continuando: Die Lunæ ad imitationem HARTMANNI in *Praxi Chymiatrica* præscribebam:

℥j. Conf. flor. tunic. ℥j.  
Mercurij vitæ gr. ij.  
Res. Scamm. gr. iv.  
Misc. pro Bolo.

Laxabat parum, ipsâ ægrâ intereâ semper, quoties detectus haberet, primariò de præcordiorum angustia conquerente: Hinc propter capitis perturbationes adhuc residuas Stereputatorium forte ordinabam:

℥j. Pulv. lil. convall. ℥j.  
Rad. belleb. alb. ℥j.  
Ol. dest. Caryoph. gutt. iv.  
Misc.

Hinc pro usu interno:

℥j. Aquæ lil. convall.  
Ceras. nigr.  
Mentha an. ℥j.  
Spiritus Ceras. nigr. ℥vj.  
Salis vel cornu cervig. xv.  
Cinnab. Antimonij ℥j.  
Syr. flor. Tunic. ℥j.  
Misc. pro Portione.

Externè pro membris hemiplecticis, ter quotidie inungendis, post prægressam fortem eorundem frictionem, item pro illinenda spina dorsi:

℥j. Ol. petra albi ℥ss.  
Dest. spica,  
Lavend.  
Maiozan. an. ℥ij.  
Succini ℥j.  
Misc.

Item pro eodem usu:

℥j. Spir. vini campb. ℥ij.  
Spiritus Lumbr. terrestr. per putrefact. ℥ss.  
Essent. Castor. ℥vj.  
Misc.

Spiritus hic blandè calidus probè affricabatur partibus; hinc oleum præscriptum illinebatur.

Porro istis ita ordinatis pro usu interno præscribebam:

℥j. Extr. belleb. nigr. gr. xvj.  
Castor. ℥ss.  
Troch. alband. gr. jv.  
Ol. dest. Succini gutt. ij.  
F. Pilule.

Hinc pro promovendo nonnihil sudore ad imitationem POTERII præscribebam:

℥j. Res. ligni Sassafr. ℥ij.  
Herb. vorismar. rec. M. ij.  
Bacc. Junip. rec. ℥j.  
Coq. in aqua & vini an. ℔ss. in cucurbita, cum alembico clausa:  
Colaturæ & liquori destillato adde  
Spiritus bacc. Junip. ℥iv.  
Sal. ammoniaci simpl. ℥ij.  
Syr. flor. tunic. ℥ij.  
Misc.

Potionem hanc hausit quotidie ter, manè, à meridie, & ingruente nocte, expectando sudorem, melius exinde aliquantulum habuit, subinde etiam liquorem corau Estimul. Oper. Tom. II.

cervi succinatum hausit &c. Pedilavium ex nervinis aquæ simplici incoctis quotidie servidè bis usurpavit, idque pedi optimè profuit. Hinc pro continuandis externis in brachio ordinavi:

℥j. Sem. Sinapi p. j.  
Bacc. Junip. rec. p. ij.

Contus. infund. in f. q. spiritus vini, vel spiritus bacc. Junip. Hinc tam cum ipso spiritu imprægnato, quàm magmate residuo, fricantur sæpius membra.

Sed cum malum esset contumax, ita ut, licet ut conque melius haberet, hemiplexia tamen eandem adhuc affligeret, ad imitationem POTERII præscripsi:

℥j. Aquæ Ceras. nigr. ℥vj.  
Spiritus theriacal. ℥ss.  
Auri diaphor. ℥ss.  
Misc.

Capiebat vesperi, idque repetitis vicibus. Primis duabus vicibus anxietatem quandam circa præcordia percepit, hinc calor quidam sensibilis in universo corpore erupit, quem levis sudor secutus fuit: tertiâ vice horâ nocturnâ tertiâ idem aurum diaphoreticum cum aqua vitæ juniperina accepit, unde per quatuor horas optimè dormivit, & sudore largo ubique persusa fuit, ac quoad cetera optimè se habuit. Sanè ex omnibus etiam volatilibus assumptis talem sensilem operationem ac elegantem adeò sudorem nunquam, ac ab hoc pulvere fixo, percepit. Saltem adhuc brachium in articulatione humeri graviter dolebat, pro quo tollendo spiritum vini, & desuper balsamum Peruvianum, frequenter illinivit, exque hujus usu melius habuit.

Discurso ita paroxysmo, instituendâ Cura præservatoria, tam in iis, qui jam semel Apoplexiâ tacti fuerunt, ut præcaveatur crebra recidiva, quàm in iis, qui futuram aliquando Apoplexiam metuunt: Cujus prodromi sunt: (in habituâ tunc dicta) dolor capitis, vertigo, tumor carotidum, memoriæ debilitas, spontaneæ oculorum illachrymationes, scotomiæ, incubus, vocis tarditas & hæsitantia, oris distorsiones, dentiumque stridores in somno, stupor frequens brachii aut pedis, aut etiam refrigeratio extremitatum partium. In his pro præservatione, præmissis digestivis convenientibus, Purgatio conveniens instituenda, & postmodum sudori præ ceteris opera danda, cum sudorifera aliàs maximopere sint apta ad curandos apoplecticos: & hæc ipsa sudorifera mirificè commendat LINDANUS; quod nempe eadem ipsa admodum convenient in cura Apoplexiæ. Simul quoque stomacho prospiciendum, ut digestio prima, quantum possibile, conservetur in naturali modo, idque respectu Apoplexiæ positivæ aromatibus, ut cerebrum ac systema nervosum in debita constitutione ac tono retineatur.

Remedia aliàs, quæ in paroxysmo ægros excitant apoplecticos, aut eos excitatos præservant à recidiva, sunt serè sequentia, aliàs generali Cephalicorum & stomachicorum nomine nota: nempe Salvia, Ruta, Origanum, Chamædrys, Chamæpitys, Calamintha, Pulegium, sem. Carui, fœniculi, anisi, sinapi, erucæ, cerasa nigra, radix angelicæ, aristolochiæ rotundæ, caryophyllatæ, valerianæ, vincetoxicæ, flores stæchados Arabicæ, lavendulæ, anthos, primulæ veris, liliorum conuallium, &c. Præ ceteris Salvia hic est in usu, cujus saluæ continuatus usus, & quælibet ex hac parata, item vinum salviatum, &c. mirè commendantur à KYPERO in *Collegio Practico*. In Cubebis, Cardamomo, semine sinapi & erucæ, singularia latent remedia ad præservandam Apoplexiam senum, ita ut dicant, nihil potentiùs eòsdem præservare, imprimis si omni manè & vesperi seminis erucæ vel sinapi & cubebarum pulverisatarum aliquantulum & crebriùs sumatur; vid. TABERNÆMONTANUS & SCHNEIDERUS de *Catarrhis*: hinc quidam recipiunt grana vj. vij. x. xij. ad xv. & xx. seminis sinapi, eaque manè jejune leviter masticata deglutiant ad præcavendam Apoplexiam; vel pulverisetur, & cum aqua florum lavendulæ spirituosâ usurpetur. STOEKERUS in *Praxi* expertum remedium contra Apoplexiam sequentem pulverem dicit esse:

℥j. Cardamom. (ratione cerebri) ℥ss.  
Sem. Coriandr. (ratione stomachi) ℥ij.  
Eruca vel sinapi albi ℥ss.  
Misc. f. pulvis pro aliquot dosibus.

De hoc sumatur circa introitum lecti.



Ad hujus imitationem:

℞. *Sem. sinapi alb.* ℥℥.  
*Cubeb.* ℥j.  
*Cassidamom.* ℥℥.  
 Misc. & pulverif.  
 D. S.

*Pulvis cephalicus pro aliquot dosibus.*

Sumatur circa introitum lecti pro aliquot dosibus. Est egregium præservativum in puncto apoplexiæ metus. Vel, quod aliis placet, commodius sub forma *electuarii* hoc semen usurpetur:

℞. Tres *Caricæ pingues* minutim concisas:  
 adde  
*Sem. Sinapi albi seu erucæ* cochl. j.  
 Misc. in mortario, addendo  
*Aquæ Lavend. simpl.* vel *spirituos.* Cochl. j.  
*Succi Violar.* ℥℥. vel qu. pl.

De quo sit dosi omni manē magnitudo juglandis: certe præservat ab apoplexia, teste SCHMUKIO *Thef. 2. Secret. Med. 16.*

Vel

℞. *Caric. pingu.* Num. vj.  
 Incis. & contus.  
 adde  
*Sem. sinapi alb. seu erucæ* ℥℥. ad ℥vj.  
*Cardamom.* ℥j. ad ℥j.  
 Mis. exacte; adde simul  
*Spiritus lavendul.* Cochl. j.  
 vel cum *Syr. flor. tunicæ* vel *borrag.* f. *Electuar.*  
 D. S.

*Electuarium cephalicum.*

De quo omni manē dosi juglandis magnitudine capiendum; à meridie spiritus carminativus de tribus, vel *Spiritus sal. ammoniaci anisatus.*

In genere omnes Autores commendant semen *sinapi* & *erucæ* pro præservativo; siquidem sal volatile *sinapi* & *erucæ* specificam vim in Apoplexia obtinet, & ab ea præservat; unde etiam in paroxysmo spiritus seminis *erucæ* urinofus cum calce viva paratus (de quo videb. in *Colleg. Pharmac. in Schröderum P. 1. Sect. 1. p. 465.*) cum aquis apoplecticis misceri, & ita commodè administrari potest. Notum aliàs etiam est, quantum valeant omnia remedia ex *cerasis nigris dulcibus* parata, quod nempe hæc ipsa singulariter conveniant: imprimis spiritus cerasorum nigrorum mirificè à KESLERO extollitur ceu summum remedium ad resuscitandos epilepticos & apoplecticos in paroxysmo, & curandos extra paroxysmum, & in specie loquelam restituendam: Vid. ejusdem *Processus* pag. 370. ubi asserit, se quandam nobilem, quæ per tres dies jacuerat desperatè apoplectica, beneficio spiritus cerasorum nigrorum denuò curasse vel restituisse. Ad hæc volatililla, tam in paroxysmo, quàm extra paroxysmum, pertinet spiritus vitrioli volatilis quicumque. Qui non habent genuinum, faciant spiritum vitrioli apoplecticum ex spiritu vini & vitriolo, sunt spiritus sulphurei exinde optimi. Modus est hic:

℞. *Vitriolum* imprimis *Hungaricum* ad solem calcinatum, vel caput mortuum vitrioli diuturnà expositione aeris de novo impregnatum.

Misce & irrota ad consistentiam pultis cum f. q. spiritus vini à plantis aromaticis abstracti: Stent per aliquot septimanas in digestionē, destillentur igne aperto, prout destillantur mineralia. Post spiritus aliquandiu stet in digestionē, tandem ex cucurbitra destilletur per alembicum, tunc prodit spiritus striatim: nebulae quando proveniunt, mutetur receptaculum, & capiatur spiritus vitrioli volatilis. Spiritus hi misti aliquandiu digerantur, de novo per balneum cohobentur, & asseruentur pro usu sub nomine spiritus vitrioli cephalici, vel etiam epileptici.

Quidam non malè spiritum cerasorum nigrorum vitriolo in sole probè calcinato assundunt, aliquot cohobis abstrahunt, & ita spiritum vitrioli quodammodo volatilem antiapoplecticum egregium acquirunt.

Ex dictis & similibus sunt simul ordinariò *Aquæ apoplectica* spirituosæ, quæ sunt spiritus volatiles inflammabiles ab aromatibus largiter impregnatæ. Ordinariò parantur ex aromatibus, in specie salinis volatilibus oleosis, v. g. ex salvia, rosmarino, ruta, floribus liliorum convallium, origano, feniculo, floribus lavendulae, flocha-

dos Arabice, anthos, & similibus: e. g. fit spiritus seu *Aquæ Apoplectica* B. D. Martii. Compositio est hæc:

℞. *Flor. lil. convall.* ℥vj.  
*Cinnamom.* ℥j.  
*Zedoar.* ℥j.  
*Croci* ℥j.  
*Macis.*  
*Caryophyll. an.* ℥℥. ad ℥℥.

Digere in *Vino Hispan.* q. s. per mensem: spiritum destilla per vesicam, abstrahendo saltem spiritum volatilem aromaticum, quem serva:

Hinc

℞. *Rad. Valerian.*  
*Vincetox.*  
*Pozon. an.* ℥j.  
*Fol. Meliss.*  
*Borrag.*  
*Rosimar. an.* M. iij.  
*Flor. tilia* M. vj.  
*Lavend.*  
*Spica.*  
*Salvia.*  
*Thymi an.* M. j.

Mista macerentur in spiritu superiore per mensem, clauso vase & bene munito: Tunc destilla per vesicam, addendo iterum *Vini Hispan.* q. s. Tandem rectificetur in Martii Balneo super ambra, moscho, & camphora, & habebitur spiritus mirandarum virtutum, & egregiè apoplecticus.

Potest hic inferuire simul pro spiritu vitrioli cephalico vel apoplectico parando, pro spiritu vitrioli volatilizando; de quibus superius monui.

Sed non immeritò queritur: An tutò satis hæc aquæ possint administrari in paroxysmo? Nego; Hæc ipsæ enim aquæ interdum plus nocent, quàm profunt.

Nam

1. Hujusmodi spiritus inflammabiles cum sint oleum resolutum, ut inebriatius & narcotica pollent, adeoque metus est, ne copioso usu subinde narcosis & stupor intendatur. Moderatè ergo illis erit utendum, præprimis si à sanguine fuerit malum, utpote quem magis turgescere faciunt: Vid. CRATO lib. 1. consil. 9. SENNERTUS loc. cit. quæst. 4. & HOECHSTETTERUS in Dec. 9. cas. 1. pag. 334.
2. Non paucæ sunt mulieres imprimis, quæ talia spirituosæ non semper possunt ferre, quin paroxysmos hystericos incurrant.
3. Etiam viri, in specie literati, quorum genus nervosum debilius, minùs possunt ferre talia spirituosæ fortiora odorifera, quin percipiant aliqualem capitis grauedinem, tensionem circa tempora, & similia.

In his ergo & similibus casibus non conveniunt; Propterea magis laudantur salia volatililla oleosa, i. e. salia volatililla oleis destillatis juncta, vel hujusmodi spiritibus fortiora, ut ita aromatum efficacia à spiritibus urinosis intendatur, & noxa à spiritibus sulphuratis metuenda præcaueatur. Plethorici tamen ad Apoplexiam proni salia volatililla oleosa interne non ferunt, ut ut optime externe, sed potius macra. Spiritus ergo urinofus volatiles, & salia volatililla urinosa macra, ad sudorem maximè disponentia, magis conducunt.

Potè castorei essentia, & omnia ex castoreo parata remedia, spirituosæ mista, specificè commendantur & insigniter conducunt: quibus addantur spiritus vegetabiles liliorum convallium, spiritus baccarum juniperi & cerasorum nigrorum, serpilli, lavendulae, theriacalis camphoratus, spiritus vini camphoratus aliis admixtus, vel etiam ori infusus est satis penetrans: Aqua magnanimitatis seu spiritus formicarum Laurembergii admodum conducit in Apoplexia; aqua & spiritus apoplecticus Myrsicini, aqua apoplectica Kolreuteri, Langii, & Hartmanni, aqua & elixyr vitæ Matthioli, aqua Anhaltina, hircundinum cum castoreo; aqua angelicæ, serpilli, cinnamomi, liliorum convallium, salviae, &c. cum vino paratæ. De essentis vegetabilibus nihil addo. Spiritus & sal volatile secundum humanæ specificum fuit CNOEFFELII in curanda epilepsia & Apoplexia. Præ ceteris spiritus sanguinis humani est commendatum, remedium G R A S E C C I I, & quem etiam, ceu singu-



singulare specificum, admodum laudat HARTMAN-  
NUS in Praxi Chymiatr. & HELMONTIUS Tr.  
Spiritus Vitæ; ut etiam spiritus cranii humani, & post  
hunc sal volatile, spiritus, & aqua spirituosa cerebri hu-  
mani, etiam sunt egregia remedia in Apoplexiis: quibus  
ab aliis simul additur & specificè laudatur spiritus fuligi-  
nis; Item spiritus salis ammoniaci, tam simplex, quam cum  
camphora junctus & legitime unitus, fit spiritus volatilis  
penetrantissimus: Item spiritus salis ammoniaci succina-  
tus ac lavendulatus. Salia enim volatilia propter insignem  
penetrantiam, & quod excellent vi sudoriferà, in Apo-  
plexia privativa maximè utilia sunt, cum præcaveant  
transitum in paraplegiam, quæ optime curatur per salia  
volatilia, sudorem expectando. Hinc conveniunt etiam  
ulceris spiritus & salia volatilia reliqua, cranii humani,  
sanguinis humani, & sanguinis cerui, viperarum, succi-  
ni; hinc spiritus cornu cerui, & liquor cornu cerui succinatus  
D. Michaelis perquam egregii sunt ad quosvis soporosos &  
imprimis apoplecticos affectus excitandos.

Ex dictis variz formulæ præscribi possunt: e. g.

℞. Quinta essentia Rorismar. ℥iij.

Lavend. ℥ij.

M. S.

Essentia cephalica.

Dos. 20. gutt. omni manè: Vespere usurpari po-  
test spiritus salis ammoniaci ad 30. gutt. vel liquor cornu cerui  
vi succinatus.

℞. Ess. Castor. ℥iij.

Quinta essentia Rorismar. ℥i.

M. S. ut supra.

Dos. ad 30. vel 40. guttas.

Quod etiam pertinet essentia composita ex ana salvia,  
zedonia & castorei, cum spiritus salis ammoniaci extracta.

Vel

℞. Essent. succini, vel castor. vinos. ℥ij.

Spiritus sal. ammoniaci anis.

Succin. an. ℥i.

M. S. ut supra.

Dos. 30. ad 40. gutt. bis in die.

In metu apoplexiæ aviæ meæ non sine successu præscripsi  
sequentem mixturam:

℞. Aqua flor. tilia,

Lavendul.

Prim. ver. an. ℥i.

Apoplect.

Spiritus ceras. nigr. an. ℥ij.

Ess. Primul. veris ℥iij.

Salis vol. succini ℥ij.

Syr. flor. tunie. ℥ij.

Misc.

Dosis 2. cochlear. singulis tribus horis.

Eidem aviæ, crebrâ scotomiâ cum insigni actionum ani-  
malium imbecillitate correptæ, præscripsi:

℞. Aqua Mentib.

Lil. corvall. cum vin.

Ceras. nigr. an. ℥i.

Spiritus Ceras. nigr. ℥iij.

Ess. Castor. ℥ij.

Salis vol. cornu cervi ℥i.

Succin. ℥ij.

Syr. flor. tunie. ℥ij.

Misc.

Huc quoque pertinent mixturæ supra in paroxysmo ver-  
iginis cap. i. præscriptæ; quibus semper essentia castorei  
addi potest.

Hiscæ tandem meritò annumerandum est aurum diapbo-  
reticum Poterii, quod ritè paratum, cum conferua florum  
tunicæ assumptum, est perquam egregium: item cinna-  
baris antimonii, & cinnabarina: hinc de specificis cepha-  
licis pro præservatione capiendis res nota est, cum in ge-  
nere quævis antepileptica etiam ferè ad apoplexiam lau-  
dentur.

E. g.

℞. Corall. rubr. præp. ℥i.

Cinnab. antimonii ℥ij.

Salis vol. succini ℥i.

Cubeb. ℥ij.

M. f. pulv.

D. S.

Pulvis cephalicus.

Ad præservationem aliâs usurpantur Eleævaria: v. g.

℞. Conf. flor. salvia,

Estmull. Oper. Tom. II.

Conf. flor. Rorismar.

Tunie. an. ℥ij.

Conf. aleberm.

Sem. sinapi an. ℥iij.

Cardamom.

Cubeb.

Macis an. ℥ij.

Cum f. q. Syr. flor. tunie. f. Eleævarium:

D. S.

Eleævarium cephalicum.

℞. Conf. flor. antbos,

Lavend.

Meliss. an. ℥i.

Corr. aurant. cond. ℥vi.

Zingib. cond. ℥ij.

Sem. sinapi,

Erucæ an. ℥iij.

Cubeb.

Cinnam.

Cardam.

Salis vol. succini oleos. an. ℥i.

Cum f. q. Syr. flor. tunie. f. Eleævarium.

D. S. ut supra.

℞. Conf. Mentib. ℥ij.

Flor. antbos ℥i.

Sem. sinapi pulveris. ℥vi.

Cinnam.

Caryophyll. an. ℥ij.

Salis vol. succin. ℥i.

Ol. dest. Mentib.

Macis an. gutt. viij.

Cum f. q. Conf. Aleberm. vel Syr. flor. tunie.

f. Eleævarium.

D. S. ut supra.

℞. Conf. flor. antbos,

Salvia an. ℥ij.

Zingib. in Ind. cond. vel Nuc. Ind. condit.

Sem. sinapi aer. an. ℥vi.

Corall. rub. præp. ℥ij.

Unic. ver.

Cinnab. antimonii,

Salis vol. succin. an. ℥i.

Ol. destill. succini ℥ij.

Cum brod. zingib. f. Eleævarium:

D. S.

Vi supra.

℞. Conf. Aleberm. vel Conf. flor. antbos ℥ij.

Nuc. Ind. cond. ℥ij.

Sem. erucæ ℥iij.

Cumini ℥i.

Succin. præp. ℥ij.

Cardam.

Cubeb.

Cinnam. an. ℥i.

Spiritus Ceras. nigr. ℥i.

Cum Syr. flor. tunie. q. f. f. Eleævarium:

D. S.

Vi supra.

℞. Conf. flor. antbos ℥ij.

Zingib. cond. ℥ij.

Sem. sinapi,

Erucæ an. ℥iij.

Cardam.

Cubeb. an. ℥i.

Cum f. q. Conf. Aleberm. vel Syr. flor. tunie.

f. Eleævarium:

D. S. ut antè.

℞. Conf. flor. antbos,

Tunie. an. ℥ij.

Nuc. Ind. condit. ℥vi.

Conf. aleberm.

Sem. sinapi an. ℥iij.

Spec. diantbos ℥i.

Cum brod. Nucis Ind. f. Eleævarium:

D. S. ut antè.

℞. Conf. flor. antbos,

Salv. an. ℥ij.

Conf. aleberm. ℥ij.

Castor. pulveris.

Spec. dia. Ambr.

Dia-Mosch. dulc. an. ℥i.

Δαα 4 Cinnab.



*Cinnab. antimonii* ℥ss.  
*Ol. destill. Succin.* ℥ss.  
 Cum f. q. *Syr. flor. Tunic. f. EleQuarium*;  
 D. S. ut suprà.

℥. *Spec. dia-Ambr.*

*Dia-Mosch. dulc. an.* ℥i.

Cum f. q. *Sacch. in aqua Salviae sol. f. Rotulæ*;  
 adspargendæ cum  
*Ol. destill. Cubebar. vel salvia*;

D. S.

*Rotula cephalica.*

Conf. *Idea Formul. Class. 1. §. 6.*

Quod etiam pertinet *D. Kolbi Mixtura præservativa*  
*ab Apoplexiis*. Compositio est hæc:

℥. *Spec. dia-Ambr.*

*Dia-Mosch. dulc. an.* ℥j.

*Margar. præp.*

*Corall. rub. præp. an.* ℥j.

*Succin. alb. præp.* ℥iv.

Conf. *alchem.* ℥ij.

*Extr. rad. Helen.* ℥ij.

*Ireos* ℥ss.

*Calam. arom.* ℥j.

*Pæon.*

*Ligni Aloes an.* ℥ss.

*Ol. destill. salvia.*

*Rorismar.*

*Succin. an. gutt. xvj.*

*Lavend. gutt. xx.*

*Spica.*

*Anis.*

*Fenicul.*

*Macis.*

*Nuc. moschat. an. gutt. xij.*

*Cubeb.*

*Caryophyll. an. gutt. viii.*

*Rutæ gutt. vi.*

*Sacchar. optim.* ℥vii.

*M. f. Pulvis.*

D. S.

*Saccharum apoplecticum.*

Sed obseruetur, quod *semen sinapi & erucæ* imprimis his  
 addenda sint.

Hæc Interna tam intra, quàm extra paroxysmum con-  
 veniunt.

Inter *Evacuantiâ*, extra paroxysmum usurpanda, prima-  
 tum obtinent *Vomitória*, & quidem *antimonialia*, ut suprà  
 monui; quæ inter

*Mercurius vitæ*, *tartarus emeticus*, &c. præscribi potest:  
 e. g.

℥. *Tartari emet. Mynf. gr. ii.*

*Sal. ammoniaci gr. ix.*

*M. f. pulv.*

Vel

℥. *Tartari vitriolat. gr. vi.*

*Emet. Mynf. gr. ii.*

*Scamm. sulphurat. gr. i.*

*M. f. pulv.*

Præter *Vomitória* conducunt etiam *Purgantiâ*, e. g.  
*helleborus niger*, *pilulæ scitidæ*, *cochiæ*, *pilulæ proprie-*  
*tatis Mynsichti*, *pilulæ polychrestæ eiusdem*, *extractum*  
*hellebori nigri*, *agariæ*, *Mercurius dulcis*: quibus pro sti-  
 mulo semper *extractum colocynthidis*, vel *alhandal* legi-  
 timè paratum, addendum est: quin etiam semper ad præ-  
 cavendam recidivam necessaria sunt *Purgantiâ*: Vid.  
 CORTHNUMMIUS l. c. cap. 70. Sequentes pilulas  
 aviæ maternæ præscripsi:

℥. *Mass. pilular. de succ. Cras.*

*Extr. absinth. an.* ℥ss.

*Troch. alband. gr. i.*

*Olei destillat. Succini gutt. ii.*

Cum *Ess. Prim. veris f. Pilulæ.*

℥. *Mercurii dulc.* ℥j.

*Scamm. sulphurat. gr. v.*

Cum Conf. *flor. tunic. f. EleQuarium*;

D. S.

*Saccharum purgans præuna dosi.*

Item conducunt *pilulæ ex Mercuriodulci cum extracto*  
*hellebori nigri*, *suprà cap. 2. Artic. 1. ubi de Epilepsia*, præ-  
 scriptæ.

Vel

℥. *Mass. pilular. de trib. Ruffi* ℥ss.

*Extr. helleb. nigr. gr. v.*

*Tartari vitriolat. gr. iii.*

Cum *ol. destill. Carpi f. Pilulæ.*

D. S.

*Pilulæ.*

℥. *Gumm. ammoniaci acet. sol.*

*Edell. in acet. sol. an.* ℥ss.

*Vitriol. maris ad albed. calc.* ℥i.

*Mag. gum. de Peru gr. xv.*

*Scamm. præp. Brendel.* ℥j.

*Extr. troch. alband. gr. vi.*

*f. Pilu. Ioslar Francof.*

D. S.

*Pilulæ emollientes, pro aliquot vicibus.*

*Dosis Num. xv.*

*Sudoriferæ ex lignis* declinante paroxysmo aliquamdiu con-  
 tinuata, sunt maximè proficua.

Si his remediis non satisfacimus scopo, etiam *cucurbitu-*  
*læ*, *setacea*, *fonticuli*, & similia adhibeantur.

Vir quidam in decresciente ætate ultra septuaginta annos  
 constitutus, aliàs sanus, sed inordinate minusque regula-  
 tæ, utut non lautæ, diætæ, adæctus, aliquando cum  
 sociis extra urbis portas ambulans, sine sensu & motu su-  
 bito corruerat totus pallidus, ab adstantibus denuò exci-  
 tatus, quid secum actum, ferè nesciebat. Debilitatus  
 tamen, & ob anhelitus difficultatem aliquoties desiderare  
 coactus, denuò intra civitatem revertebatur. Interiectis  
 aliquot septimanis, cum interea semper commodè habu-  
 isset, templum petens, simili ratione ex improvviso denuò  
 corruerat, sed balsamis & aquis antiepilepticis refectus,  
 domum lento gradu petebat. Aliquoties hoc accidebat,  
 donec ingravescente malo extra privatos parietes ipsi ver-  
 sari vix liceret, quin ex levi corporis motu vix omnimo-  
 dâ anhelitus interceptione, & simultaneâ caligine oculo-  
 rum affectus, fori impetu non tam corruiere, quàm pro-  
 sterni videretur, sensu & motu carens; hinc tabernam  
 suam mercatoriam aliquando ingrediens, ex simili corpo-  
 ris prostratione nasum tam fortiter mensæ allidebat, ut  
 mediam eius ossæam substantiam sine perceptione doloro-  
 sa perstringeret. Cum ergo tempore hyemali de paroxys-  
 mi huius apoplectici insultu sollicitus me consulere, se-  
 quentia ordinavi:

℥. *Spiritus sal. ammoniaci,*

*Cornu cervi essentif. an.* ℥ii.

Misc.

De quo capiebat quotidie ter, guttas xxx. vel xl. manè  
 in vehiculo calido, à meridie in frigido: unâ cum hoc  
 præscripti:

℥. *Ol. dest. succini* ℥i.

*Caryoph.*

*Macis an.* ℥j.

*Mur. Mosch. expr. q. f.*

Misc. pro Balsamo.

Hoc manè & vesperti tempora, verticem, nucham, &  
 regionem stomachi inungebat: sic dec tam crebrò, nec  
 atrox paroxysmus fuit.

Appetente uerò verno tempore ordinavi, præmissis di-  
 gestivo salino, purgationem Mercurialem cum extracto  
*panchymagogo*, quo pluries excrevit cum leuamine,  
 hinc interne pro præservatione præscripti:

℥. *Ficuum pingue*, minutim incis. No. iv.

adde

*Sem. sinapi contus. ℥i.*

*Cardam. pulveris. ℥ii.*

Cum f. q. *Syr. flor. tunic. & Spiritus lil. convall.*

*f. EleQuarium*:

De quo omni manè capiebat quantitatem nuclei inglandiæ  
 ieluno stomacho, desuper sorbendo quantum placer de iu-  
 sculo calido.

Externè capiti imponebat sequens Emplastrum:

℥. *Empl. de ran. cum mercurio q. f.*

*Malaxabatur cum f. q. Balf. Peruviani in*  
*vitello ovi soluti*, & super alutam exten-  
 sum sub mitra parva semper gestabat,  
 cum usu præfati balsami.

Sic hætenus benè se habuit, ut spes sit, continuato usu  
 horum remediorum malum imminens præcaveri posse.  
 Corpus est exsiccum, macrum, rugosum; hinc iusti-  
 lem duxi fonticulum.

Aliàs *Fonticuli in Apoplexia*, tam præservativè, quàm  
 cura-



curativè, præsertim in senibus vel decrepitis, ubi affectus catarrhales sunt frequentes, familiari sunt in usu, & multum conferunt: & quidem veteres *setaceum* in nucha usurparunt, ejus setacei ad præservandam Apoplexiam in nucha usum videbitis in HORSTIO lib. 1. observ. 14. sed est remedium admodum molestum; potius fonticulus in nucha inusus, vel homoplatis, aut etiam fonticulus unus in brachio, alter in crure paratus, est egregius. Veteres etiam fonticulum ipusserunt in vertice; sed est ridiculum remedium, & propter inflammationem plerumque periculosum. Interim cum distinctione agendum: Nempe Apoplexia positiva, si præfatis remediis non cessaverit, ferè lethalis est. Saltem ergò in Apoplexia privativa fonticuli & cucurbitulæ in regione dorsii intra scapulas commodè adhiberi possunt; in positiva enim præcavenda parum auxilii afferre solent. Unde dum observationes prostant nunc proficuum, nunc inanium horum remedium, causa videtur esse, quod nunquam observata fuerit differentia Apoplexiæ positivæ & privativæ: v. g. qui à carbonum fumo cadit apoplecticus, talis ab hujusmodi remediis externis nullum sperare potest auxilium; ubi verò ex sanguine grumoso, & ubi suspicio est peccantis plus minus lymphæ, dicta auxilia chirurgica multum adferunt commodi.

Denique Salivatio in declinante Apoplexia pro eradicando morbo non ineptè à BAUBETTE in Praxi proponitur, & à DECKERO in Comment. commendatur pag. 23.

Supràdictum, quod Apoplexia ex universali in particularem, nunc pauciora, nunc plura membra occupantem, transeat: Pergo igitur ad

## ARTICULUM II.

## DE

## PARAPLEGIA.

**Q**uod Paraplegiam: hæc nunc apoplexiam sequitur, sicque morbus secundarius est, nunc verò per se inchoat, sine præcedente apoplexia, utur plus minus alios morbos sequatur, estque Apoplexia particularis. Notabilis est permutatio ista, cujus meminit FORESTVS l. 1. observ. 80. ubi apoplexia mutata in paralytin, (restituitur in Paraplegiam,) deinde in epilepsiam, & ex ea denuò in apoplexiam lethalem. Sanè apoplexiæ & hinc natæ Paraplegiæ ac epilepsiæ singularem habent & mutuam convenientiam, & quasi in radice identitatem. In modo fiendi saltem aut affligendi differunt: hinc & permutatio mutua earum, & quoque in cura remedium identitas. Hinc certè GORRÆUS in Defin. Medicis inquit; Paraplegiam signare HIPPOCRATI paralytin, quæ apoplexiæ vel epilepsiæ succedit. Non enim rarum est, epilepsias in Paraplegias mutari, & contra: sic epilepsiam, quæ in paralytin totius ferè corporis, excepto brachio dextro, abiit, in quo sensus, ablato motu, perierunt, notat HILDESHEIM in Spirileg. de Affect. Capitis cap. 7. Item SCHENCKIUS in observ. refert, epilepsiam ex terrore contractam post biennium in paraplegiam alterius lateris transiisse, nihilominus singulis mensibus circa novilunium affligens: Item FONTANUS Resp. & Curat. lib. 1. pag. 32. Paraplegiam oculi sinistri post epilepsiam in gravis observat, quæ post partum gemellorum mortuorum apoplectica interit: HORSTIUS l. 2. obs. 41. notat ex epilepsia Paraplegiam lateris dextri, & hinc denuò insultus epilepticos. Pertinet huc notabilis observatio Ann. 6. & 7. M. A. N. C. obs. 212. ubi mutuo paralytis & epilepsia se exceperunt: Item confirmat hæc BARTHOLINUS Cent. 4. observ. 3. dum paraplegiam lateris sinistri & convulsionem lateris dextri in febre petechiali annotat. Sanè non secus in Apoplexia & Paraplegia, quàm epilepsia, simul aliquid convulsivi subesse videtur: Notabilissimè est HILDANI observatio 4. Cent. 1. ubi ex sola nervuli in aure irritatione, ob immisum globulum, stupores quasi paralytici, dolores, & atrophia brachii illius lateris, ac tandem epileptici convulsionem excitabantur. Ex irritatione ista, quid aliud quàm spasmus fieri potuit? Similem observationem de dolore & stupore cum ejusdem atrophia ex corallina sphaerula in aurem illapsa refert SCHENCKIUS in observat., ubi de aurium morbis. Hujusmodi Paraplegiæ, quæ apoplexiam,

epilepsiam, aliosque morbos immediate sequuntur, vulgò Paralytes vocantur, & hoc nomine tractant Theoriam earum ac Praxin Practici, præsertim veteres. Omnium loco sufficiat WILLISIUS de Anima Brutor. Part. 2. cap. 9. Cum tamen, propriè loquendo, paralytis longè alius affectus sit ab iis Apoplexiis particularibus sive Paraplegiis, ut infra Artic. 3. monebitur. Prohè hoc observetur in Autorum lectione, qui ordinariè Paralytes & Paraplegiam confundunt, unàque methodo Theoriam & Praxin tractant.

In Hemiplexia, & multò magis Paraplegia, sive apoplexiam, sive alium similem sequatur affectum, & malè paralytis vocatur, tres huius gradus observandi sunt:

1. Enim motus solum deficit superfluo sensu.
2. Sensus & motus planè deficiunt in parte, resistenti tamen adhuc partis calore naturali.
3. Iis deficientibus etiam calor partis evanescit, eaque simul ferè continuo frigida percipitur, quam constitutionem partis insequi solet ejus flacciditas notabilis ac mollities, & hinc marasmus.

Differunt hæc Paraplegiæ secundum magis ac minus, prout magis & minus est impedimentum in nervis.

## CAUSÆ.

Quoad Causas Paraplegiæ: communiter obstructionem nervorum accusant, quæ tamen nec cum modo fiendi, nec cum cura benèconvenit. Saltem non universalis causa hæc esse videtur; siquidem & per consensum aliarum partium remotarum Paraplegiam fieri observatum fuit: Nempe sicut notum est, quod graviores passionis hystericas subinde epileptici convulsionem superveniant; ita iisdem paralytes & hemiplexias supervenisse observatum fuit, in specie à QUERCETANO in Tetr. gravissimor. affect. Item lumbrici uti convulsionem & epilepsias excitant, ita etiam ad paralytes terminantur, teste SALMUTH Cent. 2. observ. 45. Hinc etiam apoplexiam paraplegiam, lateris sinistri & convulsio dextra insecuta fuerunt: vid. SCHENCKIUS in observ. Ut taceam paraplecticos deperatos quosdam subinde ex graviore animi pathemate, ira vel terrore, ex improvviso curatos fuisse, autore HORSTIO lib. 11. Observat. 15.

Adeoque Paraplegiæ istæ pro fiendi ratione nunc privativa, nunc positiva esse videntur; & in his positivis aliquid convulsivi omnino intercedere, dicta modò ratio, & cum affectibus convulsivis faciles permutationes, omnino persuadent. Sed cum in specie apoplexias non lethales ferè ordinariò insequantur Paraplegiæ, hujus permutationis ratio est inquirenda. Equidem apoplexiam sanguineam universalem, quæ ex sanguinis extravasatione evenit, ut plurimum lethalem esse existimo. Alias sanguineam privativam, quæ tantum ex motu sanguinis intercepto in vasis cerebri oritur, si universalis sit, quomodo in paraplegiam transeat, sanè obscurissimum, nisi forsitan venæ sectio largior, sanguinis motum promovendo, saltem alterius cerebri lateris affectum particularem reddat, qui antè universalis erat, ita ut saltem in altera cerebri medietate, aut saltem circa nervorum exortum, & sanguinis consistentis & turgescendum inde vasorum vitio, Paraplegiæ oriatur. Imò si apoplexiæ privativæ sanguineæ Paraplegia supervenerit, probabile est ex sanguine congruato & subsistente plus minus laticem aquosum fecisse secessum, & vel interius profundius penetrasse in cerebrum per caudicem medullarem, vel exterius defluxisse secundum ductum spinalis medullæ, & ita unius alteriusve nervi læsione vel oppensione Paraplegiam intulisse. In privativa verò lymphatica, aut huic cognata, si unquam observetur, puerilis apoplexia, lymphæ materiamve peccantis in caudicem medullarem interiora versus progressus, adeoque obstructiones, vel ejus secundum caudicem spinalis medullæ defluxus, & certis in locis compressio, Paraplegiam inferre potest, ut satis plausibile videtur. Imò forsitan aliquando irritatio contractioni fibrarum & membranarum circa principium nervorum originem subministrare, & hinc sufficientem spirituum influxum impedire, poterit.

Positivam apoplexiam etiam excipere Paraplegiam, ses nota est, sed modus est admodum obscurus. Est tunc Paraplegiam contrahentem partium æruosarum circa radi-



radicem spinalis medullæ, quæ impediatur spirituum pro motu transitus, ut HELMONT. asserit, non improbabile est: sed quomodo fiat? reuerà intricatum. Interim tamen sicut calculus in rene subinde crura istius lateris stupidum & semiparalyticum reddit, aut quando colicam intestinorum convulsivam ex improvise vel crurum paralytis, aut hemiplegia insequuntur, si causa materialis communicetur, ex simplici partium nervosarum concursu; ita similiter probabile est, per consensum nervorum, eorumque fibras circa sui radicem in caudice medullati, aut in huius progressu contractas, spirituum sufficientem pro motu impediri influxum, sicque partes, ad quas isti nervi distribuuntur, sensu & motu plus minus privari. Ex hoc enim permutationis ratio effectuum paralyticorum & convulsivorum, & eorum identitas, optime explicari possunt.

### PROGNOSIS.

Ex his patet Prognosis de cura hemiplexiæ & paraplexiæ: nempe pro varietate graduum plus vel minus gravis est cura.

Paraplegia quævis malum difficile est curatus.

Primus gradus leuissimus est, & qui cæteris partibus facilis curatur: ultimus gradus difficillimus curatu, & etiam gravissimus & periculosissimus est.

Si parti paraplexiæ correptæ vel tremor superveniat, aut formicationis sensus, aut doloris molestia, bonum signum est pro restitutione.

Quod magis calor membri paraplectici deficit, eò minor spes superest.

### CURA.

Quoad Curam harum apoplexiarum particularium: In hac eadem ferè, quæ in Apoplexia universali curanda, observanda sunt. Remedia verò ipsa appropriata sunt eadem, quæ epilepsia aut apoplexiæ medentur.

Vomitum in quavis Paraplegia est optimus, idque quando eadem supervenit apoplexiæ positivæ, & quidem fortè necesse est vomitorium; quem in finem Mercurius vitæ cum scammonio sulphurato ab HARTMANNO in Prax. Chymiatr. laudatur: v. g.

℞. Mercurii vitæ gr. ℥.

Scamm. sulphur. gr. ℥.

Cum Conf. flor. bugloss. f. Bolus.

D. S.

Saccharum emeticum pro una dosi.

Sin vomitoria non velimus usurpare, instituantur fortes purgationes: quibus addendus est semper stimulus acris ex colocynthide, Vel

℞. Resin. lalapp. ℥.

Dissolv. cum f. q. vitell. ovor., diluatur cum

Aque fumar. ℥vj.

Cinnam. ℥j.

M. S.

Lac purgans.

Item subinde necesse est, ut venæ sectio instituat, sed in latere opposito, non tamen semper æquæ necessaria, est. Lindani verba sunt: Venæ sectionem instituere, nisi a plethora adsit, magis iugulat, & puto idè multas curationes malè succedere, quod in principio sanguinem mittimus: statim vomitorium propinandum, idque ab initio. Adeoque vomitoria imprimis in paraplegia, quæ sequitur apoplexiæ positivam, conveniunt. Sicuti venæ sectio magis locum habet in ea, quæ sequitur post apoplexiæ privativam, ubi etiam fonticuli, item vesicatoria nuchæ admoda, & cucurbitule scarificatæ intra scapulas conveniunt. Utrobique verò venæ sectio adhibenda in plethoricis, aut in quibus solennis quædam sanguinis excretio suppressa fuerit.

His & similibus præmissis, inter remedia interna præceteris Sudorifera laudatissima sunt, nunc communia, nunc specifica. Communia seu generalia ista in apoplexia commendata sunt speciatim solia volatilia in paulò majori dosi, & spiritus, sanguinis humani, cranii humani, & similia, in paulò majori dosi; nempe spiritus ad integras drachmas, salta à ℥j. ad ℥ss. Liquor cornu cervi succinatissimus est egregius. Loco horum Veteres etiam usurpant Decocta sudorifera lignorum, quæ interpositis appropriatis sunt optima. Speciatim Decoctum ligni sassafras

egregiè confert, ex quo & bacis juniperi vel lauri paratum. Decoctum efficaciter paralyticum restituit, teste POTERIO Cent. 2. observ. 26. Item Decoctum sassafras cum roremarino imprimis convenit, quod singulare quid obtinet in huiusmodi nervorum affectibus. Item belenium ejusque radix dictis Decoctis additum, bene convenit: verbi gratia ad locutionem POTERII præscripsi;

℞. Rasur. ligni sassafr. ℥ij.

Herb. rorismar. rec. M. j. vel ℥j.

Bacc. Junip. rec. succul. vel lauri ℥ss. vel ℥ij.

Coqu. in Vin. & Aqua an. ℔ss. per Balneum Mariæ in cucurbita, cum suo alembico munita:

Colaturam & destillatum misce, adde

Spiritus bacc. Junip. ℥ij.

Sal. ammoniaci ℥ij. ad ℥ss. vel ℥vj.

Syr. flor. tunic. ℥ij. vel q. s. pro grato sapore.

M. S.

Potio articulos confortans.

De qua potione ter quotidie, mane, à meridie, & ingruente nocte bonum haustum capiat æger aliquamdiu, blandum sudorem expectando.

Specifica verò sudorifera sunt aurum diaphoreticum Poterii, cinnabaris antimonii, corallata, cranium humanum. Aurum diaphoreticum certè in frequentissimo usu habuit POTERIUS, & elegantes curas in paralyticis præstitit. Paravit vel ex auro per amalgamationem calcinato, vel aurum fulminans cum duplo florum sulphuris in mortario lapideo optime miscetur, (cavendo, ne fortiori trituratione illud incalcescat & fulminet;) in crucibulo pronis ardentissimis in pulverem purpureum vertitur: cum spiritu vini rectificatissimo anisato per quindecim dies blandi calore digeritur, & spiritu hoc, aut per destillationem aut per deslagrationem, separato, ad usus convenientes asservatur. Absque calcinatione etiam cum floribus sulphuris solâ digestionem cum spiritu vini rectificatissimo vel anisi, & cum eo ZWELFFERUS, hoc aurum diaphoreticum præparant; ita tamen ut prior quatuor saltem dierum, posterior aliquot septimanarum, digestionem adhibeat atque commendet. Sicuti aliàs idem cum Mercurio antimonii præparavit nobiliori modo & effectu: Vid. POTERIUS quoad descriptionem in sua Pharmac. Spag. l. 2. cap. 14. pag. 456. seqq. & in Append. pag. 599. quoad usum & vires mirabiles, vid. Cent. 1. Curat. 73. Cent. 2. Cur. 66. & 87. & Cent. 3. Cur. 14. Hoc à gr. v. ad ℥ss. in conserva quadam propinetur: in vehiculo enim liquido ad fundum cadit aurum diaphoreticum: Sic grana sex huius auri assumpta cum sensibili quadam alteratione circa præcordia sudorem cum aliquali somnolentia inferunt. Aliquando viro adulto affectu quasi paralytico correpto dedi duas doses auri diaphoretici cum conserva florum tunicæ: Prima dosis cum blando sudore tormina abdominis & mirabilia excreta excitavit, alterâ vice verò copiosum sudorem emanare fecit cum euphoria. Modus præscribendi est:

℞. Conf. flor. tunic. ℥j.

Soli diaph. gr. xv. ad ℥j.

M. f. Bolus:

div. in 2. part. æqu. S.

Saccharum sudoriferum.

Assumptâ unâ dosi hauriatur desuper spiritus theriacalis cochleare j. vel ℥j. & ita per sudorem repetitum, præmissis præmittendis, malum curabitur.

Vel

℞. Cran. hum. præp.

Unic. ver. præp. an. gr. xij.

Auri diaph. ℥ss.

M. S.

Pulvis confortans.

℞. Cran. hum. sine igne,

Corall. rub. præp. an. gr. xv.

Aurifulmin. gr. ℥ij.

M. S.

Vi anis.

℞. Cran. hum. sine igne,

Unic. ver. præp. an. gr. xij.

Aurifulmin. gr. ℥ij.

Salis vol. viperar. gr. vj.

M. S.

Vi anis.

Quoad



Quoad Cinnabarin antimonii verò, loco auri diaphoretici egregia est rite parata. Hæc datur à gr. xv. ad ℥j. nuñc solitarie, nunc cum ossibus humanis præparatis, nunc cum sale volatili cranti humani & similibus, idque repetatur crebro usu.

Vel

℥j. Cinnab. Antimonii gr. xv.  
Succin. catarrhal. ℥ss.  
Salis vol. Succin. gr. v.  
M. f. pulvis  
D. S. ut suprà.

Accipiat in vehiculo appropriato, & expectetur sudor.

℥j. Cran. hum. præp.  
Corall. rub. præp.  
Cinnab. antimonii an. ℥ss.  
Ol. dest. Cinnam.  
Caryoph. an. gutt. j.  
M. S.

Pulvis cephalicus.  
℥j. Aqua Ceras. nigr.  
Lil. convall.  
Mentha an. ℥j.  
Spiritus Ceras. nigr. ℥vj.  
Cinn. antimonii ℥ss.  
Salis vol. cornu cervi gr. xv.  
Syr. flor. tunic. ℥j.  
M. S.

Potio cephalica.

Cum his Internis optimè simul externa regioni spinæ dorsi, item vertici, aut saltem loco unde exoritur nervus partis affectæ, illinenda conveniunt: Unde in manuum apoplexiâ admoveantur nuchæ; in apoplexiâ crurum ossi sacro, regioni lumborum, & simil. Ipsa membra apoplectica illinire superfluum videtur, cum malum illis non hæreat, sed ipsa saltem passivè se habeant. Hæc inter conveniunt olea destillata (nam expressa, per infusionem, aut pingua mucilaginosâ non penetrant) vel spirituosâ, vel emplastra. Olea destillata quod attinet: talia sunt v. g. oleum destillatum succini, lavendule, spicæ, galbanum Paracelsi, quibus Petroleum album nativum, aut etiam petroleum cum cineribus destillatum, potest addi. Juxta hæc in usu sunt spirituosâ, ut essentia ex infusis nervinorum, & aqua articularis ad extra, i. e. spiritus vini, assusus simplicibus nervinis aromaticis, & aliquot cohobis abstractus, quæ vel solitarie, vel mista cum parte dimidiâ vel tertiâ spiritus salis ammoniaci cum calce viva & spiritu vini parati. Pro aquis articularibus ad extra quidam

℥j. Sem. Sinapi p. j.  
Bacc. Junip. part. ij.

Contusa infundunt in spiritu vini, eundemque imprægnatum partibus affricant: pro quo lycopo & ipsum magma simpliciter adhiberi potest.

Item essentia castorei, extracta cum aqua spirituosâ liliorum convallium cum vino, pro frictione spinæ dorsi vel alius loci commodi calide, est egregia, in specie post sudores, ut poris apertis melius possint penetrari: Item spiritus vini camphoratus ter quotidie in loco calido benè affricando parti paraplecticæ. His ipsis spirituosâ aquis & salia volatilia, in specie spiritus sal. volatile lumbricorum terrestris ac formicarum, addi possent.

Vel

℥j. Spir. vini camphor. vel formic. vel aquæ artic. ad extra ℥ij.

Spiritus lumbr. terr. ℥ss.  
Ess. Castor. ℥vj.

Spiritus sal. ammoniaci cum calce viva ℥ij.

M. D. S.

Spiritus externus.

Quod si spina dorsi probè his ipsis perfricata fuerit, applicandum desuper linteum cum gummi animæ probè sustinatum atque calidum: Vel præmissis cum aquis spirituosâ frictionibus istis olea suprà laudata desuper illinenda sunt, ut apertis his medullis poris, penetrantioris efficaciz sint hæc ipsa, quibus etiam imprimis oleum destillatum tartari, & olea ex pinguedinibus aut partibus animalium durioribus destillata addi possunt, ut ut horridè læteant; tamen aliquoties cohobando super caput mortuum, aut ossa calcinata, à nimio fœtore liberantur, & utilissima sunt in quibuscunque artuum affectibus. Illinuntur hæc olea nunc ita simpliciter, nunc ubi nimis acria

fuerint, parvasque pustulas excitent, subligenda sunt vel cum oleo lumbricorum terrestris per decoctionem, & ita illinenda. Possunt etiam fortibus frictionibus & litibus asperis, calidis ac penetrantioribus, illiniri totæ partes paraplecticæ, ut irritentur partes sensiles, & hujus medio provocetur plus minus spirituum impetus: propterea & ipsas partes ita resolutas his modis tractare consuetum est, & propter hunc finem dictis litibus alumen plumbeum, tam exudum, quàm, quod præstat, ex hoc paratum arcænum aluminis Warzii, simul addendum est, in specie quando ad atrophiam seu marasmodum membrum paraplegiâ affectum inclinare velit: c. g.

℥j. Ligu. lumbr. terrestr. in elibano parat. ℥ij.

Ol. destill. Spicæ,  
Juniperi an. ℥ss.  
Lavend.  
Majoran. an. ℥ss.  
Succini ℥ij.

Alum. plum. ℥j.

M. S.

Unguentum articulare.

Partibus affricetur.

Qui autem acria ferre non possunt, ut scorbutici, & in quibus atrophia membri meruitur,

℥j. Pingv. hum. vel anser. vel Butyr. Maior. ℥ij. jv. ad vj.

Ol. dest. cereb. ℥ij.

Bacc. Junip. ℥ij.

Spicæ ℥ss.

M. S. ut suprà.

Quibus & desuper subinde circa locum affectum, in specie spinæ dorsi, emplastra ex nervinis & aromaticis imponi possunt, imprimis ex gummatibus penetrantibus:

℥j. Gum. Galb. p. ij.

Ceraune p. j.

Malax. cum Petrol. in consistentiam Emplastri.

D. S.

Emplastrum articulare.

Quod in regione spinæ dorsi agglutinandum erit.

Pertinet huc unguentum & emplastrum paralyticum, Myofichti, & similia.

Alia plura remedia contra Paraplegiam videb. M. A. N. C. Ann. 6. & 7. Append. pag. 44.

Balnea denique ex formicis, reverà singulare quid obtinent in Paraplegiis curandis: Conf. M. A. N. C. Ann. 4. & 5. Observat. 128. pag. 137.

## ARTICULUS III.

### DE

### PARALYSI.

Cognata pathemata sunt Paralysis & Stupor; unde etiam propter summam, quam habent, affinitatem vulgò & non absque errore confundi & promiscuè tractari solent. Nam quod attinet Paralysis, Germ. die Lahmung: ad illam vulgò etiam referunt Hemiplexiam, item speciem innominatam & paraplexiam, cum tamen hæc species reverà sint species apoplexiæ, nempe particularis, & oriuntur ex affectis nervis. Paralysis verò sunt resolutiones membrorum tales, in quibus primariò motus deficit, superflite plus minus sensu, ob spirituum animalium motum & activitatem denegatam. Stupor è contrà est affectus, in quo, deficiente in partibus sensu, superest motus, Græcis ἀναισθησία dictus, symptoma tactus est, quod ad paralyticos affectus nullo modo referri debet.

Hæc tria mirum in modum confunduntur, quia explicantur ex Arabum & Galeni Scriptis. Genuino verò sensu apud Veteres Paralysis propriè significabat laxationem & resolutionem nervorum; à παρα & λυω, penitus resolutio, idque imprimis interprete CELSO, Medicorum nempe Cicerone qui tempore AUGUSTI, ante GALENUM longè, in viuis fuit, & in hoc puncto satis accuratus est. Nervus autem, Græcis δὴναιος, ab ipso dicitur vel tendo musculorum, vel ipsum ligamentum, quo necluntur artus: Et id, quod nos hodie vocamus nervum, prisce generalli nomine venarum complexi fuerunt: vid. LINDANUS in Colleg. Pract. ad Hartm. & CELSUS.



*Paralysis* ergo ex genuino sensu erit *resolutio & relaxatio* istius adstrictionis, quam debet habere nervus seu tendo & ligamentum, quibus mediantibus connectuntur & proximè moventur artus: quæ ipsa instrumenta, tendines, fibræ & ligamenta, quando sunt laxiora, vel humidiora & flaccida, sunt inepta pro movendis istis partibus, & tunc dicitur *Paralysis*. *Talis affectus est*, quem describit BONTIUS in sua *Med. Indorum* cap. 1. tanquam malum Indis familiare, sub nomine Indico *Beriberi*: Conf. etiam Tulpus *Observat. lib. 4. cap. 5.* item BARTHOLINI *At. Med. Hassiæns. Volum. 4. pag. 145.* Est scilicet talis resolutio musculorum & nervorum, ut totum corpus & ejus partes moveri nequeant. Hic ergo affectus est *genuina Veterum Paralysis*, quando tendines, & ligamenta, & fibræ artuum, ita humectantur & laxantur, ut resoluta & laxata non possint movere membra, siue universum corpus, siue certas saltem partes occupet. Nempè cessat *primariò motus* in membro paralytico, sensu plus minus superflite, malumque est in ipsa parte affecta, minus verò in nervo.

Ex quo facilè patet, quod *paraplegia & Hemiplexia* sint species *apoplexiæ*, non verò species *Paralyseos*; *Paralysis* enim est propriè loquendo saltem symptoma motus laesi, cum si lædatur simul sensus, est per accidens. Et propter neglectum hujus distinctionis Auctores nesciunt, quomodo fiat, quod pereat motus superflite sensu? quod tamen facilè cognoscetur, modò fieret distinctio hujus ab *apoplexiæ* speciebus. Quomodo autem sensus superesse possit motu deficiente, licet uterque ab eodem prodeat principio, optimè declarare videtur WILLISIUS de *Anim. Brutorum* Part. 2. pag. 280. *Paralysis* illa, quæ fit saltem ita, ut lædatur motus, remanente sensu, est *levior*, & vocatur ordinariò *Paresis*, qualis est ista, quæ supervenit colicæ, & qualis imprimis sæpius est in scorbuto: videb. DRAWIZIUS de *Scorbuto dolorifico*, ubi de *paresi scorbutica*. Quando verò sensus & motus simul, vel post motum sensus etiam partis, pereunt, gravior *Paralyseos* solet esse species. Plus enim *Paralysis* pertinet ad motum quàm ad sensum. Subiectum ergo *Paralyseos* sunt fibræ, & tendines, & ligamenta.

Ex dictis patet, quod *Paralysis* propriè sit atonia fibrarum nervearum & musculorum, præcipuè autem in tendinibus & ligamentis; quæ partes propter atoniam resolutæ, flaccidæ, molles & relaxatæ, ineptæ sunt, ut trahere aut convenienti robore firmare possint membrum; qui levior affectus dicitur *Paresis*, sicut fortior *Paralysis*.

Malè ergo & ex falsa hypothese *Paresin Paralyfin* notham vulgò indignant. Putant nempè, *paralyfin* oriri ex obstructione nervorum, & insequi *apoplexiam*, (id quod tamen dat *paraplegiam*), qualis obstructio cum non sit obvia in *paresi*, propterea eam *Paralyfin notham* indignant; cum tamen revera *paresis Paralyseos* sit species, sed levior, in qua nervi non primariò, sed tantum consecutivè, affectis fibris & tendinibus laxatis, & ipsi afficiuntur.

Facilis aliàs est distinctio inter *paraplegiam* superveniensem *apoplexiæ*, & *Paralyfin*. Differunt enim (1.) origine: Nam *Paraplegia* sequitur imprimis cerebri & spinæ morbos, & frequentissimè comitatur *apoplexiam*, *epilepsiam*, *convulsiones* &c., cum dicti affectus subinde sine mutuo permutabiles, & desinant in *paraplexiam*; *Paralysis* verò sequitur alios corporis affectus, in specie post scorbutum, malum hypochondriacum, & colicam convulsivam: frequentior est regionibus, ubi copiosum hauriunt vinum, aut oritur etiam subinde à causis externis.

Differunt (2.) subiecto: Nam in *paraplexia* primariò afficiuntur nervi, quoad exortum; in *Paralyfi* verò iidem in progressu & insertione imprimi musculi, & in specie tendines & artus. Hinc medicamentorum topicorum diversa in utroque affectu applicandi ratio, quæ in *paraplegia* magis origini nervorum partis affectæ, in *Paralyfi* ipsi parti affectæ applicanda.

(3.) Symptomatis simul differunt: Nam in *legitima paraplegia* sensu tactus ut plurimum cum motu voluntario simul perit & tollitur; in *Paralyfi* verò subinde sensus tactus superest, quandoque etiam, ut in scorbuticis, cum

sensu doloroso, formicante, lacerante, & simili, tantummodo motus tollitur, & labescit.

Quibus addatur (4.) quod *genuina nervorum resolutio* seu *paraplexia* à principio ad finem eodem ferè habitu sit constans, aut quodammodo perpetua, & crebrius Medicorum operam fallat; nam *paraplegiæ*, post *apoplexiam* sunt difficillimæ curationis: è contra *Paralyseos* & *pareses* sæpius per intervalla ægros magis & minus vexant, labefactant, cessant & redeunt, quandoque cum *arbitricis* quasi *doloribus* complicantur, ut quotidie evenit in *paresi scorbutica*, donec habitum in membro contraxerint: Quin & interdum in *convulsiones* abeunt, & in malo confirmato pertinacem *contracturam* post se trahunt, nec tamen adeò rebelles sunt exercitatis Medicis, ut *paraplegiæ*, quin nondum confirmatæ facile tolli possint: vid. DRAWITZII *Scorbutus dolorificus*.

Quæ dicta hæcenus, ostendunt, quid *genuina* sit *paralysis*. Verùm communiter in genere & abusive omnis sensus & motus in parte depravatus à quacunque causa, dicitur *Paralysis*: sic etiam, quando ex dissecto, v. g. per medium, nervo pereunt sensus & motus in partium vulneribus, dicitur etiam *Paralysis*, cum propriè in *Paralyfi* vera pereat motus, remanente sensu, rarò verò simul sensus etiam pereat; in *paraplegia* verò sensus & motus simul perit. Rarissimus è contra est affectus, ut pereunte sensu remaneat motus, & tunc malè quoque, ad *Paralyseos* refertur, cum tantum *anæsthesia* sit, seu insensibilitas, aliis stupor dicta, de quo *suprà* Sect. 2. Cap. 3. Artic. 1. egimus.

## C A V S Æ.

*Causas Paralyseos* quod attinet: hæc, prout à *paraplegia* distinguitur, ratione causæ est vel *privativa* impropiè sic dicta, vel *positiva*; quarum illa nervos afficit, & spirituum emanationem inhibet; hæc narcotin seu simile quid, quod spirituum animalium activitatem turbat, præsupponit.

Causæ ergo *Paralyseos* revocari possunt ad duplicem classem; nempè spirituum torporem, & viarum angustiam seu interceptionem. Siquidem *privativa* in viarum seu nervorum, medullæ oblongatæ, ac tendinum dissectione in vulneribus, distorsione aut compressione, aliove vitio consistit; quæ nunc hunc nunc istum nervum sine præcedente affectu *apoplectico* solent affligere: quod etiam pertinet, quando nervorum quorundam particularium per *mutuam* causæ morbosæ sit obstructio, aut compressio, vel superficietenus, vel intra membranas, aut alia nondum satis cognita affectio, quod minus possit sensus & motus communicari partibus, v. g. quando post variolas retropullas aut malè curatas, uti habet LOTCHIIUS lib. 2. *Observat. cap. 1. Observat. 15.* qui observat *paralyfin* linguæ in infante à variolis malè curatis, aut post erysipelas capitis malè curatum oritur *paralysis* linguæ, (vid. SALMVTH. Cent. 2. *Observ. 43.*) Item à *varis faciei retropullis* primò arthritis, post etiam *paralysis*, & tandem brevi mors locuta fuit, notante SALMVTH. l. a. *Observat. 35.* quæ tamen omnes à causa *privativa* excitatæ *Paralyseos* reverà potius *paraplegiæ* sunt, hodie consuetà confusione invicem confusæ. Facit huc etiam, quando per vulnera cerebri & medullæ spinæ, aliarumque partium, diffecantur nervi; aut quando nervi in medullæ spinalis compressione, ex luxatione ac fractura vertebrarum inferiorum partium dorsi, aut casibus ab alto, sunt distorti aut compressi, quod observavit HOFERVS; unde supervenit *paralysis* *privativa* ceterarum partium. His enim modis vitiatum nervi denegant spirituum animalium influxum, & per consequens sensum & motum partibus istis, in quas derivantur; unde *paraplegiæ* potius, quàm *paralyseos*: Sic HOFERVS in *Hercul. Medic. pag. 29.* observat *paralyfin* omnium partium inferiorum ex luxata vertebra lumborum, coxæ proximæ: Ita post casum in os sacrum ex scala lapidea *paralyfin* brachii & cruris sinistra secutam, & inunctione appropriata curatam fuisse, refert AMATVS LVSITANVS lib. 1. *Curat. 19.* Sic percussiones capitis excitant *paralyfin* vel potius *paraplegiam* in opposito latere: Hinc quidam ex arbore decidens in os sacrum, ex hujus contusione, in *paralyfin* dictam pedum inciderat, ut hoc observat



**BARTHOLINUS** *Cent. 1. Observat. 8.* Similiter paralysis sinistra lateris, convulsionem & mortem, ex convulsione musculi temporalis à lapsu notavit **GLANDORPVS** *Specul. Chirurg. Observat. 10.* Quod pertinet gibbus paralysis sensum inducens, cuius curam videb. in *M. A. N. C. Ann. 2. Observat. 230. pag. 333.* Sed hæc ipsa, modò allegata potius paraplegiam, quàm paralysis inducunt.

*Positiva verò Paralysis est, quæ propriè Paralysis constituit, & nunc ab externa, nunc ab interna oritur causa.*

*Externas inter nimia humectatio ac pima refrigeratio, e. g. aer frigidior ac pluviosus, indeque nata resolutio & flacciditas fibrarum ac tendinum, inserit Paralysis, eamque propriam: Sic enim non solum GALENUS jam suo tempore ex mora diuturna in aqua frigida, & ex balneo aquæ frigidae; sed etiam ZACVTVS LVSI-TANVS lib. 1. *Prax. Admir. Observat. 34. & 37.* ex diuturniore mora in aqua frigida pluviosa, item ex frequenti natatione in aqua frigida, Paralysis observant. Hinc etiam senes, item infantes, sunt quasi semi-paralytici; quia in infantibus fibræ & tendines copioso rore nutritio irrorantur, laxæ & flaccidæ sunt, & propter deficientem robur, vix valent membris movendis; in senibus verò deficiente rore nutritio succedit sæpius aquositas serosa, aut alia, quæ laxando fibras & tendines, tales semi-paralyticos reddit. Unde etiam illi, qui diutius in pluvia versantur, & vestimenta madida in corpore exsiccare permittunt, in uno alterove membro fiunt paralytici, teste **HORSTIO** in *Observat.**

Imprimis autem & sæpius à causa interna sic Paralysis positiva ex lymphæ acida seu ex materia quadam vitiose acida, lymphæ cognata, quæ lymphæ aut seri vehiculo ad quoddam membrum delata, nervosas partes istius loci irrorans, (cùm aliàs omne acidum nervis sit inimicissimum, cuius occasione fibræ unius alteriusve tendinis aut musculi affici ac quasi nonnihil intorqueri aut corrugari videntur,) earum tonum successivè corrumpit, ut ineptæ fiant istæ partes nervosæ movendis ossibus & membris; unde consequenter motus deficit cum sensu plus minus deficiente, aut saltim aliquali stupore juncto. Exemplum talis paralyseos positivæ à causa interna, v. g. à sero ad spinam descendente, videb. in **PLATERO** *Præcox Tom. 1. lib. 1. cap. 2.* **VOLCHERO** *Coiter Observat. miscel. pag. 114.* & **BONETTI** *Sepulchreto lib. 1. Sect. 15. Observat. 3.* item ab abscessu cerebri, vid. **SCULTETUS** *Observat. Chirurg. 19.* à tumore scirrhuso vid. **WILLISIUS** *de Anima Brutor. lib. 3. cap. 9.* Hac ratione, potiores vini in quibusdam regionibus subinde fiunt paralytici; & quidem cum tali paralyti ex acore contracta etiam subinde sensus quidam molestus, si non dolorosus, saltem nunc formicans, aut tantummodo titillans, aut lancinans, nunc cum stupore, conjunctus est, qui in principio nunc est gravior, nunc remissior, donec successivè superveniat partis magis magisque immobilitas, & tandem planè deficiens motus. Sensus formicans oritur ex acido primitivo vellicante, & præternaturaliter rodente fibras, nervos verò non tangente, unde tactus est salvus. Et tales paralyces frequentes sunt in Austria, Moravia, & similibus locis, ubi copiosum potatur vinum, acore insigni tartareo satis volatili turgidum; qui acor vitiosus nonnihil austerrus, in stomacho non ritè correctus, pergit ad membra & partes extimas, & defixus circa nervosas partes, tendines, fibras & ligamenta, non tantum arthritidem, sed etiam paralyticam inserit, in quibus pereunte motu imminutus aut vitiat sensus remanet, qui & successu temporis perit. Huc facit, quod habet **PARACELSUS** *de Contract. Membror.* qui dicit, quod hoc vinum inducat contracturam membrorum, aliud lithiasin, &c. Conf. etiam **HELMONTIUS** *Tract. de Lithiasi*, qui refert, causam esse in tartaro vini plus minus volatili. Nempe ab occulto acido volatili plus minus austero irroratæ fibræ, tendines, &c. rigiliores quodammodo & minus mobiles fiunt, hinc enim & contractura interdum supervenit: acida enim corrugant quodammodo partes nervosæ, (corium cum acido corrugat se, cum alcalibus non,) adeoque in his casibus primò sequitur paresis, hinc tonus

fibrarum naturalis soluitur & perfecta Paralysis, & tandem earum corrugatio præternaturalis, omnimoda membri immobilitas & contractura inducitur: Quæ illustrat **BARTHOLINUS** in *At. Med. Hassniens. Vol. 1. pag. 210.* ubi refert, Chirurgum ex potu aquæ fortis tantam passum fuisse contracturam membrorum, ut eum planè contraxerit, adeò ut ex magno homine, pusillus factus fuerit: Sicuti huc facit observatio **TACKII** in *Triplici Phasi Seph. pag. m. 148.* qui refert Paralysis omnium membrorum cum contractura ex aciori sanguine, curatam per lacticia, quæ acidum temperant, & fibras paralyti affectas restaurant. Dispositio etiam ad talem paralytin vinum, præmaturè, & antequam se depurat, sulphuratum, quò minus tartareæ sæculentæ debite possint fermentando præcipitari, & sulphur narcoticum exhalare, unde acidum, resistans plus minus volatile, profundius intra corpus penetrat, nerveas partes affligit, & ad huiusmodi Paralysis disponit: Vid. de vino ad paralytin hanc disponente *M. A. N. C. Ann. 2. Observat. 39. pag. 70.* Quod si magis volatilissimum, adeoque & spirituosius vinum fuerit, ac synoviam articularum infecerit, podagram inserit; aut inficiendo spiritum insitum, aut fermentum renum, lithiasin. Unde præmissis præmittendis Paralyces tales & hinc nata contracturæ, lacticiarum usu inter alia apri-mècurantur.

*Scorbutici etiam ex vitiat acido, item colici, nempe in colica convulsiva, simili ratione Paralysis & paresis incurrunt. Nam si acidum scorbuticum junctum fuerit vehiculo seroso, hinc inde vitiantur fibræ musculosæ ac tendinosæ, & partes ad paralytin planè singularem disponuntur plus minus contumacem: Sensum inchoat & proccedit, & primò, saltem vagus stupor aut insensibilitas cum formationis sensu partem prehendit, unde successivè labefactari tonus membri, & magis magisque paralyticus reddi incipit. Est autem vaga vel minus constans, nisi nimis inveterata fuerit, ita ut ager uno die melius, in altero pejor habeat, uno die ferè incedere, altero die decumbere cogatur: hinc nunc digitus, aut manuum aut pedum, intumescere, nunc detumesce observantur; nunc unus alterve digitus stupet, qui brevi melius se habet: Sensus manet ut plurimum, aut saltim aliqualis stupor inducitur; subinde cum dolore gravi, ut plurimum vago, raro fixo, juncta est: Jacentes verò commodè membra movere possunt, sed stantes vix denuò pergere, nec absque dolore aut stuporis sensu incedere possunt; sicuti hunc ipsum affectum omnium optimè delineat **DRAWITIUS** *de Scorbut. Sect. 3.* Sanè acidum volatile austerrum est, quod hic peccat, quod nerveas fibras diversimodè afficiendo, nunc aliquid convulsivum, nunc aliquid paralyticum inserit, ita ut huiusmodi paralytis quasi medium quid sit inter morbos paralyticos & convulsivos in specie sic dictos. Unde non rarum est, ut in talibus ægris scorbuticis membrum nunc spasmò contractum rigidum reddatur, nunc paralyti affectum idem flaccescat, & plus minus stupeat, prout nervi aut fibræ tendinose vel acido irritantur, vel eodem austero intorquentur. Huc quoque pertinet lues Venerea, Paralytin producens: vid. **RHODIUS** *Cent. 2. Observat. 34.**

Par est ratio istius Paralyseos, quæ insequitur Colicam, & quidem istam, quæ est magis habitua, & quæ vulgò à tenui acri humore oriri dicitur, & aliàs à Prædictis Colica biliosa vocatur. Alius est pertinaciter clausa, tormina atrociora & contumacissima vexant, purgantibus quibusvis per os assumptis maxime exasperatur malum, umbilicus interiora versus retrahitur. Quod si vel malè tractetur, quod imprimis fit, si irritetur acrioribus aut purgantibus, aut plus minus defævere videtur, successivè unus alteriusve aut plurium membrorum stupor, hinc subita motus impotentia, tandem perfecta Paralysis, supervenit. Si nequius hoc rectè consideretur, reverà est Colica ratione modi convulsiva, ratione causæ occasionalis materialis scorbutica; nidus verò & sones in plexibus mesenterii nerveis est; nam in ista colica non tam intestina affliguntur, quàm mesenterium. Acidum austerrum, imprimis scorbuticum, est, quod has turbas, nempe convulsiones partium internarum & colicam dat in abdomine. Dubium saltim est, quomodo colicam talem Paralysis astum insequatur, cum interdum subito atque cessat dolor, membra observen-



etur paralytica? Nempè in principio mali paralytici saltem convulsivi quid subest, unde spirituum interrupto fluxu stupor & aliqualis insultus paralyticus superuenit. Hinc colica talis in Paralyfin, subinde in convulsionem, subinde in arthriticos dolores, in principio mutationis suæ terminatur, donec ipsum acidum volatile circa mesenterii plexus resolutum, materialiter partes istas ita male affectas attingens, perfectam Paralyfin, & tandem ex fibrarum tendinosarum congregatione contracturam efficiat. Nempè sicut renum calculum stupor crurum non, raro comitatur, ita & hoc malum nonnihil remittens, ex simplici consensu unius alteriusve membri ex nervi spasmo & spirituum interrupto motu paralytica dispositio insequitur, donec malo inueterato ipsum quasi per *torpedinem* fiat, quod quoad originem, saltem per *torpedinem* erat. De cætero par serè hujus cum Paralyfi scorbutica videtur esse ratio; partim ergo ex mutuo membrorum consensu, partim ex metastasi materiæ vitiøsæ in membra externa, fibras corrugantis, sunt pareses: hinc enim etiam suffocationi matricis paralyfin superuenire notat QUERCETANUS, sicuti epilepsia & ipsa interdum paralyfin post se relinquit: uti etiam ex vermibus intestinorum interdum paralyfin oriri, observat SALMUTH. *Centur. 1. Observat. 44. & Centur. 2. Observat. 45.*

Hiscæ addenda sunt porro corpora quædam specialia, quæ singulari virtute membris & nervis torporem paralyticum inferunt. Quod pertinet Torpedo piscis non tantum, (de quo notum est, quod piscatoribus & aliis sub actu inferat stuporem & torpedinem, unde etiam, nomen accepit, vid. REDI in *Observat. & STEPHANUS FLORENZIN*, qui de hoc pisce accuratam anatomem edidit, ubi observat, in certo quodam corporis ejus loco saltim residere vim istam, unde emissæ effluvia torporem inducant;) sed præter hunc piscem etiam in India Occidentali noviter reperta est certa species quædam conchyliorum, quæ ipsa similiter solo sui contactu manibus & brachiis cæterisque membris stuporem paralyticum inferit: Vid. KIRCHERUS in *Regno Naturæ Magnet. Sect. 4. cap. 4. pag. 182.* Ulterius Mercurius & omnia Mercurialia, uti fibris & nervosis partibus sunt inimicissima (hujus rationem TACHENIUS derivat ex acido) ita etiam ij, qui trahant Mercurialia, ut aurifabri, item qui specula inargentant, subinde partium paralyfin incurrunt, uti, præter SENNERTVM in *Prax. cap. de Paralyfi*, FORESTUS lib. 5. *Observat. 3.* observat; hinc etiam ij, qui in fodinis Mercurii in Foro Julii laborant: Vid. *Acta Societ. Reg. Angl. Vol. 1. pag. 18.* Huc etiam pertinent antimonii, simillumque mineralium exhalationes & fumi, omniaque narcotica, spiritus animales prostermentia.

Interdum fit, ut solennes sanguinis evacuationes suppressæ Paralyfin inferant: Sic mulieri propter suppressa post partum lochia Paralyfi crurum cum febre ardente, fuit correpta, quæ secunda venâ in talo fuit curata: Vid. ZACVTUS LVSITANVS lib. 1. *Prax. Admir. Observat. 37.* item DEODATVS in *Valetud. pag. 212.* Sic ex suppressa hæmorrhagia narium notat Paralyfin lateris dextri BARTHOLINUS *Centur. 4. Observat. 69.* & ZACVTUS LVSITANVS l. a. *Observat. 39.* Nempè non rarum est, venæsectioni aduetos, si eam intermittant, torporem quandam & lassitudinem quasi paralyticam in uno alterove membro percipere, non nisi sanguinis missione soluendam.

Porro affectus animi graviores, terrores, mærores, pavores, iracundiæ, &c. inducunt Paralyfin. Exempla habet CORNARIUS in *Observat.*: Item ZACVTUS LVSITANVS lib. 1. *Med. Princ. Histor. 46.* ex nimio mærore & inedia Paralyfin natam refert: Sic ex subita consternatione natam Paralyfin videb. in M. A. N. C. *Ann. 4. Observat. 9. pag. 14.* Interim tamen & e contrario pertinaces etiam Paralyfes, & à Medicis pro desperatis habitæ, curatæ observatæ sunt ex subitaneis animi affectibus, ex ira, ex candescencia, & similibus: qualia exempla curiosa Paralyseos, curatæ per tales animi consternationes, habet HORSTIVS lib. 10. *Obser. 15.* item SCHENCKIVS in *Obser. de Paralyfi*, ubi duo habet exempla ex Valeriola, per terrorem & iram curatorum. Paralyfin denique à febribus natam videbitis in LOSSIO lib. 1. *Observat. 17. & 18.*

& à dentitione in AMATO LUSITANO Vol. 1. *Observat. 18.*

### DIAGNOSIS.

Quod attinet Paralyseos signa, ea ipsa per se satis patient; cessante enim sensu aut motu, aut pereunte utroque, unicuique notum erit, membrum affici Paralyfi, quam subinde atrophia membri, ejusque contabescencia, Ger. *das Glieder sich winden*, insequi solet.

Cum verò à tam variis causis oriatur Paralyfis, in his cognoscendis imprimis sedulus sit Medicus; hinc in loco affecto, an musculi? (quod Paralyfis positiva propriè dicitur) an tendines? an ligamenta? an ipsi nervi primariò afficiantur? pro meliori Praxi probè observandum est. Ubi enim vitium est in nervo, medicamenta ejus principio applicantur: ubi est in parte tota, pars ipsa externis est medicanda.

Quoad causas remotas: semper Medici judicio relinquitur pro expiscandis illis, non secus ac proximis. Imprimis antecedentia hic probè consulenda sunt.

Quod attinet locum affectum: Si oriatur Paralyfis seu paraplegia post apoplexiam, res clara est, medicamenta primariò principio nervorum applicanda esse.

Si à læsione externa, à casu, vulneratione, &c. oriatur malum, ut plurimum nervus est affectus, adeoque ad hujus ortum & progressum respiciendum in cura.

Si nullæ tales præcesserint causæ, sensus est perscrutandus: quod enim plus resistat tactus, eò minus afficitur sensus; quod verò plus de tactu perit, eò magis sensus seu nervus affectus.

Interdum ubi cessat motus, resistente tactu, ferè loquens solet esse nervus, & ligamenta ac tendines magis sunt in culpa.

In specie, quoad paralyfin faciei, benè est distinguenda convulsio faciei canina seu spasmus cynicus ab ejusdem paralyfi, ne confundamur; siue enim medietas faciei sit paralytica, siue sit convulsa, semper contractio canina oris sequitur, quæ tamen faciliè hoc modo distinguuntur. Nam si distortio oris oritur ex paralyfi, pars ista, quæ trahitur & paralytica est, mollis & flaccida percipitur, & ad partem sanam trahitur, & hæc ipsa pars faciliè potest in naturalem situm per manuum operam deduci, quia mollis & flaccida est. Contrarium fit in convulsione: nam in hac pars convulsa dura & firmiter contracta percipitur; & denique si volumus partem convulsam retrahere, dolor oritur, quod non fit in Paralyfi.

### PROGNOSIS.

Pergo ad Prognosin: Præteream suprà Artic. anteced. de Paraplegia notatam, Paralyfis seu paresis omnis, cæteris paribus, faciliùs curatur, quàm paraplegia, quæ omnem Medicoperam eludit, nisi fortioribus & generosis instructus sit remediis.

Qualibet tamen Paralyfis positiva curatu est difficilis, eò magis, quod magis inveterata est, & partes contractæ. Quod magis vagum est malum, eò maior curationis spes.

Paralyfis, in qua saltem motus læditur, superstitè sensu, securæ est, & faciliè curabilis: & vice versa, quod magis in paralyfi læditur sensus, eò gravior est affectus, & difficilioris curationis.

Paralyfis privativa, quæ fit à causa evidente solitaria, scilicet ex ictu, vulnere, luxatione valida & subitanea vertebrarum aut dorsi, aut in specie cervicis, ut plurimum est lethalis.

Quæ apoplexiæ aliisque cerebri & nervosi generis affectibus superuenit, si non brevi in melius mutetur, plerumque incurabilis evadit, potissimum si sensus & motus simul aboliti fuerint: imò quæ apoplexiæ succedanea, plerumque incurabilis evadit. Nihilominus qui à paralyfi, cujus causa evidens solitaria, semel curantur, rariùs recidivant, quàm ubi morbus à causa interna dependit.

Facilior est cura à causa positiva, potissimum si fuerit recens, membrum adhuc calidum, ac nondum contracturam minetur: eò contra quod magis calor membrorum



horum resolvitur, ac atrophiam corrumpitur, eò minus spei pro salute recuperanda affligit; item si resoluti lateris oculus immineatur.

Quò magis pars Paralyti saltem laborat, & minus inclinatur ad contracturam, eò facilius est cura: si verò superveniat successivè contractura & immobilitas, difficilior & gravior solet esse curandi ratio.

Si Paralyti superveniat tremor partis, bonum signum est recuperandi motum; resuscitari siquidem, aut insudum novum moliri spiritus animales, indicat.

In senibus cacochymicis & cachecticis, & si levior sit Paralysis, raro tamen aut difficillimè curatur, quin ad mortem eos comitetur.

Diarrhoea Paralyti debilem solvit: apoplexiæ verò, seu Paralyti, seu Paraplegiæ forti, superveniens febris acuta, uti similibus affectibus nervosis, ita hic admodum conducit, & bonum est, quia sæpius morbum tollit.

### C U R A.

Quod attinet *Curam*; in ea observanda est distinctio affectuum, eorumque origines, quæ generali Paralyseos nomine appellantur, & pro affectuum horum eorumque causarum diversitate etiam subinde varianda est cura. Alia enim est cura in Paralyti privativa, alia in positiva. Privativa enim Paralyti plus minus paraplegiis cognata, si ex causis internis præsertim ex metastasi materiæ morbificæ oriatur, eodem serè modo curatur, atque paraplegia: In quem finem sudorifera & nervina moderato usu sunt optima; quin & in malo contumaciori nil obstat, quò minus salivatio instituitur, de qua vid. imprimis WILLISIIUS de Anim. Brutor. Part. 2. cap. 9. Sin verò à vitio externi, contusione, luxatione, laceratione nervorum, &c. malum ortum fuerit, causæ hæc removeantur; adeoque v. g. vertebra luxata, si fieri possit, reponatur. Contusioni verò medela fiat per externa, fomenta, linimenta, aut balsama fortia cephalica & nervina, partibus applicata, scilicet fomenta ex herba roris-marini, salviæ, menthæ, floribus lavendulæ, chamomillæ, & similibus cum vino cocta. Post hæc convenient ex linimentis aromaticis aqua roris-marini spirituosæ, quæ nomine aquæ Regiæ Hungariæ à Gallis circumfertur, oleum chamomillæ, hyperici, lumbricorum terrestrium, acuata cum oleis aromaticis destillatis, succini, lavendulæ, salviæ, chamomillæ, roris-marini, & similibus. Litus quoque cum Petroleo, vel solo, vel oleo Juniperino nonnihil acuato, hic est egregius; Item spiritus vini cum oleo salviæ vel lavendulæ imprægnatus. In specie balsamum Peruvianum præ cæteris est nobilissimum in quibusdam nervorum affectibus externe illitum calidè; item balsamum paralyticum Mynsichti, emplastrum nervinum cum iacemabacæ mistum. Interne vix præstantius datur remedium oleo destillato lavendulæ, quod ad aliquot guttas, iv. vel vj. assumptum, expectato sudore in lecto, egregium est; quod etiam spectat oleum destillatum succini, simili modo ad plures guttulas usurpatum.

In Paralyti verò propriè sic dicta & positiva attendendum:

1. Ut causa materialis seu materia peccans, & nervos aut tendines fibræque infestans, corrigatur & removeatur; id quod speciatim præstant diaphoretica, præsertim volatilia, & aromatica solventia & discutientia.
2. Ut partium nervosarum affectarum tonus debitus restituatur & roboretur appropriatis, & in specie nervinis aromaticis ac volatilibus, vulgò calefacientibus & siccantibus dictis, idque serè imprimis applicatis remediis externis, sed non nimis unctuos.

Pro his topicis obtinendis observetur:

I. Cum tam Paraplegia, quàm Paralyti à causa interna nata, somitem aliud, tam in massa sanguinea & lymphæ, quàm etiam in officina digestionis & primis viis, præsupponat radicatum, v. g. in scorbuto, colica convulsiva, malo hypochondriaco, arthritide, ischiadico affectu, passione hysterica &c., quos imprimis solet infestare paralyti, tunc præter specialem paralyseos curam simul, præmissis debitis alterantibus & appropriatis, fomes ille evacuandus & corrigendus, semperque ad acidum austerum plus minus volatile respiciendum. Ob id fomes morbi, digestivis salinis resolutus & abstersus, convenientibus

tibus evacuantibus est expurgandus: quæ inter præter clysmata aciora, & purgantia blanda per inferiora, in specie vomitoria sunt, quæ præ aliis evacuantibus à RIVIERO commendantur, & à LINDANO mox in principio instituenda præscribuntur. Fortiora autem per inferiora purgantia sedulo hic fugienda: nam multi in uno latere resoluti seu paraplectici, si in principio fortiora præscribantur purgantia, etiam in altero latere Paralyti tentati & tandem extincti fuerunt, uti hoc observavit SOLENDER, & ex eo THONERUS in Observationibus.

II. Diæta temperata & probè nutritiva lactea, acidum quodcumque corrigens, & copiosum chylum subministrans (pro quo scopo lac præmissis præmittendis est optimum) instituitur, nec copiosus sudore loca nervea succo nutritivo defraudentur.

III. Ubi à colica fuerit paresis, cautus vel maximè sit Medicus in purgantibus fortioribus, cum ejusmodi colicæ exinde exasperentur, & metus sit, ne sequantur convulsiones & similia mala. Hinc POTERIUS in hujusmodi affectibus utitur decoctis melanagogis blandis, & ex basi hellebori nigri paratis: saltem ergò helleborinis mitioribus, usque partitis vicibus, purgatio blanda instituenda venit: id quod etiam in scorbuticis probè observandum est, qui ipsi etiam fortiores purgationes vix aut raro ferunt; sicuti in genere omnis fortis purgatio est nociva. Imò si scorbuticis membrorum affectibus correptis, imprimis paralyticis, fortiora propinentur purgantia, facillimè morbi convulsivi ipsi excitari possunt. Nervus totius cæcæ ad abdomen dirigendus est, adeoque potius frequentes conveniunt clysteres, quibus olea carminativa & nervina adduntur, v. g. oleum angelicæ, salviæ, succini, cumini, & carvi; sintque in principio saltim emollientes & lubricantes; item ex iasse & terebinthina, quæ optima sunt. In progressu verò imprimis si fomes morbi hæret circa viscera abdominis, & patiens nullum exinde sentiat levamen, tunc aciores nonnihil clysteres interdum adhiberi possunt. Quò frequentius injiciuntur, eò magis prosunt, & eò magis paralytin præservant.

IV. Externa remedia usurpanda sunt ad restituendum tonum partis, imprimis post provocatos sudores eorumque absterisionem; pori enim tunc aperti facilius remedia externi admittunt ingressum. Observandum tamen hic, si scorbutus subsistat, non semper calida acria convenire, quoniam interdum magis videntur exasperare malum; Potius igitur temperata prius tentanda, antequam ad aciora illa fiat accessus. Observandum quoque, non semper convenire unguenta pingua, viscida aut glutinantia, poros cutis plus minus obstruente, quæ non penetrant, adeoque præstat interdum uti suffitibus, fomentis, lotionibus. In specie tamen observanda cautela QUERCETANI, qui monet in administratione topicorum remedium, quæ ut plurimum calefaciunt & attenuant, quod accurate debeat expendere Medicus, ut, si paralyti sit ab humore aquoso aut pituitoso, i. e. à lymphæ vitata plus minus acida, & æger sit similis serè constitutionis, parsque paralytica intumuerit, quod medicamenta tunc adhibenda sint subtilia & penetrantia, nunc volatilia, nunc spirituosæ, nunc salina, quorum penetrantia optimè occurrunt his affectibus: Sin verò pars affecta jam marcescat, & plus minus in atrophiam labatur, & æger ipse quodammodo constitutiopis sit biliosioris, ab illis abstinere debet Medicus.

V. Si Paralyti sequitur solennem sanguinis suppressionem, idque in corpore eusarco & juvenili, solet eam curare venæ sectio subinde repetita: Exemplum vid. in VALERIO LA lib. 4. Observ. 4. qui refert de Paralyti dextræ partis in senè optimi habitus, & magnarum adhuc virium, quæ solâ purgatione & sanguinis missione fuit curata. Post venæ sectionem sudor convenit.

Quoad remedia ergo appropriata: alterantia, & vi sudoriferâ corrigentia causam morbosam in paralyticis affectibus, in genere omnia apoplectica & antiepileptica, commendantur & applicantur, etiam in quibusvis paralyseos speciebus, tam in Paralyti vera, quàm Paraplegia.

Inter cætera quod attinet primò vomitoria: hæc sunt satis nota, quæ inter flores antimonii commendat HARTMANNVS cum extracto scammonii in Traxi Chymiatr.



Inter *Purgantia* videntur cathartica potentiora, utpote malum sæpius exasperantia, nisi pituitosorum & serosorum humorum abundantia fortiora evacuantia possulet. Imprimis conducunt mitiora tantum ac rariora laxantia, v. g. *belleborina*: vid. *Poterius l. a.* Aliàs commendatur *Turbith* à ʒss. ad ʒij. item *hermodactyli* à ʒss. ad ʒij. in infuso ad ʒss. utut parum infuso tribuant; eorum loco species dia-turbith cum *Rhabarbaro* à ʒj. ad ʒss. propinari possunt, quæ insigniter admodum conducunt ad evacuandum. *Pilula scitidæ & similes*, uti & *pilulae de hiera cum Agarico*, acuatæ cum extracto trochiscorum *alhandal seu colocynthidis*, usurpandæ; Nam in paralyticis affectibus ut plurimum stimulus debet esse colocynthidis. Spectat huc *Mercurius dulcis*, quem optimum in hoc affectu remedium deprædicat *SYLVIVS Prax. lib. 2. cap. 22. §. 62.* item *terebinthina*, quam *PLATERUS in Praxi* tanquam remedium appropriatum commendat: e. g.

ʒj. *Mass. pilular. arbutis. ʒj.*  
*Scamm. sulphurat. gr. iv.*  
*Extr. troch. alband. gr. j.*  
 Cum *Ess. salviae f. pilulæ*:  
 D. S.

*Pilulae purgantes.*

Ad imitationem *BARHETTE in Praxi*:

ʒj. *Herb. Chamædr.*  
*Chamæp. an. M. j.*  
*Flor. Anthos.*  
*Prim. ver.*  
*Salvia an. p. ij.*  
*Rad. Angel.*  
*Imperat.*  
*Ireos Flor. an. ʒij.*  
*Helleb. nigri ʒj.*  
*Fol. fenic. sine stip. ʒvj.*  
*Cori. rad. esula ʒss.*  
*Cardamom.*  
*Cubeb. an. ʒij.*  
*Sal. tartari ʒij.*

F. Nodulus Vino infundendus.

Aliàs eidem evacuationis scopo egregiè satis faciunt Sudorifera à *PLATERO Prax. p. 1. l. 2. cap. 1.* commendata, v. g. Decoctum guajaci & chinæ, rob ebulli à *PLATERO l. a.* aut hujus decoctum à *RIVERO* laudatum, item bardanæ & volatilium atque aromaticorum plurium, e. g. decoctum rorismarini, helenii, &c. Quamvis *WILLISIUS de An. Brut. Part. 2. cap. 9.* de sudoribus annotavit, illos sæpius quidem multum juvare, nonnunquam tamen valde etiam obesse; adeoque non convenire subjectis illis, quorum sanguis sale fixiori minusque dissilabili gaudet, sed tantum his, quibus à sero magis insipido & aqueo hic diluitur.

Inter appropriata remedia esse dixi & apoplectica & epileptica. In genere ergo conveniunt, & præ cæteris in usu sunt in specie, *salvia*, *chamædrys* & *chamæpitys*, & *rosmarinus*, cui certè multum tribuitur ab omnibus Autoribus, in specie tamen à *LINDANO*, qui rorem marinum nobilissimum vocat ad curandos paralyticos, si ejus decoctum factum lento igne in Mariæ Balneo, propinetur ægro, jejuno ventriculo, liberaliter bonus hauustus; movet enim sic blandum sudorem, & egregiè destruit Paralyfin; cui additum sit extracti, seu essentia castorei, quantum placeat, cum successu magis felici.

De primula veris res nota est, quod vocetur herba paralytis propter insignem vim, quam obtinet in paralyticis curandis, quocunque usu adhibeatur.

*Stæchas Arabica* & ipsa interno usu singularis; item omnia aromata, uti & ex his & similibus parata, essentia, extracta, olea destillata, v. g. infusum salviae cum vino, essentia salviae, oleum florum anthos seu rorismarini, oleum destillatum succini, quod commendat *FONSECA lib. 1. cap. 17.* oleum destillatum florum lavendulæ, & similia, ad aliquot guttas interno usu in aqua betonica propinata admodum laudantur; ut & nervina cuncta suprà *Artic. 1. in Apoplexia* allegata, item *castoreum*, *sberiacæ*, & extracta *iberiacalia* ac similia. Aliàs helenium quoque admodum laudari solet, imprimis in paresti ex colica, aut abusu vinorum, & quælibet ex helenio parata remedia, vinum, decoctum, essentia, & extractum helenii. In specie decoctum radicis enulæ & sceniculi *Hæchstedteri decad. 3. Observ. 1.* ad parestim ex colica

admodum commendatur. Ligna etiam, eorumque decocta, in praxi Veterum ad paralytin curandam commendantur. Decocta lignorum cum roremarino laudat *LINDANUS*, qualia etiam *BONTIUS in Beriberi Indorum* commendat. Hæc inter *Sassafras* primatum obtinet, quod est egregium aroma, affectibus acidis ex lymphâ commendatum: Post hoc optimum est lignum guaiacum; quorum decocta pro cura sudorifera laudem suam merentur; vid. *HARTMANNUS Prax. Chymiatr. pag. 86. §. 3.* Quibus decoctis speciatim rosmarinus, bacce juniperi, vel bacce lauri sunt addendæ; sic enim meliora fieri solent. *POTERIUS Cent. 2. Curat. 26.* hoc habet decoctum, quo paralytin cum gravissimis symptomatibus stipatam curavit, ex

*Rasur. ligni sassafr. ʒj.*

*Bacc. Lauri ʒij.*

quæ in ʒvj. vini ad medias decoxit, & ita ægris propinando curavit.

Ad hujus imitationem parari potest decoctum suprà *Artic. Anteced. in Paraplexia*, & in *Idea Formul. Cl. 4. §. 12.* annotatum. Horum doctorum loco & essentia lignorum cum spiritu sambuci parata, vel essentia ligni sassafras cum spiritu serpilli, vel essentia catarrhalis ex ligno sassafras cum succino misto conducunt. Hinc spiritus lignorum, cum spiritibus simplicium nervinorum misti & conjuncti, erunt egregii. Modernis quibusdam Belgis, imprimis *LINDANO*, in usu est lignum ex Indis noviter allatum dictum *Pavana*, de quo videatur *Theatrum Botanicum BAUHINI*, qui vocat *lib. 3. cap. 151.* lignum Moluccense. Hoc fuit in frequenti & felici usu *LINDANO*: est lignum album, admodum leve, cujus rasi & in pulverem subtilem triti dedit ʒss. ad ʒij. in cochleari spiritus vini, quod remedium ipsi tres insignes effectus prestat: nam vomitum, purgationem, & etiam sudationem sine virium prostratione provocavit: quo ipso feliciter post tres doses repetitas aliquando mulierem insigniter paralyticam restituit. Hoc ipsum cum reliquis lignis, in specie sassafras, potest conjungi in eundem usum, idque, ut spero, egregio cum fructu.

Milium vulgare quidem & simplex est remedium, imprimis paresti ex colica, per copiosum admodum sudorem sæpius repetitum hunc morbum curans; vid. *SCHENCKIUS in Observat. de Paresti ex colica*, qui omnibus sudoriferis in paresti ex colica, ista longè præfert. Vid. *SCHRODERUS in Pharm. ubi de Milio*, sub nomine decocti & syrupi Divi Ambrosii. Juxta hæc tartarus admodum se commendat in affectibus paralyticis, & imprimis volatilia ex tartaro, & sal volatile tartari, & hinc tinctura Bezoardica ritè parata, mirè commendari solet in quacunque paresti, à quacunque causa, in specie in colicis paralyticis, in scorbuto & malo hypochondiaco, quæ spiritus tartari volatilis optimè curat internè & externè. Juxta quæ etiam tinctura tartari commodè parari potest; aut saltem spiritus tartari vulgaris optimè rectificatus, cohobatur cum ana spiritus vini optimè dephlegmati & sæpius tartarificati; Nam sic fit spiritus vini tartarificatus volatilis, qui à *LINDANO* ad paralytica pathemata maximè commendatur. Vel præparetur sal volatile, & spiritus tartari ex scibus vini, vel ex oleo tartari scitido; loco cujus spiritus carminativus nobilissimus est remedium. Externè etiam spiritus vini convenit tartaro crudo affusus, & cum eodem destillatus, pro fricandis membris externis, paresti affectis.

Juxta hæc volatilia ex tartaro, quæcunque etiam alia salia volatilia, eorumque spiritus, præprimis aromatizati, suam merentur laudem, ut spiritus & sal volatile urinæ per putrefactionem parata, spiritus salis ammoniaci simplex, lavendulatus, succinatus, & sassafratus, sal volatile oleosum *D. Sylvii*, quo solebat curare parestes ex colica obortas. Porro laudari solent insigniter medicamenta viperarum quæcunque, externè oleum, internè verò spiritus & sal volatile viperarum; sicut & Paralytis ab omnibus, ceu desperata relicta, curata dicitur Decocto viperarum. Post sal volatile viperarum non minùs laudatur liquor cornu cervi succinatus, sal volatile succini, si conjungatur cum pulvere paralytico *Hartmanni* ex cinabari antimonii, & magisterio perlarum: Vid. *Prax. Chymiatr.* Quibus præferuntur volatilia ex lumbricis & formicis parata, ceu remedia appropriatissima in hujusmodi affectibus partium externarum; unde etiam aqua magnanimitatis & similes non tantum externè, sed etiam in specie



specie Internè, hic suam merentur laudem, in specie, si spiritus quidam vegetabilis affundatur formicis, digerantur ad tempus, & postmodum aliquoties cohobentur; sic enim sit spiritus antiparalyticus internè, & externè egregius. Per se dant spiritum acidum: si verò asserventur, ut situm contrahant, ex iis destillatur spiritus & sal volatile urinosum penetrans, & admodum volatile, internè & externè optimum. Et certè in lumbricis ac formicis singularia latent contra affectus nervorum, præsertim eos, qui ex acido plus minus occulto originem ducunt.

Verùm in usu horum volatilium observetur, quod non semper ac promiscuè conducant, in specie sub primomorbi insultu, quia videntur affectus exasperari, & dolorem reddi, propter effervescentiam, quæ cum Acido excitatur, ratione cuius varia pathemata inferuntur. Quodsi hoc observatur, prius fixiora & acidum primarum viarum absorbentia præmittantur, & volatilia omittantur. Inter fixa eminent antimonialia & Martialia sudorifera, ut antimonium diaphoreticum Martiale, Bezoardicum Martiale, unicornu verum; præsertim cinnabaris antimonii est egregia his in affectibus, quam HARTMANNUS, & B. D. MICHAELIS semper combinavit cum osse humano præparato, quo ipso pulvere aliquoties restituit paralyticos, & ego aliquoties præscripsi cum felici successu in paralyfi scorbutica hoc modo:

℞ Off microcosm præp. ℥i. ad 3℔.  
Cinnab. antimonii gr. xli. xv. xvi. ad ℥i.  
Sal. vol. succini ℥ss. ad gr. xii.  
M. f. pulvis:  
diu. in 2. part. æqual. S.

Pulvis caput & membra confortans.

Tempore vespertino assumendus in aqua spirituosâ laven-  
dulæ, & egregiè conveniet.

Cicurato acido in primis viis per hæc absorbentia, tunc demum tutò ad volatilia sudorifera validiora possumus accedere.

POTERIUS in frequentissimo habuit usu suum aurum diaphoreticum suprà, Artic. Anteced. ubi de Paraplegia, laudatum, quod singularem sui meretur consideratio-  
nem. Nihil est aliud, quàm aurum fulminans cum du-  
plo florum sulphuris calcinando fixatum, ut obmutescat,  
& hinc cum spiritu vini alcoholisato digestum. Hoc ipso  
ad paralyfin ferè semper & utiliter usus fuit. Descriptio-  
nem videbitis admodum obscuram in Append. ad Pharm.  
Dosis gr. vi. Effectus videbitis Cent. 2. cap. 66. 67. 81. &  
87. item Cent. 3. cap. 14. item Cent. 1. cap. 73. In hac ul-  
tima observat Paralyfin quindecim annorum curatam be-  
neficio sui auri diaphoretici. Helmontius etiam dat im-  
primis tincturam coralliorum volatilem: sed hæc est rara  
avis. Vidi ego illam in Laboratorii Regio Londinensi,  
ubi Dr. FEBURE beneficio spiritus tartari volatilis tin-  
cturam hanc parabat, ita quidem, ut beneficio huius spi-  
ritus, volatilis tinctura per retortam destillaretur; Colo-  
ris erat rubri obscuri, odoris admodum penetrantis, & sa-  
poris urinacei: quæ esset remedium egregium ad paraly-  
ticos curandos, si esset divulgeata.

Quodsi oriatur Paralyfis positiva ex nimia refrigeratio-  
ne, humectatione & relaxatione fibrarum, tendinum ac  
ligamentorum, siue à causa interna siue externa oriatur,  
cuncta ea locum habent, quæ suprà in Paralyfi privativa  
dicta sunt, non tantum memorum affectum, sed spinam  
quoque dorsi cum his aut unguento ZACUTI LUSI-  
TANI, quod lib. 1. Prax. Admir. Observat. 37. descri-  
bit, fricando. In specie convenit oleum terræ cum axun-  
gia humana & asserina mistum, & parti affectæ illicum:  
c. gr.

℞ Axung. human.

Asserin. an. 3℔.

Ol. terræ 3℔ii.

M. f. Linimentum: S.

Unguentum externum arthriticum.

Item Tacamahaca cum balsamo Peruviano commista,  
laudem suam meretur, vel emplastrum nervinum ex ta-  
camahaca & galbano, cum oleo destillato succini & Phi-  
losophorum malaxatum, & circa articulos applicatum.  
Item si ed usque procedat malum, ut ligamenta ita quo-  
que resoluta Paralyfin aut relaxationem ferè membri in-  
ferant, confert emplastrum sticticum Crollii cum oleo Phi-  
losophorum & terræ malaxatum: internè cum theriaca  
sudor crebrius provocetur. Sed de his affectibus vid. im-  
Estmull. Oper. Tom. II.

primis BARBETTE in Anat. Tract. cap. 9. & 10. qui  
tale emplastrum commendat:

℞ Gum. Carann 3℔.

Galban. 3℔i

Ol. euphorb 3℔ss.

M. f. Emplastrum.

Sin. à Mercuriali veneno malum ortum fuerit, conve-  
nit imprimis Decoctum feniculi, & helicii, suprà, Cap. 2.  
Artic. 3. ubi de Tremore, laudatum; vid. HOECH-  
STETTERUS l. 4. sicuti ubi per sudores venena  
Mercurialia sufficienter exclusa fuerint, lac & serum la-  
ctis commodè propinari possunt: Sic enim HOEFERUS  
in Herc. Med. pag. 9. Paralyfin ex fumis metallicis, Mer-  
curii & antimonii, in aurifabro, omnibus aliis frustraneis,  
per serum lactis à FORESTO curatam refert.

In Parafi scorbutica volatilia urinosa & lactinea locum  
habent. Observandum autem in specie, quod juxta vola-  
tilia ista urinosa primatum obtineant remedia ex pino &  
& abiete, ex ejus in specie strobilis molliuseulis: Deco-  
ctum nempe strobilorum pini seu potius pinastri secun-  
dum BAUHNUM, est nobile remedium & appro-  
priatum specificum ad affectus artuum ex scorbutico oriun-  
dos, siue sint cum siue sine dolore, sudoris beneficio has  
pareses curans, præsertim cum radice china præparatum,  
v. gr.

℞ Turion. abiet. 3℔ss.

Rad. China 3℔.

Incisa & contusa Coqu. in aqua & cerevisia ad me-  
dietatis consumptionem:

Colatura D. S.

Potio arthritica contra scorbutum.

Decoctum bibatur bis quotidie, expectando præsertim ma-  
nè sudorem blandum. In lacte quoque alterationis gratiæ  
coqui possunt.

Egregium quoque est decoctum DECKERS in Notis  
ad Praxin Barbett. Decoctum betonica cum bacis luni-  
peri quoque laudatur: Vid. DRAWIZIUS de scorbu-  
to pag. 167. Præter decoctum strobilorum etiam essentia ex  
eorum Rob cum spiritu antiscorbutico, vel proprio, pa-  
rata sunt appropriatissima remedia in Paralyfi scorbutica:  
item essentia contra arthritidem vagam ex simplicibus ar-  
theticis cum spiritu lumbricorum terrestrium per fermenta-  
tionem & cum spiritu cornu cervi parata, in his para-  
lyticis affectibus est optima, quam & ipse probatam ha-  
beo. Cum his semper jungendum est Castoreum, sale vo-  
latili oleoso penetranti constans, & nervinis affectibus spe-  
ciatim commendatum.

Istis debite præmissis serum lactis cum antiscorbuticis  
mistum, & ipsum quoque lac egregium est, Curamque  
absolvit: sed, ut suprà monui, necesse est, præmissa sint  
universalia, non tam laxantia, quàm primo fixa absor-  
bentia, hinc volatilia; quibus præmissistandem ad ista ap-  
propriata acceditur.

Spectant huc feniculi & setacea, de quibus vid. SYL-  
VIUS Prax lib. 2. cap. 22. §. 54. & 71.

Quodsi denique colicam insequatur Paralyfis, cautus vel  
maximè sit Medicus in purgantibus fortioribus, eòdè ejul-  
modi colicæ exinde exasperentur, & provocentur magis  
paralytes & convulsiones. Nervus totius curæ ad abdomen  
dirigendus, adedque clysmata lenientia & abstergentia,  
item ex lacte & terebinthina optima sunt: Quod frequen-  
tius injiciuntur, eò magis profunt & eò magis à paralyfi  
præservant. Hinc internè semina quatuor calida majora,  
eorumque in fine decoctum, aut alia ex hisdem parata re-  
media, teste HELMONTIO, sunt appropriata intestino-  
rum solamina; quibus & adjungatur helicii decoctum,  
præmissis præmittendis, ejusvè essentia pro blando sudore  
propinata. Decoctum milli, seu, ut aliàs vocant, Syrupus  
Drui Ambrosii, mirabiliter laudatur in hujusmodi Paraly-  
fi ex colica, per sudorem hanc ipsam removens: Qui-  
bus si lignum sassafras addatur, foret eò melius. Serum  
lactis cum antiscorbuticis & similibus medicamentum no-  
bile est in hac colica, & inde nata Paralyfi. Hinc ceu  
summum appropriatum accensetur Galbanctum Paracelsi,  
tàm simpliciter secundum modum HARTMANNI pa-  
ratum Prax. Chymiatr. cap. 12. §. 8. quàm præstantius il-  
lud Drawizii pag. 193. Hoc ipsum non solummodò um-  
bilico inungitur frequenter, sed etiam ipso membro paralyti-  
co, si prius spiritus tartari, aut spiritus salis ammoniaci vino-  
so, fuerit probè perfusum, quod galbanctum hoc quotidie ter  
ungatur ad imitationem HARTMANNI l. 4. cap. 13. §. 4.



Hæc sunt Interna, quibus addenda ea, quæ hinc inde in Practicis sunt obvia.

Quoad *Externa*, quæ tonum fibrarum & motum partium restituant, sunt nunc spirituosæ & aromaticæ, nunc salina oleosæ, nunquam viscidæ & glutinosæ, nisi forsâ rabes, atrophîa & contractura imminens, aut superveniens, volatiliū ejusmodi ulum inhibeat, & blandiora, v.g. pinguedines oleæque infusa, commendet. Tempora igitur sunt distinguenda; morbus enim est vel inveteratus, vel non: si est inveteratus, ad atrophiam & ariduram partes inclinant; si non, saltem motus deficit, superstitie plus minus sensu. Quoad ergo posterius: eminent omnes aquæ apoplecticæ dictæ, spiritus vini rectificatus, & aquæ articulares ad extra. Recipiuntur nempe species aromaticæ nervinæ antiparalyticæ, quibus addenda acriora, v.g. piper, semen rutæ, urticæ, sinapi, radix ari, pyrethri, item herba satoreje, folia nicotianæ, quorum essentiam HARTMANNUS commendat: quorum etiam intuitu à CRATONE frictio spinæ cum radice iridis nostratis, & bulbo lili, ab aliis cum radice bryoniæ aut hujus Decocto, præscribitur. Speciebus dictis affunditur spiritus vini brevi cum digestionē inde aliquoties cohobandus, vel solus spiritus simplici digestionē imprægnatus sine tali destillatione commodè externè applicatur. Harum omnium loco sit formula, quam dedi in *Idea Formulæ, Class. 4. §. 19.*

Vel

24. *Fol. Nicotian. rec. M. j. vel ij.*  
*Origan.*  
*Flor. sambuc. an. M. j.*  
*Rad. Angel. ʒj. ad ʒij.*  
*Pyrethr.*  
*Aron. rec. an. ʒj.*  
*Euphorb.*  
*Castor.*  
*Myrrh. an. ʒʒ ad ʒvj.*  
*Piperis utriusque an. ʒij.*  
*Flor. Stachad. Arab.*  
*Lavend.*  
*Lil. convall. an. ʒʒ.*  
*Sem. Eruca, vel sinapi*  
*Siler. mont. an. ʒvj. vel ʒij.*  
 Concisæ & contusæ affundantur  
*Spir. vini rectif. part. ij.*  
*Lumbr. terrestr. part. j.*

Digerantur in Balneo Mariæ, & vel filtrando separantur, vel destillatione spiritus abstrahatur.

Liquore hoc fricetur aut inungatur pars paralytica post absterisionem sudoris, & aliqualem ægri requiem, dum pori adhuc sunt aperti, linteis thure & succino suffumigatis; post quam deterisionem hoc ipso infuso probè partes fricandæ & largiter illinendæ sunt: aut spiritus vini à speciebus aliquoties cohobando abstractus, tanquam aqua articularis ad extra, applicandus. Item

24. *Herb. rorismar.*  
*Salvia,*  
*Majoran. vel lavend. an. M. j.*  
*Flor. lavend.*  
*Lil. convall.*  
*Rorismar. an. p. ij.*  
*Bacc. Junip ʒj.*  
*Sem. sinapi ʒʒ. vel ʒvj. ad ʒj.*  
*Castor. ʒij.*  
*Piperis nig. ʒij.*

Concisæ & contusæ infundantur in *℥. q. spiritus vini*, digeratur aliquamdiu & filtretur:

D. S.

*Essentia externa arthritica.*

Cum his aquis articularibus ad extra optimè etiam quarta vel quinta pars spiritus lumbricorum terrestrium per putrefactionem, aut spiritus formicarum, permisceatur: exemplum dedi alio loco. Quò etiam facit spiritus primulæ veris. Hisce commodè, in specie si dolores scorbutici adsint, addantur quædam *salia volatilia*, quæ inter excellent spiritus salis ammoniaci cum calce viva; Nam hic in pluribus differt à spiritu salis ammoniaci cum sale fixo parato: c. g.

24. *Sal. ammoniaci p. j.*  
*Calcis vivæ p. ij.*  
 Irrora cum *spir. vin.*  
 Destilla, & optima spiritus est.

Vel

24. *Aque articuli ad extr. ʒij liij. ad lv.*  
*Spiritus sal ammoniaci cum calce viva ʒj.*  
*ad ʒij.*  
*Lumbr. terr. per putr ʒʒ.*  
 M. S.

*Membra confortans spiritus.*

Fricentur membra ter in die cum spiritu vini camphorato, in loco calido, ut incalescant, & pori hiant, hinc spiritus calefactus applicetur externè.

Vel

24. *Spiritus Vini camph ʒij.*  
*Lumbr. terr. per putref. par. ʒj.*  
*Ess. castor. ʒvj.*  
 M. pro usu externo.  
 D. S. ut suprâ.

Item

24. *Aqua apoplect. supra descript. vel Ludov. ʒij.*  
*Spiritus lumbr. terr. per putref. par.*  
*Sal. ammoniaci succin. an. ʒʒ.*  
 M. S. ut suprâ.

Loco talium spiritus tartari rectificatus, mistus cum aqua vel duplo spiritus vini tartarizati, & cohobatus, perquam egregius est, præsertim in Paralyti ex colica. Porro tinctura seu essentia succini cum spiritu vini rectificato parata, membris paralyticis contractis, aut quomodo-cunque refrigeratis, ritè cum successu affricatur & applicatur: vid. KUNRATH in *Medulla destillator.* Quin, & his aquis externis balsamus Peruvianus commodè admodum addi potest. Modus est hic: subigatur balsamus Peruvianus in parva quantitate cum vitello ovi, unde aquis articularibus vel spiritui lumbricorum terrestrium, aut fornicarum potest misceri: vid. felicem effectum in crurum dolore ischiadico, cum incipiente paralyti conjuncto. Applicatur etiam externè, quando nervi sunt lęsi, consorti & simil. & ita in Paralyti privativa. Hinc etiam notus est spiritus seu essentia foliorum tabaci cum vino malvatico parata, de quibus vid. HARTMANNUS in *Praxi Chymiatr. 4. cap. 11.* Pertinet huc *urina humana*, quæ ratione salis volatilis ritidem pro membris laudatur paralyticis, & hinc lotiones & frictiones membrorum cum urina propria vel pueri calida vulgariter commendari solent. Melius est, si urtica major coquatur in urina propria ægri, vel urina pueri, & cum hac pars paralytica subinde lavetur, bene fricand. Loco solius urinæ, spiritus urinæ phlegmaticus etiam non est inelegans; vel ad imitationem STOECKERI in *Praxi*, qui dicit, esse remedium expertum sui Patris. Fit hoc modo:

24. *Urtic. maior. M. ij.*  
*Chamomill. M. j.*  
*Sem. Cumin. ʒj.*  
*Salis ʒij.*

Pissentur omnia probè in mortario, & decoquantur in *urina humana* Pinchis duabus seu *℥. q.* ad consumptionem quartæ partis:

Quo ipso decocto balneetur manè & vespere pars affecta. Quin etiam postea pannis ex decocto madefactis involvatur pars de nocte & die, & ita per tres vel quatuor dies, aut amplius, continuetur; hincque postea membrum cum oleo vulpino inungatur, donec sanetur.

Quò etiam facit unguentum catulinum FAVENTINI in *Prax. cap. 7. pag. 36.* vel oleum catellorum, vid. RIVERIUS *Cent. 1. Observat. 52.* unguentum HILDANI *Traët. de Gangr. cap. 24.* & neuriticum ad imitationem PROTTEII.

Membrum post apoplexiam paralyticum seu paraplecticum factum, fricandum est ter in die cum spiritu vini camphorato in loco calido; brevi enim post restituitur membrum, quod mihi egregius quidam Practicus ex propria experientia confirmavit. *Urticæ* quoque & *urticationes* veteris iam sunt remedium, conveniens tamen imprimis in paraplegiis, quod EPYPHANIVS FERDINANDUS multoties expertus est, qui *Hist. 46.* dicit, quod *præmissis urticationibus* optimum sit pungere corpus urticis: Et testor Deum, me hoc genere remedii pluries esse usum, & semper maximâ cum utilitate & felicitate, & nunquam votis sum deceptus.

Pariter hujus loci sunt Balnea seu Infusæ ac fomenta, v.g. ex decoctis nervinis, vinaceis fermentescentibus, & formicis: Vid. JULIUS CÆSAR CLAUDINUS de *Ingross. ad Infirm. sect. 16. pag. 593. & 512.* M. A. N. C.

Ann. 4.



*Ann. 4. Observat. 128. Balnea ex vinaceis, German. aus dem wein-drusen, sunt singularia, & mirabilem habent effectum in Paralyfi scorbutica, Paralyfi ex colica, aliis que ex acido vitioso natis, præsertim in malo pertinaciori, si iisdem sibi mutud impositis, vel sponte fermentationis motu calefactis, vel, si sponte sua non incallescant, insperione pulveris calcis vivæ incallescentibus, immergatur membrum affectum fortiter sudando, ut tartarus volatilis in membra se insinuet, ita aliquoties continuetur, & mirum effectum edit. Si quidem horum usu, & partis paralyticæ debito foru & infessu, sensus motusque restituitur: hoc ipso enim desperati ischiadici, & ex ischiade facti paralytici à PETRO à CASTRO curati fuerunt. Conf. BORELLUS Centur. 2. Observat. 42. & ZWELFFERUS in Apol. contra Tachen. Nec minoris usus sunt balnea ex formicis parata, quæ reverà sunt egregia in paraplegiis, item in Paralyfi ex resolutione & relaxatione tendinum ac ligamentorum, si integer eorum acervus, vel solus, vel cum speciebus appropriatis anti-paralyticis, sacculo inclusus injiciatur aquæ ferventi, cupus vapori excipiendo insideat æger in vanno probè testito: Sequenti die in dicta aqua coquatur iste sacculus, & ita denud in vanno vaporem excipiat æger: idque bis vel ter, quamdiu penetrantem odorem spirant: Postmodum ac sequentibus diebus etiam insideat isti decocto semper cum sacculo denud calefacto, idque aliquot vicibus, donec melioratio percipiatur. Species v.g. videb in MYNSICH T I Armament. Chym. ubi habet Balneum paralyticum. STOECKERUS in Praxi, hoc habet Balneum non inelegans:*

*℥℥. Sulphuris vivi,  
Bacc. lauri an. ℥℥.  
Rad. Gentian. M. iij.  
Enul.*

*Aristol. long. an. M. ij.*

*Locidantur & concundantur pro Balneo  
Coqu. in aqua calcis vivæ temperata, loco aquæ communis.*

Tandem aliis ferè oil luvantibus, ultimum asylyum sunt *Therma* artificiales, sed cautela opus est. Interdum juvant, interdum non. In paraplegiis magis, quàm paralyticis, convenire videntur, & in illis magis post privativas apoplexias, quàm positivās. In Paralyfi quæ est ex colica, vino & similibus, non conveniunt, quia arthriticis affectibus sunt noxæ, & podagrici ex thermis subinde rediuntur contracti. Metus ergo, ne nimis maturè promoveatur contractura. Cum discretionem quoque instituantur, nec omnibus sine discrimine adhibendæ, dum melius conducunt iis, qui constitutionis sunt sanguinæ & phlegmaticæ, minus qui constitutionis biliolæ seu cholericæ. De quibus cautelis vid. *Collegium Pharmacent. in Schraderum P. 1. Sect. 3. cap. 3. pag. 160. seq. & WILLISIUS l. c. propè finem.* De parandis hujusmodi thermis artificialibus vid. ZWELFFERUS in Mant. Hermet. ubi de Sulphure.

Quoad Fomenta: convenit socus seu inunctio per spiritum vini appropriatum: vid. HQRSTIUS Obs. pag. 108. 109. & 111.

Vel

*℥℥. Herb. Majoran.*

*Salv. an. M. j.*

*Rorismar. M. ij.*

*Bacc. Juniperi ℥iv.*

*Lauri ℥ij.*

*Rad. Pyrethri ℥j.*

*Incis. & contus. S.*

*Species ad solum.*

Coquantur in aqua simplici: Decoctum fervidum submittatur pedibus, & sic fumus ascendit: Vel dividatur in duas portiones, ut refrigeratâ unâ altera substitui possit. Sufficit hoc beneficio silicum vel laterum candefactorum, pro membro stupore affecto vel paralytico.

Præ ceteris galbaneta, & balsama seu olea destillata ex galbano parata, pro externa inunctione mirè conveniunt: imprimis in usu est galbanetum Paracelsi & omnia cum eodem parata. Modos parandi varios videb. in SCHROEDERO lib. 3. Class. 2. ubi de Galbano & de Balsamis lib. 2. Vid. etiam HARTMANNUS in Pr. Chymiatr. & SENNERTVS Prax. lib. 3. cap. de Colica. Sunt qui hoc modo præparatum præ reliquis reddunt admodum conveniens:

*Ertmull. Oper. Tom. II.*

*℥℥. Galban. ℥℥.*

*Ol. terebinth. clar. ℥j. vel q. f.*

*Destilletur exinde oleum; cui addatur*

*Ol. laur. ℥j.*

*& repetatur destillatio, unde evadit balsamus generosus, qui affuso spiritu vini rectificato vel tartarifato aliquamdiu digestus & circulatus sit penetrantissimus & præstantissimus ad dolores colicos & scorbuticos, ac indenatas pareses, si umbilicus, & pars paralyfi affecta inungatur, vel solitarie, vel cum oleo saponis Veneti & paucis granis camphoræ mistus: sicuti etiam præservationis causâ spina potest inungi, si malum ulterius serpere videamus.*

Juxta hæc Petroleum, & oleum terræ dictum potenter penetrat & paralyticos restituit; sicut etiam alia olea destillata conducunt, v.g. oleum destillatum baccarum juniperi, succini, spica, laurula, salvia, mentha, terebinthinæ, item olea destillata rectificata ex tartaro, lignis, in specie de ligno fraxini, galbano, &c. Hæc olea, oleo nucista, vel laurino excepta, illinuntur & affricantur partibus affectis, & regioni spinæ dorsæ, idque aliquoties interdum. E. gr.

*℥℥. Ol. Petreæ alb. ℥ij.*

*Destill succin. ℥℥.*

*Lavend.*

*Maior.*

*Spica an. ℥j.*

*M. pro Inunctione membrorum:*

*D. S.*

*Externum oleum arthriticum.*

Ad emplastra quod attinet: ex racamahaca imprimis sunt paranda, quæ applicari solent in Paralyfi ex humectatione nervorum nimia externa. De his vid. BARBETTE in Anatom. Pract. pagina 51. Edit. Holland. ubi loq̃ olei terræ in ejus defectu oleum petreæ substitui potest.

Quibus verò acria ejusmodi non aquè conferunt, ut sit quibusdam scorbuticis, temperata magis conducunt, atque tunc imprimis conveniunt animalium pinguedines resolutæ, ut axungia humana, axungia visperina, axungia serpentis, ciconiæ, castorina, felina, vulpina, muris montani, canina, in specie pinguedo anserina, de qua vid. CRATO lib. 6. consil. 50. Hæc ipsa nunc solitarie, nunc cum petroleo aut oleo terræ, & paucis oleo quodam destillato, nonnihil acuata & benè calida, præmissâ debita frictione, applicari possunt, idque imprimis, ubi jam imminet rigiditas & contractura, aut metuitur atrophis membri: e.g.

*℥℥. Pingv. anserin vel human. ℥ij. iv. ad ℥vj.*

*Olei destill. terebinth. ℥ij.*

*Bacc. Junip. ℥j.*

*Spica ℥℥.*

*M. S.*

*Externum unguentum arthriticum.*

*℥℥. Pingv. human. ℥ij.*

*Ol. Junbr. terr. ℥j.*

*Petreæ ℥ij.*

*Succini ℥ij.*

*M. S. ut antè.*

Vel, quæ hoc in passu reliquis præfertur, pinguedo anseris aromatica ex assando destillans, dum impletur simplicibus balsamicis vel nervinis, quæ pinguedo destillans asservatur pro linimento externo, ad membra paralytica inungenda. Modi ubique sunt obvi: e.g.

*℥℥. Anserem evisceratum;*

*qui infarciatur cum fol. Salvia, Rorismarini, Spica, Caryophyll.*

*quibus addunt*

*Pingv. cati silv. ℥ij.*

*Thuris,*

*Mastich.*

*Succin. an. ℥j.*

*Castor.*

*Euphorb. an. ℥ij.*

*Infuantur omnia, & affretur anser in veru, & pinguedo destillans cautè colligatur, & pro usu servetur.*

HILDESHEIM sequens oleum anseris commendat, quo quandam Medicum in Duce Borussia usum fuisse asserit:

Bbb 2

℥℥. An-



℞. Anserem masculum deplumatum & exenteratum, probè ablutum:

Lavat probè vino intus & extra; Post

℞. Thyris alb.

Myrrh.

Masticb. an. ℥ij.

Ungu. martiat. ℥vj.

Repleatur iis mixtis venter anseris, assetur in veru; phlegma, quod prodit, abigitur, pinguedo verò stillans asservatur pro usu externæ illinitionis.

Huius liquoris cuilibet uncie addit pulveris vermium terrestrium ℥j. quo illinuntur membra. Alii

℞. Pingu. huius anser. ℥j. addunt

Pulv. verm. terrest. ℥ij.

Mista destillant per retortam, & sic acquirunt oleum pro inungendis membris paralyticis.

Quidam canem ruffum cum herbis appropinquatis, item myrrhâ, mastiche, galbano, &c. assant. Parili ratione venter ciconie impleri & huiusmodi Unimentum elici potest.

His accedunt olea costæ quædam, v. g. vulpinum, lumbricorum terrestrium, euphorbii, de piperibus, & seminis trifolii, asphaltitis sive bituminosi, à SYLVIO. *Prax. lib. 2. cap. 22.* commendata. His addenda unguenta, scilicet de bdellio, de quo vid. AMATVS LVSITANVS *Cent. 4. Curat. 22.* Agrippæ, Martiatum, pervinum, paralyticum Myrsichet, balsamus Guidonis. Quibus alumen plumbosum admiscere iubet SYLVIVS *loc. all.* si aridura subit; vid. *suprà l. 1. ubi de Atrophia.* Item cataplasma ex radice Symphyri majoris, cuius usum videbitis in HARTMANNO; & similia remedia.

Huiusmodi tamen pinguis & oleosa non adeo semper conveniunt in Paralyti, quoniam poros insarciunt & oblinunt. Dista autem unguenta oleosa & similia remedia applicantur toti membro, ubi ligamenta & tendines laborant; ubi verò vitium est in nervo, in membrum delato, tunc talia remedia spinæ dorsii aut nuchæ aut verticis commode applicantur. In hoc necessum est, sit Medicus Anatomicus, & sciat originem & progressum nervorum.

#### C A P V T IV.

##### D E

#### OPERATIONUM RATIONALIUM DEFECTU.

**H**Abuimus hactenus has Operationes, earumque lationes, quæ homini, ut animali, tam ad Esse animale, quàm ad Esse Vitale, conveniunt, & ita cum brutis illi communes sunt. Jam accessum faciam ad lationes operationum ipsi propriarum, & à quibus in Esse humano constituitur, ita ut iis abolitis brutum animal fiat homo. Operatio talis est Intellectus, & inde promanans RATIOCINATIO, quæ ipsa vera est forma & vera anima, & quamdiu iuncta est corpori, sensuum internorum, & consequenter spirituum animalium, in cerebro rectè dispositis, utitur ministerio, quatenus intelligentem oportet speculari phantasmata seu objecta, quæ sensus afficiunt internos. Quando erò objectorum in phantasia representatio malè se habet, Ratiocinatio vitatur, hincque omnes ratiocinationis lationes à sensuum internorum vitis dependent: adeoque iam sensus interni, eorumque vitia, tractandi sunt, prout pro eorum latione & Ratiocinatio læsa sequitur. Fiunt autem sensus interni à motu spirituum animalium in cerebro: prout ergo spiritus tam per se quàm in motu variant, & prout se habet cerebrum, etiam variant sensus interni, & consequenter Ratiocinatio, cuius aberrationes saltem per sermonem & gesticulationem corporis, adeoque per sermones inconditos & ridiculas gesticulationes à posteriori cognoscimus, ex quo pervenimus porrò in notitiam Memoriz lationis. Etenim per se Ratiocinatio non potest lædi, quia hæc immediatè dependet ab anima rationali, quæ ipsa, cum sit spiritus, & substantia immaterialis, erit à materia aut objectis materialibus seu causis naturalibus impatiibilis, & consequenter inalterabilis: Unde quicquid defectuum in eius operationibus occurrit, sunt lationes imaginationis & Memo-

ria, quæ ipsæ aliàs sunt per certum motum spirituum animalium in cerebro legitime dispositorum: Et quando memoria & imaginatio per morbos læduntur, causæ simpliciter inuestigandæ sunt in cerebri textura & spirituum animalium crassi læsis. Nam his læsis & animæ rationalis operationes læduntur; ipsis verò restituitur etiam ratiocinatio redit, utut nemini adhuc à priori sit cognitum, quid sit substantia ista immaterialis animæ rationalis? aut quomodo spiritus nostros gubernet in intellectu? aut quomodo ipsi spiritus in operatione animæ, & iudicio formando, inferuant? cum de rebus immaterialibus nullum habeamus conceptum positivum, sed negativum, id est, cognoscimus de anima rationali, quid non sit? aut quomodo non operetur? non autem, quid sit? Anima rationalis in infante, aut in sene denudò puerascente, non minus apra est, ut ratiocinetur ac anima iunioris subtilissimi ingenii, nisi diversitas operationum naturalium, quas sub ætatum mutationibus omnes experimur, à spirituum animalium aut cerebri alterationibus originaliter dependent.

His suppositis dico; Omnem læsam ratiocinationem inquirere defectus imaginationis & memoriæ.

Vitiatur autem ratiocinatio duobus modis: nempe

1. Quando immuitur, ut in STUPIDITATE, seu TARDITATE INGENII; aut aboletur, v. g. in STULTITIA, AMENTIA, & FATUITATE, vel etiam in senibus ex naturali causarum ordine
2. Quando depravatur; id quod fit in omnibus deliriis, tam in genere, quàm vario modo in diversis deliriorum speciebus.

#### A R T I C U L U S I.

##### D E

#### RATIOCINATIONE IMMINUTA ET ABOLITA,

& inde nata

#### MEMORIÆ LÆSIONE

&

#### STUPIDITATE.

**Q**Uoad imminutam aut abolitam Ratiocinationem, superius innui, Ratiocinationem ex se nunquam imminui aut aboleri, nisi etiam in Memoria simile adsit, aut etiam præcurrat vitium: quod vestigium est; hinc enim senes stolidi, quia eorum Memoria deficit aut fatiscit: & qui nullam habent Memoriam, semper manent pueri, dum nihil addiscunt; & sapientissimi, si ex morbo quodam vel causa quadam externa Memoriam lædant & amittant, stupidissimi & stolidi fiunt. Tantum nempe scitem scimus, quantum memoriâ comprehendimus, & cum iudicio ponderamus & applicamus.

Huius ergo Memoriz lationes hic imprimis sunt considerandæ, quibus ipsa aut immuitur, aut prorsus aboletur; depravari enim aut morbose augeri nequit: Nam memoria non rectè aut vitiosè retinens, est Memoria deficiens seu imminuta.

#### C A U S A E.

Huius erò aut imminutæ aut abolitæ Causam proximam & universalem certò determinare impossibile est; loquor syncerè; partim quoniam nondum à priori cognitum, quomodo naturaliter fiant memoriationis actus? aut in quo consistat? aut in quantum etiam in hoc negotio explicando GUILHELMUS GRATAROLUS, *Tract. de Memoria conservanda* inscripto, conatus est, saltem tamen sunt verbalia, adeoque in modo memorandi genuino omnes impingunt, utut præ cæteris CARTESIUS rem nonnihil clarius aggressus fuerit; partim verò quoniam tam multæ, & quæ tam variæ remoræ causæ Memoriam lædere, & eam deficientem reddere valent. Hoc saltem observandum (1) memoriam nobis communem cum brutis esse, prout nempe reminiscentiæ opponitur, quæ nobis & propria, & fit per ratiocinationis discursum: (2.) lationes Memoriz sequi lationes capitis certo modo.



In capite quoad hoc negotium ſaltem ſpiritus animales & cerebrum conſideranda; in quorum altero, tanquam radice, fundata erit Memoria: Spiritibus autem, ceu ſubſtantię continuè mutabili, non erit impreſſa Memoria, quia Memoria fixam habet ſetlem. Certum ergo eſt, quod cerebrum ſubjectum radicale ſit Memoriae; quomodo autem ſit, nescio. Jam verò & omnes cauſæ remotæ, quæ lædunt Memoriam, triplicis ſunt generis, & ſerè eò collimant, ut aut

1. Cerebri conformationem & texturam mechanica, ſecundum porulos ſcilicet & meatus, & hinc natam temperaturam, imprimis in humiditate aut ſiccitate; aut
2. Univerſum ſanguinem & ſpiritus vitales certo modo vitient aut corrumpant, hinc aptam ſpiritibus animalibus materiam ſubtrahant; aut
3. Denique ſpiritus animales præter modum conſument, diſſipent, aut quocunque modo torpidos reddant.

Quarum cauſarum variarum omnium ad unam proximam reſtriſſio vix poſſibilis eſt.

In conſideratione ergo læſionis Memoriae probè ſemper attendantur cauſæ eius remotæ, ut iſdem quaſi manducamur ad ſeliciorē proximam.

I. Prioris claffis Cauſæ remotæ ſunt (1.) res fortuitæ & caſuales, v.g. caſus ab alto, vulnera, & contuſiones capitis enormes, & cranii violentæ depreſſiones, ac i. Quæ in caput, & ſimiles externæ læſiones, Memoriam, deſtruentes: qualia exempla PLINIUS *Nat. Hiſtor. lib. 7. cap. 34.* RONDELETIUS *Meſch. Med. pag. 314.* PLATERUS *Obſervat. pag. 12.* BORELLUS *Cent. 2. Obſervat. 37.* & TULPIUS *lib. 4. Obſervat. 15.* allegant: Sic etiam HILDANUS *Cent. 3. Obſervat. 1.* reſert puerum aliàs admodum ingenioſum, in quo ex depreſſione cranii omnimoda Memoriae abolitio & ſtupiditas fuerit ſecura: Sic LINDANUS *ſuper Hartmannum*, ex ſubitanea capitis percuffione omnium rerum antea notarum oblivionem obortam reſert: Similia exempla videbitis in SCHENCKII *Obſervat. lib. 1. ubi de Memoria Obſervat. 9. & 10. pag. 74 & 75.* Sicut ex vulnere occipitis à ſclopero omnimodam Ratiocinationis & memoriae ablationem obſervat obortam HORSTIUS *lib. 2. Obſervat. 7.* Item nimia & frequens capitis lotio memoriam lædit. (2.) Conformatio capitis & cerebri à primo ortu vitioſa, ita ut qui pravam cerebri figuram habent, ut plurimum ſtolti, obliſioſi, &c. obſervantur: vid. BARTHOLINUS *Cent. 2. Hiſt. 20.* WILLISIUS *Anat. Cerebri lib. 1. cap. 3. fig. 4.*

II. Secundæ claffis ſunt cauſæ non fortuitæ ſeu naturales, aut ex claffe rerum vel nonnaturalium vel præternaturalium. Nonnaturalis ſunt vel aſſumpta diverſa, vel excreta & retenta, vel animi pathemata. Quoad (1.) aſſumpta; v.g. vini generoſi immoderatioſus uſus ſeu potius abuius, ut & crebrior ebrietas, Memoriam labefactare ſolet. (2.) Inedia gravior & diuturnior: Sic obſervatum ſuit in virgine poſt diuturnam & tantum non miraculoſam inediam, cum denuò comedere incepit, oblivionem & mentis ſuporem ſucceſſiſſe, teſte HORSTIO *lib. 2. Obſervat. 15.* (3.) excreta, quando nempe naturaliter excrementa ſupprimuntur. Suppreſſa ſanguinis evacuatio conſueſta & ſimilis Memoriam hebetare poteſt: Exemplum ſuppreſſionis menſium obſtinatæ, oblivionem inducentis, per cauterium in occipite curatæ, videb. in BARTHOLINI *Aſſ. Haſſniens. Volum. 2. pag. 196.* Item curioſam obſervationem habet ZACUTUS LUSITANUS *lib. 1. Prax. Admir. Obſervat. 47.* de Inſania, orta ex ſuppreſſis hæmorrhoidibus, poſtmodum tamen ſponte curata ex diuturna hæmorrhagia, facta in interſcimine per porum quendam inſenſilem: Sic ex ſuppreſſis lochiis puerperæ oblivionem cum melancholia natam obſervat SALMUTH. *Cent. 1. Obſervat. 72.* Item (4.) hæmorrhagiæ nimix, præter ſuporem mentis, oblivionem quoque inducunt.

III. Tertiæ denique generis ſunt (1.) aſſumpta vitioſa, ſpiritibus animalibus minus congrua; vid. RIVERIUS de quodam, qui poſt longum uſum aquæ papaveris rheados Memoriam ſuit deſtitutus & fatuus factus, in cujus ventriculis cerebri poſt mortem niger ſeu atramentarius humor inventus fuerit. Opii abuius mentis ſuporem & oblivionem ſubinde inducit: Sic WILLISIUS *Pharm. Rat. Part. 1. pag. 306.* ab opii abuſu mirabilem & parti-

cularem Memoriae amiſſionem reſert. Philtra multum, etiam in reſeſſu habent, quæ uti non raro varias mentis læſiones, & in ſpecie manias, ita etiam fatuitatem & gravem Memoriae læſionem inducunt, teſte SCHENCKIO in *Obſervat.* Exemplum notabile reſert HENRICUS ab HEER in *Obſervat. 12.* de quodam juvene quatuordecim annorum, ſtupendi aliàs ingenii, qui quatuor conſiſcipulis diverſa dictabat carmina, ipſe verò quintum ſcribebat, & nihilominus tamen poſtmodum per philtrum omnium rerum, imò etiam proprii nominis obliſus fuit, & alphabetum rursus addidit: De philtris, ſeliſ cerebro, aliſque narcoticis internæ & externæ applicatis, oblivionem induſtam SENNERTUS *Prax. lib. 1. pag. 241. 242. & 296.* teſtatur. Sic etiam venena nonnulla aſſumpta omnem Memoriam perdere ſolent. Vid. SCHENCKIUS in *Obſervat. Medicinal. lib. 1. de Memoria Obſervat. 3. pag. 74.* (2.) Venus nimia, quæ quò largius exercetur, eò magis Memoriam debilitat, aut ad fatuitatem diſponit, vid. SCHENCKIUS in *Obſervat. ac curioſum eſt, quod SALMUTH Cent. 1. Obſervat. 61.* reſert de viro docto, qui, ut coniugl placeret, uſus fuerit ſtimulantibus Venerem, unde ſine Memoria redditus fuerit fatuus: Eodem loco reſert de quodam, qui ex nimio Veneris abuſu adeò exſiccatum habuit cerebrum, ut illud intra cranium hinc inde moveri perciperetur. (3.) Affectus animi diverſi, diuturnæ curæ cum vigiliis conjunctæ, & ſtudia immodica, præprimis circa diverſa objecta, hic etiam in lædenda Memoria multum faciunt; Nam ex terrore Memoriam ſæpius lædi, notiſſimum eſt; item ex terrore repentino quodam Memoriam ſubito privatos reſert SCHENCKIUS in *Obſervat. 2. loc. alleg. (4.)* Morbi variæ cerebro & ſpiritibus animalibus inſeſti Memoriam abolen es, in ſpecie affectus ſoporofi, ſcilicet lethargus, carus, apoplexia, imprimis morbi acuti gravioreſ, aut febres ardentes, item diuturnioreſ epilepſiæ, non raro Memoriam viciantes. Vid. PLATERUS *Obſervat. 7.* & HILDESHEIM *Spicileg. 3. pag. 315.* Apoplexiam ſubinde oblivionem læſionis ſalvâ ſcriptione excitare, videb. in M. A. N. C. *Ann. 4. & 5. Obſervat. 154. pag. 169.* ſicuti etiam interdum ex febre ardente vel acuta reſurgentes omnino obliſioſi redditæ obſervati fuerunt in SCHENCKII *Obſervat. & CHRISTOPHORUS à Vega lib. 3. Artic. Med. cap. 30.* reſert de quodam Franciſcano, à febre acuta memoriam amittente; hinc etiam poſt peſtem Memoriam obliſam obſervat SCHENCKIUS. Ex mania omnium rerum oblivionem habet TIMÆUS von Guldenklee, in *Caſibus pag. 19.* Ut taceam, quæ de peſte illa Attica famoſa reſerunt, quod in hac homines tanta omnium rerum ceperit obliſio, ut nec familiares nec ſe ipſos agnovérunt. Tandem HENRICUS ab HEER in *Obſervat. 3.* reſert exemplum de viro quodam quadraginta annorum fatuo & obliſioſo factò (non nato) qui mortuus, cum cranium fuiſſet apertum, cerebrum ſicciffimum & durum, adeoque in ſumma ſui parte digitis friabile repertum fuit, unâ cum flavedine citri æmula, undiquaque ad digitæ altitudinem imbutum, circa ventriculos tantum & baſin molliuſ tamen inventum fuit: quo non abluſit SALMUTH. *Cent. 1. Obſervat. 61.* (5.) Senectus, dum v. gr. BASSIANUS LANDUS de *Humana Hiſtoria Franciſcum Barbarum, Græcarum literarum*, quatum erat doctiffimus, in extrema ſenectute planè obliſum fuiſſe reſert. Hæ & ſimiles cauſæ remotæ ſubinde bene perpendendæ & bene recognoſcendæ ſunt in Praxi, ut pro varietate earum varie- mus curam.

In quibuſdam à natura Memoria & ratiocinatio eſt deſciens, in aliis verò per naturam percipitur admodum ſubtilis Memoria, & acriter ratiocinantur. Naturalem autem ad Memoriam inhabilitatem, adeoque naturalem ſtupiditatem, ceu diſſiculter aut planè non curabilem, præmitto.

Interim in memoriae læſione pro meliore medendi ratione in genere obſervetur diverſitas ſubjectorum (ſi eſt à cauſa interna) an ſit in corpore ſenili? an verò in corpore juvenili? &, ſi in corpore ſenili Memoriae læſio, in his pro medendi methodo ante actæ vitæ ratio conſideranda eſt, an vita præcedens fuerit ſedentaria & quietæ magis ab animi & ſenſuum internorum moribus? an verò ſemper in his fuerit actuola, v. gr. in ſtudiis, curis, &c. Nam juvenes, imprimis malo hypochondria-



eo gravius obnoxii, item juvenes, qui interdum epilepsia corripuntur, debilem habent Memoriam, qualia ego hic jam læsio exempla. Quodsi ista Memoria læsio ex in corpore senili, ut plurimum etiam reliquarum actionum animalium torpor quidam conjunctus esse solet propter spirituum similem torporem, idque serè ob cerebrum lymphâ copiosiore nimis inundatum, præprimis quando rejiciunt copiosa phlegmata per os & aures: id quod fit imprimis in senibus, quorum ante acta vitâ multis curis aut studiis sublimioribus non fuit agitata, & judicium adhuc aliquomodo valet: Nam in senibus doctis, quorum nempe vita occupata fuit in studiis, meditationibus, curis ac negotiis urgentibus, in his adhuc est sæpe judicium, & in talibus, quod probè observetur, cerebrum aridum, siccum, ac quasi porosum nimis existit, uti etiam in his habitus corporis aridior, somnus paucus, & rarè excretio pernares, & os adest, & licet dormiant, faciliè tamen evigilant.

In junioribus, cùm Memoria nonnihil debilis aut læsa nonnihil, judicium tamen & similes rationales operationes, nempe vis judicii & ingenii, sint ut plurimum vegetæ & firmæ, debilitatâ saltem Memoriam, dicitur Præcocias: id quod fit ob spiritus animales subtiliores, agiliores, fervidiores ac serè igneos, (unde videntur tales agiles & acuti judicii,) unde cerebrum similiter aridum & exsiccum, minusque nutritio succo irroratum: Hinc judicium quidem ad tempus habile, sed Memoria nonnihil debilis, & tales in senili ætate omnino judicium & Memoriam amittunt, imprimis si sint studiis dediti, & sic spontè tandem fatiunt. Sin verò simul judicium cum Memoria firma adsit in juvene, præcox est ingenium, sed rarè durable, quin solito citius judicium & Memoriam amittunt. Quodsi juvenis sit, qui conqueritur de aliqua Memoria debilitate, ita ut accedat torpor sensuum internorum, in tali actione istæ, nempe Ratiocinatio & phantasia, sunt obtusæ ac minus acutæ, quæ præter naturam statum cerebri humidioris & spirituum animalium defectum innuunt, & cæteris paribus faciliè corriguntur.

Quæ & similes circumstantiæ in Praxi Memoria læsæ bene perpendendæ; his enim neglectis, & causis remotis non probè ponderatis, facilius destruitur, quàm promovetur Memoria.

## DIAGNOSIS.

Quod attinet signa Memoriae & Ratiocinationis vitiatæ, ex relatione agri patent: imò & hujus causæ remotæ ex vitæ genere, actionibus animalibus, & similibus antecedentibus ac concomitantibus, partim à Medico hæriolantur, partim ab agro confirmantur.

Et serè cerebri status ac spirituum ex adjunctis ratione aliarum actionum animalium, & hinc ex antecedentibus rebus non naturalibus, considerandus venit; spectatum ubi æger est iuvenis, iudiciosus, studiis nimis addictus, diutè non admodum lautâ utens in cibis, qui de Memoria defectu est querulus: in talibus ariditas & siccitas cerebri cum spirituum animalium subtiliorum fervida agilitate in causa est. Ubi verò est somnolentus, aut quando post affectus soporosos aut lethargicos Memoria læditur, aut in actionibus torpor percipitur, aut per nares & os copiose excrenitur, aut quando est senex studiis minus in inventute deditus, &c. in his Memoria læsionem ex spiritibus torpidis, & nimia cerebri humectatione oriri suspicito est. Adeo temperatura cerebri mediocris, in æquabili eius textura fundata, ad Memoriam imprimis requiritur.

## PROGNOSIS.

Quod attinet Prognosin; hæc variat pro causarum remotarum varietate. Hinc Memoria læsio in his, qui nimis studiis sunt dediti, idque ex fervore & activitate spirituum animalium, & siccitate cerebri, difficillimè curantur; & tales, si volatilibus analepticis & aromaticis spirituosus utuntur, planè fatui tandem redduntur; sicut olim ex frequentiore usu confectiois anacardine cuiusdam contigisse ex relatione D. D. MICHAELIS recordor; & Ambrata pro confortanda memoria ab his, quibus phantasia potentior est, assumpta, stuporem tandem mentis inducere, notissimum est.

E contrâ facilius & etiam melius est in his, quibus cerebrum lymphâ copiosiore madidum, & spirituum aliquis torpor, nisi senectus impediat.

Præterea Memoriae substantia magis læsio absque causa externa orta imminentis Apoplexiæ & Paralyseos, quin & interdum epilepsiæ, indicium est: sin verò ægro viribus iam dum fracto hoc contingat, mortis imminentis signum existit.

Naturalis stupiditas, & à capitis conformatione vitiosa, est incurabilis.

Superveniens pro causis remotis variis, nunc facilius, nunc difficilius curatur.

In specie, quæ est ex phyltris, rarissimè & difficillimè curabilis est, quia, uti suprâ dictum est, cerebrum tam acriter afficitur ab his, & faciliè in maniam degenerat.

Quæ ab inveterata epilepsia, similibusque capitis affectibus, morbis malignis & acutis, item venenis, oritur Memoria læsio, exindeque stupiditas, serè incurabilis est.

## CURA.

Quod attinet Curam: in hac ipsa

1. Ante omnia causarum remotarum antecedentium activitas & conditio bene est pensanda, & quomodo noceant? maturè considerandum, & iis obviam eundum, & inducta labe emendanda & sistenda, unde e.g. hæmorrhagia sistenda, evacuationes consuetæ suppressæ promovendæ, humoris genitalis dispendia immoderata, ac inedia diuturnior evitanda.

Hinc

2. Constitutio cerebri, an illud aridum nimis? an humidum? & spirituum animalium ratio probè consideranda est; & ubi illi sunt nimis ignei & fervidiores, & cerebrum aridius, hæc sunt attemperanda, & ad statum naturalem reducenda, solâ nempe diætâ lautâ & expleta, & alimentis succulentis, & bene nutritivis, v.g. lacte & lacticiis, chocolata in lacte vel vino assumpta, &c. spirituum volatilitatem blandè temperantibus, & chyloso rore impregnatis, irrorantibus, quiete, &c. Ubi verò cerebri nimia humiditas præpoller, & spiritus sunt torpidi, minus agiles, volatilibus quasi sunt excitandi, suscitandi, & subtilisandi, aromaticis cephalicis acris spirituosus & similibus crebro adhibitis.

Adeoque prior ista Memoria læsio ex ariditate & squalore cerebri & spirituum fervore nata, ex fonte Pharmaceutico non solet curari, sed saltem diætâ lautâ & humida, quæ copiosum roridum nutrimentum exhibet; posterior verò aromaticis cephalicis restauranda, & quantum possibile, denuo curanda. Omnes hæc & aliæ circumstantiæ probè examinandæ sunt; aliis remediis citius inveni, quàm invari solet Memoria.

Pro varietate ergo causarum tantum subinde specificis utendum est. Ut plurimum tamen læsio Memoriae, quæ stupiditatem infert, & curari debet ac potest medicamentis Pharmaceuticis, ex spirituum animalium torpore, & humiditate cerebri constitutione, originem ducit; unde & si serosorum humorum abundantia subsit, post purgantia blandiora, masticatoria, & sternutatoria, ut plurimum aromatica conducunt: sed ne his aromaticis in contrarium fiat præceps lapsus, insimul diætâ temperatâ, humida, & rorem nutritivum copiosum suggerens, insistenda.

Remedia ergo quod attinet: In genere omnia cephalica dicta, scilicet volatilia, spirituosas odorata & aromatica, ad roborandam Memoriam & acuendum ingenium multum laudantur, non tamen semper aciora; v.g. pro sunt rosmarinus, melissa, ocymum, flores liliorum convallium, stachados Arabicæ, tuniceæ, primulae veris, spica, serpillum, cubeba, caryophylli, cardamomum, cinnamomum &c. Et imprimis cubeba, numero tres mane jejuno stomacho comestæ, acunt insigniter ingenium & Memoriam: siquidem ipse adhuc puer, cùm ab Informatoribus coactus fuero ad ediscendas lectiones, si voluerim aliquid retinere, assumpsi cubebas tres vel quatuor jejuno stomacho, (moderata earum dosis sit, cùm sint nimis volatiles,) & percepi



cepti operationes mentis insigniter acutæ. Quod etiam faciunt grana cardamomi: sed in juvene studioso cautè applicentur, propter nimiam volatilitatem & acrimoniam aromaticam, in senibus verò tutiora sunt. Præterea thus, *castoreum*, & *succinum* cum omnibus succinatis, etiam ad Memoriam laudantur: in specie thus album pulverisatum, circa plenilunium & novilunium assumptum, laudatur ad roborandam Memoriam. Ex præparatis & compositis conservæ recensitorum vegetabilium, horumque olea destillata, imprimis cinnamomi, sunt præscribenda. Sic quoque *pulvis Trithemii* admodum laudatur ad roborandam memoriam, cujus descriptionem videb. in *Praxi Chymiatr. Hartmann. cap. 14. ubi de Memoria læsione pag. 1.* Aliam compositionem habet SCHROEDERUS in *Pharmac. Medico-Chym. Part. 1. pag. 273.* Item huc facit pulverisanalepticus Mindereri, species aromaticæ rosatæ, species dianthos, diambæ, *dianosebi dulcis*, & similes, sunt admodum convenientes. De Ambra noto, quod sit omnium optima, & quod non habeatur par remedium in firmandis viribus animalibus, & roboranda Memoria, omnibusque mentis actionibus: adeo ut nihil æquè fulciat senes labescentes, quàm ambra, sive sub forma pulveris cum ana sacchari exhibeatur, sive sub forma essentiae vel tincturæ, parandæ cum spiritu rosarum aut ceraforum nigrorum, vel cum spiritu mellissæ præparandæ, propinetur. Item elegantissima etiam sit tinctura cephalica ex granis chermes & ambra, cum spiritu lillozum convallium, vel aliis dictis spiritibus, extractis.

Sed observetur de his ambratis, quod cautè admodum internè sint usurpanda, speciatim cautius & parcius in juvenibus calidioribus, aut ubi ex aridura cerebri Memoria læsio metuitur; tutius autem senibus. Nam sicut verum est, quod ad tempus quidem fulciat Memoriam, & reddat mirabilem; ita crebriori usu data postmodum plus nocet, quàm prodest, cum præmaturationem stupiditatem post se relinquit; vim enim aliqualem inebriativo narcoticam ambra habet conjunctam, ratione cujus etiam reverà spiritus admodum refocillat & fervidos reddit, sed postmodum sensim sensimque virtute inebriativa stuporem & omnimodam saturitatem & stultitiam infert. Cauti ergo sumus in usu ambræ, ac detur potius ambra parcius & sæpius, quàm semel in nimia dosi, hinc interdum etiam ejus usus senibus concedendus: sed abusus fugiendus, quoniam certum est, quod stupiditatem etiam inferat totalem in senibus. Sic notum quoque est, quod ambra egregiè Venerem stimulet: & simul observatu dignum est, quod omnia imprimis aromatica, Venerem, propriè stimulantia, volatilia, spirituosa, satyracea, & similia omnia, ad actionis animales & Memoriam roborandam conducant; hac tamen cum noxa, ut si stimulo Venerem velimus satisfacere, Memoria insigniter debilitetur. Unde Chocolata cum vino hausta moderatè Venerem stimulat, qua suppressa Memoriam etiam egregiè firmat, in specie si cum lacte usurpetur: Hinc etiam satyrion egregiè venerem stimulans à PARACELSO ad Memoriam firmandam mirificè commendatur, quod etiam venerem est, unde etiam necesse, ut signum iniciatur Veneri: quò magis autem impetus veneri cohibentur, ad magis Memoria roboratur.

Porrò ambræ ratione confectio al-cheremes memoriæ firmandæ, imprimis senibus, conducit; sicut etiam ab aliis commendari solet confectio anacardina; sed cautè admodum usurpetur propter ingredientia vegetabilia nimis acria, nimisque volatilia; unde ejus abusu quidam insani, alii acutè febricentes facti fuerunt, adeo ut rarissimè vel nunquam sit usurpanda.

Insuper spectant huc omnia spirituosa ex formicis parata, quæ omnibus functionibus animalibus robur addunt, ac speciatim aqua magnanimitatis Laurembergii ad memoriæ robur & ingenii acumen laudatur; quæ etiam ipsa egregiè stimulat Venerem; de qua, uti etiam ejusdem arte Memoriam firmandi, vid. LAVREMBERGIVS in libello suo rarissimo *Mnemontica* dicto in *Ann. 1. M. A. N. C. in Append. pag. 199.* ubi omnia ejus remedia pro Memoria, & in Collegio Ionslöniano D. MICHAELIS inveianda, insit omnia in hoc puncto sit. Negotium perficit remediis quatuor: (1.) masticatorio, (2.) capitis lotionem (3.) aqua magnanimitatis, & (4.) linimento externo. Et hæc in isto casu possunt usurpari, ubi subest torpor spirituum, & cerebri inundatio. Nam

Extmull. Oper. Tom. II.

quoad primum, masticatorium seu apophlegmatizans est tale:

℞. Herb. Nicotian. succul. M. ij.  
Rad. Pterid. Zij.  
Zingiber. Zj.

Cum Melle purissimo in pulvem redacta, commisceantur, & hanc globuli in forma pilularum majuscularum.

De quibus omni manè una in ore agitetur hinc inde, unde copiosum phlegma colligitur in os, quod expuendum.

Quoad secundum, nempe Lotionem capitis, est hæc:

℞. Herb. Meliss.  
Maiozan.  
Salvia rec.  
Rorismar.  
Fol. lauri an. M. j.  
Flor. lavend.  
Lil. convall.  
Tilia,  
Stech. Arab. an. p. j.

Coqu. in Vno Hispan. Gallico, vel Rhenano: quo caput lavetur omni quarto, quinto, vel sextodie.

Quoad Aquam Magnanimitatis, ea est hæc:

℞. Vin. Malvat.

In cujus q. macera per 14. dies & noctes

Herb. basilic.  
Maiozan.  
Salvia,  
Melissæ,  
Puleg. an. Mß.  
Flor. Borrag.  
Salvia,  
Flor. Prim. veris,  
Rorism.  
Stachad. Arab.  
Lil. convall. an. p. j.

Hæc destilla per alembicum:

Spiritum destillatum in cucurbitam amplam supra apertam inde, & pone in nidam formicarum circa solstitium æstivum, nempe in talem nidum, cujus formica percussæ manu acidum de se spirant, & quæ nulla habent ova, & sunt nigra, Germ. *Schwartzrothe*, & *maiuscula*, quæ reperiuntur circiter arbores resinolas: in eiusmodi acervum hanc cucurbitam illo spiritu vini aromatico impletam, ut saltem quarta pars cucurbitæ sit plena, pone; hinc in dictam cucurbitam formicæ irrepunt, quarum ubi præter propter manipuli iv. vel v. irreperunt, bacillo ligneo commovendæ sunt, ut omnes suffocentur. Hoc facto digere formicas cum spiritu vini aromatico adhuc per dies & noctes 14. in radiis solaribus, hinc abstrabe spiritum destillando, in quem infunde:

Conf. Anacard.  
Cinnamom. añ. Zj.  
Croci Zß.  
Moschi gr. xij.

Mista digerit, & filtrando deparat.

De hac aqua dat cochlear unum in haustu vini modicè generosi, tempore matutino quotidie, vel saltem alternis diebus pro varietate circumstantiarum.

Quoad quartum, Linimentum externum est illud:

℞. Herb. Nicotian. M. ij.  
Flor. Basilic.

Meliss.  
Primul. veris,  
Maiozan. an. M. i.

Omnia contusa misc. cum

Ol. olivar.  
Butyr. non salis. an. Ziii.  
adde

Vini Rhenan. vel Malvat. Zv.

Coqu. pro Linimento crasso, & Cola.

Illinatur externè temporibus, & crebrius vertici.

Cum dicta aqua magnanimitatis Laurembergii quidam faciunt Essentiam ex confectioe anacardina, & sic tutius servè usurpantur remedia anacardina: Conf. HARTMANNUS *Prax. cap. 14. §. 2.* Porro nota est Aqua sulphorum Dornereitij, item aqua cephalica Mynsichti,



*Quinta Essentia Matthioli*, aqua & spiritus cerebri humani: quæ omnes commendatæ sunt pro robore memoriæ à BARTHOLETO. Myrobalani conditæ: in specie myrobalani Chebulæ conditæ, laudantur insigniter à MONTAGNANA ad conciliandam Memoriam firmam, si subinde æger unam alteramve comedat. Idem MONTAGNANA Consil. 71. commendat sequentes pilulas, quas bonum secretum vocat ad Memoriam, quibus virum antea doctum, sed Memoria privatum, restituit:

℥j. Cubebar.  
Calaminth.  
Masticis.  
Nuc. moschat.  
Caryophyll. an. ℥j.  
Ambr. Orient. ℥ss.  
Moschi gr. v.

Misc. & cum succ. Majoran. f. Pillulæ.

De quibus omni vespere, dum vadit ad lectum, deglutiat aliquot, manè verò capiat duplum, hinc jejunct duas vel quatuor horas.

Sic celebres sunt *Pilulæ ad memoriam Sebizi*:

℥j. Aloes ℥j.  
Rhabarb. ℥ij.  
Myrrha,  
Croci,  
Agar. an. ℥j.  
Rad. Gentian.

Zedoar. an. ℥j.

Cum Theriac. opt. q. s. f. Pillulæ, magnitudine Francosurtensum.

Quarum septem vel novem deglutendæ.

Vel species hæ extrahi cum spiritui vini possunt in forma elixyris: vid. *Velsch. Milionim. Cent. 1. Obser. 50. Annex. Ann. 4. & 5. M. A. N. C.*

His adnumeranda est Herba Thee, egregiè facultates animales & operationes mentis internas confortans; & quidem decoctum ejus mirabile est, dum judicium, & memoriam maximè augeat, magis tamen senum quam juvenum, ita ut sine somno & torpore aliquamdiu persistant, nempe in vino bullita, cujus haustulus omni manè assumatur.

Hæc sunt interna, quibus addi possunt spiritus & essentia salviæ, rorismarini, melissæ, ligni aloes, liliorum convallium, cinnamomi, castorei, ambræ, & similes.

Vel

℥j. Aqua cephal. ad intra,  
Sopbor. an. ℥ij.  
Quint. Essent. Matthiol. ℥ss.  
Spir. ceras. nigr.  
Lil. convall.  
Prim. veris,  
Ess. Ambra an. ℥j.  
Syr. de Heton. ℥j.  
M. S.

Potio caput & memoriam confortans.

℥j. Conf. flor. Anthos,  
Salviæ,  
Tunic. an. ℥ss.  
Nuc. Ind. concl. ℥ij.  
Spec. diamb.  
Diamoschi dntc.  
Spir. lil. convall. an. ℥ss.

Cum f. q. syr. flor. tunicæ f. EleQuarium:  
D. S.

EleQuarium caput & memoriam confortans.  
Item

℥j. Caric. ping. No. vj.  
Sem. Eruc. ℥vj.  
Cartham ℥j.

Cum syr. flor. Tunic. f. EleQuarium.  
D. S. ut antè.

De quo dosis quantitas juglandis tempore matutino: A meridie usurpari potest liquor cornu cervi succinatus, spiritus carminativus, vel salis ammoniaci caryophyllatus, vel succinatus.

Remedia lunaria pariter & hic locum inveniunt. Notum est de lunæ rasura Memoria robur concillante; quare resolutio lunæ cum spiritu salis ammoniaci vinoso ad imitationem KUNCKELII parata hic proficua foret.

Externæ pauca sunt, quæ locum inveniunt. Oleum, Myrrhæ per deliquium factum solet insigniter commendari; vid. SCHROEDERUS in Pharm. quod divinum remedium vocat HILDESHEIM in Spicil. ad Memoriam. Oleum hoc myrrhæ per deliquium si temporibus & occipiti inungatur, mirificè memoriam restituere astringit. Sic Zaphira curavit memoriam imminutam ob abundantiam succorum frigidorum in capite per spiritum vini, cui piperis parum infusum fuerat, inungendo hoc ipso subinde futuram coronalem & sagittalem; vid. ZAPATHA capit. 4. in Medic. Simile quid est, quod commendat HILDESHEIM in Spicil. 3. pag. 319. ubi laudat sequentem essentiam ad memoriam conciliandam; nempe

℥j. Fol. betonic.  
Salviæ,  
Lavend.  
Rorismar.  
Flor. Ros. rub. an. M. i.  
Nuc. moschat.  
Piperis long.  
Galang.  
Cyper. rotundi an. ℥iv.  
Castor. ℥ij.  
Nuc. Indic. ℥ss.  
Myrrhæ,  
Thuris an. ℥ij.  
Croci ℥ss. vel ℥ij.

Infundantur in vino vel spiritu vini, aut spiritu appropriato, digerantur in Maria Balneo & filtrentur.

Hoc ipso liquore, seu, ut vocant, oleo nares & tempora & vertex largiter illinantur pro ingenii robore firmando.

Conveniunt quoque balsamum memoriæ Mynsichti, & lixivium sapientiæ Mynsichti. Aliis etiam pinguedo urinae temporibus & fronti illita ad roborandam memoriam commendatur; item unguentum Caroli Ducis Burgundiæ. Preparationem videbitis in SENNERTI Praxi, ubi de Memoriae lationibus.

His præmissis iam accedimus ad Ratiocinationem depravatam; unde sequitur

## ARTICULUS II.

### DE

### DELIRIIS IN GENERE.

**Q**uando depravatur Ratiocinatio occasione læsæ imaginationis seu phantasiæ & memoriæ, ita ut à consuetæ lege & ordine aberret, dicitur *Delirium*.

Aberratio hæc observatur nunc conjunctim, nunc seorsim, secundum omnes tres mentis operationes: Nam

1. In simplicium objectorum indeque formatorum conceptuum apprehensione: v. g. cum delirans quid pro quo, vel aliud pro alio, concipit, ut dum quendam vulgarem hominem Regem Hispaniæ appellat.

Deinde

2. In ipsorum conceptuum apprehensorum compositione & divisione, indeque factâ conclusionem & ratiocinationem: ut dum aliquis putat, se constatum esse ex butyro; Unde

3. Ignem horret, ne liqueat: vid. SCHENCKII Observationes.

Omnes hæ aberrationes à recta ratione uno nomine Delirium appellantur, Græcis *ῥαπαρσιον* nempe depravatio rationis, & aberratio ejusdem ab ordinaria cognitionis lege, quæ Deliria varia, nunc ridicula & jocosa cum ægri gaudio & voluptate conjuncta, quando nempe ridet, cantant, jocosa narrant, nunc etiam morosa seu seria, ubi cum quodam impetu, furore, &c. delirant, sed absque nexu & ordine, & sine fundamento, confusè ut plurimum producuntur.

### CAUSÆ.

Causa horum Deliriorum in genere consistit in spiritu animali, in substantia nempe & motu plus minus alterato & vitiat, ita ut spiritus à debita crasi degeneret: unde prout variat crasis spirituum & eorum motus præter naturam, variant



variant etiam Deliria. *Mens* enim, id est, *anima rationalis*, utpote immaterialis & immutabilis, eadem semper manet, & à nulla alia causa materiali lædi & inquinari potest.

In spiritu ergo hæret vitium, idque varium & diversum, prout ipsius alterationis induit & causarum occasionalium multiplex est varietas, unde etiam varia deliria varietateque eorundem species. Rem hanc exemplo declarabo: Quemadmodum in ebris idem vinum sub ebrietatis exorbitantia diversa parit Deliria in diversis subiectis, dum unus sub Delirio vinoso fit iracundus aut furiosus, alter fit amorosus, tertius fit canorus seu cantans, quartus jocosus & ridiculus, quintus fit somnolentus, sextus se æstimat maxime divitem, septimus omnium evadit sapientissimus, octavus alio phantasmate afficitur &c., in his affectibus, ut utrumque sit vinum, quod omnes inebriat, indeque omnes etiam delirantes reddit; nihilominus tamen pro diversa constitutione subiectorum, eorumque alia habitudine diversa, ex massæ sanguineæ crassi materiali & seminali distincta, & inde pro varia spirituum animalium constitutione varia tamen & distincta sunt Deliria.

Quoad Differentias Deliriorum: in genere omnia vel ex interna oriuntur causa, seu quæ habent somitem quandam internum in corpore stabulantem, vel ab externa. Ab externa quæ proveniunt causa Deliria, originem ducunt vel ab assumptis intra corpus, vel extrinsecus ad motis, e. g. morsu canis rabidi, felis rabidi, tarantulæ &c.: utraque sive ex vegetabili seu animali ex regno oriuntur.

Externas quod attinet Causas: ex regno vegetabili sunt liquores spirituosus & temulentiam inducentes, in ebris delirium excitantes; item omnia narcotica stupefactiva, quæ simul cum virtute fixativa & quasi ligativa spirituum animalium, certam vim simul etiam obtinent determinandi certo modo spirituum animalium motum, cuius immutatio occasione diverſi & extraordinarii conceptus in mente formentur, indeque varia Deliria oriuntur: v. g. refert KIRCHERUS Tr. *Scrutinium Pestis* exemplum de duobus monachis, qui ex esu radicum cicutæ prope aquas crescentis, loco petroselinæ, in tale succiderunt Delirium, ut se in anferes & anates transformatos putarint, indeque isti monachi piscinis, stagnis & paludibus (crescit enim prope flumina) se immerferint, & anatum instar natare voluerint.

Constat etiam WEPFERUS de *Cicuta Aquatica*. Pertinent huc, præter opium, sed universus solanorum exercitus, quos inter in specie eminet Nicotiana, hyoscyamus, Datura, stramonium, solanum maniacum, &c. Pertinet huc Pharmacum Phantasticum Bartholetti ex stramonii semine paratum, quo ipso determinare vult Deliria pro lubitu ad certum conceptum & certam imaginationis speciem, pro auditorum aliorum varietate: de quo prolixè agit in *Tractatu de Respirationis Vitiis lib. 3. cap. 1. §. 7. pag. 405. & seqq.* NB: statum est scriptum. Sic opium & opiata, copiosius & frequentius propinata, (uti mos est in Provinciis Orientalibus, in India, Persia, & similibus) similia narcotica nobis Occidentalibus & Septentrionalibus somnum cum insomniis horrendis & admodum terribulis, de demonibus aut spectris inferunt, quasi vexatemur à demonibus, quasi vulneremur & versemur in iurgiis; Orientalibus autem, nempe Turcis, sub somno insomniis suavia, quasi in viridariis versentur in paradiso, ibique hilariter & jucundissime vivant exultat. Conf. M. A. N. C. Ann. 2. *Observat.* 69. Sic hyoscyamus assumptus quibuscumque ridiculum infert delirium cum iurgiis & contumeliis: Vid. BORELLUS *Cens.* 4. *Obs.* 49. ubi refert quendam rusticum cum sua familia ex usu radicis hyoscyami totum fuisse dementatum, ita ut quasi simia varias gesticulosas & ridiculas actiones perageret. Pertinet huc vis narcotica Nucis Metelle Arabum, quæ idem est acque Datura Turcarum, à cuius semine, ad certum pondus dato, risum efficit, aut stultitiam cum risu & iucundia animi hilaritate, & cum insigni liberalitate, ita ut qui sumperit istud semen, liberali manu omnia sua det & offerat, omnia delicta profiteatur, & omnibus jussis obsecundet: ac reverà hyoscyami est species: vid. BARTHOLETUS *loc. alleg.* E contra semen & cortex hyoscyami Peruviani, eodem Autore referente, delirium facit ecstaticum, quo delirantes putant se versare in viridariis in conversatione Angelorum: de huius narcotici vid. Mandelslo in *descriptione itineris India orientalis*, pag. 123. cuius narcotice virtutis medela est acetum; Vid. HOECHSTERUS *decad.* 7. pag. 156. Sicut semen hyoscyami nigri infert deli-

rium cum iurgiis & contumeliis; & semen solani maioris dat delirium, quo se à demonibus vexari & à serpentibus ac satellitibus malè tractari existimant. Plura similia, eaque non inelegantia & admodum curiosa, de esu simodii artificiali quasi dementia per externa excitata, videb. in DOE-RINGIO Tr. de *Opio eiusque virtute*, ubi cap. 7. pag. 72. & 79. Inter alia observat artificialem mentem quandam, quæ epi putant se naufragium pati: Sic etiam idem DOE-RINGIO *loc. cit.* pag. 79. observat mentem similitur ex medicamento, quo egi primò hilares, hinc iracundi, tandem admodum mestii sunt. Sed dementari, stupidos reddi, & Delirium induci ab huiusmodi vegetabilibus narcoticis extra dubium est. An verò semper in diversis subiectis deliria determinata inferant, aut arte per addita ita specificari queant, ut saltem determinatum efficiant delirium, de hoc admodum dubitare quis potest, cum & hyoscyamus pro subiectorum varietate amentias diversas inferat; parit scilicet modo, atque supra de vino monui: Conf. M. A. N. C. Ann. 4. & *Observat.* 124 pag. 124. Huc pertinet crocus, de quo vid. Kitcherus *loc. all.* Sulphura enim vegetabilium minustuta sunt, quia stupefactiva & narcotica sunt; sulphura verò ex regno minerali sunt tantum anodyna, non verò stupefactiva.

Sed præter vegetabilia etiam animalia certa & determinata inferunt Deliria, in specie animalia nobis dicta venenata, & hinc etiam animalia rabida, canis seu felis, &c. Vid. BAUHINUS. Sic in rabie notum est, quod à cane rabido demorsi simile delirium rabiosum contrahant, sub quo in canes semutatos existimant, unde in mores caninos se transformantur: sicut iidem semper hydrophobia seu insigni omnium liquidorum & aquarum metu corripiuntur. Notus quoque præterea est Tarantismus, quando à tarantulis demorsi earundem gestus, telarum texturam, & ad determinatam musicam, amorem, & similia exactè acquirunt. Nota etiam est rabies felina dum tres Helvetii iuvenes à felle rabida interfecta comedentes deliri exinde & rabidi fuerint, ut felium instar ungibus & dentibus se lacerarent, & morficando invicem congressi fuerint: Vid. KIRCHERUS in *Scrutin.* *Pestis* pag. 207. & WEINRI-CHIIUS Tr. de *Monstris*, ubi habet exemplum morum felinorum, ex sanguine felis assumpto inductorum. Quod si militer lupina & suilla rabies pertinet, quorum esu similiter homines in talia deliria feruntur. Exemplum prostant hinc Iude, imprimis apud BAUHINUM, qui habet de rabie canum, luporum, &c. Pertinent huc quoque philtrea, tam vera quam falsa: Falsa sæpius maniam inferunt & furorem; Vera per mumiam animalis conſervationem cum certo subiecto habent simul vim determinandi spiritus animales, ita ut exinde ferantur in determinatam personam sua inclinatione, unde consequenter amor; de quo veri philtrea parandi modo per mumiam naturalis conſervationem cum certo subiecto, & hinc transplantationem infra *Membro 4. Articuli 4.* plura. In Suecia septentrionali est hulo, animal sic dictum voracissimum, cuius pellis pretiosissima, si dormientibus obtegatur, facit insomniis animalicongrua, nempe voracissimi hominis. De marte, quod faciat Delirium ridiculum, vid. BARTHOLETUS *loc. all.* Ab his ergo & similibus externis certo modo determinantur spiritus animales, quatenus horum crasin certo modo alterant, & motum in cerebro variant, ut huius motus occasione anima rationalis exinde tam miros ac deliros formet conceptus, ut antea dixi. Quod quomodo fiat, ut externe admodum determinatum ac specificatum Delirium inducant, certo nondum constat, & adhuc perſerutandum est, cum nulla adhuc Autoris constet opinio, quæ animi scrupulosum, simulque veritatis avidum, possit exſatiare.

Præceteris operosus hic fuit HELMONTIUS in suis scriptis, & hinc MARCVS MARCI *Tract. de Ideis operatricibus*, item *Tract. de Philosophiæ veterum reſtituta*; qui per ideas naturam determinantes negotium explicare nituntur: quæ hypotheſis, si rem exactè consideremus, plausibilis primo videtur, & maxima probabilitate conceptibili nobis imponere solent. Sed tamen si exactius paulo ad rationis structuram examinentur, & ad prima usque fundamenta vera fiat inquisitio, si etiam paulatim in nosmet ipsos faciamus reflexionem, ut possimus concipere, quid & quale sit, & quomodo operari possit talis entitas idealis seu intentionalis & immaterialis sub compage materiæ? aut quomodo hæc ipsa aut involvi aut evolvi possit? certum sum, quod tunc omnis ista idealis imaginatio instar fumi seu vani cuiusdam ideæ subito sit transſparitura & evanitura.

Hinc



Hinc est, quod multi curiosi & exercitati naturæ scrutatores, quos inter meritò refero nonnullos Anglos, & hos inter Dn. BOYLE, non sine nominis honore nominandus, maximè æstimat & admiratur HELMONTIVM, ubi in Praxeos & Philosophiæ naturalis terminis se continet: ubi verò in extravagantias ideales prorumpit, eiusdem somniis quidem indulgendum non verò inherendum arbitrat. Et quidem fundamentum istius opinionis, ex quo subinde probat existentiam talium Idearum HELMONTIO seminalium, MARCO MARCI operatricium dictarum, desumptum est à formatione fœtus, in utero, ejusque per ideam ab imaginatione maturna conceptam transformatione. Hoc ipso tamen obscurum per æquè obscurum declarare nititur, æquè enim obscurum est formationis fœtus & transformationis ejus per maternam imaginationem negotium, quàm tota superstructa eidem *pumparum*, modò allegatorum explicatio; adeo ut obscuri per æquè obscurum declaratio non satisfacere possit nobis. Hæc de delirio à causa externa in genere.

Ea Deliria verò, quæ sunt à causa & occasione interna, adeoque sponte fomitem intra corpus continent, & ipsa pro fomitis interni varietate, & prout diversimode spiritus afficiuntur; nunc sunt varia & diversa, nunc quidem *vaga* sunt seu *indeterminata*, ut in febribus ardentibus & malignis; nunc verò sunt *fixa*, ut in pluribus *melancholicis*, & quasi ad certum obiectum *determinata*. Quod autem à talibus causis internis possint determinari spiritus in suo motu, ut huius occasione depravetur ratiocinatio ad certum obiectum, ac certum superveniat Delirium, per manifestum exemplum declarabo: consideremus v.g. picarescens hic sanè pica est appetitus carbonum, cretæ, hæcicis, &c. delirus, qui tamen excitatur occasione positiva in stomacho fundata: sic etiam ponamus v.g. quendam, qui tempore nocturno in somno patitur distensionem vesicæ ex collecta inibi urina, (vel quando genitura turgescens in vasculis & vesiculis seminalibus irritationem suavem excitat) in talibus certè exinde ita determinantur spiritus animales, ut superveniat somnium: & quidem in priori, quasi emitteret urinam, adeoque stragula permittit; in posteriori verò casu patitur somnium venereum, quo somniando imaginamur, nos exercere venerea negotia cum formosis puellis, indeque etiam seminis excretio seu pollutio nocturna ordinariò succedit. Par ratio est cum pica, in qua determinatum est delirium. Optimè facit huc exemplum istud Venereis imaginariæ: ut enim genitura turgescens trillando infert somnium Venereum, ita etiam simili ferè modo sordes vitiosæ, vel alia quæcunque causa interna, spiritus ad Deliria certa determinare valet. Consideremus ergo hic, quomodo seminis turgescencia inferat somnium Venereum? in quo notorium est, imaginationem ferri in obiectum quasi præsens, quod tamen absens: Rectè enim in dormientibus insomnia dicuntur dormientium deliria; sicuti contra vigiliam Deliria reverà sunt vigilantium insomnia, cum sanè tale quid patiantur delirantes vigilantes, quod patiuntur somniantes. Unde etiam delirantes vigilantes interdum recordantur eorum, quæ sub Delirio fecerunt, interdum verò non; non secus atque fit interdum cum somniis paulo profundioribus, interdum verò obliviscantur: adeo, ut quæ rectè novit declarare naturam & fieri modum insomnia, hic ipse quoque manifestam habebit theoriam deliriorum, quatenus nempe ea ex fomite interno originem habent, cum aliàs notum sit, quod somnia naturali ordine soleant insequi temperatüram, ut vocant, seu naturalem humorum ac spirituum crasin. Istud exemplum de pollutione nocturna curioso potest administrare ansam meditandi insomnia & Deliriorum naturam. Quod etiam pertinet Delirium, dictum Furor uterinus, ubi manifestum est Delirium, ex liquoris seminalis circa genitalia turgescencia, simili ferè ex causa, atque in maribus pollutio nocturna, mulieribus superveniens.

Hæc quoad Generalia.

### ARTICULUS III.

#### DE

#### DELIRIIS A CAUSIS INTERNIS.

**V**T verò singulas & frequentiores eorum, species sigillatim absolvamus, initium faciamus ab iis, quæ à causa interna oriuntur.

Deliria, quæ ab interna oriuntur causa, rursus sunt varia. Et primò quidem sunt vel cum febre, vel sine febre. Delirium cum febre aut levius est, aut gravius: Illud communiter Delirium simplex (nam deliria febrilia proprio speciali nomine carent, tam apud Græcos, quàm Latinos) appellatur: Hoc verò, quod *gravius* & *ferocius*, hodiè *ordinaria* appellatione Phrenitis audit, quod minus *Paraphrenitis*. Delirium sine febre est *Mania*.

### MEMBRUM I.

#### DE

#### PHRENITIDE.

**P**hrenitidem ex inflammatione membranarum cerebri, ejusque substantiæ cineritiæ, oriri vulgò æstimant. De hac Phrenitide ita explicata jam *suprà* l. i. monui, quod nempe secundum primos Medicinæ Autores propriè diaphragmatis inflammationem innuat, secundum quos inflammatio cerebri ejusque membranarum vocata fuerit Sphacelus, malum, ut rarum, ita ut plorimum funestum ac lethale. Verùm cum loquendum sit cum vulgo, sentiendum autem cum paucis, ob id etiam nos hac vice Phrenitidis nomen in vulgari sensu retinebimus, idque imprimis, quia ratione methodi medendi & in diaphragmatis inflammatione, & in sphacelo cerebri, eadem sit curandiratio, quæ in vulgò sic dicta Phrenitide; sicut paraphrenitidis nomine innuimus leviora Deliria.

### CAUSÆ.

Causa ergo universalis tam levioris quàm gravioris delirii febrilis seu Phrenitidis est in genere spirituum animalium varius, velocissimus & confusus in cerebro, præsertim ejus corpore calloso, motus, cujus occasione (dico occasione) fit, ut ratiocinatio & imaginatio pervertantur; unde & post tam varia & minus coherencia phantasmata ab anima efformantur, quorum index & nuntius sunt inconditi sermones, risus aut fletus, flocculorum, quævisque sunt, collectiones, vigilæ, muscarum, quævisque sunt, insolitæ venationes, & variæ artuum motiones, &c. donec aucto & nimis impetuoso, penitusque inordinato facto spirituum jam deficientium motu, convulsiones sepe lethales superveniant, aut tandem spiritibus tantum non absumptis per inconditum narcoticorum usum penitus fixatis, Phrenitis in lethargum, aut in affectum soporositatis potius, mutetur, aut successivè superato malo equabilis ordo ac circuitus spiritibus redeat.

Causa verò remota inconditi istius spirituum animalium motus in cerebro est nimia eorum & cerebri æstus & incallescencia, nunc minor nunc major, idque vel simpliciter ob sanguinis nimiam incallescencia, & phlegmæ in cerebro frequentioris, ex ejus effervescencia nati in *paraphrenitide*, vel ob stagnationem, & exinde membranarum aut corticalis cerebri substantiæ inflammationem in *Phrenitide*, propriè dicta. Cogitemus saltem æstus febrium talium acutarum, & vasa insignia & numerosa ad cerebrum distributa, & tunc huius fervor faciliè & sponte patebit: quod multò magis fiet, si cerebrum ipsum patiatur inflammationem, in quo casu dum cerebrum aded fervore & ardore æstuat, necessarii spiritus animales servidi movebuntur, & imaginatio ratiocinatioque lædentur. Unde primò in principio febrium talium acutarum vigilæ pertinaces tanquam delirii prodromus seu primus gradus ex spirituum continuo motu, secundò in incremento & statu deliria ipsa ex eorundem motu perverso, ac tandem tertio convulsiones, ex spirituum quasi ultimo nixu in membra se mutuo subsequuntur; & hi termini mortis prodromi ferè esse solent.

Ab effervescente ergò insigniter sanguine, & magis adhuc exæstuante hinc cerebro, subtiliores & servidiores redditæ spiritus animales agilius quidem, sed simul confusius & perturbatius in cerebro moventur; unde deliria similia, præsertim in incremento aut principio status febrium talium ardentium continuarum superveniunt, ubi nempe maxima est sanguinis effervescencia. Ubi enim in principio morbi aut incremento, absque tamen insigniori febrili sanguinis effervescencia, vigilæ pertinaces cum leviori delirio innuente se manifestare incipiunt, graviore malignitatis augis latet sub herba, & virus malignum perturbati spirituum animalium motus est origo, ut sit in peste & similibus



bus morbis malignioribus; quod probè observetur pro Praxi. Unde patet, quod *causare mota* sit vel simpliciter cerebri incalescentia, ex sanguinis fervore in febribus benignis & malignis; vel cerebri & ejus membranarum propria inflammatio, ex sanguinis stagnatione ibidem facta, idque in perfecta phrenitide. Subesse autem, præter simplicem cerebri exstuationem, subinde etiam membranarum aut corticis ejus inflammationem, confirmant exempla phreniticorum post mortem dissectorum: Sic enim refert RHODIUS *Cent. 1. Observat. 29.* phreneticum biduo extinctum, in cujus capite apertum cerebrum & membrana ejus cum intenso rubore adeo tumeant, ut faciliè venæ ab ipsius substantia potuerint separari; & *Observat. 40.* Phrenitidem sic dictam à pia matris inflammatione: Sic etiam NICOLAUS FONTANUS in *Analest. cap. 2.* in juvene febre continuâ perniciosâ laborante, symptomatis horrendis stipatâ, ingentem cephalalgiam observavit, accedente vigiliâ & paraphrenitide, ex qua paulatim Phrenitis subnata nullis auxiliis levâri potuit, sed furiosus, amens & inquietus, ac insomnis decimo octavo die occubuit: resecto cranio cerebrum sine læsione fuit, sed maculis sanguineis undique conspersum, & meningis, in specie pia mater, tumida admodum & sanguine nigriusculo turgens visa fuit, & omnes ejusdem rami per cerebrum dispersi, sanguine congrumato tumidi reperti fuerunt: Sic PAW *Observat. Anat. 8.* in cujusdam phrenitide & convulsione mortui cadavere abscissum in cerebello & excisionem duræ matris observavit. Tunc quoque inflammationem membranarum cerebri ejusque corticis adesse suspicio est, quando per metastasin aliarum inflammationum oriuntur Pleuritides, v. g. quando post erysipelas externum, aut post pleuritidem, aut peripneumoniam, aut post anginam subito evanescentes insequitur Phrenitis, inflammatione partæ assuetas saltem mutante: in talibus non dubium est, sanguinem in aliis locis coagulatam, solum verò denuò, stagnare in membranis cerebri, aut ipso cerebro, & ibidem novam inducere inflammationem. Certum ergo est, subinde in deliriis febrium gravioribus inflammationem cerebri & membranarum, non tamen semper, esse.

*Causas* quod attinet remotiores procatarticas, à quibus corpus disponitur ad febres acutas, & consequenter harum pedissequas, deliria, vel simplicia, vel phrenetica: ex variâ quidem sunt, omnes tamen coincidunt cum illis, quæ inferunt sanguini motum impetuosiores & febres ardentes: sic v. g. norum est, quod *ætas juvenilis, ær æstivus, crebrior ebriositas, & abusus potuum generosorum, in specie vini & spiritus vini,* nos reddant admodum promptos uti ad febres ardentes, ita etiam ad deliria & perfectas Phrenitides, uti hoc ferè videmus in ebriosis: Exempla sane! prostant ubivis ex abusu vini juvenum correptorum phrenitide: sic enim HORSTIUS *lib. 2. Observat. 25.* phrenitidem post nimiam vini ingurgitationem refert. *Suppressa quoque sanguinis evacuationes solennes, ut febres, ita etiam stagnationem sanguinis in cerebro, & Phrenitides subinde inferunt:* quâ ratione *ex lochiis puerperæ non citè expurgatis Phrenitidem abortivam* refert HORSTIUS *lib. 2. Observat. 25. & Observat. 26.* idem malum ex retentione hæmorrhoidum in viro annotat. Tandem etiam huc *affectus animi graviores* pertinent: quos inter in specie primatum obtinet ira, quæ admodum nos disponit ad febres acutas, ipsique coniuncta deliria: Sic phrenitidem ex ira sub mensium fluxu hunc coercente referunt BARTHOLINI *Alia Hæst. Volum. 2. pag. 138.* Nam potentes admodum sunt animi affectus, præsertim ira ad inducendas febres ac deliria. Ira enim ipsa per se est febris quasi talis naturalis. Nam in hac sanguis intensius effervesceat circa præcordia, unde & in hac corpus intense calet, facies rubore tincta perspicuo, caput dolet, pulsus est frequentior & maior, ex aucta sanguinis fermentatione; Unde non mirum, si superveniat febris cum delirio, aut etiam Phrenitis. *Febres malignæ quoque, uti monui, sæpissimè conjuncta habent deliria & Phrenitides, tam in principio, quàm in incremento.* Et quidem hæ Phrenitides in febribus malignis supervire solent interdum citra insignem corporis incalescentiam, aut massæ sanguineæ effervescentiam; unde talia deliria in principio cautum reddant Medicum in instituenta cura, ne perditos reddat agros. Omnia illa, quæ febres magis acutas excitant, deliria & Phrenitides inferunt; ita tamen ut Phrenitis, quamvis semper cum febre,

non tamen semper à febre sit. Notabile est, quod refert PLATERUS *lib. 1. Observat. pag. 87.* ubi delirans in febre continua uxorem per vim comprimit, mox expirat; uxor verò mox eodem morbo correpta, licet fuerit sanata, mensamen nunquam se rectè habuit. Denique gonorrhœa virulenta suppressa Phrenitidem quoque intulit, curatam post universalia per J. Philonii Romani à FONTANO *curat. & Resp. lib. 1. pag. 21.*

## DIFFERENTIÆ.

*Differentias* quod attinet: præter has, ut suprà fuit innuatam, quod *deliria febrilia*, Phrenitis & Paraphrenitis, sint nunc *graviores*, nunc *leviores*, eadem porro, in Phrenitide præprimis, sunt nunc *ridicula*, nunc sunt *seria*. Illa sunt, quando ægri varia absurda, incondita, & minus coherentia, cum quadam plus minus hilaritate, interdum & cum risu & aliquali facilitate, proferunt. Serium verò delirium est, quando ægri, quicquid faciunt, quasi alligantisper irati cum impetu, quodam furore & morositate proferunt varia & incondita, idque non tam inscit, ut videri volunt, quàm quod quasi præmeditato & summo studio facto (*κατὰ οὐδὲν*) hoc faciant. Quæ differentia probe observanda propter effatum HIPPOCRATIS dicentis: Quod *deliria ridicula* sint tutiora & minus mala, quàm *deliria seria* aut cum jurgis juncta.

## DIAGNOSIS.

Quoad *Signa* duorum horum deliriorum, Phrenitidis nempe & Paraphrenitidis: primò quidem in febribus necesse est, ut delirium imminens præcognoscatur, ut possimus ejus ferociam præcavere.

Et quidem præsens delirium cuilibet manifestum est, imminens verò, ut præcaveri possit, attendatur.

Imminens autem delirium ferè patet ex quadam garrulitate insolita, & nimia loquendi promptitudine plus minus audaci, & cum ferocia; sicut & imminente delirio insignis mutatio morum adesse solet: ita ut, si is, qui aliàs fuit mitis & facilis in respondendo, fiat nonnihil ferocis & temerarius, aut faciliè proclivis ad iram; & qui antea fuit compositus moribus, & quietus in lecto, jam fiat inquietus; item si is, qui aliàs est taciturnus, evadat loquax, si corpus indecorè moveat (quod signum mortis certum) si etiam corpus aut membra quædam denudet, si eorum, quæ legerit vel locutus fuerit, subito obliviscatur, si eundem sermonem sæpiùs citra rationem repetat; item, si vigiliæ aut cephalalgia pertinales adsint, aut saltem somnus admodum interruptus & turbulentus præcesserit, jaçant membra variè, & mille inconcinnitates solent exercere actionibus & sermonibus, in talibus casibus delirium simplex imminere patet.

Quod si verò jam dicta deliria adsint, ægri solent esse morosi, varia incondita loquuntur, fiunt furiosi, ex lectis proiliunt; accedunt his simul urina primò crassa, mox tenuis, imò diaphana, capitis tactus calidior, item oculi: qui enim, si fiant aliquantisper mobiliores, solito splendidiore & quasi fulgidi & ignei, si fiant quasi rigentes, & aspectus sit nonnihil ferocis, cum adeo rigide aliquem intueantur, faciliè delirium non leve, sed furiosum infallibile cognoscitur; sunt nempe oculi, uti fenestra animi, ita & corporis: unde etiam oculi nimis fulgidi aut pallidiores, aut plūs minus cornei apparentes, insignem virium prostrationem, spirituum ex defectu, innuunt.

Si in principio morbi acuti de dolore in bulbis oculorum seu ophthalmia conqueruntur ægri, funestissimum signum est; imò enim delirium & convulsiones adsunt; quod sæpiùs observavi.

Colores varii ante oculos apparentes, & objecta peregrino colore vestita, convulsiones, deliria, &c. innuunt. Visitavi aliquando ægrum malignâ febre correptum, licet aliàs benè se haberet, dicebat: me indurum esse pallio & veste cærulea; imò omnis niger color cæruleus illi videbatur: signum hoc aderat manè, à meridie subsequerentur delirium & convulsiones, & tandem interibat.

Alvi defectiones & urina interdum sine sensu efflaunt.

Quod si verò porro in delirio febrili adsit inflammatio cerebri, vel potius membranarum ejus, aut verò tantummodo incalescentia nimia, & fervor ejus ac spirituum, adeoque vera modernorum Phrenitis, hisce ferè modis



modis distingui potest: quod nempe tunc, præter delirium summe ferrox, immanis capitis dolor, præprimis circa occiput, adsit in Phrenitide, in qua est inflammatio cerebri, unde hoc sæpius fricant, cum respiratione difficili, magna & tarda, quia non percipiunt ægri, cum febre continua & siti nulla utut hujuscaute adsint. Nam ex natura partis facile patet, quod dolor sit vehementissimus, cum dura mater cerebri simul sit affecta, quæ est sensibilissima.

Dum autem membrana cerebri, aut corticalis ejus substantia, inflammationem patiuntur, non potest non fieri ardoris sensus: unde est, quod veri Phrenetici soleant velere capillos, inscii tamen, propter immanem & acutissimum dolorem, quem percipiunt: Item manus perpetuo capiti admovent, & vario ac quasi furioso motu caput agitant hinc inde: propter quos acerbissimos dolores etiam, adeo brevis est affectus, cum non possint superare spiritus cum immani adeo dolore. Accedunt præterea interdum convulsiones, idque, quando inflammatio cerebri incipit abire in gangrænam: nam omnis inflammationis finis est gangræna, ubi ferocia remittit, & qui antea ex lecto prostrati erant, subito fiunt mites, taciturni, oculis clausis prostrati decumbunt, & lethargici evadunt ægri. Adhuc in vera Phrenitide pulsatio adest vehementissima in & circa caput, de qua etiam ante delirium conqueruntur ægri, quæ, quanta sit? percipitur, si attentè conspiciatur collum; ibi enim arteriæ carotides quàm impetuosissime pulsant propter sanguinem insurrentem, sed ob inflammationem in cerebro stagnantem: Unde etiam Hippocrates pulsationes seu arteriam pulsantem in temporibus prænotium æstimat Phrenitidis imminentiæ.

### PROGNOSIS.

Quod attinet *Prognosin*: Phrenitis omnis malum periculosum est & acutum, imò ut plurimum lethale, cum intra quatuor aut septem dies frequentius terminetur ad mortem, raroque ad salutem, nisi in ætate juvenili & temperamento sanguineo per sudorem aut hæmorrhagiam narium criticam solvatur. Magis tamen est periculosum, in qua simpliciter inflammata sunt membrana vel ipsum cerebrum, nisi vires optime consent; ut plurimum moriuntur ægri: minus periculosum, ubi saltem adest spirituum tantum fervor & sanguinis incalescentia, ut in paraphrenitide & delirio febrili, utpote quæ ex se & per se absque aliis pravis symptomatibus & cum signis criticis parum in recessu habent, cum ordinariis febrium ardentium acutarum & malignarum graviorum symptoma sit.

De cætero, si interdum quadam intervalla habet, melior, quàm in discontinua, observatur: si autem post somnum delirium contingat aut exacerbetur, pessimum est, præprimis non cum risu, sed cum ferocia, hoc fiat; jocosæ verò deliria minus funesta sunt, è quibus ægri facile evadunt.

Si vires mox sint languidæ in vera phrenitide, si difficilis respiratio, si facies cadaverosa, si obliuio rerum adsit, rigor, si floccos legant ægri, stillicidium narium, signum est lethale, & ut plurimum moriuntur ægri.

Quod si caput sudet particulariter sine alio corporis sudore, in specie, si sudor sit glutinosus & subfrigidus, semper lethale signum est.

Si accedant *Phrenitidis convulsiones*, vel diuturnæ vigiliæ, aut cephalalgia, à quibus jam vires attrituæ, aphonia, aut singultus, aut dentium stridor, (quod ex convulsione musculi temporalis provenit) aut vox, lingua & manus tremulæ, aut urinae minustinctæ, aut sæcum & urina infusa deiectio, hæc semper Phrenitidem lethalem innuunt.

Si febre mitescente delirium non cesset, ut plurimum in lethargum, (qui etiam ut plurimum lethalis est) maniam aut melancholiam mutatur.

Phrenitis si mutetur in lethargum, aut affectum comatosum, raro curatur, & ut plurimum lethalis est; extinctionem enim spirituum animalium ferè innuit: hinc notatu digna est observatio ZACUTI LUSITANI lib. 1. *Prax. Admir. Observat. 15.* quavis in illo subiecto somnus non adeo profundus extiterit.

Observandum autem quoad deliria febribus acutis supervenientia: eadem nunc esse symptomatice, speciatim curanda; alia verò esse critica, in quibus naturæ saltem motum observet Medicus, cum ut plurimum hæmorrhagia narium critica insequi solet; quæ probe distinguenda à symptomatice, quoniam symptomatice curare debet Medi-

cus, critica verò omnino intacta relinquere, & cōsistere expectare.

*Signa ergo delirii critici*, quod ut plurimum hæmorrhagiarum sequitur, sunt sequentia: Si coctionis signa appareant in urina, & pulsus sit inæqualis, nonnihil magnus & nonnihil validus; Item tranquillitas quædam in symptomatibus sit ingro; si ex oculis splendores videantur elici; si delirium superveniat subito natam cephalalgiam; Item si adsint circa aures murmura, aut strepitus vel sonitus; si nares pruriant; si facies rubeat, & adsit tensio molli hypochondriorum, etas sit juvenilis, & forsan aliæ eger consuetus sit sanguinem per nares excernere: Vid. SENERTUS in *Instit. ubi de sign. criseos*. In tali delirio caveat Medicus, ne illud solvat, quia est motus naturæ, & imminet crisis.

Quoad delirium criticum, cui, ut dixi, hæmorrhagia narium ut plurimum succedit; & tale delirium est salutare & saluberrimum; reliqua symptomata semper sunt suspecta. Reliqua verò, quæ apparent cum signis cruditatis, diuturnis vigiliis & pulsu malo, sunt symptomatice.

NB. Rarius apud nos crises contingunt.

### CURA.

In Cura deliriorum, tam simplicium quàm phreneticorum, ante omnia

1. Sanguinis turgescentia febrilis compescenda, imprimis sanguinem evacuando, & eius stagnationem, & inde natam cerebri membranarum inflammationem in phrenitide vera, resolvendo ac maturè discutendo.

2. Inde natus spirituum fervor, & impetuosus ac perversus motus, figentibus nonnihil, tam internis quàm externis, compescendus est & sistendus. Adeoque cum delirium saltem sit symptoma in his febribus, unde principali morbo curato, nempe febre, ipsum delirium evanescit sponte, & huius ratione saltem anodyna interna, & hinc varia externa saltem conveniunt.

Aliàs eadem serè febrium cum deliriis conjunctarum, ipsarumque Phrenitidum, curandi est ratio, quæ esse solet in aliis febribus acutis, in specie cum inflammatione conjunctis. Delirium autem si criticum fuerit, vix peculiarem indicationem habet.

Proinde instituenda Cura observandum:

I. Ut sibi caveat Medicus, imprimis junior, ne ad ebrium vocatus ejus cum morbo delirioso correpti aut phrenetici curationem instituat, ut aliquando factum fuisse ab incautis Medicis observatum fuit: (vid. BARTHOLETUS, & HENRICUS ab HEER,) ne hac occasione se risui exponat ignavo, popello.

II. Quod cum phrenitide & deliriis effusus sit spirituum motus, hinc somnus deficiat, seu agrypnia & cephalalgia adsit, quæ delirium admodum exasperant, subinde blandis anodynis, & hypnoticis plus minus narcoticis utendum erit, idque tam in medicamentis internis, quàm externis. Cautè autem usurpentur talia internè, in specie opiata: Nam si opiata non sistant spiritus, eorumque motum compescant, potius delirium gravius reddunt, cum ipsum opium somnia turbulenta & truculenta inducat. Sin verò narcoticis nimis continuatis spiritus nimis figantur, metus est, ne ægrum sopiendo idem non possit amplius exsuscitari, aut metus est, ne per opiata phrenitis in lethargum transmutetur. Cum enim spiritus in Phrenitide sint admodum volatiles & subtiles, & simul propter motum continuum autum pauci, ob id facile ex narcoticorum dosi aucta permutari in lethargum seu carum potest, quæ mutatio est periculosissima. Certum est, quod opiata legitime adhibita sint magna remedia, & quæ optimo cum successu in deliriis febrilibus usurpantur; verùm si opiata tempore non opportuno, aut non legitime parata, adhibeantur, plus nocent, quàm profunt.

In eorum ergo usu observetur:

1. Quod pro usu febrili legitime præparanda sint, in morbis quidem hujusmodi ardentibus & acutis cum Acidis, nempe aceto.

2. Ratione temporis adhibeantur opiata non nimis tardè, sed maturè, nempe in incremento morbi, dum æger pertinacius vigilat, & delirium imminet; melius enim est, tempore vigiliarum, quàm delirii, adhibere narcotica. Non adhibeantur statim in principio, neque statu morbi: quia in principio morbi turbant naturæ motum; in statu verò eorum



eorum usus frustraneus & magis adhuc nocivus est, dum somnum non inducunt, delirium ingravescit.

3. Nec viribus jamdum fractis, ne veterum similesque affectus comatosos excitent: vid. RIVERIUS *Prax. lib. 1. cap. 12.* & WILLISIUS de *Anima Brutor. lib. 2. cap. 10.* quamvis etiam se primo delirii die ZACUTUS LUSITANUS Philonium Romanum cum successu se dedisse *lib. 1. Prax. Admir. Observat. 16.* perhibeat.

4. Ut his Opiatis semper addantur appropriata, diaphoretica, & bezoardica, v. g. antimonialia fixa, cinnabaris antimonii, antimonium diaphoreticum, bezoardicum Joviale, cranium humanum, &c. non tantum, quod in talibus febribus dolorosis, ipsaque phrenitide, sæpius subsit malignitas, sed etiam, quia blanda diaphoresi concitata effervescencia sanguinis febrilis insigniter placatur & mitigatur. Vnde etiam per consequens talibus ipsa Phrenitis non raro tollitur.

III. Observandum, quod in delirio phrenitico ante omnia larga venæsectio sit instituenda, quò citius, eò melius, nisi tempus & conditio febris, v. g. malignitas juncta, illam inhibeat: cum è contrà, si febris symptomatrica, semper locum habeat. Si ergo fuerit febris ardens phrenetica, absque insigniore malignitate, optimè convenit hæc ipsa; aut licet adsit malignitas, illa etiam in principio, imò sine tanto periculo, commodè potest secari vena. Larga autem sit venæsectio, cum morbus sit peracutus, vid. ZACUTUS LUSITANUS *lib. 1. de Medic. Princip. Hist. 16.* ut hoc medio acquiramus occasionem mellius adhibendi remedium, ne in pejus malum cedat. In specie in inflammatoria plus minus constitutione membranarum cerebri larga sit venæsectio, autore LINDANO, qui refert: suum parentem cum D. TULPIO viro cuidam phrenetico prima die uncias triginta sex sanguinis emisisse, tertia die totidem, & quarto die uncias viginti quinque; sic enim, inquit, Medicus, si adest furor, Medicum se prestare debet. Verùm in ipsa venæsectione quoad locum est notandum:

1. Quod si forsan præcesserit suppressa quadam sanguinis evacuatio, ut in puerperis, in partibus inferioribus, nempe intalo, & postmodum in brachijs secanda sit vena; sicuti in genere in Phrenitide, si repetenda fuerit, in quocunque casu primò vena poplitea pro revulsione, hinc in brachio pro aversione, imò tandem in fronte pro derivatione, commodè celebretur: quamvis si necessitas urgeat, & ubi in extremis commodè venam secare non licet, statim ad venæ frontis similitumque vicinarum, a pertura transire liceat: vid. ZACUTUS LUSITANUS *lib. 1. de Med. Princ. Hist. 10. Observ. 12. & lib. 1. Prax. Admir. Obs. 13.* ac RIVERIUS *loco all.* De arteriotomiæ temporum usu in phreneticis multum laudat: vid. PANAROLLVS *Pent. 1. obs. 30.* Loco venæ frontis forsan cucurbitula scarificata locum habent, quâ syncopei admodum Phrenitidem confirmatam curavit Zacutus Lusitanus *lib. 1. Prax. Admir. obs. 11.* Observandum ulterius;
2. Quod tempore venæsectionis Medicus ponat manum super carpum ægri, ut ex pulsu cognoscat, quando forsan sit sufficiens sanguinis evacuatio; item ut ex pulsu cognoscat, an æger sit apino defecturus? & magis vel minus sciat sanguinis evacuationem?
3. In ipsa sanguinis evacuatione subindè digito foramen obturandum est, denuo aperiendum ac denuò obturandum, bis vel ter repetendo, donec sufficiens sanguinis quantitas sit extravasata; sic enim cum melliori euphoria & minori ægri debilitate sanguis evacuetur.

IV. Observandum: In topicis seu externis, utut aliquanti speraceti addere quibusdam placeat; tamen non nimium ejus addendum, quoniam odoratu suo acril somnum impedit, & vigilias & agrypnias auget, utur somnus ad deliria sistenda optimus sit. Vnde etiam pimisgrayia odorata in externis sunt vitanda, ne talibus volatilibus augeatur Phrenitis propter continuam spirituum incitationem, utut camphora videatur excipienda, quæ in deliriis quibusvis, præsertim febrilibus, tam interno quàm externo usu, singulare quid obtinet.

Medicamenta ergò, quæ conveniunt in cura deliriorum febrilium, ac ipsa adeò Phrenitide, non sunt adeò prægnantia, quia deliratio est symptoma superveniens morbis: Vnde patet, quod morbo primario curato, delirium sponte cesserit, & quod saltem delirium, quæ tale, oplata internè & externè, ut & refrigerantia, imminuat: ipse verò morbus primarius, nempe febris ardens, aut benigna aut maligna, aut inflammatio cerebri, methodo ordinaria curandus sit. Adeoque conveniunt sudorifera & diaphoretica, v. g. bezoardica, sulphurea, strimomialia, cinnabarina, item succi vegetabilium subacidi, granatorum, ribium & berberum; Porrò serum lactis, & cum eo parati lulebi; item aqua anagallidis, aqua verbenæ, aqua nymphæ, papaver erraticum, & omnia ex eodem remedia: v. g.

24. *Aque Anagallid.*

*Portulac.*

*Nymph. an. 3ij.*

*Syr. Nymph.*

*Papav. simpl. an. 3vj.*

*M. S.*

*Potio refrigerans.*

Item conveniunt *spiritus acidi minerales vitrioli, salis, sulphuris; in specie spiritus nitri dulcis, & spiritus salis dulcis, Tinctura papaveris rhæodas &c.* compescit effervescentiam sanguinis, figitque parumper sanguinem ob vitrioli phlegma, quod BASILIUS VALENTINUS spiritum ecclesiem vocat. HELMONT. varia ex hoc phlegmate habet. Item camphora cum aliis, imprimis cum nitro, propinatur commodè. Hæc enim licet sit volatilissimum & penetrantissimum remedium, tamen virtute quadam singulari spirituum nonnihil fixativa & narcotica pollet, unde etiam tam egregie in Phrenitide curanda cum aliis externè & internè convenit. Internè præscribitur unà cum opio in potionibus sudoriferis; sed tunc opii dosis nonnihil imminuenda, quando simul præscribitur camphora, quod ego ita semper observo: e. g.

24. *Conf. flor. papav. err. nitriolat. 3ß.*

*Laud. opiat. Lang. gr. j.*

*Camph. gr. ij.*

*M. D. S.*

*Compescens saccharum nespertinum.*

Externè epithematibus & frontalibus commodè etiam additur. Saccharum Saturni cum spiritu nitri factum, & medicamenta similia saturnina similiter commendantur ad phrenitidem. *Mixtura ulterius simplex tinctura bezoardica, uti etiam nitrum antimoniatum largiter in potu ordinario dissolutum, frequentius in usu esse solent.* Hisce addatur tanquam singulare specificum *herba & flores anagallidis flore phæniceo, usu interno & externo ad delicta febriom admodum commendata; de qua vid. GABELCHOVE RTS Cent. 6. Curat. 13.* qui refert, quod sit in febribus phreneticis & paraphreneticis experientia frequenti compertum remedium: habet decoctum anagallidis flore rubeo: præcipit ut manipuli duo anagallidis hujus decoquantur in vini & aque ana mensurâ semis, ad consumptionem tertie partis, de quo decocto manè & vespere detur bonus haustus; simulque fiat ex ista planta sacculus interpassatus, similiter in prædicto decocto humectandus, & ita futura coronali extrinsecus applicandus; ubi exsiccatus fuerit, denuò humectetur. Confirmat hoc HILDESHEIM in suo *specie leg.* quia deliria febrilia & phrenitica commendat hoc decoctum:

24. *Herb. Anagall. cum flore M. ij.*

*Coron. cap. papav. albi No. xx.*

Hæc contusa invicem coquenda dicit in 3vj. *mini Maluatici & Rhenani* ad casum 3vi. colaturam fortissima expressione trahit, & pro duabus vicibus hauriendam propinæ in *Spicileg. 2. pag. 150.*

Exillimare tamen, generosum hunc nimis esse potum: propterea aquam simplicem cum paucis vino Rhenano acuatam potius seligerem.

Post anagallidem etiam est lauca, nymphaea, sed omni majus; item semina quatuor frigida majora, & papaveris, & exinde paratæ emulsionēs: e. g.

24. *Sem. 4. frig. mai. an. 3ij.*

*Papav. alb. 3iij.*

*Cum f. q. aque Portulac. f. Emulsio:*

*cui adde*

*Cran. hum. sine igne 3ß.*

*Bezoard. mincr. 3j.*

*Syr. Portulac. 3ß.*



M. D. S.

*Emulsio bezoardica pro aliquot dosibus.*

Sed juxta hæc primatum obtinent opiata legitimè applicata, quæ delirii respectu sunt convenientissima; quod perinet syrupus papaveris albi, qui est magis usitatus, quam de papavere nigro, emulsiones papaverinæ, & laudanum opiatum. BARTHOLETUS non immeritò commendat essentiam opii cum spiritu vitrioli volatili paratam. Veteres in usu habuerunt Philonium Romanum, syrupos diacodion, Requiem Nicolai, & similia; loco quorum nos hodie Laudanis opiatibus utimur. HORSTIVS aliquando curavit Phrenitidem post vini generosioris abusum per potionem narcoticam ex uncis duabus syrupi papaveris, aliis additis, idque jam die sexto, uti refert lib. 2. *Observat.* 12. Pariter atque FONTANVS in *Cur. & Respons.* lib. 1. pag. 20. refert juvenem viginti duorum annorum ex gonorrhoea virulenta Phrenitide correptum, qui post universalia remedia per drachmam unam Philonii Romani fuit curatus. Præscribi ergo potest in Phrenitide speciatim maligna sequens pulvis:

℞. Cinnab. antimoni gr. xij. ad xv.  
Bezoard. Lunar. gr. vj. vel viij.  
Laud. opiat.

Camph. an. gr. j. vel gr. iij.

(vel laud. opiat. gr. j.)

Camph. gr. ii.)

M. f. pulvis:

Dentur 1. doses: S.

*Pulvis cephalicus bezoardicus.*

Propinetur in decocto Anagallidis rubræ, vel in aqua anagallidis, aut in emulsionem tenui seminis papaveris albi, parata cum aqua anagallidis, oymphææ, hyperici, & similibus. Item

℞. Specif. cephal. ℞j.

Sacch. Saturni gr. vi.

Camph. gr. ii.

Laud. opiat. gr. iij.

M. f. pulvis: S.

ut antè.

Juxta hæc simul pro scopo alterativo & Julebi aciduli, in specie spiritus nitri dulcis, propinquantur, dum effervescenciam sanguinis compescunt; quibus pro alvo referenda, si adsit obstructa, commodè tamarindi incoqui possunt, quia laxant blandè, & simul sanguinis effervescenciam plus minus compescunt. Revulsionis scopo etiam cæteris paribus satisfacerent clystères, modò eosdem applicare commodè liceret.

Inter Externa prærevulsionis scopo commendantur admodum cataplasmata plantis pedum admoveenda ex ruta, chamomilla, verbenæ, radice bryoniæ, & sapone; vel cataplasma ex raphano, sale, & fermento cum aceto acerrimo l. i. in delirio febrili præscriptum; item sedum mains contusum & instar cataplasmatibus cum aceto spinæ dorsii, plantis pedum, & testibus applicatum.

Vel

℞. Succ. semperviv. mai. rec. express. ℞vj.

Acet. vini acerr. ℞ij.

Nitri ℞ij.

Camph. ℞ij.

M. pro Epithemate,

Plantis pedum & testibus applicando:

D. S.

*Epithema externum.*

Item commendantur pedum lotiones à MERCATO commendatæ, aut vesicatoria brachiis aut cruribus admodum. Discutiendo operantur cataplasmata ex porulaca ac sempervivo recentibus & rosis, similibusque refrigerantibus, capiti raso, fronti & temporibus largiter imposita; quibus etiam nonnulli addunt nymphaeam, chamomillam, & melilotum. BARTHOLETUS Tr. de Dysp. in graviore delirio quasi phrenitico commendat carnem cucurbitæ contusam, & abrafo capiti impositam, quæ præter omnem spem desperatus phreniticus fuit curatus: Facit etiam huc observatio BORELLI Cent. 4. *Observat.* 24. de rustico, qui alterum phreneticum per taleolas cucurbitæ capiti impositas curavit: Confirmant etiam hæc, quæ habet GABELCHOVERUS Cent. 3. *Curat.* 23. in schol. quod scilicet, si excavetur cucurbita per medium dissecta, & in utramque cavitatem æger immitat pedem ad tempus, idque cum cucurbita recenti tribus vicibus repetatur, tollat insigniter & fervorem febrilem;

& etiam ipsum delirium phreneticum. Commodè etiam plantis pedum & sincipiti ad moveri potest cataplasma & epithema ex sedo majore & aceto superius laudatum, quia fervorem cerebri, & spirituum motum, adeoque delirium blandè demulcet; sed detrahatur, quando æger incipit dormire. RIVERIUS lib. 1. *Prax. cap.* 12. commendat cum lacte muliebri Epithema fronti admoveendum, conducit ex mastiche & myrrha cum tinctura fantali; vid. descriptionem in RIVERO loc. alleg. pag. 117. Decoctum radices mandragoræ & hyoscyami, cum similibus externè applicatum tepidè fronti, commendatur ceu expertum à ZACUTO LUSITANO. Egregius quoque est succus cancerorum fluviatilium vivorum recentè expressus, qui ad imitationem RULANDI sub epithematis forma largiter fronti applicatus mirificè confert: Sicuti idem RULANDUS sequens epithema compositum de opio cum lineis duplicatis temporibus utiliter admoveat:

℞. Aqua Rosar. ℞z.

Opii ℞j.

Croci ℞j.

Misc. pro Epithemate.

Cum lineis duplicatis tepidè fronti admoveatur. Nam, sic blando conciliato somno mens redit.

Vel fiat epithema ad imitationem HARTMANNI *Prax. cap.* 8. §. 4. ubi & alia externa opiata præscribuntur. BARTHOLETUS commendat usum aquæ spermatis ranarum extrinsecus applicatum (& credo, quod spermæ ranarum, ejusque ritè destillata aqua, sit potens remedium fronti & temporibus crebro applicatum.) Potentius est, si misceatur cum succo cancerorum fluviatilium, addendo opium & camphoram, ut fiat epithema cephalicum compositum, ad imitationem RULANDI, quod credo non futurum inelegans hoc modo:

℞. Sperm. ranar. per transcolat. vel aqua sper. ranar. ℞vj. vel viij.

Succ. cancer. fluvi. rec. expr. ℞ij. liij. vel iv.

Opii acetosolut. ℞ij. ad ℞ij.

Camph.

Croci an. gr. vj. viij. vel ℞ij.

M. pro Epithemate.

D. S. ut supra.

Vel

℞. Succ. cancer. fluvi. cum aqua sperm. ran. par. ℞vi.

Acet. rosar. ℞ij.

Theriac. Androm. ℞ij.

Camph. ℞ij.

Croci gr. vi.

M. pro Epithemate.

D. S. ut supra.

Tepidè vel subfrigidè sincipiti, fronti, ac temporibus admoveatur.

Veteribus in cura Phrenitidis frequenti & felici in usu fuit, animalcula viva, v.g. ascleres, anates, catellos, gallinas, columbas aut palumbes, per medium dissecta, & ita cruenta ac calida sincipiti aut toti capiti raso applicare: conf. HARTMANNVS cit. loc. 9. 7. quæ remedia ratio è schola GALENI ad nos dimanavit; nihilominus tamen iam apud nos ferè in desuetudinem abiit. LINDANVS interim dicit; hoc remedium esse inestimabile ad curandam Phrenitidem, qui curat phreniticos sanguinem mittendo primum, hinc propinando sub noctem opium præparatum, vel uncias duas syrupi papaveris: Tum adhibet columbam viventem, vel gallum viventem, vel catellum vivum; quæ animalia secant per pectus, & statim cum omnibus intertaneis ita applicat capiti, si fieri potest, raso. Et applicato ita animalculo imponuntur lintea, vel culcitra, ne subito cesset omnis calor: mirum, dicit, quantum juvent hæc animalcula; in quo etiam consentit HARTMANNVS cit. loc. Remoto uno, post hoc subito applicetur aliud, idque aliquoties repetatur, donec dolor cesset, & ipsum delirium immineatur. Dicit, si per horam relinquatur, & postmodum removeatur, horrendum emergere fetorem ex animali applicato, ut necesse sit, subito immergere in aquas propter fetorem intensissimum. Animalia verò illa non statim in principio admoveantur ubi affluxum potius augerent. Præter hæc & similia observanda sunt ea, quæ aliàs conveniunt in febribus ardentibus:

Fit interdum, ut phrenitici non percipientes urinæ stimu-



stimulum, continuò eandem retineant non absque nocu-  
mento. In tali casu imposita perineo cepæ coctæ cum  
pinguedine asnerina urinam provocant: Aut

24. Fol. Parietar. M. j.  
Herb. Petrosel. cum rad. M. j.  
f. decoctio cum aqua:  
Pulpe contusa  
adde  
Olei scorp. ℥ij.  
Ecita f. Cataplasma pro pube.  
D. S.  
Urinam provocans episthema.

Post sotum:

24. Ping. Cunic. vel Urgu. dialth. ℥j.  
Olei Scorpion. ℥ij.  
M. S.

Urinam provocans unguentum.

Illinatur, quod solum etiam sine Cataplasmate adhibe-  
tur.

Absolvimus Phrenitidem & deliria à causa interna,  
cum febre: Pergo jam ad reliquas deliriorum species, &  
imprimis quidem à causa interna oriundas, sed sine febre;  
nam de deliriis à causa externa alio tempore.

## MEMBRUM II

### DE

## DELIRIIS MELANCHOLICIS.

**D**eliria hæc vulgò generali nomine Deliria Melan-  
cholica appellantur; eaque vel simpliciter talia &  
miltiora; vel in summo gradu mania seu graviora; &  
per se absque febre affligere solent, aut saltem in paroxys-  
mo graviore aliquid febrile subesse videtur, dum possum  
celeritatem & frequentioribus habent, estimationibus corpo-  
ris vagis & capitis, in specie incallescencia, vexantur, sicut  
tamen nulla adest, nec propriè febris dici potest, quanquam  
FORESTUS observat. lib. 10. Observat. 7. in schol. Me-  
lancholicorum feblicitantium exempla describat.

De his ante omnia observetur; aliud esse melancholicum  
affectum seu Melancholiam, & aliud esse Delirium Melan-  
cholicum quæ non confundenda; Rectè enim hæc duo di-  
stinguit STEPHANUS in Oper. Med. Comment. de Morbis  
Uing. pag. 41. & exactè observanda monet. Nam affectus  
melancholicus seu Melancholia est, quando homo sit non-  
nihil morosus & morosus, cum omnium ferè rerum aliis  
gratarum abominatione, quin subinde facillè irascatur, &  
quidem sine manifesta causa, si ipsi nihil arripit, si tristis  
& cogitabundus est, sine occasione externa; item quando  
interdum facillè terretur, quando circa manifestam causam  
angustias & anxietates quasdam circa præcordia percipit,  
& quasi rei gravissimæ perpetrare sibi conscius esset, & si-  
miles cogitationes oriuntur; dicunt: Cælum & terram  
ipsis angusta esse, sentire cordis gravitatem, neque scire,  
quid sibi velit. Hæc & similia sunt propriè Melancholia  
seu affectus Melancholicus.

Postmodum verò, ubi talibus subiectis supervenit tan-  
dem phantasma, constituit Delirium Melancholicum, &  
dat delirantem ex Melancholia, quod est morbus secunda-  
rius, ex causa externa sapissimè proveniens; affectus ve-  
rò ipse Melancholicus est morbus primarius, fomitem hæc  
bens ut plurimum internum. Scilicet aliud est ipse affectus,  
& aliud est ipsi adjunctum seu superveniens Delirium, oc-  
casionem ut plurimum externam agnoscens. Videmus hoc  
in nobis ipsis, quando nempe hyberno tempore ex tempe-  
state obscura nubilosa humida & ingrata reddimur Melan-  
cholici, anxii & tristes sumus, sentimus gravamen quod-  
dam non bene explicabile, facillè irascimur, est sane hic  
affectus à causa externa, ex mutatione tempestatum oriun-  
dus, & quasi affectus Melancholicus naturalis; ad cuius  
imitationem quidam à causa interna sunt morbosè Melan-  
cholici, quibus Delirium Melancholicum supervenit, pro  
varietate objectorum, phantasmatum ac symptomatum  
varium. Nempe aliud est amorosum severoticum, aliud  
ridiculum, aliud rabiosum, aliud Melancholicum mania-  
cum desperandum, metichiosum, &c.

Melancholia hæc sine delirio simpliciter solet vocari apud  
Præticos perturbatio mentis, quæ perturbationes men-  
tis Melancholicæ satis sunt frequentes, ita ut adhuc recta

ratio sine delirio constet: Sic PLATERUS observat talem  
animi perturbationem in muliere, quæ subinde stimula-  
batur, ut interficeret infantem; erat tamen adhuc compos  
restitutionis, & resistebat istis cogitationibus. Et hæc est  
perturbatio Melancholica, non verò perfectum delirium:  
sicuti talis animi perturbatio est, quod idem refert P. L. A-  
TERUS de quadam muliere, quæ subinde impellebatur  
ad maledicendum Deo; ipsa verò sana rectâ ratione resiste-  
bat his cogitationibus malis, adeoque erat tantum pertur-  
batio animi, non verò Delirium Melancholicum. His er-  
gò taliter constitutis citra manifestam causam, si interdum  
tandem superveniat Delirium, hi ipsi rectè Delirio Me-  
lancholico dicuntur affligi.

Dicitur Melancholia & delirium Melancholicum, non  
quod semper cum mœrore & tristitia conjunctum sit, ut  
vulgè equidem volunt, & falsò; (nam etiam dantur De-  
liria ridícula, in quibus admodum sunt læti & hilares egro-  
tantes) sed propterea dicitur Melancholicum, quod oriri  
dicatur ab humore Melancholico secundum Veteres, id est  
vitioso acido fixo.

Verùm Varia Melancholicorum delirantium sunt exem-  
pla, admodum inter se diversa, omnia tamen quoad Theo-  
riam in certis quibusdam punctis fundamentalibus, in quibus  
radix consistit, conveniunt. Et

I. Quoad Theoriam quidem, quod in omnibus deliran-  
tibus & Melancholicis talibus observetur cogitatio & medi-  
tatio intensa & assidua, defixa in uno saltem objecto; ut ut  
interdum aliquot objecta ordine sibi invicem succedant, à  
quibus unum Delirium diversimodè variatur, circa eadem  
tamen objecta occupata continuò videbitur, ut infra ex  
exemplis constabit.

II. Omnestales agriatmidi, anxiosi nonnihil, & quasi  
in angustias constituti videntur, adeoque quacunque vi-  
dent vel audiunt, sibi pejora & periculosiora persuadent: &  
licet interdum videantur esse ridentes, hilares & læti, v.g.  
quando quis putat, se esse divitem; nihilominus tamen  
non est reverà hilaritas, non vetum gaudium, sed potius est  
apparens, & aliquid conjunctum cum risu sardonico; est-  
que hæc hilaritas tantum transitoria, & facillè succedit no-  
vus mœror & præcordiorum anxietas, sine causa iterum  
eorum vident, & parum aut nihil omnino dormiunt, imò  
licet etiam Principes & Monarchas magnos se concipiant,  
adeoque fastuosi potius videantur, anguntur nihilominus  
cultu & veneratione ipsis denegata. Rectè itaque A. R. E.  
TÆUS lib. 1. de Caus. & sign. Morb. diuturn. cap. 3. descri-  
bit Melancholiam, quod sit animi angor in una cogitatione  
defixus atque inhærens, absque febre & furore, à phantaf-  
mate Melancholico ortus.

III. Omnes somnum admodum paucum & turbulentum  
satis patiuntur, & cum insomniis gravioribus, ita ut expe-  
rientia testetur, quosdam ipso malo inveterato plures non sal-  
tem noctes, sed septimanas & annos quoque, insomnes  
transgisse; aut si capiunt somnum, turbulentus is est, cum  
turbulentis insomniis, adeoque cum terrore evigilant.

IV. In hoc conveniunt ferè omnes, quod Deliria subin-  
de remittant, ita ut recta ratio restituta denuò videatur; su-  
binde tamen vel pro diversitate causarum internarum, v.g.  
fluxus menstrui imminenti, vel externarum, scilicet sub  
mutationibus tempestatum insignioribus, vel ex luna moti-  
bus, vel mutatione temporum anni, vel etiam, idque  
sepius ex gravioribus animi pathematibus, subinde recur-  
rat & recidant.

V. Quoad Praxin; in hoc conveniunt Melancholici inter  
se, quod malum sit contumacissimum, & nulli ferè cedat  
art, quin interdum citra adjumentum Medici, & quidem  
in eisdem dedecus, sponte non raro remittat; idque imprimis  
per insignem quandam in dicta mutationem, v.g. æ-  
ris, victus, motus corporis, &c.

VI. Quod in his non tam ad caput, quam massam san-  
guineam, & imprimis ad viscera abdominalis in hypochon-  
driis sita, sit respiciendum, quoad curationis fundamen-  
tum. In hypochondriis enim semper nidus & fomes morbi  
Melancholici est, superveniens tandem Delirium; Un-  
de à vomitoriis imprimis curatio & inchoanda & persequen-  
da: Imò non dari puto Delirium Melancholicum absque  
Melancholia hypochondriaca, quæ non habeat fomitem in  
hypochondriis. Sicut enim Pica, quæ est Delirium mulie-  
rum picantium, idcirco objectum aliquod fomitem in sto-  
macho habens; ita etiam Deliria Melancholica habent ut  
plurimum interdum sedem in hypochondriis & primis viis.  
Hinc etiam primariè cura per vomitoria instituenda est; nam  
ita



M. D. S.

*Emulsio bezoardica pro aliquot dosibus.*

Sed juxta hæc primatum obtinent opiatâ legitime applicata, quæ delirii respectu sunt convenientissima; quod pertinet Syrupus papaveris albi, qui est magis usitatus, quàm de papavere nigro, emulsiones papaverinæ, & laudanum opiatum. BARTHOLETUS non immerito commendat essentiam opii cum spiritu vitrioli volatili paratam. Veteres in usu habuerunt Philonium Romanum, Syrupos diacodion, Requiem Nicolai, & similia; loco quorum nos hodie Laudanis opiatâ utimur. HORSTIVS aliquando curavit Phrenitidem post vini generosioris abusum per potionem narcoticam ex unclis duabus Syrupi papaveris, allis additis, idque jam die sexto, uti refert lib. 2. *Observat.* 12. Pariter atque FONTANVS in *Curr. & Respons.* lib. 1. pag. 20. refert juvenem viginti duorum annorum ex gonorrhœa virulenta Phrenitide correptum, qui post universalia remedia per drachmam unam Philonii Romani fuit curatus. Prescribere ergo potest in Phrenitide speciatim maligna sequens pulvis:

℞. Cinnab. antimonii gr. xij. ad xv.  
Bezoard. Lunar. gr. vj. vel viij.  
Laud. opiat.

Camph. an. gr. i. vel gr. iij.

(vel laud. opiat. gr. i.)

Camph. gr. ii.)

M. f. pulvis:

Dentur 2. doses: S.

Pulvis cephalicus bezoardicus.

Propinetur in decocto Anagallidis rubræ, vel in aqua anagallidis, aut in emulsionem tenui seminis papaveris albi, paratam aqua anagallidis, nymphææ, hyperici, & similibus. Item

℞. Specif. cephal. ℞.

Sacch. Saturni gr. vi.

Camph. gr. ii.

Laud. opiat. gr. iij.

M. f. pulvis: S.

ut antè.

Juxta hæc simul pro scopo alterativo & Julebi aciduli, in specie spiritus nitri dulcis, propinantur, dum effervescenciam sanguinis compescunt; quibus pro alvo referenda, si adsit obstructa, commodè tamarindi Incoqui possunt, quia laxant blandè, & simul sanguinis effervescenciam plus minus compescunt. Revulsionis scopo etiam cæteris paribus satisfacerent clysteres, modò eosdem applicare commodè liceret.

Inter Externa pro revulsionis scopo commendantur admodum cataplasmata plantis pedum admoveenda ex ruta, chamomilla, verbena, radice bryoniæ, & sapone; vel cataplasma ex raphano, sale, & fermento cum aceto acerrimo i. e. in delirio febrili præscriptum; item sedum maine contusum & instar cataplasmatâ cum aceto spinæ dorsî, plantis pedum, & testibus applicatum.

Vel

℞. Succ. semperviv. mai. rec. express. ℞vj.

Acet. vini acerr. ℞ij.

Nitri ℞ij.

Camph. ℞ij.

M. pro Epithemate,

Plantis pedum & testibus applicando:

D. S.

Epithema externum.

Item commendantur pedum lotiones à MERCATO commendatæ, aut vesicatoria brachiis aut cruribus admo-  
ta. Discutiendo operantur cataplasmata ex porculaca ac sempervivo recentibus & rosis, similibusque refrigerantibus, capiti raso, fronti & temporibus largiter imposita; quibus etiam nonnulli addunt nymphæam, chamomillam, & melilotum. BARTHOLETUS Tr. de Dysp. in graviore delirio quasi phrenitico commendat carnem cucurbitæ contusam, & abrafo capiti impositam, quâ præter omnem spem desperatus phreniticus fuit curatus: Facit etiam huc observatio BORELLI Cent. 4. *Observat.* 94. de rustico, qui alterum phreneticum per taleolas cucurbitæ capiti impositas curavit: Confirmant etiam hæc, quæ habet GABELCHOVERUS Cent. 3. *Curat.* 23. in schol. quod scilicet, si excavetur cucurbita per medium dissecta, & in utramque cavitatem æger immittat pedem ad tempus, idque cum cucurbita recenti tribus vicibus repetatur, tollat insigniter & fervorem febrilem;

& etiam ipsum delirium phreneticum. Commodè etiam plantis pedum & sincipiti ad moveri potest cataplasma & epithema ex sedo majori & aceto superius laudatum, quia fervorem cerebri, & spirituum motum, adeoque delirium blandè demulcet; sed detrahatur, quando æger incipit dormire. RIVERIUS lib. 1. *Prax. cap.* 12. commendat cum lacte muliebri Epithema fronti admoveendum, conducit ex mastiche & myrrha cum tinctura santali; vid. descriptionem in RIVERIO loc. alleg. pag. 117. Decoctum radicis mandragoræ & hyoscyami, cum similibus externè applicatum tepidè fronti, commendatur ceu expertum à ZACUTO LUSITANO. Egregius quoque est succus cancerorum fluvialium vivorum recentèr expressus, qui ad imitationem RULANDI sub epithematâ forma largiter fronti applicatus mirificè confert: Sicuti idem RULANDUS sequens epithema compositum de opio cum linteis duplicatis temporibus utiliter admoveat:

℞. Aqua Rosar. ℞.

Opii ℞.

Croci ℞.

Misc. pro Epithemate.

Cum linteis duplicatis tepidè fronti admoveatur. Nam, sic blando conciliato somno mens redit.

Vel fiat epithema ad imitationem HARTMANNI *Prax. cap.* 2. 6. 4. ubi & alia externa opiatâ præscribuntur. BARTHOLETUS commendat usum aquæ spermatis ranarum extrinsecus applicatum (& credo, quod spermæ ranarum, ejusque ritè destillata aqua, sit potens remedium fronti & temporibus crebrò applicatum.) Potentius est, si misceatur cum succo cancerorum fluvialium, addendo opium & camphoram, ut fiat epithema cephalicum compositum, ad imitationem RULANDI, quod credo non futurum inelegans hoc modo:

℞. Sperm. ranar. per transcolat. vel aqua  
sper. ranar. ℞vj. vel viij.

Succ. cancer. fluv. rec. expr. ℞ij. ℞ij. vel iv.

Opii acetosolut. ℞. ad ℞ij.

Camph.

Croci an. gr. vj. viij. vel ℞.

M. pro Epithemate.

D. S. ut suprâ.

Vel

℞. Succ. cancer. fluv. cum aqua sperm. ran.  
par. ℞vi.

Acet. rosar. ℞ij.

Theriac. Androm. ℞ij.

Camph. ℞ij.

Croci gr. vi.

M. pro Epithemate.

D. S. ut suprâ.

Tepidè vel subfrigidè sincipiti, fronti, ac temporibus admoveatur.

Veteribus in cura Phrenitidis frequenti & felici in usu fuit, animalcula viva, v. g. anseres, anates, catellos, gallinas, columbas aut palumbes, per medium dissecta, & ita cruenta ac calida sincipiti aut toti capiti raso applicare: conf. HARTMANNVS cit. loc. 5. 7. quæ remedia ratio è schola GALENI ad nos dimanavit; nihilominus tamen iam apud nos ferè in desuetudinem abiit. LINDANVS interim dicit; hoc remedium esse inestimabile ad curandam Phrenitidem, qui curat phreneticos sanguinem mittendo primum, hinc propinando sub noctem opium præparatum, vel uncias duas Syrupi papaveris: Tum adhibet columbam viventem, vel gallum viventem, vel catellum vivum; quæ animalia tecat per pectus, & statim cum omnibus intertransita applicat capiti, si fieri potest, raso. Et applicato ita animalculo imponuntur linteæ, vel culcitra, ne subito cesset omnis calor: mirum, dicit, quantum juvent hæc animalcula; in quo etiam consentit HARTMANNVS cit. loc. Remoto uno, post hoc subito applicetur aliud, idque aliquoties repetatur, donec dolor cesset, & ipsum delirium immineatur. Dicit, si per horam relinquatur, & postmodum removeatur, horrendum emergere scetorem ex animali applicato, ut necesse sit, subito immergere in aquas propter scetorem intensissimum. Animalia verò illa non statim in principio admoveantur ubi affluxum potius augerent. Præter hæc & similia observanda sunt ea, quæ aliàs conveniunt in febribus ardentibus.

Fit interdum, ut phrenitici non percipientes urinas  
stimu-



Stimulum, continuò eandem retineant non absque nocu-  
mento. In tali casu imponitur perinæ cepæ collæ cum  
pinguedine ansetina urinam provocant: Aut

24. Fol. Parietar. M. ij.  
Herb. Petrosel. cum rad. M. j.  
f. decoctio cum aqua:

Pulpa contusa

adde

Olei scorp. ℥ij.

Et ita f. Cataplasma pro pube.

D. S.

Urinam provocans epithema.

Post sotum:

24. Ping. Cunic. vel Ung. dial. ℥j.

Olei Scorpion. ℥℥.

M. S.

Urinam provocans unguentum.

Illinatur, quod solum etiam sine Cataplasmate adhibe-  
tur.

Absolvimus Phrenitidem & deliria à causa interna  
cum febre; Pergo jam ad reliquas deliriorum species, &  
imprimis quidem à causa interna oriundas, sed sine febre;  
nam de deliriis à causa externa alio tempore.

## MEMBRUM II.

### DE

### DELIRIIS MELANCHOLICIS.

**D**eliria hæc vulgò generali nomine Deliria Melan-  
cholica appellantur; eaque vel simpliciter talia &  
mitiora; vel in summo gradu mania seu graviora; &  
per se absque febre affligere solent, aut saltem in paroxys-  
mo graviore aliquid febrile subesse videtur, dum pulsus  
celeriores & frequentiores habent, situationibus corpor-  
is vagis & capitis, in specie incallescunt, vexantur, sitis  
tamen nulla adest, nec propriè febris dici potest, quanquam  
FORESTUS observat. lib. 10. observat. 7. in schol. Me-  
lancholicorum feblicitantium exempla describat.

De his ante omnia observetur; aliud esse melancholicum  
affectum seu Melancholiam, & aliud esse Delirium Melan-  
cholicum; quæ non confundenda. Rectè enim hæc duo di-  
stinguit STEPHANUS in Oper. Med. Comment. de Morbis  
vulg. pag. 41. & exactè observanda monet. Nam affectus  
melancholicus seu Melancholia est, quando homo sit con-  
nihil morosus & morosus, cum omnium ferè rerum aliq-  
gratarum abominatione, quin subinde facillè irascatur, &  
quidem sine mania causa, si ipsi nihil aridet, si tristis  
& cogitabundus est, sine occasione externa; item quando  
interdum facillè terretur, quando circa manifestam causam  
angustias & anxietates quasdam circa præcordia percipit,  
& quasi rei gravissimæ perpetræ sibi conscius esset, & si-  
miles cogitationes oriuntur; dicunt: Cælum & terram  
ipsis angustia esse, sentire cordis gravitatem, neque scire,  
quid sibi velit. Hæc & similia sunt propriè Melancholia  
seu affectus Melancholicus.

Postmodum verò, ubi talibus subiectis supervenit tan-  
dem phantasma, constituit Delirium Melancholicum, &  
dat delirantem ex Melancholia, quod est morbus secunda-  
rius, ex causa externa sæpius proveniens; affectus verò  
ipse Melancholicus est morbus primarius, somitem ha-  
bens ut plurimum internum. Scilicet aliud est ipse affectus,  
& aliud est ipsi adjunctum seu superveniens Delirium, oc-  
casionem ut plurimum externam agnoscens. Videmus hoc  
in nobis ipsis, quando nempe hyberno tempore ex tempe-  
state obscura nubilola humida & ingrata reddimur Melan-  
cholici, anxii & tristes sumus, sentimus gravamen quod-  
dam non bene explicabile, facillè irascimur; est sanè hic  
affectus à causa externa, ex mutatione tempestatum oriun-  
dus, & quasi affectus Melancholicus naturalis; ad cuius  
imitationem quidam à causa interna fiunt morbose Melan-  
cholici, quibus Delirium Melancholicum supervenit, pro  
varietate objectorum, phantasmatum ac symptomatum  
varium. Nempe aliud est amosum seu eroticum, aliud  
ridiculum, aliud rabiosum, aliud Melancholico mania-  
cum desperandum, mercuriosum, &c.

Melancholia hæc sine delirio simpliciter solet vocari apud  
Præcticos perturbatio mentis, quæ perturbationes men-  
tis Melancholicæ satis sunt frequentes, ita ut adhuc recta

ratio sine delirio constet: Sic PLATERUS observat talem  
animi perturbationem in muliere, quæ subinde stimula-  
batur, ut interficeret infansem; erat tamen adhuc compos  
restitutionis, & resistebat istis cogitationibus. Et hæc est  
perturbatio Melancholica, non verò perfectum delirium:  
sicuti talis animi perturbatio est, quod idem refert P. L. A-  
TERUS de quadam muliere, quæ subinde impellebatur  
ad maledicendum Deo; ipsa verò sana recta ratione resiste-  
bat his cogitationibus malis, adeoque erat tantum pertur-  
batio animi, non verò Delirium Melancholicum. His er-  
gò taliter constitutis citra manifestam causam, si interdum  
eandem superveniat Delirium, hi ipsi rectè Delirio Me-  
lancholico dicuntur affligi.

Dicitur Melancholia & delirium Melancholicum, non  
quod semper cum mœrore & tristitia conjunctum sit, ut  
vulgò equidem volunt, & falsò; (nam etiam dantur De-  
liria ridicula, in quibus admodum sunt læti & hilares egro-  
tantes) sed propterea dicitur Melancholicum, quod oriri  
dicatur ab humore Melancholico secundum Veteres, id est  
vitioso acido fixo.

Verum Varia Melancholicorum delirantium sunt exem-  
pla, admodum inter se diversa, omnia tamen quoad Theo-  
riam in certis quibusdam punctis fundamentalibus, in qui-  
bus radix consistit, conveniunt. Et

I. Quoad Theoriam quidem, quod in omnibus deliran-  
tibus & Melancholicis talibus observetur cogitatio & medi-  
tatio intensa & assidua, defixa in uno saltem objecto; ut  
interdum aliquot objecta ordine sibi invicem succedant, à  
quibus unum Delirium diversimodè variatur, circa eadem  
tamen objecta occupata continuò videbitur, ut infra ex  
exemplis constabit.

II. Omnes tales agiti midii, anxiosi nonnihil, & quasi  
in angustis constituti videntur, adeoque quæcunque vi-  
dent vel audiunt, sibi pejora & periculosa persuadent: &  
licet interdum videantur esse ridentes, hilares & læti, v. g.  
quando quis putat, se esse divitem; nihilominus tamen  
non est reverà hilaritas, non verum gaudium, sed potius est  
apparens, & aliquid conjunctum cum risu sardonico; est-  
que hæc hilaritas tantum transitoria, & facillè succedit no-  
vus mœrore & præcordiorum anxietas, sine causa iterum  
torvum vident, & parum aut nihil omnino dormiunt, imò  
licet etiam Principes & Monarchas magnos se concipiant,  
adeoque fastuosi potius videantur, anguntur nihilominus  
cultu & veneratione ipsis depectata. Rectè itaque A. R. E.  
TÆUS lib. 1. de Caus. & sign. Morb. dicitur in cap. 5. deliri-  
um Melancholicum, quod sit animi angor in una cogitatione  
defixus atque inherens, absque febre & furore, à phantaf-  
mate Melancholico ortus.

III. Omnes somnum admodum paucum & turbulentum  
satis patiuntur, & cum insomniis gravioribus, ita ut expe-  
rientia testetur, quosdam in malo inveterato plures non sal-  
tem noctes, sed septimanas & annos quoque, insomnes  
transigisse; aut si capiant somnum, turbulentus is est, cum  
turbulentis insomniis, adeoque cum terrore evigilant.

IV. In hoc conveniunt ferè omnes, quod Deliria subin-  
de remittant, ita ut recta ratio restituta denuò videatur; sub-  
inde tamen vel pro diversitate causarum internarum, v. g.  
fluxus mensuræ imminuentis, vel externarum, scilicet sub-  
mutationibus tempestatum insignioribus, vel ex luna moti-  
bus, vel mutatione temporum anni, vel etiam, idque  
sæpius ex gravioribus animi pathematibus, subinde recur-  
runt & recidunt.

V. Quoad Praxin; in hoc conveniunt Melancholici inter  
se, quod malum sit conrumacissimum, & nulli ferè cedat  
art, quin interdum citra adjumentum Medici, & quidem  
in eisdem dedecus, sponte non rarò remittat; idque impri-  
mis per insignem quandam in dieta mutationem, v. g. æ-  
ris, victus, motus corporis, &c.

VI. Quod in his non tam ad caput, quàm massam san-  
guineam, & imprimis ad viscera abdominis in hypochon-  
driis sita, sit respiciendum, quoad curationis fundamen-  
tum. In hypochondriis enim semper nidus & fomes morbi  
Melancholici est, supervenientibus tandem Deliriis; Un-  
de à vomitoriis imprimis curatio & inchoanda & persequen-  
da: Imò non dari potest Delirium Melancholicum absque  
Melancholia hypochondriaca, quæ non habeat somitem in  
hypochondriis. Sicut enim Pica, quæ est Delirium mulie-  
rum picantium, idcirco objectum aliquod somitem in sto-  
macho habens; ita etiam Deliria Melancholica habent ut-  
plurimum interdum sedem in hypochondriis & primis viis.  
Hinc etiam primariò cura per vomitoria instituenda est; nam  
ita



ita sublati fomite Delirium Melancholicum sponte cessat, aut vel persuasione curari potest.

VII. Agrypnia omni studio profliganda, cum, quod magis vigilant, eo pertinacius malum reddi solet, quod minus, eo facilius curabile sit.

VIII. Observandum, quod in genere præmissis præmittendis omnia Deliria stulta stultis quoque interdum cunctur remediis, adeo ut ridiculo modo ridicula deliria fuerint curata, ut scilicet semel impressum phantasma per aliud contrarium quasi deleatur & extinguatur: vid. THONERUS lib. 2. Observat. 1. PLATERUS lib. 1. Observat. pag. 40. BARTHOLINUS Cent. 2. Hist. 26. Sic enim v. g. refert FORESTUS lib. 10. Observat. 13. de quodam Melancholico deliro, putante se habere in abdomine serpentes; unde præmissis præmittendis, excrementis alvi redditis serpentes addendos iussit, quos cum vidisset æger, restitutus est: Quidam putans se habere in capite passeres, curatus fuit per Medicum, qui passeres vivos applicavit naribus, quorum morsu unculas persentiscens eger, putans eos esse, extractos per nares, ad sanam mentem rediit: Alius nasum sibi instar pedis bubuli constare putabat, qui curatus est intestino alicujus animalis appenso, quod Medicus abscindebat, & ita se nasum abscidisse dicebat, & curatus est, referente FORESTO lib. 10. Observat. 13. in Schol. Alius putavit, se gestare cornua, qui fuit curatus cornuum cervinorum aligatione, & postmodum per ferram abscissione: Alius putavit se carere capite, quale exemplum habet FORESTUS lib. 1. Observat. 12. unde ille fuit curatus per impositum pileum plumbeum, cujus gravitate fuit persuasus se habere caput: Aliud ridiculum delirium parilemque ejus curationem videbitis in M. A. N. C. Ann. 3. Observat. 49.

#### C A U S Æ.

Quoad Causas & fiendi modum, unde & quomodo in Melancholicis oriantur deliria? res à priori & adeo perspicue determinari prius nequit, quam quomodo ille sensus internus, quem imaginationem vocamus, fiat, declaretur; nescimus enim, quomodo imaginatio percipi seu peragi solet: Quia ergo hoc nescimus, non possumus demonstrative procedere. Interim certum est, animam rationalem esse insontem ac proin totum negotium erit in facultate animali situm, non in sensu communi, non in memoria: ergo in imaginatione seu phantasia, quæ consistit in unionem variorum objectorum cum spiritibus animalibus per sensus externos perceptorum & spiritibus impressorum; adeoque probabilissima eorum est opinio, quod per certum motum spirituum animalium, in cerebri medulla, nunc ab externo obiecto, nunc ab anima rationali excitatum, eandem peragi asservunt, occasione cuius varii motus spirituum animalium, à natura volatili temperata lucida descedentium, anima rationalis varias concipit Ideas. Motus autem hi spirituum animalium dependent nunc ab obiectis, sensus externos afficientibus, nunc ab anima rationali diriguntur; unde etiam perturbato ac læso spirituum animalium motu, & perturbari imaginationem, & hinc deliro modo lædi ratiocinationem sequitur.

His præmissis, considerabimus adhuc aliquot exempla eorum, qui his Deliriis Melancholicis fuerunt correpti. Nonnulli, in specie pauperes, vel servili conditioni addicti, putant se esse monarchas totius mundi: quale exemplum habet SENNERTUS lib. 1. Prax. Part. 2. cap. 8. pag. 339. Item THONERUS lib. 2. Observat. 1. Alii fastuosi multa magna sibi imaginantur: confer. M. A. N. C. Ann. 3. Observat. 84. pag. 284. Sic mulier quædam se in speculo vidisse ore aperto frustum aliquod carnis supernæ ad fauces dependere, quod suffocationem sibi minari valde intenderet, sibi imaginabatur, vid. M. A. N. C. Ann. 9. Obs. 41. Alius pisces panem intoxicando, vitæ suæ insidiari querebatur, loc. alleg. Obs. 46. Quidam butyrum comedens se ex butyro totum constare arbitrabatur indeque ignem accedere volebat, ne liqueceret: sicut strenuus potator mingere volebat, metuens ne, quando mingeret, mundus diluvio interiret, qualia exempla refert LANGIUS in Comm. in Fabrum. Quidam se ranam vivam in corpore gestare putabat, referente FORESTO, & PLATERO lib. 1. Obs. pag. 40. Alius putavit se biblia in capite gestare: Exemplum hoc refert FORESTUS lib. 1. Obs. 11. Sic puer lapide in caput ictus, & postmodum Melancholicus delirus semper syllogismos optimos in lingua Germanica confecit, quos ipse postmodum componere nesciebat postquam curatus fuit: Sic LINDANUS in Colleg. Pra-

dicto habet exemplum mulleris, indoctæ atq; alicui, quæ in delirio versus concinnos elaboravit: Rusticus quidam semper sub novilunio carmina conficiebat, sed post novilunium ne verbum quidem Latine proferre poterat. Alius fuit Melancholicus, qui putavit se semper frigere, seu sese summo frigore esse affectum: hic fuit arte curatus postmodum, dum ipsi applicata fuit vestis ex pelle agnina spiritu vini seu aqua vitæ imbuta, quæ accensâ æger non amplius se frigere dixit, & ita curatus fuit, uti habet ZACUTUS LUSITANUS lib. 1. Prax. Admir. Observat. 44. RULANDUS refert exemplum piscatoris, qui cantabat, ridebat, concionabatur, disputabat cum adstantibus, uno nomine se omnium doctissimum putabat. Rarum est exemplum, quod habet HEINRICUS ab HEER Observat. 27. de quodam Melancholico, qui singulos menses in tres dividebat partes: in prima parte erat solus & meditabundus, in secunda venationi operam dabat, in tertia cantationibus musicis se delectabat & mirè hilaris erat. TULPIUS lib. 1. Observat. cap. 20. refert, alium Melancholicum putasse, se carere suris, qui fuit curatus postmodum percussione fortissimarum. BARTHOLINUS Cent. 2. Hist. Anatom. 26. refert Melancholicum Medicum Venetum quotannis sub diebus canicularibus sub lecto sedentem, qui se testam esse putabat, finito vero tempore caniculari & mense isto sanus evasit, & per totum annum ita mansit, donec redirent altero anno dies caniculares. Refert SALMUTH. Cent. 1. Observat. 63. delirium melancholicum singulis septem annis recurrens periodicè, semper durans integrum annum in chirurgo, finito anno iterum cessavit, & post exactum septennium rediit. Mulier quædam se Regi cuidam esse desponsatam imaginabatur; unde vitra perforata quasi gemmas à sponso datas diligenter asservabat, ut refert SENNERTUS de Melanchol. pag. 339. Alia Venerem se esse aiebat, & ut eo facilius crederent vestes omnes exuebat. Alius se granum milii esse cogitabat. BRENDelius in Consil. 24. refert, concionatorem quendam sibi imaginatum fuisse, se audire vocem Dei & Angelorum. Quidam se anserem credebat, annotante SALMUTH. Cent. 3. Observat. 92. Alius juxta TVLPIUM lib. 1. Observat. 18. cuncta ossa sibi molli contigisse. Femina loc. alleg. Observat. 19. se molam gerere, postmodum se fato functam, & in mundo sine corde remissam esse, somniabat. Ut taceam illorum, qui mortuos se concipiebant, qualium MARCVS MARCI Philof. vet. Restit. pag. 396. meminit. LOSSIUS lib. 1. Obs. 21. refert, quendam cibum & potum, eo detrectasse quod ad gulam usque fecibus & urinâ se repletum esse crederet. Et quæ sunt similia varia Melancholicorum phantasmata, quorum multa egregia exempla videbitis in CASPARI & EYLS Camp. Elys. Lucund. Quest. Questione 73 pag. 66.

Ex his modò allatis exemplis hoc perspicuum est, ut ut varia sint delirantium phantasmata in diversis subiectis, nihilominus tamen unum saltem sit, circa quod occupantur ordinariò, & quod ut plurimum pro determinatione phantasmatis habeant causas externas vel obiectum quoddam, quod aut fortius placet aut displicet; unde ibi desiderium, hic fuga; adeoque affectus insignes excitet: aut quod sepius recurrit, aut super quod certam reflexionem faciunt melancholici. Quod obiectum per sensus externos spiritibus animalibus vitiose constitutis fortius impressum, eos subinde iisdem motibus in cerebro sepiè reiteratis cleri vel rotari facit, cujus continuati motus occasione anima rationalis idem phantasma seu eundem conceptum vel ideam seu speciem intelligibilem & intentionalem (vocate ut lubet) continuò format & elicit.

Uterius in his deliriis determinatis solet fieri, ut in ægris jam Melancholicis, nondum tamen delirantibus, ab obiecto quodam externo fortius affectis, ejusque, vel ratione complacentis vel displicentis, impressione fortioriantur affectus animi graviores, ratione quorum certum & determinatum Delirium patiuntur Melancholicum super unum obiectum; ita enim evenit, ut spiritus animales fortius moti sibi novos quasi & aptos meatus exculcant, & sic motibus agitati in alios tramites redire nesciant. Quod ipsum ita declarabo: scilicet idem in talibus contingit ac in iis, qui graviore quodam negotio aut intensiore curâ preffi, aut qui graviore affectu, ira, terrore, metore, &c. percussi, eidem sedulo & obstinatiùs incumbentes, tempore nocturno ob negotium, continuò mentem occupans, dormire nequeunt; aut licet dormiant, propter actionem tamen & tractationem diurnam spiritus animales motibus iisdem & tractibus, quos sepius percurrerant, ad-

sueti



facti in cerebro, licet parcius in organa externa influunt, eodem tamen modo in somno moventur, adeoque eadem objecta, circa quæ versata fuit de die mens, eidem representant, & ita somniis variis somnum turbatum efficiunt: ubi sanè id, quod hic fit in dormiente, parili ratione in delirantibus Melancholicis, licet vigilantibus, evenit; unde id, quod interdum anxie tractamus, continuò & fortiter in somnio impressum habemus: sicut enim spiritus animales in cerebro continuò moti inferunt somnium; ita in delirantibus spiritus eodem motu gaudentes occasionem præbent animæ rationali, ut hæc semper eandem motionem concipiat. Unde etiam est, ut subinde ex talibus curis & negotiis, cum summa intentione tractatis, interdum tales hanc delirantes Melancholici: v.g. si studiosus impensius dat operam studiis Theologicis aut concionibus, atque studium hoc concionatorium sibi continuò inculcat, ut evadat egregius Theologus aut concionator, adeoque semper divina tractet, non tantum fit, ut alteretur successivè corporis habitus & sanguis, & in constitutionem Melancholicam abeat, sed alteratione hac spiritus continuò occupati tandem eum reddunt delirum, ut putet se summum esse concionatorem, & cum Deo, Angelis aut Dæmone confabulari.

Imprimis verò notanda est *differentia Delirii Melancholici*, quando aliud est *fixum*, aliud *vagum*: Hic in plerisque ferè actionibus aberrant à recta ratione, & vana atque delira loquuntur: Illic verò circa unum & determinatum versantur objectum, circa quod varia sibi phantasmata fingunt, aut *concupiscendo*, aut *aversando*. Vagum Delirium fit, quando spiritus animales planè deficiunt ab ordinato suo motu, ac novos poros in cerebro quasi exculpunt. Fit tamen sæpe, ut Melancholia & Delirium Melancholicum, quod primò & in se *vagum* erat & determinatum, paulò post, quando objectum aliquod excellentius aut gravius in sensus occurrit, & mentem potentiùs afficit, quòd fortius moveat, & validiori impressione afficiat spiritus animales, qui unum eundemque motum continuò tenent, & exinde motuum suorum manifesta relinquunt vestigia intra fibras cerebri medullares, quæ continuò peraguntur ab iisdem, unde certo modo delirium determinatum redditur, & circa tale objectum quasi *fixum*, quando quasi delirans se esse Monachum putat, & in hac ratione continuò occupatus est. Ver. gr. sit Melancholicus nondum quidem delirans, sed tantum solitudinarius, mœstus, meditabundus & morosus, hic transiens casu per locum, ubi vidit peponem putridum, facillè incidet in cogitationem: quid dum tu ita debes putrescere, & si jam putresceres? unde perterritus, sicut tales semper sunt anxii & mœsti, adeò afficiuntur inde spiritus, per terrorem nempe, ut superveniat Delirium melancholicum, quo putet se esse putridum, vel se etiam esse pupeponem: nempe hac impressione facta, quasi vivus putresceret, fit ut moti spiritus animales continuò easdem orbitas reperant, adeoque obuenit delirium. Vel sit talis melancholicus, qui audientes frangi vitra, statim potest venire in mentem: quid si tu etiam tali ratione frangaris? unde delirium determinatur, ut putet se esse vitrum, & metuat ne frangatur. Sic sit hypochondriacus ad Melancholiam inclinans, qui percipit rûsus, sonitum & murmura, & quasi coactiones in abdomine: his sonitibus perterritus Melancholicus, & circa eosdem fixis cogitationibus inherens, facillè exinde potest incidere in istud delirium, ut putet, se habere ranas viventes in ventre; & utut aliàs benè ratiocinetur, tamen continuò meditetur de suis ranis, ratione quarum anxius est; Unde dum ab objecto fortiori sibi incutit metum, spiritus animales continuò moti delirium excitabunt. Sic ponamus juvenem amatorem, quilibet per se sit sanissimus, hic primò sibi admodum placet circa præsentiam amatis, postmodum absens meditatatur subinde de ejusdem pulchritudine, cogitat, quomodo de novo possit acquirere ejusdem præsentiam; hinc meditatatur confabulationes, &c. porro cum semper mens & spiritus animales occupati eodem modo moventur, fit, ut subinde in somno postmodum species amatis & actiones cum eadem occurrant: tandem ita determinantur spiritus, ut non nisi amatiæ representent; hinc tale sequitur delirium eroticum sive amatorium, ut eger continuò putet, se habere præsentem amatiæ, unde incipit cum eadem confabulari, adulari, &c. talesque facit cæremônias, quasi ipsa amatiæ esset præsens, utut neminem præsentem habeat. Hæc & similia tali modo se in-

Estmull. Oper. Tom. II.

quantur. Multum hic faciunt pro determinandis deliriis terrores, tristitia, mœror, vel similes animi insigniores affectiones, idque in specie iniis, quæ jam habitu Melancholico præter naturam sunt præditi; qua ratione v. g. mulier perterrita ex viso suspensogravissima Melancholia correpta fuit, teste PLATERO *Observat. lib. 1.* & SCHENCKIO *Obs. lib. 2.*

Nam observandum quoad *Causam Remotam* ad Melancholiam, & hinc Deliria Melancholica disponentem, eam ferè esse duplicem: nempe quod vel à *causa externa* vel graviore animi affectu primò oriatur; vel à *causa interna*, constitutione nempe massæ sanguineæ successivè alterata, originem ducat, quibus constitutionibus Melancholicis inde natis demum Deliria superveniunt.

Deliria ergò quælibet, undecunque aut quocunque ab objecto oriuntur, quare non quæ in omnibus oriuntur, seu v. g. quare non in omnibus ex animi affectibus gravioribus oriuntur Deliria melancholica? Hic consideranda est certa subiecti conditio; nam certum est, quod unum magis promptum sit ad Delirium, alterum minus prout constitutio Melancholica in uno plus, in altero minus fuerit confirmata. Causa ergò huius promptitudinis ad deliria remota, est in massa sanguinea: proxima verò hæret in spiritu animali. Nempe ex superioribus innoscit, in deliriis melancholicis duo probè distinguenda esse:

1. Habitum seu Constitutionem massæ sanguineæ & spirituum melancholicam plus minus, naturalem vel præternaturalem seu morbosam.
2. *Superadditum* huic ipsum *Delirium Melancholicum* dictum, idque vel vagum sive indeterminatum, circa quæcunque objecta oberrans, vel determinatum circa unum saltem objectum, e. g. quando quis ex butyro se constatum putat, & in hoc puncto saltem delirat, licet quoad reliqua rectè ratiocinetur; & huius ratio potissimum in *spiritibus animalibus* eorundemque *natura & motu* in cerebro vitiat, investiganda venit.

Deliriorum constitutioni melancholicæ supervenientium rationem hætenus consideravimus, *constitutio ipsa melancholica iam pensanda venit*, quæ oritur nunc à causa externa, nunc ab interna. *Externa* est objectum quodvis, insigniorem animi affectum concitans; tunc enim v. g. ex mœrore diuturno, tristitia protracta, terroribus frequentioribus, curis intentis, &c. afficiuntur spiritus animales, unde alteratur successivè ab iisdem tam sanguinis motus, quàm digestio prima, sicque supervenit constitutio Melancholica. *Causa interna* est ipsa alteratio contentorum successiva, vitio diatæ, &c. nata, sanguinem & spiritus successivè afficiens, sicque ad constitutionem Melancholicam perducens. Quæ duæ remotiores causas semper probè distinguendæ & attendendæ sunt, nec confundendæ.

Constitutionem ergò sanguinis & spirituum melancholicam quod atinet: notum est, quod, prout variat massæ sanguineæ crasis naturalis ex semine oriunda, ita etiam hominum mores subinde variare; & hoc est, quod jam olim suo idiotismo optimè dixit GALENUS, quod *mores animi sequantur temperamentum corporis*. Nempe nonnullis affectus hic merè est naturalis, & totà die experimur, quosdam naturà esse *lotos*, quosdam iracundos, quosdam *tristes* & meditabundos, idque pro varietate sanguineæ craseos, & inde dependentis variaz spirituum animalium constitutionis, unde etiam morum illa & ingeniorum diversitas. Ob eandem etiam crasin hic affectus in posteros, ut alii morbi hæreditarii, transfertur, in specie in mulieres frequenter propagatur, ita ut eadem, licet antea sanæ videantur, tamen gravidæ factæ ad minimum Deliriis Melancholicis vexentur. In his verò qui dispositi sunt ad Melancholiam ac Deliria melancholica, illi ut plurimum sunt *hypochondriaci*, unde etiam *malum hypochondriacum* confirmatum sepius Delirium Melancholicum post se trahit, quod *Melancholia hypochondriaca* audit; Aut, si non sunt aperte hypochondriaci, simile tamen vitium in stomacho ac primis viis terè patiuntur, unde subinde acida eructant, egregium appetitum habent, alvo obstructa plus minus laborant.

Sanè non arbitror, dari perfectam constitutionem Melancholicam, quæ disposita sit ad deliria talia, quæ non somitem aut radicem habeat in primis viis accirca hypochondria, ejusque digestionem & fermentationem plus minus laesa, sive occasione graviorum animi affectuum, & ita

Ccc

quasi



quasi ab extra orta fuerit, sive ex causis Internis nunc per se inchoaverit, nunc alios morbos, subinde febres acutas, Insecuta fuerit: Nam utut, quoad remotam causam, affectus melancholici à causa externa, pathemate scilicet quodam graviore animi, amore, terrore, &c. nonnunquam oriuntur, in perfectum tamen Delirium non degenerant, nisi hypochondriis eorumque visceribus character vitiosus imprimatur; uti etiam ea, quæ sunt ab animi pathemate, graviora sunt, quàm quæ sponte nascuntur. Et talis Melancholia, quæ manifestò fomitem in primis viis latentem exhibet, per consensum hypochondriorum, *oriri dicitur*: sicuti, ubi nulla manifesta talis consensus signa adsunt, per essentiam cerebri *oriri* putant, quæ tamen ceu non-ens reiticienda: sicuti aut insequitur post suppressos hæmorrhoides aut restrictos menses, *Melancholia ex utero* vocari solet. Equidem nota mihi est differentia illorum, quam communiter Practici inculcant, dum melancholiam ratione fomitis dividunt per essentiam, dum fomes materialis in ipso capite & cerebro hæret, & eam, quæ est per consensum: Sed hæc differentia nil valet. Nulla enim datur per essentiam capitis, quin revera omnis, si à causa interna, sub hoc sensu per consensum dicenda venit; Unde etiam HOFFMANNUS *instituit* melancholiam cordis affectum, non cerebri, esse ostendit. Sed potius fundamentum melancholicum semper circa hypochondria consistit, utut remotior causa interna subinde aliunde oriatur, in quo puncto frequentissimè lien & uterque incusari solent.

Communiter Melancholiam ex splene oriri volunt, & omnes spleneticos obnoxios esse dicunt melancholicis: Sed non video, quare splen affectus præcisè melancholias, inferre solet, nisi ad humorem melancholicum, cuius receptaculum Veteris lienem dixerunt, respicere velimus: unde splenis viscus, si non semper, ut plurimum saltem in his casibus insons arbitror, etsi in insigniter Melancholicis simul varia splenis pathemata, splen scilicet infarctum & tumidum reperiatur, unde fortes in hypochondrio sinistro pulsationes succedunt ob sanguinis in arteriis stagnationem. An verò splen ceu primarius focus morbosus hic considerandus sit? non immeritò dubitari potest, quin subinde ceu pars secundariò affecta & productum morbosum, Melancholiam tamen per nervorum consensum insigniter exasperans, se habere videatur, quàm ut radicalis eorumdem sit sedes. Saltim exinde patet, quod verum dicit HIPPOCRATES, dum affirmat: *Quibus vena fortiter in hypochondriis (arteriam intelligit) pulsaverit, iis mens egrotat*: siquidem tumidus aut infarctus splen aut vasa eius propter fibrarum nervorum implicationes harumque spasmos plus minus contracta reverà sanguinis motum per arterias remorant, & inde pulsationis manifestum sensum in hypochondrio sinistro inferre possunt. Aliàs in Melancholia splenis viscus est insons, cum munere secernendi succum quendam melancholicum iam dudum sit exutus. Verum est, subinde in hypochondrio sinistro graves alterationes & passionis ab ægris melancholicis percipiuntur; sed cum hypochondriaci spasmi partium membranarum sint obnoxii, & cum splen habeat copiosos nervos, ob varios nexum cum pari vago & intercostali consentientes, quid mirum est, ex iis spasmò continuato affectis quod superveniant pulsationes hypochondrii & cordis, & hinc abdominis pathemata & difficiles respirationes seu convulsiva symptomata? ut adeò, si splen simul affectus deprehendatur, id fiat saltem per deuteropathiam. Quod si digestionem primæ vitiatæ viscerum aliorum pathemata superveniunt, speciatim hypochondriaci lienis mala, ab his primariis affectus eò magis nunc confirmatur, nunc deterioratur. In his ergò subiectis melancholicis seu Melancholia hypochondriaca imprimis acidum vitiosum in primis viis abundare, indeque digestionem primam in stomacho vitare, quin etiam ipsam massam sanguineam exinde firmiorem seu spissiore, minusque fermentativam ac minus spiritusascibilem esse, multa adjuncta symptomata persuadent, non minus quàm cura etiam. Quoad symptomata: omnes melancholici sunt egregie voraces, & alvi naturaliter ut plurimum adstrictioris, simulque observantur ructus acidi; quæ pathemata omnia acidi peccantis in primis viis signa sunt: quoad curam verò, ea fundamentalis consistit in eo, ut per acidum vitiosum absorbentia & destruentia, martialia quippe & tartarea, insituatur.

In taliter constituta massa sanguinea non tantùm fermentationis ejus vitalis in præcordiis lentè nec rectè procedit, unde anxietates istæ, imò non rarè graves cordis palpitatio-nes sine causa manifesta superveniunt; sed etiam ex deficiente fermentatione spiritusascencia massæ sanguineæ, ejusque in spiritus subtiles volatilifatio, minus convenienter perficitur, idque eò magis, si in aëre crasso aut cænooso aut paludoso habitat talis geger: nam aër multa tribuit ad volatilifationem spirituum; hinc etiam ex sola aëris mutatione in clarum, tenuem & subtilem, accedente corporis motu, melancholia curata observata fuit. Ex massa ergò sanguinea minus spiritusasciente spiritus vitales, & consequenter quoque animales, minus volatiles minusque subtiles, minus puri aut minus mobiles generantur, sed quodammodò texture fixioris, & quasi subactæ & crassioris sunt, adeoque, ut probabiliter multi affirmant, minus lucidæ, sed tenebrosæ: vid. BARTHOLINUS *de Luce animal.* unde iidem animales facti minus apti sunt ad varias motiones & expansiones pro multitudine objectorum sensilium varià in cerebro perficiendas, sed potius quasi fixiores, & à naturali crassi volatili temperata plus minus in acriorem, asperiore & quasi acidulam degenerantes, ab uno objecto supra dictis modis fortius affecti, non possunt non iidem quoad motum suum in cerebro medullio vitari; hinc vel inordinatè & vagè movebuntur, vel pertinaciter iisdem motionum orbitis insistent. Si prius contingat, oriuntur Deliria Melancholica vaga, cetera quæcunque objecta directà: sin ab objecto externo quodam fortius affecti, unam eandemque in cerebro motionis orbitam servant, id est in semel inchoato tramite inter fibras nerveas cerebri eodem cursu & recurso continuo peragunt, unde subministratur occasio animæ rationali immutabili & unum tantum phantasma formandi & subinde, repetendi. Nam anima non affectur rationalis, sed læditur in talibus saltem imaginatio seu phantasia, circa objectorum sensibilibus per certos spirituum motus in cerebri medullio representationem occupata. Dum ergò hæc læditur, ita ut continuò circa unum objectum verletur, ex identitate motus vitiosorum spirituum circa idem objectum delirium postmodum supervenit. Sed ex eo, quod anima rationalis sit sana, evenit, ut hujusmodi melancholici, determinata deliria patientes, circa illud objectum, circa quod delirant, subinde in reliquis satis prudentes sint. Sic enim legimus v. g. in AMATO LUSITANO (ni fallor) exemplum cuiusdam pueri, qui se putabat esse regem ingentem, sub quo Delirio loquebatur de ratione status & arcanis politicis, & tam subtilia & acuta Rempublicam gubernandi promebat consilia, ut omnes in sui admirationem raperet: postmodum curato delirio, puer de talibus politicis parum vel nihil sciebat. Satis ergò prudentes sunt melancholici circa objectum delirii: id quod non minus est mirum, quàm quod observationes Practicorum docent, somnambulones noctu surrexisse, & versus admodum concinnos scripsisse, manè tamen eorum, quæ noctu egerint, nihil scivisse. Nam circa idem objectum semper occupata est anima rationalis, quia tota ejus essentia, prout equidem à nobis cognoscibilis est, consistit in eo, quod sit substantia immaterialis, quæ semper ratiocinatur, & aliquid cogitat. Hinc anima rationalis indefessè semper ratiocinando circa idem objectum subinde occupata, necessariò de eodem elegantes & rationales formabit discursus, quoniam à nullo alio objecto interturbatur & impeditur; & utut in uno erret, tamen in reliquis suas potentias exercere potest.

Cum verò à rebus non-naturalibus scilicet mutationes inalteranda massa sanguinea & efficiendis spiritibus animalibus magnæ sint potentia, ut quotidie in brutis videmus, non mirum est pro varietate v. g. tempestatum, secundum mentem decursus, etiam mutari Melancholicos, ita ut nunc melius nunc peius habeant; unde temporibus successivè correctis, corriguntur etiam constitutiones: ac hinc est, quod sub isto delirio per mutatum vitium, per continuas vigilias, & subinde alias res non-naturales, mutetur insigniter massæ sanguineæ crasis, & consequenter spiritus animales (videmus enim, quod tales Melancholici fiant subinde admodum pingues) hinc fit subinde, ut interdum sponte, nonnihil cessent deliria, quæ tamen novà alteratione, per graviora objecta inducta, denuò recurrant; quin & exta- li mutatione crasse massæ sanguineæ & spirituum fit nonnunquam, ut delirantes Melancholici ex uno objecto



in aliud successivè dilabantur, *parili ratione*, atque videmus quosdam sub ebrietate ex vini potu fieri primò hilares, hinc admodum loquaces, tandem rixosos, & quasi maniacos, & furiosos, denique somnolentos & torpidos, qui altero verò die subinde tunc mœsti, tristes plus minus turbulentum, & quasi melancholici. Unde, sicut hoc facit vinum mutando crasin massæ sanguineæ & spirituum, cum sit causa externa, ita simili ratione successivè à causis internis facta alteratio Deliria subinde & Melancholias mutat.

Ratione fundamenti hujus Melancholiæ, in massa sanguinea & spiritibus inveteratus semel affectus melancholicus non saltem contumax est, & qui per paroxysmos sæpius recurrit, sed etiam subinde hæreditarius esse solet, ita ut à parentibus Melancholicis sæpè in liberos transplantetur, & hinc tandem ad Melancholiam deducantur, in specie in mulieribus (quamvis hæc à matribus Melancholicis editæ temper aliàs videantur sanæ mentis) præsertim gravidationis vel puerperii tempore character hæreditarius evigilare solet.

Quod verò tales stulti stultis & ridiculis interdum curentur remediis, & quod talia ridicula remedia curent subinde ridiculos ægros, ex eo serè est, quod anima rationalis, circa unum tantummodo objectum occupata, ex firmâ tali persuasione ab objecto novo, & dum objectum morbosum remotum videt æger, & exinde lætitia vel alio affectu alteratur, spiritibus animalibus novum conciliet motum; vel si ex superveniente contrario aut fortiori objecto etiam alio modo moveantur spiritus, sit, ut tale sortitus objectum, & quidem aliud ac novum, ex immutato spirituum motu animæ rationali præbeat occasionem variandi conceptus & speculationem, & ita omnes priores ridiculi conceptus à supervenientibus novis quasi omnino in momento cum manu delentur & expunguntur: quæ ratione v. g. immersio subitanea in fluvium curat delirium maniacum; hæc ratione stratagemata per assensum, delendo quasi conceptus delirios, & removendo objecta, quasi talia deliria auferunt: quæ etiam cura eò magis vel minùs erit diuturna vel constans, quò magis vel minùs restituta simul fuerit massæ sanguineæ depravata crasis: sic Melancholia observata est, quæ curata fuit per gaudium nimium & profusum, ex improvviso concitatum, quoniam fortius objectum delevisse prius.

Plura quoad hanc Theoriam videb. in WILLISIO de Anima Brutor. Part. 2. cap. 21.

## DIAGNOSIS.

Necessum est autem imprimis, ut nimius progressus Melancholiæ maturè præcaveatur, in quem finem imminens ea præcognoscenda venit.

Signa autem, quendam esse habitus melancholici, vel naturalis, vel præternaturalis, tunc colligitur, quando talis æger gravioribus subinde insomniis terretur, quando somnium habet turbulentum & insomniis intermissum, quando evadit solitudinarius, quando præter solitum sit morosus vel tristior, etiam invitus, quando funesta cogitat & trifia, quando meticulosus est sine manifesta causa, quando vel levissimo objecto subinde terretur, item si in una cogitatione subinde fixior hæret, si meditabundus & cogitabundus fuerit, &c. Hæc enim & similia sunt verè signa imminents Melancholiæ, sive ipsius affectus perturbationis mentis.

Quod si æger postmodum incipiat fabulari ridiculè de uno alterove objecto, quando putat se esse sapientissimum, & sic porro, tunc delirans melancholicè seu Delirium Melancholicum facillè manifestum evadit.

Verùm ipsa Melancholia ejusque Delirium per se patet facillè: Speciatim sines & causæ remotæ Melancholiæ diligenter sunt consideranda: pro felici instituenda cura; adeoque cognoscendum est: an causa occasionalis externa seu animi affectus quidam gravior, terror, ira, timor, primam dederit occasionem Melancholiæ, ratione cujus inserunt spiritus animales delirium? an verò ex interno vicio & depravatione ipsius massæ sanguineæ melancholica (loquor cum vulgo) seu hypochondriaca affectione successivè primam originem duxerit melancholia sine causa externa (nam longè difficilius Deliria ex affectibus animi nata, quàm à causa interna, curantur.) Signa hæc observanda esse inculcat LINDANUS, dum dicit: *Quando inciditis in Melancholicos, hoc agite, ut noscatis ori-*

*Etymull. Oper. Tom. II.*

*ginem mali, an v. gr. sit ex tristitia? nisi enim hoc agitis, laterem lavatis. Multæ enim res sunt, quæ homines tristiores, & sic longo tempore perseverantes, in melancholiam deducere possunt: Vid. Hippocrates lib. 6. aphor. 26. Et hæc est ratio, quare tam raro restituantur in integrum melancholici. Didici ex pulsu cognoscere, an sit Melancholia ex animi affectibus? an sit ex sanguine melancholico? Nam si est ab animi gravioribus affectibus, pulsus in illis est valde obscurus, quasi contractus & inconstans, quandoque aequaliter, sapius verò inaequalis, & deinde qui habet plerumque speciem deficientis. Vermicularis est interdum, interdum non. (Vermicularis & formicans est unum & idem: formicans est, quando celerimo motu pulsus currit; formicæ enim celerissime currunt: quando autem non tam subtilis est, sed paulò planior, dicitur vermiculans, talis est horum melancholicorum.) Frequenter enim hæc inaequalitas & inconstantia pulsus certum signum est melancholiæ ex animi affectibus: quoties enim animus parum relaxatur, statim etiam mutatur pulsus, unde facillè animi affectus exinde patefunt. Hactenus LINDANUS.*

Hoc observavi nupera æstate in muliere 75. annorum, aliàs devota, dicente, se rem Veneream per viginti annos cum dæmone habuisse: hoc confirmabat, dum falsa esset, aurigæ equum se fascinasse, & parere infantes dæmonicos pro vulvam, adeò ut serè ad rogum damaretur. Advocatus tunc medicus inquebat rem veram esse. At aliter se res habuit: nam interrogata à me, ubi doleret? monstrabat superiorem regionem hypochondriorum, pulsusque octavâ vel nonâ vice deficiebat, ac uno nomine, perfecta erat melancholico-hypochondriaca; alvus enim, aderat obstructa, Scybala erant dura, sibi invicem imposita conglobataque, eademque sub primo somno patiebatur incubum cum insultibus epilepticis, unde custodes excubantes baculo tetigerant alvum ejusque abdomen, putantes quasi sic se posse dæmonem superincumbentem fugare, aliquor septimanas insomnes ducebat. Huic autem Delirio Melancholico ansa dedit, quod audivisset de fascinatione, adeoque cogitasset, quid si tu hoc fecisses?

Facies quoque in melancholicis nunc rubore nunc pallore suffunditur angustis ejusmodi homines variè corripuntur, prout objecti simulachra variant; sicuti testantur historię melancholiæ ex amore detectæ, quas GALENUS lib. de Præcogn. ad Posthum. cap. 6. ARETÆUS lib. 1. de Caus. & sign. diuturnor. morbor. cap. 5. & ZACUTUS LUSITANUS lib. 1. de Med. Princip. Hist. 40. adducunt.

Si causa remota sint suppressiones hæmorrhoidum vel mensium, ex ægro cognoscitur.

Quod si verò pedetentim & citra objectum externum fiat Melancholia, tunc tales ægri habent Deliria vaga, quorum causa remota est affectus hypochondriacus. Hujus affectus signa propria erunt præsentiora, vel majora vel minora: In specie ægri tales conqueruntur de palpitatione cordis, de anxietate cordis & ructibus acidis; item conqueruntur de pathematis abdominalis, de borborygmis & murmuribus intestinorum, de alvo obstructa, flatibus, de sensu molesto plus minus obscuro in hypochondrio sinistro (in liene) cum sensu pulsationis in dorso aut dicto hypochondrio, mala quæ ex splene videntur oriri, somniaque habent turbulenta (ex quibus mox suspicio venit, adesse Melancholiam hypochondriacam) phlogosi vaga crebrius afficiuntur, & circa frontem in facie calent, &c.

Ipsæ affectus melancholicus, specialiùs ex vitiata tantum massa sanguinea, suam habet exacerbationes & remissiones, item ægri admodum sunt anxiosi & queruli, palpitatio cordis subinde est frequens, item præ aliis sunt tristes & mœrentes, & quæ sunt similia signa affectus massæ sanguineæ.

Mœtus tamen & tristitia præ ceteris etiam sunt pensanda in melancholicis; quidam enim interdum hilares, interdum pusillanimes & plus minus desperati fiunt. Non quidem rarum, inquit PETRÆUS in Dissert. Harmon. est, quod gaudere & ridere videantur: minimè tamen gaudium est verum & verus risus, sed quasi cynicus, & sarcasticus, quin paulò post mœsti & tristes evadunt, unde etiam solitudines amant, & conversationes hominum per-timescunt.



## P R O G N O S I S.

Quoad *Prognosis*: Melancholia ut talis, licet nunquam lethalis existat affectus, ratione tamen eventus, temporis & modi, valde incerta est ejus prognos, quatenus ex illa nonnulli brevi reconvalescunt, alii non nisi tardius, alii nunquam.

Ue plurimum tamen Melancholia, quæ ab occasione evidente & ab affectu animi est, longè feliciter curatur, quàm quæ post diuturnam demum procataxin seu prædispositionem Melancholicam intrinsecam sensim invadit: vid. *LOSSIUS lib. 1. Observat. 22.* Ita enim sublata dicta causâ evidente sæpè sponte cessat delirium; hinc plures ex crumena quàm ex pharmacopolio levamen suscipiunt, cum in posteriori casu, quo sanguis & spiritus ab ordinaria & debita crasi recesserunt, imò ipsa cerebri tandem conformatio temporis successu incorrigibiliter mutatur, res difficilior sit.

Pariter malum recens & quod nondum diu duravit, & cui nondum supervenit delirium, semper facilius (nempe ceteris paribus, & nisi orrum ex graviore animi pathemate fuerit) curatur; subinde etiam à sola fere conveniente victus ratione, & familiari conversatione cum jocosis, & mutatione aeris, sic laudabilis, tenuis & spirituosus generatur sanguis: Inveterata verò Melancholia, & orta ab animi pathemate externo, aut studiis immodicis noctem protrahitis, in specie cui pertinax delirium accessit, aut quæ hæreditaria est, aut quæ subinde repetit, raro aut difficillimè curatur, quin ægros ut plurimum ad mortem comitetur.

Delirium ascititium facilius cedit præ hæreditario.

Melancholia quæ post morbos alios, ut post febres diuturnas aut acutas, aut post phrenitidem supervenit, facilius aliis, mutato scilicet corporis habitu, & sæpè per solam dietam curatur.

Porrò in viris familiarior & frequentior fere est melancholia, sed minus difficilis curatu: in feminis quidem rarior, sed diuturnior & pertinacior, speciatim si mensium iam deficiat excretio aut gravidæ existant, tum etiam harum nonnullæ, quæ à parentibus melancholicis nasci, etsi alias semper sanæ mentis observentur, prægnantes tamen hujus quasdam hallucinationes ostendunt.

Præterea Melancholia, quæ est cum risu, joco seu gaudio, & hilaritate quadam intermixta, mitior, tutior, & ceteris paribus tractabilior est, quàm quæ est cum studio, aut cum quodam furore aut tristitia continua accum summo mœrore.

Melancholia, quæ à charactere seminali per parentes in liberos fuit transplantata, raro potest curari.

Si melancholicus præter solitum in risum, aut fletum, aut lachrymas solvatur, metuendum est, ne in morosum, imò maniam transeat, nonnunquam in paralyin, & quamvis rariùs, in morbos convulsivos, item in apoplexiam.

Ad salutem monstratur via, si successivè mitiora deliria sunt, si superveniat hæmorrhoidum, aut etiam uteri fluxus, si superveniant varices, Germ. *aussgelauffene Adern an Schenckeln*, quos ipsos commendat *HIPPOCRATES sect. 6. Aphor. 11. & 21. & RIVERIUS Prax. lib. 1. cap. 13.* Item si in scabiem & similia cutanea vitia fiat transmutatio; item si urina hæcenus tenuis, crassa, turbida, opaca & nigra evadat. His enim modis interdum fere aut remittit aut plane cessat melancholia.

Ad interitum verò declinant ægri, si ægri omnem cibum & potum pertinaciter avertentur, quin etiam quando nihil dormiunt, aut tandem vires successivè fatiscunt: Nam observatum fuit, Melancholicos interdum ad aliquot menses ne momentum quidem dormivisse, & ita tandem collapsis viribus intereunt.

Denique rariùs fit, quod Deliriis melancholicis superveniant convulsiones aut epileptiæ, quæ cerebrum afficiunt.

## C U R A.

Quod attinet methodum medendi ad curandam melancholiam & Deliria Melancholica, est vel præservatoria, & quæ causam antecedentem respicit, vel curatoria, scilicet ipsius delirii hujusque causæ proximæ. Ad duo igitur, ut iam supra monitum, respiciendum est:

I. Ad constitutionem massæ sanguineæ & spirituum

melancholicam.

## 2. Ad superinductum Delirium.

Unde ratione prioris, curandi tales ægri, ut malo hypochondriaci affecti, hinc vomitoria & marspalia sunt proficua. Tota cura consistit in rectificatione massæ sanguineæ, in correctione ejusdem vitiorum & regeneratione massæ sanguineæ spirituosæ & volatili: sed hoc etiam non caret difficultate, partim quod malum per se sit contumax, partim etiam quod Melancholici statim omnium remediorum sint perturbati, & aliâ etiam per se satis immorigeri.

Ratione posterioris, humores educantur & alterentur, atque spiritibus animalibus aliquis tranquillitas concilianda, illique à perverso & inordinato motu sunt avocandi, & in circulos pristinos redigendi: idque vel medicamentis vel rationibus, hoc est, auxiliis vel Medicis vel Ethicis; Medicis, hoc est, medicamentis anodynis, tam mineralibus, quàm opiatibus & camphoratis: Ethicis, vel eorum conceptibus assentiendo per stratagemata & fraudes; vid. *FORESTUS lib. 10. Observat. 13. & TULPIUS lib. 1. Observat. 18. & 19.* vel dissentiendo & corrigendo per persuasiones rationales, variis confabulationibus, recreationibus, negotiorum commissionibus. Semper sanè in malo pertinaciori simul ed respiciendum est, ut melancholicos præmissis præmittendis cauto quodam stratagemate decipiamus, eosque à semel concepta opinione, etiam subinde mediis ridiculis, avocemus; Talia enim stratagemata minus sunt aliena à Medico.

Propterea pro meliori Cura observetur:

I. Ut causa remota removeatur; quæ si sit affectus animi gravior, removenda est non tam per Medicum quàm per Ethicum seu Moralistam, nempe per rationes; si verò causa sint internæ, menses suppressi, malum hypochondriacum, &c. tunc hæc primitus curandæ. In genere habito causæ remotæ respectu per omnia ea remedia, quæ in affectu hypochondriaco usurpantur, tractandæ sunt Melancholia & omnes ejusdem species, tam per digestiva quàm laxativa: quibus addenda postmodum appropriata confortantia dicta, quæ spiritus animales volatiliores, subtiliores & agiliores reddere, & fermentationes sanguinis naturalem restituere, ejusque crasin attemperare valent. Inter priora ista ad massam sanguineam corrigendam & spiritus ascensum institutendam primatum obtinent tartarea & Martialia, vel laxativa, vomitoria, &c. quæ sunt basis curæ. Inter posteriora verò, confortantia, sunt imprimis Vinum, crocus, melissa, ambrata, & omnia cephalica spirituosæ.

II. Observandum rectè monent Auctores, omnia in casum circa Melancholicorum & Maniacorum curam tentari, nisi quàm studiosissimè Emeticorum usus observetur. Nam in vomitoriis revera consistit radix curæ omnis Melancholiæ Deliriorum & manie, quæ in majori malo, & pro ratione circumstantiarum, etiam subinde repetenda, & non una vice ipsis insistendum. In specie nemo poterit maniacum curare, nisi prius propinato vomitorio. Ut adeò in vomitoriis sæpè repetitis cura tam præservativa quàm curativa Deliriorum horum fundamentalis consistat. Delirii quidem melancholici tractati per vomitoria mitescent ex voto.

III. Caveat sibi diligenter Medicus, ne solus melancholicos aut maniacos adeat, aut iisdem propius accedat. Nam hi ipsi admodum insensibiles sunt Medicis, & simulantes licet pacem, eos subinde male tractant, verberibusque onerant, in specie maniaci. Exemplum talia videb. in *HILDANO Cent. 4. Observat. 9. & FORESTO lib. 10. Observat. 22. in schol.* Quin etiam curati licet, fere odio suum habent Medicum, ut rectè observatum fuit à *BORRICHIO in BARTHOLINI Act. Hassniens. Vol. 4. pag. 148.*

IV. Observandum, quod in malo pertinaciori, & ubi ægri tales delirantes firmius conceptâ hypothesi insistant, præmissis iam præmittendis nil melius sit, quàm ut cauto quodam stratagemate eos decipiamus, & à semel concepta opinione etiam ridiculis remediis nonnunquam deducamus: Vid. *FORESTUS loc. cit. Observat. 13.*

V. Obs. Alvus contumacior semper & quotidie molli & lubrica servanda. Nihil enim est, quod magis hypochondriacos infestat, quàm alvus obstructa; Quod magis enim obstructio affligit alvina, eò magis iidem sunt morosi & insomnes, omniaque exasperantur symptomata, Unde alvus quotidie respondere debet, aut arte aut naturâ; cui scopo omnium optime satisfaciunt passule & pas-



& passulata, quæ pro scopo tàm alterandi contenta quàm emolliendi sunt optima; hinc tartarea item gummata: NB. Clysmatum quoque humectantium, item ex & cum lacte paratorum usus hic admodum est proficuus.

VI. Cum melancholici, qui semel delirantes fuerunt, subinde recidunt circa annicardines, solstitia & æquinoctia, ob id opportunè & tempestivè vere & autumnò nonnunquam cura prophylactica per laxativa & alterantia appropriata spirituosâ instituenda.

VII. Quidam *Vena-sectionem* adhibent, sed nescio, ob quam causam. Utut enim *venæ sectio* in mania conveniat, non tamen video, quomodo melancholiæ conferat, cumque in specie melancholici debeant curari per alimenta cupepta. Quàm injuriosum ergo est, si sanguinem eorum exhauriamus? quin potius alteretur sanguis ope medicamentorum infra dicendorum, non verò protervè evacuetur. PLATERUS quidem reiteratam *venæ sectionem* commendat; cujus rei hanc rationem reddit WILLISIUS, quod nimis sanguine effecto toties educto novus facilis generetur: sed errant, cum nihil sanguinem generet, nisi ipse sanguis; & observatur quosdam ex Melancholia per *venæ-sectionem*, intempestivè & crebrò nimis administratam, in morosin & stupiditatem confici. Habenda siquidem ratio est causarum antecedentium & virium, quorum intuitu in plethoricis, ac non adeò torpidis, *venæ sectio* locum habet, sicuti etiam, quando vel suppressio evacuationis consuetæ præcesserit, vel nimis phlogoses aut effusiones subinde observentur, vel caput circa frontem intensius subinde incalcescat, metu majoris periculi, aut ne in maniam degeneret, *vena brachii aperienda*, item frontis in declinatione, aut saphæna in seminis incidenda. Quò etiam spectant varicum, & hæmorrhoidum per hirudines in maribus aperturæ. Imò Melancholia aliis irritis per hirudines temporibus admotas curata refertur à FONTANO in *Consil. & Respons. pag. 112*. Evacuationibus quoque accensenda est Trepanatio, & Fonticulorum suprà futuram coronalem inultio profundior, à RONDELETIO *Prax. lib. 1. cap. 41. & 43.* commendatæ, idèd quod nonnulli fracto fortuito cranio curati fuerint; Huic ad stipulatur RHODIUS *Cent. 1. Observat. 43.* per experientiam Casserii. Nuperrimè mulieri melancholicæ crebrioribus effusionibus corporis vagis afflicte, & præsertim intenso frontis gstu subinde correpte, vesicatoria utrique brachio admoveere iussi, ut doloris ratione impetum spirituum & humorum à capite averterem, ne mania supervenire queat.

VIII. Observandum, quod præter Vomitoria in principio mali Purgantia per inferiora conducant. In principio dico: Purgantia enim propriè dicta in morbi cursu minus commoda sunt, diuretica parum aut nihil operantur, potius nocent. In principio ergò melancholicos semel & iterum purgare licebit, monente LINDANO; in progressu verò morbi plus nocebitis, quàm proficietis per Purgantia: quin potius loco illorum malum optimè per urinas, & hinc per leves & repetitos sudores tollitur, uti differit LINDANUS. Nam (1.) Melancholici ordinariò plus mingunt quàm alii; & quoniam (2.) raro sudant ob habitum corporis densiorem, & constipationem pororum cutis, materia urinq subinde augeri solet.

IX. Diuretica sunt optima. Et in genere hic monendum, quod omnes illi affectus, qui dicuntur splenetici, aut qui dicuntur oriri ab humore melancholico, præmissis præmittendis, id est purgantibus, præsertim vomitoriis, & hinc alterantibus martialibus, optimè per diuretica & salia curantur. Et observatum fuit, quod in talibus urina turbida & crassa, opaca interdum etiam nigra reddita, & copiosis contentis saturata, signum sit declinantis in talibus morbi & imminuentis sanitatis: adeòque hic diuretica, & tanquam alterantia & tanquam evacuantia, optimè hic conducunt; v. g. arcanum duplicatum Myrsichti, nitrum antimoniatum in potu solutum, & hinc remedia tartarea, in specie tinctura tartari, tinctura nephritica Amelungii, spiritus tartari volatilis.

X. Rectè monet RIVERIUS, semper ad hypochondria præcipuam dirigendam esse curam, undecunque etiam malum primitus traxerit originem; unde curatio pro malo hypochondriaco ad reliquarum melancholicarum curationem sufficit. Unde etiam BARTHOLET-TUS *Traité de Respir.* inquit, quod Melancholia, quæ

ex consensu totius cum corde derogatur, respondeat quantè exquisitè, adeòque etiam offe tractandos melancholicos ut Quarantarios.

XI. Quantum fieri potest, opera danda, ut Agrypnia: coercetur, & somnus aut conservetur, aut restituatur vid. HORSTIUS *lib. 2. Observat. 18.* Id quod interdum post vomitorium facile evenit, ut tunc plus minùs lassati ægri vel sponte in somnum inclinent, & ut facilius ad somnum disponantur. In specie ad somnum promovendum alimenta, quæ sunt humida, ac bono nutrimento torido turgida, qualia sunt juscula, ova, carnes facillè digestionis, serum lactis, lacticia, oryza, milium, &c. ipsis primariò conveniunt; ita enim temperata massa sanguinea, & humectatur cerebrum, adeòque mulrum dicta habet in recessu. Certè quamdiu adhuc dormiunt, minùs grave malum esse solet, aut si post agrypnias somnus redeat, faustissimum signum esse solet.

XII. Opiata sola, & nisi præmissis universalibus, nunquam danda sunt. Nam in talibus opiata parum vel nil operantur, præsertim in principio, & subinde duplicata aut triplicata dosi nihil faciunt, ob acidum in primis viis stabulans, eorumque vim destruens; idque eò magis, quò diutius somnum non viderit æger eò minus narcotica & opiata operantur; sed potius, dum non faciunt somnum, gravant malum, & reddunt ægros quasi delirantes, eòdè talia narcotica per se sapius aut in majori dosi usurpata somnia nonnihil turbulenta & quasi delira inferant. Internè ergò semper appropriatis specificis miscenda opiata, in specie humectantibus, & etiam occurrendum simul externis epithematibus capiti & fronti applicandis; item pediluvia ac similia pro scopo hypnotico melancholicis optimè conferunt.

XIII. In tota cura studiosè semper *Dieta* observanda est, ut sit lauta & nutritiva; unde dentur alimenta & potulenta, quæ blando humore temperato & nutritivo probe sint turgida & imprægnata, ut lacticia, passulæ, & similia, humectantia communiter dicta; siquidem notante LOSSIO *lib. 1. Observat. 21.* melancholici non diutius curantur, quàm humectantur: unde & passulata, item poma dulcia, mirè conveniunt melancholicis. Nec negligendus haustus vini generosi, quod vinum optimè exhilarat Melancholicos; sicuti etiam motus corporis & exercendorum exercitio, quantum possibile, promovenda.

Quod ergò attinet ipsam materiam medicam hisce scopis inservientem: radix extirpandæ melancholiæ rectè à PARACELSO dicitur consistere in antimonio, cujus preparata sunt varia, imprimis vomitoria antimonialia, & hinc remedia quædam ejus per inferiora purgantia, sunt optima. Vomitoria jam aliàs nota sunt. In specie hic observandum est, eadem in paulo majori & sæpè dupla vel tripla dosi esse usurpanda, si aliquid agere debent, ut rectè observatum in BARTHOLINI *Al. Med. Haffn. Volum 4. pag. 148.* quia melancholici ordinaria dosi non moventur, sed saltem per inferiora moventur, minùs per superiora, dum per inadvertentiam animi & objecta fortiora spiritus animales in cerebro & reliquis locis non solent percipere alterationem. Certè nonnunquam observavi, quod tartarus emeticus Myrsichti, cujus grana ij. vel iij. ad jv. aliàs dantur, in hypochondriacis & Melancholicis à gran. vj. ad viij. imò ad xvij. aut in forma liquida syrupus emeticus Salæ à drachm. vj. ad unc. j. propinatus fuerit. Et sanè tales ægri longè commodius etiam ac facilius perferunt vomitoria paulò fortiora, quàm alii; quin subinde repetenda sunt: Sic aliquando puerperæ, post 14. dies à partu Delirio melancholico laboranti, ad grana vj. propinavi, & tamen modicè vomitum experta est: Inde similiter studiosocuidam Melancholico exhibui syrupi emetici unc. ß. qui tamen nullam hinc sensit motionem. Idèd vomitoria in majori dosi propinentur. Præstat tamen prima vice ordinariam dosin propinare, ut ex huius operatione pauca vel nulla concludere possit Medicus, in quantum augmentanda dosis. Et in specie flores antimonii commendat PARACELSUS quorum florum elegantem preparationem videb. in FINCKII *Encheirid. Dogmatico-Hermetico* de Melancholia, tanquam appropriatissimum ad curandos Melancholicos remedium. Aliàs pro vomitorio sit aurum vitæ seu præcipitatum mercurii cum auro (imprimè Kegleri,) item infusus mercurii vitæ repetitum interdum con-



fert. Sapa vomitoria Sylvi ex musco & mercurio vitæ est etiam egregia; item Syrupus emeticus ad unc. j. & ultra. Magni enim momenti sunt vomitoria, & ut plurimum ab horum usu mitescunt ægri. Aliquando cuidam melancholico propinare coactus fui:

- ℥. *Aqua Fumar.* ℥j.  
*Gumm. Amm. in vino solut.* ℥j. ad 3℥.  
*Syr. emet. concentr.* ℥i.  
*Scamm. sulphurat.*  
*Extr. troch. alband. an. gr. j.*  
*Syr. rosat. simpl.* ℥ij.

Misc. pro Potione.

Cuius una vice sumpti usu æger ter vel quater viscida commodè per vomitum evacuavit, & bis per alvum laxavit cum euphoria.

Par ratio est Purgantium, quæ sine addito stimulo salino, præsertim tartareo, inordinaria dosi non operantur, quin hæc potius ordinariò augmentanda venit.

Inter purgantia minoralia eminent antimonialia: Nam antimonium peculiare alexipharmacum debellans Melancholiam videtur; unde ex antimonialibus per inferiora purgantibus eminet Mercurius vitæ per sal tartari cicuratus, aut multis aliis modis parabilis, est admodum conveniens; Sic enim cessante vi emetica egregiè per inferiora purgat. Inter vegetabilia verò imprimis sunt helleborus & helleborata, quæ non tam propter laxationem simpliciter, quàm propter vim alterativam specificam in affectibus melancholicis, & in Deliriis Melancholicis conducunt. D. MICHAELIS refert exemplum delirantis, ex quo dæmon locutus, purgati per helleborata; unde nidus fuerit destructus, & cedere oportuerit. In malo verò contumaciori & mania helleborus albus, (de quo eras;) in melancholiis verò reliquis helleborus niger, palmam obtinet; nam præter vim laxativam simpli habet alterativam, melancholique convenientem: vid. VELSCHIUS *Hecatost.* 2. pag. 11. Unde extractum cum phlegmate vitrioli spirituosum paratum, & exinde paratæ pilulæ cum antimonio per inferiora purgante, hoc modo conveniunt:

- ℥. *Extr. helleb. nigr.* ℥j.  
*Troch. alband.* gr. ij.  
*Antimonii vel Mercurii vitæ per infer. purg.*  
 gr. v. (pro varietate tamen præparationis variat dosis)

Cum Ess. Martis, vel Tinctur. tartari f. Pilulæ.

D. S.

Pilulæ purgantes.

Vel, quod melius, cum aqua Anagallidis & flor. hyperici f. Potiuncula, edulcoranda cum Syrupode pomis laxativo, & ita propinanda:

D. S.

Potio purgans.

Extractum trochiscorum albandal hic adhibetur pro stimulo, ut corrigat simul viscidum præternaturale, quod, ut in omnibus chronicis morbis, ita & Melancholicis pathematis ceu subiectum causæ materialis simul peccare observatur. De usu extracti colocynthidos & trochiscorum albandal, vid. M. A. N. C. *Ann.* 3. *Observat.* 102.

Vel

- ℥. *Extr. helleb. nigr.* ℥j.  
*Martis cum succo pom. gr. xij.*  
*Troch. alband.* gr. ij.  
 Cum Ess. fumar. f. Pilulæ:  
 D. S.

ut supra.

- ℥. *Extr. helleb. n. gri.*  
*Mercurii dulc. an. ℥j.*  
*Mag. lalapp.* gr. 7j.  
 Cum Gumm. amm. in acet. sol. f. Pilulæ:  
 D. S. ut supra.

- ℥. *Aqua Mentb.* ℥i.  
*Extr. Martis liquid.* 3℥.  
*Helleb. nigri.* ℥j.  
*Troch. alband.* gr. i.  
*Syr. de pom. Reg. Sabor.* 3℥.

M. S.

Potio purgans.

- ℥. *Aqua Mentha.* ℥i.  
*Gumm. ammoniaci acet. sol.* ℥i. vel 3℥.  
*Tartari vitriolat.* 3℥.  
*Extr. troch. alband.* gr. i.  
*Syr. de pom. Reg. Sabor.* 3℥.

M. S. ut anteq.

- ℥. *Aqua Mentb.* ℥i.  
*Extr. helleb. nigri gr. xv.*  
*Troch. alband.* gr. i.  
*Scamm. sulphurat.* gr. ii.  
*Syr. Rosar.* 3℥.

M. S. ut ante.

Vel radix hellebori nigri cum foliis sennæ infundantur in aqua florum hyperici & anagallidis rubræ, vel in vino, acuantur cum sale tartari: liquor colatus appropriatum, & egregium erit purgans Melancholicum in principio ad deliria: e.g.

- ℥. *Fol. senn. sine stipit.* ℥ii. ad iii.  
*Rad. Polypod.* ℥iii. ad 3℥.  
*Helleb. nigr.* ℥i. ad 3℥.  
*Sal. tartari.* ℥i. ad 3℥. vel *Crem. tartari* 3℥. ad 3℥.

Stent in Infusione per noctem in loco calido cum f. q. aquæ simplicis, vel anagallidis, florum hyperici, &c. aut feri lactis depurati: mane, facta una aut altera ebullitione, coletur:

- Colat.* ℥iii. adde  
*Aqua cinnam.* 3℥.  
*Syr. de pom.* ℥iii. vel 3℥. ad 3vi.

M. S.

Potio purgans pro una vice.

Item possunt fieri noduli vino infundendi ex appropriatis ad imitationem HARTMANNI cap. 5. §. 7. Vel

- ℥. *Passul. min. cont.* ℥iii.  
*Fol. Senn. sine stipit.* 3vi.  
*Cinnam. cl.* ℥iii.  
*Caryophyll.* 3℥.  
*Crem. tartari.* ℥iii.

Contusa includuntur nodulo, & infundantur in aquæ simplicis ℥iii. stent per noctem in digestionem.

Conuenit etiam unum helleboratum Quercetani, quod videb. in Pharmacop. Est convenientissimum laxativum melancholicorum. Item tartarus vitriolatus ad grana iv. vel v. propinatus est etiam conueniens. Preparandi modus prostat in SCHRODERI Pharmac. vel cum stimulo blandi acuat.

- ℥. *Gumm. ammoniaci cum aceto sol.* gr. v.  
*Tartari vitriolat.* gr. iii.  
*Extr. aloes gumm.* gr. ii.  
 Cum Ess. Gum. amm. f. Pilulæ:  
 D. S.

Pilulæ purgantes.

Post helleborata sunt imprimis sennata; eadem tamen, punquam sine stimulo tartareo præscribenda: e.g.

- ℥. *Passul. min. contus.* ℥iii.  
*Coqu. in f. q. aquæ;*  
*Colaturæ.* ℥iii. infunde  
*Fol. Senn. sine stipit.* 3vi.  
*Cinnamom.* ℥iii.  
*Caryophyll.* 3℥.  
*Crem. tartari.* ℥iii.

Stent in loco calido per noctem vase probe clauso; mane coletur:

D. S.

Potio laxativa.

Dosis ℥iii. vel iv. & alius blandè laxatur.

Loco horum conueniunt etiam pro scopo laxativo massa pilularum de ammoniaco Quercetani, massa pilularum tartarearum Quercetani, massa pilularum de fumaris, item, quod rarius fit, de lapide Lazuli, & extractum melanagogum Quercetani.

Purgantibus his & uomitoriis semper præmittantur Digestiua, absorbentia acidum, imprimis Martialia: e.g.

- ℥. *Vitrioli Martis rittè par*  
*Terra sol. Tartari an. p. æqu.*

Terantur in mortario lapideo, sub tritura liquefit, hinc blando calore exsiccentur, & iterum terantur.

Dosis scrup. j.

Vel cremor tartari & vitriolum martis solvantur in aqua fervida, & in crystallos flavescentes coagulentur. Item conuenit tinctura vitrioli martis Zuelfleri, essentia martis liquida, vel liquor martis solaris; vel pulvis ex cremore Tartari & sale Tartari: Vel

- ℥. *Lapill. cancr. præp.* 3℥.  
*Corall. rub. præp.*



*Croc. martis alterat. an. ʒʒ.*

M. f. Pulvis

div. in 2. part. S.

*Pulvis digestivus.*

ʒ. Matr. perlar. prap. vel lapill. cancr.

prap. ʒʒ.

*Arcan. duplicat. ʒl.*

*Salis absinth. ʒʒ.*

M. f. Pulvis.

div. in 2. part.

D. S.

Ut antè.

ʒ. Sal. ammoniaci,

*Salis Absinth.*

*Lapill. cancr. prap. an. gr. xv.*

*Laud. opiat. gr. li. vel iii.*

M. f. Pulvis pro duab. dosibus:

D. S.

*Pulvis digestivus pro duabus dosibus.*

Vel

Convenit Potio digestiva in *Idea Formul. Class. 3. §. 1.*

Quoad remedia alterantia: ea vel respiciunt acidum corrigendum, vel crasin sanguinis emendandam, & per urinam purificandum, & quasi curandum malum hypochondriacum. Vnde ex simplicibus specificè conveniunt omnia ea, quæ in malo hypochondriaco & melancholia hypochondriaca usurpantur: quibus addenda simul splenetica antiscorbutica. Et quidem acidum corrigunt Martialia, Saturnina, corallata, aliaque acidum absorbentia: quibus addenda est tinctura lunæ vera. Sanguinem alterant & per urinam mundificant tartarea, tam fixa, quam volatilla urinosa, aliàs contra malum hypochondriacum usitata. Quibus tamen in specie vegetabilia temperata, aliàs cordialia dicta, à Veteribus ceu specifica contra affectus melancholicos laudata; item splenetica quolibet sedulo addenda sunt. Talia reverà temperando specificum acidum in melancholicis saporem operantur, suntque *sumaria anagallis*, *hypericum*, *borrago*, *buglosa*, poma dulcia, præsertim Borsdorffiana, quæ ceu alterativum specificum ab omnibus Practicis laudantur, flores tunicæ, &c. in specie *crocus* & *camphora*, quæ immediatè agunt in spiritus & eorundem dyserasiam alterant.

*Martialia* quod attinet; convenit horum usus pro scopo alterandi in cursu curæ, imprimis Infusum martis cum succo pomorum Borsdorffianorum, quod largiter propinatum est specificum; item fiat extractum Martis cum succo pomorum, (pomorum succus cum Marte se saturat, & non fermentat, sed liquor nigrescit, & perquam diu persistat). Porro omnes croci martis aperitivi, non saturati; item tinctura martis Mynsichti, essentia martis liquida, tinctura vitrioli Martis Zuverfieri, liquor martis solaris à gutt. xx. ad xxx. manè pulvis cachecticus Hartmanni, & similia, inter alterantia in Deliriis Melancholicis primatum ducunt, & optimè conveniunt. Faciunt etiam huc Acidulæ melancholicis optimæ: Sic GABELCHOVERVS Cent. 2. Curat. 69. refert mulierem melancholiâ hypochondriacâ gravissimè laborantem, per potum acidularum curatam, sed quæ ex balneo eorum pessimè habuit: Sicuti etiam thermæ melancholicis maximè nocent. Conf. BRVNNE MANNVS Conf. 5. de Melanchol. Hypochondr.

Post hæc quoque excellit Saturnus, & eius imprimis saccharum, quod frequenter usurpatum dosi ʒl. egregium & specificum est in melancholia imprimis hypochondriaca compescenda, & ex hoc ipso parata tinctura cum vitriolo martis, aliàs tinctura antiphtisica dicta. Loco huius etiam crystalli minere saturni cum spiritu nitri aceto acuato paratæ specificæ sunt in mania & reliquis melancholiis. Loco harum vel solum saccharum Saturni singulariter convenit, quo ipso Monachus quidam Italæ omnes maniacos & melancholicos curavit propinando quotidie: Sanè juvenem philiatrum novi, per solum & frequentiore saturni sacchari usum à Melancholia gravi hypochondriaca curatum. Metus, quod steriles reddat, est inanis.

Cognata sunt martialibus corallia rubra, vel eruda, vel quæcunque ex his parata, non saltem quod acidum simpliciter destruant, sed & quod sulphur eorum contra tristitiam, anxietatem, Melancholias & Deliria, appropriatum sit; unde tam in substantia propinari possunt, quam

*Ettmull. Oper. Tom. II.*

in specie eorundem tincturæ veræ, quæ præmissis universalibus singulare quid obtinent in Deliriis Melancholicis, imprimis si reducantur ad statum volatilitatis. Sed quia eiusmodi tincturæ sunt raræ, usurpetur loco harum tinctura coralliorum cum spiritu ligni sassafras parata, item cum spiritu cordis cervi, additæ essentia ambra. Egregium enim remedium est tinctura coralliorum cum spiritu cordis cervi in tristitia, anxietatibus cordis, huiusque palpitatione, aliisque angustis melancholicis, ob sulphur, simul etiam egregiè ad phantasmata melancholica dispellenda confert: c. g.

ʒ. Tinctura Corall. cum spiritum cord. cervi

vel

Rosar. par. ʒj.

Ess. Meliss.

Croci an. ʒʒ.

M. S.

*Singularis Tinctura Corallorum.*

Vel essentia fumariz mista cum tinctura coralliorum, antiscorbutica est egregia.

Ad lunaria spectat tinctura lunæ vera, non cœrulea, quæ omnis est impossoria, & tantùm est tinctura veneris cum luna imprægnata. Siac Venere enim tinctura lunæ colorem cœruleum nunquam repræsentat: sed luna purissima aliquoties cum saturno optimè purificetur, ita emergit hinc tinctura ex rubro obscuri coloris (vid. BARTHO-LINI Aethor. Med. Hassniens. Volum. 1.) in melancholicis deliriis præmissis præmittendis ceu appropriatum alterativum est optima: vel harum loco magisterium lunæ, ob id à quibusdam Ger. das Narren-Pulver dictum, (videatur ROLFINKII Chym. sub tit. Luna;) Fatui enim resituuntur beneficio huius medicamenti. Potest cum aliis absorbentibus misceri, v. g. coralliis rubris preparatis; aliàs ingratum habet saporem, vomitus & nauseam concitat. Item aqua cephalica, in qua extinguitur luna cum sulphure calcinata, extinguendo eandem ab omni calcinatione, in affectibus melancholicis præstans est.

Maximè quoque à quibusdam laudatur lapis Lazuli, tanquam singulare remedium ad affectus melancholicos, tam in forma pulveris ad imitationem HARTMANNI propinatus, quam sub forma tincturæ smaragdina cum spiritu vini & spiritu urinae. Verùm lapis hic sanè est concretum hermaphroditicum, participat itidem de luna & Venere, unde in quibusdam non ritè preparatus facit vomitus. Ratione ergo lunæ affectui melancholico succurrit, unde paretur ita, ut eliciatur saltem vis lunaris, relicta substantia Venerea, & pro usu servetur; sic enim habebitur appropriatum specificum, alterans causam peccantem. Dosis à guttis xii. ad xx. Misceatur commode cum essentia anagallidis composita, hoc modo:

ʒ. Ess. Anagall. compos. ʒiii.

Tinctura lap. Lazuli ʒi.

M. S.

*Essentia Cephalica & Splenetica.*

Dosis 40. vel 50. Gutte.

Ratione huius lapidis confectionem alchermes optimè convenire ad melancholiam, præmissis medicamentis hypochondriacis, dicunt; maxima tamen vis dependet ab Ambra, quæ confortat melancholicos, hinc etiam usurpari potest essentia ambra.

Juxta hæc inter alterantia appropriata eminet speciatim arcanum duplicatum Mynsichti, quod est egregium in omnibus Deliriis melancholicis, & mihi frequentis usus medicamentum: hinc quoque nitrum antimoniatum, in specie cum camphora.

Insuper ex regno vegetabili quædam temperata afferuntur. Præ cæteris tartarus & tartarea quolibet sunt optima, sive pro scopo digestivo humorum in primis viis usurpentur, sive pro scopo alterativo & diuretico: hinc cremor tartari, tartarus vitriolatus, cremor tartari mistus cum salibus aliis lixivialibus, in specie cum sale absinthii, cum sale fraxini, item cum ana salis tartari, est egregium digestivum in affectibus melancholicis. Imprimis conveniunt volatilla, quæ vi diuretica & acidi destructiva melancholicos juvant: Talia sunt imprimis spiritus & sal tartari volatilis, tinctura tartari, aut etiam spiritus vini tartarifatus. Paratur spiritus tartari volatilis ex tartaro diversimodè, & optimus est in affectibus melancholicis. His præfero spiritum carminativum ex nitro, tartaro, spiritu vini, &c. qui est convenientissimus, dum in paroxysmo hypochondriaco & Melancholia gravior mœstitia, angustia



slie & anxietates cordis, palpitaciones ejus, &c. gravis urgent: in tali casu, præter coralliatam, spiritus hic carminativus est optimus à 3ß. ad ʒi. propinatus, nunc solitari-  
us, nunc spiritui salis ammoniaci sociatus; in cujus lo-  
cum tinctura nephritica composita seu clyssus urino-  
sus substitui potest. Perrinet huc etiam liquor tartari  
diaphoreticus cum succis Dn. D. Rbesfeldii, qui ita se ha-  
bet:

24. Succ. express. Piperit. ʒiv.

Cochlear.

Raphani mar.

Nasturt. aquat.

Hortens. an. ʒi.

Distis addit

Spiritus tartari probè rellif. ʒi.

Mista hæc omnia, & digesta aliquandiu, destillat ali-  
quoties lento igne in Mariæ balneo.

Dosis à ʒi. ad ʒß. optimè conferens pro scopo alterandi in  
quacunque melancholia, præsertim hypochondriaca, non  
minus quàm in aliis melancholiæ speciebus; sic enim vel  
per sudorem vel urinam operatur.

Remedia ex borragine, buglossa, fumaria, & simili-  
bus, quæcunque eorum alterantia appropriata per se nota  
sunt, & speciatim in largiori dosi pro vehiculo reliquo-  
rum inserviunt. In specie tamen fumaria præ cæteris est  
utilis, & omnia ex fumaria parata remedia; Unde essen-  
tia fumarig composita nostra pro scopo alterandi optimè  
convenit, si miscetur cum essentia seu tinctura martis li-  
quida; e.g.

24. Ess. fumar. compos. ʒiij.

Tinctura martis liquid. ʒiij.

Ess. Croci ʒi.

M. D. S.

Essentia Cephalica & Splenetica, pro una dosi ʒo. gutta.

Usurpatur ter in die:

Vel

24. Ess. martis liquid. ʒiij.

Fumar. compos.

Croci ab. ʒi.

Camph. gr. v.

M. S. ut antè.

Dos. ʒo. vel 40. guttæ.

Vel in forma Noduli:

24. Herb. scolopendr. M.ij.

Fumar. M. iß.

Flor. borrag.

Bugloss. an. M.ij.

Tunic.

Violar. an. M.ß.

Cort. samar.

Frazmi an. ʒvj.

Rad. polypod. vel cnula,

Limat. martis an. ʒi.

Cinnam. ʒiij.

Incisa & contusa includ. Nodulo:

D. S.

Nodulus ad vinum.

Post fumariam succus pomorum Borsdorffianorum depu-  
ratus, vel etiam omnia ex pomis parata remedia, v. g.  
syrupus de pomis, extractum Martis cum succo pomorum  
diutius contigendum, vel solitarium vel camphoratum,  
Interponendo interdum usum spiritus salis ammoniaci;  
extractum granorum chermes cum succo pomorum ex  
Hartmanno & similia; item extractum & syrupus de  
succo borraginis, item buglossæ, à veteribus laudantur  
in majori dosi, & crebrius usurpantur; essentia splenetica,  
medicamenta quæcunque ex lupulo, & similia.  
Apud RHODIUM Cent. 1. Observat. 44. insculis cicho-  
raceis in prima mensa haustis Melancholia hypochondria-  
ca profligata fuit. Sed hæc sunt clara ex Cura mali hypo-  
chondriaci. Eminent quoque anagallis flore phoeniceo,  
quæ communiter dicitur Ger. *Vernmiffes-Kraut*, & hinc  
hypericon: Hæc enim duo mirè conferunt contra phan-  
tasmatata melancholica, sive tantum coquantur in aqua  
appropriata, & propinentur, sive fiat essentia & tinctura  
composita: quod pertinet tinctura hyperici Mynsichti, quæ  
ad Deliria Melancholica & Maniaca ab eodem commenda-  
tur, quotidie bis vel ter usurpata; item essentia anagallidis  
composita D. Michaelis, quæ ad ʒo. vel 60. guttas bis in die  
sumatur: Tinctura hyperici Mynsichti datur pro dosi ad ali-  
quot cochlearia. Sassafras, ejusque conservæ, item essen-

tia satyrii, magnam vim habet morores & tristitias pel-  
lendi, inquit Autores: sed observetur in usu, ne sit Me-  
lancholia erotica seu ex amore, utpote quam potius erra-  
vat. Essentia & conserva cum aliis mista conducit. Hele-  
nium miram vim ad spiritus excitandos habere RONDE-  
LETIUS Prax. l. 1. cap. 9. dicit. Crocus præ reliquis sin-  
gulare quid obtinet, & optimum est simplex ad affectus  
melancholicos cum & sine delirio dispellendos: nam insi-  
gniter convenit ad volatilisandos & subrilisandos spiritus,  
utut occultâ narcoticâ vi eos figat; hinc HARTMAN-  
NUS in Praxi Chymiæ. meritò commendat essentiam  
croci cum aqua vitis destillata paratam; cui tamen meritò  
præfert LINDANUS croci essentiam cum aqua betulæ,  
mense Martio ex furculis profuente paratam, utpote  
cùm dicta aqua betulæ per se sit egregia pro scopo altera-  
tivo humorum & diuretico in melancholiis, sive sit aqua  
destillata betulæ, sive per fermentationem purificata, &  
ita propinata. Essentia croci summa cordis lætitia à PA-  
RACELSO vocatur, cùm simul habeat vim sudorife-  
ram, & pro scopo efficiendi spiritus mirè convenit; un-  
de etiam Lindanus meritò etiam syrupum ex succo borra-  
ginis, cui crocus additus sit, in præsentibus affectibus sin-  
gulariter commendat. Siquidem & externè crocus inno-  
dulo circa serobiculum cordis appensus egregiè convenit  
ad tristitiam, incertitudinem & angorem Melancholicorum  
curandum, ut BORELLUS Cent. 2. Observat. 99. de  
muliere Melancholica continuò morante, gestatione  
croci super cor curatâ, refert. Melius tamen est, quod  
solen facere, ut croco huic addatur camphora, & appen-  
datur dicto loco, quia est optima. STOECKERVS in  
Praxi insigniter commendat in affectibus Melancholicis  
hanc aquam destillatam:

24. Fl. Anthos,

Borrag.

Bugloss. an. ʒiv.

Croci ʒi.

Mal. Coton. ʒiv.

Vini albigener. ʒiij.

Mista digerantur per 15. dies, & de-  
stillantur.

Aqua propinetur ad ʒi. quam lubet asservandam tan-  
quam pupillam oculi. Sed an tantæ sit efficaciz, nescio,  
& ferè dubito. Datur, uti dico, in affectibus melanco-  
licis ad ʒi. subinde repetendo.

Croco non cedit Camphora, & ejus essentia, quæ vel sin-  
gularissima est in mania, & omnium optimè conducit; ita  
etiam in reliquis Deliriorum Melancholicorum speciebus,  
tam internè cum saccharo saturni, vel arcano duplicato  
permista, quàm cum croci ʒi. noduli formâ suspensa &  
aliquandiu gestata. Exemplum novi in quodam amico,  
qui terroribus subinde affligitur & hoc ipso amuleto egre-  
giè levatur. In forma quoque epithematis externè capiti  
applicari potest, quando deliri conquiescunt de perturba-  
tione capitis; v. g. hoc modo:

24. Aqua flor. sambuc.

Hyperic. an. ʒiß.

adde

Camph. gr. vi. vel ix.

M. f. Epithema: S.

Epithema externum.

Quod applicatur fronti & temporibus, & benè confert.

Internè non adhibeatur, nisi præmissis præmittendis, e. g.

24. Pulv. cachect. Hartm. ʒi.

Corall. rubr. præp. ʒß.

Camph. gr. xv.

M.

div. in 3. part. æqual.

D. S.

Singularis pulvis cephalicus & spleneticus.

Quarum una capiatur omni manè.

24. Arcan. dupl. Myns. gr. xxiv. vel ʒß.

Corall. rub. præp. vel Mag. Corall. cum succo  
citri ʒi. vel gr. xxiv.

Camph. gr. iv.

M. f. Pulvis pro duabus dosibus:

D. S. ut antè.

24. Arcan. dupl. ʒß.

sacch. saturni gr. xli. ad scrup. i.

Camph. gr. vi. vel laud. op. gr. iv.

Misc. pro duabus dosibus:

D. S. ut supra.

Capiant



Capiantur mane & vespere, sepeantur aliquoties, in specie vespere tempore somni; nam camphora Melancholicos disponit ad somnum.

℞. Mag. corall. cum succ. citri, vel Corall. rub.   
 præp. gr. xij. ad xv.   
 Sacch. Saturni gr. viij.   
 Camph. gr. iij.   
 M. f. Pulvis.   
 D. S.

Pulvis vespere sumendus.

Vel omiſſa camphora addatur Laud. opiat. gr. ij. vel Extr. croci gr. v.

℞. Sacch. Saturni gr. v. vj. ad ix.   
 Laud. opiat. gr. ij.   
 Ol. deſt. Camph. gutt. iij.   
 M. f. Pilulæ: S.

Pilula ante ſomnum ſumenda.

Capiantur tempore ſomni.

℞. Extr. Martis cum ſuc. pom. ʒi. ad ʒʒ.   
 Camph. gr. ij. vel iij.   
 M. f. Bolus pro una vice.   
 D. S.

Bolus vespertinus pro una vice.

℞. Aqua Borrag. ʒi.   
 Arcan. duplic. ʒi.   
 Mag. corall. cum ſucc. Citri ʒʒ.   
 Camph. gr. iij.   
 Syr. Borrag. ʒʒ.   
 M. S.

Potio vespertina pro una vice,   
 Capiatur pro una vice.

℞. Aqua Anagall.   
 Borrag.   
 Flor. hyperic. an. ʒi.   
 Arcan. duplic. ʒi.   
 Sacch. Saturni ʒi.   
 Camph. gr. vj.   
 Syr. borrag. crocat. ʒi.   
 M. S.

Potio cephalica, & ſplenetica coſueat ſumenda,   
 Capiat inde æger pro lubitu.

℞. Aqua Anagall.   
 Meliſſ. an. ʒiʒ.   
 Arcan. duplic. ʒʒ.   
 Spec. dia. ſaturni Myſ. ʒi.   
 Camph. gr. v.   
 Syr. flor. borrag. vel Meliſſ. an. ʒʒ.   
 M. S. ut ante.

Vel

℞. Aqua Anagall.   
 Flor. hyperic.   
 Cordial. Herc. Saxon. frig. an. ʒi.   
 Eff. Enul. vel fumar. compoſ. ʒli. vel iiii.   
 Croci ʒi.   
 Tinct. Corall. cum ſpir. cord. cervi ʒiʒ.   
 Eſſ. Ambræ gutt. xv. ad ʒi.   
 Camph. gr. vi. vel ſpiritus vini camph. ʒiʒ.   
 Syr. de canell. vel flor. tunice, vel borrag. ʒi.   
 M. S.

Potio confortativa pro aliquot vicibus.   
 Subinde uſurpanda coch. i. vel etiam ii.

Semper camphora medicamentis alterantibus pro affectibus melancholicis & maniacis addenda venit; camphora enim immediate ſpirituum animalium vitiatam craſin alterat; cùmque tota nil aliud ſit, quàm ſal oleoſum, hinc conſequenter ſociabilis eſt ſpiritibus, internè & externè uſurpata.

Interdum pro ſudoriſero convenit præter miſturam ſimplicem imprimis ſpiritus ſalis ammoniaci volatilis, qui ad curam mali hypochondriaci, & hinc Melancholicæ eſt opetimus, imprimis ſi miſceatur cum ſpiritus carminativi ana; vel pro ſcopo diuretico

℞. Spirit. ſal ammoniaci ʒiii.   
 Ligu. terre ſol. tart. ʒiii. ad ʒʒ.   
 M. S.   
 Eſſentia ſplenem aperiens.   
 Doſis gutt. xxx. ad l.

Hiſce Eliſyr proprietatis ſemerci cum ſuccis paratum, tinctura coralliorum cum ſpiritu cordis cervi, ſpiritus & ſalia volatilla, pro circumſtantiarum ratione etiam accenſenda ſunt.

Ubi phlogoses frequentiores adſunt, ac eſtuationes vagæ, item ubi humorum alteratione & per urinam evacuatione magis indicium, arcanum duplicatum, nunc ſolitarium, nunc aliis ſociatum, eſt optimum. Sand huius uſu agrypniam melancholicis nonnihil emendari, ſuit obſervatum.

Denique pro ſcopo analeptico, unà cum laudabili diæta, convenit eſſentia meliſſæ, eſſentia corticum citri vel corticum aurantium, elixyr citri, tinctura ſolis cum oleo cinnamomi Myſſichti, tinctura coralliorum, eſſentia helonii, & ſimiles. Uſurparietiam poteſt in paroxyſmo melancholico Opiata antimelancholica TIMÆI von Guldenklec, quam crebrè commendat in paroxyſmo. Compoſitio eſt hæc non inelegans:

℞. Conf. de hyacinth. ʒi.   
 Alchermes ʒʒ.   
 Lap. Bezoar ʒi.   
 Smaragd. præp. ʒii.   
 Corn. alcis ſine igne ʒi.   
 Mag. ſuccin. albi } potius præp. an. ʒi.   
 Perlar. }   
 Corall. rub. }   
 Spiritus Roſar.   
 Rubi idai,   
 Lil. convall. an. gutt. xlii.   
 Syr. flor. Paon. q. ſ.   
 M. f. Eleſtuarium.

Aſſumatur in aqua appropriata à ʒʒ. ad ʒi.

In diæta ſerum lactiſtæ ſimplex quàm medicatum, & alia lacticia dentur, niſi quid obſtet; Item remedia ex pomis, imprimis Borsdorffianis, vinum ex paſſulis cum ſucco pomorum Borsdorffianorum fermentatis, & denique omnia alimenta rore nutritio turgida, minus ſqualida, & minus arida, conveniunt, ut jam ſuprà notatum. Nam bene edunt Melancholici; ſi non appetant, malum ſignum eſt. In ſpecie vinum generoſum præmiſſis præmittendis mire convenit Melancholicis, ſi præmiſſis merore quati ſuccumbant, utpote quod ſpiritus excitat, lætitiâ quandam conciliat, animum exhilarat, & ſimul ſomnum inducit, modò non in nimia doſi capiatur, ne phlogoses excitentur; & quamdiu hæc urgent, ab illo abſtinendum. Egregium vini uſum in affectibus Melancholicis videb. approbatum à GABELCHOVERO Cent. 3. Curat. 18. in ſchol. & THONERUS lib. 2. Obſervat. 3. reſert, quod quidam Melancholicus in ſummo gradu hauſtu vini tandem revocatus & ita curatus fuerit.

Ut res exemplis fiat clarior:

Sacerdos Melancholicus accipiebat primò ſyrupum emeticum duabus vicibus, hinc liquoris martis ſolaris ʒʒ. doſi xx. ad xxx. guttas omni mane:

℞. Sacch. Saturni ʒiʒ.   
 Laud. opiat.   
 Camph. an. gr. viij.

Miſcebantur pro 4. doſibus vespertinis.

Item   
 ℞. Arcan. duplic. ʒi.   
 Corall. rub. præp. ʒi.   
 Camph. ʒʒ.

Miſc. pro 6. doſibus vespertinis.

Item interpoſito blando laxativo ex tartaro vitriolato cum ſcammonio præparato & trochiſcis alhandal. Continuavit ante meridiem ſolutionem Martis cum ſucco pomorum: à meridie verò

℞. Arcan. duplic. ʒii.   
 Camph. gr. xv.   
 Sacch. Saturni ʒii. ad ʒi.

Miſcendo pro 8. doſibus.

Finem curæ tandem ſpiritus ſalis ammoniaci aliquamdiu continuatus abſolvere ſolet.

Alium melancholicum, qui ſibi violentam manum iniecerat, ſimili ſerè modo curavi:

Primò ordinavi jam dictos ſex pulveres ex arcano duplicato, corallis rubris præparatis, & camphora; de quibus quotidie binas doſes capiebat, mane & vespere: Hinc exhibui ſyrupi emetici ʒvj. cum levamine: ſed manebat anxius, & multum bibebat. Hinc uſurpabat liquorem martis ſolaris, doſi xx. ad xxx. guttas omni mane; appetente verò nocte

℞. Sacch. Saturni ʒi.   
 Laud. opiat. gr. ij.   
 Camph. gr. iij.

Miſc. pro doſi, ſub introitu lecti.



Post tres dies repetit vomitorium sequens:

℞. Tartari emet. ℥ss.

Vitriolat. gr. viij.

Misc.

Assumebat eum egregio levamine.

Post continuavit manē liquorem martis solaris, & à meridie octo illos pulveres Sacerdoti melancholico præscriptos, ex arcanoduplicato, saccharo saturni, & camphora; & sic continuando & alvum servando apertam, restitutus fuit.

Puerpera, cujus mater in puerperio sæpius delira melancholica fuerat, cum omnia in partu recte se habuissent, nihilominus decimo quarto die puerperii fiebat melancholica, & hinc tantum non maniaca. Hicce verò curata fuit: Applicabatur clyster carminans: hinc

℞. Solut. Martis cum succo pom. ℥ij.

Ess. Croci ℥j.

Misc.

Dosis 40. vel 50. gutt.

Continuavit per triduum: Sed cum die quarto ferè fieret maniaca:

℞. Tartari emet. Myns. gr. vj.

Dabam mane; quo bene operante placida reddebatur; hinc

℞. Arcan. duplic. gr. xv.

Sacch Saturni gr. v.

Camph. gr. iij.

• Miscendo pro pulvere: •

Capiebat horà quintà vespertinà. Sub introitu verò lecti præscribebam:

℞. Sacch. Saturni gr. v.

Land. opiat. gr. ij.

Ol. deff. Camph. q. f. pro pilulis.

Quarum usu cum multò melius habuisset, continuavit adhuc essentiam Martialem superiorem. Sed cum aliquot adhuc diebus supervenirent pathemata quædam hysterica, indiciebat idem clyster carminans, & assumebat cochlearium sequentem Potionem:

℞. Aqua meliss.

Hirund. cum castor.

Menth. an. ℥j.

Spiritus sal. ammoniaci ℥j.

Cochlear. ℥ss.

Camph. gr. v.

Syr. de cort. Aurant. ℥ss.

Misc.

F. Potio.

Cum verò alvus non bene responderet, purgabatur leniter per Decoctum sennæ cum cremore tartari; hinc continuabatur eadem solutio martis, sed cum spiritu vini camphorato mista. Cum hinc optime se haberet, & saltem de capitis perurbatione adhuc conquereretur, præscribebam sequens Epithema:

℞. Aqua flor. sambuc.

Hyperic an. ℥ss.

Camph. gr. vj.

Miscendo pro Epithemate,

aliquoties fronti applicando, & ita convaluit.

Externè, præter suprà dictum epithema camphoratum, & nodulum ex camphora & croco, emplastrum extacamahaca capiti raso applicatum commendatur ab HOECHSTETTERO Dec. 9. pag. 319. Alii

℞. Tacamahac.

Gumm. Caram.

Anime an. p. æqu.

Ex his liquefactis faciunt Emplastrum simili modo applicandum.

Sed non opus est: sufficit tacamahaca, quæ egregii usus ad Deliria melancholica. D. SCHOLZIUS in M. A. N. C. Ann. 3. Observ. 157. Species sequentes tanquam expertissimas in Melancholia à fastu commendat:

℞. Herb. beton.

Verben.

Flor. Chamom.

Salvia,

Sambuci,

Rorismar.

Nymph. an. p. ii.

Sem. Fenic.

Nigell. præp.

Coriand. præp.

Anethi an. ℥ss.

• Concisâ grosso modo misceantur & subigantur cum farina & aqua, fiat lege artis panis, qui rescissâ inferiore crustâ, parùmque excavatâ medullâ, instar mitæ calidè capiti impositus fuit.

Quodsi junctum sit splenis vitium, præter interna saturnina emplastrum de nicotiana splenis regioni applicatum convenit.

Quodsi phlogoses frequentiores adsint; aut caput nimis aestuet, ita ut Mania metuatur, observavi limum recentem cum aceto subactum, plantis pedum & cervice applicatum, nonnihil prodesse, renovando subinde; nam fortiter adhæret, ita ut vi avellendus sit.

## M E M B R U M I I I.

### D E

### M A N I A.

**A**bsolvimus Deliria Melancholica. Superest verò adhuc summus deliriorum melancholicorum gradus, & magis crudelis species, ex eo, quia homines omnino quasi in bruta transmutantur; estque ista melancholia, quæ aliàs parva dicitur Græcis, Latinis Infania, Germanis die Raserey oder die unsinnigkeit, quæ tale est absque febre delirium, (ut ut mania cum quoque febris corripere possit,) quo correpti ægri melancholici cum insigni furore & audacia, deposito omni pudore, & exurâ quasi omni ratione in tantum, non in totum, planè feroces redduntur, ita ut, quæcunque objecta aggrediuntur, eadem diffingant & lacerent, multa absurda loquantur & faciant, cum insigni furore serviant in alios, etiam in se ipsos, adeo ut quoscunque homines obviam venientes verberibus malè mulcent, & impediti gravioribus contumeliis & conviciis eosdem lacerant, ita ut ob furorem & quæcunque perpetrandi audaciam catenis subinde devinciendi & arctè incarcerationi sint ægri, & si sui juris sunt, interdum aufugiunt, quin & sese, nisi defendantur, nonnunquam jugulant aut suspendunt, & horrenda peragunt. Pertinacissimè vigilant, ita ut FERNELIUS referat, quendam maniacum per quatuordecim menses insomnem fuisse.

In his deliriis maniacis verò observandæ sunt tres circumstantiæ: nempe Furor, Robur, & Frigoris tolerantia mirabilis. Imprimis considerabilis est furor iste, quo tales ægri quæcunque perpetrare audent, qui tamen furor insignis & hæc apparens audacia non est planè absque aliquali meticulositate & absque timore interno, imprimis erga custodes suos. Nam si furiosi aut maniaci aliquem meruentem, vel pavidum vident, in eum audaces promptè irruunt; sed si audacem & constantem quem vident, eundem formidant; quin & si ab aliquo aliquando verberibus excepti fuerint maniaci, eundem admodum metuent, & quæcunque ratione possunt, fugiunt. Audaciæ huius, vel potius temeritatis, conjunctum est insigne, & tantum non stupendum in maniacis robur, cum validissima ferramenta diffingant & disjiciant, & quæcunque obvia subito conterant & devastent: Sic BENIVENIUS observat nutricem maniacam, quæ dentibus quæcunque obvia comminuit, & etiam validissima diffregit. Conf. BARTHOLINUS Cent. 2. Hist. 69. Hoc robur est stupendum, ut subinde tres robusti viri unum maniacum non possint retinere. Quod ipsum tamen non adeò proprium est solis maniacis, quin & interdum in graviore febrili quasi phrenetico delirio observetur; quale exemplum refert PANAROLLUS Pent. 4. Obser. 49. ubi quidam phreneticus in vigore febris cancellos ferreos, ac cerei essent, tractavit, & pondera ingentia facillimè elevavit, qui tamen transacto morbo (nempe febris & phrenitidis) vigore adeò imbecillis fuit, ut vix surgere potuisset. Aliàs tamen in maniacis Robur ordinariò observatur. A phrenitide hinc Maniaci distinguuntur, quod nulla iis adsit febris prægressa, nullum signum graviter affecti capitis aut cerebri. Cum demoniacis quidem subinde confunduntur sed in hoc ferè differre observantur, quod hi sæpius per vomitum ferramenta, crines, aliaque inconsueta soleant rejicere, id quod saltem in veneficis contingere solet. Accedit hæc tertium notatu & consideratione dignum in maniacis, insignis nempe frigoris, etiam intensissimi, tolerantia. Ut plurimum enim maniaci omnes vestes lacerant, & inde etiam in gelu hyberno ita jacent, aut per vias ambulant, idque sæpe membris nudis, aut solo indusio amictis, sine ulla corporis exinde contracta læsione. Sic LINDANUS refert,



fert, vidisse se Amstelodami Gallum quendam maniacum in ergastulo, qui nudus in intensissimo frigore hyberno solo solo indusio amictus incedebat, quamdiu nempe furor perduravit, quique accedente paroxysmo caput antliæ submittebat, aquam frigidissimam capite excipiens, levamen sentiebat. Quod etiam facit exemplum FORESTI *lib. 10. Observ. 22.* de mullere maniaca, quæ in hyeme nuda in lecto jacens, corpus tamen habuit admodum calidum, ubique sordido sudore perfusum: Hoc ipsum fit partim ex statu massæ sanguineæ, quæ intus vitiosè exæstuat, partim verò ex eo, quod maniaci in furore constituti vim frigoris minùs sentiunt atque percipiunt. Hoc ipsum tamen, nempe tolerantia frigoris, ut plurimum eundem adest in maniatis, non tamen semper, nec in omnibus observatur, sed tantum ut plurimum: Interdum enim observati fuerunt maniaci vestibus cincti, aut vestes sub gelu hyberno postulantes & de frigore conquerentes; quale exemplum RIVERIUS *in Observat.* habet. Quod etiam facit observatio rarissima PLATERI *lib. Observat. pag. 82.* de quodam maniaco, qui hyeme, frigore intensissimo, perit, & manè congelatus inventus est. Interdum quidem, sed rarò, conqueruntur de frigore; quod, si accidit, bonum signum est.

## CAUSÆ.

His ita de Maniæ affectis prælibatis, accedo ad causas. Quod ergo attinet Causas Maniæ: arbitror deliria maniaca non differre radicaliter à reliquis Melancholiis, & deliriorum melancholicorum speciebus, sed saltem circumstantiis quibusdam observabilibus, ob crasin spirituum animalium plus minus læsam. Nam quod non differant in radice, patet, quòd nonnunquam ambo hæc inter se transmutentur, cum videamus, quod Mania confabulationes & cantus, similiaque hilaritatis phænomena, nonnunquam interjecta habeat, & melancholicos fieri maniacos, & melancholicos subinde manere, qui ante fuerant maniaci: quò imprimis pertinet observatio dignissima observatio RIVERIO à FOMIO *communicata 32.* de Mania gravissima, post quælibet extrema remedia, nempe arteriotomiam, persistente in juvene, quæ tandem castratione fuerit curata, ita tamen, ut per castrationem cessaret ista Mania, & remanserit delirium melancholicum. Multum habet in recessu hæc observatio. Conf. etiam LOSSIUS *lib. 1. Observ. 23.* Sicuti è contrà non rarò melancholici mœsti & tristes, aut aliàs delirii, interdum in maniacos planè exacerbantur & transeunt: imò Maniæ paroxysmi cum melancholico delirio alternare solent, hocque illius gradus tantum remissior videtur: Unde etiam Mania, non secus ac aliæ melancholiæ species, iisdem omnindè remediis, eademque medendi methodo, curari solent, saltem quod in Mania remedia in majori dosi adhibeantur. Nempe, ut loquitur LINDANUS, in melancholia sanguis frigidus & siccus, in Mania calidus & siccus, h. e. textura talis est sanguinis asperior, minusque succulenta nutritiva, ut utrobique dominetur acidum, sed mitius & fixius in melancholicis, acrius & subtilius in maniatis. Est nempe Mania talis melancholiæ species, quæ cum summa morositate & omnium objectorum tadio, adeòque facili iracundia, cæque subinde intensâ, conjuncta est: uti enim observantur melancholiæ cum tristitia, uti dantur melancholiæ cum risu, cum cantilenio, cum amore; ita similiratione datur melancholia cum intensa iracundia seu furore, quæ est nostra Mania. Hoc ut fiat clarius, consideremus saltem hominem aliàs sanum & rectâ ratione utentem, summè tamen & admodum iracundum; aut saltem consideremus ebrium ad iram provocatum: (nam quibusdam ebriis in more positum est, ut insigniter incendantur:) in quibus sanguinis status & morus turbescientiam febrilem; spirituum verò alteratio & impetus eorum sub mania constitutionem ferè repræsentat. In talicasu, præsertim ebrii, considerate actiones, & videbitis in his ipsis quandam Maniam naturalem. Quæ enim non aggrediuntur, & quæ non perpetrant tales ebrii? Mirandum, quantâ audaciâ instructi sint, & omnia tentent, & quantum caleat subinde eorum corpus. Similiter, si in melancholia ex quacunque causa, subinde ex irritatione externa, aut ex positu astrorum, aut ex interna massæ sanguineæ aucta nonnihil fermentatione, & tunc Acido melancholico volatilifato magis assurgunt affectus iracundiæ, perfectum habebitis maniacum. Nam omnis iracundus solet esse robustior, quàm quando est animo pacato, & ratio inepta est regimini spirituum animalium in ebrietate admodum ferocientium. Ipsi melancholici ordi-

nariò sunt morosi, facilièque ad iram provocari possunt; unde etiam melancholici faciliè ad verbera prorumpunt: quò facile sit, ut auctâ in iis morositate, & inde natâ iracundiâ, in Maniam degenerent. Cum ergò in radice & essentia conveniant Melancholia & Mania, dum hæc, sedato spirituum impetu & fervore, v. g. per castrationem, in melancholiam degeneret, illa verò concitato spirituum jam male constitutorum impetu in maniam assurgat, sequitur, differentiam harum proximè in spiritibus animalibus eorumque constitutione & motu consistere: qui in constitutione melancholica quidem alterati, obscuriores & fixiores existunt, & quasi ad acetosam naturam accedunt; acerrimi, & aquei fortè seu stygiæ analogi quodammodo fiunt in maniatis; ut pluribus hoc deducit WILLISIUS *de Anima Brutor. Part. 2. cap. 12.* qua acri volatili aciditate illorum extraordinaria ista caloris in toto corpore impressio, & hinc frigoris tolerantia. Verùm sicut in omni irato & iracundo est quædam exæstatio & agitatio extraordinaria massæ sanguineæ, unde etiam totum eorum corpus calore plus minus excessivo percipitur perfusum; ita in maniatis & ipsa massa sanguinea, unde generantur tales spiritus, crassa quidem & spissa, plus tamen solito agitata, sub rapido circulo movetur, & à spirituum consortio vehementiorem concipit æstum, quàm naturaliter: id quod manifestatur partim per pulsus, partim per respirationem: Nam pulsus in maniatis est plenus, frequens, & satis magnus; respiratio ipsa est frequens, alta, & satis magna. Ipse verò sanguis veng sectione sensus, observatus fuit à LINDANO crassus, spissus, & intensè calidus, ita tamen ater, ut atramenti speciem retuleret. Et ita in maniatis massa sanguinea acido quidem vitioso abundante turget, volatiliiori tamen & faciliùs mobili, unde intestino motu fermentativo intensius agitata simul plus solito vehementiorem concipit calorem, indeque corpus calidum & frigoris tolerabile redditur; quin etiam, iisdem, ut iracundis, audacia ex spiritibus nonnihil velocius motis intensa conciliatur.

Vulgò juxta GALENUM à temperie cerebri calida & sicca, seu atra bile, hoc est, melancholia adusta, deriunt Maniam, quam RIVERIUS *lib. 1. Prax. cap. 13.* rejicit: Hanc autem atram bilem ex Pathologicis præsuppono nil aliud esse, quàm vitiosum acidum effervescendo exasperatum, ac ita quodammodo volatilifatum & acrius redditum. Ab hoc nim vitioso, sed admodum acuto, acore humor atrabilarius aquæ & terræ iniectus effervesceat & ebullire, vel fermentare Veteribus dicitur: Unde etiam faciliè in melancholicis ac maniatis vitiosus acor inductâ effervescentiâ exasperari & volatilifari potest, ut ita maiorem & intensiorem acquirat gradum, quem etiam atram bilem appellant: Vid. WILLISIUS *de Anima Brutorum loc. cit.*

Causa ergò Maniæ cum delirii melancholici causa eadem est; scilicet Causa proxima, eaque formalis, consistit in spiritibus animalibus, quoad crasin suam & morum plus minus vitiat, & quasi acidulis: Causa proxima materialis & remota verò querenda est in massa sanguinea acidâ, ut vocant, atrabilaria, minus spirituaſcente, ultio primarum viarum, imprimis stomachi, intestini duodeni, & viscerum inferiorum in hypochondriis; unde cum melancholia in fundamento convenit. Videantur, quæ supra Memb. 2. de causis melancholiæ dicta sunt. Spiritus animales quod attinet; hi degenerant penitus à crasi feminali naturali & sulphureo-salino volatili, cum ex sanguinis dyscrasia acida inquinati generentur ipsi spiritus vitales & animales quidem, subriles tacti & agiles in suo genere, sed acres salini & quasi sulphureo-acidi, indeque nimis mobiles, & in motibus suis ordinariis minus coercibiles, hinc acrimoniâ suâ hinc inde penetrantes, & in continuo motu existentes, ratione quorum maniaci semper irrequieti & insomnia sunt. Iidem sunt acriores & sulphureo-acidi, dum prorumpunt, sensum quandam caloris in iisdem excitant, ut externum frigus percipere non soleant; quibus adiungitur simul aliquis sanguinis exæstatio. Quin etiam isti spiritus acriores ad partes delati & irruentes, iisdem tam validum robur conciliant, ut sub motu partes quasi rigide & semi-convulsæ appareant, unde tantum robur obtinent.

Causa remota, ut dixi, hæret in dyscrasia massæ sanguineæ. Hinc est, quod dicant, oriri ex constitutione atrabilari: unde in radice conveniunt Melancholia & Mania: Illic peccat vitiosum acidum in hypochondriis; hic idem, sed exasperatum, adeòque acrius redditum. Causæ igitur remotiores sunt ferè eadem, quæ reliquarum melancholiarum, ita ut, quoad causas internas remotas, ad primas vias, & vi-



scera hypochondriaca, eorumque functiones, nunc immediate nunc mediate vitiatas, semper respectus habendus sit: V. g. excretio sanguinis solennis suppressa, in specie hæmorrhoidum, menstruorum, lochiorum, &c. in iis, qui inclinant ad habitum melancholicum, uti melancholiam, ita interdum etiam Maniam inducit, quod FORESTUS lib. 10. *Observat.* 24. testatur: Sic ex hæmorrhoidibus suppressis maniam notat ZACUTUS LUSITANUS lib. 1. *Prax. Admir. Observat.* 51. Sic etiam ex ulcere intempestive clauso orta Mania observata fuit: sed aperto rursus ulcere æger convaluit. In specie ulcerum antiquorum & varicum curationem & oclusionem Insequitur mania; sicut varices & ulcera sponte exorta maniam non raro solvunt: nam hoc iam satis de MARCO, antiquo Romano, constat, quod ex oclusionem varicum in cruribus fuerit redditus maniacus: sicut è contrâ HIPPOCRATES *sect. 6. Aphor.* 21. inquit: Si infans varices & hæmorrhoides superueniant, solutionem fieri mania. Facit huc, quod refert FORESTUS l. 10. *Obs.* 24. de puella, quæ post ulcus in crure inueteratum nimis citò curatum, & propter menstruam purgationem longè suppressam, in maniam incidit, quæ postmodum curata fuit, & restituta scilicet saphenâ menstruis fluentibus. Item HENRICVS ab HEER *Observ.* 14. recenset furorem in puerpera ob malè tractatas mammæ, in quibus mammis, apertis pustulis & evacuato purè, omnis Mania omnino cessavit. Subinde etiam febres ardentes acutæ, pleuritides & epilepsiæ diuturnæ in maniam subinde degenerant: Sic enim HENRICVS ab HEER *Observ.* 3. observat insaniam post febrem acutam ex melancholia contractam: & post quartanas diuturnas singularis quædam mania species singulariter quoque tractanda, vid. in SYDENHAM *Observat. de Morb. Acut.* pag. 112. Sic post varias maniam natam videbitis in M. A. N. C. *Ann.* 6. & 7. *Observat.* 93. pag. 133. Pariter melancholico & maniaco delirio communes existunt graves animi affectus. Seminis retentiones diuturnas Maniam inducere, probat furor uterinus. De hæreditario charactere res aliàs nota est.

Quoad causas externas: in specie venena nonnulla narcotica assumpta vim habent specialiter inducendi Maniam, seu potius affectum quendam Mania similem: Sic BARTHOLETUS de *Respir.* lib. 5. cap. 3. pag. 405. refert: radice salani furiosi infusam vino, amico semel propinari vidi, qui post ejus haustum ita extrarationis lyram emoritur, ut delirans extra fenestram magna vi se deicere tentaverit, quem illico vomitus citri succo & frigido potu excitatus in rectam rationem reduxit: Idem etiam vidit hyoscyami nigri semen certa dosi datum jurgiosam & contumeliosam effecisse stultitiam: Ex esu napelli maniam lethalem notat WILLIUS *loc. cit.* Sed differentias mania à medicamento extrinsecus assumpto ab ea, quæ ab interna oritur causa, idem BARTHOLETUS *cit. loco* refert. Nempe in illa somnolenti somnia concepta firmiter impressa effutunt & ajunt, cum in vera Mania valde vigilent, & quasi cum ratione insaniant. Sic cerebrum sellis comestum maniacam insaniam inducere dicitur: vid. SALMUTH *Cent.* 3. *Observat.* 100. In specie philtro subinde juvenibus Manias vel demencias potenter inducunt, speciatim si parata sunt cum menstruo muliebri, præsertim primo, ut refert PETRÆUS in *Diff. Harmon.* 3. lib. 1. §. 16. & confirmat BORSELLVS *Cent.* 1. *Observ.* 65. ubi dicit, Theologum prope urbem Castensem à philtro menstruum muliebrium, cum leporis sanguine in condimento sumpto, in maniam tantam incidisse, ut patrem proprium occiderit. Veneni illius remedium sunt margaritæ preparatæ. Sic RULANDUS refert, à propinato per veneficam veneno quondam per sexennium quorannis bis epilepticum & maniacum factum, tandem evacuatione forti particulari per sternutationem, & universali per infusionem croci metallorum, curatum fuisse. Jucundum est, quod rusticus maniacus sternutamento forti excitatus excreta eruca curatus fuit: vid. M. A. N. C. *Ann.* 4. & 5. *Observ.* 37. pag. 35. ut ut minus propriè dicta Mania videatur.

Dictum, insignem esse audaciam, robur & similia; hinc habentur à quibusdam pro demoniacis, pro quibus etiam habentur epileptici secundi gradus.

## DIAGNOSIS.

Quod attinet signa Maniarum: Mania levi admodum negotio cognosci potest, cum illa satis pateat.

Imminentis verò duo signorum genera observantur; quo-

rum alia remotiora sunt, & dispositionem tantum ad hunc morbum denotant; alia affectum proximè imminentem indicant. Illa sunt (1.) ægri temperatura atrabilaria vulgò dicta; (2.) sexus, ratione cujus viri ad maniam magis proclives sunt feminis; nisi ex utero & partibus spermaticis tale quid contrahant (3.) ætas juvenilis præ senili: Propinquiora verò denud observantur vel communissima, vel communia, vel propria. Communissima delirium in genere portant, scilicet dolor & gravitas capitis assidua, vigilie contumaces, aut somni interrupti, insomnia turbulenta, & aurium sonitus. Communia Mania cum morosi & melancholia observantur curæ & solitudines molestæ, ac terrores ex levi causa. Propria denique mania signa sunt, quando ægri continuò & multa absurda loquuntur & faciunt, hisque interlicitur taciturnitas meditabunda, sæviunt cum quodam furore & temeritate in obvios, & etiam in seipsos, adeo ut quoscunque obvios unguentibus & morsu instar bestiarum aggrediantur; quin & interdum, nisi prohibeantur, seipsos interdum interimant, aut suspendant, aut jugulum abscindant. Præterea & pertinacissimè vigilant maniaci, accedit robur insigne, tolerantia frigoris &c. Oculi nonnullis sanguinolenti, item torvi & truculenti conspiciuntur, præceps & frequens iracundia, ex minima vel nulla iusta occasione, splendores oculis obversantes, proclivitas ad Venerem inconsueta, pollutio nocturna frequentior, risus præter consuetudinem & rationem, &c. Hæc sunt signa Mania.

Porro cognoscendum, quomodo distinguatur Mania ab aliis affectibus cognatis? Ex quidem Aphrenitide differt in eo; quod nulla adsit febris, nullumque signum graviter affecti ipsius cerebri, ut fit in phrenitide. A demoniacis verò distinguuntur maniaci, cum quibus etiam interdum confunduntur, qui tunc tandem sunt habendi pro demoniacis, quando perpetrant talia, quæ superant humanam potentiam, & in natura non sunt perpetrabilia, quando sæpius per medicamenta vomitoria serraamenta, frustra lignorum, animalculæ viva, aliaque in corpore aliàs non reperibilia, aut non ingesta antea, solent recidere; quod semper demonis ope à veneficis & incantatoribus oriri solet.

Quid habendum sit de iis, qui in delirio peregrina lingua loquuntur? res ardua est. Habentur communiter pro demoniacis; quod tamen videtur magnum effatum; sed potius aliquid naturale subest: Vid. MARCUS MARCI. Certè prostant observationes de melancholicis, qui in delirio plura calluerunt, quàm post deliria. Vid. SCHENCKIUS in *Observationibus*.

## PROGNOSIS.

Quod attinet Prognosin. Mania à causis internis excitata in genere est malum admodum diuturnum & curatu difficilimum; quod, etsi interdum per menses & annos quoddam remittat, subinde tamen melancholiam post se relinquit; quæ facilitatione exasperata, postmodum novâ atrocità recurrit, & sæpe ad mortem usque comitatur ægros, imprimis si melancholia & Mania fuerit hæreditaria: quæ mania hæreditaria semper est incurabilis, nisi palliativè, certis anni temporibus reiterans.

Quæ tamen mania est cum risu & actionibus ridiculis, mitior est & tutior, quàm ista, quæ est cum temeritate & quadam sævitia, nimio furore & audacia.

Porro in maniacis si alvus sit ritè aperta, & in specie, si menses & hæmorrhoides ordinario naturæ cursu fluant, bonum est signum: si verò mania superveniat hujusmodi fluxus suppressio, vel si sub mania supprimatur, pejor est; Mania enim degenerat interdum in alios morbos.

Mania per metastasin superveniens sudor, aut alvi fluxus, aut hæmorrhagia parium, hæmorrhoides, uteri, dysenteria, aut hydrops, aut tertiana, aut quartana, aut varices, aut scabies & similia, item alius quidam morbus, præsertim abdominis, maniam terminat. Sola dysenteria sæpius est funesta, propter acerrimam acrimoniam humoris corrosivis intestina, quæ ad gangrænam terminat: Subinde, tamen etiam in hydropem terminasse observatum fuit; sed periculofum.

Dum intèreunt maniaci, virtutum satiescentiam ex vigilis, inediis, & continuo motu ferè vitæ terminum patiuntur.



## C U R A.

In Cura ante omnia opera danda est, ut furor mitigetur, & eo facilius tractabiles fiant infani, pro medicamentis melius adhibendis. Id quod optimè fit per venæsectiones iteratas, & valida vomitoria; quibus subiungenda sunt appropriata alterantia, dyscrasiam spirituum & sanguinis emendantia. Spiritus imprimis reficiunt camphorata & moschata, sanguinem verò ceterosque humores Martialis & Saturnina, somniferis maritata, de cætero, si paroxysmus furoris est sedatus, simul observanda sunt etiam ea, quæ suprà Membro 2. monui in melancholicis.

Radix ergo curationis consistit in vomitoriis validis & generosissimis, (sunt enim fortes, & equine nature:) quæ omnibus maniacis, (si ab animalibus venenatis demorli & iæti, excipiantur) non tantum in principio, sed morbi etiam progressu, maximè proficua sunt; non tantum, quod radicem mali, siue ab assumptis siue dispositione intrinseca illud fuerit, præscindant, sed quod mites & tractabiles admodum ægros reddant, adeoque non tantum indicationi præservatoriæ, sed curatoriæ quoque satisfaciant, spirituum efferationes aliquantum supprimendo, hinc ad venæsectionem aliorumque remedium admissionem disponant. Veteres in hoc casu, & primus autor HIPPOCRATES, helleboro albo usi fuerunt cum felici successu & operato cum eventu, vel quia ex climatis ratione mitior his ipsis fuit, vel quia concinnius ac nos præparare & propinare eundem noverunt: Nam apud nos violentum est remedium, & quod vix, præterquam in contumacioribus melancholicis, & præsertim Mantis, locum inveniat. Facile quidem nos posset terrere GEIGERUS in Tr. de Microcosm. Hypochondr. cap. 23. qui refert, quendam maniacum ex usu Decocti hellebori albi convulsam interiisse: id quod etiam HIPPOCRATES in Aphor. observat, dum inquit: *Convulsio ab helleboro lethalis*. Simile exemplum recenset HELMONTIUS Dispens. Modern. §. 30. Satis tamen tutum & specificum maniacorum est remedium. Non igitur præscribendum in subjectis tenerioribus, v. g. scæminis; ab eo enim abstineant: vid. SIMON PAULI Quadr. Botan. pag. 6. Scilicet juxta BENEDICTUM SYLVATICUM Cent. 1. Observat. 33. vix unquam in substantia erit propinanda radix hæc, sed tantum ejus infusum cum vino, primâ saltem vice illam infundendo, alterâ simul leviter ebulliendo, ac tertîâ diutius coquendo ac exprimendo: Hinc Helleborismus Fleurii, scilicet ejus infusum simplex cum vino Hispanico aut Malvatico paratum. Felicem ejus usum suadet LINDANUS super Hartmann. in Prax. Chymiat. per propriam experientiam confirmatus; hic enim refert curam melancholici per helleborum album per se institutam: Dicit nempe quod pro ablatione Maniæ non cognoscat generosius remedium, quàm helleborum album & oxymel helleboratum. Cum impetu sursum & deorsum evacuat, & maniacos insigniter curat. Præparandi modus hellebori est hic:

24. Rad. helleb. albi à 3ß. ad ʒi.

Coquitur in vino, donec mollescat: radix ubi cocta est, eximatur, vinum verò decoctionis abiciatur; (non potest hanc præparationem satis laudare;) radix verò hæc ita præparata in aliud vinum initicitur, & ita per noctem relinquitur, absque coctione tamen in loco calido; tunc mane hoc vinum, vel sine expressione, si minus validum esse velimus, vel cum leviter fortiori expressione, prout magis vel minus validius exposuletur, propinatur.

Vires hujus vini sunt optimæ, nec unquam satis laudatæ. Dosis summa ʒi. quæ sufficienter operabitur. De usu hujus Vini LINDANUS in Colleg. suprà Hartmann refert: Habui virum juvenem viginti quinque annorum, qui adeo infans erat, ut bene munito cubiculo includeretur. Totum ferè pavimentum attollebat; Nam crasso palo humi infixio alligatus erat catena in utroque pede & manibus, sic nudus semper ambulabat. Hunc prima vice cum adirem, nihil potui efficere, secunda feci, ut ignarus hauriret vinum helleboratum supradictò modo præparatum ad ʒi. unde fortiter purgabatur à vi x̄i latæ. Prima hæc purgatio illum omnibilibi lassabat, ut tanquam mitis ovis redderetur: sic constituto venæsectionem adhibui, & eduxi magnam sanguinis quantitatem, ferè ʒxxx. qui non grumescere, sicculentus, aser & horridus aspectu erat; unde ita lassatus non quidem amplius adeo insaniebat, nondum tamen animus constabat. Sæ-

quenti itaque (nempe quarto) die vomitorium ex helleboro reiteravi, quo egregiè vomuit multa & varia, ex quo plane quietus, querebatur de frigore, & postulabat vestimenta, rogatus an tegi vellet? cubitum abiit. Hoc videns, altero die venæsectionem, sed parcam, iterum adhibui, & sanguis erat melior. Hinc bonum cibum præparare iussi, gallinas cum endivia, &c. Hunc septimo vel octavo die, tertîa & ultima vice dedi præfatum vomitorium ex helleboro ad ʒß. unde iterum copiosissimè vomuit, nondum tamen mens constabat. Ob id denique dedi Decoctum subtile in vino in diplomate (nempe Mariæ balneo) factum, ne vinum possit exspirare, ex radice polypodii, filicis, scorzonerie, cum herba endivia & borraginis magna quantitate: cui decocto bonam quantitatem seminis papaveris albi sub finem decoctionis addidi, item radicem hellebori nigri ad ʒiij. pro scopo alterativo & laxativo. Hoc Decocto quosidie bis ter vel quater suis expigatus, & sic illum curavi, & plures alios etiam maniacos. Inter alia pergit, matronam quandam Leidensem saltem bis reiterato dicto vomitorio ex helleboro curavi: In puncto insanie unum maximè observabile est: quia spiritus sunt in furibundo motu, compesti debent, si fieri potest, per opiatum; sed non in forma solida sed liquida: Et si hoc obtineas, ut obdormiscant, statim post cum apto vomitorio est properandum. Quoties somnum potui conciliare, feliciter curavi; aliàs vix admittunt quicquam. Ego statim excessivum in exhibendis medicamentis generosissimis: nam non deducter in actum à spiritu, quia spiritus defixus circa aliud obiectum, cetera negligit. Hæc LINDANUS.

Aliàs loco hujus Helleborismi ad maniam & reliquas melancholias in usu etiam sunt infusa vomitoria antimonialia, & dicit LINDANUS quod aqua benedicta antimonialis ipsi sit successoria: sed vix semper sufficiunt, quia sunt nimis debilia, nisi Mercurium vitæ excipere velimus. Eiusdem generis est aurum vitæ Kelgeri, à POTERIO & FABRO valde commendatum; item folia Asari: cuncta tamen in majore, quàm aliàs, dosi propinanda, prout de delirio melancholico dictum: e. g.

24. Conf. fol. Asar. ʒi.

Pulv. rad. Asari ʒij.

Merc. vitæ gr. i.

M. f. Bolus: S.

Bolus emeticus pro una dosi.

24. Oxyfacc. emet. A. S. ʒvj.

Ext. helleb. nig. gr. ij.

M. S.

Succus emeticus pro una vice.

Quæ tamen ubi sunt debiliora, ad helleborum album confugiendum est. Et certè credo, esse optimam præparationem hellebori albi ad imitandos Veteres in affectibus maniacis eradicandis. Si antimonialia non sufficiunt, infusum rasuræ unguium humanorum est etiam validum, & omnia vomitoria antimonialia superat.

Si in principio morbi interdum per inferiora fieri debeat purgatio seu evacuatio. usurpentur superius Membro Anteced. in Melancholia allegata, imprimis usurperit helleborus niger, qui secundum FREITAGIUM optimum in hoc affectu purgans est, ejusque extractum & extractum melanagogum Quercetani, item syrupus de helleboro nigro, & oxymel helleboratum Gesneri. Quibus semper addendus est stimulus validior ex antimonio per inferiora purgante, aut ex Mercurio vitæ laxativo, &c. cum, secundum PARACEESUM, appropriatum purgans melancholicorum sit antimonium, uti heridixi: e. g.

24. Est. helleb. nig. ʒiß.

Anagall. ʒß.

Srr. emet. Ang. S. ʒß.

M. S.

Succus purgans.

24. Fol. Scm. sine stip ʒij.

Rad. helleb. nig. crud. ʒiß.

Flor hyperic. p. ii.

Terra sol. tartari ʒß.

Infund. in f. q. aquæ Anagall. per noctem, manè ebull. & experim.

adde

Syr. de spina cervina ʒiij.

M. S.

Potio purgans pro una vice.

Post purgationem validam Venæsectione instituat, eaque copiosa, & quidem sæpius reiteranda, uti antea dictum ex LINDANO; Nam interdum empirici per solam venæsectionem



tionem curant maniacos. Primò instituenda in malleolo, postmodum in brachio & fronte: vid. SYLVIUS & RIVERIUS, PLATERUS *Tom. 1. cap. 3.* & BARTHOLETUS *de Respir. lib. 5. cap. 3.* Sed non priùs potest institui, quàm post vomitoria, paroxysmo cicurato & furore mitigato, propter intrastabilitatem, tunc larga instituenda, quia optimè ferunt. Confirmat hoc PLATERUS *lib. 1. Observat. pag. 80.* de muliere ob mœrorem mania, quæ ab empirico in una septimana septuaginta venæ sectionibus, diversis in locis institutis, fuit curata. Quamvis autem audax satis remedium hoc fuerit, tamen venæ sectio debite administrata convenit. Arteriotomia quoque nonnullos maniacos sanatos MARCUS AURELIUS SEVERINUS *Angiolog. pag. 45.* & PANAROLLUS *Pentec. 1. Observ. 29.* testantur. Spectant huc cauteria & trepanationes calvarie, ut remedium tutissimum, ac utilissimum, à SYLVATICO *l. 4. Observ. 59.* & HARTMANNO *Prax. pag. 57. & 64.* deprædicatum. Quarum tamen hæc secundum SYLVATICUM ad alteram tantum laminam sunt adigendæ: confirmatque præter experientiam SEVERINI *de Efficac. Chirurg. pag. 54.* MERCURIALIS *lib. 1. cap. 16.* & GLANDORPII *Gazophylac. pagina 110.* cauteriorum & cerebationum vim GORDONIUS per historiam maniaci, qui quamdiu vulnus & fractura cranii, quæ passus, aperta, bene se habuit; clauso verò vulnere rediit ad pristinam insaniam: Ut taceam eorum, quæ superius de ulceribus clausis & apertis monita. Imò non tantum vertici & nuchæ, sed brachiis & cruribus quoque, cauteria inusta magnæ efficaciz observantur: vid. EPIPHANIUS FERDINANDUS *Hist. 91.* ROLFINCKIUS *Meth. pag. 413.* & GLANDORPIUS *l. 4. Salivationem quoque per mercurium commendat ROLFINCKIUS lib. 2. Consil. 8.* eaque leviori quendam restitutum *Meth. special. pag. 590.* testatur: quamvis circa applicationis rationem non levia existant dubia.

Quæ omnia interim dum sunt & facta vomitoria etiam repetita sunt, ejusmodi exhibeantur Alterantia, quæ sanguinis & spirituum ferocem magis turgescientiam & efferum motum refranant, varii generis à Practicis annotata, eaque vel interna vel externa. In principio hujus morbi mox excedendus est modus solitus in exhibendis remediis generosis, quia spiritus animales, quando occupati sunt in alio, vix adjuvant in actum deducere medicamenta, ob id valida sunt propinanda, quæ fortius movent & stimulant. Mox ergò in principio insaniz pro effero spirituum motu & effervescentia sanguinis aucta compescenda, unà cum alterantibus opiata & sulphura mineralia, fixa anodyna propinentur. Nam quò diuturnior fuerit affectus, eò minus opiata juvant. Propinanda imprimis sunt in dosi satis valida, aliàs nihil operantur. Et si hoc obtinemus, ut obdormiscant, statim post ad validum vomitorium properandum; sicut enim feliciter operatur. Nam dicit LINDANUS: *Quoties potui somnum conciliare, feliciter curavi, aliàs enim propter morositatem parum vel nihil admittunt.* De cætero, quod attinet reliqua remedia alterantia & appropriata: conveniunt etiam hic omnia ea, quæ aliàs in Melancholia supra *l. 4.* fuerunt laudata, in specie tartarea, martialia & saturnina. Præterea etiam huc facit nitrum crudum & omnia nitrata, quæ studiosissimè usurpentur: singularem enim vim sanguinis æstus & orgasmos domandi habent; in specie quidem nitrum antimoniatum & vitriolatum, aut etiam nitrum saltem purificatum, copiosius cerevisiæ aut potui ordinario, in mensura nempe una potus ʒss. ad ʒj. iniciendum, & ita unà propinandum; Nam egregiè conducit maniacis nimis furiosis. Vel

24. Nitri depur. ʒss.

Camph. gr. viii.

M. f. Pulvis. S.

Pulvis caput confortans.

Vel

24. Nitri depur. ʒij.

Laud. opiat. gr. ij.

M. f. Pulvis.

D. S. ut antè.

De nitri efficacia res curiosa videtur: Nam notum est ex Calibus TIMÆI *von Guldenklec.*, quod aliquando curaverit Muscum salacissimum (qui propter intolerabilem salacitatem castrationem postulavit) per continuum usum nitri crudi. Porro juvenis maniacus ex RIVERO per castrationem fuit curatus. Cum ergò nitrum archetypaliter castraret, hoc effectu maniacus feroces curare videtur.

Præmissis ita universalibus & generosis, tandem & appropriata specifica sunt subiungenda, quæ inter tamen ex appropriatissimis remediis est sanguis asinus arteriosus, prope aures decrecente verno tempore (ultra annum non durat) vel linteum mundato excipiendo collectus, & ita exsiccatus, vel per se collectus, quando grumescit, qui in furno exsiccare patitur: Linteum tale longitudinis & latitudinis digitorum duorum, cerevisiæ vel vino, vel aquæ fontanæ aut anagallidis rubræ vel hyperici vel fumariz infusum, maccatur tamdiu, donec liquor contrahat colorem: qui cum forti expressione propinatus, & aliquoties repetitus, largo sudore, præmissis reliquis, maniacos curat. Quandoque etiam pulvis istius sanguinis exsiccati ad drachm. j. usurpatus in aqua anagallidis simili sudoris effectu maniacos curat. HARTMANNUS in *Prax. Chymiatr. cap. 3. pag. 55.* PRÆVOTIUS & alii meritò hunc sanguinem commendant. Torpor nempe asini sistit furorem maniacum, pigrescunt etenim asinorum instar. Vel

24. Lint. sang. asinino tinct. manus longitudinem & latitud. æquans:

Infund. in f. q. aqua hyperic.

Colat. ʒij. adde

Ess. Anagall. ʒss.

Laud. opiat. ferm. gr. j.

M. S.

Singularis potio cephalica pro una vice.

Post Asini sanguinem vix melius est remediū, quàm Anagallis flore phæniceo. Hujus Decoctio scilicet QUERCETANUS & HARTMANNUS gloriantur se mira præstitisse in maniacis; quod etiam frequentius in usu fuit D. MICHAELIS, qui aliquando furoris fillum catenis alligatum, præmissis præmittendis, beneficio essentiz sue Anagallidis compositæ restituit. Hinc est quod Anagallis hæc quibusdam dicatur salus fatuorum, Germanis *Vernunft Kraut*, quia contra Maniam & etiam veneficia seu maleficia est adeo commendata, e qua Dn. D. MICHAELIS etiam præparavit Essentiam compositam cum spiritu proprio: cui autem meritò præfertur Decoctum. Juxta anagallidem porro imprimis non minimam laudem meretur hypericon, quacunque ratione usurpatum; unde etiam tintura hyperici composita *Mysichri* laudata est in Mania. Porro Fumaria, Nymphaea, Borrage, Melissa, Ceterach & similia, cum alimentis crebrius usurpata, aut alio modo adhibita, pro maniacis in usu sunt. Hinc est *Solanum tetraphyllum* seu herba Paris, quæ 20. diebus continuis ad dimidii cochlearis quantitatem sumpta, ad curam Maniz laudatur, cujus etiam baccas, folia, semen & radicem pulverisatam VELSCHIUS in *Epispaphmat. Observat. 15.* exhibet. Succus polypodii quercini expressus in Mariæ balneo digestus & clarificatus ad ʒiv. vel v. propinatus, nonnullis in usu est; maxime laudatur à BARTHOLETO *de Respirat. lassa. pag. 412.* ejus Decoctum compositum: c. g.

24. Herb. Paris cum bacc. M. ij.

Anagall. purpur.

Flor. hyperic. an. M. j.

Rad. Polypod. querc. ʒj.

Passul. min. contus. ʒij.

Coqu. in f. q. feri lassis:

Colat. ʒij. adde

Essent. Anagallid. ʒi.

Misc.

Hiscæ associanda simul studiosè remedia lunaria superius insinuata. De foliis buxi, eorumque ad Maniam usu, vid. in HARTMANNI *Prax. Chymiatr. cap. 4.* item SENERTO *ubi de Mania.* Aliquando enim cum ordinariis digesta hæc folia minutim incisa continuò ordinata, fuerunt egregia, licet de his propriam experientiam adhuc etiam neget prior; forsitan tamen eorum vis est à blanda narcosi, quæ vegetabile hoc gaudet. De opiatis res clara est, quod etiam subinde in usum vocanda, & semper cum aliis miscenda, in specie quidem cum medicamentis ex anagallide & ex hyperico: item pilulæ ex laudano opiato & camphora, vel cum oleo camphoræ quacunque ratione paratæ, crebrius vespertino tempore, præmissis validis vomitoriis, exhibitæ, egregiæ sunt pro maniacis & melancholicis. Ordinaria tamen dosi parum præstat, quin dupla aut tripla dosi fere conveniat. Quod si eorum usu sequatur somnus, res bene habet; si verò non, deterius fere habent ægri, cum turbulenti magis ac morosi exinde fieri soleant. Propterea bene, præsertim per alcatia, correctum saltem usurpetur opium; præsertim pilulæ ex laudano opiato cum oleo camphoræ singularem



Tandem etiam nonnunquam observatum est, immersione subitanea in aquam frigidam vel fluvium maniacos restitutos esse præmissis præmittendis, quod non ita absurdum videtur. Alii aqua tepidam, alii frigidam volunt, siue dulcis siue salsa fuerit: vid. BENEDICTUS SYLVAVICUS *Cent. 1. Observ. 54.* & FABER *Myrothec. Spagyric. Curas. 1. § 8.* Verùm non tam balneatio simplex, quàm improvi-



sa in aquam demissio, & hinc orta formido seu terror, effectum desideratum præstat, simili ferè ratione atque rabidi curari solent; id quod experientia crebriori confirmatus suadet HELMONTIUS *Tract. Demens Idea* §. 49. Conferri etiam potest BORRICHIUS *de Hermet. Medic. pag. 163.* In pavore mortis enim fiunt placidi & tremuli, & phantasma mortis in aliud mutatur: Nempe furorem maniacum subita alteratio ex inducto gravissimo terrore extinguit, sed tamen Melancholia adhuc remanet.

## ARTICULUS IV.

## DE

## DELIRIIS A CAUSA EXTERNA.

**H**Æc fuerunt ferè deliria, quæ ab internis oriuntur causis, five cum five sine febre. Sequuntur jam ea *Deliria à causa externa*: quæ ipsæ causæ externæ singulari virtute spiritus animales determinant, adeo ut ex illis datur imaginatio, ac subinde stupenda & miranda inducantur deliria. Hæc sunt duplicia: vel

1. A morfu animalium iratorum, & in specie rabidorum; vel
  2. Ab assumptis malignis narcoticis.
- Illic Rabies & Hydrophobia, hic Philtrea sunt consideranda.

## MEMBRUM I.

## DE

## RABIE.

**H**Æc inter præ cæteris eminet, præter vegetabilia narcotica, (à quibus inducta deliria præmissio vomitu optimè acidis, ut aceto, succo citri, &c. cum & sine castoreo, profligantur,) morfus animalium rabidorum ac venenatorum, in specie morfus canis, seu frequentissimus, unde delirium rabiosum seu Rabies oritur, in specie mirabile adjunctum symptoma; *Hydrophobia*. Rabies autem est talis affectus, in quo ipso simul homo planè rabiosus redditur, & omnino in mores brutales transmutari videtur, ut nihil ferè humani apud se retineat, quin homo rabiosus exactè illius bruti mores, gestus &c. referat, à quo rabido demorsus fuerit.

Frequens imprimis est *canina Rabies*, excitata à morfu canum rabidorum, cum præ reliquis brutis canes frequenter rabidi fiant. Præter canes tamen etiam feles, galli gallinæci, lupi, equl, muli, & similia animalia, fiunt rabida, quorum non rarè prostant observationes. Sic enim de mulo rabido refert SCHENCKIUS *lib. 7. Observat.* quod mulus rabidus flumen tranans ac assatim potans fuerit curatus. Sic etiam boves interdum fiunt rabidi, idque imprimis à cane rabido demorsi, teste BARTHOLINO *Cent. 2. Hist. 89.* quietiam *Cent. 1. Hist. 52.* varia habet exempla variorum animalium rabidorum, in specie Rabiei humanæ ex morfu galli gallinæci; & conferatur simul *Cent. 3. Epist. pag. 199.* ubi habetur Rabies equorum, qui natando in mari curati sunt. Nec solum per morsum ab animalibus rabidis reddimur nos homines rabidi, sed etiam ipse homo, aut jam rabiosus factus, aut sine Rabie, modò graviore ira sit percipit, morficando alios similiter potest reddere ferè rabiosos, aut si non Rabiem, revera læsiones malignas ac admodum periculosas infert: Nam, uti rectè refert HILDANUS *Cent. 1. Observat. 84.* morfus ab homine rabido malignus est summè & noxius, & non secus ac morfus à cane rabido curandus; item BECHERVS in *Microcosm. Med. lib. 1. cap. 3. pag. 10.* ubi de saliva, observat hydrophobiam ex morfu humano ortam. Ex notabile exemplum habet BARTHOLINVS *Cent. 2. Hist. 89.* de muliere hydrophobica. In Belgio, in Rheno abluta, quæ cum in curru in civitatem reversura vomeret, animam simul evomit; socia verò venenato vomitu adpersa quinto ab hinc die expiravit. Vid. etiam ZACUTVS LVSITANVS *lib. 3. Prax. Admir. Observ. 88.* qui observat mortem ex morfu hominis irati. Nam omnium animalium iratorum morfus, & adeo etiam hominis, est venenatus & malignus, ut rectè hoc suo tempore observat CELSVS ex Iurisconsulto factus Medicus, quo dicit: *Omnis feræ morfus habet quoddam virus*: Id quod pluribus confirmat HILDANVS *Cent. 1. Obs. 86.* ubi præter

morsum feræ, etiam hominum iratorum morsum lethalem, vel saltem venenatum, pronunciat. Vid. etiam *Disp. nostræ de Morfu Vipera*, & HILDESHEIM in *Spicil.* Ex hoc ipso tamen non sequitur, venenum animalium solum consistere in idea furoris, morfu in Archo nostro sigillata, qua post mortem cessante etiam venenum animalibus deficiat, quæ est sententia HELMONTII in suis scriptis, cujus vestigiis etiam insitit ZWELFERVS. Contrarium, nempe revera in subiecto materiali hæere venenum animalium, ostendit RHEDI *de Vipera*: cui licet se opponat CHARAS *Tr. Experiment. de Viperis*, qui HELMONTII hypothesein defendit mordicus, nihilominus tamen & huic satisfactum est à jam laudato RHEDI in *Epist. Resp. 1. Vid. in Ann. 2. M. A. N. C. Append.* Sed hæc obiter.

In his rabidis notatu digna quædam occurrunt. (1.) Quod etiam levissimus morfus, levissima læsio, vel etiam tantillus salivæ contactus, receptus in homine ab animali rabido, nihilominus suo tempore Rabiem inferat, ut refert HILDANVS *loc. cit.* ubi quidam à sele rabido sola scalpura, per unguem in dextro pollice læsus, vix epidermide læsa seu affecta, nihilominus tamen rabiosus in summo gradu factus est, & omnia symptomata morfus canis insequentia perpassus fuit. Loco citato idem refert HILDANVS de muliere, cujus vestis à cane rabido fuit lacerata, unde mulier consuendo vestem laceratam filum dentibus amputavit, & sic post tres menses hydrophobia facta perijt: Par ferè est exemplum, quod ex alio auctore refert HILDESHEIM in *Spicil. pag. 193.* cuiusdam sartricis, quæ cum chlamydem rabidis moribus scissam sarciendam sumeret, atque ore stamina componeret, & linguâ pannorum suturas lamberet, tertiâ die rabiosam factam esse. Imò levissimum resperio aut alicuius saltem contactus idem malum infert: Quin & infusio silicis à cane rabido demorsi potest hominem furiosum & rabidum reddere, teste BORELLO *Cent. 4. Observat. 22.* Mirabilius est, quod c. l. *Observat. 83.* refert, quendam cum gladio vulneratum, quo ante octo annos canis rabidus occisus erat, post triennium rabidum interiisse. MATTHIOLUS asserit, se duos vidisse, qui spumâ tantum perfusi, nullo accepto ex morfu vulnere, Rabiem contraxerint. Facit huc exemplum CODRONCHII, & PALMARII *de Morb. Contag.* qui inquit: *Vidi ex straminis, in quo rabie perciti sues decubuerant, esu, equos, boves, oves, & reliqua animalia, quæ stramina degustassent, rabiem contraxisse, tandemque periisse.* Rusticus quidam rabie percussus, cum brevi sibi è vivis emigrandum intelligeret, affidentes rogavit, ut sibi liberos ex osculari liceret, quod cum fuerit concessum, liberisque oscula vibrasset, extinctus est: intra septem verò dies & noctes liber eadem rabie percussus, iisdemque cruciatibus torti, brevi interierunt. CAR-DANUS testatur, Venetum Patricium ex osculatione canis rabidi, quem amabat, antequam mitteret ad occidendum, rabidum fuisse factum: item ZACUTUS LVSITANUS *lib. 3. Prax. Admir. Observat. 81.* ex osculatione demortui canis rabidi Rabiem contractam refert. Adeo penetrans, & adeo malignum est istud seminum, quod Rabiem infert.

Præter hoc, nempe inficiendi modum, (2.) notabile est in Rabie five morfu rabiosorum symptoma, *Hydrophobia*, five liquidorum omnium fuga & metus, qui omni Rabiei, à quocunque malo ortæ, solet esse conjunctus. Nempe tales zgri non possunt ferre liquida, sed aspectu eorum contremiscunt toti, anxietatibus affliguntur, & miserabiles torturas perferunt; imò potius siti intereunt, quam tantillum humidigustent. Proprium ergo videtur rabidis, ut aquam metuant. Nihilominus tamen, an solum animalium rabidorum morsum sequatur hydrophobia? res adhuc dubia ex eo videtur, quoniam proflare videntur auctorum observationes, citra animalium morfus eas esse ortas. Exemplum talis hydrophobiæ citra ullum animalis rabidi morsum recenset MARCELLUS DONATUS *Med. Hist. Mir. lib. 6. cap. 1.* item PLATERUS *lib. 1. Observat.* de femina quadam, quæ nocte extra urbem relicta, ac solitudine territa, domum reversa nihil liquidi deglutire potuit, quin illis oblati suffocationis periculum incurrat, & octavâ die extincta est: Conf. BORELLUS *Cent. 3. Observ. 38.* Sic hydrophobiam in febre maligna citra morsum animalis rabidi ortam refert SALMUTH *Cent. 2. Observat. 52.* de quo etiam videndus CODRONCKIUS in *Tract. de Hydrophobia cap. 10.* Duo exempla admodum notabilia hydrophobiæ gravioris in febribus malignis enatæ quartâ, item quintâ die, citra morsum alicujus animalis seu canis rabidi, habet

SAN.



**SANCHEZ** in suis Operibus Med. in Observat. pag. 378. (est Medicus Hispanus.) Quidam medicus Augusti incidit in hydrophobiam cum febre continua citra ullum morsum ab animali rabido, in qua non poterat ferre adspicere aqua neque potus cuiusdam, aut vini, aut infusorum, & quamvis bibere amitteretur, tamen ubi potum aut insula sumpsisset, tanta cum premebat cordis angustia, tantus tremor, tanta corporis totius anxietas, ut cogereetur liquorem emicere foras, ne guttula quidem hausta: agnoscebat quidem se non posse vivere sine potu, nec manus tamen abluere audebat; cumque nobis in ventibus scyphum admovisset, idem horror, & tanta concussio apprehendebat eum, ut totus pertremisceret, ut sudaret & convelleretur: hic quinto die perit. Alterum est simillimum huic. Et in mulieribus vitio uteri hydrophobiam sine morfu canis rabidi annotavit **SENNERTUS** Prax. lib. 4. pag. 277. Vid. etiam lib. 6. Part. 2. cap. 5. pag. 311. Verum in his ipsis hydrophobis, sine faucium aut gulæ ulla affectione, etiam citra morsum animalis rabidi enatis, adhuc hæc odubius, annon aliquando morsus quidam à cane rabido, aut contagium seu inquinamentum ab animali rabido præcesserit? Nam notum est, quod tantillus ex saliva animalis rabidi contactus inserat hydrophobiam, ut ut sæpius per decem vel plures annos contagium hoc lateat in corpore, antequam virtutem suam exferat: quod ipsum ulterius adhuc investigandum venit. Ob id quaestio est: annon in talibus præcesserit aliqualis infectio, ut ut ipsis non adeo cognita? Adeo ut determinati certo non possit, hydrophobiam non esse signum rabidi pathognomicum.

(3.) In Rabie notabile est, quod contagium rabiei illud malignum, ab animalibus rabidis communicatum, subinde ad biennium & triennium, item ad plures & multos annos, absconditum lateat in corpore, donec evigilet, & in actum secundum erumpat: Vid. **SENNERTUS** Prax. lib. 6. Part. 3. cap. 30. pag. 353. Sic **LINDANUS** super **Hartmann.** refert exemplum hydrophobie lethalis in agryta decimo tertio anno post morsum canis rabidi evenientis: & **BORELLUS** Cent. 1. Observat. 74. refert quendam septem annis demum à morfu hydrophobum factum esse: Alius in crure morfus & curatus, longo post tempore, tamen eodem die, & in eodem loco, in quo morfus fuerat, dolore magno in parte demorsa correptus fuit, veneno quasi per integrum annum in eodem loco sopitoacente: Imò per viginti annos hydrophobiam occultatam videb. in M. A. N. C. Ann. 9. & 10. Observat. 43.

(4.) Notabile est, quod subinde animalcula generentur, vel conspiciantur in saliva vel lotio animalium rabidorum, similia iis quodammodo animalibus, à quibus Rabies fuit indulta; unde v. g. vermes catelliformes, aut capillis caeculorum similes in urina taliter egrotantium observantur. Notantur hoc jam suo tempore veteres Arabes, in specie **AVICENNA** & **AVENZOAR**; quod tamen rarum est, unde ex modernis quidam plane negare volunt, sed male. Certum enim est, reperta interdum fuisse talia animalcula, non tamen semper. Fidem facere, aliqualem videtur exemplum illud notabile **SALMUTH** Cent. 2. Observat. 83. de muliere, quæ fuit in fimbria vestis morfa seu lacerata à cane rabido, & ista fimbria saliva adpersa; Unde mulier suspendit vestem laceratam aeri libero, ut exsiccaret, & post unum vel alterum diem in loco, ubi fuit saliva, percepit parva animalcula, quarum capita simillima fuerunt capiti canino. Mulier verò à canis morfu rabida octodecim frusta catellis similia per alvum ejiciens, refertur in M. A. N. C. Anno 8. Observat. 58. pag. 98.

Denique (5.) notabile est, animalia rabida, quæ sunt rabida ab alio animalis rabido, v. gr. homo rabidus, qui ab alio animali, per morsum nempe canis, vel felis, sic rabidus, exactè imitari istorum animalium rabidorum antea lædentium mores & actiones, latrando & singendo instar canis, vel morficando & lacerando instar felis: Sic **COLLE** in Cosmivore Medico pag. 319. refert Rabiem à morfu felis in indice digito, post duas horas lethalem, quæ eger volebat mordere: Quod facit curiosa **BORELLI** Observat. Cent. 3. Observat. 68. de quodam à cane rabido demorso, qui non tantummodo subito factus est rabidus, sed simul etiam instar canum adeo sagax, ut antecedentes amicos, etiam adhuc aliquatepus à longinquo, quamvis non videret, tamen odorati & nominare poterit: Vid. quoque Cent. 1. Observat. 74. & **RHODIUS** Cent. 1. Observat. 46. Sic qui à felle rabida redduntur rabidi, mores felinos

sonoris, unguibus & digitis mutuo in alios invadendo imitantur: vid. **KIRCHERUS** in Scrutin. Pestis loco supra citato. De quo ipso, ut & aliis subinde apud Practicos observabilibus sit fides penes Autores. Hæc sunt symptomata primaria.

## CAUSÆ.

Quod attinet Causas hujus Rabiei, & factæ inde transplantationis morum animalis lædentiæ in animal lætum sub tantillo contagio, illud à nemine hæcenus perspicue explicatum fuit. Præ reliquis tamen curiosè & acutè rem attigisse videntur idearum assertores, nempe **HELMONTIUS** Tract. De mensura Ideæ, de Morbis Idealibus, & simil. & præsertim **MARCUS MARCI** in eleganti scripto, Philosophia Veterum Restituta, qui ex professo de hoc agit, & instar omnium de hac materia potest consuli; item **DAVID von der Becke**, & qui talem sequuntur doctrinam, quod nempe ideæ seminales transplantentur ab animali rabido in animal quod lædunt, mediante contagio spirituofo, à quibus ideis archæus animalis læsi determinetur ita postmodum, ut pro illorum directione, & non aliter, operari queat: Nec adeo abluere videtur **BORELLUS** Cent. 1. Observat. 74. dum vim seminalem veneni accusat. Hi ipsi quidem præ ceteris omnibus non nihil plausibiliter rem explicant; sed idealis hæc hypothesis, ut ut subtilis admodum & prima facie plausibilla videatur, illistamen, qui intelligibilem, seu, ut vocant, sensatam amant Philosophiam, nullo modo satis faciunt. Nam si ad ipsum fundamentum perveniamus, est hæc hypothesis simpliciter idealis. Unde & hic proficendum est, aquam in hisce nobis hætere, & rem à priori non esse explicabilem. A posteriori ergo saltem dari potest hypothesis non nihil plausibilis.

Doctrinæ gratia Fermentum hic peculiare accusamus ab animali rabido per morsum communicatum: nam, quod alii de veneno peculiari habent, id omne ad fermentum est applicandum. Hoc fermentum ideæ, ab animali furente impressas, homini communicat, primario spiritus animales, quod etiam confirmant pathemata convulsiva, secundario massam sanguineam afficit, ita ut serè similes evadant spiritibus & sanguini animalis furentis: hinc fieri non potest, quin easdem quoque actiones edat, quas canis v. g. aut aliud animal rabidum edit. Notandum autem, animalia in se venenata non esse: hinc neque omnis morfus rabiem parit, sed animalis, aut irati aut rabidis; ira enim & furor nocent, & ita maximam partem ideale est; tamen & his adjuncto fluido aliquid acrimonie malignæ subesse, confirmat cura per canceripia, terram sigillatam, radicem gentianæ, &c.

Causa occasionalis & propinquior est saliva fermentescens & effervescens, per morsum insimul vulnere infusa, systemati nervoso, & hinc spiritibus ac massæ sanguineæ communicata; hinc nisi vulnus sit factum, ita ut spiritus animales afficere possit, furor non fit.

## DIAGNOSIS.

Hisce relictis pergo propriis ad ea, quæ potius Praxin spectant; ubi ante omnia observandum: an animal, v. g. canis, fuerit rabidus, qui momorderit, vel à quo quis demorsus, rabiosus fuerit, an non? ut nempe præcaveatur imminens tandem Rabies. Quod ut cognoscatur, nonnulli accuratiores in hoc puncto præcipiunt, ut nubes juglandes recentes contritæ imponantur vulnere facto, & ad aliquot horas super vulnere relinquuntur, quæ postmodum devorandæ obijciuntur gallo gallinaceo vel gallinæ: Quod si animal non fuerit rabidum, gallina non moritur; Si verò fuerit rabidum, altero die interit.

Idem applicandi & judicandi processus est de sanguine: quando alii sanguinem, vel per se, vel per scarificationem, ex vulnere eliciunt, ex eoque cum farina pastam formant, & gallinæ obijciunt, quæ si moriatur, signum est, animal fuisse rabidum.

Simili ratione **Avicenna** præcipit medullam panis vulnere facto affricare & applicare, & sanie vulneris imprægnatam postmodum cani obijcere devorandam; nam si illam medullam non comedere neque olfacere voluerit, aut si moriatur, signum est, fuisse rabidum.

Ipsam canem esse rabidum facillimè ex eo cognoscitur; quod tales canes rabidi omnem cibum & potum averteantur;



multam materiam viscidam sputumque circa dentes, linguam & fauces habeant, interdum ex ore & naribus emittant, torvum videant, oculos habeant rubentes & igneos, quoscunque obvios invadant, notum pariter & ignotum similiter laedant.

Uteriuscane rabidi sunt macilentissimi, caudam demissam sub ventre rebeckunt, linguam exserunt, eamque rubram, sepius croceam, interdum nigram, velociter currunt, & sub isto cursu in obvia quæque impingunt, omnes alios canes adoriuntur, & omnes alios fugant.

De cane rabido vulgò affirmatur, sub lingua ejus latere vermem quendam oblongum, quem alii à se ipsis visum testantur, quo maturè dempto nullus canis rabidus fiat; eodem verò increpente, Rabiem necessariò supervegere, unde quidam ad præcautionem solent extrahere hunc vermiculum: quidam existimant, non esse vermiculum, sed pro sanguinis concrementi particula in venis raninis sub lingua collecta & stagnantis habere. Rem hanc ceu nondum sufficienter exploratam in medio relinquo.

Interim Rabiei & impotentie lumbaris causa in lupis, vermes copiosi, in eorum renibus & aliis locis geniti, observati fuerunt: Vid. M. A. N. C. Ann. 3. obs. 193. pag. 365.

Ubi contagio inquinatus fuerit homo, in specie morsu, sive mox sive post plures annos etiam afficiatur Rabie & hydrophobia, Rabiei incipientis & etiam jam factæ signa sunt, si se offerat anxietas præcordiorum, iracundia citra causam manifestam, si conqueratur æger de molestia aeris ambientis, de corporis gravitate & ineptitudine in actionibus & variis impedimentis, aut de inquietudine, ægri sunt solitarii & morosi, moesti, tristes, uno nomine melancholici, semper murmurent, subinde lucem fugiant, & abstineant à potu.

In parte olim vulnerata solet adesse aut sentiri incipit morficatio & titillatio, aut etiam quidam dolor.

Quod si iam perfecta rabies inchoet, adest membrorum distensio, & quasi convulsiva explicatio corporis, facies rubet, ægri sunt anxii, spumant circa os, oculos horridos habent, quidam latrant instar canum, si à cane rabido morsus sunt; collum & fauces ringunt, & si à cane sit, obviam factos invadunt, & dentibus impetunt; sin à felle, unguibus lacerare tentant; & denique omnibus commune est, ut liquida & etiam aquea horrescant, quorum præsentia etiam admodum anxiosi, interdum etiam convulsi sunt, delirium quasi animi patiuntur; quin imò nunc vociferant, nunc ferè sonos edunt, ludentibus eorum bestis similes, nunc sibi propiores laedunt & infestant, facie sunt horribili, sine ullo somno, inquieti, loca tenebrosa amant, &c.

Febris Rabiosa interdum adest, interdum abest, utut PALMARIUS existimet, Rabiei perpetuam esse comitem febrem.

## PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Imminens Rabies, aut jam incipiens, appropriatis remediis curari potest.

Si verò jam perfecta Rabies adit, præsertim cum hydrophobia, est affectus satis acutus, qui raro perfecte curatur, & spes in angustio hæret; quin sepius, si diutius lateat in corpore seminum rabiosum, homines jugulet; sepius nempe secundo vel tertio, ad summum quarto die ab eo tempore, quo hydrophobia eos corripuerit, moriuntur.

Antequam verò Rabies post læsionem insequatur, observandum est, quod quando in principio, ubi sanguis copiosè à loco vulneris evacuatus & extractus fuerit; item si largiter fluxerit sapies, aut ipsum vulnus recens ritè tractatum sit, spontè vel sudor multus, vel urina, præcipue nigra, evacuetur, præservari potest Rabies & hydrophobia. Nam quod diutius vulnus factum apertum fuerit servatum, eò minor metus adest: E contra post factam ejus consolidationem ineptam, citiorem insulo scilicet, & quod magis fermentum rabiosum intraverit partes nerveas, eò certius hydrophobia metuenda est. Unde præservativè possumus aliquamdiu ægros detinere.

## CURATIO.

Substituimus adhuc in Rabie & affectibus rabiosis, & quidem superest tantum Cura, quomodo Rabies, aut jam incipiens, aut morsus à rabido infectus, debeat curari. Hanc quod attinet, in hac duo tempora observanda: (1.) ipsum tempus primæ læsionis seu vulnerationis & inquinamenti,

facti ab animali rabido: (2.) tempus ipsius Rabiei supervenientis, ubi, licet diu consolidatum sit vulnus, nihilominus tamen venenum jam tum in actum secundum deducitur, & delirium inducitur; ipsiusque adeò hydrophobia, ejusque vel imminens, vel jam præsentis.

1. Ergo quoad prius tempus, ex vulnere facto, quancocumque fieri potest, malignum virus per morsum extrahendum aut delendum, & ob id hujus sanatio non adedcitur perficienda. Quod ipsum vulnus à rabido animali inflictum attinet, quantum fieri potest, apertum servandum; ac præsertim id, quod de saliva adhæret, magno studio removendum: Quem in finem vulnus est ampliandum, ut cum sanguine saliva potius effluat, quam retrocedat.

2. Quoad posterius tempus: observandum est, ut venenum rabiosum, quacumque ratione communicatum, sive jam adhuc recens, sive jam inveteratum fuerit, sive ipsam jam Rabiem inducere incipiat, per appropriata, vel sudorifera, vel diuretica, aliisve mediis per experientiam cognitis, extinguatur.

Pro his scopis obtinendis, in posteriori, scilicet Rabie, id unice agendum, ut fermentum massam sanguineam jam occupans ex corpore expellatur. Ea autem, quæ huic fermento contraria sunt, & venenum expellunt, sunt interna alexipharmaca, tam communia, quam specifica per experientiam cognita, quæ conveniunt tam præservativè, quam curativè. Nam propter rationem Rabiei adhuc incognitam non possumus invenire remedia à priori. Appropriata talia sunt in specie radix gentianæ, radix vincetoxici, alysson Galeni, ruta, hypericon, pimpinella, carduus benedictus, & in specie carduus fullonum, salvia, betonica, myrrha, & similia. Ex his ferè primum obtinet Alysson verum Galeni, quoniam suo tempore GALENUS curavit suos ægros: quamvis, quid hoc propriè sit? dubium inter Autores existat: ejus tamen descriptionem restauratam, videb. in ultima Editione TABERNÆMONTANI pag. 928. sub nomine Alysson primum Hispanicum Galeni. Et hoc Alysson Galeni, optimum dicitur experimentum contra morsum canis rabidi, quocumque modo usurpatum. Usus ejus ferè abolevit, sed habet; Nam RENEALMUS in Observ. suis Essentiam habet Alyssi, qua ipsa curavit aliquot ægros à cane rabido demorsos. Ex his & similibus vegetabilibus confectus est pulvis Palmarii expertissimus contra morsum canis rabidi cap. 3. cuius descriptio est satis nota, & ubique prostat apud Autores, estque talis:

24. Fol. Ruta.

Salvia,

Plantag.

Polypod.

Verben.

Absinth. vulg.

Meusbel.

Artemis.

Metisophrill.

Beton.

Hyperic.

curatur. min. an. qu. v.

Misc. f. Pulvis.

Pulverem hunc Dosi ʒi. ad ʒiſs. vel ʒij. subinde demorsu exhibet in jusclo calido, vel haustu vini, vel cum Theriaca ʒb. & Symplo acetositate citri, expectato sudore, & per 40. dies ad minimum continuat.

Præter PALMARIUM felicem hujus pulveris usum, expertus est SENNERTUS lib. 1. Prax. Pars 2. cap. 16. de Hydrophobia, item TIMÆUS von Guldensklœ in Epist. lib. 5. Epist. 17. pag. 376. Pulverem autem huic tantum tribuere, vix opus videtur. Ex similibus ferè etiam conclusum est euporiston illud infallibile contra morsum canis rabidi in BARTHOLOMIÆ Med. Hassn. Volum. 2. Observat. 110. pag. 275.

Alias semen cardui benedicti, & lactes seu cardui Maris, & quod præstantius habetur, cardui fullonum seu Diplaci, ad ʒij. pro dosi aliquoties manè assumptum expectato sudore, tanquam egregium specificum experimentum commendatur à LINDANO super Hartmann. Item contra morsum à cane rabido radix Vincetoxici ad ʒiſs. vel ʒij. cum aqua cardui benedicti ad 40. dies omni manè propinata, laudatur à quibusdam specificè contra morsum canis rabidi, expectando sudorem. Vehicula, in quibus assumuntur hujusmodi pulveres, optima sunt aqua scordii, aqua

cardui



cardi benedicti, uti aqua tormentillæ, aqua theriacalis, aqua rutæ caprarix, cancerorum fluviatiliū, & similes cum spiritu theriacali: Vel

℞. Pulv. rad. Contraierv.

Gentian.

Pimpinell.

Vincetox. an. ℥j.

M. f. Pulvis.

div. in 4. part. aqu.

D. S.

Pulvis venenum pellens.

Poterō terra sigillata, item terra Lemnia, & imprimis terra S. Pauli seu terra Melitæ, itidem internæ ad morsum canis rabidi conducunt. Theriaca etiam & theriacalia, *Mithridatium*, *Electuarium de ovo*, &c. præcipuum obtinent locum, & sunt in frequenti usu, à ℥j. ad ℥ij. assumta. Sed præ his magistralibus compositionibus præ cæteris theriaca dia-tessaron est præferenda, quoniam ejus quatuor ingredientia, nempe gentiana, myrrha, &c. ferè sunt specifica contra morsum canis rabidi. Hoc ergo, modò cum opio acuetur, erit remedium maximè appropriatum ad Rabiem. Aliàs mistura simplex laudatur ab HARTMANNO, tanquam remedium à se expertum, quod propinandum est in tali casu cum copiosa aqua cancerorum fluviatiliū, aqua Poterii; prout B. D. MICHAELIS Tincturam bezoardicam, vel misturam simplicem non absque successu, expellendi per sudorem venenum canis rabidi, propinare consuetus fuit; item essentia theriacalis, cum essentia absinthii; sed omnia in dupla dosi exhibenda: ut

℞. Aqua flor. hyperic. ℥ss.

Theriace. ℥ss.

Tinctura Bezoard. ℥ss.

Eff. lapill. cancer. ℥j.

M. pro dosi cum sudore.

D. S.

Potio sudorifera pro una vice.

℞. Mixt. simpl. ℥ij.

Spir. cancer. ℥j. ad ℥ss.

M. D. S.

Mixtura sudorifera gustatim sumenda.

Dentur 60. gutt. pro dosi.

℞. Spiritus theriacal. camph. ℥ij.

Cancer. fluviat. ℥j.

M. S. ut supra.

℞. Theriac. ℥j.

Salis Absinth. ℥ss.

M. D. S.

Electuarium sudoriferum pro una dosi.

Detur in haustu vini aciduli.

Ab his autem alexipharmacis per integrum anni quadrantem monest desistendum: Nam sæpe post 40. dies, aut aliquot menses interdum & post integrum annum, iterum se prodidit hydrophobia.

Quod si verò sudoriferorum usus intermittatur, tamen specifica adhuc aliquamdiu continuanda. Lapilli cancerorum unum ex optimis specificis sunt, unde & Bezoar rabidorum audiunt; unde

℞. Lapill. cancer. præp.

Cornu cervi ust. præp.

Maxill. lucii pisc. præp. an. ℥j.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis pro 3. dosibus.

Dosis ℥j.

Nam si quid aliud, in canceris fluviatilibus est vis certa & specifica contra morsum canis rabidi, jam à GALENI tempore laudata. Recipiuntur nempe cancri, non isti, qui dicuntur *Gammari* seu *Astaci*, seu qui caudis sunt longis; sed eligendi sunt speciatim cancri non caudati, seu rotundi, Germ. *Taschen-Krebse*, quales reperiuntur ad loca maritima, tam in Italia quam Belgio. Hi enim sunt genuini cancri ad morsum canis rabidi à veteribus commendati; conf. BARTHOLINUS Cent. 2. Hist. 89. quorum tamen defectu etiam nostrates cancri fluviatiles seu *Gammari* seu *Astaci* non penitus privandi sunt virtute contra morsum canis rabidi, atque ob id penitus rejiciendi, sed commodè usurpari possunt: Nam loco cancerorum fluviatiliū etiam testæ ostrearum superiores calcinatæ, simili modo applicatæ & usurpatæ, proficue sunt. Colliguntur cancri post ortum canis seu tempore canicularium, quando sol leonem transiit, v. g. 18. Julii capti, & calcinantur vivi; quorum cineris datur ℥i. vel ℥ij. (est exigui ponderis) & pulveris gentianæ ℥j.

Ætzmull. Oper. Tom. II.

& in cyatho vini boni propinatur ægro, expectando bonum sudorem; ita Veteres illud propinarunt; idque repetierunt tam in metu imminentis quam præsentis Rabiei. De hac præparatione, & præparationis ratione, vid. PALMARIUS loc. all. & SCHENCKIUS Obser. pag. 856. Ne autem sub calcinatione oleum & sal volatile pereat, loco calcinationis horum melius est, ut tales cancri, iique vivi, probe contusi, destillentur per alembicum in Mariæ Balneo, ut ita accipiatur aqua cancerorum, adeo à POTERIO decantata in Pharm. Spagy. pag. 47. Id quod remanet, seu pulvis cancerorum, postmodum pro usu interno etiam usurpari potest à ℥j. ad ℥j. cum aqua destillata propria jam dicta, vel succo cancerorum fluviatiliū, in specie addito pulvere radices gentianæ, vel pimpinellæ: e. g.

℞. Theriac. ℥j.

Cancer. fluviat. h. m. præp.

Rad. Pimpin. an. ℥ss.

M. S.

Electuarium sudoriferum.

Juxta quem pulverem etiam modò dicta aqua destillata, item Decoctum cancerorum, ut & succus, commodè usurpari potest, quæ optima sunt vehicula remedium contra hydrophobiam. Pertinet huc pulvis Hurnii expertus contra Rabiem:

℞. Rad. Gentian. ℥ij.

Cancer. fluviat. calc. ℥ij.

Terra sigill. ℥ss.

M. f. Pulvis.

Hujus pulveris compositi ℥j. præbet in decocto cancerorum fluviatiliū; imperando sudorem, subinde repetendo.

Vel secundum HEINRICUM ab HEER

℞. Pulv. Gentian.

Myrrh. an. ℥j.

Cancer. fluviat. d. m. præpar. ℥ij.

M. cum vino, vel decocto vel aqua cancerorum fluviatiliū, & propinant imperando semper sudorem.

Dosis est ℥ss. ad ℥j.

Conf. BARTHOLINI Aët. Med. Hassniens. Volum. 1. Observ. 110. pag. 276. & SACHSI Gammarol. lib. 2. Sect. 3. pag. 638. sequ.

Præter dicta radix Rosæ sylvestris seu Cynorrhodi jam ab antiquissimis temporibus est commendata. Sunt tamen, qui præferunt hujus radici spiritum seu essentiam vermicolorum cynosbati, de quibus alio tempore dictum. Aliàs experimentum Stæckeri, quod nunquam cum, decepit, uti asserit, est sequens, idque contra quoscunque animalium, tam venenatorum quam rabidorum, morsus:

℞. Gentian. pulveris. ℥j.

cum Theriac. ℥j. miscuit.

Tribus diebus continuis, omni mane propinavit, jejunando desuper per quinque vel sex horas, simul expectando sudorem, qui semper expectari debet. Super morsus verò locum allium, rutam, & sal, eaque contusa & missa in forma cataplasmati, apponit.

Uterius medicamenta, quæ ipse canis rabidus suggerit, præcæteris sunt laudata, qua ratione sanguis canis rabidi pulverisatus, & per triduum dosi ℥j. usurpatus, cerèd juvare rabiem & hydrophobias, dicitur à PALMARIO loc. alleg. Item crines vel pili canis rabidi, quos præter PALMARIUM commendat SCHMUCKIUS, vel cor & hepar animalis mordentis decoquantur & patienti propinentur; vel in pulverem redacta dentur ad ℥j.

Præ cæteris optima cura est immersio ægri in aquam frigidam, quod remedium ceu expertum ubique commendat HELMONTIUS in Tract. Demens Idea pag. 278. §. 47. 48. & 49. Confirmatur etiam per experientiam FORESTI lib. 10. Observat. 27. & 28. Item TULPII lib. 1. Observat. 20. Quò facit rara observatio SCHENCKII lib. 7. Observat. recensita de mulo rabido in Rhodano fluvio injecto, qui sic à Rabie sanatus: ubi plura sunt exempla curatarum Rabierum per immersionem in aquam frigidam: Vid. etiam PARÆUS lib. 20. cap. 14. Remedii hujus prima vestigia reperiuntur in CELSO, qui tales ægros in piscinas injiciendos suadet. Ex quidem circa hanc submersionem notandæ sunt duæ circumstantiæ:

1. Ex improvise immergendi; &

Ddd 2

2. Ali-



2. Aliquamdiu ita relinquendi sunt tales ægri sub aquis, ut post terrorem injectum ex suffocatione imminente eò efficacia pavor mortis ipsis imprimatur; sicque feliciùs idea deletur, & delirium curatur. Vid. *suprà Artic. 2. Membr. 3. ubi de Mania.*

Immersio ista fiat bis vel ter pro ratione circumstantiarum: sic multi fuerunt curati.

Controversia est aliàs inter Autores, an convenient Purgantia in & circa curam hydrophobiae & rabiei? Et notandum, quod per se nihil conferant, quia humores exagitant, & ab habitu ad interiora venenum derivant; & contra sola appropriata alexipharmaca, imprimis sudorifera, sufficiunt, & utramque absolviunt paginam. Nihilominus tamen si sit jam longum tempus, ex quo æger fuerit commotus, & tamen nondum perfecte sit rabiosus, utut signa imminantis Rabiei se manifestent, ægerque talis non evacuatus fuerit, in his & similibus casibus pro metu subsequenti Rabiei feliciùs tollendo, utilem commendant catharsin per superiora aut inferiora, scilicet helleborum album & nigrum, item agaricum, utpote quæ vim simul alexipharmacam habent: vid. SENNERTUS *Prax. lib. 1. Part. 2. cap. 16. Quæst. 3.* Nam testatus est jam suo tempore DIOSCORIDES, catharsin huius tantum opem ferre, qui jam hydrophobiam seu aquæ metum incipientem tantummodo sentirent: Et sumpto helleboro simul ac primum morbi impetum experirentur, cum impetu expurgati, multi cetrâ experientiâ fuerunt servati: Sic quidam referunt, multos canes rabiosos helleboro cum polenta accepto vomuisse, & statim à Rabie liberatos se rediisse. Hinc post helleborum etiam Hiera, quæ colocynthidem recipit, non parum commendatur. PALMARIUS affirmat, se multos nosse rusticos, qui propinato pharmaco vehementi, quo una eademque opera suprà & infra supervatanea omnis generis è corpore excluderentur, ab hydrophobia evaserint.

Post Purgantia faciunt huc simul aliquid fortiora Diuretica, per urinam, præsertim cruentam, virus alterantia & eliminantia: quæ inter Valeriana, imò Cantharides vim specificam obtinent. Hos AVICENNA commendat contra Rabiem & hydrophobiam, ut etiam asserat, si rabidus exinde sanguinem minxerit, securum esse ab hydrophobia. Quibus vulgò nostras scarabæos Majales, & vermes Majales substituit: Vid. SENNERTUS in *Praxi Part. 1. lib. 2. ubi de Rabie pag. 440. & 441.* Remedium Avicennæ hæcenus apud Practicos sepultum est, cujus tamen mentio fit in M. A. N. C. *Ann. 1. Observat. 133. & in Append. pag. 32.* ubi cantharides ab Ungaris in aceto fortissimo asservantur, & postmodum No. 4 §. vel 6. in haustu spiritus vini contra venena rabiorum animalium sine dysuria aut mixtu sanguineo propinantur; unde saltem per sortem diuresin liberati sunt. Horum tamen c. l. dosis à nobis non imitanda, quoniam Hungari fortioris sunt idiosyncrasia; sufficiat, quod cantharidum vis quasi specifica sit ad rabiem; sicut etiam in dictis M. A. N. C. *Ann. 3. Observat. 302. pag. 524.* prostant exempla Rabiei beneficio scarabæorum aut vermium Majalium curatæ. Alii recipiunt Cantharides vel scarabæos pulverisatos, cum melle miscent & asservant, & propinant ad §j. Vid. SENNERTUS l. 4.

Quod vulnus à rabido animali inflictum attinet: hoc ipsum, dum recens est, non statim claudendum aut sanandum est, sed aliquamdiu apertum servandum, vel ampliandum, quantum fieri potest, ut cum sanguine saliva potius effluat, quàm retrocedat; aut id, quod de saliva adhæret corpori, licet non vulnerato, diligentissimè & magna cura est removendum, ut omnis virulentia beneficio rumoris, inflammationis & suppurationis ex ipso loco eliciatur. Et quidem in specie horis acc diebus fuerint adhibita, ut virus malignum citò extrahatur, alio tempore in cassum serè adhibentur, quando scilicet virus jam ad interiora penetravit. Ob id statim est properandum, & imponendi sunt primò pili canis ipsius rabidi, qui tanquam singulare experimentum vulnèræ, à cane rabido inflicto, apponuntur ex PARÆO, ut venenum magneticè vi extrahatur; id quod etiam confirmat SCHMUCK in *Curationibus Magico-magneticis pag. 38.* Vel Theriaca cum succorutæ & allio subacta, morui canis rabidi etiam utiliter imponitur: conf. WEDELIUS de *Med. Facult.* Præceteris nempe cepæ sub cineribus assata, & cepacea vulneri imposita, multum conducunt, præmissa in loco affecto scarificatione: Sic enim AMATUS

LUSITANUS *Cent. 1. Curat. 55.* puerum duodecim annorum in crure à rabido animali demorsum ita restituit, dum accersito chirurgo locum læsum profundioribus incisuris scarificare, & calido vino vel aqua salina lavare jussit: hinc loco optimè absterfo hoc Cataplasma admovit:

24. Cepam acrem No. j.  
 Aliorum capit. 5. radicem mediam.  
 Theriacis opt. 3. ad 3vj.  
 Fermenti 3ij.

Omnia pistentur, & loco affecto forma Cataplasmatidis supponantur: quibus puer brevi sanatus est.

HELIDÆUS PADUANUS, præmissa loci scarificatione, cepam cum melle contusam simpliciter imponit; vel loco mellis cepam cum theriaca subactam, & ita morui applicat, aliquot dies continuando. HORSTIUS *lib. 7. Observat. 23.* commendat emplastrum ex allio, sale, & terebinthina. Sunt, qui cataplasmatidis his scordium & semen sinapi addunt: v. g.

24. Herb. ruta  
 Scord. an. M. j.  
 Rad. Allii 3j.  
 Coqu. in f. q. Vini ad putrilaginem:  
 adde  
 Pulv. rad. Gent. rubr.  
 Aristol. rot. an. 3ij.  
 Sem. sinapi 3ij.  
 Mellis 3vj.  
 M. f. Cataplasma.

Conf. HILDANUS *Cent. 1. Obs. 87.* & LOTICHIVS *Cent. 6. Observ. 1. cap. 5.*

Scarificatio profundè satis fiat, nisi loci conditio, v. g. ratione vasorum subjacentium, hoc impediat. Alii hepatis animalis imponunt, vel partem carnis. Quò & columbarum vivarum & dilaceratarum applicatio pertinet. Quidam ligaturas magni æstiment. Præceteris insigniter etiam conducit Emplastrum magneticum Anpeli Salæ ex magnete arlenicali paratum, *suprà l. ubi de peste*, descriptum; scilicet post scarificationem vulneris, sanguinisque per cucurbitulam extractionem, loco demorsus applicatum & impositum; vel locus scarificatus eluendus est cum spiritu vini theriacali aut camphorato, aut muria. aut vino, aut aqua salina, aut decocto scordii & radicis gentianæ cum vino aut aqua parato, cui salis, vel spiritus salis, parum admixtum sit, & hinc emplastrum magneticum applicari, vel solitarium, vel etiâ 3j. vel 3ij. pulveris cancrorum fluviatilium siccatorum aut calcinatorum potest admisceri; continetur, quod diè repetendo bis: vid. AGRICOLA in *Chirurg. Parva pag. 448.* Quod si velit hoc emplastrum magneticum dolore vel inflammationem, vel excoriationem excitare, tunc optimum est, ut saltem oleum scorpionum vel hyperici cum saccharo saturni mixtum, vel unguentum nutritum, aut simile saturninum, circa vulnus illinatur; vel recipiatur oleum cereæ, addatur parum sacchari saturni, & ita illinatur, illudque emplastrum repetatur: Vel imponatur tale emplastrum:

24. Cere 3vj.  
 Ol. Olivæ.  
 Servi hirci an. 3ij.  
 liquefactis adde  
 Thuris elect. 3ß.  
 M. f. Emplastrum: S.  
 Singulare emplastrum.

Alii imponunt emplastrum de ranis cum Mercurio, vel Ceratum dia-diastamni, quod sacrum Geleni aliàs appellatur: c. g.

24. Cerat. dia-diastamn. Galen. 3ij.  
 Pulv. cancr. fluviar. 3ij.  
 Cum f. q. Ungu. de Litharg. f. Emplastrum:  
 D. S. ut antè.

Verùm promptissimum remedium externum est ustio loci affecti cum ferro candente seu cauterio actuali, cùm ustio omnem virulentiam penitus destruat; hoc enim securissimum & tutissimum remedium est curandi morsus animalium rabidorum; de quo, præter alios, vid. HILDANUS *Cent. 1. Observat. 84. 85. 86. 87. & Cent. 2. Observ. 97.* qui hoc didicit ab Empirico quodam, qui omnes cane rabido demorsos solo hoc cauterio actuali feliciter restituit, & rectè: Ustione enim penitus destruitur ipsa virulentia, & seminalis virulentia malignæ tollitur, modò conditio loci affecti id permittat. Simili modo ad motionem serra mentis ignis citra



et uestionem curat BOYLE in *Philosophia Experimentalis* morbus viperarum. Quodsi verò tardius talia externa administrentur, aut, si consolidato jam vulnere Rabies postea superveniat, optimum est denuò scarificando aperire locum, cucurbitam cum magna flamma applicare, & præter dictam elotionem morbum cauterio actuali profunde sat, imò diversis in locis, adurere; uestionis verò loco spiritus vini theriacalis, aut in quo aliquid theriacæ solutum, cum gossypio imponatur, ac vulneri cataplasmata modo descripta inferuntur: sequenti die incidenda est eschara, undique eadem topica continuando, usque dum illa secedat: quo facto mediante pisco ulcus per aliquot menses apertum servatur, singulis septimanis bis vel ter Mercurium sublimatum simplicem, vel compositum *Hildani, Cent. 1. Observat. 87.* descriptum, inspergendo, & sudorifera interdum propinando; siquidem, ut supra monitum, validas in illo loco punctiones tunc sentiant. Imò placet consilium SENNERTI *lib. 1. Prax. ubi de Rabie*, ut quocunque tempore fomiculus in aut proximo loco affecto excutitur, ut consueta illa evacuatione quasi revulsoria veneni, naturæ opem feramus.

Hæc de morfu canis rabidi, & inde nata Rabie.

## MEMBRUM II.

### DE

### TARANTISMO.

**V**icinum ferè malum est Tarantismus, seu rabies eorum, qui à tarantulis sunt morfi. De hoc tarantulæ veneno, indeque ortodelirio musico, jam quædam monenda forent; sed cum morbus hic in Europa, præter Apuliam, nullibi cognitus, & jam ab aliis sufficienter explicatus sit, qui de Tarantismo scripserunt, in specie à K. RCHERO in *Musurg. Magna & in ejus Arte Magnet. à SCHOTTO in Magna Naturali Part. 2. ubi de Auditu, à FERDINANDO in Hist. Med. nec non à SENGUERO de Tarantula*, qui integrum libellum de hac materia scripsit, cujus contenta extant in *Act. Philos. Angl. Part. 4. Ann. 1668. pag. 66.* ut ut non multum videatur habere in recessu, & alii similes Auctores; ob id, ne actum agam, in specie, cum apud nos hic affectus non occurrat, eundem transire permittam. MARCUS MARCI etiam videatur in *Philosophia Veterum Restituta, in cap. de Tarantismo*.

Primariò spiritus animales affecti sunt, & ita maximam partem affectus idealis est: tamen & his hoc modo affectis in juncto fluido aliquid acrimonie malignæ subesse, præter convulsiva pathemata, imprimis cura, quæ per lac in Persia instituitur, confirmat.

### CURA.

Cura ejus aliàs est Musica, cujus rationem WILLISIUS de *Morb. Convuls. cap. 7. pag. 65.* ita deducit: Venenum hoc mitius esse, quam ut spiritus animales penitus extinguere valeat, aut distractos prorsus dissipare; sed eostantum in fugam conjicere, fugatosque in spasmos leviores incitare: ac verò mulicam spiritus faciliè congregare ac mutuo associare, hinc serie quadam nervorum corpora subeuntes certis velut in cancellis ferri, donec veneno dissipato paroxysmus cesserit.

Omissis ergò hisce, ad deliria, ab externa causa induta, pergo. Hæc quod attinet seu ab assumptis aut inspiratis venenis, in specie simul narcoticis, oriuntur, priora optimè curantur vomitorio in principio adhibito; posteriora verò, præmissis universalibus, vel ingenere acetocum castoreo & camphora misto, vel unicuique assumpto in specie appropriata exhibenda erunt.

## MEMBRUM III.

### DE

### AMORE INSANO.

**A**D hujusmodi deliria, quæ extrinsecus adveniunt, pertinet etiam Amor insanus, qui à philtris probè distinguendus. Nam Amor insanus est species quædam melancholicæ, quam ex nimio, sed verò Amore nonnulli contrahunt: non secus ac alii ex nimia mæstitia, molestia & curis

Est null Oper. Tom. II.

melancholici fiunt, & ad deliria melancholica disponuntur: ita etiam tales amantes ex nimio amore in graviore malo nonnunquam in maniam dilabuntur, & amentes fiunt, ut superius aliquando monui.

### DIAGNOSIS.

Quoad signa cognoscendi amorem insanum: ex primariis signis est Pulsus, sicut superius monui, quod affectus animi ex pulsu cognoscantur.

Controversia aliàs est: An detur pulsus amatorius, qui proprius sit intensè amantibus? seu an ex pulsu certo cognosci possit, quendam amore nimio laborare? Experientia quemcunque informare potest. Negatur: Non datur pulsus amatorius ab aliis pulsibus specie distinctus, ut ut ex nimia pulsus perturbatione ac inæqualitate, concurrentibus simul aliis symptomatis, probabilis coniectura haberi possit. De hac controversia vid. HORSTIUS in *Oper. Med. Tom. 1. circa finem*, cui annexa est *Dissertatio quadam de Pulsu amatorio an detur specialis? ubi idem negatur*. Saltem hoc obtinet, ut in talibus soleat esse admodum varius, & insigniter inæqualis, turbulentus & inordinatus: sed simul atque fiat mentio personæ amatæ, subito alteretur & mutetur pulsus in maiorem, celeriores & vehementiores: Postmodum verò, ubi mentio istius personæ amatæ cessat, pulsus obscurus, turbulentus & inordinatus denuò fiat; & ita tandem subinde repetenda mentione istius personæ amatæ, ex pulsus tali mutatione faciliè pervenire possimus in cognitionem huius affectus. Exempla vid. in FORESTO *lib. 10. Observat. 30.* Sicuti etiam iam GALENUS tale exemplum annotavit. Sed hoc nil est peculiare; commune enim hoc habet, cum omnibus melancholicorum pulsibus.

### CURA.

Amor Insanus removendus est, partim remediis ethicis, partim remediis Medicis: Illis, ethicis nempe, persuasionibus rationalibus, ut amor iste insanus & nimius removeatur, & impetus iste cæcus amorosus corrigatur & emendetur: His, medicis nempe, similibus ferè, quæ aliàs in Melancholia & affectibus melancholicis solent commendari & præscribi. Mitiora tamen ut plurimum usurpanda, aut pro circumstantiarum diversitate divermodè immutanda, cum affectus animi hic prævalent, qui persuasionibus imprimis curandi sunt.

## MEMBRUM IV.

### DE

### PHILTRIS.

**P**Ergo potius ad ipsa Philtra, seu ad media quibus amor & affectio quædam unius personæ singularis erga aliam perf. nam determinatam conciliatur; ita quidem, ut ex præsentia talium subjectorum facultas animalis, in specie quoad affectus animi, se optimè habeat; sicuti talium personarum absentia est plus minus molesta, aut gravioribus animi anxietatibus & quasi deliquis obnoxia. Unde philtra possunt usurpari inter mares & mares, inter fœminas & fœminas, inter mares & fœminas, inter homines & bruta, inter bruta & bruta, ut hic mutus amor concilietur. Hæc ipsa Philtra sunt vel vera vel falsa. Philtra falsa seu notha sunt, quæ à plebeculis, vetulis, & mulieribus, aut etiam prostibulis & similibus, subinde propinantur. Sed hæc ipsa sunt vel vana, vel frustranea, vel alio passu nocent; aut sunt præternaturalia, aut Magica, aut si non sunt magica, saltem virtute verorum Philtrorum carent. Vana & frustranea ex variis subjectis parari solent, & ordinariò ferè & frequentissimè ex eorum menstruo sanguine, nunc solitario, nunc adjecto sanguine leporino, tanquam animalis fœcundi & salacis, componuntur. Alii ex parte umbilici infantum decidui singularem amorem conciliare volunt; alii secundinas adhibent; sunt, qui beneficio seminis humani Philtra magnetica seu amorem conciliare volunt. Alii testiculis animalium salacium, sudore certi hominis probè irrigatis, homines in amorem cogere volunt. Sed hæc omnia & similia sunt ludicra & falsa, ut & Magica & præternaturalia, quibus nil obtinetur: Nam loco cupiti amoris talibus, qui postulantur, ut ament, subinde

Ddd 3

gravia



gravia & periculosa symptomata, subinde maniam, demantiam & stupiditatem inferunt. In specie exemplum huius rei stupendum vid. in HENRICO ab HEER *Observat.* 13. stupendorum spirituum ex philuro tali falso natorum.

*Vera quod attinet Philtra:* ea sunt talia, quibus verus amor & naturalis quædam inclinatio unius personæ in aliam excitari potest, idque medio quodam naturali, tanquam maguete transplantatorio, perficitur, ut exinde sequatur mutuus affectus. Vid. D. CLAUDERI *Disputatio de Philtris*, quæ perquam elegans est. Quæritur hic: an dentur talia philtra, & quæ sine metu mania in determinata persona inclinationem & amorem excitare & conciliare valeant? Communiter propter ignorantiam modi, quo fiat, etiam res ipsa negatur: sed malè & contra experientiam. *Veritatem*, nempe quod dentur, beneficio quorum inclinatio determinata huius personæ in istam possit conciliari, *confirmat experientia*; ubique enim prostant exempla, quibus *coactus amor* possit fieri. Nam (1.) per experientiam res certa est, quod legitime instituta & usurpata Philtra omnino hanc vim obtineant, tam in hominibus, quam etiam in brutis. Sic quidam studiosus in ædibus melis paternis à lorice sua in balneo intritum (*Kalte Schaale*, Germanis dicitur) benignum, a se satis potens amorificum accepit, per cuius esum tantum amore erga eandem desagrabat, ut planè anxius redderetur, nisi quotidie eam visitaret. A quibusdam quæri solet; an fiat per *Magiam & artificia Diaboli*? & respondeo, quod non. Posito, sed non concessio, subesse ludiprium dæmonis, saltem dæmon non potest agere suprà naturam, sed potius secundum vires in natura fundatas. De cane notum est, quod si quis recipiat frustum panis, & sub axillis detineat, ut insensibili transpiratione & sudore proprio benè imprægnetur & madescat, & ei postmodum propinetur, tunc canis talem hominem vix unquam deserit, & ad heri sui amorem singularem allicietur. Notum exemplum HELMONTII, quod refert in suo *Traët. de Magnetica Vulnerum Curatione* §. 27. quod nempè receperit hebam, quam ad tempus detinuerit in manu, & postmodum pedem cuiusdam catuli eidem ad tempus detinuit in manu ista; unde factum fuit, ut postmodum catulus eum amice secutus fuerit, relicto antiquo hero. Præterea & Dn. D. HAUPTMANNVS habuit passerem, cui similiter tale Philtrum, eorum vim & virtutem probaturus, propinavit ex medio vegetabili, ita ut exinde passer eum nunquam deserere potuerit, sed in Museo illi semper adstiterit: visitans ægros cum eodem hinc inde circumvolavit, & nunquam eum deseruit, referente D. MICHAELIS. Conferantur hic ea, quæ habet HELMONTIUS *loc. cit. pag. 599.* de cura vulnerum transplantatoria, quæ fit cum pulvere sympathetico, perficaria, & similibus. Sunt duæ plantæ ubique obviæ, quæ si in manu detineantur, quæcunque ex illis sit, ut benè intepefcent, (nam hæc est conditio sine qua non) & hinc manus abjecta herbâ porrigatur virgini, ita ut & illius manus probè detineatur, ut similiter incalcescat, hinc amor mutuus conciliatur, cerrus, non tamen diu durans, sed tantum per quatuor aut quinque dies. Primam plantam hyoscyamum, alteram Cochleariam vel Perficariam puto fuisse. His & similibus exemplis certis nullum dubium est, quin possit fieri amoris certa conciliatio. Sufficit, quod ubique prostant exempla actionum in distantem & determinatam personam, tam in melius, quàm in pejus. (2.) Confirmant Philtrorum possibilitatem exempla analoga sympathiarum mutuarum, in natura obviarum, inter quædam animalia; ad quas pertinent curæ magneticæ in morbis, ut nempè certo medio morbus possit transferri ex uno animali in alterum, ita tamen, ut morbus curetur affecto altero. Sic, ut nihil dicam de pulvere sympathetico, in infuso ex urina ægri & farina super plantentur, quæ plantentur pro transplantatione morbi propinantur cani, vel feli, & icterus exinde sanabitur; quod verissimum est: Vid. BARTHOLINUS *Cent. 3. Histor. 66.* MARCUS MARCI in *Philos. Vet. Restit.* & HELMONTIUS. De atrophia per sanguinem ægri ovo inclusum curanda, vid. HARTMANNUS in *Praxi Chymiatr.* & BURGGRAVIUS in *Biolychnio*, cuius experientia certa facta est in Anglia, referente hoc BOYLE in *Philos. Experiment.* quali sympathia & mariti per incantationem fascinati curantur. Nihil dico de podagræ curatione per transplantationem in quercum, &c. Hæc & similia omnia innuunt correspondentiam totius cum partibus à toto se-

cretis. Nota etiam est sympathia & amor naturalis inter consanguineos, dum v. g. frater in Germania variolis correptus, similiter & alter frater, qui in Gallia est, isdem simul eodem tempore corripitur: aut si gemelli, unus Lipsiæ, alter Wittebergæ, simul eodem tempore variolis corripiuntur: Conferantur & singularia talia sympathiæ exempla, quæ recenset BORELLUS *Cent. 2. Observat. 47.* de puella, quæ nimis tortoris & artuum laniationibus torquebatur tunc temporis, cum ejusdem pater in loco satis distito rota frangeretur. Simile exemplum habet de muliere, quæ sensit dolorem exquisitum in fronte, cuius maritus sclopeto in capite vulnus accepit: Item BARTHOLINUS habet simile exemplum *Cent. 5. Observat. 79.* de marito, tortes & cruciatus & tormina intestinalium perferente, quoties uxor fuit in labore partus: Item in M. A. N. C. *Ann. 2. Observat. 215. pag. 316. & 317.* refertur de marito, cuius uxor, quoties fuit gravida, toties ille pica & vomitu correptus est. Hæc & similia exempla & curæ in distans multum illustrant verorum determinatorum Philtrorum existentiam & naturam, ac firmum amorem subiectorum, inter sese, etiam remediis naturalibus conciliatum. (3.) Ex opposito morum est, quoad certas idiosyncrasias, secundum quas certa objecta abhorrentur, ubi quidam, v. g. selem etiam invisam, maxime horrent & anguntur; ita quid obstat, quod minus fieri possit, ut certa objecta amentur? Conf. BORELLUS *Cent. 1. Observat. 91.* de odio singulari arte inter conjuges concitato. (4.) nemo negabit, quod dentur Philtra Magica, h. e. quando inuito cum dæmone pacto huiusmodi alterius conciliatur amor. Adeoque necesse est, ut dentur etiam naturalia Philtra, cum dæmon nec supra naturam, nec contra naturam, nisi Deo specialissime concedente, agere queat; hinc non, nisi per media naturalia, necessario, quicquid agit, perficiat.

## C A U S Æ.

*Causa proxima*, scilicet qua mediante operentur talia Philtra determinata ad certam aliquam personam, optime declarari videtur ab HELMONTIO *loc. supra cit.* dum dicit; quod philtra requirant mumialem confermentationem, mediante qua ad certum objectum trahatur alterius dilectio, ubi nempe, ut supra dictum, plantam tenet in manu, & postmodum apprehendit catellum, qui cum secutus est, relicto proprio hero. Reddit ita rationem, quare contactu herbæ prævio, ejusque benè tepefcentis auxilio, in brutum vel hominem fiat amoris transplantatio: quia, dicit, calor prius herbam calefaciens, isque non solitarius, sed effluvio quodam spirituum animalium imprægnatus, herbam ad se determinat, individuatque sibi, & assumptio hoc fermento per magnetismum alterius subiecti contactu spiritum trahit, ut superveniat mutus amor. (Omnes plantæ non habent vim singularem conservandi spiritum animale.) In his nempè nervus est omnis actionis transplantatoriæ & curationis magneticæ, & etiam in his consistit fundamentum ipsorum philtrorum genuinum. Dumque dicit, fieri debere per confermentationem mumialem, mediante qua ad certum objectum trahatur affectio & inclinatio, observandum est, quid per mumiam intelligatur? Per mumiam autem stylo Helmontiano intelligitur primario spiritus infusus, idque imprimis in cadaveribus, in quibus influi evanescere spiritus, relicto saltem infuso; secundario tamen & in viventibus spiritus influius mumia spiritus nominis subinde venit, & hic ipse sufficiens est pro toti transplantatione instituenda, modo medio quodam tertio, quod HELMONTIO vocatur *Magnes*, v. g. planta quadam; ita ut spiritus iste mumialis mediante magnetismo ex uno subiecto haustus, & certo modo alteratus & determinatus, conferatur in alterum subiectum, cuius spiritui mumiali, tam infuso quàm infuso, arctè nubat, eique se jungat, ex qua conjunctione & unione postmodum inter hæc duo subiecta mutua combinatio & inclinatio concitatur, magnetismo mumiali in distans modo agente. Nempe ex hoc fonte omnes actiones & curationes magneticæ, sympatheticæ, transplantatoriæ, & similia naturæ mirabilia sunt derivanda & deducenda, quæ partim in *Theoria*, partim & in *Praxi* multum habent in recessu.

Hæc Philtra vera, cum tantum honestatis & amoris gratia instituantur, & quæ talia, nullum nocuum inferant, non etiam est occupatus circa eadem Medicus, nec ullo modo sunt impedienda & curanda. Verum cum sapissime fiat,



fiat, ut loco Philtri veri propinetur Philterum falsum, aut per magiam illicitam & incantationem concilletur amor, ob id necesse est, ut pessimis inde oriundis symptomatis, non raro maniacis, sedula Cura à Medico adhibeatur.

### DIAGNOSIS.

Ceterum queritur: an possit cognosci Philterum talenotum propinatum? Neg. Signa enim, quibus Philtre falsa à veris discernenda, certa sunt nulla; Nulla enim nocumenta inferunt, nisi quod subinde à falsis gravium mox symptomatum superventus fraudem latentem manifestet. Ob id omnes circumstantiæ morbum, qui à Philtro falso oriri putatur, antecedentes probè perpendendæ, & saltem artificiosis conjecturis, partim ab ægro, partim à Medico, cognoscendæ. *Primum obtinet*, quod subinde ægri tales mox post assumptionem cuiusdam rei, vel esculentæ, vel potulentæ, se malè habeant circa stomachum; quando & ipsi interdum subinde suspicionem habent, à tali vel tali persona propinatum fuisse Philterum. In specie tamen, & tantum non semper, post Philtre falsa de anxietatibus præcordiorum, imprimis de *pessimo stomachi habitu*, & hinc de sensuum interiorum læsione tales ægri post propinata Philtre falsa conqueruntur. Stomachi vitium nonnunquam solet esse pertinacissimum, etiam aliquot annos à propinato Philtro interdum durans, & semper eò pejus malum, quò diutius durat malum à Philtre inducitur. Hisce superveniunt *mentis perturbationes*, & *deliria* patiuntur, vel insaniam. Mirum est, quod interdum periodicè impetustalis amatorius & morbosus ex Philtro causatus, repetat: Sic namque refert AGRICOLA *Comment. in Popp. ubi de Antimonio*, de amore per philtrem induto, cujus paroxysmus singulis pleniluniis repetebat, & per sex dies continuos durabat, intermedio tempore ægro satis benè se habente: Sic B. D. LANGIUS curavit aliquando hic quendam juvenem, qui postquam à levioris notæ semina Philtrem quoddam sub dimidio pomo citrio horà quartà pomeridianà comesto accepisset, quotidie postmodum per horæ spatium, idque sub eadem hora, tanto desiderio & anxio amore in istam seminam flagravit, ut planè anxius hinc inde cursitaret, & inquieto animo ejus præsentiam flagitaret, eamque amplecti desideraret: Cum verò aliquando voti sui compos reddi nequireret propter absentem tunc mulierem, malum in dies succrevit eadem horà in tantum, ut exinde in pessimum habitum degenerarit, donec curatus fuit. De cura postmodum suo loco.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: In hac prout variant subjecta, quæ pro mediis amatorii in Philtre falsis assumuntur, etiam variant notæ amentia ab istis inducitur.

In specie tamen post Philtre falsa, præter ventriculi insignes noxas & inde derivata pathemata plurima, frequentissimè supervenit melancholia & delirium melancholicum, sæpius mania, interdum amentia, tandem lenta mors inferitur.

### CURA.

Quod Curam: in hac exhibenda sunt

1. Universalia, imprimis Vomitoria; quibus subiungenda
2. Specifica.

Illa inter eminent Vomitoria, sine quibus vix aliquid laude digni potest perfici; quod si illa ferre nequeat æger, Purgantia usurpentur, & his præmissis Sudorifera, quibus commodè etiam admisceri possunt Specifica.

Deinde ante omnia, quantum fieri potest, laborandum est Medico, ut æstimatedis omnibus circumstantiis, & perpenis minimis conjecturis, possit invenire materialem causam, quæ applicata vel usurpata fuit in Philtro falso. Inquiratur igitur: an scilicet solum inductus sit amor per media Magica illicita, seu signum Magicum & supersticiosum? an verò naturalia, nempe per sanguinem menstruum, aut semen, aut urinam, aut alvi excrementa aut similia? Nam si suspicio sit, quod mediis Magicis Philtrem fuerit inductum, præmissis vomitu antimoniali, etiam interdum repetito, adhibeantur remedia contra incantationes directa, aut contra morbos à veneficio natos vulgò aliàs usitata: quæ inter præcipuè excellit viscus coryllinus, legitimo tempore

Ersmull. Oper. Tom. II.

collectus, tam solus internè assumptus, quàm externè: vid. HEINRICUS ab HEER loco supra cit. ubi habet unguentum seu linimentum ex visco coryllino, cum axungia cati, urina & caponum paratum: vid. CARRICHTERUS in Herbar. edit. in 8. Item juxta hunc viscum valet Valeriana minor seu Phu Ponticum Dioscoridis, (vid. Matthiolus,) carduus benedictus, flores hyperici, flores & folia aquilegia, & corallia quoque usurpari solent internè & externè in forma amuleti. Facit huc emplastrum scitidum Mynsichti, quod videb. incus Armamentar. item Electrum artificiosum est septem metallis compositum, & certo tempore confectum, amuleti formâ applicatum: vid. HELMONTIUS Tract. Iniaculatorum Modos Extrahendi. Convenit etiam Electrum immaturum Paracelsi, etiam ab HELMONTIO commendatum; sed incertum adhuc est, quid sit: Alii Zincum sed male; alii Germ. Gulden Erze, alii folia auri Hungarici substituent, &c. Sin verò de Philtre, quæ per media naturalia, utut frustranea, v.g. menstruum sanguinem, inducitur, sit suspicio, tunc optimum est, ut præmissis universalibus remedia Philtre aliàs appropriata, mista simul cum specificis istius rei, à qua inductum Philtrem, usurpentur. Propinatis etiam universalibus, sudoris provocatio per appropriata imprimis est conducibilis, & subinde necessaria. Ante omnia autem vigilet Medicus, præsertim in melancholia aut mania amoris, ut dormire possint ægri, quò placidiores reddantur, ac ferociam depellant.

Universalia sunt imprimis Vomitoria, quæ sæpius totam curam absolvunt, cujuscunque etiam generis ista fuerint: vid. RULANDUS Cent. 3. Curat. 9. & FABER Curat. 94. In specie infusa antimonialia, eaque valida & magna dosi usurpanda, ut infusum vitri antimonii ad ʒij. aqua benedicta, aurum vitæ Kegleri, Mercurius vitæ in substantia, & similia, præ reliquis conveniunt. Sic enim Dn. D. LANGIUS supra dictum juvenem curavit propinando vomitorium ex butyro antimonii cum sole & luna destillato secundum methodum FABRI in suis scriptis, è quo præcipitatur est Mercurius vitæ cum sole & luna compositus; Unde ex propinata prima dosi multum quidem, sed absque levamine, evomuit; hinc tertio post die illud idem vomitorium antimoniale mox ante ingruentis paroxysmi tempus iteratum ipsi dedit, & ita supra ac infra materiæ scitidissimæ & nigerrimæ eiecit saburram, quibus duobus vomitoriis convaleuit. Sic Halæ Saxonum fuit juvenis certus, qui certis horarum intervallis ita adeò sæviret, ut ex ædibus aufugeret, ac si maniacus esset: Unde cum in hoc esset suspicio Philtre propinati, propinatus ipsi fuit Mercurius vitæ ad gr. v. (fortiter sunt accipiendi!) quibus supra & infra multum evacuatus est, sed nondum tamen ritè restitutus: data fuit alterà die Theriaca cum ʒj. pulveris serpentum, cum aqua Theriacali vel cardui benedicti; Unde securus est sudor copiosus, quo omnino curatus fuit. RULANDUS lib. 1. Curat. Empir. pag. 32. refert, insanum ex philtro, à malefica in placentis accepto, datà aquà benedictà feliciter evomuisse placentas, quæ in terram projectæ effervescerant & ebulliebant, non secus ac cibis super ignem. Aliàs oleum sambuci ex Arillis à ʒj. ad ʒij. tanquam appropriatum vomitorium contra philtre laudatur. Ad talia remedia generaliora etiam videtur pertinere urina equina recens emicta hausta, quæ subinde per superiora & inferiora philtre evacuat. Historiam elegantem recenset SALMUTH. Cent. 2. Observat. 70. Datum pomum, in quo reconditum fuit Philtrem, sepositum intra nigricans apparet, & rursus intra triduum rursus plurimè ex eo progenitæ fuerunt; lacte calido affuso valde percreverunt; sed urina equina recens emicta interfecit fuerunt. Serva quædam accepto Philtro & cruciatibus afflicta, evomuit post sumptam urinam equinam duas sacetas & duas ranas. Nempe non novum est, post propinata talia Philtre, varia insecta intra corpus fuisse generata: Sic D. MICHAELIS observavit aliquando ab assumpto Philtro vermes tres oblongos nigros excretos fuisse. Conf. etiam SCHENCKIUS lib. 7. Observat. de quodam, qui Philtrem accepit, ac postmodum varia animalia viva observavit vomitu excreta. Unde in talibus casibus urina equina propinata non erit inconveniens remedium.

Præmissis ergo Vomitoriis & sudoriferis, v. g. mistura simplici, appropriata magis remedia sunt usurpanda: quæ inter eminet imprimis Nasturtium aquaticum, cujus succus, & quæcunque ex eo parata, multum laudantur; quod etiam convenit, ubi ex Philtre ad maniam jam inclinant ægri,



ægri, de quo vid. MONAVIUS *apud Cratonem lib. 7. Epist. 23.* uti etiam aqua nasturtii aquatici seu conveniens vehiculum usurpatur pro medicamento contra Philera. Mirabiles effectus, si non ficto exemplo, nasturtii huius usu contra Philera confirmat SCHENCKIUS *in Obser. lib. 7. pag. 83.* ex quo desumpsit BONETTUS *in Sepulchreto pag. 620.* Præterea Milturam simplicem seu appropriatum sudoriferum contra Philera commendat HARTMANNUS hinc & tinctura bezoardica parari potest. Singulare specificum est contra Philera secundina humana, ejusque spiritus urinosus volatilis per putrefactionem paratus, item pulvis per phlegmatis abstractionem in Mariæ balneo paratus; aliàs, si in clibano torretur, sal volatile aufugit; e.g.

*24. Secundina humana:*

& detracta membrana una cum vasis majoribus, eadem in Mariæ balneo in cucurbita mediante alembico, destillatur, & prodit sic phlegma; & remanentia in pulverem potest redigi.

Et quidem datur pulvis secundinae à ʒʒ. ʒi. ad ʒiʒ. vel ʒij. Item spiritus secundinae datur à ʒʒ. ad ʒi. vel ʒij. eaque cum vehiculo aquæ nasturtii, nunc solitarie, nunc cum tincturæ bezoardicae nonnihil, nunc spiritu theriacali camphorato mistis, expectando sudorem, non absque felici successu propinari solent: e.g.

*24. Spiritus theriacal. campb. ʒi.*

*Secundina hum. ʒj.*

*M. pro sudorifero:*

*D. S.*

*Spiritus sudoriferus pro una vice.*

*24. Ess. viperar.*

*Spiritus secundinae hum. an. ʒij.*

*M. S.*

*Essentia singularis.*

*Dosis gutt. 30.*

*24. Theriac. Androm. ʒi.*

*Pulv. secundinae hum. ʒij. vel ʒi.*

*M. S.*

*Electuarium sudoriferum pro una vice.*

Et spectatim quælibet remedia ex secundina parata conveniunt, ubi ex sanguine menstruo paratum fuit Philtrum, sed observetur, quod parata ex secundina, imprimis pulvis, ultra annum non duret, sed copiosissimos vermiculos generet; spiritus verò per fermentationem seu putrefactionem paratus diu durat; adeoque pulvis singulis annis renovandus.

His succedit spiritus theriacalis camphoratus, & omnia ex theriaca parata, spiritus cancrorum, extractum theriacale, item hypericon, anagallis, & omnia ex hac parata, absinthium, hinc vinum absinthites RVLANDVS *loc. all.* propinavit; bacca herbae paridis & ipsæ pulverisatæ ad ʒi. commendantur expectando sudorem. Corallia, & ex his pa-

ratæ tir Quræ elegantiores, terra sigillata Lignicensis vel Strigensis, vel etiam, uti vocant, axungia solis, tam ad absorbendum, quam per sudorem discutendum Philtrum adhibetur: nempe in principio ad ʒi. cum extra Ootheriaca limixta; ubi verò se sanè dissipit Philtrum, per sudorem dissipellendum. Decoctum corticis mediani sambuci in sero caprillo manè & vesperi aliquoties datum, etiam ante triennium propinatum materiam noxiam pro philtro, expellit, Autore BLOCHWIZIO *in Anat. Sambuci.* Essentia mumiæ humanæ, & essentia serpentum, pulvis serpentum, imò & reliqua quæcunque, tam ex homine quam serpentibus, vel viperis, item ex mumia humana parata remedia, præmissis universalibus, sunt maxime appropriata incurandis Philtris. Nam etiam calculus humanus pulverisatus, à ʒj. ad ʒi. in aqua nasturtii aquatici assumptus, contra Philtra & melancholiam eroticam plurimum confert, expellendo simul urinam plurimam, imprimis si à sanguine menstruo, teste HENRICO ab HEER *in Obs. 13. & in Obs. Spadanis.* Vid. SCHROEDERVS *Dilucid. Part. 1. sect. 1. pag. 23.* Tandem HARTMANNVS *in Praxi Chym.* habet electuarium ex lapide magnete *cap. 7 §. 13.* descriptum, contra Philtra, quod præmissis universalibus experimentum planè singulare & verissimum est, & cuius felicem usum B. D. MICHAELIS *in studio sis graviter afflicti aliquoties observavit.* PRÆVOTIVS commendat corymbos hederæ albicantes per octo dies ex vino vel decocto cicærum exhibitos ad ʒi.

Quod si jam Philtrum ad maniam procedat, tunc optimum experimentum habetur nasturtium aquaticum, de quo antea monui. Sunt, qui dicunt, quod etiam confirmat SCHMUCKIUS *in Cur. Magico-magnet. pag. 72.* quod contra maniam ex philtro sit admodum certum, si quis accipiat calceos novos, in illis probe currat, donec incalificent, & sudore pedum madescant, hinc potum infundat & hauriat: si des tamen sit penes experientiam. Tandem margaritæ præparatæ contra Philtrum in specie ex menstruo mulierum, item cum sanguine leporino, laudantur à BORELLO *Cent. 1. Obs. 65.* Quibus & alia alexipharmaca theriacalia & sudorifera aliàs etiam usitata commodè addi & subjungi possunt. Vnum adhuc referam, mihi à quodam fide digno narratum: Vir quidam loco Philtri ab uxore aliquid de ejus sanguine menstruo accepit inscius, unde fit, ut tridui spatio mirum quantum totum corpus intumuit, omnesque partes mirabiliter inflammatae fuerint. Pro cura propinatum fuit illi pulveris cardui benedicti & theriacæ ana in aqua cardui benedicti; umbilico verò appositum dimidium panis recentis seu recenter ex furno extracti, parum excavati, & similiter theriaca & pulvere cardui benedicti impleti. Sicque provocatus sudor: unde tumor cessavit, & remoto pane dimidio, livido & subceruleo, secuta levis diarrhœa, à qua ipsa tandem æger fuit perfectè curatus.





## LIBER III.

D E

## MORBIS SEXUI VIRILI PROPRIIS.

**C**UM lobitum fuerit vobis adhuc continuare ea, in quibus substitimus hactenus in Praxi, scilicet post pertractatos morbos totius corporis in genere, & utrique sexui communes, etiam in specie considerare affectus appropriatos culvis sexui & aetati, exorato prius Numine Divino, ad illos nos accingimus.

Et quidem, quod attinet primò affectus virorum: inter illos primò omnium genitura generatio laesa consideranda. Præsuppono hic officium virorum, quæ tallum, consistere in eo, ut & genitura in testibus elaboretur secundum, idem ad debitum tempus retineant & denique retentum subcoitus fervore, & certo membro excernant: unde accessum facio ad

## SECTIONEM I.

D E

## SEMINIS, vel potius GENITURÆ, VIRILIS LÆSA GENERATIONE.

**M**ultiplicant se homines mediante genitura utriusque sexus, quarum geniturarum coalitu fit verum semen humanum seu ovum secundum. Quod ergò maris attinet genituram, vulgò, sed male, semen appellatur, (vid. THOMAS CORNELIUS CONSENTINUS *Progrm. 5. pag. 172.*) elaboratur hæc in testibus, qui nihil aliud sunt, quam congeries minutissimorum vasculorum, quorum aliquot ex testis erumpentium variis suis flexibus corpus illud constituunt, quod testium dorso incumbit, & Epididymis appellatur, quod ipsum tandem dilatatum constituit vas deferens, quod hinc tandem in vesiculas seminales, ubi genitura in testibus elaborata, in epididymidibus perfecta, per vias deferens ad vecta adest, donec spumoso impetu ejaculetur. Structuram hanc testium pluribus explicatam videb. in GREFFIO *de Organ. Viror. Generationi inservient.* item in *Aff. Philos. Anglic. pag. 708. & pag. 164.*

Genitura est illud, quod uterque sexus confert: Semen est utriusque genituræ miscela.

Genituræ maris, dum elicitur, simul admisceatur liquor ferotius & blandus, uno nomine: lythpha sui generis in corpore prostaticarum glanduloso & spongioso elaborata, quæ in urethram effusa genituram seu semen maris vehiculi instar promover, ut eò melius per penem eiaculari queat, cuius etiam ratione eunuchi adhuc aliqualem coitum celebrare possunt. Prostata hæc in iis, qui sæpius Venere utuntur, maiores sunt, ut in canibus, situm circa radicem penis habent, quorum liquoris beneficio eunuchi adhuc aliqualem coitum celebrant.

Materia genituræ virilis est chylus cum sanguine per arterias hinc indè raptus, & per vasa spermatica ad testes delatus, ubi ex arteriis transudat in vascula feminalia, & ibidem formali alteratione in genituram mutatur: Videatur CONSENTINUS c. l. & BARBATUS *de ferosanguinis*, quicquid etiam in contrarium dicat CHARLETON *de succo nutritio*, nempe in *Exercit. 10.* & WARTHONUS in *Adenogr. cap. 27.* aut VELTHUSIUS *de Generat. cap. 6.* Huic genituræ se associant in specie subcoitus fervore spiritus animales copiosi, à quibus Generationis opus primariò perficitur, & qui constituunt contagium illud spirituosum, quod fecundat ova muliebria: Hi sunt quasi nucleus, cui genitura siliquæ instar inservit: de qua feminis formali ratione, eiusque fecunditate, vid. RALLIUS *de Generat. Animal. Sect. 5.*

Efficiens seu illud, quod alterat chylum in testibus, ut propriè dicta genitura seu semen evadat, est fermentum speciale, in vasculis istis seminalis reconditum, à quo, ut primariò genitura perficitur, ita ab eodem cum sanguine & lymphæ à testibus refluxis, reliquo corpori communicato, singulares istæ alterationes eveniunt, quæ sub pubertatis annis, dum homines generare incipiunt, se exferere solent, & cuius etiam defectu eunuchi adeò effeminati sunt; siquidem quasi fermento in pirato massa sanguinea tota alteratur & fermentatur, unde spirituosior magis, magisque fervida redditur, unde totius corporis habitus similiter alteratur: Vid. *de Alteratione Corporis Humani* GRAEF-

FIUS c. l. pag. 25. Sic Purgans quidam assumpsit, postmodum ancillam comprimens, illam vehementer purgavit medicamentum illud: vid. MOEBIUS in *Fund. Med. pag. 380.* HORSTIUS simile exemplum habet in *Obs. Anat. 10.* de nobili sibi amicissimo, qui Aureliæ in Gallia securo, post horam à purgante medicamento assumpto iusculum ferent, inter meretricios amplexus coitu purgantem efficaciam insinavit, ut *Antoniæ* decies vehementer purgaretur. Sic mania per castrationem curatur & cleuratur, vid. RIVERIUS. Si consideremus, quantum non raro mulieres quædam ex secundo congressu, in toto alterentur corpore, non adeò abscondita videbitur STENONIS sententia, quam recenset CASPAR BARTHOLINUS in *Exercit. miscell. pag. 45.* quod semen virile in uterum injectum (non aliter ac medicamenta aut alimenta assumpta vires subtiliores statim ad sanguinem & spiritus animales amadare videamus) sanguini & nervoso generi communicetur, & ita universum mulieris corpus suo modo alteret: hinc quædam mulieres mox à conceptu vomere omni mane, breviter picci corripit solent, &c. hinc etiam in nutricibus lac brevi à conceptione novè alterari, & infantibus hostile fieri incipit.

Mullerum, & omnium animalium feminei sexus, genitura consistit in ovulo, eoque simplici in Viviparis, composito verò ex vitello & albumine in oviparis. Ovipara animalia spectatim sunt aves & crocodilus, &c. quæ in ovario vitellum generant, quod in utero ubi incidit, albumine involuitur, mas verò spiritu animalium vitellum fecundat, ut exinde ovum fecundum emittatur, ita, ut etiam unus galli coitus reddat gallinam aliquot menses ovorum fecundorum genitricem. Quod verò pisces oviparos attinet; in his, quod Germanis dicitur *der Ragen*, nil aliud est, quàm ovulorum vel vitellorum congeries, quæ ovula in coitu (quod fit tantum per partium posteriorum attritionem) à femella excluduntur, à genitura maris resparguntur. Quæ ergò ab ista maris genitura irrorata fuerint, sunt fecunda, fiuntque ex his pisciculi: quæ verò non, ea seu infecunda intereunt: Videatur LYSERI *Culter Anatom.* ubi gallina vivos pullos excludit. Dantur etiam pisces vivipari, ut balaneæ.

Fœmina & ipsæ suam genituram oviformem ad generationem conferunt, quatenus illud corpus, quod Veteres testes muliebres appellarunt, reverà est Ovarium, in quo generantur ovula, ita, ut unumquodque in sua capsula lateat reconditum, ipsorum sic dicto, præter ovula contenta, saltim crassam ac firmam membranosam substantiam exhibente. Ovula hæc peculiari suâ tunica investita continent humorem albicantem lacteum, qui beneficio spiritus genitalis maris fecundatur, adeoque succum, ex quo formatur fœtus, constituit. Ovula hæc per tubam uterinam traiciuntur in uterum, nunc unum, nunc duo, prout vel simplex, vel multiplex generatur fœtus; fecundantur enim nunc simul, nunc successivè, unde superfætationis contingit negotium: vid. GRAEFFIUS *de Organis Mulierum, Generationi inservient.* item KERCKRINGIUS in *Anthropog.* item Tabula RUYSCHII, ELSHOLZ *de Generatione. Hominis in tuba uteri.* Superfætatio ex his ovulis clara



**Par**a est. Quando tria secundantur ovula, fit scetus tri-  
mellus.

Leditur hæc generatio Seminis seu genitura in maribus,  
aut præternaturalis redditur tribus modis:

1. Quando hæc deficit, aut imminuitur.
  2. Quando eadem abundat.
  3. Quando depravatur, aut eadem vitiosa redditur,
- dum nempe non tale semen, quale generationi aptum, sci-  
licet aut acre nimis, aut aquosius, aut purulentius produ-  
citur, aut alio peregrino colore est insignitum.

## C A P U T I.

### D E

#### SEMINIS DEFECTU aut INSUFFICIENTIA.

**C**UM autem posteriores modi raro occurrant, in hac  
sektionem primariam considerationem meretur deficiens  
& insufficientis seminis Generatio.

### C A U S A.

*Causa duplex est: aut fit*

1. Ex vicio & defectu materia, ex qua genitura elabo-  
randa est; aut
2. Vicio testium, qui istam elaborare debent.

In priori causa, quibus genitura plane deficit, præter  
hoc, quod careant stimulo Venereo, sunt etiam effemina-  
ti, torpidi, languidi, minus alacres, & eunuchos omnibus  
moribus imitantur.

Quod attinet materiam seminalem, seu ex qua genitura  
elaboranda venit: supra dixi, quod materiam constituat  
pars sanguinis chylosa, subdulcis & pinguis, adeoque plus  
minus viscosa seu mucilaginosa. Hæc ut naturaliter in ali-  
mentum partium nervosarum, seu, ut alii vocant, par-  
tium spermaticarum (quæ loquendi ratio certo modo expli-  
cata stare cum priori optime potest) impenditur; ita eadem  
ipsa pars chylosa hinc inde secreta varios liquores, in specie  
lacin mammis, nutrimentum fetus in utero, & denique  
testibus materiam genituræ sufficienter largitur. Nam quod  
talis materia seu substantia chylosa sit materia, ex qua ge-  
nitura elaboratur, confirmant omnia genituræ attributa,  
nempe ejus color lacteus, ejus consistentia mucilaginosa,  
naturaque subpinguis. Pinguem dixi, indeque non nihil  
invisibilem: Nam ob id ad morem pinguium & mucilagi-  
nosorum in actu generationis spiritibus imprægnata & turgi-  
da ipsum escit, & in bullas attollitur, quatenus spiritus ani-  
males irritati pinguedinem ejus in bullas ac spumam ele-  
vant, quod proprium est subiectis mucilaginosis à materia  
subtili imprægnatis. Jam ergo, quicquid hanc materiam  
sanguinis chylosam absorbere potest, illud etiam omne ge-  
nituræ defectum inducit, uti fit in vita nimis laboriosa,  
inedia, pravo victu, læsa chylicatione, & aliis vehemen-  
tioribus animi affectibus, evacuationibus immodicis, vigi-  
liis, &c. quod etiam fonticulorum abusus spectat. In specie  
vita laboriosa, exercitia, & alii graviores animi affectus,  
quæ acuendo quasi sanguinis fermentationem, & conse-  
quenter sanguinem nimis rarefaciendo, attenuando, & acrem  
reddendo, eo ipso citam chyli assimilationem producant,  
& sic materiam seminalem exhauriunt. Unde etiam est,  
quod *Pingues & Corpulenti* non semper genituræ abun-  
dent, sed sæpe defectum illius patiantur, utut lacte chylo-  
so sanguis eorum scatcat. Ratio est hæc, quia iste chylus  
subdulcis nondum sanguini assimilatus in pinguedinem fa-  
cessit; unde, quia in pinguedinem materia hæc, quæ aliàs  
suâ naturâ in genituram facessit, absorpta, minus semini  
impenditur. Sed hæc, ceu nota, relinquo. Facit huc ap-  
positè tritum istud proverbium: *Sine Cere & Libero seu  
Bacco friget Venus*: Confirmat nempe, quantum ad Vene-  
rem faciat digna laudabilis.

Pergo ad alteram causam, dum testium vitio deficit se-  
minis generatio, quod multiplex est, & vel in defectu fer-  
menti seminalis, vel in conformatione, in specie testium  
tum moribus, consistit.

Quod 1. genituræ elaboratio impeditur, si fermentum  
ejus spermatis effectivum sit nimis torpidum, enervatum  
aut minus activum, utut enim parenchyma testium sit tan-  
tummodò congeries minutissimorum vasculorum, nihilo-  
minus tamen certum quoddam & spirituosum his ipsis insi-  
tum est fermentum, sub dierum cursu, anno circiter 14.

evigilans, quod chylosum succum alterat in genituram seu  
Sperma; Nam in genitura elaboranda sunt considerata:

1. Materie transcolatio in testium substantiam.
2. Materie transcolatæ certa & determinata alteratio,  
quæ fit à fermento testium.

Fermentum tale ut incumbit elaborationi genituræ, ita  
præterea cum sanguine aut lymphâ ex testibus refluens massæ  
sanguineæ inspiratum & permixtum, successivè eandem al-  
terat, & volatiliorem, simulque spirituosiores reddit,  
hinc singulare toti corpori robur & virium vigorem, & insi-  
gnem alterationem sub annis pubertatis conciliat; unde  
barbæ & pubis eruptio, & similia alia accidentia, tam in  
fœminis quàm in viris contingunt. Unde etiam fit, ut mor-  
bi puerorum chronici, item incurabiles aliis epilepsia, sub  
id tempus sponte natura curentur, teste HIPPOCRATE  
in Aphor. Qui epilepsia corripiuntur, in iis anno 14. fit  
morbi solutio; quatenus scilicet à fermento isto testium tam in-  
signis massæ sanguineæ ac totius corporis fit alteratio. Fer-  
mentum hoc quid sit? non potest determinari; Probabile ta-  
men est, spiritus animales in testibus esse concentratos, quæ  
volatili sua efficacia materiam chylosam eò delatam in sub-  
stantiam spermatis mutant. Spirituosum ergo est hoc  
fermentum, quod ubi torpet, minusque est volatile, tunc  
est causa deficientis seminis. Spirituosum dixi, adeoque  
acidum oleosum volatile. Confirmatur hoc, quod omnia,  
quæ spiritus animales figunt, genituræ elaborationi spicem  
ponunt, v.g. acida nimis fixa, vitriolata, nitrata, &c.  
quæ Veneri sunt inimica, figendo & destruendo spiritus ani-  
males, & per consequens infringunt fermentum hoc & vim  
genitalem inde dependentem: hinc est, quod e contra acris  
volatilia, imprimis aromatica & spirituosas, spiritus exci-  
tando acuant hoc, & stimulent Venerem: hinc acida, in  
specie spiritus vitrioli aut nitri crebrius usurpatus, notabi-  
liter genituræ elaborationem in testibus enervat; quod con-  
firmat historia notabilis, quam refert B. noster L. A. N-  
GIUS in Discurs. super Fabrum, dum refert, quendam  
ex nimio abusu spiritus vitrioli adeo immutatos acquisivisse  
testiculos, ut tandem ad pisorum quantitatem redacti fue-  
rint: postmodum intermisso spiritus vitrioli abusu sensim  
sensimque eosdem recuperaverit. Item quod nitrum cru-  
dum, copioso acido turgidum, copiosius assumptum, Ve-  
neris impetus cohibeat, hujus rei imprimis habet notabilem  
casum TIMÆUS von Guldenklec lib. 3. Cap. 52. de quo-  
dam Musico ad Venerem hiantem, adeo, ut nullo modo sa-  
turari possit, idque ex acriore Veneris stimulo; qui tamen  
suis curatus continuos nitri crucis, seu nitri tantummo-  
dò depurati, in quo semen ita extinctum est, fermento tes-  
tium destructo (hinc enim tanta copia genitura elaborari  
non potuit) ut vix propriæ uxori postmodum satisfecerit.  
Sicut e contra acris, ut cantharides, piperata, eruca, for-  
micæ, item spiritus ex sanguine galli, & similia fermentum  
testium, & sic Venerem stimulant. Defectus ergo &  
inertia hujus fermenti etiam facit, ut deficiat genitura ma-  
ris. De ruta & mentha dicunt quidam, quod Venerem ex-  
tinguant, ut & de lactuca, sed sine ratione. Ad huiusmo-  
di torporem testibus inducendum, vel fermentum testium  
extinguendum, multum etiam facit refrigeratio, aut ni-  
mium frigus externum; hinc enim & testes languent, ge-  
neratio sanguinis imminuitur, & ipsum corpus denique  
totum insigniter alteratur. Facit nempe huc, quod obser-  
vavit SALMUTH Cent. 3. Obs. 91. qui refert, quod mi-  
lites, dum fluvia transeunt (genitalibus sub aquis existen-  
tibus) si isdem nimis refrigerentur & humectentur testes,  
quod exinde admodum effeminentur, & animositas in iis  
immutetur. Id quod illustratur ex eo, quod ebrietas, hæ-  
morrhagia narium, &c. applicatis externè testibus frigidis  
& humidis, sedentur: hinc enim acetum testibus applica-  
tum ebrietatem subito discutit; item simili ratione succus  
sempervivicum aceto & nitro mistus & applicatus scroto  
sedat hæmorrhagiam narium, à nimia sanguinis effervescen-  
tia & turgescencia, ex causa interna ortam. Quin &  
maniaci furibundi, vinculis constringendi, testium excisione  
optime curantur; Sic enim impetus furoris insigniter ces-  
sat, teste RIVERO, qui in Obs. à FOMIO communica-  
ta exemplum hujus rei habet: Sicut maniam ex semine re-  
tento recenset FORESTUS lib. 10. Obs. 24. Faciunt etiam  
suo modo Mercurialia seu Mercurius vivus, imprimis ex-  
ternè circa genitalia illita; nam & hic ipse, uti nervis ini-  
micus, ita etiam testibus hostilis est; Nam testium fermentum  
destruit, & virtutem feminalem evertendi vim insignem  
habet: Refert enim SCHENCKIUS in Obs. lib. 4. de Vi-  
rilita-



illitate & stimulo Veneris inunctione per unguentum Mercuriale ad fugandos pediculos pubis omnino ademptis, licu tamen olei destillati spica tanquam aromatis, omisso hoc linimento Mercuriali, restitutus, quo & pediculi enecati sunt. Facit huc etiam Venus nimia, quæ vim genitalem insigniter enervat, partim, quatenus testium fermentum successivè hebetat, partim, quatenus digestionem primam, subtrahendo nimis spiritus, notoriè turbat & imminuit, & ita, dum chylus non subit rectam spiritalitatem, cruditatibus occasionem suggerit. Imprimis ad vim testium genitalem conservandam, multum hæret in negotio digestionis; Omnes enim, in quibus deficit naturaliter vigor genitalis & appetitus Veneris, ille etiam simul laborant defectu digestionis primæ, cruditatibus & anorexia; quod probè pro cura ipsorum observandum: In his nullus vel exiguus Veneris appetitus, pulsus parvus, corporis gravitas ac pigrities, ipsiusque ac præcipuarum partium intemperies frigida observatur, genitura cruda, aquosa & liquida est, sub cujus emissionem etiam exiguam vel nullam voluptatem percipiunt. Hinc Ebriosi, qui nimio potu corpus obruunt, hinc Hydropici & Cachectici, sterilescent. Facit huc etiam abusus Veneris, imprimis, si nimis citò, & in prima juventute, & nimis crebrò, instituitur: Nam in nimio Veneris abusu & in manu stuprationibus, continuata genituræ elaboratione necessariò vis fermenti genitalis testiculorum deficit tandem, & continuo usque quasi atteritum torpescit, & minùs volatile evadit; unde genitura priùs aquosa, postmodum defectuosa, reddi solet; In tantum enim exhauritur fermentum, ut non possit iterum restitui. In quo casu & laxior & flaccidior testium accedit structura, eorumque totus omnino destruitur, cum à copiosiore & frequentiore materiæ transitu tandem viæ ista laxantur, & patulæ fiunt, ut postmodum nihil amplius legitime secretatur & elaboretur; quin ex hoc totum testium lesio, aperiens sanguinis vasculis, loco genituræ sanguis tandem purus in coitu effundatur, cujus non pauca prostant exempla: vid. ZACUTUS LUSITANUS lib. 3. Hist. 18. & Prax. Admir. lib. 2. Obs. 102. Imprimis quando præcesserit illegitimus cantharidum usus, qui acridus stimulo, sanguinem loco genituræ effundere facit. Huic malo etiam non raro diuturnior à Venere abstinencia ansam suggerit, quemadmodum de monacho quodam VIDUS VIDIVS lib. 11. Curat. Membr. cap. 2. refert, cujus testes licet in adolescentia iustam magnitudinem adepti fuerint, progressu nihilominus temporis, ob vorum castitatis inviolabiliter ab ipso observatum, cum vas spermaticis ferè penitus exaruerint, ut hæc post mortem instar duorum ligamentorum fuerint visa.

Deficit II. Genituræ Generatio ex testium defectu, aut naturali, aut morbo; imprimis si ambo deficient, ut sit in castratis, quia etiam cum unico teste secundi observati fuerunt: Sic in M. A. N. C. Ann. 4. & 5. Obs. 13. mentio fit monorchidis, plurium liberorum patris. Hic tamen non confundendus est defectus testium cum eorundem situ mutato, scilicet retractione seu occultatione intra corpus seu intra abdomen, cum sæpius observatum fuerit, nunc testes in abdomine latuisse, nunc in osculo pubis subfuisse, & ibidem tumorem instar herniæ induxisse: Nec tamen proinde tales pro impotentibus habendi sunt. Sic BRECHFELD BARTHOLINI in Act. Hassniens. Volum. 1. pag. 197. refert, testiculum alterum circa annos pubertatis primùm erumpentem; unde etiam monorchides an reverà sint tales? non sine ratione dubitat BORRICHIVS in Act. Hassniens. Volum. 4. pag. 169. Exempla talium non sunt pauca: Sic SCHENCKIVS lib. 4. Obs. quendam equitatione vehementi testiculorum alterum in ephippio contorquendo ita pressisse refert, ut ad abdominis musculos ad iugum retrocederet: Sic SALMUTH Cent. 1. Observat. 91. observat testiculum per 13. annos in abdomine latentem, per 14. postmodum spontè in scrotum prorupit. Imò interdum fit etiam ut unus, alterve testiculus ex scroto sursum in abdomen retrahatur, Sic scilicet idem SALMUTH Observat. 91. Cent. 1. observat retractionem testiculi in paroxysmo epileptico, ex convulsione scilicet musculi cremasteris: item Cent. 3. Obs. 63. observat testiculum sinistrum intra peritonæum retractionem ex nimio Veneris usu, & testiculum alterum in abdomine latentem: Vid. in BARTHOLINO Cent. 1. Obs. 36. Conf. hic LAURENTIVS Conf. 11. de juvene 30. annorum, qui testibus vacuum omnino habuit scrotum, in quo tamen

signa virilitatis apparebant, ut vox gravis, hirsuties, barba, &c. Dubitabatur ergo, an pro eunuchis habendus.

Deficit III. Genituræ Generatio vitio testium male affectionum, quando nempe læditur plùs minùs testium conformatio; quod pertinent imprimis eorum tumores varii, cum in tumidis & infarctis testibus nulla, aut materiæ feminilis collectio, aut collecti elaboratio fieri possit, quin necessariò genitura deficiat: De quibus Tumoribus in specie.

Hæ sunt Causæ, quæ Genituræ defectum imprimis inducunt.

## DIAGNOSIS.

Signa deficere vim genitalem, indeque productam genituram, patet ex relatione ægri, & in talibus vel nullus, vel exiguus Veneris appetitus adesse solet, corpus ipsum similiter grave, pigrum, minutumque agile existit, ipseque æger minus activus, & præsertim in actionibus animalibus deficiens observatur.

Causas quod attinet differentes: hæ ipsæ ex antecedentibus & ex adjunctis imprimis, expiscandæ erunt: Nam si nullum vitium in ipsis testibus deprehendatur, vel materiæ defectum, vel fermenti testium inertiam, in culpa esse patet. Utrum horum sit? antecedentes circumstantiæ ostendunt: Nam si ex defectu materiæ chylosæ sit, ex vitæ genere, diætâ, exercitiis, &c. patet. Si vitio testium, vel ex defectu fermenti testium contingat, præter appetitus Veneris defectum, corporis gravitatem & pigritiam, patet quando in coitu genituræ aliquantulum emittitur, hæcque tenuis & aquosa, minusque calida seu fervida, emitti percipitur. Quod si præcesserit causa, quæ testes labefactare potuerit, suspensiones hæ sunt eò clariores.

Defectus denique Testium per se spontè patet.

## PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: facillè patet, quod læsa genituræ generatio non sit periculosus affectus: admodum tamen est molestus, quia impedit opus generationis, & mares reddit generationi ineptos; unde speciei quidem, non autem individuo nocet; utut interdum per accidens vel ex animi morore, vel ex deficiente sanguinis alteratione à testibus inducitur, languor universalis & quasi tabes superveniat; unde & quatenus virili mente præditos effeminatos facit, & actionibus obeundis minus agiles reddit eosdem, omnino curandus est.

Senibus est incurabilis ferè, uti etiam iis, qui in juventute ex nimio Veneris usu fermentum testium labefactarunt, est difficillimæ curationis; Cum semel destructum fermentum testium non possit restitui.

## CURA.

Variat hæc pro varietate causarum remotarum.

1. Per alimenta temperata, succo chyloso pingui & dulci turgida, materia seminis copiosa subministranda. Quibus
2. Simul intermiscenda sunt spiritulosa & volatilia, imprimis acriora & aromatica, quæ fermentum testium transmutativum acuum, ipsique stimulum quasi addunt, & robustius reddunt.
3. Tumores testium autem sunt maturè discutiendi, aut resolvendi & emolliendi, aut ad abscessum perducendi & aperiendi, aut quacunque ratione aliis irritis, ubi majus imminet periculum, Chirurgica methodo, sectione sc. sunt tollendi.

His scopis ut satisfaciamus, inter ea, quæ defectui materiæ, & enervato fermento testium, dicata sunt, eminent alimenta temperata, quæ vel copiosum succum chylosum & subdulcem suppeditant, vel quæ acria aromatica existunt, adeoque Venerem plùs minus stimulant: Ubi observandum est

I. Ut semper simul Cura stomachi habeatur, & digestio prima promoveatur, & in debitis functionibus conservetur; quæ enim deficiente, deficit etiam vis genitalis: Conf. LUDOVICI Pharm. pag. 719. & 720. ubi simul de usu & effectu Aphrodisiacorum.

II. Remedia illis inservientia sunt vel talia, quæ materiam genituræ suggerunt, vel quæ saltem veneris impetum stimulant. Nam semel pro semper moneo: ubi Venus est stimu-



agri, de quo vid. MONAVIUS apud Cratonem lib. 7. Epist. 23. ut etiam aqua nasturtii aquatici ceu conveniens vehiculum usurpatur pro medicamento contra Philtera. Mirabiles effectus, si non ficto exemplo, nasturtii huius usu contra Philtera confirmat SCHENCKIUS in *Obfer. lib. 7. pag. 83.* ex quo desumpsit BONETTUS in *Sepulchreto pag. 620.* Præterea Mixture simplicem ceu appropriatum sudoriferum contra Philtera commendat HARTMANNUS hinc & tinctura bezoardica parari potest. Singulare specificum, est contra Philtera secundina humana, ejusque spiritus urinosus volatilis per putrefactionem paratus, item pulvis per phlegmatis abstractionem in Mariæ balneo paratus; aliàs, si in clibano torretur, sal volatile aufugit; e. g.

24. *Secundina humana:*

& extracta membrana una cum vasis majoribus, eadem in Mariæ balneo in cucurbita mediante alembico, destillatur, & prodit sic phlegma; & remanentia in pulverem potest redigi.

Et quidem dator pulvis secundinae à ʒss. ʒj. ad ʒiſs. vel ʒij. Item spiritus secundinae datur à ʒss ad ʒj. vel ʒij. eaque cum vehiculo aquæ nasturtii, nunc solitarie, nunc cum tincturæ bezoardicæ nonnihil, nunc spiritu theriacali camphorato mistis, expectando sudorem, non absque felici successu propinari solent: e. g.

24. *Spiritus theriacal. campb. ʒj.*

*Secundinae hum. ʒj.*

M. pro sudorifero:

D. S.

*Spiritus sudoriferus pro una vice.*

24. *Ess. viperar.*

*Spiritus secundinae hum. an. ʒij.*

M. S.

*Essentia singularis.*

*Dosis gutt. 30.*

24. *Theriac. Androm. ʒj.*

*Pulv. secundinae hum. ʒiſs. vel ʒj.*

M. S.

*Electuarium sudoriferum pro una vice.*

Et spectatim quælibet remedia ex secundina parata conveniunt, ubi ex sanguine menstruo paratum fuit Philterum. Sed observetur, quod parata ex secundina, imprimis pulvis, ultra annum non duret, sed copiosissimos vermiculos generet; spiritus verò per fermentationem seu putrefactionem paratus diu durat; adeoque pulvis singulis annis renovandus.

His succedit spiritus theriacalis camphoratus, & omnia ex theriaca parata, spiritus cancrorum, extractum theriacale, item hypericon, anagallis, & omnia ex hac parata, absinthium, hinc vinum absinthites RVLANDVS loc. all. propinavit; baccæ herba paridis & ipsæ pulverisatæ ad ʒj. comendantur expectando sudorem. Corallia, & ex his pa-

ratæ tincturæ elegantiores, terra sigillata Lignicensis vel Strigenfis, vel etiam, uti vocant, axungia solis, tam ad absorbendum, quàm per sudorem discutendum Philterum adhibetur: neque in principio ad ʒj. cum extracto theriaca limixta; ubi verò se sanè diffudit Philterum, per sudorem dispellendum. Decoctum corticis mediani sambuci in sero caprillo manè & vespere aliquoties datum, etiam ante triennium propinatam materiam noxiam pro philtero, expellit, Autore BLOCHWIZIO in *Anat. Sambuci*. Essentia mumiæ humanæ, & essentia serpentum, pulvis serpentum, imò & reliqua quæcunque, tam ex homine quàm serpentibus, vel viperis, item ex mumia humana parata remedia, præmissis universalibus, sunt maxime appropriata in curandis Philteris. Nam etiam calculus humanus pulverisatus, à ʒi. ad ʒj. in aqua nasturtii aquatici assumptus, contra Philtera & melancholicam eroticam plurimum confert, expellendo simul urinam plurimam. Imprimis si à sanguine menstruo, teste HENRICO ab HEER in *Obs. 13. & in Obs. Spadani: Vid. SCHROEDERVS Dilucid. Part. 1. sect. 1. pag. 23.* Tandem HARTMANNVS in *Praxi Chym.* habet electuarium ex lapide magnete cap 7 §. 13. descriptum, contra Philtera, quod præmissis universalibus experimentum planè singulare & verissimum est, & cuius felicem usum B. D. MICHAELIS in studiofis graviter affectis aliquoties observavit. PRÆVOTIVS commendat corymbos hederæ albican-tes per octo dies ex vino vel decocto cicero exhibitos ad ʒj.

Quod si jam Philterum ad maniam procedat, tunc optimum experimentum habetur nasturtium aquaticum, de quo antea monui. Sunt, qui dicunt, quod etiam confirmat SCHMVCKIUS in *Cur. Magico-magnet. pag. 72.* quod contra maniam ex philtero sit admodum certum, si quis accipiat calceos novos, in illis probè currat, donec incallescant, & sudore pedum madescant, hinc potum infundat & hauriat: fides tamen sit penes experientiam. Tandem margarita præparata contra Philterum in specie ex menstruo mulierum, item cum sanguine leporino, laudantur à BORELLO Cent. 1. *Observ. 65.* Quibus & alia alexipharmaca theriacalia & sudorifera aliàs etiam usitata commodè addi & subjungi possunt. Vnum adhuc referam, mihi à quodam fide digno narratum: Vir quidam loco Philteri ab uxore aliquid de ejus sanguine menstruo accepit inscius, unde fit, ut tridui spatio mirum quantum totum corpus intumuit, omnesque partes mirabiliter inflammatæ fuerint. Pro cura propinatum fuit illi pulvis cardui benedicti & theriacæ ana in aqua cardui benedicti; umbilico verò appositum dimidium panis recentis seu recenter ex furno extracti, parum excavati, & similiter theriaca & pulvere cardui benedicti impleti. Sicque provocatus sudor: unde tumor cessavit, & remoto pane dimidio, livido & subcæruleo, secuta levis diarrhœa, à qua ipsa tandem æger fuit perfectè curatus.





## LIBER III.

D E

## MORBIS SEXUI VIRILI PROPRIIS.

**C**UM lubitum fuerit vobis adhuc continuare ea, in quibus substitimus hactenus in Praxi, scilicet post pertractatos morbos totius corporis in genere, & utrique sexui communes, etiam in specie considerare affectus appropriatos cuiusvis sexui & statui, exorato prius Numine Divino, ad illos nos accingimus.

Et quidem, quod attinet primò affectus virorum: inter illos primò omnium genituræ generatio læsa consideranda. Præsuppono hinc officium virorum, quæ talium, consistere in eo, ut & genitura in testibus elaboretur sancta, idem ad debitum tempus retineant & denique retentum subcoitus fervore, & certo membro excernant: pnde accessum facio ad

## SECTIONEM I.

D E

## SEMINIS, vel potiùs GENITURÆ, VIRILIS LÆSA GÉNÉRATIONE.

**M**ultiplicant se homines mediante genitura utriusque sexus, quarum geniturarum coalitu fit verum semen humanum seu ovum secundum. Quod ergò maris attinet genituram, vulgò, sed malè, semen appellatam, (vid. THOMAS CORNELIUS CONSENTINUS *Progymn. 5. pag. 172.*) elaboratur hæc in testibus, qui nihil aliud sunt, quàm congeries minutissimorum vasculorum, quorum aliquot ex testè erumpentium variis suis flexibus corpus illud constituunt, quod testium dorso incumbit, & Epididymis appellatur, quod ipsum tandem dilatatum constituit vas deferens, quod hinc tandem in vesiculas seminales, ubi genitura in testibus elaborata, in epididymidibus perfecta, per vias deferens ad vecta aservatur, donec spumoso impetu ejaculetur. Structuram hanc testium pluribus explicatam videb. in GREFFIO *de Organ. Viror. Generationi inservient.* item in *Art. Philos. Anglic. pag. 708. & pag. 564.*

Genitura est illud, quod uterque sexus confert: Semen est utriusque genitus miscela.

Genituræ maris, dum eicitur, simul admiscetur liquor serosus & blandus, uno nomine: lymphæ sui generis in corpore prostaticarum glanduloso & spongioso elaborata, quæ in urethram effusa genituram seu semen maris vehiculi instar promover, ut eò meliùs per penem eiaculari queat, cuius etiam ratione eunuchi adhuc aliqualem coitum celebrare possunt. Prostata hæc in iis, qui sæpiùs Venere utuntur, maiores sunt, ut in canibus, sicut circa radicem penis habent, quorum liquoris beneficio eunuchi adhuc aliqualem coitum celebrant.

Materia genituræ virilis est chylus cum sanguine per arterias hinc inde raptus, & per vasa spermatica ad testes delatus, ubi ex arteriis transfundat in vascula seminalia, & ibidem formaliteratione in genituram mutatur: Videatur CONSENTINUS *c. l.* & BARBATUS *de sero sanguinis*, quicquid etiam in contrarium dicat CHARLETON *de succo nutritio*, nempe in *Exercit. 10.* & WARTHONUS in *Adenogr. cap. 27.* aut VELTHUSIUS *de Generat. cap. 6.* Huic genituræ se associant in specie subcoitus fervore spiritus animales copiosi, à quibus Generationis opus primariò perficitur, & qui constituunt contagium illud spirituosum, quod fecundat ova muliebria: Hi sunt quasi nucleus, cui genitura filiquæ instar inservit: de qua seminis formaliteratione, eiusque fecunditate, vid. RALLIUS *de Generat. Animal. Sect. 3.*

Efficiens seu illud, quod alterat chylum in testibus, ut propriè dicta genitura seu semen evadat, est fermentum speciale, in vasculis istis seminalibus reconditum, à quo, uti primariò genitura perficitur, ita ab eodem cum sanguine & lymphæ à testibus resuiss, reliquo corpori communicato, singulares istæ alterationes eveniunt, quæ sub pubertatis annis, dum homines generare incipiunt, se exferere solent, & cuius etiam defectu eunuchi adeò effeminati sunt; siquidem quasi fermento in pirato massa sanguinea tota alteratur & fermentatur, unde spirituosior magis, magisque fervida redditur, unde totius corporis habitus similiter alteratur: Vid. *de Alteratione Corporis Humani* GRAEF-

FIUS *c. l. pag. 25.* Sic Purgans quidam assumpsit, postmodum ancillam comprimens, illam vehementer purgavit medicamentum illud: vid. MOEBIUS in *Fund. Med. pag. 280.* HORSTIUS simile exemplum habet in *Obs. Anat. 10.* de nobili sibi amicissimo, qui Aureliæ in Gallia securo, post horam à purgante medicamento assumpto iusculum ferenti, inter meretricios amplexus coitu purgantem efficaciam insinavit, ut *Arxæi xera* decies vehementer purgaretur. Sic mania per castrationem curatur & cleuratur, vid. RIVERIUS. Si consideremus, quantum non raro mulieres quædam ex secundo congressu, in toto alterentur corpore, non adeò absorta videbitur STENONIS sententia, quam recenset CASPAR BARTHOLINUS in *Exercit. miscell. pag. 45.* quod semen virile in uterum injectum (non aliter ac medicamenta aut alimenta assumpta vires subtiliores statim ad sanguinem & spiritus animales amadare videamus) sanguini & nervoso generi communicetur, & ita universum mulieris corpus suo modo alteret: hinc quædam mulieres mox à conceptu vomere omni mane, breviter picci corripit solent, &c. hinc etiam in nutricibus lac brevi à conceptione novè alterari, & infantibus hostile fieri incipit.

Mulierum, & omnium animalium feminei sexus, genitura consistit in ovulo, eoque simplici in Viviparis, composito verò ex vitello & albumine in oviparis. Ovipara animalia spectatim sunt aves & crocodilus, &c. quæ in ovario vitellum generant, quod in uterum ubi incidit, albumine investitur, mas verò spiritu animali vitellum fecundat, ut exinde ovum secundum emittatur, ita, ut etiam unus galli coitus reddat gallinam aliquot menses ovorum fecunderum genitricem. Quod verò pisces oviparos attinet; in his, quod Germanis dicitur *der Ragen*, nil aliud est, quàm ovulorum vel vitellorum congeries, quæ ovula in coitu (quod fit tantùm per partium posteriorum affricum) à femella excluduntur, à genitura maris resperguntur. Quæ ergò ab ista maris genitura irrorata fuerint, sunt fecunda, fiuntque ex his pisciculi: quæ verò non, ea ceu infecunda intèreunt: Videatur LYSERI *Culter Anatom.* ubi gallina vivos pullos excludit. Dantur etiam pisces vivipari, ut balanus.

Fœminæ & ipsæ suam genituram oviformem ad generationem conferunt, quatenus illud corpus, quod Veteres testes muliebres appellarunt, reverà est Ovarium, in quo generantur ovula, ita, ut unumquodque in sua capsula lateat reconditum, ipso teste sic dicto, præter ovula contenta, saltim crassam ac firmam membranosa substantiam exhibente. Ovula hæc peculiari suâ tunicâ investita continent humorem albicantem lacteum, qui beneficio spiritus genitalis maris fecundatur, adeoque succum, ex quo formatur fœtus, constituit. Ovula hæc per tubam uterinam traiciuntur in uterum, nunc unum, nunc duo, prout vel simplex, vel multiplex generatur fœtus; fecundantur enim nunc simul, nunc successivè, unde superfætationis contingit negotium: vid. GRAEFFIUS *de Organis Mulierum, Generationi inservient.* item KERCKRINGIUS in *Anthropog.* item Tabula RUYSCHII, ELSHOLZ *de Generatione. Hominis in tuba uteri.* Superfætatio ex his ovulis clara



ritate & stimulo Veneris inunctione per unguentum Mercuriale ad fugandos pediculos pubis omnino adeptis, lito tamen olei destillati spica tanquam aromatizati, omisso hoc linimento Mercuriali, restituitis, quo & pediculi enecati sunt. Facit huc etiam Venus nimia, quæ vim genitalem insigniter enervat, partim, quatenus testium fermentum successivè hebetat, partim, quatenus digestionem primam, subtrahendo nimis spiritus, notoriè turbat & imminuit, & ita, dum chylus non subit rectam spirituscentiam, cruditatibus occasionem suggerit. Imprimis ad vim testium genitalem conservandam, multum hæret in negotio digestionis; Omnes enim, in quibus deficit naturaliter vigor genitalis & appetitus Veneris, ille etiam simul laborant defectu digestionis primæ, cruditatibus & anorexia; quod probè pro cura ipsorum observandum: In his nullus vel exiguus Veneris appetitus, pulsus parvus, corporis gravitas ac pigrities, ipsiusque ac præcipuarum partium intemperies frigida observatur, genitura cruda, aquosa & liquida est, sub cuius emissionem etiam exiguam vel nullam voluptatem percipiunt. Hinc Ebriosi, qui nimio potu corpus obruunt, hinc Hydropici & Cachectici, sterilescent. Facit huc etiam abusus Veneris, imprimis, si nimis citò, & in prima juventute, & nimis crebrò, instituitur: Nam in nimio Veneris abusu & in inapusturationibus, continuata genitura elaboratione necessariò vis fermenti genitalis testiculorum deficit tandem, & continui usque quasi astringit torpescit, & minus volatile evadit; unde genitura prius aquosa, postmodum defectuosa, reddi solet; In tantum enim exhauritur fermentum, ut non possit iterum restitui. In quo casu & laxior & flaccidior testium accedit structura, eorumque totus omnino destruitur, cum à copiosiore & frequentiore materie transit tandem via ista laxantur, & patulæ fiunt, ut postmodum nihil amplius legitime secerentur & elaborentur; quin ex hoc totum testium lesio, aperetis sanguinis vasculis, loco genituræ sanguis tandem purus in coitu effundatur, cuius non pauca prostant exempla: vid. ZACUTUS LUSITANUS lib. 3. Hist. 18. & Prax. Admir. lib. 2. Obs. 102. imprimis quando præcesserit illegitimus cantharidum usus, qui acridis stimulo, sanguinem loco genituræ effundere facit. Huic malo etiam non raro diuturnior à Venere abstinencia ansam suggerit, quemadmodum de monacho quodam VIDUS VIDIVS lib. 11. Curat. Membr. cap. 2. refert, cuius testes licet in adolescentia iustam magnitudinem adepti fuerint, progressu nihilominus temporis, ob votum castitatis inviolabiliter ab ipso observatum, cum valis spermaticis ferè penitus exarverint, ut hæc post mortem instar duorum ligamentorum fuerint visa.

Deficit II. Genituræ Generatio ex testium defectu, aut naturali, aut morbofo; imprimis si ambo deficient, uti fit in castratis, quia etiam cum unico teste satis fecundi observati fuerunt: Sic in M. A. N. C. Ann. 4. & 5. Obs. 13. mentio fit monoorchidis, plurium liberorum patris. Hic tamen non confundendus est defectus testium cum eorundem situ mutato, scilicet retractione seu occultatione intra corpus seu intra abdomen, cum sæpius observatum fuerit, nunc testes in abdomine latuisse, nunc in ossè pubis subsedisse, & ibidem tumorem instar herniæ induxisse: Nec tamen proinde tales pro impotentibus habendi sunt. Sic BRECHFELD BARTHOLOMI in Aët. Hassniens. Volum. 3. pag. 197. refert, testiculum alterum circa annos pubertatis primùm erumpentem; unde etiam monoorchides an reverà sint tales? non sine ratione dubitat BORRICHIUS in Aët. Hassniens. Volum. 4. pag. 169. Exempla talium non sunt pauca: Sic SCHENCKIUS lib. 4. Obs. quendam equitatione vehementi testiculorum alterum in ephippio contorquendo ita pressisse refert, ut ad abdominis musculos ad inguen retrocederet: Sic SALMUTH Cent. 1. Observat. 91. observat testiculum per 13. annos in abdomine latentem, per 14. postmodum spontè in scrotum prorupit. Imò interdum fit etiam ut unus, alterve testiculus ex scroto sursum in abdomen retrahatur, Sic scilicet idem SALMUTH Observat. 91. Cent. 1. observat retractionem testiculi in paroxysmo epileptico, ex convulsione scilicet musculi cremasteris: Item Cent. 3. Obs. 63. observat testiculum sinistrum intra peritonæum retractedum ex nimio Veneris usu, & testiculum alterum in abdomine latentem: Vid. in BARTHOLOMI Cent. 1. Obs. 36. Conf. hic LAURENTIUS Conf. 11. de juvene 30. annorum, qui testibus vacuum omnino habuit scrotum, in quo tamen

signa virilitatis apparebant, ut vox gravis, hirsuties, barba, &c. Dubitabatur ergò, an pro eunucho habendus.

Deficit III. Genituræ Generatio vizio testium male affectorum, quando nempe læditur plùs minus testium conformatio; quò pertinent imprimis eorum tumores varii, cum in tumidis & insarctis testibus nulla, aut materie femina. Iis collectio, aut collecti elaboratio fieri possit, quin necessariò genitura deficiat: De quibus Tumoribus in specie. Hæc sunt Causæ, quæ Genituræ defectum imprimis inducunt.

## DIAGNOSIS.

Signa deficere vim genitalem, indeque productam genituram, patet ex relatione ægri, & in talibus vel nullis, vel exiguis Veneris appetitus adesse solet, corpus ipsum similiter grave, pigrum, minutumque agile existit, ipseque æger minus activus, & præsertim in actionibus animalibus deficiens observatur.

Causas quod attinet differentes: hæc ipsæ ex antecedentibus & ex adjunctis imprimis, expiscandæ erunt: Nam si nullum vitium in ipsis testibus deprehendatur, vel materie defectum, vel fermenti testium inertiam, in culpa esse patet. Utrum horum sit? antecedentes circumstantiæ ostendunt: Nam si ex defectu materie chylosæ sit, ex vita genere, diætâ, exercitiis, &c. patescit. Si vitio testium, vel ex defectu fermenti testium contingat, præter appetitus Veneris defectum, corporis gravitatem & pigritiem, patet quando in coitu genituræ aliquantulum emittitur, hæcque tenuis & aquosa, minusque calida seu fervida, emitti percipitur. Quod si præcesserit causa, quæ testes labefactare potuerit, suspensiones hæc sunt edo clariores.

Defectus denique Testium per se spontè patet.

## PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: facillè patet, quod læsa genituræ generatio non sit periculosus affectus: admodum tamen est molestus, quia impedit opus generationis, & mares reddit generationi ineptos; unde speciei quidem, non autem individuo nocet; utut interdum per accidens vel ex animi morore, vel ex deficiente sanguinis alteratione à testibus inducitur, languor universalis & quasi tabes superveniat; unde & quatenus virili mente præditos efformatos facit, & actionibus obeundis minus agiles reddit eodem omnino curandus est.

Senibus est incurabilis ferè, uti etiam iis, qui in juventute ex nimio Veneris usu fermentum testium labefactarunt, est difficillimæ curationis; Cum semel destructum fermentum testium non possit restitui.

## CURA.

Variat hæc pro varietate causarum remotarum.

1. Per alimenta temperata, succo chyloso pingui & dulci turgida, materia seminis copiosa subministranda. Quibus
2. Simul intermiscenda sunt spirituosæ & volatilia, imprimis acriora & aromatica, quæ fermentum testium transmutativum acuant, ipsique stimulum quasi addunt, & robustius reddunt.
3. Tumores testium autem sunt maturè discutiendi, aut resolvendi & emolliendi, aut ad abscellum perducendi & aperiendi, aut quacunq; ratione aliis irritis, ubi majus imminet periculum, Chirurgica methodo, sectione sc. sunt tollendi.

His scopis ut satisfaciamus, inter ea, quæ defectui materie, & enervato fermento testium, dicata sunt, emittent alimenta temperata, quæ vel copiosum succum chylosum & subdulcem suppeditant, vel quæ acria aromatica existunt, adeoque Venerem plùs minus stimulant: Ubi observandum: est

I. Ut semper simul Cura stomachi habeatur, & digestio prima promoveatur, & in debitis functionibus conservetur; quæ enim deficiente, deficit etiam vis genitalis: Conf. LUDOVICI Pharm. pag. 719. & 720. ubi simul de usu & effectu Aphrodisiacorum.

II. Remedia istis inservientia sunt vel talia, quæ materiam genituræ suggerunt, vel quæ saltem veneris impetum stimulant. Nam semel pro semper moneo: ubi Venus est stimu-



stimulanda, ibi non tantum Aromaticis, stimulum augentibus, sed etiam temperatis, quantitatem seminis majorem suppeditantibus, esse studendum; vix enim citra damnum ægri sola stimulantia usurpantur: de quo, ubi de Erektione penis læsa. Ita v. g. sunt imprimis semina succo lacteo turgida, ut amygdalæ dulces, pinæ, pistacia, castanæ, &c. ex quibus parantur *Emulsiones*; hinc oleum pistaciorum & nucleorum pini recens expressum; item dactyli, ostreae & conchæ, chocolata Indica, lac, & omnia ex lacte parata, imprimis tamen muliebres ex mammis suctum, quod mirè etiam confert ad Venerem; item vinum dulce & generosum, imprimis Hispanicum & Malvaticum, sub introitu læsi haustum convenit. Hinc piper, eruca, formicæ, &c. neutra horum solitariò usurpanda, sed ferè semper Venerem stimulantibus copiosum semen generantia iungenda: Non aromatica nimis acris sola, quia imbecilles reddunt: non lactea sola, quia materiam seminalem minus spirituosam reddunt: ambo ergò combinanda: Vid. VELSCHIUS *Hecatoest.* 2. p. 10. Ita ergò, quæ materiam genituræ suggerunt, ova recentia, aut etiam sorbilla, hinc vitellum ovi recens unum alterumve haustum, seu totum conquassatum, & cum vino Hispanico mistum & ita bibitum est optimum, teste LINDANO. Huic mixturæ si addantur aliquot grana ambre, aut quedam Aromatica, ut sunt cubebæ, nux moschata, aut etiam species diapipeleon, erit mistura, quæ mirè armat in Venerem, & semen augendo & simul membrum genitale stimulando. Hinc optimum est ad imitationem SOLENANDRI *Seck.* 4. *Conf.* 17. ut lac dulce recipiamus cum pipere, quod in specie tempore æstivo ad augmentandum semen tanquam optimum commendat pro usu quotidiano:

℥i. Lactis ℥iij.  
Sacch. ℥iij. 3℔. vel 3j.  
Piperis 3℔.

Mista hauriantur pro una vice.

Hiscæ accensendi sunt testiculi gallorum exsiccati, quorum efficacia res nota est ex AMATO LUSITANO *Cent.* 2. *Cur.* 18. & SCHENCKIO in *obs.* l. 4. quod mirè stimulent Venerem: Vnde Itali farcimonia ex cristis & testiculis gallorum cum sanguine galli irroratis parata, mirè commendant. His & similibus simul acris stimulantia, & specificè Venerem excitantia adduntur.

Quæ spirituositate & acrimoniâ aromatica volatili fermentum testium acunt, qualia sunt radix zingiberis, tam pulverisata, quàm in India condita, ejusque syrupus conservativus, quæ laudatur in hoc affectu, non minus, quàm aromata cuncta aut Aromatica; Et talia sunt in specie cubebæ, caryophylli, galanga, cinnamomum, macis, crocus, cardamomum. Præter hæc aromata verò sunt semen fraxini seu lingue avis, semen sinapi, anisi, sceniculi, nasturtii, item semen erucæ. Pertinet huc etiam castoreum, baccæ sabine pulverisatæ, & borra Veneta, de qua vid. AMATVS LVSITANVS. Ex dictis Aromaticis sunt varis species officinarum, species diatrion pipeleon, diambre, diamoschi, Venereæ Mynsichti, diagalanga, &c. rotulæ stimulant Mynsichtii cum ambre & opii. j. vel ij. item aqua magnanimitatis Laurembergii cum Cephalicis & uino Maluatico, & spiritus formicarum egregiè conducunt ad augmentandam vim seminis genitalem, externè & internè. Præter testiculos & cristam galli supra laudatos habetur singularissimus spiritus sanguinis galli ex sanguine aliquantulum putresfacto destillatus; Nam hoc certum est, quod mirè Venerem stimulet, & etiam testes torpentes insigniter excitet; uel exsiccat huius pulvis cum paucis ambre. De Satyrio condito res nota est, sc. ista species, quæ Cynosorchis vocatur, Germ. Knaben-kraut, Hundes Haubtlein, &c. Hæc duos habet bulbos, unum turgidum, alterum flaccidum, quorum is, qui hoc anno fuit turgidus, altero sit flaccidus; & qui fuit flaccidus, turgidus: Jam bulbos iste cynosorchides turgidus insigniter commendatur ad Venerem stimulantem, & augmentandam genituram; sicut contrà alter bulbos flaccidus Venerem imminuit: unde ex hac radice satyrii paratur electuarium diasatyrii Augustanum, & essentia Satyrii Crollii: quæ mirè commendationis est ad stimulantem Venerem, si misceatur cū aqua magnanimitatis seu spiritu formicarum, simulq; addatur spiritus sanguinis galli. Præter radicem satyrii etiam radix eryngii condita laudatur, ut & Electuarium magnanimitatis Mynsichti. De ambra res nota est, quod in forma essentia, imprimis si cum certa quantitate opii

fiat, aut quacunque ratione usurpata, mirè spiritus reficiat, & insigniter Venerem stimulet. Ex opio & ambra etiam parantur pilulæ ad diuturniorem Venerem reddendam. Tinctura auriculi oleo cinnamomi; cantharides aliis permixtæ, multum valent ad intensius stimulantem Venerem: exemplum vid. in PLATERO *Observ.* pag. 139. pro quo scopo etiam paratur essentia cantharidum ad imitationem BARTHOLINI cum infusione vini. Cautè verò adhibendi sunt cantharides. Sanguis & cerebrum cervi aut tauri Veneri inhiantis, ex eoque parata remedia, insigniter Venerem stimulare solent. Sanguis & cerebella passerum, præcipuè in actu Venereo transfossorum, fuit secretum pro stimulo Venereo Comitibus à PAPPENHEIM, in re Venerea & Martiali excellentissimi. Sanguis & testiculi cervi in actu Venereo transfossi fuit singulare arcanum Venereum cujusdam Principis. Alii commendant potius priapum cervinum excisum ex cervo interfecto, dum in amore est; Nam 3j. pulveris talis priapi cervini cum ovo sorbilli misti, & paucis vino generoso superbibito, egregiè profuit: Vid. SOLENANDER *Conf.* 19. *Seck.* 4. Tauri priapus laudatur apud BARTHOLINUM *Cent.* 6. *Hist.* 60. Notabile est & hoc, quod rasura cornu tauri in ipso coitu abrasa mirè conducat Venerem conciliando & excitando: Et hæc fuit secretum Comitibus Solmensis. Hiscæ addantur, quæ xar iſoxia Venerem armare dicuntur, ut ambra, moschus, Zibethum, cum oleis destillatis aromatatum subacta & imprægnata.

Ex quibus varia in usu sunt simplicia & composita; ver. g. borra in ovo sorbilli assumptus, item borra cum saccharo mixtus, & cum pomo assato assumptus, mirè Venerem stimulare dicitur, quo utitur DVX Saxo Lauenburgicus, &c. Nonnullis tale remedium in usu est: Recipiunt vinum generosum Malvaticum, addunt vitella ovorum recentia, acuata cum aliquot granis ambra, uel aliis aromatibus, uel speciebus aromaticis, & exhibent pro potu, qui una vice stimulat Venerem. Principis cuiusdam secretum fuit sequens:

℥i. Olei pistac. recens. express. cochli. i.

Vitell. ovi No. i.

Ambra, quantum capit cultelli cuspidis.

Sacchari Candi, quantum capiunt 3. cultelli cuspidis.

In cineribus calidis mista egregiè Veneri prodesse dicunt. Alii

℥i. Vitell. ov. No. ii.

Ambr. cuspid. cultell. i.

Sacch. albiss. uel Candi. cuspid. cult. iii.

Mixta propè cineres calidos exhibent haurienda una vice, & Venus stimulat.

Faciunt hux Mixtura, essentia, electuaria, morsuli, rotulæ stimulant Mynsichti, Tabula viriles Paracelsi, Hartmann. *Prax.* cap. 204. Mixtura uirilis Hartmanni cap. 204. §. 4. & similia in eiusmodi casibus usitata. Mixtura Timæi contra impotentiam fuit sequens:

℥i. Aqua magnan. 3viii.

Cinnam. 3iv.

Essent. satyr. 3ii.

Ambr. 3i.

Misc.

Propinetur subinde dosis cochlearis unius.

Vel

℥i. Aqua magnan. 3iii.

Cinnam. cum vino.

Essent. satyr. an. 3iii.

Tincturæ corallior. 3ii.

Essent. ambra. 3i.

M. S.

Mixtura confortans, cochleatim sumenda.

Trochisci viperini etiam hic locum inveniunt: *Conf.* M. A. N. C. *Ann.* 6. & 7. *App.* pag. 130. item HOFFERVS *Herc. Med.* pag. 209. Unde pulvi viperis nutriti, & cum testiculis gallorum pro alimento assumpti, Principibus inserviunt: Imprimis electuaria formæ remedia hic propinari solent; e. g.

℥i. Conf. magnan.

Pacif. Myns.

Satyr. an. 33.

Essent. satyr. 3iii.

Ambr. 33.

M. S.

Electuarium confortativum.

Dosis



Dosis quantitas nuclei juglandis.

- ℥. Chocolat. Ind. ℥i. ad ℥i℥.  
 Elect. diasatyr. ℥℥.  
 Condit. rad. cryng.  
 Satyrion. an. ℥lii. vel ℥vi.  
 Nuc. Indic. ℥i.  
 Zingib. ℥i℥. ad ℥℥.  
 Rasur. priap. cervi Veneri inbiant. ℥℥.  
 Cubebar.  
 Cardamom. an. ℥i.  
 Spec. diamb.  
 Diamosch. dulc. an. ℥iv.  
 Sem. cruce,  
 Pastinac.  
 Urtica,  
 Lingu. arvis seu fraxini ad ℥i.  
 Ambr. opt.  
 Mosch. elect. an. gr. vi. ℥℥. ad ℥i.

C. f. q. brodii helenii vel zingib. vel syrup. de canella f. Ele-  
 ctuarium, tempore usus cum aqua magnanim. aut spiritu  
 formicar. probè irrorandum, & ita usurpandum. (Oportet  
 exinde bene madesieri.)

Huc facit Electuarium expertum Rulandi, quo præmis-  
 sis universalibus impotentes restituit. Compositio est hæc:

- ℥. Spec. dia-satyr. (composit. officinal.) ℥i.  
 Galang. ℥ii.  
 Ambra,  
 Moschi dulc. an. ℥ii.  
 Rasur. priap. cervi, cum hiat in Venerem inter-  
 sect. ℥i. ad ℥i℥.  
 Pinear.  
 Pistac.  
 Amygd. dulc. an. ℥℥. (hic semen argentia ad-  
 miscetur stimulantibus)  
 Carn. scincimarini. ℥ii. (ex vana persuasione;  
 quia nihil valent)  
 Sem. cruce,  
 Nasturt.  
 Urtic. vel sinapi an. ℥i. ad ℥ii.

Terantur, & F. cum melle vel Conditum vel Electuarium.

Conveniens est, si tale conditum sapius irroretur cum,  
 aqua cinnamomi, aut Magnanimitatis, vel spiritu sangui-  
 nis galli, aut formicarum. Loco mellis simpl. convenienter  
 conf. alchermes recipi potest.

- ℥. Elect. diasatyr. ℥i.  
 Rot. stimul. Myrs. ℥i.  
 Ambra,  
 Moschi an. gr. ii.  
 Laud. opiat. gr. i.  
 M. f. l. a. Bolus: S.

Electuarium confortans pro una vice.

Vel usurpentur Electuaria contra defectum seminis, quæ  
 dedi in Collegio Formular. pag.... Vel

- ℥. Conf. rad. cryng.  
 Satyr. an. ℥lii.  
 Cortic. citri condit.  
 Zingib. in Ind. cond. an. ℥℥.  
 Amygd. dulc.  
 Nuc. pinear.  
 Pistac. an. ℥lii. ad ℥i.  
 Carn. dactyl.  
 Pulp. nucis myrist. an. ℥i.  
 Priap. tauri ℥vi.  
 Sem. cruce,  
 Pastinacæ,  
 Sinapi an. ℥ii.  
 Cinnam. vel cubebar.  
 Galang.  
 Piperis albi an. ℥i.  
 Olei destillat. caryoph. ℥℥.

Cum brod. zingib. f. Electuarium: S.  
 Electuarium confortativum.

Quidam addunt pulverem cantharidum, sed non conve-  
 nit: conveniunt saltem cantharides, ubi deficit erectio pe-  
 nis. PLATERUS Observ. lib. i. pag. 256. pulverem hunc  
 tanquam efficacissimum commendat. Pertinet huc Ele-  
 ctuarium ad coitum Comitæ & WALLENSTEIN, quod  
 sequenti modo componitur:

- ℥. Sem. cruce,  
 Saturneia,  
 Urtica an. ℥i.

- Priapi cervi in coitu transoss.  
 Ras. cornu tauri in coitu abr. an. ℥ii.  
 Ambr. grise. ℥i.  
 Moschi ℥i.  
 Conf. alcherm. ℥x.  
 Mell. despum. q. s.  
 M. f. Electuarium.

Dosis magnitud. juglandis manè & vesperi.  
 Solent etiam præscribi Morsuli:

- ℥. Amygd. dulc. ambros. exc. ℥i.  
 Pinear.  
 Pistac. an. ℥℥.  
 Nuc. Ind. condit. ℥vi.  
 Spec. diation piper. ℥ii.  
 Sangu. galli exsic. ℥i.

C. f. q. sacch. in aqua cinnam. sol. f. Morsuli, subindè usur-  
 pandi:

D. S.

Morsuli confortativi.

Hæc fuerunt Interna.

Cum hisce socientur Externa nonnulla, quæ & ipsa glan-  
 di, perineo, scroto & testibus, item circa inguina, ubi de-  
 scendunt vasa præparantia, illinantur: quæ inter est impri-  
 mis balsamus apoplecticus, aut balsamus Veneris Myrsi-  
 chitii, oleum destillatum piperis, nucis moschatæ. Loco  
 horum oleum destillatum macis dictis locis blandè illicum  
 est egregium: possunt addi, si placet, aliquot guttæ olei  
 destillati caryophyllorum & spica: vel ex dictis oleis cum  
 axungia castorei vel Corpore pro Balsamis fiat Balsamus.  
 Glans moscho aut zibetho vel balsamo apoplectico inuncta,  
 Venerem stimulat, voluptatem auget, & facilitatur in-  
 mulieribus conceptio: Item spiritus formicarum externè  
 etiam potest inungi, quia valdè intendit Venerem. Tan-  
 dem fiat Linimentum seu Balsamum Venereum ex oleo nu-  
 cis moschatæ expresso, quod misceatur cum aliquot guttis  
 olei destillati caryophyllorum, sic mollescit, hinc addè  
 aliquot grana zibethi & moschi q. pl. quo scrotum, testes  
 & regio pubis inungantur: vel succo ex ovis formicarum  
 expresso parum zibethi admisceatur. Verùm observandum,  
 quod, ubi talia fraveolentia inungantur testibus pro ex-  
 citanda eorum vi, aut inungantur peni pro augenda volu-  
 ptate in actu Venereo, ne odor nimis feriat pares, nec si-  
 mul inungantur talibus nares; aliàs plus nocent, quàm  
 profunt; nimis enim tunc spiritus afficiuntur, ut minùs  
 possint sufficere actui ipsi seu exercitio Venereo.

Consideravimus hætenus Venerem stimulantia, mate-  
 riam subministrando seminalem, & acredine confortantia  
 fermentum testium: Quod attinet defectum Testium si sci-  
 licet lateant testes in abdomine, uti interdum fit, tunc  
 ad restituendos testes in naturalem locum, ut scilicet in  
 scrotum descendant, optimus est motus corporis, saltatio  
 ac similia exercitia. RULANDUS in Thes. Pract.  
 pag. 282. curavit duos adolescentes, quorum scrotum  
 testibus erat vacuum, & qui super os pubis jam à nativi-  
 tate usque retracti fuerant, beneficio Balnei emollientis:  
 post quem Influxum inunxit locum, ubi erant testiculi cum  
 balsamo sulphuris, hinc successivè detrusit testes in scro-  
 tum infra, & hinc sub virga, laxiore iniecta ligatura eo-  
 rum retractionem impedivit.

Superfunt nunc Testium Tumores, à quibus genitura ge-  
 neratio periculose impeditur.

Quoad tumores hos: sunt

1. A sanguine, unde testium Inflammatio.
2. A flatibus, unde Pneumatocèle.
3. Ab aqua intra testium membranas collecta, ut in  
Hydrocele.
4. Est Tumor scirrhusus.
5. Sarcocèle; &
6. Cirrocele, seu Hernia Varicosa.

## ARTICULUS I.

### D E

### TESTIUM INFLAMMATIONE.

I Nter Testium Tumores primatum ducit Inflammatio  
 seu Phlegmone testium & scroti, quæ fit ob sanguinis  
 circulum per testium canales impeditum, indeque obor-  
 tam sanguinis stagnationem, qui stagnans sanguis, cum  
 continuo affluxus sanguinis augeatur, in tumorem in-  
 flam-



Inflammatorum, seu, ut alii vocant, phlegmonen convertitur.

*Causa* Inflammationis testium, uti raro est interna, ita sæpius externa, ut externa concussio scroti & testium, v.g. sub equitatione compressio violenta, cum scilicet quis impingit in ephippii arcum, (vid. M. A. N. C. ann. 6. & 7. obs. 47. pag. 81. & 82. & ann. 9. & 10. obs. 138. p. 349.) contusio, plagæ & crebra verberum infusio, ligaturæ violentæ, & quæ sunt aliæ, quæ contundunt, aut sanguinis motum in testibus inhibere, & ita Inflammationem excitare possunt. Interdum gonorrhœæ, in specie virulentæ seu malignæ, suppressio etiam causa solet esse periculosa testium inflammationis.

## DIAGNOSIS.

*Inflammati* Testium facillimè cognoscitur ex tumore, tam testium, quam interdum simul scroti à latere testis affecti, coniuncto cum dolore gravi, partim lancinante, partim vehementer pulsante, orto ex sanguinis impedito motu & circulo, cum calore ardente, & denique ex partium vicinarum sæpius scroti, rubore & incalescentia: nam calor, dolor, pulsationis sensus vicinarum partium, & rubor, &c. Inflammationem testium ostendit; sicut febris plus minus lenta pro Inflammationis ratione observatur. Tactus imprimis dolor exasperatur, & sensus doloris sursum usque ad lumbos ferè porrigitur ratione membranarum, vasa spermatica & testes involventium, membranis circa lumbos continuarum.

## PROGNOSIS.

*Quoad Prognosin*: Inflammatio testium non contemenda est, propter gravem dolorem interdum convulsiones inferentem, & metum gangrænæ, in quam, nisi citò discutatur, transit.

Ubi est inveterata, & ad statum perducta, periculosa est sæpius propter abscessum, cui pariter facillè gangræna supervenire solet, faciliùs tamen in scroto inflammato (ut aliquoties vidi in Italia, imprimis ubi causa remota est venenum Venereum) quam in testibus inflammatis: cui tamen per gangrænam absumpto natura provida substantiam carnosam substituit, qua muniuntur testes: Vid. PANAROLLUS *Pent. 3. cap. 25.* BARTHOLINUS *Cent. 6. Hist. 69.* TIMÆUS *Von GuldenKlee in Casibus pag. 296.* SENNERTUS *lib. 3. Prax. ubi de scroti morbis pag. 911.*

## CURA.

*Quoad Curam Testium & scroti Inflammationis*: hæc ipsa vel

1. Discutienda; idque diversimodè pro causarum ratione, quod ut meliùs fiat, dolor imprimis sistendus est; Vel
2. Suppurandus; Hinc
3. Abscessus aperiendus, & ulcus mundificandum.

*Premissis* ergo universalibus internis, & venesectione, ubi opus est, curatur per diaphoretica, Inflammationem, quantum possibile est, citò discutientia, imprimis per ea, quæ blando sudore sanguinis circuitum promonent, & quæ aliàs in omnibus Inflammationibus in usu sunt.

*Externè* pro discutiendo tumore & resolvendo præ cæteris expertissimum est Cataplasma ex farina fabarum, cum aceto vini, vel solo, vel cum oxycrato, id est aqua & aceto, cocta & applicata. Tale cataplasma expertissimum dico ad quamcunque testium inflammationem, (equidem valde commendo) cujus aliquot experientias videbitis in RIVIERII *observ. Cent. 2. obs. 39. Cent. 3. obs. 1. Cent. 4. obs. 74.* uti & in *Observat. Communicatis*. Addi etiam commodè potest semen cumini, item flores chamomillæ & meliloti, & magis discutit. Quod si acrius fuerit cataplasma propter acetum, & scrotum excoriari velit, sub decoctione lithargyrii vel cerussæ parum, commodè addi potest, sic dulcescit acetum; hæc enim Saturnina acorem aceti nimium temperant, & in dulcedinem resolventem mutant: e.g.

℞. Farina fabar. ℥ij. vel iv.

Tulv sem. cumin. vel anisi. ℥ss. vel ℥ij.

Cum vino, vel aceto, vel oxycrato, id est, part. jaceti &

part. iv. aqua simpl. q. s. redigatur in Cataplasma.

Et si propter acetum sit acrius, adde simul

Lithargyr. vel cerussæ ℥j. ad ℥ij.

M. S.

*Puls discutiens.*

Applicetur sæpius tepidè ad discutiendam Inflammationem. Convenit ad quascunque Inflammationes, non tantum in simplici Inflammatione testium, sed etiam, quæ interdum suppressis gonorrhœis, tam benignis quam virulentis, seu ex similibus causis supervenit, &c. Sic tumor scroti ex percussione curatus fuit per cataplasma ex farina fabarum, hordei, semine cumini, floribus chamomillæ, meliloti, rosarum cum oxymelle, vid. RIVIERIUS *obs. Commun. Item*

℞. Aqua Calcis vivæ ℥ij. ad ℥ss.

Spiritus vini camphorat. ℥ss. ad ℥j.

Cerussæ vel sacch. Saturni ℥ss.

M. pro Epithemate: S.

*Epithema discutiens & refrigerans.*

Calidè applicetur, cui & in graviore dolore addi potest opii in aceto sol. ℥j.

Post hæc convenit cataplasma ex herba Paridis contusa, & ita cataplasmatibus inflar testibus applicatum. Aliàs fieri possunt similia cataplasmata & Fotus ex cicuta, solano, agrimonia, vel radice cucumeris asinini, verbenæ, folijs rutæ, floribus chamomillæ, & similibus, in vino vel posca coctis, & partim tanquam fomentum, partim tanquam cataplasma sic applicentur pro inflammationibus discutiendis: Vid. FORESTVS *lib. 27. obs. 1. in schol. & obs. 4.* Cataplasma HARTMANNI ex foliis nymphææ & nasturtii aquatici, si ana. coqu. in aceto rosaceo & vino, & cocta ita & subacta permisceantur cum pauxillo olei rosarum, applicari potest. Quod si testes & scrotum inflammantur ex contagio venereo post coitum cum meretrice, aut inflammatio dictarum partium conjuncta sit cum gonorrhœa, vel benigna vel maligna, cataplasma ex foliis rutæ & ebulli cum posca coctis applicatum est optimum, quod laudatur ab HARTMANNO. Melius adhuc est fomentum expertum Lindani ex decocto radicis chinae & florum sambuci in cerevisia generosa, aut loco huius in vino; quod decocto sæpius fomententur partes, donec disparuerit Inflammatio, quam discutit & resolvit. Fit interdum, ut ex applicatis acrioribus externis oriatur Inflammatio dictarum partium, in qua optimus est fotus ex lacte, cui incocti sunt flores chamomillæ & sambuci. Subindè fit, ut acerbus dolor conjungatur cum inflammatis testibus, hic ut sedetur, modò dictis externis optimè adduntur folia hyoscyami: e.g.

℞. Herb. absint.

Alchmill.

Cent. min.

Flor. acac.

Chamom.

Verbasc.

Fol. hyoscyami an. M. j.

Incisa coqu. in vino, addito parum aquæ (vel in posca:)

Colatura cum linteis calidè sæpius applicetur.

Aut adduntur his ipsis mucilagines seminis psylli cum aqua spermatis ranarum extractæ. Tandem balsamus sulphuris Rulandi ad extra cum oleo nucum paratus, reliquias tumoris absumit.

Quod si modò dictis remediis nequeat discuti Inflammatio, sed ad suppurationem tendat, necesse est, ut adjuvemur naturam in suppuratione, & suppuratæ inflammationis aperi-tione. Pro maturanda ergo suppuratione conveniunt Maturantia & Emollientia in lacte cocta. Præ aliis expertum est Emplastrum filii Zachariæ, cujus descriptio habetur in *Phar. Augst.* malaxatum cum balsamo sulphuris terebinthinato, qui egregiè abscessus maturat: item ubi dolor simul urget in Suppuratione, qui semper est præsens, tunc recipiantur folia hyoscyami sub cineribus cocta & contusa, excipiantur cum axungia porcina, & reducantur ad formam Cataplasmatæ, quod dolorem sedat, & simul Inflammationem maturat. Quod etiam pertinet unguentum dialthææ, populeum, unguentum dia-chylon, & similia, quæ aliàs solent maturare tales Inflammationes. Maturatus tandem debet abscessus aperiendus est manu chirurgi, lancetta, & hinc suppurantibus & exsiccantibus curetur. Vid. quæ supra l. i. de Inflammationib. in genere dicta fuerunt, & BARBETTE *Anat. Pract. Part. 2. cap. 2. item M. A. N. C. Ann. 2. obs. 235. pag. 337. Ann. 6. & 7. obs. 47. pag. 87. & Ann. 9. & 10. obs. 138.*



## ARTICULUS II.

## DE

## PNEUMATOCELE.

**P**neumatocele est Tumor, qui oritur à flatibus, imprimis intra membranas testes involventes collectis; estque saltem inflatio testium, nunc unius solum, nunc utriusque, nunc testis solius, nunc etiam scroti. Pneumatocele hæc nunc est solitaria, nunc, idque ut plurimum, cum hydrocele juncta.

## CAUSÆ.

Flatus hi nunc, idque rariùs, in scrotum aut vicina loca ex abdomine transmittuntur, nunc, idque frequentissimè, in ipsa parte affecta ex nutrimento spermatico membranarum testes obvolventium, quod viciòse alteratum & corruptum, plus minus, ab acido vitioso per fermentationem inducto transmutatur in flatus; quod malum pueris ferè est familiare. Nempe hic omnia possunt applicari, quæ l. i. sect. 5. cap. 3. sunt dicta de origine flatuum in stomacho & intestinis.

## DIAGNOSIS.

Pneumatocele cognoscitur, quando testes successivè fiunt tumidi insigniter, sine pondere tamen & gravitate, cum dolore tenso, simulque scrotum in se est adhuc rugosum & flaccidum. Si verò flatus ipsum scrotum occupant, hoc, si manibus premitur, faciliè de loco in locum moveatur.

## PROGNOSIS.

Pneumatocele est sine periculo, nisi propter dolorem & tumorem sit molesta.

## CURA.

Pneumatocele, seu Hernia flatulenta est omnium levissima (sive flatus soli, aut in hydrocele simul adfuerint) & curata facillima, discutientibus & carminantibus saltem tractanda. Unde interna, quæ l. i. Sect. 5. Cap. 2. de flatibus & Sect. 11. de Colica flatulenta dicta sunt, adhibeantur; In specie remedia ex seminibus 4. calidis majoribus, ex corticibus aurantiorum, floribus chamomillæ, bacis lauri, &c.

Externè ex similibus parentur cataplasmata cum oleo rutæ, chamæmelino, costino, &c. addito Spiritu vini, ut eò meliùs penetrent: Agrimonia in specie valet ad inflammationem testium; vid. HILDANUS Cent. 3. Obs. 87. His accedunt, Fotus discutientes, inter quos usitatus est iste, ex duplo sc. fabarum farina, & parte j. seminis cumini, in quorum defectu commodè usurpari possunt bacæ lauri, imprimis subacti cum fimo vaccino recenti, quod cataplasma mirè discutit: e.g.

℞ Pulv. flor. chamom.

Melil.

Far. fabar. an. ʒvj.

Sterc. caprill.

Baccar. lauri an. ʒss.

Cum vino & oleo anethino f. Cataplasma:

D. S.

Cataplasma resolvers.

Potentius est sequens:

℞ Fimi vaccini ʒij.

Sulphuris vivi,

Sem. cumini an. ʒj.

c. f. q. mellis & olei anethi f. Cataplasma,

laudatum quoque à FORESTO lib. 27. Obser. 25. Optimè convenit Forus, quo SOLENANDER Conf. 15. tumorem scroti & testium ab humore influente & flatu enatum curavit, cum pannis ibidem intinctis crebriùs applicandis:

℞ Sem. coriandri ʒss.

Cumini,

Anis. an. ʒij.

Alum. ʒss.

Vini,

Aque commun. an. ʒj.

Coqu. invicem leviter, & dicto modo applicetur loco hernioso ex flatibus.

Et hæc conferunt quoque in hydrocele, aut ubi cum hydrocele conjuncti sunt flatus, ubi tamen dictis Balsamus sulphuris vel terebinthinatus vel iuviperis commodè additur: nempe calidè hernia flatulenta illinatur, imponendo desuper emplastrum diasulphuris Rulandi. Si acrius fuerit, & excoriationem scroti minatur, potest temperari cum tantillo olei nucis moschatae expresso.

## ARTICULUS III.

## DE

## HYDROCELE.

**H**ydrocele, seu Tumor testium aquosus, qui Tumori scroti & testium hydropico contradistinguitur, ita dicitur ab aqua, intra testium membranas contenta. Aliàs Tumores testium dicuntur Herniæ, propterea saltem, quia cum scroti tumore conjuncti sunt, sed impropriissimè; quia tamen aliquam similitudinem habent cum hernia vera, quæ fit ex descensu intestinorum in scrotum, sic appellari possunt.

## CAUSÆ.

Hernia hæc aquosa seu Hydrocele oritur à lymphæ recursu ex testibus impedito, dum nempe vasa lymphatica in quodam loco obstructa, & lympham effundunt intra membranas testes involventes; nam & testes habent sua vasa lymphatica, quæ lympham ex testibus ad receptaculum commune, ut notum est, revehant. Quod si ergo fiat, ut obstruatur lymphæ recurrenti via, oboritur ex ruptis vasculis lymphaticis collectio, & stagnatio tandem illius lymphæ in teste, unde rupta tunica, vas lymphaticis propria, perquam tenera, eadem intra tunicas testium extimas, elythroidem nempe satis validam peritonæo continuatam, coarctata lymphæ Tumorem talem aquosum seu Hydrocelen facit, qui vulgò, sed pessimo more, vocatur Hernia; nihil enim minus est, quàm hernia. Quod si hæc rumpatur tunica, ipsum scrotum in medietate testis affecti etiam impleri solet: sed ferè membrana istius testium, in qua colligitur, aqua, quod diutius stagnat, eò solet fieri spissior, crassior & densior, unde malum redditur contumacius, adeo, ut nec faciliè rumpatur, sed potius tumorem plus minus duriusculum repræsentat. Reverà Hydrocele ex vitio testium proprio nihil est aliud, quàm hydrocorum testium, particularis, (sive ruptum, sive exesum, sive alio modo vitiatum sit vas lymphaticum ad testes protensum,) distinctus ab isto tumore scripti hydropico, quando ex hydrope ascite in scrotum aqua distillat; nam hydropici simul solent ordinariò incurrere tumorem scroti. Nunc autem tumor scroti accrescit cum ascite & intenditur; nunc in ascite particulari abdominis, evacuata per paracentesin, hydropicorum aqua, supervenit tumor aquosus scroti; vid. BARBETTE in Anat. Pract. Prius fit, quando aquæ in abdomine hydropicorum collectæ per processus peritonæi successivè in scrotum desillant: Posterius, quando scrotum, utut flaccidum, post evacuationem aquæ repletur; quia aqua ultra peritonæum & musculos abdominis est, & tunc, ubi relaxantur partes, descendit: Verùm cum hoc hydrope hic loci nobis nil est negotii. Interdum huic Hydroceli propria dictæ seti tumori testium supervenit tumor scroti aquosus, dum rumpitur tunica quædam testis à lymphæ distenta, & tandem ipsum scrotum ab ista medietate, cuius testis antea fuit affectus, impletur: quem etiam pessimo more vocant Hydrocelen.

## DIAGNOSIS.

Hydrocele non faciliè cognoscitur, in specie quando malum est confirmatum, & membranz, in quibus collecta aqua, admodum spissæ ac crassiores fiunt; tunc enim subindè tumorem duriusculum, rententem tactui, repræsentant, adeoque Hydrocele similis est herniæ carnosæ. Interim testis, si hernia aquosa laborat, utque sit durus, potest ei induci fovea, quod in carnosæ herniæ non fit.



Pater aliàs Hydrocele ex sensu fluctuationis cuiusdam in scroto seu locis vicinis, dum scilicet testes premuntur intra membranas internas, tumor nunc molliusculus, aut facile tactui cedens percipitur; Item scrotum, vel ex toto, vel ex dimidio quasi lucidum ac minus rugosum apparet, planè erugatum, præcipue si ex opposito candela ponatur, ægerque de pondere & gravitate conqueratur, nec tumor per compressionem aut decubitus resupinatus faciliè in abdomen recedat, ut in Enterocoele fit, sed semper ferè ejusdem magnitudinis, rotundus, paulò longior, instar ovi, apparet, neque habet suas vicissitudines, & potius incrementum, quam decrementum sumit, testiculus è contrà tactui ferè occultatur.

Quod si testes soli intumescant, scrotum adhuc rugosum aliquo modo apparet; quod non evenit, ubi præter testes intra scrotum iam aqua collecta fuerit, quod ipsum tunc expansum, & sine rugis conspicitur.

Si verò collectus est humor intra tunicas intimas, non potest percipi; nam hic ipse testem relaxare solet.

Prout autem humor lymphaticus aut intra scrotum, aut intra tunicas testium, nunc in superiori, nunc in inferiori loco includitur, etiam diversam tactui formam cum teste plus minus manifestam aut occultatam repræsentat.

### PROGNOSIS.

Hydrocele periculo curet, & tantum dolore, & tumore molesta est. Si verò Hydrocele seu Hernia aquosa sit inveterata, ita, ut membrana istam investientes jam tenaciores & firmiores redditæ fuerint, vix sine Chirurgia curatur, recens verò adhuc medicamentis discuti potest.

Iste scroti tumor aqueus, qui hydropem ascitam comitatur, vix, nisi hydropem curato, perfectè curari potest.

### CURA.

In Tumore testium aquosi seu Hydrocelis Cura imprimis in principio Discutientia, & Resolventia valida applicata conducunt, præmissis & annexis internæ essentia & extracto elaterii, radice gualappæ, gummi de Peru, & similibus serum superfluum evacuantibus: quin & præmissis Diureticis, specialiter succinatis & arcano duplicato, quod feliciter adhibuit LUDOVICI In M. A. N. C. ann. 9. & 10. obs. 158.

Externè conveniunt, uti dixi, Discutientia & Resolventia: quæ inter convenit emplastrum hydropicum Augustanorum, quod applicari potest, item emplastrum ad hernias Schröderi cum exuviis serpentum, loco anguillarum, paratum: Vel tillinatur Balsamum sulphuris Rulandi, vel solum, vel cum unguento althææ mistum: e. g.

℞. Ungu. dialth. ℥ij.

Bals. sulphuris terebinth. ℥vj.

M. S.

Unguentum resolvens.

Hoc inungatur scrotum calidè.

Si est debilius, convenit hoc cataplasma crassum seu Emplastrum:

℞. Emplastr. de bacc. lauri,

Stercor. caprill. (quod ad multas inflammationes oedematosas conducit) an. ℥ij.

Sem. cumini,

Flor. sulphuris, aut sulphuris pulverisat. ana ℥ij.

Misc. & malax. cum oleo ruta & chamomilla. ana q. s. Emplastrum.

Pari tumenti, tam in hernia aquosa, quam in tumore scroti hydropico, admoveatur.

Loco huius emplastri Emplastrum carminativum Myrsichii scroto applicari potest. Primatum obtinent cochleæ cum suis testibus contusæ, & cataplasmatismodo applicentur, vel solæ, vel cum stercorebus animalium, in specie caprino & vaccino, & semine carvi, quorum Formulas vid. supra h. ubi de Hydrope. Vel, quod mirè commendat D. MICHAELIS in Tumore hydropico conveniens:

℞. Flor. chamom.

Herb. Parid. an. M. ij.

Farin. fabar. ℥ss. vel ℥j.

Sterc. caprill. ℥ij.

Pulv. testar. cochlear. ℥ij.

Coque in

Aqua chamom. part. iv.

Aceti vini vel destill. part. j. vel ana part. equ. ad consistentiam cataplasmatismodo scroto applicandi:

D. S.

Cataplasma discutiens.

Vel

℞. Flor. chamom. Rom. M. ℥ij.

Farin. fabar. ℥vj.

Stercor. caprill. ℥ij.

Pulv. testar. cochlear. ℥ss.

Concisa & contusa coqu. in vino.

D. S. ut ante.

Decocto prius somentetur scrotum, & demum desuper applicetur Cataplasma ad resolvendam Hydrocelen:

℞. Sterc. caprilli ℥j.

Flor. chamom.

Sambuci ana M. ℥j.

Sem. cumini ℥j.

Coqu. in f. q. urinae pueri:

Colatura usurpetur pro Foru; Remanentia verò pro Cataplasma.

Vel denique

℞. Cochl. cum test. cont. ℥iv.

Racc. lauri,

Sulphuris ana ℥ij.

Sterc. capr. ℥ij.

cum f. q. Lixivii f. Cataplasma.

Verum in Hydrocele confirmata nihil præstabunt.

Quod si forsan ex ascite imminet Hydrocele, aut tumor scroti hydropicus, tunc petroselinum viride contusum, & scroto impositum, domesticum quidem, sed laudandum est remedium.

Item

℞. Nasturt. aquat.

Nymph. ana part. equal.

Ex quibus cum aceto rosaceo contusis, addito oleo rosaceo, paratur Cataplasma, quo tumorem testium magnum dolorificum in hydrope, aliis irritis, curavit RULANDUS in suis Curationibus.

Cataplasma ex farina fabarum cum vino & oxymelite, supra laudatum, etiam in Hydrocele confert. Conf. RIVERIUS Cent. 2. obs. 4.

Sed nihil nobis negotii est cum tumore scroti hydropico, potius ad Hydrocelen pergimus; quæ si confirmata, medicamentis non potest resolvi aut discuti, quin pertinacius resistat, aut si simul substantia corrosa adesse observetur, quæ faciliè in cancerum degenerat, ad Chirurgiam accedendum est, quæ duplici modo instituitur; vel punctura, vel castratione. Quoad puncturam: perforatur scrotum, quo perforato simul pertunditur membrana testium externa, in qua solet esse conclusus humor seu lymphæ. Hæc apertio in Hydrocele simplici nullum habet conjunctum periculum, & tutissimè instituitur, utut apertio scroti & testium in tumore eius aquoso hydropico sit periculosissima: Nam in tumore testium scrotique hydropico aperto ut plurimum supervenire solet gangræna, sive per cauterium potentiale, quod minus tutum, sive cum ferro, quod tutius est, apertio instituitur: Conferatur BARTHOLINUS Centur. 3. Histor. 69. Sed, uti dixi, nullum periculum est in Hydrocele propriè dicta, & commode apertio institui potest: Conf. HILDANUS Centur. 4. Observat. 68. Verum, utut aperiatur & extrahatur seu evacuetur liquor, nihilominus tamen non semper radicaliter malum curatur; quin periculum est, ne crebrius recurrat; unde sæpe necesse est ad tollendam Hydrocelen amputatio integri testis Hydrocele affecti ut instituitur, præprimis si durior ac spissior fuerit membrana, aut testis gangræna affectus sit, ne partes vicinæ corruptæ ex superventu gangrænae vitæ periculum inferant. Operatio est tuta & extra periculum, modò cum dextérité obeatur. Superiori anno adfui tali operationi: scilicet in isto latere, ubi nempe est tumor testium aquosus, instituitur apertio scroti inferis, & super tumorem vasa præparantia filo interjecto fortiter constringuntur & ligantur, quod celeri manu fiat, quia dolorosum est; postmodum infra ligaturam abscinditur testis una cum tumore. Vlnus scroti lentè curatur, ut filum, quod extra scrotum propendet, spontè separetur, & tunc citra periculum vlnus scroti coit. De cura Hydroceles per sectionem vid. AMATUS LUSITANUS Cent. 4. Centur. 2. Cur. 84. & Cent. 5. Cur. 69. ubi singulis sex mensibus hu-



mor sectione evacuandus venit. Sunt etiam, qui ad Hydrocelem laudant punctum aureum, quo ipso & solent curare herniam intestinalem; sed minus tutum, minusque certum est hoc auxilii genus.

# ARTICULUS IV.

## DE

## TESTIUM SCIRRHUS.

**S**equitur Tumor testium durus, qui in specie ex inflammatione eorum male curata oboritur, sine calore, sine febris; qui tumores duri & indolentes Scirrhi vocari solent.

## CAUSAE.

Oriuntur imprimis & saepissime ex vitiosa inflammationis curatione, aut insufficiente discussione, quatenus acidum in omni inflammatione praesens & concentratum per modum coagulationis materiam inspissat & indurat; unde tales tumores duri indolentes, uno nomine scirrhi, generari solent, qui interdum nonnihil maligni, quasi cancerosi, praesertim, si punctiones subinde acutae in his observentur. Interdum etiam durities seu scirrhus in teste à calculis observatus fuit, post mortem inventis, teste PLATERO *Obs. pag. 664.*

## DIAGNOSIS.

Scirrhus testium facillime cognoscimus tactu: Imprimis tumor durus repitens tactui & indolens, sine calore vel inflammatione, eamque minus concinne tractatam sequens, vel alio modo superveniens, scirrhum innuit.

Quod si subinde punctio percipiatur sensus, aut cuiusdam laciniationis, latentis tumoris cancerosi seu scirrhi nothioritur suspicio.

## PROGNOSIS.

Tumores testium scirrhusi per se parum periculi habent conjunctum, nisi interdum dolor punctorius accesserit; tunc enim ad cancerum inclinant, & ita periculum latentis canceri incutiunt, qui periculosissimum malum innuit.

## CURA.

Quod si testes inflammati ex perversa cura in tumores & scirrhum degenerent, fiatque tumor durus ac scirrhusus, hic emolliatur, ac discutiat materia collecta: id quod tamen difficulter fit.

Pro quo scopo conveniunt praeter ceteris gummata in aceto soluta, & sunt primario ammoniacum, hinc galbanum, bdellium & similia; item emplastra officinalia de cicuta, de ammoniaco, cujus descriptio est in *Pharmacop. Augustana*; (Nam hoc ipso FORESTUS curavit testem insigniter scirrhusum post inflammationem, idque omnibus remediis aliis irritis, in *lib. 27. Obs. 5.*) Balsamum sulphuris & Emplastrum diasulphuris Rolandi. Convenienter etiam cum emplastro ammoniaco miscetur emplastrum de cicuta, si ambo malaxentur cum oleo chamomillae, ac ita applicentur; resolvunt namque testium scirrhusos: e.g.

*℞. Gum. amm. cum aceto solut. ℥vj.*

*Empl. de cicut. an. q. s.*

*Dissol. malax. cum s. q. olei destillati tartari, vel ligni Guaiaci, & inducantur super linteam.*

*D. S.*

*Emplastrum emolliens.*

Imponitur loco affecto, alternis diebus novum imponendo, valde conducit.

Vel

*℞. Empl. diachyl. simpl. ℥ij. Gum. ap. ℥i.*

*Gummi ammoniaci ℥ss.*

*M. pro Emplastro.*

*D. S. ut antè.*

Quibus etiam semen & folia hyoscyami addere licet, nam tali cerato apostema frigidum & durum scroti ac testium cum

ratum fuit à FORESTO *l. 1. Obs. 7.* Efficacissimum quoque est hoc:

*℞. Rad. alib.*

*Fr. balicacabi an. M. i.*

*Rad. mandrag. rec. ℥vi.*

*Coqu. in s. q. sapae, & contundantur, & per cribrum traiciantur: adde*

*Opopan.*

*Bdellii.*

*Gumm. amm. in vino sol. an. ℥vi.*

*Stryac. ℥iii.*

*Cum s. q. aquae chamom. f. Cataplasma, vel cum cera f. Emplastrum.*

*D. S. ut supra.*

Allud Emplastrum expertum vid. in TIMÆO von GuldenKlee in *Cas. lib. 6. Conf. 12. pag. 271.* quod praemisso fori emolliente, & suffitu vaporis aceti ex lapide lateritio seu silice candente excitari, applicavit, & quo ipso discutit scirrhum.

Compositio est hæc:

*℞. Mucilag. rad. alib.*

*Sem. fenugr.*

*Ficum pingue. cost. an. ℥iii.*

*Gumm. ammoniaci,*

*Bdellii,*

*Galbanian. ℥i.*

*Medull. crurum vituli,*

*Adip. anserin.*

*Gallinae,*

*Sevi hircini,*

*Terebinthin. an. ℥vi.*

*Olei lil. alb.*

*Cera flav. an. q. s.*

*f. Emplastrum.*

Observandum tamen in scirrhuso testium, si simul sit dolorosus, cautè esse procedendum, ne in cancerum degenerare faciamus eundem; unde oleosa, mucilaginosa, & quæ alijs propriè emollientia dicuntur, sunt omittenda, & in solis Gummatis & similibus persistendum.

Foras Vinacea hic non sunt inutilia: Sic enim BORELLUS *Cent. 2. Obs. 42.* refert dolorem & tumorem cum inflammatione saepius recurrentes, demersione femorum in vinacea calida curatos.

Quod si à suppressa gonorrhoea, praesertim Gallica, superfit Tumor durus, applicari potest emplastrum de ranis cum Mercurio: vid. *M. A. N. C. Ann. 4. & 5. Append. pag. 62.*

Quod si in pus abeat substantia tumoris, maturè aperiatio fiat, ne integre testis substantia corrumpatur, aut gangraena superveniat, quin & subinde necessum est, testem tum excindere.

# ARTICULUS V.

## DE

## SARCOCELE.

**P**raeter dictum tumorem scirrhusum & alius tumor durus superuenit testibus, qui affectus vocatur Sarcocele seu Hernia carnea: nempe caro quadam superflua his interdum adnascitur, nunc tantum alteri, nunc utrique, quando occasione quadam externâ læduntur; partim fibrae nervae, partim carnae, ubi circa distas fibras laesas coagulatur & exoritur excrecentia quadam carnea, medii generis intra fibras carneas & nerveas, eaque duplex: nunc dolens, maligna, cancerosa, cum punctioibus varis molesta; nunc indolens. Hæc ipsa sarcocele seu hernia notha communis est ambobus testibus; Siquidem tam in dextro, quam in sinistro & hydrocele & sarcocele observata fuit; quod observandum contra HILDANUM in *Observ. Chirurgicis Cent. 4. Observat. 64.* qui refert, dextrum testiculum imprimis sarcocele, sinistrum vero testiculum hydrocele laborare. Hoc ipsum tamen HILDANI effatum non est verum nec universale, cum, teste experientia, promiscue fiant: Nam Riolanus *Anthropologiae lib. 2. cap. 31.* in dextro testiculo ter hydrocelem vidit; sicuti etiam aliquando in sinistro teste herniam carnosam, ut vocant: quin & talis caro non solum testibus, sed etiam membranae Dartos seu scroti internæ non raro adhæret, citra testium contactum. Tumor observatur

Ecc

in scroto



in seroto durus, successivè auctus, ferè indolens, interdum, si malignus, punctorius dolor adest.

## C A U S Æ.

Oriuntur hi tumores carnosì seu Sarcocelen plurimum à latione testium externa, contusione, istu, lapsu, laceratione, &c. Nam uri hæ, & similes causæ aliæ, inflammationem interdum inducunt; ita etiam interdum, laceratis fibris atque membranis, & vasculis testium ruptis & laceratis, alimentum proximum & sanguis in motu non nihil sistuntur, & in poris hinc inde uberiorè conervantur & alterantur, & tandem successivè in substantiam talem carnosam, plùs minus notham, assimilantur ac transmutantur, unde successivè talis caro sylvestris concretescens, sive in testibus, sive sub membrana seroti, quæ & Dartos dicitur, sarcocelen constituit; simili modo, ac si, ut rectè loquitur SENNERTUS, in arboribus cortex externus lardatur, ex affluente alimento nodi fieri solent. Probè tamen hic quoque observandum est, ne, ut supra simonitum, lymphæ intra crassèfactam membranam densius constricta ramicis carnosì seu sarcocelen facile imponat. Neque confundenda est hæc cum tumore prostatico, seu epididymidum, quæ seminali materiâ tumidæ speciem sarcocelen incautis inferre solent: vid. BARBETTE in Chirurg. Siquidem subindè præ seminalis succi copia epididymides ita tument, ut non rarò testium molem repræsentent, aut superant; idque propter sui extensionem non absque duritie; aut quando testiculi sunt scirrholi, unde in epididymides copiosius sanguis infloret; aut etiam quando copia talis adest succi seminalis, ut confosius collectus in epididymidibus, & ibi suppressus, Epididymides tumere faciat, adeò ut ex tali causa observatum fuerit, epididymides mole interdum ipsos testes æquasse. Sed dicti casus non sunt confundendi cum sarcocelen vera, ne fallamur in diagnosi. In veterata etiam hydrocele propter densitatem membranarum sarcocelen interdum mentitur.

## D I A G N O S I S.

Sarcocela ex Tumore duro indolente, & ferè scirrholo, vel teste incumbente aut adnato, vel ipso seroto adherente, patet, immutabilis est, constans potius, subindè accrescens, (modò sit spissa, modò tenuis), quasi ponderis testis adherentis sensum percipiunt ægri: Sin verò simul dolet, periculum est, ne sit caro cancerosa, quæ mox ad cancerum declinat.

Successivè ad molem talem succrescit caro hæc, & ex insensibili principio sensim augetur, secus ac in aliis testium tumoribus.

Interim tamen non confundenda est sarcocela cum tumore prostatico, quorum signa distinctiva iam explicui.

## P R O G N O S I S.

Tumores testium carnosì non admodum periculosi sunt, nisi quod propter accedentem dolorem punctorium cancer metuendus sit. Sarcocela ergò, si est dolens & maligna cancerosa, non est tangenda.

## C U R A.

Sarcocela incipiens curatur interne per medicamenta, imò si tantillum inveterata, non nisi vel ipsius carnis, seroto vel testis adnata, abscissione, vel testis ipsius excisione: Vid. BARBETTE in Chirurg. v. 1. cap. 25. HIERONYMUS ab AQUAPENDENTE, & SCULTETUS in Armam. Chirurg. In cura ergò, præmissis universalibus, attenuantibus & exsiccantibus, aut Tumoris incrementum præcavendum, aut ipse Tumor successivè absumendus: quæ si non succedant, chirurgiâ testis excidendus. Pro hoc scopo inter remedia interna conveniunt Terrea calcinata & alcalisata, quæ in strumarum cura solent esse in usu, v. g. pulvis contra strumas usitatus Arnoldi Villanovani: Loco huius adhibetur pulvis Lotichii in obs. pag. 314. ex spongiis combustis, cynosbati, lapide spongia, ex radice consolidæ maioris, herniaria, persiliata, serpa sigillata, &c. confectus. Item pulvis radices ononidis meretur laudem, qui ad 3i. per plures menses

usurpatus, non tantummodò à MATTHIOLO, sed etiam ab HORNIO in Cista Medica, SCULTETO in Armam. Chirurg. observ. 74. BARTHOLINO, M. Med. Hassing. Vol. 1. pag. 189. & in Ep. Cent. 4. Epist. 13. & 14. pag. 52. & 57. admodum commendatur; item ejus Decoctum & essentia, cujus præparationem dedi in Colleg. Pharm. in Schræderum sect. 1. p. 68. ut & spiritus salis dulcis, tam interne assumptus, quàm tumori externe illitus, ab AGRICOLA commendatur Comm. in Poppium. Verùm Interna parùm præstant, cum & Externa non semper satisfaciunt scopo. Antequam tamen ad excisionem testis sarcocela affecti perveniamus, applicanda sunt externa potenter emollientia & resolventia: quæ inter imprimis sunt Fotus ex cineribus sarmentorum vitis cum nitro & aceto mistus & applicatus, emplastrum diaphysphuris Rulandi, item Cataplasma ex sulphure & testis cochlearum cum aceto; Item luta thermarum in ipsis Thermis applicata seroto, usurpantur. Primatum ducunt Gummata penetrantia & resolventia, & huiusmodi Tumores nunc emollientia, nunc suppurationem eorum promoventia; unde gummam ammoniacum, & ex eodem paratum Cerotum & Emplastrum, hic suam meretur commendationem: Sic in SCULTETI Armam. Chirurg. obs. 47. habetur emplastrum ex ammoniaco expertum contra Sarcocelen: vel usurpetur sequens Emplastrum, quod præscribit LOTICHIVS in observat. pag. 314. & ipsi tanquam secretum communicatum fuit à quodam Lithotomo, tam contra aquosam, quàm carnosam herniam, cui multum à quibusdam tribuitur: Compositio non est inelegans:

℞. Gummi ammoniaci 3℔.

Bdellii,

Farin. sem. sinapi,

Vitæ (proprie seminibus compo-  
titæ farinæ nomen) rotand. an. 3℔.

Lap. spong. 3i.

Pulv. rad. aristol.

Sulphuris 3℔.

Terebint. 3i.

Spiritus vini 3℔.

Oleolivar. 3iv.

Cera 3vi.

M. pro Emplastro herniæ carnosæ subindè applicando.

Emplastrum aliud ad Hernias carnosas commendatum vid. in Scriptis PARACELSI, Tom. 5. Conf. 3.

℞. Nempè Gummi amm.

Serapin. seu sagapen.

Opopan.

Galbani an. 3i.

Hæc dissol. in acetum rosaceo, denuoq; nonnihil inspissata misce. cum s. q. olei Philosoph. redigantur in formam Emplastri spissi, & ita supra locum herniæ integrè applicetur.

Gesserit per aliquot septimanas hoc emplastrum, donec vel evanescat vel maturetur tumor carnosus; sic enim, dicit PARACELSVS, maturatur tumor & suppuratur, aut si fuerit recens, penitus dissolvitur & discutitur.

Hæc autem saltem sunt in Sarcocela benigna; in maligna non. Si suppuratur, loco convenienti aperiatur, aut saltim aperturâ spontaneâ, apostematâ aperto imponendum est Emplastrum ex gummis & colophonia, donec materia resoluta evacuetur, quod Emplastro typico debito modo ulterius tractandum & consolidandum venit. Si non metuat æger de impotentia Venerea, optimum est applicare Emplastrum de ranis Vigenis cum Mercurio, quod est egregiū, sed propter Mercurium periculosum est, ne destruat vis testium. Thermarum usus sarcocelen si non planè discutit, eiusdem tamen incrementum avertere solet. Ubi talia & similia non juvant, sectio instituenda, & cum tumore testiculus amputandus: Apertio faciendâ, ubi tumor fuerit minor, in seroto à latere: Ubi verò altius in vasa præparantia adscenderit tumor, apertio faciendâ in inguine supra os pubis, ubi vasa spermatica descendunt ad serotum, & ibi vel substantia carnosâ solitaria sectione tollenda, vel unâ cum teste exerescentia excidenda, & ligatio, uti artis est, faciendâ.



## ARTICULUS IV.

## DE

## HERNIA VARICOSA.

**P**ars affecta Tumor testium varicosi, dicti Hernia Varicosa seu *varicosa*, sunt vasa spermatica, praesertim venosa, ad testes protensa, quae subinde dilantur, & tumorem circa testem in scroto efficiunt: Nam vasa haec super testes in varios anfractus, in varias inter se anastomoses, invicem intexuntur & contorquentur, ut inde vasa pampiniformia dicantur. Quod si fiat, ut sanguis refluxus crassior ob aliquod impedimentum in ejusdem motu circulari, in his anfractibus seu amplexibus circa vel vulas haerens, ibidem stagnet, sit, ut venae circa valvulas laxatae in uno loco plus, in altero minus & inaequaliter distent: hinc inde circa testem tumeant, & tandem talem Tumorem interruptum seu inaequalem & varicosum, nunc eminentem, nunc depressum constituent, ubi contactus testium inaequalis est, tuncque hinc inde *crispatura* quasi se offerunt. Tumor raro est adeo ingens, & cum testis tumidus tangitur, quasi funiculi tensi hinc inde oblique distributi, & nodi inaequaliter uvae in modum conglomerati observantur cum testiculi plus minus relaxatione. Indolens ferè est malum, interdum tamen, dum intestina flatibus sunt distenta, aut pedes refrigerantur, aut vasa ista quavis ex causa dilantur, dolor aliqualis percipitur. Fit ut plurimum à causa externa, saltu nimio, casu, interdum etiam refrigeratione & humectatione scroti nimia.

## DIAGNOSIS.

*Xiphiata*, seu Hernia varicosa tactu patet; dum vasa testium tumida hinc inde percipiuntur instar funiculorum hinc inde complicatorum, teste ipso laxius ut plurimum propendente, nisi cum flatibus intestina distendant, aut pedes refrigerantur, aut graviore conatu feces alvine excernuntur. Dolor subinde hunc tumorem comitari solet. Loquendum cum vulgo.

## PROGNOSIS.

Cirsocele difficile malum est, & quod etiam interdum Canerosi aliquid occultum habet.

## CURA.

Quoad Curam: Tumor varicosus medicamentis internis curatu difficilis est: attenuantibus tamen & dissolventibus curatio tentanda; in quem finem, praestantissimum auxilium, laudatur imprimis unguentum basilicum, pinguedinibus emollientibus & medullis animalium si imprimis conjungatur & applicetur, donec emolliatur tumor varicosus, autore FERRARA observ. Chirurg. lib. 1. pag. 68. Egregium est scriptum Chirurgicum. Item applicari potest emplastrum de mucilaginis, mixtum cum ana gummi animoniaci in vino soluti, & emplastri de ammoniaco: vel solum oleum Philosophorum probè rectificatum illitum loco hernioso discutit eisdem tumores. Thermarum etiam externus usus observatus fuit admodum proficiuus, & commendatus esse solet; si non planè discutit, eorundem tamen incrementum inhibet. Hernia autem varicosa inveterata non curari potest citra Chirurgiam.

Haecenus de Affectibus, quibus genitura elaboratio impeditur: dicendum iam est ulterius de huius generatione aucta, item vitata. Sed cum eandem, qua depravata, ad gonorrhoeam referre possumus, ubi occasione causarum de his dicetur, etiam ibidem commodius tractabitur. Pergo.

## CAPUT II.

## DE

## LÆSA GENITURÆ VIRILIS RETENTIONE &amp; EXCRETIONE.

**N**am praesuppono (uti antea monui) quod genitura in testibus elaborata, & per vasa deferentia in vesiculas seminales delata, debeat retineri eo usque, donec sub coitus ardore spiritibus turgida & spumosa, cum impetu eiacularetur. Læditur autem naturalis hæc genitura retentio & excretio 4. modis:

1. Quando genitura citra coitum effluit.
2. Quando in coitu nimis citò eiacularur.
3. Quando in coitu nimis tardè emittitur; &
4. Quando nulla genitura neque in neque extra coitum excerni potest.

## ARTICULUS I.

## DE

## GENITURÆ CITRA COITUM EXCRETIONE.

**Q**uoad 1. quando citra coitum genitura effluit, vel hoc interdum tantum nocturno tempore moderatè cum insomniis, & iuncta voluptate Venerea effunditur, diciturque tunc POLLUTIO NOCTURNA, quæ res est omninò naturalis, & quæ, quæ talis, Medico Practico non subiicitur.

Vel semen effluit noctu sæpiùs, idque imprimis citra sensum Venereum, imò etiam subinde interdum, frequentius, aut rariùs, citra voluptatem, interdum cum dolore, ac sine seu citra membri tensionem &c., tunc talis fluxus genituræ GONORRHOEA appellatur, à pio suo, & gen.

Hanc Gonorrhoeam melioris methodi ergò distinguam in veram & notham. Gonorrhoea vera est, quando vera materia seminalis, aut ipsi saltem proximè similis, in testibus tamen elaborata, crebrò nimis & copiosius effluit, tam noctu, citra contigionem, quàm interdum, flaccido etiam pene. Notha Gonorrhoea verò est, quando alia materia vitiosa, vel liquamen serosum plus minus acre, aut decolor aut foetidum, loco seminis ex pene continuo effunditur, eaque ex proflatis.

## MEMBRUM I.

## DE

## GONORRHOEA VERA.

**I**n Gonorrhoea vera agri sunt graciles circa lumbos, & impotentes in motu: Conqueruntur de lassitudine & debilitate crurum capitisque: Supervenit huic ipsi atrophia corporis, & imprimis debiles & pallidi sunt, oculorumque orbitæ excavatæ apparent: Visus & oculorum fulgor perit, quin potius oculi quasi opaci aut cornei, & minus lucidi solent perspicui: Tandem fiunt tremuli, appetitus perit, functiones animales sensum deficiunt, cum semper cum genitura aliquid spiritus genitalis simul effluisse soleat, & ad tabem dorsalem pergunt, eamque duplicem: de qua vid. WILLISIUS Pharn. Ration.

## PARS AFFECTA.

Pars primariè affecta sunt vesiculae seminales, in quas ex vasis deferentibus deferretur genitura, & in quibus solet retineri, donec vel spontaneo impetu, vel in coitu debeat effundi. Harum vesicularum structuram videbitis in GRAFFIO.

## CAUSÆ.

Gonorrhoea vera triplici fit ex causa: Fit nempe 1. à nimia copia aut abundantia genituræ, una cum laudabili eiusdem consistentia, aut nimia eius excitata turgentia; unde non tantum uberior & continuus Veneris Ecce 2. Stimu.





stimulus adest, sed etiam, ubi gentura papilam turgescere incipit, levi occasione, impetu facto, ex Vesiculis seminalibus mox erumpit, & cum voluptate elaculatur.

Causæ Remotæ sunt Vicius largior & lautior, potus vini dulcis generosi, vitæ genus laboribus, tam corporis, quam animi, vacuum, meditationes & conversationes circa Obiecta Venerea, Veneris consuetæ abstinencia, &c.: quod etiam facit situs corporis, quando dormientes nocturno tempore imprimis dorso dictius supini incumbunt; tunc enim sanguis in regionibus abdominis posterioribus & exterioribus uberius coarctatus, indeque magis incoalescens, etiam per vasa spermatica atque ad podenda derivata, intensè calefaciendo genituram abundantem, hanc turgere, hinc stimulare, & tandem, spiritum animalium superveniente impetu, erumpere facit: id quod fit non tantum iuvenibus, sed etiam in viduis, quæ à Venere solita abstinere coguntur. Per quoad effectum est ratio flagrorum ad rem Venerem interdum vtilium: de quo vid. MEIBOMIUS *Tract. de usu Flagrorum in Re Venerea*. Gonorrhœa talis nocturno imprimis tempore accidit.

Sin verò cum dicta genituræ abundantia *seminales vesiculæ* simul nonnihil laxæ & flaccidæ, aut etiam meatus in urethram, ex iisdem nempe vesiculis, patentiores solito sint, in talibus levi datâ occasione & turgescentiâ, etiam interdum gentura subindè elabi solet, accedente membri tensione, & aliquali Venere pruritu, illuc, quod excernitur, est copiosum, crassiusculum, candidum, glutinosum, & naturaliter constitutum, uno nomine: genitura naturaliter constituta, idque imprimis cum stimulo aut pruritu Venereo. Unde mulieres frequenter vel intensius cogitantes de re Venerea, ut noctu faciliè genituram elaculantur, ita etiam interdum quandoque; quod fit ed facilius, quando vesiculæ seminales sunt laxiores ac flaccidiores.

2. Fit etiam Gonorrhœa vera à nimia acrimonia genituræ, specifico sapore acido, aut salio, seu aromatico imprægnata; unde & irritantur partes genitales, in specie vesiculæ seminales, continuo pruritu Venereo, & præterea istâ irritatione fibræ vesicularum seminalium & vicinorum musculorum, in specie elevatorum, ad sui contractionem coguntur, adeoque ita genitura stimulantur exprimendo effunditur: hucque una ex frequentibus gonorrhœæ causis. Genitura in principio apparet laudabilis, attamen nunc est magis tenuis, &c. *Acrimonia tunc peccans solet esse acida ut plurimum, quæ cum sero ad dictas partes delata, solet irritare has partes.*

Causæ Remotæ, quæ vel genituram acriorem generare & alterare; vel vesiculas seminales & vicinas partes magis stimulare valent, sunt imprimis copiosius assumpta acriora, aromatica, sinapi, eruca, & in specie Piperata: Item in iis, qui iam hoc vitio laborant, acida volatilia plus minus vinosa, ut sunt præter vinum, cerevisiam triticæ, &c. Sic enim SCHENCKIUS l. 4. obs. pag. 526. ex BRUYERINO l. 8. cap. 43. de Re cibaria, refert, quendam Gonorrhœam sifymbrio seu nascitio aquatico coactio semper pro lubitu, quoties voluit, provocasse; ex acrimonia enim salis volatilis assumpti nascitii, semen copiosum genituram stimulando, talis producit gonorrhœam. Hinc etiam Purgantia assumpta acrimoniâ volatili nimiam quosdam sæpius, partes genitales stimulant, ad Venerem & Gonorrhœam stimulant. Exempla videbitis in TIMÆO von GuldenKlee, & PLATERO. Cantharides quoque, perversè usurpatæ gonorrhœam, acrimoniâ suâ acciendo semen, & vellicando vesiculas seminales, inferunt. Facit & hoc constitutio massæ sanguineæ paulò acrior, aut sero saliore prædita, quod ipsum sero acrius imminuens chylosam materiam, genituram reddit acriorem, & stimulantem: hinc in febribus, & iis, qui laborant malo hypochondriaco confirmato, propter seum massæ sanguineæ, seu vehiculæ materię, ex qua fit genitura, salius & acrius, genituræ simul plus minus coactum, adeoque acriorem serè genituram reddens, stimulando hoc malum subindè inferunt. In tali casu genitura nocturno pariter ac diurno tempore, nocturno tamen frequentius, cum voluptate Venerea effluit, prout plus minus spirituosâ fuerit genitura, aut prout plus minus à naturali statu recesserit, licet non absque pruritu fortiori, continuo stimulo Venereo accentigine sæpius urgente; unde & priusquam interdum conjungitur, vel dolor. In specie observanda est materia excreta, quæ nunc tenuior & liquidior, nunc spissior: illa acrior, hæc mitior acris.

3. Fit gonorrhœa vera ex nimia tenuitate genituræ, concurrente tunc simul nimia seminalium vesicularum laxitate & flacciditate, non secus ac prostaticarum glandularum, nimisque aperturâ seu hiscentiâ meatuum ex dictis vesiculis in urethram patentium. Unde & aquosa genitura, dum non ritè continetur, facile effluit: quia laxatis, ac atoniâ seu nimia relaxatione affectis vesiculis, ista contineri aut retineri nequit: quæ laxitas vix spontè à causa interna induci potest, sed serè semper agnoscit causam antecedentem, & fit vel propter nimium, præsertim iunioribus annis, Veneris abusum, vel ut plurimum propter nefariam masturbationem, quæ sæpius reiterat & testes laxantur, & fermentum eorum debilitatur: Exemplum huius rei habet TIMÆUS von GuldenKlee Obs. 49. lib. 3. de Studio Juris, qui tali damnato modo gonorrhœam sibi contraxit. Patent etiam glandulæ prostaticæ quibusdam in urethram, quod evidentè apparebit illis, qui gonorrhœâ obire, cuius gonorrhœæ non tardè hi pori dilatati propria sedes sunt: Vid. BARTHOLINUS *Anat. pag. 144*. Genitura quæ tunc effluit, est vel crassa & laudabilis, vel tandem tenuis admodum, aquosa & ferrosa plus solito: Illud evenit, si nullum in testibus laudum est vitium, eorum vis est adhuc laudabilis: Hoc verò, si testes simul laborent; signum enim est, per istam masturbationem vim testium generativam esse encervatam, seu eorum fermentum debilitatum, quod ineptum est elaborandæ genituræ, unde genitura loco saltem liquor aquosus effluit. Hinc etiam vesiculis seminalibus nimis laxatis, sine insignioris voluptatis aut sine vehementioris contiguis sensu, interdum non advertentibus, elabitur talis genitura, vel statim ad levom imaginationem Venerem, vel ad levem semina contactum hoc ipsum spontè exilit, effluit, interdum pariter ac noctu, aut ad alvi exonerationem paulò laboriosiore exprimitur. Adeoque pars affecta in gonorrhœa vera primario sunt vesiculæ seminales.

## DIAGNOSIS.

Species Gonorrhœæ veræ sunt varæ, cuius diagnosi causa eorum distinctio partim ex ægro, partim ex recensitis hæc manifesta. Hoc tantum addo: quoniam genitura semel excreta novo subindè supplemento ex massa sanguinea refarcitur, fit exindè, ut defraudato corpori succo suo rorido & chylo nutritio, vires ægri gracilescent, & tabe dorsali corripiantur.

## PROGNOSIS.

Quod attinet Prognosin gonorrhœæ: Recens facilis curatu, minusque periculosa est: inveterata verò grave est malum, & difficilius curatur. Dum enim diutius continuatur, hominem tandem contabescere, & succumbere lethaliter cogit: vel tandem in operationibus animalibus hebetat: supervenit imprimis febris hæctica similis, cum tali aerophiæ specie, qualis est tubis dorsalis noviter natorum: qualis hæctica tunc difficillima est curationis.

Uterius Gonorrhœa diuturna non subitò nimis suppressenda est, imprimis ubi inclinât nonnihil ad virulentiam Venerem: Metus enim est, ne materia antea copiosius affluens suppressa, & interdum à naturali statu deficiens, inflammationem, aut supervenientem durum tumorem plus minus febrilem, ac varia symptomata relium inducat, ex stagnatione & segugitatione materię externi conservet.

Gonorrhœæ deploratæ indicium habetur, quæ digito in anum immisso remittentiam habet ad sensum, aut si catheter argenteus intrusus subtilividos extrahatur: Tumoris nempe aut abscessus ulcerati illud: hoc verò ichoris gangrenosi, indicium est: quod tamen potius de Gonorrhœa notha maligna, quam de Gonorrhœa vera intelligendum videtur. Conf. M. A. N. C. Ann. 4. & 5. App. p. 59.

## CURA.

Quod attinet Curam: In hac Causæ imprimis removendæ sunt, adenque aut genitura immittenda, aut eius fervor & acrimonia temperanda, aut denique testium fermento roboreto partes laxæ constringentibus firmandæ.

Pro quibus scopis obtinendis semper observandum simul.



1. Ut habeatur ratio acidit aut acris in quavis ferè Gonorrhœa, simulque plùs minùs peccantis.
2. Habenda est ratio testium, an si plùs minùs ritè constituti sint, ac genituram vel naturaliter, vel defecuisse conficiant: id quod præter eorum flacciditatem & mollitiem, & pendulum nimis situm, & ipsa genitura excreta plus minus à naturali statu degenerans, ostendit: adeoque cavendum, ne remediis quibusdam præposterè adhibitis destruat vis generativa.

Remedia ergò, quæ in genituræ copia conveniunt, sunt ea, quæ materiam seminalem imminuunt, aut genituram turgescenscentem compescunt, & fermentum testium plus minus enervant. Instituitur ergò diata parior ex alimentis parum acidioribus, minùs chylosum succum suggerentibus, unà cum vigiliis & exercitiis corporis, quæ partim chyli cum sanguine assimilationem faciunt, & partim per transpirationem eandem imminuunt. Quæ fermentum testium enervans, sunt imprimis acida, vitriolata & nitrota, quæ vim genitalem admodum infringunt: Præ reliquis spiritus vitrioli, & nitrum crudum, dosi ℥j. bis vel ter assumpta, sunt egregia. Loco horum temperata sunt succus citri, granatorum, succus Limonum, qui sunt remedium licet simplex, optimum tamen ad gonorrhœas sistendas, siue sint ex acris genitura, siue ex abundante, & ab omnibus Autoribus mirè laudantur: unde experimentum SYLVATICI Cent. 4. Conf. 1. non est inefficax: Nempe

℥j. Aquæ rosar. ℥iij.  
Succ. citri vel limon. ℥j.  
Album ovi No. j.

Mixtura hæc caplatur quotidie vel alternis diebus pro nna vice. Sylvaticus quartà quilibet vice propinat non sine successu.

PETRUS JOHANNES FABER ad curandam Gonorrhœam propinat succum limonum, cui insillavit spiritum terebinthinæ, unà cum tantillo camphoræ. Certum enim est, quod succus limonum, Germ. Citronen-Safft, admodum extinguit Venerem. Solutiones coralliorum cum succo citri etiam laudantur. Porro radix & flores nymphææ albæ, nec non absinthium, commendantur; item millefolium album, myrrha, speniolia Crollii, semen agni casti seu viticis: uti etiam semina cannabis, papaveris albi, lactucæ, plantaginis, &c. quæcunque ratione usurpata, solent sistere has gonorrhœas. In specie semen cannabis ad inveteratas etiam, & tantùm non desperatas gonorrhœas commendatur, si ex eodem, non secus ac ex reliquis seminibus, cum aqua castitatis fiant Emulsiones; quæ tamen Emulsionem cum cautela usurpandæ, cum semen cannabis propter vim narcoticam sit hostile spiritibus animalibus: e. g.

℥j. Sem. cannab. ℥j.  
Agni casti ℥ij.  
Cum f. q. aquæ millefol. f. Emulsiō:  
adde

Succini præp.  
Offis sep. præp. an. ℥j.  
M. edulcoretur parum:  
D. S.

Emulsiō adstringens.  
℥j. Sem. agni casti, vel cannab. ℥j.  
4. frigid. maj. an. ℥j.  
Cum aquis appropriatis f. Emulsiō:  
adde

Succin. præp.  
Offis sep. præp. an. ℥j.  
Edule. cum f. q. syrupi de Nymphaea vel sacch. alb.  
M. S. ut antè.

Vel  
℥j. Sem. agni casti ℥j.  
Cannab. ℥ij.  
Cum f. q. aquæ nymph. f. Emulsiō:  
adde

Corall. rubr. præp.  
Succini albi præp.  
Animonii diaph. an. ℥j.  
M. S. ut suprà.

℥j. Sem. agni casti,  
Melon. an. ℥ij.  
Cannab.  
Papav. alb. an. ℥ij.

Estmull. Oper. Tom. II.

Cum f. q. aquæ nymph. & portulac. f. Emulsiō:  
adde

Off. sep. præp. ℥j.  
Pulv. spermiol. comp. Crollii ℥ij. ad ℥j.  
Succini albi præp.  
Animon. diaph. an. ℥j.

M. edulcoretur cum rotul. man. Christi perlat.  
D. S.

Emulsiō adstringens & confortans.

Imprimis si simul fervor adjunctus fuerit in inguine circa perineum, & hinc ad lumborum principium.

℥j. Sem. agni casti ℥ij.  
Papav. albi ℥j.

Cum f. q. aquæ nymph. f. Emulsiō:  
adde

Mag. corall. cum succo citri ℥j.

Edulcoretur parum.

Conf. Iden Formul. Class. 3. §. 7. & Coll. Formul. pag. ....

Convenit præterea urtica mortua seu Galeopsis flor. albo, quæ ex signatura commendatur à CARRICHTHERO, egregio in hoc puncto Botanico, si Decodum propinetur cum vino: Hinc

℥j. Herb. galeops. flore albo M. jv.

Millefol. albi M. ij.

Sem. agni casti ℥j. vel ℥vj.

Incis. & contus. coqu. in f. q. aquæ simpl. vel in aquæ mentha, vel ruta, vel ferrar. vel vini:

Colaturæ ℥ij. ad ℥ij. adde

Syrup. de nymph. q. s.

M. D. S.

Potio adstringens.

Subinde hauriatur.

Præterea res nota est de mentha, item de ruta, de portulaca & similibus; unde sunt, qui insigniter commendant sequentem pulverem: scil.

℥j. Fol. mentha,  
Ruta,  
Sem. agni casti,  
Gall. pulveris. an. q. v.

Cujus pulveris ℥ij. propinavit in viño chalybeato, quotidie repetendo. Euripus est HELIDÆI PADUANI, qui non tantummodò ad gonorrhœam, sed præterea quæque ad fluorem album mulierum commendat; ubi simul ceu expertum specificum commendat succum Ceterach seu scolopendrii, si ad cochl. j. repetitis vicibus adsumatur; Hoc ipso enim singulariter gonorrhœas sisti notat idem HELIDÆUS PADUANUS in Obser. pag. 170. & 171.

Succus item millefolii ad ℥ij. cum lacte dulci exhibitus gonorrhœam totaliter curare referunt, imprimis ubi succus simul lactucæ cum camphora externè testibus applicetur. Alii succum malvæ expressum, & in dicto vehiculo adhibitum laudant. Pertinet hoc quævis essentia castitatis, quam vid. in MYNSICHTO & RIVERIO. Præ cæteris efficax est, idque propter admistam terebinthinam, aqua ad gonorrhœam Riverii, cujus descriptionem vid. in C. 1. Observ. 25. & in C. 2. Observ. 30. Prostat etiam in Officinis nostris aqua Castitatis Mynsichtii: sed composito ejus est admodum inepta; multa enim continet, quæ nihil per alembicum transmittunt: vid. ZWELFFERUS in Pharm. Reg. Potius loco ejusdem & seminibus ingredientibus fiat emulsiō cum aquis destillatis illarum plantarum; cui postmodum addi possunt pulveres reliqui appropriati, terra sigillata, camphora, saccharum saturni, &c. De essentia absinthii, de ejus vino, & essentia menthæ, &c. nihil dico, quia sunt satis clara & cognita. Terebinthina imprimis conducit, in specie spiritus terebinthinæ, si ipsi addatur saccharum Saturni; hinc enim evadit Mistura elegantissimè rubicunda, quæ crebrius usurpata mirè compescit Gonorrhœas.

Quoad secundum scopum: quando Gonorrhœa frequens est à causa interna, genituræ nempe acrimonia nimia, conveniunt, quæ acrimoniam istam temperant & corrigunt, & simul aliquall vi styptica prædita sunt. Conveniunt ergò corallia rubra, imprimis eorundem solutio & tintura cum spiritu Ignorum, aut etiam tintura coralliorum assafrata, quæ egregie sunt usus in Gonorrhœis. Deinde etiam Martialis, ut crocus martis adstringens, tintura martis adstringens, sulphuris vitrioli, & Saturnina, & imprimis succinata, ac quævis ex succino præparata, quæ simul vi diuretica & abstergendi partes genitales vim habent, sunt



commendata ad gonorrhœam : Scilicet succinum album præparatum , quotidie propinatum in iusculo calido . jejuno stomacho , mirè ad gonorrhœam valet , quo Dn. ELLENBERGERUS in gonorrhœa usus est , egregiè vasa seminalia expurgavit , & restitutus fuit æger : quin & oleum succini aliis additum in tali casu usurpari potest ; per se enim est paulò acrius , ita , ut totius solus pulvis usurpetur : sicuti dictus ELLENBERGERUS in alio quodam ægro oleum succini adhibuit , & tanta tormina excitavit , ut intermittere & succino albo præparato uti cogeretur . Ulterius crystallus montana præparata acrimoniam genituræ temperat , & gonorrhœas nimias compefcit . Trochisci etiam de Carabe possunt usurpari , item mandibulæ lucii piscis . Pertinet huc Electuarium sequenstev Conditum Lindani , quod à quibusdam laudatur ; ad cujus imitationem

24. *Conserv. ros. rubr.*

*Mentb. crisp. an. ʒi. vel ʒss.*

*Off. sepia præp. (est specificum) ʒli.*

*Borrac. issar alum. calc. (est instar aluminis & Venerem extinguit) ʒi.*

*Nuc. mosch. ʒss.*

*Syrup. de rosis sic. q. s.*

M. f. exinde Electuarium :

D. S.

*Electuarium temperans & adstringens.*

De hoc quotidie bis vel ter usurpetur.

Borrac. cruda intensissimè Venerem stimulat , idèd calcinetur , & relinquit terram seu caput mortuum stypticum in Gonorrhœa optimum . Facit huc succus millefolii , de quo jam dictum ; vel succus lactucæ mixtus cum camphora , & propinatus temperat fervorem materiæ seminalis ; item pulvis Hartmanni , qui vid. in *Praxi Chymiatr.* Item emulsionones ex seminibus 4. frigidis suprâ dictis cum temperantibus , plantago , decoctum radicis nymphaeæ albæ , &c.

Vel

24. *Pulv. off. sepia ʒi.*

*Sacch. Saturni gr. xv.*

M. pro 4. dosibus : S.

*Pulvis adstringens.*

24. *Off. sepia præp. ʒi.*

*Corall. rubr. præp. ʒli. vel ʒi.*

*Sacch. saturni ʒss.*

M. pro 6. dosibus.

D. S. ut antè.

24. *Crystall. præp.*

*Offis sep.*

*Succin. præp. an. ʒss. vel ʒli.*

*Antimonii diaph. simpl. vel martial. ʒi.*

*Sperniolæ Crollii ʒss. ad ʒi.*

*Sacch. saturni gr. xv.*

M. f. Pulvis pro 3. vel 6. dosibus.

D. S. ut suprâ.

Ulterius terebinthina & quilibet Terebinthipata , vi diuretica genituram vitiosam corrigentia , sunt optima ; hinc B. D. MICHAELIS militem quendam diu gonorrhœa affligentem curavit pilulis de terebinthina Cypria cum croco martis subactâ , nullis aliis adhibitis remediis : vel fiant pilulæ ex terebinthina cum shabarbaro ;

Vel

24. *Terebinth. Cypria ʒli.*

*Succini præp. vel off. sepia ʒi.*

M. f. Pilulæ

D. S.

*Pilulæ adstringentes.*

Sicuti os sepia præparatum singulare specificum contra has gonorrhœas fuit HARTMANNI , & jam laudat Dn. D. MICHAELIS , qui ipse ordinariò & feliciter utebatur pulvere ex osse sepia & antimonio diaphoretico , seu cerussa antimoniali , quæ mista à ʒss. ad ʒi. per aliquot dies propinavit , nullis aliis adhibitis remediis , nisi quod interdum succinum præparatum , aut trochiscos de carabe simul adhiberet : nam & antimonium diaphoreticum simplex & Martiale cum aqua plantaginis haustum gonorrhœas sistit ; sicuti etiam Bezoardicum Martiale , item Bezoardicum Venereum , usurpari solet : Vel

24. *Aque rutæ ,*

*Nymph. an. ʒss.*

*Succi limon. vel citri ʒvi.*

*Boli Armena ʒi.*

*Off. sepia ,*

*Antimonii diaph. cammarie an. ʒss. ad ʒli.*

*Syr. nymph. vel granat. vel limon. vel citri ʒss. vel ʒvi.*

D. S.

*Potio temperans & adstringens.*

Usurpentur cochleatim.

Modernorum experimentum est Balsamus de capaiwe ex Indiis allatum , cujus 10. aut 15. guttæ haustæ mirum sunt experimentum ad gonorrhœas quascunque sistendas : propinatur cum vino Hispanico , vel alio liquore appropriato , & pro mirabili habetur remedio . Saccharum saturni , & cum eodem parata tinctura antiphthifica est admodum egregia , propter vitriolum martis & sacch. saturni , in Gonorrhœa hac curanda , præsertim quando in gonorrhœa , in specie in lumbis circa regionem renum , ardoris sensus percipitur , qui nota malignæ gonorrhœæ est sæpius : Unde etiam Balsamus saturni terebinthinatus , quem describit HOFFMANNUS in *Clave pag. 251.* multum contra gonorrhœas laudatur .

Ubi ab acrimonia genituræ penis exulceratio :

24. *Lact. muliebr. vel bubul. ʒvi.*

*Tutia præp. ʒli.*

*Aloes hepas. ʒi.*

*Sacch. candi vel albiss. ʒss.*

M. D. S.

*Iniectio temperans.*

Cum syringa iniiciatur pro una vice ʒss. ad ʒvi. aliquandiu retineatur.

Quod si verò præter dictas causas genitura aquosa ac vesicularum seminalium laxitas inducat gonorrhœam veram , in tali casu internè medicamenta ex mentha & absinthio , succino , thure , mastiche , & similibus , conferunt . In specie corallia alba , essentia item lignorum , & essentia ligni sassafras , tinctura coralliorum cum spiritu lignorum , item tinctura martis adstringens admodum laudantur : succus menthae cum melle coctus , & ad consistentiam syrupi inspissatus , si ad ʒi. usurpetur , commendatur à FORESTO . Item thus pulverisatum , & cum aqua plantaginis ad 3. vel 4. dies propinatum , feliciter has gonorrhœas sistit , quod BURSERI est secretum . Sed non est adeò sæpè hoc ipsum repetendum , quoniam aliàs etiam urinæ fluxum cohibet . In genere omnia adstringentia blanda conveniunt , quæ inspissant , & fluxilia coagulant , præsertim Martialis & Terrea ; hinc crocus martis quilibet , tinctura sulphuris vitrioli , tinctura martis adstringens , terræ sigillatæ , bolus Armena cum aceto vel acidis usurpata sunt optima ; hinc corallia cum acidis , saccharum Saturni , trochisci de carabe , trochisci de terra sigillata , & hinc radix tormentillæ , ejusque extractum , &c. cum saccharo saturni , & similia , sunt optimi usus . Quidam ergo præscribunt pilulas contra gonorrhœam hoc modo :

24. *Extract. rad. tormentill. ʒli.*

*Sperniol. compof. Crollii ( hoc etiam admodum laudatur ad gonorrhœam ) ʒi. ad ʒli.*

*Pulv. sem. agnicast. ,*

*Plantag.*

*Rad. consol. mai. an. ʒss. ad ʒi.*

*Terebinth. Venet. coct.*

*Camphor. an. gr. xii.*

M. f. Pilulæ : S.

*Pilulæ adstringentes.*

Vel

24. *Extr. torment. ʒi.*

*Sacch. saturni ʒss.*

*Camph. ʒli. vel ʒiii. ad ʒss.*

M. f. Pilulæ , quæ subinde usurpentur .

Vel usurpetur decoctum adstringens & Electuarium cum simili regimine , quibus TIMÆUS Von GuldenKlee gonorrhœam ex frequenti manu usurpatione natam curavit in *Casibus p. 191.* Curavi aliquando studiosum Suecum , ex manu usurpatione , sub primo pubertatis tempore per plures annos repetita , diurnâ gonorrhœa affligentem , idque ob vesicularum seminalium laxitatem . Mille serè remedia frustranea adhibita fuerant , tandem solum serè curatus fuit , ordinario

24. *Tinctura sulphuris vitrioli ʒss.*

De qua capiebat omni mane 30. vel 40. guttas in vehiculo calido ; à meridie verò hora quictâ vespertinâ assumebat ʒss. trochisc. de carabe : quæ aliquandiu continuata , observando simul dietam tenuem , & decumbendo magis in lateribus , quàm dorso .

Non rarum est , ut post curatas gonorrhœas saltem subellis



subtilis liquor aquosus adhuc guttatim interdum prodeat , pro qua gonorrhœa declinante penitus exstirpanda conveniunt imprimis *pilula Riverii Cent. 2. Obs. 74.* ad cuius imitationem aliquando prescripti :

*℞. Gum. Arab.*  
*Tragac.*  
*Succini albi præp.*  
*Muriæ præp.*  
*Boli Arm. ana ℥i.*  
*Laud. op. ℥ss.*

Cum s. q. tincturæ catechu s. Pilulæ, pondere gr. j.  
Dentur pro s. dosibus.

Sic & Theriac ac Balnea aluminosa naturalia in malo vel graviore, vel contumaciore, conveniunt.

Externæ etiam fiant somenta adstringentia cum vino austriore, in quo decoquantur cortices granatorum, balaustia, & rosæ, item radix consolide majoris, plantago & similia : aut fiat inunctio perinæ ac radice penis cum oleo myrtillorum, scil.

*℞. Olei myrtill. ℥ij.*  
*Destillat. mastich. ℥i.*  
*Caryoph.*  
*Express. nuc. mosch. an. ℥ss.*

Cum pauca cer. s. linimentum,  
D. S.

Unguentum adstringens.

Quod vesiculas seminales nimis laxas nonnihil roborabit atque adstringet.

Externa plura vid. in *WEDELII Tr. de Med. Facultat. pag. 223.*

Quod si aquosior, serosior & tenuior simul genitura fuerit, quæ in gonorrhœa prodit, idque serè testium vitio, vitius nutritivus temperatus ex lacte, oryza, ovis, &c. quæ genituram semper lacteam reddunt, & ejus acrimoniam temperant, imprimis adhibenda sunt : Conveniunt etiam *ova cum aromatibus.*

Quod si necessum fuerit, ut etiam interdum sub cursu vel sub principio morbi Purgatio instituatur, præ ceteris in usu erit terebinthina cum Purgantibus, v. g. Pilulæ de terebinthina *Mynsichtli, ℥ss. ad ℥i.* ; vel etiam Pilulæ factæ ex sola terebinthina cum Rhabarbaro pulverisato ; item pilulæ factæ ex massa pilulari de fumaris & terebinthina cum Mercurio dulci, ubi suspicio superest luis Venereæ. In genere Terebinthinata cum laxent blandè, & simul vias urinarias ac spermaticas abstergant, hæc sunt convenientissima ; v. g.

*℞. Terebinth. Cypri. cost. ℥j.*  
*Scamm. ros.*  
*Res. jalapp. an. gr. v.*  
F. Pilulæ prodoli.

D. S.

Pilule abstergentes.

Hæc fuerunt species Gonorrhœæ versæ.

## MEMBRUM II.

### DE

## GONORRHŒA NOTHA.

**Q**UOD attinet *Gonorrhœas nothas* : in his loco genituræ quæ nunc alia materia vitiosa, vel liquamen serosum, plus minus acre aut decolor, aut foetidum, nunc cum nunc sine dolore, nunc cum aliis symptomatibus, ex pene continud effunditur. Sic seminis calidissimi & foetidissimi excretionem vid. in *M. A. N. C. Ann. 4. & 5. Append. pag. 67.* Hæc ipsa denud est duplex : vel benigna, vel maligna, seu, ut aliis vocatur, *virulenta*. De maligna seu Venerea jam *suprad.* 1. suo loco a Quam. Benigna est, quando citra causam manifestam, v. g. citra prægressum factum Venereum suspectum, effluit continuè ex pene materia seu liquamen aquosum & copiosum, idque citra pruritus Venereum, aut citra membri tentiginem ; fluxus talis aquosus die nocteque diutius subindè continuatur, ita, ut citra omnem intermissionem etiam ad aliquot annos protrahatur citra insignem noxam, & tali fluxui, si genitura vera esset, proportionatam virium prostrationem. Respondet hic fluxus Gonorrhœæ nothe virorum, fluxui uterino albo mulierum. Aliàs à quibusdam etiam, ut ut pauci fuerint Autores, qui ejusdem fecerunt mentionem, *Gonorrhœa Catarrhalis* vocari solet. Autores pauci, uti dico, qui de tali Gonorrhœa agunt, sunt *LAVRENTIVS in Ettmull. Oper. Tom. II.*

*in suis Consil. Consil. 10. pag. 60. LANGIUS in suis Epist. lib. 2. Tr. 5. Epist. 22. SCHNEIDERVS de Catarrhis lib. 2. cap. 8. pag. 311. HILDANVS in Obs. pag. 1032. Observ. HOECHSTEDTERI Decr. 10. Cas. 2. pag. 390. ac denique MARCELLVS DONATVS Histor. Medic. Mirab. lib. 4. cap. 18. in specie vid. M. A. N. C. Ann. 4. & 5. Obs. 20. pag. 23. Sicut fluxum illum mulierum hæc quoque ex ratione coryzam uteri vocat VALENTINVS in Epist. de Nova Matr. & Morbone Muliebr. apatome.*

## PARS AFFECTA.

Si pressius examinemus hanc Gonorrhœam notham, inveniemus, quod subiectum, seu *Pars affecta* in eadem sint *glandulae prostaticae*, vel laxiores factæ, vel leniter excoctæ, vel penitus exulceratæ, in radice urethræ circa cervicem vesicæ constitutæ : quod sufficientissimè probat *GRAAFIUS in novissimo suo Tract. de Organis virorum & Generat. inservientibus pag. 119.* Sicuti hæc ipsæ prostaticæ glandulosæ mirabilium morborum perinde sunt subiecta : Scio enim ex illdem obstruclis & insigniter tumefactis ischuriam seu suppressionem urinae lethalem Romæ in quodam Principe fuisse indutam ; sicuti e contra hæc ipsæ prostaticæ glandulosæ nimis laxæ, aut alio modo vitiatæ, sunt subiectum hujus gonorrhœæ nothe dicendæ. Cum enim naturaliter substantia hæc glandulosa & spongiosa præparet & secernat lympham quandam sui generis, seu humorem limpidum aquosum, tenuem & lubricantem, inservientem pro vehiculo genituræ ex vesiculis seminalibus in urethram expressæ, quæ genitura cum fuerit glutinosa, hujus lymphæ indiget vehiculo ad fortio rem ejaculationem : Quod si ergo fiat, ut laxatis his ipsis substantiis glandulosis nimis, copiosis & frequentius ex massa sanguinea talis lymphæ excernatur in urethram, quid miri, talis humor copiosus & frequenter elaboretur ? qui tunc simul in naturali statu ad quandam viscositatem inclinatur, & sic continuè citra Veneris exercitium effluit ad purgamentum totius massæ sanguineæ ; exinde hæc oritur Gonorrhœa notha. Nempe quod in faucibus tussis est, & in oculis illa phryniatio, hoc talis Gonorrhœa Notha est in viris.

## CAUSÆ.

*Causa ergo materialis* hujus gonorrhœæ erit dyscrasia sanguinis seroso-cachectica, seu in qua sanguis crudior copiosiore latice aquoso seu sero chyloso, ex deficiente tam chylosi, quam hæmatosi, est imprægnata, quæ per hanc substantiam prostaticarum glandulosarum, tanquam per colatorium aut cylindrum naturalem, copiosius excernitur & separatur.

*Causæ Remotæ* ad hanc Gonorrhœam disponentes erunt præter alia omnia, quæ quacunque ratione serum sanguinis coacervare solent, *Stomachinempè labes* non rite digerentis alimentis, sed hæc in cremorem aquosum & fallum pervertentis : unde etiam subiecta talia exinde vitiosum sanguinem generare, & ad cachexiam nonnihil inclinare solent ; aut si non mox in principio resolvatur talis gonorrhœa, postmodum cachexia supervenit.

*Causa efficiens formalis* hujus excretionis, seu quare in specie per hanc partem fiat ista transcolatio & secretio ? est laxitas nimia, adeoque insignis porositas ipsarum prostaticarum glandulosarum, unâ cum crebrioris excretionis provocatione, tam per manustuprationem, quam per crebrius repetitum actum Venereum, unde promptè per eas serum sanguinis nimium cribrari, & quasi filtrari potest. Ubi ergo hæc ipsa corpuscula aut ex equitatione nimia, aut ex lapsu, aut ex alia quacunque ratione, erunt relaxata, aut dissenta, aut alio modo vitiatæ, tunc talis latex massæ sanguineæ superfluius per has ipsas prostaticas glandulosas, tanquam colatorium, excernitur, & ita Gonorrhœam talem notham constituit, ut etiam sanguis subindè locogenituræ excretus observatus fuerit.

## DIAGNOSIS.

Signa hujus Gonorrhœæ ex ejus historia sunt manifesta.



## P R O G N O S I S.

**Quoad Prognosin :** Expurgatur equidem sub forma calide Gonorrhoeae universa massa sanguinea, sed tamen simul plus minus depauperatur; adeoque caveant sibi aegri, ne tandem in cachexiam cum tabe delabantur, cujus prodromus vel comes hęc Gonorrhoea est.

## C U R A.

**Cura ad Gonorrhoeam hanc,** seu superveniens quoddam symptomata, minus dirigenda venit, sed potius radix morbi & primus fons est corrigendus: nempe

1. Stomachus est roborandus, eiusque digestio restitucanda.
2. Massae sanguineae cruditas emendanda & corrigenda, eiusque serum superfluum per sudores & vias urinarias amandandum; Denique
3. Partes genitales abstergendae seu mundificandae, & externis blande adstringentibus prostratae glandulosae firmandae, & in tonum naturalem restituendae.

Ex quibus Indicationibus vel sponte methodus medendi & materia medica patent. Praeter ceteris Remedia, quae his satisfaciunt scopis, ex illis, quae superius l. 1. de Cachexia, & Affectibus catarrhalibus, dixi petenda: unde ratione cachexiae & digestionis primae amaricantia aromatica, ut absinthium, mentha, rosmarinus, & ex his parata remedia, quae & stomacho & Gonorrhoeae satisfaciunt; ratione autem serisuperflui Juniperina, & ex ligno sassafras parata remedia, & elusae essentia cum spiritu serpilli parata, crebrius & in majori dosi assumpta, conducunt; item Decocta & essentia lignorum cum tormentilla parata. Observatum quoque fuit, acidularum potum, uti in aliis morbis chronicis, ita in hac Gonorrhoea diuturna contulisse, item succinata, in specie sal volatile, quod cachexiam imminuentem subinde pervertit, diuretica vi, cujus ratione etiam Terebinthinata, & pilulae exterebinthina, pilulae Riverii supra laudatae, apprimè conveniunt. Pulvere thuris ad ℥j. ex ovo sorbilli saepius dato, plures curavit PETRUS ASSELINÆUS; vid. VELSCHIUS *Millemim. Cent. 2. Obs. 30.* quod etiam facit massae & gummi animae: quin & si forsitan scorbutus subsit, à quo foveatur malum, & huius ratio simul habenda. Conf. in specie M. A. N. C. Ann. 4. & 5. Obs. 20.

Thermarum tandem usus externus, imprimis post bibitas acidulas, pro restaurando tono prostratarum laesarum est convenientissimus, & gonorrhoeae huius Curam absolvit, Conf. SENNERTUS lib. 3. *Prax. ubi de Gonorrhoea pag. 263.* Aut etiam balnea aluminosa artificialia aut similia adstringentia erunt commodè in usum vocanda. In specie non nimis citò suppressenda est hac Gonorrhoea, nisi universalis praemissa sint, quoniam natura abuteitur his viis ad evacuandam massam sanguineam: emendetur saltem prius imminens cachexia, & vitium stomachi, & fere semper sponte cessabit Gonorrhoea.

Quod si verò vel suppressa sit intempestive, vel suppressenda sit, fonticulus in inguine aut altero crure aperiendus, ne quasi derivando alia mala praeca veamus, ad imitationem ZACUTI LUSITANI lib. 1. *Prax. Admir. Obs. 97.*

Hac de Gonorrhoea, seu isto vitio geniturae in Excretionem & retentionem, quando citra coitum & nimis copiose effunditur.

De Gonorrhoea maligna seu virulenta superius l. 1. inter symptomata Luis Venereae sufficienter egi.

Sequitur jam secundum in Excretionem & Retentionem vitium, nempe quando genitura nimis citò in congressu effunditur.

## ARTICULUS II.

## D E

NIMIS CITA GENITURÆ  
EJACULATIONE.

## C A U S A E.

**C**ausa ejus est duplex: Aut enim

1. Nimis laxae sunt vesiculae seminales, earumque meatus nimis aperti, unde vel sub levi partium attri-

tu, & prima geniturae turgescit, hanc elabi potius sinunt, quam ejaculantur: aut

2. Nimis spirituosae ac fervidae, indeque nimis turgida est genitura, ut sit ista adolescentibus, Veneri rariùs, sed tamen acriùs operam dantibus, ita, ut primo impetu turgescit à spirituum animalium ubereiore agilitate, & sanguinis fervore prorumpat foras, ut fit in Italis.

## C U R A.

Prius vitium commodè adstringentibus blandis imprimis curatur, tam internis, talibus nempe, quae modò *Artic. 1. Memb. 1. in Gonorrhoea ex laxitate vesicularum seminalium* fuerunt proposita, partim externis, Insestibus nempe, Balneis, Thermis, & similibus, quae *Artic. 1. Memb. 2. in Gonorrhoea morba benigna externe usurpanda* dixi.

Posterior verò vitium, ubi nimis spirituum impetus genituram ejiciat, opio & opiatissimis imprimis est sistendum; hoc ipsum enim nimium spirituum animalium impetum figit, & hinc subitam geniturae turgescitiam cohibet. Nam, ut ut verum sit, quod opium tam ab Indis Orientalibus quam à Turcis usurpetur, ut scilicet hanc voluptuosorem reddant, sit tamen hoc, quatenus opium refrinando spirituum animalium impetum, remoratur nonnihil geniturae citati ejaculationem, & ita per consequens ipsum coitus actum longiorem reddit. Mulieres sane Indae sunt admodum voluptuosae, restibus rerum Indicarum Scriptoribus, quae non tam saepius repetitum, quam una vice longius continuatum exorsant actum Venereum. Cui desiderio ut melius satisfaciat, opio se prius armant mariti, ut potè quorum impetus, qui alias in cita geniturae spirituosae & fervidae in calidioribus istis climatibus eruptione consistit, retunditur seu retardatur. Verum ne opium spiritus figendo nimis noceat, & cum in actu ipso spiritus copiosè excernantur, reliquiae tamen resistentes torpidiores ab opio, mentis tandem stuporem inducant; item cum spiritus genitales conjugum in actu coitus secundo transplantentur in seutum, ne exinde facili generentur fetus, stupor, aliudque facultatis animalis ipsi inducatur vitium, quod non sine causa metuendum; ob id consultum est cum opio praeparato in his casibus miscere ambra, ex quibus mistis potens sit confortativum spirituum, & egregium remedium Venereum, idque innocuum adhibetur, quod & Veneris actum ratione opii protrahendo voluptuosorem, & ratione ambrae spiritus confortando minus nocivum redditur. Hinc talis casu essentia ambrae, cui in praeparatione simul opium certà quantitate additum, cum spiritu rosarum parata, & essentia ambrae anodyna vocata, in aqua cinnamomi vel haustu vini Malvatici propinata, egregium erit remedium Venereum. Aliis in tali casu seu singularis commendatur Globulus, factus ex sanguine cervinocum Venerem stimulantibus misto, accoltus tempore in manu detentus, de quo infra *Sec. 2. Cap. 1.*

Pertinet ad hoc effectus singularis illa Observatio notatu dignissima HEINRICI ab HEER *Obs. 10.* de cita nimis, & ex primo quonq; penis contactu, Excretionis geniturae, ob ulcus, in intestino recto latens, à quod ipso vesiculae seminales (sanguis enim Intestinum rectum) per consensum affectae & irritatae, genituram retinere nequeunt, sed illam prematurè ejiciunt.

## ARTICULUS III.

## D E

GENITURÆ EXCRETIONE NIMIS  
TARDA.

**T**ertium vitium huc pertinens mox in principio huius *capitis* dixi esse nimis tardam geniturae Excretionem, quando nempe tardè nimis excernitur genitura in coitu, idque etiam in specie à defectu spirituum animalium & turgescitiae geniturae ipsius, hinc oriundae, debita dependens: Quin & vesicularum seminalium laxitas seu flacciditas, earumque & musculorum penis vicinorum aliqualls languor, & hinc ad expressionem geniturae minus turgentis ineptitudo, multum huc facit. Dum ergo spiritus deficiunt, nec genitura rite turgescit, nec partes rite constringuntur, nec rite potest ejici genitura. Nempe hoc pertinet etiam vitium istud, quod in coitu, erecto licet & agitato membro, nulla tamen genitura effluit, quae tamen postea flaccido membro in somno, invito etiam,



## ARTICULUS IV.

## SEMINIS EXCRETIONE ABOLITA.

MEMBRUM  
DE  
CARUNCULA PENIS.

**S**ubtilissimus adhuc in Capite de læsa Genitura Retentione & Excretionem : Superest , quando omnino non potest excerni genitura : Id quod præter dictos casus fit imprimis , quando meatus urinarius seu urethra obfessa est caruncula seu carne quadam parva excrecente in ipso canali , quò obstrueto , & urinæ & genituræ tandem tollitur excretio.

## CAUSÆ.

Origo hujus mali cùm rarissime ex alia causa prægressa , quàm imprimis ex gonorrhœa Gallica , quando nempe acrimonia acida corrosiva Liquaminis effluentis corrodit istum membranaceum ductum & nonnihil exulcerat , unde sequitur tandem , ut in loco corrosio ex alimento naturali affluente succrescat substantia quadam carnosâ instar cujusdam verrucæ ; idè de hoc l. 1. inter symptomata Læis Venereæ dixi.

Pertinet huc tamen istæ curiosæ Observationes , dum quidam coenantes ventris crepitum locog genituræ emittunt , vel excrementa alvi iisdem profluunt ; vid. SCHENCKIUS Obs. lib. 4. aut quando status per penem genituræ loco emittitur ; vid. M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 46. p. 85. item quando sanguis in congressu genituræ loco emittitur ; vid. SCHENCKIUS l. 1. BORELLUS Cent. 4. Obs. 17. & SALMUTH lib. 1. Obs. 81.

## CURA.

Hæc & similia vitia , observatis antecedentibus causis , & aliis adjunctis circumstantiis , diversimodè curantur . Flatus quod attinet ; per viscidum evacuantia , hinc subministrata . Carminantia nervina , refranantur : sanguis verò adstringentibus interius ac externis coërcetur .

Sed de his in specie vid. SENNERTUS lib. 3. Præf. 7. §. Sect. 2. cap. 6. & 7. pag. 969. sequ.

Hæc sufficiant de Seminis Læsa Retentione & Excretionem . Pergo jam ad

## SECTIONEM II.

## DE

## LÆSA PENIS ERECTIONE.

**R**equiritur nempe ulterius in sexu masculino ad generationis negotium , ut pene erectio genitura ejaculetur , quæ deficiens erectio , vulgo Impotentia Virilis dicitur , utæ & deficiens genituræ excretio ita dicatur : Impotentia enim est is , qui non potest id quod maritalis decet . In duobus enim consistit Impotentia propriè sic dicta virilis : nempe in deficiente membri Erectione , & deficiente per istud seminis ejaculatione : utrumque necesse est ad hoc , ut aliquis Impotens dicatur : Nam prius deficiens erectio Impotentem ad coeundum ; posterius ad generandum reddit . Læditur autem hæc erectio penis ad coitum necessaria , & hinc copula maritalis debita , tribus modis :

1. Quando deficit , seu est imminuta .
2. Quando excedit , estque nimia ejus extensio .
3. Quando depravatur , dumque penis non conveniente modo & figurâ turgescit & erigitur .

Ad doctrinam hujus rei explicandam necesse est distinguere inter penis erectionem , & ejus turgescentiam . Præsuppono hic ex Physiologico-Anatomicis distensionem & turgescentiam penis fieri primariò à sanguine arterioso , corpora penis bina , nervosa instar spongiæ excavata & foraminulenta replente , eaque fortiter distendente .

Hæc de distensione & inflatione penis .

Ut verò postmodum reddatur firmior , erectionem penis inflati & distenti , & motum ejus tonicum ( ut in tali figura & statu persistat ) fieri imprimis à 4. ejus musculis , seu duobus musculorum paribus , circa ejusdem radicem implanta-  
tis ( Anatomiam vid. in GRAAFFIO ) à quibus versus originem suam contractis , adeoque in suo vertice turgescenti-

bus , non tantum comprimitur & angustatur vena penis dorsum excurrent , ita , ut sanguis per arterias in corpora penis nervosa effusus , eademque distendens , reflueret nequeat , & penem validè distendat ; sed præterea quoque horum musculorum contractione penis ita rigidus , & distensus maneat , caputque firmius attollat , & ita erigatur , quo ipso genitura spiritibus tempore congressus turgida ( dico : tempore congressus , aliàs non ) inflans & distendens vesiculas seminales , ab horum musculorum contractorum , vesiculas simul comprimantium , robore , in sua eruptione in meatum urinarium non leviter juvatur . Unde simul atque dictorum musculorum contractio ac tonus cessat , sanguis ex pene refluus per venam denuò apertam corpus ejus flaccidum , rugosum , & tandem pendulum relinquit . Læsiones ergo hujus erectionis in pene imprimis fundatæ erunt primariò in istis musculis , qui contractione suâ venam in dorso penis comprimunt , stringunt , & sanguinis regressum impediunt , & secundariò etiam in genitura in vesiculis seminalibus plus minus irritante , & ita musculorum contracturam stimulant .





## CAPUT I.

## DE

## PENIS ERECTIONE DEFICIENTE,

*hinc oriunda*

## IMPOTENTIA VIRILI.

## CAUSÆ.

**D**eficit ergo Erectio vel distensio penis triplici imprimis ex causa:

1. Vitio instrumenti erigentis, musculorum nempe & spirituum animalium.
2. Vitio stimuli in genitalibus, spiritus animales ad determinatum motum excitantis.
3. Fascino seu maleficio.

Quod ergo attinet musculos: laborant hi, quando ita sunt affecti, ut se proprio motu contrahere nequeant: id quod fit in paralyti & resolutione ipsarum fibrarum. Resoluti sunt musculi penis erectores ex affectione ipsorum nervorum, spiritus ad animandas eorum fibras debebentium; quâ ratione & causis remotioribus, interdum equitatio nimia, comprimendo & in se cogendo hos musculos, & quasi contundendo, erectioni penis ineptos reddit: Tale exemplum recenset JACOBUS FONTANUS Conf. 2. de Nobili, qui ab exercitio violento, & qui equitatione nimia incidit in privationem erectionis penis, ob vlassus & meatus à motu obstructos, qui ad musculos derivantur. Dico: equitatione nimia; Nam equitatio moderata potius prodest ad erectionem: Sic enim FERDINANDVS Hist. 16. post gonorrhoeam benignam ex equitatione priapismum ingentem observavit. Casus item aut percussio super os sacrum vicinas partes, ubi nervi horum musculorum originem ducunt; item in dorsum, ut paralytin aliorum locorum, ita etiam penis, propter affectos nervos infert, ejusque erectionem impedit: vid. JACOBVS FONTANVS l. a. & HILDANVS Cent. 6. Obs. 39 ubi ex casu in dorsum erectio penis omnino fuit sublata, manente etiamnum insigni ad Venerem stimulo, quatenus nervi ad penem ejusque musculos tendentes, aut compressione, aut aliâ ratione affecti fuerunt sicuti e. l. similiter ex gravi percussione capitis, ejusque vulneribus, talem erigendi membri impotentiam, ex simili causa ortam refert: Conf. etiam M. A. N. C. Ann. 20. Obs. 104. p. 177. Pertinent huc Mercurialia; siquidem virilitas inunctione per unguentum Mercuriale adempta, per oleum spicæ verò fuit restituta, observante SCHENCKIO lib. 4. obs. 1. cui analoga est observatio PANAROLLI in Pent. 5. observat. 39. Facit huc etiam frigus, cujus occasione etiam non pauci impotentes sunt, resolutis quasi musculis.

Spiritus animales quod attinet, musculos hos ad radicem penis sitos moventes, & ita ad penis erectionem facientes: horum defectus imprimis erectionem deficientem facit, dum musculos non contrahunt, quibus non contractis venula laxata est, ut penis flaccescat. Deficiunt hi in musculis istis, vel ingenere ex eorum defectu universali, ut fit in senibus debilibus & languidis ex morbo, unde in morborum acutorum statu & declinatione erectio membri naturalis (naturalis dico: nam interdum est præternaturalis & convulsiva, quæ malo rediens, sanctum signum esse solet spirituum animalium regeneratorium, & in debitas motiones concitatorum: Vel in specie deficiunt spiritus animales in pene, & specialiter in ejus musculis, quando in motu suo perturbati sunt, & plus minus languent in perturbatione mentis, quando animus aut imaginatio (loquor cum vulgo) circa illud objectum occupata eos in cerebro ac aliis partibus detinet, & minus ad penem influunt spiritus. Hac ratione & pudor, terror, pavor & similia interdum, imò sæpius, penis erectionem prohibent, aq. eam jam factam denuo tollunt, quatenus aliò vocant spiritus per imaginationem pudibundam &c., ubi penis flaccescit, propter spirituum animalium motum perturbatum: sicut & contrâ meditatio rerum Venerarum, aut titillatio membri, spirituum motum ad illud ejusque musculos dirigit, sicque penis erectionem promovet. Ex hac causa, nempe pudore nimio & intempestivo, interdum evenit, ut noviter nupti se maleficatos putent, cum tamen potius ex nimio pudore impediat debita membri erectio, quo tandem discussa, resala-

crius succedit. Pertinent huc li, qui melancholia hypochondriacâ laborât, qui ut variis subinde cõstantur phantasmatibus, ita & tales subinde imaginatione propria decepti se impotentes æstimant, & reverà tunc minus commodè rem peragunt, qui curato malo hypochondriaco, spontè suâ ad rem familiarem postea redierunt: qualia exempla habentur in SALMUTH Cent. 2. obs. 78. Simile exemplum est, quod habet SYLVATICUS in Cent. 4. Conf. 4. ubi refert impotentiam ad coitum ex malo hypochondriaco, in quo dissenditur penis, sed dum accingitur ad opus, flaccescit.

Hæc est prima causa.

Secunda causa est deficiens stimulus Veneris à genitura minus copiosa, minusque turgescente: sicut enim ab hujus turgescentia aut copia, indeque facta partium istarum irritatione, & hinc dependente determinato spirituum animalium motu ad istas partes, Venus stimulat, & pollutiones, rati nocturnæ, quàm interdum etiam diurnæ, oriuntur; ita à deficiente irritatione & erectiones & pollutiones consuetæ distuntur, membraque flaccida & pendula fiunt.

Pertinent huc imprimis quælibet vitia testium, & vesicularum seminalium, genituræ præparationem & retentionem vitiantium. Tales aliàs dicuntur Frigidi, cum nullo stimulo in Venerem ferantur, nullaque aut paucâ libidine tententur; unde etiam, si quid emittant genituræ, aquæ ferè, minusque spumosa existit, quin & spontè sine voluptatibus exit: Tales naturaliter sunt senes, qui in hoc negotio naturaliter tandem deficiunt. Et pertinent huc præterea quælibet partium genitalium vitia. Sic HILDANUS Cent. 3. obs. 40. refert impotentiam ad coitum ex defectu testiculî sinistri, & depravatione vasorum spermaticorum. Pertinent huc Camphorata, vigorem genitalem suppressant: Sic LOSSIUS obs. p. 314. observat virilitatem amissam ex solo continuato odore camphoræ. De nitri usu frequentiore Venerem extinguente infra constabit ex TIMÆO non Guldenkleæ.

Huc faciunt flagra natibus insigenda, quorum flagrorum ad rem Venerem magnus est usus; de quo vid. elegans Tractatus MEIBOMII de usu flagrorum ad rem Venerem, quem superrimè notis illustratum edidit BARTHOLINUS, ubi refertur exemplum ejusdem, qui nunquam potuit amariæ satisfacere, nisi prius virgis caderetur ab hac: unde postmodum ita cæsus egregiè officio præstando functus est. Causis hisce duabus naturalibus, & quasi ordinariis, propter quas deficit subinde membri erectio, & huic succedens negotium, simul tertia causa, nempe extraordinaria & Magica addenda venit, quæ est fascinum seu maleficium, aut incantatio poveri nuptorum, dum scilicet sub ipso puncto copulationis matrimonialis sacerdotalis per maleficia, v. g. per seram clausam, per ligulam constrictam, cum culmo stramine, aut eustrum parietis infixum, aut aliis ultra se modis, quos taceo, ita ligatur sponsus, ut postmodum, simulante licet naturâ, & erigente se membro, sponsæ zonam solvere, coitum celebrare, & cum sponsa gaudia optata peragere nequeat: quin etiam, ubi armatus propius accedit, subito membra jam erectum iterum flaccescat, & tamen cum aliâ quacunque, exceptâ sponsâ, facile & optime, nisi ex aliis causis simul sit impotens, coire potest: sin verò ad sponsam, vel noviter nuptam propius accedat, mox mentula torpida cornua contrahit. Existimant equidem multi, quos inter est WIERUS de Præstigiis Demon. SALMUTH Cent. 2. obs. 78. & BORRELLUS Cent. 4. obs. 65. hæc vana esse, falsaque, & provenire solummodo ex animi affectibus, à nimio gaudio, aut pudore, aut motu, aut aliâ quacunque causâ, vel etiam ex imaginatione falsa, & in specie melancholiæ hypochondriacæ, spirituumque animalium hinc avocatione: Contrarium tamen loquitur experientia, & cum eadem BARTHOLINUS Cent. 3. Hist. Anat. 71.

Causa maleficii formalis, seu quomodo fiat? si non omnino perferutabilis, nec præcisè à Diaboli est præstigiis (quod non temerè faciendum in rebus naturalibus, quippe quæ Deo potius acceptæ ferendæ) forsitan à sola dependet imaginatione ligantis, seu ejus, qui hanc vexationem facit: Quorsum, non tantum inclinât VERULAMIUS in Sylva Sylvarum, sed præterea etiam HELMONTIUS de Magnæ. Pulver. Curatione & MARCUS MARCI in Philos. Per. Rescripta, aliisque scriptis; qui omnes, uti hoc fascinum, ita præstigia dæmonum, ac reliquos effectus ab incantatione per sagas inductos, effectivè soli imaginationi sagæ vel incantatoris ascribunt.



## DIAGNOSIS.

Quoad Signa de Ereptione membri læsa: res per se patet, & ab ægro querulo, seu potius uxore ejus, facile manifestatur, saltem causæ perscrutandæ sunt proximæ, & omnes remotæ probè pensitandæ à Medico.

Si ergo vitium adsit quali paralyticum, membrum flaccidum est, nec ullouquam obiecto, etiamsi Veneris desiderium adsit, moveri aut erigi potest.

Spirituum animalium defectus ex universali corporis languore ac imbecillitate, & actionibus reliquis animalibus, manifestus est.

Sin ex animi affectu aliud vocentur, præprimis in hypochondriacis, ab ægro cognoscitur: quia variæ cogitationes, varia phantasmata, & similia subjecta actû se representabunt.

Quod si verò nullus adsit stimulus Veneris, ab ægro etiam hoc ipsum facile cognoscitur, quod ipse patiens nullum appetitum habeat ad tales actiones.

Denique ab incantatione seu maleficio affectum ortum habere, manifestatur, si homo allàs ad Venerem satis aptus fuerit, nec ulla causa manifesta præcesserit, quæ id ipsi, & præcipue subito, inducere potuerit; aut etiam, quando cum alia quacunque coire potest, exceptâ solâ sponsâ.

## PROGNOSIS.

Prognosis est, quod tales sint infœcundi, tamdiu sc. quamdiu debite adire nequeunt.

Per se nihil mali inde imminet ægris; per accidens verò, propter oriundum inde merorem, tristitiam, & alia animi pathemata, alia mala supervenire possunt.

Malum ab incantatione naturalibus pariter remediis depelli potest, cum ipse Satan operetur secundum naturam, modò adsit v. g. suspicio de ligatura.

## CURA.

Cura varia est, in qua, si ex primis duabus oritur causis, observandum est, ut

1. Volatilibus spirituosiss spirituum animalium impetus & influxus promoveatur.
2. Ut aromaticis volatilibus acrioribus aphrodisiacis seminis impetus & acrimonia intendatur.
3. Fascinum, si quod fuerit, quantum possibile, empiricis removendum, experientiâ nempe & à posteriore cognitio.

Pro duobus ergo prioribus scopis conveniunt omnia ea, quæ suprà sect. 1. cap. 1. in deficiente genitura Elaboratione fuerunt allegata, interna & externa, imprimis aromata & omnia aromatica, ut cinnamomum, cubebæ, caryophylli, grana paradisi, cibus permilla, sinapi, eruca, macis, piper, semen coriandri, aut vinum cinnamomo maceratum, & quælibet ibidem laudata, egregie conducunt. Sic ovum sorbile, in quo veretrum cervi vel tauri, in Veneris actu interfecit, exsiccatum & pulverisatum, cum cinnamomo convenit, cuius usus internus qualiscunque ante coitum, validam erectionem facere dicitur. Item ex formicis, ex ambra, ex sanguine galli, &c. parata remedia sunt proficua: Sic namque radix satyrii condita, & essentia satyrii cum spiritu formicarum parata, in haustu vini Malvacici sub introitu lecti assumenda: Borax in ovo sorbili à gr. xv. ℥i. ad 3℥. vid. AMATUS LUSITANUS Cent. 2. Cur. 18. & MERCURIALIS Cas. 48. Pineæ, amygdalæ dulces, pistaciæ, lac, &c. materiam seminalem augent, unde quidam lac mullebre in ipso actu hauriunt; item oleum ex pinis expressum. Angli pro Veneris roboranda usurpant electuarium ex Ambra & Laudano opiato in parva dosi, excipiunt cum syrupo quodam. Spiritus genitales seu animales augmentat spiritus sanguinis galli cum spiritu formicarum, & Electuaria suprà c. 1. præscripta: Vel

- 2℥. Rad. satyr. condit.  
Eryng. condit.  
Pin. excort. an. 3℥.  
Zingib. cond.  
Nuc. Indic. cond. an. 3℥.  
Conf. alchem. 3℥.  
Sem. eruc.  
Nasturt. an. 3℥.  
Piperis albi,

Caryoph. an. 3℥.

Syr. cinnam. q. s.

f. Electuarium molle:

D. S.

Electuarium confortativum.

De hoc mane, à meridie, & vespere, quantitas instar nucis moschatæ sumatur.

2℥. Conf. rad. eryng.

Satyr. an. 3℥.

Zingib. in Ind. cond. 3℥.

Amygd. dulc. ambr. exc. 3℥.

Conf. alchem. 3℥.

Pulv. sem. eruca,

Sinapi an. 3℥.

Spec. diatrion piper. 3℥.

Cum f. q. syrupi belenii f. Electuarium.

D. S. ut antè.

2℥. Conf. flor. anbor. 3℥.

Rad. eryng. condit. 3℥. ad 3℥.

Amygd. dulc. ambros. 3℥.

Cubebar.

Galang. an. 3℥.

Macis 3℥.

Essent. satyr. 3℥.

Cum f. q. conf. alchem. f. Electuarium.

D. S. ut suprà.

Sed de his internis ad nauseam usque, Sect. 1. c. 1. ubi de Seminis Generatione læsa. In specie cantharides, acrimoniâ inâ potentissimè irritando vesicæ collum, & hinc stimulando musculos penis ibidem situatos, potentiorẽ erectionem tolerant inducere: sicut PLATERUS obs. p. 239. refert impotentiam ex imbecillitate vasorum seminalium seu genitalium ob Veneris nimium usum, refrigeratis iis & relaxatis, contractam, aliis irritis per usum cantharidum cum speciebus aliis aromaticis curatam.

Externè huc facientia sunt v. g. calor, dum e. g. membrum virile igni admoveatur & titilletur pro membri erectione: vid. M. A. N. C. Ann. 6. & 7. Obs. 179. Balnea nervina, Infusum, Fetus nervini, vel Inunctiones contra paralytin penis secundum ZACUTUM LUSITANUM l. 7. Prax. Hist. c. 10. aliàs usitata, sunt instituenda. Cubebæ bulliant in vino generoso, vel liquore appropriato, & decoctum ita applicetur testibus & locis vicinis: item balsamum Venericum Mynsibii in Armament. Chym. nunc solitarium, nunc cum oleo formicarum mistum, simul ad erectionem & ad voluptatem prodest, perinzo & radici penis, item scroto & testibus, inunctum.

Vel

2℥. Succ. pastin.

Ol. sinapi an. 3℥.

Ovor. formic. magnor. 3℥.

Pistentur ova, & exponantur soli per diem 1. aut 2. deinde permisceantur in formam Linimenti, quo glans ante coitum est illinenda. Si membrum post coitum adhuc riget, abluitur aquâ calidâ.

Inunctio pedinis vel glandis cum felle apri magnam erectionem & delectationem facere ab HARTMANNO in Crolium pag. 357. & MONTAGNANA asseritur. Radix hellebori nigri pulverisata, vel pulvis radices pyrethri cum pinguedine cornuicis commissa, & hoc ipso linimento radix penis, vel glans illita, singularissimum est: Hoc enim non tantummodò validam facit erectionem; sed & hoc præstare dicitur (sit fides penes experientiam) ut & mulier virgo; & ipse maritus magis hastatus, appareant. Item aqua & spiritus formicarum, aqua destillata & succus ovorum formicarum expressus, cui parum zibethi additum sit, vel cum oleo de piperibus & costino, vel de castoreo mistus, aut testibus aut perinzo, quod est interstitium inter membrum & anum, inunctus, cui & in specie oleum caryophyllorum permisceri potest. Aliàs oleum costinum, oleum nucis moschatæ, macis, oleum euphorbi, ac similia in usu sunt: aluminis plumbi aliquid addi potest ad imitationem consilii eruditi in M. A. N. C. Ann. 6. & 7. App. p. 143. Vnde Decoctum pyrethri & euphorbi cum Vino parat FORESTUS lib. 10. obs. 92. pro abluendis genitalibus. ANGELUS SALA tale habet Linimentum, sed pretiosum:

2℥. Zibethi gr. viii.

Ambr. gr. vi.

Moschi gr. v.

Olei destillat. cinnam. gutt. viii.

Nucis gutt. iv.

Bals.



Bals. Peruv. q. s. ut incorporentur omnia.  
Misc.

Hoc inungatur glans ante congressum, vel præsertim post Balneum ex Nervinis eodem inungatur perineum: loco cuius tamen etiam balsamus apoplecticus Veneris *Mynsichtii* aut similis, cum zibetho, moscho, aut aliis paratus, radici penis vel perineo, aut etiam spatio inter scrotum & penem, ubi musculi siti sunt, ad firmam erectionem illitus, sufficit: sicuti glans eodem illita utique sexui voluptatem auget. Unde etiam præcipitur, ut in passione hysterica, & eius paroxysmo desperato serè, vir glande ita inuncta uxorem comprimatur, pro solvendo paroxysmo.

Pertinent huc poma ambrae in manu tenenda pro promovenda erectione & continuando congressu, senibus & iis concubilibus, in quibus calor naturalis imminuitur, & qui in morbo chronico, vel arte quadam venefica, in virilitate debiles facti, quæ vid. in M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 41. p. 77. Quibusdam sequens pro singulari habetur secreto:

24. Sangu. ex cervo, dum Veneri inibiae, sclopeto interfecto, rec. collectum:

Cui adhuc calido adde

Pulv. tragac. ʒii.

Nuc. mosch.

Caryoph.

Cinnam. an. ʒß.

Campb.

Moschi,

Ambra. an. ʒi.

P. cum s. q. sanguinis illius Massa in formam globi, exsicceetur & asservecetur.

Si, qui nimis citò genituram in coitum emittunt, dum coeunt, hoc pomum in manu detineant; quamdiu continuerint, tamdiu continuare poterunt Venerem, citra spiritus aut genituræ emissionem. Quando autem pomum deposuerunt, genituram mittunt. Sic tamen fides penes experientiam.

Ab incantatione si fuerit malum, aliis opus est remediis: Conducunt Vomitoria antimonialia, ut tartarus emeticus *Mynsichtii*, & ex helleboro albo, quæ præmittantur in Cura. Post hæc convenit imprimis betula; melleus nempe per scopas betulinas recentes à *CARRICHTHERO* laudatus, qui, si quis alius, in morbis ab incantatione oriundis exercitissimus est. Potus cerevisiæ betulinæ, seu in qua decocti sunt furculi betulae recentiores, experimentum est *HELMONTII*, Traß. de Lithiæ cap. 8. §. 25. qui commendat tanquam experimentum contra maritorum seu sponforum fascinationem; cuius loco substitui potest succus betulinus ex ramo eius sauciato fluens. *GANSIUS* Traß. de Corallis commendat pulverem sequentem:

24. Corall. rubr.

Dent. hom. mort. maris an. ʒi.

Sem. ʒ. herbae antirrh. an. ʒß.

M. f. Pulvis pro suffitu.

Hic pulvis sæpius repetitus probatus fuit aliquoties in hisipis ligaturis virorum.

*Hypericon* seu Fuga demonum, eiusque essentia *Mynsichtii*, Tinctura corallorum, quæ laudatur maxime ab *Helmontio* contra veneficos morbos; *Valeriana*, in specie pratenfis, & Phu vulgare, quod à *CARRICHTHERO* in l. de veneficio laudatur; abrotanum, momordica, artemisia rubra, plantago aquatica, herba Paris, quæ pulverisata, & ʒi. assumpta, multa præstat in veneficiis; uti & sorbus, vel decoctus, vel pulverisatus in syrupo, singulariter à quibusdam commendatur. Haustus etiam bonus lactis muliebris laudatur. Porro valent origanum, aquilegia cum toto, Antirrhinum, adianthum album & nigrum, Ricinus Americanus, radix contrajervæ, aristolochiæ rotundæ, quæ multis præfertur. Aliàs tanquam secretum habetur pulvis factus ex rasura campanæ ex eo loco derasa, ubi pistillum eam ferit, rasura hæc etiam miscetur cum pulvere priapitauri & croci modico, & sponso propinatur. Mercurius vivus in nucæ avellana, vel in calamo scriptorio, collo appensus Preservativum est certum sponforum, ne ligentur in copula sacerdotali. Quibusdam placet unâ cum hoc Mercurio, calamo scriptorio incluso, plantas quasdam appropriatas, e. g. hyperici, capillorum Veneris, sem. antirrhini, herbam & baccas Paridis & similia nodulo includere, & ex collo suspendere. Fuit experimentum *D. MICHAELIS*, & ab aliis hic aliquoties expertum: e. g.

24. Mercurii viv. calamo incl. ʒii.

Capill. Veneris,

Flor. aquileg.

Hyperic.

Sem. hyperici,

Grana parad. an. ʒi.

Misc.

In linteo gestentur contra omnes incantationes, Veneficia & ligationes coniugii.

*Helmontius* laudat Eletrum immaturum *Paracelsi*, quod *ZWELFFERUS* in *Manriff. spagy. cap. de auro aurum embryonatum*, nondum satis fixatum, esse putat. Observatum aliàs fuit, quod primatum ducat viscum ex corylo, quod cum adipe canis, caponis vel urfi, redigitur in unguentum contra Veneficia: vid. *CARRICHTHERUS*, & *HEINRICUS* ab *HEER* in *Obs.* Valent item viscum quercinum & tiliaceum. Laudatur quoque fel corvi, & fel canis nigri illitum. *MYNSICHTIUS* habet emplastrum foetidum, quod etiam *D. MICHAELIS* expertus est in veneficiis. *BVRRHVS* emplastrum antidiabolicum ex cera benedicta & asa foetida habet. *HARTMANNI* experimentum certum, & aliquoties probatum, quod ipse recenset in *Praxi chymiatrica* pag. 265. fuit lotio pudendorum utriusque sexus cum decocto herbae, florum ac seminis aquilegiae (hoc enim est singulare.) Post lotionem seclit suffitum dictis partibus excipiendum, ex dentibus hominis mortui pulverisatis super carbones proiectis. Modus suffitus est hic: Recipiantur tres dentes ex capite mortui viri, qui minute pulveriscentur: hinc recipiantur 2. lateres novi, qui candefacti per crucem disponantur in terram, hinc affundatur spiritus vini Rhenani optimi, & superimponatur pulvis dentium illorum contulorum, fumo imponatur membrum incantatum, & ita excipiatur fumus, donec membrum incipiat sudare: hinc hic sudor cum linteo mundo deorsum versus abstergatur. Quo facto inungatur membrum cum asa foetida, (quæ est basis emplastri *Mynsichtii* contra incantationes,) hinc linteis involvatur, & ita incantatus cubitum se conferat.

Item expertum fuit aliquando, si quis emat Lucium piscem sexus masculini, huic per vim aperiat os, & in os eius mittatur urina maleficiati: hinc Lucius ita vivus immittatur in fluvium, idque contra eiusdem cursum, & ita sinatur; subito namque tolli maleficium. Si malum non sit nimis inveteratum, seu in maleficio novo, singulare etiam habetur secretum melleo per anulum sponsalium, Germ. *Trauring*, ante & post copulationem, eaque reciproca, aut per asseris ex reliquo tronco extrusum nodum: vid. *WEDELIUS* de Medic. Facult. p. 225. Ubi hoc non sufficit, accipiatur simul rasura annuli sponsalium, quæ interitis in poru vini assumpta singulare est experimentum in tali casu. Venefica docuit Iovenem urinam mittere per columnæ patibuli foramen terebrâ factum, & liberatus fuit. Fuit aliquando curatus quidam similiter incantatus consilio ipsi à vetula suppeditato, dum sc. in coemiterio quodam misit urinam per ansam, seu anulum cuiusdam epitaphii, vel lapidis sepulchro incumbentis. Denique siquid aliud, singulare est, si quis accipiat ovum recens, hoc coquat cum urina propria ad absorptionem medietatis: quo facto urina superstes projiciatur in flumen secundum eiusdem cursum, ovum verò ita coctum leviter apertum immittatur in acervum formicarum; Unde, quando formicæ absumperunt ovum, solum erit fascium: vid. *HARTMANNUS* in *Praxi Chymiatr. ubi de Atrophia*. Quidam stercus proprium post duas horas excrementum vesicæ includunt, & fumo exponunt: quo facto dolores aliaque mala à veneficio inducta cessare, & veneficam eundem gustum percipere dicunt.

Plura, quia pertinent ad morbos ab Incantationibus ortos, non addo. Quoad hæc enim, quia adhuc hæremus in *Theoria*, etiam hæremus in *Praxi*, dubitantes, an sint licita? an verò minus? Plura vid. in *AGRICOLÆ Chirurg. Paro. Germ. p. 656. 661.* &c. item in *CARRICHTHERI Herbario von Zauberschen Krankheiten*. Interim observetur, quod, prout variant media, quibus instituitur ligatio, ita etiam necesse sit variare remedia; unde cum dubii sumus, quomodo facta sit ligatura? etiam varia remedia tentanda sunt.

Verfamur adhuc in morbis Virorum in puncto erectionis penis; tractavimus primum vitium, nempe deficientem penis erectionem, à quacunque causa oriatur: sequitur



## CAPUT II.

## DE

## PENIS ERECTIONE AUCTA.

## ARTICULUS I.

## DE

## NIMIA SALACITATE.

**S**ecundum nimirum in erectione membri virium est, quando nimium, aut sepius, aut diutius, quam naturaliter fieri solet, in eo ferè continuè, distentum & erectum est membrum, adeoque consequenter erectio & rigiditas nimis aucta est.

Affectus est duplex, qui occurrunt in nimia membri erectione, secundum duplicem modum, quo fit; ita tamen, ut pars affectus semper sit musculi circa radicem penis, qui contractione sua comprimendo venam, impediunt sanguinis refluxum, & penem erigunt; quod tamen cum duobus modis fieri solet, est etiam duplex affectus. Primus est modus, quando ex grixi stimulo Veneris huic acriter inhiant, & hinc sepius & diutius membri tensionem cum pruriginem in Venerem patiuntur, & tunc dicitur SALACITAS, seu nimia in Venerem propensio, in qua per integram noctem vel levissimâ mentione tensionem penis insignem percipiunt, quod malum interdum eo usque excedit, ut etiam quandoque delirium aut furorem quendam Venerem inducat; idque ex nimia genituræ turgescencia & orgasmus, qui ipse furor vix, nisi genituræ uberiori excretionem sedari potest: Conf. M. A. N. C. Ann. 6. 17. Obs. 54. & 55. p. 87. & 88. tuncque affectus est similis brutorum furo Venerem, dum certis anni temporibus ex liquoris genitalis turgescencia, hincque iunctâ sanguinis auctâ fermentatione, cum spirituam insigniore fervore in Venerem impetuosiùs ruunt. Hic affectus in maribus est summus salacitatis gradus, & ferè idem, qui in mulieribus Furor Venerinus dici solet.

## CAUSÆ.

Causa hujus salacitatis ac Satyriasis facillè patet: est nempe genituræ naturaliter constitutæ & uberius collectæ, simulque spirituosæ ac acrioris, nimis fervor ac turgescencia, & inde natus stimulus ad Venerem, quem sequitur determinatus spirituum animalium motus & penis erectio.

Causæ remotæ sunt variæ: omnia nempe, quæ genituram augment, vel spirituum animalium impetum excitant, aut acrimoniam loca genitalia stimulant: hinc vita sedentaria, diæta imuta cum aromatibus condita, assumpta & propinata Purgantia, aliæque Venerem stimulantia, meditationes Veneræ, aliæque occasiones externæ, ad hoc malum disponunt. Præsupponit laudabilem genitalium constitutionem, qualis deprehenditur in his, qui sunt viri rebides; item quando SALMUTH Cem. 1. Obs. 23. refert Veneres insignes, in quorum altero magni renes, in altero tres venæ feminales dextræ visæ fuerunt. De Medicamentis purgantibus, Venerem stimulantibus, præter PLATERUM vid. TIMÆUS von GuldenKlee in Cas. pag. 193. item M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 71. pag. 131. Sin ulterius excedat hæc Salacitas, ut coitu vix satiari possit, quin etiam post coitum Venerem adhuc membrum rigidum & tensum continuè pruriginem in Venerem stimulet, ut coeundo vix satiari possit, usitato vocabulo SATYRIASIS, sumamus nempe salacitatis gradus, dicitur à Satyris, qui membro erecto, & ad libidinem deplendam semper prono, finguntur & pinguntur: Monstra scilicet talia, quæ & ipsa ex nefando hominum virorum cum capris congressu prognata fuerunt. Exemplum talis Satyriaseos, si quod aliud, insigne vid. in TIMÆO von GuldenKlee lib. 3. Cap. 32.

## DIAGNOSIS.

Diagnos Salacitatis & Satyriasis, ex relatione ægrorum, & suprâ dictis per se patet.

## PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Ex Salacitate & Satyriasi nullum incommodum, nisi quod nimiam Venerem insequitur, metuendum est: nempe debilitas corporis, ejusque tabes, in specie actionum animalium insignis lesio, viriumque labefactio, viri solet; quin etiam vitam abbreviat.

## CURA.

Quoad Curam: In Salacitate ac Satyriasi genitura ita imminuenda, ac spiritus animales, fervidiores ac acriteres, sunt absumendi & sistendi, & si aliqualis adsit genituræ acrimonia, appropriatis temperanda. Unde præter animum curis occupatum, vigillas nimias, victum tenuem, ieiunium, labores, & motum corporis validum, aut vitæ genus exercitiis occupatum, ita, ut fortis sudor laudè erumpat &c., hic conducunt venæ sectio, eaque subindè repetita; item omnia ea, quæ suprâ Sect. 4. Cap. 2. Art. 1. Memb. 1. de Gonorrhoea ex turgescencia & abundantia genituræ fuerunt proposita. In specie acida fixa viriolata, citrata, vitrata & Saturnina, hic conducunt, hinc opium & camphora. Viriolata & Nitrata vim genitalem nonnihil reserant, & genituræ vim ac impetum coercunt: vid. LANGIUS in Patbol. Fabry. Opium & camphora spirituum animalium impetum sistunt & reserant. Quoad acida: succus citri ac limonum, item acetum rutaceum sæpiùs usurpatum Salacitati nimie frantum injicit: quibus & succus menthæ est permiscendus, quibus opium & camphora maritanda sunt. Hinc Nitrata sunt optima, ut nitrum crebrius & copiosius usurpatum notabiliter salacitatis cessum temperat; aliis namque omnibus irritis, per nitrum purum in aqua nymphæa bis indè, manè & vesperi usurpatum, & crebrius continuatum, TIMÆUS von GuldenKlee lib. 3. Cap. 32. pag. 173. curavit suprâ dictum salacissimum hominem; Unde etiam spiritus nitri, & omnia ex nitro, acido spiritu adhuc turgida, sunt usurpanda. Quoad Saturnina convenit tinctura antiphthifica, saccharum Saturni &c.: vid. WEDELIUS de Medie. Fac. pag. 237. De Viriolo & ejus spiritu D. LANGIUS super Fabrum refert, quod crebrior aut diuturnior ejus usus notabiliter imminuere solet vim testium genitalem, ut etiam hujus abusu structura testium penitus fuerit immutata; unde spiritus vitrioli crebrius ac diu usurpatus, compescit egregiè Satyriasin: item tinctura florum papaveris rhæados ac florum cyani & tunicæ cum phlegmate vitrioli acidulo crebrius hausta. Nec minùs conveniunt alia per experientiam cognita, quæ inter est nymphæa, præsertim flore albo, ejusque radix, quæ specificè commendatur, item lactuca, ejusque succus, portulaca: quibus addatur millefolium flore albo, tota, & quæ ex citatis internè usurpari possunt remedia; item cicuta, quæ apud nos in fons deprehenditur: Imprimis mentha hisâddita laudari solet. De vitice seu agno casto, cujus folia, flores, & semen sunt usitatissima, res satis est nota. Post viticis semen, scilicet cannabis est etiam insignis laudis; item semen lactucæ, portulacæ & similia. De salice res nota est; nempe sunt rumulirentis salicis, ex quibus incisis liquor albus emanat, qui impetum Venerem solet extinguere: folia salicis cocta, item cum his folia verbenæ mista, cocta, diutius continuata mirè stimulum Venerem intermunt. His optimo consilio Nitrate adduntur. Camphora est hic non negligenda, non quod abstinuit, ut volunt, semen, aut vim genitalem imminuat, sed quod certâ quadam virtute spirituum fixativâ sit prædita; quâ ratione & deliriis febrium malignarum adeo potenter resistit. Quod facit, quod ZACVTVS LVSITANVS lib. 3. Med. Princ. Hist. 10. refert, coitum assiduum camphoræ usu curatum; item Eleæuarium ejus camphoratum, quod habet l. 2. Prax. Admir. Obs. 108. Conf. TACHENIVS Hipp. Cym. Ratione cujus virtutis spirituum fixativæ & Opiata conveniunt, quæ per se usurpata spirituum ferociam & agilitatem compescendo, impetum Venerem retundunt, spiritus figendo, & eorum impetum cohibendo. De opio dubium videri potest, cum in regionibus Orientalibus opium tanquam Venerem optimum usurpetur. Ad hæc opium habet summam acrimoniam, quæ etiam in quibusdam sudorem pruriginosum infert; ill tamen impedit, quod minùs & spirituum impetum figat, cum & hac ratione stimulantibus sociatum, adum Venerem diutius continuandum efficiat, & spirituum impetum impediât. Sic, ut Formulas quasdam annexam, egregia hic est Emulsio Myrsicæ cannabina:

24. Sem. cannab. 3iβ.

Semin.



*Semin. 4. frigid. mai. an. ʒi.*  
 Cum l. q. *aque flor. nymph. & rosar. an. f.* Emulsio:  
 Huius ʒlii. adde  
*Syr. ʒ succ. violar. ʒli.*  
*Aque cinnam. bugloss. ʒi.*  
 Misc.

Hæc in pollutione nocturna, satyriasi, priapismo, & omnibus aliis, à nimia genituræ quantitate vel acrimonia provenientibus affectibus, est nobilissima. Notandum, quod *Aqua cinnamomi buglossata* omittatur commodius, nisi ob nimiam genituræ projectionem insimul vires defecerint; alias enim, cum spiritiosa sit & aromatica, malum nonnihil exasperare posset. Aliàs & ita prescribere soleo:

ʒi. *Sem. cannab.*  
*Melon. an. ʒli.*  
*4. frig. mai. an. ʒi.*  
*Aqua lactuc.*  
*Acetof.*  
*Flor. nymph. an. ʒlii.*  
 F. Emulsio, edulcoranda cum *syr. pap. albi.*  
 D. S.

*Emulsio fiftens.*

Sic & *Mixtura* prescribi possunt:

ʒi. *Aque sol. vitis,*  
*Salicis an. ʒiʒ.*  
*Spiritus nitri dulc. vel virgali dulc. ʒb.*  
 Edulcor. cum l. q. *manus Christi simpl.*  
 D. S. ut antè. Vel  
 ʒi. *Phlegm. vitrioli ʒli.*  
*Tinctura flor. bellid.*  
*Rosar. an. ʒb.*  
 M. S.  
*Tinctura compefcens.*

Vel in forma Pulveris:

ʒi. *Pulv. sem. agni casti,*  
*Nitri depur. an. ʒli.*  
*Camph. ʒb.*  
*Laud. opiat. gr. vi.*  
 M. f. Pulvis.

D. S.

*Pulvis ad pudorem, ʒi. cuspidibus culeri sumendus in aqua sequenti.*

ʒi. *Aque acetof.*  
*Flor. nymph. an. ʒli.*  
*Liqu. salicis ʒiʒ.*  
*Syr. nymph. q. f.*  
 M. S.

*Aqua ad pulverem.*

Cum his externè commodè applicentur partibus genitalibus, in specie scroto & pectini, succus plantaginis, solani, cicutæ, *lysofzami*, sempervivi, cum aceto vel simplici, vel destillato, & saccharo saturni misti, & in forma Epithematis applicandi, ad compescendam nimiam salacitatem, & impedendam genituræ turgescentiam: aut fiant ex his plantis Cataplasmata aceto impregnanda: Vel partes genitales similiter foveantur succo sempervivi aut *lactucæ*, in quo nitrum crudum vel purgatum q. f. solutum sit. Testibus hoc in forma Epithematis applicatum, mirè spirituum impetus refrenatur, quin & postea regio lumbaris, seu renes, ipsumque scrotum subinde humectari potest: Item partes genitales, pecten, scrotum, &c. foveantur *aqua nymphæ*, in qua dissolutum sit opium: sin ob penetrationem ad aliqualem opii correctionem acetum admisceatur, eò melius erit. Suadent quidam *laminam Saturni* lumbis applicare circa regionem renum, sed malè; quia quandoque sic insecta est gravipræ suppressio.

## ARTICVLVS II.

### DE

### PRIAPISMO.

**S**ecundus modus nimie penis Erectionis est, dum penis ita rigidus & ita distensus est in omnem dimensionem, ut exinde graviter doleat, & dolorem tensivum sentiat: in qua ipsa distensione nullum Veneris adesse desiderium, unde & coeundo nullum aut paucissimum semen emittunt; coitu nullo levantur, quin potius malum insigniter exasperatur, adeo, ut sitales sepius coitum tentare velint, incidant subinde in convulsionem totius corporis. Morbus hic usitatè PRIA-

PISMVS dicitur, à Priapo, scortorum apud Gentiles Patrone, qui tali membro semper erecto & rigido fingitur.

### CAVSÆ.

*Causa proxima* huius priapismi est convulsio musculorum penis, quorum spasmus & continuà spasmodicà contractura; & venà penis penitè oclusa sanguis penem distendens, omnino impeditur & sistitur in refluxu, & simul dolorifica tensio in radice penis percipitur. Unde, dum sanguis copiosius in penis corporibus nervosis hæret coacervatus, tandem dolorifico tali distensionis sensu membrum cruciatur, & cum spasmolictorum musculorum convulsivi quid patitur. A tali nempe musculorum penis convulsione est, quod Epileptici quibusdam Inscitis & invitis in paroxysmo subinde membrum tendatur, imò & iisdem in paroxysmo epileptico genitura interdum elabatur, à tali sc. musculorum penis, vicinarumque partium membranosarum convulsione: Item videtur hinc oriri, quod interdum quibusdam suspensis erigatur membrum: vid. SCHENCKIUS in *Observ. ubi de Spasmo*; Confer. simul SALMVTH. *Cent. 3. Observ. 21. & 40.* ubi tale exemplum recenset, similis sc. membri convulsione in Turca interfecto propter copiosum Maslah assumptum. Verùm ne fiat confusio, dum superius dixi, inflammationem scroti, penis, ac testium fieri ex impedito sanguinis refluxu & motu; hic verò dicam, priapismum oriri ex impedito sanguinis motu propter convulsionem musculorum; Ne inquam, circa hoc fiat confusio, observandum moneo: quod sanguis in corporibus penis membranosis excavatis coëctus, & in refluxu impeditus, det membri pertinacem erectionem & tensionem: Ubi verò sanguis in ipsa substantia penis, quam irrigat, ut ibidem stagnet, tunc in procinctu esse solet periculosa eius inflammatio.

Convulsionis huius musculorum penis, & inde oriundi priapismi, causa est irritatio quæcunque, aut musculos penis aut horum nervos afficiens; unde spirituum animalium continuato influxu hi contracti & convulsi manent, & tandem priapismum inferunt; non secus sc. atque punctura nervi cuiusdam per irritationem partis, ad quam nervus tendit, convulsionem infert, unde huius membri fit contractio & rigiditas. Irritatio hæc à causa tam inquam externa excitatur, rariùs autem à causa interna, frequenter ex externa. Inter has externas primatum obtinent cantharides, intempestivè & incautè usurpatæ: quæ sicut tam externæ applicatione, quam internæ assumptione, urinam cruentam aut ulcus vesicæ inducunt; ita quibusdam, Italis præsertim, loco stimuli Venerei inserviunt, sed quorum acre & salinum vitus ad musculos penis delatum, continuà irritatione, pertinacis priapismi subinde causa est. Imò etiam alia Aphrodisiaca acriora, magisque aromatica, & copiosius assumpta, interdum priapismum inferunt: Hinc enim curiosum est, quod observat SALMVTH *Cent. 3. Obs. 29.* de Senesefunco, qui tertia die nuptiarum mortuus, pertinacis penis erectione repertus est, ex nimio abusu medicamentorum Venereorum, quibus usus fuerat, ut in nuptiis secundis noviter nuptæ iuenculæ satisfaceret, & melius placeret. Dubio procul convulsus mortuus est; nam dum ante, & in ipsa morte, musculi penis convulsi, rigidi sunt. facile fibræ post mortem in eodem tono, ex contentis humoribus successivè condensatis, perstare, & ita ex sanguine successivè in pene coagulato etiam post mortem huius rentigo continuari potest: Vid. GARMANNVS de *Mirac. Mortuor. & M. A. N. C. Ann. 9. & 10. Obs. 34. p. 95.* Sed malum hoc satis est rarum, ut plura addere verear. BORELLVS tamen *Cent. 2. Obs. 31.* notat quendam in coitu instar canum iunctum remansisse, quod à nimio ardore partium genitalium tumefactarum provenire existimat; vel quod è zibetho, quo consilio amici cuiusdam, voluptatis augendæ gratia balanum inunxerat, partes hæc calefactæ & irritatæ fuerint.

### DIAGNOSIS.

*Diagnosi* huius affectus ex relatione ægrorum, & suprà dictis addiscenda.

### PROGNOSIS.

Priapismus, cum sit interdum satis dolorificus, ac dolorem inferre soleat similem tetano, seu membris tetano correptis, metum infert, ne & aliarum partium superveniant convulsiones, ægerque sic moriatur; aut nunc tumorem, nunc inflam-



inflammationem, nunc periculosum apostema membri post se trahat.

## C U R A.

Curatur Priapismus, convulsionem musculorum imprimis removendo, causam irritantem sistendo; nam sic sponte flaccescet penis. Ubi simul Causa occasionalis excrementitia later in corpore, ad revulsionem commendatur vomitus, qui præ aliis purgandi modis, præsertim ad priapismum confert, utut *Purgantia* per inferiora eandem remove videantur; eorum tamen vis minus est valida; prætereaque notum, quod *Purgantia* interdum tentiginem inducant, & Venerem stimulent: Exemplum habet de Viduo PLATERVS, qui ex usu pilularum aromaticarum & mastichinarum tale quid percepit, unde *Purgantia* rectè omittuntur. Potius ergo *Vomitoria* laudantur in priapismo ad revulsionem, uti dicunt, causas irritantis: vid. FORESTVS lib. 16. Obs. 6. Idem habet EPIPHANIVS FERDINANDVS Hist. Med. 26. Post *Vomitoria* conveniunt acida, mentha, ruta, vitex seu agnus castus, eiusque semen: Nempè *Decoctum lentium* cum *semine agni casti* aliquandiu usurpatum, experimentum est LINDANI contra Priapismum, qui etiam refert se aliquando curasse senem septuagenarium priapismo laborantem, in quo externè & internè oleum destillatum rutæ, aliàs ab HARTMANNO insigniter commendatum, frustra adhibuerit, postmodum verò eundem restituerit decocto lactucæ & semine agni casti crebrius ac diutius usurpato. *Opium*, item *camphora*, & similia, cum succo citri copiosius usurpata etiam huc conferunt. POTERIVS, qui non habuit nec habebit parem inter Italos, C. 1. cap. 54. refert, quendam 30. annorum diu pravâ tentigine tentatum, tandem per usum auri diaphoretici fuisse curatum. Hinc lac prodesset, ubi ex cantharidibus malum ortum fuerit.

Externè Epithema ex vino, in quo coctum sit cuminum & ruta, adhiberi debet, quod JOEL in sua Praxi in usu habet; uti etiam oleum rutæ, menthæ, &c. genitalibus & perinæo illinendum. Cataplasmata quoque ex ruta, mentha, cumino, floribus nymphææ cum aceto & aqua parata; vel ex ruta confusa & semine cumini cum aceto conveniunt. Conducunt quoque cataplasmata camphorata: Vel illinatur *oleum amygdalarum dulcium*, in quo soluta sit *camphora*, radici penis; vel applicetur *camphora* in aceto vini soluta, cum aqua nymphææ superfusa rutæ confusa. Sedulo interim monent omnes Practici, ut in priapismi cura unâ cum genituram, extinguentibus usurpentur medicamenta carminantia, ut est v. g. aqua carminativa communis, mista cum aqua castitatis *Quercetani*; aut aqua castitatis *Riverii*, mista cum spiritu nitri dulci. Dico commendant Practici, quibus tamen minimè possum consentire; hypothesis enim eorum est, quod oriatur priapismus ex liquore statioso, seu ex flatibus penè dissidentibus, quod tamen minus philosophicè aut scientificè videtur locutum: unde ex hac hypothesis carminativa commendant: hinc etiam ZACUTUS LUSITANUS lib. 2. Prax. Admir. Obs. 105. aquam ex caryophyllis viridibus destillatam laudat. Potius acida vitriolacea commendando, & iuxta hæc Nitrata, quæ & ipsa priapismum curare valent. Denique Clysteres carminantes laudantur à ZACUTO LUSITANO lib. 3. Med. Princ. Hist. 21. Imprimis si addantur urinæ pueri 3li. fermenti acris 3i.

Hæc est aucta Penis erectio.

## CAPUT III.

## D E

## PENIS ERECTIONE DEPRAVATA.

Tertium vitium in Ereptione denique erat depravata penis erectio seu contorsio. Nam depravatè erigitur membrum, dum non debita in figura & modo debito contingit, cum naturaliter penis tensus in figura recta absque dolore, soleat extendi. Quando ergo contortus est penis, seu quando curvam aut aliam vitiatam figuram acquirit, dum erigi debet, læditur ejus actio, de cuius causa interna nihil est, quod addam, nisi quod consulendus sit HEINRICUS ab HEER obs. 7. ubi habet aliquot rara exempla contorsionum penis, & ex AVRANTIO refert modum, depravationem huius erectionis & contorsionem penis corrigendi: item SENERTUS l. 3. Prax. p. 923. Pertinet huc retractio penis omnimoda in ipsum ventrem, per cucurbitularam appositio-

nem curanda, secundum HEINRICVM ab HEER obs. 7. item Carminantibus applicandis restituenda. Vid. M. A. N. C. Ann. 2. obs. 50. pag. 89.

Pertinet huc Penis Tumor præternaturalis, ut quando Tumorem penis subitanè tympaniticum, foru carminativo curandum observant in M. A. N. C. Ann. 2. obs. 99. p. 160.

Depravatur etiam penis erectio subinde frangi, vel præputii vitio, quando non rite potest erigi, vel extendi membrum, Frænulum quod attinet, si nimis breve est, & tenditur membrum, glans retrahitur, & membrum incurvatur, & sic non tantum generatio impeditur, sed etiam dolor oritur. Hoc ergo curatur Chirurgiâ, ubi frænulum simplici incisione secatur, uti videbitis ex HILDANO Cent. 6. Hist. 6. Observandum tamen, ut aliquid potius detrahatur de membrana præputii, quàm de glande, si res est curta: factu hoc, applicetur stappa cannabiscum albumine ovi & bolo imprægnata, quæ immergatur in locum, ubi facta est incisio.

Præputii præratione fit, quando hoc ita est angustum & strictum, ut glans commodè detegi nequeat; sic enim coëctus penis re ipsâ se explanare nequit. Vitium hoc aliàs Phimosis dicitur.

## ARTICULUS I.

## D E

## PHIMOSI.

## CAUSÆ.

Phimosis verò triplici ratione fit: nunc est malum nativum; nunc fit interdum à coitu cum sœmina infecta, & inflammationem concipit; nunc præputium incipit corrugari, ut non possit detrahi, nisi concipiat fissuram.

## C U R A.

Phimosis hæc, quæ est à nativitate, sectione Chirurgicâ facillè curatur, & removetur: Scilicet cum incisura in præputium inciditur: interdum etiam per crucem fieri solet, observando saltem hoc, ut vitetur vena pudendi, seu illud vas, quod circa latus præputii se manifestat.

Si verò ex congressu impuro facta est inflammatio præputii, quæ solet habere coniunctum insignem pruritum, optimum est sequens Fotus:

4. Mucilag. sem. psylli,

Cydon.

Fenuer. cum aqua plantag. oxer. ad. 3i.

Vitell. ovi No. i.

Laç. vaccini 3lii.

M. sub forma Fomenti: S.

Fotus leniens.

Applicetur crebrò loco affecto.

Vel

4. Aquæ vel Decod. calcis vivæ:

Cum quo vel solo, vel addito sacch. saturni vel mercurio dulci,

f. Fotus calidè applicandus.

D. S.

Fotus refrigerans & discutiens.

4. Flor. chamom.

Samb. ap. M. i.

Hysc.

Sem. anisi,

Fenic. an. M. ʒ.

Bacc. lauri ʒʒ.

Incis. & confusa coque in Aqua calcis vivæ ʒi.

Colatura D. S.

Epithema leniens.

Applicatur calidè. Convenit etiam in Paraphimosis.

Vel hæc Cataplasma ex farina fabarum cum dicta aqua calcis vivæ, invicem miscendo, quod præputium affecto applicatum, tumorem discutit, & malum curat.

In Phimosi, in qua præputium corrugatum est, ut citra fissuram non possit detrahi, præter iam dictum Cataplasma, in specie convenit cremor calcis vivæ, qui subigitur cum butyro non salito.



## ARTICVLVS II.

## DE

## PARAPHIMOSI.

**C**ontrarium vitium est *Paraphimosis*, tanta post glandem præputii retractio, ut nequeat denuo retrahi, vel supra glandem duci, ut etiam glandis periculosam inflammationem inducat.

## CAUSA.

Vocatur *Paraphimosis*, & imprimis ex violentiori oritur coitu, eoque sæpissime primo, dum ex relaxatione fræni in tantum ex impetuoso coitu præputium retrahitur, ut tumefactum non nihil infra glandem subsistat, & ita paraphimosis inducat.

## CURA.

Cura huius vitii sit præputiis per *Emollientia*, & cùm præputii ut plurimum accidat tumor, per *Discussientia*. Conuenit, e. g. *Forusex lacte*, in quo flores sambucie bulliant. Conuenit etiam cataplasma ex floribus chamomilla, parietaria, rosis rubris, cum lacte coctis & calidè loco affecto applicatis. **FORESTUS** applicat fotum ex Decocto malvæ, violariæ, & hyoscyami propter dolorem: Aut etiam applicat Decoctum rosarum aut meliloti cum farina fabarum & foliis hyoscyami. Quidam commendant ad talem præputii dolorem, si recipiatur cortex sambuci medius, qui coquatur in lacte, quo calidè suffumigetur priapus, & postmodum panno linteo, in isto Decocto intincto, fomentetur: v. g.

*℥℥. Herb. malv.*

*Parietar.*

*℥℥. an. M℥.*

*Rad. alb.*

*Lil. alb. an. ℥℥.*

*Flor. ros. rubr.*

*Chamom. an. p. ii.*

Coqu. in lacte ad consistentiam pulvis, & applica.

*D. S.*

*Puls. emolliens & leniens.*

Vel applicetur *Forusex flor. chamom. sambuci, hyoscyami*, &c. cum aqua calcis vivæ, supra Artic. 1. in *Phimosis* laudatus: cui, si membrum insigniter simul doleat, addi potest croci momentum. Multum quoque prestat commune *Chilrurgorum Cataplasma*, ex pane tritico cum lacte, *Germ. ein Semmel-Brey*: sit exemplum:

*℥℥. Madull. panis similag. in lacte infus. ℥℥.*

*Uitell. ovor. No. iii.*

*Ol. rosac. ℥ii.*

*Croci ℥i.*

*M. f. Cataplasma.*

## ARTICVLVS III.

## DE

## PENIS INFLAMMATIONE.

**P**ertinet huc etiam *Inflammatio Penis*, ut plurimum à causa externa, in qua confert Cataplasma iam dictum ex floribus chamomilla, parietaria, &c. & aqua calcis vivæ cum appropriatis additis. his ferme curatur remediis, quæ retuli *Sect. 1. cap. 1. Artic. 1. de Inflammatione testium*. Unum tantum recensere exemplum: Fuit aliquando puer, qui ad hoc, ut membrum acquireret paulò generosius & maius, inunxit non tantum membrum, sed etiam scrotum, cum lacte esulæ seu tithymali, unde facta fuit insignis harum partium inflammatio cum non levi dolore coniuncta: facile tamen fuit discussa & curata per Fomenta ex lacte, tepidè sæpius iterata: cui, si flores sambuci incocti fuissent, effectus eò præstantior fuisset.

## ARTICVLVS IV.

## DE

## PENIS DOLORE.

**V**ltimò denique impeditur, seu depravatur debita membri erectio ex dolore, dum sc. impensius dolet membrum: Sic ex forti labore in coitu subindè fit, ut doleat, ut etiam intumescat glans, quod vitium insigniter leniunt cicuta folia trita, & per patentem præputii hiatum immissa. Commendat hoc remedium etiam **HEINRICUS** ab **HEER** in *obs. 7.* contra inflammationem glandis crystallinam, in qua glans tumida & quasi perspicua instar crystalli erat cum gravi dolore, dum sc. sumptâ cicutâ, eaque immissâ per patentem præputii hiatum, sedatus dolor, & tumor discussus fuit. Quod si verò anguis sub herba latitet, & gonorrhœa virulenta coniunctus sit Penis dolor ac reliqua hætenus dicta glandis vitia, quod tantum non semper evenire solet, & huic quoque per interna prospiciendum erit, *Purgantia* nimirum, & *Balsamica Terebintbinata*, quæ supra l. 1. ubi de *Gonorrhœa virulenta*, videantur. Optimum aliàs est Balsamum Peruvianum, dum sc. hoc ipsum excipiatur filo crasso, albumine ovi durato, & hoc ipso balsamum Peruvianum infigatur & applicetur: sic enim dolor in virgæ initio à gonorrhœa facile sedatur.

Denique dolet penis non raro ex calculo vesicæ, in quo nihil præstantius est, quam aqua albuminis ovorum, cum lacte mullebræ & camphoræ modico, quæ omnia calice excepta frigida actu vel tepida admoveantur peni, ita, ut membrum huic immittatur; sic namque statim omnem dolorem sedari, Auctor est **ZECHIUS** in *Confil.*

Et hi fuerunt Morbi Virorum, de quibus hæc dixisse sufficiat: Pergo ad Morbos Mulierum.





# LIBER IV.

## DE

### MORBIS MULIERUM.

## SECTIO I.

## DE

### FLVORIS MENSTRVI VITIIS.

**V**T virilis Sexus, simul ac genituræ in eodem sit generatione, singulares suas patitur alterationes, ita & Sexus muliebris, dum ad generandum fit aptus, seu ova in eorum testibus sunt secunda, etiam non minorem in corpore incurrit mutationem. Nam præterquam, quod puberes fiant mulieres, h. e. quod lanugo in monte Veneris efflorescere incipiat, etiam mammae turgescere, seu, ut vocant, fororiari incipiant (*cum sint binæ*) vox gravior fit, & mutationes viris similes patiuntur: sed in specie sibi habent propriam sanguinis per genitalia excretionem, quæ imprimis suam meretur considerationem, & à periodo, quâ ordinatè repetere solet, *fluxus mens-trui*, vel mensium nomine Latinis, Germanis *die Bluhme*, *die Rose*, *die Zeit*, appellatur. Propriam dixi hanc purgationem esse feminis: Nam inter animalia nulum, præter simiam & barbum piscem, similem pati fluxum dicitur. Observata tamen sunt quoque exempla, licet pauca, quod & ipsi viri omni menstruo spatio similem menstruum fluxum per penem passi fuerunt. Exemplum tale præter ZACUTUM LUSITANUM lib. 2. Prax. Admir. Observat. 101. & D. MICHAELIS, etiam annotavit BARTHOLINUS Cent. 5. Hist. 32. item FEHR Tract. de Absinth pag. 138. in specie THIERMEYERUS lib. 1. Consil. pag. 186. & 189. ubi refert mensium excretionem virilem per virgam, omni novilunio redeuntem, cum symptomatibus illis, quæ molestant feminas, si forsitan suppressionem patiantur: Sicuti aliàs interdum periodicus, & mens-truus hæmorrhoidum fluxus in viris æmulatur quasi menstruationes mulierum: cùm & in succulentioribus & habitioribus mulieribus, desinentibus mensibus, post annum ætatis 49. succedat interdum ordinatus mens-truus hæmorrhoidum fluxus; quin & interdum loco mens-truorum suppressorum, quàm mensibus fluentibus intermedio temporis spatio, hæmorrhoidalis fluxus contingat. Prioris exemplum videri potest in HORSTII Observat. pag. 296. & Problem. pag. 91. Posterioris in SENNERTO lib. 3. Prax. pag. 418. qui nempe observavit in muliere cum mens-truorum ordinario fluxu simul ordinarium hæmorrhoidum fluxum, decimoquarto die post menses cessantes supervenientem: ut taceam, subinde cum mensibus etiam fluentes hæmorrhoides; vid. M. A. N. C. Ann. 3. Observat. 22. pag. 3. Ann. 4. & 5. pag. 299. Ann. 6. & 7. obs. 63. & BARTHOLINI Aët. Med. Hæst. Volum. 1. pag. 165. Repetere dixi hunc fluxum singulis mensibus, ut in quibusdam anticipet unam vel duas dies, in quibusdam vero per tot dies etiam postponat: unde illæ priores tredecim hæ tantummodò undecim vicibus, purgantur in anno: Rarum namque est exemplum illud, quod PANAROLLUS Pentec. 2. Observ. 41. refert de muliere singulis mensibus menstrua, sine sanitatis noxa: Conf. M. A. N. C. Ann. 6. & 7. obs. 153. pag. 219. SENNERTUS l. 3. Prax. pag. 418.

Incipit, ut dixi, hic fluxus mens-truorum tempore pubertatis, dum maturæ viro, & ad generationem habiles fiunt: id quod fit ordinariò circa decimumquartum ætatis annum: incipit nimirum quasi motu naturæ critico in secundo septenario, & desinit similiter in septimo septenario, nempe anno 49. ut ut interdum circa duodecimum annum quædam mulieres & puberes, & menstruatæ fiant; & rarum est, quod citius inchoent, aut diutius fluant, quorum tamen exempla prostant. Propria hoc in passu idiosyncrastia subiecti probe est consideranda: nunc enim iuniores, alacriores, spirituosæ, vegetiores, dixerit lautæ utentes, & salaciores, citius

patiuntur hunc fluxum: quæ verò se habent contrario modo, iisdem tardiùs erumpunt. Rara ergo sunt, & quæ ob id ordinario naturæ cursui nihil derogant, quod refert SCHENCKIUS in lib. 4. observ. de puella novenni menstrua: item, quando refert TULPIUS lib. 3. observ. cap. 36. de puella quatuor annorum menstrua: Vid. M. A. N. C. Ann. 4. & 5. obs. 23. Ann. 6. & 7. obs. 63. Ann. 9. & 10. obs. 28. Sicuti è contrà nil derogat, quando iisdem menses ulterius producuntur: quæ ratione HILDANUS in Cent. 4. observat. 63. refert, menses cuidam fluxisse ultra septuaginta annos: sic mulieri septuaginta sex annorum mensium fluxus rediit, statam servans periodum; vid. M. A. N. C. Ann. 9. & 10. obs. 9. pag. 46. sicut & PANAROLLUS de menstruo in vetula diutius durante observationem habet.

Fluunt quidem continuò, nisi quod ordinariò soleant suppressi gestationis tempore, in quibusdam etiam tempore Lactationis: Unde non minùs rarum est, quando quibusdam viraginis seu virilishabitus mulieribus, etiam omninò secundis, nulli unquam fluant menses: vid. M. A. N. C. Ann. 6. & 7. obs. 64. Sic præter SCHENCKIUM PANAROLLUS Cent. 1. observ. 15. refert mulierem quintà vice prægnantem, nunquam tamen menstruatam: Sicut rarum est, quando imprægnatis etiam primis gestationis mensibus iisdem adhuc fluant, imò usque ad partum sine noxa; vid. M. A. N. C. Ann. 9. & 10. obs. 28. Aliàs curiosum est, quod mulier ante matrimonium legitime menses fluxerint, qui post matrimonium omninò suppressi fuerunt, citra ullum tamen sanitatis incommodum, ut refert PLATERUS lib. 1. obs. Non minùs observatu dignum est, quod idem PLATERUS in obs. refert, quod in alia muliere menses suppressi fuerunt, quoties pueros lactaret; sin verò puellas, hi liberè & ordinariò periodo fluebant.

De modo, quo fiat? res nota est ex Physiologia: Nempe fit menstruatio hæc seu sanguinis fluxus per turgescentiam, quandam & fermentationem extraordinariam massæ sanguineæ, propter vim peculiarem fermentativam ab uteri glandulis cum sanguine & lymphâ ab ipsis refluus, toti massæ sanguineæ communicatam, & etiam ipsi lymphæ seminali uteri & prostaticæ concessam: quæ uti aciores facit pruritum Venereum insolitum ferè excitant; ita ratione illius in sanguine turgescentiæ per anastomosen in vasis uterinis exitum invenit. Patet hoc, quia mulieres nunquam sunt salaciores, quàm instante mensium fluxu, & cessante, cùm uberè turgescens sanguis, & rapidius per vasa circulatorius, distendat hæc ipsa; Unde subinde lassitudo artuum, dolores lumborum subinde tensivi, item pulsationes arteriarum in lumbis & circa os sacrum, phlogoses quædam tunc temporis se exhibent, donec ista sanguinis turgescentiâ, apertis tandem vasis sanguifluus in vaginam uteri insertis (nam per uterum nihil fluit) sanguis erumpat, quod denique sufficienter evacuato & ejus turgescentiâ & fermentatio omninò cessat, & vasa denuò subsident ac connivent, donec à novo orgasmo sanguinis denuò aperiantur. Adesse tamen fermentationem sanguinis extraordinariam seu nonnaturalem in menstruatione, præter alia omnibus obvia hoc etiam testatur, quod odor fermenti vulgaris sæpius per nares haustus promoveat mensium fluxum subsistentem, quod uberius facere dicitur, si frustulum ejus, quantitatis castanæ, cum paucis nucis moschatæ assumatur. Unde & notabile est, quod conservæ, si recipiant halitum menstruatæ, desubito acescant: sicut etiam halitus earum vinum & cerevisiam, acescere facit, ob vim talem fermentativam, quæ earum



halitui inest: hinc etiam est, quod Chirurghi in Vulnerum cura & deligatione nullam admittant feminam metu menstruationis, quia earundem effluviis vulnera depravantur. Et quod per fermentationem fiat menstruatio, probat KERGERUS de *Ferm. Sect. 3. cap. 2. pag. 214.* Si enim solâ quantitate efficiente profueret, quotidie tantum derivandum esset, quantum excederet, &c. Vel si cumlaretur tot mensis tempore, ultimis diebus prægrauarentur ejusmodi onere, & fluxus in principio esset maximus. Fermentationem hanc etiam confirmat, quod febrile quid tunc temporis patiantur semellæ, unde & febriam mensuram observavit LINDANUS, id est, talem, quæ singulis mensibus recurreret & ad biduum duraret, quoties menstrua prorumperent: item circa uterum, arteriam portam, & venam cavam ed loci præcipue percipiuntur tensio, dolores atque anxietas, hypochondriorum durities, respirationis difficultas, aliaque mala: Vid. KERGERUS l. 4. pag. 214. Confirmant denique talem sanguinis fermentationem etiam omnia ea, quæ hunc fluxum sistunt, ut omnia acida, quæ hoc ipsum faciunt, quatenus imprimis istam sanguinis turgescientiam fermentativam supprimunt & impediunt, aut subito sistunt, destruendo salia volatilia, & coagulando blandè massam sanguineam: è contrâ, quæ menses stimulant, de natura salina volatili esse debent, & ut plurimum insigniter amariantia, v.g. præter aromata, ut cinnamomum, caryophyllos, &c. excellit castoreum, crocus, myrrha, sabina, aloëtica, hinc Elixir proprietatis, &c. Unde & splen bovis menses stimulare dicitur, ratione virtutis fermentativæ sanguinis in splene residentis: Imprimis ex colocynthide, sive intus assumpta, sive foras Pessorum formâ exhibita, menses insigniter stimulant. Sicuti gaudium, ira, &c. promovent fluxum: ita terror, tristitia, metus, &c. cum impediunt.

His pro fundamentis totius Praxeos pro mensium, vitiis præmissis, *ladytur hæc menstrua excretio* tribus modis:

1. *Quando imminuta est*, ita, ut aut parcius fluant, aut nullo modo appareant.
2. *Quando eadem augetur*, ut uberiori rivo scateat, tam una vice, quam partitis vicibus, i.e. quando quovis mense aliquoties evacuantur.
3. *Quando eadem depravata est*, & non naturali modo cum variis symptomatibus, doloribus abdominis, &c. comitata se manifestat: vel per aliena loca, vel inordinato tempore fluit, vel sanguis adiunctas habet præternaturales alterationes, ut, quando menses decolores, atrii, aut fetidi excernuntur, & qui sunt præternaturales errores circa menstruationem evenientes.

## CAPUT I.

### DE

### MENSIIUM EMANSIONE.

**Q**uod attinet primum vitium: sive imminuta, sive, planè absit menstruatio hæc, vulgò *mensium suppressio*, potius tamen cum LINDANO in *Meletomatibus Emanatio mensium* dici debet; sicut, quando actu fluentes cohibentur, tunc optime mensium suppressionem vocare possumus. Sed in verbis simus faciles, modò constet de re. *Emanatio* ergò hæc mensium est vel *naturalis*, dum post 49. vel 50. annum naturaliter deficiunt; aut *ratione ipsius mulieris status* seu conditionis, dum non observatur in gravidis, utut quibusdam habitioribus primis gestationis mensibus ad medium tempus fluat: item in quamplurimis Lactantibus naturaliter emanat sanguinis fluxus mensiuus: In convalescentibus depique seu talibus, quæ à gravi morbo resurgunt, etiam naturaliter deficiunt; in his enim depauperata massa sanguinea, partim in *quanto*, partim in *quali*, & exhausti plus minus, torpidique spiritus minus apti sunt ad fermentationem mensuram. Item naturaliter deficiunt menses in iis, in quibus alia quædam insignior *evacuatio*, aut sanguinis immediatè in gravioribus vulneribus, aut mediatè sub transmutationis forma, v.g. saniei aut ichoris in ulceribus inveteratis, fit, aut facta est absumptio. Sic refert BARTHOLINUS Cent. 2. Hist. 37. de fluxu mensium suppresso, qui postmodum a pestis & consolidatis quibusdam abscessibus, denuò fuerat revocatus. Hæc & similes

mulieres relinquenda sunt naturæ, nec fatiganda præposere medicamentis, nisi ut *laura dicta* sanguinis copia reconcilletur: id quod taxat FORESTUS lib. 28. observ. 5. in quodam Medico imperito, qui nitebatur evocare menses in puella planè extenuata. Hoc interim est notabile in iis, quæ *ulcera* vel vulnera habent graviora, & quibus ob id fluxus ordinarius plus minus est suppressus, quod hæc istotempore, quo aliàs ordinariò fluere deberent, singulatè quendam in vulnere aut ulcere *alterationem* in pelius semper sentiant: scilicet percipiunt aut dolorem, aut tumorem & incipientem inflammationem, aut copiosorem & abundantiorè fetidæ saniei effluxum, qui, ubi aliquot dies ita duraverit, spontè cessat, donec post mensuram periodum serè redeat usque ad mali curatiorem.

## CAUSÆ.

Quod ergò attinet *Causas*, propter quas menses præter naturam supprimuntur aut emanent: sunt hæc ipsæ vel ex vitio sanguinis ipsius excernendi, vel ex vitio uteri & vasorum, per quæ debet effluere sanguis. Ex uteri quidem, vitio est obstructio & interceptio viarum, adeoque pituita glutinosa ac plus minus viscida vasa uterina obstruens, in causa est: aut quando vasorum in vaginam terminantium *orificium externum* non hiat, vel propter *carnunculas* membranæ nimis densæ unitas, vel quando vagina uteri exulceratur, aut aliâ quadam ratione læsæ, coalescunt parietes, unde fluxus mensium impeditur. Ex sanguinis vero vitio est ejusdem crassities, visciditas, & quicquid hunc ad fermentationem uberiores ac turgescientiam ineptum reddere valet. Utriusque ratione defectus mensium est vel *accidentalis*, qui ex causa fortuita & improvisa evenit, vel *habitualis* qui altius radicans in corpore habeat causas antecedentes. In specie defectus mensium *habitualis* vitio sanguinis fit imprimis ex cachexia seu sanguinis cruditate, ex chylo non sufficienter digesto, & hinc plus minus acido, nec ritè volatilato, in sanguinem ingesto, unde & huius spissitudo, & viarum hypogastricarum infarctus, & sanguinis fixitas, indeque ineptitudo ad turgescientiam fermentativam; quæ cum à particulis volatilibus spirituosius imprimis dependeat, hæc ipsæ, à cruditate eius viscida obrutæ & oppressæ, vim suam exercere nequeunt.

Alii inuertunt potius hoc, dicentes, quod vitium uteri sequatur ex cachexia. Uno nomine: est cruditas acida cum inertia bilis, adeoque defectus acidi volatilis oleosi seu spirituosius: è contrâ excessus acidi fixioris in subiecto viscido sunt causæ, sanguinis fermentationem, & hinc evacuationem mensuram, impediunt, h. e. ut loquitur SYLVIVS, defectus bilis, & pituitæ excessus.

Origo autem huius acidi est ex stomacho: oritur nempe ex chylo non ritè digesto, unde nil magis disponit mulieres ad defectum mensium, quàm *cruditas acida* stomachi, ratione cuius bilis hebetatur, & turgescencia sanguinis fermentativa suppressitur, impeditur, & consequenter mensium fluxus cessat: quin & scorbutus hic non raro suam tragediam ludit, dum femina scorbuticæ spissime, si non totali mensium suppressione torquentur, parè tamen admodum non sine difficultate expurgari solent, quin & his ipsis citra debitum ordinem inordinatè menses fluere solent.

Quoad causas remotas, vitio sanguinis mensium suppressionem, tam habitualement, quàm accidentalem, inferentes: inter sex res nonnaturales sunt primò aeris frigidi susceptio, tam in uterum sub tempore mensium, unde subito sanguinis coagulatio & grumescencia, qui in uasis contractis heret: uti ex casu uel immersione in aquam frigidam sub menstruatione, mensium obstructionem & hinc pleuritidem natam refert TIMÆVS von Guldenklee, in *Casibus* lib. 2. Cas. 7. Hinc rectè Lindanus dicit: nil magis posse sistere fermentationem sanguinis mensuram, quàm frigus. *Dua scilicet potissimum causæ sunt, quæ illud præstant: (1.) refrigeratio pedum, & quidem subtilis; (2.) refrigeratio vehemens ventriculi.* Sin gelidam aquam vel cervisiam tempore fervoris bibant, refrigerando ventriculum percellunt sanguinem, vel potius spiritum, & sistitur fluxus: sic nonnullis bibito lacte acido sistitur, vel pomis acidis. Hucusque LINDANVS: Sic namque observat FORESTUS lib. 18. obs. 2.



3. menſes ex terrore & ſaltu in aqua frigida ſubito reſtri-  
ctos, unde ſummus angor circa præcordia ſecutus fuit; quæ  
ipſa tamen fuit curata per Sudorifera, ita, ut ſpontè poſt-  
modum redierint menſes. His enim ſanguinis fermentatio  
& turgelcentia per modum coagulationis liſtitur, unde ceſ-  
ſante eiſdem fermentativâ turgelcentiâ, & menſtruus ceſ-  
ſat fluxus; idque in ſpecie ſolet noſcere, quando vel inſtat  
excretio menſtrua, vel quando excerni ſolet: Sic namque  
ſubito refrigeratio pedum eo tempore, quo menſes fluunt,  
multùm huc facit: Sic ſi mulieres ſub fluxu menſium,  
lotionibus in aqua frigida indulgent, vel pedes in aqua  
frigida lavant, ſolet menſium fluxus ceſſare, &  
vel imminens, vel fluens ſupprimi. Facit huc etiam ſu-  
bitanea, ceu ſuprà dictum, refrigeratio ventriculi: Sic  
namque TIMÆUS von Guldenkleee in Caſ. 202. ob-  
ſervat menſes fluentes ſuppreſſos ex hauſtu frigidaſ poſt in-  
caleſcentiam corporis, cum atrociffimo uteri dolore. Simi-  
le exemplum recenſet FORESTUS Cent. 1. Obſervat. 3.  
Schol. de puella, cuius menſes cum purgantem tempore  
inſignioris ætus, bibita copioſa aquâ frigida lethaliter ſibi  
menſes ſuppreſſit. Item menſes frigore ſuppreſſos vomitum  
ſanguinis inferentes, vid. in M. A. N. C. Ann. 1. Obſerv. 95.  
pag. 224. Sic ex frigida nive hauſta menſium ſuppreſſionem  
SCHENCKIUS; item ZACUTUS LUSITANUS  
lib. 3. Hiſt. 4. Med. Princ. annotant. Præter frigus ad ſup-  
preſſionem menſium multùm conferunt aſſumpta, inter  
quæ ſunt omnia difficulter digeſtibiliſia, in ſpecie omnia aci-  
da, imprimis mineralia fixa, vitrioli, ſalis, nitri, &c.  
quæ admodum impediunt menſium fluxum, quatenus ſan-  
guinem inſpiſſant, eiſdem fermentationem à volatilibus  
oriundam omninò tollunt, & coagulationem inferunt;  
quod etiam faciunt omnia cruda aut viſcida, ſanguinis fer-  
mentationem impediunt, obtundendo ſal fermentativum,  
ut caſeus: hinc & panis recens furno extractus aut calens  
admodum nocivus eſt puellis & mulieribus, obſtipat ipſas  
ſubito, cum viſcido ſuo lentore promoveat cruditatem ſto-  
machi acidam, & ſanguinis fermentationem inſigniter im-  
pediat: Hinc etiam à Lacte & omnibus lacticiis tempore  
menſtruationis, vel imminens, vel præſentis, abſtineant  
mulierculæ, quoniam lac ſiſtere menſes aptum natum eſt:  
quæ etiam faciunt carnes fumo indurata. Nam cum ex aſ-  
ſumptis digeſtio ſtomachi vitietur ita, ut exinde fiat caco-  
chylia, hinc cacoehymia, & hinc denique cachexia, ordi-  
nariò etiam ex ſanguinis cruditate fermentatio menſtrua im-  
peditur, & hinc cachexia, quam ſpecialiter virgineam vo-  
cant, ſeu febris alba, oritur; hinc ex hac cauſa BARBET-  
TE in ſua Praxi pag. 83. vitium menſium ſuppreſſorum à  
cauſis externis in ſtomacho radicari non ineptè aſſerit. Con-  
firmatur hoc malum ulteriùs, dum ex menſium ſuppreſſio-  
ne pica laborare incipiunt, & varia, imprimis inſolita aut  
inconſueſta, promiſcuè ingerant; tunc enim malum longè  
deterius redditur: Sic namque SCHENCKIUS lib. 4. obſ.  
narrat mulierculam, quæ devorata magna copia prunorum  
menſium ſuppreſſionem & tumorem ventris incurrit, qui tu-  
mor tandem incredibili copiâ offiſculorum poſt annum excre-  
ta ſubſedit, & menſes repeterunt: Sic ZACUTUS LU-  
SITANUS lib. 2. Prax. admir. obſerv. 99. refert quandam  
carbonum voracem ex pica, tandem, cum per decem annos  
menſes fuiſſent ſuppreſſi, curatam per conſervam artemiſiæ  
& menthæ. Denique & animi affectus multùm valent ad  
ſanguinis fermentationem, hinc & craſin alterandam: hinc  
uti gaudium, uti moderata ira, quibuſdam per auctam  
ſanguinis exagitationem menſtrum fluxum crebriùs provo-  
cant; ita contra terror ſubitaneus, triſtitia, mæror, pavor  
ac metus inſigniores, periculòſè menſes imminentes ſiſtunt,  
vel ſubito ſupprimere valent fluentes: Sicuti notum etiam  
eſt, quod hæmorrhagia narium ſubito incuſſo terrore ſu-  
bindè ſoleat compeſci. Obſervandum tamen, contrarios effe-  
ctus ſubindè ab iſdem animi pathematis ſub menſtruatione  
obſervari, ita, ut ab iſdem nunc intendatur, nunc cohi-  
beatur fluxus: Conſ. SYLVIVS lib. 3. Prax. pag. 84. 85.  
ſeq. cap. 3. ſ. 263. ſeq. Fumi carbonum multum nocent, ſi  
foveant ſe mulieres per inferiora: vid. Rodericus à Caſtro  
pag. 76. Vitio uteri ſit menſium ſuppreſſio, vel vaſorum,  
vel uteri oriſiculi culpa. Vaſa quidem obſtruuntur à mu-  
coſa pituita inſpiſſata, & ſub menſtruationis declinatione  
ſenſim condenſata, vaſa inſarciunt: Oriſicium autem in-  
torum, idque frequentius, rariùs autem externum, uteri  
occluſum eſt cauſa ſuppreſſionis menſium: Obſervatum  
nempe fuit ſubindè, clauſum fuiſſe oriſicium externum uteri  
per membranam, nunc integram, ubi ſimul urina ex-

Et in null. Oper. Tom. II.

cretio læditur, nunc in medio ſic perforatam; eſtque talis  
membrana nihil aliud, quàm hymen adeò decantatum, præ-  
ter naturam auctum ſeu coalitum; de quo hymene quaſvis  
controverſias optime decidere videtur PANAROLLUS  
Pent. 5. Obſerv. 50. quod nihil aliud ſit, quàm membrana  
tranſverſa, aliquando tenuior, aliquando craſſior & carno-  
ſior propè collum veſicæ, in vaginæ initio: quæ, ſi labia  
tantisper deducantur, lunaris figuræ apparet; ſi verò labia  
concidant, & hymen corrugetur, carunculas quaſdam re-  
præſentare.

Denique vulnerati, aut excoriati, aut exulcerati plus  
minùs vaginæ parietes ſub conſolidatione ſubindè coaleſcunt,  
& ita vias conſuetas occludunt; ſicut à pinguedine, cicatri-  
ce, vel tumoribus comprimentibus menſium ſuppreſſio ob-  
ſervata fuit. Conſ. TIMÆUS von Guldenkleee lib. 4. caſ. 7.  
Quod etiam pertinent læſiones genitalium poſt partum vio-  
lentum, ſubindè præternaturalem eorundem coalitum infe-  
rentes: Vid. SEVERINUS Traſt. de Efficaci Medicina.  
pag. 185. PLATERUS lib. 1. obſerv. BARTHOLINUS  
Cent. 2. pag. 227. HILDANUS Cent. 6. obſ. 67. Sed de hu-  
iuſmodi Atretis ſeu clauſis & velatis plures & varias Obſer-  
vationes vid. in SENNERTI Praxi lib. 4. Part. 1. Sect.  
2. cap. 3. pag. 11.

## D I A G N O S I S.

Quod attinet ſigna diagnofica: menſes ſuppreſſos, nec ri-  
tè fluere, manifeſtatur imprimis ex relatione ægrarum, &  
ex ſymptomatis concomitantibus. In virginibus enim ſan-  
guis ſuppreſſus per venas hinc inde vagans, per inſueſta non-  
nunquam & aliena loca expurgari ſolet; imò non raro ſe-  
bres inferit: item color corporis in talibus inſigniter ſolet eſſe  
mutabilis, dum pallidaſ ſiunt, ſub tumidaſ, & colore ad li-  
vorem inclinante; ſupervenit tandem febris, quam vocant  
albam ſeu febrem virgineam.

Probe autem cognoscendum eſt, an menſes ſint ſuppreſſi  
naturaliter ex gravidatione? an verò præternaturaliter ſup-  
preſſi?

Quibus emanent præter naturam vel morboſè, præter Ob-  
ſervationes proprias conqueruntur de difficili anhelitu; quan-  
do nempe quodammodo moventur, præſertim adſcendendo,  
mox ſuffocatio imminet: Uteriùs patiuntur laſſitudinem,  
in omnibus artubus hinc inde, in ſpecie circa lumbos dolores  
tenſivos graves percipiunt, hinc præcordiorum anxietates,  
pedetentum color corporis floridus perit, labia pallida ſuper-  
veniunt, ſiunt apparenter cachectica, oculi tumunt: ſuper-  
venire ſolent ſtomachi affectus, cibi faſtidium, nauſea, vo-  
mitus, pica, & tandem perfectè cachectica evadunt.

Sed hæc per ſe facile patent.

Magis cognoscenda eſt differentia cauſarum, an vitio ſan-  
guinis, non debite turgelcentis? an verò vitio uteri & ob-  
ſtructorum vaſorum ſupprimantur menſes? Si ſanguinis  
non debite turgelcentis vitio menſes emanent, nulla ſym-  
ptomata abdominis aut lumborum, quæ menſtruationem  
antecedere ſolent, obſervantur: alia tamen ſymptomata,  
quæ ſanguinis labem oſtendunt, adſeſe ſolent, in ſpecie  
urina cruda, alvi ſegnities, ac ſymptomata hypochondria-  
ca, & procedente tempore nullam penitus ſtata periodo al-  
terationem in corpore ampliùs percipiunt. Sin verò ſaltem  
uteri eiſque vaſorum inſarctorum vitio deficient menſes,  
præſata ſymptomata conſueto tempore vigeant, quæ oſten-  
dunt adhuc ſanguinis impetum & motum excretorium, dum  
ſanguis turgelcens, quatenus conſuetis viis effundi nequit,  
alibi impetu ſacto per anastoſin eſſluit, unde nunc vomitu-  
ſcruentus, nunc hæmoptiſis ſuperveniunt: Exempla  
vid. in M. A. N. C. Ann. 1. obſ. 95. Ann. 6. & 7. obſ. 49. Item  
varia pathemata in his ſtatis temporibus, quibus aliàs fluere  
menſes debent, percipiunt ſemina: frequentes ſunt dolores  
lumborum circa vaſa lumborum, & quæ ex ramis iliacis  
oriuntur.

Conqueruntur ulteriùs de ſenſu cuiuſdam tenſionis circa  
regionem pubis: Item percipiunt pulſationes hinc inde in va-  
riis corporis locis, nunc circa hypochondria, nunc in artubus;  
adſunt murmura, borborygmi, dolores lancinantes in lumbis,  
qui oſtendunt ſanguini tunc urgentem fermentationem &  
turgelcentiam menſtrua, quæ propter impedimenta in-  
vaſis non poteſt emitti, unde quandoque in talibus ſanguis  
per loca alia eſſluere ſolet, interdum etiam per excretionem  
cutaneam: quæ ſemper augentur, quoties tempus men-  
ſtruationis inſtat, vel quando fluere debent menſes, & ſi  
quid forte eſſuat, mucoſum albidum excernitur.

Fff 2

Hæc



Hæc ostendunt deficere menses propter causam obstru-

Sed quia nusquam tuta fides apud mulieres, & ipsæ interdum incertæ sunt, an sint gravidae? an tuerent præternaturaliter menses deficient? subinde solent interrogare Medicos de hac re. Queritur ergo: an dentur signa, quibus possit demonstrari, an talis mensium emanatio sit ab ingruvitate? uel an ab alia causa oriatur? Signa certa distinctiva non habemus, quia sunt admodum similia. Dicit LINDANUS: Soleo iubere, ut expectent medium gestationis tempus, quo certa possint esse propter motum infantis: quod si se non prodant, nihilominus difficile est iudicare, quia sunt, qui motum fetus non percipiunt, etiam ultimo mense, & nihilominus pariunt. Summa: res est periculosa, plena, facile credere mulieribus. Itaque semper cauti estote. Habet tamen suppressio naturalis illustra etiam si, quæ, sed non absolute vera; possunt enim etiam cum conceptu esse: itaque oportet Medicum valde circumspicuum esse &c. Nam pathemata, quæ insequuntur gravidationem, nempe appetitus prostratus, nausea, vomitus matutini, picæ, item lac in mammis, &c. hæc omnia etiam observata fuerunt in secunda suppressionem mensium, etiam in virginibus sine graviditate: vid. THEODORICUS in Paletudinario pag. 128. HIPPOCRATES equidem Sect. 5. Aph. 39. hanc suggerit cautelam: quod nempe mulier, si nec gravida sit, neque puerpera, habeat verò lac, quod eadem deficient menses. Nihilominus tamen hoc ipsum requirere est fallax; Prostant enim multa exempla virginum, quibus, ut dixi, illibatis, mensibus etiam fluentibus, lac tamen genitum fuit: Imò BARTHOLOMÆUS in sua Anatomia refert exemplum cuiusdam familiæ, cui hoc fuit hereditarium, ut omnes virginæ, simul ac puberes sunt, lac generent: Huic etiam GALENUS assentit in Comment. in Hippocratem, qui licet id raro eventire scribit, tamen aliquando fieri posse concedit: Scribit etiam ALEXANDER BENEDICTUS lib. 3. Anat. cap. 4. se vidisse mulierem, cui, cum virgo esset, quoniam insecunda erat, menses sublestant, lacte mammarum semper disfluxerint: Et CHRISTOPHORUS à VEGA Comm. ad Aphor. Hippocratis refert, se vidisse puellam Burgensem, cui mensibus suppressis lac in mammis inerat. Raro quidem accidit, ut virginæ lac generent, & propterea, si aliquid, quæ virginem se prædicat, lac in mammis appareat, haud facile fides habenda, sed diligenter inquirendum, annon & alia conceptionis signa adsint? Interim Hippocrati & experientiæ non est contradicendum; rationi enim non adversum videtur, virginæ quoque lac in mammis habere posse. Fallibile quoque est signum quando dicunt: percipere motum fetus; nam quæ habent sanguinem ferocem, ex propter aquam, in qua fetus quasi innatat, tardè percipiunt motum fetus.

Propterea cautissimus, necesse est, sit Medicus, ne gravidam curet tanquam eam, cui menses deficient morbose, nec viæ, præterquam post aliquot mensium cursum certus de ingruvitatione, vel præsentem vel deficientem, esse potest: Ubi ergo sumus incerti, possumus dare Martialia, quæ gravidis non nocent.

Certum est, quod cibi fastidium, aut etiam pica, sit admodum suspectum signum gravidationis, ita, ut ubi concurrat cum mensium suppressione, virgo quæ fuit, tanquam femina tractanda sit, juxta HIPPOCRATEM Section. 5. Aphor. 61. Si mulieri purgationes non prodeant, neque horrore, neque febre superveniente ubique fastidium accidat, tum prægnantem esse putato.

Alias ordinaria signa, quæ naturalem suppressionem mensium sequuntur, sunt serè ejusdem conditionis, quàm quæ sequuntur graviditatem. Hæc tantum est differentia in paucis quibusdam, quod nempe

1. In gravidis successivè symptomata circa primas vias mitescant, venter attollatur, mammae turgidæ fiant; quibus verò morbose suppressi sint menses, semper magis magisque in deterius labantur, cachecticæ evadant, pedes intumescant.
2. Quibus præternaturaliter suppressi sunt menses, illi, pallor non tantummodò in facie, sed etiam in toto corpore, cum tumore quasi inflativo supervenit.
3. Quod appetitus in gravidis ultra tertium mensem non soleat esse prostratus: sin verò fastidium sit perpetuum, magna est suspicio suppressionis præternaturalis.
4. Capitis continui dolores, & ipsi suppressionem præternaturalem arguunt.

5. Perpetuæ in lumbis gravitates & pulsationes, aut etiam in aliis corporis partibus insoliti arteriarum motus, similiter præternaturalem suppressionem arguunt.
6. Crebriores vicissitudines seu mutationes caloris, & frigoris per totum corpus, etiam præternaturalem suppressionem mensium innuunt: imprimis quibus deficient menses propter impedimentum venarum uterinarum, superest tamen adhuc motus & turgescencia sanguinis ad excretionem apri, tales phlogosi vagi solent simul torqueri: hincque illisdem modis dari convenit volatilia oleosa, olea destillata, nam sic magis intenduntur phlogoses.
7. Respiratio anhelæ & admodum difficilis ad levem etiam corporis motum, similiter non ex postremis est signis, quæ præternaturalem innuunt suppressionem.
8. Pulsus ibidem frequens, inæqualis, obscurus, interdum quodammodò deficiens, etiam præternaturalem innuit suppressionem.
9. Si in tempore non succrescat abdomen, infantes esse puellas certum est.
10. De hoc imprimis solent esse sollicitæ mulieres, an per urinas etiam possit cognosci gravidatio? Mulieres enim, simul ac in virginibus suppressionem mensium deprehendunt, statim urinas Medicis inspiciendas afferunt. Veteres imprimis secundum AVICENNAM, affirmant, ex urinis hoc posse videri. Avicennæ dogma est, quod certum impregnationis signum sit, si ineunte impregnatione excremantur urinae subalbidæ, tenues, & cui grana innatent quædam instar cottæ carminatæ (vel sicut gossypium pexum); quod tamen ab omnibus Medicis, etiam expertissimis, tanquam vanum rejicitur. Probabilius procedit in hoc puncto GABELCHOVERUS Cent. 1. Cur. 55. in Annotat. ubi dicit: si urinae in iis; quibus suppressi fuerunt menses, omni ferè labe vacarunt, & ferè ex toto naturales fuerunt, tunc conceptus spem has ipsas urinas fecisse; sin verò præter naturam suppressi fuerint menses, hoc ipso vix fieri posse, quin mutentur, ac præter modum subinde aut tenuiores, aut pallidiores, ac flammæ, interdum simul crassæ ac torbidæ, fiant urinae.
11. Denique absentia tumoris uterini, qui gravidis paulatim magis magisque contingit: Conf. LINDANUS.

Hæc de signis mensium suppressionis diagnostica.

## P R O G N O S I S.

Quoad Prognosin: menses sistuntur vel in fluxu, aut accidentaliter, vel supprimuntur ante fluxum: Suppressio mensium accidentaliter faciliè curabilis est, modò maturè occurratur; habitualis verò tardè, & subinde difficulter curatur. Suppressio in ipso fluxu aut accidentaliter gravis & periculosa subinde symptomata post se trahit; vid. HIPPOCRATES lib. 5. Aphorism. 57. & lib. 1. de M. M. T. 34. differtem nempe anhelitum, lassitudinem tensivam totius corporis, sanguinis sputum, gravissimas cephalalgias, dolores abdominis, lumborum; imò etiam periculosa uterina mala, tumores inflammatorios aut scirrhusos, inflammationes, abscessus, ulcera, &c. vid. HILDANUS Cent. 2. Observat. 46. 62. 63. & 64. convulsiones manuum; vid. SALMUTH. Hist. 3. obs. 28. quæ omnia maturam urgent curam.

In habituali mensium suppressione quò diutius suppressi sunt, eò difficillius, sæpè etiam nunquam, malum curatur, & tales mulieres successivè cachecticæ, hinc leucophlegmaricæ evadunt: non quòd cachexia sit effectus deficientium mensium, sed quòd cachexia incipiens inserat menses deficientes. Quibus ergo deficient cachexia incipiente, huius redditur confirmata.

Morbi, quibus supervenit mensium emanatio, redduntur deteriores, in specie chronici; non solent rectè curari, nisi simul promoveatur mensium fluxus; est enim lerna malorum, adeò, ut inde tantum non omnes muliebres affectus excitentur & oriuntur.

Unde quilibet Medicus, simul ac vocatus fuerit ad mulierem, querere debet de statu mensium eorumque fluxu: nam



ex suppressis mensibus cachexia, hydrops, ulcera partium varia, asthma, & anhelationis difficultas, ventriculi & hypochondriorum pathemata, melancholia, &c. imò tandem ipsa mors, ingruit.

Rectè monet PRIMEROSIUS lib. 1. cap. 2. quod certum de mensium suppressione iudicium ferri non possit, cum pro varia ætate, crasseos, & reliquarum circumstantiarum ratione quædam mulieres facili, quædam nunquam curentur; facilius enim v. g. curantur, quibus menses à plethora, & hæmorrhagia suppressi, quàm à cruditate massæ sanguineæ; sicut & hæc facilius curatur, quàm quæ à scirrho uteri.

Quæ aliàs angina laborarunt, his propter menses suppressos facili redire solet.

Quædam & hirsuta sunt toto corpore; imò quibusdam barbam erupisse, & viris eas similes factas, observatum.

Et quidè magis læduntur mulieres, si penitus suppressi sint menses: sitamen per aliam convenientem viam sanguis, v. g. per alvum, nares, &c. evacuetur, minùs læduntur: Hinc HIPPOCRATES Sect. 5. Aph. 33. Mulieri menstrui deficientibus sanguis à naribus profuens, bend est.

Denique urina nigra in mensibus suppressis bonum signum est: vid. JOEL in Praxi T. 5. de Febr. Sect. 2. pag. 64.

### C U R A.

Quod attinet curam mensium suppressionis: in hac ante omnia

1. Ventriculi chylosi imprimis est rectificanda.
2. Sanguinis cruditas volatilibus salinis aromaticis est corrigenda.
3. Humorum vasa uterina obstruentium visciditas iisdem incidenda; &
4. His simul adjunctis appropriatis fermentatio menstrua stimulanda, idque nunc in-nunc Externis.

Quod si à causa externa de subito restringantur menses, tunc labes inducta emendanda, in specie sanguinem solventibus & attenuantibus, fluxusque debitus appropriatis revocandus.

Pro scopo primo, nempe chylosi rectificanda, conveniunt Vomitoria, hinc Aromatica volatilia: Pro secundo scopo conveniunt Martialia, & volatilia oleosa aromatica, quæ sal volatile oleosum sanguinis & bilis intendunt: Pro scopo tertio conveniunt imprimis gummata, gummi ammoniacum in specie, & hinc Mercurialia, imprimis Mercurius dulcis: Pro scopo quarto conveniunt appropriata, & quæ per experientiam sunt cognita, quæ menses stimulant; quæ tamen ut plurimum vi acida destructiva sanguinem dissolutum solvent pellere.

Pro his scopis imprimis, ubi diutius suppressi fuerint menses, obtinendis, ulterius observandum:

I. Nunquam danda esse specifica menses moventia in confirmato malo, nisi præmissis universalibus, adeoque non sunt ciendi menses, nisi prius mundatæ sint primæ viæ, & correctæ sit massa sanguinea: Nam frustra adhibentur omnia menses ciencia, nisi correctæ fuerit massa sanguinea, & restituta debita fermentatio, tam chylicatoria, quàm sanguificatoria.

II. Antequam menses moveantur, prius consideretur: an fluere debeant; ratione nempe constitutionis subiecti; nam emaciatis, aut à morbo resurgentibus, aut quæ nunquam viderunt menses, non, nisi cautè iidem stimulandi sunt, aut potius penitus relinquendi. Conf. HARTMANUS Prax. cap. 219 §. 2. & 3. ubi imprimis monet, curari non debere, quæ menstruationem nunquam habuerunt. Nam sæpè fit, ut virgo 18. vel 20. annorum nondum menstruatæ sit, consulitur Medicus; si quoad cetera in omnibus sit sana, non debet curare, quamvis menses hætenus non processerint. Menstruatio enim est opus naturæ, hæc cessante, quid agat Medicus? Nisi igitur gravia ad sint symptomata, curam omittat. Sæpè fit, ut virgines vel ter expertæ menses sint, & emanant per vias plurimas; quæ, si sanæ sint, nec incommodum grave sentiant, relinquendæ, & si quid agendum, solis aromaticis & roborantibus procedendum, nempe cinnamomo & similibus, ut dicie LINDANUS.

III. Tunc demùm menses stimulandi sunt & provocandi, quando statutum & naturale fluxionis aliàs consuetæ est Ettemull. Oper. Tom. II.

tempus. Adeoque probè faciendæ est computatio, quando iidem naturaliter redire debeant, ut tunc propinentur remedia: e. g. sit mulier, quæ per semestrem spatium fluxum non habuit, ubi non usurpanda sunt appropriata, nisi præmissis Evacuantibus, & acidum absorbentibus, sed tunc temporis usurpentur appropriata, ubi calculo factò deberent fluere menses; alias enim quocunque tempore usurpata sunt frustranea. Sed quando hoc punctum seu tempus latet ob nimiam diuturnitatem suppressionis, interrogandæ sunt, annon singulare interdum in corpore percipiant sanguinis motionem & agitationem? v. g. annon percipiant certo tempore insolitos tensivos dolores lumborum, aut etiam pulsationes in locis vicinis? aut annon interdum extraordinarias phlogoses, aut febriles effervescencias, aut corporis incallescencias aut effervescencias percipiant? Quando enim certis quibusdam temporibus talia eveniunt, certum est, eadem provenire à turgescencia sanguinis menstrua, quæ urget quidem excretionem, sed non sufficiens est, adeoque tunc temporis imprimis stimulantia sunt propinanda. Quod si verò ob confirmatum malum nec talia percipiuntur, monent Practici, quod convenientissimè dentur specifica tempore novilunii, mox scilicet post peractam conjunctionem Lunæ marium, præmissis præmittendis; hoc enim ipsam observavit optimo cum successu RULANDUS in sua Praxi & Obs. pag. 285. & tunc simul temporis sub lunæ incremento turgescences, & quasi spumefacti humores facilius obsecundant.

IV. Inter Universalia eminent imprimis Evacuantia, & hinc venesectio. Evacuantia sunt tam per superiora, quàm per inferiora. Nam vomitus, præmissis quibusdam digestivis, mirè convenit, sub principio curæ provocatus, aut etiam interdum repetitus, ad evacuandam ventriculi & primarum viarum saburram, sive instituat per Antimonialia, sive per Asarina, de quibus alio loco & tempore plura. Uno nomine: cura talis affectus eadem est cum cura cachexiæ, cui tandem adiungantur appropriata menses pellentia.

Hinc subministrantur Purgantia: Nam Purgationes, præsertim aciores, & in specie colocynthis & helleborus niger, simul quoque menses stimulare, ac uterum sollicitare solent, quia, dum dejectiones promonent, etiam vicini uteriqueque vasorum vim expultricem sollicitant, ut menses revocentur. Propter hæc etiam Purgantia iis, quibus nimium fluunt menses, aut etiam in mulieribus gravidis, non, nisi cum summa cautela, sunt administranda, ne scilicet in his per hæc menses nimis moveantur; & in illis, quibus subliterunt, plus sæpè catharticeis, præsertim si ea, quæ menses movent, simul commisceantur, quàm aliis, quæ tantum menses vi propria movent, efficitur. Purgatio talis raro fit confestim, potius successivè & per epiciasin: in quem finem conducunt præsertim noduli in vino, aut etiam pilulæ, tam usuales, quàm etiam his similes magistræ, præsertim cum gummatis concinnatæ, de quibus supra l. 1. ubi de Malo hypochondriaco.

Hæc inter Purgantia eminet in specie aloë & aloëtica, helleborus niger, qui non sine successu, in nodulis in specie, usurpatur; Nam omnia helleborata valdè profunt, unde etiam in specie ejus Extractum cum vino paratum confert, permixtum cum Mercurio dulci: Item Colocynthis, & omnia ex colocynthide parata. HELIDÆUS PADUANUS pag. 176. mirè commendat turpethum, & ex hoc parata remedia purgantia; unde species diatubith cum Rha-Barbaro à ʒi. ad ʒj. commendantur in decocto pulegii. Præterea pilulæ de tribus Russi (ex aloë, croco, myrrha, cum gummi ammoniaco) conf. WEDELIUS de Medicamento. Facultat. pag. 191. Item pilulæ de hiera, cum agarico, pilulæ scetidæ, & de asa foetida, de sagapeno, mastichinæ, pilulæ aloëphanginæ cum extracto alhandal acuatæ, pilulæ expertæ Bartholini ex hiera simplici cum extractis agarici, castorei, aristolochiæ longæ, sabine, myrrhæ ruaræ, & oleo destillato succini ac cinnamomi: quarum salutarem effectum sæpè se expertum fuisse asserit Centur. 5. Histor. Anatom. 100. pag. 186. Præter quæ Purgantia etiam diuretica vel fortiora, vel aliquandiu continuata, menses promovere solent: Conf. M. A. N. C. Ann. 6 & 7. Obs. 5. pag. 16. In quem finem, præmissis præmittendis, præsertim Martialibus, frequentem usum quibusdam robacrarum juniperi suasi cum successu; gummi enim hoc resina volatili acri aromaticâ impregnatum multum confert. His Purgantibus commodè præmittuntur pulveres digestivi salini, quales videb. supra libro primo ubi de Cachexia:



- ℞. *Arcan. dupl. Myrs.* (quod est egregium) ℥ss.  
*Croci Martis cachect.* ℥ii.  
*Sal. tartari* ℥ss.  
 M. f. Pulvis.  
 Div. in 2. part. æqu.  
 D. S.  
*Pulvis digestivus.*

His subnectuntur Purgantia: V. g. sint Pilulæ usuales ex Purgantibus & Alterantibus.

- ℞. *Gumm. ammon. cum aceto sol. & inspiss.*  
*Extr. belleb. nigr. an. gr. xv.*  
*Cassor.*  
*Extr. croci an. gr. lii.*  
*Troch. alband. gr. li. vel lii.*  
 cum f. q. *Olei terebinth. vel succin. f. Pilulæ.*  
 D. S.  
*Pilula aperitiva pro una vice.*  
 ℞. *Massæ pilular. færid.* (nam hæc sunt appropriatæ)  
 ℥i.  
*Gumm. ammon. in aceto squill. sol. (egregiè incidit viscida)* ℥ss.  
*Extr. troch. alband. gr. lii.*  
 cum f. q. *Olei destillat. succin. f. Pilulæ.*  
 D. S.  
*Pilula laxativa pro aliquot dosibus.*  
 Vel  
 ℞. *Massæ pilular. de hier. cum agar.*  
*Mercurii dulc. risè prep. an. gr. xv.*  
*Extr. troch. alband. gr. ii. vel lii.*  
 cum f. q. *essent. cassor. f. Pilulæ.*  
 D. S.  
*Pilulæ laxativæ pro una vice.*  
 ℞. *Extr. hier. cum agar. gr. xli.*  
*Scamm. sulphurat. gr. ii.*  
*Extr. troch. alband. gr. i.*  
 cum ess. *absinth. f. Pilulæ.*  
 D. S. ut antè.  
 ℞. *Extr. panachym. Croci, vel Catbol. ℥i.*  
*Gumm. amm. in aceto sol. vel sagap. ℥ss.*  
*Extr. croci,*  
*Cassor. an. gr. v.*  
*Troch. alband. an. gr. iv.*  
 cum f. q. *Olei succini f. Pilulæ pro aliquot dosibus.*  
 D. S.  
*Pilulæ laxativæ pro aliquot vicibus.*

**LINDANUS** commendat oxymel helleboratum à ℥i. ad ℥ii. in potionibus convenientibus ac Decoctis usurpatum. **BARBETTE** in sua Praxi, ubi de Mensium Suppressione, habet elegantes pilulas, ex gummi ammoniaco paratas cum aliis, quæ sunt admodum egregiæ in mensium suppressione, quas videatis.

De his & similibus capiat ægra dosim omnibus 4. vel 5. diebus: tempore verò intermedio in usu sint proficuo Noduli vino infundendi ex alterantibus aromaticis; v. g.

- ℞. *Rad. angelic.*  
*Levyl. vel men. an. ℥ss. ad ℥i.*  
*Galang. ℥ii. ad ℥ss.*  
*Fol. rorismar.*  
*Marricar.*  
*Sabin. an. M. i.*  
*Bacc. lauri, vel juniperi rec. ℥vi. ℥i. ad ℥ss.*  
*Cinnam. acut. ℥ii. vel lii.*  
*Macis ℥i.*  
*Croci ℥ss. ad ℥i.* (est enim potens, & levis in pondere)  
*Sal. tartari* (loco stimuli pro extrahendis Vegetabilibus) ℥ss. ad ℥ii. vel ℥iii.

Incisa & contusa includantur nodulo:

D. S.

*Nodulus mtricalis aperitivus.*

Qui pro scopis alterativo simpliciter infundatur in vinum, & de quo quotidie, mane ielund stomacho, & à meridie per bihorium antecenam, hauriatur bonus haustus.

Vel

- ℞. *Rad. caryophyll. ℥i.*  
*Enulæ,*  
*Feniculi an. ℥ss.*  
*Com. absinth.*  
*Card. bened. vel cews. min.*  
*Fol. rorismar. an. M. i.*  
*Cort. citri,*

- Cort. Aurant. an. ℥lii.*  
*Sem. 4. cal. min. an. ℥ss.*  
*Bacc. juniperi ℥ss.*  
*Galang.*  
*Gingiber. an. ℥i.*  
*Sal. tartari ℥ii.*

Incisa & contus. misc. infundantur in vino.

Convenientius est, si omisso sale tartari, nodulus infundatur in vinum chalybeatum, seu in quo limatura chalybis candefacta aliquoties fuit extincta; sic namque Marsipforum Vegetabilium activitatem egregiè adjuvat.

- ℞. *Herb. artemis.*

*Puleg.*

*Rorism. an. M. i.*

*Rad. angelic. ℥vi.*

*Cinnam. ℥ii.*

*Croci ℥i.*

Incis. & contus. includ. Nodulo, cui affunde

*Vini Rhenan.* in quo crebrius chalybis candefactus extinctus fuerit, Mens. ii.

Conf. **HARTMANNI** *Prax. Chymicæ. c. 169. §. 2. & 971. §. 8.*

Si Nodulos hos volumus reddere laxativos, addi potest senna, radix hellebori nigri, quæ singularis est in mensium affectibus, radix Rha. Barbari, bryoniæ, &c. v. g.

- ℞. *Rad. belleb. nigri crudi ℥ss. ad ℥ss.*

*Fol. senn. sine stip. ℥ss. ad ℥vi.*

*Sem. cartham. contus. vel rad. bryon. ℥ss.*

Quæ superioribus addita cum sale tartari corrigenda extraheadaque Purgantia, infundantur, ut dixi, in vinum.

Vel

- ℞. *Fol. senn. sine stip. ℥ss.*

*Rad. belleb. nigri ℥vi.*

*Rha Barb. el. ℥lii.*

Incis. & contus. misc.

V. **PACTA** hac corporis preparatione & purgatione venæsectio est salutaris, & auxilium in provocandis mensibus. Verùm disquisitio est, quando, & ubi, convenit venæsectio? quæ lites faciliè decidendæ. Res ut pateat, (1.) aut expectantur menses, qui nunquam aliàs fluxerunt: pro talibus iuvantibus venæsectio. Sufficiunt talibus Balnea & Incessus, vel particularia pediluvia, seu magis universalia semicupia, junctis simul appropriatis.

Vel (2.) Revocandi sunt menses, quando subsistunt, & diutius à fluxu cessant, sanguis coærvatur, & coærvatus tardius circulator, & sic mille malis infert: adeoque in talibus, in quibus quasi plethora præsupponitur, & dolor gravativus artuum, difficilis respiratio, &c. adest, in talibus necessarium est, instituere evacuationem per venæsectionem. Sed quæritur, in quo loco sit instituenda? an in brachio, an in crure? Ut plurimum in hoc conveniunt Practici, secundam esse imprimis venam saphenam, quam ob id etiam uterinam vocare solent: Sed præ cæteris omnibus hac in parte accurata est doctrina **LINDANI**, qui duo distinguit tempora in fluxu mensium, deficiente, in quibus vena secanda; nempe vel instar mensium fluxus; vel actu fluxus menses, & quacunque occasione imminuuntur aut sistuntur. Jam ergo optimo consilio vena est secanda in brachio ad provocanda menstrua fluenda, seu dum imminet fluxus; sic enim auspiciato brevi post menses superveniunt: vid. *M. A. N. C. Ann. 1. Obs. 6. pag. 24. c. 8.* egrè cuidam sub mensium difficultate menses instant, cui pro facilitando mensium fluxu aliquot dies ante illum secatur vena in brachio, pro ventilatione seu liberiori sanguinis circulo conciliando: Nam si secetur in pede, periculum est, ne sanguis concitatore fluxu ad inferiora tractus, stagnet circa vasa uteri, & menses supprimantur.

Aut (3.) revocandi sunt menses jam actu, sed non sufficienter, fluentes (nisi sit impedimentum in conformatione vasorum) aut casu, v. g. refrigerio, terrore, &c. in fluxu suppressi, aut iamiam fluere volentes, ad ea revocanda commodè saphenæ aut alius apparentis sit sectio in pede vel crure; quia in eam regionem, in qua vena aperitur, sanguis rapidiori motu solet ferri propter vasa liberiora, & maius requirit spatium, &c. Merentur considerari, quæ docet **LINDANUS**: „Venæsectio ante balneum fieri debet. Omnes autem venæsectiones fieri debere in saphena dicunt, quàm propterea uterinam appellant: sed me usus diu docuit, nihil magis nocivum esse, quàm vena saphenæ sectionem ante balneum.



*balneum*. Famina quadam ex gravi febre decubuit: Hanc viſitavit meus parens cum D. Pulpio, & interrogabant; an menſes inſtarent? reſpondit ægra, abeſſe adhuc ſex dies: ob id noluerant ſaphenam incidere, ſed potiùs aperuerunt venam brachii: Reduntibus altero die Medicis, narrat mulier, menſes eiſ reſluxiſſe, ob id, dicit LINDANUS, ſecaviſmus venam ante tempus ordinarium in brachio, & intra 24 horas ſequēbatur menſtruatio, ita, ut iam velim gravi pignore certare, ut, ſi fœmina ſana, cui triduo vel quatrīdno menſtruū inſeſt, & intra 24. horas purgabitur. Fundamentum deſumit ab eſſe veſcentia ſanguinis, dum ſcilicet menſes fluxuros præſentunt fœminæ, imprimis peregit, ſi fœminis accidat, ut menſtrui tempore laborent ſimul febre, unde tunc venam brachii ſecandam monui. & brevi poſt ſecuta menſtruatio; in pede verò nunquam ſecandam eſſe venam, niſi aut menſtruū aëtu fluat, aut ipſe fluxus ſuppreſſus fuerit, & tunc non fallit; nam viæ eo tempore laxæ ſunt. Ratio autem venæ ſectiōnis in brachio eſt, quod inſtantibus menſibus, dum turgeſcit & rareſcit ſanguis, tunc in eo eſt omnis natura conatus, ut deorſum verſus deducat ſanguinem: itaque, viæ cum ſint exiles, non ſtatim etiam aperiri poſſunt, ſed potiùs diſtendunt quodammodo ſanguinis fluxum ſiſtunt. Quando itaque per ſaphenam apertam inferiùs ſanguinis promovetur impetus, plus ad uterum ducitur, & ita, malum augetur; ſi verò aperta brachii vena ſurſum non nihil revellitur, liberantur viæ ab oppreſſione, & ſanguis faciliùs fluit. Nunquam certè experiemini ſaphenæ ſectiōnem menſes provocare, niſi aut aëtu ſtuentes, vel ex frigore, vel ex pauore fuerint reſtriſti. Egedem leges obſervandæ ſunt circa puerperas: interdum inſtante labore partus, aut in ipſo partu, ſecunda eſt vena in brachio; poſt partum verò, quando ſunt ſuppreſſæ lochia, tunc vena ſaphenæ ſectio aliquid valet ad revocandum illud, quod fluebat. In tam ſubitanea ſuppreſſione, licet non fluant menſes, natura tamen conatus non perit, neque ſanguinis rareſactio, ſola cauſa externa impedit. Quantò maior eſt dolor lumborum & rigor, tantò maior eſt conatus deorſum, & tantò liberius poteſtis venæ ſectiōnem in brachio inſtituere. Hæc ſententia LINDANUS. Vid. M. A. N. C. Ann. 3. obſ. 57. Hæc, quæ dicit LINDANUS, confirmata videbitis exemplo notabili RIVERIO Cent. 2. obſ. 2. item AMATO LUSITANO Cent. 2. obſ. 28. ubi egregius caſus, in quo reſert; mulierem, cui menſes aliquandiu ſuppreſſi fuerunt, ſecta pedis venâ ſtererint, qui tertio die ſecta vena in brachio optimè fluxerint; WALLÆO in M. M. pag. 98. HOEFERO in Herc. Med. pag. 204. DEODATO in Valetud. pag. 129. HOFFMANNUS tamen habet exemplum mulieris, quæ ſub menſium fluxu in nimia ira perterrita, paſſa fuit ſuppreſſionem, Medicus ſecavit venam in pede, curata fuit: Inclinat etiam huc FEHR Tract. de Abſinth. pag. 138. qui dicit: „Ubi magna eſt difficultas reſpirandi cum cephalalgia, & cordis palpitatione, audacter medianam, vel cephalicam brachii tundendam ſuadet. Cum hiſ etiam conſentit SANCTORIUS in Methodo vir. Errores in Med. pag. 811. SYLVIVS lib. 3. Prax. 3. ſ. 95. Hoc ipſum non vulgariter illuſtratur ex eo, quod per venam in brachio ſectam curetur iſchuria ſeu urinæ ſuppreſſio, in tali caſu, in quo paulò uberior copia ſanguinis eiſdem impedit ſectiōnem per renes: Cuius rei notatu dignum reſert exemplum idem RIVERIVS Cent. 1. obſ. 1. & obſ. 89. pag. 87. eiſdem Cent. 1. ubi aliis irritis venæ ſectiōne in brachio fuit curata. Ratio eſt, quod ſanguis impetu ſuo & copiâ ſe ipſum impedit, & circa renes ſtagnat, vena ſecta liberior evaſerit. Quemadmodum autem iſchuria tollitur venæ ſectiōne in brachio, ita etiam ſuppreſſionem ſanguinis menſtrui tollit venæ ſectiō in brachio, in ſpecie, dum inſtæ fluxus, unde etiam fit, ut in plethoricis dolores nephritici à calculo renali per ſcarificationem dorſi & lumborum non leviter mitigentur: ſed quàm periculosa etiam ſint fluentibus menſibus in brachio venæ ſectiōnes, vid. BARTHOLINI Act. Med. Haſſniens. Volum. 2. pag. 194. VELTHUSIUS de Generat. p. 148. & FORESTUS l. 28. obſ. 3. Imò menſibus aëtu fluentibus cucurbitularum dorſo applicatarum quanta ſit noxa, docet GABELCHOVERUS Cent. 4. Cur. 92. pag. 215.

Aut 4. revocandi ſunt menſes, quando metus, quod circa ordinariū terminum non ſint redituri: ubi verò venæ ſectiō in talo pro concitandō ſanguinis motu deorſum, non inconcinna videtur.

Quod ſi adſint inflammationes autæ cum menſium ſuppreſſione.

aut etiam cum menſibus aëtu fluentibus, ubi ſecunda ſit vena, prolixè ventilat ZACUTUS LUSITANUS lib. 1. Med. Princ. Hiſt. 77.

V. Hiſ vicariæ ſunt cucurbitulæ, præſertim ſcarificatæ, quæ in debilioribus venæ ſectiōnis loco ſunt. Conveniunt autem hæc cum quàm ſine ſcarificatione, præſertim iis in caſibus, quando ſanguis ad alia loca ſeratur, ut hic ad uterum revocetur, & commodè imponuntur primò locis remotioribus nempe cruribus, in ſpecie ſemoris regiōni interna, & ſupra genu, vel hirundines lablis vulvæ, hinc propioribus, nempe coxis, & ſic conſequenter.

VI. Hiſ univerſalibus præmiſſis, progreſſus fiat pro corrigenda ſanguinis craſi ad Martialia. Martialia ſanè multum valent in menſium vitiis: & quidem inveteratam emanſionem menſium citra Martialia curare impoſſibile eſt, adeo ut de hiſ reſerat LINDANUS, quod in Marte ſit, quicquid ad ciendos menſes deſideratur. Operatur non quidem poſitive, ſed ſerè privative, removendo nempe impedimenta, quatenus abſorbent ſcilicet acidum illud, cujus cauſa fermentatio menſtrua ſupprimitur. Unde etiam aperientia, ſic dicta Martialia, quivis pulveres cachectici, tincturæ Martiales, inſuſa & extracta Martialia, &c. aptè loco inveniunt. Convenit ergo Limatura Martis cruda, vel ſola pulveriſata, vel cum pauco cinnamomo miſta in vino Malvatico aut Rhenaſi pota; Sic namque natior ipſa in ſtomacho extractum Martis egregium facit. Et certum eſt, in iis, quibus ſtomachus robuſtus potentiore abundat acido, aut etiam, in quibus validum acidum inteſtina occupat, hiſ meliùs propinantur Limatura Martis cruda præparata & pulveriſata, quàm ſalibus vel acidis extra ſtomachum ſubacta, & in crocum corroſa. ZACUTUS LUSITANUS laudat terram Martialem in ferriſodinis inventam, ad ſtimulandos menſes egregiam. Poſt hæc eximia eſt eſſentia Martis, cum ſucco pomorum Boſfordſianorum parata, aut tinctura viſtrioli Martis Zuſſerſi, Viennæ uſiſſima, & pallidum Virginium colorem experta. Vina etiam medicata extirpationis vel inſuſionis Martis non ſunt contemnenda; item Claretum chalybeatum Myſichtii, vinum Malvaticum, Martiale Hartmanni.

24. Limat. Martis crud. ʒij.

Cinnam. ʒj.

Inſund. in Vini q. pl.

De hac ægra bibat bonū hauſtum manè & veſperi ante paſſū.

Item convenit pulvis cachecticus Hartmanni cum ſtercore aſſeris junioris, vid. HARTMANNI Prax. Chym. pag. 266. & pulvis ad pallidos virginum colores HEINRICI ab HEER obſ. 6. item ſal Martis compositum, liquor Martis ſolaris. Potus acidularum quoque egregiè promovet menſium fluxum. Hinc Eleſtuarium Martiale Horſkii, Hartmanni, plura Martialia, huc faciētia: Vid. in eius Praxi cap. 219. Optimè autem propinantur Martialia cum Laxantibus, mutatis invicem vicibus.

Hiſce denique ſocientur ſubinde volatilia aromatica amaricantia, in morbis cachecticis & chronicis uſitata, ex quibus tamen ſpeciatiim eligantur ſubjunganſur aut permisceantur, quæ ſimil ſunt appropriata menſes ſtimulantia, tam interna quàm externa, v.g. roſmarinus, calaminta, chereſolium, leviſticum, matricaria, centaureum minus, ſpica Celtica, Marubium, de quo vid. BORELLUS Cent. 4. obſ. 14. flores cheiri, flores item calendulæ, de quibus vid. RIVERIVS in obſ. 1. PACHEQUO communicatis obſ. 30. flores item lavendulæ, ſemina ſale volatili vel acri aromatica prædita, v.g. erucæ, naſturtii, ſeniculi, aniſi, dauci, cumini, baccaſ itidem lauri & juniperi, ſemen milii ſolis, ſemen ammeos, violarum, quod CORBÆUS laudat cum granis aliquot piperis & myrrhæ, ſabina, radix angelicæ, de qua vid. PETRÆI Noſolog. Diſp. 93. ſ. 28. radix item ſeniculi, eryngii, bryoniæ, radix item rubiæ tinctorum, de qua vid. FONSECA Tom. 2. Conf. 23. & RIVERIVS Pr. l. 14. c. 2. ariſtolochia rotundæ, gentianæ, enulæ, coſcumæ ac pyrethri, artemiſia, meliſſa, gentiana, cinnamomum, caſſia lignea, coſtus, galanga, nux moſcata, caryophylli, cardamomum, piperata, myrrha, eſſentia myrrhæ, Elixir proprietatis, tinctura tartari composita, & omnia ex & cum myrrha parata, gummata, colocyntidis, caſtoreum, ſplen bovis, borax, ſalia alcalia, primariò volatilia, ſecundariò fixa; item arcanum duplicatum Myſichtii, &c. Hæc nempe ſunt primaria præmiſſis præſtendens menſes ſtimulantia. Radicis angelicæ aromatica viſingularis eſt uterina, & menſibus ciendis dicata, radix aſari in aqua communi bullita; ſic namque miteſcit



eiusdem vis vomitiva, ac sic aromatica diuretica: Marrubium album vino infusum specificum est BORELLI Cent. 4. obs. 14. Decoctum artemisiæ rubræ cum oleo foeniculi destillato vel succini propinatum, mirè à CROLLIO commendatur: (nam oleum succini aliquamdiu assumptum, etiam egregium est ad ciendos menses:) aut conserva artemisiæ à ZACUTO LUSITANO pro corpore aliorum ingredientium. Pulegium admodum elegans est pro mulierculis remedium: Rosmarinus singulariter affectibus internis & mulieribus convenit: bæccæ lauri pulverisatæ saltem in communi sunt usu ad promovendos menses. Hinc decoctum rosmarini com croco, aut cum floribus cheiri in vino chalybeato, laudatur Insigulter à Practicis, aliquandiu coquanturatum: Vulgò

24. Herb. rosmar. M. iij.  
Rad. armor. rec. ʒij.  
Bacc. iunip. rec. ʒij.  
Sem. carv. ʒi.

Infus. & contus. misc. affundunt spiritum vini, & digerunt in sole.

Sabina est fortissimum remedium, præsertim oleum ejus destillatum, quod stupendæ est potèntiæ: quam ob causam adhibetur etiam ad pellendum sctum, sed tamen frustraneo sæpè cum: successu, reluctantè scilicet ipsa natura: hinc etiam pilulæ de sabina Mynsichtii in usu sunt: item extractum sabinae, cui etiam oleum destillatum succini commodè potest surrogari. Viscum quercinum singulare quid obtinet in hoc casu. De Mallicorio vid. AUGENIUS, & BARTHOLINUS in Epist. Conducunt ulterius flores cheiri, ut modò innui: flores item lavendulæ: Nam decoctum radicis angelicæ cum floribus lavendulæ in vino exlimiè est commendationis: Flores Calendulæ, exque his paratæ conservæ: Refert namque RIVERIUS in obser. Communis. quod ipsi menses naturaliter constituti odorem floriscandulæ spirent: Quod an verum sit? experientia cōsultatur: Unde concludit ex signatura Autor, etiam ipsos calendulæ flores non esse inutiles, quod etiam credo. Flores croci seu crocus mirè menses promovet, & optimum est remedium iis, quæ patiuntur difficultatem mensium actu fluentium, unde communiter cerevisiæ calidæ incoquitur crocus & cinnamomum, (quæ Germanis dicuntur Saffran-Suppen:) pro remedio menses remorantes fortiter ciende, in tantum, ut ex eo etiam lethalis mensium fluxus supervenerit: vid. RIVERIUS. Præter crocum, cinnamomum cum supra dictis aromatis est laudatissimum, quorum salia volatilia oleosa ad stomachi robur & sanguinis vitiatam emendandam crasin, & acueundam fermentationem menstruam, mirè conducunt. Certum quorundam Empiricum est hoc; nempe

24. Muc. moschat. ʒiv.  
Sacchari fini ʒiij.

Hæc probè miscent, exhibent quantitate nucis avellanæ manè & vespèri, præmissis universalibus.

Et hoc mirè conducere experientiam certam dicunt. De semine ciceris rubri notum est, quod hujus diuretica vis insigniter menses stimulet & Lochia: vid. SEBIZIUS. Sunt ergo, qui

24. Cicer. rubr. M. iij.

Macerant eos per 2. vel 3. dies & noctes in aqua pluviiali tepesacta, addunt deinde nonnihil croci, ut & parum fermenti, quo panis aliàs fermentari solet, misceant, transcolant, & colaturam agræ subindè bibendam propinant.

Præter talia, & alia similia modò dicta, imprimis efficacissimum est castoreum, sive in substantia assumptum, sive ex eodem parata essentia & extractum cum spiritus vini tartarificato, quæ in frequenti sunt usu. Facit huc infusum & Mixtura BARBETTE in sua Praxi, ubi castoreum extrahit per salia volatilia cum spiritu vini diluta, adque imitationem ejus potest fieri hoc modo: (nam in Barbettianam ingreditur aqua prophylactica, quam rejicio, quia destruit salia volatilia:)

24. Castor. ʒij.  
Sal. volat. succini,

Cornu cervi an. ʒi.

His affundatur q. spiritus vini non adeò rectif. & diluatur cum aqua cinnam.

Stent in infuso in vase clauso in loco tepido, donec extrahatur tinctura, quæ postmodum, prout plus vel minus menstrui assumptum fuerit, ad ʒi. vel cochl. j. poterit propinari.

Propius sit, si liquor cornu cervi succinatus affundatur castoreo: extrahit enim potenter ejus sal volatile oleosum, ubique unit, & sic erit essentia ad menses admodum potens, ad guttas ʒo. vel 40. tempore solitæ vel debitæ saltim menstruationis assumenda.

Quidam etiam rudè castoreum usurpant in gravidis, aut in talibus, in quibus suspecta est graviditas cum mensium suppressione: Sic namque CORBÆUS in Gynecæo suo, si cum suppressione mensium suspecta sit conceptio, sequentem laudat pulverem:

24. Castor.

Sem. anisi,

Apii an. ʒi.

Trita cum vino dissoluta exhibite.

„ Si gravida fuerit, sctum roborabit: si non fuerit gravida, menses monebit.

Castoreo non cedit myrrha, egregium balsamicum uterinum, quæ cum aliis mista menses stimulat: Hinc omnino ex & cum myrrha parata conveniunt; unde tinctura myrrhæ cum spiritu salis ammoniaci vincto, item essentia salutis D. Langii, parata ex myrrha cum spiritu vini tartarificato (sed quis est genuinus?) vel cum tinctura tartari, est egregia medicina. Myrrha aliàs per spiritum vini, licet rectificatissimus sit, solvi nequit, nisi aliquid acidi, in specie spiritus salis, ingrediat: Sed acida mulieribus inimica, & mensibus promovendis potius nocent: Ob id è contrà myrrha etiam solvi potest per alcalia, tam volatilia (quod probe notandum) quam etiam alcalia fixa, imprimis lixivialia, & sic erit eò promptior effectus ad stimulandos menses. Aliàs in officinis prostant trochisci de myrrha, qui ad ʒi. ad summum propinati potentes sunt efficaciaz ad menses movendos: item essentia composita ex castoreo, myrrha & similibus, cum salibus volatilibus in spiritu vini dissolutis, ad imitationem BARBETTE in sua Praxi cap. de mensium suppressione. Succinum & ipsum egregium est in hoc casu, imprimis, si cum cinnamomo aut croco propinetur: sal ejus volatile insigniter conducit, & ad multa prodest symptomata, ex mensium suppressione propata. De alio res nota est: Undè facile patet, quod Elixir proprietatis, ut vulgò vocant, insigniter conducit ad stimulandos menses; unde pro usu muliebri sunt qui parant Elixir proprietatis sine acido, loco spirituum acidorum addendo spiritui vini sal tartari fixum, quod egregiè extrahit aloen, crocum & myrrham: Alii parant cum spiritu salis ammoniaci pro usu muliebri, tam menstruatam, quàm etiam pro usu puerperatum: aut ejusdem species in forma sicca seu massa pilularum pestilentialium Russi usurpantur. Quæ supra dicta fuerunt de castoreo, intelligi quoque similiter possunt de asa foetida, non minus efficaci in morbis mullecularum: hinc pertinet huc essentia anonyma D. Langii, parata ex castoreo & asa foetida cum tinctura tartari. Colocynthidis, uti pro scopo laxativo deficientibus mensibus succurrit, evacuando visciditatem; ita correctæ per sal tartari amaritudine sub specificè menses ciere potest, siquidem quocunque modo internè & externè usurpata egregiè convenit in mensium vitia: vid. TIMEUS von Gulden klee, in Cas. p. 207. Splen bovis specificè laudatur à PARACELSO in suis scriptis ad menses remoratos, hinc fit decoctum splenis bovis, essentia splenis bovis composita cum spiritu vini myrrhatoparata, & extractum, indeque essentia ad menses composita frequenti fuerunt in usu D. MICHAELIS ad mensium vitia: vid. CROLLIUS & HARTMANNUS in Praxi Chymiatr. pag. 240. Item Decoctum splenis bovis Quercetani in RIVERII Praxi p. m. 188. Elixir uterinum Crollii ad guttas xxx. vel xl. hinc essentia artemisiæ, sabinae, croci, castorei, in usu est: quibus & essentia ambtæ in virginibus, quibus minus nocent Odozata, commodè admisceri potest. Propinantur talia commodè in vehiculo aque cinnamomi, aqua pulegii, sabinae, & similibus. Olea etiam destillata cinnamomi, aut caryophyllorum, aut succini, aut, quod optimum, sabinae, similiter pellunt egregiè menses.

Sanguis menstruus primus juveniculæ excipiat linteo, linteum probè tinctum exsicceatur, & sub usu cum aceto scilicet extrahatur è linteo tinctura; quod acetum ioterne commodè ad promovendum menstruum fluxum propinari potest: vid. HELVETIUS. HELMONTIUS Tractat. Tribus. Lunæ dicit, mulierem ex menstruo hausto esse suffocatam.

Tandem borax potentissimè menses stimulat, & aliis irritis optimè datur in Decocto pulegii, addito croco, vel pulvere cinnamomi: vel addita aqua cinnamomi spirituosa, egregium



Egregium est emmenagogum secundum LINDANUM ;  
sine cinnamomo enim nullum tale remedium dandum, quia  
hoc spiritus vitales egregie roborat & excitat: Hinc trochisci  
de borrace commendantur in M. A. N. C. Ann. 6. & 7.  
Appen. pag. 140. item Pilula aperientes & alterantes se-  
quentes:

℞ Gum. sagap. cum aceto solut. & inspiss.  
Succin. alb. prap.  
Borrac. Ven. an. ℥j.  
Myrrh. rub.  
Castor. an. gr. xv.  
Croc. ℥ss.  
Olei caryoph. gutt. vj.

F. Pilula subinde capiendæ.

Item conveniunt Pilula Cnæselii in M. A. N. C. loco alle-  
gato; Item POTERII Cent. 3. cap. 32. ubi optima medica-  
menta ad promovendos menses enarrantur; Item cons. Cens.  
3. Curat. 42. Cum borrace etiam salia vegetabilium fixa,  
sal melissæ, sal sabinae, & sal uterinum Mynsichti, item  
sal succini volatile, commodè combinari potest. His omni-  
bus palmam præcipit arcanum duplicatum Mynsichti, sin-  
gularis medicina pro mulierculis, & quæ mirè conducit ad  
menses sciendos. Pertinet huc pulvis ex stercore columbino  
& croco, alibi explicatus. Cæterum spiritus & salia vola-  
tilia cornu cervi, salis ammoniaci, secundine humanæ,  
præsertim spiritus carminativus, sunt egregia ad promo-  
vendos menses. Omnia hæc usurpentur eo tempore, quo  
menses fluere debent: in specie horum operatio eò est præ-  
stantior, si cum hujusmodi appropriatis jungantur, & post  
hæc imperetur corporis motus; vel expectetur post eorum  
usum blandus in lecto mador matutinus pro meliore altera-  
tione & circulatione sanguinis, & feliciter excitatur mensium  
securus.

Mihi aliquando curanda fuit virgo 18. annorum, quæ  
nunquam adhuc viderat menses, ad scorbutum inclinabat,  
& tussis phthisica eam subinde concutiebatur Mater, ejus & ipsa  
20. demum anno prima vice mensium fluxum passa erat.  
Huic ergo, præmisso Nodulo ex alterantibus & laxan-  
tibus, per spirituum carminativum menses fluere feci;  
perempte

℞ Herb. rec. cochlear.  
Chelidon.  
Fumar.  
Abinth. an. M. j.  
Pass. minor. ℥j.  
Croc. j.  
Cinnam. an. ℥j.

Incisa & contusa includebantur Nodulo, qui in-  
fundebatur in vino.

Adjunxi simul tincturam coralliorum antiscorbuticam, in  
jam dicto vino medicato hauriendam.

Hausto hoc vino propinavi Vomitorium ex syrupo emeti-  
co Angeli Salz. Denique spiritum salis ammoniaci cum spiri-  
tu carminativo quotidie bis usurpandum jussi, unde postmo-  
dum menses spontè eruperunt, cum jam in eo essem, ut or-  
dinarem sequentes pilulas, quas tamen non usurpavit, quia  
jam aderant menses:

℞ Gum. ammoniaci in aceto sol. gr. xv.  
Extr. agar. ℥ss.  
Croc. gr. v.  
Troch. al-band. gr. iij.  
Castor. gr. v.

cum f. q. essent. succ. f. Pilulae.

Sed his, ut dixi, opus non est.

Ex his hæcenus dictis facillimè diversè fieri possunt Pre-  
scriptiones.

℞ Tinctura vitrioli Mart. Zuelf. vel solut. Mart.  
cum succ. pom. ℥j.  
Essent. castor.  
Croc. an. ℥j.  
M. S.

Essentia aperitiva.

Dosis 40. vel 50. ad 60. gutt. bis vel ter in die in vehiculo  
calido, mulier nonnihil exerceat corpus blando motu.

Item

℞ Spiritus sal. ammoniaci  
Secundin. human. an. ℥j.  
(nam & hæc egregie conducit, ut & spiritus cornu cervi  
cum sale vol. acnatus.)  
Liqu. cornu cervi succin. ℥j. ad ℥j.  
M. S.

Spiritus aperitivus.

Vel

℞ Spiritus sal. ammoniaci,  
Secundin. human.  
Liqu. cornu cervi succin. an. ℥j.  
M. D. S. ut antè.

Dentur gutt. 30. vel 40.

℞ Liqu. cornu cervi succin. ℥j.  
Spiritus secundin. ℥j.

M. pro 6. dosibus matutino tempore assumendis cum  
motu blanda expectata diaphoresi.  
D. S. ut supra.

Essentia splenis bovis composita etiam optima est cum essen-  
tia Martis mista: e. g.

℞ Sol. Martis cum succ. pom.  
Essent. splen. bou. compos.  
Ad mens. Mich. vel sabina compos. an. ℥j.  
M. S.

Essentia aperitiva.

℞ Essent. sabina compos. ℥j. vel iv.  
Tinct. salut. Langii ℥j. vel ℥j.  
M. S. ut antè.

Dosis 40. gutt. bis vel ter in die.

℞ Ess. castor. ℥j.  
Quint. Essent. rorism.  
Spir. sal. ammoniaci succin. an. ℥j.  
M. S. ut antè.

℞ Ess. rorism. ℥j.  
Croc. ℥j.  
M. S. ut antè.

In forma pulveris:

℞ Borrac. ℥j.  
Myrrh. ℥ss.  
Croc. gr. xv.  
M. f. Pulvis pro 4. dosibus: S.  
Pulvis aperitivus.

℞ Borrac. Ven.  
Cinnam. acuti an. ℥ss.  
Myrrh. gr. xv.  
M. f. Pulvis pro 3. dosibus.  
D. S. ut antè.

℞ Borrac. ℥ss.  
Myrrh. gr. xv.  
Cinnam. ℥ss.  
M. f. P. pro 3. dosibus.  
D. S. ut supra.

℞ Borrac. ℥j.  
Cinnam. ℥ss.  
M. f. Pulvis.  
D. S. ut supra.

Dentur in Decocto pulegii vel rorism.

℞ Arcan. dupl. Mynsicht. Div.  
Castor. ℥ss.  
Myrrh. ℥j.  
Croc. ℥ss.  
M. f. Pulvis.

Div. in 3. vel 4. part. equ.

℞ Vitriol. Mart. tart. ℥ss.  
Myrrh. el. ℥j.  
Croc. ℥j.  
M. f. Pulvis. D. S.

Pulvis aperitivus pro aliquot vicibus.

℞ Fimi columb. calc. ℥j.  
Myrrh. el. gr. xvj.  
Croc. orient. ℥ss.  
M. f. Pulvis pro 5. dosibus.  
D. S. ut antè.

Pro vehiculo horum pulverum inseruiat:

℞ Aquæ artemis. ℥j.  
Cinnam. ℥j.  
Essent. splen. bovis ℥j.  
Castor. ℥j.  
Syr. de canella ℥vi.  
M. S.

Potio ad pulnerem.

Capiatur cochlearum & pro vehiculo pulverum.

℞ Aquæ artemis. compos. ℥j.  
Cinnam. ℥j.  
Essent. splen. bou. ℥ss.  
Syr. de canella ℥vi.  
M. S.

Potio



Potio ad pulverem.

24. Conf. meliss. ʒiʒ.

Menth. ʒvi.

Limat. martis præp. & olei destillat. sabina præ-  
rum imprægn. ʒli.

Flor. sulphuris, vel fulig. ʒi.

Borrac. Venet. ʒʒ.

Cinnam. acerr.

Galang.

Zedoar. an. ʒi.

cum f. q. syr. artemis. f. Electuarium.

D. S.

Electuarium aperitivum pro aliquot vicibus.

24. Splen. bov. castrat. num. i. vel ii.

Herb. rorismar. M. ii.

Meliss. M. i.

Sabina M. ʒ.

Zedoar. ʒʒ.

Sem. 4. calid. min. an. ʒi.

Salis tartari ʒii.

Coqu. in f. q. aqua simpl. leniter in vase clauso: Colat.

ʒiʒ. adde

Syr. artemis. ʒii.

Cinnam. ʒi.

M. S.

Potio aperitiva.

Infundi potest parvus nodulus cum croco.

24. Herb. rorismar.

- Puleg.

Spicis an. M. i.

Flor. cheiri,

Sclarea,

Cham. an. p. i.

Coqu. in f. q. aqua martial. in cucurbita suo alembico  
munita:

colat. ferventis ʒviii. adde

Aquam prius destillatam,

Syrup. meliss. ʒiv.

Ess. croci ʒi.

M. S. ut antea.

Hiscæ annumerandum est simul Balsamum sulphuriste-  
rebinthinatum, & succinatum, & ipsum menses propo-  
vens.

Hæc ferè sunt ista, quæ ad mensem conducunt stimulum  
internè.

Cura suppressionis mensium, quæ sit uteri vitio, requirit,  
ut vasa obstructa aperiantur Incidentibus Volatilibus, præfer-  
tim cum aliquali sudore usurpatis, membranz remediis Chi-  
rurgicis inciduntur; coactis verò murus etiam separatur.  
Modum operandi vid. in SEVERINO de Efficaci Medi-  
cina lib. 2. cap. 88. in FORESTO lib. 28. Obs. 55. SCHEN-  
CKIO lib. 4. Obs. HILDANO Cent. 3. Observ. 60. BAR-  
THOLINO Cent. 5. Hist. 42. & 43. in specie VIARDEL  
in observationibus pag. 47. ubi collum uteri tumoribus obfes-  
sum, coitum impediens; curatum refert.

Causa, propter quos contingit mensem suppressio acciden-  
talis, sunt duo:

1. Nimiæ refrigeratio extremorum,
2. Gravior animi affectus.

Curantur autem, causam, quæ menses suppressit, corrigen-  
do & removendo: v. g. si fiat, ut actu fluentes mense à subito  
frigore, vel alio tali casu restringantur, præmissa vel omissa  
venæ saphenæ aperture, propinanda sunt volatilia oleosa  
aromatica, quæ sanguinem grumosum dissolvunt, & acce-  
dente blando sudore, eundem denuò fluere faciunt, & in na-  
turalem motum reducunt: hinc spiritus salis ammoniaci &  
salia volatilia oleosa non satis laudanda, cum castoreo vel  
myrrha propinentur, quorum usu, & blando subsequente  
sudore sanguis ad fluorem iterum disponitur: item sperma  
ceti ad ʒi. cum castoreo in cerevisia calida optimo jure exhi-  
betur, & ægra ad blandum sudorem se componant; experi-  
mentum namque hoc est TIMÆI Von Gulden-Klee in casi-  
bus lib. 2. Cas. 7. pag. 91. vel commodè potest usurpari sal quod-  
dam fixum, sal artemisiae aut sabinae, &c. In specie addantur  
remedia ex croco & cinnamomo. In tali casu interdum su-  
pervenit gravissimus uteri dolor, ex sanguine coagulato ibi-  
dem hærente, ubi inter alia convenit decoctum chamameli,  
quod internè usurpatum cum his internis diâis optimum est:  
externè imponere jubeo regioni pubis magna decocti in for-  
ma cataplasmati, quàm calidè fieri potest, ad imitationem  
TIMÆI Von Gulden-Klee in Cas. pag. 102. Cum his necesse

est, ut in graviore malo secetur vena in pede, quia actu  
fluentes menses fuerunt restricti; tunc enim non secandæ  
sunt venæ superiores: Id quod eleganti observatione docet  
FORESTUS lib. 28. Obs. 3. in qua refert mulierem, cui ob  
menses subito suppressos vena fuit secta in brachio, unde  
singulis mensibus molestant palpitacionem in brachio recur-  
rentem habuit, donec venâ in talo sectâ, statis temporibus  
redierint: Sicetiam GABELCHOVERUS Cent. 4. Cur.  
92. varia symptomata, & insignem dorsi dolorem observa-  
vit in muliere, cui menstruatæ scarificationes in dorso factæ  
fuerunt.

Quod si ex graviore animi affectu, v. g. terrore subitaneo,  
iracundia, vel simili menses actu fluentes restringantur, re-  
vocantur secando uenam in pede, hinc propinando internè  
spiritum salis ammoniaci bis vel ter in die. FORESTUS  
lib. 28. Obs. 2. In tali casu ex terrore restrictorum mensium  
non inconsultò usurpat decoctum florum chamomillæ ad ʒiij.  
cui addit oxymel. simpl. ʒi. vel ii. & propinat. His exhau-  
stis, sudor secutus; unde menses à terrore restricti denuò flu-  
xerunt. Loco hujus similiter myrrha & castoreum cum sa-  
libus quibusdam volatilibus oleosis, aliisque quibusdam ap-  
propriatis aromaticis, quietem & blandum sudorem simul  
imperando, in aqua cinnamomi usurpari possunt.

Hæc remedia interdum conveniunt itidem in paucitate  
mensium, de qua suo loco, HOEFERUS Herc. Med. in  
animi affectibus grauioribus extractis menses cientibus lau-  
danum opiatum jungit, unde sopiuntur adjuncta symptoma-  
ta, ut menses denuò fluant.

Hiscæ internis etiam adjuvenda sunt simul externa, men-  
sium fluxum promoventia, qualia sunt imprimis Fucus, Bal-  
nea, Insestus & Semicupia, item, Pediluvia crebrius institu-  
ta, valdè proficiunt & profunt, quæ præmissa in brachio ve-  
næ sectione, quando menses erumpere debent, instituuntur  
(nam dum menses fluere incipiunt, aut sub ipso eorum flu-  
xu, potius nociva sunt Balnea) parata vel ex simplicibus, vel  
ex emollientibus vulgaribus, & appropriatis aromaticis, v.  
g. sabina, matricaria, artemisia, calamintha (est pulegium  
sylvestre, Germ. wilder poley,) pulegio, lauro, & similibus  
parata, vid. GABELCHOVERUS Cent. 4. pag. 214. item  
HORSTIUS Obs. pag. 264. & 265. Idea Formulæ Class. 4.  
§. 20. & Colleg. Formul. p. ....

Vel

24. Herb. artemis.

Puleg.

Serpill. an. M. ii.

Sabina,

Flor. chamom.

Lil. alb. an. M. i.

Rad. alth. vel malva,

Aristol. rot.

Rubia tinct. an. ʒii.

Angel.

Zedoar. an. ʒi.

Bacc. lauri, vel juniperi ʒiʒ. vel ana ʒvi.

Sal tartari ʒvi.

M. pro Balneo: S.

Ad balneum.

24. Herb. sab. M. iv.

Matricar.

Puleg. an. M. ii.

Flor. cheiri M. i.

Bacc. junip. rec. ʒiv.

Lauri. ʒii.

Grosso modo incis. & contus.

D. S.

Species ad fotum seu balneum.

Post insestum inungantur partes circa lumbos, inguina,  
& regionem hypogastricam unguento appropriato:

Item

24. Herb. Artemis.

Puleg. an. M. iii.

Sabina M. i.

Bacc. lauri,

Junip. an. ʒiii.

Incis. & contus.

D. S.

Species ad balneum herbarium.

Coqu. in aqua simpl. & ad regionem umbilicalem infideat  
ægra; vel sacculus ex hisce constans in balneo applicetur um-  
bilico & genitalibus.

Pertinent hæc Therma, quarum insestus diuturnus men-  
ses



les solet leuare & curare. **HELVETIUS** ad menses pellem-  
dos commendat, & immittantur pedes in secundinam cal-  
dam recenter extractam. Conueniunt quoque inunctiones  
externæ, circa regionem iliaca & pubis illinendæ, quæ  
sunt ex oleo cheirino, laurino, irino, diacolocynthidos, &c.  
quæ acciuntur cum oleo destillato sabina, spica, lauendule,  
baccarum lauri, petroleo & similibus. Odorem fermenti  
quidam hic commendant. Odorem moschi menses promoue-  
re probabiliter admodum refert **BARTHOLINUS** Cent. 2.  
Histor. 87. Suffitus etiam per siphonem & infundibulum  
in membro genitali intrusum vel ad motum excepti, non adeo  
sunt incongrui, ad ignitionem **TIMÆI** Von Gilden-Klee  
in Casibus ex colocynthide solâ per medium distillatâ, eaque  
in aqua simplici decoctâ, insigniter conducunt ad menses  
elendos: subinde hoc decocto silices candefacti inijciuntur.  
Item sicut trochisci profumo appropriati, v.g. ex zinzibe-  
re, sabina, colocynthide, myrrha, & similibus, vel seq.  
egregii:

24. Fol. sabinae M. 8.  
Myrrh. 3ij. vel 3li.  
Ligni aloes 3i.  
Troch. alband. 3li. ad 3i.

M. f. Pulvis grossus: S.  
Pulvis aperitiuus ad suffitum.

Inijciatur carbonibus ignitis, ut ita exciteretur suffitus uterq  
excipiendus.

Vel ex his puluerisatis cum balsamo sulphuris terobinthe-  
nato & aceto fiant Trochisci, qui inijciantur carbonibus, &  
exciteretur fumus.

Facit huc suffitus de sabina Mynsichtl, &c. Omnium  
optimus fumus fit ex decocto scoriarum reguli Antimonii:  
nempe

25. Scor. reguli antimonii q. s.  
soluantur in  
Aque simplic. vel secundum alios in lixivio  
acri:

26. Solutionis hujus p. iv.  
Vini misceat. part. i.

Hujus mixturæ unum, 2. vel 3. cochlearia inijciuntur fili-  
cibus candentibus, inde elevatus fumus nudo corpore exci-  
pietur, præsertim in mulieribus, quibus infundibulum pro fu-  
scipiando hoc sicut submittere possumus. Mirabiliter ciet  
menses, & pro certissimo remedio habuit **B. D. MICHAELIS**,  
& ab **HARTMANNO**, **PETRAEO**, **AGRICOLA**, **CORBEO**, multisque aliis laudatur Practicis. Si  
verò metuatur, ne præ nimio motu excitato sanguis non in-  
ueniat viam, uenæ sectio excitanda. Nec minus efficax est  
suffitus similis paratus ex scoris martis ignitis, vel limatæ  
Martiscandefactæ, cum urina, imprimis antiqua & fetida,  
irroratis, qui disto modo utero exceptus mirè conducit ad  
promouendum mensium fluxum; vid. **GLAUBERVS**  
de Furnis Philosop. cap. 88. sal volatile enim ascendit (opor-  
tet, ut sit urina putida, aliàs sal volatile retrotranet:) non  
enim solummodo penetrat in uasa, sed vellicat etiam ute-  
rum, ut promoueat sanguinis excretio. Veteres ulterius  
exhibuerunt pessos, quos inter non inutilis est pessus factus  
ex felle tauri, mixto cum succo Mercurialis, in quo cocta sit  
colocynthis: Hæc inuicem mista dant pessum satis potentem,  
qui quatenus irritat parietes vaginæ uterinæ, hoc ipso stimu-  
lat, ut eò melius excernantur menses.

Item allium, ejusque capita cum oleo spica trita, in sac-  
culum indita, tanquam pessus commode applicatur. Extra-  
ctum hellebori nigri cum melle exceptum sua forma pessus,  
qui sindone obducitur, & ita applicatur, insigniter pro-  
dest ad prouocandos menses. Item hellebori pulvis à 3ss. ad 3j.  
modulo inclusus, & uaginæ uteri intrusus mirifice prouocat  
menses. Laudatur imprimis ab **ANGELO SALA** in  
eius Scriptis.

Vel

27. Fol. Persicar. maculat. Sole in Leone existente  
collect. & umbra exsic. 3ß.  
Rad. helleb. nigri. 3. ad 3i.

cum f. q. mucilag. tragac. f. Nodulus parvus, qui poten-  
ter operatur.

Aut denique Pessus ex 3ss. croci post Balneum applicatus  
est egregius. Sed horum usus solet esse rarus, & quia virgi-  
nibus non æquè conueniunt, propterea loco horum applau-  
sum meretur instrumentum Glauveri ligneum, omnibus sa-  
tis notum, quod est instar pollicis longum & crassum, in  
superiore parte est capitulum foraminibus pertusum, median-  
te quo spiritus urinae concentratus, aut spiritus salis ammo-

niaci bombace exceptus, vel sal volatile salis ammoniaci,  
aut mixtura ex calce viva cum sale ammoniato, irroratis  
cum spiritu vini, vel alia salia volatilia, deriuantur in ge-  
nitalla mulierum; sic enim particule exhalantes, irritando  
parietes vaginæ uterinæ, menses prouocant: quod remedium  
uti aliàs in quamplurimis uterinis affectibus egregium, ita in  
specie ad mensium vitia insigne est. Potentius operatur, si  
phiola vitrea distillæ mixturæ q. s. repleta, carbonibus canden-  
tibus applicetur, sicque utero excipiat. Interdum in malo  
magis obstinato ad catharides internæ & externæ acceden-  
dum: vid. **VELSCHIUS** Hecat. 2. pag. 13.º

## CAPUT II

### DE

#### MENSIUM FLUXU NIMIO.

**C**onsiderauimus & absolui musea, quæ mensium eman-  
tionem spectant: Contrarium mensium suppressioni & i-  
mum est, si nigis superflue fluant, adeoque est nimius men-  
sium fluxus: ad quod vitium persinet, quando frequenter  
fluunt, id est, quando non expectant tempus menstruum,  
sed omnibus duabus vel tribus septimanis redeunt: Hæc tunc  
venit curandus, quando debilitat mulieres. Variat equidem  
sanguinis excernendi quantitas naturalis, pro subiectorum  
varietate; in uia etenim magis fluit, quam in altera: quæ  
enim constitutionis sunt succulentæ, quæ sunt iuuentula,  
& vtuntur iuxta pastu, quæ sunt habitiores, & quæ sunt  
scorbeticæ, in his singulis copiosius fluunt, ac diutius du-  
rant menses; & tales relinquendæ sunt: unde etiam quanti-  
tas debita mensurorum fluentium saltem respectu indivi-  
duorum, & virium imminente debilitate, non verò ex certa  
quadam copia, determinanda venit: confer. **FORESTUS**  
lib. 28. Observ. 10. in Schol. & **PRIMEROSIUS** de  
M. M. l. 1. cap. 9. Quibus ergo fluunt menses, ita, ut debili-  
tentur exinde, propter copiam nempe in tali subiecto insue-  
tam, venit curandum.

### CAUSÆ.

Causa fluxus copiosi sine virium laesura est, quod natura  
hac vice abutatur, & quod excernitur, non tam sanguis est,  
quam serum sanguinis, & sanguineum quid instar locuræ  
carnium.

Antequam ad causarum fluxus nimii evolutionem acce-  
damus, tria imprimis observanda sunt circa mulieres nimio  
fluxu obnoxias.

1. In omnibus nimio ac diuturno fluxu laborantibus  
stomachi robur enervatum, cum appetitu defecto,  
carnisque plus minus nausea, observatur: ac ra-  
rum est, appetitum sibi constare in eiusmodi mulie-  
ribus.
2. Observatur in talibus ut plurimum dolor in dorso  
circa lumbos tensivus & lancinans, continuus ve-  
rans, adeo, ut non raro putent, se nephritico ob-  
noxios esse affectui. Nempe acidum est vitiosum,  
quod & nerveas circa lumbos vexat partes, & irri-  
tando simul uterum, excretionem per hæc loca  
stimulat, huiusque vasculorum ora plus minus  
aperit. Hinc laudabiliter **BARBETTE** in Pra-  
xi dicit, partem primariò affectam esse stomachum,  
hinc renes.
3. Scorbeticæ volatili acido imprægnatæ, aut his co-  
gnatæ, serè obnoxie sunt huic fluxui, unde & flui-  
ditate faciei colore in iuuentute, & ætate consilien-  
te præditæ, tactu molles, & habitu quasi aquoso  
tali affectui magis obnoxie.

His præmissis, Causa nimii fluxus sunt eadem, quæ reli-  
quarum hæmorrhagiarum, quas vid. supra l. 1. de Hæmorrha-  
gia in genere. Speciatim investigandæ etiam sunt vel in  
utero, vel primariò & frequentius in ipso sanguine. In Ute-  
ro hæret vitium menstruationis nimie, vel ex nimia apertio-  
ne vasorum uterinorum; vel ex atonia uteri eiusque fibra-  
rum, vasa eorumque officia non debite exerant, unde vel  
irritatione ipsarum partium in & circa uterum, unde spæ-  
modica vasorum contractura supervenit, ut, refluxu per  
venas impedito, sanguis per arterias impulsus, quæ data por-  
ta, ruat; vel si uterus violentia quadam externa fuerit læ-  
sus, aut vasa sint rupta seu cum imperio aperta, v.g. dum  
nimium pondus forsan elevatum, quod fit cum nisu & inspi-  
ratione



ratione aeris, aut occasione externa vasa hypogastrica in eodem rupta; aut etiam in *abortu*, ubi præter naturam separatur secundina, vasis multum dilatatis cum non levi uteri dolore, unde copiosus fluxus; aut à *partu laborioso*; aut refrigeratione manuum & pedum à partu aut abortu, quæ multum intendit hunc fluxum; item apertura nimia osculorum vasorum ex distensione & quasi dilatatione; aut applicatione aerium eadem sint erosa, qualia sunt *pesti aciores*, ad motu pro stimulo mensium, in specie ex *bellebore nigro*: Talia enim interdum excoriant uterum superficialiter, ut vasa nimis aperta non possint denudè connivere, sed superveniant menses & sanguinis fluxus nimius; sicut etiam VARAN-IO ÆU S de Morbis mulierum refert exitialem uteri hæmorrhagiam ex pessario minus acri, ad aliquod tempus in utero relicto: aut denique si ex motu inordinato corporis, in specie ex iteratione nimia, ex nimio vomitu, aut laboribus, similibusque aliis causis, quæ mensium fluxu laborantibus & actu fluentibus accidunt, à sanguinis impetu quasi disrupta aut aperta nimis fuerint vasa, & propterea sequatur nimia sanguinis hæmorrhagia: Sic namque refert FORESTUS in lib. 28. Observat. 16. Mensium profluvium nimium ex uteri venis perruptis ex gravi pondere sublato: Sic HILDANUS Cent. 3. Observ. 58. observat profluvium mensium & gravissimum & periculosissimum, provocatum ex violenta & immoderata sternutatione. Speciatim aliquid præternaturale in utero hærens, vel sanguis grumosus, vel mola, aut fetus abortivus, vel pars secundina retenta, vel simile quid, &c. uteri hæmorrhagiam excitat; ex his enim occasionibus irritato utero fluxus non raro desperatus planè excitatur, non prius coercibilis, quam dicta irritamenta fuerint remota. Sed hæ causæ, quæ uteri vitio profluvium mensium excitare solent, uti dixi, sunt raræ; de quibus & similibus causis FORESTUS lib. 28. Obs. 11. & sequ.

Frequentissima ergo causa huius fluxus est in sanguine, qui tribus modis peccare solet.

*Prima est, quia abundat*, sed hoc rarissimè; nam cum ordinario fluxu vix plethora sanguinis coniuncta esse potest: ut taceam sanguinem abundantem per menses excretum potius levare vires suppressas, quam easdem debilitare, unde non nimius, sed potius saltem sufficiens, hac occasione oriatur fluxus. Potius ergo peccat *orgasmo Venereo*, aliavè fermentatione aucta & *turgescencia nimia*, ratione culus tenuior fluxiliorque evadit, nimis cietur: unde immodicè turgescens uberius etiam per uteri vasa, perumpit. Hoc vulgò dicitur de sanguine bilioso; sicut & nimium coeundi desiderium in iuvenili ætate in quibusdam, quæ à Venere abstinent, subindè sanguinem impetuosiùs effervescentem & erumpentem, hinc fluxum uteri nimium, infert. Pertinet huc aer calidior, exercitatio corporis insignior, gaudium, ira, potus generosi, aromaticorum, in specie crocatorum abusus, & omnia, quæ sanguinem nimis movere, & fermentationem eius augere valent, &c.

*Secunda*, eaque creberrima, profluvii uterini causa est sanguis serosus nimis, aquosus & tenuis, ac fluxilis, unde frequentissima dependet occasio nimii mensium fluoris. Nam imprimis mulieres habitus succulentioris, simul tamen serosi, obnoxie sunt huic uterino profluvio, unde etiam sanguis, quem excernunt tunc, ut plurimum est tenuior, fluidior, & qui minùs in grumos concreescere solet, nisi forsan intra vaginam diutius hæreat, qui facillimè vasorum ora aperit, & sic effluens subindè instar loturæ carniū similis in talicasu esse solet. *Fundamentum* ferè est in *stomacho*, qui copioso potu, simulque variâ & ineptâ digesta, onustus, minùs commodè alimenta digerit, sed nimis colligescere cogit, & in chylum nimis serosum transmutat, unde sanguis etiam serosus redditur: Hinc etiam BARBETTE in sua Praxi pag. 91. in nimio mensium fluxu primariò stomachum, & hinc renes affici, seu radices & fomites mali asserit: Ille, nempe stomachus, non ritè chylum elaborando, sed aquosiorè mignendo, indeque totalem sanguinem: Hi, nempe renes, postmodum minùs euacuando laticem aquosum superfluum. *Serum* itaque insigniter coactum, frequentem mensium fluxum solet inferre, & inde in specie in *scorbuticis*, quæ omnes copiosè purgantur per menstrua.

*Tertia* denique causa est nimii sanguinis profluvii *serum*, massæ sanguinis acris, aut acido falsus, unde quædam scorbuticæ per uterum solent purgari. Uno nomine: ut plurimum junctum est acidum sui generis, quod irritando partes

membranaceas ac sensibiles circa lumbos & uterum, huiusque fluoris causa existit. Id quod manifestum est ex eo, quod præter dolores circa lumbos lancinantes, in talibus interdum ante aut post menstruationem sanies serosa adeò acris paulatim effluit, ut etiam hinc erodantur plus minus genitalia. Disponunt ad hoc *edulia acris* copiosè assumpta; ut nihil dicam de *acrimonia succorum* in primis viis.

## DIAGNOSIS.

Malum ipsum manifestatur ab ægris: supervenit virium debilitas & membrorum languor, seu manifestum signum nimium fluentis sanguinis. Nimium enim est illud, quod excedit, vel quantitatem, vel qualitatem, vel durationem solitam: Quantitas verò, ut antea monui, in feminis non est incerta, nec semper adeò determinata: Tunc ergo rò nimium fluxus menstrui optimè æstimandum est ex virium prostratione, quæ certissima est regula æstimandi illud, quod nimium est, quando nempe manifestè vires debilitantur: Euacuantur namque menses, ut levetur foemina, non gravetur. Unde, quando nimius est fluxus, citra tamen virium prostrationem, tunc signum est, ipsam naturam abuti hoc fluxu pro sui levatione, siue sit fluxus uterinus criticus, siue aliq. etiam tempore extra crisin se manifestet: ubi verò debilitatur foemina hoc fluxu, tunc signum est, quod sit nimium.

Saltem causarum signa probè attendenda, quæ partim antecedentia, partim ipse sanguis, qui effluit, suggerunt. Uteri læsiones, cum manifestis dependant ex causis, per se patent. Considerandus ergo sanguis est, qui excernitur: Nam sanguinem ex nimia *apertione vasorum*, vel nimio *orgasmo* & *turgescencia fermentativa* effluere, constat ex Phlogosis, genis rubentibus, venis turgidis, pulsu magno, celerè & frequenti, & quæ sunt similia signa sanguinis *orgasmi*: Qui effluit sanguis, solet & esse *floridus*, naturaliter constitutus, facillè grumescit, obscurioris nonnihil est coloris, &c. Uno nomine: signa adfunt sanguinis boni. Si sanguis aquosus sit sines mali, tunc ipsa excretio & excreti conditio hoc monstrat; Qui enim effluit, est *tenuis*, floridus, intensè coloratus; dilutus nempe color est, lintea, quibus capiuntur hæc Catamenia, multum tingens, sed non adeò concrescens.

Interdum etiam loturæ carniū similis effluit, vel etiam, si sanguis linteo exceptus ita appareat, ut linteum habeat *circulum pallidum*, monstrat sanguinis *serositatem*. Accedunt alia signa, talem sanguinis statum confirmantia, ut pedum aliqualis tumor, facies subhumida, habitus corporis mollior & crassior, &c. Vix, dixi, in grumos concreescere talem sanguinem: Interdum tamen, ubi ex arcta vulvæ clausura coercetur nimium, in grumos tandem convertitur, quod perindè neminem fallere debet.

Quod si *acrimonia feri* aut *sanguinis malum* induxerint, dolor plus minùs rodens, moriscans, pruriginosus & genitalia vellicans, cum conatu quodam *ejiciendi*, simul percipi solet.

## PROGNOSIS.

Quoad *Prognosin*: molestum non saltem mulieribus, sed etiam periculosum malum est nimia *menstruatio*; Eadem enim mala, quæ aliàs insequuntur hæmorrhagiæ nimias, etiam nimium mensium fluorem insequuntur, cum præter virium debilitatem, digestionis primæ defectus, cachexia, pedum tumor œdematosus, ipse hydrops, item fluor albus, ut plurimum supervenit mulieribus sæpiùs hoc malo correptis.

Quò autem diuturnior est fluxus, eò difficiliùs curatur: Observatum enim fuit à LINDANO, quod interdum ad triennium continuò duraverit.

In senescente muliere superveniens nimia menstruatio plerumque incurabilis est, & ad mortem eam comitatur. Plura audiivistis *supra* l. i. ubi de *Hæmorrhagia*.

## CURA.

His ita premissis consideranda est *Cura*: in qua fluxus sistendus est, observando tamen, ne fiat hoc subitò nimis, aut uno quasi impetu, præprimis si aliquandiu suppressus fuerit, aut parè prodierit; potissimum in Plethoricis, & si criticis subsuerit. Nam *plethorica habitiores*, quando sine debili-



ate fluxum hunc perferunt, relinquenda sunt, quia aliis mille & gravia nocumenta infert subito restrictus fluxus, (vid. M. A. N. C. Ann. 2. obs. 26. p. 47.) nempe uteri inflammationem, vel si in alium locum sanguis derivatur, ut in pulmones, dyspnoeam, choleram, dolores abdominis, &c. quin potius, si debilitas, syncope, aut convulsiones superveniant, demum curandus venit, ubi causarum remota cum vis infringenda, & ita fluxus sistendus: vid. M. E. R. C. A. T. U. S. de Ind. Med. cap. 3. & SYLVIVS Pr. l. 3. c. 3. Adeoque in Cura causarum imprimis habeatur respectus: hinc

1. Opera danda est, ut sanguis vel imminuatur inedia, laboribus, sanguinis detractio: vel alteretur absinthio, Rha-Barbaro; vel feruor & turgentia eius nimia compescatur, & plantagine, portulaca, & blandis acidis coarctetur: Vel
2. Eius fluiditas inspissanda in crassantibus, & serositate acres Martialibus & absorbentibus dictis corrigendae & temperandae.
3. Atonia & vasa eius nimis laxa coarctanda, vel laesa consolidanda, & adstringentibus, imprimis Martialibus, firmanda.

Ad hos scopos assequendos observandum:

I. Ne subito nimis, qualiquandiu iam duravit, supprimatur fluxus, sed potius successivè; adeo omnis subita suppressio periculosa esse solet: Conf. M. A. N. C. Ann. 2. loco allegato.

II. Dieta probe observanda, & ordinanda, quae consistit in potu calido, quiete corporis & animi perquam necessaria, extremorum fortu calido, vitando aerem frigidum, & vinum: huius enim usu ordinariè exasperatur insigniter fluxus.

III. Quoad Purgantia: laudantur ab his, culpantur ab illis. LINDANUS sanè ab his abstinendum esse ait. Interim tamen cum distinctione hoc accipiendum: Conveniunt nempe Purgantia in subiectis serosioribus, ut ita serum nimium euacuetur, & ita subtractio sanguinem diluente latice, hic spissior redditus minus effluat: deinde commodius ad praecavendum, antequam ille fluxus superveniat, non in ipso fluxu, adhibentur, cum, si in ipso fluxu propinentur Purgantia quaecunque, mensium fluxum potius stimulent & promoveant. Aut ergo penitus omittenda, aut, ubi iisdem utendum est, lenia sunt usurpanda, & quae adstrictionem aliquam post se relinquunt; quae inter eminent Rha-barbarum, etiam à BARBETTE laudatum, quod in talibus casibus vi alterativa plusquam, quam laxativa noceret, & Myrobalani: vid. SENNERTUS Prax. l. 4. p. 2. S. 2. c. 6. Et quidem Rha-barbarum propinatur ad ℥i. cum conservae rosarum mixtum, vel cum syrupo cydoniorum aromatisato, seu simplici: v. g.

℥i. Pulv. Rha. Barb. el. ℥i. 3℥. ad 3℥.

Miv. cydon. simpl. 3℥. vel 3℥.

Aque plantag. 3vi. ad 3℥.

M. pro haustulo laxativo, qui post se adstrictionem relinquit.

D. S.

Potio abluens.

In ipso fluxu etiam nimio singularis septimanis bis Rha-barbarum usurpari potest à 3℥. ad 3℥. vel solum vel cum puca moschata, manè in vehiculo calido: e. g.

℥i. Pulv. Rha. Barb. 3℥. 3℥. ad 3℥.

Nuc. mosch. gr. vi.

M. D. S.

Pulvis abluens.

IV. Venae sectionem in brachio sunt, qui suadent, ut repellatur sanguis ad loca superiora; sed quocunque loco instituitur, pessimo adhibetur consilio. Quid enim opus est sanguinem ex nimio fluxu deficientem ulterius imminuere? potius removeantur causae fluxum stimulant, & ipse cessabit fluxus. Vanum ergo, in nimio mensium fluxu praemittenda esse universalia, quae non ineptè intellectus multos perdit. Stultum remedium venae sectionem vocat LINDANUS, quod potius plus promoveat fluxum, quam prohibeat. „Ego, dicit, plures tales absque venae sectione curavi; doctus enim, à venae sectione fluxum fieri vehementiorem. Neque etiam laudo, dicit, cucurbitulas; licet enim aliquid agant applicatae, tamen, quando attrahere cessant, rursus procedit fluxus. Solent enim aliis Praetici cucurbitulas nunc dorso, nunc etiam mammis applicare secundum HIPPOCRATEM, nempe Sect. 5. Aphor. 50. Mulieri si places menstrua si-

„flere, cucurbitulam quam maximam ad mammas appone. Has tamen nocivasse, etiam putat BARBETTE in Praxi.

V. Quin praestat, si in statu sanguinis seroso evacuatio quaedam instituenda, loco Purgantium aut venae sectionis persudores & diuresis eandem instituere, ut ita textura sanguinis alteretur, & etiam serosum vehiculum una cum acrioribus salibus nonnihil subtrahatur, unde reliqua massa sanguinea necessariò crassior ac spissior fieri debet. Et ut ut sub ipsa sudatione fluidior reddita massa sanguinea uberius per uterum excerni videatur, post persatam tamen sudationem, dum serum fuit evacuatum, & sanguis spissior factus, fluxus uterinus postmodum cessat. Idem est cum Diureticis.

VI. Opiata in paroxysmo praecavendo & curando multum profunt, cum & spirituum impetum sistendo, & irritationem circa partes uterinas sufflaminando, notabiliter fluxum impediunt. Habeatur tamen ratio in eorum usu virium, ne viribus nimis exhaustis copiosius usurpentur opiata.

Remedia ergo, quae contra fluxum mensium nimium sunt in usu, sunt maximam partem vel Absorbentia aut Temperantia ratione sanguinis; vel adstringentia ratione uteri. Sanè vix reperitur hic fluxus nimius, nisi ut plurimum simul subit acidum sui generis eundem stimulans. In genere ergo, quae alias ad haemorrhagias nimias superius lib. 1. sunt commendata remedia, etiam hic habent suum locum. Ex quidem, ubi est acor galenus sanguinis est nimius, ibi oleum seu spiritus vitrioli in aqua plantaginis propinatus, & subinde libatus, sanguinem sistit, idque imprimis, ubi calor & ardor simul affuerint. Quando minor adest estus, solum nitrum preparatum, aut ex ipso paratus lapis prunellae, sufficere possunt: quin & tunc alia blanda acida adstringentia Corallinis, cydoniatis, ac similibus mista, utiliter usurpantur, v. g. succus & syrupus granatorum, succus berberum cum corallinis preparatis, cum syrupo coralliorum Quercetani, ac similibus. In specie tamen appropriata, sanguinem in crassantia & adstringentia, & fluiditatem corrigentia, sunt sequentia: plantago, quae ipsa, quacunque ratione usurpata, mirè conducit: Succus plantaginis ad uncias aliquot internè haustus multum conducit: Sic experimento SOLENANDRI ex succo plantag. 3iv. colophop. 3i. exhibito, nimium menstruum fluxum curatum, observavit SCHLEGELIUS: vid. VELSCHIVS Mistom. Cent. 1. observ. 43. annexis ann. 4. & 5. M. A. N. C. Sicut etiam idem succus extrinsecus in vaginam uteri introitus, vasa adstringit; vid. FORESTUS: aut etiam mixtura ex panto aceto & bolo armena, simul etiam vulgari, eternè imposita lumbis, & regioni hypogastricae, aut genitalibus, aut utero injecta, insigniter sistit fluxum. Post plantaginem est portulaca, item bursa pastoris, urtica maior, millefolium flore albo, & imprimis horum succi, qui mensium profluvium sistunt: item muscus prunorum sylvestrium, & muscus quercinus ad 3i. in ovo sorbili mixtus, si non primà vice, certè secundà vel tertlà vice, nimium uteri fluxum compescit. Potè singularis est hymachia flore purpureo, & similia: item symphytum maius, eiusque radix, radix bistortae, imprimis acori palustris seu acori adolterini, & ex eodem paratus syrupus adstringens Langii: sic etiam nux moschata, cortices aurantium acidorum, eorumque decoctum, commendantur à quibusdam; item cortices radices mori, cortices granatorum. De floribus balustiorum res nota est. Semen papaveris & hyoscyami modò dictis convenienter additur; unde pulvis ex semine hyoscyami Plateri, ac huius valde similis Hearnii, conveniunt. Pyra, sorba, cydonta, mespilla, & similia adstringentia, sunt nota. De semine argentine vid. BURGOLIS Lib. de Obstetricibus T. 4. cap. 7. Lignum Lentiscium, ubi prostat, & ex eodem paratum decoctum, experimentum est FONSECAE, qui istud insigniter commendat & laudat. Ex hoc ligno Lentiscio desumpta massae etiam egregia est virtus, unde pro potu ordinario Decoctum massae in vino austero usurpandum venit. Alii vitum quercinum ad 3i. in ovo sorbili propinant, & ita mensis restinguunt.

Ut plurimum tamen ad serum sanguinis, vel copiosius vel aquosius, respiciendum erit: pro quo scopo remedia inter eminent Mars & Martialia quaecunque, sive sint aperientia, sive sint adstringentia, imprimis ubi cachexia imminet; hinc excellit hic liquor Martis solaris, qui, ut mensis stimulet, tamen & mensis nimium fluentes,

& lo-



de lochia nimiam fluentia sistit, *aperit & constringit*. Egre-  
gie ergo convenit. Per se namque omnia remedia ex Marte  
adstringunt, & dum absorbent acidum in primis viis, si non  
inveniunt, quæ præcipitent & absorbeant, tunc vi aperi-  
væ vel potius alterativæ optimè conveniunt. Unde juxta hæc  
*tinctura Martis adstringens*, vel *tinctura sulphuris vitrioli*,  
quæ est Martialis, vel tinctura antiphthifica, ex vitriolo  
Martis & saccharo Saturni parata, sunt optima. Pertinent  
huc alia subiecta Martialis, ut lapis hæmatites præparatus,  
qui in succo granatorum vel cydoniorum sumptus menses si-  
stet. Tinctura lapidis hæmatitis, item liquor stypticus ex  
terra Martiali, quæ in fodinis Martis reperitur, cum spiri-  
tu vitrioli paratus, & similia alia Martialis adstringentia.  
Præter dicta inter Simplicia sunt adhuc corallia pulverisata,  
vel præparata, & omnia ex corallis parata, tinctura eorum  
cum spiritu lignorum parata, & alia ex corallis parari pos-  
sunt: Nam POTERIUS in Cent. 3. cap. 43. & 95. curavit  
immodicum & inordinatum mensium fluorem, aliis irri-  
tis, essentia Martis adstringente ac tinctura coralliorum. Ho-  
lus item Armena, terra sigillata cum spiritu vitrioli irrorata,  
& quælibet his cognata Martialis, uti etiam medulla sa-  
porum, egregia sunt remedia; nam sic potentiùs adstringit  
terra vitrioli dulcis. Præter Martialis atque conveniunt in  
specie talia, quæ adhuc serositatem absorbent, acrimoniam  
temperant, & partes laxatas vi stypticâ firmant: qualia  
sunt *succinum album*, *trochisci de carabe* à ʒi. ad ʒi. de terra  
etiam sigillata, os sepis præparatum, sanguis draconis. Pro  
vehiculo tallum inservit aqua ad hæmorrhagiam uteri Myr-  
sichti, tenellorum cornu cervi, spermatis ranarum, aqua, suc-  
cus & syrupus plantaginis, portulacæ, millefolii, urticæ  
maioris, item syrupus granatorum, syrupus coralliorum,  
Quercetani, papaveris, & similia possunt addi.

Juxta hæc ex regno animali, sicuti alias hæmorrhagias,  
ita in specie uterinas, sistunt stercore: quæ inter primatum  
obtinet asininum, & hinc suillum, sive pulvis, sive ex iis-  
dem exprimitur succus, qui cum tantundem syrupi myr-  
sillorum miscetur & diluitur cum aqua plantaginis: e.g.

ʒi. *Aqua plantag.*  
Succ. sterc. asin. vel suill.  
Syrup. myrsill. an. ʒi.  
M. S.

*Potio adstringens.*

Vel ex hoc stercore asinino vino infuso, addito saccharo,  
fiat syrupus, mirè conducens ad uteri hæmorrhagiam; nam  
stercus asininum est potentius porcino. Imò stercus caninum  
album pulverisatum, & defectu dictorum stercoreum vel per  
se, vel cum aliis propinatum, nobile est remedium, & cer-  
tum experimentum. Novi mulierem jam vetulam, quæ  
adhuc in media ætate seu flore ætatis aliquando desperatâ  
uteri hæmorrhagiâ laborabat, quæ, aliis omnibus irritis, ar-  
repto stercore canino ex platea, pulverisato, & vino acidulo  
propinato, sublevata & sic curata fuit: Sic jam dimidiis  
annus est, cum experimenti gratiâ mulieri rusticæ, graviter  
hoc malo afflicta, rusticum remedium suavi, scilicet ster-  
cus caninum, quo assumpto, subito convalescit. Adertant  
verò adhuc tormina, forsitan ex grumis sanguinis adhuc resi-  
stantibus, quæ propinata tincturâ bezoardicâ, mediante  
blando sudore spontè sedabantur. Aliâ setiam usnea cranii  
humani ad ʒi. interius usurpata, aliis nihil juvantibus,  
multoties à D. MICHAELIS experta fuit; nam mirè con-  
ferat sedandam quamcunque, in specie uteri, hæmorrhagi-  
am. Vitellum ovi in vino rubro dissolutum, ac sæpius  
repetitum, experimentum est HARTMANNI, quod di-  
dicitur ex AMATO LVSIANO Centur. 4. Curat. 12.  
Ubi refert, menses diuturno tempore fluentes, aliis irritis,  
per vitellum ovi in aqua rosarum dissolutum, restrictos. Con-  
veniunt uterius ossa & cornua animalium calcinata, cornu  
cerviustum, cortices ovorum usti, item rasura cranii hu-  
mani pulverisata &c., quæ ad ʒi. subindè assumpta, etiam  
egregiè conducunt. Rasura dentis hippopotami in aqua san-  
guisorbæ assumpta ab HOECHSTEDTERO Decad. 4.  
Cas. 2. insigniter laudatur. Quidam similiter usurpant  
Sperniolam Crollii, quæ tamen propter myrrham & crocum  
ingredientia minùs commodè applicari potest. Pulvis turtu-  
ris certo modo præparatus est experimentum certum FO-  
RESTI, quod describit lib. 28 observ. 10. & quod postmo-  
dum in usu comprobavit LINDANUS, qui hoc ipso pul-  
vere turturis aliquando in desperato casu ægram sublevavit.  
Videatur præparatio in FORESTO, HARTMAN-  
NO & aliis. Quin & essentia mumiz, aut ipsa mumia,  
quantitate avellanæ in vino rubro, aut in aqua plantaginis

vitriolata assumpta, cuidam in secretis fuit, aut his cognata  
papaverina.

Cum his ex opio parata anodyna nunquam omittenda  
sunt ad sanguinis excretionem sistendam: quæ inter excellit  
laudanum opiatum, Theriaca, trochisci de carabe, ele-  
ctuarium diascordii Fracastorii, cum vehiculo acido assump-  
ta: Nam si oritur fluxus ex nimia turgescencia, eundem  
simpliciter sistit spiritus vitrioli in aqua plantaginis: Sic pi-  
lulæ POTERII laudianæ ex laudano opiato paratæ insigni-  
ter profunt: Refert namque POTERIUS Cent. 3. cap. 49.  
se aliquando continuum sanguinis ex utero fluxum duobus  
annis perdurantem curasse per vitrioli Martis & pilulas lau-  
dinas, cum jam cachexia & leucophlegmatia immineret.  
Sulphur antimonii TACHENII vi anodyna hæmor-  
rhagias uteri sistit.

Denique alumen & aluminis usus etiam sunt experta re-  
media; Alumen enim crudum à ʒi. ad ʒi. vel ʒi. quotidie  
assumptum, vel per se, vel cum aliis, remedium summum  
est Zwelferi. Unde etiam à quibusdam balneum aquæ, in  
qua alumen pulverisatum decoctum, seu infallibile experi-  
mentum commendatur.

Ex his multæ fieri possunt formulæ: e.g. LINDANUS  
sequenti pulvere composito quamplures restituit, specia-  
tim dum ex nimia serositate sanguinis malum ortum tra-  
xerit:

ʒi. *Corall. rub. præp.*  
Succini flav.  
Bol. Armen.  
Sangu. dracon. an. ʒi.  
Sem. plantag.  
Borrac. calcin. an. ʒi.  
Laud. opiat. gr. iv. vel vi.  
Extr. croci Hartmanni (Prax. c. 59. §. 8.) an. ʒi.  
M. sub forma Pulveris.

Pulvere hoc ipse innumeras mulieres, mensium nimio  
fluxu laborantes, restituisse dicit. „ Inter alias, pergit, nu-  
„ perimè curavi feminam, quæ per triennium hoc fluxu la-  
„ boraverat. Me nunquam fecellit. Nullo alio opus habetis  
„ remedio. Verùm notetis, continuari oportere, si opus fue-  
„ rit, & repetendum. Continuari debet per 3. vel 6. septi-  
„ manas, & ultra. Usus est ter in die, manè, ante prandium,  
& antequam ad ʒi. Vel cum f. q. syrupi de rosis siccis f. Ele-  
ctuarium, cuius dosi nucis castaneæ magnitudo. Sic ego ad  
imitationem hujus pulveris aliquando mulieri corpulentæ,  
sed sanguine serosiore turgidæ & scorbuticæ, post abortum  
aliquo temporis spatio interiecto subindè in enormem uteri  
hæmorrhagiam relabenti, aliis fere frustraneis, cum successu  
præscripsi hoc Electuarium:

ʒi. *Conf. ros. antiqu.* ʒvi.  
Diacydon. sine spec. ʒiij.  
Corall. rub. præp.  
Oss. hum. calc. præp.  
Trochisc. de carabe an. ʒi.  
Alum. crudi,  
Sem. plantag. an. ʒi.  
Laud. op. gr. iii. vel iv. vel vi.

Cum syrupo corall. vel de rosis siccis q. s. f. Electua-  
rium.

Quod ipsum in principio propter alumen aliquantulum tur-  
gescit, tanquam fermentans, sed mox spontè desinit. Hoc  
ter in die magnitudine juglandis capiendum, & haustus  
vini superbibendus, egregiè conducit ad sistendam nimiam  
uteri hæmorrhagiam.

Vel

ʒi. *Conf. rosar. vitriolat.* ʒi.  
Cornu cervi usti. præp.  
Hæmat. præp. an. ʒi.  
Alum. sacchar. gr. xii.  
Laud. op. per ferm. gr. ii.  
Cum syr. granat. acidor. f. Electuarium,  
D. S.

*Electuarium adstringens.*

ʒi. *Conf. ros. antiqu.* ʒi.  
Corall. rub. præp.  
Bol. Arm. præp.  
Hæmat. præp. an. ʒi.  
Cornu cervi usti. præp. ʒi.  
Alum. crudi ʒi.  
Laud. op. cum acet. præp. vel modo Glauberi gr. vi.  
Cum syr. de ros. siccis f. Electuarium.  
D. S. ut supra.



Dofis quantitas iuglandis manē poſt hauſtum iuſculum, item ante prandium, bihorio ante cœnam, & ſub introitum lecti, ſepius continuando.

Allud Electuarium vid. in *Idea Formul. Cl. 1. §. 6. & Decoctum adſtringens Cl. 4. §. 10.* Vel propinetur ſequens Mixtura Sylviana, ad omnes hæmorrhagias communis:

℥. *Aqua burſa paſt.*

*Plantag.*

*Tormentill. an. ℥i.*

*Aceti deſtillat. ℥iij. ad ℥ſſ.*

*Corall. præp.*

*Hamat.*

*Sang. drac. an. ℥i.*

*Laud. op. gr. ii.*

*Syr. myrtini ℥vi. ad ℥i.*

*M. S.*

*Potio adſtringens pro aliquot doſibus.*

*Decur cochleatim.*

℥. *Aqua ſperm. rana.*

*Fol. querc. an. ℥vi.*

*Hamat. præp. ℥ij.*

*Muſci crani humani ℥i.*

*Syr. myrtill. ℥iij.*

*M. S.*

*Potio adſtringens pro una vice.*

℥. *Aqua plantag. ℥iij.*

*Spiritus theriac. ſimpl. ℥ſſ. ad ℥iij.*

*Aceti vini ℥iij.*

*Corall. rub. præp. ℥ſſ.*

*Terra ſigill. vel hamat. præp. gr. xv.*

*Laud. op. Glauberi, vel cum aceto deſtillat. præp. gr. iij.*

*Syr. plantag. ℥iij.*

*M. S. ut antè.*

Huc pertinet Potio illa cum alumine & ſpiritu vitrioli, quam dedi ſuprà l. i. *Seſſ. 6. c. 1. ubi de vomitu nimio.*

Mulier in fluxu menſium nimio, omnibus 14. diebus recerenti, poſt ſetum mortuum, ordinaui liquorem martis ſolaris omni manē uſurpandum: appetente verò veſpera præſcripti ſequentem pulverem:

℥. *Corall. rub. præp. ℥i.*

*Dent. hippop. ℥ſſ.*

*Hamat. præp. ℥i.*

*Miſc.*

*Convaluit.*

Alla plebeia occaſione frigoris hyberni nimium & immo-deratum menſium fluxum patiebatur, cui ordinabam liquorem martis ſolaris, uſurpabat per quindecim dies & noctes, hinc ceſſabat.

Mulier alia menſium fluxum patiebatur, recente pane veſcebatur, & menſes ſiſtebantur (*ſubito enim ſiſtit menſes*) nec per dimidium annum recurrebant; abdomen intumeſcebat, ut putaret, ſegroidam eſſe; hinc effluxis ſex menſibus, occaſione ponderis & abdominis in altum elevati ſenſum ruptionis in inſi. ventriculo percipiebat, hinc maxima copia ſanguinis per plures ſeptimanas profluerebat, venter detumefcebat, vires labefcebat, appetitus deficiebat, ipſa pallida evadebat, unde pro adſtrictorio ſcopo liquorem hunc ordinabam, cuius uſu fluxus nimius ſiſtebatur.

Superiore autem ætate eundem liquorem dedi mulieri cui- dam nimio menſium fluxu laboranti, ſed fruſtrâ; quia bibacula erat, unde nihil præſtabat. Verùm corallia cum terra ſigillata aliquandiu propinata hunc fluxum curabant.

Mulier alia gravi hæmorrhagiâ uteri, cæque ſæpius recurrente, cum ſcorbuto & atonia uteri afficiebatur: curabatur, propinando interdum pulveris Rha-barbari ℥ſſ. pro doſi. Hinc præſcribebam:

℥. *Corall. rub. præp.*

*Lap. hamatis. præp.*

*Boli Armen. præp.*

*Unic. veri præpar. an. ℥i.*

*Sem. plantag. ℥i.*

*Alum. crud. ℥ſſ.*

*Laud. op. gr. v.*

*M. S. Pulvis.*

Bis in die capiebat, bihorio ante cœnam, & ſub introitum lecti, manē verò capiebat ſolut. martis cum ſucco pomorum gutt. xxx. Interdum pulvis iſte cum conſervâ menthæ, & roſarum rubr. an. ℥vi. & ſyrupo roſar. in conſiſt. Electuarii, ſed ipſi ingrati, redigebatur.

Hiſce maximam partem convaluit: nempe huius ſanguis

ſeroſior, acore ſcorbutico inquinatus, cum atonia uteri, & vicinarum partium; hinc Martialia, Rha-barbarata, & pulveres partim alterantes, partim abſorbentes, partim adſtringentes, proficua fuerunt. Inſequente tempore, crebriore & aliquandiu continuato ſucci abſinthii recenter expreſſi uſu macutino, optimè habuit, alterando dyſcrasiam ſanguinis, & atoniam viſcerum, hincque imminentiſ hydroſis metum avertendo.

Alia mulier ſeroſioris ac ſcorbuticæ admodum conſtitutionis, fluxu crebro & copioſo admodum tentabatur, idque per aliquot annos, præmiſſis Martialibus, & pulveribus modò præſcriptis ſimilibus, convaluit, capiendo omni manē ſucci abſinthii & plantaginis, ex conciſis recenter expreſſis, poſt iuſculum prolubitu, excipiendo ſubindè pro pane ebutyrato abſinthium, & quibuſvis 8. vel 14. diebus ſemel doſim pulveris rhabbari. Hiſce continuatis convaluit, & cum aliquandiu ex gemellarum partu fuiſſet laſa, ita, ut ſuperius graves dolores in profundo hypogaſtrii ſiniſtri perciperet, quos ſerè ſequiebatur hæmorrhagia uteri, horum ſuccorum diſto modo continuato uſu & hi evanuerunt. Tam præſtans eſt plantago in talibus caſibus, in cuius ſucci deſ. Au extractum ſuccolum, aut pulvis folior. plantaginis, commodè ſubſtitui poteſt.

Hæc ſunt Interna: Juxta quæ ſubindè tamen etiam quædam Externa, fluxum menſium nimium compeſcentia, & collo appendenda, & circa uterum applicanda ſunt. Jaſpidem collo appendendum ſunt qui laudant. Ego verò commendo buſonem violentè interemptum, exſiccatum; vel offa eius collo aut ſub axillis appenſa, ſiegeſtata: Alii buſones vivos contuſos, aut etiam exſiccatos circa oſſa ſacrum applicant, non abſque ratione aut ſuceſſu. MINDERERUS in *Medicina militari* producit nodulum appendendum, in quorana viridis lentè exſiccata fuit. Peſſi ex ſtercore aſinino & ſuillo cum ſucco plantaginis, & mucilagine ſeminis cydoniorum formati, ſindone excepti & applicati, potentiſſi- ſunt hoſ fluores: vel ex ſimo porcino fiat peſſus ad invationem CNOEFELII *M. A. N. C. Ann. 6. & 7. app. pag. 143.* loco quorum clyſteres uterini ex ſimplicium adſtringen- tium decocto, vel ex eorum ſuccis, addito alumine, vel ex ſucco ac decocto ſtercoris aſinini cum aqua appropriata, vel iniectiones ex ſucco plantaginis, vel ſolo, vel diſto ſtercore imprægnatæ, ſunt egregiæ: e. g.

℥. *Fol. querc. vel plantag. M. i.*

*Rad. torment. vel biſſort. ℥vi.*

*Gall. contuſ. ℥ſſ.*

*Stercor. aſinini ℥ſſ. vel hulus & ſterc. ſuill. an. ℥vi.*

*Coqu. in ſ. q. aqua ſimpl. ad ℥viii. vel ix. Colatura*

*D. S.*

*Inſperſio adſtringens.*

*Pro doſi ℥i. iij. ad ℥iv.*

*Iniſciantur per Metreſchiten.*

Plures formulas vid. in *Idea Form. Cl. 4 §. 17. & Colleg. Formular. p. ....*

Si ſimul dolor vehemens adſit, & ardor in vagina uterina, commodè etiam folia hyoſcyami & papaveris ſemen adſtrin- gentibus decoquendis poſſunt addi.

Cingulum ex helleborato, ſeu ex helleboro albo, cuius folia ſuor inſtar plantaginis, ſed maiora, experimentum eſt *Rencalini*, ut etiam *HARTMANNI in Praxi cap. 220. §. 12.* quo etiam ſeliciſſimum ſucceſſu uſus fuit *LINDA- NUS* in puerpera, cui fluitarunt nimis lochia: ſed æſtate tantum poſſunt haberi hæc folia recentia; unde in harum deſectu poteſt ſubſtitui cingulum ex burſa paſtoris & mille- folio, quod lumbis circumdari poteſt: Hiſce ſerè præferrem polygonum ſeu centumnodium, quod intra duos lapides con- tritum, ſub axillis, item circa lumbos, item in regione pu- bis, commodè applicari poteſt. *PANAROLLUS in Faſcit. Arcan. p. 414.* pro cura magnetica ad fluorem ſiſtendum com- mendat linteum ſanguine fluente imbutum, & ſub cineribus calidis poſitum, cuius ſumus utero inſpiretur & excipiat: Hoc ſuccedit, ubi eſt abſeſſu & turgelſcentia ſanguinis: ſed ubi eſt à nimia ſanguinis fluiditate, fruſtrâ adhibetur. De pulvere ſympathetico res nota eſt, quod etiâ hunc fluxum ſoleat ſiſte- re. Affirmavit mihi huius efficaciam quidam amicus, qui aliquando ſeliciſſimè huius percepit uſum: ſcilicet recepit hu- ius pulveris pug. i. quem diſſolvit in aqua tepida: ſolutio- ni immiſit linteum, ſanguine fluente recente tinctum. Ec- hoc ipſum prodeſt non tantum in vulgari hæmorrhagiâ uteri nimia, ſed etiam, ſæpeam poſt abortum ſequatur. Aliud experimentum refert *HELVETIUS in Diribi- torio*



rario Med pag. 117. quod nempe menses sistat, si mulier tali fluxu laborans induat indusium per octiduum à viro gestatum; sed metuendum, dicit, ne exinde in tantum superprimantur menses, ut nunquam amplius in posterum fluant.

Progredimur in Externis: Cataplasma ex gypso, vel terra cimelia, cum aceto irrorata, sping dorfi prope lumbos, applicandum: vid. TIMÆUS Von Gulden Klee, lib. 4. Cap. 29. & M. A. N. C. Ann. 6. & 7. app. pag. 142. Spongia marina in aceto simpl. aut rosaceo, vel solo, vel cum vino rubro permixta, bulliat seu impregnetur, & supra pubem aut genitalia applicetur: Conf. RIVÉRIUS Cent. 4. Obs. 86. Vel Spertiola Crollii in aqua spermatis ranarum dissoluta, & cum spongiis vel linteis duplicatis admoveatur vulvæ, & sic sistitur affectus.

Item

24. Rubr. fabril.

Hæmatis.

Terra vitrioli dulc.

Boli rubri an. part. æqu.

Pulverisata misc. cum f. q. album. ovor. & aceti in consistentiam Cataplasmatidis, abdomini, in specie regioni pubis, applicandi.

D. S.

Cataplasma adstringens.

Succus plantaginis etiam, vel ipsa plantago contusa, & cum aceto irrorata, mammis applicari debet; sic enim etiam uteri hæmorrhagia sistitur. Id quod etiam fit, ubi aqua spermatidis ranarum cum aceto permixta cum linteis aut spongia applicatur mammis. Optimum est sperma ranarum recens collectum, non destillatum, sed methodo Zwelfferiana per saccum transcolatum, & cum alumine conservatum, cum linteis duplicato, vel spongia frigide aut saltem tepide regioni pubis & uteri aut lumbis, aut regioni ossis sacri, vel cum spongia vulvæ, applicetur, sæpius repetendo: cui parum aceti rosacei potest addi: e. g.

24. Sperm. ran. meth. Zwelff. asserv. 3lv.

Aceti rosac. 3ss.

M. & in forma Epithematis dicto modo applica.

Si hoc non sufficeret:

24. Vitrioli ad albed. blandè calcin. q. v.

Sperm. ranar. non destillat. q. s. pro incorporatione ad pulvis mollioris formam.

Quæ mixtura cum panno crasso, vel linteis triplicato aut quadruplicato, dorso & lumbis versus & ad umbilicum usque applicanda, & egregie convenit.

De succo sempervivi, cum nitro & aceto, mammis applicato, vid. supra, ubi de phrenitide. Sacculus item ex stercore asinino in aceto calido immersus vel decoctus, regioni pubis vel vulvæ applicatus est, egregius. Chelidonium majus, aut plantago cum aceto contusa, pubi imponantur, item mammis; nam hæc mammis imposita fluxum uterinum restringere dicuntur, eodem modo, atque similia in maribus testibus admota, hæmorrhagiam narium sistunt. Unguenta sunt v. g. Comitissæ, quæ applicantur ossi sacro vel spinæ dorfi. Sed verum ut fatear, hæc ipsa parum aut nihil luant. Salvie succus cum farina triticea extra publi tanquam cataplasma applicatus, etiam compescit adstringendo hunc fluxum. Præterea suffitus ex thure, mastiche, ladanum, vel vapor aceti, super scorias Martis ignitas effusi, exceptus genitalibus compescit nimium mensium fluxum. Nihil quæ etiam menses sistere dicitur, quàm sumus seminis sinapi, vel salviæ herbæ, per infundibulum exceptus. Denique in malo chronico præmissis præmittendis usus externus thermarum naturalium est egregius. Fotus ex decocto aluminis pulverisati, vel solitario, vel addito centummodio, radice bistortæ, aut similibus, cum linteis multiplicatis aut spongia applicatus regioni pubis quibusdam convenit.

### C A P U T III.

#### D E

#### MENSIUM FLUXU DEPRAVATO.

**T**ertium in menstruo fluxu occurrens vitium est, quando hic viriosè seu depravate, & variis comitatus symptomatibus procedit: ad quod ipsum caput quamplurima accidentia & vitia, & quidem Mensium difficultas, pertinet.

### A R T I C U L U S I.

#### D E

#### MENSIUM DIFFICULTATE.

**V**tut quidem citra ullum gravius symptoma seu accedens menses naturaliter fluant, sit tamen in quibusdam, imprimis corporis impurioris & cacochymici, seu quarum succi à naturali ac debita crasi in varios, acriores plus minus, austeros vel acidos sapores degenerant, ut eadem circa mensium tempus uno alterove die ante mensium proveniunt, aut etiam dum actu erumpere incipiunt, capitis dolores, ventriculi morsus ac dolores admodum gravativos, pulsatorios & tensivos, in lumbis percipiant, qui subinde ad pubem usque se extendunt. Præterea non raro dolores atrocissimi, tanquam colici, abdomen excruciant, & variè femellas torquent; qui dolores ab umbilico, abdomen vagè percurrentes, ad genitalia continuantur, & hinc ad posteriora, ad lumbos, reflectuntur, & similes sunt doloribus parturientium. Ulterius imminentes quasi suffocationes, aut saltem insignes angustias in præcordiis, item cordis palpitantes, respirationes anhelas, ac similia pathemata persentiunt, imprimis uno alterove die, dum menses instant, donec eorum fiat fluxus; quibus fluentibus, symptomata hæc aut remittunt, aut saltem continuant, licet non adeo atrociter, donec cessante mensium fluxu omnia denique pacata fiant. Affectus est satis frequens in mulieribus, quæ vitam agunt sedentariam, aut is, qui nunquam pepererunt.

### C A U S Æ.

Causa difficiliorum horum menstruorum eadem sunt, quæ mensium suppressorum, nempe orgasmus & fermentatio sanguinis menstrui ordinaria, quidem qualis extra menstruationem solet observari, sed quæ ob vasa vaginæ uterini nimis contracta, aut à prægressa menstruatione infarcta, facile impediunt sanguinis egressum, unde isti lumborum, & circa regionem pubis dolores tensivi, istæque pulsationes. Imò ex sanguine in præcordiis turgescente plus minus quasi & stagnante istæ anxietates, palpitantes cordis, & respirandi difficultas superveniunt. Quod si in cacochymiciis vitia ta bilis, vitiosusque succus pancreaticus sub ista sanguinis fermentatione copiosius in intestina effundantur, quod ut plurimum fit, hi vitiosæ ex effervescencia, cum acidum pancreaticum vitiosum in talibus imprimis præpolleat, copiosos generant flatus. Præterea acor iste vitiosus per intestina delatus, indeque etiam ad mesenterium penetrans, membranas & nervos, horumque plexus afficiens, illorum spasmos & convulsivas contracturas, colicas convulsivas, ac inde lancinantes vago ac mirè contorquentes dolores excitant, donec facta sanguinis evacuatione, & cessante eius fermentatione menstrua, omnia fiant pacatiora, in statum naturalem redeant. Uno nomine; tales mulieres patiuntur symptomata, simillima iis, quæ patiuntur passionem hysteriicam, de qua suo loco plura.

### D I A G N O S I S.

Hæc mensium difficultas ex ægra facillimè patet.

### P R O G N O S I S.

Quoad Prognosin: non contemnendum malum est, partim, quia subinde, nisi maturè succurratur, omnino menses supprimuntur, partim interdum gravia pathemata hysteriica dicta, aliaque symptomata, superveniunt. Imò ubi virgines tales difficiles patiuntur menses, ex mulieres sæpe, graves pati solent uteri suffocationes. Aliquot novi exempla.

### C U R A.

Quod attinet Curam: in hac tempus paroxysmi, & extra eundem observandum est. In paroxysmo

1. Fermentatio sanguinis menstrualis promovenda, ut menses promptius erumpant, quod faciunt aromatica volatilia.
2. Vitiati succi, præsertim primarum viarum, qualis bilis & succus pancreaticus, effervescentes corrigendi,



di, eorum effervescentiam coercendo, flatu hinc natos resolvendo: quod præstant Martialia, hinc acida fixa &c. Et

3. Denique nati exinde spasmi & spasmodicæ convulsionis abdominis supprimendæ.

Extra paroxysmum verò vitiosa crasis sanguinis remediis anticachecticis, hoc est, Martialibus, & aromaticis volatilibus, additis vel interpositis blandè Laxantibus, emendanda est.

Quoad tempus paroxysmi: imitandus hac in parte est HORSTIUS, qui in lib. 5. Obs. 27. habet exemplum scæminæ iuenculæ, quæ singulis mensibus paulò ante fluxum vehementissimos dolores quasi colicos patiebatur, cum subsequente diarrhœa, sæpius etiam vomitu laborioso, maximeque tensione versus pubem: Hanc ipsam curavit præmissis per os iduum ante fluxum Nodulo alterante & laxativo in vino, propinando in ipso mensium fluxu pilulas suas hyssericas, ex mensibus blandè stimulantibus compositas, quarum hæc fuit compositio:

℞ Aloes succotr. ℥iii.  
Myrrh. opt. ℥i.  
Extr. calami arom.  
Card. bened. an. ℥ss.  
Croci gr. lii.  
Rad. gentiana,  
Aristol. rot.  
Distamni an. gr. v.

Cum est myrrhæ f. Pilulæ:

Quarum ℥ss. vel ℥i. dies aliquot continuandæ sunt, ut citra molestiam fluant menses.

Conveniunt ergò in paroxysmo Clysteres carminantes & blandè laxantes, imprimis terebinthinari, qui difficiles menses facilius promouent. Item essentia ad menses composita, ex splene bovis parata, nunc sola, nunc cum essentia liquida Martis, vel solutione Martis cum succo pomorum permixta, cui & addi potest essentia croci. Ipsum Elixir proprietatis vulgare, vel, quod mellus est, sine acido, & antiscorbuticum, tinctura tartari composita rite parata, insigniter conducit ad promovendos menses difficiles, uti etiam menses suppressos, ratione aloes, croci & myrrhæ. Oleum destillatum anisi ad aliquot guttas propinatum convenientissimum est in doloribus abdominis quasi colicis, cum menstruorum eruptione coniunctis: Id quod didici ex RIVERO Cent. 4. Observat. 85. & huius etiam felicem usum aliquoties vidi; præstantius tamen est oleum destillatum succini: loco quorum spiritus salis ammoniaci succinatus & anisatus usurpari possunt. Parili ratione oleum destillatum cumini ad menses stimulos, imprimis dolorosos, convenit. In genere Martialia & Aromatica volatilia, speciatim appropriata, primum ducunt, quin etiam omnia remedia aromatica volatilia, quæ in suffocatione uterina sunt proficua, in paroxysmo commodè præscribi possunt, in specie tamen pulveres cachectici Martiales, castoreum & myrrha, & ex hac parata essentia myrrhæ cum tinctura tartari compos. V. g.

℞ Ess. Martis liqu. ℥ii.  
Ad mens. compos. ℥i.  
Croci ℥ss. ad ℥i.  
M. D. S.  
Essentia aperitiva.

Dosis 40. vel 50. guttæ ter vel quater in die, menses difficiles valde promouet.

Vel

℞ Tinctura vitrioli Martis Zwelf. ℥ii.  
Ess. absinth. vel cent. min. vel similis arom. ℥ss.  
M. S. ut antea.

Aut potest fieri talis Mistura:

℞ Aqua pulg. ℥ii.  
Artemis. ℥ss.  
Essent. castor. ℥ss.  
Spiritus salis ammoniaci ℥ss.  
Olei destillat. anisi gutt. lii.  
Syrup. de artemis. ℥vi.  
M. f. Potio: S.

Mistura aperitiva, cochleatim sumenda.

℞ Aqua fenic.  
Puleg. an. ℥i.  
Carminat. ℥vi.  
Tinctura tartari ℥ii.  
Liqu. cornu cervi succin. ℥ii.  
Syr. de artemis. compos. ℥ss.

Etzmull. Oper. Tom. II.

M. S. ut antea.

℞ Aqua fenic. ℥ss.  
Carminat. ℥vi.  
Flor. sulphuris (qui in doloribus abdominis colicis & hyssericis egregiè conueniunt) ℥ss.  
Castor. gr. xv.  
Myrrh. gr. viii.  
Salis vol. succini ℥ss.  
Syr. de Canell. ℥ss. vel ℥vi.  
M. S. ut antea.

De qua Mixtura successivè hauriantur aliquot cochleatim, & egregiè conducit ad lenanda symptomata in mensium eruptione.

Item

℞ Aqua pulg. ℥ii. vel huius & aque fenic. an. ℥ss.  
Cinnam. ℥iii. ℥ss. ad ℥vi.  
Essent. castor. ℥i.  
Spiritus salis ammoniaci ℥ss.  
Olei destillat. succini gutt. v.  
Syr. de artemis. compos. ℥iii.  
M. S.

Potio aperitiva pro aliquot vicibus.

Dulcia vitanda sunt in tali casu, quia malum exasperant fermentando.

Vel

℞ Aqua artemis. compos. ℥iii.  
Solut. Martis cum succo pomor. ℥i. ad ℥ii.  
Syr. flor. calend. ℥ss.  
M. S. ut antea.

Pui aliquando vocatus ad mulierem, quæ ex læsa digesta, cum instarent menses, graves abdominis patiebatur dolores, & subindè recurrentes leves hyssericas passionnes. Clyster hic fuisset optimus sine dubio, quem tamen respuebat: Præscripsi ergo sequentem potiunculam:

℞ Aqua hirund. cum castor. ℥ss.  
Carminat. ℥i.  
Puleg. ℥ss.  
Sperm. ceti i.  
Lapill. cancr. præp. (propter acidum) ℥i.  
Antimonii diaph. ℥ss.  
Sal. vol. succini gr. viii.  
Syr. de canell. ℥vi.  
M. f. Potio:

Quæ aliquoties cochleatim hausta symptomata levavit, & Menses provocavit:

Hæc potio etiam conveniret, si ex subito frigore externo suppressi essent menses propter sperma ceticoagulatum sanguinem resolvens, modo aliquid castorei in substantia addatur.

Mulier quædam difficultate mensium actu fluentium, doloribus vagantibus & lancinantibus in omnibus artubus, hisque scorbuticis, uti & hyssericis, abdominis pathematis afflicta, cum scotomitis, syncope, ita ut ab adstantibus mortura putaretur: huic præscripsi:

℞ Aqua flor. succini ℥iii.  
Ess. castor. ℥ss.  
Spiritus cochlear.  
Salis ammoniaci an. ℥i.  
Lapill. cancr præp. ℥ss.  
Syr. cort. aurant. ℥vi.  
M. S. ut antea.

Haustit cochleatim, unde insecuto sudore melius habuit.

Extra

℞ Olei destillat. succ.  
Spica an. ℥i.  
M. S.

Oleum aperitivum.

Mista illinebantur scrobiculo cordis, plantis pedum, & aliquot guttæ vertici.

At cum ex merore & tristitia ob obitum mariti graviter affligeretur cum summa virium prostratione & anæsthesia, nullum sentiebat membrum frigus verò continuum:

℞ Aqua menth.  
Flor. samb. an. ℥ss.  
Ess. ligni sassafr. ℥iii.  
Spiritus salis ammoniaci ℥i.  
Cochlear. ℥ss.  
Syr. scelotyrb. ℥ss.  
M. S. ut antea.



Profuit equidem, sed propter inquietudines nocturnas pariter & diurnas, ut & anxietates,

*℞. Lapill. cancr. præp. gr. xv,*

*Sal. vol. succini gr. vi.*

*Myrrh. gr. li.*

*M. pro Pulvere.*

Hinc melius habuit.

Ubi graviora adsunt symptomata, in specie dolores, ubi metus est, ne menses supprimantur, sicut per dolores in partu lochiorum fluxus subinde impeditur, tunc ut sistatur dolor, ad ipsum laudanum opiatum potest fieri accessus: hac tamen observata cautela, ut misceatur idem cum mensibus clientibus; notum enim est, quod laudanum opiatum sistat omnes omnino fluxus, in specie verò hæmorrhagias. Hoc ut ne fiat, sed potius caveantur ab eodem symptomata, opium cum mensibus clientibus aromaticis saluberrimo miscetur consilio; idque ad imitationem HOFFERI in *Herc. Med. lib. 7. pag. 306.* qui in his casibus commendat pilulas factas ex extractis aromaticis, calami aromatici, helenii, zedoariæ, radice gentiane, cardui benedicti, & aloes, cui laudanum opiatum admiscendum sit, cum menses ipsis veniunt cum lancinatione, ut granum unum alterumve extracti trochiscorum alhandal commodissime talibus pilulis admisceri potest.

Quoad Venæsectionem: Dum iam iam instant, aut etiam fluere incipiunt in graviore malo, eadem in pede secunda est: sin verò adhuc aliquot dies noctesque restent, (unum vel duos dies) antequam fluere debeant, vena in brachio nonnihil evacuanda.

Externæ omnia ea, quæ in colica convulsiva & passione sic dicta hysterica præscribuntur, conveniunt: item sequens fons:

*℞. Fol. lauri,*

*Herb. artemis. an. M. li.*

*Puleg. M. i.*

*Flor. chamom. Rom.*

*Samb. an. M. ss.*

*Rad. angel.*

*Levis. an. ℥i.*

*Bacc. lauri ℥i.*

*Junip. ℥ss.*

*Sem. q. cal. maj. an. ℥ss.*

*Concis. & contus. coqu. in f. q. vini vase clauso:*

*Colatura D. S.*

*Totus externus.*

## ARTICULUS II

### DE

## MENSIUM PAUCITATE.

**S**ecundum vitium in depravato mensium fluxu est *Mensium Paucitas*, dum fluunt equidem menses, sed paucius quam fieri debet, & non sufficienter.

### CAUSÆ.

*Causæ* ferè sunt eadem, quæ menses nimium inducunt suppressos; præprimis in his culpanda est visciditas & Lentor sanguinis ex chylosi læsa ortum ducens; quæ exinde fermentationi debite ciendæ ineptus est: Unde in tali casu observantur simul cum sanguine prodire cruda, viscida & mucilaginosa excrementa.

### DIAGNOSIS.

*Signum mensium paucitatis* est, quod mulieres tales patientur sub fluxu anxietates, si non consuetâ quantitate fluunt menses, si conqueruntur de palpitatione cordis, distelli anhelitu, de dolore pulsatorio circa lumbos, & tunc curanda venit.

### PROGNOSIS.

Cauti tamen simus in hoc passu, ubi curandæ sunt maritate, quæ conqueruntur de mensium paucitate. Ut ut enim post conceptum ordinariò menses subsistant, nihilominus tamen in quibusdam usque ad medium gestationis tempus seu mensem quartum ordinariam periodum

observant, aut saltem primis mensibus pauciore quantitate effluere videntur. Ubi ergo est suspicio gravidationis, cautus sit Medicus, ne intensè menses propriet.

### CURA.

In Cura addendus est stimulus mensibus apparentibus, sed non satis fluentibus, propinando in aqua pulegii aut cinnamomi borragiata borracem Venetam à ℥ss. ad ℥ss. cum aliquot guttis essentiae croci: aut etiam ex sabina paratum Decoctum, eiusque extractum, aut aliquot guttæ eius olei sunt egregiæ. Myrrha cum castoreo, cui sal volatile succini addatur, similiter potenter hic succurrit; non minus, quam spiritus salis ammoniaci, aut alius quicumque spiritus volatilis urinosus. Omnia ergo, quæ aliàs tanquam appropriata ad mensium fluxum promovendum dicta sunt, etiam hic conveniunt: & quidem, si magis urgeat malum, coniungenda venæ sectio in pede. Quandoquidem etiam loco venæsectionis in tali casu cucurbitule sine scarificatione possunt applicari cruribus vel femori in regione superiore interna: perinde etiam aut inguinibus applicatæ, promouent sanguinis fluxum. ZACUTUS LUSITANUS applicavit hirudines orificio uteri externo.

Sicetiam CASTRO in hoc casu pessores ex aloë misce ad sanguinem proliciendum deficientem commendat. Quod si forsan contingat, ut vasa vaginæ uteri citò nimis constricta ac angustentur, in tali casu externæ fomentationes ex Emollientibus, & stimulantibus, ex althæa, malva, meliloto, tabina, pulegio, maiorana, & similibus applicatæ conducunt: Vel excipiat vapor ex horum decocto, & hinc cum oleo cheirino illinuntur inguina.

## ARTICVLVS III

### DE

## MENSIUM STILLICIDIO.

**P**aucitati huic Mensium tertio loco oppositum est vltimum, *Mensium seu uteri Stillicidium*, Affectus mensium fluxui nimio cognatus, nec nisi minoris ratione ab hoc differens. Est scilicet continuus quidem, aut saltem unaquaque periodo diutius durans fluxus, sed qui non confestim more naturali, verum tantummodo successivè atque guttatim potius utero exsistit, quam effluit.

### CAUSÆ.

*Causa* huius mensium stillicidii est acrimonia sanguinis, coniuncta cum eius lentore & crassitie, quod tamen rarius est, frequentius concurrit simul viarum vasorumque angustia; unde irritatione quidem continuâ vasorum uteri sui excretionem continuè urget, sed ipse transire, aut sufficienter per angustiora loca transmitti nequit, hinc etiam continuata quidem, sed guttatim saltem sit mensium excretio. Unde etiam FORESTUS lib. 28. Obs. 37. observat stillicidium mensium diuturnum, quod tandem in exulcerationem uteri defuit in muliere insigniter cachectica.

### DIAGNOSIS.

Affectus ex relatione agnoscitur.

### PROGNOSIS.

Si accedit lentor & sanguinis crassities, malum est magis contumax.

### CURA.

Simili ratione curatur, atque fluxus nimius.

Præter universalia anticachectica Mars & Martialis, præsertim adstringentia dicta, imprimis primatum ducunt internæ, quæ huic medentur vitio, & cachexiam corrigendo, & acrimoniam acidam absorbendo, & simul partium tonum constringendo firmanz: Unde pulvis cachecticus, item crocus Martis aperitivus, & tinctura mar-



Martis blandè adſtringentes conducunt. Quarum ventriculo adhuc ſuus conſtat tonus, hæc capiant limaturam Martis, infundant vino cum cinnamomo; Vel recipiant vinum inſuſionis baccarum iuniperi cum croco Martis aut Marte crudo, & hauriant; ſit enim blanda tunc Martis ſolutio, cuius Martis tincturæ artificiali præferenda. Hinc Noduli laxantes & alterantes cum uterinis additis ex fumaris, meliſſa, zedoaria, Rha-Barbaro, & ſimilibus conducunt. FORESTUS cit. loc. caſtorei uſum inſigniter commendat.

Externè cum frequenter adſit excoriatio in utero, conveniunt iniectiones vulnerariæ.

#### ARTICVLVS IV.

##### DE

#### MENSIUM DECOLORATIONE.

**I**uxta hoc ſtillidium obſervandum, quod menſes interdum variis qualitatibus imbuti prodire ſoleant, quod pertinet *Menſium decoloratio*, illud nempe menſium vitium, quando non debito colore, ſed ſeroſior eſt inſtar loturæ carnium, albidus, lividus, flavescens, atrior, aut ſimul acris quæſi rodens, & variis ſædis coloribus tinctus, ſanguis ſe manifeſtat. In ſpecie quidem copioſus mucus viſcidus & albicans ſimul prodire ſolet, ita tamen, ut adhuc ſanguis abundet; aliàs enim ad fluores potiùs muliebres perſtiterent.

##### CAUSÆ.

Omnia hæc cachexiæ filiæ & cacochyliæ nepotes exiſtunt, ut ſuperius monui: Unde ad ſtatum ſanguinis cachecticum proſpiciendum eſt, utut quandoque coniunctus ſit fluor albus. Differentia horum eſt hæc, quod non ſemper continuet fluxus albus, interdum ſe ſociet cum menſium fluxu, & extra hunc etiam diſpareat.

##### CURA.

Colores ſædos curamus, curato vel fluore albo, vel curato ſanguinis vitio cacochymico: ubi præmiſſo vomitorio emittunt Martialia, aloë, myrrha, & crocus, ſive in forma ſolida, ſive liquida Elixiris, aut tincturæ tartari compoſ. propinquantur. Præter Nodulos alterantes & purgantes hic præmittendos, in hoc caſu Autores laudant ſcordium: Item hiſce addantur Elixir uterinum *Crollii*, uti etiam Elixir proprietatis, miſtum cum eſſentia croci, ut fiat validius. Inſtituatur etiam Purgatio, quibus pilulæ aloeticæ cum Mercurio dulci ſunt coniungendæ. Denique Bezoardicum Martiale, aut Bezoardicum ſoniale, item antihecticum *Poterii*, etiam hic inſigniter conducunt.

#### ARTICVLVS V.

##### DE

#### MENSIUM FOETORE.

**N**aturaliter equidem ſanguis, qui profluat, nullo odore eſt impregnatus, niſi ipſi calendi odorẽ tribuere velis, uti ſuperius monui ex *RIVERII Obſervat.* Interdum tamen ex ſanguinis ſtagnatione & mora in vaſis uterini, fetor contrahitur, & menſes ſæpidi ſeu cum fetore coniuncti excernuntur. Odor iſte ſæpidus interdum eſt hircinus, ſeu hircum olet certo tempore, interdum etiam alius quidam, vel ipſis mulieribus deteſtabilis.

##### CAUSÆ.

Fit ex inchoata putredine ſanguinis in vaſis uteri, dum alcali maſſæ ſanguineæ diſſolvit eius ſulphur, ſuperveniente verò acido deſtruitur hæc actio alcali in pingue, unde oritur iſte fetor. In ſpecie ſolet fieri, dum menſes pedetentim ſolent eſſuere.

##### CURA.

Cura eſt facilis. Opera danda eſt, ut per aromatica promovendo fluxum omnis ſanguinis remora tollatur. Aloë, myrrha & crocus, quæ & Elixir proprietatis, tinctura tartari compoſita, eſſentia myrrhæ, uti etiam ſuccinum, eſſentia ſuccini, & quælibet ſuccinata, baſſamum ſulphuris terebinthinatum, aloë, & omnia aloëtica, cum Mercurio dulci, ad abſumendam putredinem, in ſpecie volatilia, huic ſcopo egregiè ſatiſ faciunt.

#### ARTICULVS VI.

##### DE

#### ERRATICO & INORDINATO MENSIUM FLUXU.

**S**extò fit ſæpiùs, ut non certam ſuam periodum obſervent menſes, ſed inordinato fluxu recurrant, nunc poſtponendo quidem, nunc anticipando, interdum vagè comparando: quod vitium *Inordinatus menſium fluxus* vocatur.

##### CAUSÆ.

Sequitur hoc ipſum vitium ut plurimum viciatam ſanguinis craſin, quatenus ineptus eſt ad turgescentiam, quæ ſub tempore menſtruationis obſervanda eſt, cum genitalium partium debilitate; unde viciato ſanguine inordinata, interrupta ſcilicet & impedita, adeoque nunc maturè reſurgens, nunc iterum deficiens, oritur menſtruatio aut fermentatio, ipſo fermento menſtruo à genitalibus inſpirato, minùs volatili ſpirituoso exiſtente. Rariùs vitium eſt in utero. Semper ergo ad ſanguinem reſpiciendum eſt, quod confirmat cura.

##### PROGNOSIS.

Menſes, quando fluunt inordinatè, ſemper ſunt prodromi cachexiæ, malum, quod tandem in omnimodam ſuppreſſionem, aut Leucophlegmatiam, terminatur.

##### CURA.

Faciant pro *Cura* menſium inordinatorum utramque paginam Martialia & Corallia, & quæ ex his duobus ſubiectis parantur remedia egregia. Verùm necesse eſt, uſu eorum ſit continuatus; admiscenda ſubinde, quæ aut promovere non nihil, aut ſiſtunt fluxum: ſpecialim Martialia maritentur cum Aromaticis; quod præſtant vina Martialia ex inſuſo Martiali, addito cinnamomo, aut aliis menſes pellentibus: nunc ſiſtentia opiata, item Temperantia ſocianda: Nempe, ſi ſemper anticipare obſervetur fluxus, id quod ſerè acrimoniam ſanguinis ſtimulantem innuit, proſunt imprimis præter Martialia ea, quæ ſanguinem purificare dicuntur, ex fumaris, ſcordio, Rha-Barbaro Monachorum, centauro minori, helleboronigro, &c. & hinc, quæ eiusdem acrimoniam temperare ſolent, hæc præſertim cum ſucco fumarig. Ex Marte, præter crocos & eſſantias, etiam acidulæ artificiales conducunt, item vitrioli Martis artificiale purum, item pilulæ *Poterii*, quæ ſunt ex croco Martis cum gommatis, vid. eius *Cent. 3. c. 42.* Ex coralliis, corallia cum ſale ammoniaco ſublimata, & ab eodem præcipitata conveniunt: Item inſigniter proſunt tinctura coralliorum cum ſpiritu cordis cervi, quâ methodo præparata fuit à D. MICHAELIS, nec non tinctura coralliorum cum ſpiritu lignorum, aut in ſpecie ſaſafrata, quæ hoc in caſu tam in deſectu, quàm in exceſſu eſt egregia; revera enim aliquid Martis in coralliis rubris inesse videtur. His nunc ſtimulantia aromatica, præſertim ex myrrha, croco, &c. nunc ſiſtentia opiata, item temperantia, ſocianda: Nempe ſi ſemper anticipare obſervetur fluxus, id quod ſerè acrimoniam ſanguinis ſtimulantem innuit, proſunt imprimis præter Martialia, ea, quæ ſanguinem purificare dicuntur, ex fumaris, ſcordio, Rhabarbaro Monachorum, centauro minori, helleboronigro, &c. & hinc, quæ eiusdem acrimoniam temperare ſolent, hæc præſertim cum ſucco fumarig.



## ARTICULUS VII.

## DE

MENSIVM PER LOCA ALIENA  
EFFLUXU.

**D**Enique depravatur mensium fluxus, quando hi per *alia loca* excernuntur, idque nunc ordinatè, nunc inordinatè. Loca sunt varia: Observatæ scilicet fuerunt mulieres, quibus per gingivas; aliæ quibus per umbilicum; aliæ quibus per uterum aut vaginæ seu vulvæ labia; aliæ quibus per pollicem sinistri pedis emanarunt menses: sicut ex modò dictis exempla refert ZACUTUS LUSITANUS in *Prax. Admir.* & BARTHOLINUS *Hist.* 16. c. 1. menses ex pedibus fluentes observavit, quod propter vasorum uterinorum obstructionem à consuetâ via fuerint exclusi. Aliis per *mammæ* fluxerunt; imò ut plurimum per os, aut vomitu, aut, quod periculosius, sanguinis sputo, menses exciuntur. Præter BENIVENTUM refert sanè PANAROLLUS *Pent.* 1. *Observat.* 6. de vetula septuagenaria, in qua ab adolescentia semper menses per os citra ullam jacturam seu noxam fuerunt excreti: Imò in *lib.* 4. *Observat.* SCHENCKII prostant notata exempla mensium per vulnèra, mulieribus inflicta, erumpentium: Aliis quæ effluerunt per *annum*, aliis intra *ungues*, aliis ex *oculorum canthis*, quod SALA observavit, & per *salvatellæ* sectionem curavit.

## CAUSÆ.

*Causa* huius perversæ mensium excretionis ferè querenda est simpliciter in *vasis hypogastricis* ad vaginam uteri terminantibus (non enim fuit per uterum sanguis, nisi post partum) sanguini exitum querenti, viam intercludentibus, idque ex horum conformatione nativâ vitiatis, vel ex horum angustia & obstructione impeditis, unde sanguis tali organo hinc inde circulator tandem aliis locis exitum querit, & eundem invenit.

## CURA.

*Cura* ergò, habitâ simul ratione corporis aut sani, aut cachectici, ed est dirigenda, non ut supprimatur fluxus ex metu graviorum symptomatum, vid. M. A. N. C. *Ann.* 3. *Observ.* 24 p. 42.) sed ut revertatur saltem & ad locum naturalem, nempe uterum, ubi videm possit effluere: quod facilius fit, ubi aliàs per uterum iam fluxerunt menses; difficilius autem, ubi nunquam vestigia ista elegerunt.

*Internè* in *paroxysmo* pauca sunt in usu, quia ad uterum specificè non perveniunt, & tandem sanguinem plus excitant: *Externè* autem usurpentur, quæ sanguinis impetum vel ad inferiora trahunt, vel quæ *uteri vasa* hîscere faciunt.

*Extra paroxysmum* ergo saltem usurpentur internè Aromatica volatilia, vasa obstructa referantia.

Inter priora eminet imprimis saphenæ sectio, imminente fluxu instituta: item *cucurbitula* inguinibus aut pedum suris & femoribus in regione interna applicatæ, nunc cum, nunc sine scarificatione, uti hoc salubriter monet TULPIUS *lib.* 3. *observ.* cap. 23. qui suadet, ut quando sanguis menstrui per os reicitur, cucurbitulæ inguinibus applicentur: Sic AMATUS LUSITANUS *Cent.* 2. *Cur.* 21. refert, mulierem per mammæ sanguinem menstruum emittentem, curatam tamen per saphenam sectam: Idem AMATUS LUSITANUS *Cent.* 2. *Curat.* 17. refert mulierem enixam, quæ sanguinem menstruum per nares & os excernebat, sed saphenæ sectione, & cucurbitulis femoribus admotis, fuit curata: Notabile est, quod SANCHEZ refert in *Observ.* pag. 166. menses per aurem excretos sectione venarum utriusque brachii sanatos. *Pediluvia* etiam posunt institui. Inter posteriora sunt forus externi utero admoti, aut suffumigia ex colocynthide, aut pessæ ex helleboris, aloeticis & similibus in mensium suppressione usitatæ; sicut *Clysmata* acriora per consensum contiguitatis uterum, vellicantia, tempore quo menses redire debent, non omitteunda: Sic namque FORESTUS *lib.* 26. *Observ.* 25. refert, menstrui purgationem per vomitum rejectam, cum dolore circa lumbos & pectus, & urinæ suppressione; qui affectus iniectione clystere emolliente omnino fuit curatus, dum

ob alvum solutam vomitus cessavit, & menses ordinariò per uterum fluere ceperunt. donec tandem tempore instantium mensium venæsectione hi ipsi naturalem & ordinarium locum semper repetierint: Hinc *Clysmata* gravidis propter metum abortus suspecta sunt. Cum his instituantur *iniectiones uterinae* ex Decocto pulegii, chamomillæ, sabinae, unâ cum colocynthide, quæ in uteri vaginam injectæ penetrant, & aperiunt facilius vasa uterina. Omnia etiam, quæ *cap.* 1. in mensium suppressione pro usu externo fuerunt allegata, huc possunt applicari, habitâ simul ratione corporis ægri, an sani? an cachectici? ut intermedio tempore vitiiis ejus maturè occurratur.

Sed quid de gravidis? Gravidis interdum primis mensibus gestationis per loca insperata erumpit sanguis, menstruo succedaneus: Sic namque SALMUTH *Centur.* 3. *Hist.* 36. refert mulierem quandam gravidam, cui statim temporibus & quantitate sufficiente per urinas fuerunt excreti menses. Imò interdum gravidis per mammæ sanguis erumpere solet, signum ab HIPPOCRATE habitum pessimum, infirmioris scilicet fœtus debilitatis; quod tamen non est universale. In talibus ergo, ne periculum subsequatur, corrigatur perversus fluxus; aut ubi in bonè habitis ex redundante sanguinis quantitate oriatur, tunc in specie ex superioribus locis, v. g. e mammis si effluat, venæsectione in brachiis instituta commodè iste sanguinis motus & effluxus corrigi potest.

Hæc sufficiant de vitiiis mensium.

## CAPUT IV.

## DE

## FLUORE ALBO.

**L**Ocuti simul hæcenus de affectibus, qui vitio mensium mulieribus contingunt; & absolvimus etiam ea quæ huc spectant: Superest nobis adhuc cognatus affectus, Fluor albus mulierum. *Frequens malum* est, in quo præter sanguinem, quem nunc naturaliter, nunc præternaturaliter, genitalia muliebria plorant, etiam interdum liquor alius *serosus*, item plus minus *pituitosus*, ut vocant, excerni solet; qui affectus exin vocatur *Fluor mulierum albus*, à quibusdam appellatur gonorrhœa muliebria; à quibusdam tamen hi duo, tanquam affectus distincti, à se invicem separantur. Consideranda ergò historia huius fluxus: nempe *fluxus uterinus* est excretio colluviei variz per genitalia muliebria, dum scilicet nunc humor pituitosus seu crassus & mucosus, nunc aquosus & serosus effluit, isque interdum paucior, interdum copiosior, interdum plus minus acris & salinus & mordax, interdum verò benignus, mitis & blandus. Ut plurimum hic fluoris morbi solet esse *mitis*, pedetentim magis magisque accrescit, ut etiam subinde *excoriationem genitalium* inferat: *ALBUS* quidem est ut plurimum, progressu tamen temporis varius color confluit, rariùs lividus est aut flavescens, interdum, sed rariùs, nigrescit, in maligno statu viridescit, interdum alio, sed vitioso, colore estinctus: Inodorusest ut plurimum, rariùs solet esse graveolens, ut fetidus, nec solet esse ferè talis, nisi inordinariò, & simul quoddam exulceratio conjuncta sit, ex qua purulenta fœtor tunc simul oritur. Occupat hic fluxus omnia ætatis & omnis status femellas, tam *virgines*, quàm *maritatas*; Virgines inquam illibatas adhuc & innocentes: Falsum namque est, quod quidam putant, hunc fluxum iis non convenire, nisi quæ iam virum passæ fuerint. Falsum hoc est: Testantur namque observationes, præter *vetulas* etiam puellæ triennales, septennales, (vid. M. A. N. C. *Ann.* 9. *Observat.* 28.) item puellas novennes; item puellas tredecim annorum, quæ nunquam nec menstruum fluxum, nec virum passæ fuerunt, huic ipsi fluori albo fuisse obnoxias. Item mulieres, quas affligit, non solum *extra graviditatis tempus*, sed etiam dum *gravida* fuerint, solet affligere: Sic mulieres, dum gerunt *gemellos*, fluore hoc continuè corripuntur: Ipse memini mulierem gemellos gestantem toto serò gestationis tempore hoc fluxu admodum affectam fuisse; quod observandum contra eos, qui dicunt, ex utero effluere, quod in gravidis impossibile est. Unde etiam hic fluoris albus longe aliud vitium est à mensium decoloratione, cum æqualiter menstruatæ & non menstruatæ affligat, tam quæ nunquam adhuc menstrua viderunt, quàm etiam, quibus ratione ætatis & lege naturæ menstrua non amplius fluunt.



fluore. Et quidem maritatus familiarissimè affligit hic fluxus, rariùs verò virgines aut puellas adhuc innocentes affligit. *Typum* aut *periodum* certam hic fluxus observat nullam, sed nunc continuis, nunc interruptis quidem, sed inordinatis, vicibus recurrit, nunc *copiosius*, nunc *parcius*; nunc menses comitatur, nunc iisdem cessantibus aliquandiu persistat; circa menstruationis legitimum tempus tamen copiosius ferè & uberius antè aut post scaturit.

De hoc affectu, eiusque natura & causis, si liberè pronuntiare debeo, quæ sentiam, proponam; Nam à nemine adhuc eius natura legitimè producta fuit & explicata: Dico ergo, *hunc fluxum album mulierum nihil esse aliud, quàm gonorrhæam muliebrem; nunc veram*, quando liquor seminalis ex prostaticis glandulis effluit; *nunc notham*, quando alius exhor seu liquorem serosum variis quandoque coloribus effluit, ubi necesse est, adesse transcolationem quandam. Analoga autem est hæc muliebris gonorrhœa virili. Dico analogam; non verò eandem. Hoc negotium per se pateret, si ex Veterum hypothese mulieres in testibus semen elaborare, illudque in utero, & tandem in vaginam effundere, statuere velim; Sic enim, qualis esset gonorrhœa, per se pateret. Sed quia huic sententiæ minorem fidem habeo (scilicet seminis generationi in testibus muliebribus) quàm vulgò fieri solet, cum testes muliebres potiùs ovarium muliebre dicam, ob id hic fluore albus, seu gonorrhœa alio modo explicanda venit.

Hoc ut pateat, certum est, *fœminas in coitu sensibiliter*, interdum etiam extra coitum in somniis, utrobique cum insigni voluptate, aliquam materiam excernere; Hanc hac vice *lympham genitalem* vocabo (dabitur enim occasio ulterius de hoc discutendi.) Jam ergò, cum hæc ipsa materia, quam effundunt, non sit semen muliebre, quod propriè loquendo non habent, sed *locobius* prostantora, sequitur materiam huius non esse *seminalem*, sed eius usum esse, ut stimulet mulieres ad coitum. Unde autem excernatur? vel qualis hæc sit materia? hic questio est. Respondet hic HORNIUS Batavus iste Anatomicus in *Prodromo epistolico de Partibus mulierum generationi inservientibus ad Rolfincium missio*, qui satis est notus; In hoc asserit, quod mulieres, quancumque talem materiam voluptuosè in congressu excernant, hanc ipsam tamen non ex testibus effluere, sed ex glandulosa osculi uteri interni substantia per multos minuculosque meatus exprimi & elici, idque beneficio spirituum per arteriolas & nervos effluentium. Hæc HORNIUS asserit, utut per anatomem nondum omnibus oculariter demonstrata, multis tamen admodum probabilis videtur, partim quod maxima voluptas muliebris Venerea in earum clitoridè ex dulci eius à membro virili fricatorio motu, partim circa illud orificium uteri internum ab istius liquoris modò dicti excretionè percipiatur; Unde glandulosa istam orificii uteri internam substantiam prostaticis glandulis & spongiosis virorum in radice penis quodammodò analogam æstimant. Primus autem glaciem fregit GRAAFFIUS in *Anat. Partium genitalium Mulier. cap. 6. dicens*: quod meatus urinarius in mulieribus ubique sit circumdatus substantia membranacea glandulosa, analoga prostaticis glandulis virorum, ex quibus, circa meatum urinarium sitis, observata sunt lacunæ seu apertiones, quæ hiant in orificium uteri externum. Has lacunas etiam observavit RHODIUS in *Mantissa Observ. Anatom. Observ. 53. quæ Mantissa Observ. Anatom. Rhodii est annexa Cent. 6. Observat. & Hist. Anatom. BARTHOLINI*. Hic RHODIUS appositè refert, humorem quandam limpidum, seu, ut vocat, salivalem, qui in congressu maris pubem irrigat, & per binas lacunas, iuxta muliebris pudendi labia sitas, exsudare (tàm in quàm extra coitum) quæ lacunæ observabiles sunt imprimis in vivis mox post congressum, in defunctis verò, cum arcè conneveant, vix observabiles. His præmissis, dico: Liquor iste, in fluore albo emanat, excernitur partim ex binis lacunis, iuxta pudendi muliebris labia sitis, adeoque ex prostaticis glandulis circa meatum urinarium consitis, partim verò ex ipsa vagina uterina, quæ à Modernis membranoso-glandulosa dicitur. Ex quibus glandulis in coitu mediante attritu membri virilis etiam genitalem huiusmodi lympham turgescens mulieres unà excernunt, adeoque tam gonorrhœa muliebris, quàm fluore earum albus, etiam partim ex prostaticis glandulis, partim ex textura vaginæ glandulo-membranæ, explicanda venit: Nam immediate tales fluxus procedere ex massa sanguinea asseri nequit, cum in œconomia humana nunquam liquoris à

Est mull. Oper. Tom. II.

sanguine distinctio vel generatio, vel separatio, aut transcolatio sine certò, vel filtro, fiat. Ergo & tale organum hic pariter necessarium erit, nisi exulceratas semper has partes dicere velimus, & materiam profluentem purulentam sanie esse,

## DIFFERENTIÆ.

Pro meliore ergo distinctione observanda est *Differentia*, quedam in hoc fluore muliebri, dum alius est *sevirior*, in quo lymphæ genitalis pauca albicans, idque non adeò frequenter, sed interruptis vicibus, & nonnihil, parum tamen, spissa, glutinosa, mitis, sine sensu ardoris aut rofionis excernitur, & sine graviore corporis vitio ac labe est adiuncta; estque *Gonorrhœa vera*, in qua materia hæc est lymphæ genitalis, quæ solummodò ex dictis prostaticis glandulis circa vesicæ collum effluit: Id quod probatur ex GRAAFFIO l. 2. qui in muliere gonorrhœa laborante has prostaticas exulceratas observavit. E contrà observatur alius fluxus copiosus & continuus, ubi multa serosa subindè, variè colorata, interdum admodum acria & similia, uberiore rivo excernuntur, concurruntque tunc simul procedente malo Leucophlegmatia, cachexia totius corporis plus minus confirmata, interdum accedit tumor pedum œdematosus, torpor actionum, flacciditas membrorum, febres lentæ, & quæ sunt huiusmodi alia concurrentia symptomata: Estque hic posterior fluore *Gonorrhœa notha*, seu propriè dictus fluore albus; & hic iterum vel benignus, vel malignus. *Benigna gonorrhœa notha* est, modò enarratus lymphæ vitiata fluxus ex glandulosa textura vaginæ uterinæ, forsitan & prostaticis illis glandulis simul, vitio massæ sanguineæ totius cachectico, ex vitio stomachi circa chylicationem imprimis enata: Nam quod ex his prostaticis solis effluere nequeat, copia subindè eius insignis manifestè persuadet. Præ cæteris accuratè hos duos fluores, gonorrhœam hanc notham à vera distinguit HEURNIUS, vocans priorem *Profluvium uterinum*, tanquam quod solummodo ex uteri orificii vitio accidat: Posteriores verò *Profluvium muliebre*, seu id, quod ex tota muliere effluat. Denique est & *Gonorrhœa notha maligna* seu *virulenta*, h. e. fluore muliebris Gallicus, à contagio Gallico oriundus, nec nisi congressum cum infecto insequens, in quo acria saniosa plus minus purulenta ac livida subindè excerni solent. Plura, quæ ad cognitionem harum gonorrhœarum seu fluorum muliebrum, de quibus, ut dixi, pauci Auctores fecerunt mentionem faciunt, qui cupit, videat HOECHSTEDTERVM in *Decad. 4. observ. 1. in Scholiop. 287. imprimis pag. 296. & ex hoc etiam SCHNEIDERVM lib. 3. de Catarrhis; ubi p. 282. & sequ. fusè & prolixè historiam huius affectus cum primis ex aliis Auctoribus declarat in integro cap. 8. item SYLVIVM lib. 3. Pr. cap. de Fluore mulier. pag. 147.*

## CAUSÆ.

*Causam* ergo quod attinet fluoris primi, seu gonorrhœæ veræ: est materiæ istius genitalis copia & ubertas, aut eius spirituosior turgescens, vel eiusdem acrimonia, coniuncta tamen cum aliquali orificiorum binarum glandularum prostaticarum laxitate seu flacciditate, quæ sola etiam hanc Gonorrhœam inducere solet; Unde hæc faciliùs dilabit ex se permittunt dictam materiam, &c. Frequentissima causa ex his videtur acrimonia istius lymphæ irritans, & ita sui excretionem provocans. Accedit & imprimis *epitus* ad aliquod tempus intermissus, aut ingens coeundi tàm in maritatis quàm in virginibus desiderium: *Virginibus* enim *salacibus*, & quæ propter humiditatem vasa spermatica habent laxa, & semen agnosius emittunt, hi fluores solent esse familiares, imprimis, ubi adest simul laudabilis vitæ ratio, vita sedentaria, & curis ac meditationibus vacua, & quæ minùs gravibus turbata est affectibus.

*Cause remotæ* eisdem ferè sunt cum istis, quæ Gonorrhœam in viris inferunt.

Posterioris vero fluoris seu *Gonorrhœæ nothæ benignæ causæ proxima* investiganda est in lymphæ, in dictis locis collectæ, & alteratæ, nimia acrimonia, eaque quidem nunc *salsa muratica* simpliciter, nunc *acida salsa*, unde subindè exoriationem, dolores, interdum dictarum partium exulcerationem, insert: Accedit simul successivè à crobriore fluxu texture illius glanduloso-membranosæ laxi-



cas & flacciditas, seu tonsearum ita lasus & laxatus, in specie orificii, quacunq; ex cau<sup>sa</sup> stratus, unde ed<sup>o</sup> contumaciore emergit fluxus. Scilicet vitia huius & acrioris huius lymphæ ratio partim est in ipsis glandulis nimis flaccidis, mollioribus & laxioribus, earumque iam vitiatæ acido, fermenti instar lympham transcolandam in tale liquamen alterante, partim est in ipsa massa sanguinea & chylo vitiatæ, ex quibus sit lymphæ istius secretio: vid. SYLVIVS lib. 3. *Prax. cap. 4. pag. 167.* Nam observatur in talibus vitium sanguinis plus minus cachecticum ex vitio ventriculi circa chylicationem imprimis enatum, vid. ZECHIVS *Conf. 37. & 97.* unde partem primariò affectam stomachum esse, BARBETTE asserit in *sua Praxi*. Hinc per dictas partes glandulosas, tanquam per emunctorium quoddam uniuersale, massæ sanguineæ cruditates cachecticæ, copiosiore seruariore dilutæ, euacuantur & transcolantur, ac ita tædiosè & continuò istæ nymphæ aliàs in sicco ludentes, humectantur & maculantur. Cum verò simul de spiritibus ac nutritivo rore plus minus euacuetur, habitus corporis perfectè sit cachecticus, ac tandem perfecta quadam leucophlegmatia; hinc tumores pedum œdematosi, febres lentæ, appetitus Veneris extinctus, & similia concurrentia symptomata manifestè se exhibent in talibus scæmellis. Quod verò in specie per has partes glandulosas genitalium ista effluant sanguinis liquamina, in causa est iunctum proprium glandularum vitium, harum scilicet vel nimis laxarum, flaccidarum, erosarum, & quasi resolutarum. Unde præter alias causas remoraseriam partus difficilis (vid. BLASIVS P. 5. *Obser. Anat. 3.*) aut abortus interdum in causa est, ut oriatur talis fluxus ex laceratione, aut alia lusione harum proflatarum, vel earundem sensibilitus irritatarum, hinc liquorem uberius transmittentium, vel quavis alia occasione interna aut externa, unde semel facta excretionem continuata postmodum transcolatio succedit.

Nihil est, quod huc theoriæ obflare possit; saltem unicum est, quod scrupulum movere videtur huic asserto, nempe abundantia seu excessiva subindè copia materiæ excretæ, quæ cum parvo colatorio vix consistere potest: Sed quando modò consideremus, quantum materiæ subindè unicà die & nocte, dum coryzâ laboramus, per nares excernatur, quantum materiæ in cacoehymicis subindè ulcusculum quoddam plorare soleat, quantum materiæ continuò stillent lippientes oculi, &c. facile possumus concipere, quod & per has proflatas vitiatas ex massa sanguinea cacoehymica copiosius tale liquamen continuò effluere possit in malo inveterato. Nempe quod est in naribus coryzâ, in oculis nimia lachrymatio; in faucibus copiosior tussis & secretus, h. e. talis, tam in maribus quàm in fœminis, gonorrhæa notha; adeoque tam ad materiæ & ceterorum contentorum vitium, quàm ad partis solidæ affectu morbosam constitutionem, simul respiciendum. Speciatim acidum sui generis seu specificum est, quod alterando materiæ lymphæ, quàm afficiendâ istas glandulas circa genitalia, hunc fluxorem album mulierum infert, cuius primus faber in ventriculo residere videtur, utur semel factâ per ista loca excretionem ulteriori postmodum quælibet vitiatæ sordes unâ evacuentur. Scorbuticæ præsertim & gravidæ & pertinacis fluxore eiusmodi albo laborare observantur. Simul tandem observandum est pro ulteriore scrutinio, quod habet HORNIUS l. a. nempe orificium uterinum internum esse glandulosum, ex quo etiam succus seminalis soleat emitti: videatur David von der Becke in *Meditat. circa Principia Rerum Natur. pag. 193.* ubi refert, vaginam uteri esse porosam, & continuò quandam lympham solere transsudare, & humectare genitalia viri in congressu: Interim SYLVIVS asserit, totam substantiam uteri & vaginæ esse membranoso-glandulosam, quæ hypothesis & fermento menstruo & huic fluori albo, præterea nutrimenti fetus transcolationi, & quam plurimis similibus problematis solvendis, aptissima esse solet.

Hæc quoad Theoriam huius Affectus.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa: Morbus hic patet Medico ex relatione ipsarum ægrarum: Et quidem imprimis distinguendus fluxor hic, qualis sit gonorrhæa? an vera? an verò notha? & quæ differentia ex adiunctis & ex effectu patet. Prior enim fluxor paucus est in moderata quantitate, crassius

scelus, glutinosus, serosus, citra ullam materiæ acrimoniam, nunc flatis, nunc vagis temporibus evacuat, & talis gonorrhæa vera seu fluxor subindè diu sine insigni incommodo perdurare potest: Sin verò copiosiora acrisa serosiora, viridescencia, fetida, tenuia, aut similia plus minus alterata effluant, accedente comite cachexiâ, prostrato appetitu, tumore pedum, roctibus, virium prostratione, omnium actionum torpore, nausæ à coitu cum spiritus deficiant in genitura, dolore in lumbis, & circa os sacrum, &c. talia fluxum gonorrhææ nothæ ostendunt: cui, ubi & acrior simul concurrat lymphæ, febris nocturna seu vespertina, quasi catarrhalis, seu febricula quædam lenta, imprimis vespertino tempore exacerbans, solet simul supervenire.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Gonorrhæa vera nihil habet in recessu; notha verò præter alia mala hoc habet incommodi, quod subindè seminas redeat infecundas & steriles, utur non semper.

Quod si fluxores hi diutius duraverint, graves morbos, diabetem, languorem totius corporis, cachexiam, hydropem, tabem, atrophiam, item prolapsum sinus pudoris, infert.

Rarum interim est, quod refert BALLONIUS *consil. 59.* de Fluore muliebri continuò suppresso, quod exinde mutatus fuerit in diabetem lethalem.

Quò diutius duraverit gonorrhæa hæc notha, ed difficilius curatur, & imprimis sedula medicamentorum continuatione opus habet; hinc seminas nonnihil seniles malum hoc plerumque ad mortem usque comitatur. In iuvenilibus autem facilius curationem admittit hic fluxus.

Si acrior sit materia proflua, pruritus, ardores, excoriationes genitalium, gangrenæ, & tandem mortem infert.

### CURA.

Ubi fluxus hic est de natura gonorrhææ veræ, tunc observandum est monitum HELIDÆI PADUANI, qui in *Observat. pag. 179.* dicit: Si singulis mensibus bi, duo vel triduo durat, & postmodum cessat, hinc suo tempore redit, non est cohibenda; si verò perpetuò durat, mirari sistenda est. In Cura ergo Gonorrhææ veræ eodem modo procedendum est, atque in gonorrhæa vera virili, aut absumendo lympham genitalem, aut temperando eandem, aut adstringendo partes laxiores. Optima medendi ratio est copula cum viro, quâ in viduis & virginibus deficienter usurpentur ea, quæ aliàs in gonorrhæa virili ex tumescencia aut acrimonia nimia genitura sunt in usu, de qua iam *suprà lib. 3. cap. 2. Artic. 1. membro 1.* pluribus actum. In specie mala citria & limonia, eorumque succus ad ʒii. vel iii. singulo mane ad temperandam caliditatem geniturae, h. e. acrimoniam, & inde dependentem fervorem lymphæ genitalis, usurpantur, imprimis ubi cum ipso fluxu titillatio quædam aut pruritus ad Venerem fuerit coniunctus: sed continuanda sunt hæc. Item, terebinthina in ovo sorbili, vel mediante ovi vitello cum aqua florum salicis mista, omni mane assumpta, & aliquandiu continuata, conducit. Folia & flores seu cimæ salicis decocta in vino & potata, crebrius etiam hic conducunt; item succus extillans ex surculis salicum verno tempore incisis, quod aliquandiu propinetur. Decoctum & extractum florum urticæ mortuæ seu galeopsidos flore albo in hac gonorrhæa specificè laudatur; vel mentha & urtica hæc mortua, item sclarea, inicienda cerevisiæ, & ita potus hauriendus; Nam hæc urtica mortua, seu galeopsis flore albo præ aliis in gonorrhæa muliebri tam vera, quàm notha, convenit. Tanquam efficax & expertum commendatur sequens Decoctum:

ʒ. Rasur. rad. liquiritis.

Sem. myrtill.

Coriandri,

Plantag.

Vitici seu agni casti an. ʒi.

Papav. albi ʒii.

Hyoscyami ʒi.

Hord. mundat. M. i.

Acacia,



*Sem. sumach. an. ℥i.*  
 Contusa coqu. in f. q. aque chalybeate :  
 Colatura ℥i℥. addendo postmodum  
 Trochisc. de alkekeng. ℥i.  
 Misc.

Quidam

℥. *Sem. viticis,*  
*Plantag. an. ℥i.*  
*Ruta ℥i℥.*  
*Fol. menthae 4i.*  
*Corall. rubr. præp.*  
*Cornu cerui usti præp. an. ℥i℥.*  
*Ebor. rasur. pulv. ℥i.*  
*Maxill. luc. pisc. ℥℥.*  
 M. f. Pulvis.  
 Dosis est ℥℥.

Vel

℥. *Conf. flor. anthos ℥i℥.*  
*Ras. eboris pulv.*  
*Mag. succini cum spiritu vini extr. an. ℥i℥.*  
*Osteocoll. ℥i℥.*  
*Puram. avell. pulv. ℥℥.*  
 cum f. q. syr. rosar. rub. f. EleQuarium.

D. S.  
 EleQuarium adstringens.

Dosis magnitud. castaneæ.

Præter dicta Pulvis mandibularum lucii piscis à ℥℥. ad ℥i. usurpatus & continuatus, itidem conducere solet. Trochisci etiam de terra sigillata, trochisci de carabe, itidem in usu esse solent. Ipsum succinum etiam preparatum, & similia etiam sunt usus laudati; item balsamus sulphuris terebinthinatus.

Externæ Balnea & Fomenta blandè adstringentia, facta ex cortice radice pruni sylvestris, cortice ligni guaiaci, &c. cum alumine in aqua chalybeata, adiecto pauco aceto, decoctis, vel applicatis, vel iniectis, vel cum parva spongia instillar pelli applicatis, flacciditatem prostratarum coercere, & hos fluxus sistere valent.

In gonorrhœa verò notha benigna, seu fluore mulierum albo posteriore & deteriore, curanda:

1. Stomachi chylicatio procuranda & emendanda per vomitum, & administranda experta stomachica: vid. JUL. CÆSAR CLAUDINUS Resp. pag. 220. & RECHIUS Conf. 97.
2. Sanguinis cruditas cachectica corrigenda, partim per appropriata cachectica, aut remedia Martialia, partim salia volatilia & aromatica, præsertim ex lignis.
3. Ipsi fluori, & partibus à fluore levis adstringentibus & Nervinis est succurrendum.
4. In specie appropriatis seu specificis malo occurrendum: quæ ferè sunt talia, quæ acidum salum specificum temperant, serositates superfluas quasi imbibunt, & hinc adstrictionem quandam post se relinquunt; qualia ferè in gonorrhœa virorum notha, aut quæ ex genitura acriori oritur, in usu esse solent.

In specie observandum:

I. Non statim est supprimenda hæc gonorrhœa notha seu fluor mulierum albus, præsertim, si diutius duraverit, cum aliàs gravia pathemata inducat, uti videri potest in M. A. N. C. Ann. 7. pag. 344. Item in BALLONIO lib. 1. Conf. 56. ubi fluor muliebri contumax suppressus diabetem lethalem intulit: quin potius præmissis præmittendis demùm per specifica & appropriatas fluxus sistendus. Conf. HELIDÆUS PADUANUS loco allegato.

II. Sanguinis detractiones quævis nihil adiuventi afferunt: interdum tamen fonticuli in crure pro scopo averforio aliquid efficere possunt.

III. Quoad Evacuantia: Vomitoria commendavi, quæ præmissis digestivis imprimis sunt egregia; hæc inter specificæ convenit pulvis radice asari an. ℥i.

Repetenda sunt etiam, ubi necessitas postularit. Nam reliqua Purgantia propriè dicta circumspectè & rarissimè usurpanda sunt, quia parum vel nihil luvant; quin potius fluxorem album magis augent: Autore enim PLATERO observatum fuit, quod Purgantibus fluxus talis interdum fuerit excitatus in iis, quæ aliàs eundem nunquam passæ fuerunt; Vomitoria verò vomitem subtrahendo eundem imminuant. Cautè ergo usurpanda hic Purgantia.

Etmull. Oper. Tom. II.

per inferiora, aut omninò omittenda. Ubi verò necessitas postulat eadem, maritanda sunt imprimis Jalappa & Rha-Barbaro, quod etiam vi alterativa in specie convenit, & cuius adstrictione relicta emendetur à purgante inducitur noxa; unde species diaturbith cum Rha-Barbaro insigniter commendantur ab HELIDÆO PADUANO. Juxta pulverem jalappæ eiusque resinam, Mercurius dulcis aliis additus proficuum videtur, quatenus cachexiam sanguinis emendat: Sic Laxativa ex helleboro nigro, eiusque extracto, Massa pilul. de hiera cum agarico, &c. cum Mercurio dulci conveniunt: item bryonia appropriatum, ubi necessitas postularit, est purgans. Quæ omnia laxativa colocynthide, vel potius extracto trochiscorum alhandal sunt acutenda. Loco Purgantium verò sola sufficiunt Sudorifera, quæ tutiora sunt: uti & Diuretica cum appropriatis maxime proficua observari solent, præsertim in subiectis humidioribus, serosioribus, aut scorbuticis, &c.

Ratione ergo sudoriferorum in usu sunt Ligna, lignum sassafras, speciatim Decoctum lignorum, janiperi; guaiaci & sassafras, cum agrimonia, fragaria; essentia lignorum composita, tinctura ligni sassafras, item tinctura corall. cum spiritu lignorum, expectando sudorem, sunt utilissimæ: Sic ZACUTUS LVSITANVS lib. 2. Prax. Admir. Observ. 89. refert uteri profluvium, undetabes secuta, Decocto lignorum curatum. Et tincture coralliorum cum spiritu lignorum egregium usum, præmissis præmittendis videbitis in M. A. N. C. Ann. 8. Observat. 25. pag. 26. Pro scopo diuretico conveniunt in specie terebinthina & terebinthinata, terebinthina in vitello ovi soluta, balsamum sulphuris terebinthinatum: Sic namque FONSECA lib. 1. Conf. 21. pro derivatione ad urinam commendat & laudat hoc:

℥. Terebinth. cum aqua ros. lota ℥℥.

Pulv. corall. rub.

Boli arm. an. ℥℥.

Misc.

Sumat ieiunè bis in qualibet septimana in conveniente vehiculo.

Unde etiam RIVERIUS Cent. 1. Obser. 40. tanquam utiles commendat pilulas ex terebinthina cum Rhabbarbo efformatas.

Hæc unà cum appropriatis usurpanda sunt.

Quoad II. conveniunt stomachica, salia volatilia oleosa aromatica, chyli & sanguinis alterativa & anticachectica, quæ secundum SYLVIVM lib. 3. Prax. cap. 2. pag. 80. præferant à fluore albo, unde etiam eundem iam præsentem corrigunt, & sanguinis vitium, radicem fluvoris albi, eradicando, & corrigendo. In specie verò ad corrigendam cachexiam, simulque inde oriundum fluxorem album, si quid aliud, expertum specificum est rosmarinus, eiusque Decoctum, ad sistendum fluxorem album: Hoc namque solo Decocto rosmarini diutius continuato quovis fluxores mulierum albos semper felicissimè curari asserit LINDANUS in suis Practicis, nec opus esse alio remedio. Et credo, quod verum sit; nobile enim est simplex rosmarinus in mulierum affectibus. Huc essentia & spiritus rosmarini, essentia lignorum; elixyr proprietatis sine acido, elixyr proprietatis cachecticum, elixyr cachecticum alterativum & laxativum, etiam conferunt: ut de balsamo sulphuris terebinthinato, juniperino & succinato nihil dicam, quæ multis usibus conducunt. Sunt qui rosmarino adiungunt folia menthae & melissæ: ex quo ternario medicamenta quæcunque continuato vii administranda moneo. Conveniunt etiam alia ad cachexiam appropriata, ut sunt v. g. radix galangæ, cyperi, caryophyllatæ, maiorana, antophylli, caryophylli, & oleum horum destillatum; etiam vulneraria, ut alchimilla, agrimonia, veronica, bacca lauri, &c.

Inter Martialia eminent liquor Martis solaris, tinctura Martis tartarifata Ludovici, solutio Martis cum succo cydoniorum, Borsdorffianorum, &c.

Specificæ verò internæ, quæ in hoc fluore conveniunt, sunt ea, quæ acre salum acidum temperant, serositates imbibunt, & hinc aliqualem adstrictionem relinquunt, & talia imprimis in gonorrhœa virorum ex semine seroso acriori usurpari debent. Talia sunt imprimis viscus quercinus, qui est commendatus pro usu, tam in substantia, quam in decocto: hinc PANAROLLUS in Pent. 2. Obs. 48. laudat Decoctum nucis pineæ cum ligno visci quercini, quo Decocto sepius hausto tanquam mirabili & experto remedio in hoc morbo curando se usum fuisse asserit.



Hinc radix filipendule, tormentille, sigilli Salomonis, angelice & similes conducunt. *Sclarea* tam proprie dicta (quam vulgo *horminum oleratum*, item *gallirichon*, vocant) quàm *horminum sylvestre*, singulare est specificum interno externoque usu ad hunc fluxum, quacunque ratione usurpata, in specie si infundatur vino, & crebrius hauriatur, preprimis Decoctum *sclarea* cum rore marino in vase clauso, vel essentia; unde etiam essentia contra fluxum album D. *Michaelis* ex *sclarea*, tanquam basi, est constructa. Post *sclarea* *galeopsis* seu *lamium flore albo*, species urticæ mortuæ, est nobile, cuius aqua, conservata, & Decoctum in vino, mirè conferunt: Certe aliquando, cum essem adhuc sub informatione Dn. D. MICHAELIS, Decoctum huius *galeopsisidis* in vino generosam feminam, diu & contumaciter hoc fluxu albo laborantem, restituisse novi, aliis quam plurimis irritis. Post hanc etiam cortices avellanarum, *millesfolium album*, radix *filicis*, *melilotus flore albo*, item *plantago*, cymæ rubidæ, *equisetum*, *hyssopus* & similia laudantur. Horum Simplicium flores, & in specie *nymphæe* albæ, item *bellis flore albo*, diutius continuata specificè album fluxum sistere à quibusdam laudantur. Lignum *Lentiscinum*, *guaiacum*, in specie *assasfras*, commodè, ubi placet simul movere sudores, usurpatur. Modus utendi sub forma Decocti & essentia; est satis cognitus. De aromaticis nihil dico, quoniam ratione cachexiæ per se commendantur, uti iam supra dixi. Porro vitum, in quo extinctum est aurum, tanquam experimentum laudatur tam à FORESTO, quàm CORBEJO, Lac etiam suum usum habet; siquidem lac chalybeatum cum bolo Armena mistum, crebrius usurpatum, in biliosioribus & melancholicis in usu esse solet, id est, ubi acrius acidum est, quod affectum hunc pertinaciorē reddit. Essentia *castitatis Michaelis* magno est in pretio. Ista ex *vegetabilibus* primatum obtinent. Hiscè porro etiam adiungenda sunt putamina ovorum post exclusos pullos, tam crudè pulverisata, quàm calcinata, dosi ʒss. assumpta, *os sepia* preparatum, *maxilla lucii piscis* cruda & calcinata, *canceri fluviales* calcinati, *cranium* seu caput caponis exsiccatum & pulverisatum, item *suber ustum*, quod ad ʒi. propinatum, fuit experimentum *Holidae Paduani*. Præ ceteris *ebur sine igne* preparatum, aut, quod melius, raspatum, & pulverisatum, *succinum album* cum ovo sorbili, (vid. FORESTVS lib. 28. Obser. 25.) & omnia succinata, trochisci de carabe, *crystallus* preparata, *osteocolla* preparata, item *pumex*, vel pulverisatus vel calcipatus, *antimonium diaphoreticum*, *alum plumosum*, item *lapis amianthus* pulverisatus ʒi. in haustu vini vel spiritu vini, *priapus cervi* & aceti à ʒss. ad ʒi. præmissis præmittendis est egregius. Horum omnium vis ed collimat, ut destruat *acidum* aut *salsum*, quæ in gonorrhœa primariò peccare solent. *Osteocollæ* lapis est unum ex primariis specificis TIMÆO Von *Guldenkleee*, ad curandum fluxum album mulierum in specie usitatum, qui vel solus, vel cum aliis propinari potest:

ʒi. Magist. *osteocoll.* ʒss.

*Carneol. præp.* ʒi.

Quibus mistis à ʒi. ad ʒss. in aqua vel conserva *rorismari*ni uti solet. Vid. eius *Casus* lib. 4. Cas. 15. pag. 4. Aliam paululum urinam descriptionem his ipsis camen primariò ingredientibus, habet idem TIMÆUS l. a. sequenti modo:

ʒi. Magister. *osteocoll.* ʒss.

*Carneol. præp.* ʒiii.

*Corall. alb.* ʒii.

*Smaragdi* ʒi.

M. f. Pulvis.

Quid autem per *Magisterium osteocollæ* intelligat? ut verum fatear, nescio, nisi *osteocollam* preparatam intellectam velit: Essentia *osteocollæ* substantia adeò dura, ut neque in igne calcinari, neque per quodcunque menstruum corrosivum dissolvi, & in magisterium redigi possit. Erit ergo intelligenda *osteocoll. præparata*: ex qua etiam TACHENIUS Venetiis, ut obiter moneam, preparat remedium singulare contra *Casum ab alto*, item contra febres quascunque. Loquo igitur huius pulveris compositi

ʒi. Lap. *osteocoll. præp.* ʒss.

*Crystall. præp.*

*Maxill. lucii pisc.* an. ʒi.

Cum l. q. conf. *rorismar.* seu *flor. anthos* f. *Electuarium*.

D. S.

*Electuarium adstringens.*

De quo grā bis vel ter quotidie capiat.

Lapidis *amianthi* seu *aluminis plumosi pulverem* BOETIUS misceat cum aqua vitæ & saccharo, & ita patienti propinat eundem; vid. *Tract. de Gemmis*. Alia per se cognita lubens omitto. Vitellum ovi in aqua rosarum dilutum, propinatum & iteratum superius ex AMATO LUSITANO commendavi in Fluxu rubro, seu mensibus nimis fluentibus. Idem AMATUS LUSITANVS ad fluxum album commendat albumen ovi cum aqua rosarum conpassatum, & ita repetitis vicibus usurpatum; hoc ipso enim se & fluxum album, & gonorrhœam curasse asserit: Vid. *Centur. 4. Cur. 12*. Efficacius erit, si aliquot *massichis grana* ad ʒi. hule albumini ovi adsumendo adiungatur. Emulsione seminis lactucæcum aqua chalybeata preparata, addito ebore, plurimas restituit MEYNOLDVS, Medicus Venetus: Vid. VELSCHIVS *Mistomim. C. 4. Obs. 95*. in M. A. N. C. Ann. 4. & 5. RIVERIUS & CORBÆVS coagulum leporis in Decocto fol. quercus commendant, quo MERCVRIALIS fluxum album se curasse testatur.

Ex his varia possunt fieri Composita. Medicus quidam egregius camen experimentum contra fluxum album cortices seu putamina dura avellanarum cum semine anisi multum commendat. Ad eius imitationem præscripsi sequentem pulverem:

ʒi. Cort. avellan. ʒii.

*Sem anisi* ʒi.

M. f. Pulvis pro 4. vel 5. dosibus non pœnitendo effe. ʒij. Sed necesse est, aliquandiu continuetur.

Alio casu præscripsi:

ʒi. Ebor. sine igne,

*Corall. rubr. præp.* an. ʒi.

*Lap. osteoc.* ʒii.

*Olei destillat. tereb. vel anthos* gutt. xii.

M. f. Pulvis pro aliquot dosibus:

D. S.

*Pulvis adstringens.*

Vel

ʒi. *Osteocoll.* ʒi.

*Hemat. præp.*

*Ebor sine igne* an. ʒii.

*Corall. rubr. præp.* ʒi.

*Olei destillat. anisi,*

*Macis* an. gutt. x.

M. f. Pulvis:

D. S. ut antè.

Medicus quidam celebris hac methodo fluxum album curavit: præmissis præmittendis propinavit ante pastum sequentem pulverem:

ʒi. Cornu. cervi ussi ʒii.

*Limat. ebor.*

*Corall. rubr. præp.* an. ʒss.

*Succin. præp.*

*Boli Armen.*

*Massich.*

*Sem. anisi* ʒii. ad ʒi.

*Cinnam.*

*Caryoph.* an. ʒii.

*Ligni aloes* ʒi.

*Ambra*

*Moschi an.* gr. lv.

*Sacch. albiss.* q. pl.

M. f. Pulvis.

Dosis ʒss. ad ʒi.

Sequenti verò Decocto bis in die pudenda abluerè, & in ipilcere iussit:

ʒi. *Ligni sancti* ʒii.

*Cort. granat.* ʒi.

*Alum. rocha,*

*Thuris* an. ʒss.

*Massich.* ʒii.

*Flor. balanst.*

*Rosar. rubr.*

*Myrtill.* an. M. ʒ.

Infundantur omnia simul per 24. horas in

*Aqua comm.* ʒii.

Ebulliant lento igne ad mediocritatis consumptionem:

adde

*Vini rubri* anst. ʒi.

Ebulliant adhuc semel,

*Colatura* servetur pro usu.

*Electuarium* vid. in *Idea Form. Cl. 1. §. 6.*

Externa quod attinet remedia pro curando fluxu albo: decan-



decanatum est hoc unguentum ex porris ex sclarea, de quo CORBEJUS de Morbis Mulierum, item STOECHERUS in sua Praxi recensent quasdam mulieres albo fluore affectas, per hoc unguentum curatas:

24. Sclaream:

Quæ confusa cum butyro subigatur, in quo aliquandiu putrescat: postmodum coquatur aliquantulum, coletur & servetur usui.

Hoc ipso mulieri ab umbilico inferiora versus ad regionem pubis usque sedulo inunge, immittendo simul parum de hoc ipso unguento per pessos vulvæ. Comedat quoque herbam ipsam. Hoc unguentum etiam commendatur ad omnes graviores post partum dolores compescendos. Therma iidem præmissis præmittendis, sunt perquam proficuae, primario naturales, imprimis Toplicenses, ut & Waldensteinenses, & confirmatum malum curant, quarum loco fiant artificiales ex sulphure, calce viva, alumine, adjunctis Vegetabilibus, nunc nervinis, nunc uterinis, nunc adstringentibus, & parum aluminis parandæ, v.g. cum plantagine, cum salvia, sclarea, matricaria, artemisia, & similibus. Horum loco Balnea & foras adstringentes, vel Iniectiones uterinae, adhiberi possunt; in specie sessio in Decocto radices chili laudari solet. Inter FOMENTA pro ventre inferiore & pube excellit Decoctum vineæ pervincæ cum alumine, quod commendatur à FORESTO. In specie cinis nucleorum juglandium cum vino mistus, in

uterum injectus, mirifice hunc fluxum sistere asseritur. Iniectionem in uterum vid. in Idea Formul. Class. 4. §. 27. Vel pro Balneo

24. Herb. absinth.

Mentb.

Rorismar.

Spica,

Flor. ros. rubr. an. M. l.

Cort. Granat. 3j.

Incis. & contus. D. pro Balneo: S.

Species ad balneum.

Aliàs suffusus ex thure & mastiche, item ex ladano, gummi juniperino, mastiche, nuce moschata, succino, bidellio, & similibus est egregius, & frequent in usu: vid. LOTICHIUS lib. 1. cap. 1. obs. 12. Suffusus salvia per Infundibulum exceptus ex secretum Corbeii, & in specie commendari solet. Adstringentibus simul abstergentia combinanda sunt cum essentia succini, essentia traumatica, &c. Nec inutiles sunt Fonticuli, femori, ubi ac humero, pro scopo evacuatorio & averfio inurendi: vid. VINCENZIUS ALSARIUS à CRUCE de Quæsit. Cap. 14. pag. 237. RIVERIUS l. 15. c. 4. & ZECCHIUS Consult. 35.

Abstinentius affectus, qui obveniunt samellis, quando nobiles sunt, menstruationem nempe & fluxum album, muliebrem. Pergo ad.

## S E C T I O N E M II.

D E

### APPETITVS VENEREI VITIIS.

C A P U T I.

D E

#### VIRGINITATE LÆSA.

**F**œmellæ simul atque pueres fiunt anno ætatis præter propter decimo quarto, & dum menstruus hos primus erumpere incipit, simul quoque appetitu venereo tentantur. Huic appetitui quamdiu satisfactio denegant, tamdiu naturaliter virgines dicuntur, vel mulieres seu semine nondum virum passæ; si verò ad explendam famem istam à viro se satiare permittant, mutato nomine desolatae appellantur. Congressus ergo legitimus distinguit virgines à non virginibus, non verò conceptio: potest enim concipere virgo ita, ut talis maneat, non autem potest congressi circa læsam Virginitatem: (istud de conceptione in sequentibus patebit, quod nempe virgo concipere queat, sine eo, ut lædatur Virginitatis nota.) In congressu verò nulla alia in mulieribus genitalibus fit mutatio, nisi quod eadem à virili membro dilatentur, & ita ampliora fiant, quæ antea angustioribus circumscribebantur terminis: idque eo magis, quod crebrius repetatur congressus; siue effundatur sanguis in primo congressu, quod fit interdum; siue non fundatur, perinde est: hæc enim cruentatio tanquam essentiale ad virgines non pertinet. In hoc ergo, minore nempe vel maiore orificii uteri externi, & ipsi continuatæ vaginæ angustia, vel maiore & minore amplitudine, naturalis & Physica consistit Virginitas. Nam non aliud desolationis indicium deprehendere potui, dicit PLATERUS lib. 3. observ. quàm quod introitus orificii ex dilatatione illa amplior fiat, & quod maturæ virgines ex vesis, frictione Veneræ in coitu referatis, sanguinem interdum profundant, (non semper). Ad hanc ipsam genitalium adstrictionem & angustiam præ cæteris pertinet caruncularum myrtiformium, post orificium uteri in introitu sitarum, cohesio & connexus mutuus per membranam mediam, suis vasculis minutulis instructam: Hæc enim membrana ex istis carunculis unitis nata, reverà est: decanatum illud Virginitatis & infallibile, ubi adest, signum, quod aliàs hymen appellatur: non autem conversim, ubi hymen abest, Virginitas læsa statim exinde concludi potest; cum mille casibus vitiari & lædi hæc ipsa membrana possit.

Hæc ergo membrana transversa, in collo seu vagina uteri post insertionem cervicis vesicæ urinariæ sita, aliquando

tenrior, aliquando crassior, si divaricatis pedibus, & diductis pudendi labiis, introspectatur, ipsa extensa figura lunari seu lunæ crescentis in latere quodam superiore perforata conspicitur. Quod si verò adductis cruribus labia denique concident, aut & ipsa ista membrana corrugata, carunculas quasdam repræsentat: uti exactè hanc hymenis sic dicti constitutionem & observavit & descripsit PANAROLLUS Pent. 5. obs. 50.

Membrana ergo hæc angustior in coitu primo strictionem præstici & impedimentum augeat; unde eius violentiore laxatione & distensione aliquantulum sanguinis in tenerioribus non nihil, aut quæ nimis mentulato substernuntur, erumpere solet. Præter hanc enim carunculam (à cuius coarctatione constrictio meatus) non est alia membrana post carunculas istas obtensa, nisi errore forsitan naturæ id contingat nonnunquam: qua ratione etiam atretæ seu imperforatæ tales dicuntur, quibus pudendi labia membrana obducta conclusa reperiuntur, uti observat AQUAPENDENS de Operat. Chirurg. CABROLIUS Observat. 23. ROENHUYSIUS pag. 102. & SENNERTUS Prax. libro 4. Part. 1. Section 1. cap. 8. Sed de his & aliis virginitatis signis, præter PINÆUM Tract. de Virginitatis Signis, in specie consulendus est PAULUS ZACCHIUS in suis eruditissimis Quæstionibus Medico Legal. lib. 4. Sect. Tit. 2.

Post amissionem per congressum Virginitatem, & inde sæpius factum conceptum, inter alias corporis mutationes etiam una insignior in mammis contingit, dum non tantum in desolatis color papillarum lividus reddatur, sed etiam ipsæ mammae, quæ in virginibus rotundæ, erectæ, duræ, scilicet & minores contractantur, in desolatis molliores, maiores & flaccidiores, magisque pendulæ, successivè fieri solent; quin & lac in iis successivè se monstrare solet. Hæc tamen læsis præsentia non statim est infallibile desolationis signum, cum & ex mensium suppressione lac in mammis interdum coacervari in innocentibus queat, ut iam suo tempore docuit HIPPOCRATES Sect. 5. Aphorism. 39. ubi scribit: „Mulieri, quæ nec prægnans, nec puerpera est, habeat tam men lac, menses suppressi sunt. Unde etiam in infantibus tenellis & puellis brevi post egressum ex utero matris sæpe observatum fuit lac ex mammis illans; id quod observationes Medicæ testantur: Ut taceam de vitis, interdum ex mammis suis paulò carnosioribus lac emulgentibus: quin & BARTHOLINUS in sua Anatome recenset de Familia quadam Nobili in Norwegia, cui hæreditarium fuit, ut etiam inter-

meratæ



merataz notæ virgines simul ac puberes fierent, lacin(mano-  
mis gen erant.

## ARTICULUS I

## DE

GENITALIUM MULIEBRUM  
SOPHISTICATIONE.

**S**emel amissa virginitas denuò in integrum restitui ne-  
quit; factum enim insectum fieri nequit: nihilominus  
adstrictio genitalium artificiosa, virginitatis veræ æmula,  
quin progenerari possit, nullum est dubium. Quæ ipsa arti-  
ficialis adstrictio præter hunc usum, ut dissimuletur com-  
missum scelus, etiam interdum hunc in finem necessaria est,  
ut post partum, dum nimis dilatata sunt genitalia, eadem  
denuò adstricta ad naturalem tonum redeant, ut viris post-  
modum gratiores fiant denuò puerperæ. Conducunt ergo  
hic imprimis Balnea, fomenta, infusus, & Emplia ex ad-  
stringentibus parata: quæ inter primarum obtinet radix sym-  
phyti maioris, de qua observationem habet non inelegantem  
**HOECHSTEDTERVS Decad. 3. Conf. 5. in schol.** ubi  
observat quidem, Balnea ex decocto radicis symphyti maio-  
ris facta mirè angustasse virginalia. Præter hanc radicem  
aluminosa imprimis conducunt in decoctis adstringentibus  
dissoluta, vaginæ uteri injecta: v. g. dissolvitur aluminis  
aliquantulum in Decocto plantaginis, quod injectum in va-  
ginam uteri, & etiam tanquam fomentum externè applica-  
tur. Alii

24. Fol. querc.

Plantag. an. M. l.

Rad. consol. mai. ℥ii. vel ℥iii.

Gall. contus. ℥vi. vel ℥i.

Alum. contus. ℥b.

Coqu. in f. q. aquæ simpl.

Decoctum per syringam iniciatur in vaginam uteri;  
aut eodem Decocto impregnata spongia aut lintecolum ex-  
ternè applicetur; aut ipsi intinctus pessus minor immittat-  
ur.

Intalibus Decoctis commodè etiam rob acacia nostratis  
immatura dissolvi potest ad quantitatem sufficientem; hoc  
enim miram adstringendi facultatem partes membranosas  
obtinet.

Conducit hic etiam alchimilla, cuius Decoctum vapo-  
re tenui in vaginam susceptum insigniter virginalia angus-  
tat.

## ARTICVLVS II

## DE

MAMMARVM SOPHISTICA-  
TIONE.

**M**ammæ quod attinet: ut & hæc denuò fiant virgines,  
conducit imprimis Fetus cum aqua pini viridis per  
alembicum destillata, qua aqua vespertim lauentur mamme,  
& spontè exsiccantur, & mirè laudatur. Item decoctum al-  
chimille pro fotu applicatum mirè conducit. In specie ma-  
millas flaccidas duriores reddit, si fomententur calidè per  
quingenta dies Decocto matricariæ & alchimille. Deni-  
que pendulas mammas erigit pannus lineus in Decocto galli-  
trichi, seu sclareæ, de qua *suprà*, madefactus, mammi-  
que superimpositus.

Dixi hætenus: amittere virginem Virginitatis coronam  
per congressum cum viro: Causa huius congressus impellens  
& stimulanse ex parte femine est appetitus Veneris natura-  
lis, cuius vitia sunt: quando est vel imminutus in quibus-  
dam, aut plane nullus; vel quando est nimis auctus, adeò  
ut omnino in furorem sic dictum uterinum degeneret. Pro-  
greddior ad

## CAPUT II.

## DE

APPETITU VENEREO  
LESO.

**S**ive is auctus fuerit, siue omnino, quod rariùs fit, abo-  
litus. Et quidem præsupponendum est ante omnia, in  
quonam consistat Veneris mulierum appetitus? Aut quo-  
modo fiat ista titillatio seu pruritus & delectatio mulierum,  
quam in congressu experiuntur? Testes hic esse infontes, cer-  
tum est, qualescunque etiam sit eorum officium: Nam hi  
ipsi sunt insensibiles, non secus ac in viris: unde iidem ad Ve-  
nerem minùs facessere poterunt. Nec uterus ipse, eiusque  
vagina, seu partes membranosæ, hic inculandæ, in quibus  
sensum nullum, aut non adeò singularem, neque ante neque in  
coitu, percipiunt semine, nisi interdum immensus dolor in  
quibusdam affectibus easdem partes corripit. Potius id,  
quod in congressu voluptate Veneris afficitur, est etiam id,  
culus titillationis quodam stimulo in appetitum Venerem  
ruunt semine; & hoc ipsum primariò est clitoris, pars peni-  
virili analoga; huius enim tensi ac instar penis parvi erec-  
tione in actu Veneris mirè delectantur semine, adeò,  
ut affluentibus hinc cum sanguine per arterias & nervos spi-  
ritibus animalibus liquor genitalis, tam in prostaticis glan-  
dulis, quàm in glandulosa textura vaginæ, turgescens cum  
summa voluptate eripat. Cuius orgasmus ut Veneris voluptas  
summe augetur, ita huius eruptione, non secus ac in viris,  
etiam postmodum cessat titillatio Veneris. Rectè etiam  
sedem libidinis clitoridem vocat **COLUMBUS in Anatom.**  
Appetitus ergo & desiderium Veneris fit, quando materia  
feminalis præcisè in prostaticis glandulis & glandulis vaginæ  
impensius turgescit, ut clitoris exinde tendatur & erigatur,  
unde singularis istarum partium sensus & quasi obscura titil-  
latio emergit, quæ, non secus ac in sexu masculino, coitum  
urget, in Salacibus etiam Satyriam efficit. Sensus ergo ap-  
petitus hæret in clitoride, ratione cuius semine etiam pos-  
sunt exercere & imitari coitus Veneris.

Leditur hic Appetitus Veneris, siue quo aliàs nemo  
hominum facile ad tam spem actionem se accingeret, vel

1. Quando est imminutus, aut in totum deficit, quod  
rarum est; vel
2. Quando excedit, quod frequentius observatur.

## ARTICVLVS I

## DE

APPETITUS VENEREI  
DEFECTU.

**D**eficientis Appetitus Veneris rara sunt exempla; ad-  
sunt tamen: Nempe, ubi quedam mulieres Venerem  
non desiderant, nec ex congressu voluptatem percipiunt,  
quod symptoma **PLATERUS Impotentiam feminarum**  
appellat. Salacitati contrarium est, eiusque exempla vide-  
bitis in **PLATERO Pr. T. 1. p. 554.** & **RIVERIO obs.**  
**19.** à **PACHEQUO** communic. Voluptas tamen non est  
necessaria, quia etiam quandoque sine voluptate possunt  
concipere: qualia exempla singularia per totum aboliti Ap-  
petitus Veneris, ac deficientis omnis in coitu voluptatis, re-  
censentur à **PLATERO l. 1. obs. p. 243.** ubi habet feminas  
nunquam à natura ad Venerem stimulas, nec unquam in  
coitu cum maritis celebrato delectatas, quales etiam à viro  
initæ steriles tamen permanent.

## CAUSÆ.

Causa deficientis appetitus Veneris variè eundem esse pos-  
sunt: In genere tamen omnes ferè referendæ sūt,

1. Quod vel omnimodum defectum, vel paucitatem  
saltem, liquoris istius genitalis minusque spirituosius  
insequantur; unde & tales femine steriles ferè per-  
manent: Hinc *scorbatica* quedam confirmata  
minùs ad Venerem inclinant (scio aliquot exempla)  
quia iste liquor feminalis minùs spirituosus genera-  
tur: Hinc *gonorrhæa notha* benigna in veterata,  
seu





seu fluore albo mulierum etiam pauca, & nulla in Venerem est propensio.

2. Ubi nullus in Venerem est stimulus, culus rarissima sunt exempla, ibi malum ex vitio conformationis oriri arbitror, in specie in iis, qui nunquam habuerunt *Appetitum Venerem*: quod etiam pertinet *castratio*, cum certum sit, feminas brutorum, facta in latere incisione castrari, extractis testibus in extremitate cornuum uterinorum sitis. Hanc in feminis etiam possibilem esse, arbitratur PLATERUS in loco supra cit. Revera autem factam eandem esse in feminis ex aliis refert SENNETUS lib. 3. Pr. P. 2. Sect. 2. cap. 1. de appetitu Veneris lasso, dum ovaria seu testes eximunt, faciendū incisionem in regione inguinum superiore. Sed castratio, ut uteriles reddat castratas, appetitum tamen Venerem ex toto an possit delere? ferè dubito. Nam & Eunuchi viriles, insecundi licet, salacitate tamen & voluptate Venerem aut stimulo non carent, dum liquor prostaticus loco virilis feminis ipsis quodammodo satisfacere possit: cui analogum puto liquorem istum genitalem semellatum, ex labiorum pudendi lacunis emanantem, hunc ipsum adhuc sufficientem puto, quod eas stimulet ad Venerem.

## DIAGNOSIS.

Signa diagnostica recensentur ab ipsis foemellis.

## PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: malum est extra periculum, nisi quod ferè steriles esse soleant foeminae, quæ nullam perferunt in coitu voluptatem, aut appetitum Venerem.

## CURA.

Cura, nisi vitium sit à conformatione nativa,

1. Instituénda per aromatica volatilia, quæ volatilitate sua & acrimonia turgescunt & vellicationem quandam in liquore genitali excitare valent.
2. Suppeditando simul uberiore copia alimentorum, tunc etiam, illius & spirituum copiam præbentia.
3. Si ad sit morbus quidam primarius, Scorbutus, fluor albus, &c. à quo dependeat, hic ipse ante omnia erit removendus.

Inter remedia omnia sunt eadem, atque superius lib. 3. Sect. 1. c. 1. & Sect. 2. c. 1. in affectibus virorum laudavimus, nempe quæ conveniunt in genitibus generatione deficiente, & penis erectione laesa, imprimis Ambrata, Molchata, Zibethina, &c. Inter alia RIVERIUS Obs. 19. communicat à Pacheco, cuius experientiam ipse fecit ad stimulandam in feminis Venerem.

Externa remedia imprimis ex formicis sunt petenda: scilicet fiat *Infessus* aut *Balneum* ex formicis cum earum cubili collectis, cui balneo insideat femina, et sacculum istum, formicarum cubili repletum, pudendis admoveat. Item fiat *inunctio* pubis & pudendorum regionisque uteri cum oleo formicarum volantium (sunt enim formicæ, quæ alas tandem acquirunt, & avolant) id quod commendatur à RIVERO loco supra citato. Item olea aromatica Zibetho & moscho mista, aut balsamum apoplecticum cum Zibetho & moscho innungantur genitalibus, in specie clitoridi.

## ARTICULUS II.

### DE

## APPETITU VENEREO AUCTO.

Contrarium abstinentiæ Veneris in appetitu laeso vitium est nimia appetentia Veneris, seu *Appetitus Veneris Auctus*, qui aliàs *Salacitas*, item *Satyrasis*, appellari solet: non secus enim ac in viri penis, ita in talibus foeminis ad Venerem proclivibus clitoris tensus, turgidus, & plus minus prominulus esse solet. Affectus est talis, in

quo mulieres continuo Veneri inhiant, & instar Messallinae lassari potius, quam satiari volunt & solent: cuius extremus gradus *Furor Venerinus* appellatur.

Ad appetitum hunc Venerem augendum non parum facit Pruritus & Pusulae pudendorum & uteri: quæ duo imprimis vitia, si non subinde simul ad Venerem exercendam, saltem tamen ad genitalia scalpenda, continuo impellunt. Sit itaque

## MEMBRUM I.

### DE

## UTERI ET GENITALIUM MULIEBRUM PRURITU.

Pruritus quod attinet Pudendorum seu sive pudoris, quid sit? per se patet. Est scilicet titillatio in labiis pudendorum & vagina uteri, quæ continuum scalpendi & vellicandi desiderium excitat. Hoc præterquam quod à feminis sponte manifestetur, ipsæ vix possunt celare, cum continuo aut saltem sæpius manus genitalibus admoveat soleant, aut pedes saltem successive mutuo attollere, & similes motiones exercere soleant: vid. M. A. N. C. Ann. 4. & 5. obs. 47.

## CAUSA.

Causam huius pruritus credo esse humorem illum genitalem, qui naturaliter vaginam & pudenda blandè humectare, in congressu vero copiosius excerni solet, utrobique ex glandulosa harum partium textura scaturiens, qui ipse vel retentus diutius, cum sit revera quædam lymphæ, vel in specie acrior aut salior, aut nonnihil acidior factus, talem pruritus in locis excretionis suæ vicinis inducere solet. Unde & interdum est, ut adsit pruritus uteri cum superveniente liquoris genitalis electione, quale exemplum refert MARNARDES lib. 13. Epist. 5. hinc & vetulis frequentior contingit pruritus talis, quam iunioribus. Adest interdum simul cocundi libido, ut ut hæc ipsa sæpius absit, interdum aliud durat hoc malum, ac difficilior curatur. Refert namque ZACUTVS LVSITANVS lib. 2. Prax. Admir. Obs. 83. talem pruritus uterini diuturnum & ferè incurabilem factum, tandem causticis seu fontanellis duabus in femoribus excitatis fuisse curatum.

## PROGNOSIS.

Malum hoc interdum est adeo molestum, ut continuo pruritu somnum etiam impediatur.

## CURA.

Quod attinet Curam: præmissis, ubi opus fuerit, blandis Laxativis, aut blandis Sudoriferis, item temperata nonnihil, ubi opus fuerit, lymphæ acrimonia, externis, quod superest, absolvendum.

Conveniunt ergo Infusa & Decocta ex fumaria, cichorio, scabiosa, melissa, pulegio, radice bryoniz, hellebori nigri, polypodii, & similibus. Imprimis Mercurius dulcis egregius est & appropriatus, item extractum trochiscorum alhandal. Medicamenta nunc vino, nunc, idque sæpius, sero lactis infundi possunt in biliosis, h. e. in quibus acidus sapor, nunc magis nunc minus volatilis, imprimis dominatur. Hinc essentia rob sambuci, essentia lignorum, tinctura coralliorum cum spiritu lignorum, pro scopo alterativo, & diaphoretico imprimis, conducunt.

Externa inter excellunt Saturnina, hinc Mercurialia: imprimis convenit Linimentum factum ex lithargyrio auri, quod per diem & noctem in aceto acerrimo maceratum fuit, si huius recipiatur ℥i. & misceatur cum olei violar. ℥ss. vel ℥i. Exinde enim, imprimis si ducantur in mortario plumbeo, fit Linimentum molle, secretum expertum HELIDÆL, quo ipso illinantur partes affectæ. In tali uterino pruritu conducit etiam acetum, in quo solum sit plumbum calcinatum; tale enim acetum edulcoratum pro lotionem pudendorum applicatum, insigniter conducit. Alii usurpant acetum per alembicum plumbeum defillatum, pro simili pruritus curandi scopo. Sin contumacius fuerit malum, tunc fiat unguentum ex p. i. unguenti de tutia, & parte dimidia olei hyoscyami: Hæc duo subacta in mortario plumbeo



beo illonitur labiis pudendi ad sedandum pruritus.

Vel

℥. Ungu. de ceruss. ℥℥.

Lithargyr. ℥℥.

Olei rosac. parum.

Ducantur in mortario plumbeo, f. Unguentum:

D. S.

Unguentum leniens.

Quo imbutus pannus applicatur locis pruritu affectis, & plus minus exoriatis.

Usurpari etiam potest hic in pertinaciori malo unguentum FORESTI lib. 27. obs. 8. quo pruritus & excoitationem penis, aliis irritis, resistit. Item ubi contumacius adhuc fuerit malum,

℥. Ungu. pomati ℥iv.

Mercurii dulc. ℥ij.

M. in mortario marmoreo pistillo lapideo, f.

Linimentum:

D. S. ut supra.

Potest etiam addi cerussæ aut sacchari Saturni ℥℥. hoc ipsum enim tanquam singulare remedium in pruritu & excoitatione uteri & labiorum commendatur.

Item

℥. Ungu. enulat.

Misc. cum Mercurio dulc. addendo oleum nicot. sicque fiat Linimentum contra nimium uteri pruritus.

Pertinaciori in malo vesicatoria in femore, vel fonticulus in crure, possunt excitari ad imitationem WEDELII in Opist. pag. 137. pertinacem scroti pruritus hoc modo curantis.

Rarum est, quod pruritus uteri fiat ab ascaridibus, injectionibus amaris & abstergentibus evacuandis: Vid. SENNERTUS lib. 4. Prax. P. 2. Sect. 2. cap. 14. p. 204. in specie M.A.N.C. Ann. 8. Obs. 75. p. 224.

## MEMBRUM II

### DE

## GENITALIUM PUSTULIS & SCABIE.

**P**ost hunc pruritus uteri simplicem, ex simili forsan vitiosa ac nimis acida lymphæ retenta corrosio in labio pudendi ac sinu pudoris, hinc furfures, pustule, ac denique, pudendorum scabieties, interdum oriri solet, adest simul intensus Pruritus, interdum simul coeundi desiderium.

Pustulæ hæc nunc sunt saltem mitiores & insigniter prurientes, ac reverà scabiem saltem pudendorum specialem constituunt; quædam verò earum sunt maligniores, & in specie Epinyctides vocantur, quarum dolor insigniter intensus est, & qui longè excedit proportionem magnitudinis pustulæ; nunquam enim saba maiores videntur hæc epinyctides, sæpè sunt minores, scabæ, pruriginosæ ac furfuraceæ, squamas de se prolicientes, interdum insignem ardoris sensum excitantes.

### CAUSÆ.

Ex causis internis retentis excernendis pustulæ tales benignæ generantur. Præter has enim etiam aliæ malignæ oriri solent, à contagio acido Venereo natæ ex congressu cum infectis, rodentes & dolentes insigniter, & successivè in exulcerationes abeuntes.

### DIAGNOSIS.

Malum hoc seu pustulæ tam tactu ægrarum, quàm ad speciem Chirurgi, facillimè per se cognoscuntur.

### PROGNOSIS.

Omnes hæc pustulæ, præter molestiam, quam excitant, ac præter contumaciam, domè difficulter curantur, simul contagiosæ sunt, & viros, qui talium seminarum consuetudine utuntur, simul inficiunt.

### CURA.

In Cura universalis ista, quæ vel in genere in scabiosis usurpantur, præmittenda, vel in specie eadem, quæ jam Membro Anteced. de Pruritu uteri fuerunt insinuada, adhibenda, imprimis Noduli laxantes, cum radice bryoniam & esulæ parati. Quod si Venereæ sint pustulæ, ad luem Gallicam cura est dirigenda, aut huic saltem similis instituenda; unde Mercurialia, & quæ ex lignis ad impugnandam luem Veneream usurpantur remedia.

Præter talia imprimis conducunt externa applicanda, quæ aliàs ad scabiem usurpari solent; in specie oleum rosatum, mistum cum vitellis ovorum, agitetur in mortario plumbeo tamdiu, donec colorem mutet; item Decoctum calcis vivæ, cui additum sit saccharum Saturni: e.g.

℥. Decocti calc. vivæ ℥℥.

Sacch. Saturni ℥. ad ℥℥.

M. S.

Mixtura purificans & leniens.

Partim externe applicetur, partim iniiciatur.

Aut, ubi contagium est suspectum, loco sacchari Saturni addatur Mercurius dulcis ad ℥℥. Vel præscribatur Mixtura composita, quam SENNERTUS tanquam expertam, describit lib. 4. Prax. Part. 1. Sect. 1. cap. 4. Compositio est hæc:

℥. Aloes,

Myrrhæ ana pondere quantlt. ciceris.

Viridis æris, seu, ut vocant, flor. æris dimid. ciceris.

His adde

Vini albi,

Aquæ rosar.

Plantag. an. ℥℥.

M. S. ut antè.

Hæc Mixtura iniiciatur, & eadem abluantur pustulæ.

Remedium hoc insigniter commendat CASTRO in suo Tractat. de Morb. Mulierum, utpote quod ipsum, etiam sine omni nocumento præter pustulas omnia ulcera pudendorum sanat & emendat, si per siphonem iniiciatur.

Sequitur post hanc l. 4. alia injectio, quæ fortior est, ex aqua plantaginis, rosarum, cum nitro, alumine, Mercurio præcipitato, & viride æris, & conducit, ubi malum est à luo Venerea.

Aliàs ad furfures & pustulas conducit etiam unguentum, factum ex melle cum myrrha, cui alumen sit additum. Ulterius unguentum album camphoratum, aut de lithargyrio, mistum cum oleo aut sale tartari per deliquium in benignis, aut cum Mercurio dulci in malignis, imprimis conducit, si post istas lotiones inungatur. Denique si contumaciores sæpius verè pullulantes fuerint hæc pustulæ, observandum id, quod dicit CASTRO: „Aperiatur fonticulus, incurre, ac diu apertus servetur: quod utut sit palliativum, forsitan etiam impostorium, nihilominus tamen interdum contulisse observatum fuit.

## MEMBRUM III

### DE

## FUORE UTERINO.

**S**ymptoma Salacitatis gradus vocatur Furor uterinus, dum appetitus Venereus nimium augetur, & eò usque exsurgit, ut delirium libidinosum tandem inserat, ad maniam blandiorem & mitiorem accedens, idque oriundum, ut dixi, ex nimio Veneris desiderio. Nempe affectus hic, Furor Uterinus, est complicatus ex nimio Veneris desiderio & delirio; tam virginibus, quàm maritatis accidit, quarum scilicet maritales ægrotant, aut peregrè absunt, hinc illæ diutius à congressu abstinere; item viduis: magis tamen iis, quæ iam gustarunt aliquoties Veneris delicias, quàm virginibus. In hoc affectu iam ad delirium propius accedente formine sunt garrulæ, loquaces, interdum vociferantur & iubilos edunt, inquietæ sunt, & vix intra domus coerceri possunt, quin foras se proripiant, & interdum per plateas vagantur, iracundæ sunt simul, & non raro obviam venientes, & in specie viros, aggrediuntur, quos ad Venerem interdum sollicitant, renuentes verò verbis interdum, interdum



dum verberibus, male puniunt: In specie inconditis formonibus suis multa & varia de rebus Venereis interferunt, & cuicunque argumento aliquid de concubitu semper intermiscere solent: interdum frequenter derectant genitalia; imò lascivius interdum in præsentia virorū se denudant, & quæ sunt alia modò maiora, modò minora symptomata. *Congressus* validus & nervosus, sapiens repetitus, citra ullum aliud remediū, tales feminas optimè curat. Inter alia SCHENCKIUS in observ. pag. 142. ubi de Mania, refert, quandam virginem, furore uterino percitam hinc inde per plateas oberrasse, & mares ad concubitu sollicitasse, idque diutius, donec tandem in taberna meritoria una nocte à quindécim viris fuerit compressa, undè optimè sanata, manè domum rediit: Simile exemplum habet BARTHOLINUS Cent. 2. Hist. 69. PANAROLLUS Pent. 3. obs. 9. & hinc in dotalia apud Auctores leguntur,

## C A U S Æ.

In perscrutanda autem huius furoris uterini natura due sunt consideranda:

I. Quidem liquoris seminalis fermentatio et turgescencia, & hinc derivanda ipsa veneris exercenda appetentia seu lascivitas.

II. Adjectum insigne delirium, quod mitior quidam, mania species esse videtur.

In genere affectus hic simillimus est q̄siro illi Venereo, quo bruta certis anni temporibus percita, v. gr. cervi & dæmæ, simili furore in venerem ruunt: Nam reverà hic Furor uterinus brutalis quidam impetus est in his feminis, quæ ita contra omne honestæ rationis dictamen simpliciter ex præternaturali veneris stimulo quasi in venerem ruunt; sicut bruta ex vehemēti, sed naturali, certis anni temporibus stimulo eam appetunt. Jam verò sicut hic brutorum furor est ex turgescencia & effervescentia quadam genitura in maribus, ita etiam ex lymphæ genitalis turgescencia in feminis contingit, quæ partes genitales irritatæ, & fervidiores redditæ, suam ac voluptuosam veneream titillationem, concipiunt: Unde etiam quædam bruta, v. g. canes Venere luxuriantes, (Germ. die Batzen,) materiam albidam aquosam & nonnihil mucilaginosam spontè & continuo per genitalia effundunt, quod aliq̄ tempore non fit: & talibus simul per sanguinem & lympham turgescētem, à partibus genitalibus refluam, simili fermentatione massa sanguinea reliqua inquinatur, turgescit & effervescebat uberius; Unde successivè spiritus animales & volatiliores & concitatiores fiunt, à quibus velocius simul in cerebro servescit & agitat, accedente isto pruritu veneris genitalium, tam insignis in venerem impetus consequitur: Similiter etiam se res habet in mulieribus, quæ lymphâ propriâ genitali quasi turgidæ aut gravidæ, istâ scilicet quæ in prostatica circa urethram generatur aut coacervatur, huius excitato orgasmo & fermentatione turgescētiâ, accedente simul forsan acrimoniâ eius volatili ex quodam blando in genitalibus vellitationis aut titillationis sensu, prius in veneris desiderio auctum incidunt, idque imprimis, si antea consuetæ fuerint aut congressui, aut aliâ habuerint suas pollutiones nocturnas, quæ utraque ubi cessant aut deficiunt, runcelitoris simul in isto orgasmo tenditur, & turgidus veneris desiderium magis magisque incendit: Nam hunc clitoridem manifestè tumere, & in furore uterino phlogosin quasi quandam & ruborem concipere, asseritur in Epist. Bartholinianis Cent. 3. Epist. 24. pag. 407. Jam verò occasione huius veneris titillationis in genitalibus talis spirituum animalium in cerebro excitatur motus, cuius occasione anima concipit affectum venereum: Quo motu spirituum animalium diutius & vehementius continuato, tandem inordinatio quædam supervenit, unde delirium, sed venereum, excitatur.

Effectum hunc obscurum nonnihil declarant sufficienter pollutiones nocturnæ virorum: In his enim turgescēte ex quacunque causa genitura in vesiculis seminalibus, inchoatâ suâ titillatione exciteatur talis spirituum animalium motus, unde exinde oritur somnium exercitii veneri, vel aliud simile, indeque genitura tandem se excretio in somnio. Jam verò deliria sunt vigilantium somnia & somnia sunt dormientium deliria: Unde sicut se habet tale delirium nocturnum, aut somnium in pollutione nocturna virorum; ita se habet tale delirium diurnum in feminis furore uterino afflitis, in quibus ex sua vi genitalium pruriginem, ob turgescētem illum & fermentantē seminalem liquorem faciliè excitatur impressio seu idea venerea, quæ continuâ sui representatione instar

cuiusdam delirantis nil aliud cogitare permittit, quàm exercitia venerea. Dum enim liquor hic genitalis, per sanguinem & lympham refluus, etiam alterat simul sanguinem & totam massam sanguineam, eius acrior fit fermentatio & effervescentia; Unde spirituum impetus magis celer & agilis redditur, ut ex concitatiores hinc spirituum animalium agitationibus talis animositas, & audacia insolita, apprehendi conatus, & similes exorbitantiæ in feminis, imò insolita corporis incallescētia, exinde sequantur, unde tales mulieres sunt audaces, minusque timide.

Quoad causas externas seu remotas, disponentes ad hoc malum, sunt omnia ea, quæ istum liquorem genitalem vel augere, vel acriorem eundem reddere, & in turgescētiâ insolitam concitare possunt: Qualia, præter assumpta varia aromatis condita & potum generosiora, sunt vitæ sedentaria, curisque vacua, lauta diæta, abstinentia à venere, habitus succi plenus, &c. Sic SENNERTUS lib. 4. Prax. ubi de furore uterino pag. 255. refert, observatam fuisse quandam sceminam ex haustu vini Hippocratici, in quo aliquantulum borracis dissolutum fuit, hoc malum incurrisse; Aliis idem accidisse post congressum cum viris, qui ad venerem augendam, & voluptatem foemina conciliandam, virile membrum moscho & oleis calidioribus inunxerunt. Nempe effluvia talia odorifera & lympham genitalem & totam massam sanguineam imprægnarunt. Præter causas istas nonnunquam evenit interdum, quod moniales serè subindè obnoxie sint huic passioni, eum ordinaria remedia his non admittantur. Et sanè, si quid aliud, mirabilis uterini furoris in moniali cum copiosissimis pollutionibus noturnis exemplum BARTHOLINUS Cent. 3. Epistol. 39. ex literis HORSTII refert: Quod referenda etiam humilis serè historia AMATI LUSITANI Cent. 6. Cur. 97. Furoris uterini in moniali; Sic ex imminente primis mensium fluxu furorem uterinum notant BARTHOLINI Asia Hassniensia Vol. 1. pag. 164. in quem desiderat pleuritidis spurta; vid. Acta Hassniens. Vol. 4. pag. 167.

## D I A G N O S I S.

Signa diagnostica ex modò dictis suprâ de habitu mulierum mutato faciliè patent.

## P R O G N O S I S.

Quoad Prognosin: Recens faciliè curatur; si verò negligatur, periculum est, ne malum diutius durans (nam per paroxysmos interdum recurrere solet) nisi maturè suppressatur, in perfectam tandem maniam degeneret.

## C U R A.

Quoad Curam: Ista, quæ fit per nervosum, validum, & crebrius repetitum congressum, est optima; Quæ ipsa tamen, cum interdum nolentibus volentibus denegatur, hi quatuor scopi observandi sunt: Opera ergò danda est,

1. Ut materia peccans in primis viis evacuetur.
2. Genituræ ubertas inhibeatur: quod præter diætam tenacem ea omnia faciunt, quæ peculiari vigenturam absumere, aut saltem alterare, per experientiam cognita sunt, & qualia suprâ l. 3. Sect. 1. cap. 2. Artic. 1. Membr. 1. & l. 4. Sect. 1. cap. 4. in gonorrhæa tam mulierum, quàm virorum, fuerunt recensita.
3. Effervescentia sanguinis, & hinc nata turgescētia liquoris seminalis, dometur per venæsectionem, per absorbentia, & lenia diaphoretica.
4. Spiritus animales corrigendi, eorumque impetuosus motus ad venerem plus minus impellens sistendus ac coercendus: quod faciunt imprimis opiata & camphorata.

Priori scopo satisfaciunt imprimis Vomitoria in paulò maiore dosi, partim, quæ ægram mitigando, & partim lymphæ genitalis materiam revellendo, item ægras debilitando & delassando, optimè conducunt.

Pro secundo scopo ad genituræ ubertatem omnia serè remedia conveniunt, quæ suprâ l. 3. Sect. 1. cap. 2. art. 1. Membr. 1. & Sect. 2. c. 2. Artic. 1. & 2. circa gonorrhæam, salacitatem, ac satyriam virorum dicta sunt, ut radix nymphææ albæ, & quælibet ex ea parata; Item vitex seu agnus castus, in specie eius semen, & ex agno casto parata remedia, lactuca,



lactuca, ruta, portulaca, cicuta, in specie eius semen, folia salicis. Nam, dum tempore verno amputantur ramuli salicis tenuiores, effluere solet ex iis liquor liospidus & aquosus, qui propinatus, ac cum farina in pastillos redactus, mulieribus, furore uterino laborantibus, omnem ad venerem propensionem extinguit. Quod etiam facit *Decoctum foliorum salicis*, in specie junioris, aliquoties eorum leluno stomacho: nam & hoc omnem appetitum venereum in feminis cohibet, quo & tandem omnes mulieres steriles facit: item extractum foliorum salicis de quo vid. LUDOVICI *Pharm. pag. 716* Hinc semen cannabaris, viticis, papaveris, & similia laudantur. A quibusdam propterea hæc laudatur Emulsio:

℞. Sem. cannab. ℥i.

Lactuc.

Portulac. an. ℥ii.

Cum f. q. aquæ nymph. vel portulacæ f. Emulsio, edulcoranda cum syrupo de nymphaea, pro aliquot dosibus:

D. S.

Emulsio cohibens.

Si addatur aliquid de camphora vel opiato quodam, remedium erit ed efficacius: cautè tamen usurpetur propter canabim. Vel ex semine viticis possunt fieri Emulsiones; ex. gr.

℞. Sem. agn. casti ℥ss.

Cum f. q. aquæ nymph. f. Emulsio  
adde

Camph. ℥ss.

M. S.

Emulsio refrigerans.

Pro tertio scopo ad mæsse sanguineæ turgescientiam convenit venæ sectio repetita; hinc usurpentur acida sæpius laudata, in specie succus citri & limonum, granatorum, & similia acida, speciatim nitrum & omnia Nitrata, aliquandiu continuata: quibus addantur sudorifera: item serum caprillum copiose haustum convenit. Alia, ut saccharum Saturni, corallia, & similia, quæ sanguinis effervescentiam etiam compescunt, non sunt omittenda, sed diligenter usur-

panda: Quia & bolum ex terebinthina ad evacuantiam materiam seminalem commendat RIVERIUS.

Pro quarto scopo optima sunt papaverina, & quælibet opiata, & hinc camphorata. Camphoram quod attinet: ad compescendum furorem uterinum huius crebrior usus præ aliis remediis specificè convenit, & omnia ex camphora parata. Confirmat hoc HORSTIUS *Epist. ad Bartholinum*, ubi dicit: se sæpius expertum fuisse in virginibus hoc malo correptis, quod ferè nihil melius contulerit, quàm camphora incensa, & sæpius in potu ordinario extincta, & ita pro potu ordinario ægræ propinata, qui potus est medicatus contra furorem uterinum: vid. BARTHOLINUS *Cent. 3. Epist. 39. pag. 147*. Credo hoc ipsum; nam notum aliàs est, quod camphora in mania ipsa sit singulare remedium; Imò, quod etiam deliria febre maligna aut febre ardente correptorum egregie domare soleat: Unde camphora cum his omnibus remediis miscenda, Imò præferenda, cum simul habeat vim narcoticam & spirituum fixativam. De opio & eius laudano itidem constat, quod conducat in Furore uterino, & genitura compescendo turgescientiam, & spirituum cohibendo motum impetuosum: Exemplum huius rei clarum, quantum opiata valeant, refert BARTHOLINUS *Centur. 5. Histor. Anatom. 85*. de muliere, quæ subito furore uterino gravi fuit affecta, curata postmodum per grana li. laudani opiat. Vi tali anodyna & cannabis semen prodesset videtur.

Ex his multæ formulæ possunt adornari, quales vid. in *Coll. Casuali*. Si opus sit evacuatione, infusum sennæ in serum caprinum apprimè conducit.

Externè conveniunt Cataplasmata, Balnea & Fomenta, tam regioni uteri externæ, quàm mammis, ex mandragora, solano, portulaca, ruta, papavere & similibus applicata. Cicuta quacunque ratione usurpata genitalibus, vel folia recentia, vel succus, imprimis commendatur. Alii laudant Mercurialem cum lenticula palustri, sub forma cataplasmatum pectini & lumbis impositum. Denique succus agni casti, salicis, lactucæ, hyoscyami, sempervivi maioris, cum aceto, saccharo Saturni, camphora, & similibus, a frigide diutius locis utiliter applicantur.

## S E C T I O III.

### D E

## AFFECTIBVS TOTIVS CORPORIS, QVI SEQUIORI SEXVI EX VITIO UTERI VVLGO CONTINGERE DICVNTVR,

Nam modò dicta Sectio hoc manu nos ducit: Nempe, cum quotidiana constet experientia, quantum genitalis liquor in utroque sexu, in puberibus naturaliter constitutis, & in iis, in quibus abundat præternaturaliter, alteret corpus, meritò accedimus ad affectus, qui vulgò ex utero vel per consensum uteri fieri in mulieribus putantur. Putantur, dico, fieri varii affectus ex utero, sed malè, cum reverà non sint ex utero, quæ tali, nisi uteri nomine partem continentem pro vitiis contentorum vel transmittendorum accipere, & sic totum genitalium muliebrium systema simplici uteri nomine appellare velimus: Sed reverà eveniunt aut vitio liquoris genitalis diutius retenti, & ita præternaturaliter corrupti, vel alio modo alterati; (hic liquor genitalis ille est, qui in coitu feminis effluit, & non confundendus est cum genitura seu ovario,) aut vitio mensium, in specie suppressorum, nec ritè fluentium. Uterus enim ceu vasculum membranaceum simul glandulosum rarissimis, nec adeò crebris, affigitur passionibus, iisque saltem cum aliis affectibus particularibus aliarum partium communibus, quales v. g. sunt inflammatio, tumor aquosus seu hydrops uteri, inflammatio uteri, scirrhus, dolor, cancer, & sic porro, à quibus non maior sequitur corporis alteratio, quàm si eadem passiones alias partes occupent, cum dicta pathemata non uterum solum, sed & alias corporis partes affligant. De cætero neque ullum cum aliis corporis partibus commercium habet uterus, quàm quod sit beneficio nervorum ex plexibus mesenterii oriundorum, cum reliquis abdominis partibus. Un-

de, si qui ex utero per consensum sunt affectus, hi solum erunt spasmi aut spasmodicæ convulsiones, unde dolores oriuntur, & pathemata, qualia Gravidis in, ante, & post partum, frequenter accidere solent.

Quando ergo uterus accusatur à Practicis in mulierum morbis abstrusioribus & contumacioribus, & variis humoribus infarctus putatur, unde pessima surgant miasmata, à quibus aliæ partes afficiantur, aut quando intemperiebus quamplurimis laborare putatur, tunc profectò causam non causam proferunt, & potius tales excusationes sunt vana effugia ignoratæ causæ proximæ magis, quàm accusationes uteri reverà affecti, quibus affectibus pallium quæruunt. Unde etiam regimen istud singularis monarchiæ in totum corpus, quod ex utero statuit HELMONTIUS, inter suaves eiusdem proprio arbitrio effictas hypotheses referri debet.

Misso ergo utero, pathemata ista, quæ vulgò tribuuntur utero, dictum est originem ducere ex liquoris genitalis plus minus turgescencia & menstruum suppressione. Quod attinet lympham genitalem: (ubi semper intellectum volo non liquorem quendam in testibus contentum aut elaboratum, hic enim nullus est, imprimis cum testes sint ovarium; sed potius intelligo eum liquorem, quem mulieres in coitu voluptuosè sensibilibiter, imprimis in prostaticis glandulosis collis vesicæ, & forsan etiam in vagina uterina ratione texturæ eius membranoso-glandulosæ, elaboratum & asservatum, excernunt: si inquam retenta ista materia & coacervata turgescendo, & stimulando dat Satyriasmum, in qua clitoris instat penis



penis rigidas pruriginē. Venerē afficitur, (adeoque affectus idem cum satyriasi virorum,) adeoque ipsum & furorem, uerinum; nondubium est, si hęc ipsa materia diutius retineatur & supprimatur, quod minus aut consuetis pollutionibus, aut congressibus excernatur, & ex retentione diuturniore insigniter alteretur, quin & mutata tandem omnino depravetur, ita, ut postmodum hęc ipsa insignes in toto corpore mutationes inferre possit. Sane considerantur *alterationes*, quę mulieribus tempore *pubertatis* accidunt, similis illis, quę viris obveniunt ex causa eadem: Multo magis ergo ex inquinata massa sanguinea, quę inquinata est ab hoc liquore seminali, varia evenerint symptomata.

## CAPUT I.

## DE

## CHLOROSI.

**H**As inter corporis mutationes primo loco considerandus est *Color pallidus virginum seu Chlorosis*, quę alio nomine etiam *Febris alba virginea*, item *lesteria alba* appellari solet, & male ab omnibus ferē Autoribus cum cachexia muliebri, quę vel mensium secum trahit suppressionem, vel ex mensium suppressione sequitur, & in qua mulieres non secus ac viri cachectici pallide etiam & decolores fiunt, confunditur. Nam posterior hęc cachexia in genere ita dicta ex æquo omnibus mulieribus, quocunque in statu sint, contingere solet, tam virginibus quā maritatis, tam iunioribus quā vetulis: Et hanc cachexiam, quā mulieres cum viris habent communem, semper aut antecedit aut insequitur mensium suppressio. Sed hęc ipsa cachexia non est *chlorosis* seu *febris alba virginea*: Nam & nominis ratio sufficienter monstrat, esse hunc affectum proprium aut virginibus aut viduis, aut similibus extra viri confortium viventibus, aut quibus mariti non satisfaciunt. Tales enim pallent, aut sublivido potius aut foedo nonnihil colore tinctę apparent, imprimis sub oculis coronam quandam quasi subceruleam, & subrubescens habere solent, anxie sunt, & non raro tristes citra manifestam causam, menses non semper suppressi sunt, sed sicut ferē statim temporibus, donec malo ulterius procedente tandem & illi emanent. Febricula sæpius adest lenta, & quodammodo inordinata, ac quasi erraticata, obscura tamen & ægris ipsis vix sensibilis: pulsus sunt inæquales & varii, vomitus etiam interdum infestat, ac præcordiorum anxietas, &c.

## CAUSÆ.

Tales vulgò putantur laborare vitio uteri tali, quod contrahatur ex mensibus suppressis: quod non semper verum est, sed mensium suppressio supervenit quandoque tanquam effectus: & posito, quod mensium suppressio sit causa huius affectus, sicut nec hęc suppressio ex causarum numero omnino excludi potest, cum hanc in maritatis æquē ac non maritatis & similia symptomata sequantur, (vid. HORSTIUS lib. 5. obs. 5. & 6. ac TIMÆUS von Gulden klee, lib. 4. Conf. 16.) quaeritur, quare tales luvet, & felicissime restituitur congressus cum viro? Idque ed melius, quod frequentius hic ipse reteratur, habitū simul circumstantiarum ratione, quod non sit in suppressione mensium laborantibus. Sane congressus, quā talis, ad cachexiam sanguinis in genere, & hinc mensium suppressionem curandam, parum aut nihil facit; potius dicendum cum LINDANO: Non statim cachexia mensium laborant femina, quę pallent; nam subinde virgines admodum pallent, & tamen non laborant mensium suppressione, sed potius volunt tales cohabitare viro. Scilicet vitium est in liquore genitali suppresso, indeque alterato, & tandem nonnihil corrupto, cujus corrupti vitium massę sanguinę communicatum instat fermenti & hanc corrumpit, unde & reliqui hinc discernendi corporis succi, uti & lymphæ, similiter corrumpuntur; hinc successivē talis color, febris lenta, & maiores calamitates, & citra ultimum diuturnum talis pallor & malus habitus, cui tandem necessariò quoque supervenit mensium suppressio, virgines tales affligit. Nam ori genitalis liquor naturaliter constitutus sub pubertatis tempore tam notabiliter corpus femininum alterat, & alacritatem, robur, venustatem, & similia cum mēstrua fermentatione & mammarum torratione inducit: Item sicut idem liquor genitalis luxurians copiosius impetum quendam plusquā humanum, furiosum & quasi

brutalem, in furore uterino infert, idque per auctas sanguinis spiritualescentias; ita retentus & contra & corruptus ac alteratus simili fermentativa virtute & totum sanguinem, hinc & spiritus inquinat, & tandem alterat & vitiat, & consequenter corporis habitum possundat. Per venerem ergo excretō istō liquore, & à spiritu genitali maris novo quasi fermentogenitalibus muliebribus inspirato, denuò spiritus adest, & impetuosius fermentare incipit massa sanguinea, & spiritus alacriores & volatiliores, motuque elastico apertiores, totam corporis machinam pererrant, & omnes corporis partes animant, unde totum corpus denuò restituitur in statum sanum, & sic redditur ejus color floridus. Hinc postmodum tales feminae per conjugium tandem tam elegantes & formosæ fieri solent, quę antea erant pallidæ & decolores, ut tantum non omnibus sint admirationi, adeoque virgines pallores sæpè dant mulieres pulchras. Multum sanè ad venustatem muliebrem juvat moderata Venus; sicut nimia hanc ipsam (venustatem nempe) successive absumit. Hęc ergo propriè dicta est febris alba virginea, lis tantum foeminae, quę marium consortio destituuntur, propriè competens, quę non est confundenda cum ista cachexia muliebri, quę lisdem cum viris est communis, & à perversa diætā oritur, & quam antecedit, aut tandem sequitur mensium suppressio. Quę dixi, confirmari possunt observationibus & Historiis affectuum plurium ex simili causa natorum: in specie, PANAROLLUS *Pentecost. 3. Observat. 14.* recte talem febrem albam ex amore puellarum nubilitum deducit, unde & multis aliis remediis isdem medicandis supdet.

A liquore ergo spermatico coactō & retento, hinc morā diuturniore corrupto & inquinato, etiam vitari dixi massam sanguineam & lympham, donec successivē ipsi adeo spiritus & reliqui corporis succi inquinentur. Hinc ex liquore isto genitali retento horrendos hystericos cruciatus cum tota convulsio totius corporis mirabili, acoris tortura in vetula enatos, recenset PANAROLLUS *Pent. 4. observ. 1.* quę tamen pristinam consecuta est sanitatem, superveniente uberiore liquoris genitalis ad aliquot dies noctesque profluvio: Est observatio notatu digna, quę vid. in *Autore allegato*: Id quod etiam LEMNIUS *de occult. Nat. Mir. confirmat cap. 6. lib. 1.* qui ex istius liquoris retentione, fluentibus etiamnum mensibus, virgines adultiores, item viduas, ut variis hysterics passionibus, ita etiam hęc ipsa febris alba consistari, eleganter illustrat; non secus ac DEODATUS *in suo Valetud. pag. 177.* observavit Iuvenulam mulierem, post obitum mariti viduam factam, quam ex retentione excernendorum per congressum vomitus horrendi, omni aurorā repetentes cum gravi tetano totius corporis, per integrum annum affligerunt, donec tandem adhibitis appropriatis fuerit restituta: Conf. HOEFERUS *in Herc. Med. pag. 137.* & HILDANUS *Cent. 4. obs. 32.* item *Cent. 6. obs. 25.* qui etiam hac ex causa in monialibus gravibus vomitus oriri asserit. Facit huc etiam, quod in superioribus discursibus ex Dn. BOYLE monui de virgine sensu tactus in toto corpore destituta, salvo tamen motu in omnibus partibus, idque ex vitio simili, unde & per exercitium Venerem repetitum postmodum fuit curata, teste BOYLEO *in Philos. Experiment. P. 2. pag. 75.* Nec rarum est, convulsiones graves varias & epilepticos membrorum cruciatus supervenire virginibus nubilibus, aut viduis salacibus, quatenus propter liquorem seminalem retentum nervis uterinis, hinc reliquis abdominis plexibus, graviter irritatis, hinc ulterius spasmos convulsivos continuant, & ita ad superiora loca quoque retorquent: Conf. hic HOECHSTETTE *RUS Dec. 4. Cas. 2. p. 110.* Sed rari sunt tales ex vitio liquoris seminalis muliebris affectus, imprimis apud nos, quia aut conjugio præveniuntur, aut ipsa natura pollutionibus spontaneis, vel nocturno tempore, vel cum ipsa mēstruatione eventientibus, se liberat.

## DIAGNOSIS.

Cognitio affectuum horum, & qui ex vitio liquoris genitalis retenti, & corrupti & alterati oriuntur, difficillima est, ac sagacem, prudentem & solertem præsupponit Medicum.

Febris alba quidem virginea, ex eo ferē cognoscitur, quod citra ullum errorem diætę seu sex rerum nonnaturalium successivē inchoaverit, & citra manifestam causam, etiam citra mensium obstructionem, ita processerit, donec negotio ulterius progressio ita curata fuerit. Suppressio enim mensium



lum non adeo est causa chloroseos, sed potius illa effectus huius est, quia in massa sanguinea est vitiosa ex aliis præcedentibus. Quia & confirmatur tunc coniectura simul ex eo, si aut virgo nubilis, & iamdiu talis fuerit, quæ aliàs per se procax & nonnihil perulantior fuerit, quæ postmodum ita successivè *tristis*, *anxia*, & in alium statum permutata apparuit: Item si *vidua* sit, quæ viro iuncta cum fuisset, optimè semper se gessit, sed post huius obitum ita successivè affecta fuerit, imprimis, ubi aliæ causæ, *dieta lauta*, *vita sedentaria*, *curis vacua*, *conversatio cum iuvenibus*, *potus generosus*, & similia alia, *liquorem seminalem* augentia, accesserint. Reliqua & alia vitia, præter febrim albam virginæam, occasione lymphæ genitalis oriri, præter dictas rationes ex eo ferè coniecturatur, si alia ferè nulla adsit vel manifesta, vel saltem probabilis causa, vel nulla alia effici possit occulta, si menses ritè fluant, aut haud ita pridem adhuc fluxerint, sique subiecto modò enarratæ conditiones & circumstantiæ simul respondeant. His & similibus confirmatur Medicus, ut habeat respectum ad hæc mala, ex *liquore seminali derivanda*.

### PROGNOSIS.

*Prognosis* pro ipsorum affectuum varietate & ipsa etiam variat: Nam quod diutius durat, eo deteriora insequuntur symptomata, sic porro.

### CURA.

*Curam* quod attinet: in ea nil facilius aut melius est, quàm iucundo congressu levare tam molesta hæc mala: vid. BOYLE Phil. Experim. P. 1. pag. 73. HIPPOCRATES de Morb. Virg. T. 3. LANGIUS Ep. 2. & PANAROLLUS l. a. Quod si hoc ipsum non liceat, ad remedia alia accedendum. Verùm pauca admodum, ut ita explicatorum affectuum, ita & remedium, apud Practicos prostant vestigia, aut si horum remedium sit mentio, sunt anticachectica, sed male. Eo ergo imprimis, quoad Indicationes, est colligandum: ut liquoris genitalis vitium corrigatur; & massæ sanguineæ hinc derivata crasis vitiosa emendetur; ac denique variis inde ortis symptomatis debitis appropriatis obviæ eatur.

Ut à posteriore incipiam, *symptomata* ipsa quæcunque obvia, eorumque truculentiam, optimè suspendunt & mitigant opiata, specificis mista. Sed hæc ipsa opiata in talibus non curant radicaliter morbum, sed saltem, ferocitatem eius palliando, occultant; Unde saltem conveniunt ad symptomata atrociora mitiganda, ad malum verò radicitùs evellendum non valent. Quæ ergo liquoris genitalis corruptelam & virulentiam corrigere valent, imprimis erunt camphora & camphorata, quæ non tam absument quantitatē, quàm corrigunt liquoris dicti virulentiam, hinc & massæ sanguineæ *dyscrasiam*, & spirituum animalium vitia mirè emendant: Singulare enim quid pro his affectibus latet in camphora; unde & pestifera miasmata tam potenter corrigit, & eorum truculentiam ferocitatem mitigat & obtundit. Hinc opiatis & camphoræ adiungatur *succinum* & *succinata*, quæ sunt proficua: Nam præter vim corrigendi malignitatem liquoris genitalis, sal eius volatile oleosum acidulum ad hystericas & alias convulsiones mirum est auxilium. Myrrham etiam non contemnendi usus putarem, cuius balsamica vis corruptionem liquoris seminalis efficaciter emendat, in specie *essentia myrrhæ* cum spiritu salis dulci aut spiritu nitri dulci parata. Convenit etiam *castoreum*, & omnia *castorina*, liquor Cornu Cervi succinatus, spiritus salis ammoniaci quo febris virginæa ferè desperata in Belgio curabatur, præmisso vomitu. Denique ex Saturno parata remedia, tam eius sal seu saccharum, quàm cum spiritu nitri, aut solo, aut aceto destillato acuto, paratæ ex minio, aut ex minera Saturni puræ, *crystalli*: nam & hæc egregiè sunt in huiusmodi affectibus primariò, quando occasione talium *delirium* imminet; siquidem vitiosos sapores succorum corporis corrigere, & præternaturales sanguinis alterationes potenter emendare valent. His addantur *moderata acida*, ex citro imprimis petita, item ex granatis accydonio erunt proficua, non secus ac nitro, omniaque *Nitrata* omnibus addantur, utpote quæ mala ex corruptione liquoris seminalis & eius turgescencia solent sistere: E. g.

℞. Conf. meliss. ʒij.

Pulp. citri,

Cydon. condit. an. ʒvi.

Ess. myrrh. ʒij.

Succini præp. ʒij.

Cryst. miner. Saturni,

Castor. pulveris. an. ʒi.

Caryophyll.

Macis,

Zadocr. an. ʒi.

Camph. ʒij.

Cum. f. q. syr. granat. f. Eleſtuarium:

D. S.

Eleſtuarium alterativum.

His intermiscenda semen extinguentia dicta, ut ex vitice, salice, cannabe, ac similibus parata remedia. Forſan & balsamica vis terebinthinæ, genitalibus locis præsertim dicta, quatenus urinam promovet, & loca urinaria emundat, erit proficua.

Venæsectio denique cum prudentia institui, interdum etiam pro circumſtantiarum ratione repeti potest: Vid. HIPPOCRATES l. a. quia liquoris genitalis elaborationi obicem ponit, & per consensum eius turgescenciam refrinat. Verùm, cum rarò occurrant tales affectus, eorum medelam primariam innuisse sufficiat.

## CAPUT II.

### DE

### CACHEXIA MULIEBRI.

**A**ltera species affectuum utero vulgò adscriptorum oritur ex mensium impedita excretionē; Exinde enim, mira malorum procella feminis imminere solet. Hos inter affectus, qui sequuntur mensium suppressionem, primariò refertur *Cachexia muliebri* in genere sic dicta, eadem omninò cum illa *cachexia*, de qua alio loco & tempore iam locutus sum, nisi quod in muliebri sexu semper simul mensium adsit suppressio, quæ ipsa mensium suppressio vulgò quidem, nunc illius *cachexiæ* causa, nunc potius, idque ut plurimum, effectus esse solet. Habitus enim sanguinis *cachecticus* & *cachochymicus*, à naturali salina volatili aut spirituosa crasi deficiens, & in massam crudam ex cacoehydia degenerans, & imminutam sanguinis fermentationem menstruam, indeque subsequentem deficientem excretionem, infert. Rectè enim inquit RENEALMUS in Obs. 89. „ In ſadis mulierum coloribus ſupprimuntur menſes ut „ plurimum à cruditate corporis, quæ ſanguificationem per „ vertens myriadem ſymptomatum increbit. Saltem ergo curen- „ retur cachexia more communi per Vomitoria, & hinc al- „ terantia, primariò Maritima, & deinde aromatica, & „ blanda hinc addita menſes leniter ſtimulantia, donec hi ipſi „ ſpontè erumpant.

Ceterum interim est, quod menses ex quacunque ratione demum suppressi mala cachectica exacerbent, & mille malis mulcent feminas, speciatim si actu fluentes ex terrore, vel ex alia quadam causa subitanea, supprimantur. Sic enim non tantum Inflammationes partium erysipelaceæ, ex acido sanguinem coagulante natas, ut pleuritides, anginas, uteri inflammationes, epilepsias, & similia mala inducunt; sed & in specie omni menstrua periodo, dum turgescere solet sanguis, & tamen per loca consueta erumpere nequit, miras ludit tragedias, superveniunt *pica* & insolitæ appetentiæ, disponuntur mulieres ad periculosas passionē sic dictas hystericas, superveniunt *epilepsia*, ac stupendæ interdum convulsiones, interdum *melancholia ex utero dictæ*, similes ex affe *melancholiæ hypochondriacæ*: Superveniunt etiam interdum *tumores* & *scirrhi viscerum*, in specie *lienis*, unde postmodum mala omnia ex splene, tanquam radice, esse vulgò dicuntur, cum potius ex morbo primario alio tanquam productum dependeat lien affectus, & consequens sit mensium suppressio. Ulterius *cephalalgia insana* & contumacissima talibus mulieribus sunt frequentes, item *palpitationes* & *pulsationes*, tam in corde, quàm in variis corporis partibus, se manifestant, in specie quidem in dorso & lumbis, & hinc in hypochondriis, & quæ alia, quam plurima sunt symptomata, donec tandem ex successivè magis magisque corrupto ventriculi fermento digestivo, vitiatoque bilis balsamo, & denique succi pancreatici corrupta natura, variæ cachexiæ, icteri, leucophlegmatiæ, hydropes, atrophici, ut plurimum *chronici affectus* difficilè curabiles, ac nescio quæ non mala exinde scaturiant: V. g. epilepsiam ex retentis mensibus Venere & puerperio curatam



jam vid. in M. A. N. C. Ann. 1. obs. 86. pag. 204. Melancholiam uterinam cum pertinacioribus vigilis in HORSTIO lib. 2. Observat. 18. Convulsionem virginis cum risu ex utero in M. A. N. C. Ann. 3. Observat. 204. pag. 226. Sic SCHENCKIUS lib. 1. Observ. de Epileps. observat uteri vitio suscitatum epilepsiam in puella, erumpentibus primùm menstruis curatam.

### CAUSÆ.

Causam ergo horum symptomatum omnium, in cachexia muliebri occurrentium, dixi esse interdum suppressionem menstruam. Nam hinc est, quod mala hæc omnia semper exasperari soleant omni menstrua periodo, & eo atrocius affligere, quod diutius suppressi menses manserint, donec oblitterato omnino typo continuam passionem, aut erraticas & inordinatas exasperationes, inferant. Mulieribus maritatis non fecundis, succulentioribus, communes sunt hi affectus.

Ut autem ex omni suppressione sanguinis menstrui omnia hæc mala sequantur; in specie tamen hæc oriuntur, si ex improvviso repente iidem fluentes supprimantur, idque ex duplici ratione:

1. Ex sanguinis excernendi retenti quantitate.
2. Ex sanguinis retenti vitiosa qualitate.

I. Quod attinet quantitatem sanguinis excernendi: certè dum nimius est sanguis, ineptus est æquabili per vasa circulationi & debitæ in præcordiis fermentationi: Unde hic ipse sanguis à debita turgescencia & fermentatione cohibitus, instar musti vasarctæ & strictè obferatis inclusi, minus spirituosus, minusque volatilis, sed potius crassus, plus minus viscidus, glutinosus, & à debita crasi omnino degener, vapidus & iners evadit; Unde angustia præcordiorum, pulsationes & palpitantes variae, cephalalgia, aliarumque partium dolores, inflammationes partium, quin & viscerum, in specie splenis infarctus, & similia mala.

II. Quoad secundum: præmonendum, quod licet sanguis excernendus singulis mensibus, sub nomine menstrui excernendi, ejusdem sit conditionis & naturæ cum eo, qui post excretionem retinetur citra nocumentum in corpore; tamen eo ipso, quo tanquam excernendus separatur per fermentationem menstruam à reliqua massa sanguinea, alterationem quandam singularem circa uteri vasa, ubi effunditur, induit, & proprietatem quandam acrem, erosioni aptam, seu tincturam aluminosam acquirit, ut scitè loquitur HELMONTIUS, & demonstrat in Tract. Lunare Tributum, & supprimitur. Unde sanguis tali vitioso characterè insignitus, & peregrino acore inquinatus, reliquam massam sanguineam permixtus, insigniter eius crasin alterare, & à naturali statu turbare solet; quin & inquinando simul & alterando reliquos corporis succos, vitiosum appetitum, digestionem pravam, & picam, abdominis cruciatus & tormina, tam à mucilagine acida, quam hinc oriundis flatibus nata, passiones & tensiones hypochondiorum, melancholica deliria, & similia mala inducit. Nam in foeminis, quibus ex mensibus suppressis oriuntur morbi, in iis imprimis acidum vitiosum austerum, idque primario in prima abdominis regione abundare & tragœdiam ludere deprehenditur: Id quod & affectus postmodum in nervoso genere & aliis locis inde nati, & methodus medendi per acidum destruentia, sufficienter declarat.

### DIAGNOSIS.

Cognitio horum affectuum fit aperta per relationem ægræ, quæ subito referunt, sibi menses esse obstruatos.

### PROGNOSIS.

Prognosis plus minus est periculosa, prout plus vel minus invaluerint dicta vitia, aut prout eadem vellemiora vel graviora fuerint: Restituto enim fluxu, omnia cessant, quo de superius dictum: quod verò diutius suppressi sunt, tandem post varias calamitates intereunt.

### CURA.

In Cura ergo talium passionum duo sunt attendenda:

1. Est corrigenda sanguinis & reliquorum succorum, inde dependentium vitiosa crasis; speciatim corrigendum est acidum austerum.

Etmull. Oper. Tom. 11.

2. Stimulanda est fermentatio sanguinis menstrua, ut redeant menses in debitum fluxum.

Coniunctim ut plurimum, & quidem præmissis debitis Evacuantibus, remedia utrique scopo satisfaciencia erunt usurpanda: nam frustra menses crientur, nisi crasis & fermentatio sanguinis debita restituatur; & denique hæc ipsa vix restituetur plenariè, nisi menses deus apparere incipiant. Conducunt ergo pro primario scopo Martialia assimilia, vitiosos sapores absorbentia & corrigentia, hinc aromatica, naturalem fermentationem ac volatilitatem sanguinis restituentia. Pro secundo scopo ea conducunt, quæ alias menses suppressos revocare solent, qualia sunt Aromatica volatilia, seu salia volatilia plus minus oleosa & aromatica. In genere omnes hi affectus curantur ista methodo, quæ alias cachexia vulgaris, & postmodum mensium suppressio, ab Autoribus curari solet, habitam tamen simul rationem symptomatum urgentium, quæ subinde simul mitiganda veniunt.

Paucis curam percurramus: Radicem curæ constituit vomitus, qui interdum sæpius repetitus mirè confert, si per antimonialia, quæ sunt optima, si per asarina, si de-nique in robustioribus per helleborismum, instituitur. Formulæ omnibus sunt notæ. Sic v.g. oxymel helleboratum Gesneri ad 3ii. propinatum promptè vomitum ciet. Ex Purgantibus pilulæ tartaræ & de ammoniaco Quercetani hic mirè conducunt; similiter etiam pilulæ de hiera, item de agarico: Nodulis diligenter admiscendæ sunt radices bryoniae ac hellebori nigri, imprimis affectibus mensruorum muliebrium dicatæ: quibus omnia pro stimulo ratione mensium inserviunt ex colocynthide seu trochiscis albandal parata, medicamenta. Hinc Martialia & alterantia, quæ vulgò vocantur Aperientia, sunt usurpanda. Ex his Martialibus nota est tinctura vitrioli Martis Zwelferi; quæ insigniter est experta in talibus affectibus cum mensruorum suppressione coniunctis: Potest etiam fieri aptissima Martis tinctura beneficio spiritus salis ammoniaci, iuncti cum spiritu vini: hæc duo enim parvâ encheiresi coniunguntur, & præbent menstruum, quod limaturæ Martis assusum promptissimè tincturam elegantem educit, optimam in his casibus: Sicuri etiam (quod incidenter moneo) spiritus salis ammoniaci affusus salii essentiali tartari Zwelferi promptè hoc imbibit, & dat tertium salum volatile, egregium remedium in morbis mulierum chronicis. Alli croci Martis aperitivi salini, cum salibus fixis parati, item aliæ tincturæ Martis iam notæ sunt. Item vina Martialia, infusionis nempe Martis, v.g. Vinum Malvaticum cum limatura Martis & cinnamomo infusa; item vinum Rhenanum extinctione chalybis impregnatum, & similia, sunt proficua. Pertinet huc vinum medicatum Cnasseli ad cachexiam virginum: Descriptio eius est hæc:

24. Limat. Martis rubiginos.

(sic enim iam facta est corrosio) per ablutionem cum aqua à sordibus purg. 3vi.

Rad. eryng.

Helen. an. 3vi.

Cinnam. 3lii.

Caryophyll. 3ii.

Spica nardi 3lii.

Raf. eboris,

Cornu Cervi sine igne,

Macis an. 3v.

Ceterach.,

Flor. anthos,

Genista,

Epithymi an. p. l.

Spec. diatrion santal. 3ß.

Bacc. iunip. 3lii.

Vini albi 3vii.

Sacch. 3vi.

Mista digerantur absque igne per octiduum, bis agitando indie, post bibatur vinum transcolatum, quotidie bis in phialis probe obturatis ad servatum.

Pulverem cachecticum Quercetani, item pulverem ad pallidos virginum colores HEINRICI ab HEER in Observ. 6. lubens prætereo, cum aliàs sit notus. Remedia hæc Martialia, ubi non habent pro vehiculo vinum, optime assumantur in Decocto vel Infuso roris marini; Nam rosarius aliquid singulare habet in morbis mulierum, à mensibus obstruatis ortis.

Post Martialia sunt Aromatica dicta, quæ inter sunt vulgariora omnia aperientia, imprimis lignum sassafras, galanga, semina calida maiora, baccæ lauri & iuniperi (quæ si-

H h b

mul



mul (sunt diuretica.) Hæc autem Aromatica, ut superius dixi, cum Martialibus iuncta, usurpanda sunt: e.g.

24. Conf. flor. anthos,

Meliss.

Flor. Salv. an. ℥iil.

Cortic. citri uel aurant. cond.

Zing. in Ind. condit. an. ℥iil.

Solut. Martis cum succo pomor. ℥℞.

Pulv. cach. Martial. ℥iil.

Borrac. Venet.

Spec. diaphana Myns. an. ℥i.

Zedoar.

Galang.

Cinnam. an. ℥i.

Olei destillas. sabine ℥℥.

Cum f. q. syr. de artemis. f. Electuarium:

D. S.

Electuarium aperiens & alterativum.

Item convenit spiritus tartari volatilis, elixyr proprietatis, sed sine acido paratum. Modus elixyr proprietatis absque acido parandi est, si ex tartaro & nitro per detonationem paratur alcali, seu, quod ferè melius, ex nitro fuso, iniecto carbonum pulvere, fiat alcali: Quod alcali per deliquium solvatur, lixivium affundatur speciebus, aloë, croco, & myrrhæ, quod ipsum istas species solvit & extrahit promptè, imprimis myrrham, quæ aliàs difficillimè solvitur: Extractio ita nonnihil inspissata coniungitur spiritui vini, sicque fit elixyr proprietatis sine acido, appropriatissimum morbis mulierum, & non est adeo nauseosum atque vulgare elixyr proprietatis. Aliàs elegantiori modo cum spiritu salis ammoniaci parari potest, paucis accedentibus encheiretibus, & est remedium admodum nobile.

## SYMPTOMATA.

### I. EPILEPSIA.

Symptomatis cum his morbis coniunctis simul nonnihil est restitendum, pro quorum autem varietate etiam specificæ ordinanda sunt: v.g. si supervenit Epilepsia, vel motus convulsivi, præter Cinnabarina, remedia ex castoreo & succino sunt optima.

### II. CEPHALALGIA.

Si Cephalalgia sit uterina, ut vocant, seu cum mensium suppressione coniuncta, tunc habita ratione primarii morbi ordinandis remediis salia volatilia & antiscorbutica, ut liquor Cornu cervi succinatus, addenda veniunt, quia & ipsum sal volatile succini usurpatum est conveniens.

Externè ad tollendam cephalalgiam convenit sacculus ex succino pulverisato cum essentia piperis irroratus, capitis vertici impositus: Loco huius ipsum oleum succini destillatum etiam convenit cum balsamo Peruviano mistum, paucis guttis vertici illitum.

### III. PALPITATIO CORDIS.

Ubi palpitationes cordis, & similes apparenter periculosi affectus conjunguntur, remedia ex corallis sunt miscenda, imprimis tinctura coralliorum cum spiritu cordis cervi, item ipse spiritus Cornu Cervi maritatus cum camphora, aut liquor Cornu Cervi succinatus. In pauperculis convenit pulvis zedoariæ, cum coralliis rubris præparatis mistus, & propinatus.

### IV. MELANCHOLIA.

Quod si Melancholica deliria mensibus superveniunt suppressis, Antimonialia vomitoria sæpius repetenda: hinc appropriatis miscendi spiritus, item pulvis secundæ humanæ: Hæc enim ipsa in delirio, quod vocatur ex utero, egregia sunt remedia.

Reliqua medendi ratio ex cura cachexiæ per se est nota.



## CAPUT III.

### DE

### PASSIONE HYSTERICA.

**A**bsolvimus ferè superius affectus, qui utrius culpæ muliebri sexui obvenire dicuntur: Verùm hos inter affectus nullus frequentior, nec alius atrocior est eo, qui vulgò Suffocatio uterina seu Passio hysterica appellatur, Germ. die Mutterbeschwerung, à primario symptomate, & quod maxime urgere solet, utut non semper, nempe ab angustia præcordiorum, & adjuncta summa in respiratione difficultate, ita appellatus. Nam hæc ipsa respirationis difficultas subinde tanta est, ut taliter constitutæ mulieres se suffocari singulis momentis putent, imò interdum suffocatæ quasi sine ullo sensu & motu, sine pulsu aut respiratione sensibili ad aliquod tempus mortuorum instar jacent: Observavit nempe LINDANUS aliquando mulierem per sex horas sine ullo sensu ac motu ac respiratione & pulsu sensibili instar mortuæ jacentem: Imò interdum ad aliquot dies sic iacent, ita ut iam iam sepeliendæ interdum denud ad se redierint. Exempla præter SCHENCKIUM de tali casu vid. in SALMUTH Centur. 2. Histor. 86. & 87. Mulieres inquit: Matrix cubiculo suum reliquit, & cordi se adiunxit, dum talem præcordiorum angustiam, suffocationem & languorem sentiunt. Aliæ etiam hic morbus Strangulatus uteri, item ascensionis uteri, ab HELMONTIO verò uteri Asthma muliebri, à PARACELSO, qui ad epilepsiam speciem refert, Caducus uteri seu Matricis, appellari solet. Tract. de Caduco Matricis §. 2. Communiter passio seu affectus hystericus, ab usque, uteris; à modernis quibusdam Suffocatio hypochondriaca dicitur. Ratio tam diversa appellacionis ex dicendis patet. Huius affectus varia cum sit forma, & hinc diversis symptomatis, nec semper iidem, subinde sese manifestet, & si quis alius frequentissimus sit mulieribus, ob id eius naturam paulò prolixius, prout quidem temporis ratio permittit, considerabimus. Ante omnia eius historia observanda est: nempe tales mulieres, quibus imminet paroxysmus seu iam adest, in ventre infimo seu abdomine subinde rugitus & borborygmos percipiunt, hinc sentiunt motum quasi undulatorium in eodem (nempe abdomine) interdum velut globi cuiusdam hinc inde impetuosè in abdomine moti & agitati, & ab imo loco ad superiora pedetentim ascendentes: Adest ferè semper hypochondriorum nunc tensio, nunc distensio; Et quidem tensio, quando conqueruntur de distensione; distensio autem, quando conqueruntur de inflatione regionis hypochondriorum: Item murmur, unà cum flatuum copiosa imprimis per os eruptione, quandoque per anum expiratione, à quorum emissionem notabile levamen percipiunt. Copiosissimum ructuum notatu dignum exemplum habet BARTHOLINUS Cent. 2. Hist. Anat. 21. Cum his flatibus subinde oscitationes & pandiculationes crebræ ac similia symptomata lungueant, & imprimis paroxysmus imminens antecedunt, aut inchoantem paroxysmum comitantur: Speciatim dolores crebri & admodum atroces in abdomine, nunc lancinantes, nunc distendentes, nunc ut plurimum contorquentes, nunc fixi, nunc hinc inde vagi, sunt coniuncti: rarum est, quod nulli penitus percipiantur: Appetitus, imprimis in paroxysmo, ut plurimum est prostratus, & omnia, quæ assument, vitiosa & quasi corrupto quodam sapore imprægnata videntur: Rarum est, quod observata sit intensa fames post paroxysmum: Alvus ut plurimum est constipata, & mulieres tales ordinariò alvi durioris esse solent; quæ verò aperta, sive sponte, sive per clysteres, levamen egregium exinde percipiunt, præsertim si flatus simul copiosi erumpant: quinimò mirandi interdum sonitus, & quasi voces horrendæ quedam, ex intimis visceribus exaudiri solent, ut etiam à dæmone creduntur obsessæ tales mulieres. Exempla talia vid. in SCHENCKIO. Subinde vomitus ac alizæ deiectiones superveniunt in quibusdam materiz viridis, flavæ, sæpius acidæ, interdum alieni ac peregrini saporis: quædam in paroxysmo sapientis vomendi conatus admodum affligit, sed rarius, semper tamen cum levamine: Accedunt his insignes anxietates & angustie circa præcordia; conqueruntur: aquè ipsis esse, ac si cor & ilia ipsis rumpantur; item dicunt: esse ipsis, ac si cor anxie constingat, & sub prælo quodam comprimatur. Unde mox accedit palpitatio cordis tremula, cum pulsu raro, parvo & debili, subinde intermittente, aliquan-



de superveniente periculosa lipothymia & syncope; & capitis recurrente, ad sensum omnino abolito: Respiratio imprimis difficillima est, inæqualis, impedita, ita ut suffocatio imminet: Imò in malo graviore respiratio ad sensum est abolita, percipiuntque mulieres tales simul angustiam in collo & faucibus, simulque constrictionis quandam sensum, non secus ac si laqueo injecto fauces præcluderentur: Vertigo capitis & visus obfcuratio imminenti paroxysmo ordinario innunt, in iis scilicet quæ sæpius solent eodem malo affligi; & mulieres tales, si easdem incipiat corripere Vertigo, certæ sunt de imminente paroxysmo, & hanc esse per consensum stomachi aut abdominis: In ipso paroxysmo quandoque perfecta adest scotomia cum oculorum rotatione, Inversione & obtenebratione, & tandem corruunt: Interdum in copiosum risum, agris licet in vitum & insitum, terminatur, qui etiam aliquandiu continuatur; quin & subinde delirium varii generis adest, & in paroxysmo varia, non raro ridicula, loquuntur, & differunt delirando: Subinde in paroxysmis gravioribus convulsiones artuum & gravissimi epileptici totius corporis superveniunt insultus, & tam atroces, ut stuporem incipiant adstantibus, quale robur habent in membris ab epilepsia correptæ: & tunc mutatur nomine Epilepsia Uterina vocatur, & superveniunt mira non raro artuum, brachiorum aut pedum, ac corporis gestulationes: Adest interdum ferè sensuum omnium, tam in quàm externorum, uti & motus abolitio: Interdum sensibus omnino integris talia fiunt, ut ut ægræ aphonia correptæ in paroxysmo nil dicere aut significare possint, donec redeunte paroxysmo omnia secum acta memorentur, eademque etiam enarrant: rariss tamen in epilepticas perfectas terminatur convulsiones, sæpius abdominis & thoracis tantummodò ad sunt huiusmodi symptomata, de quibus vid. suprà l. 1. ubi de Dolor. Abdominis Colicis: Interdum in graviore paroxysmo, & quidem in principio, & incremento, ad tactum frigent: Supervenit ut plurimum in statu calor præternaturalis, ac si adesset febris, in largum tandem sudorem finiens, qui calorem etiam post paroxysmum aliquandiu perdurare solet; & non sunt secure, nisi largus sudor superveniat. Mali hypochondriaci nomine venit in viris.

Quod attinet subiectum; insistant hæc symptomata omnis ætatis omnisque conditionis femellas, juniores ac vetulas, etiam virgines, imò interdum etiam ante mensium fluxum; sicuti etiam non raro vetulæ, quibus jam naturaliter defecerunt menses, hoc ipso interdum frequentius consistantur. Symptomata autem talia non sunt in omnibus simul, nec in omnibus eadem, sed in quibusdam pauciora, in quibusdam plura, atqueiora & mistiora: Sæpe post paroxysmum ex anthemata ipsis in ore, labijs & facie prorumpunt: Ordinariò motiones & plus minus dolores, murmuraciones, distensiones, & alia symptomata abdominis, cum præcordiorum angustia & respirationis difficultate, flatibus & scotomis vel vertiginosa affectione, adesse solent, quæ passionis hysterice rationem formalem constituunt. Est affectus, si quis alius, complicatissimus; Unde tres ferè gradus huius paroxysmi statuunt:

1. Dum respiratio est libera.
2. Quando hæc impedita & pulsus ferè cessat.
3. Quando etiam convulsiones superveniunt.

### C A U S A E.

Inter Causas remotas, quæ tales paroxysmos hystericos in consuetis aut dispositis excitare, aut insuetas ad eisdem disponere solent, imprimis sunt (1.) passionis animi graves, in specie ira, in quibusdam etiam terror. Certè nil frequentius est, quàm quod mulieres ex graviore iracundia paroxysmum hystericum incurrant. Aliquot enim novi mulieres, toties sic dictæ uterine passioni obnoxias, quoties ira nimium indulgent, sicut rectè PRIMEROSIVS ab ira, morore, item malo nuncio, affectu uterinum excitatum fuisse memorat; in specie ira ferèur maximè passionem hysterica movere solet. Deinde (2.) odores fortes naribus admodum, aut fortiter nares ferientes, hic admodum potentes, & mirabili ac stupendorum sunt effectuum, tam in excitando hoc affectu in iis, quæ sæpius jam consuetæ fuerunt, quàm etiam in eodem compescendo. Ut plurimum equidem (ut plurimum dico, non semper,) suaveolentia, moschus, ambra, zibethum, & interdum rosarum odor, naribus admodum suscitant: HOEFERVS certè in Herc. Medico pag. 311. refert suffocationem hysterica lethalem in muliere puerpera ex odore rosarum; sicuti in virgine ex eadem causa, Ettmull. Oper. Tom. II.

odore rosarum scilicet, similem passionem annotavit LANGLIVS in Miscell. Curios. pag. 46. & ex eadem causa periculosam uteri suffocationem etiam annotavit TIMÆVS von Goldenkle in suis Cas. pag. 216. quem verò graveolentia subtilia, castoreum, asa fetida, cornua raspa & accensa, Camphora, &c. odorata compescunt; sicut contra suaveolentia genitali antro applicata paroxysmum leniunt. Imò et, quibus maximè infesta sunt suaveolentia odore tenus hausta, his eadem in paroxysmo ad eum citandum, aut extra paroxysmum ad eum præservandum, intrò propinata optimè conducunt, modò nares non feriant, seu modò talia mulieres non olfaciant. Ut plurimum equidem hæc (quod nempe suaveolentia susciteint, graveolentia verò dissolunt paroxysmum,) dixi ita evenire: non est tamen universale; prostant namque etiam contraria exempla mulierum, quibus suaveolentia optimè prosunt in paroxysmo passionis hysterice naribus admodum, graveolentia verò potius nocent; adeò, ut hæc in parte in specie idiosyncrasia muliebris insignis habenda sit ratio; hinc enim, quod huic prodest, alteri nocet, & vice versa. Conferatur hic imprimis HORSTIVS lib. 5. Obs. 26. pag. 382. & lib. 10. Obs. 4. pag. 462. ubi imprimis tale habet exemplum de muliere hysterica, unàque epileptica, cui suaveolentia naribus admodum paroxysmum sedarunt; dicitque, quod graveolentia non omnibus prosint suffocatis; his nempe nocent, quibus unà insultus aut convulsiones huiusmodi epileptice adsunt, aut quibus ob accessiones epilepticas in adolescentia, vel alias ob causas caput ac nervosum genus est debile: Similiter BARTHOLINVS Cent. 3. Hist. Anat. 28. Suaveolentia quibusdam paroxysmos hystericos sedasse aut saltem conduxisse observavit: Vid. HOECHSTEDTERVS Decad. 4. Cas. 2. Schol. item Decad. 9. & HORATIVS AVGENIVS lib. 12. Epist. 7. qui sæpe in passione hysterica utitur suo experimento, quod eum, ut ipse fatetur, nunquam sefellit, quodque maximè odoratum est; v. g.

4. Moschi opt. gr. v.

Cinam.

Caryoph.

Nuc. mosch. an. ʒi.

Quæ in vino odorato soluta propinavit: sicuti etiam l. c. pilulas de moscho tanquàm efficacissimum præsidium commendat: Conf. SACHSII Gamarol. pag. 984. Præterea, quoque, quibus prosunt fetida, nocent verò suaveolentia, earum omnium non est par ratio, dum quibusdam hæc fetida magis prosunt, aliis alia. Mira hæc res est, quoad odores in paroxysmo hoc hysterico: quædam levantur pice incensa, sulphure incenso, castoreo, balsamo apopleptico, &c. Nam si est odor contrarius, paroxysmos incurrunt, & quando incipit paroxysmus, sentiunt malum circa regionem stomachi. Observavi etiam quasdam, quæ maximum solamen à graveolentibus, v. g. castoreo, habent in paroxysmo; hoc diffusio, & affectu percurato, dum denud restitute sunt, non sine motione animi & alteratione insigni odorem castorei postmodum perferre potuisse. Ad causas remotas (3.) mutatio status virginicatis, seu virginalis in uxorum, subinde etiam multum huc facit, in specie si mox hant gravida, & supprimantur menses. Hinc enim observare licet totà dic. virgines, quæ optimè odoratissima quæcunque perferre possunt; factæ postmodum mulieres tales, & hinc gravida, talia postmodum non amplius citra præsentaneum periculum talis passionis perferre posse: aut etiam si tanquàm uxores, nondum tamen gravida, eadem perferunt, gravida tamen factæ ab iis omnino abhorre, idque ita toto gestationis & puerperii tempore ferè continuari, imprimis, si sint non nihil cacochymica: quo transacta, dum denud ventre sunt vacuo, quædam minus adhuc citra paroxysmi metum dulcia odorata ferunt, quædam & contra eadem iterum optimè perferunt, donec denud gravida fiant. Denique (4.) inter causas remotas, inter assumpta dulcia imprimis sunt, quæ ordinariò exacerbant paroxysmos, aut eosdem excitant: v. gr. omnia Saccharata, omnia Syrupifata, Mellita, & similia dulcia facile fermentescibilia, adeoque partim promptè aciescentia statufque generantia, partim fermentativo impetu contenta primarum viarum alterantia, nociva sunt his mulieribus: non ergo præscribantur dulcia: Sic novi vetulam quandam ferè 60. jam annorum, quæ à solo passulæ unius usu graves passionis hystericas perferent. Interim tamen & hic idiosyncrasia habenda est ratio, cum in BARTHOLINI Abh. Med. Hassn. Volum. 2. pag. 207. referatur hysterica ab omnibus abhorrens, dulcia tamen seu saccharum ferens: Sic aliam novi juvenulam, quæ spiritum cochlearie



non absque passione hysterica assumpsit. Adeo ut & in assumptis idiosyncrasia muliebri insignis habenda sit ratio. Imprimis dulcia si excitarent paroxysmum, optimè tunc curatur per amara, in specie absinthium; amarorum enim sal nitrosum dulcem saporem, & inde ortam ascensum, fermentando optimè corrigit & transmutat: Docet hoc **RESTUS lib. 28. obs. 28.** dum refert, quod talibus mulieribus, quæ ex dulcibus paroxysmos incurrunt, Decoctum absinthii optimè conferat: Refert *idem* mulierem, quæ ex ira frequenter suffocationem uterinam passa fuerat, in specie si aliquid dulcium simul assumeret; cui consuluit, ut extra paroxysmum biberet cerevisiam absinthitem, qua ipsa postmodum à paroxysmo præservata fuit: Plura de syrupo absinthii vid. *in obs. 30. cit. lib. 28.*

His ita præmissis, in specie pergendum est ad complicati huius affectus *Causam proximam*, & *subiectum patiens*: de quibus notum est, quod in huiusmodi pathematis vulgè incusetur *uterus* (vel juxta **RIOLANUM** testes & tubæ) qui nempè *sanguine menstruo & genitura*, ad hunc humoribus vitiat & corruptis, turpidus, esse solet *subiectum* horum affectuum, quatenus partim ipse commoveatur sursum, unde ex commotione camarinæ, in eodem retentæ, tam tetra & maligna miasmata & halitus seu effluvia exspirent, quæ superiora versus per corpus nostrum ubique perspirabile, effumando, nervosum genus & cor afficiant, indeque omnia hæc symptomata tragica excitent, dum uterus ipse sursum delatus sub forma globi alicuius in abdomine variè & violenter moti versus cor & diaphragma, tactui se offerat, donec tandem diaphragma comprimendo, & sic respirationem impediendo, anxietatem & suffocationis periculum inferat, unde anxietates. Hæc est vulgaris Theoria, quam sufficienter refellunt:

1. Uteri situs, firmissimæque ejus, & quidem mediata cum intestino recto, & etiam mediata per ligamenta teretia cum osse pubis *connexio* atque agglutinatio, ita ut non, nisi summà vi ex hoc situ sursum divelli possit. Nam & communis *procidencia uteri* falsa est, cum & reverà dicta procidencia uteri nil aliud sit, quam prolapsus sinus pudoris, qui sit à relaxatione membranæ vaginæ interioris, etiam ob id simpliciter post repositionem per adstringentia externa curabilis: vid. **BARBETTE in sua Praxi c. 10. lib. 4. de Procidencia uteri**, item **JOB van Meckern in Obs. Chirurg.** ut suo loco demonstrabo.

2. Contrariatur isti hypothesei *Anatome ipsa*, quæ fraudem similiter detexit, sæpissimè in tali passione mortuis mulieribus uterus parvus in naturali situ & constitutione citra excrementorum humororum præsentiam repertus fuit: vid. **SYLVIVS, HIGHMORUS de Pass. hyster.** & **WILLISIUS Tract. de affect. hypochondr. & hyster.** nec non de *Morb. convuls.* cap. 10. uti & cap. 6. pag. 92. ubi habet exemplum mulieris, hysterici passionibus gravissimè laborantis, cujus corpus cum post mortem aperisset, uterum invenit intactum; verum iuxta mesenterii plexus nervos, in molem attolli & elevari solitos, visceris illius membranas ab invicem divulsas & solutas vidit. Hanc quoque sententiam probat **SYLVIVS** alique Modernorum. Ruit ergo **HELMONTII Monarchatus uteri**, & *Ignota actio Regiminis*. Quod autem vel clitoridis contractio, vel odorum ad uterum applicatio, paroxysmum levat, ratio est, quod stillatione illius sensibilissimæ partis voluptuosa spiritus fortiter afficiantur, & ad determinatum motum redigantur, unde motus inordinatus, convulsiones nempè, ceteraque symptomata, remittunt.

Denique 3. quod viri interdum, qui tamen omnium consensu utero carent, simili omnino passione, atque est in mulieribus, dictâ hysterica afficiantur, unde etiam in paroxysmo à fortilligatura hypochondriorum levamen sentiunt, ut & mulieres faciunt: & tales mores semper graviter malo hypochondriaco laborare solent, & non tantum simillima abdominis, quæ tales mulieres patiuntur, percipiunt pathemata, & eundem globi ascendentis motum iterum esse, multi, muliercularum instar, ridiculè asserunt, sed etiam suffocationis presentissimæ, & faucium constrictionis sensu, apertè & manifestè afficiuntur: Item sunt viri, qui odores suaveolentes non possunt ferre. Exemplum apprimè huc faciens viri passione hysterica correpti, unà cum globo isto in abdomine violenter moto, vid. in **WILLISIO de Morb. convuls. cap. 1. *Observat. 6. pag. 77.* Facit huc etiam *Historia BARTHOLINI Centur. 1. Histor. Anat. 45.* cuius auriæ affectus, si mulierem corripuisset, hysterica passio lethalis citra dubium ab omnibus vocata fuisset. Pertinet huc etiam *contractiva gula affectio* cum variis symptoma-**

ris hypochondriacæ, simillimis hysterici, quam annotat **HOECHSTETTERUS Decad. 5. Cas. 2.** Nihil sane in Praxi est frequentius, quàm quod etiam viri, qui gravioribus affectibus hypochondriacis, aut scorbuticis obnoxii sunt symptomatis, quod de ingruente suffocatione cum abdominis variis passionibus, ac mulieres hysterice, conquiescant, & etiam simili modo curantur, ut per *castoreum & volatilia*. Consuluit me aliquando Studiosus quidam, insignis hypochondriacus, quem omni nocte circæ elus medium evigilantem affligebat rugitus & gravis murmur in abdomine: jam verò aliàs continuè eum torquebant copiosissimæ flatulentæ abdomen distendentes: hinc post hæc murmura abdomen interiora versus retrahebatur, quod ipsum insequeretur insignis *respirandi difficultas*, ita, ut omni momento suffocandus videretur, cum misera cordis anxietate & palpitatione violenta: Referabat mihi, angustiam pectoris sub respiratione ista difficultate esse tantam, & se percipere talem sensum, non secus ac si intra torcular vel intra duos asseres cum violentia, summa thorax constringeretur & comprimeretur, ut putabat, ut cum nullâ vi pro inspiratione dilatari posset: Hinc accedebant simul *sensuum internorum* imprimis quædam *perturbationes* & imminutiones sub istis anxietatibus, donec post horam circiter cum dimidia, aut etiam fere duas, sudore tandem modico erumpente, paroxysmus ita discuteretur, qui tamen omni nocte statò tempore revertebatur. Passio hæc hysterica suffocationi adeo similis erat, ut ovum ovo similis esse nequeat, quæ etiam, si corripuisset mulierem, ab omnibus hysterica vocata fuisset, (sive *suffocatio uterina*), cum tamen in hoc subiecto saltem esset affectio hypochondriaca dicta, quæ istis symptomatis erat stipata: Curavi etiam eum, præmissis *Vomitivis & Martialis*, per *volatilia tartarea*, imprimis per spiritum carminativum de tribus & spiritum sal. ammoniac, per aromaticam carminantia, & acidum absorbentia. Adeo in hoc subiecto, quod obiter moneo, simul pertinax alvi obstructio, & mira acidi præternaturalis in primis viis, præprimis stomacho, abundantia, unde continuè insigni appetentiâ laborabat. Congeries ista symptomatum, truculenta, quæ mali hypochondriaci in viris, suffocationis verò uterinæ (si nempè est acerbior) in mulieribus nomine venit, adeo interdum per paroxysmos sevit, ut à demone obsessi ab ignara plebe habeantur ægri. Testimonia adhuc plurima hinc inde prostant. Sed reuerà in utrisque unus idemque affectus est; & suffocationis sensu in affectu hypochondriaco graviore viros torqueri, nihil novi est, idque duplici modo: nunc quidem putant & dicunt, fauces & laryngem à vaporibus vel humoribus acidis, ponticis, austeris & stypticis quasi costringi, quale exemplum **H. D. MICHAELIS** vidit in Jurisconsulto, quem acidum absorbentibus & concentrantibus, alcalibus fixis, nempè creta, lapillis cancerum, antimonio diaphoretico & similibus, restituit; cuiusmodi casus etiam mentionem facit **SENNERTUS lib. 3. Prax. Part. 1. Sectione 1. cap. 1. pag. 7.** nunc verò sine tali in faucibus molestia, saltem impotentia movendi thoracem adest, & cingulo vel zona quasi circa diaphragmatis cum costis connexionem se constringi & coarctari queruntur ægri: Ita ut reuerà affectu suffocationis uterine viros quoque laborare, dici possit. Sic quoque aliquando iuuenis nobilis curabatur à me, qui genuinam passionem hysterica representabat: dicebat se esse proliuè *colicam*, item *ad epilepsiam*, ita quidem, ut graves subinde patiatur insultus abdominis; abdomen contrahebatur, quoties dulcia quædam comedebat; *epilepsia* corripiebatur, quoties ira aut terrore afficiebatur: Subinde utrumque coincidebat, quando edebat dulcia: dicebat: *esse ipsi ac si malum ipsum torqueret*, & ueniret pedetentim ad superiora; tunc circulum circumdabat circa pectus, ac si *sensationes colicæ* superueniant, ne superiora versus ascendant. Affectus hic si fuisset in muliere, fuisset *passio hysterica*; sed est iuuenis hypochondriacus: Hinc *Martialis*, hinc etiam *spiritus salis ammoniac*, & *emplastrum de galbano* impositum, solebat eum curare.

His ergo ita consideratis, moderni alio modo affectum hunc, tot symptomatibus complicatum, explicant, quorum *hypothesis est duplex*. 1. **SYLVIVS**, & qui eum sequuntur, ex *acido pancreatis nimis austero*, vitiosè in intestinis effervescente, hinc copiosos flatus & vapores generante, & dolores abdominis & præcordiorum, atque symptomata inferente, hinc ad massam sanguineam delato, eam nonnihil coagulante, &c. originem huius passionis deducunt, adeo-



que ad affectus hypochondriacos graviores passionem hanc vulgò hysterica referunt, & per *salia volatilia oleosa* optimo consilio eam curandam suscipiunt.

II. Alii è contrà, ut imprimis **WILLISIUS**, & eius sectatores, ad *convulsivos morbos* ac *spasmodicos affectus* passionem hanc hysterica referunt, quales spasmi imprimis in scorbuticis & hypochondriacis affectibus frequentes esse solent, quorum symptomatum syndrome vocatur *Passio hysterica*. Dicit enim **WILLISIUS** de *Morbis convulsivis* cap. 10. pag. 165. se mulierem illustrissimam passione hysterica demortuam aperuisse, & utero insorte, invenisse in occipite principium nervorum sero acri madidum, ac ferè immersum: Deducit ergo passionem hysterica à spiritibus animalibus, principia nervorum intra cerebrum occupantibus, male affectis, quatenus in confusione acti, vel humoribus vitiosis persusi, copulam explosivam sibi adsciscant, quam unà secum in canales nerveos deducant: quoderiam ante **WILLISIUM** insinavit **HOECHSTETTERUS** Decad. 4. Cas. 3. p. 385. qui apertè asserit, sibi videri ad spasmodicam affectionem accedere uterl errorem, quæ, si reliquis cognatis partibus nervosis communicetur, & hæ in hostem assurgant, maximè si vellicatio maior accesserit.

Mihi mediâ placet incedere viâ, & utramque certo modo combinare opinionem: Nam quod materialiter seu occasionaliter *acidum* peccet primariò in hoc affectu, idque vitiosum, tam in quanto quàm in quali, à naturali statu degenerans, multa in hoc affectu occurrentia demonstrant.

1. Quod scorbutica & hypochondriaca subiecta cuiuscunque sexus imprimis obnoxia sint huic affectui, unde & scorbutica & hypochondriaca mulieres, licet lenia etiam ipsis propinentur Purgantia, ex toto tamen ad intestina copiosius peccante acido acris succo, vel pancreatis, vel, quod probabilius, in plexibus nerveis mesenterii, præter tormina acerbata, facillimè in hystericos incidunt insignes paroxysmos: Cautè ergo purgandæ sunt mulieres scorbuticæ & hystericæ.
2. Quod sanguis in talibus quodammodò coagulatus esse solet, à cuius sanguinis ingratissimâ stagnatione in præcordiis anxietates, ærethia, & syncopes non leviter exacerbantur; de quo vid. **WILLISIUS** c. l. cap. 5. p. 78. qui viro isti hysterico, de quo superius, cum detraxisset venâ fessâ sanguinem, hic minùs fluidus, sed semicongruatus, & in guttulas concretus, fuit evacuatus. Unde
3. Et per vomitus, à natura spontè aut arte provocatos, bilem æruginosam, porraceam, in quibus peccat primariò *acidum*, præcipitans bilem in istum viridem colorem, acerbam ac similia in talibus reicere solent. Unde &
4. Dulcis, quæ facillè fermentatione acescunt, & hinc copiosos generant flatus, *Hypochondriacis* sunt molesta, & paroxysmos hystericos insigniter excitant; & copia, quæ adest flatuum in paroxysmo insignis, ab acido est oriunda, à quacunque oriatur causa externa. In specie *acidum* pancreatis vitiosum in paroxysmo semper præsens multum huc facit; Unde
5. *Martialia* extra paroxysmum præservativè, *salia* verò *volatilia* spirituosa & oleosa in paroxysmo curativè, præceteris succurrunt, quatenus *acidum* vitiosum absorbendo destruant & corrigunt, teste experientiâ. Hinc **BARBETTE** in sua *Praxi* pag. 81. medicamenta anti scorbutica applicanda ad passionem hysterica suadet. Et **LANGIUS** Commentar. super *Fabri Pathol.* p. 10. omnia nobiliora antiscorbutica, & ea, quæ ardorem stomachi, nec non stranguriam compescunt, in hysterica passione quàm maximè appropriata remedia esse affirmat. Qui affectus modò recensiti omnes ab acido vitioso primarum viarum dependent.

Quod verò præter tale *acidum* in primis viis etiam spasmi & convulsiones, tam partim abdominis membranarum, quàm partium thoracis & colli musculorum, simul concurrant, tantum non manu palpari potest.

Ut enim

1. Convulsiones istas epilepticas, quæ in fine paroxysmi, interdum & in medio, variis ridiculis, subinde & horrendis, ab ignaro vulgò per Dæmoniacis habitis, gesticationibus superveniunt, taceam; Certè

Etmull. Oper. Tom. II.

2. Spasmos & convulsiones testatur globus ille in abdomine commoratus, & sursum versus cum impetu retractus; Non enim semper persentiscitur globus ille, qui dependet à plexibus mesenterii nervinis, iisque inferioribus, unâ aut pluribus convulsis, à quibus simul imæ hypogastrii partes & convelli, & quasi attoli solent, & ita molis cuiusdam agitatae aut ascendentes speciem tædii repræsentant. Hinc
3. Sub fine paroxysmi hysterici risus observatur interdum, & quidem Hystericis invitis supervenire, qui est reverà risus quidam *Sardonius* (de quo supra l. 1. ubi de convulsionibus,) ex convulsione clonica seu motu convulsivo diaphragmatis primariò dependens; sicut diaphragma tonicè convulsus difficillimam istam respirationem & dolorem circa regionem cinguli infert: Quod & foemina post paroxysmum haud obscurè indicant, dum post gravio-rem paroxysmum sibi zonam, id est, regionem istam, ubi diaphragma collis apponitur, dolere conqueruntur. Convulso autem plus minus diaphragmate, & reliqui thoracis motui dicati musculi simul convelluntur, dum hos inter musculos cum diaphragmate ex communitate nervorum intercostalium, ex quibus musculi habent suos surculos, perpetua motus sit proportio.
4. Spasmos etiam testantur dolores illi in abdomine lancinantes, contorquentes, vagi & hipcinde oberrantes, qui oriuntur à violentis contorsionibus & spasmodicis convulsionibus intestinorum: quales dolores etiam intestinorum in scorbuto, item sexul foeminino in & post partum, solent esse frequentissimi: Nam & hinc est, quod foeminis nephriticis cum dolore calculi simul, cum vomitibus passionis hystericae satis dolorosæ contingant; Unde tunc dicunt communiter: *Calculum movere matricem*. Sicut enim in viris colicæ nephriticæ dictum tunc oriuntur, dum scilicet nervis renum convulsis continuatâ, crispatione ad horum usque principium, plexus scilicet mesaraicus, vergente, hi convulsi intestina & stomachum spasmo, ratione suorum nervorum ex istis plexibus oriundorum, corripere solent; eadem ratione hæc in nephritide contingunt per consensum, atque aliàs per se hysterico dicto affectu contingere solent. Talem dolorem, abdominis lacerantem & contorquentem, frequentem in infantibus, item in viris, mulieres appositè vocant: *Epilepsiam in corpore*, convulsiones sc. quasi epilepticas partium abdominis internarum.
5. Quod si tandem post tormina & manifestæ artuum externorum superveniant convulsiones epilepticæ, hinc dicunt: *Malum internum crumpit*. Dum verò ita intestina convelluntur, flatus ab acido vitioso effervescente in illeceati, conclusi, & variè agitati, ac tumultuosè oberrantes, istos borborygmos, murmura, ac similes sonitus varios, quales in passione hypochondriaca & hysterica sentiunt, repræsentant.

*Acidum* ergo peccans, & inde natæ convulsiones spasmodicæ in abdomine, in scrutinio suffocationis uterinae combinanda sunt: vid. **WILLISIUS** de *Morb. Convuls.* c. 10.

Quod ergo modum fiendi passionis hystericae attinet: exhaustus diâis innotuit, complicatissimum sanè affectum esse, qui Passio hysterica dicitur: compositus nempe, (1.) & quasi materialis, ex vitiosa in intestinis ab acido præternaturali, vel stomachi, vel pancreatico, aliarumque glandularum intestinalium, cum succo biliioso effervescentia; unde copiosi admodum flatus & eructationes proveniunt: & irritationis talis occasione simul *acidum* in plexibus nerveis mesentericis commoveatur, à quibus consequenter isti sonitus & borborygmi, aliaque tam varia & multiplicia abdominis symptomata: quo vitioso acido ulterius promotò, etiam sanguinis coagulationes, & in præcordiis stagnationes, oriuntur. His simul coniungitur (2.) quasi formaliter depravatus & perturbatus spirituum animalium motus, primariò quidem in nervo intercostali & vago, hinc consequenter interdum etiam in reliquis nervis, in quibus inordinatus ac explosivus iste motus spirituum animalium percipitur: unde sub huius inchoamento in cerebro vertigines & scotomæ, variaque deliria, & sub progressu spasmi insignes in partibus abdominis membranosis, intestinis, mesenterio, & similibus; item

Hhh 3 simul



simul in partibus thoracis musculosis, ipsoque adeo cordis musculo quodammodo convulso; unde huius palpitatio, aut ex eius continuata seré systole iste compressionis in corde sensus.

Quoad sciendi ordinem: Talis est inter symptomata, ex effervescencia ab acido vitioso in intestinis nata; unde ex irritatione ab isto acido partium nervosarum & surculorum nervorum *spasmi interni*, hinc consequenter capitis perturbatio, & denique membrorum externorum periculose convulsiones superveniunt, ut v. g. in ira, in *esu dulcium*, in nephritide, in doloribus abdominis scorbuticis. Interdum vero præcedunt, præsertim in malo habituali, *spirituum animalium impetus* & explosiones inordinatæ ex cerebro, communique agitationes vitiosæ per nervos; unde scotomæ, varii colores ante oculos apparentes, sensus & motus deficiens, & similia inchoante paroxysmo primitus corripunt ægros, & ab his inordinatis motis constringuntur & quasi concutuntur abdominis viscera & ductus, effusa tandem uberius pancreaticâ lymphâ, adeoque commoto sic acido, & abdominis superveniunt symptomata. Et hoc evenit, quoties ab ira, aut terrore, aut ab odoratis nimium, aut simili causa externa, organa sensuum afficiente primariò malum procedit; odores enim fortiter afficiendo commovent sensuum organa, & percellunt spiritus, eosque ad motus inordinatos cogunt, quâ occasione *pancreas* & *porus biliaris congesta* effundunt suos succos. Et prout plures vel pauciores afficiuntur nervorum surculi, rami aut plexus, etiam plurimum partium symptomata & actiones læsæ conjunctæ sunt: Sic v. g. interdum tantummodo plexus nervi lienares, interdum saltem stomachici, primariò afficiuntur, & tunc paroxysmi à sinistro hypochondrio incipientes, non uteri, sed *lienis vitio*, ostendi dicuntur, utut signum parhema. Sed hæc imprimis, quoad adiuncta convulsiva symptomata, & uberius & elegantius etiam explicata, videb. in WILLISII de Morb. convuls. cap. 10. qui sane primus est, qui in *Histories & Observ. Morborum convulsivorum* in Praxi frequentissimè eosdem, in specie internos, exactius explicavit: Huius doctrinâ bene observatâ, variis affectus in Praxi occurrentes facillius patebunt. Nam frequentissimales affectus interni, qui optimè per convulsionem nervorum explicari possunt; sicut ea, quæ ad intelligenda documenta acidi, & hinc natam effervescencia præternaturalem, & vitia succorum in primis vitis, & inde originaliter dependentia abdominis accidentia, concernunt, quæ primariò in passione hysterica consideranda, videri imprimis possunt in scriptis SYLVII, qui alterationes humorum ex salium doctrinâ, alcali & acido; seu bile & lymphâ explicando, facillimam & Theoriæ & Præxensationem satis accurate præsternit; Vid. *Etyd. Disposit. de Suffocat. hypochondriaca Belg.*

Ex his ergo patet, quod reuera Passio hysterica sic dicta æterina sit saltem paroxysmus gravior mali hypochondriaci & scorbuti admodum exacerbati, oriundi imprimis ex irritante acido vitioso, siue vitio stomachi, quod sæpius adiunctum est, siue in specie vitio succi pancreatici genito, & in intestina effuso, à quo primariò oriuntur dicta pathemata, quatenus nervi afficiuntur, affligens potissimum mulieres & sceminas, quàm mares: idque ex debiliore, imbecilliore, teneriore, & magis sensibili systematis nervosi, (quod facillius commovetur, ac in spasmum convulsivum cogitur,) textura, & spirituum eorum animalium subtiliorum maiore raritate, & faciliore promptitudine in varias motuum, exorbitantias & anxias: (vid. WILLISIIUS l. a.) vel saltem, quibus non placet affectio hypochondriaca, est certa species colicæ convulsivæ gravioris: Nam hæc, dum scilicet intestinorum spasmi, ex irritante acido, in plexus mesenterici continuati, ad alias superiores partes ex connectione & crebriore concursu nervi vagi & nervi intercostalis evibrantur, etiam angustia, difficilis respiratio, & similia urgent: Id quod ex anatome nervorum, quæ hic exactè debet esse cognita, perspicuum: hinc vitiorum veracolicæ, & mulierum vera passio hysterica, à quibusdam ex vulgò profludem habentur.

Odoribus vis spiritus animales promptè afficit, eosque ad varios distinctos & enormes motus subinde disponit: Et prout variè constituti sunt ipsi spiritus animales, variatque intrinseca eorum specialis differentia, hinc idiosyncrasie, carentes etiam distincti odores in distinctas motuum anomalias eos adigunt: Unde etiam literati, quorum spiritus animales magis sunt volatiles, raro possunt ferre odores fortes, quin patiantur aut cephalalgiam, aut angustiam quandam circa præcordia: Unde mulieres etiam ab odoriferis istis tam

facile alterantur, & in istam suffocatio hysterica resuscitatur. Observandum tamen, quod odorifera seu effluvia ista volatilia subtilia non tantum afficiant spiritus animales in omnibus, sed etiam circa ipsas partes genitales, dum nempe effluvia odorata promptè spiritus istius loci afficiunt, & hinc alterando eosdem ad determinatum, nimisque erroneum seu convulsivum motum disponunt: Id quod ex eo patet, quod augeatur utrique sexui Venerea voluptas, si zibetho, balsamo apoplectico, vel similibus odoratis volatilibus iungatur membrum: Conf. WILLISIIUS l. a. Præterea tamen & odores tam naribus applicati vel hausti, quàm cum aere attracti, prout variè alterant massam sanguineam in pulmonibus fermentando æstoantem & spiritus animales, similiter non parùm contribunt ad levanda aut exasperanda hysterica symptomata, quæ ex massæ sanguineæ motu, & eiusdem impedito tractu per pulmones, oriuntur: Nam hinc fumus cornuum aut pennarum accensarum, *perdicum imprimis*, item castorei olfactus, & similia, angustias præcordiorum lenite, & amplius, quasi in thorace spatium efficere asserunt ægræ, quatenus sal volatile istorum subiectorum incensione sui iuris factum, cum aere inspirato interius attractum sanguinem dissolvit, acidumque ejus absorbet, sicque diuturniorem in pulmonibus moram & stagnationem tollit, & liberiores circuitum ipsi serè reddit.

Ex dictis hætenus patet: paroxysmatim ingruere passionem hysterica, unde sub hoc respectu nunc accidentale, nunc habituale malum esse, observator. Habituali in malo uti plures possunt esse causæ, à quibus excitator paroxysmus; ita etiam variis in partibus internis potest delitescere somes seu causa occasionalis quæcunque, cujus commotæ occasione propter irritationem hinc inde factam paroxysmus hystericus provocari potest: ut v. g. quando TACKIUS in *Chrysogon. pag. 93.* notat uteri suffocationem ferè lethalem ex depletionione frusti integri pellis latel cocti: Sic in tali respectu non semper eximendæ sunt partes genitales in mulieribus, quia interdum habent rationem somitis morbofi, non quidem, quasi uterus aut testes soli cum vulgò accusandi sint, aut quod uteri perversus motus talia symptomata inferat; non: sed vel primo modo, quatenus menses suppressi, & inde coacturatum fermentum vitiosum, occasionem præbet, uti variis aliis affectibus totius corporis, ita, & huic complicato Protheo, uti superius monitum, vel eveniendo, vel postmodum exasperando: aut secundo modo, quatenus liquor genitalis retentus & corruptus, & specificè prior factus, uti partes nervæ irritando, ita & succos corporis quoscunque inquinando, in specie spiritus animales vitando & pervertendo, hos ad varias motuum anomalias disponit, & varia symptomata inferit, & ita sicut epilepticos paroxysmos, ita & hystericos affectus inducit: v. gr. quoad prius, POTERIUS Cent. 3. Cap. 30. habet rarum exemplum uterinorum affectuum ex suppressione mensium curatorum his apertis. Quod verò ex liquore genitali retento superveniunt talia symptomata, patet ex observationibus: Refert namque FORESTUS lib. 18. Observat. 25. & 26. se observasse suffocationem uterinam in vidua ex retentione excernendorum per coitum, & ex vellitatione, pudendorum curatam: Item cap. 1. Observat. 29. lethalem uteri suffocationem annotavit in muliere ex semine, ut inquit, retento oriam: in specie ZACUTUS LUSITANUS lib. 2. Prax. Admir. Observ. 83. quorsum etiam facit exemplum FONSECÆ lib. 2. consil. 37. qui observavit suffocationem hysterica in virgine, quæ semper, antequam paroxysmus incederet, inexplicabili coeundi libidine tenebatur: præceteris elegans est historiola, quam recenset GABELCHOVERUS Cent. 4. Cap. 95. in Schol. ubi mulier hysterica fuit exsuscitata fricatione fori partium genitalium cum oleo spica, unde copiosus liquor seminalis fuit excretus; Verba historię sunt hæc: Ego aliquando unâ cum alio Medico vocatus eram ad nobilem quandam mulierem, quæ vehementissimos dolores & tormenta ex utero sustinebat. Nos variis utebamur rationibus, clysteribus & aliis, quæ cum nihil prodesse, ego abii: alter medicus remanserat tanquam propior. Is sorori huius nobilis, quæ etiam erat maritata, suadebat, ut digitos oleo spica inungeret, & sinum muliebrem fricaret. Quod cum illa facere noller, ipse Medicus aggressus est, & cum digitis inunctis oleo dicti loci fricavit, unde illa maximâ copâ crassi seminis excrevit. Maritus ipsius erat paralyticus ex colica illâ, invariare nō poterat. Mortuus autē fuit ipse brevi post superveniente epilepsia: mulier autē longo post tempore vixit, & alteri viro nupsit, etc.



Confirmat denique hoc, quod nempe modò dictæ alterationes circa partes genitales aliquid conferant interdum, quod videamus mulieres quasdam, dum virgines sunt, nihil perpeti de hoc malo aut odoribus; uxoratæ vel maritatæ postquam fuerint, aut gravidæ reddita, huic malo insigniter obnoxie deprehenduntur, quatenus in maritatis per spiritum genitalem virilem, & in gravidis per retenta menstrua, succorum varietates & alterationes, & consequenter diversæ spirituum animalium immutationes, oriri solent. Sed hæc saltem interdum observantur, adeoque respectu passionis hystericæ saltem causæ cuiusdam specialis remotæ, non verò proximæ, locum habent.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa huius mali diagnostica: suffocatio uterina seu affectus complicatissimus pathognomonicum signum vix habet; cognosci tamen facile potest ex iis symptomatibus, quæ in Historia huius affectus supra proposita fuerunt recensita, & ut aliàs monui, interdum suffocatio uterina, interdum Epilepsia uterina, vocatur.

Suffocatio tamen uterina ab epilepsia vera differt parte affecta, quod nempe in epilepsia affecta sint partes externa; in suffocatione uterina interne. In epilepsia vera solet deprehendi spuma circa os; id quod non æquæ, aut non nisi in desperata ferè suffocatione uterina contingit.

Præterea in Epilepticis pulsus cum valido nisu ferit manum tangentis, cuius contrarium evenit in suffocatione uterina.

Et Epilepticæ veræ (nempe in 2. vel 3. classe,) post paroxysmum vix remiscuntur eorum, quæ circa ipsas dicta gestavæ fuerunt; Hystericæ verò non raro istarum rerum hram habent memoriam.

*Asyncope differt:* quod hæc ex improvviso magis invadat; passio verò hysterica per dicta similiaque ingruentia signa se prodatur: In syncope pallor faciei est maior; in hysterica verò passio minor, imò ut plurimum rubedo: vid. RIV. RIV. lib. 1. cap. 6. Sudores in syncope sunt frigidi; nunquam autem in affectibus hystericis: Syncope brevior sit, si ve ad salutem, si ve ad mortem terminetur; hysterica verò passio ad horas & dies durat; ut ut interdum syncope cum passione hysterica sit coniuncta, aut illa huic superveniat, quando nempe ab huius pertinacia vires nimis enervantur: In syncope pulsus cessat; in passione autem hysterica semper percipitur, ut ut debilis sit: Imò ab odoribus gratis syncope sedatur; hysterica verò passio ut plurimum exasperatur.

Ab apoplexia differt, quod antecedentia fuerint alia, ac in apoplexia, nisi suffocatio uterina confirmata sit; non semper pulsus & respiratio abolentur, sed satis vegeta sunt: Interdum, ubi gravior est paroxysmus, mortuæ apparent.

Signa, quibus à verè mortuis discerni possunt, sunt vulgò specula & plumæ: Optimum est sternutatorium, si nempe forte in nares insufflatum nihil operari velit: Item si vomitorium generosum infusum extra effectum deprehendatur, tunc est suspicio, esse mortuam. Aliàs & D. PRÆVOTIUS Patavinus (quod obiter moneo,) nullum remedium efficacius observavit, quàm vesicantia coxis applicata: Ubi vesicæ excitant, spes est clara de vita; si frustra applicantur, res est desperata.

A colica, malo hypochondriaco, scorbutico &c. non differt realiter, sed saltem variatione symptomatum.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: malum hoc rarò est lethale, præmissis si superveniat gravior syncope, aut graviores convulsiones, ut ut subinde redeat, & graviores paroxysmos mulieribus inferat: quod gravior est paroxysmus, eo periculosius est.

Interdum si non maturè occurratur, potest mulierem, in specie gravidam, necare.

Interim, quò plures partes in consensum trahuntur, adeoque graviora symptomata excitantur, & quò respiratio & pulsus magis aboletur, & lipothymia accedit, eo malum est periculosius: Vid. FORESTUS lib. 28. Obs. 29. & PLATERUS Obs. pag. 187.

Periculosior interim est, si ex liquoris genitalis retentione & corruptione, quàm aliunde oriatur: Vid. GABELCHOVERUS Cent. 4. Obs. 95. in Scholio, & FORESTUS l. a. in Schol.

Est null. Oper. Tom. II.

Mulier graviore suffocatione uterina laboranti si superveniat sternutatio, res salva est, iuxta HIPPOCRATEM lib. 5. aph. 35. signum enim est, ut sic dicam, naturæ se ipsam resuscitantis.

In iuvenibus ut plurimum cessat hoc malum in partu, aut saltem tempore puerperii cum lochiorum fluxu; In senibus verò, quibus catamenia sunt suppressa, in iisdem rarò perfecitè curatur, quin sæpiùs recurrat.

Præ cæteris prægnantes, & hinc puerperæ, periculosius laborant hoc affectu: Prægnantes quidem propter metum, abortus; puerperæ verò propter metum suppressionis lochiorum, ac propter insignem debilitatem virium, aliaque gravia, quæ lungi ferè solent, symptomata.

Interim tamen, ut ut pulsus, respiratio, omnesque actiones animales quoad sensum cessant, non statim desperandum est, quin potius generosis remediis succurrendum; cum mortuorum instar jacent, & uti superius monui, per 24. horas mortuæ habitæ denuò revixerint, adeoque non statim sunt sepeliendæ: Sic de hystericis pro mortuis habitis iam sepeliendis, vid. SALMUTH Cent. 2. Hist. 86. & Hist. 87. Quod etiam pertinet inchoata anatome mulieris, ex uteri strangulatu mortuæ putatæ, quam refert PARÆUS lib. 23. cap. 46. & ex eo SENNERTUS lib. 4. Prax. ubi de suffocat. uteri pag. 239. Vid. etiam FORESTUS l. a. obs. 27. & 29. & LOSSIUS lib. 4. obs. 13.

Optimum remedium sunt sternutatoria fortiora, quæ naribus inflata, sisternutationem excitent, bonum signum est; si non, & repetitis etiam vicibus cura effectum inspirantur, malum est signum.

### CURA.

Quoad Curam: Cum per paroxysmos ut plurimum se viat malum, hi ipsi verò subitanæ postulent opem, ob id duplex tempus in passione hysterica distinguendum: nempe tempus paroxysmi, & extra paroxysmum. In Paroxysmo eo est attendendum, ut

1. Acidum vitiosum corrigatur & alteretur, indeque flatuum proventus nimis inhibeatur.
2. Ut convulsiones & spasmi, sistendo efferos spirituum motus, sopiantur & placentur.

Adeoque in paroxysmo utriusque scopo, speciatim priori, optime satisfaciunt salia volatilia spirituosæ, nunc mæcia, nunc oleosa: pro posteriore scopo Opiatis & Camphoratis in quibusdam mista; Nam omnes non ferunt camphoram.

Extra paroxysmum verò successivè alterantibus, inter quæ primatum obtinent Martialia, Eucuantibus & similibus, radix mali tollenda, & quantum possibile, euellenda.

Quod attinet curam in paroxysmo, usurpantur tam interna, quàm externa.

Inter Externa eminent

1. Odorata, tam naribus applicanda, ut plurimum graveolentia, aut saltem fortiter penetrantia, quàm si noli muliebri intrudenda, ut plurimum suaveolentia, eaque nunc sub forma spirituum, aut salium volatilium urinosorum, nunc sub forma suffitus, nunc oleorum: Vid. TACHENIUS Claræ Hipp. Med. pag. 224. & seq. Pertinent huc sternutatoria in graviore paroxysmo usitata.
2. Umbilico inungenda, aut abdomini applicanda.
3. Clysmata appropriata inicienda ad refrigerandam alvum.

I. Quod attinet: mulieribus hystericis mox odores fortes & graveolentes, pro ratione ægræ, admovendi sunt naribus. Omnibus præfero salia volatilia fortiter penetrantia, naribus admota, v. g. spiritum salis ammoniaci acriorem naribus admotum, in vitro angustii, sed longiusculi, colli contentum, qui optimum est remedium, & etiam in apoplexia & epilepsia mira facit. Loco huius etiam spiritus cornu cervi, vel alius spiritus urinosus volatilis, naribus applicari potest. Hic spiritus si sit maritatus ac imprægnatus cum castoreo, eo magis præsentaneam offert opem. In usu aliàs communis est castoreum, item asa foetida, naribus admota. Ubi gravior syncope urget, castoreum immittitur in unum generosum & spirituosum, & ita naribus applicatur; Nam sic refectum, magisque penetratum euadic remedium. Radix leuistici in vino macerata applicatur naribus.

Vel

Hhh 4 2. Aqua



℞. *Aqua hyssop. Lind.* ℥ii.  
*Essent. castor. vol.* ℥ii.  
*Acetirutac.* ℥i. vel ℥i℥.  
 M. S.

*Mulierum aqua apoplectica.*

Naribus etiam commodè admoventur suffitus: Quos inter primum obtinet suffitus succini, qui & Epilepticos mirè suscitatur; item suffitus nucis moschatae carbonibus inlesta: hinc plumæ & pennæ avium, imprimis perdicum combustæ, (vid. FORESTUS lib. 26. Obser. 31. in Schol.) pili item & cornua animalium combusta, quorum sal volatile acre oleosum nares potenter ferit. Lignum agallochum incensum, etiam dat egregium fumum naribus admoventum in hysteriis. JOEL in Praxi p. 200.

℞. *Castor.*

*Galban. cum aceto sol. an.* ℥ii.

*Sulphuris citrin.* ℥℥.

*Asa foetida* ℥i.

M. f. Massa cum petroleo;

ex quo fumum ad nares emittit.

RIVERIUS dicit, quod fumus tabaci citissime excitet hystericas, quod tamen mihi adhuc videtur paradoxon; non minus, quam qui fumum sulphuris accensi naribus admovent; Nam hoc ipsum omnino relicto, quia rarissime conducere solet, & periculum est, ne acidum sulphuris flagma, quod aliàs in sanis angustias præcordiorum, & difficultatem anhelitus infert, ne idem in ægris malum exasperet. Verùm habeatur ratio idiosyncrasie, quibusdam enim magis placent suaveolentia; vid. HORSTIUS, & HOECHSTETTERUS l. a. Interim observandum, quod mulieres, quas lædunt suaveolentia naribus admotæ, non lædant interius assumpta, ut moschus, item zibethum cum castoreo, modo mulieres non percipiant odorem: vid. HORSTIUS lib. 3. Obser. 26. SOLENANDER Sect. 5. Conf. 15. cujus remedium sequens etiam laudat RIVERIUS:

℞. *Moschi,*

*Saugh. dracon. an.* ℥i.

Sumendo in aqua menthae ℥iii.

& HORATIUS AUGENIUS lib. 1. Epist. qui utitur pulvere supra descripto ex moscho, cianamomo, caryophyllis, & nucis moschata.

Juxta dictos suffitus naribus admotos etiam interdum utero, imprimis genitalibus, quædam admoventur: quæ sunt Balsamum apoplecticum, (vid. SIMON PAULI O.B. pag. 201.) alium dissectum orificio vulvæ admotum: Vel fiat suffitus, per tubum aut infundibulum ad uterum mittendus, quos inter eminet experimentum Paracelsi, quod est suffitus parvus ex verrucis equorum, de quo etiam affirmat FONSECA, nullam esse ab utero suffocationem, quæ ab hoc fumo non sistatur. Compositio est hæc:

℞. *Verruc. equor.* ℥i.

*Asa foetid.* ℥ii.

*Ungu. capræ* ℥ii.

M. f. Pulvis: cuius ℥i. vel ℥i. carbonibus inlesta pro suffitu, per tubum vel infundibulum in uterum suscipiendo, inserviat.

Oleum etiam, ut oleum succini destillatum, oleum gagatis, oleum tartari foetidum, oleum cornu cervi destillatum, & similia naribus admotæ, valde conducunt: observandum tamen, quod huiusmodi oleosa nimis fortia (nam salinorum alia ratio est) cautiùs sine usurpanda, ubi in apertas convulsiones epilepticas malum desinit.

Quæ si non deficient, sed ægræ mortuæ ferè faciant, ad excitandos & resuscitandos ægros inspiretur naribus sternutatorium, quæ aliàs egregii sunt usus, ex Nicotiana aut radice hellebori nigri, aut per radicem & flores lillorum convulsivum & maiorenz folia: v. g.

℞. *Castor.* ℥i.

*Piperis longi* ℥℥. vel gr. xv.

*Rad. helleb. albi* ℥℥.

*Pyrethri gr. v. vel vi.*

M. f. Pulvis sternutatorius:

D. S.

*Resuscitans pulvis sternutatorius.*

Cuius rasellum sabiade per calicem ægræ naribus insuffleretur, sed cautè.

Cum his ill. simul consultum est, abdominis regioni, nempe umbilicali, & scrobiculo cordis, aromatica illinere, aut imponere, quæ spasmus intestinorum cohibent. Ratione inunctionis inungitur oleum rutaceum, anethinum, lau-

ripum, castoreum, succini, oleum tartari foetidum; oleum ligni gualaci, spicæ, &c. unguentum factum ex scleara, in butyro cocta, mistum cum tacamahaca abdomini illinitur: quod penetrantius erit, si imprægnetur simul camphorâ in oleo amygdalarum dulcium solutâ. Mirè enim per se à quibusdam laudatur camphora, iidem cum oleo amygdalarum dulcium soluta, umbilico admota. Inter alia eminet Galbanetum Paracelsi. Vel

℞. *Olei castor.* ℥ii.

*Destillat. succini* ℥i.

*Spicæ* ℥℥.

Cum camph. vel huius olei gr. vel gr. v.

M. S.

*Oleum matricale externum.*

Inungatur his ipsis regio umbilicalis, & scrobiculum cordis, & imponatur desuper emplastrum.

Vel

℞. *Axung. castor.* ℥ii.

*Olei destillat. chamom.*

*Cumini,*

*Carvi an.* ℥i.

*Spicæ* ℥℥.

M. f. Linimentum umbilicale: S.

*Linimentum matricale.*

Quod tepidè illinoatur dictis locis, imponatur desuper later calefactus.

Mihi saltem in usu est oleum destillatum succini, mixtum cum ana vel dimidio olei destillati spicæ, illinendo spinæ dorsæ, regioni umbilicali & scrobiculo cordis; vel quando sunt aciora, excipiantur cum oleo castorei, urino, vel corpore pro Balsamo. Vel

℞. *Olei destillat. succini,*

*Spicæ an.* ℥℥.

*Cumini* ℥℥.

*Macis gr. ix.*

M. S.

*Oleum matricale externum.*

℞. *Balsam. succin.* ℥i.

*Oli. destillat. galbani* ℥℥.

M. S.

*Balsamus matricalis.*

℞. *Olei laurini,*

*Rutac. an.* ℥ii.

*Destillat. chamom.*

*Succini,*

*Spicæ,*

*Anethi an.* ℥i.

M. pro Linimento: S.

*Unguentum matricale.*

Vel

℞. *Olei aneth.*

*Chamom. an.* ℥ii.

*Destillat. chamom.*

*Anisi,*

*Carvi,*

*Cumini an.* ℥i.

Cum f. q. corp. pro balsamo.

M. S.

*Balsamus matricalis.*

Consultum est, ut his linimentis desuper imponantur Emplastra, idque in specie ex galbano. Usitatissime galbanum, solutum corio rotundo indutum, instar emplastri applicatur regioni umbilicali, quod egregiè conducit. Addunt alii tacamahacam, alii castoreum, picem, &c. In medio huius emplastri recondunt aliquot grana zibethi, ita ut zibethum exatè umbilico imponatur, & hinc fortè ligaturâ supra umbilicum firmetur; zibethum enim umbilico illitum suffocationes hystericas insigniter alleviat, modò non nares nimium feriat: v. g. Emplastrum matricale de galbano usitatum q. s. vel solum, vel cum part. i. galbani in aceto soluti, malaxetur cum f. q. olei tartari foetid. vel cum oleo succini, vel castorei, vel spicæ: inducatur super linteam in forma rotunda.

Vel

℞. *Galbani cum aceto sol. q. s.*

Malaxetur cum part. iii. Olei destillat. succini, & part. i.

*Spicæ:*

Extende super alutam, & impone regioni umbilicali.

Plura Emplastra de Galbano huc spectantia, vid. supra l. 1. ubi de Colica convulsiva, & in Idea Form. Cl. 5. §. 3. Vel ad imitationem HERTODTII in Crocol. pag. 222. fiat Emplastrum magistrale tale:

℞. *Gal-*



℞. Galbani in aceto vel vino solut. & ad pulvis consistant, inspissari, vel quod melius, simpliciter lento igne in terebinth. liquat. ℥iij.  
Extract. castor. vel castor. pulveris.  
Croci an. ℥iij. vel ℥ss.

Olei destillat. succini,  
Coriandri,  
Spica an. ℥ss. vel ℥ij.

M. pro Emplastro efficacissimo ad usum, asservando in vasculo clauso.  
D. S.

Emplastrum matricale.

De hoc s. q. Induc. super alutam in forma rotunda, & ita imponatur abdomini & regioni umbilicali, ut firmiter conglutinetur, factio prius debito litu, imponendo desuper latrem calefactum, ut eo melius operetur remedium. Quibus displicet agglutinatorio, in illis mediante sindone rubra, Emplastro obducta, applicari potest.

Vel

℞. Tacamahaca q. s.

Subigatur & malaxetur cum s. q. Olei destillati anisi, carvi, cumini, chamomilla, &c.

Induc. super alutam pro Emplastro carminativo.

D. S. ut supra.

Prodest etiam allium contusum & umbilico impositum. Juxta hæc fortis ligatura circa hypochondria cum quocunque cingulo ut plurimum multum conducit ad levandos paroxysmos & symptomata abdominis: idque necessarium debet fieri. Nam simulatque laxant, mox præcordiorum angustias, imminuentem quasi syncopen, aut imminuentem suffocationem, sentiunt. In specie laudatur cingulum factum ex corio humano foemino, de cuius usu vid. BARTHOLINVS Cent. 3. Hist. Anas. pag. 177. Loco corii humani foemini etiam sunt, qui commendant cingulum ex corio cervi in coitu transgressi seu interempti. Neque inconsulta est vellicatio pilorum pubis à multis ceu expertum remedium laudata, qua facile ad se redeunt; aut suaveolentium genitalibus circa clitoridem applicatio, imprimis si adhuc turgescit liquoris genitalis: Scilicet immittitur pessus inunctus cum oleo nucis moschatae, in quo solutum est parum zibethi; aut illinantur vulvae in loco clitoridis Balsamum apoplecticum, zibetum, moschus:

Vel

℞. Syrac. liquid. ℥ss.

Bals. apopl. gr. vi.

Zibethi gr. iij.

Ex quibus facta Mixtura illinatur lana bombicina, & ita indatur pudendis: Sed fit raro.

Vel celebretur coitus, si licitus; vid. FORESTVS Obs.

25. & 29. in Schol.

Vnà cum his Externis ita administratis III. perquam necessaria sunt Clysmata, quæ optimo cum successu sedulo illi ciuntur, ex Carminantibus imprimis, Aromaticis, & nonnihil penetrantibus parata: quibus interdum salia volatilia addi possunt. Hæc tempore certo applicata & retenta, evacuando intestina, & promovendo flatuum expulsionem, mire levant paroxysmos. Talium Clysterum formulæ videndæ suprâ. 1. ubi de Cardialgia, & Colica, & in Colleg. Formular. pag. .... necnon in Idea Formul. Cl. 4. §. 25.

Vel

℞. Herb. chamomill. cum flor.

Salv.

Matricar. an. M. i.

Rad. angel.

Leviss. an. ℥vi.

Sem. q. calid. min.

Sal. tartari an. ℥i.

Coqu. in s. q. aquæ simpl.

Colaturæ ℥ix. adde

Elect. de baccis lauri ℥i.

Olei destillat. succini,

Sal. vol. cornu cervi, vel urinae, vel alius an. ℥i.

Virelli ovi non. i.

M. & Enema: S.

Clyster matricalis.

℞. Herb. matricar.

Leviss. an. M. i.

Flor. Chamom. Rom. M. ii.

Rad. angel. ℥vi.

Fenic.

Bacc. lauri an. ℥ss.

Sal. tartari ℥i.

Coqu. in s. q. aquæ:

Colatur. ℥ix. adde

Elect. hier. pieræ ℥i.

Castor. ℥. ad ℥i.

Olei destillat. succini ℥i. ad ℥ss.

M. pro Clysmate.

D. S. ut antè.

℞. Rad. angel. ℥vi.

Herb. matricar. M. ii.

Flor. chamom. M. i.

Bacc. lauri ℥vi.

Sal. tartari ℥ss. vel ℥ij.

Coqu. in s. q. aquæ:

Colat. ℥ix. adde

Elect. de bacc. lauri ℥vi. ad ℥ss.

Castor. ℥ss. ad ℥i.

Olei destillat. cumini,

Carvi,

Succini an. ℥ss.

(vel horum loco olei destillat. bacc. iunip. vel terebinth. an. ℥i.)

M. pro Clysmate pro 2. vicibus applicando:

D. S.

Clyster matricalis pro 2. vicibus.

℞. Rad. angel. ℥vi.

Fenic. ℥ss.

Flor. cham. Rom. M. i. vel vulg. M. ii.

Herb. matricar.

Leviss. an. M. i.

Bacc. lauri ℥ss.

Sem. q. calid. mai. an. ℥i.

Coqu. in s. aquæ comm. & urinae comm. an.

Colaturæ ℥ix. vel ℥ss. adde iam dicta:

D. S.

Clyster matricalis.

℞. Rad. angel. ℥vi.

Fenic. vel Imperat. ℥ss.

Herb. matricar.

Leviss.

Flor. chamom. an. M. i.

Bacc. lauri ℥vi.

Sal. tartari ℥ss. ad ℥ij.

Coqu. in s. q. aquæ simpl.

Colaturæ ℥ix. adde superius dicta:

M. pro Clysmate.

D. S. ut antè.

Quibus loco oleorum destillatorum, ex se quidem satis penetrantium, à Modernis salia volatilia commodè addi solent à ℥i. ad ℥ss. v. g. sal volat. urinae, cornu cervi succini, &c. & mire prosunt in affectibus ipsis etiam Epilepticis, & abdominis doloribus convulsivis, utut ultra colon ascendere nequeant Clysmata.

Vel

℞. Herb. calamint.

Origani,

Flor. Chamom. an. M. i.

Rad. angel. ℥i.

Imperat. ℥ss.

Bac. iuniperi ℥vi.

Sem. carvi,

Cumini an. ℥ij.

Sal. tartari ℥ss.

Coqu. in s. q. aquæ:

Colat. ℥ix. adde

Elect. de baccis lauri,

Hiera cum agar. an. ℥ss.

Spiritus salis ammoniaci anis. ℥ss.

M. pro Enemate.

D. S. ut supra.

℞. Herb. matricar.

Salvia,

Flor. cham. an. M. i.

Rad. angel. ℥i.

Bacc. lauri vel iunip. ℥vi.

Coqu. in s. q. aquæ:

Colat. ℥ix. adde

Elect. hier. cum agar. ℥ss.

Castor. ℥ij.

Spiritus cornu cervi cum sale vol. ℥i.

M. pro



M. pro Ememate.

D. S. ut supra.

24. Herb. rut. M. i.

Matricar.

Flor. chamom. an. M. ʒ.

Rad. levist. ʒi.

Bacc. lauri ʒʒ.

Coqu. in f. q. aqua simpl.

Colat. ʒix. adde

Elect. bier. picra cum agar. ʒvi.

Castor. ʒʒ.

Sal. volat. cornu cervi vel urina ʒi.

Vitelliovi num. l.

M. pro Clysmate, simplici vel duplici vice applicando.

D. S. ut supra.

Vel

24. Herb. matricar.

Ruta,

Chamom. cum flor. an. M. i.

Rad. meu,

Imperator. an. ʒvi.

Bacc. iuniperi rec. ʒi.

Cum f. q. aqua coquantur:

Colat. ʒx. adde

Elect. de bacc. lauri ʒvi.

Spiritus salis ammoniaci anisat. ʒʒ.

M. f. Enema.

D. S. ut supra.

Pro maiori stimulo Clysteribus dictis addi potest ʒi. ad ʒʒ. syrupi emetici.

Alii tanquam singulare laudant Clysmata, parata ex Decocto hederæ terrestris ad ʒi. & ʒi. mititidat. quæ iniecta ad suffocationem uterinam commendant. Egregie etiam conferunt clysmata terebinthinata (de quibus 4. ubi de dysenteria, colica, calculo renum, & scorbuto;) seu in quibus terebinthina cum vitello ovi dissoluta, à ʒii. ad ʒʒ. unâ immittitur, singulariter profunt in uterina suffocatione: Vid. HORSTIUS Cent. 8. Obs. 17. item VELSCHUS Hecatoſt. 2. pag. 42. WILLISIUS de Anima Brut. ubi de Colica pag. 293. Nam egregium & balsamicum & oleosum est sal in terebinthina, intestinis & matrici gratissimum: c. g.

24. Laß. bubul. vel Decoct. flor. chamom. cum laß. vel Decoct. carminat.

vel urin. puer. ʒviii. ad ʒi.

adde

Terebinth. Venet. cum vitello ovi solut. ʒii. vel ʒiii. ad ʒi.

Mell. anthosat. ʒvi.

M. pro Clysmate.

D. S. ut supra.

Initiuntur hæc Clysmata vel semel, vel partitis vicibus, præsertim quando statum impetus remoratur debitam clysmatis applicationem, vel retentionem. In casu fortiori WILLISIUS de Morbis Convuls. commendat Ememata acriora, v. g. ex radice bryon. & carminat. &c.

Clysteres ex fumo tabaci, ut in Colica, ita in passione hysterica, perquam sunt egregii.

Denique interdum usu venit, ut in ipso paroxysmo vel lipothymia, imprimis in Plethoricis, vena aperienda sit, cautè tamen & circumspèctè. Præcæteris observationem notabilem de hoc habet PANAROLLUS Pent. 3. Obs. 32. dum hystericam virginem ex nimia sanguinis copia, & circa cor stagnatione, ad mortem usque deductam in ipsa lipothymia per institutam phlebotomiam liberavit. WILLISIUS l. a. in casu fortiori commendat frictions crurum & pedum, & si ad fortiora procedendum est, cucurbitulas abdomini aut inguinibus applicandas. His ipsis externis adiungenda simul interna, supra insinuat in paroxysmo, omniaque ea penetrantia, nempe salia volatilia oleosa & spiritus; & in specie, quia promptè sudorem movent, hi autem paroxysmi per sudorem finiri solent: Quibus addantur subinde opiatæ ad impetum spasmi coercendum. In usu ergo vulgari sunt amara, zedoaria, abrotanum, absinthium, levisticum, angelica, radix gentianæ, mentha, galanga, pulegium, matricaria, sclarea, huius decoctum & spiritus, chamomilla Romana & vulgaris, cortex malorum aurantiorum, semen dauci, baccæ iuniperi, allium haustum cum vino, electuarium de allio, crocus, rosamarinus, & similia: quæ omnia ed collinant, ut sale volatili plus minus oleoso acidum destruant.

De castoreo & asa foetida res est notissima, quod singulariter conducant in hoc affectu, quatenus sua oleositate salina acidum vitiosum, eiusque effervescentiam, promptissime compescunt. JOHANNES ANGELICUS commendat semen pastinacæ vel aquilegiæ in vino: vid. WILLISIUS de Morb. convuls. pag. 20. & pag. 84. Sed Modernis eminent ipsa salia volatilia, quæ immèdiatè agunt; Unde mixturæ ex salibus volatilibus cum castoreo & opiatis paroxysmum hystericum sedant optimè. Et quidem inter salia volatilia, quæ Autores ab experientia commendant, primum obtinent spiritus salis ammoniaci ritè præparatus, cornu cervi, sale volatile succinii, & omnia succinata; sal scilicet volatile à gr. v. ad vi. vel viii. usque ad xii. in aqua hircundinum cum castoreo per os propinatum seu infusum. Essentia etiam succini cum spiritu vini rectificatissimo parata, à ʒʒ. ad ʒi. in adulta muliere insigniter prodest. Aliàs aliquot saltem guttes (3. 4. 5.) olei succini destillati, utur propter nimios ructus, quos solet ciere, ingrati, insigniter tamen conferunt in paroxysmo: vid. BORELLUS Cent. 2. Obs. 66. Spiritus & sal volatile fuliginis, & quæcunque salia volatilia, interno usu, quocunque modo usurpata, sunt perquam convenientia, imò optima: hinc etiam tinctura tartari, tinctura scoriarum reguli antimonii, propter alcali nempe, item liquor cornu cervi succinatus, sunt egregia remedia à gr. xv. ad xxx. seu ʒʒ. cum appropriato vehiculo infusa. Pertinet huc etiam essentia castorei, quæ cum spiritu vini paratur. Meliori ratione paratur cum spiritu vini, maritato cum sale volatili seu spiritu salino volatili oleoso, ad imitationem BARBETTE, qui promptè penetrat castoreum, illudque dissolvit, & elegantem & penetrantissimam suggerit essentiam, de qua superius, ubi de Mensum Emensione. Quin & tinctura tartari, spiritus salis ammoniaci vinosus, liquor cornu cervi succinatus, spiritus carminativus de tribus, &c. castoreo affusi, elegantem tincturam seu Essentiam eliciunt, proficuum sanè in paroxysmo etiam graviore hystérico. Item tinctura anonyma D. Langii est Essentia specifica hystérica ex castoreo, asa foetida, myrrha, & pauco croco, per spiritum vini tartarificatum parata: quibus speciebus commodissime baccæ sambuci exsiccatæ, item zedoaria & galanga, addi potuissent. Baccæ enim sambuci bene maturæ cautè exsiccatæ, item baccæ chamæædes seu ebuli similiter exsiccatæ & contusæ, cum spiritu vini dant tincturam, cuius cochl. l. vel ii. propinata in paroxysmo, eundem mirè leuant, provocando breui post sudorem. Tinctura hæc tanquam expertissima commendatur à LINDANO. Loco horum baccæ hederæ arboreæ, seu potius Extractum baccarum hederæ mixtum cum Tryphera magna est experimentum Prævotii. Loco horum ex granis kermes, aut iuxta alios ex baccis iuniperi, eodem successe tinctura seu essentia præparatur in hystérica passione conveniens. Sclarea, eiusque Decoctum, ac cum spiritu vini parata essentia, nobilissima sunt, si propinentur in paroxysmo hystérico, imprimis essentia cum camphora mista, non secus ac gentianæ pulvis. Occasione castorei dicti, (cuius oleum destillat. optimum quoque est,) mentio facienda myrrhæ, balsamici remedii in quamplurimis affectibus, in specie suffocatione hystérica: Nam Trochisci de myrrha vulgò à ʒi. ʒʒ. ad ʒii. propinati, egregiè, paroxysmum sedant. Potentior est essentia myrrhæ absque acido, cum alcali, tam fixo quam volatili, cum spiritu vini maritato, parata, v. g. cum tinctura tartari vel spiritu salis ammoniaci vinoso; Sic enim dat essentiam admodum elegantem. Pertinet huc etiam Elixir proprietatis mullebre sine acido per alcalia paratum de quo superius, quod in paroxysmo erit admodum proficuum: item essentia asæ foetidæ, vel cum tinctura tartari vel cum spiritu salis ammoniaci vinoso parata, est optima. Multum etiam conducunt salia destillata & rectificata fuliginis, tartari foetidum, ligni guaiaci, sassafras, &c. His addendum Elixir uterinum Crollii, dosi ʒi. ad ʒʒ. in paroxysmo propinatum, sudorem expectando: hoc enim præterquam quod paroxysmum levet, si singulis mensibus appropinquante menstruo fluxu propinetur, præservare hunc morbum dicitur, ut nonquam reuertatur. Huc etiam pertinet tinctura uterina Mynsichti. Camphora singulariter conducit, in specie sublimetur cum sale volatili spiritus salis ammoniaci, aut si paretur spiritus salis ammoniaci camphoratus; sic enim effissimum acquiritur remedium multis affectibus, in specie suffocationi uterinæ, dicatum: quin & camphora accenia in potu ordinario extincta non est frustranea, de quo supra, ubi de furore uterino, dictum fuit: sicut camphoram cum oleo amygdalarum dulcium in desperata suffocatione abhibuit cum



cum successo JOHANNES PISTORIUS; vid. VEL-  
SCHIIUS *Milcomim. anur. 4. & 5. M. A. N. C. num.*  
7. Spiritus secunditæ, imprimis primiparæ, per fermenta-  
tionem seu putredinem paratur; item pulvis secunditæ à  
36. ad 3i. usurpatus insigniter conveniunt. Hisce ultimum,  
sed nulli cedens remedium, annumerandum est; sterens e-  
quinum maris non castrati, in quo, vulgari licet subiecto,  
singulare est experimentum contra suffocationem uterinam:  
Nam sicut succus eius expressus est præsentaneum reme-  
dium contra colicam virorum, ita idem succus cum cerevisia  
calida aut cum vino expressus, aut decoctum propinatum,  
ad expectandum sudorem, est incomparabile remedium,  
præservando & in paroxysmo egregie per sudorem hunc si-  
stendo: vid. JOEL *Præx. l. 3. Sect. 1.* Loco succi sunt, qui  
Extractum stercoreis equini, vel extractum lichenum equi  
Schroederi vel Hartmanni commendant. Cum quibus etiam  
fixa, ut Bezoardicum Martiale, cinnabaris antimonii nati-  
va, à 36. ad gr. xv. sal card. benedicti & similia usurpari pos-  
sunt. Vulgo notum est, quod Jovialia remedia usurpentur:  
sunt namque, qui resuram flant in aqua appropriata propi-  
natam admodum laudant: loco huius Magisterium Jovis  
Mynsichtii, item antihæticum Poterii, item Bezoardicum  
Joviale, aut Sudoriferum magnum Fabri, sunt usurpanda.  
Panacea Hofatica seu arcanum duplicatum Mynsichti &  
ipsum est egregium pro affectu uterino mulierum. Reme-  
dium domesticum, sed facti proficuum, est fuligo furni splen-  
dens, Germ. *der Spiegel ruff*, ut vocant, à 36. ad 3i. usur-  
para. Partes animalium ossæ seu duræ, & flores sulphuris,  
in eadem dosi imperando sudorem, propinantur. Item flores  
sulphuris, aut sulphuris crudi part. ii. misce cum parte i. nucis  
moschatæ, à 3i. ad 3ii. subinde usurpara, singulare experi-  
mentum est ad curandam & præservandam uterinam suffo-  
cationem: Quibus simul auxiliares manus fert opium, adeo-  
que laudanum hystericum, laudanum opiatum, mithrida-  
tium, theriaca, aliaque theriacalia simul proficua sunt in  
passione hysterica; Theriacentim parum in vino dissolutum  
si propinetur, hystericum paroxysmum mirè levat. Est re-  
medium pro pauperculis. Potentius hoc facit, si addatur  
36. castorei; vel spiritus theriacalis camphoratus, in quo ex-  
tractum vel pulvis castorei dissolutus cochleatim propinetur  
in paroxysmo; sicut & essentia theriacalis ratione opii & vir-  
tutis diaphoreticæ, egregie conferunt, & 600. alia his similia  
composita locum inveniunt: Nam camphora, ut iam di-  
ctum, est egregium antihystericum, ex qua & laudano  
opiato sit Hartmanni secretum in epilepsia, & suffocatio-  
ne seu molestia quavis uteri, ante paroxysmum præservatio-  
nis gratiâ propinando: utrot eandem non omnes hystericas  
ferre possint: vid. THONERUS *lib. 7. de morb. uteri*  
*Observ. 8.* vel possunt ex tempore præscribi Mixture, quæ in  
hoc conspirent, ut sint salinæ volatiles oleosæ: Observando  
semper, attendendum esse, ut paroxysmus largo finiatur  
sudore; quia sic tuti magis esse possumus à metu recidivæ,  
siquidem simul atque excitatur sudor, levamen atque de-  
clinationo paroxysmi ferè sequitur: Præscribi ergo possunt  
*Mixture in Colleg. Formular. pag. .... Ludoniciano p. ....*  
*& 3d. Formular. cap. 1. §. 9.*

4. Aqua pulg.

Matricar.

Flor. sambuci an. 3i.

Spiritus theriac. simpl. 3ii. ad 3vi.

Ess. castor. vel elixir. uterin. Crollii 3i. ad 3ii.

Spiritus sal. ammoniaci 36. ad 3i.

Olei destillat. cort. aurant. gr. v.

Syr. fœnic. 3iii.

M. f. Potio.

D. S.

Potio matricialis.

Capiatur cochleatim.

4. Aqua flor. chamom. vel samb.

Matricar. an. 3ii.

Ess. castor. 3ii. ad 3iii.

Liqu. cornu cervi succin. 3i.

Laud. hyst. gr. ix.

Syr. cardibened. 3iii.

M. S. ut antè.

4. Aqua flor. chamom.

Samb.

Puleg. an. 3i.

Hirund. ann. cast. 3iii.

Liqu. cornu cervi succin. 3ii.

Ess. cast. 3i.

Laud. hyst. gr. ix.

Syr. cort. aurant. 3iii.

M. S. ut supra.

Dosis cochl. ii. expectando sudorem seu blandum sudo-  
rem.

Mihi in gratiori modo usitata est hæc deterrimi quidem  
saporis, sed præsentanei effectus, Potio, quam aliquando  
mulieri desperatè laboranti, & instar mortuæ sine sensu &  
motu in paroxysmo hysterico laceranti præscripsi:

4. Aqua menth.

Flor. sambuci;

Matricar. an. 3i.

Essent. castor. 3ii. ad 3iii.

Sal. volat. cornu cervi gr. xii.

Succinigr. vi. viii. ad xii.

Laud. hyst. gr. ix. vel 36. vel laud. op. gr. iii.

Syr. cort. aurant. 3iii. vi. vel 3i.

Potest etiam addi spiritus salis ammoniaci 3i.

Dosis laudani hysterici aliàs est ad gr. vi. Hic autem vix gr.  
16 est in unaquaque dosi Mixtura, quæ propter repetitum  
usum sufficit; capitur enim cochleatim, expectando sudo-  
rem. Vel

4. Aqua meliss.

Flor. sambuc. an. 3ii.

Carmin. 3i.

Essent. castor. 3ii.

Spiritus salis ammoniaci 3i.

Liqu. cornu cervi succinat. 36.

Syr. de artemis. 3vi.

Misc. pro Potione.

D. S. ut supra.

Capiatur cochleatim.

Si dolores urgent, laudani opiatum parum addi potest.

Vel

4. Aqua pulg.

Matricar.

Menth. an. 3i.

Ess. myrrh. 3ii.

Spiritus salis ammoniaci 3i.

Sal. vol. succini,

Cornu cervi,

Laud. op. an. gr. iii.

Syr. cort. aurant. 36.

M. pro Potione.

D. S. ut supra.

4. Aqua meliss. cum vino 3ii.

Carminat. 3i.

Essent. castor. 3ii.

Spiritus salis ammoniaci 36.

Sal. volat. succini 36.

Olei destillat. succini gr. vi.

Syr. de artemis. 3vi.

M. f. Potio.

D. S. ut supra.

Propinetur cochleatim in paroxysmo.

Paroxysmo sedato, ne subito revertatur novus, his ipsis  
Opiata & Camphorata sunt immiscenda, quæ in paroxysmo  
non semper conducunt: v. g.

4. Aqua meliss. vel pulg. 3ii.

Hirund. cum castor. 3i.

(Simplicissima, si quæ alia, huius est compositio, & tamen  
efficacissimam sæpius expertus sum:)

Tinctura gran. albes seu sambuci 3ii.

Spiritus salis ammoniaci 3i.

Laud. opiatum gr. ii. vel iii.

Camph. gr. iii.

Syr. cort. aurant. 3vi.

M. f. Potiuncula.

M. S. ut supra.

Iteratis vicibus propinetur.

Nam certum est, quod laudanum opiatum mirè conducit  
ad avertendum paroxysmum hystericum imminens, tam  
intrà assumptum, quam solùm naribus odoratum, de quo  
vid. RIVÉRIUS *Cent. 4. Obs. 85.*

4. Aqua menth.

Matricar. an. 3ii.

Ess. castor. 3iii.

Spiritus salis ammoniaci 3i.

Laud. op. gr. iii.

Syr. artemis. 3vi.

M. f. Potio.



D. S. ut supra.

℥. Aqua matricar. ℥i.

Mentha ℥i.

Zedoar. cum Vin. ℥i.

Ess. castor. ℥i.

Spiritus salis ammoniaci succin. ℥i.

Essent. opii ℥i.

Syr. cort. aurant. ℥i.

M. pro Potione.

D. S. ut supra.

Usurpetur cochleatim, crebrius aut rarius pro varietate circumstantiarum.

℥. Aqua flor. sambuci,

Matricar.

Mentha an. ℥i.

Essent. castor. ℥i. ad ℥i.

Liq. cornu cervi succin. ℥i. vel ℥i.

Laud. opiat. gr. ii.

Syr. flor. calend. ℥i.

M. S. ut supra.

Caplatur cochleatim.

℥. Aqua menth. ℥i.

Spiritus theriac. camp. ℥i.

Essent. castor. vol. ℥i.

Laud. op. gr. ii.

Syr. mentha ℥i.

M. S. ut supra.

℥. Aqua senic.

Flor. samb.

Matricar. an. ℥i.

Essent. castor. ℥i.

Liqu. cornu cervi succin. ℥i.

Laud. op. gr. iii.

Syr. cort. aurant. ℥i.

M. S.

Sistens potio matricalis.

℥. Aqua hirund. cum castor. ℥i.

Essent. castor.

Myrrh. an. ℥i.

Sal. volat. succini,

Salis ammoniaci an. gr. xv.

Laud. opiat.

Camp. an. gr. iii.

Oleofacch. nucis. q. s.

M. pro aliquot dosibus.

D. S. ut antè.

℥. Aqua matricar.

Meliss. an. ℥i.

Spiritus salis ammoniaci succinat. ℥i.

Essent. opii tartarif. ℥i.

Syr. menth. ℥i.

M. f. Potio.

D. S. ut supra.

℥. Aqua puleg.

Fenic. an. ℥i.

Cinnam. ℥i.

Elixir. uterin. vel ess. castor. ℥i.

Spiritus salis ammoniaci caryophyllat. ℥i.

Essent. opii tartarif. ℥i.

Syr. artemis. ℥i.

M. pro Potione.

D. S. ut supra.

℥. Aqua flor. samb. ℥i.

Matricar. ℥i.

Essent. castor. ℥i.

Liqu. cornu cervi succin. ℥i.

Laud. hyst. gr. ix.

Syr. card. bened. ℥i.

M. pro Potione.

D. S. ut antè.

℥. Aqua flor. sambuci,

Matric.

Mentha an. ℥i.

Ess. castor. ℥i.

Liqu. cornu cervi succin. ℥i.

Spiritus salis ammoniaci ℥i.

Syr. artemis. ℥i.

M. pro Potione.

D. S. ut supra.

℥. Aqua menth.

Matricar. an. ℥i.

Aqua Carminat. vel vita mulier. vel apopl. ℥i.

Essent. castor. ℥i.

Spiritus salis ammoniaci ℥i.

Laud. op. gr. iii.

Syr. artemis. ℥i.

M. S. ut supra.

℥. Aqua flor. sambuci ℥i.

Mentha ℥i.

Essent. castor. ℥i.

Cornu cervi nsti prap.

Corall. rub. prap. an. ℥i. ad ℥i.

Syr. flor. tunic. ℥i.

M. f. Potio.

D. S. ut supra.

In suffocatione uterina ex nephritide cuidam sequentem præscripsi formulam cum successu:

℥. Aqua cerasor. nigr.

Mentha an. ℥i.

Liqu. cornu cervi succin. ℥i.

Spiritus salis ammoniaci anis. ℥i.

Laud. hyst. gr. vi.

Syr. cort. aurant. ℥i.

M. pro Potione.

℥. Asa fetid. gr. iv. v.

Extr. castor. ℥i.

Sal. volat. succini gr. v.

Laud. op. gr. i. vel ii.

Cum Oleo destillat. chamom. f. Pilula hysterica.

Confer. RIVERIUS Prax. lib. 1. cap. 6.

℥. Extr. zedoar.

Castor. an. gr. iv. vel v.

Laud. opiat. gr. ii.

M. f. Pilula.

Cum oleo destillat. succini.

D. S.

Pilula matricales.

Flores pilularum formulæ occurrunt suo loco in Colleg. Consult.

℥. Essent. castor.

Liqu. cornu cervi succin. an. ℥i.

M. S.

Mixture matricalis, cochleatim sumenda.

Pertinet huc pulvis hystericus Timæi, quem se nunquam fecisse asserit. Descriptio est hæc:

℥. Facul. bryon. (nihil valet, cuius tamen loco succin.

prap. vel flor. sulphuris (substitui possunt)

Margar. prap. (quatenus acidum absorbent, quod tamen mellus præstant lap. cancr.)

Castor. gr. xxi.

Olei destillat. ruta,

Succini an. gr. v.

M. f. Pulvis.

Div. in 3. part. æqu. quarum quævis dosis propinetur in vino, in quo macis &amp; croci parum bullierit.

Fecula hæc nihil facit, Margaritæ saltem absorbent acidum, Castoreum autem &amp; olea destillata optime præstant.

Hinc ergo sequens Formula præferenda:

℥. Succin. prap.

Flor. sulph.

Castor. pulveris. an. ℥i.

Myrrhæ ℥i.

Camp. ℥i.

Olei express. nuc. mosch. gr. xv.

Destillat. succini gr. xii. vel xv.

M. pro 8. dosibus.

℥. Matr. perlar. prap. ℥i.

Cinnab. antimonii, vel antih. Poterii, vel Be-

zoard. Jovial. vel Marcial.

Salis vol. cornu cervi an. gr. xii.

Laud. op. gr. ii.

Olei destillat. caryoph. gr. ii.

M. f. Pulvis pro 2. dosibus.

D. S.

Sistentes pilula matricales.

In aqua hirund. cum castor. capiantur.

Plures pulverum formulas vid. in Colleg. Consultatorio.

Adhuc notandum, quod Castoreata, &amp; huiusmodi salia volatilia oleosa fortiter nares ferientia, non omnibus hystericis, quæ spiritus animales &amp; systema nervosum nimis sensibile habent, conducant. Talibus ergo salia volatilia macra præscribenda. Si vero ab his salibus volatilibus oleosis pa-

roxys-



roxysmus exasperatus fuerit, ad sistendum eum spiritus natri dulcis usurpetur, qui hunc impetum in corpore excitatum figit & sistit.

Quando occasione Dulcium excitatur paroxysmus, talibus in specie amara, v.g. Decoctum absinthii, cerevisia & vinum absinthites, in & extra paroxysmum conveniunt: item pilule ex castoreo & asa fetida: Confer. FORESTUS lib. 28. Obs. 28. Sic mulieri, ex ira frequenter suffocationem uteri patienti, imprimis si aliquis dulcium præcesserit usus, imperavi extra paroxysmum, ut cerevisiam absinthitem, item syrupum ejus caperet, & sic à paroxysmo præservabatur: vid. FORESTUS citato loco Observat. 30.

Hic & similibus depellitur paroxysmus. Quod si semel sedato paroxysmo metus sit, ne ex acido austero acriori, facilius redeat, Martialibus sepe hoc præcauari potest: v. g.

℞. Aqua hyssopi,

Antiscorb. an. ℥ss.

Solut. maris cum succo pomorum ℥ij.

Spiritus cochlear. ℥ss.

Laud. ferment. gr. ij.

Syr. sceleris. ℥ij.

M. f. Potio.

D. S.

Præservans potio matricalis.

Quod si hæc talla non sufficiant pro sedando paroxysmo, sed egre mortuorum instar sine sensu & motu ferè iaceant, ne omni auxilio destitutæ intereant, in extremo casu extrema tentanda remedia, & duro nodo durus opponendus est cuneus: nempe sternutatoria supra insinuata conducunt; quibus non satisficientibus, aliis irritis, vomitorium propinetur, cum satistutum sit remedium, quod est univocum, desperatas & tantum non pro mortuis habitas poterit exsuscitare. Hystericis non quidem sunt adeo proficua, quia stomachum in convulsionem cient, & effundere faciunt bilem & succum pancreaticum, itaque paroxysmus exacerbatur. In casu tamen desperato tandem ad vomitorium sit recursus. Insignes videbitis observationes de hoc apud PETRUM JOHANNEM FABRUM in suis Curat. imprimis in Cura 11. 12. & 13. ubi mulieres iam desperatas & pro mortuis habitas per ℥ij. salis vitrioli (est dupla dosis) in ℥ij. aquæ salviæ cum pauca aqua imperiali propinati, tandem restituit: Idem Curat. 39. similem curam desperatæ mulieris refert. Sed vitriolacea sunt suspecta; Loco horum ergo antimonialia sunt tutiora. Videbitis etiam de vomitoriorum virtute in paroxysmo ad resuscitandas desperatas hystericas RIVERIUM Cent. 1. Obs. 65. & 4. Obs. 85. Sed non conveniunt, nisi aliis irritis: vid. HORATIUS AUGENIUS l. a.

Quin etiam in desperato adeo casu venæsectio quibusdam Instituta salutaris observata fuit: Sic enim HOECHSTETERUS Decur. 4. Cas. 1. aphoniæ cum hysterica convulsionem phlebotomia avertam & impeditam refert: Item PANAROLLUS Pent. 1. Obs. 32. notat hystericam sceminam ex nimia sanguinis copia ad mortem usque adactam, venæ sectione in ipsa lipothymia curatam: Item passionem hystericas conclamatas venæ sectione in poplite curatas videb. in M. A. N. C. Anni 4. & 5. App. pag. 31. Commendatur etiam à CAPIVACCIO Pr. lib. 4. cap. 22. HORATIO Decad. 9. Probl. 3. & MERCATO de Mulier. affect. lib. 2. cap. 3.

Substituimus in cap. de suffocatione uterina, in quo ultimo proposui modum tractandi mulieres in paroxysmo: Extra paroxysmum autem passio hysterica, ceu aliis aliquis morbus chronicus, curandus est. Opera ergo detur, ut præcaveatur ejusdem recursus, & fomes mali corrigatur & eradicetur. Præmissis digestivis usurpentur vomitoria, & remedia antihypochondriaca & antiscorbutica. Digestiva videb. l. 1. ubi de Malo hypochondr. & scorbuto, in Coll. Institus. pag. 275. & 276. Vel

℞. Corall. rub. præp. vel matr. perlar. vel lapill.

cancr. præp. ℥ss.

Arcani dupl. ℥i.

Salis absinth. ℥ss.

M. pro 3. dosibus.

D. S.

Pulvis digestivus.

Convenit item Potio acidum destruens in Prolegom. præscripta. Pro Vomitorio:

℞. Arcan. dupl. vel tartari vitriolat. Tachen. gr. ix.

Tartari emet. Myns. gr. ij. vel iij.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis vomitorius.

Juxta hæc conveniunt imprimis Aromatica, blandis laxativis temperata. Ea ipsa ferè, quæ in paroxysmo ceu appropriata interne assumuntur, eidem post paroxysmum ad curam ipsius mali commodè adhiberi & usurpari possunt, imprimis eadem ferè medendi methodus atque in malo hypochondriaco pro eradicando malo extra paroxysmum instituitur. Unde communiter Nodulorum alterantium vino infundendorum usus admodum proficuus est, qui præferuntur ex carminativis & nervinis uterinis. Huc tamen omnia collinant, quod vel de alcali volatili, vel de sale volatili oleoso aromatico plus minus amaro participant, vel acidum absorbent, vel vi anodynâ plus minus conducant: hinc præter modò allegata sunt radix angelicæ, petasitidis, zedoariæ, leuistici, gentianæ & similes, item cortices aurantiorum, omnia aromata. In specie Sclarea, Germ. der stinkende Scharlach, est experimentum singulare paucis notum in suffocatione uterina, siue decoctum ejus, siue alta ex eadem parata remedia usurpentur. Hinc melissa, rosmarinus, artemisia, salvia, matricaria, & tanacetum: hinc semina carminativa, quæ vocantur calida, cum omnibus aromaticis: quibus addantur blanda laxantia, speciatim heliborus niger, & bryonia, quæ præcæteris laudatur: v. g. sit Nodulus alterans & laxans:

℞. Herb. meliss.

Matricar.

Puleg. an. M. j.

Fol. fenn.

Rad. gentian.

Helleb. nigri an. ℥j.

Esulæ. præp.

Cosli aromat. veri an. ℥ij.

Zedoar.

Sal. tartari an. ℥ss.

Incis. & contus. includ. Nodulo.

D. S.

Nodulus matricalis aperitivus.

Alios nodulos alterativo-laxativos vid. in Colleg. Formular. pag. .... & .... Vel

℞. Herb. matricar.

Meliss. an. M. ij.

Fol. fenn. sine stipit.

Rad. angel. an. ℥j.

Helleb. nigri ℥ss.

Bryon. rec.

Bacc. iunip. an. ℥vj.

Cinnam. acut.

Zedoar. an. ℥ij.

Sal. tartari ℥ss.

Incis. & contus. includ. Nodulo, qui infund. in vini.

Rhen. Menl. ij.

Stent per diem & noctem in loco calido, & hinc omni mane ægra capiat haustum.

Juxta quæ etiam Martialia admodum solent esse proficua pro more aliorum affectuum chronicorum & hypochondriacorum, sine Martialibus vix curabilibus; ut ut spiritus salis ammoniaci succinatus, similiaque volatilia ad gr. 30. simul vespere, tempore somni, assumi possint. Quæ ipsa Martialia etiam curatiue in ipso paroxysmo, præsertim in iis, quæ volatilia non æquè ferre possunt, etiam sunt egregia, quæ inter eminet sal Martis compositum mulieribus hystericeis admodum conveniens, qualia ex supra dictis de cachexia, de malo hypochondriaco iam nota sunt; uti etiam alia appropriata plus minus absorbentia.

Cum his usurpanda sunt blanda laxativa: pro quo scopo HELVETIUS in Dir. Med. pag. 116. laudat infusum senne & Rhabarbari, cui addenda sit ℥ss. pulveris secundinæ humanæ, ex quo laxativo appropriato multum utilitatis hausisse affirmat in suffocatione uterina; Nam secundina ipsa est experta, uti jam supra habui. Aliàs pilulæ hieræ cum agarico, cum myrrha & castoreo acuatæ, item pilulæ fetidæ communes ad ℥i. (vid. RIVERIUS l. a.) addito Mercurio dulci, pro expurgandis talibus mulieribus conducunt. Verùm in talibus Hystericeis laxandis duo consideranda:

1. Quod in earum malo confirmato, ubi nempe crebris recurrunt paroxysmi hysterici, aut difficilius sopiuntur, ad sit simul pituita vitrea acida, hoc est mucus viscidus, specifico acido austero sapore inquinatus, primas vias occupans.

2. Ut



2. Ut blandis tractentur laxantibus, quia aliis paroxysmus redit, & in talibus facilis est dysenteria, si acrioribus stimulantur Purgantibus. Ergo saltem blandè stimulantia cum salinis acuta osupentur, aut Purgantia blanda beneficio gummatum propinanda sunt: v. g. pro removendo muco dicto viscido:

24. *Tartari vitriolati, vel arcan. dupl. Mss. ℥ss.*  
vel gr. xv.

*Scamm. sulphurat. gr. ij. vel iij.*

*M. f. Pulvis: S.*

*Pulvis aperitivus.*

Optime sunt pilule cum gummatibus:

24. *Gum. ammoniacum acetosol. gr. xv.*

*Extr. castor. gr. v.*

*Troch. albandal.*

*Scamm. sulphurat. an. gr. j. vel ij.*

*Cum essent. saliv. vel rorisinar.*

*i. Pilule: S.*

*Pilule matricales aperitiva.*

*Vel*

24. *Gum. ammoniaci in acetosol. ℥ss.*

*Vitrioli martis gr. v.*

*Extr. castor. gr. iij. vel iv.*

*Troch. alband. gr. j. vel is. aut trochisco-*  
*rum alband. gr. iij.*

*Cum f. q. olei destillat. succini. Pilule.*

*D. S. ut antè.*

Plures Pilulas usuales vid. locis allegatis.

Ad præcauendum paroxysmum & dysenteriam purgantibus quoque Opiata admisceri possunt.

Præter hæc dicta tam in quàm extra paroxysmum ulterius conducunt tinctura uterina Mynsichti, item eiusdem Extractum specificum uterinum. Riverii pilula præservativa à paroxysmo similiter conueniunt, factæ ex castoreo, asa fetida & laudano opiato: (sunt alteratiue, non laxatiue.)

Colophonidis loco addam aliquot casus, quos mihi uidere contigit superiore ætate: Vocabar ad mulierem iuenculam, quæ in partu aliquando malè fuerat tractata, tempore tamen puerperii & lactationis sætus commode satis se gessit: Cum ablactasset sctum, & redirent menses, incidit in hæmorrhagiam uteri nimiam, non quidem conseruim, nec etiam adeo continuam, sed ita, ut menses interdum per integras sex hebdomadas fluerent: Tandem superueniebant tormina abdominis uehementissima & crudelissima, quæ principium capiebant in hypochondrio sinistro, hinc extendebantur in totum abdomen, & tandem in specie regionem dorsi lumbarem crudeliter lacerabant: Superueniebat hinc difficilis respiratio, & graues anxietates, ac compressiones cordis, ita, ut etiam syncopæ interueniret: tandem Crampus quasi seu conuulsio quædam tonica, dimidii corporis sinistri superueniebat, ita, ut dimidium caput, faciei ac nasi sinistri, ac dimidius truncus cum brachio & pede intalter rigerent, & quasi tetano efficerentur, parte dextra tota sanà: Pulsus erat parvus, celer, imò interdum ferè nullus, hæcque per paroxysmos subinde recurrerant. Reuera erat affectus, quem uocant hystericum. Vocatus ergo in paroxysmo, eum ex relatione ad lactium mulier per quinque dies habebat alium suppressam, præscribebam clysterem carminantem & emollientem:

24. *Rad. angel.*

*Leuiss. an. ℥ss. ad ℥vj.*

*Herb. malua,*

*Chamom. an. M. j.*

*Flor. chamom.*

*Sanib. an. M. ss.*

*Sem. 4. calid. mai. an. ℥ij.*

*Coqu. in f. q. aquæ simplicis:*

*Colat ℥viij. vel ix. adde*

*Elect. de bacis lauri ℥vj.*

*Castor. ℥i.*

*Olei destillat. succini,*

*Cumini an. gtt. vj. ad ℥ss.*

*Virell. ov. num. j.*

Iniciebantur pro Clysmate, quod egregie proderat.

Pro usu interno præscribebam hanc mixturam:

24. *Aqua hirund. cum castor. ℥ij.*

*Meliss. cum uino ℥i.*

*Spirit. salis ammoniaci, impr. carosphyllat. ℥j.*

*Cochlear. ℥ss.*

*Sal. vol. succini (ell oleosum) ℥ss.*

*Laud. op. gr. iij. vel essent. opii ℥ss.*

*Syr. cort. aurant. ℥iij. ad ℥vj.*

*M. f. Porio, finito paroxysmo subinde cochlearim haurienda.*

Pauca hæc remedia extoro leuarunt malum, ita, ut hæmorrhagia uteri silleretur, & omnia symptomata disparent.

Pro confirmatione autem imprimis abdominis præscripsi inunctionem saltem externam:

24. *Olei chamom. ℥ij.*

*destillat. succini ℥ij.*

*Carui,*

*Fenic. an. ℥ss.*

*M. pro inunctione hypochondri sinistri & regionis umbilicæ, applicato defuper latere calente.*

Mulier trigintaquatuor annorum, agilis aliàs & uegeta, de duobus tumoribus conquerebatur, magnitudinis ouis gallinacæ paulò supra os pubis prominentibus, sine molestia tamen insigniori: dum supina iacerent, tumores disparebant; dum uerò ruffiret, aut erecta incederet, denuò prominebant: sine noxa etiam ulla aut incommodo hos patiebatur, etiam grauida facta; tunc enim nullum aderat tumoris uestigium, post partum dictis tumoribus recurrentibus. Interim cum hoc, quod sua uolentia ferre nequeat, fetida uero & Castorina eam delectent, frequentes, idque leuissimà occasione, singulares paroxysmos patiebatur, in quibus, prægressa graui totius corporis refrigeratione, unà cum tumultu aliquo in abdomine sentiebat aliquid sursum pergere, & præcordia occupare, dicebat: quod ut impediret, ligaturâ spiriti hypochondria cingebat, hinc uomitus graues sæpè eam prehendebant, & ut plurimum repetitæ dejectiones atque sub quo statu tumores isti admodum protuberabant, indurabantur, lapidis instar, dolebant: alias molles & indolentes, unà cum torminibus grauissimis & exquisitis doloribus lancinantibus, saltim circa loca à tumore afflicta, supra umbilicum uerò non adscendentibus. Sub hoc statu ea medicamentum capiebat domesticum, absinthium, matricariam, horumque cum aqua simplici Decoctum calidè bibebat, & ita sub corporis horripilatione quocunque modo ad sudorem se disponebat; quo erumpente res saluæ erant, symptomata euanescebant, ipsaque uegeta resurrexit. Sed cum aliquando mense Februario totâ die linum carminando se grauidæ exercuisset, eadem symptomata præfati paroxysmi redibant sed atrocissima, in specie præter uomitum tumor prope inguen sinistram cum insigni duritie, cruciata lancinante intolerabili, & abdominis borborygmis, alioque pertinaciter clausa eam affligebant: Ipsa egra ad assumppta quælibet sæpius singultiebat, & uolenter eructare uidebatur, sine statu tamen. Tertiâ die uerò, cum in hoc statu constituta fuisset, me uocabat. Ego egram uisitans dicebam: esse passionem hystericam cum hernia complicatam, quæ tamen à passione hysterica exasperatur, ac ita curavi: scilicet cum per tres dies in statu dicto persistisset, antequam me uocandum curasset, die tertiâ morbi à meride præscripsi clyisma carminans cum sale tartari & oleo destillato succini pro scopis alium emolliendi stimulandique, internè simul hanc formulam ordinando:

24. *Salis card. bened.*

*Lapill. cancr. præp. an. ℥i.*

*Laud. hyst. gr. vj.*

*Missa div. in 2. part. equ.*

Cepit unam dosin uesper, alteram circa noctem mediam, sicque dolores sedabantur. Clyisma autem eodem modo, quo iniectum erat, effluebat, & sine efficacia.

Post noctem mediam, laudani opiat. uicessante, symptomata omnia recrudescerant, unde clyisma ex lacte ordinavi, cui parum lixiui communis additum fuit; itemque simul pariter externè egræ emplastrum ex galbano applicandum iussi, malaxatum cum f. q. olei destillati succini; simul præscribendo sequentem mixturam:

24. *Liqu. cornu cervi succin.*

*Essent. castor. an. ℥ij.*

*M. S.*

*Essentia matricælis.*

Capiebat 40 guttas bis vel ter in die pro lubitu.

His factis Clyisma denudè reiciebatur, & omnia frustranea erant. Ergo die quarto uesper sequentem formulâ præscripsi:

24. *Cinnab. antimonii ℥ss.*

*Laud. hyst. ℥ss.*

*Olei destillat. anisi gtt. iij.*

*Cum essent. aurant. f. Pilule pro 2. dosibus.*



Quarum unam illa vesperi cepit, alteram post noctem mediam, & mane sequente bene se habens, de nihilo conquirebatur, nisi quod alius clausa sit, & sitiat; quam tandem vetula quædam, quibusdam in cassum adhibitis, cataplasmate ex pomis Borsdorffianis cum pauxillo croci regioni umbilicali & herniosæ applicato, totumque abdomen cum sevo hircino impungendo, referavit.

Ancillæ cuidam menses fluentes, nescio quo casu, suppressantur: dolor aderat gravis in regione pubis ac lumborum, respiratio difficillima, amissa loquela, fauces occlusæ, ut iusculum calidum deglutire nequiret; anxietates, lipothymia recurrentes, suffocatio imminens, rugitus abdominis, dolor capitis, scotomæ, tinnitus aurium, &c. Adstantes putabant esse catarrhum suffocativum; ego passionem hystericaam dicebam, & mensium cohibitionem. Propinabam internè, præmissa hypochondriorum ligaturâ, sequentem Potionem cochlearim:

℞. Aqua pulg.

Meliss. an. ℥ss.

Spiritus salis ammoniaci ℥l.

Ess. myrrh. ℥ss.

Sal. volat. succini,

Cornu cervi an. gr. vi.

Syr. cort. aurant. ℥iii.

Misc.

Præscriptum simul fuit clystma carminans, quæ optime contulerant. Mane sequente aperiebatur vena in pede cum euphoria. Internè præscribebam:

℞. Spiritus salis ammoniaci simpl. (vel succin. aut caryoph. ℥i.)

Essent. castor.

Myrrha an. ℥ss.

Olej destillat. caryoph. gutt. i. vel ii.

M. S.

Mixtura napræicalis.

Dosis ʒo. gutt. ter quotidie usurpando.

Hicce melius tribuit: Sed cum præcordia essent plena muco-lagine viscidâ, & dolores acerbissimi punctorii in hypochondrio sinistro, profomiter removendo præscripsi potionem ex gummi ammoniac cum succellu; item sperma ceti, de quo in Dissert. mea cap. 2. pag. 12.

Fœmina quædam aliquando subito gravissimo dolore lancinante & pungente in regione vulvæ, speciatim in labio eius dextro, corripiebatur, dolor horrendus erat, subinde sursum vergens versus umbilicum: putabam primò calculum esse vesicæ, aut exulcerationem eius aut pudendorum; sed horum nihil aderat, quia libere urinam exercebat, & nunquam calculosa fuerat, nec pus nec sanguis in urina conspicua erant; & quia subito dolores huiusmodi evadebant, & subito etiam desinere, post dimidium annum recurrebant, dubius eram: sed cum proclivis antea ad passionem hystericaam fuerat, & se multoties curauerat per mentham contusam, in forma globuli pudendis intrusam, ubi dictum factum paroxysmus evanuerat. Hoc audiens, de spasmo imprimis, quia dolor sursum pergebat, cogitabam, & præscribebam:

℞. Lapill. percar. præp.

Cinn. antimonii an. ℥l.

Laud. op. gr. ii. vel iii.

M. f. pulvis pro duabus dosibus.

Capiebat in cerevisia calida: & ex prima dosi sensile levamen percepit, post alteram evanuit paroxysmus; nisi quod levia circa pudenda se offerrent, unde ordinavi emulsionem violarum, tincturam nephriticam; sed frustra. Externè inunxi cum oleo succini cum oleo petre, sed male habebat ab acrimonia olei: tandem ordinabam spiritum salis ammoniaci & essentiam myrrhæ, cuius usu iam per annum sana fuit, & quoties aliquid sentit, statim ad hanc mixturam confugit.

Hæc de suffocatione sic dicta uterina, & etiam de morbis, qui vitio uteri adscribuntur, sufficiant. Pergo ad

## S E C T I O N E M I V. D E

### VIRI ADMISSIONE LÆSA.

**F**œmina nempe quæcumque, quæcum mensium fluxu ad generationem quasi se habilitat, & cui pruritu venero titillant genitalia, à viro præstandi satisfactionem desiderii recipit per debitum congressum, seu potius per debitam in congressu Admissionem. Leditur hæc viri admissio vario orificii uteri externi, & vaginæ uterinæ vitio, vel nimis clausæ, aut nimis strictæ, aut angustæ, vel nimis patulæ; seu denique impedita est Admissio hæc in affectu, qui vocatur vulgò Procidencia uteri, seu eius Prolapsus; & in inflammatione atque Exulceratione uteri.

#### C A P U T I.

##### D E

#### VAGINÆ UTERINÆ ANGUSTIA.

**Q**uoad nimiam angustiam seu clausuram uteri, hæc est vel naturalis, vel præternaturalis: Naturalis, de qua supra dictum: Præternaturalis verò, quæ est huius loci.

#### C A U S Æ.

Fit à coactu vulneris, rupturæ, erosionis &c. inconcinno, per quem aut vaginæ uterinæ parietes iusto arcibus conglutinantur, aut excrecentia carnea meatum hunc occludit, cuius exemplum videb. in WIERI Obs. pag. 114. Plures causas, utut infrequenter, vid. in ROENHUYSIUS pag. 114. & 118. nec non WIERO pag. 99.

#### C U R A.

Nimia angustia subindè repetito coitu solet curari. Optimum aliàs remedium est, ut recipiatur rapa exsiccata debite magnitudinis, quæ immittatur sinui pudoris, ita per diem

#### C A P U T II.

##### D E

#### PROCIDENTIA UTERI.

**V**teri procidentiam in specie quod spectat: Vocatur ita propterea, quia communiter putant, quod uterus extra situm suum naturalem ferme progrediatur, exeat, & ita per pudenda propendeat, ita, ut procidere observetur corpus quoddam rotundum colore carneo, in medio perforatum, nunc magis nunc minus; qualem molem verum uterum, seu uteri fundum, esse putant. Verum illi sanè errant, quamvis illam communem opinionem defendere conetur GRAAFIUS de Part. mulier. Generationi Inservient. cap. 11. argumentis tamen maximè imbecillibus. Nam si iam consideramus firmam istam uteri connexionem circa os sacrum cum intestino recto ac partibus vicinis, item per membranas (quibus ligamenta eiusdem lateris laxè connectuntur per firmam cum lumbis connexionem) sanè per se patet, uterum planè esse immobilem, & omnino impossibile, ut talis fiat uteri Prolapsus, à causa scilicet interna, sed necesse est, ut semper concurrat insignis violentia externa, atque ita sit potius Uterus protractus, quàm Uterus prolapsus. Evenit hæc Protractio interdum in partu difficili, dum obstetrices sæpe malè tractant mulieres parturientes & puer-



puerperas: fit itidem hoc à nimis valida & violenta secundinarum, utero interdum adnatarum, extrahione, cum quibus simul & uterus tandem necessarjò foras extrahitur, & violenter à situ naturali divellitur. Id quod tamen fieri nequit citra ingens vitæ periculum, ita ut tales mulieres propter vasorum ruptionem & lacerationem partium, ut & inflammationem gangrænescentem, vix ac ne vix quidem salvari possint, sed semper necesse sit intereant. Exemplum tale recenset BARTHOLINUS Cent. 2. *Hist. Anat.* 91. ubi habet uteri extrahionem cum secunda lethalem. Videatur itidem HILDANUS Cent. 4. *Obs.* 60. ubi etiam habetur uteri extrahio propter ineptam violentam secundinæ tractionem. Plura vid. in BERENGARIO, DIEMERBROCIO *Anat. lib. 1. cap. 14.* CARPO *Isagog. Anat. pag. 25.* MAURICEAU de *M. M. lib. 9. c. 6. Obs.* 76. & PRIMEROSIO de *M. M. lib. 2. c. 15.*

Verùm cum talis extrahio seu protractio sit omninò periculosa & subindè lethalis, patet, quid habendum sit de traditione ista satis communi, qua uterus aut exsectus aut ulcere absumptus statuitur, remanente interim vitæ aut sanitatis integritate, imò adhuc resitante vi concipiendi? Affectus autem iste, qui vulgò nomine Procidentie seu Prolapsus uterini venit, minimè utero propriè sic dicto competit, sed tantùm vaginam uterinam afficit, utero semper in situ ac constitutione sua naturali permanente: ac ob id à Modernis genuino nomine *Prolapsus sinus pudoris* rectè vocatur, fitque duobus modis:

1. Quando vagina uteri tota nimis relaxata aut extensa propendet foras, quod interdum fit in partu difficiliore, aut improvida obstetricis manu; vid. ROENHUYSIUS *Obs. Chir. lib. 2. pag. 91.* in quo nimis laxatur, extenditur & distenditur vagina uteri, eiusque imprimis membrana interna rugosa: post talem enim difficilem partum facillè evenit, ut non rarò duos digitos latos globosè extragenitalia propendeat, ac in medio sui foramen exhibeat, quod falsò pro uteri orificio interno Veteres habuerunt. Quod si etiam ab alia quacunque causa, vel interna vel externa, relaxata, aut nimis extensa, & in naturali tono vitata fuerit ista vaginæ interna membrana, facillè citra uteri affectionem, vel in situ mutationem foras propendere, vel in labiis pudendi hærrere, vel ulterius plus minus procidere potest.
2. Etiam fit prolapsus seu procidentia vulgò, sed falsò sic dicta uteri, quando ruga vaginæ uterine in quadam sui parte laxata, aut exesa, aut crosa nonnihil, sanguine vel aliis humoribus repleta, successivè in tantum à naturali tono relaxatur, ut pedetentim extra vulvæ labia propendere incipiant, ita, ut tandem repræsentent corpus amplum, rotundum, angusto collo annexum, & extra sinum pudoris propendens; quod collum ulterius intra sinum pudoris se abscondit. Corpus propendens istud interdum in tantum augetur, ut tandem ad capitis infantis magnitudinem quoque accedat, & interdum ad genua usque propendeat; Imò interdum alteratum ab aëre externo, vel humoribus, tandem ulceratur, & graveolentem fœtorem expirat, & pondere suo ac situ, Dolorem, molestem, pariter & impedimentum in progressu, mulieribus offert.

### CAUSÆ.

Causæ huiusmodi protuberantiarum, quas uteri procidentia dicunt, sunt sæpius interna; ut plurimum post hæmorrhagias uteri nimias, à sanguine serosiore, aut post diutius continuatum fluxum album, oritur, dum laxatis fibris aut membranis, rugas vaginæ constituentibus, hæ successivè sanguinem aliosque humores colligunt, coacervant, tandemque in tale corpus successivè augentur. Humores isti conclusi successivè corrupti putredinalem tandem acorem contrahunt, sicque in ulcera fœtida tandem corpus proprium exedunt. Quod si tandem superveniente interdum gangrænâ propendens moles abscindatur, tùm uterum prolapsum, vel integrum ulceratum, citra vitæ periculum abscissum esse & abscindi posse, veteres asseverant: & cum tactu intus inæqualitatem quandam repræsentet propendens tumor, testiculos vel similia corpora in utero inverso latere putarunt: quæ tamen omnia veterum asserta de utero propendente suffi-

cienter refellit Modernorum experientia Anatomico-Chirurgica, in specie ROENHUYSEN *Observ. P. 1. pag. 91.* & Chirurgi Amstelodamensis JOB van Meeckern, qui in *Observ. suis Medico Chirurg. Idiomate Belgico conscriptis*, sed mox Germanico prodituris, *Observ. 51. §. 2. pag. 310. seq. & in Append. cap. 14. pag. 491.* elegantibus Observationibus docet, post mortem mulierem, quæ cum aliis affectibus variis complicatis lethalibus, & procidentia sic dicta uterina insigni laboravit, post factam corporis apertionem in talibus uterum verum naturali suo loco & situ constitutum fuisse, & id quod propenderit, solum in vagina uterina relaxata, aut eius aliquot rugis nimis protensis fuisse, adeò, ut aliquando ingentem talem procidentiam post convenientem in parte sui angustiore, seu collo, ligaturam Chirurgi absciderint, & relicto filo in loco abscissionis intus reposuerint, post mortem mulieris, aliquot dies postmodum evenientem, repeterunt filum parti cuidam laterali in collo seu vagina uteri, ubi relaxatæ quædam rugæ collum istius tumoris consueverunt, fuisse annexum, utero in situ naturali, hoc est in pelvis cavo, laudabiliter constituto. Unde manifestè talis experientia docuit, id quod propenderit & abscissum fuerit, solum à vagina relaxata & propendente ortum fuisse. Imò post resectionem atque extirpationem corporis prolapsantis seu uteri spurii mulieres non saltem superstites & incolumes evasisse, sed prolem quoque concepisse ac peperisse, ROENHUYS & plures Autores perhibent. Interdum etiam excrescentiæ vaginæ variæ, nunc rugosæ, nunc carnosæ, nunc polyposæ, extra vaginam uterinam enatæ, aut aliis modis curandas suscipiunt, sed frustra. Occasio excrescentiæ talis ferè esse solet læsio quædam in interiore vaginæ superficiei, exoratio aut exulceratio in locis huiusmodi membranosis, ex qua facillè talis excrescentia emergere solet: Conf. hic MEECKERN l. a. item ROENHUYSEN *Heil. Cubr. id est, Cura Salutaris, l. 2. c. 49. Bartholinus Cent. 2. Hist. 58. SALMUTH Cent. 1. Obs. 44. KERKRINGIUS in Spicileg. Anat. Obs. 53.* qui refert exempla *Sarcomatum*, nunc in orificio uteri interno natorum, nunc propendentium ex vagina uteri, quæ pro utero prolapsa habita sunt: Sic in M. A. N. C. *Ann. 2. Obs. 121. pag. 199.* prostant exempla *excrescentiæ fungosæ vaginæ, uteri prolapsum* mentientis.

### DIAGNOSIS.

Quod ergo attinet *Diagnosin* huius procidentie sic dictæ uterinæ, duplex solet esse gradus, nempe vel saltem eius descensus, vel eiusdem prolapsus: Moles enim foras propendens vel adhuc est in labiis, vel circa labia pudendi, & hoc saltem descensus uteri appellatur, tuncque apparet exiguus tumor labia pudendorum occupans, quasi extensa pellis, & simul pondus quoddam instar cuiusdam ovi maioris circa labia pudendi hærentis: quod si ulterius tumor pergat, ut etiam foras propendeat, propriè prolapsus seu procidentia dicitur, atque tunc apparet tumor ovi anseris instar, modò minor, modò maior, ita ut interdum, ceu dixi, ad capitis infantis usque magnitudinem intumescat: Interdum habet in medio sui foramen, ut antèa monui, quod internum uteri orificium putatur, & tunc est vagina tota relaxata, quæ foras prominet: Interdum citra tale foramen tumor est rotundus, globosus, & tunc aliquot vaginæ uteri rugæ affectæ esse solent: Adest in principio imprimis insignis dolor quidam tensiva partium, quibus annexitur uterus, lumborum, hypogastrii, pudendi, & circa os sacrum, aut partibus vicinis annexis, ex tumore propendente violenter protrahis & tensis: Interdum supervenit febris, interdum etiam convulsiones, & substantia propendens corrupta ulceratur non rarò, imò gangrænescit: postquam aliquandiu duravit malum ob consuetudinem dolor mitigatur, & solum ponderis molestia quædam sentitur.

### PROGNOSIS.

Quoad *Prognosin*: Prolapsus seu Protractum uteri verum, seu Protractionem uteri à causa violenta, ut in principio monui, affectum pronunciat incurabilem LINDANUS, utve curâ palliatiâ, si non sit lethalis, intus retineri possit. Fit enim talis protractio uteri violenta non nisi & avulsis & ruptis ligamentis latis, quorum consolidatio, aut repetita connexio, vix per artem potest perfici.

Quod verò attinet reliquis prolapsus putati differentias: descensus facilius potest curari, idque imprimis in iunioribus, quàm procidentia.

Quod



Quod si dolor, febris, convulsio, aliave gravia symptoma accedant, mortis causa esse possunt.

Quò magis id, quod prolapsus est, ab ambiente aëre alteratum, inflammatum, & gangrænâ plus minus corruptum fuerit, eò periculosius est, nec nisi manuali Chirurghi excisione curabile.

Quod si diutius malum fuerit (nam interdum per plures annos sine vitæ nocumento durat, uti observavit MORISONIUS de Morbis mulierum pag. 386.) eò difficiilius ad scopum optatum cura pervenire potest.

Aliàs sinus pudoris prolapsus per se rard est lethalis, valde tamen molestus & periculosus admodum, supervenientibus ulceribus radiosisimis propter fetorem.

Si fit à causa interna per successum relaxationem, facilius curari potest eo, qui fit per violentiam externam: Qui verò fit per impetum obstetricis, incurabilis est.

### C U R A.

Quod ergo attinet Curam: Prolapsus sinus pudoris ex vaginæ vitio quocunque curare qui vult, sequentes tres attendat scopos:

1. Partem prolapsam convenienter in situm naturalem reponere.
2. Repositam adstringentibus commodis vel verè, vel aliis mediis palliativè, in debito situ firmare.
3. Quod si vel reponi nequeat, aut alterata, aut jam corrupta & ulcerosa, aut etiam jam gangrænosa, substantia propendens fuerit, abscissione totaliter extirpari debet. Excrescentia verò quælibet eradicanda venit, idque omnium optimè ferro.

Repositio fieri debet citò, partim ne alteretur ab aëre vel urina, partim quia sic facilius curari potest. Fiat ut mulier debite corpore situetur, nempe in dorso jaceat & levatis cruribus, & constrictis natibus, ut ita commodius intrudi possit: Quo facto, manuum ope linteum totum ex aromaticis blandè discutientibus intus circumvolvatur digitis, & interiora versus blandè substantia emolvens intrudatur, atque in situm naturalem reponatur: postmodum ægræ quies injungenda est. Ante repositionem autem, imprimis si alteratus & relaxatus nimis fuerit tumor propendens ab aëre, commodè totus aromatici confortantes & appropriati usurrandi sunt, quorum ope denuò restituitur uterus: v. g. fiat Fotus ex rore marino, salvia, absinthio, (sc. decoctis in vino, aut vini & aquæ partibus æqualibus, aut aqua ferrariorum: Item Fotus ex decocto alii in lacte, quod JOEL commendat: aut coquantur folia & bacæ lauri, menthæ, flores sambuci, ac summitates artemisiæ, in vino adstringente: quo fomento humido, tepidè cum linteis applicato, aliquandiu fomentetur sinus pudoris prolapsus, ut partim tumor propendens, partim labes contracta corrigatur. Hinc pro scopo repositionis & firmationis conveniunt omnia alia remedia, quæ in ano prolapsu, item quæ in Hernia intestinali, superius l. i. dicta sunt. Communiter suaveolentia naribus, fetida tumori propendenti, applicant, persuasi de antiquata opinione, uterum, ut talem, delectari suaveolentibus, quibus ut viciniore sit, sursum repat: Sed de his alio tempore. Aliàs ubi repositio est difficiilior, singulare experimentum est HELIDÆI suffitus institutus ex stercore bubulo siccatò, cui adhuc præstantior, & ab omnibus decantatum experimentum, est suffitus pellis anguillæ salitæ, in fumo exsiccata & pulverisatæ, ex qua, carbonibus imposita, fumus vulvæ per tritorium excipitur: suffitus enim præbet excellentissimum ad repositionem uteri. In defectu hujus quibusdam experimentum est ovum gallinæ putridum, quod, rupto cortice ipsius, panno subtili vel lanâ exceptum immediatè tumori propendenti applicatur, & mirè confert ad reponendum prolapsum sinus pudoris. Est experimentum FORESTI, STOECKERI, & aliorum. Quidam laudant pro hoc scopo inunctionem regionis ossis sacri & circa os coxendicis pinguedine ursina, aut erinacei, item applicationem emplastri magnetici contra herniam: Sed an hæc tantum valere possint? dubito, utut aliàs paria, quæ in ano prolapsu vel in hernia intestinali conducunt, etiam in prolapsu sinus pudoris locum inveniunt. Jubent quidam pro utero reponendo, ut mulier terreatur, quia sic ferè spontè retrahatur sinus: nempe ut Chirurgus, vel Medicus, ferrum candens ipsi tunc manu ostendat, ac stimulet, quasi uellet uterum eo tangere; sic enim, muliere terrefactâ, introcedere, uti ex CASTRO refert SENNERTUS lib. 4. Prax. ubi de uteri proci dentia p. 95. ZACUTUS LUSITANUS, & ex eo RIVERIUS

Estimul. Oper. Tom. II.

in Praxi, terrorem per mures vivos filo alligatos per mulieris crus sinistrum discurrere permittunt. Quidam cucurbitulas maiores cum flamma inguini, umbilico, & sub mammis apponunt.

Repositus sic dictus uterus seu sinus prolapsus firmandus & retinendus est, vel verè, vel palliativè: Verè remediis convenientibus adstringentibus, tam in-quàm externis: Nam & internè vulneraria adstringentia, & ex his parata Decocta à quibusdam usurpantur, quæ sunt ex berniaria, pilosella, polygono, radice symphyti, nuce cupressi, betonica, tormen-tilla, & similibus. POTERIUS cum successu intus usurpat sequens Decoctum post repositionem & firmationem uteri:

℞. Nuc. cupress. (vel loco hujus possunt accipi gal-læ: ) no. xij.

Rad. symph. mai. ℞j.

Fol. seu Herb. polyg.

Herniar.

Beton.

Pilosell. an. m. j.

Coqu. in f. q. aquæ & vini.

De Colatura dantur pro dosi aliquot unciz cum Syrupò li-monium.

Cum etiam status intestinorum, turgescentiâ suâ stimu-lantes alium, malum exasperare, & ad recidivam dispo-ne possint, propterea crebriorem usum seminis anisi & feniculi convenienter suadet POTERIUS. Addantur etiam semina 4. calida majora Decoctis vulnerariis, ut præcaueatur statum nimis proventus, ne quodammodò denuò protruda-tur substantia modò reposita.

Sed imprimis firmandus est Prolapsus sinus pudoris per ex-terna Fomenta adstringentia, nunc sub forma Iniectionum, nunc Fomentorum vulvæ extrinsecus applicandorum, nunc suffi-tuum modò laudatorum, nunc Pess. ex lana carminata hujus-modi Decoctis adstringentibus intus applicantur. Parantur talia Fomenta ex adstringentibus aliàs cognitis, v. g. ex gallis, foliis quercus, myrti, prunorum sylvestrium, ex equisetis, alchimilla, & millefolio, ex corticibus granatorum, lu-mach, & similibus, quæ decoquantur in aqua ferrario-rum: quibus etiam potest addi parum aluminis, eo nem-pe in casu, quando partes non sunt excoriatae aut exul-cerate, & quando sunt indolentes; aliàs talia acris inter-mittenda sunt: c. g.

℞. Rad. symph. mai. ℞j.

Gland. no. vij.

Malicor. seu cort. granat. ℞ß.

Alum ℞i.

Coqu. in vino rubro ad medias. S.

Fotus adstringens.

Hoc ipso Decocto fomentetur sinus pudoris, & etiam pes-sus ex lana vel spongia hoc ipso ebria immittatur, ut eò me-liùs firmeretur.

POTERIUS Cent. 3. cap. 91. hoc fotu felici cum successu usus fuit:

℞. Nuc. cupress.

Gallar.

Cortic. granat.

Balaust.

Sumach. an. ℞j.

Fol. myrti,

Olivæ seu olea,

Quercus,

Polyg. an. m. j.

Flor. rosar. p. j.

Bulliant in vino rubro: quo fotu pars affecta bis vel ter in die soveatur, muliere interea quietè jacente.

Præterea Decoctum aluminis aut musci quercini pro fotu, aut etiam pro iniectione in vaginam uterinam, commodè usurpatur. Decoctum etiam galliarum in aqua ferrata, seu in quo ferrum aliquoties extinguitur, utero injectum, ceu admodum proficuum laudatur: Si in forma pessorum & globulorum usurpentur, cauti simus, ne pess. tales nimis magni sint & irritent vaginam uterinam; Metus enim est, ne excitetur fluxus albus, qui tunc solet malum sub-indè exasperare. Radix & folia urticæ contusa, & in-stilata cataplasmatibus imposita conferunt. Præterea non in-congruum est, ut continuentur suffitus ex stercore vaccino aut equino, qui egregiè conveniunt; Item ex pelle an-guillæ aliisque similiter foetentibus. Loco horum ex aceto, succino, thure, mastiche, gummi juniperi, & similibus forsitan



magis sunt proficui. Hinc pinguedine ubi inungatur regio ossis sacri, item regio pubis. Quidam ceu singulare laudant, si sumatur chrysanthemum Peruvianum, quod vulgò vocatur flos solis, Germ. *die Sonnenblume*, qui coquatur, & decocto parabenè fomentetur, quo facto regio dorsi lumbaris cum axungia seu pinguedine urli inungenda, ut firmetur tumor uteri prolapsus.

Quibus placet, possunt applicare *emplastrum* regioni umbilicali & hypogastricæ, ita ut pubem versum pertingat, aut ossis sacri, ex *opoponace*, *galbano*, *tacamahaca*, & similibus, aut etiam ceratum ex solo galbano. Nescio an tantum valeant, quantum dicunt. Alii præscribunt tale *Emplastrum*:

4. Olibani,  
Masticæ,  
Opoponacæ,  
Galbani,  
Serapini,  
Terebinthi.  
Styrac. liquid.  
Pic. fic. an. p. æqu.  
Cera parum.

Fiat *Emplastrum*.

Hoc posterius circa lumbos, & anteriùs circa pubem imponendum pro firmando prolapsu.

In malograviore, aut inveterato, aut sæpius recidivante, Thermarum usus est optimus: Conf. M. A. N. C. *Anu. 6. pag. 89. & 7. Observ. 57.*

His si nequeat denuò firmari propendens tumor, palliativè firmetur, & intrudatur in vaginam uterinam globulus cereus, & gestetur; vel factus ex subere, cerâ candidâ, aut massa emplastri, facta ex cera, colophonia, gummi elemi & similibus obducto: qualium globorum, aut rotundorum, aut oblongorum, aut pyriformium, optimam descriptionem & delineationem videbitis apud RHUMELIUM descriptam, & imprimis in MORISONIO de Morb. mulier. lib. 3. c. 5. Part. lib. 23. cap. 41. SCULTETO lib. 22. in HILDANO Cent. 4. Observet. 61. & ex eodem habet SENNERTUS de Procidencia uterina. Hi globi immittendi exactè respondeant amplitudini vaginæ, ne nimis parvi procidenciam impediunt, nimis verò magni vaginam irriterent, aut nimis dilatent, & ad fluxum album stimulent; unde commodius erit, subligaculis idoneis pessum firmare. Consultum autem est, ut in medio sint perforati, & inluculi filo, ut partim mensibus concedatur transitus, partim verò, ut pro lubitu possint extrahi, quando libuerit, in specie, si forsitan maritus ingressum molliatur, sic diu supervivunt sine molestia, quin imò concipiunt & pariunt: extra tempus autem congressus semper debent gestari hi globuli.

Putant vulgò, hos globulos intrudi in uterum, quod impossibile, sed hærent tantum in vaginæ summitate; nam replendo exactè, laxitatem, & simul hinc propendentem tumorem, impediunt & fulciunt: Cavitas enim uteri tam parva est, ut impossibiliter possit capere, aut si capiat, non possent tam faciliè extrahi & rep. ni hi globuli. Loco globulorum SENNERTUS facit mentionem annulorum sinui pudoris intrudendorum, quibus similiter prolapsus tumor superius retinetur, nè propendeat. Hi similiter nullo modo ad uterum pertingunt, sed rugas saltem vaginæ distentas & laxatas inde egressum molientes firmant & fulciunt, & ita malum palliativè curant.

Quod si verò exerescentia sint, aut saltem tumor ex relaxata una alterave vaginæ ruga, aut sinus pudoris prolapsus sit alteratus ab aëre, & vel corruptus vel ulceratus, in tali casu optimum est, ut radicatus abscindatur: quod sit sine periculo, inieciâ priùs ligaturâ cum filo; hinc instat ulceris curetur: vid. PARÆUS lib. 23. cap. 41. & ROUSSETUS de Partu Cap. 6. 4.

Locurus sum de admissione viri læsa, & occasione hujus de Procidencia dicta uterina: Sequitur jam

### CAPUT III.

#### DE

#### INFLAMMATIONE UTERI.

#### CAUSÆ.

**V**teri inflammationis Causa proxima, sicut omnium inflammationum, est sanguis intra poros uteri stagnatio.

Causa remota & occasioales frequentius sunt coitus nimis, aër frigidior post menses, aut mox à partu admissus, partus difficilis, contusiones & lacerationes uteri à partu difficili, & vulnera, (vid. FORESTUS lib. 28. Obs. 41.) nec non menses & lochia intemptivè suppressa.

#### DIAGNOSIS.

Cognoscitur, & à vicinarum partium inflammatione distinguitur per tumorem, æstum, dolorem tensivum & gravativum genitalem, inguinum, hypogastrii & umbilici, qui post immittitum digitum in genitalia augetur, & interdum ad coxas, spinam dorsi & scapulas usque extenditur; unde propter diaphragmatis compressionem & pleuræ consensum, suffocatio imminet: percipitur simul fervor, unà cum orificii interni duritie, & retractione, & duritie: vagina uteri fit rubieundior cum venulis turgidioribus, menses & lochia, supprimuntur, mammae quasi inflantur & dolent, adestque simul nunc alvi, nunc urinæ suppressio: conjuncta est febris ardens continua, interdum lipytia cum siti, linguæ ariditate, cephalalgia & delirio, convulsionibus: de quibus vid. HIPPOCRATES lib. 2. de Morb. mulier. 1. 20. 54.

#### PROGNOSIS.

Inflammatiō uteri malum satis periculosum est, quæ, imprimis eius fundus, faciliè in gangrænam abit: vid. HIPPOCRATES Aphor. 43. & HERCULES de Saxonia Prælect. P. 1. pag. 208.

De cætero tutius est, quando inflammatio hæc discutitur, quàm suppuratur; quia suppuratione abscessus, si ad cavitatem abdominis pertingat, novum periculum excitat; quia pus per inguina rariùs evacuat, uti hoc BENEDICTUS de Curat. Morbor. cap. 5. annotavit; aut per alvum expurgatur, quod observavit RHODIUS Cent. 2. Hist. 89.

Denique uteri inflammatio interdum in scirrhum degenerat, qui affectus difficilis satis est, & ut plurimum hydropem conjunctum habet: quo presente, doloris & ardoris & reliquorum symptomatum remissione tumor, renitentia, & gravitas hypogastrii atque crurum remanet.

#### CURA.

Quoad Curam: in primo inflammationis principio revulsiois causâ venæ sectio instituat in brachio, & altero die interjecto clystere in malleolo: vid. SENNERTUS lib. 4. P. 1. S. 2. cap. 13. & HERCULES de Saxonia l. 1. a. p. 208. Post, clysteres applicentur temperati, emollientes & resolventes, ex lactuca, malva, violaria, floribus chamomillæ, sambuci, verbasci, in aqua calcis vivæ decocti, & cum electuario lenitivo, syrupo rosarum solutivo, atque nitro injecti. Ratione alvi evacuandæ usurpetur Decoctum tamarindorum vel passularum minorum, cui infusa folia sennæ cum cremore tartari ad imitationem TIMÆI: quales formulæ supra l. 1. dedi, ubi de Alvo obstructa.

Externè Focus aut Cataplasmata resolutentia & anodyna, qualia parantur ex malva, althæa, pulegio, artemisia, molillo, floribus verbasci, chamomillæ in aqua, vel simplici, vel calcis vivæ, aut cum vino coctis, pestini applicentur, incrementum, & statu morbi continuanda: sicut etiam emplastrum de galbano crocatum & reliqua Resolventia usurpari possunt.

### CAPUT IV.

#### DE

#### ULTERIEIUSQUE VAGINÆ ULCERIBUS.

**I**nterdum uterus ejusque vagina exulceratur.

#### CAUSÆ.

Causæ horum ulcerum sunt vel internæ, ut lochia retenta, & inflammationes suppuratæ, sordes intra rugas retentæ, sæctus & mola corrupta, gonorrhœa maligna, fluor albus nimis acris, aliorumque humorum acrium diuturnior affluxus; vel externæ, ut frequens & violentior coitus, vaginæ æritio, partus difficilis, &c.

DIA.



DIAGNOSIS.

Ulcera hæc cognoscuntur nunc solis oculis, nunc vaginâ uteri per speculum uterinum distentâ; vel si profundiora & in ipso utero fuerint, ex dolore & mordicationis sensu, & quidem molestiore, si partes nempe hæc contrectentur, v. g. in coitu, vel acrioribus injectis.

Signa hæc confirmant fluor albus, retentio lochlorum, & acrlorum applicatio, excretio pusulenta, ulcus vesicæ propinquius, mictio frequens, ardor urinæ, & si posterior pars vaginæ affecta, tenemus: quibus tandem febris symptomatice lenta supervenit, cum crebris horribus & lipothymiis: vid. HIPPOCRATES lib. 1. de M. M. s. 38.

PROGNOSIS.

Uteri ejusque vaginæ exulceratio semper est periculosa; ulcera enim horum difficiliter consolidantur, & in fistulas plerumque degenerant, tandemque hydropem excitant, imprimis si ulcera fuerint majora.

In vetulis, & quibus major humorum affluxus, difficiliter curantur.

Ulcera ipsius uteri, etiam post inductam cicatricem, mulieres reddunt steriles, (vid. HIPPOCRATES l. c.) ut ut PRIMEROSIUS l. 2. c. 12. & ROUSSETUS de Partu Cesar. cap. 4. testentur, quasdam post enormiora ulcera concepissee.

CURA.

In Cura habenda est ratio causarum & symptomatum: unde ulcera à causa externa, v. g. coitu violentiore, solis coagulantiust tractanda: ubi humorum acrimonia peccat,

hæc corrigenda & vacuanda. Ante omnia dolor mitigandus, pus & reliquæ sordes acriores detergantur.

Internè conveniunt vulneraria mundificantia, e. g. Decoctum summitatum hyperici in cerevisia vel sero lactis, quocunque tempore bibitum.

Vel

℥. Herb. heder. terr. m. j.

Plantag.

Sanic.

Summ. hyperic. an. m. 6.

Raf. cornu cerui ℥iij.

Coqu. in f. q. aquæ simpl.

Colat. ℥viij. adde

Syr. corallior.

De symph. Fern. an. ℥j.

M. D. S.

Potio vulneraria matr. cem purificans.

De quoquater in die bonus haustus cum gutt. 3. vel 4. Bals. sulphuris.

Convenit quoque Eltxyr proprietatis, manè 30. ℥ 35. gutt., à meridie liqu. martis solat. ad 25. gutt. Externè conveniunt Injections uterinæ ex decoct. summitat. hyperici & florum verbasc. cum aqua calcis vivæ: Item

℥. Lact. chalch. ℥i.

Tereb. cum vitello ovi sol. ℥6. ad ℥vj.

Mellis rosas. ℥j.

Misc. S.

Inpersio mundificans.

Sæpius uaginæ uterinæ injicatur pro ulcere mundificando & consolidando.

Plures formulas tradam suo loco in Chirurg. Medica; quæ seligenda, & mutatis mutandis huc & in omnibus reliquis exulcerationibus applicanda. Conf. etiam hic, quæ suprà de Pruritu & pustulis vaginæ uteri dixi.

SECTIONIO V.

DE

CONCEPTIONE LÆSA.

**N**otum est, quod, dum legitime copulantur mas & foemina, mas emittat genituram suam, cujus spiritus genitalis impregnet ovum mullebre, instar ovi in ovario oviparorum, sicque fiat conceptio: i. e.

conceptio est ovuli uterini à spiritus genitalis masculini afflatus facta fecundatio, parili ratione atq; spiritus genitalis galli uno compressu omnia ova in ovario fecunda reddere solet: simili ratione mulierum testes ovaria superius dicta sunt, in quibus ovula pisorum magnitudine producuntur, quæ per tubam uterinam, cornubus uteri in brutis analogam, sub coitus ardore ad testem contortam, expanso hujus orificio excepta deferuntur ad uterum. Et hæc est compressio & generatio ordinaria: Id enim quod est ovarium in oviparis, hoc sunt testes in viviparis, & in specie in mulieribus, utpote, qui testes perfecta parva ovula in se continent, humore lim-pido scatentia, & propriis pelliculi circumdata, quæ ovula aque ferventi immissa coagulantur in formam albuminis ovi indurati, in aqua fervente cocti: Vid. STENO, HARVÆUS, HORNIUS, GRAAFIUS, MALPIGHIIUS &c.: quæ doctrina Neotericorum in Compend. vid. in M. A. N. C. Ann. 6. & 7. Observ. 196. 197. & 198.

Ovulum tale fecundatum si in tuba uterina hæreat, conceptio fit tubaria præternaturalis in homine, i. e. fœtus in tubis uterinis conceptio & generatio, matrique lethalis; de qua parvus, sed non inelegans est Tractatus ELSHOLZII de Concept. Tubaria, observata Parisi: Vid. etiam RIOLANUS. Extraordinariè quidem fit talis conceptio in genere humano; ordinariè enim fit in brutis, nempe in eorum cornibus uterinis, cum in brutis tubæ seu cornua sint verus locus generationis: Nil dicam de eo, quod refert SALMUTH, in stomacho nempe mulieris nefando congressu factam conceptionem, fœtusque digitalis postmodum per os exclusionem.

Dixi, quod spiritus genitalis maris fecundet ova, iste nempe, qui sub crassioris genituræ involucro unâ excernitur, ista materiâ genituræ crassa nullo modo vel in utero subsistente, vel ceu materiâ fœtum constituyente; demonstrante Estmull. Oper. Tom. II.

hoc HARVÆO Exerc. 6. 39. 49. 67. 68. &c. qui primus hanc veterum opinionem concussit, & ejus fundamentum, nempe ingressum & mixturam genituræ utriusque sexus, funditus diruit. Unde ejus Observationes Experimentales merito magni sunt æstimandæ, dum in Oviparis ova, sive tota sive saltem eorum vitellos, à spiritu genitali maris galli, seu cujusque ovipari, tanquam contagio quodam spirituosio afflari, & ita fecundari asserit: in vivipariis, verò uterum hoc ipso vel eodem contagio spirituosio infici, & ita foeminam à mari impregnari seu concipere dicit, unde successivè ex materia albuginea in uterum destillante, virtute istius contagii spirituosii generatur tandem fœtus perfectus.

Sed maxime hoc videtur obscurum, quâ ratione simplex talis spiritus, uterum saltem fecundans, sit causa conceptionis? Hisce ergo dubiis occurrunt Modernorum jam allegatorum inventa Anatomica, quod sc. solus spiritus genitalis contagii instar & ovum mullebre penetret, fecundum reddat, & in motum concitet, mulieremque ita impregnet, ut ex eodem tandem generetur fœtus perfectus. Gallina per integrum annum fecunda observatur ab uno coitu galli. Spiritus hic genitalis habet se instar fermenti, addendi ovo ceu masse fermentandæ: crassa materia pro tutela tantum vel pro custodia spiritus inservit: Ovulū se habet instar tomitis, qui in proxima est potentia, ut incendatur etiam à tantilla scintilla spiritus genitalis masculini: Mas confert principium actuum, foemina verò principium passivum, quod veteres dixerunt mensurum. In ovulo ita fecundato, seu à spiritu genitali maris in motum concitato, nempe quoad materiâ, mox inchoatur fœtus formatio, dum non solum ovum successivè magis magisque turgescit & dilatatur, sed etiam cum speciatim primitus apparet punctulū se movens & quasi subsiliens est filamentis circumcirca rubicundis, ita ut cordis palpitantis rudimentum inter partes solidas, & sanguinis vitalis liquor inter partes liquidas, primitus conspiciantur, & partes primogenitæ esse videantur. Emergit brevi post circa sanguinea vasa crassius quid & albidius instar nubeculæ appa-



rens, in duas partes divisum; cuius major pars rudimentum præbet, quatuor vesiculis constans, quæ cerebrum, cerebellum & oculos binos repræsentant; minor verò pars inferius instar carinæ protensa, ipinæ rudimentum est, ex quo brachia & pedes sensim protuberant, donec valis sanguisvis viscera successivè quoque adnata sætum perfectum constituant.

Materia, ex qua formatur sætus, sunt *partim* humor limpidus albugineus, per arterias ad uterum delatus, ejusque glandulosam substantiam, in ejus cavum destillans, & hinc ovulo in utero secundato affusus, tandemque in conceptum perfectum seu ovum uterinum Harveanum concrevens, non secus ac in oviparis propriè dictis vitellum ex ovario dilapsum in uterum, e. g. gallinæ, ibidem tandem albumine investitur; (præter Harveum, Stevonem & alios, etiam tale ovulum sub forma vesicali in testiculis muliebribus observatum notat BARTHOLINUS *Cent. 1. Hist. Anat. 92.*) *partim* verò est sanguis ex dicto chyloso succo prius elaboratus, ita ut verissima sit distinctio in partes spermaticas & nerveas, & sanguineas & carneas: Illis ex materia lactea seu chylosa pronatis: his ex sanguine circum istas concreto pedetentim exstructis. Liquor hic nutritius primis gestationis mensibus spiritui nitri coagulatur in caseosam substantiam, ultimis verò diebus gestationis non coagulatur, quia materia chylosa jam ablumpta est. Ex albumine nutriuntur partes nerveæ; ex vitello verò sanguineæ. Membranulæ ovorum sunt illæ, quæ postmodum fiunt secundinæ, vid. KERCKRINGIUS *Anthropogr. In genitura*, ut & in ovo, tantum gemmula aliqua inest, quæ secunda est. Juxta HARVÆUM nullus melius, quam MALPIGHIIUS *de Pulli in ovo formatione* scripsit. Ova ergo hæc secundata, dum ita in utero soventur & retinentur, donec sætus ex iisdem emergat perfectus, dant animalia vivipara; Sin verò excludantur ante perfectam formationem, & postmodum solo ovipari externo incubatu foveantur, donec perfecti pulli egrediantur, dant animalia ovipara. Non autem est *essentialis differentia*; Nam & observatum est, gallinam ova intra se fovisse, & loco duorum pullos viuos numero sex exclusisse unâ vice, utut hoc ipsum cum morte gallinæ matris fuerit conjunctum; Quam observationem videbitis in *Observat.* quas BARTHOLINUS *Cultro Anat. Lyseri* adiecit, est *Observatio 6. Bartholino à LYSERO communicata*. Dictum est, *puellum saliens*, quod postmodum cor constituit, cum sanguine primò ante omnia generari. Sunt quidam, qui existimant, partes omnes simul delineari, easdem verò postmodum successivè generari & perfici. Non incongrua videtur hæc assertio ex eo, quod MALPIGHIIUS observet, in ovo secundato jam reperiri gemmulam capitulo rotundo, cum protenso corporis rudimento conspicuam, ex qua successivè aucta pedetentim quasi evolvantur partes, ita ut suspicari liceat in ista gemmula jam rudimenta omnium partium, esse posita ac figurata, quæ postmodum per extensionem sub nutritione & auctione pedetentim magis magisque fiunt conspicuæ. Par nempe ratio hic esse videtur atque in plantarum seminibus sepius ovulis: in his etiam est gemmula, ex qua planta nascitur, & in qua tota planta jam delineata conspicitur, quâ corruptâ perit omnis vis & spes generationis: Ita similiter in ovulo est macula, seu cicatricula, seu gemmula, in qua partes pulli omnes potentissimè insunt, & ex qua ordine explicantur, in qua macula seu gemmula est spiritus, cui Creator potestatem fecit sætum efformandi. De seminibus plantarum quod sint ova sui generis, vid. FABRICIUS ab AQUAPENDENTE, & GREW, Anglus, *de Vegetabil. Generat. seu Anatomie de parte ad partem*. Dum generatur semen, generatur etiam planta. Dum ergo coeunt mas & foemina, statim generatio fit.

Efficiens hujus Formationis videtur esse spiritus genitalis utriusque sexus, matris quidem in ovulo concentratus, maris mediante genitura in congressu ejaculatur; qui licet originaliter videatur duplex, in ovo tamen mutua coitione unicus ex materia limida in ovo coërcita corporis machinam format. Quomodo autem fiat? res est obscurissima: Cartesiani, & hos sequentes, ex solo motu particularum per calorem excitato fieri formationem volunt, determinante hunc plus minus spiritui ipsogenitali, quo motu particulæ minimæ materiæ agitaræ ob suas figuras, texturas, aliasque proprietates, necessariò in germen animalis abeant, eo modo, quo ex oblongis salium particulis, in aqua vi caloris agitaris, & inter se conjunctis, variz sa-

llum, &que distinctæ, efformentur figuræ: Confirmat hoc, quod ova secundata si concutiantur, vel agitentur fortiter, fiant infecunda. Aliis casuale nimis, & quasi fortuitum stupendum, formationis corporis negotium hoc modo explicandum videtur, quin mirabilis structura in tot mille animalibus eodem modo eveniens, & speciales parentum texturas simul exhibens, determinatum & specialem formatorem exigit; unde tales per ideas seminales negotium hoc explicant, quæ antea confusæ, sed successivè & ordinatâ serie evolutæ, corporis formatorem spiritum dirigant, ut determinatum tale vel tale corpus fabricet. Id quod confirmare videtur idea matris imaginando concepta, formationem corporis sætus diversimodè modificans; si enim Idea est extraordinaria, dat sætum extraordinarium, ut caput suillum fissum, &c. Idea ergo etiam ordinaria seminalis sætum dat naturalem. Omnes homines essentia sunt similes, sed differunt accidentalibus lineamentis.

Ex hac Modernorum doctrina spinosæ quamplurimæ controversiæ de Conceptione & Generatione prolium numerosa, & *superfætatione* faciliùs possunt expediri, dum nempe sæpius gemelli, interdum trimelli, imò quatuor, etiam octo sætus vivi, sani & vegeti unâ vice à muliere, excluduntur, teste BORELLO *Cent. 2. Observ. 44.* pro numero scilicet ovulorum in uno, aut pluribus se invicem subsequenter congressibus, à spiritu maris genitali, tanquam à gallo sæcundatorum, & in utero rectorum. HARVÆUS etiam observavit ova, quæ constant duplici, aut triplici, aut etiam pluribus vitellis: An sit universale? nondum determinatum est. Huc pertinet observatio SVAMMERDAMII, quam allegat SCHRAEDERUS in *Prefat. de Generat. animalium*, de muliere, quæ mense sexto ex abortu gemellorum interiit, observatis vestigiis seu foraminibus duorum ovorum juxta se invicem confitorum, ubi etiam observata sunt ova non separatim existentia, sed binâ quædam ita invicem connexa fuisse, ut ab invicem separari non potuerint. Probabile ergo est, *oviri gemellos ex binis ovis inter se connexis*. Hisce & *superfætationis* obscura aliàs doctrina sceneratur lucem, quæ fit, quando ovulum unum, & post aliquot septimanas vel menses repetito denudè congressu aliud sæcundatur, unde post partum primum aliquot septimanarum vel mensium spatio alius partus vitalis supervenit.

Spiritum genitalem maris imprimis observandum monui, qui scilicet sub crassiori genituræ tegmine excretus, utero susceptus, sæcunda reddit feminæ ova, ipso crassiore genituræ corpore unâ cum feminæ liquore sic dicto feminall denudè ex vagina effluente. Unde patet, verum esse, posse concipere etiam virginem, cui penis non adeò profundè intrudatur, & cui claustra, quæ vocantur vaginalia, minus in tali casu aperiuntur, modò tam artificiosè ejaculetur genitura maris, ne ab aëris externi ingressu vitari, aut spiritus genitalis dissipari possit, quin potius hic ipse promptè se in uterum insinuet, & ita virginem imprægnat. Exempla, quæ hoc confirmant, habet BORELLUS *Cent. 4. Observ. 26.* non tantummodò de virgine, quæ citra perfectam penis immissionem fuit imprægnata, sed in specie de equa, cui fibulis & annulis ferreis vulva fuit oclusa, quæ nihilominus tamen concepit. Curiosa etiam est observatio de puella imperforata, & cui tantum esset foramen exiguum magnitudine pisi, quæ tamen ex sola amalli externa ejus membro frictione, & ita genitura facta excretionem, concepit, ita ut imminente partu membrana, foramen obvelans, rescindenda, & vulva aperienda fuerit, ne periculum in partu incurreret: vid. *Observatio 13. Communicata BARTHOLINO à MOINICHEN*, quæ etiam annexa est *Cultro Anat. Lyseri*, item HOBOKEN in *Spicileg. Epist. pag. 188.* HARVÆUS *Exercit. de Partu. pag. 369.* Item mirabilia refert exempla GUILLEMEAU *de Partu. 2. c. 10.* GRAAFIUS *de Organ. Mulier. pag. 51.* M. A. N. C. *Ann. 3. Obs. 273. pag. 34.* VIARDEL in *observationibus de Genitura muliebri pag. 46.* MARCUS AURELIUS SEVERINUS in *Offic. Med. pag. 285.* Sufficit ergo ad conceptionem saltem spiritus genitalis maris, modò extra aërem externum possit venire in vaginam uteri. Plura quoad materiam conceptionis & sætus vid. in HARVÆO in *Exerc. de Generat. animalium*, item in DEUSINGIO *Exercit. de Genesi Microcosmi*, item CLAUDIO de la COURVEE, *Archiatro. Regis Poloniae. Traët. de Nutrit. fatus in utero*, item MARCO MARCI *de Ideis operatric.*



In specie sumus solliciti de signis conceptionis, cum multum interest, ut cognoscamus, apud mulierem conceptum, nec ne? Equidem signa concepisse mulierem, certa ac pathognomonice rariùs deprehenduntur, imò ferè penitus non dantur, cum notum sit, ipsas falli mulieres in hoc casu. In quibusdam autem mulieribus ex peculiari idiosyncrasia evenit, ut saltem habeant signa quædam specialia, seu ipsi solummodò propria, nec multis communia. Quia igitur sunt particularia, non de omnibus testantur: qua ratione e. g. AMATVS LVSITANVS refert de muliere, quæ semper quadam melancholiâ uterinâ laboravit, simul verò atque concepit, etiam ista melancholia cessavit: Sic PANAROLLO *Pent. 3. Obs. 46.* observavit aliquando tale signum infallibile conceptionis in quadam muliere, in qua cum concepisset, statim primis mensibus vena tumens in femoris interna parte circa genu apparuit: Aliæ quædam uno alterove post conceptionem die crebris vomitibus manifestari solent: aliæ extra gravidationem libidine prurunt, sed factâ conceptione ardor videtur extinctus, uti videb. in PANAROLLO *Pent. 3. Obs. 9.* & SCHENCKIO *lib. 4. Observ. ubi de Conceptione.* Ordinarium ferè est gravidis surarum tensio & stupor pedum; dextri quidem, si masculus; sinistri, si femella fuerit embryo: Exempla vid. in BINNINGERO *Cent. 2. Obs. 38.* Interdum mulier gravida facta post paucos dies epilepsiâ corripitur. Sed hæc, uti dixi, sunt signa particularia, quæ raro observantur, & quibusdam individuis saltem propria: Communia autem Conceptionis signa pathognomonica, atque hinc infallibilia, non dantur. Probabilia tamen signa, & ex quorum syndromè satis apparenter concludi potest Conceptio, sunt ferè sequentia: Nempe

1. *Orificii uterini interni stricta clausura*, ita ut, teste HIPPOCRATE *Secl. 5. Aphor. 71.* ne specillum quidem admittat. Hoc ipsum signum pluribus evenit, & tanquam unum ex certissimis commendat PANAROLLOVS *Pent. 3. Observat. 10.* dum dicit, hoc ipsum immisso digito posse cognosci; item FORESTVS *lib. 28. Observ. 49.* In mulieribus non gravidis, dum percutiuntur cæstro libidinis, aut fricantur genitalia, (aut furore vexantur genitalium,) orificium uteri internum solet hincere instar pili; foveam enim quasi quandam representat uterus non clausus, & non concepit, efformat circa orificium foraminulum: quod si verò firmiter claudatur, post factam scilicet conceptionem, nulla fovea aut sinus tunc reperitur; vid. etiam RODERICVS à CASTRO *de Morbis mulierum P. 1. l. 3. pag. 4.* qui est in hac opinione. Et hoc signum ferè primariū habetur.

2. Succedit *menstruorum ordinaria emissio seu retentio*, quæ ordinariò ferè à conceptione supervenit. Ordinariò dico, & ut plurimum; quia non universale est: Dantur enim exempla mulierum, quibus etiam primis gestationis mensibus menses adhuc ordinariò fluxerunt: Nempe sanguine ferossiore, item copiosiore & spirituosiore abundantibus, quin & quibusdam toto gestationis tempore menses fluxisse observatum est. Excipiuntur hic quæque virgines quædam, quibus labra nunquam postuerunt catamenia, & tamen secundæ sunt, viragines aliàs dicte, quæ in hoc passu alterationem non sentiunt: vid. SCHENCKIUS, & MARCELLVS DONATVS *Hist. mirab. Cent. 4. Obs. 23.* Rarum est, quod in M. A. N. C. *Ann. 3. Obs. 348 pag. 551.* refertur de muliere, quæ nunquam passa est menstrua, nisi fuerit gravida.

3. Primis post congressum diebus subinde horror aut horripilatio quædam, aut vagus frigoris sensus, corpus seu potius corporis peripheriam sine manifesta causa pererrare percipitur; aut saltem ipse mulieres dicunt se sentire, nescio quid? in corpore: ut plurimum tamen, uti dico, ille frigoris sensus, & horror seu horripilatio percipitur post conceptionem.

4. Succedunt etiam successivè symptomata varia circa stomachum ac digestionem: nempe primò appetitus est defectus, hinc vomunt omni manè, adiunguntur pica, fastidium alimentorum, in specie carnis, & nausea ingens esculentorum aliàs consuetorum, ita ut ne quidem odorem carnis, imprimis coctæ, subinde perferre possint. An locum huius appetitus ordinarii deperditi, succedere solet pica, & appetitus plane insolitus, aut intensior circa esculenta ordinaria: prioris est exemplum, v. g. quod habet FORESTVS de gravida uno mense, quæ unâ vice 12. halesces recenter salitos absque noxa cum egregio appetitu devoravit: posterioris exemplum est, quod refert SALMVTH

*Estimul. Oper. Tom. II.*

de gravida carbones avide comedente. Et quod non rigorosus sit Medicus in prohibendis talibus, quæ appetunt, modò non nimis excedant quantitatem; vix enim aliquod incommodum exinde sentiunt mulieres. Hæc symptomata, mox primis mensibus superveniunt, non ob sanguinem menstruum retentum, aut plethoram hinc incusandam, ut vulgò existimant; sed propter motum fermentativum menstruum humoribus adhuc impressum, (vid. VELTHVSIUS *de Genitat. pag. 138.*) vel certè sunt non tam ab humoribus contentis, quam propter consensum ventriculi cum utero, uti arbitratur MORISONIVS *de Morb. mulierum pag. 124.* Nam observantur semine, quæ simul atque gravidæ factæ fuerint, in primis diebus vomitu affliguntur, rejiciendo per os copiosa aquosa & limpida. Hæc tamen insequentur etiam sine ingravitatione simpliciter mensum propter naturalem emanationem.

5. Mulieribus, imprimis quæ aliquantulum sunt cacochymicæ, vel quæ inclinant ad scorbutum, factâ conceptione, superveniunt sæpius hysterici dicti affectus, licet alias nunquam fuerint obnoxie huic passioni: aded ut gravia abdominis tormina, cum respiratione nonnihil impedita, ac superveniente vomitu, & similia, post partum & contra nihil de affectibus hisce patiantur: Idque præsertim fit circa primos tantum menses, quæ tamen symptomata postmodum circa medium gestationis tempus spontè cessant.

6. Venter sensim attollitur ac intumescit ex utero distento, i. e. ab imo ad summum protuberat. Tumor ventris est circa regionem umbilicalem, & sursum tendit, partes inferiores manent in naturali suo situ, & tumor quidem est talis, ut imprimis circa lineam abdominis albam prominat, regiones vero laterales lumbares quodammodò equales & quasi depreste sint. Id quod probe observandum est, quò melius imprægnatio vera ab aliis tumoribus congeneribus uteri vel abdominis distingui queat. Observandum tamen, quod pro situ vario fitus, & uteri etiam tumor nunc plus nunc minus protuberet.

7. Circa medium gestationis tempus tertio & quarto mense percipitur motus infantis, isque modò in hac, modò in ista parte, præsertim quarto, aut in principio quinti mensis; qui motus est in principio saltem obscurus & subsultorius, successivè tamen magis fit manifestus. Sed nec hoc semper contingit; sunt enim mulieres, quæ motum fœtus percipiunt citius, & aliæ, quæ tardius: Sic quædam tertio mense, quædam nono saltim mense, fœtus motum demum percipiunt, & nihilominus tamen brevi post feliciter pariunt. Contingit hoc imprimis illis, quæ sunt ferossiores & aquosiores, in quibus copiosus chylus nutritivus transcolatur per uterum: in his ex abundantia talium aquarum uberiorum, ut vocant, seu liquorum, quibus fœtus includitur, quarum copia uterus ita impleri & distendi potest, ut mater motum fœtus non percipiat; imprimis si hic ipse forsitan simul debilius paulò fuerit. Retardatur etiam aliàs à matre febriente motus, teste BARTHOLINO *Cent. 1. Hist. Anat. 96.* ubi observavit in muliere febriente motum fœtus demum post vigesimam septimam septimanam. In feminis etiam pinguiusculis accidit, ut hæc motum fœtus minus vel tardius percipiant. vid. BARTHOLINVS *Cent. 5. Hist. 78.*

8. Denique sæpius primis mensibus gravitas capitis & vagæ vertigines, imò sæpè etiam dolor dentium admodum molestus, & similia, superveniunt.

Ex quibus similibus signis probabiliter conjecturari solet, feminam esse gravidam: quæ conjecturæ ed sunt certiores, quò circa medium gestationis tempus, in fine quarti & principio quinti mensis, motus fœtus percipitur. Additur in mulieribus propria uniuscunque idiosyncrasia; & hoc est, quod Praxin mulierum reddit adeò difficilem. Mulieres, quæ semel conceperunt, alio tempore vix falli possunt. Vulgò tanquam primarium signum recentem retentionem spermatis seu genturæ virilis in utero, ita quidem, ut post peractum complexum mulier non sentiat denudè excerni maris genituram: Hoc an verum sit? & an unquam contingat? vehementer dubito: cum nihil de genitura maris propriè sic dicta ad constitutionem fœtus concurrat, aut admodum dubium sit, an gutta ejus in uterum recipiatur? Sanè cum consideramus ovipara animalia, v. g. gallinæ, constat, de huius genitura materiali nihil (distinguendum enim materiale à spirituali) permisceri ovis secundis: Sic etiam pisces ovipari generant ova, quæ tantum resperguntur aut quasi irrorantur à genitura piscis maris. Ova ista, quæ irrorantur, secunda sunt, & dant pisciculos; quæ non irrorantur, fatiscunt, & non



sunt secunda. Idem potest observari in papilionum genere, in specie bombyce: hujus foemella copiosissima generat ova, postmodum in coitu foemella ova hæc excludit, quæ à tenui subrubicundo, aut nonnihil flavescente liquore seu genitura maris resperguntur; & quæ ita respersa sunt, sunt secunda, & dant novaserucas, hinc papiliones; quæ non adsparguntur, manent infœcunda.

Stante ergo hypothesi, mulieres generare ova (de quo postmodum) quæ fecundantur tantummodo à spiritu genitali maris, tanquam ova gallinæ à gallo, citra materialem genituræ propriæ sic dictæ contactum: certè illud signum, si mulier retineat genituram seu semen virile, tanquam falsissimum sponte corrumpet.

Unum saltem habent argumentum contra hanc opinionem, quod etiam semen maris necessario simul concurrat: nempe similitudinem fœtus, qui sapius patrem, non minus quàm matrem, referat, ex qua materialem genituræ maris commissionem concurrere putant: Sed plumbeum est & elumbe hoc argumentum: Nam gallinæ non minus referunt patrem gallum, quàm alla animalia vivipara, & nihilominus tantum ex Observationibus Harveyaniscertum est, quod de genitura galli nihil ingrediatur aut ovum, aut ovarium gallinæ. Deinde imaginatio materna signat fœtum, ut nunc fraga, nunc mora, nunc mures, in certis corporis locis depicta aut genita reperiuntur. Imaginatio hæc, quæcunque ratione hoc faciat, citra commissionem materialem hic operatur, ita ut nihil materiei præ talibus excrecentiis communicetur fœtui. Unde etiam fœtus potest esse similis patri, ut ut nihil de genitura ejusdem ad constitutionem illius concurrat.

Conceptio autem hæc læditur quatuor modis:

1. Quando est *falsa*, ita ut mulier quidem se æstimet gravidam, cum tamen non sit: quod fieri solet in Inflatione uteri; item in *hydrope* uteri, quæ sub forma gestationis mulieres decipiunt.
2. Imminuta, ita, ut sit vel nulla, vel admodum *rara* in sterilitate.
3. Quando est *aperta*, & copiosi fœtus concipiuntur, gestantur, & excluduntur una vice.
4. Quando est *depravata*, ut est in Mola.

## C A P U T I.

### D E

## CONCEPTIONE FALSA.

### A R T I C U L V S I.

### D E

## UTERI INFLATIONE.

**H**As inter conceptiones falsas, quæ sæpius mulieres fallunt, est *Uteri Inflatio*, seu insignis ejusdem intumescencia à *flatus* in cavitate uteri collectis. Dubitant autem *Practici* quidam, an possint contineri *flatus* in uteri cavo? Sed utique verum est, quia quædam post remedia copiosus flatus ex utero emisserunt. *Uterus* ergo inflatur intumescit, & non tantum tumor abdominis, non secus ac in gravidis, sensim sensimque augeatur; sed *menses* etiam simul supprimuntur, aut parcius saltem nonnihil fluere solent; quin & *lac* in tallum mammæ genitum observatum fuit; Unde tandem tales mulliculæ se gravidas firmiter credunt. Interim tamen nihilominus interdum fit, ut *ultra solum partus tempus* ad annum integrum, imò ad biennium, se utero concepisse ita sibi videantur, & postmodum vel *medicamentis*, vel *superveniens* doloribus parturientium, aut etiam interdum sine his, excludant ex utero solummodo aliquos bombos & *flatulencias*, subsideatque denuò venter, & patet tunc vel sponte *salutis* putata conceptionis; Unde hic affectus etiam à quibusdam *mola ventosa* seu *flatusa* appellari solet. Interdum, verò sine manifesta tallum flatum eruptione impetuosa *sentim* & insensibiliter omniino flatus exhalant, venter subsidet, & nesciunt tunc temporis mulieres, quid cum fœtu de conceptione factum fuerit? Vid. exempla in GABELCHOVERO *Cen. 1. Cur. 25.* HOECHSTETTERO *Decad. 6. Obs. 4.* WELSCHIO in *obstetricum l. p. 380.* SENNERTO de *Morb. Mulier. lib. 4. P. 1. c. 10. ubi de Uteri Inflatione*, M. A. N. C. *Ann. 6. Obs. 45.* & HARTMANNO.

## C A U S A.

Inter *Causas* huius Inflationis, quæ mulieres sæpius decipiuntur, *primariæ & frequentissima* est *susceptio aeris frigidi externi* in uterum, idque imprimis *post partum* aut *abortum*, intra aut *post menses*, *post usum balnei*, &c. quales *historias* videbitis in FORESTO *lib. 28. Obs. 38. & 39.* atque SALMUTH *Cen. 2. Obs. 57.* Dum enim citò nimis aëri externo se exponunt mulieres, non bene circa genitalia munitæ, subindè in tantum inflatur uterus, ut quasi denuò *se-*rum gerere videantur: quod si fiat, ut simul supprimantur *lochia*, dolores acerbis & crudelissimis totum abdomen cruciantes sunt conjuncti: Imò etiam interdum, si *post peractum debitum lochiorum fluxum* in secunda *post partum septimana* mulier audaciùs paulò aëri libero se exponat, ventus in utero nondum perfecte clauso, sed adhuc connivente, susceptus, in loco isto calido ubi ore dilatatione turgescit, & tandem talem uteri & abdominis tumorem & distensionem successivè infert. Rarius enim à causa interna citra talem causam manifestam externam accidit talis uteri Inflatio, & serè sequitur *conceptionem falsam*, videturque fieri *occasione genituræ maris*, sine conceptione in utero contentæ, seu vix solet observari, nisi forsitan parvus quidam uteri *hydrops* conjunctus, aut ejus principium statuum copiam simul inducat, quæ aliàs pura talis Inflatio citra ullum mætiæ concursum aut collectionem rariùs reperitur. Attendendum tunc simul ad primas vias, & digestionem ibidem peractam, circa quam serè statuum proventus copiosior observari solet.

## D I A G N O S I S.

Quod ergo attinet *Signa* hujus Inflationis uterine: tunc intumescit quidem successivè uterus, utrum non præcisè prominat in medio abdominis, sed potius in omnes dimensiones abdominis se expandit; & cum contenta flatulentia nunc augeatur, nunc imminuatur, nunc magis se expandat, nunc minus, etiam uterus nunc plus nunc minus turgidus & extensus apparet. Adest præterea simul vitium quoddam in hypochondriis & stomachi digestionem, dum circa ista loca flatus & brachyrgmi copiosiores non raro perferuntur. Præterea insignis tensio dolorque sensibilis uterum occupat, adeò ut dum tumor premittur, exindè doleant mulierculæ propter nimiam distensionem: quò & nullus motus scetus, aut similis in talibus percipitur subiectis, & quando femina se volvit in hoc vel illud latus, uterus eò non volvitur, sed manet in loco.

In hac Inflatione *Uteri* considerandum, est, ut probe distinguatur à conceptione vera: ob id probe observanda sunt omnia indicia & signa, in specie *causæ antecedentes*, ex quibus aliàs concludere potest mulier se, esse gravidam, quorum uno alterove absentibus, Inflationis saltem suspicio oboritur. Et quidem distinguitur in eo, quod

1. Flatus, cum nunc minui, nunc augeri, nunc magis dilatari, nunc magis condensari, nunc plus minus distendere partem inflatam soleant, uterus etiam vi eorum elasticà nunc plus minus intumescere, aut detumescere videbitur: secus ac fit in vera *ingravidatione*, ubi tumor æqualis est, successivè accrescent.
2. Quando observat mulier *mediæ gestationis tempore* motum aliquem, sedulo attendendum, an motus sit genuinus ex fœtu, nec ne? Nam ut ut palpitatio- nis aliquis sensus, si abdomen fortius manu comprimitur, percipitur, isque ex flatuum saltem impetu oritur; præterea quoque distensus ac inflatus tympani, vel vesicæ protuberans magis videtur uterus, quàm revera à fœtu contento fieri assolet: vid. M. A. N. C. *Ann. 1. pag. 14.* Ad hæc
3. In uteri Inflatione distensio abdominis est multò major, quam in legitima gravidatione: è contra pondus est minus, quam in legitima conceptione, & vulva minus gravata minusque pressa sentitur. Interdum, sed rariùs, manu percussus venter inflatus tympani, & sonitum edere videtur. Verùm in conceptione *involens* est minor, & in specie pondus est majus; uterus & abdomen compressa *primò cordis*, sed successivè colluntur iterum.



## PROGNOSIS.

Quod attinet *Prognosis* : Inflatio uteri per se raro aliquid periculi infert, cum interdum vel sponte cesset : sin verò mox à puerperio contingat, & impediat mensium vel lochiorum fluxum, per accidens solet gravissimos in utero dolores & alia mala excitare, & tunc res est satis periculosa, quicquid SENNERTUS alique contraxerint. Vid. FORESTUS lib. 28. Obs. 28.

## CURA.

Quod ergo attinet *Curam* : Flatus uterum distendentes eiiciendi sunt aperto uteri orificio interno, & discutiendi. Cum verò frequenter simul adsint signa vitiatæ in Romacho digestionis, & oborientium hinc copiosiorum flatuum, propterea debitis *Alterantibus* & *Laxantibus* stomachum & primas vias, est corrigenda. Modum hujus curæ vid. in FORESTO l. 4. Obs. 39. & TIMÆO von GuldenKlee in *Cas. pag. 203*. Pro his scopis, si malum oriatur ex purgatione post partum vel menstrua actu suppressis, vena saphæna ferè incidi potest. Hinc inter remedia, quæ huc conducunt, ordinariò sunt & *carminativa aromatica dicta*, aliàs nota : Primatum obtinet *castoreum*, & omnia *castorina*. Flores *chamomilla*, tam vulgaris, quàm etiam *Romanæ*, quacunque ratione usurpati internè & externè mirè conducunt in hoc affectu ; *Decoctum* scilicet, aut essentia, & oleum destillatum saphirinum ex his parata : Nam conducit hæc chamomilla etiam egregiè in Inflatione uteri mox post partum, & ubi lochia suppressa crudeles minantur dolores. Addi huic chamomillæ, in specie *Romanæ*, potest pro varietate circumstantiarum etiam *rosmarinus*, *matricaria*, *pulegium*, *salvia*, &c. *Decoctum calendulæ* florum, *chamomillæ*, *senecionis* &c. item *radix helenii*, *zedoariæ*, & *gentianæ* ; semina itidem 4. calida majora seu *carminativa*, cum galanga & zingibere, ex quibus conveniens vinum medicatum ad imitationem TIMÆI von GuldenKlee confici potest ; macis in vino cocta, decoctum nucis moschatæ cum matricaria in vino &c. oleum destillatum macis, spiritus carminativus vel aromaticus Sylvi, vel de tribus D. Michaelis, spiritus aut essentia zedoariæ, item spiritus & essentia robjuniperi cum essentia castorei crebrius usurpata, sunt egregia. Ratione *stomachicæ* præ cæteris conveniunt remedia *sassafras*, decoctum nempe ligni *sassafras* cum *Carminativis* haustum, & ab omni pastu assumptum *Tragema*, v. g. ex zedoaria & cardamomo, quibus additur *Elaeacearum caryophyllorum*, *elaeacearum macis*, cumini, carvi, &c. TIMÆUS von GuldenKlee lib. 4. *Cas. 3*. cum fructu usurpat decoctum ligni *sassafras* & ligni sancti cum seminibus anisi, fœniculi, & similibus carminativis, per integrum mensem, exhibendo sub introitum lecti essentiam zedoariæ.

Sed hæc & similia *Carminativa interna* per se patent.

Hiscæ pro scopo blandè abstergendi *Purgantia amara*, species hierarum, massa pilular. de hiera cum agarico, extrahum elaterii subjungenda.

Externè conducunt imprimis fœtus & sacculi abdomini instrati ex chamomilla parati ; in specie si fiat ex milio, & sale tosto, cui addantur postmodum chamomilla & semina carminativa : coquantur hæc in vino & aqua, & sic sacculus admoveatur regioni pubis, seu uteri extensi. Item litus cum oleo chamomillæ, castorei, lauri, &c. addi possunt. In specie præmissa Inflexu seu Semicupio in decocto chamomillæ hujusmodi litus applicatus convenit, in lectum benè calidum immittendo postmodum agrum, &c. Sunt qui cataplasma ex stercore caprino cum seminibus carminantibus in vino coctis paratum ceu singulare non citra rationem laudant. Item emplastrum de baccis lauri & gummi carannæ, malaxatum cum f. q. Balsami Peruviani aut oleo destillato baccarum juniperi, insternatur abdomini : emplastrum quoque ex galbano & tacamahaca, malaxatum cum oleo destillato chamomillæ, vel cum oleo fœniculi, cumini, macis & carvi. Expertissimum est, & quod tam à SOLENANDRO Seli 5. Conf. 15. & HARTMANNO Praxi p. 27. quàm LINDANO, & aliis commendatur, suffitus nucis moschatæ per infundibulum utero exceptus. Modus utendi vid. in HARTMANNI Prax. Chymiatr. p. 279. ubi de Inflatione uteri. Convenit etiam vapor salis ammoniaci genitalibus exceptus, de quo vid. SYLVIUS M. M. lib. 2. c. 21. §. 18. Aliis irritis imprimis Theriæ conducunt ad flatulentiam uteri curandam.

Estmull. Oper. Tom. II.

## ARTICULUS II.

## DE

## UTERI HYDROPE.

POST inflationem uteri non raro etiam Hydrops uteri seu tumor ejus aquosus feminas decipit, ut se gravidas æstimant, qui non est adeò rarus : Vid. SENNERTUS de Morb. mul. cap. 11. Verùm quia de hoc Hydrope uteri confusè admodum loquantur Autores Prædici, propterea doctrinæ mellioris gratiâ distinguo *hydropem uteri* propriè dictam à *mola aquosa*. Ille, nempe Hydrops uteri, est rarior : Hæc, sc. *mola aquosa*, est frequentior. In illo copiosæ limpidæ aquæ, rariùs crocæ, in utero collectæ, cum tumentem reddunt : Hic verò in mola aquosa liquor ut plurimum nonnihil viscidus & subindè aquosus, membranâ inclusus propriâ, & quidem nunc unâ, nunc pluribus distinctis, conservatus, ita ut tot vesiculas, modò majores modò minores, representet, foras excluditur ; unde etiam à quibusdam Hydrops uteri vesicalis appellatur. Talis mola periculosa, seu Hydrops vesicalis illudre exemplum habet TVLPIVS lib. 3. Obs. cap. 32. item SCHENCKIUS l. 4. Obs. de mola.

Hæc posterior species molæ aquosæ ad doctrinam de molis pertinet, estque, ut obiter moneam, facta quædam conceptio, ovique uterini imprægnatio, sed in quo postmodum fuit læsa & destructa debita conformatio, affluente adhuc humore nutritivo, pro formatione & nutritione fœtus, qui sensim membranam vel unâ, vel hæc disruptâ & divisâ, pluribus distinctis membranis collectus, molam vesicalem, vel aliam molam aquosam representat, ut in specie de molis dicitur.

## CAUSÆ.

Verum autem & propriè dictum Hydropem uterinum, quod attinet, seu copiosam aquarum in utero collectionem & stagnationem : causæ hujus sunt variae. Antecedentes præximæ sunt in triplici differentia. Nempe 1. interdum conjunctus est hydrops uteri cum conceptione & gravitatione vera, adeoque cum fœtu vero, quale exemplum videbitis in DONÆO Obs. 49. in Schol. PRIMÆROSI lib. 1. c. 7. SCHENCKIO Obs. p. 62. & in HILDANO Cent. 2. Obs. 36. ubi mulieri gravidæ primæ parturienti lxxvij. aquæ limpidissimæ ante partum effluxere, ultra quam copiam aquæ ulterius adhuc lxx. aquæ fœtum comitatur sunt, donec tandem ipse fœtus vegetus supervenit : Vid. etiam SALMVTII Centur. 1. Obs. 59. quod notabilis adhuc est, ubi mulieri gravidæ aquæ ad lxxv. effluxere, qui fluxus aliquot dies continuavit, donec resorcitata matre ipsâ sexto mense post fluxum filiolus vivum & benè valentem pareret. Talis Hydrops cum gravitatione conjuncti origo est abundantia liquoris istius limpidi & albicantis seu chylosi nutritivi, sed in talibus subiectis copioso vehiculo aquoso diluti, qui pro nutrimento & augmento fœtus affluens ad uterum seceratur, qui non totus in alimentum fœtus cedens, donec tandem uberius congestus talem molam constituit. Vnde, uti non raro causa est, quò minus motum fœtus mater perferat ; ita, ubi copiosior congestus fuerit, ruptâ membranâ extimâ fœtum cingente, aut aliquot menses ante partum, aut in partu ipsò ante fœtum, copiosius erempt, salvâ matre & fœtu. Forsan etiam est vitium in vasis lymphaticis, quibus obstruatis lymphæ uberius congesta, molam hanc constituit. Prousergo Prædici observetur, si ante partum erumpat, cautus sit Medicus, ne abortum instare, aut, ut mulierculæ clamant, molam aquosam adesse, statim existimet, quin omnia prius benè perpendat, ut analeptici matremque roborantibus potius insistat, quàm temerè quipiam inchoet. In habitioribus enim fit, ut aquæ in chorio inclusæ effluant, reliquis in corpore restantibus, quod fit sine nocumento : Si verò ex amnio, abortum infert.

2. Deinde Hydropem uterinum etiam interdum inferunt menses & lochia suppressa, eaque vel planè non, vel parèe admodum fluentia, (vid. TVLPIVS lib. 4. Obs. 45.) ita ut sanguis licet primò effluerit, materia tamen ista serosa & quasi lactea, quæ hinc succedit, remaneat, cum coëreatur ; successivè congesta uterum in tumorem attollit, & hydropem constituit : cum quali hydropem subindè simul ex fermentatione retenti liquoris flatu conjuncti esse solent,



adeoque cum *Hydrope* Inflatione uteri est conjuncta. In talibus *Hydropicis* ordinario postmodum fluunt menses, & tamen uteri tumor & abdominis remanet; imò observatum fuit, quod tales denud conceperint & pepererint, & secundo deum partu copiose effluerint lochia cum ventre & utero detumesciente: Imò non raro fit, ut suppressa talis evacuanda materia aliò ruat, & in aliam quandam partem per metastasin congeratur, & ibi liqueat in *materiam serosam*. Exemplum hujus est in *Ephippiarii* cujusdam muliere hujus urbis, in qua lochia post binos partus ex toto suppressa fuerunt: brevi post insigniter intumescit abdomen, ita, ut in summum ejus perciperet fluctuationem aquæ; menses tamen debite fluebant, denud concipiebat: tertio partu lochia rursus suppressibantur: Tumor abdominis insigniter accrescebat, quod in erecta ad genua ferè propendebat, ut abdomen in fasci gestare necesse haberet, ita, ut umbilicus sedenti versus genitalia incumbere: cætera erant plana, saltem instar sacri amplius propendans abdomen intumuerat, quem saccum quaque aquis repletum in lecto decumbens nunc ad hoc, nunc ad illud latus seponebat: candelæ admodum translucebat: Erat *hydrops omenti*: omnia lochia suppressa per metastasin erant collecta, & in hujus duplicatura coactura per sui corruptionem in liquamen serosum alterata fuerunt ita, ut exactè ad peripheriam omenti tumor immensus in abdomine sentiretur, unde etiam nec mensium excretioni, nec conceptioni, aut partui impedimento fuerat: Hinc neque Purgantia, neque sudorifera conducebant: Suadebam paracentesin, ad quam tamen admodum erat obstinata, post moriebatur. Facit huc singulare & curiosum exemplum *JOB van Meeckern Obs. cap. 49.* qui observavit in muliere hydroper insignem, saltem collectum in duplicatura peritonæi inferiore, ex suppressis mensibus natum.

3. Denique observatur subindè hydroper uteri sine gravitatione, rarius licet detur, quando nempe in utero colliguntur spontè quasi & subindè à causa interna, cumque perquam tumorem & inflationem reddunt; qui tamen ut plurimum ob mensium suppressionem contumacem, aut impeditum in lymphæ ex utero refluxum (vasa lymphatica ex utero vidit *MEECKERN*) aut simile vitium internum quoddam interdum præsupponit. Facit huc imprimis hydroper abdominis observatus ex mensibus suppressis, in quo collecta fuit materia in duplicatura peritonæi: item facit huc Hydroper cornuum seu tubarum (in brutis dicuntur cornua, in hominibus tubæ uterinarum, qualem singularissimum observat *TULPIUS lib. 4. Obs. cap. 34.* Forfan intelligit hydroper collectum in alis vesperilionum.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet *Signa*: Signa hydroper uteri accuratè percipiet *HIPPOCRATES de Morbis mulierum*, dum inquit: „ Si *hydroper uteri* adnascatur, menses pauciores & parvi sunt, & ante tempus deficiunt, imus venter intumescit, mammae solidae aliaque molliores sunt, lac nullum habet, ut uter putet, se in ventre habere. Scilicet cognoscitur imprimis hydroper uteri:

1. Ex tumore, qui primario hypogastrium occupat.
2. Ex fluctuatione, quando tumor tangitur, aut se movet mulier.
3. Ex indolentia loci pressi, quod nullus adsit dolor seu tensio.
4. Ex insigni gravitate vulvæ seu sinus pudoris à pondere materiæ incumbentis.
5. A delapso in latus secundum motum mulieris decumbentis.

Apud omnia necesse est, ut probè cognoscat *Medicus diffinitionem hydroper uteri*, qualiscunque fuerit, à vera conceptione; ut ut res sit ardua: nempe ex eo ferè suspicio est, esse *Hydroper uteri*, quando

1. Tumor aliquantè distenditur juxta uteri & ventris amplitudinem, nec sit acuminatus, ut in vera conceptione; cum in conceptione anteriora versus promineat.
2. Si mulier adultior sit, & quæ amplius non concepit, & simul sit bono faciei colore, ferè hydroper uteri innuit.
3. Si alia signa mulieris gravidæ absint, & uterus tamen intumescat, suspicio est de hydrope uteri.
4. Si decimus gestationis putativæ mensis sit præter-

lapsus, tunc etiam suspicio adest, adesse veram conceptionem.

5. Si natus metus factus conveniens unquam perceptus fuerit.
6. Si mulier sub primo gestationis putativæ tempore commodè se habeat, nec alia indicia, præsertim primis mensibus familiaria, gravidarum symptomata non observata fuerunt. Vel
7. Si patiatur symptomata, & hæc post medium gestationis tempus non cessent, signum est, esse vel hydroper, vel inflationem uteri.

Ab abdominis vero Hydroper uteri discernitur, si color faciei est bonus, sitis nulla, tumor incipit à parte inferiore, & ascendit in medio sui versus superiora, &c.

### PROGNOSIS.

Si è sola contenta lymphæ oritur, diuturnus quidem, sed abique periculo, esse solet: Si verò liquor contentus sit pravus seu vitiosè corruptus, periculosum malum propter varia hinc inde symptomata esse solet, quod tandem ad mortem usque deducit mulieres.

Si mulier post conceptionem hydroper uteri corripiatur, fœtus intra aliquot menses ab illuvie humorum ferè enecatur, adeoque abortu rejicitur; raro enim ad legitimum partum tempus servatur.

Observandum quoque est, quod post fluxum aquæ tandem intereant mulieres.

### CURA.

Quoad Curam: ubi constiterit per conjecturam esse collectionem copiosarum aquarum in utero, considerandum est, an sint cum fœtu, aut absque eo? Si cum fœtu, parum aut nihil omnino tentandum est, sed relinquatur mulieri aut saltem blandis *Hydragogis* sic dictis, blandè & quasi per epicrasin evacuandum est nonnihil serum copiosum. *Diuretica* non sunt cura, quia stimulant menses, & metus est abortus. Sin verò nulla suspicio sit de fœtu, sed vel molam, vel pura liquamina adesse conjecturæ sint, tunc maturè & audacter fortioribus Purgantibus stimuletur uterus & partes vicinæ, ut aqua evacuetur, & Sudoriferis, Diureticis, & in specie remediis fortioribus fœtum per lentibus, urgeatur uterus ad excludendas aquas: Ubi verò constiterit, esse aquas, aut hydroper vesicalem, in utero, necesse est, ejiciatur.

In genere eadem remedia, & eadem methodus medendi adhibenda, quæ aliàs in hydrope ascite sunt laudata: hinc imprimis Purgantia conveniunt, inter quæ eminet extractum elaterii, quod cum *Mercurio dulci* aliquoties potest propinari. Convenit etiam radix esulæ, ejusque Infusum & Extractum, item radix bryoniæ ad ʒss. in Infuso, vel ejus Syrupo ad ʒss. Radix ireos nostratis in lacte coquatur, succus expressus propinetur. Item resina jalappæ, & resina gummi de Peru conducunt. V. g. fiat Purgatio per pilulas:

24. Extr. elater. gr. xij. ad xv.

Mercurii dulc. gr. xv.

Troch. alband. vel eor. extr. gr. liij.

Cum spiritu rosæmar. vel ess. lign. f. Pilulæ:

D. S.

Pilule abducentes.

Quæ in muliere supra allegata sine molestia evacuatione massam nigram, atramentum instar, 6. vel 7. vicibus.

Vomitoria propter nilum, quem exferunt, ferè ad omnibus commendantur: in quorum locum acres saltem clysteres, uterum simul stimulant, etiam injiciuntur commodè; quin & clysteres uterini purgantes.

Juxta hæc, Evacuantia etiam sunt usurpanda Interna, uterum irritantia, & excretionem contentorum sensilem promoventia, aut insensibiliter discutientia: qualia sunt Decoctum nepethæ, pulegii, & cepæ albæ cum saccharo, quod copiose expellit aquas, teste *ZACUTO LUSITANO lib. 2. Prax. Admir. Obs. 144.* Item borax cum croco & extracto sabinæ succoso redigatur in bolum, quem commendat *RIVERIUS*: Castoreum, myrrha, crocus, aromata quælibet, elixyr proprietatis, rosmarinus, calamintha, salvia, &c. & ex his parata remedia plura. In fine Decoctum lignorum usurpari potest; sicut ad præventionem species diacurumæ cum vino Malvatico pro corroborando utero commendat *ZACUTVS LVSITANVS lib. 2. Prax. Admir. Obs. 143.*

Inter



Inter *Externas* conveniunt imprimis *Pess* purgantes & stimulantibus: v. g.

*℥. Elater. 3℥.*

Cum *caricay. q. f. f. Pessus: D. S.*

*Pessus matricalis.*

Item

*℥. Colocynth.*

*Extr. bellad. nigri an. 3℥.*

*Pulp. caricay. pingv. 3℥. vel f. q.*

*F. Pessus. D. S. ut antè.*

Item *Injectiones* seu *Clysteres* uterini, parati ex decocto foliorum pulegii, sabinae, calaminthae, &c. in aqua & urina humana coctis, Eleqtuario hierè simplicis imprægnatis, injiciantur.

Vel

*℥. Fol. Mezer.*

*Rad. ieros. nostras. an. m. j.*

*Coqu. in f. q. aquæ Colatura D. S.*

*Clyster matricalis.*

Injiciatur in uterum pro illo stimulando ad reddendas aquas.

Præstat etiam ante horum applicationem prius *Balneis* & *Infectionibus* blandè *Emollientibus* & leniter *stimulantibus* fomentare uterum & genitalia ad meliorem excretionem: quibus subjunguntur *Litus* ex oleo irino, cheirino, laurino, destillato anisi, carvi, sabinae: vel cataplasma imponendum tumori ex foliis & radicibus bryoniae, angelicae, ieros nostras, cum calamintha, rose marino, sacureja, additis floribus calendulae & croco; vel ex stercore caprillo, fermento & sapone, quod suadet *JOEL in sua Praxi*: Item *Emplastrum* de baccis lauri, & hydropicum Augustanorum, vel de stercore caprillo cum castoreo imponi potest. *Thermæ* etiam sulphurem hic locum suum inveniunt.

Rarum est, quod refertur in *BARTHOLINI AB. Med. Hassniens. Volum. 1. pag. 194.* de hydropce dextrae tubæ uteri, paracentesi curato.

Sed hæc & similia ex cura *Hydropis* antea sunt cognita.

### ARTICVLVS III.

#### DE

#### HYDROPE PUDENDORUM.

**P**ropter argumenti affinitatem observandum est, graves subinde circa labia pudendorum intumescere, adeoque hydropem particularem labiorum pudendorum, nunc utrorum, nunc alterius, pati. In tali casu *Forus* discutiens ex aqua calcis vivæ est egregius, teste *LYSERO in Obs. Cultr. Anasom. p. 279.*

### CAPUT II.

#### D II

#### CONCEPTIONE IMMINUTA ET ABOLITA.

**O**ccasione læsæ conceptionis dixi de Inflatione uteri, & de Hydropce uteri. His præmissis, pergendum est ad læsiones ipsius conceptionis ordinariæ, ita ut nunc desceat in sterilitate, nunquam augentur, partim in Partu multiplici, partim in superfatatione, quando semel concepto foetu, repetito coitu, novus foetus concipitur.

### ARTICVLVS UNICUS.

#### DE

#### STERILITATE.

**C**onceptio læsa, ita ut rara aut etiam nulla sequatur, repetito licet coitu, vocatur vulgò *Sterilis*.

#### CAUSÆ.

Hujus sterilitatis *Causæ* tantum non innumeræ, & subinde imperscrutabiles sunt: nam ex parte viri potest esse vitium circa seminis seu genituræ generationem & excretionem: ex parte feminae vel vitium in ejusdem vel ovario non rite generante ova; vel in tubis uterinis angustis, tumore obles-

sis, obstructis &c. (vid. *VESLINGIUS Anat. lib. 7. Tulpius lib. 4. Obs. 42.*) in utero scirrholoso, aut calloso & cartilagineo, (vid. *BONETI sepulchretum lib. 3. S. 34. Obs. 4. S. 2. & RIO-LANUS Anthropol. lib. 2. cap. 32.*) non rite fovente ova fecundata, ipsique annexa vaginæ: in conceptus retentione aut excretionem, &c. hinc est, quod sæpius, imò ordinariò ferè, post abortum laboriosiore feminae postmodum fiant steriles: quò pertinet vitium ex sanguine ad uterum non rite distributo. Item ex parte utriusque simul potest esse vitium absolute, utriusque respective, (respectiva est certa & requisita proportio spiritus genitalis maris ad ova fecundanda,) hoc est cum utriusque femina, quod crebrò observatur, generare non possit, qui tamen cum alia optimè generat; & contra potest esse, ut femina cum hoc mare sit infecunda, quæ postmodum alii nupta satis fecunda sit. Nam & omnes Practici, tam veteres quàm Moderni, in hoc unanimiter censuerunt & consentiunt, requiri certam inter marem & feminam, quoad generationis negotium, proportionem & harmoniam, ut ovum feminae spiritus genitalis maris in motum cedere possit. Sed qualis hæc sit? & in quo consistat hæc proportio & harmonia? à nemine huc usque explicari potuit; Nec explicare ego id mihi præsumo. Res se videtur habere, ut scintillulae, quæ recipiuntur à fomite: Scintillulam repræsentat spiritus genitalis maris, fomitem verò ovum uterinum: Quando ergo fomes est pinguis, & scintillula non rectè lucida, non potest concipere ignem: Sic quando spiritus genitalis minus est volatilis & activus, & ovum non rite formatum, deficit fecundatio.

In specie tamen magis in sexu femineo, quàm masculino sexu, causam sterilitatis propriè latere, ex eo confirmatur: quod major apparatus sit in feminis, quibus variè læsis frustratur conceptus; & contra vitium in viro sit primario unicum, & imprimis in femine lateat, ex quo vitiato generationi est ineptus: Nam membri vitia aut parum obfunt, aut faciliè corrigi, aut emendari possunt. Unicum ergo vitium est in genitura maris, si aut deficiat, aut nimis aquosa ac tenuis, atque minus spirituosam sit, quod faciliè ex congressu patet: qui si languidior sit, aut diutius cum radio protrahatur, minus spirituosam, & ob id ferè defectuosam genituram innotuit. Hinc frequentissima causa sterilitatis in maribus est, si nimis citò veneri indulgere incipiunt, & sub primis pubertatis annis crebrius eandem exercere solent; enervantur enim ferè sic testes & ceteras partes genitales, unde postmodum minus secundi tales fiunt. Feminae contra, quæ & concipere, conceptum fovere, & tandem excludere debet, variis ac multiformibus, & ovarii & tubarum seu oviductuum, & uteri, & vaginæ, omniumque harum diversarum partium imò totius corporis vitiis, laborare potest, ut utriusque optime se habeat, & per consequens ob id conceptionem frustrari: Item sub gestatione variis infortunis & rerum non naturalium insultibus est obnoxia, ratione cujus conceptum potest minus commodè fovere, ac retinere. Et quidem præ ceteris internis ferè & lætioribus causis in feminis accusatur defectus genituræ, qui ex modernorum hypothesei in ovulorum vel defectu, vel deficiente in uterum injectione, vel eorum ad fecunditatem concipiendam ineptitudine, consistit. Hinc accusari solet in feminis defectus materiæ chylosæ, ex qua albumen, ut fœdica, seu incrementum ovi uterini, & tandem nutrimentum fœtui in utero, suppedietur: hinc enim nutrices, aut mulieres quæ lactant, rariùs concipere solent, aut conceptum fovere, dum lactatione istà adhuc occupantur. Par ratio est in nimis pinguibus, cum materia albuminis istius in supplementum pinguedinis suppedietur, & ipsæ etiam minus secunde observentur, cum nutrimentum chylosum pro humectatione uteri ac fœtus nutrimento, in talibus ob corporis uberiorem nutritionem ferè deficiat: hinc ulcera manantia inveterata, aut fistulæ & fontanelle uberius fluentes, massam sanguineam exhauriendo, ad sterilitatem disponere dicuntur: conf. *Sennertus l. 3. Præpag. 946.* & *Hæferus Herc. Med.* Imò macriores etiam & aridiores feminae, rubicundæ, & ut vocantur, cholerice, interdum minus secunde esse solent, ex ovulorum partim ineptitudine ad fecundationem, partim ex defectu albuminis ad ovum fecundandum necessariè: Ut taceam uterum in talibus, partesque genitales æternas, minus apte ad congressum secundum esse dispositas; hinc enim virgines adultiores non tam faciliè secunde esse solent, utero talium aridioris & quasi ex succo existente, adeoque ad fomentationem ovuli minus apto. Ulterius & ipsa uteri membranosa structura vitiata, nimis laxa sc.



laxa sc. & flaccida, & cujus imprimis orificium internum apertius minus conuoluet, etiam insigniter ad sterilitatem disponit, quia ovula non continere, aut sinu suo fovere solet. Et hoc observare datur in mulieribus cachecticis fluxu albo laborantibus, hæmorrhagiâ uteri nimia ex sanguine serosiore afflictiis, & similibus. Vocant hoc vulgò intemperiem uteri frigidam & humidam, aut inundationem ejus ab excrementis serosis aut pituitosis. Unde imprimis, qui albo fluxu diutius laborarunt, minus fecundæ, quin sæpius steriles esse soleant. Pertinet huc conformatio vitiosa: Sicut tumores orificium uteri internum obsidentes, scirrhi orificii interni, item hujus laceratio, quæ sit in difficili partu vel abortu, mulieres reddunt steriles, quatenus impediunt retentionem ovi uterini & fetus.

Denique externa quædam à quibusdam, seu conceptionem impediunt aut eundem jam factum tollentia, allegantur, quorum tamen fides sit penes Autores: qualia sunt, v. g. abusus borrachæ ante vel post conceptum assumptæ, quæ ad sterilitatem seu conceptus impedimentum disponere dicitur: Decoctum salicis junioris, aut aqua seu liquor limpidus ex salicibus tenellis incisus emanans, vel succus expressus, jejuno ventriculo aliquoties epotus, appetitum Venereum extinguere, conceptionem impedire affirmant: Item lapidis specularis seu glacie Mariæ ʒj. in decocto salicis vel vino statim à coitu hausta seu singulare experimentum contra conceptionem commendatur: Item mox post congressum pessus ex helleboro albo cum castoreo intrusus etiam conceptionem tollere ajunt.

Hæc de Causis conceptionis læsæ: Quas inter tamen adhuc sunt quædam latentes, & nobis à priori imperscrutabiles.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa: signa conjugii infecundi cognoscere res est difficillima, cujus sit vitium? maris an feminae? ut exinde impediatur conceptio, adeo, ut tantum non penitus sit impossibile. Equidem vitia viri, item vitia uteri externa, v. g. scirrhus uteri, ulcus, &c. faciliè cognosci possunt: sed vera interna causa in muliere latens, & ista utriusque sexus ad se invicem proportio, in specie, an femina absoluit? an verò respectu vel solum cum hoc vel isto viro sit sterilis? ut à priori cognoscatur, omnino impossibile æstimo. Probam per suffragium, de qua vid. SENNERTUS *Prax. lib. 4. ubi de sterilitate*, cum sine fundamento sit, meritò reiticio; licet primam originem habuisse videatur ex HIPPOCRATE *Sect. 5. Aphor. 59*. Item quod quidam de pessus ex melanterio utero intrudendo proponunt, hoc seu minus certum, aut omnino fabulosum, tantum institutum muliercularum arbitror. HIPPOCRATES etiam jubet alii caput derafum in utero subdi, & si postmodum odor ad os pervenerit, mulierem ad conceptionem aptam; sin minus, ineptam fore affirmat. AMATVS LVSITANVS etiam recipit coaguli leporini ʒj. quod dissolutum in aqua calida mulieri in balneo existenti propinat: Quod si sentiat dolores & ventristormina, secundam esse? sin minus, contra asserit. Alii pessarium ex galbano intrudunt, capite bene fumigato & circumvoluto; Si manet odor galbani ex vertice exierit, mulierem secundam dicunt; sin minus, contra. BORELLVS *Cent. 1. Obs. 11*. observavit pilos albos in adolescentis pene repertos sterilitatem denotasse. Alii ad probandam sterilitatem recipiunt urinam mulieris, & assundunt malo sylvestri, quæ si exsiccatur triduo, signum esse sterilitatis dicunt. Nonnulli hordeum in urina maceratum sepeliunt, si eo die germinet, secunditatem; si minus, sterilitatem arguere putant. Alii aliis probationibus utuntur. Quatenus autem adhuc nondum planè perspicuum factum est negotium secundationis ovi uterini, nondum causæ sterilitatis exactè determinari possunt: Unde etiam cognitio sterilitatis in quonam consistat? est difficillima.

Equidem, quando mas efficitur genituram largiter, & quando nullum adeit vitium conformationis, mas absolvitur, & vitium est in femina, quæ mille modis potest impediri, præprimis quando adsunt conformationis vitia.

### PROGNOSIS.

Prognosis, an sterilitas possit corrigi & emendari? si non impossibilis, tamen difficilissimè. Certè si dependet malum

à vitis & causis manifestis, facilis est: Si verò vitia sint latentia, aut incognita harmonia & proportio in utroque sexu, cautus sit Medicus in prognosi, quia nihil potest determinari, cum in negotio adeo obscuro & dubio quoad diagnosin, etiam quoad Prognosin pariter difficultates urgeant.

In specie sterilitas, ubi uterus exulceratus, incurabilis est: Vid. HIPPOCRATES *lib. 2. Prædict. 24. & 34. & l. 1. de M. M. 7. & 11*.

Aliàs est sine periculo, quia si non alterantur vires, ad longævitatem perducit. Habitiores verò lautà diætâ utentes, successivè disponuntur ad morbos chronicos, quibus secundatio est salutaris.

### C U R A.

Cura, ut mulier fiat gravida, pro varietate causarum varianda est; sed quia hæc sunt partim manifestæ, partim verò valde abstrusæ, neque huc usque satis determinatæ, specialiter tractari non potest. In genere tamen præmissis, ubi opus fuerit, universalibus, danda sunt ante omnia aromatica blanda, quæ utero sunt amica, ut conservetur ejusdem & ovarii tonus legitime constitutus: hinc ad promovendam conceptionem danda sunt talia, quæ seu Venerem stimulantia aliàs commendantur, & quæ etiam viris propinari solent: hinc subjicienda & ea, quæ per experientiam ut cognita ad sterilitatem muliebrem remedia commendantur; habitâ tamen semper simul ratione constitutionis, & craseos subjecti propriæ, imprimis, an macra? an pinguis? an sana? an cachectia serosa afflicta fuerit mulier? Vbi præsupponitur constitutio uteri laxa, & minus firma præ ceteris circa tempus mensium & post illos instituenda cura, & ad tempus continuanda; quia sic melius operantur: v. g. ante menses præmittantur universalis, totum corpus respicientia, post menses verò demum continentur specifica utero appropriata, quæ cum in specie roborant, firmant, & ad conceptum disponunt, tam interna, quàm in specie externa: Videatur hic in specie PLATERVS in *Praxi, & lib. 1. Obs. circa finem*, ubi aliquot steriles feminas curavit, quæ cum sint elegantia, instar ideæ sufficiant, *excellent enim præ aliis*.

Quoad remedia ergo, observandum est essatum LIN. „DANI super Hartmannum, qui dicit: Sterilitas, si à nimia caliditate & siccitate sanguinis fuerit, optimè prodest laç; „sin à nimia frigiditate & humiditate sanguinis, optimum est „rosmarinus, maxime feminis conducit, & sassafras. Ex quidem posterior causa frequentissima videtur; unde etiam volatilia & aromatica imprimis talibus conducunt, quæ uterum, & ejus tondem nervum cum ovario legitime constitutum asservant, & virtute salinâ volatili roborant; hinc præter rorem marinum, qui in mulierum sterilitate corrigenda egregius est, & ejus Decoctum ad methodum Zwelferi paratum usurpatur: de effectu rosismarini vid. etiam Pauli in *Quadrip. Bot. pag. 133*. Confer præterea salvia, lavendula, majorana, uterina selecta dicta, ut & melissa, pulegium, radix pimpinellæ, zedoariæ, galangæ, cassia lignea, macis, anthophylli, costus aromaticus, cardamomum, nux moschata, melissa, myrrha, & similia. Lignum guaiacum, præsertim sassafras, est unum, quod præ ceteris ad sterilitatem muliebrem emendandam & corrigendam commendatur, in specie, si aut ad cachectiam serosam non nihil inclinent, aut sanguine nimis seroso turgente; unde uterus sit magis laxus. Talibus aquosioribus aut scorbuticis ad massæ sanguineæ crasin immutandam diætâ sudorifera, ex decocto lignorum, præsertim sassafras, cum aliis appropriatis instituenda, & sudores in conopeo eliciendi veniunt; aut secundum HOEFRVM in *Herc. Med. vina medicata*, præsertim vinum infusionis ligni sassafras, item essentia lignorum, in specie sassafras, cum spiritu serpilli parata, copiosius & crebrius usurpata egregiè conferunt; Unde etiam tinctura collorum sassafrata admodum laudari solet. Nam esse ita remedia contra sterilitatem pro varietate temperamentorum immutanda, videb. in VELTHUYSIO de *Generat. pag. 119*.

Præter dicta, quæ alterationem subjecti totius respiciunt, conveniunt etiam appropriata & specifica, tam interna quàm externa, quæ Venerem blandè stimulant, & mulieres aptas reddunt ad coitum secundum. Quod enim voluptuosior est congressus, eò magis secundantur; quod tamen non universale est, cum sine sensu voluptatis quandoque etiam concipiant. Huic scopo satisfaciunt nux moschata, an-



ta, anthophy III, melissa, satyrion & eryngion, Item aromata, semina acris, eruca, sinapi, & similia Venetrem stimulantia, quæ abundè cognita sunt. Inter reliqua excellunt quoque ambræ & quilibet ambrata, ac moschus, quæ egregia sunt ad promovendam conceptionem, etiam externe post mensium fluxum cum pessis vaginæ uteri intrusa, multrum obtinent contra sterilitatem: hinc ex frequenti ambræ usu foeminam, quatuor annos sterilem, secundam redditam fuisse testatur ROLFINGIUS in *Ord. Ig. Meth. Sect. 6. c. 1.* Imprimis paranda essentia ambræ pro usu muliebri cum spiritu mellisæ, hinc propinanda cum essentia rorismarini, vel essentia satyrii, vel cum spiritu formicarum. Confectio alchermes, species diambæ, &c. aliàs notæ, traspheant. HARTMANNUS tanquam experimentum commendat sal satyrii, si à Hg. ad Hg. in aqua vitæ mulierum alba, vel vino Hispanico assumatur. Ulterius etiam in viperis singulare quid latet ad conciliandam fecunditatem; unde viperarum usus, earundem remedia, essentia viperina, aut in specie sal volatile viperinum, non erunt frustranea ad conciliandam fecunditatem, cum notum sit, quod viperarum, elus mares reddat fecundos, aut carpes pullorum aliorumque viperis nutritorum, usurpentur à Principibus ad fecundationem, quo remedio secundum se reddidit defunctus Dux Bavarie: Brodium item, in quo carnes viperinæ decoctæ, conductæ. Præceteris observationem curiosam & notatu dignam habet HELIDÆUS PADUANUS in *Obs. p. 294.* ubi in priori seculo brodio, in quo carnes viperinæ decoctæ fuerunt, unâ cum columba juveni, myrobalanis, floribus cordialibus, eplithymo, polypodio, anetho & similibus, curavit non tantummodò mulierem leprosam à lepra, sed præterea quoque jam quadragenariam, cum antea semper sterilis fuisset, hoc ipso Dec. totantum & sanata à lepra, & simul fecunda facta est: Unde hujusmodi brodio ad corrigendam mulierum sterilitatem optimè quis uti possit. Pulvis canerorum fluviatillum, blando calore balnei exsiccatorum, uti abortum præcaver, ita etiam contra sterilitatem laudatur.

Juxta hæc uterus specificè commendatur testiculi cervæ & apri, qui fuerunt secretum Corbei & Hartmanni, ex quibus hic parat suam essentiam contra sterilitatem, quam tanquam singularissimam sibi propriam reservavit, quæ cum essentia satyrii *Crollii*, aut cum essentia florum anthos, laudari solet in vino generoso vel aqua spirituosâ post fluxum menstruum usurpata: Vid. *Prax. eius Chym. c. 227.* In SCHENCKII *obs. lib. 4.* porci testes laudantur. Aliàs notum est, quod matrix suilla, vel leporina, vel cervina exsiccata & pulverisata, mulieribus sterilibus commendetur. Porro formicæ egregium subministrant remedium, uti ad impotentiam virilem, ita & sterilitatem muliebrem: Spiritus formicarum, & ex his parata essentia uterina, additis aliis specificis appropriatis uterinis, insigniter confert contra sterilitatem: unde aqua magnanimitatis & spiritus formicarum, vel cum hoc, aut cum spiritu rorismarini parata essentia testiculorum cervæ; vel essentia horum testiculorum propinata unâ cum essentia ambræ post mensium fluxum, & continuata, est remedium non contemnendum: Quod etiam pertinet essentia satyrii cum spiritu formicarum parata, & flores anthos, melissa, radix satyrii condita, cortex aurantium conditus, rasura eboris cum vino rubro. Quidam commendant Electuarium, factum ex pilapo cervi & tauri cum floribus stachadis Arabicæ & melle: cui ipsi Electuario convenientissimè ex formicis parata remedia addi, aut his hoc Electuarium largiter infundari potest. Aliàs sunt etiam, qui pulverem secundinæ humanæ ad 3j. usurpatam contra sterilitatem insigniter laudant.

Externè præter Thermas naturales, quæ sæpius observatæ fuerunt proficue, conveniunt contra sterilitatem, præmissâ debitâ corporis præparatione, præsertim Balnea, finita menstrua purgatione aliquot diebus continuanda, parata vel ex decocto aromaticorum uterinorum, vel, quod præstat, Balnea, quibus incoctum cubile formicarum cum ipsis formicis in constitutione præprimis succulenta: vid. *Balneum Myrsicæ contra sterilitatem*. & *Cunradi, Medulla Dehill.* ubi habet egregia de Formicis. Balnea ex cicuta aliqui commendat: vid. PLATERUS *loc. sup. cit.* Sic etiam oleum formicarum volantium externe utero illitum ad conceptionem disponit. Item convenit ulterius suffitus ex appropriatis uterinis, resinis suaveolentibus & aromaticis, v. g. gummi juniperino, baccis juniperi, succino, thure, styrace, massiche, benzoe, castoreo, gummi caranæ, animæ, & similibus, post mensium fluxum fre-

quenter institutus admodum confert. Post quem suffitus applicatur pessi uterum nonnihil expurgantes ex alio cum oleo spicæ ad imitationem Riverii parati, item pessi ex solis masticariz & Mercurialis contulis, & paucis oleo spicæ irroratis, qui pessi post suffitum vespertinum applicati per noctem postmodum resineantur. BORELLUS *Cent. 1. Obs. 29.* pro secreto communicat, si mulieres steriles, modò à viri conformationis non dependeat sterilitas, antequam virum accedant, placentulam menihastri vulvæ imponant, coronæ instar effigiatam, idque sub fine menstruarum purgationum fieri debere; uti sequenti Observatione herbæ elandestinz potentiam ad sterilitatem arcendam mirè deprædicat. Inunctio etiam glandis membri virilis cum balsamo apoplectico, vel cum zibetho, vel moscho, ante congressum, quæ utriusque coitus redditur voluptuosus, ita mulieribus sub voluptuoso congressu ad promovendum conceptum non parum confert. Ulterius sunt, qui inungunt reg-vern uterinam seu pubis cum oleo cheirino, irino nucis expresso, & oleis destillatis, ut nucis moschatæ destillatæ, majoranæ, spicæ Caryophyllorum, macis, melissæ & similibus, styrcæ liquidâ exceptis, & pro balsamo usurpatis: sicut etiam emplastrum ex massiche, racamahaca, caranæ, cum Balsamo Peruviano lubatum, alutæ superinductum, & regioni uterinæ supra juncturam impositum, pro utero confortando sterilibus non inutiliter suadetur.

## CAPUT III.

## DE

## CONCEPTIONE AUCTA.

**H**abemus in superioribus de conceptione deficiente, ex qua etiam facillè possumus judicare, quando rarior contingit conceptio. De *aperta* non opus est, ut multa addam, quia ordinariò aut gemelli aut trimelli, rarior plures præ viâ vice excluduntur Fetus: Pergo potius ad

## CAPUT IV.

## DE

FORMATIONE FOETUS  
LÆSÆ.

**N**otum est, quod, postquam concepit mulier, successivè in ovo uterino secundato formetur fetus, qui corpore autem similis speciei humanæ, aut est dissimilis: Similis est, quando ab hominibus generatur homo perfectus, sicuti ab equis equus, à canibus canis, &c. est formatio naturalis: Verum si dissimilis, est formatio præternaturalis, quæ ad duocapita referri debet, nempe

1. Ita dissimilis est speciei parentum, ut ad certam aliam quandam viventium speciem, sed vitiosè formatam, accedat, à qua etiam primariò denominationem habet, & tunc vocatur monstrum: sic v. g. est monstrum humanum, monstrum caninum &c. Vel
2. Ita vitiosè conformatum est id, quod loco fetus ex utero prodit, ut ad nullam certam speciem viventium corporum propriè referri possit, & tunc Mola appellatur.

## ARTICULUS I.

## DE

## PARTU MONSTROSO.

**P**artus monstrosi sunt, quando animalia perfecta à mulieribus ex utero excluduntur, dum nempe imaginatione leduntur alia animalia, e. g. mures & ranas, in utero formant & partunt: qualia exempla observat BORELLUS *Cent. 3. Obs. 73.* sicut SALMUTH *Cent. 1. Obs. 65.* refert, mulierem mures admodum horrentem, molas excludisse, mures præsentantes: sic molas instar ranarum ejctas notat AMATUS LUSITANUS *Cent. 1. Curat. 27.* ranas enixas, quod in quibusdam Regni Neapolitani locis familiare esse, ex Antonio Torquemata DELRIO *Disqu. Mag. lib. 1. Quæst. 7.* Item avem mordentem vivum cum fetu editum, qui fetus partem absumpserat, in Comitissa Mansfeldia observat SAL-



**SALMUTH** *Cens. 1. Obs. 66.* In **SCHENCKIO** 1. 4. *Obs. ubi de Mola*, sunt exempla mulierum, porcos, leones, canes, serpentes, astacorum copiam, &c. edentium: gliris à puerpera editi exemplum habet **BARTHOLINUS** *Cens. 1. Hist. 10.* molam volatilem vivam, aliaque animalia, excreta ex utero, videb. in **M. A. N. C.** nec non *Ann. 1. Observat. 1. Schol. pag. 11.* nec pon *Ann. 2. Observ. 16c. pag. 355.*

## CAUSÆ.

Monstrorum horum *Causæ* consistunt simpliciter in imaginatione materna, quod sufficienter explicavi in *Colleg. Insitut.* si enim ex imaginatione materna foetus capite canino aut felino, aut pede equino, generari possunt, qualia non raro prostant exempla, quidni etiam totius corporis formatio ita transformari, & in alia animalia monstruè compingi possunt. Verùm cum partus hi monstrosi, quales, sub Praxin medicam non cadant, sed ad Physiologiam potius pertineant, pauca de his datâ occasione dixisse sufficiat. Pergit igitur ad

## ARTICULUM II.

### DE

### MOLA.

**M**ola ita dicitur à pondere, dum quasi moles quædam incondita feminæ uterum premit, malèque afficit: Germanis dicitur *Ein Gewachse, ein Mutter-Kalb, ein Monden-Kind* &c. quas quidam adhuc pluribus inter se distinguunt, sed citra necessitatem. *Est* nempe mola massa quædam informis in utero, ex conceptu vero loco fetus ordinari genita, & ita malè formata, ut ad nullam certam animalium speciem referri possit; unde à mola excludo animalia perfectâ ex utero exclusa à mulieribus, quæ non tam ad molas, quàm ad monstruosos partus jam allegatos revoco.

Ex conceptu verò molas fieri in definitione dixi: Excludo ergò hic virgines & viduas, quæ, quia tales, sine viri societate molas parere non possunt. Reperimus quidem multos Auctores, quiasserunt, virgines & viduas, castas licet, molas ferre ex sanguine menstruo & semine proprio, instar gallinarum, ova hypomenia seu subventanea citra galli contactum parientium: vid. **HOECHSTETTERUS** in *Obs. pag. 293.* & **KERCKRINGIUS** in *Spicil. Obs. St.* quod tamen falsum est: Et mulieres, quæ sine mare serunt molas, sunt meretrices. Nam utut verum est, quod oviparae generent ova subventanea, citra galli benedictionem infecunda, nihilominus tamen hoc in nullo viviparorum genere vel specie observatur, ut sc. aliquid tale in se generent, citra prægressum maris congressum & contactum: Unde nec homini hoc solum tribuendum est citra necessitatem, quod nulli viviparorum speciei convenit: Et ob id etiam raræ sunt aded mola: inter virgines & viduas, licet multas & annosas, observata: Quæ (1.) si naturaliter citra viri adjumentum generentur, quidni, quæso, essent frequentiores saltem in brutis aliis ordinariò multiparis, uti incanibus, felibus, ovibus, & similibus? Deinde (3.) etiam est differentia inter molas, dum quædam ejiciuntur animata: seu potius vitales, & motu vitalitatem & animalitatem testantur, cum edant motum exercitum, & actu secundo & vitali animali gaudeant; quædam verò sunt non vitales: Sic **SALMUTH** *Cens. 3. Observ. 98.* refert molam viventem, se moventem: sic pariter **ZACUTUS LUSITANUS** *lib. 1. Prax. Admir. Observ. 144.* refert molam carneam mirabilem viventem, tribus oculis rejectam. Jam ergo, si citra viri consortium generaretur mola, unde quæso vitalitas? Nam ova subventanea seu ova hypomenia, & quæ citra secundantis galli contactum excluduntur, nunquam vel tantillum vitalitatis exhibent, quin potius sub incubatu putrescunt brevi, & corrumpuntur. Ergò solæ saltim erunt vitales mola:, quæ à mulieribus maritatis excluduntur. Virgines verò suppositæ saltim non vitales excluderent molas. Jam verò (4.) falsum est, esse molam ullam non vitalem, i. e. quæ nec in utero vitam habuisset, licet vel ante exclusionem, vel sub exclusione ex utero, vitalitatem amiserit, cum etiam sæpè diutius informes mola: in utero gesserentur, quæ postmodum citra ullum vitalitatis signum excluduntur: Sane talis

substantia omni vitalitate orbata citra sui corruptionem & putrefactionem tamdiu in utero persisterere nequiret (nisi in scirrhosam duritiem, vel simile concretum durius & siccius abeant; tales enim molas esse, quas per plures annos subinde mulieres in utero gestant, probabile est, & confirmatur ex **PARÆO**, qui *lib. 2. cap. 34.* refert, quandam feminam totos annos 17. molam scirrhosam utero circumtulisse) cum etiam infans verus, quamdiu vivit, citra corruptionem in utero hæreat; simul atque verò morietur, si diutius paulò retinetur, ad corruptionem & putredinem breviter tendit. Par ratio etiam est cum secundina uterinaque placenta, quamdiu est fetui viventi in utero juncta, ejus vitæ communi fruitur, tamdiu sana & salva perstat; simul verò æque separato fetui illa in utero remanet, vitalitate spoliata corrumpitur & putrescit. Ut taceam molas omnes à parvo principio per veram nutritionem & augmentationem successivè accrescere, item conformari plus minus, licet vitiosè; videamus molas, quæ operatio vitalis citra vitæ possessionem exequi nequit: Sic **HORSTIUS** in *Obs. fery.* refert molam muris formam referentem, à virgine in lucem editam: Sic mola bufonem referens refertur ab **HOE-FERO** in *Her. Med. pag. 344.* Ex quibus dictis concludo: non dari molas non vitales, aliàs putrescerent, & dum sunt vitales, non esse ova hypomenia, sed vera: Molas ergò quascunque nullo modo neque à virginibus, neque à viduis citra viri consortium excludi aut generari posse. Plura, quoad hanc controversiam videb. in **SENNERTO de Monb. Mulier. cap. de Mola**, ubi, quod sane miror, viduis castis molas citra viri contactum concedit, non verò virginibus, cum tamen vidua cum virginibus pari passu ambulent. Rigorose satis pro nostra parte stat **PAVLVS ZACCHIAS** in eruditis propter copiam rerum *Quæst. Medico Legal. lib. 1.*

Mola: hæc Germanis vocantur *Ein Sonnen-Kind, ein Mutter-Kalb*: item quibusdam *Mond-Kinder*: Dicunt namque obstetrices, si mas post coitum emittat urinam, ut radii lunares tangant membrum virile, generari molam. Ordinariò verò vocantur *ein Gewachse*, utur quidam rigorosè inter hasceres molas, tanquam tres species distinctas, distinguere velint, quod tamen superfluum. Observandum autem, non confundendas molas propriè sic dictas cum excretis aliis ex utero: siquidem subinde quædam feminæ, declinante mensium fluxu, aut etiam alio tempore, excludere solent ex genitalibus massam apparenter carnosam, quæ etiam reverà nihil aliud sunt, quàm majores grumi sanguinis firmids coagulati, utur sine textura carnosa aut membranosa, qualis in molis observatur: Sic pariter observantur feminæ, quæ quavis menstruatione excludunt parva corpora quasi membranosa, quæ quidem propituita viscida condensata habentur, quæ forsàn ovula sunt ex ovario matura, spontè suâ in uterum per tubas decidunt. Conf. huc **MAV. RICEAU de Mulier. Morb. lib. 1. c. 10.** Et hujusmodi rejectanea, quæ non sunt mola:, tam virginibus, quàm maritatis sunt communia.

Conjunguntur mola: propriè sic dictæ ut plurimum, non tamen semper, cum fetu vivo & vero: Imò refert **KERCKRINGIUS** *Spicil. Anat. Observ. 85.* infantem molæ inclusum repertum; & interdum unâ cum fetu, aut brevi post, interdum etiam aliquot menses vel septimanas ante fetum, excluduntur, ipso fetu adhuc in utero subsistente, & suo tempore in lucem emergente: Id quod fit imprimis, si ex quocunque accidente mola moriatur: tunc enim ceu excrementitium, à consortio vitalitatis proscriptum, ex utero ejicitur, vivo subsistente fetu. Interdum post fetum & secundinas prodeunt, fetu legitime constituto; frequenter tamen occasione molæ fetus abortu rejicitur: Interdum mola fetui juncta huic nutrimentum subtrahit, unde sanguisuga dicitur; vid. **BARTHOLINUS** *Ab. Hassniens. T. 1. Observ. 26.* & **LEMNIUS de oculis. Nat. Mirac. c. 8.** Quæ verò sunt absque fetu mola:, interdum diutius ad modum in utero subsistunt, & ipsi firmiter accrescunt aut, saltim in scirrhosam similemve duritiem degenerant, ac cum mulieribus connefcunt, quas tandem trucidare solent.

## CAUSÆ.

Quod ergò *Causam proximam* attinet, & Generationis modum in mola, res perquam intricata est. Qui veterum vestigia, imprimis **HIPPOCRATIS** 1. 1. *de Al. M. & de sterilitate*, legunt de Generatione fetus ex seminibus utriusque sexus mixtis, & sanguine menstruo, indeque molam ex sangui-



sanguine semineque copioso, & semine utriusque sexus, in specie virili, paucos vel debiles, generari asserunt, illos suo sensu abundare permitto. Qui verò ex Harveanis aut Hornianis & Graafianis principiis de ovo uterino generationem molæ explicare vult, is videat **CLAUDIUM de la COURVEE**, *Medicum Regis Poloniae, Traët. de Nutrit. Fetus in utero* P. 3. cap. 4. qui de mola optimè explicat originem & generationem molarum. Nempe quoad rationem conceptus nulla est differentia inter verum conceptum, qui dat fetum, & inter conceptum, qui dat molam, siue in principio, siue in progressu formationis hoc ipsum fiat: sc. inter duplicem membranam, amnion & chorion, fetus tam perfectus, quam ejus rudimenta, continentur: Amnion quidem tenuior est membrana, quæ tanquam munimentum est, in quo & fetus formatur & etiam custoditur, ne humor albugineus nutritius assatim ex chorio irruat in colliquamentum ovi, & inchoatam tenelli embryonis delineationem & formationem omnino interturbet. Si igitur fiat, ut lædatur ista interna amnii membrana, quæ tanquam monumentum est, indeque fiat liquorum amborum inordinata confusio, exinde impeditur formatio, & ex confusione istorum humorum, nempe nutrimenti, & ex quo & in quo formatur fetus, loco fetus perfecti emergit hinc tandem moles talis incondita & inconcinna, quas molas vocamus; quæ tamen nunc proprio motu secundum agentia & patientia naturalia oriri, nunc à superveniente imaginatione materna, ejusque forti impressione sub ista incondita forma, figuratione plus minus quadam certa, & caractere sæpius rudi, insigniri tandem solet: Sic enim refert **FORESTUS** in lib. 28. *Observat. 67.* de muliere, quæ molam carneam cum capite & quasi rostro cujusdam aquilæ conformatam eiecit, cujus rictus cartilagineus utrinque diduci potuit, natam ex imaginatione matris, sc. cum antea monstruosas figuras similibus capitibus deplētas adspexisset: **PLATERUS** lib. 3. *Prax. pag. 898.* molam vidit, stellam arboream marinam perfectè repræsentantem: Molam figuram capitis ouilli æmulantem, habet **BARTHOLINUS** *Cent. 4. Hissor. 48.* Molam, quæ maris figuram repræsentavit, videb. in **HORSTIO** lib. 5. *Observ. anat. 29.* & **SALMUTH** *Centur. 1. Obser. 65.* refertque **DIVERSUS** in *Annotat. in Alton. cap. 112.* se novisse mulierem, quæ 3. molas ad similitudinem pudendi virilis formatas peperit: **MATTHÆUS de GRADIBUS** in cap. 9. *Rhaphi* vidit bis vel ter frustum aliquatiter figuratum: Conf. **GARMANNUS** in *Dissert. de Gemellis & Partu numeroso* c. 1. §. 1. Exemplum quoque **KERCKRINGIUS** in *Observ. anat. Observ. 95. pag. 184.* adducit, cui anno 1669. Amstelodami ab obstetrice quadam 9. Februarii mola corporis formâ instar cyprini exhibita fuit, in bifurcatam caudam desinens, capite & ore perforato Cyprinosimili, & in medio molæ ventre insans perfectè efformatus, quantus solet unius mensis fetus esse: Simile exemplum etiam **ALEXANDER BENEDICTUS** lib. 25. cap. 29. *de Cur. morbor.* refert. Quod si ergo liquores hi confundantur, & formatio fetus interturbetur sub primis gestationis mensibus, in principio nempe conformationis, tunc humores isti albuginei confusi, & vel unâ eborii membranæ communi, vel exrupto amnio, quasi pluribus membranacis particularibus capsulis muniti, dant molam istam aquosam vesicularem, de qua vid. **LOSSIUS** lib. 4. *Observ. 167.* & **TULPIUS** lib. 3. *Observ. 32.* & *superius, Sect. 5. Artic. 2. Capit. 1. ubi de Hydrops Pteri.* Si verò talis humorum confusio & formationis interturbatio tardius fiat, cum stamina sanguinea sint efformata, & sanguis copiosus genitus sit, tunc ut plurimum mola sanguinea & carnea, quasi parenchymata viscerum repræsentans, apparet. Si denique adhuc longius protrahatur talis humorum confusio, & ubi jam in fetu stamina fibrosa nervorum fuerunt deducta, & spiritus animales geniti ac distributi, tunc motum simul quandam, interdum ordinatum, interdum palpitantem tantum, nata hinc mola obtinere solet. Imò in tali mola interdum etiam unum alterumve membrum, v. g. os, nasus, oculi, aut cerebrum, aut parenchyma quoddam, exactè satis jam elaboratum deprehenditur. Nempe sunt sanè membra & viscera fetus tenella juxta se quidem posita, sed minus firmiter connexa, & quæ non, nisi ultimo gestationis tempore, cure ac tegumentis membranacis firmiter investiuntur: unde confuso humorum chorii crassiore cum liquore amnii tenuiore, facillimè formatum partium solidarum tenellarum translocatio, confusio, & tandem extensis jam firmiter vasorum sanguiferorum canallibus tenuibus aliquatim sanguinis circulatio, & sic mola inconditæ nutritio, & informis plus minus augmen-

tatio, contingere potest, donec mola insignis & variformis emergat.

Negotium hoc ulterius declarant ova secunda gallinarum, quæ ipsa vel ante incubatum, vel dum jam aliquandiu fuerint incubatu fœta, si talia, inquam, ova fortiter concutiantur vel agitentur, impeditur fetus formatio, & nullus exinde excluditur pullus, confusis & permixtis invicem vitelli & albuminis liquoribus, aut translocatis ex toto sub vitio conformationis partibus tenellis jam nonnihil formati, pullus imperfectus in testa reperitur. Hinc etiam est, quod tonitruo forte, dum gallinæ incubant ovis, debitam conformationem impediat, aut pulli moriantur, ac ova, licet secunda, tamen ut corrumpantur, efficiat, à simili ovorum, in eorum sc. testis, concussionem & confusione oritur: Unde etiam sub fervido æstatis tempore minus solent feliciter excludi pulli, propterea, quia ab aëre subtili & calore ambiente humores facillè colliquescent & confunduntur, & ita formationem pulli turbant. Simile si fiat in conceptu seu ovo humano, facillè hinc frustratur formatio, & hinc molæ, vel aquosæ, vel carnosæ, vel sanguineæ, vel denique ruditer, plus minus licet, in varias figuras formatæ, generatio sequitur: Vid. **HARVÆUS de Gener. animal. cap. 16. Quod verò subindè cum fetu deprehendantur molæ, fieri videtur, quatenus vel gemellorum, pluriumque fetuum conceptio simultanea, aut saltim superfætatio facta fuerit, aut aliâ ratione plurium ovulorum sub congressu secundo, aut uno aut pluribus, exclusio contigerit, inde ovum unum in fetum perfectum successivè adolevit, cæteris impeditis, & sub formatione inchoata quacunque occasione vitiatis, in molam degenerantibus.**

*Causæ remotæ*, quod generetur mola, sæpiissimè sunt in matre, & subindè externæ: sic interdum ex inconcinno motu matris, aut ventris nimia percussione, aut saltu, vel casu, aut ira, aut aliis gravioribus animi pathematibus, formatio conceptus impeditur, membrana amnii dissolvitur, humores confunduntur, & ita molæ oriuntur. Item iis, quæ sunt salaciores, aut quæ subindè pariunt gemellos, non rarum est, quod cum fetu prodeant molæ, ubi sub congressu plura ova secunda, unde alter magis, alter minus secundatur. Allegantur etiam hic à quibusdam mulieres fervidiore sanguine præditæ, unde aut colliquescent humores, & extra debitam consistentiam abeunt, & ad conformationem inepti fiunt, membrana amnii adhuc tenera, rumpitur, ac ita humores ovi uterini distincti inordinatè confunduntur, sicque formationis negotium interruptitur, ut fiant molæ.

## DIAGNOSIS.

Quod attinet *Signa*: molam ritè cognoscere, & à vera gravidatione discernere, difficile est, & res accurato scrutinio digna: vid. **FORESTUS** lib. 28. *Obser. 62.* Equidem mola sine fetu facillè cognoscitur, quàm quæ cum fetu: In specie primis mensibus, aut ante quartum mensem, aut medium gestationis tempus, vix minima ejus præbetur suspicio.

Signa autem, quæ molam produnt, mense quarto, vel instante proximo, magis innotescunt, quæ inter imprimis sunt:

(1.) Motus, qui latentem molam nonnihil manifestat; nam fetus tunc moveri successivè incipit, primò motu pulsatorio, qui magis sit validior successivè, quod non fit in mola. Hæ enim si adsunt, vel nullum motum sensibilem edunt, vel si aliquem habeant, ipsæ mulieres illum facillè à motu genuino fetus discernere valent: Nempe ante tertium mensem tremulus saltem, minus validus & palpitatorius est, vel contrictior & dilatationis saltem: vid. **RIVERIUS** *Cent. 2. Observ. 100.* Non verò in omnem situs differentiam, ut in fetu perfectio accidit, qui interdum calcitrando firmius se movet, & tumorem quasi facit. Interdum etiam insignes motus observantur sub præsentia molæ, qui tantum sunt uteri, non verò molæ contentæ: sunt nempe species motuum convulsivorum matricis irritatæ à mola, non verò ipsius molæ, cum interdum observentur semina cum moribus adeò violentis, quasi plura animalia in eodem essent ventre: Vid. hic **MAURICEAU** *supra citatus.*

(2.) Si jam femina de latere in latus se verit, mola parili etiam ratione in latus, in quod decumbit mulier, instar lapidis, & insignis ponderis dorsum prementis, impetuosè voluitur; quod longè majus sentiunt, quàm dum in utero



utero sc̄tum perfectum gestarunt, cum in legitima gmul-  
datione sc̄tus citra talem ponderis motum in utero firmiter  
expanso, quocunque se moueat mulier, ferè eundem situm  
obtineat. Hinc etiam ponderis major sensus percipitur, &  
quasi incumbit utero, dum gestatur mola, quàm quando  
gestatur sc̄tus verus; & istud pondus deorsum versus vul-  
vam premit in gestatione molæ, quod non æquè fit in sc̄tu  
vero, qui potius in ventre sine molestia gestatur, nisi ulti-  
mo mense, circa tempus partus, ubi magis ad inferiora de-  
clinat &c.

(3.) Si tempus morus sc̄tus, mensis nempe quartus vel  
quintus gestationis, præterierit, & nihilominus nullus mo-  
tus in utero percipiatur, interim verò venter intumescat, nec  
tamen vel hydropis ascitis, vel hydropis uterini signa adsint,  
molæ latentis indicium est.

(4.) Sc̄tus uerus à mola ventris figurâ discernitur. Nam  
in sc̄tu uero uenter præsertim ad umbilicum uersus attollitur  
& protuberat, uersus latera nonnihil coarctatur: In  
mola uerò uenter non antrorsum uersus apparet turgidus,  
sed potius ubique tam ad latera, quàm anteriora, circa  
hypogastrii imprimis regionem intumescit, & in omnem  
dimensionem æqualiter attollitur, & quasi globulus seu  
massa in utero & lumborum regione posita tactu percipitur.

(5.) In ritè grauidis quamplurimis, in specie habitiori-  
bus, lac uerum circa quartum mensem aut medium gesta-  
tionis tempus subindè generari incipit: in mola uerò mam-  
mæ rarò intumescunt, aut utut intumescant, tamen  
uerum lac non generatur, sed cruda saltem quædam massa  
& liquamen seroso-excrementitium ad mammas deriuat-  
ur, & ex hisdem effluere solet, quæ successiue denuò eua-  
nescit.

(6.) Molam dolor quidam in utero, punctiōis sensum  
inferens, subsequitur, teste FORESTO lib. 28. *Observ.* 61.  
& punctiōes has dolorificas subindè molestas, peculiare mo-  
læ carnez esse notas, quibus eam à uero conceptu distingue-  
re queamus, asserit SCHOLZIUS in *Conf.* 355.

(7.) Grauiora molas, quàm uterum uerum gestantes,  
mulieres habent symptomata, præsertim minus coloratæ &  
pallidiores quasi cachecticæ apparent, uiresque magis pro-  
sternuntur, ac cachexiæ similia, circa uniuersum languorem,  
difficilem respirationem, de colorationem, &c. patiuntur:  
In uerè autem grauidis medio gestationis tempore sympto-  
mata grauiora remittere solent.

(8.) Si post decimum mensem, adeoque præterlapso tem-  
pore partus legitimo, uenter adhuc tumeat, nec hydropis &  
inflationis signa adsint, de mola suspicio adest, quæ postmo-  
dum successiue magis magisque se prodat, quò diutius in  
utero ita retinetur. Et dum

(9.) Grauidis menstrua Purgatio omnino cessat, plerum-  
que molam gestantibus ex intervallis, tertio quouis mense,  
vel etiam longioris temporis intercapedine effrantes uterini  
fluores sanguinei seminis superveniunt, sed colore vitioso:  
id quod minus convenit in vera sc̄tus gestatione, si est sanus,  
vel utralis. Interdum quoque per aliquot dies mixtio labo-  
riosa & dolorifica est, ægrèque procedit. Item tempore  
mensium consueto grauidæ neque dolores neque tensiones  
percipiunt, sed potius tantum fortiolem motum sc̄tus; con-  
trarium verò fieri solet in mola. Quibusdam menses fluunt,  
ut plurimum verò hi ipsi, non secus ac in legitime grauidis,  
suppressi sunt.

Hæc signa facillè apparent, ubi mola est sola, & citra  
adjunctum sc̄tum verum, ex quibus probabilia eruuntur,  
ut præsens mola cognoscatur. Mulieres grauidæ semper so-  
lent optime de se sperare; unde etiam, nisi varia adsint sym-  
ptomata, difficulter iisdem potest persuaderi, quod gestent  
molam. Quod si sc̄tus verus & vivus sit conjunctus, quod  
interdum fit, hoc difficillè omnino cognoscitur, nisi forsan  
ex quantitate ponderis, ventris mole maiore, ac symptoma-  
tibus grauioribus distincta singularis, quoad motum ab uno  
latere in alterum, & similia alia supervenientia signa, su-  
spicio oritur.

In genere cognoscitur rectissime mola ex pondere & gravi-  
tatis sensu in utero, & ex motu ejus, quem ægra, dum se-  
erigit, vel ambulat, vel de latere in latus movetur, percipit.  
Si ergo hæc conjectura adest, relinquatur mulier usque  
ad tempus partus.

Qua ratione autem mola & sc̄tus simul probabilis con-  
jectura possint cognosci, conf. SENNERTUS lib. 4. *Prax.*  
ubi de Mola.

## PROGNOSIS.

Quod Prognosis: Mola semper periculosus affectus est,  
matrem lædens, & multa symptomata, tam cum retine-  
tur, quàm cum excluditur, inferens, cujus occasione dum-  
retinentur menses, tam uteris quàm uniuersum corpus exin-  
dè insigniter læduntur.

Quò citius ejicitur mola, eò melius.

Quò major eadem, vel diutius retinetur, eò majus peri-  
culum imminet, & interdum in ascitem lethalem degenerat:  
vid. FORESTUS l. 2. *Obs.* 62. HILDANUS Cent.  
2. *Observ.* 55.

Interdum tamen etiam celeri satis morte enecat; vid. ZA-  
CUTUS LUSITANUS lib. 3. *Princ. Hist. cap.* 16. *Observ.*  
2. aut si prodeat, dolores acerbissimos, hæmorrhagias,  
aliaque symptomata periculosa excitat, & egrediendo  
enecat.

Si verò in plures partes divisa fuerit, minus periculi affert,  
cum successiue frustula aliquot diebus aut mensibus interje-  
ctis ejici solent.

Si sc̄tui mola jungatur, cum vel enecat, vel insigniter  
lædit, sæpiusque causat, ut mulier abortiat; aut si cum  
sc̄tu excluditur, partum laboriosum facit. Curiosum est,  
quod refert SALMUTH Cent. 1. *Obs.* 66. de ave morden-  
te cum sc̄tu edito, qui sc̄tus partem absorpserat.

Si est citra sc̄tum, quando corrumpitur antequam ejiciat-  
ur, putrescendo uterum inquinat, ac ad similem putre-  
dinem disponit: quod quidem perquam rarum est, ob-  
servatum tamen à SCHENCKIO lib. 4. *Observ.* ubi de  
Mola.

Molæ si hydrops uteri junctus sit, ferè lethalis est, cum  
duos gravissimos morbos vix superare possit mulier, quin  
jugulent.

Molæ solæ, si non corrumpantur, & inalteratæ persistant,  
subindè pluribus mensibus, quin & 2. 3. imò etiam decem  
annos in utero hærent citra gravidationis læsionem, & cum  
eadem consenscunt, imò matrem usque ad mortem com-  
mitari solent, utut non sine insigni mulieris nocumento,  
& successiue viribus languescuntibus matrem propriam ju-  
gulent.

Si excludantur tandem spontè, quod rarius est, vel medi-  
camentorum vi per artem, cruciatus insignes, & imprimis  
periculosa hæmorrhagiæ uteri, supervenire solent.

## CURA.

Quod ergo attinet Curam: In ea observandum est, ante  
omnia, quantum possibile, antequam ad Indicationes pro-  
cedatur, an mola sit conjuncta cum sc̄tu? an verò sine  
eo? Si mola est cum sc̄tu perfecto, nihil temerè agendum  
est, sed saltem abortus præservandus, & hujus exclusio ex-  
pectanda; tunc enim ut plurimum simul ejicitur mola.  
Ubi verò observandum, subindè placentas uteri insignes  
grandævas, aut varieformes, haberi subindè pro molis,  
quod tamen non est. Aut si præter ipem retineatur, tunc de-  
mum vel manu Chirurgica, vel ope Pharmaceutica extra-  
henda aut expellenda erit. Sin verò sine sc̄tu suspicio adsit,  
id quod imprimis fit, si ultra 10. menses, aut ultra annum in-  
tegrum in utero persistat, tunc opera danda est, ut quanto-  
cyus ejiciatur, ne diuturnà morà vel fiat grandis, vel ma-  
trem gestantem lædat. Ob id ergo omnia fortiora menses pel-  
lentia, & partum difficilem promovenda, & denique om-  
nia sc̄tum mortuum ejicientia, usurpanda sunt. Conveni-  
unt ob id eadem M. M. eademque remedia, quæ in partu  
difficili, sc̄tu mortuo, secundinis retentis, mensibusque sup-  
pressis, usurpantur.

Ut ergo hoc fiat, præmittantur quædam Preparantia,  
hinc pellentia. Inter Preparantia Infusus, Balnea, Fo-  
menta, Inunctiones & Clysteres alvini & uterini, & similia  
ex Emollientibus & Laxantibus parata. Scil. Infusus in De-  
coctis plantarum emollientium, laudantur: Clysteres ute-  
rini ex oleo; alvi ex lacte, solent laudari: Fomenta uteri  
ex oleo & lacte applicanda, & quæ sunt aliàs satis cognita,  
& de partu alibi recensentur, quæ vias laxant, uterum  
ejusque fibras, ac ambientes membranas, molliores, flacci-  
diores, & tractabiles & distensionem aptiores reddunt.  
Preparatis sic viis, convenit venæsectio, primò in brachio,  
postmodum in pede. Post hanc in usu sunt Vomitoria  
ualida, cum potentia sint ad excludenda in utero conten-  
ta; hæc sunt antimonialia, quæ sunt optima, seu utriusque  
inter



Inter quæ est sal vitrioli vomitivum, quæ minus sunt commoda. Juxta hæc præscribantur Purgantia fortiora, quæ, ut notum est, simul potenter uterum stimulant, & adjectionem contentorum disponunt: qualia sunt pilulæ foetide, pilulæ de hiera cum colocynthide, aut ejus extractum, species Diaturbith cum Rhabarbaro: Item Decoctum fenugreci, pullegii, sabinae an. M. ss. in serolactis, ad aliquot dies haustum, ad imitationem **RULANDI** in *Thesaur. pag. 300.* quo Decocto aliquot molas ejicit: Item extractum, & remedia ex helleboro nigro & colocynthide, & similia Draconocera internè usurpanda. His subinde addantur pellentia menses, foetum & similia, imprimis ex ruta, artemisia, pulegio, sabina, bryonia, gentiana, asaro, anetho, & similibus: Ex bacis item juniperi, ex semine nigellæ, ciceribus & similibus, quibus commodè aqua spirituosâ seu tinctura in magna copia, & similia ex cinnamomo & canella remedia adduntur; Nam hæc potentia sunt ad promovendam ex utero excretionem: Decoctum anethi & ruta in vino secundum **FORESTUM** lib. 28. Obs. 61. Essentia & oleum caryophyllorum, & pilulæ de sabina Myrsichel, hic etiam locum habent: item Decoctum ac oleum destillatum sabinae cum aliquot guttulis olei destillati caryophyllorum cum saccharo in Elæosaccharum redacta, diutius continuata, Stimulum potentem inferunt: Vel fiat pulvis ex horracis, myrrhæ, castorei ana part. æqu. addito sale volatili succini; de quo pulvere ʒss. in aqua cinnamomi quotidie semel aut bis repetitis vicibus assumatur. Pertinet huic asafœtida; aut fiant pilulæ ex trochiscorum de myrrhâ ʒi. ad ʒj. cum gran. iij. euphorbii, cum essentia myrrhæ, quæ pro 3. dosibus per 3. dies successivè hauriantur. Præ reliquis experimentum est pulvis secundine blandi igne exsiccatæ ʒj. in aqua cinnamomi aut alia appropriata propinatus, specificum est **Hartmanni** in *Prax. Chymiatr.* commendatum, insigniter à **LINDANO**, & adhuc utilitatem **SYLVIO**. Est singularis hæc secundina ad præternaturalia ex utero pellenda. Spiritus secundine per putrefactionem est optimus. **ZACUTUS LUSITANUS** lib. 2. *Prax. Admir.* Obs. 145. non experimentum commendat pilulas ex euphorbii ʒj. cum Symplo artemisiæ paratas; Nam & hæc potenter expellunt. Hæc & alia aliquando internè continuanda sunt, donec provocetur successivè uterus ad molarum exclusionem.

Hiscæ internis simul addantur *Externæ*: Externæ ergo præter clysteres fortiter stimulant & menses provocantes aciores, aliæque vaginam uteri & orificium uteri internum irritantia, & spasmus promoventia, usurpanda sunt. Hinc fiant Clysteres alvi, imprimis ex pulegio, matricaria, sabina, pulpa colocynthidos in nodulo ligata, ac similibus injiciendi: Vel fiat Clyster uterinus sequens:

ʒi. Herb. artemis.

Sabina an. m. j.

Sal. tartari ʒss.

Coqu. in l. q. aquæ simpl.

Colat. ʒiv. vel ʒss. adde

Ess. myrrhæ,

Asa foetid. an. ʒj.

Castor. ʒss.

Olei laurini.

lrii.

Lil. albor. an. ʒvi. ad ʒj.

Oitell. vii no. j.

Syr. de artemis. ʒj.

Mista sub forma Clysteris uterini per metrenchiten in vaginam uterinam injiciantur, & repetantur;

D. S.

Clyster uterinus stimulant.

*Conversæ* laudat Pellos acutos ex **Galbani** ʒij. cum ʒij. hellebori albi, qui satis acres sunt, & violenter stimulat. Accedunt etiam suffitus ex sabina, colocynthide & cinnamomo, galanga, myrrhâ, mace, galbano, & similibus, & per infundibulum excipiantur: Suffitus ex anetho & cumino, cum rasura ungulæ asini, ad desperatam molam commendatur à **CORBEJO**: item suffitus ex scoris reguli antimonii martialis, vel cum vino, vel cum aqua, vel urina foetida, infusus: item salta volatilia foetida, aut saltem spiritus sal. ammoniaci cum calce viva paratus, & cum hoc parata essentia castorei: mediante *Instrumento Glauberi*, aut mediante phiolâ carbonibus impositâ, pudendis excipiatur super pubem & uteri regionem, præmissis Inunctionibus emollientibus, cum oleo diacolocynthidos vel cheirino & anethino, additis paucis guttulis olei destillati succini, sabinae &c. & ex his cum fimo bovillo subactis fiat cataplasma pectini imponendum, quod cum profectum remedium commendatur à **FORESTO** lib. 28. Obs. 61. His ipsis opera danda, ut stimulatâ naturâ ejiciatur mola. De cæteris ad meliùs operantur hæc remedia quælibet, si simul mulier fortiore motu, in specie saltu, similitive exercitio crebriùs se exercuerit, quin etiam si sanguine turgeat mulier, venæ sectio largiter iustituta convenit.

Quod si his & similibus superveniat nixus excretorius, quævis operâ hic ipse promovendus est, ut ejiciatur mola.

Quod si difficiliùs succedunt negotium, ad manuum Chirurgi operam confugiendum erit. Speculum uterinum applicandum vaginæ uteri, & orificium uteri internum dilatandum, & vel manu immissa à Chirurgo, vel instrumentis, mola extrahenda, eaque tota, ne frustula relicta turbas inferant. Encheirises pro tali operatione videbitis in **HILDANO** *Cens. 2. Observ. 52.* item in eiusdem *Epistolis*. In specie Chirurgica operatio hic necessaria est eo casu, quando cum nisu excretorio uteri magna hæmorrhagia adest, quæ cum remediis internis & ejicientibus multò magis exasperari solet. Revera tali casu Chirurgica auxilia præferenda sunt Pharmacæuticis: vid. **MAURICEAU** lib. 2. cap. 23. Nec desistendum est, si operatio Chirurgica in principio non statim succedat, quin post aliquot dies eadem reiteranda venit, ut rectè hoc monet ac docet **HILDANUS** *Cens. 1. Epist. 39.*

Ejectâ molâ quacunque ratione, subinde non leve periculum imminet à nimio sanguinis fluxu, & hinc graves dolores uterini insequi solent, quæ symptomata eodem modo curanda sunt, atque si eadem post partum naturalem accidant: v. g. ad nimium ac desperatum sanguinis post molam fluxum, remedia *minium mensum aut lochiorum fluxum* sedantia conducunt: Expertum est Electuarium **FORESTI** lib. 28. Obs. 61. quo feliciter usus est:

ʒi. Conf. rosar. antiqu. ʒj.

Diacodon. sine spec. ʒss.

Trochisc. de carabe,

Terra sigill.

Spodio an. ʒss.

Sem. acetos.

Cornu Cerui usi præp. an. ʒj.

Cum l. q. syr. cydon. & mentha f. Electuarium:

D. S.

Electuarium confortativum adstringens.

De quo mulier capiat pro lubitu.

Ad huius imitationem varia possunt formari.

Absolvi occasione vitiatæ formationis doctrinam de Molis: Reliqua formationis vitia, quæ vel imaginatione maternâ, vel terrore, vel aliâ quacunque causa externa contingunt, cum sub Casum Practicum non cadant, meritò omitto, & pergo ad





## S E C T I O N E M VI.

D E

## REGIMINE GRAVIDARVM.

**D**Um nempe concepit mulier, in eaque generatur & formatur foetus, gravis dicitur, quasi à foetu in ventre gravata: unde in his, tam ratione Hygienes quam Therapevticos, semper ad duo primaria in toto earum statu, vel naturali vel præternaturali, respiciendum est:

1. Ad foetum simul, ne huius noxa, sed potius robur inferatur, neque ad præmaturam sui exclusionem seu abortum disponatur.
2. Quod naturaliter suppressi sint menses, ratione, quorum ut varia oriuntur symptomata, ita etiam ratione causarum & curæ symptomatum, semper ad menses respiciendum est.

In regimine ergo gravidarum semper respiciendum est ad vires matris & foetus, & ad corporis noxam illatam.

## C A P U T I.

D E

## DIÆTA GRAVIDARVM.

**Q**uoad *Dietam* ergo Gravidarum, seu Regimen sex rerum nonnaturalium: consuetudinis, uti in aliis, ita etiam in gravidis præsertim habenda est ratio, idque jam olim nos docuit HIPPOCRATES lib. 2. *Aphor.* 50. & 51. Hic enim in *allegatis aphorismis* inter alia asserit, quod consuetudo licet deteriora, insuetitamen licet melioribus, minus nocere soleant: item quod sanitatis studium sit, non satiari cibis, & impigrum esse ad labores; in gravidis quidem moderatos, cum & omne nimium naturæ inimicum observetur: item idem asserit, quod quiete & abstinentiâ multos magnos morbos curari posse. Speciatim ergo quoad res nonnaturales: ad conservandam gravidarum sanitatem, imprimis ratione aeris, odores nimis fortes, croci & aliorum, siue sint suaveolentes ob hystericas passiones, siue graveolentes ob metum abortus, vitandi sunt. Tales enim simul exagitant massam sanguineam: propterea ne hoc fiat, aut periculum foetui abortus imminet, eosdem fugiant, imprimis, si mulier proclivis est ad passionem hysterica: item propter metum abortus fugiant, ne commotis spiritibus & successivè commoveatur uterus, & excludatur foetus. Notum namque est, quod odor carbonum incensorum, & foetor candelarum extinctarum, maximè nocivus sit foetui, ut in quibusdam abortum provocare soleant.

Deinde quoad *assumpta*: ut plurimum appetitus audiat, & assueta assumantur, modo sub moderata dosi appetitus desiderio satisfiat: *Sobrietas* enim, teste HELMONTIO, *cardo est totius diætæ in ratione visus*. In specie tamen *fructus boni* non nimis capiantur propter vim fermentativam; partim quia fermentatione istâ subinde Diarrhæas aut Dysenterias, gravidis imprimis funestas, inducere solent; partim quia præter statum inde natos subinde passionem hysterica solent excitare; partim etiam, quia facillè accescunt, qui acor inimicissimus est foetui tenello. *Aromata* quod attinet: & ipsa etiam moderatè sunt usurpanda, speciatim acriora, quia sunt spirituosæ ac volatilia. Indeque facillimè massam sanguineam commovere, hincque partum, lochia, secundinas, menses, aliasque uteri hæmorrhagias, vel similes periculosas excretiones, excitare possunt. Notum enim est de cinnamomo, caryophyllis, galanga, croco, pipere, ædnaria, gingibere, quod, præter mensium vim pullivam, lochia &c. promoveant; Metus enim est, ne foetus ad abortum disponant: Moderatè ergo usurpentur, saltem ut status discutiant. *Acida* etiam imprimis nocent, & tota gestationis tempore, cujuscunque sint generis, vitentur: præter hoc enim, quod sexui sequiori minus conveniant, speciatim foetui, cujus systema nervosum debile & facillimè irritabile est, hostilia sunt, unde uterum, cum membranoso & nervoso, insigniter irritando ad abortum

disponunt, cum membranosis & nervosis partibus, nil æquè sit hostile & inimicum, quàm acidum. Ne ergo ab acido irritatus uterus ad abortum commoveatur, ab his excessivis sedulo est cavendum: Sic mulieres, quæ crebrè utuntur aceto, aliisque acidis, pariunt infantes dispositos ad epilepsiam, & sine epidermide natos: Conf. M. A. N. C. *Ann.* 2. *Observat.* 49. pag. 333. Butyri esum prægnantibus & suffocationi uterinae crebriori detentis noxium asserit BORRELLUS *Cent.* 3. *Observat.* 26. quod tamen falsum existimo.

Hinc vinum non semper conducit Gravidis, imprimis gravidis vegetis; disponit enim foetum ad epilepsiam; & in specie si mulier fuerit paulò spirituosior & vegeta, Vinum etiam ad abortum disponit. Parcè ergo & moderatè bibatur. Dulcia magis conveniunt utero membranoso, ipsique foetui gratiora, quàm ista acida vina. Præterea etiam facillè fermentescibilia quæcunque, ut *cerevisia recens*, esculenta & potulenta, indeque *farulenta*, sedulo aut studiosè sunt à gravidis vitanda, cum abdomen uberius distendatur, & distendendo difficilem respirationem matri, & angustiam foetui, tormina, passiones hybericas, cholera aut diarrhæas, inferre soleant.

Quoad *motum*: omnis motus violentus caveatur, qui maximè nocivus est gravidis, ac manuum extensio sursum, cum facillè enim abortum patiantur mulieres propter uteri compressionem, & abdominis attractionem: *Contractio* ita sic abdomine, valde comprimitur & coarctatur uterus, subinde concitantur dolores uterini, & distendit & extensa vaginâ dilatatur nimis orificium uteri, & sæpius à tali manuum sursum versus tensione membranzæ foetum ambientes rumpuntur, & præmaturus aquarum excitatur effluxus. Item omnis *gestatio* aut *sublatio oneris* gravioris cum nisu tali, ut inspirent, propter retentionem halitus, ac depressionem diaphragmatis inferiora versus, est nociva, quia sic premittitur uterus, & deorsum movetur. *Salus* item pedum quilibet deorsum, in specie primis gestationis mensibus, mulieribus gravidis ob metum abortus propter placentæ avulsionem nocet; Movetur enim sic ovum uterinum inferiora versus, ut exinde ejusdem fiat effluxus, uti quidem abortus primis mensibus vocatur. Motus autem moderatus ultimis imprimis gestationis mensibus, ut *salutatio blanda*, satis conveniens est, quia tali motione uterus non nihil subsidet, foetus magis deorsum inclinatur; hinc successivè distenduntur & dehiscunt viæ angustiores orificii uterini & vaginæ, & istâ subsidentiâ ac motu deorsum non nihil incipit laxari os pubis; unde post moderatum motum ultimis mensibus facillior sequitur partus, & facilius secundina separari potest, quæ in his, quæ sunt quietæ, difficulter separatur: sed cautè admodum, ne hujus occasione foetus situm præternaturalem in partu acquirat, ut rectè contra communem opinionem hoc urget MAURICEAU de *Morb. Mulier.* lib. 1. cap. 11. & lib. 2. cap. 6.

*Vigilia nimia* autem diutius protracta gravidis multum periculosa, Autore BARTHOLINO *Cent.* 4. *Hist.* 70.

Quoad *Veneris exercitium*: hoc ipsum vitandum, cum non adeo conducit gravidis, utut rarè soleant abstinere, ab eodem; quia metus est, ne in secundioribus primis mensibus ex repetita Venere fiat superfœtatio, aut etiam periculosa molæ generatio: ultimis mensibus penitus omittenda, ne venter tumidus nimis compressus noxam foetui inferat.

Quoad *animi perturbata* graviora: ea etiam suas merentur cautelas; imprimis terror, hincira, fugienda sunt, quia sunt affectus nocentissimi: *Ira* enim, cum insigniter moveat massam sanguineam, & excitet lochia, & hæmorrhagias uteri graviores, ad abortum disponere solet: *Terror* verò maximè signat foetum, cui adeo est nocivus, ut interdum exinde interimatur foetus, aut exinde ad epilepsiam lethalem jam in utero materno disponatur; sicut mulieres primo gestationis tempore terrefactæ interficiunt



clunt fetum, ultimo vero reddunt epilepticum : Sic mulier ultimo momento gravidationis vespere gravi terrore afficiebatur, post mediam noctem pariebat, fetus erat mortuus. *Gaudium moderatum, lætitia & similia sunt saluberrima, in specie gaudium læpius felicitem solet præcedere partum.*

Inter *Excreta & Retenta* in gravidis studendum est, ut *alvus* quotidie sit laxa seu aperta, cum retenta scybala, & suppressi status graves aliàs dent turbas, in specie ultimis mensibus : Quod si sit *clausa*, fluida servanda est omni studio. Pro hoc tamen scopo sedulo vitanda sunt *Suppositoria*, in specie acriora, tam primis quàm ultimis mensibus, idque ob metum abortus ex irritatione vaginæ uteri cum Intestino recto arctè connexi, ne uterus disponatur ad spasmus seu sui contractionem. Item vitentur *Clysters* quicunque in gravidis, nisi interdum ad horum usum, sed raro, cogatur Medicus, lique cautè in minore præscribantur dosi, & non, nisi ex blandè Emollientibus & Carminantibus, Lactiniis, Jusculis avenaceis, non verò ex aromaticis acerbis præparandi. *Adstricta* ergo si fuerit *alvus*, potius uberius assumendos est, qui hic solet emollires, & ulterius derivare fæces: aut juscula pinguiora, aut copiosiora, aut similia fluida aut liquidiora, crebrius deglutiantur: aut cremor tartari, vel solus ad ℥ss. vel ℥ij vel quod melius, cum dimidio salis tartari mistum cum jusculo carnis fervido subinde usurpatus, est optimus; sic enim alvum retinet laxam. *Aloetica* vitentur omnia, etiam *pilula*, quas vocant *Francosurfenses*; Nam omnia aloetica menses stimulant, & vellicativa vi ad abortum disponunt: præterea aloè nimiam post se adstrictionem relinquit, & ita, quantum juvat, tantum nocet. Vitetur etiam *Senna*, quia tormina admodum gravia excitat, quæ mulieribus gravidis sunt nociva, propter metum abortus: Si tamen adduntur tartareo, sine torminibus operatur. Postmodum *Purgantia* quæcunque vitentur studiosè, quia omnia sunt venenosa, virulenta, & vim habent enecandi fetum, & corrumperendi ejusdem nutrimentum proximum. Vix ex veris *Purgantibus* aliud, quàm *Rhabarbarum* tutè potest concedi gravidis, idque non solum propter adstrictionem, sed semper vel sociatum tartareo, vel cum passulato vehiculo usurpatum. *Cassia*, quæ à quibusdam propinatur prægnantibus, est nociva, ob tormina & status, quæ ab illa excitari solent: item propter vim fermentativam passiones hystericas in quibusdam causat; Est enim cassia succus crudus facillè fermentescibilis. Item *Manna* nocet, quia propter dulcedinem fermentativam, adeoque propter flatulentiam, hystericam passionem inducit. *Oleum* denique *amygdalarum dulcium* recens expressum, ab ℥ss. ad ℥j. vel ℥ij. in jusculo calido jejuno stomacho haustum, optimè conducit ad emolliendam alvum adstrictam, in specie, si à scybalis induratis fuerit adstricta. *Ova* etiam tremula seu liquida sorbilis, cum paucis saccharo, optimè prosunt ad alvum emolliendam. Conducunt ergo *passula minores laxativæ, tamarindum, & Tartareo*, aut ex passulis & tamarindis Laxativa leniora, vel sola, vel cum Tartareis mista, quæ imprimis convenientia sunt mulieribus pro laxanda alvo. Res ut pateat clariùs, v. g.

℥j. Crem tartari ℥j.  
Sal. tartari gr. viij. ad x. vel xij.  
M. D. S.

*Pulvis aperiens.*  
Capiatur manè in jusculo benè calido. Aut

℥j. Crem tartari ℥j. ad ℥ss.  
Pulv. ialapp. gr. v. ad vi.  
M. f. Pulvis laxativus:  
D. S. ut antè.

Vel  
℥j. Pulp. passular. ad ℥j.  
Crem. tartari ℥j. vel arcan. dupl. ℥j.  
Semi. anisi ℥ss. ad ℥ij.  
Syr. rosar. solut. sine scam. par. q. f.  
M. f. Electuarium.  
D. S.

*Electuarium laxans.*

De quo gravis quantitate 2. castanearum caplæ manè jejuno stomacho, quoties alvus fuerit adstricta, ingeratque post usum vel jusculum, vel batulum cerevisiæ.

Sin paulò acrius alvus sit stimulanda:

℥j. Pulp. passul. ℥j.  
Hemall. Oper. Tom. II.

*Rhabarb. el. gr. xv.*

*Sal tartari gr. viij.*

*Olei destillat. anisi gr. ij.*

Cum syr. de cicb. cum Rhabarb. f. q. f. Bolus:  
D. S.

*Electuarium laxativum pro una vice.*

Faciunt etiam huc Passula laxativæ utilitate, & sine tamen scammonio.

Quod si in forma liquida potius usurpanda sunt Passulata, tunc Decocta & infusa passulata, ut Infusum cum senna, vinum Rhenanum Infusionis passularum contusarum, sunt egregia ad laxandam alvum mulierum: v. g.

℥j. Pass. min. ℥j.

Contendantur in mortario, f. exinde Pasta: quæ coquantur in ℥ss. aqua communis:

Colaturæ ferventi infundantur

Fol. senn. sine stipic. ℥j.

Crem. tartari ℥j.

Semi. anisi ℥ss.

Flor. violar. p. ij.

Stent in loco calido per noctem: Manè coletur.

D. S.

*Potio laxativa.*

Elegans admodum & proficua est Potio, suavis saporis, cujus haustulus, quoties opus est, assumptus facillimè alvum laxat.

Quod si forsandulcia ex passulis nonnihil sint adversa, ad acidula ex tamarindo commodè potest fieri accessus; pulpa enim extracta à ℥j. ad ℥j. vel etiam, si cum tali pulpa misceatur tantillum Rhabarbari, etiam commendatur, egregiè laxat: e. g.

℥j. Pulp. tamarind. ℥j. ad ℥j.

Crem. tartari gr. xv.

Sal. tartari gr. vi. vel viij.

Syr. de cicbor. cum Rhabarb. q. f.

F. Bolus: S.

*Bolus laxativus pro una vice.*

Item Tamarindum contusum, nodulo inclusum, & vino vel cerevisiæ infusum, hauriatur pro Potu: Vel coquantur, aut ebulliat leniter in vino, vel in aqua, & hinc Colatura vel simplex, vel tantillo syrupi rubidi, vel rosarum solutivi edulcorata, datur pro Laxativo Gravidarum blando, subinde haustum capiendò. Hinc HORSTII Electuarium de Tamarindis pro laxandis gravidis describitur in *Observ. lib. 1. pag. 560.* In hujusmodi Laxativis statuum proventus vitandus: Ob id semen anisi aut feniculi contusum hujusmodi Decoctis, aut olea horum destillata pulveribus & Electuariis, commodissimè adduntur, cum hæc ipsa flatu egregiè discutiant, & proventum flatulentiarum insigniter impendant. Fetus ratione etiam de caryophyllis aut cinnamomo, aut parum de nucis moschata, intermisceri potest. Elcosaccharum anisi & feniculi etiam amicum est fetui.

## CAPUT II.

### E B

#### POETU DEBILI ROBORANDO.

**M**ater etiam respiciat ad *fatum*, ejusque *robur spirituosum* conservet. Pro fetu ergo custodiendo & roborando Gravidis conducit interdum aqua cinnamomi borraginata, aut cydoniata ritè parata, (nam officinalis est phlegma,) ut blandà ista volatilitate oleosa recreentur spiritus animales exerciti in fetu: item conveni' succus, syrupus, & miva cydoniorum, attemperata cum paucis pulveris caryophyllorum, & macis aut nucis moschata; Aromata enim gravidis prosunt pro conservando fetu: **PANAROLLUS** præ cæteris laudat ova sorbilis recentia, jejuno ventriculo assumpta: Item amygdalarum, fatum more consueto ex amygdalis ambrosinis, cum semine feniculi & paucis syrupo cydoniorum subactis, in gravidis debilibus ad roborandum fetum conducit. Haustulus vini interdum post passum in aduetis & in debilibus non est nocivus; in robustioribus verò aut spirituosus, ut sic dicam, non semper est tutum vinum, sed tales ad abortum disponit: haustulus tamen vini dulcis à passu in aduetis potest usurpari. Vel fiat vinum aromaticum Infusionis plantarum aromaticarum, ut radice



dice galangæ, levistici cum cionamomo, aut temperantibus aromaticis, de qua interdum, sed raro, capiatur haustus.

Externè pro hoc scopo commodè frustum panis aquâ vitæ mulierum, aut balsamo embryonum sic dicto, vinogeneroso Malvatico, & similibus irroratus applicetur umbilico, aut supra regionem pubis: item quando adsunt tormina abdominis aut dorsi, & metus est abortus. Panis piperratus, qui Germanis dicitur *Pfeffer Kuchen*, irroratus vino Malvatico, & adpersus pulvere caryophyllorum & nucis moschata, similiter pro sætu roborando optime conducit: & hæc ipsa imprimis si debillior sit sætus. Vel sacculus interpassatus fiat ex mentha, melissa, zingibere, galangæ, caryophyllis, anthophyllis, semine anisi, feniculi, coriandri, & similibus, oleis destillatis aromaticis, citri, cort. aurantiorum, caryophyllorum, cinnamomi, &c. adspargendis, qui sub introitum læti applicatur ventri tumido calidus circa regionem umbilicalem, vel siccus, vel vinogeneroso irroratus, ut restitueretur sætus.

Hæc de Dieta.

### CAPUT III.

#### DE

### GRAVIDARUM REGIMINE IN MORBIS.

**Q**uoad ergo Therapiam seu regimen gravidarum in morbis, tam acutis quàm chronicis, eadem sanè in his curandi est ratio, quæ in aliis subjectis, nisi quod accuratè semper uno oculo ad menses, altero ad sætum, sit respiciendum, ne aut aliquid noxæ, aut quoad ejus corpus, aut quoad ejus in utero retentionem, superveniat.

### ARTICULUS I.

#### DE

### VENÆ SECTIONE IN GRAVIDIS.

**Q**uod ergo attinet sic dicta remedia universalia: ut utriusque jam habeatur eorum ratio, de venæ sectione imprimis queritur, an conveniat gravidis? Nunc convenit, nunc nocet. Notum quidem est ex *Aphorismis*, quod mulieribus venæ sectio si administraretur, abortum inducat. Verùm *HIPPOCRATES* vixit in climate fervidiore, & ubi mediâ diætâ utebantur mulieres. Apud nos, ubi luxuriantes sunt mulieres, administrare venæ sectionem subinde consultum est, nempe junioribus, habitioribus & plethoricis. Quoad gravidas sanas: in iis sanè, qui sunt habitus laudabilioris, quæ corpore sunt succulento, & denique lauto utuntur victu & vino, in iis interdum necessaria est venæ sectio medio gestationis tempore, scilicet quarto, quinto, vel septimo mense instituta, quia præservat eas ab abortu, cui aliâ essent obnoxie. Testantur enim observationes, quod intermissâ venæ sectione mulieres nonnullæ abortum fuerint passæ, & sætum sanguinis copâ suffocaverint: Refert *PANAROLLUS Pent. 1. Observ. 10.* se novisse mulierem quinto mense semper abortientem, quæ tamen in totâ phlebotomiâ fuit præservata; unde in *Pentec. 2. Observ. 23.* tanquam optimi præservativum gravidarum plethoricarum laudatur, ubi audent primis mensibus venæ sectionem instituere suadet. In eodem etiam binâ, interdum tertiâ vice, secatur venæ medio gestationis tempore, interdum etiam ultra: Conf. *M. A. N. C. Ann. 2. Observ. 47. Ann. 6 & 7. Observ. 304. pag. 301 & Ann. 9 & 10. Observ. 48. pag. 123. PETRUS SALIUS DIVERSUS de Affect. Part. cap. 22. ZACUTUS LUSITANUS lib. 2. Pr. Admir. Obs. 144. & RIVERIUS Prax. lib. 15. cap. 16.* Non verò admittenda est venæ sectio extinctione *HIPPOCRATIS*, qui dicit: si secetur vena, medio gestationis tempore, tunc esse talem innoxiam à purpura; quod falsum est. Ex quidem instituat venæ sectio imprimis in brachio quovunque, non verò in pedè, quicquid etiam dicat *ZACUTUS LUSITANUS*. Interim tamen non sumus nimis profusi in sanguine exhausti in gravidis, sed sanguinis thesaurum conservemus sartum rectumque, ne partum reddamus difficiliorem debilibus gravidis. Instituat potius venæ sectio, si opus est, repetitâ vice, quàm ut sevel nimis de sanguine

detrahatur: Nam & in talibus etiam in partu interdum, ad facilitandum hunc ipsum laboriosiorum, necessarium est, venæ sectionem administrare, ut melius negotium succedat: qualia non pauca prostant exempla, ita ut apertè usque facillima successerit exclusio sætus. Id quod pariter tamen in morbis acutis observandum, in quibus, urgentibus indicationibus, venæ sectio convenit; tutius tamen medio gestationis tempore, minùs verò primis aut ultimis mensibus. Præsertim in his nostris regionibus temperatis, non semper adeo necessaria est venæ sectio; aut, si instituitur, parcius institui potest, quàm in climatibus calidioribus, & ubi diætâ magis lauta & spirituosâ in usu est, uti in Gallia & Italia. Unde etiam apud nos non imitanda consuetudo istorum in venæ sectione nimis excedentium, nec nisi observatis superioribus conditionibus, ad eam accedendum; Nec ad exemplum illius gravidæ, cui 48. vicibus secta fuit vena sine periculo matris & sætus, quo refertur *MAURICEAU lib. 1. cap. 12.*

Hæc de Venæ sectione,

### ARTICULUS II.

#### DE

### PURGATIONE GRAVIDARUM.

**P**urgationem quod attinet: in iis, quæ facillè vomunt, quæ continuè nausæ, aut picæ, aut stomachi dolore & similibus symptomatis laborant, leviora & blanda vomitoria primis mensibus propinare sæpe proficuum est. Nam ipsa natura hæc in parte subinde nostra est magistra, quæ nobis viam præmonstrat, & in primis mensibus crebros, interdum continuos provocat vomitus, in specie, ubi adsunt symptomata stomachi, citra matris aut sætus noxam. Hinc ipsam ergo & cautè imitari, cui erit prohibitum? Sic gravidam melancholicam vomitorio, sine sætus noxa curatam videb. in *M. A. N. C. Ann. 9. & 10. Observ. 73.* Imò hoc tempore Vomitoria tutiora longè sunt purgantibus fortioribus per inferiora; Quia mulieres si facillè vomunt, bene postea se gerunt in sex puerperii hebdomadibus.

Quod verò Purgantia per inferiora attinet: præter ista Emollientia, Laxantia & blandè abstergentia superius propinata, omnia ea, præsertim aciora, omnino damno; ut ut exempla testentur non pauca, gravidis citra ullam noxam etiam frequentiora, & vehementiora propinata & usurpata fuisse solent: vid. *SCHOLZIUS lib. 3. Observ. 2.* item *ZACUTUS LUSITANUS lib. 3. Med. Princ. Hist. 14.* Cum sanè aliâs difficillimum sit, arte prouocare abortum, Nilominus tamen in talibus nullus cordatus Medicus exempla talia suspecta saltim, & dubia alia, quæ accidentariâ saltem contingunt, studio & temerè imitari debet. Nam Purgantia propriè dicta

1. Ob malignitatem suam, quæ succum nutritivum corumpunt & alterant, ferui sunt nocentissima.
2. Ex torminibus & spasmodis intestinorum, si non hysterica in gravidis passionem excitare, tamen per consensum uterum ad sui contracturam & abortum periculosè stimulare possunt.

Quod si ergo Purgans aliquod interdum, invito etiam Medico, propinandum sit, cautissimè, ac saltim quarto vel quinto mense id fiat, idque medio tempore gestationis, & probè circumspici ejus quantitate, omnibusque ritè simul pensatis circumstantiis, vitando omnem irritationem ac tormina: conf. *HIPPOCRATES lib. 4. Aphor. 1. & lib. 5. Aphor. 29. RIVERIUS Prax. lib. 15. cap. 16. SENNERTVS Prax. lib. 4. P. 2. Quæst. 1. & ZACUTUS LUSITANUS lib. 3. de Med. Princ. Hist. 14.*

### ARTICULUS III.

#### DE

### OPIATORVM VSV IN GRAVIDIS.

**S**ymptomata denique quod attinet urgentia: utot his omnibus fere facillè succurrat *Opium*, ejusque laudanum, vix tamen tutò hoc usurpare licet in gravidis, saltim tremulâ manu, & in succinctâ admodum dosi: Observatum namque fuit, sæpissimè quævis opiata incautè administrata imprimis utero & gravidis maxime esse nociva, & omni



## C U R A.

Omni gestationis mense, etiam circa ultima tempora, ut plurimum abortus & fetus immaturus ejectionem sæpius induxisse. Nocentissima sunt fetui tenello, cum spirituum animalium exercitum destruere, & fetum enecare possint: Item in causa sunt, ut torpentiibus ab adhibitis opiatibus spiritibus, motus æquabilis & blanda fibrarum nervosarum inflatio cesset, unde & fibræ uteri quasi resolutis & relaxatis, elabi ferè fetum possunt sub forma abortus, ita ut uteri sit resolutio; adeo ut caustissimus in eorum usu pro gravidis sit Medicus, si laudabilem ejus exoptat usum. Interdum tamen, ubi metus est nimis uti irritationis, aut nimis spirituum animalium commotionis in gravidis, ne commotione tali vel noxa inducatur utero, vel provocetur fetus ad abortum, consideratis prius bene omnibus circumstantiis, tantillum laudant opiatum cum aliis adhiberi potest. Item aliis irritis in affectibus matris catarrhibus nocturnis contumacioribus, v.g. tussis ferina, vigilis nimis, &c. necessitate urgente interdum ad laudanum opiatum, cautè tamen & appropriatis missum confugero licet: De quo successu Opiatorum in affectibus catarrhibus: vid. HORSTIVS lib. 10. *Observ.* 111. In genere quoad Purgantia, & Opiata: in gravidis observandum, an magis vel minus ferat mulier eadem gravis, namque, quæ debili sunt stomacho, & facile moventur à Purgantibus, iis cautè propinanda laxantia; sicuti quæ debiliore sunt systemate nervoso, & quorum spirituum animalium rarior textura est, talibus quoque, nisi cautè, Opiata propinanda.

## C A P V T IV.

## D E

## GRAVIDARVM SYMPTOMATIBVS.

**Q**uod ergo in specie graviora attinet SYMPTOMATA, quæ gravidæ subinde uexant; horum quadruplex ferè causa observanda venit:

1. Aq̃uitas auræ genitalis maris, cujus occasione mox post conceptionem varia pathemata gravidæ affligunt.
2. Motus sanguinis fermentativus menstruus humoribus adhuc impressus, cujus occasione ex denegata excretionem varia pathemata ex commotis humoribus superueniunt, idque ferè primis gestationis mensibus.
3. Ob menses retentos, hinc sanguinem uberius congestum, & ex retentis aliis excernendis multiplices actionum alterationes.
4. Consensus uteri alterati, & successivè dissentii cum aliis partibus abdominalis, præsertim cum ventriculo.

Et hæc 4. sunt fontes symptomatum gravidæ in specie affligentium, inter quæ stomachi pathemata sunt frequentissima, imprimis sæpius familiaris & molestus est vomitus.

## ARTICULUS I.

## D E

## VOMITU GRAVIDARUM.

**V**omitus nunc saltim primis gestationis mensibus molestus est, & partim ex vi auræ genitalis, partim ex motu humorum fermentativum menstruus resurgente, oritur; sicut vomitus quotidianus eruentis in gravidis innoxius observatus fuit in M. A. N. C. *Ann. g. & c. Observ.* 6. Nunc mediis gestationis mensibus gravior affligit, & ferè ob inopiam suppressionem in plus minus cacochymicis oritur: nunc etiam ad ultimos usque gestationis menses perdurat, & modo dictas pariter agnoscit causas: nunc verò ultimus gestationis mensibus saltim supervenit, qui antea non adfuerat, & partim ex consensu ventriculi cum utero nimis dissentio, partim ex irritatione ventriculi ab utero sursum nimis elato, originem ducit. Pro varia hujus in fœcidi modo ratione diuersimodè instituenda.

Vomitus, qui primo, secundo, aut tertio gestationis mense accidit, non facile sistendus, sed naturæ negotium committendum, cum plerumque post unum alterumve mensem spontè cessare soleat; quod crebrius enim vomunt, eò facilius habent puerperium. Quod si diutius continuetur circa medium gestationis tempus, potius venæ sectione, quam remediis compescendus; venæ sectione enim in brachio in talibus vomitus cessat. Quod si ex cacochymia, adeoque retentis acrioribus, forsitan vomitus contingat, præsertim ultra medium gestationis tempus, blandè ab orbentia & abstergentia ac temperantia conducunt, non negligendo, quæ stomachum confortant. De vomitu autem observetur, quod diuersimodè affligat mulieres: Quædam, si mulatque gravidæ factæ fuerint, etiam mox primis diebus vomitu affliguntur, rejiciendo per os varia aquosa & limpidula, qualia subito non sunt sistenda; aliæ in fine primi, & principio secundi mensis vomunt, & vomunt usque ad medium gestationis tempus; quædam etiam usque ad partum vomunt, & nausæa laborant. Sed ultimis gestationis mensibus admodum periculosus esse solet, adeoque tunc maturè est compescendus. Pro sistendo ergo gravidarum vomitu, imprimis si pertinaciter hæreat, tam secundo, tertio, quam ultimis mensibus; tunc præmissis aut interpositis blandè laxantibus, appropriata stomachica sunt usurpanda: quæ inter conveniunt remedia quæcunque ex cydoniis, succus cydoniorum, mela cydoniorum, item syrupus ribium, ægrestis, de citro, & acetositate citri, quæ sunt egregia. Grana masticis manè assumpta & comesta, item aqua menthæ, cinnamomi cydonia, spiritus masticis acidus cum aqua cinnamomi propinatus, etiam conveniunt: item liquor terre fol. tartari, in specie quando adest nausæa propter mucum salsum vel pituitam salsum, vellicantem orificium stomachi: in talibus hic liquor est egregius, dosi ʒss. Ex his possunt fieri Mixture, quarum descriptiones seu compositiones sunt facillimæ: v.g.

ʒ. Aqua menth ʒss. vel ʒij.

Cinnam. ʒij. vel ʒss. ad ʒvj.

Liqu. terræ fol. tartari ʒss. vel ʒij.

M. S.

Potio stomachalis dissolvens.

Capiantur cochl. ij. vel iij. donec compescatur vomitus. Tinctura etiam vitrioli Martis Zwelferi in mulieribus gravidis nimis vomentibus ad 30 vel 40 guttas non est inconcinna, bene confortat. Alia Martialis Martis magis impregnata minus tuta sunt: eum eorum usu tormina parturientium similia excitata observaverim. Spiritus masticis, spiritus vitrioli Martis, hinc conferua rosarum, aut conferua menthæ, parumper cum spiritu vitrioli Martis acidulata, &c. in usu sunt. Quod si aciores succi sunt, præsertim ultimis mensibus, à quibus omni mane vomitus stimuletur:

ʒ. Co. all. rubr. præp ʒi.

Lap. cancr. præp ʒss.

Pulv. caryoph. gr. xv.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis stomachalis.

De quo capiatur omni mane, quantum cuspis cultelli capiat, in brodio calido. Vel ʒ.

ʒ. Corall. rubr. præp ʒss.

Pulv. cancr. calcin. gr. xv.

Nuc. mosch ʒss.

Olei destillat. mac. gr. iij.

M. f. Pulvis pro 2. dosibus.

D. S. ut antè.

Externè regioni stomachi in vomitu nimio imponendum est Emplastrum stomachale Cratonis, missum cum Tacamahaca: Emplastrum ex Theriaca, impregnata cum aliquot guttulis olei destillati menthæ & macis: aut imponatur Cataplasma ex fermento cum speciebus stomachicis. In specie aromaticis. Item fiat invocatio stomachi cum oleo masticino, oleo absinthii, cum oleo destillato masticis, menthæ, & oleo nucis moschatæ, tam expresso quam destillato. Præterea crusta panis in vino generoso intincta, & aromaticis adpersa, ventriculo applicata conducit. Vel Balsamum Peruvianum inducatur linteo denso, cui inspergatur pulvis gallarum contusarum, & aliquantum macis, & ita subindè applicetur stomacho. In vomitu contumaciori, ac gravi nimis vomendi conatu, ubi mulieribus excitantur pathemata hysterica, vel si primis



gestationis mensibus urgeant *passiones hystericae* cum vomitu, in tali casu, præter tincturam vitrioli Martis Zwelferi, Emplastrum hysterica, v. g. Emplastrum matricale de galbano & tacamahaca, malaxatis invicem cum balsamo Peruviano, regioni umbilicali applicata, conducunt. Ibi vomitus sunt simpliciter convulsivi.

## ARTICULUS II.

## DE

## PICA.

**S**ubstituimus in symptomatis, quæ Gravidis gestationis tempore subinde obvenire solent: Hæc inter symptomata molesta sunt duo famosi, nempe Pica, & Alimentorum Fastidium.

Quoad Picam? est ea appetitus insignior rerum insolitarum, superveniens ferè circa secundum mensem, dum menstruus sanguis in suo motu fuit impeditus, unde stomachi fermentum alteratur, quod à sapore naturali in acidum degenerat, & sal volatile oleosum obtundit. Appetuntur in pica vel consueta, vel aliæ sibi insolita. Si appetuntur sibi insolita, vix tutò concedi potest; Nam, utut talia comesta, non semper noceant, si non nimia quantitate assumantur, tamen vix tutò semper, imprimis si sint res absurdiores, concedi possunt. Sin verò appetantur res sibi aptæ, tunc sanè concedendæ sunt: Nam res appetitæ facilius digeruntur & concoquantur, & sæpè tales gravidæ citra noxam huiusmodi cibos assumunt, quæ non gravidis ipsis vix essent absque noxa.

## PROGNOSIS.

Malum hoc nihil habet in recessu, nisi mulier fiat languida & debilis, cum si comedat nimis intense, periculum est, ne varia symptomata superveniant, & totus ad abortum disponatur.

## CURA.

Quoad Curam: utiliter ea usurpari possunt, quæ *Artk. 1. de vomitu* dicta sunt. Quod si verò talia appetunt, quæ haberi nequeunt, ne exinde scerul imprimator signum aliquod, aut ne scerul accidat nocumentum, exhibendum est gravidæ aliquid de nucle moschata cum paucis melle; hoc enim seu probatum in tali casu laudatur. Aliàs in Pica, succus citri & aurantiorum, aqua corticum aurantiorum, syrupus de corticibus aurantiorum & citri, syrupus de absothio, item pulvis nucis moschatæ, cortex aurantiorum & citri laudantur. Tenella etiam folia vitis, exque iis expressus succus purificatus, vel solus, vel cum succo, aut syrupo, aut miva cydoniorum haustus, contra picam optima sunt: item aqua vitis, quæ Mayo mense spontè ex pampinis incisiss exstillat; aut aqua acidula tenellorum vitis foliorum destillata, seu specifica gravidarum picantium habentur remedia: oleum destillatum corticum aurantiorum, & eorum essentia, etiam utiliter propinatur. Hinc granata, eorumque succus acidus, cydoniorum &c. est egregius in pica; & panis in his ipsis maceratus comestus etiam picam tollere solet. Quod si appetantur res insolitæ, quæ apparenter sunt difficilis digestionis, ut creta, calx, carbones, &c. tunc fixa acidum absorbentia conveniunt, ut sunt corallia præparata, mater perlarum, lapilli cancrorum, cornu cervi, item ebur, tam sine igne quàm usum, quæ vel cruda, vel cum tantillo aceti incorporata, aut cum vino paucis assumantur interius.

## ARTICULUS III.

## DE

## NAUSEA ET FASTIDIO CIBORUM.

**D**uo hi affectus non rarò ad tertium usque protrahuntur mensem, quo transacto, spontè cessare solet omnis huiusmodi fastidium. Hoc fastidium, tanquam gravidationis signum, proponit HIPPOCRATES *sect. 1. Aphor. 45.* dum inquit: Si mulieri cessent Purgationes (nempe menstrua) neque horror, neque febris superveniat, & cibi fastidia accedant, judica, ipsam in utero habere.

## CAUSE.

Origo horum est ex alteratione contentorum corporis, ac fermenti stomachalis, partim ab aura genitali maris, partim detentis menstruis.

## PROGNOSIS.

Mala hæc nihil in recessu habent, nisi mulier languida & debilis fiat, &c.

## CURA.

Ne ergo ex fastidio graviore corpus contabescat, aut etiam generatio ovi uterini, & albumini vestimentum, ut sic dicam, seu albumini generando materia deficiat, propterea ad tollendum fastidium quædam à Medico sunt ordinanda. Primò lenè vomitorium propinatum, imprimis in omnihis cacochymicis, sæpius utile est: Quod si non tollatur, potest propinari fortius vomitorium. Præter hæc Pilulæ aloëphaginatæ sine Purgantibus paratæ convenienter propinquantur; aromaticæ enim cum sint, stomachum detergent, eumque roborant. Juxta hæc subinde sunt acida assumenda, ad corrigendum succum stomachalem inquinatum. Hinc syrupus conservativus radicis zingiberis, aut ipsum zingiber in India conditum, vel etiam aux moschata in India condita, vino acidulo liquorata, & parum ejusdem tempore maturius haustum, fastidium ciborum delet. Vinum generosum. Malvaticum cum buccella panis assumptum, Mala cydonia condita, miva, succus, & omnia ex cydoniis parata, & quæ jam *Art. 1. de vomitu* commendata, ad Gravidarum fastidium tollendum conducunt. Præterea aceto conditum, item cappares aceto conditi, Elixir item stomachale, (nam ab Elixir proprietatis abstinendum propter aloë, crocum & myrrham,) ac similia commodè usurpantur. Præterea spiritus mastichis acidus, item spiritus salis dulcis, convenientissimè fastidium gravidarum tollit, si assumatur in vino Malvatico, vel paucis vini generosi: vel propinetur mixtura:

*℞. Aqua menth. ℥ij.*

*Cinnam. ℥vj.*

*Spiritus mastich. ℥ij.*

*Theriac campb. ℥j.*

*Salis dulc. gr. xij.*

*Syr. de succ. cydon. ℥℥.*

*M. f. Mixtura.*

*D. S.*

*Potio pro stomacho confortanda.*

De qua interdum cochleare exhausta, gravida primis mensibus, quæ ipsam stomachi affectibus earundem insigniter conducit.

Externè commodè oleum mastichinum, oleum menthæ, cydoniorum, cum paucis oleo stomach. Cratonis (propter copiosam nucle moschatam) regioni stomachi inungitur, & later calidus desuper applicari potest: aut etiam ceratum seu emplastrum de crusta panis, malaxatum cum oleo mastichino, item ceratum de tacamahaca, commodè imponitur regioni stomachi.

## ARTICULUS IV.

## DE

## TORMINIBUS VENTRIS GRAVIDARVM.

**V**terius sæpè *Termina ventris* dolorosa molesta sunt gravidis; nunc quidem in fine gestationis, quo tempore dolores nothos parturientium constituunt, de quibus *infra*; nunc verò etiam prioribus mensibus iisdem gravia sunt; nunc ex flatibus, ab acido vitioso in intestinis per fermentationem suscitatis, sicut in passionibus hysterica; nunc à mucilagine viscida pontica intestinis adherente, & ea vellicante ortum habet, & colligitur, quando non vomunt & voraces sunt, ubi contumacia & acerbis oritur tormina.



## C U R A.

Utroque Absorbentia cum Aromatibus temperatis sociata, Carminantibus imprimis, sunt in usum vocanda. Non tantum modò semina quatuor calida maiora & carminativa notissima, in vino bullita; sed præterea, etiam cortices citri & cortices aurantium cum maxillistucii piscis; item vina aromatica, seu clareta Hippocratica; aqua etiam & spiritus zedoaria, ubi à flatibus est malum, corticum citri & aurantium tinctura seu essentia, & olea destillata: anisum etiam & fœniculum, horumque olea, in vehiculis appropriatis cum corallis & similibus propinata, tinctura tartari cum oleo destillato anisi imprægnata, egregia sunt. Præ reliquis convenit aqua vitæ mulierum cum oleo fœniculi aut corticum aurantium, insigniter juvat. Potest hinc fieri talis Mixture:

24. *Aqua fœnic.* ℞i.

*Cinnam.* ℞. ad ℞i.

*Carminat.* ℞. ad ℞i.

*Spiritus zedoar.* ℞iij. vel ℞vj.

*Nitridulc.* ℞. ad ℞i.

*Syrup. de cort. aurans.* ℞.

M. f. Potio: S.

Potio leniens cochlearium sumenda.

Cujus aliquot cochlearia subinde delibantur, quæ efficaciter discutient flatus.

Convenit etiam gummi ammoniacum in forma Potionis liquidæ assumptum, pro absterfione mucaginis acidæ. Externè inungantur superiores abdominis regiones oleo rutæ, laurino, chamomillæ, acuatocum oleo destillato chamomillæ. Item Fomenta seu Sacci ex carminantibus, v. g. ex sale & milio tosto cum seminibus istis calidis maioribus, qui sacculi interpassati, spiritu vini aut vino irrorati abdomini applicati conducunt ad sistendos dolores: Aut, quod est experimentum à CASTRO, fiat placenta mollis ex vitellis ovorum num. 17. quibus fortiter agitati addatur pulvis anisi, cumini, fœniculi, an. ℞i. & cum s. q. olei laurini misc. pro placenta infernenda abdomini. Vel fiat Cataplasma molle ex feminibus quatuor calidis contusis, cum vitello ovi exceptis, linteis superinductum, & abdomini illustratum.

## ARTICULUS V.

## D E

## DIARRHOEA GRAVIDARUM.

Vterius tam primis, quàm etiam subinde ultionis mensibus, alvi fluxus seu Diarrhoea, nunc simpliciter talis, nunc cruenta, est molesta gravidis, periculum abortus inducens.

## P R O G N O S I S.

In principio gestationis periculosior ac mali ominis esse solet, adeoque sistenda: Circa ultimos verò menses sine causa manifesta obveniens, nisi sit nimia, relinquenda; si quidem prægnantes nonnunquam huiusmodi diarrhoeas, interdum & leves dysenterias, cum euphoria ferunt usque ad partum citra noxam, quo tempore sponte cessant per lochiorum fluxum: vid. SCHOLZIUS Conf. 340.

Nimia autem est affectus periculosus, uti jam suo tempore monuit HIPPOCRATES Sect. 5. Aphor. 34.

## C U R A.

Sin ergo fiat quocunque gestationis tempore sine virium prostratione, nec sit adeo copiosus, nec interturbet somnum, & quæ sunt similes circumstantiæ, admodum consultum est, ut non adeo facile sistatur, sed aliquandiu relinquatur hæc diarrhoea, & potius stomacho prospiciatur; quoniam naturæ ductrice sanguinis excernitur excrementum, & sic purgatur. Sin verò sit diarrhoea nimia medio gestationis tempore, aut vires deiciat, ut metus sit abortus, speciatim si dysenteria maligna apprehendat mulieres gravidas, ferè semper abortiunt. Si ergo sistenda sit Diarrhoea, tunc Purgantia omnino exulent, aut saltem Rhabarbarum usur-

Attmull. Oper. Tom. II.

pandum est. Potius conferant blanda adstringentia acidula; qualia imprimis sunt: Cydonia costâ condita, succus cydoniorum fumo sulphuris asseruatus, rob cydoniorum, item Syrupus & omnia remedia cydoniata, corallia soluta, etiam Syrupi & tinctura coralliorum, cornu cervi bismum, &c. Decoctum radices tormentillæ aliis permixtum est egregium. Item gelatina cornu cervi ad ℞i. in potu ordinario dissoluta quotidie bibita, diarrhoeam sistere solet. Denique Theriaca, vel Electuarium diascordii Fracastorii, aliis irritis in vehiculo appropriato, admixto quodam acido, usurpatum est efficax. Cautus tamen sit ejus usus propter opium simul ingrediens: unde ut opium corrigatur, & ipsum Electuarium melius operetur, cum tantillo aceti vel aliis temperandum est; Nam acida corrigunt opium. In tali ergo casu potest fieri talis Mixture:

24. *Aqua menth.* ℞i.

*Succ. cydon.* ℞vj.

*Spiritus mastich. ritè par.* ℞iij.

*Elect. diascord.* Frac. ℞i.

*Extr. torment.* ℞i. vel ℞ss.

*Syr. corall.* ℞ss.

M. f. Potio subinde haurienda.

D. S.

Posio adstringens.

Quibus accedat subinde blandus sudor: Nam tali omnium optimè potest sisti nimia gravidarum Diarrhoea ac dysenteria.

Spiritus mastichis etiam confert: item conserva rosarum vitriolata, cum corallis rubris præparatis, & syrupo aut succo cydoniorum instar Electuarii, repetitum comesta conducit: c. g.

24. *Conf. rosar. vitriolat.* ℞iij.

*El. diascord.* Frac. ℞iij.

*Corall. rub. præp.* ℞i.

*Nuc. moschat.* ℞ss.

Cum s. q. *syr. cydon.* f. Electuarium.

D. S.

Electuarium adstringens.

Dosis quantitas nucis moschatæ.

Externè commendatur Emplastrum, factum ex mastiche, subacta cum oleo rosarum, quæ cum sufficiente quantitate cere in forma emplastrum inducatur linteis: & dat Emplastrum efficax, umbilici regioni applicandum, quod pariter in vomitu locum invenit. Vel fiat Cataplasma ex cydoniis costis, cum quorum pulpa misc. pulvis macis, caryophyllorum, nucis moschatæ, mastichis & similibus, quod ipsum imprimis stomacho est applicandum.

## ARTICULUS VI.

## D E

## DOLORE LUMBORUM, COXENDICUM, &amp; PUBIS.

Dolores lumborum, coxendicum, ac pubis, subinde multum affligunt gravidas, & ferè oriuntur ex distensione uteri, ejusque ligamentorum & membranarum ipsi connexarum; idque in lumborum & coxendicum; vel à pondere uteri magis subsidentis, aut anteriora versus prominentis; Idque in dolore pubis. Ligamenta ista & partes vicinæ interdum adeo distenduntur, ut etiam ruptio in uno alterove loco fiat, unde vomitus, dolores, febres, &c. superveniunt: vid. de hoc MAURICEAU de Morbor. mulier. lib. I. cap. 13. Observandum autem hic, varium esse fetus situm in abdomine: Nam quædam feminae portant fetus alitè, unde nullas sentiunt infra molestias; aliæ admodum infra eundem gestant, id quod dolores inguinum & coxarum insert, quatenus distat partes distenduntur; aliæ gestant fetus, ut insigniter promineant; aliæ, ut talem intrusum quasi recondit, unde dolores dorsi & renum inducuntur.

## C U R A.

Pro doloribus his leniendis litus blandè emollientes & laxantes ex oleo lumbricorum terrestrium, amygdalarum dulcium recentium, chamomillæ, &c. acuatocum paucis olei destillati juniperini: item pro coxarum doloribus

Kkk 3

subin-



subindè graviter lancinantibus aqua articularis ad extra cum spiritu lumbricorum terrestrium benè affricando.

## ARTICULUS VII.

## D E

## ODONTALGIA GRAVIDARUM.

**C**ommunis etiam querela est gravidarum, ut molestias dolorositas percipiant ex dentium dolore: quoniam dentium dolorem, primis mensibus molestem, optimè sistunt decocta appropriata in ore detenta, v. g. ex absinthio, quinquefolio, oxylapatho, ortica majore, & ligno sancto: quorum in aqua, paucò addito aceto, detineatur decoctum in ore, & subindè exspuatur. Quod si dolores dentium forsitan sint ex scorbutico, loco aquæ & aceti fiat decoctum in lacte vel sero lactis, quod magis appropriatum est in dolore dentium scorbutico. Aliàs etiam Decoctum Nicotianæ in ore detentum, (hæc capitellâ, ne aliquid deglutitur; nam vomitus movet,) etiam potenter dolorem dentium sistit. Vel oleum camphoræ, aut oleum origani Cretici, aut oleum destillatum caryophyllorum, bombace exceptum impitatur, aut imponatur interius denti; nam & hæc dolorem sistunt. Item essentia ligni Guajaci aut sassafras cum spiritu vini parata, est admodum elegans & efficax in dolore dentium: Si in hoc solvantur aliquot grana laudani opijati, dant tincturam odontalgicam, cum bombace salubriter applicandam; Nam veteres Phllopium Romanum non sine successu denti dolenti imposuerunt ratione papaveris: Externè temporibus applicatur emplastrum in forma thaleri ex mastiche & tacamahaca, quæ diu subacta, temporibus imposita, non raro conducunt.

## ARTICULUS VIII.

## D E

## CORDIS PALPITATIONE ET SYNCOPE GRAVIDARUM.

**I**uxta hæc procedente successivè gestationis tempore, supervenit gravidis etiam molesta palpitatio cordis, cui interdum syncope supervenit: & quidem

1. Paulò habitioribus juveniculis, imprimis, si ambulando se movere incipiunt: Talis palpitatio est ex abundantia sanguinis.
2. Affliguntur prævidæ hypochondriacæ, in quibus supervenit vitio sanguinis, & affectu nervosarum spasmodico, à vitioso acido adcongruementiam dispositi & apti, ut in ventriculis cordis stagnet.

## C U R A.

Propriè in casu, si Palpitatio sit vehementior, si superveniat circa medium gestationis tempus, si sit in constitutione corporis laudabiliori aut succulenta, optimè tollitur per venæ sectionem: quæ si non possit admitti, vel non prosit, ad alia appropriata contra cordis palpitacionem est accedendum. Posteriore in casu acidum destruat: quod inter eminent Marina, & hinc quædam salia volatilia in parva dosi. Inter Marina conveniunt corallia, & omnia ex corallis rite parata, in specie tinctura coralliorum antiscorbutica; tinctura coralliorum cum spiritu cordis cervi est remedium admodum elegans in gravidarum Palpitatione cordis, si à 30. ad 40. vel 50. guttas bis quotidie usurpetur: aut saltem loco hujus in paupericulis solutio coralliorum cum succo citri saccharo edulcorata propinanda est, & ipsa conducit. Conveniunt etiam mater perlarum præparata, testa concharum & ostræarum. His addi potest parum de sale volatili macro, non oleoso, v. g. sale volatili urine probe rectificato, vel sale ammoniaci; tale enim sale volatile ab omni oleo liberatum convenit ad palpitacionem cordis: Hinc spiritus rosarum & mellisæ, & cum his parata essentia ambre; (nam Interdum non abhorrent gravi-

dæ ambram) in palpitacione cordis, ubi metus adest syncope, commodè ad paucas guttas in vino generoso propinatur. Elixir etiam citri cum modico proprii succi in paroxyfino egregiè convenit. Interdum etiam Theriaca in haustu vini propinari potest. De cætero aqua cordis cervi composita, aqua cordialis Hereplis Saxonis, Confectio alchermes cum succo citri soluta, & similia, per se sunt nota. Externè melissa cum vino irrorata regioni cordis; vel lin-teamina spiritu cordiali calida madida dicto loco imponantur: Vel fiat Inunctio pulsum & regionis cordis cum oleo destillato mellisæ, citri, cinnamomi, quæ cum corpore pro balsamo inungantur contra lipothymiam & cordis palpitacionem.

## ARTICULUS IX.

## D E

## TUSSI GRAVIDARUM.

**I**uxta palpitacionem cordis subindè graviter & periculose vexat Tussis gravidas, quæ, quod major & grandior est fetus, eo periculosior, propter concussionem abdominis, & hinc abortus metum. Circa hæc tamen ejus differentiam observandæ; cum nunc sit nocturna, adeoque imprimis catarrhalis, ex lympha acri imprimis ostunda laryngem vellicante, in qua pauca & modica ejiciuntur; nunc verò diurna, quæ est continua, & ut plurimum ex vitio stomachi, & in qua repleta viscida & muellaginosa malum leniunt; nunc sicca, seu à materia tenui, sive à causa externa, sive à lymphâ acriore; nunc humida seu à materia crassa.

Quod si Tussis sit nocturna, & à materia tenui, quæ frequens est, curatur optimè mox in principio, mediantibus remediis temperantibus anodynis, seu medicamentis incrassantibus dictis: Hæc inter conducunt species diatreos temperata, diæ Tragacanthi frigide, conspersæ aliquot guttulis olei destillati feniculi vel anisi &c. semen feniculi saccharo obductum, quod roborare simul setum, & oculose ejus elegantes reddere dicitur; Decocta avenacea cum syrupo violarum, pulpa passularum, syrupo diacodii Montani, qui optimum remedium est, & cum baculo de glycyrrhiza capi potest. Juxta hæc in usu sunt passulæ, à quibus spiritus vini destillavit, & passulata, loch de passulis, pulpa passularum, imprimis cum spiritu vel elæosaccharo anisi imprægnata. Elæosaccharum anisi, feniculi, ac similia temperantia olea destillata, ac grata carminantia, in usu sunt gravidis. Rotulæ paratæ ex speciebus diatreos cum oleo destillato feniculi & anisi; quæ Rotulæ sub introitum lecti in ore detentæ ac deglutitæ, faucium asperitatem leniunt, & tussis ferociam mitigant: quod melius adhuc faciunt pilulæ de styrace moderatâ dosi, propter ingrediens opium; quæ ipsæ post moderatam cenam sub introitum lecti deglutiantur: Vid. Compositio in SYLVII Praxi, & SCHROEDERI Pharmacopœia, ubi de de Pilulis. Nam interdum, aliis irritis, in tussi vehementiore cum cephalalgia continua, & supervenientibus vigiliis, ad laudandum opiatum, circumspicere usurpando, aliis periculum confugere necesse est, de cujus efficacia locum ex HORSTIIQ allegavi: Propinatur imprimis cum pulvere pectorali ex benzoe, antihæstico Poterii, radice Ireos Florentina, &c. Aliàs syrupus de jujubis, de hyssopo, & tussilagine, ac similes etiam, temperant acriorem lympham, tussim nocturnam inferentem.

In Tussi verò humida & diurna, optimum est usurpare Alteranda & Incidentia, in specie stomachica; talis enim tussis frequenter habet locum in stomacho. Conveniunt ergo semen feniculi & anisi, quod sepius comestum & tussim sedare, & simul setum roborare asseritur; Adeoque optimè leniunt Feniculata, anisata, aqua asthmatica Rudolphi, tanquam spiritus aromaticæ, mista cum dimidio spiritus viridis æris aut g. ammon cum viridi æris rite parati, quæ ad 40. vel 50 guttulas usurpata, solvendo muellaginam viscidam & excretionem adjuvant, & tussim leniunt. Item syrupus & remedia ex hyssopo, syrupus & decoctum de marrubio, helenio, mixtura ex oxymelle scyllitico, si ferre possunt, cum aqua hyssopi & cinnamomi, cui parum spiritus salis dulcis sit additum, etiam lenit contumacior tussim, excernendo materiam. Item species diatreos, passulæ sepius deglutitæ, vel etiam decoctum helenii cum passulis in vino subindè delibatum, blandum



& elegans est remedium ad Tussim Gravidarum: Item Ele-  
ctuarium ex pulvere helictii cum melle, &c. Succus rapha-  
ni est egregius, modò ut præcaueatur eius flatulentia, ad-  
dendo de elcosaccharo, ex oleis seminum carminatiuorum  
parato.

## ARTICULUS X.

### DE

## HÆMORRHAGIIS GRAVIDARUM.

**I**uxta Tussim interdum *Hæmorrhagia* variæ non raro  
terribiles & periculosæ mediis & ultimis mensibus gra-  
vidis sunt molestæ; quæ nunc sunt per uterum, nunc verò  
sunt per alia quædam singularia loca: Uterinæ nunc sunt  
periodicæ, nunc vagæ. In his cautus sit Medicus, ne utiles  
supprimat, superfluas verò relinquat. Quæ sunt per ute-  
rum, ut plurimum funestæ sunt, utpote quæ præsentia-  
neum abortus inferunt periculum. Cum verò etiam plu-  
res prostant Observationes mulierum gravidarum, quibus  
mensium fluxus innoxius fuerit, v. g. in HORSTIO  
lib. 5. *Observ.* 28. item in M. A. N. C. *Ann.* 1. pag. 224. *Ob-  
servat.* 96. & *Ann.* 9. & 10. *Observ.* 29. ubi refertur stillici-  
dium uteri usque ad partum innoxium; propterea non con-  
fundenda est hæmorrhagia uteri præternaturalis, & quæ  
abortum minatur, cum hæmorrhagia vaginæ uterinæ, &  
quæ instar mensium fluxus se habet. Nempe sanguis, qui  
effluit in gravidis, aut prodit ex ipso utero pro orificium eius  
internum, aut prodit saltem ex vagina uterina, excernitur-  
que ex vasis sanguinis hypogastricis: prius si fiat, pericu-  
lum abortus imminet; posterius verò sine periculo est, &  
instar fluxus menstrui se habet. Fluxus menstrui ex eo se-  
re cognoscitur, quod periodicè & tempore consuetoe eveniat,  
idque sine dolore, & quod successivè ac pedetentim ex col-  
lo matricis effluat, internum verò orificium uteri exactè  
clausum observetur: Si verò ex ipso utero fluat, dolores  
ad sunt hypogastrii, lumborum lancinantes, parturientium  
similes, subito accidunt, & sanguis, in magna abundantia  
effluit, continuò quoque prodit, nisi à grumo sanguinis  
aliquandiu sistatur, sed brevi post maiori impetu adhuc  
redit.

## CURA.

Hæmorrhagiæ hæc uterinæ sequuntur occasione men-  
strui suppressorum: si tamen sunt periodicæ, singulis duabus  
aut quatuor septimanis repetentes, siue sint ex utero, siue  
ex aliis locis, & siant cum euphoria gravidæ, & mensium  
excretioni vicariæ sint, vel relinquendæ sunt, nec curan-  
dæ, nisi sint nimix; tunc enim moderatà venæsectione,  
& remediis appropriatis adstringentibus, nonnihil (usula-  
minari possunt. Certum est, sceminis quibusdam iunioribus  
& habitus laudabilioris, gravidis licet, ordinatà tamen,  
periodo adhuc fluere menses: item observatum est in aliis,  
cum menses non fluant per ordinatà loca, toto gestationis  
tempore subindè per alia erumpant: nunc quidem per na-  
res; observata namque fuit talis hæmorrhagia narium satis  
contumax in gravida, tamen innoxia: vid. *Observat. in lib.*  
*4. Observat.* SCHENCK II pag. 573. ubi de gravidis:  
sic SALMUTH *Censur.* 2. *Hist.* 54. & SOLEMAN-  
DER *Secl.* 5. *Conf.* 15. §. 26. observat vomitum sanguinis  
in gravida crebriorem, nihilominus tamen sine noxa: imò  
quibusdam gravidis, loco mensium, hæmorrhoidum superve-  
nit fluxus admodum salubris; vid. M. A. N. C. *Ann.* 4. &  
1. pag. 299. & *Ann.* 6. *Observat.* 63. si supprimantur for-  
san, per hirudines sunt revocandi. Singularem huius rei  
habet Observationem ZACUTUS LUSITANUS  
lib. 1. *Med. Princ. Observ.* 27. ubi refert, gravidam noni-  
mestrem epilepsia correptam, ob suppressas hæmorrhoides,  
quæ postmodum per applicatas hirudines ano fuit curata.  
Si verò hæmorrhagiæ sunt vagæ & extra uterum, signum  
est, quod subsit vitium sanguinis acrioris, aut inclinantis ad  
scorbutum, quæ uti minus sunt periculosæ, ita pro circum-  
stantiarum ratione nunc relinquendæ, nunc per venæsectione-  
nem avertendæ, nunc remediis curandæ, quod ut plurimum  
fit per Martialia, quæ in gravidis satis tuta sunt. Si gravio-  
res sunt, venæsectio adhibeatur. Verò hæmorrhagiæ gra-  
vidarum vagæ, quæ ex utero immediatè proveniunt, plus  
habent in recessu. Si primis gestationis mensibus mulieribus  
effluat sanguis ex utero, nunc florens, nunc aquosus,  
Estmull. Oper. Tom. II.

siue fiat cum torminibus, siue sine his, semper pessimum  
est: Nam innuit molam, nunc simplicem, nunc foetui  
coniunctam, quibus occasionibus irritatus uterus ad con-  
tenti præternaturalis exclusionem se accingit. Si verò,  
quod peius, in ipsis mediis plus minus aut ultimis gestatio-  
nis mensibus graviores hæmorrhagiæ uteri, vagæ & inter-  
ruptæ accendant, periculum adest vel abortus, vel foetus  
iam mortui, vel debilis, vel mole, sunt nempe ex im-  
becillitate uteri, qui irritatur ex re præternaturali, unde,  
ex irritatione ferè avulsio & separatio placentæ ab utero le-  
quitur, quam avulsionem sanguinis in uterum effusio,  
hinc ex utero irritato eiusdem per orificium internum excre-  
tio, & tandem ipse abortus insequuntur. Rarum enim est,  
quod quibusdam gravidis mensium fluxus innoxius con-  
tingat.

His & similibus consideratis benè, omnes perpendat cir-  
cumstantias Medicus, an potius sit opus naturæ talis hæmor-  
rhagia quocunque in loco erumpens? an verò sit quoddam  
symptoma, quod in gravidis, quare foetus est debili-  
or, supervenit? Nam ex HIPPOCRATE iam scimus,  
quod sanguis ex utero aut ex mammis effluens, foetus de-  
bilitatem & imminentem abortum innuat: hoc ipsum  
tamen, ut præcaueatur, omnia benè sunt pensanda.  
Si mulier consuetus sit sanguinis fluxus, si citra virum  
debilitatem contingat, si cum euphoria hoc fiat, si mu-  
lier alias abortum fecerit ex sanguine abundantiore, &  
quæ sunt similes circumstantiæ: in talibus casibus sinen-  
dus est fluxus, & saltem eius copia est moderanda, non  
verò citra necessitatem ex toto supprimendus est, in-  
specie, si simul certam quandam periodum observare  
videatur.

Quod si non fiat, sed gravior hæmorrhagia uteri super-  
veniat, & mater percipiat debiliorem foetus motum, ip-  
sa fiat lassæ & debilis, sentiat gravius solito pondus in  
utero, appetitus ipsi deiiciatur, superveniant dolores va-  
gæ lancinantes in dorso & regione lumbari, eò peiora sunt:  
In talibus casibus vix aliis remediis est locus, quàm  
promptè liberare seminam, vel per mole electionem, vel  
ut abortum promoveat; minus quidem auxiliis Pharma-  
ceuticis, utpote, quæ hæmorrhagiam magis intendunt,  
sed potius auxiliis Chirurgicis manu operà, tam orifi-  
cium uteri internum diducendo, magis magisque aperien-  
do, & ita molam aut abortum extrahendo: conf. MAU-  
RICEAU lib. 1. cap. 20. & lib. 2. c. 27. item VELSCHIIUS  
Mistom. Cent. 3. *Observ.* 89. ubi Parliensium quotidiana Pra-  
xi abortus promotionem, necessariam esse, confirmat SLE-  
GELIUS. Non enim sili solet & potest sanguinis proflu-  
vium, sed si aliquandiu perliterit, tam matrem quàm in-  
fantem è medio tollit: si verò foetus statim eiciatur, matris  
viribus constantibus, illa servari potest. Notatu digna est  
Observatio RIVERII in Cent. 3. *Observ.* 24. ubi obser-  
vavit fluxum sanguinis in gravida immodicum, euenientem  
ex fetu mortuo, qui alio modo nec potuit nec debuit curari,  
quàm foetus mortui expulsionem. Rationem dabo infra, ubi  
de fatu extrahione. Quod si ante huiusmodi auxilia ma-  
nualia aliquid tentare locus superest, semper respiciendum  
est ad fetum, ut robur partim externis analepticis, partim  
internis probè nutrientibus & nonnihil spirituosius concilie-  
tur. Juxta hæc blandè adstringentibus firmetur uterus, &  
simul nonnihil coërceatur sanguinis impetus, ne abortus  
tandem superveniat. Quod si verò hæmorrhagia fiat per  
aliud locum, minus periculosa esse solet, & considera-  
tis circumstantiis, imprimis habità ratione gravidæ, nunc  
sistenda, nunc, si moderata fuerit, relinquenda. Pro hæ-  
morrhagia compescenda usurpetur v. g. mistura polychre-  
sta SYLVII cap. 9. lib. 1. *Prax.* 6. 20. item corallia rubra  
preparata cum lapide hæmatite, terra sigillata in succo gra-  
natorum vel cydoniorum &c. remedia ex tormentilla, sy-  
rupus plantaginis, syrupus paratus ex succo symphyti &  
portulacæ, cui necessitate urgente parum syrupi papaveris  
albi admisceatur. Propinetur in aqua tormentillæ, portula-  
cæ &c. Syrupus item coralliorum, ribium, myrtillorum,  
cydoniorum & similes usurpantur. Tinctura coralliorum  
cum spiritu lignorum, ad plures guttas bis vel ter quotidie  
usurpata, optimè convenit: Aut fiat Electuarium ex con-  
serva rosarum antiqua vitriolata, cui corallia rubra & terra  
sigillata intermisceantur, cum syrupo cydoniorum, iroran-  
dum cum tinctura sulphuris vitrioli, vel liquore styptico;  
de quo Electuario bis vel ter quotidie quantitate nucis iu-  
glandis vel castanæ accipitur.

Vel



℞. Rad. torment ill.  
Bistort. an. ʒʒ.  
Herb. consol. maj.  
Sanic.  
Pyrol.  
Summit. hyper. an. M. i.  
Coqu. in aqua chalybeata q. s.  
Colatura ʒxv. ad Bib.  
adde  
Aqua cinnam. ʒʒ.  
Syr. de symph. Fernel. ʒlii.  
D. S.  
Potio adstringens.  
Dosis ʒiv. tepide.

Item in statu sanguinis serosi bolus Armena, Cornu Cerviustum, &c. usurpanda sunt. Interdum etiam ad syrupum dia-codii veterum, vel ad mitiora oplata surgendum, nempe si dolores lancinantes crebrius repetant. Conveniunt præter alia, quæ alias in nimia narium, mensum, & uteri hæmorrhagiis, superius fuerunt commendata, unâ cum corporis quiete, & externorum à frigore munitione. Observavi aliquando gravidæ scorbuticæ, & facili hæmorrhagiis nimis uteri obnoxie, ex propinata tinctura tartari composita hæmorrhoidum fluxum esse curatum, cum in non-gravidis subinde menses stimulet.

## ARTICULUS XI

## DE

SUPPRESSIONE URINÆ  
IN GRAVIDIS.

**I**uxta hæmorrhagias subinde, speciatim ultimis gestationis mensibus, supprimitur interdum gravidis urina, ex utero dissentio, & propter pondus inferius subsidente, ac vesicam comprimente. Fit hoc pro vario situ fœtus & uteri, quod rectè observavit GUILLIMEAU de felici Puerperio, qui observavit varium situm fœtus; quia mulieres quædam gerunt fœtum altè, unde nullam sentiunt molestiam; quædam infra, unde dolores inguinales & vagos solent pati, &c. Si ergo in ultimo gestationis tempore ex pondere uteri premi vesicæ collum, conqueruntur gravidæ, urinam reddere nequeunt sine insigni nisu; & hinc imprimis urina est suppressa, quando scæmina stat erecta, eadem verò jacente, facilius prodit.

## CURA.

In tali casu monet GUILLIMEAU, ut mulieres suis manibus attollant ventrem prominus superiora versus, blandè tamen, ne corpus matricis prematur; quod fit eò facilius, si simul adjungunt Forus emollientes, ut relaxentur vasa uteri. Internè à diureticis abstinendum, aut leniora saltem eadem sunt propinanda. Externè potius regio vesicæ in pube illinenda est oleo scorpionum; vel Balnea & Fomenta instituuntur ex althæa, malva, melliloto, parietaria & similibus; pro laxandis viis, & promovenda urina optimum est cataplasma, factum ex Parietaria cum pinguedine asnerina & oleo scorpionum, quod pubis regioni impositum promoveret urinam remorantem: &c.

℞. Herb. parietar. M. ii.  
Cherefol. vel flor. chamom. M. i. ad Mig.  
Coquantur ad mollietiem:  
Pulpæ per setaceum traiectionem  
adde  
Butyr. rec. ʒi. vel ʒii.  
Olei scorpion. ʒʒ. vel ʒʒʒ.  
M. f. Cataplasma. S.  
Cataplasma urinam promovens.

Applicetur calidè regioni pubis, imponendo operculum calidum.

Vel fiat Cataplasma ad imitationem WEDELII Traß.  
de Compos. Medicam. pag. 159.

℞. Rad. allu.  
Cep. sub ciner. col. an. no. i.  
Herb. cherefol.  
Parietar.

Flor. chamom.  
Melliloti an. M. i.  
Bacc. innip. ʒʒ.  
Sem. lini,  
Cumini an. ʒli.  
Olei scorpion. ʒʒ. vel ʒʒʒ.  
M. f. Cataplasma.

## ARTICULUS XII

## DE

## STRANGURIA IN GRAVIDIS.

**S**tranguriam quod attinet: de hac optime dicit GERNERUS lib. 3. Epistol. pag. 84. desperatam stranguriam mitigari posse in gravidis, si per intervalla illi alvus solvatur cum syrupo de floribus persicorum, sic enim partim evacuantur, partim revelluntur humores; & interdum, si libuerit, decoctum radices althææ recentis cum passulis & saccharo, aut cum simili decocto emulsio ex amygdalis præparetur. Item convenit decoctum jujubarum cum lapillis persicarum, &c. In mentem recurrit affectus cujusdam gravidæ medio gestationis tempore, quasi intensior stranguriæ gradus, unâ cum dolore nephritico: nempe urgebat dolor in dorso è regione lumborum, urinae creberrimus stimulus, ejusque crassæ ac turgidæ excretio cum summo conatu, ita ut etiam alvus exinde crebrius deponeretur: continuè urgebat urina, quam diutius continere non poterat, sub excretionem totius corporis tremula concussio aderat: Suspicabatur peregrinum acidum urinam inquinans, simulque membranæ renibus vicinas partes molestè irritans: Propterea præscripti:

℞. Corall. rub. præp.  
Lap. persar. præp. an. ʒi.  
Olei destillat. cors. aurant. gtt. ii.  
Escent. opii ʒi.  
M. pro 2. dosibus.

Et hinc

℞. Ess. balsam. de capaiba cum tinctura tartari  
par. ʒii.

Dosis gtt. xx. vel xxx. quibus melius habuit.

## ARTICULUS XIII

## DE

## SPASMIS GRAVIDARUM.

**S**pasmus interdum gravidas torquet, præsertim crurum, item surarum ac pedum. Convenit dens equi marini præparatus, & externè annulus ex dente equi marini, pollicis pedis applicatus: Item oleum & spiritus lumbricorum terrestrium pro litu: item oleum scorpionum, amygdalarum dulcium cum pinguedine viperina: de quibus vid. VELSCHIUS Hecat. 2. pag. 57. Euporiston etiam est matricaria recens contusa, & cervici imposita, nunc sola, nunc cum verbena mista.

Gravida quædam dolore crurum quasi convulsivo agitata sequenti remedio fuit restituta:

℞. Aqua birrud. cum castor. ʒi.  
Theriacal.  
Cephal.  
Spiritus lil. convall. an. ʒii.  
Miste.

Quæ collura pedes calidè fuere inuncti.

Simile exemplum habet HORSTIUS doloris pedum periodici acerbissimi & diuturni, in quo externè insigniter profuit aqua hysterica camphorata, cum spiritu illorum convallium & cerasorum nigrorum mista, externè usurpata. Aliàs aqua articularis ad extra, mista cum spiritu lumbricorum terrestrium in talibus doloribus insigniter confert externè.





## ARTICULUS XIV.

### D E

#### DOLORE TENSIVO, FISSURIS ET RIMIS ABDOMINIS IN GRAVIDIS.

**F**it interdum, ut mulierculæ ultimis mensibus, quando nempe primâ vice utero gerunt, ex distensione pelvis abdominis gravem *dolorem tensivum* & lacerantem percipiant: imò distensio hæc interdum est tanta, ut si fortè *cussis* sit tenerior, interdum *fiissuras* agat, ac *rimas* malas dolentes & molestas. Huic malo, partim dolori, partim imminutibus rimis ut succurratur, optima sunt unguenta & linimenta laxantia & emollientia, quæ fiunt v.g. ex mucilagine seminis lini, semine fœnu græci, radicis althææ, cum medulla crurum vituli, addito simul oleo amygdalarum dulcium ac liliorum alborum, item pinguedine gallinæ & anserinæ ac similibus: vel linimentum ad præparandum aquarum effluxum mox dicendum, quibus ipsi mane & vespere illinatur abdomen; laxat enim cutim abdominis, eamque flaccidam ac mollem reddit in specie, dum eo illinatur regio pubis: Vel solum unguentum pomatum calidè abdomini dolenti illitum convenit.

## ARTICULUS XV.

### D E

#### AQUARUM EX UTERO EFFLUXU IMMATURO IN GRAVIDIS.

**V**terius interdum per mensem, interdum per aliquot septimanas, ante partum fit *aquarum ex utero effluxus immaturus*, qui est symptoma grave ac periculosum, & suam considerationem meretur:

1. Quia metus est, ne fœtus moriatur.
2. Quia hæc aquæ nonnihil viscidæ & glutinosæ in partu sunt necessariae ad laxandas & lubricandas vias, pro facilitando partus labore.

Distinguendus ergo semper est à fluore albo mulierum. In quibusdam enim nunc toto gestationis tempore, nunc certis mensibus, humiditates rubicundæ, item fluores albi, non tam ex matrice, quàm potius collo ejus, prodeunt, & nihil commercii habent cum immaturo aquarum effluxu: Hi linquendi sunt, nisi forsan interdum nimia quantitate excedant, & periculum sit, ne abortum provocent, aut insignis impuritas vel etiam fœtores adsint; tunc enim infusum Rhabarbari, aut etiam pulvis ejus optimo cum succellu datur. Nam interdum ultimis mensibus mulieribus erumpunt ex utero copiosæ aquæ, quæ sub partu effluere debent, & fœtui nunc imminet noxa, nunc citra ullam noxam fœtus, nunc cum nunc sine doloribus, hoc evenit. Nempe observantur subindè fœminæ, quas HIPPOCRATES vocat aquosas propter abundantiam aquarum, quas evacuant: nam loco purgamentorum post partum cruentorum & bene coloratorum emittunt saltem aquas, & paucò tempore multa lintamina his ipsis replent: Conf. de his GUILLEMEAU de Ecclæ Partu l. 3. ubi observavit quasdam, quæ uno die in pelvi supposita plusquam trig. aquarum talium evacua-verint, per tres & amplius septimanas continuando, sine hoc, ut guttam sanguinis evacuarint. Tales mulieres con-queruntur de facili lipothymia ac virium imbecillitate, ac necesse habent, quando tales aquæ impetu quodam prodeunt, sicut interdum accidit, aliquantulum vini bibere, aliàs lipothymias incurrunt. Simile quid evenit honestæ mulieri, quæ 8. diebus absque doloribus per diversos dies plus quàm quatuor pintas aquarum limpidarum evacua-vit: aqua talis non fluebat ex matrice ejus, quoniam interioris orificium exactè clausum, sed saltem ex venutis va-ginæ uterina: post octiduum feliciter peperit, paucis cum cruentis evacuationibus, & per tres septimanas puerperii nil aliud, quàm aquas limpidas, evacuavit. Notabile est, quod ipsa in aliis gravidationibus labia pudendorum ita in-flata habebat, & aquis plena, ut etiam coxas & latera abdominis: Conf. etiam de hujusmodi aquis HARVÆUS de Generat. Animalium Exercit. 56. Talibus, quæ sunt magis serosæ, interdum aliquot septimanis vel diebus ante partum aquæ fluunt citra noxam, molestiam, & sine dolo-re. Noxa imminet fœtui periculosa, quando tam ex amnio,

quàm chorio, ex copiosa aqua distentis, ruptis & latis, ef-fluit humor seu liquor; deficit enim sic fœtui nutrimentum per os hauriendum, quia fœtus adhuc intra amnion conten-tus probè nutritur per placentam uterinam: Sin verò ex so-lo chorio lasso aut rupto effluit, minus periculi subest. An verò ex ambobus? an ex una tantum effluat? perfectè co-gnosci nequit, nisi ex effectu: si enim fiat effluxus harum aquarum etiam ex amnio, speciatim generantur dolores lancinantes in regione lumbari, & periculum est, ne in-se-quatur abortus, vel ne fœtus reddatur debilis, vel viæ, per quas fit partus, fiant aridæ & siccæ, & laboriosus postmo-dum sequatur partus. Notandum est, quod recenset GUIL-LEMEAU, in effluxu aquarum attendendum esse, an dolores veri ad partum adsint? aut an effluentes aquæ reve-rà sint istæ, in quibus natat infans? In quibusdam enim lon-gè ante partum effluunt. Ordinariè quidem aquas effusas dolores partus intra trium horarum spatium sequuntur; ni-hilominus tamen sæpius partus, aquis iam effluxis, retar-datur ad 6. 10. interdum etiam ad 20. horas, imò Amsteloe-dami ad trium septimanarum & trium dierum spatium ob-servatum fuit: vid. M. A. N. C. Ann. 7. obs. 112. Notabile est, quod Comitissa de Starenberg semper quindecim diebus ante partum aquam puerperii rejecerit sine gravi nocu-mento, ubi mascululum peperit; non item, ubi foemela-m: vid. M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 13. Ergò sub tali aqua-rum effluxu non statim partus instans concludendus ve-nit: Sic GUILLEMEAU cap. 3. lib. 7. refert de fœmina septem mensium gravida, gravi colicâ afflicta, quotidie ferè per 2. menses certis horis eam affligente; quæ post-quam evasit, copiosam simul aquam evacuavit, & colica etiam cessavit, ita ut putaret, se non amplius esse gravidam: nihilominus tamen post 5. dies peperit filiam citra insignes dolores, cum paucò admodum aquarum ef-fluxu. Aliis plus 10. diebus ante partum copiosæ aquæ ef-fluunt, aliis longius. Id quod probè observandum, ne ni-mis acceleretur partus: si enim sunt saltem aquæ ex cho-rio, nihil periculi subest: aliàs si dolores debiti & legitimi non superveniant, tales mulieres quasi hydrope uterinâ simul laborare videntur, ut loquitur MAURICEAU lib. 1. cap. 23. In tali ergo casu, aquarum nempe præma-turo effluxu, quietam se contineat mulier, ne vehemen-tiore motu fluxum augmentet. Quod si, cessante fluxu, sed superveniente partu, hic laboriosior fiat, loco aqua-rum tunc effluxarum substituantur olea, mucilagines, linimenta, & unguenta blanda emollientia (de quibus paulò ante, ubi de fissuris & rimis abdominis sufficenter dictum,) quibus inungenda vagina uteri ac loca vicina, unde & instar aquæ sub partu effluendæ continuò laxen-tur, emolliantur, ac lubrica reddantur, & ita partus fa-cilietur:

24. Mucilag. sem. lini,  
Fœnugr.  
Rad. alth. ana, cum aqua lil. alborum  
extr. 3i.

Axung. anserin.  
Olei lil. albor.  
Amygd. dulc. aa. ʒvi.  
Cera alba q. s.  
M. S.

Unguentum emolliens.

Conveniens etiam est Linimentum, quod infra pro facili-tando partu præscriptum, aut unguentum Cumeni ex M. A. N. C. l. a. Nempe

24. Olei chamom. ʒi.  
Cheirin.  
Ungu. dialth. compos. aa. ʒʒ.  
Pingued. gallina  
Taxi aa. ʒvi.  
M. f. Linimentum.

Item Inliciendum est oleum amygdalarum dulcium, aut oleum liliorum alborum, chamomillæ &c. in vaginam ute-rinam, ac similia, ut ab his ipsis laxentur viæ, & supplea-tur defectus aquarum effluentium.





## ARTICULUS XVI.

## DE

TUMORE ET INFLATIONE CRURUM  
IN GRAVIDIS.

**I**uxta hæc interdum circa ultimos gestationis menses gravidis crura tumore seroso insigniter inflantur & intumescunt. Talis autem tumor & inflatio pedum frequenter & ordinariò illis accidit, quæ ante conceptionem fluore albo laborarunt; non secus ac quæ sunt constitutionis humide ac serosæ, seu quæ sanguinem habent serosum, in talibus crura inflari & tumescere solent. Fit hoc saltem duobus ultimis mensibus, in quibusdam etiam secundo gestationis mense, & tamen sine periculo, saltem est molestum, & serè usque ad subsequenter partum relinquitur; tunc enim per lochiorum fluxum evacuatur, & spontè evanescit. Sin verò sit nimius tumor & excessivus, inungantur crura tumida, vespertino tempore cum oleo anethino, chamomelino, hyperici & similibus: aut, quod optimum est, applicentur Fotus, vel Cataplasma ex chamomilla, ejusque floribus, quod dissipat tumorem: vel involvantur crura sacco sale & cineribus pleno, item aqua calcis vivæ fotus instar applicata: Vel fiat etiam fotus cum lixivio sarmentorum vitis cum vino paratus, in quo simul incoqui possunt origanum, chamomilla, pulegium, calamintha, & similia: E. g. sit sequens Fotus ac Cataplasma:

*℞. Fol. salvia,  
Maioran.  
Ebuli,  
Rorismar. an. M. i.*

*Flor. chamom.  
Meliloti,  
Hyperici,  
Lavendulæ,  
Rosar. an. p. i.  
Balauft.*

*Bacc. lauri  
Juniperi an. ℥ss. ad ℥i.  
Coqu. in lixivio sarment. vitis.  
adde*

*Alum. crudi ℥i.  
Aceti ℥ii.  
F. Fotus cum spongiis applicandus.  
D. S.*

*Fotus dissolvens.  
Post hunc applicetur tale Cataplasma:*

*℞. Farin. fabar.  
Hordei,  
Orobian. ℥iii.  
Coqu. in Decocto superiori:  
adde*

*Fac. vini rubri ℥iii.  
Terebinth. ℥ii.  
Unguenti rosar. Mf.  
Olei chamom.*

*Ruta an. ℥ii.  
Pulv. rad. ireos,  
Rosar. an. ℥ss.*

*M. f. Cataplasma: S.  
Cataplasma dissolvens.*

*Admoveatur parti calidè, præmisso Fotu.  
In leviori malo sufficit fotus ex lixivio sarmentorū vitis, in  
quoparū chamomillæ bullierit; post hunc cataplasma sequens:*

*℞. Farin. fabar.  
Lupinor. an. ℥ii.  
Sulphuris ℥i.  
Sterc. columb. ℥ss.*

*Cum aqua chalybeata vel Decocto chamomillæ &  
calaminthæ bulliendo redigantur in consi-  
scent. Cataplasmatas.*

Vid. SENNERTUS Pr. lib. 4. P. 2. §. 5. & 6.

Sed mediocres crurum hujusmodi tumores serè reliquuntur naturæ, cum serè ultimis gestationis mensibus accidunt, post partum verò penitus cessant.

Post partum in puerperio frequenter sudant.

## ARTICULUS XVII.

## DE

HYDROPE PUDENDORUM  
IN GRAVIDIS.

**P**ost has pedum intumescencias etiam gravidis quibusdam supervenit *Hydrops pudoris*, in quo labia pudoris, nunc utraque, nunc alterum, ita tument, ut vid. GUILLEMEAU accedere hunc tumorem ad capitis infantis magnitudinem, unde femora ad se invicem movere nequeunt.

Tumor hic observatur clarus & pellucidus instar hydrocelis, cum solam aquam contineat.

## CURA.

Necesse est autem, ut curetur ante partum. In tali caso convenit imprimis aqua calcis vivæ sub forma Fomenti crebrius applicata, quæ est egregiè discutiens: vid. *Obser. in Cultro Anat. LYSERI pag. 223.* Sufficit etiam simpliciter Cataplasma carminativum impositum. His non sufficientibus, putat Guillemeau, loca tumida scarificanda longitudine & profunditate, & aqua clara per aperturas cum lancetta factas removenda: Vid. M. A. N. C. Ann. 3. *Obser. 256.* & MAURICEAU de Morbis Mulier. l. 1. c. 24. Item optimum quoque est, applicare hirudines.

## ARTICULUS XVIII.

## DE

## VARICIBUS GRAVIDARUM.

**F**requens etiam est, ut circa ultimos gestationis menses *Varices* seu venarum intumescencias crura gravidarum occupent, quæ serè naturæ ad partum usque relinquuntur. Verùm cum interdum adeo sint magnæ & tumidæ varices, ut periculosam ruptionem venarum inferant, tunc optimum consilium est, inungere venas tumidas cum oleo laurino & unguento de baccis lauri, aut cum oleo deranis, aut cum oleo lumbricorum terrestrium, & tunc cum fasciâ non nihil latiori vino intincta, aut decocto quodam nonnihil adstringente madefacta, constringantur.

## ARTICULUS XIX.

## DE

HÆMORRHOIDUM TUMORE IN  
GRAVIDIS.

**D**enique radiosum symptoma, quod ultimo gestationis tempore supervenit gravidis, est *Hæmorrhoidum Tumor*, nunc dolorosus, nunc indolens: pro quo resolvendo applicanda est spongia, decocto adstringente mitiore in vino imbuta: vel inungatur tumor hæmorrhoidum cum oleo ovorum, cum oleo mastichino. In specie oleum momordicæ per infusionem est experimentum optimum: unguentum litariæ applicatum etiam confert. Ac denique, si gravius videatur malum, applicanda est pulpa pomorum coctorum, qui intermissi sint millepedes, aut saltem additum oleum millepedum.

Hæc sunt symptomata, quæ gravidis accidunt.

Absolvimus ea, quæ ad gravidas, quæ tales, pertinent, eorumque symptomata & affectus frequentiores paulò illustravimus: Pergo jam ad



## SECTION E M VII.

D. E

## PARTV, &amp; PARTVRIENTIVM REGIMINE.

**P**Artus nil aliud est, quàm fœtus maturi & perfecti formati debito tempore legitima facta exclusio. Contingit hæc conatu simultaneo fœtus & matris. Fœtus enim valde operè ausus & grandior factus proprio motu exitum querit, convolvendo sese & invertendo caput deorsum versus, unde & capite primò egreditur. Motu hoc membranas diuturniore morâ tenuiores factæ dehiscunt & rumpuntur, unde & aquæ effluunt. Huic fœtus conatui accedit simul matris labor, quæ tam inspirando, & diaphragma deorsum movendo, quàm musculos abdominis contrahendo, uterum comprimit, qui quoque simul nimiam distensione irritatus modico sensu & stimulo, contractis suis fibris fœtum excludit.

Contingit hoc mense post conceptionem ut plurimum nono, nempe circa huius finem, vel circa decimi principium, (versus quadragesimam septimanam) ordinariè; Interdum, sed rariùs, mense septimo, idque sæpe saltim in primo partu, in tenerioribus autem juvenculis: qui septimestris partus sæpe imperfectionis quasdam notas in auriculis, ore, aut digitis habere solet, utpote quæ partes ultimò omnium perficiuntur; de quo vid. BORELLUS Cent. 1. observat. 71. Accidit tamen interdum, ut vel mater vetula, vel fœtus imbecillior, ultra decem menses partum differant; sicut interdum anticipant, & mense octavo pariunt: quos non vitales esse fœtus fassum est, cum plurimi hoc mense nati vixerint, de quo vid. SCHENCKIUS in obs. siquidem etiam vitales non raro sunt fœtus, qui septimo excluduntur mense. Quod si verò moriantur octimestres, hoc fit, quando ex irritatione uteri, vel fœtus, vel ex alia causa nonnunquam fœtus quasi per abortum octavo mense excludatur, qui nono mense debuisset nasci: de quo vid. DRELINCURIUS Dissert. de Partu Octimestri, item PAULUS ZACCHIAS in Quæst. Medico-Legal. Raræ aliàs, exque paucæ, prostant Observationes fœtuum 6. 12. 15. mense natorum, quallia videb. in SCHENCKIO l. a. Observandum tamen hic simul, falli non raro mulieres in calculo, dum primum conceptionis tempus non adeo exactè observare solent.

Causa impulsiva, quæ fœtum stimulat & impellit, ut molietur egressum, videtur esse anxietas quædam in fœtu propter defectum legitime respirationis, cùm aquis immersus respirare nequeat: Sanguis enim sensim sensimque circa præcordia nonnihil magis moveatur, & ita circa præcordia angustias excitat, unde fœtus anxius egressum molitur, & quamprimum egreditur, respirat: de qua contraverbia, quod nempe fœtum stimulet ad egressum, videri potest DEUSINGIUS in Genesi Meteorosmi. Hinc proba potest institui, an fœtus natus sit vivus? an verò natus sit mortuus? idque per pulmones, qui per respirationem expanduntur, & ita leviores ac spongiosiores fiunt; pulmo enim spongiosus variis aquis supernatur. Quod verò de vagitu fœtum circumspicitur, & cuius non vulgaria prostant exempla, ea, uti rara, ita sæpe solent esse prodigiola, cum non vaguisse tantum, sed etiam articulatas voces emisisse infantes adhuc in utero inclusos, testentur observationes: Vid. SPERLINGIUS de Format. Fœtus cap. 7. Quæst. 2.

Fœtus per funiculum umbilicalem coherentes secundine & ipse post fœtum exclusum maturè extrahendæ, quibus extractis uterus extensus denuò fibrarum suarum beneficio se contrahit; hæque spongiæ instar compressæ liquores, partim gestationis tempore imbibitos, partim in & post partum uberius affluentes, hic exprimit; unde purgantia uteri post partum seu lochia succedunt. Effluit autem primò cruentum humor seu sanguis purus, hinc sanguis dilutus, aquoso nempe & lacteo sero, tandem materia mucosa alba, quam esse reliquias succi nutritii fœtus in utero, cum DEUSINGIO arbitror. Nec improbabilis eorum est opinio, qui sub primo lochiorum fluxu similem sæpe fermentationem in sanguine fieri existimant, qualis sub menstruatione ordinaria observari solet. Quantitas huius purgationis,

& tempus, quamdiu durat, varium est, pro varietate constitutionis ipsius puerperæ: nonnullæ ad quindecim dies purgantur, aliæ citius, quibusdam octo dierum spatio effluxus iste absolvitur. Quando iam appropinquat pariendi tempus, formatus fœtus angustis uteri inclusus, isque grandior factus, tandem calcitrando, & se fortius movendo, egredi nititur; unde tunc graves doloresprehendunt gravidam, à quibus ipsa impellitur, ut adjuvando fœtus conatum, hunc tandem expellat vel excludat. Uterus scilicet membranofus & fibrosus, mole & motu fœtus inclusi distensus, successivè subsidere incipit, ut dicunt, & magis ad os pubis deorsum vergit: hinc tandem fœtus inclusus grandior & robustior factus, cùm istas angustias amplius perferre nequeat, se validè movet, & agitat artus, ac invertendo sese, qui antea erat convolutus, capite deorsum versus protruit, ita ut tandem caput aut ossi pubis aut orificio uteri interno perfectè insiliat & immineat: Si ossi pubis, dicunt enim, insiliat arcu, (est terminus technicus mulierum.) Hinc uterus membranofus & fibrosus islo fœtus conatu irritatus, se validè spasmodico & convulsivo quodam motu successivè & partitis vicibus contrahere nititur; unde nunc graves illi dolores lancinantes & contorquentes mulieresprehendunt. Vocantur hi dolores partus: Qui si sunt legitimi ad partum, quod probe observandum, sunt frequentes, subinde repetant. Si inchoant probe umbilicalem regionem, & in dorso circa regionem renum, hinc successivè deorsum versus pubem, & ex sinu pudoris denuò posterius sursum, versus ad lumbos & dorsum retorquentur, ibique ingentem lancinationis sensum inferunt, minusque inferiora versus vergunt, non sunt dolores partus veri, sed vocantur Dolores nothi, & nunc vomitus, nunc tremorem brachiorum, nunc alia inferunt symptomata. Ast melius sunt dolores, qui continuè ex lumbis incipientes secundum abdomen, deorsum protenduntur ad regionem pubis usque, hinc clupes & coxas occupant, & ita tremorem genuum inferunt; qui sunt spasmi dolorosi musculorum, quando convelluntur, & sunt optimi. Fiunt ergo hi dolores ex spasmio uteri & partium membranofarum connexarum, unde tales spasmi sunt continuè ex his partibus simul affectis. Sub his doloribus orificium uteri internum se pandere & aperire incipit: Nam in huiusmodi cavitatum contractionibus & constrictionibus semper orificii accedit amplitudo; unde etiam tunc, quando uterus se contrahit, orificium uteri internum se aperit, quod etiam obsestices faciliè immisso in sinum pudoris digito studiosè explorare solent & debent. Percipiunt enim tunc foraminulum, & supra foraminulum, membranam quandam adhuc integram, collectis etiam & inclusis aquis distentam, per dictum orificium ampliatum prominens, in forma sæpe ovi mollis, cui exterior dura testis deficit, quod vocant: Aqua se trahit. Nec prius mulieres ad labores partus faciliè admoneant, aut reluctantes cogant, nisi digitis orificium hians uteri, & iam vel fœtum, vel membranas densas fœtum cingentes, & à conatu fœtus fortiter distensas deprehenderint; doloresque isti parturientium veri simul accesserint: Horum quoddam ubi deficit, non sunt ad partum cogendæ. Continuato ergo fœtus motu, & repetitis uteri spasmis, rumpuntur tandem membranas fœtum cingentes, effluuntque liquores in his contenti, unde dicunt vulgò: Aqua salit: qui liquores raro sunt sinceri, sed subinde nonnihil sanguine tincti, quod fit ex orificio uteri interno aperto: Quoties enim hoc aperitur, solet sanguinem plorare, qui nunc solus, nunc cum his liquoribus solet effluere. Liquor hic seu aquarum effluxus laxat, emolliat, ac lubricat vias, ut facilius hæc differendi, fœtusque per easdem, aliàs satis angustas, promoveri possit. Patienter autem, necesse est, expectet obstetrix spontaneam membranarum rupturam aquarumque effluxum, nec ungulibus solum membranas rumpere debet, id quod fieret cum insigni fœtus & matris nocumento, semperque partus impedimento; conf. MAUR. CEAV lib. 2. cap. 7. aut in tali casu, quando membranas seniores vix cum fœtu prodeant, & mul-



tum admodum promineant; tunc enim aquas rumpere licet; vid. *Idem lib. 2. cap. 21.* uti etiam, si in præternaturali partu placenta prius se offerat; tunc enim etiam membranas pro facilitando partu aperire licet: vid. *Idem lib. 2. cap. 28.* Hæc dum fiunt, mulier ista seu mater fellæ appropriatè imposita (cuius figura prostat in Dn. D. WELSCHII *Libro Obstetricum*, lib. 1. cap. 23.) aut aliàs commodè situata, nempe per transversum lecti cruribus inflexis, ita ut totæ nates attingant, vid. VIARDEL in *libro Obstetricum* p. 33. Item MAURICEAU lib. 2. cap. 8.) comprimendo abdomen expulsionem fœtus multum adiuventi affert. Sub hoc conatu imprimis, dum tremant genua, ex utroque latere, adideat fœmina robusta, quæ dicta genua fortiter teneat & firmet, aliàs gravia symptomata in coxis post partum percipiunt. Imò si negligenter firmantur, tam debilitantur pedes, ut difficulter incedere queant. Mulier autem gravida adjuvet motum fœtus. Quod si ergo debilior in labore fiat, pauco vino generoso, aut aqua cinnamomi spirituosâ, aqua vitæ mulierum, aut pauca aqua hirundinum cum castoreo, si forsan hysterica passiones immineant, resodilletur, ut strenuè pergat in incepto labore, dum obstetrix interea temporisante & intra genua parturientis posita & situata expectet, manus & digitos oleo liliorum alborum, aut amygdalarum dulcium, aut oleo cheirino aut similibus illitis in vaginam uteri immittat, fœtum approximantem digitis blandè arripiat, ordinet, locet, & tandem capite prius ita nonnihil protrahat, arreptoque hinc umbilicali tunc simul placentam uterinam cum conjunctis membranis seu secundinis unâ extrahat, studiosè observando, ne tantillum aeris externi aut frigidiusculi in uterum parturientis ante aut post partum irumpere possit. Hinc omnia linteis, stragulis & similibus benè munita esse solent circa partum, ut aeris impediatur accessus, quia aliàs metus est, ne lochiorum superpressio, hincque uteri inflammatio, aut uteri inflatio, aut similia sexcenta mala, exinde superveniant.

## CAPUT I.

## DE

## PARTUS LÆSIONIBUS.

**Q**uod partum ipsam attinet: adhuc, ut fiat naturaliter, tria imprimis requiruntur:

1. Ut fiat legitimo tempore, nempe fœtu maturo iam & perfetto.
2. Ut fiat legitimo modo, cum debito scilicet situ & positu infantis.
3. Ut nullis gravioribus aut periculis comiteretur symptomatis.

Quoad I. notum est, quod sub ratione sanitatis & circumstantiarum variarum præter propter partus tempus naturaliter sit mensis nonus, in huius imprimis sine, aut circa principium decimi: unde quicquid tempore nascuntur, dicuntur legitimi, per se semper vitales; qui verò citius excluduntur, abortivi & non legitimi, subinde non vitales, idque, eo magis (scilicet sunt abortivi) quod longius à legitimo absunt termino; Nam etiam in septimo vel octavo mense vitales nasci fœtus, interdum observatum est, utur sæpius moriantur, quia abortivi sunt. Nec minus letalis est septimestris partus, quam octimestris, aut minus vitalis octimestris, quam septimestris: Sed ambobus plurimum sunt letales, quia sunt, ut dictum, abortivi fœtus, nono mense excludendi. Quod si septimestres aut octimestres sint vitales, hoc fit, quando vel falso calculum suum supputavit mulier seu fœmina, vel quando computavit falsum conceptionis principium, aut quoniam est partus primus in juvenula, seu robustis & vegetis parentibus genitus, in quibus equidem generatur fœtus robustus, sed quia uterus est angustus nimis, eundem retinere nequit. De partu octimestri, an sit vitalis vel non? elegantem conscripsit Dissertationem DRELINCOURT (*Scriptor Gallicus, Professor Lugdunensis*.) ubi statuit, quod per se octimestris non sit letalis, quia octimestris, sed sit letalis, quia abortivus mensis noni.

Ut autem cognoscatur, an septimo mense natus fœtus, verè sit vitalis? cum interdum partus septimestris sit pallidum impudente noviter nuptorum: ut, inquam, cognoscatur, observandum est, quod septimo mense natus plurimum habebat imperfectionis quasdam notas, nempe in auriculis, in labio oris superiore, in digitis pedum, & similibus,

istis scilicet partibus, quæ ultimò omnium perficiuntur, & quæ postmodum mino demum gestationis mense apparent perfectæ, observante hoc BORELLO *Cent. 1. Observ. 71.* aut certè imberilles, aut debiles admodum sunt: Confer. THIERMAYERUS *Consil. lib. 2. pag. 72.* Hinc perfectus & robustus fœtus suspectus est, quod sit legitimus, & non septimestris: Conf. M. A. N. C. *Ann. 8. Observ. 69. pag. 117.* Rarum est, quod famillæ integræ observatæ fuerint, quorum liberi omnes partu septimestri editi, Autore SYLVIO lib. 3. *Prax. cap. 7. §. 19.* Interim tamen si mulieres, uti dixi, juvenulæ, primiparæ, graciles ac agiles, tales primo partu raro novem menses absolutè complent; sicut mulieres, quæ iam sæpius pepererunt, aut atati consistenti sunt viciniores, ut plurimum usque ad mensem nonum perfectum, vel medium decimi mensis, utero gestare solent.

In computando autem partus tempore intelliguntur menses solares, non lunares: Conf. obsoletos *Tractatus* JOHANNIS PEGISSONELII de *Tempore humani Partus*, qui demonstrat, etiam HIPPOCRATEM numerare 30 dies pro mense, & ita intelligere menses solares: nempe lunaris est dierum 27, & 3 horarum, sed mensis solaris est dierum 30. Ergo decem menses Lunares, & novem menses Solares cum 10 diebus, exactè conveniunt, utrobique 40. septimanas complent, & ita finem noni, principium decimi mensis solaris constituunt. Hæc 40. septimanas complent exactè 10. menstruationes muliebres; unde in computando tempore partus ad mensium emanationem post conceptionem contingentem, præcise respectus habendus est, i. e. quod absolutè non à mensibus primò emanantibus periodo, aut absolutè decimà à mensibus ultimò comparantibus ante conceptionem periodo, fiat partus, idque præcise tunc temporis, cum menses periodicè redire deberent: Id quod observasse me aliquoties memini.

Hæc ratione temporis.

Quoad II. ratione modi, partus est vel naturalis, vel præternaturalis: Ille, quando partus accidit fœtu in caput prono, ita ut capite primò prodeat: Præternaturalis verò partus est, quando alio situ, aliove membro, v. g. manu, pede, podice, &c. ad orificium uteri internum primitus se sistat. Huius quidem modi ab Autoribus annotati reperiuntur: vid. in LUDOVICÆ BOURGEOIS, & Dn. D. WELSCHII *Libro obstetricum*. Situm hunc acquirat fœtus, quando ultimo tempore se incipit extendere & inverti, capite inclinato orificio uteri imminet, quod sit instantè iam partu, anxie tunc sunt mulieres, & dolores percipiunt. Capite prono & primitus apparente fœtum naturaliter prodire dixi: Nam brevi ante partum, dum violentius se movet fœtus, hic se invertit, ut ita capite pronus se ostendat.

Rarissimum est & fere singulare, (forasan adhuc dubium,) quando per septimanam unam vel alteram, imò per mensem, ita in utero, inverso situ, observati fuerunt fœtus: Nec facile hoc crederem, nisi LOUIS BOURGEOIS lib. 1. cap. 46. in *libro Obstetricum*, narraret tale exemplum mulieris, quæ fœtum per duas septimanas & octo dies gestavit inverso situ & positu, ita ut capite ossi pubis immineret. Præter hoc exemplum ipsa de se testatur, quod sex septimanas aliquando ante partum fœtum ita gesta verè inversum, & pluries se hoc observasse, similiter asseverat. Hoc ipsum etiam nuperrimè mihi confirmavit & falsa est nostra obstetrix, paucis abhinc septimanis defuncta, quæ ultra 4000. infantes ad lucem produxit, sanctè asseverans: sibi certò constare, quod aliquando ultra tres septimanas fœtus super os pubis inversus ita à quadam muliere fuerit gestatus. Fateor, res est difficillima creditu, dum pensamus, quomodo fœtus tali inverso situ in utero vivere possit ad longum tempus, cum notissimum sit, adultos pedibus suspensos ex vitato sanguinis per caput circulo, non ita multo post quasi apoplecticos interire; quod idem de fœtu subsumi potest, nisi tales observationes, quas omnes seu falsa tradocere nequeo, aliud imperent & loquerentur. Res ergo adhuc, quoad hoc negotium, ulteriori experientia relinquenda.

III. Denique læditur partus, quando graviora accedunt symptomata, ita ut aut laboriosior, aut difficillior fiat, quàm naturaliter esse debeat: quò facit imprimis, ubi fœtus in utero sit mortuus.

De his læsionibus iam in specie.



ARTICULUS I  
DE  
PARTU IMMATURO.  
MEMBRUM UNICUM.  
DE  
ABORTU.

**P**rimum ergo est vitium, nempe fetus nondum perfectus immaturus ejectus, qui ob id non, nisi rarissime, vitalis, lato sensu, Abortus dicitur. Germ. *Esgebet ihnen nichts, nicht wohl*, dicunt de hominibus; de brutis vero, *Sie haben verworffen*. Graeci rectius & accuratius rem distinguunt pro varietate temporis, dum scilicet electionem cui ab abortu propriè sic dicto & fetu mortuo accuratè distinguunt. Nam Graeci habent *ἐκπαισις* & *ἐκπαισις*: *ἐκπαισις* propriè est ovi exclusio seu reiectio conceptus seu fetus non formati sub forma ovi, quale exemplum in Hippocratis scriptis reperitur: *ἐκπαισις* vero est abortus seu ejectio fetus iam constituti. *ἐκπαισις* seu ovi hæc ejectio fit intra sex primas à conceptione septimanas: postmodum conceptus à formatione ad decimam sextam septimanam, vel ad tempus motus, vocatur *ἐκπαισις*: Nam post quartum mensem, ubi fetus moveri incipit, à medio gestationis tempore ad verum partum tempus, dicitur Fetus mortuus.

Ergo Abortus ordinarius est, qui venit ante tempus motus, prout quidem semine motum æstimare solent; post motum vero, perceptum in femina, dicitur fetus mortuus; quæ ipsa tamen à latinis sub generali Abortus nomine comprehenduntur.

CAUSÆ.

*Causa autem proxima*, propter quam fetus & conceptus non retineatur ad absolutum gestationem & partus tempus, sed citius eliciatur, est in utero, cuius vel præternaturalis coarctatio ex irritatione, contractum fibrarum occasionem præbente, conceptum fetum excludit, id quod frequentissime vel eius præternaturalis relaxatio, e.g. à fluore albi aut cachexia serosa; vid. HIPPOCRATES lib. 5. Aphor. 45. & AMATUS LUSITANUS Cent. 6. Cap. 50. item ab opiat, eundem ad tempus debitum retinere nequit; hocque rarius; membranofus enim uterus & hinc fibrosus est, ex quarum tono naturali dependet, ut retineatur fetus.

Sine ergo vel relaxatione, vel contractione (nam in huiusmodi cauturum coarctationibus & constrictionibus semper orificii ampliatio adesse solet, v.g. in vesica urinaria, fibrarum & membranarum, eius lædatur tonus, leditur etiam debita fetus retentio, ut vel excludatur intempestive, vel non debite retineatur, quin potius quasi elabatur.

Inter causas remotas primariæ sunt tres, quæ abortum excitant: Scilicet

1. Causa externa, imprimis commotio uteri.
2. Causa violenta, aut nimis motus, aut saltus, aut similia; &
3. Rarius quidem, à vitio ipsius matris, non conveniens fetus suggerentis nutrimentum. Accedit etiam interdum, ut nimia cura præcavendi abortum, abortum prouocemus, multis scilicet citra necessitatem medicamentis adhibitis: *Femina*, nempe *gravidæ nunquam melius valent, quam quando nil medicamentorum assumunt*, ut rectè loquitur LINDANUS.

Sed ut hæc legitime & decenter expediam, ad contractionem quidem nimiam, & præmaturnum spasmodum, hinc præmaturnam fetus exclusionem ex utero, irritatur vel stimulat uterum, vel à fetu ipso, vel sui ipsius vitio, vel matris, pro varietate sex rerum non-naturalium.

Primo quoad fetum, uterum irritantem & ad sui exclusionem stimulantem, fit Abortus, quando fetus est admodum debilis, ut quasi sarcina iners in utero retineatur, aut ægrotat, aut etiam moritur, vel quando non rite utero coheret: hinc enim ex præternaturali contento irritatus uterus, afflicto spiribus animalibus, se contrahit, & exinde excluditur fetus. Afficitur etiam fetus, si ex erroribus dietæ fetus debitum deficiat nutrimentum, debitam cohesio-

nem cum utero impediens. Sic etiam matris morbi in fetum derivati, hunc ad abortum disponunt, quod de variolis BARTHOLINUS Cent. 2. Epist. 85. & PLATERUS Prax. Tom. 3. pag. 250. & iætero KERCKRINGIUS Spec. Obs. 57. & PANAROLLUS Pent. 4. Observ. 44. testatur.

Secundum in utero vitium, quo irritatur & contractus fetum excludit, est in affectibus vel peressentiam, vel per consensum aut partium vicinarum laciones & irritationes. Peressentiam, quando est vitiose constitutus, nimis angustus & exulceratus, aut quando tumoribus dolorosis est affectus, v.g. scirrhus, qualem scirrhum abortus causam observavit HILDANUS, aut quando laborat abscessu occulto. Ex tali enim occasione uterus, dum debet extendi, ex dolore irritatus convellitur, hincque fetus conceptus elicitur. Huiusmodi affectus à priori semper sunt imperiscurabiles. Facillime patent per consensum, v.g. si dysenteria corripiantur intestina, aut anuscanceris, aut etiam, si acriora clysmata & suppositoria acia inconsideratè admoveantur, quæ ratione contiguitatis vaginam uteri & uterum, ipsum stimulant ad contractionem & expulsionem: quod etiam pertinet hæmorrhagiæ graves; Hinc etiam est, quod mulieres nephriticæ, aut gravidæ nephritico dolore, præsertim primis gestationis temporibus, correptæ sæpius abortiant: Vid. MAURICEAU lib. 1. cap. 13. per consensum enim uterum irritatur, se stringit & fetum excludit: & hinc etiam PANAROLLUS Pent. 3. Observ. 20. refert, se frequentissime observasse, abortus causam in scemellis quibusdam fuisse nimiam renum debilitatem. Faciunt huc tormina colica, ex fructibus horreæ fermentantibus interdum in gravidis aborta; item tormina, quæ coniunguntur cum passione hysterica; nam & hæc similiter interdum abortum prouocant.

Tertiò ipsa mater pro rerum sex non naturalium varietate diversimodè affecta solet irritare uterum, & abortum: provocare. Eminent hic assumpta, in specie acida, quæ nimis aut frequentius usurpata, & ad uterum delata, hunc irritant, fetus nocent, eundem ad epilepsiam disponunt, & ad abortum cogunt: Vid. DAVID vander BECKE de Princ. Rer. Natural. pag. 214. & seqq. Porro ex alimentis generosiore & potu spirituosiore assumpto, quæ sanguinem nimis spiritualescere & turgescere faciunt, v.g. ex aromatibus acrioribus, ex usu vini generosi, &c. subinde sequitur abortus; Vinum enim pellic fetum in iis, quæ sunt saniores, vegetiores & spirituosiores, seu, ut vulgò dicuntur, calidioris nature, id quod imprimis ab initio conceptionis primis mensibus, & medio gestationis tempore observandum est: Nam tribus ultimis mensibus haustus vini generosi sub introitu lecti est optimus & proficiuus interdum: videretur tamen vinum Hispanicum aut Malvaticum, quod nimis est spirituosum ac fermentativum. Faciunt huc odores fortes, de quibus iam supra insinuat, imprimis fetor candellarum extinctarum, hinc fumus carbonum extinctorum, de quo exemplum notabile refert MAURICEAU lib. 1. cap. 1. Irritant nempe hi ipsi membranofus uteri nimis extensis, adeoque admodum irritabilis, systema, unde contractio, & fetus exclusio. Notabile est, quod BORELUS Centur. 2. Observat. 98. abortum in femina, cum sæpe pyxidæ camphoræ infudisset, referat. Pertinent huc excreta & retenta, ubi consideretur in gravidis suppressio; unde etiam in quibusdam sanguinis abundantia, fermentatio, & hinc uberior spirituum proventus, obruendo fetum, hinc teritando uterum; adeoque communiter sic dicta plethora, dum imprimis sanguis in gravidis, ex suppressis mensibus, circa uterum coarctatus, huius contractione occasionem præbet non raro Abortui, imprimis in juveniculis acrioribus, spirituosioribus, & similibus; qui Abortus præcavendus est sectâ venâ vel cucurbitulis medio gestationis tempore, aut etiam repetitur bis vel ter hæc ipsa phlebotomia, in regionibus primis calidioribus: Vid. SYLVIVS lib. Prax. cap. 6. §. 6. &c. Imò ZACVTVS LVSITANVS refert de venesectione singulis mensibus instituenda ad præcavendum abortum. Deinde affectus animi nonnulli graviore, qui massam sanguineam insigniter commovent, & spiritus animales in vagos & inordinatos motus cogere solent, sæpius simul ad Abortum inducendum multum in recessu habent; his enim facile quoque uterus commovetur, sicque fetus expellitur. Excellunt inter hos, terror, tristitia, gaudium nimium, iracundia, & similia: Ex quidem frequentissime mulieres nimis iracundæ Abortus patiuntur; commotis enim sic spiritibus & tota massa sanguinea, exinde non tantum humores in fetus, & quibus fetus includitur, concur-



tantur, sed etiam spirituum animalium impetus pervertitur, systema nervosum convellitur, & uterus hinc commotus contrahitur, sicque foetus expellitur. De terrore postmodum. Motus quoque nimis & exercitatio corporis incondita, imprimis mediis gestationis mensibus, si sit nimia, noxia est, & maxime facit ad Abortum: Hinc corporis equitatio agitatio, saltatio nimia, cursus & casus vel ab alto, vel pronus in abdomen, & rerum ponderosarum sublatio, item fortis extensio brachiorum & manuum supra caput, & omnia ejusmodi, quae corpus graviter moveant, foetum commovent, & placentam avellunt à cohaesione cum utero, & faciunt, ut proveniat exinde abortus: Vid. SINGALDUS *Geneanthr. lib. 8. Tr. 2. cap. 3. pag. 701.* BURNETUS *Thef. Pract. lib. 1. sect. 3. pag. 6.* A sublatione enim ponderis gravioris propter retentionem halitus, & depressionem diaphragmatis, inferiora versus premittitur uterus, & deorsum movetur: Ab extensione autem manus supra caput uteriforificium ampliatur, uterus dislocatur, & interdum membranae foetus rumpuntur. Facit huc etiam sternutatio, tussis item serina, imprimis vomitus, qui si sint contumaciaiores, aut graviores, omnia haec commovendo nimis, & plus minus irritando uterum, facile Abortum foeminae provocant: Conf. SYLVIVS loco citato.

Veriamur adhuc in consideratione Abortus seu partus immaturi: consideravimus ejus causas remotas, quibus disponitur uterus ad abortivam sui contractionem, adeoque foetus praetermodum exclusionem: Pergimus jam ad eas causas remotas, earumque rariores, nempe quae uterum nimis laxant, eumque laxatum ita disponunt, quo minus commode foetum retinere possit, sed ut praeture eliciatur. Talis causa adest in foeminis, graviori & diuturno fluore albo correptis, ante vel etiam post conceptionem; item in iisdem, quae cachectia serosa sunt afflictae: in his enim fibre & membranae uteri nimis laxatae, flaccidae & debiles, & uteriforificium internum nimis spatulatum, convenienter detinere nequit foetus. Facit huc *Aphorismus HIPPOCRATIS 45. sect. 5.* „*Quae vero mediocriter corpus habentes secundo aut tertio mense absque manifesta causa abortiunt, his coelestiones mucilagines sunt reseratae, & foetus propter gravitatem retinere non possunt, sed abrupitur.*” Vid. etiam AMATUS LUSITANUS *Cent. 6. Curas. 56.* Praeterea facit huc imprimis etiam defectus sanguinis & spirituum, unde & debitus tonus uteri deficit: hinc nempe haemorrhagiae insignes, aut etiam venesectiones intempestivae, ac similes causae, sanguinem & spiritus animales male afficientes, aut depauperantes, ad abortum etiam ex parte disponunt.

Tandem terror & pavor subitaneus uti foetus non raro necem, ita & utero relaxationem nimiam inducunt, ut ob id foetus minus commode retineatur. Notum enim est, quod in terrore & pavore omnes partes exteriores subito spirituum sentiant deiectionem: hinc uti in terrore subitaneo firmiter apprehendere, aut res apprehensas retinere non possumus, sed gravi terrore percussit rem aliquam continentes dilabi simus; ita simili ratione à terrore & pavore disponitur uterus, ut brevi post elabatur foetus tanquam moles iners: unde & syncopes & similes aliae contingentes causae, lipthymiae, &c. subito abortum provocare possunt: quae ratione etiam timor ac aestus diuturnae saepe Abortum inducunt.

Denique, ut jam suo loco superius monui, opiata saepius Abortus sunt causa, quatenus spiritus animales figendo, eorum volatilitatem ac debitam in motu agilitatem nonnihil sistant, unde etiam membranae ac fibrarum uteri tonus relaxatus abortum infert, ut ut etiam opiata ipsi foetui existunt nocentissima, cuius interiectionem ferè inducunt.

Haec ferè sunt causae, à quibus ordinatio & ut plurimum supervenire solet Abortus.

### DIAGNOSIS.

Quod jam atinet Signa abortus praesentis, nempe exclusionis foetus immaturi, per se patent. Potius ergo praecognoscendus est futurus abortus seu infans, ut commode preservari possit à Medico.

Imminentem ergo abortum innuunt in specie gravitas quaedam insolita circa lumbos & coxas, cum qua concurrebat segnitie quaedam ad motum: adhuc conqueruntur tales gravidae, quibus imminet abortus, de sensu quodam inso-

lito ponderis incumbentis sinui pudoris, ac prementis vulvam. Nam alias fortes mulieres gravidae per gestationem salubres, sunt satis agiles, & nunquam tale percipiunt pondus, nisi ultimis septimanis, quando imminet partus, & quando uterus subsidet. Quando ergo alio tempore conqueruntur de similibus insuetis & insolitis gravationis doloribus in sinu pudoris, periculosum est signum imminenti abortus.

Quod si praeterea accedant vagi dolores lancinantes crebrius recurrentes in abdomine & circa umbilicum, & ad sinum pudoris usque deorsum sese extendentes, periculosum admodum est signum, ne subsequatur abortus; imprimis si simul adsit quidam involuntarius conatus quasi egerendi ex utero.

Certe haec duo sola signa, nempe gravitas insolita à regione lumbi deorsum tendens, & supervenientes vagi dolores deorsum ad sinum pudoris protensi, saepe soli sunt certum signum imminenti Abortus, cuius aliquot vidi exempla.

Item senescimus in gravida abortum portendit.

Insolita admodum segnitie, in appetentia in gravida, situs uteri vel abdominis mutatus, ita ut qui antea sursum supra regionem pubis in medio ventre blandè eminebat & proclibabatur, jam conglobatus deorsum versus pudenda inclinet, & omnis tumor ossi pubis nimis quasi appropinquet, varia etiam vaga symptomata, rigores quidam & horrores, quos subinde comitantur subitaneae phlogoses, idque recte, item tremores, cordis palitationes, &c. imminenti Abortus sunt prodromi: qui magis urget, si jam circa ventrem & lumbos dolores percipiuntur, qui versus pubem & os sacrum desinunt cum quodam egerendi conatu. Quod si post aut cum huiusmodi doloribus simul sanguinis, vel puri vel serosi, ex utero per orificium eius internum observetur aliqualls effluxus, jam jam minitantis partus indicium est. Item si mulieribus gravidis ex quacunque causa, quae ad abortum disponere potest, serum cruentum, vel etiam sanguis ex utero effluere incipiat, etiam si non statim sequatur abortus, si etiam stillicidium tale perduret, aut subinde repetatur, ante septimum vel nonum diem à prima apparentia, securi ab Abortu esse non possumus, quin hic duobus diebus ut plurimum subsequatur. Liqueores sem aquarum eruptio, qualis ferè oriri solet in partu, inquit jam factam esse membranae rptionem, & hanc insigniter orificium uteri internum, adeoque insillare proximum abortum.

Ex antiqua HIPPOCRATIS doctrina etiam ex mammae solet desumi signum futuri abortus: Vid. *Sectio. 9. Aphorism. 35.* dum ex flacciditate & extenuatione mammarum, aut etiam ex fluxu lactis, aut sanguinis ex iisdem, metum futuri abortus praesagit; innuit enim hoc ipsum corruptionem ac depravationem nutritivi foetus in utero, cum quo eadem est materia, quae mammae reddit turgidas, & consequenter mammarum lac constituit: Vitiata ergo ista materia, ita ut aut omnino deficiat, aut in mammae corrumpatur, forsitan motum foetus deorsum, & per consequens futurum Abortum, innuit.

Hec inter signa diagnostica etiam hoc observandum, cui probè fieri scilicet interdum, ut ex sero adhuc in sua matre mortuo, & ad aliquot dies gestato; matre scilicet inscia, etiam irritetur uterus ad exclusionem; unde signa & symptomata abortientium superveniunt. Apparentibus ergo signis excretionis & abortus, cavendum est, ne foetus mortuum excernendum, tanquam foetus vivum abortientem retinere studeamus. Cognoscitur foetus mortuus ex signis infra declarandis: in genere, quantum ad praesens negotium, sufficiant hoc loco signa ab HIPPOCRATE in *lib. de superstitas*, recensita, dum dicit: „Cum mortuus factus fuerit, dilabitur in utero, quocumque se vertat mulier, tanquam saxum, aut aliud quippiam simile, & pectinem frigidum, ordinario habet mulier. Regio pubis est frigida.”

Hec duo sufficienter in imminente abortu concludunt, scilicet esse mortuum.

Certe ex subito pavore, qui tertio mense v. g. corripit mulierem, facillimè fit, ut moriatur foetus, matre verò pavorem nil sentiente.

Habent equidem foeminae plura mortui foetus signa: Sed haec dubia sunt, quoniam mulieres semper bene de se sperare solent: rebus tamen in dubiis, ubi hoc solum adest signum, gravari plus solito naturam muliebrem seu genital-



genitalia, hoc ipsum sufficit imminere abortum. Et quidem si observavit semina tertio mense gravida se leviter aliquando ex repentina causa, terrore, pavore magno & simili modo inhoruisse, evenit, ut dictum factum à tali horrore moriatur fetus, matre minus hoc putante. Ubi ergo post talem horrorem brevi post sequitur gravamen pubis & genitalium, certum est signum, imminere exclusionem fetus mortui. In tali ergo casu abstinendum est ab omnibus adstringentibus, quin potius movenda est exclusio, quanto citius, tanto melius: „ Nam si adstringentia adhibeatis, quia abortus in exclusione fetus consistit, natura motum impeditis: In fetu nigro mortuo, vel saltem eius si suspicio adsit, nihil date quod adstringat, quia aliàs periculum infertur corruptionis uteri, eiusque periculosa inflammations, ut rectè loquitur LINDANUS. Par ratio est, si mola in utero congesta matrem hoc infuat.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Notum est, quod in Abortu omnes mulieres longè periculosius laborent, & quidem gravius, quam in partu genuino & naturali, quia violentia subest, & post eundem vel mox vel post aliquot septimanas gravi hæmorrhagiâ uteri corripuntur: hinc metus est, ne secunda retineatur, & dolores, hæmorrhagias graviores, ac alia graviora patiuntur symptomata, quæ si superent, subinde multis adhuc symptomatibus, hisque variis, per plures interdum annos infestantur.

Ex abortu graviore etiam interdum steriles redduntur ex læsione uteri ac vaginæ, ut postmodum non amplius uterum gerere queant mulieres, speciatim si primus conceptus fuerit abortu relictus.

Quod grandior etiam fetus est, eo quoque periculosior solet esse abortus: & quod minor & imbecillior est idem, eo minus periclitantur.

Ex casu ab alto ovi uterini primæ conceptionis relectionem novi in juvenula. Sine ominoso aut abortus ulterioris aut omnimodæ sterilitatis periculo: quin jam 25. annos nata, 12. librorum secunda mater superest; semel tamen post sextum partum ex terrore ferè circa medium gestationis tempus idem se passam esse, mihi retulit.

### CURA.

Quoad Curam: Ea in abortu est nulla, dum nempe iam sit, seu quando jam fetus à connexionem cum utero est separatus; sed potius adjuvetur à Medico, ut eo citius & cum minoribus symptomatibus eveniat. Nam si præsentem abortum adstringentibus alitve similibus remediis jam imminentem indubitatè, aut incipientem, aut jam quoddammodo factum abortum, & in quo sanguis jam incipit erumpere, aut fetus jam extinctus est, retinere volumus, periculosum est, & verendum, ne fetus mortui (nam interdum fetus in egressu moritur) retentionem, & hinc ejus & secundinæ putredinem, aut tandem ex sanguinis impedita excretionem hujus coagulati congestionem, aut periculosissimam usque inflammationem inferamus: ut utramque alia mille hinc metuenda symptomata. Aliàs religio summa sit Medico, quæcunque in casu vel tantillum dare mulieri, quoad abortum facere possit; sicuti ad hoc tenetur juxta juramentum HIPPOCRATIS. Nam ut taceam, non tam facile esse, in sano provocare abortum, quin non simul subinde ipsius matris vita periclitetur; sanè in ægris, si abortum provocare velimus, tamen incertum est, an hoc ipso gravida per abortum salvari possit: Rarus interim & notabilis casus est, quem refert CASTRO Tract. Qua ex quibus: Hoc ergo opus incumbat Medico:

(1.) Ut abortus præcaveatur.

(2.) Ut post abortum factum mulier citè tractetur, & mala imminencia maturè præcaveantur.

Quoad præservatiõnem imprimis instituenda est, dum adhuc in suo situ naturali fetus est constitutus in utero, & saltem metus imminentis abortus adest; eaque ipsa præservatio pro causarum remotionem, quæ aut irritatione, uterique præmaturatione constriktione, aut nimia us relaxatione, & membrorum tonum lædendo, Abortum inducere valent, varietate varia instituatur. Nam prima causa est frequentissima, etiam in primis gestationis temporibus; posterior verò rarior, & seminis saltem circa secundum, tertium,

ac principium quarti mensis, obvenit. Prout ergo distinguuntur hæc causæ, proxima & remota, eatenus etiam dirigenda venit cura præservatoria. Vbi in genere observandum, in plethoricis venæ sectionem interdum ab abortu præservare: vid. AMATUS LUSITANUS Cent. 2. Chir. 95. item M.A.N.C. Ann. 2. Observat. 47. pag. 86. & Ann. 6. & 7. Obs. 204. pag. 301. Ann. 9. & 10. Observ. 40. Imò ad præcautionem abortus singulis mensibus gestationis sectam venam refert RIVERIUS Cent. 1. Observ. 53. item BINNINGER in observat. Conferatur etiam HEINRICUS ab HEER observ. 14. de mulieribus, quæ cum quatuordecim abortirent, ter totogestationis tempore secta vena vitales fetus ediderint. Aperitur vena ferè in brachio; nec nisi cautè, & certis solum in casibus venæ saphenæ sectio instituenda, de quo vid. ZACUTUS LUSITANUS lib. 2. Præx. Admir. observat. 150. Interdum in impetuosiore spirituum motu, aut graviore uteri irritatione aut spasmo, subinde consideratis probe quibusvis circumstantiis, ad opata, nempe laudandum opiatum, cum aliis confugiendum erit: Ubi verò laxitas in causa est, vitanda sunt, quin potius in hoc casu cura præservatoria insinuetur cum aromaticis nervinis utero gratis, laxitatem & tonum corrigentibus; quin etiam cura similis pro cachecticis per remedia ex lignis cum aromaticis instituenda est. In genere tamen contra quemcunque Abortum præservandum commendatur ex vegetabilibus quocunque in casu primariè verbenæ; cuius usus, sive sit internus in Decocto, vel etiam aqua eius destillata frequentius corroborata, essentia, extractum aut succus, sive etiam externus, est præsentissimum euporiston muliercularum ad præservandum Abortum: quibus admisceri potest parum aquæ cinnamomi, quia confortat systema & uterum. Post verbenam sunt grana chermes, quæ multum habent in recessu, modò possint haberi sincera, & quantum fieri potest, recentia; quorum vel pulvis, vel elixir tinctura Zwelferi, item confectio alchermes sine ambra & moscho, si gravida perferre possit dulcia, optima sunt, & mirè conveniunt ad præcavendum abortum. De adstringentibus, millefolio, eiusque Decocto, bistorta, tormen-tilia, de plantagine, eiusque succo, de remediis mastichticis, & ex cydoniis, & similibus adstringentibus, seu remediis per se natis, nihil addere volo. Semen plantaginis ad 3ß. cum granis cocineis ex ovo sorbilli toto gestationis tempore adhibuit, abortum præcavit: vid. VELSCHIUS Misch. Cent. 3. obs. 66.

Imprimis ex regno animali contra abortum conducit Ebur, & omnia ex eboze parata remedia, ebur sine igne, gelatina eboris in potu dissoluta, ac similia frequenti sunt in usu: actandem ex hoc regno sunt imprimis Astaci seu cancri fluviatiles, qui singulare sunt experimentum ad præcavendum abortum, quacunque ratione adhibeantur: Sic eorum pulvis in fumo lentè exsiccatorem specificum est Potest singulare ad præcavendum contra abortum imminentem: non secus atq; succus cancrorum fluviatilium confusorum, cum bono vino expressus, & omni mense repetitis vicibus à gravida haustus, experimentum est singulare: HARTMANNI pag. 228. contra abortum imminentem: ab aliis etiam succus astacorum, aut etiam cancrorum fluviatilium, cum jusculis pullorum confusorum & expressorum laudatur: conf. etiam SACHSI Gammarolog. Loco horum pulverem cancrorum fluviatilium calcinatorum etiam cum succello usurare possumus.

Denique ad omnem abortum ex regno minerali, si ita loqui liceat, optime conveniunt Corallia præparata, eorumque parata convenientes tincturae, & quæcunque corallia, in sperie tinctura coralliorum cum spiritu cordis cervi legitime parata, insigniter confert ad præcavendum abortum, si à feminis aliquoties per septimanam in liquore conveniente hauriatur: item hypochondriacis & scorbuticis tinctura coralliorum assafrata & antiscorbutica est egregia: quod etiam syrupus coralliorum Quercetani referri potest. Ex his varia parantur Composita, quæ in frequenti solent esse usu, ut pulvis contra abortum Augustinorum, pulvis Marchionis, Margaritæ præparata, &c. propinanda in aqua verbenæ cum succo & syrupo cydoniorum, coralliorum Quercetani, de corticibus citri, & similibus: V. g. contra abortum in genere:

24. Pulv. contr. abort. Aug. 3li.

Matr. perlar. præp.

Ebor. sine igne ana 3li.

M. D. S.



*Pulvis adstringens, pro aliquot vicibus.*

Vel

*℞. Mag. Corall. cum succ. citri,*

*Ebor. sine igne,*

*Gran. Mastich. an. ℥i.*

*Pell. ventric. gallin. ℥iv.*

*M. f. Pulv. S.*

*Pulvis adstringens, de quo duæ cultri cuspides  
sumantur bis in die.*

*℞. Pulv. cancr. fluviat. in Maria Balneo exsic.*

*℥ii.*

*Calcinat.*

*Matr. perlar. præp. an. ℥i.*

*M. f. Pulvis,*

*irrorandus cum olei destillati macis gutt. aliquot.*

*D. S. ut antè.*

*Item*

*℞. Aquaceras. nigr.*

*Flor. sil.*

*Epil. Lang. an. ℥i.*

*Corall. rub. præp.*

*Ebor. sine igne ana ℥ss.*

*Syr. Corall. Querc. ℥vi.*

*M. D. S.*

*Potio adstringens, bend. circumagitanda.*

*Petr. cochlearum.*

Externè in genere ad præcavendum abortum optimè conducit panis piperatus, in forma rotunda, melle illitus, & pulvere caryophyllorum, macis, cumini, & similibus bene aspersus, & utrinque, sicut lumbis, tam abdomini, regioni pubis, calidè applicatus, dum nimis subsidet uterus; hinc enim fit interdum, ut denuò sursum versus in naturalem situm se disponat ac redeat. Nec inconueniens est, ut in imminente abortu fermentum, cum paucis cinamomi & caryophyllorum, & aliis aromatis, mediante vino subaëum, in forma cataplasmatum applicetur infra regionem umbilicalem & ad lumbos: vel dum jam dolores incipiunt corripere mulieres, optimum est applicatus facculus ex herbis menthae, absinthii, rorismarini, melissae, & similibus, in vino generoso bullitis, calidè applicatus: præsertim quando fetus est debilis, aqua vitæ mulierum, vel balsamus puerorum, vel vinum Malvaticum cum panetostio, abdominis regioni umbilicali convenienter imponitur. Optimum est cataplasma ex melle cum melissa, chamomilla, pipere, nucis moschata, zedoaria & similibus, quod nunc umbilico, nunc lumbis, ubi ad illa descendere incipiunt, applicetur. Theriac à quibusdam usurpatur: Sed hoc intelligitur eo in casu, quando mulieres ex nimia laxitate abortiunt, tunc quando nondum sunt gravidæ, sunt saluberrimæ. Aliàs, ubi imminet abortus ex relaxatione uteri, conducunt bdellum & mastix aceto dissoluta, lineis indurata, & instar cataplasmatum seu emplastrum regioni abdominis hypogastricæ applicata.

Vel

*℞. Empl. de galb.*

*Facamahac. ana q. f.*

*Malax. cum s. q. Bals. Peruv.*

*D. S.*

*Cataplasma adstringens.*

*Et applicetur lumborum regioni.*

HEURNIUS in tali casu commendat balnea aluminosa; quæ tamen in ultimis gestationis mensibus minus sunt grata, quoniam notum, quod vaginam aliàs reddunt angustam, unde sequitur partus laboriosus.

*Hæc in genere.*

Juxta hæc in specie, pro varietate causarum remotarum, imprimis ex sex rebus non-naturalibus, & variarum indicationum, varianda etiam est cura, cum sæpissimè causæ sint graviores animi affectus, primariò iracundia, terror, & pavor, qui insigniter hostiles sunt gravidis, & mortem seu necem minantur sicut, & ex his causis imminentem abortum necesse est maturè levet Medicus. Et quidem si ex medicamentis acerbis irritantibus, imò acido vel assumpto vel intus genito utero irritante, & iracundia, quæ omnes succi confusi effervescentiam excitant, sicut etiam in terrore, pavore, & similibus metus abortus imminet, appropriata quædam absorbentia, præcipitantia dicta, quæ acidum corrigunt, & sanguinis imminentem coagulationem, & stagnationem impediunt, in usu esse solent. His ergo in

casibus convenit ebur sine igne & medicamenta ex ebore, (& quidem si ab ira imminet abortus, ebur sine igne) propinetur in vino acidulo, vel in aceto rosaceo: convenit etiam gelatina eboris acida reddita, in vehiculo appropriato hausta, vel in potu ordinario dissoluta: Cancræ fluviatiles, & omnia cancrina jam laudata, singulare quid obtinent pulvis contra abortum Augustanorum, cinnabaris antimoni, Item pulvis Marchionis, specificum cephalicum, pellicula cartilaginosa ex ventriculo gallinarum sumpta, exsiccata et pulverisata ad ℥i. tali leporis, præparata ex dente hippopotami ex dente castoris, & similibus, in usu sunt: quibus addantur blanda aromatica, nux moschata, caryophylli, tantillum cinamomi, itè coralliorum tinctura, in specie assafrata, quæ à terrore imminente abortum præservant. Aliquando juvenula quarto mense gravida, quæ per scalas deciderat in cellam, & exinde insigniter terrefacta, ita ut ferè per diem noctem non sentiret motum fetus aliàs alacris, præscripsi sequentem Misluram, quæ in quovis abortu, à gravioribus animi pathematibus metuendo, usurpari potest;

*℞. Aqua lil. convall.*

*Ceras. nigr.*

*Epil. Lang. ana ℥i.*

*Ebor. sine igne ℥ss.*

*Pulv. epilept. March. ad ℥i.*

*Specif. cephal. gr. xv. ad ℥i.*

*Thuris,*

*Mastich. ana gr. v.*

*Syr. Corall. Querc. ℥vi.*

*M. D. S.*

*Potio confortativa adstringens.*

De qua mistura non ingrata capiebat subinde, bend. agitata, aliquot cochlearia: unde factum est, ut postmodum cessaret alteratio à pavore inducæ, & fetus inde roboratus denuò se alacriter moveret: applicatâ simul externè crustâ panis cum vino malvatico abdomini, de quo superius.

In specie si iracundia fuerit gravior, consultum est, ad orgasmum succorum & perturbatum spirituum animalium motum sistendum, ut nonnihil de laudano opiato, cautè tamen, usurpetur, ut sistatur facilis uteri irritatio & contractio. Quodsi uterus aut fetus roborandus sint, tormentilla, decoctum millefolii, grana chermes, mastix, thus, & similia adhibenda veniunt. Sin à nimio frigore externo, ut interdum fit, imminet abortus, ita ut fetus quasi torpidus & nonnihil stupefactus hæreat, convenit internæ aqua vitæ mulierum, balsamus embryonum, sive internè sive externè usurpentur, aqua caryophyllorum, composita, (vid. VELSCHII Mislom. Cent. 1. Observat. 10. annexa M. A. N. C. Ann. 4. & 5.) & similes aquæ spirituosæ. Externè conveniunt inunctiones cum oleo mastichino, cui additum sit oleum destillatum macis, caryophyllorum, aliquot guttæ olei destillati cinamomi cum balsamo Peruviano.

Sin à lipothymia metuendus abortus, aqua cinnamomi borraginata, tinctura coralliorum cum spiritu cordis cervi, confectio de hyacintho, syrupus florum runcicæ, &c. conducunt.

Quodsi à cachexia serosa sit malum, lignorum decoctum ad præcavendum abortum sunt optima; Sicenim PLATERUS lib. 3. Observ. abortum frequentem aliàs per crebriorem decocti guajaci usum curavit. In quo casu, ut etiam in albo fluore nimio, Fontanellæ in crure apertæ, non sunt utiles: Sic ZACUTUS LUSITANUS Prax. Admir. Observ. 450. pro præservatione abortus fontanellam summè prodesse observavit.

Ubi ex torminibus seu doloribus abdominis nobis imminet periculum abortus: convenit panis iste piperatus cum melle abdomini applicatus ac superimpositus: internè verò convenit pulvis zedoariæ, vel per se, vel cum pane, cui illitum sit butyrum, assumptus.

Hæc sunt primaria remedia, quæ contra Abortum adeius præservationem solent usurpari.

Facto jam abortu, Medicus præcaveat symptomata. Ad duo ergo respiciat:

(1.) Ut secundina & placenta post fetum simul excernantur integra: Nam post abortum pertinaciter adheret utero, unde periculum est, ne lacerata secundina, quando ab osterice paulò fortius tractatur, ex parte prodeat, & ex parte remaneat: Conf. M. A. N. C. Ann. 1. observat. 128. pag. 287. Si non excernatur, manu imprimis cautè extrahenda: (conf. MAURICEAU lib. 2. cap. 10.) cum



ed in interna medicamenta secundinam pellentia, propter hemorrhagię metum ferē suspecta sint. In specie verō mulier mox post abortum in lectum benē calefactum se componat, extensis probē simulque invicem superimpositis cruribus quietē jaceat, & ab omni frigore, quantum possibile, imprimis etiam extremorum, manuum & pedum, se muniat, nec manus etiam, si tempus sit frigidiusculum, extra lectum exferat. Nam

- (1.) Frigefactis externis vel modicē, vehementissima ac periculosa ut plurimum uteri imminet hemorrhagia, nunc immediatē post abortum, nunc post quartam demum septimanam ab abortu, ut ferē periculum mortis incurrat mulier: in qua propinanda tandem ea, quę infra Sect. 8. cap. 2. Art. 2. circa lochiorum nimium fluxum proponuntur, & aliis contra hemorrhagiam uteri nimiam quamcunque usurpari solent, conducunt.

Vel

24. Aqua tenell. cornu cervi ʒiij.  
Succ. Cydon.

vel

Granat. acid. ʒi.

Hamatit. præp.

Corall. rub. præp.

Terra sigillat. ana ʒi.

Laud. opiat. gr. iʒ. ad gr. iij.

Syr. plantag. ʒvi.

M. D. S.

Potio adstringens, benē circumagitaanda.

Ad imitationem SYLVII:

24. Aqua plantag.

Meliss. an. ʒiʒ.

Spir. theriac. simpl. ʒiij.

Acet. vini ʒʒ.

Troch. de Carabe ʒi.

Croci Martis præp. ʒʒ.

Syr. de ros. sicc. ʒʒ. ad ʒvi.

M. S. ut antiē.

Externē verō spongię aceto ac vino rubro madefactę applicentur secundū RIVERIUM Cent. 4. Observat. 46. Aut fiant sacculi ex rosis, balaustis, malicorio, & similibus, qui in vino rubro bulliti calidē applicentur.

Hęc de partu ratione temporis immaturo.

## ARTICULUS II.

DE

### PARTVS SITV VITIOSO.

**Q**UOD attinet II. Partum præternaturalem, ratione situs infantis vitiosi, cuius modi quindecim enarrantur, hujus correctio imprimis obstetrici experientie incumbit, quę manibus, oleis appropriatis junctis, fetum in naturalem situm, quantum possibile, reponere debet, sive sit vivus, sive mortuus, ut repositum commodē extrahat. Cum verō hoc rarissimē fieri possit in omni situ fetus vitioso, optimus succurrendi modus est, ut pedibus arreptus fetus extrahatur, de quo consulenda venit experientia VIARDEL in suo libro *Obstetricum*, & hinc MAVRICIAV de Morb. Mulier. Tutissima hęc simulque facillima est methodus, cuius encheirises pluribus ab hinc Autoribus descriptę videantur. Quod si hoc fieri nequeat, qua data facilliori occasione ac situ fetus extrahendus, & hac ratione matris vita salvanda. Modi videantur in iis, qui scripserunt ex professo de hac materia, imprimis LVDOVICA BOVRGOIS, item SCIPIONIS MERCVRII *Tractatus*, quem in nostra vernacula edidit spectabilis Decanus noster Dn. D. WELSCHIVS. Si enim fetus non est vitalis, non semper necesse est, ut in debili situm reponatur, sed in malograviore imprimis etiam quocunque modo eum extrahere nitatur obstetrix. Vnum adhuc moneo circa partum difficilem: Pręter ceteris casus est periculosissimus, quando pedibus primō prodit infans, ita ut etiam manus deorsum versus inclinent: nam sic fit, ut egresso corpore orificium uteri internum circa collum iterum se stringat, ita ut fetus extra uterum, caput autem elus adhuc in utero hæreat, & reddat partum difficilem. Casus est periculosissimus, & tales fetus dicuntur Agrippę. Vbi non potest emendari talis positura infantis, ob-

Estmull. Oper. Tom. II.

stetrix saltem alterutrum infantis brachium ed dirigat, ut sursum versus ad caput vergat; Sic enim fit, ut propter brachii extensionem sursum factam uterus non possit se contrahere circa collum: quo brachio retracto se vel ultra fetus ad sui exitum accingit, eumque insigniter adiuvat, ut non sine gravissimis cruciatibus matris: Vbi interea, qui de hoc scripserunt ex professo. Si fetus ita est mortuus, ut nequeat arripi, chirurgicis instrumentis frustulatim discissus extrahatur.

## ARTICULUS III.

DE

### SYMPTOMATIS IN ET CIRCA PARTVM.

#### MEMBRUM I.

DE

### DOLORIBVS PARTVRIENTIVM NOTHIS.

**P**Atet ex hactenus dictis, quod in Partu ex spasmo uteri & partium membranarum dolores certi, pro stimulando partu necessarij oriuntur: qui dolores parturientium veri cautē & accuratē discriminandi sunt à Doloribus Parturientium Nothis, utpotē qui Parturientes maximē cruciant, & partum difficilem reddunt; de quibus pauci quidem mentionem faciunt, cum tamen probē observandi sint. Fit enim subinde, ut graves dolores abdominis circa umbilicum, regionem lumbarem & totum ventrem, ad pubem protensi, interdum per mensem, interdum per aliquot septimanas aut aliquot dies, antequam partus instet, semper fœminas mirē torqueant, qui non tantummodō totum abdomen instar torminum collorum & iliacorum occupant, sed interdum etiam subinde inferiora versus ad pubem usque descendunt, & incautis tanquam veri partus dolores imponunt. Quod si tunc mulieres cogantur ad laborem partus, id cum summa difficultate, labore & anxietate contingit: imō fit interdum, ut, dum maximē eniti in talibus doloribus volunt fœminę, denuō remittant dolores & evanescant, & interdum adhuc per tres, vel quatuor, vel octo, interdum per quatuordecim dies, & interdum per & ultra integrum mensem, fœtum denuō retineant: Tales ergo dolores vocantur vulgō DOLORES NOTHI.

#### C A V S E.

Nempē oriuntur hi ipsi dolores Nothi à convulsionibus seu spasmis intestinorum & mesenterii, adeoque ad Colicis convulsivas reverā pertinent; unde etiam vicinę utero partes simul nonnihil convulsę similem dolorem, instar parturientium, representant. Uno verbo: Sunt nihil aliud, quàm dolores intestinorum colici & iliaci graviores, qui fiunt ab eorum dolorificis spasmis & convulsionibus, aut qui interdum hystericam passionem aut antecedunt, aut comitantur, & non tantū ab assumptis flatulentis, aut ab ingestis acidis, similibusque, sed etiam interdum ex effervescencia vitiosa succi pancreatici, & bilis, in primis viis corruptorum, oriuntur, prædominante etiam Acido plus minūs austero, unde & imprimis suffocationes hystericę talibus doloribus in prædispositis subinde superveniunt, vel lipothymię. Fiunt item interdum tales Dolores Nothi à macilagine pontica acida, tenaciū intestinis affixa, quavis occasione commota aut resoluta; unde dum eam crispationibus dolorosis excutere nituntur intestina, facillē tales falsi Parturientium Dolores succedunt: Sic mulier quędam aliquamdiu ex esu raphani incidebat sequenti nocte in graves dolores abdominis, ita ut accesserit obstetrix; & alię mulieres, volebant eniti, nihil procedebat, instabat laboribus per integrum noctem, manē dolores cessabant, & expectabat adhuc quatuordecim dies ac noctes. Sæpiissimē in partu veris partus Doloribus Nothi hi ipsi dolores, uti subinde antecedunt verum partum, ita quandoque cōiunguntur ipsi partui, & non raro post partum etiam ad tempus durant, dum nempē uterus in partu spasmo correptus & contractus pro excludendo fœtu, motus istos convulsivos ratione suorum nervorum,

LII

rum,



9. Pertinet huc nimia laxitas rugarum vaginæ uteri in illis, quæ vel crebrius pepererunt, vel quæ diutius fluore albo laborarunt, ubi hæ rugæ nimis laxæ aut flaccidæ, ut minus se contrahere valeant, partum laboriosorem reddunt, & quem obstetrices interdum manu juvare necessum habent. Aliàs rugæ hæ, contrahendo sese, multum faciunt ad exclusionem fœtus.

### DIAGNOSIS.

**Quod attinet Signa:** Partus difficilis & laboriosus per se patet.

Causarum signa imprimis cognoscenda; quod facile fieri potest, modò omnes circumstantiæ partus pensitentur à Medico.

Matris vitia ac debilitates, eamque minus esse promptam ad partum, ex eius relatione & causis antecedentibus facile cognoscuntur, si dolores partus sint remissiones, si sint interrupti, item si mater aliàs per se debilis aut debilitata fuerit.

Matruum vitia, si vulvam seu vaginam habent angustam, ex obstetricis relatione imprimis cognoscuntur, si & strenuè laborante matre, & strenuè se movente fœtu, & continuantibus partus doloribus, nihilominus tamen vix angustia maneat, id quod tangendo experitur obstetrix, aut orificium uteri pertinaciùs clausum fuerit: in quo casu emollientia & laxantia iniicienda.

Fœtus vitia ex circumstantiis, præsertim ex deficiente, ejus motu ac debito conatu, cognoscuntur, si partus, licet doloribus continuantibus, hic tamen tardius aut imbecillius moveatur, qui aliàs strenuè se gerit, imò interdum omnino in motu cessat, ut quibusdam fœtus putetur mortuus: quod quomodo cognoscendum, *Membro 3.* habebimus. Scilicet (ut obiter hoc loco moneam) obstetrix inungat manum aquâ vitæ mulierum vel alla spirituosa, & ita, eadem in uterum immisâ, fœtum tangit; qui si vivus adhuc est, subito se movere incipit; sin minus, mortuus est.

In specie tres sunt circumstantiæ, quæ, monente GUILLEMEAU *Tract. de Felici Partu Mulier.* Partum difficilem & periculosum reddunt, & specialem evolutionem mereantur:

1. Quando fœtus mortuus reddit partum difficilem.
2. Quando nimia hæmorrhagia uteri partum præcedit.
3. Quando partu imminente adsunt vel superveniunt convulsiones.

De his adhuc quædam monenda. De fœtu mortuo *infra suo loco.*

**Quod attinet Hæmorrhagiam uteri:** sæpius evenit, ut nonnullæ uterum gerentes obnoxie sint fluxui sanguinis per uterum: Si igitur imminente partu accidat, observet Medicus, ex quo loco sanguis prodeat? an nempe saltem ex vagina uteri? an ex matrice? Ex qua non prodit, si mulieres nullos patiantur partus dolores; item, si orificium uteri internum clausum & non apertum sit, sed sanguis prodit saltem ex vagina uteri.

Interim simul observetur, ut quando orificio uteri aperto sanguis prodit, ut tunc attendat Medicus, quid illud sit, quod orificio uteri imminet? an sit secundina? an fœtus? si sit secundina, signum est, eam esse disruptam à connexionione cum utero, & imminere mortem fœtus, adedque accelerandam esse fœtus exclusionem.

**Quod verò attinet convulsiones parturientibus supervenientes,** plures sunt mulieres, quæ sine convulsionibus pariunt, nisi aliàs affectibus convulsivis affecta sit mulier (tunc enim parum referunt). Hinc quibusdam fœtibus epilepsia sub partu est salubris, quibusdam lethalis: Vid. *M. A. N. C. Ann. 2. Observat. 67. pag. 124. & Ann. 3. Observat. 317. pag. 534.* Interim si adsunt, oriuntur ut plurimum ex impetu fœtus in utero, dum summo conatu exire nititur.

His signis diagnosticis adjungatur notatu digna observatio HORSTII *lib. 5. observat. 37.* ubi fœtus ante medium gestationis tempus, & aded ante motum, in scilicet matre, ejus, mortuus relictus fuit, qui postmodum ex supervenientibus variis symptomatibus cachecticis, gravioribus lipo-

thymis, à posteriori seu mortuus cognitus, ac feliciter expulsus fuit.

### P R O G N O S I S.

**Quoad Prognosin:** In primiparis partus non raro solet esse paulò laboriosior: nec tamen id perperum observantiæ putandum est, cum crebriores proflent observationes, quod fœminæ, quæ primum partum faciliùs absolvent, sequentibus temporibus de partu in partum serè difficiliùs habeant, & tales sæpius in partu, aut etiam sæpiùs in puerperio, moriantur: E contra partus primus quod difficilior, eo faciliores secundi & insequentiores esse solent.

Virginibus etiam seriùs maritatis imprimis periculosior & difficillimus imminet partus, imprimis quando circa trigésimum vel trigésimum quintum annum nubent: Nam quò propius tales virgines appropinquant ad quadragesimum annum, eo periculosius in partu se habent, sæpè & hæ solent mori, vel in partu, vel in puerperio; idque propter sortem juncturam & firmitatem partium uteri membranacearum.

In valde juvenculis verò difficilis est partus, quia membra omnia teneriora sunt, & exitus non adeò apertus; infantes enim primipari valde magni esse solent ut plurimum.

Interim tamen partus difficilis omnis periculosum malum est, cum exhaustis successivè viribus, vel matri vel fœtui, vel utriusque vitæ subinde imminet periculum, quia matri gravia superveniunt symptomata, ut hæmorrhagiæ uteri, febres, &c.

Potèrè partui difficili superveniunt non raro convulsiones & paroxysmi epileptici funesti & lethales, nisi brevi post sequatur fœtus; nam ubi sequitur fœtus, tunc cessant vel spontè.

Quod si verò fœtus non rite fuerit situatus, vel inversus, tam ingentem uteri distensionem facit, ut metus sit, ne utero lacerato mater gravius malum, aut periculum vitæ, incurrat.

Interdum in partu laborioso rumpitur vagina uteri impudendo, ita ut sinus pudoris cum podice in unum abeat foramen; de quo inferiùs plura.

Si mulier quatuor diebus partu difficili laboreat, vix potest fieri, fœtum permanere vivum, quin tandem moriatur, matris scilicet & fœtus viribus collabescens.

Partus difficilis, qui sit ex angustia viarum, speciatim ossis structura validiore, periculosus est, & subinde cum periculo fœtus sit conjunctus, & subinde Chirurgi accedat opera, necesse est.

### C U R A.

**Quoad Curam Partus difficilis:** ut plurimum duplex instituitur, partim præservatoria, partim curatoria, id est, Medico incumbit, tam ut præcaveatur, qui metuitur, quam etiam ut faciliatur, qui actu instat, ut fiat minus laboriosus, per medicamenta tam externa quam interna.

Aliquot ergo diebus ante partum, qui metuitur difficilis, ad hunc facilitandum, utatur mulier balneis & infusibus emollientibus, laxantibus & nervinis, ex althæa, malva, melliloto, chamomilla, pulegio, artemisia, serpillio, matricaria, & similibus: e.g.

24. *Herb. Malv.*

*Artemis.*

*Matricar.*

*Mercurial.*

*Puleg.*

*Meliss.*

*Alth.*

*Violar.*

*Branc. nrsin.*

*Parietar.*

*Flor. Chamom.*

*Sambuc.*

*Malv.*

*Melilot.*

*Lm. an. Mj.*

*Radic. alth. ʒi.*

*Malv.*

*Rad. Lil.*



*Rad. Lil. alb. an. ℥i℥.*

*Sem. Lin.*

*Fenugr.*

*Aneth. an. ℥il.*

*Incisa & contusa S.*

*Species ad Balneum.*

Cui & lactis mensura una vel duæ infundi possunt.

His poma momordicæ seu fructus momordicæ quidam addendos suadent, propter signaturam: nam si hæc poma contineantur in manu, crepitu edito per medium disrumpuntur, & sua semina ita effundunt; unde per similem signaturam, clysteribus incocta, etiam in partu facilitando à **VOLCHAMERO** in *M. A. N. C. Ann. 6. observ. 72.* aliisque laudantur. Locobalneorum usurpant quædam fomenta, ex dictis simplicibus, sacculo insutis, in aqua vel lacte probè coctis, & subinde hypogastrico tumentis admotis, concinnata. Post balneum aut talem solum, vel sine eo, illinatur regio abdominis inferior, item pudenda & regio lumbaris, cum mucilaginis, oleis & pinguedinibus, vel simili linimento, quod *suprà sect. 7. cap. 4. Artic. 15.* datum est, vel sequenti:

*℥i. Mucil. sem. Lin.*

*Fenugr.*

*Radic. Alth.*

*Malv. an. ℥i.*

*Olei lil. alb.*

*Cheirin.*

*Chamom.*

*Momord.*

*Amygd. dulc. an. ℥℥.*

*Bals. Peruvian. ℥ii. vel ℥iii.*

Misce, pro linimento: S.

*Unguentum emolliens.*

Quo post balneum vel fomentum illinatur mulier.

Conueniens etiam est, quando aquæ præmaturè effluxerint, & genitalia nimis arida existant. Vel oleum amygdalarum dulcium & oleum liliorum alborum sola conueniunt.

Dum verò iam partus inflat, & dolores mulierem prehendunt, optimum est, alvo existente vel clausa, vel intestinis flatu turgidis, applicare enema carminativo emolliens, quod maximè confert: imò ubi dolores partus notati, aut etiam colici, aut pathemata hysterica, gravidæ parturientes simul affligunt, talia clysmata ad facilitandum partum optimè conducunt; & in ipso partu difficili, aliis serè frustraneis, se aliquoties felicem successum ex tali enemate observasse, scribit **TIMÆUS von Guldenklee**, in *Epist. 16. lib. 6. pag. 432.* Enema ab ipso insigniter commendatum, in ipso labore partus infundendum, est hoc satis forte:

*℥i. Herb. Parietar.*

*Branc. ursin.*

*Malu.*

*Violar.*

*Parietar. an. Mi.*

*Flor. Chamom.*

*Melilos.*

*Sambuc. an. M℥.*

*Radic. Alth.*

*Lil. alb.*

*Brjon. an. ℥℥.*

*Sem. Anis.*

*Funiculi,*

*Lin. an. ℥ii. vel ℥iii.*

*Agaric. trochiscat.*

*in pet. ligat. ℥iii.*

*Incisa & conquass. coqu. inf. q.*

*aquæ simpl.*

*Colaturæ ℔i.*

*adde*

*Elect. hier. pier. ℥i.*

*Catholic. ℥℥.*

*Ol. lil. albor. ℥i℥. ad ℥ii.*

*Sal. gemm. ℥iii.*

*M. f. Enema infundendum.*

Idque, ut dicit, *feliciter cum successu.*

His etiam factis, aut adhuc faciendis, dum Partus inflat, obstetrix ante mulierem collocata manibus inunctis oleo liliorum alborum, amygdalarum dulcium, cheirino, aut pinguedine gallinacea, aut anserina, aut ursina & similibus, blandè vaginam dilatat, abdomen mulieris

*Estimul. Oper. Tom. II.*

tumidum, & lateralem regionem lumbarem similiter inungat, subinde etiam abdomen mulieris blandè deorsum versus premat.

Quod si in longum partus protrahatur, & dolores non sint continui, sed per longa intervalla interrupti, mulier non statim cogatur in sellam, & ad puerperii conatus ac labores instigetur, in quo morosæ, imprudentes, vel aliiis puerperis ad lucrum intentæ obstetrices sæpè delinquant; quin potiùs, cum anxiosa sit mulier, & subinde stare, subinde sedere, subinde decumbere aut ambulare velit, tamdiu parturienti libertas & blandus motus, in specie blanda ambulatio & inclinatio ad parietem concedatur, ut foetus situs deorsum versus eò meliùs promoveatur, quamdiu post effluxam aquam uterus nondum perfectè apertus, nec foetus capite uteri orificio imminet, & ad partum jam dispositus sit: tunc enim sellæ impositam in eodem situ obstetrix constanter retineat, & firmiter ad partus labores urgeat, nec priùs dimittat, nisi foetus subsequutus sit: Nam tunc, quando ita imminet partus, neque sedere, neque ambulare possunt; quin potiùs periculum est, ne sub conatu ambulandi vel sedendi vitetur positura situs infantis, & qui erat naturalis, nunc semotus vel ventre vel brachio vel aliâ parte orificio uteri incumbat; & ita partus præternaturalis reddatur. Interea dum longius labor protrahitur, obstetrix oleo cheirino, pinguedine anserina, oleo succini, liliorum alborum, & similibus suprà dictis linimentis abdomen gravidæ & vaginam uteri inungat, ut in tali casu uterus & abdominis muscoli relaxentur, & blandà manu puerperam tractet, & eam audacter ad partum stimulet. Fit interdum, ut aquæ remorentur, unde ruptis unguibus suis membranis obstetrices maturiùs effundere faciunt: id quod tamen insigni cum detrimento foetus & matris, sæpeque impedimento partus, evenit; potiùs sufficit ex emollientibus & carminantibus, in specie decocto chamomillæ, utero excipiendos instituat obstetrix. **BORELLUS** *Cent. 2. observ. 25.* habet, à potu olei olivarum ante partum mirè eundem facilitari, ita ut nec tormina ulla patiantur puerperæ, cum oleum hoc vias molles & lubricas reddat, præsertim si etiam extra admoveatur.

De Obstetricum Officio vid. **LUDOVICA BOURGOIS**, **JOANNES VESLINGIUS** in *Observat. Anatom. posthumis*, à **CASPARO BARTHOLINO** editis, pag. 159. & pag. 168. **BARTHOLINUS** in *Actis Hassinens. Volum. 1. Observ. 139. pag. 286. ad pag. 292. & Volum. 2. Observ. 22. pag. 53. sequ. & MURALD. Clav. Medic. pagina 429. De Qualitatibus & Requisitis earum. VIARDOL. in observationibus de sanguine muliebri pag. 159. seq. de earum examine **PECHLINUS** l. 1. *Observ. 33.* ubi & *Observ. antecedente de infelici obstetricis manu* conquiratur.*

Interea temporis, si foetus in ipsis oris inhæreat, & metus sit, ne vel fetus, vel mater debilitetur, ad roborandam matrem & foetum, & ita promovendum partum, Medicus vocatus internè tam analeptica varia propinet, quàm externè admoveenda ordinet. Internè propinet ea, quæ per experimenta partum promovere cognita sunt, miscendo simul cum spirituosissimis urinosis volatilibus, & acerbis aromaticis, spiritus animales roborantibus, & ita ad enixum meliùs disponentibus; & neque his sufficientibus ad specifica, fortiter pellentia, per experientiam confirmata, progressus fiat, in specie cum cinnamomo, sine quo nulla remedia pro facilitando partu propinanda veniunt. Ut ut autem spirituosissima analeptica, matrem & fetum roborantia, semper convenient, postiora tamen aromatica acris volatilia, & specifica foetum pellentia, non priùs danda sunt, quod probè notetur, nisi aliis irritis, omnibusque ad partum ratione matris & ratione foetus jam prædispositis, cum factus est in partu, atque hic saltem tardiùs procedat, id est, nisi aquæ effluxerint, orificium uteri hiet, dolores parturientis rectè se habeant, & ipse foetus in convenienti situ positus, adeoque, ut vocant, cum foetus adest & capite instat orificio uteri; aliàs enim, nisi hæc omnia adsint, fetu malè situato, aut tempore ad partum nondum requisito, ab internis partum pellentibus seu promoventibus, quibus crebrò à mulieribus peccatur, omninò est abstinendum, quia subinde frustrà & cum periculo propinantur. Nihil pelius est, quàm quod obstetrices mox mulieres ad partum cogant, antequam omnia sint parata. Uno nomine: non conveniunt talia nisi in partu naturali, in præternaturali penitus ab-



isidem abstinendum. Vnde quando dolores instant, non opus est remediis pellentibus; ubi verò omnia sunt parata ad partum, dolores tamen remittant, spirituosis analepticiis tanquam vehiculo, appropriata sctum pellentia, & novos dolores excitantia, sunt intermiscenda.

Ceterum ex innumerabili remediorum farragine saltem selecta proponemus, quæ in partu difficili promovendo sunt usitata, & in tres classes dividuntur. Remedia ergo, quæ parturientibus conveniunt, sunt, vel *spirituosa analeptica*, adeoque nervina, motum partium beneficio spirituum promoventia, atque matrem & sctum refocillantia; vel *remedia aromatica volatilia acia* sctum stimulantia; vel *specificia* per experientiam cognita, uterum speciatim irritantia, & spasmos concitantia.

Quoad 1. *Spirituosa*: sunt cinnamomum, vinum generosum, spiritus vini, aqua vitæ mulierum, aquæ hystericae spirituosæ compositæ variae, aqua cinnamomi spirituosæ, aqua pulegii & melissæ cum vino destillata, cum syrupo de canella, de artemisia, cum syrupo de cortice aurantium, & hujusmodi alia, quæ omnia sunt egregia: imò hæc spirituosæ insuper id commodi habent, ut dum commovent massæ sanguineæ circulum, postmodum lochia melius fluant.

II. *Aromatica* sctum stimulantia sunt dictamnus Creticus verus, salvia, artemisia, aromata omnia, in specie cinnamomum, quod unum est ex optimis; unde recte monet LINDANVS nunquam sine cinnamomo in partu mulieribus medicamenta, sctum vel vivum vel mortuum pellentia, esse propinanda, eò quod vires restauret & sctum pellat. Item pertinet huc canella, id est, costus Arabicus verus, Antophylli, & cassia lignea: dicimus ligneam, propterea, quia sæpius reperiuntur apud Practicos formulæ, ubi ex ignorantia substituta fuit cassia fistularis, cum tamen huius cortex nil valeat, sed sit elumbe & medicamentum sine usu. Post cassiam Crocus est egregius, qui uti menses, ita etiam sctum pellit, & miraculosus à quibusdam ad partum difficilem dicitur, aded ut etiam, quandoque ex eius usu sctus observatus fuerit colore flavescere tinctus, ut ut is crocus ipso partus labore assumptus sit: Vid. AMATVS LVSITANVS Cent. 4. Curat. 24. & 157. Cent. 6. Curat. 87. Cent. 7. Curat. 86. HORSTIVS FILIVS in observ. Anat. 31. HENRICVS ab HEER observ. 14. Quibus addantur omnia salia alcalia fixa & volatilia, speciatim volatilia oleosa, & olea aromatica, essentia croci, &c. quæ egregia sunt ad sctum promovendum.

III. Succedunt *Specificia*, inter quæ flores cyani & calcatrippæ in vino cocti à quibusdam singulariter laudantur, sicut etiam *Essentiam ad Partum D. Michaelis* ingrediuntur: item Anthere liliorum alborum, flores calendulæ, semen lauendulæ, milii Solis, &c. Pauperculus in usu est haustus urinae mariti, uti dicit HARTMANNVS; Et sanescio, hoc feliciter quibusdam successisse, dum scilicet haustu urinae maritorum liberati fuerunt ab ipsolabore partus. Porro castoreum, & omnia ex eo, sunt egregia; item succinum album, & omnia ex hoc; Nam succinum præparatum solum ad ʒi. vel ʒi. propinatum, promouet partum; & essentia succini, seu potius oleum succini destillatum, quod sub nomine Quintæ Essentiæ succini laudat BORELLVS Cent. 3. Observat. 12. sicut RVLANDVS in Thesaur. Curat. pag. 320. & 321. oleum succini egregio cum successu expertus, quod à guttis viii. x. xii. xiii. ad xxx. in aqua melissæ cum vino, vel aqua pulegii spirituosæ intus propinatum, est singularissimum remedium, in casu difficili simul externè umbilico inungendum: si acuatur aliquot guttis olei destillati cinnamomi, erit eò magis præsentaneum remedium. Loco hujus efficacius longè experimentum est RVLANDO l. a. in usu positum suum oleum Heraclinum, ex corylo, certo tempore destillato, præparatum, quod tam internè assumptum ad guttas xii. xv. usque ad xxv. & externè umbilico illitum, mirè partum promouet. Essentiam succini tartarifatam cum essentia castorei mistam, & ad guttas xxiv. aliquoties exhibitam, LVDOVICI commendat in M. A. N. C. Ann. 9. & 10. Observat. 35. cui essentia Croci etiam associari potest. His non cedit sal volatile succini, Josi ʒ. vel gr. xv. in aqua liliorum alborum, quod fuit Secretum SVLTZBERGERI, olim Archiatri Saxonici, ad promovendum partum difficilem; unde liquor cornu cervi succinatus à ʒʒ. ad ʒi. est remedium egregium.

Porro myrrha, asa scetida ac similia sunt expertissima: Hinc pilule scetidæ, ad ʒi. cum decocto sabine propinatæ, mirè stimulant partum. Myrrha imprimis & singularissima, & in specie trochisci de myrrha usitati sunt ad sctum pellendum, & vivum & mortuum, propinati à ʒi. ad ʒj. Quod pertinet etiam sabina, item decoctum; imprimis oleum destillatum sabine est efficacissimum sctum pellens: vid. VELSCHIVS Hecat pag. 32. Præ cæteris eminet secundina humana, cuius spiritum per putrefactionem paratum, & ritè rectificatum, seu summum specificum, primariò primiparæ, instar omnium in partu difficili, sctum vivo vel mortuo, vobis commendo. Modus præparandi est hic: secundina cum membranis concisa, minutim, in vase amplo bene clauso in Mariæ Balneo, digeratur per mensem & plus; sic enim resolvitur tota secundina in liquorem, sed horrendè fetentem, paucis tantummodò vestigiis membranarum crassiusculis relictis: hic liquor rectificandus est per balneum, ut solus prodeat spiritus, qui spiritus ad guttas ʒd. vel ʒo. usurpatus, non habet sibi par remedium in morbis, qui partum attinent, & post partum succedunt; in fluxu lochiorum, doloribus post partum, & sctum mortuo pellendo, est singularissimum remedium. Hoc ipso in superiori anno in quadam, medio gestationis tempore abortiente, cum reliquæ essent secundinæ, & per tres dies retentæ, frustulatim licet, expulsi. Sed hæc obiter. Hinc quonque cum hoc ipso spiritu secundinæ humanæ, seu menstruo, parantur Essentiæ ad partum, imprimis *Essentia ad partum B. Dn. D. Michaelis*, cuius ingredientia sunt præter alia aromata, antophylli & cinnamomum sive canella, costus Arabicus, caryophylli, flores cyani, tunice, calcatrippæ & cheiri, antheræ liliorum alborum, sabina &c. Ex his beneficio spiritus secundinæ fit essentia ad partum admodum efficax. Datur spiritus ille à ʒʒ. ad ʒi. in aqua liliorum alborum, aut cinnamomi, aut pulegii, aut melissæ. Qui non habent spiritum secundinæ, assumunt secundinam, eamque blandè exsiccant in elibano, aut phlegmatis in Mariæ balneo abstractione; cuius pulveris ʒʒ. ad ʒj. propinant equali fere effectu. Quia autem secundina, nisi ritè & sedulò exsicceretur, vix profert moram, sed facillè putrescit, inde ut hoc præcaveatur, pulvis impregnetur oleo destillato caryophyllorum aut cinnamomi; sic enim diu servari potest, & melius quoque operatur. De Fuligine res nota est, quod in substantia ad ʒi. propinata insigniter conducit ad promovendum partum. Hinc loco spiritus secundinæ etiam spiritus fuliginis bene rectificatus est egregius ad pellendum sctum: in specie ubi vires deficient mulieri, doloresque parturientium desinunt, & sic partus periclitatur, tunc promptè propinatur spiritus & sal volatile fuliginis, vel oleum rectificatum; sic enim promptè denuò redeunt dolores ad laborem: item applicatur fuligo furni splendens, subasta cum aceto destillato pulvis; sic enim facillè denuò partus labores repetunt. Secundinæ humanæ & fuligini succedit jecur anguillarum, unà cum suo folliculo fellis exsiccatum & pulverisatum, quod *specificum* singulare Helmontii est, Tractat. Jus Daumoviat. ʒ. 47. ad promovendum partum, cuius miram efficaciam ad promovendum partum etiam insigniter extollunt PANNAROLLVS, seu certissimum, in Observationibus, Penec. 3. Obs. 21. BINNINGER in Obs. du HAMEL de Affect. Corp. pag. 309. ZWELFFERVS Apol pag. 103. & BOYLE in Philosophia experimentalis pag. 478. ubi dicit, se aliquoties huius hepatis exsiccati usu dosi ʒʒ. ad ʒi. in casu desperato adhibuisse, dummodò sit recentius, nec ultra duos annos asservatum. Loco hepatis anguillæ etiam potest usurpari equali cum successu hepar serpentis, aut, quod melius adhuc, hepar viperarum, similiter cum suo folliculo fellis exsiccatum & pulverisatum, & hepati anguillæ non cedit. Juxta hæc Testes equini, exsiccati & pulverisati, sunt specificum singulare ad partum difficilem, cuius apud Practicos frequentia vestigia existant. Singularem horum & mirabilem efficaciam à ʒʒ. ad ʒi. vel si soli propinaptur, vel si cum tantillo borracis in aqua liliorum alborum hauriantur, mirè commendat CLAVDIVS Conf. 107. & HENRICVS ab HEER in observ. 14. & basis sunt pulveris ad partum difficilem HELIDÆI PADVANI, qui satis est efficax. Juxta hos testiculos etiam pro pauperculis est stercus equinum, eiusque succus cum vino expressus, qui loco urinae mariti haustus egregium est remedium, quod potentè pellit partum, & etiam seu vivum, sctum licet, efficacè tamen,



tamen, commendat LINDANUS. Quibus omnibus subinde procircumstantiarum ratione & alia socianda veniunt. In specie borra<sup>x</sup> Veneta unum ex optimis & potentissimis est ad promovendum partum, setum mortuum, lochia & secundinas, si à ℥i. ad ℥ss. & ℥i. propinetur in decocto vel syrupo appropriato, meritis laudatur à ZACUTO LUSITANO lib. 2. Prax. Admir. Observ. 41. 49. & 158. quod raro fallit, ubi affectus est curabilis. Porro Mercurius vivus propinatus expertum est remedium à BARTHOLINO Cent. 4. Epistolar. pag. 492. Sicuti ab aliis mirè commendatur aurum fulminans, ita ut aliis quamplurimis frustra adhibitis hoc solum sit singulare, & cea anchora sacra, & ultimum remedium. LANGIUS in Misc. Cur. pag. 101. mirè extollit tanquam expertissimum in hoc casu specificum cephalicum D. Michaelis, præprimis si epilepticis insultibus sit stipatus partus difficilis.

Jam ex his paucis & selectis mille possunt fieri formulæ: v. gr.

℥. Aqua Matricar. ℥ii.

Cinnam. ℥ss.

Borrac. Venet. ℥ss.

Mirrha ℥i.

Salis volat. succini ℥ss.

Syr. de canella ℥iii.

M. f. Potio pro duabus dosibus.

D. S.

Potio partum promovens.

℥. Aqua liliorum alb. ℥ii. vel ℥iii.

Cinam. ℥iii. vel ℥vi.

Liqu. Cornu Cervi succinat. ℥ss.

Borrac. Venet. ℥i.

Syr. Artemis. ℥iii.

M. D. S.

Potio promovens pro aliquot vicibus.

Capiatur pro lubitu.

Vel

℥. Aqua lil. alb.

Puleg. an. ℥i.

Cinnam. ℥ss.

Spiritus sulig. à ℥i. ad ℥iii. (prout rectificatus plus vel minus)

Pulv. secund. human. præp. ℥i.

Syr. de Canell. ℥ss.

M. pro 2. dos.

D. S.

Potio promovens pro 2. dosibus.

℥. Aqua lil. alb. ℥ii.

Meliss.

Puleg. an. ℥i.

Cinnam. spirituos. ℥ss.

Testic. equin. pulveris. ℥iv.

Borrac. Venet. ℥ii.

Ess. Castor.

Succin. an. gtt. xx.

Ol. destill. Nuc. mosch. gtt. vi.

Sacch. albiss. ℥ii.

M. D. S.

Potio promovens pro aliquot vicibus.

Propinetur cochleatim.

℥. Aqua flor. Cheiri ℥ii.

Puleg. cum vino ℥i.

Cinnam. cum vino ℥ss.

Pulv. Hepat. Anguill. cum felle ℥ss.

Borrac. ℥i.

Syr. Artemis. ℥iii.

M. S. ut antè.

Detur pro lubitu.

Pertinet huc Mixtura experta TIMÆI von Guldenkle, ex myrrha, croco & succino, cujus efficaciam vel centies in difficili partu se expertum fuisse affirmat in Casibus lib. 4. cas. 25. pag. 123. & 28. Formula est hæc:

℥. Aqua Meliss.

Artemis.

Cinnam.

Hysteric. an. ℥i.

Mirr. elect. ℥ss.

Succin. alb. præp. ℥i.

Croci ℥ss.

M. f. Potio, haurienda calidè, quæ subito partum promovet.

Item Mixtura TIMÆI von Guldenkle, Cas. 28. cujus Estimul. Oper. Tom. II.

formulam infra Sect. 8. cap. 2. artic. 1. ubi de Lochiis suppressis, communicabo. Meritis addit succinum album, ob rationes suprà dictas. BARAETTE, ut & SYLVIVS, insigniter commendant hanc potiunculam:

℥. Aqua puleg. ℥ii.

Meliss. cum Vino ℥i.

Vira Matth. ℥vi.

Syr. de Artemis. ℥ss.

Misc. pro Potione.

De hac mixtura aliquot cochlearia subinde propinata, mirè matrem roborare & partum promovere dicuntur: si non fuerit sufficiens, reliquis pro vehiculo inservire potest.

D. CUMMIUS in M. A. N. C. Ann. 3. obs. 132. talem commendat mixturam roborantem in partu difficili:

℥. Aqua puleg.

Fenic. an. ℥ii.

Vira mulier. ℥vi.

Ess. Castor.

Croci an. ℥ss.

Syr. de Artemis. ℥i.

Misc.

Detur cochleatim per vices.

Pertinent huc species dia-borracis Mynsichtii, cum Decocto Matricaræ vel Sabinæ propinata, quæ mirificè setum pellunt: & in Curationibus HILLERUS curavit setum nam triduo partu laborantem, propinando tandem borracis ℥i. cum unicorn. animal. ℥ii. & sic tandem peperit filium mortuum. Pulveres aliquot compositos expertos vid. in HERTODTII Crocol. pag. 224. Item convenit pulvis ad partum Augustanorum, & pulvis ad difficilem partum HELIDÆI PADUANI, qui satis est efficax, & cujus hæc est compositio:

℥. Testic. equin. exsic. & pulveris. ℥ii. vel ℥i.

Borrac. ℥ii.

Cinnam.

Croci an. ℥ss.

M. f. Pulvis pro duabus vel tribus dosibus:

quatum singula in ℥ii. aqua artemisia propinanda.

Pertinet huc pulvis expertus Lindani, quem in defectu secundinæ humanæ se semper felici cum successu etiam aliquoties in propria uxore ad setum pellendum adhibuisse testatur:

℥. Cinnam. acerr.

Oss. Dactyl.

Borrac. Venet. an. ℥i.

M. f. Pulvis.

Detur in haustu vini generosi vel Hippocratici, aut in Decocto radicis liliorum alborum.

Si potentius debeat esse remedium, loco ossium dactylorum sumatur Trochiscorum de myrrha ℥i.

Mirè laudat hunc pulverem, ubi vires deficient, & dolores in parturientibus remittunt; ab assumpto enim hoc pulvere subito rediisse dolores, se aliquoties observasse affirmat. Vel

℥. Troch. de Myrrha,

Borrac. Venet. an. ℥ss.

Cinnam. acuti ℥i.

M. f. pulvis: S.

Pulvis promovens.

Item

℥. Pulv. hepat. Anguill. ℥i.

Borrac. Venet. ℥i.

Myrrh. ℥i.

M. pro 3. dos.

S. ut antè.

Quorum vehiculum sit:

℥. Aqua puleg. ℥ii.

Cinnam. ℥ii.

Misc.

Vel

℥. Pulv. hepat. Anguill.

Secund. hum. an. ℥i.

Borrac. Venet. ℥ii.

M. pro 2. dosibus.

D. S.

Ut antè.

Propinantur in vehiculo sequenti:

℥. Aqua Lil. alb. ℥ii.

Puleg. ℥i.

Cinnam. spirituos. ℥iii.

M. pro vehiculo: S.

LII 4

Aqua



*Aqua ad pulverem.*

Similis ferè est pulvis Sylvi ad promovendum partum:

℥. Borrac. Venet. 3℥.

Myrrh. el. ʒi.

Croci opt. 3℥.

Cinnam. acut. gr. vii.

M. f. pulvis pro duabus dosibus.

quæ ex mixtura spirituosâ propinentur.

Dum jam mentionem facio Croci, hoc ipso memoratū digna est observatio AMATI LUSITANI Cent. 5. Curat. 24. Cent. 6. Curat. 51. Cent. 7. Curat. 66. cujus egregius & expertus pulvis est sequens:

℥. Cinnam. opt.

Troch. de myrrh.

Croci an. 3℥.

M. f. Pulvis pro una vel duabus dosibus.

A quo postmodum infantes enixi quasi luteo colore apparere tincti, ratione nempe croci, cuius nimia vitetur quantitas.

Dum de Borrace superius locutus sum, in mentem venit, quod scribit CORNARIUS in suis Observationibus, quod „ si scilicet pariendi conatus ex longa mora infantis & orificii uteri angustia deficere volunt, tunc exhibeatur pulvis sequens:

℥. Borrac. Venet. ʒiv.

Croci,

Cinnam. an. ʒi.

Misc.

„ & propinetur gravidis pro duabus dosibus in aqua artemisiae aut vino dulci dissolutis.

„ Obstetrix verò interea abdomen & loca parturientis adipe coturnicis liquefacto calidè inungat, unde subito „ & brevi post nova tormina superveniant & partus sequitur.

Hæc equidem sunt talia, quæ partum promovere, & dolores imprimis reiterare faciunt: quod si tamen nimii sint dolores, ita ut ab his ipsis fatigaretur nimis ac debilitetur semina, tunc SYLVIVS huiusmodi pellentibus aliquot grana laudant opiatâ tunc addenda suadet, (consilium quod apud neminem Practicorum unquam invenietis) si propinetur imprimis in aqua appropriata cum tinctura castorei.

Cum his internis sæpè necesse est, ut usurpentur quædam Externa: inter quæ præ cæteris convenit Cingulum ex exuvils serpentum, circa hypochondria vel lumbis circumligatum, quod singulare quid obtinet ad promovendum partum: Sic etiam ad eundem facilitandum unguentum fit ex exuvils serpentum, quas spontè deponunt, axungia vulpis, leporis, lumbricis terrestribus, & succo cancrorum, fluviatiliū, abdomini illinendum; quod ipsum, à quibusdam in secretis habitum, partum potentissimè promovere. Descriptum videri potest in Gammarol. SACHSII pag. 782. Sed mox abstergendum propter nimiam pellendi virtutem. Item convenit suffitus ex benzoë, ladano, succino, thure, & massiche; vel fiat suffitus STOECKERI, quem infra Sect. 8. cap. 1. dabo, item unguentum ex oleo cheirino, liliū alborum, unguento althææ & c. quæ acuuntur cum oleo destillato succini imprimis & spicæ q. s. pro litu externo abdominis: e. gr.

℥. Olei Cheirin. ʒvi.

Dest. succin. ʒi.

M. D. S.

*Unguentum promovens.*

Illinatur regio umbilicalis & abdominis tumens.

Vel

℥. Ungu. Nervin.

Ol. laurin. an. 3℥.

Dest. succin. 3℥. ad ʒi.

M. pro Linimento.

D. S. ut antè.

quo abdomen illinatur.

Item subigatur succus sabine pinguedine asferinâ, & moderato igne redigantur in formam linimenti, quod illinatur abdomini, fetum promovere. Alii commendant zibethum humanum seu pinguedinem circa testiculos virorum, quam vulvæ & umbilico illitam fetum pellere affirmant. Præ cæteris specificè laudatur axungia viperina & serpentum, quæ regioni umbilicali inuncta promptissimè pellit fetum: Sed quoniam est singulare remedium, post partum mox abstergatur, valde promovet lochia: Item oleum destillatum succini, misctum cum axungia serpentum, um-

bilico illitum, mirè partum promovere. Hoc enim à Lonicchio laudatur ad promovendum fetum etiam mortuum, quo etiam vaginam uterinam illinendam suadet, ut feliciter succedat partus: v. g.

℥. Pingu. viperin. ʒvi.

Ol. Cheirin. vel Momord. ʒiii.

Destill. spica ʒi.

M. D. S.

*Unguentum promovens.*

Vel fiat Fetus abdomini applicandus ex plantis aromaticis pellentibus, v. g. ex mercuriali, distamno Cretico, radice Ireos, radice Cucumeris agrestis, Floribus chamomillæ, pulegio, artemisia & similibus, ex quo fetu abdomen aliquamdiu fomentetur, postmodum verò illinatur abdomini unguentum de arthanita, quod potenter pellit. Vel fiat cataplasma ex Decocto colocynthidos, succino, ruta, & myrrha cum farina hordei, quæ omnia insternantur abdomini sub cataplasmatris forma. Et hæc ita internè & externè in partu difficili ac in fetu mortuo conveniunt, nisi quod in hoc magis valida, & in maiori dosi usurpanda sint. Pessi intruduntur ex sabina viridi, confusa cum croco; vel ex galbano in aceto dissoluto, cui myrrha & crocus addita sint: e. g.

℥. Galban. in acct. dissolut. ʒi.

Myrrh. ʒii.

Croci 3℥.

Cum Ol. Irino

F. Pessus: S.

*Pessus promovens.*

Alia Externa, nempe cingulum ex corio humano, lapide ætires coarctatus, per se sunt nova. Frustum cutis Tigris femori sinistro alligatum, partum facilitare, vid. in M. A. N. C. Ann. 6. observ. 59. Oculos leporis exsiccatos, vertici aut umbilico applicatos, laudat HARTMAN NVS ad pellendum fetum: res mihi subinde fuit visa ridicula, nihilominus tamen MACASIVS in Promptuar. Med. item MAIOR in Tract. de Inunct. Vera hoc ipsum experimentum comprobant.

His verò & similibus adhibitis, ubi speratus non succedit effectus, & fetus adhuc in partu hæreat angustis, aliquantisper fortiora adhibenda sunt remedia. Necesse ergo est, ut subiungantur simul sternutatoria quædam, dum sternutationis nisu per vires quasi irritantur semine, & ita fortis diaphragmatis & abdominis concussionem concutitur uterus & partus simul promovetur. De eorum usu vid. HEER Obser. 14. HARVÆUS lib. de Partu: HILDANVS Cent. 3. Observat. 53. Fiant autem ista sternutatoria ex nicotiana, helleboro albo & nigro, majorana, radice & floribus liliū convallium, pipere, castoreo, caryophyllis & similibus.

Quibus frustra adhibitis, tandem in causa non nihil difficiliore & desperata videtur necessarium, ut ad vomitoria fiat accessus, quæ extremum sint remedium. Hæc inter eminet mercurius vitæ, quem mirificis extollit laudibus LANGIUS Misc. cur. p. 101. HOFFMANNVS Meth. Med. lib. 1. cap. 9. & BILLICHIUS in suis Paradox. & Observ. Chymicis, ubi occasione mercurii vitæ egregium discursum habet, & partum difficilem desperatum hoc ipso beneficio vomitus curari dicit. Et certum est, quod inter vomitoria, quoad partum difficilem, hic mercurius vitæ sit singularissimus, qui rariò fallit, & in isto vomitus conatu aliis desperatis tandem excludunt semina tam vivum quam mortuum fetum. Sunt qui succum nicotianæ inspissatum pro vomitorio hic laudant, sed est nimis violentus, nimisque malignus: Potius ergo Mercurius vitæ in substantia, vel infusum antimoniæ ex mercurio vitæ est usurpandum. Quinimo Modernorum audacia pro facilitando partu venæ sectioni locum interdum concessit, & aliquot novi exempla, in aliis locis (non hic) mulierum, quæ cum aliàs laborarent ordinariò partu difficili, sibi, dum inciperent dolores partus, venam aperire in brachio, curarunt, unde faciliè postmodum fuerunt liberatæ: & ipse PATINUS Parisiis mihi retulit, se plus quam ter in partu difficili secasse venam in cubito, unde brevi post liberatæ fuerunt semina à fetu. Nec res est impossibilis aut absurda, in paulò scilicet habitioribus juvenculis, & in magis plethoricis, quæ sanguine spirituosiore & magis turgesciente abundant. Id quod antea etiam docuit de la COUVÉE in Parad. de Nutrit. Fetus in utero, quic. ultimo circa finem p. 357. ut in aliis gravidarum affectionibus, ita in specie venæ sectionem commendat ad facilitandum Partum, cuius felicem usum etiam



BAUHINVS observavit. Imò jam vestigia præstant in HIPPOCRATE lib. 1. de Morb. Mulierum, ubi Venæ Sectionem in ralo instituendam hic commendat. vid. ZACUTUS LUSITANUS l. 2. Prax. Admir. Observat. 64. BORELLUS Cens. 4. Observat. 24. & RIVERIUS Prax. lib. 15. cap. 16. Apud nos non videtur necessaria hæc Venæ Sectio. In climatibus calidioribus, & in habitu foemellarum succulentioribus paulò, aut quæ utuntur pro potu ordinario Vino, in his venæ sectio in ipso partus labore instituta admodum necessaria & proficua est; sic enim immutato sanguinis quanto interdum mirabiliter partum promover.

Quod si imminente partu hæmorrhagia uteri accedat, huc alio modo succurrere non possumus, nisi ut quanto citius à fœtu liberetur mater, aliàs impossibile est, ut sistatur sanguis: adeo opera danda est, ut fœtus excludatur & foras provocetur, ne diuturniore morâ vel fœtus vel mater periculum vitæ incurrat; vid. MAURICEAU de Morb. mulier. cap. 21. Idque præprimis, si dolores parturientium præcesserint, aut adsint; item si simul aquæ vel effluunt, vel effluere incipiunt, etiam si fœtus vel sex vel septem vel octo fuerit mensium; item si orificio uteri aperto secundina immineat. Si verò orificio interno clauso sanguis ex vagina uteri saltem prodeat, tunc mulieres non sunt urgendæ ad partum, sed curandæ sunt ad modum curationis aliarum hæmorrhagiarum.

Si adsint in partu convulsiones, quæ ut plurimum ex impetu fœtus in utero, ejusque summo egrediendi conatu, oriuntur, in hoc casu egregiè se gerit *specificum cephalicum D. Michaelis ad H.* in aqua quadam spirituosâ exhibitum: vid. LANGIUS Miscell. Cur. pag. 92. Hoc non sufficiente, & metu uteri lacerationis aut alius gravioris mali, subito mater à fœtu liberetur, in specie manuali operatione secundum modos, quos docet *GUILLEMEAU*, quàm MAURICEAU l. a.

Sæpiè etiam evenit, ut in partu difficili, fœtu vivo existente, mater intereat, ubi vix aliud salvandi fœtus est medium, quàm Sectio Cæsarea, seu abdominis in regione laterali hypogastrica, ibique facta apertio, & ex eo fœtus vivus extrahendus, qui postmodum, uti notum est, appellantur Cæsares: quæ sectio abdominis pro partu Cæsareo non, nisi in hoc casu, toleranda. Vid. prout pluribus hoc explicat MAURICEAU l. 2. cap. 31. Hujus feliciter administratæ exempla, præter ROVSSÆVM de Partu Cæsareo, qui optimus, & SENNERTVM, vid. VALERIOLA l. 2. Observ. 22. MARCELLVS, DONATVS Histor. Med. lib. 7. cap. 12. RARTHOLINVS C. 2. Histor. 8. ubi refertur mulier, cui quater & amplius, & alia in Epist. Medicin. Cens. 4. Epist. 41. pag. 237. ubi ter fœtus exfecti fuerunt.

### MEMBRUM III.

#### DE

#### FOETU MORTUO.

**P**ericulosū & difficilem partum præ ceteris casibus fœtus ipse mortuus constituit, quia omnis ejus conatus tunc cessat, sæpeq; etiam perversum habet situm, & totum negotium matri, sæpius tunc debili, unice incumbit; unde vel postmodum mater debilitata tandem & ipsa in labore fatiscit & moritur, vel non sine labore fœtus tardè enititur: Imò in tali casu evenit interdum, ut mortuus fœtus in matre debilitata, cessante fœtus motu & conamine, omnino dolores partus cessent & evanescent, nec unquam redeant, quicquid etiam ad promovendos eos adhibeatur; aut si redeant, non tamen sufficiant pro excludendo fœtu, imprimis si vitiosè simul situatus fuerit infans in utero materno, adeoque omnia medicamenta sunt frustra.

#### C A V S Æ.

Moritur fœtus aut in partu, aut aliquot diebus vel mensibus ante partum. In partu moritur ex iisdem fere causis, ex quibus aliàs difficilis fit partus; v. g. aut ex propria fœtus debilitate; aut ex matris debilitate fœtus conatum, non promoventis; aut ex viarum angustia, ex quibus enitri nequit, quin suffocatus quasi hæreat, & quandoque capite vehementer compresso intereat. Imò perversus ejus situs multum etiam simul tribuere potest ad ejusdem interuersionem, si scilicet accedat simul fortior matris conatus,

quatenus subinde aut collum ejus inuertendo, aut laxando; mors hinc fœtus in utero acceleratur. Ante debitum verò partus tempus sæpius externis ex causis moritur fœtus, v. g. ex nimia matris ira, terrore aut ejus pavore, à quo etiam in utero adhuc constitutus tenellus loco mortis epilepticiis convulsionibus corripitur solet. Item etiam perit fœtus ex prolapsu matris in abdomen ex percussione gravi abdominis, & similibus. Ex causis internis febres acutæ, alii morbi acuti matrem graviter affligentes, sæpius fœtum adhuc in utero interimunt.

#### DIAGNOSIS.

Quod attinet *Diagnosin fœtus mortui*: circa hunc imprimis arduum negotium incumbit Medico, ut cognoscat, an revera fœtus sit mortuus? aut saltem, an sit debilitatus quidem, & adhuc vivus? Et quidem si hoc evenit, vel suspicio sit de fœtu mortuo, observetur, an tempore legitimo partus hoc eveniat? ut extindè sciat, an chirurgica applicanda sint instrumenta? siue extrahendus sit uncis, siue discindendus scalpellis, & ita frustulatim foras protrahendus: sin verò ante tempus partus moritur, necesse est cognoscat, an fœtus sit mortuus? ut eundem mortuum maturè ejiciat, ne eundem tanquam vivum retinere studeat, nec retentus in utero suâ putredine matri detrimentum insigne, & ejusdem uteri corruptionem ac putredinem, & tandem mortem inferat.

*Signa*, fœtum esse mortuum, infallibilia & certò demonstrantia non dantur, potiùs aliquot vel plura simul sumpta accuratius inter se collata & bene pensitata, rem tandem certiorè reddere valent. Nam sic subinde, ut à doloribus nothis irritatus & uterus & fœtus, egressum moliantur mense septimo & octavo, sub quo molimine adeo interdum debilitatur fœtus, ut non ampliùs se moveat, adeoque interdum tanquam mortuus in utero hæreat. In tali casu, ne fiat deceptio, omnes omnino circumstantiæ probè sunt pensandæ.

Horum ergo signorum, quæ manifestant fœtum vel in partu, vel aliàs esse mortuum, sunt sequentia:

1. Quando mater & obsterix, si est in partu, motum fœtus amplius non percipiunt, etiam si roborantia, aut aliàs confortativa spirituosâ exhibeantur, siue interna siue externa.
2. Quando gravida de latere in latus se vertendo ac volvendo fœtum simul ex una parte in alteram lapidis aut molis cujusdam inconditæ instar, dilabi & moveri sentit. BN. Sæpe fallit hoc.
3. Facies & imprimis labia puerperæ admodum pallescent.
4. Partes extremæ interdum sublividæ, & ad tactum frigidæ apparent.
5. Vteri regio extrema, & postea ejusque cervix, frigida tactu deprehenduntur; hinc, quando obsterices sentiant os pubis frigidum, dicunt: *Os pubis friget*.
6. Mammæ, quæ antea blandè turgabant, & surgebant, flaccescere, emolliri ac per læ fieri incipiunt, & lac, quod est, emulgetur instar feri candidi.
7. Temporis progressu anhelitus gravidæ fit fœtidus: hinc
8. Aqua & sanies tandem fetida ex utero effluit.
9. Superveniunt hinc subinde febres admodum graves, periculosæ lipothymis, cordis palpitatione & deliriis conjunctæ: Et
10. Subito horror febrilis sine manifesta causa accidit tali matri: & curiosum est, quod extincto fœtu mox sequatur horripilatio ingens. Vnde si post gravem terrorem, vel si in ipso partu, vel ante partum, matrem ingens horripilatioprehendat, unum est ex familiaribus & certissimis signis, fœtum esse mortuum: vid. SALMVTH. Cent. 2. Observ. 69. Sunt, qui hoc signum tanquam infallibile putant; non tamen est universale: semper quidem, quando fœtus moritur, matres corripuntur horrore, sed non vice versâ, cum nihilominus ab experto quodam Practico mihi relatum fuit, se observasse frigus cum tali horripilatione, fœtum tamen adhuc superstitem fuisse vivum; sæpe enim parturientes horrore percipiuntur, utut vivus sit fœtus.
11. Subinde graviora animi deliqua superveniunt.



12. Stomachi & capitis dolores interdum, si fœtus mortuus aliquandiu retineatur, superveniunt.
13. Interdum & convulsiones, nonnunquam horrendæ, accedunt.
14. Si ante fœtum secundinæ excludantur, vel vasa umbilicalia flaccida, item si obsterrix funiculum umbilicalem contingens, non percipiat arteriarum pulsum, fœtus in utero extincti & mortui signum admodum certum, & RIVERO signum certissimum est, & raro fallit. Cessante enim debito sanguinis circulo inter fœtum & placentam, item inter placentam & uterum, necesse est mori fœtum, verissimum est. Exemplum contrarium, nempe in partu difficili secundinam ante fœtum prodisse, matre & fœtu salvis, observavit LÖSSIVS in *Observ. pag. 380.*
15. Si prægna, quæ suspicatur de fœtu mortuo, manum in calentem aquam imponat, in eaque aliquandiu teneat, nec fœtum moveri sentiat, signum etiam est ultimum, eum mortuum esse.
16. Dolores parturientium, si subito penitus extoto intermittant, noxam fœtui illatam testantur; id quod adhuc validius est signum, si succedat adhuc horror & pandiculatio.
17. Manus aquâ frigidâ madida cujusdam adstantis ventri matris imposita manifestat ex subsequente motu fœtum vivum; si enim hinc non moveatur, fœtum mortuum esse, signum est: Vid. BARTHOLINVS *Cent. 5. Hist. 78.*
18. Majorana viridis digitistrita umbilico imponenda est; fœtus enim se movebit, si adhuc in vivis sit.
19. Panis vino malvatico intinctus applicetur ventri, in pede vero fiat parva venæ sectio, & fœtus, si est vivus, movebitur: Vid. BARBETTE in *Chirurg. Vterius*
20. Caput infantis in partus loco situatum, si fontanella ejus capitis seu membræa, Germ. *das Blatgen*, in interstitiis ossium cranii est flaccida, nec fortiter tensa, tunc ex tali flacciditate ejus arguitur, fœtum certo esse mortuum.
21. Ultimo denique unum ex primariis, & certissimis fœtus mortui in partu signum est, si in partu meconii seu excrementa alvi ante fœtum prodierint. Nihilominus tamen RVLANDVS huius rei habet contrariam experientiam in *Thef. p. 300.* ibi enim refert fœminam, quæ cùm biduum parere non potuisset, etiam fœtus meconium exclusisset, nihilominus tamen postmodum fœtum vivum expulit beneficio olei succini, cujus guttas 3c. cum vino propinavit, oleo ligni heracolini umbilico illito, sic enim post dimidiam horam fœminam esse epixam sanam & salvum filium.

Plura signa videbitis in MAVRICEAV *lib. 2. de Morb. Gravidar. c. 12.* Ex hac tenus dictis signis primatum obtinet deficient motus fœtus, horripilatio matris, secundinarum aut meconii prægressus, & denique membrana fœtus flaccida.

### PROGNOSIS.

Quoad *mortui Fœtus Prognosis*: Hic retentus, præter hoc, quod difficilem reddat partum, ad putredinem ruit, & gravissimum periculum vitæ matri variis modis affere solet: his enim, præter anhelitum difficilem, superveniunt appetitus dejectus, cachexiæ, febres erraticæ, lipothymia, parthemata convulsiva, ac varia symptomata, tandem & ipsa mors.

Rarissimum est, Fœtum mortuum ad tempus citra corruptionem putredinalem, aut citra sensibile matris incommodum, fuisse in utero retentum, nisi exsiccatus fuerit: de quo vid. BARTHOLINVS *Centur. 1. Hist. 12.* & M. A. N. C. *Ann. 6. & 7. Observ. 13. pag. 23.*

Interdum autem, utut fœtus mortuus sui putredine matri mortem intendat, putrefactus tamen frustulatione per uterum ejusque vaginam excernitur: Conf. M. A. N. C. *Ann. 2. Observat. 256. pag. 382.* Interdum partes molles in liquamen corruptæ profluunt, durioribus ossibus relictis, ita ut mater sceleton in utero gesseret. Interdum ex putredine fœtus uterus corruptus, & ipse putrescit, unde vicinæ partes simili putredine correptæ putrilaginem fœtus aut per umbi-

licum, aut per alvum, aut per inguina, aut per alla similia loca erosa ac corrupta, ejiciuntur. Miræ hujusmodi historie fœtum mortuorum, in utero matris putrefactorum, per varia loca illasâ matre frustulatione ejectionum, videbitis in SENNERTO *lib. 4. Prax. ubi de Fœtu mortuo*, & in SCHENCKII *Observationibus, ubi de Fœtu mortuo*, in specie BARTHOLINO, *Traçt. de Insolit. Partus Hum. Viis.*

### C U R A.

Abolvimus *Membro 2.* quæ pertinent ad partum difficilem promovendum. Restat adhuc, ut subnectam, quomodo Fœtus mortuus, partus præ aliis casibus admodum difficilis & periculosus, promendus & ejiciendus.

Si ergo mortuus sit fœtus, opera danda est, ut quanto citius, quocunque tempore mortuus fuerit, promoveatur & excludatur. Omnia igitur validiora, partum difficilem promoventia, fœtumque pellentia, hic locum habent, modò præmissa sint prius, quæ primas vias emollire, laxare, & lubricas reddere valent, idque imprimis, si fœtus mortuus ante legitimum partus tempus sit excludendus.

Et quidem, si ipso in partu extinctus fuerit fœtus, quanto citius promovendus venit, tam internè fœtum pellentibus, quàm externis, manuum operâ, vel speculi, vel instrumentis armatâ ad mortis.

Quoad Interna: præ cæteris remedia ex secundina, myrrha & borrace, hic conveniunt: v. g.

24. Trochisc. de Myrrh. 36.

Borrac. gr. xv.

M. f. Pulvis:

in aqua artemisiæ vel alia appropriata propinandus. Experimentum sunt Thoneri.

Vel 3j. pulveris secundinæ, quæ primatum obrinet, cum unicornu veri in vino Malvatico vel aqua cinnamomi exhibetur; aut loco hujus, si non habeatur pulvis secundinæ, cœuæ qualis efficaciz, LINDANUS sequentem substituit pulverem compositum:

24. Troch. de Myrrh.

Borrac. Ven. an. 36.

Cinnam. ʒi.

Cum decocto rad. lil. alb. f. Potio.

Egregia est ad promovendum mortuum fœtum; aut in forma pulveris pro una dosi in haustu vini vel aque cinnamomi assumatur.

Vel

24. Testicul. equin. pulveris.

Borrac. Venet. an. 3i.

Croci ʒi.

M. pro 2. dosibus,

in aqua lil. albor. propinandis.

M. D. S.

Pulvis promovens.

Quin & succinata, in specie oleum succini ad guttas xij. xx. usque ad xxx. (daro enim nodo durus quærendus est cuneus) in haustu vini internè propinatum, & externè simul umbilico ac musculis abdominis illitum, mirè conducit. Reliqua interna ex superioribus jam sunt cognita. Vomitoria itidem ex aquis benedictis Infusionis antimonii, aut etiam gr. jv. Mercurii vitæ internè propinati, vomitu forti fœtum pellunt.

Externè balnea & fomenta, imò emollientia, laxantia, & lubricantia, similiaque ejectionem præliminariter faciliorem reddentia, v. g. ex malva, althæa, mercuriali, floribus genistæ, chamomillæ, artemisiæ, pulegio, oleo lillorum alborum, amygdalarum dulcium, chamomillæ, adipos anseris, &c. sed post horum usum fortiter pellentia usurpentur. Inter balnea convenit, quod præscribit Joël in *sua Praxi*, hoc modo:

24. Flor. Chamomill.

Abrotani,

Parietar.

Puleg.

Artemis.

Malva cum rad.

Betonie.

Sabin. an. M. ij.

Rad. Bryon.

Aristoloc. long.

Filic. an. ʒij.

Sem. lini,

Fœtus.



Sem. Fœnugr. an. M. lii.

Concisa &amp; contusa

Coque in aqua pro Balneo,  
cui infideat usque ad umbilicum mulier.Ipsæ species sacculo postmodum inclusæ pro somento exter-  
terno crebrius applicentur abdomini.Post tale balneum & somenta, usurpantur unguenta pel-  
lencia, ut dixi; inter quæ conveniunt etiam unguentum  
de arthanita cum oleo succini subacti, & largiter regionibus  
umbilicalibus & hypogastricis inunctum, præmisso fotu ex  
pellentibus seu irritantibus, qualem *suprà Sect. 1. cap. 1. de*  
*Mens. emans.* commendavi; aut cataplasmata expellencia,  
in specie ex decocto colocynthidos: post quem cataplasma-  
eum pellentium usum inunctio cum oleo succini instituitur,  
aut unguento jam dicto: Vel

24. Rad. Cyclam.

Ireos.

Aristol. rot.

Cucum. Sylv. an. ʒij.

Nitri,

Myrrhæ an. ʒj.

Opoponac. ʒʒ.

Ol. Cbirin. q. l.

F. Cataplasma ventri infernendum:

D. S.

Cataplasma promovens.

His etiam sociandi sunt Pelli stimulantés, qualem, cep-  
validissimum, sequentem commendant:

24. Gum. Ammon.

Opoponac.

Asphalt. an. ʒj.

Ellebori nigri,

Sem. Staphisagr.

Rad. Aristol. long.

Pulp. Colocynth. an. ʒij.

Scammon. ʒj.

Ex quibus cum f. q. Fellis tauri conformetur massa, quæ la-  
næ involuta, & sindone obducta, tassar pelli applicetur.Quin & suffitus instituantur orificio pudendorum per  
Infundibulum excipiendi. Quos inter præ cæteris experi-  
mentum est singulare suffitus ex decocto uvarum putrida-  
rum paratus: v. g.24. Uvar putridar. (cujuscunque sortis sint) ʒiv. Proli-  
ce in aquam ferventem per horæ dimidium: hinc  
supra arduentes prunas impone, & suffumigium  
excipiat femina septies in die per vulvam quadran-  
tis spatio.Ceu experimentum singulare fuit communicatum, cujus  
tamen mentionem factam inuenietis cum felici successu in  
SCULTETI *Observat. Chirurg. Observ. 77.* ubi etiam  
in ZACUTO LUSITANO in eiusdem *Praxi Hi-*  
*storiar.*Loco hujus ex sequentibus trochiscis, à JOELE com-  
mendatis, non immerito potest fieri suffitus utero expicien-  
dus:

24. Vernas. seu exuv. serpent. Num. j.

Myrrhæ,

Castor. an. ʒi.

Rad. rub. tinctor.

Sterr. Columbin. an. ʒij.

Contusa omnia cum felle bubulo redigantur in trochiscos,  
qui carbonibus ignitis impositi, dant sumum ad proritandum  
fœtum.Aliàs etiam suffitus ex ungula asini vel asinæ cum galba-  
no ac myrrhæ institutus, ad promovendum fœtum insigniter  
commendatur.Denique ubi res est admodum periculosa, imitandum est  
experimentum BARTHOLINI, quod recenset in  
*Cent. 6. Histor. Anatomicar. Histor. 83.* Nempe imponitur  
orbis ligneus seu stanneus abdomini tumido matris, in ca-  
su scilicet, quando fœtus est in situ ad partum naturali,  
sed tamen mortuus & valida manu à Medico percutitur,  
hac enim forti percussione quasi cum imperu revicetur fœtus.  
Observetur hoc, refert enim c. l. BARTHOLINUS  
hoc modo expulsum fœtum mortuum, ubi omnia fuere de-  
sperrata.In contumaci uteri clausura, mediante instrumento Glau-  
beri volatilia utero veniunt applicanda: vid. *supra ubi de*  
*mensib. suppressis*, conf. BARTHOLINUS *Cent. 3.*  
*Epist. pag. 67.*His & similibus occurrimus matri & fœtui, vivo & mor-  
tuo, in partu difficili. Quod si hæc pro fœtu ejiciendo non  
sufficiant, ad chirurgiam progrediendum; vel instrumen-  
tis, in specie uncis aut hamulis aut sub mento aut circa cla-  
viculas infixis, extrahatur fœtus totus; sive, quando vitio-  
se nimis est situatus, novaculis & scalpellis artificiosè ad-  
hibitis, in frustra discissus extrahatur, utut casus sit peri-  
culosissimus, in specie apud nos, ubi vix nisi in desperatissimo  
casu, tale admittere solent. De hac operatione vid. SEN-  
NERTUS *in lib. 4. Præcos, ubi de Fœtu mortuo*; SCUL-  
TETUS, PARÆUS, & BARBETTE in suis *Chi-*  
*rurgicis.*Hæc sufficiant de Partus lésionibus, Pergo à partu  
ad

## S E C T I O N E M VIII.

D E

## REGIMINE PVERPERARVM.

**V**bi ergo jam peperit mulier, studiosè sibi caveat ab  
omni aeris externi frigidi insultu, ne uterum lædat,  
quia metus est, ne ex talis aeris susceptione infla-  
tio uteri superveniat, aut ne coagulatus sanguis in-  
de stagnet in utero, & inde periculofam inflammationem,  
lochiorumque defectum inferat, imo dolores gravissimi par-  
tum insequantur. Unde obstetrix mox post egressum infan-  
tis cum funiculo umbilicali secundinam extrahat, quo fa-  
cto puerpera circa costascingulo vel linteo probe cincta, in  
specie cum cingulo ex corio humano, mox in lectum trans-  
feratur, & pedibus probe extensis vel blandè incurvatis,  
quietis, labisque vulvæ spongiis aut linteis probe munitis,  
pro excipiendo sanguine effluente: Post hinc quæta jaceat,  
& ab omni corporis jectigatione, aut etiam extremorum  
frigido aëri expositione, studiosè caveat; aliàs enim suppri-  
muntur lochia, quæ inferunt tormina, & similia sympto-  
mata. Jam verò, dum lectum petunt, ut plurimum insigni-  
ter ex labore partus incalescunt, subinde etiam non parum  
debilitantur, & speciatim ordinariò sibi gravi ex æstu, su-  
dore, & lochiorum fluxu præmuntur; hinc vulgò receptum  
est, propinari post partum jusculum gallinaceum, eaque calida  
recentia pro refocillandis viribus, ratione gelatinæ blandæ  
quam continent, & fallenda sibi: loco quorum etiam hau-  
stulus cerevisiæ calidæ imprimis, cui cuminum pulverifa-

rum incoctum sit, commodè propinari potest; sic enim non-  
nihil recreantur, quin etiam promoventur lochia, & sistun-  
tur post partum, ratione cumini, dolores supervenientes.  
Interim ditioribus propinari queunt juscula gallinarum ca-  
lida, sed caute: nempe ea sint non nimis pingua, neque ni-  
mis diu gallinæ coquantur, ne juscula ista carniū nimis  
substantiā carnis imprægnata, sed diluta, & quibus pingue-  
do detracta, nec adeò nimis sint nutritiva, sed talia, qualia  
pro viribus sufficiunt: nam quando nimis diu fuere cocta,  
non sunt puerperis convenientia, cum talia juscula nutritia  
postulent prius stomachum, qui eadem digerat & con-  
coquat. Jam verò periculum est, ne loco digestionis lauda-  
bilis talia juscula aut alimenta nimis nutritiva cadaverisen-  
tur & corruptantur in stomacho mulieris, noviter à partu  
liberata, non secus atque aliàs fieri solet in febrientibus,  
cum semper puerperæ recentes plus solito caleant, & quasi  
febrile quid patiantur. Nam earum pulsus est frequens,  
celer, mollis, magnus, aut saltem in magnitudine & vehe-  
mentia moderatus, & quasi febrilis, prout plus, vel minus  
debilitata fuerit puerpera. Est scilicet tunc aucta insigniter  
sanguinis turgescencia & fermentatio, & rapidior sit ejus cir-  
culus, similis isti, qui aliàs sub quavis menstruatione con-  
tingit, medianre quâ & lochiorum promoveretur fluxus, & si-  
mul quicquid heterogenei est in ejus massa, simul expellitur  
& se-



& separatur. Unde non tantum suffocationes hystericæ ratione inordinati motus spirituum animalium, & copiosius effusorum succorum, biliosi & pancreatici ad intestina, & impetuosi mororum spirituum animalium, sed etiam febres ardentes, aut malignæ & petechiales, item purpuratæ, subinde talibus superveniunt. Nullo autem modo impedienda est talis in partu sanguinis ebullitio, cum multum salutis hinc seminis emergat: quæ etiam observanda sunt circa alimenta, ne scilicet mulier post partum laute nimis nutriatur; putrescent enim, & cadaveriscentur, & exinde mulieres ad febres continuas malignas, petechiales, purpuratas, & similes disponuntur, imò ad diversos alios morbos, imprimis illis septem diebus. Adeoque à partu potius propinetur cerevisia calida cum cumino, vel juscula gallinarum macria, parca nutritientia. Quibus verò minus aridit aut conveniunt talia juscula nutritiva, ut in specie debilitatis, iis haustus parvus vini generosi non nimis frigidi est concedendus, ac stultæ mulieres nostrates horrent vinum, dicentes, *esse ipsis nimis calidum*: aut mica panis similaginei mollior vino intincta propinanda; hinc enim mirè denuò refocillantur tales mulieres debiliores: nec ex ista ista vini caliditate, aut aciditate, febris vel calor intensio superfluitate inde metuenda est; nam potius restituit, & lochiorum simul promovet fluxum, quibus fluentibus vix febris intensio supervenire potest, modò hoc observetur, ne frigidum præbeatur: quod etiam de omni potu cerevisiæ & aëre ambiente intelligendum; si enim hoc fiat, ut frigida assumatur, subito supprimuntur lochia, & dolores abdominis graves excitantur. Tepida ergo propinentur; sic enim nullo modo nocet vinum: quædam etiam non inconsultò præbent buccellam panis butyro illitam, adspargendo eidem pulverem zedoariæ, quod laudandum; vel etiam hunc solitariè cum cerevisia exhaustiendum suadent; his enim mox à partu appropriatis dolores sistunt, & promovenitur lochia. Refocillatæ ita post aliquot horas possunt assumere ovum, sorbile cum paucis cinnamomi, ac tantillo nucis moschatæ, vel vitellum ovi cum jusculo gallinæ & tantillo cinnamomi. Pro medicamento vero analeptico excellit tinctura Coralliorum cum spiritu cordis cervi, quæ est egregia atque nobilis.

Superveniente æstate vocabar ad parturientem, quæ post partum felicem insigniter licet debilitata, gravi premebatur siti, superveniebant suffocationes hystericæ leves, & in specie immensus lochiorum fluxus; erat enim juvenula, & succi plena: Veniebam ad ipsam, mulieres adferebant jusculum gallinaceum, quibus restiti, interim suadebam vinum, omnes ridebant, utot tamen, propinato tandem haustulo vini, egregiè refocillabatur femina: Ergo in tali casu maximè observanda est virium ratio, & propinandus loco jusculli gallinacii potius haustus vini tepidi, utot lochiorum fluxus hoc in tali casu potuisset inhibere. Sed hæc obiter.

Porro mox à partu puerpera somno non indulgeat, sed aliquot horas ad minimum vigilet; interdum enim quibusdam post partum hystericæ suffocationes aut lipothymia sub forma soporis gravioris, aut nimis in somnum propensionis, imminet, in quibus, nisi cauti sint adstantes, puerperæ sub specie somni lipothymia aut passionibus hystericis correptæ ita dormire possunt, ut non amplius evigilent: unde aliquot horis vigilent, donec debitis remediis dicta symptomata præcavita sint, vel cessaverint. Insuper odorifera omnia & nimis spirituosæ à puerpera studiosè fugienda sunt, & in specie, dum fluunt lochia, cum non tantum promptissimè hystericam passionem, sed etiam affectus capitis, in specie graves cephalalgias, & contumaces agrypnias, faciliè excitare possint, nisi in imminente hystericæ passione interdum odor castorei, aut similis olfactus appropriatus, præter voluntatem sit concedendus.

Præterea ex omnibus animi pathematis etiam Ira ac Terror maximè nocent puerperis, cum mille gravissima post se trahant symptomata. Nam ex ira periculose febres, incoercibiles ferè uteri hæmorrhagiæ, & lipothymia; ex terrore verò lochiorum suppressio, & multa alia mala supervenire solent: Vid. TULPIUS *observ. cap. 20. lib. 2.* & SALMUTH *Cent. 3. histor. 49.* qui observavit exterrore profusum lochiorum lethale, quod rarum est. Item omnis efus acidorum est noxius, quia infantes hinc faciliè in tormina ventris incidunt.

Remedia inter, puerperis primis à partu diebus propinanda, imprimis laudo Mixturem aliàs polychrestam, quæ pluribus scopis, tam præservatione quàm curatione, recentissimis puerperis confert:

#### ℥. Aqua Cerasor.

Matricar. an. ʒij.

Acet. vini ʒiij. ad ʒʒ.

Lap. Caner. præp. ʒj.

Antimonii diaphor ʒj.

Syr. Artemis. ʒʒ. ad ʒvj.

M. D. S.

Mixtura discutiens.

Capiatur cochleatim.

Mixtura hæc est quasi vulneraria, genitalium in partu plus minus lesiones, inde metuenda symptomata, maturè restituit, lochiorum grumescentiam dissolvit, & hinc eorum fluxus promovet, corpus in diaphoresi & blando madore conservat, æstum plus minus febrilem, puerperis interdum gravem, moderatè coercet, cephalalgiam earum tollit, stimulearum minuit, &c. Ubi animus est promovere lochia, myrrhæ ʒʒ. ad gr. xv. ad ʒj. addi possunt. Si dolores abdominis aut uteri adsint, lochiorum fluxum plus minus impediens, commodè Laudani opiati gr. ij. addi potest.

Interdum ordinariò post partum alius contumaciter est clausa, quam validioribus remediis movere, aut acrioribus clysmatis stimulare, religio est, nisi forsan lochia parcius fluant; potius illa tertio aut quarto die à partu nisi spontè soluta, aperiatur, antequam nempe superveniat febris lactea, unde aut blandis clysmatis vel suppositoriis, aut, quod optimum, globulis zibethinis proritetur, aut observatis circumstantiis, assumptione *pilularum pestilentialium Russi* (ex aloë, myrrhæ, croco & gummi ammoniaci compositarum) ad gr. vi. viij. x. xi. xii. xv. & ʒj. alius segnior denuò aperiatur, cum ad promovendam alvum & lochiorum fluxum simul egregia, & hic in felicissimo usu sint: vel mediante Elixir Proprietatis cum Rhubarbaro, ad guttas 30. 40. 50. propinato, referetur, cujus ingredientia simul lochia pellunt: Vel, quod satis commodum est:

℥. Crem. tart. ʒʒ. ad gr. xv.

Pulv. Jalappa gr. iij.

M. Pulvis: S.

Pulvis aperiens.

Capiatur in vehiculo jusculi calidi.

Quod si autem simul non ritè fluant lochia, imprimis locum habent clysmata fortiter stimulantia, ut ita cum alvo etiam lochiorum fluxus provocetur; habitæ tamen semper, uti dico, ratione attentæ, an adsit febris maligna ex genere petechialium, an purpuratarum? nam in his alvum vel suppositorio stimulare, non caret periculo, imprimis si fuerit febris purpurata alba, quam vocant Germ. *den weissen Friesel*, in qua vel minimus error est lethalis.

De venæ sectione notandum, quod hæc in principio puerperil, lochiis ritè fluentibus, magis noceat quàm prosit, licet indicatio ejus adsuerit; cum sanguinis evacuationem natura tunc temporis rectè agens dirigat: sin vero lochia suppressa vel imminuata fuerint, venæ sectio maximè necessaria erit, tanta nempe, quæ lochiorum fluxui tum temporis naturali proportionata sit. Quod si vero progressu demum temporis ejusmodi affectus venæ sectionem posulantes eveniant, intra terminos nihilominus auctus lochiorum, ac mulier non perfectè purgata sit, venæ sectio omnino locum habet: imò licet puerpera commodè evacuata fuerit, propter morbum tamen ingrauescentem, ejusque symptomata, parca venæ sectio administranda: sin autem post lochiorum fluxum, & in puerperii declinatione, morbus venæ sectionem urgens evenerit, ab hac indicata nequitiam erit metuendum: Vid. RIVERRIUS *Prax. lib. 1. cap. 24.* & TULPIUS *lib. 2. Observ. 2.*

Absolutum jam ea, quæ ad regimen puerperarum secundum leges dietæ requiri videbantur: Pergo ad alios affectus, qui & ipsi puerperis non raro solent esse familiares; inter quos omnium primus est secunda aut mola post partum retenta, siue secunda tota, siue saltim frustulum ejus in utero relinquatur.





C A P U T I.

DIAGNOSIS.

D E

SECUNDINÆ RETENTIONE.

**P**ost partum, simul atque fœtus exclusus est, secundina, id est placenta uterina cum membranis fœtum naturaliter involuentibus, mola etiam, aut quicquid præternaturaliter in utero reperitur, sequi debet. Secundinæ autem, relicta in naturali partu us plurimum tertia die sponte sua vim facillimè ex utero per funiculum umbilicalem sequuntur, & citra extrahuntur. Fit tamen subinde, ut secundinæ post partum resistant, quando eadem aut cum difficultate separantur, aut quando omnino non prodeunt, sed rupto umbilicali fune intra uterum subsistunt, adeoque quando nunc integræ, nunc frustulum earum in utero remaneant; tota enim secundina ejici debet, quia vel tantillum relictum frustulum non vulgares dare solet turbas.

C A U S A E.

*Causa*, quare secundina nunc tota, nunc verò quædam frustula, in utero matris retineantur, nec debite excernantur, sunt:

(1) Quando eadem suis vasibus pertinaciter uteri positis inoscultata & agglutinata quasi fuerit, & sic firmitus adhærescit; siquidem PLATERUS *Obs. p. 231.* Secundinas utero conatas refert; qui coacti sunt imprimis, quando præmaturè excluditur fœtus, ut in abortibus fieri solet: hinc enim tenacius utero adhærens secundina non sine difficultate solet divelli, secus ac in partu legitimo, & ubi legitimum tempus instat, tunc enim sæpe quasi spontè sequitur secundina; quod magis enim partus instat tempus, eò magis remittit, & eò minus firmiter placenta utero adhærescit. Firmiori coalescentiæ occasionem suggerunt, præter partum ante debitum exactè tempus supervenientem, interdum causæ externæ ex contusione vel simili modo lædentes placentas aut uterum, & ita sub alterutroque sanatione firmiorem coactum inducentes. Huc facit, quando mulieres, præprimis ultimis gestationis mensibus, vitam nimis sedentariam agunt; nam & in his firmitus adhærent: contra quæ laboriosæ sunt, quæ exercent corpus vel ambulatione vel similibus, in his longè felicius divellitur secundina post fœtum. Vel

(2) Quando funiculus umbilicalis tenerior in labore, partus rumpitur, & à secundina avellitur, vel propter vim infantis, vel propter ipsius funiculi corruptelam, vel propter intempestivam funiculi umbilicalis in fœtu rescissionem vel similem lationem; aut ineptè ab obstetrice tractatur, tunc enim fit, ut instat chordæ contortæ funiculus umbilicalis separatus in se invicem retrocedat, ac subito uterum introeat: unde defectu hujus funiculi non potest trahendo separari secundina, & tunc utero connivente secundina excludi non potest. Non enim semper necesse est, ut obstetrix immissa in naturalia manu secundinam arripiat, præprimis si manu non prius prehenderit funiculum; sed potius blanda contorsione saltem funiculi umbilicalis secundinarum avulsionem procurare debet.

Caveat ergo obstetrix separare funiculum umbilicalem à fœtu, antequam post eum etiam prodierit secundina; aut si forsitan diutius retineatur in utero, ita ut fœtus periculum imminet, tunc rescandus quidem venit funiculus umbilicalis, sed separatus forti filo alligandus est femori, ne denuò intra uterum repere, & secundinæ exclusionem impedire possit; permittendo tamen, ut sanguis à funiculo probe exstillet, ut ita placenta, in magnitudine imminuta, facilius extrahi possit.

De obstetricum aliàs malitia circa neglectionem secundinæ extrahendæ videri potest KERKRINGIUS *Observat. Anat. 36.*

(3) Quando cervix uteri seu orificium uteri internum tumet, adeoque angustum, aut citò nimis clausum est.

(4) Denique si puerpera non bene muniatur in partu, sed aut frigidiusculus in uterum irreat, faciliè hinc uteri contractura, sanguinis coagulatio, secundinarum retentio, &c. accidere possunt.

Et hæc sunt causæ ordinariæ; aliæ causæ minus frequentes, ut refrigeratio extremorum subitanea, &c. transigant.

*Signa*: secundinam retineri, vel integram, vel ex parte, ipsi oculis patet; ubi cauti sumus, ne vel minima particula remaneat: nam retentam secundinam brevi post ejus putrefactio, hinc febris acuta & periculosa, & dolor ventris, post partum insignis, & tormina infra umbilicum in & circa uteri regionem, quasi secundus generandus esset fœtus, superveniunt.

Sæpius, licet rarius, supprimuntur simul nonnihil lochia semper venter turgit, magnus fit; sicuti è contra, si frustulatum prodeat secundina, retentum frustulum continuò irritando uterum subinde crudelem uteri hæmorrhagiam excitat: superveniunt difficultas anhelitus, halitus fetens intolerabilis, lipothymia, & tandem convulsiones.

Quæ per genitalia excernuntur post aliquot dies, sunt saniosa, fetida, ac horrendè olentia; unde etiam lochia fetorem cadaverosum referentia secundinarum partem in utero relictam indicant, quæ successivè sub rotulaginis formâ, seu liquamiosis putridi specie, ex utero effluit, de quo vid. RIVIERIUS *Cent. 1. Obs. 61.* Conf. HORSTIUS in *Obs. pag. 293.* KERKRINGIUS *Spicileg. Anat. Observ. 36* & PRIMEROSIUS de *Morb. Mulier. lib. 4. cap. 9.* sic VEL-SCHIUS *Hecat. 2. pag. 4.* refert, secundinam septemdecim dies à partu retentam & putrefactam sine nocumento: non secus ac in M. A. N. C. *Ann. 6. & 7. Observ. 222. pag. 2.* caput fœtus in utero relictum successivè per septem annos excreri refertur: nunc verò putrescendo uterum inficit, eumque similiter in putredinem & gangrenam lethalem abire facit.

Rarum est, quod retenta secundina in utero exsiccata fuerit secundum RIVERIUM *Cent. 2. Observat. 3.* Rarius adhuc est, quod observavit KERKRINGIUS in *Spicileg. Anat. Observat. 36.* de secundinæ portione quarto demum mense à partu incorrupta & innoxia edita: sicut & id curiosum est, quod prostat in M. A. N. C. *Annot. 3. Observat. 117. pag. 107.* de secundina, ultra mensem incorrupta, in utero reperta: aut quando post quatuordecim septimanas integra excernitur, Conf. BARTHOLINUS in *Alb. Med. Hassn. Vol. 2. Observ. 12.* KERKRINGIUS *Observ. Anat. 30.* Scilicet evenit subinde pertinaciter ut secundina vel tota, vel saltem pars ejus non tam adhæreat, quàm firmiter utero connectatur, ipsique quasi adnascatur, unde fit, ut secundina non vivat fœtus virâ, sed matris, & ceu pars uteri se habeat, atque hoc in casu, si se habeat ut pars matris in utero, citra sui corruptionem in utero hæret, utpote sanguine & spiritu vitali matris ad uterum delato adhuc perfusa; secus fit, si eadem viâ fœtus vivat, uti ordinariò contingit, unde detractio fœtu, & sic impedita sanguinis & spirituum animalium in secundinam distributione, in cadaver degenerat & putrescit.

P R O G N O S I S.

Quoad *Prognosin*: Gravissima pericula, & omnia eadem mala, quæ fœtum sequuntur mortuum, comitari etiam solent secundinam retentam, tandem quoque mors; nec aliter speranda salus, nisi ejiciatur: Nam aut retenta putrescit, indeque febrem malignam periculosam, uteri corruptelam, aut saltem deterrima & gangrenosa ulcera, ac tandem mortem infert: aut putrefacta tandem, sub forma saniei putridæ foras excluditur, quod tamen raro sit citra notabile damnum.

C U R A.

Quoad *Curam*: Pro ea optimum est, secundinam maturè, quantum fieri potest, totam, non difficilam, extrahere. Quod si gemelli adfuerint, hi ipsi interdum unam, interdum duplicem habent secundinam: Vbi secundina fuerit duplex, post fœtum propria secundina prodit: si verò gemelli unicam habent secundinam, aut saltem unam placentam cum duplicibus membranis, tunc, cum primus infans in lucem prodit, prudentiores obstetrices ejusdem funiculum umbilicalem rescindunt, & ipsius residuum, cujus superior pars secundinis intra uterum adhæret, parturientis femori alligant, quoad alterius infantis in utero manentis umbilicus ab utero, unâ cum placenta,



centa, divellatur, & ita cum secundo fetu amborum secundina integra excernatur, & tunc denique funiculus à femore solvatur; sicut hoc facillimè succedens negotium rectè urget **RODERICUS à Castro Part. 1. lib. 3. de Morb. Mulier.** Quodsi post fetum egressum vel mores agat secundina intra uterum, vel particula ejus remaneat, jubetur, ut dum egra vel puerpera adhuc sellig insidet, tussiat subinde, & tussiendo aut quasi sternutando, concusso utero & abdomine, ea separetur; quæ tussis si non sufficiat instetur naribus sternutatorium, ut sic concussione totius corporis promoveatur separatio secundinæ: vid. **B. A. R. THOLINVS Cent. 1. Histor. 39.** unde non nisi in graviore casu, & ubi circumstantiæ aliæ id urgent, vomitoria conveniunt. Quibus irritis, ne frigus puerperam corripiat, imponatur ea lecto firmiter ligata, obstetrice interea continuò abdomen ægræ comprimente deorsum versus, ut ita secundina discedat, & faciliùs excernatur. Et his medelis mulieres ordinariò utuntur, quibus nonnunquam opera Medici est addenda; adedque in retentione secundinæ usurpanda sunt remedia secundinas expellentia, & eadem ferè omnia, quæ in partu difficili, aut mola & fetu mortuo promovendo, usurpantur; de quibus superiùs jam sufficienter dictum fuit. Pre ceteris expertus pulvis & decoctum prostat in **TULPIO lib. 4. Observ. 41.** quæ ceu experta sepiùs multumque proficua in secundina retenta commendat:

℥. Borrac. Venet.  
Succin. alb. an. ℥j.  
Croc. ℥ss.  
Cass. lign.  
Castor. an. ℥ss.  
M. f. Pulvis.

Cui tanquam vehiculum inserviat sequens Decoctum:

℥. Rad. Gramin.  
Paon.  
Scorzoner.  
Cichor. an. ℥j.  
Herb. Acetos.  
Endiv.  
Borrac.  
Meliss. an. M. j.  
Artemis.  
Card. bened. an. Mss.  
Borrac. Venet. ℥ij.  
Coqu. ex aqua herd. ad ℥ij.  
quibus adde  
Syrup. Artemis.  
Limon. an. ℥ij.

Misceatur, & subinde exhibeatur.

Cujus felicem experientiam se aliquoties fecisse idem Autor memorat.

Alia, quæ vulgò exhibentur ad pellendam hujusmodi secundinam retentam, satis nota sunt, in specie Cherosolium, & jusculum ex decocto cherosolii egregium etiam est, & singulare, de quo vid. **M. A. N. C. Anno 3. loc. allegat.** Item decoctum Artemisæ rubræ cum antheris liliorum alborum, quibus & sabina adjici potest, admodum laudatur à **CORBEIO**: sicut simusequinus, vino infusus & expressus propinetur, qui tanquam remedium potens, pellens secundinam, mirè laudatur. Omnibus palmam præferunt pulvis & spiritus ex secundina, primariò quidem ex humana, secundariò etiam ex secundina ovis vel capræ; nam & hanc ceu infallibilem commendat **CORBEIVS**. Singulare certe quid latet in secundina humana, supra quam non datur præstantius remedium: nam, non tantummodo parturientium & puerperarum quamplurimis succurrit affectibus; sed præterea epilepsiam etiam, ut quidam asserunt, hæreditarium, singulari virtute paratus ex eadem spiritus pellit & domat: imò experientia, prudentum & stultorum magistra, docuit, per secundinam magica naturalia, per magnetismum in damnum primariò fetus, secundariò ipsius puerperæ, non leve inferri posse; hinc & bruta omnia devorant secundinas post partum, id quod non sine singulari naturæ instinctu fieri, admodum probabile est. Pulveris item Sabinæ ℥ss. cum Croci ℥ss. in aliquot uncis aquæ liliorum alborum secundinam pellit. De oleo Heraclino ex **RULANDO** res nota est; loco ejus olei ligni Ipiniperni guttæ 30. aut olei succini destillati guttæ 18. propinatæ, non vulgares possident vires. His adnumeretur Myrrha, & trochisci de myrrha, in aqua cinnamomi, vel vino generoso propinati: item borraç, Ca-

storem, succinum, sal volatile succini, & similia, nec non oleum destillatum succini.

Ex his sub forma pulveris vel decocti usurpantur remedia ad pellendam secundinam: Conf. **TULPIUS lib. 4. Observ. cap. 48.**

Vel

℥. Myrrh rub. ℥j.  
Croc. ℥ss.  
Borrac. Venet. ℥ss.  
Ol. destill. Cinnam. gr. ℥ij.  
M. f. Pulvis S.

Pulvis pellens.

Conveniunt etiam Mixtura **TIMÆI von GuldenKlee in casib. l. 4. Cas. 23. p. 223. & Casu 28. p. 227.**

Quodsi incipiat putrescere secundina retenta, vel tota vel frustulata, & in saniem collinescere, commodè Elixir proprietatis propinari potest, ut scilicet præter hoc, quod pellat secundinam, simul putredinis noxa cohibeatur, nec aliæ vicinæ partes sanæ simili contagio inquinentur, unde illud tam simplex, vulgari modo acidulatum, aut, quod melius (in omnienim ulcere seu putredine est acidum) cum alcali fixo paratum, egregiè progressum putredinis præcaverit, idque imprimis, si cum spiritu theriacali camphorato extrahatur.

Insuper cum his Internis conveniunt quædam Externa abdomini imposta, uti vulgò in usu habent, ut recipient semen lini contusum, illudque coctum in oleo lini in formam cataplasmatidis calidè abdomini insternunt, quod euporiston periculoso quodam in casu proficuum fuisse observi.

Aliàs quoque conveniunt suffitus per vulvam excipienti: quos inter sequentem suffitum tanquam expertum ad extrahendam secundinam, fetum, molam, ipsumque sanguinem in matrice conglutatum, commendat **STOECKERUS in sua Praxi**:

℥. Myrrhæ el. ℥ss.  
Cinnam.  
Galban.  
Castor. an. ℥ss.  
Opoponac. ℥j.  
Helleb. nigr. ℥ss.

Ex his cum felle vaciniano Trochisci.

De quibus projiciantur quidam super carbones, & excipiantur fumus genitalibus beneficio infundibuli vel syphonis, quo aliquoties repetito, prodibit secundina.

Quodsi secundina non exierit, dicit **CICERO ANTOR**, non amplius esse quid tentandum, sed injiciendum esse unguentum Basilicon putrefactionem promovens:

Convenit etiam suffitus ex scorilis regullantimonii.

Alii inter externa usurpant exuvias serpentum ad coxam alligatas; nam has, ut aliquoties monui, etiam secundinas pellere dicunt; mox tamen removendæ sunt, ubi prodierint. Juxta hæc clysteres uterini ex Decoctis simplicium stimulantium, & acriorum aromaticorum, imprimis artemisæ, salviæ, calaminthæ, sabina, pulegii, colocynthidos, & similitum etiam conveniunt, partim ut stimuletur uterus ad secundinas pellendas, partim ut sanies ex putrefactis secundinis exhauriatur; modò maturè hæc, antequam orificium uteri Internum denuo se stringat: sicut etiam eadem ingredientia commodè sub forma fortis vel cataplasmatidis calidè insterni possunt. Item applicantur pessi ex sabina, salvia, colocynthide, helleboro, cum oleo cheirino, felle bubulo, aut melle, &c. Imò etiam inundationes cum oleo cheirino, & oleo colocynthidos, quibus aliquot guttæ olei destillati sabinæ vel succini additæ sint, crebriùs repetitæ conveniunt. Vel usurpetur Mixtura salis ammoniaci & salis tartari in instrumento Glauberi vel vitro longioris colli, vaginæ uteri intruso, ut spiritus subtilis sensim in uterum se insinuet, & secundinæ aut frustulorum reliquorum excretionem stimulet. Simul etiam sternutatoria consilio **HIPPOCRATIS lib. 5. Aphor. 49.** de quibus supra in Partu difficili dictum. Vehementiùs quoque puerperæ sub specie tussis expiret.

Sed optimum est, vel mox, vel saltem primis diebus à partu, manuum operâ admodò arripere, blandè intorquere, & ita ex utero extrahere secundinam; sic enim secundinam relictam tertîa die sine labore manuum operâ extractam videb. in **BORELLO Cent. 6. Histor. 39. MAURICEAU** simile huc refert exemplum **lib. 2. cap. 9.** Siquidem non adeo citò apertus uterus se-



contrahere solet, quin per os iduum à partu uteris amplius & spissus esse solet, antequam se contrahat, ut loquitur PLATERUS in *Observ. pag. 231*. His tamen non sufficientibus, si suspicio sit secundinam penitus retentam tandem putrescere, injiciantur in uterum decocta emollientia, secundinae putrefactionem blandè promoventia; in quem finem

24. *Herb. Malv.*

*Aleb.*

*Parietar.*

*Matricar.*

*Chamom. an. Mg.*

*Coqu. in aqua simpl. ʒss.*

*Colat. ʒss. adde*

*Myrrha,*

*Aloes,*

*Rad. Aristol. rot. an. ʒss. ad ʒvj.*

*Ol. rosat. ʒij. ad ʒij.*

*Aces. vini ʒi*

*M. pro Injectione: S.*

*Inpersio promovens.*

Quibus subinde addantur vel subiciantur etiam injectiones cum unguento basilico, vel paucio unguento *Aegyptiaco*, ut ita putrefacta separetur, & uterus à putredine præservetur. Forsan aqua calcis vivæ hisce liquoribus addita, aut etiam cum aqua calcis vivæ parata Decocta, ad putrefactionem secundinae promovendam, & præservationem corruptionis uteri obtinendam, proficuo cum usu applicari poterunt. Par omnino ratio est de mola retenta. Aut si tales casus superveniunt, raro solent supervivere puerperæ.

Si fiat, ut uterus denuo conniveat, ac se claudat, præter interna stimulantia externæ injectiones emollientes & lubricantes denuo sunt injiciendæ in vaginam uteri, & innodendus uterus laxantibus & emollientibus, aut apertus facilius prodeat secundina.

Eadem locum habent in Mola, à fœtu supersite, ex utero ejicienda.

## CAPUT II.

### E E

#### LOCHIORUM VITIIS.

**C**æterum subinde sunt mulieres, quibus licet post partum sequatur secundina, & se optime habeant; nihilo minus tamen interdum contingit, ut post octo, decem, vel quatuordecim dies à partu superveniant horrores, cum gravi astu & doloribus dorsii, regionisque hypogastricæ; uno nomine, cum doloribus partus redeuntibus. Hoc si fiat, certum signum est, vel subesse sanguinem grumulosum in utero, ex defectu lochiorum non sive evacuatorum, vel etiam tales mulieres emittunt sub partu copiosas aquas limpidas, quod vocant vulgò non incongruè: *Resitare adhuc molam, vel bullam aqueam*. Observatur etiam subinde aliquid, mola, simile, aquosum in membrana contentum, quod post partum remanet, & stimulo novo dolore infert, non cessantes, antequam dicta materia in utero coarctata denuo sit rejecta. Aliàs quando ita in partu separantur fœtus & secundina, in toto hoc labore cum secundinis uberius sanguinis fluxus per uterum consequi solet, ita ut subinde plus subinde minus evacuetur, pro circumstantiarum varietate. Effluit continuò, in quibusdam diutius, in quibusdam brevius.

Vocatur hic sanguinis fluxus post partum Græcis *αἷμα*, quibusdam sanguis puerperalis, aut Purgamenta uterina. Cæterum hic sanguis non solus est: Nam fluunt lochia parum cum ipso fœtu, cum quo simul sanguis plus minus copiosus excrenitur: deinde post fœtum adhuc naturaliter per triduum ferè vel quatrimum sanguis fluit: post loco materis cruentæ effluit liquor aquosus, sanguine saltem tinctus, instar loturæ carniū crassioris, quod fit usque ad diem sextum vel septimum; hinc materia viscida & quodammodo mucilaginosa & tandem serosa, paucò aut nullo sanguine permixta, fluere incipiunt, idque ferè per novem, decem aut quatuordecim dies, & sic successivè cessat lochiorum fluxus: in quibusdam tamen, quibus non adeo copiosè aut confertim fluunt, ferè ad tres aut quatuor septimanas excretio durat, donec debita menstruatio denuo superveniat: in quibusdam integris fere sex septimanis evacuatio hæc protrahitur; vid. HARVÆUS *Tract. de Partu pag. 353*. Quantum lochiorum effluere debeat, determinari

exacè non potest; quin pro mulierum idiosyncrasie ratione in quibusdam plus, in quibusdam minus eorum evacuetur.

Variat interim lochiorum quantitas duplici ex causa: Nam

(1) Habeatur ratio mensium, cum mulieres, quæ menstruatim largiùs evacuantur, largiùs etiam per lochia purgantur; vel quæ parciùs habent mensium fluxum, hæ etiam parciùs solent purgari per lochia; & quibus durante gestationis tempore vel per uterum, vel per nares, vel alia loca, crebrior fuit facta sanguinis excretio præternaturalis, his etiam parum sanguinis post partum evacuetur. Rarissimum est, quod citra noxam puerperæ pauca vel nulla fluant lochia in his, quæ non habent menstrua, utut sint fecundæ, quod ut plurimum fit in his, quæ minus sunt succulentæ, & aliàs dicuntur naturæ siccioris: quale exemplum refertur à SALMUTH *Cent. 3. Observat. 89.* de quadam parturiente, cui lochia nulla fluxerunt citra noxam, ob corporis siccæ constitutionem, & sanguinis exhaustionem.

(2) Mulieres, quæ lactant, aut lactare volunt, in talibus post sanguinis excretionem parum de materia serosa, aut lactea, ac nonnihil glutinosa solet evacuari, quia multum absorbetur in materiam lactis; quæ verò lactare volunt, his uterus evacuetur. Observatum autem à me fuit, quod, quando inceperunt mammae turgescere & lacte scaturire, parum per uterum materia serosa fluxerit: postmodum verò, quando lac fuit suppressum, copiosa materia per uterum fuit evacuat.

Unde prædeterminanda lochiorum sufficientia vel insufficientia observetur mensium fluxus, an hic naturaliter copiosior vel parior existat?

Ita se res habet naturaliter. Sed observandum est, quod non semper lochia hujusmodi colorem naturalem obtineant: Nam interdum etiam flava lochia quandoque observantur, de quibus exemplum videh. in *M. A. N. C. Ann. 3. observat. 115. pag. 186.* & HARVÆO *Exerc. 58.* Imò interdum simpliciter aquosa sine sanguine rejiuntur confertim uti hoc observat GUILHELMUS *lib. 3.* qui refert, se aliquoties observasse, quod reperiantur mulieres, quæ simpliciter aquosa saltim evacuaverint loco veri sanguinis: Sic refert historiam de muliere, quæ octo dies ante partum sine ullo dolore abdominis per aliquot dies quatuor vel quinque Pintas aquæ clarissimæ evacuaverit, quæ tamen non fuit intra matricem firmiter clausam, sed prodixit per vasa quædam colli uterini seu vaginæ: post octo dies peperit filium, parumque cruenti evacuavit: Imò, quod notandum, simul observavit, tempore gestationis labia pudendi ab aqua ita fuisse inflata, ut mulier non potuerit commodè incedere.

Jam autem Fluxus hic sanguinis, seu Lochiorum excretio, vitiatu triplici modo:

1. Quando deficit omnino, aut saltem imminuta est; vel
2. Quando est nimis copiosa ac abundans; aut denique
3. Quando per aliena loca efficiuntur dicta sic lochia.

## ARTICULUS I.

### D E

#### LOCHIIIS RETENTIS.

### C A U S Æ.

**L**ochiorum suppressionem aut vitiatam excretionem quod attinet: hujus causæ non solum in sanguine aut humoribus circa uterum coarctatis, sed simul etiam tum in vasis ipsius uteri, per quæ fieri debet excretio, tum imprimis in spiritu movente, querendæ sunt. Quoad vasa uteri: eadem contracta & obstructa suppressionis lochiorum sunt causa, quando adstringuntur in subita uteri refrigeratione, si in partu, aut brevi post eundem, frigus aeris externum subito irrumpat in uterum, quæ



de exemplum refert **TIMÆUS** *Van Guldenclee in Cas. pag. 626.* vel etiam *lintheamina frigida*, tam sicca quàm humida, admoventur, quæ subito sanguinem plus minus coagulando lochiorum fluxum imminuere solent; à grumis enim circa valiorum orificia hærentibus ulterior excretio suppressitur. Parratio est, si frigidum potum hauriat, aut etiam mammae & extrema, manus pedesque, refrigerentur; item in dolore uteri undecunque nato, cujus occasione, etiam stringuntur fibræ, & angustantur vasa. In movente spiritu est causa suppressionis lochiorum, quando per graviora animi pathemata, iram, terrorem, pavorem, tristitiam, metum & similia, subinde diversimodè determinatur ejusdem motus, sicque simul sanguinis motus & spirituum animalium impetus, hinc consequenter etiam lochiorum fluxus, modificatur, & naturalis cohibetur: ex stagnatione verò & coacervatione sanguinis retenti per alia loca evacuationi instituitur; ipseque observavi in muliere sæctum mortuum pariente, quod ob dolorem & inde natam tristitiam, nil lochiorum evacua verit, nisi arte postmodum succurreretur: ipsæmet etiam mulierculæ nimis verecundæ exhibent occasionem, quod sistantur lochia: item si in succulentioribus primo post partum impetu uberius proruant excrementa uterina, à quibusdam insulse per internè propinata, aut externè applicata adstringentia, perniciosè sistuntur lochia. Unde in sistendis lochiis mox post partum sumus cautiissimi.

### DIAGNOSIS.

Quoad *Signa*: Deficere aut imminui lochia, præter ipsum visum aut relationem agræ, confirmant supervenientia alia, dum nempe abdomen ordinariò tumidum manet, tenditur & induratur, nec debite subsidere potest, dolor gravis, distendens & lancinans, item pulsationis & ardoris, ventrem imum, lumbos & inguina occupat, uterus interdum inflammatur: hinc rigor & febres periculose, præcordiorum angustia & anxietates, respirationes difficiles, plus minus anhelosæ; dicunt: *velle ipsis cor suppressere*; animi deliquia, sudores frigidi, pulsatio temporum, cephalalgia crudelis, & similia symptomata, à sanguinis motu per inferiora impedito enata, deliria, & interdum ipsa mors, superveniunt.

### PROGNOSIS.

Quoad *Prognosis*: Ex dictis spontè manifestum est, quot pericula mulieri ex lochiorum suppressione imminere possint; idque ed periculosius, quò magis vel minus sanguis suppressitur, ut neque arte possint per uterum evacuari, neque per alia loca, mammæ, alvum, nares, & similia exitum querant. Vid. **BARTHOLINUS** loc. all. & **M. A. N. C. Am. 2. Observat. 184. pag. 282.**

Quod si uterus inflammatur, perquam periculosum est, si alia superveniant pathemata, melancholia, sanguinis spurum, pleuritidis, hydrops &c. Hæc omnia difficillima curata sunt, & in quibus semper mensium debita evacuatio ante omnia lochiorum loco procuranda venit. Si tamen copiosius sudor in puerpera erumpat, aut successivè livida, nigra, foetida, &c. copiosè tamen, ex utero fluere incipiant, hæc ipsa lochiorum vices supplere possunt.

### CURA.

Quoad *Curam*: Cura pro causarum varietate & suppressionis ratione plus minus varianda. Primarius scopus esto, ut, quantum potest, præcaveatur suppressio lochiorum fluxus. Obtinebitur hoc partim per remedia chirurgica, partim per pharmacia.

Inter remedia *Chirurgica* eminet venæ sectio, aut hirudinum applicatio, imprimis ubi metuitur, sine hac vel non suffectura, vel non citò satis operatura interna remedia: in specie, ubi aut sanguinis abundantia absolute, aut hujus turgescientia fermentativa, febris nimia, &c. magis subitaneum postulant auxilium, tandem ad apertionem venæ est accedendum. Malè enim communiter à saphenæ sectione initium promovendorum lochiorum faciunt, quin potius internis stimulantibus præmissis, & non sufficientibus, aut his adiunctis, vena aperienda est. Sin lochia non sufficienter fluant, & sanguinis minor adsit abundantia, sufficit saphenæ sectio, & ibidem pro circumstantiarum varietate plus vel minus evacuetur de sanguine pro revulsione particula-

ri, & ut sanguinis eò major impetus concilletur ab utero, & hanc solam ferè Autores adhibent (vid. **M. A. N. C. Am. 3. Observ. 53.**) istam, quæ in brachio fit, omninò rejicientes, contra quos tamen rectè disputat **MAURICEAU de Morb. Infant. lib. 3. cap. 11.** In Gallia & Italia loco hujus, vel etiam præmissæ eadem, pro derivatione applicant hirudines interiori vulvæ parti: vid. **Theodatus in Valerud. pag. 191.** Sic **ZACUTUS LUSITANUS lib. 1. Med. Princ. Hist. 4. in annexa observatione** refert, ex puerperio retento febrim continuam cum pleuritide, hirudinibus internè uteri parti applicatis curatam: Item **THEODATUS Valerud. pag. 171.** refert lochia suppressa cum febre ardente & delirio, hirudinibus interiori parti vulvæ applicatis curata. Applicandi modum communicavi in *Collog. Pharmaceut. in Schræd. par. 1. sect. 2. pag. 321.* Ast verò hoc remedium nostrates mulierculæ horrent. Loco venæ sectionis cucurbitula, vel cum vel sine scarificatione, suris vel interiori femoris parti commode applicari possunt. Quod si in juvencula aut succulento corpore, cui suppressa sunt lochia, major sanguinis abundantia sit turgescientia, & hinc superveniat inflammatio uteri cum febre acuta, difficili respiratione &c. in tali casu, ne nimio impetu deorsum provocetur sanguis, si saltem in talo instituat venæ sectio, præmittenda est in brachio moderata, & hinc subjungenda sufficiens saphenæ evacuatio: Rationem hujus superius, ubi de Mensibus suppressis, dedi. Nempe supprimuntur lochia, vel superius jam dictum, vel ex causa, quæ in ipso sanguine ejusdemque motu hæret, vel etiam supprimuntur saltem ex vitio in ipso utero ejusque vasis latente. Prius accidit usq. à terrore, quale exemplum prostat apud **NICOLAUM TULPIUM lib. 2. observ. 2.** à morore, quale exemplum vidit **Sylvius in Praxi**: Posterius fit, quando ex grumo sanguinis in utero, ex ejus præternaturali contractione, &c. idem accidit. Si prius, venæ sectio in pede omninò convenit, ut ejus medio modificetur quasi & determinetur illius morus ad uterum, aut saltem in plethoricis præmissa illa in brachio in pedem demum instituenda venit: sin verò in utero sit vitium, venæ sectio in pede inutilis erit. Mulier hic partu octavo abortiebat, hinc lochia suppressæbantur, superveniebant anxietates præcordiorum, quas vocabat *Cordis angustiam*, æstus, sitis &c., cui ex venæ sectione in pede statim lochia redibant, unde sub fluxu Myrrhæ internè exhibuit. Ubi verò alia superiorum partium ex lochliis suppressis urgeant pathemata, ut cephalalgia, dyspnoea, vomitus aut sputum cruentum, &c. venæ sectio saltem in brachio instituenda venit, pro urgentibus istis mitigandis symptomatibus.

Quoad *remedia Pharmaceutica*: ea sunt interna & externa.

Inter Interna, præmissa vel omisæ venæ sectione, conducunt remedia appropriata, menses aliàs aut fixum, tam vivum quàm mortuum, pellentia, blandis aromaticis diaphoreticis mista, ut ab his aut à frigore coagulatus sanguis resolvatur, aut cessans sanguinis turgescientia post partum restituatur & corrigatur, sanguis fluxilis magisque fermentativus redditus, & ejus circulus concitator procuretur, dum illa uterum imprimis irritant, ut per hunc evacuetur sanguis. Inter appropriata in specie conducunt Myrrha, quæ egregia est in lochiorum fluxu deficiente, tam in substantia usurpata, quàm essentia myrrhæ cum tinctura tartari, vel spiritu vini probè tartarizato parata, unde & trochisci de myrrha sunt elegantes: hinc Crocus, Borrax Veneta, Zedoaria, essentia Zedoariæ, Dictamnus Creticus, Castoreum, Succinum, Cumini cum cerevisia collum, aliaque similia immensum defectu, satum & secundis promovendis ferè usitata. Nostratium muliercularum ordinarium unicum sunt Ciceres rubri, quorum decoctum vel per se, vel cum radice petroselinii in jure carnis paratum, addito croco exhibitum, non inconveniens est, eleganter lochia ciet, & uterum purgat; attamen non semper juvat. Aliàs syrupus vel Decoctum Absinthii, si à frigore supprimantur lochia, est optimum; item Decoctum pulegii, Decoctum & aqua florum cheiri, Matricariæ cum Artemisia & chamomilla; vel Decoctum betonicæ, vel Chamomillæ usurpatum cum Elixir proprietatis, aut etiam, quod melius, & Lothil experimentum est:

℞. Flor. Chamomill. nostr. M. jß.

Corr. Aurant. sic. ʒj.

Coqu. in f. q. Cerevisia.

Hoc decoctum propinatum egregie convenit in lochiorum suppressione. Potest aliquid addi de Myrrhæ, vel propinetur in eodem Elixir Proprietatis, præsertim sine acido seu cum spiritu.



*Spiritu salis ammoniaci paratum, quod est egregium euposition, & probatum.*

Hinc essentia sabinæ, essentia ad menses, & essentia castorei conveniunt. In lochiis suppressis mihi, cum hic frequentissimus sit hic affectus, in more positum, cum dicto decocto ex Chamomilla propinare sequentem pulverem, qui admodum convenit, nec unquam me fessit:

℞. Antimonii diaphoret. ℥j.

Zedoar. ℥ss.

Myrrh. elect. gr. viij.

Cinnam. gr. vj.

Croc. gr. v. vel vj.

M. f. Pulvis pro una vel duabus dosibus:

D. S.

*Pulvis aperiens.*

Exhibentur in modo dicto decocto, vel cerevisia calida, ita blandè sudando lochia copiosè promoventur, & dolores post partum cum lochiis suppressis frequentissimi simul sopiuntur.

Vel

℞. Antimonii diaphor. ℥j.

Myrrh. ℥ss.

Castor. gr. xij.

M. f. Pulvis pro duabus dosibus.

D. S. ut antè.

Externè simul flores chamomillæ modò decocti regioni pubis, adhaerementi, imponi possunt; Nam egregiè etiam conveniunt.

Faciunt huc Mixturæ TIMÆI Von Guldenkleæ expertæ in partu difficili, secundinis & lochiis retentis, ex myrrhæ, castoreo, succino & croco, dilutis in convenienti vehiculo, quæ convenienter usurpari possunt, & multis profuerunt: Harum prior descriptio in *Casib. lib. 4. Cas. 25. p. 223.* (vid. supra, ubi de Partu difficili) posterior verò *Cas. 28. pag. 227.* est hæc:

℞. Aquæ Artemis.

Hyster. Myrs. an. ℥ss.

Cinnam. ℥ss.

Pulv. Myrrh. el. ℥j.

Succin. alb. præp.

Castor. an. ℥ss.

M. pro una dosi:

Quam admodum laudat; neque sine causa.

Vel

℞. Ess. Myrrh. cum sp. vin. tartarizat. ℥ij.

Tincturæ antimonii ex scor. ℥j.

M. D. S.

*Essentia aperiens.*

Dosis 40. vel 50. guttæ bis vel ter in die.

Vel

℞. Myrrh. elect. gr. xv.

Borrac. ℥j.

Croc. gr. vj.

M. pro 2. dos. S.

*Pulvis aperiens.*

℞. Aqua Card. bened.

Matricar. an. ℥ss.

Ess. Myrrhæ ℥ij.

Borrac. Venet. ℥j.

Sal. vol. cornu cervi gr. jx.

Syr. Artemis. ℥vj.

M. D. S.

*Mixtura aperiens cochleatim sumenda.*

Capiatur subinde cochleatim, vel assuatur pro tribus vicibus; gustui verò non est gratum.

Aliquando mulieri jam teretio à partu die, cui penitus suppressa essent lochia, præscripsi:

℞. Borrac. ℥ss. ad ℥ij.

Myrrh. gr. xv.

Croc. ℥ss.

M. f. pulvis pro duabus dosibus, accipiendis in haustu cerevisiæ calidæ, vel, quod melius, in decocto artemisiæ & chamomillæ, præmissa venæ sectione in pede.

Ego aliquandò femellæ juveniculæ sanæ, post partum felicem parum de lochiis expurganti, cui post decimo à partu die varia colluvies ex utero effluxit, ut promoveretur lochiorum fluxus, ordinavi ipsi Essentiam Myrrhæ cum tinctura tartari paratam, ad aliquot dies usurpandam; sed frustra nihilominus hic labor fuit: Hinc, ut promoverem eadem, præscripsi sequentem pulverem:

*Estmull. Oper. Tom. II.*

℞. Borrac. Venet. ℥ij.

Myrrh. elect. gr. xvj.

Croc. gr. viij.

Mistis his, & duabus dosibus usurpatis, maxima copia lochiorum & colluviei expurgata seu evacuata fuit, ut necesse fuerit sanguinem denuo suppressere; Hunc enim pulverem in graviore malo adhibere soleo.

*Pulvis radice Zedoariæ à ℥ss. ad ℥j. multis symptomatis puerperarum medetur, in specie, si sit conjuncta lochiorum retentio cum dolore post partum, vel pulveris Zedoariæ ℥j. pro duabus dosibus propinetur, acuendo cum aliquot guttis olei destillati rosismarini ad provocanda lochia: Vid. BARTHOLINUS Aët. Med. Hassn. Volum. 2. pag. 209.*

*Pellentibus his etiam possunt annumerari Elixyr Proprietatis absque acido, sed cum alcali fixo (quod magis accedit ad præparationem Paracelsi, quàm vulgare) vel spiritu salis ammoniaci paratum: Item, loco hujus, Elixyr Proprietatis siccum seu pilulæ pestilentiales Ruffi, Avicennæ, vel de sagapeno, stimulant lochia, simulque ventrem, alvus si sit obstructa, laxant. Nam mox post partum non convenit purgatio ad promovenda lochia, nisi septem aut novem dies effluxerint, quo tempore blandum infusum ex Rhabarbato, Agarico & succino, propinari potest: cautè tamen in nostris regionibus propter latentes sæpius febres malignas purpuratas, quæ interdum vix ante nonum aut undecimum diem à partu se manifestant.*

*Quodsi à frigore sanguinis grumosi aut plus minus coagulati subsit suspicio, his ipsis appropriatis sperma ceti addi potest, quod cum paucis castoreo multum conducit ad solvendos sanguinis grumos; vel etiam Mixtura hæc, quam ingrediuntur lapilli canerorum cum aceto, est egregia ad sanguinem grumosum resolvendum & lochiorum fluxum promovendum: v. g.*

℞. Aqua Cheresol.

Matricar. an. ℥ss.

Acet. vini acerr. ℥vj.

Lapill. caner. præp. ℥j.

Antimoni. diaphor. ℥j.

Syr. artemis. ℥ss.

M. D. S.

*Mixtura discutiens & aperiens, cochleatim sumenda.*

Quodsi cum lochiis suppressis gravia urgeant symptomata, aut insignis perturbatio in corpore juncta sit, aut dolores uterini urgeant, in specie ubi aut adeff. crudelis cephalalgia, aut periculosum imminet delirium, commode tali mixturæ & dictis stimulantibus ac lochia pellentibus laudani opiat. gr. j. vel gr. iij. adhi potest, monente hoc non incongruè WILLISIO *Tract. de Feb. pag. 284.*

Externè Fomenta & sacculi ex chamomilla cum sabbina & serpillio; quin & Licus emollientes, sanguinis grumos resolventes & blandè stimulantés seu cientes, sunt optimi, fomentando & ungendo partes abdominis inferiores cum oleis penetrantibus laxantibus & aromaticis, oleo cheirini, cui additum sit oleum destillatum succini, baccarum juniperi, item parum olei destillati spicæ: v. g.

℞. Ol. Cheirin ℥ss.

destill. Cumin.

Bacc. junip. an. ℥j.

Succini ℥ss.

M. D. S.

*Oleum discutiens & aperiens.*

Hoc calidè inungatur largiter abdomen ab umbilico usque ad genitalia, licui superimponatur later calefactus, vel sacculus emolliens, resolvens, plus minus cientes, probe calidus, ex artemisia, absinthio, matricaria, mentha, pulegio, serpillio, melissa, floribus chamomillæ, radice angelica, seminibus quatuor carminantiis maioribus, & similibus, nunc in forma sicca, nunc in vino coctis. Conf. HILDANUS *Cent. 5. obs. 42. V. g.*

℞. Herb. Absinth.

Flor. Chamomill. an. M. iij.

Herb. Matricar. M. ij.

Rad. Angel. ℥ss.

Sem. 4. cal. mai. an. ℥ij.

Bacc. Junip. ℥ij.

Incisa & contusa includantur sacculis duobus.

D. S.

Mmm

Sac-



*Sacculi discutientes & aperientes.*

Hi mutud, quàm calidè fieri potest, imponantur abdomini, priùs isto oleo inuncto, idque crebriùs repetatur. Prodest hoc euporiston in specie, si à frigore externa oritur lochiorum suppressio. Egregie convenit Fotus, quem supra dedi, ubi de Mensium emansione: item in Colleg. Formular. pag. .... & Id. Formular. Cl. 4. §. 10.

Vel

- ℥℥. *Herb. sabina* M. ij.  
*Artemis.*  
*Puleg.* an. M. j.  
*Rad. Alcan.* ℥ij.  
*Valer.* ℥vj.  
*Flor. Chamom.* Rom. M. ij.  
*Cheiri,*  
*Samb.* an. M. j.  
*Bacc. Juniper.* ℥ij.  
*Lauri* ℥j.

Incisa & contusa includantur sacculis duobus rotundis interpassandis:

D. S. ut ante.

Ebulliant in aqua & vino, & vicissim applicentur.

Ubi simul adest urinæ suppressio, convenit cataplasma ex parietaria, cherefolio, & oleo scorpionum, v. g:

- ℥℥. *Herb. Parietar.* M. ii.  
*Cherefol.*  
*Flor. Chamomill.* an. M. j.  
*Coqu.* ad molliem:  
*Pulpæ persea* equi traidæ adde  
*Ol. scorpion.* ℥j.  
*Butyr. rec.* ℥j.  
M. D. S.

*Cataplasma urinam promovens.*

Imponatur calidè regioni pubis, applicato desuper operculo calido.

Ut hæcenus dicta fiant magis clara, exemplum lochiorum retentionis, cum suppressione urinæ & doloribus post partum complicatæ, curatæ narabo: Mulier nempe partu perquam laborioso, in quo ab obstetrice ruditer tractata, erat, filium enitebatur, quem difficilis & turba Secundinarum, earumque frustulatum disceptarum, exclusio, sequebatur: Hinc lecto imposita altero manè graves abdominis lancinantes & ad pubem usque protensos dolores pariebatur, repetitis usque crebrioribus vicibus recurrentes, similes partus doloribus: Acerbissime simul circa pubis regionem dolebat, ita ut præ dolore tantum non ejulare cogeretur: Lochia parè fluebant, loturæ carniū similia, eaque pauca: urina difficulter reddebatur, eaque tandem penitus supprimebatur: Ponderis sensum in abdominis regione hypogastrica, versus genitalia prementis, intrinsecus sentire dicebat. Tertiâ demum die, vocatus, ægram, præter enarrata frigidiusculè circa extrema & frontem sudantem, cum ructu & singultu offendebar, simulque pulsū celegem, frequentem, magnitudinis & vehementia moderatum, durum non nihil deprehendebar: quam sic curavi:

Primus ut promoverentur lochia penitus ferre suppressa, præscripti duos pulveres:

- ℥℥. *Borrac. Venet.* ℥ss.  
*Myrrh. gr.* xvj.  
*Croci* ℥.

M. f. Pulvis produbus dosibus.

Primam dosin mulier manè capiebat, secundam revomebat; vesperi ob id præscripti sequentes pulveres:

- ℥℥. *Salis Card. Bened.*  
*Artemis.* an. ℥ss.  
*Borrac. Venet.* ℥ss.  
M. pro 2. dosibus.

Primam dosin capiebat vesperi, alteram à media nocte. Externe præscribebam Litum:

- ℥℥. *Ol. Cheiri.* ℥ss.  
*Destill. Cumin.*  
*Bacc. Junip.* an. ℥j.  
Misc.

Hoc calidè illinebat regionem hypochondriorum & pubis, idque crebriùs; hinc post primam pulveris dosin sat commodè fluxere lochia: Sed infrequente manè & die penitus supprimebantur cum ventris tumore intensoque dolore, tunc venter durus erat, sudor frigidus superveniebat, hinc sanguinis grumos in utero adesse collegi, & præscripti sequentem Potiensem:

℥℥. *Aqua Cherefol.*

- Marricar.* an. ℥ss.  
*Acet. vin. acerr.* ℥vj.  
*Lapill. cancr. præp.* ℥j.  
*Myrrh. gr.* xv.  
*Laud. opiat.* gr. iß.  
*Syr. Artemis.* ℥vj.  
M. pro Potione.

Probè agitando capiebat sapiùs cochleatim.

Cum usu hujus Potionis sacculi parabantur, & repetitis vicibus abdomini calidè applicabantur:

- ℥℥. *Flor. Chamomill.*  
*Herb. Absinth.* an. M. iij.  
*Matric.* M. ij.  
*Rad. Angel.* ℥ij.  
*Sem. 4. cal. mai.* an. ℥ij.  
*Bacc. Junip.* ℥ss.

Concisa & contusa sacculis duobus inclusa, ut dixi, applicabantur; & exinde sanguis dissolutus egregiè evacuabatur.

Cum autem agra adhuc urinæ suppressione molestaretur, sequens cataplasma peccini calidè applicare jussi:

- ℥℥. *Herb. Parietar.* M. ij.  
*Cherefol.* Miss.  
*Incis. coqu.* ad consist. pultis:  
cui adde  
*Butyr. rec. non salis.* ℥ij.  
*Ol. scorpion.* ℥ij.  
*Destill. cerebintb.* ℥ss.  
Miscantur.

Alii mulieri per tres dies & noctes partu difficillè laboranti, & tandem foetum mortuum excludenti, post partum, cum graviter partes essent læsæ & urina non contineretur, & lochia supprimerentur, dictam Mistruram felici cum successu dedi: Sed sexto die Purpura alba superveniebat, cui hæc mistrura propter additam myrrham egregiè profuit.

Insuper cum his, quando puerpera sub mutatione fragulorum, aut lectum petens, metuit de periculo imminente, consultum est, ut in sella perforata fiat suffitus ex sagapeno, myrrha, succino, gallia moschata, ex trochiscis de myrrha, bdellio, scoris reguli antimonii & similibus, blandè uterum stimulantibus: Quibus adnumerandi trochisci supra cap. 1. ubi de secundina Retensione, præscripti. Præ cæteris optimi sunt suffitus, parati ex *colocythide*, qui potentissime resistentes purgationes post partum promonent & eliciunt, de cuius suffitus egregio usu vid. in *Cas. TIMÆI Von GuldenKlee* pag. 226. Lateres quoque ignis in lixivium scoriarum reguli antimonii insciantur, & per infundibulum fumus attrahatur. Item si forsan adsit inflatio uteri dolorifica, optimè convenit suffitus ex nucce moschata, de quo vid. *HARTMANNI Præcis Chymiatr.*

Quibustandem accedant Clysters alvini, ex emollientibus blandioribus, aromaticis, carminantibus & uterum stimulantibus, ano injecti, imprimis ubi mulieres simul laborant suppressione alvi, qui tanquam fomentum sanguinem circa uterum stagnantem incidunt, fluxilem & excretioni aptum reddunt. Horum proficiuus usus vid. in *BARTHOLINO Cent. 3. Hist. 19. & TIMÆO Von GuldenKlee in Casibus lib. 4. cas. 28. pag. 227.* ubi tale præscribit Enema:

- ℥℥. *Rad. leviss.*  
*Alb.*  
*Lil. alb.* an. ℥ss.  
*Aristol. utriusque* an. ℥ij.  
*Herb. Malva,*  
*Puleg.*  
*Artemis.*  
*Sabina,*  
*Calamintb.* an. M. ss.  
*Flor. Chamomill.*  
*Sambuci,*  
*Melilot.* an. p. i.  
*Sem. Lini,*  
*Aneth.*  
*Fenugr.* an. ℥ij.  
*Bacc. Lauri* ℥ss.  
Incisa & conquassata coqu. in f. q. aqua simpl.  
Colaturæ ℥x. adde  
*Spec. hier. simpl.* ℥ij.  
*Ol. Chamomill.*



*Ol. Aneth. an. ℥j.  
Ungu. de Arthanis.  
Salis gemm. an. ℥j.*

Mista iniiciantur pro Enemate.

*Instrumentum Glauberianum* hic locum suum invenit; sicut hellebori nigri pulvis inclusus nodulo, & vaginæ uteri intrusus, mirifice prolicit lochia.

Lotio denique pedum in auxilium quasi revulsorium in-  
stitui potest.

*Harum adhuc in affectibus*, qui post partum solent supervenire puerperis, & quibus absolvimus retentionem secundinæ, & remorata expulsione lochiorum: Pergo jam ad

## ARTICULUM II.

## DE

## LOCHIORUM FLUXU NIMIO.

**C**ontrarium vitium est *Nimius lochiorum* in partu seu mox post partum *Fluxus*. Sapius etiam usu venit imprimis post abortum, item post rejectam molam, aut etiam post exclusionem foetus mortui, item, rarius licet, post legitimum partum, ut graves subsequantur sanguinis fluxus ex utero seu nimis lochiorum excretiones, vel sanguinis obscuri, nigricantis, grumosi, vel sanguinis floridi, tenuis, coccinei: prius ex venoso genere; posterius ex arterioso fluere solet.

## CAUSÆ.

Causæ nimii lochiorum fluxus sunt:

1. *Sanguis uberius aut serosior & aquosior, adeoque fluxilior.*
2. *Idem concitior, aut etiam magis turgescens.*
3. *A læsione uteri, imprimis ex placenta avulsa.*
4. *Irritatio uteri, vel à sanguine grumoso, vel à frustulis placenta, vel à mola in utero relicta.*

*Primum* quod attinet: aut effluit interdum quidem naturaliter sanguis copiosior in juvenulis succi plenius, calidioribus, coacervatus gestationis tempore, imprimis quæ ordinariò patiuntur mensium fluxus: aut evenit, ubi sanguis sua natura est serosior, aquosior, ac paulo acrior, adeoque fluxilior, ut patet in *scorbuto* & similibus, quibus cum impetu fluunt lochia.

*Secundum* quod attinet: in specie in puerperis, dum insigniter incalescit corpus & sanguis fermentescit, ordinariò quoque adest pulsus celer, frequens, magnus, ubi sub turgescencia in partu uberius effluit lochia. Item evenit non raro, ut in ipso partendi conatu, ubi paulo fuerit difficilior, propinata copiosius spiritus, nempe vinum, aqua vitæ, mulierum &c. nec non salina, foetum pellentia, &c. massa sanguinea postmodum exagitetur, rareseat, turgescat, & uberius ejus profluvium per uterum inducatur. Sanè muliercularum plebejarum mos est, aut vino generoso tantum non inebriare sceminas parturientes, aut loco hujus aquas apoclecticas spirituosas, seu spiritum baccarum juniperi, aut similia, copiosius, ad vomitum usque interdum, propinare, à quibus volatilis facta partim, partimque fluxilior & magis fermentativa reddita massa sanguinea, uberius post partum evacuetur.

*Quoad tertium*, nempe læsionem uteri: accidit interdum nimius lochiorum post partum fluxus ex placenta disrupta, aut violentius avulsa: id quod imprimis fit in abortivis aut intempestivis partibus; aut etiam, quando aliquocunque tempore firmius secundina cum utero adhærescit, tunc hæc abrupta *vasa uterina* læduntur, ubi ex laceratione quasi uteri gravior subindè profluvium sanguinis excitatur. Quod etiam pertinet vaginæ uteri plus minus excoarctatio, aut ejusdem in parte quadam rupio, cujus occasione etiam *nimia hæmorrhagia* interdum supervenire possunt: vid. *VESLINGIUS* in *Obs. pag. 164. Bartholiniana Editionis.*

Quartus denique periculosus uteri fluxus fit ab irritatione uteri ob res molestas, quando placenta uterina remanet, aut tota non extrahitur, sed una alterave ejus supermanet in utero particula, cujus cadaveris præsentia continuò irritat uterum ad copiosam sanguinis profusionem. Interdum non tam placenta frustulum est, quàm mola quadam, à partu interdum adhuc in utero relicta: & hæc posterius

*Estimul. Oper. Tom. II.*

ferè frequentior solet esse causa, cujus molesta præsentia uterus irritatus copiosius plorat sanguinem. Rectè enim hic loquitur *AMATUS LUSITANUS* *Cens. 7. Cur. 54.* „ dum dicit: *Enixofactum & secundinis, sapiens nimium sanguinis sequitur profluvium, quod nullis restitui potest remediis, idque ob molam quandam in utero adhuc latentem, qua excreta, vel spontè sistitur istud sanguinis profluvium.* Profunt ergo tunc menses clientia, ut passus ex elaterio, item medicamenta ex cyclamine, sabina, &c. Nec sola mola, sed frustulum secundinæ, violenter abruptæ aut laceratæ, in utero resistens similem infert hæmorrhagiam: Quod etiam facit observatio elegans *RIVERII* in *Cens. 3. obs. 24.* ubi gravis uteri fuit exorta hæmorrhagia, cum foetus mortuus in eodem contineretur. Huc denique etiam pertinent *sanguinis grumi* in utero collecti. Omnia hæc præternaturali sua præsentia continuò irritando uterum, graves hæmorrhagias inferunt, ita quidem, ut vel impossibile sit has sistere, vel easdem sine recidivæ metu compescere, nisi distæ illæ res molestæ in utero existentes prius fuerint remotæ, quæ quamdiu durant, tamdiu etiam fluxus lochiorum non cessat. Quin & retenta intestinorum præternaturalia, aut excrementa viscidiora aut duriora, abdominis dolores ac tormina inferentia, per accidens etiam ex consensu nimiam lochiorum excretionem inferre possunt. Notabilis in hunc finem est observatio, quam habet *MAURICEAU lib. 3. de Morb. Mulier. cap. 5.* hæmorrhagiæ uteri nimis ex simili causa natæ, per acrius injectum clystima curatæ.

Hæ sunt causæ, quæ inferunt nimium lochiorum fluxum.

## DIAGNOSIS.

Quod attinet *Signa*: fluxus & quantitas sanguinis excreti nimia facilè & spontè per se patent & cognoscuntur, idque eo magis, si in ipso partu non pauca hujus effluerit copia.

Arteriosus, an venosus sanguis effluit? testantur conditiones in fluxu, nempe materia excreta.

Causæ per antecedentia sunt manifestæ: primariò tamen vires puerperæ innuunt, an nimium sit, quod effluerit? an secus? ubi enim deiciuntur vires, ac pulsus debilis ac frequens supervenit, ubi salidum, visus obtenebratio, aurium tinnulus, & quodammodo animi deliquium tandem imminere videtur, imò interdum mors ipsa subsequitur, tunc satis patet, nimium esse id, quod effluit.

## PROGNOSIS.

Quemadmodum omnes hæmorrhagiæ uteri sunt nimis periculose, ita mulieribus periculosus est nimius lochiorum fluxus; quia in laboribus partus vires debilitatæ, & massa sanguinea nimis agitata & exhausta, easdem plurimum solet labefactare: quin imò mœstitia, melancholia, & alia gravia superveniunt symptomata, imprimis deliria & syncope, quibus si convulsiones superveniant, eo pejus est; vid. *HIPPOCRATES sect. 5. Aph. 56.* dum etiam interdum mors ipsa supervenire solet.

Cæterum distinctionem hic faciunt mulieres inter sanguinem ut sic seu venosum, & ut dicunt, *Ger. sub sanguine cordis*: Quæ distinctio non est de nihilo. Per sanguinem cordis enim intelligunt sanguinem arteriosum; Nam qui effluit post partum, is est ex venis, quod monstrat color obscurus & ex rubro nigricans. Si ergo sanguis intensè floridus seu magis coccineus, & ex rubro ad flavum colorem inclinans, emanat, revera indicum est, quod immediatè ex arteriis evacuetur. Periculosus ergo est, si arteriosus effluit sanguis.

Porro lochiorum hæc hæmorrhagia nimia frequentius accidit post abortum, quàm post partum legitimum: Illa, quæ sequitur vel violentam secundinæ separationem, vel abortum, solet esse longè periculosior & gravior, quàm quæ sequitur partum naturaliter constitutum: Aut si post abortum parum videtur excerni sanguinis, tamen melius periodo & graviorem & periculosiorem hæmorrhagiam supervenisse observavi.

Et in genere: Quæcunque vitia aliàs hæmorrhagias inferunt, ista in specie sequuntur lochiorum nimium fluxum.



## C U R A.

Quoad Curam : in hac optimè est, ut habeatur ratio causarum remotarum, quibus sufflaminatis, faciliè constabit omne negotium. Opera ergo danda est, ut sanguinis nimius fluxus sistatur; idque pro causarum varietate vel sanguinem incrassantibus, demendo simul ipsi superfluum serum; vel ejusdem motum fermentativum, à spirituosius excitatum, compescentibus; vel laciones uteri ab avulsa placenta consolidantibus, adstringentibus; vel denique illud, quod uterum irriter, frustra nempe secundinæ, seu molas retentas, removensibus: nam ubi hæc fuerint secreta, vel spontè subinde sistitur sanguis; ipsa enim sanguinis copia, fluxum faciens uberiozem, spontè sistitur, ubi tandem, quod superfluum est, fuerit evacuatum.

Ex quibus patet, venæ sectionem in brachio esse auxilium minus conveniens in lochiorum fluxu, ut ut hanc admodum ceu probabilissimum remedium approbat GUILLEMEAU lib. 3. cap. 10. nisi vel in habitioribus, vel in casu adeo gravi, ut ex necessitate pro aliquo saltem revulsione venæ sectionem in cubito instituere cogatur Medicus, qualem refert SYLVIVS lib. 3. cap. 8. §. 55.

Quod ergo attinet remedia : ea sunt pro varietate causarum varia. Hinc, dum sanguis est serosior & aquosior, mediantibus sudoriferis serum derivetur per loca aliena. Sudorifera certè ex omnibus evacuandi rationibus, sola conducunt, & interdum maxime profunt in nimio lochiorum fluxu: nam ut in ipsa sudatione ex fluidiore massa sanguinea, & rapidiori ejusdem circulo, incrementum contingat ipsius fluxus, tamen hic, ubi sufficienter sudavit corpus, aut spontè imminuitur, ut postea sanguis inspissatus parcius effluat per uterum. Etiam in ipsa sudatione spongia aceto rosaceo imbuta genitalibus ac regioni pubis applicanda est; sic enim præcavetur, quod metuendum est, sanguinis nimium profluvium. Ratione sanguinis turgescens conveniunt blanda acida, sanguinis ferociam compescentia, & eundem modocriter ad coagulationem disponentia; qualia sunt remedia ex Tormentilla, Portulaca, Plantago, lysimachia flore purpureo, quæ ceu specifica hic commendantur à quibusdam.

Ratione causa tertia, quando nempe uterus læsus ab avulsa placenta infert nimium lochiorum fluxum, adstringentia blanda & vulneraria conveniunt: quæ inter eminet Cheresolium, cujus Decoctum inter vulneraria est egregium: quibus addatur Plantago, Cydoniata quæcunque, &c. Vel fiat talis Mistura:

℞. Aqua Plantag.

Portulac. an. ℥i.

Cinnam. ℥vj.

Acet. destill. ℥ss.

• Corall. rub. præp.

Terra sigillat.

Hamatit. an. ℥j.

Laud. opiat. gr. ii.

Syr. Cydonior. vel Corall. ℥j.

M. D. S.

Mixtura sanans & adstringens.

Mistura hæc subinde cochleatim hausta, blandè fluxum adstringit, & uterum denuò consolidat.

Vel

℞. Aqua Plantag. ℥vj.

Fl. Acac. ℥ij.

Extr. flor. hyperic.

Plantag.

Fol. Alb.

Sanicul. an. ℥ss.

Laud. opiat. Lang. gr. iij.

Syr. Corall. vel de Alb. Fern. ℥j.

M. S. ut antè.

Decur cochleatim.

Quod si in quarta causa, irritato nempe utero, fiat, ut resistans placenta frustulum, vel mola, &c. nimium sanguinis coarctet fluxum, periculosum imminet Medico negotium; necesse enim est, ut expellatur hæc secundina retenta molesta, quo facto mox cessabit nimia uteri hæmorrhagia. Cum verò omnia pellentia simul soleant promovere lochiorum fluxum, & stimulent uteri excretionem, idè

cauti sumus in utendis his ipsis; quò potius, cum illa retenta sit causa profluvii, pellentia aromatica ratione retenti frusti, & simul incrassantia seu blanda adstringentia ratione uberioris fluxus, sunt conjungenda; applicando externè pestos, aut irritando uterum, internè verò, quæ possunt nonnihil adstringere, simul tamen secundinam aut molam promovere: v. g. SYLVIVS in Prax. lib. 3. de Morb. Mulier. cap. 8. de Lochiorum fluxu læso §. 2. habet mixturam ex radice bistortæ, herba maiorana, pulegii, &c. quæ dicit feliciter se usum esse in hoc casu. Interim in hoc sphalma typographicum latere puto, & pro ℥ij. radice bistortæ, sumendas esse suspicor ℥ij. Nam hoc magis probabile videtur. Ad imitationem ergo Sylvi in tali casu fiat tale Decoctum:

℞. Rad. Bistortæ aut Tormentill.

(est adstringens) ℥ij.

Fol. Majoran.

Puleg. (menses pellentia suprà) an. M. j.

Coqu. ex aqua pura & vini albi. an. f. q.

Colat. ℥xx. adde

Syr. Artemis. ℥j. vel ℥ij.

Aqua Cinnam. ℥ss.

M. D. S.

Decoctum matricale.

De hoc capiat subindè ægra bis vel ter in die ℥ij. vel iij.

Vel

℞. Rad. Bistort. ℥ij.

Tormentill. ℥vj.

Herb. seu summ. Majoran.

Puleg.

Com. hyperic. an. M. j.

Coq. in f. q. aqua & vini;

Colatur. ℥j. ad ℥ss.

adde

Aqua Cinnam. ℥ss. vel ℥vj.

Syr. Artemis. ℥ss.

M. f. Portio adstringens nonnihil, simul tamen pellens:

D. S. ut antè.

Succinata imprimis conveniunt in hoc casu, ut succinum præparatum, trochiscide Carabe, &c. quæ & sanguinis fluxum cohibent, & simul pellunt contenta uterina. Quod si debilius promoveant, acienda sunt aut sale volatili succini, aut aliquot guttulis ejus olei destillati, aut granis sufficientibus borracis Veneræ. Si ergo quis pro decocto malit pulverem, talis parari potest:

℞. Cornu Cervi ussi ℥ij.

Borrac. ℥j.

Cinnam.

Croci an. ℥ss.

M. f. Pulvis pro duabus dosibus: S.

Pulvis singularis.

Capiatur in aqua Cinnamomi.

Vel

℞. Cornu Cervi ussi præp. ℥ij.

Hamatit. præp.

Cinnam.

Croci,

Borrac. an. ℥j.

M. f. Pulvis pro duabus vel tribus dosibus:

D. S. ut antè.

Aliis in genere in quibuscunque fluxibus nimis optimum est, miscere subinde, quæ plurimis satisfaciunt scopis; hinc Cydonia & omnia Cydoniata conveniunt, succus nempe cydoniorum, vel vinum seu succus granatorum. Conducunt itidem Corallia & Coralliata, in specie mactura coralliorum sassafrata, coralliarubra mixta cum succo granatorum acidorum recentè expresso, quæ mixtura puerperis subinde propinata solet lochia nimis fluentia egregiè sistere: quibus etiam possunt addi succus aut syrupus Portulacæ, imprimis in acrimonia sanguinis aut utero læso. Pulvis dentis hippopotami, vel unicornu verum, à ℥ss. ad ℥j. ceu specificum experimentum laudatur à MINDERERO in Medic. Militari, & VELSCHIO Hecat. 2. pag. 26. Observandum tamen de dente hippopotami, miras ejus esse facultates ad quascunque sistendas hæmorrhagias: differentia tamen quædam intercedit inter ipsos dentes, cum non omnes sint ejusdem efficacis, sed certo tempore ejecti ab ipsis brutis, hic conveniunt. In genere autem in quibuscunque lochiorum fluxibus nimis conveniunt imprimis Martialia, & hinc Terra, adeoque eminet lapis hamatitæ præparatus, Bolus Armena, Terra sigillata, Cor-



Cornu cervi ustum, Crocus martis adstringens, in specie Tinctura martis adstrictiva, aut, quæ ejusdem est naturæ, Tinctura sulphuris vitrioli ritè preparata, aut liquor Martis solaris, in graviore malo mirificè conveniunt: liquor martis solaris à gutt. viij. x. xij. & xv. tinctura verò sulphuris vitrioli à gutt. xx. ad xxx. ut ut fortioribus his non facillè utamur, nisi in graviore casu.

Mulier quædam hic patiebatur nimium lochiorum fluxum, cum jam puerperium esset sublatum, usurpabat liquorem martis solaris à gutt. xij. ad xv. per aliquot dies, & fluxus cessabat.

Alia mulier juvenis parum lochiorum sub tertio partu emittebat, hinc subsistebat, & sequebatur gravis hypochondriorum dolor; pro quo scopo ordinabam Essentiam Myrrhæ cum tinctura tartari, sed frustra; Unde præscripti sequentes pulveres:

℞. Borrac. Penet. ℞ij.  
Myrrh. gr. xvi.  
Crocigr. viiij.

M. pro 2. dosibus.

Exinde copiam & variam colluviam emittebat, ita ut Fluxum hunc stringere necesse esset, quod mediante hoc liquore præstabilem.

Sunt, qui laudant sperniolam Crollii: sed hæc propter myrrham & additum crocum minus laudanda, minusque conveniens videtur: potius convenient trochisci de carabe, item de terra sigillata, vel per se in vehiculo quocunque, vel in vino austero acidulo, vel etiam cum cochleari aceti: in specie conducunt, ubi vel læsio inducitur utero ex ærula secundina, vel ubi subest sanguis serosior & aquosior; uti etiam antihæticum Poterii, imprimis Bezoardicum Joviale, ad compescendum uteri fluxum conveniunt.

Conveniunt aliàs hic omnia ea, quæ superius de Hemorrhagiis in genere, aut nimio mensium fluxu commendavi, imprimis Laudanum opiatum, & ex eo parata remedia; desperatam enim uteri hæmorrhagiam post partum hoc ipso Laudano opiato curavit TIMÆUS Von Gulenklee, in suis Casibus. Vehiculum horum assumendorum constituunt aqua tormentillæ, fragorum, plantaginis, item vinum, granatorum, aqua marialis seu ferrata, & similia; imprimis aquam tenellorum cornuum cervi, Germ. Hirsch kolbenwasser, cochleatim propinata. Nam hæc aqua arcanum fuit Cratonis, trium Imperatorum Archiatri, ad nimium mensium fluxum, cum qua propinavit pulverem de osse cordis cervi: in specie, si sanguis arteriosus fluere percipitur, quod vocant, Sanguis Cordialis abie, id quod ex tenuitate, colore florido & uberiori scaturigine cognoscitur, vix melius habebitis remedium, quàm aquam tenellorum cornuum cervi ritè preparata, & cum spiritu cornu cervi non nihil acuatam, cum cornu cervi, vel coralliis rubris, &c.

Hæc primatum ducunt in Hemorrhagia nimia post partum: Hinc v. g.

℞. Cornu Cervi ussi præp. ℞ij.  
Terra Sigillat.  
Lap. hamat. præp. (est melius quàm Crocus Martis adstringens) an. ℞ß.  
Laud. opiat. ferment. gr. iß. vel gr. ij.  
M. pro 2. vel 3. dosibus. S.  
Pulvis adstringens.

Propinquantur in vino austero acido.

℞. Lapill. cancr. præp. vel Corall. rub. præp. ℞ij.  
Terra Sigillat. ℞ij.  
Laud. opiat. gr. ij.  
M. f. Pulvis produabus dosibus.

Cum aceto vini non nimis forti assumendis.  
D. S. ut antè.

Vel

℞. Conf. rosar. antiqu. ℞ij.  
Dia. Cydon. sine speciebus. ℞ß.  
Trochisc. de Carabe.

Terra Sigill.  
Cornu cervi ussi præp. an. ℞ij. vel ℞ij.

Cum f. q. Syrup. cydonior. f. Electuarium.

De quo capiatur subinde quantitas nucis juglandis: Vid. FORESTUS lib. 28. Obs. 62.

Vel

℞. Aqua Tormentill.  
Menth. an. ℞ß.  
Cinnam. cum vino ℞ij.  
Trochisc. de Carabe ℞ß.

Estmull. Opr. Tom. II.

Syr. Corallior. ℞vj.

M. S.

Mixtura adstringens.

Cochleatim hauriatur.

℞. Aqua Tenell. cornu Cervi ℞ij.  
Succ. Cydon. vel Granat. acid. ℞ij.  
Hemat. præp. ℞ij.  
Corall. rub. præp.  
Bol. Armen. præp. an. ℞ij.  
Laud. opiat. gr. ij.  
Syr. Corall. ℞vj.

M. S. ut antè.

Hanc & sequentem Mixturam, ad imitationem SYLVII lib. 2. Pr. cap. 8. præscriptam, egregiè profuisse observavi: Scilicet superiori æstate mulier quædam erat, quæ altero die post partum irascebatur, unde ex ira, confusis sic succis & spiritibus, supprimebantur lochia, quod aliàs rarè evenire solet. Erat autem mulier non plethorica, sed inclinebat ad cachexiam: tertio, quinto & sexto die à suppressione superveniebant graves dolores abdominis, & hinc enormis lochiorum fluxus repetebat de novo. Causa erat sanguinis grumi, qui in utero coacti postmodum dolores istos, hinc nimiam hæmorrhagiam inferebant, quod monstrabatur, quia grumosis sanguis cum florido ejiciebatur. Variis ceteroquin tractatis, præscripti sequentem Mixturam, quæ feliciter operata est:

℞. Aq. Tenell. cornu cervi (cupressi CRATONIS in hæmorrhagia uteri nimia) ℞ij.  
Succ. Cydon. rec. ℞ij.  
Corall. rub. præp. ℞ij.  
Hemat. præp. ℞ß. ad ℞ij.  
Laud. opiat. gr. iß.  
Syr. Cydon. vel Plantag. ℞ß. ad ℞vj.

Misc.

Hæc Mixtura usurpabatur repetitis vicibus cochleatim, & brevi post lochia suppressa sunt, & sic unà cum aliis successe curata fuit.

Observandum tamen adhuc est, non subito esse suppressendum sanguinem, in specie mox à partu, quia subinde ubi primus impetus cessaverit, sponte denuò soleat fisci: quod si non fiat, tunc demum ad appropriata accedendum erit.

In graviore autem malo, aliis desperatis, ultimum refugium sit Bolus ex conserva appropriata, nempe rosarum vel radices symphyti majoris, in quo parum aluminis propinetur, scilicet à ℞ß. ad gr. xv. aut ℞ij. & ℞ß. ad ℞ij. pro una vel duabus vicibus exhibendum, & ceu optimum laudatur experimentum.

Opiata per se in hoc casu nota sunt.

Cum his internis Externa blanda, vel sanguinem nimis effluentem sistantia, vel vasa circa uterum nonnihil adstringentia, adjungenda sunt. Quibusdam in usu sunt Iniectiones in uterum ex decoctis adstringentibus. Commendat VALERIOLA lib. 4. Obs. 6. iniectionem factam ex Decocto aut succo plantaginis aut portulacæ, ex decocto stercoreis suilli, & similibus in aqua ferrariorum decoctis, injiciantur cum siphone in uterum, imprimis ubi suspicio est læsi aut excoriati uteri; quibus necessitate urgente Unguentum Comitissæ adstringens addendum monet citatus VALERIOLA. Vel sunt decocta adstringentia cum aqua ferrariorum, in quibus succus Acaciæ nostratis, item sanguis draconis aut bolus Armena dissoluta sunt: item fiat cataplasma ex suligine cum aceto rosaceo & albumine ovi, quod regioni lumbari prope os sacrum applicandum & subinde repetendum suadet RIVERIUS. Vel argilla calcinata simili modo cum aceto subacta, circa regionem renum lumbarem applicari potest. Item pubi ac genitalibus applicari potest Epithema ex aqua spermatis ranarum ritè destillata, aut spermate ranarum cum aceto rosaceo pauco mixta, cum spongia, vel tepide vel frigide, admovenda. Nec incongruum est, ut applicentur mammis quædam, & quidem si fluunt nimium lochia ex sanguinis turgescentia & nimio orgasmo: nempe Epithemata ex aceto, succo semper vivi, nitro, & aqua spermatis ranarum, frigide applicata & sæpe reiterata, imprimis in iis, quæ nolunt lactare: Vel applicentur cucurbitule cum magna flamma sub mammis, ut ita motu sanguinis quasi contrario sursum concitato impediatur ejus nimius raptus ad vasa uteri.

Tandem singulare experimentum est cingulum, factum ex foliis hellebori albi (folia scilicet nonnihil contusa, ut partes nervæ subideant, assuantur lineo, & ita cinguli



formā applicentur nudæ pubi circa lumbos) est Experimentum HARTMANNI, quod seu experrum à se commendat LINDANUS in nimio lochiorum fluxu.

Denique in habitioribus aut sanguine turgescuntiori, impetuose per uterum erumpente, præditis, venæ sectio incubito maturè instituta, subinde in prima herba affectum suffocat, quia ejus impetum deorsum versustollit. Hanc imprimis extollit GUILLEMEAUX: Ast facit hoc more Gallis consueto, cum tantum locum habeat venæ sectio in statu sanguinis copiosi, & nimis quasi febriliter turgescens.

Hæc fuerunt lochia nimis fluentia.

### ARTICULUS III.

#### DE

#### LOCHIORVM PER LOCA ALIENA EXCRETIONE.

Nempè ubi impeditur Lochiorum Excretio, vel pertinaciter supprimuntur, non mirum est, ut regurgitantia in massam sanguineam fermentativè turgescant per alium quendam locum moliantur egressum. Pro partium natura, in quas fit metastasis, multiplicia symptomata superveniunt, quæ ratione BARTHOLINUS refert Cent. 3. Hist. Anatom. 19. se observasse aliquoties lochia salutariter non raro per alvum expurgata: Sic SALMUTH refert Cent. 4. Observ. 89. quod à retentis lochiis febris acutissima, doloresque abdominis in puerpera fuerint oborti, donec lochiis per nares erumpentibus hæc omnia cessarint: Vid. M. A. N. C. Ann. 2. Observat. 184. pag. 282. Quin & observatum fuit aliquando, per mammas suppressa lochia salutariter fuisse evacuata: Gravissimum morbum ex lochiis retentis videbitis apud HILDANUM Cent. 5. Observ. 42. Scabiem foetidissimam & fere leprosam per lochiorum suppressionem abortam apud eundem c. l. Observ. 43. SALMUTH Cent. 1. Obser. 82. observavit melancholiam & oblivionem: FORESTUS in Respons. Medicis pag. 25. Apoplexiam: ex lochiis non ritè fluentibus phthisin & pulmonum corruptelam CATTIER apud BORELLUM Observ. 11. Paralysin etiam supervenit lochiis suppressis, imprimis in partibus inferioribus; quale exemplum etiam habet THEODATUS in Valent. pag. 112. sicuti etiam ex lochiis suppressis epilepsiam observavit TIMÆUS Vond. Guldenklec in Epist. pag. 26.

#### CUR A.

In tali casu cautus sit Medicus, ne turbet motum naturæ, quem facilius est impedire quàm corrigere, & nisi notabile damnum adferat Excretio lochiorum per aliena loca, semel cepta vestigia ne turbet, sed naturæ motum permittat: sin vero malum aliquod imminet, v. g. si tussi aut hæmoptysi rejiciatur, tunc per externa lochia suppressa revocanda ad uterum, & perversè excretorum lochiorum corrigat fluxum.

### CAPUT III.

#### DE

#### DOLORIBVS POST PARTVM.

Porro præter hos affectus circa lochiorum fluxum etiam mirè cruciant frequenter puerperas post partum Dolores, iique varii, qui ipsi nunc similes sunt Doloribus partus, nunc verò sunt dissimiles: Si sint similes, vocantur Dolores post partum; vix enim est partus, cui non superveniant. Non tamen confundendi sunt varii hi dolores, qui possunt mulieribus à partu supervenire: propterea, qui forsitan superveniunt orificio interno laeso, vel vaginæ uteri laceratæ, illi hæc non pertinent propriè, sed iidem dolores, qui affligunt puerperas post partum in ipso abdomine, sunt propriè illi; adeoque dividuntur in dolores Veros propriè dictos, & Nocthos seu impropriè dictos. Veri sunt, qui affligunt intestina, mesenterium, partesque his connexas.

Dolores veri sunt nihil aliud, quàm continuatus pariendi conatus, dum ex quacunque causa adhuc post partum uterus vel irritatus, vel insigniter læsus, continuato spasmo violento & convulsione se contrahere, & rem irritantem excu-

tere, nititur, & tales Dolores infert: propterea etiam sunt vagi, non continui, sed nunc insurgunt, nunc remittunt, iis similes, quos aliàs percipiunt in partu, & saltim aliquot horas, interdum aliquot dies puerperas vexant. Imò & hi ipsi dolores post partum, interdum atrociores & crudeliores sunt, quàm ipsi dolores in partu, ita ut Patientes dicant, se libentius partum ipsum, quàm dolores hos perferre velle.

Hi sunt veri post partum dolores, similes ferè ipsius partus doloribus.

#### CAUSÆ.

Causa horum dolorum in genere est saltem irritatio uteri, & hinc laboriosus & ferè frustraneus egerendi conatus, seu, ut sic dicam Tenesmus uterinus.

Causa autem, quæ uterum irritare, & eundem in spasmum concitare valet, est duplex: nempe, vel frigus extrinsecus admissum; vel grumi sanguinis in utero retenti, aut secundinæ frustula, vel etiam mola, vel simile quid post partum adhuc in utero restans, quod aliàs excernendum fuisset: Quibus occasionebus uterus irritatus, continuatis sic spasmis dolores superveniunt, speciatim si puerperæ aërem frigidum post partum citò nimis suscipiunt, hinc enim subinde atroces superveniunt dolores. Hoc observavi in quadam muliere, quæ vespere ante partum convivio præsens vescebatur nimio pulmento, Germ. Kombs, hinc nocte insequente, urgente tunc frigore, corripiebatur diarrhæa cum copiosis flatibus, unde iter aut quater læso surgens alvum exonerabat: hinc frigus contraherat, post horam pariebat, peræoque partu integris 24. horis gravibus doloribus cruciabatur, ut etiam diceret, ludum esse pariendi dolores veros, si cum his conferantur. Frigus enim externum, lædendo plus minus uterum, eumque irritando, occasionem præbebat superveniens doloribus; sicut ex eadem causa sanguine grumoso læso & impediatur lochiorum fluxus, unde graves dolores lancinantes, qui reverà conveniunt cum veris partus doloribus aut eisdem superant; quod etiam fit subinde, quando secundina diutius post factum in utero moratur, tunc enim ex frigore externo aëris inflatus uterus admodum dolet, imminuit plus minus lochiorum excretionem. Id quoque similiter fit, quando extrema, v. g. manus vel pedes, nonnihil refrigerati sunt. Par ferè ratio est potius frigidi mox post partum aut saltim in puerperio crebrius hausti; nam & hinc uterus læditur, fere tumidus & quasi inflatus redditur, & plus minus dolet. Vel (2) infert tales dolores post partum interdum plus minus violenta secundinarum, utero firmius connexarum, avulsio, indeque nata uteri læsio & quasi excoarctatio; unde læsus uterus à partu dolet, qui dolores continui, nec lancinantes sed angentes esse solent, & hoc habent conjunctum sibi, quod abdomen, non verò corpus, angant, ut dicant: Senon debere corpus tangere, esse enim quasi parulentum; quod ipsum signum est læsi uteri, & vel à placenta impetuosè avulsa, vel ab excretis ibidem acrioribus, sanguine nempe acriori, saliori, &c. uterum in suo transitu plus minus irritante, & ad dolores stimulante. Quod si autem dictæ causæ concurrant, dolores sunt eò graviores; utut rariores sint, qui ab utero læso, frequentiores tamen ratione frigoris suscepti, vel sanguinis grumosi. Cæterum his causis simul adde flatum, quibus si inflatus uterus, dolores post partum oriuntur cum gravissima regionis hypogastricæ distensione, dicuntque ejusmodi græ: esse ipsis ac si corpus vellet dirumpi.

Dolores verò nocthos & colicis similes, Germ. die falschen Wehen, quod attinet, simillimi sunt iisdoloribus, qui sub mensium difficultate subinde mulieres affligunt, & eandem rationem fiendi & curandi habent: Nempè circa umbilicum tensiones percipiunt, dolores ad cor properant, uno nomine: sunt saltem tormina ventris seu dolores colici & iliaci, aut hypochondriaci, &c. oriundi à dictis lochiorum spasmis quasi hysterici, qui ipsi graviter interdum excruciant mulieres, & excitantur ab excrementis retentis ante partum, vel succis in intestinis effusis, qui ubi effervescent, flatum & tormina inferunt, vel similibus causis, quibus intestina irritantur, atque ita post partum dolores non tam uteri, quàm abdominis partium contentarum inferunt, unde injectis clysmatis faciliè levantur.



## DIAGNOSIS.

Quoad Signa : Puerperæ ipsæ hos dolores & indicant , & nothos à veris faciliè discernere possunt ; partim à loco ; In doloribus enim veris loca abdominis inferiora affiguntur , quia sunt similes genuinis partus laboribus & doloribus , reliqui verò hypochondria , specialiter sinistrum , magis occupare solent , vagi sunt , & modo atrocius , modò remissius cruciant ; quin & ad superiora magis recurrunt , cum veri dolores post partum descendant deorsum ad pubem , & hinc reflexantur ad lumbos : partim à dolore ; in doloribus enim veris est irritatio in utero , ubi dicunt : esse ipsas ac si denuò debeant parere ; si vero uterus sit læsus , dicunt intolerabiles in utero sentire dolores ; si status distendunt uterum , tunc in specie lochia simul suppressa sunt .

Causæ , an sanguis congruatus ? an aer susceptus ? ab antecedentibus , item ab excretis lochiis aliisque circumstantiis & relatione ægræ , faciliè cognosci possunt .

Vana interim est muliercularum persuasio , quasi salubres & admodum proficui sint hi dolores post partum , quatenus lochiorum promoveant fluxum ; quod tamen falsissimum est , quin potius interdum impediunt eundem : quando enim uterus est irritatus , inflatus , aut excoriatus , uterius ejus orificium interius se stringit , lochiaque supprimuntur , & sic dolores fiunt longè acerbiores , subindeque magis excruciant puerperas , quàm veri dolores .

Interdum occasione lochiorum suppressorum exsuscitatur febris cum delirio , adeoque virium defectum & inde varia mala inferunt , ut in ipso partu mulier non adeo debilitata fuerit ; unde potius dolores præcavendi sunt , quàm curandi .

## PROGNOSIS.

Quoad Prognosin : Molestissimi puerperis sunt hi dolores à partu , reddunt illas inquietas , & præter lochiorum suppressionem , graviores si fuerint , ad convulsiones ac deliria , disponunt : imò ex istis doloribus universo corpore commoto interdum occasionem suggerunt , ut febrim contrahat mulier periculosa , in specie summam virium prostrationem post se trahant , unde symptomatis aliis ferendis post impares sunt . Errant ergo hoc in passu mulieres , ceu dixi , quæ dolores hos proficuos , quasi lochiorum fluxum concitantes , putant . Conf. in specie SYLVIVS lib. 3. Prax. cap. 9. ubi prolixè de his doloribus post partum agit , §. 2.

## CURA.

In hac ergo opera danda est , ut dolores maturè removeantur , & sistantur , tam per interna aromatica carminantia , & sanguinis fluxum nonnihil promoventia , quàm per externa fomenta uterina aromatica , uterum , ut vocant , roborantia , succurrendo tamen in specie causis variis . Hinc si malum fuerit ex frigore suscepto , tunc præter remedia ex chamomilla , optimè conveniunt fomenta & litus , in specie suffitus ex nucè moschata supra , ubi de inflammatione uteri , allegatus : Sic SCHENCKIUS libr. 4. Observat. de Puerperis refert , puerperam intempestivè egressam puerperium , contrahis doloribus magnis , suffitu nucis moschatae adhibito , emissio ingenti crepitu ex utero , curatam . Si sint ex retentione sanguinis grumosi vel lochiorum , præter misturam polychrestam supra laudatam nil melius est chetrefolio , cuius aqua & decoctum , ac quoque efus , sanè multiplici usu prodest puerperis : consolidat simul , si quid læsum est in utero , & sanguinis grumosi optimè dissolvit , aliaque retenta ejicit , ac multis scopis satisfacit : addi potest crocus & macis , sic enim magis stimulat , si aliquid ibi contrarium est . In specie convenit sperma ceti à ʒss. ad ʒj. in aqua cardui benedicti vel decocto florum chamomilla exhibitum , nam & hoc talem dolorem ex sanguine congruato curavit TIMÆUS Von GuldenKlee in Casib. pag. 34. Aut ad dissolvendum sanguinem grumofum tale paratur decoctum , quod etiam est experimentum .

ʒ. Rad. Gramin. ʒ.

Herb. Chetrefol. M. j.

Coqu. in aqua fontan.

addendo in fine crocum & macin :

Colatura pro libitu edulcorata S.

Decoctum pro aliquot vicibus .

Estmull. Oper. Tom. II.

Huius potu sanguis grumofus in utero optimè dissolvitur .

Quod si lochia minus bene fluxerint , usurpari potest :

ʒ. Tinctura tartari ʒj.

Ess. Myrrb. ʒj.

M. S.

Essentia dissolvens & leniens .

Dosis guttæ 40.

Si acrior sanguis hos dolores concitaverit , cornu cervi usum convenit , item oleum amygdalarum dulcium recens expressum ad aliquot uncias subinde repetitis vicibus à partu assumptum : Vel

ʒ. Ol. amygd. dulc. rec. ʒj.

Syr. Violar. ʒj.

Aqua Borrag. ʒss.

M. D. S.

Mixtura leniens , cochlearim capienda .

Quod si verò dolores illi sint ab excoriatione vel læsione uteri , tunc præter Misturam polychrestam , vulneraria supra allegata anodynis addita , conveniunt , ut & Corallia & corallata , blanda Martialis & hæmatites , in vehiculo specifico . In genere omnium optimè conducunt , præter semina calida ista carminantia , cumini , feniculi , anisi , carvi , & remedia ex his specifica , qualia etiam utero non incongrua sunt ; semina enim hæc in vino bullita ac propinata optimè conducunt in doloribus post partum , non secus ac semen cumini in cerevisia coctum . Juxta hæc nobile est simplex ad sopiendos post partum dolores uteri chamomilla , quæ par sibi remedium non habet , tam communis , quàm Romana . Decoctum sanè florum chamomillæ vulgaris interne haustum , quo semper tanquam arcano felicissimo usus sit cum successu , commendat FORESTVS lib.

28. Observat. 75. & 81. Confirmant hoc alii , in specie AMATVS LVSITANVS , item ROSENCRÉVZE RVS in sua Astronom. Inferiorum , qui omnes singularissimè hanc chamomillam , ejusque decoctum , nunc solitariè , nunc cum aliis , aliaque remedia contra nimios dolores post partum laudant : Imprimis si accipiatur chamomilla Romana , magis aromatica & volatilis , esset remedium eò magis præsentaneum : unde etiam aqua & essentia florum chamomilla , tam vulgaris quàm Romana , cum spiritu proprio parata . erit egregia ; non minus quàm oleum chamomillæ utriusque destillatum saphirinum mirè conducit , & ad aliquot guttas haustum vix deseret egram aut Medicum . Sic potest etiam in Decocto chamomilla assumi Eliaxr proprietatis , vel essentia Myrrhæ , imprimis dum non rectè fluunt lochia : & sanè creberrimè in doloribus post partum , imprimis quando sanguis grumofus aut lochia suppressa simul aderant , felicissimè cum successu Decocto florum chamomilla , cum cerevisia parato , usus fuit . Aliquando curavi hoc Decocto , in quo ratione lochiorum simul propinabatur Eliaxr Proprietatis , mulierem hujusmodi acutissimis post partum doloribus , cum imminuto admodum lochiorum fluxu , & hinc gravissimis præcordiorum anxietatibus afflictam , magnæ decoctionis residuum regioni pubis simul imponendo , & his ipsis omnis postmodum dolor brevi evanuit : & sanè ab omnibus Practicis hæc ipsa chamomilla extolli solet . Addi potest interdum Artemisia rubra , ut fiat remedium eò magis appropriatum . Juxta chamomillam convenit in specie etiam Lavenulæ decoctum , in vino vel cerevisia pro sopiendis his doloribus . De remediis ex secunda res nota est , quod in his doloribus ex conatu ejicienti oriundis sit singulare & infallibile experimentum , si vel pulvis secundinæ à ʒss. ad ʒj. vel spiritus secundinæ in simili dosi , calidè exhibeatur in juseulogallinæ . Quibus addatur Castoreum cum Myrrhæ sociatum , & omnia ex iisdem parata , essentia castorei , essentia myrrhæ cum tinctura tartari parata , item tinctura hysterica seu anoryma D. Langii ex castoreo & asa foetida cum spiritu vini confecta , quæ sunt admodum proficue item spiritus salis ammoniaci anisatus commodè propinari potest in his doloribus . Juxta hæc est Zedoaria , item galanga , commune muliercularum euporiston , quarum pulvis à ʒss. ad ʒj. in haustu vini calidi assumptus , optimè confert ad nimios post partum dolores . Obstetricis nostræ laudabili consilio ad præcavendos nimios tales dolores propinant post partum panem butyratum , cui pulvis zedoariæ , argiter adspersus , aut saltem in vino calido propinant , subinde etiam repetunt , idque felici cum successu . Ad præcavendos æquè atque sopiendos post partum dolores , iuxta muliercularum plebejarum est aqua seu lotura butyri , quantitate trium cochlearium hausta , admoto naribus pane to-



flo, ne excidetur vomitus: quod etiam duo decies se exper-  
tum habere, dixit mihi experientia ipsa edocta quædam  
mulier; cui nec ignotum est vinum, post partum tepidè  
haustum, mirè refocillare, quæ itidem dolores partus ve-  
ros à nothiis discernere novit, dum élicit: *Dolores nothi  
sursum ascendunt, neque sequuntur partum, sicut veri.*

Præter dicta etiam conveniunt ex *Artemisia*, item ex  
*Matricaria* parata remedia, uti etiam *Angelica*, essentia,  
*Zedoaria*, succini, &c. cum aqua cinnamomi propinata,  
cinnamomum, Zingiber, cardamomum, oleum destilla-  
tum baccarum lauri, &c.

His ipsis non sufficientibus in graviore malo ad opiata, ne-  
cessitate coacti, confugimus, addendo tamen simul, quæ  
nonnihil stimulent, ne lochiorum impediatur fluxus; secus  
enim illa sistuntur: e. g.

24. *Aqua Puleg.*

*Chamomill.* an. ʒi.

*Carmin.* ʒß

*Ess. Castor.* ʒi.

*Ol. Chamom. saphir.* gr. ii.

*Laud. opiat.* gr. ii.

*Ssa. Artemis.* ʒi.

*M. f. Potiuncula,*

Interdum cochleatim haurienda.

*D. S.*

*Mixtura leniens & aperiens pro aliquot vicibus.*

Quod si febricula simul adsit aut superveniat, his commo-  
dè parum de spiritu nitri dulci addi potest.

Sin *Dolores post partum sint nothi*, tormina nempe ab-  
dominis & hypochondriaca, optimo cum consilio applican-  
tur Clysmata ex carminantibus & aromaticis confecta, quæ  
istiusmodi dolore brevi sopiunt. Internè propinetur *Ze-  
doaria*, spiritus carminativus extartaro & nitro, ut & spi-  
ritus salis ammoniaci, & sic etiam subinde evanescent do-  
lores.

Juxta hæc externè in genere conveniunt imprimis in dolo-  
ribus, tam verisquàm nothiis, *Fomenta* abdomini appli-  
cata, paranda imprimis ex *Artemisia*, *Matricaria*, *Pule-  
gio*, *Abfinthio*, floribus *chamomillæ*, *Roremarino*, foliis  
& baccis lauri & juniperi, & similibus aromaticis carminan-  
tibus, in vino vel aqua decoctis; quæ vel intinctis lineis  
vel sacculis inclusa, quàm calidè fieri potest, abdomini ap-  
plicantur. Præmatum obtinet fomentum ex decocto *Arte-  
misiæ*; Hoc ipso enim *RULANDUS in Thesaur.* curavit  
seminam quandam, post gemellorum difficilem partum  
difficillimo dolore matricis in officio cum omnimoda uring  
suppressionè, per multos dies durante, correptam: solam  
scilicet herbam coxit in aqua simplici, quo decocto somen-  
tando uterum externè, malum curavit. Item conveniunt  
*fomenta* suprâ annotata, ubi de Colica:

Vel

24. *Herb. Ruta,*

*Fol. lauriani.* M. ii.

*Summ. Aneth.*

*Flor. chamom.* Rom.

*Samb.* an. Mj.

*Rad. Angel.*

*Leviss.* an. ʒi.

*Bacc. lauri.* ʒi.

*Juniperi.* ʒß.

*Sem. 4. cal. mai.* an. ʒii.

Coqu. in f. q. *Vini*, vase clauso:

Hæc linteamina immersa tepidè applicentur, imponenda  
desuper laterem calefactum.

Item Litus ex oleo cheirino, oleo liliorum alborum, cha-  
mamelino, anethino, lumbricorum; item ex *axungia ca-  
storei* cum oleo destillato spicæ, succini, cumini, angelicæ,  
& baccarum lauri, nisi forte unum horum ægra ob odorem  
non possit ferre: e. g.

24. *Axung. Castorei.* ʒii.

*Olei destill. spicæ,*

*Succini,*

*Cumini,*

*Angel.* an. ʒß. vel gutt. xv.

*M. f. Linimentum:* S.

*Unguentum leniens.*

Quo calidè inungatur umbilicus & regio hypogastrica sub  
eodem repetitis vicibus.

Vel applicentur linimentum, unguentum seu Empla-  
strum, suprâ ubi de suffocatione uterina, & in *Idea Form.*  
*Class. 5. 3.* commendata, Si potest mulier ferre odorata,

*Zibetum* illinatur calidè abdomini, & reiteretur, vel *Li-  
nimentum* mollius ex *axungia gallinarum*, mixta cum oleo  
destillato *chamomillæ*, illinendo abdomini; præsertim  
quando puerperas jam aliquot post partum diebus dolores  
lancinantes & pulsantes in hypogastrio, nunc in altero,  
puncin utroque, vexant. Aut

24. *Ungu. de Alth.* ʒß.

*Ol. Chamom.* ʒii.

*Destill. Chamom.*

*Succin.* an. ʒi.

*M. S. ut suprâ.*

Illinendo abdomini. Applicentur desuper linteamina probe  
calefacta.

Vel applicetur *Emplastrum matricale de galbano*, mala-  
xetur cum oleo destillato *chamomillæ*, & insternatur abdo-  
mini. Vel applicari potest sequens *Cataplasma*, quod & ip-  
sum seu singulare laudatur:

24. *Bacc. lauri pulveris.* ʒi.

*Rad. Alth.* ʒi.

*Calam. arom.* ʒii. vel ʒiii.

Coqu. ad spissitudinem pulculæ in aqua fontana:

adde

*Pingv. Capon.*

*Anserin.*

*Gallina.* an. ʒi.

Subigantur deinde blando igne ad consistentiam  
*Cataplasmat*is spissioris, ut linteo induci, & ita  
pubicalidè applicari possit; ubi refrigerit, subin-  
de repetatur.

*D. S.*

*Cataplasma leniens.*

Nec inconveniens est *cataplasma* ad imitationem *C.O.  
URVEL de Morb. mulierum*, ex radice liliorum alborum  
& cepiscoclis cum farina seminis lini, cumini, addito oleo  
*chamomillæ*: v. g.

24. *Cepas in aqua coctas.* No. iiii. vel iv.

His comminutis adde

*Pulv. sem. cumini,*

*Lini,*

*Flor. chamom.* an. M. i.

*Farin. hord.* q. f.

Cum f. q. aquæ, in qua coctæ cepæ:

*F. Cataplasma.*

Quod applicetur calidè abdomini infra umbilicum.

Sclæra cum butyro frixa, & umbilicali regioni & infra  
eam inunda, quosvis à partu dolores etiam sistit.

Quod si ex inflatione uteri dolores ortum trahant, clysteres  
carminantes ex herba *matricariæ*, *calamintha*, *pulegio*,  
*artemisia*, radice *althææ*, liliorum alborum, &c. (vid.  
*TIMÆUS loc. all. Cas. 30.*) injecti per anum; & suffus,  
imprimis si à refrigerio malum fuerit, ex *nuce moschata* in-  
stitutus, optimè conveniunt: Vid. *HARTMANNUS Pr.*  
*pag. 279.* & *SOLENERANDER Sect. 5. Conf. 15.* Plura su-  
pra dixi, ubi de Uteri Inflatione.

## CAPUT IV.

### DE

### LIPOTHYMIIS PUERPERARVM,

### ET

### VTERI SUFFOCATIONE.

**P**ORRò *Suffocatio* seu *Strangulatio uteri* gravior, ut vo-  
cant, sæpè mox à partu, interdum aliquot post par-  
tum diebus, affligit puerperas, eaque duplici modo: Inter-  
dum enim mox à partu *lipothymia* imminet, ac tunc dor-  
mire volunt, quod ipsum reverà est *Passio Hysterica*: vel  
*Passiones* tales *hysterica* superveniunt postmodum in cursu  
puerperii, atque sunt vel solitariae, vel coniunctæ aliis  
morbis.

Prius si sit, optimum est, ut utamur saltem sale quodam  
volatili: v. g. solus spiritus salis ammoniaci cum liquore  
cornu cervi succinato in vehiculo calido dissipat imminentes  
*lipothymias* hystericas, repetendo aliquoties, donec mulier  
evadat immunis. Verùm si posterius sit, nempe *passiones  
hystericae* in cursu puerperii, vel complicatae cum aliis affe-  
ctibus, est malum difficilius, partim quia non potest facile  
cognosci ob alios morbos, partim quia incuria respectus ha-  
bens



tendunt ad ipsum partum: Nempè si aliquot dies à partu tales superveniunt *suffocationes uteri*, hæ ipsæ imprimis se manifestant maximis cordis anxietatibus, & insigni compressione præcordiorum, cum difficili respiracione, adiuncta symptomata abdominis vel pauca sunt vel nulla, nisi postmodum tandem superveniant; adeoque, ut interdum quibusdam pro alto affectu imponat, & ipsæ interdum puerperæ nesciant, se laborare hysterica passionē.

## C A U S A.

Imprimis excitatur hoc symptoma, si pro cura alius affectus propinantur remedia aut dulcia, aut aliis ingrata & fastidiosa; tunc enim subito solet excitari hoc ipsum *trædum*, & supervenire illi angustia. In specie verò apud nostras mulierculas cum purpura imminente & erumpente se solet frequenter coniungere, adeò ut nesciamus sepè, an febris & purpura? an hysterica passio magis excruciet puerperam?

## D I A G N O S I S.

Interim tamen in *passione hysterica anxietates præcordiorum* affligunt circa regionem stomachi & hypochondriorum; quibus verò imminet *purpura*, conqueruntur simul de *difficili anhelitu*, non quod thoracis motus impediatur, sed quod *pectus repletum sit*: Dicunt, *totum pectus ipsis esse repletum*. Quod ipsum fit ex aliqua sanguinis stasi, propter *vitiatam fermentationem* circa præcordia.

## C U R A.

In tali ergo casu, utut præter absorbentia & remedia ex castoreo ac myrrha, optima essent clysmata, quæ ipsa etiam talem hysterica passionem subito tollunt, tamen ubi purpura incipit erumpere, cavendum studiosè ab omni evacuante, aut alvum stimulante, idque èd magis, si purpura fuerit alba, Germ. *der Weiße Friesel*; nam rubra minus est periculosa. Vbi ergo suspicamur, esse complicatam *passionem hysterica cum imminente purpura* aut alio morbo *acuto*, aut adjunctus est aut intensus calor cruciet puerperam, simus cauti in remediis volatilibus exhibitione; quia non semper eadem ferunt morbi *acuti*. Potius ergo, cum semper simul habenda sit reflexio ad lochiorum fluxum, *temperata*, e.g. castoreata, hinc myrrhata, ac denique ex succino, quibus semper simul fixa temperata ex matre perlarum, antihædico Poterii, antimonio diaphoretico, cinnabari antimonii & similibus, item salia fixa, cardui benedicti, &c. cum myrrha, salibus volatilibus, cornu cervi & succini, sociata, usurpari debent, ut ita utrique affectui urgenti, nempe *passioni hystericae, & morbo acuto*, vel imminenti vel præfenti, simul occurramus. Propinanda sunt in aqua hirundinum cum castoreo: Vmbilico verò inungatur oleum succini, cum quo probè subactum sit parum castorei. Res mira in tali casu, dum in hysterico paroxysmo probè contestæ tales mulieres sudant, si illis propinetur subinde, quod necesse est fiat, cochlear unum vel alterum aquæ hirundinum cum castoreo, subito stimulat urina, & inficæ subinde stragula permingunt. In tali casu, ubi est hysterica passio cum erumpente purpura, præscribi potest talis pulvis: Nam potulenta, dulcia, &c. instar diaboli fugienda sunt: V.g.

℥. Ebor. sine igne,

Antimonii diaphor.

Specif. Cephal. vel Cin. antimonii an. ʒi.

Myrrh. elect. (ratione lochiorum & ratione purpure: nam myrrha est appropriatum remedium febrium purpuratarum)

ʒss.

Castor. gr. vi.

Sal. vol. Cornu Cervi,

Succini an. gr. ix.

M. f. Pulvis pro tribus dosibus: S.

Pulvis matricialis.

Propinatur in aqua hirundinum cum castoreo, acuata cum tantillo de essentia castorei. Est pulvis nauseosus, sed bonus; nam & purpuram promovet, & hysterica passionem sistit, & lochia stimulat.

Aliàs ubi nullus metus est purpure, volatilia oleosa ca-

storeata vel sola sufficiunt, modò observetur, quod vel solæ anxietates præcordiorum, citra sensibile abdominis symptoma, sufficiant pro passione hysterica. Item vitentur omnia dulcia in puerperis.

## C A P U T V.

### D E

## INSULTIBUS EPILEPTICIS PUERPERARUM.

Porrò interdum mox post partum, aut suppressis lochiis, aut interdum etiam ritè fluentibus lochiis, sed cum suffocatione quasi hysterica superveniunt *Epileptici insultus*; qui ubi adsunt, nisi subsit singularis malignitas, sæpius vitium lochiorum subito suppressorum, aut hysterica passionis plus minus manifestæ præsupponere solent, vel hanc sibi comitem adsciscunt: sicut etiam TIMÆUS von Gulden-Klee, in *Epist. pag. 26.* Epilepsiam ex retentione lochiorum observavit.

## C U R A.

Convenit ergo in hoc casu, præmissa tamen vel omissa, venè in talo sectione, imprimis liquor cornu cervi succinatus, qui utriusque scopo satisfacit, cum castoreatis propinatus, Conducit etiam Essentia hysterica D. Langii, quæ hæc est commendata: aut ex myrrha & castoreo parata essentia cum spiritu salis ammoniaci oleoso; aliaque castoreata & myrrhata cum volatilibus mista, sunt experta: aut saltem usurpentur antimonialia fixa, præsertim cinnabaris antimonii cum succinatis volatilibus mista; sic namque ex utriusque connubio aptissimum pro epilepticis puerperis habetur remedium, subinde reiterandum.

## C A P U T VI.

### D E

## GRAVIDARUM CEPHALALGIA, VIGILIIS, ET DELIRIIS.

Par ratio est, si *Vigiliae, Deliria* ac similia *Pathemata Capitis* ac nervosi generis, superveniunt puerperis; in his enim primariò ad lochiorum fluxum respiciendum venit; Sic SALMUTH Cent. 1. *Observ. 82.* refert melancholiam & oblivionem puerperæ ex lochiis retentis: FORESTUS in *Resp. Med. pag. 25.* observat puerperam ex non ritè fluentibus lochiis apoplexiam incurrentem, clysteribus & venæ cephalicæ sectione curatam.

Quod si Vigiliæ comitentur febres acutas, levantur optimè per medullam crurum vituli temporibus bis vel ter illitam. Opiata non faciliè usurpantur.

## C A P U T VII.

### D E

## PUDENDORUM EXCORIATIONE.

Fit interdum etiam, ut in partu, idque imprimis difficili & violento, contendantur, excorientur aut lacerentur *Pudenda*; in quali casu in specie prodest, si oleum hyperici & rosatum misceantur cum ovis integris probè coctis, & sub forma *Linimenti mollioris* applicentur.

## C A P U T VIII.

### D E

## TUMORE PUDENDORUM.

Iuxta hanc pudendorum excoriationem, evenit interdum, ut in partu, vel primo vel difficili, ex dilatatione nimia & quasi fibrillarum & membranarum laceratione oriatur *Tumor inguinum & pudendorum*, & aliqualis eorum inflammatio, aut saltem tumor edematofus post partum, quod vocant, Germ. *Matricem esse turgidam*.



## C U R A.

In tali casu convenit oleum verbasci & chamomillæ: imprimis fons ex floribus chamomillæ & sambuci in vino & aqua coctis, quicum linteis calide & crebro applicatus difficit tumorem. Vel recipiatur *Beccabunga viridis* contusa (est enim succulenta) cum floribus chamomillæ, quæ calide instar cataplasmati imponantur pudendis tumidis; sic enim etiam cessare solet pudendorum tumor. Item herba *Meliloti* cum semine *sanugraci* in fons forma usurpata admodum laudatur à PAULI in *Quadrip. Botan. ubi de Meliloto*.

## C A P U T I X.

## D E

FISSURIS LABIORUM  
P U D E N D I.

**I**n Fissuris & laceratione labiorum vulvæ ac orificii uteri exterioris à partu difficiliore, usurpant nostrates Decoctum raparum exsiccatum in Torgaviensi cerevisia, cum butyro pauco non salito: Hoc decocto eluunt, mundificant & purgant partes læsas, quod etiam convenit in pudendum excoaratione. Optimè etiam convenit Emplastrum sequens:

- ℞. Cera alb. ℥ss.  
Ol. Amygd. dulc. ℥i.  
Liquescis addo  
Bals. Peruv. ℥iii.  
Misc. pro Linimento,

agitando donec refrigerat, & plumaceolis applicetur in loco affecto:

## D. S.

Unguentum sanans.

In maioribus verd fissuris:

- ℞. Ol. hyperic. ℥ss. vel Bals. Peruviani ℥iii.  
Axung. porc. ℥ii. vel ℥iii.  
Ol. vitell. ovor. ℥iii.  
Terebint. Venet. ℥i.  
M. f. Balsamus. S.  
Balsamus sanans.

Applicetur cum plumaceolis intinctis, Germ. mit gescheten Fasgen, didis fissuris.

## C A P U T X.

## D E

RUPTURA VULVÆ SEU  
P E R I N Œ I.

**V**ersamur adhuc in symptomatibus, quæ post partum, tam naturalem quam præternaturalem difficilem, solent subsequi subinde: juxta quæ etiam puerperas grave affligit malum, quando nempe interdum in primiparis, vel ex angustis viarum, vel ex partu difficiliore, vel à grandiore scitu, contigit *Ruptura Perinæi*, seu spatii, quod est inter rimam vulvæ & anum, ita ut hi duo sinus efficiant unum idemque foramen.

## P R O G N O S I S.

Affectus, si quis alius, est molestus & dolorosus, qui non sit tractatus, facile in inflammationem, hinc gangrenam degenerat, & ita mortem infert.

## C U R A.

Malum hoc nunc est recens, nunc inveteratum, ita ut loca disrupta jam cicatrices contraxerint. Recens si fuerit, ante omnia vulnus recens elvatur cum Decocto calido pruni sylvestris, in quo dissolutum sit rob acaciæ, sic labia loci rupti adstringendo non nihil uniantur: hinc sutura conjungenda, sive cum filo confuantur, sive mediante sutura per glutin adstringens, Germ. ein Heft pflaster, linteo induendum, & utrinque labiis ruptis imponendum; quæ ubi probe cohererint, per anulas mutuo colligantur, & ita unienda: Factà conjunctione imprimis convenit radix consolidæ

majoris, si scilicet pulverisata saltem inspergatur, aut miscetur cum albumine ovi, & ita rimæ in spatio illo factæ blandè illinatur, aut cum filamentis carptis imponatur; sic enim breviter fit consolidatio foraminis. Affirmant quidam intra viginti quatuor horas fieri; sed vix credo, esset nimis cita curatio. Alii faciunt cataplasma ex decocto radicis consolidæ majoris cum herba verbasci, quo cataplasmate applicato curare volunt hoc ipsum vulnus, situando ita puerperam, ut clunibus elevatis, cruribus & pedibus probe angustatis, supina continuò jaceat ad octo vel novem dies, vitando omnem motum tussis, sternutationis, & similem. Vel cum plumaceolis subinde immittatur balsamum quoddam vulnerarium; v.g. balsamus sulphuris ad extra, nunc solitarius, nunc cum balsamo Peruviano imponitur; aut solus balsamus Peruvianus, qui si fuerit acrior, diluatur cum vitello ovi; aut imponatur balsamus sulphuris terebinthinatus, promptè consolidans, aut alius expertus balsamus in vulneribus recentibus, cum oleo hyperici aut momordicæ, donec perfectè fuerit consolidatum, agrà interea ab omni motu corporis abstinente, & quieto in loco jacente. Optima methodus medendi est, quam docet in *Cas. Medicis. T. I. MÆUS von Guldenklee, lib. 4. Cas. 31. pag. 130.* ubi solo glutine, utrinque labiis rimæ ruptæ applicato, curavit talem *rupturam* citra balsamum vulnerarium. Descriptio est hæc:

℞. Pulv. rad. Consol. mai. ℥ii.

Boli Arm.

Massich.

Sangu. dracon.

Sarcocoll.

Farin. volat.

Pompholyg. an. ℥i.

Cum resina pini & album. ovi q. s. misc. pro Glutine.

Quod si accidat, ut ex urina effluente, & neglecta ruptura immineat gangræna, quale exemplum refert RULANDUS in *Thesaur. tunc* abscissa parte gangrenosa applicetur crebro aqua calcis vivæ cum linteolis duplicatis, sic gangræna sistetur: quo facto, illinatur balsamus sulphuris terebinthinatus, ut pars gangrenosa consolidetur.

Sin verd jam inveterata fuerit ruptura, ita ut utrinque cicatrices jam sint adpatæ, cura ad eum modum, quo labiorum leporinorum cura, instituenda venit, vulnerando aut leviter exulcerando labia cicatrifata, hinc consuendo eadem, & cum balsamo vulnerario consolidanda. Conferatur hic VIARDEL in suo libro *Obstetricum cap. ult. p. 170.* Aliud curiosum casum & singulare exemplum rupture vulvæ ad anum habet GUILLEMEAU in *lib. 3. cap. 7 de felici Tuerperio*, quæ ruptura neglecta cicatrices induxit, ita ut unum foramen remanserit: Interim mulier denuò concepit, & postmodum sequente partu ab eo fuit curata eodem modo, quo labia leporina curari solent, scilicet abscindendo primò pellem cicatrifatam, post per filum circa anum transfixum denuò ductum labia uniendo, & postmodum in extremitatibus levibus suturis conjungendo, & pro consolidatione hocce balsamum Elemi compositum, mediante quo curabatur, applicando:

℞. Gum. Elemi ℥ii.

Terebint. Venet. ℥iii.

Ol. hyperici ℥iij.

Sangu. dracon.

Myrrha.

Aloes an. ℥i.

Liquefiant omnia simul,  
& f. l. a. Balsamum.

## C A P U T XI.

## D E

INFLAMMATIONE UTERI CUM  
G A N G R Œ N A.

**P**orro in difficiliore partu ex contusione & laceratione uteri subinde huius inflammationem cum gangræna & sphacelo supervenire, supra dictum. Quod si hoc fiat in ipso utero, conveniunt. Iniectiones, qualem dedit VIARDEL in libro *Obstetricum, cap. 24. & quæ supra cap. 1.* fuerunt infusa, ubi de retenta & putrescente secundina.

Vel

℞. Herb.



24. Herb. laſſuc.

Nymph.

Plantag.

Scord. an. M.l.

Coqu. in ſ. q. ſeri laſſis, vel in laſſe.

ipſo:

Colatura

D. S.

Lac inſpergendum.

Sed ſi mala hæc ipſum uterum afficiunt, raro curari eundem arbitror, quin potiùs intereant puerperæ: ſin verò partes exteriores affligantur, imitari poſſumus RULANDUM, qui gangrænam vulvæ curavit præſcindendo quotidie partes, utpotè carnes emortuas: Poſt præſciſſionem, affecta loca mundificavit intus & extus aquâ calcis vivæ, mundificatas & linæolis ſecatas partes ungebat oleo ſulphuris ſuo, poſtea deſuper applicabat emplaſtrum diaſulphuris, quibus dolor mitiùs agebat, & partes corruptæ in dies conſaneſcebant: vel ſortes è profundo faciendæ ſunt inciſiones, hinc inſtituenda ablutio cum vino, melle, ſale & aceto, hinc linimenta mundificantia uſurpanda. Vid. RIVERIUS Obſerv. 22. & 23. communicata à FOMIO.

## CAPUT XII.

DE

### HÆMORRHOIDIBUS CÆCIS.

**P**orro in quibuſdam *Hæmorrhoides cæcæ*, à partu prorumpere incipiunt, & doloribus acerbis puerperas affligunt, tam internè quàm externè. Non ſtatim applicandæ ſunt hirudines, quod quidam faciunt, ne per derivationem lochiorum impediatur fluxus, ſed potiùs dolor ſiſtatur hoc ſotu:

24. Flor. Chamomill.

Verbaſc.

Sambuc.

Herb. linar. an. Miſſ.

Miſta & concifa ebulliant in laſſe:

Colatura D. S.

Lac lentur.

Partim ſub forma fomenti uſurpetur, partim ſpongia decocto imprægnata ano applicetur.

Item radix fabariæ vel ſcrophulariæ recens in dorſo ſuſpenſa convenit:

Vel

24. Ol. Verbaſci ʒiſſ.

Expr. ſem. Papav. ʒi.

Ceruſſ. ʒß.

Camph. gr. iſſi.

Miſta probè ducantur in mortario plumbeo pro Linimento:

D. S.

Unguentum leniens.

Applicetur crebrò.

## CAPUT XIII.

DE

### ALVO SUPPRESSA PUERPERARUM.

**P**orro ſuperiùs dixi, alvum puerperis eſſe ſæpiùs ſuppreſſam, quæ tamen nullo modo acrioribus eſt irritanda: Curam ſuprà ſimul, ubi de ſymptomatibus gravidarum, exhibui. Sufficiunt, ut monui, pilulæ peſſilentiales Ruſſi, aut paſſulæ laxatiivæ, ſi eas propter dulcorem ferunt puerperæ; ad ſummum, ſuppoſitorio uſitato leniore ſtimulanda eſt alvus: fortiora ante nonum aut decimum quartum à partu diem vix tutò uſurpari poſſunt.

## CAPUT XIV.

DE

### DIARRHOEA PUERPERARUM.

**C**ontrarium hoc & periculoſum vitium eſt, quando puerperis ſupervenit *Diarrhœa*, ut plurimum, niſi fuerit à cauſa externa, ſuneſta & lethalis; nam interdum puerperæ ſunt nimis ſiticolæ, & bibunt frigidum potum, parum quidem unâ vice, ſed crebriùs, unde ſupervenit tandem *Diarrhœa*, quæ à tali maniſeſta cauſa non eſt adeò periculoſa, niſi forſan in adiuncta purpura, & petechiali febre ſimilive caſu retroceſſum excernendum inducat; nam in hoc caſu eſſet admodum periculoſa.

CURA.

Hæc *diarrhœa* à potu copioſo, in ſpecie ſi frigiduſculus hauriatur, ſiſtitur inungendo umbilico & regioni ſtomachi oleum deſtillatum Macis, cum oleo deſtillato ſuccini: (poſterius additur, ne odor gratus macis hyſtericam paſſionem excitet). Item propinentur ova ad duritiem cocta, quibus parum pulveris nucis moſchata recentis inditur; Nam hæc denuò *diarrhœam* ſupprimunt. Puerperis imprimis malignè febrientibus primis poſt partum diebus frigidus potus, ceu peſſilentiffimus, eſt fugiendus. Hauriatur potus uliratus & ordinarius, & quantum fieri poteſt, tepidè aut nullo modo frigidè, & ſimul diſſolvatur in eodem gelatina cornu cervi ſimplex, ubi nullus adeſt æſtus corporis, gelatina verò cornu cervi acida, ubi æſtuatio febrilis ſimul adeſt: nam potus tepidè hauſtus promovet lochia, addita gelatina cornu cervi malignitati ſæpiùs latentè obſtram venit, & corpus in blanda diaphoreſi ſervat.

Imprimis in *Diarrhœa* puerperarum duæ circumſtantiæ ſunt conſiderandæ:

1. An ritè fluant vel fluxerint lochia?

2. An adiunctus ſit morbus acutus malignus.

In utroque caſu cautus ſit Medicus. Si ſuperveniat *Diarrhœa* lochiis rectè fluentibus, ſiſtenda venit, in ſpecie blandis ſudoriferis, & ſimul ſtypticis: ſi verò vel non manant, vel non ſufficienter fluxerunt, relinquenda. Interdum enim ſit, ut *Diarrhœa* oriatur aut potiùs ſuperveniat lochiis ſuppreſſis, naturæ conatu admodum ſalubri, quæ interdum, ut ſe ipſam liberet, *diarrhœam* inſtituit loco ſuppreſſionis lochiorum: quale exemplum videbitis in BARTHOLINO Centur. 2. Hiſtor. 19. Cum ergo interdum lochia per *diarrhœam* ſoleant evacuari, propterea talis *Diarrhœa*, ubi lochia vel non, vel non ſufficienter fluunt, niſi ſit nimia, aut niſi nimis debilitet ægram, adeòque quamdiu durat cum appetitu integro, nullo modo eſt ſupprimenda; potiùs propinando lochia ſtimulantia, horum fluxus aut revocandus, aut ſaltem, ut promptior per alvum fiat ſimilis excretio, ſtimulandus. Sin verò febris maligna à cauſa interna, eſſeſcentis cutaneis, &c. ſuperveniat *Diarrhœa*, reſeſt periculoſiſſima, & quia impeditur eadem naturæ motus, propterea venit curanda, atque tunc externè aromaticis, internè præcipitantibus ſudoriferis fixis, nonnihil ſtypticis, malo obſtram eundem eſt, ut ita beneficio ſtypticorum alvi fluxus ſiſtatur, per ſudorifera verò eliciantur recrementa, cauſa *Diarrhœæ*. Conveniunt ergo cornu cervi uſtum, terra ſigillata, magiſterium coralliorum cum ſucco citri, quibus pro circumſtantiarum ratione addendum eſt nonnihil de laudano opiato, imprimis ubi lochia ſufficienter fluxerunt; ſic enim prohibetur cauſa motus, & cauſa ipſa per ſudorifera evacuat; ſtyptica verò fluxum ſiſtunt, & *diarrhœam* compeſcunt. Subinde intermiſcenda ſunt Cydoniata blanda, ſtomachum & inteſtina modicè adſtringentia.





## CAPUT XV.

## DE

INCONTINENTIA URINÆ  
PUERPERARUM.

**P**orro fit interdum in laborioso partu, ut foetus grandior, nimis distendendo vaginam uterinam, adeo distendat collum vesicę urinarię, vaginę uterinę insertum, ut ex hujus distensione puerperę continere nequeant urinam: id quod, præter talem distensionem, accidit etiam interdum vitio obstetricum ignararum vel incautarum, male digitis genitalia tractantium, in specie carunculam istam myrsiformem majorem, isti vesicę orificio in vulva instar pessuli oppositam, & simul sphincterem vesicę, lacerantem, vel alio modo ludentem: vid. HILDANUS Centur. 6. observ. 39. SALMUTH Cent. 1. observ. 69.

## PROGNOSIS.

Sevissimum hoc symptoma ratione molestię est, quando parturientes tractantur ita, ut simul lædatur *sphincter vesicę*, & urina cohiberi non possit; exinde enim excoriantur & exulcerantur pudenda, malum est difficile, aut si inveteratum, non curabile: vid. HEINRICVS ab HEER Cent. 1. obs. 14.

## CURA.

Talis urinę incontinentia ex fibrillarum laceratione aut nimia distensione orta & recens curatur imprimis per socus aromaticos nervinos, fibras læsas in naturalem tonum restituentes. Fiunt scilicet decocta aut sacculi decoquendi ex foliis lauri, rosismarini, pulegii, origani & similibus, quę in vino cocta instar fori vel sacculorum applicantur pubi, item lintea humectata intruduntur vaginę instar parvorum pessorum, ut ita fibris nerveis læsis in vagina & orificio vesicę, redeat suus tonus. Alii Autores infusis & balnea ex nervinis, additis adstringentibus, instituunt. Item conveniunt injectiones adstringentes vulnerarię, iinimenta & similia, imprimis unguentum de catellis, quod habet SENNERTVS *Prax lib. 4. Part. 2. sect. 7. cap. 9. ubi de Morbis Mulierum*, & inter hos de hoc symptomate; aut oleum ab HORSTIO *lib. 5. obs. 25. laudatum*, singularissimum experimentum est in tali casu, quod *busones* legitimo tempore occisi, vel vivi, in olla nova calcinati & appensi, ut immineant regioni stomachi, hanc urinę incontinentiam sistant & compescant, teste non tantum experientia, HEINRICI ab HEER *Observat. 14. sed præterea etiam BOYLE in sua Philosophia Experimentalis similem in Anglia factam experientiam notat pag. 216. Jam verò BOYLE est Autor fide dignissimus, de quo nullum est dubium. Certum est, quod inveteratum malum ferè incurabile sit, nisi forsitan Theriacę, de quibus tamen adhuc dubito, aliquid conferant; Sphincter enim læsus vix cicatricem contrahit, unde vix curari potest hoc malum.*

## CAPUT XVI.

## DE

## SUPPRESSIONE URINÆ PUERPERARUM.

**C**ontrarium vitium *Urina retentio* est, quando interdum supprimitur urina in puerperis, quando, quod rarius est, tumet nonnihil vagina uteri aut collum vesicę post partum laboriosum; aut, quod frequentius accidit, fit talis suppressio aliquot à partu diebus, dum sanguinis quidam grumi circa vesicam in vagina uteri hærent, aut etiam in vicinis locis in vasis sanguis stagnat & grumescit, à quibus grumis impeditur urinę excretio, ut non fiat aut fieri possit, nisi cum summo excernendi conatu, postmodum, verò, si resoluti sint tandem grumi isti, sponte denuò urina fluit.

## CURA.

Intall suppressione urinę à partu externe inunctio cum oleo scorpionum, pubi & vesicę regioni illito, convenit, aut applicentur somenta ex simplicibus sanguinis grumos resolventibus & urinam stimulantibus, v. g. ex parietaria, ex cheresolio, ex floribus chamomillę, cum radice rubię tinctorum: quibus si addantur lumbrici contusi, aut oleum lumbricorum, erit eò melius: Hinc

24. *Herb. Parietar. M. ii.*

*Cheresol. M. i. vel iß.*

*Flor. Chamomill. M. i.*

Incisa coquantur ad consistentiam poltis;

cui adde

*Butyr. rec. non salis. ʒi. vel ʒii.*

*Ol. Scorpion. ʒß. ad ʒiß.*

*Terebinth. vel Junip. ʒiß.*

M. D. S.

*Cataplasma urinam promovens.*

Imponatur calidè regioni pubis, & desuper adhuc operculum calidum.

Interne quando sanguinis grumus urinę impedit excretionem, in tali casu post usum sanguinem grumosum dissolventium, imprimis decocti cheresolii cum spermate ceti, denuò urina fluit. Reliqua ad sanguinis grumos dissolvendos nota sunt ex *suprà dictis articulo primo Capit. 1. de lochiorum fluxu imminuto post partum* ex sanguinis grumis. Convenit item emulsio seminis violarum cum aliis usurpata.

Ceterum præter interna conveniunt etiam *Clysmata* acquirra & similia injecta, alvum laxantia & fortiter stimulantia; nam ab his stimulatur etiam sanguis stagnans, non minus quàm urina restitans.

## CAPUT XVII.

## DE

## VENTRIS RUGIS.

**C**onqueruntur etiam sæpè Puerperę, imprimis delictiores, de rugis ventris post partum: quę cum perquam tediose sint illis, fiat unguentum ex spermate ceti cum oleo nucisę expresso, cera & paucis croco, mixtis in consistentiam unguenti vel emplastri, calidè abdomini applicandi, quod abdominis rugas optime delet & corrigit; vel adhibeatur emplastrum de spermate ceti *Myrsichti*;

Vel

24. *Cera nov. ʒiii.*

*Sperm. Ceti ʒiß.*

*Terebinth. ʒi.*

*Olei amygd. dulc.*

*Hyperici an. ʒi.*

*Myrtin.*

*Mastich. an. ʒß.*

*Serv. cervin. vel medull. crur. bubul. ʒii.*

M. f. Vngu. S.

*Unguentum singulare.*

## CAPUT XVIII.

## DE

## FEBRIBVS PVERPERARVM.

**R**estant adhuc duo primaria symptomata *Puerperarum*, nempe *febres*, & *morbi acuti*; ut plurimum febres continuę & acutę, raro absque malignitate, & præ aliis affectibus specialiter periculosę vel infestę, vel communes sunt omnibus puerperis, vel saltem quibusdam particulares.





ARTICULUS I.

DE

FEBRE LACTEA.

**C**ommunis omnibus est Febris lactea ita dicta: Nempe à partu successivè mammae turgent, colligitur in lisdem colostrum seu serum lacteum, donec, dum perfectum lac in lisdem generari incipiat, ordinariò sub primo lactis propriè sic dicti in mammas impetu, circa tertium aut quartum diem à partu præter propter, supervenit simul febris, quam vocant Lacteam; tunc enim, à proventu hujus subitaneo levi horrore concutiuntur (tertio vel quarto die est horror, quando venit colostrum, & postea venit lac) postmodum insequitur æstus continuus moderatus, biduum vel triduum durans, & circa nonum, interdum septimum à partu diem, blando sudore & madore faustò finitur. Nihilominus tamen observatum etiam est, quod hæc febris lactea subinde pro subjecti & circumstantiarum varietate, variare soleat, & demum septimo, imò nono die à partu superveniat, utut jam antemammæ lacte turgidæ conspiciantur.

CAUSÆ.

Oritur ex materia lactis, quæ aliàs per uterum ad fœtum pro nutrimento derivata fuit, quæ sub uteri contractura, ysaforumque clausura regurgitat ad massam sanguineam, in eaque motus hujusmodi inordinati febrilis occasionem præbet, donec deposita eadem in mammas, hinc successivè, excretæ, & ita continuò promotæ, febricula cesset, id quod sub turgescentiæ motu simul ex massa sanguinea secretum, fuit, per sudorem tandem excerpitur: conf. WILLISIUS de Febr. cap. 16. Per fermentationem enim & per præcipitationem aliquam lac disponi, ut faciliùs à sanguine secedat, præter febrem ipsam lacteam inde constat, quod fœminæ lactantes mox, antequam ad mammas deferatur, sitim quandam & phlogosin percipiant; quam sitim, licet nonnulli à feri seu succi nutritivi detractiōe & ad mammas depositione deducant, quia tamen illa sitis, antequam, mammae turgescant, tales affligit, tunc scilicet, quando intra vasa adhuc hæret secernendum lac, imò postquam hæc secretio facta denuò cessat; ab agitatione fermentativa potius, hancque excipiente præcipitatione seu secretionē solâ, hæc sitis derivanda erit.

Plura de hac febre non addo, cum raro aut nunquam cadat sub praxin Medicam, & quæ de eadem notata sunt digna, eadem in specie à WILLISIO loc. alleg. sufficienter declarata sunt: sicuti etiam hic WILLISIUS optimus & solus ferè est, qui aliquid laudatū dignum scripsit de febribus Puerperarum. Hoc saltem moneo, observandum esse, non tantum febrem hanc lacteam ordinariò oriri sub primo lactis in mammas impetu terciâ & quartâ à partu die, sed si casu fiat, ut lac in mammas vel non exsugatur, vel aliâ ratione in corpus ex mammas regurgitet, tunc simili quoque ratione & rigorem & subsequentem æstum non levem inferre, itidem per sudores discutiendum, aut lactis continuata exsuctione curandum.

Et hoc saltem colligitur, quàm proficius sit sudor puerperis, ita ut, quando à partu mox madere incipiunt, & mador talis plus minus copiosus postmodum continuet per aliquot dies, in specie usque ad septimum vel nonum, hoc ita conducere puerperis, ut per reliquum puerperii tempus incolumes sint, aut licet interdum febres aliæ etiam superveniant, tam malignæ quàm purpuratæ aliæve, tamen, modò corpus continuò maceat, has ipsas faciliores fore: & contra dum sine madore sunt puerperæ primis à partu diebus, vix sine febribus aut aliis gravioribus symptomatibus puerperium transigunt.

CURA.

In febre ergo lactea curanda natura sibi ipsi ferè prospicit, per sudorem quasi criticum malum levans. Pro levando tamen malo, si quid agendum, optimum est, ut sudor blandè promoveatur, & lochia nonnihil stimulentur, & sic citiùs evanescat febris hæc lactea. Observandum autem, an lactare velit mater? an secus? Si prius, lochia non stimula sunt; sin verò posterius, proimminuendo lactis quan-

to lochia ed copiosius movenda. Ut ergo compescatur æstus & concurrens cephalalgia, quin & diaphoresi blandâ magis ventiletur massa sanguinea, hunc pulverem ordinare soleo:

℞. Antimonii diaph. gr. xv. ad ℥i. vel 3℥.

Myrrh. el. gr. iv. v. vel vi.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis sudoriferus.

Propinetur ægræ prodosi, subinde repetendus, blando sudore & lochiorum fluxum promovendo hanc febrem finiens, nisi puerpera in laboribus partus vel post partum largiter sudarit, aut lochia sufficienter fluant.

Vel

℞. Lapill. cancr. præp. vel antimonii diaphor. ℥i. ad 3℥.

Salis Absinth. vel Card. Bened. ℥ss. ad gr. xli.

Myrrh. el. gr. v. vi. vel vii.

M. div. in 2. part. æqual.

D. S. ut suprâ.

Item Mixtura polychresta supra laudata optimè quoque convenit.

Quodsi verò fiat, quod non rarum est, ut ingruebat hæc febre die quarto simul angustia præcordiorum & difficilis respiratio oboritur, ex eo, quod tunc uberius lac turgescat in sanguine: tunc præter dicta utilis est emulsio ex seminibus expellentibus cum antimonio diaphoretico, v. g. ex semine cardui benedicti, napi, aquilegiæ, &c. cum paucis myrrhæ, additâ antimonii diaphoretici sufficiente quantitate. Hac emulsione dicta præcordiorum pathemata & febris lactea facillè evanescunt.

Mulier quædam juvencula secundâ vice puellam enixa, à partu optimè se habebat, & cum ipsa infantem prima vice lactasset, secundo partu laboris pertæsa nutriti negotium committebat: Sed die saturni, à partu nono, media nocte, intento corripiebatur æstu, cum siti, cephalalgia & anxietate, mammae antea lacte moderate repletæ immensum turgabant, & tumebant, dolebant & indurabantur: appetente aurora prædicta, præter mammarum symptomata, per levem sudorem evanescabant, superstite saltem insigni virium prostratione, appetituque deiectione. Die solis vocatus, præter externa mammis imponenda, præscripti sequentes pulveres;

℞. Cornu cervi sine igne 3℥.

Salis Absinth. ℥ss.

Myrrh. el. gr. vii.

M. f. Pulvis pro duabus dosibus.

Quarum unam ægrâ à meridie hora tertia capiebat.

Verum omnia supra dicta symptomata cum simili ferocia redibant & ad mediam noctem perdurabant, quoties porè alteram dosin sumere debuisset; dubitabat tamen, an hoc facere debeat? Die lunæ insequente melius habebat, mammae minus dolebant, lac per papillas effluebat, nox insequens quæta erat: sicut & die Martis horis antimeridianis optimè habebat: A meridie præscripti hunc pulverem:

℞. Lapill. cancr. præp. ℥i.

Salis Absinth. gr. xli.

M. prodosi:

Quem hora prima capiebat; & circa vesperam hora quinta ex improviso gravi horrore per horam durante corripiebatur, æstus gravis per aliquot horas superveniebat, mamma sinistra de novo intumescebat, indurabatur, insigniter dolebat, post mediam noctem symptomata febrilia remittebant, mammae affectibus eodem tenore durantibus.

Die Mercurii cum benè se haberet, nisi quod mamma dolebat & dura esset, præscripti:

℞. Spiritus sal. ammoniaci cum calce viva

3℥ss.

Ess. Croci 3℥ii.

Misc.

Hinc

℞. Empl. de galb. croc. Myns. q. s.

Malaxabatur cum f. q. olei tartari satid.

Inducebatur super linteum, quod in medio perforabatur pro papillæ protuberantia. Spiritus ille tepidè calefactus spongiola illinebatur mammae, & applicabatur desuper Emplastrum allegatum calidè: Hinc imponebantur sacculi oryza, avenæ vel millo ad pollinis crassitiem referti, iique, quantum fieri poterat, calidissimi. Die Jovis benè se habebat; sed hoc ipso à meridie eodem tempore rigor & æstus cum reliquis symptomatibus redibant, dextra simul mamma



mamma indurabatur, tumebat, dolebat, & speciatim tumor durus magnitudine fere instar ovi gallinacei in prima mammæ parte paulo profundius tactu percipiebatur. Post mediam noctem symptomata remittebant, mammarum saltem pathemata affligebant, ægra ipsa fatebatur appropinquante paroxysmo se sæpius aliquid in mamma percipere: pulverem igitur præscriptum aliquoties repetebat, & remedia dicta externa ter quotidie applicabat, intermedio tempore sacculos probe calidos sæpe renovando, & sic convaleuit; sicuti usus hujus emplastri mamma sinistra & dextra, in quibus jam tum nodi duriores erant, curabantur.

## ARTICULUS II.

## D E

## MORBIS ACUTIS PUERPERARUM.

**Q**UOD verò attinet cæteros puerperarum Morbos acutos febresque, rarò hæc sunt benignæ, sed ut plurimum malignæ, unde etiam in pluribus, quoad principaliora capita, imprimis quoad excretionem cutaneas, cum reliquis conveniunt febribus malignis, tam in Theoria, quàm Praxi, de quibus alio tempore pluribus actum. Ea saltem monebo, quæ circa puerperarum febres, tanquam ipsis peculiaribus & propria, imprimis sunt consideranda. Superveniunt hæc febres puerperis, aut dum fluunt rectè lochia, aut dum hæc præternaturaliter sunt imminuta aut suppressa, aut dum hæc naturaliter non amplius fluunt, ritè tamen fluxerunt; Nam lochiorum excernendorum in his febribus summa habenda est ratio. Et quidem si supprimantur lochia adhuc fluentia, immedie febrilia symptomata ac ipsa denique febris superveniunt: unde primum, quod tunc agendum est, ut revocetur lochiorum fluxus per *venæ sectionem in tala* administratam, & per remedia interna, lochia *promoveantur*, corpusque ad blandam *diaphoresin* disponantur. Si verò non amplius fluant lochia, rectè autem antea fluxerint, ut aliæ febres benignæ vel malignæ, aut cum excretionibus cutaneis conjunctæ, v.g. petechiales, curandæ sunt. In omnibus enim febribus acutis & malignis puerperarum ad duo imprimis respiciendum est primario:

1. Ad lochiorum fluxum, qualis ille & quantus fuerit?
2. Ad primas vias & succorum ibidem scaturiginem, horumque ibi factam commotionem, alterationem & ejectionem ex pancreate, poro cholodochi, & glandulis mesenterii in & post labores partus.

Cum enim ex mensibus suppressis alterentur hi succi insigniter toto gestationis tempore, prout plus minus cacoehymicum fuerit corpus, indeque tam varia pathemata circa primas vias oriri soleant, ob id succi circa partum commoti, adeoque plus minus effervescentes, observandi sunt probe, qualia symptomata in primis viis post quartum inferant? Speciatim an simul pathemata hysterica, aut alia pathemata, excitent? ut partim præcaveri, partim etiam maturè coerceri queant.

## DIAGNOSIS.

Febres puerperarum acutæ primò invadunt cum rigore, quem mox insequitur æstus continuus, ac vehemens cum siti inextinguibili, pulsu celeri, inæquabili & debili, virium prostratione, vigiliis, inquietudine, urina crassa & rubicunda lochiorum suppressione: quibus tandem superveniunt passionibus hysterice, deliria, stupor, convulsiones, similiaque generis nervosi symptomata.

## P R O G N O S I S.

Febres hæc puerperarum satis periculose sunt, nisi statim in principi diarrhœa, lochiorum fluxu, aut simili evacuatione solvantur.

In specie tinnitus aurium, & gravitas capitis, tertio aut quarto die supervenientes, ge neris nervosi symptomata graviora innuunt: quibus si accedant summa præcordiorum anxietas, respiratio difficilis, cum pulsu debili & inæquali, res desperata est.

Febres ergo superveniunt puerperis, vel dum fluunt ritè lochia, vel dum hæc præternaturaliter sunt suppressa, vel dum hæc non amplius fluunt: nam lochiorum in his febribus summa habenda est ratio. Et quidem, si supprimantur lochia, immedie febrilia pathemata, & ipsa denique febris, superveniunt. Unde primum quod attinet: agendum est, ut revocetur lochiorum fluxus: si verò lochia non amplius fluant, antea autem ritè fluxerint, febres supervenientes ut aliæ febres curandæ fere sunt. Si verò lochia adhuc fluant, horum motus ita gubernandus erit, ne alia symptomata ab iisdem augeantur, vel motus naturæ in sanguine turgescente, aut nimio eorum fluxu impediatur, aut imminuto eorum fluxu perturbetur aut impediatur.

Verum cum hæc puerperarum febres ut plurimum sint malignæ, imprimis quæ superveniunt ritè factæ expurgationi per uterum, (in quibus, quoad malignitatem, in sudoris legitima provocatione primarium curationis punctum consistit,) tunc *cautus sit Medicus*, ne nimis sudorem provocando lochiorum sistat fluxum, quod ordinariò fere accidere solet; dum enim superveniunt tales febres, lochiorum fluxus conveniens est, modò non excedat: aut etiam caveat sibi, ne, dum lochia fluant copiosius malignitati hac ratione pandatur accessus ad interiora; cum notum sit aliàs, quàm periculose sint quæcunque in febribus malignis evacuationes, eam sanguinis, quàm aliorum humorum, nisi ea, quæ est per sudorem. Et imprimis cum tales febres interdum per excretionem cutaneas, sive petechiales, sive pustulares, Germ. *Böcken und Masern*, sive miliæres, Germ. *Friesel* nempe, salubri naturæ conatu mitigentur, observet probe Medicus, ne lochiorum fluxus nimis istum, quem vocant, naturæ conatum excretorium, impediatur: (*Puerpera Medici sagacitatem periculo exponunt*: ) Ob id inter ea remedia, hæc febres curantia, *primatum obtinent ea alexipharmaca*, quæ & blanda diaphoresi maligna fermenta remonent, naturæque conatum excretorium adjuvant, & simul nonnihil stimulant, quæqualem lochiorum fluxum conservant, ne cum diaphoresi & leni subinde madore lochia imminuantur. Si tamen influant nimio, addantur talia, quæ blanda vè adstrictoria lochiorum fluxum nimium sistant, ut *terrasigillata & cornu cervi usum*, ut adeo cum moderatis alexipharmacis nunc stimulantia, ut *myrrha*, nunc adstringentia, combinanda sint. Fortiora tamen pelletia addenda, ubi supprimi incipiunt, aut cum omninò iam suppressa sunt. Quæ si revocari nulla arte possint, fortius moti & profusius emissi sudores eorum defectui & inde ortis malis mederi fere possunt. In genere ergo in febribus puerperarum malignis remedia ex cornu cervi parata, item ex antimonio fixato, nempe diaphoretico, bezoardico minerali, item myrrha, & succino, & hinc salibus volatilibus, fuliginis, cornu cervi, viperarum &c., & hinc fixis concinnata remedia, in his febribus primatum obtinent, ac quidem Cornu cervi, tam sine igne preparatum, quàm cornu cervi solare, quod imprimis in febribus purpuratis egregium est. His addi possunt, præter antimonialia, etiam alia diaphoretica nota, imprimis Cinnabaris antimonii ritè preparata, quæ in puerperarum morbis malignis maxime sunt proficua. De sale volatili succini & sale volatili cornu cervi, ana mixtis, & additis fixioribus in pauca quantitate res, nota est.

Quoad Purgationes verò: eæ in febribus his malignis cautissime instituendæ sunt, quin potius omninò omittendæ (contra Gallos & Italos) cum certò observatum sit, etiam clysteres applicatos in his febribus cum excretionem cutaneam junctis subinde fuisse periculosissimos: imò Purpuram albam, Germ. *den weißen Friesel*, vel suppositorium applicatum, retrocedere facit. Unde cautus hac in parte sit Medicus, & mox in principio puerperii secundo vel tertio die, ubi suspicio est imminere morbum malignum, primas vias eluat, v.g. pilulis pestilentialibus Russi, & similibus, vel clysmate aliquo temperato præveniat. Ergo alui stimulario vel tantilla est periculosa: sicut venæ sectio, ubi ritè fluunt aut fluxerint lochia, locum nullum habet, imò nociva est; idque præsertim in nostro climate; nam alibi quod fit apud Hispanos, Gallos, &c. in corporibus ex se rerum non naturalium varietate diversimodè dispositis, apud



apud nos æquè non imitari potest: v.g. dum ZACUTUS LVSITANVS lib. 1. Princ. Medic. Hist. 77. in annexa observatione refert scemina, tribus diebus à partu angina suffocante correptam, ritè fluentibus lochiis per sextam venam in utroque brachio curatam, apud nos non adeò commodè institui potest, cum minus acutus hujusmodi affectus esse soleat. Suppressis verò mox in principio lochiis, ubi urget malignitas, nemo cogitet de aperienda vena; sin verò in minus periculosis malignis, aut etiam in simplici febre, institui necesse sit, consideret Medicus habitum ægræ; an juvencula sit? In plethoricis enim seu sanguineis juvenculis, ubi ebullit sanguis, applicatis prius utero emollientibus ac nonnihil stimulantibus convenientibus, sanguinem ibidem hærentem solventibus, meatus laxantibus & ad fluxum disponentibus, secetur saphæna in talis, utram vis, potius tamen internam, quàm externam, ut ita concilietur sanguini impetus inferiora versus. Sin verò graviter affligat malum, & corpus sit succulentum, & sanguinis insignior copia adsit, quod tamen vix apud nos locum habet, interdum præmitterenda est brachii venæ apertio, & hinc subjungenda istius est postmodum incisio, quæ est in cruribus. Nihilominus tamen rarissimè aperiatur vena, equidem id nemini consulo, imprimis ubi saltem in partu aut aliquot dies à partu impetuosis lochia fluxerint, à venæ sectione in malignis superfedere debet Medicus.

Dieta in quibusvis puerperarum febribus, non secus ac in primis puerperii diebus, sit tenuior, aut saltem pro consuetudinis ratione mediocris, quæ sustentet saltem corpus, & vires hinc non augeantur. Notabile est effatum FONSECÆ Consult. 45. Tom. 1. ubi refert, quod febres acutæ puerperarum ex retentis lochiis ob pleniorum plus debito vitium sæpius recurrant, sed semper sequentibus sudoribus salubriter solvantur: Vbi observatur, quod intantum noceat liberalior victus, in quantum profunt diaphoresis aucta atque sudores.

Quod si lochia suppressa dent febres benignas ardentes, siue solitarias, siue inflammatorias, v.g. comitatas cum pleuritide, angina, uteri inflammatione &c., tunc tutior res est, ac præmissa, aut etiam omissa venæ sectione (imprimis in nostro climate) in pede, sudoriferis, aut salinis volatilibus potentioribus, aut antimonialibus fixis, similibusque acedum absorbentibus, adjunctis myrrhatis, propter lochia nempe, sanguinis coagulatio, & stagnatio, & hinc lochiorum suppressio est corrigenda. Mox ergo usurpentur talia, quæ sanguinis grumos ab acido natos promptè dissolvunt, & effuso sudore sanguinem stagnantem in debitum circuitum revocare possunt; unde, præter remedia ad inflammationes laudata, item myrrhata & castorina, sæpius spectanda ceti usurpetur.

De cetero ad sitim fallendam, & temperandum sanguinis effervescentis æstum, acida nimis non bene conveniunt in his ardentibus acutis, ut & in reliquis malignis puerperarum febribus, ex eo, quia periculum hic est, ne alterando sanguinem, fluxum lochiorum, uti aliàs menses, fiant propter coagulationem, cum & acida utero membranoso, & à partu plus minus læso & facile adhuc irritabili, indeque doloroso, sint inimica. Potius ergo temperata, aut subacida temperatis mista, in casu majoris sitis & æstus sunt convenientia, ut v.g. sunt rincturæ florum aquilegie aut cyani, gelatina cornu cervi acida, citri, granatorum, berberum, cydoniorum, cum Decocto cornu cervi infusa blanda acida, & similia blandiora: quibus in moderata dosi, aut etiam, ubi nimis urget æstus, spiritus salis aut nitri dulcis parum potest addi.

Qualis Cura & qualia remedia his febribus imprimis conveniant, ex supra dictis per se patet; nempe præcipitantia dicta & diaphoretica, simulque lochiorum fluxum conservantia primatum ducunt: Hinc variæ solent fieri formulæ variis in casibus. Res ut pateat, ad febres puerperarum malignas hæc formula est admodum conveniens, imprimis in principio:

℞. Aquæ pulg.  
Flor. sambuci an. ℥ss.  
Acet. vini ℥vi.  
Lapill. cancr. pulverisat. (sic falsum tertium diureticum) ℥ii.  
Bezoard. mineral. ℥i.  
Myrrh. cl. ℥ss.  
Syr. Artemis. ℥ss.  
M. f. Potio: S.  
Mistura resolvens sudorifera.

Capiatur subinde cochleatim.

In pleuritide à partu superveniente, & quidem imprimis cum lochiis suppressis:

℞. Aqua Pulg.  
Papav. errat. an. ℥i.  
Antimonii diaphor. ℥i.  
Salis vol. Fulig. aut loco huius salis vol. Arina, aut salis vol. sal. ammoniaci vel Cornu cervi gr. iv. v. vel vi.  
Succini gr. iiii. iv. v. vel vi.  
Myrrh. cl. gr. iv. { (ratione lochiorum.)  
Castor. gr. ii. {  
Syr. Card. Bened. ℥iii. vel ℥ss.  
M. D. S.  
Potio sudorifera pro una vice.

Hæc Potio & pellit per sudorem, & lochia simul stimulat & promovet: Vel

℞. Aqua flor. Papav. errat.  
Puleg. an. ℥ss.  
Spiritus salis ammoniaci ℥i.  
Ess. Castor.  
Antimonii diaphor. an. ℥ss.  
Myrrh. gr. v.  
Syr. card. Bened. ℥i.  
M. S. ut antè.

Item in forma pulveris:

℞. Cornu cervi sine igne ℥i.  
Salis card. Bened. gr. xii.  
Antimonii diaphor. gr. vi.  
M. f. Pulvis pro una vel duabus dosibus;  
D. S.

Pulvis sudoriferus.  
℞. Cornu cervi sine igne,  
Antim. diaphor.  
Nitri antimoniaci an. ℥ss.  
M. div. in 2. part. æqual.  
D. S. ut antè.

℞. Cornu cervi sine igne ℥i.  
Antim. diaphor.  
Salis Card. Bened. an. ℥ss.  
Myrrh. cl. gr. vi.  
M. f. Pulvis.  
Div. in 2. part. æqual.  
D. S. ut suprâ.  
Vel

℞. Antimonii diaphor.  
Salis Card. bened. an. ℥ss.  
Myrrh. cl. gr. v.  
M. pro dosi.  
D. S. ut antè.

Item, præsertim si excretio quædam cutanea immineat:

℞. Cornu cervi sine igne ℥ss.  
Antimonii diaph.  
Bezoard. miner. an. ℥ss.  
Myrrh. gr. vi.  
M. pro 2. dosi. S.  
Pulvis sudoriferus.

Capiatur in vehiculo calido: (frigida omnino prohibeantur): Vel

℞. Ebor sine igne,  
Antimonii diaphor.  
Specif. cephal. an. ℥i.  
Myrrh. gr. xii.  
Sal. vol. cornu Cervi gr. ix.  
M. pro 3. dosibus.  
D. S. ut antè.

Propinetur in aqua pulgii &c.

Cinnabaris antimonii egregia est in febribus puerperarum, præsertim malignis, & in quibus nervosum genus afficitur: Hinc

℞. Pulv. Bezoard. D. Mich.  
Cinnab. antimonii an. gr. xii.  
Salis vol. cornu cervi,  
Succin. an. gr. ii.  
M. S. ut suprâ.

Capiatur in vehiculo pro lubitu.

Vel  
℞. Pulv. Bezoard. M. ℥i.  
Cinnab. antimonii ℥i.  
Sal. vol. cornu cervi,  
Succin. an. gr. xii.



M. f. Pulvis pro aliquot dosibus:

D. S.

Pulvis sudoriferus.

Item

℥. Cornu cervi solar. ℥i.

Pulv. Bezoard.

Cinnab. antimonii an. ℥ss.

Salis vol. Piper. gr. viii.

M. f. Pulvis pro duabus dosibus:

D. S. ut supra.

℥. Antimonii diaphor.

Cinnab. Antimonii an. ℥i.

Salis vol. sangu. hum. ℥ss.

Succini gr. vi.

M. f. Pulvis pro duabus dosibus.

Cui etiam pro ratione circumstantiarum addi possunt

Myrrh. gr. iv. vel vi.

D. S. ut supra.

Sumuntur dicti pulveres in aqua tenellorum cornuum cervi, aut aqua scorzonere, ulmarie, & similibus, paucum vel nullo syrupo dulci admisso propter metum hystericæ passionis; aut propinetur in aqua hirundinum cum castoreo, vel simili.

℥. Cornu cervi sine igne ℥ss.

Antimonii diaphor.

Cinnab. antimonii ritè par. an. gr. xv.

Myrrh. el. gr. xii.

M. f. Pulvis pro duabus vel tribus dosibus:

D. S. ut supra.

Propinantur in quocunque vehiculo; aut ubi suspicio ad est angustie præcordiorum in hystericis, in aqua hirundinum cum castoreo, quæ ipsa blandè acida.

Bezoardicum Joviale, solare, Antihecticum Poterli, &c. commodè etiam propinari possunt: item Tinctura Coralliorum antiscorbutica in nostratibus purpurâ afflicta est egregia: item Tinctura Coralliorum cum spiritu cordis cervi in hisce febribus, in quibus vires unâ debilitantur, est egregia. Laudano opiato & opiatum in his cautè & parcè utendum est, ne sufflaminando symptomata, motus naturæ inhibeatur, lochiorum fluxus imminuatur, & ad deliria ac convulsiones disponatur ægra: Interdum tamen laudanum opiatum cum croco aut aliis appropriatis mistum usurpari potest, etiamsi lochia suppressa sint, si insignior sanguinis & humorum agitatio in corpore adsit: conf. WILLISIUS de Febr. Puerperarum pag. 285. & 293.

Puerpera secundo à partu die gravi terrore percussa, subito intensissimum corporis æstus cum gravi cephalalgia, lochiorum maximam partem suppressione, mammarum eurgescencia, & post quatuor vel quinque horas incipiente delirio, incurrit: hinc ante omnia venam in pede aperiendam jussi, licet esset hora nona vespertina, simul præscripsi sequentes pulveres:

℥. Cornu cervi sine igne ℥ss.

Antimonii diaphor. ℥i.

Myrrh. el.

Salis vol. cornu cervi an. gr. vi.

Mista div. in 2 part. equal.

Unam capiebat vesperi, alteram appetente diluculo.

Manè sequenti, cum melius haberet, propter vaga abdominis symptomata usurpatum clystma carminativum cum euphoria. Internè præscripsi sequentes duos pulveres:

℥. Cornu cervi sine igne ℥i.

Bezoard. minor. gr. xvi.

Salis Absinth. ℥ss.

M. pro 2. dosibus.

Hinc altero manè satis commodè habebat, pulsu licet admodum febrili adhuc existente; quibuscumque & similibus insistendo, & in declinatione essentiam quoque myrrhæ cum tinctura tartari frequenter usurpando, tandem convalevit.

Pro Potu Julebi interdum præscribi solent, qui tamen minus conducunt in principio harum febrium, aut etiam prima puerperii septimana: reliquis temporibus tunc Julebi, moderatè tamen acidulati, & semper cum gelatina cornu cervi imprægnati, usurpari possunt: verbi gratia Julebus pro Potu in febribus malignis Puerperarum sit sequens:

℥. Decoct. hord. cymrad scorz. vel folius radices scorzon. ℥viii.

Gelat. cornu cervi rec. ℥i.

Tinct. flor. aquileg.

Tinct. flor. Cyani an. i.

Syr. Ribium,

De Juleb. vel Violar. an. ℥vi.

Spiritus nitri dulc. parum.

M. pro blando Julebo.

D. S.

Julepus Bezoardicus.

Vel

℥. Aqua Ulmarie.

Puleg. an. ℥iv.

Hirund. cum castor. ℥li.

Gelat. cornu Cervi acid. ℥ss.

Acet. theriacal. ℥iii. (aut loco huius tincturæ flor. Aquileg. & Cyani an. ℥i.)

Syr. Ribium

de Juleb.

Corall. an. ℥vi.

Spir. nitri dulc. parum.

M. f. Potio: S.

Mixtura Bezoardica, cochlearis sumenda.

Potius insipida acida, quàm dulcè-acida sit.

Vel etiam in siti nimia ordinetur Julebus ex infusione florum Sylvi, vid. supra lib. 1. ubi de siti laesa; ut & ex Colleg. Formul. pag. .... acidulatus parum: e.g.

℥. Flor. Viol.

Cyani,

Aquileg. an. p. i. vel Mss.

Irrorentur parum cum spiritu sulphuris:

(quem hic meritò eligo)

infund. in

Aquæ cheresfol.

Ulmæ.

Meliss. an. q. f. (vel aqua Card. Bened. vel etiam aqua simpl.)

Stent in loco tepido vel Balneo Mariæ, donec liquor probe tinctus sit:

Tunc Colat. adde

Syr. Berber.

Scord.

Artemis. vel Ribium q. f.

ad suavem & nonnihil dulcem saporem, qui nec nimis acidus, nec nimis dulcis sit, aliàs in prædispositis excitat passionem hystericam.

D. S.

Julepus confortativus.

Vinum generosum puerperis malignis febrientibus cautè exhibetur, imprimis mox partum, ut rectè monet HOEFERUS in Herc. Med.

## ARTICULUS III.

### D E

#### PURPURA seu FEBRE MILIARI PUERPERARUM.

**S**pecialim ex omnibus febribus malignis serè, imprimis apud nos, pessimæ notæ est Febris Purpurata mulierum, Germ. der Friesel, seu Febris Miliaris quorundam dicta; sive rubra fuerit, quod pustulæ saltem rubræ sint, eaque serè salutaris: sive alba fuerit, dum milli instar candida grana copiosissima, ceu tot pustulæ, corpus incrustant, eaque periculosior. Purpura hæc est maligna, quæ tamen, ut mihi videtur, radicem quodammodò ac fomitem suum acquirit ex scorbuto, idque idèd, quod observaverim, unâ cum reliquis remediis in febribus malignis usitatis etiam remedia antiscorbutica permixta & usurpata promovere insigniter purpuræ eruptionem.

### DIAGNOSIS.

Imminere febrem millarem, aut saltem aliam excretionem cutaneam, serè ex hoc cognoscitur, si puerpera graviter febriliter, cum aliquo tamen odore, percipiant subinde vagos ac leves horrores, dorsum aut peripheriam corporis occupantes, aut si pungi dorsum hinc inde, tanquam si ab aciculis fiat, sentiant.



PROGNOSIS.

Salutis spes affulget, si tempore critico peruniversum corpus cum symptomatum levamine confertim purpura erumpat, hinc prurire incipiat, donec pustulae exsiccatae sub minutarum squamularum forma erumpant. Alterutrum istorum si deficiat, semper periculum subesse innuitur, speciatim in purpura alba, quae praeter ceteris admodum periculosa.

CURA.

Scilicet ad instar variolarum duplex tempus observandum est in purpura:

1. Tempus ebullitionis.
2. Tempus excretionis.

Istud quidem in imminente purpura: Hoc verò in eadem erumpente.

In tempore ebullitionis, ratione effervescentiae succorum compescendae, conveniunt simpliciter remedia effervescentes humores compescencia, & blanda diaphoretica: quibus semper vel parum de myrrha, seu appropriatum malignitati purpurae in specie resistens, vel parum de sale volatili, addendum.

Postmodum, ubi imminet tempus excretionis, & vestigia Purpurae incipiunt apparere, simpliciter expulsiua conveniunt: adeoque v. gr. in principio morbi excellunt partes animalium durae & antimoniatæ, cornu cervi. utrum, & solare ad ℥i. bolus Armena, terra sigillata, Bezoardica mineralia quaecunque, cinnabaris antimonii, Jupiter diaphoreticus. Si quod aliud in his febribus miliaribus periculosum est symptoma, hoc est diarrhoea, quæ uti impeditur excretio cutanea, ita huic supervenienti absorbentia modò dicta optimè resistunt; item sal volatile cornu cervi, & succini ana mista, & in parva dosi cum dictis pulveribus sociata; quin & conveniunt Salia fixa vegetabilium, ut cardui benedicti, &c. v. gr.

- ℥i. Cornu cervi solar. ℥i.  
Bezoard. minor.  
Cinnab. antimonii an. ℥ss.  
Sal vol. Cornu cervi,  
Succini an. gr. ii. vel iii.

M. f. Pulvis pro duabus dosibus;  
D. S.

Pulvis excretorius.

Perquam est egregius; hauriatur in potu ordinario.

Vel

- ℥i. Cornu cervi sine igne gr. xii. ad xv.  
Salis Card. Bened. ℥ss.  
Myrrh. el. gr. iii.  
M. f. Pulvis pro dosi.

D. S.

Ut supra.

Qui pulvis in specie egregius est.

In progressu Purpurae, ubi vestigia se ostendunt, egregia est tinctura Coralliorum cum spiritu cordis cervi, & Tinctura Coralliorum antiscorbutica, quæ optimè expellit, dosi gutt. xxx. vel xl. Loco hujus prodest sequens Mixtura nobilis, quam observavi proficuum:

- ℥i. Aqua scord.  
Scorzon. vel tenell. Cornu cervi, vel li-  
quoris vitis an. ℥ss.  
Spiritus Cochlear. ℥i. ad ℥i ss.

Mag. Corall. cum succ. citri,  
Antimonii diaphoret. an. ℥ss.  
Syr. de scord. vel de Calend. ℥vi.  
M. D. S.

Mixtura sudorifera.

Capiatur prout vel bina dosi, vel usurpetur subinde cochlearim.

Vel etiam, ubi incipit apparere Purpura, optimè conveniunt Emulsiones ex seminibus expellentibus, Cardui benedicti, napi, aquilegiae, citri & similibus, cum vel sine myrrha: aut essentia myrrhae pro ratione lochiorum, additisque simul cornu cervi sine igne, antimonio diaphoretico, bezoardico minerali, pulvere bezoardico SENERTI, &c. ad imitationem ZWELFFERI: quales formulas supra lib. i. de Febribus malignis & petechialibus dedi. Nam hæc Emulsiones potenter expellunt Purpuram imminentem, aut nondum sufficienter erumpentem: v. g.

- ℥i. Flav. cort. Citri ℥i.  
Sem. Citri ℥i.  
Card. bened.  
Aquileg.  
Myrrh. an. ℥ss.  
Amygd. dulc. ℥i.  
Cum f. q. aqua scorzon.  
F. Emulsio,  
Leniter edulcoranda:  
D. S.

Emulsio expellens.

Vel

- ℥i. Flav. cort. Citri ℥i.  
Contusis in mortario adde  
Sem. Card. bened. ℥i.  
Napi,  
Citri an. ℥i.  
Myrrh. el. gr. xvi.  
Cum f. q. aqua flor. samb. & scabios.  
F. Emulsio:  
adde  
Cornu cervi sine igne ℥i.  
Antimonii diaphor. ℥i.  
Edulcor. parum.  
M. D. S.  
Ut antè.

In specie tamen observetur:

1. Quod acida, nisi admodum temperata, puerperis purpurâ laborantibus minus convenient, propter uterum à partu læsum, propter lac in mammis, & etiam propter lochiorum fluxum.
2. Ut etiam calidissime tractentur, ex eo, quia tantillus halitus frigidus facit retrocedere omnem Purpuram: Unde subito difficultas respirationis, anxietates precordiorum, investigationes corporis, subindeque diarrhoea lethalis, & similia superveniunt: speciatim hoc advertatur in purpura alba, præ reliquis puerperis periculosa.

Plures cautelas dedi supra lib. i. cap. 9. Sect. 15.

Quod si Purpura prurire incipiat, & sub forma squamatum decidat, continentur remedia antiscorbutica; sicut enim reliquæ ejus radices evelluntur.

Absolvitur ferè ea, quæ Mulieribus post partum sunt vel nociva, aut saltem molesta:

Pergo ad



## S E C T I O N E M IX.

D E

## LACTIS ET LACTANTIVM VITIIS.

**V**tilis infans seu foetus in utero nutritur lacte, ita & extra uterum, quam diu tenellus est, nec solidiora alimenta commodè digerere potest, sed lacte ex mammis hausto nutritur. Mox enim secundo aut tertio post partum idie puerperis mammae, primò quidem lacte aquoso vel seroso & tenui, quod vocant Colostrum, turgescere incipiunt; procedente verò tempore aut quarto præter propter die, imprimis cum febre, lactea dicta, lac ipsum verum sub naturali consistentia mammas replet. Materiam lactis Veteres omnes sanguinem menstruum statuerunt, cum lactantibus menses ut plurimum deficiant: quibus manifestissime contradicere HIPPOCRATES de Nat. Puer. F. 21. & de Morb. Mulier. lib. 1. Text. 95. ubi alium sanguine dulciorem, pinguiorem & candicantem succum ex cibis & potibus ad mammas exprimi dicit: cui subscribunt Neoterici ferè omnes. Materia enim ex qua nihil aliud est, quàm chylus: Vid. *suprà* lib. 1. ubi de Motu chyli, PLEMPIUS *Fund. Med. pag. 63.* ENTIUS pro Circul. sanguinis *pag. 186.* MOEBIUS *Fund. Physiol. pag. 565.* WARTHONUS *Adenograph. pag. 239.* CHARLETON *Oeconom. Animal. pag. 126.* EVERHARDUS de Hom. Bruti que Exortu *pag. 176.* SCHNEIDERUS de Catarrh. lib. 3. cap. 3. BARBATUS de Sanguine & sero *pag. 39.* Chylus tamen huic etiam in mammis, sicut sero in glandulis, à spiritibus animalibus aliquid per nervos accedere, ex NEEDHAM de Form. Fat. *pag. 13.* & WARTHONO *Adenogr. pag. 237. & 211.* videri potest.

Per quas vias autem chylus hic ad mammas deferatur, novè iterum exortæ sunt lites: Quippè BILSIUS vasis suis roriferis negotium hoc assignat; DEUSINGIUS, EVERHARDUS, & alii plurimi peculiariter vasa lactea haec lenus incognita ex receptaculo lumbari & ductu thoracico ad mammas tendentia se observasse putant. Verum nemo Anatomicorum post jam dictos Autores vasa hæc, ut ut accuratius investigata fuerint, invenire potuit; sicut etiam vasa lymphatica seu rorifera BILSI ex mammis potius resellunt sua affecta. Probabilissimum igitur est, per arterias mammarias chylum nondum huic assimilatum cum sanguine arterioso per totum corpus, non per vias singulares, ad mammas distribui: Vid. WARTHONUS *Adenogr. pag. 240.* CORNELIUS CONSENTINUS *Progygn. Phys. pag. 219.* NEEDHAM de Form. fat. *pag. 18.* LOWE-RUS de Corde *pag. 216.* Accedit & hoc, quod in lactantibus arteriæ hæc cum suis venis longè crassiores magisque tumentes sint.

De modo lac generandi similiter controversitur, dum queritur: quomodo lactis materia ad mammas moveatur, & à reliqua massa sanguinea separetur, ut lactis formam acquirat? DEUSINGIUS dispositionem peculiarem lacti generando aptam, atque ab utero contractam, in mammis præsupponit, & in gravidis ob compressionem ventriculi hepatis at reliquorum abdominis viscerum à fetu crescentem factam, chylum versus mammas propelli statuit, quod tamen refutat DIEMERBROECK *Anat. lib. 2. pag. 247.* Unde alii ad ignorantiam illud asylum, peculiarem naturæ providentiam confugiunt, quæ tamen tanquam particularis & proxima non, sed tanquam universalis, consideranda. Alii denique suctionem frequentiore per motu hujus ad mammas verò, tanquam causam, in medium profertur; hinc SALMUTH *Centur. 1. Observat. 92.* de virgine quædam refert, quæ, cum infanti, cuius curam egerat, mammam frequentius fugendam exhibuisset, lactis proventum in ipsam deprehenderit; imò maribus quibusdam tale quid per ipsam contractionem & suctionem frequentiore accidisse, DIEMERBROECK *l. a. cap. 3.* ex diversis Auctoribus & propria experientia exempla ejusmodi adducit; nervosè tamen satis ad hanc hypothesein responderet, quod in centum viris, virginibus aut feminis non lactantibus, licet harum fugantur aut contrahantur mammae, quousque placer, non omnibus, sed forsan aut pulli aut alteri tantum lac ad mammas derivetur. Aliam

ergo causam suppeditat, & quidem talem, cujus neminem hæcæus mentionem fecisse putat, fortiore scilicet imaginationem, seu intentam & crebram de lacte & mammis prolisque nutritione cogitationem, cum imaginationem aliàs in corpore mirabilia operari, notum sit. Verum, utut fusio frequentior, non minus ac intenta quoque, de infante lactando cogitatio pro lacte advocando multum faciat; attramen nec illam, nec hanc, primariam, hujusmodi causam esse, inde patet, quod (1.) non meretricibus saltem, dum foetus sui in utero nullam rationem habent, nulloque illius amore trahuntur, & de expellendo vel perdendo foetu cogitant; sed in aliis quoque mulierculis, rerum harum minus gnaris, quæque se gravidas esse ignorant, circa medium gestationis tempus mammae à lacte intumescant, hocque per papillas copiosè satis effluat: (2.) Non infrequens sit, ut matres, quæ eà lactis quantitate, quæ proli sufficienter nutriendæ opus habent, destituuntur, sæpius per intentam nimis de lactatione incommoda cogitationem fontes hujus liquoris planè exsiccant: (3.) Historia à DIEMERBROECKIO de uxore propria adducta, circumstantias tales continet, quæ thesin ipsam ambiguum satis reddunt; v. g. dum refert, post tempus demum illam vori sui compotem factam, post longum, quàm scilicet per aliquot menses nihil lactis produci potuerit. Probabilis ergò videtur, nutrimentum foetus lacteum in utero, sub hujus contractione ad massam sanguineam regurgitare, & propter denegatam cum massa sanguinea subactionem, fermentationem ac agitationem, & per consequens febrem lacteam ita distam, excitari, donec cessante motu febrili materia lactea à sanguine secedat, & per tubulos mammarios externi possit. Per motum enim febrilem & aliquam præcipationem lac à sanguine facilius secedere, *suprà* Sect. S. Articulo 1. caput 19. ubi de Febre lactea, sufficienter explicavi.

Sicut autem per fermentationem hanc lac ad mammas tam copiosius non urgetur, quàm ita disponitur, ut facilius in mammis postmodum secedat; simili ratione ac in chylo à fecibus secretionem illa fermentatio & præcipitatio, quam à bile & succo pancreatico chylus sustinet, non sufficit, sed transcolatione per vasorum lacteorum oscula ad intestina hiantia opus est: ita chylus, lacteus sanguini laxius coharens, dum per glandulas mammarias deferretur, ab hoc secedit, & intra tubulos lactiferos sub lactis forma excerpitur.

Generatur ergo lac per modum transcolationis, accedente tamen pro hoc negotio certa quasi tinctura seu fermento glandularum mammariarum, cujus ratione serum sanguinis chylosum alteratur, & quodammodo disponitur pro materia lactis, quod hinc per tubulos lacteos ex glandulis ad papillas derivatur. Sicut enim in diversis glandulis diversimodè, ratione consistentiæ, saporis & similitum proprietatum, serum transcolatum alteratur; ita in mammarum glandulis idem serum chylosum aliquo modo immutari, probabile est, utpote quod ratione substantiæ, coloris, & saporis, à chylo, reliquarumque glandularum sero, multum differt. Serum chylosum in mammis alterari probatur; quia ex sero beneficio cujusdam spiritus aut tincturæ acidæ præcipitatur grumus lacteus; unde blandum acidum, in dictis glandulis unà elaboratum, probabile est, præcipitare ex sero dictum chylum, & cum condensare in lac, quod deferatur tandem ad papillas, quod est spissius ipso sero. Notum enim est, quod sanguis lacteus observatus sit, & LAURENTIUS in *Controvers. Anatom.* exemplum mulieris, quæ lac per lochia excrevit, refert; mulieresque brevi à partu tempore percipiunt motum materiæ ad mammas, ita ut primum lac sit aquosus, sicuti tertio vel quarto die cum febre lactea propriè dictum lac generari solet. Lac istud præbendum est infanti, quod est alimentum medicamentosum.



In specie circa lac & eius generationem tria vitia consideranda sunt:

1. Quando deficit.
2. Quando nimis abundat; &
3. Denique, quando præternaturaliter depravatum est in mammis & corruptum.

Causæ horum in genere sunt vitia materiæ, vel vitia organi.

## CAPUT I DE LACTIS DEFECTU. CAUSÆ.

**Q**UOD primum in specie, nempe *Defectum Lactis*: deficit lac vel vitio seu defectu materiæ, ex qua lac generandum est; vel deficit lac vitio vel defectu mammarum, materiam alterantium, in specie glandularum, chylum non sequestrantium. *Materia deficit*, dum vel non generatur, vel genita licet, absorbitur, vel aliorum transfertur: hinc nimis macræ, juveniles, teneriores, febrientes, nimis sudantes, &c. parum vel planè nihil comedentes & bibentes, acillæ, quibus immensûs fluxerunt lochia, quibus uberidè evacuatur materia candida serosa, &c. minus lacte abundant; sed hoc rarius est: item quæ gravidationis tempore vel ex nausea alimentorum parum comederint, vel ex ratione pice vitiosa alimenta assumpserint, raro à partu lacte abundare solent: item mulieres sicciore lacte minus abundant, cum chylus promptè in sanguinem assimilatur. In morbis acutis lac quoque imminuitur, unde puerperis febrientibus lac ferè deficere incipit, &c. Puerperæ etiam nimis sudantes nunc vitium, nunc totalem lactis defectum patiuntur: unde quæ lactare nolunt, præter copiosorem lochiorum fluxum, copiosius imprimis sudant. Tempore quoque gestationis lactantibus lac partim imminuitur, partim notabiliter alteratur, dum è contrà majori quantitate, ad uterum deferretur. Vinum, item acida & austera quælibet, lactis copiam imminuunt; in specie vinum acidulum, v. gr. Rhenanum, &c. lac notabiliter depauperare solet. Denique mæror, tristitia, item interdum terror subitaneus, lac imminuunt in specie. Communiter post animi pathemata dicunt, lac retro remansit, dum spirituum perturbato motu etiam contentorum corporis motus alterari, ac plus minus perturbari solet.

Ut plurimum *mammarum vitio* deficit lac, quando nempe harum glandulæ transcolatoræ sunt vitiosæ, quarum primum vitium est, quando vel scirrhusæ, vel induratae, vel obstructæ, vel vi nimis adstrictæ, minus porosæ & poris arctis constantes, aut quando viæ ad mammæ aut tubuli glandularum excretorii nimis angustati fuerint; id quod fit in specie arte, quando mulieres adhuc virgines nimis constringunt vestimentis thoracem, & comprimunt mammæ & vasa ac meatus ad hastendentes: Et hæc est causa, quare nostratas puerperæ tam raro possint lactare proprios fœtus seu infantes, quoniam in juventute nimis adstringendo & comprimendo mammas impediunt lactis proventum. Præterea huc etiam faciunt, quando externis variis admotis mammarum augmentum aut turgescencia & glandularum debita structura, sub pubertatis annis impeditur, aut etiam, quando mediis gestationis mensibus, dum mamme itidem augeri incipiunt, similibus earundem augmentum coercent. Accedit huc etiam, utut indirectè, infans debilis, non sufficienter sugens ac quasi attrahens lac ex mammis; quò magis enim hoc allicitur, eò magis illabitur, eòque magis ampliantur vasa: unde interdum ex nimio infantum suctu sanguis purus locolactis emanare observatus fuit: hinc tales puerperæ interdum prius catellos aut alios infantes robustiores admoveant mammis, ut horum suctu promoveatur lactis affluxus. Notabile exemplum lactis, solius fœtus ope in mammæ attrahi, videbitis in M. A. N. C. Ann. 2. Observ. 133. in Schol. pag. 219. & in vetula Ann. 3. Observ. 10. pag. 14. item SALMUTH Cent. 1. Hist. 61. ubi refertur virgo lactans, cum infanti sæpius expectulancia mammæ exhibuisset. Si ipsæ mamme in culpa sunt, subtilè istud acidum volatile, quod chylum in mammis præcipitando coagulat, si vitiosum sit, causa est supervientis lactis defectus.

Cæterum præter hæc enarratas causas lactis defectus, Estmull. Oper. Tom. II.

simul in specie consideranda venit certa quædam conspiratio aut quasi sympathia uteri & mammarum, dum imprimis post conceptum, item post partum, lac ad mammæ moveri incipit; item quod uterus & mamme iisdem ferè morbis, in specie scirrhus & canceris, affligi soleant; ita quidem gravidatione lac alterari & imminui solet; sicut in aliis, quamdiu lactare solent, ferè conceptio impediri solet, &c. Quæ omnia certam quandam inter uterum & mammæ conspirationem ostendunt, qua unius functio ab alterius functione plus minus adjuvari vel impediri videtur.

## DIAGNOSIS.

Deficere lac per se patet, idque imprimis, si simul accesserint mamme flaccidæ ac pendulæ minusque turgentes, ex quibus parum vel nihil lactis effluere possit.

Causarum signa ex circumstantiis & antecedentibus sunt pensitanda.

## PROGNOSIS.

Quoad *Prognosi*: Puerperis equidem per se parum aut nihil mali infert lactis defectus, modò ritè fluant lochia, ut infanti subinde nocivum sit, quia non potest ritè nutrir, hinc viribus deficere, ex ploratu verò continuo varia mala accelerari solent. Interdum, cum infantes unam modò sugunt mammam, tum lac in altera remanet, indurefcit, nec vult exire.

## CURA.

Quod ergò attinet *Curam*: In hac aut externis emollientibus, mammæ irritantibus, admotis viæ ampliandæ, laxandæ, & mamme quasi spongiosiores & molliores reddendæ, aut internis appropriatis lactis proventus accelerandus, subministrando simul victum *symplicem* & laudabilem, imprimis lacticia, ova sorbilia, pulvis ex ovis cum lacte, butyro, item ex amygdalis, &c. Oryzam aut hordeum excorticatum contusum, in lacte coquendo, & instar pulvis capiando, quæ pluscondiendæ est cum cinnamomo, galanga, caryophyllis ac similibus. Nostrates fecale contusum in aqua coquunt, & ita iusculi formâ copiosum lac suggerentis assumunt: carnes mamillarum vacæ juveniles, quæ etiam cocta, indurata & pulverifata, cum aliis lac provocantibus miscentur. Inter remedia appropriata, eminent flores sambuci in lacte moderatè cocti; lac decoctionis bibitum, copiosum lac subministrat: Vid. L. A. N. G. I. U. S. in Miscell. pag. 46.

Nempe

2℥ Fl. sambuc. arid. M. j.

& cum mensura una lactis vaccini coquatur.

Quod decoctum bibat calidè nutritrix ad augmentandum lac: Vidi enim aliquando, quod hi flores copiosius in lacte cocti, & à muliere assumpti, lac equidem ejus augmentarent, sed & fœtum & puerperam insigniter purgant, id quod, cum interdum sit minus consultum, propterea in minori sumantur quantitate.

Juxta hos in specie eminet sceniculum totum, cujus summitates recentes comestæ egregiè conducunt ad lactis proventum augmentandum; unde aliæ decoquunt summitates sceniculi ut plurimum, vel cum potu ordinario, vel in lacte, & ita hauriunt: adeoque ipsum semen sceniculi copiosius assumptum, item radix sceniculi, & decoctum summitatum sceniculi, sunt experimentum AMATI LUSITANI Cent. 6. Curat. 86. unde etiam oleum destillatum sceniculi, in usu esse solet ad lac augmentandum. Præter dicta lumbrici singulare quid obtinent in augmento lactis conciliando; v. g. decoctum lumbricorum terrestrium cum sceniculo egregium est experimentum Helidæi Paduani in brodio sceniculi ad generandum lac, item pulvis lumbricorum terrestrium ad 3℥. aliquamdiu propinatus. Post sceniculum imprimis conducit anisum, ejusque semen. Hoc enim semen anisi egregium est remedium copiosius comestum ad generandum lac, sive in substantia assumatur, sive ejus oleum destillatum subinde gulletur, sive in lacte coquatur. Novi puerperam, cui decoctum hoc propinatum pro copia lactis suggerenda, cum uberrimo lactis proventu gravissimum somnum induxerit. Post hæc semen Carvi, quod Germanis dicitur *camminum album*, cardui Mariæ, Dauci, semen Nigellæ, Non 2 &c.



&c. omnia optime conducunt in hoc caso. Semen Anethi, vel solum, vel cum semine cardui Mariz, nutritibus lac auget. Item hic in usu sunt Agaricus mineralis seu lac luna, à ʒʒ. ad ʒi. propinatum; crystallus preparata ad ʒi. assumpta, species diacryalli Myrsibei, & marga saxorum, quæ pro lacte nutriticum multiplicando summum sunt remedium; privative scilicet operantur removendo vitiosum acidum, lactis profluxum impediens; nunc solum in cerevisia calida, nunc addito semine fœniculi. Olea destillata præfatorum seminum, præsertim anisi, juxta hoc, quod lac generent, simul etiam lac medicamentosum reddunt, depellit infantibus lacerationes, ipsumque lac sapit postea illud oleum. Observavit Kerckringus, quod crepitus ventris, odorem anisi referentes, fœtus, habuerit; quia mater lactescens oleum destillatum anisi assumpserat. Semen Danci nostratis egregie convenit, & in scula cumini.

Hinc

ʒi. Lact. Luna ʒii. vel ʒi.

Crystall. præp. ʒi.

Ol. dest. anisi,

Fœnic. an. gr. vi. vii. ix. vel xii.

M. f. Pulvis pro duabus vel tribus dosibus;

D. S.

Pulvis lac promovens.

Capiatur vel brogio gallinæ, vel in brodio decoctionis fœniculi.

Vel

ʒi. Lact. Luna ʒii.

Crystall. præp. ʒi.

Olei dest. Fœnic. gr. ix.

M. f. Pulvis pro duabus dosibus;

D. S.

Ut antè.

Vel

ʒi. Sem. anis. ʒii.

Lact. Luna ʒi.

Crystall. præp. ʒi. vel ʒii.

Ol. dest. anis. gutt. viii.

M. f. Pulvis pro 4. dosibus;

D. S.

Ut antè.

Assumendus in decocto fœniculi.

Vel

ʒi. Crystall. præp. ʒii.

Sem. Fœnic.

Carvi an. ʒʒ.

Ol. destill. anis. gr. vi.

M. f. Pulvis;

D. S.

Ut antè.

Quoad Externa: usurpentur partim Emollientia mammas, partim irritantia & lac promoventia; unde confert fœtus ex decoctis simplicium appropriatorum, cum emollientibus aliis notis miltorum, crebrius mammas applicatur: v. g. ex herba & radice fœniculi, ex malva, mentha, floribus sambuci, melilori, semine fœniculi, anisi, nigellæ & similibus: quæ vel in lacte vaccino, vel in aqua simplici coquantur, ut ita ad majorem lactis copiam transmittendam disponantur in mammas. Item sunt qui commendant cataplasma ex farina hordel, herba malvæ, & fermento, mammas applicatum, quod nonnihil aterahit. Item Inunctio mammarum cum oleo lumbricorum terrestrium laudatur, (vid. HILDANUS Cent. 4. observ. 17.) quod præpregnandum venit cum aliquot guttis olei destillati anisi. Item herba Pimpinellæ mammas appositæ, aut vinca per vinca contusa, mammas circumdata lac augmentat: quin & post partum & absolutam digestionem frictio mammarum moderata cum pannis asperis, ut incallescant nonnihil, ac ita mediante sanguine uberius affluente, uberiori lacte turgescant. Mercurius in nuce avellana excavata intra mammas alligatus commendatur: Vid. WEDELIUS de Fac. Med. pag. 196.

Hic est defectus lactis.

## CAPUT II.

### DE

## LACTIS ABUNDANTIA.

Contrarium vitium est, cum lac nimis redundat, quod vocatur *Lactis Abundantia*. Fit enim interdum, ut lac nimis redundet, ita ut plus debito luxuriet lac, dum non tantummodò sufficit nutriendo fœtui, sed præterea, etiam vel spontè effluit: Idque fit vel absolute, vel respectivè: respectivè in iis, quæ lactare nolunt, & ita lac in mammis colligitur; absolute lac abundat, quando mulieres, etiam lactantes, plus lactis congerunt, quàm fœtus exsugere potest.

### CAUSÆ.

Origo ejus investiganda est vel in materiæ copia seu uberiori alimento assumpto in subjectis sanis & salubribus, hinc in laudabili digestionem stomachi; vel mammarum laxitate molliorque, hinc spongiositate glandularum copiosarum & melioris consistentiæ, à quibus uberior lactis copia emulgetur & transcolatur; & in specie volatili acido, præcipitante lac ex massa sanguinea: quod & ipse fœtus robustior & famelicus, fortius exsugens lac, ac proinde majorem ejus influxum per accidens excitans, pertinet.

### DIAGNOSIS.

Quoad Signa: sequentia observanda sunt:

(1.) Evenit interdum, ut mulieres lactantes, dum lac promptè vel uberius affluit ad mammas, vel quibus jam lac copiosum in mammis est, in iis percipiunt insignem turgentiam à lacte retento, & dolorem quasi prementem & contundentem in regione spinæ dorsæ; quod ipsis per quàm molestum est, sæpe enim non possunt dormire. Et hoc sepius evenit ex abundantia lactis, vel quando simpliciter redundat, vel quando non sufficienter emulgetur ex mammis; quod ipse observavi non solum in mulieribus lactantibus, sed etiam habitioribus & succulentioribus, quibus mediis gestationis mensibus, dum scilicet lac in mammis suboritur in quibusdam solet, qui tamen dolores evanuerunt, ubi lacti patuit exitus per mammas. Et talis, uti dixi, dorsæ compressivus dolor oritur ex redundantia lactis, stagnantis quasi in locis & valis, per quæ aliàs esset deferendum ad mammas.

(2.) Quod lac, quando vel uberius ad ubera movetur, & copiosius in iis retinetur, interdum simul tumorem glandularum mulieribus, ubi sub axillis musculus pectoralis, qui brachium attrahit, inferat, quod ineptè Chirurgi pro abscessu radicali interdum habent: unde puerpera lactantes brachium movere sine dolore non possunt. Præterea

(3.) Lactis abundantia patet ex copiosiore excretionem, ejus, quæ imprimis tunc est curanda, quando tam copiose abundat lac, ac simul spontè effluit, ut exinde emacietur fœmina, aut etiam nonnihil debilitetur.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Malum per se patet, per se innocuum est, & benignum naturæ beneficium.

Moderata ergo abundantia minus mala est; cum fœtus successive grandior acrobustior, plus ejus in sui nutrimentum absumat.

Non tamen adeo contempnendum est, si enim nimis abundet, ut atrophiam sequatur, aut virium debilitas, curationem omnino postulat. Metus quoque est, ne lac in mammis redundans ex tumore nimio dolorem, inflammationem, hinc lactis corruptionem inferat: imo ipsum lac in mammis uberius congestum, quàm vel fœtus exsugit, vel in mulieribus, quæ lactare non volunt, proprio motu ad suam corruptionem & acescentiam vergere, coagulari, & ita mammarum dolorosa irritatione scirrhos, scrophulas & abscessus, aliaque mala, inferre potest: minus tamen adeo periculosa, quando uberius fluunt lochia.



## C U R A.

Quoad Curam: In hac duo scopi observandi sunt:

1. Nimijs lactis proventus tam internis appropriatis, quàm externis, præcavendus.
2. Genitum verò jam lac copiosum & mammas distendens, vel mediante sudore, quo etiam promovetur lochiorum excretio, vel mediante per papillas effluxu, removendum.

Effluxus per papillas promovetur vel emulsionem spontaneam; vel suctione per canem, qui dentes non habet; vel mediante sacculis oryza, aut milio, aut hordeo confuso plenis, quàm fervide ferri potest, mammis impositis, idque in specie, si prius impositum fuerit *emplastrum de spermate ceti Myrsichti*, ut integras mammas tegat; sic præcavetur lac à sui coagulatione; fiant nempe sacculi pollicis crassitie, iique interpassati, probè calefacti imponentur dicto emplastro, crebrius repetendo, toties nempe, quoties calor remittit, sic lac fluidum manet, & spontè per papillas emanat. Milium enim, oryza & hordeum mammis imponuntur non propter specialem vim, sed propter calorem, quia magis quàm aliud subiectum calorem retinet.

Post moderatam ergo dietam interna quædam appropriata, in specie autem externa, vel adstringentia, vel resolutiva, vel appropriata, quæ lactis redundantiam tam præservant quàm curant, usurpanda veniunt.

Quoad remedia interna: Mentha, ejusque aqua & decoctum, est unum ex optimis lac absorbentibus: (quidam etiam dicunt, lac generare:) item Cicuta, Apium, ejusque aqua vel decoctum radicis bibitum; item *Vitex* seu agnus castus, *eiusque semen*, & ex eodem parata remedia. Rosmarinus etiam & Cherefolium ad lactis copiam imminuendam laudantur. Nicotianæ usus lac potenter absorbit, Auctore SANCHEZ in *Observationibus*. Ex Anetho etiam, Cherefolio, item Cumino, Coriandro & Myrrha, quæcunque assumpta lac imminuunt. Semen lactucæ lac imminuere solet, quando nimirum in nimia copia affluit, temperando illud; quod quidem non solum, sed cum vitæ, facit. In genere omnia ea lac muliebri imminuunt, quæ aliàs ad genituram extinguendam & imminuendam in gonorrhæa in usu sunt; sed parciùsea usurpari solent, ne vis genitalis imminuatur: quibus accedat uberior lochiorum fluxus, aut revocetur in ordinarium cursum menses, qui ut plurimum sunt suppressi lactantibus; aut infiruetur venæ sectio in brachio.

Potius tamen externis hic insistendum est, quæ sunt imprimis aqua apii & menthæ applicata, quæ epithematum instar lac imminuunt; sicut ipsa mentha confusa, instar cataplasmatum mammis circumposita, lac discutit & dissolvit in iis, quæ lactare nolunt, uti & calamintha. Quædam idè mulierculæ aquam menthæ reiciunt, quod postea nunquam lactare possint. Fetus ex semine cumini confuso in aceto & aqua decocto applicatus, vel decoctum cumini cum aceto, cum vel sine paucò alumine, foris instar calidè subinde mammis applicatur; aut paratum cataplasma ex semine cumini confuso cum aceto simplici, & ita calidè applicatum, convenit. Cataplasma ex farina fabarum & lentium in oxycrato decoctum est expertissimum mammis impositum: Vid. M. A. N. C. Ann. 6. & 7. Append. pag. 36.

Vel

Rad. Apii ʒi.

Sem. Cumini,

Coriandr. an. ʒʒ.

Coqu. in f. q. aceti & aquæ Menthæ, vel in aqua, & vino, addendo parum aceti destillati.

Colatura D. pro Epithemate.

Cum lintels multiplicatis calidè applicando mammis, cui interdum etiam aliquid aluminis addi potest:

D. S.

Externum epithema.

Expertus est hic fatus sæpissimè à D. MICHAELIS ad præcavendam lactis abundantiam. Cautè tamen applicandum hoc epithema, ne lac tam ab hoc, quàm aceto, coaguletur.

Folia & radix petroselinii nonnihil siccata, vel in nodulis infusa & externè applicata, lactis abundantiam impediunt. Eminent *Cicuta* & *Mentha*, vel recentè confusa & mammis applicata; vel ex his paratum fomentum cum semine cumini & coriandri in aqua vel vino, lintels multiplicatis applicatum mammis calidè; vel ex decoctis fiat cataplasma

Estimull. Oper. Tom. II.

additè farinà fabarum cum oxycrato, seu aqua & aceto, quod cataplasma etiam egregiè conducit; vel cicuta cum aqua cherefolii, vel succus cicutæ aceti tantillo temperatus, item folia cucurbitæ & plantaginis cum aceto confusa, applicata, item emplastrum de cicuta mammis impositum, confert ad imminuendum lac; simul quoque lactis coagulationem, & glandularum indurationem præcavet; uti etiam succus plantaginis mammis illitus certò lac imminuit; quod etiam facit facit vinca per vinca in forma cataplasmatum dorso applicata. Papyrus griseus, sive charta bibula, melle virgineo illitus, mammis impositus lac imminuit: ac denique cancri fluviatiles calcinati, sacculo lineo inclusi & mammis applicati, usurpantur ad lac imminuendum.

Quod si mulier lactare nolit, ut evanescat lac denuò, convenit imprimis cataplasma ex mica panis, pulvere menthæ, aceto & sale, quo usus subinde TIMÆUS von Guldenkle. Vid. etiam WEDELIUS de Med. Facult. p. 197. Nec inconveniens est emplastrum HOFERI in Herkul. Med. pag. 340. cujus hæc est compositio:

ʒi. Cera alb.

Flava,

Pingu. gallin.

Axung. cervin. an. ʒʒ.

Mellis & liquatis adde

Camphora,

Myrrh.

Asæfat. ana ʒʒ.

Croci ʒi.

M. f. Emplastrum:

Quotingantur lintea in formam mammarum concinnata, sed ita perforata, ut papillæ exeant, sicque gestentur per sex septimanas.

WEDELIUS l. a. & pag. 199 mammis applicat emplastrum diachylon simplex, exceptis papillis, quæ libere sint; dorso verò emplastrum de spermate ranarum cum ana albi cocti, ut influxurum lac in via etiam impediatur, nec in mammas perveniat. Euporiston mulierum nostratum est, ut mox post partum, aut quando lac se manifestat, aut etiam dum jam effluere incipit, herba Alline viridis, Germ. das Maufe gedarme, leviter confusa nonnihil calidè applicetur mammis, & subinde renovetur, & ita lactis proventus in mammis sistitur. Vel folia brassicæ capitæ albæ, leniter conquassatæ, imponi solent, aut solitaria, aut petroselinio viridi nonnihil confuso repleta, calidè applicant ad præcavendum lac. Quidam recipiunt folia brassicæ capitæ, & huic imponunt allinem confusam, & calidè admovent mammis, crebrius repetendo. De cætero etiam optimum est experimentum sympatheticum, ut quando mulier vel recusat lactare, vel infantem ablaçtavit, pro lactis ubertate tollenda, si de suo lacte emulgeat aliquid in carbonem candentes, vel in ferrum candens: Omne enim lac, quod reliquum est in mammis, exsiccat, & successive breviter absorbitur. Notat hoc HELMONTIUS in suis Scriptis per experientiam, certum esse. Expertum etiam fuit à PETRO à CASTRO, Medico Veronensi. Probaturum est aliquoties post ablaçtationem infantum ad lac imminuendum: Nihil nocet lacti, alioque tempore lac accipiunt. Quando infantes clamitant, mater dolorem in mammis sentit, licet non sit domi: si fœtui mors immineat, lac mulieri deficere incipit. Communis etiam traditio est muliercularum, quod si mus nutritis lac gustaverit, lac statim in mammis absorbitur, quod tamen ferè dubium mihi videtur. Ratio dubitandi est hæc, quod in nutritum lacte seposito murium excrementa sæpius fuerint reperia, absque tamen impedimento ulterioris lactationis, ut ut lac degustaverint. Si post infantis ablaçtationem lac adhuc resistans mammis dolorem conciliet, prodest tunc ad lactis in iis scaturiginem sistendam, si succinum & crystallus appendantur in regione dorsi mammis opposita in nodulo; sic enim lac successive ex mammis moveri, & per alvum egredi, asserunt.





## CAPUT III.

## DE

LACTE IN MAMMIS DEPRAVATO,  
ET VARIIS INDE NATIS  
AFFECTIBUS.

## ARTICULUS I.

## DE

## COAGULATIONE LACTIS.

## CAUSÆ.

**T**ertium denique vitium est, quando *Lac depravatur* ac vitiosum fit: 1. quod variis modis in sapore, in colore & consistentia, fieri potest, pro vario usu sex rerum, non naturalium, & hinc digestionum varietate: qua ratione MEARA contra WILLISIUM observavit laccœruleum ex mammis excretum. Præ ceteris tamen familiarissimum & nocentissimum vitium est in lacte, si in mammis concreseat & coaguletur in grumos, ac in caseationem secedat; quod fit, quoties acidum, tam lacti proprium, quam aliunde superveniens, excessivum, lac condensaverit; sive coagulatio hæc in mammarum substantia fiat, sive in ductibus & glandulis ad papillas derivatis, perinde est. Jam vero promptissime aciescit & coagulatur lac, *partim* quod in se ipso occultum gerat acidum; hinc enim acorem, & per consequens coagulationem, lacti inducunt omnia ea, quæ eius alterationi vel aliquali corruptioni occasionem præbent, hinc namque subito aciescit, unde ejusmodi congrumescentia: *partim* quod in glandulis mammarum à lymphâ acidula, tanquam peculiari fermento, probabiliter specifico acido, corrumpatur: quibus si accedit spirituum animalium defectus, ex more nempe eorum sub animi pathematis gravioribus perturbato, necessario acidum antea blandum & occultum fit manifestum, indeque lactis proprii coagulativum. *Coagulatur* nunc ergo *lac sua sponte, nunc à rebus non naturalibus*. Sua sponte, quando quocunque modo in mammis alteratur, aut etiam diutius in ipsis retinetur; sic enim retentum, nec excretum, tempore loci occultâ fermentatione, alteratur, alteratum facillime aciescit & grumescit, & hinc mammarum supervenit tandem inflammatio, atque huiusmodi coagulationes pedetentim fiunt; sicut subito id accidit in rebus non-naturalibus, v.g. animi pathematis, mœrore, terrore subitaneo gravi, ira ac similibus; ab his enim mulieres mox percipiunt lactis grumos in mammis. Ex terrore mox lac coagulatur: Novi puerperam, quæ in somno ex graviore insomnia perterrita, huius insomnia occasione, mox lac in mammis coagulatum contraxerit. Si iracundiâ nimia sint affectæ, lactis coagulationem & erysipelas contrahunt. Facit huc etiam si post sudorem mammae subito exponantur aeri frigido; sic enim subito induci solet sicuti sanguinis, ita etiam lactis, ab acore subito coagulatio. Porro acida quælibet assumpta, in specie austera, si copiosius ingerantur, nisi corrigantur maturè in primis viis, vel extra inconsulto & intempestivè in mammis applicentur, lac quoque coagulare valent: qua ratione fomenta nimis acida, & quæ recipiunt acetum ab alijs admixtis non ritè temperatum (cominum temperat acetum) facillè lactis coagulationem inducere possunt. Rigor febrilis in febribus intermittentibus lac pariter in mammis coagulat, ut observat SCHNEIDERUS in *Obj. pag. 228*.

Causæ hæc si fuerint graviores, lac totum coagulant, mammaeque induratas reddunt: leviores si fuerint, lactantum modo in una alterave glandula grumesciunt, aut exinde saltem aliquot lorum infarctum inducunt, unde tunc fit, ut permaneat adhuc lactis per papillas effluxus, utut grumosa, & caseosa in mammis deprehendantur tactu.

## DIAGNOSIS.

Quoad *Signa*: Lac in mammis in grumos abisse, subito percipiunt femine: sed aliud est durities mammarum à lacte nimio mammae distendente, aliud lac coagulatum in mammis. Ordinariò in puerperio, quando tertio vel quarto die lac desertur ad mammae, mammae durissimè ap-

parent, sed tunc sunt æqualiter duræ: Verùm quando lac coagulatum est in mammis, mammae inæqualiter tument, nempe hinc inde tumores duri, tactui renitentes, nunc simplices, nunc multiplices, duplices, triplices, &c. subito deprehenduntur, modò majores, modò minores, modò continui, modò interrupti, prout plus vel minus continuæ, vel secretæ aut discretæ, fuerint affectæ glandulae; basis enim semper est glandula lacte circumflecta.

Tumor hic in principio est sine dolore; successivè autem mulier dolorem obtusum gravativum & quasi contundenrem in mamma percipit, nisi maturè dissolvatur grumus coagulatus.

Malo occasione grumi caseosi procedente supervenit calor, rubor, & insignis æstus mammae in loco lactis caseati, cum pulsu & pathematis totius corporis febrilibus, hinc dolor punctorius, intensissimus ardor, &c. mammae prehendantur, magis magisque phlogosi seu inflammatione intumescit, ac ex fibrarum spasmus propter irritationem doloris indurescit, hinc insigniter augentur dolores ardentes, pungentes, pulsantes, non secus ac si spina digito infixa est: hinc sub his tormentis inflammatio successivè suppuratur, ac simul laccaseatum in pus mutatur; factâ suppuratione aperitur abscessus, & ulcus factum mundificantibus & consolidantibus lege artis tractetur. Hæc ordinaria sunt phænomena, quæ insequuntur lac coagulatum; quibus semper suppurationis negotio febricula plus minus intensè iungitur, nisi lac jam grumosum factum maturè dissolvatur. Nam ubi perfectè semel induraverit coagulum lacteum: non nisi suppurationis negotio solvi, & ex mamma elici potest. Nempe ex lactis coagulatione tres sunt modi evadendi; aut successivè emollitum disparerit; aut superveniente inflammatione, beneficio abscessus, nunc sponte à apertura, nunc chirurgicâ per lancettam, vel cauterium potentiale a pertione evacuetur; aut tertio tandem, utut raro, promptè induratur, & in scirrhum abit.

Quod si ab animi pathematis, speciatim à terrore, fiat lactis coagulatio, ordinariò mox inflammatio erysipelacea primitus occupat mammae, cum intenso rubore, ardore, dolore pungente, in superficie mammae simul induratur, & in profundo grumi lactis caseati apparent; qui discussâ inflammatione erysipelacea adhuc contumaces persistent, & ita suprâ dicto modo, superventugenuinæ inflammationis & suppurationis, dissolvuntur.

## PROGNOSIS.

Patet ex his *Prognosis* facillè: scilicet non leve malum esse lactis aciescentiam, cum dolorosissima mammarum sint apostemata, febris etiam adjuncta, plus minus intensè esse solet, & ex his occasionibus ulcera mammarum diuturna & cacoëthea, cum sint partes glandulosæ, facillè oriri possunt.

Tota ergo huius ratio consistit in grumo lactis, qui si dissolvatur maturè, res in vado: si verò hæreat pertinax, non nisi mediante abcessu potest curari, qui nunc ritè mundificatur, nunc in ulcus sinuosum & fistulosum abit, nunc ipse tumor in scirrhum induratur, nunc facillè etiam in canorum degenerat.

## CURA.

In *Cura* ergo, ubi adest suspicio vel præsentia lactis coagulati in mammis, lac nondum concretum quantocyus removendum, coagulatum maturè resolvendum, & lac resolutum vel insensibiliter discutendum, per sudores nempe, vel sensibilibiter emulgendum; grumus verò si resolvi nequeat, saltem suppuratio promovenda, & abscessus maturandus, ut citius & jucundius, hoc est, minori doloris tormento, liberetur.

Unde pro his scopis obtinendis subito quantocyus mulier coagulum lactis, vel exinde sibi nasci tumorem, in mamma percipit, mammae emulgeat, quantum potest; vel si non possint, lac emulgere, mammae exsugendam cani præbeat, aut exsuctio per vitra instituat, ut id, quod nondum concretum est, maturè removeatur, ne & hoc concrecere incipiat. Quo facto, ut grumi citò dissolvantur, usurpentur internæ sudorifera absorbentia seu acidum coagulans infringentia, atque hinc sanguinem & lac grumosum resolvant, qualia sunt sperma ceti, grumos quoscunque resolvens, à 3ss. ad ʒi. usurpatum. Hinc etiam emplastrum de spermate ceti Mynsichti, externè mammae mulierum lactare nolen-



polentioni statim impositum, ad præcavendos lactis grumos non habet æquale remedium, præcavet simul, ne reliquum lac tam facile in mammis concrefcere possit. Propinquetur ergo lapillis cancerorum, qui vulnerarii, & acido absorptio lac resolvunt, imprimis si myrrha paululum sit addatur, cornu cervi sine igne, antimonium diaphoreticum, cum salibus fixis, cardui benedicti nempe, absinthii & similibus; nunc in forma pulveris, nunc cum rob sambuci in forma boli, & mediante superventu sudoris acidum infringatur, & lactis grumos, quantum possibile, dissolvatur. Pulvis millepedum seu asellorum sicut mira præstat in chirurgicis casibus, ita etiam in specie in resolvendo lacte coagulato si ad ʒss. ad ʒi. crebrius hauriatur, idque experientia RIVERII Cent. 4. Observ. 89. ulceraque mammarum cavernosa mirabiliter curat. Porro semen feniculi, cumini, anisi, crocus, salvia, mentha, cheresolium ac similia internè usurpata etiam lactis præcavent & resolvunt grumos. Præceteris *salia volatilia*, quæ per sudorem & vi alcalinâ grumos lactis coagulatos dissolvunt; primariò spiritus salis ammoniaci probe ædificatus, liquor cornu cervi succinatus & similia, acidum quodcunque destruentia, & hinc lactis grumos dissolventia, conveniunt dosi ad ʒi. ad ʒi. & blandum sudorem, istis propinatis, mulier exspectet. Et si rectè sudant, mox sensibilis levamen in mammis percipiunt, tam in lactis coagulatione, quàm etiam, si supervenit inflammatio. Si spiritus salis ammoniaci usus sit nauseosus, commodè dissolvitur & assumitur cum lacte; sic enim sapor & odor ejus fit insensibilis.

Quoad Externa: ubi sudaverunt, mox in principio ad dissolvendos lactis grumos maturè imponatur emplastrum de spermate ceti Myrsichti, de quo jam monui, tanquam optimum, imponendo desuper supra laudatos sacculos ex oryza, milio vel hordeo confuso, ut partim internis, partim his externis, grumus lactis denuò dissolvatur, quæ ipsa etiam remedia aliquamdiu continuanda. Certè emplastrum hoc de spermate ceti non est contempnendum, ritè paratum nempe, si ceræ albæ liquefactæ in sartagine addatur galbanum, & hinc probe mistis ab igne remoto addatur demum sperma ceti, ut fiat emplastrum ductile, totis mammis inducendum. Conferatur de ejus usibus TIMÆUS von GULDENTREE in *Casibus* pagina 234. Tamen hoc magis præservationis gratiâ, aut tutum in principio coagulationis confert. Si enim jam grumi quidam appareant, aut coagulum lactis durius & pertinacius fuerit, ita ut dicto emplastro cedere nolit, vel coagulum hoc modo resolutum iri vix suspicio sit, tunc optimum est emplastrum de galbano crocatum Myrsichti probe calidum (*Galbanum est valdè bonum*) integræ mammae insitratum, ad motis simul modò dictis sacculis, & continuatis internis, imprimis cum sudore, certè egregium est hoc emplastrum in grumulis lactis dissolvendis, vel sequens emplastrum, quod aliquoties expertus fui:

ʒi. Empl. de Galb. crocat. Myrs.

Gummi ammoniaci aceto solut. vel lento igne liquat. an. q. f.

Liquefacta malax. & sign.

Emplastrum resolvens.

Inducatur super alutam seu linteum crassum (aliàs xylinum) ita ut integram mamam obtegat, transcendendo foramen pro papilla; post imponatur mammae probe calidè, & imponantur sacculi fervidi jam dicti, & mulier disponatur ad sudorem; sic perchoatos grumos absorbit, & denuò resolvit, atque lac successivè evanescit. Sed necesse est, ut fiat in principio; si enim per bidduum aut triduum lac coagulatum in mammis hæserit, frustra est, ut dissolvantur grumi, & insensibiliter dispareant. Convenit etiam hujus emplastri usus illis, qui infantes ablaçant, & quibus ex lacte retento & coærvato dolor & grumescencia imminet. Sanè si ex terrore vel alia subitanea occasione lac in grumos abeat etiam, emplastra dicta imposita cum sacculis istis sæpius renovatis, & internè sudoriferis propinatis, in principio administrata multum profunt. Externè quotidie bis sequentem spiritum illinare jubeo:

ʒi. Spiritus sal. ammoniaci cum calce viva, vel aqua calcis viva saltem, ʒi.

ʒss. Croci ʒiii.

Diluatur cum spiritu Vini, non adeò rectificatus plus minus:

D. S.

Externa Mixtura resolvens.

Mixtura hac calida illinantur loca grumosa, & sic impona-

Erasm. Oper. Tom. II.

tor dictum emplastrum, quotidie bis renovando illinitionem, & idem emplastrum denuò, & desuper sacculum oryzæ & avenæ repletum calefactumque imponendo.

Subinde etiam ita præscribo:

ʒi. Empl. de Galb. crocat. ʒi.

Diachylon. simpl. ʒiii.

Liquefacta malax. cum f. q. feci cervini.

Inducatur super linteum amplum, & applicetur mammae

D. S.

Emplastrum resolvens.

Egregiè dissolvit.

Novi mulieres, quæ ubi ex quodam affectu animi, vel alia quavis occasione duritiem mammae cum rubore & phlogosi erysipelacea observant, & hinc lactis coagulationem metuunt, mox emplastrum Norimbergense dictum applicant, & hinc potentem sudorem eliciunt.

Juxta hæc etiam hic in usu est, ut ad lactis coagulati grumos dissolvendos Ruta & Mentha confusa, & tanquam cataplasma mammis imponatur per osiduum, quotidie novam recipiendo: Optimè resolvit lactis grumos, imprimis si simul propinquetur internè omni manè ʒi. seminis anethi. Hinc cicuta confusa & imposita etiam lac grumosum resolvit. Quidam etiam fotus suadent ex decocto chelidoni majoris applicato; vel ex decoctis feniculi, anethi, abrotani, chamomillæ, cheresolii, cicutæ, menthæ, & similibus applicantur: quod etiam pertinet fotus PAULI in Quadr. Botan. pag. 396. ex herba menthæ, & rutæ cum tantillo seminis carvi in aceto cerevisiæ coctis, & insit cataplasmatibus applicatis. Vel

ʒi. Herb. Mentha,

Flor. Chamomill.

Lil. alb. an. M. i.

Rad. apii ʒss.

Sem. Cumin.

Coriandr. an. ʒii.

Inelisa & confusa D. S.

Externe species.

Ebulliant in posca sive oxycrato, id est, mixtura ex aqua & aceto: Decocto immergantur lintea, & calidè repetitis vebibus mammae admoveantur.

Sed quoniam hujusmodi humida ad mota facile refrigerantur, unde & tenera & sensibilia mammarum cutis occasione frigidi & humidi ambientis poros contrahit, indeque ex insensibili transpiratione impedita dolor, irritatio, & hinc inflammatio exasperatur, propterea fotuum loco majoris facio emplastra. His etiam adnumerentur folia & radix petroselinii imposita, quæ lactis grumescentiam impediunt: verùm hæc saltem juvant in principio. Quod si nihilominus in duiores grumos abierit lac, ita ut dictis modis discuti nequeant, tunc supervenit vel inflammatio mammarum, vel gangræna, vel indurantur in scitridum.

## ARTICULUS II.

### DE

### ABSCESSU LACTANTIUM.

**S**i ergo hæc sunt dicta sint irrita, ita ut ex lactis coagulo jam imminet mammae inflammatio, suppuratio & futurus abscessus, ut maturetur inflammatio, & promovetur suppuratio, internè propinquetur pulvis ex lapillis cancerorum, sale cardui benedicti, myrrha & similibus, quæ nimium acorem in primis viis absorbent & destrunt. Si mulier sudet interdum, est curatio magis prospera.

Externe egregium est pro maturando abscessu, ut mamma tumida illinatur spiritu salis ammoniaci cum calce viva, & spiritu vini parato; melius est, si addantur crocus & caryophylli, & destilletur; e. g.

ʒi. Spiritus sal. ammoniaci cum calce. vin. ʒvi.

ʒss. croci ʒiii.

M. D. S.

Externa mixtura leniens.

Vel

ʒi. Aqua artie. ad extra ʒi.

Spir. sal. ammon. cum calce. vin. ʒvi.

M. S. ut ante.

Illinatur, quàm calidè ferre possunt, cum linteolo, mammae tumide, quousque rubet, tumet & dolet, ter quotidie, imponendo desuper calidè emplastrum diachylon cum gummi, vel modò laudatum emplastrum de galbano crocatum



Mynsichti, malaxatum cum sufficiente quantitate olei tartari scetidi, superimponendo calidè sacculum oryza, vel milio turgidum. Reiteretur hoc quotidie bis vel ter; his enim mediis facilitatur in tantum suppuratio abscessus, ut ne dimidios dolores percipiant, quos aliàs sentirent, si cataplasmata Chirurgis usitata applicentur: *suppurat facile & emollit*, &c. Vel illinatur mamma isto spiritu, & imponatur desuper emplastrum diachylon cum gummatibus, vel solum, vel cum allis mixtum, e.g.

℞. Empl. de Melil. ℥iij.

Diachylon. cum gummi. ℥ij.

Mista malaxentur cum s. q. ol. lil. alb.

D. S.

Emplastrum emolliens.

Aut

℞. Empl. de galb. croc. Myns. ℥ij.

Diachyl. simpl.

Gumm. ammon. cum acet. dissol. an. ℥ij.

M. pro Emplastro,

Malax. cum s. q. Ol. Philos.

D. S. ut antè.

Hoc post factum istum litum semper denuò probè calefactum imponatur, idque quotidie ter repetatur; sic pedetentim suppuratur abscessus. Nam successivè in quodam loco levius emergit tuberculum, quod si appareat, digito contingendum est, an sub eo omnia sint molliora? nam si durum est, continentur remedia; sin verò molle, aperiendum est cultello. Aliàs pro promovenda suppuratione in usu est, ut imponatur emplastrum ex mica panis cum lacte, vel medulla panis cum succo apii imprægnata; sed faciunt dolores. Sin uerò suspicio supervenientis inflammationis absit, sed futura apostematis aperiitionis, commendatur remedium HILDANI Cent. 2. Obs. 58. quod est cataplasma, quod vel solum impositum mammae interdum dissolvit coagulum, & cessare facit inflammationem, vel si hoc non fit, faciliè abscessum ducit inflammationem. Accipitur etiam ad maturandam suppurationem succus simi ovilli, qui mistus cum aqua agrimonie imponitur; aut ipsa herba agrimonie, vel cherefolii cum radice contusa, addito butyro & melle, suppurat, & maturatq; suppurationis abscessum adjuvat. Sicuti etiam loco horum ad maturandum & rupendum tumorem sequens cataplasma est egregium:

℞. Rad. Ireos. noff. vel Florens.

Cepar. sub cineribus cal. coct. an. ℥iij.

Fermenti ℥ij.

Pitell. ovor. No. iij.

Axung. porcinæ. rec. non salit. ℥ij.

Ol. Rosar.

Farin. sanogr. vel sabar.

Scm. Lini an. ℥i ad ℥ij.

Omnia contund. & Misc. pro Cataplasmate mammis imponendo:

D. S.

Puls. emolliens.

His modis ferè lactis gromositates & ex his natæ inflammationes tractandæ veniunt.

Quodsi maturatus sit abscessus, convenientissimum est, ut lancettâ aperiatur; dolorum enim atrocitas non permittit, ut expectetur spontanea apertura. Cutis nempe membranosâ & densâ longum tempus requirit, donec plus minus salum penetret, unde dolores majores, quando ad cutem pervenit. Internè autem, quia tantum glandulæ & pinguedo faciliè pure resolvuntur, inde minores dolores observamus. Aperto abscessu evacuandum est pus, postmodum mundificandus est, partim ut grumi foras eliciantur, partim ne in vlcus fordidum degeneret. Pro purificando & consolidando abscessu facto optimum est applicare cum turundis balsamum Peruvianum, balsamum sulphuris terebinthinatum, oleum hyperici, aut saltem digestivum quoddam commune ex vitello ovi, melle & terebinthina. Egregiè etiam mundificat abscessus mammarum oleum nucis juglandiscum turundis applicatum. Loco huius præstantius longè est oleum stercoris humani, quod ulcera & abscessus mammarum periculosos, qui acriores facti gangrænesunt, egregiè mundificat & purificat. Præterea commendatur oleum Momordicæ per infusionem, vel infundantur poma momordicæ rubicunda & spinosa in oleo olivarum vel lini. Hoc cum turundis applicatum, vel blanda manu instillatum in abscessum, est admirabile in mammarum abscessibus & ulceribus. In defectu huius sumitur balsamus sulphuris vel communis Rulandi cum oleo papaveris, vel oleo nucum, vel amygdalarum

dulcium expresso, vel nobilior cum oleis destillatis; terebinthinæ, &c. & vel solus, vel si acrior fuerit, mixtus cum vitello ovi applicatur, applicato desuper emplastro dia sulphuris Rulandi, vel emplastro diachylon composito. Solis etiam foliis tussilaginis ulcera mammarum curata sunt. Abscessus servatur tamdiu apertus, donec parum vel nullum tumoris duri superfit indicium.

### ARTICULUS III

D E

#### MAMMARUM FISTULIS.

**Q**uodsi fiat, ut abscessus apertus degeneret in *Fistulam* (quæ in huiusmodi locis glandulosis admodum sunt contumaces) sinuosaque ulcera, sanè oleum modò laudatum Momordicæ est præstantissimum ritè adhibitum, aut usurpanda sunt medicamenta FORESTI lib. 1. observ. 24. Nempe eluenda est quotidie fistula bis cum decocto agrimonie, in quo parum aluminis & myrrhæ sunt contenta; Hinc tale applicetur unguentum:

℞. Succ. agrimon. ℥i.

Aloes,

Myrrhæ,

Sarcocoll.

Alum. plum. an. ℥i.

Et incorporentur cum melle pro Unguento ad fistulas mammarum.

D. S.

Unguentum mundificans.

Alia remedia fistulis dicata pro mammis videbitis in SCULTETI *Armat. Chirurg. obs.* 75.

### ARTICULUS IV.

D E

#### INFLAMMATIONE MAMMARUM.

**H**abulmus superius symptomata, quæ circa lactis generationem superveniunt: verùm hæc ipsa symptomata, in specie coagulum lactis, spissimè causa est variorum & gravium mammarum tumorum, quibus mulctantur sæpius; qui tumores propius ad Chirogiam spectant. Quoniam autem periculosissimi sunt, & singulare quid obtinent, de his quædam adhuc monenda sunt. In genere in omnibus mammarum affectionibus observandum est, quod mamilla affecta rard ad sanitatem perducatur, nisi altera sana lacte exsicceatur, ut rectè hoc observat AMATUS LUSITANUS in Cent. 1. Cur. 47. quia, dum hæc insitit ad unam mammam, etiam fluit ad alteram, & sic malum exasperatur. Observatur enim, quod in muliere lacte abundante, si frætus mammam unam sugit, ex altera etiam lac ploret vel stillat.

### CAUSÆ.

Sæpè ergo ex lactis coagulo in mammis, aut quod aliàs stagnat, accescit vitiosa, aut quacunque ex causa, Inflammatio vel simplex, vel erysipelacea, mammam mulieris, præsertim puerperæ,prehendit: id quod præter intensum ruborem & dolorem gravativum ac non nihil lancinantem, simul rigor febriliscum in sequenti çstu, & in medio sub vehemens pulsatio, ostendit. Rariùs oriuntur inflammationes mammarum ex contusione externa, aut etiam ex angustia nimis mammarum constrictione.

Hæc ferè sunt causæ, quæ inducunt inflammationem Mammarum.

### DIAGNOSIS.

Signa ex dictis patent: Nempe ex tumore, dolore, ardore, & pulsationis sensu, ratione arteriarum in sanguinis distributione impeditarum: quæ si percipiuntur, certum signum est, properare tumorem mammae ad inflammationem & suppurationem, ubi frustra est omnis conatus discutienti grumos lactis & tumorem inflammativum; qui tumor est quidem minor in Erysipelate, ardor verò & dolor in hoc est maior.



## P R O G N O S I S.

Quoad *Prognosin*: Inflammationes omnes mammarum sunt periculosa, quia ut plurimum abeunt in abscessus, & hinc in ulcera sinuosa, interdum etiam in fistulas: si non abeunt in abscessus, indurantur in scirrhos, qui levi errore abeunt in caneros. *Rarissimè enim inflammationes mammarum, in specie ex lactis coagulo, discuti possunt.*

## C U R A.

Quoad *Curam*: mox opera danda est, ut lac sedulè emulgeatur, inflammatio verò resolvatur ac discutiatur quanto citius: aut si hoc fieri nequeat, sanguinis aut lactis grumi ex acido coagulati & stagnantes, per suppurationem maturentur, & in abscessum transmutentur. Internè sudoriferum fixum ex pulveribus diaphoreticis cum salibus fixis, lapillis cancerorum, *myrrha*, sale absinthii, cardui benedicti, & similibus propinandum, ut largiter sudent. Conveniunt etiam remedia ex mentha & cherefolio; nam horum decota, succi, &c. inflammationem sistunt, aut suppurationem fientem adjuvant; vel sola aqua ex mentha & cherefolio destillata artificiosè, si poterit mirificè in inflammatione, mammarum conducit. Hinc ex carduo benedicto blandè & moderatè usurpata sudorifera sanguinis stagnationem egregiè tollunt. Hisce sperma ceti primariò est addendum, si parum eius misceatur cum *myrrha*: prius, nempe sperma ceti, coagulatum tam lactis quam sanguinis dissolvit: postea, *myrrha* scilicet, acorem corruptivum sub suppuratione arceat.

Præ ceteris tamen, *Externis* imprimis insistendum, quæ inter ad inflammationem mammarum discutieodam imponatur Papyrus griseus, seu charta bibula, vel cæruleus propter colorem, qui est ex Cobalto, benè confisicatus, melle virgineo illitus, mammis impositus. Si verò fuerit *Inflammatio* gravior, est optimum phlegma vitrioli, purum sine acido, aliquoties à proprio capite mortuo cohobatum; quia singulares habet vires à sulphure vitrioli: Item aqua cicutæ, aqua plantaginis, in specie spermatis ranarum, remediùm singularissimum ad quæcunq; erysipelata. Convenit itidem decoctum thuris & myrrhæ in aceto & vino tepidè applicatum. Aqua calcis vivæ, si quæ alia, inflammationem omnem avertit, resolvit & discutit: vid. *WEDLIUS de Med. Facult. pag. 199.* Ulterius unum ex expertissimis ad mammarum inflammationes remediis est castaplasma, factum ex farinis, v. gr. ex farina fabarum, lupinorum & lentium in oxverato, seu aqua & aceto, coctis & subactis, & cum abdominis ori pauco mistis, imponatur mammis: vid. *RIVERIUS Cent. 4. Observ. 74.* Hoc castaplasma, uti *suprà* ad Inflammationes Testium seu singularissimum commendavi, quia etiam sunt corpora glandulosa; ita & hoc ipsum est experimentum *RIVERII*, tam in testium quam mammæ inflammatione, in *Cent. 1. observ. 39. Cent. 3. obs. 1. & Cent. 4. obs. 74.* & *AMATI LUSITANI Cent. 2. Cur. 34.* contra mammarum inflammationes: Idque calidè sæpiùs repetendo; sicuti loco huius alii usurpant Linimentum ex farina seminis lini cum melle subacta illitum. Porro etiam canceri fluviatiles triti crudi, tum mentibus mamillis illiti, mire profunt; Nam in canceris ad rem Chirurgicam pertinentia multa latent arcana. Tandem emplastrum de spermate ceti Mynsichti, emplastrum de cicuta Hildani, & similia, inflammationes similiter resolvunt. Præ ceteris observatu dignum est, quod manus, in qua talpa viva tamdiu fuit detenta, donec moriatur, si imponatur mammæ, in principio statim inflammationes egregiè sistantur; quæ ipsa manus etiam cancerum mammæ occultum, singulariter curat: Vid. *SCHMUCK in Curat. Magico-Magnet. & HORSTIVS.* Denique pinguedo serpentum in tumore mammarum ex lacte abundante cum metu inflammationis mirificè confert, si illinatur; uti etiam in iam dicto casu singulariter utile est, si recipiatur medulla panis, imbibatur cum succo apii, & imponatur mammæ; sic enim sanabitur.

His & similibus dictæ inflammationes discutieudæ; minus, suppuratio expectanda & promouenda, de qua *suprà* sufficienter dixi.

## ARTICULUS V.

## D E

## ERYSIPELATE MAMMARVM.

## C A V S Æ.

**D**istinctio autem facienda est ab inflammatione mammarum, quæ ab alia causa superuenit, & etiam ab ERYSIPELATE. Interdum enim, & quidem sæpiissime, terrori puerperarum superuenit similis erysipelacea inflammatio in mammis, una cum lactis coagulo; exinde enim horrore corripiuntur, postmodum gravem æstum incurrunt, & vehementem pulsationem in mammis percipiunt.

## D I A G N O S I S.

Erysipelas mammæ mox apparet, mamma rubet, calet, coccineo colore tincta est, & dolores lancinantes & pungentes in eius superficie percipiuntur.

## C V R A.

In *Cura* lac emulgeatur. Internè verò, dum calor durat, propinentur remedia diaphoretica fixa, in specie alcalia, acidum absorbentia, v. g. Bezoardica antimonialis, cornu cervi, lapilli, cancerorum, &c. cum sale absinthii, cardui benedicti, &c. v. g.

℞. Cornu cervi sine igne ℥i.

Salis Card. bened. ℥ss.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis dissolvens.

Expectetur sudor, sub quo mammæ lintels calidis probe obtegantur, ut sudor erumpat.

Hoc facto, si levius fuerit erysipelas, pro discussione tumoris erysipelacel applicentur sacculi ex floribus sambuci, qui interpassati cum spiritu vini probe rectificato largiter irrorentur, suffumigando pulvere succini & thuris, & quàm calidè fieri potest, admoveantur, aliquoties repetendo. Vel, si gravius fuerit malum, optimum est, ut fiat emplastrum ex theriaca & sale absinthii:

Nempe

℞. Theriac. ℥ss.

Salis Absinth. ℥i. vel ℥ss.

Quæ mixta in forma emplastri calidè imponantur mammæ erysipelate affectæ; est præsens remedium.

Loco horum est optimum Rob sambuci, quod inducatur linteis, & postmodum probe calefactum tam calidè, quàm mulier perferre potest, imponatur, & hoc omni hora repetatur calidè (in hoc enim consistit arcanum) sic & resolvitur lac & discutitur imminens & jam factum erysipelas. Superfluitio est, quod horreat talia humida. Vel pulvis erysipelatos Mynsichti cum spiritu vini tartarificato ebrius, calidè mammis applicandus, & imponatur vel linteum vel sacculus ex floribus sambuci & chamomillæ, mulierque blandè fudet, aut semper madeat. Convenit itidem decoctum thuris & myrrhæ in aceto & vino tepidè applicatum. Ubi dolor intensior, aut folia hyoscyami, aut laudani opiatum tantillum, aut similia, commodè addi possunt. Vulgo, & quidem non à vulgo Medicorum, sed à singularibus Chymicis, commendantur specula pavonum seu orbicula lucida, quæ in pennis pavonum sunt conspicua, idque ex signatura, quam habere dicuntur cum mammis, quas quodammodo repræsentant: Sed profectò nescio, annon ex falsa quadam hypothese seducti sint hi Auctores de speculis pavonum; & vereor, ne soli imaginationi indulgentes frustra usurpentur.





## ARTICULUS VI

## DE

## SCIRRHO MAMMARUM.

## CAUSÆ.

**V**erum hi ipsi tumores, siue sint ex sanguinis siue lactis coagulo, non semper resolvuntur, neque etiam suppurantur, sed sapissime non ritè tractati, ab acido proprio, contracto in materia coagulata, indurantur in tumores duros & indolentes: Et quidem si sint ex sanguinis grumis, ex inflammatione indurata & coagulata, oriuntur imprimis scirrhi: sin verò sint ex lacte, in glandulis mammae coagulato & indurato, oriuntur scrophulæ seu strumæ, ut ut hoc rarius fiat, quin ut plurimum per suppurationem grumorum lactis, tanquam spina exotica à natura ejicitur. Alias causas vix habent scirrhi & scrophulæ, nisi interdum in mulieribus ex mensium aut emansione naturali aut suppressione præternaturali superveniat scirrhosus in mamma.

## DIAGNOSIS.

Tumor talis tactui renitens, indolens, & qui instar lapidis in parte infixus ponderosus hæret.

Indolentem dixi tam scirrhum quam strumam. Scirrhi mammarum sunt varii; oriuntur enim vel à causa manifesta, & sunt indolentes; vel pedetentim ab interna causa, qui subinde sunt nonnihil dolentes, non quidem continuo, sed interdum. Scirrhi hi, si duri, indolentes, sine insigni caloris naturalis mutati vestigio fuerint, scirrhi legitimi dicuntur, & specialiter ex acido fixiori, lac aut sanguinem fortius condensante & coagulante, oriuntur. Sin verò pulsare & hinc dolere incipiunt, & punctiones acutæ in eodem observantur, calor etiam, obscurus licet, non nihil in eodem observetur & color ad aliqualem livorem degenerat, signum est scirrhi illegitimi seu cancerosi, aut saltem ad canceri naturam declinantis, & ab acido volatili corrosivo facillimè effervescenti originem ducit: unde relinquendi sunt, ne exasperentur, & crabrones irriterentur; reliqui vero scirrhi curandi sunt. Ex quibus faciliè patet, quomodo cognoscantur scirrhi & scrophulæ mammarum.

## PROGNOSIS.

Quoad *Prognosin* eorum: Causæ & circumspiciendæ admodum curari debent; nam facili errore in canceros degenerant; idque imprimis in mulieribus, quibus jam naturaliter deficiunt menstrua.

Imo qui ex mensium vitiiis superveniunt scirrhi aut scrophulæ, scirrhi imprimis, non nisi cautè attingi debent, quia ut plurimum, si non semper, aliquid cancerosi subest.

## CURA.

Quando ergo tumorem durum scirrhosum, ut plurimum inveteratum, patiuntur mammae, hic, si indolens fuerit, id est sine punctiõibus subinde recurrentibus affligat, durum coagulum, siue sanguinis sit in scirrho, siue lactis in scrophula, nunc relinquendum, nunc verò successivè emolliendum, discutiendum & resolvendum est. Nam ut suppurantia applicentur, nisi ipsa natura edendat, nemini auctorero; periculum enim est, ne suppurantia & emollientia propriè sic dicta acidum scirrhi attenuent & volatilifcent, & ita promptissimè hos tumores in cancerosam naturam degenerare faciant. Acris ergo resolutiva, penetrantia, & potenter emollientia, sunt applicanda. Internè ex fumaria & vulnerariis parata remedia, & similia, sunt usitata, quæ tamen facillima.

Externè primum obtinebit ad scirrhum legitimum & scrophulas mammae emolliendum gummatum, speciatim gummi ammoniacum in aceto solutum, & instar emplastri mammae indutum. Eisdem vires cum ammoniaco obtinet etiam Galbanum, & in genere quælibet emplastra ex gummatibus composita. Semper autem, antequam applicentur, præmittendus suffitus ex vino & aceto, siliçi seu lateri candenti affuso. Convenit itidem Unguentum de cicuta Hildani, mistum cum ana gummi ammoniaci, vel succus cicutæ cum gummi ammoniaco in forma emplastri.

Item emplastrum de ranis Vigonis cum mercurio, emplastrum de cicuta, de ammoniaco Foresti, diachylon magnum, ad tumores scrophulosos & scirrhosos mammarum, non cancerosos, resolvendos optima sunt. Potest sumi Mercurij vivi dosi dupla. Vel fiat Linimentum tenue ex succo solani, subactum cum lithargyrio in mortario plumbeo, talia enim, quæ acidum absorbent, hos tumores curant, uti sunt saturnina. Si non suffecerint, mammarum scirrhosus tumor emolli & discuti potest Emplastro THONERI in Observ. quo tumorem dextræ mammae scirrhosum chronicum aliis irritis facili cum successu curavit:

℞. Empl. diachyl. magn.

De Melil.

Ceron. vel de Petro an. ʒj.

Gum. ammoniaci in aceto dissol. ʒʒ. ad ʒvj.

Misc. instar Emplastri,

Tumori mammae duro applicandi.

℞. Empl. diachyl. magn.

Ceron.

Gum. ammoniaci in aceto subact. an. ʒj.

M. S.

Emplastrum emolliens.

Sin verò scirrhosus sit illegitimus, adeoque ad canceri naturam degeneret, cautissimè abstinendum est ab omnibus emollientibus, ac vel minimè scirrhum irritantibus; periculum enim est, ne in cancerum exulceratum abeat. Quod ne fiat, optimum est unguentum contra tumores scirrhosos as cancerum degenerantes Hildani, quod habet in Cent. 6. obs. 75. Habetur etiam Cataplasma excellens in tumoribus mammarum duris, in cancerum degenerantibus, curandis in Methodo Medendi HOFFMANNI pag. 417. factum est pulpa pomorum Borsdorffianorum cum aliis:

℞. Pulp. pom. Borsdorff.

Rapar. mai. an. ʒj.

Coqu. in lacte caprillo vel aqua Malva ad pulvis consistentiam:

adde

Medull. panis albis. ʒʒ.

Farin. Fabar.

Pulp. sem. Foenugr. an. ʒij.

Fol. Alb.

Brass. rubra,

Flor. Malv. arb.

Rosar. rub. an. ʒj.

Ficum No. vij.

Croc. ʒʒ.

F. Cataplasma.

Revera enim in pomis Borsdorffianis bene maturis multa egregia latent recondita contra ulcera maligna, alcali eorum specifico fermento ulcerum contrario: hinc etiam succus, item aqua Borsdorffianorum pomorum destillata in gangrena mammarum est laudata.

Hoc cataplasma potest adhuc meliorari, si lumbrici conculsi aut horum succus simul applicetur; hæc enim remedia ex lumbricis parata in hujusmodi mammarum scirrhosis tumoribus, in cancerum vergentibus, simul optima. Sin verò dictus scirrhosus tumor subinde punctiõibus molestus fuerit, non attingendus est, quia talis facillimè in cancerum degenerare potest.

## ARTICULUS VII.

## DE

## SCROHPULIS seu STRUMIS MAMMARVM.

**S**ed præter modò dictos scirrhos, in specie glandulæ mammarum tumores contrahunt, duros, plus minus magnos, propriè Scrophula seu Struma mammarum dictos ex lymphæ in eisdem coagulata, & condensata ab acido sui generis; unde etiam nunc legitime, nunc illegitimè, plus minus cancerosæ esse solent. Tumor est circumscriptus & qui specialem suam habet figuram ad glandulæ modum, non adeo indeterminatus, ut scirrhos.

## CURA.

Curatur autem hisdem ferè, quæ modò de scirrho monita fuerunt.



## ARTICVLVS VIII.

## DE

## CANCRO MAMMARUM.

**D**Enique quoad *Cancrum mammarum*: hic aut per se incipit, aut alios mammarum affectus, inflammationes, ulcera, scirrhus, &c. insequitur. Verum hoc ipsum, acidum in scirrhis mammarum, aut etiam earundem cancris, interdum vel sponte adeo est excessivum, vel remediis nonnullis fermentando exasperatur, ut corrosivitate arsenicalem acquirat, ac in cancrum degeneret, qui cancer frequentissime glandulas, ac primario in mammis, infestat. Ut plurimum enim cancer ex progressu mammae scirrhus aut scrophula, in specie si adlungatur his mensium vitium: Rarissime per se incipit. Et quidem si per se oriatur cancer, tunc primitus se saltem manifestat sub forma tuberculi parvi, quod in profundo situm vix ciceris aut fabae, primum rubicundi, hinc livescens, & nonnihil nigricantis, magnitudinem superat. Tuberculum hoc successivè augmentum capit, donec pulsatione & punctationibus quibusdam acutis in eodem se manifestet, & tumore vadat paulatim magnus, & cum venis circumcirca tumentibus & liventibus instar pedum cancrinorum, unde etiam nomen habet, se prodit. Scirrhus vel scrophula si supervenit, vel hi degenerent in cancrum, tunc hi tumores duri, aut aliàs indolentes, continuis puncturis acerbum dolorem, ardorem & æstum concipiunt, citra hoc ut inflammatio quondam suppuratoria superveniat: Huic accedit partitumor, color tumoris livescens, venæ tumidae, &c. Huiusmodi *cancer est vel occultus vel est manifestus. Occultus est*, cuius acidum nondum fermentando eo usque exaltatum est, ut possit mammarum corrosionem constituere, sed quod adhuc a propria materia concentratur & saturatur. Quod si verò acidum hoc per fermentationes exasperetur, & etiam partes vicinas aggrediatur, & exsiccate exulceretur, & acorem putrefactivum concipiat, ulcus emergat fetidum & foetidum, labra habeat inversa, loco partis sanies acris, & successivè latius se diffundat, tunc *cancer manifestus seu cancer exulceratus appellatur*.

## CAUSÆ.

*Proxima causa est acidum volatile fermentativum.*

*Causa remota sunt* fere occasiones externæ, compressio, contusio, percussio aut contrectatio inclementior mammae in quodam loco. Menstruatio multum ad cancrum confert, eundem plus exasperando, prout plus minus menses fluxerint: Quantum enim ad cancrum mammae producendum conferant menses suppressiones, vid. in BARTHOLINI *Alb. Med. Hassi. Vol. 2. pag. 195.*

## PROGNOSIS.

Quoad *Prognosin*: Observandum est Autore HIPPOCRATE *sect. 3. Aphor. 38.* quod nempe cancri occulti non sint attingendi, quia sic diutius supervivunt: e contra si attingantur, facillimè abeant in cancrum incurabiles. Quare & HIPPOCRATES & GALENUS incurabilem, nisi ferro & igne extirpetur, censuerunt.

## CURA.

In *Cura* occultus cancer, quamdiu talis est, ita relinquendus; multi enim talibus cum cancri multos annos supervixerunt, adeoque saltem palliatio est curandus, ita ut universum corpus expurgetur, fomiculi in loca vicina inurantur, acredo ejusdem, quantum possibile, temperetur, & hac temperata tumor successivè insensibiliter resolvatur.

Faciunt huc ex regno minerali imprimis remedia Saturnina, quæ absorbendo successivè acidum, illud in dulcedinem adstrictivam aluminosam transmutant, hinc ejus effervescentiam ac suppurationem, adeoque in cancrum manifestum exasperationem impediunt.

Ex regno vegetabili huc faciunt Vulneraria, alcali temperato & quodammodo occulto prædita, quæ aliàs frigida appellantur.

Ex regno animali imprimis conducunt cancri, & ex his quæcunque parata remedia, similiter alcali occulto, sed co-

pioso, prædita; loco quorum etiam rana in aquis puris viventes commodè usurpari possunt.

Præter interna etiam *Externæ* ex Geranio Rupertiano, Agrimonia & Persicaria, & similibus usurpata, sunt optima. Externæ dixi, quod imprimis Saturnina convenient; unde ad cancrum occultum omnia Linimenta & unguenta, omniaque emplastra, diu multumque subigenda sunt in mortario plumbeo, ut ramenta saturni successivè commisceantur cum iisdem. Præter cerussam & saccharum saturni in cancro imprimis emplastrum saturninum Myosichel est usitatum pro extirpando cancro occulto, dum impedit, ne fiat manifestus: vid. TIMÆUS *Von GuldenKlee in Cas. pag. 240.* Hinc Ceratum Prævoiti; vid. SCUL- TETUS *in Armament. pag. 155.* Unguentum de cerussa album, diapompholygos, lamina plumbea imposita, & similia, cum fructu conducunt; vid. M. A. N. C. *Ann. 4. & 5. Observ. 161.* Ex vegetabilibus herba & succus Onopordi contusi sæpe ad moveri debet, vid. BORELLI *Observat. pag. 151.* Item Plantago eidem substitui potest; aut succus plantaginis extra impositus, subigendo plantas has recentes aut succos in mortario plumbeo, ut sic fiat magis appropriatus. Præter dictum hoc Geranium Robertianum, Sonchus, Scabiosa, Agrimonia, Persicaria, & ex his parata externa, sunt optima, non minus quàm succus aut aqua pomorum putridorum, imprimis Borsdorffianorum: in quibus pomis putridis singularia latent ad chirurgiam pertinentia. Quoad vulneraria alia, quomodo etiam in mammis per appropriata vulneraria cancer occultus sit conservandus, ne fiat manifestus, vid. TIMÆUS *Von GuldenKlee in lib. 4. Consil. 39. & 40.* ubi habet egregia remedia.

Quod si verò fiat, ut nihilominus cancer occultus fiat manifestus & exulceratus, talem, seu dictum, incurabilem judicant HIPPOCRATES & GALENUS, nisi ferro & igne eradiceatur, nisi, præmissis præmittendis ferro cancer excindatur, & hinc ferro ignito hæmorrhagia sistatur, & sic ipsa mamma cancrofa radicitus extirpetur. Sententia hæc stetit hæcenus inconcussa in scholis Medicorum, donec ante sex, & quod excurret, annos D. A. L. L. IOTH, Lotharingicus, Archiater Ducis Lotharingici, novum modum invenit curandi cancrum exulceratum citra ferrum & ignem, cujus curationis aliquot singularia, & illustra exempla fecit Parisiis in mulieribus intestis, ut exinde etiam ad Regiam matrem, licet tardis, fuerit vocatus. Arcanum curæ fundatum est eleganter super hypotheseos has duas de acido cancri arsenicali, quod curandum præcipit per alcalia, tanquam acidis omnibus contraria: alcalia verò jubet sumenda non pura; quoniam alcalia sola pura concurrentia cum acidis nimis, effervescentiam inducunt periculosam, unde postmodum tumor & dolor mammae major conciliatur. Propterea temperare jubet alcalia per sulphur, ut sulphuribus temperata alcalia promptè postmodum acidum cancri corrosivum jugulent citra supervenientia periculosa symptomata. Prostat ejus scriptum de hoc ante septem præter propter annos editum, in quo tribus thesibus totum hoc comprehendit negotium. Verum cum non omnibus liceat adire Corinthum, ubi exulceratus est cancer, neque torturam ferri aut ignis velit subire femina, saltem applicatis externis malignitas corrosiva cancri est mitiganda, & sic uberior ejus progressus per palliativam curam, ne uberius serpere possit, inhibendus.

Præ cæteris singulare quid obtinet cancer vivus, cui colligatz sunt chelæ, cancro exulcerato impositus: dum enim ad tempus geritur, moritur; hinc renovanda est impositio cum novo cancro, idque toties, quoties moritur, donec in vita permaneat; tunc enim signum est, virulentiam fermenti cancrofæ jam temperatam. Hinc convenient pro temperando acido fere *suprà dicta*, quæ cancrum occultum sistunt: v. g. imponenda est cancro lamina plumbea, quæ acidum absorbet, aut etiam pulveres, parati ex bufonibus, ranis & cancri, unguentis & emplastis saturninis aliisque appropriatis permiscendis. Aqua item pomorum putridorum, aqua caloris vivæ, sunt egregia ad eluendum cancrum exulceratum. Novus etiam est pulvis benedictus hinc inde proflans apud Autores, cujus circumspiciendus usus admodum est proficiuus. Fuligo furni etiam singulare est remedium in cancro exulcerato, sive ipsa fuligo inspergatur, sive liquor ex sale fuliginis per deliquium paratus inungatur, sive cremor calcis vivæ, de natura temperaturæ alcalium, illinatur. Aliàs nota sunt emplastra & unguenta parata ex succis scrophulariæ, urticæ, geranii Robertiani, virgæ aureæ, solani & similibus, cum pompholy-



pholyge mistis, & in mortario plumbeo subactis: qua ratione *Linimentum ad caneros mammarum Spigeli*, impediens ejus nimium progressum, est sequens.

℞. Succ. Virg. aur.

Solani,

Sonchi an. ℥j.

Ol. Nolar.

Rosar. an. ℥ss.

Hæc in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo subigan-  
tur, & redigantur in formam unguenti seu Linimenti, quod  
est optimum.

Huic, si addatur (quod non habet SPIGELIUS) sal  
calcis vivæ, aut ejus cremor, (quod sal calcis vivæ quibus-  
dam est non ens,) est remedium satis potens ad absumendam  
virulentiam cancri exulcerati.

Plura de mammarum tumoribus uberius explicata videb.  
in specie in BARBETTE *Chirurg. de Affect. Mamillar.*  
& SENNERTO lib. 4. *Prax. ubi de Cancro Mamma-*  
*rums.*

## C A P U T I V.

### D E

## LACTATIONE LÆSA.

**H**æc de Lactis Vitilis in mammis. Præter hæc lactis vi-  
tia etiam *Vitiatum lactatio*, vitio nempe papillarum:  
v. g. quando papillæ aut sunt nimis parvæ, aut omnino defi-  
ciunt, aut quando papillæ agunt fissuras seu rimas, propter  
quarum dolorem non possunt admoveere nutrices infantes;  
aut denique, quando ulcusculis corripiuntur papillæ.

## A R T I C U L U S I.

### D E

## PAPILLARUM DEFECTU.

**P**apillæ aut parvæ nimis, aut minus prominentes, facile  
extrahuntur beneficio cucurbitulæ superimpositæ: vel  
habetur vulgo instrumentum quoddam vitreum, quo appli-  
cato, oris suctu facile extrahitur papilla latens. Verum il-  
cet papillæ pateant, non tamen satis sint perforatæ, tunc  
foraminula earum fiant ampliora imprimis per suctum, in-  
stitutum aut per catellos admotos, aut si mulier quædam  
fortius fugat; sic enim aperitur meatus in papilla.

## A R T I C U L U S II.

### D E

## FISSURIS PAPILLARUM.

### C A U S Æ.

**P**orro frequenter rimas agit & fissuras papilla, quæ acer-  
bissimum lactantibus dolorem pariunt, adeo ut lacta-  
tioni haud sufficiant. Interdum eni quæ procedunt fissu-  
ræ hæc mamillarum, ut per ipsas papillas penetrent, adeo,  
ut frustulatum earum particulæ decidant: Interdum ipsius  
papillæ integræ lacturam faciunt lactantes, quod sit inter-  
dum, si serum lactis acrius sit paulo, quod corrodendo non-  
nihil valet exulcerare ipsas papillas, unde agunt fissuras &  
rimas: Fit etiam quando infantes lactantes papillas lacte bu-  
midas relinquunt; unde ab aëre ambiente alteratum lac ace-  
scens tenebriorem papillarum substantiam subtiliter erodit,  
ut rimas & fissuras agant.

## C U R A.

Pro hoc malo præservando optimum est, ut mulieres an-  
te partum aliquandiu recipiant Nucem moschatam, cam-

que excavatam, adeo ut exacte papillæ respondeat, huic im-  
ponent, & rite aliquandiu gestent. Vel fiat Linimentum,  
ex bolo communi exacte pulverisato, cum pinguedine por-  
cina subacto, quo ipso aliquandiu ante partum manet & ve-  
speri illinantur papillæ, quæ exinde majorem firmitudinem  
acquirunt. quod minus tam facile scindi queant.

Quod si facta sint rima seu fissura papillarum, curantur fa-  
cile cum balsamo Peruviano. Expertum quoque est oleum  
Momordicæ, quod est optimum: potentius sit hoc, si misceat-  
ur oleum ovorum; nam & hoc est egregium remedium ad  
papillarum fissuras, si illinantur crebro, papillæ prius sa-  
liivâ madefactæ: quod etiam facit oleum ceræ, storum,  
hyperici. Pinguedo crurum vituli crebrius illita est unum  
ex optimis. Oleum seu liquor sacchari etiam est egregium  
remedium; item oleum nucum cum saccharo: vid. R. I-  
VERIUS *Observ. 14.* à PACHEQVO *communica-*  
*ta.* HARTMANNUS oleum ceræ commendat; DE-  
CKER S *in Praxi* flores zinci. Pinguedo cochlearum est  
usitatissimum remedium, & experimentum HARTMAN-  
NI. Geranium Robertianum viride contusum & imposi-  
tum, vel gossypium hujus succo imprægnatum & applica-  
tum, est præstantissimum: vid. VELSCHIUS *Milkomim.*  
*Cent. 2. obs. 38. annexis Anno 4. & 5. M. A. N. C.* Muci-  
lago tragacanthæ cum aqua appropriata parata, fissuris illita  
eisdem consolidat; aut etiam pulvis tragacanthæ insperga-  
tur iisdem: vid. VELSCHIUS *l. a. Cent. 3. Observ. 95.*  
sicut etiam IOEL. Vernicem & mucilaginem tragacanthæ,  
item mucilaginem cydoniorum cum aqua rosarum aut suc-  
co plantaginis paratam: quæ omnia tamen antecellit succus  
millepedum cum vino expressus & applicatus. Item un-  
guentum de saturno, de rutia, aut rutia præparata cum oleo  
liliorum alborum continuatâ agitatione in mortario plum-  
beo in linimenti formam redacta, & applicata sunt egregia.  
His applicatis sæpius quotidie vel folium hederæ recens de-  
super imponatur, vel folium lilii albi recens, vel calcei co-  
rium desuper admoveatur, vel, quod optimum est, passula  
magnæ exacinatæ superimponantur papillis; nam hæc solæ  
fissuras leviores solent curare.

In fissuris grandioribus:

℞. Aquæ Plantaginis,

In qua dissolv. parum de Saccharo saturni.

D. S.

Mixtura sanans.

Illinatur frequenter locis illis, & imponatur desuper fo-  
lium hederæ vel plantaginis, &c. bene abluendo papillam  
cum aqua calida, ne reliquum intra fissuras lac aciescens  
malum intendant, & modò laudatum remedium desuper ap-  
plicetur.

Sic in fissuris hisce remedium incomparabile dicitur Coa-  
gulum albuminis masculum, Italis dicitur *Gallatura*, cum  
aqua rosarum & saccharo applicatum: Vid. VELSCHIUS  
*Milkom. 26. Cent. 1.* Idem præstat quoque oleum albuminis  
ovorum, de quo vid. in *Colleg. Pharmaceut. P. 1. Sect. 2.*  
*pag. 250.*

Quod si verò althiis serpat malum, ita ut potentiora requi-  
rantur remedia, tunc faciendum est unguentum:

℞. Lithargyr. ℥ss.

Myrrha ℥ij.

Alum. ℥j.

quæ cum oleo rosaceo subacta in formam Linimenti, pro  
inungendis papillis:

D. S.

Unguentum sanans.

Quod si ulcera contrahant papillæ, quæ ut plurimum gra-  
vem simul habent dolorem, tunc præter remedium ultimo  
loco positum convenientissima est aqua seu decoctum cal-  
eis vivæ, si eadem applicatâ laventur papillæ.

Graviora si fuerint ulcera papillarum, huic aquæ calcis vi-  
væ parum Mercurii dulcis additum, est optimum remedium.  
Hæc de morbis mulierum sufficiant.

*Absolvimus Bono cum Deo Morbos Mulierum: Pergimus ergo recto tramite ex conjunctione & connexionem  
ad Librum V.*



# LIBER V.

## DE

### MORBIS INFANTVM.

#### CAPUT I.

#### DE

#### INFANTVM REGIMINE.

**S**cilicet Infans, simul atque utero materno in lucem egreditur, excipitur cum sequente & simul annexa secundina ab obstetrice. balneo aquæ dulcis tepidæ abluitur, & probè mundificatur, & sordes istæ mucilaginosæ, quæ in naribus, auribus, ano & similibus locis reperiuntur, probè eluuntur, ut ita infans purificetur. Antequam autem in balneum eum imponat obstetrix, umbilicalem placentæ funem probè ligatum ab umbilico refecat per tres vel quatuor transversos digitos supra umbilicum, & inteaque tepidiuscula superimponit, & ita linteolis involutum in lectulum reponit, ut collectis in utero materno secretis excretis aptior fiat pro nutrimento lactis ex mammarum vel maternis vel ad id conductæ nutritis, emulgendo. Studiosè quoque incumbendum, ut copiosæ impuritates gestationis tempore collectæ ejiciantur. In hunc finem subinde post balneum recens natis parum sacchari albisimi vel penidii, aut oleum amigdalorum dulcium recens expressum ingeritur; aut conjunctim, e. g.

24. Ol. Amgd. dulc. rec. expr. ʒv.

Sacch. albis. vel penidii ʒij.

M. S.

Mixtura evacuans.

Horam enim ope lubricantur & absterguntur stomachus & intestina, & copiosæ sordes, gestationis tempore collectæ, eliminantur: aut, quod optimum, parum de syrupo cichorii cum rhabarbato, vel de syrupo rosarum soluto, aut de melle rosarum solutivo feliciore sanè cum successu in os imponitur, ut lenè deglutatur. Soli enim huic oleo non fidendum est; cum vel rancescendo facillimè infanti propinatum, non leve incommodum in primis vis inferat; vel non rancidum licet, vix tamen omnia ex iis tam exactè eliminet, quin subinde aliquid sordium remaneat. Mihi convenientissimum semper & in usu est præscribere pulpa passularum minorum cum ana syrupo de cichorio cum rhabarbato mistam, addito paulillo coralliorum rubrorum præparatorum & lapillorum canerorum præparatorum ana, horum ʒij. vel ʒss. ad illorum ʒss. addendo:

Vel

24. Syr. rosat. sol. ʒij.

De Cich. cum Rhab. ʒj.

Emet. A. S. ʒss.

M. S.

Syrupus evacuans.

Quæ cum parvulo cochleari subinde & successivè propinatur infanti recens nato, idque toties & tam diu, donec copiosè partim per vomitum auspiciatum à copioso sero mucilaginoso ventriculum occupante, partim per secessus à meconio, seu nigricante illo & spisso excremento, in intestinis stabulante, evacuetur, & in specie vitiosa ejus & succorum aliorum æscencia absorbeat & tollatur: nam hæc excrementa, præsertim meconium, retenta vitiosa sui æscencia lac ingestum inquinant, & mille malis, præsertim epilepsiæ mutant infantes: vid. M. A. N. C. Ann. 6. & 7. Observat. 201. Denique syrupus de spina cervina seu domesticus est optimum & convenientissimum abstergens omnium sordium, & laxans infantum, speciatim si loco sacchari cum melle per se depurato sub insolatione confectus fuerit, vix unquam fallens & sine ullo incommodo evacuans, imprimis cum pulvere lapillorum canerorum præparatorum & coralliorum præparatorum si subactus fuerit. Nec infans facillè prius mammarum admovendus, quàm aliquoties supra aut infra purgatus fuerit. A partu infantes ante decem vel duodecim, quatuordecim vel quindecim horas non admovendi sunt mammarum, sed quò longius

post partum esuriunt, eò melius est, donec interea in mammarum matris se colligat Colostrum seu lactis primum rudimentum, serum nempe lacteum: Hoc ipsum equidem tanquam nocivum, sunt qui præbere infantibus prohibent: sed hoc pessimo consilio, cum blandum sit infantum laxativum, abstergens optime sordes ejus, & purificans intestina; & cum minus negotii faceat stomacho pro digestionem, hoc ipso facilius transit, minusque lacte ipso corrumpitur in eodem, dum interea lacti perfectio, tertio vel quarto die supervienti cum febre lactea, concoquendo adsuæcat melius infans, & hujus nutrimento magis largo sustentetur. Colostrum nanque est alimentum medicamentosum, quod natura cum in finem generavit, ut modicè nutriendo, leviter pro infantis imbecillitate purget per aliquot dies, ut rectè asserit SPIGELIUS Tr. de Form. Fac. cap. 13. pag. 17. Ab ipsa matre lactetur infans, si est sana, & lac habet quod huic negotio sufficiens; aliàs eligenda est nutrix. Vulgè examinant hujus lac per colorem, odorem, saporem, &c. an scilicet crassum, tenue, dulce, pingue, &c. sit? sed ridiculo planè consilio: Non enim hæc similes proprietates lac vel bonum vel malum reddunt, cum occultis sæpius defectus maximi momenti hoc ipso cognosci & videri nequeant, qui tamen sæpius longè majoris sunt conditionis, & insensibilia ut plurimum vitia, secum vehunt, quæ lactis corrumpunt miscelam, ut non tantum in seminibus morbofis cum lacte transplantatis, sed in specie vitiosis moralibus per lac insensibiliter communicatis, est manifestum. Sed, ut rectè loquitur HELMONTIUS Tr. sextupl. Digest. §. 74. estimanda est lactis conditio ex sanitate nutritæ, & bestiarum, vitæ, & cibis. Modò ergo sana sit nutrix, bonis utatur alimentis, aut talibus saltem, quibus aliàs consueta sit, & quæ facillè ferat, & denique ab affectibus animi gravioribus se temperet, & abstinat, laudabile erit lac, sive crassum, sive tenue, sive plus minus album, sive flavescens nonnihil fuerit? Nam conditiones lactis etiam sani sunt variae: cum, uti digestio prima in unaquaque specie & individuo certatione variat, ita etiam varient conditiones inde oriundorum corporis succorum, & per consequens lactis. Potest nutrix lue Venerea inquinata lac apparenter optimum habere, & alia sana non. Lac enim in mammarum pro nutrimento fetus extra uterum ejusdem ferè naturæ & rationis est, cum alimento fetus chyloso intra uterum, utrob id minùs audiendus sit supra laudatus HELMONTIUS, inter dicens ipsum lac tenellis. Nam, quod obiter moneo, omnia ea mala, quæ infantibus incumbunt, ex hausto lacte & mammarum, & recensentur ab HELMONTIO, eadem ipsa mala impendent & adherent iisdem in utero ad eorundem alimento chyloso simul deglutito. Uti autem, nihilominus providissimo consilio natura infantes nutrit in utero materia lactea; ita simili ratione extra uterum eodem nutrimento naturalissimè sustentandus est. Lactet autem mater seu nutrix infantem utraque mammarum; quia infantes aliàs sunt lusciosi, seu strabismo laborant: si uni tantummodo admoveantur mammarum, continuo oculos ad hanc conferunt, & ita tandem ex consuetudine lusciosi fiunt.

Utrique ergo mammarum admoveantur, ne ita ex consuetudine oculorum perversum acquirant motum: id quod aliàs in situ infantum in cunis observandum, ne ex altera tantummodo parte candelas lucentes & fenestras adspiciant; sed ita situati sint, ut vel promiscuè modò dextrum modò sinistrum lateri illuminetur, & etiam candelæ utrique parti admoveantur & situentur, propter vitandum strabismum infantum.

Jam verò tam sub tempore lactationis, quàm post eandem, infantes variis corripuntur morbis, qui dum exactè considerantur, ad duos ferè principales causarum fontes referri possunt remore, excluso tamen semper vel vitio parentum hæreditario, vel aliunde hausto fermento contagioso. Nempe est primus fons obstinata retentio excernendorum, & secundus perversa ingestio nutrimentorum.

Hæc



Hæc facile inferunt crudelitatem acidam & viscidam, ex qua, tanquam causa proxima, omnes eorum morbi oriuntur. Ibi quidem eminet (1.) *scorum* primarum vitarum, & *meconii* in specie, suppressio; & hinc (2.) insensibilis transpirationis oclusio: Hic vero offerunt primario se *Vitia Lactis*, & *Errata pultis*. Hæc quatuor suppetunt Capita generalia affectuum infantilium.

## CAPUT II.

## DE


MORBORUM INFANTILIIUM  
ORIGINE.

**N**on absque præmeditata ratione miratur HARVÆUS de *Generat. Animalium Exercitat. de Partu* pag. m. 301. qui fiat, quod fœtus non tantum ultimis gestationis mensibus in utero, sed etiam tandem extra uterum, dum membranis adhuc integris est opertus, & etiamnum in aqua sua manens, per aliquot horas citra suffocationis periculum superses sit? Idem tamen secundinis exutus, si semel aerem intra pulmones attraxerit, postea ne momentum quidem temporis absque eo durare possit, sed confestim moriatur? At æquè, si non magis mirabile ridentur possit, quod fœtus ex tam subitanea, adeoque apparenter periculosa mutatione, quam subit, simul atque ex claustris vapidis uteri materni in liberum apertumque irrumpit aerem, non statim graviter & ferè lethali ter agrotet? quidni enim loci calidi cum frigido, humidi anxiosique æstuarii cum aura sicca patulaque permutatio, & ab aere in pulmones primò irrumpente, & inde succedente reciproco respirationis negotio, maxima in sanguine facta mutatio, totius corporis sensibilem inducat alterationem? Tantam sanè, quantam post primam hanc inspirationem usque ad ultimam expirationem pertotum vitæ cursum vix perferre videtur animal. Hæc ipsa, quam tunc suscipiunt corporis mutationem infantes, non ad ejus destructionem, sed perfectionem potius tendit. Plus sanè in recessu habet operosum respirationis negotium, quàm ut vel fuliginum explosioni, vel sanguinis simpliciter refrigerationi, vel hujus saltem circulationi, vel soni formationi inserviat, modò attendamus mirabilem aeris naturam & effectus, simulque nexum respirationis cum vita, ita ut quamdiu extra uterum vivimus, tamdiu etiam necessariò respiremus, & contrà. Scilicet ad sanguinis perfectionem & spiritus ascensionem vitalem tendit hic aeris fœtus, ita ut hujus medio attenuetur, & resolvatur sanguis in pulmonibus, & imprimis ejusdem sulphur hac ratione quodammodo resolvatur & volatilifetur, quo sub aucta fermentatione in corde cum salibus sanguinis volatilibus coëat in gas spirituosum volatile, sive spiritus vitales, calidos & probabiliter lucidos, ac ita sanguis quasi accendatur. Quod cum rite fiat primitus in fœtu, dum utero materni egreditur, non potest non ex debita perfectione sanguinis tunc primitus inducta, adeoque ejus majori spiritus ascensione & incallescencia ex aucta ejusdem fermentatione, cum rapidiori per omnes meatus circulo, & uberiori spirituum animalium proventu, indeque organorum corporis quorumcunque ad motum singulari nisu, fœtus quasi noviter aut propriè animatus reddi, & vita perfecta animalii dotari, qui antea in uteri materni claustris saltem plantæ ejusdem aut zoophyti vitam egisse videtur. Occultum, nempe vitæ cibum in aere contineri, sublimiorum naturæ scrutatorum communis fert sententia: idque ratione salis sui, ut sic dicam, mirabilis, quæcunque penetrantis, solventis, & volatilifantis, atque universalis quasi solventis. Unde tanta respirationis ad vitam emergit necessitas, ut quæcunque animalia, simul atque ex ovis semel eruperint, aeris per necessarium victum nunquam carere possint, ipsis etiam insectis eodem indigentibus, non secus ac pisces, aquarum licet incolæ.

Cum ergo ad perfectivas potius quam destructivas alterationes pertineat dicta fœtus singularissima passio, quam primo in mundum ingressu suscipit, saltem hæc ipsa ratio videtur subministrare probabilem: qui fiat non rarò, quod matres quædam cacoehymicæ, & in specie nostrates scorbuticæ, quos in utero feliciter gestarunt, & optimè lacteo nutrimento aluerunt fœtus, postmodum facta exclusione citra periculum lactare ipsæ nequeant, quin potius, si eisdem sanos conservare velint, conductæ illud nutrimenti committere necesse habeant, qui aliàs sub pro-

prio matris lacte, eo nempe, ex quo ipsæ partes corporis primò coaluerunt, adeoque iisdem appropriatissimum sit, continuo ploratu, torminibus, non rarò quoque supervenientibus epilepticis insultibus, aliisque varis pathematis, non leves ægritudines testentur, subinde ad mortem terminantes: quæ omnia alieno lactis superveniente succu, successivè evanescent & non rarò cum optimo infantis habitu permulentur? Solutionem hujus dubii subministrat præfata sanguinis & totius corporis per inspiratum aerem alteratio, sub qua ipsa sanguis citiori fermentatione turgescit, & ab inspirato aere resolvitur, unde simul morbosa semina, sub nutrimento lacteo in utero matris communicata, excitantur, & ceu fermenta exotica partim sanguinis crassia vitiant, partim alios à sanguine dependentes succos, in specie lympham & bilem alterant, aut ipsum stomachi fermentum protopepticum inquinant, unde successivè largæ morborum affectuum segetes progerminant: Idque ed magis, quò amplius simili, inquinato nempe à morboso matris lacte, nutritur infans, & ita seminibus morbois, nempe igni oleum, aptissimum se multiplicandi subiectum subministratur. Simile ferè hic evenit atque id, quod tempore verno sub renovati quasi aeris inspiratione adultis etiam crebrius accidit, ut scilicet eodem tempore latentia & aëtea sopita morborum semina quasi evigilent, & varios affectus, & corporis passiones, ceu tot flores, protrudant. Maturè ergo à mammis propriis abigant necesse est matres tales suos fœtus, & alienis in talicasu tradant, pauper culis licet, mulieribus, modò sub moderata dieta, & laborum continuo exercitio, sanæ magis & vividæ existant, ut temperato & salubri tali lacte opprimantur morbosa fermenta, imprimis salina scorbutica, & corrigantur sanguinis dyscrasie, quò constans & firma magis exinde conservetur sanitas. Ex hoc ipso etiam ratio indaganda, quare infantes, speciatim nostrates, recens nati, subinde tertio aut quarto à partu die efflorescentiâ cutis miliari, purpurâ, Germanis *der Friesel* dicta, affligantur, quatenus scilicet ex respiratione facta massa sanguinea intensiori fermentationis gradu agitata, salia heterogenea præcipitando separat, & ceu feculentias non rite miscibiles ex suo misto extrudit, quas ipsa seroso latice, ceu communi nutrimenti & excrementi vehiculo imbibita, occasione balnei in recens nato instituti, & promotæ hac ratione libetioris perspirationis, ad corporis peripheriam, in specie glandulas intercutaneas miliares, deponuntur, ubi cum rubedine, pruritu, & aliquali subsequente excoaratione seu cuticulæ desquamatione pedetentim exhalant. Revera purpuræ nostratis origo, ex scorbutica affectione matrum, originem ducere videtur, cuius productum inter alia pathemata & purpurata hæc existit efflorescentia.

Monitum fuit suprâ, ex spiritus ascensione majori ab inspirato aere promota, indeque spirituum vitalium concitatiore impetu, in organis quibusvis insignem ad motus nisu excitari. Exinde namque originem ducit, quod fœtus recens editus non tantùm artus validè moveat & vibret, adeoque digitos variè inflectat, sed quod in specie urinam brevi post per urethram emittat, crebriori vomitu cruditates stomachi eliciat, & alvi recementa varia protrudat: Quæ ipsa in utero nunquam naturaliter excernuntur, aded, ut certum signum fœtus in partu ex labore & nimio conatu mortui referatur à VELSCHIO de *Egagrop. Dissert. 2. pag. 61. Curat. 61.* si meconium seu alvi excrementum, a tequam fœtus prodierit, emittatur; ut ut contrarium huic asserto exemplum reperiatur apud RULANDUM, *Thef. Curation. Empiricar. Cent. 3. cap. 66. pag. 300.* Sternutare etiam interdum fœtus recens exclusus observatur, dum ex membrana narium irritata, nervis intercostalibus per consensum connexionis affectis, etiam convulsiva partium, cui inferuntur, sequatur commotio & concussio. Hæc ipsa tamen omnia, cum opera potius sint naturæ, quàm morbosa symptomata, ob id propiùs ad affectus præternaturales accedamus.





## CAPUT III.

## DE

RETENTIONE EXCREMENTORUM  
IN FOETU.

## ARTICULUS I.

## DE

## RETENTIONE MECONII.

**F**æces primarum viarum quod attinet: præter ventriculolum albicante plus minus lentæque materiæ repletum, pituitosa, flava, & variegata recementa interdum intestina tenuia occupant, in crassioribus verò excrementa dura, crassiora & quasi picea, ex nigro viridescensia, papaverculum seu Meconium quibusdam appellata (utur meconii vox generaliter HIPPOCRATI de *Vit. Acutorum* Sect. 69. Num. 9. quod primum natis exit excrementum denotet) hospitantur, & omnia hæc ex nutrimento, per os sub formatione & nutritione foetus in utero hausto, genita sunt. Hæc ipsa verò maturæ ex corpore infantis expurganda sunt, ne diutius retenta aut pertinacem alvi obstructionem inferant, aut lactis nutritivi distributionem impendant, aut sub distributione per intestinorum gyros idem corumpant, & æruginoso vitore tinctum ad corruptionem & cadaverisationem disponant, aut intestinis pertinaciter adherendo, & acedicat rodendo, tormina crudelia inferant. Constat sane omnium Præficorum est sententia, omnium atrociorum, torminum, uti & epilepsie, originem esse ex excrementis his diutius retentis, & hinc in deterius corruptis: quemadmodum & meconium retentum sæpiissime est causa, quare recens natis interdum tertio aut quarto die à partu efflorescat *Jæterus*, imò ipsis interdum conascatur: Item meconium retentum sæpiissime causa est, quod infantes afficiantur aphthis seu ulcusculis oris, de quibus postea, quatenus hoc meconium lac haustum coagulat, spissat, & acescere facit: Unde si meconium tempestive vel per assumptam vel per colostrum evacuetur, ab omnibus his malis possunt præservari. Hinc ipsa natura provida ordinariâ lege mox à partu est occupata, ut partim vomitu, partim secessu, infantes expurget, etiam antequam aliud quid molliatur, præmonstrans his ipsis viam ministro Medico, quid sub tardiori ejus conatu ipsi agendum sit? Præ cæteris meconium malè audire solet, idque suo merito; nam acidum præternaturale est, quod in ejus recessu peccat. Cum enim oriatur ex nutrimento foetus quasi lacteo in utero, nil aliud esse videtur, quàm crudior calens, à reliqua substantia nutritiva separatus & quasi præcipitatus: qui ipse acorem in stomacho semel conceptum plus minus retinere solet, indeque occurrente in intestinis bile obscurum, ex nigro viridescentem colorem contrahit, & pedetentim in intestinorum cellulis sub mora diuturniori coagulatur firmius, & eò magis nocense vadit: quæ ipsa mutatis murandis & reliquis recementis accommodari possunt.

Pro meconio ergo purgando nil æquè convenit, atque colostrum, quod est aquosius, salius, & vi absterfivâ præditum: & ceu alimentum medicamentosum infantes blandè purgat. Hoc si fieri nequit, studiosè incumbendum est in id, ut pharmacis nihilominus evacuetur dictæ sordes ex primis viis, tam per vomitum, quàm per secessum: in quem finem propinentur ea, quæ supra dicta sunt.

## ARTICULUS II.

## DE

## TRANSPARATIONIS OCCLUSIONE.

**Q**uod attinet insensibilis Transpirationis morbosam, in infantibus occlusionem, ceu alterum Fontem morborum infantilium: notum est hujus in omni ætate & vitæ genere summam esse necessitatem pariter & quantitatem, quod eleganter docuit SANCTORIUS in *Medicina Statica*, adeo ut corpus nostrum in continuo fluxu constitutum atmosphæram certam ubique in ambitu circumfundat. Præ cæteris infantes cum copioso sustententur nutrimento, ob id necesse est, ut copiosè quoque transpirent, partim ut nu-

trimenti, tam universalis seu remoti in massa sanguinea, quàm particularis seu proximi hinc inde distributi puritas, ab omni vel heterogeneâ vel effusa seculentia, partibus non assimilabili, sarta restaque conservetur, partim etiam, si quid seculenti sub nutritione enatum ipsis commissum sit, mediante insensibili transpiratione ex partibus solidis eliminetur. Jam verò notum est, infantum corpora ordinariò crassa quasi aut mucilagine viscida & glutinosa obdacta esse, quæ lanugoritur ex liquore nutritivo, in quo innatant, à quo mucosè successivè cuti extrinsecus adherente insensibilis halitus effluxus insigniter impeditur solet. Retenta igitur talia transpirabilia in massa sanguinea si concerventur, hujus æquabilem turbant fermentationem, & ad febres ordinariò disponunt; sin verò sub poris cutis deposita hæreant, & variam corruptionem subeunt, & eò simul sint naturæ salinæ, & sapore salso adeoque composito prædita, plus minus licet, (vid. TACHENIUS *Hipp. Chym. pag. 78.*) exinde facile sub cute hærendo suâ corruptione intentam acrimoniam contrahunt, nunc salam simpliciter, nunc acido-salam, nunc urinoso-salam, ut plurimum acido-salam, unde digestionem particulares seu privata partium subcutanearum turbantur, & cutanei affectus efflorescunt, alterato & corrupto ab illis recens nutrimento dictarum partium proximo, simulque destructo plus minus fermento dictarum partium digestivo: qui affectus eò promptius eveniunt, quò magis excrementa transpirabilia ex mucilagine minus temperata, sed magis aciore, vel saliore, vel facili aciesibili, vel alio modo vitata, originem ducunt; siue fiat vitio nutriticis perversè lac infantis præbentis; siue vitio digestionis primæ in infantibus, vel non corrigentis nutrimentum minus adæquatum, vel ipsum acore præternaturali inquinantis. Quod si verò dicta transpirabilia retenta, fuerint magis temperata, & nonnihil pinguis, adeo ut minus ad acrimoniam salso acidam degenerare queant, sit ut cohibeantur partim sua sponte, partim tepore loci humido, in infantibus semilacteis ad putredinem ruant, & emergente tunc alcali destruyente acidum larga seges animalculorum variorum pedetentim emergere soleat.

Ut verò insensibilis promoveatur transpiratio, aspiciendū solent mulierculæ recens natos infantulos immergere balneo aquæ dulcis tepido seu subcalido (non, qui asperimus & sanæ rationi pariter ac constitutioni sanæ reluctans erat veterum Germanorum mos, de quo vid. SENNERTUS *lib. de Morb. Infantum Part. 1. cap. 4.* aquæ frigida; aut flumini) ut illius medio abluantur sordes viscosæ, lanuginis instar tegentem terrimam cutim, & accedente blandâ frictione aperiantur & magis patuli reddantur conniventes aliis cutis pori. Non ineptum est, quod in more positum, ut simul saponis adjumento fiat sordium ablutio, & hujus alcalinæ lixivialis acrimoniam promptius detergantur ista caseosa quasi concrementa extracutanea, quia satis sunt viscosa, & dissiliis removeri possunt: postmodum, si reiterantur crebrius hæc balnea, ipsa aquæ, quæ abluantur, parum lixivii communis addendum erit, ut eò meliùs tam resolvantur & detergantur dictæ sordes, quàm etiam hujus alcalini salis beneficio præcaveantur maturæ affectus infantum cutanei; sicuti hos affectus jam inductos dicta alcalia fixa optime tollunt, ut infra monebitur. In communi recipiunt farinam pisorum, & hujus medio abstergunt infantes toties, quoties balneantur: Nempe reiteranda est sæpius hæc balneatio, quoties sanitas infantis & vires permittunt, idque in specie primis septimanis, in quibus quotidie balneandi sunt infantes, reliquis alternis aut tertiis diebus, donec exactè purificatus, glaber, mollis, robicundus atque nitidus appareat foetus; aliàs enim suggerunt occasionem vel febrim, vel asfectuum intercutaneorum. Unde non rarum est, quod flavedine quodammodo croceâ, adeoque Jæterio colore tincti in lucem prodeant infantes, aut tertio vel quarto die post partum illius color superveniat; qui extraordinarius color vix meliùs dictis balneis detergi penitus, & detergi poterit; quibus convenit etiam, si gr. j. croci optime triti in lacte nutriticis vel alio conveniente liquore exhibeatur foetui, & aliquoties in die propinetur, quo ipso dicta cutis defordatio extinguí potest.



## ARTICULUS III.

## DE

## VITIIS LACTIS.

**E**rat hæc excernendorum retentio : ad nutriendorum vitiosam pergo digestionem, ubi primario se offerunt Vitia Lactis. Lac est naturalissimus cibus & succus nutritivus infantum, quod necessario infantibus lactantibus propinandum, certo tamen ordine.

Eius vitia sunt varia : quorum primum est, quando fuerit alienum, h. e. dum non à propria matre tenellis porrigitur mamma, sed nutritibus hoc negotium committitur. Quod ut pateat clariùs, præsuppono :

1. Factum in utero materno nutriri non solum per umbilicum, sed simul etiam per os: Vid. *Dissert. SEGERI de Hipp. Orthod. & Democr. Heterod. in Nutrit. fætus*; JOHANN. CLAUDIUS, item de la COURVEE *Tr. de Nut. Fætus in utero*, item HARVÆUS de *Gener. Animal. Exercit. 58. item 56. & Exercit. de Humor.*
2. Nutrimentum utrobique non esse sanguinem, sed lac sive chylum lacteum, cum sanguine per arterias (cum aliæ nondum repertæ sint viæ, in vacclis licet lactantibus instituta fuerit inquisitio Anatomica) ad uterum delatum: Vid. præter loc. cit. NEEDHAM. *Tract. de Form. Fætus cap. 1.*
3. Lac mammarum & ipsum revera esse chylum, in mammarum glandulis secretum, & ductibus particularibus exinde ad papillam delatum: Vid. DEVSINGIUS de *Lacte*, & CHARLETON *Exerc. de Galaxia.*

Jam verò unicuique mulieri suum proprium est lac, seu specialis lactis proprietas ac idiosyncrasia (ut taceam lac diversum in una mammarum observatum fuisse ab eo, quod erat in altera, à LYSERO *Observ. 11. annexa Cultro suo Anatomico*) eaque oriunda ex speciali fermenti digestivi stomachalis differentia (nam hoc in omni individuo insignem patitur latitudinem); unde hoc fermentum, prout in unoquoque individuo fuerit constitutum tam naturaliter, quam præternaturaliter, hâtenus distincta oritur appetitus & digestionis primæ ratio, eorundem licet assumptorum, unde supervenit distinctum lac pro diversitate mulieris, in qua generatur. Diversum ergo lac mammarum nutritis, à lacte uterino matris necessario in stomacho infantuli tali lacti aliàs non adfuerit, (cum consueta longo tempore, licet deteriora, insuets minus molesta esse soleant, juxta HIPPOCRATEM *Scilicet. 2. Aphor. 50.* idque ob intimam symbolizationem assumendorum cum fermento) alterationem insignem infert, & plus minus ad corruptionem pergit, aut digestionem primam necessario insigniter turbat; quin imò lac istud alienum distributum ulterius in massa sanguinea heterogeneitate sua turbat hujus crasin, & fermentationem vitalem, antequam successive stomachi fermento alterato, & sanguinis crasi immutata, conveniens magisque homogeneum fiat nutrimentum, cum generalis stomachi digestio præsit quibusque singularium digestionum culinis. Speciatim cum matres subinde vivunt opiparæ, & ita cæteris paribus lac nutritivum generent, nutrites verò adscititiæ sint ut plurimum pauperculæ, & quibusque edulis subinde latrant satisfaciunt stomacho, vix fieri potest, quin & cacochymia in his superveniat: (vid. SENNERTUS de *Cura Infant. Part. 1. cap. 1.*) & sic lac maximè est diversum & contrarium lacti matris, ex quo coaluit fœtus: unde per dictum lac tam vitia naturalia quam moralia à nutritibus generantur in infantes, de quo merito cõqueritur HELMONTIUS *Tractatu Infant. Nutrit. pag. m. 623.* cum legitimo sensu verissimum sit illud Galeni, quod mores sequantur temperamentum corporis: Sic puella v. g. observata fuit admodum siticulosa ex nutrice bibacula à DEODATO *valetud. pag. vigesima sexta.* Cum & brutales proprietates & mores cum lacte in infantem penetrent ac in vitam perseverent, ut in pueris à cervæ, item à capræ lacte nutritis observatum fuit; REIES *Camp. Elys. quæstion. 41. pag. 586.* Hic Lippiæ aliquando infans ob defectum nutritis lacte caprino nutritus fuit, qui adhuc vocem capræ imitari potest. Sed hæc cum minus faciant ad scopum nostrum, ob id vel

summis labris ea delibasse sufficiat. Quæ ipsa de lacte ex chylo elaborato explicata hætenus, fortius adhuc eos stringunt, qui ex sanguine lactis fontes derivant. Proprium igitur matris lac, si fieri possit, infanti est propinandum, quod est omnium optimum; quia ex hoc primo concevit infans, nec sine insigni alteratione alterius lacti adfuecit, imprimis si mater sana sit, vel non admodum morbosa, & habeat lac negotio sufficiens; aliàs in ejus locum, ut ut deteriorum, eligenda est nutrix, quæ mammas infanti præbeat: Vid. SENNERTUS *Tr. de Morb. Infant. Part. 1. cap. 1. quæst.*

Hæc ipsa simul ostendunt, quàm aliena sit à vero eorum opinio, qui consideratione facilis corruptionis lactis in infantulis, indeque natorum variorum malorum, alio potius nutrimento, quàm lacte, tenellos cibare & educare malunt: Adeoque vel hordeata juscula, vel ex crepatura hordei addito vitello ovorum emulsioni similem misturam, vel juscula avenacea, vel amygdalorum emulsum lacteum succum, aliudve simile substitunt: quo etiam nutrimentum HELMONTII pro pueris, *Tr. Infant. Nutrit.* pertinet, expantantisper cum tenui cerevisia bullito cum melle. Siquidem nec frustra, nec sine prægnanti ratione, aut ornatus saltem gratiâ, mammae mulieribus, & in his mox post partum lac, non secus ac reliquis brutis terrestribus, uti & quibusdam aquatilibus concessum fuit à natura; quin hæc ipsa potius digito quasi intento hanc fœtum nutritionem monstraverit. Hinc aves mammas carentes earum defectu grana deglutita, & in ingluvie aliqua mora macerata, ac ita ad fundendum citius lacteum suum nutrimentum prædisposita, evomunt denuo, promeliori pullorum sustentatione. Tenerior siquidem infantum est stomachus, minisque exaltatum fermentum eorum digestivum, unde quæcumque ferè ingesta laboriosam saltem, si non & defectuosam penitus redderent digestionem; quæ facillima & summè nutritiva erit, dum lac, seu chylus jam ante in nutrice elaboratus, ipsis suggeritur: Talis scilicet succus, ex quo & primitus machina eorum corporea constructa fuit, & ipse fœtus jam in utero sustentatus, & quem ceu jam consuetum facillimè digerere & concoquere potest. Quod si quædam ex lactis alteratione in infantibus metuenda erunt pericula, ea sanè in se sunt facile corrigibilia, modo maturè & legitime hisdem occurratur. Unde & rarissima eorum observata fuerunt exempla, qui defectu nutritum feliciter adoleverint.

2. Secundum lactis vitium est, si fuerit morbosum: sive ergo nutriatur à matre, sive nutrice sitiens puerulus, nisi vegeta & sana gaudeat corporis œconomia, indubitatum est, varia morborum semina radicesque firmissimas in eum tanquam per medium somitem transplantari in fœtum: Sic Lithiasin ex nutrice calculosa derivatam in puerum, cujus fratres priores à calculo liberi fuerunt, notat HELMONTIUS *Tr. Nutritio Infantum ad Vitam long. & de Lithiasis*: Sic Lues Venerea, Scorbutus, &c. quorum contagiosa indoles per se notissima, per lac communicata sunt fœtibus, ita ut quæcumque contagia morbosa ex nutrice vel matre facile deriventur in infantem, si non sint sanæ: Lue venerea per matres infectas puellas inquinatas binas observavi in nosocomio Patavino: Nutrices habitus serosioris ad affectus catarrhales proclives reddere, quos nutriunt infantes, compertum est. Sed res ipsa cum loquatur, quid opus ulteriori diductione? Quin etiam sana licet in proprio corpore deprehendatur nutrix, si tamen propria constitutionis causa: idque ex ratione peculiaris in stomacho digestionis, vel serosioris & salioris sanguinis constitutionis, vel certæ in glandulis maximarum texturæ, serosius, acrius aut salius, aliove modo minus conducens infanti lac colligat, etiam citra sugentis oxiā id propinari nequit, quin nutrimentum tale, ipsi minus appropriatum, hostile & inimicum evadat.

3. Tertium lactis vitium est, si fuerit nimis nutritivum. Scilicet utut sanissima etiam sit mater vel nutrix, tamen tenello infantulo ipsum lac probè excoctum, crassius, spissius, adeoque magis butyrosū & nutritivum, non æquè primo statim haustu vix convenire videtur, quia in utero materno adhuc conclusus fœtus nutrimento lacteotenui & limpidio fuerit sustentatus; unde mox à partu si tale lac hauriatur, ab eodem oneratur ejusdem stomachus, & exinde varia recementa coacervantur. Ob id nempe provida mater natura post partum matribus in salutem editi fœtus in mammæ derivat colostrum, h. e. serosiorē tenuioremque chylum, quod præmittitur lacti peritico, pinguiori & spissiori,



forti, tertio vel quarto die demum supervenienti. Colostrum enim ab ipsa natura præmittitur, ut ceu serosum ac tenuius minus negotii facessat stomacho, sed potius serositate salinâ abstergat blandè stomachi mucum, & intestinorum subgestatione collectas sordes expurget, & simul virtute diuretica urinarias vias probe eluat, & vias quasi parulas reddat, donec successivè, lacte magis magisque alimentoso reddito, stomachus eidem adsuecat, facilitetur digestio, & impediatur facillima ejus corruptio. Rectè igitur dicunt Practici: Colostrum non esse reiiciendum, sed esse foetus alimentum medicamentosum pro purificatione primarum viarum eidem inferens. Hinc istud, quod die primo scaturit ad mammam, potentiùs purgat, quod secundo & tertio, minus, donec succedat purgatrici vis nutritrix. Matres ergo quàm pessimè infantes statim nutricibus robustis, obelis aut pinguibus, aut quæ jam aliquandiu lactarunt, exponunt, quia ab harum lacte butyroso & caseoso nimis oneratur stomachus tenellus, & digestiois opus inde insigniter retardatur, ac cruditati acidæ, lactisque coagulo, promptissima occasio subministratur. Illustrat hæc epilepsiæ exemplum aliquot filiabus lethale, ex nimia lactis, materni licet, butyrositate & pinguedine, quod recenset HOFFMANNUS *Tr. de Usu & Abusu Medic. Chym. pag. 49.* Quod si verò matres nutrire intendant suos foetus, quo quæso consilio corrigunt naturæ prudentissimos conatus, & tam studiosè emulgent tam salutare hoc colostrum: quasi nocere possit infanti, quod ceu divina medicina ipsi propinandum foret; de quo etiam imprimis contra Medicum quendam sufficienter & egregiè differit VESLINGIUS in *Epist. & Obs. 28 pag. 123.* & antequam SPIGELIUS in *crudito scripto de Formato Fætu cap. 13. pag. 16.* ubi valde peccare matres ait, quod non admoveant recens natos mammis, dum scilicet habent adhuc colostrum. Propinent ergo matres vel nutrices suis infantibus colostrum, ut hoc præparentur ad ipsum lac uberius nutritivum.

Sed tolerabile aduc, quia facilè corrigibile, esset hoc erratum nisi IV. gravius longè, familiarissimum licet, se offerret vitium, nempe *superflua & inordinata*, & tantum non per vim lactis insulio in os & stomachum infans, ut subinde mater aut nutritrix pueros suos nimis alendo sapiens necet. aut lachrymâ malet, ut rectè observat KERCKRINGIUS in *Spicileg. Anat. Observ. 40.* Familiare enim est, ut infantibus ad quemvis ex quacunque causa excitatum, ipsis tenuentibus licet, sapius præbeant mammam, & unâ die decies imò vigies lactent, antequam prius lac haustum ex toto digestum; unde crudum adhuc & subacidum in stomacho hærens, à superventu novi lactis grumescit, caseatur, & abit in mucilaginem acidam, viscidam & tenacem, atque sic unum corrumpit alterum: unde ab inordinata ingestione & corruptione pylorus indignatur, ut vel, saluari licet effectu, omnia illa vitiosa vomitu rejiciat, vel eadem corrupta & caseata se pertinaciter stringendo transmittere nolit, hinc infantibus mille impendunt mala. Secundum KERCKINGIUM enim I. a. pylorus in infantibus se firmiter claudit, unde ea ulteriori morâ in stomacho retenta, in loco illo tepido in deterius, ac ex cruditate acidâ in corruptionem putredinalem delabuntur, & in liquamen putridum, flavescens, nidorosum, viridescens, &c. tandem degenerant: Vid. HELMONTIUS *Tr. Infant. Nutrit.* qui tragœdiam hanc graphicè & eleganter delineavit.

Lactet ergo nutritrix foetum, quantum sufficit, cavendo imprimis, ne crebrius seu sapius accopiosius fiat: nam aliàs aut acori seu cruditati acidæ, aut nidori seu corruptioni nidorose lactis occasio datur. Præstat sanè peccare hic in defectu, quàm in excessu, cum replectiones ad extremum productæ graves esse soleant, teste HIPPOCRATE *Secl. 1. Aph. 14.* & sicut in adultis omnis repletio, in specie patris, est pessima, quod verissimum est; ita sanè lactis in infantibus nocet: hinc enim consequenter impura corpora, quod magis nutritivis, eo magis læseris; Vid. HIPPOCRATES *Secl. 1. Aph. 10.* Nam tantum non omnes infantum affectus primariam originem habent ex lactis vitio; siue acefcat, siue coaguletur, siue alio modo corrumpatur, idque vel vitio ventriculi infantilis, vel vitio nutritricis, aut insuetis aut incommodis alimentis utentis, aut affectibus animi nimis indulgentis.

Unde V. periculosus jam urget fatum misellos lactentes, si lac per perversam & sapiusquè inordinatam dietam matris vel nutritricis fuerit depravatam. Dietæ peccata sunt

1. Varia alimentorum ingluvies.
2. Affectum neglecta refrenatio, &
3. Excernendorum pariter ac retinendorum neglectus.

1. Quod attinet assumpta: Equidem sanis omnia sunt sana, modò per internam appetentiam assumantur, & sobriè ingerantur; quod enim sapit, nutrit. Aded ut lo sanis scrupulosus alimentorum delectus reverà sit frustraneus, quin potius, si appetitus circa aliquod objectum feratur intensius, imprimis consuetum, (nam in insuetis appetitus subinde medicamentum quærit,) vix denegandum sit, quia fermentum digestivum potenter quolibet in sui ditionem trahit & coarctet, ut ut talia cum moderamine mediocritatis propinanda sint, cum sobrietas rectè cardo totius dicatur diætæ; id quod nutritricibus conducticulis in specie observandum, ut plurimum egenis, adeoque famelicis, & frequenter nimio nutrimentorum excessui primitus indulgentibus. Nihilominus tamen lactantes præ cæteris in specie respiciere debent scotos tenellos, quibus errata nutritrici innocua solent esse nocentissima, & graves subinde inducunt passionibus; siquidem assumptorum plures proprietates in chylo persistunt, quæ ut ut plus minus infraactæ aut alteratæ sint, & nutritrici non noceant, suam tamen in lacte præsentiam manifestè exseruunt, & foetus nocivæ sunt. Res nota est de *Purgantibus*, quæ à nutritrice assumpta subinde graviter infantem laxant, & omnia imprimis propriè dicta infantibus sunt inimicissima. Notum est de *anisio*, quod pro augmentando & corrigendo lactem chylo propinatum nutritrici, sui in eo vestigia odore repræsentet. Tacebo peculiare idiosyncrasias infantum quoad certa assumpta, à parentibus transplantatas, quæ à nutritricibus neglecta graviter tenellos lædunt, quorum exempla recenset DIGBY de *Nat. Corpor. Tr. 1. cap. 38. pag. m. 424.* & 436. Imprimis autem urgentur *acida*, in quibus ordinariò peccatur, nempe quæcunque *acida* aut acefcentia, siue sint condimenta siue potulenta, mox sui vestigia in dulci lacte, ut ut sensibus abscondita, relinquunt, quæ ordinariò ejus coagulatio & congrumescencia, & corruptio in excreta viridia & actria, manifestè acotem spirantia, &c. sequuntur; unde tunc temporis tormina infantibus molestissima, ab acido intestina torquente, convulsiones & infantum epilepsiæ, ardores & insultus febriles, ab acore peregrino sanguini infuso, aphthæ, achores, favi, tinea, abdominis inflammationes, & similia mala ab acido oriunda. Et hæc mala infantibus sunt frequentissima, sicut etiam corruptio lactis acidâ ipsis est familiarissima, unde etiam conveniunt infantibus primariò absorbentia terrea, marina &c. Hinc & cautiore matres, dum foetum in utero inclusum gestant, acida nimia fugiunt, ne infantes in utero præmature torquant, aut iisdem fomitem epilepticum ingenerent. Sic sapius observavit Clarissimus SYLVIVS, quod tales mulieres ordinariò generent foetus epilepticos; dum verò acido abstinuerint alio gravidationis tempore, foetus saniores, epilepsiæ minus obnoxios, produxerint, idque etiam adeo pluribus matribus prædixit: Cum præterea acidorum abusus ad abortum gravidas disponere rectè asseratur à BECKIO in *Med. & Experimen. pag. 214.* Quod etiam de vino, quod nempe foetum pellat, asserit HARTMANNUS *Prax. Chymiatr. cap. 228 §. 3.* Unde etiam JOHAN-ANTONIUS Von der LINDEN in *Comment. super hunc loc.* primis gestationis mensibus vinum gravidis, in specie, ut vocat, calidioribus, prohibet, metu abortus, quibus ultimis duobus vel tribus mensibus Creticum aut Malvaticum, in parva tamen dosi, concedit. Hic etiam vinum nutritricibus (non assuetis) non semper prodest, quia ab hujus præmatura coagulatione ad grumescenciam lac in mammis disponitur: In quo tamén acido frequentissimè peccatur, amicum & gratissimum cum sit stomacho, tantum non quotidianum ejus percipimus appetitum. Caseo itidem non immeritò interdicitur nutritricibus, ne hoc, tantum præmature coagulo, ad grumescenciam præternaturalem jam in mammis lac disponatur. Cerevisia non ritè fermentata, aut à secipis depurata, ut ut nutritrici sine torminibus aliaque noxa propinetur, à fermento stomachi serè subacta, tamen lac corruptum ab ea pueris diarrhæas torminosas excitare solet. Quod etiam de *fructibus horais succulentis*, *uvivis*, *musto*, *prunis*, & similibus facile fermentescibilibus, verum est, quorum esu infantes solent disponi ad diarrhæam torminosam: sicut aridiores rectè contra alvum pertaxiis sistunt, dum refert TIMÆUS von GuldenKlee in *Cas. 1. §. Cas. 15. p. 252.* ex eo, quod nutritrix castaneas copiosius assumpserat, alvum infantis pertinaciter obstructam: sicut



ex floribus sambuci lactis incoctorum uberius haustu & nutritricem & foetum copiose purgatas esse observavi. Confer. BARTHOLOMÆUS Cent. 2. Hist. 93. pag. 328. utut aliis infans soleat esse potus, imò admodum proficius pro lactis augmento. Propterea cautæ sint nutrices in assumptione alimentorum, plus minus tamen, prout nempe aut consuetudinis, aut digestionis primæ, vel absolutioris vel deficientis, adeoque subactorum plus minus, & alteratorum à fermento digestivo ingellorum, in his fert ratio.

Juxta hanc acidam corruptionem, & hinc ortam coagulationem, & foetidissimam corruptionem, & depravationem lactis ab assumptis, etiam secundò *Affectuum* exorbitantiæ jam attingendæ sunt, quorum inordinatus insultus, ut generaliter spiritus animales, totumque genus nervosum, & his medianibus massam sanguineam & reliqua corporis contenta liquida commovendo, insigniter alterat; ita specialiter nutrientium corrumpit lac. Imprimis dum nutritrix affectuum agitata fluctibus, nunc iræ, nunc libidine estuat, nunc terrore percussa; ex his enim lac inspissatur, & ad coagulationem & corruptionem disponitur: unde lac ita alteratur, ut exinde epileptici insultus frequentes, in specie ab ira, superveniunt infantibus. Turbant sanè affectus omnes concoctionis primæ negotium, aded ut ex tristi nuncio esurienti inopinatò allato, adedque incusso sic terrore, statim pereat omnis appetitus, unde digestionis consequenter impedimenta, & cruditarum acidarum occasiones: qui effectus eidem exire furore expectandi sunt, sub cuius fervore vel maximè sanguinis ebullitio & quasi febrilis effervescencia, cum bilis orgasmo consideranda veniunt. Ex alterato ergo ac depravato chylo simile generabitur lac, aut hoc genitum licet in statu pacato, sub intestina tamen affectuum rebellionem, & inde nata omnium corporis contentorum à spirituum vario ac præternaturali impetu, non potest non insigniter alterari, & varè commotum & quasi secundum minima concussum, in partes secedere, & butyri ac casei ex seroso vehiculo quasi separationem præternaturalem pati. Sic terror non minus, quàm iracundia, mediante lactis coagulo, ac in mammis grumescencia, inflammationes, dolorosissimæque abscessus, & in specie *oxytelas mammarum*, sapissimè inferunt; hinc mater infanti infanti præsens lacte tali semicaleato mille nocumenta inferre. Nihil magis autem infantes ad epilepsiam ordinariò disponit, quàm terror & iracundia nutritricis: Sic quædam puerpera voluit nutrire proprium foetum, sed simul lactare catellum, ut lac uberius alliceretur: aliquo die casu patella porcellanea ex alto hypocaulo decidit & frangitur, unde graviter perterrefcit, unde repente ad secum rediisset animus, mox catellum mammis, ut lac terrore alteratum exsugatur, applicat, ne isto foetui noceret: quo facto intra dimidia horam gravi epilepsia catellus corripitur; propinquit eidem Theriacam, unde oborto gravi somno fuit curatus. Sed præter has sensibiles coagulationis & grumescentiæ qualitates nocivas, & alias multifarias difformitates induit lac, ex tam variis affectuum fluctibus, quibus sanè non tam matres, quàm specialiter nutrices, obnoxie succumbunt, quarum singulæ infantis nutrimentum lacteum morbose disponunt; hinc in varia liquamina cadaverisatur, unde excrementa, nunc intensè flava dulcia, nunc sèculenta foetida, instar fecum cerevisiæ, nunc ex nigro purrida, aut alio modo corrupta, imprimis in diarrhæa infantum, relictuntur: quin & vomitus, febres, atrophia tandem, aut saltem varii cutanei affectus superveniunt, quæ ita foetus sanitatem graviter labefaciunt.

Præter dictas lactis materni depravationes, ab affectuum exorbitantiis oriundas, matres etiam gravidæ occasione subitanei terroris, & inde ortæ fortioris impressionis, suos in utero materno adhuc conclusos foetus notabiliter ligare, aut horum cutim variis maculis defecare solent, unde

#### NÆVI MATERNI.

Nævi materni sunt maculae varii, imprimis rubicundæ, vel sanguineæ, flavi quoque & nigri coloris, & variae figuræ, quæ nunc planæ, nunc in tumores aliquo modo elevatae, imò excrecentiæ carneæ, conspiciuntur variarum rerum, plurimum imprimis appetitarum, e.g. fragorum, myrtillorum, cerasorum, pomorum, &c. hanc vel illam fructus in utero materno adhuc conclusi partem afficiunt, à subicanea & pavida rei horrendæ, e.g. flammæ, sanguinis, linguæ bubulæ, muris, aut cuiusdam animalis ex angulo

profluentis, ulceris cacothelæ, &c. aspectu, & inde fortiori matris impressione inducitur; unde & rerum harum figuram & colorem referunt.

#### PARS AFFECTA.

*Subiectum* patiens seu *Pars affecta* sunt partes cutaneæ, vel solæ, vel cum vasorum ramis majusculis conjunctæ, quæ in tales excrecentias terminari solent; unde quæ feliciter ac aliae partes corporis naturales succreant, adeoque non sine periculo præscinduntur.

#### CAUSÆ.

*Causa proxima* latet in ideali, idem matris quàm foetus, primariò tamen matris, specifico conceptu & impressione, adedque spiritus insit in certa corporis parte alteratione. Dum enim mater gravis ex subitaneo & improvviso hæmorrhagiæ, flammæ, muris, aut alius rei conspectu, certam corporis partem, v.g. frontem, labia, genitalia, &c. attingit, ab idea hac concepta, & spiritibus animalibus præsentata, spiritui insito simul alterato rei conceptæ character, & sic foetui eidem in parte nævus certus imprimitur: Sic notum est HELMONTII exemplum de militis manu abscissa, cujus aspectu gravis quædam filium manu carentem peperit: Sic paucis abhinc annis in consistorio quodam Ecclesiastico in causa divortii casus sequens de vulva monstrosa, erinacei vultum representante, adeoque congressui inepta, ventilationi subiciebatur: Scilicet femina quædam illustris ex profapia, ni fallor, Comitissæ cujusdam oriunda, alterâ aut tertiâ nuptiarum die circa vespem inter saltandum à Tychone citata, vesicam exoneratura, in proximum conclave se recipit; Inter mingendum verò ex improvviso erinaceus in angulo delitescens proruit; quo perterrita genitalia fortè attingit: unde suo tempore filiam peperit, quæ pudendis non solum erinacei vultum repræsentavit, sed cui etiam debito pubertatis tempore loci pubis pilii crassiores, aculeos erinacei ferè referebant, effluerunt.

Denique tertiò superest consideranda Ratio *Excernendorum ac Retinendorum* in nutritricibus. *Excreta* quod attinet: hæc inter primarium obtinent *menstrua muliebria*; nam sicut gravidis, ita etiam in lactantibus naturaliter supprimuntur *menfes*, probabiliter in salutem foetus. In habitioribus tamen, sanguine turgescitior præditis, Viraginitibus dictis, vel plethoricis, subinde primis gestationis mensibus etiam adhuc sub ipso lactationis tempore iidem ordinarij periodo crebrius fluunt; qualia collegit exempla SCHENCKIUS in *Observat.* pag. 754. & 630. Jam verò observandum, quoties nutritrix fluunt *menfes*, quod tunc foetus minus commodè se habeat, & sensibilis in eo observetur alteratio, languidus, lachrymosus ac imbecillissimè toto menstruationis tempore; quoniam cessante cessat etiam dictus languor foetus: Id quod etiam observatum à PAULO ZACCHIA *Quæst. Medico legal. lib. 7. Tit. 3. quæst. 3. pag. 490.* Nempe certâ fermentatione massa sanguinea sub menstruatione agitur, & turgescit, unde & menstruum febrem, sive omni mense, cum sanguis per genitalia evacuetur, recurrentem, ex acriori scilicet sanguinis effervescencia observavit LINDANUS in *Coll. Manuscr. super Harim. Prax. Chymiatricam*, sub qua commovetur camarina cacochymia; unde tunc menses partim curant, partim præservant multos morbos chronicos. Si ergo commovetur camarina sub lactatione, exinde lac tunc temporis alteratum, & similem fermentativum concipit motum, qui & turbat infantis primam digestionem, & vitalem sanguinis fermentationem vitiat, foetum lædit, & eundem egrotum reddit; forsân simili quodammodo ratione, atque quando adultæ cerevisiæ potui vel vini adjecti, ex potu talis liquoris adhuc non nihil fermentantis, seu extraordinariè affecti subinde non leviter læduntur. Imprimis insigniter alteratur lac, si fortivà nutritrix utatur Venere, aut clanculum denuò fuerit imprægnata; corrumpitur hinc lac, & horridam quodammodo acquirit impressionem, foetui nocivam; unde istud nauseat infantis stomachus, ut subinde spontè se ablaçent infantes: id quod & in brutis observabile est; ut curiosè exemplo observatum à GRÆFO de *Organ. Virorum Genital. p. 126.* de cane selem lactante. Lac ita depravatum, ne dicam corruptum, ab infante haustum, tanquam hostile, aut in ejus stomacho in peregrinum casei coagulum abit, tenellus infantis stomacho mirè infestum, adeo ut eidem exinde stigma, casei



averfatio multis familiaris, & per totam vitam durabilis, imprimatur; aut lac aliâ ratione in liquamen dulce putridum, flavefcens, &c. alteratum, diarrhoeas, maciem, ac modò dicta mala infert. Ob id & Medicorum est præceptum, ut toto lactationis tempore nutrices à coitu abftineant; unde etiam lactantes matres à redditione debiti excufat, propter infignia fœtus nocumenta: **PAULUS ZACCHIAS** loco *ſupra citato*. Quod verò ex alteratione lactis poſt impregnationem, & inde in ſtomacho ejus facta caſeatione, oriatur averſatio caſei, poſtmodum per totam vitam durabilis, præ cæteris eleganter deducit **MARTINUS SCHOOCKIUS** Tr. de *Averſatione Caſei*, & Illuſtris **DIGBY** Tr. ſatis acurrato & eleganti Phyſico, de *Immortal. Animæ hum.* uti & de *Nat. Corpor. cap. 38. pag. 437.* & denique **SCHOTTUS** in *Phyſ. Curioſ. cap. peculiari prolixiſſe de Averſatione caſei pag. 534.*

## C U R A.

Lactis hæc & lactationis vitia aut errata ex iis, quæ hæcenus dicta ſunt, ſacillimè quivis corrigere valet; Nempè ſemper habeatur reſpectus, ut omnis ejus ſub digeſtione prima oriunda *vitioſa aceſcencia*, hincque grumofa *coagulatione*, cœu familiariffima vitia, quantum poſſibile, præcaveantur. Unde in infantum curis vel maxime nutricum, habenda eſt ratio, cum peccatorum earum pœnas ſæpiſſimè luant infantes inſonres. Propterea mulieribus vel nutricibus commendatiſſimus ſit uſus *aniſi* & hinc *ſeniculi*, ſive ſemina eorum poſt ſingulos paſſus comedantur, ſive radix ſaltem & herba ſeniculi quacunq; ratione uſurpetur, & ex his parata medicamenta: nam præter lactis ubertatem, etiam ſaluberrimam vim, & corruptioni minus obnoxiam, ipſi ſimul conciliant, aromaticâ volatili oleoſâ naturâ vitioſam & præmaturam lactis aceſcentiam & coagulationem prohibent & corrigunt; quin & *termina* & ſtatus infantis feliciter tollunt, blandèque inteſtina abſtergendo infantes laxant. Caveat nutritrix ſimul ſedulo, ne aquæ frigidæ diutiùs aut crebriùs manus immergat, vel ne crebriùs pedibus nudis in loco frigido ambulet, & ſtatim ab hoc lac infanti infundat; ſic enim ſtatim lac in mammis alteratur, nec infantes tantum, ſed & ipſa nutritrix, ventris tormina ſolent pati.

Quod ſi inopinato terrore percuſſa, vel ira commota fuerit mulier vel nutritrix, lactiſque grauiorem alterationem metuat, primò omne lac ex mammis priùs *emulgeat*, poſtea aſſumat *ſpermatæ ceti* ʒʒ. ad ʒj. cum lapillorum cancrorum, vel *antimonii diaphoretici*, vel coralliorum gr. xv. ad ʒj. in hauſtu cereviſiæ calidæ, & ad blandum ſudorem ſe componat, quo omnis lactis corruptela ſic emendetur, ſperma ceti enim quemcunq; grumum & quodcunq; coagulum lactis promptè diſſolvit. Vel

ʒj. Cornu Cervi ſine igne ʒʒ.

Salis card. bened. ʒʒ. ad gr. xv.

M. F. Pulvis: S.

Reſolvens pulvis ſudoriferus.

Capiat in aqua ſorum ſambuci, & blandum ſudorem expectet.

Vel in tumore, dolore, & duritie ſuperveniente, & ita inflammationis metu:

ʒj. Cornu Cervi ſine igne ʒj.

Antimonii diaphor. ʒʒ.

Sal. vol. cornu Cervi aut viper. gr. viij.

M. D. S. ut antè.

Vel horum loco ſpiritum ſalis ammoniaci à ʒʒ. ad ʒj. in aqua cardui benedicti hauriat, & ſudorem plus minus largum expectet, imponendo ſimul mammæ, in leviori quidem affectu, emplaſtrum de ſpermate ceti Myſiſichti; in graviore verò inducendo mammæ emplaſtrum de galbano crocatum Myſiſichti, cum ana gummi ammoniaci, in aceto deſtillato ſoluti, invicem liquefactis, & linteo denſo inductis, conſectum, quàm calidè perferre poteſt: utroque in caſu de ſuper ſacculum interpaſſatum ex oryza conſectum probè calefactum imponat, ut per ſudoriferâ iſtâ alcalinâ diſſolutum lac horum adjumento promoveatur in motum, & ſtagnatio ejus ac grumefcencia ita corrigantur maturè. Aliud emplaſtrum, lactis coagulationem à terrore præcavens, habet **SYLVIVS** in *Praxi* pag. 387. 6. 45.

Uti autem in infantibus adhuc lactentibus imprimis habenda eſt ratio corruptelæ lactis, & inde aſtorum liquaminum multiplicium, in ſpecie crudicatis acidæ; ita in infantibus ablaſtandis habenda quoque eſt ratio digeſtionis primæ, & propter voracitatem ſeu addiphagiam cumulatorum

Estmull. Oper. Tom. II.

excrementorum acidorum viſcidorum, unde morbi infantum ablaſtatorum maximam partem oriuntur, ad quæ incuria primariò reſpiciendum venit.

*Nervi Materni*, cum ſibi relictæ, imprimis profundiores, ad ultimum vitæ terminum remaneant, & ad reliquarum corporis partium modum adaugeantur, maturam requirunt Curam: pro quo optimum remedium eſt ſecundina, ſive propria, ſive alius fœtus, ſi eadem adhuc cruentâ & callidâ nævus mox à partu aliquoties fricetur; ſicut & puelli mortui attactus, & quidem ſæpius admiſſus, à multis laudatur. Quidam requirunt ſecundinam primiparæ & puellum primogenitum: ſed non neceſſe eſt; modò ſæpius reperatur; Lintea etiam ſanguine menſtruo tincta ſufficiunt; quibus nævi probè fricandi: ganglia enim hiſce linteis curata videtur. **HELMONTIUS** laudat frictionem cum pomis reſolventibus, de qua vid. *Tract. de Magnet. Vulner. Curat.* Italis contra hos nævos buſones cruſtatos, ſeu teſtudinæ, tanquam ſecretiſſimum remedium commendant, ſanguinem linteolis exceptum applicando, & ſimul particulam carnis imponendo. Hiſ non juvantibus ad corroſiva magis accedendum, v. g. aquam Divinam Fernelii. Huc etiam pertinet ſinapi maſticatum, cum quo pars deſordata frequentius fricanda. Ubi verò integra corpora excrevere, eaque majora, propriis vaſis ſanguiferis & nervis majoribus inſtructa, per conſtrictionem & abſciſſionem ſunt auferenda.

Quoad *Ablaſtationis Tempus*: lactet infantem mater præter propter annuo ſpatio; ablaſtandus poſtmodum venit commodiſſimè verno & autumnali tempore poſt æquinoctia, idque potius crescente luna, quàm decreſcente. Sub alteratione hac maxime lædantur infantes à potu nocturno cereviſiæ, vel aliorum liquidiorum; hinc enim ſtomachi atonia inſtatio totius abdominis, diarrhoea, & mille mala ſuperveniunt: Propterea potui nocturno ſemper aliquantulum eſſentiæ abſinthij addendum, partim ut amarore hujus deterreantur ab ulteriore potu, partim ut hoc modo medicatus ipſe potus ventriculo & primis viis medicamentoſe evadat, nec ampliùs noceat. Sin verò ſupradicta mala ex potu nocturno jam orta ſint, corriguntur optime, pauxillum vini Malvatici propinando: externe verò ſacculum ex mentha, roſemarinò, angelica, caryophyllis, mace, & ſimilibus aromaticis, conſectum abdomini applicando.

## ARTICULUS IV.

## D E

## VITIIS PULTIS.

**H**æc vitia lactis ſuere, reſtant adhuc *Errata Pultis*, conſecundum genus errorum in aſſumptis.

Sunt hæc potiſſimum

1. *Præparatio*;
2. *Propinatio*:

quæ culpantur.

Quoad 1. deſector in pulte imprimis farinæ crudæ uſum, quæ vel cum aqua ſimplici, vel cum lacte ſubacta, & cocta, ac in pulmentum viſcidum, craſſum & glutinoſum, &c. redacta, quid aliud dabit, quàm paſſam tenacem, crudam & viſcidam, utiliorem biblopegis pro glutinandis chartis, quàm infantibus pro nutritione? Jam verò notum eſt, quod farina quæcunq; cum aqua ſufficienti ſubacta, & in loco tepido aſſervata, ſpontè ſua & facile incipiat inſigniter aceſcere, & hinc fermentare, atque ſpumofè turgere, etiam citra fermenti additionem: quid jam fiet in ſtomacho infantis, quem talis pulvis ingreditur, & poſtmodum lac butyroſum ſuperfunditur? Ex hoc nempè præternaturali & ſtomacho peregrino pultis acore emergit materia acida, viſcida, cui ſuperinſectum lac mox corrumpitur, & in grumos caſeoſos coagulatur, adeoque digeſſio prima exinde depravatur inſigniter. Siquidem ob fermentationis farinæ in panificio pro adultis etiam ſummè neceſſariæ defectum difficillimè eadem paſta exiſtit digeſtionis, quia laborioſæ in ventriculo fermentationis. Conſiderate ſaltem, quod panis ex quacunq; farina conſectus, non ritè fermentatus, ac ſic pro digeſtione ſtomachali faciliùs ſuſpicenda, & in aliis unâ aſſumptis promptiùs adjuvanda ineptus, ex defectu acidi ſpirituofii volatilis, crudam farinæ mucaginem reſolventis & volatiliſantis, adultis maxime ſit noxiuſ, & quàm



secundus sit genitor morborum chronicorum; quod præter quotidianam experientiam vel muliebris loquitur sexus, ex talis panis esu menstruorum patiens defectus & cachexias, ut pluribus videri potest KERGERUS de Fermentat. Sect. 3. cap. 2. pag. 216. & SCHOOCKIUS de Ferment. cap. 2. & 3. Quid ergo fiet, si edamus panem ex farina cruda cum aqua subacta? At robustus est adultorum ex spirituosi ac acriori fermento stomachus, debilis contra infantis. Inperat quis tale pulmentum glutinosum & viscidum infanti, & superaffundat lac butyro & caseo pingui turgidum, quidni talis puls infantibus erit admodum nociva? tenax nempe & glutinosus, stomacho ponderosus, vitiosoque acore intensè tinctus emerget mucus, mille malorum in junioribus talibus secundus parens. Porus ergo farinae talis pro meliori digestionem fermentativa præparatio extra corpus præmittatur, quam quod tanto sanitatis periculo eadem in stomacho demum instituenda supponatur. Perspexerunt hoc, & rejecerunt ob id tales pulces jam olim plures insigniores Medici, uti de hoc videri potest VELSCHIUS de Venæ Med. seu Dracunculis Veter. Excitat. de Verm. capill. infantum pag. 291. Conf. simul HILDANUS Cent. 6. Observ. 34. qui periculosissimam pylori obstructionem, à tali spissa pulce natam, observat.

Quoad 2. post pulvis præparationem culpo etiam ejus usurpationem, dum consuetæ sunt mulieres vel nutrices, ut pulcem prius ingerant in proprium os, & cum saliva ad debitam fluiditatem subactam postea in os infantis intrudant. Consideremus ergo salivam, & ejusdem singularem fermentativam vim, à modernis sufficienter declaratam, (ratione cujus proficua sanè esset ejus cum pulce miscela, si exactè sana nutritrix eam institueret) quam promptè sub ejus vehiculo ratione hujus virtutis fermentativæ etiam morbi contagiosi promptissime soleant communicari, & propagari in distans; ob id minus istam nutritricis delibationem permittere possum, cum exinde facillimè ad morbosam corruptelam puls disponatur, imprimis si tantillum scorbutici fermenti gingivas & salivam inquinaverit. Si ergo saliva talis nutritricis vel tantillo cacochymiae vel scorbutici est inquinata, eo etiam inquinat infantem, cum tamen per se puls sit satis nocens.

Superest pulvis correctio, quæ consistit in eo, ut loco farinae sumatur panis triticeus, vel, ut vocant, similagineus, qui nonnihil exsiccatus vel induratus, probè tritus, cum lacte vel cum aqua, adjecto vitello ovi, in pulvis consistentiam mollem coquatur, tantillum seminis anisi pulverisati superaddendo. Experientia me hætenus docuit, valiam optime conducere tenellis, & ubertim eos nutrire, ceteraque mala præcavere. Nempe fermentatus panis similagineus, adeoque facillè resolvable, promptiusque in stomacho digestibilis, melior est, quam pasta farinacea cruda, unde salubriores fiunt pulces. Pauciores enim sic elevabuntur flatus, & mucus erit longè liquidior post ejus usum, & minus viscidus, qui etiam facillius potest abstergeri, quam è communi pulce fieri solet. Sed etiam non nimia quantitate propinetur puls, verùm tantum saltem, quantum citra coactionem abluunt infans.

Quibus hætenus dictis rite observatis, nullum est dubium, quin infantes vitam sanam sint conservaturi diutius.

## CAPUT IV.

## DE

## MORBIS INFANTUM PRÆCIPUIS.

Sed quàm facillè hæc imperantur, quæ tantum non impossibilia sunt, ut observentur, idque tam à matre, quam à nutrice, non poterit tamen tam rigorosum regimen institui, quin propter multiplices circumstantiarum varietates colligatur tandem succus acidus, copiosior vel parior, acidior vel temperatior, viscidior & pituitosior vel serosior; unde morbi infantiles plerique successivè propullulant. Sub hoc enim nutritionis cursu frequentissimis tenelli obnoxii sunt agitudinibus, quæ & ipse post ablationem non statim desinunt, quin interdum factà ablatione demum se prodant, ob errores circa nutritionem commissos. Primus intestinorum tormina frequentissime cruciant illos, cum quibus excreta alvi à consuetâ flavedine subinde defleunt, & obscuriori colore subinde viridiorum, porra-

ream vocant Prædicti bilem, tincta apparent: quin & cum hoc peregrino colore (rarius sine eo) eadem ipsa non indubita fluida æqualiter permixta consistentia cernuntur, sed in parvos quasi grumulos discerpra procedunt: præter quas vitiosas excretiones & copiosior alvi fluxus seu diarrhoea non raro eos delassat. Juxta has passionnes, & vigilæ pertinaces maxime necessariam junioribus somnolentam quietem tollunt, aut interrupti pavores eandem turbant, prodromi scilicet gravioris mali epileptici, cui vel maxime ista ætas est obnoxia, sive interiores abdominis tantum convellantur partes & thoracis (quod nosstrates vocant epilepsiam in corpore) sive externa concutiantur membra. Hypochondrium præterea flatulenta intumescencia, tumorque præcordiorum angustat eosdem, non minus quàm difficilis respiratio, tussisque perquam vel ex eo molesta, quod aut nesciant aut nequeant rejicere ea, quæ ad tussim proritant, nisi repetitus vomitus spontè naturâ vitiosa auspicatò eliminet. Utut autem viscerum & membrorum mollis extensibilitas aptissima sit pro uberiori augmentante nutritione; crebri tamen exarescunt potius, aut deficiente nutrimento atrophici laborant, aut, nutrantur licet, vitio tamen hujus nutritii succi prava non raro efflorescunt tubercula, in ulcera saniosa & curandas partes instat favorum in mellificio excedentia, aut tinea instat craniitragmina erodentia: quibus malis nec linguae artificiosus musculus, nec palati concamerata structura carent, quin ulcusculis, Aphthis appellatis, infestentur. Ut nihil dicam de febribus variis, in specie lentis, nem de variolarum, & morbillorum contagio insultu, musteum tenellorum sanguinem, non minus quàm paulò adultorum magis, febrili turgescencia & tantum non effervescentia turbante. Supervenit tandem & dentitio, dolorosa eadem, & pessimorum symptomatum concitatrix: non secus ac intertrigo, sive cuticulæ tenerimæ hinc inde facta excoriatio. Ac ne malorum aliquid desit, lumbricorum incondita turba, quibus non malis multat infantes in intestinis qui hospitantur, dum crinones seu capillares vermiculi intercutanea loca cateruatim inhabitant.

Talis tantaque malorum strages imminet pueris, ut rectè cum PLINIO in Proem lib. 7. Histor. Natural. dicendum sit: à suppliciis vitam auspicatur homo, unam tantum ob culpam, quia natus est: aut afferendum cum sapiente SOLONE: Homo est puerdom exorsus, bulla in omni vita, cetera verum in morte.

## CAUSA PROXIMA.

Detectis hætenus remotioribus causarum morborum fontibus, dum exactius consideramus omnia hæc vitia, & nocendi rationem proximam seu rationem causandi, perspicuum evadit, succum vitiosum acidum, nunc viscidum, nunc aquam serosum, defectu primæ digestionis in ventriculo, ejulque in intestino duodeno perfectionis, adeoque ex cruditate acida coarctatum, esse Causam proximam & radicem omnium ferè affectuum infantilium. Hunc, sive Galenicorum pituitam acidam, sive Paracelsistarum tal acidum, sive tartarum styacem appellare velitis, mihi perinde est; sinus namque in verbis faciles, modò in rebus conveniamus. Nempe omnia vitia lactis in stomacho concurrunt, inque eo magis alterantur, & in coagulum acidum abeunt, idque eo magis, quod copiosius aut inordinatius ingeritur, hinc spissescit, & facta per coagulum seri à contentis separatione casei cum butyro perniciosus grumus nunc in stomacho, nunc in intestinis subsidet, & plus minus pertinaciter agglutinatus hæret; unde oriundus mucus impensè acidus & ponticus originem ducit: id quod excreta inde per alvum viridia, seu porracea & aruginosa, quasi grumosa, & quamplurimi morbi, sufficienter declarant, dum præter tormina sæpe corripiuntur epilepsia, flatibus, inflatione præcordiorum, convulsionibus, pulsibus, achoribus, fauis, morbillis, variolis, atrophis, &c. Confer huc suum symbolum puls farinaceus cruda & viscidus facillè accessibilis, unà cum retento & plus minus corrupto meconio, unde ex conditione loci, hoc est si machi calidi, & ratione contentorum, uti & ingessorum lacteorum & pul-taceosum, intensus acor necessariò & de facili oritur; qui nunc materia viscida irritatus in primis vias suas ludit tragedias; nunc vehiculo aqueo-seroso & lymphatico ulterius distributus, etiam aliis & remotis in locis mille malorum existit artifex. Clara hæc evadunt spontè, modò superius explicata probè consideremus, in specie quæ de retentione meco-



meconii, vitilis lactis & pultis, dixi. Confirmat etiam hoc medendi ratio, quæ ordinariò & optimè instituitur per *alcalia*, tam fixa quàm volatilia, in specie per *salia volatilia*, aromatica oleosa, infantibus optima remedia, quæ *acidum* destruant, & *serosum* evacuant.

Hæc tamen non ita intelligenda sunt, ac si hæc quasi solitaria sint *causa proxima* horum affectuum, sed quod etiam subinde, rariùs tamen, aliæ errata in corpore tenello observentur; ubique enim excipiendi sunt *morbi hereditarii*, utut occasione tali subinde maturiùs expurgiscantur, uti & à laetantibus transplanteata morborum semina, aut aliorum hausta contagia. Præterea *lac* in sui corruptione mille larvas induit, mille inde nocendi artes, non tantum dum adhuc in mammis turget, sed in specie, dum nunc in stomacho, nunc in intestinis à *bile* & *succo pancreatico* diversimodè alteratur, subinde à restitente meconio similibusque excernendis inquinatur, quin & propriâ sponte de facili corrumpitur, unde diversimodè dulcescit, amarescit, colliquescit, viridescit, livescit, putrescit, verminescit, aliasque quàm plurimas peregrinas adsciscit sibi qualitates: nam & iam in tenellis sexcenta seu potius infinita Hippocratea, de quibus *Autor libri de Præfca Medicina*, locum inveniunt. Unde tam in abdominis visceribus, quàm massa sanguinea, & inde derivatis reliquis contextis liquoribus activis, quàm plurima præternaturalia nocumenta præstò adsunt; Utut frequentissimum & familiarissimum sit nocumentum, si in *coagulum acidum* aut cruditatem acidam abeat.

Verùm hoc quibuldam paradoxum videtur, infantibus tenellis semilacteis, adeoque dulci rore chyloso ubique perfusus, ex lacte dulci primitus concretis, & eodem cum pulte insipido dulci enutritis peccare posse *acidum* adeo nocivum, & subinde *excessivum*, à quo tam tetra superveniant symptomata. Sed clarius redditur facile totum negotium, modò consideremus *assumpta* tam matris utero gestantis, quàm nutricis lactantis, & postmodum ipsam *naturam lactis*, tum facile patebit, quod subinde *acidum*, etiam satis *excessivum*, in foetu tenello possit congeri. Frequens est, ut mater & natrix ex dictamine appetitus ingerant manifestè acida; sed posito, non vesci talibus, certum tamen est, matrem & nutricem vesci saltem pane, & bibere cerevias: Jam verò in pane omni, in specie fecalino, semper adest spiritus acidus, volatilis tamen, saluberrimus quidem in se, sed adeò potens, ut etiam duriora corpora, v.g. corallia, vitrum antimonii, martem, saturnum, aliaque rodere & dissolvere queat. Jam verò panis cum aliis assumptis etiam materiam lacti suggerit, unde hic ipse acor, quamvis in stomacho sub digestionem, & in jejuno ab alcali bilis, alteretur plus minus in falsum volatile; nihilominus adhuc in lacte occultus hæret, qui per se quidem est innocuus, datà tamen occasione facile de novo se exerit & operatur, & dicta mala infantibus infert; hinc enim tam facilis lactis acescentia, & assumpta acida matri ac nutrici innocua, tamen infantibus per lac, revera ad gustum dulce, sunt torminosa, & vel maximè hostilia. *Cervisia* quoque facillimè acescunt, cum modica lupuli pinguis aromatica conditura non semper sufficiat, quin tandem acescat. Si ergo cerevisia novella, vel à facibus nondum sufficienter depurata, fermentando in stomacho facillimè acescens, aut cerevisia inveterata jam non nihil acidula à nutricibus subinde ingeratur, facile in his suo acore lac inquinat, ut consequenter in foetu quoque evigilando lac dictum acorem possit inferre. De cætero his ipsis vix ulla est cura, quantum sua assumpta scetum aut infantem afficiant, utur earum delicta diu post deum luant infantes, idque datà qualibet occasione, ut plurimum per epilepsiam, ut suprà monitum. De fructibus horæis, effervescentibus facillimè, acetariis & similibus, gravidis pariter ac lactantibus, citra reflexionem in foetum familiarissimis, res nota est. Adeò ut acidum sit, quod morborum infantilium frequentissimus est autor: sicut subjectum ejus viscidum, eos contumaces subinde reddit, aut crebriùs recidivantes; vehiculum verò aquosum etiam in remotioribus locis, & extrema corporis peripheria eisdem propullulare facit.

### CURA IN GENERE.

Pro horum correctione, & inde natorum morborum cura, in genere, remedia talia conveniunt, quæ *acidum* absorbent vel destruant, *viscidum* incidunt, seu attenuant, & utrumque pro ratione occasionis, tam per *urinam*, tam in *sensibilem transpirationem*, quàm per alvum evacuant, *Estimul. Oper. Fom. II.*

primasque vias seu fomitem morbosum abstergere valent: Adeoque mox à nativitate propinanda sunt, & subinde repetenda remedia *temperata*, his indicationibus satisfacienda: inter quæ prima sunt ex animalium partibus parata *salia volatilia*, in specie *oleosa*, quæ optimè *acidum* corrigunt, & in falsum alcalinum blandum transmutant, diureticum pariter & diaphoreticum; quin etiam penetrando potentissimè attenuant & resolvunt quascunque obulas cruditates viscidas, & sic lac salubre & à corruptione præservant; unde *spiritus salis ammoniaci* vel simplex, vel cum aromatibus destillatus, sicque factus oleosus, item *spiritus salis ammoniaci anisatus*, & *caryophyllatus* convenit. Optimè etià conveniunt aliquot guttæ spiritus cornu Cervi, & quem mille encomiis extollo pro curandis infantibus, liquor cornu Cervi succinatus, à B. Doctore MICHAELIS prinitus in usum vocatus, & hæstenu mille experimentis multis in casibus adutorum pariter ac juniorum utriusque sexus comprobatus. Hæc enim *salia volatilia* hostiles acores altiùs in corpore tenellum penetrantes, & inde ortas convulsiones & epilepticas passiones corrigunt & sedant, eorumque declinantem sanitatem firmant; hinc etiam spiritus cornu cervi succinatus, pusillo ad duas vel tres, in infanti unius anni ad septem vel octo guttulas, est expertum remedium in epilepsia infantum. Paratur modò laudatus liquor ex spiritu cornu cervi & sale volatili succini, ab omni oleositate empyreumatica crebrioribus cum aqua & spiritu vini solutionibus, & inde sublimationibus, purificato, anaquantum sufficit, ut imbibat & solvat intemè dicta *salia*: quæ mistura, utut effervescat primitus, cum succini sal equalitè acidum suavissimum admodumque delicatum conjunctum habeat; brevis tamen amicè cocunt, & digestionem debità ac cohobationem reiteratà liquorem hunc commendatissimum constituunt. Nec est, quod generosa nimis nimisque graduata pro infantibus putemus *salia volatilia*; nam circumspèctus usus in lacte nutricis, vel in aqua aut *syrupis mentha, feniculi* &c., & limitata ad guttulas saltem dosis, optimè potest accommodari tenellis pariter ac paulò robustioribus infantibus; & licet, dum propinantur infantibus, mirè mutantur, nemo tamen interit; mox enim ad se redeunt, & aliquot dosibus repetitis, lissidem quatenus consuetis minus solent angere. Miratus sum sapius, à quibusdam vel præconceptis opinionibus excecatis, vel experientià debità destitutis Medicis, cum pauore quasi audiri salium volatilium mentionem, speciatim pro infantum cura, cum tamen sub legitimo & circumspècto usu Deorum manus eadem vocanda existimem. Volatilibus hisce alcalibus & fixa per spiritum vini temperata in solutiones tinctas etiam subjungenda erunt, imprimis tinctura tartari, & tinctura scoriarum reguli antimonii.

Præter *salia* hæc volatilia acriora & aromatica, conveniunt etiam infantibus ægris subjecta alia aromatica & oleosa, suo volatili sale non destituta. Inter hæc eminet *Anisum*, ejusque semen pulverisatum; quod recens, dosi ℞i. ad ℥ss. aromaticà vi vitiosas acescentias corrigit, & inde productionem flatuum impedit, blandèque intestina abstergendo tenellos laxat; sicuti commendatur ab HEURNIO in *Meth. ad Prax. lib. 2. cap. 26.* Juxta hæc Castoreum benedicta est Medicina, mirè temperans acidum austerum, & quascunque convulsiones & tormina leniens. Myrrha quoque omnem corruptionem & acorem tollit, & balsamicà vi quancunque corruptionem putredinalè inhibet, indeque ad vitam longam ab HELMONTIO commendatur *Tr. Arcan. Paracels. pag. 626.* Unde PARACELsus ipse in *Consil. antipestil. Sterzingens.* Myrrham junioribus & infantibus, seu optimum pestis præservativum, commendat. Propterea Tinctura salutis B. Doctoris Langil ex myrrha cum spiritu vini tartarificato vel tinctura tartari parata, salutare est pueris remedium, corrigens acidum, & resoluens viscidum; loco cujus etiam *spiritus salis ammoniaci* cum spiritu vini paratus pro menstruo proelicienda essentia myrrhe capi potest. Facit huc etiam Elixir proprietatis sine acido paratum, per alcalia nempe, vel fixa, ut sal tartari, & hinc dissoluta cum spiritu vini, vel volatilia, cum spiritu salis ammoniaci: hoc ipsum enim iis, qui adhuc lactis gaudent nutrimento, mirificè conducit; sicut post ablactationem id, quod cum acido consueto modo vulgò conficitur, tutò concedi potest.

Hiscè acidum corrigentibus volatilibus, partim salinis, partim oleosis, adjungenda simul erunt denique Concreta quasi terrea & paulò fixiora, acidum, quod talia rodit, in se absorbentia: qualla sunt imprimis marina seu aquatilia,



ut lapilli cancerorum, & cum his, viz nobilioris usus, margaritæ præparatæ, maxilla lucii piscis, unicornii verum præparatum, dens hippopotami præparatus, corallia rubra, &c. in genere, etiam quævis animalium partes duræ, ut Cornu Cervi, tam communi modo, quàm sine igne aut philosophicè, ut vocant, usum, ut & ebur simili modotractatum, &c. ex quibus decantatus pulvis Marchionis ferè est compositus, qui ad tormina & epilepticos insulset infantum mulierculis est usitatissimus item mineralia absorbentia, in specie crystallus, terra sigillata, antimonium diaphoreticum, lapis bezoar animalis. His denique pro scopo anodyno aut Theriacæ aut Mithridatii, anniculis gr. j. vel grana ij. pro una vel duabus dosibus, aut cinnabaris antimonii, aut pulvis epilepticus antimonialis, addi possunt. Nec est, ut Theriacæ aut Mithridatii vel caliditatem vel narcotism opiatum metuamus, modò à grano dimidio ad gr. j. vel ij. pro ratione ætatis propinetur; quin & acida vitiosa temperent, & inde illatas noxas dolorosas blando sopore fallant. Opiata autè nimis generosa nocent infantibus, tam ante quàm post ablactationem, iacent ibi, ac si mortui essent: Conf. PANAROLLUS Pentec. 2. Obs. 27. V. g. loco pulveris epileptici Marchionis etiam feliciter usurpari solet pulvis pro pueris polychrestus sequens:

- ℞. Lapill. cancer. præp. ℥ss.  
Cornu Cervi sine igne ℥j. ad ℥ss.  
Corall. rub. præp. ℥ss.  
Myrrh. el. gr. vj. vel ix.  
Ther. Androm. gr. iij. vel iv.  
Ol. destill. anisi get. iij. ad vj.  
M. f. Pulvis: S.  
Pulvis infantum contra tormina.
- ℞. Cornu Cervi sine igne ℥j.  
Lapill. cancer. præp. ℥ss.  
Myrrh. el. gr. vj.  
Ol. dest. anisi get. iij.  
M. f. Pulvis: S.  
Pulvis pro pueris.

Vel

- ℞. Lapill. cancer. præp. ℥ss.  
Corall. rub. præp.  
Cornu Cervi sine igne an. ℥j.  
Salis Card. ben. gr. xij.  
Theriac. gr. iv.  
Ol. destill. anisi get. vj.  
M. f. Pulvis.  
D. S. ut suprà.
- ℞. Lapill. cancer. præp. ℥ij.  
Salis absinth. gr. xli.  
Myrrh. gr. vj.  
M. S.  
Ut ante.

De his, quantum sufficit, in lacte matris vel nutritis, vel in pulve, vel alio vehiculo, infanti propinetur: & loco salis cardui benedicti vel absinthii grana quædam salis volatilis cornu Cervi, vel salis volatilis cranii humani, vel viperarum, permisceri possunt; erit enim sic usus ejus longè salubrior, magisque præsentaneus: E. g.

- ℞. Lapill. cancer. præp. ℥ss.  
Cornu Cervi sine igne ℥j.  
Unic. veri præp. gr. xv.  
Salis volatilis cornu Cervi vel cancer. hum. gr. ix.  
Theriac. gr. iij.  
Ol. destill. anisi get. iv.  
M. f. pulvis:  
D. S. ut suprà.

Vel

- ℞. Cornu Cervi sine igne ℥ss. ad ℥j.  
Lapill. cancer. præp.  
Corall. rub. præp. an. ℥ss.  
Salis vol. cornu Cervi gr. vj.  
Theriac. gr. iv.  
Myrrh. el. gr. iij.  
M. f. pulvis: S.  
Pulvis pro infantibus sanguinem mundificans.
- Item Mixture polychresta:
- ℞. Aquæ flor. samb. ℥ij.  
Spir. sal. ammoniaci get. xli. ad xv.  
Cornu Cervi sine igne,  
Maxill. lucii pisc.  
Unic. veri præp. an. gr. ix. ad ℥ss.  
Syr. Papav. albi vel Diacod. ℥ss. ad ℥ij.  
M. D. S.

Potio leniens contra tormina.

Temperatus sic partim, partim resolutus mucus acidus viscidus, necesse interdum est, ut foras eliminetur, idque per alvum imprimis, obstericante naturæ defectibus arte. Opiatam hic ferunt opem Clysmata, imprimis cum sale tartari aut simili lixiviali acuata, quæ mucum in crassioribus intestinis resolvunt, optimèque deducunt, & stimulo reliquis intestinalis ita injecto, cætero mucos descendenti vias patentiores reddunt. Optimè parantur ex decocto florum chamomillæ, v. g.

- ℞. Decoct. flor. Chamomill. ℥j. vel ℥ij. ad ℥ij.  
pro ratione ætatis,  
adde  
Mell. rutæ. ℥ss.  
Sal. tartari ℥ss. ad ℥j.  
Ol. destill. anisi get. iij. vel iv.  
M. pro Enemate.  
D. S.  
Clysm. abluens.

Quod injectum feliciter operatur.

- ℞. Decoct. emoll. ℥ij.  
Ungu. clysmat. ℥ij.  
M. pro Enemate:  
S. ut suprà.
- ℞. Spec. emoll. M. ij.  
Bacc. iuniper. ℥ss.  
Cin. clavell. ℥ij.  
Coqu. in aqua simplici:  
Colat. ℥iv. adde  
Ol. lil. alb.  
Mell. mercurial. an. ℥ss.  
Misc. pro Clysmate:  
D. S. ut suprà.

- ℞. Spec. carmin. M. j.  
Sal. tartari ℥ss.  
Coqu. in f. q. aquæ ad ℥ij.  
Colaturæ adde  
Elect. Hier. cum agar. ℥ij.  
M. f. Enema:  
D. S. ut suprà.
- ℞. Rad. lil. alb. ℥j.  
Flor. Chamomill. M. j.  
Sem. anisi ℥ss.  
Coqu. in f. q. aquæ:  
Colat. ℥ij. adde  
Elect. de bacc. lauri ℥ij.  
Mell. mercurial. ℥ij.  
Ol. destill. Tereb. ℥ss.  
M. f. Enema:  
D. S. ut antè.

Vel loco tallum enematum iniciantur ex lacte dulci, sed cum terebinthina mediante vitello ovi dissoluta permixto, quæ admodum sunt egregia, idque in specie, ubi dolorosi abdominis affectus simul urgeant: E. g.

- ℞. Lactis ℥ij. vel iij.  
Terebinth. tum vitello ovi dissol. ℥ij.  
M. pro Enemate: S.  
Clyster leniens contra tormina.

Quin si & fortius agendum per clysmata, ubi stimulanda alvus, & detergendus mucus, non raro vitreus, etiam calibux simpliciter vegetabili decocto paratis, pro fortiori acumine addendus est syrupus emeticus à ℥j. ad ℥ij. pro ætatis ratione, aut etiam insulsum quoddam antimoniale, nomine aquæ benedictæ aliis cognitum: quallia pertinacioribus intestinalibus, epilepsiam jam minitantibus, quæ ferè semper in infantibus fomitem obtinet in abdomine, convenientissima sunt: E. g.

- ℞. Decoct. carmin. cum ℥ss. vel ℥j. sal. tartari par. ℥ij. vel iij.  
Syr. emet. ℥ss. ℥j. ad ℥ij.  
Mell. rosæ. ℥ij.  
M. S.  
Clyster abstergens.

Quoad laxantia; sanè infantes bene possunt ferre Purgantia, ut rectè observavit WEDELIUS in Opiol. pag. 38. Quod si opus sit ex lacte farinaque in pulve congestum mucum per vomitum evaculare, in specie in asthmatis aut gravioris suffocationis metu, sufficit pulvis radices Zeros Florentinæ ad grana aliquot (iv. vel xli.) propinatus. Instat omnium sit syrupus emeticus seu Oxysaccharum emeticum Angeli Salæ. De hoc, ut apud nos paratur, infantum unius



unus anni 36. trium annorum 36. sex annorum 3i. & sic porro, ratione ætatis præter propter plus minus propinatur: Quod si viscidior mucus occupet præcordia, parum de syrupo nicotiano potest addi: v.g. Infanti unius anni adhuc lactanti:

℞. Aqua Hyss. 3iij.

Syr. Nicot. 36.

Emet. 3i.

M. D. S.

Potio emetica.

Propinatur pro dosi.

Quando infantes teneriores, propter sordes in primis viis copiosas, vomitu sunt evacuandi, tutissima est methodus, ut recipiatur quantitas syrupi emetici, quoad dosin pluribus guttis ætatem infantis superans, e.g. gutt. vi. vel viij. ad 3i. diluatur cum aquæ menthæ vel scniculi vel alius appropriatæ, 36. vel 3i. & de mistura hac aliquoties, successivè tamen, idque tutius, quàm semel pro una dosi, quod periculosius, cochleare parvum unum vel duo ad tria propinetur, tandem continuando, donec sufficiens evacuatio successerit, suadente hoc iridem experto LUDOVICI c. l. pag. 197. sic enim sine ullo periculo possunt purgari infantes, & haud facillè nec in excessu, nec defectu peccari potest: Sit v.g. Infans dimidii anni, cui præscriberem pro vomitorio:

℞. Aqua Menth. 36.

Syr. emet. 36.

M. S. ut supra.

De hoc cochleatim propinetur, donec sufficiens sequatur evacuatio:

Sedulo nempè hoc observandum in omnibus remediis, quæ infantibus propinantur, nunc plus nunc minus se exferre in operando posse, quatenus vel copiosior mucus, grumulusque caseosus, vel parcius, aut prout tenacior vel minus tenax in stomacho & primis viis hæserit. Fancium irritatio cum pena oloio intincta molestissimum est remedium; interdum enim frustra infantes ad vomitum stimulat.

Si per inferiora purgandi sunt infantes, præter ea, quæ supra Artic. 1. cap. 3. pro meconio removendo laudavi, omnibus palmam præcipit syrupus de spina cervina vel domesticus, vel solidus, vel cum syrupo de sumaria mixtus & subinde exhibitus; item syrupus de cichorio cum rhabarbaro: V. 8.

℞. Syr. de Fumar. 3iij.

Domest. 3i.

M. S.

Succus aperiens.

℞. Aqua Menth. 3vi.

Syr. de spina cerv. 36.

M. S.

Ut ante.

De quo propinetur infanti pro lubitu.

Vel

℞. Syr. de spin. cerv. 3i. (vel huius & syr. ros. solut. an. 36.)

Lapill. cancr. præp. vel Maxill. lucij pisc. 36. ad 3i.

M. S.

Succus aperiens bene circumagendus.

℞. Syr. de spin. cerv. 36. Cichor. cum Rhab. 3iij.

Lap. cancr. præp. 3i. ad 36.

M. D. S. ut supra.

Propinetur cochleatim.

Potest etiam dilui cum paucis aquæ cuiusdam appropriatæ. Item

℞. Syr. de spin. cer. 3i. rosior. 3iij.

Lapill. cancr. præp. 36.

Corall. rub. præp. gr. xij.

Spiritus Anisi parum.

M. S. ut supra.

Propinetur cochleatim. Vel

℞. Syr. de spin. cerv. 36.

Aque Cinnam. 3iij.

Spiritus sal. ammoniaci 36.

Lapill. cancr. præp. 3i. ad 36.

Mista diluantur cum paucis aquæ scniculi.

D. S. ut supra.

Singulare aliis pro referenda alvo infantum quid obinet Muscerda, non nisi superflue delicatis horrida, cuius minutæ pilulæ No. j. vel ij. aut iij. pulverisatæ, & cum lacte, vel pulve potius, exhibitæ ad imitationem RULANDI Thes. lib. 3. pag. 220. optimè solent purgare infantes; vel tamen Estmull. Oper. Tom. II.

les pilulæ vj. vel viij. aut x. dissolvantur in lacte, per linteum exprimantur, & exhibeantur.

Jalappa quoque absorbentibus in parca dosi addi potest, nempè ad imitationem LUDOVICI in accurata Pharm. Dissert. 1. pag. 196. qui

℞. Cornu Cervi usli præp. vel sine igne p. iij.

Pulv. Jalapp. p. j.

M. pro pulvere.

Dosis gr. j. vel. ij. trimestri gr. iij. ad v. pro ratione ætatis & virium, feliciter purgat.

℞. Cornu Cervi sine igne gr. xij.

Pulvis Jalapp. gr. iij. vel jv.

Ol. destill. anis. gutt. jv.

M. pro 3i. dos. S.

Pulvis aperiens pro aliquot vicibus.

Ablatis infantibus eadem Jalappa cum tartari cremore commodè potest propinari, semper grano uno alterove excedendo annorum numerum; v.g. pro purgando infante quadrienni:

℞. Crem. tartari,

Pulv. Jalapp. an. gr. v.

M. f. Pulvis.

D. S.

Pulvis purgans.

Item

℞. Pulver. Jalapp. gr. vj.

Tartari vitriolat. 36.

M. S.

Ut ante.

Vel

℞. Pulver. Jalapp.

Crem. tartari an. gr. vj. vj. viij. ad 36.

M. f. Pulvis pro infante j. vel 6. annor.

Propinetur in jusculo calido, vel in syrupo domestico, aut de cichorio cum rhabarbaro.

Vel pro infante 8. annorum:

℞. Crem. tartari gr. xij.

Pulv. Jalapp. gr. ix. ad 36.

Ol. dest. anis. gutt. j.

M. f. Pulvis pro dosi:

D. S. ut ante.

Propinatur in vehiculo jusculi servidi.

Hisipis quoque Nodulus ex Rhabarbaro pulverisato in cerevisia suspendi potest, cui addenda subinde interdum radix Helenii, quæ pulverisata potui ordinario in nodulo suspensa, interdum expressa, commodè satis infantes laxant; non minus quàm dimidia vel unica pilula aloëtica ab eodem LUDOVICI cit. loc. præscripta. Habitioribus paulò eadem mutatâ saltè dosi conveniunt. Manna quoque Calabrina purior in pulve & infantibus propinata, quantitate plus minus auctâ, 3iij. ad 36. pro scopi vel ætatis ratione, suaviter & blandè eisdem laxare solet, sed est simul fermentativa, & flatuum torminumque in infantibus auctor. Præ aliis specificè infantes evacuat Mercurius dulcis & aurum fulminans. Nam cum gravissimi infantum morbi in lactantibus oriuntur ex acido in fomite plus minus viscido, & in ablatis ex simili cruditate acida, convenientissimus est mercurii dulcis usus & corrigens acidum dissolvens viscidum. Infanti, dum adhuc lactatur, gr. j. vel ij. in lacte, vel potius in aqua quadam destillata, cerasorum, menthæ, &c. propinatur. Mirum quantum viscida & horrida evacuat. Datur tunc etiam febricitantibus: Item quando suspicio est de nutrice mali moris, necesse est mercurius dulcis sedulo infantibus detur. In ablatis verò datur ad plura grana ferè pro ætatis ratione, tot scilicet ferè grana, quot sunt annorum, in paulò robustioribus & vegetioribus stimulum grani unius alteriusve Jalappæ addendo: v.g. infanti trium annorum:

℞. Mercurii dulc. gr. iij. vel jv.

Sacch. gr. ij. vel vj.

M. S.

Pulvis purgans.

℞. Pulp. passul. 36.

Mercurii dulc. gr. 16.

Pulv. Jalapp. gr. iij.

M. S.

Electuarium purgans pro una vice.

Infanti quinque annorum:

℞. Mercurii dulc. gr. v.

Pulv. Jalapp. gr. j.

Conf. Rosar. q. l.



M. f. Bolus: S.  
Bolus laxativus.

Egrege operatur.

Infanti sex annorum:

℞. Mercurii dulc. gr. viij. adix.

Sacch. ℞.

M. f. pulvis: S.

Pulvis purgans.

Puero octo vel novem annorum:

℞. Mercurii dulc. gr. ix.

Scamm. præp. gr. j.

M. S.

Ut antea.

Vel

℞. Pulv. passul. min. ℞j.

Mercurii dulc. gr. viij.

Scamm. præp. gr. j.

M. D. S.

Succus purgans.

Puero decem annorum:

℞. Mercurii dulc. ℞.

Scamm. sulphurat. gr. ℥.

M. f. Pulvis pro j. dosi.

D. S.

Pulvis purgans.

In specie imminenti variolis & morbillis mirabilis est ejus usus in principio propinatus; nam tunc simul ordinarij vomitus movet, & variolæ facilius postmodum erumpunt, pauciores fiunt, & minus malignæ, quod probe observandum: & pro infantum cura singulare quid latet in mercurio dulci. Hic, ubi non videtur sufficere, ad aurum fulminans me accingo, cujus operationes ordinarij in infantibus sunt, quod horridas dejectiones efficiat, interdum etiam vomitus moveat, ordinarij, ante vel post evacuationem, quiete insequente: nempe acrimoniam corrosivam, unde serè epileptica pathemata, in infantibus absorbet, & simul viscidissimas sordes notabiliter abstergit; saltem dosi probe notanda est; potenter enim operatur. Infantibus adhuc lactentibus gr. j. prodosi, aut in delicatioribus gr. ℥. pro duabus serè dosibus sufficit, idque quamdiu lacte utuntur; robustiores si fuerint, aut tenaciores sordes primas vias occupaverint, ad gr. ij. etiam ascendere possumus: v. l. aliquando infanti septem dierum cum coralliis præparatis auri fulminantis gr. ij. pro duabus dosibus dedi in torminibus gravioribus, in quibus epilepsia metuebatur provenire. Infanti duarum septimanarum in insigni totius corporis aestu, torminibus acerbissimis & epilepsia affecto, cum clysmatibus præmissis præscripsi sequentes pulveres:

℞. Unic. veri præp. gr. ℥j.

Ebor sine igne,

Crysell. mont. præp. an. gr. vj.

Auri fulm. gr. iij.

M. pro 2. dosibus:

in aqua succi Pæoniæ propinandis:

D. S.

Pulvis aperiens singularis.

Item aliquando puellæ viginti septimanarum:

℞. Dent. Hippop.

Ebor. sine igne an. ℞.

Auri fulm. gr. ij.

M. pro 2. dosibus:

D. S. ut supra.

℞. Ebor. sine igne ℞.

Auri fulm. gr. j.

M. S.

Pulvis singularis.

Et ita quidem, quamdiu infantes lactantur, in dosi gr. i. serè subsistit, raro plus, interdum, ubi cautius agendum, paulo minus propinando.

Quodsi ablactati fuerint, cautior hujus auri fulminantis sit usus: quia enim in his deficit lac, aut hujus in stomacho coagulum, à quo notabiliter aliàs temperatur aurum fulminans, propterea potentius operatur, adeoque secundum annorum rationem grana etiam ordinanda pro dosi: & hinc est, quod ablactato subinde vomitus moveat, minus lactentibus; item quod infanti lactenti unius alteriusve septimane tantum propinare queam, quantum ejusdem lactenti octo vel novem mensium; quia nempe, quod iuniores sunt infantes, eò copiosiori utuntur lacte, adeoque eò magis temperatur aurum fulminans; item quod juniores

sunt infantes, eò temperatius est acidum fermentum vitale in ventriculo, quod in ablactatis potentius magis valet dissolvendo, vel acuendo auro fulminante, unde in talibus etiam potentius operatur: Sic infanti duorum annorum, & qui jam diu ablactatus est, propinata gr. ij. aliquot vomitus & secessus movent cum impetu, & sic porro in aliis. De cætero, quando infantibus, tam lactentibus, quam ablactatis, copiosæ sordes occupant primas vias, præsertim acido plus minus corrosivo imprægnatæ, unde hypochondriorum inflationes, epilepsia partium internarum & externarum, asthmata convulsiva, tormina, æstuationes universi corporis, convulsiones &c. in talibus casibus sacra anchora est aurum fulminans, repetito in usu adhibendum. Sunt qui scammonii usum reliquis præferunt, & ejus aliquot granula in forma emulsionis propinant, & admodum commendant; vel si ejus gr. j. aut ij. syrupo de cichorio addantur. Sed acrius est, & infantibus perniciosius simplex, & vix, præterquam in ablactatis & robustioribus, locum habet. Horreo esulinam vel tithymalinam scammonii virulentiam, adultis & robustis gravem, & subinde nocivam, tanto minus infantibus tolerabilem. Quidam etiam mediante nutrice purgare volunt infantes; sed consilium est incônstante seu incertum, prout scilicet plus vel minus alterari potest remedium purgans in stomacho nutritis; item prout citius vel tardius purgabitur infans: propterea, quia res est dubia, simplici remedio tutius laxantur infantes. Huc pertinet aliquo modo, quando papillis pulvis quidam laxativus inspergitur, de quo PANAROLLUS Pent. 5. Observ. 10. sed propter summam incertitudinem doseos, quæ in tali casu ad factum certò determinari nequit, adeoque obmerum, ne plus debito purgentur tenelli, minus tutum negotium existimo: Vid. BARTHOLINUS Cent. 2. Histor. Anatom. 93.

## CAPUT V.

### MORBI INFANTUM SPECIALES.

**I** Ad his hinc fundamentis facilis est via ulterius indagandi supra enarratorum morborum generationes.

## ARTICULUS I.

### DE

### TORMINIBUS VENTRIS.

**Q**uod ergo specialia attingit pathemata infantum, familiarissime affligunt infantes, præsertim recens natos, Tormina Abdominis, Germ. das Reizen im Leibe, qua ipsi serè sunt inevitabilia, unde infantes sunt inquieti, continuò plorant, pedibus calcitrant, virè se torquent, & hinc inde jactant, mammas recusant; præterea subinde simul venter inflatur, aut crepitus copiosus emittuntur, alvus plus minus adstricta esse solet, & quæ excernunt, sunt aut viridia plus minus, & æruginosa, quæ ordinarij acidum odorem spirant, aut flava, sed quæ brevi post in aère viridescunt, aut sunt grumosa. Tormina hæc formaliter sunt motus convulsivi intestinorum; unde non rarum est, quod gravioribus his torminibus, cum convulsivis spasmodicis junctis, non raro superveniant epilepsia. Materialiter seu occasionaliter oriuntur à corruptela lactis, quia lac æscendo, aut in stomacho aut postmodum in intestinis præternaturali hostili ac viscido acore intestina afficiendo, rodendo, lancinando &c. tormina talia inducit, eaque eò crudeliora, quod acidum viscidius & glutinosius se affixerit parietibus intestinorum; quin & ex acido per vitiosam cum bile fermentationem excitantur flatus, à quibus simul & hypochondria infantum, Germ. das Hertz gepann, uti vocant, & præterea totum abdomen, mire distenditur. Vidi ego aliquando tantam à flatibus abdominis distensionem, ut etiam Hernia scrotalis sequeretur.

Tales infantes, qui torminibus ab acido excessivo & vitioso infestantur, habent excrementa ut plurimum viridia, sive, ut vocant, porracea, sive æruginosa cum grumosis lactis excreti, cum bile salina oleosa volatili permista, ex quorum miscela viriditas ista exurgit. Comprobat hoc experientia quotidiana, dum acida, imprimis acria, bilem solent in viridem colorem transmutare; unde simile acidum in intestinis concurrens & effervescentes cum bile, istum uitorem inducere potest.



Equidem viridis color reverà sub concursu plurium ex miscela flavi & cærulei emergit: flavedo in bile clara est, & conspicua: cæruleus color in nullo succorum corporis unquam, nec naturaliter nec præternaturaliter, observatus fuit; unde rarissimum & sædè unicum est exemplum, quod recenset MEARA de lacte nutricis, sapphirinum colorem exadè referente, in *Exam. Diatrib. de Febribus Willisii* pag. 75. Cum tamen cæruleus color ad nigrum accedat propius, adeoque in certa luminis maximam partem introsusceptione in poros, & cum umbrulis mistione consistat, loco huius in corpore absentis acidum, perspicuum licet, constringendo tamen & angustando aliquali subiecti coagulatione, poros flavi corporis, sufficit, imprimis si dictum acidum & ipsum in subiecto nonnihil densiore & crassiore hæreat, ut exinde viridis ceu medius inter cæruleum & flavum color emergat. Comprobat dicta experimentum GRAFII de *Succo Pancreatico Thes.* 145. & 147. ubi bilis flava ex miscela cum spiritu vitrioli atrovirescentem induit colorem. Nec est, quod quoad experimenti fidem obici possit, id quod alto mihi obtigit tempore, in spiritu vitrioli adhuc contentas esse, & sub rigoroso ignis examine cum acido simus elevatas metallicas cupreas & martiales particulas, quæ attractu alcali bilis præcipitata virorem representent; sicut eadem attractu gallarum in vitriolo atrum colorem induant: nam idem experimentum tentavi & cum spiritu salis purissimo, non secus accum spiritu nitri, & ubique idem fuit successus & eventus, quod nempe ista mixtura intensus virorem efflauerit; id quod simili ratione de lactis vitioso acore, virorem cum bile producente, verum erit. Hinc talia sub infantum torminibus excreta, licet non semper simul viridia, subinde sunt tamen *grumosa*; qui *grumi* sunt lac à præternaturali acido condensatum & coagulatum, quod istam larvam induit. Talia grumosa etiam nunc sunt viridia, nunc flava, quorum excrementorum discoloratio oritur à bile per acidum mutata & corrupta; in intestinis mox virorem contrahunt; sæpè tamen evenit, ut feces excernantur flavæ, quæ paucò tempore postmodum colorem viridem acquirunt. Causa huius phænomeni est: (1.) quod acidum in corpore in bilem, quamdiu in corpore fuit, non sufficienter egerit, propter impedimentum à lacte, continuò vel brevibus intervallis tantum assumpto, quippe quod ejus vim temperando infringat: (2.) quia non nisi finita effervescencia & facta præcipitatione mutationem regum accuratam observare licet, unde post factam præcipitationem, dum aer externus accedit, finita mutua actione & reactione permistorum, color tandem tertius emergit: (3.) quia & ipsa commista excreta facilius forsan in aere libero novum coloris schema arripiunt, quàm dum in intestinis adhuc sunt coëreita. Observandum quoque hoc loco, atrocissima non raro adesse tormina, excretis alvi aquæ instar leviter flavescens fluidis, quæ nimis fluida, subinde adeò acris observantur, ut & podex excoriari exinde soleat.

Corrumpitur lac nunc à meconio retento, nunc ex proprio suo motu alterativo in ventriculo abdominis. Meconium quidem pessimè corrumpit lac, unde sedulo à partu hoc evacuandum, cum hoc retentum ex lactis induit vitiosa corruptela epilepsias sæpius recurrentis fomes existit. Proprio motu accescit lac, vel quia nutrites acidis viscosi utuntur, vel quia copiosius nimis infanti ingeritur & unde recens prior nondum digesto supergressum promptè acorem contrahit. Vulgò refrigeratio corporis non immerito hic accusatur; nam frigidum facile lædit tenellum infantis stomachum, ut exinde non ritè digeratur lac, sed acore corruptivo inquinatum ad intestina descendat.

## P R O G N O S I S.

• Quoad Prognosin: Dolores hi infantum vires prosterunt, crebrò convulsionem & epilepsias excitant.

## C U R A.

In Cura imprimis operanda, ut alvus sit aperta, cum alvo obstructa pathemata hæc insigniter exasperari soleant: hinc ea, quæ acidum temperant, viscidum incidunt & abstergunt, sunt convenientissima; adiungendo subinde blanda anodyna, dolorem sedantia.

Pro his scopis conveniunt injecti clysteres suprà laudati, reiterandi: attendendo sedulo, an magis acrimonia acida, an visciditas causæ peccantis urgeat? ut ita delectus aliquis instituantur in clysteribus injiciendis; speciatim si tenuia &

liquida, lacteis cujusdam instar, plus minus flavedine tineta; ut ut acerrima, relictantur per alvum, ut etiam, prætergravia infantum tormina, excorietur podex, sufficiunt clysmata simplicia ex lacte bubulo, vel cum vel sine *terebinthina*, aut cum paucò saccharo imprægnata, injecta, quibus dicta acrimonia temperari, & quæ imminet intestinorum crassorum gravis læsio ac excoriatio, tutò præcaveri potest: si verò viscida sint, conveniunt clysmata ex decocto simplici, chamomillæ imprimis, parietariæ, foliorum & baccarum lauri atque juniperi, imprimis pisorum, cum sale tartari vel simili sale lixiviali, quæ dissolvunt mucum & abstergunt. In quo decocto olei destillati rutæ aliquot guttæ possunt dissolvi, quod est egregium in torminibus infantum: loco olei rutæ aliquot guttæ olei destillati anisi commodè dissolvantur; nam & huius aromatica vis intestina solatur, ut utar verbis HELMONTII. EleQuarium etiam de baccis lauri commodè dissolvitur in his clysteribus: V. g.

24. Spec. carmin. M. l.  
Sal tartari ℥i. ad 3℥.  
Coqu. in f. q. aquæ simpl.  
Colaturæ 2℥. 3℥. ad 5℥. (prout pro uno vel duplici clystere præscribitur)

adde  
Mell. rosat. 3℥. ad 5℥.  
Ol. dest. anisi,  
Bacc. juniper. an. gr. iii.  
M. pro Clysmate. S.  
Clyster leniens.

24. Spec. Dec. carm. M. 8.  
Bacc. lauri 3i.  
Coqu. in f. q. aquæ simpl.  
Colat. 3℥. adde  
El. de bacc. lauri 3℥.  
Ol. dest. Cumini,  
Carvi an. gr. i.  
M. f. Enema:  
D. S. ut suprà.

24. Decoct. Carm. 3℥.  
El. de bacc. lauri 3℥.  
Vitell. ovi No. i.  
Ol. dest. bacc. lauri gr. ii.  
M. pro Enemate:  
S. ut suprà.

Item  
24. Decoct. Pisor. 3℥.  
El. de bacc. lauri 3℥.  
Sal. tartari ℥i.  
Ol. dest. succini gr. lv. ad vl.  
M. f. Enema:  
D. S. ut suprà.

Præter ista clysmata internè conducunt lenia Abstergentia, quæ sunt syrupus rosarum solutivus, item pulvis seminis anisi ad 3i. propinatus, qui maximè conducit tenellis, dum non tantummodo corruptionem lactis acidam corrigit, sed etiam aromatica vi flatuum generationem impedit, & ut suprà monui, blandè infantes laxat; vel præter laxativa superius cap. 4. allegata, convenit pulvis Comitidis de Warwick ad ʒss. propinatus, quæ à RIVERO *Cens. 2. obser. 27.* commendatur. In specie, ubi tormina cum flatibus aut excretis viridiusculis & porracels aliisve deiectionibus præternaturalibus conjuncta sunt, in tali casu non crebrò nimis præbenda est mamma, sed interea

24. Aqua Fœnic. 3i.  
Spiritus sal. ammoniaci anis. 3℥.  
Lap. Cancr. præp. ℥i. ad 3℥.  
Syr. de Spin. cerv. 3℥.  
M. D. S.

Potio aperiens, benè circumagitanda.

Detur cochleatim crebrius.

Aqua etiam carminativa Dornereilli, in qua cum syrupo de chamomilla, qui expertissimus est, aliquot guttæ olei destillati anisi sint permixtæ, opimè conducunt: Quin & syrupus de corticibus aurantiorum non inconvenienter præbetur tenellis.

Conveniunt porro cum lacte Corallia præparata, & lapilli cancrorum, additæ semper anatica portione pulveris seminis anisi; Item Crystallus præparata, quæ in horridis torminibus ventris à bile æruginosa optimum remedium est, & similia absorbentia; aut loco talium pulvis Marchionis, aut, qui præsentanei magis est auxili, pulvis suprà cap. 4. dictus



*dictus puerilis propinetur, augmentando dosin olei destillati anisi; vel istis acidum torminosum absorbentibus castorei parum addendum, & quacunque ratione fieri potest, propinandum. Sin pertinacius malum fuerit, nec talibus crebrius repetitis quiescat, ita ut jam vel epilepsia metuenda, salia volatilia, v.g. sal cornu cervi, & supra dicti spiritus & liquores salini volatiles, imprimis blandè aromatizati oleosi, liquor cornu cervi succinatus, spiritus salis ammoniaci anisatus, &c. Theriaca aut Mithridaticum pisi vel minoris vel majoris magnitudine, vel quantum cultelli parvi cuspidè capi potest, sub vesperam exhibitum plus minus pro ætatis ratione, blandam quietem inducit; v. g. infantulis aliquot dierum pro una vel duabus dosibus; item Laudanum opiatum ad gr. i. in Mistoræ ℥iij. vel ℥iv. usurpari potest. Castoreum quoque mirè convenit. Hinc aliis irritis aurum fulminans secundum leges supra insinuat, idque imprimis ubi simul contumaciior ac obstructa alvus fuerit, magnè hoc in casu observatur efficacie. Datur infanti aliquot dierum, aut etiam unius septimanæ, gr. i. cum gr. iij. nitri depurati vel antimoniaci: datur etiam solum vel absque addito in iis, qui jam fuerint aliquot septimanarum, gr. ii. vel ℥i. pro ratione circumstantiarum: propinatur in lacte, vel, quod melius, in aqua florum tilia aut cerasorum nigrorum, vel alia aqua destillata idonea, & præter alios effectus; quos aliquoties admiratus fuit, sand tormina sistit, horridas dejectiones alvi inducit, & epilepticos insultus, tam imminentes præcavet, quàm præsentès sopit. Observetur autem varietas in auri fulminantis operatione: interdum fortidus, interdum debilius, interdum citius, interdum tardius operatur, quatenus, uti suspicor, plus minus in ventriculo infantis à grumo lactis vel mucro vituoso obviscatur vel irritatur. Semen anisi contusum cum pulve exhibitum egregium est in torminibus cum flatibus: sic sperma ceti cum semine anisi, velejus oleo destillato maritatum, egregium est remedium; hinc etiam oleum destillatum anisi convenienter aliis additur: V. g. in torminibus ventris, ubi adest pavor in somno:*

℥. Cornu Cervi sine igne,  
Lapill. cancr. præp. an. ℥i. ad ℥ss.  
Myrrh. cl. gr. vi.  
Theriaca. gr. iij.  
Ol. dest. anisi gtt. iij.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis infantum contra tormina,

℥. Lapill. cancr. præp. ℥i. ad ℥ss.  
Corall. rub. præp.  
Cinnab. antimonii an. ℥ss.  
Theriaca. gr. iv.  
Ol. dest. anisi gtt. iij.

M. f. Pulvis:

D. S. ut supra.

℥. Cornu cervi sine igne ℥ss.  
Myrrh. cl. gr. vi. ad ix.  
Sal. vol. Cornu cervi gr. vi.  
Theriaca. Andr. gr. iij. ad iv.  
Ol. dest. anisi vel Caryoph. gtt. iv.

M. f. Pulvis pro 4. vel 5. dosibus;

D. S. ut supra.

℥. Pulver. diaphor. Lud. ℥i.  
Theriaca. gr. ii. vel iij.  
Ol. dest. anisi,

Caryoph. an. gtt. i.

M. f. Pulvis:

D. S. ut supra.

℥. Lapill. cancr. præp. ℥ss.  
Salis absinth. gr. vi. vel viij.  
M. pro 2. vel 3. dosib.  
D. S. ut supra.

℥. Lap. cancr. præp. ℥ss.  
Crystall. præp. gr. xij.  
Corall. rub. præp. gr. vi.  
Ol. dest. anisi gtt. iv.

M. f. Pulvis:

D. S. ut supra.

Detor cum lacte pro aliquot dosibus:

In forma potiunculæ puerilis duarum vel trium septimanarum:

℥. Aqua flor. samb. ℥iij.  
Liqu. cornu Cervi succin. ℥ss.  
Lapill. cancr. præp.  
Cornu cervi sine igne an. ℥ss.

Syr. ros. sol. ℥ss.

M. D. S.

Mixtura leniens, benè circummagitanda.

Vel, v. gr. pro infante decem vel duodecim septimana-

rum:

℥. Aqua ceras. nigr. ℥iij.

Menth. ℥ss.

Spiritus sal. ammoniaci anis. ℥ss.

Lap. cancr. præp. ℥ss.

Crystalli præp. ℥ss.

Syr. diacod. ℥iij. vel iij.

M. D. S.

Ut antè.

Si tum torminibus purpura emineat:

℥. Aqua scorxon. ℥i.

Menth. ℥ss.

Cornu cervi sine igne,

Maxill. lucii pisc. an. ℥ss.

Salis vol. Cornu cervi gr. iij. ad xl.

Syr. Fumar. ℥iij.

M. D. S.

Potio leniens & purgans.

Quodsi cum torminibus adfint simul alvi dejectiones cre-

bre, fluidæ, acres, podicem excoriantes:

℥. Cornu cervi ussi ℥ss.

Corall. rub. præp.

Terra sigill. an. gr. xij.

Ol. dest. anisi gtt. iv.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis adstringens.

Aut

℥. Cornu cervi ussi ℥iij.

Unic. foss. ℥i.

Terra sigill. ℥ss.

Theriaca. gr. iv.

Extr. Castor. gr. iij.

Ol. dest. Macis gtt. ii.

M. f. Pulvis: S.

Ut antè.

E contra, ubi cum torminibus alvus simul laxanda veniat,

in infante v. g. trium mensium:

℥. Lap. cancr. præp. ℥i.

Crystall. præp. ℥ss.

Salis vol. cornu Cervi gr. iv. ad xl.

Pulu. lalapp. gr. iij. ad v.

Ol. dest. anisi gtt. iij.

M. f. Pulvis pro 4. vel 5. dosibus.

D. S.

Pulvis aperiens.

Aliquando in torminibus infantis quasi dysentericis, cum

excretis horridis, atiam viscido-rubicundis, in infante 28.

septimanarum:

℥. Cornu cervi ussi ℥i.

Cryst. præp. ℥ss.

Pulu. hepat. Viper. gr. xij.

M. pro 2. dos. S.

Pulvis adstringens.

Aliquando in torminibus ventris cum metu jamjam im-

minentis epilepsie cum singulari effectu præscripti:

℥. Unic. veri præp. gr. ix.

Cinnab. antimonii gr. iv.

Extr. Castor. gr. ss.

M. f. Pulvis pro dosi.

Item pro infante trium mensium:

℥. Aqua Menthe,

Chamomill. an. ℥vi,

Ess. Castor. ℥ss.

Lap. cancr. præp. ℥i.

Syr. fenic. ℥iij.

M. pro Potione: S.

Potio leniens, benè circummagitanda.

Usurpetur crebrius cochleatim.

Aliquando puero, altero à partu die gravissimis tormi-

bus correpto, præscripti:

℥. Aqua flor. Peon. ℥x.

Liqu. cornu Cervi succin. ℥i.

Cran. hum. præp.

Unic. veri præp. an. ℥ss.

Syr. flor. Peon. ℥iij.

M. D. S. ut antè.

Externè abdomini & umbilico infantis inungendum venit

oleum septem florum Myrsichti, acuatum cum oleo de-

stillato



# Inflatio & Tensio Hypochondriorum in Infantibus. 939

Stillarofeniculi, anisi, caryophyllorum, rutæ, &c. Item seroaleculo cordis & umbilico utiliter inungi potest oleum anethi, chamomillæ, rutæ, per infusionem seu corpus, aut oleum nucis expressum, aut oleum stomachale Cratonis, acuta cum oleo destillato Angelicæ, carui, cumini, chamomille, corticum aurantiorum, & similibus, ne hæc destillatorum acrimonia dolorem ex excoriatione inferat; E. g.

℞. Ol. destill. Cumini,  
Chamomill. an. ℞.  
Succin. gutt. vi.

Corp. pro Bals. q. s.  
M. S.

Balsamus leniens.

℞. Ol. coct. absinth. ℞.  
Expr. Nucist. ℞.  
Dest. Macis,

Anisi an. ℞.

M. S.

Oleum leniens.

℞. Ol. expr. Nuc. mosch. ℞.  
Dest. Iunip. ℞.

Macis gutt. vi.

M. S.

Balsamus leniens.

Quibusdam commendatur linimentum seu unguentum, factum ex spolio vel exuviis serpentum cocti in pinguedine propria cum oleo anethi; ex quibus paratum unguentum abdomini illitum confert contra tormina infantum. Item pulvis caryophyllorum cum aqua menthæ applicetur calide abdomini secundum VELSCHUM in Hecatost. 2. pag. 22. Forus parati ex aniso & chamomilla cum summitatibus anethi & foliis lauri, etiam commodè imponuntur abdomini.

Quod si tormina oriantur à mucilaginis acida viscida, pertinaciter intestinis adherente, & quæ per clysmata convenienter abstergi nequeat, convenienter paratur unguentum ex gummi ammoniaco & huiusmodi, liquefactis vel in vino, vel in aceto destillato: e. g.

℞. Gummi ammoniaci in aceto sol. ℞.

Terebinth. ℞.

Aloes hepat. ℞. vel ℞.

Seui hircin. vel cervin.

Butyri non saliti an. q. s. pro consistentia debita.

M. f. Unguentum.

Huic ulterius semper, quoties illinitur, olei destillati anisi vel cumini ℞. convenienter additur, & ita abdomini, vel umbilicalibus dictis locis, imponitur, ac quoties opus fuerit, aliquali portione fellis tauri acuat.

D. S.

Unguentum emolliens.

Hoc unguentum resolvit, & liquefact mucilaginem acidam viscidam, eamque per inferius guttur facilius euacuat.

## ARTICULUS II.

D E

### INFLATIONE ET TENSIONE HYPOCHONDRIORUM.

**D**ixi hætenus, quod lac acidum, aut aciditate corruptum, in intestinis cum bile concutendo per fermentationem generet flatum, qui collecti in intestino colo sub hypochondriis juxta tormina recens natis sæpius inferunt *Inflationem & Tensionem Hypochondriorum*, quam vulgò vocant *Germ. das Hertz-geßpan*, seu *Affectionem Cardiacam*, dum nempe hypochondria utrinque tumida, inflata, & insigniter distenta sunt, unde difficilem respirationem committunt, inquietudine & agrypnosin ferè patiuntur.

C A U S Æ.

Oritur malum ex nimia lactis aut pulvis ingestione, dum plus assumunt, quam digerere valent, unde ex cruditate acida fermentando emergunt flatulentie, speciatim hypochondria distendentes. Oritur etiam, quando infantes acri ventoso nimis exponantur, hinc enim quoque hoc malum superuenit.

## DIAGNOSIS.

Solo visu faciliè patet.

## C U R A.

In Cura imprimis radicis Angelicæ pulvis convenit cum pulicula propinatus, vel gutta una aut altera olei destillati simul cum lacte infantibus porrecta, & omnia hætenus recensita ad inflationem hypochondriorum, aut tympaniticam quoque abdominis distensionem, optima sunt. Præ reliquis convenit semen cumini & anisi, ejusdem oleum, & spiritus salis ammoniaci anisatus, species diacumini, item emulso seminis violarum & cardui Mariæ secundum VELSCHUM Hecat. 2. pag. 53. Vel

℞. Sem. anisi pulveris. ℞.

Corall. rub. præp. gr. xv.

M. f. pulvis: S.

Pulvis infantum contra flatum.

Detur in pulve infantibus tenellis.

Item olæolaccharum anisi propinquetur cum lapillis cancrinis, item Theriacæ parum propinari potest. Herba botryos, *Germ. das Trauben-kraut*, à quibusdam tanquam experimentum singulare laudatur, si aqua ejus destillata sæpius propinquetur infantibus, imprimis sæpius cohobata à nova planta; mirè enim conducere ad inflationem hypochondriorum prædicant: cui incommode syrupus corticum aurantiorum addi poterit.

Externè quoque conducit oleum rutaceum & laurinum, cui aliquot guttæ olei destillati angelicæ sunt additæ:

Vel

℞. Ol. Chamom. ℞.

Dest. Cumini. vel anisi ℞.

Misc.

Illinantur calide hypochondria.

Idem extractum Angelicæ illinatur umbilico, item butyrum rubrum, acuetur aliquot guttis olei destillati Angelicæ, & loco tumenti illinatur. Sunt qui semen botryos contusum in oleo communi infusum & digestum tanquam expertissimum laudant, si externè inungatur hypochondriis inflatis: Item cataplasma ex cheresolio cum butyro contuso commendatum à PAULI in *Quadrip.* pag. 257.

## ARTICULUS III.

D E

### ANOREXIA ET VOMITU.

**I**uxta hæc observetur, quod si copiosior tenaciorque grumus ex lacte & pulve stomacho incumbat, cui per pylorum transitus denegetur, *Appetitus* hinc deiciatur, & activitate fermenti digestivi à lacte, vel copiosiore vel coagulato, obruta horror *Mamma* oriatur, cum absoluta *apepsia*, cum quotidie observemus, illud quod semel stomachum laeserit, seu hostile postmodum diu ab eodem averfari.

Quod si gravis adhuc oneretur stomachus, & irritetur pylorus, infantes continuò *vomunt*, eaque varia, nunc albicantia viscida, nunc tenuia flavescantia, nunc viridia acrida, quæ vulgò vocantur *aruginosa*, nunc similia.

C A V S Æ.

*Causa* vomitus querenda est in lacte imprimis, quod vel per se vitiatum, vel in stomacho fortis corruptum, irritando pylorum vomitum inferit. Imprimis equidem copia lactis sola sæpè est causa vomitus, imprimis si ingeratur lac novum, priore nondum concocto: Hinc enim fit, ut lac recens super infusum congrumeat aut coaguletur, aut saltem transeat in liquamen viscidum aut mucilaginosum, quod obstruendo pylorum, eumque oppilando (de quo vid. HOEFERUS *Hercul. Medic.* pagina 149. item HILDANUS *Cent. 6. Observ.* 34.) vel irritando quoque, causa est hujus convulsivæ contractionis, quam vomitus violenti sequuntur, in quibus cum lacte assumpto copiosa viscida reiciuntur: qui vomitus tenellos infantes insigniter quidem lædunt & debilitant, salubres tamen sunt, quatenus excrementa ista reiciuntur, & gravia mala jam jam imminencia præveniunt. Fingite equum, hæc talia diutius



diutius in ventriculi bursa, facillè ex acore fermentativo passæ instar farinaceæ intumescunt, & impetuoso flatuum, proventu intumescunt præcordiorum, hinc diaphragmatis impedito motu, difficilem respirationem, & ex horum flatuum in orificium sinistrum impetu, huiusque pertinaci stricture, præcordiorum anxietates, inde inquietudines, somni impedimenta, vigilias, &c. inferunt; & quamdiu tales grumi, aut talia liquamina viscida, pylorum infarciunt, tamdiu vomitus etiam continuatur, ac præterea in quieti sunt infantes, & interruptis clamoribus in somno perturbantur. Nec tantummodò lactis copia, & inde orti grumi ac viscida, in pyloro hærentia, sed etiam quæcunque ejusdem corruptiones in ventriculo vomitum inducunt. Unde si nidore corripiatur lac, flavescuntia foetida excernuntur: Sin vitiosis succis ex intestinis in stomachum regurgitantibus, in specie acore peregrino, in stomacho inficitur lac, hoc viridescens & æruginosum per vomitum rejicitur.

### DIAGNOSIS.

Affectus per se patet: cognitio saltem circa causas versatur.

Copiam lactis adesse, vomitus materiæ albicantis & viscidæ testantur.

Nidore corrumpi lac, foetida flavescuntia reiecta loquuntur.

Viridia & similia per se patent.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Utilis est vomitus in infantibus, ex quacunque causa oriatur, si non sit nimius; innuit enim robustum stomachum (vulgè dicitur stomachus flaccidus, quod tamen falsum est) West, satis sensilem & validè se contrahentem, molestia rejicientem, quin & interdum promovendus est vomitus, si signum adsit ventriculi malè digerentis ingurgitatum lac.

Et quidem minimum periculum habet vomitus, si sit à copia lactis; suspectus autem est nonnihil, quando vario colore, crocea, viridiuscula ac nigricantia, rejiciuntur.

Pravus est, & non absque cautela considerandus, qui est foetidus, cum putredinem lactis insignem subesse connotet.

### CURA.

Quoad Curam, si Vomitus turbet infantes, isque per essentiam, ut vocant, fuerit, sinendus est, donec mucus vitiosus aut acris latex evacuati fuerint; postea cum moderato lactis usu pulvis ex nuce moschata, coralliis & caryophyllis paucis propinetur, & subinde repetatur: e.g.

℞. Corall. rub. præp. ʒʒ.

Nuc. mosch. gr. vi.

Caryophyll. gr. iii. vel iv.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis Stomachalis adstringens.

℞. Lapill. cancr. præp.

Corall. rub. præp. an. ʒʒ.

CrySTALL. præp. gr. vi.

Nuc. mosch. gr. v.

M. f. Pulvis:

Div. in 2. part. S.

Ut antè.

℞. Corall. rub. præp.

Lapill. cancr. præp. an. ʒi.

Extr. tormentill. gr. vi.

M. f. Pulvis:

D. S. ut antè.

Vel temperatior aqua Cinnam. spir. its infundatur. Theriaca etiam externus pariter ac internus usus in minuta dosi non negligatur, idque etiam si per consensum fuerit. Quod si ab lactati fuerint infantes, & sufficienter evacuatus stomachus, pro quo scopo syrupus de cichorio cum rhabarbato interdum conducit, tunc ad quemcunque infantum vomitum non immeritò commendat JOEL in Pr. lib. 9. Sect. 4. membr. 3. pag. 344. Decoctum, quod fit ex Caryophyll. ʒʒ. & gran. Mastich. ʒi. quæ simul concisa in ʒvi. vini rubri bulliant; cujus colaturæ subinde cochlear unum vel alterum infanti propinandum est,

Imò commendat hic ipse etiam in absentia febris, quod in infantum vomitu commodè propinentur gutt. ii. olei de stillati caryophyllorum in pauxillo vini, quod mirè conducit contra infantum vomitus. Loco olei caryophyllorum, quod tamen ferè est optimum, sunt qui oleum menthæ destillatum, item oleum destillatum zedoariæ, imprimis ubi simul sunt tormina, commendant; hinc talem potiunculam præscribere possumus:

℞. Aqua menthæ ʒiʒ.

Corall. rub. præp. gr. xv.

Ol. dest. zedoar. gr. iv.

Menthæ gr. ii.

Syr. Cydonior. ʒvi.

Subacta invicem misceantur, & in absentia febris propinetur cochlear unum vel alterum contra vomitum infantum:

### D. S.

Potio Stomachalis adstringens.

Ex Cydoniis aliàs quæcunque parata & aromatica condita, ut acor temperetur, conducunt contra vomitum infantum, & talia subacida tutius usurpari possunt, quando ab lactati sunt infantes, quoniam tunc lactis coagulatio non aquè metuenda est. Conveniunt itidem grana mastichis cum pulvere galangæ & caryophyllorum infanti propinata; Item nux moschata pulverisata, pulicula infusa, ac escensiam lactis prohibet, concoctionem adjuvat, & in specie vomitum sistit.

Sed, ut supra monui, non nimis citò compescendus est vomitus, in specie si nausea urget, aut stertor anhelando auditur.

Quod si variegata seu diversicolora & multiformia vomitu rejiciantur crementa, & suspicio est, non ritè feri separationem chyli à fecibus in intestinis, cum talia non absque perverso regurgitationis motu ex superioribus intestinis in ventriculum eueniant, imprimis clysmata supra laudata conducunt, quæ stimulo inferiora perversum superiorum peristalticum motum inferiora versus corrigunt, materiam ex superioribus deorsum versus proliciunt, & ita vomitus violentiam cohibent. Clysmata hæc componenda sunt ex carminantibus imprimis aromaticis, quibus pro stimulo parum salis gemmæ addatur.

Aliàs externè inungatur stomachi regio cum oleo mastichis & cydoniorum, quibus aliquot guttæ olei destillati caryophyllorum & menthæ simul adduntur; uel aliquot guttæ olei destillati macis cum oleo nucis moschatæ expresso exceptæ commendantur.

Vel

℞. Ol. Stomach. Crat. ʒiʒ.

Dest. bacc. innip. ʒʒ.

Menthæ gr. v.

M. S.

Balsamum Stomachale.

Aut recipiatur frustulum panis madefactum vino Malvatico, imponatur regioni stomachi; aut irroratum aceto destillato, cui inspergatur ulterius pulvis caryophyllorum, & nucis moschatæ, & hoc epithema imponatur externè regioni stomachi & hypochondriorum ad nimium sistendum vomitum. Vel recipiatur parum fermenti, & misceatur cum pulvere menthæ, nucis moschatæ & caryophyllorum, quæ invicem subacta, calefacta apponantur stomacho.

Cerotum Stomachale ex LINDANO & ipsum convenit infantibus non minus quàm adultis.

### ARTICVLVS IV.

#### DE

#### SINGULTU.

Si tenacior aut acidior mucus in superiori ventriculi orificio firmius adhæserit, per consensum firmissimæ connexionis diaphragma simul irritatur; unde hujus sub inspiratione facta communis acontractio, indeque singultus subinde etiam infantibus contumax & pertinax obvenit, qui in talibus ordinariò ex viscido acido, circa stomachi orificium, superius stabulante, originem ducit.



C U R A.

Siergo Singultus ex quacunque causa, & paulò pertinacior adit, vomitus imprimis conducit, evellendo acres acidasordes, stomacho & orificio superiori adherentes. Propinetur postmodum pulvis Ioclis in omni singultu ab eo restimatus, ex cornu cervi nro & coralliis preparatis ana mistis confectus, cui interdum consultò gutta una vel altera olei destillati anisi aut cinnamomi aut caryophyllorum addi potest. Nec omittendus proficuus Theriaces ulus, aut, quod jam saepius laudari, nostras aroma, Anisum nempe, singultui etiam aduorum appropriatum, externo pariter ac interno usu, non minus quam polychrestum castoreum.

ARTICULUS V.

D E

ALVI ADSTRICIONE.

Porro frequenter infantes affligit Alvi Adstrictio, ita quidem, ut infantes, qui naturaliter bis quotidie ad minimum egerunt, interdum ad biduum & ultra nil excernant; unde abdomen intumescit, inflatur, indurefcit, difficulter respirant, inquieti sunt, immoderatè estuant, &c.

C A U S Æ.

Causa saepissimè est mucilago viscida, crassa & tenax, ex vitio lactis crassioris, spissioris, minùs debite digesti, magisque caseosi, quæ cum sit tenax & viscida, difficulter mobilis, hinc inde obstructioni alvi occasionem præbet. Nunc pritur ex vitio assumptorum à nutrice, si nempe nutrices vescantur alimentis adstringentibus, unde lac crassum, aut alimentis adstringentibus adstrictiorum redditur, & hinc interdum infantibus alvus obstruitur; siquidem omnia assumpta à nutrice sui vestigia lacti imprimunt: Sic TIMÆUS von Goldenkle in Cas. pag. 252. refert pertinacem alvi obstructionem in infante ex nimio esu castanearum à nutrice. Nunc causa hujus morbi sunt grumi lactei, ex lactis bene constituti corruptela in intestinis nati, hinc inde cellulas intestinorum occupantes, sicque admodum tardiores secessus remorantes.

Denique accedit his simul bilis defectus in intestinis, cujus vis salina attenuat & liquefacit feces alvinas, easque mobiles reddit ac fluidas. Unde si vel mox post partum infarctus sit ductus cholodochus à meconio, (unde tunc fit icterus interdum in infantibus,) aut si mucilago similis tenax eundem ductum oppleverit, ut plurimum infans solet esse obstructæ & adstrictæ alvi.

DIAGNOSIS.

Ipsam vitium per se est manifestum.

Causæ ipsæ latere non possunt, imprimis si est à matre vel nutrice.

Sin viscida & tenax mucilago sit causa, excreta sunt crassa & tenaciora.

Bilis denique defectus in intestinis si fuerit, ea, quæ reiciuntur, alba sunt, cineritia, minusque ordinariè tincta.

PROGNOSIS.

Periculosum quidem malum hoc non est, nisi si nimis durum; naturale enim est infantibus, ut alvus eorum demum sit ordinariè laxa.

C U R A.

In Cura eph alvi obstructæ conveniunt blandè emollientia & laxantia, nempe syrupus storum persicorum recentium decerptorum, non spontè decidentium, syrupus de eichorio cum rhabarbaro, syrupus rosatus solutivus, syrupus de pomis Regis Saboris: item passulæ laxativæ officinales propinatæ; aut saltem brodium passularum laxativum subinde infusum cochleatim. Manna pro ratione ætatis à ʒss. ad ʒi. vel ʒii. in lacte dissoluta, vel una cum pulve propinata, egregiè laxat infantes; nam dulcedine sua blandiente, non reicitur ab infantibus: item cum ʒi. olei amygdalarum

dulcium manna commodè propinari potest; sed cauti sumus in hujus usu, cum sit fermentativa, & fluxum torminumque in infantibus Autor. Aliàs oleum raparum saccharatum movet felicissimè alvum: Conf. M. A. N. C. Ann. 4. & 5. pag. 74. Præ omnibus præstantissimum est remedium mucifera No. i. vel ii. ad v. vel vi. pro varietate ætatis plus minus; vel pulverisfata cum pulicula usitata permisceatur & infanti decur; vel cum lacte dissoluta propinetur; vel aliquot eorum permisceantur lacti, subigantur, & lac per lin-teum expressum ita propinetur: Sane optimè alvum laxat; raro fallit: Medium hoc est RULANDO expertum, qui proprio filio lotres menses nato ex alvo obstructa, insignibus alvi torminibus correpto, propinavit mucifera No. i. in pulicula solita, unde soluta fuit alvus, & dolor omnis cessavit. Vel propinatur tenello spermatis ceti tantum, quantum cuspis cultelli potest capere in cerevisia calida; nam hoc etiam blandè viscidam mucilaginem abstergit, & alvum laxat: sicut in paulò robustioribus pulvis mechoacanæ inspidos, & tamen qui piritam viscidam suaviter detergit, optimè confert, an. ʒi. ad ʒss. cum pulve vel cum pane Martio propinatus, quamvis sit citra saporem & odorem. Denique, ubi magis adustus fuerit infans,

ʒ. Crem. tartari ʒi.

Diagrid gr. v.

M. f. pulvis: S.

Pulvis aperiens.

Datur à ʒss. ad ʒi. pro conditione nempe ætatis.

In malo graviore ad Mercurium dulcem aut aurum solmi-pans confugere licet.

Externè imprimis conducunt balnea. Quibus præmissis suppositoria ex ʒi. Hercoris muris cum melle ad duritiem cocto, quod alvum blandè prorit, aut saltem domestica ex sapone, vel simplici vel Veneto confecta applicentur, & ubi fortius stimulandum, oleum diacolocynthidos Quercetani illinantur. Vel omnium optimè conducunt Clysters emollientes ad ʒi. vel iv. pro ratione ætatis: quibus, ubi opus est absterfione, simul mel addi potest: Item clysteres ex brodio seu decocto pisorum cum saccharo Thomæ; nam hoc absterfendo sordes mucilaginosas alvum aperit. Sin meconium seu excrementa indurata sint in colo ejusque cellulis, clystma solum ex oleo lini & raporum paratum commodè eadem educit, quia emollit & lubricat. Quod si opus sit fortiori stimulo, Decocto emollienti addi potest extractum hellebori nigri, quod stimulando alvum solvet. Præterea etiam epomphalia seu unguenta laxativa umbilico imponantur pro solvenda alvo: nempe specierum hieræ picræ ʒi. cum scammoni gr. v. misceantur, cum nuce juglandæ applicentur umbilico, contumacem alvum leniant. Item pomum Borsdorsianum putridum cum pinguedine asserina subactum applicetur abdomini, quod promptè alvum infan-tum reserat. Item oleum diacolocynthidos Quercetani, item oleum chamomillæ, cui incocta sirpupa colocynthidis, similiter illinatur. Butyrum vel adeps gallinarum cum felle bubulo & scammonio subactum, illinatur quoque, pro stimulanda alvo, umbilico. Vel

ʒ. Ungu. de Artan. ʒi.

Fell. taur. insp. ʒi.

Cum f. q. Ol. Colocynth. f. Linimentum: S.

Linimentum aperiens.

Item

ʒ. Aloes ʒii.

Fell. tauri ʒi.

Scammon. ʒi.

Butyr. rec. q. s.

M. f. Linimentum,

D. S. ut supra.

Illinatur umbilico, sic aperitur alvus.

His ipsis Epomphalitis etiam oleum nicotianæ, unguentum dialthææ, & ubi fortius agendum, unguentum de arthanis, commodè permisceatur. Vel fiat Linimentum ex succo cycaminis, subacto cum adipe gallinæ, quæ blando calore decoquantur ad consistentiam linimenti, umbilico illinendi.





ARTICULUS VI  
DE  
INTERTRIGINE.

**I**ntertrigine frequenter acerbo dolore excruciantur infantes tenelli, Germani vocant *das Frals seyn der Kinder*, & nil aliud est, quam excoꝛiatio circa genitalia & clunes, item sub axillis, in rimis colli, & similibus locis: quæ oritur partim ex urina, qua continuò humectatq̃ partes ab huius salina acrimonia tenerrimam epidermidem amittunt, & ita pedetentim penitus excoꝛiantur, aut quando lintea humectata minus sedulo permutantur & exsiccantur: partim verò à sudore, vel insensibili transpiratione in articuloꝝum flexuris, & sub axillis assidue locis retenta, acrimonia simili cuticulam erodente: qua ita abrasa nuda cutis admodum dolet, interdum plus minus exulceratur, unde agrypnig, & continuati infantum vagitus aliaque pathemata subsequuntur, quæ exulceratio etiam ad mortificationem partis subinde tendit. In multis nempe sudor & urina convenit, adeoque affectuum identitatem comitem secum trahere solent.

DIAGNOSIS.

Malum per se patet.

CURA.

In Cura ergo ea, quæ acce temperare, humidum imbibere, & blandâ exsiccatione & adstrictione poros cutis firmare possunt, adhibenda.

Inspergatur ergo Nihil album, Cornu cervi usum, Creta, Cerussa, Tutia, lapis calaminaris pulverisatus; aut loco huius lac longè etiam convenit, & similia. In specie vix citius aut jucundius removetur Intertrigo, quam croco martis ex vitriolo martis precipitato, qui sine ullo vel minimo sensu excoꝛiata loca restituit; cuius defectus & terra vitrioli dulcis consuleò substitui potest, nisi macularum in linteis exinde nata flavedo sit obstaculo. Nempe abluantur prius partes intertrigine affectæ aquâ calidâ, hinc pulveres isti, nodulo inclusi raro, ita inspergantur: V. gr.

℞. Lapid. calam. exactè pulveris. ʒiʒ.

Tut. prap. ʒʒ.

Ceruss. lora ʒi.

Terra vitrioli dulc. gr. xv.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis inspergendus.

Ex nodulo tenui suspensâ manu blandè inspergatur, superimposito linteolo.

Vel qui sit ex cornu cervi usso, creta & cerussa mistis:

V. gr.

℞. Cornu cervi uss. prap. ʒi.

Creta alb. prap. ʒiʒ.

Ceruss. ʒ.

Pulv. Rosar. rubr. q. s. pro gratia coloris.

M. f. Pulvis:

D. S. ut antè.

Vel

℞. Lap. calam. ʒʒ.

Croci Martis ex vitriolo Martis precipitati ʒi.

Creta prap.

Cerussa an. ʒi.

M. f. Pulvis subelliss.

D. S. ut antè.

Gravius si malum fuerit, & ad aliqualem exulcerationem jam devenierit, aut ubi rubor saltem & color adjunctus sit intensus, saccharum saturni commodè additur; vel loco huius cerussa, vel unguentum de lithargyrio, aut unguentum album seu de cerussa camphoratum, aut unguentum diampompholygos, &c. hisce locis commodè inungitur.

ARTICULUS VII.  
DE

UMBILICALI PROMINENTIA.

**P**orro infantibus recens natis subinde umbilicus laxior insigniter protuberat ac prominet, & in formam parvi & angusti fasciminis inversi protenditur, in *Umbilici Prominentia* dicta. Nullus adest ardor, nullus mutatur color, nec tumor, specialiter umbilicus ita protuberat, & in medio sui propè peritonæum foraminulum quasi exhibet. Accidit hoc malum, cum funiculus umbilicalis à partu non debite ligatur, parsque eius maior, quàm debeat, relicta est, quæ ita in altum attollitur & protuberat, vel cum peritonæo non nihil relaxatur, unde vel omentum, vel intestinulum quoddam relaxatum, se insinuat, & ita eundem prominere faciunt: id quod frequentius à fletu infantum nimio, item à tussu vehementiori accipiunt, quibus occasionibus facile relaxari peritonæum, & ita umbilici prominentia induci potest.

DIAGNOSIS.

Umbilicalis hæc prominentia per se manifesta est, dum foras prominet & tumet citra colorem, & citra omnem ad tactum dolorem.

Causæ antecedentes facile patent per se.

PROGNOSIS.

Malum non contemnendum est, quia temporis successu successive incrementum, & ita in omphalocelen seu perfectam umbilici herniam degenerare potest.

CURA.

In Cura probe observandum est, ut præcaveantur sedulo status in infante, in quem finem semen anisi, exque eo parata remedia, sedulo usurpentur.

Externè verò, imprimis si ruptura adest peritonæi, convenit herba persiliata, contusa, cocta, umbilico impositæ item rob Acacia nostratis, dissolutum in liquore appropriato ad consistentiam unguenti seu linimenti, illinatur umbilico relaxato, donec denuò coeat: vel, quod optimum est, pulvis mastiches, pauxillo terebinthinæ in mortario calido subactus, & cum linteo impositus; vid. WEL-SCHIUS Hecad. 2. pag. 22. Item plantago & musci pruni sylvestris in vino rubro probe cocta, & cataplasmati formâ imposita, & aliquamdiu continuata. Semen persiliata cum adipe urino probe subactum etiam confert. Optimum est, si formentur globuli ex corio, magnitudine rotundi grossi præter propter seu quanta est prominentia umbilici, qui globuli linteoboluti obducendi sunt emplastro oxycroceo aut mastiche, & ita imponendi sunt cum firma ligatura umbilico prominenti. Conducit etiam, si oleo ovorum illinatur umbilicus prominens roties, quoties ligatur infans novis fasciis, & post inunctionem banc imponitur globulus latus, factus ex cera flava cum mastiche permixta, qui globulus convenienti fasciâ firmandus est, ut firmiter hæreat, donec denuò coeat successive umbilicus. Nostrates ex cera flava faciunt pileolum parvum, quem inverso situ umbilico imponunt, & ita ligaturâ firmant, aliquamdiu ita relinquunt, donec denuò spontè suâ coalescat peritonæum, atque curetur malum.

ARTICULUS VIII.

DE

UMBILICI INFLAMMATIONE.

**R**ecens decussus Umbilicus interdum inflammatur, unde ejusdem tumor, rubor, & ad tactum insignis calor percipitur, durus est umbilicus, nonnihil dolet, nec tactui facile cedit, & si attingantur infantes, ejulatu dolorem producat.



## CAUSÆ.

Oritur ferè, cùm ligatura ante abscissionem non firmè, satis facta fuerit; hinc enim ex abscissione propter dolorem, aliamve similem occasionem facillè inflammatio excitari potest, quo rupto intestina procidunt. Imò interdum simul ipsa intestina afficiuntur, ita ut excretio fecum alvi per umbilicum suppuratum observata & curata fuerit in M. A. N. C. Ann. 3. observ. 64. pag. 116. Fit etiam ex alteratione ejus ab aere externo, vel etiam interdum ex nimio clamore & tensione abdominis; quod tamen rarum est.

## PROGNOSIS.

Facillè curari potest, si maturè fiat; sin verò cura tardidè instituat, & factus sit abcessus, periculum est prolapsus intestinorum infantis per umbilicum.

## CURA.

In Cura ergò Inflammatio subitò, & quanto cyus fieri potest, discutienda & resolvenda est; in quem finem optimè convenit, ut maturè illinatur locus inflammatus oleo rosarum, aut oleo lumbricorum terrestrium, cum cerussa vel saccharo saturni probè subactum: item saccharum saturni in decocto Malvæ solutum, addito oleo rosaceo, cum linteis multiplicatis imponatur: Item emplastrum de spermate Ceti Mynsichel, emplastrum album seu decerussa camphoratum, aut emplastrum de spermate ranarum officinarum, imponendum.

Sedatà denique inflammatione oleum chamomillæ vel anethi tepidiuscula illinenda sunt ad reliquias omnino discutiendas.

## ARTICULUS IX.

## DE

## ANI PROCIDENTIA ET TENESMO.

**C**ognatus his intestinalibus affectibus est frequens in pueris observabilis *Ani Procidentia*, eoque frequentior, uti dico, in pueris, quò laxior magis, magisque flaccida existit substantia intestinali recti & musculorum ejus.

## CAUSÆ.

*Causa* ergò, quare interdum foras promineat anus seu intestinum rectum, est sapius *Tenesmus*, seu continuus, frustraneustamen, egerendi infantum conatus; qui tenesmus oritur ex mucilagine acida & viscida, intestinum rectum obsidente, à qua continuò irritatum continuò egerere nititur, unde tandem foras protruditur intestinum rectum. Præter talem tenesmus etiam nimia laxitas ac nimia flacciditas musculorum intestinali recti subinde causa est hujus procidentie, in specie quando nimis frequenter suppositoriis molestantur tenelli.

## DIAGNOSIS.

Affectus ipse per se patet, facilis etiam est restitutionis, si tempestivè fiat: aliàs periculum est, ne ab aere ambiente alteratum intestinum in gangranam dilabatur.

## CURA.

Ut ergo denuò restituatur anus prolapsus, si est ex laxitate, sufficit sola cum linteis calido reposicio, aptaque infantis fasciatio, ut pedibus extensis ita permanent.

Sin verò causa prolapsus sit tenesmus, tunc ad corrigendum & tollendum tenesmus conducit imprimis sacculus, aut etiam infusus, balneum, voca ut lubet: v. g.

℥j. Flor. Verbasc. M. iii.

Furfur. tritic. M. ii.

Sem. Cumin. ℥i.

Bacc. laur. ℥ss.

Incisa & contusa includantur

sacculo interpassando:

D. S.

Sacculus fissens.

Sacculo insuta coquantur in sufficiente quantitate aquæ: sacculus expressus calidus supponatur, ita ut eidem insideat infans; nam hic tollit tenesmus.

Utiliseriam est ad tenesmus suffusus ex cerebriothina prunis injecta seu imposita.

Vel

℥j. Suffit. ex Colophon. ℥ss.

Sarcocoll. ℥ii.

Bacc. lauri.

Sem. fenic. an. ℥i.

Quæ pulverisata prunis iniiciantur, & inde exiens sumus excipiat, ano:

D. S.

Pulsis singularis ad suffutum.

Curato tenesmo facillè postmodum restitui potest anus prolapsus.

Quod si extra tenesmus anus sit prolapsus, si ab aere alteratus non nihil intumuerit, ante repositionem fovendus est decocto malvæ & seminis cumini in aqua & vino: foveatur hoc decocto.

Forus ita anus denuò blandè reponendus, qui repositus in suo loco maneat. Optimum est, si infans insideat asseri plano calido, cui massix sit illita; aut etiam loco mastichis, seuum hircinum aut cervinum sufficit, si asseri dicto calido illinantur: Vel etiam fovendus est anus hoc ipso sevo hircino aut cervino liquefacto, & ita reponendus; non enim adeò facillè postmodum denuò excidit.

Conducit etiam infusus ad umbilicum usque in decocto adstringentium; gallarum nempe, glandium, corticum granatorum, foliis myrti & similibus, adjecto, si opus sit, pauco alumine: Aut etiam intrudatur vel applicetur ano parum bombacis imprægnatæ pulvere sanguinis draconis, mastichis pulverisatæ, balaustrorum, thuris & similibus: Nam his facillè anus repositus in loco suo firmabitur.

## ARTICULUS X.

## DE

## URINÆ SUPPRESSIONE.

**N**on rarum est, quod infantes tenelli, præsertim puelli, retentionem aut difficultatem urinæ patiantur, ita ut vel planè non eandem excernere possint, vel cum insigni difficultate aut dolore eandem excernant, idque interdum mox à partu observatur in talibus materia instar sabuli subtilis rufescentis, qui meatum urinarium obsidet, & cum urina interdum excernitur. Putant mulierculæ esse calculi rudimentum; quod tamen non est, cùm successivè subtili hoc sabulo excreto, ordinariè & ritè profluat urina.

## CAUSÆ.

Frequentior *Causa* est pituitosus humor viscidus & crassus, quacunque ratione ad meatum urinarium delatus, qui in cervice vesicæ denuò quasi inspissatus aut concretus, meatum urinarium plus minus obstruit, & malum hoc infert, unde talium urina crassa & seculenta quasi excernitur.

Origo hujus mucilaginis est ab assumptis, imprimis pulvereis viscidioribus, dum propinantur pulvis ex farina, aut pane similagineo (Germ. von Semmel) non rite fermentato, quo viscidum in stomacho difficulter digeritur, & viscida copiosa inde in primis viis generantur, quæ ad vesicam urinarum cum urina derivata retentionem & difficultatem urinæ inferunt.

Denique pueri interdum reverà calculo observantur obsessi, unde urinæ suppressio.

## DIAGNOSIS.

Malum per se patet, dum nihil vel parum ab infantibus excretum conspicitur.

Item epulatus & aliqualis tumor circa regionem vesicæ sufficiens malum declarat.

Calculus præsens vix aliâ ratione, quàm per catheterem in infante jam non nihil robustiore cognosci potest.



## P R O G N O S I S.

Quoad *Prognosis*: Malum in pueris non contemnendum est hæc urinæ suppressio, cum nulla excretio præternaturaliter sine periculo in infantibus supprimatur, quin plura alia symptomata, nempe dolor, eiulatus, vigilie & similia exinde oriri queant.

Imò si diutius protrahatur malum, periculum est, ne exinde mors imminuat infantibus.

## C U R A.

Ergo primò quidem mucilago tenax & viscida est evacuanda: quod præstat imprimis mechoacanna propinata, cum syrupo rosarum solutivo.

Evacuato corpore promovenda est blandè urina. Conveniunt imprimis flores cyani & calcatrippæ; sive propinetur horum aqua destillata, minoris tamen efficacis; sive decoquantur in aqua simplici vel potu ordinario cerevisiæ, & propinetur decoctum infantis; aut, quod melius est, si in illis, qui iam sunt ablactari, fiat infusio horum florum cyani & calcatrippæ in aqua polygoni & ononidis cum spiritu salis dulci acidulatis; sic enim extrahitur elegans tinctura, cui gratia saporis concilianda cum syrupo capillorum veneris, aut cum syrupo artemisiæ. Convenit imprimis decoctum cicerum & decoctum radices & summitatum fœniculi, quæ sufficient in infantibus ad promovendam urinam. Theribinthinata omnia, in specie spiritus terebinthinæ, egregium est ad promovendam infantum urinam. Expertus est succus pastinacæ lutæ recentis expressus, & infantibus ita propinatus. Semen violarum, & ex hoc parata emulsio cum dictis aquis appropriatis, in specie ononidis, etiam egregium est medicamentum: v. g.

℞. Sem. violar.

Amygd. dulc. an. ℥i.

Cum f. q. aqua Petrosel. f. emulsio:

cui adde

Lapill. cancr. præp.

Corall. rub. præp. an. ℥ss.

Edulcoretur parum.

M. S.

Emulsio aperiens & leniens.

Profuit infanti 4. dierum, alvi tormina & urinæ suppressionem habenti.

Item in alto infante, ex suppressione urinæ:

℞. Sem. Violar. ℥i.

Cum f. q. aqua flor. sambuci f. Emulsio:

adde

Cornu cervi sine igne ℥ss.

Antimoni diaphor. gr. v.

Edulcoretur parum.

D. S.

Ut supra.

Farina ex lycopodio seu sulphur vegetabile nobile specificum est in suppressione urinæ infantum, etiam si jam exinde epilepsia imminet: vid. M. A. N. C. Anno 3. Observat. 15. in Schol. pag. 20. Datur à ℥ss. infanti trium annorum.

Externè illinatur regio pubis & perinæ cum oleo scorpionum simplici:

Vel

℞. Oleilil alb.

Chamom.

Scorpion. an. ℥i.

Pulv. Scorpion. ℥i. ad ℥ss.

M. D. S.

Unguentum urinam promovens.

Quod linimentum post balneum aut totum inungatur dictæ regioni.

Aut etiam unguentum dialtheæ cum oleo scorpionum permixtum, iisdem in locis illinendum est. Si fortius agendum est, oleum scorpionum cum paucis oleo ceræ illinatur regioni vesicæ ad promovendam urinam: item cataplasmata ex parietaria cum oleis aut pinguedine anserina applicata: item cataplasmata ex chamomilla vulgari applicata regioni vesicæ sunt optima. Possunt etiam simul addi modò dicto cataplasmati ex parietaria ceræ sub cineribus coctæ, quæ & solitariae sunt optimæ; sic enim optime & promptissime promovetur urinæ fluxus.

Vel

℞. Herb. Pariet. M. A.

Cherefesol.

Flor. chamomill. an. M. A.

Coqu. ad mollitiem:

Pulpæ per setaceum traxe: adde

Ol. scorp. ℥ss.

Butyr. rec. ℥i.

M. D. S.

Cataplasma aperiens.

Applicetur calidè regioni pubis.

Balnea denique sunt usitata, quæ emolliunt & resolvunt nonnihil sordes istas mucilaginosas, multum profunt ad simulandam suppressionem.

## ARTICULUS XI.

## D E

## INCONTINENTIA URINÆ.

**C**ontrarium vitium est, quando infantes retinere nequeunt urinam, & dicitur incontinentia urinæ. malum quod in ætate tenella vix potest judicari, quoniam imprimis infantes in somno excernunt nescientes & nolentes; postmodum verò ubi talia intelligere incipiunt, si urinam retinere nequeant, vitiosum est, siue fiat ex consuetudine, siue fiat interdum ex vitio partium vesicæ, in specie ex resolutione eiusdem sphincteris, aut ex læsione ejusdem & calculo, aut quacunque alia sphincteris vesicæ læsione.

An sit ex consuetudine, vel non? non potest cognosci, nisi in infantibus nonnihil robustioribus: in quo casu & tempore etiam cura instituenda est.

Talis urinæ incontinentia ex consuetudine nihil mali sese habet; si verò vitium sit in sphinctere, hoc ipsum mature corrigendum est, imprimis per balnea ex nervinis & adstringentibus parata, uti sunt in specie ex foliis quercus, ex satvia, ex satireja, fœniculo & similibus. Inungi etiam potest oleum mastichinum, quod valde adstringit, uti etiam unguentum Comitissæ cum oleo irino, & etiam cum oleo cassino.

Internè pulverem ex castoreo & myrrha cum oxymelitis propinandum commendat JOEL, si subsit affectus quodammodo paralyticus seu ex laxatione sphincteris vesicæ.

Commodè etiam propinatur internè pulvis ex erinaceo villo, herba & semine agrimonie, mastiche, medulla saxorum, & similibus *supra* l. i. ubi de urinæ suppressione actum fuit, propositis.

## ARTICULUS XII.

## D E

## HERNIIS INFANTUM.

**M**ultum etiam infantes teneriores obnoxii sunt Herniis, tam umbilicæ, quàm scroti, ex peritonæi frequentius relaxatione, rariùs ex eiusdem ruptione.

Occasionem peritonæo relaxando suggerit clamor nimis aut continuus ejulatus, tussis crebrior ac vehementior, ac denique intensior fœces egerendi per alvum conatus; quæ ipsa eo magis ad hoc malum disponunt, quò magis infantum abdomen, vel naturaliter vel præternaturaliter tumet, aut prout magis vel minus flatibus fuerit turgidum.

## D I A G N O S I S.

Signa herniarum, scroti & umbilicæ per se patent, dum imprimis violenta talis causa præcesserit, v. g. ejulatus, clamor, tussis, vehemens egerendi conatus &c. sicut etiam, quod altera tantummodò scroti medietas ordinariò ferè sit affecta & tumida.

Ab Hydrocele seu tumore ex aquo sitatibus, ex abdomine in scrotum descendentibus, nato Hernia distinguitur, quod ille utrumque scroti latus occupet; scrotum quoque tumidum magis, quàm in herniis, observetur, nec tam facillè recedat tumor, atque recedit iste, qui est ab intestinis; atque denique admotà candela quasi impidius & perspicuus iste tumor apparere solet, si est Hydrocele; in herniis verò intestina prolapsa tactu ferè possunt deprehendi, secus ac in alio scroti tumore.

Herniæ umbilicales etiam per se manifestæ sunt, dum foras



ras prominet & tumet extra dolorem, & citra omnem ad tactum dolorem.

Causæ antecedentes facillè patent per se.

### PROGNOSIS.

Propriè dictæ herniæ in infantibus facillè curantur, modò debitum regimen accedat, peritonæo adhuc molliori existente, & quidem naturali augmento facillè firmatur denuò ac consolidatur.

### CURA.

In Cura ergò herolaram internè pulveres, decocta, aut syrupi ex vulnerariis præparati imprænis conveniunt, v. gr. decoctum herniarie edulcoratum cum syrupo symphyti, aut decoctum perfoliatæ cum sanicula; aut detur pulvis seminis perfoliatæ, herniarie, consolidæ majoris, &c. item harum, uti & saniculæ, plantaginis, &c. aquæ destillatæ: observando simul, ut, quantum possibile, status arceantur ab intestinis.

Externè singulare experimentum est in herniis infantum, si admoveatur frustum pellis seu cutis anguillæ solummodo obductæ cum albumine ovi; hæc enim applicata mirè consolidat rupturam peritonæi: cum quo remedio internè simul propinandum est semen nasturtii vino infusum. Certum est experimentum. Quod si ipsa cutis anguillæ hoc modo applicata non sit sufficiens, accipiatur pellis anguillæ salicæ, quæ coquatur in lixivio fortè ad consistentiam emplastri, alutæ inducendi, quod emplastrum loco rupturæ applicatum brevi consolidat eandem. Vel fiat emplastrum ex *gummi caranna* p. ij. & *seminis nasturtii* p. j. subactis cum pauxillo *zerebinthina coctæ*, quod inducatur super linteam crassum, & applicetur loco hernioso, ut probè adhæreat. Item emplastrum dia-sulphuris Rulandi, aut saltem cerorum ex pice, imponatur, relinquendo tamdiu, quamdiu firmiter adheret, simul subligaculis aut fasciis muniendo loca herniosa, ut intestina & omentum in loco naturali retineantur.

Ubi reposita fuerint intestina, superimponunt fomenta adstringentia ex vulnerariis, perfoliata, herniaria, plantagine, myrtillo, robacaciæ & alumine, in aqua & aceto non nihil coctis & ita applicatis. Superimponendum quoque est loco rupto aut laxato emplastrum ex gummi elemi, in aceto macerato, denuò inspissato, cum oleo ovorum in formam emplastri subacto. Vel fiat emplastrum adstringens & quasi corrugans ex *mastiche*, *ichthyocolla*, *saramabaca*, *gummi Arabico* ana ℥ij. *thuris*, *picis Græcæ* ac *picis nigre* ana ℥ij. quæ subacta alutæ (vel linteo potius, quod tractabilius est) inducta imponantur loco rupturæ. Aut illinatur frequenter locus rupturæ cum oleo hyperici & oleo ovorum, & superimponatur postmodum emplastrum de pelle arietina.

Communitè lapis ceraunius seu lapis fulminaris ad curandam hernias infantum laudatur. Novi infantem ejus beneficio curatum, qui ex nimis clamoribus Enterocelen scroti contraxerat: nempe mater omni manè & vespere, quoties infantem lecto imponeret, cum lapide fulminari salivâ probè humectato, aliquoties compressit sursum versus lapidem ducendo, & ita continuato usu herniam curatam vidi. Porro radix consolidæ majoris conteratur, & cataplasmatibus instar loco affecto imponatur, omnibus duodecim horis renovando, multum confert contra hæc mala.

Quod si copiosi flatus adsint, litibus, aut foribus ex foliis lauri, floribus chamomillæ & sambuci, cum quatuor seminibus calidis majoribus, aliisque carminantibus, vino decoctis, & instar fomenti applicatis, sedulo hi ipsi discutendi, ne consolidationem impendant.

### ARTICVLVS XIII.

#### D E

### SCROTI TUMORE AQUOSO.

Observandum, præter hujusmodi hernias umbilici ac scroti, etiam infantes subinde alio adhuc *Scroti Tumore*, nempe *aquoso*, laborare, in quo, peritonæo salvo, scrotum à collectis aquositatibus serosis intumescit, & insciis pro hernioso affectu imponit.

Estmull. Oper. Tom. II.

### DIAGNOSIS.

*Signa Hydroceles ex Artic. antecedente patent.*

### PROGNOSIS.

Tumores aquosi scroti sine periculo sunt, eòdem nisi sint nimii, spontè sua evanescent, vel solius arcani duplicati usus cedant.

### CURA.

Tumor scroti aquosus & Hydrocele curatur litu olei laurini & chamomillæ, vel cataplasmate ex farina fabarum, pulvere seminis cumini ac similibus in aqua coctis, impositis. Cataplasma ex stercore caprillo est optimum, aut solus sctus ex succo stercoris caprilli admotus est optimus.

### ARTICULUS XIV.

#### D E

### APHTHIS.

Familiare perquam malum est interdum paucis à partu diebus affligens, quod *Aphthas* vocant, Germ. *Schwamme, oder Blasen auf der Zunge der Kinder*. Sunt scilicet tubercula parva, seu pustulæ quasi vesicales, quæ hinc inde in lingua, carne gingivarum, faucibus, palato, œsophago &c. eleuantur, in medio sui albicantes: in circumferentia intense rubent, infantibus verò insigni ardore & dolore non levi impedimento sunt, quò minus lac sugere possunt. Hæ ipsæ vesiculæ successivè, nisi curentur, interdum in perfectâ abeunt ulcuscula, exesa scilicet superiori tunica seu pellicula, quæ tamen postmodum facillè curantur: non raro serpunt, & in ulcera serpentina abeunt, & aliqualem imprimis gingivarum putredinem inducunt: interdum, acriori dum constant materia, foetere solent, & putredine junctâ longius serpunt, ac serpendo latius vicina depascunt. Affligunt imprimis fauces, linguam, hinc gingivas & palatum, interdum tamen etiam œsophagum & ventriculum, imò & ipsa intestina occupant: id quod tunc temporis imprimis patet, quando in excrementis rejectis parvæ squamulæ hinc inde conspiciuntur.

### CAUSÆ.

Causa harum aphtharum est acre acidum, excorians & exulcerans plus minus dictarum partium superficiem. Fons peccantis acidi sæpissimè est corruptela & aciescentia nimia, pulvis & lactis tenuis aquosi in ventriculo. Ut ut enim aut lactis nutritis aut salivæ ipsius infantis à quibusdam nimis accusetur acrimonia, vix tamen in infantibus aliam originem agnoscunt, quam acres halitus, qui successivè ex stomacho assurgunt, os quodammodo inflammant, & hinc inde talia ulcuscula excitant. Nam & in adultis frequentes contingere solet, ut correpti febribus, cruditatibus recrementosis, in specie porraceis in stomacho existentibus, aphthis molestè laborent, nisi maturè fomes removeatur à Medico ex ventriculo.

### DIAGNOSIS.

*Diagnosis ex dictis patet in principio.*

### PROGNOSIS.

Quoad *Prognosin*: Per se nihil periculi habent aphthæ, nisi sint nigricantes aut sublividæ; tales enim sæpè abeunt in ulcera depascentia & periculosa: sicut etiam aphthæ reliquæ, si perfectè exulcerentur, & in ulcuscula abeant serpentina, non sunt adeò contemnendæ.

### CURA.

Maturè removendæ sunt, partim quod ut plurimum functionem lactis impediunt, partim quod periculum ulterioris exulcerationis inferant. Conducunt ergò collutio aphtharum cum urina propria, eaque repetita, vel aqua ferratorum,



riorum, in qua salvia & parum mellis bullierint, pro ab-  
uendo ore: item succus sempervivi & portulacæ cum aqua  
osarum permistus usurpatur, quæ etiam easdem subito  
corrigit & emendant.

Vel

24. *Aque Rosar. 3ij.*

Misc. cum vitello ovi probè conquassato, & sacchari  
albi vel candi parum: quæ mixturâ abluantur aph-  
thæ, ut sic dispareant.

Ubi nimis æstuaverint, tunc loco aquæ rosarum commo-  
dè aqua spermatis ranarum, aut aqua fragorum, cum tan-  
tillo aluminis potest adhiberi. Mucilago etiam seminis cy-  
doniorum cum aqua spermatis ranarum extracta, etiam  
cum succo sempervivi majoris subacta, linimentum præbet  
non inconvenienti pro illinendis aphthæ. Plures in usu ha-  
bent fungos sambuci, Auriculæ Judæ dictæ, quos insun-  
dunt aut coquant in aqua salviæ vel lacte, & abluunt aph-  
thas, & sanè optimè profunt. Præ cæteris rapæ in aphthæ  
egregiè conveniunt, sive recipiatur succus raparum in aqua  
coctarum expressus, cui aliquid sacchari vel mellis addatur,  
sive recipiatur decoctum raparum, sive recipiantur rapæ su-  
pra ignem tecto vase sine aqua assatæ, ex quibus expressus  
succus, etiam sine saccharo, est optimus dicto modo illitus.  
Item oleum raparum saccharatum est præstantissimum pro  
aphthæ: Vid. de his SYLVIVS lib. 3. *Prax. ubi de morbis  
Infantum*; item *Misc. Academ. Nat. Curios. Ann. 4. & 5.  
pag. 73.* BARTHOLINI *Art. Med. Hassn. Vol. 4. pag. 49.*  
Si deteriores sint aphthæ, pro lotionis oris decoctum Veron-  
icæ in aqua simplici factum cum melle mistum; aut loco  
Veronicæ potest sumiatureja, quæ simili ratione adhibita  
convenit. Decoctum salviæ in vino vel hydromelite flican-  
do aphthas & benè os abluendo easdem sanat: aut etiam de-  
coctum foliorum & florum ligustri in aqua communi, addito  
paucò melle, pro aphthæ perfectè exulceratis sanandis usu  
frequenti compertissimum est.

Facit huc gingivarum putredo, curanda persequens de-  
coctum:

24. *Herb. Chersfol. M. j.*

*Salv. Mg.*

Quæ in aqua simplici decocta, cui parum aceti, & in fine  
paululum mellis additum sit, dat quasi gargarisma seu mi-  
sturam admodum convenientem in hac putredine gingiva-  
rum.

Vel ubi adhuc plus ulcerantur, convenit linimentum ex  
myrrha, thure, gallis, & melle; quæ invicem mista exul-  
ceratis locis illinuntur.

In aphthæ exulceratis periculosioribus adeoque serpenti-  
bus, idque in ablactandis imprimis (nam lactantium nutri-  
mentum lacteum pro medicina ex parte inservire potest:)

24. *Aqua plantag.*

Quæ imprægnetur spiritu vitrioli ad suavem saporem, ad-  
dito vel omisso melle aut syrupo violarum.

Hoc ipso tangantur aphthæ, optimè prodest.

Porrò ubi alia non juvant, instar omnium sit linimentum  
ex melle rosato, vel simplici, cui tantillum spiritus sulphu-  
ris vel spiritus vitrioli, vel, quod magis placeat, spiritus salis  
fuerit admixtum, quo subinde illinantur aphthæ exulcera-  
te; sic enim curantur. Aut denique ulcera oris serpencia  
in ore infantum curat linimentum ex melle despumato, cui  
album græcum est immixtum; hoc enim illitum loco exul-  
cerato eundem sanat. Colluatur postmodum os cum aqua  
vincæ pervincæ, cum aqua salviæ, plantaginis, & similibus.

Sed cum hac cura externa etiam interna, interdum anodyna usurpanda  
sunt: Conf. RIVIERUS *Cent. 2. Observ. 43. & Centur. 3.  
Observ. 35.*

## ARTICULUS XV.

### DE

### VIGILIIS NIMIS.

**V**igilia nimia, dum nimis vigilant, & parum dormiunt,  
subinde graviter vexant infantes, unde non solum  
nutritio eorum impeditur, sed etiam aliis malis occasio si-  
mul suggeritur. Ute plurimum alios sequuntur affectus, &  
ad sunt non per *spontaneum*, sed per *sursum* ad *sursum*.

## C A U S Æ.

*Causa* omnium frequentissima est (1.) abundantia lactis  
& pultis, quo infanti infantes ex digestionem laboriosiore  
minus dormire possunt. (2.) Est lac acrius plus minus, irri-  
tans præcordia aliasque partes nervosas, cum quotidie in  
Praxi observemus, lac unius nutricis longè magis quietos  
reddere infantes, quàm alterius; quo minus nempe tempe-  
ratum, sed magis butyrosum fuerit, eò minus dormire va-  
lent. (3.) Cruditates & acria contenta præternaturalia in  
stomacho & primis viis, lac plus minus vitiantia, & partes  
nervæ circa hypochondria irritantia, sapissimè inquietos  
reddunt infantes, & somnum interruptum efficiunt, in  
specie ubi cruditates vitiosæ fermentando simul inflationes  
hypochondriorum effecerint. (4.) Dentitio difficilis. (5.)  
Lumbrici subinde pertinaces vigilias cum ejulatu diuturno  
solent inducere: Vid. M. A. N. C. *Ann. 8. obser. 36. pag. 66.*  
Adedque semper in agrypnis infantum ex causa interna  
ad primas vias respiciendum, cum ibidem ferè causæ la-  
teant.

## S I G N A.

Affectus per se est manifestus, & periculosus, propterea,  
quoniam vires infantum notabiliter dejicit, atque occasio-  
nem dat epilepticis insultibus.

## C U R A.

In Cura ergo præmissis præmittendis, in specie blandè la-  
xantibus ac primas vias abstergentibus, cautius usurpentur  
Papaverina, nempe syrupus de papavere, emulsio ex semi-  
ne papaveris & similia, infantibus tenellis ferè damna-  
la, nec, nisi præmissis aliis, idque cautè, admovenda, vel in  
Imminuta dosi propinentur, quia stuporem & torporem in-  
signem inducunt spiritibus animalibus, ut postmodum tales  
semper habere soleant ingenia stupida: Non ergo, nisi in  
adultioribus seu adultis, ad papaverina est accedendum. Aut  
quod tolerabilius est, sufficit pulmentum ex lacte, in quo  
cortices capitis papaveris cocti fuere; in his enim mitior est  
vel hypnotica. Nostrates propterea Mithridatii vel Theria-  
ces tantillum propinant: vel fiant emulsiones:

24. *Amgd. dulc. 3j.*

*Scm Papav alb. 3ß.*

Cum *Aqua Funic. f. Emuls.*

adde

*Cornu Cervi sine igne gr. xv.*

*Sal. vol. Cornu Cervi gr. iv. vel v.*

*Edulcoretur parum.*

*M. D. S.*

*Emulsio ad quietem.*

Item syrupus papaveris albi, aut diacodium cum aliis, in  
parca dosi exhibetur: vel etiam loco syrupi papaveris simpli-  
cis syrupus papaveris rhæados, tanquam minus malignus;  
est usurpandus; interdum unum alterumve parvum cochlear  
cum aqua hypnotica Dorncrellii propinari potest. Cinnaba-  
ris antimonii cum cervinis similibusque absorbentibus pro-  
pinetur. Aliquando infanti, pertinacibus vigiliis afflito,  
ex acrimonia humorum cum metu imminens epilepsia,  
prescripti:

24. *Aqua Funic. 3j.*

*Farin. Inopod. 3j.*

*Cran. hum. præp. gr. xij.*

*Syr. flor. Tunic. 3j.*

*M. f. Potiuncula:*

Propinetur crebrius.

Externè:

24. *Ol. expr. Nuc. mosch. 3j.*

*Dest. ruta 3j.*

*Succini 3ß.*

*Misc.*

Hoc ipso illinantur præcordia & nucha, quod factum cum  
successu.

Etiam oleum anethi destillatum ad aliquot guttas com-  
modissimè misceri cum oleo nucis moschatæ expresso, &  
temporibus blandè illini potest: quibus etiam commodè ap-  
plicatur lac muliebri cum paucò croco temporibus illitum:  
vel fiat emulsio ex nucleis persicorum cum lacte muliebri,  
quæ instar epithematis tepidè fronti admovenda est. Item  
pinguedo lucii piscis, plantis pedum applicetur. Item me-  
dulla



dulla cervina vel medulla crurum vituli liquefacta temporibus illinatur, aut, quod tutius est, plantis pedum inuncta commodè usurpatur.

## ARTICULUS XVI.

### D E

#### PAVORIBUS IN SOMNO.

**P**ropter agrypnias, dormientes licet, infantes etiam subinde Pavoribus in somno corripiuntur, eo magis suspectis & periculosis, quò frequentius epilepsie solent esse prodromi.

### CAUSÆ.

Oriuntur ex explosivo ferè impetu spirituum animalium in nervos, qui cum sub somni requie blando tardoque gressu intluere debeant, impetuosius irruentes inopinatò totius infantis corpusculum ex fibrillarum nervearum momentaneo nisu contractivo inferunt ejusmodi concussionem, adeò ut hi pavores non ineptè mulierculis habeantur prodromi Epilepsie; qui Insultus epileptici alias admodum solent esse familiares infantibus. Fomite, imprimis cruditatem acidam, semper agnoscunt, in primis viis circa ventriculum & intestina, iisdem ferè ex causis, ex quibus agrypnias induci modò insinuatum fuit. In specie ad acre acidum volatile hic imprimis respiciendum, quod vellicando præcordia, os ventriculi, &c. somnum ita interruptit, & pavidos infantes reddit; unde subinde etiam plorant. Saepius etiam torminibus infestantur infantes pavore nocturno correpti, cum noctu de improvviso expavescent.

### PROGNOSIS.

Pavor hic est periculosus, non per se, sed quod prodromus ut plurimum sit epilepsie.

### CURA.

Propterea in Cura ea, quæ hoc acidum temperare possunt, primum ducunt, semper simul respiciendo ad epilepsiam, propterea etiam subinde antepileptica cum successu usurpari possunt. Conveniunt ergo Crystallus præparata, cranium humanum præparatum, cornu cervi sine igne, smaragdus præparatus, pulvis puerorum seu Marchionis, cinnabaris antimonii, pulvis epilepticus antimonialis, corallia rubra præparata, dens hippopotami, &c. in aqua peoniar, menthar, foeniculi, &c. cum quibus etiam semen peoniar non inconcinnam præbet emulsionem. Hinc pulvis ex semine anisi, aquilegie, & succino præparato, commodissime propinatur infanti cum pulvere; sicut & specificum cephalicum cum semine anisi permixtum commodè propinatur; est enim oleum anisi optimum specificum etiam contra pavorem nocturnum. Imò mechoacanar pulvis pro abstergendo lacte corrupto ex primis viis subinde propinatur.

Externè Clysmata acria pro scopo revulsivis iniiciuntur. Hinc oleum stomachale Cratonis, cum oleo destillato anisi acuat, ventriculo, umbilico & hypochondriis illinatur; vel oleum nucis moschatæ expressum cum oleo destillato anisi impregnatum, tam ventriculo quàm temporibus illinatur, sed in parva dosi. Vel sacculus ex aniso contuso vertici capitis impositus, unà cum reliquis commodè usurpari potest.

## ARTICULUS XVII.

### D E

#### EPILEPSIA.

**M**ater puerorum, seu potius eorum noverca, quibusdam dicitur Epilepsia, qua frequentissime afficiuntur infantes, nata ex inordinato & perverso spirituum animalium motu in cerebro, & violenta explosione in nervos. Frequentissime autem paris vagi & intercostalis ramificationibus annexæ partes abdominis & thoracis præ cæteris partibus convulsionibus huiusmodi epilepticis tentari solent, hisque subinde gravia tormina in abdomine superveniunt, quia dictæ partes internæ prius affliguntur, quæ tormina

mulierculæ convenienter admodum epilepsiam in corpore appellare solent. Post repetita autem talia pathemata superveniunt etiam convulsionibus epilepticæ in partibus externis, quia continuus & nunquam interruptus spirituum animalium in hos nervos est motus & influxus, pro continuando motu cordis, diaphragmatis, & respirationi intervenientium musculorum primariorum, ut & ventriculi & intestinorum motu peristaltico perficiendo: unde consuetò quasi tramite longè promptius irruunt in dictarum partium nervos spiritus animales, quàm in membra externa in infantibus magis quæta, adeoque dictos spasmos internos frequentius concitant. Quod si verò crebrius repetant, tandem totum spirituum animalium exercitum integrumque systema nervosum per consensum & continuitatem motus similiter afficiunt, unde universalis tandem supervenit epilepsia, de qua dicunt: epilepsia erumpit.

### CAUSÆ.

Malum hoc ferè semper per *diuturnitatem* seu per consensum partium nervosarum cum partibus nervosis & membranis oriri solet, insequitur nervorum & horum fibrarum quocunque in loco irritationem, quæ tamen effectivè excitatur occasione vitiosi volatilis & corrosivi acidi, per se nervis inimicissimi, multò magis nervis tenellorum, quorum fibrarum nervearum textura mollior, tenerior & subtilior, facillimè mobilis, & ita in convulsivos motus crispabilis, ut sic dicam, existit. Hinc quò propinquiores sunt partes fonti vitiosi acidi, stomacho nempe & intestinis, aut mediantibus nervis connectuntur iisdem, etiam frequentius patiuntur convulsivos spasmos, qui continuati ulterius in tantum, donec totum nervorum systema in cerebri cerebellique confinis concutiant, universalem tandem epilepsiam, superveniente spirituum impetu, inferant. Uti in adultis subinde in membro quodam externo focus latet epilepticus, qui per continuatos spasmos sub apparente auræ frigidæ sensu sursum delatus ad cerebrum, tandem universum microcosmum concutit; ita par ratione ex acido, quod imprimis viscidum in intestinis aut glandulis mesenterii hospitat, tam spasmi leviores interni, quàm epilepticus totius corpusculi insultus, oriuntur: propterea absorbentia rariora, & hinc liquor cornu cervi succinatus, aliaque salia volatilia acria, quæ acidum destruant, & viscidum incidunt, experientia teste infantibus epilepticis solent esse convenientissima. Adeò ut rarissimam infantum existimem epilepsiam, cujus locus acidus non in abdomine lateat, aut ex abdomine non derivetur, ita tamen, ut citra halituum aut fumorum impossibilem adscensum malum dicto modo explicari queat. Fomite epilepsie infantilis existere ferè in abdomine, ex eo concludi potest, quod imminente malo ferè semper soleat tendi abdomen, & ut arbitror, peritonæi membrana spasmò afficiatur; hinc infantes solent difficulter & quasi cum suspiriis respirare: Vld. M. A. N. C. Ann. 6. & 7. observat. 201. qualis difficilis respiratio in iisdem ferè semper originem ex hypochondriis ac stomacho, harumque partium vel repletionem, vel tensionem habere solet: hinc vomitoria tali in casu sunt optima. Oborisi autem nocturnos pavores & epilepsiam infantum primariè ex acido peccante, etiamsi nulla huius indicia vel adsint, vel præcesserint, nisi ex dentitionis dolore epilepsia superveniat, ex eo fit manifestum:

(1.) Quod frequenter tormina infantes cum excretis æruginosis aut nigricantibus simul affligant, & si diutius continuentur, tandem in infantibus epilepsiam inferant, teste præter QUERCETANUM in Teir. Graviss. Cass. Aff. cap. 11. pag. m. 116. LINDANO super Hartm. in Prax. Chymiatricam, -qui vix virorem æruginis instar intensam in infantum excretis observari asserit citra epilepsiam. Quod si dicta materia ita sit acris, ut febris eam accedat, plerumque interimit infantes. Epilepsiam ab hac causa ortam prægredi solent ejulatus infantum ferè continui, tormina & dolores abdominis, & jectigationes infantum; tormina verò & talia excreta ex acido lactis corrupto superius derivavi.

(2.) Juxta HIPPOCRATEM lib. de morbo sacro. post curatam epilepsiam undecunque natam pustulæ & achores, aut scabies, nunc in universo corpore, nunc in capite, nunc circa aures, nunc



in facie, nunc in nucha & dorso, efflorescere solent, quæ cum pruritu supparantur, hinc decidunt, idque cum euphoria: Vid. **SENERTUS** de Morb. Infant. Part. 2. cap. 3. pag. 28. quas exulcerationes etiam ex acido lymphæ deduxi. Quibus

- (3.) Accedit cura epilepsiæ infantis per alcalia volatilia, item per terrea acidum absorbentia.

Alia frequentissimæ epilepsiæ occasiones solent esse:

- (1.) Meconium à partu non sufficienter expurgatum; vid. **M. A. N. C. loco allegato.**

Hinc

- (2.) Lactis in stomacho corruptela, & inde natus vitiosus acor, sæpissime infert epilepsiam; atque tunc excreta infantum solent esse viridia aut nigricantia.

Deinde

- (3.) Dentitio difficilis propter dolorem, & propter fibras nervosas in gingivis à dentibus erumpentibus punctas, concitando inordinatum spirituum animalium motum, & commovendo in corpore acidum vitiosum, facillime epilepticos reddit infantes.

- (4.) Vehementiores ac subitanei animi affectus, tam nutritis quam infantis, præsertim illius ira, hujus verò terror, ordinariò ferè ad epilepsiam disponunt.

- (5.) Excreta retenta aut cohibita, v.g. achores, variolæ, epilepsiam inferunt.

- (6.) Lumbrici familiarissimi epileptiarum sunt Autores: Vid. **M. A. N. C. Ann. 6. & 7. obs. 107. & 236.**

Hæ sex causæ, aut meconium retentum, aut acor lactis vitiosus, aut dentitio difficilis, aut immoderatus animi affectus nutritis, aut excreta cohibita, aut lumbrici, facillime inordinatum spirituum animalium in infante concitant motum. Unde consequenter epilepsia, & quidem eo facilius in infantibus, quò debilius adhuc textura partium nervosarum, & quò porosius & spongiosius adhuc, minusque solidum aut poris angustioribus periculum eorundem est cohibendum; unde faciliè hinc inde dispergi & inordinatè moveri possunt spiritus.

## DIAGNOSIS.

Signa epilepsiæ per se patent.

Causæ etiam latere non possunt, partim ratione ipsius infantis, ex retento meconio, difficili dentitione; partim relatione putricis, si vult, partim ex acescentia lactis.

## PROGNOSIS.

Quoad *Pregnosin*: Funestum malum est infantibus, licet familiare, ex quo sæpius periclitantur, mortemque obeunt, præsertim si in tenuiore constitutione crebrius malum repetat.

In principio variolarum minus periculi habet; nam ubi erumpunt variolæ, spontè cessat epilepsia.

## CURA.

Pro *Cura*, causarum habenda est ratio: cum verò ut plurimum ex stomacho & acido acri ibi genito malum oriatur, absorbentia & acidum destruentia, tam fixa quam volatilia, & hinc anodyna mineralia, sunt optima. Specificè conveniunt radix pæoniæ, & internè & externè, justo tempore collecta, emulsio ex semine pæoniæ, vid. **STROBELBERGERUS** Traët. de morb. Infant. & omnia ex pæonia parata. Majoris pretii tamen est viscus corylinus, & post hunc viscus quercinus, optimus ad curam epilepsiæ infantum. Præcæteris tamen omnibus est expertum remedium in epilepsia infantum Succinum, & quibusdam inter secreta repositus pulvis iste citrinus seu farina ex musco clavato terrestri, h. e. lycopodio insidens, sulphureæ profapiæ, adeoque faciliè flammam concipiens, & instar pyrii pulveris crepitum edens: & verum est, interdum ad ʒss. seu summum epilepticum puerile interdum prosperè adhibetur. Multò magis tamen convenit similis farina ista seu pulvis flavus primo vere ex iulis coryli collectus, ob sulphur anodynum nobilissimus in epilepsia & plurimis infantum affe-

ctibus. Deinde non relictenda communia corporis, unicornu marinum præparatum, dens hippopotami, crystallus præparata, imprimis si excernantur per alvum viridia, acidum enim interimit, cum appropriatis imprimis si permisceatur, spina mustellæ piscis, cranium humanum, lapis bezoar animalis, pulvis Marchionis, &c. Omnia enim hæc acidum nervos infestans absorbent, & ita malum non mediocriter levant, interdum planè tollunt. Quæ si non suffecerint, si pulvis secundinæ humanæ primiparæ, quilibet spiritus urinosi, ac quælibet salia volatilia, in specie spiritus & sal volatile cornu cervi, cranti humani, secundinæ humanæ, & sal volatile succini, quod sibi par non habet remedium in infantum curanda epilepsia quacunque, etiam si dentitionis difficultas easdem excitaverit, suo tamen officio optime satisfacit, crebriori experientiâ comprobatum: Hinc liquor cornu cervi succinatus nunquam satis laudari potest pro epilepsia infantili, ita ut vix quencquam relinquit hic liquor, si epilepsia non sit lethalis: sicuti gr. i. camphoræ in aqua florum cheiri post paroxysmum assumptum præservat, ne tam faciliè recurrere possit. Porro cinnabaris antimonii, nec minoris pretii cinnabaris nativa præparata, depurata, & super ejus basin compositum specificum cephalicam, optimum est remedium in epilepsia infantum. Hisce tamen, si non superius, nobile sanè est medicamentum Sulphur antimonii, ex scoris reguli ultimâ vice certo modo præcipitatum. Infantibus datur ad gr. i. & in robustioribus paulò ad gr. iss. ad summum gr. ij. Mirabilis est ejus vis in epilepsia infantum tam imminente quàm præsentente sistenda; nempe primâ vice mineram morbi auspiciat vomitu exturbat, si quandam inveniat; si verò primis viis repurgatis nihil offendit, etiam repetitis vicibus sine tali effectu insensibiliter per sudorem operatur, & insequente blando somno infantes curabit. Vocatur pulvis antepilepticus antimonialis. Aurum quoque fulminans mirabilis est efficaciz in corrigendo & eradicando fomite epileptico, cum arcano duplicato vel nitro depurato propinatum. Si à terrore sit malum, smaragdus laudatur. Alia etiam sexcenta ad epilepsiam infantum commendata faciliè modo dictis applicari possunt. Venicula horum sunt satis nota.

Ex his plures possunt fieri formulæ: v. g.

ʒi. *Aqua Fenic.*

*Flor. Pæon. an. ʒi.*

*Cran. hum. præp. ʒj.*

*Cinnabaris antimonii gr. ix.*

*Syr. Fenic. ʒij.*

*M. f. Potiuncula: S.*

*Potiuncula cephalica contra epilepsiam.*

ʒi. *Aqua Fenic.*

*Fl. Tilia an. ʒi.*

*Ess. Castor. ʒj.*

*Spiritus sal. ammoniaci,*

*Liqu. cornu Cervi succin. an. gutt. viij.*

*Syr. de Stachad.*

*Papav. simpl. an. ʒʒ.*

*M. S.*

*Ut suprâ.*

Item

ʒi. *Unic. fossil.*

*Per. præp. an: ʒʒ.*

*Olei dest. succini, aut si sit nauseosus, Rosimar. vel Ruta gutt. iij. vel v.*

*Theriac. gr. ij.*

*M. f. Pulvis pro aliquot dosibus.*

*D. S.*

*Pulvis singularis antepilepticus.*

Item

ʒi. *Unic. ver. præp. ʒʒ.*

*Cinnab. nat. sel. gr. xv.*

*Salis vol. Cornu cervi gr. iij.*

*Extr. Castor. gr. j.*

*Ol. dest. anisi gutt. ij.*

*M. f. Pulvis pro tribus dosibus:*

*D. S.*

*Pulvis singularis.*

ʒi. *Unic. veri præp.*

*Cran. hum. an. ʒʒ.*

*Sal. vol. Viper. gr. iv.*

*M. f. Pulvis produabus dosibus.*

*D. S.*

*Ut suprâ.*



Præmissis præmittendis, in specie auro fulminante, quod  
tomes morbosus ed melius eradicetur, e. gr.

℞. Ebor. sine igne ℥℥.

Aurifulmin. gr. j.

M. S.

Pulvis singularis.

℞. Unic. veri præp.

Cran. hum. sine igne an ℥℥.

Aurifulmin. gr. ij.

M. f. Pulvis.

Div. in duas partes.

D. S. ut supra.

℞. Aquæ flor. Pæon. ℥℥.

Cinnam. cum vino ℥.

Syr. flor. tunic. ℥℥.

M. S.

Aqua ad pulverem.

Pro Infante aliquot dierum.

℞. Unic. mar. præp. gr. viij.

Pulv. epilept. Antimonial. gr. ℥.

M. S.

Pulvis singularis.

Infanti duorum annorum.

℞. Pulv. epil. Antimonial.

Aurifulmin. an. gr. ij.

M. S.

Pulvis cephalicus.

Item

℞. Farin. lycop. ℥℥.

Cinn. nativ. gr. iv.

M. f. Pulvis.

Puella undecim dierum laborabat purpura, anhelabat,  
nec respirare poterat, extrema refrigescabant, oculi contor-  
ti erant, mortui instar jacebat cum stertore: uno nomine, erat  
epilepsia partium internarum, aut saltem asthma convulsi-  
vum occasione muci vitiosi in ventriculo & primis visceri-  
bus: subito vocatus, præscriberem:

℞. Aqua ex succo rad. Pæon. ℥.

Liqu. cornu Cervi succin. ℥.

Syr. emet. A. S. ℥℥.

Misc.

Propinquetur cochleatim.

Præscribam item clystma. Potiuncula continuabatur,  
donec superveniente repetito vomitu infans ad se sedi-  
ret.

℞. Aurifulmin. gr. ij.

Unic. veri præp. ℥.

M. pro duabus dosibus.

Horridi feculi secessus, infans convalescit.

Item in aliis tenerioribus, præmissis præmittendis:

℞. Aquæ flor. Pæon. ℥.

Unic. ver. præp. gr. xv.

Salis vol. cornu Cervi gr. viij.

Syrup. flor. Tunic. ℥.

M. D. S.

Mixtura caput confortans.

Propinquetur cochleatim, excitato sudore melius habens in-  
fantes.

Infanti unius & dimidti anni epilepsia gravi occasione  
dentitionis correpto, præscribam:

℞. Liqu. cornu Cervi succin. ℥.

Dosis gr. xij. ad xv. vel xvj. sæpius in vehiculo

aquæ flor. Acacia.

Item

℞. Unic. veri præp. ℥.

Aurifulm. gr. ij.

M. f. Pulvis pro duabus dosibus.

Item

℞. Farin. lycopod. ℥℥.

Aurifulmin. gr. j.

Dabatur in vehiculo iusculi carnis calidi: hinc

℞. Aquæ ceras. nigr.

Fl. Tilia aa. ℥.

Unic. veri præp.

Cran. hum. præp. an. gr. xv.

Salis vol. cornu Cervi ℥.

Syr. flor. Tunic. ℥.

M. f. Potiuncula.

Item

℞. Ol. de still. succin.

Ruta an. ℥.

Retinell. Oper. Tom. II.

Ol. expr. Nucistæ q. s. pro consist. Balsami.  
quo illinebantur præcordia, aucha aut vertebra colli &  
dorsi.

Pro Clysmate:

℞. Flor. Chamomill. M. j.

Sem. Anisi ℥.

Banc iunip. ℥.

Coqu. in f. q. aqua commun.

Colat. ℥.

Elect. de bacis lauri ℥.

Syr. emet. Sala ℥.

M. pro Clysmate.

Hiscæ convalesce.

Sequens etiam convenit Clysmata:

℞. Fl. Chamom. Rom. M. i.

Coqu. in f. aqua simpl.

Colat. ℥.

Salis vol. cornu Cervi gr. viij.

Mell. rosat. ℥.

Olei de st. anisi gr. v.

M. pro Clysmate infantis unius anni.

℞. Rad. Pæon. ℥.

Angel.

Leuist. an. ℥.

Flor. Chamomill.

Sambuc. an. p. j.

Coqu. in f. q. aqua:

Colat. ℥.

Ungu. clysmat. ℥.

Elect. Hier. cum agar. ℥.

Sal. vol. succini gr. v.

M. f. Enema pro infante unius anni.

Potero quatuor & dimidti annorum insigniter epileptico

una cum aliis imprimis contulit:

℞. Unic. veri præp. ℥.

Bez. solar. ℥.

Aurifulmin. gr. v.

M. pro 2. dosib.

Profectus etiam erat sequens Potio:

℞. Aquæ flor. Pæon. ℥.

Farin. Lycopod. ℥.

Aurifulm. gr. ij.

M. pro 2. dosib.

Hæc ipsa farina lycopodii etiam commodè cum pulce pro-

pinari, & ita varis infantum affectibus succurri potest.

Quoad externa: optimè confert & præservat ab infan-  
tum epilepsia Cinnabaris nativa, de collocationem suspen-  
sa, vel, ut aliis placet, carpis applicata. Usneam cranii  
humani externè contra infantum epilepsiam prodesse scri-  
bit KIRCHERUS in Regn. Naturæ sympath. Osculum  
busonis pulsui infantis applicatum, ob ideam pavoris, epi-  
lepsiam ex ira vel terrore nutritis, & infantem paulo post  
lactantis, natam sistit. Vertici, si paulo robustior fuerit  
infans, oleum succini commodè illinitur: dico, si fuerit  
robustior; nam est penetrans remedium. Aliàs Litus pro  
vertice, præcordiis & abdomine ex oleis & balsamis rutæ,  
rosæmarini, scæniculi, imprimis balsamum succini, seu  
optimum euphoris, sedulo in usum vocandi; quibus &  
paucum castorei vel extractum ejus subinde addi potest;  
quin & oleum castorei pedum plantis utiliter admoventur.  
Quod etiam pertinet oleum seminis ricini majoris seu gra-  
norum illi expressum, cujus p. i. cum p. iv. pinguedinis  
erinacei in Linimentum rediguntur, quod umbilico illi-  
nuntur.

Item

℞. Cerot. pro bregm. usitat. q. s.

Malaxetur cum oleo succini aut ruta, seu, si penetran-  
tiora hæc videantur, cum balsamo Peruvianiano, & im-  
ponatur capiti: qualia potentius in infantibus operantur,  
quàm in adultis, quoniam fontanella in iisdem est adhuc  
aperta.





## ARTICULUS XVIII.

## DE

DENTITIONE INFANTUM  
DIFFICILI.

**S**æpius epilepsiæ occasio est *Dentitio* infantis *difficilis*, partim, dum intra alveolos incrementum capiunt, partim, dum extra gingivas jam robustiores dentes prorumpunt. Hujus ergo dentitionis negotium, & symptomata, ejus occasione excitata, hic evolventa erunt. Nam dentium pulpa radicalis in formatione foetus inseritur gingivis in forma mucilaginis mollis: postmodum dum quinque vel sex mensium sunt infantes, circa sextum vel septimum ista pulpa dentium successivè indurata & augmentata penetrari incipit per gingivarum carnem spongiosam. Si ergo facile penetrat, & hanc carnem perforat, est dentitio facilis, quod si propter tenacitatem aut duritiem gingivarum difficilior erumpat, propter concurrentia gravia symptomata, est dentitio difficilis. Erumpunt primò dentes incisores seu anteriores, hinc canini, ac tandem molares.

Dixi, quod imprimis gingivarum durities sit causa: unde sub dentitione hac, dum non possunt satis penetrare, insignem pruritem, hinc intensum dolorem, ardorem febilem, &c. percipiunt gingivæ, dum ab aculeis talibus ossibus incrementibus perforantur, eadem insigniter intumescunt, simul plus minus inflammantur, inde inquietudines, ploratus, agrypnia, &c. superveniunt. Dolor qui primariò urget, similis quodammodo est illi, dum acido morbofo gingivæ in dentium radicibus punguntur & quasi perforantur. Sed cum sensilis gingivarum ex interspersis variis nervulis substantia cum partibus vicinis insignem consensum habere soleat, quod ex odontalgia adultorum, subinde dimidium capitis sphaeram per consensum afficiunt, interdum musculi temporales aliquem spasmodum inferente, notissimum est, de facili evenit, ut atrocioribus sub doloribus tandem univèrsum ferè nervorum systema simul vellicetur, & inde convulsiones, epilepsiæ superveniant: idque eò promptius, quò vel per se & in se ipso nervorum systema infantium tenerius & mobilius extiterit, vel ipsius ex perversa dila matris vel nutritis, acidis abutentibus, in primis suis staminibus debilius, & facilius irritabile redditum, vel ex lymphæ viciosa commota hinc inde irritatum fuerit: item cum doloris gingivarum occasione vicina glandularum, præprimis salivarum, vasa, & illas integentes membranz, vellicari soleant simul, hoc ipso copiosius saliva in ore effundatur, ordinariè copiosè admodum salivantes infantes; quod vocant Germ. *das Geißeln*, & interdum aliquamdiu præcedere dentitionem molestiorem solet: quæ saliva copiosius etiam deglutita læditur appetitus, nunc turbatur digestio prima, relaxatur ventriculus & intestina, interdum supervenit vomitus cum tussi serena, aut certe copiosa diarrhœa plus minus serosa, quæ hoc tamen habet commodi, quod quò copiosius fuerit, eò minus epilepsiæ tentari soleant infantes. Item cum copiosior ex saliva, regionisque vicinæ dolore, simul irritantur fauces, etiam copiosior lymphæ ad fauces & asperam arteriam affluxus supervenire solet: quæ lymphæ, si & ipsa minus temperata, sed falso acida plus minus fuerit, ejus occasione, præter rationem faucium & laryngis, tussis creberrima siccæ seu inaniscum respiratione sterroia quibusdam accidit: Imò cum in infantibus minus sanis doloris & agrypnia ratione, commotis nimis spiribus, quælibet in corpore turbati soleant, faciliè viciosa acidum commoveri, hinc epilepsiæ tam frequenter dentitioni supervenire solet, donec erumpentibus tandem dentibus ista symptomata successivè cessent. Et quidem diarrhœa dentitioni superveniens est salubris, nec adeò faciliè sistenda. Observatus fuit interdum in infantibus sub dentitionis tempore genarum tumor, qui linqvendus est; nam superveniens diarrhœa interdum eundem solvere solet. Contingunt hæc ferè, dum sex septemve mensium fuerit infans: idque omnium maxime in dentibus caninis erumpentibus, hinc in molaribus, omnium minime in incisoriis, symptomata talia observari solent.

## DIAGNOSIS.

Quoad *Signa diagnostica*: ista patent ex jam dictis, ex dolore, saliva, tumore, caloris sensu, & sic porro: imprimis faciliè sentiunt nutrices imminentes dentes, quando nempe infantes, dum sugunt, papillas gingivis acridis & fortius apprehendunt, ac adstringunt: item calor insuetus in ore infantis percipitur, ipsique infantes manibus ori ingessis doloris locum ferè ostendunt.

## PROGNOSIS.

Quoad *Signa Prognostica*: Dentitio ipsa per se malum est minus periculofum, saltem propter supervenientia symptomata, nempe convulsiones epilepticas, aut diarrhœas excessivas, periculum incurrunt, quæ tamen & leviores sunt & minus periculofæ, si adjuncta sit diarrhœa moderata, aliàs sæpius sunt funestæ. In specie autem ex caninis dentibus graviter laborare solent infantes, propter eorum duritiem & majorem acutiem.

## CURA.

In *Cura* omnis intentio eò dirigatur, ut emolliantur gingivæ, ardor & dolor earum sopiatur, symptomata supervenientia mitigentur, atque erumpentes dentes facilius transmittantur: in quem finem recipiatur *mucilago seminis endoniorum & psyllii cum aqua sperm. ran. extr.* quæ dentibus subinde illinenda.

Vel

℞. *Mucil. sem. Psyll.**Radic. alb. cum aqua semperov. par.*  
an. ʒʒ.*Olei amigd. dulc.**Papav. an. ʒij.**M. D. S.**Linimentum.*℞. *Mucil. sem. Cydon.**Sem. alb. par. cum aqua sperm. ran.**But. rec. non salit. an. ʒʒ.**Quibus addatur**Viscillum ovi dimidium.**Subigantur mœtu in formam Linimenti:**D. S.**Unguentum leniens.*

Quo illinendæ sunt gingivæ.

Mel etiam vel solum, vel cum medulla crurum vituli subactum, & gingivis illitum, dolorem sistit. *Frustrulum radicis Althææ* cretens, vel aridum, in aqua malvæ maceratum, sæpius datur infantibus, ut istud probè mastitent, & masticando mucilago radicis extrada, successivè emolliat gingivas; cujus loco non ineptè *frustrulum cori lardi recentis* substituitur. Non enim approbo communem sententiam, quæ dens aut lupinus crystalli frustrum infantibus pro masticatione porrigitur, quoniam durities horum facit, ut gingivæ fortiori attritu magis potius indurentur, quàm ut emolliantur. Item medulla crurum vituli, aut unguentum dialthææ, gingivis illinendum venit: succus cancroruz, sive vitæ, cum aqua storum cyani confusorum, illitus gingivis puerorum, benè confert: vel fiat balsamum puerorum dentientium, quo illinantur gingivæ, quale elegans describit JOHANN. DANIEL HORSTIUS in *Dispens.* pag. 567. vel *M. A. N. C. Ann. 6. & 7. Append. pag. 576.* Præ aliis sanguis ex crista galli parum locula exstillans gingivis illitus, ad dentium eruptionem promovendam impensè quibusdam laudatur. Vel ipsa crista à gallo nigro rupta vel decisa ipsanti pro masticatione quasi, vel gingivis contentenda porrigitur infanti; hoc enim modo etiam promovetur dentium eruptio. Potentissimum remedium dicitur cerebrum leporinum gingivis illitum, quod potentè dentium quasi extractionem promoveat, collum tamen & cum melle in forma linimenti mixtum, tutius esse dicitur, quam crodium; ejusdem enim vis nimia sic mitigatur. Leporinocerbro cerebrum agni aut hirci alii substituitur. Aliis irritis, si protuberantia gingivarum, & superior ejus candidior reddita pars, dentisiam proximè absconditi ligum exhibeant, scalpello eas incidit PARÆUS lib. 23. capit. 67. quod ceu tutum sibi compertum & summe proficuum commendat BORELLUS *Centur. 1. observat. 97.*



Extra sunt foris maxillarum, item inuolones ex emollientibus, discurrentibus & lenientibus; hinc butyrum recens infusum, medulla crurum vituli, oleum amygdalarum dulcium, oleum liliorum alborum, oleum chamomillæ, unguentum dialthææ, mucilago radicis althææ aut seminis psyllii, theriaca, &c. maxillis & regioni temporum loci dolentis illinatur pro leniendo spasmo doloroso dictorum locorum, & intensiore dolore. Quidam faciunt linimentum ex axungia leporis cum melle despumato, ana; ex quibus paratum linimentum post aures vel ante aures illinunt, ut faciliatur & dentium eruptio, & præcaveatur vicinarum partium tumor.

Intra os supra dicta Emollientia ex mucilaginis & axungis non adeo nimis copiose aut frequenter usurpanda sunt, quando nempe adeest diarrhœa, quia periculum est, ne talibus laxantibus & lubricantibus successivè deglutitis exasperetur potius quàm leniatur diarrhœa, utur dentibus conducatur.

Ut verò reliqua interea mitigentur supervenientia symptomata, qualia primariò sunt febres & convulsiones, optimum fuerit, si alvus, quantum possibile, servetur probè fluida: nam quibus, cum dentes erumpunt, alvus crebro lavatur, minus convulsiones tentantur, inquit HIPPOCRATES de Dentis. lib. Hinc vel spontè alvus fluidior servetur talis, vel eadem clysmatis, similibusque remediis laxior reddatur; conf. HOEFERUS Herc. Med. pag. 355. Idque speciatim in iis, qui ex nutricis cacochymia minus laudabilem sanguinis, reliquorumque contentorum, crasin obtinent: nam & tales ordinariò gravius sub dentitione laborare assolent. Internè gelatina cornu cervi recens, crebriùs quocunque vehiculo propinata, & hinc liquor cornu cervi succinatus, ob convulsionum imprimis merum, medicamenta sunt tutissima & utilissima.

Hæc est Dentitio vera.

## ARTICULUS XIX.

### DE

## DENTITIONE NOTHA.

**R**eperitur præterea etiam *Dentitio notha*, quod vocant Germ. *Beul-Zahne*, quando scilicet erumpunt tubercula, Germ. *Beulen*, in gingivis, eaque insigniter dolentia, ex quibus tamen nulli dentes erumpunt, quin potius lactationem impediunt, & lactando infantes suorum sonorum edunt.

### DIAGNOSIS.

Imprimis huiusmodi dentitio notha cognoscitur, si infantes juxta aures digitis premantur: tunc enim intipiunt eiulare.

### PROGNOSIS.

Malum hoc propter dolorem aut subsequenter inflammationem est satis periculosum non raro.

### CURA.

*Cura* huius *Dentitionis nothæ* consistit in eo, ut inungantur infantes circa & penes aures axungia leporina: ipsi verò tumores illinendi sunt & fovendi oleo amygdalarum dulcium recenti, sic enim successivè evanescunt.

## ARTICULUS XX.

### DE

## DIARRHŒA.

**A**lvi fluxus sæpissimè est dentitionis difficilioris comes, dum nempe infantes copiosissimè eliciunt per alvum, cum quo conjuncta esse solet eorundem imbecillitas: sæpiùs adeest dejectus appetitus, & tandem nonnihil atrophia corripit incipiunt infantes.

### CAUSÆ.

Quoad *Causas*: ordinariò, uti notum est, dentitionis tempore supervenit diarrhœa, dum continuè os madet saliva, quæ copiosius deglutita lactis digestionem prohibet, & intestina nimis laxa, cum simul propter dolorem & inquietudinem lac minus commodè concoqui possit, quod ipontè ex pyloro denuò egeratur. Præterea tamen etiam nutricum lac nimis aquosum, tenue, acrius, salius, serosius, &c. sæpissimè diarrhœæ est causa, irritando intestina ac ventriculum, & ita ad diarrhœam disponendo. Id quod sit imprimis, quando nutrices crebriùs usurpant potum frigidum, aut etiam quando mammas libero aeri nimis exponunt; tunc enim lac crudius & serosius generari solet, à quo hausto sæpissimè alvi fluxus supervenit. Aut denique ipsa infantis digestio læsa, indeque nata liquamina acria, salsa aut æruginosa, alvi fluxum inducere valent.

### DIAGNOSIS.

Malum per se patet.

An causa sit dentitio, etiam non latet.

Vitium nutricis ex ejus dicta cognoscitur.

### PROGNOSIS.

Per se quidem proficua observatur alvus laxior infantibus, præprimis in dentitione, in qua, uti monui, potius conducit, quàm nociva est: sin verò crebriùs affligat, imprimis si ad septimum usque porrigatur diem, funesta esse solet.

Mitior tamen est alvi fluxus, ubi albicantia aut flavescantia reiliuntur; deterior, ubi acria, viridia, in specio foetida plus minus nigra excernuntur, adeoque de remediis cogitandum.

Si appetitus adhuc constet, res bene habet; hoc nimis delecto, res non caret periculo.

In febre ardente, aut acuta, si os gra reiliantur, infantibus sæpè periculum mortis imminet.

### CURA.

Ordinatè ergò debita nutricibus dicta, præsertim ex oryza, milio & similibus, potuque calido, ut ita lac ejus nonnihil alteretur, conveniunt internè cornu Cervi ustum, terra sigillata, maxilla lucii piscis, crystallus, corallia, pulvis tormentillæ, nux moschata, theriaca, & similia. Ulterius Mumia cum spermate ceti permixta, ad ℥i. optimè sistit alvum infantum, etiam ubi laborant dysenteria. Gummi Arabicum ad ℥j. in jusculo gallinæ aut carnis exhibitum insigniter conducit ad sistendam infantum alvum. Item pilulæ extracto tormentillæ, cui granulum semis, aut etiam adhuc minus, Laudani optatè sit additum, offerri etiam possunt infantibus, in lacte dissolutæ: v. g.

℥i. Pulv. diaphor. Lud. gr. vi. viii. x. ad xii.

Theriac gr. i. vel ii.

M. D. S.

Pulvis adstringens.

℥i. Cornu cervi ust. præp.

Terra sigill. an. gr. viij.

Extr. rad. Torment. gr. xii.

Theriac. gr. ii.

M. pro 2. dof. S.

Uc antè.

Vel

℥i. Aqua menth.

Scord. an. ℥vj.

Cornu cervi usti præp. gr. xv.

Terra sigill. gr. xii.

Theriac. gr. ii. vel iii.

Syr. Plantag. ℥ii.

M. D. S.

Potio adstringens.

Vel

℥i. Aquæ Plantag.

Cinnam. cydon. an. ℥j.

Extr. tormentill. ℥ss.

Theriac. gr. viii.

Syr. Corall. ℥ss.

M. D. S.

PPP 4

Mixtu.



*Mixtura adstringens.*

De qua mixtura cochleare unum alterumve interdum, sed rarius, propinetur infanti ad sistendam alvum.

Grana mastiche cum paucis nucis moschatæ permixta, etiam stomachum roborant, & alvi fluxum sistunt: vel subigatur mastiche cum paucis syrupode rosæ siccis, & cydoniorum, aut etiam cum syrupo mastiche, & subinde lambenda offeratur infanti. Tincturæ coralliorum imprimis commendantur à modernis, si nimio acore non sint inquinatæ; Unde tinctura coralliorum cum spiritu cordis ceri in parva dosi propinari potest infanti, in specie si cum febre maligna vel torminibus conjunctur sit alvi fluxus.

Item in Diarrhoea infantis cum excretis viridibus & acerbis, æstu corporis, &c. ex acrimonia contentorum aut laesione,

24. *Aqua Plantag. ʒi.*

*Mentha ʒij.*

• *Gel. cornu Cervi rec. ʒʒ.*

*Lap. cancr. præp. gr. vi.*

*M. D. S.*

*Potio adstringens.*

Vel

24. *Cornu cervi us. præp. ʒʒ.*

*Terra sigill. gr. xij.*

*Theriaca Androm. gr. ʒij.*

*Ol. destill. Macis gutt. i.*

*M. pro 3. dos. S.*

*Pulvis adstringens.*

Usurpando simul clystina ex lacte, & illinendo regioni ventriculi & umbilici vel balsamum nucis moschatæ, vel theriacam.

Clysmata lenientia imprimis, quando acres succi peccant, egregie conveniunt. Curavi aliquando puellam quatuor annorum, ex febre acuta laborantem, & diarrhoea insigni cum flatuum copiosorum proventu correptam, crebroque, sed parum desiccientem, (quod non tam quantitatem, quam qualitatem seu stimulum excrementorum subesse indicabat,) quæ beneficio clysmatis ex lacte optime levabatur.

Hiscæ, si dysentericus superveniat fluxus, bolus armenia, crystallus præparata, maxilla lucii piscis, ac similia acidum absorbentia, addi possunt.

In infantibus ablaetis diarrhoea affectis:

24. *Aqua flor sambuc.*

*Fenic. an. ʒi.*

*Succ Cidoy. ʒvi.*

*Corall. rub. præp. ʒi.*

*Terra sigill. ʒ.*

*Syr. Papav. alb. ʒiii.*

*M. S.*

*Potio adstringens.*

Externè infantibus convenit proliu umbilici theriaca, aut oleum destillatum menthæ, macis, absinthii, spicæ, excepta cum theriaca aut balsamo Peruviano aut similibus; aut etiam oleum mastiche & nardinum, cum aliquot guttis olei spicæ umbilico illitum: vel cataplasma ex cydoniis coctis, per setaceum tractatis. Item sorsum decocto rosarum rubrarum, radiceis tormentillæ, menthæ, plantaginis, &c. in vino rubro coctis, cui simul nux moschatæ & caryophylli sunt addita, & ita cum pannis multiplicatis applicatur calidè abdomini, ut nimius impediatur fluxus.

## ARTICULUS XXI

## DE

## LUMBRICIS.

**P**Ræteris mille malorum autores infantibus existunt *Lumbrici*, sique saltem longi, Germ. *die Spuhl-wormer*: rard enim lumbricus latus seu tinea aut cucurbitinus in infantibus observatur, exemplum tamen videatur in BARTHOLINI *Art. Med. Hassn. Vol. 2. pag. 116.* Non rard etiam ascaridibus torquentur, quæ scilicet incolunt intestinum rectum. Nullum ferè est symptoma, quod non excitetur à lumbricis, in intestinis infantum stabulantibus, aded ut etiam horrendas epilepticas convulsiones in iisdem excitent. Ob id accuratiores Practici studiosè monent, in omnibus affectibus infantum curandis, imprimis abstusio-

ribus, semper ad lumbricos esse attendendum, qui latentes pessima inferunt symptomata, utur certa certa eorundem indicia vix dentur & supèrissime in obscuro lateant. In specie tamen infantibus talibus, quibus lumbrici in intestinis intrent, os copiosè salivæ, & quidem semper jejuno stomacho, continuè abundat, item crebrò nares siccant, admodum turbulenti & pavidi in somno sunt, strident præter solum dentibus in somno. Hæc sunt ferè primaria signa, quæ in lumbricorum præsentia se solent manifestare. His accedunt, quod rursus sepiùs adsit sicca, sitis plerumque infantes, præsertim manè vigilantes, graviter infestat, appetitus etiam subinde nimius est, cum quò nihilominus marcescunt, & minus nutriuntur, interdum planè deficitur venter, interdum simul inflatur & intumescit, alvus ut plurimum lubrica est & laxa, tormina ventris rosivæ crebrò adsunt, præsertim ventre vacuo existente; quæ tormina ferè cessare solent, ubi aliquid alimenti assumpserint; color faciei est inconstans, interdum phlogosi quadam rubere videtur, interdum subitò denuò pallet. Superveniunt tandem febres, exque sepiùs malignæ, aut saltim varii typi inconstantis, quæ mirè infantes excruciant: interdum periculosæ epilepsiæ & convulsiones capitis, manuum ac crurum: vid. M. A. N. C. *Ann. 1. obs. 63. & Ann. 6 & 7. obs. 137. & 138.* THONERUS *lib. 1. observ. pag. 94.* BONNETTUS *lib. 1. Med. Sept. sect. 13. cap. 5. pag. 132. & lib. 3. sect. 16. cap. 3.* AVICENNA *sen. 16. 3. Tr. Lipothymia*, aliæque lethalia interdum symptomata superveniunt, quæ omnia, sive plura sive pauciora horum adsint, suspicionem de vermibus ed magis confirmant, si interdum unus alterve mortuus per alvum excretus observatus fuerit, aut ex plurim jam dictorum symptomatum sydyome de vermibus conjectura fieri potest: ex quibus priora sunt copiosior saliva, stridor dentium in somno, sarius crebrior scalpura, sitis matutina, ventristumor, &c.

## CAUSÆ.

Generantur lumbrici in intestinis, imprimis stenosis, & sepius oriuntur ex *diæta* seu copia *assumptorum*, lactis aut pulvis, aliorumque alimentorum; hæc enim copiosius ingurgitata, dum non ritè digerì possunt, in mucum degenerant. Mucus hic blandus tamen & dulcis, ex alimentorum, vel non digestorum, vel ritè licet digestorum, reliquis, si in intestinis diutius hæserit, mediante calore levi, & consequenter *lucida* successivè *putrefactione*, semina *Lumbricorum* recondita gerit: quæ in infantibus, quorum vis digestiva tam potenter alterata assumpta nequit, facillè resuscitata, lumbricos producit. Nempe semina vegetabilium, imprimis *cerealium*, speciatim *secalina* & *triticea*, vel immediate in pulve infantum fatiosæ, vel mediatè in lacte nutritis, ex pane ingesto nata, & seminall insectorum in vasorum contagio, (quod sub minima etiam mole latere potest, utpote constituitur dicitur saltem 280. partem sui seminis corporis) quasi imprægnata, data occasione & quasi vigilando in infantibus diutius lumbricos excludunt. Accedit, ut monui, *tempus loci* blandus, simulque in infantibus *vis digestiva ventriculi debilitata*, quando digerendo non subiguntur exactè omnia *diffusum* animalculorum seminallia principia, sed vivos fortis emittunt. Præterea etiam dulcia, imprimis saccharata, quibus delectantur, facillimè animalia subministrantia, eaque varia, faciunt, ut ed promptius in infantibus lumbrici generentur. Et hinc est, quod etiam lumbrici per dulcia ex lacte, saccharo, melle, &c. parata, imprimis alliciantur & infescunt. Accedit denique temperata *bilis* acrimonia, minusque amara in infantibus, aliis succos, quos attingit, à tam prompta putredine & verminatione descendens; quæ cum deficiat in infantibus, ubi vis digestiva stomachi est mitior, & bilis temperata, minus coruptelam humorum animatam temperare ac præcavere potest, atque in adultis. Ut namque sal volatile oleosum bilis instat balsami condit chylum, eumque præservat ab omni corruptione, idque ed magis, quod acrior magisque salina volatilior fuerit, uti est in juvenibus adultis; ita cum in infantibus sit magis temperata & minus salina, ob id minus condire potest chylum, minusque descendere eundem à putredine & verminatione, unde tandem *mucus lacteus subdulcis* in intestinis putrefactus *Lumbricos* excludit: Hinc & ubi bilis deficit balsamus, lumbricorum est patria, recondit HELMONTIUS *Tractat. sex. tupl. Dig. 6. 82.* hinc etiam *tinearum* in adultis causam refert MARTMANNUS potissimum in *obstructione*



nem folliculi fellis, in *Prax. Chymiatr. cap. 136. §. 21.* Unde etiam talia quæ amaricantia sunt, & bilis balsamo cognata, uti sunt myrrhata, absinthiaca, aloetica, colocynthiaca, & denique ipsum fel bubulum, promptè lumbricos fugant & pellunt.

Denique in ablactatis præter addiphagiam, fructuum horzorum elus vi fermentativa vel corrumpit lacticiam & pultacea, ita promptissime infantes ad lumbricos disponit. Talibus ergo occasionibus faciliè viva ista purredo excitari poterit. Diutius equidem lumbricis subinde astliguntur infantes sine notabili detrimento, us plurimum tamen pessima symptomata inducunt, ex quibus non raro periclitari contingit infantes. Quod si suspicio sit de eorum præsentia, mæurè ejiciendi & excludendi sunt.

C V R A.

In *Cura* eorumdem conveniunt omnia amara, quæ eos aut caecant, aut seu ipsis adversa fugant. Si propinentur enecantia, simul vel brevi post subjungenda sunt purgantia, eos expellentia. Nam licet semel enecati sint, sitamen adhuc hospitentur in corpore, ex eorum corruptione novi exsurgunt lumbrici.

Conveniunt ergo inter cetera mechoacanna, item paululum de jalappa: item syrupus florum persicorum admodum infusus lumbricis, si paulò robustior fuerit sætus: non est melius interficiens aut enecans lumbricos, quam species diaturbith cum rhabarbaro à gr. viii. x. usque ad xv. propinata: si non habentur, assumendus est *Mercurius dulcis*: e. g.

℞. *Mercurii dulc.*

*Sacch. an. gr. liij.*

*M. f. Pulvis: S.*

*Pulvis laxativus pro una vice.*

Detur in vehiculo liquido ex cochleari ligneo.

Commodissime autem cum conserva florum persicorum in forma boli, vel cum saccharo in rotulas redactus, usurpatur; metuenim est, ne in forma pulveris sub antiqua facie cochleari metallico adhaereat: v. g.

℞. *Conf. Rosar. Persic. vel quod melius, Conf. flor. Persic. (quæ tamen amaricat:)* ℞. 3℞. ad 3j.

*Mercurii dulc. gr. liij. iv. 3℞. vel gr. xv. ad xviiij. (pro ratione ætatis.)*

*Cum f. q. Syr. flor. Persic. f. Bolus. S.*

*Bolus laxativus contra lumbricos.*

℞. *Conf. flor. Persic. 3j.*

*Mercurii dulc. gr. xv.*

*M. f. Bolus infanti 3. annorum pro duabus vicibus.*

*D. S. ut antè.*

Ubi infans fuerit jam aliquot annorum, commodè etiam pro stimulo aliquot grana jalappæ addi possunt: nam jalappa etiam promptè pellit lumbricos: e. g.

℞. *Conf. flor. Persic. 3j.*

*Mercurii dulc. gr. xij.*

*Pulv. Jalapp gr. v.*

*Cum Syr. flor. Persic. f. Bolus pro duabus vicibus infanti 3. annorum.*

*D. S. ut supra.*

℞. *Mercurii dulc. gr. v.*

*Pulv. Jalapp gr. i.*

*Conf. Rosar. parum.*

*M. f. Bolus. S.*

*Bolus laxativus pro una vice.*

℞. *Conf. flor. Persic. 3j.*

*Mercurii dulc. 3j.*

*Spec. diaturb. cum Rhab. gr. v.*

*Cum Syr. flor. Persic. f. Bolus. S.*

*Bolus contra vermes.*

Iuratus enim lumbricorum hostis est *Mercurius*, si cum saccharo, quod succum singularem vocat *SCHROEDERUS* in *Pharm. lib. 3. cap. 15. pag. 398.* subigat probe tamdiu in mortario vitreo, donec pulvis gryle emerget, qui pulvis aliàs notus est sub nomine *pulveris a. vermes D. Michaelis*, à 3j. ad 3℞. certum experimentum in cochleari ligneo, promptissime vermes enecat & expellit.

Vel

℞. *Conf. flor. Persic. vel Rosar. 3j. ad 3℞.*

*Pulvis Mercurial. sacchar. gr. xij. xv. 3j. ad 3℞.*

Misc. pro una vel duabus vicibus:

*D. S. ut antè.*

℞. *Conf. Rosar. 3j.*

*Pulv. Mercurial. sacchar. 3℞.*

*Ol. destill. spicæ gr. iij.*

*Cum Syr. flor. Persic. f. Bolus:*

*D. S. ut antè.*

Vid. *HORSTIUS* obs. pag. 449.

Etiam aqua *Mercurialis Hermetica*, quam vocant, vel *anthelmintica Helmontii*, seu quæ fit ex infusione Mercurii vivi, eiusque agitatione aut ebullitione, certum est experimentum ad lumbricos: Nempè recipiatur 3j. *Mercurii vivi bene purgati*, aut, quod melius est, ex laboribus *Mercurialibus resuscitati*: (vocatur aliàs reuiuificatus:) infund. in 3℞. aquæ simpl. vel radicis graminis, vel hyperici (nam hæc etiam sunt inimici lumbricis) & probe agitantur invicem in lagenâ vitrea, vel decoquantur: Reponitur hæc Mixture, ut *Mercurius* omnis fundum petat, & aqua superflua contagio *Mercurii* infecta clarescat: quæ aqua est certissimum experimentum ad enecandos & fugandos lumbricos. Vocatur ab *HORATIO Augenio Aqua Hermetica*, quæ filtrata cochlearim datur.

Præter dicta ulterius lumbricos enecant & pellunt omnia cornu Cerui usum, & ex cornu Cerui parata, quælibet ex marte; hinc absinthium, hypericon, corallina, eiusque pulvis, zedoaria, scordium; pulvis item summatum & seministenaceti, gentianæ pulvis cum cornu Cerui sine igne & tantillo myrrhæ, jurato lumbricorum hoste; velque presentaneam magis fert opem, tindura salutaris, aloë & similia amaricantia: sal polatile & spiritus cornu Cerui probe essentificatus, vel sale volatili proprio atuatus, adeoque & polychrestus liquor cornu Cerui succinatus; hic enim promptè lumbricos pellit, & commodè usurpatur, ubi simul imminet epilepticæ convulsionis cum lumbricis.

Ex his aut similibus parantur Essentia composita contra vermes, qualem habet *SCHARFFIUS* in *Descript. Insuperi. Aqua destillata raphan. rusticani*, de qua vid. *M. A. N. C. Ann. 6. & 7. observ. 187.* ubi ob acrimoniâ cum aliis mixta & propinata 11. vermes, moruum convulsivorum auctores, exturbavit. Aliàs Decoctum radicis filicis in lacte infantibus propinatum, tanquam certissimum commendatur contra vermes. *Crocus martis* ex uirgiolo præcipitatus huc quoque pertinet: e. g.

℞. *Croc. Martis per præcipitat. 3j.*

*Sem. tanacet. 3j.*

*Pulv. Zedoar. 3j.*

*Cum f. q. Sacchari,*

*F. Rotule.*

Certissimum experimentum etiam pro adultis est Precipitatum Veneris, quod & *TIMÆUS Von Guldenkle*, tanquam arcanum, & *ZWELFFERUS* tanquam expertum ad lumbricos commendat: Nempè utriusque Veneris affundit phlegma vitrioli Veneris acuatam cum paucis spiritu proprio, ut in hoc liquore solvatur vitriolum & solutio filtrata præcipitatur cum oleo tartari per deliquium; sic acquiritur pulvis, vel cæruleus, vel exactè viridis, qui optimè edulcoratus ad gr. v. vel vj. pro ratione ætatis in vehiculo convenienti propinatus, in infantibus promptissime pellit lumbricos, qui & in adultis eisdem certè fugat.

Ubi non amplius lactantur infantes, optima sunt remedia spiritus sulphuris, seu, quod melius est, spiritus vitrioli, ut in radice conveniunt; si nempè quicunque potius, & aqua appropriata hyperici, portulacæ, radicis graminis, aut etiam saltem aqua communis acidulata, præscriptis spiritibus sulphuris vel vitrioli modicè, de qua interdum pro lubitu hauriat infans, misum est, quam promptè pellat lumbricos, eosque fugat.

Cum his interne assumptis vermepallentibus simul per Clysteres semper injiciantur dulcia, quæ lumbricis sunt amica, & deorsum versus ad se alliciunt; qualia sunt clysteres ex lacte vaccino vel muliebri ad 3j. vel liij. cum sufficiente quantitate sacchari pro ratione ætatis infantis; aut ex decocto passularum cum saccharo, aut ex decocto caricarum aut similibus, quorum dulcedine allecti lumbrici, dum fugunt per os assumpta hostilia, in fugam versi facilis ita ejiciuntur; aut saltem aqua saccharo imprægnata loco clysmatis injicitur.

Externè simul umbilico applicetur Linimentum sequens, domesticum quidem, sed certum, cujus aliquoties felicem vidi successum:

℞. *Aloes*



24. Aloes ℥ij.  
Myrrha ℥ss.

Cum felle Tauri f. Linimentum:

D. S.

Linimentum contra vermes.

Cum oleo colocynthidos acutum indetur frusto vesicæ bubulæ vel suillæ quantitate palmæ seu parvæ manus, & ita applicetur umbilico, & quamdiu adhæret, ferineatur; sic namque faciliè halitu suo lumbricos fugat: Quodsi adhuc lumbrici, fortiter adhæret, nec prius cadere solet, quod certissimum est, & ipse vidi, nisi enecati & fugati fuerint lumbrici, quo tempore spontè cadit: Quodsi verò applicatum non adhæreat, est signum non improbabile, non adesse lumbricos.

Præterea etiam oleum absinthii, oleum diacolocynthidos, oleum nucleorum persicorum expressum, unguentum contra vermes Augustanorum, unguentum de arthanita, & similia Linimenta, umbilici regioni illinantur.

Vel

24. Ungu. de Arthan. ℥ij.  
Fellis tauri inspiss. ℥j.  
Ol. diacoloc. Querc. q. s.  
Destill. Absinth. gutt. vi.  
M. f. l. a. Linimentum:

D. S. ut antè.

Quod si stricte adhæret, certò adfunt lumbrici. Quibusdam in usu est, applicare etiam Theriacam cum succo vel oleo absinthii aut rutæ.

Vel

24. Aquæ Absinth. ℞j.  
in qua dissolv.  
Aloes ℥ij.  
Misc.

probatè terendo & subigendo.

Valet contra vermes, corpora puerorum in balneo frigando.

## ARTICULUS XXII.

D E

### VERME UMBILICALI.

**S**ed præter hos lumbricos in intestinis infantum stabulantes, notabilis est *Vermis umbilici*, quem vocant Germani *den Nabelwurm*, *den Zehrwurm*, *den Geitzwurm*; de quo vid. pauca in specie in SENNERTO lib. 3. Prax. P. 10. de Morb. Abdominis cap. 4. pag. 984. Affectus est rarissimus; nullus enim Autorum de tali verme umbilicali habet aliquid: veritas tamen horum etiam observata fuit à D. Michaëlis, qui etiam methodo mox recensenda eosdem fugavit.

### D I A G N O S I S.

In tali casu infantes cum nutrice optima, optimè sugentes licet, successivè emaciantur, labia pallent, sunt quasi *cerulei coloris*, & deficiunt à nativo calore, inquieti sunt, & quasi tormina ventris patiuntur, interdum se jactitant.

Signa alia manifesta sunt nulla hujus vermis umbilicalis.

### C U R A.

Quoad CURAM: ubi adest suspicio talis vermis, applicetur fundulus umbilico sub introitu lecti; quem depascit vermis, idque bis vel ter repetitur, imponendo novum fundulum, ut simus certi de præsentia hujus vermis umbilicalis; postmodum applicetur puramen nucis juglandis internum, idque durius, excavatum, pulveris vitri Veneti & sabinae cum sufficienti quantitate mellis repletum; hoc modo dulcedine mellis allectus vermis cum sabina & pulvere vitri postmodum enecatur, ut extrahi queat. Dum ergo apparet, nil absumi ex mistura vel juglandis insita, tunc appropriata purgantia usurpentur, ut vermis enecatus quacunq; via evacuetur.

## ARTICULUS XXIII.

D E

### T U S S I.

**I**nfantes ulterius subinde *Tussi* & affectibus catarrhalibus laborare solent, circa quàm infantum tussim melioris doctrinæ gratia ante omnia observanda venit differentia. Tussis, vel *humida*, vel *sicca*; item vel *stomachalis*, vel *peccoralis*. Tussis *sicca* est, quando solummodo est absque materiæ excretionem, & hæc est apud infantes rarior, nisi quod sæpius soleat esse prodromus variolarum. Tussis verò *humida* seu cum materiæ excretionem est, quando rejiciuntur aut saltem rejectibilia deglutuntur, postmodum viscida, mucilaginosa & pituitosa, ut vocant.

Hoc præsupposito, *Tussis* ista *sicca* *peccoralis* est à lymphâ nimis acida, vellicante fauces & membranâ eas subcingentem; in specie istam quæ cingit interioris laryngem asperamque arteriam, de qua lymphâ jam alio loco plura dicta fuerunt. Aliàs omnis *tussis* infantum est *humida*. Par ratio est circa tussim istam, quæ sub dentitionis tempore frequenter oritur, ut supra insinuatum fuit, cui successivè propter copiosioris salivæ subinde salso-acrioris defluxum in stomachum, & imprimis membranas pituitarias copiosam lympham plorantes, & per gulam in ventriculum dimittentes, & inde defectuosam redditam digestionem primam & coarctatas cruditates, etiam Tussis *stomachalis* *humida* supervenire solet tandem. Item aëris inclementioris afflatus liberiorque inspiratus suo modo infantes subinde ad tussim siccam *peccoralem* disponit, ex lymphâ nempe ab aere copiosius effusione, quæ tandem evadit *humida* ex successiva, mucigenatione cum stertore affligens. Pertinet huc *tussis* *puerorum convulsiva*, de qua WILLIS. in Pharm. Rat. Part. 2. sect. 1. cap. 6. pag. 101.

Sed frequentior est *tussis* *infantum serena*, seu quibusdam *subunda* dicta, in qua infantes multumac diu tussunt, & quæ subinde tanta violentia repetens vix sisti potest, nisi spontaneus tandem supervenerit vomitus copiosiusque mucil rejectio, post quem vomitus cessat tussis ad tempus, donec reuertatur post dimidium diem præter propter similes ferè tussendi paroxysmus, similis vomitu claudendus. Talis ordinari ex ventriculo esse solet. Oritur hæc ipsa ordinariò vel ex addiphagia infantum seu copiosiore pultaceorum ingestione, vel lactis acrioris & serosioris crebriore haustu, vel ejusdem in stomacho corruptione, & acrimonia singulari ventriculum vellicante: quæ duo nimia copia cum imparia fiant fermento stomachi digestivo ex defectu concoctionis, degenerant in liquamina viscida, crassa & mucilaginosa, quæ ipsa nunc flatuum subministrant materiam, unde difficilis respiratio, quamdiu supini jacent infantes, aut etiam hæc pituitosa acida aut salso: acida in stomachi cavo magis fluctuantia, successivè irritando orificium stomachi sinistrum, & cum hoc arctè connexum diaphragma, tussim pertinacem, & primo quidem inanem hinc cum rejectione mucilaginis viscida conjunctam inferunt; sicut in ablactatis frequentior hæc tussis ex mucil viscido, utut paucò, orificium inferius obfidente, oriri solet: vel infensâ & molesta sui præsentia; vel saltem halitibus acrioribus, excitant sub expiratione per consensum vellicati diaphragmatis, & ipsi compatiuntur musculorum thoracis expirationi inferuentium, horum convulsivos motus, unde tussis sæpius repetentes tenella pectora concutunt.

Idem sentiendum est de *Asthmate* infantum, quod ut plurimum etiam ex stomacho onerato oritur, propter cruditates acidas mucilaginosas coarctatas, quæ si turgescant, & in flatu, abeant, fermentando in tantum diaphragmatis deorsum versus impeditur contractio, ut molestus talis asthmaticus paroxysmus imminet; hinc enim etiam provocato vomitu statim liberantur, Autore PRIMEROSIO de Pueror. Morb. pag. 73. Unde in tali infantum tussi semper ad stomachum erit respiciendum.

### D I A G N O S I S.

Affectus per se patet: an sit *sicca* vel *humida* & etiam est in propatulo.

In specie, quando est *sicca* *tussis*, conjuncta solet esse stertutatio, conjuncta solet esse involuntaria oculorum illachry-



chrymatio, & qui sunt similes affectus ex lymphâ paulo acidiori oriundi.

*Tussis humida* ex eo luculenta est, quod cum stertore quodam respirare soleant infantes, item quod tussiendo materiam rejiciant, aut resolutam denique deglutiant.

Subinde etiam *inflatio* quadam in præcordiis, & quædam ibidem locorum intumescencia adesse solet; *Venter enim* ipsis solet *intumescere*; & quæ sunt similia tussim satis manifestantia signa.

### PROGNOSIS.

Non negligenda est tussis in infantibus, quia præter vigilias & vomitus etiam hernias, suffocationes &c. inducere solet.

### CURA.

Si prodromus est variolarum tussis, vix curari solet, cum sponte postmodum cesser, imprimis autem tussis humida sub curam Medici cadit. In tussis enim cura, uti etiam in cura asthmatis infantilis semper supra insinuata observanda venit differentia. In genere tamen tussis infantum inveterata, humida quælibet, & hinc illa, quæ ex stomacho, præ cæteris tussis speciebus furibunda, vix curari poterit absque vomitu; quouno, apte, si opus fuerit, repetito, plus præstare possumus, quam pluribus aliis remediis, diu licet continuatis; hinc nisi sponte superveniat vomitus, arte provocandus est: quo facto, vel sponte remittunt dicta paræmata.

Provocatur facili in infantibus, si digito oleo illito irriteretur fauces, aut etiam si penna similiter oleo tinta faucibus intrudatur; si namque infantes alia facili vomiturientes ad vomitum stimulantur, & subvenit vomitustam in tussi, quàm in difficili respiratione, asthmate infantum & similibus admodum utilis.

Vel

℞. *Aqua hyssopi* ℥℥.  
*Oxyssach. emer. A. Sala* ℥j.  
M. S.

*Succus emeticus.*

Ubi per inferiora volumus evacuare, mechoacanng pulvis adhibetur utilissimè, habitâ ratione ætatis pro ratione dosæ.

In *Tussi* ergo contumaci *Sicca* pectorali capius nocturna, aut larynge potius affecta, & à lymphâ aciore, vel ære inclementiore irritata, convenit imprimis loch ex passulis cum mucilagine seminis lini aut cydoniorum permissum; est enim blandum temperans. In tali etiam tussi mulierum euporiston est ex *C R A T O N I S*, trium Imperatorum Archiatri, experientia ipsis compertum, jusculum raparum, in specie *siccæ cum saccharo*, quod crebrius infantibus propinatum *tussim catarrhalem* sistit: item succus raparum, &c. Adultioribus paulo decoctum radicis helenii cum uvis Corinthiacis in vino Malvatico, paucis additis saccharo, ut fiat quasi syrupus, ad levandam tussim mirè conducit. Syrupus diacodium egregius est, uti & succinum & succinata, succinum catarrhale, species diatragacanthi, pulvis contra tussim infantum *Mysichti*, item flores sulphuris cum saccharo paucis mixti; temperant enim acrimoniam lymphæ. *Sperma ceti* annuo ad ℥℥. quacunque ratione, commodissimè in cerevisia calida, vel in jusculo aut cum lacte probè calido propinatum, aliove simili calido vehiculo; item syrupus de jujubis, de scabiosa, de glycyrrhiza, &c. quibus & *spiritus salis ammoniaci anisatus* pro lubitu addi potest, qui infantibus est egregius; & insigni meritis extollendus encomio: etiam ubi *Difficilior Dentitio* talem *Tussim*, quod interdum contingit, infantibus excitaverit, quo in casu vomitorium interdum præmittendum erit. Præ cæteris tamen liquor cornu Cervi succinatus, supra pluribus laudatus, nunquam omittendus est; in *Affectibus Catarrhalibus* quibuscunque, infantum præcipue, & inde in *tussi sicca* primum meretur locum. Pinguedo itidem caponis in jure pisorum liquefacta & propinata, mirè commendatur.

Et hæc Incrassantia dicta in quavis tussis infantum sicca, tam pectorali quàm stomachali, locum inveniunt. Nostrates mulieres in tali tussi infantibus ablatatis non absque successu propinant caricas pingues, in minutas particulas coactas, in spiritu vini maceratas, deslagrando; caricas relictas propinant, vesperi scilicet cum successu.

**FORESTUS** asserit, infantem tussis laborantem curari per mures coctos, esitatos, manducatos prius à nutrice, & in os infantis inditos.

Quoad *Externa*: præ cæteris in tali *Tussi sicca* in usu est lotio pedum in cerevisia calida; qua peractâ pinguedo oculi piscis recens, vel logo hujus sebum hircinum, aut medulla cervina, liquefacta in cochleari, & plantis pedum inuncta, contra hanc tussim optime prodest, in specie si misceatur cum oleo laurino. Linimentum ex pinguedine caponis cum capitibus alliorum factum, ceu notum, hic præsuppono. Item si ex catarrhali fuerit vitio, suffusus ex succino, thure, gummi juniperino, &c. bombace exceptus, capiti imponitur scilicet cum successu; vel cerorum pro bregmate usitatum, cum tacamahaca mistum, oleo destillato majoranz irroratum, capiti imponitur.

In *Tussi convulsiva* convenit liquor cornu Cervi succinatus, essentia castorei, & remedia à **WILLISIO** l. a. commendata: Vel

℞. *Aqua senic.*

*Hyssopi an.* ℥vj.

*Spir. sal. ammoniac. lavendul.*

*Succin an.* gr. xx.

*Syr. papav. simpl.* ℥℥.

M. D. S.

*Tussim sedans potio.*

℞. *Ess. castor. vinos* ℥j.

*Spir. sal. ammoniac. succin.* ℥℥.

M. D. S.

*Tussim sedans Essentia.*

Quod si tussis fuerit humida, atque juncta copioso mucos acido viscido, præter vomitum incidentia & attenuantia conveniunt: quæ inter primatum ducit spiritus salis ammoniaci anisatus: Item syrupus de nicotiana ritè paratus perquam egregius est in incidendo & attenuando mucos & libidinis infantibus à suffocatione: Hinc syrupus de hyssopo item de scabiosa, vel syrupus de erysimo &c. qui propinari possunt in aqua hyssopi, in aqua scabiosæ, vel menthæ, ac similibus.

Vel

℞. *Syr. Nicotian.*

*Hyssopi an.* ℥ij.

*Emet.* ℥j.

M. S.

*Succus emolliens.*

Resolvit mucum, & vomitum blandè movet.

*Succus* item raphani recens cum saccharo depurato temperatus, ingratus licet, efficacissimus tamen est: vel, qui melior & temperatior, non minus tamen potens est, qui ex raphano excavato & saccharo repleto in frigido per deliquium, aut ex raphano in taleolas inciso, saccharoque largiter insperso, destillat, aut intra duos orbiculos stanneos exprimitur, succus est egregius pro resolvendo mucos stomachi, tussim & asthma inferente. Item succus feniculi, mistus cum lacte & propinatus, non parum levat infantum tussim. Convenit etiam ad mucilagines stomachi resolvendas sperma ceti, si hoc in pauca quantitate pro ratione ætatis in lacte calido propinetur infanti; resolvit enim insigniter mucilagines stomachi. Elensacchara feniculi & anisi optime conducunt, si lambenda præbeantur infantibus: Hinc pulvis radicis Ireos, radicis aronis, liquor cornu Cervi succinatus, pulvis contra tussim infantum *Mysichti*, &c. V. g. Infans 12. septimanarum tussi humida cum copioso mucos & bronchia infarciens, periculosè ob suffocationis metum infestabatur:

℞. *Aqua Menth.* ℥ij.

*Syr. emer. Sala* ℥j.

M. f. Porioncula;

Quæ cochlearim propinabatur, donec sequeretur vomitus: sed parum operabatur: Hinc

℞. *Aqua Hist.* ℥ij.

*Syr. Nicot.* ℥vj.

*Spir. sal. ammoniac. anis.* ℥j.

Misc.

Quatuor vel quinque horas ab illo priori remedio porrigere incipiebant, hinc tandem per repetitos supervenientes vomitus admodum mucilaginosos, & serosos secessus beneficio suppositorii, infans levabatur. Mirabar vomitorii dosin in infante unius anni & amplius, sufficientis minus ex se ipso vomitum suscitasse: sed partim copia mucos, partim usus lactis, remedii vim obtundebat.

Item in tussi sicca:

℞. *Rob.*



℞. Rob. Paspul.

Syr. Papav. alb. an. ℥℥.

Misc.

Interdum addebantur

Lapill. cancr. præp.

Flor. sulphuris an. gr. xv.

Misc.

ropinabatur infanti sæpius.

Item decoctum raparum flaccidarum cum passulis & ficibus bene confert.

In tussis sicca pro puero tertium annorum:

℞. Aqua Scabios. ℥ij.

Spir. sal. ammoniac. anis. ℥℥.

Syr. diacod. ℥ij. ad ℥℥.

M. D. S.

Potiuscula contra tussim.

In asthma infantum, vinum infusionis millepedum est optimum, auctore HERTODT in Croch. pag. 129.

Externè oleum chamomillæ & amygdalarum dulcium pectori illitum convenit.

Puer ingendus novem vel decem annorum, macilentus corpore, facie tamen plenâ, paulo tamen pallidiore ornatus, laborabat catarrho suffocativo ex vitio lymphæ in arteria aspera; subinde enim subito solebat, nocturno tempore somno alto oppressus, in respirationem difficillimam incurrere, ita ut cum stertore seu fonitu (adstantes dicebant, *sibildt*) spiritum ducendo exasperatus omni momento suffocandus videretur, facie sub angustis illis intumescente, & ex rubro cærulecente cum extremorum refrigeratione: tussis crebra accedebat, sed difficillima & inanis, cuius impetu nil præterquam aqua tenuis, eaque non copiosa, excernebatur; sic pedetentim paroxysmus remittebat, febre aliquot dierum lentâ superstita, ipse verdæger, cum facie sub tumida raucus remanebat, & continuò tussiebat. Tandem, præterlapsis duabus vel tribus diebus, materiam viscidam copiosam rejiciebat, quo facto totius morbi cursus absolvitur. Idem paroxysmus redibat crebrius, ut plurimum omni menstruo spatio semel, idque tempore præsertim autumnali & hyberno: Interrogatus, quid sub paroxysmo patiatur? de respirationis difficultate, & in larynge titillatione, conquererebatur: Interdum præcedebat dolor capitis, colli aut partium vicinarum, ipse æger etiam subinde dolori & tumori tonsillarum obnoxius erat. Occasionem paroxysmi redeuntis suggerebat nunc auræ frigidæ susceptio, nunc progressio corporis motu & exercitio, aliqualis extremorum refrigeratio.

Curavi hunc puerum sequenti modo: In Paroxysmo, qui repente affligebat puerum, mox verticem inunxi oleo destillato succini, brachio verdè applicare jubebam striduras fortes: nam si ætatis fuisset consistentis, venam aperire necesse fuisset.

Cum his misturam sequentem ordinavi:

℞. Aqua Scabios. ℥ij.

Asthmat. Rud. ℥℥.

Syr. diacod. Mont. ℥vj. ad ℥j.

Misc.

Ubi lymphæ vitium magis urgebat, pro sudore procurando

℞. Aqua Scabios. ℥ij.

Spir. sal. ammoniac. anis. ℥ij.

Syr. Papav. alb. ℥vj.

Misc. pro Potiuscula.

Capiebat cochleatim in principio paroxysmi, ad respirationem facilitandam, quod saltem poteram facere, sensum vellicationis sistendo, & lymphæ acrimoniam temperando.

In incremento

℞. Aqua Scabios.

Serpill. an. ℥ij.

Asthmat. ℥vj.

Flor. sulphuris. ℥. ad ℥ij.

Syr. vel scabios. vel Violæ. vel papav. vel de.

Inimb. ℥vj. ad ℥j.

M. f. Potio.

Hæc probè agitata crebriusque assumpta tussim minuebatur, & materię copiosioris proventui præveniebatur: Nam & irritantem causam in faucibus demulcebam, & sensum irritationis sistebam, unde lymphæ effluxus copiosior præcevebatur.

Post in statu, cum mucus excerneretur, sufficiebat suetus raphani cum paucis saccharo expressus.

Quod adhuc febricula lentè restabat, sudore blando per liquorem cornu Cervi succinatum, vel spiritum salis ammoniaci oleosum, vel per blanda diuretica, præsertim ex succino, vel ex lumbricis, removebam.

Præservationis gratiæ extra paroxysmum plura tentabam, semper tamen voracitas pueri & vita sedentaria obitabat, egregiè erat somnolentus, &c. qui cum habitu corporis ferociore ostendebant, à priori succurri non posse; unde inurebatur fonticulus brachio sinistro, & sic levabatur. Fonticulus tam ubertim fluxbat, ut mane & vesperi mundandus esset.

## ARTICULUS XXIV.

### DE

## OBSTRUCTIONE NARIIUM IN INFANTIBUS.

**H**Ac occasione etiam moneo, fieri non raro, ut nares infantum in summitate narium sint obstructæ ac infarctæ mucro crasso, quem ut resolvamus, optimum est auxilium sequens:

℞. Vitrioli albi gr. jv. ad v.

Aqua Maior.

Cerâs. nigr. an. ℥℥.

Misce & filtra.

Filteratura detur, de qua cum linteolis naribus incedatur.

Extra, nares supremæ inungatur butyro sine sale, vel oleo amygdalarum dulcium, cum aliquot guttis olei majoranæ destillati misto: hoc enim aut externè illitum summitati narium, aut labris narium externè applicatum, resolvit sordes & denuo respirationem per nares liberam reddit: vel naribus butyrum non salitum pili magitudine indatur.

## ARTICULUS XXV.

### DE

## CRUSTA LACTEA, SEU ACHORIBUS FAUIS ET TINEIS.

**P**orro Lactationis tempore frequenter Infantes affligunt exanthemata faciei & capitis, seu pustulæ & ulcuscula, quæ cutim faciei, hinc superficiem capitis pilosam, interdum etiam quodammodo universam cutim, in crustant. Vocantur aliâs hæc ipsa ulcuscula & pustulæ *Crusta Lactea* seu *Lactumina*, Germanis *der Ansprung*, Græcis *ἀχόρις*, quæsi profundius eroderint cutim, *Favi* appellantur. Post ablactationem autem simile vitium capitis partem pilosam affligit, quæ *Tinea* dicitur, Germanis *der bosc Grund*. *Lactumina* sunt pustulæ prurientes robre, quæ successivè suppurantur, hinc exulcerantur, & nunc exsiccando in crustas abeunt, quibus deciduis subindè de novo propululant, nunc post exulcerationem ulcera manantia, plus minus sordida, supermanent. Occupat malum hoc ordinariò faciem, hinc ad caput etiam subindè se extendit; interdum etiam brachia, crura, ipsumque corpus hinc inde plus minus affligit. Tinea verdè caput saltim occupat, pruritu imprimis incipit, hinc surfutes copiosi detidant, donec pustulæ hinc inde erumpant, quæ suppurantur & exulcerantur, & nunc saltim in crustas vel squamas siccas abeunt, nunc verdè ulcera manantia & copiosas sordes plorantia inferunt. Uno nomine: sunt hæc mala nil aliud, quàm scabiei quædam species, infantibus magis propria. Crusta lactea quidem, sive infantes lactentes infestet, sive post lactationem denuo se manifestet, serè ex acido vitiosa lactis non dissolubili & resoluibili per poros corporis oritur; à quo acido nutrimentum partium cutanearum inficitur, unde pustulæ, pruritus, exulcerationes, non secus ac in variolis aut scabie humida vel sicca oriri solet. Tinea verdè, quæ interdum plures annos post ablactationem demum infantes affligit, oritur ex simili vitioso acido, intra corporis coram coercito, ex massa sanguinea tamen & lymphæ secretæ, & ad partes intercutaneas beneficio sanguinis circuli deposito; unde semper serè tumores glandularum in collo pone aures & pone cervicem comitari solent tinea. Si enim cum sanguine & lymphæ plus minus acida, acri & viscida, nutrimentum exinde pro augmento & sustentatione partium confectum has ipsas subin-



træ, nullo modo illis perfecte assimilari potest; sed potius volatili acore, antea quidem apparenter occultato, & aliquantulum visciditate ipsius inimica, hinc inde in pustulas extollitur, in quibus acor denuo successivè manifestatus, cum vicinis partium succis acridis effervescebat: hinc altior tumor, intensior rubor & ardor supervenit, donec mutua temperatura nunc in pus, nunc in sanie, nunc aliud simile liquamen abeat, & per pruritum in pustulas vel alio modo exeat, relicto adhuc post se fermento subtili acido viscido, quod etiam aliud inculpatæ notæ alimentum inquinat, istudque in similes sordes transmutat, & consequenter dicta mala magis magisque propagat; hinc etiam adjacentes partes è dictis pustulis pruritu & ardore inquinantur, unde Favi, Tineæ, Crusta lactea, uti etiam Furunculæ infantum, primitus enascuntur. Quæ ed facilius eventunt, eoque pertinaciores radices fiunt, quod minus transpirabiles sunt partes ita affectæ, & quod magis poris earum clausis dicta excernenda successivè congeruntur.

Facta modò lymphæ præternaturaliter acidæ ac viscidæ, istæ crustæ lacteæ mentio, uberiorem sui explicationem urget. Nam dictæ corporis, & imprimis capitis ac faciei, defecationes pustulosæ, crustosæ, ulcerosæ &c. quæ crustæ lactem, achorum, & tineæ nomine venire solent, quarum descriptiones & differentiæ saltem accidentales vid. apud Practicos, revera ex lymphæ nimis seu præternaturaliter acidæ, & plus minus simul viscidæ originem ducunt; lacte vel matris in utero sub gestatione foetus, vel nutritricis extra uterum sub ejus lactatione vitioso, causæ remotæ vices gerente: semper etiam ferè cum hisce affectibus externis glandularum in collo & capite densè constitutarum, item parotidum, &c. tumores conjuncti esse solent, quos vocant Germ. Haupt-Drusen; ita quidem, ut vel præcedant, aut simul assurgant, vel hos affectus declinantes subsequantur. Ordinariò autem rarissimè observatur, quod insequantur, & si sit, vel metus recidivæ, vel mutatio defecationis dictæ in peiores affectus insinuat: istud prius frequens nempe est, ut hos affectus comitentur, ut hinc etiam mulieres per experientiam edocet ex conditione distorum tumorum quasi scrophulorum, & quos ordinariè Germ. Haupt-Drusen appellare solent, affectuum horum vel magnitudinem vel diuturnitatem, aliasve circumstantias, probabiliter soleant hariolari. Certe observavi in infante quinque mensium tumores tales glandularum in collo prope aures ad ovi parvi gallinacæ magnitudinem cum castrata lactea caput obducente, quæ evanescente dicti tumoris etiam evanuerunt, & tandem lactumina illa denuo efflorescebant. Iam verò non amplius dubitatur, glandularum functiones versari circa lymphæ præparationem & distributionem: unde spontè patet, si lymphæ vitium primum subesse, ita quidem, ut ab ejus consistentia materiali obsistantur glandulæ, & inde consequenter intumescant, ab ejus verò acido largius in partes intercutaneas capitis extimas effuso, ex denegatâ plus minus debita distributione & motu per glandulas, pruritus intensissimus in dictis locis cum pustulis rubris pedetentim albicantibus, & in pus abeuntibus, & squamis insequentibus ac furfuribus, ex cutis & cuticulæ erosionibus superveniant: quæ omnia, ut pruritus, purulenta sanies, crusta & squamæ, ab acri salio plus minus acido agente, tanquam causa peccante, manifestè fiunt, ut alio loco & ab aliis probatum est. Imo hujusmodi crusta, tineæ capitis, & horum acor vitiosusque ed seipit, ut etiam ossa cranii erodant, & eaque cariola reddat, pro more acidorum, osses substantias faciliè erodentium; de quo vid. SENNERTUS lib. de Morb. Infantum Part. 2. cap. 3. pag. 281. id quod fit imprimis, quando nutritrix contagio Gallico non nihil inquinata lactaverit infantem. Hinc & capitis partes exteriores præ reliquis locis magis infestantur his affectibus propter copiosiores glandulas, quibus caput hinc inde, speciatim collum, stipatum est.

Differentia autem hæc inter capitis defecationes observatur, quod materia peccans, prout est nunc acrior, aut acidior & tenuior, soleat inter se ulcuscula minuantia, & copiosam acrem sanie fundentia: Sed quatenus eadem est minus acris, sed ferè magis temperata & viscida extiterit, tunc crustæ crassiores & densè subinde compactæ, & sibi invicem superstratæ, induci solent, successivè decedentes: imò etiam pro lymphæ ita peccantis ratione varia glandularum quoque observatur constitutio, de quo uberior experientia adhuc consulenda venit. Et sanè non levis est cognatio horum lactuminum cum adultorum scabie: nam & subinde contagiosa sunt, & mediantibus linteamini-

in alios etiam infantes propagantur: unde lisdem ferè remediis, in specie nicotiana, sulphure, mercurio, &c. quibus adultorum pertinax & serena scabies curatur, etiam curari possunt; & retropulsa, ut vocant, varia plane inferunt symptomata, ita ut quasi particularis capitis sit scabies. Equidem vulgi fert persuasio, salubres esse infantibus defecationes, quatenus præservent eos à gravioribus affectibus: quod negari suo modo nequit, quatenus sunt bonum signum. Sed malæ causæ, quæ si abesset, magis conducere.

Quæ hætenus sunt exposita, videtur confirmare, dum observavi in puerulo novem mensium præterpropter, vitio nutritricis cacoehymico scorbuticæ insigniter dicta crusta lactea super cranii hemispherium & faciem ferè integram mirè deformato: quæ cum spontè evanisset, successit gravissima tussis, tenellum pectus insigniter & continuè quatiens, cum copiosi muci in stomacho & œsophago præsentia, una cum diarrhœa serosa adeo acri, uti etiam extrema podicis & vicina loca excoriarentur: totum corpusculum insigni æstu fervebat, et insultus quidam epileptici subinde istud convellebant. Factem hic fuisse arbitror lymphæ peccantis metastasin, præter alia loca in specie ad glandulas salivales, & quæ laryngem irrorant, ut & ad pancreaticas, per quas lymphæ ista acida acris, non adeo viscida, uberius effusa speciatim dictam tussim & diarrhœam, alia ut transeant symptomata, induxerunt. Dicta modò etiam rationem aurium humiditatis fluentis, exoriationis & exulcerationis, item labiorum, manifestam reddunt.

## DIAGNOSIS.

Signa horum achorum, tineæ & favorum, sunt manifesta per se.

## PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Omnes hi affectus bonum equidem sunt signum malæ causæ: Bonum signum, quod non tam inquinens massam sanguineam, sed potius in partibus intercutaneis defixi hæreant: Malæ causæ; innunt enim acidum vitiosum, quod massam sanguineam inquinavit, & hinc expulsionem sua ista ulcuscula interdum periculosa excitat. Ostendunt nempe secretionem acidi vitiosi ad partes intercutaneas, sed à quo ipso, nutrimentum proximum dictarum partium insciente, affectus diuturnitas, & per contagium multiplicabilitas oriuntur. Subinde tamen horum affectuum medio ab aliis gravioribus malis, in specie epileptici præservantur & liberantur infantes; sicuti retropulsis his ipsis pustulis, aut exsiccatis subito ulcusculis (id quod sæpius fit occasione supervenientium dolorum dentitionis) multa mala, in specie febris lymphatica plus minus lenta, convulsionis, diarrhœæ, tussis pectorales diuturnæ, & similia superveniunt.

Spontè naturæ subinde sanantur: interim tamen si diuturniora seu contumaciora fuerint hæc ulcera saniosa, interdum in ulcera maligna & depascentia degenerant.

## CURA.

In Cura ergo dyscrasia contentorum corporis corrigenda & evacuanda, acidum intercutaneum fermentativum corrigendum, blanda diaphoresi ad partes ambientes beneficio sudoris est promovendum, & hinc nata mala ad motus externos removenda.

Internè ergo conveniunt medicamenta ex sumaria, syrupus ex sumaria simplex & compositus, essentia de sumaria simplex & composita, essentia cardui benedicti, essentia helonii, essentia lignorum composita, tinctura coralliorum, sassafrata, item remedia ex sambuco, rob sambuci, aqua, spiritus & essentia ex floribus & rob sambuci parata; item aqua betule, liquor cornu Cervi succinatus, cornu Cervi sine igne, omnia ex cornu Cervi parata diaphoretica, imprimis utilia sunt, item quilibet viperina, essentia viperarum, earumque pulvis & sal volatile. In adultoribus infantibus, quatuor vel quinque annorum, una alterave gutta olei destillati viperarum foetidi miram vim sudorem pellendi, & hujus medio hos affectus curandi, obtinet: E. g.

2℥. Cornu Cervi sine igne gr. xxiv.

Antimonij diaph. gr. xvj.

Sal. vol. cornu Cervi gr. jv.

Theriac. gr. xliij. M. f. Pulvis: S.

Pul.



*Pulvis sanguinem purificans ad quietem.*

Decoctum florum acacie cum radice helenii est elegantissimum laxativum & alterativum; specificari potest cum sumaria. Quælibet alcalia, vel salia volatilia sæpè laudata, essentia myrrhæ, vel lapilli cancrorum, aut cornu cervi sine igne, aut antimonium diaphoreticum cum pulvere myrrhæ propinata & sæpius repetita, curationem horum ulcusculorum mirè faciunt. Convenit etiam cinnabaris antimonii, & tinctura antimonii ex scoriiis supra laudata, crebrius guttatim exhibendo, ut destruat acidum primum miasm, quod subinde nutrimentum solet inquinare. V. g.

℞. Tinctura antimonii,  
Tartari an. ℥iſſ.  
M. D. S.

*Tinctura sanguinem mundificans.*

De purgantibus præmittendis studio taceo. Præ omnibus Mercurius dulcis seu appropriatissimus convenit.

Quodsi gravis affectus aut symptomatis alicujus occasione Introcedat crusta lactea, pro expellenda eadem convenit emulsio seminis napi, nasturtii, aquilegiæ, cum myrrhæ, cornu cervi, &c.

Externè in his malis pro lotionibus specificum est oxylapathum acutum, nicotiana, helenium, malva, pisa; item linimenta, vel sulphurea, vel quælibet saturnina, acidum absorbentia aut temperantia blandè inungantur; hinc pro ratione circumstantiarum tutia præparata, pulvis lapidis calaminaris, unguentum diapompholygos, unguentum enulatum: quibus si addatur parum salis tartari, habebitur effectus magis tutus. Unde unguentum de cerussa camphoratum, vel diapompholygos, vel unguentum enulatum, mistum cum floribus sulphuris & sufficiente quantitate olei nicotianæ vulgaris, addendo salis tartari plus minus, prout acrius vel mitius postulamus Linimentum, egregiè convenit, quo ipso illitæ pustulæ optimè exarescent & curabuntur. Unguenta & linimenta vulgaria merito fugimus, ubi simplicia ceræ, oleis, terebinthinâ, pinguedinibus, resinis, similibusve permixta, & partim saturata, partim obruta & subacta, nullam operandi vim exferere valent, nisi quod poros cutis densè incrustando malum longè deterius reddant.

Merito autem duplex harum in cute efflorescentiarum status duplicem medendi rationem Medico insinuat; unde in specie observanda est *Differentia ulcerum*, an sint *crustosa*? quando nempe mitius in dictis ulcusculis peccaverit acidum, idque jam sub sua falsedine temperata cum purulenta viscida in tenaces & subinde spissas crustas colverit; an *manantia*? quando interdum pustulæ ex acriori acido in ulcuscula manantia jam degeneraverint, acrem plus minus tenuemque saniem jugiter plorantia. V. g. si lactumina, siue *Crusta lactea*, faciei obscurant nitorem, præmissis præmittendis internis, imprimis laudo inter externa in ulceribus manantibus inperfusionem pulverum, acida absorbentium, viscida modicè resolventium & abstergentium, & ita, ut vocant, exsiccantium & detergentium: quales componuntur ex creta, lacte lyncæ, succino, cornu cervi ulso, cerussa, tutia, myrrhæ, floribus sulphuris, & similibus, quibus tantillum salis tartari, cosmetici summi, quantum nempe sine doloris sensu perferre potest, imprimis si contumaciores fuerint, aut subinde repullularint defædationes dictæ, consultò addendum: V. g.

℞. Lap. calam. præp. ℥i. vel ℥iſſ.  
Cornu cervi ulsi præp. vel Ceruss. ℥ſſ. ad ℥ij.  
Flor. sulphuris ℥i. ad ℥ſſ. vel ℥ij.  
Sal. tartari gr. xij. vel xv.  
M. f. Pulvis subtilissimus:  
D. S.

*Pulvis inspergendus.*

Ulcusculis cum linteolo vel spongiola, aqua spermatis raparum imprægnata, absterfis blandè inspergatur.

Vel

℞. Creta pulverisat.  
Tutic præp. an. ℥i.  
Flor. sulphuris ℥ſſ.  
Sal. tartari,  
Myrrh. an. gr. xij.  
M. f. Pulvis.

D. S. *Ut antè.*

Hinc namque absorpta acido, & deterso viscido, spontè successivè coibunt ulcuscula, idque citra ullum recidivæ metum.

Quibus omnibus præfero & propterea addendum suadeo pulverem seu crocum ex vitriolo Martis, per oleum aut lixivium salis tartari præcipitato factum, & probè ablutum, qui solum ex nodulo inspersus mirè absorbit acida, & prædicta ulcera ad sanitatem perducit; cui pariter tantillum salis tartari admisceri potest; e. g.

℞. Croci Martis per præcipitat. ℥i.  
Lapid. calam. præp. ℥iſſ.  
Creta præp.  
Ceruss. an. ℥i.  
M. D. S.

*Ut antè.*

Quodsi sicca fuerit Crusta crassa, sufficient simpliciter alcalia fixa, tales crustas blandè emollientia, & acidum vitiosum in radice penitus destruentia, ita ut spontè decendant: quem in finem optimum est, ut blandè humectentur subinde dictæ pustulæ, vel cum lixivio vulgari, vel blandè quasi illinantur cum oleo tartari per deliquium, vel illinantur olen amygdalarum dulcium recenti, aut butyro recenti non salito, addita tamen pauca camphora; sic emollitur crusta, ut ita blandè auferatur, relinquendo vel naturæ, quod superest, conficiendum, vel si supersint ulcera manantia, blandè istos pulveres inspergendo. Commodè etiam oleo amygdalarum dulcium expresso; aut dicto butyro parum olei tartari per deliquium addi potest pro Linimento blando & tenui, cum in finem, ut eò melius corrigat fermentum acidum: moderatè tamen hoc fiat, ne acriorilitu doloris ratione exasperetur malum. Quin & ulterius conducunt balsamus sulphuris temperatus cum axungia porcina & illitus; quæ axungia porcina cum sola camphora subacta in mortario plumbeo, dat unguentum admodum conveniens ad crustam lacteam & capitis tineam.

Aliquando puero novem mensium, cujus cubitum talis crusta lactea infestabat, & instar herpetis exulcerari magis magisque serpendo maximam brachii partem occupabat, præscripsi:

℞. Cornu cervi sine igne,  
Lap. cancr. præp. an. ℥ſſ.  
Mercurii dulc. gr. iv.  
Misc. pro usu interno,

Hinc

℞. Ceruss. præp.  
Creta pulveris.  
Lap. calam. an. ℥i.  
Sal. tartari gr. vi.  
Misc. pro Pulvere.

Inspergebatur leniter ex nodulo locis exulceratis, hinc filamenta carpta imponebantur.

Parcurandi ratio est Tineæ capitis infantum, nempe præmissis & continuatis internis: quoad externorum usum, tineæ est vel sicca crustosa, vel est humida manans. In Tinea crustosa sicca saltem liu emolliente supra insinuato crustæ semel factæ emolliantur (non tamen citò nimis, ne remotis crustis cutis eadem exulcerata appareat,) & hinc lotione facta ex decocto radices oxylapathi, chelidonii majoris, betonicæ, saponariæ, herbæ malvæ cum pissin cerevisiæ secundaria, quibus commodè surfures addi solent, abluatur: idque non adeò crebrò, sed intra tres, quatuor ad sex septimanas semel, prout necessitas requisiverit, lotio talis instituat, illud, quod de crustis interne subnatum fuerit, & interdum à litu emollientum, pectine sive scopæ blandè removendo. Convenietiam decoctum radices althææ cum urina infantis, pro lotionem capitis usurpatum. Generosissima Comes à FLECKENSTEIN tineæ & alopecia correpta, purgata est pilulis Mercurii dulcis, & pulvere viperarum sæpius ex vino sumpto, caput lixivio cynoglossæ abluendo, & pinguedine natricum Germ. illinendo convaleuit: Vid. VELSCHUS *Misomim Cent. 1. Observ. 23. annex. Ann. 4. & 5. M. A. N. C.* Sic porro tineas in puella Nobili, pileolo ex carne suilla salita imposito brevi percuratus est Patavii: vid. loc. cit. Cent. 2. Obs. 68. Si verò tineæ manans & ulcerosa fuerit, ante omnin crines abluendi sunt: Stenim hi ipsi à sordibus manantibus inviscantur, crustam tam densam inducunt, sub qua non solum cuniculos profundos agit sanies, sed etiam generantur copiosi pediculi, quorum morsificationibus stimulati infantes, scalpendo caput, eò magis malum exasperant, ac deterius reddunt; remotis crinibus filamenta carpta locis exulceratis imponantur, item absterfis sordibus pulveres supra insinuatim leniter inspergantur, & hinc dicta filamentis muniantur, donec successi-



successivè crusta sicca supernascat, sub qua, ne nimis colligantur sordes, illa ipsa subinde exprimenda est, ut saniet pateat exitus, deinde ubi sicca apparuerit, litu emolliente attenuanda, & hinc pederentim separanda.

Tumores grandiores glandularum in collo & capite, si qui supersint, emplastro de ammoniaco, de cicuta, de galbano matricali, &c. applicatis attenuandi & discutendi. Vel Emplastrum de melliloto malaxetur cum oleo Philosophorum vel fiat compositum ex eodem cū emplastro de galbano crocato Myrsichiti & ita imponantur, aliquamdiu relinquendo.

Hæc quidem modis mitiori malo commodè succurri potest; si vero gravius fuerit, non secus atque scabies curandæ veniunt. In specie in capitis tinea graviori vulgi experimentum est lotio capitis ex decoctione nicotianæ pulverisve ejus inspersio: sed pessimo cum consilio, cum ebrietatem, turbulentam, anxietates præcordiorum, lipothymias, vomitus, copiosos secessus, & alia gravia symptomata inferre soleat: Conferatur BOYLE in sua Philosophia Experimentalis, & FEHR Tract. de Absinth. pag. 90. qui similem ebrietatem observavit ex pulvere nicotianæ ulceribus capitis manantibus insperso: Sic novè exemplum de puero aliquot annorum pediculis affecto, cui inunctum fuit caput unguento ex pulvere nicotianæ parato, additis aliis, quo ipso brevi post infans percipit angustias præcordiorum, superveniunt purgationes crebriores supra & infra, unà cum lipothymias repetitis. Causa omnes latebat: Tandem deveniebant in suspicionem unguentij, quod abluit & cum linteolo detergunt: & omnia cessarunt supra dicta symptomata. Propterea cauti sumus in usurpandis remediis ex nicotiana.

Præter Nicotianam contra tineam capitis etiam utuntur Mercurialibus litibus, nunc ex Mercurio crudo, nunc vario modo præparato constantibus: Sed hoc non semper absque periculo, quia imprimis in tenerioribus gravissima inducere solet symptomata Mercurius capiti applicatus: e. g. infans achoribus laborans ex inunctione capitis Mercuriali epilepsiam lethalem contraxit, referente T. L. MÆO Von Guldenklec in Resp. 42. pag. 106. In robustioribus etiam infantibus Mercurialia cautè sunt usurpanda propter merum salivationis, quæ superveniens tam spontè & facillè sisti nequit: Ob id mercurius vivus necessitate cogente in pauca quantitate est permiscendus remediis. Tutius adhuc, quàm Mercurius vivus, usurpatur Mercurius præparatus, imprimis cum spiritu nitri præcipitatus, qui communiter appellatur arcanum corallinum: Item conducit etiam Mercurius dulcis, qui non inconvenienter unguentis & linimentis permisceri potest. Aliàs cingulum Mercuriale, seu, ut vocant, cingulum sapientis, lumbis saltem circumdatum achores & tineas, uti etiam phthiriasin, optimè curat: Paratur ex cingulo panneobendè infusato, ut sic dicam, cum Mercurio vivo, vel subigatur mercurius vivus cum axungia porcina, & bene illinatur in cingulum ex panno paratum. Tutò usurpatur in adultis tale cingulum, si præmissa fuerint universalia, si continuò simul usurpentur corpus in blanda diaphoresi conservantia, illudque non nimis exponatur frigori, quin cadum & probè munitum continuò conservetur: Sic FONTANUS in Anal. cap. 9. Exempl. 6. refert, rusticum achoribus & phthiriasin laborantem, præmissis universalibus zona Mercurio vivo cincta lumbis circumdata curatum. Rectè dicit: universalibus præmissis; his enim non prius adhibitis non facillè hæc mala curanda veniunt: Sic enim PLATERUS in Observat. pag. 342. refert crustas in mulieris capite erumpentes intempestivè exsiccatas, unde continuò secuta est cephalæa, quæ aperta denuò capitis cute per vesicatorium desit. Aliàs forma talis unguenti Mercurialis sit:

℥℥. Ungu. ros. ℥ij.  
Mercurij vivi,  
Tut. sem. staphisagr. an. ℥ij.  
M. f. Linimentum: S.  
Unguentum contra pediculos.

Tutius est, quod describit JOEL in sua Praxi ad tineam capitis contumacem, post lotionem capitis cum decocto Malvæ, aut aliam appropriatam illinendum:

℥℥. Lithargyr.  
Cru. an. ℥ij.  
Flor. sulphuris,  
Mercurij vivi an. ℥j.

Cum s. q. olei Rosarum commisc. in mortario plum.

beo dulcissimè, & f. Unguentum, contra tineam non inlegans.

D. S.

Unguentum mundificans.

℥℥. Ungu. pedicul. ℥ij.

Ol. Nicot. ℥vj.

Sal. tartari ℥ij.

M. f. Unguentum.

D. S. ut supra.

℥℥. Ol. tartari per deliq. ℥ij.

Amygd. dulc. rec. expr. q. s. pro consistentia Linimenti:

adde

Ol. destill. spica ℥ij.

M. S. ut antè.

Sed non, nisi extremo in casu, mercurialibus, hisque cautè, utendum erit; hæc enim Infantibus tenellis externè sunt nociva, utpote quos subinde ad epilepsiam disponunt. Tutius est, quod ceu mirandum & sæpius expertum unguentum commendat PANAROLLUS in Pensæ. s. Obs. 31. quod paratur ex sulphure, axungia porcina & succo limonum. Item Linimentum de amiantho paratum miraculosum dicitur ad tineam puerorum à BOOTIO libro secundo de Gemmis & Lapid. pag. 104. quod etiam non sine successu usus fuit SCULTETUS in Armam. Chirurg. Obs. 96. quo ipso capitis tineam contumacem curavit. Revera tamen parum de Amiantho participare videtur, sed plus de sacro & tutia. Oleum non contemnendum contra capitis tineam est & hoc:

℥℥. vitell. ov. adduris. elix. No. xvj.

Myrrhæ ℥ij.

Rad. ari,

Serpentar. an. ℥ij.

Helleb. nigr. gr. iv.

Misc. probè, & coquantur super carbonibus ignitis absque flamma, donec spumescere incipiant, tuncque exprimatur oleum usui reservandum.

In specie decrecente luna commodè instituitur cura tineæ; nam achores & favi spontè naturæ cessant. Ubi periculosiora aut periculosa fuerint ulcera, lapis medicamentosus Crollii (descriptio prostat in BEGUINO & aliis) dissolvatur in aqua nicotianæ, & ita levi manu inungatur; valde enim juvat.

Quod si verdè ex increcente cranio fuerit læsum, præmissa ablutione ulcerum, cranio læso inungendum est mel rosaceum cum spiritu vini, hinc applicetur pulvis aristolochiæ subactus cum balsamo Peruviano; sic enim successivè deletur caries, & os denuò sanescit.

Quæcunque autem modò recensita externa non nisi præmissis internis, & somitem morbosum tam in primis viis, speciatim in stomacho, quàm in latice lymphæ corrigentibus & delentibus, in usum vocanda sunt, ne pallietur morbus externus, & gravior internus inducatur affectus.

## ARTICULUS XXVI.

### D E

### AFFECTU PEDICVLARI SEU PHTHIRIASI.

**T**ineæ capitis conjunctus & familiaris est affectus pedicularis seu Phthiriasis, Infantes sæpius mirè torquens, etiam interdum adultos.

### C A U S Æ.

Causa hujus est in singulari seminio, ex quo generantur pediculi, quod imprimis in corpore infantili se exserit, & factus suos excludit.

Ex internis causis sunt, qui inferre dicuntur phthiriasin, uti hoc observavit HEINRICUS ab Heer in Observationibus oppido raris.

### D I A G N O S I S.

Malum ex molesta, quæ inde oritur, per se patet.

### CURA.



## C U R A.

In Cura convenient lotiones capitis cum semine staphisagriae, item cum scordio, absinthio, colocynthide, centauro minori, radice hellebori nigri, & similibus in aqua appropriata coctis. Vulgo commendatur lotio capitis cum decocto nicotianae, sed pessimo cum consilio, ex rationibus supra dictis. Sanè tutius est usurpare aquam lavendulae aut spicae nardi, si his abluantur loca pediculis infestata; aut oleo spicae, quod est unum ex optimis, vespere sub introitu lecti caput leviter illinatur, operiendo post inunctionem, istud vitia; sic enim interea noctis omnes pediculi interimuntur. Quod si acrius fuerit oleum, subigi potest cum paucis butyro non salito, aut oleo amygdalarum dulcium, aut unguento nicotianae; sic enim dictum factum delentur pediculi, ablundo subsequente mane caput cum lixivio decoctionis spicae seu lavendulae. Etiam si inquinant loca pudenda pediculi, oleum spicae est tutissimum. Vel succus absinthii depuratus, in quo probe agitur fuerit Mercurius vivus, & hic denud subfedit, optimus est, si illinantur loca pediculis infestata. Semen staphisagriae coquitur in lixivio, vel cum butyro recenti, sit unguentum: item Cocculi de levante pulverisati, & cum butyro non salito subacti, suo litu in margine primo, deinceps vertici & toti capiti, potenter enecant quosvis pediculos.

Vel

24. Pulv. Coccul. de lev. vel rad. Gent. ʒij.  
Rad. Helleb. albi ʒij.

Cum s. q. Ol. Nicot. vel Laurin. s. Linimentum,

irrorandum sub missione cum aliquot gutt.

Ol. dest. spica,

D. S.

Unguentum contra pediculos.

Aloe etiam, & cum hac parata aqua aloetica TIMÆI Von GuldenKlee in Cas. pag. 444. imprimis etiam confert ad affectus pediculares, si hac aqua abluantur loca pediculis inquinata: Prae omnibus equidem juratus pediculorum hostis est Mercurius, minus pulicibus insensus: confert. BARTHOLINI *Alia Med. Haffn. Vol. 4. pag. 156.* Sed non semper tuto uti licet Mercurio in phthiriasi, quia graviora infert symptomata. Interim praesentissimum remedium, quod omnes fugantur & interimuntur pediculi, ratione Mercurii est, si pediculi haereant in locis secretis, in superciliis, &c. si abstergantur hi loci linteolis istis, quibus aurifabri pocula sua post deurationem detergere solent; sic pediculi adherent vitæ privati. Aliàs certum est, quod Mercurius vivus, aut dulcis, aut cum spiritu nitri praecipitatus, quibus is unguentis additus, subitò quosvis enecat pediculos. In specie ex pinguedine porcina, succo absinthii, farina lupinorum, & pulvere seminis staphisagriae paratur Linimentum Mercuriale, sed paucis addito Mercurio acuendum. Denique vel solum cingulum istud Mercuriale seu sapientiae, de quo superius locutus sum, etiam certo pediculos fugat, saltem si lumbis circumgestetur; vel Mercurius vivus in bursula secum gestatus in vestimentis pediculos fugat, eosque interficit.

## ARTICULUS XXVII.

## D E

## VARIOLIS ET MORBILLIS.

H Aftenus dicta occasionem suggerunt in Morbillorum. & In specie Variolarum, originem & abstrusam aliàs naturam meditando, & inquirendi quæ, quæ tales, cum dicta crusta lactea, &c. quoad faciem externam, fiendi modum & effectum, in quàm plurimis conveniunt, cum etiam tinea capitis non rarò post variolas superesse, aut etiam easdem insequi soleat.

## C A V S Æ.

Torquet imprimis Philiatros inevitabilis serè harum insultus, omnibus Europæis, ne dicam de aliis quibusdam Nationibus, familiaris. Ex menstrui sanguinis reliquiis multum cum Arabibus earum radicem derivant; alii ex repetita post semel factam conceptionem venerea libidine; neutrum

mihi satisfacere videtur. Quin potius, si quid certi statuendum est, quod aliquod in nobis quasi implantatum sit variolarum principium, ratione cuius nemo serè possit effugere eas, videtur probabile, quod hæ ipse originem habeant ex corruptela lactis nutritivi, tam in, quam extra uterum, & vitioso viscido acore infantes inde inquinant; exinde enim & frequentissimè saltem infantes & pueros, rarissimè demum adultos, affligere solent, dum lac peregrino acore inquinatum ad massam sanguineam perferretur, ubi acor iste aut mox cum sale volatili oleoso massæ sanguineæ effervescente praecipitatur, aut aliquamdiu latens occultè, tandem quasi maturatus occasione datâ, in specie excitatâ massâ sanguineâ, per fermentum simile extrinsecus inspiratum vel haustum, successivè quasi magulando tandem pernitiosam effervescentiam febrilem insens, quocunque tempore hoc eveniat, concurrente, acido fermentativo viscido cum sale volatili oleoso massæ sanguineæ, donec praecipitato & subjugato acido isto vitioso, & sero involuto, critica sanguinis purgatione per vasa capillaria hinc inde sub cute defixa, in specie beneficio glandularum subcutanearum miliarium excernatur, & ibidem sub cuticula hærendo, successivè in pustulas taliter coacervetur, quarum contentus succus falso acidus effervescente ulterius mitescit, & in pus perfectum abit, unde cuticulæ tandem in squamas erosio, erodente interea sub his ipsis acido cutim subjectam in foveas plus minus, prout magis vel minus effervescentiâ febrili temperatum fuerit; hinc post variolas interdum ulcera periculosa & cacoethea remanent, tam in partibus externis quàm internis, in specie in tenera vesiculosa pulmonum substantia, pro conditione acidi plus minus virulenti varia; & subinde tinea capitis variolas insequitur; uti in variolis hæc sunt satis clara.

Quæ omnia sunt mitiora in reliquis febribus vel cum morbillis vel cum petechiis conjunctis: Ut plurimum tamen sunt variolæ.

Praeter dicta, ut sunt erosio, ulcuscula & similia, quæ confirmant acorem in variolis, etiam confirmatur ex eo, quod imprimis solet praecedere tussis sicca, rubor & illachrimatio oculorum; quæ omnia loquuntur acrimoniæ nimiam in lymphæ: item, quod in variolis sæpius sit conjunctus ardor urinæ & exulceratio vesicæ, effectus acidi, quod ipsum in dictis variolis ossa non rarò arrodere & corrumpere assolet; id quod expertus testatur PARÆUS de Variol. cap. 1. Hinc etiam liberi à parentibus lue Venereæ infectis prognati, si postmodum corripiantur variolis, longè pejus habent, observante hoc HORSTIO lib. 6. Observat. Append. pag. m. 308. Hinc etiam Mercurius dulcis in scabie & lue venerea acidum viscidum delet, & ceu singulare alexipharmacum, maturè administratus, variolas quoque curat, & earum maturam expulsionem promovet, pariterque præservat: Conf. M. A. N. C. Ann. 3. Observat. 9 & 56. Unde & convulsivi motus & epileptici insultus variolas sæpè antecedunt, vellicant & laedente partes nervosas quibus omnia acida imprimis sunt inimicissima) acido viscido, & ad crispaturas earum fibras, & hinc ad inordinatos ac imperuosos motus spiritus animales irritante, antequam perfectè sit praecipitatum effervescente & in falsum transmutatum, in quo tamen adduc præpollat acidum. Unde variolæ & similes febres cum exanthematibus in infantibus conjunctæ oprimè curantur per remedia acidum istud vitiosum in massa sanguinea corrigentia, & salia volatilia id per sudorem eliminantia, sive absorbendo sive temperando: absorbendo per sal volatile cornu Cervi, cornu Cervi sine igne, ebur sine igne, unicornu fossile, antimonium diaphoreticum, corallia, & similia: temperando per myrrham, castoreum, cinnabarin, antimonii, &c. Non rejicio hoc ipso vermiculorum exercitum, in singulis pustulis acervatim grassantem: vid. BORELLUS Cent. 2. Obs. 72. & Observ. Microscop. Obs. 1. pag. 21. Item LIPSIUS de Variol. BARTHOLINUS Cent. 5. Hist. 20. RHODIUS Cent. 3. Obs. 64. cum nullum pus absque horum pullulante segete reperiatur, sed hostisquam effectus spontè ex ordine causarum morbosarum in pure superveniente, transmittit.

Unicus hic est scrupulus: cur variolæ interdum tardè in quibusdam crumpant, ita ut interdum ad annos sex, decem, & terè ad ætatem adultam harum fermentum in corpore lateat? Verùm si consideremus, quod diutius morbosa fermenta in corpore delirescere possint, donec sub sua dierum maturitate tandem evigilent; id quod non-



tum evenit in affectibus hereditariis, sed etiam in canis rabidi salivali fermento, & sebrum petechialium subinde ad aliquot hebdomadas latente contagio: item, quod vel seminium Luis Venerea haustum diutius sæpe in corpore lateat, non adeo ineptum videbitur, etiam dicta fermenta variolarum tandem in corpore latere posse, antiquâ occasione miasmatis similis externè hausti variolas inferente: unde & Infantes, qui sub nutritione sanierant & vegeti, post ablationem subinde cutanea contrahunt vitia, achores & similia, dum vitia lactis per consuetudinem sub lactatione quasi appropriata naturæ citra nocuummentum adsunt, quæ mutata dictâ per effervescentiæ motum in musteo sanguine separata, & instar sæcum præcipitata, hinc inde per sanguinis circulum sub cute defiguntur, & ibidem coacervata, suas morbosas ludunt tragedias, redeunt subinde pertinaciter, quamdiu tantillum miasmatis morbofi aut semini fermentativi, nunc sub sanguinis velamento, nunc sub epidermidis tegumento latuerit; quod ex materia conveniente datâ occasione se multiplicat, & malum renovat: quæ ipsa de variolis & morbillis pariter asserenda videntur.

### DIAGNOSIS.

Imminentes ergo variolas in infantibus innuntiat æstus insignis corporis, dolor pulsatorius in spina dorsi, tussis sicca, quatiens pulmones, oculorum tumor & illachrymatio, pruritus in naribus, angustia quædam, & occultus dolor in faucibus, donec hinc inde die imprimis tertio vel quarto incipiunt emergere monticuli parvi rubicundi, acutiores in variolis, plani ferè & depressi in morbillis. Hi monticuli in variolis rubicundi, interdum etiam purpurei, interdum pessimo omne lividi, turgidiores facti tandem suppurantur, & abeunt in pus, à quo pure tandem corrupta cuticula abit in squamam, quæ tandem spontè decidit, relicto post se foramine, modò maiore modò minore, in ipsa cute.

### PROGNOSIS.

Variolæ, quæ quarto die crumpunt, septimo suppurantur, (nam criticus motus in variolis imprimis est observandus) & undecimo incipiunt exsiccari & decidere, sunt salubres & faciliè curantur: sin verò variolæ erumpentes non sint plenæ five turgidæ, sed depressæ & in medio sui habeant quasi foveam, innuit deficientem expulsiõnem variolarum, adeoque latens periculum.

Variolæ, quæ jam suppurantur, ubi in suppuratione concidunt, & in medio sui foveam quodammodo acquirunt, periculosum est.

Hoc tamen hic observandum est: fit ordinariò, ut dum suppurantur, ex moru isto suppurationis fermentativo & turgescencia materiz suppurandæ, quod semper pustulæ sint plenæ & turgidæ, quæ ubi factum est jam pus, non nihil concidere videntur: sed hæc coincidentia & depressio matura, non confundenda cum coincidentia immatura & subitanea, quæ dum fit, est periculosa.

Erumpentes variolæ quò magis rubicundæ, eò meliores, benigniores & salubriores; quò magis lividæ eò, maligniores & sæpissimè lethales.

### CURA.

Quoad Curam variolarum & morbillorum (quæ etiam, potest adhiberi in Purpura infantum, quam ex utero materno habent: ) mox in principio, quando infantes incipiunt ægrotare, vel altero die, principium, fiat laxando alvum per Mercurium dulcem, modò infantes fuerint ablactati. Sanè cum ante hoc triennium variolæ populariter grassarentur inter infantes, ad imitationem BOUCHARDI & GRASSII in M. A. N. C. Ann. 3. Observ. 9. & 56. pag. 13. & 56. omnibus, quibus suspicio forsan imminentium variolarum aderat, mox in primo principio Mercurium dulcem dedi pro ætatis ratione, grano uno vel altero præter propter annorum numerum transcendens: v. g. Infanti duorum annorum dedi gr. ij. vegetiori gr. iij. trium annorum gr. iv. quatuor annorum gr. v. vel vi. Pulvis hic nunc solitarius, nunc sub tegmine conservæ rosarum, in principio primo datus nunc vomitum, quod libenter vidi, & aliquot secessus, nunc alterutrum solum provocavit, & ferè semper felicem eventum appropriatis remediis adhibitis observavi: e. g. pro infante 1. 2. vel 3. annorum:

Emull. Oper. Tom. II.

℞. Conf. rosar. ʒss.

Mercurii dulc. gr. j. li. vellij. pro ratione ætatis.

Cum f. q. Syr. rosar. f. bolus.

D. S.

Bolus laxativus.

In forma pulveris:

℞. Mercurii dulc.

Sacch. an. gr. iij.

M. D. S.

Pulvis laxativus.

Detur in vehiculo liquido ex coebleari ligneo infanti 1. vel 3. annorum.

Interdum nihil operatur, unde pro stimulo granulum pulveris jalappæ addi potest, sequenti modo:

℞. Mercurii dulc. gr. v.

Pulv. Jalapp. gr. ʒ. ad gr. j.

Sacch. ʒss.

M. f. Pulvis:

S.

Pulvis laxativus.

Puero 4. vel 5. annorum:

℞. Conserv. rosar. ʒss.

Mercurii dulc. gr. v. ad viij.

Pulv. Jalapp. gr. ʒ. ad gr. j. (si robustior)

Cum Syr. Ros. solut. f. Bolus:

S.

Bolus purgans.

Sin verò gravidus affligat morbus mox cum prostratione virium, æstu, jectigatione corporis, in principio exhibetur pulvis epilepticus antimonialis cum euphoria. Principio autem præterlapso aliis insistendum.

Quando symptomata circa primas vias urgent cum murmuratione hypochondriorum, tensioneque abdominis, clystma blandum injiciatur ex decocto avenæ cum lacte, addito melle.

Præterlapso principio pro variolarum & morbillorum expulsiõne, seu acidi visceris peccantis ex lymphæ & sanguine separatione, indeque natæ febrilis effervescentiæ mitigatione, emulsiones ex seminibus istis expulsivis dictis, aquilegiæ videlicet, napi, cardui benedicti, nasturtii, & similibus, additâ paucâ myrrhæ, optimæ sunt, factæ cum aqua florum sambuci, scabiosæ, sceniculæ, veronicæ, tenellorum cornuum Cervi, & similibus, ad imitationem ZWELFFERI Pharm. Reg. pag. 209. quæ infantibus perquam salutariter porriguntur.

His si adsit epilepsia, vel immineat, grandæ præoniæ simul possunt addi; ut etiam, si inquieti sint nimis infantes, sese jactitent, & stragula non ferant, id quod imprimis fit prioribus duobus diebus, tunc optimè aliquantulum seminis papaveris albi addi potest in his emulsionibus: v. g.

℞. Sem. aquileg.

Napi an. ʒj.

Papav. albi ʒij.

Cum f. q. aqua Fenic. & flor. Sambuci f. Emulsiõ, quæ est optima:

D. S.

Emulsiõ expellens.

Huc possunt addi vel antimonium diaphoreticum, vel cornu Cervi sine igne, vel pulvis epilepticus Marchionis, vel unicornu fossile, & similia appropriata:

Vel

℞. Sem. Napi,

Aquileg.

Card. bened. an. ʒj.

Cum f. q. aqua Scabiosæ vel flor. samb. f. Emulsiõ: adde

Ess. Myrrh. ʒj. ad ʒij.

Cornu Cervi sine igne ʒss.

Edulcoretur parum:

D. S.

Emulsiõ expellens.

Uterius & antimonium diaphoreticum, tam vulgare quàm, quod magis appropriatum hic creditur, ex Mercurio vitæ cum nitro præparatum, addito parum myrrhæ, item castorei, consultò in aqua vel vehiculo appropriato iisdem reiteratis vicibus exhibetur; non secus ac Bezoardicum solare & cornu Cervi sine igne, simili modo salubriter convenit; item magisterium coralliorum cum succo citri mistum cum myrrhæ: e. g. præmissio præsertim usu Mercurii dulcis:



℥. Cornu Cervi sine igne gr. xvi. ad ℥j.

Myrrb. el. gr. iv. vel vj.

Tberiac. gr. ij.

M. f. Pulvis.

Divid. in 2. part.

D. S.

Pulvis expellens.

℥. Cornu Cervi sine igne ℥j.

Myrrb. el.

Sal. vol. cornu Cervi an. gr. ly.

M. f. Pulvis;

Divid. in 2. part.

S. Ut ante.

Item

℥. Corn Cervi sine igne,

Ebor. sine igne an. gr. vij.

Castor. gr. ij.

M. D. S.

Ut supra.

℥. Cornu Cervi sine igne ℥j.

Antimonii diaph. ℥j.

Myrrb. el. gr. vj.

M. pro Pulvere:

Divid. in 2. part. æqu. S.

Pulvis sanguinem purificans.

℥. Antimonii diaphor. ℥j.

Cinn. Antimonii ℥j.

Myrrb. el. gr. v.

Castor. gr. iij.

M. pro 3. dos. S.

Pulvis expellens.

℥. Pulv. Bezoard. D. Mich. ℥j.

Salis card. bened. gr. iv.

Myrrb. gr. ij.

M. pro 2. dos.

D. S. ut ante.

℥. Cornu Cervi sine igne gr. xvj. ad ℥j.

Myrrb. el. gr. vj.

Salis absinth. vel Card. bened. gr. ij. vel lv.

M. pro Pulvere:

Divid. in duas part. S.

Pulvis sanguinem mundificans.

℥. Cornu Cervi sine igne gr. xij. ad ℥j.

Antimonii diaph. gr. iv. ad ℥j.

Salis Card. bened. gr. iij. vel lv.

M. f. Pulvis:

Div. in 2. part. S.

Pulvis expellens confortativus.

℥. Aqua Scabios.

Card. bened. an. ℥vj.

Eff. Myrrb. ℥j.

Cornu Cervi sine igne ℥j.

Antimonii diaph. ℥j.

Syr. scabios. ℥ij.

M. S.

Ut ante.

Diſt pulveres imprimis propinquantur in incremento morbi ſecundo vel tertio die, dum gltus urget, ante eruptionem, quibus etiam, variolis erumpentibus, inſiſtendum.

Caſtoreum ſingulare eſt in expellendis & curandis infantum variolis, miras habet virtutes in expellendo, & cum antimonialibus commodè permilcetur: v. g.

℥. Cornu Cervi sine igne,

Antimonii diaph. an. gr. vij.

Castor. gr. ij. vel iij.

M. f. Pulvis S.

Pulvis expellens.

Detur infanti trlum vel quatuor annorum, potenter expellit, Unde butyrum rubrum porabile eſt ſingulare remedium, ſi liquefactum propinquetur infantibus contra variolas, quoniam ingrediens habet caſtoreum.

Caſtoreo non cedit myrrba jam aliquoties præſcripta, nec unquam in variolis & morbillis negligenda eſt, tot expeſtiments jam confirmata, & in expulſione, nec non promovenda ſuppuratione, & impediendis cicatricibus mirabilis: e. g.

℥. Antimonii diaphor. ℥j.

Cinnab. antimonii ℥j.

Myrrb. el. gr. v.

Castor. gr. iij.

M. f. Pulvis pro tribus dos.

D. S.

Pulvis sanans & sanguinem purificans.

Mihi aliquando evenit talis caſus: Erat puella decem annorum, cujus variolæ jam erumpebant, & eruptæ incipiebant ſine ſuppuratione evaneſcere, cum ſuperveniente gravi diarrhœa, & cujus pedes jam omnino uſque ad genua cum intenſo calore liveſcebant; quæ omnia ſymptomata veniebant ex variolis retrocedentibus. Ut ergo eaſdem denud promoverem extrorſum verſus, præſcripſi ſequentia:

℥. Antimonii diaphor. gr. xij.

Castor.

Myrrb. an. gr. lv.

Campb. gr. ij.

M. f. Pulvis:

Præparabatur in duplo.

Capiebatur doſis una manè, altera vespert, & his iſtis denud puella ſuit reſtituta erumpentibus denovo & ſuppurationi variolis.

Unde & Eſſentia myrrhæ ſeu ſaluſi ſuprà laudata comprobata hîc eſt eſſicaciſſa; non ſecus ac eſſentia caſtorei, tam ſimplex, quàm, quæ magis eſt compoſita, è caſtoreo & aſa fetida, cum tinctura tartari aut ſpiritu vini tartariſato parata, præſervativè pariter ac curativè ab aliis maximè commendantur.

Dum ergo variolæ plenè erumpunt & attolluntur:

℥. Tinctura tartari acerr. ℥ij.

Eff. Myrrb. volat. ℥j.

M. D. S.

Eſſentia ſanguinem purificans.

Vel

℥. Tinctura tartari acerr.

Eff. Myrrb. tartariſ. an. ℥ij.

M. S.

Ut ante.

℥. Eff. Myrrb. ℥ij.

Tinctura antimonii ℥j.

M. S.

Ut antea.

De his doſis gutt. xx. vel xxv. pro infante trlum, quatuor & quinque annorum bis, ter & quater in die & noctis ſpatio, pro ratione circumſtantiarum.

Diſtis uſibus, (niſi ſuperſtue delicati in remediorum ſeſteſſe uſilimus) ſimiliter ſimul equinus eſt ſummum remedium in variolis infantum, recens cereviſiæ vel potui ordinario inſuſus, ſubaſus & expreſſus, vel ejus ſuccus his permixtus, promover expulſionem & febrim potenter ſiſtit, & in ſpecie certiffimè præſervat ab angina, & ne variolæ partes internas, in ſpecie fauces, inſeſtent, quod periculolum eſt: præfertur tamen huic adhuc ſtercus ovillum in variolis, ſicut in morbillis caprillum eminet.

Quod ſi grauior malignitas & acrimonia in variolis ſub eruptione convulſiones & epilepticos inſultus inferat, in teneſtoribus convenit liquor cornu Cervi ſuccinatus, aut ſalla volatilia viperarum, aut cornu Cervi, cranii humani & ſuccini; ſicut robuſtioribus paulò pulvis epilepticus antimonialis, uel cinnabaris antimonii, & ſuper ejus baſin conſtitutum ſpecificum cephalicum; quæ mirè conferunt in infantum epilepticis aſſectibus in variolis. Nam cinnabaris antimonii malignitati potentiſſimè reſiſtit, plus quàm omnia antimonialia, imprimiſcum diſtis volatilibus ſociata: item bezoardicum ſolare: e. g.

℥. Cornu Cervi sine igne gr. v. vel viij.

Cinn. antimonii gr. iv.

Sal. vol. cornu Cervi gr. ij.

M. S.

Pulvis expellens alterativus.

℥. Aqua Card. bened. ℥ij.

Cornu Cervi sine igne ℥j.

Cinn. antimonii gr. xij.

Sal. vol. cornu Cervi gr. v.

Syr. Card. bened. ℥ij.

M. S.

Potio confortativa expellens.

℥. Aqua Scabios. ℥ij.

Cornu Cervi sine igne gr. xij.

Cinnab. antimonii gr. viij.

Bezoard. ſolar. gr. iij.

Sal. vol. cornu Cervi gr. iv.

Tberiac. gr. ij.

Syr. scabios. ℥ij.

M. S.



M. S.

Ut ante.

Externè simul, si dolor abdominis tenfivus adfuerit:

℞. Ol. de fill. succini ℥j.

Spice gr. v.

Corp. pro Bals. q. f.

M. D. S.

Balsamus lenitior.

Quo regio umbilici & scrobiculus cordis inungatur, idque aliquoties; sic enim epilepsia evanescit.

In declinatione, si jam eruperint variolæ, corporis feruor tepescat, & suppurari incipiant, ut facilliter suppuratio fiat, & præcaveantur cicatrices, in specie in puellis, optimum est propinare lapillos cancrorum præparatos cum pauca quantitate myrrhæ, erebriusque repetere; hæc duo temperant acrimoniam & corrosionem impediunt.

Vel

℞. Lap. cancr. præp. ℥ij.

Salis absinth. gr. xij.

Myrrhæ gr. vj.

M. f. Pulvis pro tribus dos.

D. S.

Pulvis sanguinem mundificans.

Externè spongiam cum lixivio salis tartari ebriâ blandè tangantur pustulæ, sic mortificatur acidum, & tollitur erosio.

Nutrix interea, si infans est adhuc sub lactatione, quotidie utatur in potu communi gelatina cornu Cervi dissoluta: item hauriat subinde decoctum radicle scorzonæ, quod est optimum; id quod etiam potest infanti propinari felici cum successu.

Decoctum cornu Cervi cum sicubus commodissimè etiam propinatur infantibus, cum sicus temperando acrimoniam salinam quemcumque effluenscentiæ motum nonnihil minuunt, & nimium impetum variolarum, imprimis in faucibus & collo aliisque partibus internis, corrigant; unde etiam quibusdam in usu decoctum milii est cum sicubus salubri cum successu.

Hoc tamen observandum est, ne sicuum nimia sumatur quantitas: Nam sicus laxant alium infantum, quæ alui laxatio in variolis & morbillis sepius est lethalis: etiam si per octo aut decem dies in his obstructa sit alvus, nihil periculi insert, sed spontè aperitur denuò. Cautissimus ergo sit Medicus, ne aperiat alium infantum, dum laborant variolis.

Cum crassæ iterum decidunt, pro interna mundificatione post duas vel tres septimanas à primo morbi insultu iterum purgatio instituatur ex Mercurio dulci; cum verò minus laxare soleat, pro stimulo eidem granum unum vel alterum Isappæ addi possunt.

Vomitus in principio urgentes nunquam tutò sistendi; si vero excedant, optimum est Theriaca, vel g. is. Laudani opiatæ pro aliquot dosibus. His non sufficientibus accedendum ad liquorum cornu Cervi succinatam, qui optimè prodest, & eosdem quietos reddit. Dosis sunt gr. iij. iv. v. in potu ordinario.

Si vero in incremento & statu Diarrhææ superueniat, ut plurimum funestum est, nisi in infantibus succulentis, præcipuè si in statu, occasione vel potus nimis vel frigidiusculi orta, & imprimis si murmurationes abdominis conjunctæ & excrementa spumosa fuerint, tunc infundatur ℥j. pulveris terræ sigillatæ in mensuram semis potus ordinarii, de quo infantes bene agitando bibant; sic brevi post sedatur diarrhæa, & variolæ progerminant.

Vel

℞. Aqua Menthe,

Flor. samb. an. ℥j.

Gel. cornu Cervi ℥vj.

Succ. Cydon. ℥ss.

Terræ Sigill. ℥j.

Aminoni diaphor. ℥ss.

Syr. ex rose citro ℥ss.

M. S.

Mixtura adstringens, confortans & expellens: capiatur cochlearim.

Si vero in statu obfymptomatum syndromen Vires fuerint prostrata, optima fuit Tinctura Coralliorum cum spiritu cordis Cervi ad gutt. viij. vel xij.

Si nimis sudoribus distuant, & inde fiant imbecilliores, analepticum optimum est haustus vini, vel panis simlagineus vino intinctus, & ita propinatus. Aliàs non liberales sumus in vino concedendo.

Uc à variolis præserventur nares, odor aceti imprimis conducit.

Emull. Oper. Tom. II.

Quod si periculum oculis imminet, quod duplex est:

1. Ne variolæ oculi bulbum occupent;
2. Palpebras obfideant, quibus suppurantibus oculus aperiri non potest.

Hinc ratione prioris mulier quædam sana allium mastice, & halitum oris oculis inflet, manè stomacho jejuno crebrius repetat: vel crocus accipiat, infundatur aque sceniculi, & infusum hoc (non tamen sit acre) infilletur: vel ex ruta recenti contusa exprimatur succus, qui per filtrum missus, & cum aquis ophthalmicis mistus, infilletur: Interdum aqua plantaginis cum pauca cerussa & camphora infillanda.

Si vero Palpebræ sint obfessæ & inviscatæ, pro illis aperiendis, ne erodantur, sufficit Decoctum blandum vel florum meliloti, vel herbæ malvæ, calidè applicatum oculis cum linteis. Malè lac usurpatur, quia facillè acorem contrahit. His irritis, si oculi inquinentur, & post curatas variolas vel lippitudo, vel ophthalmia, vel visus hebetudo superfit, appropriatis succurratur, sed simul nuchæ applicandum vesicatorium: quo non sufficiente & clauso, bina vesicatoria pone aures applicentur, quæ impedimenta remonent, ut oculi melius curari possint per reliqua remedia. Pro vesicatorio autem

℞. Empl. vesic. nst. ℥ij.

Citrin. ℥j. vel ℥ij.

Cum f. q. Ungu. alb. f. Emplastum: S.

Emplastrum vesicatorium.

Quod inducatur super linteum, & applicetur.

Ut vero diutius apertum ferretur, recipiatur Emplastrum de spermate ranarum, & addatur quinta vel sexta pars dicti emplastri vesicatorii.

Ut Angina præcaveatur, sinus equinus, aur, si collum jam obfessum sit variolis, decoctum sicuum moderatâ dosi conducit: syrupus variolarum interdum lentè deglutitus maturat suppurationem.

Tussim & pectoris affectus optimè curant remedia ex scabiosa, vel sola, vel cum spiritu salis ammoniaci misato mista; hic enim in affectibus pectoris in variolis optimus est:

Vel

℞. Tinctura tartari ℥ij.

Elix. Propr. sine acido ℥j.

M. S.

Tinctura solvens: 30. guttæ.

Vel

℞. Aqua hyssopi,

Tussilag. an. ℥ss.

Syr. de Juiub.

Violæ.

Nicot. an. ℥vj.

M. D. S.

Succus tussim solvens.

Puer unius anni cum semile, cum alii fratres morbillis correpti decumberent, ex improviso à meridie cum gravi stertore incallescere admodum & debilitari cepit. Cum malum hoc ex imminetibus variolis esse suspicaret, & alii fratres unâ decumbentes graviter tussirent, præscripti sequentem potionem:

℞. Aqua flor. samb. ℥ss.

Liqu. cornu Cervi succin. ℥j.

Syr. Papav. albi ℥ss.

Misc.

Huius usus copiosissimi proruperunt morbilli, & stertor & difficultas anhelandi cessarunt: Nempè ex impetu lymphæ acrioris, & hinc inimica vellicatione & irritatione faucium, laryngis & pulmonum, malum ortum fuerat: ob id acrimonia suspecta maligna erat corrigenda per volatilia, irritatio autem sensus sopiendus per papaverina.

Interdum superuenit Apbonia, quæ duplex: vel sonum formare non possunt, quod fit vitio laryngis & nervorum ejusdem; vel licet sonum edant, loquelam tamen formare nequeunt, quod fit vitio lingue & ejusdem nervorum. Primus casus reperitur in HILDANO Cent. 6. Obs. 14. sed est rarus. Secundus casus curatur per interna volatilia antiparalytica, imprimis essentiam castorei, quæ lingue in parte prima circa frenum crebrè affricetur. Vid. HORSTIUS Obs. lib. 1. Observ. 29.



## ARTICULUS XXVIII.

## DE

## SUBLUXATIONE INFANTUM.

**I**nfantes paulò adultiores vehementiori sub motu frequentèr *Subluxationem* incurrunt, unde hypochondriorum tumor, difficilis respiratio, totius corporis estus, appetitus dejectus, vigilie, &c. superveniunt.

## CURA.

*Curatur* optimè, si Infantes imponantur ventri, & manus & pedes per crucem sibi invicem admoventur; hoc enim modo curatur subluxatio.

## ARTICULUS XXIX.

## DE

## MACIE ET ATROPHIA INFANTUM.

**F**requens & sæpè difficillimum curatu, simulque periculosum malum est, quando sub nutritione subinde deficiunt infantes, ita ut eorum corpus succo nutritivo privetur, & ejus partes musculosæ flaccidæ & molles fiant; uno verbo: quando non nutriuntur & augentur, sed successivè, utut alimenta capiant, macilenti fiant, adeoque plus minus macie & atrophie corripiantur.

Macies hæc in genere est vel *symptomatica*, vel *morbosa*. *Symptomatica* est, quando alium morbum, febrem, diarrhæam, vel similem affectum sequitur. *Morbosa* est, quando citra talem prægressam causam, vel citra prægressum alium morbum, ex se ipso radices egerit, vel ex se ipso incipit.

## CAUSÆ.

Talis Maciei *Causa* sunt plurimæ, quas ordine pertractabo.

## CAUSA I.

## DE

## NUTRIMENTI DEFECTU.

**P**rima quidem *Causa* est defectus nutrimenti laudabilis, quando lac nutricis minus proportionatum est ad crassin foetus seu infantis nutriendi, quin potius acrius & falsius existit; tunc enim minus nutriri possunt infantes. Id quod fit imprimis in nutricibus cholericis, ut sic dicam, seu habitus minus succulenti, & quæ quodammodo ad phthisin, aut hecticam inclinant, in specie, si jam diutius lactaverint alios infantes: nam talium lac asperum nonnihil est, & minus aptum ad nutriendum infantem, qui nutrimentum temperatum, roscidum & quasi oleosum requirit; vel vitiatum: ubi illinc atrophie, hinc cachexia supervenit.

## DIAGNOSIS.

Cognoscitur hoc ipsum vitium, si ipsa nutrix talis sit, & infantes citra manifestam aliam quamcunque causam successivè emacientur & parum vel nihil proficiant.

## PROGNOSIS.

Affectus non est contemnendus; semper enim periculum infantis viribus intendet.

## CURA.

Propterea in Cura lac & nutrimentum laudabile suggerendum; pro quo scopo imprimis mutanda est nutrix, & post mutationem nutricis, aut etiam si infans quodammodo spontè minus aptus sit nutritionis aut si contabescat & minus nutriatur propter vitium nutricis, post nutricis remotionem commodè balneari infans in lacte bovino vel caprino: quo ipso subinde blandè fricanda sunt ejusdem membra, & postmodum capiat hederam arboream, crescens in quercu, ex qua

hedera arborea destillatur aqua, quæ mirè commendatur in tali infantum macie: sicut etiam ipsa folia hujus hederæ pulverisata ad ℥j. cum paucis syrupo violarum sunt propinanda.

Præter hæc etiam aqua flicis destillata mirè laudatur, ex qua flice etiam culcitras sub dorsum ponendas suadent. Sunt etiam, qui in tali casu post balneum lactis commendant unguentum ex butyro non salito, quo subinde membra tenella fricanda sunt.

## CAUSA II.

## DE

## LUMBRICIS.

**C**æterum præter lactis vitium *Secunda Causa* maciei infantum est, quando nutrimentum, licet laudabile, assumitur à *lumbriticis*, item *crinonibus*, qui ubi sunt copiosiores, aut etiam diutius retenti fuerint in infantibus, tandem maciem inducunt. De *Lumbricis*, cum eorum signis & cura, *suprà dixi*.

## CAUSA III.

## DE

## CRINONIBUS SEU COMEDONIBUS.

**S**equitur *Causa tertia Maciei & Atrophie*, *Draconculi* sive *Vermiculi* subcutanei capillares infantum, quatenus hi ipsi atrophiam simul junctam semper habere solent. Incognitus & indictus antiquioribus fuit morbus, cujus passim superiori ac hodierno seculo à Medicis non minus, quam medicastis mulierculis, fit mentio, & ab istis quidem morbus pilaris infantum communiter appellatur, proprio autem nomine *Comedones* ab adiuncta infantis tæbe, quasi *vermes* qui nutrimentum infantum comedendo largius absument, item *Crinones* à figura, quod, si in balneo ritè tractentur, crinum seu pilorum curtorum nigrorum formam foras interdum prominere per poros cutis soleant, appellantur. Germanis *die Mit-Eßer*, *die Zebr-Wurme*, quæ pro animalculis intercutanea loca inhabitantibus ab aliis habita fuerunt. Differunt à *Sironibus* seu *Cironibus*, *vermiculis* minutis, quasi *pedicularibus*, in pustulis serosis prurientibus sub cuticula manuum imprimis & pedum enatis, de quibus vid. SENNERTUS lib. 9. *Prax. Part. 1. cap. 24 pag. 118.* LANGIUS lib. 2. *Epistol. 42.* GOEDARTIUS *Metamorphos. Part. 1. pag. 126.* sicuti & *Sironum* & *Crinonum* formæ, per microscopium consideratæ, differentes planè deprehenduntur. Dicit *Crinones* *vermiculi* capillorum spissorum seu setarum curtarum formam nudo oculo aspicienti se exhibent, qui mellis dulcedine per frictionem allecti in loco calido foras prorumpere nonnihil, frigoris vero ipsis inimici sensu denuò introrepere, observantur; sic enim apparent *vermiculi* formam singularem, oculis rotundis grandiusculis, coloris subcineritii & plus minus nigricantis, cornubus seu potius antennis binis longè prominentibus instructi, cum caudis oblongis in fine villosis, uno nomine: aspectu satis horridi; prout nuperrimè ab amico curioso & artificioso, nempe Dn. CHRISTIANO SCHÆFFERO *Serenissimi Ducis Saxonie MAURITII Apelle Amico* dexterrimè (non secus ac alia talia minutissima insectula, in specie *sirones*, item *termites* seu potius *lendes* caseorum, &c.) hacce sub forma accuratè per microscopium observati & delineati fuerunt: quorum iconismus videri potest in *Valetud. Infant. cap. 2. §. 33.* Occupare magis loca musculosa, imprimis dorsum, sive totius intercapillii tantum, maxime tamen scapularum, humeri, item surarum & crurum, sub cuticula assolent. Infantes imprimis teneriores, minus robustiores, affligere solent.

## CAUSÆ.

Originem iis subministrat suppressa insensibilis transpiration, ut rectè id suspicatur HORSTIUS lib. 4. *observ. 53. pag. 254.* quæ temperata si fuerit, minusque acris, dulcis & pinguis, retenta diutius ad putredinem ruit, unde occultata antea & oppressa penitus principia seminalia, quæ in minimo, seu, ut vocant, in atomo sensibus imperceptibili latere possunt, sui juris facta, destinationes naturales exequuntur,



quantur, & in viva animalcula prorumpunt. Nempe in lacte, ratione alimentorum ex quibus generatur, non secus ac in pulce, milleformia insectulorum & vermiculorum latent semina, quæ in tenello infantis stomacho non adeo exactè alterata, faciliè data occasione evigilare, & in actum secundum erumpere valent: hinc & quidam crinones hos illis vermiculis seu ascaridibus similes asserere volunt, qui in antiquis casels innascei observantur. Hi ipsi crinones animati molestiam admodum prurientem & continuò lacescentem, plus minus tamen, sub cuticula admodum sensili excitant, indeque inquietos, ejulantes & vigiles reddunt infantes, quibus utut sæpius porrigant mammas nutrices, quas etiam exhauriunt, tamen inquietudine, vigiliis & ploratu confecti, minus dictum alimentum degerere aut ritè assimilare possunt, donec emacientur tandem, & ita successivè in tabem proruant: ut ob id exillimem, non tam ratione nutrimenti à vermibus exhausti, quàm ratione symptomatum ab illis introductorum, maciem & tabem consecutivè supervenire. Ubi ergo adfunt talia symptomata, mulieres statim dicunt, aut subesse fascinationem, aut adesse crinones.

### C U R A.

**Quoad Curam:** Crinones sunt eliciendi. Hi cognoscuntur & remouentur simul, si infans deducatur in balneum aquæ dulcis, in quo benè fricetur cum melle farinà subacta; sic enim sub lotionem hujus dulcedine allecti cum sudore per poros erumpunt sub forma pilorum nigrorum crassiorum, qui tamen postmodum, dum ita emittunt capita, commodè vel cum unguibus acutioribus, vel novacula exigua, vel cum crusta panis acuta, subtiliter abraduntur, & ita tolluntur; id quod aliquoties reiterandum erit, unde melius habere infantes observantur. Aliis in more positum est, ut ablutos in balneo infantem manu melli intinctâ blandè perfricent: & hinc proleptos vermiculos vel crustâ panis durior in formam aciei cultri rescissa, idque tutius; vel scalpello, idque minus secure, abradant & removeant. **PETRUS à CASTRO** *Tr. de Colostro* mulierum Lusitanarum experimento fuliginem camloariam cum melle & lacte mixtam, dorso illitam laudat. Quidam loco talis unguentum ex melle imponunt infantes in lixivium, in quo sterus pullorum gallinarum bullivit: Huic ipsi lixivio ad collum usque immergunt infantes, & ita nonnihil ad sudorem disponunt, postmodum levi manu melle illud crinones pruritane, quos postmodum dicto modo vel novacula vel crustâ panis acutâ abradunt: repetitur toties (ad biduum, triduum) quamdiu præsentia talium hospitem se manifestat.

Quodsi copiosiores sint, aut subinde regenerentur, radicibus evellendi sunt secundum modum **TIMÆI Von Guldenkle**, quem habet *in suis Casib. lib. 5. de morb. infantum cap. 23.* nempe ut propinentur internè tincturæ antimontales; loco quarum tamen essentia myrrhæ & remedia viperina non erunt minoris pretii. Externè verd in balneis talibus & post talem frictionem quotidie abstergendi sunt infantes cum aqua sua aloetica, parata ex aqua absinthii  $\mathfrak{ssij}$ . In qua dissolutæ sint aloes hepaticæ  $\mathfrak{ssij}$ . Hac ipsa aqua fricati ita infantes omnino amittunt, & curantur ab istis crinonibus. Quin imò putarim, aquam hermeticam seu decoctionis Mercurii vivi, uti lumbricis & scabiei optimè conferre solet, etiam eandem in balneo cutim abluendo usurpata, citra ullum periculum dictos crinones necare & tollere posse. Plura de his videb. in **VELSCHIO** *supra citatis locis*. Unguentum contra Sirones vid. in **SENNERTO** *Pr. lib. 5 pag. 118.*

### C A U S A IV.

#### D E

### VASORUM LACTEORUM & GLANDULARUM MESENTERII OBSTRUCTIONE.

**P**orro quarta *Causa atrophie & maciei* infantum, hæc ænus ferè incognita, est, quando commodè nutrimentum distribui nequit, ex infarctu & obstructione viarum ac ductuum abdominis, vasorum lacteorum, & consequenter glandularum mesenterii, per quas vias naturaliter chylus deberet moveri ad massam sangulneam. Certum enim est, quod his ipsis locis obstructis & oppilatis, tandem deficiat necessariò corpori nutrimentum: unde tales infantes quoad membra sunt macilenti, & minus nutriuntur, *Etmull. Oper. Tom. II.*

quin potius decrescunt; abdomen autem ferè tumet; ut plurimum secessus liquidi copiosi observantur. Vocant hunc affectum mulieres Germanæ *das unterwachsen der Kinder*, quando scilicet intumescit abdomen infra collas: conf. **M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 152. pag. 227.** **SYLVIVS** *Prax. lib. 1. cap. 14. §. 56. pag. 168.* **BARBETTE** *in Prax. lib. 3. cap. 2. Observ. 3. & Anat. Pract. lib. 1. cap. 14.* **HOEFERUS** *Herc. Med. lib. 7. pag. 349.* & **SYDENHAM.** *de Feb. pag. 89.*

### C A V S Æ.

*Causæ sæpissimè sunt pulmenta viscidiora & tenaciora, uberius ingesta; Nutrices enim interdum vix desistunt, quin infarciant talia pulmenta, ut tantum non digitis attingere ferè possint. Hinc fit, ut talia pulmenta loco nutritivi succi distribuendi sæpissimè degenerent in mucilaginem crassam, plus minus acidam viscidam, quæ successivè intestina aut admodum incrustando, aut orificia & ductus lacteorum obstruendo, etiam ipsas glandulas mesenterii consequenter infarciendo, debitum nutrimentum corporis deficere facit.*

### D I A G N O S I S.

*Signa ex modò dictis faciliè patent, imprimis ex causa prægressa, ex tumore abdominis, item ex aliquali ejus ad tactum duritie, quæ excernuntur, solent esse viscida, albicanteria, & quæ sunt similia indicia.*

### P R O G N O S I S.

*Periculosum est hoc malum; nam atrophie lethalis tandem necessario sequitur.*

### C U R A.

Si ergo ex denegato nutrimenti transitu, & debitâ distributione cessante, atrophie infantes corripit, pro cura hujus mali internè conveniunt alimentis depravationem corrigentia, & hujusmodi mucilaginosas sordes, vasa obstruentes, alterantia & resolventia. Conveniunt ergo laudata sæpius *salia volatilia*, quæ forti penetratione obstructos antea meatus referant, præmissis & interdum iterato subinde blando laxativo, ob id lactationis tempore subinde iteranda: sicuti post ablactationem convenit *tartarus vitriolatus Tachenii*, ut & arcanum duplicatum Mynsichti, in brodio seu decocto passularum propinata, quotidie reiteranda. Pariter liquor terra foliata tartari seu sal essentielle tartari resolutum in liquorem, infanti subinde guttulatim propinatum, à **BARBETTE** laudatur in *Praxi lib. 3. cap. 2. pag. 3.* Item tinctura tartari. Commodè etiam usurpantur Martialia, liquor seu tinctura vitrioli Martis tartarifata; vid. **M. A. N. C. Ann. 3. observ. 150. pag. 454. & crocus martis aperitivus cum tartareis permixtus. Hinc ceu præsentissimum sæpeque expertum remedium in tali casu commendat **HOEFERUS** in *Herc. Med. pag. 249.* Pulmentum illud, quod vertex ferreus rotæ molaris inter movendum colligit, extra illitum, quod nihil aliud est, nisi subtilissimus quidam crocus martis istâ agitatione, è ferreo vertice abrasus. Unde **HORSTIVS** propinat in tali casu infantum aquam istam, quæ in arcuandis instrumentis ferreis sub cote colligitur, *Germ. das wasser vom schleif-Stein.* Commodius est, ut usurpentur tincturæ Martiales, imprimis permixtæ cum remediis tartareis. Hæc interius oblata sunt optima.**

Externè commodè fiunt unguenta & linimenta abdomini illinenda pro resolvenda & attenuanda ista mucilagine spissiore & meatibus referandis, quæ attenuata postmodum in intestinis blandè per laxantia est evacuanda. Imprimis conveniunt linimentum ex gummi ammoniaco supra laudatum, ubi de Torminibus; vel unguentum Martiatum, unguentum Althæa compositum, & oleum Philosophorum, mixta, selle tauri acuata, & abdomini illita. Sequens unguentum **BARBETTE**, quod habet in *Anatomia Practica l. 1. cap. 14.* est egregium, quod etiam singulariter commendat:

Nempe

24. Ungu. Alth. compos.  $\mathfrak{ssij}$ .

Arthanit.

Martiat. an.  $\mathfrak{ssij}$ .

Ol. lil. alb.



*Olæ Chamomill. an. ℥ij.*

*M. f. Linimentum:*

Quo inungitur abdomen.

Aliud habet in sua Praxi citato loco, scilicet:

*℥. Ungu. dialth. compos.*

*Arthan. an. ℥ss.*

*Ol. macilag. ℥j.*

*Misc. pro Linimento.*

Conveniens etiam est, si fiat *unguentum Sylvii Prax. lib.*

*1. cap. 14. §. 56. pag. 167. Nempé:*

*℥. Ungu. dialth. vel simpl. vel compos.*

*Ol. lib. alb. an. ℥ss.*

*Laseris Philosoph. seu ℥ij.*

*M. f. Linimentum.*

Quod commendat SYLVIVS insigniter, ut eodem inungatur abdomen infantis, dum lectulo imponitur, resolvit potenter visciditates intestinorum & glandularum mesenterii, ut postmodum feliciter blandis evacuantibus possint evacuari.

## C A V S A V.

### D E

## FASCINATIONE PUERORUM.

**O** Vinta denique causa maciei puerorum sapius est aut saltem dicitur Fascinatio seu Fascinum, quod vocant, Germ. *Wendie Kinder beschrien sind*. Vim talis fascini cum PARACELSO multi moderni ex impressione imaginativa deducunt, quæ per solum visum potest nocere. Alii hoc ipsum negant, & totum negotium veneficio attribuunt: de quibus hic non est dicendi locus. Sufficiat subsumptionem esse fascini & veneficii, vel in tali statu, ubi nulla adest sufficiens causa, quæ monstret affectum alium: item quando cum macie simul præter spem nimis imbecilles & debiles sunt infantes: item quando subsumptio est aut suspicio de vetula, quadam, quæ familiaris aliquando cum infante fuit conversata. Prolixum Tractatum de Fascinatione edidit D. FROMMANNUS. Sed ad hoc, ut cognoscatur, an fascinatus fuerit infans? cum ponitur vas aqua fluente plenum sub cunis, in illud iniicitur ovum; quod si natat in alto, fascinatus est infans: si vero cadit fundum versus, nihil adest mali: Ratio est, quia Spiritus ligati voluit esse liberati, ideoque attrahunt ovum in alium.

## C U R A.

Ad tollendum hunc fascinum & veneficiū partim superflua quamplurima, partim naturalia revocantur remedia.

Internè suadentur aliæ contra fascina corallia, viscoso-ryli pulverisatus, aut etiam pulvis baccarum uvæ inversæ seu herbæ paridis: Item pulvis GANSII in suæ Coralliis Tractatu ex semine antirrhini, coralliis rubris & albis, & dente hominis mortui; Nam coralliis singularis adscribitur efficacia. Unde Tincturæ Coralliorum quacunque ratione paratæ, in specie in vehiculo ex hyperico propinatæ, insigniter laudantur. Essentia hyperici, spiritus secundinæ primiparæ, pulvis secundinæ primiparæ, quæ uti aliæ ad quæcunque veneficia, ita in specie ad fascinum seu maciem ex fascino insigniter commendantur, si remedia ex secundina parata interius propinentur infanti.

Externè conducit sacculus appensus ex floribus seu summitatibus hyperici, & baccis uvæ inversæ cum semine & herba antirrhini: item suffumigium ex herbis contra fascinum & veneficia decantatis, v. g. ex conyza flore cæruleo, hyperico, antirrhino, dentibus hominis mortui, viscoso-rylino & quercino, ac similibus. Quibus adiungenda etiam sunt balnea, quæ inter præservat à macie balneum, cui cortices & folia salicis sunt incocta, quod insigniter commendatum ab HARTMANNO & GABELCHO. VERO tam curæ quam præservat à macie. In ipsa macie cum foliis & corticibus salicum possunt simul incoqui flores squilegiæ, adianthum, antirrhinum, hypericon, conyza, folia & baccæ inversæ. Sideritide cum filagine, vel solitario, vel cum hyperico & tanacetum, mulieres utuntur pro balneo, fricantes eisdem unâ cum herbis, & tunc comparent copiosæ sordes extrinsecus, incantationis indices habetæ, sed falsæ: Conf. HOEFERUS *Herc. Med. pag. 107.* Convenit etiam iunclio ex unguento corylino ad venefi-

cia HEINRICI ab HEER, quod videbitis in ejus observationibus; aut imponatur regioni stomachi emplastrum Mynsichti contra veneficia, malaxatum cum hoc ipso unguento seu oleo corylino Heurici ab Heer. Ex sola Asa foetida etiam potest fieri emplastrum contra maciem ex veneficio seu fascino oriundam, ventriculo imponendum. CASTRO in suis Manuscr. pro pueris fascinatiss sequens unguentum commendat:

*℥. Ol. Rosæ.*

*Nardin.*

*Massich.*

*Succ. Mentha,*

*Asynth.*

*Cydonor.*

*Pom. redolens. an. ℥ij.*

*Corall. rubr.*

*Pulv. ras. Eboris,*

*Xyloaloes an. ℥ss.*

Cum s. q. Cerae f. Unguentum:

Quod bis vel ter in die stomacho applicandum suadet.

Solet etiam Hispanica mulieres suffumigare partes fascinatæ gummi ammoniaco, cui commodè asa foetida potest addi. Sepè etiam observavit à Castro sufficere suffitus ferrei calcei equini nigri, Germ. *aus einem Hufe Eisen*, candentis, aceto ter excitatus, quo suffumigandus est puer.

## ARTICULUS XXX.

### D E

## FEBRIBUS.

**D** Enique quoad Febres infantum: hæ sunt variae, quæ eos infestant, rariùs tamen intermittentes, nisi in infantibus paulo adultioribus, aliquot nempè annorum, ordinariò plus minus acutæ & continuò ardentes, hæque ipsæ sæpiùs cum pustulis & exanthematis conjunctæ, quæ vulgo vocantur variolæ & morbilli, pro varietate exanthematum.

Omnes autem febres, nisi malignæ ex contagio natæ fuerint, originem habent ex cruditatibus viscidis acidis primarum viarum, siue lactentur adhuc, siue ablactati fuerint.

## FEBRES LENTÆ.

In specie, si succus nutritivus minus viscidus, crudus tamen, & vitioso acore inquinatus, vel saltem acris-falsosapore infectus, distribuatur ad massam sanguineam, pro hujus augmento & corporis nutrimento, necessariò ex tali alimento inepto depravatur massæ sanguineæ crasis, vitaturque insigniter sanguificatio, & inde oritur præternaturalis ejus effervescencia, unde Febres variæ, imprimis tamen lentæ, sub vespere præcipue exacerbantes, supervenire solent. Hinc etiam consequenter vitatur lymphæ, & redditur nimis acida, acris & simul subinde nimis viscida, unde & circa glandulas Tumores, & varii affectus catarrhales infantibus superveniunt, in specie tussis sicca nocturnæ, ex lymphæ talis acido-acris ad laryngem effusione; item per membranam pituitariam inferiorem transudatione oriunda: Obteunditur contra bilis sal volatile oleosum seu balsamicum, unde perfectio digestionis primæ in intestinis deficit ultimò, & ita magis magisque propullulantes jam confirmantur egritudines.

## FEBRES ARDENTES.

Cæterum præter has & aliæ febres variae, plus minus acutæ & continuò ardentes, aut periodicæ continuæ, aut catarrhales, similesve frequentes sunt inter tenellos, quarum ratio omnis ex corruptione lactis interna, aut ex obstructione pororum cutis externa, optimè explicatur. Nam præter cruditatem acidam lactis & pultis in stomacho infantili, unde ejus febres frequentissimè nunc lentæ nunc acutæ scaturiunt, & jam variae aliæ omnino sunt lactis corruptiones, jam supræ insinuatæ, siue in stomacho sub digestionis primæ, siue in intestinis sub hujus digestionis perfectione & secum separatione superveniant; in specie cruditas nidorosa appellatur, dum flavacopiosa aut fetida ab infantibus ejiciuntur. Excreta talia flava non sunt beneficio bilis tingentis, talis enim copia bilis in foetu juniore non adest, nisi infantulos serè omnes primo sui initio bilio-



biliosiores viris ipsis dicere velimus: neque amarescunt semper hæc ipsa, sed dulcescunt potius subinde, & avidè à cælibus amari omnis osoribus comeduntur. Sed ista excreta nidiorosa & flava sunt frequentissimè ex lactis vitiata digestionem, & ejus multiplici corruptione; Lacenim vitiata, quacunque ratione digestionem ventriculi spontè de facili citrinescere, sufficienter declarat HELMONTIUS Tr. Schol. Pass. Decept. cap. 3. Aded ut hujus digestionis primæ multiplici errata ex alimentis, & hinc affectibus nutritis primariò oriunda, cum non corrigi possint in secunda digestionem, necessariò sanguineam crasin in tantum alterent, & diversas vicioas in sanguine effervescentias febriles inevitabiliter inferant: id quod pariter in quibuslibet Infantum, etiam ab lactatorum, febribus, tam lentis quàm acutis, observandum venit, quæ omnes ferè pro causa interna Errata digestionis primæ in ventriculo & intestinis, propter ordinariam eorum addiphagiam, agnoscunt. Et quidem sicriditate nidiorosa, ex oleosa parte lactis corrupta, fuerit inquinatum lac, tunc febrem ardentem gravem insert cum insigni virium imbecillitate conjunctam: idque ed magis, si vel vigilæ præcesserint, vel nutritrix iracunda fuerit, vel aliquoque latente vicio fuerit correpta; Nam quæ dentitionem Infantum superveniunt febres, cum fere tantum non sint symptomaticæ, huc non pertinent. Edcitatis autem ex enararatis occasionibus sunt febres, quæ minus transpirant Infantem percutim, vel ob defectum caloris ambientis, vel crebriorem linteorum non sufficienter calefactorum mutationem. Ad hæc pertinet neglectus balnearum, admodum nocivus Infantibus, & eosdem ad febres disponens. Calidi sane balnei locio, ut sordes cutaneas Infantis copiosas abstergit & removel, ita & fibras retis cutanei laxando pororum aperture & copiosiori transpirationi amplam occasionem suggerit, cujus intermissio & poros constipat, & ex heterogeneorum coacervatorum impetu hujus febrili fermentationi uberissimam occasionem suggerit.

## D I A G N O S I S.

Patent facili febres Infantum, dum inquieti sunt, facies rubet, artus Infantis insigniter æstuant, Infantem sicculosi sunt, &c.

## P R O G N O S I S.

Vacant autem ut plurimum periculo hæc febres, utut, nisi in tempore occurratur corruptioni lactis, etiam lethale tandem fieri possint hæc febres.

Si superveniat Diarrhæa non nimis violenta, optimè curantur Infantum febres spontè natura quasi per motum criticum.

## C U R A.

Quod Curam: hæc pro varietatè febrium varianda venit.

Febres intermittentes, quæ rariores sunt in Infantibus ab lactatis, curantur ut febres adultorum, præmisso vomitorio, & interdum repetito, cum syrupo emetico, v. g. pro Infante duorum annorum ad ℥j. bihorio ante paroxysmum; vel purgatione repetitâ cum Mercurio dulci, qui promptè confert, si simul vomitum moverit. Vel

℥j. Pulp. Tamarind. ℥j.

Pulp. Mechoacan. gr. xv.

Sal. tartari gr. v.

Cum Syr. de Stachad. f. Bolus.

Quem aliquando præscripsi Infanti sex annorum in febre quotidiana intermittente, cum elixyr proprietatis sine acido, aut febrili cum essentia absinthii, & similibus, die intermittente crebrò usurpatis, ante paroxysmum propinando lapillos cancerorum cum sale absinthii fixo, vel sale Holstæico, dicto aliàs Arcanum duplicatum Mynsichtij, oleo destillato caryophyllorum; aut loco horum spiritu salis ammoniaci, liquore cornu Cervi succinato, spiritu carminativo de tribus, &c.

Si verò infans adhuc lactens febre intermittente corripitur, qualiscunque fuerit, curator præmisso vomitorio, aut purgatione Mercuriali, imprimis per aurum fulminans ante paroxysmum propinatum. Sic infans decem mensium quartana duplicata affectus, præmisso vomitorio antimoniali curabatur, propinando ante paroxysmum sequentem pulverem:

Ess. mul. Tom. Oper. II.

℥j. Auri fulmin. gr. i.

Ebor. sine igne gr. viij.

M. pro Pulvere: S.

Aperiens pulvis febrilis.

Detur aliquoties, donec cesset paroxysmus, observando, ut aliquot horis ante paroxysmum jejunus servetur infans, ne lacte in ventriculo nondum digesto paroxysmus superveniat; quin etiam non prius mamma porrigenda venit, nisi in statu paroxysmi, ubi æstus jam invaluit.

Lactis loco pro sit fallenda commodè proplacetur:

℥j. Aqua flor. samb.

Card. bened. an. ℥vj. ad ℥j.

Spir. sal. ammoniac. gr. xv. plus minus.

Lap. cancr. præp. gr. xv.

Syr. fenic. ℥ij.

M. f. Potiuncula: S.

Potiuncula febrilis.

Externè verò recipiatur cepa, hæc contusa applicetur capis, & aliquandiu relinquantur.

Continua verò lenta, ex acido viscido, ut & cognatæ Febres Catarrhales ex lymphâ nimis acida, curantur, præmissis laxativis & clysmatis, optimè spiritu salis ammoniaci, vel simplici vel anisato, aut liquore cornu Cervi succinato, in specie posteriores. Non curemus æstum, qui tempore vespertino adest, nam quia est ab acido, sistitur à calibus volatilibus. Item tinctura myrrhæ supra dicta salutariter convenit. Quod si verò ablaetati fuerint, optimè liquor tartari supra laudatus, item sal ammoniacum cum dimidio lapillorum cancerorum sæpius reiteratum eas profligabit.

Item

℥j. Aqua flor. samb. ℥j.

Mentha ℥ss.

Acet. vini ℥j.

Lap. cancr. præp. ℥ss.

Antimonij diaphor. gr. xij.

Syr. flor. Tunic. ℥ij.

M. S.

Mixtura discutiens.

Quoad Febres verò continuas ardentes & benignas, aut his similes, utut rariùs affligant tenellos, nihil ferè peculiare habent, quàm quod has, præmisso imprimis vomitorio, vel aliis primas vias evacuativis, præceteris curent abstergentia, cornu Cervi sine igne præparatum, & cum eodem compositus pulvis febrilis LUDOVICI in Pharm. pag. 280. & 281. quàm etiam salia volatilia: v. g.

℥j. Aqua flor. samb. ℥ij.

Spir. sal. ammoniac. gr. xv.

Cornu Cervi sine igne,

Maxill. Lucii piscis an. gr. xv.

Syr. Papav. albi ℥ij. ad ℥ij.

M. pro Potiuncula: S.

Potiuncula refrigerans.

Propinetur cochlearium.

Vel propinetur pulvis ex cornu Cervi sine igne, myrrhâ, &c. supra de Terminibus præscriptus: item Cinnabarina, antimonium diaphoreticum fixum, & similia probe conveniunt; non secus atque gelatina cornu Cervi recens parata, tam Infanti, quàm in specie etiam nutriti, in potu ordinario frequenter dissoluta, temperando acre, & sale volatili corrigendo acidum, simulque conservando corpus in debita diaphoresi, multum Infantibus prodest. Stercus equinum recens potui ordinario, quem præter lac avidè suppetunt, infusum in nodulo & subinde expressum, multum prodest in mitigando æstu harum febrium: vile quidem, sed non nisi à superstitione delicatis contemnendum est euporiston. Aliàs, si robustiores paulo extiterint, nitrum antimoniatum, uri & arcanum duplicatum Mynsichtij modò laudatum, cum modò dictis exhibita, sunt egregiè proficua: ex gr.

℥j. Arcan. dupl. gr. xxiv.

Cornu Cervi sine igne ℥ss.

M. f. Pulvis:

Div. in 2. part. æqu. S.

Pulvis refrigerans.

Quin & nitrum præparatum in jusculis aut cum pulicula commodè permiscetur & propinatur.

Sin ablaetati Infantes fuerint, etiam blanda acida addi possunt, Tinctura nempe rosarum cum spiritu nitri parata, item syrupus granatorum acidorum, syrupus de citro, & ex similibus paratæ misturæ blandæ acidulæ pro compescendo æstu sitique molesta: v. g.

Q 99 4 ℥j. Aquæ



24. *Aquæ scorzon.*

*Rubi idæi an. ʒi.*

*Succ. Rub. id. ʒvj.*

*Tincturæ flor. Papau. err. ʒi.*

*Cornu Cervi sine igne ʒi.*

*Antimonii diaphor. gr. xv.*

*Syr. rubi idæi vel Papau. alb. ʒʒ.*

*M. pro aliquot dos.*

*ʒ.*

*Mixtura refrigerans, capienda cochleatim.*

Sicut & seri lactis cum succo citri acidulati potus non est ingratus.

Nutrici blanda laxativa sunt propinanda: hinc sæpius propinetur cornu Cervi cum rob. samburi aut baccarum juniperi, idque imprimis dum cubitum estitura.

Externè convenit imprimis oleum rosarum, cui camphora sic permixta, quod oleum rosarum camphoratum spine dorsi illitum mirè confert ad arduentes infantum febres. Item ruta viridis concusa, ac aceto mista, optimo consilio plantis pedum alligatur. Lutum etiam foratum cum succo rutæ mistum, & aceto irroratum, ad temperandum estum febrilem commodè applicatur infantum plantis pedum. Optimum est, si recipiantur herbæ anserinæ M. v. quæ planta concusa & probè concisa miscetur cum paucosale: additur his succus ex radice *Armoracia* minutim rafa expressus, pulvicula vel cataplasma ex his confectum excipitur linteis & applicatur plantis pedum. Mirè conducit ad febres infantum.

Quodsi etiam, quod interdum evenit, simul cum febribus infantum conjuncti sint pedum tumores, hi ipsi hoc ipso remedio promptè discutuntur & resolvuntur.

Quodsi malignitas adfuerit, eodem modo curandæ veniunt atque variolæ aut morbilli, de quibus suprà pluribus actum. Unde, præter modò narrata, etiam emulsiones in variolis cum cornu Cervi sine igne, antimonio diaphoretico, terra sigillata, & similibus in specie conveniunt. Pulveres quoque ex cornu Cervi sine igne cum myrrha &c. suprà laudati, interdum etiam *Theriaca* & *Mithridatium*, uti & mixturæ cum electuario discordii Fracastorii, aut moderatè theriacæ dosi impregnatæ, in paulo robustioribus tutè in usum revocari possunt.

## EPILOGUS.

Hec & similia, quæ hætenus tractata fuerunt, uti primariò de tenerioribus, & qui nutricis adhuc sustentatur lacte, intelligenda veniunt infantibus; ita etiam eadem mutatis mutandis de facili applicari possunt ablactatis, & vegetiore robore jamjam adolescentibus, & usque ad duodecimum annum prouectis; saltem observando, quod quicumque infantes, & speciatim qui lautiori gaudent diætâ, & à teneris unguiculis luxuriosè magis, quàm salubriter, educari solent, propter communem iis addiphagiam, & quasi nimiam voracitatem, coaceruent succos crudos acidos, & pituitam viscidam, quæ se habent simili modo ac laccoagulatum, vel ex pulve congestus mucus, ex quibus cœu uberrima scaturigine similia iis, quibus sub lactatione, ex lactis præternaturali aciescentia & corruptione, &c. consistari solent, mala in eosdem largiter redundare solent; unde eadem serè aut similia medicamentorum genera ablactatis, quæ infantibus lactentibus conveniunt, usurpari possunt.





# LIBER VI. CHIRURGIA MEDICA.

## PROOEMIUM.

**P**ergimus nunc ad *Chirurgiam*, & quidem *Medicam*: non enim omnia, quæ Chirurgo propria sunt, pertractanda suscepimus, sed quantum spectat ad Medicum, ut curationes Chirurgicas aut corrigere, aut dirigere, aut prompto consilio adesse possit ac debeat. Ob id, quæ ad operationes Chirurgicas in specie pertinent, omnia missa faciemus, eaque alii tempori reservabimus, & potius synopsin Theoretico-Medico-Practicam pertractabimus.

*Chirurgia* ergo est ista pars Medicinæ, quæ manuum operâ externâ mederi docet affectibus corporis humani externis.

Affectus autem huius Medicinæ parti subiecti quinarlo numero commodè comprehenduntur; suntque *Tumores*, *Vulnera*, *Ulcera*, *Luxationes*, & *Fracturae*: quorum priores tres partibus mollibus; posteriores verò duo partibus duris sunt proprii.

Artifex Chirurgiæ dicitur *Chirurgus*, cuius descriptionem exactam præ ceteris docet **CELSUS** in *Prooemio* in 7. *sua Medicinæ Partem*.

Jam harum partium affectuum, nempe aut durarum aut mollium, exacta notitia per necessaria est, & in durioribus scienda est:

1. Earum *Conformatio*, *Situs* & *Convexio*.

2. Earundem *Usus*; &

3. Quod his omnia mucida, omnia *unctuosa* & *pinguia*, ac oleosa *vulgaria*, maxime novæ sint illudem, nigrantea artificiosè ea volatilitata & destillata fuerint. Est enim in omnibus istis occultum acidum, quod pertinaciter adherendo ossibus, faciliè etiam carnem corrodit: hinc potius sicca & *amariscula*, item remedia sale paulo acriora talino prædita, in ossium affectibus sunt convenientissima.

Hæc de partibus duris.

In partibus mollioribus præ ceteris accuratè notanda est *differentia inter partes sanguineas, & spermaticas* seu *nervosas*: quarum hæc ex colligamento uterino ortu immediate postmodum succo chyloso nutriuntur & sustentantur; Sanguineæ contra, productæ prius & ortæ ex sanguine, sanguine etiam postmodum augmentantur & conservantur.

Distinctio ergo inter has duas partes vel maxime est observanda, quæ utramque paginam facit, tam propter prognosin in affectibus chirurgicis ferendam, quam etiam propter curam & medicamentorum convenientium electionem & applicationem, quæ pro partium harum varietate variat.

Nam

1. *Sanguinearum partium affectus* Chirurgici, *Tumores*, *Vulnera* & *Ulcera*, sunt longè tutiores, quàm *nervosarum*, nec tantis symptomatis, in specie gangrænæ & morbis convulsivis aded sunt obnoxii, neque etiam aded sunt sensibiles, nec aded faciliè irritabiles: unde vulnera articularum v. g. longè periculosiora sunt & citius gangrænam contrahunt; item periculosiora obtinent symptomata atque vulnera partium musculosarum sive carnosarum.

2. Affectiones hæc in partibus sanguineis curatu sunt longè faciliores; quàm in partibus nerveis.

Hinc

3. Non sunt aded dolorificæ sive dolorosæ, sanguineas si occupaverint partes, quàm si affligerint nervosas.

4. Etiam si in partibus sanguineis superveniat aliquod fermentum præternaturale corruptivum, ut in vulneribus & ulceribus ordinariò fieri solet, hoc in sanguineis non aded est acre & vitiosum, non

aded malignum, sed est mitius longè & correctu facilius, quàm in partibus *nervosis*: Unde in gangrænosa ulcera promptius longè abeunt in nerveis partibus, quàm in sanguineis.

5. *Sanguineæ* partes ablatæ aut detruncatæ facilius restituntur, aut saltem quodam analogo refarciuntur; secus ac fit in nerveis, quorum iactura solet esse immedicabilis.

Hinc

6. *Sanguineæ* partes læsæ debillioribus etiam medicamentis facilius auscultant, & imprimis *temperata balsamica*, seu *sale volatili oleoso* temperato prædita, naturæ amica possulant. Ex errore verò applicata forsitan paulò acriora melius perferunt: nervosæ verò, utot his balsamica temperata sint acceptissima, tamen eadem debilia subinde conducunt; acriora verò & fortiora easdem irritant, earumque affectus longè deteriores reddunt.

7. Denique quomodocunque curatæ lésiones distarum partium *sanguinearum*, nec lésiones nec deformitatem tantam in corporis actionibus, neque etiam tantam membris deformitatem afferunt contracturam, incurvationem, & sic porro, quàm fit in partibus nerveis læsis.

Juxta partes has, tanquam primariò subiectas lésionibus & curationibus Chirurgicis, etiam quies abluunt exactè considerandi sunt liquores; primariò quidem sanguis, hinc etiam chylus nutritivus, cuius vehiculum separatum ex parte constituit lympham.

Sanguis salinus volatilis oleosus & balsamicus, spiritu salino similiter volatili balsamico turgidus, partium conservationi dicatur, ubi corruptionem incurrit, acorem quidem faciliè contrahit, sed hunc aut arte faciliè corrigibilem, aut spontè effervescendo sale volatili oleoso in pus salsum temperaturatum transmutatur.

Chylus verò latice aquoso dilutus, & hinc postmodum lymphæ, vitiati insigniter aciescunt, & in mucilagines varias sepius, in specie in locis glandulosis in liquamen corruptivum corumpuntur.

Jam verò in distarum partium externa lésione, & earundem Curatione Chirurgica, tria imprimis observanda in genere:

1. *Naturale conservandum*: & hoc est imprimis naturalis humorum motus, tam universalis sanguinis & lymphæ, quàm particularis succi uniuscujusque partis nutritii balsamici; nam hi humores faciliè delent omnes affectiones.

2. *Præternaturale tollendum* seu delendum: & hoc est imprimis acor vitiosus sepius putrefactivus, tam interdum in massa sanguinea, quàm in specie in stomacho & primis viis, primariò autem in parte læsa tanquam fermentum corruptivum præternaturam enatum. Deleto hoc acido & sic vel spontè curabuntur vulnera & ulcera.

3. *Symptomata mulcenda*: & inter hæc præ aliis est dolor, qui sepius est vel tensivus, vel morficans, & pungens seu corrosivus.

Hæc tria probe observanda in omni casu chirurgico; facilitant etenim curam, neglecta verò eandem difficiliorem reddunt. Nam *primum* si absit, corporis totius, in specie partis læsæ, æconomiam naturalem turbat; *secundum* lésionem morbosam sustentat & auget; *tertium* corpus partemque debilitat & ideo accidentia advocat: Et hoc ipsum tertium ex primis duobus primariò dependet. Nam dolor tensivus ex impedito motu liquoris transeuntis, indeque partis dilatatione oritur, uti fit in tumoribus; corrosivus verò



verò & pungens dolor ex acido habet originem præter naturam rodente & vellicante.

*Auxilium* ergo in genere, quæ his conveniunt affectibus, ex tribus petuntur fontibus, imprimis Dieta, Pharmacia, & Chirurgia in specie sic dicta.

*Manus* artificiosa *Chirurgi* debet esse activa, partim removendo impedimenta seu impedientia, partim applicando conducentia remedia. Quæ applicanda sunt, ex Pharmacia desumuntur, imprimis ex regno vegetabili, remedia nempe, quæ sale volatili balsamico constant, ut sunt dicta vulneraria resinosa & similia, quæ utramque paginam faciunt in Chirurgia. Nam hæc non tantummodò tribus superiùs monitis requisitis, quocunque usu interno & externo, optimè satisfaciunt, sed etiam pro aliis scopis hinc inde intervenientibus optimè unà succurrunt.

Imprimis autem, dum impedimenta removet *Chirurgus*, ea scilicet, quæ naturam tanquam primariam Medicatricem in suis actionibus morantur, verè artificiosum se exhibet, dum nempe

1. Separata jungit.
2. A situ naturali dilapsa reponit.
3. Id quod inutile aut vitiosum est, à toto separat.
4. Deficiens, quantum possibile, restituit; &
5. Solvendo continuum & meatus aperiendo promptè succurrit.

Hæc sunt operationes primariæ, quæ *Chirurgo* incumbunt in operatione manuali; quæ optimè descripta videbitis san-

quam in synopsi in *Microtechnicæ* *Hornii*, item in *Armamentario* *Chirurgi*. **SCULTETI**; sicut etiam videnda sunt in *efficaci Medicina* **MARCI AURELII SEVERI NI** Medici Neapolitani: quæ tamen vix melius, quàm per autopsiam ocularem, addisci, & per Praxin deduci possunt.

Jam ergo pro remediis varietate *Chirurgia* est duplex, vel Medica, vel Manualis. Medica consistit in recta cognitione affectuum præternaturalium per manum chirurgicam tractandorum, & legitima inventionem remedium ex Pharmacia & Dieta convenientium: Manualis verò versatur saltem circa operationes chirurgicas, quæ nos non tangunt.

Hæc in genere de Chirurgia monuisse sufficiat. Circa Therapiam affectuum & inventionem remedium ex fonte dietetico & pharmaceutico considerandi sunt Autores: Inter omnes optimi sunt, & quidem in Chirurgia Rationali: 1. **AGRICOLA** in *Chirurg. Parva*, 2. **BARBETTE** in *Chirurg. & Anatom. Practica* 3. **FELIX WURTZ**, qui rectè ab **HELMONTIO** *Chirurgorum Antesignanus* vocatus in libro suo intitulo *Wund-Artzney*: In Chirurgia verò Mechanica: vid. **FABRICIUS** ab **AQUAPENDENTE**, **PARÆUS**, **SCULTETUS**, & **GUILLEMEAU**.

In specie cum quinque dixerim esse affectus, qui *Chirurgi* manui sunt subiecti, jam inchoandum

## C A P V T I.

### D E

## TUMORIBVS IN GENERE.

**Q**uod attinet *Tumores* in genere: nomine *Tumoris* in genere intelligitur Magnitudo partis præternaturaliter in longitudine, latitudine, & profunditate aucta, sive sit conjuncta cum materia purulenta, ut abscessus, sive non: Convenit cum abscessu in conceptu generali, qui internè differunt ut genus & species.

*Excrescentiæ* ergo præternaturales, in quibus non tam major sit pars, quàm nova moles quasi adnascatur ipsi, propriè non sunt tumores, utut respectivè harum pertractatio ad Tumores pertineat, & etiam pertractentur simul.

### C A U S A E.

*Causa* in genere omnium *Tumorum* seu auctæ magnitudinis est (1.) vel pars quedam ex naturali situ dilapsa, & in proximam partem propulsa seu dislocata, aliam partem expellens; & est nunc mollis, uti apparet in Herniis; nunc dura, ut in Luxationibus; quibus semper conjuncti sunt Tumores. (2.) Vel est *Humor* quidam replens, indeque partis magnitudinem augens. Vel (3.) est *Platus* dissendens; unde etiam non raro sunt *Tumores fluviosi*, qui interdum antequam aperiuntur, abscessum mentiuntur, & hi imprimis in genibus solent esse frequentes.

Ex quibus causis tamen causa media, nempe *Humor*, solet esse frequentissima: Nam licet interdum etiam lapides, item vermiculi, pediculi, copiosa parva quasi ovula, item crines, & similia varia, in Tumoribus & inde natis abscessibus reperta fuerint, easque in ipsis Tumoribus genita; (unde excludo hic ea, quæ extorsum per Incantationem intenduntur;) tamen cum hæc sint rariora, ad insolita naturæ opera meritò referenda, quæssi, quod sit ut plurimum, nil derogare possunt. *Humor* ergo, qui partem replendo Tumorem producit, in eadem colligitur de novo, qui antea non aderat: & quidem vel ob motum humoris cuiusdam trans partem impeditum, unde oritur humoris stagnatio; vel propter novam humoris in parte generationem.

Stagnatione fiunt Tumores, si humorum motus per partium meatus & vasa subtilia impeditur, & est hæc humorum stagnatio, & inde natus tumor, vel simpliciter vel paulatim congestio: Illa fit in Tumoribus aliis vulgò notis; hæc fit etiam imprimis in *Tumoribus criticis*, hisque aliis analogis tumoribus: Ibi promiscuè hæret humor transiens; hic verò, quasi secretionem quadam factà, partes quedam adbo-

rent, quibusdam adhuc transmissis. Hinc illa stagnatio propriè dicta; hæc Congestio dici potest.

Jam in specie ex stagnatione morbosa simpliciter dicta, fiunt omnes Inflammationes, omnes Contusiones, Erysipelata & similes tumores, & hæc quidem omnes ex sanguine; ex lymphâ verò stagnante fiunt Tumores œdematosi & serosi quicunque, item hydrops, tam universalis quàm particularis. Pertinet huc lac in mammis concretum, lochia circa uterum contenta, &c.

Congestione verò paulatina seu successiva Tumores Critici & Abscessus, hisque similes, Excrementis scilicet febrilibus, ob crassitiam aut coagulationem seu macerationem resistentibus, ipso sanguine aut lymphâ tenuiori sensim transeunte. Huc pertinent Bubones Pestilenciales, furunculi, Germ. die Schweren, phlegma, Parotides, Carbunculi, & his similes Tumores. Pro illustratione talium Tumorum consideremus saltem filtrum chymicum, quod per præcipationem ex liquore continente separata retinet, reliqua transmittit. Par ratio est in Tumoribus per digestionem abortis. Faciunt huc etiam viscerum scirrhi & strumæ circa glandulas enatæ. Hiemum Tumores sensim generantur ex viscidior ex humore sanguine & lymphâ relicto, tenuiore transeunte. Hoc modo fiunt Tumores per stagnationem.

Per novi humoris in parte generationem & collectionem fiunt Tumores reliqui, quando alimentum partis proximum coarctatur & colligitur in parte præternaturaliter: idque vel corruptum, vel plus aut minus alteratum.

Corruptum quidem, quando fermentum vitiosum quoddam in parte adhuc latens alimentum affluens degenerare, facit in varios vitiatos succos, qui successivè collecti dant Tumores, continuò in ulcera denuò degenerantes. Hinc enit fit, ut abscessus aut ulcera non sitè mundificata dent Tumores & abscessus recidivantes, qui vulgò malè fluxionibus corporis, ad certam partem decumbentibus, adscribuntur. Hinc caries ossium non sitè curata post ulceris consolidationem denuò novum infert Tumorem, novumque exinde natum abscessum. Pertinet huc *Bubo venericus* ex contactu scorti successivè in inguine enatus: item pertinent huc *Tophi*, *Cancer mammarum*, ac gummata Gallica, ex acido maligno, nutrimentum ossium corruptente, & hinc istos tumores excitante, unde postmodum Gummata ac Tophi enascuntur.

Ex alimento verò ulterius affluente, minus verò in parte al-



C U R A.

et alterato, oriuntur Tumores istis partibus quodammodo similes: quales sunt Tumores ossium fracturorum callosi, item carnis in ulceribus mundificatis luxurians & excresecientia, aucta viscerum insignes magnitudines, nodi item, & ganglia. Ex alimento vero congesto, sed magis alterato & coacervato, nascuntur Tumores, partibus quibus adhaerent nonnihil dissimiles; quod quidem pertinet omnes excresecientiae, ut sunt *Verrucae*, *Polypi*, item *Cornua*, quae ipsa comode ad verrucas referuntur, quales in superiori parte pedis enatum memorant M. A. N. C. Ann. 4. & 5. Obs. 180. Item *Fungi*, & omnes isti tumores, qui in propria tunica observantur contineri, quales sunt *Melicerides*, *Atheromata*, *Steatomata*, vel similia, de quibus pluribus infra.

Hæ sunt Causæ Tumorum generales proximæ.

Quoad Causas remotas: Stagnatio humorum quæcunque contingit aut vitio aviarum transmissioni repugnantium ob earundem angustiam, aut propter humoris ipsius ad transeundum ineptitudinem, vel propter sui crassitiam, vel propter ineptitudinem particularum ejus respectu figurationis ad poros partium.

Viciorumque sunt angustiae:

- (1.) Propter compressionem ab incumbendis quibuscunque.
- (2.) Propter constrictionem à vinculis, & sic porro.
- (3.) Propter obstructionem à materia viscida mucilaginosa ve efficiente frigido imprimis inspissata, aut ab acido condensata.
- (4.) Propter fibrarum partis contractionem ac crispationem, indeque natam porulorum partis angustiam, quæ oritur imprimis ex dolore seu dolorosa partis affectione.

Humorum vero crassities, & inde ejus orta stagnatio, accidit vel propter pituitam, quam vocant chylum crudiorum & viscidiorum, in prima vel secunda vel tertia digestionem non rite subactum, vel propter frigus humoris inspissans, aut propter acidum humores coagulans, aut denique propter remedium externum malè adhibitum transeuntes humores locraffans: quo ipso reiciuntur omnia Repellentia, & Adstringentia in Fracturis & Luxationibus ineptè applicata.

Denique Humoris particula malè figurata per poros transire nequeunt, quin hæ per præcipitationem separatæ ex massa sanguinea, & hinc densius agglomeratæ, in liquore fluctuant, quo vehiculo seu liquore vehente transeunte, per poros ipsæ resistant, ut in abscessibus Criticis usu venire solet.

Ex alimento coacervato & collecto præternaturaliter, aut etiam alterato oriuntur Tumores, quando fermentum, quoddam corruptum, ut plurimum visiosè acidum, in parte latet, quod ipsum alimentum partis proximum effluens degenerare facit, istudque transmutat in varios vitiosos succos, qui collecti sensim dant novos tumores atque abscessus, ut v.g. in abscessu, carie ossium, ulceribus non rite mundificatis, &c.

Alimentum vero minus alteratum dat tumorem, quando ut plurimum ex causa externa subinde propter labores ob poros partium dilatatos, fibrasque nonnihil laceratas, item propter membranas distinctas, alimentum copiosius recipitur, & ita uberius colligitur, unde Tumores oriuntur: Quæ ratione extenditis cujusdam in manu ex labore distensione circa articulos supervenit successive Ganglion; aut quando ex compressione aut dilatatione fibrarum ejus ex calce supervenit in pede *Clavus*, & similes tumores pro partis læsæ constitutione.

Alimentum denique plus minus alteratum à statu naturali, non tamen corruptum, dat excresecientias membranis propriis inclusas, & pro alimenti alteratione ex varia in membrana colligente transcolatione, nunc serum, nunc serum, nunc pulcem, nunc aliam similem materiam, cum radice tamen, ex qua enascitur, aliqualem analogiam obtinente, referentes tumores: Quin & *Polypi*, *Verrucae*, & similes hujusmodi nascuntur, adeo ut raro citra externam quandam violentiam, aut citra impetum quandam externum, item si absit hæc externa violentia, raro citra interdum levem ab acido vitioso præcedentem corrosionem, subnascitur talis Tumor: Sic enim v.g. ex ulcusculis narium, subinde propullulant *Polypi*.

Ut ergo curentur Tumores in genere, necesse est, ut evacuetur continens eorum Causa, seu potius in tumore contenta materia, quæcunque id fiat ratione, ut remota materia fibræ partium porique distenti denuò se contrahant, & ita naturalis parti redeat figura, & hanc postmodum insequeas actio & functio naturalis antea in parte læsa.

A stagnantibus humoribus pars liberatur:

1. Restituendo ipsis motum naturalem, si fieri potest.
2. Evacuando ipsos immediate ex parte, aut resolvendo, aut insensibiliter discutiendo, aut viam novam aperiendo, secando, vel urendo: Illud (nempe discussio) stagnantibus humoribus simpliciter; hoc vero (nempe apertio) humoribus congestis magis convenit.

Ut his duobus satis fiat, Motus stagnantibus restituitur vel vias angustas dilatando:

- (1.) Removendo impedimenta externa angustantia, ut sunt vincula, ligamenta: id quod in fracturis & luxationibus considerandum.
- (2.) Humoris coagulationem obstruentem solvendo.
- (3.) Dolorem tensivum mulcendo.
- (4.) Vel denique crassitiam ipsius humoris tollendo.

Tollitur hæc Stagnatio

1. Removendo externa in crassantia.
2. Temperando frigus inspissans: &
3. Corrigendo acidum coagulans.

Discutiuntur stagnantes humores vel insensibiliter; quod fit vel acidum coagulans temperando, & humores per medicamenta, partibus subtilibus constantia & penetrantibus prædita, sensim sensimque attenuatione dissipando; vel apertione novi foraminis evacuando humores; vel demulciti & temperati per suppurationem, si nempe mutationis in pus sunt capaces; aut saltem si à cruditate sua nonnihil sunt mitigati aut quasi alterati, si suppurationis perfectæ sunt incapaces.

Illud (suppuratio nempe) sanguineis aut cum sanguine permixtis liquoribus tantummodo convenit: Hoc vero reliquis saltem humoribus & tumoribus ex aliis occasionibus est proprium. Terenda tamen ubivis vestigia à natura præmonstrata.

Suppuratio fit, quando in sanguine stagnante & congesto evanescent & dissipantur partes ejus spirituosæ subtiles ac tenues; unde id, quod remanet, spissescit sensim & grumescit (hinc omnis sanguis extravasatus in grumos tandem concrevit) & ex corruptione successive acorem contrahit putredinalem, à quo acido fit effervescencia acris cum salibus volatilibus oleosis ipsius sanguinis, ex qua effervescencia aucta non tantum calor in parte affecta sentitur major, sed ipsa tumoris magnitudo successive in medio sui turgescendo augetur: & quasi florem acquirit. Unde dolor & tensivus (ratione partium distensarum) & pulsatorius (ratione articularum in motu impeditarum) intenditur, & tandem sanguis in pus corrumpitur, acido adhuc nonnihil prædominante, unde pus album apparet: omnia enim alcalia, oleosa vel sulphurea ab acido præcipitantur in album colorem, uti in Chymicis ex lacte sulphuris patet.

In hoc suppurationis negotio, acidum imprimis est considerandum: Nam hoc nimis excedente nulla fit suppuratio, sed aut partis in ulcus corrosio, aut tumoris in scirrhum induratio; deficiente vero acido non opus est suppuratione, cum liquor fluxilis tunc temporis aliâ ratione facile removeri possit, aut tunc exactâ temperatura opus non habent. Hoc ergo acidum cum sale volatili oleoso sanguinis concurrendo dat inflammationis ac similibus tumorum suppurationem. Ex dictis facile patet, qualia medicamenta in genere sint applicanda? Nam motum naturalem humoribus restitunt omnia ea, quæ resolvunt, attenuant, & alcali seu sale volatili plus minus temperato factum coagulum tollunt ac mobile reddunt.

Per diaphoresin vero Tumores discutiunt primariò quæ participant de sale volatili seu alcali, nunc acri, nunc fixo. tam minus quàm magis temperato, acidum fixum temperante & absorbente, atque ita occasionalem causam stagnationis tollente.

Suppurationem vero, si fit legitimo modo, adjuvet Chirargus, non applicando diaphoretica alcali acris constantia: quia



quia horum operatio dissiparet quasi tenuia & volatilia, reliqua verò spissiora induraret in scirrhum: nec applicet etiam his contraria acida, quia acida suppurationem impediunt, & facile occasionem grumescenzæ dant, & sic ulcus inducerent. Applicet ergo Chirurgus remedia temperata, humectantia, & blandè laxantia, occulto tamen alcali, ut vocat HELMONTIUS, & temperato constantia, plus tamen minus aciora, pro ratione nempe materiz suppurandæ. Imprimis tamen suppurantia debent esse nonnihil mucilaginosæ, & suaviter humore quasi roscido laxantia: nam talia acrimoniam humoris suppurandi, imprimis acidum, suaviter temperant, unde acido temperato salia in liquore suppurando minus impetuosè effervescent, & per consequens cum minore dolore & ardore inter se concurrunt, & blandè seipsius salis ununt & convertunt, dum interea per ista remedia applicata simul laxantur tensæ antea fibræ, unde dolor successivè mitigatur, & pus faciliùs exteriora versus viam invenire potest. Temperata ergo nonnihil mucilaginosæ dixi suppurantia esse.

Quodsi verò Tumor suppurandus constat materiâ crassiore & viscidiorè & acidiorè, qualis v.g. sit lac in mamma coagulatum ad suppurationem tendens, qui Tumor ob id minus fermentationi sese accinget, sed potiùs ad scirrhum degenerare velit, tunc cum ordinariis suppurantibus applicanda sunt paulo aciora, sale volatili magis acriminipregnata: qualia sunt cepacea, alliata & similia: de quibus inferius, prout conditio tumoris & humoris suppurandi requisiverit.

*Apertio Tumoris* (quæ est tertius modus curandi) aut *suppurati*, aut aliquantisper alterati, si ineptus sit ad suppurationem, sit vel spontè naturâ, dum supertensa cutis ob acrimoniam contenti humoris successivè eroditur; vel *apertio* ista sit arte: idque nunc ferro, quod *Lancettam* vocant, qui modus est optimus Gallis usitatus; vel *apertio* sit igne, qui modus ferè est Italorum, & hoc aut actuali per ferramenta ignita, quod tamen rariùs fit; vel potentiali caustico, sive *corrosivo*, quod constat ex sale quodam acerimo: Nunc quidem ex *alkali fixo* acri, idque usitatissimè: hinc parantur *Cauteria* ex lixivio saponario inspissato, Germani *Seisensieder Lange*, vel sunt cauteria ex calce viva cum cinere fraxini, vel hunc ex sale tartari & cineribus clavellatis, & quæ sunt similia alia subiecta *alkalia fixa*: Nunc verò constant *cauteria ex acido*, nempe butyro antimonii, quod singularissimum est cauterium pro parandis v.g. Fontanellis, item quod bubones vel carbunculos quoscunque optimè aperit; item parantur talia ex magnete arsenicali, qui legitime adhibitus est cauterium arcanissimum, quia indolens: sapienti sat; vel parantur ex lapide infernali, ex spiritu nitri concentrato cum luna (quod usitatum est Italis & satis conveniens;) vel sunt talia ex opio in spiritu nitri dissoluta, quod tamen singulare est.

His viis, vel ferro vel igne potentiali, apertus tumor, ubi materia contenta jam erit evacuata, tunc *cavum* restans vocatur *abscessus*, qui ubi per occultos quasi cuniculos hinc inde terpit, alio nomine vocatur *sinus*, Germani *ein bohle Geschwür*. Et est talis abscessus reverà nihil aliud, quàm ulcus post suppurationem relictum, simili modo curandum ut alia ulcera, de quibus *inferius plura*, mundificando, & hinc consolidando.

Hæc est curatio tumorum ex humoribus stagnantibus ortorum.

Quod attinet Tumores ortos à materia per novam generationem introducta, liberatur parstunens; aut materiam collectam insensibiliter discutendo, quod rariùs contingit; aut per factam aperturam materiam evacuando, quod fit frequentius, materiam ipsam euacuandam emollientibus aut suppurantibus plus minus ante alterando & mitigando; cavendo recidivam tumoris per fermenti ulcerosi & peregrini in loco affecto totalem destructionem. Nam aliàs v.g. dabo exemplum: si in mammarum ex lacte coagulato suppuratione (quod frequentissimè fit) non ritè curetur abscessus, & mundificetur per fermenti peregrini extinctionem, deumum, licet consolidata fuerit mamma, recurrit tumor, & novus fit abscessus, qui postmodum per balsamica oleosa (ut habebimus) probè mundificatus est curandus.

Excrecentiæ verò tolluntur ut plurimum, imprimis insigniores, omnimodà earum ferro aut igne extirpatione; igne imprimis potentiali; rariùs, nismore Italorum, actuali, præcavendo hic recidivam talium excrecentiarum per radicis membranosa omnimodam deletionem.

Hæc manuali artificio externè applicatis remediis com-

modè etiã simul adduntur medicamenta interna: nunc quæ laxando primas purificant vias, aut quæ massam sanguineam quacunque ratione expurgant, imprimis quidem sudorifera; nunc quæ acidum vitiosum, tam in primis viis quàm in toto corpore oberrans, subinde absorbunt & destruunt; nunc quæ labem massæ sanguineæ peculiarem corrigunt, v.g. cachecticam, & veneream, scorbuticam, aut similem; nunc verò, quæ blandum sudorem per subiecta de natura alcalium provocando, omnes liquorum stagnationes & coagulationes successivè solvendo, æqualem humoribus motum restituant, & resistentes insensibiliter resolvunt, & talia sunt v.g. antimonium diaphoreticum, lapilli cancerorum, qui Chirurgorum debent esse arcana quoad internum usum, myrrha, castoreum, viperina, quæque, & hinc succinata balsamica internè usurpata: nam talia in omni Chirurgico casu commodè possunt applicari.

Quodsi febricula aut æstus adsit, nitrata sunt usitata, ut sunt nitrum antimoniatum imprimis, hinc nitrum per alcali purificatum, & tandem, quod vilissimum omnium est, (ut vulgò contrarium statuatur) lapis prunellæ, commodè internè usurpantur; sicuti milites ordinariò usurpant pulverem pyrium, cujus internus usus ratione nitri, sulphuris, & alcali fixi in carbonibus stillicis, in chirurgicis casibus esse debet frequentissimus, nec sine ratione.

Hæc de Cura Tumorum in genere.

Quod attinet ergo remedia Tumoribus in genere applicanda, sunt ea in triplici classe, vel resolvunt, vel discutunt, vel suppurant.

I. *Resolventia* sunt ea, quæ imprimis stagnationi humorum sunt opposita, utpote quos resolutos in naturalem motum revocare debent. Sub hunc titulum revocanda sunt omnia ea, quæ externè applicanda & crassum attenuant, coagulata solvunt, grumos & visciditates incidunt & rarefaciunt, & concreta fundunt, exque his ortas durities varias emolliunt. Omnia hæc sub nomine attenuantium & resolventium comprehenduntur. Operandi rationes facile patent.

In corpore humano dixi humores stagnare, incrassari & indurari, vel ob frigus externum coagulans, vel ob propriam visciditatem & crassitiem. Qui coagulantur humores, sunt vel sanguis solus, qui imprimis ab acre congruatus hæret: vel est piruita seu chylus crassior & crudior, nondum in sanguinem perfectum assimilatus, tam in sanguine quàm in lymphâ, tam ob frigus externum, quàm ob acidum internum inspissatus: nunc verò concurrunt simul uterque humor, sanguis nempe crassus & viscidus, ob chylî portiones erudas ipsi permixtas ex cacochylia natas: qui tertius modus est communissimus, & dat Tumores obstinatissimos, ad scirrhum nempe & scrophularum naturam inclinant.

Medicamenta ergo, quæ has humorum affectiones curare valent, Emollientia ratione duritiei, & Attenuantia & Resolventia ratione crassi & coagulati dicta, hanc habent virtutem, ut acidum temperent, partes coagulatas penetrent, easque attenuent, & ita humores denuò molles, tractabiles ac mobiles reddant. Nam quæ à frigore sit coagulatio, admoto externo calore potest resolvi.

Medicamenta quæ huc valent, sunt

1. *Pinguia* & nonnihil mucilaginosæ, quæ acidum temperant & quasi obtundunt, fibras & membranas laxant & emolliunt, vulgò *Emollientia* in specie sic dicta.
2. Deinde valent huc etiam paulò aciora, de sale volatili penetrantiori participantia, quæ & acidum omninò absumunt, & partibus volatilibus in poros penetrant, & coagulo isto absumpto humores tenues, mobiles ac fluidos reddunt: & hæc sunt propriè Attenuantia dicta.

Et quidem, prout nunc coagulum, & inde orta stagnatio, est magis vel minus fortis & contumax, ratione aut aciditatis ipsius, vel humoris crassi & visciditatis subsistentis, etiam remedia varianda, & nunc aciora, nunc temperatiora, adhibenda sunt. Unde tres sunt gradus Emollientium & Attenuantium, nempe sunt lenia, mediocria, & fortiora, diaphoreticis seu discutientibus cognata. Obiiciat quis: Reseruntur etiam acida, quæ attenuant & resolvunt: Sed hæc, quatenus sunt acida, hoc non præstant, sed salinarum partium volatilitate; unde vix sola usurpantur, sed pro vehiculo aliis adduntur.

Primi gradus Emollientia & Resolventia sunt sequentia:

Radix



*Radix & herba malvæ, althææ, atriplicis, Mercurialis, brancæ ursinæ, violariæ, liliorum alborum, parietariæ; flores meliloti, malvæ, semen scœnu græci, lini, althææ, lupinorum, & ex his paratæ mucilagines atque farinæ; item caricæ pingues assatæ & calidè impositæ, uvæ passæ & similia; adipēs & axungia caponis, vaccina, porcina, humana, Pinguedines recentes magis emolliunt, veteres attenuant, & illud magis, si sint pinguedines ex fœmellis, quàm si ex maribus; medulla animalium recentes; lac, butyrum, oleum amygdalarum dulcium, violarum, liliorum alborum, unguentum de mucilagibus, dialthææ, quod singulare est cum unguento resumptivo, & similia.*

*Attenuantia & Emollientia secundi gradus sunt: Radix & herba apii, pulegii, helenii, imprimis cepæ coctæ, quæ sunt egregiæ; ebulli, hyperici, chæresolii, betonicæ, verbasci, sambuci, rutæ, menthæ, artemisiæ, satorejæ, cicuræ, scabiosæ; flores hyperici, croci, sambuci, scabiosæ, chamomillæ; item adipēs, v. g. asferina, ursina, cervina: serum hircinum; medulla cervina, gummi taramahaca, styrax liquidus, resina terebinthinæ, cera, mumia; farina fabarum cum aceto applicata, sperma ceti, spiritus tartari; oxymel scilliticum; oleum chamomillæ, amygdalarum amararum, hyperici, nucum, anethinum, laurinum & nicotianæ; unguenta & emplastrum de cicuta, de betonica, diachylon simplex, de spermate ceti Mynsichti, de meliloto, &c.*

*In tertio gradu Emollientia & Attenuantia sunt: Radix & herba bryoniæ, cucumeris agrestis, raphanus, cepæ crudæ (antea dixi de cepis coctis; nam in coctione avolat sal volatile, vincetoxicum, cyclam; sigilli Salomonis, asari, squilla, sabina, absinthium, centaureum minus, nicotiana; semen sinapi, erucæ, cumini cum aceto coctum; gummi ammoniacum, vel solum, vel cum emplastro de cicuta, galbanum, bdellium, sagapenum, opopanax, myrrha, elemi, ladanum, resina pini; stercorea & urinæ animalium; nidus hirundinum cum excrementis; spiritus urinæ, salis ammoniaci, vini spiritus crocatus, acetum scilliticum, fermentum; oleum irinum, laterinum, scorpionum, terebinthinæ, ceræ, lumbricorum, petroleum, oleum tartari destillatum, oleum nicotianæ, balsamus sulphuris; unguentum Martiarum; emplastrum diachylon cum gummiis, oxycroceum, dia-sulphuris, cuius extemporanea compositio videri potest in Collegio Pharmaceut. ad Ludovici Pharmaceutiam; de cicuta, de ammoniaco, & Vigonis de ranis cum Mercurio; Mercurius laminæ plumbeæ illitus & applicatus.*

Ex his modò dictis simplicibus varia possunt fieri remedia composita:

1. Fomenta,
2. Cataplasmata,
3. Linimenta & Unguenta,
4. Emplastrum.

Formula ergo Fomenti Emollientis sit hæc:

℞. Rad. alb.  
Lil. alb. an. ℥ij.  
Herb. & flor. malvæ,  
Melilot.  
Sambuc. vel chamomill. an. M. i.  
Caric. ping. No. vj.  
Coqu. in f. q. ferilactis vel in lacte caprillo:  
Colatura D. S.  
Cataplasma emolliens.

Applicetur calidè cum linteis duplicatis, idque sæpius repetendo.

Vel loco lactis coqu. in f. q. aquæ simplicis:

Colat. ℥ij. adde  
Succ. cepar. rec. vel olei chamom. aut lil. alb.  
℥ij.  
M. D. S.  
De suprâ.

Cataplasmata emollientia & resolventia sunt hoc modo:

℞. Rad. alb. ℥ij.  
Cucum. asin. vel loco hujus leos rec. ℥j.  
Fol. brass.  
Malvæ,  
Herb. absinth. an. M. j.  
Flor. chamom.  
Melilot. an. M. ℞.  
Sem. lini ℥ij.

Contusa coqu. in f. q. aquæ simpl. vel lactis, vel feri lactis pro lubitu:

Trajecte per setaceum, pulpæ trajecitæ adde

Sterc. caball. ℥ij.  
Olei chamom. ℥ij.  
Cepar. sub cineribus coct. ℥ij. vel ij.  
M. D. S.  
Puls emolliens.

Wedelius de Med. Facult. lib. 1. Sect. 2. c. 1. pag. 31. & Traject. de Comp. Med. p. 159. simile parat Cataplasma emolliens ex rad. althææ, lil. alborum; flor. cham. meliloti, farina seminis lini, scœnu græci, caricis ping. In lacte ad putrilaginem coctis. Cataplasma resolutivum Foresti egregiè convenit in Tumoribus duris: non secus euporiston quoque est insigniter emolliens & maturans Tumores, quod paratur ex sapone communi in lacte calido dissoluto.

Aliud & quidem sub forma Linimenti:

℞. Mucilag. sem. alb.  
Fœnugr. cum decocto sicum extr. an. ℥j.  
Adip. anser. ℥vj.  
Olei chamom.  
Lil. alb. an. ℥ij. vel ℥ss.

M. super ignem ad consistentiam Linimenti: sub finem, verò adde

Olei destillat. terebinth. ℥j.  
Tartari sat. ℥j.  
(licet factor si horribilis, est tamen potens)  
M. pro Linimento: S.  
Unguentum emolliens.

Denique sub forma Emplastri:

℞. Empl. de melior.  
Gumm. amm. in aceto sol. & inspiss. vel lento igne liquat. an. ℥ij.  
Liquefacta malax. cum f. q. olei irini & nicotianæ: induc. super alutam in forma debita: S.  
Emplastrum resolvens.

Conveniens est in Tumoribus duris ad scirrhus quodammodo inclinantibus. Item

℞. Empl. de bosc. ℥ij.  
Gumm. ammoniaci lento igne liquat. vel cum aceto sol. & inspiss. ℥j.  
M. S.  
Us ante.

II. Post Resolventia seu Emollientia proxima sunt remedia Discutientia, ea scilicet, quæ insensibiliter materiam Tumoris ex parte expellunt: aliàs etiam Diaphoretica appellantur, quæ si sint leniora, dicuntur Raresfacientia. Pertinent hæc, quæ aliàs interno usu Carminantia & Aperientia appellantur, quæ poros partium, dum sunt occupati Tumore quodam, aperiant, humores penetrent & discutiant: id est, pori partis cujusdam, dum sunt oppilati humore recente, non possunt liberari, nisi ut resolutus humor iste, vaporis aut halitus specie dissipetur, & insensibiliter evacuetur.

Ad hoc ipsum requiritur, ut humor sit fluidus & tenuis, resolubilis in halitus, expers ob id omnis crassitie aut coagulationis; quæ si adsint, prius corrigendæ. Quæ ergo talem humorem ita resolvere debent, necesse est, ut habeant partes subtiles, tenuiores & facilè penetrantes, simulque valeant in parte producere quendam calorem, quo ipso liquefacti & resoluti humores partim in meatus ordinarios remeant, partim verò per poros cutis exhalent.

Vitanda ergo frigida quæcunque, quæ pororum oclusio: ni occasionem præbent. Vitanda quoque quælibet acida, quæ coagulando humorem magis inspissant, & parti noxam inducunt, nisi sint acida, quæ habent partes admodum subtiles & penetrantes, quales in vino, item in aceto, sunt conspiciunt.

Medicamenta ergo, quæ huc conveniunt, erunt imprimis penetrantia aromatica, sale volatili oleosa prædita, quæ penetrant & attenuant insigniter, & uti omnem humoris crassitiem, ita omnem ab acido inductam coagulationem, tollunt, ac simul partis calorem suaviter foveant, nervisque amica sunt. Post hæc etiam salia alcalia, nunc volatilia, nunc fixa, lixivii forma applicata, sunt utilia: Sic spiritum salis ammoniaci ex calce viva cum oleis in consistentiam unguenti redactum adhibuit BURRHUS ex relatione BARTHOLINI.

Vicina ergo admodum sunt Diaphoretica Resolventibus seu Attenuantibus, gradu auctiori tantummodò distando. Nam quæ resolvunt continuato usu, tandem etiam discutunt, & quæ in corpore densiore seu in duriori materiam compage sunt Attenuantia & Resolventia, ea in corpore mol-



molliori, & in leviori materie concretione, erunt Diaphoretica.

Dum autem Diaphoretica semper præsupponunt humorem facilem resolvablem, eo ipso etiam postulant aut præcedentem aut conjunctum Attenuantium & Resolventium usum, ne, dum pars humoris in crassata diaphoresi resistat, ita ut subtilioribus & tenuioribus partibus dissipatis reliquæ crassiores magisque coagulatae, & hinc contumaciore remaneant. Ob id Diaphoreticis commodissime semper simul Attenuantia permisceantur.

Externis hisce commodissime simul adduntur Interna. Diaphoretica ex alcalium republica desumptæ hæc enim attenuando & liquefaciendo succos, naturalem eorum motum concitatiores reddunt, & præternaturalem eorum stagnationem resolvunt. Unde liquefacti humores partim per poros discutuntur, partim cum aliis in vasa refoventur.

Remedia ergo Tumores discutientia sunt sequentia, imprimis aromatica, ut: Radix scniculi, calami aromatici, Ireos, helenii, aristolochiæ rotundæ, sigilli Salomonis, coumeris asinini, pyrethi, zingiberis; sol. & herba anethi, sambuci, ebuli, lauri, plantæque cæteræ aromaticæ, ut origanum, pulegium, cheresolium, thymus, calamintha, majorana, rosmarinus, absinthium, centaureum, minus, salvia, ruta, sabina, lavendula, hyssopus, abrotanum, chamæpitrys, Satureja, & similia; flores chamomillæ, imprimis Romanæ, meliloti, sambuci, lavendulæ, anethi, salviæ, anthos, croci; baccæ juniperi, lauri; nux moschata, macis, ac alia aromata; semen anethi, cumini, carvi, anisi, scniculi, rutæ, sinapi, petroselinii; farina fabarum cum aceto applicata; castoreum, benzoe; storax calamita, camphora; spiritus vini camphoratus, essentia plantarum cephalicarum & aromaticarum; oleum lumbricorum terrestrium, chamomillæ Romanæ, anethinum, cumini, carvi, scniculi, anisi, laurinum, juniperi, nardinum, laterinum, menthæ, trinum, costinum, spicæ, petroleum, oleum cere, terebinthinæ, tartari, succini, quæ inter primarum obtinent olea destillata; adipēs & pinguedines animalium sylvestrium, canis, vulpis, ursi, cervi; etiam stercorea & urinæ animalium, imprimis caprillum, hinc equinum; balsamus sulphuris, decoctum sulphuris cum stercorebus; lixivium sarmentorum vitis, aqua calcis vivæ, suffusus aceti super filicem candentem; emplastrum diachylon, iratum, emplastrum Martiatum, diaphosphuris, emplastrum Augustanorum ad hydropem, & similia.

Modus applicandi hæc Diaphoretica est

1. In Suffitu.
2. In Fotu.
3. In Cataplasmate.
4. In Linimento vel Unguento.
5. In Emplastro.

Emplastra tamen nimis unctiosa & Emplastica, quæ potius oblinunt & infarciunt, semper sunt vitanda.

Exemplum Fomenti aut Suffitus discutientis sit hoc:

2℥. Rad. enul.

Ebul.

Bacc. junip. an. ʒi.

Herb. orig.

Calaminth.

Puleg.

Rorismar.

3℥. Fol. laur.

Samb. an. M. l.

Sem. anisi.

Fenic.

Cumin. an. ʒʒ.

Sterc. caprill. ʒʒ.

Coqu. modice in s. q. aquæ simpl.

Sub finem adde

Vini Rhenan. ʒiv.

Colatura D. S.

Fomentum discutiens.

Decoctum hoc pro Fotu cum lineis multiplicatis vel spongiis novis repetitis vicibus applicandum; aut ex Decocto suffusus excipiat membrum tumens.

Exemplum Cataplasmatidis discutientis:

2℥. Fol. lauri,

Rorismar.

Ruta, an. M. j.

Flor. chamom. Rom.

Flor. Sambuc.

Summit. anethi an. M. ʒ.

Bulliant in s. q. aquæ & vini ad mollitiem:

Pulpæ trajæ per setaceum adde

Far. fabar.

Furfur.

Sterc. vaccin. an. ʒʒ.

Mellis opt. ʒiv.

M. pro Cataplasmate: S.

Cataplasma discutiens.

Exemplum Linimenti Diaphoretici:

2℥. Bals. sulphuris terebinth. ʒʒ.

Terræ. ʒʒ.

Olei destill. fenic.

Cumin. an. ʒʒ.

Camph. gr. vj.

M. pro Linimento, cum vel sine Cera: S.

Balsamus discutiens.

Denique Emplastrum Diaphoreticum:

2℥. Empl. dia sulphuris Ruland. ʒi.

Diachyl. cum Gummi ʒi.

Malax. cum s. q. olei destill. chamomille:

Inducatur super alut. pro Emplastro, irrorando cum oleo destill. succini:

D. S.

Emplastrum discutiens.

III. Remedia Tumorum in genere sunt suppurantia. Discutuntur ea, quæ pus generant; alio nomine vocantur *Maturantia*, & ob sanguinis in pus alterationem, quam à calore fieri existimant Veteres, quibusdam dicuntur *Concoquantia*. Et hæc habent locum in Tumoribus vel sanguine simplicibus, vel cum sanguine complicatis, nempe dum sanguinis pars coagulata alitque, sanguini tamen permixti, humores, aut cui sanguinis suffusio tandem supervenit, ex acido præternaturali incipit effervesce, tunc ex acidissimo in sanguine congruato orto, cum sale volatili malse sanguine concurrente & effervescente, fit sanguinis totalis mutatio in aliam planè substantiam, quæ vocatur Pus: Salsum hoc est, natum scilicet ex concursu acidi peregrini & urinosi sanguinis, quorum concursu fit sapor salis spuris præponderare tamen in pure facto adhuc videtur acidum, ob quod albedo, cum acida oleosa & sulphureo-salina in colorem album cogere soleant, & hinc ulcera remanent mundificata.

Medicamenta ergo, quæ ad promovendam hanc alterationem applicantur à Chirurgo, dicuntur *Suppurantia*, ad id adhibenda,

1. Ut Suppurationem reddant promptiorem, faciliorem, & jucundè aut brevi tempore absolvatur, & cum minori ægri incommodo seu molestia Facilitant Suppurationem omnia ea, quæ leviter & blandè humectando salia ista dubio resolvunt, & resoluta promptius & citius in se invicem agunt.
2. Quæ acidum modicè temperando, æquabilem cum urinoso fermentationem adjuvant.
3. Quæ penetrando coagulatum sanguinem non nihil resolvunt, & ita suppurationem promovent: quamdiu acidum nimis præponderat, perfecta aut absoluta Suppuratio fieri nequit.

Monstrant ergo hæc, quod medicamenta Suppurationem facilitantia debeant esse leniter humectantia, & alcali occulto & blando prædominante prædita pro acido temperando, simulque non nihil emollientia & resolventia; nunc magis nunc minustalia, pro acidi & humoris coagulati ratione varia. Ubi enim fortius est acidum, aciora; ubi contumaciusest coagulum, magis resolventia requiruntur remedia.

Jucundiores seu minus molestam Suppurationem reddunt:

1. Quæ salium acrimoniam temperant; sic enim majori impetu inter se agunt: unde & acor & etiam punctiones tolluntur, atque salium motus adio cohibetur, ne adeo impetuosè effervescent.
2. Quæ partem adstrictam laxant, & ita fibrarum contractionem dolorosam tollunt: unde dolor tensivus sensim longè redditur mitior, & præterea eruptio & apertio apostematis facilitatur.

Quæ huc faciunt medicamenta, sunt mucilaginosæ, & oleosæ substantiæ constant: nam hæc ambo salia (1.) temperant (2.) partem tumentem laxant: & hæc inter lac primum locum meritò habere dicitur.

Suppu-



Suppurantia autē remedia ferē sunt sequentia: rad. althææ, liliiorum alborum, tussilaginis, bryoniæ recentis, cucumeris sylvestris, cepæ costæ, cyclaminis, sigilli Salomonis, allium sub pruniscoctum, &c. folia & herbæ althææ, malvæ, brancæ ursinæ, parietariæ, melilori, chamomillæ, sambuci, ebuli, tussilaginis, Mercurialis; flores horum simplicium, violarum, crocus, semen lini, scenu-græci, hordei, tritici, orobi; mica panis albi cum lacte, caricæ pingues, passulæ, dactyli pingues, gummi ammoniacum, imprimis ubi opus est simul tumoris duri resolutione; terebinthina, thus, pix; adeps gallinarum, anserum, axungia porcina, medulla vituli, butyrum, pinguedo humana, sebum cervinum; vitellum ovi, cera flava, propolis, mel, lac; oleum dulce, oleum amygdalarum dulcium, liliiorum alborum, chamomillæ, vulpini, & similia; aqua calida, hydrolæum, spiritus vini non adeo rectificatus; unguentum althææ, resumptivum, basiliconis, arregonis, Agrippæ; emplastrum diachylon simplex & cum gummis; emplastrum de meliloto, de mucilaginis, basilicon; fermentum, sapo Venetus; stercus bubulum, nidus hirundinum, lumbrici, & cum his parata externa.

Forma utendi est:

1. In forma Cataplasmatidis,

2. Unguenti,

3. Emplastri,

4. Interdum in Fomentis.

Cataplasma suppurans sit hoc:

℞. Rad. althææ,

Lil. alb. an. ℥ij.

Fol. malvæ,

Violar.

Senecion.

Mercurial. an. M. j.

Nid. hirund. cum excre. No. j.

Missa coqu. in f. q. aquæ simpl. vel lactis:

Pulpæ trajectæ per setac. adde

Axung. porc.

Butyr. recent. non salit. an. ℥ij.

Olei lil. alb.

Violar. an. ℥ij.

Farin. sem. lini ℥j.

Vitell. ovor. No. ij.

M. f. Cataplasma: S.

Cataplasma suppurans.

℞. Cepar. sub ciner. cost. ℥ij. ad iij.

Ficuum ping. No. vj.

Contund. in mortario calido,

adde

Axung. anser. vel anat. ℥j.

Ungu. basilic. ℥vj.

Mell. Virgin.

Far. sem. lini an. q. s. pro consistentia Cata-

plasmatis:

D. S.

Ut autē.

Denique sit Emplastrum maturans:

℞. Empl. de Melilori. ℥ij.

Diachyl. cum gummi. ℥j.

Malax. cum oleo lilior. albor. vel balsam. sul-

phuris.

Inducatur super alutam:

D. S.

Emplastrum maturans.

℞. Empl. de Melilori.

Diachyl. cum gummi. an. ℥ij.

Dia sulphuris Ruland. ℥vj.

Malax. cum oleo lil. alb.

D. S.

Ut autē.

Inducatur super alutam, & applicetur.

Hæc est Theoria & Praxis Tumorum in genere.

## ARTICULUS I.

### DE

## TUMORIBUS SANGUINEIS.

### MEMBRUM I.

### DE

## INFLAMMATIONE.

**O**UOD Tumores sanguineos in specie, communissimus est Inflammatio. Loquor de Inflammationibus partium externarum; nam de internis superius, ubi de sanguinis circulos per partes impedito, actum fuit. Inflammationes sive Phlegmones omnes sunt per motum sanguinis impeditum, & inde ortam sanguinis stagnationem, unde fit ut oriatur Tumor, ex tumore Tensio, ex tensione partisque repletionem ad tactum renitentia, propter sanguinem stagnantem Rubor, propter sanguinis in arteriis impeditum motum Dolor pulsatorius, & tandem propter sanguinem calidum effervescentem insignis Ardor. Jam verò prout variat sanguinis crasis & constitutio, eatenus etiam varia est Inflammatio; nunc quidem genuina ex sanguine puro; nunc verò spuria, ad erysipelata, vel œdematosos tumores, vel scirrhus propius accedens.

### CAUSÆ.

Causæ Inflammationum externarum sunt vel læsiones externæ, vel spina quadam interna. Læsiones externæ sunt interdum sola transpiratio insensibilis, à frigore externo impedita, unde feri & sanguinis in parte affecta stagnatio, & inde Inflammatio oritur. Interdum ab ictu, calu, contusionibus, fracturis, vulnibus, ulceribus, & reliquis rebus extraneis violentis oriuntur. Imprimis autem simul cum rebus ædentibus sordes & aliæ quisquiliæ partibus intruduntur; unde semper pro exactiori instituenda Cura semper Inflammationis causa probe inquirenda. Per spinam verò internam, cuiusmodi parti infixam, intelligitur similitudo, quia, sicut spina extrinsecus digito infixa infert inflammationem, ita in partibus internis heterogeneum, in vel sub digestionem prima enatum, vel digestionem publica obortum inflammationes infert.

### PROGNOSIS.

Omnes Inflammationes vel insensibiliter desunt, vel suppurantur, vel malè tractatæ in gangranam transmigrant.

### CURA.

Pro Cura ergo ritè instituenda usurpentur externa & interna. Interna sunt sudorifera moderata de natura alcalium, tam fixa, quam salibus volatilibus constantia, quæ sanguinem coagulatum resolvunt, & stagnationem tollendo eum in debitum motum revocant. Unde omnia ea, quæ aliàs in pleuritide sunt usitata, in quacunque inflammatione internæ commodè possunt usurpari; v. g. sperma ceti cum antimonio diaphoretico, additis quibusdam salibus volatilibus; item spiritus nitri probe dulcificatus; nam hic sudorem movet. Ratione febris, in omni ferè inflammatione adjunctæ, si acuta magis eadem fuerit, internè conducunt nitrata, primariò nitrum antimoniatum, hinc trochisci de nitro Myosicti, &c. Externè verò applicantur in principio post venæ sectionem revulsoriam, quæ sanguinem stagnantem resolvunt, denuò fluxilem reddunt: quæ inter primariò sunt Decoctum sulphuris cum urina, decantatum à PARACELSO, quod crebrius calidè applicatum optimè conducere asserit; item stercus vaccinum, caprinum, equinum, album græcum, &c. impositum. Convenit etiam succus cancerorum sturviatilium recens calidè applicatus & renovatus, emplastrum de spermate ceti, balsamus sulphuris, emplastrum dia sulphuris Rulandi; item fomenta & foras ex vegetabilibus blandis diaphoreticis & aromaticis, una cum vini spiritus camphorato extrinsecus applicati; item spiritus vini mixtus cum rob sambuci, imprimis ubi aliquid erysipelacei subest; flores sambuci sicci vel in forma Deco-



Et aut cataplasmatibus impositi; in inflammationibus malignis herba Paris sub forma decocti vel cataplasmatibus cum fuligine, conveniunt. *Decoctum quoque calcis vivæ* in forma Epithematis applicetur, vel solum, vel cum saccharo Saturni: v. g.

℞. *Aqua calcis vivæ* ℞j.

Sacch. Saturni ℞j.

M. D. S.

*Cataplasma discutiens.*

Vel cerussa cum oleo rosarum in mortario plumbeo in linimentum redigatur; loco cuius etiam Epithema convenit ad discutiendos Tumores inflammatorios:

℞. *Lixiv. Ciner. sarmens. vitis* ℞j.

Nitri ℞.

Salis ℞.

Aceti vini optimi ℞j.

M. S. ut antè.

Conferre non solum ad simplices Inflammationes erysipelaceas, vel adematofas nobis, sed etiam imminuentem gangranam & sphacelum præservat:

Vel

℞. *Vini spiritus camphor.* ℞ij.

*Spiritus vitrioli volat.* ℞.

M. S. ut suprà.

Quibus, ubi adhuc persistat Tumor inflammatorius, ut possit discuti, maturantia & suppurantia sunt subjungenda, temperata quidem, ubi est inflammatio legitima; quibus addantur aciora paulò ex cepis & similibus, ubi inflammatio est notha, seu, uti vocant, pituitosa, ubi nempe sanguis inflammatus pruriens chylo crudo & viscido est permixtus.

In aestu inflammationis & ardore magno vitanda sunt pinguis & oleosa, sicutque fortis & cataplasmata emollientia; in sero lactis bene depurato cocta, & applicata; vel ubi deest ardor, in lacte ipso.

Vel

℞. *Empl. de Melilot.* q. s.

*Malax. cum oleo lil. alb.*

D. S.

*Emplastrum emolliens.*

Vel

℞. *Empl. de Melilot.* ℞j.

*Diachyl. compos.* ℞.

*Malax. cum ungu. dialtheæ,*

D. S. ut antè.

Præ reliquis egregium est suppurans lac, in quo coctus sapo Venetus, plus minus, prout magis vel minus genuina est Inflammatio, hoc appositum cum lintheis multiplicatis mirè maturat & aperit abscessum. Si his suppurata fuerit Inflammatio, tumor aperiendus, & nisi spontè fiat, aperiatur primario scalpello vel cauterio potenciali; hinc apertus abscessus purificandus & consolidandus: pro quo scopo vel balsamus sulphuris terebinthinatus, vel balsamus Peruvianus cum melle & vitello ovi permixtus, instillatus & applicatus est optimus; c. g.

℞. *Terebinth. clar.* ℞j.

*Mell. rosat.* ℞j.

*Bals. Peruv. cum vitello ovi sol.* ℞.

M. pro Linimento mundificativo.

Hæc enim omnis satisfaciunt indicationibus, resolvunt, maturant, & factum jam abscessum purificant & consolidant. Verissimum est effatum LINDANI, quod balsamus sulphuris & emplastrum dia sulphuris hic sufficiant. Sinuosi sint abscessus, pro mundificatione mellore conveniunt injectiones ex Decocto nicotiana & plantaginis cum alnè & myrrha, vel ex aqua calcis vivæ cum spiritu theriacali temperata; quibus, si contumacior & malignior sit abscessus, pro maiore mundificatione unguentum Ægyptiacum similiaque addenda sunt.

Factà mundificatione consolidatio spontè sequitur, pro qua facilitanda omnis mundificantibus unguentum de tutia vel betonica applicantur, vel emplastrum diapalmæ, aliaque similia desuper imponuntur. Vulgò in uso est in principio Inflammationum admoveere Intercipientia, & Repellentia, Cataplasmata adstringentia ex bolo Armena, terra sigillata, sanguine Draconis, albumine ovi, mastiche, cum aceto vini & similibus, qui cum in finem faciunt, ut hisce humoribus affluentibus intercipiatur via, & qui jam effluerint, retrò in sua vasa pellantur, & ita factus tumor atque inflammatio mox in prima radice curetur: Sed omnibus patet, quod hæc sententia cum circulatione sanguinis

fit incompatibilis, quoniam intercipientia motui & regressui sanguinis per arterias sunt contraria, adeoque impossibiliter possunt conciliari cum sanguinis circulatione. Potius quæ adstringendo vias angustant porosque occludunt, aut quæ humores hac ratione & sanguinem inspissant, stagnationem sanguinis indeque ortam Inflammationem augebunt periculosè, & ita malum deterius reddunt. Propterea etiam hæc & similia Repellentia & Intercipientia, (vulgò vocantur Defensiva) talia ex adstringentibus parata serè in defuetudinem abierunt, quia in metu Inflammationis Refrigerantia dicta, uti aqua spermatis ranarum, succus semper-vivi majoris, plantaginis, aqua calcis vivæ, & aqua solutionis Saturni sacchari, & similia, commodius applicantur, non quod repellant talia, sed potius quod hæc & similia alcali occulto sunt instructa (quod imprimis ex aqua spermatarum patet) ratione cuius alcali subtilis acorem occultum in incipiente inflammatione delent, & ita radicem inflammationis extirpant, ut ita inflammatio sedetur. Pertinet hoc Decoctum sulphuris in aqua simplici commendatum à POTERIO, aut, quod melius est, Decoctum sulphuris cum aqua calcis vivæ. Hoc enim in principio impositum non repellendo, sed resolvendo & absorbendo acidum, inflammationem curabit. Plura de Curatione inflammationum in genere videbitis in BARBETTE Chirurgia.

## MEMBRUM II.

### DE

### ECCHYOMATE ET SUFFUSIONIBUS SANGUINIS.

Præter Inflammationes subindè etiam ex sanguine oriuntur Tumores post contusionem partium violentam, dum nempe ex contusione ruptis vasculis & poris transformatis naturalis sanguinis circulus inhibetur & stagnare incipit. Vocantur tunc Ecchymomata, item suffusiones sanguinis, à CELSO Vexatio.

### CAUSÆ.

Oriuntur ex Causa externa & serè eandem cum Inflammationibus genuinis naturam habent. Nempe in suffusionibus stagnat in loco tumente sanguis ob poros vel vasa compressa aut lacerata; quæ enim contundunt, eà occasione faciunt dislocationem pororum & meatuum in parte contusa, & conterunt vasa capillaria loci contusi, hinc non potest non ob poros distortos impediri sanguinis motus, & consequitur fit suffusio sanguinis & ejus extravasatio; hinc extravasatus & stagnans subito corrumpitur, moritur seu vita privatur, unde ex colore primitus quidem rubeo successivè contusiones carulefcunt, livefcunt, & tandem flavescunt. Hinc in cada veritate sanguine mox emergit acor peregrinus, qui sanguinem in grumos coagulat. Sanguis corruptus vel insensibiliter discutitur, vel, si hoc fieri nequeat, fermentando in pus mutatur, apertoque abscessu evacuatur, vel putrefactus gangranam infert. Prius fit in contusione leviori, posterius in graviore, ultimum in gravissima, cum laceratione partium carnosarum & nervosarum.

De sanguinis extravasatione in partes internas alio tempore locuti sumus: hac vice de Suffusione seu Ecchymomate in partibus externis à causa externa enata.

### CURA.

Factà jam contusione, & hinc nata sanguinis suffusione, sive fiat à casu, sive percussione, sive lapidibus, sive suffibus, &c. Imprimis opera danda est, ut sanguis extravasatus congruatur & acore inquinatus successivè resolvatur, isque insensibiliter absumatur, & per meatus seu porulos corporis eliminetur. Conveniunt ergo remedia interna, acidum absorbentia, sanguinem congruatum resolutentia, simul blandè nonnihil diaphoretica, ut simul cum sudore Massa sanguinea dissoluta, in meatibus partis contusæ impedita, facilius eos penetrare, & in debitum circulum remeare possit: Observando simul, ut imprimis, si sit suffusio partis cuiusdam internæ læsæ, propinquent vel blandè laxantia, vel blanda diaphoretica; Si verò in locis externis hæreat, sufficiunt sudorifera. Eminent sperma ceti cum lapillis cancerorum, item cum succino albo præparato, cum coralliis



corallis rubris, in aceto vini dissolutis; vel etiam carbones tilia in vino hauriantur; sicut & *salia volatilia* indebita doli sunt egregia. Cerefolium, & omnia ex eo parata liquida, etiam conducunt internè ad sanguinem congruatum in Ecchymomatibus. Alia interna vulneraria mitto.

Externè similis imprimis Resolventia, & sanguinem congruatum insensibiliter dissipantia, sunt usurpanda. Communiter vinum calefactum applicent, quo adhuc potentior est *vini spiritus probe rectificatus & tartarifatus* externè illitus, vel cum linoleis applicatus, nunc simplex nunc *camphoratus*, nunc *crocatus*, aqorem sanguinis temperans. sanguinemque fluidum reddens; cuius super applicetur mel cum spiritu vini subactum: Efficacius erit, si vini spiritus societur cum theriaca, à qua dissolutione aromatica sanguis grumofus arectetur ab ulteriori corruptione. Convenit etiam cum vino factum lixivium, *spiritus salis ammoniaci cum vini spiritu paratus*, sanguinem congruatum in gravioribus suffusionibus potenter discutiens; & in specie balsamus Peruvianus dissolutus in vitello ovi & spiritu vini est egregium remedium, imprimis in contusionibus partium nervosarum (de quibus *infra plura*). Fotus ex decocto radicis bryoniae cum vino, item chelidonium majus recens contusum, suffusioni seu Ecchymomati applicatum, etiam egregie conducit.

In Ecchymomate non adeò ingenti applicatio carnis crudæ, præsertim bubulæ, sive etiam vitulina, in tenues lammellas sectæ, optimè conducit, subinde repetatur. Emplastrum de spermate ceti est admodum egregium, item unguentum Myrsichti ad livorem faciei est expertum. Insigniter etiam conducit emplastrum in Ecchymomate à casu facto ex theriaca & rob sambuci, cui parum salis absinthii, vel saccharum Saturoi, fuerit additum: si fortiora requirantur, melius non habetur remedium, quàm radix sigilli Salomonis, quæ contusa in aqua vel vino cocta, & sub forma fotus aut cataplasmatibus applicata, mirè confert ad quæcunque ecchymomata tollenda. Melius adhuc est, si addatur simul radix symphyti majoris, quæ duo sunt expertissima ad Ecchymomata: v. g.

℞. Rad. consol. mai. ℥ij.

Sigill. Salom. ℥j.

Coqu. in vino ad consistent. Cataplasmatibus.

D. S.

Cataplasma discutiens.

Vel

℞. Rad. symph. mai. ℥vj. iv. v. vel iij.

Sigill. Salom. ℥ij. i. vel is.

Herb. agrimon.

Cherefol.

Meliss. cum flor. vel summit. hyoscyami,

Flor. sambuc.

Chamomill. an. M. j.

Sem. lini,

Fenu grec. an. ℥b.

Coqu. in f. q. Vini alb. vel aqua simpl. ad consistentiam Cataplasmatibus:

cui adde

Croci ℥j.

M. S. ut antè.

Applicetur Ecchymomatibus, vel decoctum sub forma Fotus.

Item

℞. Rad. symph. mai. ℥ij.

Sigill. Salom. ℥j.

Summ. hyperic. M. j.

Albi Graci ℥vj.

Coqu. in f. q. Vini ad puerilag.

Traiciantur per setaceum & f. Cataplasma,

cui adde

Olei hyper. ℥j.

Ungu. rub. potab. ℥b.

M. S. ut antè.

℞. Rad. consol. mai.

Minor. an. ℥b.

Sigill. Salom. ℥j.

Herb. chamom. cum flor.

Melilot. cum flor. an. ℥ij.

Farin. fabar.

Fenu Grac. an. ℥iv.

Croci ℥b.

Butyri non salis. ℥v.

Coqu. radices usque ad consistentiam temperatam, deinde reliqua addantur.

Emull. Oper. Tom. II.

M. pro Cataplasmate:

D. S. ut *suprà*.

Probatissimum est in gravioribus contusionibus post pregressam cum spiritu vini camphorato inunctionem. Quod si partes nervosæ sint contusæ & Ecchymomate affectæ, id quod imprimis patet ex loco affecto circa articulos, item ex intensissimo dolore, quia aliàs talis esse non posset, tunc opera danda est, ut omne id, quod ex contusione fuit extravasatum, maturè discutatur & resolvatur, quia periculum est aliàs, ne materia corrumpatur, putrescat, & ita tendines partesque nervosæ similiter putrescant, & in gangrænam abeant. Hoc ut præcaveatur, pro resolutione materię extravasatæ post istam contusionem inungatur locus affectus cum balsamo Peruviano & vini spiritu (ut antea monui, item cum oleo castorei, cum oleo lumbricorum terrestrium, cum oleo chamomillæ & rosismarini; vel soveatur pars affecta nervosa sequenti Decocto:

℞. Rad. Ireos nostr. ℥ij.

Fol. roismar.

Mensb.

Maior. an. M. ℥.

Coqu. in f. q. vini albi:

Decoctum instar fomenti sæpiùs calidè applicetur.

D. S. ut *suprà*.

Internè in tali casu optimè propinquantur aliquot guttæ olei destillati lavendulæ, imprimis ubi simul tensiones nervorum observantur: hoc enim oleum est expertum ad tales partium nervosarum contusiones, & subsequentes tensiones, metumque convulsionis.

De Cura magnetica mediante persicaria videbitis in PARACELSI Herbario. Refert non nemo, se in Gallia vidisse puellam, in tota facie per casum ab alto miserrimè contusam: huic, cum antè multa, sed in cassum adhibita fuissent, tandem muliercula suavitè usum hujus herbæ, ut trahatur per aquam frigidam, post loco contuso imponatur, donec incalcescat, planta adhuc repida postmodum sepellatur post finem vel alium locum, ubi citò putrescere potest, & altero die statim sanata est. Exemplum de equo contuso & hoc remedio curato prostat, de quo *suprà* egi, ubi de Odontalgia: Vid. quoque HELMONT, & MARCUS Marci.

Quod si his & similibus remediis nequeat dissipari Ecchymoma seu materia extravasata, vel si suffusio sit grandior, & ad suppurationem tendat, tunc opera danda est, ut sanguis iste extravasatus maturetur & suppuretur in pus, ut tandem facto abscessu ita aperiatur, & ulcus restans convenienti modo consolidetur eadem ratione ac inflammatio. Verùm non semper æquè tutum est, ut discutatur suffusus sanguis & resolvatur; non minus quàm expectare semper maturationem. Nam interdum imprimis in partibus carnosis contusio adeò magna est, ut pars brevi post livorem contrahat, atque gangrænam minuetur.

In talicasu, ubi metus adest gangræne, mox pars contusa profundè scarificetur, & sanguis extravasatus, congruatus, quantum fieri potest, extrahatur: hinc Decocta aromatica cum vino applicentur, vel aqua calcis vivæ, acuatæ cum spiritu vini & Mercurio dulci imponatur, ut ita gangrænescent. pars salvetur & conservetur. Item præter dictum casum non tutum est expectare maturationem, quando contusiones non sunt præcisè in partibus intercutaneis, cum sint sit paulo profundius, ita ut periculum sit, ne facta maturatione, antequam pus per partes subjacentes egressum inveniat, quandam partem vicinam, v. g. os, corrumperet vel corrodat, vel, ne partes vicinas perforando, in cavitatem corporis nobiliorem irrumpat: v. g. in contusione musculorum abdominis, ne per peritonæum perforatum pus irrumpat in abdomen. In his casibus non expectanda perfectam maturationem, sed maturè aperiendus est tumor mollescentis scalpello, & materia hærens extrahenda, hinc immittenda turunda, unguento Ægyptiaco, cum Digestivo vel simili mixto, illita, & factum ita ulcus solito modo consolidantibus & mudificantibus curandum.

Plura de Sugillationibus quibusque habent FORESTUS, HILDANUS, RULANDUS, RIVERIUS, SCULTETUS, BARBETTE, JOB VAN MEKERN, aliique plures.



## M E M B R U M I I I.

## D E

## ERYSIPELATE seu ROSA.

**P**orro quod si fiat, ut subito cum gravioribus symptomatis, nempe cum precedente rigore, & subsequente gravi ardore, erumpat Tumor inflammatorius non admodum insigniter protuberans, intensè tamen coloratus & quasi igneus, latè diffusus, ac subinde latius serpens, cum intenso partis ardore & æstu, ac sensu acutarum punctationum, qui tumor quidem digito pressus maculam albam ostendit, subito tamen rubescens rursus, & appellatur *Erysipelas seu Rosa*.

## C A U S Æ.

Non oritur à bile, ut vulgò existimant, seu sale volatili oleoso simpliciter, sed potius occasionaliter à subtili ac volatili acido, quod cum sale volatili massæ sanguineæ febriliter effervesceat, & in parte quadam cutanea diffusum ibidem sanguinem in vasculis extremis coagulat, & ad stagnationem disponit; unde scorbutici levi de causa laborant Erysipelate: hinc magis circa nervosa & sanguinea loca simul, non circa sanguinea solum, oritur Erysipelas.

Tales Inflammationes erysipelaceæ in genere in partibus externis ita dicuntur, si sint in partibus internis, peculiariter obtineant nomina: nam tale Erysipelas in pectore dicitur Pleoritis & peripneumonia; in renibus dicitur Nephritis; in hepate Hepatitis, & sic porro. Nec præsens affectus ab illis differt, quàm ratione loci; occupat namque inter partes externas caput, faciem, mammæ, brachia, pedes, imò ipsum serotum.

Subinde magis malignitas subest, ita ut in vitæ periculum conjiciatur ægrum, imprimis quando erysipelas erraticum est, & per totum corpus vagatur, unde tunc ignis faciei, seu roster, interdum etiam Herpes erysipelaceus, à serpendo, vocatur. Interdum periodicè & tunc plerumque singulis mensibus affligit. Apud nos Scorbutici imprimis obnoxii sunt erysipelati, & sæpius in scorbutico, cum euphoria tamò ægri, talia erysipelata erumpunt.

## D I A G N O S I S.

Signa intermixta diagnostica cum signis inflammationis (de quibus P. I. Sect. 18. cap. 1. Artic. 1.) eadem sunt, Calor scilicet, Rubedo, Dolor, & Febris, sub aliis paulò saltem circumstantiis observabilia. Nempe

1. Calor in erysipelate acrior & mordicans magis est.
2. Rubedo magis purpurea & splendens, quæ quidem ad levissimam compressionem cedit, & maculam albicantem, mox denuò rubescens, relinquit; quod non fit in inflammatione, nisi pars inflammata fortius premitur.
3. Dolor exilis est, non tensivus, & saltem pungens.
4. Febris in erysipelate semper primaria seu comitata, est, imò vehementior, tam ratione horrois quàm caloris.

Quibus omnibus accedit, quod erysipelas mox latius se extendat, & ad vicinas partes progrediatur.

## P R O G N O S I S.

Quoad Prognosin sciendum; Erysipelas à causa interna præcipue plethorâ, ac in aduersis, item in parte externa, pronatum, sine singulari periculo esse; secus à causa externa, v.g. fractura, vulnere, &c.

Erysipelas in brachiis non ita frequens est, ac in pedibus; & quod in brachiis, diuturnius est quàm in pedibus, quia plerumque vel inflammationem aliquam conjunctam habet, vel bubonem sub alis, vel alium tumorem inflammatorium judicatur.

Erysipelas mammarum puerperis ac lactantibus familiaris est, & plerumque ulcera post se trahit. Erysipelas malignum, in specie roster, sæpius lethale est, imprimis si vel in os, vel in anum per intestina, vel aliam corporis cavitatem, serpat. Erysipelas scorbuticum si in corpore, aut per repellentia tractetur, periculosum est, cum facillimè exulceretur, & interdum aut in gangrænam, aut in ulcera capi-

cothea maligna, chronica, aut facillè recrudescens, ac sæpius longè latèque serpenti, (qualia in Italia sunt frequentissima) degeneret, & quibus vix, nisi generosioribus remediis, occurrere potest: Conf. HIPPOCRATES Sect. 7. Aphorism. 20. Præ cæteris periculosum est Erysipelas in parte nobiliori, ut in capite, si partes capitis externas, faciem imprimis, occupat; præ reliquis enim hujus speciebus hoc erysipelas sæpius lethale esse solet.

Malum quoque est, quando erysipelas ab exterioribus ad interiora vertitur, juxta HIPPOCRATEM Sect. 6. Aphor. 25. quod aut naturæ imbecillitate in erysipelate maligno, aut ab aere frigidior, aut repellentibus applicatis, facillè fieri potest.

## C V R A.

Curatur aliàs facillimè, si rectè procedatur, modò scilicet acidum istud vitiosum internis sudoriferis cum rob & remediis aliis ex baccis sambuci paratis jungendis, infringatur, & internis etiam temperatis calidibus volatilibus, acidum subtile discutientibus, aut metallicis Saturninis, istud promptè absorbentibus, corrigatur.

Purgatio omnis est summè vitanda. Venæ sectio est periculosissima, nisi erysipelas à contusione, fractura ac vulnere, ortum fuerit; in quo casu venæ sectio revulsoria institui debet. SENNERTUS quidem in *Praxi*, *Wierus in Obs. lib. 1. cap. de Erysip.* multique alii, in plethoricis mox à primo principio purgationem & venæ sectionem commendant: cum autem erysipelas mox ad habitum corporis vergat, & sæpius cum malignitate complicatum sit, experientia quoque testetur, quod omnes cutaneæ excretiones purgantibus & venæ sectione facillimè retrocedunt, è contra solis diaphoreticis & sudoriferis facillè expelli, ac per cutis spiracula efflorescere, ab illis omnino abstinendum.

Internè ergò solis diaphoreticis Cura inchoanda & absolvenda: pro quo scopo supra dixi, quod primatum obtineant ex baccis sambuci parata diaphoretica, ad hæc conveniunt imprimis rob sambuci, quibus suis formulis additum, aut pro vehiculo pulverum usurpandum, seu appropriatissimum erysipelatis remedium; præsertim quando motus naturæ excretorius deficit, nec debet erysipelas efflorescere potest, tunc loco stimuli usurpatum rob sambuci, ad ʒj. cum aqua florum sambuci dissolutum, cum gr. xv. vel ʒj. salis volatilis Cervi optimum est: si aliquantulum de camphora addideretur, esset edo potentius sudoriferum. Conveniunt quoque flores sambuci in lacte cocti, vid. SENNERTUS de Febris. & SIMON PAULI in *Quadrup. Bor.* item essentia rob sambuci à ʒss. ad ʒj. vel ʒij. propinata, per sudorem optimè curat Erysipelas. Paratur scilicet hæc essentia ex rob sambuci mediante spiritu ex floribus sambuci per fermentationem parato. Præterea antimonium diaphoreticum cum bezoardico minerali & cum cornu cervi sine igne, & similibus, & omnia illa, quæ superius loco allegata de Inflammatione in genere laudavi, per sudorem nempe, curant Erysipelas. Aliàs ubi faciem accipit occupaverit erysipelas, ex cinnabari antimonii parata remedia, & hinc specificum cephalicum, sunt optima; c. g.

ʒj. Cinnab. antimonii gr. xxiv. ad ʒss.  
Sal. volat. Cornu cervi ʒss. ad gr. xij.  
Volat. succin. gr. vi.

Laud. opiat.  
Camph. an. gr. ij.  
M. f. pulvis:

Div. in 2. part. æqual. S.  
Pulvis expellens.

Item

ʒj. Cornu cervi sine igne ʒss.

Antimonii diaphor. ʒj.

Cinnab. antimonii ʒss.

M. f. Pulvis.

Dividatur in 2. part. æqu.

D. S. ut antè.

In declinatione demum lenè putgang superaddendum.

Externè omnia unguosa, omnia mucilaginosæ, omnia pingua, omnia quæ sunt actu frigida, item omnia adstringentia, magis quàm ipsum malum sunt fugienda: Hæc enim obliuendo poros ex Erysipelate aut ulcus depascens faciunt, aut erysipelas in gangrænam transmutant: vid. HILDANUS. Potius applicetur cortex sambuci medianus succulentus, vel folia raphani sylvestris confusa leniter; nam



nam horum sal volatile optime corrigit acidum erysipelatis: Item optima est aqua spermatis ranarum imposita, item aqua stercoris bubuli mense Majocollecti & destillati. Convenit etiam Decoctum ex myrrha, thure seu olibano, in vino paratum, cui aliquantulum camphoræ & croci simul in fine additur; hoc enim Decoctum impositum mirè conserat ad resolvenda erysipelata: Nempè

24. Myrrha,

Olibani, an. ʒʒ.

Coqu. in vino:

Colaturæ adde

Camph. ʒi. vel ʒii.

Croc. ʒʒ.

M. D. S.

Decoctum resoluens.

24. Flor. sambuc. M. ii.

Lithargyr. ʒii.

Olibani,

Myrrh. an. ʒii.

Croc. (pro dolore leniendo) ʒʒ.

Pulverisata coqu. in

Vini part. ii.

Aceti part. i.

Colaturæ adde

Camph. ʒi.

Applicetur calidè cum linteis.

Convenit etiam Decoctum florum samb. cum vino, addito sapone Veneto & theriaca, quod LOSSIVS lib. i. obser. 25. commeneat. Etiam vini spiritus solus, aut camphoratus, aut crocatus, vel etiam spiritus theriacalis camphoratus, erysipelati illitus, hinc spermaranarum, & linteæ hoc spermate probè imprægnata, & pannus linteus crocatus Mynsichti, optime resolvunt tumorem.

Vbi intensus est ardor & dolor, opii nonnihil huic Decocto addendum erit, V. g. alio modo:

24. Myrrh. ʒi.

Sacch. Saturni ʒʒ. vel ʒii.

Camph. ʒi.

Opii gr. xv.

Vini alb. ʒvi.

Quæ invicem mista leviter bulliant, hinc confusa cum linteis duplicatis applicantur, & egregiè conducunt in erysipelate.

Nobile etiam Epithema Zwelferi in Pharm. Reg. pag. 91. ad ejus imitationem aliud communicavi in Idea Formular. Class. 4. §. 19. quod cum linteis multiplicatis bis vel ter vel crebrius in die applicetur. In usu aliàs sunt pulveres erysipelaci, qualis egregius est pulvis Mynsichti ad Erysipelas. Fieri etiam possunt ex floribus sambuci, saccharo Saturni, thure, minio, myrrha, creta, cerussa, croco & camphora, & similibus: quæ invicem pulverisata inspergantur tumori, vel cum papyro griseo melle illito, vel imprægnato spiritu vini crocato; absorbent enim acidum erysipelatis: e. g.

24. Flor. sambuc.

Cbamom. Rom.

Fol. hyoscyami an. M. i.

Myrrh. ʒii.

Creta ʒii.

Oliban. ʒi.

M. f. Pulvis.

Pulvis spemiole composuit Crollii, cum spiritu vini vel vino calente subactus, egregium erit remedium propter camphoram, myrrham, & crocum. Singularissimum est linteum tinctum croco leporino, ex lepore quidem in venatione interempto, ex quo ipso sanguis collectus asservatur, cui linteæ immerguntur postmodum exsiccanda, quæ ita sanguine leporino tincta sicca applicata erysipelati, probatissimum sunt remedium. Vid. HELMONTIVS Imag. Ferm. §. 13.

Non minoris est efficaciz, quod certum est, linteum sanguine primo menstruo virginis tinctum, hoc linteum exsiccatum citra locurum applicatur erysipelati, & miros habet effectus. Fel carpij applicatum specificum est, cum alcali temperatum eius destruat acidum erysipelatis, item linteæ cum solutione saponis in aqua appropriata imbutæ & exsiccatæ tepidè admota: vid. SOLENANDER Sect. 5. Conf. 12. & 13. atque WIERVS Observ. l. 2. cap. de Erysip. Vnum etiam ex optimis remediis est theriaca linteæ illita, probè calida erysipelati imposita. Melius est remedium, si ipsi addatur parum salis absinthii, subigatur & in forma unguenti erysipelati imponatur: e. g.

Ettmull. Oper. Tom. II.

24. Pulv. flor. samb. ʒii.

Ceruss. ʒiʒ.

Salis absinth.

Theriæ. q. s.

Misc.

Hoc enim subinde repetitum probè calidum optime conserat ad sistenda & resolvenda Erysipelata: sicuti etiam emplastrum seu unguentum ex rob sambuci cum saccharo saturni impositum probè calidè, est optimum.

Si facies & caput erysipelate laboret, suffumigetur massiche & thure quinquies vel sexies de die.

Quod si fiat, ut nihilominus erysipelas vel spontè vel male curatum exulceretur, ad curam huius optima est aqua calcais vivæ cum aqua flor. sambuci parata, linteis duplicatis calidè, vel solum vel cum saccharo Saturni apposita: item succus nasturtii inspissatus, cui saccharum saturni vel cerussa, lithargysium, lac lunæ, crocus Martis per præcipationem, sit additum, imponatur erysipelati exulcerato, estque optimum remedium. Aut fiat saltem tale unguentum saturninum, quod est euporiston Foresti, sequens:

24. Lithargyr. ʒii.

Ungu. popul.

De cerussa

Infrigid. Gal. an. ʒiʒ.

Olei rosat. camph ʒi.

M. & ducantur probè in mortario plumbeo, fiat Unguentum applicandum, usque ad Erysipelatis exulcerati consolidationem. Quia tamen hic morbus frequentius nonnullos ex quacunque causa externa, præprimis ira, faciliè affligit, eius præcavendi gratiâ commendantur primò Evacuationes circa æquinoctium vernum atque autumnale, tam per venæ sectionem, quàm purgationem instituendæ, pro diversa corporum constitutione: Deinde laudantur illa, quæ sanguinis æstum & acrimoniam temperant, v. g. lac cum floribus sambuci decoctum, singulis decreascentibus lunis ter vel quater vel per totum annum, bis de die ad ʒviii. haustum: vid. SOLENANDER Sect. 5. Conf. 12. & 13. Nec inutiles quoque sunt acidulæ sanguinis fervorem mitigantes.

## ARTICULUS II.

### DE

## TUMORIBVS & ABSCESSIBVS CRITICIS.

Porro ad hos Tumores sanguineos pertinent etiam Tumores & Abscessus Critici, vel, qui his similes, interdum symptomatici. In morbis acutis & febribus, tam benignis quàm in specie malignis, oriuntur, & sunt per congestionem in his morbis acutis, nunc celerius, nunc tardius, dum nempe fermentum morbosum malignum unà cum partibus massæ sanguineæ heterogeneis & corruptis beneficio fermentationis præcipitatum & correctum in locis extremis circa vasa capillaria in quodam loco hæret, sensimque coæcantur & stagnant, unde sanguini transitu præcluso tandem supervenit phlegmone & inflammatio suppuranda. Oriuntur tales Tumores nunc promiscuè in partibus carnosiss, nunc & primariò in locis glandulosis: Et isti, qui in locis glandulosis emergunt, si in inguinibus aut sub axillis se manifestant, ordinariò Bubones appellantur: si vero propè aures appareant tumores cum rubore, dolore pulsante & ardente, Parotides vocari solent: aliis in locis, ubi glandulæ sunt minores, si propullulent, speciali nomine carere solent.

## MEMBRUM I.

### DE

## BUBONIBVS.

Bubonis vox utitur propriè certam corporis partem, quæ posita est in flexura femoris circa inguina in utroque latere, tantum significet, tamen etiam tumori, huic parti in hærenti, propter similitudinem partis affectæ & ipsius affectus sub axillis tumores enatis tribuitur.

Fiunt autem Bubones, quatenus vasa cubitalia & cruralia majora glandulas hæc transeunt, inque transitu sanguinem pro feri segregatione (hic enim glandularum usus est, ut serum à sanguine segregatum recipiant, & vasa lymphatica

Rrr 2

tica



tica aliorum derivent) effundunt, qui propter crassitiam & visciditatem stagnans tumorem producit.

Bubones hi sunt nunc critici in statu morbi cum levamine acri; nunc symptomatici in principio cum virium dejectione: nunc tui, quando circumscripti, prominuli, & quasi in acumen desinentes; nunc minusturi vel infidi, depressi, oculi seu in profundo siti, & eadem est natura in hoc casu ac carbuncolorum, nisi sint mitiores. Porro Bubones hi aut benigni sunt, aut maligni; *Benigni*, qui in febribus ardentibus in statu & declinatione superveniunt, ubi per *Expositio* heterogeneum cum lymphâ vitiosa in diâs glandulas protruditur, illicque stagnando ac suppurando tumorem inflammatorium suscitât: *Maligni*, qui etiam contagiosi sunt, & imprimis in pestilentialibus febribus solent esse frequentes.

### C U R A.

Benignus Bubo ut aliæ inflammationes præmissis sudorifero est discutiendus, & quidem iisdem remediis, quibus aliâs inflammationes solent suppurari: v.g. illinatur balsamus sulphuris, & applicetur desuper emplastrum de mellilo cum unguento diachylæ, & similibus.

In Bubone verò maligno pro malignitatis ratione Cura variat. Nempè sunt *vel* in febribus malignis *vel* in lue Venerea. In Bubonibus febrium malignarum, & pestilentialibus, omni studio cavendum, ne incautorum Prædictorum aut nasutulorum barbitonorum nostratum more, vel purgantibus vel venæ sectione naturæ motus turbetur, & in bubonum retrocessione lymphæ huius ferocientis & miasmatis maligni excretio impediatur. In primo ergo principio internè danda sunt diaphoretica & alexipharmaca, imprimis sulphurea antimonialia, ut *lib. 1. Sect. 15. de Morbis Pestilentialibus* monui. Post sudorem iulepi moderate aciduli propinandi cum in finem, ut malignum fermentum, de natura alcalium acrium participans, his ipsis corrigatur & emendetur, simul tamen corpus, quantum fieri potest, in diaphoresi blanda conservetur & retineatur.

Præterea malignus Bubo ita tractandus, ut cataplasmatibus emollientibus sæpius impositis quamprimum mutetur & aperiatur, aut si profundus sit, aut minus prominens, foras quasi attrahatur, ne subito iterum dispareat: Nam quando retrocedunt tales Bubones, factum est de vita. Ad hoc ergo, ut melius promineat & citius suppuretur, quod necessarium est, applicandæ cepæ & allium sub cineribus coctæ, quibus permiscetur theriaca & fuligo furni, cum succo chelidonii; aut etiam *bubo*, (certo tempore captus & interceptus) exsiccatus, & in vino maceratus, calidè imponitur buboni: vel ex *bubone* paratur cataplasma, ut mellis temperetur malignitas, & promptius postmodum suppuretur tumor. Aliâs etiam cataplasma ex scabiosa cum fermento & sapone Veneto applicatum, tumorem maturat. Vel fiat Emplastrum vel Cataplasma ex foliis sambuci contusis, cum pulvere sinapi contuso subactis: hæc duo applicata maturant & promptè rumpunt abscessum seu bubonem.

Optimum tamen est, & optima methodus, ut nempè mox in principio, imprimis in cute densiori, vel bubone profundius latente, applicetur *vesicatorium*: hinc facta vesica promptè incidatur per transversum, quo facto applicetur emplastrum, quod vocant, *tractivum* tale:

*℞. Empl. diachyl. cum gummi.*

*De mucilag. an. lbj.*

*Ungu. basil. ℥iv.*

*Sem. sinapi cont. ℥ij.*

Mista sub forma Empl. imponatur vesicæ aperte; hoc enim maturat promptè & suppurat tumorem. Loco huius emplastri melius longè est emplastrum ex magnete arsenicali Ang. Salæ, aut Eriderici Hoffmanni, vesicæ aperte superimpositum; hoc namque mox malignitatem ita elicit, ut densa crusta oriatur, quæ faciliè & spontè serè separari potest.

Crustâ separatâ & bubone aperto, ubi non fuerit sufficienter malignitas extracta, denuò imponendum erit idem emplastrum, & hinc denuò facta crusta removenda; postmodum, ubi ulcus factum, cum balsamo sulphuris & unguento basilico & theriaca mundificandum, aut cum emplastro diapompholygos cum oleo nicotianæ digerendum, & cum emplastro diaphysphuris Rutandî consolidandum. Conf. *BARBETTE Chirurgia*, *DIEMERBROCK in Tr. de Peste*, & *NICOLAUS de BLEGNY Tr. de Lue Venerea Gallicè conscripto.*

Præter Bubones autem pestilenciales etiam observandi sunt *Bubones Venerei*, qui non sine malignitate existunt, cum ipsa lues venerea solo actu seu contagio contrahatur: Idè non minus congesta hic purulenta materia contagium est, si ejus aura scetidiore vel ipsum pus alii, in eodem lecto decumbenti, communicetur. Oripitur ex acido viscido maligno in dicto loco successivè coactato, idque laudabili naturæ conatu; nam sic præservantur à lue Venerea, ut non eadem corripiantur. Unde de his dicit *CARDILUCIUS in Offic. Sanitat. p. 846. Apparent verò crebrius in sanguineis, alioquin raro vel nunquam, nisi gravissima lue Venereæ obnoxiiis, occultante scilicet elegante habitu corporis hostem inquilinum, eumque ad inguina protrudente.*

In Cura opera danda est, ut maturè aperiatur & virulentia eliciatur. Pro hoc scopo imponatur *emplastrum Vgonis cum Mercurio*, malaxatum cum oleo destillato ligni guaiaci, vel *emplastrum diachylon compositum* malaxatum cum oleo destillato ligni sancti, vel *emplastrum diachylon simplex*, malaxatum cum oleo Philosophorum vel tartari volatili, quod *CARDILUCIUS* lococitat tanquam discutiens præstantissimum commendat, ut horum medio emolliatur bubo; perfecta enim suppuratio in hoc loco raro aut nunquam accidit. Maturatus aperiatur apertura largâ, & materia evacuetur, mundificetur ulcus cum balsamo hyperici, mixto cum oleo destillato ligni sancti & tartari, vel cum unguento de apio, cui additum sit parum de Mercurio præcipitato vel arcano corallino: superponatur dictum emplastrum exteriùs.

Internè usurpentur primò lignorum Decocta, postea purgantia, in fine sal & spiritus viperarum Curam bubonum absolunt.

Accidit sæpius, ut Bubones Venerei nullo modo maturarentur, etiam legitimè institutâ diatrâ sudoriferâ & salivatoriâ: in hisce tamen casibus, præter impositionem emplastri magnetici vel decicuta, oleo Philosophorum vel saponis malaxati, vix quicquam applicandum, cum sensim sensimque tandem viscidissima hæc lymphâ in glandulis hisce quasi congelata resolvatur.

## M E M B R U M I I.

### D E

## P A R O T I D I B U S.

*Parotides*, Germ. *die ohrengeschwulre*, plerumque post malè judicatas febres, quando nempè egroti aut non, aut non sufficienter, sudarunt, unde post cephalalgiam in glandulas pone aures fausto naturæ conatu ex massa sanguinea præcipitatur heterogeneum, & protruditur.

### C U R A.

Si sint *benignæ*, maturationi operanda, & tractantur sicut bubones benigni, & aliæ inflammationes ad suppurationem vergentes. Si verò ipsæ oriantur in febribus malignis aliisque morbis, semper ferè sunt suspectæ, quarum funestus est eventus: vid. in *M. A. N. C. Ann. 4 & 5. observ. 4. pag. 6.* Unde sudoriferis naturæ conatus erit adjuvandus, aerem externum cautè arcendo, & caput lintels, suffumigio quodam infectis, involvendo. Et si à natura spontè resolvantur, quod rariùs fit, solventia blanda usurpanda.

Consultissimum potius erit maturatione succurrere, eisdem imponendo cepam sub cineribus coctam, cui oleum scorpionum fuerit additum: emplastrum etiam diachylon commodè imponitur. Quodsi durior & pertinacior fuerit Parotis, emplastrum diachylon ireatum cum gummi ammo niaco in aceto dissoluto imponendum: quibus omnibus si olei destillati scetidi, guaiaci aut tartari parum addatur, multo promptius facilitatur suppuratio: post maturationem promptè aperiendus abscessus, & instar ulceris simplicis curandus.

Empyema à Parotide videbitis in *M. A. N. C. Ann. 3. observ. 50.*



MEMBRUM III.

C U R A.

D E

C A R B U N C U L I S.

**A**D hos ipsos Tumores malignos primario etiam pertinet *Carbunculus*, Græcis ἀρσπῆξ, Germanis *ein Carfunkel* oder *Pest Geschwür*. Eadem enim est natura horum atque Bubonum malignorum, cum non raro in febris malignis & pestilentialibus, ipsaque peste, & bubones & carbunculi simul oriuntur, atque etiam ex eadem proveniant *Causa*.

Nam rarissimus observatur Carbunculus benignus, quia ut plurimum, si non semper, in Carbunculo adest malignitas; quæ tamen in bubonibus magis est correctæ magisque subacta, in carbunculis verò minus est cicurata, adeoque insigniter maligna.

Malignitas ista videtur consistere in fermento salino acris volatili & quasi caustico instar cauteriorum potentialium, quando effervescentiæ febrili præcipitatum & nonnihil separatum ex Massa sanguinea in extima cutè & carne hæret, ibique causticæ suæ acrimonia & dolorosissimum ardorem & subitam partis mortificationem, etiam livorem, hinc omnimodam nigredinem infert: propter talem enim partis in nigrum livorem corruptionem vocatur Carbo, item Carbunculus, cum inferat crustam in parte corrupta nigram instar carbonis; unde quibusdam etiam Pruna appellatur: Græcis verò eadem ratione vocatur ἀρσπῆξ.

Corruptio ista in Carbunculo obvia, dico, quod oritur ex sale acris & caustico maligno, in Carbunculo existente, quo inducitur parti omnimoda nigredo instar cauteriorum potentialium, ex salibus lixivialibus paratorum; cum hæc ipsa eundem planè habeant effectum. Nam acida corrosiva non inducunt nigredinem mortificantem, sed primò intensam rubedinem, hinc consequentem albedinem insensilem, in partibus mollibus inducunt; acris verò lixivialia omnimodam partis mortificationem & nigredinem inducunt, quæ subinde ulterius prosperit cum dolore ardente: ad quod similiter fit in Carbunculis, ubi etiam talis subitanea nigredo, livor & mortificatio cum diffusionem in longum & latum mox sub primo conspectu se manifestat; unde patet, quod ejus venenum consistat in tali sale acris caustico lixiviali.

Carbunculus quidem, quando in febre vel morbo maligno oritur (in specie in peste) manifestat se primò exigua quadam pustula, aut albicante aut livescente, interdum simul plures tales exsurgunt pustulæ, à quibus brevi mora, subsequente cum ardore & dolore acerbissimo excitatur ulcus crustosum, simile ipsi, quod ferro ignito vel candente solet excitari: interdum citra ullam præcedentem pustulam mox talis crusta in carbunculo incipere solet, excitaturque ulcus crustosum in crusta modò livida, modò cinerea, modò omnino nigricante. Crusta tandem emortua decedente ulcus putridum in carne profundum, & hinc inde putrescendo latius serpens, subsequitur, carnem circum circa depascens & mortificans. Caro adhuc sana in confinis carbunculi inflammatur cum intensa phlogosi & ardore, unde circa omnem anthracem seu Carbunculum simul adest circulus ex inflammatione admodum dolorosus, rubeus quidem instar erysipelatis, interdum cæruleus, in Carbunculis malignis aut lividis, aut nigricans.

P R O G N O S I S.

Quò magis hic circulus est rubeus, eò salubrior est Carbunculus; quò verò lividus magis fuerit circulus, aut magis nigricans, eò periculosior est anthrax: sicuti etiam, quò magis rubet aut minus livet carbo, eò etiam securior est; quò verò magis livescit aut nigrescit, eò est periculosior: sicuti etiam periculosus est, qui in locis nobilioribus erumpit, cum optimus sit, qui in artubus carnosiss se manifestat; minus enim periculi tunc subest.

Malignitas ergo Carbunculi caustica & acris, de lixivialium acerrimorum natura, optimè mortificatur & curatur per suum contrarium, nempe per acidum: hinc enim est, quod nihil magis resistat Carbunculo, aut quod potentius enecet ejus malignitatem, quàm butyrum istud *Antimonii* acidissimum: quod ipsum sicuti in sphacelo, (quod obiter moneo) ubi pars est emortua, si cum eodem circumducatur circulus in termino, ubi pars mortua attingit sanam, separat promptè partem mortuam à sana, & sistit ulteriorem mortificationis sphacelose progressum; ita hoc ipsum butyrum antimonii in carbunculo eandem habet efficaciam, si scilicet in centro carbunculi, siue in medio apicis, cum pluma illinatur butyrum antimonii, ad quantitatem nummi, siue solidi præter propter, vel, quod melius est, ducatur circulus beneficio plumæ huic butyro intinctæ circa mortificatum anthracem, in confinio nempe cum parte sana; sic namque his modis optimè virulentia carbunculi caustica extinguitur, & ulterior mortificans progressus potenter inhibetur: & hinc separatur pars ægrota & mortua carbunculi à parte vicina sana, ut ulterius serpere nequeat, quin intra circulum contenta pars à carbunculo mortificata spontè excidat, & postmodum ulcus mundificandum, ac more consueti consolidandum relinquitur. Notum est aliàs, quod sympathetico modo circulus circa anthracem ductus à sapphiro, annulo incluso, etiam inhibeat progressus ulterior carbunculi, quin carbunculus excidat, & ulcus cavum relinquat.

Loco butyri antimonii commodè etiam potest adhiberi nobile emplastrum magneticum arsenicale *Angeli Sala*, quod ipsum applicatum etiam brevi inducit crustam, quæ separata illinatur unguento lenè maturante, crustam suppurante. Si adhuc malignitatis carbunculi quædam subest suspicio, denuò applicandum est emplastrum, donec virulentia ejus fuerit extincta; hoc factò, ulcus mundificandum, diù apertum servandum, ac consolidandum. Hoc ipsum tamen emplastrum, ut in corpore robusto cutique densiori melius & promptius operetur, commodissimè carbunculo prius imponitur *vesicatorium*: v. g.

℞. Sem. sinapi,

Piperis an. ʒʒ.

Pulv. canthar. ʒij.

Ferm. acerr. ʒʒ. vel q. f.

F. Vesicatorium imponendum carbunculo.

Vesica post aliquot horas excitata incidenda est, & modò dictum emplastrum applicandum. Vel loco vesicatorii scarificetur Carbunculus, & post scarificationem dictum emplastrum applicandum. In defectu hujus emplastri post discissam vesicam, vel post factam scarificationem, communiter unguentum *Ægyptiacum* illinunt, quod ipsum etiam non contemnendum est.

Notum aliàs est, quod in vulgari Carbunculos, curandi ratione soleant post factas scarificationes imponi Cataplasmata ex scabiosa, succisa, una inversa, calendula, cum cepis sub cineribus coctis, cum scibus, cum fuligine, cum fermento, busonibus pulverisatis & similibus: Item imponi solet post scarificationem emplastrum de fuligine, emplastrum diachylon cum gummis, & similia. VALERIOLA insigniter commendat in suis *Observationibus* Cas. 6. sequentia duo remedia, post scarificationem tam carbunculis, quàm etiam bubonibus pestilentialibus, applicanda:

℞. Succ. symph. mai.

Scabiosa,

Calend. an. ʒj.

Ther. vet. ʒij.

Salis comm. ʒj.

Vitell. ovor. No. ij.

Incorporentur simul.

Hoc ipso illinatur Carbo post scarificationem factam, quod aliquandiu continuandum, ubi tanquam secrete malignitas corrigitur, carbunculi progressus inhibetur, & crusta ac eschara facta promptè separatur, quæ separata ulceris mundificativum optimum est sequens:

℞. Succ. calend.

Abstinth.

Scabios.

Apian. ʒj.

Myrrhæ,

Rrr 3

Rad.



Rad. Ireos Flor.

Aloes an. ʒj.

Sarcocoll. ʒij.

Mell. rosac. ʒij.

Quæ mista sub forma unguenti ulceri illinantur ad mundificandum & consolidandum illud. Loco hujus tamen posterioris, ruptus carbunculus unguento Ægyptiaco Wurzel, vel Hildani, aut basilico, mundificari, & postmodum ulceris probe detergi cavitas linteis carptis, oleo ovorum imbutis, iterumque expressis, impleri potest, super imposito emplastro diachylon cum gummis & supra emplastrum hoc defensionis loco vini spiritu theriacali camphorato. Aliàs quoque balsamus sulphuris ad mundificandos & curandos bubones & carbunculos optimus est.

Cum his externis etiam internè conveniunt alexipharmaca sudorifera, in specie antimonialia fixa: quibus Julepi blandè aciduli temperati ex citro, cydoniis, spiritu salis, spiritu vitrioli, & similibus adhibendi sunt, de quibus lib. 1. Sectione 15. ubi de Febris Malignis & Pestilentialibus actum jam est.

Huic etiam pertinent Furunculi, Germ. die Schwabren: Item Phymata ac Phygethla.

## M E M B R U M I V.

## D E

## F U R U N C U L I S.

**F**urunculi sunt inflammationes parvæ in locis extimis, tamen glandulosi, conspicuæ, in acutum tuberculum tendentes, ovum columbinum magnitudine non excedens, cum rubore & dolore, interdum atrocissimo cum ardore, ac si carbo igneus admotus esset.

Dicuntur ita à Furorè, Germanis die Blut-Schwahre.

## C U R A.

In Cura applicandum est emplastrum citrinum, vel alla maturantia ac malleatica, ut maturetur & suppuretur Furunculus. Repellentia quàm maxime nocent, cum materia vitiosa repulsa longè deteriora excitet symptomata; sicut ex levi Furunculo sepius anthraces satis malignose evasisse. CARDILUCIUS in Offic. sanit. pag. 356. observavit.

Furunculus apertus spontè coalescit: si hoc non fiat, tantillo balsami Peruviani consolidari solet, vel imponatur emplastrum de melioto.

## M E M B R U M V.

## D E

## P H Y M A T I S.

**P**hyma est tumor glandularum rotundus, acuminatus instar plantæ seu arboris, quæ in parte inferiore est plana, in superiori acuminata, plus minus rubens ac dolens, qui statim augetur, & suppuratur. Dicitur ita à Græco *phya*, nascor, Germanis ein hitzige Beule. HIPPOCRATES Aphorismo 26. Sect. 3. ad morbos pueriles refert, quia quos maxime affligit.

## C U R A.

In Cura à Repellentibus cavendum. Maturatio per emplastrum citrinum, imo solam inunctam salivam, promoveri potest, cum natura potissimum in hujus suppuratione occupata sit.

## M E M B R U M VI.

## D E

## P H Y G E T H L I S.

**P**hygethlon, Latinis Pannus, est Tumor durus Phymate major magisque rubens ac dolens, expansus instar panni seu fungi arbori adnascens, in locis glandulosi emergens.

## C U R A.

Curatur Discutientibus, pro quo scopo convenit oleum tartari sesquidum vel ligni guajaci. His interdum & Emollientia cum anodynis iunctis adduntur, unde laudatur cataplasma ex foliis & radice atriplicis, malvæ, althææ, farina triticea, &c.

Pus statim evacuandum, & vulnus consolidandum.

## M E M B R U M VII.

## D E

## P A R O N Y C H I A.

**P**aronychia, Germanis dicitur der Wurm oder das unge-nandec, cuius appellationis rationem videbitis in SENNERTO lib. 5. Prax. Part. 1. cap. 14. pag. 78. Hanc quod attinet, est tumor ordinariò obveniens in extremitatibus digitorum, ultimis nempe articulis digitorum, ita tamen, ut non excludantur reliqui articuli. Quandoque est erraticus, & ex uno digito in alium transit, ita ut uno persanato mox vicinus inquinetur, donec omnes successivè infestaverit: tantus est dolor, ut lubinde universum brachium consensu afficiatur.

## C A U S A.

Oritur ex humore acri admodum corrosivo, circa ungolium radices effuso, immediatè periosium & ipsi adherentes tendines occupante, & quidem mediatè. Supervenit inflammatio, eaque in apostema vergit, imò interdum, nisi ritè tractetur, antè factam apostemationem Paronychia ad gangranam vergit: nam brevi officulum articuli extremum fit cariosum, nec curatur, nisi illo ablato, quod facile fit, modò vossellâ maturè extrahatur. Illustratur hoc à BONETO in Anat. Pract. l. 4. Sect. 2. p. 1544 qui observavit sphacelum in ancilla quadam, implorante auxilium culsdam matronæ, quæ certam opem omnibus pollicebatur beneficio herbæ cognominis: hac aurem per plures dies frustra adhibita ancillæ digitus post ingentes dolores gangræniæ & sphacelo corripitur, ut ad amputationem supra secundum digiti articulum deveniendum fuerit: Et secundum longitudinem post amputationem aperto digito caro & tendines omninè computruisse apparuit, ossa nigredine tetra affecta & quasi calcinata, cinerei coloris & friabilia evaserunt.

Occasio huius acidi est ut plurimum ex latione ossis, articulos constituentis; tunc enim ex osse transudat nutrimentum proximum, unde acorem contrahit & partes afficit, unde dolor.

## C U R A.

Pro dolore hoc sistendo, præmissâ purgatione Mercuriali, nil melius est remediis ex lumbricis: nempe lumbricis sub cataplasmate forma contusis, vel lumbrico vivo imposito, vel liquore lumbricorum in clibano facto, spiritum lumbricorum, & similibus, digitis illitis: quod etiam facit balsamus sulphuris & emplastrum diachylon cum gummis. Dolorem quoque & tumorem discutit, atque, si fieri potest, maturè ad suppurationem perducit linimentum ex aurum sordibus cum saccharo Saturni, commixtum cum pauco oleo avellanarum expresso. Certum experimentum dicitur, si ovorecenter excluso & calido digito imponatur, quo facto patiens illico à doloribus liberari: vid. SORBAIT Med. Pract. Tr. 5. cap. 24. p. 634.

Convenit etiam, si digitus intrudatur in sterquilinum; vel recipiatur linteum, quod humectetur cum sterquilinio, & calidè digito dolenti applicetur, sic dolor & tumor optime discutitur & sistitur. Interdum tamen lanceola vel forfice aperiendus tumor, interdum fistula in ipso ungue cultello facienda, quo ichor illuc effluere possit: quò citius enim ichor maturatur, eo minus periculum est ossis cariei. Vbi autem Paronychia altiores egerit radices, opus est incisione, quæ etiam tutissima est, & quidem per longitudinem & latitudinem fibrarum usque ad ipsum os, ut rectè monet cum allegato BONETO SORBAIT l. 1. vid. HILDANUS Centur. 1. Observat. 97. FORESTVS observat. 26.



26. nec non GLANDORPIUS in peculiari de Paronychia Traſſatu, & ROLANDUS in obſerv. Faciã incifione ad prælaudati BONETI imitationem theriaca cum vini ſpiritu ſoluta digito applicanda; toti verò manui deſenſivum; quæ inter non inelegans eſt, quod Sorbait loco allegato commendat, nempe

24. Ungu. alb. camph.

Popul. an. ʒi.

Opii Thebaic. ʒʒ.

Theriac. rec. ʒiij.

M. pro Linimento ſæpius reiterando.

Huc quoque pertinet affectus pernicioſiſſimus, qui pollices pedum cum doloribus atrociffimis infeſtat, & nihil aliud eſt, quàm Paronychia pedis digitorum, cui gangræna & ſphacelus, & tandem mors, ſubſequitur.

Febris plerumque conjuncta eſt, nunc continua, nunc ſola ephemera, per longiora intervalla rediens.

Cauſa eſt eadem, ac de Paronychia iam dixi.

In Cura cavendum à Repellentibus, cum horum uſu pars affecta in gangrænam & ſphacelum abeat: potius unà cum Internis diaphoreticis, & acrimoniam temperantibus, emplaſtrum diachylon cum gummis aliisque emollientia & ſuppurantia anodynis juncta applicanda; quibus ſi ichor circa ungues ſtagnans in pus laudabile ſuppuretur, reſalva erit: Ulcuſculo inſtilletur vel baſamum vulnerarium, Prævoſii, vel de capaiſbe.

Hiſ nihil proficientibus, ipſa digiti reſectio tentanda, de qua vid. HILDANUS, & JOB van MECKERN, & alii. Cum autem ſola inflammatio partes vicinas occupet, ad præcavendam gangrænam vini ſpiritus, vel ſpiritus theriacalis camphoratus, applicetur; ſublata enim inflammatione gangræna latius ſerpere non poteſt, modò portiuncula ſphacelata ad vivum uſque reſectetur.

## M E M B R U M VIII.

### D E

#### P E R N I O N I B U S.

**H**is ſubinde inflammationes ſuperveniunt, affligunt imprimis partes extimas nerveas; tales enim partes ſi affectæ tument, & ex albedine ad aliquam cœruleſcentiam inclinant, dolent, ita ut nunc cum, nunc ſine exulceratione evaneſcant, ut tamen ſemper, quoties inclementia aeris & frigoris inſtat, dolor increſcat.

### C U R A.

Ut præſerventur perniones, nil melius eſt, quàm petroleum illitum, quod & præſervat, & factas jam curat. Pin-guedo etiam anſerina vel cati ſylveſtris contra frigus externum præſervat, ſi membra eo illinantur. Item terebinthina loco refrigerato, dum imminet frigus, denuò cum uſſica bubula impoſita. Juxta hoc oleum pini deſtillatum nobile eſt præſervativum & curativum. Vel

24. Olei terebinth.

Petra an. ʒʒ.

Salu. ʒʒ.

Spica ʒi.

Camph. ʒʒ.

Miſc. S.

Oleum præſervans.

24. Olei expreſſ. rapar. ʒi.

Deſtillat. terebinth. ʒʒ.

M. S. ut antè.

24. Olei expr. rapar. ʒʒ.

Petra alb. ʒij.

Deſtillat. ſuccin. ʒi.

Terebinth. ʒʒ.

Cum ſ. q. Corp. pro Baſam. f. Baſamus.

D. S.

Baſamus præſervans.

Crocus cum ſpiritu vini, imprimis camphorato, membris frigore læſis applicandus. BORELLUS Cent. 3. obſ. 32. frequentem manuum ac pedum friktionem cum fragis recentibus tempore verno commendat; unde & loco ſpiritus vini, ſpiritus fragorum, vel vini ſpiritus rectificatus, cul fraga recentia inſuſa, ſæpius applicari poteſt. Si verò gravius læſæ ſint partes à frigore, tunc ad eliciendum frigus (ut vocant) optimum eſt cataplaſma liquidum ex fermento, acce-

Estmull. Oper. Tom. II.

to deſtillato, & ſulphure antimonii, calidè applicatum; ſic omne frigus & dolor diſcutitur & reſolvitur. Aliàs notum eſt, quod contra hos nil melius ſit præ nive gelidiſſima, ſi partes frigore læſæ manè & velperi hac vel glaciæ fruſtulo probè fricentur; vel rapæ frigore congelatæ, in ſpecie exſiccæ, frigidè applicentur; ſicut & horum decoctum eſt egregium; unde etiam unguentum de rapis Myſſichti eſt elegans ad perniones curandas.

Vel

24. Unguent. Saturnin. Zwelfſ. vel Baſ. Saturni ſimpl. ʒʒ. ad ʒij.

Olei Petra vel Philoſoph. ʒʒ.

M. pro Linimento: S.

Linimentum calefaciens.

Quo partes affectæ manè & velperi fricandæ, ſic tumor imminuitur, & promptè tollitur.

Prodeſt etiam ſevum cervinum, pernionibus manè & velperi illitum.

Ruptis pernionibus imponi poteſt emplaſtrum ſpermatis raparum camphoratum, quod acidum invertit; ſi verò iam exulceratæ ſint Perniones, præter unguentum de rapis Myſſichti egregium etiam eſt, ſi recipiatur rapa, & mediocriter excavetur, inſundatur oleum roſarum vel hyperici, & aſſetur ſub cineribus calidis: quo factò ſi poſt expreſſionem linimentum applicatur pernionibus, eaſdem ſolet reſtituere & consolidare.

Parari poteſt linimentum ſimplex ex rapis gelidis cum butyro. Aut perniones eluantur cum decocto raparum, & poſt imponatur unguentum tutiæ.

Aliàs expertum eſt linimentum Sculteti in Obſervationibus, conſtans ex baccar. recent. juniperi M. j. butyri cocti, Germ. geſchmeitzte butter, ʒiv. Antè applicationem pernionibus exulceratis inſpergatur pulvis ex ſtercore humano combuſto, vel ſpongia cynoſhati calcinata & pulveriſata. TACHENIUS Tr. Morb. Princ. p. 129. typham aquaticam inſperſam mirabiliter ſanare aſſerit.

Item mucilago ſeminis cydoniorum cum aqua ſolani extra-cta, addendo parum tutia præparata, convenit, ſi cuo- lintels multiplicatis applicetur pernionibus exulceratis. Modum, quo Boreales perniones, imò ipſam gangrænam à frigore oriundam, curare ſolent, videbitis apud BARTHO- LINUM Tr. de Nive. Plura de Pernionibus legere poteſtis apud FORESTUM, SCHENCKIUM, SCULTE- TUM, & SEVERINUM.

Hi ſerè ſunt tumores ſanguinei aut ſanguineis cognati: .

Sequitur

## A R T I C V L V S III.

### D E

#### T U M O R I B U S E X L Y M P H Œ V I T I O.

**N**empè ſi fiat, ut ex impedito lymphæ motu, propter vaſa lymphatica, aut obſtructa aut rupta, aut aliter affecta, lymphæ fiat præternaturalis collectio & ſtagnatio in parte quadam, oriuntur Tumores, qui vocantur ſeroſi ſeu aquoſi, molles nempe ad tactum, laxi, indolentes, in quibus impreſſionis à digito nullum veſtigium remanet, & qui interdum ad lucem vel candelam lateraliter conſiderati ſerè pellucidi apparent. Nam hæc ipſa lymphæ in cavitate quadam corporis collecta dat hydropes, uti notum eſt, particulares, quæ in totius corporis peripheria congeſta, dat Anaſarcam.

### P R O G N O S I S.

Tumores hi ſeroſi ſine ingenti ſunt periculo, ſaltem, quia ſubinde ſunt comites aliorum affectuum.

### C U R A.

Scopus pro Cura horum Tumorum eſt, ut potenter diſcutiatur & reſolvatur lymphæ ſtagnans, quibus ipſis ſimul imprimis obſtruentes humores in vaſis lymphaticis liqueſcunt & reſolvuntur.

Conveniunt ergo imprimis aqua calcis vine, vel per ſe, vel cum vini ſpiritu ebria, ſæpius calidè cum ſpongiis vel linteis applicata, & ſubinde renovata. Conveniunt imprimis



his stercore animalium, primario quidem caprillum, hinc stercore bubulum; scilicet fiat Cataplasma ex stercore bubulo, cui permisceatur semen cumini pulveffiatum: hæc duo excipiantur linteo vel spongiâ lixivio acri humectatâ, & imponantur ita (præmissis internis universalibus, de quibus postmodum) parti, in qua est tumor serofus seu aqua collecta. Insignis vis latet in stercore bubulo; sic enim, quando hoc applicant pedibus, qui podagrâ laborant, cum levamine id faciunt. Vel convenit emplastrum paratum ex baccis lauri, vel *hydropicum Augustanorum*, imprimistamen de baccis lauri mixtum cum ana stercoreis caprilli, quæ cum melle rediguntur in Emplastrum.

℞. Empl. huius ℥ij.

De Melilot. ℥vj.

M. D. S.

Emplastrum resolvens.

Applicetur calidè, & Tumores aquosos & serofos potenter resolvit.

Convenit etiam, ubi fortius agendum est, tale Cataplasma:

℞. Sterc. vacc. ℥℞.

Columb. ℥ij.

Sulphuris viri ℥℞.

Nicri ℥ij.

Mellis,

Aceti destillati an. ℥℞.

Farin. fabar.

Bacc. lauri,

Sem. cumini an. ℥℞.

Olei anethin.

Nardin. an. ℥j.

Vini alb. Gallic. q. l. pro miscendo cataplasma.

D. S.

Cataplasma discutiens.

Quo applicato promptè discutuntur tumores serofi.

Cum his externis jungantur interna, tam diuretica, quam in specie diaphoretica, inter quæ Decocta sudorifera, in specie ex ligno juniperino & sassafras parata, optimè opem ferunt, externis appositis.

## MEMBRUM I.

### D E

## O E D E M A T E.

**E**Adem lymphæ, sed vitata, imprimis crassa nimis, ac pituita, ut vocant, viscida, h. e. ex chylo crudo massæ sanguineæ permixto, & hinc inde distributo, si stagnet, id quod fit imprimis in extremitate manuum & pedum, dat Tumorem, qui vocatur Oedema.

Oedemata sunt tumores molles, laxi, & qui promptè cedunt digito prementi, pressionis etiam huius vestigia diutius retinent, imprimis foveam, & successivè denuò protuberant, indolentes sunt & albicantes, sæpius in cruribus, rariùs in brachiis, se manifestant, & oriuntur à materia crassiori in partibus hærente. In Leucophlegmatia totum corpus oedemate laborare videtur. Rarum est, quod hæc oedemata per se oriantur, frequentius aliis superveniunt morbis, imprimis chronicis, ut phthisi, asthmati, &c. & sæpe inchoamentum habent hydropis: interdum succedunt affectibus soporosis ac convulsivis, similibusque, febribus intermittentibus; & quidem his in declinatione superveniunt, in specie febribus acutis, & tunc fieri solent imprimis, quando præatur ægri lautiori diætâ utuntur. Gravidis etiam familiaria sunt.

## P R O G N O S I S.

Si per se apparent, malum signum est, quia metus est, ne morbi chronici supervaleant.

In genere in junioribus minus periculi habent oedemata, quæ in senibus debent esse suspensissima, cum sæpius mortem imminuentem portendant; sicut etiam in phthisi contumaci seu confirmata oedemata pedum mortem fores pulsare indubitatè loquunt.

## C U R A.

In Cura præmissis internis, imprimis stomachicis & aromaticis, cum originem ducant ex viciata chylosi, elixir proprietatis antiscorbuticum, remedia ex roremarino, ligno sassafras, & quæ ex eodem paratur *Essentia*, dicta *catarrhalis*, conveniunt: item remedia ex seminibus calidis majoribus, anisi, fœniculi, & similibus: etiam noduli laxantes & alterantes vino infundendi; in genere omnia ea, quæ aliàs ad cachexias usurpari solent, & intermissis interdum etiam simul sudoriferis & diureticis, imprimis in oedemate post febres intermittentes.

Externè optimè applicantur diaphoretica & potenter solventia, nunc salinis alcalibus acrioribus, nunc verò aromaticis temperatioribus, constantia; nam resolvendo, & discutiendo curantur oedemata, rarissimè aut nunquam suppurantur. Conveniunt ergo omnia aromatica, in specie Cataplasmata & Fomenta ex absinthio, roremarino, chamomilla, pulegio, salvia, ruta, floribus sambuci, juniperi, radice cucumeris asinini & similibus, in lixivio communi vel vino decocta, quæ optimè discutunt oedemata, in forma nunc fomenti mediantibus filicibus ferventibus excipiendi, nunc cataplasmatibus applicandi. His convenientissimè stercorea animalium adduntur, ceu optima ad resolvenda oedemata remedia: v. g.

℞. Fol. tamarisci,

Rorismar.

Ruta an. M. j.

Bulliant in aqua vel vino ad mollitiem: addo

Farin. ciccr.

Furfur. frum. an. ℥ij. vel ℥ij.

Sterc. vaccin. ℥ij. vel iv.

Axung. anat. ℥℞.

Mellis opt. ℥iv.

M. f. Cataplasma: S.

Cataplasma resolvens.

Applicatur manè & vespere oedemati & partibus oedematosis, donec detumuerint.

℞. Herb. rorismar.

Bacc. junip. an. q. v.

Bulliant in aqua simpl. & lixiv. q. l. Fiat

Pediluvium, quod in pedibus oedematosis est egregium.

Lixivia in dictis casibus sunt optima: vid. HARTMANUS & PLATERUS. Convenit etiam emplastrum de baccis lauri, malaxatum cum petroleo, vel oleo destillato succini, quotidie bis repetitum. Vel etiam præparetur suffus aceti super lapides candefactos.

℞. Succini pulveris. ℥viii.

Aceti vini ℥ij.

Infund. lapidibus candefactis, & excipiatur fœtus pedibus aut partibus oedematosis, postmodum applicetur dictum emplastrum.

Juxta hæc, si acris desiderantur, emolnet aqua benedicta Chirurgorum seu aqua calcis vivæ, & lixivium ex cineribus sarmentorum vitis; etiam hic optima sunt: applicatur cum spongia nova, ubi pars prius fuerit illita cum adipe porcino. Meliorem successum habet hæc aqua applicata, si cum eadem bulliat sulphur commune aut baccæ lauri contusæ: Tale lixivium est, quod discutit dicta oedemata; sicuti & thermarum usus commendandus.

Ubi durius ac pertinacius sit oedema, recipiendum est stercore caprillum, & hoc bene subigendum cum urina humana, vel ipsius ægri: Còquuntur invicem ad crassitiem pulvis seu cataplasmatibus, quod calidè imponendum oedemati contumaciori. Vel simus equinus misceatur cum farina hordei & aceto, & simili applicetur modo; promptissimè enim solet discutere tumorem.

Emplastrum hydropicum Augustanorum notum est in vulgus: item in unguento cum oleo laterino seu Philosophorum, cum oleo hyperici, in specie cum petroleo, aut cum oleo tartari foetido rectificato aliquoties à cornu Cervi ulla, quod etiam per se illitum mirum est. Non inferius est oleum guaiaci destillatum, quod commodissimè etiam discutit oedemata.

Si huiusmodi oedemata in declinatione febrium & morborum, vel acutorum vel chronicorum, dum ægri denuò strenuè edunt, oriuntur, imprimis vespertina, (nam matutino tempore solent cessare & evanescere,) optimè applicatur Gernium Rupertianum cum absinthio contusum instar cataplasmatibus. Eiusdem efficaciz & probatz experientiz est quoque chelidonium maius recens contusum, & plantis pedum imposi-



impositum. Laudatur etiam pediluvium ex cinere farmentorum vitis cum calamintha, origano, malva & chamomilla.

In tumoribus pedum cedematosi heclicorum ac phthisicorum omnia sunt frustranea, nisi quis ægris blandiri velit, ut aliquid agere videatur.

## MEMBRUM II.

### DE

## SCROPHULIS.

**P**orro juxta cedemata similis lymphæ viscida & vitiosa, simulque sapore non nihil adstringente & austero prædita, ac acido occulto imprægnata, si in poris & meatibus glandularum colligatur, coaguletur, & ab acido proprio sensim inspissetur, ac ibidem indurescat, dat tumores glandularum, quos vocant *Strumas* seu *Scrophulas*, Germ. *Kropfe*, quæ frequentius equidem collum, utpote quod ubique glandulis oblectum, rarius aliàs partes occupant, ut ut subinde, mesenterium his repletum observatum fuerit.

Ipsæ *Scrophulæ* & *Strumæ*, imprimis in collo, sub duplici sunt differentia: vel sunt *mobiles* & pendulæ foras prominentes, vel *immobiles* seu fixæ, quæ artuum partium vicinarum musculis profundius intertextæ, & iisdem firmitus irradiatæ sunt. Porro ad eadum strumæ sunt vel *duræ*, vel *molles*, colore albicantes, vicinis partibus colore similes, suntque vel *dolentes* vel *indolentes*, & tales sunt strumæ legitimæ: *dolentes* verò sponte & punctationibus spontaneis interdum molestæ, aut quæ colorem subæruleum vel sublividum repræsentant, sunt non *legitimæ* seu *nothæ*, sed ex acidi vitiosi & corrupti abundantia sunt cancroræ, unde non facile curandæ. *Legitimæ* sunt *benignæ*; *illegitimæ* verò malignæ, pro cura nunquam attigendæ.

## CURA.

In Cura ergo emolliendæ sunt strumæ & resolvendæ successivè, per remedia potenter resolventia & strumas emollientia ac discutientia, viscida liquefacientia, & acidum viscidum corrigentia: quæ inter *gummi ammoniacum* ac reliqua gummata in aceto soluta, inspissata, emplastri formâ loco strumoso imposita. Loco hujus emplastrum Myrsichtii de Galbano crocatum, de ammoniaco, item emplastrum de Eleuta Hildani, vel solitariè, vel cum gummi ammoniaco in aceto soluto, commodè impunguntur. Pinguedo viperarum in strumis incipientibus egregia medicina est, earumque progressum & incrementum præcavet. Item totus cum spongia aquâ calidâ vivæ ebrâ & hic est convenientissimus. Cataplasma etiam resolutivum Foresti, uti & ex foliis & radice cucumeris asinini paratum, *optimum* est, emollit & resolvit glandulas strumosas, quod potentius est adhuc, si cum stercore caprillo fuerit subactum.

Hæc si non suffecerint, ad potentiora accedendum est, quæ inter præceteris eminent Mercurialia, sub viva forma addita, imprimis Mercurius vivus potenter penetrans & resolvens strumas. Hinc expertum est emplastrum de ranis Vigonis cum Mercurio, vel ex gummi caranna cum Mercurio & terebinthina subacta, hæc emplastrum ad imitationem **BARBETTE**: Habetur sic amalgama Mercuriale, ex quo & cum quo emplastra parata sunt egregia. Vel emplastro diachylon cum gummi, v.g. ʒj. addi potest Mercurij vivi ʒj.

Vel

ʒj. Ungu. Martiat. ʒj.

Olei myrtin.

Laurin. an. ʒʒ.

Mercurij viv. flor. sulph. extinct. ʒij.

M. f. Unguentum: S.

Unguentum emolliens.

Hoc scrophulis seu Strumis imponendum, & quotidie renovandum; hoc enim promptissime resolvit & emollit.

In quibus tamen Mercurialibus semper inspiciendæ sunt fauces & gingivæ, an forsan ex eorum usu immineat salivatio.

GRUELINGIUS lib. 5. *Medicina Practica* P. 3. c. 19. omnia linimenta & emplastra corio canino denso illinit egregio cum usu.

Præceteris excellens est oleum destillatum HELMON-

**TII in Scriptis, in Tr. Tartarus Non Est in Potu** 6. 15. quod oleum destillatum etiam invenitur jam olim descriptum in *Epistolis Medicinalibus LANGII Epist. 4. lib. 2.* Hoc illitum potenter resolvit & insensibiliter discutit Strumas & Scrophulas; quod etiam facit oleum Philosophorum & iridis nostratis per infusionem paratum.

Quod si emolliiri aut resolvi nequeant scrophulæ seu strumæ, usurpanda sunt successivè ad quandam suppurationem ducentia, ad quam scrophulæ legitimæ interdum sponte tendunt. Ad suppurationem præstat imprimis *emplastrum* de melliloto cum oleo amygdalarum dulcium & pinguedine serpentum subactum, aut unguentum diachylon cum gummatibus commodè suppurat, & maturat scrophulas, vel *cataplasma* ex cucumere asinino; *emplastrum magneticum Angeli Sale*, cum *emplastro diaspulphuris mixtum*, ad imitationem **FABRI in Cura Cancri Curas. 99.** Vel applicetur emplastrum de nicotiana *Plateri*, quod vadebitis C. 1. Obs. 18.

His & similibus suppurandæ sunt Scrophulæ. Scrophulæ dum suppuratæ sunt, non statim aperiendæ, sed quamdiu fieri potest, clausus linquendus est abscessus, propterea, ut ed major glandulæ strumose pars per maturationem in pus abeat; Nam aperto abscessu tota glandula affecta per suppurationem est absumenda. Aperto ergo abscessu, ut hoc fiat, imprimis ut tota strumosa glandula absumatur, sufficit vel solum *commune digestivum* ex terebinthina, vitelloovi & melle illitum (de quo alio loco plura); vel quod melius est, permisceatur cum tali digestivo Mercurius præcipitatus probe ablutus; sic enim blandè & sere absque dolore absumit glandulam strumosam. Absumptâ in totum strumâ, ulcus glandularum reliquum mundificandum, & solito modo consolidandum erit. Promundificando sufficit balsamus sulphuris.

Si verò glandulæ sint pendulæ, commodè filo seu feto equinâ pederentim constringendæ sunt, ut sensim marcidæ sponte separentur: si verò propriis tunicis sint inclusæ, subinde necesse est, ut, cum discutientia & suppurantia sint frustranea, Chirurgi mano curentur, prospiciendo ut membrana tota tollatur, quod saltem fieri potest, ubi non magna vasa aut nerulæ ad glandulas tendunt.

Hicce externis commodè subjungenda sunt interna, ut plurimum fixa acidum istud vitiosum, lympham scrophularum inquinans, absorbentia, qualia sunt ex spongiis combustis, earum lapidibus calcinatis, osse sepiæ, pumice, cum zingibere, pipere, & similibus, remedia *niperina*, *arcanum duplicatum*, *pumex* preparatus, præmissâ tamen internâ purgatione ex helleboro nigro & Mercurioducti. Facit quoque huc pulvis *Helmontii* contra strumas, qui vid. in *cir. loc.* item pulvis *Arnoldi Villanovanæ* contra strumas, qui vid. in *Pharm. August.* dosi ʒʒ. Vel fiat talis pulvis, in quo sere sunt omnia ingredientia contra scrophulas:

ʒj. Spong. marin. comb. ʒij.

Off. sepiæ,

Maxill. lucii pisc.

Lap. cancr. præp.

Piper. long.

Zingib. abt,

Rad. pyrethri,

Gallarum,

Test. ovor. calcin. an. ʒj.

M. f. Pulvis.

Quotidie decrescente lunâ dosi ʒj. usurpatur.

Magis appropriati redduntur pulveres ad strumas, si eisdem p. ij. vel iij. miscentur cum p. i. arcani duplicati Myrsichtii, dosi ʒj. ad ʒʒ. vel ʒij.

In potu commodè infunduntur vel decoquuntur rad. scrophulariæ, filipendulæ, & harum herbæ, genista, & similia. Vincetoxicum decoctum & exhibitum scrophularum Antidotus vocatur in *M. A. N. C. Ann. 1. Obs. 57. Lacertarum* cum aceto preparatarum pulvis nobilis est contra scrophulas qui etiam redigitur in Eleqtuarium: e. g.

ʒj. Lacertar. præp. & pulveris. ʒj.

Mellis ʒij.

M. f. Eleqtuarium.

Dosis ʒj. vel ʒij. omni mane continuando per aliquot septimanas.

Huc quoque facit manus & sudoris mortui afflictio: Conf. **WEDELIUS Physiol. Sect. 3. c. 27. p. 189.** Denique haustus potus ordinarius ex cranio hominis sepulti, ad tempus continuatus singulariter conducit ad strumas, in specie colli.



## M E M B R U M I I I.

## D E

## S C I R R H O.

**S**cirrhus vocatur Tumor durus saſſui renitens, qui ſenſim ut plurimum generatur in partibus mollioribus, & indolens eſt, & loco immobilis, & præter glandulas occupat alias partes, imprimis carnoſas, ſive internas, nempe viſcera, ſive externas quacunq̃ue.

## C A V S Æ.

**N**aſcitur ex coagulatione aut ſanguinis, aut chyli crudioris, aut utriusque ſimul: Ex ſanguine coagulato, quando inflammationibus male tractatis, imprimis per Repellentia dicta adſtringentia, ſupervenit; tunc enim talis tumor durus remanet ſeu ſcirrhus. Ex chylo crudo & viſcido, cum ſanguine hinc inde diſtributo, vel etiam cum alieno vehiculo, cùm ſimiliter in talem tumorem durum coagulando coeunt: qua ratione oedemata epithematis nimis validè diſcutientibus tractata in ſcirrhum degenerare ſolent: quod pertinet etiam Tumor mammarum ex lacte coagulato, qui & ipſe interdum ſcirrhelſcit, & tandem tam durum ſcirrhum quàm ſcrophulam generat. Interdum ſimul & ſanguis & talis chylus viſcidus per poros partium, in ſpecie viſcerum, tranſeundo ſucceſſivè hæret, congeritur & coacervatur, ibique coagulatur in talem ſcirrhum autore acido præternaturali, aut nimio, aut fixo, aut auſtero, aut alio ſimili modo vitiat, dictam materiam coagulante. Cauſa remota & occaſionalis, præter febres chronicas, menſium aut hæmorrhoidum ſuppreſſionem, ſæpè ſunt fracturæ: (vid. WISEMANNUS *Chirurg. lib. 1. cap. 19.*) Item convulſiones, (vid. HILDANUS *cap. 3. Obſerv. 79.* & WISEMANNUS *l. 4.*)

In his ſcirrhis probè obſervanda eſt differentia & diſtinctio: *Scirrhus vel indolens eſt & legitimus*, vel *dolens & præterea non nihil liveſcens eſt & nothus*, qui ſubinde eſt *cancerofus*, unde ſi curatur, periculum eſt ne in cancerum degeneret.

## D I A G N O S I S.

Facile patet ſcirrhus ex duritie & indolentia, quæ ſemper ſunt in ſcirrho legitimo.

## P R O G N O S I S.

Scirrhus, imprimis inveteratus, difficulter curatur, cùm nec reſolvi, nec commodè ſuppurari poſſit, & cauſa ejus ſæpe maligna, & ſcirrhus facilè in cancerum degeneret: vid. HILDANUS *C. 3. Obſ. 79.* & *C. 6. Obſ. 75.*

## C U R A.

In Cura opera danda eſt, ut ſcirrhus emollitus ſucceſſivè inſenſibiliter reſolvatur & evaneſcat, idque maturè, aliàs enim facilè incurabiles ſunt ſcirrhi. Curantur imprimis maturè, aut, uti dico, inſenſibiliter reſoluti, aut, quod rarius & etiam periculoſius, ſi tandem ſuppurentur & degenerent in abſceſſum. Acidum ergo coagulans temperandum eſt, & durities ſaſta emollienda.

Faciunt huc *Reſolventia fortiora*, diſcutientibus moderatis nec adeo acerbis permitta, ut reſolvatur tumor ſucceſſivè. Id quod faciunt imprimis remedia ex naſturtio, eryſimo, cochlearia, eruca, cicuta, mandragora, nicotiana, ſcrophularia, cucumere aſinino, ac ſimilibus, imprimis ſub forma emplaſtri ſucculenti vel cataplaſmatis applicata, donec tumor ſcirrhofus emolleſcat. Stercus bubulum aceto incoctum & applicatum ſcirrho, tumores ſcirrhofos quamplurimos miſericè diſſipat. Oleum lumbricorum terreſtrium, olei tartari deſtillati pauco miſtum, & hæc duo vini ſpiritu diluta & illita, optimè curant ſcirrhum: Nam certum eſt, quod oleum tartari rectiſicatum, fortidum licet, mirè reſolvat, & tumores duros potenter diſcutiat & emolliat, quod etiam facit oleum Philoſophorum, vel ſaponis.

Hæc juxta, Cataplaſmata ex radice bryoniæ cum ſtercore caprillo impoſita ſimiliter egregiè ſunt ad diſcutiendum &

emolliendum ſcirrhum; vel applicatur Cataplaſma reſolutum Foreſti; aut fiat tale Cataplaſma, quod expertus eſt ſcilicet THONERUS:

*℞. Farin. & furfur. bord. an. ʒij.*

*Sterc. caprill. ʒij.*

*Melilot.*

*Chamomill. an. M. ſ.*

Cum lixivio & ſapa F. Cataplaſma, addito pauco oleo anethi.

Præcæteris tamen gummata ſunt, quæ potentiffimè ſcirrhos reſolvunt, nempe bdellium, galbanum, opopanax, & hæc inter gummata ammoniacum primatum obtinet, ſi ſcilicet vel ſolum gummi ammoniacum in aceto ſolutum inducatur alutæ & applicetur ſub forma emplaſtri, optimè reſolvit ſcirrhum. Melius adhuc eſt, ſi emplaſtrum de cicuta vulgare miſceatur cum gummi ammoniaco in aceto; Nam cicuta per ſe mirè laudatur ad quoscuq̃ue ſcirrhos curandos. Hinc emplaſtrum ſpleneticum Aquapendentis, parum ex gummi ammoniaco & ſucco cicutæ, expertum eſt remedium ad percurandos ſcirrhos. Item emplaſtrum diachylon, vel de meliloto, cum duabus partibus gummi ammoniaci mixtum, ſcirrhum emollire ſolet. Elegans etiam eſt ſequens emplaſtrum, efficax ſatis ad ſcirrhos curandos; nempe

*℞. Succ. cicutæ expr.*

*Mandrag. an. ʒiv.*

Coqu. in tigillo aſſiduè moveſdo ad extracti liquidioris conſiſtentiam: adde

*Galb. cum aceto ſol.*

*Gum. ammon. cum aceto ſol. an. ʒij.*

*Empl. ad melilot.*

*Diachyl. ſimpl.*

*Terebinth. an. ʒij.*

*Croci Orient. ʒij.*

*Sal ammoniac. ʒj.*

*Olei tartari ſas ʒij.*

*Cera q. ſ.*

M. F. Emplaſtrum applicandum ſcirrho.

D. S.

*Emplaſtrum emolliens.*

Hocce applicatum dolorem equidem primitus movet: ſed propterea non eſt ceſſandum, ſed tertiâ quaque die novum eſt reiterandum.

Aliàs etiam emplaſtrum Hildani tanquam ſingulare experimentum laudatur ab Autoribus, cujus deſcriptionem videbit. in *C. 6. Obſerv. 75.* Loco huius emplaſtrum diaphurici Rulandi, item emplaſtrum diachylon cum gummis, commodè etiam applicantur.

His non ſatisfacientibus, & Mercurialia ex Mercurio vivo parata commodè etiam ſcirrho legitimo imponuntur. Hinc emplaſtrum de ranis Vigonis cum duplo Mercurio applicari poſſit: Vel ſequens:

*℞. Empl. diachyl. cum gummi. ʒij.*

*Mercurij vivi ʒij. ad ʒij.*

M. D. S.

*Ut ſupra.*

Imponatur de ſcirrho.

Vel pinguedo ſuilla cum oleo laurino & Mercurio vivo in mortario lapideo cum piſtillo ligneo ſubigatur, donec fiat unguentum. Convenit etiam ſolùm lamina plumbea hydragyro illita & impoſita, vel etiam ad ſcirrhos Cloſſæi, vel emplaſtrum Maſtrale, quod habet AGRICOLA in *Chirurgia Parva p. 689.* ſufficit ad tollendum & percurandum ſcirrhum.

Quod ſi his ipſis & ſimilibus, & imprimis Gummi ammoniaco, non poſſit legitime diſcuti aut reſolvi ſcirrhus, tunc neceſſitate urgente ad maturationem in pus, quantum poſſibile, deducendus eſt, temperatis tamen, ſed non nihil acrioribus, quàm in inflammationibus fieri ſolet, non tamen nimis oleoſis nec mucilaginoſis remediis: talia nempe imponenda ſunt, quæ alcali quidem, ſed temperato, conſtant, quæ imprimis acidum blandè reſolvunt, alterant, & ſucceſſivè materiam in puſ tranſmutant: id quod ipſum tamen cautè ſimiliter admodum faciendum eſt. Nam nimis ſuppurantia periculosa ſunt, quia ſcirrhus quicunque ſub maturatione ſacillimè abit in Cancrum, eumque exulceratum: quod obſervetur imprimis in ſcirrho dolente, & colore non nihil liveſcente, qui ſuppurantibus tractatus abit in Cancrum; in ſcirrho enim indolente hoc non ſemper eſt metuendum. HILDANUS *cap. 6. Obſerv. 75.* habet unguentum in tumore ſcirrhoſo ad Cancrum inclinante, quod etiam



etiam in scirrhomammæ mulieris, ubi metus suberat *Canceri*, optimum fuit.

*Dolens* ergo *Scirrhus*, *puncturis occultis molestus* ad *sa-*  
*stum dolens*, *colore livescens*, in subiecto vel jam ad sen-  
centem vergente, vel cui ordinarius aliàs hæmorrhoidum  
aut mensium fluxus est suppressus, talis, inquam, scirrhus,  
si non potest sensim resolvi & successivè absumi, insensibili-  
ter & citra suppurationem, aut intactus omnino est relin-  
quendus, aut applicatione nitri in aceto dissoluti in lapi-  
deam duritiem indurandus; nitrum enim hoc modo dissolu-  
tum cum linteis vel spongulis applicatum indurat scirrhum,  
& in lapideam concretionem ferè transmutat.

Quidam tumoribus scirrhosis, præmissis universalibus,  
cauteria potentia applicanda commendant, (vid. HIL-  
DANUS *Cent. 3. Obs. 79.*) quæ tamen vitanda, præsertim  
quando scirrhi in Cancrum degenerare volunt: vid. HIL-  
DANUS *Cent. 6. Hist. 75.* Scirrhos hos dolentes, sicuti  
etiam strumas dolorosas, in subiectis modò citatis faciliè in  
Cancros degenerare dixi.

Pergo igitur ad

#### M E M B R U M I V.

##### D E

##### C A N C R O.

**C**ancer est tumor planè singularis, a compnò sui gene-  
ris. Primò quidem vix ciceris ac pisii aut fabæ magni-  
tudinem adæquat, ita tamen, ut in ipso subinde punctio  
percipiatur ab ægro, successivè modò citius, modò tardius  
incrementum capit, & sub isto parvo initio tuberculum illud  
durum, nigricans, interdum lividum, punctationibus quibus-  
dam molestum, esse solet: Ubi Cancer augmentum acce-  
pit, apparet tumor durus, coloris plumbei aut lividi, dolens  
in principio moderatè, in augmento vehementius: Ubi ve-  
rò est exulceratus jam, ardor est acerbissimus, instat aquæ  
fortis corrodens & depascens partes vicinas molliores, cum  
insigni in ulcere putrilagine ac fœtore: adest in incrementò  
Cancer, aut ubi jam ad exulcerationem vergere incipit, fer-  
vidus ardor, pulsatio punctoria molesta, & ambiunt tumorem  
venæ hinc inde turgidæ, & nigro sanguine distentæ, tan-  
quam pedes cancerini hinc inde extensi, donec exulceratus  
tandem Cancer, nisi ferro aut igne deleatur, miserà morte  
ægros occidat.

Qui tamen per se rariùs inchoat, nisi forsan in mammis;  
cùm sæpius alios tumores, in specie scirrhos, & quæ his  
sunt cognatæ, strumas scilicet subsequi solet, si malè tra-  
dentur: Nam Cancer creberrimè occupat mammæ, in quibus  
quamplurimi oriri solent Canceri; post mammæ etiam  
locæ glandulosa alia; sic namque in locis glandulosis ul-  
cera deteriora fiunt, quæ subinde ad canceri malignitatem  
accedunt.

Post hæc glandulas occupat Cancer frequentius, si per se  
incipiat, faciei partes externas, nempe os, nasum, labia,  
& similia. Si nasum, os, vel labia occupat, dicitur *Noli me tan-*  
*gere*; item *Lupus*. Pariter etiam genitalia, tam virilia quàm  
muliebria, licet sæpius & ipse uterus ex partu difficili, aut  
impuro coitu, cum annexis, Cancro afficiuntur.

##### C A U S Æ.

*Occasio* hujus interdum est ex *causa externa*, nempe con-  
tusione, contrectatione inclementiori, vel alla læsione mam-  
mæ, aut aliarum partium glandulosarum, qua tunc in  
parte læsa colligitur tale fermentum malignum, quod sub  
feri vehiculo unà cum acido corrosivo sensim sensimque  
circa vasa capillaria varices efficit, dum illic stagnat, ac cor-  
rodendo latius serpit; ubi tamen simul vasa capillaria propter  
vim quasi illatam constringuntur, adeoque, dum sic tot  
maius sanguinis transitus præpeditur, Cancer oritur: Ubi  
principium ejus diu latere potest, donec sua sub diuturno ma-  
turitate supervenientibus causis internalis, in specie in scor-  
buticis quibusdam, hypochondriacis, melancholicis, hyste-  
ricis, lue venerea affectis, &c. mensium fluxu suppresso,  
aut hæmorrhoidibus deficientibus, ut ferè in ætate consi-  
stente evenire solet, tandem se manifestet & augmentum  
capiat. Interdum etiam retardio viscidioris lymphæ in ip-  
sis glandulis, accedente acido corrosivo, causa antecedens  
hujus affectus est. Cum ergo varia hæc ad Canceri genera-  
tionem concurrant, hinc ejus productionem ad unam sal-

tem causam remotam vix referre possumus, excepto illo,  
qui à certis & jam dictis subiectis prædispositis contagio pro-  
pagatur.

*Causa proxima* Canceri communiter statuitur humor me-  
lancholicus adustus, seu, ut alio nomine venit, atrabilis,  
id est, si intelligibili sensu explicetur, acidum volatile insi-  
gniter corrosivum, de natura quasi (si per simile explican-  
dum est) arsenicali, in quo ipso, in specie si exuberat, du-  
plex venenum esse, non ineptè asserit HILDANUS, nempe  
putrefactivum & corrosivum.

Hoc ipsum acidum est occultum in Cancro incipiente, in-  
crescente & nondum exulcerato; manifestum verò est in  
Cancro exulcerato.

Latet autem istud acidum, quamdiu à novo acido vitio-  
sum nullum augmentum capit, aut quamdiu per applicata  
externa non irritatur seu in effervescencias cogitur; aliàs  
enim levi irritatione effervesceat, unde acor malignus sic se  
explicans ulcus constituit cancerosum, seu cancerum exulce-  
ratum, qui Veteribus, HIPPOCRATI & GALENO, citra totalem partis cancerosæ extirpationem ferro  
& igne fuit incurabilis; Modernis autem, licet paucissimis,  
per certum quoddam alcali sulphureum citra partis jactu-  
ram curabilis.

Cancer iste, qui adhuc latet, si nondum in ulcus degener-  
at, dicitur *Cancer occultus*; qui verò jam prodidit sese exul-  
ceratione, dicitur *Cancer manifestus*. Occultum fieri ma-  
nifestum seu exulcerari ferè, patet ex superveniente dolore  
intensiore, pulsatione punctoria molestiore, ardore, & can-  
cri insolita intumescencia, donec perfectum prodeat ul-  
cus.

##### P R O G N O S I S.

Cancer est affectus gravissimus, quo plures moriuntur,  
quàm restituntur; vid. FRANCISCUS *de Roma Conf. 21.* ut ut non absolutè lethalis sit, ille præprimis, qui à cau-  
sa externa oritur, vid. WISEMANNUS *Chirurg. p. 20.*  
& quia non, nisi generosis remediis curari potest, periculosa  
etiam applicatione malum sit difficilior.

Cancer, qui totam Massam sanguineam & viscera interna  
inquinat, periculosus est: vid. AVICENNA *de Cura Can-*  
*crici*, FORESTUS *lib. 4. Observ. 5.* & FRANCIS-  
CUS *de Roma Consult. 22. in Append.* qui experientia  
testatur, una mamma cancerosa rejecta alteram mox cancro  
affici.

Cancer, qui immediate sub cute hæret, faciliùs curatur,  
quàm qui profundius latet; unde cancerosis, vaginæ uteri-  
næ, faciliè quidem exstirpatur, commodè tamen non cica-  
trifari potest.

Qui valis majoribus propinquis, aut in mamma costis ar-  
ctius cohæret, difficilior curatur.

Cancer cum dolore atrociori & hæmorrhagiis frequen-  
tioribus grave malum est.

Cancer exulceratus periculosior est Cancro non exul-  
cerato.

##### C U R A.

*De modo curandi per remedia*, vid. *Discurs. ALLIOT*  
*in P. 1. Art. Hæm. pag. 158.*

Cancros ergo hos occultos seu nondum manifestos, adeo-  
que scirrhos & scropulas indolentes, non attingere melius  
est, monente HIPPOCRATE *lib. 6. Aphor. 38* cùm per  
medicamenta discutientia, suppurantia & erodentia atta-  
cti faciliùs exasperentur & alterentur, unde postmodum  
ægri citius intereant: aut si attingi debet hic ipse Cancer oc-  
cultus, palliativè saltem tractetur, incrementum ejus præ-  
cavendo, & excessivum gradum acidi temperando & quasi  
edulcorando, per medicamenta imprimis Saturnina, aci-  
dum quodcunque, quate nempe est in aceto & spiritu nitri,  
edulcorantia, aut per vegetabilia temperata, alcali fixo &  
ferè insensibili prædita, vulgò refrigerantia dicta, nempe  
plantago, solanum, cicuta, quibus Canceri suviatiles, ster-  
cus humanum, ranæ, bufones, & similia animalia acce-  
dunt: *quædam internæ, quædam externæ conveniunt*; inter-  
nè remedia ex Cancris, acidum nimium in corpore ablorben-  
tia, ejusque proventum impediunt.

Inter externa ergo, quæ applicentur in Cancro occulto  
palliativè conservando, ne exulceretur, ex vegetabilibus  
est cataplasma ex cicuta recenter impositum; hoc nempe po-  
tenter mitigat Cancrum. Hinc omnes species intyborum,  
atque



atque Decoctum solani, aut similia, aut succi horum vegetabilium, Item succus scabiosæ, geranii Robertiani, herniariæ, plantaginis, & similia mitigant Cancrum incipientem. Solani nempe folia teruntur in mortario plumbeo, & imponuntur locis, ubi Cancer occultus est: vel subigitur succus in mortario plumbeo. Solo succo onopordi contusi quidam apud BORELLUM Cent. 2. Obscrv. 51. à Cancro narium curatus fuit; ubi plantago, si mammarum Cancris applicatur, laudatur: Vid. Cent. 2. Obscrv. 67. ubi egregia medicamenta contra Cancrum describit: Vid. pariter AGRICOLA, ubi idem arcanum reperietis. Præcæteris poma putrida applicata, aut aqua pomorum putridorum, & cum hac parata aqua calcis vivæ applicata, est optima; quin & Cancri fluviales contusi in mortario plumbeo, & succus eorundem in simili mortario probè agitatus, optimè applicatur partibus Cancro occulto laborantibus.

Fiunt etiam unguenta ex Cancris fluvialibus huic usui destinata. Hinc sterco humanum impositum, aut oleum & aqua sterco humani destillata applicata, optimè conducunt ad palliandum Cancrum occultum. Rari etiam vires dant unguentum & oleum, quod describit SENNERTUS, & valde etiam commendatur ab aliis Autoribus pro Cancro occulto.

Saturnina imprimis dixi esse utilis & his cognata: hinc Saturnus calcinatus, lithargyrium, cerussa, saccharum Saturni, & similia optima sunt: unde usurpetur *emplastrum de Saturno*, nempe ex oleo rosarum, dilutis in mortario plumbeo cum Saturno calcinato terendo tam diu, donec fiat Linimentum crassum & lividum. Unde etiam unguenta, & liquida Cancro occulto applicanda, omnia subigenda sunt in mortariis seu vasibus plumbeis; sicut etiam unguentum ex plumbo usso, plantaginis, solani succis, &c. habet AMATUS LUSITANUS l. a. quod etiam pertinet unguentum de turia, diapompholygos, &c. imprimis si his oleum & cineres ranarum admisceantur.

Vel

24. Saturni ussi ʒj.  
Olei rosar. ʒiij.  
Croci ʒvj.

Mista ducantur in mortario plumbeo calidè cum pistillo plumbeo:

D. S.

*Unguentum præservans.*

Hinc *emplastrum Saturninum Mynsichti*, Item *emplastrum de carne bubulæ ejusdem*, optimè conducunt in hoc casu, Oleum ranarum ducatur diu in mortario plumbeo, addendo cornu Cervi ussi & saturni calcinati q. s.

Convenit etiam in Cancro occulto lamina plumbea, primò simplex, postmodum Mercurio incrustata, cancroso tumori artius applicanda: Vid. AMATUS LUSITANUS Cent. 2. Cur. 32. & PARÆUS lib. 7. c. 32. *Amalgama Mercurii cum saturno*, quale amalgama & inde paratum *emplastrum* est optimum. TULPIUS lib. 1. Obscrv. cap. 47. & lib. 6. cap. 51. etiam habet Ceratum de Saturno ad hujusmodi Cancrum palliandum convenientissimum, quod sequenti modo paratur:

24. Olei rosar. ʒij.  
Cera alb. ʒvj.  
Plumb. ussi & lot. ʒss.

Cera cum oleo liquefiat, & addito plumbeo agitentur per sex horas in mortario plumbeo, fiat Ceratum. Cautè tamen mercandum in tumoribus cancroso cum unguentorum applicatione: Vid. WEDELIUS Tr. de Comp. Medicamentorum p. 185.

Nec negligendi etiam sunt Fonticuli, e. g. brachii in cancro mammarum inusiti, quos commendat CLAUDI-NUS in Respons. Med. 35. HILDANUS cap. 6. Obscrv. 12. & LUDOVICUS MERCATUS Chir. lib. 2. cap. 7.

Interne his Ipsis succurrendum est appropriatis: unde præmissis abloribentibus, & acidum causticum Invertentibus, v. g. antimonio diaphoretico Joviali, saccharo ac magisterio Saturni, & similibus, vel seorsim vel junctim, quotidie bis vel ter assumptis, imprimis usurpanda purgantia ex hel-leboro nigro, quæ etiam in scirrhis conveniunt, cum Mercurio dulci propinanda. Item conveniunt etiam in specie remedia ex sumaria, borragine, buglossa, portulaca, &c. quæcunque hinc Saturnina, saccharum Saturni, crystalli Saturni cum spiritu nitri, balsamus Saturni, &c. tinctura Angimoni tartarificata, tartarea etiam volatilia, spiritus tar-

tari volatilis per fermentationem parandus, &c. quæ optimè ad præcavendum cancri progressum usurpantur. Convenit etiam lac, cui cancri fluviales incocti, quod commendat CLAUDINUS l. a. & pro acido diluendo serum lactis, decoctum theæ à KYPERO olim laudatum, decoctum radiciæ chinæ, sarsaparillæ, ligni sassafras, decoctum herniariæ, de quibus vid. RIVERIUS Tr. lib. 1. c. 10. Præcæteris polvis millepedum præparatorum, à ʒj. ad ʒss. usurpatus, singularem habet virtutem contra Cancros occultos, in specie si mammas occupaverint: propinatur cum dimidio lapillo-rum cancrorum, ut acidum occulti Cancri temperent, ne exulcerationem inducat. Cum his legitima instituatur diæta, quæ solâ etiam multi cancroso per plures annos sine incommodo vixerunt: Conf. AMATUS LUSITANUS C. 2. Cur. 32. Vitetur vinum, utpote acidum volatile corrosivum augens.

De Cura Cancri exulcerati inferius Artic. 6. Cap. 3. habebimus, ubi de ulceribus cancroso, quæ vix nisi arsenico cedunt. In talem Cancrum exulceratum, ut supra dictum est, gingivarum cancer occultus, scirrhi & scrophulæ dolentes, uti etiam exerescentiæ quædam lividæ & dolentes, v. g. polypus narium, quædam verrucæ & similes, facili de-generant, si scilicet nigrescant, vel lavescant, vel sint doloro-se, aut malè tractentur.

Signum imprimis est dolor eorum punctioris & lancinans, qui oritur ex eo, quod acidum istud volatile corrosivum mor-ficat obscure fibrillas quasdam nerveas & vicinas partes; vel ob sui excessum, dum non satis habet à quo imbibatur; vel in specie, quia infestat partes sensiles nerveas & fibrillas fa-cilè irritabiles; vel si dolor occultum, quam istud aci-dum jam concipit, effervescentiam ad exulcerationem dis-positivam, cum qua semper simul ardor quasi & aestuatio in loco dolente concurrere solet; si tamen illud ergo acidi in in effervescentiam concitetur, etiam portò in exulceratio-nem promovetur. Quicquid in his casibus tentetur, irri-tando crabrones faciliè in perfectum exulceratum cancrum mutabitur, idque imprimis si ducatur ineptè ad suppuratio-nem tumor per propriè dicta maturantia aut emollientia, aut illegitimo aut Inconvenienti modo adhibita. Nam si ta-lia adhibeantur aciora, acidum in fermentationis ex fuscif-atur motum, dolorosa oritur exulceratio, & cancer mani-festatur: Sin hæc aciora fuerint mucilaginosas nimis & oleosa, tunc pori partis agglutinantur & incrustantur, unde exhal-a-tio particularum acrium subtilium impediatur, quæ retro-gressa acidum corrosivum augebunt, & ita promptius exul-cerationem inferent: Sin humectantia, tunc resolvendo aci-dum occultum istud inactum deducitur, quo solato super-venit corrosio & exulceratio, hinc dicunt; in scirrhi dolen-ti focus in humidi sunt nocivi; Item focus cum aqua sunt reji-ciendi.

Scrophulæ ergo & scirrhi, & similes tumores dolentes, aut non sunt attingendi, aut tentandum ut iis, quibus can-ceri occulti ad tempus palliantur, successivè discuti ac remo-veri possint: id quod tamen, nisi appropriatis internis succur-ramus, vix sit citra metum recidivæ, aut orientis cancri oc-culti in alia corporis parte.

Hæc de Tumoribus ex congestione & stagnatione ena-tis.

Sequitur

## MEMBRUM V.

DE

## GUMMATIS GALLICIS.

Quod attinet alteram Tumorem speciem, ex alimen-to partis proprio corrupto aut alterato, paulatimque coacervato oriundorum: pertinent ad hos imprimis *Gum-mata Gallica*, quæ sunt tumores duri, tactui renitentes, in-terdum dolentes, in ossium medio enati, & iis immediatè incumbentes, subinde ipsi dolore nocturnum gravissimum ferè intolerabilem ostropon inferentes, tandem partes mol-les subjacentes & omnia subiecta eroduntur & cariola red-duntur.

## CAUSÆ.

Originem ducunt ex acido maligno Venereo, quod ag-greditur partes nerveas, in specie ossa, in his se firmius im-plantat, eorum alimentum corrumpit, quod corruptum a core inqui-



inquinatur, successive in medio ossium coacervatur, & porro coagulando in ista gummata induratur, donec acidum vitæ loca erodendo ulcera pessima excitet.

C U R A.

In mitiori casu profunt sudorifera ex lignis, aliaque lue Venereæ appropriata, in graviore salivatio Mercurialis, quibus etiam semper Viperina & Martialis fixa remedia sunt intermiscenda.

Præter interna applicanda sunt hic gummata emollientia & resolventia, antequam ulcera ossium & partium mollium inferant.

Conveniunt ergo emplastra ex gummis fortiter penetrantibus, in specie oleo destillato ligni guajaci malaxando, quod oleum imprimis cariem præservat & curat, illis tamen semper Mercurialibus concurrentibus, tanquam specificis alexipharmacis. Præter hæc, Gummata talia resolvuntur lamina plumbea imposita, cum Mercurio vivo illita, si scilicet sunt adhuc in principio; vel etiam imponendus est Mercurius vivus fumo Saturni coagulatus, & hinc quasi in laminam ductus; aut etiam emplastrum de ranis Vigonis cum Mercurio; vel miscendum est oleum terebinthinæ cum oleo destillato guajaci, & ipsi addendum est opii q. s. pro leniendis nonnihil doloribus, unâ cum Mercurio vivo, & instar linimenti illinendum est Gummatibus dolorosis. Optime convenit in tumoribus sanguineis opium; dolorem enim sistit, & simul resolvit. Vel

24. Empl. de hyoscyam. Lud.

Misceatur cum Mercurio, pinguedine subacto:

D. S.

Emplastrum emolliens.

Item emplastrum, quod Para vii in usu est, cujus descriptionem videbitis in Colleg. Pharmaceut. in LUDOVICI, Tit. 32. p. ....

M E M B R U M V I.

D E

TUMORIBUS RECIDIVANTIBUS.

Pertinent hæc Tumores post curatos abscessus & ulcera, sæpius recidivantes: Nempe sæpius post abscessum induratum non rite mundificatum, & nimis maturè consolidatum, aut post ulcera partium, imprimis nervosarum, alcalibus balsamicis non rite mundificata, aliquid de fermento ulceris corruptivo, tantillo licet, remanet, aut si post ulcera occulta ossis subinde caries, etiam carie non rite sublata consolidata, recidivant tumores insignes, qui pedetentim de novo suppurati novos abscessus & ulcera faciunt, de quibus inferius.

In his & similibus casibus alimentum partis proximum alteratur, & in materiam acrem subacidam mutatur, & in novum tumorem collectioni ansam præbet: Unde successive dolor oritur; his enim ex causis tumor & inflammatio & irritatio supervenit, & tandem per suppurationem abscessus renovatio, idque toties (decies v. g.) quoties occulta caries in osse non subitè perfecte curata.

C U R A.

Cura est eadem, quæ ulcerum, propinando internæ positiones vulnerarias: in specie tamen opera danda est, ut salibus volatilibus Massa sanguinea purificetur, & fermentum stomachale in naturali vigore conservetur, & acidi proventus prohibeatur; externè verò probè mundificando ulcus vel abscessum de novo factum, & diutius apertum conservando. Mundificatur vel communibus digestivis cum balsamo sulphuris rite preparato, vel balsamo Peruviano cum oleo nicotianæ, aut simili. Quod si pertinacius fuerit malum, imprimis quando suspicio est latentis forsitan malignitatis Venereæ, præter interna dictis mundificantibus semper de Mercurio, aut dulci aut præcipitato, parum addendum erit.

Ossium caries occulta inquirenda, & ut alio loco dicitur, appropriatis curanda.

M E M B R U M V I I.

D E

CALLIS, GANGLIIS, ET SARCOMATIS.

Ad hos Tumores pertinent etiam Calli, Ganglia, & Sarcomata, quando nempe pars quæcunque, tam carnosâ quàm nerveâ, imprimis tamen nerveâ, ex quacunque causa, imprimis externa, ita lædatur, ut ejus nimia extensio, staminum fibroso-nerveorum laceratio, pororum & meatuum ex naturali figuræ confusio & inordinatio fiat; tunc enim fibrillis partium læsis alimentum proximum partis uberius recipiatur, diutius retinetur, & magis, quàm pars requirit, assimilatur. Atque his occasionibus fiunt Tumores congeneres, seu ejusdem naturæ cum partibus, quibus adherent; v. g. circa ossa & Calli, in tendinibus Nodi seu Ganglia, in partibus variis carnosæ Sarcomata seu Exerescentiæ. Unde Ganglia admodum familiaria sunt Religiosis Romanensibus, quibus oriuntur à frequenti genuum prostratione in tabulas lapideas, imprimis hybernæ tempore, quâ sensim circa genua partes membranosæ & tendinosæ unâ cum carnosæ concutiuntur, simili modo ac pueri vesicas bubulas aut suillas concutiendo ampliores faciunt, adeoque successu temporis uberiori alimentum proximi receptione & assimilatione majus incrementum capiunt.

C U R A.

Curantur faciliè vel emolliendo & resolvendo eadem insensibiliter; id quod locum habet in Callo nimis exerescente id osse fracto, cujus curationem videbitis in SCHENCKII & HILDANI Obs. Idem locum habet in Gangliis & Nodiis, ut nempe emolliantur & insensibiliter resolvantur: Vel curantur Tumores aperiendo & radicitus excindendo; id quod imprimis in Sarcomatibus seu Exerescentiis carnosæ faciendum. Vel Ganglia & Nodi resolvuntur per folium semper-vivi majoris detractâ pelliculâ internâ arde ligatum, & quotidie, mane & vespere, renovando. Item Nodos & Ganglia in principio discutit vel resolvit lamina plumbea, vel sola, vel cum Mercurio vivo illita, & superimposita: aut loco Mercurij lamina plumbea oleo destillato juniperinæ illita imponenda; sic enim aliquandiu gestata faciliè etiam disparet; hujus loco etiam oleum tartari foetidum, item saponis Veneti, expertum de prædicatur remedium. Conveniens etiam est, si applicetur gummi ammoniacum in aceto solutum, ac postmodum emplastrum figens, Germ. ein. Heffipflaster, super imponitur. Vel

24. Empl. diaphoret. Myrs.

De ammon. For. an. ʒj.

Olei tartari fixid. ʒj.

M. D. S.

Emplastrum emolliens.

Vid. M. A. N. C. Ann. 3. obs. 326. & 7. obs. 201. Curantur denique etiam Ganglia, si illinantur cum spiritu vini temperato cum succo rutæ; hæc enim applicata sæpius, optime discutunt & resolvunt Ganglia: Vid. BORELLUS Cent. 1. obs. 15. Interdum solum gummi ammoniacum in forma emplastri imponitur satisfaciunt. Pertinaci malo convenit Emplastrum de ranis Vigonis cum Mercurio: Vel lamina plumbea, infusa spiritu vini & aceto destillato, & adperso euphorbiæ applicata Gangliis, successive illa evanescere cogit.

Sarcomata verò abscindenda & exciscanda sunt, in casu, quando nempe non adherent nervis, vel quando sarcomata non conspirant cum vasculis insignioribus arteriosis & nervosis, & in talem excreverunt magnitudinem, ut manibus commodè ea ad radices usque prehendi & excindi possint. Sectio autem decussatim faciendâ, cutisque incisa crucis formâ à cystide avellendâ, cystisque ad radicem sarcomatis ligandâ ac stringendâ, trajectâ prius acu sub ejus radice; hæc probè contrictâ ac ligatâ sarcoma cultro vel novacula sub filo abscindatur. Sedatâ hæmorrhagiâ heterogenea substantia membranosa vel fibrosa crystallis lunaribus fricetur, vel pauxillo butyri antimonij attingatur, & blandè exedatur, ut radix emoriatur, nec novus denud tumor excreseat: postmodum radicaliter est tollenda per suppurantia; aliàs enim revertitur. Suppurationi sufficit unguentum Ægyptiacum, vel suppurantia communia: postmodum per empla-



emplastrum quoddam glutinans, vel aliis consolidantia vulneraria adstringentibus mista, pars leſa consolidetur. Sic in M. A. N. C. *Ann. 2. Observ. 255. p. 379.* verruca lingue & excreſcentia ex loco dentis evulſi, per chordam reſecta & curata reſertur.

## M E M B R U M VIII.

## D E

## EXCRESCENTIIS.

**S**imili ratione ſerè generantur & alii Tumores ſuis propriis folliculis incluſi, qui omnis ex eo, quod foras adnaſci ſoleant, *Excreſcentiæ* vocantur, & in membranis propriis peculiarem & ſingularem humorem retinent: Germanis dicuntur *die Gewachſe*: pro cuius humoris varietate diſtinſta & varia ac diſtinſta hi Tumores acquirunt nomina, ita ut nunc *Melicerides*, nunc *Atheromata*, nunc *Steatomata* appellari ſoleant.

*Meliceris* equidem dicitur, quando materia contenta eſt ſimilis quodam modo melli vel piſis coctis: *Atheroma* dicitur, ſi materia contenta eſt inſtar pultis: *Steatoma* verò dicitur, quando materia contenta eſt inſtar ſevi, vel adipis, vel ſaponis.

Reperiuntur etiam alia contenta varia, dum interdum ſub forma farinæ contineri ſoleant, interdum etiam unà lapides in iſdem continentur, interdum fila longa ex iſdem extrahuntur, & quæ ſunt huiusmodi contenta alia varia, quæ omnia propriâ tunica ſeparatim ab ambiente cute ſunt incluſa, & ita retenta. Oriuntur hæ excreſcentiæ ex nutrimento partis cuiusdam nervæ, in ſpecie membranæ aut tendinis, ut plurimum membranæ copioſiori retento, ſed nonnihil alterato, & hinc in aliam ſubſtantiam, quàm præciſe eſt pars alenda, tranſmutato.

## C A V S Æ.

*Cauſa* autem, quod uberius colligatur tale nutrimentum & alteretur, eſt, quod membranæ & partes membranofæ aut à cauſa violenta diſtendantur, dilatentur & dilacerentur, quod ut plurimum fit, vel quando à cauſa interna, levi tamen, nonnihil eroduntur. Unde fibræ, quarum textura membranæ conſtituuntur, à ſe invicem ſeparatis, & poris dilatatis & ampliatis, alimentum earum proximum diſtributum uberius recipitur, retinetur, & ita ſenſim extrorſum verſus proruberans, tumor generatur: nam introrſum non patet ſpatium, ut eò vergere poſſit. Ut plurimum dixi, præcedere cauſam externam: hinc enim eſt, quod Moniales & Monachi ex crebrioribus genuflexibus, adeoque dilatatione membranarum iſtus loci, ſæpius patientes tales tumores, in ſpecie *Melicerides*, in genubus: Sic enim ex equitatione violenta & concuſſione, ingens *Steatoma* cuidam militi ſucceſſivè in perinæo fuit enatum, de quo ſcripſit *Elsholtz* in quadam *Epiftoſa*. Obſervetur hoc, quod, ſi non ſemper, tamen ut plurimum, tales tumores à cauſa externa violenta occasionaliter oriuntur.

Quod verò attinet *folliculum* proprium, videtur fieri ita: nempe fibrillæ iſtæ membranarum eroſæ aut laceratæ, aut à ſe invicem ſeparatæ, cum ſpontè non ampliùs redeant in naturalem ſitum & unionem, à nutrimento collecto & coſervato diſtendente ſucceſſivè & ipſæ longiùs prætenduntur, & hinc inde aliàs emittentes fibrillas, tandem ſe uniunt, & mutuo concurrunt in perfectam talem membranam, talem tumoris materiam ex parvo initio propullulantem comprehendentem, eſtque ipſa membrana, aliarum membranarum inſtar, & cum incrementum tumoris & ipſa accreſcit ſenſimque augetur. Quoniam verò ſuccus alimentitius per membranas laſas ſucceſſivè tranſudans, non naturali ritu & ſitu diſponitur & ordinatur, ſed ſaltem conglomeratus coſervatur ſimpliciter, ob id nudam materiam, aut ſevi aut pultis aut mellis, repræſentat, prout ſimul ſub iſta tranſudatione & collectione plus minus alteratur.

Obſervatum etiam fuit, quod hi tumores, propriis folliculis incluſi, ſubinde longæ phaſes imitantur, quod videtur commune quibuſdam tumoribus in partibus nervis radicatis: Item quod hi tumores ſæpè & frequentius circa caput, collum, nucham & ſimilia reperiuntur, rariùs in aliis locis, etiam carneis, ſarcomata protuberent.

## DIAGNOSIS.

Facile patet, an ſine proprio folliculo incluſi? qualiſ autem materia contineatur? vix poteſt cognosci; hoc parum reſert.

## PROGNOSIS.

Tumores tale cyſtici per ſe præter moleſtiam ſerè nihil habent periculi: attamen, quia interdum enormem excreſcentiam, interdum deformitatem important, curandi ſunt.

## C U R A.

In *Cura* ergo obſervandum eſt, ut materia contenta, tumorem conſtituens, omnimode tollatur; ſive inſenſibiliter reſolvatur & diſcutiatur, quod fit rariùs, & ſaltem in hiſ tumoribus incipientibus, aut minus inveteratis, quorum cyſtis ſeu membrana nondum tam firmiter coaluit, aut nondum adeo tenax fuit reddita; ſive ſenſibiliter evacuetur, dum alteratur & quodammodo in materiam puri ſimilem tranſmutatur, & hinc aperto cum lacerola tumore exhaustur; quod fieri poteſt tantummodo in *Meliceride*: nam alii tumores alterationem quancunque reſpuunt. Interdum ſpontè aperiuntur tumores, & materiam contentam largiter effundunt: interdum inſtituta ſectiōe integra membrana cyſtim conſtituens penitus extirpanda eſt, qui modus eſt optimus. Verùm ſi tumor eſt confirmatus, & ejus membranæ firmiter coaluerint, ſine ſectiōe Chirurgica vix tolli ſolet: unde obſervandum in omnibus curandi modis, ut diſta cyſtis radicitus tollatur, quod fit vel cultro ſucceſſivè ſeparando, vel inunctione butyri antimonii, aut friſtione cum cauterio lunari, vel ſimilibus unguentis erodentibus, ne tantillum ejus ſuperſit; aliàs namque à paucis ejus fibrillis reliſtis novi tumoris regeneratio ſupervenit: Vid. M. A. N. C. *Ann. 2. Observ. 93. p. 167. & Ann. 3. & 5. App. pag. 71.*

Reſolvunt hoc Tumores baſamus Peruvianus, baſamus ſulphuris, vel gummi ammoniacum, item lamina Saturnia Mercurio illita ſuperimpoſita, item emplastrum oxycroceum applicatum, item emplastrum de ranis Vigoniis cum Mercurio:

Vel

℞. Picis naval. ℥j.

Gum. ammoniac.

Sulphuris an. ℥ß.

M. f. Emplastrum.

D. S.

Emplastrum reſolvens.

Potens ſatis eſt hoc emplastrum ad reſolvendos & diſcutiendos hoſtumores non inveteratos.

Facit hoc etiam emplastrum diſſinapios, deſcriptum à SCULTETO in *Tab. ultima*, quo ipſo curavit *Melicerides*, uti patet ex *Observ. 66.*

Quod ſi reſolvi nequeat Tumor & ſuppurari poſſit, ſuppurandus venit per ſuppurantia paulò fortiora & acriora impoſita; id quod tamen raro fit. Pro hoc ſcopo BARBETTE in *Chirurg.* parat emplastrum utile ex gummi ammoniaco, pyrethro, & oleo ſuccini, quod impoſitum tumorem maturare & ad ſuppurationem deducere, ſolet ſequenti modo:

℞. Gum. ammon.

Sagap. an. ℥ß.

Rad. pyrethr.

Euphorb. an. ℥ß.

Sulphuris ℥ij.

Olei ſuccin. ℥j.

M. f. Emplastrum:

D. S.

Emplastrum emolliens.

Tumor ſuppuratus aperiendus eſt vel medicamentis, vel ſectiōe Chirurgica; & hinc evacuatâ materiâ membranæ eam continens ſeu folliculus catherencis ſeu exedentibus eſt abſumenda. Id quod faciendum eſt, quando talis tumor ſpontè rumpitur: tunc enim & materia tumoris & membrana continens blandiſcorroſivis eſt tollenda; quia aliàs aut recidivam parit, aut reliſto tantillo membranæ in fiſſulam abit, aut ulcus diuturnum ac ſetidum conſtituit. Abſumunt



materiam & folliculum unguentum *Aegyptiacum*, vel unguenta cum Mercurio præcipitato eductorato applicata; aut

24. Unguent. *Aegypt.* 38.

Terra vitrioli opt. edulc. 3i.

Salas 3i.

M. f. Unguentum, applicandum pro exedendo folliculo:

D. S.

Unguentum exedens.

Optimus tamen curandi hos Tumores modus est per excisionem sive abscissionem: in specie si inveteratus & contumacior fuerit.

Fit sectio cutis per crucem, quæ ita facienda est, ne lædatur folliculus, hinc cutis separanda à folliculo, (quod facile fit) & ipse folliculus ac cum eodem tumor iuxta radicem (quæ semper est parva & angusta) abscindendus, & si quæ superveniat hæmorrhagia, applicatis debitis sistenda: hinc exempto folliculo factum ulcus mundificantibus, ut moris, est curandum, sic abscessu mundificato caro succrescens tumorem denuò replet.

## MEMBRUM IX.

D. B.

### TESTUDINE, TALPA seu LUPIA.

**T**alis Tumor excrefcit subinde in pericranio, qui ob densam capitis cutim, firmiter cranio circumtextam, non tam extorsum prominet, quàm quod latius expandatur, & ob id *Testudo*, item *Talpa*, seu *Lupia*, vocari solet. In hac Talpa, si materia proprio folliculo contenta (similis esse solet materię in modò dictis excrefcens contentę) diutius retenta fuerit, acrior, tunc ipsum cranium cariosum reddere incipit.

C U R A.

Talis Talpa seu Tumor si fuerit immediate super futuras cerebri, ita ut ex fibris membranę cerebri duræ per futuras transmissis oriri videatur, ferè relinquendus est, propter periculum inflammationis durę meningis, aut alios affectus capitis lethales: sin verò alio in loco sit, aut insensibiliter resolvenda est materia, aut cataplasmate emolliente aliquo suppuranda, aut ipse tumor lanceolâ aperiendus more consueto, & membrana tollenda, facta capitis caries probe radenda, hinc pulvis contra cariem ossium extrad. Ileos Flor. cum paucis euphorbio cranio affecto inspergendus, & cutis aperta cum emplastro diachylon simplici vel cum gummatibus denuò consolidanda, ut sit in aliis hujusmodi excrefcens.

## MEMBRUM X.

D. E.

### VERRUCIS, CLAVIS ET CORNUBUS.

**Q**uod si fibrille nervę, quę copiosius extremitatibus valorum capillarium intertextę, cutis rete constituunt, nunc solitarie, nunc cum fibris subjacentibus aut laceratę, aut nonnihil erossę, nutrimentum suum foras emittant, hoc successivè coagulatur in *Verrucas*: quę si ex attritione, hinc laceratione fibrillarum ex calceis fiant in digitis pedum, vocantur *Clavi*, qui Clavi interdum profundius radicati sunt & ex ipsis tendinibus, articulos digitorum pedum moventibus, attritis, instar gangliorum oriri solent. *Verrucę* verò pro ratione radicum, quibus inhærent, nunc sunt planę seu sessiles, nunc sunt pensiles, & ex angusto collo capite ampliore prominentes; quę priores in specie vocantur *Myrmecia*; hæ verò *Verrucę* pensiles dicuntur *Acrochordones*; sicuti tales *Verrucę*, si ulterius proveniant, & latius se expandant, & singularem habeant duritiem, in hominibus *Cornua* appellantur, quę sæpissimè pro fundamento habent os, à cujus alimento, simul in *Verrucam* transudante, structuram peculiarem singularemque duritiem obtinere videntur.

C U R A.

Observandum autem est in *Cura* harum *Verrucarum*, an simpliciter ex fibris nervis cutis originem ducant? an verò simul in subjectis tendinibus sint radicatę? Si prius, nihil habent periculi, & facile curantur: si posterius, vix radicitus extirpari possunt, citra ingentia supervenientia pericula, dolorem, inflammationem, convulsionem, & cancrum aut gangrænā. Id quod imprimis observandum est in *Verrucis* faciei, & *Clavis* pedum profundius radicatis: qui posteriores superficialiter equidem possunt tolli, sed ex ipso tendine vix possunt extirpari, quia gangrænę metus interdum supervenit.

*Verrucę* autem hæ, consideratis his circumstantiis curantur eas absumentibus, iisque variis. In genere *Verrucas* delet succus chelidoni majoris recens sæpius illitus, qui successivè absumit verrucam, donec in totum dispereat & evanescat; quod probatum est imprimis, si prius nonnihil incidantur verrucę duriores, ut leviter sanguinem fundant. Item est planta, quæ vocatur *Cieporum*, verrucis similis propter figuram, quæ contusa verrucis imposita eas evanescere facit. Lac esulę verrucis illitum easdem exedit: si densior & tenacior sit, leniter vulneranda est, ut melius pateat introitus lac esulę. Succus laqueus dentis leoniseriæ applicatus conveniens est admodum. Folia semper viv. detraçtā pelliculā tenui internā applicata, sæpiusque repetita, successivè verrucas tollunt. Cineres bryonię, cum succo ejusdem misti, verrucas in quacunque corporis parte certissimo experimento tollunt *HOPPERI*, Medici *Oxonienfis*. Vid. *VELSCHII* *Mist. Cent. 2. Obs. 94*. Succum pomorum *Borsdorsianorum*, & alia cetera nota, taceo. Aqua, quę supernatat truncis quercus ex pluviis collecta, probatum est remedium, si illinatur ad delendas verrucas. Aqua, in qua solutum est sal ammoniacum, si aliquoties ea tangantur verrucę, certissimum est experimentum *BORELLI* C. 2. *Obs. 46*. Convenit etiam egregiè unguentum plus minus ex melle cum tantillo spiritus sulphuris aut olei vitrioli, quod applicatum verrucis, easdem pedetentim erodendo solet mortificare. Experimentum est *TIMÆI*. *Limaces* sunt egregii, qui abstergerendi sunt sale communi, sic produnt salivalem humorem, quo illitę verrucę crebrius, insensibiliter evanescunt; quod etiam harum plinguedo præstat. Item fiat unguentum ex unguenti albi camphorati 3i. & olei tartari per deliquium 3i. aut loco hujus sal. tartari 38. si enim hoc linimento seu unguento illinantur verrucę crebrius, insensibiliter evanescunt & disparent. Emplastrum oxycroceum, cui parum arsenici albi fuit admistum, absumit etiam & exedit verrucas, quod etiam facit emplastrum ex cera cum tantillo Mercurii dulcis. Omnium optime cauterio actuali eradicari solent; vel quibus ferrum ignitum non placet, aut alię circumstantię prohibeant, attingantur butyro antimonii vel aqua forti, partes vicinas muniendo simul emplastro aliquo defensivo. *Verrucę* autem si sint pensiles, facile tolluntur constrictione cum lecta equina aut filo serico, quia inde marcescunt, intercepto illorum nutrimento.

Prę ceteris tamen istę *Verrucę*, merentur considerationem, quę in locis pudendorum ex congressu Venereo sunt natę, ad quas, Itali utuntur aqua forti: sed melius est *Mercurius sublimatus solutus in aqua plantaginis cum alumine*: v. g.

24. Aqua plantag. vel aqua rosar. ʒss.

Mercurii sublimati ʒiv.

Alum. 38.

Dissolvantur invicem, & cum penna huic liquori intincta diçę verrucę attingantur; sic emarcentur pedetentim declidunt.

Vel si racemose sint consistę ad modum thymi & condylomatium in pudendis, curantur sequenti mixturā: scilicet recipiatur aqua calcis vivę, misceatur cum *Mercurio sublimato*. Hac mixtura in forma fluida, vel linteaminibus huic intinctis, solent exsiccari & curari.

Quod *Cornua*: Curantur cornua abscissione radicali, nisi immediate ex futuris crani emergant, tunc enim abscindi equidem possunt, ita tamen, ut radix maneat, ex qua radice denuò cornu novum crescit, ferè singulis mensibus aut singulo bimense spatio denuò abscindendum, quale cornu vidi Parisiis.

*Clavos* pedum quod attinet: Interdum post sola pediluvia radicitus tolluntur, si prominentiores extiterint, ita ut



ut ipsis unguibus evellantur: Si verò latiores & in ipstendinibus radicati fuerint, pediluvia non sufficiunt. Potius his præmissis cutis carnea detrahenda, aut cultello rescandenda, & postmodum resina abjuncta aut picea, item cera viridis, pauxillo olei Philosophorum, saponis vel ceræ malaxata, Clavo imponenda, emolliendi, & exedendi sine. Præceteris expertum est *emplastrum Myrsicetii de galbano* crocatum cum sale ammoniaco, quod ceu expertissimum ad clavos pedum prædicant TIMÆUS, & SENNER-TUS; sic etiam pars emollita semper potest abscindi; nam solum galbanum aut gummi ammoniacum in acetodissolutum & inspissatum, linteo extensum & impositum, optimè curat verrucas pedum seu clavos, quod pariter cum guttula una vel altera prædictorum oleorum malaxari potest; sicuti & ipsum oleum ipso clavo, per cultellum leviter vulnerato, instillari poterit. Succus item tithymali pluma illitus eodem delet, & *emplastrum de ramis Vigonis cum Mercurio* admodum emollit Clavos pedum & verrucas; loco cuius *emplastrum* decicuta cum Mercurio dulci permixtum est illinendum, quod etiam verrucas pedum tollit. Item recipiatur caro bubula recens, Germ. *rohe Rind-Fleisch*, & ejus frustulum tantum, quanta est magnitudo Clavorum, instar emplastri his alligetur, & sæpius renoveretur; sic enim citò omnino & quasi spontè dilabi clavi dicuntur. Laudatur quoque allium recens cum saponè raso contusum, ac instar cataplasmatismpositum. PLATERUS à pediluvio & crassioris cutis remotione senecionem affricatum imposuit cum successu: vid. VELSCHIIUS *Milom. Cent. 2. Obser. 61.*

Sunt etiam, qui corrosioni cauterium lunare, aquam fortem, butyrum antimonii, spiritum sulphuris, &c. commendant ceu probatissima; quod, verum est, in specie sicum melle in unguenti formam redigantur, & post detractam, cuculam duriorē applicentur, aut solo cauterio lunari salivā madido, clavi fricentur; unde eschara subsequitur, absque omni dolore postea decidens. Ut verò hæc eschara edocitūsmaturetur, imponatur emplastrum diachylon cum gummi; vulnus autem post escharam delapsam modo aliarum lationum simplicium consolidetur. In horum tamen cauteriorum applicatione hæc conditiones sunt observandæ: ut circa clavum imponatur emplastrum quodeunque fortius adhærens, quod præmuniat partes vicinas, ne linimentum easdem corrodere possit, in medio sit perforatum, ut emineat Verruca seu clavus. Hinc si radices habeat Clavus in tendine, seu ex tendine oriatur, cavendum est, ne corrosio ad tendinem usque perveniat, ne dolorem, inflammationem, ulcus & similia excitemus.

A sectione quoque aut eradicatione per cultrum abstinentum est, si infixi sint circa articulos, profundioresque radices egerint; facile enim unà cum Clavis vicina vasa, tendines ac ligamenta, simul laderentur.

## MEMBRUM XI.

### DE FUNGUS.

**F**it subinde, ut circa articulos, ex dilatatis aut laceratis membranis & tendinibus ibidem expansis, aut similibus partibus nervosis, ex casu vel contusione vel violenta luxatione in saltu, &c. læsis, excrescat tumor mollis, successivè incrementum capiens, qui si apertâ cute amplius spatium nanciscatur, subito incrementum capit enorme, & instar fungorum velociter excrescit in substantiam carnosam, mollem & pallidam & indolentem, quæ ob id *Fungus articuli*, Germ. *ein Glied-Schwamm*, appellatur. Rarissimum est, quod præter articulos etiam alia loca infestare soleat; semper tamen membranæ aut tendinibus, similibusque partibus adherere & affigi observatur, unde etiam membranæ cerebri post vulnerationem capitis læsæ, ubi non benè præservantur ab aere ambiente, intales fungos, qui tamen quasdam proprietates adhuc speciales habent, erumpere vel adnasci solent. Historias aliquot notatè dignissimas refert SENNERTUS lib. 5. *Præx de morbis externis in Chir. P. 1. cap. 39.* Item HILDANUS *Centur. 2. Obs. 19. & Cent. 3. Obs. 1. Cent. 4. Obs. 62.* Vid. quoque M. A. N. C. *Ann. 9. Obs. 63.* sunt enim rariores.

## CAUSÆ.

*Causa* autem horum Fungorum est humor nutritivus tenax & collectus, cui cum se jungat synovia seu axungia illa glutinosa, quæ naturaliter oblinat articulos pro facilitando motu, exinde substantia mollis, rara, ac insigniter luxurians, generatur: interdum tamen corruptionem quandam, & hinc occultam acefcentiam concipit materia, ex qua fungus generatur: unde facillimè, si male tractetur, Fungus, malignitatem cancerosam acquirit.

## CURA.

*Cura* est difficilis, sæpiusque nulla, nisi pars affecta extirpetur & radicitus tollatur, quandoquidem successivè ad rābem perducatur corpus ægri, omni nutrimento in fungo deperdito; eoque difficilior est Cura, quò magis in profundo originem trahant Fungi. Quod igitur circa genua aut cubitum fungus sese prodar, neque emollientia neque sectio per cultrum locum habet, cum mox ab aere ambiente labia in cancerum exitiosum degenerare, eademque symptomata, quæ in Cancro nondum exulcerato, sequi soleant. Nam, auferendus est totus fungus ex toto, si scilicet radix ejus sit manifesta, ac si commodè fieri potest: quod si non fiat, exedentibus & absumentibus blandis erit tollendus, aut nimium saltem incrementum impediendum; quæ ipsa tamen exedentia cum sæpius sint periculosa, & illis fungus malignus sæpius in cancerum exacerbetur, ob id omnis omnibus linimentis nervinis ac undonosis emollientibus, malum contumacius reddentibus, valida exsiccantia, & acidum occultum temperantia & mitigantia fungo sunt inspergenda & applicanda, v.g. ex radice aristolochiæ rotundæ veræ, Ileos Florent, ari, foliis sabine, rosmarini, rutia, myrrha, thure, lapide calaminari, terra vitrioli dulci, lapillis cancerorum calcinatis, cineribus cancerorum fluvialium, saccharo Saturni, vitriolo, calce viræ, & similibus.

Fungus mox in principio supprimendus est: Ergo mox adspargatur cornu Cerviustum præparatum, myrrha, pompholyx & similia. MARCHETTE in *Observ. Medico-Chirurg. 6.* utitur pulvere ex spica & schœnantho: Vid. M. A. N. C. *Ann. 9. & 10. Obser. 124.* Si nec hæc suffecerint, maturè usurpetur *Mercurius præcipitatus*: si & hic non suffecerit, lethale est malum. Videatur HILDANUS in *Centur. 1. Obser. & SCULTETUS Obser. Chirurg. Obs. 17.*

Quod si verò vel ferro vel arcta ligatura abscindi possit Fungus, post abscissionem similes pulveres inspersi locum adstringendo claudunt, & recidivam prohibent.

In vulneribus & ulceribus exorientes omnium optimè per pulverum prædictorum insersionem tolluntur, imponendo simul emplastrum di sulphuris Rulandi. Vitanda tamen acris & corrodentia, ne convulsiones accersantur, aut ulcus in cancerum degeneret.

## ARTICULUS IV.

### DE TUMORIBUS VASORUM SANGUIFLUORUM.

## MEMBRUM I.

### DE ANEVRISMATE.

**S**equuntur singulares quidam & quasi anomali Tumores, qui sanguiflua vasa interdum occupant, & *Aneurisma*, & *Varicis* nomine vulgè noti sunt, illud, *Aneurisma* nempe est, dum arteria est tumefacta, aut saltim tumor est ex & circa arteriam natus: Hoc verò, nempe varix, est, dum vena turgida & tumefacta ceratur & contractatur.

Aneurisma est collectio sanguinis arteriosi, si dum arteria aut exesa, aut laxata nimis, aut rupta ex quacunque violentia, aut vulnerata ineptè ejus, loco venæ, sectione, aut in arteria per venam pertusam vulneratione, dum, inquam, his modis læsa arteria sanguinem spirituosum, quem vehit, in loco læsionis colligit, & hinc existit sanguinis



nis collectione in talem tumorem successivè attollit.

Exeam dixi arteriam interdum, dum nempe ab interna successivè oritur causa; hinc enim interiore arteriæ tunica exesa aut erosa, externa ambiens successivè dilatatur & ampliatur, etiam ulterius interdum exeditur, simulque vicina loca hinc affliguntur; quale exemplum videatur in *Praxi BARBETTE*. Frequentia etiam sunt Aneurismata à vehementi cordis palpitatione, ita utramus arteriæ descendens intumescat. Sed hæc ad Chirurgum non pertinent.

Laxata sæpius reperitur arteria aut rupta ex nimio conatu in artuum violenta commotione, vociferatione, in partu, in firma spiritus retentione. Ex his enim causis Aneurismata in collo sunt frequentia; nam frequentissimè collum occupant Aneurismata: hinc etiam interdum brachiis & cruribus, rariùs licet, observata fuerunt.

Frequentissimè fiunt ex venæ sectione inepta. Exempla talia sunt frequentia in regionibus, ubi crebriùs celebrantur venæ sectiones.

## DIAGNOSIS.

Affectus hic faciliè cognoscitur ex impetuosa floridi sanguinis eiactatione, qui pro ratione rhythmorum in pulsu subsultim magis floridus ac dilutior prodit, unde mox tumor cum dolore successivè assurgit, colore partibus vicinis similis, interdum ubi immediate sub cute est, ut à venæ sectione, nonnihil rubicundior pulsabilis est, & tactui recedens: dum, nisi nimis inveteratum sit Aneurisma, digito compressus tumor successivè subsidet, & omnino intromeat; digitis verò remotis denuo redit: augetur successivè ad magnitudinem interdum ovi asferunt. Sanguis in eo est ut plurimum corruptus, nonnihil tamen spissior & paulo obscurior reliquo sanguine, atque hæc magis locum habent in Aneurismate non adeo ingenti aut inveterato; & quò magis inveteratum est Aneurisma, eò magis talis conspicitur contentus sanguis, uti etiam in tali inveterato Aneurismate minùs pulsans minùsque tactui cedens tumor, & etiam sanguis semigrumosus, esse solet, unde non tam subito in arterias potest propelli.

In partibus externis faciliè patent, in partibus verò internis subinde imperferutabilia sunt, & rupto aneurismate ad mortem perducitur æger. *HORSTIUS* in *Obs. Anatomicis* dicit, quod interdum Aneurismata oriuntur in partibus internis lethalia in illis, qui morbo Gallico curari volunt.

## PROGNOSIS.

Tumor hic Aneurismaticus externus nihil periculi habet, nisi quod interdum ab Imperitis Chirurgis habeatur pro abscessu suppurato; unde si aperiatur tunc temporis tumor, subito sub manibus ægri cum sanguine animam emittit.

Rariùs est, ut in gangrænam ex sanguine corrupto detento Tumor abeat, quod tamen rarissimum est: Vid. *BORELLUS* & *HORSTIUS* de eodem.

## CURA.

Cum frequentissima causa sit pertusio arteriæ loco venæ, mox forti ligatura ligetur pars læsa, vel moneta minor aut lamina plumbea, superimposito emplastro de chalcitide, applicetur, & fortiter ligata pars læsa firmetur; in opposita verò parte mox secetur vena. Hoc neglecto sit Aneurisma, quod, dum est in principio, fortiter adstringentibus applicatis ex terra sigillata, bolo Armena, terra vitrioli dulci, colophonia, thure, sanguine draconis, sperniol. Crolli & similibus, cum laudano opiato mixtis, sub forma emplastri forti ligaturâ applicatis, tumoris progressus tolli, et ipse tumor tunc faciliè curari potest. Quies simul severe Imperanda, nec emplastrum nimis citò removendum, quin mox recens ligetur; aliàs autem corporis motu frequentiori tumor faciliè cresceret, & tandem lipothymia, affectui huic familiares, subsequerentur.

Curiosum est, quod observat *HORSTIUS*, & ex eo *HOEFERUS*, quando arteriæ applicaverit laudanum opiatum, & mox hæmorrhagia steterit. Quibusdam expertum est hoc emplastrum *SANCHEZ* in *Obs. Medicis*.

℞ Pulv. sumach.

Hypocist.

Acacia,

Sangu. Drac.

Aloes,

Thuris an. ʒj.

℞ Estmull. Oper. Tom. II.

Ex his cum albumine ovi subactis fac Emplastrum, addito, loco ceræ, emplastro contra rupturas.

Applicandum hoc est emplastrum statim in principio, ut tangere ferè possit arteriam, forti ligatura subjecta, & sic consolidetur locus læsus: ubi grumus sanguinis in loco est collectus, frustra applicatur.

Aliàs notum est emplastrum Galeni ex thure, aloë, pilis leporinis, & albumine ovi. Etiam lamina plumbea, vel sola applicata, vel cum succo plantaginis priùs illita; cum forti ligatura Aneurisma tollit; aut ex toto istud curat, si mox in principio applicetur, v. g. post ineptam venæ sectionem; vel etiam istud palliativè ad multos annos sustentat, si continuò alligata loco arteriæ læsæ circumgessetur.

Quodsi verò jam factum sit Aneurisma, & sanguis contentus in tumore jam spissior nonnihil fuerit, ad imitationem *HILDANI* in *C. 2. Obs. 44.* corrigendus est priùs sanguis imposito emplastro de chalcitide, hinc correctio sanguine, & eodem retropulso, addendo laminam plumbeam aut ferream, super hanc iterum emplastrum fortiter adstringens ex supra dictis est imponendum: huic pulvilli, Germ. *Bauschlein*, & demum fasciæ fortiter adducendæ.

Quodsi verò his irritis nihilominus Aneurisma persistat, aut his remediis cedere nolit, similibus adstringentibus ulterius progressus præcavendus, evacuetur sanguis contentus, & super locum læsionis arteriæ injicienda est fortis ligatura, & infra ligaturam per transversum dissecandus ramus arteriosus, quod tamen periculosum; hinc vulnus facium digestivis ac consolidantibus consolidetur.

Galli moderni Aneurismata post ineptas Venæ sectiones vitriolicis blandè erodentibus optimè curant, ut labia crassa successivè coalescant & coeant, postmodum locum ipsum & foramen consolidantibus restitunt. Hæc methodus est nova, & reperitur apud *DECKERS*, quale exemplum ipsemet vidi Parisiis. Modus est hic: scilicet Chirurgi minister arripit brachium, & fortiter premit, ubi arteriæ ex ramo axillari decurrunt in brachium, tandiu, ut nullus percipiat pulsum in carpo: Postea Chirurgus tumorem seu Aneurisma factum (quod dimidium ovum æquabat) in flexura cubiti aperit largâ incisione, sanguis semigrumosus evacuetur, postea in loco arterioso mox pater, ubi sit læsio hæc facta: denuò in superiori brachii parte adstantes digitis fortiter comprimunt arteriam, ut post coagulatam sanguinem nihil amplius effluere possit, & Chirurgus imponit foramini arteriæ per venæ sectionem ineptam gelido globulum parvum unum vel duo magnitudine pisi paratos ex vitriolo albo vel Cyprio ad albedinè calcinato, eosque bombaci probè involutos: postmodum inspergitur vulneri seu tumori aperto pulvis ex sarcocolla, colophonia, & thure cum stuppis canabinis, hoc pulvere imprægnatis, de super applicando plumaceolos digestivos ordinario illitos, & ita convenienter fasciatur & fortiter ligatur vulnus: quotidie removeantur plumaceoli superficiales, ut in labiis tumoris aperti pus evacuari possit, ipse verò globulus & immediate super injecti plumaceoli non removeantur, nisi spontè cadant, quod non fit, nisi arteria sit consolidata; sic enim fit, ut à sanguine successivè transudante resolvatur successivè vitriolum, & liquefactum erodat nonnihil labia arteriæ apertæ, quæ corrosa simul blandè adstringuntur ab isto vitriolo, & ita, ut successivè labia arteriæ, quasi renovato vulnere fauciata, per nutrimentum proximum denuò conglutinentur. Si ceciderit globulus, & nondum sufficienter conglutinata sit arteria, novus imponitur donec obtineatur scopus. Hinc caro musculorum vicinorum faciliè supercreseit, & tandem tumor ulcusque ex toto consolidatur.

Chirurgi incauti, simul ac errorem hunc commiserint, statim confugiunt ad unguentum de althæa, populeum nervinum, aliæque unguosa; quibus tamen Tumor hic maxime augetur. Vitanda ergo sunt omnia pingua emollientia, balnea pariter ac exercitia omnia vehementiora, nec non aromatica spiritiosa pulsum accelerantia & purgantia, massam sanguineam magis exagitantia.

Hæc de Aneurismate.

## MEMBRUM II.

### DE

## VARICIBUS.

**I**uxta Aneurisma in venis observantur Varices: nempe sunt nihil aliud, quàm venæ laxatæ tunica, seu quando venæ tunica laxatur, ut fibræ ejus molliores valde distendatur, Sff & post.



& postmodum in loco venæ disento hærent sanguis, & stagnando tumorem inferat, qualis tumor vocatur *Varix*. Malum hoc frequens est mulieribus in ultimis à partu mensibus, uti & post partum difficilem.

## C A U S A.

*Causa interna* sæpius est sanguis crassior, qualis Melancholicus dicitur, id est, qui ab acido nimio crassiorem nonnihil habet consistentiam. Talis ergo sanguis in motu suo in quodam venæ ramo insigniter impeditus, in specie circa venarum valvulas, non nihil vas continens ex succedente sanguine novo ita distendit, ut atoniam ejus nimiamque laxationem tunicæ venosæ inferat, ut postmodum in isto loco laxato sanguis uberius collectus & tanquam alveo ampliori contentus, talem tumorem inferat. Præter hanc tamen causam internam etiam ipse sanguis, naturaliter licet constitutus, in trunco tamen venoso ex hujus compressione vel simili causa in motu suo impeditus, in istius trunci ramis potentioribus extrorsum, adeoque minus à partibus vicinis angustatus, hærens nonnihil distendere, & ita Varicem inferre potest: quæ ratione ultimis gestationis mensibus, propter vasa iliaca venosa in mulieribus ab utero rumido compressa, varices crurum gravidis familiares esse solent.

## D I A G N O S I S.

Sequuntur hi tumores venarum ductum, & tanquam venæ ampliores & insigniter turgidæ, colore ex ceruleo livescente aut nigrescente, conspiciuntur, idque imprimis in cruribus circa genua.

Tumor hic pressus quidem retrocedit popnibil, qui tamen mox redire solet.

## P R O G N O S I S.

Malum hoc cum minus sit molestum, quin potius quibusdam non parum proficuum ad conservandam corporis sanitatem, in specie in Melancholia hypochondriaca, minus curationi subicitur, nisi aut nimis distenta vasa tandem rumpantur, aut sanguine accescente corrupto, & hinc inflammationis modo suppurando effervescente, ulcus parvum inducat, aut etiam partis gangrænam minuetur, aut etiam insignis partium valdeque molestus dolor adsit.

De Varicum apertione spontanea, item propter hæmorrhagiam incoercibilem lethali, vid. M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 54. & 204. item Ann. 6. & 7. Obs. 26. p. 59.

## C U R A.

Hæc & similia ubi imminet pericula, necesse est subinde, ut eugentur & removeantur Varices. Nempè si nimius fuerit tumor, varix acu aureâ vel argenteâ pungatur, sanguisque crassior exprimat; quo facto applicanda remedia adstringentia & lamella plumbea desuper alliganda pro tumoris incremento coercendo: Aut etiam citra talem puncturam:

## C A P V T II.

## D E

## VULNERIBVS IN GENERE.

**V**ulnus est divisio unionis naturalis in parte molli, facta ab impetu & vi externa, secante, pungente, mordente, rumpente, aut fortiter contundente.

Inferat promiscuè nunc partes nervosas, nunc partes sanguineas, quarum tamen diversitas vel maximè observanda est in Cura.

*Differentiæ* verò *Vulnorum* accidentales sunt varizque diversæ pro ratione Vulneris; dum nunc est simplex, nunc complicatum adjunctione aliorum affectuum, imprimis aut cum inflammatione, aut contusione, aut virulentia, aut aliis similibus; nunc ratione subiecti aut partis affectæ Vulnus dicitur *partium nervearum*, *sanguinearum*, *thoracis*, *capitis*, &c.

## 24. Alum.

Salis comm.

Fruct. acac.

Hæc coqu. in aceto acerrimo.

Spongia hoc aceto ebria pro fomento applicetur mane & vespere loco varicoso, & hinc arctissimè deligetur, & hoc continuandum per mensem integrum: postmodum ubi exsiccata apparent Varices, removenda est spongia, & solum strictè per 3. vel 6. menses locus varicosus est ligandus, donec omnino dispareat. Expertum fuit in Varicibus costarum à FERRARA. Vel in tumoribus varicosis levioribus fiat Unguentum ex *butyro Maiali* cum duplo *succi camavorum fluviatilium expresso*, quæ invicem mista leni ebullitione coquantur ad consistentiam unguenti. Laudatur ab HARTMANNO in *Praxi Chymiar.* ad curandas Varices pro illitu. Vel

## 24. Farin. lupinor. B.

Stere. capr. exsic. Blij.

Aceti non valde fortis, in quo ferrum ignisum quinquies sic extinctum, q. l.

M. S.

*Epithema externum.*

Et vel in forma emplastri spissi applicetur; vel fortiter ligetur, aliquandiu continuando.

Quodsi varices apertæ sanguinem copiosius funderent, hic cauterio actuali mox sistendus erit.

Optimum etiam euporiston ad sanguinem sistendum est stercus suillum, quod pulveris formâ adpersum mox omnem hæmorrhagiam sistit: Vel lintea solutioni vitrioli Martis & aluminis immergantur, & varicibus apertis applicentur; ita tamen involuendo & ligando, ne refluxus sanguinis ejusque motus omnino intercipiatur, aliàs periculum est disruptionis varicum sub ipsa ligatura; sanguinis enim circulus magis promovendus, quàm impediendus est.

Denique pro Varicibus dolentibus & tumentibus:

## 24. Ung. popul. B.

Mucilag. sem. psyll.

Lini,

Fragrac. ad. B.

Olei chamomill.

Farin. fabar. ad. B.

Cera q. l.

M. F. Ceratum seu Emplastrum imponendum varicibus.

D. S.

*Emplastrum emolliens.*

Interdum Varices, harumque venæ capillares, præcipue in pedibus, propter lympham acriorem exulcerantur, unde pruritus intolerabilis. In his elegans est emplastrum de spermate ranarum, vel griseum, inspergendo simul acidum absorbentia, e. g. cornu Cervi usum præparatum, &c. cum mastiche & thure; quibus aliquid Mercurii dulcis addi potest.

His internè subveniendum est appropriatis sanguinis dyscrasiam corrigentibus. In communi usu Decocta lignorum guaiaci, radicis chinæ & sarsaparillæ cum herbis appropriatis usurpari solent, idque non infelicitè, uti apparet ex FORESTO l. 29. Obs. 25.

Hi sunt Tumores, tanquam prima pars affectuum, qui subsunt Curæ Chirurgi: Pèrgo à Tumoribus ad Vulnèra.

Quoad *Vulnèra in genere*: In omnibus corrumpitur ab ære ambiente nutrimentum partis proximum, & sanguis effusus propter spiritus vitalis dissipationem successivè corrumpitur & putrescit; unde nascitur acor vitiosus, qui subitò omnem ludit Tragediam, infert dolorem rodendo partes fibrosas nervas, tumorem erysipelaceum, &c. totumque spiritui vitali balsamico partis præservativo prorsus hostilis, instar fermenti peregrini partem affectam ejusque alimentum proximum, multifariè alterat, illudque in pus falsum de natura alcalina, saniem & ichores, transmutat. Unde tandem, nisi acor maturè temperetur, faciliè ulcera depascentia emergunt.



## DIAGNOSIS.

Quoad signa diagnostica: his in vulneribus externis; quæ talibus, opus non est. Quæ autem partibus profundius lætentibus inflata fuerint, cognoscuntur

1. Ex *Vulneris externi signum*: cuius ratione in hypochondrio dextro hepatis, in sinistro verò lienis læsio colligi potest.
2. *Ratione doloris*: unde dolor acutus partium nervosarum & membranarum; obtusus verò carnosarum Vulnera indicat.
3. *Ratione loci*: sic vulnera v.g. sub hypogastrio vesicæ, uteri, &c. læsionem innuunt.
4. *Partis vulneratæ actione læsa*: sic e.g. ex facultatis animalis læsione aut perturbatione, cerebri; ex dyspnoeâ & asthma, pulmonum & diaphragmatis; ex vomitu, ventriculi; ex urinæ profluvio involuntario, sphaeteris vesicæ, &c. vulnera colligi possunt.
5. *Excretis*: partim quæ talibus, quando e.g. in læsionibus abdominis chylus effluens ventriculi & intestinorum tenuium; alvi verò excreta intestinorum crassorum; sicut & urinæ per abdomen effusus renum, ureterum & vesicæ, vulnera indicat: partim *excretionis modo*, quando e.g. sanguis effluit cum pulsu; tunc enim arteriam esse vulneratam patet.

## PROGNOSIS.

Quoad Prognosin *Vulnerum*: primariò requiritur Medici iudicium, an vulnus sit *lethale*? an verò *non lethale*? quod non confundendum cum eo, an vulnus sit *sanabile*? an *insanabile*? multa enim vulnera sunt insanabilia, & perfectè sanari nequeunt per longum tempus, quæ tamen non sunt lethalia. Distinguendum ergo est, an vulnus sit *sanabile*, vel *insanabile*? & hoc, an sit *lethale* vel *non lethale*? v.g. vulnus penetrans per pulmones, nisi maiora vasa fuerint læsa, est *sanabile*, aut abijt in abscessum; si verò vasa maiora læsa sunt, est *lethale*, sicuti lue Venereâ affectis si insignantur Vulnera, hæc difficulter sunt sanabilia, sæpius insanabilia, quia degenerant in ulcera contumacia maligna, quæ tamen vulnera, uti dixi, in se non sunt lethalia.

Jam verò fundamentum leg. tima Prognoscos *vulnerum*, consistit in his tribus:

- (1.) In *functione seu usu partis læsæ*, plus minus ad vitam necessariam.
- (2.) In *modo læsionis*.
- (3.) In *curandi ratione possibili & impossibili*: & hæc est talis vel simpliciter, vel secundum quid, in tali vel tali subiecto.

Adeoque *Vulnus* id est *lethale*, quod necessariò & ex summa ac inevitabili necessitate, seu simpliciter & absolute, mortem infert, ut nullâ arte dignosci, nullisque remediis curari, nec æger conservari possit, hinc semper & ut plurimum intra paucos dies moriatur: id quod fit, vel quatenus spirituum & sanguinis atque feri nimius partim & incoercibilis oritur effluxus; partim iam dicti & alii succi vitales extravasati in certa corporis aut visceris cavitate, ex qua arte educi nequeunt, colliguntur, & ibi aut corrumpendo aut comprimendo viscerum nobiliorum functiones lædunt; vel quando viscustale, quoad vitam simpliciter necessarium est, enormiter læditur. Hinc ratione prioris, nempe *usus partis læsæ*, *Vulnera ventriculorum cordis, nasorum internorum insignium*, &c. sunt lethalia: unde illa punctura gladii, quæ læditur *ramus iliacus cruralis* (Germ. die groſſe Brand Ader) est vulnus lethale: quare? quia hæmorrhagia ista est incoercibilis: hac ratione etiam vulnera hepatis profundiora sunt lethalia, quatenus vasa maiora (imprimis in centro ejus læsa incoercibilem hæmorrhagiam inferunt. *Ratione secundi*, vulnera *cerebri profunda*, & substantiam ejus graviter lædenti, sunt lethalia; superficialia verò minus. *Ratione tertii*, v.g. *substantia diaphragmatis nervosa*, læsa est lethalis, quia ipsi succurri nequit.

Verùm quoad secundum requisitum: observetur etiam, quod non semper sufficit, quod pars graviter læsa sit, sed quod cum alia parte habeat *consensum*, v.g. si ex *vulnere apparenter levi*, nervos tamen læso, *superveniat Convulsio lethalis*, tale vulnus lethale est. In genere ergo in vulnere lethali necesse est, ut vel spirituum animalium motus vel distributio deleatur; sin hoc enim sit, animal interit.

Estmull. Oper. Tom. II.

Hi ferè sunt casus, in quibus vulnera solent esse lethalia. *Vulnera cordis* non semper sunt lethalia, nisi sint maiora, ac penetrent usque in ejus sinus, in specie in ventriculorum sinistram usque: superficiales cordis læsiones, quæ saltem tangunt ejus parenchyma musculolum, non sunt lethales, ut ut forsitan propter læsa maiora pulmonum vasa in transitu instrumenti lædenti sequatur mors. Vidi ego Romæ apud egregium Chirurghum cor canis, in cuius parenchymate tres globuli ferrei erant, & ita quidem, ut isti globuli omnino coaluerint in parenchymate cordis; nam caniserat mortuus sub cultro anatomico: sic etiam in SCHENCKIO, PARÆO, SCHNEIDERO, &c. habentur Observationes talium vulnerum cordis superficialium non lethaliū.

*Pulmonum Vulnera* propter nimium & incoercibilem sanguinis effluxum, hujusque in thoracis cavitate collectionem, lethalia sunt; nisi leviora & superficialia sint, utpote quæ interdum curantur, testante GLANDORPIO *specil. Chirurg. Obs. 24.*

*Asperæ arteriæ* intra pulmones latentium *bronchiorum Vulnera* lethalia sunt, propter profusionem aeris inspirati in thoracem. Ventriculi vulnera, quæ lædunt vasa maiora & orificia, primariò sinistra, hinc dextrum, ordinariorum sunt lethalia, propter alimentorum & chyli effluxum: minus, quæ reliquas lædunt partes, imprimis superiores; non verò circa fundum, cavitate nempe illam, quæ orificia interjacet.

Vulnera diaphragmatis semper ferè sunt lethalia, siue carnosæ, siue nervosæ seu mediæ ejus parti inflata fuerint; nam suffocati intereunt ægri: minora tamen, tam carnosæ parti, quam tendini diaphragmatis secundum fibrarum tractum inflata, curari possunt, quod videbitis in GLANDORPIO l. 1. a. Obs. 27. HOLLERIO in Hippocrat. sect. 6. aphor. 18. SENNERTO l. 2. Prax. p. 224. & l. 5. p. 366. nec non DIEMERBROCK. Anat. p. 422. Mirabile est in diaphragmatis vulneribus, quod scilicet per unum factum stomachus, intestina, &c. ex abdomine penetrant in cavum thoracis: quale exemplum, præter PARÆUM l. 9. c. 20. ipse vidit Witteberge cum D. SCHNEIDERO in rustico, cui ab alio cum cultro diaphragma erat perforatum, ita ut venter in thoracem retractus continuus vomitus, singultus, & tertiâ die mortem, inferret. Vid. etiam SENNERTUS l. 1. a. HEINRICUS ab HEER *Observ. 25.* & GLANDORPIUS l. 1. c. 28.

*Oesophagi vulnera*, præprimis in parte interna, lethalia sunt; cum non solum per hæc assumpta in thoracis cavitate effluant, sed & propter dolorem ac inflammationem ipsa alimentorum deglutitio ac respiratio impediatur: in parte tamen exteriori interdum sanari possunt: Vid. SCHENCKIUS in *Observat. pag. 316.* & PIGRÆUS *Epist. Med. & Chir. p. 376.*

Intestinorum vulnera semper sunt lethalia, imprimis transversalia, qualia exempla videbitis in SCHENCKII *Observationib. pag. 38.* TIMÆO non GudenKlee *Resp. Med. 17.* SALTHUTH *Cent. 1. Obs. 18.* & WELSCHIO nostro de *Lethalib. Vulnerum* p. 103. nec non diversis in locis inflata, vid. VALERIOLA lib. 11. Obs. 9. & SALTZMANNUS in *Observ. Anatom. p. 10.* quia non solum chyli & stercorea in abdominis cavitate effluunt, ex qua evacuari nequeunt, unde putrescendo & rolando intestina reliqua & abdominis integumenta afficiunt, sicque mortem inferunt, (conf. FALLOPIUS de *Vulneribus* cap. 57.) sed & ipsa intestina vulnerata brevi gangrenescunt; vid. WUERZIUS in *Chirurg. P. 1. cap. 13. pag. 704.* Contrarium observatur in intestini recti extremitate vulnerata, cum remedia externa commodè applicari possint, nec excrementorum ad abdominis cavitatem effluxus metendus.

*Mesenterii Vulnera*, nisi vasa ejus majoribus inflata fuerint, lethalia non sunt.

*Vulnera autem omenti*, propter nimiam & incoercibilem hæmorrhagiam, per se lethalia sunt.

Idem etiam judicandum de *Pancreatis vulneribus*.

*Vulnera hepatis* juxta GLYSSONIUM in *Anat. hepatis* lethalia sunt, præsertim cum hujus substantia sine vasorum læsione, & hinc enormi sanguinis effusione, vix vulnerari possit; contra GLANDORPIUM in *specil. Chirurg. Obs. 38.* & HILDANUM c. 2. Obs. 34 & Cent. 4. Obs. 2. aliosque, qui vulnera hujus vasorum tantum notabilium lethalia, substantiæ vero hepatis inflata minus lethalia dicunt.



*Vulnera vesiculæ felleæ, nec non ramorum maiorum ductus hepatici, & ductus cholidochi, per se lethalia sunt, propter bilis, ad corporis conservationem adeo necessarium, profusionem, & in abdominis cavo collectionem.*

Huc etiam pertinet ligamenti umbilicalis ruptura vel praefissio, quam SPIGELIUS *Anat. l. 8. cap. 5.* LAURENTIUS in *Hist. Anat. l. 6. cap. 9.* HILDANUS *Cent. 1. Obs. 52. & 53.* item MOEBIUS in *Fund. Med. Physiol. cap. 14. & 20.* lethalem pronunciant.

*Receptaculi lumbaris & Ductus Thoracici Vulnerum* lethalityatem confirmat experimentum LOWERI *Tr. de Corde*, cum non solum chylus & lymphæ in cavitatem, quamdam corporis effluant, & ibidem coarcescantur, sed etiam sanguinis circulatio turbetur, & corporis nutritio impediatur. Contrarium quidem exemplum refert LANGELOTTUS in BARTHOLINI *Epist. Med. C. 3. Epist. 37.* de quodam Equitum Magistro Brandenburgico, circa mediam dorsi vertebra sclopeto vulnerato, cui similis liquor chylosus efflueret, qui non tam linteæ quintuplicia, indusium & lodices imbuere, quam etiam lumbos inundaverit, sine vitæ periculo. Verum potius credendum, in hoc ægro non ipsum ductus thoracici truncum, sed huius saltem ramum quendam, læsum fuisse.

*Lienis Vulnera* profundiora, siue vasa simul, siue non lædantur, lethalia sunt, utut plurimi de lienis substantiæ vulneribus contrarium defendant: Verum cum ex VESALIO, HIGHMORO, WEPFFERO & MALPIGHIO notum sit, quod tota lienis structura, præter vasa, ex cellulis membranosis & fibrosis contexta sit, ad quas sanguis arteriosus, à venis resorbendus, omnis deponitur, non mirum, quin cellulis his læsis hæmorrhagia incoercibilis oria-

tur. *Renum pariter Vulnera*, imprimis maiora, ubi maiores tubuli urinarii lacerati, sine etiam vasorum emulgentium, aut horum insigniorum ramorum læsione, lethalia sunt; cum non solum per hæc serum urinarium ad cavitatem abdominis effluat, sed etiam mox inflammationes & dolores ingentes superveniant: ut taceam, Renum substantiam siue vasorum huius sanguiferorum notabiliorum læsione, profundius vulnerari vix posse, uti ex Anatome Publica nuperime vobis demonstratum fuit.

*Vesicæ vulnera* quod attinet: hæc cervici inflata, præsertim quando simul vasa maiora lacerata, propter inflammationem, gangrænam, convulsiones, & sphacelum, spississime lethalia sunt: utut contrarium per calculi vesicalis excisionem plurimi defendere soleant; conf. SALMUTH *Cent. 2. Obs. 44.* quæ ipsa tamen operatio circumspectè & prudentis artificis manu instituta cum Vulneribus fortuitis & casualibus non confundenda: ut taceam, ipsam etiam vesicæ lithotomiam propter dicta symptomata frequentius observata periculo plenissimam esse. Fundi autem vesicæ vulnera propter tunicam carneam exteriorem huiusque cum peritonæo & abdominis musculis contiguitatem, & faciliorem cum his coalescentiam ac consolidationem, sanari possunt; quod etiam contra GLANDORPIUM in *spec. Chir. cap. 38.* aliisque quamplurimos, testantur BAUHINUS in *Append. ad Russæum pag. 192.* FELIX WURZ in *Chir. P. 2. c. 13. pag. 205.* PLATERUS *Observat. l. 3. p. 831. & 832.* & SIMON PAULI *Flor. Dan. P. 2. pag. 53.* testantur.

*Uteri vulnera* per se lethalia non sunt, nisi maiora, & cum vasorum maiorum læsione, & inde orta hæmorrhagia copiosiori, fuerint: in gravidis autem propter hæmorrhagiam incoercibilem, sanguinis in abdominis cavitatem collectionem, & foetus extra uterum, & cum sanguine ibidem putrescentis, prolapsum, per se lethalia pronuntianda.

*Cerebri vulnera* sunt varia: si cortex solum lædatur, & rectè tractetur, imprimis si sanguis extravasatus & congrumatus extra cranium evacuari possit, nec gravis confusio adsit, minus solent habere periculi: si verò medulla profundius & corpus callosum vulneretur, nec sanguis in cerebro collectus evacuari possit, lethalia esse solent. Tamen, uti sunt interdum miracula in Medicina, observationem quandam habet SCHENCKIUS de *vulnere cerebri* ad ventriculum usque sanato: an Observatio rectè sit facta? nescio, sit fides penes Autorem.

Pertinet huc *Cerebri compressio*, tam à cranii subsidencia, quam à sanguinis extravasati & congrumati copia: dum enim cerebri meatus angustantur, & sanguis in vasis cerebri circulatio, simulque spirituum animalium dispensatio, impeditur aut saltem turbatur, nec cranium relevari, nec san-

guis extravasatus & congrumatus, aut etiam non maturè satis evacuari potest, lethalis est. Similiter *cranii fractura & fissura*, quarum fragmenta cerebro aut huius involucris ita compacta, ut eximi non possint, lethales pronuntiandæ; utut sæpè per aliquot septimanas, imò menses, vulnerari ex improvise quasi & nihil mali metuentes demum intereant; qualia exempla, præter quotidianam experientiam, referunt PAW in *Hippocratem de vuln. cran. p. 82.* SALMUTH. *C. 1. Observ. 12.* & WEPFFERUS de *Apopl. p. 336.* quæ lethalitas magis promovetur, ubi sanguis simul supra cerebrum effusus, & vascula intra cranii duplicatam læsa fuerint.

Lethalia etiam sunt omnia *Cerebelli*, nec non quædam *medullæ spinalis, vulnera*, superiori nempe intra colli & dorsi vertebrae parti inflata, & inferioris transversim dissecta, de quo vid. TULPIUS *l. 3. Obs. 27.* sicut quoque hac in parte, ubi nervus intercostalis parvis vagi dissectus & laceratus, respirationem impediendo, pulsum intercipiendo, &c. lethalis esse solet.

*Vulnera musculi temporalis* vulgo lethalia dicuntur: verum non per se & semper lethalia esse, experientia testatur, v. g. CHATTIER *Observ. 4.* qui in contusione huius musculi, item VOORDE *Chir. pag. 481.* IOB van MEECKERN *Obs. 1.* RIVERIUS in *Obs. comm. p. 333. & 361.* & PAW in *Hippoc. de vulneribus cranii p. 174.* qui in fractura cranii musculi temporalis incisionem feliciter factam perhibent: imò PAW *l. 4. & GLANDORPIUS Specil. Chir. Obs. 12.* vulnera huius musculi casu illata, sine notabilibus symptomatibus curata testantur. Testatur etiam inspectio Anatomica, quod nihil in musculi huius conformatione observetur, cujus læsione actio quædam nobilis & ad vitam simpliciter necessaria turbetur, aut cui non quævis remedium genera applicari possint.

Specialia plura de vulnerum Prognosi videb. in SEBIZIO de *vulnerum lethalityate*, hinc etiam WELSCHIO de *Rationali Vulnerum Iudicio*, & Medicina Crit. AMMANI: In specie etiam videri potest SENNERTUS ubi de *vulneribus*, qui satis prolixus est quoad Prognosin vulnerum. Nunquam enim potest generaliter Prognosis institui propter varietatem subjectorum & circumstantiarum.

## C U R A.

*Cura vulnerum* consistit in unionem partium separatarum, earumque conglutinatione; quod opus est solius naturæ, quæ beneficio succi nutritii ad omnes partes distributi, apppositi & agglutinati, tanquam balsamo quodam salino oleoso temperato, sensim semque easdem reponit & reducit: cui cum vix reperiatur adæquatè simile quoddam remedium in rerum natura, sequitur hoc esse solius naturæ opus ac laborem. Chirurgi autem hic opus est adjuvare eam in hoc bono opere, sequendo ejusdem ductum, removendq. imprimis impedimenta externa, quæ sunt alimenti partibus coridæ & sanguinis effusi superinductæ alterationes, & successivæ corruptiones & putredines, quas inseparabiliter comitatur acor viscosus, ex ista corruptione natus: adducendo divisa labia, applicandaque medicamenta, succum partis nutritium, tanquam balsamum ejus naturale, quæ conservent, ejusdem corruptionem impendant, factam jam denuo emendent, adeoque parti familiaria ac amica sint, quæ medicamenta aliàs Vulneraria, Agglutinantia, item balsamica, vocantur.

Pro his à Chirurgo scopis melius attingendis notandum est, quod *balsamus hic naturalis* seu alimentum partis proximæ, cum consideratur ut conservans partem læsam, sit in naturaliter constitutis salinis volatilissimis, seu humor roscidus tenuis, imprægnatus sale volatili oleoso temperato, investito substantiâ humidâ, non nihil glutinosâ & pinguiusculâ: variat tamen insigniter pro constitutione ætatis, sexuum, vitæ generis, & in specie pro varietate ipsarum partium variâ, prout hæc ipsæ nunc sanguineæ sunt, nunc nervosæ; prout etiam variant subjecta in latitudine signitatis, etiam hic balsamus variat: Unde vulgè dicunt; *hic sanabilem, ille insanabilem vel immedicabilem à natura natus est curæ.* Et quod vitiatè magis sunt corporis digestiones, indeque plus minus alterata massa sanguinea, eodem vitiosior & magis degener est hic balsamus; unde etiam nunc facilius nonne difficilius consolidabit partem læsam. Nam & hinc mulieribus inflata vulnera sæpè deteriorantur & in pejus ruunt sub tempore menstrualium: & qui vel scorbuto vel lue venerea sunt



sunt inquinati, lis leves, in specie in nervosis partibus, acceptæ lésiones & vulnerationes in gravia subinde ac periculosa abeunt ulcera & symptomata.

Et quidem alteratio & mutatio balsami naturalis partis læsa dependet à causis internis, vel externis. Ab internis causis dispositio nutrimenti balsamici corruptibilis, uti de se ipso vulnus difficulter glutinat; ita facillimè quasvis externas impressiones recipit, quæ leves licet, in male tamen constitutis gravem inferunt noxam, cum in bene constitutis, graviores licet, impressiones faciliè corrigantur & eluantur.

Ab internis causis & morbis oriundas balsami naturalis corruptiones Medicus curet tollendo earum radices, restituendo digestionem & fermentationem, & corrigendo partium noxam; unde consequenter balsamus faciliè naturalem reinduit statum: quod eò faciliùs fiet, si præmissis aut purgantibus temperatioribus, aut sudoriferis salinis volatilibus blandis, remediis balsamum naturalem confortantibus, seu sale volatili oleoso temperato & spiritu volatili mediocri imprægnatis, ipsi succurratur, nempe vulnerariis internis dictis, & balsamicis, alcali temperato & oleoso constantibus; quod confirmat HELMONTIUS, & post eum TACHENIUS in Hipp. Chym. quia horum succus revivificat Mercurium: myrrhâ, trochiscis & essentia myrrhæ, viperinis, antimonalibus paratis remediis.

Externa autem ab iniuria, præprimis ab aeris impressione illatos defectus succi nutritii, omnibus ferè Vulneribus communes, & qui in sanissimis etiam contingunt subiectis, Chirurgus applicatis debitis remediis externis emendare debet: Nam vulnera spontè coeunt, nisi impediuntur. Huiusmodi defectus à Medico & Chirurgo emendandi alii non sunt, quàm balsami naturalis partis vulneratæ, & sanguinis unâ in labiis vulnerum hærentis corruptio & putredinalis alteratio, quam primariò inferat alteratio & impressio aeris ambientis. Huius corruptionis putredinalis indivisibilis comes est acor vitiosus & peregrinus, qui uti aliàs excessivus omnibus partibus insigniter est hostilis, ita in specie partibus vulneratis est autor omnium symptomatum, supervenientium. Nam tanquam vitiosum fermentum labia vulneris inquinat, nutrimentum balsamicum & sanguinem affluentem inficit, corrumpit, & fermentando in pus mutat, nisi violentior majorque corrupta aciditas loco purischores aut saniem manare cogat. Unde si vulnus recens apto balsamo à corruptione & acore putredinali defendatur, citra puris generationem faciliè istud conglutinabitur. Et hoc est, quod quasi pertransennam observarunt MAGATUS & SEPTALIUS in Nova Ratione Curandi Vulnera; unde & ordinariam Vulnera medendi methodum nonnihil immutarunt. Nam eleganter MAGATUS improbat GALENO, quod solummodo fuerit occupatus circa sordes vulnerum & ulcerum, circa pus, saniem & ichores abstergendas, non verò consideravit causam, à qua istæ sordes producantur: hac in parte accuratè respondet cum HELMONTIO, qui & ipse scholis & Medicorum & Chirurgorum, in specie hoc in loco Chirurgorum, exprobat, eas magis esse sollicitas circa productam morbosa, quam circa eorundem causas radicales; unde fermenta ista vitiosa, à quibus producantur per fermentationem istæ sordes, pensitanda esse sedulò & studiosè inculcat. Id quod etiam SEPTALIUS & MAGATUS studiosè monuerunt, nempe in vulnerata parte temperamentum partis esse conservandum, quoniam hoc, ab aere ambiente læso, generantur excrementa: unde Vulnera rarè reliquanda suadent, hisque sola medicamenta balsamica applicanda, quæ ex horum hypothesei temperamentum partis vulneratæ, ejusque calorem nativum conservent. Ex principiis verò Helmontianis applicanda sunt balsamica, quæ corruptionem balsami naturalis in acorem vitiosum inhibeant, ulterioremque progressum coerceant; his enim observatis studiosè vel spontè coire vulnera, quod verissimum est.

Acor ergo vitiosus, qui in vulnere enatus, consolidationem ejus à natura instituendam impedit, qui sæpissimè inducitur ab alteratione per contactum aeris ambientis; nam & in culinis si carnes corrumpi incipiant, earum juscula acefcunt, & ex simili ratione vulnera degenerant faciliè in ulcera ex acore istomagis intenso, magisque rosivo & corruptivo, depascente partes vicinas. Hinc etiam est, quod Chirurgi & mulierculæ omnia acida, adeo etiam, & rectè quidem, vini usum interdiciunt vulneratis, perperam tamen assignantes causam, quod vinum calefaciat, adeoque sanationem impediat; sed vera causa est vini aciditas, ne

Etzmull. Oper. Tom. II.

accendatur, ac dolorem, inflammationem & putrefactionem promovendo pervertat vulnera; sicuti in ipso vulnere quandoque vermes exorti fuerunt: quæ tamen vini aciditas, ubi mitigata fuerit ab alcali lapillorum cancerorum, ut in saporem lixiviale abeat, utile potius & conveniens vulneratis est remedium; sicuti etiam hac ratione lapfos ab alto restituit: aut si ad 3j. lapillorum cancerorum præparatorum vel coralliorum, vel eadem soluta in aceto succove limonum, quotidie bis ad cochlear Vulneratis propinentur, etiam si moderatè tunc vinum biberint, vulnus nihilominus citò, tutò & jucundè, etiam absque febre, cicatrizabitur; non quod hi lapilli vel in pulvere, vel soluti, materialiter ad vulnera à primis viis remota properent, sed quia dicta concreta absorbeant acidum vini vel aceti, & fiat mixtura saporis salis de alcalina natura: vid. TACHENIUS in Princp. Morborum pag. 124. Et hoc ipsum in remediis aliis vulnerariis, tam internis sub potionum forma usurpatis, quàm externis sub balsamorum ratione applicatis, est obvium, quorum balsamica vis, ratione cujus conducunt ad curanda vulnera, fundatur primariò in alcali volatili temperato plus minus oleoso, prout ipsa variant vulneraria: sicuti postmodum nata ulcera ex vulneribus Saturnus & Saturnina remedia curant, non quatenus refrigerant, non quatenus nuxeficcant, non quatenus detergent, sed quatenus acidum nimium absorbent; sicuti aliàs acida, quæcunque Saturni tactu transmutantur in dulcedinem aluminosam adstringentem: id quod patet omnibus in aceto destillato; hoc sanè minio seu Saturno calcinato affusum dulcescit manifestè instar sacchari, unde & exinde paratum sal sapore dulci saccharum Saturni appellari consuevit.

Acorem hunc vulneratis partibus & vulneribus adeo nocivum ex corruptione & putredine oriri dixi, nutrimenti putæ & balsami naturalis in parte hærentis, quæ inducitur primariò ab aere externo ambiente, aliave quadam concurrente causa externâ: v. g. halitus Chirurgi si attingat labia vulneris, est nocivus; unde etiam accuratior Chirurgi halitus semper aliorum efflant, & à vulneribus vitandum suadent, & quæ sunt huiusmodi externa alia; Nam ab his alteratus succus alimentitius in putredinem ruit. Unde acor semper est intensior in partibus nervosis quàm sanguineis. Alteratus etiam sanguis circa labia vulneris effusus congruatus hæret, & similiter acescit. Corruptum hi succi plus minus, prout aut externa impressio aut alteratio plus minus intensa fuerit, aut ii ipsi faciliùs vel difficiliùs corruptibiles existunt. Hic acor peregrinus omnium ferè accidentium & symptomatum vulneribus superuenientium, eorumque curationem & consolidationem remorantium, primarius est auctor: nam proximum alimentum & sanguinem salsum volatilem fermentando caorem, ruborem, & dolorem infert; hinc vicinos succos coagulando tumorem & inflammationem excitat; fermentando hinc se ipsum multiplicat & ulcus generat; cum salso volatili alimentario concurrente, sub effervescencia istud in pus transmutat.

Hæc vitiosa aciditas putredinalis in vulnere nunc simplex est, corruptiva tantum per fermentationem, nunc verò combinata est cum aliis extraneis qualitatibus, aut à causa lædente, aut ab aere ambiente, aut à sanguine & humoribus affluentibus oriunda.

Ratione causæ lædentis quidem combinatus est hic acor cum aliis qualitatibus, si instrumentum veneno tinctum sit, & sic plagæ inferantur venenatæ, ad quod & animalium omnium morsus pertinent; nam omnis fere mortuus, uti rectè loquitur CELSUS, habet quoddam virus, adeo ut etiam hominis irati morsus sub iræ fervore impressus vel instictus non minus periculosus sit, quàm alius cujusdam bestię virulentię morsicatio; cum hominis irati morsum, & non graviora symptomata, sæpissime gangrena partis mortuæ, putredo ac corruptio, sequatur. Observandum etiam est, quod instrumentum lædens aut vulnerans nunc solum secando, vel pungendo, interdum etiam imprimis contundendo, partem lædat, ut in pessimis sclopetorum vulneribus usu venit.

Hæc ratione Causæ lædentis.

Ratione aeris ambientis etiam variat acidum vulnorum peregrinum pro aeris diversa constitutione, quæ temperata, faciliorem, minus temperata difficiliorem promittit Curam; ita ut tempore vernali vulnera ac contusiones quævis faciliùs sanentur, quàm æstate aut hyeme. Pariter prout aer proclimatum ratione variat, etiam in uno loco faciliùs, in alio difficiliùs vulnera curari solent: sicuti uno loco capitis,



ut Bononiæ, in alio loco crurum vulnere, ut Romæ, citius curantur: sic GUIDO de CAULIACO vulnera capitis Lutetiæ difficiliora quàm Avenioni; crurum autem vulnera Avenioni difficiliora quàm Lutetiæ, esse observavit: sicut etiam PARÆUS in *Chir. p. 55.* testatur, omnia ferè vulnera sclopeto inflicta in præliis oblidionis Rotomagensis, in agro Dionysiaco confertis, lethalia fuisse. Item variat vulnorum cura, si aer frigidus, nebulosus, temperatus, aut abditæ ratione loci Endemica Inquinatus, aut adstantium halicibus & occultis aporrhæis infectus fuerit: hinc enim est, quod Chirurghi non promiscuè omnes admittant, ut inspiciant ligationes vulnorum, in specie in nervosis partibus, ut mulieres propter menstrua, item potui deditos & inebriatos. Pertinent huc etiam lunares radii vulnera illustrantes, sed simul deteriorantes, quod, quæ ratione fiat, illustrari potest Observatione istius Medici Galli, qui vocatur GUIDO de la BROSSÉ, *Tr. de Natura Planetarum.*

Hic observavit, quod radii lunares, luna existente plena, si concentrentur, dent materiam lacteam seu albicantem, intensissimè frigidam; sicuti aliàs radii Solares collecti dant flammulam seu ignem, &c. Observationes sunt satis curiosæ.

Denique ratione succi nutritii & sanguinis affluentis combinatus est acor fermentativus vulperum, si magis vel minus balsamus nutritius à statu naturali declinaverit; v. g. si sanguis affluens veneno venereo aut cruditate cachectica inquinatus fuerit, item si hæmorrhoidibus suppressis & mensibus stagnantibus fuerit repletus; qualium vulnera difficillimè sanantur, quia sæpius in ulcera cacoethæa degenerant. Nam hæc omnia modò dicta acidum vulneris corruptivum pejus superius reddendo, variorum symptomatum vulnere supervenientium sunt causa.

Hanc ergo balsami nutritivi & quasi glutinosi vulnorum naturalis corruptionem acidum impedire, aut jam factam leviorē corrigere, & balsamum naturalem per sibi amica & familiaria conservare, debet Chirurgus; idque per *medicamenta dicta balsamica*, mox in principio adhibenda, quæ debent esse salina volatilia temperata oleosa ad instar balsami istius naturalis: nam talia & acidum corrigunt, & naturale balsamicum conservant, & ulteriorem corruptionem ejus præcavendo, brevi sanitas sperata & desiderata succedit. Talia v. g. sunt balsamus Peruvianus, balsamus de capatbe, terebinthina Cypria, massix, olibanum, oleum momordicæ, hyperici, succus seu liquor folliculorum ulmi, theriaci in vini spiritu soluta, oleum terebinthine cum balsamo Peruviano temperatum, balsamus sulphuris, aliaque balsamica & unguenta infinita, quorum apex est balsamus samech Paracelsi. Paratur ex sale tartari volatilifato à vini spiritu, ut ambo coeant in dulcedinem aluminosam blandè adstrictoriam; qui balsamus samech omnium vulnorum corruptorem enecando, brevi consolidationem & sanitatem optatam adjuvat. Pauca tamen sufficiunt, quæ Chirurgum nobilitant; Compositionum enim multitudo ostendit ingredientium ignorantiam.

Dixi, quod debeant esse applicanda salsa volatilia temperata, dicta aliàs balsamica, non verò salsa excessiva seu acria; nam acria, tam acida quàm salsa, sunt nociva: acida quidem malum augerent, & omnem balsamum naturalem destruerent; ut nil dicam de horrendo dolore, quem inferrent, cum partibus sint inimica. Hinc & olea communia solâ expressione facta, citrà aliqualem præparationem tutò adhiberi non possunt, seu applicari nequeunt vulnibus, non tam ob unctuositatem viscidam, ratione ejus vulnibus & partibus nervis sunt inimica, sed præterea etiam, quia in se habent acidum occultum satis potens, quod argentum & ferrum corrodit, & corruptionem balsami naturalis insigniter promoveret, & vulnus pejus redderet.

Observandum tamen etiam est, ne applicentur nimis acria urinosa volatilia, seu sale volatili acriori constantia, aliàs deterfiva, abstergentia seu mundificantia dicta; quia hæc experientia teste vulnus diu nimis apertum detinent, eiusque coagulationem impediunt: ratio, quia colligesciunt, fundunt, & consumunt nutrimentum balsamicum partis, carnem ejus, & sanguinem: Ergo acrimoniâ suâ & facultate deterfivâ fluxiones, dolores, aliaque symptomata inferunt.

Talia ergo acriora solis ulceribus conveniunt, non vulnibus, quia vulnus diu apertum retinent; Talia enim colligesciunt & consumunt funditus nutrimentum partis balsamicum, acrimoniâ suâ fluxum, dolores, & alia inferunt. Ulceribus ergo conferunt, ubi potentiùs acidum potentio-

ra postulat corrigentia, & ubi productæ in labili ulceris fonsdes potentiora urgent deterfiva. Applicanda esse alcalina, oleosa seu temperata balsamica, notandum & observandum est tam in vulnibus partium sanguinearum, quàm nervosarum seu articularum vulnibus. Licet enim partes nervæ balsamica requirant paulo fortiora, quibus nempe levia corrosiva sint simul admixta, dum in partibus nervosis semper reperitur acor magis intensus, subtilior & penetrantior, quàm in sanguineis; & præterea copiosior sordium in vulnibus partium nervæarum fiat generatio: tamen aciora vix ferunt, quin potius exinde irritatæ dolorem & multa alia symptomata inferant. Temperata ergo acriscula & amaricantia conducunt.

His ipsis tamen externis admotis, simul administranda sunt interna, & quidem vulnervaria, quæ alcali occulto Mercurii reuiuificatio, tamen temperato, constant, & aciditatem qualemcunque, aut in stomacho aut primis viis, aut etiam consequenter in ipsa vulnervata parte, enatam aut auctam mitigant & corrigunt. Observavit enim FELIX WURZIUS, quod si simul Chirurghi adhibeant vulnervaria internæ, non opus sit tanta copia balsamorum externorum. Talia interna sunt *planta vulnervaria*, potionum forma usurpatæ, quales sunt ex alchimilla, haderæ terrestri, sanicula, plantagine, pyrola, ueronica, hyperico, consolidida saracenica, hepatica stellata, geranio Rupertiano, persfoliata, pulmonaria, maculosa, scabiosa, uinea peruvina, floribus hyperici & similibus: quibus & Album Græcum meritò annumerandum est, non minus quàm ex lumbricis paratæ remedia, partibus nervosis læsis appropriata interno & externo usu, uti & sanguis hirci. Huc pertinent lapilli cancerum in vino bulliti & ita assumti; sicuti ustus totus cancer fluviatilis interno partiter & externo usu est Chirurgorum Patronus, & insigniter vulnervarius.

Dixi, quod hæc remedia vulnervaria etiam contineant in se occultum alcali, ratione cujus reuiuificent Mercurium; eumque tam præcipitatum quàm sublimatum; transfiguratur enim Mercurius in varias larvas, beneficio nempe salium & spirituum acidorum. Reuiuificatur autem denuo ex istis variis, quæ assumptis, formis beneficio succi plantarum vulnervariorum, si in his bullierit: quare? quia acidum, quod antea induerat in forma præcipitatis aut sublimati, destruitur in Vulnervariis, unde destructo acido denuo sub nativa forma emergit. Unde verò destruitur acidum? nihil aliud est, quod magis vel potentius & à priori quasi acidum destruat, quàm alcali: necessarium ergo hoc erit in vulnervariis: iam verò temperatum est, & minus acriter linguam ferit, unde occultum vocatur ab HELMONTIO, vel blandum & minus apertum. A simili alcali lapilli cancerum & totus cancer fluviatilis vim obtinent vulnervariam: nam hinc est, quod aceto injecti effervescent, concursu acidum cum alcali: hinc est, quod vino infusi lapilli cancerum omnem aciditatem ejus interimant præcedente blanda quadam & obscura effervescentia, alcali cancerum in acidum vini operante.

Per talia ergo interna, & balsamica dicta externa vulnervaria, curanda sunt mox in principio vulnervaria recentia. Non enim imitanda est vulgaris Chirurgorum consuetudo, qui neglectis vulnervariis balsamicis, vulnervibus etiam recentibus imponunt primo *Digestiva & suppurantia*, hinc, dum genitum est pus, *Mundificantia*, & denique *Sarcotica* & conglutinantia. Hæc methodus est frustranea, imprimis in vulnervibus recentibus, cutam in longum protrahens, partem inflammans, & succum nutrimentum alterans, ut exinde interdum facta plaga levis degeneret in ulcus sordidum: sed potius, ubi repressa est hæmorrhagia, & nil extranei in vulnervia transierit, quod ex mendum sit, aut nulla conjuncta sit contusio, ut sit in sclopetorum vulnervibus, vel in quibus necessario expectanda sit suppuratio, optime vulnervibus talibus recentibus applicatur unicus balsamus Peruvianus, in specie vulnervarius, qui sale acris præditus vulnervis inspillatur, cum paucis, interdum nullo (quod aliquoties vidi etiam in periculosis vulnervibus) puris, & sine symptomatis, proventu citò vulnus conglutinatur, nisi aliquid de partis substantia secando ablatum fuerit: unde in hoc postremo casu cum vulnervariis blandè adstringentia, & humiditates superfluas imbibentes, vulgò *Sarcotica*, simul admisceantur. Interdum tamen necesse est, ut pegleis balsamicis, digestiva applicentur methodo vulgari, nempe eo in casu, ubi vulnus studio ad aliquod tempus apertum servandum sit, in vulnervibus v. g. capitis, aut ubi conjuncta est cum vulnervibus contusio, ut in specie in diabolicis sclopetorum vulnervibus evenit, aut ubi vulnus iam



jam degenerare incipit in ulcus, aut nimis ab aëre alteratum fuerit, ita ut balsamica sola his noxis corrigendis non sufficiant; aut etiam, si quid heterogenei continetur in vulnere, quod eximendum & separandum est, & quæ sunt similes circumstantiæ.

In his necesse est ex methodo communi prius applicare, *Digestiva* seu suppurativa, quæ pus in vulnere producant, & hinc post suppurationem *Mundificantia*, & tandem *sarcostica*. Nam ista *digestiva* successivâ supuratione aut id, quod contusum aut extravasatum & corruptum fuerit, remonent, aut id, quod contentum est peregrinum, tandem excludunt, aut leniâ sanatione aliis circa vulnus agendis occasionem subministrant.

*Digestiva* seu suppurantia talia ordinario constant ex *terebinthina* & *vitello* ovi tanquam basi, quibus pro re nata nunc mellis parum cum myrrha aut balsamo Peruviano, aut gummi elemi, aut simile quid, addendum est; imprimis si circa partes nerveas, quæ aliàs faciliè putrescunt, suppuratio expectanda: v. g.

℞. *Terebinth. opt.* ℥vj.

*Sevi cerv.* ℥ij.

*Cera alb. mastich.*

*Oliban. an.* ℥ß.

*Oleiosar.* ℥ß.

*Camph.* ℥j.

M. f. l. a. Unguentum.

Vid. WEDELIUS de Compos. Medic. Sect. 3. c. 2. p. 181. BORELLUS C. 1. Obs. 96. deprædicat sequens in puncturis, ulceribus & vulneribus:

℞. *Vini alb. haustum.* j.

*Mell. alb. seu comm.* ℥iv.

*Vitell. ovor.* No. iij.

M. & super ignem leniter spatulâ agita, donec vinum in fumum abierit, & quod residuum, consistentiam acquisiverit, eoque utendum sæpe renovando.

Talia oleosa temperata, vulneratilis balsamicis cognata, acidum vitiosum in vulnere inveterato etiam mitigant, ne à mundificativis veris tanquam paulò acrioribus in principio irritatum, effervescente ulcus peius reddat, quin à digestivis alteratum faciliùs mundificantibus cedat: deinde & talia ulteriorem acoris in vulnere progressum inhibent, & interea, quod vitiosum est, effervescente suppuratum sponte naturæ separari & excludi possit. Ubi per digestiva pus genitum laudabile profuit, tanquam ulcus quoddam benignum per mundificantia, hinc incarnantia, & cicatrisantia, tractandum erit, de quo plura, ubi de ulceribus.

Ex his patet, omnia balsamica vulneribus recentibus dicta, ut *mundificantia* & *digestiva*, cognata esse naturæ inter se, quatenus alcali constant, & acidum destruunt vulnorum & ulcerum, si nempe temperata sunt balsamica; si non sunt temperata, sed aciora, digerentia sunt & *mundificativa* ulcerum; si verò nimis oleosa sunt temperata, sunt *digestiva* seu *pus promorientia*: Unde unum idemque horum medicamentorum, v. g. *terebinthina*, pro ratione sub est, nunc mundificativi, nunc digestivi, nunc consolidativi nomen habet. Hisce tamen alia alcalia subinde addenda erunt, qualia metallica fixa, quæ successivè absorbendo omnia acida vitiosa privata vulnere & ulcerum conducunt, ut creta, *terra vitrioli dulcis*, remedia *saturina*, item quæ ex Venere adhibentur ad curam vulnorum. Naturæ constat ergò in consolidando vulnere succurrat Chirurgus, primariò equidem per modò dicta remedia applicando balsamica, secundariò tamen etiam mechanice succurrat naturæ, non removendo tantum ex vulnere omnia heterogenea, quacunque etiam ratione illa extrahere aut eximere possit, sed etiam conjungendo vulneris labia, ut interveniente naturali balsamo, tanquam glutine, promptius cohereant: id quod fasciis communibus labia vulneris ad se invicem adducendo, nunc futuris eadem fortius uniendo, sic quæcunque recentes læsiones ac vulnera citra suppurationem omnem, inflammationem & tumorem faciliè & tuto coeunt, & omnia istis optimè mundificata, novâ carne replentur.

*Heterogenea extrahenda* Monui: cum certum sit, omne peregrinum & non vitale naturæ esse inimicum, idque eo plus, quò faciliùs & ipsum heterogeneum est alterabile aut corruptibile. Hinc namque globuli sclopetorum præ aliis externis commodius relinqui possunt in corpore, si ossi hæreant infixi, seu saltem in partibus musculosis, lateant. Hi, inquam, globuli faciliùs possunt retineri in corpore ex eo,

Ettsmull. Oper. Tom. II.

quoniam nullam alterationem inferunt parti, nisi quod pondere ipsum gravent: aliàs verò ipsi globuli nec alterantur, nec ullo modo corrumpuntur, utut tandem proprio pondere successivè deorsum & extrorsum ferantur, atque ita à provida natura excludantur. Res quoque extraneæ in vulneribus hærentes ordinariò sunt *grumi sanguinis*, &c. qui tamen non penitus in principio removendi sunt, sed crusta sanguinis grumosi circa labia vulneris relinquenda est; hæc enim defendit labia vulneris ab impressione aeris externi, defendit balsamum nativum, quò minus alteretur, item promovet suppurationem. Alia verò heterogenea, v. g. *frustula vitri, festuca, ossium frustula, surculi lignorum, &c. similia*, nunc arte extrahuntur, vel variis instrumentis, rostro corvino, gruino, ciconiæ, & similibus, vel eadem obscure & profundè situata beneficio suppuracionis successivè foras ejiciuntur cum pure.

In specie autem *ad extrahenda heterogenea ex vulneribus optimè conducit* pinguedo leporis, quæ quorundam Chirurgorum est arcanissimum, si vel sola illinatur, vel cum ana aut duplo unguenti seu emplastri ex betonica applicetur vulnere, vel etiam ex *pinguedine leporina* cum *gummi Arabico* fiat emplastrum vulnere imponendum, pro extractione peregrinorum. Alii pro extrahendis vitiosis infixis commendant admodum picem sutoriam, *Germ. das Schnüßer-Pech*, quæ fortissimè res alienas ex vulneribus eliciat; uti & hoc à quibusdam laudatur:

℞. *Ferment.*

*Mellis opt.* an. ℥ß.

*Visci quercin.* quartar. j.

Quæ invicem combinantur in formam Emplastri applicandi ubi res heterogeneæ sunt eliciendæ.

Quin & raphanum fortiter cum axungla subactum, & vulnere impositum, peregrina fortiter elicere affirmant. Dictamnus Creticus cum pinguedine leporina etiam applicatur. Non Inconsultum est, dum recipiunt alii cancror vivos, eosque contusos miscent cum pinguedine leporina, & res alienas prodire juvat. Vel

℞. *Ovor. cancror. viv.*

*Pingu. lepor.* an. ℥ß.

*Succin. albi* ℥ij.

M. D. S.

*Unguentum extrahens.*

Applicetur ad extrahendas res alienas.

Juxta hæc nonnullis in maxima secreto est *lingua vulpis*: evellitur nempe Mense Martio ex vulpe viva vel violenter mortua, exsiccat, & usurpatur suo tempore in vino: scilicet macerata vulneribus applicatur, sic omnia heterogenea prorumpunt.

Composita quibus placent:

℞. *Cera alb.* ℥j.

*Colophon.*

*Terebinth. an.* ℥vj.

Liquefiant super igne:

adde

*Gummi ammon.* ℥j.

*Bdellij* ℥ij.

*Succini* ℥ij.

*Axung. lepor.*

*Aprugn.* an. q. s.

M. f. Emplastrum; S.

*Emplastrum extrahens.*

Hisce externis succurrendum est per vulneraria, in specie quidem per sabinam, vincam pervincam, & lapillos cancrorum, qui primariò tunc debent ingredi portiones vulnerarias, ubi extrudenda sunt heterogenea infixa; videatur FELIX WVRZ: Sic WEDELIUS de Med. Facultatib. lib. 1. Sect. 2. cap. 6. refert studiosum, qui idus erat globulo plumbeo in pede, quem instrumentis exuierat, decocto vulnerario ex radice dictamni extractum & curatum. Pertinet huc experimentum Arculani, qui ibidem videtur.

Juxta hanc extractionem etiam fasciis succurrat Chirurgus *Fasciarum* variz sunt & species & modi. In vulneribus præ cæteris in usu est fascia seu *ligatura incarnativa* seu *agglutinativa* dicta, quæ nempe fit cum fascia duorum capicum: Applicatur ita, ut medium ejus imponatur in membro læso in parte plagæ opposita, & ducatur hinc supra plagam ipsam cruciatum, repetendo hanc viam aliquoties, ut labia plagæ ita ad se invicem adducantur; sic enim beneficio fasciacionis seu fasciæ adducuntur labia vulneris. Et hæc fasciatio vel sola sufficit in vulneribus, vel non adeo



infigerioribus, vel in illis, quæ secundum longitudinem membri, vel secundum fibrarum protensarum ductum, inflata fuerunt: sed in vulneribus & sectionibus quando partes quædam ferro abscessæ sunt, ut in narum, aurium & digitorum tali separatione, ut tamen adhuc pendeant; aut etiam quando in articulis graviores infliguntur plagæ; aut quando ampla vulnera per transversum membri aut fibrarum musculorum sunt illata; aut quando frustra integra carnosæ feræ sunt decisa, in his & similibus casibus non sufficit fasciatio sola, ut adducantur labia vulneris ad se invicem, & ita adducta maneant; sed in talibus casibus *sutura labiorum vulneris* (Germ. *das heffen*) sunt instituendæ. *Sutura* hæc sunt nunc per *acus*, & *fila* illarum medio traducta; nunc vero sunt per gluten utrinque vulnere applicatum (*per emplastrum figens*.) Illud convenit in subiectis durioribus & fortioribus in partibus à visu remotis minusque sensibilibus: hoc vero, nempe sutura per gluten, in partibus contrariis. *Modus per gluten* est hic: Applicentur utrinque labiis vulneris lintea luis ansulis seu filamentis instructa (Germ. *mit Bandern*) ut horum medio ipsa emplastra, & per consequens vulneris labia, ad se invicem adduci possint, postquam ipsa lintea hoc linimento, tanquam glutine, prius fuerint illita:

24. Gum. tragacanth.

Arabic.

Mastic.

Thuris.

Sarcocoll. an. ʒj.

Pulverisata subigantur probe cum ovi albumine, agitataque optime cum spatula, donec in spumam, hinc in liquorem, resolutum fuerit, & ita lintea hoc linimento illita applicanda sunt.

D. S.

*Emplastrum figens.*

Interim utrinque *sutura* diversimodè instituitur pro ratione partis vulneratæ, observando in ambabus, tam quæ sunt cum acu, quam cum glutine, hoc imprimis, ne

(1.) Applicetur, nisi necessitas urgeat in supra dictis casibus.

(2.) Ne nimis arctè adducantur labia vulneris, quia in omni vulnere hæc ipsa aliquantulum intumescunt.

(3.) Ne nimis prope sint ad se invicem adducta, ne puri & sordibus vulnere egressus, balsamis vero & unguentis applicandis ingressus, inhibeatur.

(4.) Ne in futuris nervus simul cum acu attingatur.

Quæ quatuor requisita in futuris legitime instituendis vel maxime sunt observanda; aliàs enim plus nocent futuræ, quam profunt. Imprimis quidem, si nimis arctè labia vulneris adducantur, aut ipsa *sutura*, sive per *acus* sive per *ansulas*, sint nimis prope ad se invicem sitæ, tunc imprimis ingens dolor ex impedito tumore labiorum vulneris exoritur & inducitur: & præterea pus factum in fundo vulneris non rectè egreditur; unde postmodum fundus vulneris non probe mundificatur, ipsa vero labia interna coalescunt; adeoque fit tandem, ut ex remanentis puris & fermenti vitiosi in parte vulnerata & consolidata oriatur abscessus occultus, successivè non absque periculo se manifestaturus: qui antequam fit, pus acre retentum subinde cuniculos agit in partibus subcutaneis, easdem hinc inde erodit, & ita postmodum abscessum sinuosum producit; imò interdum ipsa ossa aggreditur, eaque cariosa reddit, interdum alia incommoda post se ducit, à vitiosis applicatis futuris oriunda. Imprimis autem in locis nervosis cautè applicetur *sutura* per *acus*, propter dolorem, aut etiam propter metum puncturæ tendinis aut nervi: Nam à priori, nempe dolore, partes nervosæ irritatæ plorant synoviam (*accedit Pisuita seu phlegma per omnia diffuens*): si vero posterius fiat, si scilicet pungatur nervus vel tendo, metus est supervenientium convulsionum: Ob id ergo quàm paucæ applicentur *sutura*, imprimis per *acus*, propter nervos, &c.

Jam vero ut *sutura* insigniter conducunt in vulneribus gravioribus casum factis; ita etiam in vulneribus levioribus punctim inflatis *Turundarum* rectè administratarum egregius est usus, quod certum est (dico rectè administratarum:) quæ ipsæ tamen *turundæ* (Germ. *Meissel-wiecken*) in nec abscessibus sinuosis, uti nec in ulceribus & fistulis, minoris sunt utilitatis, quin in his posterioribus casibus etiam insigniter conducunt.

In specie usus earum est, quoad vulnera, ut nempe per

his *turundas* applicatas vulnus tandem in superficie apertum servetur, donec ex fundo probe purificato succrescens caro summitatem labiorum successivè attingat; cum aliàs in superficie citius caro ipsa ipsaque cutis promptè coalescens, pus & sordes in fundo occludant, unde necessariò aut dolores, aut inflammationes, aut abscessus recidivi, aut fistulæ, aut sinus profundi, simillaque supervenientia mala: cum è contra ipsæ *turundæ* rectè fabricatæ sillis fuerint unguento & balsamo convenienti, vehiculum sunt, ut ubique unguentum aptius distribuatur, & ad fundum vulneris usque derivetur vis medica balsami vulneraril.

Parantur autem *turundæ* aut ex lino contorto, aut ex linteo teneriori convoluto & filo alligato in forma quasi pyramidalis, ita ut basisturundæ, seu latior & amplior pars, dividatur in quatuor lacinias, quæ impendant, ne nimis profundè *turunda* in vulnus intrudatur; aliàs enim hoc esset dolorosum, quod in usu *turundarum* est observandum: idque

(1.) Si partes nervosæ aut in vicinia, aut in fundo vulneris reperiantur: nam in talibus longiores aut crassiores *turundæ* magnum dolorem excitant, qui partium nervosarum lésiones insigniter exasperat, ad convulsiones agros disponit, & synoviam & consequenter partis ariduram tandem producit.

(2.) Observandum est in usu *turundarum*, ne nimis sint crassæ, nempe circa medium sui sint crassissimæ, ita quidem, ut modicè repleant vulnus, cum ordinariò *turundæ* nonnihil intumescere soleant: in apice sint *turundæ* teneræ & molles, ne durior apex & acutus partes sensiles lædat & irriter, nec carnem teneram ex fundo succrescentem lædat, ejusque augmentum impediatur; quin potius ipsæ *turundæ* non nimis crassæ faciliè cedant genito puri, nec hujus retentionem indeque ortam majorem acrimoniam inferant; quin & crassæ nimis *turundæ* hoc habent periculi, ut labia vasorum sanguifluorum coalescentia, & à sanguine grumoso nonnihil conspata, denuò referent, novasque hæmorrhagias inducant.

(3.) Ne *turundæ* frequenter nimis, aut ubi minus necessarium est, applicentur, in specie, ubi partes nervosæ fuerint simul læsæ: nam nimis frequenter aut diu usurpatæ consolidationem impediunt; item partes cutaneas circa labia occalescere successivè faciunt seu ad occalescentiam disponere solent. Sufficit per *turundam* vulnus in quodam loco servare apertum, ut vel sanies vel simile possit excerni.

His ita probe observatis coalescunt tandem vulneris labia & nutriuntur denuò partes antea separatæ; nihilominus tamen inequalities, asperitas duritiesque in loco consolidato remanere solent, id quod *cicatricem* appellant. Nam dum balsamus nutritivus successivè denuò unit labia, tamen fibræ cutaneæ nervæ antea separatæ vix adeò exactè sibi denuò circa extremitates junguntur; pori quoque & meatus inæquali tractu aliàs juxta se invicem sicuti pervertuntur, & minus aptè serie collocati ita inter se cōfunduntur: unde glutinans succus nutritivus in istis locis decedens & implicatus in offibus callum, in partibus mollioribus cutaneis *cicatricem* talem constituit: idque eò magis, quò adstringentia magis & exsiccantia, *cicatrificata* vulgò appellata, applicata fuerint: nam hæc poros angustando, fibrasque duriores & minus tractabiles reddendo, tandem insigniori cicatrici occasionem præbent, & quidem eò magis, quò asperior minusque roscidus fuerit nutritivus balsamus: nam propter hanc ultimam causam in adultis majores magisque deformes cicatrices nascuntur, quæ in junioribus minustales existunt, quin potius hi ipsi rectè tractati vix cicatricis vestigium relinquere solent. Pinguedo asciæ piscis vulneribus, dum coeunt, instillata, consolidat citra *cicatricem*.

Remedia ergo vulnere in genere Glutinantia seu vulneraria appellata, sunt ista, quæ partes molles naturaliter quidem unitas, præternaturaliter vero divisas, denuò coniungere juvant, ut quasi conglutinatæ videantur, unde *Glutinantia* dicuntur. Pertinent huc ea, quæ tam ad vulnera recentia consolidanda adhibentur, ut *vulneraria*, unde balsami vulneraril præparantur, tam ad ulcera cava replenda, ut *Sarcotica* dicta, tam ad *cicatricem* inducendam, ut *Epulotica*.

Sup-



Superius monitum fuit, quod natura simpliciter impositione & agglutinatione sui balsami seu succi nutriti, partes divisas uniat, aut imminutas restituat, modò non impediat per huius balsami aut alterationem aut corruptionem. Non ergo medicamenta generant carnem, sed naturæ tantum adiumentum præstant, conservando balsami integritatem naturalem: quod ea faciunt, quæ sale volatili occulto seu oleoso temperato constant, *vulneraria* communiter dicta, & quæ simul imprimis adiunctam habent *moderatam* quandam *adstringentiam*.

Prout autem iam alimentum partis balsamicum alterationem quandam & corruptionem acidam suscipit, aut majorem aut minorem, eligenda etiam sunt medicamenta, quorum sal volatile nunc magis nunc minus erit acre, aut addenda erunt *temperatis metallicis*, imprimis *Saturnina*, acidum quodcumque *absorbentia*. Dum autem semper cum succo partis nutritio tenuis quidam & serosus humor, istius scilicet vehiculum, in partem læsam transudat, quod aut impedit partis reunionem & alimenti agglutinationem, aut saltem partem regentium humectando, nimis laxam, flaccidam & mollem reddit, indeque nimis carnis luxurie & excrescentiæ occasionem præbet: ob id interdum sunt addenda remedia, vel *exsiccantia* dicta, quæ nempe nimiam humiditatem in se absorbent, vel *adstringentia moderata*, quæ laxitatem corrigunt, & debitum tonum ac consistentiam carni regenti tribunt: quod imprimis observandum est, ubi simul vel pars carnis, vel cutis, vel alia quæcumque ablata, regenerari debet; tunc enim modò dicta remedia, pro necessitate partis regenerandæ, vel augenda vel minuenda sunt: Nam talia si sunt debilia, *sarcotica*: si fortiora, *epulotica* dicuntur, quoniam in partis solâ per vulnus divisione non tanta imminet necessitas, atque in partis ab ulcere erosione.

Remedia ergo vulneraria sunt multifaria, v.g. herbe & folia agrimonie, geranii, feniculæ, pyrolæ, pilosellæ, berniarie, cynoglossæ, plantaginis, hyperici, equiseti, verbenæ, scabiosæ, chamæpityos, centaurii minoris, millefolii, quod recens contusum vulneribus recentibus impositum, vel ejus succus recens instillatus extra suppurationem consolidat; betonica, bugula, pignellia, nicotiana, pimpinella, myrti, nummulariæ, vineæ pervicacæ, bellidis minoris, cheresolii, telephii, veronicæ, scabiosæ, fabinæ, caprifolii, virgæ aureæ, eorumque succi: radix aristolochiæ utriusque, tormentillæ, symphyti majoris, cypri, Ireos Florentinæ, galangæ, valerianæ, vincetoxicæ, sigilli Salomonis: cortices granatorum: flores rosarum, balsamorum, hyperici, bellidis, verbaſci, crocus: fructus momordicæ, nux moschata, caryophylli, nux cupressi, gallæ immaturæ, glandes quercinæ, sarcocolla, sanguis draconis, tacamahaca, tragacanthum, gummii elemi, hederæ, galbanum, olibanum, benzoe, luccinum, bdellium, gummii juniperi, resina pini & omnium arborum resiniferarum, terebinthina, colophonium, myrrha, quæ imprimis est conservativum mumiæ, & per centum & plures annos homines à corruptione arcere potest, beneficio spiritus vini myrrhati conditos, unde elixyr proprietatis omnes corporis nostri putredines arceat; pix, mastix: Ex succis inspissatis sunt hypocistidis, acaciæ veræ, aloë, liquor vesicularius ulmi, saccharum eum spiritu vini temperatum: farinæ hordii, fabarum, orobi, foenu Græci, &c. Ex animalibus mumiæ, lumbrici terrestres & omnia lumbricalia, cerumina aurium sunt singularia, cera, mel, cornu cerviustum, os sepiæ, eburustum, cancri fluviatiles, lapilli cancrorum, & omnia ex caneris desumpta, quia cancri constant sale alcalino temperato & minus oleoso, ratione, cujus successivè destruunt acidum in parte vulnerata: exuvie serpentum, tela araneorum, pinguedo canis, usnea, crani humani, urina, &c. Ex mineralibus colcothar vitrioli, quod commendatur ab Helmontio, & omnem vulnèrum corruptionem tollit, ex quo Felix Wurzelium unguentum fuscum parat. Idem etiam præstat Saturnus & Saturnina, ut lithargyrium, plumbum calcinatum, cerussa, minium, cadmia, lapis calaminaris, tutia, bolus Armena, terra sigillata, pompholyx, creta alba, lac lunæ, lapis hæmatites, gypsum, alumen, sulphur, calx viva lota, terra vitrioli dulcis balsamica, crocus Martis, &c. Hinc vini spiritus, oleum hyperici, oleum momordicæ, quod vim habet vulnera consolidandi, oleum nucis expressum, oleum mastichis, nicotianæ, oleum lumbricorum terrestrium, & in vulneribus non adeò magnis oleum liliorum alborum; balsamum Peruvianum in omnibus corporis vulneribus,

vel, quod reliquis præfertur, balsamum Indicum seu de Capaibe, balsamum sulphuris, balsamum sulphuris antimonii cum oleo succini aut terebinthinæ, balsamum Saturniterebinthinatum; theriaca. Sic solum oleum seminis hyperici expressum cum floribus sulphuris blandissime emolliendo dat balsamum sulphuris nobilissimum. Vnguentum de lithargyrio aureum, de betonica, de pompholyge, de nicotiana, de cerussa, unguentum Wurzelii fuscum, unguentum album Rhafis, unguentum de tutia, de minio: emplastrum diasulphuris Rulandi, emplastrum sticticum Crollii, emplastrum Oppoteldoch Paracelsi, emplastrum diapalmæ, de betonica, de gratia Dei, &c. quæ recentia vulnera subito ad consolidationem perducunt.

Vfus horum simplicium & compositorum est multiplex: Vsurpantur enim

- (1.) Vel internè in Potionibus vulnerariis.
- (2.) Vel externè in Iniectionibus sub forma Decoctorum.
- (3.) Tanquam olea & balsama.
- (4.) Tanquam Unguenta cum turundis aut filamentis siccis applicanda.
- (5.) Tanquam emplastræ.

V.g. sic præscribo: sit. 1. Potio vulneraria:

℞. Cancr. fluviat. No. xij.

Rad. symph. maj. ℥i.

Fol. bugloss. Alchymill. Heder. terrestr.

Summit. hyper. an. M. j.

Concisa & contusa bulliant in f. q. aquæ & vini:

(Vinum additur propter caneros;)

Colaturæ adde

Syr. caprill. Vener. Heder. terrestr. an. q. f.

M. D. S.

Potio vulneraria pro aliquot vicibus.

Si sitis urgeat, etiam de syrupo succo citri, &c. addatur, bis in die hauriendo semper ℥iv. ad vj. tribus vel quatuor horis ante pastum, in utroque haustu aliquot guttæ balsami sulphuris terebinthinati, vel succinati in nervorum affectibus, assumi possunt:

Vel

℞. Cancr. flu. No. x. vel xx.

Rad. aristol. rot. ℥j.

Fol. bugul.

Beton. vel plantag.

Alchimilla vel millefol.

Sanicul. an. Mj.

Alb. Græc. ℥ij. ad ℥j.

Bulliant in aquæ p. ij. & vini p. j.

Colaturæ ℥ij. adde

Syr. de symph. Fern. ℥ij.

(vel hujus loco syr. de hed. terrestr. ℥ij.)

M. D. S.

Potio vulneraria sanans.

Dosis ℥ij. ad v. bis in die, cui semper balsamus sulphuris gutt. x. ad xv. addantur.

Vel

℞. Herb. plantag. Mij.

Pyrol. Alchim. an. M. ℥.

Com. hyperic. floreſc. M. j.

Raf. cornu Cervi ℥j.

Coqu. in f. q. aquæ:

Colaturæ ℥ij. adde

Sacch. vel syr. de symph. Fern. q. f.

M. S.

Ut antè.

℞. Lap. cancr. præp. ℥ij.

Aceti vini ℥vj.

M. S.

Sanans Mixtura vulneraria.

Huius mixturæ cochlear. j. propinetur in haustu Decocti calidi. Vel

℞. Herb. scabios. M. ij.

Hed. terr. M. j.

Rad. enul. ℥ij.

Ireos Flor. ℥vj.

Sem. anisi vel Fenic. ℥ij.

Coqu. in aqua simpl.

Colaturæ ℥ij. adde

Oxym. squillit. q. f. pro grato sapore.

M. D. S.

Sanans potio vulneraria.

In forma sicca:



℥. Mumia ℥℥.  
Sperm. ceti ℥ij.  
Lapill. cancr. præp. ℥ij.  
Rhabarb. el. ℥j. vel ij.  
Cinnam. ℥℥.

M. f. Pulvis: S.  
Pulvis vulnerarius.

II. Si ordinanda sit *injectione* in vulnera profunda, in sinus, item ulcera cavernosa, &c.

℥. Herb. veron.  
Pyrol. Sanie.  
Fol. nicot. an. M. ij.  
Alb. Gras. ℥ij. vel iv.  
Coqu. in f. q. aqua simpl.  
Colat. q. f. adde  
Spiritus vini vel mell. pro lubitu.  
M. D. S.  
Aqua inspergenda.

Hoc externè vulnera & ulcera eluuntur, vel etiam plagulam in eo madefactam imponuntur.

Vel  
℥. Asacor. fluo. No. xx.  
Rad. aristol. rot. ℥j.  
Herb. bugul.  
Alchimill.  
Sanicul.  
Betonie. an. M. j.  
Coq. in f. q. aquæ comm. & vini.  
Colatura D.

Qui volunt habere plures compositiones Decolorum vulnerariorum, adeant **POTERIVM** Pharm. lib. 1. Sect. 1. pag. 320.

III. Sequuntur oleosa seu balsama vulneraria, quæ, utut simplicia, sunt tamen optima: v. g. sufficit balsamus *Peruvianus* vel *Tolitanus*, item balsamus sulphuris cum oleo *hyperici*. Quibus tamen placent composita,

℥. Balsam. Peruv.  
Oleo hyperic.  
Momord. vitè par. an. ℥ij.

(Vidi hoc solo oleo momordicæ mirabiles peractas curationes)

Balsam. sulphuris ℥j. ad ℥℥.  
Gumm. elemi q. f. pro consistentia balsami liquidioris vulnerari.

Misceantur blando calore, asservetur usui, instilletur vulneri. Vel

℥. Olei flor. hyper. tripl. infus. cum oleo sem. expresso par. ℥ij.  
Terebint. opr. ℥ij.  
M. D. S.

Unguentum vulnerarium.

℥. Olei hyperic. ℥j.  
Momord. ℥℥.  
Bals. sulphuris ℥ij.  
Oleo express. nuc. mosch. q. f. pro incorpor.

Alius:

℥. Flor. sulphuris vel sulphuris pulverisat. ℥j. ad ℥ij.  
Bulliant lege artis in oleo hyperici, expresso ex seminibus (nam infusum hic nil valet) ℥j. vel q. f. ad solutionem sulphuris:

Hinc adde

Gumm. elemi,  
Tacamah.  
Terebint. an. ℥℥.  
Thuris el.  
Myrrb. an. ℥ij.  
Bals. Peruv. vj.  
Terra vitrioli dulc. vitè par. ℥ij.

M. & leniter ebull. in arena, f. Bals. pro digestivo:

D. S.

Balsamus vulnerarius.

Alius:

℥. Terebint. Venet.  
Resin. abietin. pelluc. an. ℥ij.  
Gumm. elemi,  
Thuris an. ℥℥.  
Myrrb.,  
Masticb.  
Benzoes,  
Aloes hepatic. an. ℥℥.  
Spiritus vini ℥iv.

Subacta probè invicem destillantur lege artis per retortam;

& fiat balsacum, separandum à phlegmate & magmate, temperandum non nihil vel cum balsamo de Peru vel cum oleo hyperici expresso:

D. S.

Ut suprâ.

Temperandum dicitur: destillata enim balsama statim volatilia sunt & acriora, adeoque sunt temperanda, & postmodum potius in partibus nervosis læsis, quàm in sanguineis affectis, conducunt.

Plures compositiones videbitis in **POTERII** Pharm. Spagy. **WURZIO**, **HILDANO**, **BARBETTE**, &c.

IV. Si Unguentum Vulnerarium expetatur:

℥. Summ. hyper. floresc.  
Centaur. Min.  
Veron.  
Sanie. an. ℥j.

Concisa & confusa infunde in f. q. Olei Oliv. puri & butyri non saluti v. g. an. ℥iv.

Digere in Balneo Mariæ per octiduum, hinc fortiori igne ad exhalationem humiditatis inspissa probe agitando, post per linteum exprime: Materiam tractatam adde

Terebint. ℥vj. vel ℥j.  
Bals. Peruv. ℥ij.  
Pul. masticb.  
Myrrb.  
Oliban.  
Flor. sulphuris an. ℥vj. vel ℥j.  
M. pro consistentia Unguenti:  
D. S.

Unguentum vulnerarium.

Vel

℥. Flor. sulphuris ℥j.  
Oleo expr. sem. hyperic. ℥℥.

Hæc cum blanda ebullitione redigantur in bals. sulphuris: cui adde

Cera nov. ℥ij.  
Terebint. ℥ij.  
Oliban.  
Myrrb.  
Terra vitrioli dulc. an. ℥ij.  
M. S.

Ut suprâ.

Et si V. Postuletur Emplastrum vulnerarium, immixtione olei, & auctione ceræ & reliquorum siccorum ingredientium, unguentum hoc faciliè in consistentiam emplastri redigi potest: qualia emplastra vulneribus adducendis inferviunt, & instar operculorum esse poterunt: quæ inter eminet emplastrum stypticum Crollii seu oppoteldoch Paracelsi.

Vel

℥. Cera,  
Resina,  
Sevi birc.  
Terebint. an. ℥℥.

Super igne liquefactis & colatis adde

Patv. rad. consol. mai.  
Ulmæ. an. ℥j.  
Terra vitrioli dulc. ℥ij.  
M. f. emplastr. S.  
Emplastrum vulnerarium.

℥. Rad. aristol. rot.  
Consol. mai. an. ℥℥.

Mumia,  
Masticb.  
Aloes,  
Colophon.  
Tutia præp.  
Litbargyr. an. ℥j.  
Gumm. elem. ℥ij.  
Terebint. q. f.

Cum pauca cera etiam f. emplastr.

D. S.

Ut suprâ.

Inducatur super linteum, prius cum bals. Peruv. leviter irroratum aut humidatum. Vel

℥. Litbargyr.  
Oleo olivar. an. ℥j.

Coqu. ad consistentiam spissam & colorem obscurum: hinc successivè adsperge

Aloes succor.  
Myrrb. an. ℥ij.  
Sevi birc.



*Cera flav. an. ℥ij.*

Agitata ab igne remove, & adijce denuò

*Camph. in oleo hyperic. sol. ℥ss.*

M. f. Emplast. in Magdaleones

Malaxandum, aut in vesica oleo illita asservandum.

D. S.

*Ut supra.*

Cæterum in selectu remediorum internorum & externorum judicium nonnihil adhibendum est, ut interna præstantiora, & simplicia sint optima; unde ex internis pauca quedam vulneraria supra dicta, item lapilli cancerorum, & antimonium diaphoreticum, sufficiunt; interdum tamen spiritus vel liquor cornu Cervi succinatus in partium nervosarum læsione usurpatur.

Internè in æstu aut phlogosi febrili nitrum antimoniatum imprimis sub largiori dosi concedendum est, quibus semper lapilli cancerorum efusque cancerorum sturviatilium addequda erunt: e. g.

℥. Lapill. cancer. præp. ℥j.

*Cinnab. antimonii ℥ss.*

*Laud. opiat. g. j.*

M. f. Pulvis: S.

Febrilis pulvis vulnerarius.

In forma Mixture:

℥. Aqua plantag. vel hed. terrestr. ℥ij.

*Aceti destill. ℥ss.*

*Extr. succos. plant. vel vulner. Mich. ℥ij.*

*Lapill. cancer. præp. ℥j.*

*Laud. opiat. gr. ij. ad iij.*

*Syr. corall. vel de symph. Fernel. ℥ij. vel ℥ss.*

M. S.

Potio vulneraria, cochleatim capienda.

Vel

℥. Aqua Hyssopi ℥ij.

*Mentha ℥j.*

*Aceti vini ℥ss. ad ℥vj.*

*Lap. cancer. præp.*

*Syr. de hyssop. ℥ij.*

M. pro 2. vel 3. dosib.

D. S.

*Ut supra.*

℥. Aqua betonic.

*Scabios. an. ℥ij.*

*Aceti ℥ij.*

*Spir. theriac. campb. ℥ss.*

*Lap. cancer. præp. ℥ij.*

*Antimonii diaph. ℥j.*

*Syr. betonic. ℥ss.*

M. D. S.

*Ut antè.*

Talem etiam in febre vulneraria, capitis vulneribus superveniente, præscribere soleo.

Qui volunt habere selectum Potionum vulnerariarum, adeant FELICEM WURZIUM.

Par ratio est & Balsamorum & unguentorum vulnerariarum, quæ inter simpliciora & selectiora sunt optima; Balsamus sulphuris, balsamus Peruvianus & Tolutanus, sunt optimi; vel oleum hyperici expressum ex seminibus, cui proprii flores infusi sunt, est egregium.

Cujusdam Chirurgi Neapolitani singulare experimentum in omnibus vulneribus, sive scelopetis, sive ictu, sive alia ratione factis, fuit sequens: Recepit scilicet spiritum vini phlegmaticum, vel etiam in ejus defectu spiritum vini rectificatum, cum aqua communi diluit, calefacit & imposuit vulneribus cum lioteis, vel iniecit in sinus, aut fistulas vel profunda vulnera, per siphonem, semper tamen calidè, & hoc effectum edit planè mirabilem; Impedit non tantummodò supervenientem inflammationem, sed quamcunque etiam ex vulnere arceat corruptionem.

Alii ad vulnera biduo curanda commendare seq.

Recipitur Vini spiritus rectificatissimus, quo eluuntur vulnera recepter infecta; deinde imponitur pulvis subtilissimus aloes hepatica cum gossypio, oleo hyperici imprægnato, ligatura comprimitur, & superimponitur emplastrum dia sulphuris Rulandi; si sanabitur vulnus intra biduum. Item

℥. Benzoes ℥j.

*Spir. vini ℥ss.*

*Mastic. ℥j.*

*Balsam. nigr. ℥ss.*

M. in form. Linimenti:

D. S.

*Balsamus vulnerarius.*

Consolidat & cicatrizat quæcunque vulnera recentia simplicia.

Cerum est, quod vini spiritus singulare quid obtineat: unde theriaca cum spiritu vini subacta & diluta, vulnere applicata, putredinem & corruptionem quamcunque in vulnere arceat, & promptè consolidat. Mucus seu ceruminus aurium sunt singularissimum vulnerarium: cum oleo nucum inglandium expresso vel oleo seminum hyperici mista, & nonnihil inspissata in formam unguenti, dant balsamum seu linimentum vulnerarium egregium, imprimis ad vulnera nervorum nulli æquiparandum; cui balsamum Peruvianum vel sulphuris addi potest; vim enim abstergendi possidet mucus iste, nec finit aliquid crescere in pus. Sic liquor folliculor. ulmi solus instillatus, in vulneribus, & imprimis oculorum, sufficit. Qui verò volunt habere plura balsama vulneraria, videant HENRICUM ab HEER Observ. 10 de herba hyperici, & ZWELEFERUM in Pharm Regia.

AGRICOLA in sua Chirurgia Parna pag. 245. etiam commendat sequens unguentum, ex basi ceruminum aurium confectum, quo mirabilia se præstitisse brevi tempore asserit:

℥. Cerum. aur. ℥ij.

*Sacch. Saturni ℥j.*

adde

*Olei anell. vel nuc. ingland. expr. q. l.*

M. S.

*Balsamus vulnerarius.*

Et si desideretur in forma paulò solidiori, tunc igne inspissa.

Moderni in usu habent balsamum quoddam Indicum, quod vocant balsamum de Capaibe, quod paucos ante annos nobis innotuit; de quo uti aliàs monui, quod expertum sit remedium ad gonorrhœam internè; ita mirabiliter sæpius intra vigintiquatuor horas vulnera recentia sanat, idque citra ullam suppurationem, & ferè sine insigniori cicatricis vestigio; id quod per primam intentionem vulnus curare appellat HELMONTIUS. Hic ipse HELMONTIUS aliàs præ cæteris commendat ad curam vulnerum vitriolacea, non tantummodò pulverem sympatheticum ex vitriolo Veneris ad solem calcinato, qui curat vulnera in distans, si cruor ex vulnere effluens, aut linteam cruore tinctum & madidum, hoc ipso certo modo imbuatur vel eius virtute imprægnetur, de quo vid. Dygby in Oratione. Sed vel maxime colcothar vitrioli probe elotum, sive inspersum sive dissolutum in liquore & infusum, nempe vino coctum, seu alia ratione applicatum, tanquam egregium commendat ad quemcunque vulnere corruptorem tollendum. Sic etiam pro Cura sympathetica Persicaria recens trahitur per aquam frigidam, postea loco contuso imponitur, donec nonnihil incalcescat: postea planta adhuc tepida sepelitur sub sinum vel alium locum, ut eilò putrescat; sic enim vulneratus citò convalescit. In gravioribus vulneribus usui eius repetendus est, & experimentum est haud contemnendum. Videatur PARACELSUS in Herbario, qui primus huius vires pro Cura magnetica eleganter scrutatus est, vocans eam Germ. Blut-Kraut, id est, Herbam sanguinis.

Aliàs quoad potiones vulnerarias, notanda est earundem varietas, ita ut pro partium vulneratarum ratione etiam delectus subinde habendus sit in simplicibus potionum vulnerariarum: v. g. ubi opus est, ut sordes macilaginose, pus, ossicula fracta & similia ex vulnere eiciantur, egregiè conducit in portione vulneraria sapicula, artemisia rubra, veronica, consolida saracenicæ, agrimonia, cuius succum RIVERIUS ad vulnera verminosa commendat; hederæ terrestris, chamæpitrys, pyrola, sabina, &c. Ex his parata potio fortificatur additione singulis haustibus spermatis ceti aut lapillorum cancerorum.

Præ cæteris autem sabina fortiter adjuvat excretionem heterogeneratorum ex vulneribus, scilicet eius p. i. cum partibus vi. ingredientium reliquorum, combinetur in potionibus vulnerariis, non omitendo pulverem lapillorum cancerorum præparatorum.

Et quidem potiones hæ, aut dicta vulneraria non usurpanda, nisi quando vitium est insignius in vulnere; subito enim atque vulnus probe mundatum denuò coire incipit, abstinendum est ab his potionibus vulnerariis successivè. Hinc etiam, quando propinantur potiones vulnerarias, non opus est tot unguenta & balsama applicare vulnere, quoniam



niam ipsa portio sponte succurrit naturæ in medendo vulnere.

Facit hoc imprimis, quod refert FORESTUS lib. 6. *Chirurgia Observ.* 17. scilicet de vulnere thoracis utramque partem perforante, quod nempe omnes, cum vulnera eius traquerent, persuasi fuerint, per vulnera aperta odorem decocti vulnerarii transfundere, & quasi roridum quid illius per vulnera transmitti; quod ipsum etiam aliquoties se observasse mihi affirmavit Patavii MARCHETTI Junior. Chirurgo-Medicus excellentissimus.

De Vulnerum Cura Magnetica videbitis in HELMONTIO, DIGBY in *Theatro sympathetico*, MAXVELLI *Medicina Magnetica*, & BARTHOLINO de *Transplantatione Morborum*.

Hac de Vulneribus in genere; pergo ad vulnera in specie: & quidem, quæ dicta sunt hætenus, omnibus vulneribus partium sanguinearum & nervicarum in genere, & speciatim quæ caesum & punctum inferuntur, optime applicari possunt.

## ARTICULUS I.

### DE

#### VULNERIBUS cum CONTUSIONE.

Inter Vulnera autem in specie considerationem subeunt primò *Vulnera cum contusione facta*, in quibus istud, quod contusum est, facile mortificatur, putrescit, & consolidationem vulneris impedit. Itaque in hoc casu istud, quod contusum est & mortificatum, separetur, & per turundas foras excernatur. Equidem *queritur*, an suppuratio expectanda sit? & an non potius pars scarificanda & profundius incidenda sit, & sanguis extrahendus secundum WURZIUM, quia sanguis tardius in pus mutatus in gangrenam abit? Respondeo cum distinctione: Contusio cum vulnere vel est levior, ut spes sit per suppurationem eam posse curari pedetentim; in tali casu sufficiunt *digestiva & suppurantia*: si verò cum vulnere graviore conjuncta sit contusio, & metus sit, ne gangrena superveniat ante suppurationem abscessus, præter vulneraria mox *scarificando* aut *incidendo* contusionis locus aperiendus erit, & sanguinis exitus promovendus; hinc *digestivis*, quod reliquum est, sub forma puris promovendum; digestivis tamen aliquid de *unguento Ægyptiaco* addendum est, ut præcaveatur gangrena.

Cum his etiam applicanda *externa* in specie in principio morbi corruptionem ulterius præcaventia: eminet *oleum cera* illitum, desuper imposito *emplastro de cumino*, seu illinatur *oleum hyperici* ex seminibus expressum, aut *oleum Philopborum*, imposito *emplastro de baccis lauri*:

Vel

℞. Rad. consol. mai. ʒiʒ.

Sigill. Salom. ʒi.

Coqu. in vino, vel solo, vel cum aqua misso, pro Fotu.

D. S.

Fotus externus.

℞. Rad. consol. mai.

Minor. an. ʒiij.

Herb. chamomill.

Melilot. an. ʒi.

Croci. ʒi.

Fasin. fabar. ʒi. vel ʒij.

Fennugraci ʒi. vel ʒiʒ.

Coqu. cum aqua, & in specie primò radices, addendo

Pulv. absinth.

Cumin. an. ʒʒ.

M. D. S.

Emplastrum externum.

Applicetur externè.

Hæc sedatà maximam partem contusione, pro reliquis tollendis convenit illitus spiritus salis ammoniaci cum calce viva destillatus.

## MEMBRUM UNICUM.

### DE

#### SCLOPETORUM VULNERIBUS.

Quod verò atinet *Sclopetorum Vulnera*, propter istam contusionem sunt omnium pessima, adeoque periculosa; cum in omni sclopetorum vulnere semper insignis contusio & partium dilaceratio conjuncta sit; nam globulus, quousque penetrat, omne secum contundendo, & dilacerando absumit.

Quæstio est: an etiam ardor adsit? vix probabile est, quod calor cum globo communicetur parti, nisi propius fuerit lesum patiens. In tali casu, si propius vulneratus adfuerit instrumento, tunc globulus intenso ardore seu calore fervens partem quasi nonnihil amburit. Dico qui propius adsunt: Nam qui sunt remotius, in his ardor & æstus à globulis quodammodo frigestis non ita sentitur, de quo vid. imprimis HORSTIUS in *Observ. lib. 1. de Casibus Chirurgicis*, ubi ventilat hanc controversiam, & aliquot habet observationes, quod reverà sclopetorum vulnera quoddam empyreuma habeant conjunctum, si propius fuerint infesta; impetus imprimis celerrimus globulorum cum actuali ignis contactu conjunctus necessariò introsum servorem concipit.

Hoc certum est, quod globi majores tormentorum bellicorum, si infixi hæreant in pariete, & brevi post attingantur, intensè calidi semper soleant percipi.

### CURA.

Ut ergo curentur sclopetorum vulnera (nam *Diagnosis* per se patet) præter internas *potiones vulnerarias* hic imprimis proficuas, & præter usum nitri, nunc solummodò depurati, nunc cum antimonio fixati; item præter usum pulveris pyril (qui ratione sulphuris, nitri, & carbonum tillis optime convenit) externè omne contusum in pus est maturandum; idque sit tardè: nam vulnera sclopetorum vix ante tertium vel quartum diem suppurari solent: ob id etiam sufficit, inter hoc tempus singulis 24. horis semel tantum deligentur.

Facta autem suppuratione, & inde nato abscessu, & eo, quod contusum est, sub forma puris separato, mundificantibus & incarnantibus debitis denuò vulnus est curandum, modò omne extraneum ex vulnere prius fuerit exemptum: Globi enim non semper extrahi possunt, & etiam toto remanere poterunt.

Jam ergo pro scopo *suppurationis substantia confusa*, optimum est, ut applicentur ante omnia *digestiva & maturantia* (de quibus, ubi de ulceribus) quibus semper spiritus vini, item balsamus Peruvianus in minori dosi, est addendus, ne hæc ipsa digestiva nervosis partibus noceant, ne labia vulneris confusa ad gangrenam ruant, cum & ipse spiritus vini in ambustionibus egregiè conducat: hinc turundæ, quibus illinuntur unguenta digestiva & suppurantia, optimo consilio prius immerguntur in vini spiritum, & deinceps digestivo illinuntur, præprimis etiam, quoniam sola digestiva partibus nervosis non semper equè conveniunt: propterea optime additur vini spiritus, qui omnem metuendam noxam corrigit: & quidem ita applicantur, ut utriusque puri pateat exitus.

Loco digestivi communis optime applicatur balsamum Paræi singulariter commendatum ad curam vulnerum sclopetis inflictorum, quod describitur à SENNERTO & BARBETTE. Descriptio est hæc:

℞. Olei lil. alb. vel violar. ℥iv.

In hoc coqu. catelli duo nuper nati ad osium usque dissolutionem:

postea adde

Lumbr. terrestr. in vino coct. ℥j.

Coqu. simul, & Colaturæ adde

Terebinth. Venet. ʒiij.

Spir. vini ʒiʒ.

M. f. Linimentum: S.

Unguentum leniens.

Quod egregiè conducit ad sedandum dolorem, & maturanda vulnera sclopetorum.

Applicantur hæc Digestiva cum turundis (imprimis hoc balsamo Paræi) i istis nunc una, si scilicet vulnus non penetrat,



netrat, nunc verò applicantur cum turunda duplici, si scilicet vulnus sit penetrans.

Ubi ergo per hæc & similia suppuratum est vulnus, & omne contusum separatum, applicandum est mundificativum sequens *Vigierii*, vel quodcunque aliud pro purulentis abscessibus & ulceribus detergendis:

24. *Terebinth. Venet.* 3v.

*Olei rosar.* 3j.

*Moll. rosar. col.* 3ij.

*Myrrha,*

*Aloes,*

*Mastich.*

*Rad. aristol. rot. an.* 3ss.

*Parin. hord.* 3ij. ad 3vj.

M. f. Linimentum:

Impregnandum & irrorandum nonnihil cum spiritu vini.

Hoc ipso mundificandum est vulnus suppuratum, donec sponte caro nova succrescat.

Quod si verò aut in suppuratione, aut subsequente mundificatione, putredo ac corruptio adsit insignior, in specie in loco non nimis nervoso, supra dictis remediis nonnihil de *Mercurio præcipitato*, quantum fieri potest, dulcificato commodè addi potest, idque imprimis, ubi partes nervosæ minus fuerint læsæ vel affectæ.

Interdum in sclopetorum vulneribus superveniunt dolores ossium in profundo, imprimis si vulnera non bene fuerint curata; in his singulare est oleum *terebinthina*, in specie si adsit suspicio fractionis vel fissuræ, quæ Germanis dicuntur *ein Kleck- oder Schlitze Bruch*; hoc enim oleum illitum mirè emollit & lenit partem consolidatam, & promovet in fissuris ossium, ut coeant, & si osculum est abscissum, huius separationem promovet, adeo ut quicquid præternaturale reliquum sit, extrudatur foras.

Sufficit hæc vulnere sclopetorum Curatio: placet tamen quibusdam Autoribus in prima horum vulnerum deligatione ad ardorem à globulo inductum corrigendum, linimentum ex cremore calcis vivæ cum melle mixto, ad imitationem *AGRICOLÆ* in *Chirurgia Parva*, applicare: quo tamen, ut antea monui, non semper opus est. Nempe

25. *Calcis vivæ* 3ij.

*Crem. lactis,*

*Mell. despum. an.* 3ss.

M. probe & cum turundis mollioribus applicetur vulneri, vix ultra tres vel quatuor horas tamen, relinquatur.

Hoc probe corrigit ardorem & empyreuma vulneris: postmodum aliàs usitata supra dicta erunt adhibenda. Vel

26. *Aqua calcis vivæ*, cui adde olei rosar. q. s.

Agita in mortario lapideo in Linimentum butyri forme.

D. S.

*Unguentum refrigerans.*

Loco huius quoque convenit ipsa aqua calcis vivæ cum succo cancerorum fluviatili cum phlegmate aluminois expresso.

## ARTICULUS II.

### DE

#### VULNERIBUS MALIGNIS & VENENATIS.

**P**ORRO inter Differentias Vulnerum etiam est, quod vulnus quoddam dicitur penetrans, aliud non; quod sit ratione instrumentorum: Fit namque interdum, ut præter lationem simpliciter inductam, ipsa causa lædens malignitate venenosa sit tincta, sive armis venenatis, sive morsu animalium iratorum aut venenosorum insignantur, unde etiam dantur vulnera maligna & venenata.

### DIAGNOSIS.

Morsu animalium vulnera insignita faciliè patent; semper enim suspicio est, in omni animalium morsu latere venenum.

Sed si arma, aut globuli, aut alia instrumenta veneno sine insignita, hoc ipsum à priori cognosci nequit. Cognoscitur autem ferè à posteriori, scilicet ex supervenientibus gravioribus symptomatibus, dum nempe partem vulneratam urget dolor atrocior, quàm naturaliter fieri potest; item si breui post lationem partis vulneratæ color nativus seu naturalis mutetur, & cæruleus, lividus ac nigrescens fiat, adeoque ipsa gangræna imminet; item si non tantum in parte vul-

nerata, sed in ipso toto corpore atrocia superveniant symptomata, in specie angustia præcordiorum, sudores symptomatatici, frigidi & glutinosi, syncope, ardores, cephalalgia horrenda, ac similia pessima symptomata.

### PROGNOSIS.

Vulnera hæc, sive ab animalibus venenosis, sive ab armis veneno tinctis, insignita fuerint, ut plurimum lethalem eventum habere solent, quorum venenositas consistit in hoc, quod idea furoris & rabiei corpori nostro communicetur.

### CURA.

Animalia ergo venenata si læserint, aut mordendo aut pungendo, observetur diversitas animalium lædentium, ut læsus locus nunc scarificatione, nunc sine scarificatione, appropriatis curetur. Scarificandum est, quando vulnus profundius, ac metus est, ne venenum, quod penitus immisum est, & elicere volumus, mediante sanguine ad cor deferatur: aut sine scarificatione, ubi minus virulentia communicatum fuerit. Theriaca sola cum spiritu vini applicata, item pulvis busonum, viperarum & scorpionum, decantata sunt remedia optima. Optimum remedium est buso in vulneribus venenatis malignis contuso & applicatus; uti & stercus humanum cum allii capitibus impositum, quod certum levamen affert. Conducit quoque succus cydoniorum recens instillatus, si vulnera venenata à telis insectis, v. g. à sclopetis, insignita fuerint. Sic in vesparum puncturis sufficit oleum scorpionum vetus, item emplastrum de ranis Vigonis cum Mercurio. In araneorum punctura allium & cepæ contusa, item folia salviæ: (vid. M. A. N. C. Ann. 8. obs. 35) commodè imponuntur.

Si Viperæ morderint, præmissa, uti dixi, scarificatione buso vivus contusus & applicatus optimè conducit: aut si delit vivus, in serpentum & viperarum morsu sufficit buso aridus, vel nudus, vel, quod melius, prius in aceto vel ulno maceratus, & applicatus, vel pulverisatus & inspersus: aut saltem ferrum probe candefactum prius loco morsuræ est applicandum, citra tamen ambustionem; nam hoc singulare est remedium curandi morsum viperæ, uti hoc propria experientia recenset *BOYLE* in *Philos. Experim.* Succus foliorum fraxini etiam commendatur, vulneri applicatus, & haustus urinæ.

Quod si verò Canes aliaue animalia rabiosa mordendo vulneraverint, optimum est applicare lapidem serpentinum, qui in serpentibus pileatis Indiæ Orientalis reperitur, aut etiam ex iisdem fabricatur: de quo præter experimenta alia imprimis videndus est *KIRCHERUS* in *Tr. Regn. Natur. Magneticum* inscripto: hic habet egregia aliquot experimenta de hoc lapide serpentino, vulnere animalium rabidorum applicato, & postmodum in lac deposita, qui in genere ad quæcunque vulnere ab animalibus venenatis insignita certo experimento conducit: vid. M. A. N. C. Ann. 4. & 5. Obs. 2. In huius defectu, cum sit rarus & carus, sufficit, ut morsui canis rabidi vel alius animalis post factam scarificationem, imponatur emplastrum magneticum *Angeli Sala*, cui pulvis cancerorum fluviatili, vel per se, vel calcinatorum, addi debet.

Quod si inflammationem vel dolorem inferre velit, illinitur locus vicinus oleo scorpionum cum paucis saccharo saturni.

Est aliàs hoc emplastrum magneticum catholicum ad quoscunque morsus animalium venenatorum, modò additione vel pulveris cancerorum, uti dixi, vel pulveris busonum, vel pulveris viperarum, pro varietate bestiarum lædentium, approprietur plagæ insignitæ. Communiter expertum remedium est cataplasma morsui canis vel alius animalis rabidi imponendum, paratum ex

*Cepæ acri,*

*Cap. allii an.* No. 1.

*Theriac. opt.*

*Ferm. vulg. an.* 3ss.

Quæ omnia inuicem pistata iussu cataplasmatia applicantur loco morsuræ.

His ita applicatis, correcto & elicto sic veneno, postmodum ipsum vulnusculum sæpius leve vel sponte, vel leni applicato balsamo vel digestivo, si in morsu contuso quædam facta sit, curari potest; cui digestivo semper aliquid unguenti *Egyptiaci*, vel communis, vel ab *HILDANO* correcti, addendum erit.

Inter-



Interne Interea non cessandum, sed appropriatis remediis, imprimis sale volatili & spiritu viperino, item spiritu & decocto cancrorum fluviatili, in rabiosis simul progressus veneni, ejusque activitas est cohibenda.

Quod si verò *venenatis armis inflatum sit vulnus*, tunc imprimis, ut extrahatur virulentia, opera danda est, applicando scilicet Cataplasma sequens:

*℞. Cepar. coll. ʒij.*

*Ster. capr. ʒi.*

*Theriac. ʒß.*

*Ol. scorpion. ʒß.*

*Mellis,*

*Cera an. q. s.*

*F. Emplastrum vel Cataplasma:*

Quod promptè elicit malignitatem ex vulnere venenato.

Vel etiam *Emplastr magnet. Angeli Sala* imponendum, cujus descriptio suprâ, ubi de Peste, & passim obvia: aut usurpandum est emplastrum singulariter expertum Guidonis, mirè commendatum à plurimis Autoribus ad corrigenda vulnera venenata: nempe

*℞. Galb.*

*Sagapen.*

*Opoponac.*

*Alsa sat.*

*Myrrhæ,*

*Piperis,*

*Sulphuris an. ʒß.*

*Sterc. Columb.*

*Anat. an. ʒij.*

*Calaminth.*

*Mentha an. ʒj.*

Dissolvantur gummata in vino, misceantur omnia cum oleo hyperici, & fiat emplastrum, imponendū vulnere venenato.

Interne appropriatis sudoriferis alexipharmacis, qualia sunt nota, in specie aceto destillato cum *theriaca* aut electuario dialcordii Fracastorii, tinctura bezoardica, spiritu theriacali camphorato, antimonio diaphoretico, & similibus antimonialibus fixis cum nitro præparatis, virulentia maturè est occurrendum. Elegans est observatio FORESTI, qui lib. 12. *Chirurgia Obs.* 10. refert, cum in bello Turcico plures vulnerati ex telis venenatis subito morerentur, supervenisse tandem Medicum senem, qui vulneribus poma cydonia, dentibus contrita, & ita salivâ ieiunâ permista, apposuit, nullis remediis antea juvantibus. Facit huc occasione cydoniorum, quod refert MINDERERUS in *Medic. Militari*, vinum seu succum cydoniorum sine saccharo optimum esse ad corrigendum empyreuma vulnorum sclopetis inflistorum.

Extracto veneno ex vulnere, vulnus ad sui consolidationem perducendum est.

### ARTICULUS III.

#### DE

#### VENARUM & ARTERIARUM VULNERIBUS.

Ceterum præter hæc vulnera imprimis consideranda sunt *Vulnera vasorum sanguiferorum*, nempe *Venarum & Arteriarum*, propter gravissimam supervenientem hæmorrhagiam, sæpius lethalem: minus quidem periculosam, si fuerit læsa vena; nam & facilius fistitur: magis periculosam, ubi arteria fuerit læsa; periculosum namque est malum. Er quidem vix erit vulnus, quod non habeat commitem hæmorrhagiam.

#### PROGNOSIS.

Imprimis tamen hæc est periculosa, ubi maiora læsa sunt vasa, adeoque primum, quod urget Chirurgum, est, ut hæmorrhagia nimia sedetur.

#### CURA.

Vulgò ad sanguinem sistendum utilissimus est *crepitus lupi*, fungus nempe iste hoc nomine insignitus, qui in specie probè exsiccatus & compressus, vasi læso applicatus arctè, ut ex sanguine eò magis turgescat, & turgescendo orificia vasorum læsa obturet, optimè sanguinis fluxum cohibet. Si hic solus non suffecerit, immergatur solutioni vi-

trioli Martis non adeò fortè. Ad hæc præter tallia conveniunt liquor stypticus modernorum, qui fit ex solutione vitrioli Martis, cui additur dimidium Aluminis soluti in decocto quodam vegetabili blando & adstringente, quæ frigida cum *bombace* vel *stuppis cannabinis* applicentur vulnere, sic cessat omnis fluxus. Vel, si *vulnera* fiant profunda, conveniens est, ut immittatur pulvis ex *lunæ lacte*, *bolo Armena*, & *capite mortuo vitrioli* probe eloto. Isti pulveres optimi sunt in sistenda nimia hæmorrhagia. Locus huius pulvis *Galeni* compositus ex *aloe*, *thure*, sanguine Draconis, & *bolo Armena* invicem missis, & *stuppis albumine ovi* madefactis inspersis & applicatis, interne confert ad sistendam hæmorrhagiam. Melius adhuc est, si *terra vitrioli dulcis*, nunc sola, nunc cum parum terræ sigillatæ mista, cum albumine ovi subacta, cum *stuppis* intrudatur vel applicetur arctè vasi læso; quin & tinctura sulphuris vitrioli cum stuppa applicata, in specie arteriæ, optimè confert. *Fuligo furni* cum albumine ovi subacta & applicata vulnere sistit hæmorrhagiam. Bursa pastoris contusa imponatur vulneribus recentibus pro sistendo sanguine: succus foliorum fraxini vulneribus infunditur, vel ipsa folia vulneribus illis & locis, per quæ hæmorrhagiæ contingunt, applicantur. Muscus quercinus pulverisatus, aut medulla sambuci pulverisata inspersa, etiam compescit hæmorrhagiam vulnere: quibus tamen longè præferenda est *usnea cranii humani vera*, quæ applicata infallibile est experimentum. Conducit etiam *stercus asinum recens*, aut pulverisatum, aut *succus* ex eodem expressus, aut cum sanguine effluente exsiccatum permixtus, si applicantur vulneris fundo. *Sperniola Crollii* in aqua spermatis ranarum soluta, in hæmorrhagia arteriæ ex inepta venæ sectione utilis est, & citra aneurisma curat. Linteum etiam *alumine & spermate ranarum* probe impregnatum, exsiccatum, atque iterum impregnatum, atque impositum vulnere, multum conducit ad hæmorrhagiam sistendam. Huc facit pulvis stypticus expertissimus ex alumine, & lacca pictoria, qui describitur in *M. A. N. C. Ann.* 1. obs. 24. pag. 86. *Ann.* 2. pag. 403. & *Ann.* 9. & 10. obs. 351. pag. 326.

In arteriarum puncturis minoribus applicata pilula ex laudano opiato, est experimentum ab HORSTIO recensitum lib. 9. obs. 12.

Denique quibusdam secretum est ad hæmorrhagiam venarum & arteriarum resecatarum, & quidem unum ex fortissimis:

*℞. Acet. vin. fortiss. ʒj.*

*Croci Martis ʒj.*

*Colcothar siue terra vitrioli dulc. ʒß.*

His probè invicem subactis madefiant vel lintea vel *stuppa*, conspergantur pulvere lumbricorum terrestrum: hæc enim ita applicata sanguinem sistere dicuntur.

De pulvere sympathetico & similibus, tanquam vulgò notis, nihil addo.

Quod si his nequeat compesci hæmorrhagia, ligatura interdum vasorum applicanda est, imprimis quidem in membris abscissis, cæteroquin autem locum non habet. In aliis locis, sicuti etiam in membris abscissis, sunt qui cauteria admovent, nunc actualia, nunc potentialia, in specie vitriolacea, uti de aneurismate monui. Actualia sunt periculosissima propter gravia supervenientia symptoma, item quoniam decidente crustâ seu escharâ nihilominus sæpius nova supervenit hæmorrhagia. Tutiora sunt caustica potentialia; non quidem spiritus acidi, qui pessimi; sed, si quid tentandum per caustica, convenit vitriolum ab albedinem calcinatum, vel cum *bombace* applicatum, vel cum crepitu lupi permixtum, & ita loco sanguinem ploranti impositum, modò, quod sedulo cavendum, non pateat nervus vel tendo insignior in vulnere, ad quem scilicet vis vitrioli corrosiva perveniat, & ita periculosissima symptomata inducat.

De remediis Internis pauca monenda sunt, quia hoc loco non adeò conveniunt. Interim tamen, quia observatur quotidie, quod vel iracundia ægri, vel ebrietas, vel incalascencia à vino, &c. agitent massam sanguineam, & hæmorrhagiam atrociorē reddant, hinc pro sanguinis impetu compescendo nitrum & omnia nitrata, item omnia stercora, ex porco vel alino desumpta, sunt optima; hinc nitrum antimoniatum, tinctura sulphuris vitrioli, mixtura acidula cum tinctura antiseptica seu saturni composita, tinctura Martis adstringens, & similia aliis nota. Observando, ut affectus graviores, imprimis iræ, hinc amoris, sedulo vitentur.



utentur: item quodcunque corporis exercitium, uti etiam paroxysmi morboſi, ſub quibus interdum recrudescunt hæmorrhagiæ, ſtudioſe præcavendi.

# ARTICVLVS IV.

## D E

### NERVORUM VULNERIBUS.

**P**ost vaſorum vulnera, vulnera nervorum imprimis, & partium nervoſarum læſiones, cauſiſſimè ſunt tractandæ.

1. Propter dolorem inflammatorium & convulſiones, quæ ſæpiſſimè ſuperveniunt læſionibus nervorum.
2. Propter facilem partium nervoſarum alterationem ab aere externo, hinc corruptionem ac gangrenam.
3. Propter ſynoviz fluxum, qui ſæpiſſimè vulnerum conſolidationem impedit, & periculoſam partis atrophiam, interdum totius corporis tabem, poſſe trahit.

## PROGNOSIS.

Vulnera hæc ſunt periculoſiſſima, ut etiam punctura inſectorum adeo ſit periculoſa, quia ut plurimum læditur nervus ac tendo.

## C U R A.

In genere ergo, ubi in parte quadam vulnerata nervus ſimul vel partes nervoſæ ſentiliores fuerint læſæ, totum membrum uſque ad principium nervorum, ad membrum derivatorium, inungendum eſt oleo lumbricorum, acuto cum oleo deſtillato lavendulæ; nam & hoc interne convulſiones partium nervoſarum læſarum curat: aut cum oleo ſalviæ, aut ſucciſi, aut ſimilibus. Item optimum eſt, ſi inungatur membrum ſequenti unguento:

℞. Olei lumbricor.

Vulpin.

Axung. hum. vel viperar. an. ℥i.

Succ. lumbr. ℥i.

M. probe & illinantur membro.

Cataplaſma etiam ex radice conſolidæ majoris, & ſigilli Salomonis cum vino & aqua coctis convenit.

Vel

℞. Fol. beton. rec. p. l.

Rad. ſymph. rec. p. ℥i.

Contuſa applica in forma cataplaſmatis.

Vel ſi recens haberi nequit, ſymphytum pulveriſatum cum vino calido in cataplaſma redigatur & apponatur.

In ſpecie nervi læſi ac partibus nervoſis omnia unctuosa, omnia nimis mucilaginosa, & expreſſa oleoſa aut pingua, ſunt admodum nociva; ſæpe enim dolores, gangrenæ & inflammationes inducunt, inde etiam oriuntur vermiculi innumeri. Quin potius volatiliora paulò penetrantiora, & quæ vulgò dicuntur calidiora, uſurpanda: quæ ratione, baſamus Peruvianus, oleum ceræ, oleum deſtillatum lavendulæ, oleum Philoſophorum, oleum lauri deſtillatum, ſucciſi, quod vocatur Baſamum Europæum ſeu ſacratum, miſtum cum terebinthina & ſaccharo ſaturni, baſamum hyperici, ſpiritus vini, gummi elemi, tacamahacæ & carannæ, imprimis conducunt. Hinc elegans eſt miſtura Wurzi:

℞. Ungu. di. Alth. ℥iv.

Ol. deſtill. lauri ℥iſſ.

Succini ℥iſſ.

Quæ miſta convenienter vulneri, ubi nervus eſt punctum læſus, poſſunt applicari.

Si verò Nervus per tranſverſum laſus ſit, vel tendo, vel ligamentum, inter remedia uſitata ſemper ſimul dicta baſama vulneraria accendenda ſunt cum aliquot guttis olei deſtillati culculidam. Præ cæteris ſolum terebinthina, ſalvia, ſucciſi, &c. conveniunt. Specialiſſimè lumbricalla optima læſorum nervorum conſolidandorum ſunt ſolamina, quæ ratione Oleum hyperici Carpi compoſitum optime conſert:

℞. Summ. hyperic. flor. M. ii.

Ol. com. ℥v.

Hæc probe invicem digerit, poſtea addit

Terebinth. ℥iſſ.

Verm. terreſt. pulveriſat. ℥iſſ.

Croci parum.

M. pro Linimento, nervis, tendinibus, aut ſimilibus partibus vulneratis, aut punctum aut caſum convenientiſſimo. Vel

℞. Lumbr. terr. q. ſ.

Exſicca blandè & pulveriſa.

Vel pulveriſatos lumbricos latos contritis miſc. cum terebinthina, quo per 24. horas ſupra vulnus poſito illud ſanatur; vel ſine terebinthina pulvis inſpergatur venis vel tendinibus diſſectis denuò conſolidandis.

Nobile eſt remedium CNOEFFELII, aliàs uſitatum ad nervos per tranſverſum inſectos:

℞. Exuvias ſerpentum, quas ſpontè deponunt,

Lapill. cancr. præp. an. part. æqual.

Invicem miſta pulveriſantur.

Qui pulvis nervis læſis inſperſus mirè convenit pro eorumdem unione.

Et quidem periculoſius eſt, ſi pungantur nervi, quam tranſverſim diſſecentur, propter doloris ac convulſionis metum, ut etiam punctura inſectorum adeo ſit periculoſa, quia ut plurimum læditur nervus aut tendo. In tali caſu, in nervo punctum læſo, (quod etiam locum habet in inepta venæ ſectione, quando tendo pertunditur) nil melius eſt, quam immittere, inſillare, aut illinire oleum deſtillatum terebinthina: Vid. SYLVIVS in Praxi lib. 1. cap. 42. §. 18. & lib. 2. cap. 23. §. 80. ſeqq. item SCULTETUS in Obſervationib. Chirurg. Obſervatione 64. Loco hujus etiam oleum ceræ adhiberi poſſet vulneribus.

℞. Ol. deſtill. Terebinth. ℥i.

Spiritus vini ℥i.

Camph. vel Euphorb. ℥ß.

Miſc.

Inſilletur vulneri aut ulcuſculo, in quo nervus punctum læſus fuit. Experimentum eſt PARÆI lib. 9. cap. 38.

Aliàs aurium cerumina ſunt ſpecificum Helmontii contra nervorum puncturas; ſicuti GALENUS uſurpavit Euphorbium, quod & hoc tempore adhuc ad nervos punctum læſos ex inepta venæ ſectione eſt optimum, ſi ſcilicet fiat unguentum ſequens:

℞. Euphorb. ℥i.

Terebinth. ℥ß.

Ceræ parum.

Quæ miſta extendantur ſuper linteam, & applicentur per quàm calidè, ubi nervus per venæ ſectionem fuerit læſus: id quod non tantummodo eſt experimentum SCULTETI in obſ. 64. ſed præterea HELIDÆI PADUANI in Obſerv. pag. 310.

Quæ nervorum, eadem & tendinum, eſt ratio: punctum ſcilicet aut non ex toto diſſecti dolorem acerbum & convulſivum minantur; per tranſverſum autem diſſecti morum, ſicuti nervi ſenſum & motum ſimul, perire ſolent.

Hoc ne fiat, ſi hæcenus dicta non ſufficiant, Moderni per ſuturas conjungunt tendines diſſectos. Res primà fronte videtur paradoxa & periculoſa, ſi ſcilicet punctura tendinis minatur convulſionem, quomodo poſſint acubus conſui? Nihilominus huius experimentum factum eſſe Pariſiſ ipſe obſervavi, cum cuidam juveni in carpo manus omnes tendines per tranſverſum erant diſſecti: Hinc Chirurgus per acum valde latam, ſed admodum ſubtilem, intra fibras, ex quibus conſtant tendines, tam artiſticiſſè intruſam, denuò per ſubſequent ſilum conſuebat, & hinc baſamo vulnerario efficaci vulnus & ſuturas illinebat; ſic enim poſtmodum brevi conſolidabantur iterum tendines, & diſſecti denuò uniebantur, extra hoc, ut motum digitorum perderet eger.

Cura eſt mira, & à nemine adhuc notata. Hoc tamen poſt curam ſuperveniit incommodi, ut toties, quoties tempeſtatum mutationes ingruerent, eger in loco antiqui vulneris perciperet dolorem quodammodo ſimilem podagræ. Poſtmodum etiam inveni huiusmodi ſuturam tendinum per ſilum in VESLINGIO, nempe in eius Epistol. & obſerv. à BARTHOLINO editis p. m. 90. & 91.

Aliàs tendines, ligamenta, & per conſequens articuloſum vulnera, uti hæc ſunt frequentiſſima, per Baſama vulneraria apparenter calidiora debent curari, omiſſis imprimis, niſi ſumma urgeat neceſſitas, turundis, utpote à quibus



quibus propter dolorem spinæ exasperantur partium nervosarum & articulorum vulnera.

## ARTICULUS V.

## DE

## PECTORIS VULNERIBUS.

**Q**uædam etiam monenda sunt de *Vulneribus pectoris & capitis*.

In *Vulneribus pectus penetrantibus, vel pulmones lacerantibus*, sanabilibus, observandum est:

I. Ut semper habeatur respectus & metus pleuritidis imminens & peripneumoniæ; unde internis remediis, hos affectus curantibus, tam præservativè, quàm curativè, semper insistendum est.

II. Quod etiam in his vulneribus subinde necesse sit, ut applicentur *thyrunda*, ut sanguini & saniei pateat liberior exitus, ne superveniat *empyema*. Hæ turundæ parandæ sunt, ut habeant extrinsecus ansulas, ne possint intrudi, unde etiam applicandæ sunt sub expiratione.

III. Observandum etiam, quod in hisce partibus vulneratis semper sint eligenda talia remedia, quæ simul habeant vim *diuresicam*, aut potionibus vulneratis *diuretica* addenda sunt: observatum enim est, quod optimè, subinde spontè, subinde arte, in vulneribus pectoris tam sanguinis grumi, quàm pus & sanies, evacuata sint à natura *per copiosum urina fluxum*. Propterea hic videat Medicus opus naturæ.

IV. Quod ea vulnera, quæ inferiores costas penetrant, infra septimam costam, sint simpliciter *vulnera abdominis*, non *pectoris*, quia non penetrant diaphragma: unde etiam nullum signum læsi pectoris ex respiratione læsa potest haberi; sed potius *abdominis pathemata* investiganda erunt.

## ARTICULUS VI.

## DE

## CAPITIS VULNERIBUS.

**Q**uod attinet *Capitis vulnera*, de his paucis. Qui plura cupit, adeat limatissimum scriptum PETRI PAW, *Anatomici succenturiati*, quod est *Commentar. in Hippocr. de Vulner. capitis*; item MARCHETTUM in *obs. Chirur.* rarissimis & curiosis, & SCULTETUM in *Armat. Chirurg.*

*Vulnera Capiti inflata* sunt vel *casim* vel *contusim*. *Vulnera capitis casim* inflata lacerant vel saltem partes extimas supra cranium, vel simul cranium, ut tamen non penetrent univèrsum, vel dividunt etiam cranium & meninges, vel etiam ipsum cerebrum,

## CURA.

In omnibus capitis affectibus *alvus sit aperta*. In specie, verò, si *vulnera* saltem sint *superficialia*, facillimè curantur vel cum betonica contusa & succulenta imposita, vel oleo *hyperici*, vel *balsamo Peruviano*, vel alio quodam vulnerario imponendo desuper *emplastrum de betonica malaxatum cum balsamo Peruviano*, vel *simpliciter*, vel *emplastrum* sequens:

℞. Empl. de beton.  
Gumm. Tacamahac. an. q. f.  
Malax. cum Bals. Peruviano.  
D. S.

*Emplastrum cephalicum.*

Sicut & sola hæc ingredientia seorsim sufficiunt.

Loco hujus sit *emplastrum de gummi hedera Alexandri Benediæ*: Videatur HENRICUS ab HEER. Vel *emplastrum* sequens *Arcei* contra vulnerationes capitis:

℞. Gummi elemi ʒij.  
Terebinth. ʒij.  
Axung. porcin.

Human. an. ʒj.

M. f. Emplastrum molle.

Sin verò *vulnus cranium lacerat*, non tamen penitus perforat, necesse est, ut habeatur ratio cranii læsi, & sic inspergatur capio pulvis ex radice iridis, aloë, myrrha, cum

*spiritu vini imprægnatus*; vel pulvis ex bolo Armena, Iræda Florentina, Aristolochia rotunda, & similibus, tantillo olei destillati terebinthina imprægnatus. Hic cranio læso inspergantur, ut impediatur ejus corruptio aut caries; desuper verò imponentur filamenta sicca. Cavemus etiam in cranio læso à quocunque unctuofo, aut viscido, aut pingui; disponit enim cranium ad cariem. Si vulnera autem penetrant, & cranium divisum, & meninges læsæ, necesse est, ut *hemorrhagia interna* maturè sistatur; quod fit pulvere Galeni ex aloë, thure, & albumine ovi conquisato: quibus parum boli Armena addendum. Hemorrhagia sedata sufficiens est natura; cuius opus ut adjuvemus, immittatur intra cranium linteola, imprægnata tantillo olei ex terebinthina, vel balsami Peruviani, vel de capibe, ut quasi odore tenus afficiatur cerebrum ejusque membranae, & disponantur melius ad consolidationem. Ipsi cranio læso supra dicti pulveres applicentur & foveatur lintels siccis: *Vulnera* verò curantur externè per *balsamum vulnerarium*. In usu est, ut cerebro læso applicetur *oleum rosarum*, sed male, quia talia membranam lacerant. Mel etiam applicatur, sed convenit saltem, ubi cerebrum corrumpitur, & membranae incipiunt putrescere, tunc mel imprægnandum est aliquot guttis olei destillati terebinthina, aliàs nocet.

*Vulnera contusim* facta sunt vel *superficialia*, vel *graviora*. *Superficialia* parum habent in recessu. Illinitur loco contuso *oleum hyperici* imprægnatum cum oleo destillato anisi. Si verò sint *graviora*, ut magnus tumor immineat, considerandum est, an spes sit insensibiliter posse discedi? si hoc est, fiat: si non, aperiatur in principio, quod observandum, ut contusio suppurata quantocyus aperiatur, ne pus ex retentione acris factum pericranium & cranium erodat, & cariosum reddere incipiat. Si verò *contusio* fuerit *gravior*, est vel sine vulnere, & tunc modo dicto curetur; vel cum vulnere, & tunc est vel sine cranii lésione, vel cum lésione. *Contusio gravior cum vulnere sine cranii lésione* curatur more reliquorum vulnerum contusorum, nempe *digestivis & suppurantibus*: pro quocasu præ reliquis commendatur *gummi elemi*, aut *unguentum Arcei* sequens:

℞. Terebinth. clar.  
Gumm. elemi an. ʒij.  
Pingu. Castoris ʒij.  
Porci antiqu. ʒj.  
M. f. Unguentum.

Convenit etiam *gummi elemi* cum terebinthina mistum in forma emplastri in cranii vulneribus.

Si verò *cranium simul fuerit laceratum*, huius lésiones admodum sunt variae: nam interdum fit, ut cranium ex contusione deprimatur, & nunc cum, nunc sine fractura; sine fractura in capite infantum, quorum ossa sunt mollia, & possunt cedere; cum fractura in adultis, quorum durius cranium.

Porrò *gravior contusio capitis*, quæ cranium lacerat, istud interdum findit, vel in loco contuso, vel in loco opposito, quod vocatur *contrafractura*. Fissura nunc penetrat utramque laminam, nunc externam illam internam, nunc internam, externam sanam. Hic observandum, ut cognoscatur *Depressio Cranii*, & *Fissura*. Signa desumuntur

1. Ex symptomatibus.
2. Ex causis lædentibus.
3. Ex ipsis sensibus.

I. *Symptomata* sunt multiplicia; in specie vomitus biliosi, vertigo, sanguinis per os, nares, aures, & simil. effluxus, subitanea obtumescencia, & brevi superveniens delirium, convulsiones, paralysis. Symptomata hæc superveniunt nunc mox in principio, ubi gravior fuerit læsio, nunc quarto, vel septimodie, ubi levior. Origo horum symptomatum est, quod festuca pungat cerebri membranas, vel quod sanies destillet in membranas cerebri, & acrior facta easdem vellicet, vel sanguis grumofus intra cranium ex insistent meningibus collectus, inferat hæc symptomata.

II. Suspicio etiam desumitur à majoribus instrumentis.

III. Visus ipse. Præter apertionem cranii, nempe præter specillum & ocularem inspectionem, ad fissuras cognoscendas est experimentum *Cataplasma ex farina fabarum* capiti raso applicatum: hoc, ubi non sunt fracturae, exsiccat; secundum ductum verò fissuræ non exsiccat: Vid. BORELLUS Cent. 2. Observat. 10. Ubi de fissuris inscit sunt Chirurghi, jubent, ut agri accipiant funiculum, firmiter teneant inter maxillas, quem fortiter Chirurgus post se trahat;



trahat; si ita æger habeat fissuram in cranio, in loco fissio percipit dolorem: quod etiam fit, si foriter contineat mandibulas, aut nucleum cerasi frangat; quod si fissura adfit, in loco quodam dolorem insigniorem percipiunt. Quo in casu ut plurimum necesse est, ut *perforetur cranium*, ut sanguini effuso & sanies pateat exitus, ubi etiam *festuca*, si quæ sint, removeantur & tollantur. Unum adhuc observandum, quod observavit GLANDORPIUS in speculo Chirurg. Observ. 4. Nempe fieri interdum, ut in graviore capitis contusione & læsione, ex sanguine collecto intra meninges, etiam integras, generetur pus, quod graviora inferat symptomata; ubi aperiendum cranium, & dura mater scalpello, ut sanies educatur. Ad hæc observandum, quod nempe vulnera interdum capitis simplicia post quartum vel septimum diem contrahant dolores, hinc rigorem & febrim. Hæc si superveniant in graviore capitis læsione & contusione, suspicio est fracturæ cranii & fissuræ, adeoque necessum est, ut cranium aperiatur trepano: si non appareant, non statim debent perforari, quia dicta symptomata etiam interdum ex alia causa superveniunt. Nisi ergo adsint alia symptomata, quæ cranii fracti vel fissi suspicionem inferant, non statim ad trepanationem accedendum est. Præcipitur etiam, ut in trepanatione vitetur musculus temporalis: interdum tamen quidam Chirurghi etiam hunc musculum per transversum secant; vid. RIVERRIUS Observ. Communicat. & BORELLUS Cent. 2. Obs. 20.

## ARTICULUS VII.

### DE

## VULNERUM SYMPTOMATIS.

**C**irca vulnera subinde urgent quædam symptomata, quæ specialem merentur considerationem. Hæc sunt vel generalia, vel specialia. Ista sunt, quæ vulneribus quibuscunque solent evenire: Hæc verò, quæ saltem superveniunt vulneribus in hac vel illa persona, idque ex peculiari conditione ægri, qualia sunt v.g. quæ superveniunt viro vulnerato, cui hæmorrhoides suppressæ sunt. In his casibus causis symptomatum prospiciendum est, fluxus tamen promovendus, non tam internis, quàm externis. Interna quidem humoribus motum largiuntur, sed, ut omnis impetus transferatur in locum læsum, & sic exasperentur symptomata.

## MEMBRUM I.

### DE

## VULNERUM INFLAMMATIONE.

**I**nter symptomata ergo est *Inflammati*o, quam præ reliquis sistit aqua calcis vivæ, vel crudè applicata, vel cum saccharo saturni aut cerussæ imprægnata: Hæc enim Epithematis instar crebrius applicata inflammationem solent sistere: Item imprægnetur cum camphora, & erit eo magis efficax. Hinc remedia cancrina, aqua nempe cancrorum putrefactorum nonnihil destillata, applicata vulneri & inflammationem sistit, & sanguinis fluxum in vulneribus articulorum & partium nervosarum solet præcavere & sistere. Cancri fluxuatiiles etiam contusi fundunt succum, qui expressus, & cum multiplicatis linteis applicatus, est conveniens. Interne convenit succus plantaginis, qui etiam externe non inelegans est.

Vel

24. Lapill. cancr. præp. ʒi.

Mum. parib.

Sangu. hirc. Ritè collect. an. ʒß.

M. f. Pulvis: divide in partes æquales:

D. S.

Refrigerans pulvis vulnerarius.



## MEMBRUM II.

### DE

## VULNERUM ERYSIPELATE.

**S**i Erysipelas affligit vulnera, illinatur erysipelas cum spiritu vini, in quo dissoluta sit theriaca, & additum parum salis absinthii; vel inspergantur pulveres erysipellacci ex floribus sambuci, creta, farina, cerussa, & similibus, qui, loco prius cum spiritu vini probe illito, inspergantur.

## MEMBRUM III.

### DE

## CARNI IN VULNERIBUS LUXURIANTE.

**S**i in vulnere consolidatione observatur Caro luxurians, Germ. wild Fleisch, (quod fit imprimis ex ignorantia Chirurghi,) non debitis epuloticis curandum vulnus; rursus enim fibræ aut stamina nervea laxata partem reddunt spongiosam, unde pars ista recrescit. Curatur autem adspersione alumen usum, vel crocum metallorum, aut illinat carnem luxuriantem cum unguento Egyptiaco. Præ reliquis conveniunt aquæ virides, inter quas excellunt aquæ viridis Plateri, Hartmanni, & Barbette. Instar omnium sit lapis infernalis seu pulvis crystallorum lunæ in aqua forti solutus: nempe ex lona purissima, spiritu nitri soluta, & denuò coagulata, sunt crystalli, & ex his pulvis, qui adpersus huic carni, illam exedit statim: unde postmodum applicetur emplastrum epulosicum seu cicatrizans.

## MEMBRUM IV.

### DE

## VULNERUM DOLORIBUS.

**I**nterdum Dolores graves urgent egrum vulneratum, qui varii sunt: quidam tertio aut quarto die superveniunt, quando vulnus incepit suppurrari: Dolor verò præternaturalis & intensus, quando supervenit partibus nervosis, aut circa articulos læsis, item dolor, qui supervenit cum quadam tensione, quæ tensio sunt incipientes spasmi partium nervosarum & tendinosarum. Hos dolores, præter interna blanda opiata, imprimis sistunt externa, & cum proprii sint partibus nerveis, olea nervina conveniunt: Quapropter

24. Olei lumbr. terr. ʒiv.

Destill. lavend. vel bacc. Lauri ʒiß.

Succini ʒß.

M. f. Oleum balsamicum:

D. S.

Oleum leniens.

Quo illinatur pars dolens.

Vel cum unguento dialthææ, imprægnato balsamo Peruviano, & additis aliquot guttis olei destillati lavendulæ seu spicæ.

## MEMBRUM V.

### DE

## SYNOVIA.

**L**ocutus sum supra de Synovia, seu fluxu aquæ articulorum ex vulneribus articulorum, Germ. wenn das Gled-Wasser fließet. Hoc ipsum est nihil aliud, quàm fluxus nutrimenti nervosarum partium albicans, acrescit successu temporis, & est in partibus nervosis obvia potissimum.

## PROGNOSIS.

Periculosum & fere funestum est symptoma, & subinde partium atrophiam relinquit.



## C U R A.

## • Ut compescatur:

24 Pulv. testar. ostr. ℥i.  
Cicon. calcin. vel lap. calamin.  
Offis sepiæ,  
Maxill. lucii pisc. calc. an. ℥ij.  
Spodii præp.  
Terra sigillat. vel alum. an. ℥ij.  
M. f. Pulvis.

Qui inspergatur vulneri synoviam ploranti; sic namque cito evanescit synovia.

Chirurgus quidam recepit usneam cranij humani & laccam pictorum ana; aut in defectu usneæ pulverem ex ipsis ossibus humanis seu calvariarum, linteum concepto vulneribus applicare solebat, & pro summo habuit secreto: vid. M. A. N. C. Ann. 2. obs. 53. pag. 104. Optimum quoque est Unguentum fuscum Wurzii. Quia tamen præparatio est laboriosa, & propterea difficulter potest parari, recipiatur loco ejus vitrioli roties calcinati simpliciter terra vitrioli dulcis, speciatim ex vitriolo Martis, & dicto modo cum hoc procedatur, atque vult Autor; Nempe immittatur in acetum quoddam vulnerarium, & ita addatur mel, flores aris, sicque porro misceantur. Vel recipiatur Unguentum Egyptiacum simplex, & addatur terra vitrioli dulcis, in aceto dicto permixtum, quantum postulat ingredientium proportio: quod potest esse loco unguentij fusci Wurzii, & unguentij Egyptiaci magistralis compo-  
siti.

Aliud singulare experimentum est, si stercus porcinum cum sanguine vulneris invicem mistum coquatur, & ita vulneri applicetur instar cataplasmati; hoc enim compescit synoviam. Quin & linteum sanguine primo menstruo virginis tinctum, sive humidum sive siccum applicatum, certissimum habetur remedium ad compescendam synoviam. Polychrestum est, si destilletur aqua ex canceris fluviatilibus contusis: hæc enim cum linteis duplicatis imposita, non tantummodo synoviam sistit, sed præterea omnes inflammationes, erysipelata, dolores, &c. partium vulneratarum. NB. Canceri fluviatiles multum profunt in casibus Chirurgicis.

## M E M B R U M V I

## D E

PARTIUM VULNERATARUM  
CONVULSIONE.

**T**andem, si superveniat Convulsio partibus vulneratis, magnum imminet periculum agro, ne inter hæc epilepsia superveniens eum interimat.

## C A U S A.

Causa semper est in parte læsa.

## C U R A.

Præter interna spasmis resistencia, & in specie specifica, cephalica, succinata, & salia volatilia ex regno animali, externè investiganda est causa: & si adest punctura, læsio curatur, ut supra dictum; si incisio nervi, non tamen perfecta, necesse est, ut per transversum discindatur nervus aut tendo; melius est enim, partem sensu privare, quam

ægrum vitæ. Conveniunt Linimenta hoc in casu ex balsamo Peruviano, quibus oleum destillatum succini & similia addenda sunt.

## M E M B R U M V I I

## D E

PARTIUM VULNERATARUM  
ATROPHIA.

**P**ost vulnera articularum & nervorum ordinariè supervenire solet Atrophia, de qua suo loco actum: vid. WURZIUS, & excellit ejusdem arcanum aluminis ex alumine plumoso.

## M E M B R U M V I I I.

## D E

## FEBRIBUS VULNERARIIS.

**Q**uod si verò fiat, ut vulneribus jungantur Febres, pro varietate febrium res majoris vel minoris est periculi; si febris hæc symptomatica sit ex nimia sanguinis commotione in vulnerato, ex iracundia, terrore, &c. aut si febris ex generatione puris in vulnere, quod die quarto, septimo, nono fit; aut ex inflammatione, superveniente vulnere.

## D I A G N O S I S.

Tales febres præcedere solet sensus ardoris in vulneribus, oculorum rubedo, phlogoses & dolores insoliti in vulneribus.

## P R O G N O S I S.

Facile curantur, imò interdum vel spontè evanescunt. Verò si sint continuæ, aut si ex læsa sanguinis crasi superveniant, periculosæ sunt admodum, & quæ non parum curam vulneris remorantur, quin subinde vulnus ipsum asperius reddunt.

## C U R A.

Hæ ipsæ febres optimè curantur remediis acidum in vulneribus peccans, & sanguinem inficiens, absorbentibus & corrigentibus: propterea primatum obtinent blanda diaphoretica, si scilicet propinetur ℥j. antimonij diaphoretici in aqua fumariz, vel convenienti mistura, cum spiritu theriacali camphorato, & lapillis cancerorum præparatis in vino vel aceto destillato propinatis; vel corallia, & magisterium coralliorum cum succo citri, sal ammoniacum & spiritus salis ammoniaci cum debitis Mixturis Vulnerariis.

Si ardor & sitis nimis urgeant, ad nitrum accedendum est, & sumatur vel nitrum purum, vel nitrum antimoniatum, & similia convenienter in his febribus conducunt, quæ etiam lulæpis possunt addi: vel fiat Julebus ex aqua fontana, cui syrupus ribium & berberum additus fuit, addito parum de spiritu nitri dulci. Continuentur simul vel cancrina, vel antimonialia fixa; nam blandus sudor optimum est harum febrium remedium, observando simul alia tunc temporis appropriata. Hæc omnibus Vulneribus partium externarum, & mutatis mutandis internarum, applicari possunt.





# CAPUT III.

## DE VLCERIBVS IN GENERE.

**P** Ego jam ad *Ulceras*, seu tertium Objectum, circa quod versator Chirurgus Medicus.

*Ulceris* nomine venire solet *solutio unitatis*, facta ab *acredine corrodente* & *absumente substantiam partem*, molli pariter ac dura; & si huiusmodi exesio & corrosio sit solum in parte molli, dicitur proprie *ulcus*; si vero sit in parte dura, dicitur *caries*, ossibus propria.

### CAUSÆ.

*Corrodens hoc in Ulceribus est acre acidum*, quod instat fermenti corruptivi, nunc simul corrosivi, nunc virulenti, &c. labiis vulneris ejusque parietibus affixum, pervertit omne alimentum partis proprium, illudque in excrementum acre & liquamen fordidum immutat, seu in saniem, cujus mitior species est pus; illudque acidum simul fibras & carnosas substantias partis sensim sensimque rodit, absumit, & depascit in abscessibus, post inflammationes imprimis oriundis, vel ex aliis causis natis, qui sunt ulcera inchoata, & in vulneribus, quæ facili in ulcera degenerant. Hoc per se patet: In his enim alimentum partis corruptum acescit, & labiis vulneris adhærens, alimentum balsamicum pervertit & corrumpit, unde tandem aciditatis incrementum, & ulceris augmentum.

Acidum hoc confirmatur ulterius ex eo, quod *emplastra ulceribus admodum*, nisi interdum proprius medicamenti odor vel sapor puris prævaleat, si removeantur, subinde acidum spirent subtile; (quod aliquoties observavi in nosocomiis Paduæ & Parisiis;) & quod corrosio dolorosa, quæ etiam ossa absumit & exedit, vix nisi per acorem commodè explicari possit, cum alcalia caustica non tam corrosionem quam mortificationem seu omnimodam putredinem cum partis nigredine & corruptione inducant. Unde etiam *metallica*, *Saturnina*, aut *Mercurialia*, *Veneræ*, *Caput mortuum vitrioli* & similia, promptè acida aut edulcorantia aut absorbentia, & *vegetabilia vulneraria* etiam aciora, *vi alcalina prædita*, acidum corrigentia & in salsum transmutantia, ulcera optime curant.

*Acidum hoc corrosivum, Ulceris causa, oritur vel*

I. *Ab alimento partis proximo corrupto & degenerante*, cujus corruptionis inseparabilis comes est aciditas, uti sit in vulneribus, quæ semper degenerant in ulcera, nisi maturè curentur, in contusionibus, in ambustionibus, in ipsis ulceribus contagiosis, & externis corrosivis admotis, &c. Hinc enim v.g. lues Veneræ seu Gallica, aut scabies per contactum externum manus, est contagiosa, quibus contagia, per contactum manus sanæ adhærentia; in hac alimentum proximum pervertunt, vitiant, & ipsi acorem vitiosum imprimunt, unde per consequens ulcuscula leviora in scabie, aut majora periculosiora in lue Veneræ, & similibus ulceribus contagiosis piuribus, oriuntur.

II. *Oritur acidum ulcerum ab aciditate peregrina*, quæcunque de causa in sanguine aut lymphâ oborta, quæ aciditas cum subiecta materia in parte quadam, quæcunque ex causa, sæpius ex paulatina congestione delixa, alimentum partis proximum pervertit, partem corrodere, & ita abscessum ac ulcus inferre solet: Manifestum hoc est in ulceribus spontè natis, in *scorbuticis*, in *cachecticis*, in lue Veneræ laborantibus, & similibus: Nam v.g. scorbutico confirmato sæpius superveniunt ulcera in cruribus ex acore vitioso scorbutico in sanguine enato: Et hinc talium subjeclorum *cachecticorum*, *veneræ*, &c. ulcera sunt vix curabilia, nisi ipse morbus primarius prius curetur & corrigatur; quin & curentur licet ulcera talia, tamen sæpius, nisi primarius morbus sit solutus, in aliis locis recidivas inducunt, quale exemplum legi in *HILDANO*, item *SCULTETO*, & horum *Observationibus*. Unde etiam est, quod interdum, palliativè licet,

*Estmull. Oper. Tom. II.*

fonticuli in talibus subiectis sint excitandi, ut ita ulceris contumacia mitigetur, & ex eodem occluso recidiva periculosa præcaveatur. Patet etiam in *abscessibus ab inflammatione suppurata natis*, ubi sanguis stagnans ab acido fermentativo transmutatur in pus, ita tamen, ut præponderet acidum, & alimentum partis corruptum acescit, quod labiis abscessus adhærens, sequentis ulceris propriè sic dicti autor est.

III. *Causa*, unde oritur acidum hoc, est ex *vitio ipsius sanguinis*, ipsique permixto excremento quocunque, aut alius cujuscunque humoris in corporis statu præternaturali, à quo in parte quadam vel nutrimentum parti nutriendæ ineptum suggeritur, vel nutrimenti proximi perversioni occasio ministratur: unde vitiosus ejus acor ulceri inde enascenti primam originem seu occasionem ministrat. Patet hoc in ulceribus, quæ aliis morbis superveniunt.

Acidum ergo hoc, quæcunque ex causa in ulcere obortum, proximum, quod ad partem distribuitur, alimentum corrumpit, & quod saline volatilis oleosæ quasi balsamicæ naturæ esse debet, acescit similiter, fitque parti alendæ omnino hostile; unde ulcus ejusque fermentum acidum valde augetur, & hujus activitas validior redditur.

Prout verò vel major vel minor est aciditas, aut etiam hæc ipsa simul variantis nonnihil saporis deprehenditur, uti ratione graduum diversitatis variat, cum aliis adjunctis proprietatibus diversis, varia est etiam alimenti exinde orta corruptio, & exinde etiam contrumax plus minus solet esse ulcus, quod aut *purulentum*, aut *saniosum*, aut *verminosum*, aut *dyssepuloticum* seu *phagedanicum*, aut *cancerosum*, aut *corrosivum*, aut *dolorosum*, aut *malignum*, aut *contagiosum*, aut *cariosum*, aut *gangranosum*, aut aliâ speciali proprietate est distinctum, pro varietate acidi specifica.

In *specie nervosarum partium ulcera* ut facilius oriuntur, ita etiam omnia sunt pejora & difficilius curantur, ob acidum in his vulneribus majorem gradum: nam alimentum partium nervosarum, cum sit admodum temperatum, nec adeò imprægnatum sale volatili acri, ut sanguis in partibus sanguineis, ob id facili corruptione & alteratione acescit, & ob defectum sufficientis correctionis fit acris, ipso spiritu animali subtiliore in his partibus celerius aut distributo, & promotio, aut facilius exhalante.

Sanguinæ verò partes abundant sale volatili acriori oleoso, unde difficilius ipsis inducitur acor, qui etiam contra facilius temperatur, fiuntque hinc ulcera benigniora; unde *ulcera partium sanguinearum sunt faciliora*, quam *nervosarum*. Hinc & in *glandulosis locis*, cum in his aliquid acidi subtile ex sanguine secerni, & unâ cum aliis lympham constituere videatur, *contumaciora & magis dolorosa ac corrosiva oriuntur ulcera*, & quæ facillimè degenerant in *fistulas*, ex quacunque causa sint producta: imò hæc ulcera frequentius *cancerosam malignitatem* solent habere conjunctam.

Lympha hæc in locis glandulosis elaborata, subtili acido sale imprægnata, cum facillimè acidi corrosivi in articulis recipiat impressionem, ulcera & vulnera articularum reddit & difficiliora & periculosiora.

Certum est, contumacissima esse ulcera & summè dolorosa in partibus glandulosis, in specie sub axillis, & hinc circa inguina, quæ acore corrosivo latius serpunt, & vicinas partes acriter depascere solent.

Acor ergo talis, aut à vicino ulcere ad os subiectum delatus, aut ex corruptione ipsius ossis, ab acris contactu orta, genitus, aut etiam ex acido peregrino ad os cum alimento distributo enatus, os ipsum corrodit, & cariosum reddit, ulcusque cum ossis carie conjunctum constituit simpliciter immedicabile, & vel centies recidivans, iterumque erumpit, nisi ossis caries primò emendetur.



De cætero observanda est *differentia*, nempe vel immediate & primario ab aciditate peregrina afficitur os, & huius occasione demum ulterius partes molles ossi instratæ afficiuntur, & postmodum harum contagio ipsum os, quod sit in ulceribus cum ossium carie coniunctis. Uterque exemplis fiat clarior: In fracturis, in quibus os est denudatum, nisi hoc probe & citò curetur, successivè livescit, & nigrescit, sicque tandem cariosum evadit, propter subitam alterationem ab aere impressam: similiter in lue Venerea in medio ossium oriuntur gummatæ, à quibus successivè os subiectum eroditur & cariosum evadit, (quod etiam sit in spina cariosa,) quibus alimentum partium nervosarum in lue Venerea maligno acore inquinatum, etiam ad ossa distributum hæc ipsa erodit ac inficit.

Quodsi corrosiva sanies in ulceris labiis producta per interstitia partium latius serpat, aut molliores substantias inter stamina fibrosa duriora exedat, & ita per cuniculos longius latitudique serpat, hinc inde ulcus sinuosum seu cavernosum constituit, quod Germani vocant *einen locherischen Schaden*: cuius orificia aut etiam canales in locis membranosis imprimis & nervosis, ex alimenti vitiati congectione & conglomeratione indurata, & in callum quasi osseum transmutata, fistulam & ulcera fistulosa constituunt.

Occalescentia hæc & durities circa membranas, imprimis in orificiis horum ulcerum sinuosorum nata, oritur ex acido visioso satis intenso, dictas partes corrugante, & pedetentim indurante, ac in callum seu cartilagineam transmutante: Exinde orificia fistularum semper sunt angusta.

Proximum ergo partis alimentum, prout facilius ab acido ulcerum impressionem recipit, exinde plus minus diuturna aut maligna efficit ulcera, ut in *hydropeis*, *cachecticis*, lue venerea inquinatis, aut iis, quibus aut *hamorrhoides*, aut *menfes* suppressi stagnant, luculentissime patet; & talia ulcera solent esse graviora, propter alimenti partis corrupti facilem impressionem ab acido. Hæc ulcera cum humorum affluxu esse conjuncta dicuntur.

Facilius verò corruptio hæc in alimento partium sit, imprimis ex defectu partium spirituosarum & salino-volatilium, quæ contraria dum sunt acido fermento ulceris, ejus vim infringunt: quibus dum caret interdum præternaturaliter pars sanguinis alimentitia, aut etiam aliàs ex vitiosa prima aut secunda digestionem ad recipiendam corruptelam acidam magis est disposita, promptius sic corrumpitur, & ulcus ipsum sic augetur, sit *manans*, & difficulter curabile.

Acidum hoc ulceris fermentativum & corruptivum non rite correctum & sublaturum, dum vel eius aliqua, tantilla licet, portio post curam ulceris relicta est, aut in labiis ejus, aut, quod sæpius contingit, in osse carioso; vel eius aliqua portio per sanguinis vel lymphæ motum aliorum delata, pervertendo alimentum loci proximum, aut recidivam antiqui, aut per metastasin, generationem novi ulceris inducit. Sic in SCULTETO exemplum est ulceris præposterè curati, unde postmodum ulcus in pectore enatum fuit: sic & FABRICIUS HILDANUS *Centur. 3. obs. 39. observavit* ulcus in veteratum in crure sinuosum, quo intempestivè curato supervenit pleuritis, ubi materia similima per os fuerit reiecta, acida, quæ ex ulcere cruris emanaverat.

Ulceris ergo ordinaria & adjuncta, & fermenti ejus acidi producta sunt:

1. *Canitas* ab acore exedente, & labia vulneris depaescente plus minus, indurata.
2. In partibus carnosius pus laudabilius ex sanguine.
3. In partibus nervosis seu spermaticis ichor seu sanies tenuis, aut saltem pus minus laudabile, hoc est, quod labia ulceris sicca & citra sordes inveniantur.

Rarissimum enim est, quod labia ulceris sicca & citra sordes inveniantur; id quod tamen fit interdum, quando nempe ulcera aeri aperto diu nimis fuerunt exposita; aut quando labia dura & callosa sunt; aut quando loco suppurantium & mundificantium exsiccantia aut cicatrisantia, intempestivè fuerunt applicata. Quodsi citra tales causas manifestas spontè & subito (dico subito, quod bene observandum) sicca aut minus humida deprehendantur ulcera, malum signum est; nam vel inquit imminet mortem totius; vel si ulcere ex succo accedat aliqualis liquor vel decoloratio labiorum, imminetis gangraena est indicium; omnia enim ulcera, si imminet mors, solent exsiccari.

## P R O G N O S I S.

*Prognosis* ex his facile est formanda de quocunque ulcere. Nempe fundamenta prognoseos in ulceribus desumuntur ex tribus circumstantiis:

- (1.) *Ab ipsa conditione ulceris*, an sit simplex? an complicatum? an sinuosum, fistulosum, cariosum &c. Nam hæc conditiones ulcus plus minus reddunt difficile.
- (2.) *Ab ulceris excretis*, pure nempe & sanie: Nam quò citius ulcus reddit pus, idque magis laudabile vel minus acre, candidum, mediocri consistentiæ, eò melius est ulcus: contrarium est, si ploret saniem tenuem, ichorem acrem, flavum & fetidum, aut similia.
- (3.) *Ab ipso subiecto ulceris*, tam particulari quàm universali. Ratione subiecti particularis, ab ipso loco ab ulcere affecto, an sit carnosus, glandulosus? ratione subiecti universalis, an æger sit sanus, vel non? an sit laudabilis constitutionis, &c. hæc enim ulceris naturam & curam plus minus gravem ostendunt.

Ulcerata antiqua maciem, febres lentas, aliaque mala, quæ excitant, ac ulcera pulmonum.

## C U R A.

Ex hæcenus dictis facillimè patet, quod Cura ulcerum chirurgica primario in acidi mortificatione consistat, quò tollatur alimenti depravatio, & partis ulcerosæ profluo, & inhibeatur sordium proventus; reliquum ipsa natura agente, alimenti appositione & convenienti assimilatione carnem generando, & foramen claudendo.

Ea, quæ acidum hoc corrigere valent, sunt nulla alia, nisi quæ vel aperte huic sunt contraria, ut alcalia omnia, præsertim volatilia, imprimis vel vegetabilia, vel fixa mineralia, imprimis naturæ metallicæ, aut huic cognata, quæ acidum absumunt avidè & absorbent. Nam ex regno animalium, præter caneros aut fella animalium, aut urinam humanam, vix singularia contra ulcera habentur remedia.

Ex his vegetabilia imprimis agunt positivè, temperando & desendo acidum per sal suum volatile seu alcalinum, quod ipsum nunc est occultum & temperatum pleosum, nunc verò manifestum & acius. Temperatum est v.g. in betonica, in veronica, in plantagine, in vinca pervinca, in bugula, in agrimonia, & similibus; acius verò est in ablinthio, mentha, chelidonio majori, in sabina, in picotiana, quæ in specie in expurgandis fistulis & ulceribus mundificandis valdè conducit, & vinacorea polle; in alne & myrrha, in spiritu vini, & similibus. Mineralia verò & metallica operantur ut plurimum privativè, absorbendo acidum, & istud sui tactu quodammodò dulcificando, sub qua ipsa actione simul virtutem adstringentiam aluminosam acquirere solent. Talia sunt caput mortuum vitrioli, terra vitrioli dulcis seu balsamica, quæ in omnibus ulceribus immiscenda est, saturnus, & hinc paratum saccharum saturni, ac omnia saturnina, quæ sunt solatia Chirurgorum in ulceribus partium; post cerussa, minium, venerea, æs viride, pompholyx, Mercurius sublimatus, item Mercurius præcipitatus, Mercurius dulcis, & quæ huc pertinent sulphurata, & in specie ad ulcera maligna & cacoetha usurpata arsenicalia fixa, & in alcali naturam transmutata, hinc balsamum Paracelsi ex fuligine & arsenico; quia, ut loquitur HELMONTIUS, arsenicum est quasi fumus metallicus.

Hæc medicamenta, dum destruyendo acidum, ulteriorem ejus activitatem inhibent, & simul excrementorum generationem seu alimenti perversionem sistunt, sicque ulcera nitida & labiorum carnem rubeam, sanam, & naturall modo dispositam reddunt, unde *Mundificantia* seu detergiva vulgò appellari solent, quatenus ulcera purificant, & ablatis sordibus labia naturaliter constituta reddunt. Et quidem ulcera purgare, & sordes detergere, est superficialistantummodò cura & palliativa, cum sordes, pus & sanies effectus tantum sint, & productum ulceris: modò tollatur tantum causa horum effectrix, & palma facile acquiritur: id quod superius de Vulneribus, partim ex SEPTALIO & MAGATO, partim etiam HELMONTIO, monui. Sordes hæc sunt nihil aliud, quàm alimentum, five san-



sanguineum five chylosum, ad partem ulceratam deman-  
datum, quod dum vitatur & corrumpitur in sordes varias,  
sanien acrem, ichorem varicolem, pus foetidum, sordes  
nigricantes, & excrementa tandem ex putredine vermino-  
sa reddita, degenerat. *Graduum autem ac similitum proprie-  
tatum in his detergentibus & mundificantibus observanda  
est diversitas*, pro ulcerum nempe varietate variandis.

In genere eorum quædam sunt acriora, quædam verò ma-  
gis temperata. A temperatis seu inferioribus successivè in-  
choanda est cura ulcerum, nisi forsan ulceris prava conditio  
nimis progressa aliud suadeat, ne acrioris acidi vigor per acre  
contrarium effervescendo & irritando fiat malignior, & pu-  
tredo in ulcus inducatur; sed potius lenioribus acrimoniam  
temperantibus prius utamur, donec fortiora tutius tandem  
applicentur.

Temperata ista vulgò digestiva seu pus generantia appel-  
lari solent, quæ usurpantur in casu, ubi ulcus non nimis  
progressum est. Si verò ulcus jam est putridum aut alio modo  
male affectum, statim fortiora detergentia & acria usurpan-  
da sunt. Temperata autem ista, temperando acidum in  
ulcere vitiosum, alimentum corruptionem in excrementum  
acre & saniosum inhibent, ut temperatus acor ulceris mo-  
derata fermentatione cum alimento partis concurrere,  
& excrementum similiter temperatum quasi coctum in  
meliori consistentia, colore & temperatura generare  
possit, ut id, quod antea tenue, acre, & quasi crudum  
esset, nunc crassius, temperatius, & quasi maturius pro-  
fluat. Quod ipsum mitius excrementum pus appellatur,  
sicuti prius istud acrius & tenue, ichor seu sanies ulitato no-  
mine appellari solet. Hinc etiam hæc digestio suppuratio  
dicitur.

Quoad generationem puris: dictum fuit *suprà cap. 1.*  
*Membrum 1. Articuli 1. ubi de Inflammatione*, quod gener-  
tur per motum & per modum effervescentiæ, ex concursu  
acidi & urinosi, temperaturum tamen utrorumque me-  
diante oleo, ita tamen, ut in pure adhuc præpollcat aci-  
dum, hinc albedo. Hæc in genere, ubi de Tumoribus; jam  
in specie quoad ulcera.

Dum enim concurrunt hæc duo in ulceribus, alimentum  
partis, quod naturaliter est salivum volatile oleum in  
sanis, & ita temperatum, ab occurrente acido corrosivo ex-  
cessivo sine resistentia pervertitur, & in liquamen acre &  
ichorem vitiosum corrumpitur: sin verò acidum sit modera-  
tum, hoc à nutrimento partis aliqualem percipit resisten-  
tiam, ut ita mutuo concursu & actione degenerent in ex-  
crementum mitius, pus dictum.

Temperata talia remedia, de quibus *suprà dictum*, sola  
ulceris simplicis possunt absolvere curam: ulceris verò, vel  
corrosivi, vel putridi, vel cancerosi, vel maligni, virulen-  
tia acriora & validiora, ut plurimum ulcers & ejus specifice  
fermento appropriata, nunc *Mercurialibus*, nunc arseni-  
calibus permixta, requirunt remedia. Observanda tamen  
simul partis affecta erit conditio: nam partes sanguine & tem-  
perata imprimis vegetabilia requirunt; nervosæ verò pau-  
lò acriuscula aromatica & saturnina magis possulant,  
& sic etiam pro varietate reliquarum partium affecta-  
rum.

Frequentius tamen fit, ut, præter simplicem ab acido  
corruptionem, singularis partis concurrat putredo aut cor-  
ruptio in ipsa parte, ubi præter degenerationem alimenti  
in varias sordes putrilago simul cadaverosa, & incipientis  
quædam quasi gangræna, solet adesse. In hoc casu ergo  
fortissimis omne putridum ad partem usque sanam absum-  
endum, & putredinis ulterior processus inhibendus, quod  
sæpius fit per acida, uti est unguentum imprimis *Egy-  
ptiacum*, aut in perfecta gangræna per butyrum antimonii,  
aut similia: quibus tamen laudabiliter suo officio defungen-  
tibus aut defunctis, post operationem peractam subito re-  
movenda sunt, ne partes sanæ etiam absumantur aut affi-  
ciantur.

Facta ergo acidi fermentativi & corruptivi in ulceribus  
absterfione alimentum partis, seu ejus balsamus naturalis,  
sensim labilis ulceris agglutinatum, partem cavam nova  
carne replet, dum interea fibræ & vascula cutanea & ipsa  
successivè longius extensa, inæquali tamen concursu varia-  
que textura in cicatricem coeunt.

Ne impediatur autem hæc partis deperditæ seu erosæ  
per carnis regenerationem restauratio, sed potius ut promo-  
veatur naturæ motus in generatione carnis, (nam facile  
impeditur, dum nempe vel ab acre ambiente sub deliga-  
tione alterantur ulcera, vel dum ab interno vitio nova ali-

menti corruptio & ulceris succedit renovatio) oh id post  
mundificatum ulcus, dum caro nova succrescit, balsamica  
glutinantia vel vulneraria, sarcotica tunc appellata, tunc  
applicantur, quæ nempe denuò solent consolidare ulcus re-  
gens, & mundificatum carne replere. Hæc nempe, tempe-  
rata suâ virtute nonnihil adstringente, & balsamum natu-  
rale conservant, & omnem acorem forsan de novo subortum  
promptè delent, quæ ipsa blandâ adstrictione impediunt  
simul, ne caro enata laxior aut nimis mollis, aut nimis  
superflua, luxuriet: id quod fieri solet, si citrà emplastrum  
sarcotici convenientis applicationem soli naturæ negotium  
committatur: Hinc etiam promptè luxuries ejus coercetur,  
si applicetur v.g. emplastrum vel unguentum de tutia, quod  
optimum est ad ulcera carne replenda, item emplastrum,  
seu unguentum diapompholygos, de spermate ranarum,  
defensivum vulgare, de lapide calaminari, de lithargyrio,  
item emplastrum diaphysphuris Rulandi, imprimis si mala-  
xentur cum oleo nicotianæ.

Similia remedia glutinantia & consolidantia, sed magis  
adhuc adstrictiva & humidi absumptiva, per modum exsic-  
cationis cicatricem firmiorem generari adjuvant, si desuper  
applicentur; unde Epulotica seu cicatrisantia appellantur;  
nam vulneraria balsamica, sarcotica & cicatrisantia gra-  
dualiter tantum differunt; unde in corporibus delicatis &  
mollioribus cicatrisantia sunt in sublevis durioribus sarcoti-  
ca, & contrâ.

Non ergo ad pretiosiora emplastra oppositæ doch & similia  
confugiendum, cum emplastra hæc solummodò instar oper-  
culi sint, ne aer ambiens & frigidus subintret. Imò sunt,  
qui solo decocto calcis vivæ, in quo plantæ vulnerariæ bul-  
lierint, ulcera ope syringæ eluunt; post unguentum simplex  
digestivum, exterebinthina cum vitello ovi dissoluta, &  
oleo hyperici paratum, mediante turundâ breviori os ulce-  
ris elaudunt, superimponendo emplastrum aliquod, acidum  
absorbens seu defensivum, ut jam dixi.

Rustici, & qui PARACELSUM in Chirurgia imitan-  
tur, plantam aliquam euphorisam vulnerariam, vel folia  
liatim vel contusam, superimponunt, & sæpe magna ul-  
cera sanant, quæ etiam meo judicio omnibus unguentis præ-  
ferenda. Verùm cum Chirurgia, ars olim præstantissima,  
nostris temporibus à Barbitonsoribus & Balneatoribus im-  
peritis exerceatur, qui omnia ulcera ac vulnera suis un-  
guentis ac emplastris, à magistrorum suorum magistris  
commendatis, sine judicio curare audent, concinnior cu-  
randi methodus negligitur; quæ solis diâis simplicibus &  
euphorisæ sapissime absolvi posset.

Externis talibus applicandis, quæ vulgò quatuor capitulis  
comprehenduntur, sub nomine digestivorum, mun-  
dificativorum, sarcoticorum, & epuloticorum seu cicatri-  
santium, ad promovendam curam externam commodissi-  
mè simul adjuvenda sunt interna, acidum tam in primis  
vis, quàm in ulceribus, correctiva & destrutiva, & quan-  
tum possibile, succum nutritivum ita alterantia, quod minus  
à fermento ulceris acido corrumpi possit, quæ nempe alcali  
plus minus acipollent; his enim neglectis frustra Chirurgi-  
cum imploratur auxilium.

Talia ex vegetabilibus vulnerariis seu ulcerariis, ex can-  
cris fluviatilibus, albo Græco, pulmonaria maculosa, con-  
solida media, Gummitaribus hyperici, & similibus, portio-  
num vulnerariarum forma parari solent, de quibus vid.  
PARACELSUM, FELIX WURTZIUS, HELMON-  
TIUS, BARBETTE, E.g.

24. Herb. beder. terr.

Vron. Sanic.

Summ. hyperic. florese. an. M.j.

Rad. Polypod.

Caryophyllas. an. 3vj.

Raf. cornu Cervi.

Albi Graci an. 3ij.

Coqu. in f. q. aquæ:

Colat. 3xvj. adde

Syr. Corall. Querc.

De symph. Fern. an. 3ß.

M. D. S.

Potio sanguinem mundificans.

Aut Essentia vulneraria formâ:

24. Herb. Cherefol. Mij.

Flor. hyperic. M. ii.

Bellid.

Calcagr.

Herb. Pyrol.

Sanic.

Tec 2

Herb.



*Herb. Vinca pervine.*

*Consol. Sarac.*

*Alchimill.*

*Vron.*

*Heder. terrestr.*

*Plantag.*

*Scabiosa.*

*Equiseti.*

*Auric. Muris.*

*Millefol. an. M. l.*

*Rad. rub. tinctor.*

*Consol. mai. an. ℥ij.*

*Card. ben.*

*Aristol. rot.*

*Sigill. Salom. an. ℥ij.*

*Myrrha ℥ij.*

*Spiritus Cheresol. ℥vii.*

Digerantur per aliquot septimanas, exprime & filtra:

Speciebus residuis affunde

*Aqua rosis Maial. q. s.*

Destilla per arenam, residuum exprime, & inspissa ad extracti consistentiam, quod coniungatur cum essentia per digestionem: adde

*Aquam destillatam, filtra & asserva pro Essentia Vulneraria.*

Dosis gutt. xxx. ad L. bis vel ter in die.

His addenda simul remedia sudorifera, tam ex lignis, imprimis essentia lignorum, tinctura coralliorum cum spiritu lignorum, & decocta lignorum quæcunque, quæ cum digesta sudorifera usurpata multum conferunt; quàm ex antimonio, viperis & serpentibus parata, in specie tinctura antimoniales genulæ, essentia viperarum, spiritus & sal volatile viperarum, quæ usurpata nobilia sunt, & multum conferunt. Additur his usus frequens lapillorum cancorum cum myrrha & croco, corallis, & lapillis cancorum cum aceto propinatis, cum Bezoardico Joviali, antihætico Poterii, antimonio diaphoretico, simpliciter & Martiali, non omittenda, si opus sit, purgatione. Inter purgantia autem, eminet Mercurius dulcis, vel turbitum minerale, si crebrius usurpentur cum extracto hellebori nigri, vel panchymagogo Crolii, vel catholico.

Quod si verò deteriora fuerint ulcera, ipsa salinatio Mercurialis in auxilium est vocanda.

Quoad remedia externa, ferè sunt sequentia; digestina quidem oleum rosarum, mastichinum, butyrum recens non salitum. Maiale, vitellum ovi, mel, gummi elemi, terebinthina, thus, massix, farina triticea, hordci, sænu-graci, & similia. Ex his v. g. sit Unguentum digestivum hoc modo:

℥. Terebinth. ℥i.

Vitell. ovi No. i.

Mell. rosar. ℥ij. ad ℥ij.

Ol. hyperic. ℥j.

M. f. Linimentum vel Unguentum digestivum: S.

Unguentum digestivum.

Vel

℥. Terebinth. ℥i.

Mellis ℥ij.

Succ. apii ℥ij.

Far. hordci,

Fanugr. an. ℥ij.

Myrrha parum.

M. S. ut antea.

Pus ubi genitum est, & quidem laudabile, simul mundificantiæ, & acidum in ulceribus peccans corrigentia, sunt admiscenda & usurpanda, eoque actiora, mitiora, positivè & privativè operantia, pro ulcerum conditione & varietate.

Talia mundificantia sunt radix apil, Aristolochiæ utriusque, althææ, bryoniæ, cyperi, plantaginis, sigilli Salomonis, tormentillæ, aronis, cucumeris asinini, dracunculi, iridis, gentianæ, hellebori nigri; herbæ & folia cichorii, item absinthii & apil, anagallidis minoris, brassicæ, origani, chamædryns, betæ, marrubii, plantaginis, sempervivi maioris, solani, serophulariæ, betonicæ, veronicæ, vineæ pervineæ, artemisiæ, fumarie, nicotianæ, hyperici, centaurei minoris, chelidonii maioris, sabine, &c. item folia farsaræ succulenta contusa, ulceribus calide imposita; flores rosarum rubrarum, hyperici, centaurei minoris; cortices pini; lignum guaiacum, sassafras; semen urticæ, plantaginis, apii; bacce juniperi; farina semi-

nis lloi, sænugræci, ciccerum, lupinorum, hordci, fabarum, fursures; purgantia externo usu, imprimis scammoniata: succi absinthii, agrimonie, rosarum rubrarum, apil, chelidonii maioris; Extractum aristolochiæ rotundæ, & alia vulneraria cum spiritu vini parata; item cum saccharo ex diâis succis parati syrupi, simplices & compositi vulnerarii; item saccharum, macis, aloë, & similia: vinum & spiritus vini, lixivium commune, muria hæc cum cum passulis, animalium urina & fella, serum lactis, mel, mel rosatum, mumia, succus serpentum, cancorum fluvialium, sperma ranarum & eius aqua, stercus canis ossa rotentis; camphora & camphorata, resina, terebinthina, balsamus Peruvianus, thus, myrrha, euphorbium; item sulphur, & omnia sulphurea, sulphur vegetabile siue farina lycopodii, ulceribus manantibus inspergenda; plumbum calcinatum, & omnia saturina, nempe minium, creta, cerussa, lithargyrium, bolus Armena, marga saxorum, crocus Martis adstringens, & crocus vitrioli Martis per præcipitationem paratus, terra vitrioli dulcis, rubrica tutia, ænustum, alumen crudum & calcinatum, nitrum, imprimis ænustum, arsenicum, in specie fixum, pulvis sympatheticus ex vitriolo Veneris, qui ulcera in distans curat, decoctum scoriarum reguli antimonii, quod est singulare; spiritus salis, sulphuris, vitrioli, aqua fortis, butyrum antimonii, Mercurius dulcis, Mercurius præcipitatus, arcanum corallinum; aquæ virides quæcunque ex ære viridi paratæ, in specie Hartmanni & Plateri; aqua calcis vivæ benedicta, thermæ naturales & artificiales, quæ in ulceribus inveteratis egregie sunt; oleum nicotianæ, terebinthina, ceræ, ovorum, oleum tartari per deliquitum, balsamum sulphuris, tam ex sulphure communi, quàm in specie ex sulphure aurato antimonii secundum methodum POTTII, &c. unguentum dialthææ, nicotianæ, iridis, fuscum officinarum, ceterinum, album, album camphoratum, diaphanopholygos, de tutia in ulceribus crurum, Ægyptiacum, & fuscum Wurtzii, linimentum de amlancho Schræderi; porro Emplastrum de betonica, de gratia Dei, diuinum, cum emplastro diascurni Mynsichti, diasulphuris Rulandi, item emplastrum de carne bubula ejusdem.

Utendi horum modus est:

1. In Injectionibus in ulcera canerosa, sinuosa, fistulosa, tam liquidis, quàm succis, in forma pulveris inspergendis.

2. In Unguentis.

3. In Emplastris. Verbi gratia sit

1. Iniectione in ulcera sinuosa & fœtida:

℥. Fol. Nicot. Mij.

Summ. absinth.

Herb. Veron. an. M. l.

Rad. Aristol. rot. ℥j.

Bacc. juniperi ℥ij.

Aluminis crud. ℥ij. ad vj.

Coqu. in f. q. aquæ ferrarior.

Colatura servetur ului pro iniectione in ulcus, addendo omni iniectionis dosi spirit. vini ℥j. plus minus, pro ratione quantitatis liquoris iniciendi, & capacitatis ulceris.

D. S.

Externa mundificatio.

Item

℥. Fol. Nicot.

Herb. Veron. an. M. j.

Coqu. in f. q.

Aqua calcis vivæ cum aqua Plant. fact.

Colat. 3x adde

Mercurii dulc. ℥j. ad ℥ij. vel ℥ij.

Campbor. ℥ij.

M. D. S.

Aqua iniectionis.

Vel

℥. Aqua calcis vivæ ℥ij.

Mercurii dulc. ℥ij.

Spirit. sberiac. camp. ℥j.

M. S.

Mixtura mundificans.

Hæc elvantur ulcera, vel applicetur hæc ipsa cum linteis.

In forma pulveris:

℥. Croc. Martis per præcipit. ℥ij. vel ℥ij.

Lap. calamin. vel terra sigill. ℥j.

Lact. Luna ℥ij.

Macis,

Myrrha,



Myrrha;  
Olibani,  
Aloes an. ʒi.  
Campb. ʒʒ.

M. f. Pulvis, qui irroretur cum spiritu tberiacali campb.

D. S.

Pulvis externus sanans & mundificans.

Qui ulceribus manantibus inspergatur, in specie ulceribus tibi-  
larum, quæ difficillimè consolidantur.

Huc facit etiam pulvis ad ulcera maligna Marci Barcbai, qui  
extat in Misomimet. VELSCHII Cent. 1. Obs. 3. annex. Ann.  
4. & 5. M. A. N. C.

II. Unguentum mundificans ulcera fit hoc:

ʒi. Succ. Nicot. ʒiv.

Plantag.

Abstinb.

Beton. an. ʒii.

Mell rosat. col. ʒiv. vel v.

Coqu. & subigantur probe lento igne:

adde

Terra vitrioli dulc.

vel loco hujus

Croci Maris per præcipitat. ʒiij. vel ʒʒ. ad ʒvj.

Pulv. aloes,

Myrrha,

Flor. sulphuris an. ʒi.

Misc. probe, addendo simul

Terebinth. Venet. q. l. v. g. ʒiij.

Pro consistentia Unguenti plus minus spissi: in fine etiam  
nonnihil

Balsami Peruv. est intermiscendum:

D. S.

Unguentum mundificans.

Denique III. Unguentum Sarcoticum, ex quo facile fieri  
potest emplastrum, fit hoc:

ʒi. Ungu. diapomphol.

De Tur. an. p. j.

Dia-sulphuris Rul. p. ij.

Cum s. q. olei Nicot. f. Unguentum, applicandum  
cum petiis.

D. S.

Unguentum sanans.

Vel additione paucæ Cera fiat Emplastrum, quod induca-  
tur litheo.

Inter hæc autem remedia pauca sufficiunt, & secundum  
HELMONTIUM ad ulcera benigna terra vitrioli dulcis,  
ad maligna verò arsenicum. Eminent etiam balsamus sulphuris  
terebinthinatus, balsamus sulphuris, vel communis, vel anti-  
monialis cum oleo lini aut nucum inglandium expresso paratus:  
vid. de hoc POLEMANNUS de Sulphur. Philosophor. qui  
habet simul egregium emplastrum; ubi tamen loco vitrioli  
Veneris dulcis potest substitui vel caput mortuum vitrioli elixi-  
vatum solum, vel addito tantillo avis viridis. Convenit  
etiam balsamum Peruvianum. Habeatur tamen delectus, an  
pinguis conveniant, an non? Si possunt ferre, conveniunt  
dicta balsama; si non, sufficit mel cum succo vulnerario. In  
rebellibus ulceribus respiciendum est ad Mercurium vivum,  
à quo spiritus nitri fuerit abstractus. In ulceribus putridisq;  
viride cum aceto destillato est optimum; unde unguentum  
Ægyptiacum, Apollolorum, fuscum Wurzi, &c. conveniunt.  
Sic ex vitello ovi & melle fit unguentum utile in quibuscun-  
que vulneribus:

ʒi. Vitell. ovor. ad duris. coq. No. iij.

Mellis ʒʒ.

M. cum haustu vini, in unguentum.

D. S.

Unguentum mundificans.

Quod optime purgat ulcera, & etiam à gangræna præser-  
vat. Si ulterius progrediatur malignitas, addatur mercurii  
præcipitatus ʒʒ. vel ʒi. plus minus, pro ratione circumstantia-  
rum.

Emplastrum polycbrestrum cicatrizans est seq.

ʒi. Mastich. ʒi.

Terebinth. ʒiij.

Cera flav. ʒiv.

Hæc liquefactis adde Mastichen, & redigantur simul  
in Emplastrum præstans ad consolidanda & cicatrificanda ul-  
cera:

D. S.

Emplastrum consolidans.

Non cedit huic ad consolidanda ulcera sequens:

Estmull. Oper. Tom. II.

ʒi. Calcis viva vel servata & parum exsec. q. pl.

Misc. cum ol. lini q. l. Tingatur cum bolo Armena  
vel bolo rubra ad carneum quasi colorem; f. Em-  
plastrum,

Egregium in ulceribus vetustis:

D. S.

Ut antè.

Fit interdum, ut ulcera quædam omnino arida reddan-  
tur, ita ut paucam vel nullam suppedient materiam seu  
excrementa. In tali casu optimum est unguentum imposi-  
tum ex terebinthina, melle, succo apii, & farinis: hæc  
ipsa enim probe permista, faciunt, ut pus laudabile ulcus  
suppeditet.

Quod si in ulcere purificato denud, jam carne replendo  
& cicatricem inducendo, carnis regeneratæ uberior luxu-  
riet copia, quod fit, quando applicata sunt emplastra vel  
nulla, vel nimis oleosa & pingua, quæ fibras reddunt la-  
xas, sive naturalis fuerit caro, sive flaccidior & præterna-  
turaliter laxa; tunc optimum est, ut inspergatur pulvis ex  
gallis, corticibus granatorum, & spongiis combustis ana-  
ly. Hæc ipsa omnia carnem superfluum optime absumunt.  
Præterea pulvis ex aloë & myrrha, quibus commodè pa-  
rum aluminis usti admiscetur, cum stuppis siccis imponi-  
tur; hoc enim blandè carnem superfluum cohibet: non  
minus etiam, quàm crocus metallorum pulverisatus; hic  
enim si inspergatur, subito carnem nimis excrecentem  
mortificat, & insensibiliter absumit: Experimentum sin-  
gulare est Rulandi.

Galli in usu habent ad coercendam carnis luxuriam appli-  
care lapidem, quem vocant infernalem, paratum scilicet ex  
luna soluta in aqua forti ad cuticulam evaporata, & in  
loco frigido crystallifata. Crystalli istæ egregium dant cau-  
terium indolens pro Fontanellis, uti superius alio in loco  
monui, & hoc ipso cauterio si contingatur caro luxurians,  
in momento comburitur & resolvitur in spumam albam;  
id quod tamdiu repetendum est, donec luxuria carnis reprimi-  
atur & torum absumatur: etiam probe elotus, nec corro-  
sivus applicatus, prodest; sed in leviori casu sufficit Crocus  
metallorum, in graviore lapis infernalis.

Unguentum etiam Ægyptiacum in casu hoc conducit ex  
basi æris viridis paratum, uti & omnes aquæ virides, &  
ipsæ etiam ex ærugine compositæ hic imprimis conducere  
solent.

Hæc est doctrina ulcerum & remediorum ad eadem perti-  
nentium in genere: Pergo paucis ad ulcera in specie.

## ARTICULUS I

### DE

## CARIE OSSIIUM.

**I**N specie quod attinet ulcera secundum Differentiam: me-  
rentur considerationem ulcera cum ossis carie. Ulcera  
enim quædam conjuncta sunt cum ossum carie, quæ caries  
interdum est manifesta oculo, interdum sit manifesta specil-  
lo: si subest, necesse est hæc auferatur; alias enim ulcus  
nunquam curabitur.

Caries autem nihil est aliud, quàm ossis corrosio, nunc  
major nunc minor, prout magis vel minus fuerit invetera-  
ta; & quidem si oculis pateat os denudatum, facile caries co-  
gnosci potest: primò enim oleosum quodammodò & pingue  
evadit os, hinc successivè flavescit, deinde successivè magis  
nigrescit, & post nigredinem etiam hinc foraminulatum  
redditur, quasi terebinibus pertusum & perforatum.  
Prius est signum imminenti cariei: sicut nigredo, perforatio &  
inequalitas est signum iam perfectæ cariei. Sin verò sit abscon-  
ditum os, tunc vix cognoscitur, nisi per specillum aut sty-  
lum expiscetur fundus ulceris; tunc enim os in fundo non  
glabrum, sed inæquale & scabrosum percipitur; quia  
& quæ effluunt ex ulcere sordes & excrementa, pingula,  
oleosa, & acris, majorique copîa effluere foras solent,  
quàm in ulcere rectè se habente. Quod si ulterius lateat ca-  
ries, ex eo ferè patescit, quod ulcera talia nequeant ad per-  
fectam cicatricem perducî, & etiam optime suppurrata aut  
subinde recidunt, aut difficillimè sint curationis, & op-  
timis etiam non auscultent remediis: non enim potest firmi-  
ter conglutinari caro cum osse carioso, quia sanies ex osse  
plorans semper novum ulcus generat, quod etsi consolide-  
tur, caro tamen, quæ ulceri supervenit, est flaccida, mol-  
lis, & minus dolens.



Sic ergo ad sit tale *ulcus cariosum*, impossibile est, ut consolidetur, quin potius continuo recidivet, nisi prius caries ossis sit ablata.

### PROGNOSIS.

Caries, quod magis est inveterata, eo difficilius auferitur: hinc etiam, quod magis occupat ossa circa articulos, aut ubi est copia partium nervosarum, ibi etiam difficilius tolli solet.

### CURA.

Pro Cura Internè conveniunt *universalia* cum suis pro hoc scopo externis. Ut autem cariosum ulcus melius possit tractari vel separari, congruum est, ut labia ulceris nonnihil dilatentur, vel scalpello, vel immixtis turundis intumescentibus. Tales sunt, si volumus acrids procedere, ex *radice gentiana*, si non, ex *medulla sambuci* compressa; hæc enim imbibit copiosam humiditatem, unde intumescit, & orificia ulceris aperta reddit. Post etiam consideratur, an caries ulceris sit talis, quæ possit remediis cedere: an verò necesse sit adhibere remedia Chirurgica?

Ut ergo cureturos cariosum, vitanda sunt omnia oleosa & mucilaginoia; quia potius fortiora corruptioni & putredini resistentia applicanda: quæ ratione *spiritus vini rectificatus* seu aqua vitæ cum petiisimposita optimè convenit. Idem, si quid aliud, Euphorbium est singulare experimentum ad cariem ossium corrigendam & tollendam, si *pulvis euphorbii* cum plumaceolis ossi carioso immediate imponatur, de quo vid. HILDANVS Cent. 2. obs. 76. & 92. Cent. 4. obs. 21. & 96. & Cent. 5. obs. 12. item RIVERRVS Cent. 2. obs. 76. & 73. est enim expertissimum remedium. Applicatur vel solum, vel etiam permiscetur commode cum aliis: v.g.

*Mumia,*

*Sarcocoll. an. 3ß.*

*Euphorb. 3i.*

*M. f. Pulvis: S.*

*Pulvis mundificans.*

Applicetur ossi carioso.

Mixtus agit, quàm Euphorbium, pulvis radice Ireos Florentinæ, qui & ipse iuxta Euphorbium semper est optimus, & fuit experimentum HEURNII in ossibus cariosis, sive per se, sive cum spiritu vini irroratus, sive, quod melius, cum euphorbio adjunctus, inspergatur: quin & pumex ustus, radix aristolochiæ rotundæ, pulvis aloës & myrrhæ impositus ossi carioso, egregie confert. Huc pertinet quoque pulvis catharticus pro ossibus Clossæi, cui additur oleum destillatum Caryophyllorum: (vid. SCHROEDERVS Pharm.) qui optimè convenit in carie ossium. Oleum ligni guajaci destillatum, oleum caryophyllorum destillatum, cum pluma ossi carioso illitum (olea expressa & infusa dixi vitanda in ossibus; de destillatis alia est ratio) usitatissimum est in moderna Praxi Gallis Chirurgis ad ossium cariem corrigendam: uti etiam spiritus vini parum cum spiritu vitrioli acuat, ubi fortius agendum est, imponi potest. Quin & injectiones instituendæ, imprimis in fistulis & ulceribus sinuosis, quæ sæpius diuturnitatem obtinent à latente ossi carie; tunc ergo vel optimè incutitur succus chelidonii majoris cum spiritu vini, cum quibus aloë & myrrha probè sunt permixta: aut etiam, ubi fortius agendum est, parum vitrioli additum sit: Hæc ipsa injecta subinde solent tollere cariem, & etiam os mundificare, ita ut interdum squamulæ ossis abscedere soleant. Melius adhuc est, & quod vix aliis cedit remediis in vulneribus, fistulis & similibus ulceribus cum ossi carie, Mercurius dulcis solutus in aqua plantaginis, qui calidè injectus in ulceribus ossi cariem absorbit, simulque egregie ulcus mundificat. Singulare est, quod ad os cariosum commendat TVLPIVS lib. 1. cap. 39. nempe de oleo sublimati (per quod forsant intelligit butyrum antimonii) cum oleo lini mixto, mediante quo graves ossium caries notat se observasse curatas. Veteres Turbith, es viride allaque commendant; sicuti unguentum etiam Ægyptiacum, pulvis terebinthinæ ad duriciem coctæ cum unguento fusco Wurzii, hic profunt. Quod si profundior sit caries, ut his remediis non velit cedere, ferro aut igne corrigenda est, ita quidem, ut *limia*, aut etiam *scalpello* radatur locus cariosus, si sit in superficie, aut terebrâ perforetur caries eo usque, donec os album, solidum & transudantibus vel emanantibus hinc, inde san-

guineis guttulis se manifestet, postmodum dicta remedia applicentur. Quod si ratio non videatur sufficiens, vel hæc omissa, vel post peractam rationem cum scalpello, ad cariem funditus delendam cauterio actuali seu ferro ignito adendum est os cariosum, ita ut ardor ab igne inductus totam cariem penetret, vitando cautè, ne partes vicinæ nervosæ aut carnosæ tangantur. Facta ratione vel ustione expectandum est, donec spontè naturâ fiat separatio ossis cariosi ab osse sano: quod ut fiat promptius, Batavi moderni applicant spiritum vini felici cum successu: quod si hic minus videatur efficax, oleum destillatum caryophyllorum applicatum est convenientissimum: postmodum os consolidetur *spiritu vini, myrrhæ, aloë, & similibus.*

Iuxta ossium cariem & inde nata ulcera rebellia, considerationem meretur

### ARTICULUS V.

#### DE

### FISTVLIS seu VLCERIBVS SINVOISIS.

**F**istula seu ulcera profunda & sinuosa sunt unum idemque, nisi quod interdum in ulcere diuturniore aut male tractato superveniat Callus, qui nunc cingit simpliciter ambitum seu orificium ulceris ipsius, non verò totum sinum ulceratum in crusta, & occupat, & talia ulcera sinuosa cum callo interno vocantur *Fistulae*.

Ulcus tale sinuosum seu fistulosum nunc loterius est unum, utur plura habeat orificia, vel extrinsecus habet orificium unum, utur interius in plures canales sit excavatum.

### DIAGNOSIS.

Per se facile patet, ex callo nempe enato: saltem observandum est, an fistula sit simplex? an verò multiplex? item observandum est, quousque pertingat? an scilicet desinat in osse? an verò in parte molli, v.g. nervea, in carne, in vena aut quadam arteria finiatur?

Simplicem aut multiplicem esse fistulam ex quantitate materiae effluentis serè colligitur, item expressione eius, & ex situatione ægri, an in uno latere? an in altero nunc hoc nunc aliud puseffluat? item si plura orificia fuerint fistulae, ita quidem, ut injectus liquor per unum orificium non effluat per alterum foras, fistulam multiplicem esse, tunc serè colligitur seu innuitur: item an recta an verò tortuosa sit fistula & sinus? ex stylo colligitur, qui si rectè penetrat, rectam fistulam; si verò penetrare aut sine dolore immitti nequeat, tenuis candela ex cera & terebinthina intrudenda, & ex hujus curvatione figura fistulae est expiscanda, cum hæc sine dolore sinus & fistulas, etiam carnosas & tortuosas, possint penetrare.

Quousque terminetur fistula, ex stylo patet facile; Nam stylus in rem duram impingens ostendit: Et quidem dum absque ullo dolore sentitur, perostio jam os denudatum innuitur: sin durum & glabrum sit cum pure non pingui seu oleoso, os adhuc integrum est; sin verò os inæquale & asperum tangatur, est cariosum. Si stylus intrusus circa fundum in ossum dolorem inferat, nervum aut partem nervosam ad modum sensilem in fundo subesse innuitur; si fundus mollis minusque dolens est, in partem carnosam terminare præsumitur, & materia effluens est similis puri laudabili. Fistulae verò partium nervosarum plorant pus acre & tenue. Si desinat in vas sanguiferum, materia est obscuri coloris propter sanguinem; si ipsum vas erosum sit, subinde sanguis ex fistula profuit vel rubicundus, vel obscurus, ratione vel venæ vel arteriæ.

Imprimis autem in locis glandulosis frequentes oboriri solent fistulae; quin & ulcera diuturna in locis glandulosis oborta, si non sunt cancerosa, sæpius sunt fistulosa & sinuosa.

Habent & hoc vitium adjunctum fistulae, ut orificium habeant admodum angustum, quod continuo sanem acrem plorat: unde etiam dolentes sunt fistulae, miserior callus omnem sensum abstulerit.



## P R O G N O S I S.

*Fistulae* difficiles sunt curatu propter callum, qui, nisi auferatur, sunt incurabiles.

## C U R A.

Ve ergo curentur *fistulae*, callus est absumendus, hinc *fistula* probe purgantibus seu mundificantibus, ut uocantur, & hinc convenientibus sarcoticis, consolidanda.

Hoc ut fiat, conueniens est, ut prius amplietur orificium callosum, quia aliis ad callum aut absumendum, aut *fistulam* purgandam, minus commodè pertingere possunt remedia.

Amplificatur orificium *fistulae* callosum per penicillos ex medulla sambuci intrusos, item ex radice aristolochiae confectos & immisos. Facit etiam huc turunda ex radice gentiane sicca, uid. HOEFERVS in *Herc. Med.* quae est optima; uel nudè intrusa, uel, quod melius est, unguento quodam emolliente illita, immittitur: sic enim optimum habet effectum ad emolliendum callum, & amplificandum orificium *fistulae*, sicque post extractionem radix duplo crassior inueniri solet. Fortius ubi agendum est, ipsa radix gentianae aspergenda est prius alumine usto, & ita applicanda; sic enim conuenienter admodum dilatur orificium, & absumitur callus. Callis ulcerum exserendis Patauli in nosocomio publico succum chelidoniae cum pinguedine uitulina & cera permixtum, cum successu adhibitum uidit à MARCHETTE VELSCHIVS in *Mittom. Centur. 3. Obseru. 86.*

Hoc facto, praeter remedia interna, ut omnia uulneraria, faciat ex agrimonia, gentiana, centaurio minori, sabina, cum lapillis cancerorum, item praeter usum millepedum, externe ad mundificandam *fistulam*, & exedendum callum, varia in usu sunt remedia plus minus acuta. Fiet ergo remotio calli, & *fistulae* mundificatio, uel remediis Pharmaceuticis, uel Chirurgicis. Quoad remedia: per siphonem iniicitur succus nicotianae, permixtus cum spiritu uini & puluere exularum serpentum, qui mirabiliter sanat *fistulas*; aut expurgari debet sanies ulceris *fistulosi* cum aqua malsa uel simili; uel iniciendum est hoc:

℞. Mell. ros. ℥iij.  
Spiritu uini ℥ss.  
Mercurii praecipitati edulo. uel Mercurii praecipitati unlg. ℥ss.  
Misc.

Et ita iniciantur; sic enim optime purificantur ulcera saniosa & *fistulosa*.

Minui potest dosis praecipitati pro ratione scilicet circumstantiarum.

Item ad purificandum inici potest aqua calcis uina benedicta ista Chirurgorum, uel sola, uel cum spiritu uini acuta, cui si addatur Mercurius dulcis, erit remedium ed potius; uel sufficit sola aqua plantaginis, in qua Mercurius dulcis solutus est, li calidè probe in *fistulas* iniciatur. Conuenit etiam succus cancerorum fluuiatilium, subactus probe cum succo foliorum nicotianae, qui uel soli, uel addito Mercurio dulci iniecti in *fistulas*, egregie easdem admodum mundificant. Omnia Mercurialia hic palmam praeripiunt, si cum uulnerariis probe mista iniciantur. Hinc etiam turunda immitti possunt, illitæ cum unguento fusco Felicis Wurzii, item cum unguento Aegyptiaco. Balsamum sulphuris terebinthinatum, uel solum, uel cum camphora mistum, *fistulas* mundificat, & callum absumit, quod etiam faciunt crystalli mineræ Jouis cum melle rosato. Alii commendant unguentum, paratum ex melle despumato & inspissato, permixtum cum thure, aloë, & asa fetida, quo turundas illiniunt: c.g.

℞. Mell. despum. ℥ij.  
Coqu. ad aliquam glutinositatem:  
Hinc dum incipit refrigerari, adde  
Aloes,  
Thuris minutim puluerisat. an. ℥j.  
As. fetid. pulueris. ℥ss.

Diu terantur in mortario, & Unguentum:  
D. S.

Unguentum mundificans.

His & similibus mundificantur & purificantur *fistulae*, & deterguantur calli; unde postmodum facillimè consolidan-

tur, & eleuantur successuè *fistulae* citra sectionem & uisionem.

Si uerò in malo pertinaciori, aut callo grauiori, non sufficiant, necesse est subinde, ut addantur mercurialia aut antimonialia, v.g. flores Cheiri Paracelsi, qui in loco frigido in oleo liquefacti tanquam arcanum contra *fistulas* laudantur: Vel

℞. Unguent. Aegypt. ℥ss.  
Mercurii sublimat. ℥j.  
Lixiu. ℥iv.  
Aqua rosar. ℥j.  
Plantag. ℥iv.  
Arsen. ℥j.

Coqu. ad consumptionem tertiae partis, quod reliquum est, *fistulis* illinitur & ejus loco calloso, ut exedatur & absumatur callus.

Verum non semper propter dolorem & alias circumstantias possunt applicari, unde necesse est, ut tota *fistula* cultro incidatur & aperiat: facta apertione dictis remediis callus uel exedatur, uel etiam pedetentim sectione auferatur: ablato callo ulcus tanquam simplex blandis mundificantibus & consolidantibus curari potest. Nam ubi cedere nolunt remediis *fistulae*, necesse est fiat accessio aut ad sectionem, aut ad uisionem, dolorosissimam tamen; quæ ipsa cum raro admittatur ab ægris, potius palliativa cura instituenda uenit.

Vnum adhuc moneo; aquæ uirides dictæ ex æris uiridi paratæ, ad ulcera sinuosa & *fistulosa* mundificanda & curanda sunt optime.

Palliativa Cura consistit in eo, ut convenientibus sudoriferis, purgantibus & dicta subtrahatur materia affluentis saniei, quantum possibile, hinc *fistula* consolidetur in superficie; nam cum conuenienti dicta ad aliquod tempus interdum satis diu conseruari potest clausa, ut ut successuè denud soleant recidiuare siue exulcerari denud. Unde continuanda uenit talismodi palliativa Cura.

## A R T I C U L U S I I I.

## D E

## F I S T U L A L A C H R Y M A L I.

Pertinet huc etiam *Fistula Lachrymalis*, ad quam celeberrimum experimentum est D. de LORT, nempe

℞. Tutia præp. ℥j.  
Pulv. Saturni subtiliss.  
Antimonii crudi an. ℥ss.  
Cerusæ,  
Lithargyr. an. ℥j.

M. cum Cerato dia Chalcis.

Uid. VELSCHIVS *Mittomim. Cent. 1. Obs. 36. annexis Anno 4. & 5. M. A. N. C.*

## A R T I C U L U S I V.

## D E

## U L C E R I B U S S O R D I D I S &amp; P U T R I D I S.

Porro, præter *fistulosa* ulcera uel sinuosa, interdum etiam reperiuntur *Ulcerata* admodum sordida, ita dicta propter copiam sordium crassarum, & mucosorum excrementorum, quæ effunduntur liuidi, nigricantis, aut similis coloris abscessu; quod si hæc ipsa simul odorem graueolentem & quasi cadauerosum expirant, tunc *Ulcus putridum* appellari solet. Quod si simul cum tali excremento periphæria ulceris in latum & longum magis magisque extendatur, & partes uicinas inquinat, tunc dicitur *Ulcus corrosivum*.

## C A U S A E.

Causæ horum ulcerum sunt variae, interne & externe, quæ ex supra dictis de ulceribus in genere facillè patere possunt. Hoc saltem moneo, sordida interdum fieri ulcera ab unguentis & linimentis nimis oleosis, & nimis unguosis aut uiscidis applicatis, specialiter si sit ulcus in locis neruosis.



## D I A G N O S I S.

Spontè patent hæc ipsa ulcera.

## C U R A.

Quoad Curam ulcerum sordidorum, putridorum & corrosivorum, præter interna optimum est, ut mundificentur cum spiritu vini, vel simpliciter rectificato, vel camphorato, vel theriacali camphorato, myrrhato, &c. quod dissoluta si Theriaca. Abluto ulcere usurpandum unguentum *Egyptiacum* vel *Apostolorum*, quæ mundificant & detergunt dicta ulcera. Conveniens etiam est decoctum scordii cum vino paratum, succus taraxaci, nicotianæ, sabinz cum melle mistus, vel sequens unguentum frequentis & experti usus apud Gallos:

℞. Succi. depur. apii,  
Absinth.  
Beton. an. ℥j.  
Plantag. ℥iv.  
Agrimon. ℥ij.  
Mell. rosat. col. ℥iv.

Bollant ad consumptionem succorum:

Remota ab igne incorporentur hoc pulvere:

℞. Gallar. ℥ss.  
Myrrba el. ℥j.  
Thuris,  
Mastich.  
Aloes,  
Sangu. Dragon.  
Sarcocoll. an. ℥j.  
Flor. rosar. rubr.  
Balaustiorum,  
Cin. sarment. vitis an. ℥j.

Hæc incorporentur cum modò dicto unguento: quo feliciter uti dixi, utuntur adhuc temporis Galli.

Huc facit quoque efficax aqua *SENNERTI lib. 1. Prax. Part. 3. Sect. 4. cap. 1.* quæ etiam Album Græcum ingreditur: Vid. *HILDANUS Cent. 2. Obs. 23.* Quin & stercora animalium, in specie stercus canis ossa rodentis applicatum, imprimis ubi nimis unduosa antea sunt applicata, optimè conducit. Convenit etiam stercus bovinum cum vino veteri expressum & applicatum. Elegans hic est observatio *FORESTI in l. 7. Obs. 4.* de quodam, qui ulcus desperatum habuit, ita ut à nullo curari potuerit: huic apposuit quidam stercus caprinum cum vino generoso expressum, & eo modo ulcus consolidatum fuit: id quod etiam in aliis postmodum adhibuit.

Mercurialia etiam conducunt in his ulceribus; hinc unguentum Saturni *Mynsichticum* arcano corallino vulgari, vel cum Mercurio præcipitato mistum, imponendum est: vel abluantur cum decocto calcis vivæ, cui addatur Mercurius dulcis, qui talia ulcera optimè curare solet. *Vi Mercurius præcipitatus* tutius extorrens possit usurpari, optima est præparatio *AMATI LUSITANI Cent. 4. Curat. 51.*

℞. Mercurii vivi,  
Aqua fortis an. part. equal.

Misc. & aqua fortis abstrahatur per retortam, pulvis præcipitatus remanens misceatur cum spiritu vini, digeratur aliquamdiu, & aliquoties ab eodem abstrahatur, semper novum spiritum vini affundendo, donec spontè exsiccetur super Mercurio.

Loco hujus etiam arcanum corallinum commodè potest administrari. Additur hic Mercurius præcipitatus aliis quibusdam unguentis aut balsamis, aut emplastris plus minus, prout ratione circumstantiarum.

## ARTICULUS V.

## D E

## ULCERIBUS DYSEPULOTICIS seu PHAGEDÆNIS.

**H**ujusmodi ulceribus putridis & sordidis vicina sunt Ulcera, quæ aliàs dicta *Ulceres dysepulotici*, *Chironia*, *Telephæa*, & quæ sunt alia nomina, in specie *Phagedæna*, scilicet omnia Ulcera, quæ inveterata sunt, & specialiter in tibiis occurrunt, & hinc tam profundè radicata sunt, ut

vix possint deinde consolidari & curari, dicuntur dysepulotica, item *Chironia*, quod nempe *Chirone Centauro*, famosissimo Chirurgo, opus habeant. Aliàs etiam *Phagedæna* dicuntur à *phagere*, Comedo, Exedo, quod talia ulcera, subinde ad vicina serpendo, accrescant, & augmentum capiant.

## C U R A.

Ad hæc ergo ulcera curanda optimum est, ut, præmissis internis, eluantur frequenter aqua pomorum putridorum destillata, quæ vel sola, vel cum linteis multiplicatis applicata, est insigne remedium in hujusmodi ulceribus plus minus depascentibus: vid. *SCHMUCK in Thes. & AGRI-COLA in Chirurg. Parva*. Aut etiam, si volumus hanc aquam ulterius reddere medicamento fam, in eadem dissolvatur extractum radices aristolochiæ rotundæ, paratum cum spiritu vini. Talis enim aqua cum extracto, optimè mundificat & purificat hæc ipsa ulcera. Vel loco hujus extracti commodè in eadem aqua destillata dissolvi potest *Mercurius dulcis*, vel solus, vel cum saccharo Saturni, in casu, ubi ardoris vel inflammationis adest suspicio, quæ mixtura imponatur cum linteis duplicatis pro cura horum ulcerum: &c.

℞. Aqua calcis vivæ vel pom. putrid. ℔j.  
Spiritus vini rectif. vel theriacal. campb. ℥j. ad ℥ss.

Mercurii dulc. ℥j. ad ℥ij.  
vel solum, vel additâ  
Sacch. Saturni ℥ss.

M. D. S.

*Epithema mundificans.*

Nam ad hujusmodi contumaciore ulcera certum est, quod Mercurialia imprimis requirantur: unde etiam *POTERIUS* felicissimè in usu pro cura horum ulcerum habuit suum calcinatum majus, ut vocat, quod nil aliud fuit, quam Mercurius certo modò præcipitatus. Aliàs Mercurius vulgari modo præcipitatus commodè etiam applicari potest ad imitationem *RVLANDI*:

℞. Aqua Plantag. ℔j.  
Rosar. ℔ss.  
Flor. Aurant. ℥ij.

Mercurii præcipitati pulverisat. ℥ss.

Coqu. lento igne per horæ quadrantem, removeantur & applicentur hinc ulceribus; admodum enim exinde hæc ad consolidationem properant.

Vel applicetur *Fernelii aqua benedicta*, quæ talis:

℞. Aqua Plantag. ℥vj.  
Mercurii præcipitati gr. xij.  
Misc.

Convenit etiam in his ulceribus, frabuantur cum aqua plantaginis, decocto nicotianæ, in quo aliquid aluminis dissolutum est; nam & hæc multum confert ad curanda hæc ulcera. Loco hujus solutio scoriarum reguli antimoni in aqua appropriata habetur experimentum singulare in contumacioribus curandis ulceribus: *RIVERIUS* agrimoniam ad ulcera verminosa commendat. Denique experimentum militare est, si pulvis pyrius sive pulvis nitratus (qui erit optimus, certum est) solvatur in vino, & ita solutio excepta linteolis imponatur ulceribus dysepuloticis, etiam malignis; consolidat enim & mundificat. Hinc ulceribus sic absterlis & elotis, applicetur postmodum commodè etiam unguentum *diapompholygos*, vel nudum, vel cum Mercurio præcipitato mistum: vel balsamus Saturni & sulphuris serebinthi-natus, & cum petiis istis ulceribus potest imponi:

Vel

℞. Ungu. diapomph. ℥ss.  
Sacch. Saturni ℥j.

M. pro Linimento.

Post elutionem cum aqua calcis vivæ, turundis applicetur, desuper imponendo emplastrum gryseum. Hæc enim talia contumaciore ulcera commodè ad consolidationem disponunt: vid. *M. A. N. C. Ann. 6. & 7. Obs. 10.*

Medulla quoque saxorum vel lac lunæ cum paucis granis myrrhæ, aloës, &c. inspersa, egregiè promovet consolidationem. Vel inspergantur pulveres suprà dicti de ulceribus in genere. Singulare quid latet in stercore humano, quod ad ulcera phagedæna corrosiva & cancrofa, etiam in mammis, singulare exhibet specificum: nam dum destillatur stercus humanum, ultimo loco per retortam ascendit oleum admodum fetidum, aliquoties rectificandum, & quod



quod ipsum imprimis illinendum est peripheriis seu circumferentiis huiusmodi ulcerum; impeditur enim sic ulterior progressus, & ulcus pedetentim ad naturalem redit statum.

Non incommoda etiam est compositio PLATERI ad ulcera serpentia, quæ est hæc:

*24. Ceruss.*

*Tut. 12.*

*Sarcocoll. an. 3ij.*

*Myrrh. 3i.*

M. & f. Pulvis subtilissimus, cuius media pars addatur

*Ungu. populi. 3i.*

*Succ. plantag. 3ß.*

*Terebinth. laric. q. s. ut f. Unguentum.*

Reliqua medietas inspergenda est ulceri, & desuper applicandum modò dictum unguentum.

## ARTICULUS VI.

### DE

## ULCERIBUS CANCROSIS.

**M**entio facta est modò *Ulcera* phagedænorum exedentium, quæ propriè loquendo sunt *Ulcera cancrofa*, corrosione arsenicali ad cancri naturam accedentia, & imprimis occupare solent vel loca glandulosa, vel glandulis vicina. Ipsos quod attinet Cancròs, de his sufficienter dictum fuit *suprà*, ubi de *Tumoribus*.

Dictum fuit, eos esse vel occultos vel manifestos: Per manifestos intellige eos, quorum arsenicalis maligna aciditas corrodingo iam in perfectum abiit ulcus corrosivum, & putrefactivum. De his ergo cancrofis ulceribus iam sermo erit.

## DIAGNOSIS.

Eorum signa *suprà* fuerunt prolata; siue oriantur ex cancri anteà occultis, siue exulceratis, siue sint scitri & scrophulæ, qui malè tractati in cancròs exulceratos abeant; quod sit vel per se, vel præpostero remedium usu, quale exempli habet TVLPIVS *lib. 1. obs. 47.* siue sint alia ulcera, quæ putredine & corrosione arsenicali ad cancrorum naturam proximè accedant.

## CURA.

Hæc ipsa & similia cautè admodum specificis sunt tractanda; nam si tantillo acri exasperantur, in deterius abire solent; si verò levioribus tractentur, frustra fieri eorum curationes solent. Ut ergo citra irritationem dolorosam venenum arsenicale corrigatur & tollatur, iuvat imprimis inspergio absorbentium terreorum, cadmiæ, boli, cornu cervi ussi præparati, pulveris bufonum calcinatorum: scilicet bufo & lacerta calcinantur ambo in olla nova benè clausa, postmodum cancer exulceratus seu ulcus cancrosum oblinitur aquâ plantagiolis, & inspergitur huic modò dictus pulvis, qui brevi curat cancrum. Quod si fortitùs agendum sit, recipiatur bufo in olla nova exsiccatus & pulverisatus, addatur hinc parum auripigmenti, piperis nigri, salis communis, & fuliginis siccæ, quæ invicem pulveriscentur, & pulvis inspergatur cancro exulcerato seu ulceri cancroso, & hinc petia salivâ madida desuper est applicanda. Singulare etiam auxilium apud quosdam commendatur stercus felis, simpliciter cancri fluxuatiilibus nutritæ, quod in pulverem redactum mirabiliter iuvat in ulceribus cancrofis. Felis, vel dico, clausa & asservata solis cancri fluxuatiilibus est alenda & nutrienda; hinc enim eius excrementa tam singulares virtutes obtinent. Convenit etiam cremor calcis vivæ.

Hæc si parum emolumentum afferant, aut in ulceribus cancrofis malignis frustranea sint, ad arsenicum confugiendum erit, quod est specificum ad ulcera cancrofa funditus sananda & curanda, modò ita applicetur, ne nimis irritet ulcus cancrosum acrimoniâ suâ atque nociva sua malignitate: siue ergo hoc sub forma pulveris cum aliis applicetur, quod pertinet *pulvis benedictus* ad cancròs ex arsenico, radice ari, fuligine, & similibus, cuius compositio & usus: vid. in FALLOPIO, HARTMANNI *Praxi Chymiatr. de Cancro*, item in *Ep. Libanii*, & aliis quamplurimis locis:

siue, quod melius est, arsenicum priùs sit fuerit fixatum beneficio nitri, & hinc per deliquium resolutum in oleo sine insigni agrimonia: vid. SCHROEDERI *Pharm. lib. 3. pag. 300.* Tale enim oleum *arsenici fixi*, cum spiritu vini edulcoratum, aliis omnibus meritò palmam præripit in cura cancrorum exulceratorum, cui simul addendum oleum myrrhæ, ut habet SCHROEDERVS *loc. cit.* siue etiam ipsum arsenicum fixum commodè permiscetur balsamo sulphuris Rulandi, addita simul fuligine furni; hæc enim dant unguentum singulare contra cancròs exulceratos. Nam cancri cura perfecta in arsenico consistit.

Oleum stercoris humani in ulceribus cancrofis summum est remedium; sic enim oleo hoc illinitur, ulterior progressus præcavetur.

KERKRINGIVS *Comment. in BASILII VALENTINI Curram Triumphal.* laudat balsamum antimonii, tanquam summam cancri medelam, applicatum, quo desperatissimum cancrum exulceratum se persanasse restatur.

Post hæc, quæ apta nata sunt, ut curent cancrum exulceratum, imprimis conducunt saturnina remedia, acidum acre corrosivum malignum cancrorum ulcerum, depascens & exulcerans, mirè absorbentia & edulcorantia. Vnde, balsamus Saturni terebinthinatus cum camphora & oleo fuliginis mistus est conveniens admodum remedium. Item saccharum saturni cum fuligine probè attemperatum, & cum succo sonchi & plantaginis illitum, si priùs ducatur in mortario plumbeo, commodè ibidem applicari possunt ad ulcera cancrofa. Item *emplastrum ex saturno*, quod habet TVLPIVS *lib. 1. cap. 47.* Pertinet huic etiam *pulvis Tulpii* ibidem descriptus ex saturno, liquefacto cum ana Mercurii vivi, & qui ab eodem mirè commendatur ad ulcera cancrofa: aut ex hoc amalgamate possunt fieri emplastra appropriata: vid. SCHROEDERVS *cap. de Empl.* ubi habet tale emplastrum, quod multum habet in recessu, & si addatur aliquid mercurii vitæ, erit mirabile. Nam certum est, quod saturnus, ut aliorum pertinacium, ita & ulcerum cancrorum, egregium existit mitigativum: unde, etiam unguenta omnia ulceribus cancrofis applicanda, ducenda & miscenda sunt cum pistillo plumbeo in mortariis plumbeis calidis. Aut sunt etiam communi modo unguenta contra ulcera cancrofa satis proficua ex succis vegetabilium, nempe solani, uvæ inversæ, virgæ aureæ, agrimonia vel geranii *Rupertiani*, & similibus, subactis cum pplveribus saturninis, minio, cerussa, plumbouso &c. in mortario plumbeo; quibus vel ex fuligine vel ex arsenico parata remedia commodè admisceri, aut horum posteriorum acrimonia suspecta illis probè edulcorari potest.

Cavendum tamen ab omnibus unctuosius, cum cancer ab his exasperetur, & latius serpat: hinc prudentiores saltem crocum Martis per reverberationem paratum, aut cornu cervi ussum subtilissimè lavigatum, inspergunt.

Ad hos ipsos tumores cancròsos & ulcera cancrofa, ne latius serpent, commendatur à quibusdam sequens emplastrum:

*24. Ungu. diapomphol. 3ij.*

*Empl. demucilag. 3i.*

*Rad. scrophul.*

*Ari. an. 3ii.*

*Cornu Cervi. uss. præp.*

*Cin. canc. fluxu.*

*Ranar. an. 3ß.*

Misc. in mortario calido: addendo

*Ol. nucell. onor. rec. expr. q. l. ad consentiam debitam Emplastri:*

Applicetur, ne ulterius serpent.

Quod si ulcus cancrosum sordidum videatur, necesse est, sanè, ut blandè tractetur, ne excitetur dolor, ob id sequens medicamentum imponendum est:

*24. Aqua cancrorum,*

*Ranar.*

*Plantag.*

*Card. bened. an. 3ß.*

*Sem. Cydon. subtiliss. pulv. 3ii.*

*Cornu Cervi. uss. præp.*

*Tut. præp.*

*Saturni ussi,*

*Ciner. ranar.*

*Gammar. live Canc. fluxu. an. 3i.*

*Theriac. 3ß.*

Misc.







tingunt; ab his enim empyreuma saltem superficiale induci solet. *Maiorem ambustionem* inferunt olea & oleosa omnia, pix, mel, cera & similia, imprimis si diutius in parte hæserint. *Maximam ambustionem*, & quæ ut plurimum escharam efficiunt, sunt metalla liquefacta, v. g. plumbum fusum, stannum liquefactum aut similia, si hæc contingant partem; in his enim concentratus ignis periculosissimam infert ambustionem.

In omni igne acidum; quod confirmat experientia, vid. **TACHENIUS**: Nam ignis est actus dissolutionis corporum sulphureorum. Omne autem corpus sulphureum habet occultum acidum. Hoc præsupposito, ab omni subiecto igneo, præter motum celerimum, quem ignis infert, acidum ignis se insinuat in partem, & subito liquefacit nutrimentum partium roridum, unde emergunt pustulæ albæ, quæ nihil aliud sunt, quàm nutrimentum partium roridum, ab acido ignis subtili, mediante celerissimo motu, liquefactum. Ab urinosi enim colliquefactum nutrimentum exhibet pustulas nigras.

### DIAGNOSIS.

Malum ipsum ab ægris per se patet, & non absque ciuitate refertur.

### PROGNOSIS.

Quoad *Prognosin*: uti alijs notum est, quod, quod grauior sit ambustio, eò sit peior, hoc in specie observandum venit, ut quod profundior est ambustio, & quod maiores venæ aut arteriæ aut etiam nervi fuerint lēsi, eò etiam periculosior soleat adesse status; partim quoniam post ablata escharam vasa ex toto non conglutinata periculosissimas inferunt hæmorrhagias; partim verò, quia in his locis ex sanguinis impedito motu in partibus vicinis gangræna oriri solet.

### CURA.

In *Cura* ergo removeatur hoc acidum, & ambustio curatur. Interdum simul cum externis primariis usurpantur interna, eaque nitrata, quæ febrem ambustioni supervenientem interdum optimè compescunt: Hinc nitrum fixum, nitrum antimoniatum, pulvis pyrius & similia, internè sunt optima, quibus celeberrima ex lapillis cancrorum parata chirurgia, aut solum ipsi lapilli cancrorum, simul commodè subiungi possunt.

*Externa* quod attinet: quoad eorum usum studiosè observandi sunt ambustionis gradus: Nam in primogradu combustionis remedia ordinaria Emphyreuma, & inde ortam nutrimenti in parte alterationem, tollentia, *Unguenta ad ambusta* Germ. *die Brand-Salben*, ut vocant, applicanda sunt: qualia primariò ferè sunt ex cepis, ex calce viva, ex stercorebus animalium, ex succo cancrorum, & similibus: v. g. ex calce viva lota usitatissimè sunt unguenta ad ambusta, seu applicetur mox spiritus theriacalis camphoratus, aut aqua calcis viæ, vel lixivium ejus, imprimis si paretur cum decocto raparum, recipiendo nempe decoctum raparum, (vel etiam aquam simplicem) in quo colato calx viva recens aliquoties extingatur, ita ut liquor aliquot digitos, 4. vel 5. supereminet. Hæc aqua calcis viæ cum lintheis duplicatis calidè aliquoties imposita, mirè curat ambusta.

Aliàs usitatum est, ut recipiatur calx lota sapius, & ab omni acri sale probè temperata, ac cum quocunque alio permisceatur Ingrediente: v. g. recipienda calx aliquoties lota, eaque probè subigenda est butyro Maiali non salito in mortario saturnino, ut fiat unguentum, quod ipsum applicandum est, idque liquidum, loco ambusto.

Loco calcis viæ recipi potest cerussa.

Melius est unguentum, quod fit ex

24. Calcis viæ p. ij.

Crem. lactis,

Mell. despum. an. p. j.

Hæc omnia probè mista in consistentiam unguenti liquidioris seu Linimenti optimè convenient ad tollenda ambusta.

Melius est, si recipiatur aqua calcis viæ dicto modo parata, cui infundatur oleum lini vel rosarum, quantum sufficit, ut hæc mixtura congelascat in consistentiam butyri, quod unguentum loco ambusto miro cum successu potest illiniri, velicas certò prohibens.

Mellus vix habetur.

Vel

24. Calcis viæ lotæ,

Tnt. Alex. an. ʒij.

Album. ovor. No. ij.

Cam. Aceto destillato & ol. rosar.

F. Linimentum in mortario plumbeo.

Succus etiam allii aut ceparum illitus recenti ambustioni ratione salis volatilis aeris, destruentis acidum in ambustis, exulcerationem inferens, optimum est; aut ex his fiat tale unguentum insignis commendationis:

24. Cepar. crud. ʒij.

Salis,

Sapon. Venet. an. ʒij.

Misc. in mortario, affundendo

Ol. rosar. q. s.

F. Unguentum egregium in ambustis.

vid. **HILDANUS** Cent. 4. Obs. 93.

Aut cepæ cum melle contendantur & imponantur, quod mirè prodest.

Optimum est Linimentum, si cum aceto solvatur minimum, aut lithargyrium, aut cerussa, aut plumbum usum: solutioni filtratæ addatur oleum ovorum, vel oleum raparum recens expressum, vel florum sambuci, vel rosarum q. s. ut coeant in consistentiam Linimenti liquidioris: quæ aliquamdiu ducantur in mortario plumbeo, donec fiat griseum, & asservetur prout. Addi potest camphora cum oleo appropriato soluta, ʒss. pro ʒij. Linimenti.

De Cancris itidem dixi, quod mirabile suppeditent remedium contra ambustiones: id quod fit, si cancri fluviales vivi contendantur in mortario, & succo inde expresso calidè fomentetur pars.

Vel

24. Cancr. fluvial. q. v.

Contusi vivi in mortario misceantur cum butyro Maiali recenti non salito, ferveant commodè & probè despumentur, coquendo tamdiu, donec fiat unguentum subrufum, quod transcolandum est, & experientiæ usum efficacissimum contra recentia ambusta.

Nam etiam ex cancris composita remedia conducunt insigniter, si ex pulvere pyrio orta sit ambustio, contundendo scilicet cancos fluviales cum aqua rosarum, aut, quod melius, cum aqua ranarum aut spermatis ranarum, ex contusis mucilago crassior aquæ permista separetur, eaque pars seu membrum pulvere pyrio ambustum fomentetur & illinatur; nam hæc sunt egregia in tali casu. Notum aliàs est, quod etiam mucilagines, aut, quod melius, mucilago seminis cydoniorum, parata cum spermate ranarum, & cui parum sacchari saturni & camphoræ sit permixtum, illita cum pluma parti ambustæ optimè conducit ad tollendam ambustionem.

Vel

24. Mucil. sem. Cydon.

Ungu. saturnin. iam dicti,

Album. ovor. an. ʒss.

M. pro Linimento: S.

Ambustionis extinctio.

Quo pars ambusta illinatur.

Vulgare est & primà fronte viliissimum remedium, compositum ex p. j. olei olivarum, mista cum albuminis ovi p. ij. quæ duo conquantur & exactè misceantur: & nihilo minus hoc ipsum applicatum verè est unguentum singularissimi effectus. Cui tamen adhuc præferendum est, similiter primà fronte vile apparens, quod fit ex olei lini recens, vel olei nucum recens expressi ʒss. vitellis ovorum No. iv. quæ probè ad albedinem usque conquantur applicantur calidè parti ambustæ, idque egregium cum successu: Vid. **AGRICOLA** Chir. Part. Tr. 3. pag. 342. & **BORELLUS** Observ. Cent. 1. obs. 40.

Solum etiam oleum albuminis ovorum valdè conducit, cuius præparandi modum videbitis in Coll. Pharm. in Schröderum; uti & Rob Sambuci cum spiritu vini dilutum & applicatum.

In grauiori verò combustione, nempe in secundo gradu, talia etiam, sed tamen paulò fortiora, applicanda sunt remedia: nempe ubi pustulæ jam sunt exiguæ, intra hoc ut cutis subiecta sit reddita corrugata, relinquendæ hæc sunt ad diem tertium, quo tempore nisi spontè rumpantur, aperiendæ sunt, & modò dictis unguentis parsulterius curanda.

Sin verò à grauiori ambustione cum subitaneis pustulis ipsa



Ipsa cutis sit combusta, subito pustule sunt aperiendæ, & statim apertis pustulis modò dicta remedia applicanda: aut in apertis vesiculis imponendum est *unguentum emolliens*, quod sit ex stercore gallinæ cocto cum butyro non salito, quæ duo imposita optimè talia curant empyreumata.

Potentius adhuc est, ¶

24. *Flor. salu. rec. M. j.*

*Plantag. M. ij.*

*Butyr. rec. non salit. ʒvj.*

*Sterc. gall. rec. & quantum fieri potest, albiss.*

ʒiij.

Frixentur mutuo per horæ quadrantem, & inde factâ expressione lervetur usui.

Notetur, hoc quia bonum. Vel unguentum emolliens aliud quoddam imponendum est, ut cutis corrugata denuo laxetur. Aut

24. *Pom. dulc. No. li. vel jr.*

*Coqu. in aqua sperm. ranar. vel rosar. ad molliem;*

*Pulpæ trajectæ addantur*

*Sacch. albiss. ʒiij.*

*Camph. gr. xv.*

*Croci gr. v.*

*Misc.*

*Vel*

24. *Pulp. pom. dulc. sub ciner. coct. ʒij.*

*Farin. hordei,*

*Fenugr. an. ʒß.*

*Croci ʒß.*

*M. f. Linimentum*, vel Cataplasma molle, quod illitum & dolores sistit, & cutim corrugatum planam & mollem reddit.

Cataplasma hæc etiam in oculorum ambustione usurari possunt.

Vel applicetur mucilago seminis cydoniorum cum camphora; & saccharo saturni, item albumen ovi cum frustulo aluminis agitatum.

Quodsi verò in tertio gradu ex cute omnino combusta facta sit crassa & eschara, tunc mox apertis omnibus pustulis opera danda est, ut primo vel secundo die separetur eschara, applicando scilicet desuper Linimenta, præter empyreuma corrigentia, imprimis emollientia & laxantia; quæ inter mucilago seminis cydoniorum cum spermate ranarum aut aquæ ejus extracta, addito butyro non salito, oleo liliorum alborum, & vitello ovi, vel ejus oleo, non ultimum meretur locum. Quò & commodè applicatur Linimentum emolliens, paratum ex butyro recenti, bene agitato in mortario plumbeo cum decocto malvæ; hoc enim tanquam linimentum illitum, applicando desuper folia brassicæ repida, subito separat escharam, id quod sit primo vel secundo die.

Quodsi durior & contumacior non separetur eschara, tunc hæc ipsa ferro aliquot incisuris est incidenda, & sordes ac ichores subtus latentes evacuandæ, ne harum acore ulcus profundum depascens & putridum generetur.

Factâ humoris evacuatione modò memorata Emollientia applicanda, donec separetur eschara, qua separata convenientibus Digestivis & Mundificantibus relictum ulcus est consolidandum: in quo casu etiam unguentum ex calce viva, in aqua frigida sexies vel septies lota, cum oleo rosarum & vitello ovi paratum, unguentum album camphoratum, unguentum alabastrinum, &c. convenienter possunt usurari & imponi; item emplastrum ex alcalibus Tachenii & Norimbergense.

## C A P V T I V.

### D E

## L V X A T I O N I B V S.

**H**Æc sufficiant de ulceribus: Pervenimus usque ad *Luxationes*; nam mollium Affectiones Chirurgicas, nempe Tumores, Vulnere & Ulcera absolvimus. Super sunt Affectiones partium durarum, nempe ossium *Luxationes* & *Fracturæ*, faciles & cognitu & curatu.

Notum autem est, quod *luxari* dicantur *Ossa*, quando eorum capita ex situ naturali remonentur, ita ut *Luxatio* propria sit *ossibus*; molles enim ex sede remotæ non *luxari* dicuntur, sed *transponi*, & affectus tales proprio nomine dicuntur *Hernia*.

*Ossa* ex partibus tribus potissimum constant: quarum prima, ossis media, maxima & durissima portio est: altera *Apophysis* seu processus dicitur, qui ossis reliquo quidem continuus, ultra tamen illius superficiem protuberans cernitur: tertia *Epiphysis* seu *Appendix* dicitur, dum os ossi per contiguitatem immediatam tantum adnascitur, ejusque superficiem inæqualem reddit. (2) Notandæ in ossibus cavitates; & quidem vel interiores ac medullam recipientes, vel externæ seu sinus dictæ: quarum hæc, quæ circa articulos, si profundiores, *acetabula* seu acetabula; si superficiales *foramina* appellantur; extra articulos verò quæ deprehenduntur, nomen sinus generale retinent. (3) Membrana cinguntur, periossium dicta, exceptis dentibus & ossibus sesamoideis, item extremitatibus ossium reliquorum, quæ mutuo articulantur; & ab hæc, quicquid ossa duriora & perfectiora sensus habent, recipiunt, seu potius periossium, non autem ossa, sentiunt. (4) Ratione connexionis sciendum, illam fieri aut *κατ' ἀρθρον* seu per articulationem, aut per *σύνουον* seu coalescentiam. Articulatio cum motu est, eoque vel obscuro, qualis in costis & harum vertebra, item in ossibus carpi aut tarsi deprehenditur; vel manifestiore, & *σύνουον* audit, cujusmodi tres numerantur species: prima vocatur *ἐνάρθρωσις*, inarticulatio, ubi ossis recipientis cavitas insignis est, & illius, quod excipitur, caput satis prominens: altera dicitur *ἀνάρθρωσις*, ubi sinus excipiens superficialius est, & extremitas, quæ excipitur, depressa magis est: tertia *σύνουον*, cum os idem excipit & excipitur,

ita ut se invicem subintrent. Quæ autem per *σύνουον* ossium connexio contingit, absque motu est, sitque vel sine medio, vel per medium: Sine medio est (a) futura in ossibus capitis tantum, *ισθμὸς*; (β) harmonia per lineam simplicem; (γ) per *σύνουον* seu inelavationem, quæ dentibus & maxillis intercedit. Cum medio iterum triplex est, scilicet aut interveniente cartilagine, & vocatur *σύνουον*; aut ligamento, & dicitur *σύνουον*; vel carne seu musculo, quam vocant *σύνουον*.

Quando ergo ossa dicto modo connexa ex situ naturali remonentur, dicitur *Luxatio*.

### C A U S Æ.

Ista verò remotio sit *duplex ex causa*: vel ob *vim externam*, vel ob *causam internam*. *Luxatio*, quæ fit per *vim externam*, satis manifesta est sensibus & notissima ægro; causa verò interna ut plurimum solet esse occulta, & vix sensibilis a priori, sed à post priori per effectum cognosci potest.

*Vim externa* fit e.g. in contusionibus, lapsu seu casu, plaga, rupturis violentis, membrorum contorsionibus, & similibus. Uno nomine: quicquid per violentiam ossa loco suo remove, & ita luxationem procurare potest. Si fit *propter causam internam*, ut plurimum est obscura; fit tamen manifesta, si consideremus, quod ad hoc, ut os in suo loco naturali & receptaculo debito contineatur, duo requiruntur.

1. *Spacium debitum*, quod in se recipiat os, & cui ossis caput commodè inseri possit. Hoc ipsum receptaculum pro capitulo ossis recipiendo est nunc majus, nunc verò minus. Quod si fiat, ut caput magnum recipiendum sit in cavitate parva, tunc vel vicinorum ossium processibus, vel utriusque adnatis cartilaginibus cavitas talis efformatur seu excavatur, quæ sufficiens sit recipiendo capiti ossis insignioris: Sic enim v.g. in articulatione humeri cum scapula cavitas ista minor pro processu cornuideo & vicinis illis insignis satis firmandò humero efficitur: sicut in insertionem ossis femoris



ris in os coxae cavitas hujus superficialis per adnatas cartilagineas usque ampliatur, ut optime sufficiat firmando femori.

Hoc est primum requisitum ad firmationem ossis, nempe cavitas sufficiens.

Sequitur

II. Requisite: Hoc est funiculus, qui firmiter alligat os ita ut motum licet, non tamen loco moveri possit. Tales funes sunt primario ligamenta, deinde tendines, & tandem muscoli: Nam hæ partes tanquam chordæ aut funes super articulos hinc inde passæ & extensæ, ossium articulationes firmant.

Ex his duobus requisitis ad ossium firmam insertionem ac motum debitum possumus delabi ad cognoscendas causas internas occultas Luxationum: Scilicet quando cavitas ossis, capiti alterius ossis recipiendo dicata, repletur ab alia quacunque materia, necessario ossis caput extruditur, & ita luxatur; vel quando funiculi ossis, articulationem firmantes, vel relaxantur à causa interna, vel dissecantur à causa externa, os necessario sua sede excidit. Repletur quidem ossis cavitas seu receptaculum, aut, ut vocant Anatomici, sinus, imprimis ob acidum vitiosum & præternaturale, synoviam, seu liquorem istum blandum glutinosum, pro ossis humectatione ad facilitandum motum & capitis ossis in ejus receptaculo rotationem necessarium, inspissans, incrassans, & coagulans. Nam synovia ab acido vitioso incrassata successivè in gypseam & quasi tartaream coagulatur materiam, à quo coagulo sinus ossis repletur, indeque os insertum sensim sensimque suâ sede extruditur, & ita luxatur.

Pejus adhuc est, si istud coagulum peregrinum os seu caput ossis & annatos nervos successivè jungat cum sinu, & quasi ferruminando uniat; hinc enim immobilitas ossis & membri tandem sequitur: & quidem hoc rarius fit, prius frequentius.

Malum prius, nempe luxatio à causa interna, familiare esse solet affectibus arthriticis obnoxiiis, oriundis scilicet ex acidopræternaturali, stomachi vitio in corpore coarctato: unde etiam in iis, qui ischiadico malo laborant, subinde talis luxatio ex tali tartareo coagulo supervenire solet in femore: quia & arthriticorum nodi & topi in articulis manuum & pedum aliam non agnoscunt originem, quam talem synoviae coagulationem ab acido vitioso ortam. Unde etiam tales nullum motum in articulis habent, nec retinere valent.

Ex altera autem parte Ligamenta similesque funiculi nervi laxantur & flaccidi fiunt, & quasi enervantur, unde ossa ex sede sua dilabi patiuntur, ex humiditate serosa salina, fibras nerveas istarum partium laxante, resolvente, simulque stuporem quandam insensilem inferente. Malum hoc iis, qui scorbutico laborant, aut etiam qui affectibus catarrhalibus sunt obnoxii, non infrequens esse solet: nam in his à vitioso scorbutico, aut acido, aut falso rancido sale, vehiculo laticis in partes translato, funiculi nervi laxati & resoluti & ferè insensiles fiunt: unde paralyti scorbuticæ talis subinde articulorum seu ossium in articulis luxatio, & loco sup remotio, supervenit; utut etiam ab externis causis, nempe à contusionibus, à vulneribus transversim factis, ligamenta vel tendines dissecti similem luxationem occasionaliter inferre possunt, qui affectus ad vulnera potius pertinent.

## DIAGNOSIS.

Os luxatum facile potest cognosci, si conferatur cum membro altero in longitudine, in figura, & in situ; luxatum enim os seu membrum ut plurimum longius evadit parte non luxatâ.

Deinde luxatum membrum vix aut non naturali modo moveri potest, secus atque fit in membro non luxato. Item non habet eandem figuram pars luxata cum non luxata: sæpius minus recta, minusque extensa est.

Situs denique partis cum aut introrsum, aut extrorsum, aut in alium situm differentem, detortum est os luxatum, facile monstrat, quodnam malum subsit?

Et quidem luxatio nunc est perfecta, nunc imperfecta: Perfecta, quando articulus seu os omnino è sede sua remotum est: Imperfecta, quando non totaliter è sede sua remotum est os, quin extrusum quidem sit, adhuc tamen in margine receptaculi hæreat.

## PROGNOSIS.

Differentia hæc attendenda propter Prognosin: nam quod magis perfecta est luxatio, eò difficilius curatur; quod minus perfecta, eò facilius.

Præ cæteris omnibus luxationibus luxatio ossis femoris curatu est difficillima; sicuti luxatio ossis in talo seu in pedio est omnium periculosissima.

Difficillima est ossis femoris luxatio, quoniam non potest fieri, nisi à causa violentissima, propterea quod os ipsum femoris cum foris ligamento sit alligatum suo receptaculo in osse coxae, & præterea ambientes musculi insigniores, qui nates constituunt, & femora investunt, facile impediunt, quod minus os femoris nisi à violentissima & insigniori causa luxari possit.

Non potest ergo luxari os femoris, Germ. *die Hufste*, nisi ligamentum illud internum (vid. *Anatomia VESLINGII*, ubi habet egregia de structura & usu hujus ligamenti) aut ruptum omnino, aut insigniter laxatum sit.

Quacunque sit causa, difficulter corrigi potest: Nam ruptum ligamentum consolidationem respuit; laxatum vero difficulter in naturalem tonum restitui potest, cum in profundo nimis loco situm sit, ita ut applicata topica nihil ferè operari possint, quin eorum virtus & efficacia à musculis ani ferè tota impediatur, interna verò nihil aut parum præstant.

Ergo os femoris luxatum rarè potest restitui, quin sæpius claudicationem per vitam durantem inferat, nisi in tenellis subiectis, v. g. infantibus, in quibus propter diuturniorem quietem, propter fasciaciones instituendas, facilius potest talis luxatio femoris curari, quàm in adultis.

Periculosissimam verò dixi istam luxationem, quæ fit in pedio, ubi nempe est os tali, calcanei tria ossa innominata, os cubicularæ, &c. Horum luxatio est periculosa, propterea, quoniam ibidem copiosissimi sunt tendines, & ipsa articulatione ossium est talis, ut sede sua remota vix adeo commode possint restitui, utut rarè perfecte luxentur.

Jam ergo in luxatione hujus pedis, in restitutione sæpius dolor; dissentis aut laceratis non nihil tendinibus convulsiones: si mitius est malum, sæpius inflammationes; si læsio tendinum sit insignior, sæpius Fungi articulares superveniunt: Imprimis convulsio est metuenda. Ex his ergo & similibus causis periculosissima omnium est luxatio pedis, nam sunt septem ossa.

## CURA.

Quoad Curam luxationis: hæc pro varietate causarum subinde varianda est; nam si luxatio est ob vim externam, vulnus, contusionem, lapsum, & sic porro, tunc membro extenso maturè os reponendum est, quo facto, nil aliud incumbit Chirurgus, nisi ut commodis ligaturis os firmet, aptèque collocet, ac inflammationem facile superventuram & alios affectus maturè arceat.

Primaria ergo cura luxationis consistit in Repositione, secundaria in Firmatione & symptomatum remotio-

ne. Ad repositionem requiritur Extensio, ad firmationem Ligatura, ut in figura media reponatur membrum luxatum. Extensio requiritur, quia in parte luxata partes vicinæ musculosæ firmiter contrahuntur; musculi enim omnes sunt tensi, & in se contrahuntur, & breviores redduntur. Necessè est ergo, ut pars extendatur, extensa reponatur, reposita firmetur, & in debito situ collocetur.

Firmatio articuli repositi fit commodis ligaturis & fasciacionibus, fasciis mundis lineis, nunc latis, nunc brevioribus, pro varietate circumstantiarum instituendis.

Fasciaciones factæ non sint nimis arctæ seu strictæ, ne compressis aut coarctatis vasis, tam sanguifluis quàm lymphaticis, oriantur Tumores; ex vitio quidem vasorum sanguifluorum inflammatio; ex vitio verò vasorum lymphaticorum oedema, tumorve serosus: ob id Repellentia dicta & Adstringentia, Germ. *die Dorbande*, & cataplasmata ex modo dictis parata, cum sanguinis & lymphæ motum impediunt, in luxationibus sunt vitanda, utut contrarium fieri adhuc solet in vulgari Chirurgorum Praxi.

Dixi jam fasciaciones non nimis esse debere strictas; neque tamen etiam sint nimis laxæ, ne pars semel restituta denuo elabatur ex loco, novamque luxationem inferat.



Verum cum subinde luxationi in principio, vel ante, vel post factam repositionem luxationis, supervenit inflammatio, necesse est, ut præcaveatur vel removeatur per medicamenta interna, salina alcalia, imprimis volatilia, aut alia terrea vel fixa diaphoretica, acidum enervantia, & sanguinem fluidum & mobilem reddentia, sive cum sive sine sudoris provocatione propinentur; sic enim impeditur sanguinis stagnatio: quibus adjungantur externa, nunc quidem in loco opposito venæ sectio; postmodum admoventur etiam medicamenta externa pro sanguine resolvendo, eumque fluidum reddendo, & moderatè, si quid resistet, discutendo.

Quod si fiat, ut jam facta sit inflammatio, antequam membrum repositum sit, nihil prius tentandum est, quam inflammatio discussa fuerit, & omnino remota quâdiu enim inflammatio durat, tamdiu pars inepta est extensioni; si vero violentius luxatio inflammata extendatur, supervenit ex nimio dolore convulsio interdum lethalis.

Ut ergo inflammatio imminens præcaveatur, vel etiam præsens discutatur, abluendus est articulus repositus, partesque vicinæ vino tepido, aut, quod melius est, vino decoctionis seu ebullitionis vegetabilium aromaticorum, florum aut summitatum hyperici, chamomillæ, verbasci, rorismarini, stachados Arabicæ, & simillum: E. gr.

4. Summ. hyperic. floresc. M. ijß.

Herb. Betonic.

Chamomill.

Rorismar. an. M. j.

Rad. Consol. mai. ʒij.

Aristol. rotund. ʒvj.

Sem. 4. cal. mai. an. ʒß.

Coqu. in f. q. Aqua simpl.

Colat. ʒijß.

adde

Vini infus. salvia vel flor. hyper. ʒvj.

M. S.

Fotus articulorum externus.

Hoc ipso calidè pars foveatur; & ut restituantur fibræ in debitum tonum, humectandæ sunt fasciæ vel sacculi largiter, successive pro cura luxationis tepidè circumvolvendæ; quandoque etiam fasciæ tali decocto per spongiam imbutæ humidæ & calidæ sunt servandæ: nam tali fomento & sanguinis stagnatio & inflammatio præcavetur, & fibrarum, aut laceratarum, aut dissolutarum, aut dissentiarum, in luxatione tonus spontè quasi & faciliè redibit; unde eò facilius luxatio denuo sanabitur. Ubi major adfuerit contusio, augmentanda radix symphyti; ubi vero levis, augeatur radix aristolochig; ubi urgent dolores, capita papaveris possunt addi.

Interim in membro luxato, nunc sub luxatione, nunc post repositionem, supervenit Tumor quandoque œdematosus. Dicunt fieri affluxum in membrum. Intali tumore removendo nihil melius est, quàm ut præmittantur interna sudorifera, & loca externa oleo volatili fortiter penetrante illinantur, tam in loco luxato, quàm tumido, ut discorietur tumor, & pars firmetur. Conveniunt ergo Litus cum oleo destillato tartari & ossium humanorum, oleo pinguedinis humanæ, &c. quæ, quando sunt nimis scetida, rectificentur prius cum cornu cervi usso, vel simili parte animalium, ut supra calcè vivam; sic sunt admodum penetrantia & discutiva. Si suspicio sit, hujusmodi luxationes à coagulo gypseo vel tartarico excitari, illinantur partes petroleo; vel balsamum Peruvianum, cum vitello ovi dissolutum, misceatur cum spiritu baccarum juniperi temperato, & sub forma linimenti illinatur parti luxatæ; & locis vicinis imponatur vel fasciæ sicca calida, vel, quibus placet, emplastrum quoddam nervinum, vel fiat emplastrum ex cera flava & resina albissima, quibus liquefactis immittatur succini & gummi elemi sufficiens quantitas, ut ita coeant in massam homogeneam, quæ postmodum malaxetur cum balsamo Peruviano, & tum abie in emplastrum plus minus spissum; hoc illinantur lintea & applicetur membro luxato, ita ut non exactè coeat, sed extremitates emplastri saltem se contingant, quia ordinariò aliqualis tumor & intumescencia supervenit partibus luxatis: unde si emplastrum tenacius sibi superimponatur, impedit dictum tumorem, quod non semper consultum est.

Communiter partem, scilicet externam, & membrum totum luxatum, inungunt cum oleo rosarum, liliorum alborum, cum oleo omphacino & similibus, quæ tamen illinationes potius sunt fugiendæ, nisi forsan oleum hyperici cum

oleo destillato Terebinthina temperatum, commodè admitti possit. Nam ista supra dicta olea mucilaginosæ oblinendo poros, insensibilem transpirationem impediunt, imprimis cum luxatio primis diebus sæpè ad aliquod tempus pro robore partis luxatæ sine repetita deligatione relinquenda sit: unde ex talibus oleosis nimis pruritus tollitur, dum pars religata fovetur, & abluitur cum decoctis plantarum nervinarum aromaticarum, in aqua coctarum, quibus tantillum lixivii communis additum sit. Item dicta olea idcirco sunt adhibenda, cum sint emollientia & laxantia, uti notum est, & si penetrant, nihil aliud præstant, quàm ut fibras nerveas ulterius laxent, & ita humorum, ut vocant, affluxui seu stagnationi, aut saltem faciliori relaxationi, ut ita dicam, occasionem dent.

Qui non admovent olea Chirurgi, admoveere solent emplastra aut cataplasmata conspantia & adstringentia, ex bolo Armena, terra sigillata, sanguine Draconis, thure, mastiche, cum albumine ovi aut cera aut similibus. Hujusmodi tamen cataplasmata & emplastra adstringentia nullo modo adhibenda; utut enim interdum cerâ in visceatur, tamen nihil aliud faciunt, nisi quod poros oppleant, cutis eorum vis adstrictiora, quæ non nisi per corporalem contactum sit, intus penetrare nequeat: & posito hoc fieri, si valide partes nerveæ fibrosæ à luxatione extensæ adstringantur, firmabitur equidem membrum, sed metus est, ne dum semper circa articulum luxatum aliqualis fieri soleat intumescencia, ne, arctatis porulis intimis, sanguinis motus impediat, & inflammatio aliisque tumor exinde inducatur. Adhuc insulsum est, velle fibras lasas in tonum naturalem redigere hisce adstringentibus; genuina enim restrictio aut restauratio fibrarum nervearum fit per aromatica volatilia nervosa, vel fortum formâ, vel emplastrorum, applicanda, v. g. ex gummi elemi, succino, balsamo Peruviano, &c. & aliquod tempus continuanda.

Hæc est cura luxationis, factæ à vi externa. Quæ verò luxatio fit propter os, ob coagulum gypseum à sua sede remotum, alia requirit remedia, nempe talia, quæ materiam istam coagulatam denuo resolvere & attenuare valent, quod in incipiente facilius fieri potest: In facta verò coagulatione & firmata luxatione negotium est penitus difficile, imo ut plurimum frustraneum. Conveniunt ergo, speciatim imminente coagulatione, interna remedia, quæ acidum quodcunque destruunt, tam fixa quàm volatilia, & acriora resolventia, quæ & præcavent talia coagula, & eadem jam facta imprimis resolvunt. Ex horum censu comperta partim, partim laudanda sunt remedia ex tartaro, ex quo parata volatilia utramque faciunt paginam in hujusmodi morbis articularibus, ab acido vitioso ortis; hoc enim ablato coagulum solvitur sensim: sive sit spiritus tartari volatilis ex fecibus vini paratus, sive sit spiritus tartari volatilis cum ana niri per retortam tubulatam pulsus, sive, qui modus est optimus, qui ex tartaro per fermentationem cum proprio aleali præparatur, spiritus insigniter penetrans. Hujusmodi tartarea medicamenta coagula talia continuato usu optimè resolvunt. Post hæc tartarea, salia volatilia quacunque, ut sal ammoniacum, spiritus & sal volatile ossium humanorum, sunt appropriatissima remedia, præmissis tamen pro ratione circumstantiarum appropriatis laxantibus & sudoriferis ac similibus.

Externè similia acidum destruentia & coagulum resolventia applicanda sunt. Mitius remedium est petroleum, item balsamus Peruvianus cum vitello ovi dissolutus, & cum spiritu vini, vel simpliciter rectificato, vel cum spiritu juniperi temperato, subactus & illitus. Melior adhuc est spiritus lumbicorum terrestrum per putrefactionem paratus, crebrius inunctus, vel solus, vel mistus cum ana spiritus salis ammoniaci; nam hi in loco calido crebrius inuncti tandem penetrant, & peregrina coagula, quantum possibile, egregiè dissolvunt. Oleum tartari fatidum destillatum horrendum est ratione odoris; nihilominus tamen nobile admodum ratione efficaciz, vel per se, vel cum oleo ossium humanorum aliquoties destillando mixtum, & illitum. Item emplastrum sticticum Crollii cum oleo Philosophorum malaxatum & applicatum, sicut etiam convenit emplastrum de pice Poterii, quod habet Cent. 2. Obs. 10. 13. 39. & 86. Ad cuius imitationem:

4. Pic. naval. ʒij.

Terebinth. ʒij.

Liquefactis, & ubi opus fuerit, cum olei chamomillæ q. f. subactis, adde successivè inspergendo & bene agitando,

Flor.



*Flor. sulphuris 3ij.*

*Pulv. iuccini,*

*Mastic. an. 3i.*

Mista inducitur super alutem aut linteum crassum in forma quadrata oblonga absque sindone:

D. S.

*Emplastrum dissolvens.*

Egregium est in doloribus circa os sacrum ac ischium ex nimia onerum gestatione, aut simili causa externa, internarum partium nexum plus minus lædente, natis.

Uno nomine: omnia ea remedia externa, quæ aliis in confirmato malo ischiadico usurpari solent, commodè etiam hic in usum vocantur, cum omnia sint acidum destruentia & resolventia.

Interdum per accidens evenit, ut, nisi maturè reponantur ossa luxata, tale coagulum peregrinum in ossis sinu reperiatur, à quo enato impeditur postmodum ossis repositio, adeo, ut nisi coagulum illud fuerit remotum, & non reponi nequeat: pro quo egregium est sequens oleum destillatum, admodum penetrans, sed gravis odoris:

*℞. Ol. oss. hum. destill. part. i.*

*Tartari fact. part. ii.*

Hæc mista affunduntur calci vivæ (hæc enim absorbet actum ex oleis, ut ratione salis volatilis fiant penetrantiora) & ita per retortam destillatur oleum penetrans, extirpans illudendum, egregii usus.

Remedia etiam hæcenus dicta usurpanda sunt in luxatione ex coagulatione synoviae incipiente & imminente; nam factam iam dissolvere difficillimum est, nisi forsitan Mercurialis aliquid faciat.

Quod si verò funiculi luxati aut resoluti quasi occasionem subministrant luxationibus, tunc hæ ipsæ restituntur præmissis universalibus internis sudoriferis, additis nris, seu sale volatili oleoso constantibus: hinc conveniunt omnia ex ligno sassafras parata remedia, quin & spiritus salis ammoniaci oleosus & aromaticus crebrius usurpatus; nam sunt diuturni affectus. Hinc imprimis conducit spiritus lumbricorum terrestrium per fermentationem paratus, & cum eodem parata essentia contra arthritidem vagantem egregia in hoc casu, in specie, ubi ex radice scorbutica huiusmodi proveniat luxatio & laxatio funicularum nervorum. Præ ceteris convenit Aurum diaphoreticum Perierii.

Hæc crebrius & aliquandiu expectando sudorem usurpatis & continuatis, applicanda sunt præterea externe nervina aromatica, & diaphoretica seu discutientia, quæ ipsa partem luxatam & partes nerveas laxatas in naturalem tonum dequod faciunt: quibus subjungenda sunt adstrin-

gentia, nervinis temperata, ut firmetur pars læsa in naturali tono.

Pro qua cura optima & satis accurata est methodus, quæ præscripta & usu experta est ab HILDANO Cent. 6. Obs. 100. methodus non est inelegans, & quæ faciliè in quibysdam potest emendari. Ergo Lumbricalia etiam hic externe palmas obtinent; unde ex lumbricis paratus spiritus, & liquor, eo modo, quo præscribitur ab HILDANO loco citato, & externe illitus, conducet ad huiusmodi luxationes. Item essentia contra arthritidem vagantem Timæi interne & externe est proficua. Convenit quoque emplastrum Hildani, aut etiam, quod parari potest, aliud ex sola Tacamahaca & caranna, cum oleo succini destillato malaxatis. Emplastrum tale post frictionem & illitionem cum lumbricallibus toti articulo, vel ubi repines sunt articulum firmantes, impositum commodè conducit: aut etiam emplastrum sticticum Crolii cum oleo tartari, vel cum oleo terra, modernorum oleo Philosophorum, vel cum petroleo, subactum, alutæ inductum & applicatum, insigniter in tali casu conferre solet, ubi laxati & resoluti funiculi nervi sunt occasioalis causa luxationis. Oleum terræ illitum ligamenti & tendinibus artuum relaxatis, experimentum fuit BARBETTE; resolvit enim lympham, & firmat ligamenta, non neglecta vel omissa debita & conveniente fasciatione & deligatione.

In specie, quod attinet enchiresin, pertinet ad Chirurgiam mechanicam. Hæc verò omnibus luxationibus, mutatis mutandis, applicari possunt.

Fit etiam interdum, ut à causa externa simul frangatur, & luxetur, malum perquam difficile, circa quod necesse est, ut simul curetur fractura & luxatio. Fiat vel sub puncto extensionis & repositionis; dum enim extenditur membrum, necesse est, ut luxata & fracta pars eadem vice reponatur, & sub ista extensione coadaptetur, quo facto ligatura debita instituenda venit.

In luxata maxilla, si est à vi externa, repositio est facilis, si ex utraque parte luxata sit; si altera verò parte maxilla luxetur, promptum remedium est alapa inflata.

Potèrò parvum est os, quod luxatum varia inferre mala, nempe os coccygis, quod luxatur tam introsum, quam extrorsum, ut in partu difficili. Hanc utramque luxationem qui vult cognoscere, & reponendi modum considerare, vid. Ann. 3. M. A. N. C. Obs. 135.

Luxatio ossis femoris difficillimè curatur, ut maneat firma, quia os femoris conjungitur cum suo acetabulo per firmum ligamentum: quod si luxatum, difficillimum vel planè frustraneum est repositum: si fractum, impossibilis est restitutio fibrarum, & claudi sunt ægri. Hæc de luxatione.

## C A P V T V.

D. E.

## FRACTURIS.

**S**uper sunt tractandæ Fracturæ. Dicitur idem in ossis Fractura, quod in parte molli vulnus, ut partes corporis duræ seu ossa à quacunque causa, sæpius quidem ab insigni vi, tam externa quam interna, subito discontinuata, fracta dicantur.

### C A U S Æ.

Ut enim cause omnis fracturæ frequentissimè sint violentiæ externæ, nihilominus tamen observatum est, quod à causa interna, nempe à nimis convulsionibus artuum, manus & pedes fracti & discontinuati fuerint: Exemplum tale refert Medicus Norimbergensis in M. A. N. C. Ann. 1. obs. 225.

Frangitur os vel secundum latitudinem, adedque transversim, in quo casu interdum simul insigniter conteritur; vel frangitur os secundum longitudinem, adedque saltem finditur, diciturque propriè Fissura. Chirurgi nostros priorem fracturæ speciem vocant German. einen Schlusbruch, Imprimis si sit fractura cum vulnere, ita ut aliquid de ossis fracto foras promineat; posterior verò

species, nempe fissura, vocatur iisdem Germ. ein Klackbruch.

Hæc duæ fracturarum species probe sunt discernendæ, cum differentis admodum sint naturæ, & diversissima etiam post se trahant symptomata.

Per transversum quidem factæ fracturæ etiam ab imperitis facillimè cognosci possunt, idque tunc imprimis, quando ossa fracta etiam à loco suo commota fuerint: & si externa vis lædens accesserit, siue ex solocatu ossis fracta sint, non possunt tamen non ingentes dolores molestique inferre partibus membranosis & fibrosis superjacentibus, qui sunt atrociores, si fissura ossis separata atrocius partes cutaneas vel membranas læserit aut punxerit. Accedit Tactus sensus, quopotest percipi fracturam in ossis, & ed magis, si sede sua motum fuerit. Accedit motus in ossis fracto per transversum cessans vel depravatns, quatenus figura membri circa os fractum mutata est. Accedit, quod sæpius membrum fractum appareat brevius aut distortum à simili figura, dum musculi, ossa separata trahunt versus suum principium.

Accedunt & causæ externæ aliæ, à quibus facillimè ossis

Vuu

fra-



fractura pater. Imprimis autem hoc consideratu dignum est, quod in fractura partium superjacentium musculofarum & nervosarum pori naturales ex contusione à fractura laceratione transformati, simulque ob dolorem & hinc junctam fibrarum nervearum crispationem angustati, facile cursus motusque sanguinis naturalis & lymphæ impediunt, remorentur & stant; unde præter ordinariam aliqualem partem fracturæ intumescuntiam, nunc inflammationes, nunc ædemata, familiares fracturarum sunt comites, sæpius in principio supervenientes.

Non autem confundendi sunt hi tumores, qui in principio fracturæ superveniunt, cum inflammatione aut erysipelate. Chirurghi vocant Germ. *ein Wund-Fieber*, id est *Febris vulneraria* quæ interdum quarto, quinto aut septimo die post fractum & repositum os supervenire solet, ita ut nunc simpliciter aliquod erysipelas in loco fracturæ efflorescat, nunc horror & rigor, & insequens æstus, erysipelas tale soleat comitari.

Hujus causa est varia, in specie tamen supervenit, quando occasione fracturæ partes nervæ, tendinosæ & membranosæ lase fuerint, idque in specie in corpore cacochymico, ubi occasione partium nervosarum lacerationum, harum nutrimentum proximum alteratur, quod ipsum contrahit acorem, & irritando partes nervæ erysipelas infert; quæ occasione commota camarina succorum facile febrem excitare solet, ubi subinde solet esse suspicio *festucarum*, hinc inde ex osse fracto procedentium, & partes vicinæ lædendum aut pungentium plus minus.

Hæc ita quidem quoad fracturam transversam factas se habent: quæ quod simpliciores, eo minus periculosæ; si cum vulnere, sunt multo periculosiores; si cum abscessu ossis, ita ut ossicula separata incipiant suppurari, sunt omnium periculosissimæ.

Quod attinet *Fissuras*: hæc etiam sæpius in occulto latent, in specie si minores fuerint, & non nisi tardè per varia ac gravia supervenientia symptomata se manifestant: scilicet ex casu vel ex lapsu vel ex saltu fortiori, vel in contusione membri in lapidem perpendiculari, vel similibus, fit subinde, ut findatur in quodam loco os, idque pro constitutione ægri vel naturali, vel præternaturali seu morboſa, vel facilis vel difficilis.

Hinc senes levi occasione & violentiâ incurrunt fracturas ossium, tam transversales quàm longitudinales, quia eorum ossa sunt arida & facile scissilia, facileque finduntur; & ii, quibus ex contagio luis repere per nutrimentum ossium corruptum ipsa ossa cariola facta sunt, facillimè eorum fracturam patiuntur. Si ergo finditur os, pedecentim dolor ibidem locorum exoritur, profundus tamen, & in principio osteocopus, nunc maior nunc minor, pro ratione scissuræ, patiens tamen munera solita adhuc cupo isto membro ferè obire potest: hinc levis quidam tumor, interdum rubescens nonnihil, simul successivè se manifestat: verùm hæc in minoribus fissuris tardius supervenit, quia ex fissura nutrimentum ossis proximum dilapsum & quasi transudans, intra periossium & partes vicinæ successivè alteratur & corrumpitur, & sensim secundum longitudinem membri defluens usque ad loca articulationis vicina congeritur, ubi tendines copiosiores & ardui teſti, progressum ulteriorem impediunt, unde ibidem tandem congestum in abscessum & ulcus transformatur; dum interea ipsum os in loco scisso corruptionem & cariem concipit, unde infra fissuram enatum plicus continuo quasi fomite sustentatur & conservatur.

Hæc fissuræ, quæ non sunt adeo raræ, nisi tempestivè fuerint cognite, si tandem ulcera illa producant, vulgo pro abscessibus ex defluxionibus corporis habentur, quæ Germanis vocantur *Leib Flusse*, cum in loco abscessus facti, omnis cura sit irrita, propterea quoniam obortus abscessus sæpius remotus est longius à loco ossis læsi: unde etiam in his casibus internâ purgantia & sudorifera, externa vero balsamica quæcunque malum diu protrahunt, nunquam curant, nisi lateus & abscondita fissura detegatur.

## D I A G N O S I S.

Necesse ergo est, ut Chirurgus sit admodum accuratus & judiciosus in cognitione harum & similium fissurarum & fracturarum secundum longitudinem, expiscando sedulè causam antecedentem, & dolens & tumens membrum totum percutiendo, & hinc inde digitis investigando, utrum per omnia sibi æqualesit, neque aliquid rimulæ vel inguallitatis, instar fissuræ in baculo quodam fuso, vel in profundo asperigas, signum cariei, percipi queat: perquirat etiam, an in casu v. g. vel motu, sonus quidam & strepitus vel similia in membro læso exaudita fuerint: an brevi post tumor ibidem subortus fuerit? an non perciperit successivum motum materię lentè descendentis quasi in abscessum? & quæ sunt similia signa, ex quibus acutè conjecturâ fissuram cognoscere debet. Vid. FELIX WURZIUS.

## P R O G N O S I S.

Fracturæ hæc, prout variant tam ex se, quàm ratione partium fractæ, & ratione partium in consensum tractarum, atque ratione symptomatum, &c. variant.

In genere fissuræ seu fracturæ ossium secundum longitudinem, utut ex omnibus fracturis sint facillimè curatæ, tamen difficilior cognoscuntur; hinc non ritè curatæ aut neque ulcus post se trahunt: imprimis si in loco fuso ossium caries superveniat, admodum periculose sunt, & sæpius ad membrorum abscissionem deducunt.

Fracturæ transversales cognitæ sunt faciliores, curatæ difficiliores.

Fracturæ, in quibus loca ossium sunt minus reſusa, ut non habeant multas prominentias acutas, pungentes, ossaque fracta transversim non penitus loco suo remota, facilius curantur; quæ verò semotè, difficilior longe.

Si ut fractum & comminutum fuerit os in frustula & fragmenta, periculosum est; omnino enim conjunctum solet esse vulnus, nunc sensibile nunc occultum, quod sub cute partes membranosas lædit, adeoque abscessus imminet.

Potius si sit fractura ossium, ubi ossa duo conjuncta sunt, si alterum saltem fractum, minus periculosum est, si verò utrumque, malus est: Nam in osse uno fracto reliquum os firmat membrum, & non tam validâ extensione opus est. Postmodum os sanum etiam sulci instar se habet, quo alterum non potest loco moveri.

Os fractum in medio sui dat fracturam leviolem, quàm circa articulum: Nam hujus repositio & firmatio longe sunt difficiliores: item circa articulum sunt plures tendines, multi nervi, &c. unde periculum est, ne inferantur varia symptomata.

Item os fractum, quod tegitur multis musculis, minus periculi habet ratione symptomatum, quàm quod frangitur circa loca tendinosa & fibrosa: v. g. si v. b. circa furas frangitur, minus periculum est, quàm in talo.

Si os fractum sit absque vulnere, & lésione partium mollium, eo levior est cura; si verò cum vulnere partium mollium & contusione, periculosa est fractura, & periculosa inflammationes, dolores, convulsionem, interdum gangrenam, infert.

Si est fractura ossium in plura frustula, subinde necessarium est, ut ossa separentur à se invicem; quod fit nunc citius in minoribus, nunc tardius in majoribus: citius, si ossa penitus fuerint separata; tardius, si ossicula adhuc hæreant cum membranis.

Ossa præter reliquas substantias, prout sunt vel maiora vel minora, vel magis vel minus porosa, nunc citius nunc tardius solent consolidari, pro varietate ætatis, constitutionis ægri, vitæ generis, ac similibus circumstantiarum; ut plurimum consolidantur à die 20. ad 25. alia subinde ad 40. 50. vel 60. in majoribus, extenduntur. Minora ossa fracta intra 7. aut 14. diem ferè sanantur; ossa maiora ferè intra 20. ad 40. præter præter curationem recipiunt.

Præ reliquis ossa femoris fracta rarè consolidantur in integrum, quia semur circumseptum est vastissimis musculis, mediantibus quibus fractum os vix ritè reponi vel firmari potest, quin denuo elabatur, vel figuram vitiosam contrahat: adeoque instar regulæ erit, si semur fractum sit, in specie in adultis, sine claudicatione non posse restitui.



## C U R A.

Resin. albæ pur. ℥i.  
Terebinth. ℥ij.

In Cura ergo fracturarum duo scopi incumbunt Chirurgis, *prima* ossa fracta in locum naturalem reponere, & reposita firmare: sic enim supervenit naturæ motus, ferruminans ossa fracta. Fracta ergo ossa extendantur, & extensa coaptentur in situm naturalem, tunc necesse est, firmentur, quod fit per fascias, vel per ferulas. Firmatum os fractum postmodum in figura debita est situandum, *media* nempe, & quæ est consuetudo agro: media est, quando membrum est in quiete; sic enim quiescunt omnes muscoli: Item consuetudo hinc etiam attendatur. Facto hoc, dum ossa fracta sunt reposita, & oræ separatae denuo ad se invicem admotæ, tunc natura eadem firmiter denuo *conglutinat*, proprium nempe eorum suggerendo alimentum, quo in spatio ossis separati infuso & indurato, reuniuntur firmiter, ac denuo conglutinantur ipsa ossa. Quod fit *nunc* citius, nunc tardius, pro ratione (1) *ætat*; in senibus enim tardius fit, propter defectum nutrimenti: (2) *Ratione sexus*: sic imprimis notatu dignum est, quod in *gravidis*, si forsan frangatur os, difficillima & tardissima sit huius fracti consolidatio, quæ tamen, si supervenit partus naturalis & legitimus, postmodum facillime ferruminari solet: Vid. M. A. N. C. *Ann. 1. Observat. 25. pag. 91.* (3) *Ratione habitus ægri*: succulenti, *imbricati*, sani, &c. citius conglutinantur, quàm aridi, phthisici, &c. quò magis accedit nutrimentum.

Modus ferruminandi est is: *Liquor alimentosus chylosus ossium*, spermaticus eorum principio similis, per meatus ac poros eorum secundum longitudinem fibrarum, ex quibus primitus ossa coaluerunt, rependo ea nutrit & auget: dum verò in loco fracturæ rectus & naturalis pororum ac meatuum situsest vitatus & impeditus, quoque impeditur naturalis & legitimus alimenti cursus, unde hoc circa locum fracturæ stagnat, & per foramina aperta hinc inde uberius transudat, successivè congeritur, & ita tandem in similibus ossibus duritiem coagulat, sicque tandem callus appellari solet, qui substantiâ quidem similis est ossi, conformatione verò solâ ab eodem differt.

Nullum ergo aliud directè Chirurgi officium est circa *Fracturas*, nisi, ut ossa extensa prius probè circa extremitates oris reponat, mutudque conjungat: quorum prius in fracturis per transversum factis tantum locum habet, nempe Extensio; posterius verò, nempe Coniunctio extremitatum, etiam in fissuris probè observandum est. Postmodum ossa reposita ita, in situ naturali conservat, nempe fasciarum circumligatione & ferularum adaptatione, ac denique membri aptâ collocatione. Indirectè tamen etiam circa *conglutinationem ossium* fractorum mediante *callo* Chirurgus est occupatus, facilitando opus naturæ, præcavendo aut tollendo inflammationem, aliaque symptomata, & admovendo ea, quæ *balsamum naturale* seu alimentum proximum ossium fractorum conservent, & ita conglutinationem & calli generationem promoveant. *Externe* ergo locum fractum consideret, an adsit *inflammatio* vel non? Si adest, hæc prius curet, antequam tantillum circa fracturam tentet. Curatâ hac, fractura curetur, acque reposito osse, locum fracturæ inungat *spiritu vini calido*, vel *solitario*, vel *cum infusione florum hyperici*: vel *illinatur cum spiritu vini*, cui tertia pars *spiritus lumbricorum terrestrium* per putrefactionem admixta sit, ut se infuset in poros, & partes nerveas læsas restituat: vel applicetur *fokus supra* in *Luxatione* commendatus. Si insignis simul adsit *contusio partis*, illinatur *mel cum spiritu vini* probè temperatum; hoc enim loco, nempe in *fractura cum contusione* plus minùs intensa, optimè confert, & contusionem dictam removet, imminentiæque symptomata lenit. Illinatur etiam locus fractus cum *oleo hyperici*, aut fomentando eundem cum *vino decoctionis rorismarini*, aut inungendo *oleum lumbricorum terrestrium*, quæ debent esse acuatæ cum paucò *oleo destillato terebinthinae*, & paucò *oleo destillato rorismarini*, aut *oleo pinguedinis humanæ* ab ossibus humanis calcinatis rectificatæ; quæ singulariter ossibus fractis convenire dicuntur: factò hoc, applicetur *emplastrum* ex *tacamahaca*, malaxatum cum *oleo destillato rorismarini*, quò simplicius, ed melius; aut, quod ut plurimum usu venit, applicandum *emplastrum* ad rupturas seu fracturas, *Germ. ein Bruch-Pflaster*, parandum nempe ex *cera*, *resina*, & *terebinthina*: vid. WURZIUS, qui habet simplex *emplastrum* ex

Estimul. Oper. Tom. II.

Quæ liquefacta & probè permixta super igne, imprægnentur *pulvere radicis ulmarie, bistortæ, & aristolochiæ rotundæ*, donec invicem subacta coeant in consistentiam *emplastri*, sub focum addendo parum *olei destillati ossium humanorum*.

Potest meliorari, si addatur *extractum radicis aristolochiæ rotundæ cum spiritu vini*; item si istis invicem liquefactis addatur *pulvis succini*, ut unâ liquecant; vel factum *emplastrum* malaxetur blandè cum *oleo destillato succini*, vel tempore usus cum *balsamo Peruviano*.

In loco ergo fracturæ, postquam conjunctum & repositum fuerit os, imponitur tale *emplastrum*, ita ut non exactè extremitates *emplastri* se contingant, non verò sibi invicem superimponentur, sed ut aliquantisper hiscant, ne superveniat intumescencia. Ceratum mirabile ad contusiones & fracturas videb. in BAPTISTÆ SITONI *Miscell. Med. Tract. 23. pag. 116.* Præmitti potest, uti dixi, *inunctio* loci cum oleis appropriatis, imprimis cum *oleo lumbricorum terrestrium*, acuatò cum *oleo destillato rorismarini*.

*Emplastro* applicato imponuntur *ferulæ*, quæ postmodum conjunguntur per tria ligamenta.

*Ligationes & fasciationes* sint moderatæ, ita, ut nec sint nimis arctæ, nec nimis laxæ: Nam nimis arctæ partem suffocant: semper enim in loco fracturæ aliqualis supervenit intumescencia, quæ impediri nec potest nec debet; Non ergo deligationes nimis strictæ sunt adducendæ, quia aliàs, si ista intumescencia impediatur, gangrena partis supervenire assolet. A medio seu ipso loco ossis fracti fasciarum deligatio est instituenda, & eodem nunc sursum nunc deorsum pro lege artis sunt ducendæ.

Queritur, an *plures fasciæ* circumligandæ sint? an, verò saltem sufficiat *emplastrum cum ferulis*? Resp. Pars fracta vel est fracta in loco musculis destituto, & magis tendinoso & membranoso, vel non: Si prius, musculi sunt loco multiplicium fasciarum circumvolutarum, & non opus est multis fasciis involvendis: Si posterius, ut firmentur melius ossa, convenienter fasciis duabus contrario situ circumductis (una scilicet ad dextram, altera ad sinistram ducta) parset fascianda, & adaptentur ferulæ.

*Ferularum* numerus nimis, earumque arctia nimis collestio seu connexio est nociva; sepius tres sufficiunt, rarius ultra quatuor ascendendum est; eque ad digitum distantiam à se invicem sint remotæ, ne comprimendo dolorem, aut etiam intumescentiæ impedimentum afferant.

Fugienda ergo sunt in fracturis *cataplasmata* quacunque ex pulveribus adstringentibus, bolo Armena, rosis, balaustris, *thure*, sanguine Draconis, & similibus, cum ovi albumine exceptis, sed pravâ consuetudine, parata; quia poros obstruunt, partem incrustant, insensibilem transpirationem impediunt, & nihil juvant, quin potius nonnulla mala inducunt. Ista etiam ex *succino, mastiche, terra lemnia*, &c. quia ex illis nullus major fructus, quàm ex *cera*, expectari potest. Sin applicanda sint *cataplasmata*, ea paranda sunt ex vulnerariis appropriatis, nempe ex *geranio Robertiano*, confuso & instar *cataplasmati* imposito: inungatur locus fractus *oleo hyperici*, hinc imponatur *cataplasma* ex *pulvere radicis bistortæ* in vino infuso: Hoc enim fit commode pro adiuvanda consolidatione ossis fracti, & impedienda aut præcavenda inflammatione.

Non incongruum est *Unguentum BARTHOLINI C. 6. Histor. 25.* si post tres vel quatuor dies & noctes fasciæ resolvantur, & consideretur locus fractus; ibi, ubi consutum est, abluantur vel *aqua simplici*, vel *cum vino decoctionis plantarum nervinarum & vulnerariarum*, vel *similium*.

Cum his externalis coniungi etiam possunt commodè interna quedam, quæ *promouent callum & præcavent symptomata*; inter quæ eminent *vulneraria*, quibus semper *Rorismarinus* addendus est: eminet etiam *herba agrimonie*, *consolida maior*, *Geranium Robertianum*, *sabina*, aliaque ulceraria in vulnerum & ulcerum cura recensita.

Præteris *osteocolle lapsi*, à 3ss. ad ʒi. in aqua symphyli majoris, vel vino, vel aceto, vel decocto *ninæ peruvicæ*, repetitis vicibus usurpatus, est appropriatissimus, cuius mi-



ra est efficacia in adjuvanda consolidatione ossium fracturum, & in promovendo callo, adeo ut interdum etiam, si nimis diu usurpetur, magnum nimis callum producat: Vid. TACHENIUS Princ. Morbor. pag. 140. HILDANUS Cent. 1. Obs. 91. & Cent. 2. Obs. 50. Per experientiam hoc certum est, quod osteocolle lapis sit mirabilis. Quo autem modo operetur, est serè obscurissimum; tam durus enim est, ut neque igne calcinari, neque menstruis corrosivis commode corrodì possit: multò minus ergo à stomacho erit resolvable. Quicquid sit, tamen singularissimus est in callis ossium fracturum generandis, & augmentandis. Eminet quoque pulvis Fabricii Hildani ex lapide osteocolle:

℞. Lap. osteocolle præp. ℥j.  
Cinnam. cl. ℥ij.  
Saceh. ℥j.

M. f. Pulvis. Dos. ℥ij.

Quod si in fracturis, imprimis cum contusionibus, Nervi, Ligamenta, Tendines, & similes partes nervæ, circa fracturas sint dislocatæ & quasi contortæ, tunc ad torsiones illas partium nervosarum sequens Ceratum Foresti est admodum commendatum, quod post diem septimum fracturæ imponit ad lationem tollendam:

℞. Rad. figill. Salom. ℥iv.  
Alth. ℥j.

Fol. Plantag. M. ij.

Pulveris. coqu. ad consistent. pulvis;  
cui adde

Cera alb. q. s. pro Cerato molli, miscendo cum

Ol. Rosar.

Myrtillor. an. ℥ij.

Terebinth. clar. ℥ij.

Ungu. Egypt.

Dialth. an. ℥j.

Boli Arm. ℥vj.

Sangu. dracon. ℥ij.

Thuris ℥j.

Santal. omni. ℥ij.

M. f. Ceratum.

Cujus usus est, ut post septimum diem calidè imponatur contra prædictos nervorum affectus.

Hæc modò dicta imprimis locum habent in ossium fracturis per transversum factis.

Fissuras quod attinet: si recentes sint, facillè curantur, si loco tumenti & nonnihil dolenti, ubi suspicio est fracturæ, applicetur emplastrum ad fracturas conveniens ex supra dictis, v. g. ex resina cum radice symphyti & similibus paratum; vel etiam omittis ferulis, pro ratione circumstantiarum, membrum deligatum quietum contineatur, sic namque nutrimenti ossis corruptio impeditur, quin cum facta jam corrigetur, & fractura facillè consolidabitur.

Quod si in fissura recenti tumor insignis, molliis tamen & tractabilis, adsit, quod signum est collecti circa locum affectum aut sanguinis aut alius liquoris ex osse fissio transudantis, tunc aperiendus est tumor icalpello, ex liquori contento parandus est exitus: vulnusculum servetur apertum per turundam, & hinc tractetur tanquam fractura cum vulnere; sic enim facillè consolidabitur & os fractum, & etiam vulnus infistum.

Quod si verò, aut ignorantia Chirurgi, aut ex neglectu ipsius ægri, temporis diuturnitate fissura degeneravit in ulcus & abscessum, tunc tumor & abscessus facta alioall muratione aperiendus, & apertura usque ad locum fissuræ continuanda, ut ibidem os fractum, sapissimè simul successu temporis redditum cariosum, commodè curari possit, &c. vel pulvis euphorbii, vel solus vel cum ana radicis iridis Florentinæ, inspergatur; tunc enim abscessus facillè mundificantibus ac consolidantibus curari in totum poterit:

de quibus casibus nemo unquam meliùs scripsit, quàm FELIX WURZ in sua Chirurgia, qui sapè Chirurgorum Germanorum optimus & antesignanus est, ut eum vocat HELMONTIUS.

Hæc in genere de Fracturis per transversum & cum Fissuris.

Et quidem Fracturæ hæc nunc sunt simplices, nunc sunt complicata cum vulnere, ita ut & os frangatur, & superstratæ partes molles musculosæ lacerentur atque pun-gantur.

Post extensionem ergo & repositionem ossis vulnus considerandum venit: Et ubi nihil de osse abscessurum metuitur, labia vulneris vel suturis vel glutine conjungenda sunt, & balsamo vulnerario tractanda: Emplastrum in loco vulneris perforatum seu foraminulatum fracturæ applicandum, ut ita beneficio foraminis commodè vulnus tractari possit: hinc ferulis & fasciis convenienti modo pars læsa tractanda & deliganda, & quotidie semel aut bis pro ratione circumstantiarum est medicanda vel religanda; quod in simplici fractura tertio demum die fieri solet, ut nempe religetur fasciatio prima.

Quod si verò ossis fracti particule insignes extra vulnus promineant, ita ut jam ab ambiente aere alteratæ, & quod citò fit, cadaverifatae fuerint, tunc pars ossis eminens aut lima abradenda, aut tenaciùs adhærens separanda: id quod etiam fieri necesse est, si eminens os & cutim perforans, dextrè reponi nequeat. Sin verò os adhuc sanum & non alteratum sit, tunc denuò in situm convenientem more solito restituendum est, vulnusque factum per unguenta digestiva impolita diutius apertum servandum. Ulcusculum, si est majus, per cutem adducatur; si parvum, relinquatur, apertum tamen servetur, idque cum in finem, ut particule & frustula ossium interdum in fracturis per transversum à toto separatæ, si forsàn coalescere cum reliquo osse nequeant, per vulnus foras extrudi aut etiam extrahi possint.

Quod si mox in principio officula talia omninò separata se manifestent, vossellâ saltim sunt extrahenda; sin verò tantillum adhuc cum toto aut cum periostio saltim cohæreant, naturæ integrum committendum negotium, quæ nunc talia ossa omnino separat, nunc verò denuò eadem consolidat; hoc ipsum verò cum lentè fieri soleat, adjuvanda est ossis facillior conglutinatio unguento parato ex

Mellis virg. ℥ij.

Mili cum

Pulv. lumbric. terrestr. ℥ij.

Quod applicatum convenienter ossis separationem adjuvat: vid. BARBETTE in Chirurg.

Vel etiam, quod melius est:

℞. Pulv. aloes,

Myrrhæ an. ℥j.

Rad. consol. mai.

Aristol. rotund. an. ℥ij.

Euphorb. ℥j.

Terebinth.

Cera an. q. s.

M in formam Linimenti seu unguenti, quo illitum vulnus promover officulorum separationem, si denuò cum toto consolidari nequeant.

Si osse fracto denuò coalito callus nimis magnus genitus sit, corrigendus & imminuendus est, si quod docet HILDANUS Cent. 1. Obs. 91. Si non habeat debitam figuram, opus est interdum, ut corrigatur, quod facillè fit callus nondum est firmatus; si verò est firmatus, sine noxa deformitas non potest curari. Si os iterum frangatur, non frangitur in callo, sed circa callum.

De Fractura vid. in specie Autores Chirurgici.





## C A P V T V I.

D E

## G A N G R Æ N A &amp; S P H A C E L O.

**D**Enique communis omnium affectuum Chirurgorum affectio est partis omnimoda corruptio, *Gangræna & Sphacelus*: quæ voces ex modernorum usu, uti alio in loco monui, ubi nempe de Phrenitide, longè aliud quid significant, quàm apud Veteres. Nihil novi est, ex luxationibus partim per se, partim ex inflammatione superveniente, corripitur partes gangræna & sphacelo: Fracturæ obnoxie sunt gangræne & sphacelo: Vulneribus non ritè curatis facillè gangræna supervenit: Ulcera cacotheca subinde gangrænam concipiunt: Tumores, imprimis sanguineos, comitari solet gangræna & sphacelus. Imprimis distinguendum inter gangrænam & sphacelum est: Gangræna jam significat incipientem partis mortificationem; hinc Germanis audit, *der heiße Brand*, quia cum dolore & aliquali ardore adhuc est conjuncta: Sphacelus verò, ut propriè loquuntur, *Necrosis*, è contrà est perfecta mortificatio partis, & omnimoda vitalitatis carentia; Germanis *der kalte Brand*. Differunt ergo saltem gradualiter gangræna & imminens sphacelus.

## C A U S Æ.

Oritur vel à *Causa externa vel interna*: *Externæ* sunt contusiones, luxationes, lacerationes, morsus animalium venenatorum, & similes: *Internæ* verò morbi pestilentiales, variolæ, morbi chronici cum tumoribus juncti; hujusmodi enim in morbis supervenit gangræna, in specie in pollice pedis, qui nonnihil lividus sit, accipit pustulam, sub hac maculam nigricantem, subito tamen pergit, & integram tibiam occupat.

Ut sim brevis:

*Causa* gangræne & sphaceli in genere sunt ea, quæ quacunque ratione sanguinis & spirituum vitalium distributionem, & per partes circulationem, inhibere valent. Hæc enim ex parte toto in quodam loco aut membro impeditur & sublata pars nativum vigorem omnem amittit: hinc est, quod vix sæpius oriuntur gangræne & sphaceli, quàm ex inflammationibus malè curatis, imprimis si parti inflammata per emplastica imprudenter admota impediatur insensibilis transpiratio; tunc enim sanguis extravasatus stagnans corrumpitur, ex toto putrescit, & partis inflammata gangrænam post se trahit: quæ quidem incipiens, est gangræna, confirmata est sphacelus. Imprimis erysipelata per unguenta oleosa aut mucilaginosa insulse tractata subito serpentem inducunt gangrænam.

Quoad *Causas proximas*: communiter & rectè dicunt, gangrænam & sphacelum esse partis mortificationem, hujusque causam esse calidi nativi extinctionem. Calidum verò hoc consistit in acido volatili & spirituoso, quod principii agentis instar se habet in structura & coagulatione partis seu formatione partis. Hoc acidum ergo vitale conservatur & restauratur continuò à sanguine & spiritu vitali influentibus salis, & occultè acidis. Quæcunque ergo acidum istud destruunt, vel fomitem ejus impedire valent, omnia gangrænam & hinc sphacelum inferunt, adeò ut exinde sequatur, quod in gangræna & sphacelo peccet imprimis alcali, quatenus propter acidi destructionem emergit, vel quatenus in se gentium acidum destruere valent. Hinc subinde post gangrænam & sphacelum supervenit partis fetor & pueredo, signum alcali agentis in acidum, & dissolventis sulphur partis. Et quidem oriuntur he ipsæ mortificationes imprimis in partibus nervosis, minus in partibus sanguineis.

*Causæ remotæ* sunt, quæ illud acidum dissolvunt, & sulphuris partes destruunt. *Causæ remotæ*, quæ ita acidum destruere valent, agunt hoc loco vel immediatè vel mediatè. Mediatè, quæ fomitem ejus, nempe influxum sanguinis & spiritus vitalis, impedire solent, ut *ligatura fortis, contusiones, lacerationes, & similia*, quorum occasione propter vasa læsa impeditur influxus sanguinis & spiritus vitalis; & propter hanc causam partes nervosæ præ reliquis maxime proclives sunt ad gangrænam & sphacelum, quod

Estmull. Oper. Tom. II.

minus sanguine & spiritibus vitalibus irrorationi solcant. Immediatè verò partem lædunt imprimis insensibilis transpiratio prohibita, quæ detenta acrior redditur, & acidum vitale destruendo partem mortificat: *Venena & morbi maligni, morsus animalium venenatorum*, quæ fermento suo maligno alcalinæ prosapiæ acidum destruunt, & sphacelum inferre possunt. Conducunt etiam ad gangrænam ulcera maligna, item inveterata quæcunque, item ulcera cancerosa, uti etiam refrigeratio partium nimia; hinc enim interdum ex frigore extrinsecus irrudente partes gangrænosæ fiunt, quia oclusis poris impeditur transpiratio, & affluxus sanguinis grumescit, unde gangrænam contrahit; Uti etiam nimis firmæ ligaturæ externæ interdum hoc malum inducunt: Id quod fit interdum, si in ossum fracturis locus fractus arctè nimis ligetur; nam uti suo loco habebimus, in omni fractura aliqualis circa locum fractum supervenit necessarius tumor, unde si nimis arctè ligetur tunc fractura, periculum est, ne hinc sanguinis motu impedito, inflammatio ac gangræna superveniat.

## D I A G N O S I S.

*Signa gangræne* imprimis monstrat in inflammationibus, in ulceribus, item in vulneribus partim nervosarum, color floridus nativus plus minus rubicundus, qui mutatur in pallidum obscurum, sublivescens aut cæruleum seu cærulescentem, qui in sphacelo exactè nigrescit. Sub his colorum mutationibus caro partis gangrænosæ antea tensa mox evadit flaccida, mollis, & quasi omni tono ac vigore destituta, ita ut in facto iam sphacelo cutis spontè à partibus separetur, & aqua quædam decolor pravi odoris effluere solet. In parte ipsa nullus arteriarum pulsus sentitur, in incipiente verò ingniter pulsatur; sicuti etiam sensatio ipsa tactus successivè imminuitur, quæ ex toto aboletur in sphacelo; in ipso pars nigrescens odorem cadaverosum spirare incipit. In imminente quidem est acerbus dolor, sed pederentim evanescit. Calor in parte imminuitur, & pars antea calida remittit, hinc manifestè tepet, tandem friget. Hæc manifesta sunt in gangræna & sphacelo, quæ insequuntur inflammationem.

Quod si ulcus evadat gangrænosum, præter dicta signa nullas fordes seu nullam materiam, ut vocant, generare solet, aut si quid est materiæ, est pauca, decolor ac fetida.

## P R O G N O S I S.

Quoad *Prognosin*: præter modò dicta sphacelus est incurabilis, nisi pars mortua ex toto fuerit separata.

Gangræna & sphacelus, quando oriuntur à causa interna, sæpius sunt lethales: Auferatur enim licet integra pars gangrænosæ, in opposita tamen vel alia parte iterum regerminabit malum, & necessariò mortem post se trahit. Hoc certissimum est.

Si ab interna causa gangræna exsurgat in extremitate pedum, tunc certus sit eger de morte, quæ successivè, dum serpit gangræna, necessariò supervenit, si ve manus si ve pedes amputentur: Fermentum enim istud inquinans sanguinem, & ejusdem sulphur virale per modum malignitatis destruit, & sic ad mortem perducit.

Partes quò magis sunt sanguinæ, vel carnes, eò minus corripuntur gangræna & sphacelo, & facilius curantur; partes verò nervosæ ut facilius corripuntur his affectibus, ita difficilius curantur.

Gangræna ab externa causa orta curari potest, si maturè succurratur; ablata enim parte corrupta, reliquum corporis permanet sanum.

Præ ceteris nota est cautela servanda, ne decipiamur in cognoscenda gangræna & sphacelo: nempe si fiat, ut pars sphaceli interdum motum adhuc habeat, quatenus movetur



à tendine oblongo, cujus musculus sit sanus: Ne ergo partem mortificatam pro sana habeamus, cauti sumus, ut reliqua signa conferamus.

## C U R A.

In Cura ergo Gangræne ejusdem progressus est inhibendus; in sphacelo verò pars jam mortificata separanda, & ulterior mortificatio præcavenda ac sistenda venit. Præstamus hoc internis & externis. Interna sunt omnia sudorifera alexipharmaca, qualia sunt *Campora*, quæ internè & externè est optima, *Spiritus vini campboratus*, *Spiritus theriacalis campboratus*, essentia & *Spiritus baccarum sambuci*, *Spiritus cornu cervi proprio sale acuat*, *theriaca*, in *Spiritu vini campborato* propinata, *elixyr proprietatis præservativum*, sive cum *Spiritu vini campborato*, vel *Spiritu theriacali campborato præparatum*, & similia putredini potenter resistentia; *aqua scordii*, *cornu cervi citrata*, cum *campora* & similibus, sunt remedia, quæ in morbis malignis usurpantur, hic possunt administrari. Fuit hæc mixtura a Tilemami:

24. *Theriaca*.  
*Flor. sulphuris an. 3ß.*  
*Rad. Ireos flor. 3vi.*  
*Spir. vini 3vj.*

Mixtura hujus propinentur duo vel tria cochlearia, & expectetur sudor:

24. *Aqua card. bened.*  
*Scord. an. 3iß.*  
*Spiritus theriac. campbor. 3ß. ad 3vii.*  
*Theriaca. Androm. .j.*  
*Cornu cervi sine igne 3ij.*  
*Antimonii diaphor. 3ß.*  
*Syr. ex toto citro 3j.*  
*M. D. S.*

Potio præservans & confortativa.

Externè in metu gangræne, aut hac saltem incipiente, mirè conducit *Spiritus vini vel simplex*, vel *Spiritus vini theriacalis*, vel *Spiritus theriacalis campboratus*, cum linteo calidè impositus; aut, quod melius est, *Spiritus vini permisceatur* probè cum *aloe*, *thure* & *myrrha*, & hæc invicem permixta imponantur: Hæc enim mirè conducunt ad gangrænam incipientem. Loco *Spiritus vini simplicis* longè præferendus est *Spiritus vini theriacalis* vel *campboratus*: Nam in *campora* singularia latent ad curam gangræne experimenta. Item cum in gangræna immineat mortificatio acidi, externè vel acida, vel falso-acida primatum obtinent: Hinc *muria* seu *brodium brassicæ acidæ* experimentum est elegans ad sistendam gangrænam. *Decoctum calcis vine* mirabile est in gangræna, vel solitarium, vel si in eodem decoctum *sulphur*, vel in decocto calcis vivæ dissolvatur *Mercurius dulcis*, addito *Spiritu vini*, quod vocant *Galli aquam phagedænicam*, quam mox ceu expertissimum experimentum ulceribus applicant, præmissa, si opus est, scarificatione. Certè singulare experimentum, uti monui, habetur hæc aqua calcis vivæ cum *Mercurio dulci*, & *Spiritu vini*, sicut hæc abluantur membra, vel ulceribus ipsis linteis duplicata hæc aqua calidà madefacta continuè imponantur, & sæpius repetantur. *Decoctum scoriarum* antimonii in aceto sistit gangrænam; vid. RIVERIUS Cent. 4. Obser. 50. vel ex MINDERERO *decoctum salis ammoniaci in urina agri* applicetur. In usu etiam est *scordium* applicatum, quod ex vegetabili regno vix ulli cedit remedio ad curam gangræne, sive *lixivium decocti scordii* solum, aut cum *radice scorzonæ* & *vincetoxici*, imponatur; nam hæc *lixivia* commoda admodum sunt & proficua; sicut & *succus urticæ* cum linteis duplicatis applicari solet contra ulteriorem gangræne progressum. Vel

24. *Rad. Valeria.*  
*Obstru.*  
*Angel. an. 3i.*  
*Herb. Scord.*  
*Salu.*  
*Summ. absinth.*  
*Flor. chamomill.*  
*Sambuci,*  
*Bacc. iunp. an. M. l.*  
*Myrrh. 3ii.*  
*Incil. & contus. coqu. in*  
*Vinigenerosi Mens. li. in vase clauso:*  
*Colaturæ adde*

*Camp. 3ii.*

Misc. & calidè applicetur.

Gangræna faciei à morbillis relicta aqua marina, cui incoctum fuit *absinthium*, curata vid. in M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 2. pag. 2. & Ann. 4. & 5. obs. 60. pag. 50.

Quin & apud multos usus obtinuit, ut imponatur cataplasma ex *scordio*, *scabiosa*, *alliaris*, *absinthio*, *hyssopo*, *salvia*, *agrimonia* & similibus, quæ cum aqua calcis vivæ dilutione simul decoctæ dant cataplasma admodum egregium. *Radix bryoniæ* recens contusa aut rasa in forma cataplasmatibus imponatur, vel sola, vel cum *cherefolio* mista. Hæc cataplasmatibus sunt qui præferunt cataplasma paratum ex *farina lupinorum*, *fabarum*, ac similitum cum *lixivio dulci* vel *oxymelite*, & gangræne impositum, cum quidam asserant, decocto lupinorum cum vino albo & *lixivio*, addito parum *croci*, nihil requiri posse potentius ad coercendam gangrænam. Item *poma putrida* contusa sine liquoris ullius affusione cocta in gangræna felicissimo cum successo adhibita, vid. in M. A. N. C. Anno 3. obs. 321. Pertinet huc etiam fermentum cerevisiæ, vid. BARTHOLINVS Cent. 5. Hist. 41.

Caput mortuum aqua fortis contusum, & decoctum cum aqua rosarum, in qua summitates panni lintel sunt intincti, & applicati aliquoties calidè gangræne.

In graviore gangræna, præmissa partis profunda scarificatione, conducit *sinus equinus*, coctus in vino, aut aceto, aut urina humana, cum vel sine mica panis, & instat cataplasma applicatus fuit remedium expertum & secretum SYLVII atque BARBETTE. Vel cum eodem simo sequens parari potest cataplasma:

24. *Summ. absinth.*  
*Flor. Chamomill.*  
*Samb. an. M. 1ß.*  
*Herb. Scord. M. 1ß.*  
*Ruta M. l.*  
*Mica panis similag. (potest etiam omitti) 3vii.*  
*Fimi caball. sine equini 3iii.*  
*Coqu. ex aqua muriat. (Germano nomine Laache) Sub finem addendo*  
*Atram. 3ii.*  
*Spir. vini 3iii.*

Mista hæc imponantur.

Vel eluatur scarificata pars cum *muria*, vel cum decocto calcis vivæ, vel decocto RIVERII in Obs. 24. à Fomio communicata, acuat cum vino Hispanico, spiritu vini redificato, campborato theriacali, aut cum spiritu salis ammoniaci, essentia myrrhæ, &c. in quibus aliquid unguenti lithargyrii dissolvendum. Huc etiam pertinet Lotio HILDANI de Gangræna & Sphacelo; vel RIVERII l. 4. obs. 22. ex vino, sale, melle, & aceto. Vel

24. *Muria 3iv.*  
*Spir. vini campb. 3ii.*  
*Ungu. Egypt. 3ii.*  
*Misc.*  
 24. *Aqua calcis vine 3j.*  
*Spir. theriac. campbor. 3iii.*  
*Mercur. sublimati 3ß.*  
*Misc.*

Scarificationis hoc modò probè elotis imponatur vel *Mercurius sublimatus solus*, vel cum *alumine*, capite mortuo vitrioli, *myrrhæ* & *aloe* mixtus; item *lapis medicamentosus Crollii*, similiaque escharotica; aut cum *plumaceolis* applicetur butyrum antimonii, cujus singularem usum RIVERIUS Cent. 1. obs. 84. commendat.

Quod si gangræna sit gravior, & incipiens iam sphacelus, loco scarificato largiter inungendum est unguentum *Aegyptiacum*, & modò dicta unguenta vel cataplasmata imponenda. Sanguis talpæ, si in papyro exsicceetur, illudque postmodum sub usu humectetur cum aqua, & imponatur, contra sphacelum & gangrænam laudatur.

Quod si verò jam in sphacelum degeneraverit gangræna, mortuum ex toto separandum est à parte sana.

Quæritur: quomodo pars ægra à corpore separanda? Usus obtinuit amputare membra, quod sit vel ferro candente vel candefacto, inurendo partem tamdiu, donec ægri percipiant. De loco controversitur, an in articulo, an prope articulum instituenda sit amputatio? v. g. an in gangræna tibie amputandus sit pes sphacelatus infra genu? an verò permittendus sit progressus mortificationi usque ad articulum, & ita instituenda amputatio? Experientia hac in parte



parte ferit iudicium, quæ docet, cum minori symptomatum præsentia, & cum minori egræ iam convalescentis incommodo in actionibus fieri amputationem infra articulum, latitudine præterpropter unius palmæ, German. *etne Hand breit unter dem Gelenke*; sic enim optimè potest curari, ac æger partem, mutilatam licet, pro actionibus usurpare potest.

Ulterius *quæstio* est: an amputatio sit facienda in parte præcisè, ubi cessat mortificatio? an in parte sana? an verò in parte mortificata? *Respondeo*: Si à causa oriatur interna gangræna, necesse est semper, ut largiter in parte sana fiat amputatio, ut nempe sic possit impediri recursus gangrænae in aliam partem; periculum enim est, ne sub cute ulterius serpsit malum, quàm extrinsecus appareat. Si verò gangræna aut sphacelus simpliciter ab externa proveniat causa, sufficit in contermino partis mortuæ cum sana instituere amputationem, & egræ cutistam firmiter ducatur deorsum, ut sic aliquid de parte sana amputetur; vel in ipsa etiam parte mortua amputatio institui potest, modò id, quod adhuc de sphacelo resistat, admoto ferro candente removeatur.

Amputatio fit cum culteris falcatis (Germ. *mit Krummen Messern*), iisque nudis, qui mos est Gallorum; vel cultris ignitis, qui mos est Italicorum: (Prior est convenientior, posterior magis dolorosus, utut non tanta succedat hæmorrhagia:) postmodum cum ferra pro ossibus. BORELLVS habet singulare instrumentum, cum quo in istu possit separari pars egræ. Hæmorrhagia impeditur applicatione pulveris cuiusdam styptici, vel solius terræ vitrioli dulcis, vel, quo nil præstantius, pulveris stercoris suilli. Quidam vitriolum Martis & alumen anaticum proportionem in luco plantaginis, vel aqua ejusdem destillata solvunt, quâ solutione lintea madefacta imponunt. Quidam inspersis pulveribus stypticis crepitum lupi superimponunt, & ultimò cum emplastro diachalcitidis Hildani cooperiunt. Aliis quomo-

do partes amputandæ, & hæmorrhagia reprimenda, vid. *Scriptores Chirurgiæ*.

Nostrates nimis abhorrent amputationem: hinc alius est modus separandi mortuum à sano beneficio butyri antimonii, si scilicet hoc ipso ducatur circulus ibi, ubi desinit mortificatio. Hoc ipso enim, uti aliàs monui de anthrace & carbunculo, circumductus circulus si sit sanabilis sphacelus & gangræna, promptè separatur sanum ab ægro seu mortuo, ita ut dehiscat mortuum à sano, & progressus ulterior mortificationis impediatur, hinc postmodum instat ulceris recentis, nempe suppurantibus & mundificantibus pars sana curari possit. Vel si sphacelus non adeò profundus processerit, necesse est, ut locus scarificetur profunde, locus scarificatus eluatur lixivio, cui addita sit farina lupinorum & aloë; vel eluatur cum aceto, mixto cum spiritu vini, postmodum applicetur unguentum *Ægyptiacum*, vel *vulgare*, vel *Hildani*, quo loca scarificata illinantur; vel loco hujus recipiatur Mercurius præcipitatus, & misceatur cum unguento quocunque mundificativo, & illinantur scarificatæ partes; vel ad imitationem HARTMANNI est *elegans remedium* Mercurius præcipitatus cum oleo nucum coctus in consistentiam, linimenti obscuri, quo illinatur pars sana & egræ. Factæ huc curiosa observatio THIERMAYERS *Cons. lib. 1. pag. 106.* ubi scrotum in variolis sphacelatum per præcipitatum rubrum cum unguento rosato digestivo mixtum, separatim & resarcitum.

Dum hæc fiunt, ultra talia, quæ hinc inde applicantur, ad mortificationem tollendam *Epithema* imponatur, v. g. ex scordio, aristolochia rotunda, radice hirundinaræ, absinthio, bacis juniperi, myrrha, aloë &c. coctis in aqua vel aceto, item vino vel lixivio, addito alumine, vitriolo, sale marino, & similibus, &c. ut impediatur ulterior progressus. Instat omnium sit *Epithema & Cataplasma* HOFFMANNI in *Metb. Medendi* p. 411.





# A P P E N D I X.

## PRAXIS EXTRAORDINARIA.

**M**edicina Practica vulgaris est adhuc manca in-  
quamplurimis, & mutila, idest, defectuosa.  
Causa verò, propter quam Medicina, in specie  
Practica, est manca, duplex est.

I. In Theoria, defectus nempe experimentorum in ma-  
cro & microcosmo, super quæ Theoria Medica solet fun-  
dari. Sed quia adhuc multa experimenta deficiunt, fit, ut  
etiam in Theoria multi sint defectus, qui se exerunt quoti-  
die in Praxi. Et hinc tam studiosè excolitur Chymia & Ana-  
tomia, nempe ex his duobus Pathologia seu morborum dia-  
gnosis & fiendi ratio petenda est.

II. Causa est defectus genuinorum, & hinc generosiorum  
remediorum, tam universalium, quam particularium, seu  
specificorum, id est, defectus remediorum, quæ in se effi-  
cacia sint, ut sine insigni stomachi molestia vim suam exer-  
cere, & morbos statim tollere possint. Hinc qui supra ordi-  
nariam Praxin excellunt, hoc præstant vel ope solidioris  
theoriæ, & observationum circa ægros, vel ope generosio-  
rum remediorum, quibus etiam altiora præstiterunt subli-  
miores Chymici VALENTINUS, PARACELsus, POTERIVS, & similes.

Res ut pateat, notum est, quod in Praxi vulgarisatione  
defectus sufficiat Theoria. Sæpius evenit, ut vix circa radi-  
cem morborum versetur Medicus, sed saltim circa produ-  
cta. (2.) Quod non raro anus aut empiricus melius interdum  
curet, quam etiam studiosus Medicus. Propterea fit,  
ut tam sæpe affectus incurabiles habeantur, non tam propter  
morbum incurabilem, quam propter generosiorum reme-  
diorum defectum.

In Praxi vulgari propter Theoriam mancã sæpius vix cir-  
ca radicem morborum versantur Medici, sed ut plurimum  
vel circa causam occasionalem, vel productum morbosum;  
unde etiam à posteriori, rarius à priori, solent curari ægri.  
V.g. spina digito infixã, vel vitiatum fermentum spinæ in-  
flar partes lædend; ista spina dat tumorem, inflammationem,  
abscessum, &c. sicuti vitata fermenta interna affe-  
ctus chronicos & acutos inferunt. Si verò in isto casu exte-  
rio spina evellitur, fit ut omnia evanescant symptomata:  
Si verò relicta spina saltem anodynus dolor sistitur, si discu-  
titur tumor, aut ad abscessum perducitur, adiuvatur qui-  
dem naturæ motus, sed saltem à posteriori producta morbo-  
sa curando.

Par ratio est in morbis internis, v.g. in malignis, ubi fer-  
mentum exterius haustum massam sanguineam inquinat,  
infert varia symptomata; quo remoto, tollitur febris; si  
non, à posteriori per sudorem & similia curantur ægri. Sic  
contagium luis Venereæ leve est, quo destructo, omnia  
curantur; si non fiat, mediante dicta sudorifera, &c. dis-  
solutione Mercuriali, inquinamentum istud à posteriori  
saltem evocatur. Si talis spina est v.g. istud acre tantillum,  
quod alterat nervos, vellicat & totum corpus in convulsio-  
nes excitat: Si tollitur, morbus cessat; si non, per opiata  
& similia à posteriori occurrendum. Sic v.g. tantillum efflu-  
vium acrius, nares vellicans, statim sternutationem effi-  
cit: Curatur sternutatio à posteriori per opium; per sudori-  
fera à priori temperando acre, quod nares vellicat. Sic tan-  
tillum acidum est, quod instar spinæ radicis dentis infixum  
est, dolorem gravem inferens: Si evellitur, omnis dolor,  
hemicrania, tumor, palpitationis sensus, &c. evanescunt;  
à posteriori verò per externa si quis sistere velit, saltem  
à posteriori symptomata curabit, radice intacta relicta.  
Exilis sæpe est calculus, qui universum corpus interdum  
cruciat: si diffingitur & expellitur, omne malum sublatum  
est; si non, à posteriori anodynus, balneis, linimentis,  
opiatis, diureticis, & similibus succurrimus quidem ægris,  
radicem verò morbi non attingimus. Medicus tamen qui at-  
tendit radicem morbi, ritè se operari existimat; alius verò  
generosiorum remediorum defectum admodum deplorat:  
vid. POTERIVS.

Qui ergo ultra Praxin vulgatam excellere cupiunt, du-  
plici hoc consequuntur medio: vel mediantibus remediis,  
vel mediante modo extraordinario medendi. Illud ii, qui

vel appropriato specifico, vel universalibus instructi sunt;  
posterius ii, qui magneticè aut transplantatoriè morbos  
quosdam chronicos curare satagunt:

Quoad prius: qui appropriato specifico particulari vel  
universalis instructi sunt, uti citius curant ægros, ita quam-  
plurimis remediis commodè super sedere possunt. Sic qui in-  
structus est appropriato remedio, super sedere potest omni  
venæ-sectione, scarificatione, fonticulis, hirudinibus, &  
similibus, quia scit per remedium appropriatum radicem  
morbi curare: si verò subito evenit plethora apparens ex  
sanguinis orgasmo, & appropriato remedio mox sedat effe-  
vescentiam, hinc non opus erit venæ-sectione. Qui instru-  
tus appropriato particulari, vel generoso universali, non  
opus habet purgantibus, malignis nempe & venenatis re-  
mediis; quin, quicquid heterogenei forsan in corpore col-  
lectum fuerit, per appropriatum remedium à secundante  
natura spontè eliminatur vel per urinam, vel per sudorem;  
unde etiam nobilia remedia insensibiliter operantur.

Sola ergo blanda Vomitoria requiruntur in tali casu: nem-  
pe Medicus instructus generosis remediis saltem peccantia in  
primis viis evacuat: vel opus erit interdum lenissimo abster-  
gente primas vias.

Ut reformetur ergo & exaltetur Praxis, ad hæc duo re-  
spiciat Medicus; nempe

1. Theoriam magis exaltet, & promoveat per expe-  
rientiam, & observationes.
2. Remedio, vel appropriato particulari, vel generoso  
universali, sedulo incumbat.

Prius non est unius hominis nec sæculi; ob id quilibet in-  
dustriam adhibeat, ut communicatis pluribus observationi-  
bus Theoriam exaltet; posterius potest acquiri ab artifice  
sedulo, qui generosis remediis incumbit.

Hæc remedia sunt vel *particularia*, vel *universalia*. *Par-  
ticularia* dicuntur specifica, & quæ præcisè hunc vel istum  
morbum levibus quibusdam præmissis solent curare: *Uni-  
versalia* sunt, quæ quæcumque morbum tollere valent.  
His posterioribus insistendum est in specie, quia specifica  
subinde à natura ægrorum solent alterari. Multis exosum,  
paucis cognitum est nomen remedii universalis. Posse ta-  
men dari, ut illustrem ex Praxi vulgari, consideremus sal-  
tem opium, quæcumque symptomata ex spirituum impetu  
sistens, sed saltem palliativè, & quia cum opio est adiuncta  
quædam virulentia narcotica: Sic de absinthio res nota est  
in febribus intermittentibus cachexiis, hydrope, &c. Sal  
volatile urine seu spiritus salis ammoniaci in quamplurimis  
affectibus est optimus: De Marte res nota est, quod in chro-  
nicis morbis sit artifex; à Marte enim omnes acidulæ effi-  
ciam habent, quæ in chronicis morbis curant eos, quos  
Medici ad acidulas ablegant: Notum est de Thermis, quod  
varios morbos curent. Si autem ritè evolveretur natura aci-  
dularum, forsan haberi posset tale remedium efficax. Par  
ratio hæc est atque cum remedio Drebelliano, quo vim vita-  
lem in acre ita concentrant, ut homines quosdam sub aqua  
suffocatos curaverit; nec deest experientia: Vid. POTERIVS,  
qui multum præstitit suo specifico stomachico; au-  
rum ejus diaphoreticum in affectibus nervorum & similibus  
fuit polychrestum. De RULANDO notum est, quan-  
tum præstiterit beneficio aquæ terræ sanctæ, olei Heraclini,  
balsami, & similibus. Quæ habet BASILIUS VALEN-  
TINUS de solo antimonio, notum est. Verissimus Scri-  
ptor est BASILIUS; quo, potest comprobari, modò con-  
sideretur KERCKRINGIUS in *Comm. in Currum Trium-  
phalem Basilii Valentini*.

Queritur ergo: an verum sit, quod dari possit Pa-  
nacea? Affirmat. Nempe remedium universale datur,  
modò huc non trahantur vitia, quæ nec ab ipsa natu-  
ra sunt corrigibilia, verb. gr. conformationis defectus,  
&c.

Quales verò sunt hæc panacæ? Remedia sunt universa-  
lia, ea, quæ sunt valida & generosa, restaurantia vitæ na-  
turæ, id est, quæ vitæ radicem conservant, & eam labefa-  
ctam restituunt. Nempe omnes morbi vitæ insidiantur;  
unde



unde remedia vitam & eius radice vim conservantia, consequenter quovis morbos curabunt.

Resurget pateat, notum est, vite radicem consistere in sanguine, ejusque debita crasi. Crasis hac variat, vel essentialiter vel accidentaliter: Essentialiter ratione principii seminalis, unde vita in radice vel longa vel brevis erit, & dispositivè vel sana vel agra: Accidentaliter variat ratione rerum externarum & digestionis primæ, ratione sex rerum non-naturalium plus minus labefactatæ. Seminalis vis vitalis consistit in ejusdem principio sulphureo, quod est humidum radicale seu acidum pingue, quod coagulat & specificat acium in determinatum corpus. Quicquid ergo hoc sulphur sarrum rectumque conservare valet, potens erit totam naturam conservare & restaurare.

Mediatè seu indirectè hoc fit ratione digestionis primæ, seu fundamenti totius economiæ vitalis. Remedium tale vix sperandum est ex regno vegetabili: Nam huius simplicia, si non sunt venenata aut maligna, sunt alimentitia, & à stomacho nostro subigi solent; nec ex regno animali, cum nobis maximè sint cognata, vel, si quæ sint, sunt saltem particularia. Ergo ex regno minerali investigandum erit. Hinc imprimis à sole, hinc antimonio, cujus sulphur ex parte naturæ est solaris; hinc ex Venere & vitriolo veneris, cuius sulphur ita via est ad naturam solarem, quarunt talia remedia, & juxta hæc tandem in Marte, ejusque genuino sulphure. Hinc tantum tribuitur tincturæ antimonij genuinæ, vitriolo veneris, & ejus igni seu oleo, sive sulphuri ex HELMONTIO: Tinctura lili. Paracelsi nota est; Mercurius diaphoreticus Paracelsi seu Helmontii est Mercurius fixatus à sulphure Veneris, propterea etiam, quia fixus est, & sulphure auri tinctus, vocatur ab HELMONTIO *Aurum Horizontale*. Cinnabaris antimonij particulare est remedium, sed quod multum habet in recessu in febribus malignis & nervorum affectibus: sulphur ex scoris antimonij singulari modo præcipitatum, in epilepsia & morbis infantum est mirabile, partim vomitus, partim sudorem excitans.

Alterum, in quo Praxis solet variari, est cura sympathetica & transplantatoria.

Circa hæc tria sunt consideranda:

1. Quid per hæc nomina sit intelligendum?
2. An dentur?
3. Quodnam sit harum curarum fundamentum?

*Cura sympathetica* ita dicitur, quia fit quasi per consensum, ut in distans curetur morbus à remedio absente, ut tamen fiat certo quodam consensu, quem remedium fovet cum corpore ægro aut parte ægra. *Transplantatoria* vocatur, quando morbus transfertur in aliud subiectum vivum, vel vegetabile, vel animale.

Hæc Curæ sunt medio intercedente tertio, mediante quo à corpore ægro separato in distans sunt, & istud medium vocatur *Magnes*. Dicuntur aliàs *Curæ Magnetica*, quasi magnes ex corpore ægro morbum efficiat, vel quod alterius similiter alteret ipsum morbum. Equidem multa prostant exempla hujusmodi curationum, quæ tamen non omnia sunt bonæ fidei.

Quod *Curam sympatheticam* in specie attinet; res nota est de pulvere sympathetico, ex vitriolo Veneris per calcinationem solis, sole in leone versante. Usus ejus notus est pro cura hæmorrhagiarum externarum, sive forma sicca vel humida, si dissoluto in aqua simplici immergatur linteam cruentum, & applicetur. In internis affectibus subinde utiliter usurpatur, speciatim hæmorrhagiæ, mictu cruento, &c. Sic D. MICHAELIS retulit, se aliquando gravem mictum cruentum cum exulceratione vesicæ curasse, ægro excrementa in distans pulverem excrecente: CNOEFFELIUS excretis scibis dysentericorum super caput mortuum vitrioli, dysenterias curavit. Notus etiam natus restitutus ex TALACOTIO. Multum etiam facit observatio BARTHOLINI Cent. 5. Obs. 41. qui observavit in quodam viro, cui cutis capitis cum capillis fuit decisa, unde cutim istam asservavit in scrinio, ubi eodem modo atque pili in capite ejus in colore mutati fuerint, ita etiam isti pili incute decisa resistentes etiam mutati fuerint. Facit hoc exemplum de viropica laborante, quoties uxor fuit gravida, quod vitium etiam fuit in filium translatum. Quidam equis contusis vel compressis *Perficariam* recentem in aqua frigida maceratam imponunt, donec intepuerit, quo facto sepeliunt in locum, ubi potest faciliè putrescere. Idem efficitur in hominibus graviter contusis: vid. MEYSONE-RIUS de Pulvere sympathetico, annexus est scripto DI-

GBY de Immortalitate anime, ubi refert, se vidisse puellam, graviter contusam ex casu ab alto, ad motionem *Perficariæ* curatam: Unde etiam ad odontalgiam, & curam vulnorum & ulcerum fuit traducta, ubi usus ejus repetendus est. De *magneto magnetico simplici & armario* res nota est. Mulieres lactantes lacte abundantes non melius remedium habent, quàm ut emulgeant suum lac, vel in prunas candentes, vel laminam ferream candefactam. Sic res nota est de verrucis, quod curentur per affricationem lardi recentis, quo putrescente verrucæ evanescent: Vir huius rei testis est FRANCISCUS BACO de VERULAMIO in Sylv. Sylvar. Centur. 10. Hist. 997. Videatur etiam HELMONTIUS Tractatu: *Magnum Oportet*. Pertinet huc manus cadaveris lento morbi intercepti, quæ attractu curat excrecentias; quod HELMONTIUS quidem refert sine exemplo: Sic quædam puella in majori oculi cantho habuit excrecentiam fragiformem, quæ pueri mortui manu mortuam applicavit huic excrecentiæ, & inde curata, & quamprimum infans mortuus putresceret. Hoc etiam testatur D. BOYLE in *Philosophia Experimentalis*, ubi refert, observasse tale exemplum, quod mediante tali contactu excrecentiæ fuerint curatæ. Facit hoc exemplum in hac civitate, ubi quædam mulier, laborans doloribus chronicis crurum, post varia remedia frustra usurpata, tandem sensim levamen habuit per curam sympatheticam: nempe empiricus quidam in urina ejusdem decoxit ovum ad duritiem, quod in minutissima spissa discidit, & denuò in eius urina de novo blandè ebullivit, & sepelivit in acervum fornicarum: Sic atrophiam curavit HARTMANNUS in Praxi Chymiatr. per ovum in urina egri coctum, & in acervum fornicarum sepultum: Sic Medicus quidam Anglus seipsum ex atrophiam curavit, teste BOYLEO.

*Transplantatoria Cura* sunt, quando transplantantur morbi in aliud quoddam subiectum vivum, ut transplantari in animalia sint magis presentaneæ curæ, quàm in vegetabilia. Et quidem transplantantur solum in specie morbi chronici, & qui firmas radices egerunt in corpore egri.

Ad hujusmodi curationes pertinet, quando vel per immediatum contactum egri cum corpore animalis, vel mediato, curatur. Immediatè fit v.g. quod refert RIVERIUS, se vidisse bis curatam paronychiam immisso digito in aurem fells, morbo in felle transplantato: vid. RIVERIUS Cent. 4. Obs. 19. & 63. De catellis podagricis & colicis dolores mitigantibus, & eos dolores, sanatis egri, sibi contrahentibus, vid. BARTHOLINUS Cent. 3. Hist. 66. Centur. 6. Hist. 53. Iterum à se refert PETRUS à CASTRO in M. S. curatum, dum ex urina egri cum farina placentas fecit, & blandè exsiccatas obtulit feli vel canis esurienti, idero sublato: Similem historiam refert BOYLE citat. loc. Sic podagra curatur per transplantationem, nimirum quando ungues & capilli in salicem vel radicem iuglandis sodiuntur: vid. TIMÆUS von Guldenclee, in lib. 5. Epistol. 7. & 8. Sic podagra quandoque curata est in Hortulano Electoris Saxonie, qui accepit caseos & butyrum, recentia nondum salita, & applicavit pedibus dolentibus, à quibus sensim levamen percepit; caseos abiecit, quos comedit canis, qui brevi post eodem laboravit. Idem LAURENTIUS præstitit sanguine egri in radicem iuglandis immisso. Sic odontalgia transplantari potest in sambucum vel corylum, nempe ramus insignis transversim discindatur, & colligatur ex eo festuca, qua fricandæ & nonnihil sedende sunt gingivæ, ut sanguis stillet; illa festuca immitti solet in locum coryli, ex quo fuit desumpta, & loco iterum ligato, ut possit concrelescere festuca cum reliquo trunco, curatur. Sic certum est de quodam, qui laboravit febre intermittente supra sex septimanas, qui accepit carnis suille libram unam, & maceravit in urina propria, aliquot horas ante paroxysmos emissa, coxit, & proiecit cani esurienti, fecit hoc iter, unde febris evanuit. Biennii spatio nova ingruit febris, quæ remedio hoc iterato iterum curata est.

Quoad *scrutinium causarum*, variant sententiæ. Quidam easdem seu veras considerant, & nunc admittunt, nunc scrutantur. Alii easdem reiiciunt, & ubi experimentis sunt convicti, ad dæmonis opem confugiunt. Alii verò, qui rationibus hæc curas volunt impugnare, ut HELMONTIUS, in hoc peccant, quod ad tribunal suæ rationis huiusmodi curas examinent, & ex preconcepta hypothesi easdem malè relinquant; multa enim latent in natura recondita, quæ non scimus, & multa,



multa, quæ scimus, sed quorum causæ latent.

Potius ergo cum sint curæ hæc confirmatæ, earum scrutinium sagacius instituendum est. Quod autem hujusmodi curationes reddantur suspectæ, est hoc, quod sint rara, & quod non semper succedant. Quoad prius, paucæ eas sciunt administrare, & à plurimis reiciuntur: quoad posterius, hujusmodi curationibus commune cum quibusdam, etiam optimis, remediis particularibus est, quæ non in omnibus succedunt, propter idiosyncrasiarum diversitatem. Ratio, quod non semper succedant, inter alias primaria est hæc, quod subinde lateant adhuc quædam circumstantiæ, vel ratione temporis, vel modî, vel aliarum circumstantiarum; modò crebrò instituerentur, ut collatis pluribus experimentis redderentur certiores, forsitan magis ceræ forent. Observetur autem, quod fundamentum curationum sympatheticarum & transplantatarum serè in eo consistat, quod omnia corporis humani excreta semper participant aliquid vitale, seu de spiritu vitali, nunc insito, nunc infuso, ratione cuius, quamdiu perstat ista spirituum vitalium portio, tamdiu habent commercium ista excrementa cum ipso corpore, unde prout citius vel tardius evanescit, aut corrumpitur iste spiritus vitalis, eò diutius & tardius solet durare iste consensus excreti cum integro corpore.

Jam verò, ut diutius conserventur istæ portiones spirituum vitalium, necesse est habeatur medium conservans, quod vocatur *Magnes*.

Magnetes hi sunt in quadruplici differentia; nempe inserviunt

I. Excreta alvi, de quorum preparatione ex P A R A

CELSEO videri potest TENZELIUS in *Medicina diastatica*.

II. Est caro humana siccata, quæ regioni cordis applicanda venit, ut acquirat vim magneticam: imprimis conveniæ caro ex corpore violenter interempto assumpta.

III. Est ipse sanguis ex homine sano desumptus, qui grumescit potest ita preparari, ut decanterur serum supernatans; grumus verd in umbra exsiccatus sero decantato humectatur tamdiu, donec serum imbibitum.


IV. Si sumatur urina, sudor, siue excreta alvi, eaque omnia preparata misceantur & usurpentur.

De his optimè scripsit SAMUEL BOULTON, Anglus natione. Hæc spiritus vitalis portio in hoc casu vocatur Mumia vitalis, siue Mumia spiritalis microcosmi.

Ista ergo Mumia est medium, mediante quo peragitur hujusmodi cura magnetica, ut quamdiu hæc mumia à toto separata conservatur in suo vigore, & alteratur eo modo, quo extra corpus alteratur, etiam totum spirituum systema in corpore alterari solet, & effectus vel ad sanitatem, vel alios, exercere solet.

Unicum subest dubium; qua ratione nempe fiat in distans actio & reactio? seu quo medio communicetur mumia vitalis extra corpus alterata cum mumia vitali in corpore residuo? quod etiam in medio relinquitur.

Tamen qui curiosi sunt, possunt videre imprimis *Theatrum Sympatheticum*. Conferatur cum his JOANNES MARCUS MARCI in *Philosophia Veterum restituta*, & MEYSONNERIUS.



FINIS TOMI SECUNDI.

















